TÓPICOS EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

VOLUME 7

Editora Poisson

Editora Poisson

Tópicos em Ciências da Saúde Volume 7

1ª Edição

Belo Horizonte
Poisson
2019

Editor Chefe: Dr. Darly Fernando Andrade

Conselho Editorial

Dr. Antônio Artur de Souza – Universidade Federal de Minas Gerais

Msc. Davilson Eduardo Andrade

Dra. Elizângela de Jesus Oliveira – Universidade Federal do Amazonas

Msc. Fabiane dos Santos

Dr. José Eduardo Ferreira Lopes – Universidade Federal de Uberlândia

Dr. Otaviano Francisco Neves – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Dr. Luiz Cláudio de Lima – Universidade FUMEC

Dr. Nelson Ferreira Filho – Faculdades Kennedy

Msc. Valdiney Alves de Oliveira – Universidade Federal de Uberlândia

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

T674

**Tópicos em Ciências da Saúde-Volume 7/
Organização Editora Poisson – Belo
Horizonte – MG: Poisson, 2019**

Formato: PDF

ISBN: 978-85-7042-147-0

DOI: 10.36229/978-85-7042-147-0

Modo de acesso: World Wide Web

Inclui bibliografia

1. Saúde 2. Medicina 3. Enfermagem

I. Título

CDD-610

O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade exclusiva dos seus respectivos autores.

www.poisson.com.br

contato@poisson.com.br

SUMÁRIO

Capítulo 1: Aprendendo a ser farmacêutico: O processo de formação profissional ... 07

Renata Pimentel da Silva, Anísio José da Silva Araujo, Simone Salviano Alves, Yana Thamires Mendes Felix

DOI: 10.36229/978-85-7042-147-0.CAP.01

Capítulo 2: Assistência domiciliar como um aprendizado mútuo para graduandos de medicina e usuários do SUS: Relato de experiência..... 14

Amanda Ferreira Vigó, Natália Tomaz Almeida, Mariana Galindo Silveira, Lucineide Alves Vieira Braga

DOI: 10.36229/978-85-7042-147-0.CAP.02

Capítulo 3: Avaliação da aprendizagem do curso qualificação do ato transfusional da escola de saúde pública do Ceará..... 18

Rosimary da Silva Barbosa, Geórgia de Mendonça Nunes Leonardo, Maria Verônica Almeida de Brito, Fernanda Brito de Castro, Tereza Rosane de Araújo Felipe Torres Lima, Patrícia Amanda Pereira Vieira

DOI: 10.36229/978-85-7042-147-0.CAP.03

Capítulo 4: Conhecimentos dos alunos da área da saúde acerca de pesquisas científicas desenvolvidas na Universidade Federal de Alagoas..... 22

Thayuanne Silva de Melo, Carmem Lúcia de Arroxelas Silva, Pedro Augusto Tibúrcio Paulino, Gabriele Fernanda da Conceição Santos, Daniel Leite Góes Gitaí

DOI: 10.36229/978-85-7042-147-0.CAP.04

Capítulo 5: Experiência multiprofissional e interdisciplinar do programa de extensão pró-Parkinson da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE..... 29

Patrícia Fernanda Faccio, Eduardo Borges da Costa Leite, Danielle Carneiro de Menezes Sanguinetti, Nadja Maria Jorge Asano, Maria das Graças Wanderley de Sales Coriolano, Carla Cabral dos Santos Accioly Lins

DOI: 10.36229/978-85-7042-147-0.CAP.05

Capítulo 6 Revisão na Síndrome de Parkinson: Freezing da marcha 34

Eloisa Araújo Souza, Ketlin Lorraine Barbora Silva, Maristela Lúcia Soares Campos, Rannielly Rodrigues da Silva Santos, Juliana Alves Ferreira, Daisy de Araújo Vilela

DOI: 10.36229/978-85-7042-147-0.CAP.06

Capítulo 7: Aplicação de protocolo cinesioterapêutico com uso lúdico de materiais recicláveis no setor de Hemodiálise. 38

Erica Laiza Alves de Souza, Hellen Karoline Martins de Lima, Lizandra Mayrane Leite Melo, Pammala Mirelly Soares Vasconcelos, Thassiany Sarmiento Oliveira de Almeida

DOI: 10.36229/978-85-7042-147-0.CAP.07

SUMÁRIO

Capítulo 8: Assistência do serviço de controle de hipertensão e diabetes aos indivíduos acometidos por insuficiência renal crônica..... 44

Dieslley Amorim de Souza, Eduardo Nagib Boery, Ícaro José Santos Ribeiro, Carine de Jesus Soares

DOI: 10.36229/978-85-7042-147-0.CAP.08

Capítulo 9: Ocorrência das principais doenças crônicas em pessoas com deficiência visual no Instituto de Cegos do Nordeste em Campina Grande - PB 51

Messias Gomes Alves, Mariana Moraes Dantas, Maria de Fátima Ferreira Nóbrega, Lindomar de Farias Belém

DOI: 10.36229/978-85-7042-147-0.CAP.09

Capítulo 10: Artéria braquial em humanos e suas formas variantes 58

Vanessa Apolonio Targino, Ana Beatriz Marques Barbosa, Camila Freitas Costa, Nathalie de Almeida Silva, Pablo Giovanni Franklin Cruz, Thiago de Oliveira Assis

DOI: 10.36229/978-85-7042-147-0.CAP.10

Capítulo 11: Práticas preventivas e o enfrentamento ao HPV em mulheres no contexto rural 65

Elis Amanda Atanázio Silva, Clodoval Bento de Albuquerque Segundo, Pollyana Ludmilla Batista Pimentel, Lidianny Braga de Souza, Iria Raquel Borges Wiese, Ana Alayde Werba Saldanha

DOI: 10.36229/978-85-7042-147-0.CAP.11

Capítulo 12: A juvenilização do HIV/AIDS: Um desafio na contemporaneidade 70

Camila Rachel Lira Silva, Eliz Rejane Vicente da Silva, Maria do Socorro Pontes de Souza

DOI: 10.36229/978-85-7042-147-0.CAP.12

Capítulo 13: Vulnerabilidade programática em saúde em cidades rurais Paraibanas segundo os níveis de atenção 76

Eunice Aristides Araújo, Francisca Marina de Souza Freire Furtado, Ana Alayde Werba Saldanha

DOI: 10.36229/978-85-7042-147-0.CAP.13

Capítulo 14: Modelo de acompanhamento e reintegração do trabalhador afastado – Como o processo de reintegração pode auxiliar na longevidade da vida laboral..... 84

Eliane Aparecida Floriano, Noélly Cristina Harrison Mercer, Yanas Aparecida Zorzi, Wellen Franco Dias, Rodrigo Meister de Almeida

DOI: 10.36229/978-85-7042-147-0.CAP.14

SUMÁRIO

Capítulo 15: Terapias de estética em spas voltados ao bem-estar para a terceira idade	87
--	----

Débora Teixeira da Cruz, Patrícia Gonçalves da Silva Barcelos, Marcielli Marques Sangalli Vecchi

DOI: 10.36229/978-85-7042-147-0.CAP.15

Capítulo 16: Suicide in the elderly: A systematic review	92
---	----

André Garcia Ambrosi, Antônio Gabriel Araújo Pimentel de Medeiros, Mariana Ferreira Silveira de Queiroga, Stela Ferreira Gadelha Mendes, José Antônio Spencer Hartmann Júnior

DOI: 10.36229/978-85-7042-147-0.CAP.16

Capítulo 17: Síndrome de Burnout: Esgotamento profissional em professores universitários.....	99
--	----

Tatiane Isabela de Araújo Leite, Eudes Euler de Souza Lucena, Dulcian Medeiros de Azevedo, Ana Aline Matos de Medeiros, Thiago Santos de Araújo, Thiêgo Santos de Araújo

DOI: 10.36229/978-85-7042-147-0.CAP.17

Capítulo 18: O contato entre gerações e a subjetividade.....	107
---	-----

Maria Laura Medeiros Bleinroth, Edja Mayra Ferreira de Castro, Maysa Lanne Vieira Damasceno, Myrna Lins Tenório, Cristina Camelo de Azevedo

DOI: 10.36229/978-85-7042-147-0.CAP.18

Capítulo 19: Condições de trabalho e saúde de psicólogos hospitalares.....	113
---	-----

Simone Salviano Alves, Renata Pimentel da Silva, Yana Thamires Mendes Felix, Anísio José da Silva Araújo

DOI: 10.36229/978-85-7042-147-0.CAP.19

Capítulo 20: A intervenção psicológica no programa do planejamento familiar em Cabedelo/PB	119
---	-----

Lúcia Robertta Matos Silva dos Santos, Francisca Marina de Souza Freire Furtado, Degmar Francisco dos Anjos, Rogério dos Santos Gesteira

DOI: 10.36229/978-85-7042-147-0.CAP.20

Autores:	124
-----------------------	-----

Capítulo 1

Aprendendo a ser farmacêutico: O processo de formação profissional

Renata Pimentel da Silva

Anísio José da Silva Araujo

Simone Salviano Alves

Yana Thamires Mendes Felix

Resumo: Esta pesquisa objetivou identificar como se deu a formação profissional dos farmacêuticos em relação à formação universitária, bem como em relação à formação prática, isto é, que acontece fora dos muros da academia. Para alcançar tal objetivo utilizou-se para coleta de dados o Inquérito em Saúde e Trabalho em Serviços – INSATS e uma entrevista individual semiestruturada. Participaram da pesquisa 48 farmacêuticos de redes de farmácias situadas na cidade de Campina Grande – Paraíba. Os dados obtidos no INSATS foram armazenados no programa SSPSS, onde se utilizou estatísticas descritivas, enquanto os dados oriundos das entrevistas foram submetidos à análise de conteúdo temática. Os resultados apontaram a percepção dos farmacêuticos de uma formação profissional insuficiente, isto é, uma formação que não atende as necessidades sentidas na prática. Os aspectos apontados como prejudiciais à formação foram a defasagem curricular e atitudes negligentes por parte dos professores. A aprendizagem, segundo os participantes, ocorre diretamente no mercado de trabalho, em especial com os demais profissionais.

Palavras-Chave: Formação profissional, farmacêuticos, mercado de trabalho

1. INTRODUÇÃO

Embora a profissão farmacêutica tenha vivido uma evolução histórica inegável, garantindo a possibilidade de uma retomada do papel do farmacêutico frente ao cuidado com a saúde dos usuários e uma melhor definição do seu papel dentro do estabelecimento farmacêutico, a situação vivenciada pelos profissionais não pode ser considerada ideal ou satisfatória. O farmacêutico se vê, por um lado, sendo cobrado para assumir as práticas de atenção à saúde, propostas pelo novo enfoque da profissão, e por outro, absorvido por situações que descaracterizam seu trabalho.

A OPAS (2002) aponta aspectos do contexto da prática farmacêutica no Brasil que retratam claramente a realidade da profissão. Inicialmente é apresentada a crise de identidade profissional do farmacêutico, aliada à sua pouca inserção na equipe multiprofissional de saúde, e consequente falta de reconhecimento social. A proposta da OPAS (2002) destaca ainda que a prática profissional está desconectada das políticas de saúde e de medicamentos, priorizando as atividades de cunho administrativo em detrimento das atividades de educação em saúde e de orientação sobre o uso de medicamentos. A inequidade no acesso aos medicamentos e a falta de integração e unidade entre as entidades representativas da categoria farmacêutica também constituem características que dificultam a prática destes profissionais, assim como a formação profissional recebida pelos farmacêuticos nas instituições de ensino.

A formação universitária dos farmacêuticos constitui uma realidade preocupante. O que se percebe é uma formação excessivamente tecnicista, com uma formação clínica ainda elementar, além de um distanciamento entre a teoria estudada e as exigências práticas demandadas pelas farmácias e pelos serviços de atenção à saúde (Bastos, 2007; OPAS, 2002). Corroborando tal apontamento, Leite e colaboradores (2008) alegam que a educação farmacêutica é desenvolvida de forma desarticulada da realidade social, não estando comprometida com a resolução dos problemas de saúde, mas sim com a produção de medicamentos, técnicas e exames, além de possibilitar pouca interação academia-serviços, onde se percebe escassez de atividades multidisciplinares. Em pesquisa realizada com coordenadores de cursos de Farmácia sobre a interdisciplinaridade na formação de farmacêuticos, Sousa e Bastos (2016) apontaram

Esta pesquisa objetivou identificar como se deu a formação profissional dos farmacêuticos em relação à formação universitária, bem como em relação à formação prática.

2. MÉTODO

2.1. PARTICIPANTES

O grupo base da pesquisa foi formado por 48 farmacêuticos atuantes em farmácias e drogarias de uma cidade do nordeste brasileiro, vinculadas a diversas redes de farmácias. Do total de participantes, 46 responderam ao Inquérito Saúde e Trabalho em Serviço (INSATS) e 15 participaram de entrevistas individuais semiestruturadas.

3. INSTRUMENTOS

Os participantes responderam a uma entrevista individual semi-estruturada. A entrevista constitui uma das possibilidades de, ao fazer emergir a palavra do indivíduo, favorecer a apropriação do vivido do trabalho. Os participantes responderam também ao Inquérito Saúde e Trabalho em Serviços – INSATS, versão adaptada do Inquérito Saúde e Trabalho – INSAT, proposto por Barros-Duarte, Cunha e Lamcomblez (2007). Enquanto proposta metodológica, o INSAT tem como objetivo “estudar as consequências do trabalho e das condições de trabalho, atuais e passadas, ao nível de saúde e bem-estar” (Barros-Duarte, Cunha & Lacomblez, 2007, p. 57).

4. ANÁLISE DOS DADOS

Para analisar os dados oriundos das entrevistas recorreu-se à análise temática de conteúdo proposta por Minayo (2012). Os dados do INSATS foram armazenados na forma de banco de dados no programa SPSS (*Statistical Package for Social Science for Windows*), onde foram realizadas análises estatísticas descritivas (média, desvio padrão, frequência).

5.RESULTADOS E DISCUSSÕES

5.1.PERFIL DOS PARTICIPANTES

A amostra é predominantemente feminina (68,8%), com idades variando entre 23 e 50 anos ($M=34,1$; $DP=7,9$), sendo a faixa etária prevalente a dos 29 aos 35 anos. Deve-se destacar que se constitui claramente como uma amostra jovem, onde 66,7% dos participantes estão abaixo de 35 anos. No que se refere ao estado civil, pouco mais da metade da amostra (52,1%) é casada ou mora com companheiro. Quando questionados se possuem filhos, 52,1% afirmaram positivamente, dos quais 48% possuem dois filhos.

Tabela 1: Caracterização da amostra quanto ao sexo, idade e estado civil

SEXO	IDADE ($M=34,5$; $DP=8,7$)	ESTADO CIVIL
Feminino (68,8%)	22 - 28 (18,8%)	Casado (a), mora com companheiro (a) (52,1%)
	29 - 35 (47,9%)	
	36 - 42 (12,5%)	Solteiro (37,5%)
	43 - 49 (12,5%)	
Masculino (31,3%)	50 - 56 (6,3%)	Separado (a), divorciado (a), desquitado (a), viúvo (a) (10,4%)
	Não informado (2,2%)	

6.A FORMAÇÃO PROFISSIONAL NA UNIVERSIDADE E NA PRÁTICA

Buscou-se identificar como se deu a formação profissional dos farmacêuticos participantes do estudo, tanto em relação à formação universitária quanto em relação à formação que acontece fora dos muros da academia, ou seja, na(s) empresa(s), por meio de cursos realizados, estágios, etc. No que se refere a formação recebida na universidade, 60,9% dos profissionais que responderam ao INSATS afirmaram que o que aprenderam a universidade atende “mais ou menos” as necessidades da atividade prática, acompanhados de 23,9% que afirmaram atender pouco as necessidades sentidas na prática:

Figura 1: Relação entre os conhecimentos adquiridos na universidade e as necessidades sentidas no trabalho

Nas entrevistas, os profissionais corroboraram tais dados, ao caracterizarem a formação acadêmica com adjetivos do tipo: muito deficiente, insuficiente, fria, ausente, precária e arcaica.

As justificativas apontadas para os problemas na formação foram: o direcionamento para determinadas áreas; a falta de aulas práticas, por um lado, e excesso de teoria, por outro; afastamento dos professores para pós-graduação, sem reposição das aulas perdidas e preponderância da formação para a área acadêmica.

Nunca é suficiente. Porque no campo de trabalho a gente se depara com outras situações que não tem na universidade. Mesmo assim, ficou muito a desejar. Por greves, e assim, professores que saiam pro doutorado deixavam a gente abandonados, depois não tinha tempo pra repor. (E08)

Pesquisa realizada por Bastos (2007) com farmacêuticos atuantes na cidade do Rio de Janeiro chegou a constatações semelhantes às de nosso estudo, ou seja, o distanciamento existente entre o que é ensinado na universidade e a realidade encontrada no cotidiano das farmácias. Esse descompasso entre a formação recebida e a realidade encontrada nas farmácias comerciais só é possível de reduzir com a experiência adquirida ao longo do tempo.

No começo eu me desesperava. É muito difícil você decorar, na universidade a gente aprende princípio ativo, e na drogaria ela trabalha com marca, praticamente marca. E é uma infinidade de marcas. E até mesmo saber pra que serve cada substância [...] A prática, o dia a dia é a melhor escola. (E06)

A realidade da formação nos cursos de Farmácia apresentada pelos entrevistados corresponde ao panorama exposto pela OPAS (2002) no Consenso Brasileiro de Atenção Farmacêutica, que afirma que a formação é deficiente, excessivamente tecnicista e com pouca ênfase na área clínica. Também é apontada a divergência encontrada entre a formação e as demandas dos serviços de saúde. Leite *et al* (2008) apresentam as discussões realizadas no I Fórum Nacional de Educação Farmacêutica, onde os debates reafirmaram a desarticulação entre a teoria e a realidade social vivenciada no país, a ênfase dispensada à produção de medicamentos, às técnicas e a realização de exames, além de pouca interação entre a academia e os serviços. Diante desta realidade, durante o encontro foi levantada a proposta de uma melhor avaliação dos cursos, em busca de promover o atendimento das necessidades do sistema de saúde.

Segundo Lorandi (2006) faz-se necessário um novo perfil de profissional que esteja preparado para o atendimento de necessidades sociais. O farmacêutico deve estar inserido nas discussões acerca das políticas de saúde e dos medicamentos. Desta forma, o novo perfil de atuação coloca o farmacêutico na equipe multidisciplinar e na busca do uso racional de medicamentos. Uma proposta para alcançar essa atuação multidisciplinar, bem como a maturidade pessoal e a identidade profissional, de acordo com Gondim (2002), é a implantação de uma formação generalista e a ampliação das atividades práticas nas graduações. Desta forma, o profissional estaria mais preparado para os imprevistos inerentes às situações de trabalho.

7.A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO

Arguir os participantes sobre seu percurso profissional permitiu perceber os modos de inserção dos mesmos no ramo da farmácia comercial. Duas profissionais relataram que, após o término da graduação, enfrentaram, como principal dificuldade, a rejeição dos donos de farmácia quanto a sua presença no estabelecimento:

[...] foi como eu fui recebida. “Eu vim acertar, trouxe minha carteira, mas quanto é mesmo o salário?” “Não, na carteira é isso aqui, mas vou lhe pagar R\$200,00, mas não precisa você vir não”. Aquilo me matou. A realidade do farmacêutico comercial era essa. O dono de farmácia não queria nem que a gente viesse na farmácia [...]. (E12)

Naquela época, o farmacêutico em si não era cobrado na farmácia. Eram poucos os farmacêuticos que queriam trabalhar. Os patrões faziam de tudo pra não ter farmacêutico na Farmácia, porque isso aí era um obstáculo pra eles. Então no início, eu me lembro, da minha turma, a única que ficou desempregada foi eu. Porque não queria assinar, queria trabalhar. Então todo mundo já estava empregado. Mas só encontrava pra assinar. Então ainda fiquei quase um ano sem farmácia, aí tive que entrar, porque só encontrava pra assinar (E10).

Essa realidade é uma marca na história da profissão farmacêutica e resulta da crise que se seguiu ao crescimento das indústrias farmacêuticas. Embora a responsabilidade técnica do farmacêutico já

constituísse uma exigência legal, não era devidamente respeitada, pois se contratavam farmacêuticos apenas para “assinar a farmácia”, ou seja, para atestar que existia um farmacêutico, embora ele não atuasse enquanto tal (Angonesi & Sevalho, 2010). Segundo Farina e Romano-Lieber (2009) essa situação vem se transformando, sendo nítidas as melhorias alcançadas ao longo dos anos. Os próprios participantes perceberam essa melhoria na profissão:

[É mais valorizada?] A exigência do farmacêutico na farmácia mesmo. Coisa que sempre teve mais não era cumprida. E também de ter mais profissionais nas farmácias, que antes era só um, hoje não, são dois, são três farmacêuticos no estabelecimento farmacêutico [...] Então cumpre à risca o que manda a lei. [...] Isso motivou muito, e fez com que agente farmacêutico, ele tivesse um melhor desempenho, melhor, assim, valorização do trabalho (E11). 101

Os profissionais formados mais recentemente também percebem esse avanço, que se manifesta na criação de programas de estágio em algumas redes de farmácia, abrindo-se, desse modo, a possibilidade de contratação de farmacêuticos como funcionários efetivos após o período de estágio. A entrevistada 06 relatou que iniciou seu trabalho *“como estagiaria no último ano, e assim que conclui fui contratada. Trabalho aqui já fazem sete anos”* (E06). Essa situação também retrata a estabilidade que algumas redes proporcionam aos seus trabalhadores, como no caso acima em que a profissional já está há sete anos na mesma empresa e também em outro exemplo que a farmacêutica está há onze anos em outra rede.

8. APRENDENDO A SER FARMACÊUTICO

O aprendizado da atividade do farmacêutico, segundo 91,3% dos respondentes do INSATS, se deu diretamente no local de trabalho, através de treinamentos oferecidos pela instituição empregadora (47,8%), observando colegas (80,4%), por orientação de colegas (71,7%) ou sozinhos (78,3%).

Nas entrevistas podem-se confirmar tais dados, ou seja, a maioria dos participantes explicitou que o aprendizado profissional se deu por diversas vias:

No dia a dia mesmo, observando as pessoas mais experientes, outros farmacêuticos. Meu treinamento foi na empresa A, foi antes de me formar mesmo, como estudante, mas assim já adiantou muito. Meu estágio era tipo uma Atenção Farmacêutica, que eu tinha o contato com os clientes, tinha controle quando estava terminando a medicação, medicação de uso contínuo. Eu aprendi muito porque ficava no balcão, auxiliando os outros balconistas, farmacêutico (E08). 102

Esse caso ratifica a importância da prática profissional para o estudante que, desse modo, já vai adquirindo as competências necessárias ainda no processo de formação acadêmica, o que permite que chegue ao mercado em melhores condições. Como afirma Carrillo (2000), ao referir-se ao ensino farmacêutico, faz-se necessário que, o mais cedo possível, o aluno entre em contato com a realidade de trabalho de maneira que, através do confronto entre a teoria e a prática, lhe seja possível refletir sobre seu papel enquanto profissional da saúde. O estágio curricular pode permitir que os alunos se habituem e compreendam melhor os problemas e perspectivas do futuro profissional. Desta forma, é necessário uma diversificação dos locais de ensino-aprendizado, treinamento em serviços no início dos cursos e a experiência em equipe multiprofissional (OMS, 1993).

No que se refere a realização de estágio, dos 15 farmacêuticos entrevistados, sete fizeram menção a estágios, que foram realizados nas áreas de farmácia comercial, análises clínicas, bioquímica, farmácia hospitalar, no Centro de Atenção psicossocial CAPS, no serviço municipal e na atenção primária, através da farmácia-escola. No I Fórum Nacional de Educação Farmacêutica, ocorrido em 2007, foram apontadas como propostas que deveriam pautar a educação farmacêutica, a obrigatoriedade de estágios como disciplinas obrigatórias na graduação, indo além do estágio de final de curso e a inserção dos estudantes nos sistemas de saúde (Leite *et al*, 2008), evidenciando assim que o contato do estudante com a prática farmacêutica está cada vez mais em foco nas discussões acerca da formação profissional da categoria.

É relevante frisar que alguns profissionais afirmaram que para aprender seu trabalho contaram com a orientação dos balconistas das farmácias, de maneira que esses profissionais assumem um papel importante na adaptação do farmacêutico à rotina do estabelecimento:

Foi aprendendo assim, com o mais antigo, até com balconista. Antigamente o balconista era o top de linha mesmo, hoje é que tá mais... mas na minha época era assim. E tinha uns balconistas que me ensinavam, negócio de troca de medicamentos, substituir medicamentos, porque a gente entra só com aquele, [...] (E15).

Como se sabe, o balconista numa farmácia tem um contato direto com o público e acaba por desenvolver habilidades e adquirir conhecimentos capazes de auxiliar o farmacêutico em sua inserção na farmácia. O entrevistado 01, ao destacar a importância da prática e do contato com o cliente defende que *“aprender realmente só na prática. Só você indo pro balcão, atendendo cliente, tirando suas dúvidas, que você vai aprendendo”* (E01).

Embora o auxílio do balconista e o contato com o cliente contribuam para o aprendizado, o entrevistado E13 esclarece que o ensino das atividades técnicas é prerrogativa do farmacêutico mais experiente: *“Estamos treinando dois farmacêuticos, dois novatos que estão aí no balcão, e eles estão sendo treinados por balconistas. Assim, a parte técnica é com a gente [os farmacêuticos], a área de vendas é mais voltada para o balconista.”* (E13)

De acordo com um dos entrevistados, para aprender seu trabalho, o farmacêutico também tem que adotar uma postura ativa de busca do conhecimento e de superação das limitações de sua formação, conforme pode ser observado na fala da entrevistada 02: *“Então o que aprendi foi buscando, correndo atrás, estudando, investigando na internet, na legislação, essas coisas. Foi mais sozinha, porque a empresa trabalha mais com essa parte de reciclagem, eu já tenho que entrar sabendo”*.

Por fim, também foi apontado que a prática, o dia a dia de trabalho, possibilita o aprendizado das atividades de responsabilidade do farmacêutico: *“Aprendeu na prática, dando à cara a tapa. Aprendendo no dia a dia [...]. Treinamento, assim, poucos dias com o farmacêutico que já tinha antes. [...] no conteúdo do farmacêutico, só no dia a dia mesmo”* (E03).

Esses dados corroboram a ideia de que para aprender não basta apenas aprender o conhecimento, mas também aprender a fazer, de modo a garantir uma ação sobre meio. A formação deve gerar conhecimentos, habilidades e atitudes para subsidiar uma atuação com competência (Silva, Miguel & Teixeira, 2011).

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados da presente pesquisa reforçam uma realidade onde a formação teórica recebida nas universidades não consegue suprir as necessidades surgidas na prática profissional. Os profissionais apontaram que a formação predominante tecnicista prejudica a formação dos profissionais para as novas demandas do mercado, demonstrando uma clara defasagem curricular. Para suprir essas lacunas os profissionais contam com a aprendizagem prática, aquela que fora da universidade e se estende no próprio mercado de trabalho.

Os estágios são apontados como oportunidades de aprendizagem, bem como de entrada no mercado de trabalho. De fato, os profissionais apontam que é no mercado de trabalho que os mesmos conseguem aprender e desenvolver suas habilidades técnicas. Esse processo de aprendizagem ocorre junto a outros farmacêuticos, assim como os próprios balconistas; ambas as categorias possuem conhecimento prático e auxiliam a entrada dos novos profissionais.

Esses aspectos reforçam as dificuldades encontradas durante o processo de formação, uma vez que este se encontra em flagrante descompasso com a realidade de trabalho, restando aos profissionais aprender no dia a dia, observando ou sob orientação de colegas de trabalho. Os elementos que conseguimos apreender das entrevistas com os farmacêuticos corroboram evidências da necessidade de melhorias na formação, equilibrando teoria e prática, de modo que os profissionais possam exercer plenamente a profissão (Silva e Vieira, 2004).

REFERÊNCIAS

- [1] Angonesi, D.; Sevalho, G. Atenção Farmacêutica: fundamentação conceitual e crítica para um modelo brasileiro. *Ciência & saúde coletiva*, v. 15, n. 3, 3603-3614, 2010.
- [2] Bastos, C. R. G. Tem farmacêutico na farmácia: as percepções dos farmacêuticos sobre seu trabalho nas farmácias comunitárias do estado do Rio de Janeiro. (Dissertação de Mestrado). Instituto de Medicina Social, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2007.
- [3] Carrillo, G. G. G. Ensino farmacêutico e a necessidade de mudanças na concepção de estágio na carreira do farmacêutico-bioquímico. *Revista Educação Pública*, v. 9, n. 16, 25-41, 2000.
- [4] Farina, S.S.; Romano-Lieber, N. S. Atenção farmacêutica em farmácias e drogarias: existe um processo de mudança? *Saúde e Sociedade*, v. 18, n. 1, 7-18, 2009.
- [5] Gondim, S. M. G. Perfil profissional e mercado de trabalho: relação com a formação acadêmica pela perspectiva de estudantes universitários. *Estudos de psicologia*, v. 7, n. 2, 299-309, 2002.
- [6] Leite, S. N. et al. I Fórum Nacional de Educação Farmacêutica: o farmacêutico que o Brasil necessita. *Interface-Comunicação, Saúde, Educação*, v.12, n. 25, 461-462, 2008.
- [7] Lorandi, P. A. Análise histórica da formação acadêmica do farmacêutico – Quatro décadas. *Infarma*, v. 18, n. 7/8, 7-12, 2006.
- [8] Minayo, M. C. S. Análise qualitativa: teoria, passos e fidedignidade. *Ciência & saúde coletiva*, n. 17, v. 3, p. 621-626, 2012.
- [9] Organização Mundial Da Saúde – OMS. Papel do farmacêutico: Assistência Farmacêutica de qualidade – benefícios para os governos e a população. Relatório da Reunião da OMS: Tóquio, Japão, 1993.
- [10] Organização Pan-Americana De Saúde - Opas. Consenso Brasileiro de Atenção Farmacêutica: Proposta. Brasília: Opas, 2002.
- [11] Aguilar-Da-Silva, R. H., Miguel, S. S.; Teixeira L. S. Problematização como método ativo de ensino-aprendizagem: estudantes de farmácia em cenários de prática. *Rev Trab Educ Saúde*, v. 9, n. 1, 77 – 93, 2011.
- [12] Silva, L. R.; Vieira, E. M. Conhecimento dos farmacêuticos sobre legislação sanitária e regulamentação da profissão. *Revista de Saúde Pública*, n. 38, v. 3, 429-37, 2004.

Capítulo 2

Assistência domiciliar como um aprendizado mútuo para graduandos de medicina e usuários do SUS: Relato de experiência

Amanda Ferreira Vigó

Natália Tomaz Almeida

Mariana Galindo Silveira

Lucineide Alves Vieira Braga

Resumo: Trata-se de um relato de experiência que se deu no município de João Pessoa, mais especificamente na Unidade de Saúde da Família Mandacaru VIII. O incentivo para o aprofundamento acerca desse tema surgiu durante as práticas do Módulo de Atenção em Saúde (AS), cujo foco era o acompanhamento da rotina de determinadas famílias assistidas pela Unidades de Saúde da Família Mandacaru VIII no Município de João Pessoa-PB. Após um semestre de estudos dedicados a assuntos que focavam às diversas formas de contribuição do aluno de medicina para/com a sociedade dependente do SUS foi possível concluir os benefícios existente na visita domiciliar.

1. INTRODUÇÃO

Em 1988 foi instituído o Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil, ao qual atividades são atribuídas. Tarefas estas de analisar, identificar e propagar fatores condicionantes e determinantes da saúde; promover serviços e ações por meio da formulação de políticas de saúde; e garantir assistência à população através de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde (BRASIL, 2000).

As práticas da Estratégia de Saúde da Família (ESF), visam ter como foco do trabalho a família em si, assim como conter ações de caráter preventivo sobre a demanda (GIACOMOZZI, 2006). Para o autor supracitado a ESF prevê ainda a utilização da assistência domiciliar à saúde, com ênfase na visita domiciliar, como maneira de instrumentalizar os profissionais para sua inserção e o conhecimento da realidade de vida da população, além do estabelecimento de vínculos com a mesma, e de buscar atender as diferentes necessidades de saúde das pessoas.

A visita domiciliar, instrumento contido na ESF, dá prioridade ao diagnóstico da realidade do usuário e as ações educativas. Ela constitui-se de uma estratégia importantíssima na contribuição da saúde da família e na continuidade de qualquer forma de assistência e/ou atenção domiciliar à saúde, sendo esquematizada com o intuito de subsidiar intervenções ou o planejamento de ações (TAKAHASHI, 2001).

Desta forma, na sociedade atual, a assistência prestada por meio da visita domiciliar constitui um instrumento de atenção à saúde que permite - a partir do conhecimento da realidade do indivíduo e sua família in loco - fortalecer os vínculos do paciente, da terapêutica e do profissional, assim como atuar na promoção de saúde, prevenção, tratamento e reabilitação de doenças e agravos. Decorre daí a demanda de sua prática nos processos de formação de graduandos da área de saúde, a exemplo da medicina.

Tendo em vista os aspectos trazidos sobre a visita domiciliar como uma possibilidade para incremento na construção do saber do graduando e no processo de promoção e suporte à saúde dos usuários, este trabalho tem como objetivo relatar a vivência de acadêmicos de Medicina realizando assistência domiciliar durante os estágios curriculares na Unidade de Saúde vinculados a formação acadêmica da Faculdade Ciências Médicas da Paraíba.

O incentivo para o aprofundamento acerca desse tema surgiu durante as práticas do Módulo de Atenção em Saúde (AS), cujo foco era o acompanhamento da rotina de determinadas famílias assistidas pela Unidades de Saúde da Família Mandacaru VIII no Município de João Pessoa-PB. Após um semestre de estudos dedicados a assuntos que focavam às diversas formas de contribuição do aluno de medicina para/com a sociedade dependente do SUS foi possível concluir os benefícios existente na visita domiciliar.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um relato de experiência que se deu no município de João Pessoa, mais especificamente na Unidade de Saúde da Família Mandacaru VIII. Este cenário está vinculado ao Módulo de Atenção à Saúde II (AS II) do segundo período da graduação em Medicina, que possui como um dos objetivos específicos: Vivenciar o papel e a atribuição dos profissionais da Estratégia de Saúde da Família.

A vivência foi realizada por meio de visitas à USF e à casa de uma usuária que foi indicada pela própria Unidade durante o segundo semestre letivo do ano 2014. Apesar de observar e participar de diversas atividades durante o estágio, neste relato será dada maior ênfase à experiência do acompanhamento de uma usuária.

A estrutura curricular da instituição em questão é modular, e tal módulo possibilita uma maior reflexão sobre as vivências práticas dos alunos. Durante as aulas/visitas foram feitas anotações, como um diário, em que eram relatados os acontecimentos e fatos do dia e depois eram feitos aprofundamentos sobre algum tema que estivesse envolvido e uma reflexão acerca do aprendizado do dia.

Este trabalho então relata a experiência de três alunas acerca de tudo o que foi vivenciado neste módulo e o valor do que foi visto nas suas formações acadêmicas, dando ênfase na importância da assistência domiciliar.

3.RELATO DE EXPERIÊNCIA (RESULTADOS E DISCUSSÃO)

Durante a experiência prática na USF, visitamos a casa da usuária M.S.C., sexo feminino, 67 anos, que encontra-se acamada há 15 anos. Fomos recebidos pela sua filha mais nova, que mora com a mãe e é a responsável pelos seus cuidados. A casa em si era pequena, sem janelas, sem ventilação e pouco iluminada, só entrando luz solar por meio da porta da frente e dos fundos, a qual dava para um pequeno quintal. Importante destacar que a usuária não tinha quarto próprio e sua cama era no canto da sala, sem nenhuma ventilação.

Na primeira visita fomos informadas que a usuária sofreu um AVC há 15 anos e ficou com algumas sequelas, como paralisia do lado esquerdo do corpo, o que justifica em parte o seu estado atual. Além disso, sua filha relatou que desde então ela não costuma falar com frequência, tendo a mesma não trocado nenhuma palavra conosco nesta primeira visita. A filha relatou problemas para realizar a higiene da mãe por ela permanecer sempre deitada, não querendo ficar sentada nem para banho.

Na pequena casa, além das duas moradoras citadas, encontramos 8 gatos, 3 galinhas e 1 cachorro, os quais passavam a maior parte do tempo dentro da casa, inclusive em cima da cama da idosa enquanto a mesma também estava deitada. Para agravar a situação, o cachorro e os gatos saíam e voltavam quando queriam, andando pelas ruas e lixos e depois entrando em contato com a acamada.

Na segunda visita, conseguimos conversar um pouco com ela, percebemos que apesar da idade e da situação em que se encontrava, ela tinha a função cognitiva totalmente preservada. Com a ajuda da filha, ela relatou que os problemas começaram a surgir quando o marido se tornou alcoólico, trazendo muitos transtornos para vida do casal e fazendo com que ela fosse ficando cada vez mais reprimida, o que sua filha nos confidenciou que foi diagnosticado como depressão há alguns anos pela médica da unidade na época. Logo depois ela sofreu o AVC, o que piorou seu estado e corroborou para seu estado atual de acamada.

Nesta mesma visita, sua filha nos informou sobre os remédios que M.S.C. utilizava para diabetes e hipertensão, onde pudemos ver que eram cometidos alguns erros de administração. O de hipertensão por exemplo, deveria ser tomado meio comprimido por dia, mas como sua filha não conseguia partir direito, resolveu passar a dar a mãe um comprimido dia sim e um da não, acreditando que teria o mesmo efeito. Nós então corrigimos esse erro e explicamos a importância da medicação ser administrada na forma e dosagem correta, seguindo prescrição médica.

Na terceira visita, a usuária aparentou-se feliz quando nos viu, se apresentando muito mais falante. Resolvemos então verificar a pressão e o nível de glicose para confirmar que estava tudo bem e encontramos os valores dentro da normalidade. Nesta visita, como ela estava mais acessível aproveitamos para conversar mais, sabendo da sua vida e fazendo com que ela exercitasse a memória.

Na quarta e última visita, fomos recebidas pela outra filha de M.S.C, pois a mais nova não se encontrava. Ela informou que M.S.C. estava bem, “do mesmo jeito de sempre”, perguntamos se ela tinha regulado a dosagem do remédio que não estava correta, mas a irmã informou que não sabia dos remédios da mãe, só quem sabia era sua irmã.

Como última atividade, elaboramos um plano de cuidado para M.S.C, frisando a importância da melhoria das condições de vida em que ela se encontrava e em uma maneira de tratar a sua solidão, enfatizando que ela deveria passar a maior parte do tempo acompanhada, e que não deveria ficar com os animais no quarto e, principalmente, em cima de sua cama. Além disso, falamos da importância de uma casa com melhores condições de higiene, iluminação e ventilação, além de que quem ficasse responsável por seu cuidado, no caso sua filha mais nova, deveria ser melhor instruída sobre os cuidados para com a mesma e sobre as medicações e suas formas de administração e posologia.

Como visto, o plano de cuidado é pautado na vivência do paciente, examinando os problemas enfrentados pelo mesmo, suas necessidades básicas e o grau de dependência do indivíduo, da família e da comunidade. Ele cria estratégias sob a forma de ações e cuidados, por meio das intervenções adequadas, buscando a qualidade de vida do usuário (SILVA et al., 2009).

Entregamos o plano a filha de M.S.C, que ficou de explicar a sua irmã mais nova, que é a responsável pelos cuidados da mãe. Agradecemos então pelo tempo que nos foi disponibilizado e nos despedimos encerrando assim nossa atividade de assistência domiciliar.

4.CONCLUSÃO

Conclui-se a importância da assistência domiciliar na vida dos usuários, pois possibilita o conhecimento da realidade de vida da população, a formação de vínculo, uma maior compreensão das relações existentes neste contexto, preocupando-se com a infraestrutura das comunidades, e assim facilitando a consulta, visando atender a necessidade de saúde dessas pessoas a partir do seu contexto e realidade.

Ao lançar um olhar retrospectivo sobre esta experiência, percebemos que a usuária não tinha condições de comparecer a ESF, pelo seu estado acamado, e foi notório a necessidade da visita, para ouvi-la e agir do modo necessário para atendê-la, buscando melhorar sua qualidade de vida. Dessa forma, percebemos a necessidade da assistência domiciliar, pois são frequentes os casos de impossibilidade de locomoção. Ressalta-se que a assistência domiciliar vai muito além de um atendimento focado na doença do paciente, mas uma atenção diferenciada que possibilita a formação de vínculo com o paciente e um olhar integral sobre ele, portanto, não deve ser direcionado só a pessoas restritas ao leito, como no caso relatado, mas sim a todos usuários, para assim formar um atendimento mais humanizado e uma boa relação médico paciente.

REFERÊNCIAS

- [1] Brasil, Ministério da Saúde (BR). O SUS é legal. Rio Grande do Sul (RS): O Ministério; 2000.
- [2] Giacomozzi, C.M; Lacerda, M.R. A prática da assistência domiciliar dos profissionais da estratégia de saúde da família. Texto Contexto Enferm, Florianópolis, 2006 Out-Dez; 15(4): 645-53.
- [3] Silva, I. et al. Cuidado, autocuidado e cuidado de si: uma compreensão paradigmática para o cuidado de enfermagem. Revista da Escola de Enfermagem. São Paulo, 2009, 43(3): 697- 703.
- [4] Takahashi, R.F; Oliveira, M.A.C. A visita domiciliária no contexto da saúde da família. In: Ministério da Saúde (BR). Programa de Saúde da Família: manual de enfermagem. São Paulo (SP): O Ministério; 2001, p.43-6.

Capítulo 3

Avaliação da aprendizagem do curso qualificação do ato transfusional da escola de saúde pública do Ceará

Rosimary da Silva Barbosa

Geórgia de Mendonça Nunes Leonardo

Maria Verônica Almeida de Brito

Fernanda Brito de Castro

Tereza Rosane de Araújo Felipe Torres Lima

Patrícia Amanda Pereira Vieira

Resumo: O trabalho desenvolvido pelo Centro de Educação Permanente em Vigilância em Saúde da Escola de Saúde Pública do Ceará Paulo Marcelo Martins Rodrigues foi apresentado no II Congresso Brasileiro de Ciências da Saúde, em Campina Grande, PB, no período de 14 a 16 de junho de 2017. Durante o evento, pode-se relatar a experiência vivenciada na turma de 2016 na aplicação do pré e pós-teste. O Curso Qualificação do Ato Transfusional de 40 horas foi direcionado para os enfermeiros envolvidos com a transfusão sanguínea, atuantes no SUS Ceará, de Fortaleza e do interior do estado, por se tratar dos profissionais que tem a atribuição da instalação das bolsas de hemocomponentes.

1 INTRODUÇÃO

A proposta para Qualificação do Ato Transfusional surgiu de um projeto desenvolvido pela Ubhem/Nuvig/Anvisa e a Coordenação-Geral de Sangue e Hemoderivados do Ministério da Saúde – CGSH/DAHU/SAS/MS, em 2010, com o objetivo de disponibilizar e estimular o uso de um instrumento pedagógico como referencial básico para a capacitação de profissionais de saúde envolvidos com o ato transfusional, visando à melhoria da assistência ao receptor de hemocomponentes e ao fortalecimento das ações de hemovigilância (BRASIL, 2016).

A hemovigilância é o conjunto de procedimentos de vigilância que abrange todo o ciclo do sangue, tendo o objetivo de obter e disponibilizar informações sobre os eventos adversos ocorridos nas suas diferentes etapas para prevenir seu aparecimento ou recorrência, melhorar a qualidade dos processos e produtos e aumentar a segurança do doador e receptor (ANVISA, 2016).

A ampliação do escopo da hemovigilância no Brasil, incluindo a vigilância de eventos adversos que podem ocorrer em todo o ciclo do sangue, inseriu-se com a definição das diretrizes apresentadas no Marco Conceitual e Operacional de Hemovigilância (ANVISA, 2015). Tal ampliação justifica-se ao considerar a influência que as ocorrências de não conformidades ou de eventos adversos detém sobre a qualidade do produto e na segurança das pessoas envolvidas no processo, quer seja doador ou receptor.

Nesse contexto, a Escola de Saúde Pública do Ceará Paulo Marcelo Martins Rodrigues (ESP/CE), por meio do Centro de Educação Permanente em Vigilância da Saúde, em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado (SESA/CE) e o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (HEMOCE), idealizou um curso voltado para profissionais dos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS), envolvidos com a transfusão sanguínea. Nos anos de 2015 a 2017, a ESP/CE realizou o curso de Qualificação do Ato Transfusional, duas vezes ao ano, favorecendo, assim, a implantação de uma prática transfusional mais segura.

Com o intuito de analisar e avaliar o alcance dos objetivos de aprendizagem propostos no curso, foi realizada uma correlação do desempenho dos alunos quanto aos acertos das questões nos instrumentos de pré e pós-teste, aplicados ao início e ao término do curso, respectivamente.

2 METODOLOGIA

O trabalho desenvolvido pelo Centro de Educação Permanente em Vigilância em Saúde da Escola de Saúde Pública do Ceará Paulo Marcelo Martins Rodrigues foi apresentado no II Congresso Brasileiro de Ciências da Saúde, em Campina Grande, PB, no período de 14 a 16 de junho de 2017. Durante o evento, pode-se relatar a experiência vivenciada na turma de 2016. Para evidenciar essa escolha será detalhado informações sobre o curso e a avaliação efetivada.

O Curso Qualificação do Ato Transfusional apresentou sua estrutura curricular organizada em atividades presenciais e atividade de ensino-aprendizagem no ambiente de trabalho, com carga horária total de 40 horas, conforme apresentado no quadro a seguir:

Quadro 1- Estrutura organizacional do Curso Qualificação do Ato Transfusional, ofertado pela ESP/CE, no ano de 2016.

Momentos de aprendizagem	Tipos de atividade	Carga horária
Atividades presenciais	Atividades Teórico-Práticas	20 horas
	Seminário de Avaliação	4 horas
Atividade de Ensino Aprendizagem no Ambiente de Trabalho	Atividade Prática <i>in loco</i>	16 horas

Fonte: ESP/CE, 2016

A formação teve o objetivo de qualificar os profissionais da enfermagem que atuam na assistência dos cuidados pré, trans e pós transfusionais, visando a qualificação do ato transfusional e a notificação de reações transfusionais (RT).

Os objetivos de aprendizagem do curso foram: implementar medidas de segurança, quando da instalação e acompanhamento do ato transfusional; proceder adequadamente com as notificações de reações transfusionais; utilizar procedimentos de hemovigilância; utilizar ferramentas que potencializem a eficiência terapêutica do procedimento da transfusão.

O público do curso foi composto, em sua totalidade, por enfermeiros envolvidos com a transfusão sanguínea, atuantes no SUS Ceará, de Fortaleza e do interior do estado, por se tratar dos profissionais que tem a atribuição da instalação das bolsas de hemocomponentes.

Durante as atividades práticas, foi realizada uma visita *in loco* ao Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (HEMOCE), intitulada HEMOTUR, na qual os alunos do curso puderam presenciar todos os procedimentos das etapas da doação sanguínea, desde a coleta do sangue, processamento e distribuição de hemocomponentes.

Em relação à atividade de ensino aprendizagem no ambiente de trabalho, os alunos foram orientados a realizar uma atividade *in loco*, com o objetivo de identificar como era realizado o ato transfusional em seus locais de trabalho, desde o procedimento até a notificação de reações adversas.

Ao início e ao término do curso, aplicou-se um instrumento de avaliação, em formato de pré e pós-teste, respectivamente, ambos com composição idêntica de 10 questões objetivas, visando avaliar o conhecimento prévio e o conhecimento construído durante o curso. Como subsídio para resolução das questões, utilizou-se um texto único (relato de caso). Os alunos foram orientados a responder aos testes individualmente, sem consulta a quaisquer materiais, e, depois que todos finalizaram a resolução do instrumento em questão, foi realizada a correção em plenária, de forma coletiva.

Após a finalização do processo formativo, analisou-se os instrumentos de avaliação de aprendizagem (pré e pós-testes) aplicados em duas turmas do curso, ocorridas no ano de 2016. A primeira e a segunda turma do curso ofertadas naquele ano apresentaram, respectivamente, 35 e 30 alunos. Entretanto, por motivos diversos, nem todos os alunos fizeram o pré teste e/ou o pós-teste.

3 RESULTADOS

A análise dos instrumentos de avaliação aplicados ao início e ao término das duas turmas do curso, no ano de 2016, evidenciou que houve, de forma geral, uma melhoria em relação ao número de acertos das questões dos testes. Nas turmas I (35 alunos) e II (30 alunos) esse percentual passou de 79,06% (n=253) para 86,57% (n=303) e de 77,73% (n=171) para 89,13% (n=205), respectivamente, conforme apresentado nas tabelas 1 e 2.

Tabela 1 – Proporção de acertos por questão no pré e no pós-teste aplicados na turma I do curso de Qualificação do Ato Transfusional, Fortaleza-CE, 2016.

Questão	Pré-teste		Pós-teste	
	Nº acertos	%	Nº acertos	%
1	26	81,25	32	91,43
2	27	84,38	29	82,86
3	22	68,75	24	68,57
4	24	75,00	31	88,57
5	25	78,13	31	88,57
6	28	87,50	35	100,00
7	27	84,38	35	100,00
8	32	100,00	35	100,00
9	32	100,00	35	100,00
10	10	31,25	16	45,71

Fonte: Escola de Saúde Pública do Ceará, 2016

Tabela 2 – Proporção de acertos por questão no pré e no pós-teste aplicados na turma II do curso de Qualificação do Ato Transfusional, Fortaleza-CE, 2016.

Questão	Pré-teste		Pós-teste	
	Nº acertos	%	Nº acertos	%
1	17	77,27	22	95,65
2	14	63,64	21	91,30
3	15	68,18	15	65,22
4	21	95,45	21	91,30
5	15	68,18	21	91,30
6	20	90,91	23	100,00
7	18	81,82	20	86,96
8	22	100,00	23	100,00
9	21	95,45	23	100,00
10	8	36,36	16	69,57

Fonte: Escola de Saúde Pública do Ceará, 2016

Ainda em relação às tabelas apresentadas, observa-se que o menor percentual de acerto, no pré e pós-teste de ambas as turmas, foi na questão 10, a qual versava sobre transfusão de plaquetas de um paciente em pré-operatório. O enunciado da questão solicita que seja assinalada a conduta mais apropriada, e por se tratar de uso racional do sangue, (uma conduta médica), gerou dúvidas o que vai de encontro com os dados coletados.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir desse trabalho, pode-se inferir que o curso de Qualificação do Ato Transfusional tornou o procedimento terapêutico da transfusão mais segura e se constitui como uma importante ferramenta de capacitação dos enfermeiros no sentido de suprir possíveis lacunas existentes em sua formação acadêmica no que concerne à área de hemoterapia.

A eficiência e eficácia da transfusão dependem não apenas da produção segura e de qualidade das unidades hemoterápicas, mas também do processo completo que requer a qualificação dos profissionais de enfermagem envolvidos na administração e no monitoramento adequados da transfusão e das possíveis reações adversas que possam acontecer.

Concluímos que o curso tem tornou-se um evento importante para a formação dos profissionais e melhoria da qualidade na assistência prestada aos pacientes que necessitam da terapêutica transfusional, em todo estado do Ceará.

REFERÊNCIAS

- [1] Anvisa. Marco Conceitual e Operacional de Hemovigilância: Guia para a Hemovigilância no Brasil. Disponível em: Acesso em : 20 de jun de 2016
- [2] Brasil. Ministério da Saúde. Qualificação do ato transfusional : guia para sensibilização e capacitação / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Hospitalar e de Urgência; Agência Nacional de Vigilância Sanitária. – 1. ed. atual. – Brasília: Ministério da Saúde, 2016. 116 p. ISBN 978-85-334-2113-4.
- [3] _____. Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 36 de 25 de julho de 2013 que institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União 2013;26 jul. Brasília, DF, 2013.
- [4] _____. Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 34 de 11 de junho de 2014 que institui as Boas Práticas no Ciclo do Sangue. Disponível em : http://www.hemoce.ce.gov.br/images/PDF/resolucao_rdc34_2014.pdf. Acesso em: 02 jan 2016.
- [5] _____. Portaria de Consolidação nº 5 de 28/09/2017 revoga a Portaria MS/ nº 158 de 4 de fevereiro de 2016 que redefine o regulamento técnico de procedimentos hemoterápicos. Disponível em: http://https://www.normasbrasil.com.br/norma/portaria-de-consolidacao-5-2017_356384.html. Acesso em: 02 junho 2019.

Capítulo 4

Conhecimentos dos alunos da área da saúde acerca de pesquisas científicas desenvolvidas na Universidade Federal de Alagoas

Thayuanne Silva de Melo

Carmem Lúcia de Arroxelas Silva

Pedro Augusto Tibúrcio Paulino

Gabriele Fernanda da Conceição Santos

Daniel Leite Góes Gitaí

Resumo: A iniciação científica (IC) é uma atividade que inicia o aluno de graduação na produção de conhecimento científico. Essa atividade geralmente acontece em instituições de ensino superior. É através desse conhecimento científico que os discentes têm a oportunidade de desenvolver o senso crítico, ético, profissional e de produzir conhecimento. A universidade é o veículo mais importante para estimular e incentivar à pesquisa, tendo um papel fundamental no desenvolvimento desta atividade, sendo necessário o apoio da instituição e de professores, porém existem motivos que distanciam os alunos dessa vivência de realizar pesquisa científica no meio acadêmico. Assim, o objetivo dessa pesquisa foi avaliar se os graduandos dos cursos de Ciências Biológicas licenciatura e bacharelado, Educação Física, Enfermagem, Farmácia Medicina, Nutrição e Odontologia da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) têm conhecimento sobre pesquisa científica. Foi possível observar que dentre os motivos que impedem os alunos a desenvolver atividades de pesquisa científica, os mais citados foram, conciliar entre os estudos da graduação e pesquisa no laboratório, muitas vezes por falta de tempo devido à carga horária dos cursos ou ainda pela necessidade de conciliar os estudos com o trabalho de alunos que precisam trabalhar e estudar, ficando inviável a participação dos mesmos nessas atividades extracurriculares que a universidade oferece. A produção científica nos cursos de saúde pode contribuir para a sociedade, para o aluno, na formação do professor pesquisador e para a vida profissional.

Palavras-chave: universitários, conhecimento, pesquisa científica.

1. INTRODUÇÃO

De acordo com a legislação, artigo 207 da Constituição Federal de 1988, pesquisa faz parte de um dos tripés que constitui o eixo fundamental das Instituições de Ensino Superior (IES) no Brasil. Junto a esse eixo está o ensino e a extensão que não podem ser compartimentados. Os termos pesquisa, trabalho e investigação científica são definidos como qualquer investigação metódica, desenvolvida para fornecer informações que possam solucionar um problema (VICKERY, 1972; OHIRA, 1998).

A pesquisa científica nas universidades tem uma função importante na formação dos alunos, segundo Jankevicius (1995) “as atividades de pesquisa tentam reduzir a distância entre o que é ensinado e a fronteira de conhecimento, sendo atividade acadêmica essencial para o bom desempenho da função privativa de ensino”. Essa pesquisa está voltada, geralmente para a solução de problemas da comunidade, da realidade a qual ela está inserida. De acordo com César (2013) tradicionalmente, as universidades são determinados conhecimentos em grupos de cidadãos que interagem entre si. Segundo Rocha (2010) o cidadão é responsável por cuidar do meio ambiente quando age de forma consciente e solidária em relação a temas que fazem parte do bem-estar da sociedade que estão inseridos. Dentro das universidades brasileiras existem espaços de investigação científica e de produção de conhecimento. Essa produção deve procurar responder às necessidades sociais mais amplas e ter como preocupação tornar-se expressão do real, compreendida como característica do conhecimento científico (FÁVERO, 2006).

Diante deste fato, a pesquisa pode e deve ser uma das principais fontes de continuação da educação após a conclusão do curso, pois pode ser um meio relevante de apontar os caminhos para a especialização do futuro profissional (CRUZ, 2003).

Os laboratórios de pesquisa da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) possuem diferentes linhas de pesquisa científica que contribuem para a formação científica dos discentes. Assim, essa pesquisa teve como objetivo verificar se os alunos da graduação dos cursos na área da saúde tem conhecimento sobre as pesquisas científicas desenvolvidas dentro da UFAL.

2. METODOLOGIA

Este estudo trata-se de uma pesquisa de caráter descritiva quali quantitativa, baseada no método survey, elaborada pelo Grupo de Pesquisa em Epilepsia Clínica e Experimental da Universidade Federal de Alagoas. O estudo delimitou-se aos graduandos dos cursos da área da saúde, especificamente os cursos de Ciências Biológicas bacharelado e licenciatura, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Medicina, Nutrição, e Odontologia, destacando que:

A pesquisa survey pode ser referida como sendo a obtenção de dados ou informações sobre as características, ações ou as opiniões de determinado grupo de pessoas, indicado como representante de uma população-alvo, utilizando um instrumento de pesquisa, usualmente um questionário (PEREIRA, 2007).

Os dados foram obtidos por meio de um questionário online (criado na plataforma Google Forms) que foi disponibilizada para os alunos, no período entre abril a maio de 2018, contendo questões de múltipla escolha e aberta sobre pesquisa científica. Ao fim do tempo estabelecido, as respostas foram analisadas quantitativamente, através de métodos estatísticos, para isso foi utilizado o programa Microsoft Excel 2013.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Participaram da pesquisa 211 alunos, sendo esses do curso de Biologia (25%), Educação Física (3%), Enfermagem (12%), Farmácia (26%), Medicina (22%), Nutrição (6%) e Odontologia (7%).

Figura 1- Total de discente participante por período.

Na UFAL, o ano letivo é dividido por períodos, a figura 1 nos mostra que a maioria dos estudantes que participaram estava entre o 2º e 5º período do curso. Não houve participação de alunos do 11º e 12º período, provavelmente por que apenas o curso de Medicina perdura este tempo, visto também que neste momento do curso os estudantes de medicina estão voltados para realização de trabalhos de conclusão de curso e estão no internato onde o fazem em hospitais e clínicas, ficando fora dos limites acadêmicos como os outros estudantes o que pode ter inviabilizado a obtenção de respostas do último ano deste curso.

Tabela 1 - Quantidade total de respostas das questões objetivas

PERGUNTAS DO QUESTIONÁRIO	Sim		Não	
	Frequência relativa	Frequência absoluta	Frequência relativa	Frequência absoluta
1 - Você é integrante de algum laboratório de Pesquisa?	62	30%	150	70%
2 - Já teve vontade de estagiar em algum Laboratório?	171	89%	22	11%

Na Tabela 1 observamos que o número de alunos que não participam de algum laboratório de pesquisa representa mais que o dobro em relação aos que participam. Isso nos faz questionar os motivos que podem contribuir com este dado: os alunos desconhecem o assunto, não tem incentivo por parte da universidade e dos professores, desinteresse do aluno pelo assunto, falta de tempo ou mesmo pela falta de divulgação. De acordo com Barbosa et al (2010), isto pode ocorrer por que “aluno, universitário ou não, calouro ou veterano, o ato de iniciar uma pesquisa parece, num primeiro momento, precipitado e, às vezes, distante de sua realidade. Grande parte dos estudantes desconhece as possibilidades e o caminho para fazer pesquisa”. Essa realidade nos permite afirmar que muitos alunos chegam à universidade totalmente alheios ao que acontece além da sala de aula. Não conhecem o que a universidade oferece além da grade curricular obrigatória e acabam por não usufruir de tudo o que ela oferta.

Isso demonstra que, geralmente estudantes recém-ingressos não têm conhecimento do que se passa na própria Universidade e se detém apenas a sala de aula, ficando indiferente aos projetos de pesquisa que são realizados continuamente pela instituição e muitos acabam se privando de vivenciar tais experiências durante seu processo de formação no período de graduação. Nem todos os alunos sabem que já podem fazer parte de qualquer grupo de pesquisa desde o primeiro período do curso e alguns passam a ter conhecimento sobre os projeto de pesquisa muito tempo depois.

Diante disso, a produção científica universitária feita por docentes pesquisadores e alunos de graduação é necessária para o crescimento da sociedade como um todo; por isso, quanto mais “cedo” os estudantes de graduação começam a produzir cientificamente, consequentemente poderão se tornar pesquisadores, com

o objetivo de solucionar os problemas que a sociedade enfrenta no seu cotidiano (SANTOS et al. 2007 apud SOUSA; MARQUES, 2011).

Na segunda pergunta, como mostra a Tabela 1, vemos que o interesse dos alunos que nunca participaram de algum laboratório de pesquisa é bem superior aos que nunca tiveram interesse. Este dado demonstra que 89% dos participantes gostariam de ser integrante de um grupo de pesquisa. E podemos vincular essa contradição nas duas perguntas seguintes do questionário, a falta de divulgação por meio da universidade e a dificuldade de conciliar a graduação com essa outra atividade acadêmica.

Para o público leigo, a divulgação de informações de pesquisas científicas faz-se de extrema importância para integração de um eixo constituído pela comunidade acadêmica- sociedade. Segundo Bueno (2010) existe uma individualização das divulgações científicas onde as produções assumem apenas um caráter coletivo de quem as desenvolve ou burocrático, que assim podemos atribuir os órgãos de fomento. A individualidade nas pesquisas está voltada também para dentro das Instituições de Ensino superior que deixam a desejar nas divulgações de suas linhas de pesquisas, eventos científicos abertos para comunidade e laboratórios fechados à visitação da população.

Esse fato revela que a falta de divulgação sobre os laboratórios e seus grupos de pesquisas dentro da universidade mostra influência direta na participação dos alunos. Como observamos na Figura 2, 92% dos participantes acreditam que há falta de divulgação científica. Um dos caminhos que pode ser usado para uma boa divulgação da pesquisa seria feita através dos docentes que estão à frente desses trabalhos. Bridi (2004) ressalta que “para alguns professores, a introdução à pesquisa começa na graduação, na sala de aula, quando o professor desperta o interesse do aluno em aprofundar seus estudos na área de sua disciplina”.

Figura 2 - Distribuição dos alunos que acham que existe uma boa divulgação das pesquisas científicas desenvolvidas na Ufal.

Os professores devem, em sala de aula, promover reflexões para que o aluno tenha conhecimento do que é produção científica e da importância disso em sua formação (ASSIS; BONIFÁCIO, 2008). Deste modo, para que ocorra o desenvolvimento de produção científica na universidade é preciso o interesse e a iniciativa não só dos alunos, mas também dos professores, pois o professor deve oferecer a oportunidade para que o aluno possa participar de projetos.

De acordo com o nosso estudo, existem alguns fatores que influenciam diretamente a participação dos alunos nos laboratórios de pesquisa. Listamos alguns deles na Tabela 2.

Tabela 2: Fatores que influenciam a realização da pesquisa científica durante a graduação.

Fatores que interferem na realização da pesquisa Científica durante a graduação	Quantidade de respostas
Disciplinas difíceis	21
Depender de transporte intermunicipal	5
Turno do curso	0
Carga horária do curso	178

A Tabela 2 nos mostra que a maioria dos participantes tem uma carga horária incompatível com o tempo disponível para a realização de atividades extracurriculares. Muitos laboratórios exigem uma carga horária mínima semanal para que o aluno possa estar vinculado a ele. Isso pode ter influência direta na quantidade de alunos participantes no meio científico.

Reunimos na Tabela 3 as respostas da questão aberta que mais se repetiram dentre os cursos sobre o que poderia ser feito para melhorar a divulgação da ciência no ambiente universitário.

Tabela 3 - Comentários dos participantes sobre como melhorar a divulgação da pesquisa científica na Universidade.

CURSO	COMENTÁRIO
Biologia	<i>"Divulgar as linhas de pesquisa dentro do campus"</i>
	<i>"Divulgação nas redes sociais, pois a maioria das pessoas utilizam, especialmente os alunos".</i>
Farmácia	<i>"Eventos, divulgação online através de redes sociais".</i>
	<i>"Uma divulgação melhor, tanto em redes sociais, como realizando eventos pra divulgar os trabalhos".</i>
Enfermagem	<i>"Mostras e eventos de divulgação das pesquisas feitas. Compartilhamento nas redes sociais".</i>
	<i>"Acesso à informação por meio de um site exclusivo para a divulgação da ciência".</i>
Medicina	<i>"Maior divulgação nas redes sociais e nas salas de aula dos universitários".</i>
	<i>"Aumentar as divulgações em redes sociais".</i>
Odontologia	<i>"Ambiente virtual, cartazes em murais".</i>
	<i>"Divulgar em redes sociais".</i>
Nutrição	<i>"Exposições/feiras/eventos".</i>
	<i>"Utilizar as redes sociais da universidade".</i>
Educação Física	<i>"Divulgações nas redes sociais, nos murais".</i>
	<i>"Divulgações em mídias sociais".</i>

De acordo com a Tabela 3, percebemos que a maioria dos estudantes dos diferentes cursos relatou que uma boa divulgação seria através das redes sociais, eventos, feiras e exposições oferecidas aos discentes e por meio desses veículos exporem o que acontece dentro dos laboratórios, nos grupos de pesquisas e a partir daí, despertar a curiosidade e o interesse da participação dos estudantes pelas diferentes áreas científicas que permeiam a universidade e provavelmente através destes caminhos conseguiríamos aumentar a quantidade de alunos envolvidos no meio científico.

Outra situação que contribui para o baixo índice de alunos fora do eixo pesquisa e ensino é a dificuldade de conciliar a pesquisa com os estudos da graduação. De acordo com a Figura 3, nossa pesquisa revelou que 92% dos participantes declararam existir dificuldade em manter a relação da pesquisa com os estudos acadêmicos, o que pode dificultar o ingresso de novos estudantes e a continuação daqueles que já se encontram em algum laboratório de pesquisa, pois como afirma Sousa e Marques, (2011) "a dificuldade de conciliar as atividades da pesquisa com as disciplinas da graduação constitui-se uma desvantagem para a permanência do aluno no programa de Iniciação Científica".

Figura 3 - Distribuição dos alunos que dizem que tem dificuldades em conciliar a pesquisa científica e estudos da graduação.

4.CONCLUSÃO

A pesquisa científica nos cursos de saúde na Universidade Federal de Alagoas ainda é restrita a minoria dos discentes. Essa realidade pode ser justificada pelas dificuldades que os alunos passam tais quais como conciliar os estudos da graduação e com a pesquisa no laboratório, muitas vezes por falta de tempo devido à carga horária dos cursos ou ainda pela necessidade de conciliar os estudos com o trabalho, ficando inviável a participação dos mesmos nessas atividades extracurriculares que a universidade oferece. A produção científica nos cursos de saúde pode contribuir para a sociedade, para o aluno, a formação do professor pesquisador e para a vida profissional.

REFERÊNCIAS

- [1] Fontanella, D.; Meglhioratti, F. A. A Divulgação Científica e o Ensino de Ciências: Análise das Pesquisas. VIII EPCC – Encontro Internacional de Produção Científica, 2013.
- [2] Rocha, M. B. Textos de divulgação científica na sala de aula: a visão do professor de ciências. Revista Augustus, 2010; 29 (14), 24-34.
- [3] Bueno, W. C. Comunicação científica e divulgação científica: aproximações e rupturas conceituais. Informação & Informação, [s.l.], v. 15, p.1-12, 16 dez. 2010. Universidade Estadual de Londrina.
- [4] Jankevicius, J. V. A pesquisa científica e as funções da Universidade. Semina: Ci.
- [5] Biol./Saúde, Londrina, v.16, n. 2, 1995.
- [6] Bridi, JCA. A pesquisa nas universidades brasileiras: implicações e perspectivas. In: Massi, L., and Queiroz, SL., orgs. Iniciação científica: aspectos históricos, organizacionais e formativos da atividade no ensino superior brasileiro [online]. São Paulo: Editora Unesp, 2015, pp 12-35. ISBN 978-85-68334-57-7. Disponível em: SciELO Books.
- [7] Barbosa, E. M. S.; Eduvirges, J. R.; Ciriaco, M. S. S. Oral: Despertando para a produção intelectual: a importância da pesquisa científica. 2010.
- [8] Sousa, J. M. T.; Marques, H. V. C. F. Contribuições da iniciação científica no processo de ensino e aprendizagem em química. 2011
- [9] Assis, R. M.; Bonifácio, N. A. A produção científica na formação dos alunos do curso de educação física do caj/ufg. V II (5), 2008
- [10] Cruz, M. A. As contribuições que a elaboração de uma monografia trouxe para a formação dos graduados em ciências contábeis no ano de 2002 da universidade estadual de montes claros – unimontes.2003, 56 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia) – Curso de Ciências Contábeis, Universidade Estadual de Montes Claros, Montes Claros, 2003
- [11] Ohira, M. L. B. Por que fazer pesquisa na universidade?, 1998.
- [12] Fávero, M. L. A. A Universidade no Brasil: das origens à Reforma Universitária de 1968, 2016.

[13] César, S. B. A indissociabilidade ensino, pesquisa, extensão e a gestão do conhecimento: Estudo em universidade brasileira, 2013.

[14] Pereira, M. A. C. Competências para o ensino e a pesquisa: uma survey com docentes de Engenharia Química, 2007.

[15] Constituição Federal de 1988. Disponível em:<<https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10650167/artigo-207-da-constituicao-federal-de-1988>> acesso em: 28/05/2018.

Capítulo 5

Experiência multiprofissional e interdisciplinar do programa de extensão pró-Parkinson da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

Patrícia Fernanda Faccio

Eduardo Borges da Costa Leite

Danielle Carneiro de Menezes Sanguinetti

Nadja Maria Jorge Asano,

Maria das Graças Wanderley de Sales Coriolano

Carla Cabral dos Santos Accioly Lins

Resumo: A assistência à terceira idade é uma área de contato de muitas especialidades; a troca de conhecimentos facilita a atuação de cada elemento do grupo dentro do conceito de “descentralização integrada”. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi o de relatar a importância da experiência interdisciplinar e multiprofissional no cuidado ao idoso com doença de Parkinson na formação dos profissionais de saúde tendo como vivência o Programa de Extensão Pró-Parkinson da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE vinculado ao Hospital das Clínicas de Pernambuco HC/PE. Trata-se de um estudo descritivo com uma abordagem qualitativa do tipo relato de experiência, que buscou relatar a vivência clínica na interação multidisciplinar e interdisciplinar no cuidado aos pacientes e a importância na formação discente. A equipe é composta por diferentes áreas de conhecimento: Medicina, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Odontologia, Psicologia e Nutrição, que semanalmente se revezam em realizar palestras educativas utilizando-se do Manual de Orientações Para Pessoas com Doença de Parkinson, que foi confeccionado pelos coordenadores de cada área da equipe. Esses pacientes são atendidos pelo neurologista e são convidados para agendarem atendimentos para as outras especialidades. O programa promove pesquisas científicas, pois está vinculado a dois grupos de pesquisa. Vem desempenhando um importante papel no fortalecimento da interação dialógica, na interdisciplinaridade e interprofissionalidade, na indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão, no impacto na transformação do estudante e na transformação social. A contribuição da interdisciplinaridade promovida pelo Programa de Extensão Pró-Parkinson, é importante, à medida que derruba barreiras, une profissionais, contribuindo no desenvolvimento de habilidades técnicas, que perpassam e se integram na multiprofissionalidade provocando reflexões entre as pessoas que nela atuam, de modo a buscar alternativas para se conhecer mais e melhor o idoso.

Palavras-chave: Comunicação Multidisciplinar. Doença de Parkinson. Envelhecimento.

1. INTRODUÇÃO

O aumento da proporção de idosos é um fenômeno global e apresenta-se como um processo diferenciado em cada país; fato tão novo que as demandas de uma sociedade envelhecida só recentemente têm sido conhecidas¹. O envelhecimento da população brasileira vem ocorrendo de uma forma rápida, e as projeções para as próximas décadas indica que serão 64 milhões de pessoas acima de 60 anos até 2050, representando cerca de 30% da população². Com o envelhecimento o idoso pode apresentar perdas funcionais originadas do próprio processo de envelhecimento (senescência), e/ou do acometimento de enfermidades, por exemplo, doenças crônicas não transmissíveis (DCNT)³.

As DCNT caracterizam-se como um desafio e exigem o planejamento de ações multidisciplinares de prevenção, promoção e reabilitação de programas voltados para a saúde do idoso, levando em consideração a heterogeneidade da população idosa e as diferenças de renda marcantes no país⁴. Dentre as DCNT está a doença de Parkinson que é considerada um dos distúrbios neurodegenerativos de maior incidência em pessoas idosas, depois da doença de Alzheimer, afetando 0,3% da população⁵.

A doença de Parkinson (DP) é caracterizada pela perda seletiva de neurônios dopaminérgicos da substância negra compacta, o doente apresenta sintomas motores específicos, tais como: tremor, movimento lento, músculos rígidos, postura prejudicada e equilíbrio⁶, e associados a esses podem apresentar déficits perceptuais, como diminuição da sensibilidade do olfato, toque, propriocepção e sensação háptica⁷. Sua causa é multifatorial, tendo uma combinação de predisposição genética com a presença de fatores tóxicos ambientais. Com relação à contribuição do envelhecimento cerebral, este estaria relacionado com a prevalência da idade, associada à perda neuronal progressiva⁸.

Considerando-se a diversidade e a complexidade do idoso, a atuação de uma equipe interdisciplinar torna-se fundamental, na medida em que participa, analisa e integra conhecimentos específicos de diversas áreas com o objetivo comum de promover e manter a saúde. A assistência à terceira idade é uma área de contato de muitas especialidades; a troca de conhecimentos facilita a atuação de cada elemento do grupo dentro do conceito de “descentralização integrada”⁹. Este cenário representa um desafio para os profissionais de saúde, e enfatiza a importância de ampliar o conhecimento quanto à realidade e cuidados voltados para essas pessoas, na tentativa de atuar nos fatores que possam comprometer uma velhice bem sucedida¹⁰.

Tendo em vista a interdisciplinaridade como possibilidade de manifestar ou correlacionar diversos tipos de conhecimentos fragmentados, existe a necessidade de caracterizar e sugerir uma ligação coerente dos conhecimentos que elas produzem. A instauração de um novo nível de discurso para a interação entre os profissionais da área de saúde em relação ao paciente idoso a partir de uma abordagem com novas relações disciplinares, fornecendo caminhos para o conhecimento, reconhecendo-se a mesma como maneira de apreender a sua relação com aspectos da realidade do idoso, como um ideal nunca finalizado na íntegra¹¹.

Desta forma, o objetivo deste trabalho é relatar a importância da experiência interdisciplinar e multiprofissional no cuidado ao idoso com doença de Parkinson na formação dos profissionais de saúde tendo como vivência o Programa de Extensão Pró-Parkinson da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) vinculado ao Hospital das Clínicas de Pernambuco HC/PE.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo com uma abordagem qualitativa do tipo relato de experiência. O presente relato foi desenvolvido a partir das práticas clínicas vivenciadas no Programa de Extensão Pró-Parkinson da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Para o desenvolvimento do estudo foram observados em um grupo de idosos, com o diagnóstico de Parkinson, a interação multidisciplinar e interdisciplinar no cuidado desses pacientes e a importância na formação discente.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Programa de Extensão Pró-Parkinson existe oficialmente desde dezembro de 2012, quando foi registrado junto ao Sistema de Informação e Gestão de Projetos (SIGProj)/PROEXC da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. Entretanto, as ações do programa começaram em 2008, quando havia um único projeto de caráter multidisciplinar com atividades educativas para paciente e cuidador.

O ambulatório do Hospital das Clínicas HC/PE é referência em Pernambuco no atendimento médico os pacientes com Doença de Parkinson, entretanto, a criação do Programa Pró- Parkinson atrelado ao ambulatório agregou uma equipe multidisciplinar no atendimento desses pacientes. A vantagem é que o paciente não vem ao hospital com o objetivo único da sua consulta com o neurologista, mas também para se beneficiar dos demais serviços especializados que são ofertados.

A equipe é composta por diferentes áreas de conhecimento: Medicina, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Odontologia, Psicologia e recentemente em 2019 foi incluído a equipe da Nutrição, que semanalmente, sempre as quartas-feiras, se revezam em realizar palestras educativas utilizando-se do Manual de Orientações Para Pessoas com Doença de Parkinson, que foi confeccionado pelos coordenadores de cada área, buscando contribuir para suas atividades de vida diária e uma melhor qualidade de vida, que pode ser acessado através do seguinte link: http://issuu.com/pro-parkinson/docs/manual_pro_parkinson_final?mode=window. Esses pacientes são atendidos pelo neurologista e são convidados para agendarem atendimentos para as outras especialidades (Figura 1).

Figura 1- Ambulatório de Neurologia do HC/UFPE.

Além destas atividades, mensalmente cada equipe realiza uma palestra para os profissionais e acadêmicos envolvidos nos projetos, visando trocar experiências e conhecimentos. O Programa promove pesquisas científicas, pois está, também, vinculado a dois grupos de pesquisa: Neurociências e Neurofisiologia Clínica e ao Pró-Parkinson. Fazem parte do Programa de Extensão Pró-Parkinson cerca de 100 pessoas incluindo docentes, discentes de graduação e pós-graduação nível mestrado e doutorado, e técnicos administrativos (<https://proparkinson.wordpress.com/>) (Figura 2).

Figura 2-Ambulatório de Neurologia, com Dr. Amdore Asano e acadêmicos de graduação e pós-graduação.

Os acadêmicos de odontologia fazem atendimentos semanais e realizam exames clínicos, raspagens corono-radulares, profilaxias, aplicações de flúor, tratamentos de canais, radiografias periapicais, próteses totais e removíveis, restaurações e cirurgias (Figura 3). De 2012 até julho de 2019 já foram realizados mais de 400 procedimentos na odontologia, na medicina mais de 2000 consultas, na fisioterapia mais de 280 atendimentos, fonoaudiologia mais de 60 atendimentos (em grupo) e psicologia mais 100 atendimentos (em grupo). A terapia ocupacional vem se dedicando as pesquisas em tecnologias assistivas.

Este programa de extensão tem aproximado a Universidade da comunidade e vem revertendo, o mais breve possível, os frutos das pesquisas científicas em benefícios dos doentes com Parkinson. O programa tem também um forte compromisso com o ensino, pois contribui para a formação das graduações da Medicina, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Odontologia, Psicologia e na Pós-graduação da Gerontologia (PPGERO) e da Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento (PosNeuro).

Figura 3- Atendimento odontológico aos doentes de Parkinson no Curso de Odontologia da Universidade Federal de Pernambuco.

Desse modo, o programa vem desempenhando importante papel no fortalecimento da interação dialógica, na interdisciplinaridade e interprofissionalidade, na indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão, no impacto na transformação do estudante e na transformação social. Além de que ações que envolvem ensino-serviço são muito importantes para os usuários como para a comunidade acadêmica que dialoga e percebe a necessidade da sociedade, e com isso fortalece o espaço de diálogo entre o ensino e o trabalho qualificando os profissionais de saúde¹².

4.CONCLUSÃO

A contribuição da interdisciplinaridade promovida pelo Programa de Extensão Pró- Parkinson da Universidade Federal de Pernambuco, é importante, à medida que derruba barreiras une profissionais, contribuindo no desenvolvimento de habilidades técnicas, que perpassam e se integram na multiprofissionalidade provocando reflexões entre as pessoas que nela atuam, de modo a buscar alternativas para se conhecer mais e melhor o idoso, sem esquecer as diversidades de relações da vida familiar, social, cultural, biológica, entre outras. A tônica processual transforma o cotidiano do aluno a partir de uma prática de trabalho científico, profissional, de construção coletiva e benéfica para o idoso, estabelecendo dessa forma saberes, atitudes e valores, tendo como pano de fundo a interdisciplinaridade.

REFERÊNCIAS

- [1] Chiamowicz, F. et al. Saúde do Idoso. 2ª Ed. Belo Horizonte: Nescon UFMG: 2013. 167 p.
- [2] Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Coordenação de Trabalho e Rendimento. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Um Panorama da saúde no Brasil: acesso e utilização dos serviços, condições de saúde e fatores de risco e proteção à saúde : 2008. Rio de Janeiro, 2010.
- [3] Freitas, EV, Py L, Cançado, FAX, Gorzoni ML. Tratado de Geriatria e Gerontologia. 2ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
- [4] Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Diretrizes para o cuidado das pessoas com doenças crônicas nas redes de atenção à saúde e nas linhas de cuidado prioritárias / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. Brasília : Ministério da Saúde, 2013.
- [5] Wirdefeldt K, Adami H, Cole P, Trichopoulos D, Mandel J. Epidemiology and etiology of Parkinson's disease: a review of the evidence. Eur J Epidemiol. 2011; 26:1–58.
- [6] Kalia Kalia LV, Lang AE. Parkinson's disease. Lancet. 2015;386:896-912.
- [7] Zia S, Cody F, O'Boyle D. Joint position sense is impaired by Parkinson's disease. Ann Neurol. 2000;47:218-28.
- [8] Souza Cfm, Almeida HCP, Sousa JB, Costa PH, Silveira YSS, Bezerra JCL. Parkinson's disease and the Process of Aging Motor: Literature Review. Rev Neurocienc. 2011;19:718-723.
- [9] Shinkai Rsa, Cury AABC. The role of dentistry in the interdisciplinary team: contributing to comprehensive health care for the elderly. Cad. Saúde Pública. 2000;16:1099-1109.
- [10] Bovolenta TM, Felicio AC. How do demographic transitions and public health policies affect patients with Parkinson's disease in Brazil?. Clin Interv Aging. 2017;12:197-205.
- [11] Camacho Aclf. A gerontologia e a interdisciplinaridade: aspectos relevantes para a enfermagem. Rev Latino-am Enfermagem. 2002;10:229-33.
- [12] Queiroz, MA, Costa HJF, Sousa LM, Menezes, Ihcfm, Vieira Msn. Interação ensino, serviço e comunidade: (re)conhecendo a mostra parceria ensino-serviço-comunidade (Mopesco) realizada pela Universidade de Goiás. Revista Brasileira de Extensão Universitária, v.9, n.2, p.115-124, 2018.

Capítulo 6

Revisão na Síndrome de Parkinson: Freezing da marcha

Eloisa Araújo Souza

Ketlin Lorraine Barbora Silva

Maristela Lúcia Soares Campos

Rannielly Rodrigues da Silva Santos

Juliana Alves Ferreira

Daisy de Araújo Vilela

Resumo: Na síndrome de Parkinson temos degeneração de estruturas subcorticais do cérebro, como neurônios dopaminérgicos na substância negra, com alterações físicas que são ilustradas por bradicinesia, rigidez, e tremor involuntário levando alteração na marcha. **Objetivo:** analisar os pacientes com Parkinson, que tenham ou não FOG, e utilizando a Realidade Virtual evidenciar as alterações ptovocadas. **Metodologia:** Pesquisa descritiva do tipo revisão bibliográfica. **Conclusão:** A associação de farmacos contribui para um menor comprometimento de FOG nos pacientes.

Palavras-chave: Parkinson; Dopaminérgicos; Congelamento da Marcha.

1. INTRODUÇÃO

O Parkinson traz o conceito de uma doença neurodegenerativa, crônica e progressiva que pode levar a uma série de alterações motoras, cognitivas e comportamentais nos indivíduos acometidos pela doença (TWELVES et al, 2003) . Os sinais clínicos na evolução da doença é caracterizado por transtornos da marcha, que podem levar às quedas e comprometer a qualidade de vida dos pacientes. Dentre os distúrbios da marcha presentes , temos o *Freezing of Gait*, ou *Freezing*/ (congelamento) da marcha. Alguns autores o descrevem como um tipo de apraxia caracterizada por um breve episódio, que impede a realização da marcha devido ausência ou redução significativa de passos, apesar da intenção de andar (NUTT et al., 2011; GLIADI et al., 2001) .

Os sintomas da Doença de Parkinson são antecidos por um extenso ciclo no qual a neurodegeneração se espalha por todo o sistema nervoso, o que se evidencia a existência da fase prodrômica, que compreende o período onde os sintomas estão presentes, entretanto ainda não são suficientes para determinar o diagnóstico (DAYAN; BROWNER, 2017). Os prejuízos vão além da deficiência motora, ocorrem alterações da memória, visuais, funcionais, cognitivas que resultam em transtorno de comportamento social; manifestam também déficits nas capacidades de varredura visual, “teoria da mente” e reconhecimento de emoção facial, devido à perda de neurônios dopaminérgicos (LIU et al., 2017).

Na Síndrome de Parkinson, conhecida também como parkinsonismo, é um diagnóstico clínico fundamentado na presença de dois dos três sintomas, bradicinesia, rigidez e tremor. O diagnóstico definido de mutáveis neurodegenerativas baseia-se em achados patológicos (RAIPUT; RAIPUT, 2017).

O congelamento da marcha (*freenzing of gait* – FOG) é uma disfunção da marcha complementar com certa descontinuidade do passo ou até mesmo a diminuição assinalada progressão do pé para frente, afetando seriamente a qualidade de vida (QV), comprometendo o equilíbrio e favorecendo o fenômeno de queda nos pacientes com DP. A averiguação fisiopatológica de FOG é extremamente desafiadora por ser influenciada por diversas habilidades cognitivas, de atenção e emocional (LUCA et al., 2017 ; SUPPA et al., 2017).

A pesquisa foi estruturada embasada em lacunas do conhecimento em relação ao congelamento da marcha nos portadores de Parkinson, e faz parte dos estudos no projeto de extensão da Universidade Federal de Goiás- Regional de Jataí: “ Rede de Vigilância em Saúde para Idosos Institucionalizados (REVISII)”- que acontece em parceria com uma instituição de longa permanência para idosos institucionalizados (ILPI) no município, neste local temos atendimento fisioterapêutico aos pacientes com este diagnóstico, e os acadêmicos participam e acompanham os procedimentos.

Tivemos como objetivo realizar uma revisão de literatura para analisar , entre pacientes com diagnóstico de Parkinson, com e sem FOG, através da Realidade Virtual evidenciar as alterações presentes.

2. METODOLOGIA

O estudo constitui-se de uma revisão de literatura, nas bases de dados Google Acadêmico, Medline, Scielo e PubMed; com os descritores: FOG nas doenças de Parkinson e Parkinsonismo ; publicados nos idiomas inglês e português, e foram incluídos os artigos de revisão. Foram incluídos os trabalhos disponíveis sem custos, que abordassem a patologias- principalmente os distúrbios na marcha e FOG. O período das publicações foi de out. 2005 a set. de 2017. E esta estratégia foi aplicada no mês de out. 2017.

Atendemos os preceitos éticos, respeitando a Resolução CNS 510/2016, por se tratar de material disponível em bases de dados públicos, com informações adjuntas, e que impossibilitam identificação de sujeitos, foi dispensado a submissão ao Conselho de Ética e Pesquisa.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram selecionados 33 artigos, aplicando os critérios de inclusão ficaram apenas sete. Onde destacaram-se a aplicação de testes, escalas e instrumentos, para analisar os indivíduos com distúrbios motores decorrente da DP, mais precisamente aqueles que apresentam disfunções na marcha, desequilíbrio e dificuldade para realizar atividade de vida diária (AVD).

Apenas dois artigos abordam realidade virtual (RV) em FOG, onde observamos as variáveis da velocidade, tempo de movimento, equilíbrio, marcha, controle postural e funcionalidade de membros superiores, através da atividade lúdica visual e auditiva.

Uma das principais características da doença DP é o comprometimento da área motora e FOG na marcha, quanto mais avançada é a doença maior será a dificuldade de locomoção, existindo dificuldades específicas ao começar os movimentos na marcha e para virar-se. A mudança de direção geralmente é seguida de vários e pequenos passos, podendo ocorrer pausas repentinas da marcha (congelamento), especialmente na presença de obstáculos. A tendência de FOG surgir é enorme quando eles precisam de uma assimilação rápida e complexa de uma informação visual durante o ato de andar (DIAS et al., 2005).

Os distúrbios da marcha é uma das principais barreiras que limita a autonomia e a QV destes pacientes. Portanto, estes distúrbios podem agravar dando início a episódios de aceleração (marcha festinada), redução da dissociação de cinturas (movimento em bloco), levando a constantes quedas. O início da locomoção para indivíduos com DP é particularmente difícil, pois é frequente o sintoma de FOG, e isso faz com que o paciente adquira uma postura padrão devido à dificuldade na marcha (GONÇALVES; LEITE; PEREIRA, 2011).

Durante o congelamento, observou-se a redução na marcha e o desequilíbrio na sua execução. Apesar de apresentar uma média relativamente baixa, a RV têm sido eficaz no auxílio ao tratamento de pacientes com DP. Na análise dos artigos podemos observar que, 46 % dos pacientes com DP relataram FOG; 13 % apresentaram melhora com tratamento dopaminérgico; e 18 % tiveram progresso com RV.

A fisioterapia convencional vem mudando, e realizando diversas pesquisas onde mostram que a medicação, circuitos e RV associados com treinos para reabilitação, podem ser de extrema importância para a melhoria da QV, programas com enfoque nas atividades funcionais vêm sendo amplamente destacados na literatura. A importância das intervenções terapêuticas na DP, através de evidências científicas e de acordo com a fisiopatologia das desordens de movimento nas doenças dos gânglios da base (GONÇALVES; LEITE; PEREIRA, 2011).

A RV incorpora princípios de aprendizado motor, ao mesmo tempo em que oferece treinamento envolvendo engajamento e desafio ao participante em ambientes complexos. Dessa forma, acredita-se na potencial contribuição da RV para resolver os déficits motores apresentados pelos pacientes com DP. Entretanto, muitos estudos baseados em metodologias bem elaboradas são necessários para embasar tais hipóteses (VIEIRA et al., 2014). Os programas de reabilitação através de exercícios aeróbicos e treinamentos por circuitos vêm trazendo benefícios motores para indivíduos com DP, embora sejam percebidos mais devagar do que em indivíduos saudáveis (GONÇALVES; LEITE; PEREIRA, 2011).

Finalmente, ao examinar o efeito do tratamento dopaminérgico sobre o número de episódios de FOG em pacientes com PD na iniciação da marcha, durante a passagem direta através de um espaço estreito, durante o giro e durante a turn-to-sit, descobrimos que L-DOPA diminuiu significativamente os episódios FOG durante o giro provável, melhorando a mobilidade axial dos pacientes. Sabe-se que, o FOG está associado ao fenótipo rígido akinético, contribuindo para dificuldades na mudança de direção (SUPPA et al., 2017).

Os resultados positivos encontrados na literatura apoiam a hipótese de que o aumento no foco de atenção é responsável pela melhoria no passo de indivíduos com DP (GONÇALVES; LEITE; PEREIRA, 2011). Tivemos como limitação no estudo a escassez de publicações nas base de dados selecionadas que abordassem o tema.

4. CONCLUSÃO

Entendemos que os pacientes com distúrbios motores têm grande dificuldade na marcha o que atrapalha na sua AVD, comprometendo a funcionalidade e a autonomia do indivíduo tornando-o dependente de ajuda. Tivemos a oportunidade de verificar a variabilidade em relação às condições de FOG na marcha, e observar melhora dos pacientes com e sem FOG, tiveram um resultado mais eficaz em relação ao congelamento, com o menor comprometimento de FOG em pacientes que utilizavam os dopaminérgicos associados a RV.

REFERÊNCIAS

- [1] BAGGIO, J.A.O et al. *Validity of the Brazilian version of the freezing of gait questionnaire*. **Arq Neuropsiquiatr**; 70(8):599-603, 2012.
- [2] DIAS, N.P et al. Treinamento de marcha com pistas visuais no paciente com doença de Parkinson. *Fisioterapia em Movimento*, Curitiba, v.18, n.4, p. 43-51, out./dez., 2005.
- [3] DAYAN, E; BROWNER, N. Alterações na conectividade funcional intrinsic striato-thalamo-pallidal como um pródomo da doença de Parkinson. *NeuroImage: CLINICAL*, Estados Unidos, n. 16: 313-318, p. 1-9, 2017.
- [4] GILADI, N.; TREVES, T. A.; SIMON, E. S. et al. Freezing of gait in patients with advanced Parkinson's disease. *J Neural Transm.* v. 108, n. 1, p. 53–61, 2001.
- [5] GONÇALVES, G.B., LEITE, M.A.A., PEREIRA, J.S. Influência das distintas modalidades de reabilitação sobre disfunções motoras decorrentes da Doença de Parkinson. *Revista Brasileira de Neurologia*, Volume 47, Nº2, abr–mai–jun, 2011.
- [6] GUIMARÃES, J; ALEGRIA, P. O Parkinsonismo. *Medicina Interna*, Lisboa- Portugal, v.11, n.2, p.109-114, 2014.
- [7] LIU, T. et al. Modulação Dopaminérgica da Percepção do Movimento Biológico em pacientes com doença de Parkinson. *Scientific Reports*. China, n. 10159, p. 1-25, 2017..
- [8] NUTT, J.G.; BLOEM, B.R.; GILADI, N. et al. Freezing of gait: moving forward on a mysterious clinical phenomenon. *Lancet Neurol.* v. 23,n. 11, p.1639-40, Aug. 2011
- [9] PALMERINI, L., et al. Identificação de padrões de motor característicos anteriores congelamento da marcha na doença de Parkinson usando sensores Wearable. *Frontiers in Neurology*. 8: 394, 2017.
- [10] SOUSA, A. et al. Efeitos das pistas visuais na marcha em pacientes com Parkinson. *Revista de Ciencias del Deporte*, 11 (Supl. 2), 185-186. ISSN 1885 – 7019, 2015.
- [11] SUPPA, A. et al. I-DOPA e congelamento da marcha na doença de Parkinson: avaliação objetiva através de um sistema sem fio Wearable. *Frontiers in Neurology*. 8: 406, 2017.
- [12] TWELVES, D.; PERKINS, K.S.; COUNSELL C. Systematic review of incidence studies of Parkinson's disease. *Mov Disord.* v.18, n.1 p.19–31, Jan. 2003.
- [13] VIEIRA, G.P, et al. Realidade virtual na reabilitação física de pacientes com doença de Parkinson. *Journal of Human Growth and Development* 24(1): 31-41, 2014.

Capítulo 7

Aplicação de protocolo cinesioterapêutico com uso lúdico de materiais recicláveis no setor de Hemodiálise.

Erica Laiza Alves de Souza

Hellen Karoline Martins de Lima

Lizandra Mayrane Leite Melo

Pammala Mirelly Soares Vasconcelos

Thassiany Sarmiento Oliveira de Almeida

Resumo: Introdução: A Doença Renal Crônica é definida como resultado das lesões renais irreversíveis e progressivas provocadas por problemas que tornam os rins incapazes de realizar suas funções glomerular, tubular e endócrina. Nos pacientes submetidos à hemodiálise as complicações cardiovasculares contribuem sobremaneira para a diminuição da capacidade funcional, para a baixa tolerância ao exercício e, conseqüentemente, para a dificuldade de realização das atividades de vida diária. A Cinesioterapia se define como um conjunto de movimentos com propósitos terapêuticos que procura normalizar fisiologicamente o comportamento postural. Assim, a pratica de cinesioterapia em pacientes de hemodiálise se justifica, uma vez que, exercício físico favorece o retorno da função musculoesquelética. Os materiais recicláveis podem atuar como recursos alternativos para a prática de atividades físicas, seu fácil acesso e baixo custo podem levar a Educação Física e a Educação Ambiental à toda população. Objetivo: aplicar protocolo cinesioterapêutico com uso lúdico de materiais recicláveis no setor de hemodiálise em hospital. Metodologia: O material utilizado para desenvolver atividades lúdicas em cinesioterapia foi totalmente de uso reciclável. Cada instrumento foi elaborado pensando em melhor atender às necessidades dos pacientes. A construção do material de cinesioterapia foi confeccionado com garrafas pets, tampas de garrafas, bandejas de isopor, areia, fitas adesivas, bexigas, farinha, emborrachado, papel e arcos de plástico. Resultados: Programas de treinamento de exercícios físicos têm modificado a morbidade e sobrevida dos pacientes urêmicos crônicos, trazendo-lhes benefícios metabólicos, fisiológicos e psicológicos. A prática de exercícios durante as sessões de hemodiálise contribui para o controle pressórico, para o aumento da capacidade funcional, melhora da função cardíaca, melhora da força muscular, conseqüentemente, melhora da qualidade de vida, e possivelmente para a redução da morbimortalidade cardiovascular em pacientes renais crônicos. Conclusão: a promoção de saúde pode estar ligada com a promoção do desenvolvimento sustentável.

Palavras-chave: Hemodiálise, Cinesioterapia, Reciclagem.

1. INTRODUÇÃO

A Doença Renal Crônica (DRC) é definida como resultado das lesões renais irreversíveis e progressivas provocadas por problemas que tornam os rins incapazes de realizar suas funções glomerular, tubular e endócrina. É reconhecida como um problema de saúde pública global e, entre pacientes com outras doenças crônicas, como as cardiovasculares, infecciosas ou câncer, a presença da DRC está associada ao aumento dos riscos de complicações para essas patologias (COUTINHO, 2011).

“A Insuficiência Renal Crônica (IRC) é definida como uma síndrome caracterizada pela perda lenta, progressiva e irreversível da capacidade excretória renal” (SOARES et al., 2011, p.134). Em sua fase mais avançada, chamada de fase terminal de insuficiência renal crônica, ocorrem alterações em quase todos os sistemas do corpo, tais como, nervoso, cardiovascular, respiratório, musculoesquelético, imunológico e endócrino/metabólico (COELHO et al., 2006). Nesta fase, o tratamento de escolha substitutivo da função renal mais utilizado é a hemodiálise (HD) (SILVA et al., 2013).

Nos pacientes submetidos à hemodiálise as complicações cardiovasculares contribuem sobremaneira para a diminuição da capacidade funcional, para a baixa tolerância ao exercício e, conseqüentemente, para a dificuldade de realização das atividades de vida diária. Além disso, a redução da capacidade funcional nestes pacientes pode ser atribuída à uremia, à anemia, à atrofia e à fraqueza muscular, ao sedentarismo, à desnutrição, à alteração na regulação do potássio, entre outros (REBOREDO, 2011).

A monotonia e dependência associadas às restrições dietéticas e hídricas, a presença de cateteres e fístulas arteriovenosas provocam alterações na capacidade física, autoestima, imagem corporal do paciente e compromete o aspecto físico e psicológico, com repercussões pessoais, familiares e sociais (LARA, 2013).

Para melhorar as alterações causadas pela hemodiálise, o treino aeróbico adequando é bem-vindo. Segundo Reboredo et al (2007), há evidências de que pacientes renais crônicos submetidos a exercício aeróbico realizado na hora da hemodiálise pode gerar melhora na eficácia da diálise e, pode ser observado redução pressórica significativa após três meses.

A Cinesioterapia se define como um conjunto de movimentos com propósitos terapêuticos que procura normalizar fisiologicamente o comportamento postural. Pode ser realizada através de instrumentos como halteres, bastões, bolas suíças, thera-band, entres outros, porém, muitas vezes esses materiais não são acessíveis devido ao seu custo, mas podem ser substituídos por outro tipo de material.

Assim, a prática de cinesioterapia em pacientes de hemodiálise se justifica, uma vez que, exercício físico favorece o retorno da função musculoesquelética. Os exercícios terapêuticos aplicam o estresse de forma apropriada gerando alterações sem provocar lesões. Os efeitos são acumulativos conforme a manutenção do processo, mas se reverterem caso esse processo seja interrompido. Tem como objetivo melhorar a estrutura muscular, promovendo o estado funcional do indivíduo (TRIBASTONE, 2001).

Os materiais recicláveis podem atuar como recursos alternativos para a prática de atividades físicas, seu fácil acesso e baixo custo podem levar a educação física e a educação ambiental à toda população (SOUZA, 2015). Deste modo, possibilitam a confecção de instrumentos para cinesioterapia, ou qualquer tipo de material lúdico terapêutico para o uso de qualquer indivíduo.

A presença do lúdico na fisioterapia para Fujisawa (2000) caracteriza-se como uma atividade-meio, ou seja, um recurso que tem como finalidade facilitar ou conduzir aos objetivos estabelecidos. Porém, deve ser assegurado que a utilização dos jogos e das brincadeiras durante a sessão tenha finalidade terapêutica.

Segundo Souza (2015), os materiais recicláveis vindos do lixo como as garrafas PETs, os cabos de vassouras, cordas, pneus, entre outros, podem ser reutilizados como recursos alternativos acessíveis a toda a população, levando a atividade física para qualquer classe social.

Nesse cerne, a presente pesquisa objetivou realizar ações no setor de hemodiálise em hospital. Dentre as ações desenvolvidas, buscamos aplicar fundamentalmente protocolo cinesioterapêutico com uso lúdico de materiais recicláveis.

2.METODOLOGIA

No dia 18 de março de 2017, realizamos uma visita ao centro de hemodiálise do hospital Dr. Edgley, que se encontra locado na Rua Fernandes Viêira, 659 - José Pinheiro, Campina Grande/Paraíba (PB). Com A mesma foi feita pela turma do primeiro e sétimo período do curso de bacharelado em fisioterapia da Faculdade de Ciências Médias de Campina Grande (FCM-CG).

Desde o princípio, a intenção da visita foi conhecer o setor de hemólise do prezado hospital. Em sequência promover um momento informativo, que envolveu a elaboração de um folder sobre técnicas de antisepsia, e de descontração através de canções, e o mais importante, a prática da cinesioterapia com os pacientes. A priori, o material utilizado para desenvolver atividades lúdicas em cinesioterapia foi totalmente de uso reciclável.

A arrecadação e confecção do material foi totalmente feita na própria instituição de ensino pelos alunos e professores participantes. Grupos foram divididos a fim de que todos participassem das etapas do processo de criação e confecção. Cada instrumento foi elaborado pensando em melhor atender às necessidades dos pacientes.

A construção do material de cinesioterapia foi confeccionado com garrafas pets, tampas de garrafas, bandejas de isopor, areia, fitas adesivas, bexigas, farinha, emborrachado, papel e arcos de plástico. Todo material utilizado com os pacientes teve como objetivo, realizar exercícios de cinesioterapia, como também de despertar o lado lúdico de cada paciente através dos jogos.

Para os exercícios de cinesioterapia foram confeccionados halteres com a junção de garrafas pets, colocando um quilo de areia dentro e isolando com fita adesiva, para trabalhar flexão, extensão, abdução, adução e circundução da articulação glenoumeral, e realização da flexão e extensão de cotovelo, promovendo melhor mobilidade e força para essas articulações. Com bolas de futebol de tamanho adequado realizamos exercícios de isometria com cada paciente ajudando na amplitude de movimento de membros superiores e membros inferiores.

Jogos foram confeccionados, entre eles o jogo de argolas com garrafas pets, onde as garrafas foram enfeitadas com fitas adesivas, areia dentro para dar estabilidade e então, o paciente jogava a argola para alcançar a garrafa. Isso ajuda a movimentação de membros superiores, melhora a amplitude de movimento, além de melhorar a interação entre pacientes e melhorando também o psicológico de cada um.

Ainda com material reciclável, foram confeccionados jogos de passatempo, como jogo da memória, caça palavras e “jogo da velha”, feitos com bandejas de isopor e papel, que criavam uma interação entre os pacientes e os voluntários, e também um entretenimento durante o tratamento. Assim como, bolas de bexigas com farinha dentro como forma de cada paciente massagear as mãos.

Além disso, informações sobre antisepsia foi passada para todos através de folders criados pelos alunos com assuntos referentes ao, o que é e qual a importância da antisepsia, afim de promover conhecimentos para os pacientes e seus acompanhantes. Pois sabe-se que as mãos funcionam como um reservatório de microrganismos, sendo considerada a principal via de transmissão de patologias [...] para isso, deve fazer o uso de soluções antissépticas por promoverem uma maior redução de microrganismos com objetivo de prevenir a transmissão de doenças e microrganismos, desencadeadores de processos infecciosos (SILVA, et al., 2011).

Contudo, é visto que os materiais recicláveis, além de ser de baixo custo e fácil acesso, podem ser produzidos pelos próprios pacientes e possibilitam também cinesioterapia para todos os indivíduos, seja de forma individual, seja em grupo, promovendo bem-estar tanto para os indivíduos, quanto para o meio ambiente.

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO

Programas de treinamento de exercícios físicos têm modificado a morbidade e sobrevida dos pacientes urêmicos crônicos, trazendo-lhes benefícios metabólicos, fisiológicos e psicológicos. Os programas de exercícios existentes para esses pacientes, em sua maioria, não são realizados durante a hemodiálise. No entanto, os estudos mostram que exercícios realizados durante a hemodiálise, quando devidamente orientados, são indicados a esses pacientes (CORRÊA, 2009).

A prática de exercícios durante as sessões de hemodiálise contribui para o controle pressórico, para o aumento da capacidade funcional, melhora da função cardíaca, melhora da força muscular, consequentemente, melhora da qualidade de vida, e possivelmente para a redução da morbimortalidade cardiovascular em pacientes renais crônicos (REBOREDO et al., 2007).

Sendo assim, a fisioterapia contribui de forma significativa na prevenção, no retardo da evolução e na melhoria de várias complicações apresentadas pelo paciente renal. Mas os programas de exercícios existentes para esses pacientes, em sua maioria, não são realizados durante a HD. Vários estudos revelam que a fisioterapia durante as sessões de HD pode ser parte significativa da reabilitação física nestes pacientes. (SILVA et al., 2013). Ou seja, o treino aeróbico realizado no paciente em hemodiálise pode ser realizado pelo fisioterapeuta, podendo ser iniciado com a cinesioterapia.

Para Costa, Cruz e Guimarães (2015) confeccionar equipamentos de cinesioterapia com material reciclável é simples, não tem custo, além de contribuir com a preservação do meio ambiente. De acordo com Zordan (1998), a reciclagem contribui no aspecto econômico, âmbito social e também no meio ambiente, onde pode reduzir à acumulação progressiva de resíduos a produção de novos materiais, como por exemplo, o papel, que exigiria o corte de mais árvores; as emissões de gases como metano e gás carbônico; as agressões ao solo, ar e água; entre outros tantos fatores negativos.

A visita começou as 8:00 horas, que é o horário de chegada da primeira turma de pacientes para hemodiálise. Grupos foram divididos para não superlotar as salas e para melhor aproveitamento do espaço. Começamos nos apresentando e logo em seguida foram divididos grupos. Cada grupo ficou responsável por um tipo de entretenimento. A atividade ocorreu de forma conjunta a fim de que todos participassem da prática.

A priori o protocolo de atendimento foi dividido em três etapas:

Primeira etapa: Foram oferecidos folders com informativos sobre técnicas de antisepsia, a fim de promover conhecimento para os pacientes.

Imagem 1 e 2: Exercícios cinesioterapêuticos no setor de hemodiálise

Segunda etapa: Foram realizados os exercícios de cinesioterapia com os materiais recicláveis. Com os halteres foi possível realizar movimentos de flexão, extensão, abdução e adução de ombro; assim como, flexão e extensão de cotovelo. Bolas foram colocadas abaixo do braço, sendo comprimidas contra o tórax para realizar isometria do ombro. Essas bolas também eram responsáveis por relaxamento quando colocadas no chão, e o paciente com o pé movimentava a bola. Jogos interativos que trabalhavam a funcionalidade, percepção e o psicológico dos pacientes.

Terceira etapa: Realizamos uma descontração com música e dança para os acompanhantes e pacientes, que se mostraram bastantes atentos e colaborativos.

Imagem 3 e 4: Uso lúdico de jogos no setor de hemodiálise.

4.CONCLUSÃO

Podemos ver que a promoção de saúde pode estar ligada com a promoção do desenvolvimento sustentável. Deve-se sempre informar e conscientizar sobre a educação ambiental e seus benefícios, pois essa pode ser primordial para uma mudança de estilo de vida e novas práticas em relação à prevenção de patologias e prevenção do meio ambiente.

Diante das atividades propostas a visita se mostrou de grande valia, pois além de nos mostrar a realidade do segmento hemodiálise, do tipo de paciente que vamos receber, ainda pudemos levar um dia de promoção de saúde e divertimento, mostrando que podemos criar instrumentos lúdicos de baixo custo e alta qualidade, utilizando materiais recicláveis.

REFERÊNCIAS

- [1] Coelho, D. M. et al. Efeitos de um Programa de Exercícios Físicos no Condicionamento de Pacientes em Hemodiálise. *Jornal Brasileiro de Nefrologia*, Belo Horizonte, v, 1 n. 3, p.121-127, set. 2006.
- [2] Corrêa, L. B. et al. Efeito do Treinamento Muscular Periférico na Capacidade Funcional: e Qualidade de Vida nos Pacientes em Hemodiálise. *Jornal Brasileiro de Nefrologia*, Porto Alegre, v. 1, n. 31, p.18-24, fev. 2009.
- [3] Costa, B. N. R; Cruz, C. M. A; Guimarães, M. S. M. A. Reabilitação e sustentabilidade: viabilidade nas sequelas motoras neurológicas. 2015. Disponível em: . Acesso em: 25 maio 2017.
- [4] Coutinho, N. P. S; Tavares, M. C. H. Atenção ao paciente renal crônico, em hemodiálise, sob a ótica do usuário. *Caderno de Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 2, n. 19, p.232- 239, abr. 2011.
- [5] Fujisawa, D. S; Manzini, E. J. Formação acadêmica do fisioterapeuta: a utilização das atividades lúdicas nos atendimentos de crianças. *Rev. Bras. Ed. Esp.*, Marília, v. 1, n. 12, p.65-84, 2006. Disponível em: . Acesso em: 1 maio 2017.
- [6] Lara, C. R. et al. Qualidade de vida de pacientes renais crônicos submetidos: à fisioterapia na hemodiálise. *Revista Ciência & Saúde*, Porto Alegre, v. 6, n. 3, p.163-171, dez. 2013.
- [7] Reboredo, M. M. et al (Comp.). Exercício físico em pacientes dialisados. *Revista Brasileira de Medicina do Esporte*, Juiz de Fora, v. 13, n. 6, p.427-430, dez. 2007.
- [8] Reboredo, M. M. et al. Exercício aeróbico durante a hemodiálise: relato de cinco anos de experiência. *Fisioterapia em Movimento*. Curitiba, v. 24, n. 2, p. 239-246, Jun de 2011.
- [9] Silva, D. R. et al. Comparação de Dois Métodos de Antissepsia Pré-operatória de Mãos em Cirurgia Bucal. *Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial*, Camaragibe, v. 11, n. 2, jun. 2011.
- [10] Silva, S. F. da et al. Fisioterapia durante a hemodiálise de pacientes com doença renal crônica. *Jornal Brasileiro de Nefrologia*, Belo Horizonte, v. 35, n. 3, p.170-176, jul. 2013.

- [11] Soares, K. T. A. et al. Eficácia de um protocolo de exercícios físicos em pacientes com insuficiência renal crônica, durante o tratamento de hemodiálise, avaliada pelo SF-36. *Fisioterapia em Movimento*. Curitiba, v. 24, n. 1, p.133-140, mar. 2011.
- [12] Souza, R. C. Efeitos da prática da dança com o uso de materiais recicláveis na promoção da saúde de moradores de vitória de santo antão. 2015. 26 f. TCC (Graduação) - Curso de Educação Física, Núcleo de Educação Física e Ciência do Esporte, Universidade Federal de Pernambuco, Vitória de Santo Antão, 2015. Cap. 1. Disponível em: Acesso em: 25 maio 2017.
- [13] Tribastone, F. O Esporte como cinesioterapia. In: — *Tratado de Exercícios Corretivos: Aplicados a Reabilitação Motora Postural*. 1. ed. Manole, p. 367-370, 2001.
- [14] Zordan; S. E. A utilização do entulho como agregado, na confecção do concreto. 1998. Disponível em: Acesso em: 1 maio 2017.

Capítulo 8

Assistência do serviço de controle de hipertensão e diabetes aos indivíduos acometidos por insuficiência renal crônica

Dieslley Amorim de Souza

Eduardo Nagib Boery

Ícaro José Santos Ribeiro

Carine de Jesus Soares

Resumo: Objetivo: averiguar a assistência prestada pelos profissionais do serviço de controle de hipertensão e diabetes sob a ótica dos indivíduos acometidos por insuficiência renal crônica. Métodos: estudo epidemiológico descritivo de corte transversal, realizado em uma clínica satélite de hemodiálise no município de Guanambi-BA. Para tanto foram utilizados como instrumento de coleta de dados um formulário acerca da qualidade assistência da equipe de saúde. Resultados: Os resultados apontaram que 55,6% dos indivíduos investigados não foram acompanhados pelo serviço de atendimento ao hipertenso e diabético na atenção básica sendo que, 42,6% foram acompanhados entre um a três anos, 77,4% eram do sexo masculino, 70,2% tinham menos de três anos de escolaridade e 76,5% eram não brancos e 56,7% não tiveram exames da função renal solicitados. Conclusão: O presente estudo evidenciou a associação entre o grau de escolaridade e etnia com a maior chance de ser acompanhamento pelo serviço de controle da Hipertensão e Diabetes evidenciando assim que determinantes sociais de saúde que são fatores potencialmente modificáveis precisam ser levados em conta para que o acesso ao serviço seja de fato equânime e universal.

Palavras-chave: Atenção primária à saúde; Doença renal crônica; Enfermagem

1. INTRODUÇÃO

No Brasil, o crescimento acelerado da população idosa, tem gerado impactos significativos na sociedade. O sistema de saúde é o que mais tem sido afetado sendo justificado pela precariedade encontrada na infraestrutura necessária para responder as demandas específicas dos grupos populacionais, e isso inclui instalações, programas específicos e recursos humanos inadequados quantitativamente e qualitativamente (OMS, 2002; VON KORFF et al., 1997).

Desde o início da década de 60, a população brasileira vem assistindo à modificação da pirâmide etária, caracterizado pelo estreitamento progressivo da base da pirâmide populacional, devido à redução das taxas de fecundidade. A problemática com o controle da mortalidade infantil e doenças transmissíveis não permitiu o desenvolvimento de estratégias eficazes voltadas para prevenção e o tratamento das doenças crônico-degenerativas e suas complicações (MENDES; SCHRAMM; OLIVEIRA, 2004). Fazendo com que ocorresse um aumento das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) e potencialmente preveníveis, principalmente tendo como causa base a hipertensão arterial sistêmica (HAS) e diabetes melitus (DM), que se configuram como principais comorbidades no país e, principais causas para a doença renal crônica (DRC).

No intuito de atenuar o avanço dessas patologias e seus agravos, foi instituída a Política Nacional de Atenção ao Portador de Doença Renal (PNAPDR) através da portaria 1168 GM em 15 de junho de 2004 pelo Ministério da Saúde (MS) com o objetivo de articular e organizar o fluxo do paciente com doença renal (DR) no Sistema Único de Saúde (SUS), uma vez que, devido à falhas na assistência e/ou captação do mesmo precocemente, existe um contingente de indivíduos que adentram na rede de assistência através da alta complexidade, invertendo a porta de entrada no sistema, impossibilitando a execução das ações de prevenção e proteção propostas pela portaria em questão evidenciando assim, falta de integração entre os níveis de atenção e/ou deficiência técnica dos profissionais de saúde em conduzir consultas e condutas clínicas (BRASIL, 2004).

O alcance do objetivo proposto pela política é possível mediante articulação entre os entes federados visando o desenvolvimento de estratégias e ações que contemple a prevenção, diagnóstico precoce, tratamento e quando possível, a recuperação da função renal do indivíduo. Nesse intento se faz necessário a garantia do acesso universal, integral, resolutivo e equânime a todos os pacientes, desde os acometidos por HAS, DM e os indivíduos com DR, sendo a aplicação das ações propostas a cargo do Serviço de Controle da Hipertensão e Diabetes (extinto Hiperdia) e, quando necessário, o acesso de qualidade a terapia renal substitutiva (TRS) (BRASIL, 2004).

O funcionamento do serviço se dá a partir do processo de territorialização, rastreamento e cadastro de todos os pacientes com HAS e DM do território atendido pela unidade básica de saúde (UBS), para planejamento das ações e aquisição de fármacos específicos para distribuição. Os pacientes atendidos pelo serviço são acompanhados pela equipe multidisciplinar do referido serviço para a realização de avaliações clínicas, prescrição medicamentosa e dispensação dos fármacos prescritos disponíveis na rede básica. Não obstante, é realizado periodicamente reuniões de grupo com o objetivo de socializar orientações prestadas pelos mais diversos profissionais da rede básica bem como, a discussão entre os participantes sobre o convívio com a HAS e DM (BRASIL, 2004).

Porém, apesar das ações voltadas para o controle e redução de agravos, o Brasil apresenta um crescimento de 10% de pacientes com DRC por ano, sendo essa média superior a diversos países com os Estados Unidos (9%), países da Europa (4%) e Japão (7%) que, desenvolve um sistema de triagem para avaliação da função renal visando diagnóstico e tratamento o que permite o controle epidemiológico (YAMAGATA et al., 2007).

Nesse sentido, para o adequado funcionamento da política e da rede de assistência aos pacientes com HAS e DM faz-se necessário a existência de uma estrutura operacional que envolva os três níveis de atenção, buscando a integração dos objetivos, garantindo a integridade da caracterização de rede de atenção à saúde, dentre da perspectiva da rede poliárquica (FEUERWERKER; COSTA; RANGEL, 2000; LOURENÇO et al., 2005; MENDES, 2010). Diante do exposto, objetivou-se averiguar a assistência prestada pelos profissionais do serviço de controle de hipertensão e diabetes sob a ótica dos indivíduos acometidos por insuficiência renal crônica.

2.MÉTODO

Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo de corte transversal, realizado em uma clínica satélite de hemodiálise localizada no município de Guanambi-BA que abarca uma demanda aproximada de 180 pacientes da região do Alto Sertão Produtivo do estado da Bahia. Os participantes do estudo foram indivíduos com diagnóstico de DRC que realizam hemodiálise (HD) clinicamente estáveis, sem nenhuma restrição de contato. Foram excluídos do estudo os indivíduos que estavam clinicamente instáveis, os que não estavam presentes nos dias da coleta dos dados e que obtiveram pontuação inferior ao valor de corte no Mini Exame do Estado Mental (MEEN). Sendo assim, participaram do estudo 151 clientes.

O MEEN visa a avaliação das funções cognitivas do indivíduo sendo embasado nos domínios orientação espacial, temporal, memória imediata e de evocação, cálculo, linguagem-nomeação, repetição, compreensão, escrita e cópia de desenho. A pontuação máxima a ser alcançada é de 30 pontos, sendo os pontos de corte para analfabetos, baixa/média escolaridade e alta escolaridade, respectivamente 13, 18 e 26 pontos (FOLSTEIN; ROBINS; HELZER, 1983).

Para a coleta foi utilizado um formulário acerca da qualidade assistência da equipe de saúde que avaliou a qualidade da assistência oferecida pelos profissionais nos centros de HD e objetivou extrair dos participantes a percepção desses em relação a assistência oferecida pelos profissionais. Para isso, o formulário contou com questões que abordava tempo e financiamento da HD, acompanhamento pela equipe multidisciplinar, aporte nutricional e orientação sobre outras modalidades dialíticas.

A análise dos dados se deu, primeiramente, por meio da estatística descritiva, pela apresentação das frequências relativas e absolutas. A prevalência de acompanhamento pelo serviço de Hipertensão e diabetes, bem como, as razões de prevalência e seus respectivos intervalos de confiança (IC) 95% foi calculada para a totalidade das variáveis independentes elencadas.

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia sob parecer nº 972.480 e obedeceram às determinações da resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde.

3.RESULTADOS

Os resultados mostram que 55,6% (n=84) dos indivíduos investigados não foi acompanhado pelo serviço de atendimento ao hipertenso e diabético na atenção básica (ATB), sendo que 42,6% (n=29) foram acompanhados dentre um a três anos.

A tabela 1 abaixo evidencia as características sociodemográficas dos pacientes de acordo com o acompanhamento pelo serviço de atendimento ao hipertenso e diabético, evidenciando que entre os não acompanhados 77,4% eram do sexo masculino, 70,2% tinham menos de três anos de escolaridade e 76,5% eram não brancos.

Tabela 1. Caracterização da população estudada de acordo com o acompanhamento pela atenção básica. Guanambi, 2016

Guanambi, 2010								
	Foi acompanhado pela ATB				Prevalência do acompanhamento	RP	IC95%	p
	Sim		Não					
	n	%	n	%				
Sexo								
Masculino	45	67,2	65	77,4	40,9	1		
Feminino	22	32,8	19	22,6	53,7	0,76	0,53-1,09	0,08
Escolaridade								
≤ 3 anos	33	50,0	59	70,2	35,9	1		
> 3 anos	33	50,0	25	29,8	56,9	0,63	0,44-0,89	0,01*
Raça/cor								
Não brancos	59	89,4	62	76,5	48,8	1		
Brancos	7	10,6	19	23,5	26,9	0,55	0,28-1,06	0,02*

Entre os indivíduos que referiram ser acompanhados, 56,7% (n=38) não tiveram exames da função renal solicitados estando as características do encaminhamento a outros níveis de atenção dispostos na tabela 2 abaixo.

Tabela 2. Avaliação dos encaminhamentos da rede de atenção secundária de acordo com o acompanhamento pela ATB. Guanambi, 2016

acompanhamento pela ATB: Guanambi, 2010								
	Foi acompanhado pela ATB				Prevalência do acompanhamento	RP	IC95%	p
	Sim		Não					
	n	%	n	%				
Consulta com nefrologista								
Sim	43	65,2	47	58,8	47,8	0,859	0,58-1,25	0,21
Não	23	34,8	33	41,3	41,1	1		
Encaminhamento para diálise								
ATB	7	10,4	2	2,4	77,8	0,565	0,36-0,87	0.02*
Emergência	33	49,3	42	50,0	44,0	1		
Consultório	27	40,3	40	47,6	40,3	1,092	0,74-1,60	0.32
Formas de admissão								
Programada	27	40,3	33	39,3	45,0	0,976	0,67-1,40	0,44
Emergência	40	59,7	51	60,7	44,0	1		
Orientação de formas de diálise								
Sim	10	15,6	20	24,1	33,3	1,385	0.80-2.38	0,10
Não	54	84,4	63	75,9	46,2	1		
Acesso utilizado								
FAV	20	29,9	26	31,0	43,5	1,03	0,69-1,53	0,44
CDL curta	43	64,2	53	63,1	44,8	1		
CDL longa	4	6,0	4	4,8	50,0	0,895	0,43-1,85	0,38
Prótese PTFE	0	0	1	1,2	0	-	-	-

4.DISCUSSÃO

Este estudo evidenciou que indivíduos brancos, de maior escolaridade e encaminhados pela atenção básica para a diálise, têm maior chance de serem acompanhados pelo Serviço de Controle da Hipertensão e Diabetes.

No presente estudo a maior escolaridade foi percebida como fator de proteção para o acompanhamento pelo serviço de controle de hipertensão e diabetes, uma vez que essa, vem sendo associado ao reconhecimento e sensibilidade quanto a importância do acompanhamento da equipe multidisciplinar para o adequado controle (PACHECO; BREGMAN; SANTOS, 2006). Essa característica e atributos, está associado ao grau de importância que o indivíduo destina a sua saúde. Portanto, a maior escolaridade aproxima a população dos serviços de saúde, devido à preocupação em preservar a sua saúde, resultando assim em uma menor prevalência de doenças e agravos passíveis de prevenção, como as DCNT (PACHECO, 2005).

As DCNT são um grupo de doenças preveníveis, que se desenvolvem no decorrer da vida e são de longa duração tais como: doenças cardiovasculares, câncer, doenças respiratórias, diabetes dentre outros. Devido a capacidade de causar maior impacto aos seus acometidos e devido a elevada prevalência, elas são consideradas um sério problema de saúde pública, sendo responsáveis por 63% das mortes no mundo, em 2008 (BRASIL, 2011). O Brasil segue essa tendência mundial, em 2013, elas foram responsáveis por 72,6% das mortes (BRASIL, 2015). Assim, as DCNT além de causar impacto nos indicadores de saúde e no seu financiamento, também atingem a qualidade de vida dos indivíduos afetados.

As DCNT possuem diversos fatores causais mutáveis que a OMS elencou os de maior impacto sendo, o fumo, inatividade física, alimentação inadequada e uso prejudicial de álcool, além das causas imutáveis como os fatores genéticos (WHO, 2005). A influência da raça no desenvolvimento das DCNT também tem sido demonstrada (CHOR; LIMA, 2005). Estudos apontam, por exemplo que HAS e DM, apresentam maior prevalência na população não branca, estando a maior prevalência de HAS relacionada a população negra. Não obstante, a prevalência do DM em negros foi de 10,9% enquanto nos brancos foi 7,0% (MONTGOMERY et al., 2007). Com o objetivo de investigar fatores associados à incidência de diabetes entre 41.387 participantes de uma coorte, um estudo verificou que ser negro (OR 1,36; IC95% 1,09- 1,70) e o incremento de um ano na idade (OR 1,03; IC95% 1,02-1,04) estavam associados a maior chance de desenvolver esse desfecho (TONSTAD et al., 2009).

Nesta pesquisa, pertencer ao grupo étnico/racial “branco” foi considerado fator de proteção para o acompanhamento na ATB pelo serviço. Tal fato, mostra-se de certa forma contraditório, uma vez que os “não brancos” deveriam ser os mais acompanhados pelas prevalências mais elevadas neste grupo.

Todavia, apesar de ser um atendimento público, colocam-se aqui questões sociais que podem determinar a não procura dos serviços pelos “não brancos” (CHOR, 2013; LOPES, 2005).

A ATB é considerada a porta de entrada, preferencial, do sistema de saúde nacional devido a concentração dos serviços básicos de assistência à saúde da população visando as ações de prevenção de doenças e agravos. Nesse intento o espaço tona-se cenário para a atuação da PNAPDR promulgada através da portaria 1168/2004 a fim de promover as ações de controle da HAS e DM e, prevenção para DRC. Nesse espaço está alocado a estrutura para atendimento e direcionamento inicial das ações do Serviço de Controle de Hipertensão e Diabetes (extinto Hiperdia) que consiste no diagnóstico precoce, acompanhamento e encaminhamento do usuário para o especialista e, se necessário, para a Terapia Renal Substitutiva (TRS) (ALMEIDA et al., 2015).

Nesse intento, o encaminhamento precoce do paciente com DR para o especialista (nefrologista) se faz de extrema importância para melhor avaliação e definição de conduta, sendo possível assim, estabilizar, atenuar a evolução da lesão renal, bem como postergar a admissão na TRS, sendo essa realizada em caráter programado, melhorando a qualidade de vida desses usuários minimizando os danos associados.

E, por ser a porta de entrada do SUS, cabe as UBS a captação e atendimento dos usuários categorizados dentro do grupo de risco para desenvolvimento da DRC sendo usuários com diabetes, hipertensão, idosos, familiares de pacientes em TRS e com doenças cardiovasculares. Portanto, o atendimento tem como pressuposto a natureza múltipla dos fatores de risco que envolve a doença, requerendo, portanto, uma abordagem integral e interdisciplinar, competências atribuíveis aos profissionais de atenção primária de saúde (BRASIL, 2000).

A cada esfera de atenção cabe o desenvolvimento das atividades assistenciais afim de garantir o fluxo do usuário dentro da rede de serviço em saúde. Sendo assim, na atenção primária a saúde é realizada a identificação dos grupos de risco para a doença e intervenção nos fatores de risco, como, a orientação antitabágica, diminuição de peso nos obesos, prática de exercícios físicos, uso de bloqueadores do receptor da angiotensina ou inibidores da enzima conversora de angiotensina, como no caso de diabéticos tipo 2 e hipertensos sem nefropatia diabética, entre outros (KIRSZTAJN; BASTOS, 2007).

Quando evidenciada a necessidade em ampliar a avaliação ao paciente, o mesmo é encaminhado para ao profissional nefrologista, que tem por objetivo retardar a progressão da DRC, identificar e corrigir suas complicações e co-morbidades e quando necessário, preparar os pacientes para TRS.

O fluxo desse paciente dentro da rede de atendimento à saúde, porém apresenta alguns entraves logístico que impedem o adequado desenvolvimento do acompanhamento do paciente com DR sendo os principais: a identificação do grupo de risco para DRC, identificação da DRC e os seus estágios pelos profissionais da ATB, disponibilidade de nefrologistas na rede municipal de atenção à saúde para referência (REFERÊNCIA?).

Quanto mais precocemente for realizado o diagnóstico a DR bem como o encaminhamento ao nefrologista, melhor o desfecho do paciente. O encaminhamento precoce proporciona melhor avaliação, acompanhamento da patologia visando a cura, tratamento do agravado, paralisar o avanço da DR bem como protelar a admissão do paciente com DRC na TRS. Porém, quando esse é realizado de forma tardia, reduz-se a possibilidade terapêuticas para retorno da função renal, contribuindo para admissão na TRS em caráter emergencial, sem o devido preparo prévio do acesso venoso a ser utilizado, aumenta a chance de hospitalização, aumento o risco de intercorrências associadas ao aumento das escórias nitrogenadas, aumento do custo da terapia reduzindo assim, a sua qualidade de vida (BASTOS; KIRSZTAJN, 2011; BASTOS; BASTOS; TEIXEIRA, 2007; CAMPOS et al., 2012; PADOVANI; SCHOR; LARANJA, 2012).

Estudos acerca da prevalência da DRC a nível da ATB no Brasil ainda são escassos revelando uma lacuna científica. Pesquisa realizada em um laboratório de análises clínicas de Juiz de Fora a partir de 24.248 indivíduos adultos, evidenciou, a partir da taxa de filtração glomerular estimada (TFG), que 2,3% dos avaliados apresentavam DRC, estágios 3B, 4 e 5. A projeção deste percentual permite estimar que em média 3 milhões de brasileiros apresentam tal doença em estágio avançado (BRASIL, 2006).

A escassez de estudo acerca da prevalência de DRC na ATB, impede a ampliação das estratégias para captação dos usuários e induz ao subdiagnóstico e o subtratamento (BASTOS et al., 2009; CORESH et al., 2003; JUUSOLA et al., 2012; ZÚÑIGA; MÜLLER; FLORES, 2011) constituindo como fator preponderante para o crescimento acentuado da sua epidemiologia.

Diante do exposto, o manejo da DRC deve ser pensado no sentido de minimizar ou estabilizar os danos ao paciente com DRC e prepara-los para a admissão na TRS caso seja essa a indicação terapêutica, evitando

assim a admissão em caráter de emergência que configura como fator que contribui um desfecho desfavorável do paciente devido ao tipo de acesso venoso a ser utilizado, bem como a adaptação fisiológica a depuração das escórias nitrogenadas, quantidade tempo de internação bem como aos custos assistenciais. Não obstante, a abordagem tardia, impede a possibilidade de escolha da modalidade dialítica, o que possibilita uma menor adaptação, não apenas nos aspectos físicos, psíquicos bem como dos hábitos de vida (DIAZ-BUXO, 2000; JAGER et al., 2004; JUNG et al., 1999; LEE et al., 2008; LITTLE et al., 2001; ROCHA et al., 2010).

5.CONCLUSÃO

No presente estudo possuir maior escolaridade, pertencer ao grupo étnico brancos e ser encaminhado pela atenção básica ao serviço de diálise foram evidenciados como fator de proteção para o acompanhamento pelo Serviço de Controle da Hipertensão e Diabetes.

Assim, nota-se que os determinantes sociais na saúde, no caso raça e escolaridade, são fatores importantes a se levar em conta para que os indivíduos possam realizar o adequado acompanhamento pelos serviços oferecidos na atenção básica, a fim de que a captação precoce dos casos de doentes renais permita o adequado manejo dos futuros dialisados.

Ademais, além dos fatores próprios dos indivíduos avaliados, vislumbra-se que o fortalecimento dos elos de comunicação das redes de atenção deve ser fortalecido para que as potenciais complicações próprias do encaminhamento tardio, como não escolha do método dialítico, admissão de emergência, não uso de fistula etc., sejam dirimidos

REFERÊNCIAS

- [1] Almeida, F. A. DE et al. Agregação familiar da doença renal crônica secundária à hipertensão arterial ou diabetes mellitus: estudo caso-controle. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 20, n. 2, p. 471–478, fev. 2015.
- [2] Bastos, M. G.; Kirsztajn, G. M. Doença renal crônica: importância do diagnóstico precoce, encaminhamento imediato e abordagem interdisciplinar estruturada para melhora do desfecho em pacientes ainda não submetidos à diálise. *Jornal Brasileiro de Nefrologia*, v. 33, n. 1, p. 93–108, mar. 2011.
- [3] Bastos, R. M. R. et al. Prevalência da doença renal crônica nos estágios 3, 4 e 5 em adultos. *Revista da Associação Médica Brasileira*, v. 55, n. 1, p. 40–44, 2009.
- [4] Bastos, R. M. R.; Bastos, M. G.; Teixeira, M. T. B. A doença renal crônica e os desafios da atenção primária à saúde na sua detecção precoce. *Revista APS*, v. 10, n. 1, p. 46–55, 2007.
- [5] Batista, Luciana KC et al. Manuseio da doença renal crônica em pacientes com hipertensão e diabetes. *J Bras Nefrol*, v. 27, n. 1, p. 8–14, 2005.
- [6] Brasil. Vigitel 2014: Vigilância de fatores de Risco para doenças crônicas por inquérito telefônico. Brasília: Ministério da Saúde, 2015.
- [7] Brasil, M. DA S. A Implantação da Unidade de Saúde da Família Brasília, 2000.
- [8] Brasil, M. DA S. Portaria No 1168/GM, de 15 de junho de 2004. Brasília. Ministério da Saúde, 2004.
- [9] Brasil, M. DA S. Caderno de prevenção clínica de doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e renais. Brasília. Ministério da Saúde, 2006.
- [10] Brasil, M. DA S. Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) no Brasil 2011-2022. Brasília: 2005.
- [11] Campos, F. G. DE et al. Tempo decorrido entre o primeiro contato com a unidade de nefrologia e o início da diálise em pacientes com insuficiência renal crônica. *Brasília méd*, v. 49, n. 2, p. 82–86, 2012.
- [12] Chor, D. Desigualdades em saúde no Brasil: é preciso ter raça Health inequalities in Brazil: race matters. *Cad. Saúde Pública*, v. 29, n. 7, p. 1272–1275, 2013.
- [13] Chor, D.; Lima, C. R. de A. Aspectos epidemiológicos das desigualdades raciais em saúde no Brasil. *Cad. Saúde Pública*, v. 21, n. 5, p. 1586–1594, out. 2005.
- [14] Coresh, J. et al. Prevalence of chronic kidney disease and decreased kidney function in the adult US population: Third national health and nutrition examination survey. *American Journal of Kidney Diseases*, v. 41, n. 1, p. 1–12, jan. 2003.

- [15] Diaz-Buxo, J. A. Early referral and selection of peritoneal dialysis as a treatment modality. *Nephrology, dialysis, transplantation*. v. 15, n. 2, p. 147–9, fev. 2000.
- [16] Feuerwerker, L.; Costa, H.; Rangel, M. L. Diversificação de cenários de ensino e trabalho sobre necessidade/problemas da comunidade. *Divulg. saúde debate*, p. 36–48, 2000.
- [17] Folstein, M.; Robins, L.; Helzer, J. The mini-mental state examination. *Archives of general*, 1983.
- [18] Jager, K. J. et al. The effect of contraindications and patient preference on dialysis modality selection in ESRD patients in The Netherlands. *American journal of kidney diseases*, v. 43, n. 5, p. 891–9, maio 2004.
- [19] Jung, B. et al. Attitudes of Canadian nephrologists toward dialysis modality selection. *Peritoneal dialysis international*. v. 19, n. 3, p. 263–8, 1999.
- [20] Juusola, J. L. et al. The Cost-Effectiveness of Preexposure Prophylaxis for HIV Prevention in the United States in Men Who Have Sex With Men. *Annals of Internal Medicine*, v. 156, n. 8, p. 541, 17 abr. 2012.
- [21] Kirsztajn, G. M.; Bastos, M. G. Proposta de Padronização de um Programa de Rastreamento da DRC. *J. bras. nefrol*, v. 29, n. Supl.1, p. 18–22, 2007.
- [22] Lee, A. et al. Patients' views regarding choice of dialysis modality. *Nephrology Dialysis Transplantation*, v. 23, n. 12, p. 3953–3959, 16 jul. 2008.
- [23] Little, J. et al. Predicting a patient's choice of dialysis modality: experience in a United Kingdom renal department. *American journal of kidney diseases*. v. 37, n. 5, p. 981–6, maio 2001.
- [24] Lopes, Fernanda. Para além da barreira dos números: desigualdades raciais e saúde. *Cad. Saúde Pública*, v. 21, n. 5, p. 1595–1601, 2005.
- [25] Lourenço, R. A. et al. Assistência ambulatorial geriátrica: hierarquização da demanda. *Revista de Saúde Pública*, v. 39, n. 2, p. 311–318, abr. 2005.
- [26] Mendes, E. V. As redes de atenção à saúde. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 15, n. 5, p. 2297–2305, ago. 2010.
- [27] Mendes, J.; Schramm, D. A.; Oliveira, A. F. DE. Transição epidemiológica e o estudo de carga de doença no Brasil. *Ciências & Saúde Coletiva*, v. 9, n. 4, p. 897–908, 2004.
- [28] Montgomery, S. et al. Comparing self-reported disease outcomes, diet, and lifestyles in a national cohort of black and white Seventh-day Adventists. *Preventing chronic disease*, v. 4, n. 3, p. A62, jul. 2007.
- [29] Oms, O. M. da S. *Innovative Care for Chronic Conditions: Building Blocks for Action*. Brasília: Organização Mundial de Saúde, 2002.
- [30] Pacheco, G. de S. O ensino do autocuidado junto a clientes com doença renal crônica em tratamento conservador: estudo epidemiológico e sociopoético. [s.l.] Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2005.
- [31] Pacheco, G. DE S.; Bregman, R.; Santos, I. dos. Características de clientes com doença renal crônica: evidências para o ensino do autocuidado. *Rev. enferm. UERJ*, v. 14, n. 3, p. 434–439, 2006.
- [32] Padovani, C. S. da S.; Schor, N.; Laranja, S. M. R. Evaluation of profile epidemiologic and the found encountered by patients to the care o the first query in the ambulatory screening of Nephrology Unifesp. *Jornal Brasileiro de Nefrologia*, v. 34, n. 4, p. 317–322, 2012.
- [33] Rocha, P. N. et al. Motivo de “escolha” de diálise peritoneal: exaustão de acesso vascular para hemodiálise? *Jornal Brasileiro de Nefrologia*, v. 32, n. 1, p. 23–28, mar. 2010.
- [34] Tonstad, S. et al. Type of vegetarian diet, body weight, and prevalence of type 2 diabetes. *Diabetes care*, v. 32, n. 5, p. 791–6, maio 2009.
- [35] Von Korff, M. et al. Collaborative management of chronic illness. *Annals of internal medicine*, v. 127, n. 12, p. 1097–102, 15 dez. 1997.
- [36] Who, W. H. O. *Preventing chronic diseases: a vital investment*. Geneva: [s.n.].
- [37] Yamagata, K. et al. Risk factors for chronic kidney disease in a community-based population: a 10-year follow-up study. *Kidney International*, v. 71, n. 2, p. 159–166, jan. 2007.
- [38] Zúñiga, C. S. M.; Müller, H. O.; Flores, M. O. Prevalencia de enfermedad renal crónica en centros urbanos de atención primaria. *Revista médica de Chile*, v. 139, n. 9, p. 1176–1184, set. 2011.

Capítulo 9

Ocorrência das principais doenças crônicas em pessoas com deficiência visual no Instituto de Cegos do Nordeste em Campina Grande - PB

Messias Gomes Alves

Mariana Moraes Dantas

Maria de Fátima Ferreira Nóbrega

Lindomar de Farias Belém

Resumo: As doenças crônicas não transmissíveis são um importante problema de saúde pública que ocorre com maior ou menor frequência em várias partes do mundo, dentre estas doenças destacam-se a hipertensão e o diabetes. Essas enfermidades se revestem de maior importância quando acometem as pessoas com deficiência visual, principalmente em países em desenvolvimento pelas dificuldades que esta parcela da população enfrenta para superar as dificuldades ocasionadas pela sua condição e ter acesso aos cuidados necessários para controlar estas disfunções. Nesse contexto a atuação do farmacêutico é de vital importância para garantir a segurança e a efetividade no uso de medicamentos, assim contribuindo sobremaneira no desenvolvimento da autoconfiança orientações quanto aos cuidados com a saúde. Este estudo teve como objetivo principal avaliar a ocorrência de doenças crônicas e a necessidade da Atenção Farmacêutica as pessoas com deficiência visual que frequentam e trabalham no Instituto de Educação e Assistência aos Cegos do Nordeste em Campina Grande – PB, para isso, se utilizou uma metodologia de caráter descritivo, de campo qualitativo e quantitativo no período de outubro de 2014 a outubro de 2015. Das amostras analisadas uma parcela significativa da população relatou ter algum problema de saúde, assim, constata-se a necessidade de estimular informações sobre saúde e farmacoterapia aos pesquisados ressaltando a importância do trabalho do profissional farmacêutico na prestação do serviço de Atenção Farmacêutica.

Palavras-chave: Deficientes visuais. Doenças crônicas. Atenção Farmacêutica.

1. INTRODUÇÃO

A hipertensão arterial sistêmica é uma doença de alta prevalência cujo controle é difícil de ser alcançado, visto que requer além do tratamento medicamentoso mudança no estilo de vida. Maiores obstáculos quanto a essa enfermidade são enfrentadas pelas pessoas com deficiência visual, tanto no que diz respeito ao acesso ao médico como ao tratamento medicamentoso.

Não menos relevante é o diabetes, que a cada dia apresenta um aumento da frequência ligada aos hábitos alimentares e a hereditariedade, e que também atinge pessoas com deficiências visuais, podendo ser uma das causas da perda parcial ou total da visão.

Em 2002, a Organização Mundial de Saúde (OMS) estimou que existiam 37 milhões de cegos e 124 milhões de pessoas com deficiência visual grave no mundo. Se considerarmos as 153 milhões pessoas com deficiência visual devido a erros refrativos não corrigidos, teremos 314 milhões de pessoas no mundo com alguma deficiência visual (RESNIKOFF, 2004). Sendo assim numerosa parte destes, apresentam grandes dificuldades na utilização correta dos medicamentos, podendo destacar que as informações em bulas, receitas, e na maioria das embalagens dos medicamentos, geralmente são disponibilizadas apenas com informações visuais. E quando há informações em Braille na embalagem, geralmente, só é disponibilizado o nome comercial e sua quantidade dentro daquela embalagem.

Desta forma a atuação do profissional farmacêutico no auxílio de pessoas com deficiência visual através da orientação e acompanhamento farmacoterapêutico, se faz necessário através da Atenção Farmacêutica.

Igualmente, sendo de significativa importância que o Farmacêutico atue da maneira mais atenciosa possível visando a melhor efetividade da terapia, levando em consideração desejos e habilidades dos pacientes com deficiência visual e orientando-os acerca da terapia.

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi conhecer as doenças crônicas que acometem o grupo estudado e a relevância do profissional farmacêutico quanto à orientação no uso da medicação.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GERAL

Avaliar a ocorrência de doenças crônicas e a necessidade dos Cuidados Farmacêuticos a pessoas com deficiência visual que frequentam e\ ou trabalham no Instituto de Educação e Assistência aos Cegos do Nordeste em Campina Grande – PB.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Detectar as doenças crônicas que atingem os indivíduos estudados;
- Observar as formas farmacêuticas com mais dificuldade na utilização;
- Verificar como a pessoa com deficiência visual reconhece o medicamento que está utilizando;
- Avaliar a necessidade dos Cuidados farmacêuticos na orientação da medicação utilizada pela população pesquisada.

3. METODOLOGIA

3.1. DELINEAMENTO DA PESQUISA

O projeto no modelo de Pesquisa Intervenção (com característica extensionista) foi realizado no período de Outubro de 2014 a Outubro de 2015, através de um trabalho de caráter bibliográfico, descritivo, de campo, com abordagem qualitativa e quantitativa.

3.2. ÁREA DO ESTUDO

O estudo foi realizado no Instituto de Educação e Assistência aos Cegos do Nordeste na Cidade de Campina Grande – PB, localizado na Rua João Quirino, 33- Catolé.

3.3. DEFINIÇÃO DA POPULAÇÃO

A amostra foi composta por 29 pessoas de ambos os sexos, com faixa etária acima de 18 anos, que tivessem algum tipo de deficiência visual, e que se dispuseram a participar do estudo.

3.4. COLETA DE DADOS

As ações desenvolvidas ocorreram a partir do preenchimento de um formulário de identificação, termo de livre consentimento e a aplicação de uma entrevista especificamente elaborada, com a finalidade de avaliar a existência de doenças crônicas, como também, verificar as formas farmacêuticas com maior dificuldade na utilização e ainda como ocorre o reconhecimento do medicamento pelas pessoas com deficiência visual, analisando a necessidade do profissional farmacêutico na orientação dos medicamentos que seriam utilizados. Essa entrevista foi realizada de forma oral e gravada com auxílio de aplicativos em telefones móveis. As respostas dos participantes foram avaliadas, e a partir das necessidades detectadas foram preparadas palestras de orientação. As palestras ministradas foram sobre: Hipertensão arterial, Diabetes Melitus, Dislipidemias, Uso racional de medicamentos e Parasitoses. Os dados coletados foram inseridos em tabelas e gráficos, de modo a possibilitar a realização de uma análise quantitativa, considerando os valores relativos e absolutos. Foi utilizado o software Windows Excel 2010.

3.5. CONSIDERAÇÕES ÉTICAS

A coleta dos dados foi autorizada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual da Paraíba-CAE 0366.0.133.000-12. O Estudo foi realizado observando-se os aspectos éticos da pesquisa preconizados pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que normatiza pesquisas em seres humanos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Figura 1 verifica-se a prevalência da deficiência visual no Instituto de Educação e Assistência aos Cegos do Nordeste em Campina Grande relacionada ao gênero. Percebe-se um predomínio de deficientes visuais do sexo masculino com 86%, divergindo dos resultados detectados pelo censo IBGE em 2010 que mostrou uma superioridade de mulheres com deficiência visual. Isso deve-se ao fato que a faixa etária mais encontrada na população estudada se situava abaixo dos 60 anos, sendo tomada como parâmetro nos dados científicos mulheres acima dessa idade.

Figura 1: Prevalência da deficiência visual por gênero

FONTE: Dados da pesquisa

A Tabela 1 mostra a frequência de escolaridade e estado civil dos participantes do estudo. Quanto ao nível de escolaridade, constatou-se um maior percentual de pessoas com nível fundamental incompleto com 38%. No que se refere ao estado civil foi detectado um maior percentual de pessoas solteiras, representando 70% dos pesquisados.

Tabela 1: Frequência de escolaridade e estado civil das pessoas com deficiência visual que frequentavam o Instituto de Educação e Assistência aos Cegos do Nordeste, no período do trabalho.

Escolaridade	%
Fundamental incompleto	38% (n=11)
Médio incompleto	4% (n=1)
Médio completo	17% (n=5)
Superior	34% (n=10)
Sem Instrução	7% (n=2)
Estado Civil	%
Solteiro	70% (n=20)
Casado	27% (n=8)
Divorciado/Viúvo	3% (n=1)

FONTE: Dados da pesquisa

O Nível de escolaridade pode dificultar a inserção de pessoas com deficiência visual no mercado de trabalho, sobretudo aquelas com problemas cognitivos e incapacidade ou grande dificuldade física. Dos 11,8 milhões de pessoas com deficiência em idade ativa, em 2010, apenas 4 milhões, ou 34%, estavam ocupadas (GARCIA; MAIA, 2014)

Na Figura 2 Aponta-se a frequência entre indivíduos saudáveis e com problemas de saúde. Observa-se que 62% dos participantes do trabalho relataram ter algum distúrbio de saúde.

Figura 2: Frequência de Indivíduos Saudáveis e com problemas de Saúde

FONTE: Dados da pesquisa

De acordo com um estudo de Nascimento e colaboradores (2009), ocorre uma propensão dos deficientes visuais negarem qualquer tipo de patologia. Sendo explicado pelo temor de uma dependência maior, aliada ao medo do sofrimento, bem como a depressão ocasionada muitas vezes por falta de amparo dos familiares, por limitações físicas, dificuldade de planejar novos projetos ou falta de atividades que preencham o tempo. Essas informações não são reforçadas com os resultados do presente estudo, cujo maior percentual de participantes tiveram a coragem de confirmar que tinham patologias.

A Figura 3 demonstra as enfermidades crônicas mais frequentes que acometem os usuários do Instituto de Educação e Assistência aos Cegos do Nordeste em Campina Grande.

Figura 3: Relato das doenças mais frequentes

FONTE: Dados da pesquisa

Constata-se que a hipertensão com 44% oferece maior destaque entre as doenças prevalentes, acompanhando a literatura científica segundo a qual, Pesquisa Nacional de Saúde (PNS, 2013) a proporção de indivíduos de 18 anos ou mais que referem diagnóstico de hipertensão arterial no Brasil foi de 21,4% em 2013, o que corresponde a 31,3 milhões de pessoas, liderando as doenças crônicas não transmissíveis.

A retinopatia diabética (RD) é a principal causa de novos casos de cegueira entre 20 e 74 anos (FONG; AIELLO, et. al. 2004). É mais comum no DM1 e sua incidência está fortemente relacionada à duração do diabetes. Está presente em aproximadamente 25% dos indivíduos com DM1 após cinco anos do diagnóstico, aumentando para 60%, 80% e 100% após, respectivamente, 10, 15 e 20 anos (FRANK, 2004). No DM2 a RD já está presente em 21% dos indivíduos recém-diagnosticados e pode atingir 60% dos pacientes após 20 anos de doença (KEENAN; COSTACOU, 2007).

Dispõe-se na Figura 4 das formas farmacêuticas com maiores dificuldades na utilização pelos questionados.

Figura 4: Forma farmacêutica com maiores dificuldades na utilização

FONTE: Dados da pesquisa

A forma farmacêutica que apresentou maior dificuldade de uso entre os deficientes entrevistados foram as líquidas com 55% dos relatos; outros 14% declararam dificuldades com o uso de comprimidos, enquanto 28% não tinham dificuldades em usar nenhuma forma.

“Os líquidos ainda representam um probleminha... principalmente os em gotas eles geram dificuldade...mas cada uma tem sua forma de contornar essa situação, eu não posso usar gota, mas dou uma xiringadazinha e está resolvido Rss”. Para Professor John.

Pelos resultados demonstrados o farmacêutico poderá ter um papel de destaque nos cuidados quanto a utilização correta do uso de medicamentos pelos deficientes visuais, podendo contribuir através da Atenção Farmacêutica buscando garantir a necessidade, segurança e a efetividade do medicamento. Pode contribuir ainda, na autoconfiança, e valorização da capacidade do deficiente em agir com maior segurança em relação ao uso dos medicamentos. Portanto, para definir uma estratégia é necessário conhecer o universo destas pessoas e obter informações suficientes sobre elas, para definir o melhor método de Aplicar a Atenção Farmacêutica (HEPLER, & STRAND, 1990).

De acordo com a figura 5 temos a representação do Modo de Identificação dos medicamentos pela população interrogada.

Figura 5: Modo de Identificação dos Medicamentos

FONTE: Dados da pesquisa

Percebe-se que o maior índice entrevistados 49% são de pessoas que utilizam o tato como método de identificação, seguido dos que fazem uso do método Braille 47%, sendo que 4% conseguem distinguir por meio da leitura.

Apesar de a Associação Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ter publicado, no dia 23 de dezembro de 2009 em seu diário oficial, uma norma na qual diz que os fabricantes de medicamentos são obrigados a colocar nas caixas o nome do medicamento em Braille. Além de incluir informações sobre conservação e prazo de validade do produto após a abertura, grande parcela da população não é familiarizada com o método Braille (BENJAMIN, 2012).

5. CONCLUSÃO

Em conformidade com os resultados no presente estudo, pode-se concluir que:

- ✓ A doença crônica mais frequente na população pesquisada foi a hipertensão arterial.
- ✓ Dentre as formas farmacêuticas com maior dificuldade na utilização encontram-se as líquidas, tendo destaque para as em gotas.
- ✓ Através do tato é a maneira que a pessoa com deficiência visual mais identifica os medicamentos utilizados.
- ✓ Pela dificuldade de utilização das formas medicamentosas pelas pessoas com deficiência visual faz-se necessário os serviços do profissional farmacêutico, o qual poderá prestar atendimento no intuito de uma maior acessibilidade e orientação através dos Cuidados Farmacêuticos.

REFERÊNCIAS

- [1] Benjamim, X. C. Identificação Visual de Caixas de Medicamentos Usando Features Correspondentes. Natal, RN, 2012.
- [2] Fong, D. S. et. al. Retinopathy in diabetes. *Diabetes Care*, 27(Suppl. 1): S84-7, 2004.
- [3] Frank, R. N. Diabetic retinopathy. *N. Engl. J. Med.*, 350(1): 48-58, 2004
- [4] Garcia, V. G; Maia, A. G. Características da participação das pessoas com deficiência e/ou limitação funcional no mercado de trabalho brasileiro. *R. bras. Est. Pop.*, Rio de Janeiro, v. 31, n.2, p. 395-418, jul./dez. 2014
- [5] Hepler, C. D; Strand, L. M. Opportunities and responsibilities in pharmaceutical care. *American Journal of Hospital Pharmacy* „v.47, n.3, p.533-543, 1990.
- [6] Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico do ano 2010. Disponível em: <<http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/cartilha-censo-2010-pessoas-com-deficiencia-reduzido.pdf>>. Acesso em: 06 de maio de 2016.
- [7] Keenan, H. A. et. al. Clinical factors associated with resistance to microvascular complications in diabetic patients of extreme disease duration: The 50-year medalist study. *Diabetes Care*, 30(8): 1995-7, 2007.
- [8] Nascimento, E. L.; Marques, L. A. M. O Deficiente Visual e a Atenção Farmacêutica. *Latin-American Journal Pharmaceutical*, v.28, n.2, p.203-210, 2009.
- [9] Resnikoff, S. et. al. Global data on visual impairment in theyear 2002. *Bulletin of World Health Organization*. 2004; 82:844-5.

Capítulo 10

Artéria braquial em humanos e suas formas variantes

Vanessa Apolonio Targino

Ana Beatriz Marques Barbosa

Camila Freitas Costa

Nathalie de Almeida Silva

Pablo Giovanni Franklin Cruz

Thiago de Oliveira Assis

Resumo: A artéria braquial é a principal fonte de irrigação sanguínea dos membros superiores. Ramo terminal da artéria axilar, tem sua origem ao nível da margem distal do músculo redondo maior, atingindo a fossa cubital do cotovelo onde se bifurca para formar as artérias radial e ulnar. Embora raras, as variações na anatomia desse vaso parecem estar relacionadas a implicações clínicas de grande importância tais como cateterismo vascular, recanalização arterial, bem como demais procedimentos clínicos e cirúrgicos voltados aos membros superiores. **Objetivo.** Analisar as características morfológicas e as variações anatômicas da artéria braquial em humanos. **Materiais e Métodos.** Trata-se de uma revisão sistemática de artigos indexados nas bases de dados SCIENCE DIRECT; PubMed; SCOPUS; PEDRO; e SPRINGERLINK, no período de maio a julho de 2018. Foram incluídos artigos originais envolvendo as variações na anatomia da artéria braquial em humanos. Considerou-se para inclusão nesse estudo o nível de divisão desse vaso, o número de divisões terminais e a sua ausência. A busca dos artigos foi realizada por dois revisores independentes e a análise de concordância interobservador foi verificada por meio do teste de Kappa (Bioestat V 5.0). **Resultados.** Ao final da busca foram selecionados nove artigos, caracterizados quanto à amostra, método para avaliar a estrutura anatômica e principais resultados. A variação anatômica mais ocorrente foi a bifurcação alta da artéria. Quatro estudos identificaram uma bifurcação alta da artéria braquial em seus ramos terminais radial e ulnar. O surgimento de uma artéria braquial acessória esteve presente em um estudo, enquanto em outros dois foi verificado a presença de uma artéria braquial superficial. **Conclusão.** Os resultados desta revisão mostram a bifurcação da artéria braquial nos seus ramos terminais em nível mais alto no braço. As variações anatômicas mais prevalentes da artéria braquial e apontam a importância do conhecimento de tais modificações no âmbito clínico e cirúrgico. Desse modo, essas alterações devem ser consideradas durante as intervenções nessa região para o melhor tratamento das condições clínica e cirúrgicas.

Palavras-chave: Artéria braquial; trifurcação; membros superiores, variação anatômica.

1. INTRODUÇÃO

As artérias são estruturas que conduzem o sangue que sai do coração e distribuem-no para todo o corpo. Os seus vários tipos são diferenciados de acordo com o tamanho, quantidade relativa de tecido elástico ou muscular na túnica média, espessura da parede e função (MOORE, K.L.; DALLEY, A.F.; AGUR A.M.R., 2014).

A artéria braquial é a continuação da artéria axilar, sendo a principal fonte de irrigação sanguínea dos membros superiores (MADEIRO *et al.*, 2016). A sua localização segue da margem distal do músculo redondo maior até a fossa cubital do cotovelo, onde se bifurca para formar seus ramos terminais, as artérias radial e ulnar. Em seu trajeto, percorrendo por entre os músculos bíceps braquial e braquial, emite as artérias profundas do braço, colateral ulnar superior e colateral ulnar inferior, além de diversos ramos musculares e um ramo nutrício para o úmero (GOZZI, 2016). De início, a artéria braquial situa-se medialmente ao úmero. Porém à medida que desce, torna-se gradualmente anterior a ele, na fossa cubital, situa-se à metade da distância entre os dois epicôndilos (GOSS, 2012).

Em relação às variações anatômicas nas artérias responsáveis pela irrigação do membro superior, a maioria ocorre na artéria radial, seguida pela artéria ulnar, sendo menos comum na artéria braquial (MCCORMACK, CAULDWELL, ANSON, 1953). Na artéria braquial, tais variações são menos frequentes quando comparadas ao sistema venoso, e, um mínimo de seis padrões já foram descritos, sendo o mais comum, a artéria braquial superficial (FATHABADI *et al.*, 2015). A artéria braquial é relativamente superficial e palpável em todo o seu trajeto, possibilitando ser comumente medida sua pressão arterial (MADEIRO *et al.*, 2016), porém, essa aproximação com a superfície corporal, embora ainda que seja protegida pela fáscia do braço, a torna propensa a lesões. Traumas causados a esta artéria podem ser motivo de preocupação, especialmente em fraturas completas com deslocamento medial dos retalhos do úmero (ITACARAMBI, 2014).

O braço, devido a sua funcionalidade, está mais propenso a lesões e traumas, além de estar envolvidos com procedimentos invasivos (MADHYASTHA *et al.*, 2009), nesse contexto, torna-se importante o estudo das formas variantes da artéria braquial para que possa ajudar clínicos e cirurgiões sobre suas possibilidades variantes e consequentes intervenções clínica e cirúrgica com o mínimo de possibilidade de lesões iatrogênicas.

Portanto, essa revisão propõe-se a analisar as formas variantes da artéria braquial em humanos.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão sistemática. Para a realização desse estudo, foram consultadas as seguintes bases de dados: SCIENCE DIRECT; PUBMED (Biblioteca Nacional de Medicina e Instituto Nacional de Saúde); SCOPUS; PEDRO; e SPRINGERLINK. A estratégia de pesquisa envolveu os respectivos termos de pesquisa: SCIENCE DIRECT, "variação anatômica, artéria braquial"; em PUBMED, "variação anatômica, artéria braquial". Na SCOPUS, "variação anatômica, artéria braquial"; em PEDRO, "variação anatômica, artéria braquial". Em SPRINGERLINK "variação anatômica, artéria braquial, trifurcação"; em TEMAS EM SAÚDE "variação anatômica, artéria braquial", em inglês e português.

Inicialmente foram localizados 760 artigos no SCIENCE DIRECT, 57 em PUBMED, 0 em SCOPUS, 63 em SPRINGERLINK, 1 em TEMAS EM SAÚDE, totalizando 881 artigos.

A busca foi realizada por dois revisores independentes, sendo a análise de concordância interobservador realizado por meio do teste de *Kappa* através do software Bioestat V 5.0, conforme método de Landis e Koch (1977). O valor encontrado foi $K = 0.78$ (Acordo substancial).

Foram incluídos os artigos originais envolvendo a artéria braquial em seres humanos de estudos cadavéricos ou em humanos vivos a partir de imagens radiológicas. Foram excluídos artigos de revisão, bem como aqueles que envolviam animais. Os artigos encontrados em duplicidade foram contabilizados apenas uma vez.

Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 9 foram selecionados para análise (Figura 1).

Os artigos foram analisados criticamente através de um guia de interpretação, usado para avaliar sua qualidade individual, com base nos estudos de Greehalgh (1997) e adaptado por Mcdermid *et al.* (2009). Os itens de avaliação da qualidade dos artigos são expressos por pontuações na Tabela 1, no qual 0 = ausente; 1 = incompleto; e 2 = completo.

3.RESULTADOS

Na tabela 1 é apresentada a análise de qualidade dos artigos selecionados para cômputo desse estudo.

Tabela 1: Análise da qualidade dos artigos encontrados sobre a variação anatômica da artéria braquial:

ESTUDOS (ANO)	Critérios de avaliação												Total (%)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Bertolazzo <i>et al.</i> (1981)	1	0	0	1	1	NA	1	1	1	2	0	2	45,45
Vollala <i>et al.</i> (2008)	2	0	2	0	1	NA	1	2	0	0	0	2	45,45
Honma <i>et al.</i> (2010)	2	2	2	2	2	NA	1	0	2	2	0	0	68,18
Rossi Junior <i>et al.</i> (2011)	2	0	1	2	2	NA	2	2	1	2	0	2	72,72
Al-Sowayigh <i>et al.</i> (2013)	2	0	0	2	2	NA	2	2	0	2	0	2	63,63
Chakravarthi <i>et al.</i> (2014)	2	0	2	2	2	NA	2	2	1	2	0	2	77,27
Gupta <i>et al.</i> (2014)	2	0	1	2	2	NA	1	1	1	1	0	2	59,1
Fathabadi <i>et al.</i> (2015)	2	0	2	2	1	NA	2	2	1	2	0	2	72,72
Madeiro <i>et al.</i> (2016)	2	0	2	2	1	NA	2	2	1	1	0	2	68,18

Abreviações: NA, não aplicável ao papel.

*Critérios de avaliação: 1. Revisão minuciosa da literatura para definir a questão da pesquisa; 2. Critérios específicos de inclusão / exclusão; 3. Hipóteses específicas; 4. Alcance apropriado das propriedades psicométricas; 5. Tamanho da amostra; 6. Acompanhamento; 7. Os autores referenciaram procedimentos específicos para administração, pontuação e interpretação de procedimentos; 8. As técnicas de medição foram padronizadas; 9. Os dados foram apresentados para cada hipótese; 10. Estatísticas apropriadas - estimativas pontuais; 11. Estimativas de erro estatístico apropriadas; 12. Conclusões válidas e recomendações clínicas.

Um resumo da busca eletrônica nas bases de dados selecionadas é apresentado na figura 1. Inicialmente foram identificados 881 artigos, dos quais 841 foram excluídos por não possuírem dados relevantes ou por estarem em duplicatas, 28 excluídos por outros critérios. Desses, 12 foram lidos na íntegra, dos quais somente 9 artigos Rossi, Esteves e Fernandes (2011), Volalla, Nagabhooshana, Bhat (2008), Honma et al. (2011), Al-Sowayigh et al. (2013), Chakravarthi et al. (2014), Madeiro et al. (2016), Gupta, Anshu e Dada (2014), Madhayastha et al. (2009), Fathabadi et al. (2015) preenchem adequadamente todos os critérios de inclusão sendo, assim, selecionados para esta revisão integrativa.

Figura 1: Estratégia de busca e seleção de artigos

A tabela 2 estratifica os estudos selecionados para análise por autor e ano, amostra, métodos e principais resultados.

Tabela 2: Características dos estudos que descreveram algum tipo de variação anatômica na artéria braquial em humanos.

Estudos (ano)	Amostra	Métodos	Resultados
AL-SOWAYIGH et al. (2013)	61 cadáveres	Dissecção de cadáver	Em 13 casos (21,7%), a bifurcação da artéria braquial era normal. Em 33 casos (55%), o nível de bifurcação estava a poucos centímetros abaixo do colo do rádio. Em 7 casos (11,7%), o nível de bifurcação estava acima do colo radial na área da fossa cubital. Em 6 casos (10%), o término da artéria braquial foi encontrado no meio da região anterior do braço. Em um dos casos anteriores, a artéria radial surgiu da artéria braquial no lado medial da artéria ulnar. Em um caso (1,7%), as artérias radiais e ulnares originaram-se diretamente da artéria axilar, a artéria braquial estava ausente.
BERTOLAZZO et al. (1981)	202 cadáveres	Dissecção de cadáver	Variação anatômica rara em relação à bifurcação alta da artéria braquial, com baixa incidência no material dissecado (0,5%).
CHAKRAVARTI et al. (2014)	140 cadáveres	Dissecção de cadáver	A artéria braquial acessória foi observada em oito cadáveres (11,43%). Destes oito, em três cadáveres (4,29%) uma artéria braquial acessória bilateral incomum decorrente da artéria axilar foi encontrada. A variável da artéria braquial acessória unilateral, a sua reunião com a artéria braquial principal na fossa cubital, seu curso variável em relação ao nervo musculocutâneo e ao nervo mediano, também foram observados em cinco cadáveres (7,14%).
FATHABADI, F. F. et al., (2015)	1 cadáver	Dissecção de cadáver	O procedimento levou a observar uma anormal bifurcação na localização da artéria na porção proximal do terço do medial do braço.
GUPTA, N.; ANSHU, A.; DADA, R., (2014)	1 cadáver	Dissecção de cadáver	A artéria braquial foi encontrada superficial ao nervo mediano no braço e, portanto, chamou-se de artéria braquial superficial. Na fossa cubital (2,8 cm distal à linha intercondilar da articulação do cotovelo) esta artéria braquial superficial terminou pela trifurcação em ramos radiais, interósseos e ulnares comuns.
HOMNA, S. et al., (2010)	1 cadáver	Dissecção de cadáver	Foram encontrados as artérias braquiais superficiais mais altas em ambos os braços de um único cadáver, sendo que a artéria braquial superficial direita passou profundamente ao nervo mediano para o arco axilar muscular.
MADEIRO, L. O. et al., (2016)	1 cadáver	Dissecção de cadáver	Em um cadáver do sexo feminino, apresentou-se uma alta bifurcação da artéria braquial bilateralmente.
ROSSI JUNIOR, et al. (2011)	56 cadáveres	Dissecção de cadáver	Foram encontrados em um único cadáver, a bifurcação da artéria braquial localizada ao nível do terço superior em ambos os braços, perto da axila.
VOLLALA, NAGABHOOSHANA, BHAT (2008)	1 cadáver	Dissecção de cadáver	Relatório de baixa divisão e trifurcação da artéria braquial, com curso anormal da artéria radial, passando profundamente ao músculo pronado redondo.

Nos estudos relacionados com o tema, quatro deles (44,4%) (BERTOLAZZO, M. et al., (1981), FATHABADI, F. F. et al., (2015), MADEIRO, L. O. et al., (2016), ROSSI JUNIOR, W. C. et al., (2011)), apresentaram uma alta bifurcação da artéria braquial, e em apenas um (VOLLALA, V.R.; NAGABHOOSHANA, S.; BHAT, S. M. (2008)), uma bifurcação baixa.

Observou-se um surgimento de uma artéria braquial acessória (CHAKRAVARTI, K. K. et al., (2014)), e de uma artéria braquial superficial em dois estudos (22,2%) (GUPTA, N.; ANSHU, A.; DADA, R., (2014), HOMNA, S. et al., (2010)). Além disso, um autor (AL-SOWAYIGH, M. A. et al., (2013)) ter comprovado a ausência desta artéria em um dos 62 cadáveres dissecados.

Dois dos artigos utilizados (22,2%) (GUPTA, N.; ANSHU, A.; DADA, R., (2014), VOLLALA, V. R.; NAGABHOOSHANA, S.; BHAT, S. M. (2008), abordavam o surgimento de uma trifurcação da artéria braquial, dando origem a artéria radial, ulnar e interóssea.

4.DISSCUSSÃO

Os estudos sobre a morfologia e as variações anatômicas do ser humano, sempre implicaram grande importância clínica, principalmente no que diz respeito à vascularização. As variações da artéria braquial,

embora sejam raras, influenciam diretamente na irrigação do membro superior, como também em intervenções clínicas e cirúrgicas neste local (MADHYASTHA *et al.*, 2009).

Em procedimentos cirúrgicos, aos quais necessitem recorrer a acessos/cateterismos vasculares, a artéria braquial torna-se a mais solicitada, uma vez que esta se movimenta consideravelmente menos e não dispõe de grande número de nervos ao seu redor quando comparado a arterial axilar, sendo, a mesma, abandonada pelas complicações constatadas devido à hemorragia por compressão, lesão associada ao plexo braquial e síndrome dos nervos mediano e ulnar. Além disso, a artéria braquial tem uma maior acessibilidade, ficando a frente, também, da escolha da artéria femoral para a realização do procedimento, pois, apesar de ter maior calibre, a oclusão da artéria femoral, cirurgias recentes e a obesidade, dificultam o acesso até esta artéria (KYUNGMOUK; THOMAS, 2015).

Nesse contexto, as variações anatômicas na artéria braquial descritas nesse estudo sugerem grande importância clínica, tendo em vista que esse vaso é frequentemente utilizado durante procedimentos cirúrgicos, a exemplo dos cateterismos vasculares nessa artéria que são realizados com fins diagnósticos e terapêuticos, além da monitorização hemodinâmica contínua do sistema cardiovascular (SINGH *et al.*, 2017). Outro ponto relevante são as lesões arteriais traumáticas com presença de isquemia aguda ou em embolias arteriais, onde normalmente utilizam-se técnicas tradicionais de revascularização e recanalização de tais vasos comprometidos, a fim de haver a diminuição de amputações do membro, mediante o mecanismo de lesão (DEGUARA *et al.* 2005).

Em um estudo realizado por Rossi Junior *et al.* (2011), encontrou-se uma bifurcação alta bilateral da artéria braquial sobre o plexo braquial, na parte superior do terço superior do braço de um cadáver masculino. Tal variação é condizente com os achados encontrados nos estudos de Madeiro *et al.* (2016), que além de observar uma bifurcação alta da artéria braquial em um indivíduo, constatou que a artéria radial se originou medialmente e a artéria ulnar lateralmente, e estas se cruzavam na parte média do úmero para seguir o seu trajeto anatômico normal no antebraço. Sabe-se que apesar do pulso que mais se assemelha ao do central aórtico, ser o carotídeo, é a palpação da artéria braquial que permite melhor avaliação da amplitude, forma e velocidade do pulso, além da consistência das artérias periféricas, sendo possível a dificuldade da precisão desses dados diante de uma variação sobre sua topografia e trajeto (SERRA-AZUL; PILEGGI; MOFFA, 1988).

Bertolazzo e colaboradores (1981), em 202 cadáveres, encontraram variação em apenas 0,5%. A bifurcação alta desta artéria foi sua característica mais comum. O que nos revela que embora exista, esse tipo de variação é pouco comum de ser encontrada.

Segundo Al-Sowayigh *et al.* (2013), em uma amostra com 61 cadáveres, abordando a localização da bifurcação desta artéria, verificou que em 55% o nível de bifurcação estava a poucos centímetros distal do colo do rádio, enquanto 11,7%, proximal a este nível. Em 10% dos casos, o término da mesma encontrava-se acima da região medial anterior do braço. Notou-se ainda a presença da artéria radial surgindo da artéria braquial medialmente à artéria ulnar, podendo tal achado influenciar quando utilizados procedimentos como gasometria arterial e teste de Allen (SBPCML, 2014), nos quais necessitam principalmente, da palpação do pulso da artéria radial. Essa origem incomum da artéria radial, também poderia ter implicação clínica na revascularização do miocárdio, visto que, quando há impossibilidade anatômica ou patológica de se fazer o enxerto com a veia safena, ou até mesmo por sua taxa insatisfatória de permeabilidade em longo prazo, é recorrido à utilização da artéria radial para a otimização da irrigação miocárdica (LOCALI; BUFFOLO; CATANI, 2006). O curso anormal da artéria radial, também foi descoberta no estudo dos pesquisadores Vollala; Nagabhooshana; Bhat (2008), somado com a trifurcação da artéria braquial, onde a mesma se dividia abaixo da altura normal e a artéria radial percorria pelo antebraço profundamente ao músculo pronador redondo.

Ainda no estudo de Al-Sowayigh *et al.* (2013), em outro caso (1,7%), percebeu-se que as artérias radiais e ulnares originaram-se diretamente da artéria axilar, concluindo a ausência da artéria braquial, tal achado pode resultar em dificuldade na aferição da pressão arterial, que é feita (mais frequentemente) por meio da ausculta de ruídos sonoros (sons de Korotkoff) na artéria referida (FARINATTI; POLITO, 2003).

Durante a dissecação do membro superior direito de um cadáver embalsamado masculino de 50 anos, Fathabadi *et al.* (2015) observaram a bifurcação na porção proximal do terço médio do braço, posterior ao nervo mediano. Por conseguinte, o ramo medial redirecionava-se lateralmente atravessando o nervo mediano novamente, desta vez anterior a este, até atingir a região lateral do braço. O ramo lateral da artéria braquial permaneceu lateral ao nervo mediano, continuando como a artéria ulnar, originando a artéria interóssea. É notório que as paredes das artérias são mais espessas (comparando-as com as veias) e dotadas de pulsação, possibilitando que o sangue seja distribuído por todo o corpo de forma eficiente

(MOORE, K. L.; DALLEY, A. F.; AGUR A. M. R., 2014). Visto isso, tal achado, que evidencia o cruzamento dos ramos terminais da artéria braquial em volta do nervo mediano, pode ocasionar a compressão de tal nervo, devido a contração das paredes das artérias, gerando parestesia em todo o trajeto do nervo, a partir da área onde houve o seu pinçamento.

Com uma amostra de 70 cadáveres, Chakravarthi *et al.* (2014), notou que entre estes, 15,72% apresentava uma artéria braquial acessória. Tal achado possibilita ao membro em questão, um fluxo alternativo de suprimento sanguíneo, caso haja uma oclusão de alguma artéria em área de circunscrição (MOORE, K. L.; DALLEY, A. F.; AGUR A. M. R., 2014).

Uma trifurcação foi notificada por Gupta; Anshu; Dada (2014) ao analisar um cadáver bilateralmente, onde a artéria braquial originou ramos radiais, interósseos e ulnares comuns. Nesse estudo, verificou-se também a origem superficial da artéria braquial, caso semelhante havia sido descrito por Homna *et al.* (2010). Essa situação superficial, expõe a artéria a riscos de lesões traumáticas ou durante procedimentos invasivos (MADEIRO *et al.*, 2016).

5.CONCLUSÃO

A artéria braquial é um dos principais vasos de irrigação sanguínea presente nos seres humanos. Embora sua variação quanto às origens dos seus ramos terminais, ramos acessórios, superficiais, como também sua ausência seja encontrada raramente, tais pesquisas abordadas nesse estudo, apontam que há sim a possibilidade de tais variações onde a mais comum é a formação dos tradicionais ramos terminais, artérias radial e ulnar, em locais mais proximais que a habitual fossa cubital. O conhecimento das formas variantes é válido para os profissionais de saúde que atuam na clínica bem como na área cirúrgica que necessite da artéria braquial seja para realizar uma simples aferição da pressão arterial seja para realizar procedimentos invasivos que necessitem de sua localização precisa.

REFERENCIAS

- [1] Rossi Junior WC, Esteves A, Simões JS, Fernandes GJM. Bilateral high division of the brachial artery in one human male cadaver: case report. *Journal of Morphological Science*. 2011; 28(3): 204-207.
- [2] Vollala VR, Nagabhooshana S, Bhat SM. Trifurcation of brachial artery with variant course of radial artery: Rare observation. *Anatomical Science International*. 2008; 83: 307-309.
- [3] Honma S, Kawai K, Koizumi K, Kodama K. The superficial brachial artery passing superficially to the pectoral ansa, the highest superficial brachial artery (Arteria brachialis superficialis suprema). *Anat Sci Int*. 2011; 86:108-115.
- [4] AL-Sowayigh MA, Zaki AI, EL-Haggagy AA, AAL Iha, Badawoud MH. Anatomical variation of brachial artery bifurcation. *Saudi Med J*. 2013; 34 (9): 908-912.
- [5] Chakravarthi KK, KS S, Venumadhav N, Sharma A, Kumar N. Anatomical Variations of Brachial Artery - Its Morphology, Embryogenesis and Clinical Implications. *Journal of Clinical and Diagnostic Research*. 2014; 8(12): 17-20.
- [6] Fathabadi FF, Abbaszadeh H, Noorozian M, Bayat M, Ebrahimi V, Laeegh ER, et al. Case Report: A Case Report on Variation in Bifurcation of Brachial Artery. *Anatomical Sciences*. 2015; 12(2): 97-100.
- [7] Madeiro LA, Oliveira ASB, Estrela YCA, Resende ACC, Pereira Fel, Araújo TMS. Variação anatômica da artéria braquial – relato de caso. *Temas em Saúde*. 2016: 115-131.
- [8] Bertolazzo W, Romero AM, Bica DT, Cavalheiro FC, Barroso Filho F, Pezzi LH, et al. *Revista Brasileira de Cirurgia*. 1981; 71(3): 173-80.
- [9] Gupta N, Anshu A, Dada R. Trifurcation OF Superficial Brachial Artery: A Rare Case With Its Clinico-Embryological Implications. *Clinical Therapeutics*. 2014; 165(5): 243-7.
- [10] Madhayastha S, Nayak SR, Krishnamurthy A, D'costa S, Jose AA, Bhat Kmr. Relato de caso de origem alta das artérias radial, ulnar e braquial profunda, suas implicações clínicas e revisão de literatura. *Jornal Vascular Brasileiro*. 2009; 8(4): 374-378.
- [11] Dangelo JG, Fattini CA. Anatomia Humana Sistemica e Segmentar. 3ª ed. São Paulo: Editora Atheneu; 2007. Introdução ao Estudo da Anatomia 1; 1-11.
- [12] Itacarambi AA, Santos GL, Oliveira IG, Guimarães NN. Análise das variações anatômicas mais frequentes descritas entre 2010 e 2012. *Revista eletrônica de Educação da Faculdade Araguaia*. 2014; 5: 114-122.
- [13] Moore KL, Dalley AF, Agur Amr. Anatomia orientada para a clínica. 7ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.

- [14] Serro-Azul, L. G. C. C.; Pileggi, F. J. C.; Moffa, P. J. Propedêutica cardiológica, bases fisiopatológicas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1988. 73-80.
- [15] Singh, A.; Bahadorani, B.; Wakefield, B. J.; Makarova, N.; Kumar, P. A.; Tong, M. Z.; Sessler, D. I.; Duncan, A. E. Brachial arterial pressure monitoring during cardiac surgery rarely causes complications. *Anesthesiology*. 2017. 126, 1065–1076.
- [16] Kyungmouk Stevelee, Md.; Thomas, A. Brachial Artery Access. *Techniques in Vascular and Interventional Radiology* 2015. 18(2), 87–92.
- [17] Deguara, J.; ALI, T.; Modarai, B.; Burnand, K. G. Upper limb ischemia: 20 years experience from a single center. *Vascular*. 2005. 13, 84-91.
- [18] Sbpctl. Recomendações da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (SBPC/ML): coleta e preparo da amostra biológica. – Barueri, SP: Manole: Minha Editora, 2014.
- [19] Locali RF, Buffolo E, Catani R. Artéria radial versus veia safena pararevascularização do miocárdio: metanálise (não houve diferença estatisticamente significativa). *Braz J Cardiovasc Surg*. 2006; 21(3): 255-261.
- [20] Polito MD, Farinatti PTV. Considerações sobre a medida da pressão arterial em exercícios contra-resistência. *Rev Bras Med Esporte*. 2003; 9(1).

Capítulo 11

Práticas preventivas e o enfrentamento ao HPV em mulheres no contexto rural

Elis Amanda Atanázio Silva

Clodoval Bento de Albuquerque Segundo

Pollyana Ludmilla Batista Pimentel

Lidianny Braga de Souza

Iria Raquel Borges Wiese

Ana Alayde Werba Saldanha

Resumo: O reconhecimento da importância do Papiloma Virus Humano (HPV) e dos agravos associados emerge como um novo desafio no âmbito da saúde pública, levando em conta as presente na maioria dos casos de câncer de colo uterino, tendo como formas de prevenção o rastreamento das lesões precursoras e a vacinação. Assim, este estudo teve como objetivo analisar as práticas em saúde e o enfrentamento ao HPV de mulheres residentes em cidades rurais do Estado da Paraíba. Trata-se de um estudo exploratório, descritivo e analítico de caráter transversal, realizado em 16 cidades, cujo design foi quantitativo, o qual teve uma amostra de 421 mulheres em idade reprodutiva (abaixo de 50 anos), e qualitativo, composto por 16 mulheres com diagnóstico de HPV. Foi utilizado um questionário estruturado, sendo os dados analisados por estatística descritiva (medidas de tendência central e dispersão) e estatística relacional (Qui-quadrado e t-Student, correlação); e entrevistas, as quais foram analisadas com base em categorias determinadas a partir dos temas suscitados. Os dados do estudo quantitativo apontam para um perfil de mulheres com média de idade de 35,6 anos (DP=8,13), casadas (75%), com escolaridade fundamental (51%), exercendo função de dona de casa (32%) com renda de até dois salários mínimos (93%) e 49% recebe algum benefício social. Embora a média da idade em que ocorreu a iniciação sexual seja aos 18,8 anos (DP=4,59), verifica-se que para 23% ocorreu entre os 10 e 15 anos, 71% afirmando não terem feito uso do preservativo na primeira relação sexual e apenas 12% afirmam uso constante atualmente. Do total das participantes, 24% afirmaram nunca terem consultado com um ginecologista, 45% afirmaram que se sentem constrangidas na consulta; 11% referiram nunca ter feito exame Papanicolau, 42% nunca fizeram ultrassonografia e 77% mamografia. Complicações ginecológicas foram afirmadas por 36% das mulheres, destas, 24% afirmaram ter tido alguma inflamação ou infecção mas não souberam especificar. A maternidade foi afirmada por 86% das mulheres investigadas, com o número de filhos variando entre 1 e 11 (M=2; DP=1,44 – 88% até 3 filhos) e 56% das mulheres afirmou utilizar métodos contraceptivos, sobretudo o anticoncepcional oral ou injetável (32%). Em relação à avaliação dos serviços em saúde em geral foi atingido o escore médio de 6,3 (DP=3,02, variando de 0 a 10), portanto satisfatório, apesar de serem elencadas muitas dificuldades de acesso. As quatro categorias: *Diagnóstico Tardio; Momento do Diagnóstico; Dificuldade de Acesso; e Prevenção*. Assim, evidenciou-se a falta de informação acerca do HPV e da necessidade de campanhas que incentivem as mulheres moradoras de cidades rurais a realizarem os exames preventivos, apontando para aspectos de vulnerabilidade programática. Portanto, ressalta-se a importância de suscitar o debate acerca da saúde sexual e reprodutiva das mulheres residentes em cidades rurais, da prevenção ao HPV e do câncer de colo de útero, bem como estudos que considerem esses contextos mais marginalizados quanto ao acesso às políticas públicas de partir das entrevistas com mulheres diagnosticadas com HPV, evidenciaram-se saúde.

Palavras-chave: HPV, prevenção, rural.

1. INTRODUÇÃO

O reconhecimento da importância do Papiloma Virus Humano (HPV) e dos agravos associados emerge como um novo desafio no âmbito da saúde pública, levando em conta as especificidades das formas de transmissão e de manifestação ao longo da vida, se fazendo presente na maioria dos casos de câncer de colo uterino (RAMA et al., 2008). Duas formas de prevenção foram propostas: o rastreamento das lesões precursoras e a imunização contra o HPV (BRASIL, 2013).

Estima-se que a vacinação de 70% das meninas contra o HPV antes dos 13 anos, combinado com ao menos três Papanicolau em mulheres de 35 a 45 anos, preveniria 100.000 novos casos de câncer, reduzindo o risco em 61%. Visando um alcance de no mínimo 80% de cobertura vacinal, gerando uma “imunidade coletiva”, o Sistema Único de Saúde (SUS) está disponibilizando a vacina quadrivalente contra o HPV (contra quatro tipos de HPV: 6, 11, 16 e 18) para meninas de 9 a 13 anos (BRASIL, 2013).

Ocorrendo em Unidades Básicas de Saúde (UBS) como rotina e em escolas públicas e privadas por ocasião das ações extramuros, o esquema adotado pelo Ministério da Saúde é composto por três doses: a primeira dose oferecida nas escolas e UBS, segunda serão aplicadas com intervalo de seis meses e a terceira, de reforço, cinco anos após a primeira dose, as duas últimas administradas na unidade de saúde. Pressupõe-se que os meninos passam a ser protegidos indiretamente com a vacinação do grupo feminino (“imunidade de rebanho”), havendo drástica redução na transmissão do HPV entre homens (BRASIL, 2013).

Não obstante a constatação de que a suscetibilidade ao câncer é determinada pela interação de múltiplos genes, portanto, caracterizando-se como genética, a ocorrência da doença é conectada às desigualdades sociais. O fato de as coberturas serem maiores nas áreas mais desenvolvidas, urbanas e entre as pessoas de maior renda, influenciam também na efetividade da saúde suplementar no padrão de desigualdades sociais no acesso (TRAVASSOS, OLIVEIRA; VIACAVA, 2006; VIEIRA, 2010).

Embora muitos fatores, particularmente socioeconômicos, contribuam para a situação de saúde nas áreas rurais, elenca-se o acesso inadequado ao sistema de cuidados efetivos à saúde, seguido pelos problemas relacionados à oferta e a organização dos serviços de saúde, a dificuldade de se atrair médicos e outros profissionais de saúde, além da grande rotatividade destes profissionais e a qualidade da assistência oferecida (TRAVASSOS, OLIVEIRA; VIACAVA, 2006). Ressaltam-se, ainda, os fatores culturais, onde as noções populares sobre as doenças e seus meios de infecção derivadas contribuem para a uma exposição diferenciada aos problemas de saúde na população rural, podendo levar a uma baixa demanda por modernas intervenções na saúde (VIEIRA, 2010).

Neste sentido, a grande diversidade cultural brasileira pode provocar reflexos na busca do cuidado para a saúde. Na região Nordeste brasileira, a histórica repetição de problemas sociais como os derivados das secas nordestinas revelam um quadro de carências sociais agravadas pela ausência de investimentos contínuos, no sentido da superação e reversão das adversidades. O efeito imediato e mais comumente associado à seca é a pobreza que resulta, por sua vez, da falta de oportunidade de trabalho alternativo àqueles que dependem basicamente do desenvolvimento da agricultura nas áreas por ela atingidas.

Dos 223 municípios paraibanos, 66% têm menos de 11.000 habitantes, podendo-se considerar como um sistema de cidades pequenas, em geral sem centralidade, e às vezes muito pequenas até mesmo em termos de um conceito de cidade; elas existem, no Brasil, por força de uma definição legal de cidade-sede de município, podendo ser consideradas “cidades rurais”.

Partindo destes pressupostos, questiona-se: como promover a prevenção e promoção da saúde nestas comunidades? Que recursos estas populações utilizam para resolver seus problemas de doença? Como se dá o acesso aos serviços de saúde, essenciais para a efetivação do esquema vacinal do HPV? Como promover a testagem com o Papanicolau? De que forma se dá o diagnóstico e o tratamento? Partindo do pressuposto de que, anterior à implementação de intervenções, faz-se mister avaliar as condições estruturais de vida e de acesso aos serviços de saúde em cada contexto e comunidade, tendo como base o modelo teórico da vulnerabilidade, este estudo teve como objetivo analisar as práticas em saúde e o enfrentamento ao HPV de mulheres residentes em cidades rurais.

2. MÉTODO

Trata-se de um estudo exploratório, descritivo e analítico de caráter transversal, cujo designé quantitativo e qualitativo. A amostra quantitativa foi constituída por 421 mulheres em idade reprodutiva (abaixo de 50 anos), provenientes de 16 cidades rurais, estratificadas por macro região de saúde do Estado da Paraíba

(4), regiões de saúde (13). Para a parte qualitativa, foram entrevistadas 16 mulheres com diagnóstico de HPV com a mesma estratificação.

Foi utilizado um questionário com respostas objetivas referentes às práticas sexuais, preventivas e aspectos clínicos associados ao HPV, além de itens referentes à avaliação do serviço e atendimento em saúde. Para a parte qualitativa foram realizadas entrevistas domiciliares baseadas no método das cenas para a exploração de situações de experiências relacionadas ao agravamento em saúde. Os dados coletados por meio das questões objetivas foram analisados por estatística descritiva (medidas de tendência central e dispersão) e estatística relacional (Qui-quadrado e t-Student, correlação).

A análise dos conteúdos das entrevistas foi realizada com base em Categorias determinadas a partir dos temas suscitados. Este estudo foi realizado considerando os aspectos éticos pertinentes a pesquisas envolvendo seres humanos e submetido e aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal da Paraíba.

3.RESULTADOS E DISCUSSÕES

Dados Quantitativos

Os dados sociodemográficos apontam para um perfil de mulheres com média de idade de 35,6 anos (DP=8,13, variando entre 18 a 49 anos), distribuídos nas faixas etárias de 18 a 29 anos (31%) e 30 a 49 anos (69%). São casadas (75%), com escolaridade fundamental (51%), exercendo função de dona de casa (32%) ou agricultoras (18%) e 27% atividades formais, na maioria no comércio ou prestação de serviços gerais, com renda de até dois salários mínimos (93%) e 49% recebe algum benefício social. Embora a média da idade em que ocorreu a iniciação sexual seja aos 18,8 anos (DP=4,59 – variando entre 10 e 39 anos), verifica-se que para 23% ocorreu entre os 10 e 15 anos.

A partir dessa caracterização da amostra percebe-se o baixo nível sócio econômico dessas mulheres, bem como a iniciação sexual precoce, reforçando a cultura dos contextos rurais, a qual remonta à subordinação da mulher frente a figura masculina, seja para reforçar a ideia do homem provedor e machista, seja para reforçar a mulher enquanto aquela que precisa ser “do lar”, fazendo-se necessário refletir sobre as questões de gênero nesse contexto (PEREIRA; LOZANO, 2012).

Em relação ao uso de preservativo, 71% afirmaram não terem feito uso na primeira relação sexual e apenas 12% afirmam uso constante atualmente. A interrupção do uso ocorrida para 65% da amostra se deu devido à confiança estabelecida (57%), uso de outros métodos contraceptivos ou impossibilidade de gravidez (20%), desconforto (9%), por ser casada (7%) e pelo desejo de engravidar (7%). Apenas 10% referiram ter dificuldade em solicitar ao parceiro o uso de preservativo.

Associando o uso do preservativo com a faixa etária, verifica-se que o uso na primeira relação sexual e a continuidade do uso em todas as relações sexuais, são maiores para a faixa etária menor (18 a 29 anos; $\chi^2=26,961$; $p=,000$ e $\chi^2=12,565$; $p=,002$), no entanto, não houve diferença estatisticamente significativa para a interrupção do uso e motivos para tal. Da mesma forma, não houve diferença entre a idade da iniciação sexual e o uso de preservativo na primeira relação e nas demais.

Do total da amostra, 24% das mulheres afirmaram nunca terem consultado com um ginecologista. Dentre as que frequentam o serviço de ginecologia, 49% o fazem anualmente, 41% semestralmente e 10% apenas quando apresentam sintomas. A comparação por faixa etária apresentou diferença estatística quando em relação à consulta ginecológica, maior àquelas mulheres com maior idade ($\chi^2=4,207$; $p=,040$). A consulta ginecológica causa constrangimento para as mulheres em 45% dos casos, causada principalmente pela vergonha em expor partes corporais íntimas (71%), atendimento por profissional do sexo oposto (25%) e por não ter costume (4%). Em relação a exames preventivos, 11% referiram nunca ter feito exame Papanicolaou, 42% nunca fizeram ultrassonografia e 77% mamografia. Complicações ginecológicas foram afirmadas por 36% das mulheres, sendo 20% cistos nos ovários, 17% DST (sendo 15 casos de HPV, 7 casos de Candidíase e 1 caso de sífilis) 14% miomatose uterina, 12% leucorreia. Destaca-se que 24% afirmaram ter inflamação ou infecção sem saber especificar.

Conforme aponta BRASIL (2013), sabe-se que a consulta ginecológica tem, sobretudo um caráter preventivo ao câncer de colo de útero. Sendo assim, torna-se importante o diálogo com essas mulheres acerca dessas questões que as impedem de ter o hábito de cuidar da sua saúde sexual e reprodutiva, bem como é importante que os profissionais de saúde acolham essas mulheres em suas demandas.

A maternidade foi afirmada por 86% das mulheres investigadas, com o número de filhos variando entre 1 e 11 (Média de 2 filhos; DP=1,44 – 88% até 3 filhos). A maioria referiu ter realizado o pré-natal ainda que de forma incompleta. As justificativas dadas pelas 34 mulheres que não realizaram o pré-natal (11%) se referem, principalmente, à ausência de serviço de saúde na localidade (08), dificuldade de acesso/distância (05) e desconhecimento da importância (03). Apenas 56% das mulheres afirmou utilizar métodos contraceptivos, dentre eles destaca-se o anticoncepcional oral ou injetável (32%) e preservativo masculino (10%). Foi citado ainda a laqueadura como método contraceptivo (8%).

Em relação à avaliação dos serviços em saúde em geral foi atingido o escore médio de 6,3 (DP=3,02, variando de 0 a 10), portanto satisfatório. Dentre as principais queixas, estão a falta de médicos diariamente (76%), ausência de hospital (74%) e de equipamentos/laboratórios para exames (69%). Embora o acesso ao serviço de saúde tenha sido avaliado, de forma geral, como fácil (84%), dentre as dificuldades impostas ao atendimento foram citadas a dificuldade de agendamento (40%), distância (23%) e a dificuldade de transporte (18%). O deslocamento até o serviço de saúde é feito caminhando (55%), de carro próprio (28%) ou transporte pago (17%). A maioria das mulheres não tem acompanhante para o atendimento em saúde (53%).

Aponta-se que a acessibilidade dos serviços de saúde é fator preponderante para que o esquema vacinal contra o HPV seja garantido e efetivado. Bem como, assim como apontado no estudo de MANOEL et al. (2017), é necessário que os profissionais de saúde tenham conhecimento sobre a vacinação, de modo a garantir que estas cheguem até os usuários dos serviços, desconstruindo possíveis mitos envolvidos nela e, por sua vez, ampliando o acesso à mesma.

Dados Qualitativos

A partir do resultado das entrevistas com mulheres diagnosticadas com HPV, evidenciaram-se quatro categorias: Diagnóstico Tardio; Momento do Diagnóstico; Dificuldade de Acesso; e Prevenção.

Em relação à categoria Diagnóstico Tardio, observou-se que, apesar da existência dos serviços de saúde, por vergonha, falta de informação e ausência de sintomas aparentes, só buscaram atendimento quando do aparecimento de verrugas, coceira ou vermelhidão. No *momento do diagnóstico* – segunda categoria – emergiram sentimentos de medo, fragilidade e associação com a morte, justificados pela falta de esclarecimentos sobre a doença pelos profissionais, restrita à prescrição medicamentosa e indicação de cauterização da ectopia, além das expressões faciais dos médicos e enfermeiras, que levavam à dedução de gravidade.

Na terceira categoria, *dificuldade de acesso*, ressalta-se a necessidade de deslocamento para centros maiores a fim de realizar a colposcopia e o tratamento. Além disso, foram citados o fato de não ter com quem deixar os filhos e falta de apoio do marido. Na categoria *Prevenção*, observou-se ausência do uso de preservativo, justificado pela confiança no parceiro, conforme também observado em pesquisa realizada por SILVA (2012).

Evidenciou-se a falta de informação acerca do HPV e da necessidade de campanhas que incentivem as mulheres moradoras de cidades rurais a realizarem os exames preventivos, apontando para aspectos de vulnerabilidade programática. Destaca-se também, corroborando o estudo de BLENDIA et al. (2016), a preocupante frequência com que ocorre o diagnóstico tardio, mesmo quando se faz o exame preventivo, uma vez que este possui algumas limitações, a exemplo da alta taxa de falsos negativos, sendo necessário propor outras formas de diagnóstico para infecção decorrente de HPV.

4. CONCLUSÕES

Os resultados do estudo trazem implicações importantes para a efetivação do esquema vacinal proposto para o HPV, uma vez que apontam adequação entre a idade de iniciação sexual das participantes desse estudo e a faixa etária abordada no esquema (9 a 13 anos), administradas nas UBS e escolas. Destaca-se que, ainda que a faixa etária do presente estudo não seja a mesma do esquema vacinal, tem implicações também para o mesmo, uma vez que é formada, provavelmente, pelas mães das adolescentes, exercendo influência no cuidado com a saúde. No entanto, as duas últimas doses podem ser prejudicadas pela forma como o tema é abordado (ou não abordado) nas consultas pelos profissionais de saúde, pela ausência de campanhas específicas e pelas dificuldades de acesso aos serviços de saúde.

Da mesma forma, a proposição de, ao menos, três exames Papanicolau em mulheres de 35 a 45 anos, é prejudicada pela ausência de laboratórios, ausência de hospitais e de médicos diariamente nas cidades rurais, levando à necessidade de deslocamento para centros urbanos maiores, fato este observado pelo

número de mulheres que nunca fizeram uma consulta ginecológica, nunca realizaram o teste Papanicolaou, ultrassonografia e mamografia.

O estudo aponta ainda que, embora a geração mais jovem tenha aumentado o uso do preservativo tanto na primeira relação sexual quanto na sua continuidade, este é interrompido quando a relação afetiva se torna estável, justificadas pela confiança no parceiro e pelo fato de ser casada. Crenças estas fundamentadas no mito do amor romântico, pilares da instituição do casamento.

A organização da rede de saúde deve estar preparada para lidar com a especificidade de cada contexto sócio-cultural na construção de políticas de saúde. As dificuldades das mulheres moradoras em cidades rurais, mais do que derivadas das desigualdades de gênero como comumente preconizadas, se devem, além da carência de informações específicas e contextualizadas, às condições estruturais dos serviços de saúde que dificultam, sobremaneira, o seu acesso. das mulheres residentes em cidades rurais, da prevenção ao HPV e do câncer de colo de útero, bem como aponta para a necessidade de novos estudos na área, considerando esses contextos mais marginalizados quanto ao acesso às políticas públicas de saúde.

REFERÊNCIAS

- [1] Bezerra, S. J.; Gonçalves, P. C.; Franco, E. S.; Pinheiro, A. K. Perfil de
- [2] Mulheres portadoras de lesões cervicais por HPV quanto aos fatores de risco para câncer de colo uterino. *J bras doenças sex transm*, v. 17, n. 2, p. 143-8, 2005.
- [3] Blenda, E, et al. Tumores relacionados ao HPV: estudo retrospectivo de quatro casos sobre mulheres pós-menopausa. *Anais de Medicina*, 2016.
- [4] Brasil. Guia prático sobre HPV: perguntas e respostas. Ministério da Saúde. 2013. Disponível em: http://www.suvisa.ba.gov.br/sites/default/files/Guia%20Pr%C3%A1tico%20HPV%20Perguntas%20e%20Respostas_0.pdf
- [5] Manoel, A. L., et al. Avaliação do conhecimento sobre o vírus do papiloma humano (HPV) e sua vacinação entre agentes comunitários de saúde na cidade de Tubarão, Santa Catarina, em 2014. *Epidemiol. Serv. Saúde*, Brasília, v. 26, n. 2, p. 399-404, 2017. Disponível em: <http://www.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S223796222017000200399&lng=en&nrm=iso>.
- [6] Rama, C. H., et al. Prevalência do HPV em mulheres rastreadas para o câncer cervical. *Revista de saúde pública*, v. 42, n.1, p. 123-130, 2008.
- [7] Pereira, M. A. S; Lozano, L. Um olhar de gênero e de geração nos universos rurais. *Rev. Estud. Fem.*, Florianópolis, v. 20, n. 2, p. 589-592, 2012. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-026X2012000200021&lng=en&nrm=iso
- [8] Silva, E. A. A. Dinâmica das relações afetivas: crenças e implicações para a vulnerabilidade à Aids. Dissertação de Mestrado. UFPB, Paraíba: 2012.
- [9] Travassos, C.; Oliveira, E. X. G.; Viacava, F. Desigualdades geográficas e sociais no acesso aos serviços de saúde no Brasil: 1998 e 2003. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 11, n. 4, p. 975-986, 2006.
- [10] Vieira, E. W. R. Acesso e utilização dos serviços de saúde de atenção primária em população rural do Município de Jequitinhonha, Minas Gerais. Dissertação de Mestrado. UFMG, Belo Horizonte: 2010

Capítulo 12

A juvenilização do HIV/AIDS: Um desafio na contemporaneidade

Camila Rachel Lira Silva

Eliz Rejane Vicente da Silva

Maria do Socorro Pontes de Souza

Resumo: Este artigo resulta das discussões tecidas no projeto de extensão “Educação em Saúde no enfrentamento do HIV/Aids: intervindo nas Unidades Básicas de Saúde no município de Campina Grande/PB” e tem como objetivo contribuir com o debate acerca da questão da juvenilização da doença, considerando o aumento significativo de casos de Aids entre os jovens. Tais dados, podem ser comprovados através dos últimos boletins epidemiológicos sobre HIV/Aids do Ministério da Saúde, que demonstram que, atualmente, o número de casos de HIV/Aids registrados entre pessoas de 15 a 29 anos é cada vez maior, o que tem exigido investimentos em políticas públicas e planejamento de ações que respondam ao aumento de tal demanda, considerando as peculiaridades que abrange este público alvo. O aumento do número de casos de HIV/Aids, especialmente, entre jovens, justificou a realização do referido projeto de extensão tendo como objetivos: realizar ações de Promoção e educação em saúde nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) localizadas nos bairros com maiores incidências de Infecções sexualmente transmissíveis - IST/Aids na cidade de Campina Grande/PB. O referido projeto tem como foco desenvolver sensibilização, divulgação e esclarecimento acerca da importância da prevenção das IST's/Aids; promover ações sócio-educativas que contribuam para a diminuição da contaminação das IST's/Aids. Essa discussão reforça algumas questões tais como: a necessidade de ações de combate à epidemia; o aprofundamento dos debates acerca dos desafios impostos a política de enfrentamento ao HIV/Aids, e as atuais dificuldades de controle da disseminação da doença, sobretudo, entre as camadas mais jovens da população.

Palavras-chave: HIV/Aids. Juvenilização. Educação em Saúde.

1. INTRODUÇÃO

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é uma doença causada pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), responsável pela destruição do sistema imunológico. Atualmente, não existe uma cura efetiva para a doença, apenas tratamento denominado terapia antirretroviral ou ART, a fim de prolongar a vida da pessoa infectada e diminuir as chances de transmissão.

A AIDS teve suas primeiras notificações por volta do ano de 1980 nos Estados Unidos e logo mais se alastrou por todo o mundo. No Brasil, a epidemia começou a ser registrada em meados da década de 1980, quando surgiram os primeiros casos da doença nos centros urbanos mais populosos do país nas regiões Sul e Sudeste (São Paulo e Rio de Janeiro).

Inicialmente não se acreditava que a doença fosse tomar a dimensão que tomou, a epidemia conseguiu caminhos férteis para atingir de forma significativa diversos segmentos sociais por todo o mundo, afetando indivíduos que se encontram vulnerabilizados nos diversos aspectos sociais, econômicos e culturais.

Tendo em vista o crescente número de pessoas infectadas pelo HIV/AIDS em todo o mundo, a epidemia vem se configurando nos últimos anos como um grave problema e desafio da saúde pública, apesar dos avanços científicos acerca da doença.

O número de infectados pelo vírus da AIDS, conforme os números do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS) é de 36,7 milhões de pessoas no mundo.

Quando a doença surgiu, o quadro inicial era de uma epidemia restrita a determinados “grupos de risco” como homossexuais, hemofílicos e usuários de drogas. No entanto, esse perfil foi se modificando ao longo do tempo e, atualmente, a epidemia de HIV/AIDS ultrapassa o campo biológico e destaca-se por afetar indivíduos que se encontram vulnerabilizados nos diversos aspectos sociais, econômicos e culturais.

Desse modo, a epidemia do HIV/AIDS veio assumindo outras características e seguindo algumas tendências como a heterossexualização, interiorização, pauperização, feminilização, envelhecimento e juvenilização, sendo esta último objeto de análise neste trabalho.

Nesse sentido, o presente artigo parte de um recorte das discussões tecidas no projeto de extensão intitulado “Educação em Saúde no enfrentamento do HIV/Aids: intervindo nas Unidades Básicas de Saúde no município de Campina Grande/PB” desenvolvido através da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) cota 2016/2017, que tem dentre seus objetivos desenvolver sensibilização, divulgação e esclarecimentos acerca da importância da prevenção das IST's/Aids¹ e Promover ações sócio-educativas que contribuam para a diminuição da contaminação das IST's/Aids.

O projeto tem duração de um ano e é voltado para intervir nas Unidades Básicas de Saúde da Família de Campina Grande-PB, junto as comunidades com maior incidência de IST's/Aids, através de trabalhos sócio-educativos voltado a apreensão do significado de vulnerabilidade social, em torno de tais doenças. Através das discussões destes temas consideramos que foi possível contribuir para que a comunidade tivesse acesso e troca de saberes que podem estimular o envolvimento dos mesmos no que se refere a sua própria saúde.

Diante do exposto, o presente artigo de caráter documental e bibliográfico, pretende aprofundar as análises construídas durante a realização do referido projeto de extensão, especificamente no que concerne à relação ente IST's/Aids e a elevada incidência entre os jovens. Para tanto, traz inicialmente algumas considerações sobre o surgimento do HIV/AIDS no globo e no Brasil, posteriormente, discute a tendência atual da doença com ênfase na juvenilização e por fim, apresenta algumas considerações finais em torno do tema.

¹ Cabe esclarecer que Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das IST, do HIV/Aids e das Hepatites Virais passa a usar a nomenclatura “IST” (infecções sexualmente transmissíveis) no lugar de “DST” (doenças sexualmente transmissíveis). A nova denominação é uma das atualizações da estrutura regimental do Ministério da Saúde por meio do pelo Decreto nº 8.901/2016 publicada no Diário Oficial da União em 11.11.2016, Seção I, páginas 03 a 17. O Ministério da Saúde explica que “O termo IST é mais adequado e já é utilizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelos principais Organismos que lidam com a temática das Infecções Sexualmente Transmissíveis ao redor do mundo”, pois “A denominação ‘D’, de ‘DST’, vem de doença, que implica em sintomas e sinais visíveis no organismo do indivíduo. Já ‘Infecções’ podem ter períodos assintomáticas (sífilis, herpes genital, condiloma acuminado, por exemplo) ou se mantém assintomáticas durante toda a vida do indivíduo (casos da infecção pelo HPV e vírus do Herpes) e são somente detectadas por meio de exames laboratoriais” (BRASIL, 2017).

2.0 HIV/AIDS: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Conforme o Programa Nacional de Aids, na metade do século XX já se começou a notar a infecção pelo HIV. Os primeiros relatos são de que a doença surgiu na África Central, pela mutação do vírus do macaco, sendo transmitido para o homem pela manipulação de carnes de chimpanzés infectados. Esse relato de transmissão é propagado por diversos autores, que difundem da ideia de que o vírus passou para o ser humano através do “contato íntimo desses animais com os nativos africanos, quer por arranhaduras ou mordidas, quer pelo hábito dessas populações ingerir como alimento a carne de macaco mal cozida, contendo em seus tecidos e fluidos (sangue, secreções) o vírus causal da doença” (VERONESI, 1991, *apud* PINTO et al, 2007, p. 47).

Os primeiros casos clínicos da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, conhecida mundialmente como Aids (infecção que se manifesta em pessoas que adquiriram o vírus HIV), entretanto, é identificada pela primeira vez nos Estados Unidos, no final de 1970. Surge em uma época que as autoridades sanitárias mundiais julgavam que as doenças infecciosas estavam controladas, atribuindo esse controle às tecnologias e ao saber médico moderno.

A descoberta do HIV/Aids no Brasil se dá no início da década de 1980, permeada por dúvidas por se constituir numa doença nova e estigmatizada (GALVÃO, 1997). Apesar dos avanços científicos acerca da infecção, a AIDS ainda vem se apresentando como um dos maiores desafios no âmbito da saúde pública nacional e internacional. Os primeiros casos identificados da doença no Brasil foram, na cidade de São Paulo, sendo logo em seguida notificado no Rio de Janeiro. O quadro inicial era de uma epidemia restrita a determinados “grupos de risco” como homossexuais, hemofílicos e usuários de drogas.

É possível distinguir três momentos distintos na evolução da epidemia no Brasil. O primeiro momento vai da sua origem até 1986, período que se caracterizou, predominantemente, pela infecção via relações homossexuais, com nível alto de escolaridade; o segundo ocorreu entre 1987 e 1990 e as características principais do período foram o aumento dos números de casos pelo uso de drogas injetáveis, diminuição da faixa etária e uma maior disseminação em pessoas com práticas heterossexuais; a terceira fase ocorre a partir de 1991 até os dias atuais, acentua-se a disseminação em casais heterossexuais em vários níveis de escolaridade e classes sociais, em especial as mulheres (BRASIL, 2011).

Passados mais de 30 anos desde o surgimento da AIDS no Brasil, o perfil da doença foi se modificando ao longo dos anos e atualmente, a epidemia de HIV/Aids ultrapassa o campo biológico e destaca-se por afetar indivíduos que se encontram vulnerabilizados nos diversos aspectos sociais, econômicos e culturais. Hoje a infecção apresenta características como: Feminização, juvenilização, interiorização, envelhecimento e pauperização (SANTOS, 2005).

Segundo dados do último Boletim Epidemiológico HIV/Aids²/2016, de 1980 a junho de 2016, foram notificados no país 842.710 casos de aids, o Brasil tem registrado, anualmente, uma média de 41,1 mil casos de aids nos últimos cinco anos. Do ano 2000 – quando da implantação do relacionamento probabilístico dos dados – a junho de 2016, observou-se um total de 634.051 casos de Aids. Contata-se ainda, que de 2007 até junho de 2016, foram notificados no Sinan 136.945 casos de infecção pelo HIV no Brasil, sendo 71.396 no Sudeste (52,1%), 28.879 no Sul (21,1%), 18.840 no Nordeste (13,8%), 9.152 no Centro-Oeste (6,7%) e 6.868 na Região Norte (6,3%). Importa acrescentar ainda que as regiões Norte e Nordeste apresentam uma tendência linear de crescimento da taxa de detecção; em 2006 a taxa registrada foi de 14,9 (Norte) e 11,2 (Nordeste) casos/100 mil hab., enquanto no último ano a taxa foi de 24,0 (Norte) e 15,3 (Nordeste), apresentando um aumento de 61,4% (Norte) e 37,2% (Nordeste). De todos esses percentuais, contata-se que a maior concentração está nos indivíduos com idade, em ambos os sexos, de 25 a 39 anos (BRASIL, 2016).

² O Boletim Epidemiológico HIV/Aids do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis, do HIV/Aids e das Hepatites Virais (DIAHV), da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), do Ministério da Saúde (MS), tem publicação anual, apresenta informações e análises sobre os casos de HIV/aids no Brasil, regiões, estados e capitais, de acordo com os principais indicadores epidemiológicos e operacionais estabelecidos. As fontes utilizadas para a obtenção dos dados são as notificações compulsórias dos casos de HIV e de aids no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), além de dados obtidos no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do qual são selecionados os óbitos cuja causa básica foi o HIV/aids (CID10: B20 a B24); o Sistema de Informação de Exames Laboratoriais (Siscel); e o Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (Siclom) (BRASIL, 2016).

É importante ressaltar que a vulnerabilidade social em contrair o HIV/AIDS está associada a uma série de fatores que podem ampliar ou diminuir as situações de risco. Dentre estes estão: a falta de acesso a informações e baixo nível de escolaridade traduzidos na dificuldade em se adotar práticas seguras. Parte-se do pressuposto de que todas as pessoas são vulneráveis a infecção pelo HIV, estando o aumento ou diminuição dos riscos diretamente relacionados aos aspectos socioculturais e econômicos.

Diante do exposto, no tópico seguinte, será traçada algumas considerações a respeito da juvenilização do HIV/AIDS, característica crescente nos últimos anos.

3. O AUMENTO DE CASOS DO HIV/AIDS ENTRE OS JOVENS: UMA QUESTÃO EM DEBATE

A tendência a “juvenilização” da AIDS é atualmente crescente em todo o globo. Ambos os grupos de transmissão horizontal e vertical se somam na juvenilização da AIDS, que apesar das campanhas de prevenção tem crescido. A UNICEF (2016), divulgou alguns dados, os quais, demonstram que a cada hora vinte e nove (29) adolescentes entre 15 e 19 anos são infectados pelo vírus HIV.

Cabe destacar de acordo com o Estatuto da Juventude, lei 12.852, de 5 de agosto de 2013 parágrafo primeiro, são consideradas pessoas jovens aquelas com idade entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) anos, faixa etária que vem demonstrando um aumento considerável da doença.

Desse modo, a discussão da juvenilização da Aids, tem ganhado visibilidade no debate público sobre as políticas em resposta à epidemia pelo HIV/Aids no Brasil e no mundo, e nesse âmbito, os jovens constituem-se num preocupante grupo de risco, demandando por parte do poder público resposta e ações mais efetivas nesta área.

Os estudos revelam que os jovens têm iniciado a vida sexual cada vez mais precocemente, tornando-os vulneráveis as IST's/AIDS, a baixa idade das primeiras relações, a variabilidade de parceiros, a falta de prevenção e o uso de drogas ilícitas, são apontados como principais fatores de risco para que a contração das IST's/AIDS. Como aponta Saldanha (2008):

O primeiro caso de AIDS em jovens brasileiros foi notificado em 1982, atingindo o número de 10.337 casos entre jovens de 13 e 19 anos, considerando-se o período de 1982 a 2006 e o possível atraso de notificações e dificuldade de acesso do adolescente à testagem. A partir de 1998 houve a inversão da razão de sexo nos casos de AIDS nesta faixa etária, passando a predominar o sexo feminino com taxa de incidência de seis homens para cada dez mulheres. Atualmente predomina a categoria de exposição sexual, com diminuição proporcional dos casos por uso de drogas injetáveis (IDEM *et al*, 2008, p.36).

A diminuição da idade na iniciação sexual não está sendo acompanhada pela informação necessária a respeito das ISTs/AIDS. Com isso, cada vez mais os jovens mantêm relações sexuais associadas a padrões de vulnerabilidade, práticas sexuais sem proteção, o que tem aumentado a contaminação do HIV entre os jovens. Com isso, cabe destacar que,

Apesar de haver uma estabilização nas suas taxas, a infecção pelo HIV vem aumentando entre os adolescentes em todo o mundo. Quase metade dos novos casos de AIDS ocorre entre os jovens com idade entre 15 e 24 anos. Apesar da grande divulgação através da mídia e de campanhas na comunidade e em escolas, a ausência do uso de preservativo masculino nas relações sexuais ainda é um fator de grande relevância na contaminação desses jovens. Problemas relacionados a diferenças socioculturais entre os gêneros tornam as adolescentes um grupo ainda mais vulnerável, pois, apesar de conhecerem os riscos de uma relação não protegida, ainda se sentem inibidas por solicitar o uso do preservativo nas suas relações (NADER *et al*. 2009, p.374-375).

A falta de políticas públicas direcionada para esse segmento e a desinformação acerca da doença, reforçam ainda mais os obstáculos para que esses jovens apreendam o grau de suas exposições em contrair a doença, diante das suas realidades individuais e coletivas.

Dados do Boletim Epidemiológico do ano de 2016, confirmam a elevação dos casos de contaminação pelo vírus entre a população jovem.

A razão de sexos também varia de acordo com a faixa etária. Entre os jovens de 13 a 19 anos, observa-se uma tendência de aumento da participação dos homens. Em 2015, foram registrados 62% de casos a mais em homens do que em mulheres (razão de sexos de 17 casos em homens para cada 10 casos em mulheres) (BRASIL, 2016, p. 11).

Nesse sentido, portanto, a maneira de apreender a infecção e a falta de prevenção acarreta em maior vulnerabilidade. Outra característica peculiar entre os jovens é a confiabilidade em pessoas da mesma idade, e o não diálogo com pessoas mais velhas, por entenderem a prática sexual entre adolescentes como *tabu* (UNESCO, 2002).

Outro agravante se dar quando sob o uso de drogas, o uso da camisinha se torna dispensável e desnecessário durante as relações sexuais. Os dados trazidos pelo Boletim Epidemiológico de 2016 produzido pelo Ministério da Saúde aponta que, de 2006 para 2015 a taxa entre jovens de 15 a 19 anos mais que triplicou (de 2,4 para 6,9 casos/100 mil hab.) (BRASIL, 2016).

Neste sentido, para que a epidemia da AIDS seja enfrentada em todas as suas dimensões se faz necessário compreendermos todas as formas de vulnerabilidade social, seja ela política, étnica, racial, de gênero ou cultural a que estão submetidos todos os segmentos sociais, especialmente, os jovens.

Apesar dos avanços em relação ao controle da doença, sobretudo, pela política Nacional de HIV/Aids, é preciso atentar para a naturalização atribuída a infecção. Nessa perspectiva, as ações de promoção e educação em saúde, tornam-se importante instrumento no enfrentamento do avanço da doença, enquanto práticas sociais ao voltar-se para a reflexão da realidade social, identificando os determinantes e a determinação do processo saúde-doença.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do aumento significativo no número de casos registrados de HIV/AIDS, vem se acentuando o fenômeno da juvenilização da epidemia, o que tem gerado preocupação de técnicos, ativistas e pesquisadores da área. É possível identificar que a Aids adentrou o universo juvenil e é uma das tendências em ascensão no mundo atualmente. Com isso, os mais jovens são os mais vulneráveis, por diversos fatores, sejam eles; cultural, econômico e/ou social, dentre outros.

O jovem com HIV não só terá que enfrentar as mudanças e transformações inerentes a época da vida, além de preocupar-se com o impacto que a revelação do diagnóstico causará em si mesmo, mas também em todo ao seu cotidiano. O medo da não aceitação dos seus pares, o medo do desconhecido, poderão levar tal segmento ao afastamento da família e do convívio social, por vezes pelo preconceito para com a doença, este se isola, entra em depressão o que pode vir agravar ainda mais seu quadro.

Portanto, embora não exista cura, e sim tratamento, Rios (2003) enfatiza que a possibilidade transformadora só se concretizará à medida que nos dispusermos a realmente enfrentar as desigualdades e opressões, a encarar as contradições dos nossos universos sociais e sexuais, e rasgar os véus dos preconceitos.

A juvenilização da AIDS é um sério problema de saúde pública, que precisa ser enfrentado. Partindo desse pressuposto, fica evidente que temas como a sexualidade, por exemplo, ainda são tabus em nossa sociedade, e que precisam ser melhor trabalhados com os segmentos jovens, com o intuito de haver diminuição do número de casos e da vulnerabilidade dos mesmos.

Convém destacar que todas as pessoas são vulneráveis à infecção pelo HIV. Nesta perspectiva, se faz necessário a construção de respostas efetivas, referentes a ações de prevenção e promoção que tenham abrangência à população em geral, tendo em vista que os dados da epidemia na atualidade vêm aumentando entre indivíduos que se encontram vulnerabilizados, dentre os quais, o segmento jovem da população.

Com base na mudança de seu perfil ao longo dos anos, e acreditando que seu trato não se restringe apenas a uma intervenção médica e medicamentosa, o desenvolvimento de práticas educativas em saúde promotoras de um cuidado integral torna-se importante, uma vez que as decisões sobre o comportamento sexual não podem ser isoladas das influências sociais, econômicas e culturais mais amplas que norteiam a vida dos indivíduos e da coletividade.

REFERÊNCIAS

- [1] Brasil. Ministério da saúde. Boletim epidemiológico aids/DST. Brasília jul./ set. 2011. Disponível em: <http://www.aids.gov.br/sites/default/files/anexos/publicacao/2012/52654/boletim_2012_final_1_pdf_21822.pdf>. Acesso em: 25 abr. 2017.
- [2] _____. Departamento de IST, Aids e Hepatites Virais. Disponível em: <<http://www.aids.gov.br/noticia/2016/departamento-passa-utilizar-nomenclatura-ist-no-lugar-de-dst>> Acesso em Maio de 2017.
- [3] _____. Ministério da saúde. Boletim epidemiológico aids/DST. Brasília jul./ set. 2016. Disponível em: <http://www.aids.gov.br/sites/default/files/anexos/publicacao/2010/44546/_p_boletim_hepatites_2010_pdf_p_36425.pdf>. Acesso em 18 abr. 2017.
- [4] _____. Presidência da República Secretaria Nacional da Juventude LEI Nº 12.852, de 5 de agosto de 2013. Estatuto da juventude. Brasília –DF, 2013
- [5] Galvão, J. As respostas das organizações não-governamentais brasileiras frente à epidemia de HIV/AIDS. Políticas, instituições e AIDS: enfrentando a epidemia no Brasil / Richard Parker (org.). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, ABIA, 1997.
- [6] Nader, S. S. et al. Juventude e AIDS: conhecimento entre os adolescentes de uma escola pública em Canoas, RS. Revista da Amrigs, Porto Alegre, 53 (4): 374-381, out.-dez. 2009. Disponível em:. Acesso em: 20 abr. 2017.
- [7] Pinto, A. C. S. et. al. Compreensão da Pandemia da AIDS nos últimos 25 anos. In. DST – J bras Doenças Sex Transm 2007; 19(1): 45-50 – ISSN: 0103-4065. Disponível em :< <http://www.dst.uff.br//revista19-1-2007/7.pdf>>. Acesso em: 06 abr. 2017.
- [8] Rios, L. F. Juvenilização do HIV/AIDS por via sexual. In: Boletim Abia. Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS – Abia. Rio de Janeiro, nº 49 julho/Setembro de 2003. Disponível em: http://abiaids.org.br/_img/media/boletim49b.pdf. Acesso: 20 Abr. 2017.
- [9] Saldanha, A. A. W. (org); et al. Comportamento sexual e vulnerabilidade à aids: um estudo descritivo com perspectiva de práticas de prevenção. In: DST – J bras Doenças Sex. Transm. 2008.
- [10] Santos, R. M. dos. O serviço social e a Exclusão/ Inclusão dos portadores de HIV/AIDS: Demandas e Desafios nos hospitais públicos. Dissertação (Mestrado em Serviço Social) Universidade Federal do Rio Grande do Norte- UFRN, Natal/RN, 2005.
- [11] Silva, J. C. O atual perfil do HIV/AIDS e a questão da juvenilização da doença: um estudo junto aos usuários do serviço de assistência especializada em HIV/AIDS e hepatites virais (SAE) do município de Campina Grande-PB. 2016. . Universidade Estadual da Paraíba – UEPB, Campina Grande: 2016. [Monografia] Unaid Brasil. Disponível em: < <http://unaid.org.br/estatisticas/> Acesso em: Abr. 2017.
- [12] Unesco. AIDS: o que pensam os jovens. Brasília: Unesco, 2002.88p. Disponível em: <<http://unaid.org.br/biblioteca/AIDS%20o%20que%20pensam%20os%20jovens%20-%20pol%EDticas%20e%20pr%Eticas%20educativ.pdf>>. 2017.
- [13] Unicef. Organização Mundial de Saúde. 2016. Disponível em: <http://www.unaid.org.br/>>. Acesso em: 24 abr. 2017.

Capítulo 13

Vulnerabilidade programática em saúde em cidades rurais Paraibanas segundo os níveis de atenção

Eunice Aristides Araújo

Francisca Marina de Souza Freire Furtado

Ana Alayde Werba Saldanha

Resumo: Este estudo teve como objetivo analisar elementos de vulnerabilidade programática em saúde a partir da percepção de moradores residentes em cidades rurais da Paraíba, segundo os níveis de atendimento. Essas cidades são caracterizadas por apresentarem baixo nível econômico, social, demográfico, com população inferior a 10.000 mil habitantes. Participaram desse estudo 992 sujeitos, distribuídos entre 31 municípios do estado. Com relação à busca por atendimento e nível de atenção constatou-se que 41% da amostra buscou os serviços de pronto atendimento, 12% consulta por médico especialista, 12% prevenção e 8% pré-natal. Para atender a seus problemas de saúde, 32% dos participantes foram atendidos na atenção básica (ESF), 24% em serviços de média complexidade (UPA/Policlínica) e 44% na alta complexidade (hospitais). Quanto à avaliação da equipe e estrutura dos serviços de saúde os resultados apontaram para uma avaliação regular, com média de 7,44 (DP=2,48) e 6,93 (DP=2,73), respectivamente. Quanto à organização, vínculo e acolhimento, resolatividade e prevenção, observou-se que apenas o fator Prevenção apresentou diferença estatisticamente significativa ($f=6,921$; $p=0,000$) entre as macrorregiões. Dessa forma, observa-se que a precariedade na estrutura e organização dos serviços disponíveis nas cidades rurais interferem no fluxo pela busca e nível de atendimento, o que contribui para a desarticulação nas redes de atenção.

Palavras chave: Vulnerabilidade Programática, Cidades rurais, Níveis de Atenção.

1. INTRODUÇÃO

Entre as políticas desenvolvidas para melhor atendimento à população destaca-se a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), regulamentado pelas Leis nº 8.080/90 e nº 8.142/90 as quais determinam as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, assim como, sobre a participação da comunidade na gestão e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, respectivamente. (BRASIL, 1990).

O SUS conta com redes articuladas que se organizam de acordo com níveis de complexidade referentes aos níveis de atenção à saúde: Atenção Primária, Média Complexidade e Alta Complexidade. A Atenção Primária em Saúde (APS) é considerada um "componente-chave" do sistema de saúde e apresenta dois aspectos que apesar de serem diferentes, são interdependentes: esse modelo representa tanto uma estratégia de organização do sistema de saúde, quanto um modelo de transformação frente às práticas clínicas-assistenciais pelos profissionais de saúde (STARFIELD, 2002). A Estratégia Saúde da Família (ESF) é apresentada como uma das propostas desenvolvidas pelo Ministério da Saúde com o intuito de reorganizar a atenção primária e atingir os objetivos da universalização, equidade e integralidade. É definida como um conjunto de ações e práticas que perpassam a assistência médica, com ênfase nas necessidades da população, estruturadas e apreendidas mediante o estabelecimento do vínculo entre usuários e profissionais de saúde (OLIVEIRA; PEREIRA, 2013). Por outro lado, a Atenção de Média Complexidade (AMC) refere-se a um conjunto de ações e serviços disponibilizados por profissionais especializados realizados em âmbitos ambulatoriais e hospitalares com a utilização de recursos tecnológicos para auxiliar no diagnóstico e tratamento dos problemas de saúde da população. A Alta Complexidade (AAC) compreende um conjunto de procedimentos que abarca altas e complexas tecnologias, o que demanda maior custo, com o objetivo de proporcionar à população serviços especializados e qualificados. (MENDES, 2011).

Embora as políticas de saúde sejam desenvolvidas com o intuito de atender as necessidades da população, elas precisam ser capazes de extinguir os obstáculos existentes entre os serviços e a comunidade de forma a construir uma rede de apoio regionalizada e integrada que possa garantir o acesso a todos de forma integral e igualitária (ASSIS; JESUS, 2012). De acordo com Paim (2006), a distribuição dos recursos para a infraestrutura dos serviços de saúde ocorre de forma desigual entre as regiões, estados e municípios, assim como entre localidades urbanas e rurais, centros das cidades e periferias, o que repercute diretamente na intensificação das disparidades frente ao acesso e disponibilidade dos serviços entre essas regiões.

As práticas de atendimento e acesso aos serviços de saúde em cidades rurais apresentam certa deficiência quando comparadas com os territórios caracterizados como urbanos. É importante salientar que a literatura não apresenta uma definição acerca de cidade rural, apenas caracteriza esse meio como sendo localidades com baixo índice de desenvolvimento com população inferior a 10.000 habitantes. Além disso, essas cidades são marcadas pela precariedade na cobertura e organização dos serviços de saúde, dificuldades de assistência médica especializada, condições socioeconômicas e saneamento básico precários. (NERI; SOARES, 2002).

As barreiras frente ao acesso e (in)disponibilidade dos serviços de saúde e a própria organização desses serviços são alguns dos elementos que compõem o que Ayres, França Jr., Calazans e Saletti-Filho (2003) chamam de vulnerabilidade programática. Estes fatores contribuem para que as pessoas que residem em cidades de contexto rural apresentem-se ainda mais vulneráveis ao adoecimento. O termo vulnerabilidade corresponde a um conjunto de aspectos (individuais e coletivos) relacionados à maior predisposição dos indivíduos e comunidades ao adoecimento e/ou agravamento, além da falta de recursos à proteção e ao seu enfrentamento. A partir dessa concepção o indivíduo é caracterizado como um sujeito ativo e construtor compreendido a partir da sua intersubjetividade, e não apenas efeito das relações sociais. (AYRES; FRANÇA JR.; CALAZANS; SALETTI-FILHO, 2003). Com base no que foi apresentado, este estudo teve como objetivo identificar os elementos de vulnerabilidade programática segundo os níveis de atenção à saúde em cidade rurais da Paraíba.

2. METODOLOGIA

Tratou-se de um estudo quantitativo, de caráter descritivo, exploratório e analítico, de cunho transversal. Uma amostra de 992 participantes foi determinada por um processo de múltiplos estágios, em 31 municípios do estado da Paraíba distribuídas entre as 04 macrorregiões de saúde. Destes, 285 (29%)

participantes pertencem à macrorregião de João Pessoa,) 302 (30%) da macrorregião de Campina Grande; 234 (24%) da macrorregião de Patos e 171 (17%) pertencentes à macrorregião de Sousa. Foi utilizado o questionário "Levantamento de cuidados de saúde e vulnerabilidades" desenvolvido a partir dos estudos realizados por Ribeiro (2012), Saldanha (2011), Saldanha, et al. (2008) e Saldanha, et al. (2012).

Para construção do banco e análise dos dados foi utilizado o Software SPSS.for Windows (SPSS) versão 20.0. Na sequência os dados foram analisados por meio de estatística descritiva e outros testes de comparação e associação. Além disso, este estudo seguiu os procedimentos éticos determinado pela Resolução nº 466/96, vigente na época, Sobre Pesquisas Envolvendo Seres Humanos do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba.

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO

As diferenças no ato de buscar os serviços de saúde, ter disponibilidade de acesso e ser beneficiado com o atendimento recebido refletem as desigualdades individuais frente às situações de vulnerabilidades que possam levar os sujeitos ao adoecimento, assim como diferentes formas de se comportar frente à doença (uso de chás, plantas medicinais...), além da oferta e das características dos serviços que são disponibilizados à sociedade. (TRAVASSOS et al., 2000).

Os dados socioeconômicos e demográficos apontam para um perfil de participantes, na maioria, feminino (74%), casado (70%), em idade produtiva ($M=43,6$ anos; $DP=14,8$; variando entre 21 e 85 anos), com baixa escolaridade (11% não tem nenhum nível de escolaridade e 36% cursou até o quarto ano do ensino fundamental) e baixa renda (91% declararam renda até 2 salários mínimos).

Para a maioria dos participantes deste estudo, o último atendimento em serviços de saúde ocorreu nos seis meses anteriores ao estudo, ocorrendo na alta complexidade, que aqui se refere aos hospitais. Constatou-se que as mulheres buscam atendimento em menor tempo ($M=1,3$; $DP=0,67$) do que os homens ($M=1,6$; $DP=0,84$) ($t=4,794$; $p=0,00$). Os motivos para a busca por atendimento em saúde nesta última vez, em geral, foram para: 41% pronto atendimento (hipertensão, dor aguda, virose, dengue), 15% consulta por médico especialista (gastroenterologista, cardiologista, oftalmologista, urologista, dermatologista, mastologista, endocrinologista e neurologista), 12% prevenção e 8% pré-natal (Tabela 01). Para atender a seus problemas de saúde, 32% dos participantes foram atendidos na atenção básica (PSF), 24% em serviços de média complexidade (UPA/Policlínica) e 44% na alta complexidade (hospitais). A partir cruzamento entre os motivos de busca e o nível de atenção, observa-se distorções propositivas no nível atendimento em cada nível de atenção, a exemplo da prevenção e pronto atendimento pelos hospitais, quando deveriam estar situados na Atenção Básica.

Tabela 01: Motivos da busca por atendimento de acordo com os níveis de atenção

Motivos (*)	Nível de Complexidade do Atendimento							
	Básico		Média		Alta		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%
1. Prevenção (B)	47	38%	18	14%	59	48%	124	12%
2. Pré-Natal (B)	23	28%	17	21%	41	51%	81	8%
3. Doença Crônica (B)	06	27%	03	14%	13	9%	22	2%
4. Pronto-Atendimento (B)	132	32%	116	28%	159	39%	407	41%
5. Odontologia (B)	13	56%	-	-	10	43%	23	2%
6. Transtornos Psi (B)	10	30%	07	21%	16	48%	33	3%
7. Trocar receita (B)	02	20%	01	10%	07	70%	10	1%
8. Exames (M)	07	30%	08	35%	08	35%	23	2%
9. Especialista (M)	42	28%	48	32%	62	41%	152	15%
10. Acidente (A)	06	26%	14	61%	03	13%	23	2%
11. Cirurgia (A)	-	-	-	-	10	2%	10	1%
12 - Outros	28	33%	11	13%	45	53%	84	8%
Total	316	32%	243	24%	433	44%	992	100%

*Nível de Complexidade da Demanda

Estudos que abordam as diferenças de gênero na saúde demonstram que as mulheres buscam os serviços de saúde com mais frequência que os homens. Este diferencial pode estar associado às variações no perfil das necessidades entre os grupos, no caso das mulheres, a gravidez, o parto, campanhas de vacinação infantil, até mesmo a cultura, onde à mulher é associada ao papel de “cuidadora”, não apenas dos filhos, mas dos parceiros, familiares e pessoas mais próximas. Essa temática tem se mostrado o tema de grande relevância no âmbito da saúde, pois a literatura tem evidenciado não apenas a resistência dos homens buscarem os serviços de saúde, mas também, as barreiras que estes encontram ao acesso aos serviços, além das crenças subjacentes ao processo de busca por atendimento pelos homens o que contribuem para que estes só procurem o atendimento quando a doença já se encontra instaurada, tornando-o mais vulnerável tanto ao adoecimento quanto ao agravamento do problema de saúde (PINHEIRO, COUTO, 2008; NASCIMENTO, GOMES, 2008; LIMA et al., 2014; SOUSA et al., 2015). A alta procura pelos serviços de saúde pelas mulheres já vem sendo evidenciado em outros contextos, por exemplo, na área da saúde mental. Estudo desenvolvido em cidades rurais da Paraíba por Freire (2016) e Costa e Ludemir (2005) constatou-se que as mulheres apresentavam maior tendência a desenvolver transtornos mentais comuns.

Embora o estudo tenha sido desenvolvido em cidades rurais onde os próprios participantes informaram a existência da ESF, os dados demonstraram alto índice de busca por serviços de alta complexidade, um dado bastante preocupante quando observamos os motivos que levaram os usuários a se dirigirem aos serviços: pronto atendimento, consulta a médicos especialistas, exames de prevenção e pré-natal. Sabe-se que esses serviços, são, ou pelo menos deveriam ser (conforme preconizado pelo Ministério da Saúde) disponibilizados na atenção básica. Estudo desenvolvido por Rossaneis et al. (2011) já retrata que a falta de profissionais qualificados, a escassez de recursos, equipamentos, materiais para exames, medicamentos e o número cada vez mais reduzido de vagas para a realização de exames, assim como, o tempo de espera são apenas alguns motivos que têm levado a população a buscarem atendimentos nos hospitais para o tratamento de patologias que poderiam ser resolvidas na atenção básica e, com isso, a superlotação nos serviços de média e alta complexidade, dificultando o acesso dos pacientes que de fato necessitam deste tipo de serviço. Isso nos leva a questionar a efetivação das políticas de saúde nessas cidades, assim como, o direcionamento dos repasses públicos para investimento e manutenção dos serviços básicos que garantem melhor assistência à população.

Na Figura 01, o quadro verde ilustra o atendimento correto para cada nível de complexidade. Conforme pode ser visto, há um desvio no atendimento em relação aos níveis de atendimento, principalmente em relação às demandas do nível de complexidades básico e médio que são efetuadas na alta complexidade.

Figura 01: Motivos da busca por atendimento de acordo com os níveis de atenção

Pesquisas sobre a avaliação do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) destaca que as principais dificuldades mencionadas pelos usuários na atenção básica consistem na falta de médicos, na quantidade de vagas e fichas, muitas vezes insuficientes para atender a demanda (FAUSTO et al., 2014). Essas barreiras encontradas nas unidades básicas de saúde podem contribuir para que os usuários se direcionem aos serviços de alta complexidade com o intuito de terem seus problemas resolvidos com mais rapidez. Além disso, muitos usuários não têm noção das atribuições das unidades e nem que tipos de serviços elas disponibilizam gerando uma desarticulação nos níveis de complexidade (ANDRADE et al., 2013). Entretanto, não podemos trazer isso como uma justificativa, pois estaríamos correndo o risco de naturalizar os problemas já evidenciados e não buscar meios eficazes de redirecionar/atrair os usuários a buscarem primeiramente as unidades básicas.

Quanto à avaliação dos serviços de saúde, os resultados apontaram para uma avaliação regular, com média de 7,44 (DP=2,48) para a equipe de profissionais de saúde e 6,93 (DP=2,73) para a estrutura física e organizacional do serviço de saúde. Para verificar a percepção de moradores de cidades rurais acerca dos serviços de saúde foram avaliados quatro aspectos: Organização; Vínculo e Acolhimento; Resolutividade e Prevenção.

Em relação ao fator Organização, verifica-se que a maioria dos usuários afirma a presença dos profissionais nos serviços e equipamentos satisfatórios. As maiores deficiências estão no que se refere à disponibilidade de medicamentos, pior na macrorregião de Campina Grande ($X^2=11,437$; $p=.01$) e realização de exames, com menor percentual em João Pessoa e maior em Sousa ($X^2=7,754$; $p=.05$). O fator referente à Resolutividade foi avaliado com percentuais variando de 71% à 90% em todas as macrorregiões, denotando avaliação bastante positiva. Observa-se, assim, que, no que se refere aos subsídios materiais e resolução de demandas, os usuários não se sentem prejudicados.

Dados da Avaliação Externa realizada na Paraíba já denunciam a precariedade do acesso aos serviços especializados, pois ao se analisar o percurso para uma consulta com um médico especialista pela unidade de saúde, constatou-se que 47,2% das vezes a consulta é agendada pela unidade de saúde e só após é comunicada ao usuário. Apenas 10,2% das ESF os usuários já saem das unidades com a consulta marcada. Um dado preocupante, pois desperta para a existência de problemas no fluxo dos níveis os quais podem estar associados com a estrutura, organização, dificuldade de acesso, falta de planejamento e, com isso, o aumento no tempo de espera (PROTASIO et al., 2014).

Algumas pesquisas como a desenvolvida por Taddeo et al. (2012) demonstram que a existência de barreiras geográficas limita a locomoção e acesso aos serviços de saúde o que pode interferir, inclusive, na adesão ao tratamento. Resultados semelhantes foram identificados por Vieira (2010) com uma população rural nos municípios de Jequitinhonha/MG que teve como objetivo avaliar o acesso e a utilização dos serviços de saúde. De acordo com Ramos e Lima (2003) o acesso dos usuários às instituições de saúde é marcado pelas dificuldades relacionadas desde o percurso entre suas residências e as unidades de saúde que perpassa a efetivação da consulta até a garantia de conseguir retornar ao mesmo profissional através de agendamentos.

Em relação Vínculo e Atendimento, o acolhimento dado ao usuário, o entendimento e explicações do que é dito tanto pelo usuário quanto pelos profissionais é muito bem avaliado, com percentuais acima de 84%, com destaque para o acolhimento que atinge 95% de afirmações em Sousa ($X^2=8,38$; $p=.04$). No entanto, quando avaliados os aspectos relativos ao retorno para o mesmo profissional, tempo da consulta e a solicitação de informações sobre sua condição de vida, os percentuais afirmativos para avaliação satisfatória no caso dos dois primeiros e negativa quanto a informações sobre sua condição de vida, com diferença estatisticamente significativa ($X^2=14,699$; $p=.002$), com destaque negativo para as macrorregiões de Sousa e Campina Grande, respectivamente. Sabe-se que a interação junto aos profissionais tem se mostrado de grande relevância, sobretudo para ações de promoção e prevenção de doenças, além de proporcionar o contato direto e mais profundo com a realidade dos usuários dos serviços de saúde. (ASSUNÇÃO, URSINE, 2008; OLIVEIRA, TUNIN, SILVA, 2008).

Quanto à Prevenção, os usuários afirmam a existência de campanhas e propagandas nos serviços de saúde (menos visível na macrorregião de João Pessoa, $X^2=40,947$; $p=.000$) e a disponibilidade de preservativos, com distribuição maior nas macrorregiões de Campina Grande e Sousa ($X^2=8,137$; $p=.04$; $p=.01$). No entanto, poucos usuários afirmaram terem recebido convites para participação em grupos preventivos, principalmente na macrorregião de Sousa ($X^2=15,755$; $p=.001$) e menos ainda terem recebido oferta de testagem para o HIV, com destaque para a macrorregião de João Pessoa, ainda que sem diferença estatística significativa.

Sabemos da existência de campanhas de prevenção que são realizadas anualmente como Janeiro Branco, Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, entre outras. São ações que, de fato, têm contribuído e atraído a atenção dos usuários aos serviços de saúde, contudo, não devemos limitar a saúde mental, a saúde do homem, saúde da mulher apenas a um determinado mês. Somado a isso, ainda tem a baixa oferta dos testes de HIV/AIDS. Embora o estudo não apresente dados acerca do número de gestantes, observou-se que a maioria da amostra é composta, em sua maioria, por mulheres em idade produtiva. Sabe-se que esse teste é uma das exigências durante o pré-natal tanto para prestar melhor assistência à mãe quanto para evitar a transmissão vertical para o feto quando a mãe descobre ser soropositivo ao HIV. Este dado é bastante intrigante, sobretudo, num contexto onde a população, muitas vezes, não se considera vulnerável ao vírus em decorrência, principalmente, da confiança no parceiro (SILVA et al., 2014).

De acordo com França Júnior, Calazans e Zucchi (2008) é de fundamental importância o aumento dos testes de HIV, principalmente acompanhado do aconselhamento, uma vez que essa estratégia tanto pode auxiliar na ruptura da cadeia de transmissão do HIV e conhecer o estado sorológico, quanto permite aos profissionais de saúde identificar as vulnerabilidades dos pacientes que frequentam os serviços. Nesse sentido, o aconselhamento deve ser um momento de discussão com o intuito de sanar as dúvidas. O que preocupa é que essas práticas são poucas evidenciadas no sistema, quando não ignoradas ou realizadas de forma inadequada, sem respaldo teórico nas redes de atenção básica (PAIVA; PUPO; BARBOZA, 2006).

4. CONCLUSÃO

Apesar das responsabilidades municipais na administração serem requisitos da descentralização do Sistema Único de Saúde, a sua efetivação ainda é problemática. A falta de informação e formação dos profissionais que estão em contato direto com essas pessoas poderiam contribuir para que estas adquirissem um pouco mais de conhecimento acerca dos seus direitos e deveres, assim como, os profissionais teriam maiores e melhores oportunidades de “adentar” na realidade de uma população que, muitas vezes, sofre por falta de conhecimento.

Mesmo com alta cobertura da Estratégia Saúde da Família nesses municípios, identificou-se certa “deficiência” dessa política na efetivação de suas ações, uma vez que motivos básicos (como hipertensão, diabetes, exames de prevenção) que levaram os usuários a buscarem os serviços deveriam ser solucionados nas unidades básicas foram direcionados aos serviços da alta complexidade o que contribui para a desarticulação do sistema e, conseqüentemente, uma desordem na rede de assistência. Associado a isso, ainda, constou-se as situações de vulnerabilidades às quais os moradores desses municípios se encontram susceptíveis em decorrência, de forma especial, das condições financeiras, da cultura local e da forma como os serviços de saúde se encontram estruturados e organizados, além da falta de políticas educativas de prevenção e promoção da saúde.

Não se pode negar a beleza do Sistema Único de Saúde, o que se deve questionar é a forma como ele se encontra organizado e como essa organização têm gerado disparidades ao acesso e atendimento aos serviços. É certo que os recursos são distribuídos aos municípios proporcionalmente ao número de habitantes, contudo, seria de grande valia levar em consideração as principais demandas e, conseqüentemente, buscar melhores investimentos em práticas de saúde. Isso nos leva a refletir sobre a qualidade dos serviços prestados nas cidades rurais e nas políticas que têm sido desenvolvidas para essa população, além de fiscalizações mais rigorosas da redistribuição dos recursos do Governo Federal aos municípios para a implantação de novas unidades de saúde e aprimoramentos dos serviços atuais. É preciso tratar os problemas de saúde no meio rural de maneira contextualizada com a realidade à qual essa população se encontra inserida. E de forma dinâmica e estruturada propor estratégias resolutivas que envolvam ações de prevenção, promoção e reabilitação da saúde conforme preconizado pelo SUS.

REFERÊNCIAS

- [1] Assis, M. M. A.; Jesus, W. L. A. Acesso aos serviços de saúde: abordagens, conceitos, políticas e modelo de análise. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 17, n. 11, p. 2865-2875, 2012. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-81232012001100002&script=sci_abstract&tlng=pt>. Acesso em: 17 maio. 2018.
- [2] Ayres, J. R. C. M.; França Junior, I.; Calazans, G. J.; Saletti Filho, H.C. O conceito de vulnerabilidade e as práticas de saúde: novas perspectivas e desafios. In: Czeresnia, D.; Freitas, C.M. *Promoção da saúde: conceitos, reflexões, tendências*. Rio de Janeiro: Fiocruz, p. 117-39, 2003.
- [3] Azevedo, R. L. W. Aspectos Psicossociais da Sexualidade Adolescentes Associada à Vulnerabilidade ao HIV/AIDS. Dissertação de Mestrado (Psicologia Social). João Pessoa: Universidade Federal da Paraíba, 2007.
- [4] Brasil. Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990. Regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou privado. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm. Acesso em: 17 maio. 2018.
- [5] _____. Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Disponível em: http://conselho.saude.gov.br/legislacao/lei8142_281290.htm. Acesso em: 17 maio. 2018.
- [6] Costa, A. G. D.; Ludermir, A. B. Transtornos mentais comuns e apoio social: estudo em comunidade rural da Zona da Mata de Pernambuco, Brasil. *Cadernos de saúde pública*, v. 21, n. 1, 73-79, 2005. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/csp/v21n1/09.pdf>> Acesso em: 19 maio. 2018.
- [7] Fausto, M. C. R.; Giovanella, L.; Mendonça, M. H. M.; Seidl, H.; Gagno, J. A posição da Estratégia Saúde da Família na rede de atenção à saúde na perspectiva das equipes e usuários participantes do PMAQ-AB. *Saúde Debate*, v. 38, n. especial, pp. 13-33, 2014. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/sdeb/v38nspe/0103-1104-sdeb-38-spe-0013.pdf> Acesso em: 19 maio. 2018.
- [8] França Júnior, I.; Calazans, G.; Zucchi, E. M. Mudanças no âmbito da testagem anti-HIV no Brasil entre 1998 e 2005. *Revista de Saúde Pública*, v. 42, n. 1, pp: 84-87, 2008. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89102008000800011 Acesso em: 19 maio. 2018.
- [9] Furtado, F. M. S. F. Vivendo à margem: prevalência e vulnerabilidade ao transtorno mental comum em mulheres residentes em cidades rurais paraibanas. Paraíba. Tese de Doutorado. Ufpb, João Pessoa, 2016.
- [10] Lima, M. A. S.; Silva, J.; Freire, F. M. S.; Ribeiro, K. C. S.; Pichelli, A. A. W. S. A influência de crenças masculinas de gênero no cuidado com a saúde. *Gênero e Direito*, v. 2, n. 2, pp.194-210, 2014. Disponível em: <http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/ged/article/view/19428> Acesso em: 19 maio. 2018.
- [11] Mendes, E. V. As redes de atenção à saúde. Brasília: Organização Pan-Americana de Saúde, 2011.
- [12] Nascimento, E. F.; Gomes, R. Marcas identitárias masculinas e a saúde de homens jovens. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 24, n. 7, pp. Disponível em: <1556-1564, 2008. http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-311X2008000700010&script=sci_abstract
- [13] Acesso em: 19 maio. 2018.
- [14] Neri, M.; Soares, W. Desigualdade social e saúde no Brasil. *Caderno de Saúde Pública*, v. 18, n. (Suplemento), p. 77-87, 2002. Disponível em: <<https://www.scielo.org/article/csp/2002.v18suppl0/S77-S87/>>. Acesso em: 17 maio. 2018.
- [15] Oliveira, M. A. C.; Pereira, I. C. Atributos essenciais da Atenção Primária e a Estratégia Saúde da Família. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 66, ed. especial, p. 158-164, 2013. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71672013000700020. Acesso em: 17 maio. 2018.
- [16] Paim, J. S. *Desafios para a saúde coletiva no século XXI*. Salvador, Edufba, 2006.
- [17] Paiva, V.; Pupo, L. R.; Barbosa, R. O direito à prevenção e os desafios da redução da vulnerabilidade ao HIV no Brasil. *Revista de Saúde Pública*, v. 40, n. (supl), pp: 109-119, 2006. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/rsp/v40s0/15.pdf>> Acesso em: 19 maio. 2018.
- [18] Pinheiro, T. F.; Couto, M. T. Homens, masculinidades e saúde: uma reflexão de gênero na perspectiva histórica. *Cadernos de História da Ciência*. São Paulo, v. 4, n. 1, p. 53-67, 2008. Disponível em: <http://periodicos.ses.sp.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-76342008000100004&lng=pt> Acesso em: 19 maio. 2018.
- [19] Protasio, A. P. L.; Silva, P. B.; Lima, E.C.; Gomes, L. B.; Machado, L. S.; Valença, A. M. G. Avaliação do sistema de referência e contrarreferência do estado da Paraíba segundo os profissionais da Atenção Básica no contexto do 1º

ciclo de Avaliação Externa do PMAQ-AB. *Saúde Debate*, v. 38, n. especial, pp. 209 – 220, 2014. Disponível em: < <http://www.scielo.br/pdf/sdeb/v38nspe/0103-1104-sdeb-38-spe-0209.pdf>> Acesso em: 19 maio. 2018.

[20] Ramos, D. D.; Lima, M. A. D. S. Acesso e acolhimento aos usuários em uma unidade de saúde de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 19, n. 1, pp. 27-34, 2003. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-311X2003000100004&script=sci_abstract Acesso em: 19 maio. 2018.

[21] Rossaneis, M. A.; Haddad, M. C. L.; Vannuchi, M. T. O.; Sentone, A. D. D.; Gabriel, C. S. Acolhimento com Avaliação e Classificação de Risco em Hospital Público de Médio Porte e a Responsabilidade da Atenção Básica. *Unopar Cient Ciênc Biol Saúde*, v. 3, n. 3, pp. 169-74, 2011.

[22] Saldanha, A.A.W.; Carvalho, E.A.B.; Diniz, R.F; Freitas, E.S.; Félix, S.M.F.; Silva, E.A.A. Comportamento sexual e vulnerabilidade à Aids: um estudo descritivo com perspectiva de práticas de prevenção. *DST-J Bras Doenças Sex Transm*; v. 20, n. 1, p: 36-44, 2008. Disponível em: < <http://www.dst.uff.br/revista20-1-2008/6.pdf>> Acesso em: 19 maio. 2018.

[23] Saldanha, A.A.W. Situações de Vulnerabilidade à Gravidez na Adolescência: Estilo de Vida e Comportamentos de Risco de Adolescentes Paraibanas Relatório Final, Projeto Temático, Processo CNPq 551215/2007-0, Edital nº 22/2007- Saúde da Mulher. João pessoa, PB, Universidade Federal da Paraíba, 2011.

[24] Saldanha, A.A.W.S.; Silva, J.; Tenório, A.T.; Lima, M.A.S.; Galvão, J.O.; Amorim, G.K. Acessibilidade Masculina aos Serviços de Saúde: implicações para a vulnerabilidade à Aids. Relatório Final de Iniciação Científica. João pessoa, PB, Universidade Federal da Paraíba, 2012.

[25] Silva, e. A. A.; Wiese, I. R. B.; Furtado, F. M. S. F.; Anjos, D. F.; Pichelli, A. A. W. S. Comportamentos preventivos e percepção de vulnerabilidade ao HIV de adultos jovens em relacionamento estável. *Investigação qualitativa em saúde, Ciaiq*, v.2, pp: 412-418, 2014. Disponível em: < <http://proceedings.ciaiq.org/index.php/CIAIQ/article/view/558>> Acesso em: 19 maio. 2018.

[26] Starfield, B. Atenção Primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e tecnologia. Brasília: Unesco, Ministério da Saúde, 2002.

[27] Sousa, D. H. A. V.; Lima, M. A. S.; Vieira, K. F. L.; Saldanha, A. A. W. Os homens e as práticas de cuidado em saúde. *Gênero e Direito*. pp. 397-415, 2015. Disponível em: < <http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/ged/article/view/22693>> Acesso em: 19 maio. 2018.

[28] Taddeo, P. S.; Gomes, K. W. L.; Caprara, A.; Gomes, A. M. A.; Oliveira, G. C.; Moreira, T. M. M. Acesso, prática educativa e empoderamento de pacientes com doenças crônicas. *Ciência e Saúde Coletiva*, v. 7, n. 11, pp. 2923-2930, 2012. Disponível em: < http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232012001100009> Acesso em: 19 maio. 2018.

[29] Travassos, C.; Viacava, F.; Fernandes, C.; Almeida, C.M. Desigualdades Geográficas e Sociais na Utilização de Serviços de Saúde no Brasil. *Ciência & Saúde coletiva*, v. 5, n. 1, p. 133-149, 2000. Disponível em: < <http://www.scielo.br/pdf/csc/v5n1/7085.pdf>>. Acesso em: 17 maio. 2018

[30] Vieira, E. W. R. Acesso e utilização dos serviços de saúde de atenção primária em população rural do Município de Jequitinhonha, Minas Gerais. Dissertação de Mestrado. UFMG, Belo Horizonte, 2010.

Capítulo 14

Modelo de acompanhamento e reintegração do trabalhador afastado – Como o processo de reintegração pode auxiliar na longevidade da vida laboral

Eliane Aparecida Floriano

Noélly Cristina Harrison Mercer

Yanas Aparecida Zorzi

Wellen Franco Dias

Rodrigo Meister de Almeida

Resumo: O índice de afastamentos gerados por CID F e CID M (CID 10 – Classificação internacional de doenças) tem crescido muito nos últimos anos levando a um aumento significativo no número de trabalhadores à exclusão do trabalho. Quanto maior o tempo de afastamento, maiores serão as dificuldades e barreiras encontradas para seu retorno e para a garantia e da sua permanência no ambiente laboral. Dessa forma, observou-se a necessidade da criação de um modelo de gestão de afastamentos e de reintegração dos trabalhadores no ambiente laboral através do desenvolvimento de competências que permitam enfrentar a situação evitando os casos de reafastamentos após o seu retorno. Ações bem-sucedidas permitem a reintegração do trabalhador na vida laboral pelo maior tempo possível de forma saudável durante o processo natural de envelhecimento humano, contribuindo dessa forma para a longevidade da vida laboral.

1. INTRODUÇÃO

Segundo o anuário estatístico de 2014, o índice de afastamentos por CID M (CID-10 Classificação Internacional de Doenças) e CID F tem crescido nos últimos anos, o que leva um grande número de trabalhadores à exclusão do trabalho por período superior a 90 dias. Quanto maior o tempo de afastamento, maiores serão as dificuldades para o seu retorno e para a fixação no ambiente laboral, podendo ocorrer reafastamentos tanto pelo CID que originou o primeiro afastamento como por CIDs secundários. Para o trabalhador afastado de seu trabalho, as condições de inserção são mais difíceis, tanto pela perda de determinadas funções e habilidades quanto pelos temores quanto ao futuro profissional. Um acidente de trabalho pode implicar na ruptura da construção da identidade profissional, na medida em que o papel assumido pelo indivíduo, assim como em todas as expectativas sociais e os projetos de vida relacionados à profissão são drasticamente modificados (ROSIN-PINOLA et al., 2004).

Ações bem-sucedidas de acompanhamento e de reintegração desse trabalhador as suas atividades evitam os casos de reafastamentos. Ao sentir-se acolhido, esse profissional torna-se mais engajado e motivado. Além disso, o monitoramento periódico da saúde possibilita, à empresa, realizar diagnósticos precoces e evitar, assim, possíveis afastamentos e, como consequência, reduzir o absenteísmo e garantir a promoção da longevidade no trabalho.

Uma metodologia que possibilita a gestão dos trabalhadores afastados e a sua reintegração na indústria e permite um melhor controle e acompanhamento, reduzindo, assim, o risco de reafastamentos e consequentemente aumenta as chances de uma longevidade da vida laboral.

Uma das principais preocupações do modelo é a sensibilização dos líderes no amparo do funcionário quando do retorno as suas atividades profissionais. É comum, após um longo período de afastamento por acidente de trabalho ou adoecimento, a pessoa sentir-se deslocada no ambiente de trabalho e com isso associar outros quadros emocionais, o que pode gerar perda de rendimento e até mesmo novos afastamentos.

2. METODOLOGIA

A metodologia de reintegração, além de criar o modelo de gestão de afastamento e reintegração de trabalhadores após um período de afastamento, também capacita os gestores da indústria ao desenvolver competências que possibilitem enfrentar a situação, organizando a gestão. Para apoiar esse trabalho, será desenvolvido um *software* com um sistema de informações que possibilite, ao gestor e à equipe de recursos humanos e saúde ocupacional, obterem orientações sobre a conduta a ser adotada, de acordo com o tipo de doença apresentada pelo trabalhador no período que antecede o afastamento, durante esse afastamento e no processo de reintegração, incluindo as restrições do trabalhador quando houver e seu acompanhamento. Espera-se, a partir do projeto, aprimorar o processo de reintegração e reduzir os índices de reafastamento dos trabalhadores, permitindo, dessa forma, uma longevidade da vida laboral.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Entendendo-se a urgência de se criar alternativas para lidar com a reintegração do trabalhador afastado por um período superior a 90 dias, criou-se o projeto reintegração, que visa a metodologia de gestão de afastamentos e a reintegração dos trabalhadores as suas atividades de forma harmoniosa, com vistas a contribuir efetivamente para o processo produtivo e reduzir o risco de reafastamentos.

Seus principais objetivos são:

- Modelo de gestão de afastamento e reintegração dos trabalhadores na indústria.
- Desenvolver um *software* para acompanhamento dos afastados.
- Elaborar um manual do modelo desenvolvido para orientar os gestores da indústria.
- Capacitar os gestores para acolher o funcionário afastado no retorno ao trabalho.

O projeto indica uma oportunidade de melhor gerenciamento do afastamento e da reintegração do trabalhador e pode também contribuir para a diminuição do índice de reafastamento de trabalhadores da indústria e permitir uma longevidade da vida laboral dos trabalhadores.

As características inovadoras do serviço proposto revelam-se na metodologia, que possibilita tanto a gestão dos trabalhadores afastados como a reintegração deles na empresa. Esse programa contemplará a sensibilização dos líderes para que estejam preparados para receber os trabalhadores que retornem de eventuais afastamentos e para que possam também preparar suas equipes que acolherão o trabalhador no ambiente laboral. O diferencial da metodologia está na sua abordagem, que vai desde a concepção de um modelo de gestão dos afastados, até o trabalho com os gestores para a reinserção destes, objetivando evitar possíveis reafastamentos e permitir uma longevidade no ambiente laboral.

A capacitação dos líderes é realizada de forma a sensibilizar e promover o acolhimento no ambiente laboral para que possa ser posteriormente reaplicada às equipes.

Além da capacitação dos líderes, foi desenvolvido um manual com dicas para facilitar e auxiliar o acolhimento do trabalhador na indústria, o qual contém passos e dicas que facilitam as ações do líder com a equipe e com o trabalhador, que irá se sentir acolhido e com isso se evitarão os reafastamentos.

4.CONCLUSÕES

As condições de trabalho, assim como o ambiente ao qual o trabalhador está inserido, são determinantes na longevidade da vida laboral. A falta de adaptação às novas condições e ao ambiente de trabalho após um período de afastamento pode comprometer o processo de reintegração e deixar muitos trabalhadores em idade produtiva afastados, diminuindo a força de trabalho. A metodologia Modelo de Acompanhamento do Trabalhador Afastado pretende reduzir os riscos de reafastamentos após o retorno à indústria e permitir a integração do trabalhador na vida laboral e social pelo maior tempo possível e de forma saudável durante o processo natural de envelhecimento, o que contribui para a longevidade no trabalho.

REFERÊNCIAS

- [1] Cepellos, V. M.; Tonelli, M. J.; Aranha Filho, F. J. E. Envelhecimento nas organizações: percepções e práticas de RH no Brasil. Encontro de Gestão de Pessoas E Relações de Trabalho, 4., 2013, Brasília. Anais... EnGPR. Brasília: Anpad, 2013.
- [2] Diniz, K. T.; Miranda, M. R.; Diniz, T. E.; Moreira, C. H.; Miranda, R. S. S.; Filho, J. E. C. Capacidade laboral dos segurados do INSS portadores de LER/DORT que retornaram ao trabalho. Rev. Conscientiza Saúde, n. 9, v. 4, p. 676-683, 2012.
- [3] Ilmarinen, J.; Tuomi, K.; Eskelinen, L.; Nygard, C-H.; Huuhtanen. P.; Klockars, M. Background and objectives of the finnish research project on aging workers in municipal occupations. Scand J Work Environ Health, 1991a; 17 Suppl. 1:7-11.
- [4] Ilmarinen, J. Promoting health and well-being of the worker: the finnish experience. In: Investing in older people at work, health authority. London: Hamilton House, 1994.
- [5] Levy, M. S. F.; Pagliaro, H. The aging of work – age population in Brazil. 13 h Triennial Congress of the International Ergonomics Association; 1997. Tampere Finland.
- [6] Merbach, o. Empregado afastado ao inss – custo ou oportunidade? Caderno informativo de prevenção de acidente. Disponível em: <http://www.abqv.com.br/anexos/revista_cipa_-_empregado_afastado_ao_inss.pdf>. Acesso em 28/08/2014.
- [7] MTE – Ministério do Trabalho e Emprego. RAIS - Relação anual de informações sociais. Disponível em: <<http://www.mte.gov.br/rais/>>. Acesso em: 30/07/2014.
- [8] Rocha, P.R.F. O trabalhador-doente e sua família nos seus papéis como atores sociais no processo de retorno ao trabalho. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Medicina da Bahia. Universidade Federal da Bahia, 2010.

Capítulo 15

Terapias de estética em spas voltados ao bem-estar para a terceira idade

Débora Teixeira da Cruz

Patrícia Gonçalves da Silva Barcelos

Marcielli Marques Sangalli Vecchi

Resumo: O envelhecimento é um assunto relevante na contemporaneidade, essa realidade contextualiza a qualidade de vida a nível mundial, tendo em vista que a inversão da pirâmide apresenta mudanças que pode estar relacionada a diversos fatores, entre eles herança genética ou à estrutura óssea, algumas pessoas simplesmente envelhecem melhor que outras. este estudo tem como justificativa afirmar que para um envelhecimento com qualidade e bem estar é preciso adotar varias práticas entre elas a terapia que busca a autoestima bem como a aparência do ser humano aliviando as suas tensões que estão presentes no ciclo de vida. O objetivo deste estudo foi analisar métodos que proporcionam uma melhora na qualidade de vida dos idosos, promovendo relaxamento e bem estar biopsicossocial. O delineamento metodológico foi uma revisão bibliográfica de artigos publicados nas bases científicas de forma qualitativa os artigos selecionados para descrição dos resultados encontrados foram publicados no período de 2000 a 2013, os resultados foram organizado numa tabela, ressaltando técnicas, objetivos e resultados, sendo assim foram discutido quais os benefícios que a técnica pode produzir para o idoso, bem como as contra indicações. Para concluir o estudo observou-se que Diversas técnicas de terapias faciais e corporais podem ser realizadas para idosos, proporcionando bem-estar físico, mental, além do relaxamento. Alguns cuidados essenciais com a saúde, bem como alimentação, atividade física, tratamentos estéticos, por sua vez, podem acrescentar vida à pele, além da qualidade de vida. as autoras propõe que outros estudos de campo devem ser realizados para comparar com os resultados aqui descritos.

1. INTRODUÇÃO

A estética é uma disciplina filosófica que busca estabelecer uma coesão cognitiva e sensível do homem, que por sua vez representa o objeto específico da nova experiência, que na atualidade tem apresentado resultados relevantes e imprescindíveis para a sociedade. O termo estético foi originado do grego *aisthesis* simbolizando a sensação, e tem como significado percepção, satisfação, reconhecimento sensorial, sensibilidade e reconhecimento sensorial (VACCHIANO, 2000).

Neste sentido a estética vem sendo estudada e tem como conceito a ciência do belo, ou seja, estuda o comportamento do bem estar e a beleza exterior, de acordo com Cervi (2014) a estética é articulada como uma ciência que estuda o belo e a obra de arte entre as varias profissões, denotando uma interdisciplinaridade. Observa-se que as ambiguidades podem remeter a diversos significados, porém criando sempre um espaço de discussão sobre a beleza, autoestima, bem estar e designer da apresentação pessoal.

Sendo assim a estética está cada dia desenvolvendo inovações tecnológicas e estabelecendo uma coesão da cognição sensível do homem, este que por sua vez representado como objeto de uma nova experiência, na utilização de técnicas e produtos, responde a resultados relevantes nas pesquisas e estudos de qualidade de vida para o idoso.

Filosoficamente a lógica leva ao raciocínio da metafísica e da ética, que busca responder questões preocupantes e conceituais do aspecto da beleza humana. Neste sentido surgem novas perspectivas ao problema do belo, e a estética transforma-se em teoria do gosto, compreendida como faculdade de percepção e discernimento, ganhando perspectivas de renovação e contornos da teoria kantiana e schilleriana, visando uma possibilidade de apresentar a sensibilidade para a vida moral, indicando que o conceito representa uma força imaginativa e fantasmática em relação a sensibilidade (CERVI, 2014).

Pereira (2013) afirma que na Grécia, Hipócrates considerado o pai da medicina, já indicava fricções e massagens para tratamentos de dores e tensões, levando a longevidade pela melhora das dores e articulações.

O uso da técnica não ficou simplesmente nas questões de dores, mas no bem estar físico, bem como na vaidade da pessoa que preocupa com a qualidade de vida, e busca de melhoras do bem estar, visando que a estética tem se destacado em outras pesquisas contemplando a melhoria do corpo, face, saúde, bem estar, autoestima entre outras variáveis (CERVI, 2014). A estética tem uma capacidade de inovar técnicas capaz de adiar, o envelhecimento físico e mental.

Entende-se que o envelhecimento é um assunto relevante na contemporaneidade, essa realidade contextualiza a qualidade de vida a nível mundial, tendo em vista que discrepância da pirâmide apresenta nuances de inversão, ou seja, a mudança pode estar relacionada a diversos fatores, entre eles herança genética ou à estrutura óssea, algumas pessoas simplesmente envelhecem melhor que outras (CERVI, 2014).

Para a autora é importante avaliar as condições do desenvolvimento humano, o autocuidado, de forma geral contribui para que o idoso tenha uma pele saudável, bem como o corpo no todo, Cervi (2014) afirma que envelhecer bem nos dias atuais tornou-se de extrema importância, e na visão dos profissionais da estética é imprescindível compreender que estar bem fisicamente e esteticamente contribui para o estado geral de saúde de qualidade de vida.

Peixoto (1997) relata que o processo de envelhecimento deve ser analisado por diferentes ângulos, ou seja, numa visão biopsicossocial, bem como introduzir uma cultura de cuidados, “Ser velho” é um fenômeno que se altera no tempo e no espaço. De acordo com Figueiredo (2007) os estudos de envelhecimento contemporâneos têm despertado todas as especialidades: psicólogos, esteticistas, médicos, gerontólogos, entre outros, hipóteses referentes a dois grupos, que foram classificados como envelhecimento: primário processo gradual e inevitável de deterioração física que começa cedo na vida e continua ao longo dos anos, não importa o que as pessoas façam para evitá-lo. E o secundário que são resultado de doenças, maus hábitos (alimentação, fumo, álcool), podendo ser controlados.

Este estudo tem como justificativa entender que a estética defende as questões de bem estar do idoso independente da idade, é fundamental que ter uma pele saudável pode refletir na saúde, e os resultados dependem das decisões individuais sobre o estilo de vida, dieta balanceada e exercícios regulares, reduzindo o estresse, e regulando o sistema imunológico. Essas conquistas, por podem acrescentar vida à pele, além de retardar a suscetibilidade de muitos fatores estéticos do envelhecimento (CERVI, 2014).

O objetivo deste estudo foi analisar métodos que proporcionam uma melhora na qualidade de vida dos idosos, promovendo relaxamento e bem estar biopsicossocial.

O delineamento metodológico foi uma revisão bibliográfica, qualitativo e descritivo artigos publicados no período de 1997 a 2014, os resultados foram organizado numa tabela, ressaltando técnicas, objetivos e resultados.

2.RESULTADOS E DISCUSSÃO

AUTOR/ ANO	TÉCNICA	OBJETIVO	RESULTADO
Pereira, 2013	Oxigenioterapia	Retardar o envelhecimento, através do uso de cosméticos saudáveis e de ingredientes naturais.	Renovação celular, reativa o embelezamento físico.
Vacchiano, 2000	Shiatsu Facial	Eliminar o estresse, cansaço físico e mental, enxaquecas de cefaleias.	Desbloqueio das energias estagnadas nos meridianos, equilibrando o fluxo e energia, dessa forma, proporcionado a melhora do aspecto da pele.
Reichman, 2002	Shiatsu Corporal	Reestabelecer o ritmo normal do corpo e preservar a saúde, corrigindo distúrbios funcionais no organismo e eliminando os sintomas manifestados.	Através da pressão realizada sobre a pele com os dedos e movimentos circulatórios e contínuos, auxiliam reestabelecimento do ritmo corporal, promovendo bem estar.
Pimentel, 2007	Peelings	Acelerar o processo de renovação celular.	Melhorar a permeabilidade da pele, reduzindo a hiperqueratinização dos folículos e reduzir manchas superficiais.
Pimentel, 2007	Hidratação	Melhorar a textura da pele.	Melhorar a elasticidade da pele, mantendo o seu equilíbrio hídrico, resultando na revitalização da pele e atenuando linhas de expressão.
Brown, 2001	Massagem Relaxante	Aliviar dores e rigidez das articulações.	Promover uma melhora na circulação, eliminando o estresse, através de movimentos lentos e precisos para promover relaxamento.
Guirro; Guirro, 2002	Drenagem Linfática	Auxiliar no processo de eliminação de excesso de líquidos acumulados nos espaços intersticiais.	Atua no sistema circulatório e linfático, através de movimentos suaves e lentos.
Pereira, 2013	Bambuterapia	Promover relaxamento, aliviando dores e tensões, estresse e ansiedade.	Proporcionar leveza, flexibilidade e força, através de massagem terapêutica associada ao bambu.
Pereira, 2013	Pedras Quentes	Produzir reações fisiológicas e orgânicas de alto benefício para o ser humano.	Aliviar músculos cansados, dando apoio e equilíbrio, acalmando a mente.
Pereira, 2013	Pindas Chinesas	Promover relaxamento muscular, aumentar a autoestima, combater o estresse e descongestionar as vias respiratórias.	Através das ervas medicinais aromáticas, promove relaxamento criando efeito terapêutico, equilibrando e energizando, proporcionando bem estar.

Fonte: Artigos pesquisados, Curso de Estética e Cosmética da Faculdade Unigran Capital, 2016.

Para Pereira, (2013) a técnica de Oxigenioterapia é um procedimento que utiliza oxigênio com base em: vitaminas, minerais, enzimas e aminoácidos naturais. O tratamento é uma das formas que busca minimizar, ou seja, retardar o processo de envelhecimento, reativando o embelezamento físico. Cabe entender que os processos de envelhecimento cutâneos são reflexos biológicos da aparência da pele, porém, nem sempre são compatíveis com a idade cronológica. Essa diferença pode estar relacionada e influenciada pelo ambiente, cultura, qualidade de vida, apresentando envelhecimento endógeno, a pele tem elementos importantes e a degradação funcional pode estar relacionada a perda da tonicidade, diminuição de colágenos, desequilíbrio hídrico, desarranjo celular entre outras condições de adoecimento fisiológico.

Para os tratamentos faciais da terceira idade uma das técnicas utilizadas é a Shiatsu Facial, conforme discute Vacchiano, (2000) que é através das expressões que o ser humano expressa seus sentimentos e emoções. A técnica permite um desbloqueio das energias estáticas, evidenciando o equilíbrio do fluxo e energia. Ainda conforme o autor a técnica elimina o estresse, cansaço físico e mental, bem como à contração facial, graças às pressões leves da técnica de Shiatsu que permite uma regulação energética. A terapia do envelhecimento facial através do Shiatsu deve ser compreendida nos estágios de drenagem linfática e relaxamento.

Kagotani, (2004) defende a técnica de Shiatsu corporal tende a corrigir distúrbios funcionais no organismo. Enquanto, Reichmann (2002) afirma que os conceitos fundamentais do Shiatsu são guiados por Yin e o Yang e se complementam antagonicamente a natureza considerando todos os movimentos corporais.

Conforme os resultados encontrados sobre o Peelings, Pimentel (2007) afirma que essa técnica tende a remover as células das camadas da pele superficial, bem como mais profunda e pode ser utilizadas em diversas regiões do corpo, como por exemplo: face, corpo, pés e mãos. Entretanto, é observável que indivíduos com lesões de pele têm contra indicação ao uso da técnica devido aos processos inflamatórios e sensibilidade cutânea.

Pimentel (2007) afirma que deve ser utilizada a hidratação comprovando a melhora na textura da pele, os produtos devem ser específicos para cada região corporal, tendo em vista que a pele tem reações e texturas diferentes. A hidratação favorece a elasticidade, mantém o equilíbrio hídrico, revitaliza a pele e atenua as linhas de expressões. Para o autor o tipo de hidratação também pode ter contra indicação para pessoas com alergias e doenças de pele.

Um dos tratamentos muito utilizados para a terceira é a massagem relaxante, conforme descrito por Brown, (2001) que o objetivo dessa técnica é aliviar dores e rigidez das articulações, entende-se que os resultados atingidos dessa técnica são os movimentos lentos e precisos, para promover um relaxamento de toda a musculatura, atuando como um poderoso sedativo, circulação, eliminando o estresse, e desobstruindo as vias respiratórias.

Outra técnica defendida por Guirro e Guirro (2002) é a drenagem linfática que favorecer a eliminação do excesso de líquido acumulado nos espaços intersticiais, a técnica utiliza manipulações suaves e lentas, atuando diretamente no sistema circulatório e linfático, pode ser feita tanto na face quanto no corpo. É indicada para prevenir, bem como no processo terapêutico da fibro edemagelóide, edemas, acne e linfedemas. Mas, também tem contra indicações para processos infecciosos, bem como em indivíduos com neoplasias, trombose venosa profunda e erisipela.

Pereira (2013) destaca a técnica de bambuterapia, e relata que a planta representa união, leveza, flexibilidade e força. As indicações apresentam resultados relevantes no relaxamento muscular, dores, estresse, ansiedade, tratamento estético facial e corporal, medicina desportiva, massagem modeladora, lifting facial, drenagem linfática manual facial e corporal, reflexologia, Shiatsu, exercícios de isometria (fortalecimento de grupos musculares). Cabe lembrar que os procedimentos terapêuticos apresentam resultados concretos e fidedignos nos indivíduos de terceira idade, melhorando a qualidade de vida.

Segundo Pereira (2013) a terapia das pedras quentes, produz reações fisiológicas e orgânicas de alto benefício para o ser humano, a técnica tem produz efeitos penetrante e alternado com pedras extremamente frias. Usando-se temperaturas quentes ou frias, sobre o corpo, de acordo com o autor a técnica visa o bem estar fisiológico e orgânico, e produz efeito relaxante psíquico e desacelera os movimentos físicos, causando um bem estar e qualidade de vida no ser humano.

Pereira (2013) afirma que a técnica de Pindas chinesas contém ervas medicinais, aromáticas e especiarias, tanto relaxantes como estimulantes, que aquecidas previamente criam um efeito terapêutico, equilibrando a energia interior e trazendo bem-estar. Ainda o autor destaca que durante o outono e inverno a terapia constitui uma forma saudável e 100% natural de equilibrar o sistema respiratório, liberando a fadiga associada aos resfriados, sinusites, bronquites, constipações e estados de obstrução de vias respiratórias, sendo indicados também para pessoas asmáticas. A característica de um tratamento benéfico para todo o corpo proporciona um relaxamento profundo, combatendo situações de estresse, controlando estados depressivos, vias respiratórias, provocando um relaxamento muscular, aumentando a autoestima, elevando o estado de consciência e facilitando a concentração e a meditação.

De acordo com o autor os tipos de substâncias utilizada nesta técnica, são: lavanda que diminui o estresse emocional, melhora a insônia, atua como hidratante cicatrizante e regenerador celular. Enquanto a camomila alivia as dores musculares, queimaduras regula o aparelho digestivo, mantendo um relaxamento

trabalhando a impulsividade e ainda tem função relevante como bactericida. Já o capim limão é para enxaqueca, concentração e esgotamento mental, a canela produz efeitos antissépticos, combate artrite, reumatismo e é estimulador cardíaco, melhora a circulação sanguínea e a memória, antidepressivo que ativa os neurônios, enquanto o alecrim combate dores de cabeça, cansaço mental, dores musculares.

3.CONCLUSÃO

observou-se que Diversas técnicas de terapias faciais e corporais podem ser realizadas para idosos, proporcionando bem-estar físico, mental, além do relaxamento. Alguns cuidados essenciais com a saúde, bem como alimentação, atividade física, tratamentos estéticos, por sua vez, podem acrescentar vida à pele, além da qualidade de vida. Entretanto, todas as técnicas têm também as suas contra indicações, dependendo do organismo e doenças relacionadas à pele. Deve ser realizado estudo de campo para comparar e concretizar os resultados encontrados.

REFERÊNCIAS

- [1] Brown, D.W. Massagem Terapêutica: introdução prática. São Paulo: Editora Manole, 2001.
- [2] Cervi, C, Estética na qualidade de vida dos idosos, 2014. Disponível em: <http://repositorio.pucrs.br:8080/dspace/handle/10923/6864>. Acesso em: 30/07/2016.
- [3] Guirro, E. C. O; Guirro, R. R. J. Fisioterapia Dermato-Funcional: fundamentos, recursos, patologias. 3.ed, rev e ampl. São Paulo: Editora Manole, 2002.
- [4] Kagotani, T.. Shiatsu na Estética. Trad. José Ricardo Amaral. São Caetano, SP: Andrei, 2004.
- [5] Peixoto, C. De volta às aulas ou De como ser estudante aos 60 anos. In: Veras R. Terceira Idade: Desafios para o Terceiro Milênio. Rio de Janeiro: Relume Dumará; 1997. p. 370-7.
- [6] Pereira, M.de F.L., Spaterapia. 1 ed. São Caetano do Sul, SP. Editora Difusão, 2013.
- [7] Pimentel, A. dos S., Peeling, máscara e acne: Seus tipos e passo a passo do tratamento estético. 1.ed. São Paulo: Editora Livraria Médica Paulista, 2007.
- [8] Reichmann, B.T., Auriculoterapia. Fundamentos de Acupuntura Auricular. Curitiba. Tecnodata, 2002.
- [9] Vacchiano, A., Shiatsu Facial: a arte do rejuvenescimento. Rio de Janeiro: Ground, 2000.

Capítulo 16

Suicide in the elderly: A systematic review

André Garcia Ambrosi

Antônio Gabriel Araújo Pimentel de Medeiros

Mariana Ferreira Silveira de Queiroga

Stela Ferreira Gadelha Mendes

José Antônio Spencer Hartmann Júnior

Resumo: Antecedentes: Com o envelhecimento da população, é necessário atentar para as novas demandas decorrentes desse fenômeno demográfico. Entre as preocupações psiquiátricas, o suicídio em idosos não é incomum e precisa de atenção. Objetivo: O objetivo deste artigo é produzir uma revisão da literatura sobre o suicídio em idosos, abordando seus principais aspectos relacionados. Métodos: A busca por artigos para esta revisão sistemática foi realizada em julho de 2017 nas seguintes bases de dados: MEDLINE, PsycInfo, LILACs e PubMed. Palavras-chave tiveram que aparecer no título, resumo ou assunto e a busca foi restrita às publicações dos últimos 5 anos. Resultados: Cento e noventa e um artigos foram identificados e cinco preencheram os critérios estabelecidos e incluídos os molhados. Todos eles foram publicados nos últimos 5 anos. O suicídio em idosos estava relacionado a muitos fatores psicológicos, físicos e sociais. Conclusões: Há muitos fatores envolvidos no suicídio em idosos, mas os principais que foram abordados nos estudos foram desesperança, peso percebido, pertencimento frustrado, depressão e traços de personalidade.

Palavras-chave: Idosos; Suicídio; Desesperança; Depressão.

1. INTRODUCTION

Suicide is an extremely complex phenomenon with origins in intolerable stress and in the inability to cope¹. The highest suicide rate, in almost all the rich countries, is found in the group of men aged 75 years and older². Furthermore, the elders tend to be more violent by choosing means of killing themselves than youngers and the chances of surviving to a suicide attempt are smaller in this group than in others¹.

These high rates of suicide can be justified by challenges and chances that they used to face in this part of life as: loss of work and self-esteem, loss of partners³ and social support, relocation and alcohol abuse⁴. Also, the physical illness must be quoted because plays a significant role in the suicidal behavior of the ancients².

Additionally, the mental health plays a key role in suicide and the most common mental health factors associated with suicide in this group are: anxiety disorders; history of attempts; hypersomnia³; the complicated or traumatic grief²; especially hopelessness and depression⁵.

Another point observed in this population is that perceived burdensomeness explains a significant variance in suicide ideation, even after other predictors as depressive symptoms and hopelessness are controlled⁶.

Nevertheless, unfortunately, the risk of suicide is undervalued in this group of people. Consequently, it should be analyzed along a continuous line: from ideation, intent, and plan to attempts and completion³.

Therefore, the purpose of this study is to produce a literature review of suicide in the elderly, addressing their main related aspects.

2. METHODS

The search for papers for this systematic review was conducted in July 2017 in the following databases: MEDLINE, PsycInfo, LILACs and PubMed. The keywords used in databases were: “elderly”, “suicide”, “hopelessness” and “depression.” Keywords had to appear in the title, abstract or subject and the search was restricted to publications from the last 5 years (2013-2017).

Figure 1 illustrates the process of collecting the articles

Figure 1: Flow diagram of search strategy.

3.RESULTS

The oldest study included in this systematic review was published in 2013 in USA, at the Journal of Abnormal Psychology⁷. This cross-sectional study test theory-based predictors regarding variables that help to death ideation and suicide ideation in older adults. Participants included 239 adults aged 60 and older from primary care clinics who completed the following instruments: Beck Hopelessness Scale (BHS), Center for Epidemiologic Studies Depression Scale, Geriatric Suicide Ideation Scale(GSIS), Interpersonal Needs Questionnaire(INQ).

The results suggested that only perceived burdensomeness and hopelessness meaningfully predicted variation in death ideation. It supports the association of perceived burdensomeness with death ideation, but do not indicate that thwarted belonging was associated with death ideation. As such, these results provide partial support for the interpersonal theory's assertion that perceived burdensomeness and thwarted belonging are each associated with death ideation when experienced independent of each other. In addition, the pattern of results (though nonsignificant) is consistent with Van Order et al. (2010)'s prediction that individuals with elevated perceived burdensomeness and thwarted belonging would develop suicide ideation when they feel hopeless that these states will change. Thwarted belonging was not significantly associated with death ideation. Increasing scores on thwarted belonging, perceived burdensomeness, and hopelessness are all associated with a much greater probability that an individual is experiencing thoughts of suicide, whether they are reported.

The limitations of this study were: the cross-sectional design prevents inference of causal relationships, so that conclusions about the variables in the development and maintenance of death ideation or suicide ideation could not be made; investigation of other variables not examined in the study may offer additional explanation of the differential increased risk among older adults with greater risk for death by suicide; limited racial diversity, relatively high education levels, and limited geographic dispersion of the sample all limit generalizability.

In summary, was suggested that perceived burdensomeness and hopelessness are important risk factors for death ideation in older adults. It indicates that the experiences of thwarted belonging, perceived burdensomeness, and hopelessness are critical to the identification of ancients may be experiencing suicide ideation, but are not directly reporting it.

In 2014, a study was published at Nursing Research and Practice⁸ which aims to evaluate depressed older persons' suicidal experiences. The participants comprised two men and seven women aging over 60 years.

Two points came up from this analysis: loneliness without meaning in life and struggling to achieve reconciliation. Additionally, mental, emotional and psychological pain seem to have the same meaning as intolerable pain in the mind, soul or heart, which increases the risk of suicide.

Being alone without meaning in life was characterized as an involuntary catastrophic state. Emotional pain and suffering appear to be a clear manifestation of existential aloneness that alienates the elders from themselves. Also, loneliness has been associated with depression.

The difficulty to achieve reconciliation exposed that elders' past traumatic experiences were still present. Furthermore, the lack of reconciliation can lead to difficulty to love and forgive oneself as well to hostility, anger and fear.

Feelings of inadequacy (described sort of vulnerability associated with expectations and rejections), of bitterness and of humiliation tend to increase emotional pain. Also, the liberating power of surrendering bitterness and humiliation can enable depressed elderly people to survive emotional pain. Taking responsibility for one's life in order to alleviate emotional pain was challenging for the participants as it elevated the risk of suicide.

Loss of the close relationships was described by several participants: grief can be an difficult emotional experience that elevate suicidal thoughts.

This study's limitations were: the sample was small and includes more women than men; due the small sample size, the generalization is limited; the narratives allowed the researchers to understand from a first person perspective, which can be an advantage, but might also influence the interpretation in a negative way.

This analysis' findings revealed the necessity to provide increased support to help suicidal older people to take responsibility for their life.

Still in 2014, another study was published at *Aging & Mental*⁵, that purpose to evaluate the components of a measurement model that are constant across young and older adults and then analyze relations among dimensions of personality and suicide risk. The group was consisted in 316 young adults aged between 18 and 35 years (mean = 26,2; SD = 3,8), and in 339 older adults aged between 58 and 75 years (mean = 66,38; SD = 3,9) who answered self-report questionnaires. The questionnaires were: Beck Depression Inventory Second Edition (BDI-II), BHS, 9 Attachment Profile (9AP) and Zuckerman-Kuhlman-Aluja Personality Questionnaire (ZKA-PQ).

The results shown that both the young and the older adults scored high in specific personality (self-other perception and introversion) and psychiatric (depressive symptoms and hopelessness) dimensions were similarly exposed to increased risk of suicidal ideations. It was found that attachment dimensions are associated to personality traits in determining risk of SI in the elderly. Also, was found a common underlying latent structure for young and older adults, indicating that most predictors of SI are common across these groups, however there is the possibility that the salience of the relations may vary across age.

The limitations were: it is possible that the self-reported nature of data could have biased results by misleading or spurious correlations; the sample consisted of residents of Italy, the generalization to other contexts is limited; hopelessness was referred to as a proxy of SI RISK; as an analysis based in a cross-sectional data, a causal interpretation among associations of variables is not allowed; and, although the study revealed the predictive power of the BHS, there is the possibility of false positives may be induced by other contributing factors, limiting the validity of results.

The findings of this study indicate that young and older adults may be similar on psychopathology and personality predictors of suicidal ideation than previously speculated.

A more recent article was published in 2015 at *BMJ Open* in England⁹. The study was a cross-sectional analysis and the objective was to examine a multiple mediator with depressive symptoms, hopelessness, thwarted belongingness and perceived burdensomeness acting as parallel mediators of associations between personality disorder traits (independent variable), and suicide ideation (outcome variable) in elderly. The sample was composed by 151 participants (73 females and 70 males) ranged from 65 to 93 years (mean= 73,3; SD =6,5). They were applied the measures of Geriatric Suicide Ideation Scale(GSIS), BHS, Beck Depression Inventory- II (BDI-II) Interpersonal Need Questionnaire(INQ) and the Structured Clinical Interview for DSM-IV-TR Axis II Personality Disorders, Patient Questionnaire (SCID-II-PQ).

This article's results revealed that thwarted belongingness, perceived burdensomeness, and depressive symptoms act as parallel factors of the association between personality disorders traits and suicide ideation in elderly, but hopelessness does not. These evidences suggest that thwarted belongingness and perceived burdensomeness may be critical risk factors for suicide ideation in the elderly.

The limitations of this study were: don't assess causality; rely on self-reported personality traits, as the opposed to personality disorder diagnoses; don't examine the associations suggested in the study in ancients with personality disorders; the sample is composed by generally healthy, community-dwelling older adults from a limited geographic area, the generalization to other contexts is limited; the focus was not in the context of the theory of aging, it was on suicide risk in the context of the interpersonal theory of suicide.

The last and newest article included was published in 2017 at *Geriatric Nursing* and was carried in Chinese rural area, where were recruited a group of 205 older adults (110 females and 95 males) aged 60 or above living in nursing homes (mean age of 77,31; SD =7,86).

The newest article included was published in 2017 at Geriatric Nursing and was carried in Chinese rural area, where were recruited a group of 205 older adults (110 females and 95 males) aged 60 or above living in nursing homes (mean age of 77,31; SD =7,86). The objectives of this study were to report the prevalence of suicidal ideation among the ancients who live in nursing homes in rural China, associate, directly or indirectly, their suicidal ideation with factors such as gender, age and financial status. Were evaluated demographic characteristics, physical health, social characteristics, self-esteem (using the Rosenberg Self-Esteem Scale-RSES), loneliness (using the UCLA Loneliness Scale – ULS), depression (using the Hospital Anxiety and Depression Scale - HADS), hopelessness (using Beck Hopelessness Scale–BHS) and suicidal ideation (using item 9 of Beck Depression Inventory – BDI).

The results of this study revealed that women, divorced or widowed, the ones who had fewer visits from their families, the elders who has more physical problems and who participated in the fewer social activities had higher chances to have suicidal ideation. Also, the participants' self-esteem, loneliness, depression and hopelessness were critically associated with suicidal ideation; loneliness and self-esteem were indirectly associated with suicidal ideation and only related to the direct factors: hopelessness and depression.

Demographic, social, and physical factors were only indirectly correlated to suicidal ideations, whereas psychological factors were associated directly and indirectly to suicidal ideations.

Furthermore, there were suggested relations between the loneliness and the ancients who had fewer visits; also, between the older adults with more physical incapacities, the smaller number of social activities and lower self-esteem.

Demographic, social, and physical factors were only indirectly correlated to suicidal ideations, whereas psychological factors were associated directly and indirectly to suicidal ideations.

The limitation of the chinese article were: the sample size was not adequate and generalization to others contexts is limited as the group is from a limited geographic area (Chinese rural nursing homes); there is the possibility that the participants who had suicidal ideation might have hided their actual feelings because they felt a sense of shame, and compromised the reliability of the results; the specific psychometric properties of BDI may not be suitable for a tonic as sensitive and subtle as suicide among elders, been used only item 9 of BDI; and it cannot draw conclusions regarding cause and effect given the study's cross-sectional design.

Table 1: Description of results.

Author	Year	Sample	Main findings
Cukrowicz ⁷	2013	239 adults ages 60 and older	Death ideation varied significantly with the perceived burdensomeness and hopelessness.
Holm ⁸	2014	9olderpersons	Self-management can lead to an unreasonable shift of responsibility to the patient.
Iliceto ⁵	2014	339 young adults ranged from 18 to 35 years and 316 older adults (ranged from 58 to 75 years)	Suicidal ideation associated to personality were shown in both groups.
Jahn ⁹	2015	151 older adults from a primary care clinic	The relation between total personality disorder traits and suicide ideation was mediated by perceived burdensomeness, thwarted belongingness, and depressive symptoms.
Zhang ¹⁰	2017	205 residents of five rural nursing homes	Hopelessness and depression had direct impacts on SI, and self-esteem and loneliness can impact SI through the mediating of depression and hopelessness.

4. DISCUSSION

Many aspects associated with suicide in the elderly have been discussed in the studies included in the systematic review. The main ones were hopelessness, perceived burdensomeness, thwarted belongingness, depression and personality traits.

Regarding hopelessness, Cukrowicz⁸, Jahn⁹ and Zhang¹⁰ agree that it is a significantly predicted constant in death ideation, associated with a much greater probability that an individual is experiencing thoughts of suicide. Hopelessness has the most significant and direct effect on suicidal ideation, but it was not significant as an indirect effect and it does not contribute as a parallel mediator of the associations between personality disorder traits and suicide ideation in older adults.

Cukrowicz⁷ and Jahn⁹ suggested that thwarted belongingness and perceived burdensomeness are each associated with death ideation when experienced independent of each other and contribute as a parallel mediator of the associations between personality disorder traits and suicide ideation in elderly. In terms of the mediated factors, the indirect factors via thwarted belongingness and perceived burdensomeness are significant, but Cukrowicz⁷ indicate that thwarted belonging is not significantly related with death ideation, that only perceived burdensomeness and hopelessness decidedly predicted variations in suicidal thoughts. Beside this, thwarted belongingness and perceived burdensomeness may be significant risk factors for suicide ideation among elders, and clinicians should be attentive to these issues when assessing and treating suicide risk among older people.

Depression was quoted by Jahn⁹ and Zhang¹⁰ as a factor importantly correlated with suicidal thoughts and having indirect and direct effects, by mediating the development of it. As well as perceived burdensomeness and thwarted belongingness, depressive symptoms contribute as a parallel mediator of the associations between suicide ideation and personality disorder traits in elderly. The severity of depression was another factor indicated by Zhang¹⁰ who is directly related with suicidal thoughts.

Beside these main aspects, the authors suggested as significant factors associated with suicide in the elderly: emotional, mental and psychological pain, self-management, taking responsibility, loss of close relationships, grief, demographic and social factors, being a woman, divorce, have few family visits, physical problems, lower self-esteem and loneliness.

The main limitations of the included studies were due the cross-sectional design, who prevents inference of causal relationships, so those conclusions about the variables in the development and maintenance of death ideation or suicide ideation could not be made; the size and limited geographic dispersion of the samples limit generalizability; the self-reported nature of data could have biased results by misleading or spurious correlations; and the relations suggested in the most part of the articles cannot be examined in elders with various personality disorders.

Their implications consist in highlight the value of improving research, especially focused on identifying risk factors for suicidality in older adults and providing a more comprehensive theoretical framework. Understanding the structure of these associations will allow for development and implementation of advanced prevention and treatment policies⁵.

Providers should use this knowledge in developing efficient and effective screening methods for suicide ideation, as well as for ensuring accurate assessment of older adults who might underreport to direct questions regarding suicide ideation⁷. Healthcare professionals must think about the best way to help suicidal older people to engage in self-management and to take responsibility for their life. The team of professionals needs to reach agreement on planned objectives. Such objectives can guarantee that suicidal elderly persons receive education about how to manage their daily life. Also, there is a necessity of different prevention strategies⁸.

5. CONCLUSIONS

Considering the small number of studies carried out on the subject addressed in this systematic review, evidenced by the number of articles included in it, it is highlighted the need for more studies to be implemented, preferentially overcoming the limitations presented in them. Through this, there will be greater level of evidence regarding the factors that directly and indirectly affect the occurrence of suicide

in the elderly and it will be possible to attain more reliable conclusions and to ensure the formulation of increasingly effective strategies in the prevention of suicide in the elderly.

REFERENCES

- [1] Uncapher H, Gallagher-Thompson D, Osgood NJ, Bongar B. Hopelessness and suicidal ideation in older adults. *Gerontologist*. 1998; 38(1), 62-70.
- [2] Szanto K, Gildengers A, Mulsant BH, Brown G, Alexopoulos GS, Reynolds CFI 3rd. Identification of suicidal ideation and prevention of suicidal behaviour in the elderly. *Drugs Aging*. 2002; 19(1), 11-24.
- [3] Crumacker DW. Suicidality and antidepressants in the elderly. *Proc (Bayl Univ Med Cent)*. 2008; 21(4), 373-7.
- [4] De Leo D, Ormskerk SC. Suicide in the elderly: general characteristics. *Crisis*. 1991; 12(2), 3-17.
- [5] Iliceto P, Fino E, Sabatello U, Candilera G. Personality and suicidal ideation in the elderly: factorial invariance and latent means structures across age. *Aging Ment Health*. 2014; 18(6), 792-800.
- [6] Cukrowicz KC, Cheavens JS, Van Orden KA, Ragain RM, Cook RL. Perceived burdensomeness and suicide ideation in older adults. *Psychol Aging*. 2011; 26(2), 331-8.
- [7] Cukrowicz KC, Jahn DR, Graham RD, Poindexter EK, Williams RB. Suicide Risk in Older Adults: Evaluating Models of Risk and Predicting Excess Zeros in a Primary Care Sample. *J Abnorm Psychol*. 2013; 122(4), 1021-30.
- [8] Holm AL, Lyberg A, Berggren I, Åström S, Severinsson E. Going around in a Circle: A Norwegian Study of Suicidal Experiences in Old Age. *Nurs Res Pract*. 2014; 734635.
- [9] Jahn DR, Poindexter EK, Cukrowicz KC. Personality disorder traits, risk factors, and suicide ideation among older adults. *Int Psychogeriatr*. 2015; 27(11), 1785-94.
- [10] Zhang D, Yang Y, Sun Y, Wu M, Xie H, Wang K, Zhang J, Jia J, Su Y. Characteristics of the Chinese rural elderly living in nursing homes who have suicidal ideation: A multiple regression model. *Geriatr Nurs*; 2017, 1-8.

Capítulo 17

Síndrome de Burnout: Esgotamento profissional em professores universitários

Tatiane Isabela de Araújo Leite

Eudes Euler de Souza Lucena

Dulcian Medeiros de Azevedo

Ana Aline Matos de Medeiros

Thiago Santos de Araújo

Thiêgo Santos de Araújo;

Resumo: A síndrome de burnout é um tipo de stress de caráter duradouro ligado às situações de trabalho, sendo resultante da constante e repetitiva pressão emocional associada à intensa ligação com indivíduos por longos períodos de tempo. O objetivo desta pesquisa é analisar as dimensões da síndrome de Burnout em professores universitários, relacionando-as com variáveis sociodemográficas, psicossociais, laborais e de saúde. Esta síndrome afeta negativamente o trabalhador, tal como o ambiente institucional, sendo descrita como uma desordem psicológica composta por três dimensões: exaustão emocional, despersonalização e redução da realização pessoal. Realizou-se uma pesquisa quantitativa com cem professores universitários de quatro instituições públicas e privadas do município de Caicó-RN, os dados foram obtidos através de dois instrumentos auto aplicados: um com questões sociodemográficas, psicossociais, ocupacionais e aspectos relativos à saúde e outro baseado no *Maslach Burnout Inventory Educators Survey* (MBI-ES). Foram feitas análises univariada, bivariada (Teste qui quadrado) e um modelo de regressão logística. Observou-se que dos 100 indivíduos estudados, 50,5% eram do sexo feminino, a faixa etária dos docentes variou de 23 a 59 anos, possuíam média de 12 anos de experiência profissional, 80,4% tem a docência como ocupação principal, atendendo em média 37 alunos por dia, quanto às dimensões do Burnout, verifica-se que 1,0% dos docentes estão com alto nível de Despersonalização (DE), 10,0% com alta Exaustão Emocional (EE) e 69,0% com Baixa Realização Pessoal no trabalho (RP). Os resultados demonstraram a importância de considerar o Burnout como um problema de saúde possibilitando intervenções preventivas e elaboração de medidas de enfrentamento.

Palavras-Chave: Burnout., prevalência., professor., docência., estresse

1. INTRODUÇÃO

O ensino no Brasil como em todo o mundo vem passando nos últimos anos, por um processo de mudança profunda. Os desafios educativos colocados pela sociedade e pelo trabalho docente são cada vez mais exigentes e permanentes. As novas demandas dos processos laborais educativos têm exigido adequações dos professores às inovações tecnológicas, às constantes atualizações e a excelência profissional. Essa exigência tem refletido na vida pessoal, na qualidade de saúde e na satisfação desses trabalhadores, gerando várias vezes sentimentos de mal-estar e impotência por parte desses profissionais. (Freitas e Facas, 2013).

O docente devido à dupla jornada de trabalho tem menos tempo para cumprir o seu trabalho, para sua formação e atualização profissional, para atividades de lazer e convívio social (Tabeleão, 2011). Poucas profissões exigem tanto em todos os níveis do profissional, pois além de desempenhar a função técnica específica exigida pelo seu trabalho, é requerida sensibilidade e habilidade para lidar com todo o processo escolar.

O ser docente é considerado um das profissões mais estressantes atualmente devido aos fatores já citados.

O estresse é um dos problemas mais comuns que o ser humano enfrenta, caracterizado por um estado de tensão, ocasionando um desequilíbrio intenso no organismo, que pode desencadear diversas doenças graves. A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma que o estresse é uma epidemia global, em que o homem contemporâneo vivencia enormes exigências de atualização e é chamado constantemente a lidar com novas informações (Andrade, 2012).

Fica evidente que, tanto na natureza do trabalho do professor como no contexto em que exerce suas funções, existem vários estressores, que se persistentes, podem levar à Síndrome de Burnout.

O burnout é considerado por Harrison (1999, citado por Carlotto, 2003) como um tipo de stress de caráter duradouro ligado às situações de trabalho, sendo resultante da constante e repetitiva pressão emocional associada à intensa ligação com indivíduos por longos períodos de tempo.

Síndrome de Burnout manifesta-se a partir de quatro classes sintomatológicas: física, quando o trabalhador apresenta fadiga constante, distúrbio do sono, falta de apetite e dores musculares; psíquica observada pela falta de atenção, alterações da memória, ansiedade e frustração; comportamental, identificada quando o indivíduo apresenta-se negligente no trabalho, com irritabilidade ocasional ou instantânea, incapacidade para concentrar-se, aumento das relações conflituosas com os colegas, longas pausas para o descanso, cumprimento irregular do horário de trabalho; e defensiva, quando o trabalhador tem tendência ao isolamento, sentimento de impotência, empobrecimento da qualidade do trabalho e atitude cínica. (SANCHES, et al, 2017)

A Síndrome de Burnout é caracterizada por exaustão emocional, despersonalização e redução da realização profissional. A exaustão emocional representa o esgotamento dos recursos emocionais do indivíduo, decorrendo principalmente da sobrecarga e do conflito pessoal nas relações interpessoais. Já a despersonalização é caracterizada pela insensibilidade emocional do profissional, que passa a tratar clientes e colegas como objetos. Por fim, a redução da realização profissional que revela auto avaliação negativa associada à insatisfação e infelicidade com o trabalho (SOARES, GROSSI, SUNDIN, 2007).

A Síndrome de Burnout (SB) é considerada pela World Health Organization (WHO) um risco para o trabalhador podendo conseqüentemente leva-lo a deterioração física ou mental. Atualmente é considerada uma importante questão de saúde pública, para além da sua óbvia relevância no contexto exclusivo das patologias laborais, devido às suas implicações para a saúde física, mental e social dos indivíduos. O Burnout é um dos agravos ocupacionais de caráter psicossocial mais importantes na sociedade (CAMPOS et al., 2012).

Partindo dos pressupostos apresentados, essa discussão torna-se extremamente necessária e pertinente aos dias atuais, pois a síndrome atinge em sua maior parte profissionais que lidam diretamente com pessoas, como é o caso do docente, de modo que os mesmos são expostos diariamente a situações estressoras o que implica no comprometimento da sua saúde física e mental, influenciando diretamente na atividade laboral. O que por sua vez, despertou o interesse em desenvolver essa pesquisa com os professores da rede pública que, teoricamente, encontram-se mais expostos a essas situações estressantes.

Este estudo teve como objetivo analisar as dimensões da síndrome de Burnout em professores universitários, relacionando-as com variáveis sociodemográficas, psicossociais, laborais e de saúde.

2.METODOLOGIA

A pesquisa realizada com abordagem quantitativa, do tipo seccional, foi realizada em quatro universidades do município de Caicó-RN, sendo duas públicas e duas particulares. Fizeram parte do estudo 100 docentes efetivos e contratados que exerciam suas funções regularmente nas instituições de ensino. Utilizamos como critério de exclusão os educadores que encontravam-se em capacitação docente e licença maternidade.

Para o levantamento dos dados, foi utilizado um instrumento auto aplicado construído pelos pesquisadores, composto de quatro blocos de questões: (1) dados demográficos: sexo, idade, estado civil e filhos; (2) profissionais: titulação, tempo de experiência profissional, tempo de experiência na universidade, número aproximado de alunos que atende diariamente, trabalho exclusivo na instituição, docência como ocupação principal e residência no município em que trabalha; (3) variáveis psicossociais: necessidade de atualização profissional, execução de atividades burocráticas, multiplicidade de papéis a desempenhar, elevado número de disciplinas, disponibilização de acompanhamento médico especializado, salas de aula espaçosas e adequadas, recursos audiovisuais suficientes, incentivo à capacitação, inclusão e acessibilidade; (4) dados relativos à saúde: antecedentes familiares, presença de alguma doença de base, qual/quais essas doenças.

Utilizou-se ainda outro instrumento auto aplicável baseado no *Maslach Burnout Inventory Educators Survey* (MBI-ES) criado por Christina Maslach (1996), para avaliar a síndrome de Burnout voltada ao ensino, com adaptação para o uso no Brasil realizada por Carlotto e Camara (2008). Nesta, foram identificados os requisitos necessários em termos de validade fatorial e de consistência interna para ser utilizada na avaliação da Síndrome de *Burnout* em professores em nossa realidade. O inventário totaliza 22 itens e através desse instrumento pode-se verificar os índices presentes nas três dimensões que compõem o *Burnout*, sugeridas por Maslach e Jackson (2001).

Nesse estudo, a presença de cada uma dessas dimensões foi avaliada através da frequência das respostas, considerando uma escala de pontuação que varia de 0 a 6: numa escala tipo Likert, empregou-se zero para “nunca”, um para “uma vez ao ano ou menos”, dois para “uma vez ao mês ou menos”, três para “algumas vezes ao mês”, quatro para “uma vez por semana”, cinco para “algumas vezes por semana” e seis para “todos os dias”.

Foram utilizados os pontos de corte adotados por Shiron (1989) e sugeridos por Gil- Monte, et. al (2006), que os consideram uma alternativa válida para identificar os níveis de *Burnout* baseados na frequência de sintomas em países que ainda não possuem pontos de corte validados. Shiron (1989) recomenda o diagnóstico mediante a escala de evolução, de acordo com os critérios normativos. Ou seja, os indivíduos que apresentam os sintomas com frequência igual ou superior a “uma vez por semana” desenvolveram os sintomas característicos do Burnout. Com esse procedimento, considera-se que apresentaram alto nível de Burnout os sujeitos que se situaram igual ou acima do ponto médio 4 (uma vez por semana) da escala de Likert.

O tamanho da amostra foi calculado a partir da prevalência estimada da doença. O indicador de proporção (50%) de indivíduos que tiveram Burnout foi adotado para o cálculo da amostra, em virtude da inexistência de estudos nacionais e internacionais com o público alvo. Considerando N=150 e n=170, a margem de erro de 15% e uma taxa de não resposta de 20%, chegou-se a uma amostra de 79 indivíduos. A amostragem foi por conveniência.

O banco de dados da pesquisa foi construído na plataforma do software SPSS® (*Statistical Package for Social Sciences*) versão 21.0, com posterior verificação de consistência da digitação. Após a estruturação final do banco de dados, realizou-se análise descritiva de todos os dados relativos às variáveis sociodemográficas, ocupacionais, psicossociais e de saúde geral (análise univariada). A associação entre a presença de Síndrome de Burnout e suas dimensões, as variáveis sociodemográficas, ocupacionais, psicossociais e de saúde geral foi verificada pelo teste estatístico qui-quadrado (análise bivariada).

A análise multivariada foi feita usando um modelo de regressão logística, através da análise hierárquica para estimar as razões de prevalência para ocorrência de Síndrome de Burnout ajustadas por doença de base, número aproximado de alunos atendidos, trabalho exclusivo na instituição e elevado número de disciplinas. O modelo foi iniciado pelas variáveis mais significativas, seguida das variáveis adicionadas individualmente, considerando o p valor crítico para entrada no modelo de 0,07. A permanência da variável no modelo foi baseado no Teste de verossimilhança, multicolinearidade bem como pelo teste de Hosmer e Lemeshow. Para todos os testes, o nível de significância de 5% foi adotado.

O projeto foi enviado e apreciado pelo Comitê de Ética de Pesquisa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) recebendo parecer favorável (725.711). Os entrevistados assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, possibilitando a decisão formal em participar deste estudo. Os direitos éticos dos participantes foram resguardados conforme previsto na resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (Brasil, 2012).

3.RESULTADOS

Participaram deste estudo 100 professores universitários de quatro instituições públicas e privadas do município de Caicó-RN. Em relação às variáveis sócio-demográficas, do público estudado 50,5% eram do sexo feminino e 49,5% do sexo masculino. A faixa etária dos docentes variou de 23 a 59 anos com predominância do sexo feminino até os 37 anos e do sexo masculino dos 38 anos a mais. A grande maioria da população da amostra era casados, cerca de 58,8%, precedidos de 23,7% de solteiros, 12% em união estável e 5,2% de divorciados. Os docentes obtiveram número máximo de três filhos e número mínimo de zero, sendo que a maior prevalência foi a de nenhum rebento (39,2%).

Já nas variáveis ocupacionais, em relação à titulação, a maior parte dos docentes eram mestres (39,2%), sendo que, 27,8% eram doutores, 25,8 especialistas, 5,2% graduados e 2,1% tinham pós-doutorado.

Os professores possuem, em média, 12 anos de experiência profissional, sendo 1 ano o mínimo e 38 anos o máximo de experiência, já em relação a experiência profissional na universidade a média é de 6 anos, sendo 1 ano o mínimo e 30 anos o máximo. A maioria trabalham exclusivamente em tempo integral na instituição estudada, cerca de 59,8% e a docência é sua ocupação principal (80,4%). Atendem em média 37 alunos diariamente e residem no município em que trabalham (56,7%).

Nas variáveis psicossociais 92,8% da população da amostra relataram que necessitam de atualização profissional, 60,8% executam atividades burocráticas, 63,9% exercem multiplicidades de papéis, e 77,3% dos docentes não possuem elevado número de disciplinas a ministrar. No que diz respeito à caracterização institucional cerca de 70,1% dos profissionais declaram que a instituição possui inclusão, porém relatam que não existe acessibilidade visto que, 61,9% dizem que sim e 38,9% dizem que não. Destacam ainda que as salas de aula são espaçosas e adequadas (70,1%), os recursos audiovisuais são suficientes (69,1%) e possuem incentivos à capacitação (66,0%), contudo, 73,2% dos profissionais alegaram que a instituição não disponibiliza acompanhamento médico especializado sendo que, 26,8% alegam que a mesma disponibiliza.

A variável de saúde em geral mostra que a maioria da população não apresentava doenças de base (75,3%). Em relação aos antecedentes familiares 50,5% tiveram hipertensão arterial, 34,0% doenças cardiovasculares e 30,9% diabetes. Quanto aos índices de Burnout em relação aos escores, identificamos que 61,6% dos docentes analisados encontram-se na fase inicial do Burnout, 35,3% estão no momento em que a doença começa a se instalar, 2,1% encontram-se em possível desenvolvimento da síndrome e apenas 1,0% da população da amostra não apresentam nenhum indício de Burnout.

Já no que se refere aos resultados da avaliação das dimensões do Burnout (Tabela 1), verifica-se que apenas 1,0% dos professores apresentaram alto nível de Despersonalização (DE), 10,0% alto nível de Exaustão Emocional (EE) e 69,0% alto nível de Baixa Realização Pessoal no trabalho (RP).

Tabela 1: Avaliação das dimensões do Burnout nos professores universitários de Caicó-RN, 2015

Dimensões	M<4	F%	M≥4	F%	TOTAL	F%
Despersonalização	99	99,0	1	1,0	100	100,0
Exaustão Emocional	90	90,0	10	10,0	100	100,0
Realização Profissional	31	31,00	69	69,0	100	100,0

4.DISSCUSSÃO

Burnout é um fenômeno psicossocial que surge como uma resposta crônica aos estressores interpessoais ocorridos na situação de trabalho, que acomete profissionais que mantêm uma relação constante e direta com outras pessoas, como professores, médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, policiais, bombeiros etc. (Maslach, Schaufeli e Leiter, 2001). O modelo teórico de Maslach utilizado nesse estudo descreve a síndrome de Burnout como um processo em que a exaustão emocional é a dimensão precursora da síndrome, sendo seguida por despersonalização e, na sequência, pelo sentimento de baixa realização profissional.

A análise dos resultados indica a presença de Burnout e a possibilidade do processo se encontrar em curso na população estudada, podendo estar sendo contido pelo sentimento de baixa realização profissional no trabalho, tendo em vista ser a dimensão que apresentou maior percentual, cerca de 69,0% dos profissionais estudados. Numa investigação realizada em dois mil e dez por Batista et al, com professores de João Pessoa-PB identificou-se resultados também superiores, 33,6% dos professores apresentaram alto nível de Exaustão Emocional, 8,3% alto nível de Despersonalização e 43,4% baixo nível de Realização Profissional.

Carlotto, et al (2015) refere que esses resultados podem estar relacionados a valores presentes na construção sócio-histórica da profissão docente, que, por ser entendida como profissão vocacional, pode induzir o profissional à repressão dos questionamentos sobre até que ponto o trabalho tem sido fator de realização e satisfação, este sentimento pode tornar o professor ainda mais vulnerável, pois o mesmo pode se envolver de forma excessiva com o trabalho, tendo como resultado a sobrecarga geralmente relacionada à dimensão de Exaustão Emocional.

A existência de um processo em curso, também pode estar relacionada a duas outras questões: a primeira delas diz respeito à dimensão de despersonalização que pode não estar representando a realidade, ou seja, baixos valores. Muitas pessoas atualmente podem não ter condições de reconhecer, verdadeiramente, o que está acontecendo com elas próprias, o que dificulta a identificação de questões relacionadas a essa dimensão.

Assim, pode-se pensar na ocorrência de alguma dificuldade para o professor revelar certas atitudes suas no trabalho, tais como não tratar seus alunos com afetividade, uma vez que essa é uma importante expectativa de pais, administração escolar e sociedade em geral, fazendo parte do perfil idealizado do professor (Carlotto et al, 2015).

A segunda questão é a situação que muitas vezes a instituição passa a subestimar o tamanho dos riscos oferecidos pelo processo de trabalho, porque os mais afetados não conseguem manter-se no emprego, afastando-se por licenças para tratamento de saúde, por demissões e por outros motivos. A partir dessas ponderações, o resultado obtido enseja preocupação, tendo em vista que os professores estão em pleno exercício funcional, provavelmente, agravando seu quadro com sérios prejuízos para a qualidade de seu trabalho com consequências importantes na relação ensino-aprendizagem.

O burnout é um tipo de stress de caráter duradouro ligado às situações de trabalho, sendo resultante da constante e repetitiva pressão emocional associada à intensa ligação com indivíduos por longos períodos de tempo. Os resultados obtidos no estudo corroboram essa afirmação na medida em que variáveis psicossociais, laborais e de saúde apresentaram associação com as dimensões da Síndrome.

Em relação aos dados obtidos pelo questionário com as variáveis sociodemográficas constituída pelo “sexo”, “idade”, “estado civil” e “filhos” nenhuma variável mencionada apresenta diferenças estatisticamente significativas. Dessa forma, não confirmamos a existência de uma associação entre a síndrome de burnout e variáveis sociodemográficas nesse estudo.

Encontramos variáveis associadas significativamente à presença de Burnout, nas dimensões da Exaustão emocional e Despersonalização, já na falta de Realização Profissional não foi encontrado nenhuma variável associada significativamente apesar de apresentar escores altos.

Conforme descrições na Tabela 2, observaram-se associações significativas ($p \leq 0,05$) de algumas variáveis psicossociais, laborais e de saúde com o burnout:

Tabela 2. Modelo de regressão logística entre ocorrência de Burnout e variáveis ocupacionais e de saúde geral. Caicó/RN, 2015.

Variáveis	Referência	Exposição	RP _{naj}	IC (95%)	RP _{ajustado}	IC(95%)
Doença	Sim	Não	1,678	1,125-2,503	3,561	1,235-10,273
Número aproximado de alunos	30 alunos e mais	Até 30 alunos	0,643	0,422-0,979	0,602	0,242-1,498
Elevado número de disciplinas	Sim	Não	1,540	1,016-2,332	2,998	1,042-8,622
Exclusivo no IES	Não	Sim	0,643	0,422-0,979	0,481	0,196-1,181

A docência como ocupação principal (0,033) e a necessidade de atualização profissional (0,016) foram às únicas variáveis associadas significativamente com a despersonalização.

De acordo com Souza et al (2013), o professor universitário, por vezes, é visto como o principal responsável pela formação de cidadãos, ao mesmo tempo em que se depara com um mercado de trabalho cada vez mais exigente, e ainda com a necessidade de conciliar o dar aulas, com a investigação e orientação de alunos, levando esse profissional a estar intimamente ligado a sua clientela, passando muitas vezes preocupando-se mais com seus educandos com que si próprio. A dedicação exclusiva à docência pode representar um indicador relevante para o estresse podendo levar esse profissional a desenvolver uma fadiga física e emocional, ocasionando no mesmo uma ação de enxergar os educando como um objeto do seu processo laboral.

O ensino vive em constante evolução devido ao mundo globalizado e a inserção das novas tecnologias, com isso o professor teve que acompanhar essas transformações de mundo e de sociedade para promover uma educação de qualidade aos seus educandos, ou seja, os tempos mudaram, o ensino mudou, a escola mudou e o professor, como consequência, também se viu impulsionado a efetuar mudanças.

Essa situação gerou nos professores a necessidade de se ajustarem às novas exigências sociais, tecnológicas e profissionais com que são confrontados no seu dia-a-dia (WANG ET AL, 2015). O professor, neste processo, se depara com a realidade e busca incessantemente atualizar-se frente às mudanças que acontecem e quando a instituição não dispõe ao docente a possibilidade de atualização, faz com que esses profissionais entrem em estado de frustração ocasionando repercussões evidentes na saúde física e mental e no desempenho profissional desses professores.

Considera-se que a síndrome de Burnout não é um problema das pessoas, mas principalmente dos lugares onde elas atuam. Por isso, a instituição deve manter o ambiente de trabalho saudável. O bem-estar e o desenvolvimento dos trabalhadores são fundamentais para o êxito das empresas. Esse bem-estar só poderá ser sustentável se houver espaço físico adequado, uma boa integração da produtividade, eficácia, eficiência e bom desempenho com a satisfação do trabalhador, as oportunidades de realizar um trabalho interessante, a sua responsabilidade, as suas competências pessoais e o seu crescimento profissional.

A presença de doenças de base na família (0,049), e a presença da hipertensão arterial (0,024) foram às únicas variáveis associadas significativamente com a exaustão emocional, porém não foi encontrado em nenhum estudo sobre o tema em que o acometimento da síndrome esteja relacionado a alguma doença de base. De acordo com o que foi estudado pode-se dizer que o Burnout já instalado pode sim acarretar picos hipertensivos.

Santos (2004) ao avaliar os determinantes do processo saúde/doença em professores do ensino básico da cidade de São Paulo-SP, observou que o tempo prolongado no exercício do magistério, o número excessivo de alunos em classe, as jornadas extenuantes, o acúmulo de responsabilidades transferidas à escola, o desgaste na capacidade de trabalho e a desvalorização do magistério – características relacionadas às dimensões do Burnout – são fatores que, de maneira cumulativa, desencadeiam adoecimento no professor, principalmente no que diz respeito à elevação da pressão arterial, confirmando ser essa uma profissão que risco.

A produção de conhecimento científico sobre os determinantes das doenças e agravos ocupacionais vem contribuindo para a tendência de queda do número de várias enfermidades ocupacionais, em quase todo o mundo (Batista, et al, 2010). O entendimento e reconhecimento dessa realidade se fazem necessários para uma inclusão do professor nas medidas de políticas públicas voltadas para a saúde e bem-estar da categoria.

A identificação do perfil e dos sinais precoces de desenvolvimento do Burnout é de fundamental importância para intervenções preventivas (Wang et al, 2015). Segundo Andrade (2012), o adoecer e morrer por causa do trabalho gera situações evitáveis, e não se pode aceitar passivamente que o trabalho seja causador de doenças ao trabalhador, produzindo interferências na quantidade e qualidade de vida.

É essencial a preparação para um trabalho em equipe eficaz e produtivo, para o uso harmonizado das novas tecnologias e para a adaptação às mudanças organizacionais e oportunidades que daí poderão advir. Nesse sentido, novas pesquisas devem ser desenvolvidas no Brasil para continuar explorando a influência de variáveis que envolvam processos entre indivíduos e o ambiente, com a finalidade de estabelecer a sua participação no desenvolvimento de fenômenos que atingem a saúde do trabalhador.

5.CONCLUSÃO

A análise das dimensões da síndrome de Burnout em professores universitários, e a relação desta com as variáveis sociodemográficas, psicossociais, laborais e de saúde, foi o principal objetivo desta investigação. Esta população foi escolhida como alvo do estudo, por ser considerada uma das profissões que exige um frequente contato com os outros no exercício da sua profissão, além de ser uma profissão que tem vindo a vivenciar uma grande pressão da sociedade para tentar amenizar dificuldades sociais, enquanto ensina aos alunos conhecimentos acadêmicos e cívicos.

Os resultados da pesquisa demonstram a importância de considerar o Burnout como um problema de saúde a ser resolvido, a síndrome está constantemente entre nós, o índice de Burnout encontrado nas análises é preocupante, o que confirma a hipótese do estudo de que a prevalência da síndrome de Burnout nos professores universitários no município de Caicó-RN é relativamente alta. Os fatores associados ao Burnout de acordo com a pesquisa estão relacionados às variáveis laborais, psicossociais e de saúde geral.

Encontramos variáveis associadas significativamente à presença de Burnout, nas dimensões da Exaustão emocional e Despersonalização, já na falta de Realização Profissional não foi encontrado nenhuma variável associada significativamente apesar de apresentar escores altos.

A docência como ocupação principal e a necessidade de atualização profissional foram às únicas variáveis associadas significativamente com a despersonalização e a presença de doenças de base na família, e da hipertensão arterial foram às únicas variáveis associadas significativamente com a exaustão emocional.

A detecção precoce de níveis sintomáticos de Burnout pode ser um bom indicador de possíveis dificuldades, possibilitando intervenções preventivas e elaboração de medidas de enfrentamento.

REFERÊNCIAS

- [1] Andrade, P. S. de.; Cardoso, T. A. O. Prazer e Dor na Docência: revisão bibliográfica sobre a Síndrome de Burnout. Saúde Soc. São Paulo, v.21, n.1, p.129-140, 2012.
- [2] Brasil. Ministério da Saúde. Resolução nº 466/12, sobre pesquisa envolvendo seres humanos. Conselho Nacional de Saúde. Brasília, 2012.
- [3] Campos, J. A. D. B.; et al. Síndrome de *Burnout* em graduandos de Odontologia. Rev. bras. epidemiol., São Paulo, v. 15, n. 1, mar., 2012.
- [4] Carlotto MS, Câmara SG. Análise da produção científica sobre a Síndrome de Burnout no Brasil. *Psico-PUCRS*2008; 39(2): 152-8
- [5] Carlotto, M. S. Síndrome de Burnout em Professores: Prevalência e Fatores Associados. *Psicologia: Teoria e Pesquisa*. v. 27, n. 4, p. 403-410, 2011.
- [6] Carlotto, M.S. Síndrome de Burnout e gênero em docentes de instituições particulares de ensino. *Revista de Psicologia da Universidade do Contestado*, v. 1, n. 1, 2003.
- [7] Carlotto, M.S.;DIAS, S.R.S.;Batista, J.B.V.;Diehl, L. O papel mediador da autoeficácia na relação entre a sobrecarga de trabalho e as dimensões de Burnout em professores. *Psico-USF, Bragança Paulista*, v. 20, n. 1, p. 13-23, jan./abr. 2015.

- [8] Freitas, L.G.; Facas, E.P. Vivências de prazer-sofrimento no contexto de trabalho dos professores. *Estud Pesqui Psicol.* v.13, n.1, p.7-26, 2013.
- [9] Maslach, C., Schaufeli, W., Leiter, M. Job Burnout. *V.* 52, p. 397– 422, 2001.
- [10] Gil-Monte PR, et al. Relación entre el síndrome de quemarse por el trabajo (Burnout) y síntomas cardiovasculares: un estudio en técnicos de prevención de riesgos laborales. *Revista Interamericana de Psicología.* v.40, n.2, p.227-32, 2006
- [11] Melo, W. F.; ET AL. Síndrome de Burnout em Professores. *Revista Brasileira De Educação E Saúde.* v. 5, n. 4, p. 01-06, Out-Dez, 2015.
- [12] Sanches, G.F., et al. Síndrome De Burnout Entre Concluintes De Graduação Em Enfermagem. *Rev enferm UFPE on line.*, Recife, v.1, n.1, p. 31-39, 2017.
- [13] Santos, R. O professor e a produção do conhecimento numa sociedade em transformação. *Revista Espaço Acadêmico.* n. 35, p. 28-36, 2004.
- [14] Shiron A. Burnout in work organizations. In: Cooper CL, Robertson I [ed.]. *International Review of Industrial and Organizational Psychology.* Nueva York: Wiley & Sons. p. 25-48, 1989.
- [15] Soares, J.J.F.; Grossi, G.; Sundin, Ö. Burnout among women: associations with demographic/socio-economic, work, life-style and health factors. *Archives Women's Mental Health.* v.10, p. 61–71, 2007.
- [16] Souza, M.C.; Guimaraes, A.C.A; Ramos, C.C. Estresse no trabalho em professores universitários. *Revista Brasileira de Ciências da Saúde.* v. 11, n.35, 2013.
- [17] Tabeleão, V. P.; Tomasi, E.; Neves. S. F. Qualidade de vida e esgotamento profissional entre docentes da rede pública de Ensino Médio e Fundamental no Sul do Brasil. *Cad. Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 27, n. 12, p. 2401-2408, 2011.
- [18] Wang, Y. et al. Relationship between occupational stress and burnout among Chinese teachers: a cross-sectional survey in Liaoning, China. *Int Arch Occup Environ Health.* v. 8, n. 8, p. 589-597, 2015.

Capítulo 18

O contato entre gerações e a subjetividade

Maria Laura Medeiros Bleinroth

Edja Mayra Ferreira de Castro

Maysa Lanne Vieira Damasceno

Myrna Lins Tenório

Cristina Camelo de Azevedo

Resumo: Diante do aumento da população de idosos surgem diversos questionamentos acerca das suas implicações biopsicossociais. Devido a este cenário, o presente artigo centraliza-se na relação intergeracional, tendo como base o conceito de subjetividade de Vygotsky e o conceito de geração de Karl Mannheim, objetivando analisar as relações presentes entre subjetividade e intergeracionalidade na vida do sujeito idoso. Como metodologia foi realizada uma revisão de literatura, tendo sido o levantamento bibliográfico realizado nas bases Scielo e BVS, assim como no banco de teses e dissertações da CAPES, compreendendo o período de 2006 a 2016. Por meio desta pesquisa, pode-se observar o contato intergeracional como via de transmissão cultural, ressignificação do processo de envelhecimento, bem como um aporte para a criação de vínculos. Diante disso, destaca-se a importância do contato entre as gerações para a construção da subjetividade.

Palavras-chave: Intergeracionalidade, laços intergeracionais, gerações, subjetividade, envelhecimento.

1. INTRODUÇÃO

Ao longo das últimas décadas, pesquisas têm apontado o crescente processo de envelhecimento populacional. Os dados estatísticos apontam a previsão de que, em 2020, o Brasil será o sexto país em maior população idosa no mundo¹. Diante desse fenômeno, são produzidos diversos questionamentos acerca das implicações biopsicossociais e sobre os vários desafios para as políticas públicas, para a sociedade e para a universidade, quanto a produção de conhecimentos e de novas práticas de intervenção junto a essa demanda². Um ponto bastante relevante neste cenário é a questão da relação intergeracional, como se dá o contato entre as gerações e as consequências que são originadas, considerando ser relevante a questão da subjetividade implicada nessas relações.

Segundo o sociólogo Karl Mannheim (1893-1947), geração não se refere a um grupo concreto em que seus laços são conscientes e determinados pelos sujeitos que nele estão inseridos. Seu pensamento sobre geração não se restringe a categoria idade, mas encontra-se intimamente associado a dinâmica das transformações sociais. Assim, distancia-se de associar as gerações a um princípio de linearidade, abarcando-a, em contrapartida, a partir da noção de um tempo interior estritamente qualitativo e não mensurável, e, portanto, apreendido apenas em uma dimensão subjetiva³. Neste sentido, diferentes grupos etários apesar de estarem situados em um mesmo período cronológico possuem tempos subjetivos distintos⁴.

A compreensão de geração tem como pressuposto um sentido sócio-histórico que compreende como geração um grupo de sujeitos que nasceram em um período próximo e que têm uma similaridade de experiências históricas e culturais. Isso não quer dizer que há um pensamento único entre os integrantes da mesma geração, pois apesar estarem situados em um dado tempo cronológico, os sujeitos vivem em eras subjetivas e qualitativamente diferentes⁵.

De acordo com Doll⁵, Mannheim critica a psicologia que reduz a velhice a elementos conservadores e, do outro lado, põe a juventude como vigorosa. No entanto, o teórico não desconsidera a importância de questões biológicas, mas afirma que este fator isolado não é suficiente para abarcar a amplitude da concepção de geração. A teoria de Mannheim traz que é preciso compreender que o processo de se tornar indivíduo ocorre mediado através da correlação com o ambiente, especialmente com questões culturais e sociais específicas. Assim, o “eu” não pode ser compreendido amplamente fora do seu contexto social e cultural. Em articulação ao presente trabalho, é necessário, portanto, ressaltar que ao se falar em geração parte-se da crença de que a realidade é uma construção social².

Nessa concepção, Vygotsky reafirma a importância da interação com o outro para a construção da subjetividade. O sujeito é constituído pelas significações culturais, em que estas só acontecem devido ao fato que os sujeitos entram em relação uns com os outros e passam a significar. Vale ressaltar que a subjetividade é processo que não é estático. Deste modo, o conceito de subjetividade, referente à perspectiva da Psicologia histórico-cultural, está intimamente relacionado ao fato de que cada geração começa sua vida em um mundo composto de significados construídos pelas gerações anteriores. O desenvolvimento dos sujeitos é, portanto, um processo histórico e social⁷.

Considerando os aspectos supracitados, o presente artigo buscou analisar, a partir das considerações da psicologia histórico-cultural, as relações presentes entre subjetividade e intergeracionalidade, com o intuito de dar visibilidade a importância do convívio intergeracional e sua proximidade com questões subjetivas, bem como sua contribuição para ressignificação do processo de envelhecimento.

2. METODOLOGIA

Foi realizado um estudo através de uma revisão da literatura em que o levantamento das produções bibliográficas foi efetuado através das bases de dados, Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), bem como no banco de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). A busca foi efetuada utilizando-se as palavras-chave separadamente: laços intergeracionais, subjetividade, gerações, subjetividade e envelhecimento; e combinadas: laços intergeracionais e envelhecimento, laços intergeracionais e subjetividade, laços intergeracionais e envelhecimento, gerações e subjetividade, gerações e envelhecimento.

Além disso, foi realizada uma análise detalhada dos artigos encontrados em todas as bases, seguindo os critérios de inclusão e exclusão, a saber: a) critérios de inclusão: artigos brasileiros, publicados entre os anos 2006 a 2016; ter ao menos uma das palavras-chave acima, no título e/ou resumo, b) critérios de

exclusão: artigos repetidos; texto completo indisponível; e não serem da área da psicologia ou da abordagem adotada, a histórico-cultural.

A partir do levantamento bibliográfico foram contabilizados no total duzentos e quatorze artigos. Porém, diante dos critérios de inclusão, permaneceram nove artigos. Os duzentos e três artigos que foram excluídos, seguiram o critério de exclusão. Na tabela 1, apresentada a seguir, estão representados características referentes aos artigos considerados pertinentes para os objetivos dessa pesquisa.

Quantidade	Título	Autores	Ano	Revista	Base de dados
1	Impacto de atividades dialógicas intergeracionais na percepção de crianças, adolescentes e idosos.	Massi G, Santos AR, Berberian AN, Ziesemer NB.	2016	CEFAC	CAPES
2	Troca de cartas entre gerações”: Projeto gerontológico intergeracional realizado em uma ILPI de São Paulo.	Piovezan M, Bessa TA, Borges FSPS, Prestes SM, Chubaci RYS	2015	Kairós Gerontologia	BVS
3	Laços intergeracionais no contexto contemporâneo.	Borges CC, Magalhães AS.	2011	Estud. psicol.	BVS
4	Velhice no Olhar do Outro: Uma perspectiva do jovem sobre o que é ser velho.	Caldas CP, Thomaz, AFA.	2010	Kairós Gerontologia	BVS
5	Convivência com pessoas idosas em instituições de ensino superior: a percepção de alunos da graduação e funcionários	Cachioni M, Aguilar LFA	2008	Kairós Gerontologia	BVS
6	Como vai a educação gerontológica nas escolas públicas do Distrito Federal?: um estudo com idosos e jovens	Zanon CBFM, Alves VP, Cardenas CJ	2011	Revista brasileira de Geriatria e Gerontologia	SciELO
7	Subjetividade: uma análise pautada na Psicologia históricocultural.	Aitta EB, Facci MGD.	2011	Revista Psicologia	SciELO
8	Transmissão intergeracional da cultura: um estudo sobre uma família mineira	Lisboa AV, FeresCarneiro T, Jablonski B	2007	Psicologia em Estudo	SciELO
9	Relações intergeracionais: as barreiras da institucionalização	Vieira SL.	2012	Kairós Gerontologia	SciELO

Fonte: Bleinroth ML, Castro EMF, Damasceno ML, Tenório ML, Azevedo CC (2017).

3.RESULTADOS E DISCUSSÕES

As referências selecionadas foram analisadas tendo por base o objetivo do trabalho, considerando as teorias de Vygotsky (1996) e Karl Mannheim (1982), explicitadas anteriormente. A partir da análise foi possível observar três fatores que estão intimamente relacionados com a subjetividade e a intergeracionalidade, tais são: transmissão sociocultural, ressignificação do processo de envelhecimento e construção de vínculo.

3.1TRANSMISSÃO SOCIOCULTURAL

No que tange a consequente sucessão das gerações, é possível afirmar que está implicado na sociedade o desafio da transmissão dos bens culturais acumulados de uma geração para outra, não se restringindo, no entanto, a um simples compartilhamento de conteúdos ou conhecimentos. Isso quer dizer que os sujeitos envolvidos interpretam as situações com pontos de vista diferentes em função dos seus posicionamentos em gerações diferentes⁵.

O processo de transmissão de conhecimentos e de comunicação possibilita a continuidade do processo histórico, permitindo as gerações acesso ao desenvolvimento histórico-cultural da humanidade. Assim, ressalta-se que não há sociedade que se destine a transmissão cultural realizada entre as gerações, nem que seja isenta de diferenças intergeracionais. Tanto a transmissão quanto as diferenças entre gerações constituem elementos fundamentais nos laços intergeracionais⁸.

Através da teoria Mannheimiana, compreende-se que as diferenças intergeracionais são inerentes à estrutura social, considerando que os indivíduos estão inseridos nas suas gerações, e, como consequência, possuem maneiras próprias e distintas de visualizar o mundo daqueles que pertencem a outras gerações⁸. Dessa forma, busca-se a partir de Vygotsky a noção de subjetividade, em que considera que o indivíduo se constitui a partir do outro, desenvolvendo-se a partir de uma situacionalidade sócio-histórico-cultural. Nesse sentido, essa perspectiva considera também que a construção da identidade vai além do próprio indivíduo, sendo influenciada por aspectos extrínsecos⁹.

O conteúdo que foi supracitado é importante para a compreensão do que diz respeito o conceito de geração, pois o processo de transmissão cultural que se faz de uma geração a outra é referente a transmissão de uma realidade e de significados. Esse processo de transmissão vem acompanhando aceleradas mudanças em decorrência da inovação tecnológica, sendo permeado por transformações. Essa afirmativa tem a ver com os ensinamentos dos jovens de hoje para com os mais velhos, como, por exemplo, informações técnicas diante de aparelhos tecnológicos. No entanto, não se pode desconsiderar uma série de outros conhecimentos e práticas sociais que são transmitidas das gerações mais antigas às mais novas⁸. Neste sentido, também é válido ressaltar também que o processo de transmissão é importante em nível grupal, porque se constituiu na base para a uma a construção de uma identidade do grupo, assim como permeia a construção da subjetividade individual dos membros do grupo¹⁰.

3.2 RESSIGNIFICAÇÃO DO PROCESSO DE ENVELHECIMENTO

Antigamente, a representação da imagem do idoso estava imbricada como alguém com significativas contribuições e, como consequência, tal imagem posicionava-o em lugar de respeito na sociedade e na família. Devido a isso, o idoso tinha papel fundamental para transmissão das memórias, histórias e lembranças vividas por aquela família. No entanto, ao longo dos anos essa imagem foi se distanciando dessa representação positiva e passou a ser relacionado com estigmas e valores negativos. Essa associação negativa foi também resultado de uma lógica consumista presente em nossa sociedade, considerando o alvo do mercado como o jovem, ativo e bem-sucedido. Porém, a partir da constatação do aumento da população idosa, o sujeito idoso passou a ocupar um possível mercado consumidor, fazendo surgir um novo conceito de ser idoso, bem como formas de encarar e se relacionar com o envelhecimento. Porém, ainda é um processo recente e em construção¹¹.

A identidade da pessoa idosa está associada ao movimento constante de criação de imagens sociais e individuais acerca do envelhecimento. Considerando isso, é válido destacar que a construção da identidade e subjetividade do idoso, bem como o modo em que ele se posiciona na sociedade, não é algo que diz respeito somente a ele, mas está imbuída aos demais sujeitos, que, mutuamente, vão interferir e contribuir para o conceito de envelhecimento que possuímos¹¹.

A imagem social que é oferecida ao sujeito idoso passa a ser apropriada pelos mesmos, modificando sua identidade pessoal através das novas características dessa imagem. Consequentemente, esses novos significados sociais posicionam ele de uma nova maneira no mundo. Essa visão contribui para romper com o discurso acerca das limitações no que diz respeito as possibilidades de movimento da identidade do idoso, já que é possível se colocarem no mundo de outra forma. Portanto, é importante analisar qual imagem social está sendo reproduzida aos idosos, para que ela não seja a transmissão de caracteres preconceituosos e limitadores para a consequente apreensão desses sujeitos. Além disso, que ela tenha expansão para promover uma subjetividade mais rica e com maior número de possibilidade para os mesmos¹¹.

Considerando os aspectos mencionados, é a partir do convívio entre sujeitos que é possível a aquisição de ideias, comportamentos e hábitos. Deste modo, compreende-se que durante o convívio entre diferentes gerações, em todos os âmbitos e dimensões de alcance, são proporcionadas múltiplas e ricas trocas experiências. No que diz respeito as gerações mais antigas, há a experiência histórica que diz respeito à sociedade inteira, associando os tempos sociais e as gerações¹².

Zanon, Alves e Cardenas¹³ perceberam as necessidades e problemas decorrentes das mudanças biopsicossociais da velhice, no qual um dos problemas detectados é a existência de preconceitos e estereótipos relacionados às gerações mais velhas, destacando a emergência na superação destes. De acordo com os resultados obtidos na pesquisa, constataram visões plurais e multidimensionais dos sujeitos da pesquisa, observando que não existe uma resposta única sobre o processo de envelhecimento, pois é complexo e heterogêneo, além de abarcar as relações biopsicossociais e culturais. Deste modo, evidenciaram que o envelhecimento saudável vai além de investimentos individuais, sendo de suma

importância os investimentos sociais contínuos dirigidos aos cidadãos, independente da fase vida em que se encontram. Por fim, alegam que as atividades que visem à promoção de encontros entre diferentes gerações podem trazer benefícios para todos os envolvidos, traduzidos em compreensão, respeito mútuo, afeto e melhor qualidade de vida.

Massi¹⁴ considera a linguagem como uma via essencial para que ocorra a interação entre as gerações, garantindo contínua participação e motivação dos idosos junto às suas famílias e às suas comunidades. Isso quer dizer que, sendo uma prática dialógica, ela possui um papel relevante na superação de preconceitos em torno do envelhecer. Através do estudo realizado pelo autor, é possível constatar que as atividades dialógicas intergeracionais exerce influências positivas na percepção dos sujeitos envolvidos ao proporcionar momentos de aprendizagem, aproximação e troca de experiências recíprocas entre as gerações. Para os idosos, essa possibilidade de diálogo e participação em atividade com outras gerações favoreceu o reconhecimento de valorizar e respeitar a geração mais nova. No caso das crianças e adolescentes, destacaram que os encontros promoveram reflexões em torno de visões estereotipadas da velhice, contribuindo para romper com representações preconceituosas e carregadas de acepções negativas.

No caso da pesquisa realizada por Borges e Magalhães⁸, há uma expressiva compreensão acerca do processo de constituição de laços intergeracionais diante do contexto de transformações sociais emergentes, observando as mudanças subjetivas e relacionais que se encontram na base dos processos de transmissão sociocultural as diferenças geracionais. Os autores afirmam que a partir de estudos psicossociais é possível observar distintas perspectivas teóricas que abordam o conceito de geração em contraposição à categoria idade, nas quais destaca-se o caráter subjetivo da experiência de pessoas de diferentes idades, tal como o proposto por Mannheim. Além disso, os autores afirmam a relevância em analisar as implicações do intenso e acelerado fluxo de transformações tecnológicas, bem como as mudanças sociais e culturais características da atualidade, buscando observar os efeitos nas relações estabelecidas entre as pessoas de diferentes gerações.

3.3 CONSTRUÇÃO DE VÍNCULOS

Piovezan, Bessa, Borges, Prestes e Chubaci¹⁵ promoveram um estudo que proporcionou uma ação gerontológica por meio de cartas anônimas, fomentando a construção de um vínculo intergeracional entre idosos institucionalizados e estudantes do ensino médio. A ação se deu como exemplo de projeto intergeracional, em que através dos resultados obtidos os programas e projetos intergeracionais se apresentam como uma interação intencional planejada entre diferentes grupos etários com objetivo de reduzir a distância entre jovens e idosos, assim como também promover atenção aos aspectos do passado, presente e futuro por meio do compartilhamento de diferentes valores e estilos de vida. Os benefícios desses programas refletem no rompimento de preconceitos no âmbito cognitivo, social e afetivo. O projeto através das atividades contribuiu para fortalecer vínculos emocionais dos idosos com outras pessoas, permitindo também que os estudantes tivessem a possibilidade de conhecer o indivíduo idoso. Quanto aos jovens, a participação no projeto trouxe maior abertura para a temática sobre o envelhecimento como processo natural e sobre o idoso como indivíduo adulto, heterogêneo e pleno de direitos, papéis e funcionalidade, tanto biológica como social¹⁵.

O estudo de Massi¹⁴, que investiga o impacto que atividades dialógicas intergeracionais pode ter na percepção que crianças e adolescentes têm sobre pessoas idosas e vice-versa, corrobora para o que foi supracitado, tendo em vista que um grande número de idosos explicitou que as atividades intergeracionais viabilizaram interação e fortalecimento de vínculos com as crianças e os adolescentes. Para esses idosos, a convivência com pessoas de gerações mais novas é fundamental para que haja uma interação mais próxima entre eles, visto que essa convivência é facilitadora de fortalecimentos de vínculos entre gerações, reconhecendo valores de suas histórias de vida.

Assim, a interação entre todas as idades é um processo mutuamente importante, bem como o respeito das particularidades entre jovens e idosos durante a troca de experiências, na qual ocorre uma interdependência fundamental para a construção de legados. Entende-se que o convívio entre diferentes gerações atua como oportunidade de aprendizagem para ambos, além de ser uma possibilidade de fortalecimento de vínculos entre os sujeitos. Através do estudo supracitado realizado por Massi¹⁴ acerca dos programas intergeracionais, foi constatado que além do fortalecimento da relação entre pessoas de diferentes idades, atividades intergeracionais têm efeitos benéficos sobre a saúde e o bem-estar de todas as gerações envolvidas. Ainda nesse estudo, vale destacar que os alunos apresentaram primeiramente uma visão preconceituosa e estereotipada da velhice, estando associada a doenças crônicas e a

incapacidade, o que seria contribuinte para a manutenção de preconceitos e estereótipos¹⁵. Para minimizar essa discriminação, tem-se como uma via os programas educacionais e trocas intergeracionais¹⁶.

4.CONCLUSÕES

Apesar de ter sido recorrente encontrar nos artigos discussões acerca da subjetividade diante do contato entre as gerações, não traziam como centralidade a discussão da relação entre ambos, mas afirmavam a relevância pertinente ao assunto. Neste sentido, mostra-se uma via que fornece embasamento para a realização de estudos na área voltados para a construção da subjetividade e a sua relação com o convívio intergeracional.

Conclui-se que, apesar de os idosos ainda serem vistos sob um viés encoberto de mitos e preconceitos, está emergindo um novo conceito de se viver a velhice, mais positivo e inclusivo. Essa nova visão acerca do envelhecimento tem contribuição do contato intergeracional, considerando que fornece uma via para a ressignificação do processo de envelhecimento, bem como para construção de vínculos, contribuindo significativamente para que se possa promover uma subjetividade mais rica e não limitante para os idosos. Assim, o convívio intergeracional foi visto como importante, o que também denota uma mudança no modo de pensar da sociedade. Isto indica uma nova visão do sujeito idoso, pautada em outros valores sociais e marcada por características que não são somente negativas, que começam a configurar um idoso mais participativo, com direitos e anseios.

Além disso, compreende-se que sem o processo de transmissão de conhecimentos e de comunicação seria impossível a continuidade do processo histórico, visto que as gerações seguintes não teriam acesso ao desenvolvimento histórico-cultural da humanidade. Ressaltando que, o conceito de subjetividade, referente à perspectiva da Psicologia histórico-cultural, é indissociável da relação das gerações mais novas ao começarem a entrar em um mundo constituído de significados construídos pelas gerações anteriores.

REFERÊNCIAS

- [1] MR, Guerra TO, Monteiro CA, Pereira JM, Porto MA, Mainardi SM, et al. Envelhecimento e subjetividade: experiência de atuação em psicologia com grupos de idosos. *Revista Ciência em Extensão*. 2015; 11 (2): 129-139.
- [2] Guimarães SMD. De geração para geração: as relações entre avôs e netos em face do avanço tecnológico. (Dissertação de mestrado). Curitiba: Universidade de Tuiuti do Paraná; 2014.
- [3] Bortolazzo SF. De Comte à Bauman: algumas aproximações entre os conceitos de geração e identidade. *Estudos de Sociologia*. 2016; 22 (1): 121-144.
- [4] Weller W. A atualidade do conceito de gerações de Karl Mannheim. *Soc. Estado*. 2010; 25 (2): 205-224.
- [5] Doll J. Gerações – um olhar para o “Problema das Gerações” de Karl Mannheim. *Rev. Portal de Divulgação*; 28 (1): 2012.
- [6] Crochik JL. Os desafios atuais do estudo da subjetividade na psicologia. *Psico. USP*. 1998; 09 (2): 69-85.
- [7] Molon SI. Subjetividade e constituição do sujeito em Vygotski. 3ª ed. Petrópolis: Vozes, 2010.
- [8] Aitta EB, Facci MGD. Subjetividade: uma análise pautada na Psicologia históricocultural. *Psicol. rev.* 20011; 17 (1): 32-47.
- [9] Borges CC, Magalhães AS. Laços intergeracionais no contexto contemporâneo. *Estud. psicol.* 2011; 16 (2): 171-177.
- [10] Lisboa AV. Transmissão intergeracional da cultura: um estudo sobre uma família mineira. *Psicol. estud.* 2007; 12 (1): 51-59.
- [11] Caldas CP, Thomaz, AF. A Velhice no Olhar do Outro: Uma perspectiva do jovem sobre o que é ser velho. *Revista Kairós Gerontologia*. 2010; 13(2): 75-89.
- [12] Cachioni M, Aguilar LF. A convivência com pessoas idosas em instituições de ensino superior: a percepção de alunos da graduação e funcionários. *Rev. Kairós*. 2008; 11(1): 79-104.
- [13] Zanon Cbfm, Alves VP, Cardenas CJ. Como vai a educação gerontológica nas escolas públicas do Distrito Federal?: um estudo com idosos e jovens. *Rev. bras. geriatr. gerontol.* 201; 14 (3): 555-566.
- [14] Massi G, Santos AR, Berberian AN, Ziesemer NB. Impacto de atividades dialógicas intergeracionais na percepção de crianças, adolescentes e idosos. *Rev. Cefac*. 2010; 18 (2): 399- 407.
- [15] Piovezan M, Bessa TA, Borges FSPS, Prestes SM, Chubaci RYS. “Troca de cartas entre gerações”: Projeto gerontológico intergeracional realizado em uma ILPI de São Paulo. *Revista Kairós Gerontologia*. 2015; 18(3): 137-153.
- [16] Vieira SL. Relações intergeracionais: as barreiras da institucionalização. *Revista Temática Kairós Gerontologia*. 2012; 15(1):119-133.

Capítulo 19

Condições de trabalho e saúde de psicólogos hospitalares

Simone Salviano Alves

Renata Pimentel da Silva

Yana Thamires Mendes Felix

Anísio José da Silva Araújo

Resumo: Os psicólogos hospitalares assumem numerosas atribuições e estão constantemente expostos aos riscos característicos das condições de trabalho em hospital. Considerando que o trabalho ocupa um lugar central na vida dos seres humanos e na sociedade, portanto, se relaciona de forma íntima com a saúde dos trabalhadores, o presente estudo teve como objetivo analisar a relação entre as condições de trabalho e a saúde dos psicólogos hospitalares de João Pessoa- Paraíba. Partiu-se de um delineamento não-experimental, de caráter exploratório e descritivo. Como instrumentos de coleta de dados foram utilizados o Inquérito Saúde e Trabalho (INSAT) e uma entrevista individual semi-estruturada. A pesquisa envolveu 40 psicólogos hospitalares, do sexo masculino e feminino, atuantes em hospitais públicos da Cidade de João Pessoa-Paraíba, localizada na Região Nordeste do Brasil. As respostas do INSAT foram armazenadas no programa Statistical Package for Social Science for Windows (SPSS, versão 20.0), onde foram submetidas ao tratamento de estatísticas descritivas e inferenciais. Já os dados alcançados por meio da entrevista individual semi-estruturada foram analisados por meio da análise de conteúdo temática. Por fim, entrelaçamos os dados oriundos dos dois instrumentos. Os resultados apontam, principalmente, que os psicólogos hospitalares estão constantemente expostos a condições de trabalho que afetam a sua saúde. Espera-se, por meio dos resultados deste estudo, contribuir para a produção e popularização do conhecimento acerca da psicologia hospitalar e dos aspectos que envolvem o profissional da categoria, especialmente, os relacionados ao seu trabalho e a sua saúde.

Palavras-chave: condições de trabalho, saúde, psicólogo hospitalar.

1. INTRODUÇÃO

A configuração de um novo paradigma econômico, político, social e organizacional decorrente, especialmente, das transformações nos mundos do trabalho geram inúmeras consequências para a vida e a saúde dos trabalhadores em geral. Esta ideia é reforçada pelo elevado número de pesquisas que mostram que o trabalho pode afetar a saúde do trabalhador, tanto positiva, quanto negativamente (Dejours, 2004).

Diante desse quadro geral por referência e considerando que a psicologia hospitalar é uma especialidade relativamente nova, fato que se reflete também no número restrito de estudos que contemplam o trabalho e a saúde desta categoria, delineamos o objetivo da presente pesquisa: analisar a relação entre as condições de trabalho e a saúde dos psicólogos hospitalares. Cabe ressaltar que aqui toma-se como condições de trabalho os elementos físicos que compõem o universo de trabalho de um ser humano ou categoria específica de trabalhadores (Dejours, 2004).

Simonetti (2004) define “a Psicologia Hospitalar como um campo de entendimento e tratamento dos aspectos psicológicos em torno do adoecimento” (p.15). Afirma que esta especialidade não se ocupa apenas de doenças com causas psicológicas, classicamente denominadas “psicossomáticas”, mas dos aspectos psicológicos de toda e qualquer enfermidade, tendo como cenário principal o hospital. Tais aspectos podem ser entendidos como manifestações da subjetividade do paciente diante do adoecimento. Como especificidade, trata-se do fazer do psicólogo intimamente relacionado a “questão saúde”, visto que o hospital é uma instituição restauradora e promotora de saúde por excelência.

O interesse pela área é crescente, mas ao que parece, é pouco dada atenção a questões como implementação de disciplinas teóricas e estágios práticos, além de questões diretamente relacionadas ao que o profissional de psicologia realiza dentro do hospital. Para Ismael (2005) apesar do aumento do número de profissionais, ainda existem dificuldades quanto à inserção do psicólogo no hospital e a deficiência de instrumental teórico necessário para orientar a prática, desde a formação universitária. Segundo o autor, isso pode gerar, entre outros problemas, mão-de-obra inexperiente e sem base suficiente para a realização de um trabalho satisfatório, especialmente, no enfrentamento da realidade do cotidiano de trabalho, dando descrédito a categoria e margem para que o trabalho realizado reflita de forma negativa na vida e saúde do trabalhador.

Diante disso, Carvalho, Souza, Rosa e Gomes (2011) enfatizam a necessidade de mais estudos na área, que tratem desde o histórico da profissão, até o seu estado na atualidade, limitações e potencialidades. Gorayeb e Guerrelhas (2003) dizem que o psicólogo que atua em hospital tem se apoiado quase que exclusivamente em teorias e não em dados empíricos para orientar sua prática. Assim, percebemos que o caminho percorrido pela psicologia hospitalar justifica sua relevância e consolidação como um campo novo para o saber psicológico. No entanto, muito ainda precisa ser feito no sentido da sistematização da prática do profissional em foco e da elucidação das inúmeras nuances das suas condições de trabalho e de como isso se relaciona com a sua saúde daqueles que o realizam.

Na esteira dessa discussão, aqui utiliza-se como referencial teórico, além dos autores supracitados acerca da própria psicologia hospitalar, a perspectiva de autores como Canguilhem (2006) que postula que saúde e doença são dimensões coexistentes. Neste sentido, saúde implica a possibilidade de poder adoecer e sair do estado patológico. Em outros termos, saúde concerne a “margem de tolerância ou de segurança que cada um possui para enfrentar e superar as infidelidades do meio” (Canguilhem, 2006, p. 148). Embasa-se ainda na Psicodinâmica do Trabalho (Dejours, 2004), campo de estudos que busca investigar sob que condições o trabalho pode constituir-se como operador de saúde e desenvolvimento ou, inversamente, em fonte de sofrimento e adoecimento. Por último, a Ergonomia da Atividade (Falzon, 2007), uma disciplina que estuda as interações do homem com o seu meio de trabalho, em busca de elementos que permitam conceber um trabalho (organização de trabalho, condições de trabalho) que respeitem as necessidades e peculiaridades humanas.

2. METODOLOGIA

2.1 DELINEAMENTO

Diante da complexidade do nosso objeto de estudo – condições de trabalho e saúde de psicólogos hospitalares -, optamos por realizar uma pesquisa exploratória e descritiva, associando as abordagens quantitativas e qualitativas. De acordo com Creswell (2010), diante da legitimidade reconhecida tanto da pesquisa quantitativa quanto da pesquisa qualitativa nas ciências humanas e sociais, os delineamentos

que combinam estas duas abordagens estão ganhando cada vez mais popularidade na comunidade científica.

Locus da pesquisa

A pesquisa foi desenvolvida em quatro hospitais públicos, todos localizados na cidade de João Pessoa-PB, na Região Nordeste do Brasil. Um dos hospitais possuía uma capacidade de funcionamento de 50 a 150 leitos (considerado pela própria administração um hospital de pequeno porte), e os outros três de 150 leitos ou mais (considerados pelas próprias administrações hospitais de médio porte).

Participantes

A amostra, não probabilística por conveniência, foi composta por 40 psicólogos hospitalares, atuantes em hospitais públicos, devidamente regularizados, na cidade de João Pessoa-PB. 92,5% eram do sexo feminino e 7,5% do sexo masculino, com idades que variaram entre um mínimo de 27 anos e um máximo de 63 anos. Cabe destacar que o total de 40 psicólogos hospitalares respondeu ao INSAT, dos quais 18 participaram da entrevista individual semiestruturada. O número de sujeitos que responderam a entrevista semi-estruturada foi definido com base no critério de saturação, que consiste na identificação, por parte do pesquisador, de repetições persistentes nas respostas emitidas. Assim, diante da ausência de novas informações, ele pode considerar atingido o ponto de saturação da amostra (Thiry-Cherques, 2009).

Procedimento e instrumentos

A presente pesquisa foi realizada em três fases que denominamos da seguinte forma: a) contatos iniciais, onde fizemos os contatos com as instituições e com os participantes, considerando os aspectos éticos; b) aplicação do Inquérito Saúde e Trabalho – INSAT (desenvolvido em Portugal pelas pesquisadoras Carla Barros-Duarte, Liliana Cunha e Marianne Lacomblez), onde apresentamos e aplicamos tal questionário que visa apreender dados acerca das características do trabalho e de como ele afeta a saúde dos trabalhadores; e c) realização de uma entrevista semi-estruturada, onde discorremos sobre essa modalidade de entrevista e a colocamos em prática com os psicólogos hospitalares tratando da temática saúde-trabalho.

Análise dos dados

Para analisar os dados provenientes do INSAT e da entrevista semi-estruturada, optamos por fazê-la em três momentos distintos, porém, complementares no movimento de elucidação dos nossos resultados. São eles: a) Análises estatísticas, descritivas e inferenciais, utilizadas tratar os dados oriundos do INSAT; b) Análise de conteúdo com base em Minayo (2007), no intuito de interpretar os dados advindos das entrevistas realizadas; c) Entrelaçamento dos dados, especialmente, um exercício de identificação das aproximações entre os dados quantitativos e qualitativos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Aqui apresentamos os principais elementos que emergiram em nossos resultados acerca das condições de trabalho dos psicólogos hospitalares, especialmente em relação aos fatores de risco e as exigências físicas impostas pela dinâmica da atividade que estes profissionais realizavam no hospital e a aproximação de tais elementos com a saúde dos atores em foco.

Em relação à condição de exposição no ambiente físico de trabalho, constatamos que 95,0% dos psicólogos hospitalares reconheceram estarem expostos a agentes biológicos. Durante a aplicação do questionário INSAT, foi possível perceber que eles atribuíam tal realidade a própria natureza do trabalho hospitalar. No entanto, alguns enfatizaram que tinham receio em realizar atendimentos no setor de doenças infectocontagiosas. A distribuição de respostas acerca desta temática pode ser verificada na Figura 1.

Figura 1. Distribuição dos participantes em função da exposição no ambiente físico de trabalho.

A condição de exposição a agentes biológicos também foi relatada pelos participantes no momento da entrevista semi-estruturada, em falas como:

“(...) aqui é um hospital, todos estamos expostos a vírus, bactérias e coisas do tipo (...)” (Paciente 5);

“(...) o ambiente é carregado de riscos biológicos, então eu posso citar vários, mas o mais comum são as bactérias (...)” (Paciente 8);

“(...) aqui é tanto que a gente já se considera imune, se considera batizado (...)” (Paciente 12).

Nesta última fala foi possível identificar uma estratégia de defesa do participante, expressa pelo tom de humor que ele imprimiu em sua colocação sobre a exposição a agentes biológicos. Ainda com base na Figura 1, é possível afirmar que o trabalho era realizado em um ambiente com ruído elevado (42,0%) e constante (55,0%). Tais aspectos puderam ser observados de forma imediata e bastante evidente nas visitas realizadas às instituições. As principais fontes de ruído identificadas pelos participantes foram o trânsito das macas pelos corredores, as máquinas que auxiliavam o funcionamento do hospital (geradores, climatizadores) e o barulho das ambulâncias, especialmente, para os psicólogos que trabalhavam no setor de urgência e emergência. Sobre isto, podemos destacar a seguinte afirmação:

“(...) aqui o ruído é constante, não para em momento nenhum. Se você prestar atenção vai perceber isto. A movimentação do hospital é essa todo dia, não para, chega ambulância a todo instante, aí vem à sirene, a correria dos socorristas, as macas sendo arrastadas a todo vapor, sem falar que, para completar, a imprensa não sai daqui (...)” (Paciente 5).

Lida (2005) define o ruído como um estímulo auditivo que não fornece informações úteis e desejáveis. Quando presente no ambiente de trabalho, pode se tornar uma fonte poderosa de incômodo, acarretando prejuízos ao desenvolvimento das atividades e, ainda, riscos à saúde do trabalhador, tais como: problemas de audição, dores de cabeça, estresse, irritabilidade e ansiedade.

Outros dois pontos que nos chamaram a atenção em relação as condições no ambiente físico de trabalho foram a exposição a poeiras ou gases (42,5%) e ao calor intenso (35,0%). De acordo com os participantes, o problema se dava devido às condições dos equipamentos de climatização, que além de antigos, não recebiam a manutenção necessária, chegando a acumular poeiras ou a nem mesmo funcionarem satisfatoriamente. Assim diziam: *“(...) os condicionadores acumulam muita poeira e dificilmente recebem manutenção, acabam que nem funcionam direito (...)” (P12).*

Os aspectos mencionados configuram os principais riscos à saúde que identificamos relacionados as condições no ambiente físico de trabalho dos psicólogos hospitalares. Na nossa perspectiva, os riscos se definem como elementos que, devido a sua natureza, podem acarretar danos à integridade global do trabalhador (Nouroudine, 2004). Alertamos que os elementos que não foram discutidos de forma extensiva (vibrações, radiações, frio intenso e agentes químicos), apesar de terem apresentado frequências menos elevadas, não estiveram ausentes. Assim, mesmo em menor intensidade, também compõem o quadro em questão.

Um número expressivo de participantes também reconheceu que o trabalho de psicologia dentro do hospital exige posturas penosas (42,5%), outros 45,0% assinalaram precisar permanecer muito tempo no mesmo local, 62,5% permanecer muito tempo de pé com deslocamento e 70,0% permanecer muito tempo de pé na mesma posição, conforme ilustrado na Figura 2.

Figura 2. Distribuição dos participantes em função das exigências físicas do trabalho.

Os dados acima mencionados sobre as condições de trabalho dos psicólogos em foco podem ser justificados por diversos fatores. Um deles é que o atendimento a pacientes hospitalizados acontece, quase que exclusivamente, dentro de enfermarias que comportam mais de um interno, onde não é permitido aos profissionais de saúde, entre eles o psicólogo, sentarem-se nas camas destinadas aos pacientes, nem nas cadeiras de apoio reservadas aos acompanhantes. Cabe ressaltar que cada atendimento dura, em média, 30 minutos, podendo variar de acordo com as necessidades de cada caso.

Além de permanecer em pé durante os atendimentos, o psicólogo hospitalar também permanece muito tempo no mesmo local, pois faz parte de sua estratégia de trabalho manter-se de frente para o paciente que está sendo atendido e de costas para os outros ocupantes do quarto, visando imprimir algum grau de privacidade ao atendimento (Romano, 1999). A distância da divisão de psicologia para os setores de trabalho, atrelada à necessidade de se deslocar ao encontro de cada paciente durante todo o plantão, também são fatores que tornam compreensíveis os resultados expostos na Figura 2. Apesar de reconhecerem a importância de uma qualificação específica na área, alguns autores (Castro & Bornholdt, 2004; Chiatone, 2006) defendem que o psicólogo hospitalar é, antes de qualquer coisa, o profissional de psicologia que presta assistência ao paciente hospitalizado “à beira do leito”. Os participantes desta pesquisa trabalhavam exatamente assim, atendendo aos pacientes nas enfermarias, de onde a maioria não podia sair, ou mesmo ao lado das macas que chegavam ao setor de emergência, razão pela qual trabalhavam quase que exclusivamente em pé.

4. CONCLUSÕES

Tratando especialmente das condições de trabalho, apresentamos os principais elementos que emergiram em nossos resultados acerca da exposição no ambiente de trabalho dos psicólogos hospitalares. Quanto aos elementos identificados destacaram-se a exposição a ruídos constantes e incômodos, a ruídos elevados e a agentes biológicos. A maioria dos participantes também precisava permanecer muito tempo em pé com deslocamento e muito tempo em pé no mesmo local.

Apesar do seu caráter variado, o ambiente e as condições de trabalho dos psicólogos hospitalares pesquisados são marcadas por aspectos como a insatisfação, a exposição a fatores de risco e a exigências físicas demasiadas, que acabam se refletindo nas relações no ambiente de trabalho, na qualidade do serviço prestado e, especialmente na saúde física e psíquica dos profissionais.

Diante do exposto, ressaltamos que esta pesquisa não se propôs a tratar de forma exaustiva o tema em foco, visto que a complexidade do nosso objeto de estudos fundamentalmente exige empreendimentos constantes no sentido de elucidar as inúmeras nuances que permeiam o seu universo. No entanto, é possível pontuar que a participação voluntária dos psicólogos hospitalares neste estudo constituiu-se em

um momento de reflexão acerca das condições de trabalho em que estão inseridos e de como elas afetam de forma positiva ou negativa a sua saúde. Esperamos, por meio dos nossos resultados, contribuir com uma pequena e relevante parcela rumo a compreensão do fenômeno tratado, assim como inspirar pesquisas futuras que se proponham a aprofundar o tema.

REFERÊNCIAS

- [1] Canguilhem, G. (2006). *O normal e o patológico* 6ª Edição. Rio de Janeiro: Florense
- [2] Universitária.
- [3] Carvalho, D.B., Souza, L.M.R., Rosa, L.S., & Gomes, M.L.C. (2011). Como se escreve, no Brasil, a história da psicologia no contexto hospitalar? *Revista Estudos e Pesquisas em Psicologia*, 11(3), 105-126.
- [4] Castro, E.K., & Bornholdt, E. (2004). Psicologia da saúde x psicologia hospitalar: definições e possibilidades de inserção profissional. *Psicologia, Ciência e Profissão*, 24(3), 48-57.
- [5] Chiattonne, H.B.C. (2006). A significação da psicologia no contexto hospitalar. Em V. A. Angerami-Camon (org). *Psicologia da saúde: um novo significado para a prática clínica* (pp. 73-167). São Paulo: Thomson.
- [6] Creswell, J. W. (2010). *Projetos de pesquisa. Métodos qualitativo, quantitativo e misto*.
- [7] Porto Alegre: Artmed.
- [8] Dejours, C. (2004). *Addendum: da psicopatologia à psicodinâmica*. Em S. Lancman (org), *Cristophe Dejours: da psicopatologia à psicodinâmica do trabalho* (pp. 47-104). Brasília: FIOCRUZ/Paralelo 15.
- [9] Falzon, P. (2007). Natureza, objetivos e conhecimentos da ergonomia: elementos de uma análise cognitiva da prática. Em P. Falzon (Org.), *Ergonomia* (pp.3-19). São Paulo: Editora Blücher.
- [10] Gorayeb, R., & Guerrelhas, F. (2003). Sistematização da prática psicológica em ambientes médicos. *Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva*, 5(1), 11-19.
- [11] Iida, I. (2005). *Ergonomia: projeto e produção* 2ª Edição. São Paulo, Edgard Bluche.
- [12] Ismael, S.M.C. (2005). A inserção do psicólogo no contexto hospitalar. Em S.M.C. Ismael (org), *A prática psicológica e sua interface com as doenças* (pp. 102-119). São Paulo: Casa do Psicólogo.
- [13] Nouroudine, A. (2004). Risco e atividades humanas: acerca da possível positividade aí
- [14] presente. Em M. Figueiredo, M. Athayde, J. Brito, & Alvarez, D. (orgs.), *Labirintos do Trabalho: interrogações e olhares sobre o trabalho vivo* (pp. 37-62). Rio de Janeiro: DP&A Editora.
- [15] Romano, B.W. (1999). *Princípios para a prática da psicologia clínica em hospitais*, 1ª Edição. São Paulo: Casa do Psicólogo.
- [16] Simonetti, A. (2004). Manual de psicologia hospitalar: o mapa da doença. São Paulo: Casa do Psicólogo.
- [17] Thiry-Cherques, H.R. (2009). Saturação em pesquisa qualitativa: estimativa empírica de
- [18] dimensionamento. *PMKT*, 4(1), 20-27.

Capítulo 20

A intervenção psicológica no programa do planejamento familiar em Cabedelo-PB

Lúcia Robertta Matos Silva dos Santos

Francisca Marina de Souza Freire Furtado

Degmar Francisco dos Anjos

Rogério dos Santos Gesteira

Resumo: O Programa de Planejamento Familiar se constitui em um dispositivo do Sistema Único de Saúde que prevê ações educativas para conscientização de sua escolha pelo planejamento familiar de homens e mulheres casal sobre seus direitos reprodutivos. O presente relato de experiência objetiva apresentar o olhar de psicólogos que atuam nesse programa dentro das políticas de saúde do município de Cabedelo/PB, cuja atuação envolvem atividades que possibilitem o acesso livre e consciente a homens e mulheres que desejam se submeter a cirurgias de laqueadura tubária e vasectomia. As pessoas que se inscrevem no programa passam por atendimentos multiprofissionais, envolvendo médicos, psicólogos, assistentes sociais e enfermeiros. Estes são feitos de forma individual ou em grupo, buscando-se garantir o direito de cidadania e da liberdade de livre escolha quanto à paridade de filhos, atuando-se numa perspectiva de conscientização e educação popular. Uma das principais intervenções da equipe multidisciplinar é mobilizar o comprometimento compartilhado dos parceiros na construção do planejamento diário da família e para a prevenção e orientação quanto os cuidados gerais em saúde, visto este atendimento ser uma possibilidade que profissionais encontram para favorecer o entendimento dos sujeitos quanto à necessidade de prevenção em saúde e para uma melhor qualidade de vida de toda família.

Palavras-Chave: planejamento familiar, atendimento psicossocial, sistema único de saúde.

1. INTRODUÇÃO

O Programa do Planejamento Familiar é um dispositivo do Sistema Único de Saúde que dispõe de ações em conjunto para regulação da fecundidade que possa garantir direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal, dentro de uma visão de atendimento global e integral à saúde (Lei 9263/96 do Planejamento Familiar). Parte-se do entendimento de que o planejamento familiar deve ser um ato consciente do casal de planejar o nascimento dos filhos, levando em consideração tanto o número desejado quanto a ocasião mais apropriada para tê-los. Tal decisão deve ser, então, construída com base em seus valores éticos, morais e religiosos.

Segundo a Portaria SMS.G Nº 497, de 25 de março de 2006, deve fazer parte do Programa de Planejamento Familiar uma equipe multidisciplinar composta, por exemplo, por médicos, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros e profissionais de apoio/suporte.

Quanto aos métodos contraceptivos reversíveis, como o DIU (dispositivo intrauterino), preservativos masculinos e femininos e contraceptivos injetáveis ou de uso oral, estes devem estar disponíveis na rede de saúde do município, estando, inclusive, os serviços de atenção básica preparados para atender a demanda e as situações previstas na Lei 9.263/96.

Um aspecto importante a ser observado neste programa é a questão da gravidez precoce desprotegida, tendo em vista as consequências sociais e de saúde que esta pode acarretar. Assim, tanto para adultos como para adolescentes, torna-se imprescindível no Programa de Planejamento Familiar a discussão sobre as diversas formas de contraceptivos, bem como da proteção com relação às doenças sexualmente transmissíveis, principalmente da Aids, em virtude tanto do não uso como pelo uso inadequado da camisinha. Sendo a Aids uma das doenças mais agravantes do século XXI, esta deve ser trabalhada em toda população, mediante todos e quaisquer serviços que possam garantir informação adequada para sua prevenção e/ou promoção de saúde às pessoas que vivem com HIV/AIDS (SALDANHA, 2003). Nesse sentido, este trabalho tem com o objetivo apresentar a visão da Psicologia neste Programa.

2. METODOLOGIA

O presente estudo é um relato de experiência e tem como objetivo apresentar a atuação de psicólogos nesse programa dentro das políticas de saúde do município de Cabedelo/PB. Este é realizado no Hospital Municipal Padre Alfredo Barbosa (HMPAB), hospital que recebe os pacientes encaminhados das Unidades Básicas de Saúde e outros serviços de atenção secundária da cidade.

O Programa de Planejamento Familiar funciona neste hospital desde 2005 e é composto por equipe multidisciplinar contando em seu quadro médico, assistente social, psicólogo e enfermeiro. O hospital é referência para trabalhos focais de orientação e/acompanhamento para laqueadura tubária, vasectomia, bem como fluxo para casos de regulação de gestações e desligamento de trompas no município.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 O SERVIÇO DE PSICOLOGIA DO PLANEJAMENTO FAMILIAR DO HMPAB

No processo de constituição do programa, o serviço de Psicologia recebe sua clientela dentro de uma perspectiva de aconselhamento, atendendo seus pacientes por meio de um processo de reflexão de vida. As intervenções em Psicologia são realizadas na sala de Psicologia do próprio Hospital, de forma individual e/ou grupo.

O aconselhamento psicológico baseia-se no enfoque psicológico centrado na pessoa que se apresenta como uma alternativa muito mais promotora de encontros entre pessoas do que de transmissão de informações em consultas (ROGERS, 1987). Quanto ao acesso ao Programa, os pacientes demonstram o desejo pelo planejamento familiar para fins de controle de prole tanto pelas equipes das unidades básicas de saúde quanto diretamente no hospital, onde são cadastrados e avaliados de acordo com cada caso em específico, sendo atendidos pela equipe multidisciplinar e dando os devidos encaminhamentos, seja para exames na atenção básica como para consultas posteriores para reavaliações. Ao adentrarem no programa, os usuários são recebidos, acolhidos, orientados e encaminhados para suas devidas necessidades, seja ela a opção de realizar a cirurgia de laqueadura ou vasectomia de acordo com a Lei 9263/96. O fluxo de atendimento é explicitado a seguir:

Figura 01: Fluxo de atendimento

4. DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES COM A PSICOLOGIA

De forma individual, os usuários são escutados diante de suas necessidades e podem enfocar aspectos relativos ao planejamento familiar, trazendo inclusive, as informações que dispõem, seus desejos, conflitos com os parceiros, medos e angústias. Mas, mais que um momento de educação é um momento único e exclusivo para cada usuário, onde procura-se respeitar seus valores e expectativas e desenvolver um vínculo e uma relação de confiança entre os profissionais e os usuários.

De forma conjugal, ambos os parceiros são ouvidos, orientados e aconselhados a tomar uma decisão compartilhada, que seja mais adequada a sua atual condição e que esteja dentro de uma perspectiva de desejo do próprio casal e sua expectativa de vida. Além do mais, o atendimento ao casal favorece a percepção do paciente quanto a sua opção pelo planejamento e quanto ao companheiro quanto a sua coparticipação na ação do planejamento do conjugue, assim, respeitase um dos requisitos da Lei: “Na vigência de sociedade conjugal, a esterilização depende do consentimento expresso de ambos os cônjuges (Lei 9263/96, Art. 10, II, § 5º).

Quando realizado em grupo, além da psicóloga, também participam médicos e assistentes sociais do Programa. Há a apresentação geral do Programa, distribuição de material audiovisual explicativo e reflexão sobre as formas diversas para regulação do planejamento familiar. A seguir, encontra-se detalhadas algumas ações realizadas pelo Serviço de Psicologia.

Figura 02: Ações realizadas pelo Serviço de Psicologia

Após os encontros individuais, conjugais e em grupos, algumas temáticas surgem como mais necessárias para o debate e reflexão como pode ser mostrado a seguir.

Figura 03: Temáticas trabalhadas pelo Serviço de Psicologia

De forma mais explícita, pode-se explicar que os sentimentos quanto aos processos cirúrgicos apresentam-se diversificados. Todavia, os medos relacionados ao processo cirúrgico têm uma maior repercussão entre os usuários. Segundo Angerami (1998), um processo cirúrgico sempre é causador de intensa mobilização nos sujeitos, visto que uma intervenção cirúrgica promove nos sujeitos mobilização internas, medo pelo inesperado e temor pela morte, mexendo no seu aspecto biopsicossocial e provocando intensa angústia e ansiedade. (SEBASTIANI E MAIA, 2005; MELO FILHO, 1992).

A satisfação quanto à quantidade de filhos já vem sendo repensada há décadas no país, visto ser o processo de avaliação de qualidade de vida associada à quantidade de filhos. Desta forma, a preocupação existe entre os usuários que não querem ter uma grande prole e a lei concede um requisito quanto a quantidade de filhos mínima para a realização do método cirúrgico irreversível. “*Somente é permitida a esterilização voluntária... em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de vinte e cinco anos de idade ou, pelo menos, com dois filhos vivos*” (Art 10, II da Lei Nº 9.263, de 12 de Janeiro de 1996).

Questões relativas às informações que os usuários têm sobre a contracepção fazem toda diferença na escolha do melhor método a ser indicado para a família. Segundo Osis et al. (1999), ter o conhecimento dos métodos contraceptivos, a adequação melhor ao corpo e as necessidades da família, em especial ao de cada sujeito individualmente, é um dos pré-requisitos a manifestação de vontade segura por um dos métodos. O indivíduo deve saber as informações corretas para o seu caso, e não apenas o “ouvir falar” de alguém sobre o assunto. Uma vez que a pessoa é conhecedora da existência de outros métodos contraceptivos possíveis para seu uso, evita-se o risco de uma escolha inadequada e que possa causar arrependimento.

5. QUESTÕES QUANTO A FEMINILIDADE

Também são muito discutidas, justamente pelo motivo de que o maior quantitativo de usuários a se candidatarem ao Planejamento Familiar é de mulheres. Desta forma, percebe-se no histórico da feminilidade o quanto o papel reprodutor e de mãe reflete na subjetividade feminina. Segundo Santos (2009), desde a antiguidade, pensava-se que a mulher era um ser criado por Deus somente para servir a reprodução. Os egípcios estudaram o útero e avaliaram como tendo um efeito poderoso e importante na saúde mental da mulher (CALIRI, 1994); na religião o corpo feminino era considerado como fundamentalmente impuro (PRIORI, 1999) e no percurso histórico social, a mulher devia contribuir para a reprodução da espécie, submetendo-se às ordens do marido ou do pai e servir sociedades históricas (SALDANHA, 2003). O tornar-se mulher e o tornar-se homem constituem obras das relações de gênero e este, por sua vez, se constrói e se expressa através das relações sociais.

Com o passar dos séculos, do renascimento, da industrialização e dos avanços da medicina com as pílulas anticoncepcionais, houve um reconhecimento do feminino, valorizando-a também como ser

participante deixando de ser vista como relação mulher-homem e passa a ter também a relação mulher-sujeito (BIALOSI-ALVES, 2000; DIAS, 2003; OSIS, 1998). Desta forma, a possibilidade de submeter-se a uma cirurgia que a impossibilite de ter mais filhos pode causar uma sensação de dúvidas quanto a sua futura feminilidade, sua sexualidade pois a intervenção cirúrgica pode despertar sentimentos de rompimento, de inutilidade, de destituição da condição feminina (ANGERAMI-CANON, 1998).

A reflexão quanto a qualidade de vida ainda tem espaço na vida dessas mulheres e homens que buscam o planejamento familiar. Assim, há toda uma preocupação desses sujeitos quanto ao futuro da família, quanto às questões sociais, econômicas, culturais e de saúde. Segundo Minayo (1994), essas reflexões levam os sujeitos a poder relacionar conforto e bem-estar como essencial para a vida familiar futura.

6. CONCLUSÃO

A atenção a mulher e ao homem que desejam a regulação da quantidade de filhos e, com isso, melhoria da qualidade de vida é, sim, o grande foco do Planejamento Familiar. Entretanto, outros aspectos são trabalhados nessa assistência em saúde, como a ação integral à saúde. Neste caso, o Planejamento Familiar pode ser um aporte de entrada para a atenção global a saúde do paciente e de seus familiares e cabe, as redes de serviços públicos do SUS, a realização dos devidos encaminhamentos para a proteção à saúde primária e mais emergencial, respeitando a demanda dos pacientes.

E entendendo que os sujeitos precisam de um apoio multidisciplinar, a Psicologia vem desenvolvendo ações no sentido de promover reflexões quanto a melhor escolha para cada contexto familiar e de acordo com as necessidades de saúde de cada família. O Estado assumiu a responsabilidade de implementar políticas públicas para as mulheres e homens e estes tem aderido cada vez mais os processos de contracepção com o objetivo de construir a igualdade e a equidade de gênero, considerando a diversidade de raça e etnia, gerações, orientação sexual e deficiências (BRASIL, 2007).

REFERÊNCIAS

- [1] Angerami-Camon, V. A. Urgências psicológicas no hospital - as cirurgias ginecológicas: uma questão para a psicologia. São Paulo: Thomson Pioneira, 1998.
- [2] Biasoli-Alves, Z. M. M. Continuidades e Rupturas no Papel da Mulher Brasileira no Século XX. Psicologia: Teoria e Pesquisa. Vol.16, n.3, 2000.
- [3] Brasil. Presidência da República. Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. Textos e roteiros de discussão para as Conferências Municipais e/ou Regionais e Conferências Estaduais de Políticas para as Mulheres – Brasília: Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, 2007.
- [4] Caliri, M. H. L. Tentando resolver incertezas: trajetórias de mulheres ao enfrentarem o processo de histerectomia. Ribeirão Preto, São Paulo, 1994. Dias, Diocleide. Os diversos papéis das mulheres e os seus efeitos para o bem-estar psicológico: um estudo comparativo entre mulheres com trabalho pago e donas de casa. Tese de Mestrado. Pós-Graduação em Psicologia Social. Universidade Federal da Paraíba, 2003.
- [5] Minayo, M. C. S. O Desafio do conhecimento científico pesquisa qualitativa em saúde (2a ed.). São Paulo: HucitecAbrasco, 1994.
- [6] Osis, Maria José Duarte; Anibal Faúndes; Maria Helena De Sousa; Patricia Bailey. Consequências do uso de métodos anticoncepcionais na vida das mulheres: o caso da laqueadura tubária.
- [7] Osis, M. J. M. D.. Caderno Saúde Pública vol.15 n.3, 1999. Paism: um marco na abordagem da saúde reprodutiva no Brasil. Cad. Saúde Pública v.14, 1998.
- [8] Priori, M. D. Viagem pelo imaginário do interior feminino. Revista Brasileira de História, v.19,n.37, 1999.
- [9] Rogers, Carl. Torna-se pessoa. São Paulo: Martins Fontes, 1987.
- [10] Saldanha, A. A. W.; Vulnerabilidade e Construções de Enfrentamento da Soropositividade ao HIV por Mulheres Infectadas em Relacionamento Estável. Tese de Doutorado. Pós-Graduação em Psicologia, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 2003.
- [11] Santos, L. R. M. S. S. Acta Cirúrgica Brasileira, v.20, supl.1, 2005. Histerectomia: aspectos psicossociais e processos de enfrentamento. Psico-USF, v. 16, n. 3, p. 349-356, set. /dez. 2011.
- [12] Sebastiani, R. W.; Maia, E. M. C. Contribuições da psicologia da saúde- hospitalar na atenção ao paciente cirúrgico.

Autores

AMANDA FERREIRA VIGÓ

Acadêmica do décimo primeiro período de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba. Monitora concursada de Histologia (2015.2-2016.1) e Neonatologia (2016.2-2017.1) da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba. Extensionista concursada do projeto de pesquisa e extensão “Suporte Básico de Vida Pediátrico” (2017.2-2018.1) e “Prevenção” à Cegueira” (2018). Membro da comissão organizadora do V e VII Simpósio Paraibano de Ginecologia Endócrina. Vice presidente da Liga Acadêmica de Cardiologia da Paraíba- CARDIOLIGA (2016-2018), e Vice presidente da liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia da Paraíba- LAGOP (2016-2019). Autora do livro “Manual de Cardiologia para Graduação” (2019).

ANA ALAYDE WERBA SALDANHA

Graduação e Formação em Psicologia pelo Instituto Paraibano de Educação (1985), Especialização em Saúde Coletiva (1996), Mestrado em Psicologia (Psicologia Social) pela Universidade Federal da Paraíba (1998); Doutorado (2003) e Pós-Doutorado (2012) em Psicologia pela Universidade de São Paulo (USP). Atualmente é professor Associado II da Universidade Federal da Paraíba, no Programas de Pós Graduação em Psicologia Social (Mestrado e Doutorado -UFPB), onde desenvolve pesquisas com ênfase na Atenção Primária em Saúde, trabalhando com os seguintes temas: Aids, ações e programas na unidade básica, prevenção e promoção da saúde, saúde do adolescente, vulnerabilidade, gênero, terceira idade. É coordenadora do Núcleo de Pesquisa Vulnerabilidades e Promoção da Saúde (UFPB). Atua como pesquisadora do Programa de Atendimento Psicossocial à Aids vinculado a FFCLRP/USP.

ANA ALAYDE WERBA SALDANHA PICHELLI

Graduação e Formação em Psicologia pelo Instituto Paraibano de Educação (1985), Especialização em Saúde Coletiva (1996), Mestrado em Psicologia (Psicologia Social) pela Universidade Federal da Paraíba (1998); Doutorado (2003) e Pós-Doutorado (2012) em Psicologia pela Universidade de São Paulo (USP). Atualmente é professor Associado II da Universidade Federal da Paraíba, no Programas de Pós Graduação em Psicologia Social (Mestrado e Doutorado - UFPB), onde desenvolve pesquisas com ênfase na Atenção Primária em Saúde, trabalhando com os seguintes temas: Aids, ações e programas na unidade básica, prevenção e promoção da saúde, saúde do adolescente, vulnerabilidade, gênero, terceira idade. É coordenadora do Núcleo de Pesquisa Vulnerabilidades e Promoção da Saúde (UFPB). Atua como pesquisadora do Programa de Atendimento Psicossocial à Aids vinculado a FFCLRP/USP.

ANA ALINE MATOS DE MEDEIROS

Possui Bacharelado e Licenciatura em Enfermagem pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte/UERN (2015), Campus Caicó. Bolsista PIBIC-CNPQ (Vigência 2013-2014). Especialista em Enfermagem do Trabalho. Especializando em Saúde da Família. Atualmente mestranda do Programa de Pós Graduação de Saúde Pública-UEPB.

ANA BEATRIZ MARQUES BARBOSA

Graduanda em Fisioterapia pelo Centro Universitário UNIFACISA - Campina Grande /PB. Vice presidente da Liga Campinense de Morfologia (LCM)

ANDRÉ GARCIA AMBROSI

Possui graduação em Ciências Contábeis pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP(2010) e ensino-médio-segundo-grau pelo Mário Marques de Oliveira(2001). Graduando em Medicina.

ANISIO JOSÉ DA SILVA ARAUJO

Possui graduação em Formação de Psicólogo pela Universidade Federal da Paraíba (1983), mestrado em Administração pela Universidade Federal da Paraíba (1991) e doutorado em Ciências pela Fundação Oswaldo Cruz (2001). Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal da Paraíba e está vinculado ao mestrado em Psicologia Social, fazendo parte do núcleo de estudos intitulado Psicologia Social, Trabalho e Subjetividade. A área de atuação principal é Psicologia do trabalho e organizacional, e os temas de interesse são: subjetividade e Trabalho, saúde mental e trabalho, saúde do trabalhador, produtividade e qualidade com saúde e segurança.

ANÍSIO JOSÉ DA SILVA ARAÚJO

Possui graduação em Formação de Psicólogo pela Universidade Federal da Paraíba (1983), mestrado em Administração pela Universidade Federal da Paraíba (1991) e doutorado em Ciências pela Fundação Oswaldo Cruz (2001). Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal da Paraíba e está vinculado ao mestrado em Psicologia Social, fazendo parte do núcleo de estudos intitulado Psicologia Social, Trabalho e Subjetividade. A área de atuação principal é Psicologia do trabalho e organizacional, e os temas de interesse são: subjetividade e Trabalho, saúde mental e trabalho, saúde do trabalhador, produtividade e qualidade com saúde e segurança.

ANTÔNIO GABRIEL ARAÚJO PIMENTEL DE MEDEIROS

Graduado em Psicologia pela Universidade de Pernambuco (UPE) - Campus Garanhuns (2017) e integrante do Grupo de Estudos sobre Saúde Mental do Idoso, vinculado ao CNPq. Atualmente mestrando no programa de mestrado profissional em Psicologia: Práticas e Inovação em Saúde Mental, pela Universidade de Pernambuco (UPE) - Campus Garanhuns

CAMILA FREITAS COSTA

Graduanda em Fisioterapia pelo Centro Universitário UNIFACISA - Campina Grande /PB. Membro da Liga Campinense de Morfologia (LCM)

CAMILA RACHEL LIRA SILVA

Tem experiência na área de Serviço Social, com ênfase em Serviço Social, atuando principalmente nos seguintes temas: Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), Promoção da Saúde, Estratégia Saúde da Família (ESF), Atenção Primária à Saúde (APS) e HIV/AIDS

CARINE DE JESUS SOARES

Doutorado em andamento pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Saúde (PPGES) da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), com área de concentração em Saúde Pública, linha pesquisa em Políticas de Saúde, campus de Jequié/BA. Especialista em Urgência, Emergência e UTI pela Fundação Visconde de Cairu. Graduada em Enfermagem e Obstetrícia pela UESB no ano de 2014. Integrante do grupo de estudo e pesquisa em Saúde Mental: Loucos por Cidadania; (CNPQ/UESB). Experiência profissional em Atenção Básica e área hospitalar.

CARLA CABRAL DOS SANTOS ACCIOLY LINS

Graduada em Odontologia pela Universidade Federal de Pernambuco (1997), especialista em Endodontia pela Universidade Federal de Pernambuco (1998), Mestrado em Morfologia pela Universidade Federal de Pernambuco (2002) e Doutorado em Odontologia (Endodontia) pela Universidade de Pernambuco (2010). Atualmente é Professora Associado I do Departamento de Anatomia e participa como Membro Permanente do Programa de Pós-graduação em Gerontologia da Universidade Federal de Pernambuco. Atua como membro efetivo do Comitê de Ética Humano CCS/UFPE desde 2008 e Coordena o projeto de Extensão: Pró-Parkinson: Odontologia. Tem experiência na área de Morfologia, com ênfase em Anatomia Aplicada à Clínica Odontológica, na Gerontologia atua na linha de pesquisa envelhecimento e saúde.

CARMEM LÚCIA DE ARROXELAS SILVA

Doutoranda pelo Programa de Pós Graduação em Ciências da Saúde da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) na área de Neurociência clínica e experimental. Mestre em Ciências da Saúde pelo PPGCS/ICBS/UFAL. Possui graduação em Farmácia Generalista Bacharelado pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL). Integrante do Grupo de Pesquisa em Epilepsia Clínica e Experimental (GPECE) no qual desenvolve pesquisas com ênfase em Expressão Gênica Relativa, Neurodegeneração Hipocampal e Descoberta de Fármacos Naturais e Sintéticos com atividades Anticonvulsivante, Neuroprotetora e Anti-inflamatória sob orientação do Prof. Dr. Daniel Leite Góes Gitaí.

CLODOVAL BENTO DE ALBUQUERQUE SEGUNDO

Bacharel em Direito pela Faculdade de Campina Grande - FAC/CG (UNESC Faculdades) em 2012; Advogado inscrito na OAB/PB sob o nº 18.197; Especialista em Direito Previdenciário pela Escola Superior de Advocacia (ESA), Subseccional Campina Grande, Estado da Paraíba e Faculdade Maurício de Nassau. Pós-graduando em Direito Administrativo e Gestão Pública pela Faculdades Integradas de Patos - FIP, Membro da Comissão de Direito Previdenciário da Ordem dos Advogados da Paraíba, Subseção de Campina Grande. Procurador do Município de Umbuzeiro - PB.

CRISTINA CAMELO DE AZEVEDO

Professora Doutora do Instituto de Psicologia da Universidade Federal de Alagoas e dos Mestrados Profissionais de Ensino na Saúde e de Saúde da Família da FAMED/UFAL.

DANIEL LEITE GÓES GITAÍ

Professor Associado da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) atuando no depto de Biologia Celular e Molecular do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde (ICBS). Orientador permanente no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da UFAL (nível 4) e do Mestrado Profissional em Ensino de Biologia em Rede Nacional (nível 4). Coordenador do Grupo de Pesquisa em Epilepsia Clínica e Experimental (GPECE). Membro da Câmara Técnica Permanente de Avaliação e Assessoramento da Fundação de Amparo a Pesquisa do estado de Alagoas (FAPEAL). Tem experiência na área de Genética e Biologia Molecular com ênfase em Análise da Expressão Gênica, Estudos de Associação, Estudos funcionais e experimentação animal.

DANIELLE CARNEIRO DE MENEZES SANGUINETTI

Docente do curso de Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Doutora em Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento, na área de Neurociências (UFPE). Líder no grupo de pesquisa; Tecnologia Assistiva, Funcionalidade e Inovação;. Pesquisadora do grupo de pesquisa Neurociências e Neurofisiologia Clínica - Neurofis, na linha Análise da Atividade, Realidade Virtual e Tecnologia Assistiva para Pessoas com Doença de Parkinson.

DAISY DE ARAÚJO VILELA

Prof. Adjunto I da UFG-REJ. Doutoranda em Ciências da Saúde. Esp. Epidemiologia pelo IPTSP-UFG; Esp. Fisioterapia Hospitalar PUC GO; Grad. em Fisioterapia pela Unisaesiano-Lins SP. Linhas de Pesq.: formação em Fisioterapia, Saúde do idoso; Funcionalidade humana; Ensino em saúde ; Promoção da saúde; Qualidade de vida; Hanseníase. Experiência no ensino semi-presencial, pelas Plataformas MOODLE, SABIÁ, AROUCA.

DÉBORA TEIXEIRA DA CRUZ

Doutora em Saúde e Desenvolvimento pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, linha de pesquisa (Doenças emergentes, reemergentes e negligenciadas na Região Centro-Oeste: aspectos sócio-culturais ecoambientais, epidemiológicos e clínicos). Mestrado em Bioética (linha de pesquisa saúde coletiva) Universidade do Vale do Sapucaí (UNIVAS). Especialização em Mediação de Conflitos pelo Instituto Federal do Sul de Minas; Possui graduação em Radiologia pela Universidade de Alfenas (UNIFENAS); graduação em Psicologia pela Universidade do Vale do Sapucaí (UNIVAS) Graduação em Pedagogia(Unigran); Atualmente é revisora ad hoc da Revista Brasileira de Pesquisa em Saúde da Universidade Federal de Espírito Santo (UFES) ESTUDOS INTERDISCIPLINARES SOBRE O ENVELHECIMENTO da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Avaliadora e Consultora AdHoc da Fundect. Coordenadora de CST em Radiologia, Supervisora de Estágio de Psicologia e docente nos cursos de Radiologia, Enfermagem, Psicologia e Biomedicina da Faculdade UNGRAN Capital, além de docente de disciplinas semi presenciais da Faculdade UNIGRAN Capital (CEAD). Participa da Comissão de Biossegurança da Faculdade Unigran Capital, Docente nos cursos de Pós Graduação do Centro Universitário da Grande Dourados. Professora colaboradora na Educação a Distância da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (EAD/UFMS). Revisora associado da revista Perspectivas Experimentais e Clínicas, Inovações Biomédicas e Educação em Saúde (PECIBES) do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (HUMAP) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul na área de Psicologia e Ciências do Comportamento. Avaliadora adhoc para Autorização e Reconhecimentos de Cursos representando o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP/MEC e Membro da Comissão Assessora de Área do Enade - INEP/MEC/SINAES. Membro do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário da Grande Dourados. Membro da Frente Parlamentar dos Direitos da Pessoa Idosa de Mato Grosso do Sul Tem experiência na coordenação de cursos; orientação de trabalhos acadêmicos e científicos; supervisão de estágios; psicodinâmica do trabalho e docência de ensino superior e pós-graduação. Autora de livros.

DEGMAR FRANCISCO DOS ANJOS

Possui doutorado em Psicologia (Psicologia Social) pela Universidade Federal da Paraíba (2012), mestrado em Estudos de Linguagem pela Universidade Federal de Mato Grosso (2007) e graduação em Letras Português e Espanhol pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (2000). Atualmente é Docente Efetivo e Diretor de Educação Profissional do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFPB e docente colaborador no Programa de Mestrado Acadêmico em Ensino do Instituto Federal de Mato Grosso. Já exerceu os cargos de Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional (IFMT), Pró-Reitor de Ensino e Reitor Substituto (IFAC), Assessor de Reitoria (IFMT), Chefe de Departamento Geral de Educação (CEFET-MT) e Coordenador de Cursos, dentre outros. Tem experiência e pesquisas nas áreas de Educação Superior, Educação Profissional, Linguagens, Psicologia Social e Psicanálise, atuando principalmente nos seguintes temas: Construcionismo social, HIV/Aids, juventude, cuidados a pessoas idosas, diversidades, vulnerabilidades, preconceitos e identidades.

DIESLLEY AMORIM DE SOUZA

Doutorando em Ciências da Saúde pelo Programa de Pós Graduação em Enfermagem e Saúde (PPGES) da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) na linha de pesquisa Vigilância à Saúde. Mestre em Ciências da Saúde pelo PPGES-UESB na linha de pesquisa Política, Planejamento e Gestão em Saúde (CAPES 4). Pós Graduado em Nefrologia pela Atualiza Cursos e UCB- Universidade Castelo Branco. Pós Graduado em UTI pela FAM- Faculdade Montenegro. Pós Graduado em Enfermagem em Ginecologia e Obstetrícia pela Unyleya Graduado em Enfermagem pela FTC - Faculdade de Tecnologia e Ciências, campus de Vitória da Conquista- BA. Professor substituto da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), DEDC, Campus XII- Guanambi- BA . Professor do curso de Medicina das Faculdades Integradas Padrão (FIP Guanambi). Enfermeiro Assistencial da Clínica de Hemodiálise Nephron de Vitória da Conquista. Vice-líder do Grupo de pesquisa interdisciplinar em Saúde Coletiva (GPISC) CNPq/UNEB (Universidade do Estado da Bahia), campus XII com a linha de pesquisa sobre Política e planejamento atuando com os temas IRAS (Infecção Relacionada a Assistência a Saúde), Doença Renal Crônica(DRC), Terapia Renal

Substitutiva (TRS), Hipertensão e Diabetes e Controle Autonômico Cardíaco. Membro do grupo de pesquisa em Epidemiologia e Saúde da UESB atuando na temática saúde do trabalhador.

DULCIAN MEDEIROS DE AZEVEDO

Doutorado em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil(2014)
Docente (Adjunto IV) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte

EDJA MAYRA FERREIRA DE CASTRO

Psicóloga graduada pela Universidade Federal de Alagoas, integrante do Grupo de Pesquisa Multiprofissional sobre Idosos desde 2014. Foi bolsista no programa de iniciação científica PIBIC entre 2017 e 2018.

EDUARDO BORGES DA COSTA LEITE

Possui graduação em Odontologia pela Universidade Federal de Pernambuco (1974), Especialista em Radiologia (1977); Especialista em Dentística Restauradora(1979); Mestre em Endodontia pela Universidade Federal de Pernambuco (1997) e Doutor em Odontologia (Dentística) pela Universidade de Pernambuco (2006). Atualmente é professor Associado 3 da Universidade Federal de Pernambuco, e Vice-coordenador do Projeto de Extensão Pró-Parkinson: Odontologia. Tem experiência na área de Odontologia, com ênfase em Dentística, atuando principalmente nos seguintes temas: resina composta, clareamento.

EDUARDO NAGIB BOERY

Doutor em Enfermagem pela Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP. Mestre em Saúde Pública pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO. Especialista em Enfermagem Médico-cirúrgica (UNIFESP). Especialista em Acupuntura (Faculdade de Ciências de Saúde de São Paulo). Graduado em Enfermagem e Obstetrícia pela Universidade Federal da Bahia. Professor Pleno da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB. Membro do Conselho editorial da Revista saude.com (UESB). Docente e membro do Colegiado do Programa de Pós - Graduação, strictu sensu, em Enfermagem e Saúde. Ex-Conselheiro do Conselho Estadual de Educação da Bahia - CEE/BA. Ex-Diretor científico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia - FAPESB.

ELIANE APARECIDA FLORIANO

Consultora em Saúde e Segurança na SEST Consultoria e Treinamentos. Coordenadora do Curso de Socorrista na SEST Consultoria e Treinamentos. Foi Gestora do Projeto Reintegração do Trabalhador Afastado - SESI/PR. Ergonomista. Graduada em Fisioterapia. Especialista em Ergonomia e Fisioterapia Laboral e Ocupacional. Técnica em Segurança do Trabalho. Auditora Interna SGI

ELIS AMANDA ATANAZIO DA SILVA

Psicóloga graduada pela Universidade Federal da Paraíba, possui mestrado e doutorado em Psicologia Social, tendo cursado Doutorado sanduíche pela Universidade de Lisboa (ICS), Portugal. Atualmente coordena o Curso de Psicologia do Centro Universitário Maurício de Nassau - CG - e foi coordenadora do Serviço de Reabilitação em Deficiência Intelectual da FUNAD - PB. Possui Especialização em Psicologia Clínica cognitivo-comportamental, com experiência em atendimento clínico e hospitalar. É colaboradora de pesquisas do Grupo Vulnerabilidades e Promoção da Saúde (NPVPS), coordenado pela professora Dra. Ana Alayde Werba Saldanha, no qual possui vínculo desde 2007, na UFPB. Possui experiência em Pesquisa e Docência, atuando principalmente nos seguintes temas: Psicologia Social; Psicologia Educacional e da Aprendizagem; Psicologia do Desenvolvimento; Clínica Infância-Juvenil; Psicomotricidade; Inclusão na Educação; Sexualidade; Psicologia e a Pessoa com Deficiência; Transtorno do Espectro Autista - TEA; Psicologia da Saúde;

Saúde Coletiva; Saúde Pública; Vulnerabilidades em Saúde; Preconceito e Discriminação em saúde; HIV/Aids; Psicologia aplicada ao Cuidado; Psicologia Hospitalar; Crenças; Dinâmica das Relações Afetivas; dentre outros.

ELOISA ARAÚJO SOUZA

Acadêmica do curso de Fisioterapia UFG-REJ, voluntária no projeto de extensão REVISSI. Possui minicursos de manipulação miofacial manual e instrumental- agulhamento, bandagem, crochê, microfisioterapia.

ERICA LAIZA ALVES DE SOUZA

Graduanda em Fisioterapia pela Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande (FCM), com formação completa no método Pilates e na Técnica Dry Needling.

EUDES EULER DE SOUZA LUCENA

Graduado em odontologia pela UFRN. Mestre em odontologia pela UFRN. Doutor em psicobiologia pela UFRN. Professor adjunto IA da Escola Multicampi de Ciências Médicas da UFRN. Áreas de interesse: anatomia humana, embriologia, estomatologia, morfologia e epidemiologia.

EUNICE ARISTIDES ARAÚJO

Mestrado em Psicologia Social - Universidade Federal da Paraíba (2017). Graduação em Psicologia - Universidade Federal da Paraíba (2016). Graduação em Letras - Universidade Federal de Campina Grande (2009). Pesquisadora (Bolsista) em Iniciação Científica (2014 -2015) no Núcleo de Pesquisa em Vulnerabilidades e Promoção da Saúde (UFPB). Interesses em Psicologia da Saúde, Vulnerabilidade Social e Promoção da Saúde.

FERNANDA BRITO DE CASTRO

Graduação em Enfermagem pela Universidade Estadual do Ceará (1981). Tem experiência na área de Enfermagem, com ênfase em Enfermagem. Trabalha no Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará desde 1983, onde já atuou nos setores de doação de sangue, triagem clínica, iniciou o serviço de aférese, foi chefe do setor de coleta/doação. Fez parte da coordenação do serviço de enfermagem da Hemorrede até dezembro de 2017. Atualmente é coordenadora da Hemovigilância da Hemorrede, onde realiza treinamentos com os enfermeiros dos hospitais aos quais o hemocentro atende, visando a minimização das reações transfusionais e importância da notificação. Trabalha no Instituto Dr José Frota desde 1988, atuando como enfermeira assistencial na emergência (1988-1991) e na unidade de neurocirurgia (1991-atual).

FRANCISCA MARINA DE SOUZA FREIRE FURTADO

Possui Licenciatura e Formação em Psicologia pela Universidade Federal da Paraíba - UFPB (2003) e Especialização em Saúde da Família pela Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas - FACISA (2005). É Mestra (2010) e Doutora (2016) em Psicologia Social pela Universidade Federal da Paraíba - UFPB, com período sabbático no Centro de Investigação e Intervenção Social (CIS) do Instituto Universitário de Lisboa - ISCTE/IUL em Lisboa/Portugal (2014/2015) tendo a CAPES como instituição de fomento. Atualmente é psicóloga hospitalar do Hospital Universitário Alcides Carneiro em Campina Grande/PB (EBSERH/HUAC/UFCG) e pesquisadora colaboradora do núcleo de pesquisa Vulnerabilidades e Promoção da Saúde (NPVPS/UFPB). Principal área de atuação: Psicologia e Políticas Públicas, em especial, a Psicologia no SUS; Saúde Mental nos cuidados primários em saúde; Saúde Mental e Gênero; Vulnerabilidades em saúde em contextos rurais.

GABRIELE FERNANDA DA CONCEIÇÃO SANTOS

Graduada em Farmácia pela Universidade Federal de Alagoas. Mestra em Ciências da Saúde. Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde- ICBS/UFAL Integrante do Laboratório de Biologia Celular e Molecular do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Federal de Alagoas.

GEÓRGIA DE MENDONÇA NUNES LEONARDO

Graduada em Nutrição pela Universidade Estadual do Ceará (2006). Mestre em Nutrição e Saúde pela Universidade Estadual do Ceará (2018). Especialista / Residência Multiprofissional em Saúde da Família pela Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia/Universidade Estadual Vale do Acaraú (2010). Tem experiência na área de Saúde Coletiva, com ênfase em Saúde Pública, atuando principalmente nos seguintes temas: atenção à saúde, saúde da família, ações de alimentação e nutrição, vigilância alimentar e nutricional e educação permanente em saúde. Colaboradora na Escola de Saúde Pública do Ceará, no Centro de Educação Permanente em Vigilância da Saúde, atuando como Coordenadora Educacional nos cursos de pós-graduação Lato sensu (2016-atual), Gerente de Projetos (2017-atual), membro da Comissão de Educação Permanente em Saúde (2016-atual) e membro do Comitê de Ética em Pesquisa (2017-atual).

HELLEN KAROLINE MARTINS DE LIMA

Graduada em Fisioterapia pela Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande (FCM), Pós Graduada em fisioterapia intensiva (FAMOSP).

ÍCARO JOSÉ SANTOS RIBEIRO

Doutor em Ciências da Saúde pelo Programa de Pós Graduação em Enfermagem e Saúde na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Mestre em Ciência pelo Programa de Pós-Graduação Biotecnologia em Saúde e Medicina Investigativa no Centro de Pesquisa Gonçalo Moniz - FIOCRUZ-BA. Graduado em Enfermagem pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (2011). Atuou como docente do curso de medicina, regime de estágio de docência, nos módulos abrangências médicas. Desenvolve pesquisas na área da saúde coletiva, com ênfase nos aspectos epidemiológicos das doenças crônicas não transmissíveis, saúde cardiovascular, qualidade de vida, ansiedade e estresse.

IRIA RAQUEL BORGES WIESE

Possui Licenciatura em Psicologia, graduação em Psicologia (formação de psicólogo), mestrado e doutorado em Psicologia Social pela Universidade Federal da Paraíba. Foi servidora do IFPB, cargo Psicóloga, por quatro anos. Atualmente é professora efetiva da Escola Técnica de Saúde da Universidade Federal da Paraíba e membro do Núcleo de Pesquisa Vulnerabilidades e Promoção da Saúde (NPVPS)/Pós-Graduação em Psicologia Social/UEPB. Tem experiência na área de Psicologia, com ênfase em Psicologia Social da Saúde, Saúde Coletiva, Sexualidade, Gênero e Educação.

JOSÉ ANTÔNIO SPENCER HARTMANN JÚNIOR

Possui graduação em Relações Públicas pela Escola Superior de Relações Públicas (1992), graduação em Psicologia Clínica pela Faculdade de Ciências Humanas - PE (2003) ; Mestrado em Psicologia Clínica pela Universidade Católica de Pernambuco - UNICAP (2006).Doutor em Neuropsiquiatria pela UFPE. Pós-Doutor em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina do ABC - São Paulo. Atualmente é Professor Adjunto concursado da UPE - Universidade de Pernambuco- no Curso de Medicina. Coordenador do Módulo Ciclo da Vida Curso Medicina da Faculdade de Ciências Médicas -FCM . Professor permanente do curso Strictu Sensu do curso de Mestrado Psicologia e Saúde Mental Ex-coordenador do curso Psicologia Campus Garanhuns. Membro da Comissão Científica da Associação de Terapia Cognitiva do Estado Pernambuco e Membro-Doutor na Federação Brasileiro de Terapias Cognitivas. Membro da ANPEPP - Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia através do grupo de trabalho GT - Pesquisa básica e

Aplicada em uma Perspectiva Cognitivo-comportamental. Professor-monitor na disciplina Psicoterapias com ênfase em Terapia Cognitivo-comportamental para residentes em Psiquiatria nível II. Membro docente curso pós-graduação da UNICAP curso Teratia Cognitivo Comportamental com a disciplina Epistemologias. Líder de pesquisa em Saúde Mental do Idoso certificado pelo CNPQ em 29.07.2016. Membro titular do GT Álcool e Drogas da Universidade de Pernambuco. Leciona disciplinas como Psicologia Experimental, História da Psicologia, Psicologia Clínica, Metodologia Científica, Psicopatologia Fundamental I e II, Psiquiatria Clínica, Psicofarmacologia, Psicologia Médica e Psicologia Social. Psicólogo da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Pessoal. Professor do curso de pós-graduação da UPE em Psicopedagogia com a disciplina Psicologia da Aprendizagem. Lecionou nos Cursos Gestão de Pessoas e Gestão Hospitalar na área do Comportamento Humano da Faculdade Boa Viagem. Tem experiência na área de Psicologia Cognitiva e Filosofia, com ênfase em História, Teorias e Sistemas em Psicologia, atuando principalmente nos seguintes temas: Neurocognição; Neuropsiquiatria; Psicogeriatrics. Trabalha em projetos de pesquisa em depressão de idosos em suas características clínicas, variáveis psicossociais e qualidade de vida. Áreas de pesquisa em Psicopatologias Social e Clínica, com ênfase em Psicologia

JULIANA ALVES FERREIRA

Mestranda no Programa de Pós Graduação em ciências aplicadas à saúde UFG/ REJ; Especialista em Fisioterapia musculoesquelética -FAMERP) ; Fisioterapeuta da Associação de Beneficência Albergue São Vicente de Paulo- ILPI; Preceptora de estágio do curso de Fisioterapia da UFG/ REJ.

KETLIN LORRAINE BARBORA SILVA

Acadêmica de Fisioterapia na UFG-REJ, monitora voluntária na disciplina Fisioterapia aplicada a ginecologia e obstetrícia. Membro da equipe do projeto de extensão REVISII.

LIDIANNY DO NASCIMENTO GONÇALVES BRAGA

Psicóloga (Formação e Licenciatura); com Doutorado (em finalização) em Psicologia Social; Mestrado em Psicologia Social; e Especialização em Política e Gestão do Cuidado, com Ênfase no Apoio Matricial, todos pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Tem experiência na área de Saúde Pública, Psicologia Clínica, na abordagem Humanista/ACP e em Psicologia Social e da Saúde, focando principalmente nos seguintes temas: saúde mental, saúde pública e coletiva, álcool e drogas, atenção básica/estratégia de saúde da família, DST/Aids, vulnerabilidades, relações de gênero e adolescência.

LINDOMAR DE FARIAS BELÉM

Professora Associada B da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB); Mestre em Fitopatologia pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB); Doutora em Farmacologia de Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos pela UFPB; Coordenadora do Centro de Informações sobre Medicamentos da (CIM) da UEPB. Leciona as disciplinas: Farmacoepidemiologia, Introdução a Ciências Farmacêuticas e Estágio Supervisionado em Medicamentos.

LIZANDRA MAYRANE LEITE DE MELO RAULINO

Graduada em Fisioterapia pela Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande (FCM), Pós Graduada em Traumatologia Ortopedia e Formada em Acupuntura e Pedia Suit.

LUCIA ROBERTTA MATOS SILVA DOS SANTOS

Doutorado em Psicologia Pela Universidade Federal da Bahia (2017), Mestre em Psicologia Social pela Universidade Federal da Paraíba (2008), com Licenciatura e Formação em Psicologia pela Universidade Federal da Paraíba (2003). Especialista em Gestão do SUS pelo Sírio Libanês Centro

de Formação (2012), em Saúde Pública pela FACISA (2008) e em Psicologia Hospitalar pelo Centro de Formação de Psicologia (PB). Docente na Universidade Federal de Sergipe (2018), pesquisadora do Núcleo de Pesquisa LEV (Laboratório de Estudos Vinculares e Saúde Mental) na UFBA, colaboradora do núcleo de pesquisa Vulnerabilidades e Promoção da Saúde da UFPB e psicóloga do Hospital de Emergência de Sergipe (HUSE). Tem experiência na área hospitalar, clínica na abordagem fenomenológica existencial e em Psicologia Social, atuando principalmente nos seguintes temas: saúde coletiva, políticas públicas, subjetividade, enfrentamentos sociais e de saúde, processo lúdico- hospitalização, psicologia e saúde.

LUCINEIDE ALVES VIEIRA BRAGA

Mestre em Enfermagem – Atenção em Saúde, formada pela Universidade Federal da Paraíba (2009), Especialista em Saúde da Família pela Universidade Federal de Pernambuco (1999), Especialista em Saúde Pública pela Universidade Federal da Paraíba (1991). Docente da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba. Sanitarista da Secretaria Municipal de Saúde João Pessoa, Coordenadora do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade. Tem experiência na área de ensino, pesquisa e extensão, na área de saúde coletiva, saúde mental e enfermagem obstétrica, tanto na graduação, como na pós. Terapeuta Comunitária, Auriculoterapia e Barra de Acces.

MARCIELLI MARQUES SANGALLI VECCHI

Graduada no Curso de Tecnologia em Estética e Cosmética pela Universidade Anhanguera Uniderp - (2012). Especialista em Estética e Imagem Pessoal pela Faculdade Unigran Capital (2015). Pós Graduada em Mídias na Educação pela UFMS (2019). cursando 2ª Graduação em Pedagogia na Unigran. Atualmente é professora e Coordenadora do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética Semipresencial da Faculdade Unigran Net.

MARIA DAS GRAÇAS WANDERLEY DE SALES CORIOLANO

Professora Associada do Departamento de Anatomia e Docente Permanente do Programa de Pós-Graduação em Gerontologia da Universidade Federal de Pernambuco. Graduação em Fisioterapia pela Universidade Federal de Pernambuco em 1995. Especialização em Morfologia pela Universidade Federal de Pernambuco em 1999. Mestrado na área de concentração da Morfologia Aplicada pela Universidade Federal de Pernambuco em 2006. Doutorado em Neurociências pela Universidade Federal de Pernambuco em 2009. Líder do Grupo de Pesquisa Pró-Parkinson e Coordenadora do Programa de Extensão Pró-Parkinson. Membro da Sociedade Brasileira de Gerontecnologia - SBGTEC.

MARIA DE FÁTIMA FERREIRA NÓBREGA

Maria de Fátima Ferreira Nóbrega – Professora Doutora A da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB); Especialista em Análises Clínicas pela UEPB; Mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente – Sub-área Saneamento Ambiental pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB)/UEPB; Doutorado em Ciências da Educação pela Universidad Autónoma de Asunción (UAA); Chefe Adjunta de Departamento; Membro do Núcleo Docente Estruturante (NDE); Colaboradora do Centro de Informações sobre Medicamentos (CIM). Leciona as disciplinas: Parasitologia Clínica e Estágio Supervisionado em Farmácia Comunitária e Hospitalar.

MARIA DO SOCORRO PONTES DE SOUZA

Mestrado em Serviço Social pela Universidade Federal da Paraíba, Brasil (1998). Professor Efetivo da Universidade Estadual da Paraíba

MARIA LAURA MEDEIROS BLEINROTH

Psicóloga graduada pela Universidade Federal de Alagoas, mestranda em Processos Psicossociais no Instituto de Psicologia da Universidade Federal de Alagoas, integrante do Grupo de Pesquisa Multiprofissional sobre a Pessoa Idosa.

MARIA VERÔNICA ALMEIDA DE BRITO

Graduada em Enfermagem pela Universidade Estadual do Ceará (1985). Mestre em Ensino na Saúde, Área de Concentração: Formação e Desenvolvimento Docente na Saúde pela Universidade Estadual do Ceará (2015). Especialista em Educação em Saúde Pública pela Universidade de Fortaleza (1989). Atua no Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará- HEMOCE (1989- atual), desenvolvendo suas atividades ao longo desses anos, nos setores de Coleta de Sangue, Aférese, Triagem Clínica e na Coordenação das Agências Transfusionais, (2008-atual). Tem experiência na área de Enfermagem, com ênfase em Hemoterapia na coleta de plaquetas, células tronco periféricas, aférese terapêuticas e gestão nos processos das agências transfusionais. Ministra cursos e treinamentos na área de Hemoterapia para profissionais da área de saúde, destacando a qualificação dos enfermeiros para o processo transfusional. Atua como professora nos Cursos de Pós Graduação: Enfermagem em Terapia Intensiva e Hemoterapia e Hematologia.

MARIANA FERREIRA SILVEIRA DE QUEIROGA

Estudante de Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco, cursando 9º período.

MARIANA GALINDO SILVEIRA

Acadêmica do décimo primeiro período de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba. Monitora concursada de Bases e Técnicas Cirúrgicas e Anestésicas (2016-2017) e Procedimentos Básicos e Avançados em Medicina (2017-2018) da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba. Fundadora e extensionista concursada do projeto de pesquisa e extensão Abordagens Médicas na Prevenção e Promoção da Saúde da Mulher (2016-2018). Membro da comissão organizadora do I Simpósio do Projeto de Extensão PAS-Mulher – Sexualidade e Parto Humanizado (2017). Membro da Liga Acadêmica de Oftalmologia de João Pessoa (2018-2019), e Membro e Fundadora da Liga Acadêmica Paraibana de Otorrinolaringologia (2018-2019)

MARIANA MORAIS DANTAS

Bacharela em Farmácia pela Universidade Estadual da Paraíba (2018), atualmente mestranda em pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas - UEPB (2019). Desenvolveu atividades na área de farmácia clínica, atenção farmacêutica, controle de qualidade em medicamentos e toxicologia.

MARISTELA LÚCIA SOARES CAMPOS

Acadêmica de Fisioterapia na UFG-REJ. Presidente da liga de estudos e desenvolvimentos em Fisioterapia (LEDF). Exerceu atividade de monitoria voluntária nas disciplinas: biomecânica, massoterapia e fisioterapia aplicada a dermato funcional. Membro de equipe de projetos de extensão: REVISII; Prevalência e fatores associados a vulnerabilidade em saúde em idosos na estratégia saúde da família em um município de Goiás.

MAYSA LANNE VIEIRA DAMASCENO

Graduanda em Psicologia pela Universidade Federal de Alagoas, participa do Grupo de Pesquisa Multiprofissional sobre a Pessoa Idosa e da pesquisa de Iniciação Científica "Tecendo redes com a Gestão Autônoma da Medicação: políticas e práticas de cuidado em saúde mental"

MESSIAS GOMES ALVES

Bacharel em Farmácia pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB); Pós-Graduando em Atenção Farmacêutica e Farmácia Clínica pela DNA - UNIQE; Participante do III CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – CONBRACIS. Apresentação de Trabalho Intitulado: Ocorrência das Principais Doenças Crônicas em Pessoas com Deficiência Visual no Instituto de Cegos do Nordeste em Campina Grande – PB; Desenvolveu Trabalho de Assistência Farmacêutica em Hospital Fundação Assistencial da Paraíba (FAP).

MYLLENE MIGUEL DA SILVA

Enfermeira, graduada pela Universidade Federal de Campina Grande -UFCG, pós-graduanda em Urgência e Emergência e Unidade de Terapia Intensiva pela Faculdade de Ciências Humanas e Exatas do Sertão de São Francisco - FACESF.

MYRNA LINS TENÓRIO

Graduanda de Enfermagem pela Universidade Federal de Alagoas

NADJA MARIA JORGE ASANO

Possui graduação em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco (1980), Residência Médica pela Universidade Federal de Pernambuco (1984), Mestre em Medicina Tropical pela Universidade Federal de Pernambuco (1992), especialista em Acupuntura e em Reumatologia, Doutora em Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento. Atualmente é professora adjunto de Terapêutica da Universidade Federal de Pernambuco, e do programa de Pós-graduação em Gerontologia da UFPE. Tem experiência na área de Medicina, com ênfase em Reumatologia, Neurologia, Psiquiatria, Genética e Acupuntura. Atuando principalmente nos seguintes temas: Reumatologia (Lúpus Eritematoso Sistêmico), Neurologia (Doença de Parkinson), Psiquiatria (Doença de Parkinson e Lúpus Eritematoso Sistêmico) Genética (Lúpus Eritematoso Sistêmico e Doença de Parkinson) e Acupuntura (Doenças Reumatológicas e Doença de Parkinson).

NATÁLIA TOMAZ ALMEIDA

Acadêmica no décimo primeiro período de Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba (FCM-PB). Monitora concursada da disciplina de Semiologia Médica por dois anos consecutivos (2015-2017) na Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba. Extensionista do projeto de pesquisa e extensão “Prevenção à Cegueira” (2017.1 2017.2) e do projeto “Doação de Sangue” (2017.2). Membro da Liga Acadêmica de Clínica Médica – LACM (2016-2017), e Membro da Liga Acadêmica de Oftalmologia de João Pessoa – LAO JP (2018-2019).

NATHALIE DE ALMEIDA SILVA

Graduanda em Medicina pelo Centro Universitário UNIFACISA. Mestre em Saúde Pública pela Universidade Estadual da Paraíba (2016). Especialização em Fisioterapia em Unidade de Terapia Intensiva pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (2013). Graduação em Fisioterapia pela Universidade Estadual da Paraíba (2012). Presidente da Liga Campinense de Morfologia (LCM)

NOÉLLY CRISTINA HARRISON MERCER

Coordenadora da área de Longevidade Produtiva do SESI-PR. Gestora do Programa Diagnóstico de Saúde e Estilo de Vida. Graduada e Enfermagem. Especialista em Enfermagem do Trabalho. Mestre em Psicologia Social Comunitária

PABLO GIOVANNI FRANKLIN CRUZ

Graduando em Medicina pelo Centro Universitário UNIFACISA - Campina Grande /PB. Membro da Liga Campinense de Morfologia (LCM)

PAMMALA MIRELLY SOARES VASCONCELOS

Graduada em Fisioterapia pela Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande (FCM), Pós-graduanda em Traumatologia Ortopedia e Esportiva com ênfase em terapia manual (CERTRO). Tem formação completa em Pilates e em Liberação Miofascial com abordagem manual, instrumental e ventosaterapia.

PATRÍCIA AMANDA PEREIRA VIEIRA

Graduada em enfermagem pela Universidade de Fortaleza, especialista em Saúde Pública pela Universidade Estadual do Ceará e mestre em Ciências Médicas pela Universidade de Fortaleza. Atuou como preceptora de estágio supervisionado no Centro Universitário Estácio do Ceará, enfermeira assistencial no Hospital Geral de Fortaleza e como supervisora do Centro de Educação Permanente em Vigilância da Saúde da Escola de Saúde Pública do Ceará. Atualmente está como docente da Especialização em Saúde Pública da Escola de Saúde Pública do Ceará em parceria com a Fiocruz e como gerente de projetos do Centro de Educação Permanente em Vigilância da Saúde da Escola de Saúde Pública do Ceará. Tem experiência na área de educação em saúde, vigilância em saúde e doenças infecciosas e assistência ao paciente grave.

PATRÍCIA FERNANDA FACCIO

Fisioterapeuta graduada pela Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas - UNCISAL (2011); Especialista em Gerontologia Social pela Universidade Federal de Alagoas - UFAL (2013); Mestre em Gerontologia pela Universidade Federal de Pernambuco - UFPE (2019); É pesquisadora do grupo de pesquisa Neurociências e Neurofisiologia Clínica (UFPE) e colaboradora do Programa de extensão Pró-Parkinson Odontologia (UFPE) e foi voluntária da Universidade Aberta à Terceira Idade (UNATI-UFPE) em 2018; Atuou como docente nas disciplinas Fisiopatologia Clínica na Saúde do Idoso e Bases Fisioterapêuticas na Saúde do Idoso na Universidade Joaquim Nabuco - UNINABUCO em Paulista - PE no ano de 2018 do Grupo Ser Educacional.

PATRÍCIA GONÇALVES DA SILVA BARCELOS

Graduada no Curso de Tecnologia em Estética e Cosmética pela Universidade Anhanguera Uniderp - (2012). Especialista em Procedimentos Estéticos Pós Cirurgia Plástica pela Universidade Anhanguera Uniderp - (2014). Especialista em Cosmetologia aplicada à terapias Faciais e Corporais e disfunções Dermoestéticas pela Foco Pós Graduação (FAMPER) - (2016). Pós Graduada em Mídias na Educação pela UFMS (2019). Atualmente é professora e Supervisora de Estágio do curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética Semipresencial da Faculdade Unigran Net. Também é Coordenadora da Pós-graduação em Tecnologias Avançadas em Estética e Cosmetologia na Faculdade Unigran Capital. Possui experiência em desenvolvimento e organização de eventos e projetos. Tem experiência na área de Estética Facial, Corporal e Capilar.

PEDRO AUGUSTO TIBÚRCIO PAULINO

Graduando do 10º período em Farmácia Generalista Bacharelado pela Universidade Federal de Alagoas - UFAL. Bolsista de Iniciação Científica PIBIC/CNPq no Laboratório de Biologia Celular e Molecular. Integrante do Grupo de Pesquisa em Epilepsia Clínica e Experimental que é coordenado pelo Prof. Dr. Daniel Leite Góes Gitaí, do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde - ICBS/UFAL. Foi monitor de Genética e Biologia Molecular (ano letivo de 2017). Integrante da Liga Acadêmica de Farmácia Hospitalar (LAFaH), onde promove atividades acerca da importância do profissional Farmacêutico, sob coordenação do Prof. Dr. Alfredo Dias de Oliveira Filho, da Escola de Farmácia e Enfermagem - ESENFAR/UFAL.

POLLYANA LUDMILLA BATISTA PIMENTEL

Doutoranda e Mestra em Psicologia Social pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Formada em Psicologia pela mesma instituição. Possui experiência no âmbito das medidas socioeducativas, bem como na psicologia da saúde.

RANNIELLY RODRIGUES DA SILVA SANTOS

Acadêmica de Fisioterapia na Faculdade Estácio de Sá. Membro de equipe do projetos de extensão REVISII (UFG-REJ), membro de equipe do projeto de pesquisa CarDes. Estágio extra curricular no Centro Estadual de Referência a pessoa com deficiência -CERPED.

RENATA PIMENTEL DA SILVA

Doutora em Psicologia Social, pela Universidade Federal da Paraíba. Fez estágio de doutoramento no Instituto de Ciências Sociais, na Universidade de Lisboa. Mestre em Psicologia Social pela Universidade Federal da Paraíba, formada em Psicologia pela Universidade Estadual da Paraíba. No âmbito da pesquisa, desenvolve pesquisas nas áreas de Psicologia Social, Saúde do Trabalhador e Psicologia da Saúde.

ROGÉRIO SANTOS GESTEIRA

Possui graduação em Enfermagem pela Faculdade de Tecnologia e Ciências da Bahia (2011). Tem experiência na área de Enfermagem.

ROSIMARY DA SILVA BARBOSA

Graduada em Tecnologia de Alimentos pela Faculdade Instituto Centro de Ensino Tecnológico de Limoeiro do Norte/CE (2006). Mestranda em Gestão em Saúde pela Universidade Estadual do Ceará (2018 - atual). Especialista em Vigilância Sanitária pela Escola de Saúde Pública do Ceará (2013), Gestão em Saúde pela Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) da Fundação Oswaldo Cruz(FIOCRUZ) (2015) e Vigilância em Saúde pelo Hospital Sírio-Libanês(2016). Tem experiência na área de Saúde Pública, com ênfase em saúde coletiva, atuando nos seguintes temas: Vigilância Sanitária e Ambiental, vigilância e controle de endemias e zoonoses, vigilância em saúde, educação permanente em saúde, ensino na saúde. Na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, atua principalmente nos seguintes temas: higiene, boas práticas de fabricação e manipulação de alimentos, controle de qualidade, vigilância sanitária de alimentos e legislações. Colaboradora na Escola de Saúde Pública do Ceará, no Centro de Educação Permanente em Vigilância à Saúde(2014 -atual), atuando como Coordenadora de Vigilância em Saúde(2017-atual), membro do Comitê de Ética e Pesquisa (2017-atual), membro do Colegiado de Coordenação da Especialização em Vigilância Sanitária (2014-atual), docente nos curso livres e pós-graduação Lato sensu (2014-atual) e coordenadora da área de vigilância sanitária(2016). Coordenou a vigilância sanitária, ambiental e endemias no município de Itaiçaba-Ce(2009-2012).

SIMONE SALVIANO ALVES

Doutora em Psicologia Social pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Mestre em Psicologia Social (UFPB, 2014). Graduada e licenciada em Psicologia (UFPB, 2011). Pesquisadora vinculada ao Núcleo de Pesquisa em Desenvolvimento Sociomoral (NPDSM/UFPB). Tem se dedicado, especialmente, às áreas de Pesquisa, Psicologia do Trabalho e Organizacional, Avaliação Psicológica, Contexto de Trabalho e Jurídico, Desenvolvimento Sociomoral e Psicologia Social.

STELA FERREIRA GADELHA MENDES

Acadêmica de Medicina do 6o período na Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco (FCM/UPE).

TATIANE ISABELA DE ARAÚJO LEITE

Graduada em enfermagem pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (2015) e em pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2007). Especialista em Enfermagem do Trabalho, Especialista em Saúde da mulher com ênfase em ginecologia e obstetrícia; Mestranda pelo programa de pós-graduação e saúde e sociedade- UERN.

TEREZA ROSANE DE ARAÚJO FELIPE TORRES LIMA

Possui graduação em Farmácia pela Universidade Federal do Ceará (1981). Atualmente é FARMACÊUTICA da secretaria de saúde do estado do ceará no Núcleo de Vigilância Sanitária. Tem experiência na área de Saúde Coletiva, com ênfase em vigilância sanitária, atuando na área de serviços de saúde.

THASSIANY SARMENTO OLIVEIRA DE ALMEIDA

Possui graduação em Fisioterapia pela UEPB (2011). Doutoranda em Inovação Terapêutica pela UFPE, com desenvolvimento de pesquisa no departamento de Imunogenética da CPqAM/FIOCRUZ/PE. Mestre em saúde pública pela UEPB (2015), com aperfeiçoamento em Saúde da Família. Atualmente é docente da Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande (FCM).

THAYUANNE SILVA DE MELO

Possui graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (2014). Graduanda do 9º Período em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Alagoas - UFAL. Foi aluna de Iniciação Científica PIBIC no Laboratório de Biologia Celular e Molecular. Integrante do Grupo de Pesquisa em Epilepsia Clínica e Experimental do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde - ICBS-UFAL. Foi monitora de Histologia e Embriologia entre os anos de 2016 e 2017. Participou do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) no ano de 2017.

THIAGO DE OLIVEIRA ASSIS

Possui graduação em Fisioterapia pela Universidade Estadual da Paraíba (2007), mestrado em Patologia pela Universidade Federal de Pernambuco (2010) e doutorado em Ciências Morfológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2015). É professor Adjunto da Universidade Federal da Paraíba e da Universidade Estadual da Paraíba, Professor do Centro Universitário UNIFACISA.

THIAGO SANTOS DE ARAÚJO

Mestrando em Educação, Trabalho e Inovação em Medicina (UFRN), Professor da Escola Multicampi de Ciências Médicas (UFRN), Possui graduação em Licenciatura e Bacharelado em Educação Física pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (2004), Especialização em Fisiologia do Exercício Aplicada pela Universidade do Grande Rio (2007), Especialização em Gerontologia e Atividade Física pela Universidade Veiga de Almeida (2010), Graduação em Licenciatura e Bacharelado em Enfermagem pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (2013), Graduação em Administração de Empresas pela Universidade Potiguar (2018).

THIÊGO SANTOS DE ARAÚJO

Possui graduação em Farmácia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte(2009) e especialização em Hematologia Clínica pela Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte(2010), Mestrando em Gestão de Processos Institucionais (UFRN). Atualmente é Técnico Administrativo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte

VANESSA APOLONIO TARGINO

Graduanda em Fisioterapia pelo Centro Universitário UNIFACISA - Campina Grande /PB. Membro da Liga Campinense de Morfologia (LCM)

YANA THAMIRES MENDES FELIX

Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Psicologia Social na Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Possui mestrado em Psicologia Social na Universidade Federal da Paraíba em caráter integral (2013-2015). Psicóloga, formada pela Universidade Federal da Paraíba (2011). Fez parte de um grupo de pesquisa voltado para o estudo sobre o abuso e exploração de crianças e adolescentes; Posteriormente trabalhou também os temas envelhecimento, aposentadoria e projeto de vida. Foi monitora bolsista da disciplina Seleção e Orientação Profissional durante um ano. Fez estágio Clínico e Hospitalar, com a abordagem Psicoterapia Breve de Base Psicanalítica. Foi Bolsista da Fundação Oswaldo Cruz e trabalhou com dependentes químicos.

YANAS APARECIDA ZORZI

Analista de PDI área de Longevidade Produtiva do SESI-PR Graduada em Ciências Contábeis MBA em Gestão de Projetos

Agência Brasileira do ISBN

ISBN 978-85-7042-147-0

9 788570 421470