TÓPICOS EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS

VOLUME 3

Editora Poisson

Editora Poisson

Tópicos em Ciências Agrárias

Volume 3

1ª Edição

Belo Horizonte

Poisson

2019

Editor Chefe: Dr. Darly Fernando Andrade

Conselho Editorial

Dr. Antônio Artur de Souza – Universidade Federal de Minas Gerais

Msc. Davilson Eduardo Andrade

Dra. Elizângela de Jesus Oliveira – Universidade Federal do Amazonas

Msc. Fabiane dos Santos

Dr. José Eduardo Ferreira Lopes – Universidade Federal de Uberlândia

Dr. Otaviano Francisco Neves – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Dr. Luiz Cláudio de Lima – Universidade FUMEC

Dr. Nelson Ferreira Filho – Faculdades Kennedy

Ms. Valdiney Alves de Oliveira – Universidade Federal de Uberlândia

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

T674

**Tópicos em Ciências Agrárias - Volume 3 -
Organização: Editora Poisson - Belo
Horizonte - MG: Poisson, 2019**

Formato: PDF

ISBN: 978-85-7042-201-9

DOI: 10.36229/978-85-7042-201-9

Modo de acesso: World Wide Web

Inclui bibliografia

**1. Agricultura 2. Meio Ambiente
3. Tecnologia 4. Ciências Agrárias
I. Título.**

CDD-630

O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade exclusiva dos seus respectivos autores

www.poisson.com.br

contato@poisson.com.br

SUMÁRIO

Capítulo 1: Desempenho da beterraba sob diferentes lâminas de irrigação e doses de pó de rocha adicionadas ao solo 07

Diogo Luiz Fruet, Muriel Tambani, João Celio de Araujo, Romano Roberto Valicheski, Sidnei Leandro Sturmer

DOI: 10.36229/978-85-7042-201-9.CAP.01

Capítulo 2: Determinação de parâmetros da curva de retenção de água no solo em campo por meio do Software Hydrus 1-D 12

João José da Silva Júnior, Matheus Barcelos de Sousa

DOI: 10.36229/978-85-7042-201-9.CAP.02

Capítulo 3: Determinação de vazão por meio de Tubos Venturi 18

Bruno José de Souza, Marinaldo Ferreira Pinto, Leonardo Duarte Batista da Silva, Conan Ayade Salvador, Dinara Grasiela Alves

DOI: 10.36229/978-85-7042-201-9.CAP.03

Capítulo 4: Danos por impacto e seus efeitos na qualidade pós-colheita de citros armazenados sob condições ambientes 23

Fabiano Tavares de Moura, Elisangela Nunes Melo de Macedo, Silvanda de Melo Silva, Laesio Pereira Martins, Francisco de Assys Romero da Mota Sousa, Antônio Fernando da Silva, Eduardo Felipe da Silva Santos, Thiane de Lima Rodrigues

DOI: 10.36229/978-85-7042-201-9.CAP.04

Capítulo 5: Influência da radiação solar modificada por túneis baixos de sombrite no cultivo da alface (*Lactuca Sativa L.*) 29

Neiva Sales Rodrigues, Maria Aparecida da Silva Alves, Jakson Bofinger, Renata Freitag

DOI: 10.36229/978-85-7042-201-9.CAP.05

Capítulo 6: Propriedades químicas e físicas de misturas com adjuvantes 34

Dionatan Frescura Nunes, Filipe Andres Dalenogare, Gabriel Naresi Roos, Cristiano Santos Bonato, Leonardo A. Gollo, Marcelo Gripa Madalosso

DOI: 10.36229/978-85-7042-201-9.CAP.06

Capítulo 7: Precificação de sementários confeccionados com material reutilizado ... 38

Yasmim Braga Pacheco, Líbia Luiza Galvão Lima, Kaylen klyttssan Oliveira Gomes, Sandra Grutzmacher, Hudson do Vale de Oliveira

DOI: 10.36229/978-85-7042-201-9.CAP.07

Capítulo 8: Análise do potencial de secagem de grãos de soja e milho com ar ambiente em diferentes Municípios do Estado de Mato Grosso 44

Decio Mossini Junior, Fabrício Schwanz da Silva, Rivanildo Dallacort, Alexandre Gonçalves Porto, Eduardo José Oenning-Soares

DOI: 10.36229/978-85-7042-201-9.CAP.08

SUMÁRIO

Capítulo 9: Rusticidade de cultivares de soja com e sem TSI, à três doenças radiculares 55

Marcelo Grippa Madalosso, Rafael Cardoso, Filipe Andres Dalenogare, Jéssica Santi Boff, Mateus da Cunha Dorneles, Dionatan Frescura Nunes, Higor da Silva
DOI: 10.36229/978-85-7042-201-9.CAP.09

Capítulo 10: Parâmetros técnicos na secagem em alta temperatura de milho safrinha 58

Fernando José Giza, Evandro Marcos Kolling, Paulo Felipe Quinquilo, Jaqueline Vargas
DOI: 10.36229/978-85-7042-201-9.CAP.10

Capítulo 11: Uso de diferentes corantes para a estimativa da viabilidade polínica dos grãos de polens de milho 64

Débora Cristina Leal, Rafael Stieven, Luiz Fernando Gibbert, Bruna Francielly Gama, Sheila Caioni, Isane Vera Karsburg, Itamar de Souza Sauer
DOI: 10.36229/978-85-7042-201-9.CAP.11

Capítulo 12: Ação de bioestimulantes na germinação e no desempenho de plântulas de milho 67

Bruna Francielly Gama, Sheila Caioni, Luiz Fernando Gibbert, Débora Cristina Leal, Rafael Stieven, Tiago de Lisboa Parente, Giseudo Aparecido de Paiva
DOI: 10.36229/978-85-7042-201-9.CAP.12

Capítulo 13: Inoculação de longa vida contribui para a produção brasileira de soja. 71

Flávio Gentil Bonfante, Martin Diaz-Zorita, Pedro Henrique de Medeiros Buso, Maria Laura Ramos
DOI: 10.36229/978-85-7042-201-9.CAP.13

Capítulo 14: Desempenho e rendimento de carcaça de frangos de corte de crescimento lento alimentados com farelo de palma forrageira 75

Cicero Cordeiro Pinheiro, Irani Ribeiro Vieira Lopes, Francisco Luan Fernandes Ferreira, Layla Victória da Silva Sousa, Cicera Karine Silva de Souza, Ednardo Rodrigues Freitas
DOI: 10.36229/978-85-7042-201-9.CAP.14

Capítulo 15: Controle estatístico e análise da capacidade do peso de frangos pré abate 83

Miliano De Bastiani, Carla Adriana Pizarro Schmidt, Gloria Patrícia López Sepulveda, José Airton Azevedo dos Santos
DOI: 10.36229/978-85-7042-201-9.CAP.15

SUMÁRIO

Capítulo 16: Entraves na implantação da piscicultura no Povoado Quadra Fé em Deus, Zé Doca-MA.....	87
---	----

Nathália Lira de Oliveira, Lucélia da Cunha Rodrigues Guimarães, Elka Machado Ferreira, Fabiano Brito Duailibe, Leyde Emanuelle Costa Pereira, Amauri Ernani Torres Areco

DOI: 10.36229/978-85-7042-201-9.CAP.16

Capítulo 17: Agricultura familiar: A necessária revisão de sua classificação operacional	93
---	----

Cesar José de Oliveira, Fernando Costa Bastos

DOI: 10.36229/978-85-7042-201-9.CAP.17

Capítulo 18: Diagnóstico agroambiental de uma pequena unidade de produção agrícola da Região Oeste do Paraná.....	97
--	----

Romero Santos de Brito, Marcieli Paula Langer, Márcio José Araújo, Everton Schneider dos Santos, Fabiana Costa de Araujo Schutz, Claudio Leones Bazzi

DOI: 10.36229/978-85-7042-201-9.CAP.18

Capítulo 19: Elaboração de iogurte de Kefir com Cupuaçu e Mel	110
--	-----

Alanna Natália Brito de Figueirêdo, Francilene Gomes Nascimento, Joina Maria Silva de Sousa, Silvia Myrelly Tavares da Silva, Caroline Roberta Freitas Pires, Stenia Katila Souza Carvalho, Raileide Barbosa Miranda

DOI: 10.36229/978-85-7042-201-9.CAP.19

Capítulo 20: Avaliação sensorial da geleia de uva (<i>Vitis vinifera</i> L.) da variedade benitaka adicionada do resíduo da própria fruta	123
---	-----

Kauyse Matos Nascimento, Luciana Alves da Silva Tavone, Suelen Siqueira dos Santos, Carolina Moser Paraíso, Valkirea Matos Nascimento, Monica Regina da Silva Scapim

DOI: 10.36229/978-85-7042-201-9.CAP.20

Capítulo 21: Desenvolvimento de sorvete artesanal utilizando extrato hidrossolúvel de soja em substituição ao leite	131
--	-----

Edenilze Teles Romeiro, Priscila Barbosa Bezerra Nunes

DOI: 10.36229/978-85-7042-201-9.CAP.21

Autores:	147
-----------------------	-----

Capítulo 1

Desempenho da beterraba sob diferentes lâminas de irrigação e doses de pó de rocha adicionadas ao solo

Diogo Luiz Fruet

Muriel Tambani

João Celio de Araujo

Romano Roberto Valichski

Sidnei Leandro Sturmer

Resumo: No alto vale do Itajaí a beterraba é largamente empregada principalmente em pequenas propriedades como alternativa de geração de renda. Acredita-se que em muitas propriedades a irrigação ocorra sem o controle da lâmina de água aplicada a cultura, afetando diretamente o custo, proporcionando possível prejuízo com excessos ou falta de água. Na região está sendo largamente empregado o uso do pó de rocha, originário da ardósia com poucas pesquisas realizadas até o momento. A pesquisa realizada visou analisar o efeito de diferentes lâminas de irrigação aplicadas diariamente na cultura da beterraba com doses de pó de ardósia adicionados ao solo. Foram realizados 12 tratamentos, sendo 3 lâminas de irrigação diárias, sendo calculadas 2 lâminas a partir da equação de Hargreaves e Samani e uma lâmina fixa de 3 mm, com 4 doses de pó de rocha. O cultivo foi realizado em estufa do IFC Rio do Sul. Efetivada a colheita 66 dias após transplante, sendo avaliados diversos dados morfológicos e qualitativos das plantas. Analisando os parâmetros pode-se afirmar que a melhor lâmina de irrigação foi a correspondente a 130% da evapotranspiração da cultura. Com relação ao pó de rocha não foi encontrada correspondência significativa ao desenvolvimento dos parâmetros considerados.

Palavras Chave: Água, Ardósia, Evapotranspiração

1. INTRODUÇÃO

No Alto Vale do Itajaí a cultura é cultivada em pequenas propriedades como alternativa para a obtenção de renda. O cultivo da beterraba vem crescendo nos últimos anos e ocupa uma área de aproximada de 773 ha, envolvendo diretamente cerca de 296 famílias (EPAGRI, 2010 apud OLIVEIRA et al, 2016).

A utilização da água na agricultura supera em muito as outras utilizações, assim, torna-se preponderante empregar uma quantidade de água próxima a necessidade real da cultura, para evitar perdas e diminuir custos. Na utilização descontrolada, na maioria das vezes, ocorrem excessos, causando consequentemente a utilização excessiva de mão de obra e energia, além do favorecimento de doenças, redução do crescimento, da qualidade e produção. Concomitantemente, ocorre a generalização de métodos de determinação das necessidades de irrigação, assim se faz necessária a verificação regional da necessidade real da cultura. A irrigação vem impactando na cultura da beterraba na região do Alto Vale do Itajaí, em razão do incremento de produtividade e menor risco de perda da produção que proporciona, além do aproveitamento da estrutura que já é usada na cebola.

Além disso, por ter baixo custo e disponibilidade na região do Alto Vale do Itajaí, vem sendo utilizado por horticultores o pó de rocha (ardósia). Tais produtores aplicam doses variadas, geralmente de 3 a 10 toneladas por hectare, com a expectativa de resultar em ganhos produtivos.

A pesquisa teve como objetivo, verificar o efeito da aplicação de diferentes lâminas de irrigação e doses de pó de rocha silicática (pedra ardósia) no desenvolvimento e produtividade da cultura da beterraba.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido em ambiente protegido no Instituto Federal Catarinense em Rio do Sul-SC com a cultivar de beterraba Boro. O cultivo foi realizado de outubro a dezembro de 2017.

O solo utilizado nos vasos foi um Cambissolo (argila= 240 g.kg⁻¹) com os seguintes atributos químicos: pH (água) = 6; P e K = 5,3 e 212 mg.dm⁻³; Ca, Mg e Al: 4,2; 1,2 e 0 cmolc.dm⁻³, respectivamente; saturação por bases (V)= 67,2%. A adubação do solo foi realizada, utilizando a adubação com N, P, K e S, com dose de 115, 425,5, 115 e 30 kg. ha⁻¹ respectivamente, todas as adubações foram incorporadas ao solo. As mudas foram produzidas em bandejas de poliestireno expandido, transplantadas 30 dias após a semeadura, aos 28 dias após transplante (DAT) foi realizado o desbaste. O controle de plantas daninhas foi realizado de forma manual, o controle de doenças foi realizado com aplicações de fungicidas protetores, para o controle de pragas foram usados inseticidas.

As doses de pó de rocha aplicadas no vaso foram ajustadas pela camada arável 0-20 cm, com densidade do solo solto de 1g.cm⁻³, utilizando doses de 0, 5, 10 e 15 ton. ha⁻¹. Os vasos foram preparados com antecedência ao transplante, sendo mantidos úmidos para reação do pó de rocha com o solo.

A irrigação foi manejada da seguinte forma, nos primeiros dias após transplante com lâminas fixas para todos os tratamentos após isso, para a avaliação da eficiência da lâmina de água, utilizou-se a equação de Hargreaves-Samani, levando em consideração as variáveis exigidas pela mesma e os dados que teríamos disponíveis para coleta, juntamente com a lâmina de irrigação que apresentou melhor resultado durante o experimento realizado pelo mesmo autor no período de maio a junho de 2017, onde a lâmina de melhor resultado foi 3 mm de irrigação diários. O modelo proposto por Hargreaves e

Samani (1982; 1985 apud BORGES et al., 2007) para estimar a evapotranspiração de referência ETo (mm.dia⁻¹) é representada na equação:

$$\text{Evapotranspiração de referência} = a \text{ Ra TD}^{1/2} (T_{\text{med}} + 17,8)$$

Em que:

a – Coeficiente adimensional, cujo valor proposto é 0,0023.

Ra – radiação solar extraterrestre incidente no topo da atmosfera, mm.dia⁻¹

TD – é a variação de temperatura no dia, (Tmax - Tmin) em °C

Tmed – temperatura média diária 0,5 (Tmax + Tmin) em °C

A radiação solar extraterrestre foi obtida através da estação de monitoramento climático de Ituporanga, com a conversão dos dados, como o experimento foi realizado em estufa, encontra-se na literatura o índice que apenas 60% do valor de radiação passa o filme plástico assim foi utilizado este valor para realização dos cálculos. Com os valores da evapotranspiração de referência foram utilizados os valores de coeficiente de cultura (Kc) propostos por Doorenbos E Pruitt, 1977, considerando intervalo de 22 dias cada coeficiente iniciando pelo segundo valor devido as plantas serem transplantadas.

Sendo assim os tratamentos de irrigação foram: T1= lâmina calculada pela equação e Kc, T2= 3 mm e T3= 130% da lâmina calculada pela equação e Kc.

A colheita foi realizada aos 60 dias após o transplante, sendo extraídos dados de massa raiz tuberosa, diâmetro da raiz tuberosa, produtividade total (estimada com uma população de 300000 plantas.ha⁻¹), clorofila, utilizando o índice spad, com medição direta da clorofila, massa folhas fresca, massa seca das folhas e brix com a utilização do refratômetro, com as devidas medidas para evitar erros nas leituras.

Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado (DIC) com 3 repetições (blocos), com 12 tratamentos cada, com esquema fatorial 3 x 4, sendo três lâminas de água (Lâmina calculada pela equação, 3mm e 130% da lâmina calculada pela equação) e quatro doses de pó de rocha de pedra ardósia 0, 5, 10 e 15 toneladas.ha⁻¹ numerados de 1 a 4 respectivamente, totalizando 36 parcelas experimentais. Cada parcela correspondia a um vaso com capacidade volumétrica de 8L. Os dados foram submetidos a análise em programa estatístico, aplicando-se o teste de Tukey ao nível de 1% e 5% de probabilidade.

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO

No período de condução do experimento as médias das temperaturas máxima e mínima foram, respectivamente 28,05 °C e 16,27 °C e as médias das umidades máximas e mínimas foram, respectivamente 82,48% e 45,81%. Segundo Filgueira (2006), a beterraba produz bem em temperaturas amenas ou baixas, com melhor desenvolvimento em temperatura ao redor de 20 °C, sendo não recomendável períodos longos com temperaturas acima de 25 °C.

Para obter uma visão geral do comportamento de distribuição dos dados foi realizada análise estatística descritiva para todas as variáveis estudadas.

Tabela 1. Síntese dos valores de análise de variância e do teste de médias para as variáveis de massa raiz tuberosa (MRT), diâmetro raiz tuberosa (DRT), produtividade (PR), clorofila (CL), massa fresca das folhas (MFF), massa seca folhas (MSF) e Brix (B)

FATOR Irrigação (I)	MRT (g)	DRT (mm)	PR (kg. ha ⁻¹)	CL	MFF (g)	MSF (g)	B (%)
T 1	67,66 b	48,41 ab	20300 b	53,48 a	41,50 b	10,07 ab	6,55 b
T 2	63,50 b	47,49 b	19050 b	48,72 ab	42,00 b	8,90 b	6,32 b
T 3	95,66 a	53,79 a	28700 a	46,25 b	53,00 a	11,79 a	8,08 a
Pó de Rocha (R)							
T 1	68,22 a	48,28 a	20466 a	46,78 a	47,11 a	8,31 a	6,43 a
T 2	82,22 a	51,64 a	24666 a	48,71 a	48,22 a	10,63 a	7,19 a
T 3	74,44 a 77,55 a	49,60 a	22333 a	50,75 a	44,44 a	10,72 a	7,29 a
T 4	11,69 **	50,08 a	23266 a	51,70 a	42,22 a	11,35 a	7,02 a
I	0,98 NS	4,66 *	11,69 **	6,41 **	5,78 **	4,89 *	9,19 **
R	0,82 NS	0,58 NS	0,98 NS	1,70 NS	0,74 NS	3,04 NS	1,10 NS
IxR	23,43	0,55 NS	0,82 NS	0,57 NS	0,55 NS	1,30 NS	0,49 NS
C.V. (%)	23,43	10,95	13,7	10,17	20,58	22,4	15,62

NS: não significativo (P>0,05); *: significativo (P<0,05); **: significativo (P<0,01); C.V.: coeficiente de variação.

Conforme os dados representados na Tabela 1 podemos perceber o efeito das lâminas de irrigação sobre as variáveis analisadas, sendo o tratamento 3 o que resultou em melhores médias, ocorrendo diferença, na massa raiz tuberosa, produtividade, massa folhas frescas e brix, não ocorrendo diferença entre o tratamento 1 e 3 no diâmetro da raiz tuberosa e massa seca das folhas.

A análise do teor de clorofila, revelou o menor desenvolvimento de plantas submetidas ao tratamento 1 e 2 concomitante a não diferença entre os tratamentos 2 e 3 sendo que a menor média registrada no tratamento 3. Na análise do brix a uma maior concentração no tratamento 3, sendo propiciada pelo melhor aproveitamento de nutrientes e sua absorção pela água.

Os resultados comprovam a baixa eficiência na utilização do pó de rocha sobre as médias avaliadas, ou seja, um custo desnecessário, onde mesmo na maior dose não foram diferenças grandes na produtividade, sendo o tratamento 2 com 5 ton. ha⁻¹ o que representou o melhor aproveitamento do pó de rocha ardósia.

As diferenças encontradas nas lâminas de irrigação concordam com diversos autores, em que segundo Silva et al. (2013), tais diferenças podem ser causadas pela baixa tolerância da beterraba de mesa ao déficit hídrico, o que leva esta cultura a perdas crescentes de rendimento. Sadeghian e Yavari (2004), observaram uma redução das plantas de acordo com a diminuição do potencial quando estudaram o efeito do déficit hídrico no crescimento e germinação da beterraba.

A menor massa das plantas com menor lâmina de irrigação concorda com Tivelli et al. (2011), que propôs como a água constitui cerca de 90,9% da parte aérea e 87,3% da raiz da cultura da beterraba, sendo a falta de água responsável pela queda drástica no desenvolvimento e produção desta hortaliça. A ocorrência de déficit hídrico em hortaliças compromete a produtividade e a sua qualidade por causa do seu ciclo curto e do alto teor de água em sua constituição. Por isso, qualquer ocorrência de estresse pode levar ao baixo rendimento e prejuízos na produção (SILVA et al., 2015).

Esses resultados são semelhantes aos encontrados por Oliveira Neto et al. (2009), avaliando a cultivar Early Wonder em diferentes lâminas de irrigação e cobertura do solo em cultivo orgânico. Nesse estudo, os autores encontram uma média de 55 mm de diâmetro da raiz tuberosa, um pouco acima da encontrada por este trabalho, sendo a diferença podendo ser causada pelo cultivo em vasos, que afetam o diâmetro da raiz tuberosa.

Os resultados encontrados para pó de rocha diferem de Santos, Silva e Beserra (2014), verificaram um efeito positivo do pó de rocha na produção de batata, porém com tendência a decrescer, e afirmaram que as melhores produtividades ficaram nas doses de 3,18 ton. ha⁻¹.

4.CONCLUSÕES

Segundo as condições de realização deste trabalho a lâmina de irrigação com melhor desempenho e produtividade foi a com utilização de 130% da evapotranspiração da cultura, não sendo encontrada a diferença significativa na utilização de pó de rocha ardósia.

5.AGRADECIMENTOS

Ao CNPq pela concessão de bolsa de pesquisa PIBIC-EM. Ao Instituto Federal Catarinense pela concessão de bolsa de estudos para a graduação.

REFERÊNCIAS

- [1] Borges, A. C.; Menciondo, E. M..Comparação entre equações empíricas para estimativa da evapotranspiração de referência na Bacia do Rio Jacupiranga. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, Campina Grande, v. 11, n. 3, p.293-300, 12 jan. 2007.
- [2] Doorenbos, J.; Pruitt, W. Crop water requirements. 1977. Disponível em: <<http://www.fao.org/docrep/018/s8376e/s8376e.pdf>>. Acesso em: 23 abr. 2018.
- [3] Filgueira, F. A. R. Novo manual de olericultura: agrotecnologia moderna na produção e comercialização de hortaliças. Universidade Federal de Viçosa. MG: UFV, 357 p. 2006
- [4] Oliveira Neto, D. H.; Necessidade hídrica, função de resposta e qualidade da beterraba (*Beta vulgaris* L.), sob diferentes lâminas de irrigação e coberturas do solo em sistema orgânico de cultivo. 2009. 120 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Pós-graduação em Fitotecnia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2009.

- [5] Oliveira, R. JP et al. 2016. Calibração da adubação fosfatada e potássica para beterraba na região do Vale do Itajaí. *Horticultura Brasileira* 34: 210-215.
- [6] Sadeghian, S. Y.; Yavari, N. Effect of Water-Deficit Stress on Germination and Early Seedling Growth in Sugar Beet. *Journal Of Agronomy And Crop Science*, [s.l.], v. 190, n. 2, p.138-144, abr. 2004. Wiley-Blackwell. <http://dx.doi.org/10.1111/j.1439-037x.2004.00087.x>.
- [7] Santos, J. F.; Silva, E. D.; Beserra, A. C. Produção agroecológica de batata em relação a doses de pó de rocha. 2014. Disponível em: <<http://revistatca.pb.gov.br/edicoes/volume-08-2014/volume-8-numero-1-marco-2014/tca8106.pdf>>. Acesso em: 09 abr. 2018.
- [8] Silva, A.O et al. Desenvolvimento de cultivares de beterraba sob diferentes tensões da água no solo. *Horticultura Brasileira*, Brasília, v. 33, n. 1, p.012-018, jan. 2015.2015.
- [9] Silva, A.O. et al. Eficiência de uso da água em cultivares de beterraba submetidas a diferentes tensões da água no solo. *Water Resources And Irrigation Management*, Campina Grande, v. 2, n. 1, p.27-36, 06 abr. 2013.
- [10] Tivelli, S. W. et al. Beterraba do Plantio a Comercialização. 210. ed. Campinas: Instituto Agrônômico, 2011. 45 p. Boletim Técnico IAC.

Capítulo 2

Determinação de parâmetros da curva de retenção de água no solo em campo por meio do Software Hydrus 1-D

*João José da Silva Júnior
Matheus Barcelos de Sousa*

Resumo: O objetivo deste trabalho é a determinação rápida e de baixo custo em campo dos parâmetros do modelo de van Genuchten – Mualem (α , n) da curva de retenção de água no solo com a utilização do método numérico inverso com o software Hydrus – 1D. O experimento foi conduzido na estação experimental da Biologia na Universidade de Brasília, nesta área predomina um Latossolo Vermelho de textura argilosa a muito argilosa. Para a obtenção dos dados de infiltração acumulada foram realizados testes de infiltração em nove locais diferentes com infiltrômetro de anel duplo com diâmetro de 30 e 60 cm e 30 cm de altura. Os mesmos foram cravados a uma profundidade de 15 cm no solo. Antes do início do teste de infiltração foram obtidas as condições de umidade inicial nas profundidades de 20 cm, e na superfície do solo. Como conclusão, verificou-se que o método numérico inverso do software Hydrus – 1D, estima com baixa precisão os parâmetros do modelo de van Genuchten – Mualem (α , n) da curva de retenção de água no solo, com uso de dados de infiltração acumulada obtidos por meio de teste de infiltração com infiltrômetro de duplo anel em campo. A baixa precisão das estimativas dos parâmetros Mualem (α , n) é evidenciada pelos baixos valores dos índices estatísticos utilizados.

1. INTRODUÇÃO

O avanço tecnológico verificado nas últimas épocas a nível informático tem permitido o desenvolvimento, a crescente utilização e o aperfeiçoamento de modelos matemáticos de circulação e/ou de balanço da água e de transporte de solutos no solo cada vez mais sofisticados e exigentes. Esses modelos são geralmente baseados na resolução numérica da equação de Richards que, por conter duas incógnitas (θ e h), numa única equação requer previamente o conhecimento das características hidráulicas do solo de modo a permitir a sua resolução.

Embora de uso relativamente simples, muitos dos métodos laboratoriais existentes para determinação das propriedades hidráulicas (Wind, 1968; Stakman, 1974; Silva et al, 1975; Arya et al, 1975; Bouma et al., 1983, Embrapa 2009) são morosos, dispendiosos, bastante trabalhosos e limitados ao tamanho das amostras colhidas, restringindo a sua utilização na avaliação das propriedades hidráulicas do solo devido à heterogeneidade do meio.

O conhecimento da condutividade hidráulica do solo é essencial para qualquer estudo que envolva o movimento da água no solo. Ela pode ser determinada por vários métodos, no campo ou no laboratório, e a sua alta variabilidade entre repetições é frequentemente apontada como um problema experimental. O método de estimativa de parâmetros ou método inverso envolve a estimativa indireta das funções hidráulicas do solo através da solução numérica da equação que governa o processo de fluxo sujeita às condições de contorno impostas. Primeiramente, as propriedades hidráulicas são supostas como sendo descritas por um modelo analítico com valores de parâmetros desconhecidos. Durante a execução de um ensaio um os mais atributos são medidos (dados observados) ex. potencial matricial no tempo, infiltração acumulada, variação do armazenamento, conteúdo volumétrico de água. Subsequentemente, a equação de fluxo é resolvida numericamente usando funções hidráulicas com estimativas iniciais fornecidas.

Os parâmetros das funções hidráulicas são otimizados pela minimização da função referida os dados observados e os preditos pelo modelo, usando a simulação numérica repetida do processo de fluxo (Eching et al., 1993). A vantagem da utilização da estimativa de parâmetros é que permite uma abordagem flexível que permite determinar a curva característica de água no solo e a curva de condutividade hidráulica simultaneamente (Kool et. al., 1987).

Estes métodos são baseados na construção de uma função, denominada função objetivo que se pretende minimizar, e que expressa o desvio entre os valores observados por amostragem e os estimados pelo sistema. Os valores dos parâmetros inicialmente estimados serão então atualizados sequencialmente e melhorados de modo a minimizar as diferenças até se obter a precisão pretendida. O método baseia-se ainda no fato dos processos de infiltração, drenagem e evaporação permitem caracterizar hidrodinamicamente, uma vez que esses fenômenos integram as propriedades do meio poroso incluindo a influência da heterogeneidade espacial; as diferenças na estrutura do solo e irregularidades texturais; os caminhos preferenciais; as distintas camadas existentes e a anisotropia do solo (Šimůnek et al., 2009).

Assim o objetivo deste trabalho é a determinação rápida e de baixo custo em campo dos parâmetros do modelo de van Genuchten – Mualem (α , n) da curva de retenção de água no solo com a utilização do método numérico inverso com o software Hydrus – 1D.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

O experimento foi conduzido na estação experimental da Biologia na Universidade de Brasília, nesta área predomina um Latossolo Vermelho de textura argilosa a muito argilosa. Para a obtenção dos dados de infiltração acumulada foram realizados testes de infiltração em nove locais diferentes com infiltrômetro de anel duplo com diâmetro de 30 e 60 cm e 30 cm de altura. Os mesmos foram cravados a uma profundidade de 15 cm no solo. Antes do início do teste de infiltração foram obtidas as condições de umidade inicial nas profundidades de 20 cm, e na superfície do solo.

A técnica de modelagem inversa foi aplicada para a obtenção da condutividade hidráulica saturada a partir da minimização de uma função objetivo formulada usando-se os dados de infiltração acumulada e os valores de umidade e tensão na capacidade de campo com o uso do software Hydrus-1D.

Para a estimativa pelo método inverso dos valores de condutividade hidráulica saturada, para os testes de infiltração, foram realizadas simulações no Hydrus-1D, no modo inverso. O software HYDRUS-1D requer para a simulação inversa as mesmas informações que para o problema direto, que é o tempo de simulação, informação geométrica (perfil do solo com 100 cm de profundidade), as condições iniciais e as

condições de contorno, mais as estimativas iniciais dos parâmetros, a posição dos pontos de observação e o tempo medido com os correspondentes dados.

Para a caracterização física do solo a área foi dividida em três e foram coletadas amostras indeformadas e também deformadas em três repetições na camada de 0-0,10 m, para determinação da textura segundo Embrapa (1997), densidade das partículas (g/cm^3) pelo método do balão volumétrico, densidade do solo (g/cm^3) método do anel volumétrico e porosidade total do solos (%), segundo Embrapa (1997).

As curvas de retenção de água no solo foram obtidas por meio de funções de pedotransferência (FPT) com o auxílio do programa Rosetta (Schaap et al., 2001), foram utilizados como dados de entrada do programa Rosetta, respectivamente, a granulometria do solo e a densidade do solo em cada área.

Utilizou-se diferentes critérios estatísticos para a comparação das curvas $\theta(h)$ e obtidas por modelagem inversa com o HYDRUS-1D e pelo método padrão de laboratório: índice de concordância de Willmott (d); erro absoluto médio (EAM); raiz quadrada do erro médio normalizado (RQEM) e índice de eficiência (E). Esses indicadores foram obtidos a partir das Equações (1) a (4).

$$d = 1 - [\sum_{i=1}^n (P_i - O_i)^2 / \sum_{i=1}^n (|P_i - \bar{O}| + |O_i - \bar{O}|)^2] \quad (1)$$

$$EAM = \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |(O_i - P_i)| \right] \quad (2)$$

$$RQEM = \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (O_i - P_i)^2 \right]^{0.5} \cdot \left(\frac{100}{\bar{O}} \right) \quad (3)$$

$$E = \left[\sum_{i=1}^n (O_i - \bar{O})^2 - \sum_{i=1}^n (O_i - P_i)^2 \right] / \sum_{i=1}^n (O_i - \bar{O})^2 \quad (4)$$

Sendo

P_i = dados obtidos nos ensaios experimentais;

O_i = dados simulados pelo modelo Hydrus-2D;

n = número de observações; e

$\bar{O}$ = média dos valores simulados.

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na tabela 1 são apresentadas as curvas de retenção de água no solo os valores de umidade na capacidade de campo (cm^3/cm^3) e a disponibilidade total de água no solo (mm/cm) para as áreas estudadas.

Tabela 1. Valores médios das curvas de retenção de água no solo, umidade na capacidade de campo (cm^3/cm^3) e disponibilidade total de água no solo (mm/cm).

Área	$\theta_r (\text{cm}^3/\text{cm}^3)$	$\theta_s (\text{cm}^3/\text{cm}^3)$	α	n	$\theta_{cc} (\text{cm}^3/\text{cm}^3)$	DAT (mm/cm)
Área 1	0,108	0,543	0,025	1,268	0,375	4,348
Área 2	0,106	0,551	0,023	1,298	0,375	4,455
Área 3	0,108	0,533	0,025	1,258	0,370	4,250

Observa-se na tabela 1 os valores dos parâmetros da curva de retenção de água no solo, a umidade na capacidade de campo (cm^3/cm^3) e a disponibilidade total de água no solo (mm/cm), os valores de umidade na capacidade de campo obtidos para as três áreas variaram de 0,370 a 0,375 estes valores estão próximos dos obtidos por Polyanna et al. (2005) que obteve valores de umidade na capacidade de campo variando de 0,323 a 0,325 para latossolos de cerrado com textura argilosa e dos valores obtidos por Costa et al. (1997), que foi de 0,323 para as mesmas condições.

Observa-se que a disponibilidade água total nas três áreas variaram de 4,250 a 4,348 (mm/cm) o que equivale a 212,5 a 217,4 mm de água disponível para as plantas até a profundidade de 0,5 m.

Tabela 2. Caracterização físico - hídrica da área estudada.

Área	% Argila	% Silte	% Areia
Área 1	58,09	11,90	30,01
Área 2	52,32	18,49	29,20
Área 3	58,15	7,94	33,91
Área	Dp (g /cm ³)	Ds (g /cm ³)	Porosidade total (%)
Área 1	2,20	1,17	46,58
Área 2	2,21	1,13	48,78
Área 3	2,21	1,15	47,68

Na tabela 2 são apresentadas a caracterização físico hídrica para a área estudada.

Observa-se na tabela 2 que em todas as áreas amostradas o percentual de argila do solo ficou acima de 50%. Os valores de densidade do solo variaram entre 1,13 e 1,17 (g/cm³), estes valores estão próximos da Ds para áreas de mata nativa o que pode ser explicado por essa ser uma área que está em repouso por um longo período de tempo, e possui bastante matéria orgânica, e cobertura morta, elevados teores de matéria orgânica elevam a densidade do solo (Silva & Kay, 1997; Dalal & Chan, 2001).

A matéria orgânica proporciona também maior estabilidade da estrutura do solo (Horn et al., 1995) favorecendo a redução da Ds do mesmo. Os valores de Porosidade total variam de 46,58% até 48,78%, estes valores estão próximos dos obtidos para um latossolo vermelho em área de cerrado por Carneiro et al. (2009), segundo Tormena et al. (1998), há redução de até 24 % no VTP, quando comparado com áreas que não sofreram ação antrópica, mais uma vez a elevada porosidade total das áreas em estudo pode ser explicada por essa ser uma área que está em repouso por um longo período de tempo. A densidade de partícula variou de 2,20 a 2,21 (g/cm³) esses resultados eram esperados já que, de acordo com Brady (1989), a densidade de partículas depende da natureza do material mineral predominante apresentando, portanto, pouca ou nenhuma diferença para a mesma classe de solo.

Na Tabela 3 podemos observar os valores de α e n estimados pelo método inverso do software Hydrus-1D e os valores obtidos pela função de pedotransferência FPT do software Rosseta, e os diferentes critérios estatísticos utilizados para comparação dos parâmetros.

Tabela 3. Valores de α e n estimados pelo método inverso do software Hydrus-1D e obtidos pelo FPT do software Rosseta, e índices estatísticos erro absoluto médio (MAE), raiz quadrada do erro médio (RMSE) e índice d de Willmot.

Testes	Estimado		Calculado		MAE	RMSE	E	d
	α	n	α	n				
18/nov	1,2	2	0,03	1,28	0,172	1,104	0,218	0,566
19/nov	1,2	1,1	0,02	1,26	0,108	0,690	0,239	0,775
21/dez	1,2	1,1	0,02	1,26	0,091	0,584	0,356	0,613
23/set	1,2	1,4	0,02	1,28	0,167	1,072	(-0,13946)	0,505
24/set	1,2	1,4	0,02	1,30	0,167	1,072	(-0,13946)	0,604
05/nov	1,2	1,4	0,02	1,31	0,104	0,665	0,293	0,579
21/abr	1,4	1,4	0,03	1,25	0,104	0,665	0,293	0,579
19/mai	1,4	1,4	0,03	1,25	0,104	0,665	0,293	0,579
02/jun	1,4	1,4	0,02	1,27	0,104	0,665	0,293	0,579

Na tabela 3 são apresentados os índices estatísticos comparando os valores de α e n estimados pelo método inverso do software Hydrus-1D e obtidos pelo FPT, pode-se observar que os valores do Erro Absoluto Médio variou de 0,091 a 0,172, de acordo com Mentzer e Bienstock (1998), o MAE mede o afastamento médio das previsões em relação aos valores observados, constituindo na média dos erros da previsão. Neste sentido, seu valor ideal seria igual a zero. Os valores de α e n estimados pelo método inverso do software Hydrus-1D obtiveram elevados valores desse índice indicando grande diferença entre o valor estimado pelo método inverso e o calculado pela FTP.

A Raiz Quadrada do Erro Médio (RMSE) variou de 0,584 a 1,104, assim como no MAE, quanto menor o valor de (RMSE), mais próximo do valor real está o parâmetro estimado, os valores obtidos para este

índice estatístico mostram que o valores de α e n estimados pelo método inverso do software Hydrus-1D diferem dos obtidos pela função de pedotransferência.

O índice de Eficiência E variou de 0,218 a 0,356, exceto para os parâmetros estimados teste 23/11 e 24/11 que obtiveram valores de $E = (-0,13946)$, $(-0,13946)$ respectivamente, e o Índice d de Willmont variou de 0,505 a 0,775, o valores do índice d de Willmont mostra um desempenho razoável para os valores de α e n estimados pelo método inverso do software Hydrus-1D, já que quanto mais próximo da unidade (1,00) os valores destes índices de concordância do modelo melhor o ajuste. No caso do índice de Eficiência os parâmetros estimados não obtiveram um desempenho satisfatório já que este obtiveram valores menores que 0,356 e ate valores negativos.

Figura 1. Comparação entre as curvas de retenção obtidas com os parâmetros de α e n estimados pelo método inverso do software Hydrus-1D e umidade de saturação igual a porosidade total e a curva de retenção obtida meio de funções de pedotransferência (FPT) com o auxílio do programa Rosetta.

Na figura 1 pode se observar o comportamento da curva obtida com os parâmetros estimados comparada com a curva (FPT) do programa Rosetta observa-se que as curvas estimadas diferem das estimadas. Assim recomendasse em trabalhos futuros a utilização de mais dados na estimativa, além da utilização das curvas de infiltração acumuladas e dos valores de umidade e tensão na capacidade de campo, a utilização de valores de umidade em diferentes profundidades e diferentes tempos durante a realização do teste de infiltração.

4.CONCLUSÕES

O método numérico inverso do software Hydrus – 1D, estima com baixa precisão os parâmetros do modelo de van Genuchten – Mualem (α , n) da curva de retenção de água no solo, com uso de dados de infiltração acumulada obtidos por meio de teste de infiltração com infiltrometro de duplo anel em campo.

A baixa precisão das estimativas dos parâmetros Mualem (α , n) é evidenciada pelos baixos valores dos índices estatísticos utilizados.

Aconselha-se em futuros trabalhos com o uso desta metodologia a utilização de dados como valores de umidade em diferentes profundidades e diferentes tempos durante a realização do teste de infiltração, no intuito de melhorar a estimativa da curva de retenção.

REFERÊNCIAS

- [1] Angulo-Jaramillo, R.; Vandervaere, J.P.; Roulier, S.; Thony, J.L.; Gaudet, J.P.; Vauclin, M, Field Measurement of soil hydraulic properties by disc and ring infiltrometers: A review and recent developments, *Soil & Tillage Research*, Madison, v,55, p,1-29, 2000,
- [2] Arya, L. M.,; Farrel, D. A & Blake, G. R., 1975, A field study of soil water depletion patterns in presence of growing soybean roots, I, Determination of hydraulic properties of the soil, *Soil Sci, Soc, Am, J*, 45: 1023-1030,
- [3] Brady, N. C. *Natureza e propriedades dos solos*. 7.ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1989. 878p.
- [4] Bouma, J.; Belmans, C.; Dekker, L. W. & Jeurissen, W. J. M, 1983, Assessing the suitability of soils with macropores for subsurface liquid waste disposal, *J, Environ, Qual*, 12, 305-311,
- [5] Carneiro, M. A. C.; Souza, E. D. de; Reis, E. F. dos; Pereira, H. S.; Azevedo, W. R. de. Atributos físicos, químicos e biológicos de solo de Cerrado sob diferentes sistemas de uso e manejo. *Revista Brasileira de Ciência do Solo*, v.33, p.147-157, 2009.
- [6] Costa, A. C. S.; Nani, M. R.; Jeske, E. Determinação da umidade na capacidade de campo e ponto de murchamento permanente por diferentes metodologias. *Revista Unimar*, v.19, p.827-844, 1997.
- [7] Dalal, R.C. & Chan, K.Y. Soil organic matter in rainfed cropping systems of the Australian cereal belt. *Aust. J. Soil Res.*, 39:435-464, 2001.
- [8] Eching, S.O., J.W. Hopmans, and O. Wendroth, 1994, Unsaturated hydraulic conductivity from transient multi-step outflow and soil water pressure data, *Soil Sci, Soc, Amer, J*, 58:687-695.
- [9] Mentzer, J. T.; Bienstock, C. C. *Sales Forecasting Management*. California:Sage, 1998
- [10] Horn, R.; Domzal, H.; Slowinska-Jurkiewicz, A. & van Ouwerkerk, C. Soil compaction processes and their effects on the structure of arable soils and the environment. *Soil Till. Res.*, 35:23-36, 1995.
- [11] Wind, G. P., 1968, Capillary conductivity data estimated by a simple method, In: P. E. Rijtema & H. Wassink (eds.), *Water in the unsaturated zone*, Procced, Wageningen, Symposium, IASH/Aihs – Unesco, vol, I: 181 – 191,
- [12] Kool, J.B., J.C. Parker, And M.Th, Van Genuchten, 1987, Parameter estimation for unsaturated flow and transport models—A review, *J, Hydrol*, 91:255–293,
- [13] Polyanna, M. O.; Silva, A. M. da; Coelho, C.; Silva, R. A. da. Análise comparativa da caracterização físico-hídrica de um Latossolo Vermelho distrófico in situ e em laboratório. *Irriga*, v.10, p.1-19, 2005.
- [14] Silva, A. A.; Alvim, A. J. S. & Santos, M. J., 1975, Métodos de análise de solos, plantas e água, *Pedologia*, 10 (3),
- [15] Silva, A.P. & Kay, B.D. The sensitivity of shoot growth of corn to the least limiting water range of soils. *Plant Soil*, 184:323-329, 1996.
- [16] Šimůnek, J.; Van Genuchten, M.Th.; Šejna, M, The Hydrus-1D Software Package for Simulating the Movement of Water, Heat, and Multiple Solutes in Variably Saturated Media, Version 4.14, HYDRUS Software Series 1, Riverside: Department of Environmental Sciences, University of California Riverside, 2009
- [17] Stakman, W. P., 1974, Measuring soil moisture, In: *Drainage Principles and Applications*, Int, Inst, Ld, Reclam,, 16(3): 221-251, Wageningen,
- [18] Tormena, C.A.; Roloff, G. & Sá, J.C.M. Propriedades físicas do solo sob plantio direto influenciadas por calagem, preparo inicial e tráfego. *R. Bras. Ci. Solo*, 22:301-309, 1998.

Capítulo 3

Determinação de vazão por meio de Tubos Venturi

Bruno José de Souza

Marinaldo Ferreira Pinto

Leonardo Duarte Batista da Silva

Conan Ayade Salvador

Dinara Grasiela Alves

Resumo: O tubo Venturi é um dos instrumentos mais utilizados para a mensuração de vazão em tubulação. Tem como característica ser autolimpante podendo medir a vazão de fluidos com presença de sedimentos. O dispositivo contém uma seção de escoamento reduzida onde a carga piezométrica é transformada em carga cinética. Medindo a queda de pressão por manômetro diferencial se calcula a velocidade de escoamento e a vazão da tubulação. A velocidade do fluido no seu interior é aumentada na seção estrangulada, podendo provocar pressão efetiva negativa. O trabalho teve como objetivo obter as curvas de calibração de tubos Venturi para medição de vazão. As atividades foram desenvolvidas no Laboratório de Hidráulica do Departamento de Engenharia do Instituto de Tecnologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde foram ensaiados quatro tubos Venturi distintos. Utilizou-se uma bomba centrífuga com potência de 5,0 CV. As variações de pressão e a vazão correspondente a cada variação de pressão foram monitoradas, obtendo-se a curva de calibração dos medidores Venturi. Essas curvas foram analisadas e o modelo potencial foi o que melhor se ajustou aos valores observados. Deve-se realizar a calibração de cada tubo Venturi para que se possa determinar vazão com maior precisão.

Palavras-Chave: Hidráulica; diferencial de pressão; hidrometria.

1. INTRODUÇÃO

O medidor Venturi é um instrumento inventado por Clemens Herschel em 1881, que recebeu o nome do filósofo italiano Venturi pelo fato de ter sido o primeiro hidráulico a experimentar tubos divergentes (AZEVEDO NETTO, 1998). Esse medidor se constitui em um dos métodos mais utilizados para a medição de vazão em tubos, podendo ser mais preciso em relação a orifícios e bocais, por apresentar menor perda de carga, devido à recuperação de pressão. O tubo Venturi tem a característica de ser autolimpante, o que impede a acumulação de partículas sólidas, o que proporciona a medição de vazão de fluidos com grande quantidade de sedimentos (FOX; MCDONALD, 1995). O aparelho compreende três seções principais: uma peça convergente, outra divergente (difusor) e uma seção intermediária a qual é denominada de garganta e seu diâmetro está compreendido entre $\frac{1}{4}$ e $\frac{3}{4}$ do diâmetro da tubulação (AZEVEDO NETTO, 1998). O tubo Venturi, através da redução da seção de escoamento da tubulação, transforma a carga piezométrica em carga cinética, aumentando a velocidade da água na seção estrangulada provocando uma pressão efetiva negativa (vácuo) (FEITOSA FILHO, 1998). Medindo-se essa queda de pressão através de um manômetro diferencial pode-se calcular a velocidade de escoamento e, conseqüentemente, a vazão da tubulação (PERES, 2011). O dispositivo se destaca também como injetor de fertilizante. O conhecimento das características hidráulicas deste equipamento se torna necessário, para que a prática desta técnica seja bem executada. Desse modo, o presente trabalho teve por objetivo obter as curvas de calibração de tubos Venturi para medição de vazão.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Hidráulica do Departamento de Engenharia, pertencente ao Instituto de Tecnologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Para tanto desenvolveu-se uma bancada constituída por tubulações de 2 polegadas de diâmetro. A água foi recalçada em diferentes vazões por um sistema de bombeamento que utilizava uma bomba centrífuga da marca WEG com potência de 5,0 CV, um medidor eletromagnético de vazão da marca KROHNE instalado logo após a bomba e quatro tubos Venturi os quais foram instalados e ensaiados um por vez. O ajuste das pressões de alimentação do sistema foi realizado por meio de uma válvula de gaveta e monitorado utilizando um manômetro instalado logo após a bomba hidráulica, já os diferenciais de pressão dos tubos Venturi foram ajustados utilizando-se válvulas de gaveta instaladas à montante e à jusante dos mesmos. Para medir os diferenciais de pressão foram utilizados dois manômetros, um na entrada e outro na garganta dos tubos Venturi. Para a obtenção da curva de calibração dos tubos Venturi foram utilizados os diferenciais de pressão e a vazão correspondente a cada variação de pressão. A Figura 1 ilustra o trecho da bancada onde os tubos Venturi foram instalados e ensaiados.

FIGURA 1. Vista frontal da bancada hidráulica de ensaio.

A Tabela 1 apresenta as características dos tubos Venturi ensaiados.

Tabela 1. Características dos tubos Venturi.

Venturi	Diâmetro de entrada e saída (mm)	Diâmetro da garganta (mm)	Comprimento total (mm)
1	19,5	4	100
2	25,4	7	180
3	38,1	11	230
4	27,8	7	180

Durante os ensaios foram utilizadas diferentes pressões de alimentação do sistema para os diferentes tubos Venturi. Para o Venturi 1 e 2 utilizou-se a pressão de alimentação de 196 kPa, para o Venturi 3 utilizou-se a pressão de alimentação de 343 kPa. Para o tubo Venturi 4 utilizou-se a pressão de alimentação de 196 kPa.

Aplicando a equação de Bernoulli nas seções 1 (entrada do medidor Venturi) e 2 (garganta do medidor Venturi) da Figura 1, tem-se (equação 1):

$$\frac{P_1}{\gamma} + Z_1 + \frac{V_1^2}{2g} = \frac{P_2}{\gamma} + Z_2 + \frac{V_2^2}{2g} \quad (1)$$

em que:

$\frac{P}{\gamma}$ = carga de pressão, m;

z = carga potencial, m

$\frac{V^2}{2g}$ = carga cinética, m.

Como a carga potencial é a mesma no ponto 1 e 2, então (equação 2):

$$\frac{P_1}{\gamma} - \frac{P_2}{\gamma} = \frac{V_2^2}{2g} - \frac{V_1^2}{2g} \quad (2)$$

A vazão (Q) na seção 1 e 2 é a mesma (equação 3):

$$Q_1 = Q_2 = V_1 \cdot A_1 = V_2 \cdot A_2 \quad (3)$$

em que:

Q = vazão, $\text{m}^3 \text{s}^{-1}$;

V = velocidade, m s^{-1} ; e

A = área da seção, m^2

Sabe-se que a área do círculo é igual a equação (4):

$$A = \pi \frac{D^2}{4} \quad (4)$$

Substituindo a equação 4 na equação 3, e rearranjando temos (equação 5):

$$V = \frac{4Q}{\pi D^2} \quad (5)$$

Substituindo a equação 5 na equação 2, e rearranjando temos (equação 6):

$$Q = K \frac{\pi \sqrt{2g \frac{\Delta P}{\gamma}}}{\sqrt{\frac{1}{D_2^4} - \frac{1}{D_1^4}}} \quad (6)$$

em que:

k = coeficiente da perda de carga, adimensional.

Observa-se na equação 6 que a vazão varia com a variação da diferença de pressão entre a seção 1 (entrada do tubo Venturi) e a seção 2 (garganta). Os demais componentes da equação são constantes para o medidor Venturi analisado, então a equação 6 pode ser reescrita da seguinte forma:

$$Q = a\sqrt{\Delta P} \quad (7)$$

em que:

a = constante da equação específica para o medidor Venturi analisado, m² s⁻¹.

O valor da constante da equação (**a**) foi obtido por meio de análise de regressão para cada tubo Venturi ensaiado.

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com os valores obtidos das aferições da diferença de pressão entre a entrada e a garganta de cada tubo Venturi, juntamente com a vazão para cada diferencial de pressão, foi possível encontrar a curva de calibração para cada tubo Venturi que pode ser visualizada na Figura 2.

Verificou-se que o coeficiente de determinação da curva de calibração variou de 84 a 91% cujos valores são considerados bons. Para se obter maiores valores de coeficiente de determinação seria necessária a utilização de manômetros com maior precisão. Ressalta-se que o maior valor de coeficiente de determinação foi observado no tubo Venturi 4. O menor valor de coeficiente de determinação foi observado no tubo Venturi 1 que possui menores dimensões que os demais tubos Venturi analisados. O modelo potencial foi o que melhor se ajustou às curvas diferencial de pressão e vazão.

Figura 2. Valores de vazão versus diferencial de pressão entre a entrada e a garganta do tubo Venturi (ΔP). A: Venturi 1; B: Venturi 2; C: Venturi 3; D: Venturi 4.

4.CONCLUSÃO

Deve-se realizar a calibração de cada tubo Venturi para que se possa determinar vazão com maior precisão.

REFERÊNCIAS

- [1] Azevedo Netto, J.M.; Fernandez, M.F.; Araújo, R.; Ito, A.E. Manual de hidráulica. 8. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 1998. 669 p.
- [2] Feitosa Filho, José C. Otimização hidráulica e manejo de injetores tipo Venturi duplo para fins de quimigação. Piracicaba, 1998. 164p. Tese (Doutorado em Irrigação e Drenagem) - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", Universidade de São Paulo.
- [3] Fox, R. W.; Mcdonald, A. T. Introdução à mecânica dos fluidos. 4ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1995, 662 p.
- [4] Peres, J. G. Hidráulica Agrícola. Piracicaba-SP, 2011. 374 p.

Capítulo 4

Danos por impacto e seus efeitos na qualidade pós-colheita de citros armazenados sob condições ambientes

Fabiano Tavares de Moura

Elisangela Nunes Melo de Macedo

Silvanda de Melo Silva

Laesio Pereira Martins

Francisco de Assys Romero da Mota Sousa

Antônio Fernando da Silva

Eduardo Felipe da Silva Santos

Thiane de Lima Rodrigues

Resumo: A citricultura tem grande importância para economia brasileira contribuindo com o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, contribuindo com a balança comercial nacional e principalmente, como geradora direta e indireta de empregos na área rural. O objetivo do trabalho foi avaliar em laboratório os efeitos dos danos mecânicos por impacto em laranja Pêra (*Citrus sinensis*) e tangerina Cravo (*Citrus reticulata*). Foi efetivada a caracterização inicial de ambas as espécies de citros. O dano por impacto foi simulado com a queda livre dos frutos para todos os tratamentos através de equipamento de sucção. Foram ocasionadas duas alturas de impacto, um e dois metros de altura em superfície plana e rígida em cada variedade. As avaliações realizadas foram: firmeza (N), ácido ascórbico (AA - mg.100mL⁻¹), acidez titulável (AT - g. ácido cítrico.100mL⁻¹), sólidos solúveis (SS - %) e perda de massa (%). Alternativas para evitar impactos por queda devem ser encorajadas visando manter a qualidade dos frutos cítricos e aumentar sua conservação. Danos de impacto por queda afetam significativamente a qualidade de laranjas 'Pêra' e tangerinas 'Cravo', o que diminui o tempo de armazenamento.

Palavras-Chave: *Citrus sinensis*, *Citrus reticulata*, dano mecânico, conservação

1. INTRODUÇÃO

A citricultura tem grande importância para economia brasileira contribuindo com o PIB brasileiro, gerando 9 bilhões de reais (5,2 bi dólares), contribuindo com a balança comercial nacional e principalmente, como geradora direta e indireta de 400.00 empregos na área rural (LOPES et al, 2011). Segundo dados do IBGE (2017), o Brasil teve uma produção de 18.666 milhões de toneladas de laranja, sendo a Paraíba, a sexta maior estado produtor de laranja da região Nordeste com a produção de 3.659 mil toneladas. Perdas pós-colheita de produtos agrícolas podem ocorrer devido à ocorrência de injúrias (mecânicas, patológicas e fisiológicas) nos produtos. O dano de impacto é geralmente causado pela colisão do fruto contra superfícies sólidas ou outros frutos durante as etapas de colheita, manuseio e transporte, causando danos externos que são facilmente visualizados na superfície, com ruptura ou não na epiderme, formação de lesões aquosas translúcidas e amolecimento (SANTOS, 2014).

Apesar dos citros serem uma das frutíferas mais estudadas, ainda há poucas informações sobre danos por impacto em citros, seja na colheita, manuseio ou transporte, pois esses ocasionam lesões externas e internas, afetando sua qualidade e diminuindo sua conservação pós-colheita. Estes estudos podem proporcionar a base fisiológica, que consequentemente, possibilitará a aplicação de materiais e métodos de conservação, visando à manutenção da qualidade e o aumento de vida útil pós-colheita destes frutos, visto que são perecíveis. Neste sentido, informações sobre possíveis danos no manuseio dos frutos e avaliação dos aspectos qualitativos geram contribuição para a divulgação do potencial comercial das laranjas 'Pera' e tangerina 'Cravo' na região e a divulgação entre os pequenos produtores dos resultados desta pesquisa, como forma de subsidiar benefícios na qualidade dos produtos da região.

O objetivo do trabalho foi avaliar em laboratório os efeitos dos danos mecânicos por impacto em laranja 'Pêra' (*Citrus sinensis*) e tangerina 'Cravo' (*Citrus reticulata*).

2. MATERIAL E MÉTODOS

Os frutos foram colhidos manualmente em estágio de coloração classificado como C2, de acordo com o Programa Brasileiro para Modernização da Horticultura – PBMH (CEAGESP, 2011), no período da tarde em uma propriedade rural do município de Remígio – PB (6°59'32.69"S e 35°46'2260"O). Após acondicionamento em caixas plásticas revestidas com papelão, foram transportados rapidamente em um veículo não refrigerado para o Laboratório de Fisiologia Pós-Colheita do Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias - CCHSA da Universidade Federal da Paraíba – UFPB.

As laranjas 'Pêra' (*Citrus sinensis*) e as tangerinas 'Cravo' (*Citrus reticulata*), foram selecionadas quanto ao estágio de maturação, a injúrias mecânicas e fúngicas e, sanificados em solução de hipoclorito de sódio por imersão a 100 ppm por 10 minutos, enxaguados com água potável e secos com auxílio de papel toalha. O dano por impacto foi simulado com a queda livre dos frutos para todos os tratamentos através de equipamento de sucção, conforme Magalhães (2007). O impacto foi ocasionado em superfície plana e rígida em cada variedade de citros em estudo.

Após a aplicação dos danos por impacto os frutos das laranjas 'Pêra' e tangerinas 'Cravo' foram acondicionadas em bandejas plásticas e armazenadas a temperatura ambiente ($23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$, com $83 \pm 2\%$ UR), durante 24 dias.

Avaliações Efetivadas:

Avaliações Físicas: Perda de Massa (%): Para a avaliação de perda de massa, os frutos foram pesados em balança semi-analítica, anotando a diferença entre peso inicial e final em todo o período de conservação, expressando-se os resultados em porcentagem; Firmeza (N): realizada com penetrômetro, acoplado a um suporte e ponteira plana de 5 mm de diâmetro. Duas leituras foram distribuídas no fruto, uma na região sem impacto e outra na com impacto.

Avaliações Físico-Químicas: Acidez Titulável (AT - g. ácido cítrico.100mL⁻¹): determinada por titulometria com NaOH 0,1N, utilizando fenolftaleína como indicador, segundo Instituto Adolfo Lutz (2008); Sólidos Solúveis (SS - %): medidos com refratômetro digital portátil (Mod. RTD-95); Ácido Ascórbico (AA - mg.100mL⁻¹): determinada por titulometria utilizando solução de 2,6 diclorofenolindofenol (DFI) a 0,2 % padronizada com ácido oxálico (AOCS, 2004);

O delineamento experimental foi inteiramente ao acaso para cada variedade de citros com 3 repetições, 2 fruto por repetição, em esquema fatorial 3 x 9, sendo 3 tratamentos (controle, altura 1 = 1 m de queda

livre e, altura 2 = 2 m de queda livre) e, 9 tempos de avaliação (aos 0, 3, 6, 9 e 12, 15, 18, 21 e 24 dias de armazenamento). Os resultados das análises de variância e a interação entre os fatores 'altura' e 'período' de armazenamento' foram submetidos à análise de regressão.

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO

Caracterização dos Frutos:

A caracterização inicial de laranjas 'Pêra' e tangerinas 'Cravo' colhidas no estágio de maturação comercial, classificado na categoria II (C2) é apresentada na tabela 1. Nos resultados obtidos, para a avaliação de firmeza dos frutos analisados, a maior firmeza foi para a laranja 'Pêra' com 64,78 N. A firmeza do fruto é determinada pela força de coesão entre as pectinas. Com a evolução do amadurecimento ocorre atuação de enzimas pectinolíticas, que transforma a pectina insolúvel em solúveis e promovem o amolecimento dos frutos.

Tabela 1. Caracterização inicial de laranjas 'Pêra' e tangerinas 'Cravo' colhidas no estágio de coloração classificado como C2, de acordo com o Programa Brasileiro para Modernização da Horticultura (Remígio – PB, 2018).

Avaliações	CARACTERIZAÇÃO	
	Laranja 'Pêra'	Tangerina 'Cravo'
Firmeza (N)	64,75 ± 0,89	40,20 ± 2,24
AA	82,69 ± 6,30	46,15 ± 1,92
AT	0,16 ± 0,01	0,78 ± 0,01
SS	8,33 ± 0,32	9,70 ± 0,20
AST	15,66 ± 0,33	18,97 ± 0,83

N = Newton; AA = ácido ascórbico (mg.100mL⁻¹); SS = sólidos solúveis (%); AT = acidez titulável (g.ác.cítrico.100mL⁻¹); Açúcares solúveis totais (g.100mL⁻¹). (*) Médias de 3 repetições de 2 frutos ± desvio padrão (DP).

Para a quantidade de vitamina C (ácido ascórbico), as laranjas 'Pêra' apresentaram maior média com 82,69 mg/100g de suco, enquanto que os teores para as tangerinas 'Cravo' foi de 46,15 mg/100g de suco.

Já para os teores de acidez, as laranjas 'Pêra' e tangerinas 'Cravo' analisadas obtiveram de 0,16 e 0,78%, respectivamente. Durante o processo de amadurecimento, os ácidos nas frutas de citros são degradados, o teor de açúcar aumenta e a relação açúcar/ácidos atinge um maior valor.

As laranjas 'Pêra' e tangerinas 'Cravo' apresentaram teores de SS na faixa de 8,33% e 9,70%, respectivamente. O teor de sólidos solúveis é usado como indicador de maturidade e também determina a qualidade da fruta. Coelho e Nascimento (2004) avaliando laranja 'Pêra' obtiveram valores na faixa de 8,9 a 9,5 %, no entanto os valores encontrados foram inferiores. Segundo Figueiredo (1991), o teor de sólidos solúveis para as tangerinas cv. Ponkan gira em torno de 10,8%, valor mais alto aos encontrados no presente trabalho.

Os teores de açúcares solúveis totais para as laranjas 'Pêra' e tangerinas 'Cravo' analisadas foram de 15,66 e 18,97%, respectivamente. De acordo com Chitarra e Chitarra (2005), o teor de açúcares aumenta com o amadurecimento de frutos, em geral, através de processos de biossíntese ou através de degradação de polissacarídeos, e as variações que muitas vezes ocorrem dentro de uma mesma espécie são decorrentes de vários fatores como cultivares, tipo de solo, condições climáticas e tratamentos culturais, embora os frutos cítricos apresentem poucas modificações nesta variável após atingida a sua maturidade fisiológica.

Avaliações Físicas:

Perda de Massa - Ficou evidente que as perdas aumentaram linearmente durante o armazenamento devido à transpiração dos frutos, seja para as laranjas 'Pêra' como também para as tangerinas 'Cravo'. Considerando que, a perda de massa fresca pelos frutos, quando superior a 10%, inviabiliza ou prejudica sua comercialização *in natura* (AGOSTINE et al., 2014), as laranjas 'Pêra' em todos os tratamentos atingiram esse percentual no décimo segundo dia de armazenamento (Figura 1 A). Enquanto que, tangerinas 'Cravo' para os tratamentos da altura 1 m e 2 m, atingiram no nono dia de armazenamento, e o tratamento controle após o nono dia de armazenamento (Figura 6 B). Pode-se observar que, a maior perda de massa nas laranjas 'Pêra' foi para o tratamento controle com 18,60 % ao final do armazenamento. Já

para as tangerinas ‘Cravo’, foi nos frutos que sofreram impacto na altura 1m, com 22,35%, e obtiveram maior perda de massa que os demais tratamentos.

Figura 1. Perda de massa em laranjas ‘Pêra’ (A) e tangerinas ‘Cravo’ (B) colhidas no estágio de coloração classificado como C2, de acordo com o PBMH, submetidas a dano por impacto em queda livre (altura 1 = 1 m, altura 2 = 2m) e, armazenadas sob condições ambientes ($23 \pm 2^\circ\text{C}$, com $83 \pm 2\%$ UR).

Firmeza - A firmeza dos frutos para laranjas ‘Pêra’ (Figura 2 A) no tratamento controle e submetidos à altura 1 e 2 aumentaram ao longo do armazenamento, sendo os frutos controle obtendo maior firmeza. Uma explicação para o aumento da firmeza nas laranjas ‘Pêra’ pode estar na compartimentalização do mesocarpo desses frutos associado à desidratação, tornando-os rígidos ao longo do armazenamento e, diferentemente das laranjas, as tangerinas são frutos de casca solta.

Figura 2. Firmeza em laranjas ‘Pêra’ (A) e tangerinas ‘Cravo’ (B) colhidas no estágio de coloração classificado como C2, de acordo com o PBMH, submetidas a dano por impacto em queda livre (altura 1 = 1 m, altura 2 = 2m) e, armazenadas sob condições ambientes ($23 \pm 2^\circ\text{C}$, com $83 \pm 2\%$ UR).

Segundo Queiroz-Voltan e Blumer (2005), o tecido do mesocarpo se prolonga para dentro do fruto, formando tabiques ou septos que separam os carpelos ou gomos da laranja e que se unem no centro da laranja com o eixo vertical que parte do pedúnculo. Os tabiques na laranja são delgados e finos, em algumas tangerinas chegam quase a desaparecer por completo e deixam os carpelos facilmente separados, sendo, na toranja e no pomelo, mais grossos e permanentes. Os frutos que sofreram impactos na altura 2 tenderam a aumentar ao longo do período do armazenamento sendo maior evidenciado entre os de 21 e 24 dias de armazenamento. Já as tangerinas ‘Cravo’ (Figura 2 B) tiveram a firmeza diminuída até o terceiro dia de armazenamento sendo que, os frutos submetidos à queda livre tiveram menor firmeza ao longo do período do armazenamento.

Avaliações Físico-Químicas:

Sólidos solúveis (SS) - As laranjas ‘Pêra’ aumentaram os teores de SS até o decimo oitavo dia, logo após mantiveram os conteúdos, sendo menores durante todo o período de armazenamento nos frutos que sofreram impactos (Figura 3 A). As tangerinas ‘Cravo’ acumularam os teores de SS durante todo o período de armazenamento, no entanto, os teores de SS foram inferiores ao tratamento controle até o décimo

oitavo dia, se igualando ao final do armazenamento (Figura 3 B). A diminuição dos impactos antes da chegada à indústria pode preservar o conteúdo de sólidos solúveis em laranjas (MIRANDA et al., 2015).

Figura 3. Sólidos solúveis (SS) em laranjas 'Pêra' (A) e tangerinas 'Cravo' (B) colhidas no estágio de coloração classificado como C2, de acordo com o PBMH, submetidas a dano por impacto em queda livre (altura 1 = 1 m, altura 2 = 2 m) e, armazenadas sob condições ambientes ($23 \pm 2^\circ\text{C}$, com $83 \pm 2\%$ UR).

Acidez Titulável (AT) - A acidez titulável diminuiu ao longo do armazenamento para as laranjas 'Pêra' (Figura 4 A), sendo os teores de AT maior nos frutos tratados com impacto na altura 2 ao longo do período de armazenamento. Já as laranjas 'Cravo' (Figura 4 B) tratadas com queda livre em ambas as alturas tiveram valores de AT menores que o tratamento controle durante o período armazenamento.

Figura 4. Ácidez titulável (AT) em laranjas 'Pêra' (A) e tangerinas 'Cravo' (B) colhidas no estágio de coloração classificado como C2, de acordo com o PBMH, submetidas a dano por impacto em queda livre (altura 1 = 1 m, altura 2 = 2 m) e, armazenadas sob condições ambientes ($23 \pm 2^\circ\text{C}$, com $83 \pm 2\%$ UR).

Ácido Ascórbico (AA) - As laranjas 'Pêra' tratadas em ambos os tratamentos com impacto tiveram diminuição no conteúdo de ácido ascórbico ao longo do armazenamento. Os teores de AA para os frutos em ambos os tratamentos por impacto foram inferiores ao tratamento de controle exceto, no décimo quinto dia para os frutos tratados com impacto na altura 1 para as laranjas 'Pêra' (Figura 5 A). Já as tangerinas 'Cravo', o teores de AA apresentaram um comportamento errático oscilando entre os tratamentos (Figura 5 B). Apesar da falta de constância, as tangerinas do tratamento controle apresentaram conteúdos de AA superiores aos demais tratamentos no décimo oitavo dia de armazenamento, com $63,29 \text{ mg.100mL}^{-1}$ em maiores perdas de AA. Embora os citros sejam frutos não climatéricos, ou seja, de baixa atividade metabólica após colhidos, o dano por impacto gera *stress* aos frutos resultando na aceleração da taxa metabólica mesmo que baixa, aumentando consequentemente, o consumo de O_2 e acelerando as reações oxidativas.

Figura 5. Ácido ascórbico (AA) em laranjas 'Pêra' (A) e tangerinas 'Cravo' (B) colhidas no estágio de coloração classificado como C2, de acordo com o PBMH, submetidas a dano por impacto em queda livre (altura 1 = 1 m, altura 2 = 2m) e, armazenadas sob condições ambientes ($23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$, com $83 \pm 2\%$ UR).

4.CONCLUSÕES

O dano por impacto reduziu significativamente os teores de sólidos solúveis, acidez titulável e ácido ascórbico, refletindo seu maior efeito estressante nas laranjas 'Pêra' e tangerinas 'Cravo', o que diminui o tempo de armazenamento.

Alternativas para evitar impactos por queda devem ser encorajadas visando manter a qualidade dos frutos cítricos e aumentar sua conservação.

É de suma importância à continuidade desse estudo através de outros métodos de avaliação de perda de qualidade pós-colheita, a exemplos, danos mecânicos por compressão e corte, das espécies cítricas estudadas e outras, visando uma melhor avaliação da perda de qualidade dos citros estudados gerando uma contribuição socioeconômica.

REFERÊNCIAS

- [1] Agostini, J. S.; Scaloni, S. P. Q.; Lescano, C. H.; Silva, K. E.; Garcete, G. J. Conservação pós-colheita de laranjas Champagne (*Citrus reticulata* × *Citrus sinensis*). Brazilian Journal of Food Technology, Campinas, v. 17, n. 2, p. 177-184, jun. 2014.
- [2] Aocs. Official methods and recommended practices of the American Oil Chemists' Society. Champaign: American Oil Chemists' Society, 2004.
- [3] Chitarra, M. I. F.; Chitarra, A. B. Pós-colheita de frutos e hortaliças: fisiologia e manuseio. 2. ed. rev. e ampl. Lavras: Ufla, 2005.
- [4] Coelho Y. S.; Nascimento, H. G. Citricultura no amazonas: problemas, potencial produtivo e qualidade dos frutos. Citrus em foco, n. 26. Manaus: Embrapa. 2004.
- [5] Figueiredo, J. O. Variedades-copa de valor comercial. In: Rodriguez, O.; Viegas, F.; Pompeu Júnior, J.; Amaro, A.A. (Ed.). Citricultura Brasileira. Campinas: Fundação Cargill, 1991. v.1, p.228-264.
- [6] IAL. Instituto Adolfo Lutz. Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz. Métodos físico-químicos para análises de alimentos. 4ª ed. (1ª Edição digital), 2008. 1020 p.
- [7] Ibge. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Levantamento Sistemático da Produção Agrícola. Disponível em: <<https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1618#resultado>> Acesso em: 08 de julh. 2018.
- [8] Lopes, J. M. S.; Déo, T. F. G.; Andrade, B. J. M.; Giroto, M.; Felipe, A. L. S.; Junior, C. E. I.; Bueno, C. E. M. S.; Silva, T. F.; Lima, F. C. C. Importância econômica do citros no Brasil. Revista Científica de Agronomia, Garça-SP, v. 2, n. 2, p. 1-4, n. 20, 2011.
- [9] Magalhães, A. D.; Ferreira, M. D.; Braunbeck, O. A.; Estevom, M. V. R. Superfícies protetoras na diminuição de danos mecânicos em tomate de mesa. Ciência Rural, v.37, n.3, p.878-881, 2007.
- [10] Miranda, M.; Spricigo, P. C.; Ferreira, M. D.. Mechanical damage during harvest and loading affect orange postharvest quality. Engenharia Agrícola, Jaboticabal, v. 35, n. 1, p. 154-162, Feb. 2015.
- [11] Queiroz-Voltan, R. B. & Blumer, S. Morfologia dos citros. In: Mattos Júnior, D.; De Negri, J.D.; Pio, R.M.; Pompeu Júnior, J. Citros. Campinas: Instituto Agrônomo e Fundag, 2005, p. 105-123.
- [12] Santos, M. Z.; Neitzke, D. F.; Favarão, S. C. M. Injúrias mecânicas na qualidade pós-colheita de laranja 'rosa' armazenada sob condição ambiente. Revista Ciências Exatas e da Terra e Ciências Agrárias, v. 9, n. 1, p. 37-44, jul, 2014.

Capítulo 5

Influência da radiação solar modificada por túneis baixos de sombrite no cultivo da alface (Lactuca Sativa L.)

Neiva Sales Rodrigues

Maria Aparecida da Silva Alves

Jakson Bofinger

Renata Freitag

Resumo: Este capítulo tem como objetivo avaliar a influência do efeito da radiação solar no cultivo da alface (*Lactuca sativa* L.) em túneis baixos de sombreamento. O experimento foi realizado no Campus Experimental do Centro Universitário de Várzea Grande-Univag. Foram plantadas sementes de alface (*Lactuca sativa* L.), cultivar Tall Top Early Wonder, em uma cobertura de sombrite e preenchidos com terra preta, foram utilizadas 2 bandejas de poliestireno, cada uma delas contém 240 células e utilizando-se de 3 a 5 sementes por célula. Foi utilizado o delineamento experimental de blocos casualizados com dois tratamentos e duas repetições. Como conclusão, o uso de sombrite, para redução da incidência solar direta, não teve grandes variações nas médias das características analisadas pelo método utilizado, logo, o uso de sombreamento não proporcionou melhor desempenho produtivo nas alfaces.

1. INTRODUÇÃO

A alface (*Lactuca sativa* L.) é uma das mais importantes espécies olerícolas produzidas, tanto em volume de produção quanto em renda financeira, estando entre as cinco primeiras nesses quesitos (ABCSEM, 2014). Essa importância reflete diretamente na demanda por sementes. No ano de 2012, a alface ocupou a quinta posição em volume de sementes comercializadas no Brasil (ABCSEM, 2014), sendo a folhosa mais cultivada em sistema convencional e orgânico.

Segundo Scherer et al., 2016, a hortaliça pode ser cultivada durante todo o ano, sendo que, em canteiros de terra, estas plantas ficam em contato direto com o solo durante seu período de desenvolvimento. Do ponto de vista nutricional, possui elevado teor de vitamina A em suas folhas, sendo rica em sais de Ca e Fe, apresentando baixo valor calórico e baixo custo de produção. É uma planta de tamanho herbáceo, pertencente à família Asteraceae, tendo seu consumo preferencialmente in natura, na forma de salada verde (STAGNARI et al., 2015).

Como grande parte da produção de sementes de alface no país é realizada a pleno sol, o local de produção é dependente de clima, exigindo uma estação seca bem definida, que deve coincidir com a colheita. Essa característica pode ser um problema para agricultura familiar, pois distancia a produção de sementes dos campos de produção da hortaliça. Uma alternativa para locais onde o clima é considerado desfavorável pode ser o cultivo protegido em casas de vegetação, onde o agricultor possui maior controle dessas condições, proporcionando sementes de melhor qualidade.

Tudo isso faz da alface uma das hortaliças mais comercializadas e consumidas no país (HOLVOET et al., 2014). Nesse sentido, o consumo de hortaliças em geral é crescente no Brasil, exigindo cada vez mais um sistema de cultivo otimizado para atender a essas necessidades dos consumidores.

A cultura da alface é sensível a altas temperaturas e radiação solar. A intensidade de luz afeta o crescimento e desenvolvimento das plantas, quando estas estão conduzidas dentro da variação ótima de luminosidade com outros fatores favoráveis, a fotossíntese é elevada, a respiração para o crescimento e desenvolvimento da planta é alta. Nessas condições, considerando um manejo adequado de um dado cultivo, os rendimentos comerciais tendem a ser elevados. O uso de telas de sombreamento e de cultivares adequadas às condições de temperatura e luminosidade elevadas no desenvolvimento da alface pode contribuir para diminuir os efeitos extremos da radiação, promovendo uma planta vigorosa e de boa qualidade (RAMOS, 1995).

O presente trabalho objetivou avaliar a influência do efeito da radiação solar no cultivo da alface (*Lactuca sativa* L.) em túneis baixos de sombreamento.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Uma das principais etapas do sistema produtivo de hortaliças é a produção de mudas de qualidade, pois delas depende o desempenho final das plantas nas hortas, tanto do ponto de vista nutricional, quanto do tempo necessário à produção e, conseqüentemente, do número de ciclos produtivos possíveis por ano (FREITAS et al., 2013). Uma das opções para auxiliar o processo produtivo, favorecendo a regularidade e continuidade do fornecimento do produto no mercado, é a produção de mudas em bandejas (BEZERRA, 2003), potencializando o uso da mesma área e reduzindo o ciclo da cultura no campo (GOMES et al., 2008).

Dessa forma, a produção das mudas em bandejas é apontada com maior eficiência sob diversos aspectos, como: maior economia de substrato e de espaço dentro da estufa, menor custo para o controle de pragas e patógenos (controle fitossanitário) (GOMES et al., 2008), na produção de mudas de alta qualidade, alto índice de sobrevivência após o transplante, aumenta o rendimento operacional, reduz a quantidade de sementes e permite a colheita mais precoce (BORNE, 1999; FILGUEIRA, 2000).

Apesar deste sistema de produção de mudas ter várias vantagens, alguns problemas ocorrem em relação às condições de controle como umidade do ar, vento, temperatura e radiação solar. Estes são fatores relevantes que afetam diretamente a porcentagem de germinação e o desenvolvimento das plantas, definindo a quantidade e qualidade final do material produzido. Para auxiliar na resolução desses problemas, uma alternativa é o cultivo protegido, controlando fatores climáticos e atuando na formação do solo, principalmente por meio da ação da temperatura e das precipitações pluviométricas (RAIJ, 1991).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

O experimento foi realizado no Campus Experimental do Centro Universitário de Várzea Grande-Univag. O clima da região é classificado como Aw de Köppen-Geiger com dois períodos bem definidos, seco (abril a setembro) e chuvoso (outubro a março). Apresenta pluviometria média anual de 1350 mm, temperatura média anual de 26°C e umidade relativa média anual de 74% (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, 2016). A pesquisa foi desenvolvida no período seco, nos meses de maio e junho.

Foram plantadas sementes de alface (*Lactuca sativa* L.), cultivar Tall Top Early Wonder, em uma cobertura de sombrite e preenchidos com terra preta, foram utilizadas 2 bandejas de poliestireno, cada uma delas contém 240 células e utilizando-se de 3 a 5 sementes por célula. Foi utilizado o delineamento experimental de blocos casualizados com dois tratamentos e duas repetições.

O desbaste foi realizado aos 15 dias após a semeadura (DAS), nos primeiros sinais de pares de folhas definitivas, mantendo assim, somente a planta mais vigorosa. As quatro bandejas foram dispostas sobre suportes de ferro a uma altura de 0,5 m, duas sem e duas com telado sombreado a 50% (modelo, com efeito ‘capela’). A irrigação ocorreu de acordo com as necessidades das condições climáticas, sendo o sombrite retirado apenas para as realizações dos tratos culturais (capinas e adubações).

Após 20 dias do plantio nas bandejas, todas as mudas foram transplantadas no solo em canteiros de 2 x 3,5 metros (7 m²), com espaçamento de 0,25 metros entre os indivíduos, totalizando 7 plantas por linha. Para as plantas com redução de luminosidade, foi mantido o sombreamento a 50% sobre suportes de ferro a uma altura de 0,5 m, proporcionando às mudas proteção parcial contra a radiação solar direta durante todo o desenvolvimento, exceto nos momentos dos tratos culturais (capinas, controle fitossanitário e adubações complementares). Já as demais plantas, permaneceram sob os efeitos das condições climáticas naturais, ou seja, expostas à radiação solar direta.

Foram coletados os dados da raiz, caule e folhas aos 50 DAS em 20 plantas submetidas e não submetidas ao sombreamento. Os indivíduos que não se desenvolveram adequadamente e os situados nas bordaduras do experimento foram excluídos, evitando assim o efeito de borda. Foi aferido o comprimento das folhas, das raízes, e do caule com fita métrica, este último, após a retirada de todas as folhas e raízes.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foi constatado que o percentual de sobrevivência para as mudas de alface submetidas a redução de luminosidade foi de 58,5%, enquanto que para as mudas expostas à radiação solar direta foi de 72,5%. O crescimento das alfaces cultivadas normalmente, sem sombreamento, obteve um resultado médio maior em todas as partes mensuradas, raiz (4,7 cm), caule (0,5 cm) e folha (1,02 cm). Contudo, as plantas de alfaces cultivadas com sombreamento de 50%, somente a raiz teve um crescimento considerável (4,35 cm), já o caule (0,37 cm) e a folha (0,87 cm) tiveram um crescimento abaixo dos valores obtidos com as das alfaces que foram cultivados fora do sombrite. Resultados semelhantes também foram encontrados por Ricardo et al. (2014), onde verificaram que o cultivo de alfaces em campo aberto proporcionou maior produtividade de matéria fresca de alface ante o cultivo protegido por telas de sombreamento. Vale destacar que, apesar do efeito modificador das telas na quantidade da radiação solar incidente, não houve diferenças no desenvolvimento das plantas. Porém, Sales et al. (2014), constataram efeito direto sobre a produção de folhas nas plantas de alface quando submetidas a redução incidência solar.

O crescimento das alfaces cultivadas fora da cobertura por sombrite obteve um resultado mais considerável em relação ao outro. A raiz, caule e folha tiveram um crescimento um pouco acima (Figura 01) dos valores obtidos com as das alfaces que foram cultivados sob sombrite (Figura 02).

Figura 01: Características avaliadas, sem uso do sombrite.

Figura 02: Características avaliadas com uso do sombrite.

Apesar dos resultados diferenciados, os dados comparativos não foram significativos.

Figura 03 Resultado comparativo dos dados.

5.CONCLUSÃO

O uso de sombrite, para redução da incidência solar direta, não teve grandes variações nas médias das características analisadas pelo método utilizado, logo, o uso de sombreamento não proporcionou melhor desempenho produtivo nas alfaves.

REFERÊNCIAS

- [1] Associação Brasileira de Comércio de Sementes e Mudas. 2º Levantamento de dados socioeconômicos da cadeia produtiva de hortaliças no Brasil: ano base 2012. Holambra, 2014.
- [2] Bezerra, Fred Carvalho. Produção de mudas de hortaliças em ambiente protegido. Fortaleza, CE, Embrapa Agroindústria Tropical. Documentos nº 72. 2003.
- [3] Borne, H.R. Produção de mudas de hortaliças. Guaíba: Agropecuária, 1999. 189 p.
- [4] Freitas, Gilson Araújo de; Silva, Rubens Ribeiro da; Barros, Hélio Bandeira; Vazde-Melo, Aurélio; Abrahão, Walter Antônio Pereira. Produção de mudas de alface em função de diferentes combinações de substratos. Revista Ciência Agronômica, Fortaleza, CE. v. 44, n. 1, p. 159-166, jan-mar, 2013.
- [5] Filgueira, F.A.R. Novo manual de olericultura: agrotecnologia moderna na produção e comercialização de hortaliças. Viçosa: UFV, 2000. 402 p.
- [6] Gomes, Luiz Antônio Augusto; Rodrigues, Artenisa; Collier, Leonardo; Feitosa, Selma. Produção de mudas de alface em substrato alternativo com adubação. Horticultura Brasileira, v. 26, n 3, p. 359-363. 2008.
- [7] Holvoet, K.; Sampers, I.; Seynnaeve, M.; Jaxsens, L.; Uyttendaele, M. Agricultural and management practices and bacterial contamination in greenhouse versus open field lettuce production. International Journal of Environmental Research and Public Health, v. 12, n. 1, p. 32-63, 2014. <http://dx.doi.org/10.3390/ijerph12010032>.
- [8] Monteiro, Gean Charles; CARON, Braulio Otomar; Basso, Claudir José; Eloy, elder; Elli, Elvis Felipe. Avaliação de substratos alternativos para produção de mudas de alface. Centro Científico Conhecer, Goiânia, v. 8, n. 14, p.140-148, jun. 2012.
- [9] Raij, B. V. Fertilidade do Solo e Adubação. Instituto Agronômico de Campinas. Editora Agronômica Ceres. São Paulo. 1991.
- [10] Ramos, J.E.L. Sombreamento e tipos de recipientes na formação de mudas e produção em alface. 1995. 53 f. (Tese mestrado) - Esam, Mossoró.
- [11] Silva, Elisângela Aparecida da; Mendonça, Vander; Tosta, Mauro da Silva; Oliveira, Alessandra Conceição de; REIS, Luis Lessi dos; Bardivieso, Diógenes Martins. Germinação da semente e produção de mudas de cultivares de alface em diferentes substratos. Semina Ciências Agrárias, Londrina, v. 29, n. 2, p. 245-254. 2008.
- [12] Scherer, K., Granada, C. E., Stülp, S., & Sperotto, R. A. Avaliação bacteriológica e físico-química de águas de irrigação, solo e alface (*Lactuca sativa* L.). Revista Ambiente & Água, v. 11, n. 3, p. 665-675, 2016.
- [13] Stagnari, F., Galiene, A., And Pisante, M. Shading and nitrogen management affect quality, safety and yield of greenhouse-grown leaf lettuce. Scientia Horticulturae, v.192, n.3, p.70-79, 2015.

Capítulo 6

Propriedades químicas e físicas de misturas com adjuvantes

Dionatan Frescura Nunes

Filipe Andres Dalenogare

Gabriel Naresi Roos

Cristiano Santos Bonato

Leonardo A. Gollo

Marcelo Gripa Madalosso

Resumo: O objetivo foi avaliar as interações químicas e físicas entre os diferentes adjuvantes nas misturas no tanque e o potencial de entupimento. As misturas foram preparadas em garrafas PET, para a vazão de 60 e 100 litros/há. As misturas foram realizadas com diferentes adjuvantes, adicionados aos fungicidas. Foram avaliadas a formação de espuma, pH, CE, entupimento e massa da gota. Os tratamentos TA®, IOP Full e SprayBio+ não apresentaram diferenças de pH quando adicionado à calda em nenhuma das vazões/há estudadas, já o GoodSpray reduziu significativamente. Porém, o menor valor foi do LI700. As variações de CE e formação de espuma, foram particulares a cada um dos tratamentos. Com relação a massa de gotas para as duas vazões, o LI700 foi o que apresentou a maior valor, já o IOP Ful, o menor. Assim, as vazões de 60L/há apresentaram menores entupimentos que os 100L/há, mostrando que há necessidade de doses maiores para maiores vazões. Os adjuvantes TA®, GoodSpray® e SprayBio® apresentaram os comportamentos mais estáveis, ficando esses últimos como os menores valores de entupimento.

Palavras-chave: adjuvante, vazão, espuma, pH, condutividade elétrica, entupimento e massa da gota.

1 INTRODUÇÃO

Atualmente, o mercado conta com um grande número de soluções, produtos e serviços, para garantir que, o número mínimo de gotas possam chegar ao seu alvo. O objetivo é garantir a qualidade de aplicação, reduzindo ao máximo as perdas, assim aumentando a eficiência do manejo fitossanitário e maior sanidade vegetal.

Segundo Kissmann (1998) qualquer substância ou composto sem propriedades fitossanitárias, exceto a água, que é acrescentado numa preparação da calda de algum defensivo agrícola, para facilitar a aplicação, aumentar a eficácia ou diminuir riscos, é classificada como um adjuvante.

De acordo com Hess; Foy, 2000; Van Zil et al., 2010; Xu et al., 2010, os adjuvantes possuem uma maneira de atuar entre os mesmos e podem promover alteração nas propriedades físico-químicas das caldas. Dentre os efeitos, destacam-se a redução da tensão superficial das gotas pulverizadas, aumentando sua superfície de contato com o alvo biológico e melhorando sua cobertura, uniformidade, entre outros.

Assim, o objetivo foi avaliar as interações químicas e físicas entre os diferentes adjuvantes nas misturas no tanque e o potencial de entupimento.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Os experimentos foram realizados nos laboratórios de fitopatologia e de química da URI Campus Santiago/RS. As misturas foram preparadas em garrafas PET, dosando os produtos em 1 litro de água na relação equivalente para hectare. Todos os tratamentos citados a seguir, foram preparados para a vazão de 60 e 100 litros/ha. As soluções foram preparadas e agitadas manualmente em 10 inversões completas das garrafas. Os ensaios de pH e Condutividade Elétrica (CE) foram realizados, preparando as soluções e mensurando com um medidor portátil Simokit modelo 986. As misturas foram realizadas com diferentes adjuvantes, adicionados aos fungicidas Aproach Prima® [Ciproconazol + Picoxistrobina] (300ml/ha) + Unizeb Gold® [mancozebe] (1,5 Kg/ha). Os adjuvantes foram GoodSpray® (Aller Biw®+Desadere®), TA35®, IOP Full®, Spraybio+®, LI700®, além de um tratamento sem adjuvante à mistura com os fungicidas. Após a agitação, foi utilizado um Paquímetro Universal 150mm em Aço Carbono - KINGTOOLS-500150, para medir a formação de espuma em todos os tratamentos aos zero minutos e um minuto. A avaliação de entupimento foi realizada com uma seringa de 1ml e uma agulha de 8 x 0,3mm. A seringa foi completada com a solução de cada tratamento e era esvaziada até o momento em que o entupimento obstruía a saída da mistura. A avaliação da massa de uma gota foi realizada em Balança Analítica Shimadzu ATX 224. A gota era formada na extremidade da agulha da mesma seringa citada acima e solta em um suporte de arame na forma de gancho, possibilitando a retenção de uma gota. A análise estatística dos dados foi realizada através do software SASM-Agri (V.8,2). As comparações múltiplas entre as médias foram realizadas pelo teste de agrupamento Scott & Knott com nível de 5% de probabilidade.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A medição do pH somente em água apresentou o pH de 6,64, próximo a neutralidade (Figura 1). Quando foi preparada a calda com os adjuvantes e os fungicidas, houve alterações em grande parte dos tratamentos. Os tratamentos TA®, IOP Full e SprayBio+ não apresentaram diferenças de pH quando adicionado à calda em nenhuma das vazões/há estudadas. Já o GoodSpray reduziu significativamente, ficando abaixo desses acima, com 5,48 e 5,24, respectivamente para cada vazão. O tratamento com menor pH de todos foi encontrado com a adição de LI700, ficando abaixo de 5, estatisticamente menor de todos, nas duas vazões. Essa queda no pH é provocada pela ação do ácido propiônico, base da constituição do LI700. Quando não foi usado adjuvante, somente água e os fungicidas, o pH se manteve alto, próximo ao valor da água isolada para os 60L/ha. Já quando foi trabalhado com 100L/há, o pH reduziu. A avaliação de pH é um parâmetro importante para as misturas em tanque para fungicidas, pois podem causar dissociações e/ou hidrólise, resultando em queda de eficácia e/ou fitotoxidade (Madalosso et al. 2013). Segundo Grigolli et al. Os fungicidas precisam de um pH em calda entre 5,0, 6,0 e 7,0 para se obter uma maior eficácia no tratamento de doenças. De acordo com Gheller, pH<3,5 corre risco de dissociação iônica e precipitação do produto com redução na solubilidade, aumentando os riscos de fitotoxidade; já pH>7 podem sofrer hidrólise alcalina com degradação do ingrediente ativo, afetando a meia vida do produto.

Em relação à Condutividade Elétrica (CE), a análise da água mostrou 0,03 ppm, indicando a baixa disponibilidade de íons capaz de conduzir eletricidade (Figura 1). Para a CE na vazão de 60L/ha, os tratamentos T2, T4 e T6 (sem adjuvante) não obtiveram diferença estatística. Já os tratamentos T1 e T3

obtiveram resultados abaixo dos citados acima, e o tratamento T5 (LI700®) obteve valor de CE significativamente abaixo de todos. Em relação à condutividade elétrica com a vazão de 100L/ha, os tratamentos T2, T3, T4 e T6 (sem adjuvante), não obtiveram diferença estatística. O tratamento T1 obteve valor dos citados acima e o tratamento T5 obteve valor bem abaixo dos demais. Segundo (Carlson; Burnside, 1984), a condutividade elétrica, além de poder influenciar na eficácia biológica de alguns produtos também é uma importante característica na pulverização eletrostática.

Em relação a espuma, apenas o tratamento T3 na vazão de 100L/ha teve valores significativos, 0,7 cm logo após a agitação e 0,5 cm após um minuto o término da agitação. Todos os demais tratamentos não apresentaram formação de espuma.

Figura 1 – Parâmetros químicos e físicos dos adjuvantes adicionados aos fungicidas na vazão de 60 e 100L/há.

		60 L/ha							
Adjuvantes + Aproach Prima® + Unizeb Gold®		pH		CE		Espuma (cm)			
						0"		1"	
1	GoodSpray® (Aller Biw® + Desadere®)	5,48	b	5,39	b	0	ns*	0	ns*
2	TA®	6,80	a	6,53	a	0		0	
3	IOP Full®	5,90	a	5,90	b	0		0	
4	SprayBio+®	6,00	a	6,30	a	0		0	
5	LI 700®	4,82	c	4,78	c	0		0	
6	s/	6,80	a	6,40	a	0		0	
	CV %	4,13		3,94					
		100 L/ha							
Adjuvantes + Aproach Prima® + Unizeb Gold®		pH		CE		Espuma (cm)			
						0"		1"	
1	GoodSpray® (Aller Biw® + Desadere®)	5,24	c	5,36	b	0	b	0	b
2	TA®	6,50	a	5,90	a	0	b	0	b
3	IOP Full®	6,66	a	5,87	a	0,7	a	0,5	a
4	SprayBio+®	6,13	a	6,08	a	0	b	0	b
5	LI 700®	4,78	d	4,81	c	0	b	0	b
6	s/	5,75	b	5,75	a	0	b	0	b
	CV %	4,59		3,76		28,57		30,26	
	Água	6,64		0,03					

Com relação a massa de gotas para as duas vazões, o T5 foi o que apresentou a maior massa de uma gota (Figura 2). Para essa vazão, o T3 apresentou a menor massa de todos os adjuvantes, fato que pode ter um potencial de deriva maior. A massa de gotas está diretamente relacionado ao seu tamanho. Segundo Salyani, 1999; Summer & Summer, 1999, afirmaram que gotas finas estão mais sujeitas à perda por deriva e evaporação, diminuindo a eficiência da pulverização e aumentando os riscos de contaminação ambiental.

Quando foi avaliado o entupimento, os tratamentos na vazão de 60L/há apresentou o menor índice de entupimento, fato que pode ter relação com a concentração dos adjuvantes, pois na menor vazão a calda fica mais concentrada. Ainda nessa vazão, o tratamento com maior entupimento foi o T5 e o T6. Os demais ficaram semelhantes, estatisticamente com os menores problemas de entupimento. Na vazão de 100L/há, apenas os tratamentos 1 e 4 apresentaram menores índices de entupimento, os demais estiveram estatisticamente abaixo.

Figura 2 – Massa de uma gota e entupimento das misturas adjuvantes adicionados nas vazões de 60 e 100L/há.

Adjuvantes + Aproach Prima® + Unizeb Gold®		60 L/ha			
		massa de 1 gota (g)		entupimento (ml)	
1	GoodSpray® (Aller Biw® + Desadere®)	0,0046	c	2,0	a
2	TA®	0,0047	c	3,0	a
3	IOP Full®	0,0038	d	3,0	a
4	SprayBio+®	0,0053	b	3,4	a
5	LI 700®	0,0056	a	1,0	b
6	s/	0,0053	b	1,2	b
	CV %	2,75		3,95	
Adjuvantes + Aproach Prima® + Unizeb Gold®		100 L/ha			
		massa de 1 gota (g)		entupimento (ml)	
1	GoodSpray® (Aller Biw® + Desadere®)	0,0052	c	2,4	a
2	TA®	0,0053	c	0,7	c
3	IOP Full®	0,0049	d	0,8	c
4	SprayBio+®	0,0063	b	2,3	a
5	LI 700®	0,0062	b	1,4	b
6	s/	0,0073	a	0,3	c
	CV %	13,53		10,11	
	Água	0,0079			

4 CONCLUSÃO

É necessário o estudo do comportamento dos adjuvantes para uma recomendação assertiva.

As vazões de 60L/há apresentaram menores entupimentos que os 100L/há, mostrando que há necessidade de doses maiores para maiores vazões. Os adjuvantes TA®, GoodSpray® e SprayBio® apresentaram os comportamentos mais estáveis, ficando esses últimos como os menores valores de entupimento.

REFERÊNCIAS

- [1] CARLSON, K. L.; BURNSIDE, O. C. Comparative phytotoxicity of glyphosate, SC-0224, SC-0545, and HOE-00661. Weed Science, v. 32, n. 6, p. 841-884, 1984.
- [2] CUNHA, A. R.; PAULO, J.; SOUZA, G. A.; SANTOS, M. R. Tensão superficial, potencial hidrogeniônico e condutividade elétrica de caldas de produtos fitossanitários e adjuvantes, Rev. Ciênc. Agron., v. 48, n. 2, p. 261, abr-jun, 2017.
- [3] GRIGOLLI, J.F.J.1; GRIGOLLI, M.M.K.1; GITTI, D.C.1; LOURENÇÃO, A.L.F.1; MELOTTO, A.M.1; BEZERRA, A.R.G. Eficácia de controle de ferrugem asiática da soja com diferentes fungicidas e diferentes pH de caldas.
- [4] KISSMANN, K. G Adjuvantes para caldas de produtos Fitossanitários.
- [5] GRIGOLLI, J.F.J.; GRIGOLLI, M.M.K.; GITTI, D.C.; LOURENÇÃO, A.L.F.; MELOTTO, A.M.1; BEZERRA, A.R.G.
- [6] MASKI, D.; DURAIRAJ, D. Effects of electrode voltage, liquid flow rate, and liquid properties on spray chargeability of an air-assisted electrostatic-induction spray charging system. Journal of Electrostatics, v. 68, n. 2, p. 152-158, 2010.
- [7] SALYANI, M. Optimization of sprayer output at different volume rates. St. Joseph: ASAE, 1999. 16 p. (ASAE, Paper No. 99-1028).
- [8] SUMNER, P.E.; SUMNER, S.A. Comparison of new drift reduction nozzles. St. Joseph: ASAE, 1999. 17 p. (ASAE Paper n.99-1156).

Capítulo 7

Precificação de sementários confeccionados com material reutilizado

Yasmim Braga Pacheco

Líbia Luíza Galvão Lima

Kaylen klyttssan Oliveira Gomes

Sandra Grutzmacher

Hudson do Vale de Oliveira

Resumo: A produção de sementários é uma atividade comumente utilizada em cursos das ciências agrárias, especialmente na agronomia e na engenharia florestal, com foco na conservação das sementes. Neste sentido, o objetivo da pesquisa foi analisar a precificação de sementários produzidos com material reutilizado. A pesquisa pode ser considerada aplicada (do ponto de vista da sua natureza) e quantitativa (no que se refere à sua abordagem). Para atingir os objetivos propostos, a pesquisa foi dividida em três etapas, a saber: coleta dos materiais necessários à elaboração dos sementários; produção dos sementários; e precificação dos sementários produzidos. A maioria dos respondentes da pesquisa é do gênero feminino (56%), tem até 20 anos de idade (27%), é solteira (53%), tem como grau de escolaridade o ensino médio completo (22%) e tem renda mensal de 2 a 3 salários mínimos (32%). Foi possível identificar, com a realização da pesquisa, contribuições nos aspectos ambiental e econômico. Este último, no sentido de ser uma possibilidade, ainda que em pequena escala, da geração de renda, por meio da comercialização/venda dos sementários confeccionados. Aquele, ressaltado devido à reutilização dos resíduos sólidos, com foco em garrafas de vidro, de diferentes tamanhos e formatos, matéria-prima para a confecção do sementário.

Palavras-chave: Geração de Renda; Sementários; Valor Agregado.

1. INTRODUÇÃO

Com o aumento da população ocorre, consequentemente, uma elevação da quantidade de resíduos orgânicos e inorgânicos por ela produzidos. Oliveira *et al.* (2010) destacam que a geração de resíduos sólidos tem se configurado como um dos principais problemas ambientais da sociedade, uma vez que os volumes insustentáveis daqueles causam danos ao meio ambiente e prejudicam a qualidade de vida das pessoas.

Os autores supracitados (2010) ressaltam ainda que essa situação tem exigido um novo repensar acerca das práticas tradicionais que estão relacionadas ao destino dos resíduos sólidos produzidos e/ou gerados.

Devido à grande quantidade de lixo, ações aparentemente simples como a reciclagem e a reutilização têm se configurado em atitudes cada vez mais importantes para a manutenção não só da saúde das pessoas, mas também do planeta.

Essas ações podem contribuir, de forma significativa, para a produção de diferentes materiais, sendo estes utilizados como material de decoração, como é o caso, por exemplo, dos sementários.

A produção de sementários é uma atividade comumente utilizada em cursos das ciências agrárias, especialmente na agronomia e na engenharia florestal, com foco na conservação das sementes.

Para além do aspecto da conservação, pela beleza que apresenta, pode também ser considerado um material/objeto decorativo, especialmente se este for confeccionado com uma adequada junção das cores, dos tamanhos e dos formatos que as sementes utilizadas no processo apresentam.

Ademais, se tais materiais tiverem aceitabilidade no mercado, ainda que em pequena escala, se pensarmos, por exemplo, em mercado local, considerando uma determinada comunidade, pode haver geração de renda e, quem sabe, se tornar um nicho de mercado promissor, especialmente considerando o empreendedorismo.

Nessa perspectiva, é importante identificar se as pessoas teriam interesse em adquirir o material produzido, bem como, em tendo interesse, quanto estariam dispostas a pagar pelo produto.

Assim, faz-se necessário abordarmos o termo precificação que, grosso modo, refere-se à determinação do preço, embora essa precificação possa ser estabelecida por meio de diferentes metodologias.

De acordo com Kotler e Armstrong (2007, p. 258) o preço pode ser definido da seguinte forma:

[...] quantia expressa em dinheiro que se cobra por um produto e/ou serviço, ou ainda de forma mais ampla, o preço é a soma de todos os valores que os consumidores trocam pelos benefícios de obter aquele determinado produto ou utilizar aquele serviço.

Neste sentido, o objetivo da pesquisa foi analisar a precificação de sementários produzidos com material reutilizado. Para tanto, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: a) identificar a aceitabilidade do material produzido; b) verificar quanto estariam dispostos a pagar pelo material produzido (sementário); e c) identificar as razões que levam ao estabelecimento do valor atribuído ao material produzido.

2. METODOLOGIA

A pesquisa pode ser considerada aplicada (do ponto de vista da sua natureza) e quantitativa (no que se refere à sua abordagem).

A natureza aplicada, conforme destacam Gerhardt e Silveira (2009), tem por objetivo gerar conhecimentos para a aplicação prática, ou seja, conhecimentos que sejam direcionados à solução de problemas específicos, pontuais.

O aspecto quantitativo, como o próprio nome sugere, retrata que os dados obtidos na pesquisa podem ser quantificados, centrando-se, portanto, na objetividade (FONSECA, 2002). Segundo Oliveira (2004, p. 19) “o método quantitativo é muito utilizado no desenvolvimento das pesquisas descritivas e também empregado no desenvolvimento das pesquisas de opinião”.

Para atingir os objetivos propostos, a pesquisa foi dividida em três etapas, sendo que as duas primeiras foram apenas complementares a etapa principal.

Na primeira etapa, foram coletados os materiais necessários para elaboração dos sementários que serviram de base para a realização da pesquisa de precificação, por meio da apresentação do produto em questão, de forma que as pessoas participantes da pesquisa tivessem acesso ao material produzido.

Nesta etapa, foram coletados os seguintes materiais: a) garrafas de vidro, transparentes, de diferentes tamanhos e formatos; b) sementes de diferentes espécies, cores, tamanhos e formatos; c) rolhas, utilizadas para finalização do processo de produção dos sementários.

Quando da coleta das garrafas de vidro transparentes é importante destacar que antes da utilização destes no processo de produção dos sementários era realizada a sua higienização e, posteriormente, o processo de secagem, uma vez que se permanecessem úmidos inviabilizariam a produção, especialmente em função do surgimento de fungos nas sementes utilizadas.

No que se refere às sementes, destaca-se como principal cuidado também o aspecto da umidade. Assim, as sementes, muitas vezes, eram, também, submetidas ao processo de secagem. Porém, nem todas as sementes necessitavam passar por este processo. Para aquelas sementes em que o processo de secagem era necessário, era importante estar atento para não deixá-las submetidas ao sol, por exemplo, por um longo período de tempo, de forma a evitar o ressecamento destas, pois, neste caso, elas perderiam o brilho necessário ao sementário. Porém, o foco era sempre manter as sementes secas para evitar o surgimento de fungos, o que muitas vezes ocorre quando o sementário já está produzido, se este aspecto não for levado em consideração. Na Figura 1, temos a representação de alguns materiais que são utilizados na produção dos sementários.

Figura 1: Materiais utilizados na Produção dos Sementários

A segunda etapa, de posse dos materiais necessários coletados, foi efetivamente a produção dos sementários, com garrafas de vidro de diferentes tamanhos e formatos, assim como com diferentes cores, formatos e tamanhos de sementes.

Na Figura 2, temos alguns sementários que foram produzidos com os materiais coletados na primeira etapa.

Figura 2: Sementários Produzidos

Fonte: Autores

Por fim, a etapa central consistiu na apresentação do produto para pessoas que passavam por locais estratégicos da cidade de Boa Vista, Roraima, para analisar a precificação dos sementários produzidos. Para tanto, utilizou-se como instrumento de coleta de dados um questionário, com perguntas abertas e fechadas.

O questionário foi dividido em dois segmentos, a saber: perfil dos respondentes (com perguntas relacionadas aos participantes da pesquisa como, por exemplo, grau de escolaridade) e questões específicas referentes aos sementários (teria interesse em adquirir o produto?, por exemplo).

Os dados coletados por meio da aplicação dos questionários foram tabulados e analisados considerando estatística descritiva e apresentados por meio de gráficos. A análise foi de caráter quantitativo, feita a partir das tabulações simples, por meio de planilhas eletrônicas no Excel, onde foi mostrado os valores percentuais relacionados às questões pontuadas no questionário aplicado.

3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA

A maioria dos respondentes da pesquisa é do gênero feminino (56%), tem até 20 anos de idade (27%), é solteira (53%%), tem como grau de escolaridade o ensino médio completo (22%) e tem renda mensal de 2 a 3 salários mínimos (32%).

Os resultados apresentados nos gráficos 1 e 2, respectivamente, buscaram identificar se os participantes da pesquisa tinham conhecimento acerca do que é sementário e se teriam interesse em adquirir o produto, elaborado com sementes e com material reutilizado, no caso as garrafas de vidro transparentes, conforme descrições apresentadas na metodologia.

Gráfico 1: Conhecimento sobre sementário

Fonte: Dados da pesquisa

No gráfico 1, observa-se que 60% dos respondentes não tinha conhecimento acerca do que é um sementário. Porém, apesar desse desconhecimento, observa-se, no gráfico 2, que 82% manifestaram interesse em adquirir o produto.

Gráfico 2: Interesse em adquirir o produto

Fonte: Dados da pesquisa

A partir desse percentual de respondentes que manifestaram interesse em adquirir o produto, foi possível determinar o percentual do valor, em real, que estes estariam dispostos a pagar pelo material produzido, conforme pode ser observado no gráfico 3.

É importante destacar que para definição do valor atribuído ao produto, foi apresentado aos respondentes o mesmo material produzido, de forma a padronizar o produto em análise, uma vez que diferentes materiais, por si só, já possibilitaria diferentes atribuições de valor.

Gráfico 3: Atribuição de valor ao material produzido (sementário)

Fonte: Dados da pesquisa

Verificou-se que as seis opções apresentadas aos respondentes, por meio do questionário, foram mencionadas. Assim, 35% informaram que estariam dispostos a pagar um valor acima de R\$ 9,00 reais, nesse caso, porém, sem especificação de valor. Os menores percentuais, 5% cada, foram atribuídos para o valor abaixo de R\$ 1,00 real e para a faixa de R\$ 2,00 a R\$ 3,00 reais.

Observa-se, portanto, que apesar da maioria dos respondentes não ter conhecimento acerca do que seria um sementário, eles estão dispostos a adquirir o produto e a pagar um valor relativamente alto pelo material produzido, valorizando, dessa forma, o trabalho realizado em função da produção deste.

No levantamento acerca dos valores atribuídos, pelos respondentes, ao material produzido foram justificadas as mais diferentes razões pela atribuição, desde “é um material bonito e interessante” até “é bacana por usar um material que é reutilizado”.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi possível identificar, com a realização da pesquisa, contribuições nos aspectos ambiental e econômico. Este último, no sentido de ser uma possibilidade, ainda que em pequena escala, da geração de renda, por meio da comercialização/venda dos sementários confeccionados. Aquele, ressaltado devido à reutilização dos resíduos sólidos, com foco em garrafas de vidro, de diferentes tamanhos e formatos, matéria-prima para a confecção do sementário.

REFERÊNCIAS

- [1] Fonseca, J. J. S. Metodologia da pesquisa científica. Fortaleza: UEC, 2002.
- [2] Gerhardt, T. E.; Silveira, D. T. Métodos de pesquisa. Universidade Aberta do Brasil – UAB/UFRGS; Curso de Graduação Tecnológica – Planejamento e Gestão para o Desenvolvimento Rural – SEAD/UFRGS. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009. 120 p.
- [3] Kotler, P.; Armstrong, G. Princípios de Marketing. 12ª Ed., São Paulo, Pearson Prentice Hall, 2007.
- [4] Oliveira, S. L. Tratado de metodologia científica: projetos de pesquisa, TGI, TCC, monografias, dissertações e teses. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004.
- [5] Oliveira, S. K. S. de; Vaz, F. A.; Silva, M. O. da; Andrade, A. R. de; Lima, S. N.; Farias, K. M. F. Caminhos percorridos na gestão de resíduos sólidos urbanos em Boa Vista/RR. Norte Científico, v. 5, n. 1, 2010.

Capítulo 8

Análise do potencial de secagem de grãos de soja e milho com ar ambiente em diferentes Municípios do Estado de Mato Grosso

Decio Mossini Junior

Fabício Schwanz da Silva

Rivanildo Dallacort

Alexandre Gonçalves Porto

Eduardo José Oenning-Soares

Resumo: A secagem com ar ambiente consiste em promover a retirada parcial de água do produto sem a utilização de uma fonte de calor para aquecer o ar. A perda de umidade só é possível devido os grãos serem higroscópicos, ou seja, tem a capacidade de perder ou ganhar água para o ambiente em que estão armazenados. Para realizar esse tipo de secagem é necessário conhecer o potencial de secagem do ar e as características climáticas da região. Com base em dados climáticos dos municípios de Diamantino, Rondonópolis, Sinop e Campo Verde, calculou-se a umidade de equilíbrio de grãos de soja e milho, em todos os decêndios do ano com características climáticas menos favoráveis para a secagem com ar ambiente. A umidade de equilíbrio calculada foi comparada com a de comercialização e armazenamento dos grãos para a identificação dos períodos com possibilidade de secagem com ar ambiente. A secagem de soja e milho até o grau de umidade máximo permitido para a comercialização, pode ser realizada nos municípios estudados; a secagem de soja até 12% de umidade é possível nos municípios de Diamantino e Rondonópolis; e a secagem de milho até 13% de umidade só é possível na segunda safra.

Palavras-chave: ar natural, umidade de equilíbrio, equilíbrio higroscópico

1. INTRODUÇÃO

A secagem possui a finalidade de reduzir o teor de umidade nos produtos agrícolas, a fim de diminuir a disponibilidade de água para o desenvolvimento de fungos e bactérias, evitando assim, o surgimento de grãos ardidos e micotoxinas. Além disso, minimiza o processo de respiração e reações bioquímicas do produto, uma vez que, tais fatores provocam perda de peso, geração de calor e degeneração (Silva 2005).

Em sementes, o elevado teor de água acelera o processo de deterioração, isso em função da alta atividade metabólica das mesmas. A semente então passa a consumir suas propriedades de reserva, liberando água e energia em forma de calor, propiciando condições para o desenvolvimento de microorganismos e insetos (Peske & Vilela 2003).

Segundo Garcia et al. (2004) a secagem de grãos ou sementes possibilita a antecipação da colheita, minimizando as perdas por contaminação do produto no campo e prolongando o período de armazenamento. Além disso, de acordo com Santos (2007), trata-se do método mais econômico para a manutenção da qualidade dos produtos agrícolas no período de armazenamento.

A secagem deve ser efetuada até níveis de umidade que garantam o armazenamento seguro do produto. Estudos feitos por Harrington (1972) mostram que o grau de umidade ideal para o armazenamento de sementes está entre 10% e 13%, e que a longevidade da semente diminui pela metade a cada 5°C de aumento em sua temperatura ou a cada 1% de aumento na umidade.

De acordo com Silva et al. (2008a) a principal condição para que haja secagem é que a pressão de vapor da água da semente seja maior que a pressão de vapor do ar de secagem. Em geral, todas as sementes possuem esta característica, conhecida como higroscopicidade, que lhes dá a capacidade de perder ou ganhar água para o ambiente em que se encontram, tendendo sempre a uma umidade de equilíbrio.

Uma das formas de secagem artificial é a secagem em camada estacionária ou leito fixo. Neste modelo de secagem, o ar é insuflado pelo sistema de ventilação, movendo-se da parte inferior da célula de secagem até a camada superior de sementes, ocorrendo desta forma uma transferência de calor e massa entre o ar e o produto. A secagem inicia-se na camada de sementes mais próxima ao fundo do secador (*plenum*), e após esta camada atingir o equilíbrio higroscópico, inicia-se a secagem da próxima camada, e assim sucessivamente até que a toda a camada de sementes esteja seca (Guimarães & Baudet 2002).

Para esse tipo de secagem tem-se como alternativa a utilização de ar ambiente. Neste caso, o produto é submetido à secagem com o ar em sua forma natural, ou seja, sem que haja queima de nenhum combustível para o seu aquecimento. No entanto, para se efetuar esse tipo de secagem é necessário conhecer o potencial de secagem do ar, assim como, verificar as mudanças diárias e mensais de temperatura e umidade relativa da região (Treidl 1974).

Segundo Gonçalves (1984) a secagem com ar ambiente é viável para ser aplicada no Brasil, principalmente para pequenos e médios produtores que desejam realizar a secagem na própria fazenda, porém, existe ainda falta de conhecimentos básicos sobre o real potencial de secagem do ar nas mais distintas regiões do país. Eichelberger et al. (2009), abordam que o procedimento depende especialmente das condições psicrométricas do ar do local, sendo favorável principalmente em locais com baixa umidade relativa.

Uma das vantagens na secagem com ar ambiente é a redução na dependência de combustíveis requeridos, além da obtenção de um produto final de melhor qualidade (Lopes et al. 2002). Segundo Devilla et al. (1999) isso se dá pela diminuição da temperatura de secagem e pelo aumento no tempo de repouso, resultando assim em grãos com menor suscetibilidade a quebra.

A região centro-oeste, em especial o Estado de Mato Grosso, tem se destacado nas últimas décadas pelo volume de produção agrícola. Segundo Figueiredo (2003) o setor agrícola constitui o eixo dinâmico da economia no Estado, possuindo ampla relação com as demais atividades econômicas desenvolvidas, e proporcionando assim, o crescimento da economia em ritmo superior aos demais Estados brasileiros. No entanto, existem fatores climáticos (temperatura, umidade relativa, precipitação) que limitam a produção agrícola.

Uma marcante característica do Estado de Mato Grosso é a divisão durante o ano entre períodos secos e chuvosos. Segundo Marcuzzo et al. (2011) os meses de abril e de setembro definem o período de transição entre os meses chuvosos e secos. Sendo que no mês de maio inicia-se a estação seca, que se prolonga pelos meses de junho, julho e agosto (período de inverno no estado), com início das primeiras chuvas no mês de setembro.

Desse modo, os períodos propícios para semeadura das culturas agrícolas, assim como, a implantação de alternativas como a secagem com ar ambiente, devem ser cuidadosamente definidos, com base no comportamento climático da região.

Guimarães e Baudet (2002) abordam que quando as condições ambientais impõem às sementes um grau de umidade de equilíbrio inferior ao recomendado para o armazenamento, torna-se possível a realização da secagem com o ar ambiente. Os autores recomendam a utilização de dados meteorológicos oriundos de instituições oficiais, para a análise da possibilidade de realização de secagem com ar ambiente para um determinado local.

O objetivo desse trabalho foi avaliar os decêndios do ano com possibilidade de secagem de grãos de soja e milho, com ar ambiente, em municípios produtores do Estado de Mato Grosso (Diamantino, Rondonópolis, Sinop e Campo Verde), com base na umidade de equilíbrio de cada produto e no grau de umidade mínimo para a comercialização e armazenamento.

2.METODOLOGIA

O presente trabalho foi realizado no Laboratório de Agrometeorologia da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), localizado no município de Tangará da Serra (MT). Utilizou-se dados climáticos do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), das estações meteorológicas de Diamantino, Gleba Celeste, Rondonópolis e São Vicente. Os dados de cada estação meteorológica foram utilizados para representar os municípios de acordo com o apresentado na Figura 1.

Figura 1. Estação, altitude, localização, município representado e número de registros analisados em estações meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia.

Estação	Altitude (m)	Latitude Sul (°)	Longitude Oeste (°)	Local Representado	Registros (anos)
Diamantino	286	14,40	56,45	Diamantino (MT)	39
Rondonópolis	284	16,27	54,34	Rondonópolis (MT)	35
Gleba Celeste	415	12,28	55,29	Sinop (MT)	13
São Vicente	800	15,81	55,41	Campo Verde (MT)	12

Para o cálculo das médias de temperatura diárias utilizou-se a Equação 1, utilizada pelo INMET, e recomendada por Teramoto et al. (2009) para o cálculo das temperaturas médias diárias.

$$T_m = \frac{T_{12} + T_x + T_n + 2T_{24}}{5} \quad (1)$$

Em que:

T_m = Temperatura do ar média diária (°C); T_{12} = Temperatura (°C) às 12 h (*Universal Time Coordinated*); T_{24} = Temperatura (°C) às 24 h (*Universal Time Coordinated*); T_x = Temperatura máxima diária (°C); e T_n = Temperatura mínima diária (°C).

Na determinação da umidade relativa média diária, utilizou-se a Equação 2, também utilizada pelo INMET.

$$UR_m = \frac{UR_{12} + UR_x + UR_n + 2UR_{24}}{5} \quad (2)$$

Em que:

UR_m = Umidade Relativa do ar média diária (%); UR_{12} = Umidade Relativa (%) às 12 h (*Universal Time Coordinated*); UR_{24} = Umidade Relativa (%) às 24 h (*Universal Time Coordinated*); UR_x = Umidade Relativa máxima diária (%); e UR_n = Umidade Relativa mínima diária (%).

Os horários das variáveis climáticas aplicadas nas Equações 1 e 2 estão em UTC (*Universal Time Coordinated*) ou Tempo Universal Coordenado. Aplicam-se os horários de tal forma a fim de que as

equações possam ser utilizadas em diferentes fusos horários sem a necessidade de alteração nas mesmas. Os horários 12 h e 24 h (UTC) correspondem para o Estado de Mato Grosso a 8 h e 20 h, respectivamente.

Calculou-se para cada ano o potencial adiabático do ar, referente a cada município, através da Equação 3, adaptada de Gonçalves (1984) que por sua vez, baseou-se nas equações psicrométricas de *Agricultural Engineers Yearbook* (1983).

$$PSA = \frac{\left[\frac{(0,6219 \cdot P_{su})}{(P_{atm} - P_{su})} \right] - \left[\frac{(0,6219 \cdot P_v)}{(P_{atm} - P_v)} \right]}{\left[\frac{(287 \cdot T_s)}{(P_{atm} - P_v)} \right]} \quad (3)$$

Em que:

PSA = Potencial adiabático de secagem (kg de vapor m⁻³ de ar úmido); P_{su} = Pressão de vapor do ar saturado à temperatura de bulbo úmido (Pa); P_{atm} = Pressão atmosférica do local (Pa); T_s = Temperatura de bulbo seco (K); e P_v = Pressão atual de vapor (Pa).

O potencial adiabático de secagem trata-se da diferença entre a umidade absoluta do ar à determinada temperatura e umidade relativa, para com sua umidade absoluta à umidade relativa de 100%. Ou seja, quanta água em forma de vapor é possível acrescentar ao ar a determinadas condições de temperatura e umidade relativa, até que este atinja seu ponto de saturação. Dessa forma, torna-se possível a identificação da pior condição do ar para a secagem com ar ambiente. Assim, os dados médios de umidade relativa e temperatura de cada decêndio do ano menos favorável para a secagem (com menor potencial adiabático), foram utilizados para calcular a umidade de equilíbrio para os diferentes produtos agrícolas (soja e milho), de acordo com o proposto por Gonçalves (1984) e Gonçalves & Ferreira (1988).

A pressão atmosférica do local (P_{atm}) foi calculada em função da altitude do local pela Equação 4 (Tubelis & Nascimento 1980).

$$P_{atm} = 101,13 \left[\frac{293 - 0,0065 \cdot z}{293} \right]^{5,2568} \quad (4)$$

Em que:

P_{atm} = Pressão atmosférica do local (kPa); e z = Altitude do local em relação ao nível do mar (m).

A pressão atual de vapor foi calculada pela Equação 5, segundo ASABE (2008), citado por Compagnon et al. (2010).

$$P_v = U_r \cdot P_{ss} \quad (5)$$

Em que:

P_v = Pressão atual de vapor (Pa); U_r = Umidade relativa do ar (decimal); e P_{ss} = Pressão de vapor do ar saturado à temperatura de bulbo seco (Pa).

A Pressão de vapor do ar saturado à temperatura de bulbo seco foi calculada pela Equação 6, de acordo com ASABE (2008) citado por Compagnon et al. (2010).

$$P_{ss} = 22.105.649,25 \cdot \exp \left[\frac{(-27.405,526 + 97,5413 \cdot T_s - 0,146244 \cdot T_s^2) + 0,00012558 \cdot T_s^3 - 0,000000048502 \cdot T_s^4}{(4,34903 \cdot T_s - 0,0039381 \cdot T_s^2)} \right] \quad (6)$$

Em que:

P_{ss} = Pressão de vapor do ar saturado a temperatura de bulbo seco (Pa); e T_s = Temperatura de bulbo seco (K).

A pressão de vapor do ar saturado à temperatura de bulbo úmido (P_{su}) também foi calculada através da Equação 6, utilizando-se no local da variável temperatura de bulbo seco (T_s) a temperatura de bulbo úmido. Esta, quando não disponível nos dados do INMET, foi obtida em função de sua relação com a entalpia e a umidade relativa do ar, através do *software* “Psicro 2009”, elaborado por Compagnon et al. (2010).

A umidade de equilíbrio foi calculada através da Equação de Henderson-Thompson (Equação 7), utilizada por Gonçalves (1984), Gonçalves & Ferreira (1988), Guimarães & Baudet (2002) e avaliada por Lehn & Pinto (2004), demonstrando bom ajuste na determinação da umidade de equilíbrio.

$$U_e = \left[\frac{(\ln(1-U_r))}{-k*(T_s+c)} \right]^{\frac{1}{n}} \quad (7)$$

Em que:

U_e = Umidade de equilíbrio (base seca %); T_s = Temperatura de bulbo seco (°C); e U_r = Umidade relativa do ar (decimal).

As variáveis “k”, “c” e “n” são constantes referentes a cada produto, expressas na Figura 2.

Figura 2. Constantes “k”, “c” e “n” utilizadas para o cálculo da umidade de equilíbrio de diferentes produtos agrícolas.

PRODUTO	Constantes		
	K	c	n
Milho	8,6541x10 ⁻⁵	49,810	1,8634
Soja	30,5327x10 ⁻⁵	134,136	1,2164

Fonte: Agricultural Engineers Yearbook (1983).

A equação 7 expressa o valor de umidade de equilíbrio em base seca. Para a transformação dos valores de umidade de base seca para base úmida, utilizou-se a Equação 8, segundo Silva et al. (2008b).

$$U_e \text{ (b. u.)} = \left[\frac{U_e}{(100+U_e)} \right] * 100 \quad (8)$$

Em que:

U_e (b.u.) = Umidade de equilíbrio em base úmida (%); e U_e = Umidade de equilíbrio (base seca %).

De acordo com Guimarães & Baudet (2002), deve-se considerar que o ar ao passar pelas pás do ventilador sofre um aquecimento de 1°C a 3°C. Deste modo, considerou-se, um incremento de 2°C à temperatura do ar, sendo esta nova temperatura (no *plenum* do secador), utilizada para o cálculo da umidade de equilíbrio (Equação 7). Sabe-se ainda que a umidade relativa varia exponencialmente em função da temperatura do ar, portanto, tal modificação também foi considerada no cálculo da umidade de equilíbrio. Para o acréscimo da temperatura, e ajuste a da umidade relativa, foi utilizado o *software* “Psicro 2009”, elaborado por Compagnon et al. (2010).

Os dados de umidade de equilíbrio obtidos para cada produto agrícola foram comparados em função da umidade ideal para o armazenamento seguro no período de um ano (Figura 3), e em função da umidade máxima permitida para a comercialização (Figura 4), alternativa esta, adotada para o caso do produtor optar por comercializar a produção logo após a secagem.

Os locais que apresentaram períodos com umidade de equilíbrio do produto, menor que a umidade necessária para o seu armazenamento seguro, ou para sua comercialização, foram classificados como aptos para a secagem com ar ambiente.

Figura 3. Umidade segura para o armazenamento de diferentes produtos agrícolas durante o período de um ano.

Produto	Umidade de Armazenamento (%)
Milho	13,0
Soja	12,0

Fonte: Silva et al. (2008b).

Figura 4. Umidade padrão máxima permitida para a comercialização de diferentes produtos agrícolas, de acordo com as especificações brasileiras de padronização, classificação e comercialização.

Produto	Umidade de Comercialização (%)
Milho	14,0
Soja	14,0

Fonte: Brasil (2011) para o milho e Brasil (2007) para a soja.

O potencial de secagem com ar ambiente foi avaliado para os diferentes municípios em todos os decêndios do ano, identificando assim os períodos onde há ou não a possibilidade de se realizar a secagem com ar ambiente. Em seguida, observou-se quais os períodos propícios para a secagem, e se estes, coincidem com os períodos de colheita dos diferentes produtos agrícolas (soja e milho) nos municípios do Estado (Diamantino, Sinop, Rondonópolis e Campo Verde).

Foi considerada a possibilidade de realização de secagem de com ventilação contínua (com os ventiladores do sistema de secagem ligados durante todo o dia), e com ventilação intermitente, com os ventiladores ligados durante 10 horas do dia (das 8 h às 18 h). Para tal, foram utilizadas as Equações 9 e 10, propostas por Mossini Junior et al. (2013), para calcular as médias de temperatura e umidade relativa diárias, no período entre 12 h e 22 h (UTC). Os horários 12 h e 22 h horas (UTC) correspondem a 8 h e 18 h no Estado de Mato Grosso.

$$T_{me} = \frac{(T_{12} + (2 * T_{18}))}{3} \quad (9)$$

Em que:

T_{me} = Temperatura média estimada, das 12 h às 22 h (UTC); T_{12} = Temperatura às 12 h (UTC); e T_{18} = Temperatura às 18 h (UTC).

$$UR_{me} = \frac{(UR_{12} + (2 * UR_{18}))}{3} \quad (10)$$

Em que:

UR_{me} = Umidade relativa média estimada, das 12 h às 22 h (UTC); UR_{12} = Umidade relativa às 12 h (UTC); e UR_{18} = Umidade relativa às 18 h (UTC).

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados climáticos, dos anos com menor potencial adiabático, foram utilizados para determinar os períodos com possibilidade de realização da secagem. Na Figura 5 está apresentado o potencial adiabático do ar (PSA), calculado para as diferentes localidades.

Figura 5. Local, período analisado e potencial adiabático de secagem (kg de vapor m⁻³ de ar úmido) dos municípios estudados.

Local	Período analisado	¹ PSA máximo	PSA Médio	PSA Mínimo	Ano de menor PSA
Diamantino	1961-2011	0,010122	0,00364	0,00270	1983
Sinop	1972-2011	0,010088	0,00367	0,00205	1985
Rondonópolis	1995-2011	0,005632	0,00348	0,00167	2004
Campo Verde	1998-2011	0,004238	0,00260	0,00170	2009

¹ PSA: Potencial adiabático de secagem.

Observa-se que em todos os locais o PSA mínimo foi relativamente menor que o PSA médio, ficando evidente a utilização da pior situação para a determinação dos períodos propícios para a secagem. Espera-se assim, que as condições de secagem nos locais estudados, sempre sejam iguais ou mais favoráveis que as apresentadas no presente trabalho.

Estão apresentados na Figura 6 os períodos propícios para a secagem de soja nos diferentes locais. A secagem, até a umidade padrão máxima permitida para a comercialização (14%), pode ser realizada nos municípios estudados, tanto com ventilação contínua, quanto com ventilação intermitente (com os ventiladores ligados entre 8 h e 18 h).

Para os produtores que desejam armazenar o produto pelo período de um ano, recomenda-se a secagem da soja até 12% de umidade (Silva et al. 2008b). Nesse caso, os municípios de Diamantino e de Rondonópolis, foram os que apresentaram as melhores condições para a secagem. De acordo com Santos (2005), a semeadura da soja no Estado de Mato Grosso pode variar de 01 de outubro a 31 de dezembro, sendo que as cultivares de ciclo precoce levam aproximadamente 115 dias para a colheita, e as de ciclo médio cerca de 135 dias. Assim, o período de colheita no Estado compreende-se entre o segundo e o décimo decêndio do ano.

Nesse período, os únicos locais que apresentaram aptabilidade para a secagem de soja até 12% de umidade, foram os municípios de Diamantino e de Rondonópolis, secagem esta, realizada com ventilação intermitente. No município de Rondonópolis, no sexto e sétimo decêndio há a possibilidade de realização de secagem com ventilação contínua.

Figura 6. Períodos decendiais com possibilidade de secagem de soja com ar ambiente, com ventilação contínua e intermitente, nos municípios de Diamantino, Sinop, Rondonópolis e Campo Verde.

Observa-se ainda, que do décimo primeiro ao décimo quarto decêndio, para as cidades de Diamantino e Rondonópolis, há a possibilidade de realização de secagem com ventilação contínua até 12% de umidade, sendo esta, uma alternativa para os produtores que semear em fim de dezembro e utilizarem variedades de ciclo tardio.

Nas localidades de Sinop e Campo Verde não é possível a realização de secagem de soja com ar ambiente, até 12% de umidade, nesse caso, há a necessidade de fornecimento de energia em forma de calor, ao ar de secagem. Este fato pode ser explicado devido à localização e altitude dos municípios.

O município de Sinop está localizado na Amazônia brasileira. Região, que de acordo com Costa et al. (1998), possui clima quente e úmido com ocorrência de longos períodos de chuva ao longo do ano, desse modo, a alta umidade relativa encontrada na região impede que o produto atinja o nível de umidade seguro para o armazenamento.

O município de Campo Verde está localizado a 800 metros de altitude (Figura 1). Este fator proporciona à região temperaturas mais amenas e umidade relativa maior, impedindo assim, que a secagem de soja seja realizada até 12% de umidade.

Em estudo semelhante, avaliando a possibilidade de secagem de soja com ar ambiente no município de Botucatu (SP), Gonçalves & Ferreira (1988) observaram que entre os meses de março e junho, não é possível a secagem com ventilação contínua. No entanto, no período entre 01 de março a 15 de maio, a secagem pode ser realizada abaixo de 12% de umidade, nos horários entre 8 h e 20 h.

Estão apresentados na Figura 7 os períodos com possibilidade de secagem com ar ambiente para a cultura do milho. A secagem até 14% de umidade (umidade máxima de comercialização) pode ser realizada ao longo do ano nos diferentes locais, com ventilação contínua ou intermitente, já a secagem até o nível de umidade seguro para o armazenamento no período de um ano (13%), está limitada a algumas épocas do ano.

Segundo Sans et al. (2001) a melhor época para a semeadura de milho na safra de verão no Estado de Mato Grosso é no mês de outubro. Outra alternativa de cultivo para o estado é no período de segunda safra (safrinha), implantado nos meses de fevereiro e março após a colheita da soja. No entanto, segundo Broch & Ceccon (2008), a semeadura a partir de 15 de março expõe a lavoura a maiores riscos de perdas devido à estiagem nos meses após a semeadura. Adotando o mesmo ciclo (120 dias) utilizado por Sans et al. (2001) para o zoneamento da cultura do milho sequeiro no Estado de Mato Grosso, tem-se como período de colheita o intervalo entre o terceiro e o vigésimo decêndio do ano.

Nesse período, nos municípios de Diamantino e Rondonópolis é possível a realização de secagem de milho com ar ambiente com ventilação intermitente até 13% de umidade. Já no município de Sinop a secagem até 13%, só é possível a partir do décimo quarto decêndio, e em Campo Verde a partir do décimo sexto decêndio. A realização de secagem até 13% de umidade, com ventilação contínua, só é possível no município de Sinop a partir do vigésimo primeiro decêndio, e para as demais localidades a partir do décimo oitavo decêndio.

Avaliando a possibilidade de secagem de milho com ar ambiente na cidade de Botucatu (SP), Gonçalves (1984) observou a impossibilidade de secagem com ventilação contínua até 13% de umidade. Porém, entre os meses de março e junho, há semanas em que, operando o sistema nos horários entre 9 h e 17 h, há a possibilidade de secagem até 12% de umidade.

A viabilidade na secagem de milho também foi observada por Eichelberger et al. (2009) na região de Passo Fundo (RS). Os autores verificaram a possibilidade de secagem de sementes de 19% para 13% de umidade, na segunda quinzena do mês de março.

A secagem com ar ambiente é uma prática de baixo impacto ecológico e que pode ser aplicada a municípios do Estado de Mato Grosso, sendo em especial destinada a produtores que desejam beneficiar e armazenar o produto na própria propriedade. Porém, a implantação do sistema deve ser acompanhada de um bom planejamento das atividades de semeadura e colheita, e o sistema só deve estar em funcionamento quando a umidade de equilíbrio do produto for inferior a sua umidade atual. Além disso, segundo Guimarães & Baudet (2002), no momento da projeção dos sistemas de secagem deve-se atentar para o tempo de secagem da camada superior da célula de secagem, a fim de se evitar a deterioração do produto.

Figura 7. Períodos decendiais com possibilidade de secagem de milho com ar ambiente, com ventilação contínua e intermitente, nos municípios de Diamantino, Sinop, Rondonópolis e Campo Verde.

4.CONCLUSÃO

Os resultados encontrados no presente trabalho permitem concluir que:

- A secagem de soja e milho com ar ambiente, até o grau de umidade máximo permitido para a comercialização, pode ser realizada nos municípios estudados;
- A secagem de soja até 12% de umidade é possível nos municípios de Diamantino e Rondonópolis;
- A secagem de milho até 13% de umidade só é possível na segunda safra (safrinha);

REFERÊNCIAS

- [1] Agricultural Engineers Yearbook. Saint Joseph. American Society of Agricultural Engineers. 30ª Edição, p.853, 1983.
- [2] Brasil. Instrução normativa número 60, de 22 de dezembro de 2011. Regulamento técnico do milho. Ministério da agricultura pecuária e abastecimento. Diário oficial da união, Brasília, DF, 23 de dezembro de 2011, seção 1, p.15.
- [3] Brasil. Instrução normativa número 11, de 15 de maio de 2007. Regulamento técnico da soja. Ministério da agricultura pecuária e abastecimento. Diário oficial da união, Brasília, DF, 16 de maio de 2007, seção 1, p.13-21.
- [4] Broch, D.L.; Ceccon, G. Produção de milho safrinha com integração lavoura e pecuária. 2008. Artigo em Hipertexto. Disponível em: <http://www.infobibos.com/Artigos/2008_2/safrinha/index.htm>. Acesso em: 20/06/2012.
- [5] Compagnon, A. M.; Gava, R.; Dalpasquale, V. A.; Martins, C. H. Psicro 2009 - Programa computacional para a determinação das propriedades psicrométricas do ar. Revista em Agronegócios e Meio Ambiente. v.3, n.3, p.251-269, 2010.
- [6] Costa, R. F.; Feitosa, J. R. P.; Fisch, G.; Souza, S. S.; Nobre, C. A. Variabilidade diária de precipitação em regiões de floresta e pastagem na Amazônia. Acta Amazônica, n.28, v.4, p.395-408, 1998.
- [7] Devilla, I. A.; Couto, S. M.; Queiroz, D. M.; Damasceno, G. S.; Reis, F. P. Qualidade de grãos de milho submetidos ao processo de seca-aeração. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, Campina Grande. v.3, n.2, p.211-215, 1999.
- [8] Eichelberger, L.; Portella, J. A.; Gutkouski, L. C.; Santin, J. A. Secagem de sementes de milho com ar natural forçado. Pesquisa Agropecuária Gaucha, Porto Alegre. v.15, n.2, p.159-169, 2009.
- [9] Figueiredo, M. G. Agricultura e estrutura produtiva do Estado de Mato Grosso: uma análise insumo-produto. 2003. 188 f. Dissertação (Mestrado em Economia Aplicada). Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Piracicaba, São Paulo.
- [10] Garcia, D. C.; Barros, A. C. S. A.; Peske, S. T.; Menezes, N. L. A secagem de sementes. Revista Ciência Rural. v.34, n.2, p.603-608, 2004.
- [11] Gonçalves, V. A. Potencial de secagem do milho a granel com ar natural em Botucatu-SP. Pesquisa Agropecuária Tropical, Goiânia, v.13, n.1, p.141-166, 1984.
- [12] Gonçalves, V. A.; Ferreira, W. A. Potencial de secagem de grãos com ar natural em Botucatu-SP, comparação entre arroz, feijão, milho, soja e sorgo. Pesquisa Agropecuária Tropical, Goiânia, v.18, n.1, p.151-156, 1988.
- [13] Guimarães, D.; Baudet, L. Simulação de secagem de grãos e sementes. Pelotas: Universidade Federal de Pelotas, p.214, 2002.
- [14] Harrington, J. F. Seed storage and longevity. In: Kozlowski, T. T. Seed biology. New York: Academic. v.3, p. 145-245, 1972.
- [15] Lehn, D. N.; Pinto, L. A. A. Isotermas de equilíbrio e curvas de secagem para arroz em casca em silos de armazenagem. Revista Engenharia na Agricultura, Viçosa – MG. v.12, n.3, p.177-191, 2004.
- [16] Lopes, R. P.; Silva, J. S.; Ruffato, R.; Sena JR, D. S. Consumo de energia em dois sistemas de secagem de café. Revista Ciência Agrotecnológica, Lavras. v.26, n.6, p.1266-1274, 2002.
- [17] Marcuzzo, F. F. N.; Melo, D. C. R.; Rocha, H. M. Distribuição espaço-temporal e sazonalidade das chuvas no Estado de Mato Grosso. Revista Brasileira de Recursos Hídricos. v.16, n.4, p.154-167, 2011.
- [18] Mossini Junior, D.; Silva, F. S.; Dallacort, R.; Carvalho, M. A. C.; Mossini, A. Modelo matemático para a estimativa da temperatura e umidade relativa média diurna do ar. Revista Enciclopédia Biosfera, Goiânia, v.9, n.16, p.1479-1494, 2013.
- [19] Peske, S. T.; Villela, F. A. Secagem de sementes. In: Peske, S. T.; Rosenthal, M. D.; Rota, G. R. M.; (Ed). Sementes: fundamentos científicos e tecnológicos. 1. ed. Pelotas – RS: Editora Rua, 2003, Cap.5, p.281 – 319.
- [20] Santos, G. L. Resposta técnica. Sistema Brasileiro de Respostas Técnicas. Senai – RS, Departamento regional, 2005.
- [21] Santos, R. R. Análise de sistema de secagem de café, utilizando-se bomba de calor e gás liquefeito de petróleo – GLP. 2007. 112 f. Dissertação (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola. Universidade Federal de Viçosa. Viçosa – MG.
- [22] Sans, L. M. A.; Assad, E. D.; Guimarães, D. P.; Avellar, G. Zoneamento de riscos climáticos para a cultura de milho na região centro-oeste do Brasil e para o Estado de Minas Gerais. Revista Brasileira de Agrometeorologia, Passo Fundo, v.9, n.3, p. 527-535, 2001.

- [23] Silva, L. C. Secagem de grãos. Revista Grãos Brasil: da semente ao consumo. v.1, n.14, p.10-14, 2005.
- [24] Silvaa, J. S.; Afonso, A. D. L.; Donzelles, S. M. L.; Nogueira, R. M. Secagem e secadores. In: Silva, J. S; (Ed). Secagem e armazenagem de produtos agrícolas. 2. ed. Viçosa – MG: Universidade Federal de Viçosa, 2008, Cap.5, p.109 – 145.
- [25] Silvab, J. S.; Berbert, P. A.; Rufato, S.; Afonso, A. D. L. Indicadores da qualidade dos grãos. In: Silva, J. S; (Ed). Secagem e armazenagem de produtos agrícolas. 2. ed. Viçosa – MG: Universidade Federal de Viçosa, 2008, Cap.4, p.63 - 107.
- [26] Teramoto, E. T.; Carvalho, L. G.; Dantas, A. A. A. Comparação entre valores de temperatura média do ar de estação convencional com valores obtidos em estação automática e análise de equações para a estimativa de médias da temperatura do ar em lavras, MG. Revista Ciencia Agrotecnológica, Lavras, v.33, p.1789-1803, 2009.
- [27] Treidl, R. A. Corn drying in Canada using ambient air. Canadian agricultural engineering. v.16, n.2, 1974.
- [28] Tubelis, A.; Nascimento, F. J. L. Meteorologia descritiva: fundamentos e aplicações brasileiras, São Paulo: Nobel, 1980, 374 p.

Capítulo 9

Rusticidade de cultivares de soja com e sem TSI, à três doenças radiculares

Marcelo Gripa Madalosso

Rafael Cardoso

Filipe Andres Dalenogare

Jéssica Santi Boff

Mateus da Cunha Dorneles

Dionatan Frescura Nunes

Higor da Silva

Resumo: O objetivo avaliar a incidência de três doenças radiculares: Podridão Cinzenta (PC) (*Macrophomina phaseolina*), Podridão Geográfica (PG) (*Phomopsis* spp.), Podridão Vermelha das Raízes (PVR) (*Fusarium* spp). Foram semeadas 20 cultivares de soja, com TSI: 5959, 5947, 5838, 6410, 7063, Ativa, Lança, Raio, Ícone, Ponta, Elite, Zeus, Delta, Fibra, Compacta, 5892, 5601, 5909, 4823, Garra e Garra produtor (sem TSI). Foram coletadas dezessete raízes e examinadas individualmente no laboratório de fitopatologia da URI Santiago. A cultivar 5601 foi a que apresentou a menor incidência de PVR, seguida da Raio, com 12 e 18%, respectivamente. As cultivares Ativa, 5838, 5947, Zeus e 5959 ficaram com incidência próxima a 50%. Na avaliação de PC, a incidência desse patógeno foi alta em todas as cultivares, ficando as menores incidências com as cultivares (Fibra, 6410, Zeus, Ícone e 5959): 71%. A maior incidência ficou com a cultivar Ponta (100%). Quase todas as cultivares estudadas apresentou incidência de 100% para PG. Apenas a cultivar 5892 apresentou incidência em torno de 70%, as demais ficaram acima. Portanto, é fundamental conhecer o histórico da área para a escolha da cultivar com maior rusticidade. O uso do TSI mostrou ser eficiente para as três doenças de solo, comparada a semente sem tratamento, resultando em maior produtividade.

Palavras-chave: Podridão Cinzenta, *Macrophomina phaseolina*, Podridão Geográfica, *Phomopsis* spp., Podridão Vermelha das Raízes, *Fusarium* spp., Soja.

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos tem aumentado a incidência de doenças de solo e morte de plântulas na cultura da Soja (*Glycine max*), sendo que incidência depende muito da cultivar. O aumento dos tombamentos, pode prejudicar o estande de planta e a uniformidade da lavoura, além de facilitar a mato competição.

Os patógenos de solo não são novidade na agricultura. Grande parte dos produtores não mudam o cultivo de soja, fazendo com que a monocultura, facilite a disseminação e permanência do patógeno no solo. Isso se deve a característica desses necrotróficos em permanecerem no solo saprofitando e/ou em estruturas de resistência.

Esses fungos têm características distintas para sua ocorrência, como, por exemplo, a Podridão Cinzenta (PC), que ocorre mais em áreas compactadas e déficit hídrico. Já a Podridão Vermelha das Raízes (PVR) é uma doença de maior ocorrência em anos chuvosos, e em solos mal drenados, e a Podridão Geográfica (PG) acontece em ambas situações.

A melhor alternativa seria a rotação de cultura, porém devido aos custos e infraestrutura, a grande maioria dos produtores não consegue executar esta prática. Assim, a opção mais viável para o produtor seria identificar a doença em suas áreas e buscar uma cultivar que tenha maior rusticidade para o patógeno que atacou a cultura.

O presente trabalho teve por objetivo avaliar a incidência de três doenças radiculares: Podridão Cinzenta (PC) (*Macrophomina phaseolina*), Podridão Geográfica (PG) (*Phomopsis* spp.), Podridão Vermelha das Raízes (PVR) (*Fusarium* spp.).

MATERIAL E MÉTODOS

O presente trabalho foi realizado no município de Capão do Cipó, na propriedade do produtor rural Adelmo Fracaro Cardoso, à qual fica localizada nas coordenadas, S 28° 54' 32,7" e WO 54° 33' 19". Foi realizada a semeadura no dia 04/12/2018 em área com histórico dessas doenças radiculares, usando uma densidade de 18 sementes/metro linear, para todas as cultivares. Utilizou-se as 7 linhas de semeadura, com 9 metros de comprimento, assim proporcionando uma parcela de 27,71 m².

Foram semeadas 20 cultivares de soja, fornecidas pela empresa 3 Tentos com TSI padrão da empresa (2ml/kg de Standak Top®, 2ml/kg de Yaravita Raiz®, Pó Secante, Polímero): 5959, 5947, 5838, 6410, 7063, Ativa, Lança, Raio, Ícone, Ponta, Elite, Zeus, Delta, Fibra, Compacta, 5892, 5601, 5909, 4823, Garra e Garra produtor. A cultivar Garra foi a única que teve as duas possibilidades, TSI e sem, por isso chamada de Garra produtor. As demais cultivares não foram encontradas sem TSI.

Foram coletadas dezessete raízes de forma aleatória na parcela de cada cultivar, para fazer a avaliação. As raízes foram examinadas individualmente no laboratório de fitopatologia da URI Santiago, com o intuito de avaliar a incidência das doenças presentes em cada uma dessas raízes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A exemplo de outras doenças do sistema radicular, ainda não estão disponíveis formas eficientes de controle da PVR. Entre as possíveis táticas de controle da doença pesquisadas atualmente, a seleção de cultivares resistentes é apontada como a mais promissora (Chang et al., 1996; Rupe et al., 1991).

A cultivar 5601 foi a que apresentou a menor incidência de PVR, seguida da Raio, com 12 e 18%, respectivamente. Assim, se constatada a PVR na área, seria interessante o uso dessas cultivares (Gráfico 1). Nas cultivares com ciclo precoce os sintomas dificilmente aparecem, ou quando aparecem os danos são pequenos, sendo que a doença é mais severa em baixas temperaturas e alta umidade (Rupe et al., 1991). Já se a área for de histórico dessa doença, o uso da cultivar Lança não seria indicado, apresentando a maior incidência de todas as cultivares estudadas. As cultivares Ativa, 5838, 5947, Zeus e 5959 ficaram com incidência próxima a 50%, apresentando alto risco de utilização em áreas de histórico.

A contínua produção de soja em campos de semeadura direta (monocultura) pode resultar no acúmulo de palha, a qual é citada como agente favorecedor de enfermidades de PC e como um problema ao sistema de semeadura direta (Saraiva e Torres 1999). A longevidade dos microescleródios viáveis de PC, no solo, varia de três meses a três anos (Dhingra e Slinclair 1978).

Na avaliação de PC, a incidência desse patógeno foi alta em todas as cultivares, ficando as menores incidências com as cultivares (Fibra, 6410, Zeus, Ícone e 5959): 71%. A maior incidência ficou com a cultivar Ponta (100%), onde todas as raízes apresentaram sintomas de ataque de *Macrophomina phaseolina*. Assim, em áreas com histórico, essa cultivar precisa ser evitada. Além dela, cultivares como 5838 e Garra produtor (sem TSI), apresentaram alto risco para uso em áreas com PC, pois ficaram com incidências de 94%.

A incidência de PG nas raízes de soja estudadas foi alta. Quase todas as cultivares estudadas apresentou incidência de 100% para esta doença. Apenas a cultivar 5892 apresentou incidência em torno de 70%, as demais ficaram acima. É importante o monitoramento desta doença, visto que produz grãos de menos peso e tamanho que são removidos no processo de limpeza (Sinclair e Backman, 1989).

A análise dos dois tratamentos na cultivar Garra, que foi a única possível comparar com e sem TSI, apresentou resultados distintos. Para as três doenças analisadas, o uso do TSI resultou em menor incidência para todas elas, mostrando que auxiliou na proteção do sistema radicular contra o ataque dos patógenos.

Gráfico 1 - Porcentagem de incidência de doenças radiculares em 21 cultivares de soja:

CONCLUSÃO

De acordo com os resultados encontrados, foi possível concluir que as cultivares apresentam rusticidade diferentes com relação ao tipo de doença de solo.

É fundamental conhecer o histórico da área para a escolha da cultivar com maior rusticidade. Além disso, é importante a disponibilidade dessa informação da cultivar.

O uso do TSI mostrou ser eficiente para as três doenças de solo, comparada a semente sem tratamento na cultivar Garra, resultando em maior produtividade.

REFERÊNCIAS

- [1] CHANG, S.J.C., DOUBLER, V.K., SUTTNER, R., KLEIN, J., SCHMIDT, M.E., GIBSON, P.T. & LIGHTFOOT, D.A. Two additional loci underlying durable field resistance to soybean sudden death syndrome. *Crop Science* 36:1684-1688. 1996.
- [2] DHINGRA, O.D; SINCLAIR, J.B. Biology and pathology of *Macrophomina phaseolina*. Viçosa: UFV, 1978. 166P.
- [3] SARAIVA, O. F. ; TORRES, E. Manejo dos resíduos da colheita condicionado por sistemas de preparo do solo. In: EMBRAPA SOJA. Resultados de pesquisa da Embrapa Soja 1999. Londrina, 2000.
- [4] SINCLAIR, J.B.; BACKMAN, P.A. Compendium of Soybean diseases. 3th ed. The American Phytopathological Society. St. Paul, MN, USA, 1989.
- [5] RUPE, J.C.; GBUR JR. E.E. Effect of plant age, maturity group and environmental on disease progress of Sudden Death Syndrome of Soybean. *Plant Disease*. v.79, n.2, p.139-143, 1995.

Capítulo 10

Parâmetros técnicos na secagem em alta temperatura de milho safrinha

Fernando José Giza

Evandro Marcos kolling

Paulo Felipe Quinquiolo

Jaqueline Vargas

Resumo: A tratativa ao tema se deu pelo acompanhamento e análise do processo de secagem de milho em uma unidade beneficiadora e armazenadora de grãos, foram tomados dados de secagem relacionados à temperatura do ar e do produto, assim como parâmetros operacionais empregados pela Unidade. No procedimento de coleta de informações levantadas antes e depois do processo de secagem, em tempos pré determinados, dentro do período de colheita do milho safrinha. Os dados foram confrontados com recomendações de trato cultural, de modo a avaliar a influência da temperatura do ar de secagem sobre temperatura do grão e as práticas funcionais adotados pela Empresa. Os resultados permitiram observar que a temperatura dos grãos na saída do sistema de secagem ficaram abaixo de 40°C com temperatura de secagem média de 75°C. O sistema de secagem tem baixo rendimento por conta das práticas operacionais adotadas, porém apresenta bom resultado quanto a umidade final do produto.

Palavras-Chave: Perdas, Processo de secagem, Armazenamento.

1. INTRODUÇÃO

A alguns anos o Brasil ocupa a terceira posição de produtor mundial de milho, sendo no país a segunda cultura com maior importância na produção agrícola. Com produção ainda muito atrelada a expansão da avicultura e suinocultura, o milho deve ganhar espaço nas lavouras por conta da produção de biodiesel, o acréscimo do consumo mundial em alimentação e o emprego pela indústria de baixa e alta tecnologia.

Para atender a demanda das indústrias, é necessário o armazenamento temporário de boa parte da produção principalmente nos períodos de entressafra, o que remete ao controle das etapas de beneficiamento para que o armazenamento não comprometa a qualidade do produto.

A secagem dos grãos é um dos processos de beneficiamento muito utilizados no trato dos grãos e sementes de milho. Este processo contribui com o gerenciamento da lavoura, seja no ciclo de cultivo do campo ou no momento ideal de comercialização, assim como permite a colheita do milho com maior umidade e assim mais próximo do ponto ideal de maturação. De modo geral o processo de secagem artificial é realizada com ventilação forçada a baixa ou alta temperatura. Cabe ressaltar que embora a possibilidade de secagem artificial apresente-se como um benefício a atividade, se esta não for bem realizada, pode trazer grandes prejuízos, por conta da desqualificação do produto e ou perda de qualidade.

Atualmente, há vários modelos de secadores de grãos que buscam se adaptar as diferentes necessidades exigidas por agricultores, cerealistas, cooperativas, dentre outras. Dentre eles está o secador de torre com sistema de descarga contínuo e fluxo misto (tipo cascata) que constitui o objeto dessa análise.

No Brasil, tradicionalmente o produto é seco em secadores de altas temperaturas que, em boa parte são projetados para que o terço final da torre/coluna de secagem seja utilizada para resfriamento do produto. Assim operados, e contando com o controle da temperatura de secagem; o produto deve apresentar uma temperatura segura para o armazenamento. No entanto, dependendo das características iniciais do produto, bem como, da demanda de secagem, podem ser adotadas práticas de secagem em torre inteira, sem resfriamento, ou mesmo a necessidade da passagem do produto por mais de uma vez no secador (prática conhecida como rodízio). Outra medida empregada é a secagem em duas etapas, em que o produto que passou pelo secador espera temporariamente em um silo aerado, por nova passagem até que atinja a umidade padrão de estocagem. Em qualquer das práticas, atentando-se apenas a condição do produto seco, é preciso muita atenção, na umidade inicial, temperatura de secagem e do produto, e na umidade de saída do produto. Esses parâmetros podem influenciar diretamente em quebras técnicas por danos físicos, e/ou supersecagem, além de influenciar diretamente nas operações e custo de armazenamento.

A temperatura do grão é um dos fatores influenciadores na manutenção de sua qualidade. Segundo Aguiar et al. (2012), a temperatura acelera reações bioquímicas e metabólicas dos grãos, pelas quais reservas armazenadas no tecido de sustentação são desdobradas, transportadas e ressintetizadas no eixo embrionário.

Segundo Silva et al. (2008), grãos de milho que tenham como finalidade a obtenção de amido podem ser aquecidos até 55 °C e se forem destinados à indústria de ração podem chegar até 82 °C sem comprometer a qualidade para a qual se destinam. Já para sementes de milho, a temperatura máxima da massa não deve ultrapassar os 44 °C. Os mesmos autores afirmam que grãos de milho que são aquecidos acima de 60 °C tem seu endosperma modificado, o que poderia afetar a taxa de extração de amido.

Friedrich et al. (2015) afirmam que é possível secar grãos de milho com temperaturas de 60, 60/80 e 80°C no ar de secagem, em que a máxima temperatura dos grãos não ultrapasse a média de 48 °C, sem afetar a qualidade dos mesmos.

Kolling et al. (2012), avaliaram a operação de secagem a altas temperaturas do milho e encontraram perdas por quebras físicas superiores a 1% e por secagem excessiva na ordem de 0,52 a 0,80%.

Com nesta operação do beneficiamento e nas observações acima levantados, fez frente a demanda de avaliação do equipamento (secador), a fim de melhorias e possíveis soluções a cerca da automatização do processo de secagem.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho em questão foi realizada em uma Cerealista no Sul do Oeste do Paraná. Esta, contara com um secador KEPLER WEBER KW 100 para a operação de secagem de grãos recebidos e estocados na unidade. O secador em questão possui sistema de aquecimento por fornalha à lenha, quatro exaustores para

movimentação de ar e sistema de descarga de grãos baseado em controle de nível e temperatura.

O acompanhamento das operações de secagem coincidiu com o início da colheita de milho nas lavouras da região. Com isso, o milho foi o produto utilizado como objeto de análise, frente os parâmetros de secagem.

O processo se dá início com o descarregamento do produto, de diferentes lavouras, em moegas com umidade variando de 22 a 27 %. Após a descarga, o produto era transportado através de elevadores e esteiras para o processo de pré-limpeza e posteriormente para o secador. Na prática da Unidade Cerealista, o produto seco no secador era conduzido ao processo de limpeza e posteriormente ao armazenamento definitiva ou provisória. Este último, era empregado quando o produto necessitava de mais de uma passagem pelo secador. Isso é prática comum quando de períodos de safra onde o fluxo de beneficiamento não é suficiente para atender a chegada de produto da lavoura, neste caso, acabavam sendo armazenados temporariamente em silos conhecidos como pulmões.

Os parâmetros tomados na operação de secagem da Unidade, foram a umidade e a temperatura dos grãos de milho na entrada e saída do secador, e a temperatura de secagem.

Para determinação da umidade do produto (%) foi utilizando um Determinador de Umidade Universal, no ato do descarregamento na moega e pós passagem por secador.

A temperatura (C°) do grão na entrada do secador foi coletada retirando-se amostras da saída da operação de pré-limpeza. Este procedimento foi realizado a cada 30 minutos. Da mesma forma, foi coletada a temperatura do grão na saída do secador, porém, desta vez diretamente no mecanismo de descarga de grãos. Neste caso os grãos foram acondicionados em copo de isopor e a leitura realizada após estabilização da temperatura, com um termômetro digital *INCOTERM*, Modelo 7427.03.0.00..

A temperatura do ar de secagem (C°) foi obtida do sistema de informação do secador em tela de controle. Este procedimento de coleta também foi feito a cada 30 minutos, acompanhando a coleta dos demais parâmetros.

O tempo de secagem foi obtido a partir da subtração do horário final de secagem de uma carga de grãos pelo seu horário inicial de operação.

A quebra técnica foi obtida através da equação sugerida por Silva (1995), em que $QT = [(Up - Uf) / (100 - Uf)] \times 100$. Nesta equação Up significa Umidade Padrão de comercialização e Uf representa a umidade final do produto secado.

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados coletados durante o período de análise referem-se a valores médios de primeira e segunda passagem pelo secador, quando da operação em regime de rodízio descontinuo (Tabela 1).

TABELA 1. Parâmetros de entrada e saída no processo de secagem do milho safrinha.

Etapa de secagem	Amostras	Umidade entrada (%)	Umidade saída (%)	Temp.do ar de secagem (oC)	Temp. do grão entrada (oC)	Temp. do grão saída (oC)
Primeira Passagem	SC1	18,5	15,6	68	21,3	33,4
	SC2	18,0	16,0	74	22,3	35,6
	SC3	17,6	15,2	77	32,3	38,9
	SC4	20,5	14,9	81	29,8	40,1
	SC5	22,3	16,8	79	25,8	39,7
	SC6	20,5	16,7	75	27,9	40,0
	SC7	19,0	17,1	72	26,3	41,0
	SC8	18,3	16,9	69	28,6	43,2
	SC9	20,5	16,8	80	29,3	43,5
Médias 1o Passagem		19,5	16,2	75	27,1	39,5

(continuação ...)

TABELA 1. Parâmetros de entrada e saída no processo de secagem do milho safrinha.

Etapas de secagem	Amostras	Umidade entrada (%)	Umidade saída (%)	Temp. do ar de secagem (oC)	Temp. do grão entrada (oC)	Temp. do grão saída (oC)
Segunda Passagem	SC1	17,0	14,4	76	29,6	36,8
	SC2	16,7	14,3	71	32,1	34,3
	SC3	17,5	13,0	65	41,2	39,8
	SC4	16,9	13,6	68	35,9	39,2
	SC5	17,5	13,8	66	38,7	37,3
	SC6	17,5	14,7	55	29,8	30,2
	SC7	16,8	14,4	60	32,7	34,8
	SC8	16,7	13,6	60	26,7	40,0
	SC9	14,3	13,2	40	37,0	36,9
Médias 2o Passagem		16,8	13,9	62,3	33,7	36,6

Com base na umidade de entrada que poucas vezes superou 20%, e, nas temperaturas do ar de secagem (Tabela 1), é possível inferir que o secador apresenta baixa eficiência de secagem, visto que reduz em torno de 3 pontos percentuais a umidade na primeira passagem, exigindo uma segunda etapa de secagem para alcançar a umidade padrão, possivelmente por conta do volume de ar do sistema. A observação cria consistência quando do cálculo da capacidade de secagem do secador, que nestas análises ficou abaixo de 50 ton/h.

Na Figura 1, inicialmente é possível observar uma dispersão alta na temperatura de grãos submetidos à primeira passagem pelo processo de secagem, o fato se explica pode ser explicado pela heterogeneidade do produto, que advieram de diferentes áreas de cultivo e cultivares, com diferentes teores de umidade, dentre outros fatores que influenciam na temperatura do grão. Pode se verificar que embora a temperatura de secagem apresente variações negativas no processo, a temperatura dos grãos continua a crescer. A temperatura máxima do grão na saída do processo verificada foi de 43,5°C, o que segundo estudos já mencionados não devem trazer problemas relacionados a qualidade do produto.

Figura 01. Temperaturas de entrada e saída dos grãos e do ar de secagem, na primeira passagem pelo secador.

Frente a Figura 2 é possível observar que a temperatura dos grãos submetidos à segunda passagem se mantiveram estáveis ao longo da operação. Embora o produto inicie a segunda passagem com temperatura maior, a temperatura do ar de secagem aplicada a operação é menor. Cabe ressaltar que a unidade empregou neste período um regime de secagem de rodízio descontinuo, onde após primeira passagem o produto foi pré-armazenado em silo, para após uma nova primeira passagem, voltar ao secador.

O processo de secagem adotado pela Unidade caracterizou-se por utilizar uma temperatura menor para a segunda etapa de secagem uma vez que o produto já possuía teor de umidade próximo a de estocagem. Com isso, como pode ser observado nos dados de umidade de saída (Tabela 1), evitou-se que o produto fosse secado em excesso, reduzindo quebras técnicas. Esta medida faz com que a temperatura de saída do grão também diminua em relação ao que foi observado na primeira etapa de secagem, mesmo assim, observa-se a necessidade de resfriamento ou aeração adicional da massa no armazenamento definitiva.

A temperatura média do ar de secagem baixou de 75°C para 62,3°C na segunda passagem. Observando a Figura 2 é possível verificar dificuldade na manutenção da temperatura da fornalha, principalmente na secagem na segunda passagem. Embora seja uma dificuldade comum em secadores a lenha, a prática de reduzir a temperatura funcional do secador dificulta o controle e identifica a necessidade de maior atenção operacional ao processo.

Figura 2. Temperaturas de entrada e saída dos grãos e do ar de secagem, na segunda passagem pelo secador.

A temperatura média de saída dos grãos na segunda passagem foi de 36,6°C, nesta condição poderá haver danos qualitativos, visto que, segundo Schwartz et al. (2014), o milho armazenado em uma temperatura de 35°C reduz o rendimento de extração e afeta os parâmetros colorimétricos do amido, aumentando a coloração amarela e reduzindo o brilho do amido, devido ao aumento do teor residual de proteína. Camargo et al. (2014), recomenda temperaturas inferiores a 25°C para um armazenamento e garantia de boa qualidade da matéria prima de industrialização.

Após a secagem, o teor de umidade médio ficou em 13,9 %. Mesmo se tratando de valores médios, considerando uma umidade padrão de comercialização de 14%, pode se inferir que não foi significativa na quebra técnica por secagem excessiva.

4.CONCLUSÕES

É importante reforçar que nestes tipos de avaliações, em que sistemas operam sem controles experimentais, em condição de fluxo contínuo em pico de safra, os dados levantados podem incorrer em erros pela dificuldade de delimitar-se o início e final da secagem e dos lotes processados. Assim, quanto mais tempo durar as coletas, maior a confiabilidade dos resultados.

Uma análise geral do sistema e práticas de secagem da Unidade, embora observado pontos positivos; a medida de carregar o secador hora com grãos úmidos das moegas, hora de silos, pode indiretamente acarretar em maior consumo de energia, além de provocar fuga de ar na caixa de alimentação, diminuindo a eficiência da secagem e necessitando de um tempo maior para a realização do processo.

5.CONSIDERAÇÕES

Os dados aqui representados e analisados foram publicadas nos Anais do XLIV Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola - CONBEA

REFERÊNCIAS

- [1] Aguiar, R. W. S.; Brito, D. R.; Ootani, M. A.; Fidelis, R. R.; Peluzio, J. N. Efeito do dióxido do carbono, temperatura e armazenamento sobre sementes de soja e microflora associada. Revista Ciência Agronômica, v. 43, p. 554-560, 2012.
- [2] Camargo, C. M.; Talhamento, A.; Silva, R. S.; Santos, R. F.; Paraginski, R. T.; Oliveira, M. Efeitos da Temperatura de Armazenamento na Qualidade Industrial de Grãos de Milho. In: VI Conferência Brasileira de Pós-Colheita, 2014, Maringá – Paraná. Anais da VI Conferência Brasileira de Pós-Colheita. Londrina: Abrapos, 2014. P. 290-297.
- [3] Friedrich, R. De L. et al. Qualidade em Grãos de Milho Submetidos à Secagem a Alta temperatura e

Armazenados. Disponível em http://eventos.abrapos.org.br/anais/paperfile/110_20142111_01-54-59_7202.pdf , acesso em janeiro de 2015.

- [4] Kolling, E. M; Trogello, E.; Modolo, A. J. Perdas econômicas vinculadas às etapas de beneficiamento de milho e trigo, em unidade cooperativa do norte do Paraná. Revista Agro@mbiente On-line, v. 6, n. 3, p. 268-274, 2012.
- [5] Kolling, E. M; Trogello, E.; Modolo, A. J.; Dallacort, R. Análises Técnica e Funcional de um Sistema de Beneficiamento de Cereais Operando com Milho Safrinha. Revista Brasileira de Milho e Sorgo, v.11, n.2, p. 202-208, 2012.
- [6] Silva, J.S. Pré-processamento de produtos agrícolas. Juiz de Fora, MG: Instituto Maria, 1995. 509p.
- [7] Silva, J. S. Secagem e Armazenagem de Produtos Agrícolas. Viçosa: Aprenda Fácil, 2008, 560 p.
- [8] Schwartz, J. A.; Peres, W. B.; Santos, R. F.; Goebel, J. T. S.; Paraginski, R. T.; Elias, M. C. Efeitos da Temperatura de Armazenamento no Rendimento de Extração e nas Características Colorimétricas do Amido de Grãos de Milho. In: VI Conferência Brasileira de Pós-Colheita, 2014, Maringá – Paraná. Anais da VI Conferência Brasileira de Pós-Colheita. Londrina: Abrapos, 2014. P. 251-258.

Capítulo 11

Uso de diferentes corantes para a estimativa da viabilidade polínica dos grãos de polens de milho

Débora Cristina Leal

Rafael Stieven

Luiz Fernando Gibbert

Bruna Francielly Gama

Sheila Caioni

Isane Vera Karsburg

Itamar de Souza Sauer

Resumo: A viabilidade polínica é um fator determinante para os estudos dos recursos genéticos visando melhoramento genético de planta. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a viabilidade polínica em diferentes corantes. Os pendões foram coletado Novo Mundo – MT. Para a estimativa da viabilidade foram usados cinco corantes Orceína acética 2%, Reativo de Alexander, Reativo de Lizague, Verde malaquita e Lugol. Os dados obtidos foram utilizados para a análise de variância e as médias foram contrastadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade através do programa R. Com base nos resultados obtidos foi possível determinar que existe diferença significativa entre os corantes utilizados para determinar a viabilidade, sendo no qual o corante Orceína acética 2% se destacou dos demais por apresentar as maiores taxas de viabilidade polínica correspondendo a 98,35% sendo altamente eficiente para a determinação da viabilidade, porém os demais também apresentam eficiência na estimativa polínica.

Palavras chaves: Viabilidade polínica, Zea mays L, Orceína acética 2%.

1. INTRODUÇÃO

O milho (*Zea mays L*) pertence à ordem Gramineae e a família Poaceae, é uma espécie pertencente ao grupo monoica, se caracterizando por apresentar órgãos masculinos agrupados na panícula, localizado no topo do colmo e os femininos em espigas axilares. Sua inflorescência são compostas de 3 estames e o tempo de produção de pólen é por cerca de 8 dias, onde sua panícula chegar a produzir aproximadamente 50 milhões de grãos de pólen, este cereal é classificado no grupo C4, por apresentar adaptabilidade e a rusticidade natural (BARROS et al. 2014).

Os grãos de pólen do milho apresentam características trinucleados, onde seu possui uma membrana muito fina em torno do grão onde terá reflexos na baixa proteção levando a perda de viabilidade por desidratação em um curto período de tempo (FEHR e HADLEY 1980)

Desta forma os estudos da viabilidade polínica, tem como proposito estudar estimativa do potencial de reprodução masculina da espécie, sendo de grande relevância para caracterização de recursos genéticos e visando melhoramento genético de planta. Atualmente possui diferentes métodos que são empregado nos estudo da viabilidade polínica, dentre eles os métodos colorímetros, que possuem como pontos positivos a rapidez e o baixo custo. (FRESCURA et al., 2012)

2. MATERIAL E MÉTODOS

Os pendões foram coletados nos municípios de Novo Mundo – MT que estão situadas no extremo norte do Estado de Mato e a cerca de 813km da capital, Cuiabá-MT, fazendo parte do ecossistema Amazônico. O trabalho foi realizado no Laboratório de Citogenética e Cultura de Tecidos Vegetais da Universidade do Estado de Mato Grosso, Campus de Alta Floresta - MT. Para a realização deste trabalho foi utilizado o cultivar 30A37 com 5 repetições, sendo coletados 20 pendoes por repetição.

A viabilidade polínica foi estimada através da utilização de cinco corantes: Orceína acética 2%, Reativo de Alexander, Reativo de Lizague, Verde malaquita e Lugol. Os pendões coletados e os botões foram imediatamente armazenados em etanol: ácido acético (3:1) e ficaram em local refrigerado até o momento do preparo das lâminas. Para as montagem da lâmina os botões foram lavados e posterior feito a técnica de esmagamento das anteras para facilitar a liberação dos grãos de pólen. Os grãos de pólen foram considerados viáveis quando apresentaram coloração do protoplasma.

As lâminas foram analisadas em objetiva de 40x em microscópio (Leica ICC 50). Após a análise das lâminas, calculou-se a percentagem de pólen viáveis, e submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade através do programa R, (R CORE TEAM, 2016).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dos corantes utilizados e analisados mostrou que com o uso do corante orceína apresentou maior percentual de viáveis em comparação a porcentagem da viabilidade polínica dos demais corantes como visto na (Tabela 1). Mas o reativo de Alexander diferencia melhor assim como o Liza, porque eles coram de diferentes parte interna do pólen o protoplasma e a parte externa exine.

Tabela 1 - Média percentual da viabilidade polínica de *Zea mays L.*, com uso dos corantes, Orceína acética 2%, Reativo de Alexander, Reativo de lizague e Verde Malaquita, Alta Floresta – MT.

Corantes	Viabilidade polínica (%)
Orceína acética 2%	98,35 a
Reativo de Alexander	96,93 b
Reativo de liza	94,69 c
Verde malaquita	94,62 c
Lugol	92,35 d
CV (%)	0,87
Valor de F	46,09**
DMS	1,58

Médias seguidas pela mesma letra minúscula nas colunas não diferem entre si, pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de significância.

Desta forma que os corantes mais indicado são os que coram de forma diferenciada a parte interna e externa dos pólen por nós dar a certeza de que apresenta ambas estruturas. Já os demais corantes podem corar de forma mais intensa por conta da reação química, superestimando os valores. Portanto é o que deve ter acontecido com este material. Mas por meio de todos corantes foi possível verificar que o material analisado tem potencialidade alta de viabilidade estando acima de 85% (SOUZA et al., 2002)

Como observado o corante Orceína acética 2% apresentou 98,35% de viabilidade se destacando dos demais. Segundo HISTER & TESDECO (2016) notou-se que os pólen corados com orceína acética 2% pronuncia uma alta viabilidade, superior a 98,1% na *Psidium cattleianum Sabine*, assim ressaltando que a orceína é eficiente e seu resultado é semelhante a desse trabalho.

Neste trabalho observou-se que não houve diferença significativa entre as os corantes utilizados, segundo NASCIMENTO *et al.* (2014) comparando corantes como Reativo de Alexander, Verde Malaquita para *Delonix regia* notou-se que não houve diferença significativa entre os dois corantes, isso explica sua eficiência, o que não foi visto neste trabalho.

Conforme KUNH (2015) o corante Reativo de Alexander apresenta grande eficiência por ser um corante que difere facilmente quanto aos polens viáveis e inviáveis de fácil identificação ao microscópico optico.

Desta forma a viabilidade polínica atende um papel primordial para a disseminação da espécie, portanto quanto maior for sua percentagem da viabilidade acarretara em uma melhor para reprodução da espécie, segundo SOUZA et al.(2002) cita que a viabilidade polínica é considerada alta acima de 70%, deduzindo assim a viabilidade dos polens de milho é alta, no qual confere as exigências de espécies comerciais.

4.CONCLUSÃO

De acordo com os dados obtidos de viabilidade dos grãos de polens do *Zea mays* L, pode-se concluir o milho tem seu destaque por possui uma alta viabilidade polínica, com corante Orceína acética 2% se destacando dos demais por apresentar 98,35%, porém os demais também apresentam eficiência.

REFERÊNCIAS

- [1] Barros, J. FC; Calado, J. G. A cultura do milho. 2014.
<https://dspace.uevora.pt/rdpc/bitstream/10174/10804/1/Sebenta-milho.pdf>.
- [2] Ferreira, E.B.; Cavalcanti, P.P.; Nogueira, D.A. ExpDes: Experimental Designs package. R package version 1.1.2. 2013. www.scielo.br/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000141&pid=S1413...Ing.
- [3] Fehr, W. R. and Hadley, H. H., "Hybridization of Crop Plants" (1980). *Agronomy Books*. 3.
https://lib.dr.iastate.edu/agron_books/3
- [4] Frescura, V. D. et al. Pollen viability of *Polygala paniculata* L. (Polygalaceae) using different staining methods. *Biocell*, v. 36, n. 3, p. 143-145, 2012.
- [5] Hister, C. A. L.; Tedesco, S. B. Estimativa da viabilidade polínica de araçazeiro (*Psidium cattleianum Sabine*) através de distintos métodos de coloração. *Revista Brasileira de Plantas Medicinais*, v. 18, n. 1, p. 135-141, 2016.
- [6] Nascimento, L. S.; Benevenuti, A. S.; Leite, D. M.; Silva, D. D.; Moura, A. E.; Miranda, D.; Melo, V.; Dahmer, N.; Karsburg, I. V. Estimativa de viabilidade polínica e índice meiótico de *Delonix regia*, Alta Floresta MT, 2014. www.conhecer.org.br/Agrarian%20Academy/2017a/viabilidade.pdf. DOI: 10.18677/
- [7] R Core Team. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.
<https://www.R-project.org/>. 2016. Stanley, R. G.; Linskens, H. F. Pollen - biology, biochemistry and management. New York: Springer-Verlag, 1974. 172p.
- [8] Souza, M. M de; Pereira, Telma Nair Santana; Martins, Ernane Ronie. Microsporogênese e microgametogênese associadas ao tamanho do botão floral e da antera e viabilidade polínica em maracujazeiro-amarelo (*Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Degener*). *Ciência e Agrotecnologia*, v. 26, n. 6, p. 1209-1217, 2002.

Capítulo 12

Ação de bioestimulantes na germinação e no desempenho de plântulas de milho

Bruna Francielly Gama

Sheila Caioni

Luiz Fernando Gibbert

Débora Cristina Leal

Rafael Stieven

Tiago de Lisboa Parente

Giseudo Aparecido de Paiva

Resumo: Os bioestimulantes podem atuar trazendo diversos benefícios as plantas, estimulando o crescimento e desenvolvimento de plantas, além de resistência a praga e doenças, gerando maior produtividade. O trabalho tem como objetivo avaliar a eficácia de agentes bioestimulantes sobre sementes de milho. O experimento foi realizado no Laboratório de Análise de Sementes da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) em Alta Floresta/MT. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 5 tratamentos e 5 repetições, sendo os tratamentos constituídos de T1 (testemunha), T2 (*Azospirillum brasiliensis*), T3 (*Trichoderma* sp. isolado de raízes de colve e multiplicados em milheto), T4 (Trichoplus, composto de *Trichoderma asperellum*) e T5 (*Azospirillum brasiliensis* + *Trichoderma* sp. + *Trichoplus*). O tratamento com *Trichoderma* (T3) reduziu a germinação, crescimento inicial da raiz, massa verde e massa seca da raiz na cultura do milho. O *Trichoplus* e *Trichoderma*+*Azospirillum*+*Trichoplus* se mostraram eficientes em relação ao comprimento e massa verde da parte aérea. Os tratamentos testados apresentaram resultados positivos em comparação a testemunha sobre a variável a massa seca da parte aérea. Com base no exposto o tratamento T5 (*Trichoderma*+*Azospirillum*+*Trichoplus*) é mais indicado para as sementes de milho.

Palavras-chave: Bioestimulantes, promotores de crescimento, *Zea mays*

1 INTRODUÇÃO

Os bioestimulantes atuam estimulando o desenvolvimento e crescimento natural das plantas, afim de permitir maior absorção de nutrientes, resistência a estresses bióticos e abióticos e aumentar a produtividade (Calvo et al., 2014). Alguns microrganismos estão se destacando devido a eficiência como promotores de crescimento, dentre eles pode-se citar o *Azospirillum brasiliense* e o *Trichoderma sp.*

As bactérias *Azospirillum brasiliense* são apresentadas importância atuando na fixação biológica de nitrogênio (FBN) em gramíneas, e na promoção de crescimentos de plantas (Bashan & Bashan, 2010). Em alguns experimentos com milho foi observado incremento no rendimento de grão de cerca de 25% (Kennedy et al., 2004).

Machado et al. (2012), destacam que o *Trichoderma* pode atuar no controle de patógenos de solo, geração de hormônios vegetais, além de auxiliar a assimilação de nutrientes. A aplicação desse bioagente permite aumento na germinação e aceleração nesse processo, além de outros benefícios (CONTRERAS-CORNEJO et al., 2009).

Com base no exposto o presente trabalho tem como intuito avaliar a eficiência de agentes bioestimulantes sobre sementes de milho.

2 MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado no Laboratório de Análise de Sementes da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) em Alta Floresta/MT, com o uso de sementes da cultivar de milho LG 3055. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 5 tratamentos e 5 repetições, sendo os tratamentos constituídos de T1 (testemunha), T2 (*Azospirillum brasiliensis*), T3 (*Trichoderma sp.* isolado de raízes de colve e multiplicados em milheto), T4 (Trichoplus, composto de *Trichoderma asperellum*) e T5 (*Azospirillum brasiliensis* + *Trichoderma sp.* + Trichoplus).

As sementes foram dispostas sobre folhas de papel germitest, umedecidas com água destilada na proporção de 2,5 vezes a massa do papel seco. Posteriormente as mesmas foram enroladas com o papel formando rolos, e colocados no germinador tipo B.O.D. (Demanda Bioquímica de Oxigênio). Passados sete dias, foram iniciadas as avaliações. Os dados coletados passaram pela análise do Programa Computacional Sisvar, (FERREIRA, 2011) e as medias foram comparadas pelo teste Tukey a 5% de probabilidade.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O *Trichoderma* apresentou interferência negativa sobre a germinação, comprimento da raiz e comprimento da parte aérea. Para a variável comprimento da parte aérea (Tabela 1.), os tratamentos T5 e T4 apresentaram resultados semelhantes entre si, onde ambos demonstraram medias estatisticamente superiores. Chagas et al. (2017) analisando a eficiência do agente *T. asperellum* UFT 201 (componente do Trichoplus) sobre as culturas de soja, feijão, arroz e milho, avaliadas 25 DAE, observou que ambas apresentaram maior acúmulo de biomassa.

Em relação a M.V. e M.S. da raiz, é visto que os tratamentos foram inferiores ou iguais à testemunha (Tabela 2), já M.V. de parte aérea apresentou resultados promissores onde os tratamentos T4 e T5 demonstraram maior peso. Quanto a M.S. da parte aérea, todos os tratamentos testados foram superiores à testemunha (T1), destacando-se o T5 com 420 mg, enquanto que a testemunha (T1) apresentou apenas 280 mg. Cadore et al. (2016) observou em seu experimento que separadamente ou em conjunto, Trichodel® (0,1 mL) e Masterfix® (0,05 mL) podem atuar positivamente sobre a germinação de sementes de arroz.

4 CONCLUSÃO

A utilização de *Trichoderma* isolado (T3) reduz a germinação, crescimento inicial da raiz, massa verde e massa seca da raiz na cultura do milho. Para as variáveis comprimento e massa verde da parte aérea, os tratamentos com Trichoplus e *Trichoderma*+*Azospirillum*+Trichoplus se mostraram mais eficientes. E com relação a massa seca da parte aérea, todos os tratamentos se mostraram mais eficientes do que a testemunha. Desta forma, é recomendável a utilização do tratamento T5 (*Trichoderma*+*Azospirillum*+Trichoplus) nas sementes de milho.

REFERÊNCIAS

- [1] BASHAN, Y.; BASHAN, L. E. (2010). How the plant growth-promoting bacterium *Azospirillum* promotes plant growth - a critical assessment. *Advances in agronomy*, 108:77-136.
- [2] CALVO, P.; NELSON, L.; KLOEPPER, J. W. Agricultural uses of plant biostimulants. *Plant and Soil*, The Hague, 383: 3-41, 2014.
- [3] CHAGAS, L. F. B.; CHAGAS JUNIOR, A. F.; SOARES, L. P.; FIDELIS, R. R. *Trichoderma* na promoção do crescimento vegetal. *Revista de Agricultura Neotropical*, 4:97-102, 2017.
- [4] CONTRERAS-CORNEJO, H. A.; MACIAS-RODRIGUES, L. M.; CORTEZ-PENAGOS, C.; LOPES-BUCIO, J. 2009. *Trichoderma virens*, a Plant Beneficial Fungus. Enhances Biomass Production na Promotes Lateral Root Growth through na Auxin-Dependent Mechanism in Arabidopsis. *Plant Physiology*. 149:1579-1592.
- [5] FERREIRA, D. F. Sisvar: um sistema computacional de análise estatística. Universidade Federal de Lavras, 2011. *Ciência Agrícola*, 13: 19- 25, 2015.
- [6] KENNEDY, I. R.; CHOUDHURY, A. T. M. A.; KECSKÉS, M. L. (2004) Nonsymbiotic bacterial diazotrophs in crop-farming systems: can their potential for plant growth promotion be better explored. *Soil Biology and Biochemistry*, 36:1229-1244.
- [7] MACHADO, D. F. M.; PARZIANELLO, F. R.; SILVA, A. C. F.; ANTONIELLI, Z. *Trichoderma* no Brasil: o fungo e o bioagente. *Revista de Ciencias Agrarias* 35: 274-288, 2012.
- [8] CADORE, L. S.; SILVA, N. G.; VEY, R. T. SILVA, A. C. F. Inoculação de sementes com *Trichoderma harzianum* e *Azospirillum brasiliense* no desenvolvimento inicial de arroz. *Enciclopédia Biosfera*, 24:1726, 2016.

ANEXOS

Tabela 1. Médias dos tratamentos e resultado do teste F para as variáveis germinação, comprimento de raiz e comprimento de parte aérea, em função dos tratamentos com bioestimulantes na cultura do milho. Alta Floresta – MT, 2019.

Tratamentos	Germinação	Compr. de raiz	Compr. de parte aérea
	----- % -----	----- cm -----	
(T2) <i>Azospirillum</i>	99 a	14,5 a	8,3 bc
(T3) <i>Trichoderma</i>	94 b	6,9 b	7,8 c
(T4) <i>Trichoplus</i>	96 ab	16,8 a	9,7 ab
(T5) <i>Trichoderma</i> + <i>Azospirillum</i> + <i>Trichoplus</i>	98 a	14,4 a	10,4 a
(T1) Testemunha	99 a	15,9 a	8,3 bc
Teste F	7,40**	54,3**	7,99**
DMS	3,5	2,4	1,7
CV (%)	1,62	7,80	8,72

** significativo a 1% pelo teste F. Médias segundas de mesma letra nas colunas não diferem entre si a nível de 5% pelo teste de Tukey.

Tabela 2. Médias dos tratamentos e resultado do teste F para as variáveis Massa Verde de raiz (M.V. raiz), Massa Verde de parte aérea (M.V. aérea), Massa Seca de raiz (M.S. raiz) e Massa Seca de parte aérea (M.S. aérea), em função dos tratamentos com bioestimulantes na cultura do milho. Alta Floresta – MT, 2019.

Tratamentos	M.V. raiz	M.V. aérea	M.S. raiz	M.S. aérea
	----- g -----	----- mg -----		
(T2) <i>Azospirillum</i>	3,8 ab	4,0 bc	430 b	375 ab
(T3) <i>Trichoderma</i>	1,5 c	3,5 c	212 c	327 ab
(T4) <i>Trichoplus</i>	4,1 ab	5,3 a	470 ab	355 ab
(T5) <i>Trichoderma</i> + <i>Azospirillum</i> + <i>Trichoplus</i>	3,4 b	5,0 ab	447 b	420 a
(T1) Testemunha	4,8 a	3,4 c	660 a	280 b
Teste F	22,1**	11,5**	13,6**	4,65*
DMS	1,1	1,1	193	109
CV (%)	14,7	11,9	19,3	13,8

** e * são, respectivamente, significativo a 1% e 5% pelo teste F. Médias segundas de mesma letra nas colunas não diferem entre si a nível de 5% pelo teste de Tukey.

Capítulo 13

Inoculação de longa vida contribui para a produção brasileira de soja

Flávio Gentil Bonfante

Martin Diaz-Zorita

Pedro Henrique de Medeiros Buso

Maria Laura Ramo

Resumo: O objetivo neste trabalho foi descrever a duração do pré-tratamento do inoculante nas sementes com formulação contendo *Bradyrhizobium elkanii* e agentes protetores (CTS500), comparando a nodulação e a produção de grãos das culturas de soja, cultivadas sob uma ampla gama de condições ambientais brasileiras. Foi utilizada a Safra 2016/17, 50 ensaios de campo de soja ao longo de 3 estados brasileiros (Paraná, Goiás e Mato Grosso). Os estudos no delineamento de blocos completos randomizados com parcelas de 24 m². ANOVA de todos os dados foi realizada usando a média em 50 locais, com as diferenças entre médias determinadas usando o teste de Scott Knott em um nível de significância de 0,10. Em todos os tratamentos, fungicidas, inseticidas e nematicidas comercialmente disponíveis foram aplicados às sementes em cinco diferentes combinações. Como resultado observou-se que sob condições normais de produção de soja no Brasil, o pré-tratamento de sementes com inoculante 26 a 78 dias antes do plantio, usando estirpes de *Bradyrhizobium elkanii* e formulação específica, combinado com agentes bioprotetores e com tratamentos químicos de sementes é tão eficaz quanto a inoculação realizada no momento do plantio.

1. INTRODUÇÃO

Uma característica benéfica da soja [*Glycine max* (L.) Merrill] é sua capacidade de se associar com bactérias rizóbicas, sendo altamente eficientes na entrega de nitrogênio, pela simbiose da fixação biológica de nitrogênio (Herridge et al. 2008; Thilakarathna and Raizada, 2017). Inoculantes contendo cepas de elite de *Bradyrhizobium spp.* para a soja, têm sido amplamente utilizados na América do Sul e contribuem fortemente para a nutrição com nitrogênio da soja, apoiando a alta produtividade das culturas (Legget et al., 2017).

Sabe-se que a sobrevivência de rizóbios em sementes diminui à medida que a duração do pré-tratamento de sementes com inoculante aumenta, devido a processos oxidativos e outros processos fisiológicos (Deaker et al. 2004). Esse comportamento varia dependendo das condições ambientais, como temperatura e umidade, bem como da presença de compostos aplicados em combinação com o inoculante, que protegem as células microbianas (Bikrol et al. 2005; Hartley et al. 2012). Vários estudos mostram que o uso de aditivos selecionados facilita a sobrevivência de rizóbios inoculados em sementes quando as sementes também são tratadas em combinação com vários produtos químicos. Por exemplo, Araujo et al. (2017) mostraram que o pré-tratamento de soja com inoculante, em combinação com fungicidas e inseticidas selecionados, foi viável quando as sementes também foram tratadas com o protetor microbiano, mostrando que as práticas de inoculação podem ser realizadas também vários dias antes do plantio, e em combinação com tratamentos com fungicida, inseticida e nematicida.

Nosso objetivo neste trabalho foi descrever a duração do pré-tratamento do inoculante nas sementes com formulação contendo *Bradyrhizobium elkanii* e agentes protetores (CTS500), comparando a nodulação e a produção de grãos das culturas de soja, cultivadas sob uma ampla gama de condições ambientais brasileiras.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Safrá 2016/17, 50 ensaios de campo de soja ao longo de 3 estados brasileiros (Paraná, Goiás e Mato Grosso).

Os estudos no delineamento de blocos completos randomizados com parcelas de 24 m². ANOVA de todos os dados foi realizada usando a média em 50 locais, com as diferenças entre médias determinadas usando o teste de Scott Knott em um nível de significância de 0,10.

Em todos os tratamentos, fungicidas, inseticidas e nematicidas comercialmente disponíveis foram aplicados às sementes em cinco diferentes combinações.

Os tratamentos foram:

i) sementes sem inoculante (**UTC**); ii) sementes inoculadas com rizóbio, mas fertilizadas com 200 kg ha⁻¹ N (46: 0: 0), 50% no plantio e 50% no estágio R1 (**N200**); iii) sementes inoculadas com *Bradyrhizobium japonicum* e *Bradyrhizobium diazoefficiens* no plantio (**IP**); iv) sementes inoculadas com *Bradyrhizobium elkanii* e protetores biológicos, aplicadas no instante do plantio (**IST**); v) sementes inoculadas com *Bradyrhizobium elkanii* e protetores biológicos, aos 38 dias antes do plantio (**CPT**); vi) sementes inoculadas com *Bradyrhizobium elkanii* e protetores biológicos, aos 52 dias antes do plantio (**MPT**) e; vii) sementes inoculadas com *Bradyrhizobium elkanii* e protetores biológicos, aplicadas aos 66 (**LPT**) dias antes do plantio, curto, médio e Longo pré tratamento.

Na safra 2018/19, foram implantados pela equipe de Desenvolvimento tecnológico Bayer, 65 ensaios de franjas em produtores, abrangendo uma vasta gama de ambientes de produção em vários estados brasileiros comparamos a inoculação no plantio e a longo prazo antes do plantio, foram estabelecidos em condições de manejo do agricultor

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os gráficos abaixo mostram a efetividade do tratamento a partir de resultados de nodulação e sua contribuição para a melhoria na produtividade, em todos os locais de teste de campo, aumento no número de nódulos foram observados tanto na raiz principal quanto nas raízes laterais das plantas de soja, independentemente do tempo de pré tratamento.

A produção, usando o rendimento médio de grãos nos 50 ensaios, houve diferenças entre o tratamento controle e o tratamento longa vida (CTS500). Em média, a produtividade das culturas pré-tratadas com

inoculante foi 14 % superior, independentemente do tempo de aplicação do inoculante. Ao utilizar um pré-tratamento de sementes com um inoculante especialmente formulado para proteção microbiana, o pré-tratamento melhorou a nodulação, assim como a produtividade de grãos.

Dados dos 50 ensaios mostram incrementos em número de nódulos da raiz principal (41% a mais no número de nódulos, com 95 % de casos com resposta positivas) e ganho em produtividade (3 % de incremento de produtividade, com mais de 72 % de casos com resposta positivas) quando comparados a faixa com inoculação de longa vida com o uso do inoculante comercial da propriedade.

Média de 50 ensaios de campo nos estados do Paraná, Goiás e Mato Grosso, Brasil. NRP = nódulos na raiz principal, NRL = nódulos nas raízes laterais. Letras diferentes mostram diferenças significativas entre os tratamentos (Scott-Knott, $p < 0,10$).

Média de 50 ensaios de campo nos estados do Paraná, Goiás e Mato Grosso, Brasil. Efeitos nos componentes de rendimento de grãos. Letras diferentes mostram diferenças significativas entre os tratamentos (Scott-Knott, $p < 0,10$).

Efeitos do pré-tratamento de sementes na nodulação e rendimento de lavouras de soja.

As características dos bioprotetores, aliado com o tipo de formulação e o tratamento com químicos compatíveis nos permitiram identificar através de dados laboratoriais de recuento de bactérias que o CTS500 possui, em comparação aos seus concorrentes do mercado, de igual número de dias de pré tratamento, 16,8 vezes mais bactérias vivas e aptas na semente após os 60 dias de tratamento.

Colaboram também com os dados obtidos acima os resultados coletados pelo Time de Representante de Desenvolvimento Tecnológico (TDR) Bayer, nesta safra 2018/2019, aonde em 65 faixas a campo em diferentes ambientes agrícolas do Brasil, comparando CTS500 com tratamento usual do agricultor, obtivemos um incremento no número de nódulos na raiz principal superior a 18 %, e este aumento de número de nódulos na raiz principal foi responsável pelo aumento no rendimento de grão, em 5%. Neste caso o tratamento com inoculante de longa vida mostrou-se superior ao tratamento utilizado pelo agricultor, validando a importância da inoculação em cada safra, e comprovando a eficiência agrônômica da inoculação antecipada.

Média de 65 ensaios em campo de tiras em regiões brasileiras de soja. Efeitos nos nódulos da raiz principal. Letras diferentes mostram diferenças significativas entre os tratamentos (Scott-Knott, $p < 0,10$).

Média 65 ensaios de franjas a campo em regiões brasileiras de soja. Efeitos nos componentes de rendimento de grãos. Letras diferentes mostram diferenças significativas entre os tratamentos (Scott-Knott, $p < 0,10$).

4.CONCLUSÕES

Sob condições normais de produção de soja no Brasil, o pré-tratamento de sementes com inoculante 26 a 78 dias antes do plantio, usando estirpes de *Bradyrhizobium elkanii* e formulação específica, combinado com agentes bioprotetores e com tratamentos químicos de sementes é tão eficaz quanto a inoculação realizada no momento do plantio.

A inoculação de sementes de soja aumenta a nodulação na raiz principal.

Esses resultados confirmam a viabilidade de implementação efetiva do pré-tratamento de sementes de soja, nas regiões produtoras do Brasil, proporcionando benefícios na nodulação e por consequência rendimento, nos sistemas atuais de produção agrícola.

Dados a campo em franjas com produtores nos 65 locais testados pelo time de TDR atestam a eficácia do tratamento antecipado de sementes de soja com inoculante. O Sistema integrado de tratamento de sementes fornecido pelo CTS500, incluindo químicos, inoculante e bioprotetores, é uma ferramenta eficaz na formação de nódulos e garantia de incrementos de produtividade em comparação ao tratamento no momento do plantio.

REFERÊNCIAS

- [1] Araujo, R. S.; S. P. da Cruz; E. L. Souchie; T. N. Martin; A. S. Nakatani; M. A. Nogueira and M. Hungria. 2017. Preinoculation of soybean seeds treated with agrichemicals up to 30 days before sowing: technological innovation for large-scale agriculture. *International Journal of Microbiology*, Article ID 5914786, 11 pp.
- [2] Bikrol, A., Saxena, N. and Singh, K. 2005. Response of *Glycine max* in relation to nitrogen fixation as influenced by fungicide seed treatment. *Afr. J. Biotechnol.* 4:667-671.
- [3] Deaker, R.; R. J. Roughley and I. R. Kennedy. 2004. Legume and seed inoculation technology – A review. *Soil Biol. Biochem.* 36: 1275-1288.
- [4] Hartley, E. J., Gemell, L. G. and Deaker, R. 2012. Some factors that contribute to poor survival of rhizobia on preinoculated legume seed. *Crop. Past. Sci.* 63:858-865.
- [5] Herridge, D. F., Peoples, M. B. and Boddy, R. M. 2008. Global inputs of biological nitrogen fixation in agricultural systems. *Plant Soil.* 311:1-18.
- [6] Leggett, M.; Diaz-Zorita, M.; Koivunen, M.; Bowman, R.; Pesek, R.; Stevenson, C. and Leister, T. 2017. Soybean Response to Inoculation with *Bradyrhizobium japonicum* in the United States and Argentina. *Agron. J.* 109: 1031-1038.
- [7] Thilakarathna, M. S. and Raizada, M. N. 2017. A meta-analysis of the effectiveness of diverse rhizobia inoculants on soybean traits under field conditions. *Soil Biol. Biochem.* 105:177-196.

Capítulo 14

Desempenho e rendimento de carcaça de frangos de corte de crescimento lento alimentados com farelo de palma forrageira

Cicero Cordeiro Pinheiro

Irani Ribeiro Vieira Lopes

Francisco Luan Fernandes Ferreira

Layla Victória da Silva Sousa

Cicera Karine Silva de Souza

Ednardo Rodrigues Freitas

Resumo: A avicultura é uma atividade econômica internacionalizada e uniforme, sem fronteiras geográficas, gerando grande impacto na economia brasileira. Inúmeros trabalhos buscam a implementação de alimentos com menor custo de produção visando a diminuir os custos com ração sem diminuir o desempenho e o rendimento de carcaça. Assim, o objetivo dessa pesquisa foi avaliar o uso de farelo de palma forrageira na alimentação de frangos de corte de crescimento lento. O experimento foi conduzido no Setor de Avicultura da Universidade Federal do Cariri, no período de 18 de setembro a 12 de dezembro de 2018. Foram adquiridos 200 pintos não sexados da linhagem pesadão vermelho, de um dia de idade. De 1 a 27 dias, todos os pintos receberam, à vontade, ração inicial apropriada para frangos de corte de crescimento lento, disponível no comércio local. Quando os frangos completaram 27 dias, foram pesados e distribuídos em um delineamento inteiramente casualizado com três tratamentos (ração controle, ração com 5% de farelo e ração com 10% de farelo de palma) e cinco repetições de 10 unidades cada, totalizando 50 aves por tratamento. Os frangos que receberam dieta contendo 5 e 10% de palma forrageira apresentaram menor consumo alimentar, mas sua conversão alimentar não diferiu significativamente daqueles alimentados somente com ração comercial bem como o ganho de peso. As variáveis peito e coxa + (mais) sobrecoxa não apresentaram diferenças significativas entre si, enquanto o rendimento de carcaça e a moela foram afetados pela inclusão de farelo de palma na alimentação dos frangos. O farelo de palma pode ser utilizado na alimentação de frangos de corte de crescimento lento até o nível de 10%.

Palavras-Chave: Galinha caipira, Alimentação alternativa, Cactácea, Farelo de palma forrageira, *Opuntia*.

1. INTRODUÇÃO

A avicultura é uma atividade econômica internacionalizada e uniforme, sem fronteiras geográficas de tecnologia, sendo considerada, por Vieira e Dias (2005), um complexo industrial que não deve ser analisado apenas sob o aspecto de produção e distribuição, mas, sim, sob uma abordagem sistêmica do setor.

No Brasil, a produção avícola tem forte impacto sobre a economia nacional por gerar 3,5 milhões de empregos e impulsionar a agroindústria, fortalecendo vários setores como os de equipamentos, máquinas, insumos, logística e transporte (BRFRURAL, 2016).

Inicialmente concentrada nas regiões Sul e Sudeste, a atividade vem se espalhando pelo território nacional, aproximando-se não só das regiões produtoras de matérias-primas, caso do deslocamento de criadouros e abatedouros para a Região Centro-Oeste, mas também das regiões consumidoras, o que explica em parte seu crescimento na Região Nordeste. Conquanto a avicultura nordestina não se tenha ainda lançado ao mercado externo (com raras exceções), já se constitui em importante geradora de renda e de emprego (EVANGELISTA, *et al.*, 2008).

A criação avícola tradicional é considerada uma alternativa de emprego e renda para a agricultura familiar na Região Nordeste do Brasil. Além disso, a atividade representa grande importância tanto na questão de segurança alimentar para as famílias quanto no aspecto econômico. Outro ponto relevante é que o esterco pode ser utilizado nos cultivos agrícolas, e essas aves apresentam maior rusticidade, resistência às doenças e às condições adversas de clima e aproveitam os restos de plantios e dos refugos de frutas e hortaliças e outros produtos e resíduos produzidos no seu próprio imóvel rural, sendo feito ainda uso da mão de obra familiar disponível. Para Amando (2018), a produção de galinha caipira é uma atividade viável, pois gera renda no campo e evita o êxodo rural.

De acordo com Silva *et al.* (2003), a exploração de frangos de corte em sistema semi-intensivo com livre acesso a áreas de pastejo e exercício resulta em diferenças particulares na sua qualidade quando comparados àqueles criados em confinamento. Takahashi *et al.* (2006) destacam que as características sensoriais diferenciadas se referem a uma carne mais escura e firme, sabor acentuado e menor teor de gordura na carcaça.

Uma problemática que cresce, concernente à produção avícola, são os custos com alimentação, que representam mais de 70% em razão do aumento dos preços nos dois principais insumos componentes das rações - milho e farelo de soja (SANTOS *et al.*, 2017).

Inúmeros trabalhos buscam a implementação de alimentos com menor custo de produção, visando a diminuir os custos com ração sem diminuir o desempenho e o rendimento de carcaça.

Estudos conduzidos com a palma desidratada e posteriormente triturada em forma de farelo mostraram ser possível alimentar outras espécies de animais, como as aves. Assim, o objetivo dessa pesquisa foi avaliar o uso de farelo de palma forrageira na alimentação de frangos de corte de crescimento lento.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

No Brasil, a produção de carne de frango no ano de 2017 foi de 13.056 (mil t), valor inferior apenas à dos Estados Unidos. Entretanto, com 4.320 (mil t), o Brasil é o maior exportador mundial (ABPA, 2017).

Segundo Amaral *et al.* (2015), a grande competitividade e a produção intensiva de frangos de corte e poedeiras comerciais têm contribuído para o surgimento de novas tendências voltadas para o consumo de carne de frangos e ovos oriundos de sistemas de produção que garantam a segurança alimentar (alimentação isenta de antibióticos, ingredientes de origem animal, promotores de crescimento etc.) ou que sejam ligados à qualidade e ao bem-estar do animal (grande densidade de criação, aves alojadas em gaiolas).

As aves caipiras são naturalmente mais rústicas e resistentes que os frangos de corte ou poedeiras comerciais, o que facilita o manejo. No entanto, os produtos da avicultura alternativa são direcionados a um nicho de mercado bastante exigente, tornando essa atividade cada vez mais tecnificada, eficiente e rentável.

A carne e os ovos das aves caipiras alcançam preços mais elevados do que os das aves industriais no mercado varejista, em razão, principalmente, dos requisitos de produção (crescimento lento dos frangos e menor produção de ovos) e do marketing diferenciado (FILHO e MENDES, 2001). Esse novo segmento do mercado, composto por consumidores dispostos a pagar mais caro por produtos de certificação diferenciada de qualidade, tem contribuído para o desenvolvimento da agricultura familiar, gerando emprego e ampliando a renda.

O grande gargalo da avicultura alternativa de corte é o fato de a carne de aves caipiras chegar ao mercado varejista a um preço mais elevado em relação àquele oriundo de aves industriais. Embora a exploração comercial de galinhas caipiras criadas em regime semi-intensivo utilize material genético melhorado (híbridos), o custo adicional da criação se deve, principalmente, ao crescimento mais lento dos frangos, visto as aves caipiras levarem maior período de tempo para alcançar peso de abate (80 a 90 dias de idade), resultando em maior quantidade de alimento consumido durante a criação de um lote.

A alimentação é um dos itens mais onerosos na exploração econômica de aves, correspondendo a mais de 70% do custo total da produção, sendo causado pelo aumento de preços no milho e farelo de soja, principais insumos componentes das rações. A busca por alimentos alternativos para a substituição do milho-soja tem possibilitado um grande avanço no conhecimento na área de avaliação dos alimentos e das exigências nutricionais de aves e nos programas de alimentação que utilizem as matérias-primas regionais (FERNANDES *et al.*, 2013).

Segundo Benício *et al.* (1993), a escolha de um alimento alternativo deve considerar não só seu valor nutricional, como também sua disponibilidade em uma determinada região por um período mínimo de tempo e em quantidade que permita substituir parcial ou totalmente os alimentos convencionalmente utilizados nas rações de aves.

Das diversas famílias de plantas existentes nas regiões áridas e semiáridas do nordeste brasileiro, as Cactáceas são uma das mais importantes, em virtude do seu mecanismo de adaptação à escassez de água, assim como do seu metabolismo CAM, o que permite maior perenidade em ambientes, algumas vezes, de extrema condição de aridez (ROJAS-ARÉCHIGA e VÁZQUEZ-YANES, 2000).

A palma é um cacto suculento, ramos clorofilados achatados, ramificação superficial, arbustiva, atingindo altura entre 1,5 e 3,0 m, de coloração verde-clara a verde-escura, indo de espinhosa até desprovida de espinhos. As folhas são excepcionalmente pequenas. Peixoto (2004) constatou que a capacidade de fixar o CO₂ no escuro, oriunda do metabolismo ácido das crassuláceas (CAM) e de suas células fotossintetizantes, que mantêm os estômatos fechados durante o dia, evitando perda de água para o ambiente, é uma característica fisiológica fundamental para a adaptação da planta às condições de alta intensidade e estresse hídrico, peculiares às zonas áridas e semiáridas.

Muitas são as pesquisas desenvolvidas sobre o cultivo da palma forrageira, objetivando atingir as melhores condições, com altos índices de produção e redução dos custos para possibilitar ao pequeno produtor uma melhor condição de alimentar o rebanho bovino, caprino e ovino no período de seca. Oliveira *et al.* (2010) afirmam que, nesta área, é necessário valorizar as plantas forrageiras que melhor se adaptam às suas condições climáticas.

Para Chiacchio *et al.* (2006), a palma forrageira tem sido de imenso valor nos períodos de estiagem, servindo de suprimento alimentar para o gado e, ao mesmo tempo, como fonte de água. Os autores também constataram que as diferentes espécies de palma desempenham papel importante na conservação do meio ambiente e na segurança alimentar dos rebanhos.

Estudos conduzidos com a palma desidratada e, posteriormente, triturada em forma de farelo mostraram ser possível alimentar outras espécies de animais. Ludke *et al.* (2006), trabalhando com suínos na fase de crescimento e terminação, observaram ser possível a inclusão de até 21% de farelo de palma forrageira em dietas isonutricionais de suínos, sem prejuízo na qualidade de carne e no rendimento de cortes na carcaça.

Muitas são as pesquisas desenvolvidas sobre o cultivo da palma forrageira, objetivando atingir as melhores condições, com altos índices de produção e redução dos custos para possibilitar ao pequeno produtor uma melhor condição de alimentar o rebanho bovino, caprino e ovino no período de seca.

Apesar de os trabalhos com farelo de palma na alimentação de aves ainda serem bastante escassos, alguns têm mostrado ser promissor o uso deste produto no arraçamento de codornas, frangos de corte comerciais e de aves caipiras.

Algumas das características mais importantes a serem levadas em consideração na escolha de um alimento alternativo, além do valor nutricional, são sua disponibilidade em uma determinada região por um período mínimo de tempo e em quantidade que permita substituir parcial ou totalmente os alimentos convencionalmente utilizados nas rações de aves (BENÍCIO *et al.*, 1993).

Santos *et al.* (2012), analisando níveis de inclusão do farelo de palma miúda (*Nopalea cochenillifera* Salm Dyck) na dieta de codornas japonesas (*Coturnix japonica*), verificaram ser possível a inclusão de até 10% do farelo na fase inicial (8 a 21 dias) sem prejuízos para o desempenho zootécnico dos animais. Para a fase de crescimento (22 a 35 dias), é possível incluir até 20% do farelo de palma na dieta.

Carvalho *et al.* (2012) recomendam a utilização de até 5% de farelo de palma forrageira em substituição ao milho nas rações de codornas europeias, no semiárido.

3.METODOLOGIA

O experimento foi conduzido no Setor de Avicultura do Centro de Ciências Agrárias e da Biodiversidade (CCAB) da Universidade Federal do Cariri (UFCA), Campus Crato, no período de 18 de setembro a 12 de dezembro de 2018. O CCAB está localizado a 7°13'56" de latitude Sul e 39°22'11" de longitude Oeste, com altitude média de, aproximadamente, 440 m.

O farelo de palma forrageira (FPF) foi produzido de raquetes provenientes do Instituto Federal do Ceará – IFCE, Campus Crato. Após ser fatiado em cortador manual e triturado em triturador forrageiro em peneira de 12 mm, o material foi distribuído em lonas plásticas de polietileno e revolvido constantemente para acelerar a desidratação, secando totalmente em três dias. Em seguida, foi triturado novamente em peneira de 4 mm para deixar a granulometria semelhante à da ração comercial e armazenado em baldes plásticos fechados. Uma amostra foi retirada e enviada para análise bromatológica no Laboratório de Nutrição Animal do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal do Ceará (LANA/UFC).

Foram adquiridos 200 pintos, não sexados, da linhagem pesadão vermelho, de um dia de idade, vacinados no incubatório contra Bouda Aviária, Marek e Gumboro.

Ao chegaram ao Setor de Avicultura, os pintinhos foram pesados para formar grupos uniformes em cada unidade experimental, conforme recomendações propostas por Sakomura e Rostagno (2007), e alojados em grupos de 12 em 15 piquetes. Cada piquete era constituído por uma área de alvenaria medindo 2 m², coberta por telha de barro, piso de cimento, com pé direito de 2,40 m e uma área descoberta de 28 m², cercada com tela de arame.

Na fase inicial (1 a 27 dias de idade), todos os pintos ficaram restritos à área coberta, recebendo água e ração comercial apropriada para frangos de corte tipo caipira, com 20% de proteína bruta (PB) e 2.950 kcal/kg de energia metabolizável (EM), à vontade. Durante a primeira semana de vida, as aves foram mantidas aquecidas por lâmpadas incandescentes e com o uso de cortinas durante o período diurno e noturno. A partir do oitavo dia, as lâmpadas ficavam acesas, e as cortinas fechadas somente no turno da noite. Aos 18 dias de idade, todos os pintos foram vacinados contra a doença de New Castle e Gumboro por via ocular.

A temperatura e a umidade relativa do ar foram registradas no período da manhã e à tarde através de dois termo-higrômetros digitais de máxima e mínima, instalados no interior dos galpões.

A ração inicial foi pesada no primeiro dia do experimento e ao final da fase, sendo o consumo alimentar (kg ave/semana) comparado aos valores definidos no manual da linhagem. Com base nesse consumo, foi calculada a quantidade de ração e de farelo de palma que seria disponibilizada nas semanas seguintes.

Quando os frangos completaram 27 dias, foram novamente pesados e distribuídos em um delineamento inteiramente casualizado, com três tratamentos e cinco repetições de 10 unidades cada, totalizando 50 aves por tratamento. Os tratamentos testados foram: (T1) ração controle, com 0% de farelo de palma; (T2) ração com 5% de farelo; e (T3) ração com 10% de farelo de palma. A partir desse período, os frangos passaram a ter acesso à área descoberta.

As rações comerciais fornecidas às aves nas fases de crescimento e final foram formuladas com 18% de PB e 3.050 kcal/kg de EM e 17,5% de PB e 3.150 kcal/kg de EM, respectivamente.

Os frangos submetidos ao T1 (ração controle) foram alimentados com ração comercial sem inclusão do farelo de palma; submetidos ao T2 receberam dieta com 95% de ração e 5% de FPF; e àqueles submetidos ao T3, foi disponibilizada dieta constituída de 90% de ração e de 10% de FPF.

A ração fornecida e as sobras foram pesadas no início e no final de cada fase para determinar a quantidade de ração consumida. O peso médio da parcela foi calculado no dia da chegada dos pintos e aos 27, 54 e 79 dias de idade. A conversão alimentar foi obtida pela relação entre o consumo de ração (kg/ave) e o ganho de peso dos frangos (kg/ave).

As aves foram abatidas aos 85 dias de idade. Na noite anterior ao abate, foi retirada a ração, sendo os frangos submetidos a jejum alimentar de oito horas. Pela manhã, após a pesagem de todas as aves, foram selecionadas duas unidades de cada piquete com pesos próximos ao peso médio da parcela, sendo um macho e uma fêmea, identificadas e sacrificadas manualmente por deslocamento cervical, seguido de sangria, escaldagem (água a 60°C por 3 minutos), depena e evisceração. No momento da evisceração, o fígado e a moela de cada ave foram retirados, identificados e pesados.

As carcaças limpas, sem cabeça e pés, foram pesadas para determinar o rendimento de carcaça (expresso em porcentagem do peso vivo). Em seguida, foram feitos os cortes para calcular o peso relativo da coxa, sobrecoxa e peito inteiro. Os dados de rendimento de carcaça (%), peito (%), coxa e sobrecoxa (%), das vísceras comestíveis (fígado, moela e coração) foram obtidos pela relação entre o peso da parte ou órgão avaliado e o peso da carcaça quente.

Os resultados foram submetidos à análise de variância, pelo procedimento análise de variância ANOVA do programa SAS (2000), e as médias comparadas pelo teste SNK a 5% de probabilidade.

4.RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os valores médios da temperatura máxima e mínima e da umidade relativa do ar também, máxima e mínima, no interior dos galpões no período experimental, foram de 37,3 °C ± 3,2 e 25,5 °C ± 3,2 e de 66,9% ± 12,9 e 29,1% ± 10,9, respectivamente.

Com base na matéria seca (90,38%), o farelo apresentou 6,78% de proteína bruta, 1,36% de extrato etéreo, 15,67% de matéria mineral, 15,85% de fibra em detergente neutro, 14,61% de fibra em detergente ácido e 3.295 kcal energia bruta/kg.

Os resultados apresentados na Tabela 1 mostram que não houve diferença significativa no ganho de peso e na conversão alimentar das aves alimentadas com rações contendo 0, 5 ou 10% de FPF. No entanto, os frangos que receberam farelo de palma na proporção de 5% e 10% apresentaram menor consumo de ração do que aqueles do tratamento controle.

Freitas (2012), trabalhando com frangos de corte alimentados com diferentes níveis (0%, 3%, 6%, 9% e 12%) de FPF, durante 1 a 45 dias, observou aumento no consumo de ração com o incremento dos níveis de palma. Santos *et al.* (2017) avaliaram a inclusão de 0%, 5%, 10%, 15% e 20% de FPF na dieta de codornas no período de 08 a 35 dias e constataram que a inclusão de FPF não afetou significativamente ($P>0,01$). Para Carvalho *et al.* (2012), a utilização de 10% de farelo de palma forrageira na ração de codornas de corte na fase final de criação (36 a 45 dias de idade) resultou em menor consumo alimentar em relação aos outros níveis testados (0, 5 e 15%).

Tabela 1: Desempenho de frangos de corte de crescimento lento alimentados com rações contendo palma forrageira no período de 1 a 79 dias de idade.

Parâmetros	Inclusão de Palma Forrageira			Média	CV (%)
	0%	5%	10%		
Consumo de ração (kg/ave)	8,597 ^a	7,822 ^b	7,666 ^b	8,028	6,44
Ganho de peso (kg/ave)	3,268 ^a	2,985 ^a	2,932 ^a	3,062	7,37
Conversão alimentar	2,63 ^a	2,62 ^a	2,62 ^a	2,62	2,40

Na linha, médias seguidas de letras diferentes diferem entre si pelo teste SNK ($P<0,05$).

Um dos fatores que podem afetar o consumo de alimento pelas aves é o teor de fibra na dieta. Barreto *et al.* (2012) afirmaram que o consumo alimentar de frangos de corte diminui principalmente em aves mais jovens, quando o teor de fibra aumenta em função da baixa capacidade de fermentação desse material no intestino grosso. Leite (2018) ressalta que o maior tempo de retenção do alimento no trato digestivo, principalmente na moela, ocasionado pelo nível de fibra na ração, também confere às aves sensação de saciedade, reduzindo a ingestão. As fibras podem causar aumento do volume do bolo alimentar, proporcionando sensação de saciedade causada pela dilatação da parede estomacal, interferindo na disponibilidade dos demais nutrientes (LEITE, 2009). É possível que o conteúdo fibroso do farelo de palma possa ter contribuído para a menor ingestão alimentar nessa pesquisa.

Na presente pesquisa, o ganho de peso de frangos de corte de crescimento lento aos 79 dias de idade não foi afetado ($P < 0,05$) pelos níveis de FPF incluídos na alimentação das aves durante as fases de crescimento e final. Santos e Granjeiro (2012) avaliaram o desempenho de frangos e de galinhas de corte caipiras submetidos a diferentes dietas com farelo de mandioca e palma forrageira enriquecidos com levedura e também não obtiveram diferença significativa no ganho de peso em função dos tratamentos utilizados.

Por outro lado, Freitas (2012), trabalhando com inclusão de 0%, 3%, 6%, 9% e 12% de FPF na alimentação de frangos de corte de 22 a 45 dias de idade, verificou que o ganho de peso foi aumentando com o incremento do farelo na ração. Santos *et al.* (2017), trabalhando codornas no período de 8 a 35 dias de idade, alimentadas com 0%, 5%, 10%, 15% e 20% de FPF, observaram que, à medida que se aumentou o nível de FPF, o ganho de peso das aves foi reduzido.

A conversão alimentar não diferiu significativamente entre os tratamentos ($P < 0,05$) (Tabela 1). Resultados semelhantes foram obtidos por Santos *et al.* (2017) em codorna, com a inclusão de 0%, 5%, 10%, 15% e 20% de farelo de palma no período de 8 a 35 dias.

Esses resultados diferem daqueles relatados por Carvalho *et al.* (2012), que alimentaram codornas com quatro níveis de FPF (0, 5, 10 e 15%) na ração e observaram que a melhor conversão alimentar foi obtida pelas aves cuja ração continha 5% do farelo.

As variáveis percentagem de peito e coxa + (mais) sobrecoxa não diferiram significativamente entre si quando os frangos foram submetidos a dietas com e sem FPF, no entanto, o rendimento de carcaça, a percentagem de fígado e de moela apresentaram diferença pelo teste de SNK ($P < 0,05$) (Tabela 2).

Tabela 2: Características de carcaça de frangos de corte de crescimento lento alimentados com rações contendo palma forrageira.

Parâmetros (%)	Inclusão de Palma Forrageira			Média	¹ CV (%)
	0%	5%	10%		
² Carcaça	75,20 ^a	73,61 ^b	74,03 ^b	74,28	0,89
Peito	26,86 ^a	25,46 ^a	26,72 ^a	26,35	8,26
Coxa + sobrecoxa	28,66 ^a	28,33 ^a	28,80 ^a	28,60	4,98
Moela	1,46 ^b	1,74 ^a	1,82 ^a	1,68	8,71

¹CV=Coeficiente de variação. ²Relação entre o peso da carcaça (sem cabeça, pés e vísceras) e o peso da ave viva em jejum. Na linha, médias seguidas de letras diferentes diferem entre si pelo teste SNK ($P < 0,05$).

As aves alimentadas com 5% e 10% de FPF apresentaram piores rendimentos de carcaça em relação àquelas do tratamento controle. Esses resultados se assemelham àqueles apresentados por Silva *et al.* (2018) utilizando níveis de substituição de 0%, 1%, 2% e 3% de farinha da cactácea ora-pro-nóbis (*Pereskia aculeata*) na dieta. Os pesquisadores relataram que o rendimento de carcaça dos frangos de corte no período 1 a 42 dias não foi influenciado pelos tratamentos avaliados.

No entanto, Brandão (2011), trabalhando com codornas europeias (*Coturnix coturnix*), observou que o farelo de palma forrageira pode substituir o milho em até 5%, sem prejuízos no rendimento de suas carcaças.

O farelo de palma não influenciou a percentagem de carnes nobres, peito e coxa + sobrecoxa. Silva *et al.* (2018) também verificaram que frangos de corte alimentados com farinha da folha de ora-pro-nóbis em níveis crescente (0%, 1%, 2% e 3%) aos 42 dias de idade não tiveram as variáveis estudadas afetadas.

Almeida *et al.* (2009) alertam que uma grande variação no peso de partes da carcaça descrita na literatura pode ser atribuída a vários fatores, entre eles a falta de padronização empregada nos cortes.

Nesse experimento, o peso da moela das aves aumentou com os níveis crescentes de FPF na dieta. Conforme foi descrito por Hetland *et al.* (2004), o tamanho e o conteúdo da moela são afetados pelo aumento ou redução de fibra bruta na dieta. De acordo com Rufino *et al.* (2017), a influência da alimentação nas características da moela está associada ao estímulo mecânico deste órgão, que depende do nível, do tipo e da fonte de fibra utilizada, além das propriedades físico-químicas da ração e, consequentemente, da maior atividade dos músculos da moela. Assim, é possível que o teor de fibra do FPF possa estar associado ao peso da moela analisada.

5.CONCLUSÕES

O farelo de palma forrageira pode ser incluído na ração de frangos de corte de crescimento lento de 28 a 85 dias de idade até o nível de 10%, sem prejudicar o desempenho e as características de carcaça.

REFERÊNCIAS

- [1] ABPA– Associação Brasileira de Proteína Animal. Relatório Anual 2017. Disponível em: <http://abpa-br.com.br/storage/files/3678c_final_abpa_relatorio_anual_2016_portugues_web_reduzido.pdf>. Acesso em: 14 de Out. de 2019.
- [2] Almeida, A. P. S.; Pinto, M. F.; Poloni, L. B.; Ponsano, E. H. G.; Garcia Neto, M. Efeito do consumo de óleo de linhaça e de vitamina no desempenho e nas características de carcaça de frango de corte. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, v. 61. N. 3, p. 698-705, 2009.
- [3] Amando, M. R. DA S. A importância da criação de galinhas como fonte de renda no assentamento Mandassaia-Orocó/Pe. Orocó, 2018.17 p. Monografia (especialização em Educação no Campo). Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, UNIVASF, 2018.
- [4] Amaral, G.; Guimarães, D.; Nascimento, J. C.; Custodio, S. Avicultura de postura: estrutura da cadeia produtiva, panorama do setor no Brasil e no mundo e o apoio do BNDES. BNDES Setorial 43, p. 167-207, 2015.
- [5] Barreto, V. N. S.; Menezes, D. R.; Perreira, L. G. R.; Araújo, G. G. L. A.; Silva, A. E. V. N.; Sousa, L. N.; Barbosa, A. L.; Costa, J. M. S.; Moreira, R. F. *Atriplex nummularia* como alternativa alimentar para frangos Caipira Francês. Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal, v.13, p.214-223, 2012.
- [6] Benício, L. A. S.; Fonseca, J. B.; Silva, D. J. da; Rostagno, H. S.; Silva, M. A. A utilização do aguapé (*Eichhornia crassipes*) em rações prensadas para poedeiras comerciais. Revista da Sociedade Brasileira de Zootecnia, 22(1):155-166, 1993.
- [7] Brandão, J. S. Substituição do milho pelo farelo de palma forrageira nas rações de codornas europeias no semiárido. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) - Universidade Federal de Campina Grande, Patos, 2011. 37 f.
- [8] Brfrural. Publicação da área de agropecuária da BRF-nº30. Curitiba: Agosto 2016. 16p.
- [9] Carvalho, A. V. de; Brandão, J. S.; Brandão, P. A.; Souza, B. B. de; Ferreira, D. H. Silva, D. R. P. da; Almeida, A. P.; BATISTA, N. L. Farelo de palma forrageira na fase final de criação sobre o desempenho de codornas de corte criadas no semiárido. Rev. Cient. Prod. Anim., v.14, n.2, p.177-180, 2012.
- [10] Chiacchio, F.P.B.; Mesquita, A.S.; Santos, J.R. Palma forrageira: uma oportunidade econômica ainda desperdiçada para o semiárido baiano. Bahia Agrícola, v.7, n.3. 2006.
- [11] Evangelista, F. R.; Nogueira Filho, A.; Oliveira, A. A. P. A avicultura industrial de corte no nordeste: aspectos econômicos e organizacionais. 2008.
- [12] Fernandes, R. T. V., Vasconcelos, N. V. B., França Lopes, F., Arruda, A. M. V. & Pinto, A. R. M. (2013). Aspectos gerais sobre alimentos alternativos na nutrição de aves. Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável, 7, 67-72.
- [13] Filho, L.C.D.; Mendes, C. M. I. Viabilidade técnica e econômica na criação alternativa de frangos. In: Conferência apinco de Ciência e Tecnologia Avícolas, 2001. Campinas. Anais... Campinas: FACTA, 2001, p. 254-266.
- [14] Freitas, J. C. P. Efeito da substituição do farelo de milho (*Zea mays*) pelo farelo de palma (*Opuntia ficus-indica* Mill) na alimentação de frangos de corte. Monografia (Graduação em Ciências Agrárias) - Universidade Federal da Paraíba, Catolé do Rocha, 2012. 12f.

- [15] Hetland, H.; Choct, M.; SVIHUS, B. Role of insoluble non-starch polysaccharides in poultry nutrition. *World's Poultry Science Journal*, v. 60, n. 4, p. 415-422, 2004.
- [16] Leite, B.G. de S. Fibra na dieta de poedeiras comerciais. 2018.47 f. Dissertação (Mestrado em ciências) – Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2018.
- [17] Leite, M. L. M. V. Avaliação de clones de palma forrageira submetidos a adubações e sistematização de informações em propriedades do semiárido paraibano. 2009. 186 f. Tese (Doutorado em Zootecnia) - Universidade Federal da Paraíba, Areia, 2009.
- [18] Ludke, J.V.; Andrade, M.A. de A.; Ludke, M. do C.M.M.; Rosa, M. das G.S.; Silva, A.M. da.; Bertol, T.M.; Freitas, C.R.G.de.; Thaysa R. Farelo de palma forrageira na alimentação de suínos em crescimento e terminação - desempenho e avaliação econômica. In: IV Congresso Nordestino de Produção Animal. 4. 2006, Petrolina. Anais... Petrolina: CNPA, 2006.
- [19] Oliveira, F. T. de; Souto, J. S.; Silva, R.P. da; Andrade Filho, F.C. de; áridos e semiáridos. *Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável*, v. 05, p. 27-37, 2010.
- [20] Peixoto, M. J. A. Aclimatização de plantas micropropagadas de palma forrageira *Opuntia ficus-indica* (L.) Mill. em diferentes substratos. 2004. 46f. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza.
- [21] Rojas-Arehchiga, M.; Vahzquez-YANES, C.; Cactus seed germination: a review. *Journal of Arid Environments*, (2000) 44: 85–104.
- [22] Rufino, J. P.F.; Cruz, F.G.G.C.; Oliveira Filho, P. A.; Melo, R.D.; Feijó, J. C.; Melo, L. D. Fibra alimentar em dietas para aves – Uma revisão. *Revista Científica de Avicultura e Suinocultura*, v. 3, n. 2, p. 033-042, 2017.
- [23] Sakomura, N.K.; Rostagno, H.S. Métodos de pesquisa em nutrição de monogástricos. Jaboticabal: FUNEP, 2007. 283p.
- [24] Santos, J. F. dos; Grangeiro, J. I. T. Desempenho de aves caipiras de corte alimentadas com mandioca e palma forrageira enriquecidas com levedura. *Tecnologia & Ciência Agropecuária*, João Pessoa, v.6, n.2, p.49-54, 2012.
- [25] Santos, J. S.; Cunha, F. S. A.; Silva, R. A. C.; Miranda, P. B. P; Duarte, M.E.; Soares, A. L. S.; Lima, F. S.; Menezes, J. C. Desempenho de codornas japonesas (*Coturnix japonica*) na fase de 22 a 35 dias, alimentadas com dietas contendo diferentes níveis de inclusão do farelo de palma (*Nopalea cochenillifera* Salm Dyck). Anais... VII Congresso Nordestino de Produção Animal, Maceió, Alagoas, 2012.
- [26] Santos, J. S.; Cunha, F. S. A.; Silva, R. A. C.; Miranda, P. B. P; Duarte, M.E.; Soares, A. L. S.; Lima, F. S.; Menezes, J. C. Desempenho de codornas japonesas (*Coturnix japonica*) na fase de 22 a 35 dias, alimentadas com dietas contendo diferentes níveis de inclusão do farelo de palma (*Nopalea cochenillifera* Salm Dyck). Anais... VII Congresso Nordestino de Produção Animal, Maceió, Alagoas, 2012.
- [27] Santos, J. S.; Cunha, F. S. de A.; da Silva R. A. C.; Soares, A. L.S. Farelo de palma na alimentação de codornas. *Nutritime Revista Eletrônica*, Vol. 13, Nº 04, 2017.
- [28] Silva, M. A. N.; Filho, P. H.; Rosário, M. F.; Coelho, A. A. D.; Savino, V. J. M.; Garcia, A. A. F.; Silva, I. J. O. Menten, J. F. M. Influência do Sistema de Criação sobre o Desempenho, a Condição Fisiológica e o Comportamento de Linhagens de Frangos para Corte. *Revista Brasileira de Zootecnia*, v.32, n.1, p.208-213, 2003.
- [29] Silva, V. B. M. da; Brainer, M. M. de A. B.; MARTINS, J. de S.; Oliveira, H. B. de; Souza, V. B. de L.; Cândido, G. de P. Rendimento de carcaça e cortes nobres de frangos alimentadas com farinha da folha de ora-pro-nóbis (*Pereskia aculeata*). 2018. Disponível em:< <https://even3.blob.core.windows.net/anais/110817.pdf>>. Acesso em 04 de out. de 2019.
- [30] Takahashi, S. E.; Mendes, A. A.; Saldanha, E. S. P. B.; Pizzolante, C. C.; Pelícia, K.; Garcia, R. G.; Paz, I. C. L. A.; Quinteiro, R. R. Efeito do sistema de criação sobre o desempenho e rendimento de carcaça de frangos de corte tipo colonial. *Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia*, v. 58, p. 624-632, 2006.
- [31] Vieira, N. M.; Dias, R. S. Uma abordagem sistêmica da avicultura de corte na economia brasileira. Artigo Científico. Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2005.

Capítulo 15

Controle estatístico e análise da capacidade do peso de frangos pré abate

Miliano De Bastiani

Carla Adriana Pizarro Schmidt

Gloria Patrícia López Sepulveda

José Airton Azevedo dos Santos

Resumo: Com a crescente automatização dos processos de abate, a padronização do tamanho dos animais vem se tornando cada vez mais indispensável. O objetivo do presente estudo foi a construção de gráficos de controle estatístico e avaliação da capacidade do processo em atender os limites de especificação de pesos para adequação aos equipamentos automatizados e embalagens de uma agroindústria de abate de aves. Foram coletados 1200 pesos médios dos frangos pré-abate, a construção de gráficos de controle e as análises de capacidade foram executadas com o auxílio do software Action Stat®. Observou-se que os dados utilizados seguiram uma distribuição normal, sendo que o peso médio dos frangos foi de 2,82 Kg com um desvio padrão de 0,16. Alguns pesos médios avaliados mostraram-se fora dos limites de controle, sendo 16 abaixo do limite inferior e 9 acima do limite superior. O processo não foi capaz de atender os limites de especificação inferior 2,6 e superior 2,9 adotados pela empresa apresentando índices de capacidade do processo 0,14, de especificação inferior 0,44 e de especificação superior 0,14. Concluiu-se que o peso dos frangos não foi capaz de atender os limites de especificação adotados pela empresa, apresentando alguns desvios dos limites de controle.

Palavras-Chave: Agroindústria; Análise Estatística; Processo de Produção.

1. INTRODUÇÃO

Na cadeia produtiva de frangos a eficiência está relacionada a vários fatores, tais como: melhoramento das linhagens; automação do sistema produtivo; controle das condições sanitárias da criação; aperfeiçoamento da mão de obra; manejo das aves e sistema de produção integrado (Oliveira & Nääs, 2012). Os investimentos relacionados a esse setor, incluem a criação de novas linhagens de matrizes, inovações tecnológicas, aquisição e implementação de equipamentos modernos nas etapas de criação, abate e processamento (Albino & Tavernari, 2008). De acordo com CPT, (2011), os frangos podem ser abatidos a partir de 1 Kg de peso vivo, com idade entre 25 e 30 dias, porém cabe destacar que dependerá do mercado para o qual ele estará sendo direcionado, a preferência do mercado externo é por aves menores dessa forma se o frango for para exportação deve ser menor, outro fator que deve ser levado em conta é a máxima eficiência em relação à conversão alimentar, que fica bem pior após os 42 dias de idade quando a ave pesa em torno de 2,150 Kg. Segundo Costa, Epprecht e Carpinetti (2012), o controle dos processos é importante para indústrias ou organizações prestadoras de serviço. Estas técnicas podem identificar desvios nas especificações e permitir correções. Para Ramos, Almeida e Araújo (2013), o controle estatístico é uma técnica composta por um conjunto de ferramentas aplicadas ao monitoramento dos processos para obtenção de limites de controle. Com base nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo realizar a construção de gráficos de controle para avaliar a especificação de pesos das aves na adequação dos equipamentos automatizados de uma agroindústria de abate de frangos de corte.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Os dados foram obtidos junto a uma empresa de abate de aves instalada na região oeste do estado do Paraná. Cada uma das repetições de pesos médios foi obtida pela divisão do peso total do lote pela quantidade de aves desse mesmo lote. Os pesos médios das aves dos 1200 lotes utilizados para análise apresentada neste estudo, foram coletados de forma automatizada, através de plataforma de pesagem do modelo 900i correspondente a marca Toledo do Brasil, quando o caminhão carregado chega até na Agroindústria para realizar a descarga pré-abate das aves. Os dados foram tabulados em planilha eletrônica Microsoft Excel[®] e as análises foram executadas com o auxílio do software Action Stat[®] (Estatcamp 2014). Primeiramente a normalidade dos 1200 pesos médios dos lotes das aves obtidos na entrada da linha de abate foi testada, posteriormente os dados foram utilizados como valores individuais para a elaboração da análise de Controle Estatístico do Processo (CEP), pois pesos realmente individuais não são coletados, por esse motivo optou-se pelo uso de gráfico de amplitude móvel e não de desvio padrão o qual necessitaria do peso de cada ave individualmente. Para a análise de capacidade do processo utilizou-se os mesmos 1200 valores de pesos médios das aves utilizando-se os limites superiores e inferiores de especificação indicados pela própria empresa que são de 2,6 e 2,9 Kg.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O conjunto de dados coletados obedeceu a distribuição normal, dessa forma podem ser submetidos a uma análise de CEP sem necessidade de tratamento ou transformação. Observou-se 16 pontos com valores de peso inferiores ao valor estabelecido pela análise como limite inferior de controle e 9 valores acima do limite superior de controle, sendo que a média foi o peso 2,826 Kg. Desta forma, os limites de controle do processo obtidos por esse estudo podem ser observados na Tabela 1. O uso do gráfico de CEP pela empresa então possibilitará um melhor controle de todos os valores que ficarem fora dos limites de controle estabelecidos, sendo que estes poderão então ser investigados, por meio de um acompanhamento dos motivos dos pesos médios das aves estarem acima ou abaixo dos limites estabelecidos, tais como a relação dos pesos com a conversão alimentar, com os dias de idade e com vários outros índices zootécnicos daquele lote, os quais a empresa já controla em seu banco de dados. Após o uso dessa ferramenta a empresa apresentará um melhor

entendimento da influência de tais fatores no desempenho de peso médio dos animais no préabate. Tal estudo de padronização dos pesos mostra-se importante para reduzir a necessidade de alterações na linha de produção, principalmente no que diz respeito à regulagem de equipamentos automatizados e na padronização das embalagens primárias e secundária entre outras partes do processo onde o tamanho padrão seja necessário.

Tabela 1 - Valores dos limites de controle estabelecido para a Agroindústria acompanhada pelo estudo.

Tipo de Limite	Valor Indicado
Superior	3.185
Central ou Médio	2.8266
Inferior	2.4684

Figura 1. Gráficos de Controle Estatístico dos pesos individuais em Kg dos frangos ao final da linha de abate.

Flemming (1989), explica que o ganho de peso é inversamente proporcional à idade das aves, sendo que o mercado vem ano a ano buscando apresentar aves prontas para o abate cada vez mais jovens. De acordo com CPT (2011), após 42 dias de idade as aves já estariam com peso acima de 2Kg e poderiam ser abatidas, sendo que após essa idade a conversão alimentar se reduziria, nesse estudo a média de idade das aves foi de 45 dias, superior ao recomendado. Porém a empresa apresenta limites de especificação de peso para abate superiores ficando entre 2,6 e 2,9 Kg. Observando-se a análise da capacidade do processo, em atender esses limites de especificação, verificou-se que o processo não foi capaz de atender nenhuma das especificações indicadas pela indústria como desejáveis para o processo, apresentando índices

de capacidade do processo 0,14, de especificação inferior 0,44 e de especificação superior 0,14, de onde se pode observar que o problema mais destacado foi a falta de capacidade do processo em atender os limites de especificação superior (Figura 2). Fica claro diante do

exposto que os animais estão sendo abatidos com mais idade do que deveriam o que faz com que fiquem acima do peso, isso ocasiona maior tempo de consumo de ração e pode ocasionar gastos desnecessários para a agroindústria. Observa-se que o processo precisa de ações de melhoria a fim de reduzir a variabilidade do peso médio dos frangos vivos trazidos para o abate.

Figura 2. Análise da Capacidade do Processo em relação ao peso vivo dos frangos.

4.CONCLUSÕES

Com base na avaliação do controle estatístico observou-se que a empresa não trabalha com todos os lotes dentro dos limites de controle e que não consegue atender aos seus próprios limites de especificação para o peso médio pré-abate. Concluiu-se ainda que a empresa poderia reduzir a idade de abate e com isso melhorar a capacidade de seu processo produtivo.

REFERÊNCIAS

- [1] Albino, L.F.T.; Tavernari, F.C. Produção e manejo de frangos de corte. Viçosa: UFV, 2008.
- [2] Costa, A. F. B.; Epprecht, E. K.; Carpinetti, L. C. R. Controle Estatístico de Qualidade. 2.ed., São Paulo: Atlas, 2012.
- [3] CPT – Centro de Produções Técnicas. Frangos de corte: idade e peso para o abate. 2011. Disponível em: <https://www.cpt.com.br/cursos-avicultura/artigos/frangos-de-corte-idade-epeso-para-o-abate>. Acesso em: 08/08/2016.
- [4] Estatcamp. Software Action. Equipe Estatcamp- Consultoria em estatística e qualidade, São Carlos - SP, Brasil. 2014. Disponível em: <<http://www.portalaction.com.br/>>. Acesso em: 04/05/2017.
- [5] Flemming, R. Determinação da idade ideal de abate de frangos de corte, considerando-se os teores de umidade, proteína e extrato etéreo da carcaça. Dissertação de Mestrado em Ciências Veterinárias da Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 1989.
- [6] Oliveira, D.R.M.S. & NÄÄS, I.A. Issues of sustainability on the Brazilian broiler meat production chain. In: International Conference Advances IN Production Management Systems, 2012. Ramos, E. M. L. S; Almeida, S. S.; Araújo, A. R. Controle Estatístico da Qualidade. Porto Alegre: Bookmann, 2013.

Capítulo 16

Entraves na implantação da piscicultura no Povoado Quadra Fé em Deus, Zé Doca-MA

Nathália Lira de Oliveira

Lucélia da Cunha Rodrigues Guimarães

Elka Machado Ferreira

Fabiano Brito Duailibe

Leyde Emanuelle Costa Pereira

Amauri Ernani Torres Areco

Resumo: O Brasil se destaca como um país com grande potencial para aquicultura devido a relevante disponibilidade de água doce e amplo litoral. A intensificação nos sistemas de produção de organismos aquáticos tem revelado obstáculos que afetam a produtividade e o crescimento da atividade. Diante disto, objetivou-se identificar os principais entraves na implantação da piscicultura no povoado Quadra Fé em Deus, no município de Zé Doca- MA. A pesquisa foi realizada através de entrevistas com questionários estruturados com piscicultores da região. Verificou-se como principais entraves a carência de assistência técnica no manejo da piscicultura; alto custo com insumos e falta de organização dos piscicultores em associações. Todos estes entraves dificultam o desenvolvimento sustentável e a inserção socioeconômica deste setor na região estudada.

Palavras-chave: associativismo, gestão, peixes, produção

1 INTRODUÇÃO

O Brasil é um país com grande potencial para piscicultura uma vez que possui características favoráveis ao desenvolvimento aquícolas, como 12% da água doce do planeta, um litoral de 8.500 km, uma Zona Econômica Exclusiva (ZEE) de 4,5 milhões de km², clima tropical na maior parte do território, significativa produção de grãos e uma grande diversidade de espécies com potencial zootécnico e mercadológico. A produção aquícola nacional de origem continental aumentou de forma significativa de 2010 para 2011, com um incremento de aproximadamente 38%, demonstrando um crescimento consistente no setor da aquicultura. Na região Nordeste a produção aquícola continental em 2011 foi de 134.292,6 toneladas, sendo o Maranhão responsável por 32.238,0 toneladas, destacando-se como o segundo maior produtor da região (BRASIL, 2013).

Os sistemas de produção aquícola, apesar de promissores, enfrentam diversos desafios. A intensificação nos sistemas de produção tem revelado obstáculos que afetam a produtividade e o crescimento da atividade, sendo a sanidade um dos principais (RESENDE, 2009). Altas densidades, manejo inadequado, deficiências nutricionais e variações nas características físico-químicas da água favorecem a quebra no equilíbrio do sistema hospedeiro/patógeno/ambiente. Para Ostrensky et al., (2007) deficiências e carências técnicas e estruturais do setor produtivo, aliadas à histórica falta de prioridade do Estado brasileiro com a sua produção, são os maiores gargalos da aquicultura.

O conhecimento dos reais obstáculos enfrentados no dia a dia das pisciculturas, bem como a opinião dos piscicultores e técnicos sobre estes obstáculos, é fundamental para a definição de políticas e ações voltadas ao desenvolvimento do setor (KUBTZA et al., 2012). Nesse sentido, o diagnóstico é um elemento fundamental para a administração de qualquer cadeia ou setor produtivo. Sem adequada identificação da situação e reais problemas que afetam a atividade, fica praticamente impossível propor alternativas que possam transformar o setor de maneira positiva, garantindo de certa forma a segurança do alimento e a saúde pública (OSTRENSKY et al., 2007).

Diante disto, objetivou-se identificar no Povoado Quadra Fé em Deus, Zé Doca, MA os principais entraves que afetam a atividade piscícola local e que podem comprometer a qualidade do produto, a segurança do alimento e dos consumidores.

2 METODOLOGIA

Neste estudo foram entrevistados proprietários de seis pisciculturas situadas no Povoado Quadra Fé em Deus, no município de Zé Doca - MA. A entrevista foi realizada nos meses de fevereiro e março de 2016, mediante a aplicação de questionário estruturado com perguntas abertas e fechadas, visando o levantamento de dados de questões sociais, econômicas, ambientais e técnicas, tais como escolaridade, renda familiar, tempo de atividade, informações quanto ao histórico da propriedade, infraestrutura, caracterização do sistema de criação, espécies criadas, comercialização, filiação às associações, prestação de serviços público e privado, dificuldades e sugestões para desenvolvimento da piscicultura, entre outras.

Para a seleção dos piscicultores, contou-se com a colaboração da Secretaria de Agricultura da cidade de Zé Doca - MA, sendo selecionados somente aqueles que desempenhavam a piscicultura ativamente e que representavam a realidade do sistema de criação do local. Foram selecionadas pisciculturas com mais de dois tanques de criação, sendo estas identificadas como A, B, C, D, E e F.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Todos os proprietários eram do sexo masculino com idade média de 52 anos, o número de integrantes por família variou de dois a cinco pessoas. A mão de obra em todas as propriedades era familiar, tornando-se um ponto positivo por serem inseridos em programas de apoio à agricultura familiar como o PRONAF (Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar). Do total de piscicultores e seus familiares, 22 pessoas, 45% possuíam ou estavam cursando o nível médio, 35% concluíram o ensino fundamental ou estava incompleto. O percentual de pessoas com nível superior foi igual ao de alfabetizados (10%). A escolaridade dos piscicultores é favorável ao planejamento de ações futuras de capacitação adequadas a este público, uma vez que o grau de instrução pode restringir ou limitar as atividades vinculadas à piscicultura, dificultando ou facilitando a propagação do setor e o crescimento ordenado e planejado das ações.

Quanto ao tempo de trabalho com piscicultura, 66,66% dos produtores possuía entre cinco e 10 anos, 16,67% menos de cinco anos e 16,67% mais de 10 anos de atividade. A piscicultura desenvolvida por tanto tempo demonstra que essa atividade pode ser rentável para quem produz, o que colabora para permanência no setor. Outro fator relevante para manutenção é a colaboração com associados, fator observado durante a entrevista, que contribui para crescimento produtivo e aperfeiçoamento das técnicas que visam o maior ganho financeiro. O perfil econômico revelou que 16,67% dos produtores possuía renda entre 1.000 a 2.000R\$, 50% entre 2.000 a 3.000R\$ e 33,33% entre 3.000 a 5.000R\$. Ao serem questionados sobre a contribuição da piscicultura para a renda familiar, a maioria afirmou que a atividade é satisfatória e que contribui para o aumento da renda e qualidade de vida da família.

Constatou-se que todas as propriedades eram delimitadas por cerca e que possuíam entre cinco e 50 hectares. O ambiente de criação dos peixes em todas as propriedades ocorria em viveiros e não havia padronização de tamanho e formato. Apenas 50% dos piscicultores souberam informar o tamanho dos viveiros, com o menor contendo 600m² e o maior 3.000m², uma média de dois hectares de lâmina de água por propriedade. Em 50% das propriedades, os viveiros possuíam entrada e saída de água. Todos os viveiros foram construídos com auxílio de maquinários, porém sem acompanhamento técnico adequado. Nas pisciculturas visitadas, verificou-se problemas como má escolha do local para construção do viveiro, formato e sistemas de captação e drenagem inadequados. Nenhum dos produtores declarou realizar desinfecção do viveiro, porém a correção do solo era realizada com cal virgem sobre orientação técnica.

Quanto à quantidade de viveiros, os piscicultores possuíam entre três e 15 tanques, conforme Tabela 1. De acordo com Castro et. al (2014), geralmente as pisciculturas são classificadas pelo número de tanques em pequena (um a três tanques), média (quatro a seis tanques) e grande (oito a 28 tanques).

Tabela 1. Número de tanques e classificação das pisciculturas localizadas no povoado Quadra Fé em Deus, Zé Doca, MA, quanto ao tamanho.

Piscicultura	Número de tanques	Classificação
A	15	Grande
B	11	Grande
C	5	Média
D	7	Média
E	3	Pequena
F	7	Média

A disponibilidade de água para as pisciculturas dependia do período chuvoso, compreendido entre dezembro e junho, quando os piscicultores abasteciam seus viveiros e fontes de água. Somente neste período havia a renovação da água dos viveiros. Apesar de terem reservas para o ano todo, os piscicultores também utilizavam água da chuva para usos múltiplos como irrigação de hortas e dessedentação de outras espécies de animais de produção. Alguns piscicultores ainda abasteciam os viveiros bombeando água de poço.

Quanto aos cuidados com a qualidade da água nos cultivos, apenas 33,33% dos piscicultores monitoravam a água aferindo parâmetros como temperatura, transparência e pH, porém era uma prática realizada esporadicamente ou quando havia algum problema na criação. Manter a água em condições adequadas para criação de organismos aquáticos é um aspecto importante e complexo, que exige principalmente um manejo efetivo. Santos et al. (2008) enfatizam que o monitoramento dos parâmetros de qualidade da água exige equipamentos caros ou uma série de reagentes químicos, o que torna o procedimento difícil, sendo feito esporadicamente. No entanto, o que se observou neste estudo foi que, apesar da maioria dos piscicultores não exercerem a prática adequada de monitoramento de água, estes estavam cientes da importância.

Para alimentação dos peixes todos os piscicultores utilizavam ração comercial, diferenciada na fase de recria (maior teor de proteína) e de engorda (menor teor de proteína). Alguns piscicultores ofertavam aos peixes produtos agrícolas como milho e mandioca, para suplementar a ração. Segundo a Embrapa (2013), em sistemas semi-intensivos não é recomendado utilizar alimentos além da ração, uma vez que estes não

são balanceados como a ração e tal prática pode prejudicar a qualidade da água e consequentemente o crescimento dos peixes.

Todos os produtores relataram fazer biometria e a maioria conseguia medir a conversão (quantidade de ração que o peixe utilizou para engordar 1 kg), porém o faziam de forma esporádica, alguns piscicultores não mexiam nos peixes com frequência, pois temiam o estresse ao peixe e a mortalidade. A Embrapa (2013) orienta que o ajuste da taxa de alimentação e do tipo de ração a ser fornecida aos peixes deve ser feito, de preferência, semanal ou quinzenalmente para a fase de recria e quinzenal ou mensalmente para a fase de engorda. Através de tal prática, há uma melhoria na eficiência da produção.

Quanto aos alevinos, 16,67% dos produtores adquiria em laboratório no próprio município, 33,33% dos produtores em laboratório no município de Santa Rita - MA a 293 km do município de Zé Doca - MA, estes revendiam aos demais produtores, atuando assim em etapas diferentes de produção. Apesar de existir laboratório no município, percebeu-se a preferência pelo laboratório fora do município, por fornecer alevinos de tamanho padronizado e sem deformações, além de embalagem segura (saco plástico com oxigênio). Apesar de geograficamente mais próximo, os produtores consideram o laboratório do município de Zé Doca, de baixa qualidade. Quanto à aquisição de alevinos, 50% dos produtores adquiriam uma vez ao ano, os demais duas vezes ao ano, sendo que entre os que adquiram uma vez ao ano estão os piscicultores responsáveis pelas pisciculturas com maior produtividade e adquiram em maior quantidade, reduzindo custos com transporte e frete.

Em relação à sanidade dos peixes, apenas um produtor relatou ter problemas durante o período da seca; falta de oxigênio, em que os peixes subiam a superfície da lâmina d'água e não se alimentavam; os demais informaram não ter problemas. Os principais predadores de cultivo de peixe mencionados foram pássaros, patos, lontras, cobras, jacarés, camarões e traíras.

83,33% dos piscicultores cultivavam duas ou mais espécies (policultivo) e apenas 16,67% dos piscicultores cultivava uma espécie (monocultivo). As espécies cultivadas eram tabatinga (*Colossoma macropomum* x *Piaractus brachypomus*), tambacu híbrido (pacu x tambaqui) tilápia do Nilo (*Oreochromis niloticus*), curimatã (*Prochilodus lineatus*), piau (*Leporinus piau*), tambaqui (*C. macropomum*), pacu (*Piaractus mesopotamicus*) e pirapitinga (*Piaractus brachypomus*), Tabela 2. Com destaque para as espécies tabatinga e curimatã cultivadas por 83,33% e 66,67% dos produtores, respectivamente. Verificou-se na região uma situação favorável ao policultivo, tal sistema é interessante tanto no ponto de vista da diversidade de espécie ofertada na comercialização, como no aproveitamento do alimento pelos peixes no ambiente de cultivo. Segundo Ostrensky et al., (2007) na utilização simultânea de várias espécies há um aproveitamento das diferentes formas de alimento natural, presente no ambiente, por meio de espécies com hábitos alimentares diferentes.

Tabela 2. Principais espécies de peixe cultivadas em pisciculturas localizadas no povoado Quadra Fé em Deus, Zé Doca, MA.

Piscicultura	Espécie(s) cultivada(s)
A	Tabatinga, tambacu, tilápia do Nilo, curimatã e piau
B	Tabatinga e curimatã
C	Tabatinga, tambaqui e pacu
D	Tabatinga e curimatã
E	Tabatinga
F	Pirapitinga e curimatã

Na fase final do cultivo todos os piscicultores despescavam à medida que os peixes cresciam. Produtores das pisciculturas C e F conservavam os peixes após a despesca em freezer, já nas pisciculturas A e B a conservação ocorria em tanques de cimento com água, com a finalidade de vender o peixe vivo. Nas pisciculturas D e E o armazenamento dos peixes, após a despesca, era realizado em isopor sem gelo. Apenas os responsáveis pelas pisciculturas A e B registravam a quantidade de peixes na despesca.

A produção de peixes tinha finalidade tanto comercial como subsistência, podendo variar de acordo com o produtor. Neste sentido, alguns produtores relataram consumir de duas a três vezes na semana, outros

somente durante a despesca no fim de semana. O responsável pela piscicultura F declarou que a família raramente consumia o peixe cultivado. A forma de comercialização variava entre as pisciculturas. A piscicultura C comercializa através de peixarias e vendas diretas, as demais pisciculturas comercializam através de venda direta na própria propriedade e em feiras livres. 83,33% dos piscicultores vendiam o peixe vivo ou fresco, apenas na piscicultura B era agregado valor ao peixe, neste caso a evisceração. 33,33% dos piscicultores entrevistados relataram perdas ou descartes durante o cultivo, despesca ou pós-venda.

O transporte do peixe até o local de venda era feito por todos os produtores em isopor sem gelo ou em sacos plásticos ou de ráfia. O peixe apesar de sua importância nutricional é um alimento com grande probabilidade de deterioração, devido às suas características intrínsecas. Portanto, é importante que desde a despesca até a comercialização, se utilize técnicas de conservação adequadas, para se obter um produto seguro e de qualidade a ser oferecido ao consumidor.

A utilização de gelo de forma adequada e na devida proporção é a forma mais comum de conservação de peixes. O pescado fresco deve ser mantido o mais próximo possível do ponto de congelamento, com a temperatura próxima a 0°C. No intervalo decorrido da captura até o processamento ou comercialização, o pescado fica sujeito a perdas de qualidade (físico-química, sensorial e microbiológica) devido às condições de armazenamento e à natureza da sua composição. Os vários métodos de captura, tempo de arraste, áreas de pesca, resfriamento, etc. influenciam o grau de conservação e frescor do peixe (SOARES & GONÇALVES, 2012).

O peso médio do peixe para venda era de 1 Kg, variando o preço por quilo, de R\$5,00 a R\$8,00. Neste caso, considera-se acessível o valor do peixe cultivado pelos piscicultores da Quadra Fé em Deus, comparado ao valor do quilo da carne vermelha que custava em torno de R\$15,00 e a do frango que custava 10,00R\$ na região. A isto soma-se uma crescente mudança de hábitos alimentares da população que tem buscado cada vez mais alimentos saudáveis, em que o peixe surge como uma ótima opção de fonte de proteína facilmente digestível e com baixo teor de gordura, favorecendo uma maior demanda por produtos aquícolas e consequentemente maior rentabilidade para pisciculturas.

Embora exista a iniciativa de compra coletiva de alevinos e rações, as pisciculturas eram desenvolvidas primariamente de maneira individual com cada piscicultor realizando sua própria aquisição de insumos e construção dos tanques. Alguns produtores relataram a compra coletiva dos insumos, para baratear o frete e até mesmo para obter descontos no valor do produto. Dentre os insumos necessários para a atividade piscícola, a ração foi relatada como a que mais onera os custos operacionais e a que mais sofre com variações de preço.

De forma geral, os principais entraves observados de origem técnica foram a falta de planejamento na construção dos tanques, formato inadequado e vegetação em excesso, que dificultavam o manejo do peixe, além da escolha inadequada do local para a construção dos viveiros, verificou-se também falta de assistência técnica no manejo das pisciculturas quanto ao controle da qualidade da água, densidade de estocagem, gastos com ração, preparação dos viveiros, biometria, controle da quantidade retirada em cada despesca e falta de controle dos gastos com insumos. O principal entrave relacionado às questões sociais foi a falta de organização dos piscicultores em associações.

4 CONCLUSÃO

A piscicultura desenvolvida em Quadra Fé em Deus em Zé Doca – MA apresentava-se como uma atividade diversificada dentro das propriedades rurais, com aproveitamento da mão de obra familiar, o que propicia ao pequeno produtor um complemento na renda familiar. O principal entrave de ordem técnica que envolvia a cadeia produtiva da piscicultura foi a carência de assistência técnica sobre o manejo da piscicultura em geral e o de ordem social foi a falta de organização dos piscicultores em associações o que dificultam o desenvolvimento sustentável e a inserção socioeconômica deste setor.

REFERÊNCIAS

- [1] BRASIL. Ministério da Pesca e Aquicultura. Boletim Estatístico da Pesca e Aquicultura 2011. Brasília, DF, 2013. 60p.
- [2] CASTRO, S.F.; BARBOSA N.D.; LOBATO, A.N. Avaliação da estrutura física e da qualidade da água em pisciculturas, no município de Macapá-AP. Revista de Ciências da Amazônia, vol.1, n.2, p.27-40, 2014.
- [3] EMBRAPA. Manejo alimentar. Piscicultura familiar, 2013.
- [4] KUBITZA, F.; CAMPOS, J.L.; ONO, E.A.; ISTCHUK, P.I.; Criação da garoupa: um peixe indicado para a região nordeste. Panorama da Aquicultura. v.22, n.132, 2012.
- [5] OSTRENSKY, A.; BORGHETTI, J.R.; SOTO, D. Estudo Setorial para Consolidação de uma Aquicultura Sustentável no Brasil. Curitiba, 2007, 279p.
- [6] RESENDE, E.K., Pesquisa em rede em aquicultura: bases tecnológicas para o desenvolvimento sustentável da aquicultura no Brasil. Aquabrazil. Revista Brasileira de Zootecnia, v.38, 2009.
- [7] SANTOS, V.B.; FIRETTI, R.; SALES, D.S. 2008 Peixe quer água boa. Anuário da Pecuária Brasileira. p.294-296.
- [8] SOARES, K.M.P., GONÇALVES, A.A. Qualidade e segurança do pescado. Revista do Instituto Adolfo Lutz. v.71, n.1, p. 1-10, 2012;

Capítulo 17

Agricultura familiar: A necessária revisão de sua classificação operacional

Cesar José de Oliveira

Fernando Costa Bastos

Resumo: O artigo objetiva desvelar a inadequação do atual módulo fiscal para fins de classificação operacional do agricultor (a). A classificação do agricultor como familiar possibilita o acesso a condições diferenciais no universo de políticas públicas de promoção do desenvolvimento rural, no Brasil. A problematização científica a esse critério é fundamental para chamar a atenção quanto a equívocos gerados pelo Estado brasileiro. Na elaboração deste artigo é adotada a técnica de pesquisa de documentação indireta. Destacam-se como resultados e conclusões: o módulo fiscal considera para fins de definição do tipo de atividade econômica predominante apenas a sua ocorrência no maior número de estabelecimentos; a sua fixação não considera a existência de condições específicas que limitem o uso permanente e racional de recursos naturais nos estabelecimentos; ele nunca foi atualizado, embora o Estado brasileiro tenha utilizado no seu dimensionamento, dados do INCRA, declarados pelos produtores em 1978.

Palavras-chave: Módulo Fiscal; Classificação Operacional; Agricultura Familiar.

1 INTRODUÇÃO

Há um número expressivo de estudos que versa sobre a construção da noção agricultura familiar no Brasil. Todavia, um aspecto pouco explorado, nesse contexto, diz respeito à adoção do atual parâmetro utilizado para dimensionar a unidade de medida agrária do estabelecimento agropecuário - o módulo fiscal. Por isso, esse artigo objetiva revelar a inadequação de sua utilização como unidade de medida agrária para fins de classificação operacional do agricultor (a) familiar.

Essa análise é relevante porque é essa classificação operacional que possibilita ou restringe o acesso dos agricultores (as) a um conjunto de condições especiais atualmente presentes em várias políticas de promoção do desenvolvimento rural, no Brasil. A reflexão produzida neste artigo deriva da dissertação de mestrado de Oliveira, 2016.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Na elaboração deste artigo é adotada técnica de pesquisa de documentação indireta, cuja característica é a realização da revisão bibliográfica para exame das questões em análise (MARCONI e LAKATOS, 2010).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A associação do parâmetro área do imóvel rural à noção pequena produção, produção de subsistência entre outros é relativamente recente, no Brasil. É a partir do Estatuto da Terra, Lei Nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, que no âmbito operacional é regulamentado o dimensionamento econômico do estabelecimento agropecuário. Por exemplo, na definição de propriedade familiar, o Artigo 4º, inciso II, do referido Estatuto preceitua:

Propriedade Familiar, o imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico, **com área máxima fixada para cada região e tipo de exploração**, e eventualmente, trabalho com a ajuda de terceiros. (grifo dos autores).

Outra iniciativa nessa direção ocorrera na década seguinte, embora estivesse circunscrita a uma perspectiva regional. Por exemplo, ao definir o público participante do programa Polonordeste¹, implantado na região Nordeste, no final da primeira metade da década de setenta, o governo federal estabeleceu os seguintes parâmetros, para classificar os pequenos produtores² (WILKINSON, 1986, p. 31): área máxima de 200 hectares para cada estabelecimento agropecuário, posteriormente alterado para 50 hectares, no caso de estabelecimentos agropecuários com predomínio da agricultura e 100 hectares para pecuária; renda máxima de dois salários mínimos regionais, depois acrescida da orientação de renda total e não renda agrícola; e trabalho essencialmente familiar na unidade de produção.

Posteriormente, o Estado brasileiro formula diferentes definições operacionais de alcance nacional para um grupo específico da agricultura brasileira. Desde a constituição do Programa de Valorização da pequena Produção Rural – PROVAP, no ano de 1994, passando pelas formulações do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura familiar – PRONAF, a partir de 1995, também pelas Resoluções do Conselho Monetário Nacional (CMN), relacionadas ao PRONAF, até a sanção da Lei Nº 11.326, de 24 de julho de 2006, que estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais.

Essa Lei estabelece os seguintes requisitos para definição operacional de agricultor (a) familiar:

I – não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) **módulos fiscais**; (grifo nosso) II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; III – tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo; (Redação

¹ O programa foi instituído em 1975 e apresentou como objetivo promover a modernização de áreas agropecuárias prioritárias, com ênfase no pequeno e médio produtor. A preocupação central foi o incremento de produtividade em detrimento da realização da reforma agrária. Uma análise crítica a esse programa pode ser encontrada em Wilkinson (1986).

² Esse termo era muito utilizado para designar um grupo social da agricultura brasileira.

dada pela Lei nº12.512, de 2011) IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.

O conceito de módulo fiscal incorpora critérios do módulo rural e estabelece que o mesmo seja fixado por Município. Segundo a Lei Nº 6.746, de 10 de dezembro de 1979, ele será determinado considerando os seguintes fatores:

Art. 4º- O módulo fiscal de cada Município, expresso em hectares, será fixado pelo INCRA, através de Instrução Especial, levando-se em conta os seguintes fatores: a) o tipo de exploração predominante no Município: I - hortifrutigranjeira; II - cultura permanente; III - cultura temporária; IV - pecuária; V - florestal; b) a renda obtida no tipo de exploração predominante; c) outras explorações existentes no Município que, embora não predominantes, sejam expressivas em função da renda ou da área utilizada; d) o conceito de “propriedade familiar” constante do art. 4º, item II, da Lei 4.504, de 30 de novembro de 1964. §1º - Na determinação do módulo fiscal de cada Município, o INCRA aplicará metodologia, aprovada pelo Ministro da Agricultura, que considere os fatores estabelecidos neste artigo, utilizando-se dos dados constantes do Sistema Nacional de Cadastro Rural. §2º **O módulo fiscal fixado na forma deste artigo, será revisto sempre que ocorrerem mudanças na estrutura produtiva, utilizando-se os dados atualizados do Sistema Nacional de Cadastro Rural.** (grifo dos autores).

A Instrução Especial INCRA, Nº 19, de 28 de maio de 1980, conforme Artigo 1.º, parágrafos 2.º e 3.º, preceitua que o módulo fiscal será calculado conforme prevê o artigo 4º, citado acima, e ainda, que a exploração predominante é aquela que ocorrer no maior número de imóveis. Já os aspectos relacionados à alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do mesmo artigo, são atendidos mediante a utilização do módulo médio por tipo de exploração (hortigranjeira, lavoura permanente, lavoura temporária, pecuária, florestal e imóveis inexplorados), previsto na Tabela III da Instrução Especial INCRA, Nº 5A, de 6 de junho de 1973, calculado para cada imóvel com base nos dados atuais do Sistema Nacional de Cadastro de Imóveis Rurais - SNCR.

É importante registrar que o Estado brasileiro não considerou para fins de cálculo do módulo fiscal municipal a existência de condições geográficas específicas que limitem o regular e adequado uso do estabelecimento agropecuário nem tampouco as limitações e restrições de ordem ambiental, conforme prevê a Instrução Especial INCRA, Nº 19, de 28 de maio de 1980:

§ 3.º - A fixação final do Módulo Fiscal do Município levará em conta, ainda, a existência de condições geográficas específicas que limitem o uso permanente e racional da terra: a) Regiões com terras anualmente alagáveis; **b) Regiões com terras de cerrados pobres ou caatingas; c) Regiões com cobertura de mata natural de interesse para a preservação ou conservação** (grifo dos autores).

A tabela de módulo fiscal dos Municípios, elaborada pelo Estado brasileiro, nunca foi atualizada. Ela foi calculada em 1980 com dados do recadastramento de 1978, do Sistema Nacional de Cadastro de Imóveis Rurais, do INCRA. Embora já houvesse previsão de atualização do módulo fiscal, conforme estabeleceu o artigo 4º do Decreto Nº 84.86, de 06 de maio de 1980: “§2º O módulo fiscal fixado na forma deste artigo, será revisto sempre que ocorrerem mudanças na estrutura produtiva, utilizando-se os dados atualizados do Sistema Nacional de Cadastro Rural.

Atualmente, o módulo fiscal é utilizado para estabelecer a fração mínima de parcelamento, seja enquanto dimensão máxima de imóvel a ser adquirido por estrangeiros, ou como referência para o dimensionamento do imóvel rural, adotado para fins de classificação do agricultor (a) na condição familiar (até quatro módulos fiscais). Estranhamente, a atual tabela de módulo fiscal dos Municípios, em que pese o decurso de prazo de mais de quatro décadas, desde a sua publicação, ainda não captou as mudanças que ocorreram na estrutura produtiva, nos mais diferentes Municípios brasileiros. Essa ausência de contemporaneidade (mais de quatro décadas) gera muitas distorções no dimensionamento do módulo fiscal.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No âmbito da análise produzida nesse artigo é possível destacar um conjunto de aspectos que torna inadequado a utilização do atual módulo fiscal como parâmetro de unidade agrária para fins de classificação operacional do agricultor (a) na condição familiar. Quais sejam: o módulo fiscal considera para fins de definição do tipo de atividade econômica predominante apenas a sua ocorrência no maior número de estabelecimentos e despreza o valor da produção e da área cultivada; a delimitação do módulo não considera a existência de condições específicas que limitem o uso permanente e racional de recursos naturais nos estabelecimentos agropecuários; o módulo fiscal nunca foi atualizado, em que pese o fato de o Estado brasileiro ter utilizado no seu dimensionamento, em 1980, dados do INCRA, declarados pelos produtores no Sistema Nacional de Cadastro Rural, decorrente de atualização cadastral realizada em 1978 (mais de quatro décadas) e de previsão legal para atualização sistemática. Os aspectos destacados nesse artigo evidenciam a inadequação do atual módulo fiscal para fins de classificação dos agricultores (as) familiares. Eles reforçam a relevância de estudos analíticos que se proponham a produzir uma análise crítica sobre a agricultura familiar brasileira, especialmente sobre a sua formulação operacional. Nesse contexto, é relevante observar a pertinência de adequações nessa formulação operacional, no âmbito aqui destacado – atualização do módulo fiscal.

REFERÊNCIAS

- [1] BRASIL. Decreto Nº 84.865, de 06 de maio de 1980. Regulamenta a Lei Nº 6.746, de 10 de dezembro de 1979, que trata do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/D84685.htm. Acesso em: 08 nov. 2014.
- [2] BRASIL. Lei Nº 4.504, de 30 de novembro de 1964. Dispõe sobre o Estatuto da Terra e dá outras providências. Presidência da República. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4504.htm>. Acesso em: 12 out. 2014. BRASIL. Lei Nº 6.746, de 10 de dezembro de 1979. Altera o Estatuto da Terra e dá outras providências. Presidência da República. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6746.htm>. Acesso em: 11 out. 2014.
- [3] BRASIL. Lei Nº 11.326, de 24 de julho de 2006. Estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. Presidência da República. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/11326.htm>. Acesso em: 09 set. 2014. MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
- [4] OLIVEIRA, Cesar José de. Módulo Fiscal: os problemas decorrentes da sua utilização na classificação operacional dos agricultores (as) familiares. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais, UFRN, Natal, 2016.
- [5] WILKINSON, Jonh. O estado, a agroindústria e a pequena produção. São Paulo: Hucitec/Cepa-BA, 1986.

Capítulo 18

Diagnóstico agroambiental de uma pequena unidade de produção agrícola da Região Oeste do Paraná

Romero Santos de Brito

Marceli Paula Langer

Márcio José Araújo

Everton Schneider dos Santos

Fabiana Costa de Araujo Schutz

Claudio Leones Bazzi

Resumo: O presente artigo tem como objetivo estudar uma unidade de produção agrícola familiar localizada no município de Missal no estado do Paraná. A propriedade é composta unicamente de agricultura familiar, tendo como principais atividades produtivas o cultivo de milho para produção de grãos e silagem para alimentar o gado, criação de gado de corte e sua principal atividade a fumicultura. Levantou-se através da aplicação de questionário indicadores quantitativos da propriedade, que permitiram a realização de análises e conclusões em torno de algumas características, tais como: terra, trabalho e capital. Especificamente a respeito deste último, o capital, estudou-se e apresentou-se a viabilidade de venda da propriedade, prevendo a aproximação da aposentadoria dos proprietários.

Palavras-chave: Unidade de Produção Familiar, Agricultura Familiar, Indicadores Descritivos.

1 INTRODUÇÃO

O estudo dos indicadores quantitativos de uma propriedade é importante pois nos ajuda a ter um panorama geral da situação da propriedade sob os aspectos de terra, trabalho e capital, permitindo projeção de estratégias e tomadas de decisão. Por meio destes é possível verificar se a relação receitas/despesas da propriedade em estudo estão suficientemente balanceadas produzindo assim um montante positivo e que permita ao proprietário a realização de investimentos adequados à melhoria das condições de produção agrícola.

Ainda por meio do estudo destes indicadores, é possível verificar a saúde financeira da propriedade, além de verificar se as áreas de terra disponíveis estão sendo adequadamente aproveitadas e se são as mais adequadas às culturas cultivadas pelo produtor.

Quanto ao trabalho, permite verificar a compatibilidade da mão de obra aplicada ao cultivo, garantindo que não se esteja desprendendo esforço excessivo à uma determinada atividade ou deixando de investir em mão de obra adequada à outra atividade, gerando consequências negativas na produção.

Com base nesses indicadores, o presente artigo tem como objetivo inicialmente compreender os indicadores descritivos, passando em seguida a levantá-los em uma unidade de produção agrícola familiar no município de Missal-PR, elencar aqueles cujos números representam situações significativas e que chamaram a atenção para a propriedade em estudo, visando elaborar análises conclusivas a respeito de sugestões de melhoria contínua da propriedade e dos mecanismos de produção, bem como, da qualidade de vida dos proprietários.

2 MATERIAL E MÉTODOS:

A metodologia escolhida para a execução desse trabalho possui caráter exploratório. Gil (2001) define a pesquisa exploratória como o tipo de pesquisa que busca familiarizar o pesquisador com o problema, buscando principalmente o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. A pesquisa exploratória pode envolver levantamento bibliográfico, entrevista ou análise de exemplos.

Na pesquisa exploratória, não existe um conhecimento em relação aos problemas e fenômenos a serem estudados por parte dos pesquisadores. Um processo de investigação para identificar a natureza do fenômeno deve ser desencadeado, criando assim um sistema de teorias e conhecimentos. Esse tipo de pesquisa trabalha com o levantamento da presença de variáveis e sua caracterização quantitativa ou qualitativa (KÖCHE, 2011).

A realização de uma entrevista com os proprietários de uma pequena propriedade rural foi escolhida como o método para a tentativa de levantamento dos indicadores quantitativos. Para levantamento dos indicadores e extração de características importantes da UPA, foi aplicado o questionário conforme Apêndice A.

2.1 ANÁLISE GLOBAL DA REGIÃO

A propriedade escolhida se encontra no município de Missal, localizada no extremo Oeste do Paraná, a 85 quilômetros de Foz do Iguaçu e a 615 km da capital do Estado – Curitiba. Faz divisa ao norte com Santa Helena e ao sul com Itaipulândia e Medianeira. À Oeste se encontra novamente o município de Medianeira o Lago de Itaipu e a leste o município de Diamante do Oeste (PREFEITURA DE MISSAL, 2016).

O município de Missal foi criado oficialmente em 30 de dezembro de 1981, por meio da Lei Estadual nº 7.566, e se deu a partir do desmembramento do município de Medianeira (PREFEITURA DE MISSAL, 2016).

De acordo com o IPARDES (2019), com base nos dados do Censo Agropecuário realizado em 2017, o município de Missal possui 1.331 estabelecimentos agropecuários, que ocupam uma área total de 26.953 hectares. O milho e a soja são as principais culturas produzidas no município, com 71.440 e 38.340 toneladas produzidas respectivamente em 2018. Na produção pecuária possuem destaque os galináceos, com um total de 1.560.000 aves.

Em relação ao clima, a Prefeitura Municipal de Missal (2014) aponta um clima subtropical úmido mesotérmico com uma temperatura anual variando de 19° C a leste e 21° C a oeste. O índice pluviométrico médio anual é de 1.700 a 1.800 milímetros.

A topografia é relativamente plana, encontrando-se no terceiro planalto paranaense, com afloramentos esparsos de arenitos eófilos e formações superficiais de textura mais argilosa onde o latossolo roxo distrófico é desenvolvido (PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAL, 2014).

2.2 O CONTEXTO HISTÓRICO DA UPA

Os proprietários da UPA estudada são provenientes do Rio Grande do Sul. A propriedade foi adquirida na década de 70 pela família, pais do senhor atual proprietário da UPA.

Desde a sua aquisição a principal cultura aplicada na UPA foi a fumicultura. A atividade foi repassada de pai para filho, e as técnicas foram aprimoradas de acordo com o avanço da tecnologia e exigências das firmas com as quais são firmados contratos de produção.

O casal de proprietários teve dois filhos, que até sua vida jovem/adulta contribuíram na UPA, deixando a residência dos pais para estudar e seguir sua vida adulta. Após a saída dos filhos o casal passou a administrar a propriedade sozinhos, contando apenas com o apoio de trabalhadores diaristas e empreiteiros no ato do plantio e colheita. Juntamente com a produção de fumo, a família carrega em seu histórico o cultivo de milho, entretanto, em menor quantidade. De 1998 a 2012 os proprietários aproveitaram a oportunidade de cultivar hortaliças e milho doce para a Cooperativa Lar, que naquela época instalou uma unidade de processamento destas matérias primas no município de Itaipulândia (vizinho ao município de Missal). As culturas foram encerradas na propriedade visto que a cooperativa encerrou as atividades da unidade de beneficiamento. Alguns anos depois o produtor voltou a cultivar hortaliças e milho doce, desta vez, destinados ao programa de agricultura familiar do Governo Federal, destinando sua produção às escolhas públicas da região. No ano de 2012, a família deixou de criar gado apenas para consumo próprio de carne e produção de leite, e passou a confinar gado para venda à frigoríficos da região.

Deste modo, atualmente a propriedade é administrada pelo casal de proprietários, tendo como cultivo e produção principal o fumo, e secundários o milho e gado de corte.

2.2 ANÁLISE DA PAISAGEM DA UPA

Na figura 01, pode se observar mais precisamente a UPA, para tanto, vê-se um mapa extraído e editado da aplicação Google Earth Pro, ano 2019.

Figura 1: Mapa de uso e ocupação do solo da propriedade analisada.

Fonte: Google Earth, [2019]. Editado pelos autores, 2019.

O imóvel possui precisamente 8,2096 hectares localizados nas coordenadas geográficas de Latitude 25°04'53,15"S e Longitude: 54°14'43,75"O no município de Missal, no estado do Paraná, sendo sua cobertura de solo composta conforme a Tabela 1:

Tabela 1: Cobertura do solo

Descrição	Área (ha)
Área total de remanescentes de vegetação nativa	0,3910
Área total de uso consolidado	7,6087
Área total de servidão administrativa	0,2006
Área total	8,2096

Fonte: Adaptado de <http://www.car.gov.br/#/consultar>, capturado em maio, 2019.

A Localidade está dividida em duas áreas. A principal é a Área 1, onde estão localizadas a sede da UPA (Fotografia 2a), bem como galpões (Fotografia 2b e Fotografia 2c) e a maior parte da área de plantio. Ainda nessa área principal também estão contidos açudes, utilizados para produção própria de peixes, água para o gado e irrigação da lavoura. O gado e demais animais criados na propriedade estão situados nesta área principal.

Figura 2a: Fotografia da sede da UPA

Figura 2b: Fotografia do galpão de fumo

Figura 2c: Fotografia de área recém colhida

Figura 2d: Fotografia de área recém colhida

A segunda área trata-se de uma porção de terra arrendada de aproximadamente 1 ha, onde atualmente desenvolve-se a cultura do milho, presente na Figura 2d. Essa área é totalmente composta de área de plantio.

2.3 ANÁLISE DOS FATORES DE PRODUÇÃO DA UPA

Objetivando uma análise mais aprofundada da UPA diagnosticada neste trabalho, bem como maior clareza de sua situação junto ao cenário nacional das principais atividades desenvolvidas na unidade, quais sejam, a cultura do milho e a bovina de corte, foi feito uma pesquisa no Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA) para verificar a evolução dos preços aplicados nacionalmente das referidas culturas.

Cabe primeiramente esclarecer que o CEPEA é parte do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ), unidade da Universidade de São

Paulo (USP), localizada em Piracicaba. É um grupo de pesquisas registrado no CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).

Na pesquisa feita ao sítio do CEPEA verifica-se a evolução do comércio do milho conforme gráfico abaixo para os últimos 12 meses.

Gráfico 1: Precificação do Milho em reais por saca de 60 kg, à vista, segundo o CEPEA para o período de junho de 2018 a maio de 2019.

Fonte: <<https://www.cepea.esalq.usp.br/br/indicador/milho.aspx>>

Do Gráfico 1, pode-se inferir que o mercado do milho apresenta relativa volatilidade tendo em vista à perceptível oscilação de seu preço no decorrer dos meses grafados. É importante destacar que no mês de maio, o preço de comercialização do milho tem atingido seu menor valor (R\$ 33,26).

Na mesma linha da análise feita em relação ao milho, pode-se extrair do sítio do CEPEA, análise similar em relação à precificação do comércio do boi gordo para os últimos 12 meses, ou seja, para o período de junho de 2018 até maio de 2019.

Gráfico 2: Precificação do Boi Gordo segundo o CEPEA para o período de junho de 2018 a maio de 2019.

Fonte: <<https://www.cepea.esalq.usp.br/br/indicador/boi-gordo.aspx>>

Diferentemente do milho, verifica-se que no caso do boi gordo (Gráfico 2), nos últimos meses, está havendo um relativo aumento no preço. Esse aumento repete a tendência de evolução no preço para essa modalidade. Esse fato pode também ser constatado em uma análise mais profunda no sítio do CEPEA, atingindo seu maior valor no mês de abril de 2019, R\$ 157,29. Demonstrando, sob esse aspecto, a maior viabilidade do gado em relação ao milho.

Estudos como de Bonato et. al. (2010) apontam que a produção de fumo se comparada às demais atividades agrícolas, como soja, milho e feijão, se destaca em resultados econômicos. Entretanto, Ramos et. al. (2018) lembra que apesar de rendosa, a atividade da cultura do tabaco requer um esforço físico muito intenso. O processo de produção de tabaco apesar de todo avanço tecnológico ainda é bastante manual e humanizado, além de se conjugar um processo produtivo extenso.

3 CONCLUSÕES

É através de diagnósticos como este, que é possível determinar o levantamento da realidade de uma determinada área a fim de analisar a viabilidade de implantação de técnicas sustentáveis e autorreguláveis visando minimizar o desmatamento. Concluindo-se que é de extrema

importância, a realização sistemática de produção, para auxiliar na rentabilidade do negócio, observou-se aumento nos custos de variáveis de produção, os atuais níveis de preços no mercado internacional somada à expectativa de safra na produção. A sustentabilidade na agricultura é desafiadora, por envolver aspectos econômico, social e ambiental da agricultura de pequeno porte. Na observação ao exposto verificou-se que a propriedade está bem administrada e com exploração correta da terra, mas ainda não tem condições de implementar técnicas sustentáveis e autorreguláveis de produção.

REFERÊNCIAS:

- [1] AGROSMART, O uso de imagens de satélite na agricultura: conheças os benefícios. 2018.
- [2] Disponível em: <https://agrosmart.com.br/blog/agricultura-digital/imagens-de-satelite-agricultura-beneficios/> Acesso em: 09 de maio de 2019.
- [3] ARAUJO, L. A. Planejamento de Propriedades Rurais. Epagri, 2013. Disponível em: http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_33631.pdf. Acesso em: 09 de maio de 2019.
- [4] GOVERNO DO PARANÁ, Agricultura: Municípios do PR se destacam na agropecuária, segundo IBGE. 2011. Disponível em: https://docs.google.com/document/d/1n9BgGOh7ciX_p-AlwcxE_v6vJs1fAFO-WpRMMVMQyz8/edit#heading=h.kvrdmm2criwb . Acesso em 16 de maio de 2019.
- [5] KAGEYAMA, A. et al. O novo padrão agrícola brasileiro: do complexo rural aos complexos agroindustriais. In: DELGADO, G. da C. (Org.) Agricultura e políticas públicas brasileiras. Brasília : IPEA, 1990. p. 113-221. (Série IPEA, 127).
- [6] MMA. Desenvolvimento Rural. Ministério do Meio Ambiente, [entre 1999 e 2019]. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/desenvolvimento-rural.html>. Acesso em: 06 de abril de 2019.
- [7] PADOVEZE, C. L; Contabilidade Gerencial: Um Enfoque Em Sistema de Informação Contábil, 2 ed. São Paulo: Atlas,1997.
- [8] PORTAL DA EDUCAÇÃO TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA; A cartografia: Novas tecnologias. 2013. Disponível em: <https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/informatica/a-cartografia-novas-tecnologias/49983> . Acesso em: 16 de maio de 2019.
- [9] TCU. Agricultura e Desenvolvimento Rural. Tribunal de Contas da União, [entre 1999 e 2019]. Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/desenvolvimento-nacional/agricultura-e-desenvolvimento-rural.htm>. Acesso em: 06 de maio de 2019.

Capítulo 19

Elaboração de iogurte de Kefir com Cupuaçu e Mel

Alanna Natália Brito de Figueirêdo

Francilene Gomes Nascimento

Joina Maria Silva de Sousa

Sylvia Myrelly Tavares da Silva

Caroline Roberta Freitas Pires

Stenia Katila Souza Carvalho

Raileide Barbosa Miranda

Resumo: O presente trabalho cujo tema a Elaboração de Iogurte de Kefir com Cupuaçu e mel, tem como objetivo geral, elaborar um iogurte natural utilizando leite fermentado com Kefir, com polpa da fruta de cupuaçu. Sabe-se que o iogurte é um dos produtos lácteos mais consumidos por pessoas de todas as idades, seja porque alguns possuem propriedades que favorece e regulam o funcionamento do intestino, ou simplesmente como fonte de nutriente. Visando tal fator pensou-se na elaboração de um iogurte utilizando Kefir, que trata-se de um probiótico, ou seja, possui propriedades funcionais. Os procedimentos metodológicos utilizados para a elaboração do projeto consistiram em pesquisas e revisões bibliográficas, a pesquisa possui cunho quantitativo e experimental. Para alcançar o objetivo foi realizado análises laboratoriais, aspectos microbiológicos, físico-químicos e sensoriais. A análise sensorial foi realizada por meio de questionário, utilizando a escala hedônica, que busca numa escala de 9 pontos o grau de satisfação do produto. Os resultados obtidos para as análises em laboratório foram: pH (3,43), umidade (79, 52%±16,79), proteínas (não foi quantificado), cinzas (0,49±0,17%), açúcares totais (7,05), açúcares redutores (8,57) e lipídeos (22,17) . Diante desses valores, foi possível concluir que o produto está de acordo com a legislação brasileira vigente para leites fermentados apresentando características físicos - químicas, microbiológicas e sensoriais adequadas para consumo, possuindo grau de aceitação satisfatório. No entanto, será necessário aprofundar este tema, no que diz respeito à análise de lipídio, a qual o valor obtido não condiz com a literatura.

Palavras Chaves: Probiótico. Kefir. Leite. Iogurte. Cupuaçu.

1. INTRODUÇÃO

O iogurte é um dos produtos lácteos mais consumidos por pessoas de todas as idades, seja porque alguns possuem propriedades que favorece e regulam o funcionamento do intestino, ou simplesmente como fonte de nutrientes. Segundo Mathias (2013, p.9) “o consumo deste alimento tem tido aumentos consideráveis, em razão da busca por uma alimentação mais saudável e sadia”.

Com relação à origem do iogurte não se pode afirmar com nítida certeza onde teve início, mas existe alguns episódios espalhados pelo mundo que indicam a idade deste alimento um desses episódios esta relacionado com a descrição deste alimento como sendo de maior digestibilidade comparativamente ao leite e o seu efeito benéfico e purificador no excesso de bÍlis e nos problemas de estômago” (SILVA, 2010, p.9).

Por ser considerado um alimento com interferências significativas na digestibilidade o iogurte foi considerado como medicamento, para Silva (2010, p. 9) “este lacticínio era considerado um medicamento, vendido apenas em farmácias, no entanto, o seu consumo generalizou-se na Europa, incluindo Portugal, e entrou nos consumos alimentares, a partir da década de 50”. Atualmente o iogurte é consumido em diversas ocasiões do dia, substituindo muitas vezes a refeição principal, dado que muita pessoa o consome no almoço, janta, ceia, mas principalmente nos intervalos entre essas refeições.

Atualmente a produção de iogurte é bastante diversificada, além de ser produzido industrialmente há muitas pessoas que invertem na produção caseira, por ter se tornado tão diversificado nos dias de hoje “existem vários tipos de iogurte, para alcançar o extenso mercado consumidor”. Estes produtos podem variar de acordo com os ingredientes, a composição, o sabor, a consistência, a textura, o valor calórico, o processo de elaboração e a natureza do processo de pós-incubação (MATHIAS, 2013, p. 9 apud RASIC e KURMANN, 1978). Com relação ao preparo do iogurte Rodas (2001, p.9) enfatiza que, “o leite empregado no processamento do iogurte deve ser de boa procedência e qualidade, pois é responsável pelo seu valor nutricional. Deve passar por tratamento térmico [...] a fim de eliminar microrganismos patogênicos e destruir as substâncias inibidoras do crescimento bacteriano”.

No Brasil, segundo Silva (2010) o iogurte é o leite fermentado mais consumido, o autor ressalta ainda que nos outros países há variadas técnicas e produtos que são utilizados para fermentação do leite, tais como o kefir, colônia de microrganismos vivos de origem da Rússia, que pode fermentar leite de vaca, cabra e de outras espécies, esse processo segundo o autor dar-se “por fermentação láctica, alcoólica e carbónica” (SILVA, 2010, p. 9).

É importante ressaltar que embora o kefir não seja conhecido e consumido com frequência por muitos brasileiros, é um produto que vem ganhando seu espaço no território brasileiro, atualmente ele se encontra em diversas regiões brasileiras, tais como são Paulo, Rio Grande do Sul, Tocantins, Brasília, Manaus, Belém e dentre muitas outras. Outro ponto importante desse produto, é que raramente ele é encontrado para comercialização, tal fato o difere das demais técnicas de produção de iogurte, dado que, por ser considerado um alimento probiótico, o kefir é geralmente doado de pessoa a pessoa (TERRA, 2007).

De acordo com Terra (2007) o kefir trata-se de um alimento probiótico complexo produzido através da fermentação do leite por leveduras e bactérias. O Kefir pode ter um gosto refrescante. Levemente azedo, com um aroma suave de fermento fresco, assim como também pode ter um sabor forte efervescente natural e picante.

É importante ressaltar também, que com o aumento do consumo de iogurte muitos produtores estão apostando em diversificar os sabores, apostando principalmente em bases de frutas tais como, morango, marajá, pêssego dentre outras, segundo Silva (2010) essa diversificação influencia de forma significativa no aumento do consumo desse produto.

Pensando nisso, optou-se por elaborar um produto com um fruto regional de Imperatriz-MA, o cupuaçu, e pensando nas características organoléticas e nutricionais do produto, optou-se por utilizar um adoçante natural e com características funcionais, o mel de abelha.

O cupuaçu (*Theobroma grandiflorum*) é uma fruta tropical que apresenta excelentes características de aroma, sabor e textura, tendo adquirido grande aceitação no mercado nacional e internacional, apresentando grande potencial econômico no que se diz à industrialização e comercialização (VRIESMAN et al., 2009).

Com relação ao mel, segundo Silva *et al* (2006) citado por Escobar e Xavier (2013, p. 160) o “mel é um produto fornecido pelas abelhas mais conhecido e disseminado pelo mundo, foi um dos primeiros alimentos do homem, era muito utilizado para adoçar alimentos, que os utilizavam também como recurso medicinal”. Os autores ainda ressaltam referenciando-se Bera, Almeida e Muridian (2007) que o “mel é uma substância produzida por abelhas melíferas, em especial aos pertencentes ao gênero *Apis*, o mesmo se produz a partir do néctar das flores, e possui um alto valor nutricional”(2013, p.160). Além disso o mel é caracterizado como um alimento funcional.

O estudo sobre alimentos funcionais é de grande importância para o campo da nutrição, uma vez que a presente área visa prevenir diversas enfermidades nos tempos atuais, buscando sempre o bem estar social e nutricional do indivíduo. Sendo assim, o objetivo principal desse trabalho, elaborar um iogurte natural utilizando leite fermentado com Kefir, com polpa da fruta de cupuaçu e mel de abelha.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1. PROCESSAMENTO DO IOGURTE DE KEFIR COM CUPUAÇU E MEL

Toda a metodologia utilizada para a elaboração do Iogurte de Kefir com Cupuaçu e Mel, utilizou-se como base a metodologia descrita por Mascarenhas (2012).

▪ Aquisição da Matéria-prima

Os materiais utilizados para a produção do iogurte, foram adquiridos nos estabelecimentos comerciais de Imperatriz-MA e por meio de doação. Os utensílios utilizados na produção foram de cunho doméstico, assim sendo, não houve gastos em relação a estes. O leite integral foi adquirido nos estabelecimentos comerciais de Imperatriz. O mel de abelha e a polpa de cupuaçu vieram de São Miguel do Tocantins, pequena cidade que fica uns 20 minutos de Imperatriz. O kefir que é a base da produção do produto, foi adquirido por meio de doações, os doadores em questão residem em São Paulo e em Brasília.

▪ Inoculação e Fermentação

Foram utilizados dois potes de vidro, onde cada um tinha medida para 2 litros, os mesmos foram esterilizados com água fervente em tachos por 10 minutos, com água suficiente para submergir-os. Em seguida foram retirados para resfriamento com água fria por 5 minutos. Acrescentou-se 2 litros de leite UHT integral (marca Bianca) e duas colheres de sopa de grãos de kefir em cada recipiente, estes foram tampados com papel toalha e com o auxílio de uma liga. Foram armazenados em lugar arejado e temperatura ambiente por 24 horas para o processo de fermentação.

▪ Filtração e Escoamento

Após 24 horas de processo de fermentação esterilizou-se 4 potes de vidro de 1 litro cada, 1 colher plástica, 4 funis plásticos, 1 peneira plástica, em uma panela grande contendo água morna, todos foram esterilizados, depois higienizados com álcool 70% e água destilada para a retirada e o cuidado para que não houvesse contaminação, ao término desse processo utilizou-se a peneira para a separação do leite fermentado dos grãos de kefir, colocou-se os filtros nos funis, nos quais aconteceu a filtração por 16 horas na geladeira, para adquirir-se a consistência de iogurte.

▪ Adição de bases de fruta

Após o período de inoculação, estocagem e filtração o iogurte natural obtido adquiriu consistência. Foram adicionadas 737,55 gramas de polpa de cupuaçu anteriormente batida no liquidificador por 5 minutos e levada para a cocção por 10 minutos para a diminuição da acidez do fruto. Foi misturada a polpa com o iogurte e 2 xícaras de chá de mel.

▪ Mistura e Homogeneização/Envase e Conservação

Foi realizada a mistura manualmente em uma bacia por 10 minutos para melhor homogeneização. O iogurte foi embalado em pequenas vasilhas descartáveis com tampa e acondicionado em refrigeração entre 8 a 10°C.

2.2. ELABORAÇÃO DA FICHA TÉCNICA DO IOGURTE

A ficha técnica do iogurte foi elaborada fazendo o levantamento dos custos, ordenando o modo de pré-preparo e preparo e realizando os cálculos do valor nutricional, para isso foi definido os seguintes itens de acordo com a metodologia descrita Philippi (2006) (apêndice 7).

2.3. ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS

As análises foram desenvolvidas no laboratório de microbiologia, para determinação de coliformes fecais, totais e termotolerantes, além de bolores e leveduras utilizando a metodologia descrita pelo Instituto Adolfo Lutz (1985).

2.4. ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS

▪ pH

A determinação do pH (potencial de hidrogênio) foi realizada em duplicata utilizando um pHmêtro (FURLAB, mPA-210), introduzindo o eletrodo diretamente na amostra conforme metodologia do Instituto Adolfo Lutz (1985).

▪ Umidade

A determinação de umidade foi realizada em triplicata sendo metodologia descrita pelo Instituto Adolfo Lutz (1985), procedeu-se pesando 10 gramas da amostra, aquecendo na estufa (Nova Ética, Ne6430) a 105°C, a análise iniciou as 10h00min da manhã de uma quinta-feira, e terminou às 10h do dia seguinte, sendo que durante o período diurno foi realizado sucessivas pesagens de três em três horas, de modo a verificar a variação de peso. Para a determinação do teor de umidade foi realizada a seguinte fórmula:

Percentual de umidade (% U)=

$$\frac{(\text{perda de peso}) * 100}{(\text{peso da amostra úmida})}$$

▪ Lipídios

A determinação do quantitativo lipídico foi realizada somente uma vez. Foram desenvolvidas as análises através do método de SOXHLET, segundo método descrito pelo Instituto Adolf Lutz (1985). Para a determinação do quantitativo de lipídios foi utilizado a seguinte fórmula.

Lipídios =

$$\frac{100 * N}{P}$$

No qual: N = N° de gramas de lipídios e P= N° de gramas da amostra

▪ Açúcares totais e redutores

A determinação de açúcares redutores e totais do produto foi realizada através do método de Lane – Eynon, com a utilização das soluções de Fehling A e B, segundo metodologia descrita pelo Instituto Adolfo Lutz (1985). Logo após, foi realizadas as seguintes cálculos para a determinação de açúcares redutora e total.

▪ % de glicídios redutores em glicose foi dado por:

$$\frac{100 * 100 * T}{V * P}$$

- % de glicídios totais foi dado por:

$$\frac{100 * 100 * T}{V * P}$$

- Cinzas

O quantitativo de cinzas totais foi realizado em triplicata pelo método gravimétrico segundo metodologia do Instituto Adolfo Lutz (1985). Ao fim da análise utilizou-se a seguinte fórmula para a obtenção dos resultados.

%cinzas

$$\frac{= (\text{peso cadinho} + \text{cinzas}) - (\text{peso cadinho}) * 100}{(\text{peso cadinho} + \text{amostra seca}) - (\text{peso cadinho})}$$

- Proteínas

A determinação de proteína foi utilizada em triplicata pelo método de Kjeldahl, conforme a metodologia descrita pelo Instituto Adolf Lutz (1985). No entanto, só foi possível fazer a primeira parte do processo, a etapa de digestão, na qual determinou-se a presença de proteína, porém não foi quantificado.

2.5. ANÁLISE SENSORIAL

Foram realizados testes de aceitação sensorial para os seguintes atributos: cor, aroma, sabor, aparência, consistência, textura e impressão global. A análise sensorial teve como objetivo, avaliar a aceitabilidade do iogurte de kefir com cupuaçu e mel. A mesma foi conduzida no laboratório de técnica dietética da instituição de Ensino Superior do Sul do Maranhão (IESMA-UNISULMA), foram selecionados 60 provadores dentre alunos professores e funcionários sendo 52 do sexo feminino e 8 do sexo masculino entre a faixa etária de 17 à 36 anos, utilizando uma escala hedônica estruturada de 9 pontos. (STONE e SIDEL, 2004).

Para a avaliação sensorial, cerca de 44 ml de iogurte foram servidas em copos de plásticos descartáveis, utilizou-se 10 cabines individuais, devidamente organizadas com as amostras do produto para degustação, durante o processo foi preenchido um formulário contendo as devidas informações, termo de consentimento livre esclarecido (apêndice 8), termo relacionado à aceitabilidade dos provadores em relação ao consumo de iogurte (apêndice 9), por fim os participantes responderam ao questionário (apêndice 10), referente ao produto analisado. Para cálculo da aceitação utilizou-se a seguinte equação segundo Cotim (2007) (*apud* PEDRERO; PANGBORN, 1997):

$$A = M \times 100\% \quad 9$$

Onde: A= Aceitação; M= Média das notas obtidas e 9= nota máxima.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O Iogurte foi desenvolvido, com características sensoriais aceitáveis como cor (creme), textura (homogenia), consistência (emulsificante), aroma (característico do fruto e do mel), com a elaboração do produto foi desenvolvido as seguintes análises.

3.1. ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS

Sobre a contagem de coliformes fecais, totais e termotolerantes da amostra analisado pôde-se constatar que não houve nenhuma contaminação após 48 de incubação na temperatura de 37 °C. Esses resultados mostram que o processo de produção do iogurte foi realizado de forma higiênica e dentro dos padrões descrito pela RDC 216/04, portanto a amostra de 25 g de iogurte analisada encontra-se em conformidade com o padrão estabelecido pela legislação (<10) (BRASIL, 2001).

Com relação à presença de bolores e leveduras das amostras analisadas pôde-se constatar que houve um crescimento de uma colônia em uma das placas, porém o número não pode ser quantificado nem classificado. Segundo as normas estabelecidas pelo Ministério da Agricultura (2007) referente aos Padrões de Identidade e Qualidade do Leite Fermentado a Contagem de leveduras específicas (ufc/g) deve ser no mínimo de 10^4 e com relação às bactérias lácticas de no mínimo 10^7 de unidade formadora de colônia por gramas.

Segundo o Ministério de Agricultura (2007) os grãos de Kefir são constituídos por leveduras fermentadoras de lactose, levando em conta esse fator era evidente que a análise desse produto apresenta-se positivo para esses microrganismos não patogênicos, na quantidade determinada. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2005) para leite fermentados com kefir a contagem total de bactérias lácticas viáveis deve ser no mínimo de 10^6 UFC/g.

3.2. ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS

Os resultados das características físico-químicas do Iogurte estão descrito na tabela. 1.

Tabela 1: Características físico-químicas do Iogurte de Kefir com cupuaçu e mel

Avaliação	Média e desvio padrão
Ph	$3,43 \pm 0$
% umidade	$79,52 \pm 16,79$
% lipídios	22,17
% açúcares redutores	8,57
% de açúcares totais	7,05
% cinzas	$0,49 \pm 0,17$
Proteínas	–

Fonte: Autores, 2016.

▪ pH

O valor de pH (3,43) encontrado na análise apresentou-se divergente com o descrito na literatura, segundo Mascarenhas (2012) o kefir de leite fermentado por 24 horas em temperatura ambiente possui um pH de, 4,6, Marchi, Palezi e Pietto (2015), encontraram um pH de 4,75. Esta diferença pode ser explicada segundo Silva *et al* (2012) pela informalidade do modo de produção e comercialização deste produto, uma vez que, por se tratar de um produto caseiro pode não ter ocorrido a padronização da fermentação influenciando assim o pH final.

Para Rodas (2001) citado por Silva *et al* (2012) “a acidez torna os iogurtes alimentos relativamente estáveis por inibir o crescimento de bactérias Gram negativas, e o pH do produto pode variar de 3,6 a 4,2 podendo atingir pH final de até 4,5”. Pode-se perceber, porém, que o valor de pH encontrado na análise está abaixo do encontrado pelo autores aqui citado, esse fato se deve a influência do pH da polpa de fruta de cupuaçu, juntamente com a influência dos outros ingredientes utilizados para produção do produto.

Segundo Contim (2007) adição de polpa de fruta e açúcar ao Kefir natural influencia nos valores de pH, no presente caso observou-se que tanto o pH do cupuaçu, que conforme Canuto *et al* (2010) é de, 3,5 quanto o pH do mel 4,3 (CHIAPETTI e BRAGHINI, 2013) estão relacionados com o pH baixo do produto, mesmo a polpa de fruta de cupuaçu tenha passado por cocção para diminuir acidez.

▪ Umidade

Ao final das análises o percentual de umidade do Iogurte elaborado apresentou-se, sendo 79, 52 % com desvio padrão de $\pm 16,79$, valores próximos do quantificado na literatura. Segundo Weschenfelder *et al* (2011) o percentual de umidade do kefir leban, fase sólida que se obtém o iogurte, foi de 79,39 e 79,4 % respectivamente, valores próximos ao encontrado por Braga, Neto e Vilhena (2012) de 76,24 e 78,80%. Já Marchi, Palezi e Pietto (2015), ressalta que o valor de umidade encontrado foi de 83,36%, ou seja está dentro do esperado levando em consideração o desvio padrão e a variação de 3, 84 % entre a amostra aqui analisada e a descrita por Marchi, Palezi e Pietto (2015).

▪ **Lipídios**

Analisando a tabela 1, o percentual de lipídios apresentou-se com um valor bastante elevado se comparado com a literatura vigente. Que conforme Contim (2007) que elaborou Kefir com polpa de graviola o percentual de lipídios foi 3%, valor bem abaixo do encontrado, que se apresentou de 22,17%.

Esse fato pode estar relacionado com a quantidade de ingredientes que compuseram o iogurte, leite integral UHT, Mel e a polpa de cupuaçu. Analisando a composição nutricional dos ingredientes utilizados constatou-se que segundo Embrapa (2007) citado por Robim *et al* (2012), a concentração de gordura no leite pode variar de 3,0%- 4,0% e às vezes até 4,5%. Já com relação o teor de lipídios na polpa de cupuaçu congelada a TACO (2011) ressalta que é equivalente a 0,6%. Analisando a composição nutricional do Kefir Carvalho (2009) citando por Mascarenhas (2012) encontrou um percentual de 3,5 % de lipídios, o mel segundo na tabela de composição química dos alimentos, não contém lipídios (FRANCO, 2008). Obtivendo a média do percentual de lipídios da composição dos ingredientes utilizados foi de 3,5%, percentual que ainda é bastante inferior ao encontrado no iogurte elaborado.

▪ **Açúcares totais e redutores**

Analisando os dados da tabela 1 que apresentou um quantitativo de açúcares redutores de 8,57 % e açúcares totais de 7,05%, e comparando como os dados dos valores obtidos pelos autores da literatura aqui apresentada, percebe-se que os valores não condizem com os citados na literatura. Segundo Martins (2013) os teores de açúcares totais da análise do iogurte elaborado em seu trabalho foi de 1,43%, açúcares redutores de 1,23%, açúcares não redutores de 0,17%. Já conforme Contim (2007) em seu trabalho no qual ele elaborou um iogurte de kefir com polpa de graviola ressalta que o teor de carboidratos do kefir natural apresentou-se 6,32% e com a polpa 5,96% fato pertinente, pois esse fator significa que a polpa influenciou na composição de açúcares do iogurte. No entanto, comparando os valores do autor com os resultados aqui obtidos verifica-se que o percentual de açúcares não há uma discrepância de valores. Já os teores de sacarose aparente não foram detectados.

Esses valores podem ser explicados ainda pelo teor de açúcares do mel de abelha, Sodré et al (2003) *apud* Chiapetti e Braghini (2013) relatam que o teor de sacarose no mel deve estar entre 2 e 3%. O autor ainda ressalta que o mel é um alimento formado basicamente por açúcares sendo 38% frutose e 31% de glicose, ou seja, é basicamente formado por açúcares redutores.

▪ **Cinzas**

A determinação de cinzas representa a quantidade de minerais presentes no iogurte, analisando a tabela 1, sobre o percentual de cinzas encontrado, de $0,49 \pm 0,17$, constatou-se que está dentro dos padrões esperados, conforme Weschenfelder *et al* (2011) e Cotim (2007), que quantificaram respectivamente o percentual de cinzas do kefir, o primeiro analisou o kefir leban sem polpa de fruta com cinzas totais de 0,89%, o segundo analisou respectivamente o kefir sem polpa de fruta obtendo um percentual de cinzas de, 0,63% e com polpa de fruta onde obteve o percentual de 0,42% de cinzas.

▪ **Proteínas**

Como dito anteriormente o quantitativo de proteína não foi identificado, devido às últimas etapas, destilação e titulação não terem sido realizadas. No entanto buscou-se o quantitativo de proteínas na literatura. Segundo Contim (2007) o teor de proteínas do iogurte de kefir com a polpa da graviola apresentou-se como sendo de 2,32 em 100 gramas do iogurte. Segundo Mascarenhas (2012) o teor de proteínas em 100 gramas de kefir é equivalente a 3,3 gramas. No entanto, não se pôde fazer a comparação, pois o teor de proteínas não foi quantificado. Contudo ao elaborar a ficha técnica do Iogurte produzido obteve-se um alto teor de proteína (7,80). (apêndice 7).

3.3. ANÁLISE SENSORIAL

Os resultados obtidos na análise sensorial do iogurte de cupuaçu fermentado com kefir e mel. Verificou-se que o iogurte teve uma grande aceitabilidade quanto a sua cor demonstrando que 37% dos provadores avaliaram o produto na escala no parâmetro Gostei muitíssimo, 43% gostei muito, (14%) gostei moderadamente, (3%) Gostei ligeiramente, (3%) nem gostei/nem desgostei, enquanto o parâmetro desgostou não obtiveram nenhuma nota pelos avaliadores.

Demonstrados na tabela (apêndice 1) Resultado similar ocorreu na análise sensorial em produtos derivados de kefir, leite e iogurte líquido natural (MASCARENHAS, 2012).

Analisando o atributo aparência teve sua aceitação entre (54%) gostei muitíssimo, (30%) gostei muito, (13%) gostei moderadamente, (3%) gostei ligeiramente, de acordo com a tabela 2 as medias de aceitação para o atributo aparência foi de (94%) sabe-se que a cor de determinado produto influencia bastante no poder de compra sendo um importante atributo ser avaliado, demonstrados na tabela (apêndice 2).

Com base nos resultados referentes ao sabor demonstram uma aceitabilidade de (34%) gostei muitíssimo, (24%) gostei muito, (25%) gostei moderadamente, (14%) gostei ligeiramente, (2%) nem gostei/nem desgostei (1%) desgostei ligeiramente, representado na tabela (apêndice 3). Esses resultados indicam a boa aceitação sensorial do sabor do iogurte de cupuaçu fermentado com kefir e mel o que pode ser atribuído, segundo Tomelin et al. (2009), ao fato de que o leite fermentado pelos grãos de kefir apresenta características peculiares de sabor levemente ácido e carbonatado natural, resultado de combinações aromáticas que contribuem ao seu flavor distinto. O sabor é a mais importante propriedade na determinação da aceitabilidade de um alimento (CHAIB, 1983).

Em relação à textura aceitação foi de (37%) gostei muitíssimo, (45%) gostei muito, (12%) gostei moderadamente, (5%) gostei ligeiramente, (1%) nem gostei/nem desgostei, a media de aceitação encontrada para textura foi de (94%) entre os parâmetros gostei muitíssimo e gostei muito. O iogurte de cupuaçu fermentado com kefir teve um aspecto viscoso sendo comparado ao iogurte grego por alguns dos participantes devido a sua consistência. (apêndice 4).

Resultado similar ocorreu na análise sensorial em produtos derivados de kefir, leite e iogurte líquido natural (MASCARENHAS, 2012). Onde no que diz respeito à textura na boca, apenas 3 provadores preferiram o kefir, enquanto que os restantes preferiram o iogurte; fator que denota que o kefir é mais aceito quando se tem adição de frutas. No que diz respeito ao odor o autor ressalta que, todos os provadores preferiram o iogurte em termos de doçura, 7 provadores preferiram o iogurte, os restantes 3 preferiram o kefir.

Para o atributo aroma a aceitação foi de (30%) Gostei muitíssimo, (39%) Gostei muito, (12%) Gostei moderadamente, (12%) Gostei ligeiramente, (3%) Nem gostei/Nem desgostei, (3%) Desgostei ligeiramente, (1%) desgostei muito. Representado na tabela (apêndice 5).

Os resultados relacionados à impressão global do iogurte de cupuaçu fermentado com kefir e mel, em uma escala hedônica de 1 a 9 pontos constatou-se maior percentual de aceitação com (43%) gostei muitíssimo, e só (1%) nem gostei/nem desgostei, pode se justificar o fato de a aceitabilidade não ter sido maior, devido ao teor de acidez característica natural do kefir, os provadores não serem habituados a consumirem o mel como alimento e sim como um remédio. Tabela (apêndice 6)

Segundo Silva (1995) afirmou que o aumento da acidez é determinado pela transformação da lactose pelos microrganismos, com formação de ácido láctico, conferindo acidez característica do produto. O produto apresentou características como: cor, textura semelhantes aos iogurtes industrializados.

Com relação à intenção de compra do iogurte elaborado pelos provadores, 58% dos indivíduos degustadores responderam que certamente comprariam, 25% provavelmente comprariam, 16% talvez compraria e somente 1% provavelmente não compraria. Comparando esses resultados com os obtidos por Mascarenhas (2012) em seu trabalho no qual utilizou 51 provadores para análise sensorial, 47 demonstraram intenção de compra e apenas 4 não comprariam. Conclui-se através desses resultados que o iogurte de cupuaçu fermentado com kefir e mel apresentou ótima aceitação sensorial.

3.4. ELABORAÇÃO DA FICHA TÉCNICA

A informação nutricional da ficha técnica elaborada segundo a tabela de composição dos alimentos (TACO), apresentou os seguintes valores: proteína, 7,80g; lipídios, 0,327g; carboidratos, 21,76g; o quantitativo calórico de 105,6 kcal. Os valores apresentados divergiram quanto aos valores dispostos nas análises físico-químicas. (apêndice 7). O iogurte apresentou alto teor protéico, o que o difere de outras formulações como o do Mascarenhas (2012), produzido apenas o kefir com 3,3 de proteína em 100g. O produto além de apresentar alto valor nutritivo e propriedades funcionais, por ser um alimento probiótico, pode ser adquirido com baixo custo se comparado com outros apresentados no mercado.

4. CONCLUSÃO

A produção do iogurte de kefir com cupuaçu e mel, foi realizada de forma satisfatória permitindo a obtenção de um produto com características físico – químicas e microbiológicas adequadas para consumo. Além de agregar valor nutritivo o produto avaliado apresentou de boa a ótima aceitação e intenção de compra. O novo produto foi aceito pelos provadores, no entanto, será necessário aprofundar este tema, no que diz respeito à análise de lipídio, a qual o valor obtido não condiz com a literatura.

REFERÊNCIAS

- [1] Braga, Adriano César Calandrini; Neto, Erasto Ferreira de Assis; Vilhena, Maria de Jesus Vaz. Elaboração e caracterização de iogurtes adicionados de polpa e d e xarope de mangostão (*garcinia mangostana* l.)/ Revista Brasileira de Produtos Agroindustriais, Campina Grande, v.14, n.1, p.77-84, 2012. ISSN 1517-8595
- [2] Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução – RDC nº 12, de 2 de janeiro de 2001. Dispõe sobre Regulamento Técnico sobre Padrões Microbiológicos para Alimentos. Brasília: Diário Oficial da União, jan. 2001.
- [3] Chiapetti, Elisa ; Braghini, Francieli. Comparação das características físico-químicas do mel de abelhas africanizadas (*apis mellifera*) e abelhas jataí (*Tetragonisca angustula*)/ Elisa Chiapetti e Francieli Braghini: Universidade Tecnológica Federal do Paraná- Francisco Beltrão, 2013.
- [4] Contim, Luciana Silva rocha. Produção do quefir com polpa de graviola (*anona muricata*) e avaliação das características microbiológicas, físico-químicas e de sua aceitabilidade/ Luciana Silva Rocha Contim: Universidade Federal do Amazonas. Manaus, 2007
- [5] Dacoregio, Daniela de Freitas Vieira. Elaboração e aceitabilidade de receitas para festas de aniversário para um grupo de pessoas portadoras de doença celíaca e/ou intolerância à lactose, no município de Criciúma, SC. UNESC. Criciúma- Santa Catarina. 2009. Disponível em: <http://www.bib.unesc.net/biblioteca/sumario/000044/000044C0.pdf>. Acesso em: 09/2016
- [6] Escobar, Ana Lúcia Silva; XAVIER, Fábio Branches. Propriedades fitoterápicas do mel de abelha. Revista Uningã, Maringá – PR, n.37, p. 159-172, 2013.
- [7] Franco, G. Tabela de composição química dos alimentos. 9. ed. São Paulo: Ateneu, 1999. 307p.
- [8] Instituto Adolfo Lutz. Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz. v. 1: Mé- todos químicos e físicos para análise de alimentos, 3. ed. São Paulo: IMESP, 1985. p. 36-37.
- [9] Marchi, Luana de; Palezi, Simone Canabarro; Pietta, Giordana Maria. Caracterização e avaliação sensorial do kefir tradicional e derivados/ Unesco & Ciência - ACET Joaçaba, Edição Especial, p. 15-22, 2015.
- [10] Mathias, Thiago Rocha dos Santos. Avaliação do comportamento reológico de diferentes iogurtes comerciais/ Thiago Rocha dos Santos Mathias. Campinas, v. 16, n. 2013 <http://dx.doi.org/10.1590/S1981-67232013005000004>
- [11] Mascarenhas, Marisa Alexandra da Cruz. QualiKefir: Avaliação da Qualidade Físico-Química e Sensorial em Produtos derivados de Kefir, Leite e Iogurte Líquido Natural/ Marisa Alexandra da Cruz Mascarenhas. Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar – Peniche Instituto Politécnico de Leiria. 2012
- [12] Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/ Instrução Normativa Nº 16, de 23 de Agosto de 2005.
- [13] Philippi, Sonia Tucunduva. Nutrição e Técnica Dietética/ Sonia Tucunduva Philippi- 2.ed. nev. E atual- Barueri, SP. Manole, 2006.
- [14] Santos, F. L. ; Silva, Edleuza ; Barbosa, Adna ; Silva, Joseane . Kefir: uma nova fonte alimentar funcional?. Diálogos & Ciência (Online), v. 10, p. 1-14, 2012.
- [15] Santos, Ferlando Lima. Kefir: propriedades funcionais e gastronômicas/ organizado por Ferlando Lima Santos-Cruz Das Almas/BA: UFRB, 2015.
- [16] Silva, Leticia Cogo da et al. Aspectos microbiológicos, ph e acidez de iogurtes de produção caseira comparados aos industrializados da região de Santa Maria – RS/ Leticia Cogo da Silva , Thais Brito Machado, Márcia Liliane Rippel Silveira, Claudia Severo da Rosa e Silvana Maria Michelin Bertagnolli: Ciências da Saúde, Santa Maria, v. 13, n. 1, p. 111-120, 2012.
- [17] Silva, Ana Inês Dias da et al. Produção de Iogurte. Faculdade do Porto-FEUP, 2010.
- [18] Stone, H.; Sidel, J.L. Sensory Evaluation Practices/ 3. Ed. New York: Academic press. 2004, 408p.
- [19] Taco. Tabela brasileira de composição de alimentos. 4ª edição revisada e ampliada. Campinas – SP, 2011. Disponível em:

https://www.unicamp.br/nepa/taco/contar/taco_4_edicao_ampliada_e_revisada.pdf?arquivo=taco_4_versao_ampliada_e_revisada.pdf

[20] Terra, Flávio Marques. Teor de Lactose em Leites Fermentados por grãos de kefir/ Flávio Marques Terra: Universidade de Brasília, Brasília, 2007.

[21] Weschenfelder et al. Caracterização físico-química e sensorial de kefir tradicional e derivados. Arq. Bras. Med. Vet. Zootec., v.63, n.2, p.473-480, 2011. Disponível em <<http://www.scielo.br/pdf/abmvz/v63n2/27.pdf>> acesso 28/08/2016.

APÊNDICES

Apêndice 1: Resultado da análise sensorial do atributo cor

Tabela 1 - Resultado da análise sensorial do atributo cor

ESCALA HEDÔNICA	PORCENTAGEM
9-Gostei muitíssimo	37%
8-Gostei muito	43%
7-Gostei moderadamente	14%
6-Gostei ligeiramente	3%
5-Nem gostei/Nem desgostei	3%
4-Desgostei ligeiramente	0%
3-Desgostei moderadamente	0%
2-desgostei muito	0%
1-Desgostei muitíssimo	0%

Fonte: Pesquisa de campo 2016.

Apêndice 2: Resultado da análise sensorial do atributo aparência

Tabela 2-Resultado da análise sensorial do atributo aparência

ESCALA HEDÔNICA	PORCENTAGEM
9-Gostei muitíssimo	54%
8-Gostei muito	30%
7-Gostei moderadamente	13%
6-Gostei ligeiramente	3%
5-Nem gostei/Nem desgostei	0%
4-Desgostei ligeiramente	0%
3-Desgostei moderadamente	0%
2-desgostei muito	0%
1-Desgostei muitíssimo	0%

Fonte: Pesquisa de campo, 2016.

Apêndice 3: Resultado da análise sensorial do atributo sabor

Tabela 3-Resultado da análise sensorial do atributo sabor

ESCALA HEDÔNICA	PORCENTAGEM
9-Gostei muitíssimo	34%
8-Gostei muito	24%
7-Gostei moderadamente	25%
6-Gostei ligeiramente	14%
5-Nem gostei/Nem desgostei	2%
4-Desgostei ligeiramente	1%
3-Desgostei moderadamente	0%
2-desgostei muito	0%
1-Desgostei muitíssimo	0%

Fonte: Pesquisa de campo, 2016.

Apêndice 4: Resultado da análise sensorial do atributo textura

Tabela 4- Resultado da análise sensorial do atributo textura

ESCALA HEDÔNICA	PORCENTAGEM
9-Gostei muitíssimo	37%
8-Gostei muito	45%
7-Gostei moderadamente	12%
6-Gostei ligeiramente	5%
5-Nem gostei/Nem desgostei	1%
4-Desgostei ligeiramente	0%
3-Desgostei moderadamente	0%
2-desgostei muito	0%
1-Desgostei muitíssimo	0%

Fonte: Pesquisa de campo, 2016

Apêndice 5: Resultado da análise sensorial do atributo aroma

Tabela 5-Resultado da análise sensorial do atributo aroma

ESCALA HEDÔNICA	PORCENTAGEM
9-Gostei muitíssimo	30%
8-Gostei muito	39%
7-Gostei moderadamente	12%
6-Gostei ligeiramente	12%
5-Nem gostei/Nem desgostei	3%
4-Desgostei ligeiramente	3%
3-Desgostei moderadamente	0%
2-desgostei muito	1%
1-Desgostei muitíssimo	0%

Fonte: Pesquisa de campo, 2016.

Apêndice 6: Resultado da análise sensorial do atributo impressão global

Tabela 6-Resultado da análise sensorial do atributo impressão global

ESCALA HEDONICA	PORCENTAGEM
9-Gostei muitíssimo	43%
8-Gostei muito	35%
7-Gostei moderadamente	12%
6-Gostei ligeiramente	9%
5-Nem gostei/Nem desgostei	1%
4-Desgostei ligeiramente	0%
3-Desgostei moderadamente	0%
2-desgostei muito	0%
1-Desgostei muitíssimo	0%

Fonte: Pesquisa de campo, 2016.

Apêndice 7: Ficha Técnica

FICHA TÉCNICA

Nome Técnico: Iogurte de kefir com cupuaçu

Nome Fantasia: Iogurte funcional cupuaçu

Ingredientes	Medida caseira	Quantidade (g/ml)	Custo deste ingrediente
4 litros de leite	20 copos americanos	4.000 g/ml	16 R\$
½ polpa de cupuaçu	3 xícaras de chá	737,55g	12,5 R\$
kefir	4 colheres de sopa	80g	
Mel	2 xícaras de chá	595g	8,85 R\$

Utensílios e equipamentos

- Liquidificador
- Bacias de plástico
- Xícara (chá)
- Recipiente de vidro
- Funil
- Filtro
- Peneira
- Balança analítica (Bio precisa)

Modo de preparo

- Inocular os grãos de kefir em 4 recipientes de vidro, com os 4 litros de leite.
- Deixar fermentar por 24 horas.
- Separar com auxílio de uma peneira os grãos de kefir do leite fermentado.
- Colocar o leite fermentado para escoar em 5 potes de vidro, utilizando os 5 funis e 5 filtros de papel.
- Colocar para escoar na geladeira por 16 horas para obter consistência de iogurte, reservar.
- Cozinhar a polpa de cupuaçu.
- Bater no liquidificador por 5 minutos.
- Misturar a polpa de cupuaçu com o iogurte manualmente.
- Acrescentar 2 xícaras (chá) de mel.

Tempo de preparo: 40 horas e 40 minutos

Rendimento: 2.662 ml. N° de porções : 60 pessoas - 44,66ml)

Informação nutricional (Por porção de 44ml)

	Quantidade por porção	%VD *
Valor energético	105,6kcal	5%
Carboidratos	21,76g	7%
Proteínas	7,80g	10%
Lipídeos	0,327g	0,59%

Fonte: TACO

Custo da receita: 37,35 reais.

Custo por porção: 0,62 reais.

Capítulo 20

Avaliação sensorial da geleia de uva (Vitis vinifera L.) da variedade benitaka adicionada do resíduo da própria fruta

Kauyse Matos Nascimento

Luciana Alves da Silva Tavone

Suelen Siqueira dos Santos

Carolina Moser Paraíso

Valkirea Matos Nascimento

Monica Regina da Silva Scapim

Resumo: A uva é uma fruta rica em compostos que são benéficos à saúde, além de ser uma das frutas mais apreciadas em todo o mundo, tanto *in natura* quanto processada. A uva da variedade Benitaka é uma mutação da uva Itália, diferindo apenas por sua coloração rosada. A produção de geleia dessa fruta propicia a conservação da mesma por um longo período de tempo, além de agregar valor ao produto. A utilização de casca na formulação da geleia proporciona ao produto propriedades funcionais, além de dar um destino mais sustentável a esse resíduo da produção de vinhos. Este trabalho teve como objetivo avaliar sensorialmente uma formulação de geleia de uva adicionada da casca da própria fruta como fonte de fibras naturais. A avaliação sensorial foi realizada com 50 julgadores, foram aplicados dois testes sensoriais: um teste de aceitação, utilizando escala hedônica estruturada de 9 pontos, e um teste de intenção de compra. Através destas avaliações observou-se uma boa aceitação da geleia, sendo a maioria dos índices de aceitabilidade superiores a 80% e 89,66% de intenção de compra. Portanto, a adição de casca de uva na formulação de geleia pode ser uma alternativa sustentável para esse resíduo da agroindústria, além de enriquecer o produto com propriedades funcionais que a casca propicia.

Palavras-Chave: Processamento de geleia; Casca, Índice de aceitabilidade, Intenção de compra.

1. INTRODUÇÃO

A uva é uma das frutas mais consumidas no mundo, seja na forma in natura, seja na forma processada e, está também recebendo atenção como uma importante fonte de compostos biologicamente ativos, benéficos à saúde humana. É rica em açúcar e vitaminas do complexo B e C, sais minerais e proteínas. Possui propriedades rejuvenescedoras, anticancerígenas, diuréticas e depurativas, por apresentar grandes quantidades compostos antioxidantes e funcionais (EBERT et al., 2010; RIBEIRO et al., 2009).

Existem inúmeras variedades de uva, sendo as mais comuns a Niágara, Rubi e Benitaka. A Benitaka é uma mutação da Itália, apresentando as mesmas características vegetativas e produtivas das cultivares Itália e Rubi, diferindo apenas quanto à coloração rosada intensa das bagas e à coloração avermelhada do pincel (PINHEIRO et al., 2009). As uvas em geral são utilizadas como matéria prima na fabricação de vinhos, sucos, geleias, e passas. As partes mais aproveitadas do fruto são a polpa e a semente; e sua casca podendo ser utilizada na indústria alimentícia para elaboração de produtos com apelo funcional (FREITAS, 2007).

A casca de uva Benitaka é uma rica fonte de fibras, com propriedades funcionais, especialmente uma maior concentração de fibras insolúveis em relação à fração solúvel, além de compostos bioativos, vitamina C e antocianinas, também contém minerais como ferro, potássio, zinco, cálcio e manganês (SOUSA et al., 2014).

A vitivinicultura brasileira é uma atividade produtiva realizada principalmente em pequenas propriedades e com forte presença da mão-de-obra familiar. Considerando a produção nacional de uvas, cerca de 65% são destinados à elaboração de vinhos, sucos, geleias e outros derivados, enquanto que 35% destinam-se ao consumo in natura (EBERT et al., 2010).

A geleia é um produto de fácil fabricação que agrega valor às frutas e ainda permite a conservação destas por um período prolongado de tempo (EBERT et al., 2010).

A resolução CNNPA nº 12, de 1978, define geleia como sendo um produto obtido pela cocção, de frutas, inteiras ou em pedaços, polpa ou suco de frutas, com água, pectina, ácidos e açúcar, concentrado até consistência gelatinosa, podendo ser classificadas em:

- Geleia Comum: Quando preparadas numa proporção de 40 partes de frutas frescas, ou seu equivalente, para 60 partes de açúcar (BRASIL, 1978).
- Geleia Extra: Quando preparadas numa proporção de 50 partes de frutas frescas, ou seu equivalente, para 50 partes de açúcar (BRASIL, 1978).

Segundo Moceró et al., (2008) as geleias devem ser claras, brilhantes, transparentes e macias ao serem cortada, quando extraídas da embalagem, precisam manter o estado semissólido, não deve ser açucarada, pegajosa ou viscosa, devendo conservar o gosto e o aroma original da fruta que lhe deu origem.

A formulação ideal para o preparo da geleia é aquela em que a matérias-primas são combinadas, de modo a se obter o menor tempo de cozimento possível, assegurando melhor conservação da cor e sabor natural da fruta (EBERT et al., 2010).

Os hábitos alimentares dos consumidores vêm sendo modificados, onde a preocupação com a saúde tem levado os consumidores a procurar produtos com apelo funcional e optar por uma vida mais saudável, as indústrias vêm buscando novas formulações que atenda este mercado exigente. Visando isto, objetivou-se avaliar sensorialmente geleia de uva adicionada de fibras naturais (casca), verificando seu índice de aceitabilidade e intenção de compra caso disponível no mercado.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 MATERIAL

Para a produção das geleias, foram utilizadas uvas da variedade Benitaka adquiridas no comércio local, assim como o açúcar tipo cristal que foi utilizado na formulação.

2.2. PROCESSAMENTO DE GELEIA

Optou-se por utilizar um fluxograma básico para o processamento da geleia conforme apresentado na da Figura 1.

Após serem adquiridas e recepcionadas, as uvas foram higienizadas em água corrente e em seguida sanitizadas em solução de hipoclorito de sódio (200 ppm/15 minutos).

As frutas foram selecionadas e separadas, onde os frutos em bom estado foram utilizados para elaboração de geleia, e os que estavam em estágio avançado de maturação ou com alguma injúria, foram descartados.

Figura 1: Fluxograma básico do processamento de geleias.

Fonte: Dados da pesquisa

As sementes foram retiradas manualmente e, em seguida, separadas a polpa da casca com a utilização de uma centrífuga. O teor de sólidos solúveis da polpa foi medido através de um refratômetro digital, e o pH foi medido através de um potenciômetro digital.

Um método para verificar se a fruta apresenta ou não um bom teor de pectina é através do Teste do álcool, que consiste na mistura de uma proporção de 1:1 de volume de suco de fruto e de volume de álcool à 96%. O resultado é verificado através do volume de precipitado e a consistência do gel formado, sendo o de maior volume e consistência com alto teor de pectina (MOCORÓ et al., 2008).

A formulação básica da geleia deveria conter 40% de polpa de uva e 60% de açúcar, deste total foram acrescentados 6% do total de casca extraída. Assim, iniciou-se a concentração em fogo médio e à pressão atmosférica, até que produto atingisse um teor de sólidos solúveis em torno de 62-70°Brix.

O envase da geleia foi realizado à quente, em vidros estéreis, e o fechamento foi realizado com tampas metálicas esterilizadas. Após o fechamento das embalagens, as mesmas foram invertidas e mantidas nesta posição por 5 minutos para esterilizar o espaço vazio. Após este tempo foi realizado o resfriamento em água corrente até temperatura de 25°C, as amostras foram armazenadas à temperatura ambiente até o dia de análise.

2.3 ANÁLISE SENSORIAL

Os testes de análise sensorial foram realizados com 50 julgadores não treinados, as amostras foram apresentadas aos julgadores em copos plásticos brancos descartáveis com capacidade para

50 mL, contendo aproximadamente 20 mL de amostra, as amostras foram codificadas com algarismos aleatórios de 3 dígitos.

2.3.1 TESTE DE ACEITABILIDADE UTILIZANDO ESCALA HEDÔNICA E TESTE DA INTENÇÃO DE COMPRA

O teste de aceitabilidade usando escala hedônica foi realizado para determinar a aceitabilidade da geleia de uva, para cada um dos atributos: cor, aroma, consistência, acidez e

doçura. Para a determinação da aceitabilidade da geleia foi usada um escala hedônica estruturada de 9 pontos, onde 1 = desgostei muitíssimo e 9 = gostei muitíssimo.

Uma pesquisa de intenção de compra também foi realizada com os julgadores, utilizando uma escala de 5 pontos variando de “Certamente compraria a certamente não compraria”. A Figura 2 apresenta a ficha utilizada durante a aplicação do teste.

Figura 2: Ficha aplica durante o teste de análise sensorial da geleia de uva acrescida de fibras naturais.

Nome: _____		Sexo: () F () M	Data: __/__/__	Idade: ____
<p>Você está amostra de GELEIA DE UVA acrescida de FIBRAS NATURAIS. Avalie a amostra quanto a COR, SABOR, CONSISTÊNCIA, ACIDEZ e DOÇURA ; e indique na escala abaixo o quanto você gostou ou desgostou da amostra.</p>				
Amostra: _____				
	NOTA			
COR:	_____	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 9 gostei extremamente 8 gostei muito 7 gostei moderadamente 6 gostei ligeiramente 5 nem gostei/nem desgostei 4 desgostei ligeiramente 3 desgostei moderadamente 2 desgostei muito 1 desgostei extremamente </div>		
SABOR:	_____			
CONSISTÊNCIA:	_____			
ACIDEZ:	_____			
DOÇURA:	_____			
Comentários: _____		<p>Se este produto estivesse no mercado e se o preço não fosse problema você:</p> <p>() Certamente compraria</p> <p>() Provavelmente compraria</p> <p>() Talvez comprasse/talvez não comprasse</p> <p>() Provavelmente não compraria</p> <p>() Certamente não compraria</p>		

Fonte: Dados da pesquisa

Os resultados para o teste de aceitabilidade e o teste de intenção de compra foram apresentados em pontos percentuais. O índice de aceitabilidade (IA) de cada atributo avaliado foi

calculado considerando-se a nota média alcançada pelo atributo, dividido pela maior nota obtida no teste, multiplicado por cem.

3.RESULTADOS E DISCUSSÕES

De acordo com Mocaró et al., (2008) o pH ideal para uma boa geleificação deve estar em torno de 3,0 a 3,2. Caso esse pH não seja alcançado com a acidez natural da fruta, será necessário proceder a adição de acidulante na matéria-prima. Para a polpa de uva utilizada no processamento de geleia obteve-se um valor médio de pH 3,18 assim não sendo necessário a adição de acidulante.

Outro fator importante para uma boa geleificação é o teor de pectina presente no fruto. O teste do álcool realizado com o suco da uva Benitaka apresentou-se com alta consistência, assim não necessitando de adição de pectina no processo da geleia.

Após a elaboração da geleia verificou-se a aceitabilidade do produto através de análise sensorial utilizando o teste de aceitação. Na Tabela 1, encontram-se as aceitabilidades médias dos atributos da amostra avaliada quanto a cor, sabor, consistência, acidez e doçura.

Tabela 1 - Valores médios das notas atribuídas pelos julgadores a cada atributo avaliado no teste de aceitabilidade análise da geleia de uva

Atributo	Média
Cor	8,1
Sabor	7,8
Consistência	7,9
Acidez	7,3
Doçura	6,2

Fonte: Dados da pesquisa

Os valores médios para os cinco atributos, variaram de 6 (gostei ligeiramente) a 8 (gostei muito), demonstrando que os julgadores gostaram da geleia. Utilizando-se dos valores médios de aceitabilidade da Tabela 1, pode-se calcular o Índice de Aceitabilidade de seus respectivos atributos, conforme disposto na Tabela 2.

Tabela 2: Índice de aceitabilidade para cada atributo apresentado na análise sensorial da geleia de uva

Atributo	IA (%)
Cor	90,4
Sabor	86,7
Consistência	87,4
Acidez	80,7
Doçura	77,5

Fonte: Dados da pesquisa

O atributo cor obteve maior índice entre todos os atributos e a doçura o menor índice. O alto valor para o atributo cor pode ser explicado devido à adição de casca na formulação, uma vez que segundo Falcão, et al. (2007), o aumento da temperatura durante o processo de elaboração, auxilia na transferência dos pigmentos das cascas da uva para a geleia, e assim favorecendo sua aparência.

Já para o atributo doçura, o menor índice de aceitabilidade deve-se a diferença da palatabilidade entre os julgadores. Além disso, mesmo obtendo o menor índice, apresentou-se um valor de 77,5%, sendo que segundo Dutcosky (2007), para que um produto seja aceito quanto às suas características sensoriais, é necessário que seu índice de aceitabilidade seja, no mínimo, de 70%. Desta forma, para todos os atributos analisados a geleia apresentou um bom índice de aceitabilidade.

Outro estudo avaliou a adição de casca de uva e linhaça em geleia de uva, os índices de aceitação na análise sensorial obtidos foram superiores a 70%, indicando que a adição de casca de uva não descaracteriza o produto, além de não sofrer rejeição por parte dos provadores (SILVA et al., 2015)

A intenção de compra é fator determinante para o consumidor avaliar às inovações dos produtos para possível disponibilidade no mercado. Na figura 3 está representado o histograma referente aos resultados da intenção de compra realizada.

Analisando a Figura 3, pode-se observar que a formulação de geleia obteve 53,33% de intenção de compra na opção “certamente compraria”, 33,33% para “provavelmente compraria”, e

apenas 13,33% “talvez comprasse/talvez não comprasse”. Desta forma, supondo que o produto fosse inserido no mercado teria 89,66 % de intenção de compra.

Figura 3: Intenção de compra para geleia de uva enriquecida com fibra natural extraída da própria fruta.

Fonte: Dados da pesquisa

Devido a este cenário apresentado, e em relação a busca pelos consumidores por uma vida mais saudável, é importante destacar que a adição da casca da uva no processo de produção da geleia, garante maior capacidade antioxidante (propriedades nutricionais que previnem os radicais

livres) sendo assim saudáveis para o organismo humano. O fato de acrescentar a casca à mistura minimiza a perda dos compostos fenólicos, uma vez que as altas temperaturas necessárias no processo favorecem a degradação dos compostos antioxidantes (SANTOS, 2011).

Vários estudos têm sido desenvolvidos ao longo dos últimos anos com o intuito de utilizar resíduos industriais de frutas. Damiani et al. (2008) avaliou a aceitação sensorial de geleia de manga adicionada da casca, e obteve notas entre 7 e 8 em escala hedônica estruturada de 9 pontos e 100% de intenção de compra do produto.

4.CONCLUSÃO

A elaboração de geleia de uva com adição de casca foi satisfatória, sendo sensorialmente aceita, com elevado índice de aceitabilidade e com valor de intenção de compra de 89,66 % na análise sensorial. Isto demonstra que os consumidores anseiam por produtos com apelo funcional e que sejam saudáveis para a saúde. Além disso a adição da casca minimiza o impacto ambiental gerado pelo descarte deste resíduo sólido, além de agregar valor a este produto.

REFERÊNCIAS

- [1] Brasil, Agência de Vigilância Sanitária. Resolução - CNNPA nº 12, de 1978. Regulamento técnico para fabricação de geleia de frutas. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, D.O. 24/07/1978.
- [2] Damiani, C.; Boas, E. V. B. V.; Junior, M. S. S.; Caliari, M.; Paula, M. L.; Pereira, D. E. P.;
- [3] Silva, A. G. M. Análise física, sensorial e microbiológica de geleias de manga formuladas com diferentes níveis de cascas em substituição à polpa. Ciência Rural, v.38, n.5, p.1418-1423, 2008.
- [4] Dutcosky, S. D. Análise sensorial de alimentos. Curitiba: DA Champagnat, 2007. 239p. Ebert, L. C.; Silva, H. R.; Orsolini, A.; Palezi, S. C.; Giuliani, F.; Demori, A. B.;

- [5] Richards, N. S. S. Geleia de uva com reduzido teor calórico: formulação e caracterização físico- química e sensorial. In: Amostra de Iniciação Científica, 13., 2010. Anais... Unicruz, 2010.p. 4.
- [6] Falcão, A. P.; Chaves, E. S.; Kuskoski, E. M.; Fett, R.; Falcão, L. D.; Bordignon-Luiz, M. T.; Índice de polifenóis, antocianinas totais e atividade antioxidante de um sistema modelo de geleia de uvas. Ciência e Tecnologia de Alimentos, v. 27, n. 3, p. 637-642, 2007.
- [8] Freitas, L. S. Desenvolvimento de procedimentos de extração do óleo de sementes de uva e caracterização química dos compostos extraídos. 2007. 227f. Tese (Pós-graduação em Química). Instituto de Química; Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2007.
- [9] Mocoró, R. C.; Ferreira, D. V. S.; Ferreira, R. G. S. Como montar e operar uma pequena fábrica de doces e geleias. Viçosa, CPT, 2008. 312 p.
- [10] Pinheiro, E. S.; Costa, J. M. C.; Clemente, E.; Machado, P. H. S.; Maia, G. A. Estabilidade físico-química e mineral do suco de uva obtido por extração a vapor. Revista Ciência Agronômica, v. 40, n. 3, p.373-380, 2009.
- [11] Ribeiro, S.; Matos, G; Marques, M.; Lima A. Caracterização físico-química, fenólicos totais e capacidade antioxidante de uvas Benitaka cultivadas no estado do Piauí-Brasil. In: Congresso DE Pesquisa e Inovação da rede Norte E Nordeste DE Educação Tecnológica, 4., 2009. Anais... Belém: [s.n.], 2009.
- [12] Santos, R. C. Adição de casca enriquece geleia de uva. Jornal Unicamp, Campinas, v. 25, n. 485, 2011.
- [13] Silva, N.V.; Sousa, B. A. A.; Costa, S. S.; Júnior Gomes, D. Elaboração e aceitabilidade de geleia de uva (*Vitis* ssp. L) adicionada de linhaça (*Linum usitatissimum* L.) e resíduos do processamento. In: Simpósio Latino Americano de Ciência de Alimentos (Slaca), 11., 2015. Anais... Slaca, v.2, p.36298, 2015.
- [14] Sousa, E.C.; Uchôa-Thomaz, A. M. A.; Carioca, J. O. B.; Moraes, S. M.; Lima, A.; Martins, C. G.; Alexandrino, C. D.; Ferreira, P. A. T.; Rodrigues, A. L. M.;
- [15] Rodrigues, S. P.; Silva, J. N.; Rodrigues, L. L. Chemical composition and bioactive compounds of grape pomace (*Vitis vinifera* L.), Benitaka variety, grown in the semiarid region of Northeast Brazil. Food Science and Technology, Campinas, v.34, n.1, p.135-142, 2014.

Capítulo 21

Desenvolvimento de sorvete artesanal utilizando extrato hidrossolúvel de soja em substituição ao leite

Edenilze Teles Romeiro

Priscila Barbosa Bezerra Nunes

Resumo: O sorvete é um produto que, além de bem apreciado, consiste numa fonte de proteínas, gordura e carboidratos provenientes do leite. Porém, pessoas que possuem intolerância à lactose, alergia ao leite, e os veganos, acabam por não desfrutarem dessa iguaria. Uma das alternativas é a substituição do leite por produtos derivados da soja. Frente a isto, foi realizado desenvolvimento de formulações para um sorvete artesanal à base de extrato hidrossolúvel de soja em substituição ao leite. Foram elaboradas e testadas 11 formulações, sendo 5 (cinco) sabor maracujá, 4 (quatro) sabor morango, e 2 (duas) sabor baunilha com coco, obtendo-se o melhor resultado com o sorvete sabor maracujá, por apresentar sabor natural da fruta, corpo macio, volume ideal e textura pouco arenosa. Realizou-se a análise sensorial e a avaliação de aceitação deste sorvete. Tal produto obteve boa aceitação pela maioria dos degustadores, mesmo entre aqueles que declararam não gostar do sabor da soja e de seus derivados, ficando o sabor como a característica mais apreciada, e a textura a menos apreciada. Desta forma, foi possível desmistificar que todo produto à base de soja possui sabor e aroma não apreciáveis, como citado por muitos consumidores.

Palavras-Chave: Derivado da soja; Gelado comestível; Produto artesanal.

1. INTRODUÇÃO

Inicialmente, os ingredientes para fabricação de sorvetes eram somente leite, creme, açúcar e estabilizantes. Atualmente, é utilizada uma grande gama de ingredientes, levando em consideração certas características como custo, propriedades de manipulação (viscosidade, ponto de congelamento e aeração), aroma, corpo, textura, valor nutricional, cor e palatabilidade do produto final (XAVIER, 2009).

De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvete (ABIS, 2017), houve um crescimento no consumo nacional de sorvetes de 90,5% entre os anos de 2003 e 2014, onde o consumo per capita girou em torno de 6,43 litros/ano, com uma queda entre 2015 e 2016.

Embora o Brasil seja um país tropical, ainda são baixos os índices de consumo de sorvete. Isto se deve à manutenção do conceito de que o sorvete é um produto de consumo exclusivo durante os meses de verão. Nos países nórdicos as estatísticas revelam um maior consumo do produto, o que revela a influência do hábito alimentar se sobressaindo ao clima com baixas temperaturas predominantes durante o ano. As possibilidades do mercado nacional são otimistas frente ao bom crescimento nas vendas nacionais, com um aumento de 81,6% entre os anos de 2003 e 2013 (ABIS, 2014).

A soja, por ser um alimento com alta quantidade e qualidade de proteína, pode substituir os alimentos lácteos, ou seja, aqueles que contêm lactose. A introdução da soja e seus derivados como parte da dieta são recomendáveis, pois contêm nutrientes, entre eles as fibras, vitaminas e sais minerais, necessários para o crescimento, desenvolvimento e manutenção do organismo, além de fornecer componentes naturais como a isoflavona e fosfolipídios, entre outros, que promovem o bem estar físico. Esta leguminosa se destaca pelas suas propriedades funcionais e seus potenciais benéficos à saúde, os quais se destacam os efeitos preventivos em doenças cardiovasculares, osteoporose e câncer, além de alívio dos sintomas da menopausa (PEREIRA, 2010).

Frente aos fatos expostos, o mercado tem buscado cada vez mais produtos que ofereçam elevado valor nutricional e que possuam características sensoriais aceitáveis para que atenda a demanda de grupos com restrições alimentares, como os produtos isentos de lactose tendo como base a soja. Assim teve-se por objetivo produzir sorvetes saborizados com maracujá, morango e baunilha com coco, sob condições artesanais, a partir de formulações substituindo o leite pelo extrato hidrossolúvel de soja, sendo feita posteriormente análise sensorial da formulação que obtivesse maiores indicadores de qualidade conforme descritos por Souza et al. (2010).

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 SORVETE

2.1.1 HISTÓRIA

De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Sorvete (ABIS, 2006), o primeiro relato que se tem do sorvete data de mais de três mil anos atrás e tem sua origem no Oriente. No deserto da Pérsia, com 42°C ou mais no verão, o sorvete era feito construindo-se uma piscina ampla e rasa, protegida por uma parede para protegê-la do sol. A piscina era cheia com água pura vinda de reservatórios subterrâneos e após o congelamento, durante a noite, cortava-se o gelo em blocos antes que o sol começasse a aquecê-lo. Esses blocos eram armazenados numa enorme casa de gelo semelhante a um iglu. A espessa parede feita de tijolos de barro oferecia um bom isolamento. No século I da Era Cristã, o imperador de Roma, Nero, apreciava uma mistura de vinho, sucos de frutas e mel, que era congelada com a neve trazida dos Alpes. No século XIII, Marco Polo retornava do Oriente à Itália trazendo recipientes que diziam terem sido utilizados na Ásia por mais de mil anos para congelar água. Foram os italianos os primeiros europeus a ter esse alimento e a desenvolver receitas de sorvete com leite, e por volta de 1500 o produto parece começar a ter sido difundido por toda a Europa (ABTA, 2010).

Os ingleses introduziram o sorvete nos Estados Unidos, onde se inicia a industrialização do produto, sendo aberta em 1851 a primeira fábrica de sorvetes do mundo por Jacob Fussel, sendo o “ice cream” produzido pela primeira vez em grande quantidade. A invenção da refrigeração mecânica, fato que facilitou o acesso do produto a pessoas que moravam em lugares quentes e distantes, ajudou no processo da popularização do produto (XAVIER, 2009).

A história do sorvete no Brasil tem início em 1834 quando chega um navio carregado com 270 toneladas de gelo vindo dos Estados Unidos. Dois comerciantes do Rio de Janeiro compraram todo o carregamento e fabricaram sorvetes com frutas tropicais com o nome de “gelado”, abrindo a primeira sorveteria brasileira

em 1835. Na época não havia como conservar o sorvete gelado, por isso ele tinha que ser consumido logo após o preparo (SOUZA et al., 2010).

A história conta apenas que até 1941 a evolução do sorvete no Brasil deu-se de forma artesanal. A partir de então se deu o início da industrialização do sorvete, com elevados volumes de produção e utilizando-se a tecnologia do frio. De 1942 até 1980 a indústria de sorvetes apresentou crescimento constante, tendo hoje à disposição do consumidor uma imensa variedade de produtos como bolos gelados, torta de frutas, cones de biscoitos e outras combinações. Atualmente, o mercado brasileiro de sorvetes está dividido entre os produtos industrializados e os fabricados em escala artesanal (MIGUEL, 2009).

2.1.2 DEFINIÇÃO

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA (BRASIL, 1999), o sorvete está inserido no grupo dos gelados comestíveis, sendo estes definidos como:

Produtos alimentícios obtidos a partir de uma emulsão de gorduras e proteínas, com ou sem adição de outros ingredientes e substâncias, ou de uma mistura de água, açúcares ou outros ingredientes e substâncias que tenham sido submetidas ao congelamento, em condições tais que garantam a conservação do produto no estado congelado ou parcialmente congelado, durante a armazenagem, o transporte e a entrega ao consumo.

Sob o ponto de vista bioquímico, o sorvete consiste em uma mistura heterogênea, sendo uma emulsão, gel, suspensão e espuma ao mesmo tempo, cuja coesão é mantida devido ao congelamento. Estruturalmente trata-se de uma espuma, na qual as bolhas de ar estão cobertas por cristais de gelo, glóbulos de gordura individualizados ou parcialmente fundidos (grânulos gordurosos) e cristais de lactose (no uso de leite). A estrutura dos glóbulos parcialmente fundidos e sua união às bolhas de ar dão ao sorvete firmeza residual depois da fusão dos cristais de gelo, sendo tal fato importante para os atributos sensoriais (MOSQUIM, 1999).

2.1.3 CLASSIFICAÇÃO

Segundo a ANVISA (BRASIL, 1999), os gelados comestíveis podem ser classificados em:

- a) Sorvetes de massa ou cremosos - compostos basicamente de leite e derivados lácteos e/ou outras matérias-primas alimentares, nos quais os teores de gordura e/ou proteína são total ou parcialmente de origem não láctea, contendo no mínimo 3% de gordura e 2,5% de proteínas, podendo ser adicionados outros ingredientes alimentares;
- b) *Sherbets* - elaborados basicamente com leite e/ou derivados lácteos e/ou outras matérias-primas alimentares e que contêm uma pequena porção de proteína e gordura, as quais podem ser total ou parcialmente de origem não láctea, contendo no mínimo 1% de gordura e 1% de proteína;
- c) *Sorbets* - produto elaborado basicamente com polpa de fruta, sucos ou pedaços de frutas e açúcares;
- d) Picolés - são porções individuais de gelados comestíveis de várias composições, geralmente suportadas por uma haste, obtidas por resfriamento até o congelamento da mistura homogênea, ou não, de ingredientes alimentares.

Segundo Giordani (2006), o sorvete de massa pode ser apresentado em pequenas, médias ou grandes embalagens, cones ou picolés, tortas de sorvete ou mono porções, até mesmo por meio de equipamentos que produzem sorvetes tipo *soft*, podendo ser classificados pela sua natureza e por seus percentuais que aparecem na composição da sua calda base.

Os sorvetes também podem ser classificados de acordo com o seu processo de fabricação, artesanal ou industrial. O sorvete de massa industrial tem um elevado *overrun* (taxa de aeração do sorvete devido o ar incorporado durante a agitação da calda), pois no seu processo de fabricação ocorre a agitação vigorosa da massa, incorporando desta maneira mais ar, proporcionando um sorvete mais leve. Quando o sorvete de massa é fabricado de forma artesanal, a agitação da calda não é tão vigorosa, proporcionando um sorvete com mais corpo, mais denso. O seu *overrun* (incorporação de ar) varia de em torno de 40 a 80% (ABTA, 2009).

A composição do sorvete varia bastante, normalmente apresenta entre 8 e 20% de gordura, de 8 a 15% de sólidos não gordurosos do leite, de 13 a 20% de açúcar, e de 0 a 0,7% de emulsificante-estabilizante, porém pode haver variabilidade de acordo com a região e em diferentes mercados. As proteínas do leite totalizam de 34 a 36% de seus sólidos não gordurosos, e o sorvete contém elevada concentração de minerais e vitaminas, cujo conteúdo dependerá primariamente da quantidade de sólidos do leite utilizados na formulação (SOUZA et al., 2010).

As proteínas auxiliam no desenvolvimento da estrutura do sorvete, inclusive para emulsificação (adsorção das proteínas aos glóbulos de gordura), aeração, desenvolvimento de corpo, apresentando ainda propriedades funcionais, como interação com outros estabilizantes, estabilização da emulsão depois da homogeneização, contribuição para a formação da estrutura do gelado e capacidade de retenção de água (contribui para a melhoria da viscosidade). Além disso, as proteínas podem contribuir para o aumento do tempo de derretimento do sorvete e para redução de formação de gelo (KINSELLA, 1994).

A gordura no sorvete tem o papel de contribuir para o desenvolvimento de uma textura suave e para a melhoria do corpo do produto. Este ingrediente interage com outros desenvolvendo o sabor (transporta os sabores solúveis em gorduras, lubrifica a boca, confere cremosidade) e a estrutura. O tipo, a composição e o ponto de fusão da gordura utilizada vão influenciar decisivamente as características organolépticas e a estabilidade do sorvete durante sua conservação. A principal gordura empregada na fabricação do sorvete em adição ou substituição à gordura láctea é a gordura vegetal hidrogenada devido aos baixos teores de colesterol, plasticidade e bom preço (AMIOT, 1991).

O principal carboidrato é a lactose (sorvete à base de leite), com poder adoçante e solubilidade menores se comparados aos de outros açúcares. Influencia na textura do sorvete, dá sabor doce, mas se em excesso pode cristalizar e produzir alterações indesejáveis na textura devido à sua baixa solubilidade. Depois da lactose, o açúcar mais comumente utilizado na elaboração de sorvetes é a sacarose. Os carboidratos, ao formarem solução com a água, contribuem para a redução do ponto de congelamento da mistura. Sua presença contribui para o aumento da viscosidade, do tempo de batimento da mistura e da suavidade de textura, e tendem a aumentar a taxa de derretimento (SOUZA et al., 2010).

Os sais minerais são geralmente utilizados em quantidades limitadas (aproximadamente 0,1%). Esses componentes são usados há muito tempo como neutralizantes da acidez, alguns são utilizados para ajudar a controlar a separação da gordura na calda durante o processo de congelamento. Citratos e fosfatos contribuem para o aspecto, consistência do produto final e para a estabilidade da emulsão. A adição destes sais melhora as propriedades de batimento facilitando o congelamento. Fosfato de sódio e magnésio, óxido de cálcio e magnésio, e bicarbonato de sódio, tendem a promover o sabor, a textura e o corpo, melhorando, em geral, as características do produto final. O uso de sulfato de cálcio aumenta a acidez da mistura, produzindo maior viscosidade da calda e reduzindo a velocidade de derretimento do sorvete (AMIOT, 1991).

No sorvete, os emulsificantes são usados para promover a uniformidade durante o batimento, reduzir o tempo de batimento da calda, controlar a aglomeração e o reagrupamento da gordura durante a etapa de congelamento (estabilizar a emulsão de gordura) e facilitar a distribuição das bolhas de ar, produzindo um sorvete com corpo e textura cremosa. Os emulsificantes também reduzem os efeitos negativos causados pela flutuação da temperatura e aumentam a resistência ao derretimento (MOSQUIM, 1999).

Os estabilizantes são empregados para evitar o crescimento de cristais de gelo ou sua recristalização, causada pelas variações de temperatura durante a estocagem, e também para evitar a separação do soro do leite em ambas as fases, tanto no congelamento como no descongelamento (SOLER; VEIGA, 2001). Eles também melhoram as propriedades de batimento, aumentam a viscosidade da calda, contribuem para o melhoramento do corpo e textura do produto final, melhoram as propriedades de derretimento, facilitam a incorporação e a distribuição de ar durante a fabricação do sorvete, promovem melhor estabilidade durante o armazenamento, e não têm efeito no ponto de congelamento. Em excesso, o produto fica com uma textura gomosa e elástica (KINSELLA, 1994).

Os corantes e aromatizantes são colocados para intensificar as propriedades de cor, aroma e sabor do alimento. Estas substâncias podem ser naturais ou artificiais. Geralmente, as essências de sabores pouco intensos são mais facilmente misturadas e tendem a não ser rejeitadas em altas concentrações (SOUZA et al., 2010).

O sorvete comum é fabricado a partir de uma emulsão estabilizada, também nominada de calda, a qual é pasteurizada e passa por um processo de congelamento sob agitação contínua (batimento) e incorporação de ar, produzindo uma substância cremosa, suave e agradável ao paladar. Esta emulsão é composta de produtos lácteos, água, gordura, açúcar, estabilizante, emulsificante, corante e aromatizante (SOUZA et al., 2010).

A primeira etapa é a mistura dos ingredientes selecionados e previamente pesados. Os ingredientes em pó são adicionados após a mistura dos líquidos, sob agitação, e antes de atingir 50°C. Os estabilizantes devem ser primeiramente dispersos em açúcar (ou ingrediente sólido em pó), na proporção de cinco vezes o seu peso, e só então adicionados à mistura. A gordura deve ser dividida em pequenos pedaços e adicionados em tempo suficiente para que derretam ao logo do tempo, antes do início da pasteurização. A mistura pode ser feita em misturadores (tanques equipados com hélice e aquecimento) ou no próprio tanque de pasteurização, já que posteriormente será submetida a esse tratamento térmico (ANTUNES, 2012).

Enquanto os ingredientes estão sendo agitados, o aquecimento é contínuo até alcançar a temperatura de pasteurização em toda a mistura. A legislação brasileira determina para os gelados comestíveis o tratamento térmico em batelada, descontínuo, no qual a mistura é aquecida a 70°C por trinta minutos, e o processo contínuo, em que a temperatura atinge 80°C durante 25 segundos. Outras condições equivalentes de tempo e temperatura são aceitas, desde que haja a destruição dos micro-organismos patogênicos (BRASIL, 2003). O tratamento térmico mais elevado é eficaz na destruição de micro-organismos, além de melhorar o corpo, a textura e o sabor do produto (ABTA, 2010).

O processo de homogeneização consiste na redução e uniformização de partículas de gordura por meio da redução do tamanho dos seus glóbulos, chegando a ser reduzidos em 1/10 do seu tamanho normal, obtendo-se desta forma uma suspensão de gordura estável e uniforme permitindo que mais proteínas cubram os glóbulos de gordura evitando sua separação. O processo resulta em uma textura mais suave, mais corpo, maior capacidade de batimento, reduzindo o tempo necessário de maturação, possibilitando a diminuição da quantidade de estabilizantes (maior número de glóbulos de gordura, maior a viscosidade). Se a mistura for devidamente homogeneizada a gordura não irá separar, evitando a separação de uma camada de gordura. O produto congelado também não terá aparência ou textura amanteigada, tornando a cor mais brilhante e atrativa (MÜCKE, 2010).

A próxima etapa é o resfriamento à temperatura de 7 a 10°C, sendo a mistura transferida às tinas de maturação onde permanece à temperatura de 3-5°C. O objetivo do resfriamento é evitar o crescimento de micro-organismos e uma viscosidade excessiva (SOUZA et al., 2010).

A maturação consiste em manter a mistura por um período de, no mínimo, 4 horas até 12 horas ou mais à temperatura de 2 a 5°C antes de congelar. Nesse tempo ocorrem mudanças benéficas na mistura como, por exemplo, uma completa hidratação das proteínas e estabilizantes para que o sorvete tenha uma boa consistência e cristalização das moléculas de gordura. Contribui-se, assim para o aumento da viscosidade, uma melhor absorção do ar durante seu batimento e congelamento, e o aumento da resistência ao derretimento do sorvete (MOSQUIM, 1999). Nesta fase acontece a adição de polpas de frutas, aromatizantes, emulsificantes e acidulantes, os quais são sensíveis ao tratamento térmico (CORREIA et al., 2007). Quanto mais tempo passa na maturação, maior é a qualidade do sorvete. Quando o ponto de consistência desejada for atingido, o produto deve ser acondicionado em embalagens definitivas, mediante o enchimento automático ou manual (SENAI, 1999).

A embalagem não deve conferir nem alterar o sabor e o odor do sorvete; a migração de compostos da embalagem, mesmo que não tóxicos, deve ser inferior ao limite desses compostos estabelecidos pela legislação; os materiais da embalagem devem conter somente substâncias permitidas pela legislação, não excedendo a concentração máxima permitida; deve apresentar boa resistência mecânica a baixas temperaturas; deve apresentar boa resistência à absorção de umidade e deve apresentar um sistema de fechamento que desestimele e/ou evidencie violações e fraudes (MÜCKE, 2010).

Durante a armazenagem segue o processo de congelamento, chamado dessa vez de endurecimento. O endurecimento é feito em câmaras de congelamento à temperatura de -20 a -30°C. Nestas câmaras, o teor de água congelada do sorvete chega de 80% a 90%. O ideal é que o endurecimento seja o mais rápido possível para que seja evitada a formação de grandes cristais de gelo (SOUZA et al., 2010). Se a temperatura durante a armazenagem não for adequada, todo o processamento pode ser comprometido, resultando em alterações na textura e, conseqüentemente, em perda de qualidade (ANTUNES, 2012).

A distribuição do sorvete deve ser feita em carros refrigerados ou com paredes isoladas termicamente. Se a temperatura durante o transporte não for adequada, todo o processamento pode ser comprometido, resultando em alterações na textura e, conseqüentemente, em perda de quantidade (MÜCKE, 2010).

2.1.6 INDICADORES DE QUALIDADE

Segundo Soler e Veiga (2001), os parâmetros mais importantes para a avaliação sensorial no controle de qualidade são a cor, o aroma, a textura e o sabor do produto. As alterações desses parâmetros podem acarretar perda de qualidade e rejeição por parte do consumidor (SARANTÓPOULOS et al., 2001).

O sorvete ideal deve possuir um sabor típico, fresco, agradável e delicado; ter textura definida e macia; possuir resistência moderada; derreter lentamente em forma de líquido com a aparência da mistura original (sem separações de fase); ter uma cor natural; possuir partículas regularmente distribuídas; e ter contagem bacteriana baixa (SOUZA et al., 2010).

O primeiro contato sensorial com o produto é a cor, esta deve estar relacionada ao tipo de sabor. Para isso, o corante escolhido deve ser adequado ao sabor. Se a cor estiver muito fraca, resulta em pouca atratividade do produto, porém, se for muito forte, pode passar a impressão de um produto artificial (MÜCKE, 2010).

Como o sorvete é sempre consumido gelado, o aroma percebido é mais suave, uma vez que temperaturas baixas diminuem a percepção das substâncias aromáticas. Para que a intensidade de um aroma de sorvete seja avaliada, deve-se deixar que dissolva na boca. Se o aroma for muito fraco ele não permitirá sua identificação, não conferindo personalidade ao sorvete, já se o aroma for muito forte, poderá saturar o olfato ou deixar um residual prolongado, o que também se torna desagradável (MÜCKE, 2010).

Quanto à sua aparência, o sorvete de boa qualidade deve apresentar uma textura macia, porém não pegajosa, e o preenchimento bucal não poderá ser muito viscoso. A textura suave e aveludada amacia o palato. Um sorvete de alta qualidade deve mostrar resistência limitada ao derretimento quando exposto a temperatura ambiente por tempo determinado (SOUZA et al., 2010).

A textura do sorvete depende do número, do tamanho, da organização e da distribuição dos cristais de gelo. O defeito mais comum é a textura grosseira, arenosa e quebradiça, favorecida pela utilização de uma calda mal equilibrada (alto teor de extrato seco desengordurado, insuficiência de estabilizante ou congelamento muito lento), um processo inadequado de produção e má condição de conservação (altas temperaturas e flutuação constante de temperatura - grandes cristais de lactose) (AMIOT, 1991).

Em relação ao sabor, observa-se que quando em excesso promove um efeito enjoativo: a acidez excessiva, que no verão pode ser um pouco mais elevada para dar maior sensação de refrescância; o amargor excessivo, que nos sorvetes de chocolate e de café podem se tornar muito amargos, causando rejeição do consumidor; e sabores indesejáveis relacionados à deterioração (MÜCKE, 2010).

2.1.7 PRODUÇÃO ARTESANAL DE SORVETE

Baseado em Tozato et al. (2007), a produção de sorvetes artesanais de boa qualidade requer que seja feita a escolha de ingredientes comprovadamente indicados para esta atividade, devendo ser proporcionalmente balanceados e perfeitamente misturados, com o objetivo de produzirem uma composição satisfatória em relação a cor, ao sabor, ao aroma, à doçura, textura e apresentação.

Os mesmos autores relembram a questão da qualidade do sorvete, a qual está intimamente ligada à matéria-prima, como também à composição da mistura e ao processo de produção. Os processos podem ocorrer a frio ou a quente, este último realizando a pasteurização dos ingredientes básicos de produção do sorvete, executados em maquinário específico. A autora coloca as etapas básicas e imprescindíveis na produção de sorvete artesanal que emprega o processo a frio:

- Medir e pesar precisamente todos os ingredientes indicados para o produto escolhido;
- Aquecer a gordura com uma parte da calda;
- Bater os ingredientes no liquidificador ou batedeira, até que haja total homogeneização;
- Deixar descansar a mistura em local refrigerado (geladeira ou freezer doméstico, por exemplo) onde as condições adequadas de temperatura possam ser atingidas, durante aproximadamente 1-4 horas ou mais;

- Proceder à fabricação após o tempo de descanso, batendo novamente a mistura congelada;
- Colocar o produto finalizado em um "freezer" para estocagem ou comercialização.

O maquinário básico necessário incluindo equipamentos e acessórios para a produção artesanal incluem: balança, "freezer" armazenador, liquidificador e/ou batedeira, fogão a gás (se for realizar pasteurização), baldes e colheres. As principais matérias-primas são água ou leite, leite em pó, açúcar, emulsificante, estabilizante, gordura vegetal hidrogenada e/ou creme de leite, e frutas ou pó saborizante para sorvete.

2.2 SOJA

A *Glycine Max* (L.) Merrill é nativa da Ásia, sendo considerada uma das culturas mais antigas desta área, e tornou-se conhecida na Europa no século XVII quando foi plantada pela primeira vez no Jardim Botânico de Paris. É também conhecida como feijão soja, ervilha chinesa ou feijão da Manchúria. Foi introduzida na Ásia central há cerca de cinco mil anos pelos chineses (EMBRAPA, 2002).

O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de soja, sendo superado apenas pelos Estados Unidos. Na colheita de 2016/17, foram produzidas 351 milhões de toneladas no mundo, e desse total, 113 toneladas foram produzidas somente no Brasil (EMBRAPA, 2017).

O grão da soja concentra um elevado teor de proteínas, ácidos graxos poli-insaturados e fibras, como os frutooligossacarídeos, oligossacarídeos prebióticos, como rafinose e estaquioses, vitaminas e minerais e baixo teor de açúcares. Alguns benefícios à saúde podem ser considerados a partir do consumo regular da soja, como a redução do colesterol sanguíneo, a recuperação muscular, como também a sua ação anticancerígena (CARVALHO, 2015).

Em média, a soja possui 40% de proteínas, 20% de lipídios (óleo), 5% de minerais e 34% de carboidratos (açúcares como glicose, frutose e sacarose, fibras e os oligossacarídeos como rafinose e estaquiose). As proteínas possuem alto valor biológico assemelhando-se, portanto, às proteínas animais, sendo a soja o único vegetal que contém proteína completa equivalente à do ovo, podendo ser consumida como fonte única de proteínas, tanto a curto como a longo prazo. A soja não possui amido e os principais açúcares que ela contém são frutose, glicose e sacarose, além de possuir um teor considerável de fibras solúveis, que auxiliam no controle do diabetes, principalmente do Tipo II. Os carboidratos insolúveis são celulose, hemicelulose e lignina encontrada na casca do grão, sendo as fibras que auxiliam a digestão dos alimentos e ajudam a prevenir incidências de câncer de cólon. Como outra leguminosa, revela-se uma ótima fonte de ferro, constituindo-se também de cobre, fósforo, magnésio, potássio e zinco. É também uma fonte moderada de cálcio (MANDARINO; CARRÃO-PANIZZI, 2011).

Verifica-se que os grãos são uma excelente fonte de fitoquímicos, como as isoflavonas, as quais possuem atividade antioxidante e fornecem aminoácidos necessários ao organismo humano. Muitos desses componentes têm importantes efeitos benéficos à saúde humana como fonte preventiva de doenças crônico-degenerativas, especialmente o câncer, cardiopatias e osteoporose (JACKSON et al., 2002). Além disso, a leguminosa não possui lactose, podendo substituir o leite na elaboração de produtos destinados a consumidores intolerantes a lactose (CARDOSO, 2011).

Essas características fazem com que o uso da soja integral ou de seus derivados, como ingredientes ou aditivos, em produtos alimentícios em geral e lácteos em particular, esteja empregado em produtos diversos com funções nobres, elevando sua importância econômica, social e estratégica para o país (ASSUMPÇÃO, 2008).

Nas décadas de 70 e 90 esse alimento era consumido apenas por adeptos a esta alternativa ou por aqueles que eram intolerantes à lactose, como também por vegetarianos. No entanto, na última década houve uma mudança expressiva no seu consumo devido à conclusão e a divulgação de alguns estudos realizados, fazendo com que a mesma tomasse ciência e incentivasse o consumo de dietas com produtos à base de soja. Outros avanços para melhoria de processos de diferentes derivados de soja - com ênfase, também, na redução de odores e sabores típicos dos componentes do grão - têm contribuído para a popularização do seu consumo, demonstrando ser uma das categorias que mais crescem no momento (EMBRAPA, 2000).

2.2.1 PROPRIEDADES FUNCIONAIS

As propriedades funcionais tecnológicas são qualquer propriedade dos alimentos ou dos seus componentes, excetuando-se as nutricionais, que influencie a sua aceitação e utilização. Vão depender das

propriedades físicas e químicas das proteínas, as quais são muito importantes para o preparo de determinados alimentos, interferindo sua conservação, estocagem e aceitação dos consumidores (SGARBIERI, 1996).

Liu (1997) cita as propriedades funcionais apresentadas pelos produtos derivados da soja, sendo:

- **absorção de água:** o isolado proteico de soja apresenta maior capacidade de absorção de água (aproximadamente 35 g/100 g), em razão do seu maior conteúdo proteico dentre os produtos derivados da soja;
- **emulsificação e solubilidade:** a capacidade de emulsificação das suas proteínas aumenta com o aumento da solubilidade e diminui com o aumento da concentração destas moléculas, o que, entretanto, resulta no aumento da estabilidade da emulsão;
- **formação de espuma:** as proteínas da soja são consideradas bons agentes de aeração, tendo propriedades espumantes adequadas;
- **geleificação:** a farinha e o concentrado protéico de soja formam géis macios.

2.2.2 CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS

Apesar de ter sua contribuição nutricional reconhecida, a aceitação sensorial da soja ainda é uma barreira para o seu uso comum, pois para muitos o seu sabor e aroma são desagradáveis ao paladar, provenientes de compostos naturalmente presentes no grão e de outros formados durante o processamento (ASSUMPÇÃO, 2008).

Os sabores e odores desagradáveis (*off-flavor*) dos derivados da soja são atribuídos à ação das enzimas lipoxigenases que formam hidroperóxidos dos ácidos graxos poliinsaturados do vegetal (CIABOTTI et al., 2007). Da ação das lipoxigenases derivam os compostos voláteis, os quais têm sido caracterizados como responsáveis pela gênese dos sabores herbáceo (*grassy flavor*) e de feijão cru (*beany flavor*). Durante as etapas de maceração e moagem os compostos que originam os *off-flavors* são rapidamente formados. Isso decorre do contato entre as enzimas e os ácidos graxos desses compostos (MIN et al., 2005).

Os fenólicos são os principais compostos não voláteis encontrados na soja e são responsáveis pela formação dos sabores amargo (*bitter flavor*) e adstringente (*adstringent flavor*). Dentre os fenólicos da soja incluem os ácidos fenólicos, as isoflavonas e as saponinas. Alguns peptídeos, presentes na soja, podem conferir gosto amargo aos produtos derivados. No grão de soja íntegro esses peptídeos não se encontram expostos. Porém, durante o processamento e sob determinadas condições, como a ação de proteases, micro-organismos e ácidos, as proteínas podem ser hidrolisadas e os peptídeos que conferem sabor amargo são liberados. A adição de proteases com o objetivo de melhorar a solubilidade da proteína da soja também apresenta o inconveniente de incrementar o *bitter flavor* (MIN et al., 2005; MORAES et al., 2006).

2.2.3 EXTRATO HIDROSSOLÚVEL DE SOJA

O extrato hidrossolúvel de soja (EHS), mais conhecido de forma equivocada como leite de soja, é um dos derivados, não fermentados, obtido a partir do grão da leguminosa, sendo de fácil obtenção, até feito de modo doméstico (MORAES et al., 2006). O produto é obtido a partir da emulsão aquosa resultante da hidratação dos grãos de soja, convenientemente limpos, seguido de processamento tecnológico adequado, adicionado ou não de ingredientes opcionais permitidos, podendo ser submetido à desidratação, total ou parcial (BRASIL, 2005).

O extrato hidrossolúvel pode se apresentar na forma aquosa ou em pó. O último apresenta vantagens quando comparado ao extrato aquoso, principalmente em relação ao manuseio, transporte, conservação e maior valor nutricional. Por outro lado, a solubilidade das proteínas deste produto desidratado pode ser reduzida devido à formação de aglomerados proteicos durante o seu processamento. Não só através dos grãos, o EHS também pode ser obtido a partir da farinha ou do isolado protéico da soja, que permite eliminar algumas etapas do processamento, gerando, assim, alterações nas suas composições químicas, sensoriais e nutricionais (PEREIRA, 2010).

3. METODOLOGIA

O projeto de pesquisa foi desenvolvido no Laboratório de Alimentos de Origem Animal do Departamento de Zootecnia da UFRPE – Universidade Federal Rural de Pernambuco.

Utilizou-se durante os testes ingredientes e utensílios básicos para a produção de sorvete artesanal como aqueles citados por Tozato et al. (2007) e Lopes et al. (2019), sendo o leite substituído pelo extrato hidrossolúvel de soja. A tabela 1 mostra as formulações que foram utilizadas para cada amostra de sorvete, com base nos intervalos de porcentagens apresentados por Souza et al. (2010). Todos os ingredientes utilizados foram obtidos no comércio local da Região Metropolitana do Recife/PE e usados conforme indicação do fabricante. Estes foram utilizados em proporções de acordo com formulações baseadas em porcentagens usadas para sorvete.

Foram produzidas 11 formulações de sorvetes: 5 (cinco) sabor maracujá, 4 (quatro) sabor morango e 2 (duas) sabor baunilha com coco (Tabela 1), cada uma com peso total de 500g e com rendimento de 1L após batimento, totalizando aproximadamente 11L de sorvete produzidos durante toda a pesquisa para fins de teste e escolha da amostra a ser utilizada para a análise sensorial e intenção de compra. Todas as formulações foram processadas a frio por ser em escala artesanal e por não ter como objetivo fazer análises microbiológicas do produto final, não foi realizada a etapa de pasteurização como realizada por Souza et al. (2010) e Marques et al. (2017).

A primeira etapa de produção para todos os sorvetes era a pesagem dos ingredientes selecionados em balança calibrada, com leitura digital e com números pares. Os ingredientes em pó eram misturados à parte e adicionados após a mistura dos líquidos, sob agitação. A homogeneização (1º batimento) se fazia em liquidificador semi-industrial durante 3 minutos.

Essa mistura base (calda) era acondicionada em embalagens plásticas, apropriadas para sorvete, com capacidade para 1L e 2L, sendo etiquetadas com a identificação do sabor e a data de fabricação, e levadas ao congelamento rápido em freezer a uma temperatura de -22 °C. As 3 (três) primeiras amostras de maracujá e as 2 (duas) primeiras de morango foram levadas à maturação por apenas 2 horas, pela temperatura ser bem inferior àquela citada por Eiki et al. (2015). As demais amostras passaram por um tempo maior de maturação (mais de 24 horas) para verificar se quanto maior o tempo de maturação, melhor o sorvete.

Tabela 1 - Formulações com ingredientes em (%) para produção de sorvetes saborizados.

Ingredientes	Formulação sabor maracujá (%)					Formulação sabor morango (%)				Formulação sabor baunilha com coco (%)	
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª
Água	40	43	40	-	-	60	60	-	-	-	-
Extrato de soja líquido	-	-	-	40	45	-	-	60	40	54	58
Extrato de soja em pó natural	10	8	10	9,2	6	-	-	-	-	8,4	6,8
Extrato de soja sabor morango	-	-	-	-	-	10	9,2	9,2	8,8	-	-
Açúcar cristal	-	15	15	16	15	15	16	16	16,8	14,4	14,8
Açúcar de confeitiro	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gordura Vegetal Hidrogenada	12	11,6	13	13,2	12	13	12,8	13,2	12,4	11,6	10,4
Emulsificante	1	1,2	1,2	0,8	1,2	1,2	1,2	0,8	1,2	0,8	1,2
Liga neutra (estabilizante)	1	1,2	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Polpa de maracujá	20	20	20	20	20	-	-	-	-	-	-
Polpa de morango	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-
Coco ralado desidratado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	8
Essência de baunilha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	0,02

Após o tempo de maturação, a calda congelada era dividida em partes menores e batida por 15 minutos em batedeira doméstica. Apenas a 5ª amostra de maracujá, a 4ª de morango, e a 2ª de baunilha com coco foram batidas em batedeira planetária pelo mesmo tempo da anterior. Nessa etapa, as polpas (forma

líquida) e a essência de baunilha eram adicionadas faltando 1 minuto para o término do tempo de batimento, e o coco somente após o término do batimento, por ser ralado e desidratado.

Posteriormente ao batimento, a massa dos sorvetes era acondicionada nas mesmas embalagens para a maturação e levadas ao freezer novamente para o 2º congelamento, sendo neste feito o endurecimento e o armazenamento em uma única etapa por se tratar de um sorvete artesanal. Inicialmente, as 4 (quatro) primeiras amostras de maracujá e a 1ª de morango foram levadas ao freezer com temperatura a -18 °C. Como era possível baixar ainda mais a temperatura para acelerar o processo de congelamento, as demais amostras foram congeladas à temperatura de -22 °C por, no mínimo, 24 horas.

Quanto aos testes de análise sensorial e de aceitação do produto, estes foram realizados no Laboratório de Alimentos de Origem Animal do Departamento de Zootecnia da UFRPE. Foram preparadas 100 amostras do sorvete de maracujá, com a mesma formulação da 4ª amostra em destaque na tabela 1. O sorvete foi disposto em copos plásticos com capacidade para 50 mL para que cada provador tivesse o mesmo produto, sem alteração, a qual poderia ocorrer caso fosse armazenado em um único recipiente e fosse servido em bolas para a prova, isso em função do congelamento e descongelamento do produto.

Para a escolha da formulação a ser submetida a análise sensorial pelos julgadores, as formulações preparadas foram analisadas previamente pela equipe do projeto, seguindo os atributos de qualidade descritos por Souza et al. (2010): aparência, aroma, sabor, cor, textura e resistência ao derretimento. Para avaliação da aceitabilidade geral do produto foi utilizada escala hedônica de 5 pontos com os extremos 1 (desgostei muito) e 5 (gostei muito), também sendo avaliadas a intenção de compra, o aroma, o sabor, a cor e a textura, além de questionar ser ou não intolerante a lactose e vegetariano, e sentir o sabor da soja na formulação (Ficha 1). Participaram da avaliação 100 julgadores, homens e mulheres acima de 18 anos e não treinados, escolhidos aleatoriamente, sendo todos servidores e alunos da UFRPE.

Figura 1. Ficha de análise sensorial e de intenção de compra do produto

Sexo:	☐ F	☐ M	Idade:
1. Sua nota para este produto: 5 – Gostei muito; 4 – Gostei; 3 – Indiferente; 2 – Não gostei; 1 – Desgostei muito			
2. Você COMPRARIA este produto? ☐ Sim ☐ Talvez ☐ Não			
3. O que MAIS gostou no produto? ☐ Aroma ☐ Sabor ☐ Cor ☐ Textura			
4. O que MENOS gostou no produto? ☐ Aroma ☐ Sabor ☐ Cor ☐ Textura			
5. Você possui intolerância à lactose? ☐ Sim ☐ Não			
6. Você é vegetariano (a)? ☐ Sim ☐ Não			
7. Você sentiu sabor de soja? ☐ Sim ☐ Não			

Fonte: Próprio autor

No momento da análise, com os voluntários já reunidos, se fazia uma explicação do produto e de como os julgadores iriam proceder na sua avaliação e no preenchimento da ficha. Os dados obtidos foram tabelados e analisados, sendo posteriormente colocados na forma de gráficos para um melhor entendimento.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

De modo geral, os sorvetes elaborados de forma artesanal apresentam poucas diferenças em relação aos sorvetes industriais. Se bem elaborados, o sabor também não é muito diferente, visto ser um sorvete produzido sem todo o aparato industrial.

O resultado geral de cada amostra se apresenta na figura 2, sendo a análise baseada nos critérios citados por Souza et al. (2010) como indicadores de qualidade para sorvetes. Alguns pontos foram observados, quanto ao emprego dos ingredientes e aos métodos de produção, os quais influenciaram na escolha da formulação para ser feita a análise sensorial.

Figura 2. Resultados das amostras conforme indicadores de qualidade descritos por Souza et al. (2010)

	Formulações	Resultados
Sabor Maracujá	1 ^a	Baixa cremosidade, alta resistência ao derretimento, ausência de cristais de gelo, sabor marcante da fruta, cor natural, baixa arenosidade.
	2 ^a	Textura idem ao anterior, sabor com mais realce, melhor corpo, cor natural, baixa arenosidade, baixa resistência ao derretimento.
	3 ^a	Sabor da soja mais presente, textura macia e compacta, ausência de cristais de gelo, baixa arenosidade, baixa resistência ao derretimento.
	4 ^a	Ótimo sabor, maciez e volume ideais, baixa arenosidade, cor natural, ausência de cristais de gelo, resistência moderada ao derretimento.
	5 ^a	Ótimo sabor, textura quebradiça, bom volume, baixa arenosidade, cor intensa, ausência de cristais de gelo, alta resistência ao derretimento.
Sabor Morango	1 ^a	Sabor suave de morango, textura macia e leve, ausência de cristais de gelo, baixa arenosidade, cor suave, baixa resistência ao derretimento.
	2 ^a	Boa maciez, poucos cristais de gelo, sabor mais presente, textura quebradiça, baixa arenosidade, cor suave, baixa resistência ao derretimento.
	3 ^a	Sabor leve, macio, volume ideal, baixa arenosidade, cor suave, ausência de cristais de gelo, baixa resistência ao derretimento.
	4 ^a	Sabor mais acentuado, macio, ótimo volume, baixa arenosidade, cor intensa, ausência de cristais de gelo, resistência moderada ao derretimento.
Sabor Baunilha com coco	1 ^a	Sabor ótimo, baixa arenosidade, macio, bom volume, cor natural da soja, ausência de cristais de gelo, alta resistência ao derretimento.
	2 ^a	Sabor bom, baixa arenosidade, baixa maciez, bom volume, cor natural da soja, ausência de cristais de gelo, alta resistência ao derretimento.

Como observado na figura 2, as amostras tiveram resultados diversos devido às diferentes formulações e aos métodos de preparo. Foi observado que o uso do extrato líquido de soja deu ao sorvete um melhor resultado em corpo e textura por promover a aeração e emulsificação, não afetando o sabor nem a solubilidade da mistura quando comparado com o sorvete que utilizou a água.

Quanto ao uso do açúcar cristal e o de confeitiro não houve diferença de textura nos sorvetes, apesar do açúcar de confeitiro ter menor granulometria quando comparado ao cristal. Porém, o açúcar cristal ofereceu um melhor poder adoçante sendo usado na mesma quantidade que o açúcar de confeitiro.

O sorvete à base de soja normalmente fica mais viscoso que o sorvete à base de leite, devido às propriedades de emulsificação e solubilidade das proteínas da soja, conforme explica Liu (1997), porém as formulações trabalhadas resultaram em um sorvete cremoso, sem, no entanto, ser excessivamente viscoso conforme preconiza Souza et al. (2010) quando fala que os sorvetes comuns não devem ser muito viscosos, além de terem que mostrar resistência moderada ao derretimento.

Mücke (2010) destaca a importância da cor estar relacionada ao sabor do sorvete. Mesmo com a cor parda do extrato de soja, a cor do sorvete sabor maracujá ficou amarela sem uso de corantes, deixando clara sua relação com o sabor. Apesar da soja possuir compostos voláteis desagradáveis derivados da ação das enzimas lipoxigenases, os quais passam para os seus produtos derivados, como bem explica Ciabotti et al. (2007), o aroma e o sabor do sorvete de maracujá foi bem marcante, ficando a fruta em realce.

A textura em todas as amostras apresentou-se um pouco arenosa, provavelmente devido a granulometria do extrato da soja em pó, mas não referente aos cristais de gelo como fala Amiot (1991) sobre os sorvetes comuns. Antes do congelamento, a massa já se apresentava um pouco arenosa, e mesmo alterando os percentuais dos ingredientes, sem alterar negativamente a sua textura, esta continuava, mas não tão perceptível ao paladar. Por se utilizar tanto o extrato da soja líquido como o seco na formulação, o grande teor proteico contribuiu para que a água da polpa fosse absorvida e não ficasse disponível para formação de cristais de gelo, como também para a textura macia.

O volume (*overrun*) adequado que o sorvete alcançou em parte se deve à soja, já que suas proteínas são consideradas bons agentes de aeração, o que explica o sorvete com extrato líquido da soja ser mais volumoso e macio que o feito com água. A gordura ofereceu plasticidade para envolver as bolhas de ar durante o batimento e promover o volume do sorvete juntamente com as propriedades do emulsificante adicionado.

Quanto aos métodos de preparo, o resultado mais satisfatório se deu quando a calda ficou por mais de 24 horas na maturação, antes do batimento, tendo os ingredientes mais tempo para se firmarem uns aos outros, aumentando a estabilidade da calda. No uso dos equipamentos, observou-se que o volume do

sorvete obtido era maior e a textura era menos quebradiça quando feito o batimento na batedeira planetária, já que o equipamento tem uma configuração do gancho que permite o batimento circular pegando todo o conteúdo, diferente de uma batedeira sem ser planetária, a qual para ter este mesmo movimento tem que ser controlada a mão, neste caso, tendo variações na velocidade de rotação, apesar da formulação diferente também ter contribuído para tal. Com relação à mudança de temperatura do acondicionamento, de -18°C para -22°C , não causou modificação na estrutura do sorvete, apenas aumentou o tempo de resistência ao descongelamento.

A formulação 4ª do sorvete de maracujá foi selecionada pela equipe do projeto, como base para a análise sensorial, visto apresentar características desejáveis num sorvete, como descritas por Souza et al. (2010), como sabor típico da fruta, textura moderada definida, resistência moderada ao derretimento (Figura 3). Nenhuma formulação do sorvete de morango foi selecionada por suas características estarem mais distantes quando comparado a um sorvete tradicional de morango. As formulações do sorvete de baunilha com coco foram elaboradas apenas a fim de teste.

Figura 3. Sorvete sabor maracujá - quarta (4ª) formulação

A análise sensorial contou com a participação de servidores e alunos da UFRPE, dentre eles, a parcela feminina foi de 60% (60/100) e a masculina foi de 40% (40/100). A média de idade de todos os participantes foi de 28 anos. Apenas 4% (4/100) do público possuíam intolerância à lactose, e 3% (3/100) vegetarianos. Dentre estes somente 1 (um) era vegetariano e também possuía intolerância à lactose.

De acordo com o demonstrado no gráfico 1, com relação à nota que dariam ao produto numa escala decrescente de 5 a 1, observou-se que a maioria gostou do produto e apenas 5% (5/100) ficou indiferente, dentre estes 40% (2/5) era do sexo feminino e 60% (3/5) do sexo masculino. Um dos avaliadores, sendo do sexo masculino, disse não gostar, e nenhum dos avaliadores disse desgostar muito do produto. A rejeição maior pelo público masculino pode ser entendida pela sua menor sensibilidade a aromas e sabores do que as mulheres, conforme aponta Reitenbach (2014). Dentre os intolerantes à lactose, 50% (2/4) deu nota 4 e 50% (2/4) nota 5. Entre os vegetarianos, 2 (dois) deram nota 5 e 1 (um) nota 4 (este também tinha intolerância à lactose).

Gráfico 1. Nota atribuída pelo público ao sorvete sabor maracujá

Com relação à intenção de compra, a maioria dos degustadores disse que compraria o produto. Ressaltando que todos intolerantes à lactose e vegetarianos disseram que comprariam o produto.

Bueno et al. (2018), ao elaborar sorvetes à base de extrato de soja, verificaram que, a partir da análise sensorial e comparação com sorvete de mesmo sabor preparado com leite, 68% dos avaliadores preferiram sorvete à base de leite do que à base de soja (32%). Apesar do índice baixo de aceitação, os autores concluíram que pode ser um bom resultado, uma vez que relacionado a um produto fabricado com soja.

Através das questões 3 e 4 da ficha, foi possível caracterizar o gosto do público frente a este produto. A característica mais apreciada pelo público, dentre as colocadas como indicadores de qualidade, foi o sabor, como expresso no gráfico 2. O sabor foi a qualidade mais apreciada também pelos intolerantes à lactose (3/4), sendo para um deles o aroma a melhor característica. Para todos os vegetarianos (3/3), o sabor foi a melhor característica do sorvete degustado.

Isso vem a demonstrar que o pré-conceito com o consumo dos produtos derivados da soja pode advir de um evento gustativo anterior mal sucedido, influenciando negativamente nas escolhas futuras. Provavelmente por terem degustado um produto derivado da soja de baixa qualidade, generalizando que todo produto à base de soja é ruim.

Quanto à textura, esta característica foi a que menos agradou ao público em geral (Gráfico 3), também foi a característica que menos agradou aos intolerantes à lactose. Os vegetarianos divergiram em opinião: um deles gostou menos do aroma, outro da cor e o outro da textura. Este tipo de sorvete, por sua matéria prima não ser láctea e seu processo de preparo ser totalmente artesanal, apresenta uma textura diferente do sorvete feito industrialmente. Na pergunta 4 da ficha a de análise sensorial e de intenção de compra do produto, muitos avaliadores contestaram não ter a opção “nenhuma das alternativas”, pois todas as características estavam boas, segundo alguns.

A maioria dos entrevistados, 74% (74/100), afirmou não sentir o sabor da soja presente no produto, apesar de identificarem algo diferente no sorvete, muitos até se surpreenderam ao saber que era feito à base de soja. Muitas pessoas que provaram disseram não gostar de produtos derivados da soja, mas não distinguiram que havia soja e até apreciaram o produto. Alguns, menos acostumados a consumir produtos de soja, também não conseguiram sentir seu sabor. Entre os intolerantes à lactose, 75% (3/4) não sentiram o sabor da soja no sorvete, apesar de consumirem seus produtos derivados. Nenhum vegetariano sentiu o sabor da soja no produto. Algumas pessoas nem sequer já havia sentido o sabor de soja, ou seja, não tinham a memória gustativa para este tipo de produto, portanto marcaram a opção de que não sentiram o gosto.

Dos avaliadores, 26% (26/100) conseguiram sentir o sabor da soja no sorvete de maracujá. Foi visto que estas pessoas, as quais identificaram a presença de soja apenas provando o produto, tinham familiaridade e/ou costume no consumo dos seus derivados, ou ficaram marcados por não gostarem de produtos

derivados da soja e evitavam todo produto deste tipo, tendo estes, portanto, uma memória gustativa para este tipo de ingrediente.

Em estudo realizado por Arruda et al. (2015) com sorvete tipo iogurte à base de soja com sabor de açaí, os atributos aroma e consistência apresentaram resultados mais expressivos que o sorvete de base láctea, enquanto que para os atributos cor, sabor e aparência, o sorvete de iogurte à base de soja apresentou médias semelhantes ao sorvete de base láctea, com pontuação de “gostei muito”. Entretanto, não houve diferenças entre o sorvete à base de soja e o sorvete de base láctea em relação ao atributo sabor, evidenciando que o sorvete à base de soja sabor açaí conferiu sabor muito satisfatório, uma vez que geralmente há uma maior aceitação por sorvetes de base láctea.

Gráfico 2. Característica mais apreciada pelo público

Gráfico 3. Característica menos apreciada pelo público

5. CONCLUSÃO

Foi possível desenvolver uma formulação para sorvete à base de extrato hidrossolúvel de soja em substituição ao leite, com sabor agradável e sem odor residual da soja. Sendo uma alternativa de consumo àqueles que não consomem leite. Este tipo de produto pode ser elaborado em condições artesanais sem grandes interferências nas qualidades organolépticas e estruturais, obtendo-se um produto bem aceito pelo público.

REFERÊNCIAS

- [1] Abis. Associação Brasileira das Indústrias de Sorvete. Produção e consumo de sorvetes no Brasil. 2017. Disponível em: <http://www.abis.com.br/estatistica-producaoconsumodesorvetesnobrasil.html>. Acesso em: 28 ago. 2019.
- [2] _____. Associação Brasileira das Indústrias de Sorvete. Estatística: Produção e consumo de Sorvetes no Brasil. 2014. Disponível em: <http://www.abis.com.br/estatistica-producaoconsumodesorvetesnobrasil.html>. Acesso em: 09 dez. 2017.
- [3] _____. Associação Brasileira das Indústrias de Sorvete. Institucional: História do Sorvete. 2006. Disponível em: http://www.abis.com.br/institucional_historia.html. Acesso em: 16 jan. 2017.
- [4] Arruda, E. F.; Oliveira, A.; Oliveira, A. D. Avaliação de sorvete tipo iogurte à base de soja com adição de microrganismos probióticos. *Revista Episteme Transversalis*, v. 9, n. 2, 2015. Disponível em: <http://www.ugb.edu.br/revista-episteme-transversalis/edicao9/Artigo1.pdf>. Acesso em: 27 ago. 2019.
- [5] Abta. Agência Bragante de Tecnologia de Alimentos. Tecnologia da Fabricação de Sorvetes. 2010. Disponível em: <http://abgtecalim.yolasite.com/resources/Tecnologia%20da%20Fabrica%C3%A7%C3%A3o%20de%20Sorvetes.pdf>. Acesso em: 13 jan. 2017.
- [6] _____. Agência Bragante de Tecnologia de Alimentos. Processo de Geleificação em Alimentos. 2009. Disponível em: <http://abgtecalim.yolasite.com/resources/Processo%20de%20Gelifica%C3%A7%C3%A3o%20em%20alimentos.pdf>. Acesso em: 23 jan. 2017.
- [7] AMIOT, J. *Ciência y tecnología de la leche*. Zaragoza (España): Acribia, 1991. 547 p.
- [8] Antunes, B. M. Desenvolvimento de sorvete de soja sabor chocolate com morango. *Sorvetes & Casquinhas*, 2012. 7p.
- [9] Assumpção, G. M. P. Viabilidade tecnológica do uso de extrato hidrossolúvel de soja na fabricação de iogurte. 2008. 116 p. Dissertação (Mestrado em Ciência dos Alimentos) – Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2008.
- [10] Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 268, de 22 de setembro de 2005. Aprova o regulamento técnico para produtos protéicos de origem vegetal. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*, Brasília, 23 set. 2005.
- [11] _____. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Portaria nº 267 de 25 de Setembro de 2003. Dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos Industrializadores de Gelados Comestíveis e a Lista de Verificação das Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos Industrializadores de Gelados Comestíveis. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*, Brasília, set. 2003.
- [12] _____. Ministério da Saúde. Portaria nº 379, de 26 de abril de 1999. Aprova o regulamento técnico referente a gelados comestíveis, preparados, pós para o preparo e bases para gelados comestíveis. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*, Brasília, 29 abr. 1999. Disponível em: <http://www.anvisa.org.br>. Acesso em 08 mar. 2017.
- [13] Bueno, M. M.; Antunes, V. C.; Castro, W. F. Sensory evaluation of ice cream with hydrosoluble soy extract. *Food Research*, v. 2, n.2, p. 183-186, 2018. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/321453002_Sensory_evaluation_of_ice_cream_with_hydrosoluble_soy_extract. Acesso em: 28 ago. 2019.
- [14] Cardoso, J. R.; Pessoa, R.A.; Ramos, L.S.N. Elaboração de sorvete de abacate à base de leite de vaca e de extrato hidrossolúvel de soja. *Revista ACTA Tecnológica*, v. 6, n. 2, 2011. Disponível em: <http://portaldeperiodicos.ifma.edu.br/index.php/actatecnologica/article/download/29/83>. Acesso em: 13 jan. 2018.
- [15] Carvalho, H. V. M. As evidências dos benefícios do consumo das isoflavonas da soja na saúde da mulher: revisão de literatura. *Journal of Health Sciences*, v. 16, n. 4, 2015. Disponível em: <http://pgsskroton.com.br/seer/index.php/JHealthSci/article/view/397/373>. Acesso em: 28 ago. 2019.
- [16] Ciabotti, S.; Barcelos, M. F. P.; Pinheiro, A.C.M.; Clemente, P. R.; Lima, M. A.C. Características sensoriais e físicas de extratos e tofus de soja comum processada termicamente e livre de lipoxigenase. *Revista Scielo, Ciência e Tecnologia dos Alimentos*, Campinas, p. 643-648, 2007.
- [17] Correia, R. T. P.; Pedrini, M.R.S.; Magalhães, M.M.A. Sorvete: Aspectos Tecnológicos e Estruturais. *Revista Higiene Alimentar*, Rio Grande do Norte, RN, v. 21, n.148, p. 19-23, 2007.
- [18] Costa, J. A. Origem e Histórico. In: Manica, I.; Costa, J. A (eds). *Cultura da soja: interpretação, procedência da soja*. Porto Alegre: Evangraf, p. 13-16, 1996.
- [19] Eiki, G.; Hanai, L.N.; Pires, L.; Ekuni, M.M.; Madrona, G.S. Aceitação sensorial de sorvete a base de vegetais. *Revista Geintec*, v. 5, n. 4, p. 2569-2578, 2015. Disponível em: <http://www.revistageintec.net/index.php/revista/article/view/791/607>. Acesso em: 28 ago. 2019.

- [20] Embrapa. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. (2017). Soja em números. Disponível em: <https://www.embrapa.br/soja/cultivos/soja1/dadoseconomicos>. Acesso em: 28 ago. 2019.
- [21] _____. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Soja Potencial de Uso na Dieta Brasileira. Londrina: Embrapa, p. 19-22, 2002.
- [22] _____. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Recomendações Técnicas para Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Dourados: Embrapa, p. 12-13, 2000.
- [23] Giordani, R. Sorvete: Alimento e prazer. Porto Alegre: Imagens da Terra Editora, 2006. 184p.
- [24] Jackson, C. J. C.; Dini, J.P.; Lavandier, C.; Rupasinghe, H.P.V.; Faulkner, H.; Poysa, V.; Buzzell, D.; Grandis S. Effects of processing on the content and composition of isoflavones during manufacture of soy beverage and tofu. *Process Biochemistry*, Oxford, v. 37, n. 10, p. 1117-1123, 2002.
- [25] Lopes, A. O. A.; Singh, T. C.; Volpini-Rapina, L. F. Desenvolvimento e avaliação de sorvete de abacate isento da proteína do leite de vaca. *Revista Nutrição Brasil*, v. 18, n. 1, p. 13-20, 2019. Disponível em: <http://portalatlanticaeditora.com.br/index.php/nutricaoobrasil/article/view/2235>. Acesso em: 27 ago. 2019.
- [26] Kinsella, J. E. Milk proteins: physicochemical and functional properties. *CRC Crit. Rev. Food Sci. Nutr.*, v. 21, n. 3, p. 197-262, 1984.
- [27] Liu, K. Soybeans: chemistry, technology and utilization. New York: Chapman and Hall, 1997. 532 p.
- [28] Mandarino, J. M. G.; Carrão-Panizzi, M. C. Soja na Alimentação. Agência Embrapa de Informação Tecnológica – Ageitec, 2011. Disponível em: <http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/soja/arvore/CONT000fv0xofuo02wx5eo0c9slraa4ux9qv.html>. Acesso em: 22 jan. 2017.
- [29] Miguel, D. P. Desenvolvimento de sorvete de “iogurte” simbiótico à base de extrato aquoso de soja e de yacon (*Smallanthus sonchifolius*) fermentado com *Lactobacillus acidophilus* CRL 1014. Athena, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Araraquara, 2009. 117 p. Disponível em: http://www.athena.biblioteca.unesp.br/exlibris/bd/bfa/33004030055P6/2009/miguel_dp_dr_arafcf.pdf. Acesso em: 13 jan. 2017.
- [30] Marques, L. C. O. A.; Antunes, J. A. P.; Gama, L. L. A. Desenvolvimento de um sorvete de chocolate com potencial funcional: caracterização físico-química e Microbiológica. *Revista E-Scientia*, Ed.UniBH, Belo Horizonte, v. 10, n. 2, p. 18-30, 2017. Disponível em: <https://revistas.unibh.br/dcbas/article/view/2257>. Acesso em: 28 ago. 2019.
- [31] Min, S.; YU, Y.; Yoo, S.; Martin, S. Effect of soybean varieties and growing locations on the flavor of soymilk. *Journal of Food Science*, Chicago, v. 70, n. 1, p. 1-11, 2005.
- [32] Moraes, R.M.; Haj-Isa, N.M.A.; Almeida, T.C.A.; Moretti, R.H. Efeito da desodorização nas características sensoriais de extratos hidrossolúveis de soja obtidos por diferentes processos tecnológicos. *Revista Scielo, Ciência e Tecnologia dos Alimentos*, Campinas, v. 26, n.1, 2006.
- [33] Mosquim, M. C. A. Fabricando sorvete com qualidade. Fonte Comunicações e Editora Ltda. São Paulo. 1999.
- [34] Mücke, L. R. Desenvolvimento de Sorvete à Base de Extrato Hidrossolúvel de Soja adicionado de Soro de Leite em Pó e Semente de Linhaça. Universidade Federal do Paraná, Medianeira, 2010. 30p.
- [35] Pereira, G. G. Utilização de extrato hidrossolúvel de soja na produção de sorvete. Domínio Público, Lavras: Ufla, 2010. 166p. Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=196098. Acesso em: 13 jan. 2015.
- [36] Reitenbach, A. O paladar para elas e para eles: Diferenças de percepção entre os sexos. *Revista da Cerveja*, jun., 2014. Disponível em: <http://revistadacerveja.com.br/o-paladar-para-elas-e-para-eles-diferencas-de-percepcao-entre-os-sexos/>. Acesso em: 10 jan. 2015.
- [37] Sarantópoulos, C. I. G. L.; Oliveira, L.M.; Canavese, E. Requisitos de Conservação de Alimentos em Embalagens Flexíveis. Campinas: Cetea/Ital, 2001.
- [38] Senai. Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial–Departamento Nacional. Guia de elaboração do plano APPCC; Geral. Série Qualidade e Segurança Alimentar. Projeto APPCC. Convênio CNI / Senai / Sebrae. Brasília, Senai / DN, 1999 (a). 317 p
- [39] Sgarbieri, V. C. Proteínas em alimentos protéicos: propriedades, degradações, modificações. São Paulo: Varela, 1996. 517 p.
- [40] Soler, M. P.; Veiga, P. G. Série Publicações Técnicas do Centro de Informação em Alimentos: Sorvetes. Instituto de Tecnologia de Alimentos, Campinas, 2001.
- [41] Souza, J. C. B.; Costa, M.R.; de Rensis, C.M.V.B.; Sivieri, K. Sorvete: composição, processamento e viabilidade da adição de probiótico. *Revista Alimentação e Nutrição*, Araraquara, v.21, n.1, p. 155-165, jan./mar. 2010. Disponível em: <http://serv-bib.fcfar.unesp.br/seer/index.php/alimentos/article/viewFile/1401/923>. Acesso em: 13 jan. 2017.

[42] Tozato, A.R.C.; Silva, R.G.G.; Silvia, M.S.L. Dossiê Técnico – Sorvetes. Cozinha Net, 2007. Disponível em: <http://www.cozinhanet.com.br/Artigo.aspx/2295-Producao-de-Sorvetes-Dossie-Tecnico>. Acesso em: 13 jan. 2017.

[43] Xavier, L. P. S. Processamento de sorvetes. Química de Alimentos, Pelotas, 2009. 51p. Disponível em: <http://quimicadealimentos.files.wordpress.com/2009/08/processamento-de-sorvetes.doc>. Acesso em: 13 jan. 2017.

Autores

ALANNA NATÁLIA BRITO DE FIGUEIRÊDO

Nutricionista graduada em Nutrição pelo Instituto de Ensino Superior do Sul do Maranhão - IESMA/ UNISULMA. Desenvolvimento de pesquisas em elaboração de produtos alimentícios. Atuação acadêmica em Nutrição Clínica, Social e de Produção em Unidades de Alimentação e Nutrição.

ALEXANDRE GONÇALVES PORTO

Engenheiro Agrícola pela Universidade Federal de Pelotas (1999), mestre em Engenharia e Ciência de Alimentos pela Fundação Universidade Federal do Rio Grande (2001) e doutor em Ciência e Tecnologia de Sementes pela Universidade Federal de Pelotas (2004). Atualmente é Professor Adjunto da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT). Foi Pró-Reitor de Extensão e Cultura e Pró-Reitor de Gestão e Finanças, atualmente é Pró-Reitor de Ensino e Graduação da UNEMAT. Tem experiência na área de Processamento e Tecnologia de Produtos Agroindustriais, atuando principalmente na área de pós-colheita de produtos agropecuários.

AMAURI ERNANI TORRES ARECO

Possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS e duas especializações pela Faculdade Unileya em Vigilância Sanitária e Qualidade dos Alimentos e Higiene e Inspeção de Produtos de Origem Animal. Atualmente é residente no programa de residência em área profissional da saúde – medicina veterinária e saúde (MEC/SUS), na área de Medicina Veterinária Preventiva, na Universidade “Júlio Mesquita Filho” UNESP/Jaboticabal. Atua principalmente nas áreas de vigilância sanitária, medicina veterinária preventiva e saúde pública.

ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA

Possui graduação e mestrado em Agronomia pela Universidade Federal da Paraíba (2013 e 2015). Atualmente é estudante de doutorado na Universidade Federal da Paraíba. Tem experiência nas áreas de Ciências agrárias, Ciência e Tecnologia de Alimentos, com ênfase em Fisiologia Pós-Colheita de frutos e hortaliças, atuando principalmente nos seguintes temas: Bioquímica Vegetal, Eletroforese em Gel, Capacidade antioxidante, compostos fenólicos, frutos tropicais comerciais e não tradicionais.

BRUNA FRANCIELLY GAMA

Atualmente é bolsista de iniciação científica e estudante do curso Bacharelado em Agronomia pela Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT - Campus de Alta Floresta.

BRUNO JOSÉ DE SOUZA

Engenheiro Agrimensor e Cartográfico pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro-UFRRJ (2012-2018). Tem experiência na área de Hidráulica, Geociências, com ênfase em Topografia, Geodésia, Cartografia, atuando principalmente nos seguintes temas: Levantamentos Topográficos, Locação de Obras, Projeto de Terraplenagem, SIG e Georreferenciamento de Imóveis Rurais.

CARLA ADRIANA PIZARRO SCHMIDT

Graduada em Agronomia (1992), Mestre em Ciências de Alimentos (1997) e Doutora em Agronomia (2008) pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Especialista em Tecnologia de Sementes e Administração Rural. Atualmente é professora efetiva 40 horas em regime de dedicação exclusiva da Universidade Tecnológica Federal do Paraná no campus de Medianeira-PR, estando lotada no curso de Engenharia de Produção junto ao Departamento de Administração e Produção. Atua como professora convidada do mestrado em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos da UTFPR - Campus Pato Branco (2010) e professora permanente do mestrado em Tecnologias Computacionais para o Agronegócio da UTFPR - Campus Medianeira (2015). Possui

experiência nas áreas de Engenharia, Agronomia, Ciência e Tecnologia de Alimentos, Processos de Produção Agroindustrial e Gestão Ambiental. Atuando principalmente nos seguintes temas: Análise de Alimentos, Gestão Ambiental em Municípios, Estudos em diversas áreas do Processamento Agroindustrial com foco em Modelagem, Previsão de Demanda e Controle Estatístico de Processos.

CAROLINA MOSER PARAÍSO

Mestre em Ciência de Alimentos na Universidade Estadual de Maringá (2018). Graduada em Engenharia de Alimentos pela Universidade Estadual de Maringá (2015). Experiência nas áreas de tecnologia e ciência de alimentos, atuando principalmente nos seguintes temas: extração de compostos bioativos e análises antioxidantes.

CAROLINE ROBERTA FREITAS PIRES

Possui graduação em Nutrição pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), 2007. Mestrado em Ciência dos Alimentos pela Universidade Federal de Lavras (2009). Doutorado em Ciência dos Alimentos pela Universidade Federal de Lavras (2012). Atualmente é professora da Universidade Federal do Tocantins. Tem experiência na área de Nutrição e na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, com ênfase em Bioquímica e Fisiologia Pós-Colheita de Frutos e Hortaliças, atuando principalmente nos seguintes temas: pós-colheita, química de alimentos, tecnologia de alimentos, processamento mínimo e conservação de alimentos.

CESAR JOSÉ DE OLIVEIRA

Agrônomo, mestre e doutorando do Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. Ex-diretor nacional do INCRA e atual Diretor-geral da Emater/RN.

CICERA KARINE SILVA DE SOUZA

Graduanda em Agronomia pela Universidade Federal do Cariri – UFCA. Membro do Centro de Referência em Pesquisas com Aves – CREPAV.

CICERO CORDEIRO PINHEIRO

Graduando em Agronomia pela Universidade Federal do Cariri - UFCA. Bolsista do Programa de Educação Tutorial – PET e membro do Núcleo de Estudo em Fitotecnia e Melhoramento de Plantas – NEFIMP.

CLAUDIO LEONES BAZZI

Possui graduação e especialização na área de computação (entre 1999 e 2007), mestrado (2007) e doutorado (2011) em Engenharia Agrícola pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná e Pós doutor na Universidade Estadual da Califórnia - Estados Unidos (2016). É professor adjunto da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - câmpus Medianeira, coordenou o curso de Bacharelado em Ciência da Computação (2011-2015), foi proponente da proposta de abertura (2014) e coordenou o Programa de Mestrado Acadêmico em Tecnologias Computacionais para o Agronegócio (PPGTCA) (2015-2016) e atualmente atua como professor permanente do PPGTCA e como Diretor de Graduação e Educação Profissional da UTFPR-Medianeira. Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em computação aplicada e desenvolvimento de sistemas, atuando principalmente nos seguintes temas: agricultura de precisão, bancos de dados relacionais, bancos de dados geográficos e análise de dados espaciais. Está coordenando projetos junto ao PPGTCA, com objetivos focados no desenvolvimento de tecnologias aplicadas à agricultura de precisão.

CONAN AYADE SALVADOR

Engenheiro Agrícola pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). É Mestre em Engenharia Agrícola na área de concentração em Água e Solo, pela Faculdade de Engenharia Agrícola (FEAGRI), UNICAMP. É Doutor em Ciências na área de concentração em Irrigação e Drenagem, pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ/USP). Atua como Professor Adjunto do Departamento de Engenharia da UFRRJ. Tem experiência na área de Engenharia Agrícola, com ênfase em Irrigação e Drenagem, atuando principalmente nos seguintes temas: tecnologia e manejo de irrigação, subirrigação, fertirrigação e instrumentação na agricultura.

CRISTIANO SANTOS BONATO

Acadêmico de Agronomia na Universidade Regional Integrada do Alto do Uruguai e das Missões (URI) – Campus Santiago/RS. Participações em palestras ministradas na faculdade, e em eventos promovidos pelos sindicatos das regiões com profissionais qualificados da área agrônoma. Atualmente, é estagiário no Laboratório de Fitopatologia (URI) e na empresa Madalosso Pesquisas, conduzindo protocolos de pesquisa e desenvolvimento de fungicidas e adjuvantes na área de Fitopatologia e Tecnologia de Aplicação

DÉBORA CRISTINA LEAL

Formada em Técnica em Agropecuária na Escola Técnica da Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia - SECITEC, no ano de 2016. Atualmente é estudante do curso Bacharelado em Agronomia pela Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT - Campus de Alta Floresta.

DECIO MOSSINI JUNIOR

Possui graduação em Engenharia Agrícola pela Universidade Estadual de Maringá. É especialista em pós-colheita e produção de sementes, mestre em Ambientes e Sistemas de Produção Agrícola e possui certificação em Green Belt. Tem conhecimento e experiência na área de fisiologia e produção de sementes, secagem e armazenamento de produtos agrícolas, análises de processo, ferramentas Lean&Seis Sigma. Atualmente trabalha na empresa Bayer como Engenheiro de Processos, atuando principalmente em melhoria contínua.

DINARA GRASIELA ALVES

Engenheira Agrônoma pela Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE, mestrado em Ciências, área de concentração: Irrigação e Drenagem pela ESALQ-USP, doutorado em Engenharia de Sistemas Agrícolas pela ESALQ-USP com período de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE-CAPES) no Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'environnement (IRSTEA), França. Pós-doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental da UFRRJ. Tem experiência na área de Agronomia e Engenharia Agrícola e Ambiental, atuando principalmente com engenharia de água e solo, fertilidade do solo, hidráulica, engenharia de irrigação e tratamento de efluentes e resíduos agroindustriais.

DIOGO LUIZ FRUET

Possui qualificação Técnica Agrícola em Ciências Agrárias pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense - IFC / Campus Videira (2013). Formado em Engenharia Agrônoma pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina - IFC / Campus Rio do Sul, com atuação na pesquisa agrônoma nas culturas de milho, soja, algodão e feijão, atualmente participa do programa de pós-graduação em produção vegetal na UDESC/CAV, com o desenvolvimento de pesquisas em proteção de plantas, na área de plantas daninhas e herbicidas.

DIONATAN FRESCURA NUNES

Técnico em Agricultura - Instituto Federal Farroupilha, Campus São Vicente do Sul. Acadêmico de Agronomia na Universidade Regional Integrada do Alto do Uruguai e das Missões (URI) – Campus Santiago/RS. Assistente Técnico na empresa SprayExpert tecnologia de aplicação. Atualmente, é estagiário no Laboratório de Fitopatologia (URI) e na empresa Madalosso Pesquisas, conduzindo protocolos de pesquisa e desenvolvimento de fungicidas e adjuvantes na área de Fitopatologia e Tecnologia de Aplicação.

EDNARDO RODRIGUES FREITAS

Possui graduação em Agronomia pela Universidade Federal do Ceará -UFC (1991), mestrado em Zootecnia pela UFC (1999) e doutorado em Zootecnia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho- UNESP- FCAV- Jaboticabal (2003). Atualmente é Professor Adjunto do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal do Ceará e Docente do Curso de Pós-graduação em Zootecnia.. É bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq - nível 1D.

EDUARDO JOSÉ OENNING-SOARES

Engenheiro de Produção Agroindustrial e Engenheiro de Segurança do Trabalho. Mestre e Doutor em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Foi professor na graduação e pós-graduação na Faculdade Boa Viagem em Recife, e da Universidade de Cuiabá (UNIC) de Tangará da Serra no curso de Engenharia de Produção. Atualmente é professor Adjunto da UNEMAT no curso de Engenharia de Produção Agroindustrial. Realiza pesquisas na área de Gestão da Produção, Gestão da Qualidade, Desenvolvimento de Produtos e Saúde e Segurança Ocupacional. Atualmente é coordenador do Centro Tecnológico de Mato Grosso do Campus da UNEMAT de Barra do Bugres.

ELISANGELA NUNES MELO DE MACEDO

Possui Graduação em Ciências Agrárias (Licenciatura Plena), pela Universidade Federal da Paraíba - UFPB, no Centro de Ciências Humanas Sociais e Agrárias, Campus de Bananeiras, ano de conclusão (2007). Mestrado no Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Agroalimentar na UFPB. Foi bolsista do Programa de Iniciação Científica, PIBIC/CNPq/UFPB. Tem experiência em fracionamento de lipídios em tilápia cultivada, com ênfase em diferentes sistemas de cultivo, tendo atuado principalmente nos seguintes temas: Composição química e fracionamento de lipídios por cromatografia clássica.

ELKA MACHADO FERREIRA

Graduação em Medicina Veterinária e mestrado em Ciência Animal pela Universidade Estadual do Maranhão. Atualmente é doutoranda em Medicina Veterinária Preventiva pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”. Tem Experiência na área de Inspeção de Produtos de Origem Animal e em Microbiologia com ênfase em bacteriologia, atuando principalmente nos seguintes temas: mastite bovina, microbiologia da segurança alimentar e estudo de estafilococos coagulase-negativa e Staphylococcus aureus (identificação, fatores de virulência, resistência às drogas e epidemiologia molecular).

EVANDRO MARCOS KOLLING

Graduado em Engenharia Agrícola pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (1999), mestre em Engenharia Agrícola pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (2001), especialista em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (2006) e doutor em Agronomia pela Universidade Estadual de Maringá (2007). Atualmente, professor do magistério superior da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

EVERTON SCHNEIDER DOS SANTOS

Possui graduação em Ciências da Computação pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (2016). Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em desenvolvimento de software com as tecnologias mais utilizadas pelo mercado atualmente. Em seu trabalho de conclusão de curso propôs a utilização de recomendação de conteúdo para extração de conhecimento em redes sociais, em um processo amparado nas abordagens de Inteligência Artificial, Big Data e mineração de sentimentos. O crescimento na geração de conteúdo em redes sociais é um desafio para empresas e pesquisadores que desejam extrair conhecimento em tempo real de volumes massivos de dados. Avaliou-se a preferência dos usuários por empresas de tecnologia. Para medir a preferência dos usuários por um determinado item foi utilizada a abordagem baseada em mineração de sentimentos. Os dados gerados foram então utilizados para construir recomendadores de conteúdo e os resultados obtidos foram avaliados.

FABIANA COSTA DE ARAUJO SCHUTZ

Possui graduação em Engenharia Agrícola pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (2001), mestre em Engenharia Agrícola pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (2004) e doutora em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Campina Grande (2014). Atualmente é professora do ensino superior da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e desenvolve estudos na área de Recursos Hídricos e simulação.

FABIANO BRITO DUAILIBE

Possui graduação em Matemática pela Universidade Estadual do Maranhão – UEMA. Foi docente de Matemática do ensino fundamental nas prefeituras de Santa Rita – MA e São José de Ribamar – MA. Atualmente é docente na Universidade Estadual do Maranhão – UEMA, campus Bacabal.

FABIANO TAVARES DE MOURA

Possui Curso Técnico em Agroindústria (1999), Graduação em Licenciatura em Ciências Agrárias (2003), Mestrado em Agronomia (2005), Graduação em Bacharelado em Agroindústria (2018) e, Doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos, pela Universidade Federal da Paraíba - UFPB. Atualmente, é Técnico de Laboratório em Análises Físico-Químicas de Alimentos do Centro de Ciências Humanas Sociais e Agrárias - UFPB. Tem experiência na área de Agroindústria e Ciências Agrárias, com ênfase em Bioquímica, Fisiologia e Tecnologia Pós-Colheita, atuando principalmente nos seguintes temas: qualidade de frutos, biologia e tecnologia pós-colheita, fisiologia da maturação, conservação pós-colheita e armazenamento refrigerado e, análises de alimentos.

FABRÍCIO SCHWANZ DA SILVA

Graduação em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Pelotas (1996), Mestrado em Ciência e Tecnologia de Sementes pela Universidade Federal de Pelotas (2000) e Doutorado em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Viçosa (2003). Professor Adjunto na Universidade Federal do Paraná no Setor Palotina no Departamento de Engenharias e Exatas. Tem experiência e atua na área de Engenharia Agrícola, com ênfase nas áreas de Armazenamento e Processamento de Produtos Agrícolas, atuando principalmente nos seguintes temas: armazenamento, secagem, propriedades físicas, sementes, grãos, alimentos, qualidade e meio ambiente.

FERNANDO BASTOS COSTA

Professor colaborador da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Doutor pelo programa de pós-graduação em ciências sociais da UFRN.

FERNANDO JOSÉ GIZA

Formado em Técnico Agropecuária pelo Centro de Educação Profissional do Sudoeste do Paraná, Francisco Beltrão - PR, com Graduação em Engenharia Eletrônica pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus Toledo - PR. Atualmente Engenheiro Eletrônico da Wiki Soluções e Desenvolvimento LTDA . Principais atividades: Projeto e design eletrônico, supervisão de processos de montagem de placas eletrônicas, pesquisa na área de telemetria aplicada a agropecuária, cotação junto a fornecedores de componentes eletrônicos, execução de projetos de implantação de sistemas de telemetria, etc

FILIFE ANDRES DALENOGARE

Acadêmico de Agronomia na Universidade Regional Integrada do Alto do Uruguai e das Missões (URI) – Campus Santiago/RS. Estágio supervisionado na empresa Matrisoja – Paraguai. Atualmente, é estagiário no Laboratório de Fitopatologia (URI) e na empresa Madalosso Pesquisas, conduzindo protocolos de pesquisa e desenvolvimento de fungicidas e adjuvantes na área de Fitopatologia e Tecnologia de Aplicação

FLAVIO GENTIL BONFANTE

Engenheiro Agrônomo pela ESAPP - Escola Superior de Agronomia de Paraguaçu Paulista. Mestre em Produção de sementes pela UFPEL - Universidade Federal de Pelotas. 11 anos no Mercado de Biológicos, principalmente Inoculantes soja e milho, trabalhando com pesquisa e desenvolvimento, produtos registrados e para registro. Treinamento e Palestras para equipes técnicas e comerciais, distribuição e clientes finais. Ligação com instituições para montagem e elaboração e condução de protocolos.. Região de atuação - Brasil

FRANCILENE GOMES DO NASCIMENTO

Formação: Graduada em Nutrição. Instituição de Formação: IESMA-Unisulma. Participação de palestras ministradas na faculdade, com profissionais atuantes no mercado de trabalho da área de nutrição. Vivência no ambiente hospitalar, produção e social adquirida por um estágio de três meses, cada, desempenhando as funções de elaborar cardápios, avaliação nutricional, capacitação de manipuladores, palestras e mini cursos.

FRANCISCO DE ASSYS ROMERO DA MOTA SOUSA

Doutorando em Agronomia pelo Programa de Pós-graduação em Agronomia da Universidade Federal da Paraíba. Integrante do Laboratório de Biologia e Tecnologia Pós-colheita da Universidade Federal da Paraíba, sendo bolsista PROBEX/PROEXT, Tem experiência na área de Agronomia. Técnico Agrícola formado pela Escola Justulino Ferreira Gomes. Técnico em Agropecuária da Prefeitura Municipal de Bom Jardim, PE.

FRANCISCO LUAN FERNANDES FERREIRA

Graduando em Agronomia pela Universidade Federal do Cariri – UFCA. Membro do Centro de Referência em Pesquisas com Aves – CREPAV.

GABRIEL NARESSI ROÓS

Acadêmico de Agronomia na Universidade Regional Integrada do Alto do Uruguai e das Missões (URI) – Campus Santiago/RS. Estágio Supervisionado em soja na Empresa de Consultoria SA Tec e na Agropecuária Santo Antônio [2018], Santiago/RS. Estágio Supervisionado em Plantas Forrageiras na Fazenda São José [2017], Bagé/RS. Participação em Palestras e minicursos. Atualmente, é estagiário no Laboratório de Fitopatologia (URI) e na empresa Madalosso Pesquisas, conduzindo protocolos de pesquisa e desenvolvimento de fungicidas e adjuvantes na área de Fitopatologia e Tecnologia de Aplicação

GLORIA PATRICA LÓPEZ SEPULVEDA

Possui graduação em Engenharia da Computação - Universidad Tecnológica de Pereira (2011) e mestrado em Engenharia Elétrica - Universidade Estadual Paulista (2013) e doutorado em Engenharia Elétrica - Universidade Estadual Paulista (2017). Atuando principalmente nos seguintes temas de pesquisa: Métodos de Inteligência Computacional aplicados à solução de problemas de Engenharia, Modelos de otimização matemática. Engenharia de Software para Desenvolvimento de Software. Mineração de dados e aprendizado de máquina.

HIGOR DA SILVA

Acadêmico de Agronomia na Universidade Regional Integrada do Alto do Uruguai e das Missões (URI) – Campus Santiago/RS. Atualmente, é estagiário no Laboratório de Fitopatologia (URI) e na empresa Madalosso Pesquisas, conduzindo protocolos de pesquisa e desenvolvimento de fungicidas e adjuvantes na área de Fitopatologia e Tecnologia de Aplicação

HUDSON DO VALE DE OLIVEIRA

Doutorando em Administração no Programa de Pós-Graduação em Administração da UDESC. Faz parte do Núcleo de Inovações Sociais na Esfera Pública (NISP), atuando, também, no Observatório de Inovação Social de Florianópolis (OBISF). Doutor em Agronomia pela UEL. Mestre em Agronomia pela UEM. Especialista em Gestão de Cooperativas pela UFRR. Graduado em Agronomia pela UFERSA, em Administração pela UERN e em Comunicação Social (Jornalismo) pela UFRR. É Professor Efetivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR), Campus Boa Vista Zona Oeste (CBVZO). Atuou como Tutor na modalidade de Ensino a Distância no curso de Administração Pública da Universidade Estadual de Maringá - UEM. Possui experiência e interesse de projetos (pesquisa e extensão) nas seguintes áreas: Agronegócios, Sustentabilidade, Cooperativismo, Gestão de Pessoas, Gestão Pública, Inovação Social e Educação.

IRANI RIBEIRO VIEIRA LOPES

Engenheira Agrônoma graduada pela Universidade Federal do Ceará - UFC em 1987. Concluiu Mestrado em Zootecnia pela UFC em 1994 e Doutorado em Produção Animal pela UFC em 2007. Possui ainda curso de graduação em Licenciatura Plena pela Universidade Estadual do Ceará tendo concluído em 2003. Atualmente é Professora efetiva com dedicação exclusiva no Curso de Agronomia da Universidade Federal do Cariri (UFCA), fazendo parte do Núcleo Docente Estruturante (NDE), é vice coordenadora do Comitê de Ética no Uso de Animais e coordenadora do grupo de pesquisa intitulado Centro de Referência em Pesquisas com Aves (CREPAV).

ISANE VERA KARSBURG

Possui graduação em Ciências Biológicas Licenciatura Plena pela Universidade Federal de Santa Maria (2000), mestrado em Agronomia pela Universidade Federal de Santa Maria (2002) e doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento pela Universidade Federal de Viosa (2006). Atualmente é professora adjunta da Universidade do Estado de Mato Grosso e coordenadora do lab. citogenética e cultura de tecidos vegetais da Universidade do Estado de Mato Grosso. Professora Coordenadora do Programa de Pós Graduação de Genética e Melhoramento de Plantas- UNEMAT/Multicampus. Tem experiência na área de Citogenética Vegetal, atuando principalmente nos seguintes temas: citogenética clássica, mutagenese, citometria de fluxo e biotecnologia vegetal.

JAKSON BOFINGER

Possui graduação em Zootecnia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (2004). Tem experiência na área de Zootecnia. Mestre em Engenharia Agrícola, Área de concentração Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná.

JAQUELINE VARGAS

Possui graduação em Engenharia de Controle e Automação pela faculdade Assis Gurgacz (2009) e mestrado em Engenharia de Automação e Sistemas pela Universidade Federal de Santa Catarina (2012). Suas áreas de interesse compreendem controle, inteligência artificial e automação. Atualmente é professora do curso de Engenharia Eletrônica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Câmpus Toledo.

JÉSSICA SANTI BOFF

Tem experiência na área de Agronomia, com ênfase em Ciência do Solo, Reflorestamento e Fitopatologia, atuando principalmente nos seguintes temas: atributos do terreno, formação campestre, geoestatística, levantamento de solos e gênese do solo, em produções de mudas florestais e em doenças de grandes culturas. Atualmente, é bolsista no Laboratório de Fitopatologia (URI) e na empresa Madalosso Pesquisas, conduzindo protocolos de pesquisa e desenvolvimento de fungicidas e adjuvantes na área de Fitopatologia e Tecnologia de Aplicação.

JOÃO CELIO DE ARAUJO

Engenheiro Agrônomo (UDESC - 1995), especialista em Irrigação e Drenagem (UDESC - 1999), mestre em Máquinas Agrícolas (ESALQ/USP - 2001) e doutor em Irrigação e Drenagem (ESALQ/USP - 2004). É professor do Instituto Federal Catarinense - Campus Rio do Sul. Tem experiência nas áreas de Agronomia, com ênfase em Irrigação e Drenagem, Sensoriamento Remoto, Topografia e Mecanização Agrícola. Atua nos cursos de Agronomia (Hidráulica, Agricultura de Precisão e Irrigação e Drenagem), Técnico em Agrimensura (Sensoriamento Remoto e Levantamento Hidrográfico) e Técnico em Agropecuária (Irrigação e Drenagem) e Técnico em Agroecologia (Irrigação e Drenagem). Licenciado em Matemática (UNIASSELVI 2018).

JOÃO JOSÉ DA SILVA JUNIOR

Professor Adjunto na Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária FAV/UNB, atuou como instrutor na formação profissional rural pelo SENAR/MG capacitando trabalhadores nas seguintes atividades: operação e manejo de sistemas de irrigação localizada (microaspersão e gotejamento), sistemas convencionais de irrigação por aspersão convencional, e sistemas de irrigação por aspersão autopropelido. Foi Professor Substituto no Departamento de Engenharia Agrícola da UFLA no período de fevereiro a julho de 2013 ministrando as disciplinas de Qualidade Ambiental e Saneamento I. Possui Doutorado pelo programa de pós-graduação em Recursos Hídricos em Sistemas Agrícolas da Universidade Federal de Lavras, Área de concentração de Engenharia de água e solo. Foi Tutor a Distância no curso de Pós-graduação Lato Sensu em Educação Ambiental UFLA/UAB/CEAD das disciplinas de Avaliação de Projetos Ambientais, Gestão de Movimentos da Juventude e Ambiente de Orientação do TCC. Atuou como tutor das disciplinas Antropologia I e II e de Sociologia I, II e III do curso de Pedagogia a distância da UFLA/UAB/CEAD. Foi estagiário do PET/Agronomia (Programa de Educação Tutorial) da Universidade Federal do Recôncavo Baiano no período de Julho de 2003 a Janeiro de 2009. Tem experiência na área de irrigação e na área de manejo de fertirrigação foi estagiário da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária EMBRAPA CNPMF Laboratório de Irrigação e Fertirrigação de fruteiras tropicais. Tem experiência na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, com ênfase em Tecnologia de Produtos de Origem Vegetal, e de pós colheitas de frutos tropicais atuando principalmente nos seguintes temas: acerola, caracterização físico-química, opuntia ficus, caracterização física, propagação, vegetativa e umbu-cajazeira, populações, variabilidade genética.

JOINA MARIA SILVA DE SOUSA

Bacharel em Nutrição pelo Instituto de Ensino Superior do Sul do Maranhão-IESMA. Pós-graduanda em Nutrição Esportiva e Funcional na Faculdade Laboro em Palmas Tocantins. Atuante em palestras, rodas de conversas e ações promovidas na instituição IESMA-Unisulma com profissionais da área de nutrição e outras áreas relacionadas a saúde humana. Participação em estágios relacionados ao âmbito hospitalar, social, produção de cardápios, avaliação nutricional,

qualificação para manipuladores de alimentos e outras atividades como mini cursos correspondentes à área da nutrição.

JOSÉ AIRTON AZEVEDO DOS SANTOS

Possui Graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Católica de Pelotas (1987), Mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina (1994) e Doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina (1999). Atualmente é professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Tem experiência nas áreas de Engenharia Elétrica e Engenharia de Produção, atuando principalmente nos seguintes temas: Energia e Meio Ambiente, Modelagem e Simulação de Sistemas Contínuos e Discretos e Inteligência Artificial. É professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Computacionais para o Agronegócio da UTFPR - Campus Medianeira.

KAUYSE MATOS NASCIMENTO

Possui graduação em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal da Grande Dourados (2013) e mestrado em Engenharia de Alimentos pela Universidade Estadual de Maringá (2018). Teve aprovação em Processo Seletivo para Professor Temporário na área de Tecnologia em Alimentos pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (2014), ministrando aulas durante 2 anos nos cursos de graduação em Engenharia de Alimentos, Tecnologia de Alimentos e Química Industrial. Ministrou as seguintes disciplinas: Introdução a Engenharia de Alimentos, Operações Unitárias, Bioquímica, Fundamentos da Tecnologia em Alimentos, Processamento de Frutas e Hortaliças, Fundamentos da Indústria e Comércio de Alimentos, Marketing e Distribuição, Tecnologia de Massas e Pastifícios, Tecnologia de Amidos, Farinhas e Cereais, Tecnologia do Açúcar, Bebidas, Sorvetes e Doces. Atualmente é discente de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Alimentos da Universidade Federal do Paraná.

KAYLEN KLYTTSSAN OLIVEIRA GOMES

Técnica em Serviços Públicos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR), Campus Boa Vista Zona Oeste (CBVZO). Atuou como Bolsista do Programa Institucional de Iniciação Científica (PIBIC).

LAESIO PEREIRA MARTINS

Possui graduação em Licenciatura em Ciências Agrárias pela Universidade Federal da Paraíba (1997), mestrado em Agronomia pela Universidade Federal da Paraíba (2000) e Doutorado em Agronomia pela Universidade Federal da Paraíba (2009). Atualmente é professor de 3 grau da Universidade Federal da Paraíba. Professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Agroindustrial. Tem experiência na área de Agronomia, com ênfase em fitotecnia, atuando principalmente nos seguintes temas: Fisiologia pós-colheita, tecnologia de produtos de origem vegetal, Tem experiência na área de Agricultura Tropical, com ênfase em Fisiologia e Tecnologia Pós-Colheita de Frutos e Hortaliças, como também na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos: processamento mínimo, análises físicas, químicas e físico-químicas, bioquímica de frutos e controle de qualidade de alimentos.

LAYLA VICTÓRIA DA SILVA SOUSA

Graduanda em Agronomia pela Universidade Federal do Cariri – UFCA. Membro do Grupo de Pesquisa em Fisiologia e Bioquímica de Plantas – FISIOBIO.

LEONARDO A. GOLLO

Acadêmico de Agronomia na Universidade Regional Integrada do Alto do Uruguai e das Missões (URI) – Campus Santiago/RS. Atualmente, é estagiário no Laboratório de Fitopatologia (URI) e na empresa Madalosso Pesquisas, conduzindo protocolos de pesquisa e desenvolvimento de fungicidas e adjuvantes na área de Fitopatologia e Tecnologia de Aplicação

LEONARDO DUARTE BATISTA DA SILVA

Engenheiro Agrícola, formado pela UFV. Doutor em Agronomia (Área de Concentração: Irrigação e Drenagem) pela ESALQ-USP. Pós-Doutorado em Engenharia Agrícola (Área de Concentração: Engenharia de Água e Solo) pela UFRRJ e EMBRAPA Agrobiologia em 2005. Engenheiro Ambiental, formado pela Universidade de Vassouras (USS) em 2011. Professor Associado III do Departamento de Engenharia da UFRRJ. Atua em pesquisas relacionadas à Recursos Hídricos e Engenharia do Meio Ambiente: manejo da irrigação, evapotranspiração, consumo hídricos dos cultivos, agrometeorologia, tratamento e disposição final de águas residuárias, estudos climáticos no continente antártico e mudanças climáticas.

LEYDE EMANUELLE COSTA PEREIRA

Possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Camilo Castelo Branco – Fernandópolis/SP e mestrado em Medicina Veterinária (Medicina Veterinária Preventiva) pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – Jaboticabal/SP. Atualmente desenvolve doutorado na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – Jaboticabal/SP na área de Medicina Veterinária Preventiva. Tem experiência na área de Medicina Veterinária, com ênfase em Medicina Veterinária Preventiva, atuando principalmente nos seguintes temas; zoonoses, doenças infecciosas, saúde pública, epidemiologia.

LÍBIA LUIZA GALVÃO LIMA

Técnica em Serviços Públicos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR), Campus Boa Vista Zona Oeste (CBVZO). Atuou como Bolsista do Programa Institucional de Iniciação Científica (PIBIC).

LUCÉLIA DA CUNHA RODRIGUES GUIMARÃES

Graduação em Medicina Veterinária e mestrado em Ciência Animal pela Universidade Estadual do Maranhão. Especialista em Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal do Maranhão e Docente do Curso de Tecnologia em Alimentos do Instituto Federal do Maranhão – IFMA (Campus Barreirinhas). Tem experiência na área de Medicina Veterinária, com ênfase em saúde pública, controle de qualidade de alimentos, atuando principalmente nos seguintes temas: avaliação microbiológica, condições higiênico-sanitárias, inspeção e tecnologia de alimentos.

LUCIANA ALVES DA SILVA TAVONE

Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Ciências de Alimentos pela Universidade Estadual de Maringá (UEM). Mestra em Engenharia de Alimentos pela Universidade Estadual de Maringá (UEM). Bacharela em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). Foi monitora bolsista de Ensino de Graduação nas disciplinas de Refrigeração na Indústria de Alimentos, Operações Unitárias I e Fenômenos de Transporte. Experiência profissional no ramo sucroalcooleiro, frigorífico e laticínios, desenvolvendo atividades no setor de Garantia de Qualidade e Produção de Alimentos Industrializados e in natura. Na área de pesquisa, em Engenharia e Ciência de Alimentos, com ênfase em modelagem matemática, processamento de alimentos, reaproveitamento de resíduos e extração de antioxidantes. Atualmente é professora conteudista e tutora na educação a distância (EAD), atuando na docência do ensino superior dos cursos de Engenharia, Gastronomia e afins.

LUIZ FERNANDO GIBBERT

Formou-se Técnico em Agropecuária Integrado ao Nível Médio pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - IFMT - Campus São Vicente no ano de 2016. Atualmente é estudante do curso Bacharelado em Agronomia pela Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT - Campus de Alta Floresta

MARCELO GRIPA MADALOSSO

É Mestre em Engenharia Agrícola pela UFSM e Dr. em Agronomia: [Fitopatologia e Tecnologia de Aplicação] pela UFSM. Professor e Pesquisador da Universidade Regional integrada. Campus Santiago e Santo Ângelo. Palestrante. Participa do desenvolvimento de novos Fungicidas e de Tecnologias de Aplicação, na empresa Madalosso Pesquisas. Autor de bibliografias na área e revisor. Tem experiência nas áreas de fitopatologia, tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas, controle químico, estudo avançados de fungicidas e fitotoxidade, atuando principalmente nos patossistemas ligados a soja, milho, arroz, aveia e trigo.

MARCIELI PAULA LANGER

Formada no Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (2008-2011) com Especialização em Engenharia de Software (2012-2014), ambas pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campus Medianeira. No ano de 2015 obteve certificação em contagem de pontos por função (CFPS), pelo IFPUG. Posteriormente (Julho/2017) concluí MBA em Gerenciamento de Projetos pela UDC. Atualmente sou mestranda no curso de Tecnologias Computacionais para o Agronegócio, pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campus Medianeira. Entre as áreas de interesse, as principais são Métricas de Software (ênfase em APF), Engenharia de Software e Gerenciamento de Projetos de Software. Participei ativamente no processo de certificação MPS.Br Nível F da empresa Eits. Tenho conhecimentos aprofundados em desenvolvimento e metodologias ágeis, engenharia de software e mensuração de software.

MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO

Mestrando em Tecnologias Computacionais para o Agronegócio pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Graduado em Ciência da Computação pela UTFPR. Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Sistemas de Computação: programação, linguística computacional e análise e desenvolvimento de sistemas.

MARIA APARECIDA DA SILVA ALVES

Possui graduação Licenciatura em Ciências Biológicas e Bacharel em Ecologia, pelo Centro Universitário de Várzea Grande (2011), Pós graduação em Análises Clínica e Toxicológica - Faculdade de Cuiabá (2011), Pós Graduação em MBA em Gestão e Perícia Ambiental, Universidade de Cuiabá - Unic (2014), Mestre em Recursos Hídricos na Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT.

MARINALDO FERREIRA PINTO

Possui graduação em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (2008), mestrado em Ciências (Irrigação e Drenagem) pela Universidade de São Paulo (2010) e doutorado em Ciências (Irrigação e Drenagem) pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz- USP (2013). Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de Engenharia Agrícola, com ênfase em Irrigação e Drenagem, atuando principalmente nos seguintes temas: controle de obstrução de emissores, modelagem matemática, desenvolvimento tecnológico em irrigação.

MARTIN DIAZ ZORITA

Ingeniero Agrónomo, Magíster en Ciencias Agrícolas y Doctor en Ciencias del Suelo

MATEUS DA CUNHA DORNELES

Técnico Agrícola - Instituto Federal Farroupilha, Campus Alegrete. Acadêmico de Agronomia na Universidade Regional Integrada do Alto do Uruguai e das Missões (URI) – Campus Santiago/RS. Atualmente, é bolsista no Laboratório de Fitopatologia (URI) e na empresa Madalosso Pesquisas, conduzindo protocolos de pesquisa e desenvolvimento de fungicidas e adjuvantes na área de Fitopatologia e Tecnologia de Aplicação

MATHEUS BARCELOS DE SOUSA

Estudante de Agronomia da Universidade de Brasília, Bolsista de iniciação científica, atuando nos seguintes temas, manejo de irrigação, fertirrigação, propriedades físico - hídrica do solo.

MILIANO DE BASTIANI

Possui graduação em Sistemas de Informação - Uniguaçu (2010), especialização em Administração em Banco de Dados pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná Campus Medianeira (2013), especialização em Computação Aplicada a Agroindústria pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná Campus Medianeira (2015), mestre no curso de Tecnologias Computacionais para o Agronegócio - PPGTCA pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná Campus Medianeira (2018). Atualmente é Gerente de Suporte - SWA Sistemas Acadêmicos. Proprietário da empresa MTEC Soluções em Tecnologia com foco em geração de conteúdo para ebooks, artigos científicos e blogs. Tem experiência na área de Sistemas de Informação, com ênfase em banco de dados relacionais, experiência com geoprocessamento, tratamentos de imagens e análise de dados espaciais. Atualmente participa de grupo de estudos relacionados a mineração de dados e inteligência artificial.

MONICA REGINA DA SILVA SCAPIM

Possui graduação em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal de Viçosa (1994), mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal de Viçosa (1997) e doutorado em Ciência de Alimentos pela Universidade Estadual de Londrina (2009). Atualmente é docente adjunto D do curso de Engenharia de Alimentos da Universidade Estadual de Maringá e docente permanente do curso de pós-graduação stricto sensu em Engenharia de Alimentos (mestrado acadêmico) DAL-UEM. Tem experiência na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, com ênfase em: Processamento de Alimentos de origem Vegetal; Embalagens Biodegradáveis e Aproveitamento de Resíduos de Agroindústria.

MURIEL TAMBANI

Possui qualificação Técnica em Agropecuária pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense - IFC / Campus Rio do Sul.

NATHÁLIA LIRA DE OLIVEIRA

Tecnóloga em Alimentos pelo Instituto Federal do Maranhão – IFMA, Campus Zé Doca – MA.

NEIVA SALES RODRIGUES

Doutoranda (Tese defendida) em Engenharia Agrícola pelo Programa de Pós Graduação em Engenharia Agrícola (PGEAGRI) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), Campus de Cascavel-PR, na Área de Concentração: Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental (RHESA), Linha de Pesquisa: Recursos Hídricos. Mestra em Recursos Hídricos pelo Programa de Pós Graduação em Recursos Hídricos (PPGRH) da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Campus de Cuiabá-MT, na Área de Concentração: Manejo e Conservação, Linha de Pesquisa: Dinâmica Superficial e Subterrânea. Especialista em Ciência do Solo e Nutrição de Plantas pela Universidade de Cuiabá (UNIC), Campus de Primavera do Leste-MT. Atuou como Professora na Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia (SECITEC), Campus de Rondonópolis-MT. Bacharel

em Engenharia Agrícola e Ambiental pelo Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas-UFMT, Campus de Rondonópolis-MT.

PAULO FELIPE QUINQUIOLO

Graduado em Engenharia Eletrônica pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR (2017). Atualmente atua como Engenheiro Eletricista e instrutor de cursos técnicos e de qualificação profissional no SENAI Toledo PR, bem como instrutor da norma regulamentadora NR10, módulo básico e SEP. Atua na área de projetos elétricos e de telecomunicações.

RAFAEL STIEVEN

Formou em técnico em agropecuária, pela escola técnica Albert Sabin e atualmente é acadêmico de agronomia.

RENATA FREITAG

Doutora em Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal - Universidade do Estado de Mato Grosso (2018) com estágio na Universidade de Oxford. Mestra em Recursos Hídricos - Universidade Federal de Mato Grosso (2013). Especialização em Gestão e Perícia Ambiental - Universidade de Cuiabá (2011). Graduada em: Licenciatura em Ciências Biológicas - Universidade de Várzea Grande (2009) e bacharel em Administração de Empresas - Fundação Universidade de Tocantins (2011). Áreas de atuação: planejamento/gestão de recursos hídricos e recuperação de áreas degradadas; Estoque de carbono e dinâmica de gás carbônico em área de transição Amazônia-Cerrado; Mudanças climáticas. Assessoria e consultoria ambiental. Professora no Ensino Médio, Superior e na Pós-Graduação.

RIVANILDO DALLACORT

Professor do Mestrado em Ambiente e Sistemas de Produção Agrícola – PPGASP e do Mestrado em Biodiversidade e Agroecossistemas Amazônicos - PPGBioAgro; Coordenador do Centro de Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto Aplicado a Produção de Biodiesel - CETEGEO, UNEMAT. Professor Adjunto no Departamento de Agronomia da Universidade do Estado de Mato Grosso, Campus Universitário de Tangará da Serra. Atuante na área de Engenharia Agrícola nos seguintes temas: Agrometeorologia, Solos, Irrigação, Recursos hídricos, Meio Ambiente, Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto.

ROMANO ROBERTO VALICHESKI

Possui graduação em Licenciatura Em Ciências Agrícolas pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (2002), mestrado em Produção Vegetal pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (2004) e doutorado em Produção Vegetal pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (2008). Foi docente do efetivo do Instituto Federal Catarinense - Campus de Rio do Sul, e, atualmente está lotado no IF Goiano Campus Iporá. Tem experiência na área de Agronomia, com ênfase em Gênese, Morfologia e Classificação dos Solos, atuando principalmente nos seguintes temas: atributos físicos do solo, áreas degradadas, atributos químicos do solo, compactação do solo.

ROMERO SANTOS DE BRITO

Possui graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pelo Instituto Federal de Roraima (2008) e especialização em Perícia Forense Aplicada à Informática pela Unyleya Editora e Cursos S/A(2017). Atualmente é Policial Federal do Departamento de Polícia Federal. Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Sistemas de Computação.

SANDRA GRUTZMACHER

Possui graduação em Letras, Licenciatura Plena, Português e Literaturas da Língua Portuguesa, pela Universidade Federal de Santa Maria. É especialista em Literatura Brasileira, pelo Centro Universitário Franciscano. Possui MBA em Recursos Humanos e Marketing, pela Faculdade Metodista de Santa Maria. Fez mestrado na Universidade Federal de Juiz de Fora (MG). Atuou em vários cursos (pré-vestibulares, preparatórios para concurso, cursos técnicos) e na Universidade Federal de Roraima. É professora de Redação Oficial, Comunicação Empresarial e Língua Portuguesa no Instituto Federal de Roraima/ Campus Boa Vista Zona Oeste. Na gestão, atuou como Diretora do Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão e Coordenadora de Extensão do IFRR/CBVZO. Atualmente, é Pró-Reitora de Ensino do IFRR.

SHEILA CAIONI

Doutorado em Agronomia (Área de concentração: Sistema de Produção) pela Universidade Estadual Paulista; Júlio de Mesquita Filho - UNESP (2019), atuando na área de fitotecnia, com ênfase em adubação e nutrição de plantas e tecnologia de sementes, nas culturas de soja e milho e sistema Integração Lavoura Pecuária. Possui mestrado em Agronomia pela Universidade Estadual Paulista; Júlio de Mesquita Filho; - UNESP (2015), atuando na área de fitotecnia, com ênfase em adubação e nutrição de plantas e micronutrientes, nas culturas de soja e milho. Possui graduação em Agronomia pela Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT (2010).

SIDNEI LEANDRO STURMER

Engenheiro Agrônomo, formado pela Universidade Federal de Santa Maria - RS (UFSM), Mestre em Ciência do Solo pela mesma Universidade, doutor em Ciência do Solo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) na área de Manejo e Conservação do Solo e da Água com ênfase em Mecanização Agrícola. Tem experiência na área de Agronomia, principalmente em Física, Morfologia e Classificação do Solo, atuando principalmente nos seguintes temas: Uso, manejo e classificação do solo. Desde setembro de 2010 é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense - Campus Rio do Sul, tendo atuado como Coordenador do Curso Técnico agrícola com habilitação em Agropecuária em 2012 e, como Diretor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFC no ano de 2015.

SILVANDA DE MELO SILVA

Possui graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal de Pernambuco (1985), mestrado em Ciências dos Alimentos pela Universidade Federal de Lavras (1992) e doutorado em Horticultura - Michigan State University (1998). Atualmente é professor Titular da Universidade Federal da Paraíba. Tem experiência nas áreas de Agronomia e Ciência e Tecnologia de Alimentos, com ênfase em Bioquímica Fisiologia e Tecnologia Pós Colheita, atuando principalmente nos seguintes temas: qualidade de frutos, biologia e tecnologia pós-colheita, fisiologia da maturação, conservação pós-colheita e armazenamento refrigerado.

SILVIA MYRELLY TAVARES DA SILVA

Mestranda em Ciência e Tecnologia de Alimentos - UFT- Palmas - To (2018). Especialista em Gestão em Unidades de Alimentação e Nutrição - IBPEX. Graduada em Nutrição pelo Instituto de Ensino Superior do Sul do Maranhão - IESMA/ UNISULMA (2012). Atualmente é professora substituta no curso de Nutrição - UFT - Palmas - To (2019). Atuou como docente do curso de Nutrição (2016-2018), onde ministrou as disciplinas de Técnica Dietética I e II, Custo e Planejamento de Cardápio, Nutrição em Saúde Coletiva e a disciplina Prática Aplicada à Nutrição I, atuou como Supervisora de estágios em Nutrição Social 1 e 2 e Supervisora de estágio em Administração e Planejamento de Unidade de Alimentação e Nutrição.

SUELEN SIQUEIRA DOS SANTOS

Doutoranda em Ciência de Alimentos pela Universidade Estadual de Maringá. Mestra em Ciência de Alimentos pela Universidade Estadual de Maringá (UEM). Bacharela em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). Foi bolsista do Centro de Piscicultura Experimental, Treinamento e Difusão Tecnológica da Grande Dourados (CEPEXP) e do Programa de Educação Tutorial (PET) Engenharia de Alimentos, tem experiência na área de ciência e tecnologia de alimentos, com ênfase em alimentos funcionais e antioxidantes.

THIAGO DE LISBOA PARENTE

Professor contratado pela Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) desde 2017, atuando na área de Ciências do solo. Doutorado em Agronomia (área de concentração: Sistemas de Produção) pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - UNESP (2019), campus de Ilha Solteira - SP. Atuando nas áreas de nutrição e adubação das culturas de milho e soja e plantas de cobertura no Sistema Plantio Direto. Mestrado em Agronomia (área de concentração: Sistemas de Produção), pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - UNESP (2014), campus de Ilha Solteira - SP. Com ênfase na área de fitotecnia: adubação e manejo do Nitrogênio na cultura da Soja. Engenheiro Agrônomo pela Universidade do Estado de Mato Grosso UNEMAT (2010), campus de Alta Floresta - MT. Com ênfase na cultura da cana-de-açúcar forrageira e adubação e manejo da adubação fosfatada.

VALKIREA MATOS NASCIMENTO

Possui graduação em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal da Grande Dourados (2013), mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental pela Universidade Federal da Grande Dourados (2016). Atualmente é doutoranda em Biotecnologia e Biodiversidade (UFGD) - Rede Pro-Centro-Oeste. Atuando principalmente nos seguintes temas: cinética de crescimento e fisiologia de microrganismos, produção de biopolímeros e cromatografia líquida.

YASMIM BRAGA PACHECO

Técnica em Serviços Públicos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR), Campus Boa Vista Zona Oeste (CBVZO). Atuou como Bolsista do Programa Institucional de Iniciação Científica (PIBICT).

Agência Brasileira do ISBN
ISBN 978-85-7042-201-9