VOLUME IV

FISIOTERAPIA: PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

EDITORIA CONHECIMENTO LIVRE

Frederico Celestino Barbosa

Fisioterapia: princípios fundamentais

1ª ed.

Piracanjuba-GO
Editora Conhecimento Livre
Piracanjuba-GO

1ª ed.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Barbosa, Frederico Celestino
B238F Fisioterapia: princípios fundamentais

/ Frederico Celestino Barbosa. – Piracanjuba-GO

Editora Conhecimento Livre, 2021

87 f.: il

DOI: 10.37423/2021.edcl312

ISBN: 978-65-89955-56-6

Modo de acesso: World Wide Web

Incluir Bibliografia

1. reabilitação 2. tratamento 3. prevenção 4. diagnóstico I. Barbosa, Frederico Celestino II. Título

CDU: 613

<https://doi.org/10.37423/2021.edcl312>

O conteúdo dos artigos e sua correção ortográfica são de responsabilidade exclusiva dos seus respectivos autores.

EDITORA CONHECIMENTO LIVRE

Corpo Editorial

Dr. João Luís Ribeiro Ulhôa

Dra. Eyde Cristianne Saraiva-Bonatto

Dr. Anderson Reis de Sousa

MSc. Frederico Celestino Barbosa

MSc. Carlos Eduardo de Oliveira Gontijo

MSc. Plínio Ferreira Pires

Editora Conhecimento Livre

Piracanjuba-GO

2021

CAPÍTULO 1	5
VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO-INVASIVA NA ASMA INFANTIL	
Jimena Gonçalves Ferreira	
Isabelle Caroline Verissimo de Farias	
Leyla Brilhante de Oliveira	
DOI 10.37423/210804618	
 CAPÍTULO 2	 16
EFEITOS DO MÉTODO ISOSTRETCHING NAS ALTERAÇÕES MUSCULOESQUELÉTICAS EM IDOSOS	
Tatiane Araújo dos Santos	
Jardeson Rocha Filgueiras	
Patrícia Regina Gomes de Sousa	
Ludmilla Karen Brandão Lima de Matos	
DOI 10.37423/210804619	
 CAPÍTULO 3	 29
A ATUAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA NA SÍNDROME DO IMOBILISMO: UMA REVISÃO DAS PRINCIPAIS INTERVENÇÕES E EFEITOS.	
Yuri Sena Melo	
Erica Daniele de Amorim Cunha	
Rodrigo da Silva Marques	
Wendy Brasil Fernandes	
Lorena Walesca da Costa Almeida	
Ivannicy Santos de Queiroz	
Natália Dias Cancio	
Patrick da Costa Santos	
Douglas do Nascimento Mendes	
Gean Carlos Colares da Fonseca	
DOI 10.37423/210804656	
 CAPÍTULO 4	 41
INTERVENÇÕES FISIOTERAPÊUTICA NO PÓS-OPERATÓRIO DE ARTROPLASTIA DE QUADRIL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA	
Maria Jessica Alexandre da Silva Veras	
Ester Nogueira da Silva	
Renata Soraya Coutinho da Costa	
DOI 10.37423/210804662	

CAPÍTULO 5 60

TERAPIA MANUAL E EDUCAÇÃO EM NEUROCIÊNCIA DA DOR NO MANEJO DE PACIENTES
COM DOR LOMBAR CRÔNICA E CINESIOFÓBICOS.

DRIELLY ANDRADE DA CUNHA

Renata Soraya Coutinho da Costa

Luana Maria Barros de Carvalho

Emilly Virginia Natanny Ribeiro Pedrosa

Evelyn Cristina Xavier da Silva

DOI 10.37423/210804664

CAPÍTULO 6 78

RECURSOS ELETROTERRAPÊUTICOS NO TRATAMENTO DE HIPERIDROSE PRIMÁRIA: UMA
REVISÃO DE LITERATURA

Roberto Oliveira de Moura Junior

Ivone de Oliveira Mendes

Nely Dulce Varela

DOI 10.37423/210804665

Capítulo 1

10.37423/210804618

VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO-INVASIVA NA ASMA INFANTIL

Jimena Gonçalves Ferreira

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

Isabelle Carolline Verissimo de Farias

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

Leyla Brilhante de Oliveira

Faculdade Internacional da Paraíba

Resumo: Objetivo: Promover uma Revisão Bibliográfica sobre artigos publicados com tema da ventilação mecânica não-invasiva no tratamento da crise de asma aguda em crianças. **Métodos:** Revisão Bibliográfica de artigos originais sobre asma e ventilação mecânica não invasiva em crianças, publicados entre 2010 a 2017, nas bases de dados eletrônicas Pubmed, Medline, Lilacs, Scielo e buscadores on line, encontrados por meio de busca pelas palavras-chaves “BIPAP”, “CPAP” “Ventilação não-invasiva”, “Asma”, “Infância”. **Resultados:** A maior indicação da ventilação mecânica não-invasiva é na insuficiência respiratória hipercápnica, estando contra-indicada na instabilidade hemodinâmica. Tem como vantagens: facilidade de instalação, não-invasividade, diminuição do desconforto, redução da incidência das complicações associadas ao uso do tubo endotraqueal e menor custo. Desvantagens: distensão gástrica, hipoxemia transitória, necrose de pele facial. Sua instalação requer uma interface (máscara) e um respirador. São revistos os tipos de ventiladores e modos ventilatórios, e orienta-se sua instalação, monitorização e parâmetros iniciais. A retirada da ventilação mecânica não-invasiva é mais simples, mas pacientes crônicos podem necessitar assistência domiciliar. **Conclusão:** A insuficiência respiratória aguda na infância deve ser precocemente diagnosticada e o rápido restabelecimento de oxigenação e ventilação adequada é essencial para uma boa evolução. Dessa forma, a utilização da Ventilação não-invasiva, como intervenção eficaz e de simples execução, torna-se uma ferramenta importante para o tratamento desses pacientes.

Palavras-Chave: Ventilação não-invasiva; VNI; Asma; Infância; Pediatria.

INTRODUÇÃO

A angústia respiratória é considerada um estado de compensação no qual o paciente mantém as trocas gasosas adequadas a partir do aumento do trabalho e da frequência respiratória. Quando a criança entra em exaustão ou apresenta piora da função respiratória que não pode ser compensada, instala-se a insuficiência respiratória. Na situação de deterioração, seja pela historia natural da doença ou pelo atraso ou ausência de tratamento, o paciente entra no estágio de falência cardiopulmonar que antecede a parada cardiorrespiratória. A falência cardiopulmonar pode ser conceituada como insuficiência respiratória associada a choque, que requer intervenção imediata para evitar parada cardiorrespiratória (FONSECA *et al*, 2013).

A asma é uma doença inflamatória crônica, predominantemente eosinofílica, caracterizada por distúrbio ventilatório obstrutivo de graus variados, sendo uma das principais causas de visita às salas de emergência pediátrica nas unidades hospitalares. Manifesta-se clinicamente por episódios recorrentes de sibilância, dispnéia, sensação de aperto no peito e tosse, particularmente à noite e ao despertar. Hoje, sabe-se que existem diversas apresentações clínicas, que se diferem de acordo com o fenótipo do paciente. É um resultado da interação entre genética, exposição ambiental precoce à aeroalérgenos e outros fatores que causam o desenvolvimento e a manutenção dos sintomas (MARTIRE, 2012).

A exacerbação da asma é um episódio agudo ou subagudo de progressiva dificuldade respiratória com tosse, sibilância e dor ou desconforto torácico ou combinação de todos esses sintomas, acompanhada por diminuição ao fluxo expiratório, que pode ser quantificado por medidas de função pulmonar e ou de O₂ (MARTIRE, 2012).

Apesar dos casos de asma grave serem apenas 5 a 10% do total de pacientes com asma, apresentam maior morbimortalidade relativa e são responsáveis por um consumo desproporcionalmente alto dos recursos de saúde em relação aos grupos de menor gravidade. Pacientes com asma grave não controlada procuram 15 vezes mais as unidades de emergência médica e são hospitalizados 20 vezes mais do que asmáticos moderados (MARTIRE, 2012).

Existem evidências de alta qualidade na literatura para apoiar a utilização da VNI para o tratamento da Insuficiência Respiratória Aguda em adultos, devido a diferentes causas, como exacerbação de doença pulmonar obstrutiva crônica e edema agudo pulmonar cardiogênico. Porém, há poucos relatos sobre seu uso em crianças. Até o momento, séries de casos constituem a grande maioria do

conhecimento disponível nessa faixa etária, com estudos evidenciando efetividade da VNI em pacientes com pneumonia, edema pulmonar, fibrose cística, bronquiolite, crise de asma aguda e síndrome torácica aguda (FONSECA *et al*, 2013).

Esse estudo busca mostrar, através da revisão de artigos, a fisiopatologia da asma e os efeitos da ventilação não-invasiva no paciente infantil com esta patologia, procurando ampliar a visão do tratamento fisioterapêutico para os pacientes acometidos por tal injúria, tendo em vista que é muito importante o conhecimento desse assunto para que o fisioterapeuta planeje um tratamento mais voltado para a realidade atual do paciente.

MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo constituiu de uma revisão de literatura e a análise dos dados através da busca nas seguintes bases: Pubmed, Medline, Lilacs, Scielo e buscadores on line, por meio de busca pelas palavras-chaves “BIPAP”, “CPAP” “Ventilação não-invasiva”, “Asma”, “Infância”, entre o período de 2010 a 2017. Foram selecionados para o estudo 7 trabalhos que atendiam aos critérios de inclusão para esta revisão: artigos que citavam a patologia da asma, ventilação não-invasiva e que relacionavam os efeitos da VNI na asma. E foram excluídos os artigos que não respondiam aos objetivos esperados.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

A asma é uma resposta inflamatória evidenciada pela presença de citocinas que medeiam a inflamação. Algumas citocinas iniciam a resposta inflamatória por meio da ativação de fatores de transcrição, que atuam sobre os genes que codificam citocinas inflamatórias, quimiocinas, moléculas de adesão e outras proteínas que induzem e perpetuam a inflamação. A presença de anticorpos IgE em alguns casos está ligada à gravidade da asma. A liberação de citocinas depende da ligação de IgE ao alérgeno. Os anticorpos IgE são sintetizados e liberados pelas células B, que logo circulam no sangue e se ligam a receptores de alta e de baixa afinidade de IgE (MARTIRE, 2012).

Para Araújo (2013), as alterações anatomopatológicas da asma incluem a presença de células inflamatórias nas vias aéreas, exsudação de plasma, edema, hipertrofia da musculatura lisa peribrônquica, tampões mucosos e desnudamento do epitélio brônquico. A principal característica fisiopatogênica da doença é a inflamação brônquica, resultante das interações entre células inflamatórias, mediadores e células estruturais das vias aéreas. Ela está presente em todos os pacientes asmáticos, inclusive naqueles com asma de início recente, nas formas leves da doença e mesmo entre os assintomáticos.

Os processos fisiopatológicos que alteram a função pulmonar na asma grave com risco de vida são: contração da musculatura lisa brônquica, edema, inflamação da mucosa brônquica e obstrução de vias respiratórias. A obstrução do fluxo de ar causa alteração da ventilação/ perfusão e hipoxemia. A obstrução expiratória diminui o VEF1. A principal característica da asma é a diminuição da relação volume expiratório forçado/capacidade vital forçada (VEF1/CVF). Na crise aguda de asma, o paciente é incapaz de completar a expiração devido à resistência expiratória. A taquipnéia induzida por limitado tempo expiratório ocasiona aprisionamento de ar, aumento da capacidade residual funcional e diminuição da CVF (MARTIRE, 2012). Ocorrendo assim a hiperinsuflação que aumenta o trabalho respiratório. Edema e secreções das vias respiratórias também aumentam e comprometem o fluxo inspiratório, quando combinados com a hiperinsuflação pulmonar (MARTIRE, 2012; CESAR, 2014; ARAÚJO, 2016).

Durante uma crise grave de asma, as pressões transpulmonares inspiratórias ultrapassam 50 cmH₂O (normal: aproximadamente 5 cmH₂O). O aumento do trabalho muscular é acompanhado pelo aumento do fluxo sanguíneo para o diafragma, mas mesmo aumentado o fluxo costuma ser insuficiente para suprir as demandas metabólicas. Se a obstrução de vias aéreas não é prontamente corrigida e o trabalho respiratório (WOB) reduzido pode ocorrer fadiga da musculatura respiratória, ventilação inadequada e falência respiratória (CESAR, 2014).

Os fatores desencadeantes são múltiplos. Em crianças, as infecções virais em menores de 2 anos e os aeroalérgenos nos maiores de 2 anos são os principais estímulos causadores de hiperreatividade brônquica. Entretanto, diversos estímulos são desencadeantes de asma atópica e não atópica: Alérgenos inalatórios; Infecção viral das vias respiratórias superiores (VRS) ou infecção de vias respiratórias inferiores (VRI) no período de lactância e no pré-escolar; Mudanças climáticas; Exercício físico; Medicamentos; Muito raramente: infecções respiratórias bacterianas, DRGE, alimento, menstruação e gestação (MARTIRE, 2012).

A gravidade da asma, por sua vez, pode ser estratificada de acordo com a idade da criança:

Crianças de 0 a 4 anos: Identifica-se a gravidade por sinais e sintomas (uso de musculatura acessória, sibilos inspiratórios e expiratórios, respiração paradoxal, cianose, taquidispneia, tosse, letargia ou agitação psicomotora, pouca tolerância ao exercício, atividades diárias prejudicadas) e pelo escore pediátrico de gravidade da asma, além da necessidade do uso de β 2 agonista, de corticoide sistêmico ou aumento do esteroide inalatório. Entre as medidas objetivas, a de maior relevância é a saturação do O₂: que se for < 91% significa dificuldade respiratória grave (MARTIRE, 2012).

Crianças entre 5 a 11 anos: Todos os sinais e sintomas da criança de 0 a 4 anos, incluindo uma mensuração da função pulmonar - seja por meio do VEF1 (volume expiratório forçado no 1º segundo) ou do PFE (pico de fluxo expiratório) (MARTIRE, 2012).

Por outro lado, o National Institute of Health (NIH) define a exacerbação ou crise aguda de asma de acordo com 3 componentes, todos relacionados a tratamento: (i) uso de esteroide sistêmico, (ii) ida à emergência ou hospitalização e (iii) uso frequente de β_2 de curta duração (MARTIRE, 2012).

Qualquer que seja a definição, a gravidade inicial na apresentação clínica ou laboratorial e a resposta ao tratamento definirá qual a melhor abordagem para o manejo do paciente pediátrico ou do adolescente com crise aguda de asma (MARTIRE, 2012).

Os sinais de esforço respiratório representam a tentativa do paciente de compensar a piora da troca gasosa, por meio do aumento do trabalho respiratório. A observação de elevado número ou de determinados sinais de esforço respiratório está geralmente associada à maior gravidade do comprometimento respiratório (FONSECA *et al*, 2013).

O médico deve ficar atento para alguns sinais que são indicativos de insuficiência respiratória grave com progressão para insuficiência cardiopulmonar, nas quais a intervenção imediata é necessária para evitar a parada cardiorrespiratória: cianose, $\text{Sat.O}_2 < 90\%$ com O_2 suplementar em altas concentrações, número elevado de sinais de esforço respiratório, bradipneia, apneia, movimentação de ar distal fraca ou ausente, rebaixamento de nível de consciência. Há ainda a situação na qual uma criança com comprometimento respiratório grave entra em exaustão, levando à diminuição dos sinais de esforço respiratório. Nesse cenário, a observação do desaparecimento do esforço ou abrandamento da frequência respiratória, associados a rebaixamento do nível de consciência, em uma criança anteriormente considerada como tendo insuficiência respiratória grave, pode ser um sinal de fadiga e de parada respiratória iminente (FONSECA *et al*, 2013).

O manejo rápido e eficiente da crise pode alterar favoravelmente o desfecho clínico do paciente, por meio da abordagem sistematizada e diferenciada nos serviços de emergência. A morbimortalidade nas UTIs se deve a anoxia na maioria das vezes. A intervenção de forma apropriada, com terapia farmacológica agressiva e ventilação mecânica, resulta em um desfecho favorável em alguns casos de exacerbação aguda de asma grave (MARTIRE, 2012).

Para Fonseca *et al* (2013), a intervenção dependerá da classificação do paciente quanto ao grau de comprometimento respiratório e ao tipo de problema respiratório. O manejo do comprometimento

respiratório tem como objetivo: a) garantir a patência e a sustentabilidade da via aérea superior; e b) dar suporte para oxigenação e ventilação adequadas. A terapêutica necessária para esses objetivos dependerá do grau do comprometimento; e a quantidade e complexidade das medidas aumentam com a piora da condição clínica do paciente.

Reconhece-se, portanto, a importância de se fazer o diagnóstico precoce, classificar o paciente de acordo com a gravidade e evitar as exacerbações na faixa etária pediátrica e de adolescente. Tais medidas permitirão mudar o retrato das emergências no Brasil, visando à diminuição da morbimortalidade dessa doença crônica, permitindo seu controle e, quando possível, impedindo sua evolução para distúrbios ventilatórios obstrutivos de diferentes níveis de gravidade (MARTIRE, 2012; ARAÚJO, 2016).

Dessa forma, Pediatras devem educar os pais no reconhecimento precoce e no tratamento das exacerbações das crises agudas de asma, o qual deve ser iniciado em casa e imediatamente procurar o serviço de emergência. Dentre os meios de tratamento para esta doença estão a: Oxigenoterapia; uso de $\beta 2$ agonistas inalatórios de curta duração; Glicocorticoides orais; Medicações de segunda linha Anticolinérgicos inalatórios; Sulfato de magnésio; Teofilina; Antibióticos e a Ventilação Mecânica invasiva e não-invasiva (MARTIRE, 2012).

A ventilação não invasiva (VNI) refere-se ao fornecimento de suporte respiratório mecânico sem o uso de intubação endotraqueal, sendo o *continuous positive airway pressure* (CPAP) e o *bilevel positive airway-pressure* (BiPAP) os principais modos utilizados. Pode ser indicada nas situações em que a Insuficiência Respiratória Aguda (IRA) é reversível em um período de tempo relativamente curto. Nesse cenário, o objetivo é maximizar a função pulmonar até reverter a causa precipitante. Esse suporte ventilatório tem a meta de "ganhar tempo", ao reduzir a carga sobre os músculos respiratórios pelo aumento da ventilação, poupando, com isso, o esforço respiratório do paciente e melhorando a troca gasosa antes que ocorra exaustão (FONSECA *et al*, 2013).

Se o paciente precisa de pressão positiva apenas para recrutar áreas pulmonares em atelectasia e para manter volumes, está indicado CPAP nãoinvasivo por meio de uma interface adequada. Se o paciente demanda assistência ventilatória, está indicada a modalidade de VNI Bi-PAP (CESAR, 2014).

O uso da VNI, bem como suas diversas modalidades, difundiu-se de forma complementar as técnicas convencionais durante a fisioterapia respiratória, otimizando a reexpansão pulmonar, auxiliando na remoção de secreção e diminuindo o trabalho respiratório durante o treinamento da musculatura

respiratória. Além de aumentar a tolerância do paciente ao tratamento durante a fisioterapia, reduzindo a sensação de dispnéia, e aumentando sua adesão (FILHO, 2016).

A utilização da ventilação não-invasiva com aplicação de máscara facial é uma opção terapêutica para suporte ventilatório de curto prazo na criança com falência ventilatória hipercapnica, mas ainda em condições de manutenção da via permeável. A ventilação não-invasiva com pressão positiva é uma opção atrativa para o tratamento da asma refratária. Na asma aguda grave a utilização de pressão positiva contínua em vias aéreas através de máscara diminui o trabalho respiratório, causa broncodilatação, diminui a resistência de vias aéreas, reexpande áreas de atelectasia, promove a remoção de secreção, permite um repouso dos músculos inspiratórios e do diafragma e diminui os efeitos hemodinâmicos adversos de uma pressão pleural inspiratória muito negativa (MARTIRE, 2012; ARAÚJO, 2016). Além de funcionar como um gerador de fluxo variado que permite controle independente da pressão inspiratória e da pressão expiratória positiva em vias aéreas, a VNI tem a vantagem de ser associado à broncodilatadores por via nebulizada através do circuito inspiratório do aparelho (ARAÚJO, 2016).

Para efetivar a oferta de oxigênio aos pulmões, o aparelho deve conseguir que um fluxo de ar vença a resistência das vias aéreas e a resistência à distensão dos pulmões. Um dos modos de garantir que o ar se movimente em direção aos pulmões é por meio da criação de um gradiente de pressão entre as vias aéreas inferiores e o aparelho por meio da aplicação de pressão positiva sobre as vias aéreas proximais, conectadas ao aparelho por meio de cânula traqueal ou dispositivos de ventilação não-invasiva (VNI) como máscaras. Alguns aparelhos antigos aplicavam pressão negativa externamente à parede torácica, que se expandia e levava ao enchimento pulmonar, mas as limitações de sua aplicabilidade levaram ao progressivo abandono de seu uso. De qualquer modo, em ambos os casos a pressão transpulmonar é aumentada causando fluxo de ar para dentro dos pulmões (CESAR, 2014).

Disponível para suporte ventilatório nas faixas etárias pediátricas, possui limitações técnicas que podem inviabilizar seu uso. Máscara e prong nasal devem se ajustar adequadamente ao paciente, sem escape. As variações nas dimensões anatômicas e a pobre tolerância aos dispositivos limita seu uso em crianças, a despeito da grande variedade de dispositivos disponíveis (CESAR, 2014).

No estudo de Araújo (2016) o uso da ventilação não invasiva como tratamento da asma tem efeito benéfico, pois reduz os sintomas da patologia. O estudo mostrou principalmente efeitos positivos quando a VNI foi utilizada nos casos de exacerbação da doença, reduzindo a sensação de dispneia, evitando a intubação orotraqueal (IOT) e consequente diminuição da taxa de mortalidade.

As indicações para o uso de VNI podem ser categorizadas em "short-term" e "long-term". A VNI short-term é indicada quando o suporte com pressão positiva é necessário agudamente em pacientes hospitalizados durante cuidados emergenciais ou intensivos para condições reversíveis dentro de poucos dias. A VNI long-term está indicada em casos com tendência a progredir ou cronificar. Asma aguda está entre as indicações de VNI por curto prazo (CESAR, 2014).

Devido à capacidade de respirar espontaneamente a cada fase, A VNI é uma modalidade que permite melhor adaptação do paciente, e assim, menor sedação, podendo ser vantajosa em crianças. Ao prolongar os períodos baixa pressão, BIPAP pode ser usado durante todo o período de ventilação artificial, incluindo o processo de desmame, mas o trabalho respiratório pode ser um problema em crianças (CESAR, 2014).

Alguns estudos demonstraram que pacientes que receberam VNI por 3 horas consecutivas apresentaram melhora rápida dos sintomas e diminuição da necessidade de internação em relação ao grupo controle. Concluindo que o uso da VNI para o tratamento da exacerbação grave da asma teve respostas positivas (SILVA E BARRETO, 2015).

CONCLUSÃO

A insuficiência respiratória aguda, não reconhecida, é a principal causa de parada cardíaca na população pediátrica. Com isso, o reconhecimento precoce e o tratamento adequado dessa condição devem ser encarados como habilidades essenciais para todos os médicos que lidam com essa faixa etária (FONSECA *et al*, 2013).

A Oxigenoterapia é a primeira medida a ser tomada diante de um paciente com asma aguda na sala de emergência. O inalador dosimetrado acoplado ao espaçador é o dispositivo de escolha para se administrar medicação na sala de emergência. A medicação de resgate e o esteroide, oral ou parenteral, resolvem a maioria de casos de asma aguda. FC, FR, Sat O₂ e a classificação de gravidade determinam o tratamento e o acompanhamento. Diante de piora clínica, da Sat O₂ < 91%, FC, FR e dos parâmetros funcionais deve-se considerar hospitalização. Se não houver melhora em 4 h de tratamento na sala de emergência, avaliar inclusive se há indicação de terapia intensiva (MARTIRE, 2012).

Para Taquary *et al* (2013), a insuficiência respiratória aguda na infância deve ser precocemente diagnosticada e o rápido restabelecimento de oxigenação e ventilação adequada é essencial para uma boa evolução.

Dessa forma, a utilização da Ventilação não-invasiva, como intervenção eficaz e de simples execução, torna-se uma ferramenta importante para o tratamento desses pacientes.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, APS. Efeitos da ventilação não invasiva na crise asmática. 2016. Disponível em: <https://monografias.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/2194/1/TCC%20P%C3%93S%20GRADUA%C3%87%C3%83O.pdf>. Acesso em: 24/10/2017.

CESAR, RG. O Uso da Pressão Positiva em Crianças Asmáticas. Blucher Medical Proceedings Novembro de 2014, Número 4, Volume 1. Disponível em: <http://pdf.blucher.com.br.s3-sa-east-1.amazonaws.com/medicalproceedings/2cise/011.pdf>. Acesso em: 28/10/2017.

FILHO, PDT. Asma Brônquica. 2017. Disponível em:

www.asma-bronquica.com.br/medical/fisiopatologia.html. Acesso em: 28/10/2017.

FONSECA, JG; OLIVEIRA, ALMS; FERREIRA, AS. Avaliação e manejo inicial da insuficiência respiratória aguda na criança. Revista Médica de Minas Gerais. 2013. Vol:23.2. Disponível em: <http://rmmg.org/artigo/detalhes/38>. Acesso em: 23/10/2017.

MARTIRE, TM. Asma aguda na Infância. Revista de Pediatria SOPERJ. 2012;13(2):43-53. Disponível em: http://revistadepediatriasoperj.org.br/detalhe_artigo.asp?id=618. Acesso em: 20/10/2017.

SILVA, PS; BARRETO, SSM. Ventilação mecânica não invasiva na crise de asma aguda grave em crianças: níveis de evidências. Rev. Bras. Ter. Intensiva. 27(4): 390-396, 2015. Acesso em: 28/10/2017.

TAQUARY, SAS; ATAIDE, DS; VITORINO, PVO. TAQUARY, Perfil clínico e atuação fisioterapêutica em pacientes atendidos na emergência pediátrica de um hospital público de Goiás, Brasil. Fisioter. Pesqui., São Paulo , v. 20, n. 3, p. 262-267, Sept. 2013. Disponível em:

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-29502013000300011&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 28/10/2017.

Capítulo 2

10.37423/210804619

EFEITOS DO MÉTODO ISOSTRETCHING NAS ALTERAÇÕES MUSCULOESQUELÉTICAS EM IDOSOS

Tatiane Araújo dos Santos

Universidade Federal Delta do Parnaíba

Jardeson Rocha Filgueiras

Universidade Federal Delta do Parnaíba

Patrícia Regina Gomes de Sousa

Centro Universitário Unifacid

Ludmilla Karen Brandão Lima de Matos

Universidade Federal do Delta do Parnaíba

Resumo: INTRODUÇÃO: O envelhecimento é caracterizado por alterações fisiológicas como redução da força, flexibilidade, agilidade, postura e equilíbrio, dificultando as atividades da vida diária. Diante disso, a Fisioterapia apresenta como proposta de intervenção o método Isostretching, que visa um bom funcionamento corporal a partir do recrutamento muscular e articular, correção postural, trabalho de flexibilidade e equilíbrio, por meio da execução de posturas simétricas e assimétricas.

OBJETIVO: O objetivo geral deste estudo consistiu em analisar as repercussões do método Isostretching em alterações musculoesqueléticas em idosos. Os objetivos específicos consistiram em: mensurar a flexibilidade, verificar a mobilidade da coluna vertebral, mensurar o equilíbrio dos idosos por meio das oscilações corporais nos eixos Ântero-Posterior (AP) e Latero-lateral (LL), e analisar o posicionamento da cabeça em relação ao tronco no plano sagital.

MÉTODOS: Trata-se de um estudo transversal e de abordagem quantitativa. A amostra foi composta por 10 idosos, avaliados antes e após a intervenção. Na coleta de dados foram utilizados o teste 3º dedo-solo, teste Stibor, um baropodômetro S-Plate da marca Medicapteurs® e o programa posturograma 3.0. Foram realizados 16 atendimentos, duas vezes por semana, com duração de 40 minutos. As análises estatísticas foram feitas por meio do programa GraphPadPrism 5.0 e o nível de significância adotado foi de $p < 0,05$.

RESULTADOS: Os resultados indicaram melhora da flexibilidade com nível de significância de $p < 0,0001$. Verificou-se melhora da mobilidade da coluna vertebral com $p = 0,0480$. O estudo apresentou diferença significativa do posicionamento da cabeça em relação ao tronco no plano sagital, com redução de $1,64 \pm 0,9997$ para $1,13 \pm 1,0995$, e $p = 0,0095$. A oscilação corporal no eixo Ântero-Posterior com os participantes de olhos fechados apresentou diminuição de $2,3 \pm 0,776$ para $1,72 \pm 0,5266$, com $p = 0,0016$.

CONCLUSÃO: O método Isostretching diminuiu alterações musculoesqueléticas presentes em idosos participantes do estudo. Foi constatada a melhora significativa da flexibilidade, mobilidade da coluna vertebral, redução significativa da anteriorização da cabeça e das oscilações corporais no eixo Ântero-Posterior. Tais resultados ajudam a entender a importância da realização do Isostretching nos idosos, pois pode reduzir alterações musculoesqueléticas que poderão influenciar na capacidade funcional.

Palavras-chave: Equilíbrio Postural, Idoso, Postura, Exercício.

INTRODUÇÃO

O processo de envelhecimento acarreta diversas alterações nos sistemas corporais, dentre eles o sistema neuromuscular e osteoarticular, que podem ocasionar a diminuição dos diferentes componentes da capacidade funcional, em especial, a flexibilidade e o equilíbrio. Estes elementos por sua vez, possuem importantes relações com a efetivação de atividades de vida diária (AVD) e por consequência, com a manutenção da autonomia funcional e qualidade de vida do idoso (ARANTES, 2020; DANIEL; VALE; NODARI; GIANI *et al.*, 2015).

A flexibilidade é dependente da condição das estruturas que envolvem as articulações. Porém, com o avançar da idade, ocorre uma redução da elasticidade de tendões, ligamentos e cápsulas articulares e consequentemente uma diminuição significativa da flexibilidade. Sua diminuição é um fator limitante ao bom desempenho motor, restringindo a possibilidade de movimentar-se (andar, calçar sapatos, subir escadas, colocar e retirar objetos de prateleiras, vestir um casaco), além de provocar alterações na postura e no equilíbrio, sendo um facilitador de lesões musculoesqueléticas (CUBAS; RIBAS, 2017; SOUZA; RAMOS; GOMES, 2018).

Observa-se em indivíduos idosos padrões posturais inadequados, como a cabeça e o ombro projetados para frente, que consequentemente levam a uma restrição da movimentação da coluna cervical e aumentam o risco de queda. Além disso, a coluna vertebral torácica se curva para uma postura mais cifótica e há ainda uma perda da lordose lombar fisiológica. Dessa forma, alterações na postura fazem com que ocorram mudanças na estrutura corporal e afetam o equilíbrio, limitando o indivíduo a realização de algumas atividades da vida diária (OLIVEIRA; BERTOLINI; MADEIRAS; BIANCHI *et al.*, 2015).

A manutenção do equilíbrio para o controle da postura resulta da integração de vários tipos de informação sensorial (visual, vestibular e somatossensorial), propriedades ativas e passivas do sistema musculoesquelético e de parte do sistema nervoso. Assim, a deterioração ocorrida nos diversos sistemas durante o envelhecimento pode influenciar o controle postural (DANIEL; VALE; NODARI; GIANI *et al.*, 2015; KAFRI; HUTZLER; KORSENSKY; LAUFER, 2019). Logo, as recorrentes queixas de tontura e desequilíbrio dos idosos, decorrentes de alterações na coordenação e no controle do equilíbrio corporal estático e dinâmico, levam à perda da estabilidade postural, colocando-os em um risco significativamente maior de quedas (ARAÚJO; BLASCZYK; FENG; OLIVEIRA *et al.*, 2018).

Diante disso, a fisioterapia apresenta como proposta de intervenção diversos métodos visando uma melhoria da qualidade de vida dos idosos. Dentre eles, destaca-se o método Isostretching, desenvolvido na década de 1970 por Bernardo Redondo, um fisioterapeuta francês. Esta intervenção consiste em exercício postural, pois os exercícios são realizados na posição correta, respeitando as curvaturas fisiológicas e exercício global, pois todo o corpo é trabalhado com contrações e alongamentos, incluídos em cada postura. Os exercícios envolvem a respiração, percepção corporal e posicionamento correto da coluna vertebral. Assim, é utilizada para o aumento da flexibilidade, correção postural, percepção corporal, equilíbrio e qualidade de vida em idoso.

O objetivo geral da pesquisa foi analisar as repercussões do Método Isostretching em alterações musculoesqueléticas em idosos. Os objetivos específicos foram: mensurar a flexibilidade, verificar a mobilidade da coluna vertebral, mensurar o equilíbrio dos idosos por meio das oscilações corporais nos eixos Ântero-Posterior (AP) e Latero-lateral (LL), e analisar o posicionamento da cabeça em relação ao tronco no plano sagital.

MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo foi elaborado com base na resolução 466/2012 que regulamenta a realização de pesquisas envolvendo seres humanos e teve início após submissão e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa de uma instituição privada de ensino superior (protocolo nº 25962113.0.0000.5211). Os dados foram coletados mediante a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido pelos sujeitos da pesquisa.

O mesmo foi delineado como transversal com abordagem quantitativa. O campo de coleta de dados foi uma clínica escola de uma instituição particular de ensino superior escolhida intencionalmente. A amostra foi composta por 10 sujeitos participantes.

Os critérios de inclusão foram sujeitos que se encontrassem na faixa etária de 60 a 80 anos, com cognitivo preservado, que tivessem o Índice de Massa Corpórea (IMC) classificado como normal (ORGANIZATION, 2000), que não estivessem praticando exercício físico e que não estivessem fazendo uso de dispositivos auxiliares para marcha. Os critérios de exclusão foram sujeitos que relatassem episódios de tontura, arritmia, angina, taquicardia, vestibulopatias, dor aguda, histórico de fraturas não consolidadas e/ou que foram submetidos a procedimentos cirúrgicos que contraindicassem a realização da intervenção com o método Isostretching.

Os participantes selecionados foram avaliados antes de iniciar o tratamento. Foi preenchida em uma ficha de avaliação os campos de identificação e dados pessoais relacionados a idade, peso, altura e IMC. Peso, altura e IMC foram calculados pelos pesquisadores mediante a pesagem e medição em uma balança antropométrica. Após a coleta destes dados, os participantes foram submetidos aos testes 3º dedo-solo e teste de Stibor, para verificação da flexibilidade e mobilidade da coluna vertebral, respectivamente. A seguir, realizaram uma avaliação postural para verificar o posicionamento da cabeça por meio de uma foto tirada no plano sagital, analisada posteriormente, no programa Posturograma 3.0. Por fim, foram submetidos também a Estabilometria para mensuração das oscilações corporais nos eixos Ântero-Posterior e Látero-Lateral com os participantes de olhos abertos e de olhos fechados.

Foi realizada uma intervenção fisioterapêutica com o Método Isostretching, totalizando 2 meses de atendimento, distribuídos em 16 atendimentos com frequência de duas vezes por semana em dias alternados com duração de 40 minutos cada.

Todos os participantes realizaram as mesmas posturas. Em cada atendimento foram trabalhadas 6 posturas do método: duas posturas em pé, duas posturas sentadas e duas posturas deitadas.

Na primeira e segunda semana do programa, foram realizadas posturas simétricas e assimétricas em 3 e 2 repetições, respectivamente. Na terceira semana o número de repetições foi mantido e a progressão dos exercícios foi realizada quanto ao nível de dificuldade por meio da utilização de um bastão como recurso. Na quarta semana as posturas foram mantidas e a progressão foi realizada quanto ao número de repetições aumentados para 6 e 4 para posturas simétricas e assimétricas, respectivamente. Na quinta semana foi mantido o número de repetições e foi realizada a progressão quanto ao nível de dificuldade dos exercícios utilizando bola como recurso. Na sexta semana foram mantidos os mesmos parâmetros da quinta semana. Na sétima semana a progressão foi feita quanto ao nível de dificuldade dos exercícios utilizando-se bola e bastão como recursos e o número de repetições foi mantido. Na oitava semana as posturas foram mantidas e foi realizada uma progressão quanto ao número de repetições aumentados para 9 e 8 para posturas simétricas e assimétricas, respectivamente.

Ao término dos 16 atendimentos cada participante foi novamente submetido ao teste 3º dedo-solo, teste de Stibor, avaliação postural do posicionamento da cabeça no plano sagital e a Estabilometria a fim de se comparar os valores obtidos antes e após a intervenção.

Após coletados, os dados foram transferidos para o programa Microsoft Office Excel 2010 distribuídos em planilhas e posteriormente organizados em tabelas e gráficos. As análises estatísticas foram realizadas com o programa estatístico GraphPadPrism 5.0 e a correlação entre as variáveis foi feita pelo teste “T Student” com $p < 0,05$ e IC 95%.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os participantes da pesquisa foram idosos com faixa etária entre 60 a 80 anos. Em relação ao IMC a amostra estudada foi homogênea (Figura 1).

Figura 1: Massa corpórea dos participantes do estudo.

Após a análise comparativa da flexibilidade observou-se um aumento estatisticamente significativo da mesma (Figura 2).

Figura 2: Flexibilidade dos participantes antes e após a intervenção.

A flexibilidade pode ser aumentada por meio da aplicação de várias técnicas de alongamento. Dentre elas, o método Isostretching é uma opção para proporcionar a manutenção ou ganho do comprimento muscular de indivíduos em processo de envelhecimento (CUBAS; RIBAS, 2017), como comprovado pela análise dos resultados obtidos neste trabalho.

O Isostretching é um método fisioterapêutico que contribui para o ganho da amplitude de movimento, da força muscular e melhora da conscientização corporal. É uma ginástica postural global que trabalha o estado de contração e estiramento de seus diversos segmentos, no qual os exercícios são executados em um máximo alinhamento vertebral possível, com toda a musculatura corporal sendo recrutada (CUBAS; RIBAS, 2017; SILVA; MASSUCATO; DURANTE; SARTORI, 2015).

Em uma pesquisa realizada objetivando verificar os efeitos do Método Isostretching na postura e flexibilidade de idosas, verificou-se os ângulos da cadeia posterior em 16 participantes, no qual foi constatado durante o teste do terceiro dedo ao chão que todas possuíam encurtamento muscular e alteração nos ângulos coxofemoral e tibiotársico pré-intervenção e após a intervenção, apenas um participante permaneceu com encurtamento muscular (MENEHINI; SCHU; OLTRAMARI; GIACOMET *et al.*, 2019) . Houve uma semelhança quanto aos resultados obtidos neste estudo, pois ambos resultaram em aumento significativo da flexibilidade dos participantes após a intervenção.

Outra pesquisa analisou a flexibilidade em mulheres por meio da prática do método Isostretching, consistindo em 10 atendimentos, sendo dois por semana, com duração de aproximadamente uma hora cada. Ao término dos atendimentos, houve melhora na flexibilidade de mulheres avaliadas pelo teste Finger-floor comprovando a eficácia do método Isostretching, no qual notou-se uma redução significativa das medidas (dedo/chão), após a técnica. (SILVA; MASSUCATO; DURANTE; SARTORI, 2015)

Em relação a mobilidade da coluna, após a intervenção houve melhora significativa (Figura 3).

Figura 3: Mobilidade da coluna dos participantes antes e após a intervenção.

De acordo com os estudos clínicos, o Isostretching mostrou-se eficaz em aspectos como a melhora do alinhamento vertebral, aumento da amplitude de movimento e ganho de flexibilidade, sendo este conquistado com os alongamentos e aliado a contração isométrica que juntos contribuem para que a coluna vertebral alcance o seu máximo comprimento, favorecendo seu auto crescimento e uma melhora da sua mobilidade (SILVA; BEZERRA; GOMES; SANTOS-JÚNIOR, 2018; SOUZA; DALLA COSTA; DOS SANTOS, 2019).

O êxito sobre a mobilidade somente é possível pela manutenção da harmonia do conjunto da pelve-coluna, incrementada pelo fortalecimento dos músculos abdominais e pela tomada de consciência corporal durante a realização das posturas do método Isostretching (MACHADO, 2009). Logo, os resultados relacionados a mobilidade da coluna alcançados na presente pesquisa podem significar que o método foi executado pelos idosos participantes do estudo de forma adequada.

Em relação ao posicionamento da cabeça, antes e após a intervenção fisioterapêutica, houve redução significativa da anteriorização da cabeça, visto que houve uma adequação da mesma de $1,64 \pm 0,9997$ para $1,13 \pm 1,0995$ (Tabela 1).

Tabela 1: Posicionamento da cabeça dos participantes antes e após a intervenção.

VARIÁVEL	ANTES			DEPOIS			t
	M	DP	Máx/Min	M	DP	Máx/Min	
Anteriorização da cabeça	1,64 cm	0,9997	3,39/0,29	1,13 cm	1,0995	3,39/0,29	0,0095

Legenda: M, média; DP, desvio padrão; Máx/Min, máximo/mínimo; t, p para o teste T de Student pareado com IC 95% e significância em $p < 0,05$. Fonte: dados originais.

Em um estudo, idosos de 50 a 84 anos foram submetidos a 20 atendimentos fisioterapêuticos mediante a utilização de auto posturas do Isostretching por aproximadamente 10 segundos, sendo executadas no mínimo três vezes cada. Cada sessão teve 40 minutos de duração, executadas em dias alternados, três vezes por semana. Três idosos obtiveram melhora no plano frontal com realinhamento da cabeça, cinturas escapulares e pélvicas, e encaixe dos ombros, dois idosos no plano sagital com melhora do alinhamento da cabeça e da coluna; e no teste TFP todos demonstraram mais flexibilidade ao realizá-lo. (UCHÔA; COELHO, 2012) Outro estudo ainda, comparou os efeitos do método Isostretching na postura pré e pós intervenção e observou-se melhora postural em relação a protusão cervical (MENEHINI; SCHU; OLTRAMARI; GIACOMET *et al.*, 2019). Os resultados do presente

estudo corroboram com os supracitados, referente a melhora do posicionamento da cabeça anteriorizada.

Apesar do Isostretching ser vastamente utilizado para correção de assimetrias posturais, os estudos demonstram melhores resultados no caso de alterações no plano sagital (hipercifoses, hiperlordoses, protusão dos ombros e da cabeça), provavelmente, porque há ênfase no alongamento da cadeia muscular posterior e anterior, além de diferentes segmentos corporais trabalharem de maneira simultânea e alternada (ARTIOLI; BERTOLINI, 2014).

A análise da mensuração das oscilações corporais dos participantes antes e após a intervenção mostrou que entre a avaliação inicial e final houve significância apenas para as oscilações corporais no eixo Ântero-Posterior com os participantes estando de olhos fechados (Tabela 2).

Tabela 2: Oscilações corporais dos participantes antes e após a intervenção.

VARIÁVEL	ANTES			DEPOIS			T
	M	DP	Máx/Min	M	DP	Máx/Min	
Oscilação postural							
AO LL	1,61 mm	0,642	2,6/0,8	1,63 mm	0,5397	2,5/0,9	0,4585
AO AP	2,87 mm	2,0505	7,8/1,0	2,65 mm	1,5981	5,7/1,0	0,3136
OF LL	1,57 mm	0,7832	3,1/0,4	1,42 mm	0,5554	1,9/0,5	0,2229
OF AP	2,3 mm	0,776	3,2/0,6	1,72 mm	0,5266	2,30,5	0,0016**

Legenda: M, média; DP, desvio padrão; Máx/Min, máximo/mínimo; t, p para o teste T de Student pareado com IC95% e significância em $p < 0,05$. Fonte: dados originais.

Quanto ao equilíbrio, este é essencial para o controle da postura e resulta da integração de uma série de informações entre os sistemas vestibular, visual e somatossensorial de forma que deteriorações em qualquer um destes afeta o controle postural (DANIEL; VALE; NODARI; GIANI *et al.*, 2015).

Dentre as causas mais importantes de morbidade na população idosa, estão os desvios posturais. As mais observadas são alterações cervicais (cabeça projetada para frente), inclinação da pelve, onde esta se inclina posteriormente com mais frequência, aumento de cifose dorsal, da lordose lombar, flexão de quadril e flexão de joelho e tornozelo, sendo estas alterações diretamente relacionadas com a flexibilidade. Consequentemente, acontece uma projeção do centro de gravidade para frente que aumenta a inclinação postural e gera um quadro de instabilidade. Portanto, acredita-se que a condição postural durante o envelhecimento é um fator determinante da estabilidade postural (OLIVEIRA; BERTOLINI; MADEIRAS; BIANCHI *et al.*, 2015). A presente pesquisa relevou uma melhora significativa da oscilação corporal no eixo ântero-posterior, o que pode ter sido influenciada pela melhora do

posicionamento da cabeça. No entanto, a melhora da oscilação corporal ocorreu apenas de olhos fechados. Assim, é essencial realizar intervenções na postura do idoso que sejam capazes de proporcionar mudanças positivas no quadro de instabilidade.

Uma pesquisa obteve resultado semelhante ao desta quanto a oscilação corporal. Submeteram 15 participantes idosos de faixa etária entre 65 e 70 anos a um protocolo de intervenção psicomotora durante três meses, três vezes na semana com duração de uma hora cada atendimento e após o término dos atendimentos realizou-se o exame de Estabilometria no qual foi observado redução significativa das oscilações no eixo AP com o participante de olhos fechados (RUBIRA; DA SILVA; DE CARVALHO; SENE *et al.*, 2014). No entanto, não foi comentada uma relação entre a postura e melhora das oscilações no estudo citado e a intervenção não foi a mesma.

As informações somatossensoriais se relacionam com a posição, movimentos do corpo e as superfícies de apoio, além de enviar dados da relação dos segmentos corporais uns com os outros (RIBEIRO, 2015). O sistema visual, por sua vez, transmite noção de espaço, senso de direção e estabilização da oscilação corporal ao indivíduo, por meio de informações do posicionamento corporal em relação ao ambiente em que o corpo se encontra. O comprometimento desse sistema pode gerar disfunção no equilíbrio postural, causando redução da estabilidade, podendo gerar alterações de movimento. Um comprometimento no sistema visual, pode gerar um aumento da oscilação corporal, levando a um déficit no equilíbrio (NADAI; GONÇALVES, 2019).

Estas informações podem ser evidenciadas no presente estudo ao observar que os dados estabilométricos da avaliação inicial demonstram que os participantes já apresentaram inicialmente um valor de oscilação menor no eixo AP estando de olhos fechados em relação a análise das oscilações considerando o mesmo eixo com eles estando de olhos abertos. Além disso, poderia justificar os resultados apresentados na estabilometria, analisando as oscilações de olhos abertos e de olhos fechado do eixo AP, do presente estudo.

Vale ressaltar que os estímulos promovidos pelo método Isostretching alcançam o sistema somatossensorial, o que pode ter contribuído também para um resultado significativo na oscilação ântero- posterior de olhos fechados.

Com o envelhecimento o corpo tem maior suscetibilidade a alterações na integração entre os sistemas sensorial e motor. Este fato interfere diretamente na manutenção de uma postura estável (equilíbrio estático), ou em movimento (equilíbrio dinâmico). O comprometimento do sistema postural do indivíduo pode ocorrer devido a alteração proprioceptiva (percepção da postura e da movimentação

do corpo), vestibular (posição e movimento da cabeça, incluindo aceleração linear e angular), ou visual (relações espaciais e percepção do ambiente), o que causa distúrbios de equilíbrio e quedas, originando preocupação em cair, o que interfere negativamente na qualidade de vida dos idosos (SOARES; SOLDERA; OLCHIK; GONÇALVES *et al.*, 2021). Por isso, é importante a realização de pesquisas que analisem a influência de exercícios nas alterações de sistemas como o sensorial e o motor, que ocorrem com o processo de envelhecimento.

CONCLUSÃO

Considerando que o sistema Musculoesquelético exerce forte influência sobre a funcionalidade do indivíduo e com o avançar da idade, este sofre uma deterioração, faz-se necessário intervir visando retardar os efeitos negativos decorrentes do processo de envelhecimento e possibilitar uma melhora da qualidade de vida às pessoas da terceira idade. Diante disso, o método Isostretching apresenta-se como um recurso fisioterapêutico benéfico. No presente estudo foi constatada a melhora significativa da flexibilidade e mobilidade da coluna vertebral, redução significativa da anteriorização da cabeça e das oscilações corporais no eixo ântero-posterior permitindo, desta forma, ressaltar a importância da utilização do método ao proporcionar efeitos significativamente positivos na atenuação de efeitos deletérios do envelhecimento que acometem o sistema musculoesquelético.

REFERÊNCIAS

- ARANTES, R. D. S. OS BENEFÍCIOS DO ALONGAMENTO NA VIDA IDOSA. INSTITUTO LUTERANO DE ENSINO SUPERIOR DE ITUMBIARA, 2020.
- ARAÚJO, T. B. d.; BLASCZYK, J. C.; FENG, Y. H.; OLIVEIRA, R. J. et al. Efeito da equoterapia no equilíbrio de idosos: uma revisão sistemática com metanálise. *Revista Brasileira de Ciência e Movimento*, 2018.
- ARTIOLI, D. P.; BERTOLINI, G. R. F. Isostretching: avaliação, aplicação e resultados. *Revista Brasileira de Fisiologia do Exercício*, 13, n. 3, p. 168-175, 2014.
- CUBAS, S. R. O.; RIBAS, D. I. R. Método isostretching em ambiente aquático e a melhora da flexibilidade muscular de idosos. *Geriatr., Gerontol. Aging (Impr.)*, p. 37-41, 2017.
- DANIEL, F. d. N. R.; VALE, R. G. d. S.; NODARI, R. J.; GIANI, T. S. et al. Equilíbrio estático de mulheres idosas submetidas a um programa de atividade física. *Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia*, 18, p. 735-742, 2015.
- KAFRI, M.; HUTZLER, Y.; KORSENSKY, O.; LAUFER, Y. Functional performance and balance in the oldest-old. *Journal of geriatric physical therapy*, 42, n. 3, p. 183-188, 2019.
- MACHADO, A. C. A prática do método isostretching na redução da dor e melhora da qualidade de vida em pacientes com escoliose toracolombar. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) – Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, 2009.
- MENEGHINI, G. O.; SCHU, J. M.; OLTRAMARI, J. D.; GIACOMET, D. et al. EFEITOS DO MÉTODO ISOSTRETCHING NA POSTURA E FLEXIBILIDADE DE IDOSAS. *Revista Brasileira de Ciências do Envelhecimento Humano*, 16, n. 2, p. 36, 2019.
- NADAI, R. A. A. d.; GONÇALVES, G. B. Análise do equilíbrio e controle postural em deficientes visuais adquiridos. *Brazilian Journal of Health Review*, 2, n. 3, p. 1754-1772, 2019.
- OLIVEIRA, J. M. D.; BERTOLINI, S. M. M. G.; MADEIRAS, J. G.; BIANCHI, A. B. et al. BENEFÍCIOS DA PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS NAS ALTERAÇÕES POSTURAIS DOS IDOSOS. *REVISTA UNINGÁ*, 44, n. 1, 2015.
- ORGANIZATION, W. H. Obesity: preventing and managing the global epidemic. 2000.
- PRADO, É. R. A.; MEIRELES, S. M.; CARVALHO, A. C. A.; MAZOCA, M. F. et al. Influence of isostretching on patients with chronic low back pain. A randomized controlled trial. *Physiotherapy Theory and Practice*, 37, n. 2, p. 287-294, 2021/02/01 2019
- RIBEIRO, J. S. Influência da visão e da dupla tarefa no controle postural de idosas com perdas urinárias. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, 2015.
- RUBIRA, A. P. F. D. A.; DA SILVA, M. G.; DE CARVALHO, T. G.; SENE, M. et al. Efeito de exercícios psicomotores no equilíbrio de idosos. *Conscientiae saúde*, 13, n. 1, p. 54-61, 2014.

SILVA, A. M. d.; MASSUCATO, G. d. S.; DURANTE, R. A.; SARTORI, D. V. B. A Influência do método isostretching na flexibilidade de mulheres sedentárias. *Ensaio e Ciência: Ciências Biológicas, Agrárias e da Saúde*, 19, n. 1, p. 3-6, 2015.

SILVA, H. L. d.; BEZERRA, F. H. G.; GOMES, P. X. L.; SANTOS-JÚNIOR, F. F. U. Efeitos da técnica isostretching em pacientes com escoliose: uma revisão sistemática. *ConScientiae Saúde*, 17, n. 1, p. 101-108, 2018.

SOARES, R. S.; SOLDERA, C. L. C.; OLCHIK, M. R.; GONÇALVES, A. K. et al. Relação entre resultados da posturografia dinâmica “foam-laser”, preocupação em cair e quedas em idosos praticantes de exercícios físicos. *Research, Society and Development*, 10, n. 7, p. 1-12-, 2021.

SOUZA, A. A. d.; RAMOS, J. A.; GOMES, M. D. d. O. TREINAMENTO FUNCIONAL E O IDOSO: Estudo sobre os efeitos da prática na flexibilidade e capacidade funcional. *Revista Científica da FASETE*, 2018.

SOUZA, R. M. d.; DALLA COSTA, L. B.; DOS SANTOS, D. BENEFÍCIOS DO ISOSTRETCHING SOBRE A FORÇA MUSCULAR RESPIRATÓRIA E A EXPANSIBILIDADE TORÁCICA EM SEDENTÁRIOS. *Fórum Internacional de Qualidade de Vida e Saúde*, p. 84, 2019.

UCHÔA, E.; COELHO, D. M. L. A INFLUÊNCIA DO ISOSTRETCHING NAS ALTERAÇÕES POSTURAS DO IDOSO, 2012.

Capítulo 3

10.37423/210804656

A ATUAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA NA SÍNDROME DO IMOBILISMO: UMA REVISÃO DAS PRINCIPAIS INTERVENÇÕES E EFEITOS.

Yuri Sena Melo

Universidade Federal do Amazonas

Erica Daniele de Amorim Cunha

Centro Universitário do Norte

Rodrigo da Silva Marques

Centro Universitário do Norte

Wendy Brasil Fernandes

Centro Universitário do Norte

Lorena Walesca da Costa Almeida

Centro Universitário do Norte

Ivanncy Santos de Queiroz

Centro Universitário do Norte

Natália Dias Cancio

Centro Universitário do Norte

Patrick da Costa Santos

Centro Universitário do Norte

Douglas do Nascimento Mendes

Centro Universitário do Norte

Gean Carlos Colares da Fonseca

Centro Universitário do Norte

Resumo: Pacientes acamados em enfermarias ou unidade de terapia intensiva são propensos aos riscos de desenvolverem síndrome do imobilismo. Esta síndrome causa diversos problemas sistêmicos, levando o indivíduo a aumentar o tempo de internação e consequentemente diminuição da expectativa de vida. Vários estudos já demonstraram que protocolos de fisioterapia, bem planejados, diminuem os efeitos deletérios da síndrome do imobilismo. O objetivo desta pesquisa é reunir as principais evidências científicas sobre as intervenções e os efeitos da fisioterapia em pacientes suscetíveis ao risco de síndrome do imobilismo. A busca dos artigos foi realizada nas seguintes bases de dados: EBSCO, Pubmed, PEDro, MEDLINE (via BVS) e Science Direct, no período de abril de 2021 e encerrada no mês de junho do mesmo ano. Foi usada a combinação das seguintes palavras chaves no campo de pesquisa: (modalidades da fisioterapia OR mobilização precoce OR terapia intensiva) AND reabilitação. Ao todo, 4 artigos compuseram esta revisão e foi observado que a maioria deles apoiam o uso da fisioterapia em pacientes com riscos de síndrome do imobilismo e as principais intervenções realizadas foram: exercício de amplitude de movimento, treino resistido, alongamentos e exercício aeróbico no cicloergômetro.

INTRODUÇÃO

A síndrome do imobilismo é definida como um evento de alterações que ocorre no corpo humano quando se encontra por muito tempo acamado, ela acomete vários sistemas como músculoesquelético, gastrointestinal, urinário, cardiovascular, respiratório e cutâneo (SILVA E MEIJA, 2012; CINTA, MENDONÇA E ROSSI, 2013; SILVA, MAYNARD, CRUZ, 2010; ALENCAR E ANDRADE, 2017). Nos últimos anos, a quantidade de hospitalização de pacientes em unidade de terapia intensiva decorreu de várias causas como: doenças do sistema respiratório, insuficiência respiratória, doenças do sistema cardiovascular e doenças neurológicas. (FEIJÓ et. al. 2006; DAMASCENO et. al. 2006)

Unidade de terapia intensiva (UTI) é uma área hospitalar responsável pela assistência de paciente de alta complexidade, que precisa de monitoramento 24 horas por dia, sempre com apoio de vários profissionais de Saúde e diversos recursos especializados para manutenção da sobrevivência do paciente. O indivíduo muito crítico que é mantido, por bastante tempo, internado em uma unidade de terapia intensiva gera altos custos financeiros hospitalares (OLIVEIRA, DIAS E MELLO, 2010; CURZEL et. al. 2013).

Além disso, o repouso prolongado desses pacientes, criticamente enfermos aumenta, ainda mais, o tempo de internação pois acarreta vários problemas sistêmicos como: úlcera por pressão, contraturas articulares, fraqueza muscular, perda da massa óssea e problemas respiratórios. Devido esses fatores de riscos poderão ocorrer complicações durante o período de hospitalização e com isso ocorrer um declínio funcional acarretando déficit em sua qualidade de vida. (BROWER, 2009; MARAMATTO, 2006; MORAES, 2010)

Atualmente, existe diversas pesquisas na literatura que procuram investigar os efeitos da fisioterapia motora e respiratória em pacientes críticos e restrito ao leito, dentre os principais recursos mais utilizados da fisioterapia estão: exercício passivo (MACHADO et. al. 2017); exercícios com o cicloergômetro (COUTINHO et. al. 2010) e estimulação elétrica (FOSSAT et. al. 2018). Nesse contexto, os exercícios terapêuticos são bastante fundamentais na maioria dos planos de tratamento fisioterapêutico, e tem finalidade de diminuir o tempo de hospitalização e reduzir as incapacidades funcionais causadas pela síndrome do imobilismo.

Portanto, devido às alterações sistêmicas apresentadas pelo paciente acamado e as suas consequências, as quais poderão ocorrer em virtude desta síndrome, ressalta a relevância do profissional fisioterapeuta com a finalidade de melhorar a funcionalidade e com isso proporcionar

qualidade de vida nesses pacientes. Diante do exposto, o objetivo desta pesquisa é reunir as principais evidências científicas sobre essa temática e verificar os principais efeitos de Protocolos de fisioterapia motora e respiratória em pacientes suscetíveis ao risco de síndrome do imobilismo

MÉTODO

Tipo de estudo

O presente estudo trata-se de uma revisão de literatura de abordagem qualitativa.

Crítérios de elegibilidade

Foram incluídas apenas revisão sistemática e interativa da literatura publicadas nos últimos dez anos (2011-2021) nos idiomas inglês ou português com indivíduos que se enquadram nos seguintes critérios: (1) indivíduos acamados, restritos ao leito devido quaisquer patologias sendo de origem respiratória, geriátricas, cardiorrespiratória e neurológica; (2) que realizaram fisioterapia motora ou respiratória; (3) a variável principal foram quaisquer relacionadas a capacidade funcional do indivíduo como força muscular. Foram excluídos artigos que preenchessem qualquer dos critérios a seguir: a) artigos de revisão bibliografia; b) estudo de caso; c) série de caso; d) monografias, e) dissertações, f) estudos publicados em anais de eventos; g) artigos sem acesso na íntegra; h) artigo de opinião.

Análise dos dados

Foram feitas construções de tabelas com os resumos das características dos estudos, bem como sua metodologia, resultado e conclusão.

Estratégia de busca

A busca dos artigos foi realizada nas seguintes bases de dados: EBSCO, Pubmed, PEDro, MEDLINE (via BVS) e Science Direct, no período de abril de 2021 e encerrada no mês de junho do mesmo ano. Foi usada a combinação das seguintes palavras chaves no campo de pesquisa: (modalidades da fisioterapia OR mobilização precoce OR terapia intensiva) AND reabilitação.

Etapa da seleção dos estudos

Os artigos identificados pela estratégia de busca foram avaliados em 3 etapas: (1 etapa) – identificação através da estratégia de busca por três pesquisadores distintos, foram excluídos os artigos que se encontravam repetidos em mais de uma bases de dados; (2 etapa): foi realizado a leitura do título e os que não obedeceram aos critérios de inclusão foram excluídos;

(3 etapa): o mesmo procedimento foi realizado com análise dos resumos dos estudos incluídos na etapa anterior; (4 etapa): e última etapa foi realizada a leitura na íntegra de todos os estudos incluídos na etapa anterior.

Avaliação da qualidade metodológica dos artigos

A análise da qualidade metodológica foi realizada pela escala *instrumento Assessment of Multiple Systematic Reviews* (AMSTAR). Esta escala é composta de 14 itens onde é avaliado vários os critérios metodológicos minimamente necessários para que uma revisão sistemática seja considerada de qualidade.

RESULTADOS

ESTUDOS IDENTIFICADOS

A partir da estratégia de busca, realizada pelos autores, foram identificados 85 artigos. Desses, 55 foram excluídos após a leitura do título e 16 foram excluídos a partir da leitura dos resumos. Assim, 14 artigos foram selecionados para a leitura na íntegra, e desses 10 foram excluídos por não se enquadrarem nos critérios de inclusão. O fluxograma da seleção se encontra esquematizado na Figura 1

Figura 1 - Fluxograma da busca dos estudos

A tabela 1 descreve os principais objetivos dos estudos incluídos nesta revisão. De modo geral, dois estudos pesquisaram sobre os efeitos da mobilização precoce em pacientes críticos em unidade de terapia intensiva (SOUZA et. al. 2021; SARAIVA, CARDOSO E FERNANDES, 2017); um estudo teve o objetivo de identificar as contribuições da fisioterapia para prevenção da síndrome do imobilismo em idosos (RAMOS et. al. 2021) é um estudo avaliou os resultados funcionais e a segurança do paciente submetido a protocolos de fisioterapia motora (ADLER E MALONE, 2012).

Tabela 1 - Descrição dos objetivos dos artigos

Autor	Objetivo
Ramos et. al. 2021	Identificar na literatura as contribuições da fisioterapia para a prevenção de complicações pela síndrome do imobilismo em idosos.
Souza et. al. 2021	Revisar de forma sistemática estudos que abordam os efeitos procedentes da mobilização precoce em pacientes adultos internados em Unidades de Terapia Intensiva.
Saraiva, Cardoso e Fernandes, 2017	sistematizar o conhecimento das principais evidências científicas, abordando para análise treinamento físico e mobilização precoce no desmame de paciente crítico.
Adler e Malone 2012	avaliar a literatura relacionada à mobilização do paciente crítico com ênfase nos resultados funcionais e na segurança do paciente

A tabela 2 descreve as principais condutas utilizadas nos estudos. De modo geral, a maioria dos recursos utilizados foram exercícios de amplitude de movimento, exercício resistido, eletroestimulação, treino de equilíbrio, posicionamento de membros inferiores e superiores, treino de transferência e exercício aeróbico com cicloergômetro.

Tabela 2 - Principais intervenções e efeitos dos artigos

Estudo	Principais intervenções	Efeitos
Ramos et. al. 2021 7 estudos incluídos	<ul style="list-style-type: none"> • Exercício de amplitude de movimento ativo e passivo. • Exercício resistido de membros inferiores e membros superiores. • Eletroestimulação FES. • Posicionamento de membros inferiores e membros superiores. • Transferências de decúbito. 	<ul style="list-style-type: none"> • Melhora da força muscular. • Melhora da amplitude de movimento. • Melhora do equilíbrio. • Melhora da propriocepção.
Souza et. al. 2021 5 estudos incluídos	<ul style="list-style-type: none"> • Fisioterapia respiratória. • Técnicas de reexpansão pulmonar. • Diagonais de PNF em membros superiores e membros inferiores. • Exercício ativo resistido. • Exercício de amplitude de 	<ul style="list-style-type: none"> • Melhora da força muscular. • Melhora da capacidade cardiorrespiratória. • Melhora da força

	movimento passivo, ativo e ativo-assistido. <ul style="list-style-type: none"> • Técnicas de transferências. • Exercício aeróbico com o uso do cicloergômetro. 	muscular inspiratória. <ul style="list-style-type: none"> • Diminuição do tempo de internação.
Saraiva, Cardoso e Fernandes, 2017 9 artigos	<ul style="list-style-type: none"> • Técnica de fisioterapia respiratória. • Técnicas de deambulação e subir/descer escadas. • Exercício ativo resistido e passivo. • Exercício aeróbico com uso de cicloergômetro. • Treino de equilíbrio de tronco. • Exercícios de amplitude de movimento de membros inferiores e superiores. • Treino de descarga de peso parcial. 	<ul style="list-style-type: none"> • Melhora da força muscular. • Diminuição do tempo de internação. • Melhora da capacidade respiratória. • Melhora da saturação. • Diminuição do tempo de oxigenoterapia.
Adler e Malone 2012 10 artigos	<ul style="list-style-type: none"> • Treino de transferências. • Exercícios resistidos de membros inferiores e superiores. • Exercícios de amplitude de movimento. • Treino de equilíbrio. • Treino de deambulação. • Exercício aeróbico no cicloergômetro 	<ul style="list-style-type: none"> • Melhora da saturação. • Diminuição do tempo de internação. • Melhora do equilíbrio. • Melhora da força muscular. • Diminuição do uso de oxigenoterapia.

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE METODOLÓGICA DOS ESTUDOS

A qualidade metodológica dos estudos encontrados de acordo com a escala AMSTAR, variou de 9 a 13 pontos conforme está descrito na tabela 3. De acordo com a avaliação é possível observar que todos os artigos obedeceram quase todos os itens da escala, exceto o estudo de Souza et. al. 2021.

Tabela 3 - Qualidade metodológica das revisões incluídas

Artigo / Itens da escala	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Total
Ramos et. al. 2021	X	X		X	X	X		X	X		X			X	9
Souza et. al. 2021	X			X	X		X		X		X				6
Saraiva, Cardoso e Fernandes, 2017	X	X	X	X	X		X		X		X	X			9
Adler e Malone 2012	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		13

(1) O objetivo da pesquisa está claramente descrito? (2) Os elementos essenciais que compõem a estratégia de busca são descritos? (3) A origem da publicação foi utilizada como critério de busca? (4) Os critérios de inclusão e exclusão utilizados na seleção dos estudos foram descritos? (5) Uma busca abrangente foi realizada? (6) No mínimo dois juízes realizaram a busca e a seleção das publicações? (7) O número de artigos incluídos e excluídos em cada etapa da busca foi informado?

(8) No mínimo dois juízes realizaram a extração de dados? (9) Foram descritas as características dos estudos incluídos? (10) A forma de avaliação da qualidade metodológica dos estudos incluídos foi descrita? (11) Os métodos utilizados para integrar os resultados dos estudos foram descritos? (12) A qualidade metodológica dos estudos incluídos foi utilizada apropriadamente na formulação das conclusões? (13) O viés de publicação foi considerado? (14) O conflito de interesses foi descrito?

Fazendo uma análise geral de todos os artigos que fizeram parte dos estudos de Ramos et. al. 2021, Souza et. al. 2012, Saraiva, Cardoso e Fernandes 2017 e Adler e Maione 2012. Foi observado os principais recursos utilizados e eles se encontram descritos na figura 2.

Figura 2 - Principais recursos utilizados em pacientes com riscos de síndrome do imobilismo

DISCUSSÃO

Esta pesquisa teve o objetivo de analisar e reunir as principais evidências científicas sobre as intervenções e efeitos de protocolo de fisioterapia em pacientes acamados da síndrome do imobilismo. A síndrome do imobilismo é a contribuição mais importante para incapacidade a longo prazo de paciente restrito ao leito. O fisioterapeuta é o profissional que vem atuando na minimização dos efeitos deletérios causados por esta síndrome.

O estudo de Ramos et. al. 2021 tem o objetivo de identificar as contribuições do fisioterapeuta para prevenção de complicações pela síndrome do imobilismo em idosos. O autor demonstrou que recursos fisioterapêuticos associados à eletroterapia podem agregar diversos benefícios em idosos restritos ao leito. Um dos principais efeitos foi a melhora da força muscular periférica, melhora da amplitude de movimento, melhora do equilíbrio e melhora da propriocepção. Os exercícios terapêuticos geram benefícios da capacidade funcional e consequentemente psicológica (SILVA, MAYNARD E CRUZ, 2010;

FRANÇA et. al. 2012). Por outro lado, quando exercícios terapêuticos são associados a eletroterapia de baixa frequência, ocorre uma potencialização dos efeitos (CINTRA et. al. 2013; SILVA, MAYNARD E CRUZ, 2010).

Corroborando com os achados de Ramos et. al 2021, Souza et. al. 2021, revisou sistematicamente diversos estudos só quais abordaram os efeitos da mobilização precoce em pacientes adultos internados em unidade de terapia intensiva e concluiu que a mobilização precoce é de suma importância para os desfechos pós-alta, tanto para UTI e Hospital. Os principais efeitos encontrados foram: diminuição do tempo de internação, melhora da capacidade cardiorrespiratória e melhora da força muscular periférica. Entretanto o autor sugere novas pesquisas a qual procurem investigar mais a fundo os benefícios de forma isolada. Todavia, na prática clínica devemos elaborar uma boa avaliação do paciente e as suas principais necessidades para posteriormente traçar objetivos e condutas, respeitando sempre a sua individualidade biológica.

Na revisão realizada por Saraiva, Cardoso e Fernandes, 2017, a autora incluiu 9 artigos que em sua grande maioria utilizavam os seguintes recursos de exercícios terapêuticos em pacientes críticos: fisioterapia respiratória, técnicas de reexpansão pulmonar, diagonais de PNF em membros superiores e em membros inferiores, exercícios resistidos, exercícios de amplitude de movimento, técnicas de transferências e treino de descarga de peso. Podemos observar que a fisioterapia tem um arsenal de recursos disponíveis para um bom tratamento cinesiológico funcional os quais se for bem realizado por um profissional capacitado, esses recursos são capazes de prevenir encurtamentos, fraqueza muscular, deformidades osteomioarticulares e problemas respiratórios, gerando assim qualidade de vida e diminuição do tempo de internação dessa população (MORRIS et. al. 2008; RODRIGUES et. al. 2017).

A imobilidade, por muito tempo no leito é bastante prejudicial a recuperação do paciente internado, visto que ocorrem várias alterações sistêmicas, entretanto protocolos de exercícios devem ser feitos com muito cuidado. Diante disso, o estudo de Adler e Malone 2012, teve o objetivo de avaliar a literatura relacionada a mobilização do paciente crítico com ênfase nos resultados funcionais e na segurança do paciente. O autor concluiu que existem números limitados de estudos que examinam a mobilização precoce de pacientes críticos na unidade de terapia intensiva. No entanto, os estudos apoiam o uso da mobilização precoce e a fisioterapia como intervenção segura e eficaz que pode ter um impacto significativo nos seguintes desfechos funcionais: melhora da saturação, melhora do

equilíbrio, diminuição do uso de oxigenoterapia, melhora da força muscular periférica e diminuição do tempo de internação.

CONCLUSÃO

Os dados analisados nesta pesquisa demonstraram que a fisioterapia motora e respiratória promovem bons resultados no desempenho da capacidade funcional principalmente na melhora da força muscular periférica, capacidade cardiorrespiratória, diminuição do tempo de internação. Por outro lado, os autores foram unânimes ao sugerir novas pesquisas sobre esta temática, devido alguns estudos sugerem de média qualidade metodológica. Além disso, é bom ressaltar que nenhum dos pesquisadores relatou intercorrência durante o tratamento, o que sugere que este recurso é extremamente útil, seguro e eficaz para reabilitação de pacientes internados com risco de síndrome do imobilismo.

REFERÊNCIAS

- ADLER, Joseph; MALONE, Daniel. Early mobilization in the intensive care unit: a systematic review. *Cardiopulmonary physical therapy journal*, v. 23, n. 1, p. 5, 2010.
- ALENCAR, Livia Raquel Ribeiro de; ANDRADE, Fabrícia Castelo Branco de. Redução das complicações do imobilismo no paciente acamado através da atuação multiprofissional: projeto de intervenção. 2017 [acesso em 08 agosto 2021].
- BROWER, Roy G. Consequences of bed rest. *Critical care medicine*, v. 37, n. 10, p. S422-S428, 2009.
- CINTRA, Mariana Molinar Mauad et al. Influência da fisioterapia na síndrome do imobilismo. In: *Colloquium Vitae*. ISSN: 1984-6436. 2013. p. 68-76.
- CINTRA, Mariana Molinar Mauad et al. Influência da fisioterapia na síndrome do imobilismo. In: *Colloquium Vitae*. ISSN: 1984-6436. 2013. p. 68-76.
- CURZEL, Juliane; FORGIARINI JUNIOR, Luiz Alberto; RIEDER, Marcelo de Mello. Avaliação da independência funcional após alta da unidade de terapia intensiva. *Revista Brasileira de Terapia Intensiva*, v. 25, p. 93-98, 2013.
- DA SILVA, Karen Alessandra Correa; MEJIA, Dayana Priscila Maia. A importância da fisioterapia na redução da síndrome do imobilismo em pacientes acamados. 2010.
- DAMASCENO, Moyzes Pinto Coelho Duarte et al. Ventilação mecânica no Brasil: aspectos epidemiológicos. *Revista brasileira de terapia intensiva*, v. 18, p. 219-228, 2006.
- DE MORAES, Edgar Nunes; MARINO, M. C.; SANTOS, Rodrigo Ribeiro. Principais síndromes geriátricas. *Rev Med Minas Gerais*, v. 20, n. 1, p. 54-6, 2010.
- FEIJÓ, Carlos Augusto Ramos et al. Gravidade dos pacientes admitidos à unidade de terapia intensiva de um hospital universitário brasileiro. *Revista Brasileira de Terapia Intensiva*, v. 18, p. 18-21, 2006.
- FOSSAT, Guillaume et al. Effect of in-bed leg cycling and electrical stimulation of the quadriceps on global muscle strength in critically ill adults: a randomized clinical trial. *Jama*, v. 320, n. 4, p. 368-378, 2018.
- FRANÇA, Eduardo Ériko Tenório de et al. Fisioterapia em pacientes críticos adultos: recomendações do Departamento de Fisioterapia da Associação de Medicina Intensiva Brasileira. *Revista Brasileira de Terapia Intensiva*, v. 24, n. 1, p. 6-22, 2012.
- MACHADO, Aline dos Santos et al. Efeito do exercício passivo em cicloergômetro na força muscular, tempo de ventilação mecânica e internação hospitalar em pacientes críticos: ensaio clínico randomizado. *Jornal Brasileiro de Pneumologia*, v. 43, p. 134-139, 2017.
- MARAMATTOM, Bobby Varkey; WIJDICKS, Eelco F. M.. Acute neuromuscular weakness in the intensive care unit. *Critical Care Medicine*, [S.L.], v. 34, n. 11, p. 2835-2841, nov. 2006.
- MORRIS, Peter E. et al. Early intensive care unit mobility therapy in the treatment of acute respiratory failure. *Critical care medicine*, v. 36, n. 8, p. 2238-2243, 2008.

OLIVEIRA, Ana Beatriz Francioso de et al. Fatores associados à maior mortalidade e tempo de internação prolongado em uma unidade de terapia intensiva de adultos. *Revista Brasileira de Terapia Intensiva*, v. 22, p. 250-256, 2010.

RAMOS, Ingrid Pereira et al. ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NA PREVENÇÃO DE COMPLICAÇÕES CAUSADAS PELA SÍNDROME DO IMOBILISMO EM IDOSOS ACAMADOS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA. *Revista CPAQV-Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida-CPAQV Journal*, v. 13, n. 1, 2021.

RODRIGUES, Gleica Sampaio et al. Mobilização precoce para pacientes internados em unidade de terapia intensiva: revisão integrativa. *Rev Inspirar Mov Saude*, p. 27-31, 2017.

RODRIGUES, Gleica Sampaio et al. Mobilização precoce para pacientes internados em unidade de terapia intensiva: revisão integrativa. *Rev Inspirar Mov Saude*, p. 27-31, 2017.

SARAIVA, Amanda Abrantes; CARDOSO, Bruno Braz; DOS SANTOS FERNANDES, Lauro. O uso do treinamento físico muscular como forma de mobilização precoce no desmame da Ventilação Mecânica em pacientes críticos na UTI. *Revista Científica do Hospital Central do Exército (HCE)*, n. 1, p. 29-37, 2017.

SILVA, Ana Paula Pereira da; MAYNARD, Kenia; CRUZ, Mônica Rodrigues da. Efeitos da fisioterapia motora em pacientes críticos: revisão de literatura. *Revista Brasileira de Terapia Intensiva*, v. 22, p. 85-91, 2010.

SILVA, Ana Paula Pereira da; MAYNARD, Kenia; CRUZ, Mônica Rodrigues da. Efeitos da fisioterapia motora em pacientes críticos: revisão de literatura. *Revista Brasileira de Terapia Intensiva*, v. 22, p. 85-91, 2010.

SOUZA, Ranná Barros et al. Efeitos da mobilização precoce em pacientes adultos internados em unidade de terapia intensiva: revisão sistemática. *Brazilian Journal of Development*, v. 7, n. 3, p. 30427-30441, 2021.

Capítulo 4

10.37423/210804662

INTERVENÇÕES FISIOTERAPÊUTICA NO PÓS-OPERATÓRIO DE ARTROPLASTIA DE QUADRIL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Maria Jessica Alexandre da Silva Veras

Instituto Pernambucano de Ensino Superior

Ester Nogueira da Silva

Instituto Pernambucano de Ensino Superior

Renata Soraya Coutinho da Costa

Instituto Pernambucano de Ensino Superior

Resumo: **Objetivo:** Identificar quais os exercícios cinesioterapêuticos mais empregados no pós-operatório de artroplastias de quadril, assim como destacar sua importância. **Material e Método:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, que considerou artigos científicos sobre a fisioterapia no pós-operatório de artroplastia de quadril. A busca foi realizada entre setembro e outubro de 2020. Para esta análise integrativa, foram coletados artigos publicados nas bases de dados eletrônica PUBMED, PEDRO e SCIELO. **Resultados:** Foram encontrados um total 115 artigos nas bases de dados de pesquisas. 21 preencheram os critérios de inclusão. 32 foram excluídos pois não obtiveram coerência com tema abordado, 14 por serem revisão sistemática, 38 pelo resumo inadequado e 10 após leitura completa foram excluídos devido à falta coerência do tema abordado. **Conclusão:** Os estudos demonstraram que os exercícios de fortalecimento da musculatura do quadril, exercícios aquáticos, treino de resistência progressiva, exercícios baseados em testes funcionais adequados para a ATQ, exercícios em casa, mobilizações faciais combinados com exercícios, exercícios com sustentação de peso, exercícios para os músculos do quadril e rotadores do quadril, exercício em ambiente hospitalar na fase aguda com orientação, treino de marcha, tem se mostrado eficazes no tratamento de pós-operatório de ATQ.

Palavras-chave: Artroplastia Quadril, Modalidades de Fisioterapia.

1 INTRODUÇÃO

As articulações coxofemorais são estruturas anatômicas importantes para que a postura do corpo seja ereta e equilibrada. Essa articulação pode sofrer grande sobrecarga devido a modificações de movimentos básicos como corrida, saltos e caminhada. É comum ocorrer degeneração dessa região, causando osteoartrite degenerativa ou, como também referida, artrose da cabeça do fêmur (YAZAR, KARAKUS e SAYGI, 2019). Melhorias funcionais podem ser previstas nos pacientes com osteoartrite e artrite reumatóide após a cirurgia de artroplastia de quadril (CRAWFORD e MURRAY, 1997).

A artroplastia do quadril (AQ) é considerada um dos maiores avanços no tratamento das doenças degenerativas do mundo. Devido a sua rápida recuperação e retorno as atividades da vida diária (AVDs) é considerada um dos poucos tratamentos que beneficia o paciente como um todo (GALIA et al, 2017). A indicação mais frequente de AQ é a osteoartrose (OA), mas a etiologia envolve outras enfermidades como: Artrite reumatoide, necrose vascular e fraturas. Podendo ser tratada com artroplastia parcial do quadril (APQ) ou artroplastia total do quadril (ATQ), dependendo do quadro do indivíduo (LENZA et al, 2013).

Tem sido uma das intervenções com maior eficácia do ponto de vista econômico e funcional para o paciente. É um procedimento realizado após uma avaliação cuidadosa pré-operatória para minimizar os riscos. Muitos avanços na medicina têm melhorado o resultado final na reabilitação desses pacientes (BARROS et al, 2017).

O papel da fisioterapia no pós-operatório AQ é minimizar os danos e perdas funcionais do indivíduo, deixando-o o mais próximo possível da sua independência nas atividades da vida diária (AVDS). Devido à perda de força no membro operado, a cinesioterapia é fundamental para que a perda da função do membro seja o mínimo possível (HEIBERG et al, 2012).

As técnicas e protocolos usados pela fisioterapia para tratamento da AQ são variados e têm importante eficácia clínica. Os ensaios clínicos, em geral, sugerem melhora significativa nos grupos experimentais em comparação aos grupos controle nos desfechos funcionalidade, força muscular e amplitude de movimento (ADM) (BUDIB et al, 2020)

O objetivo desse trabalho é identificar quais exercícios cinesioterapêuticos são mais empregados no pós-operatório de artroplastias de quadril, assim como destacar sua importância. Analisando artigos que mostram o papel do fisioterapeuta nos cuidados pós-operatórios de cirurgia de AQ. Ajudando

assim a compreender que o fisioterapeuta é importante no âmbito hospitalar, ambulatorial e domiciliar, ajudando os pacientes a manterem a função e a qualidade de vida.

2 METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, que considerou artigos científicos sobre a fisioterapia no pós-operatório de artroplastia de quadril. A busca foi realizada entre setembro e outubro de 2020. A seleção do material e análise foram realizadas pelas autoras envolvidas neste estudo. Para esta análise integrativa, foram coletados artigos publicados nas bases de dados eletrônicas PUBMED, PEDro e SCIELO. As estratégias de busca foram baseadas nos termos do MESH, para o PUBMED, e nos termos do DESC para as demais bases.

Como critérios de inclusão foram considerados: estudos na língua inglesa e portuguesa, publicados entre 2011 e 2020, disponíveis na íntegra, sobre intervenção fisioterapêutica no pós-operatório de artroplastia de quadril. Foram excluídos os estudos de revisão, artigos que não mostravam intervenções fisioterapêuticas no pós-operatório de artroplastia de quadril e os repetidos em mais de uma base de dados.

A coleta de dados seguiu etapas e se encontra detalhada no quadro 1: Busca nas bases de dados selecionadas; Leitura dos títulos e dos resumos. Seleção do Material para ser lido na íntegra; aplicação dos demais critérios de inclusão e exclusão. Após coletados os dados foram construídos quadros e tabelas para exposição dos achados e análise criteriosa.

Quadro 1- Estratégias de busca utilizadas nas bases de dados pesquisadas.

BASE DE DADOS	ESTRATÉGIA
PEDRO	ARTHROPLASTY, REPLACEMENT AND HIP.
SCIELO	HIP ARTHROPLASTY PHYSICAL THERAPY MODALITIES ARTROPLASTIA QUADRIL MODALIDADES DE FISIOTERAPIA
PUBMED	HIP ARTHROPLASTY, REPLACEMENT, PHYSIOTHERAPY

3 RESULTADOS

Foram encontrados um total 115 artigos nas bases de dados de pesquisas. 21 preencheram os critérios de inclusão. 32 foram excluídos pois não obtiveram coerência com tema abordado, 14 por serem revisão sistemática, 38 pelo resumo inadequado e 10 após leitura completa foram excluídos devido à falta coerência do tema abordado. Esses achados estão expostos na figura 1 enquanto a tabela 1 detalha os artigos incluídos no estudo.

Figura 1. Fluxograma das etapas de seleção dos artigos identificados com intervenções fisioterapêutica no pós-operatório de artroplastia de quadril

Tabela 1. Disposição dos artigos selecionados quanto ao autor, ano, tipo de estudo, objetivo, método, resultados. 2011 a 2020.

Autor/Ano	Tipo de Estudo	Objetivo	Métodos	Resultados
WINTHER et al, 2018	Ensaio clínico Randomizado	Investigar a eficácia do treino de força máxima (MTS) em comparação com a fisioterapia convencional (PC) no pós-operatório de ATQ.	N= 60 ambos os sexos com ATQ.	Aumento na força no leg press e abdução no grupo MST comparado ao PC em 3 meses. 1 ano de pós-operatório, não foram encontradas diferenças entre os grupos.
LYP et al, 2015	Ensaio Clínico pré e pós teste	Avaliar um programa de reabilitação com exercícios aquáticos personalizados em pacientes com AO antes e após ATQ.	N=192 pacientes com AO avaliados antes e após ATQ. 2 programas de reabilitação usando cinesioterapia e campo magnético de baixa frequência.	O maior aumento de força muscular foi observado no grupo de reabilitação com exercícios combinados na água.
MARCHISIO et al, 2020	Ensaio Clínico Randomizado Duplo-cego	Comparar um protocolo fisioterapêutico acelerado com um protocolo fisioterapêutico convencional em ATQ.	N=48 pacientes com OA de quadril submetidos a ATQ. Comparou fisioterapia de reabilitação acelerada e fisioterapia padrão.	Foram observados aumento na força muscular no pós-operatórios no grupo intervenção em comparação ao grupo controle.
MIKKELSEN et al, 2019	Ensaio Clínico Randomizado Controlado	Investigar a assimetria da marcha e amplitude de movimento pélvica durante caminhada e escada ascendente após a ATQ.	N=32 aleatorizados em 2 grupos com reabilitação diferentes. Velocidade, assimetria e amplitude pélvica e força da perna medidos no pré-operatório, 10 semanas e 6 meses pós-operatório.	Não houve mudanças significativas na assimetria da marcha. Força da perna e velocidade durante caminhada e subida de escadas aumentaram significativamente no grupo intervenção.
MIKKELSEN et al, 2016	Ensaio Clínico Randomizado Controlado	Apresentar uma descrição detalhada de treinamento de resistência progressiva adotada logo após a ATQ	N=73 alocados para o grupo de intervenção que recebeu resistência progressiva. Controle recebeu um programa de exercícios sem	Houve uma melhora na carga de treinamento durante as 4 primeiras semanas. A dor em repouso antes e depois do treinamento era

			carga em casa.	geralmente leve.
OKORO et al, 2016	Ensaio Clínico Randomizado Controlado	Realizar um estudo piloto como prova de conceito, avaliando se um programa PRT foi benéfico em relação a reabilitação padrão em até 1 ano acompanhamento.	N=49 randomizados para o grupo PRT e o grupo de reabilitação padrão.	Todas as medidas de resultados mostraram melhorias progressivas marcadas a partir das medidas de base em 9-12 meses após a cirurgia para ambos os grupos.
MIKKELSEN, S. MIKKELSEN e CHRISTENSEN, 2012	Ensaio Clínico Controlado	Investigar a viabilidade de um regime de treinamento intensivo em casa e formar a base de estudos futuros com relação a exercícios, resultados medidas e cálculos de potência.	N=46 pacientes submetidos a ATQ para AO no grupo de intervenção recebendo 12 semanas de exercícios intensificados ou um grupo de controle.	Houve aumentos significativos em ambos os grupos em todas as medidas durante as 12 semanas de exercícios.
HEIBERG et al, 2012	Ensaio Clínico Randomizado Controlado	Investigar o efeito de um programa de treinamento de habilidades de caminhada de 12 sessões com levantamento de peso, sobre o funcionamento físico e a autoeficácia iniciada em pacientes 3 meses após ATQ.	N=68 pacientes com ATQ, foram randomizados e avaliados os testes de caminhada de minutos (6MWT), subir escadas (ST) teste de figura de oito; Índice de Função Muscular (IMF) e Pontuação de Resultado de Disfunção Quadril e Osteoartrite.	O grupo intervenção teve melhorias maiores do que o grupo de controle no pós-teste 1 no 6MWT. A diferença entre os grupos persistiu no pós-teste 2 no 6MWT de 52 metros e no ST de 1 segundos.
MIKKELSEN L.R. et al, 2014	Ensaio Clínico Randomizado Cego simples	Examinar se 2 sessões semanais de PRT em combinação com 5 sessões semanais de exercícios domiciliares não supervisionados são mais eficazes do que 7 sessões semanais de exercícios domiciliares não supervisionados.	N=73 pacientes agendados para ATQ foram randomizados. O desfecho primário foi a mudança na força de extensão da perna em 10 semanas de acompanhamento.	A força de extensão da perna aumentou desde a linha de base até as 10 semanas acompanhamento em ambos os grupos sem diferença entre os grupos.

BUSATO et al, 2016	Ensaio Clínico Randomizado Controlado	Comparar a eficácia da manipulação facial (FM) quando adicionado a um protocolo padrão de atendimento.	Os pacientes foram randomizados em dois grupos; ambos seguiram um protocolo padrão baseado em duas sessões diárias de exercícios ativos durante 45 minutos. Duas sessões foram substituídas por FM no grupo intervenção.	Diferenças estatisticamente significativas foram observadas em graus de flexão entre o grupo intervenção e controle.
STEINHILBER et al, 2012	Ensaio Clínico	Complementar a terapia supervisionada com exercício (ISET) com um programa de exercícios de fortalecimento domiciliar progressivo (PHSEP).	N=36 testados numa intervenção de 8 semanas. A randomização foi estratificada por gênero devido à sua possível influência sobre eficácia de exercícios de fortalecimento.	A adesão às sessões da Hip School foi de 93% para IG e 92% para CG. A adesão do IG ao PHSEP foi de 99%. A avaliação média da percepção de esforço foi de 9,8 durante a fase 1; 11,2 durante a fase 2 e 11,8 durante a fase 3.
TSUKAGOSHI et al, 2014	Ensaio Clínico Randomizado Controlado	Investigar os efeitos dos exercícios de sustentação de peso e sem peso no desempenho funcional, força muscular e espessura muscular em pacientes com ATQ.	N=65 pacientes foram randomizados em 3 grupos, 2 grupos intervenção e 1 controle. Grupo NWB, WB e controle.	Os grupos de intervenção apresentaram melhorias em quase todo o desempenho funcional medidas comparadas com o grupo controle.
APRILE et al, 2011	Ensaio Clínico Randomizado Cego simples e cruzado	Comparar os efeitos da reabilitação em grupo com a reabilitação individual para pacientes internados que foram submetidos a artroplastia de joelho e quadril.	N= 27 pacientes foram submetidos a um programa de fisioterapia após a substituição do joelho ou quadril. Pacientes foram randomizados em dois programas de intervenção em grupo e individual.	Não foram observadas diferenças significativas em todas as medidas de resultados no início do estudo entre o GrpR / IndR. A maioria dos resultados não mostrou diferença significativa.

NANKAKU et al, 2016	Ensaio Clínico Randomizado	Identificar se o programa de exercícios com foco no rotador externo durante a fase aguda após ATQ promoveria uma melhora clínica nos pacientes.	N=28 atribuídos a um grupo de exercícios realizando rotação externa do quadril, além da reabilitação convencional. Grupo controle foi programa de reabilitação convencional de 4 semanas.	Houve melhora na dor pós-operatória no quadril e na ADM em comparação com o valor pré-operatório nos dois grupos. Força no abdutor de quadril no grupo de exercício aumentou após a intervenção.
MUSUMECEI, PRANOVI e MASIERO, 2018	Ensaio Clínico	Avaliar a eficácia de um programa de reabilitação intensiva precoce em ambiente térmico após artroplastia total do quadril.	N=11 submetidos a uma avaliação clínica padrão no dia da admissão e após 2 semanas de tratamento. Que consistiu em 6 sessões semanais de fisioterapia e cinesioterapia na piscina termal.	Redução da dor após o tratamento, seja em repouso ou durante a caminhada, mas ambos os resultados não atingiram significância estatística.
LIEBS et al, 2015	Ensaio Clínico	Avaliar os anos de vida ajustados pela qualidade atribuídos (QALYs) a AT de quadril e joelho e as intervenções pós-operatórias específicas.	N= 837 distribuídos em dois grupos A e B. Nos quais o efeito da bicicleta ergométrica e a terapia aquática após a ATQ e ATJ foram examinados.	Os QALYs ao longo da vida aumentaram 2,35 anos no grupo sem ergômetro e 2,30 anos no grupo de terapia aquática tardia.
MONAGHAN et al, 2016	Ensaio Clínico Randomizado Controlado	Verificar a eficácia de um programa de exercícios funcionais supervisionado por fisioterapeuta entre 12 e 18 semanas após a ATQ.	N=63 aleatorizados para o grupo de cuidados usuais e exercício funcional e o cuidados usuais. Avaliados de acordo com WOMAC.	Na semana 18, o componente de função da pontuação WOMAC foi significativamente menor indicando melhora no grupo de exercícios funcionais
BARKER et al, 2013	Ensaio Clínico Randomizado Controlado	Identificar se um programa de reabilitação adaptado é mais eficaz que o padrão em melhora da função em pacientes ATQ.	N=80 divididos em 2 grupos. O intervenção com protocolo aprimorado até a semana 8. O outro, cuidados de rotina para ATQ.	Houve diferença entre os dois grupos. O OHS do intervenção foi maior que o de controle.

UMPIERRES et al, 2014	Ensaio Clínico Randomizado	Determinar a eficácia de um protocolo de intervenção fisioterapêutica hospitalar em comparação apenas com a orientação.	N= 106. O GC recebeu apenas o atendimento prestado pelo grupo multidisciplinar de quadril. O GI recebeu as mesmas instruções verbais e demonstrações associadas à prática diária guiados por fisioterapeutas.	GI teve resultados mais elevados do que o controle que teve menos mudança para todos os itens medidos.
MATHEIS e STÖGGL, 2017	Ensaio Clínico Randomizado	Melhorar a função do quadril por uma mobilização direcionada adicional e treinamento de força dos músculos do quadril dentro da primeira semana pós-operatória após uma ATQ em contraste com a fisioterapia padrão.	N= 39 pacientes em pré-operatório de ATQ divididos em 2 grupos. A fisioterapia para o GC consistia em mobilização passiva e ativa do quadril. O GI recebeu as mesmas aplicações adicionada de instruções de marcha.	As melhorias no GI em comparação com o GC foram registradas na amplitude de movimento e desempenho de marcha.
COULTER et al, 2017	Ensaio Clínico Randomizado	Determinar se os pacientes se saem melhor com fisioterapia domiciliar não supervisionada ou em ambulatorial.	N=98 aleatoriamente designados para exercícios supervisionados e exercícios não supervisionados, em casa, acompanhados 6 meses após a cirurgia.	Não houve diferenças entre os grupos para nenhuma medida. As pontuações basais para WOMAC, SF36 e UCLA foram semelhantes para ambos os grupos, mas o TUG foi mais lento no grupo baseado em casa.

Legendas: **SAP:** Protocolo de Assistência Padrão; **ARP:** Acelerado Protocolo de Reabilitação; **IG** ou **GI:** Grupo intervenção; **CG** ou **GC:** Grupo controle; **6MWT:** Teste de caminhada de minutos; **ST:** Teste de subir escadas; **IMF:** Índice de Função Muscular; **HHS:** Pontuação Harris Hip; **ADM:** Amplitude de movimento; **PRT:** Treinamento de resistência progressiva supervisionado; **FM:** Manipulação facial; **VNS:** Escala numérica verbal; **ISER:** Terapia institucional supervisionada com exercícios em grupo; **PHSEP:** Programa de exercícios de fortalecimento domiciliar progressivo; **NWB:** Sem peso; **WB:** Sustentação de peso; **GRPR:** Reabilitação em grupo; **INDR:** Reabilitação individual; **ATJ:** Artroplastia de joelho; **QALYs:** Anos de vida ajustados pela qualidade; **WOMAC:** Índice de osteoartrite das universidades de Western Ontario e McMaster; **HOOS:** Incapacidade de quadril e pontuação de resultado de osteoartrite; **OHS:** Oxford Hip Score; **SF36:** Short form 36; **UCLA:** Índice de atividade da Universidade da Califórnia em Los Angeles; **TUG:** Timed Up and Go Test.

4 DISCUSSÃO

A fisioterapia é uma parte importante da reabilitação do paciente após a artroplastia de quadril. Ao praticar tarefas e atividades na reabilitação a força muscular, o equilíbrio, e a resistência muscular são treinadas para melhorar a eficácia do tratamento após a cirurgia. (HEIBERG et al, 2012).

Os dados das intervenções fisioterapêuticas coletados mostram a eficácia das intervenções realizadas em pacientes após a cirurgia de artroplastia de quadril. Winther et al (2018) investigaram a eficácia do treino de força máxima em comparação com a fisioterapia convencional no pós-operatório de ATQ. Foi avaliada a capacidade máxima no leg press e abdução da perna operada, 3 vezes por semana até 3 meses de pós-operatório. Houve um aumento substancial na força no leg press e abdução no grupo intervenção em 3 meses e 6 meses no pós-operatório. Classicamente, o quadro crônico de osteoartrite repercute em importante diminuição da força muscular. Tais déficits tornam-se ainda mais acentuados em razão dos efeitos deletérios causados pelo procedimento cirúrgico (BUDIB et al, 2020).

Lyp et al (2015) avaliaram um programa de reabilitação com exercícios aquáticos personalizados em pacientes com AO antes de depois da cirurgia. Foram comparados 2 programas de reabilitação usando cinesioterapia e campo magnético de baixa frequência. Os resultados mostraram que a maior redução da intensidade da dor e ganho de força foram observados nos pacientes que realizaram exercícios na reabilitação na piscina. O ganho de força através da hidroterapia é relatado na literatura, principalmente, quando associada a equipamentos para aumentar a resistência. Ademais, trata-se de uma modalidade que pode ser prescrita de forma segura, a fim de potencializar o condicionamento muscular e com diminuição do risco de lesões que podem ser causadas pelo exercício (TURNER, CHANDER e KNIGHT, 2018).

Marchisio et al (2020) compararam um protocolo fisioterapêutico acelerado com um protocolo convencional para ATQ. A permanência hospitalar foi menos no grupo acelerado. Os 2 grupos demonstraram melhorias significativas nos escores pré e pós-operatórios para dor, considerando os escores de Merle d'Aubigné e Postel e na mobilidade. O estudo mostra uma redução no tempo de internação, início precoce do treinamento de marcha e aumento da força de alguns músculos do quadril com resultados positivos iniciais e benefícios para o paciente.

Mikkelsen et al (2019) investigaram a assimetria da marcha e amplitude de movimento pélvica durante a caminhada e subida de escada após a cirurgia de ATQ.

Velocidade, assimetria e pélvica amplitude de movimento e força da perna foram medidos no pré-operatório, 10 semanas e 6 meses pós-operatório. Os resultados mostram que não houve diferenças significativas na mudança nos parâmetros ou função muscular entre os grupos, no entanto, uma redução tendenciosamente maior na assimetria do tempo do passo é vista no grupo de intervenção em comparação com o grupo controle. Esse achado sugere a necessidade de inclusão do treino de marcha e equilíbrio nessa população (BUDIB et al, 2020).

Mikkelsen et al (2016) avaliaram a implementação de uma intervenção de treinamento de resistência progressiva implementada após ATQ. Foram comparados os grupos que recebeu resistência progressiva e os pacientes que fizeram exercícios de quadril sem carga. Os resultados mostraram que a dor durante o exercício diminuiu significativamente durante as quatro semanas de treinamento em todos os tipos de exercícios. A dor em repouso antes e depois do treinamento era geralmente leve. A dor após cada sessão de treinamento diminuiu significativamente ao longo do tempo com as pontuações mais altas na primeira e terceira sessão. O estudo mostrou uma melhora na carga de treinamento durante as 4 primeiras semanas.

Okoro et al (2016) avaliaram um programa de treinamento de resistência progressiva em comparação a reabilitação padrão. Foram avaliados teste sentado para de pé em 30 segundos, Timed up and go em segundos, desempenho de subida de escada, teste de caminhada de 6 min e massa magra da perna operada. Todas as medidas de resultados mostraram melhorias progressivas marcadas a partir das medidas de base em 9-12 meses após a cirurgia para ambos os grupos. Segundo Budib et al (2020) um programa de treinamento resistido domiciliar é tão eficaz quanto a reabilitação padrão no desfecho funcionalidade, a partir de protocolos de exercício resistido de baixa intensidade para pacientes com ATQ.

Mikkelsen, S. Mikkelsen e Christensen (2012) investigaram um regime de treinamento intensivo em casa. Foram avaliados velocidade máxima de marcha, força isométrica do músculo abductor do quadril, postura unipodal, qualidade de vida relacionada à saúde. O estudo mostra que houve aumentos significativos em ambos os grupos em todas as medidas durante as 12 semanas de exercícios. A força de abdução do quadril foi significativamente mais fraca na perna operada em comparação com a perna não operada após a intervenção em ambos os grupos. Não existiam diferenças significativas entre os grupos quanto à quantidade de treinamento.

Heiberg et al (2012) investigaram o efeito de um programa de treinamento de habilidades de caminhada de 12 sessões de atividades com levantamento de peso sobre o funcionamento físico e a

autoeficácia iniciada em pacientes 3 meses após ATQ. Foram avaliados os testes de subir escadas; teste de figura de oito; Índice de Função Muscular; amplitude de movimento ativa do quadril em flexão, extensão e abdução; Pontuação Harris Hip; auto eficácia; e Pontuação de Resultado de Disfunção Quadril e Osteoartrite. O estudo mostrou que o grupo que recebeu o programa de treinamento obteve melhoras significativas nos resultados. Esse achado está em consonância com o que prega a maioria dos estudos.

Mikkelsen L.R. et al (2014) examinaram se 2 sessões semanais de PRT em combinação com 5 sessões semanais de exercícios domiciliares não supervisionados são mais eficazes do que 7 sessões semanais de exercícios domiciliares não supervisionados para melhorar a força de extensão da perna operada 10 semanas após ATQ. Foi avaliado mudança na força de extensão da perna em 10 semanas de acompanhamento, a força muscular isométrica do quadril, teste sentar para levantar, teste de subida de escada, velocidade de caminhada de 20 m e resultado relatado pelo paciente. O estudo mostrou que o grupo que recebeu o treinamento PRT obteve melhora na velocidade máxima de caminhada e subida de escada. Ou seja, nessa amostra a presença de sessões presenciais foi positiva.

Não parece claro qual é o potencial dos protocolos de exercício resistido, considerando-se os efeitos de diferentes cargas sobre a funcionalidade de pacientes com ATQ. Diante disso, mais estudos são necessários para elucidar qual a intensidade de exercício resistido que promove melhor recuperação funcional (BUDIB et al, 2010).

Busato et al (2016) investigaram a eficácia da manipulação facial quando adicionado a um protocolo padrão e atendimento após ATQ. Foram avaliados Harris Hip Score, teste Time Up and Go, amplitude de movimento articular em abdução, flexão, extensão e rotação externa bilateral com calcanhares juntos e escala numérica verbal. Os resultados mostram que em todos os dados avaliados houve melhora significativa no grupo que recebeu manipulação facial. O estudo mostra que duas sessões de tratamento de manipulação facial associadas a sessões de uma reabilitação pós-cirúrgica padrão resultaram em melhora significativa.

Steinhilber et al (2012) analisaram um programa complementar de exercícios ISET comparado a exercícios PHSEP para fortalecimento da musculatura do quadril. Foram executados exercícios de força progressiva para abdução, adução, flexão e extensão do quadril para o grupo PHSEP e foram avaliados usando a análise de covariância (ANCOVA). Os resultados da ANCOVA mostraram melhorias estatisticamente significativas na força muscular do quadril para que recebeu PHSEP. O estudo mostra que o programa de exercícios

PHSEP pode ser implementado de forma segura e autônoma em casa em pacientes que submeteram ATQ.

Tsukagoshi et al (2014) investigaram os efeitos dos exercícios com e sem carga (WB e NWB) no desempenho funcional, medida de resultado funcional para doenças específicas, força muscular e espessura muscular em pacientes com ATQ. Foram avaliados o desempenho funcional, pontuação HHS, força isométrica e espessura muscular. Os resultados mostraram que o grupo que recebeu os exercícios WB apresentou melhorias em quase todo o desempenho funcional, mostrou significativamente maiores alterações pré e pós na posição sentar-para-levantar e caminhada de 3 minutos teste em comparação com o grupo NWB. Em termos de HHS, apenas o grupo WB mostrou melhora significativa, ou seja, o exercício resistido deve constar em programas de reabilitação pós ATQ. Melhoria significativa na espessura do músculo quadríceps foi observada no WB.

Aprile et al (2011) compararam os efeitos da reabilitação em grupo com a reabilitação individual para pacientes internados submetidos a artroplastia de quadril e joelho. Os exercícios de reabilitação incluíram exercícios de propriocepção com sustentação de peso, treinamento de força e flexibilidade. Foram utilizados escalas e índice para avaliação WOMAC, VAS, SF-36 e HHS. Os resultados mostram que não houve diferença significativa nos dois grupos avaliados. O estudo mostra que houve nenhuma mudança significativa estatisticamente devido as limitações do estudo e a pequena amostra.

Matheis e Stoggl (2017) investigaram se uma mobilização direcionada adicional e treinamento de força dos músculos do quadril nas primeiras semanas após ATQ melhora a função do quadril em contraste com a fisioterapia padrão. Os resultados mostram que o GI mostrou melhorias na ADM e desempenho de marcha. Segundo Nankaku et al (2016) que investigaram os efeitos de um programa de treinamento de exercícios com foco nos músculos do quadril e rotadores externo durante a fase aguda após ATQ promoveria uma melhora clínica nos pacientes. Os resultados mostram que no grupo que recebeu a intervenção a força do abdutor do quadril no GI aumentou significativamente, a diferença na força do rotador externo do quadril e extensor do joelho pré e pós intervenção não foi significativa e o teste Timed Up and Go melhorou significativamente após a intervenção.

Musumec, Pranovi e Masiero (2018) avaliaram a eficácia de um programa de reabilitação intensiva precoce em ambiente térmico após ATQ. Os resultados mostraram onze pacientes relataram uma redução da dor após o tratamento em repouso ou durante a caminhada, mas ambos os resultados não atingiram significância estatística. Na flexão e abdução de quadril houve melhora significativa antes e após o tratamento nos movimentos articulares. Segundo Budib et al (2020) as evidências científicas

relacionada à efetividade da hidroterapia são fracas, devido a baixa qualidade metodológica dos estudos identificados. São necessários mais estudos para demonstrar a eficácia da hidroterapia como recurso na ATQ.

Liebs et al (2015) avaliaram os anos de vida ajustados pela qualidade atribuídos a ATQ e ATJ e as intervenções pós-operatórias específicas. Os resultados mostram que após a ATQ, os anos de vida ajustados pela qualidade QALYs aumentaram em 2,90 anos no grupo de bicicleta ergométrica, em 2,35 anos no grupo não ergométrico, em 2,30 anos no início grupo de terapia aquática e por 2,41 anos no grupo de terapia aquática tardia. Segundo Yamamoto et al, (2007) A qualidade de vida e a função pós-operatória na população brasileira, ainda necessita ser mais pesquisada e não podem ser consideradas encerradas.

Monaghan et al (2016) verificaram a eficácia de um programa de exercícios funcionais supervisionado por fisioterapeuta entre 12 a 18 semanas após a ATQ. Os resultados mostram que não houve diferença significativa entre o grupo de exercícios funcionais e o grupo de controle nos testes paramétricos ou não paramétricos. Na semana 18, o componente de função da pontuação WOMAC foi significativamente menor indicando melhora no GI e não houveram diferença significativa nos componentes de rigidez e dor do Questionário WOMAC entre os grupos.

Barker et al (2013) investigaram se um programa de reabilitação adaptado é mais eficaz do que a prática padrão em melhorar a função em pacientes submetidos a artroplastia de recapeamento de quadril de metal sobre metal. Os resultados mostram que OHS do GI foi maior que o GC, a pontuação de atividade da UCLA e HOOS mostrou uma mudança entre os grupos. O estudo mostrou que um programa de reabilitação adaptado para a obtenção de resultados funcionais é eficaz em pacientes que se submeteram a ATQ.

Umpierres et al (2014) investigaram a eficácia de um protocolo de intervenção fisioterapêutica hospitalar em comparação apenas com a orientação. Os resultados mostram que a GI teve resultados mais elevados, quanto ao pós-operatório os resultados entre os dois grupos foram encontrados diferenças na adução e abdução. Segundo Martínez-Velilla et al (2018) exercícios de treinamento de resistência de baixa intensidade realizados durante um curto período fornece um benefício significativo em relação ao tratamento normal e pode ajudar a reverter a perda funcional associada à hospitalização aguda em idosos.

Coulter et al (2017) investigaram se os pacientes se saem melhor com fisioterapia domiciliar não supervisionada ou em ambulatorial. Os resultados mostram que não houve diferenças entre os grupos

para nenhuma medida. As pontuações basais para WOMAC, SF36 e UCLA foram semelhantes para ambos os grupos, mas o TUG foi mais lento no grupo baseado em casa.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os estudos demonstraram que os exercícios de fortalecimento da musculatura do quadril, exercícios aquáticos, treino de resistência progressiva, exercícios baseados em testes funcionais adequados para a ATQ, exercícios em casa, mobilizações faciais combinados com exercícios, exercícios com sustentação de peso, exercícios para os músculos do quadril e rotadores do quadril, exercício em ambiente hospitalar na fase aguda com orientação, treino de marcha, parecem eficazes no tratamento pós-operatório de ATQ. Com uma maior homogeneidade para os exercícios resistidos que estão bem fundamentados. Um ponto a se destacar é a variedade de protocolos e testes empregados, que dificulta a padronização dos resultados. Sugerimos mais pesquisas com protocolos mais padronizados e amostras maiores.

REFERÊNCIAS

- APRILE, I., RIZZO, R. S., ROMANINI, E., SANTIS, DE F., MARSAN, S., RINALDI, G., PADUA, L. (2011) Group rehabilitation versus individual rehabilitation following knee and hip replacement: a pilot study with randomized, single-blind, cross-over design. *Eur J Phys Rehabil Med* 2011; 47: 551-9 PMID: 21666574
- BARROS, A. A. G., MENDES, C. H. C., TEMPONI, E. F., COSTA, L. P., VASSALO, C. C., & GUEDES, E. de C. (2017). Efficacy evaluation of a protocol for safe hip surgery (total hip arthroplasty). *Revista Brasileira de Ortopedia (English Edition)*, 52, 29–33. Doi:10.1016/j.rboe.2017.08.004
- BARKER, K. L., NEWMAN, M. A., HUGHES, T., SACKLEY, C., PANDIT, H., KIRAN, A., & MURRAY, D. W. (2013). Recovery of function following hip resurfacing arthroplasty: a randomized controlled trial comparing an accelerated versus standard physiotherapy rehabilitation programme. *Clinical Rehabilitation*, 27(9), 771–784. doi:10.1177/0269215513478437
- BUDIB, M. B., HASHIGUCHI, M. M., OLIVEIRA-JUNIOR, S. A., & MARTINEZ, P. F. (2020). Influência da reabilitação física sobre aspectos funcionais em indivíduos submetidos à artroplastia total de quadril: uma revisão sistemática. *Rev. bras. geriatr. gerontol.* vol.23 no.2 Rio de Janeiro 2020 Epub Sep 18, 2020. doi.org/10.1590/1981-22562020023.190252
- BUSATO, M., QUAGLIATI, C., MAGRI, L., FILIPPI, A., SANNA, A., BRANCHINI, M., ... STECCO, A. (2016). Fascial Manipulation Associated With Standard Care Compared to Only Standard Postsurgical Care for Total Hip Arthroplasty: A Randomized Controlled Trial. *PM&R*, 8(12), 1142–1150. doi:10.1016/j.pmrj.2016.04.007
- COULTER, C., PERRIMAN, D. M., NEEMAN, T. M., SMITH, P. N., & SCARVELL, J. M. (2017). Supervised or Unsupervised Rehabilitation After Total Hip Replacement Provides Similar Improvements for Patients: A Randomized Controlled Trial. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, 98(11), 2253–2264. doi:10.1016/j.apmr.2017.03.032
- CRAWFORD, R. W., & MURRAY, D. W. (1997). Total hip replacement: indications for surgery and risk factors for failure. *Annals of the Rheumatic Diseases*, 56(8), 455–457. doi:10.1136/ard.56.8.455
- GALIA, C. R., DIESEL, C. V., GUIMARÃES, M. R., & RIBEIRO, T. A. (2017). Atualização em artroplastia total de quadril: uma técnica ainda em desenvolvimento. *Revista Brasileira de Ortopedia*, 52(5), 521–527. Doi:10.1016/j.rbo.2016.09.013
- HEIBERG, K. E., BRUUN-OLSEN, V., EKELAND, A., & MENGSHOEL, A. M. (2012). Effect of a walking skill training program in patients who have undergone total hip arthroplasty: Followup one year after surgery. *Arthritis Care & Research*, 64(3), 415–423. Doi:10.1002/acr.20681
- LENZA, M., FERRAZ, S. de B., VIOLA, D. C. M., GARCIA FILHO, R. J., CENDOROGLO NETO, M., & FERRETTI, M. (2013). Epidemiology of total hip and knee replacement: a cross-sectional study. *Einstein (São Paulo)*, 11(2), 197–202. Doi:10.1590/s1679-45082013000200011
- LIEBS, T. R., HERZBERG, W., RÜTHER, W., RUSSLIES, M., & HASSENPFUG, J. (2016). Quality-Adjusted Life Years Gained by Hip and Knee Replacement Surgery and Its Aftercare. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, 97(5), 691–700. doi:10.1016/j.apmr.2015.12.021

- ŁYP, M., KACZOR, R., CABAK, A., TEDERKO, P., WŁOSTOWSKA, E., STANISŁAWSKA, I., SZYPULA, J. & TOMASZEWSKI, W. (2016). A Water Rehabilitation Program in Patients with Hip Osteoarthritis Before and After Total Hip Replacement. *Medical Science Monitor*, 22, 2635–2642. doi:10.12659/msm.896203
- MARCHISIO, E. A., RIBEIRO, T. A., UMPIERRES, C. S., GALVÃO, L., ROSITO, R., MACEDO, C. A. S. & GALIA, C. R. (2020). Accelerated rehabilitation versus conventional rehabilitation in total hip arthroplasty (ARTHA): a randomized double blinded clinical trial. *Rev Col Bras Cir* 47:e20202548 DOI: 10.1590/0100-6991e-20202548
- MATHEIS, C., & STÖGGL, T. (2018). Strength and mobilization training within the first week following total hip arthroplasty. *Journal of Bodywork and Movement Therapies*, 22(2), 519–527. doi:10.1016/j.jbmt.2017.06.012
- MARTÍNEZ-VELILLA, N., CASAS-HERRERO, A., ZAMBOM-FERRARESI, F., LÓPEZ SÁEZ DE ASTEASU, M., LUCIA, A., GALBETE, A., GARCÍA-BAZTÁN, A., ALONSO-RENEO, J., GONZÁLEZ-GLARÍA, B., GONZALO-LÁZARO, M., IRÁIZOZ, I. A., GUTIÉRREZ-VALENCIA, M., RODRÍGUEZ-MAÑAS, L. IZQUIERDO, M. (2018). Effect of Exercise Intervention on Functional Decline in Very Elderly Patients During Acute Hospitalization. *JAMA Internal Medicine*. doi:10.1001/jamainternmed.2018.4869
- MIKKELSEN, L. R., PETERSEN, A. K., SØBALLE, K., MIKKELSEN, S. S., MECHLENBURG, I. (2019). Asymmetry and pelvic movements 6 months after total hip replacement Secondary analyses from a randomized controlled trial. *Acta Orthop. Belg.*, 2019, 85, 338-345
- MIKKELSEN, L. R., MIKKELSEN, S. S., & CHRISTENSEN, F. B. (2012). Early, Intensified Home-based Exercise after Total Hip Replacement - A Pilot Study. *Physiotherapy Research International*, 17(4), 214–226. doi:10.1002/pri.1523
- MIKKELSEN, L. R., MECHLENBURG, I., SØBALLE, K., JØRGENSEN, L. B., MIKKELSEN, S., BANDHOLM, T., & PETERSEN, A. K. (2014). Effect of early supervised progressive resistance training compared to unsupervised home-based exercise after fast-track total hip replacement applied to patients with preoperative functional limitations. A single-blinded randomised controlled trial. *Osteoarthritis and Cartilage*, 22(12), 2051–2058. doi:10.1016/j.joca.2014.09.025
- MIKKELSEN, L. R., PETERSEN, A. K., MECHLENBURG, I., MIKKELSEN, S., SØBALLE, K., & BANDHOLM, T. (2016). Description of load progression and pain response during progressive resistance training early after total hip arthroplasty: secondary analyses from a randomized controlled trial. *Clinical Rehabilitation*, 31(1), 11–22. doi:10.1177/0269215516628305
- MONAGHAN, B., CUNNINGHAM, P., HARRINGTON, P., HING, W., BLAKE, C., O' DOHERTYA, D., & CUSACK, T. (2017). Randomised controlled trial to evaluate a physiotherapy-led functional exercise programme after total hip replacement. *Physiotherapy*, 103(3), 283–288. doi:10.1016/j.physio.2016.01.003
- MUSUMECI, A., PRANOVI, G., & MASIERO, S. (2018). Patient education and rehabilitation after hip arthroplasty in an Italian spa center: a pilot study on its feasibility. *International Journal of Biometeorology*, 62(8), 1489–1496. doi:10.1007/s00484-018-1548-9

NANKAKU, M., IKEGUCHI, R., GOTO, K., SO, K., KURODA, Y., & MATSUDA, S. (2016). Hip external rotator exercise contributes to improving physical functions in the early stage after total hip arthroplasty using an anterolateral approach: a

randomized controlled trial. *Disability and Rehabilitation*, 38(22), 2178–2183. doi:10.3109/09638288.2015.1129453

OKORO, T., WHITAKER, R., GARDNER, A., MADDISON, P., ANDREW, J. G., & LEMMEY, A. (2016). Does an early home-based progressive resistance training program improve function following total hip replacement? Results of a randomized controlled study. *BMC Musculoskeletal Disorders*, 17(1). doi:10.1186/s12891-016-1023-x

STEINHILBER, B., HAUPT, G., MILLER, R., BOEER, J., GRAU, S., JANSSEN, P., & KRAUSS, I. (2011). Feasibility and efficacy of an 8-week progressive home-based strengthening exercise program in patients with osteoarthritis of the hip and/or total hip joint replacement: a preliminary trial. *Clinical Rheumatology*, 31(3), 511–519. doi:10.1007/s10067-011-1893-0

TSUKAGOSHI, R., TATEUCHI, H., FUKUMOTO, Y., IBUKI, S., AKIYAMA, H., SO, K., KURODA, Y., OKUMURA, H., ICHIHASHI, N. (2014) Functional performance of female patients more than 6 months after total hip arthroplasty shows greater improvement with weight-bearing exercise than with non-weight-bearing exercise. Randomized controlled trial. *Eur J Phys Rehabil Med* 2014; 50: 665-75 PMID: 25051209

TURNER, A. J., CHANDER, H., KNIGHT, A. C. (2018) Falls in geriatric populations and hydrotherapy as an intervention: a brief review. *Geriatrics*. 2018;3(4):71. doi: 10.3390/geriatrics3040071

UMPIERRES, C. S., RIBEIRO, T. A., MARCHISIO, Â. E., GALVÃO, L., BORGES, Í. N. K., MACEDO, C. A. DE S., & GALIA, C. R. (2014). Rehabilitation following total hip arthroplasty evaluation over short follow-up time: Randomized clinical trial. *Journal of Rehabilitation Research and Development*, 51(10), 1567–1578. doi:10.1682/jrrd.2014.05.0132

WINTHER, S. B., FOSS, O. A., HUSBY, O. S., WIK, T. S., KLAKSVIK, J., & HUSBY, V. S. (2018): A randomized controlled trial on maximal strength training in 60

patients undergoing total hip arthroplasty. *Acta Orthopaedica*, DOI: 10.1080/17453674.2018.1441362

YAMAMOTO, P. A., LAHOZ, G. L., TAKATA, E. T., MASIERO, D., & CHAMLIAN, T. R. (2007). Avaliação da função e qualidade de vida em pacientes submetidos a artroplastia de ressecção tipo Girdlestone. *Acta Ortopédica Brasileira*, 15(4), 214–217. doi:10.1590/s1413-78522007000400008

YAZAR, E. A., KARAKUS, O., & SAYGI, B. (2019). Efeito das posições dos enxertos na estabilidade da artroplastia total de quadril com diferentes tipos de encurtamento subtrocantérico. *Revista Brasileira de Ortopedia*, 54(04), 465–470. Doi:10.1055/s-0039-16940

Capítulo 5

10.37423/210804664

TERAPIA MANUAL E EDUCAÇÃO EM NEUROCIÊNCIA DA DOR NO MANEJO DE PACIENTES COM DOR LOMBAR CRÔNICA E CINESIOFÓBICOS.

DRIELLY ANDRADE DA CUNHA

Farec - Faculdade do Recife

Renata Soraya Coutinho da Costa

Farec - Faculdade do Recife

Luana Maria Barros de Carvalho

Farec - Faculdade do Recife

Emilly Virginia Natanny Ribeiro Pedrosa

Farec - Faculdade do Recife

Evelyn Cristina Xavier da Silva

Farec - Faculdade do Recife

Resumo: Introdução: A dor lombar crônica é a sintomatologia que tornou-se uma preocupação urgente de saúde pública mundial por resultar em alta incapacidade e baixa qualidade de vida. Despendendo altos custos financeiros com tratamentos e exames, e acumulando prejuízos econômicos por afetar a produtividade laboral. Comumente associada à dor lombar crônica, encontramos a cinesiofobia descrita como medo debilitante de realizar movimentos. Para indivíduos cinesiofóbicos e com dor lombar crônica, a aplicação da terapia manual tem mostrado resultados animadores quando combinada com um protocolo de educação em neurociência da dor. Tal intervenção visa ser capaz de atender as expectativas do paciente, aprimorar os esquemas corporais dentro do cérebro e recontextualizar a percepção da dor. **Objetivo:** Analisar a redução da dor e cinesiofobia em pacientes com dor lombar crônica submetidos a um protocolo de terapia manual associado a educação em neurociência da dor. **Método:** As buscas foram realizadas nas bases de dados PubMed, PEDro, Cochrane Library e LILACS no período de março a maio de 2021. As palavras-chave “dor lombar crônica”, “lumbago”, “terapia manual”, “manipulação musculoesquelética” e “educação em neurociência”, traduzidas para o inglês, foram combinadas em 3 estratégias diferentes, cada uma adequada a base de dados a ser investigada. **Resultados:** Inicialmente foram encontrados 62 estudos, dos quais 55 foram excluídos por não se enquadrarem na proposta da pesquisa e 4 por estarem duplicados nas bases de dados. Assim, 3 estudos foram considerados nesta revisão. Todos apresentaram score $\geq 6/10$, na Escala PEDro, que qualifica metodologicamente os artigos como de alta qualidade. Após a análise dos resultados obtidos através dos artigos selecionados, todos os dados coletados, bem como seus respectivos resultados, foram descritos em uma tabela que contém dados dos artigos. **Considerações finais:** Com base nos resultados dos estudos a educação em neurociência da dor quando associada a terapia manual apresenta evidências relevantes, que apoiam sua aplicação na prática clínica, por reduzir a dor e níveis de cinesiofobia em pacientes com dor lombar crônica inespecífica. Contudo, faz-se necessário que novos ensaios clínicos sejam desenvolvidos, com maior rigor metodológico, e que avaliem a educação em dor e da terapia manual de maneira isolada de outras intervenções para se compreender melhor a ocorrência do medo do movimento e sua relação com a dor.

Palavras-chave: Dor lombar crônica. Lumbago. Terapia manual. Manipulação musculoesquelética. Educação em neurociência.

1. INTRODUÇÃO

Assumindo posição de liderança entre os distúrbios musculoesqueléticos, a Dor Lombar (DL) é a sintomatologia, que tornou-se uma preocupação urgente de saúde pública mundial por resultar em alta incapacidade e baixa qualidade de vida. Pesquisas sustentam que esse problema acarreta uma alta prevalência de cronicidade atingindo a marca de até 21,5% da população brasileira na fase adulta (ALMEIDA et al., 2008; NASCIMENTO e COSTA, 2015; STOPA et al., 2019).

Classificamos como Dor Lombar Crônica Inespecífica (DLCI), a exposição prolongada à dor entre a margem costal e a região superior à prega glútea, por período igual ou superior a 12 semanas e na ausência de um fator etiológico identificável. Sendo frequente nesses indivíduos: alterações de relacionamento social e profissional, limitações nas atividades físicas, transtornos de humor e ansiedade e as alterações de funcionalidade (ALTUG et al., 2016; MAHER, UNDERWOOD, BUCHBINDER, 2017; DONATTI et al., 2019).

Em pacientes com DLCI, a cinesiofobia, um fenômeno que pode ser explicado por um medo debilitante de realizar determinados movimentos e atividades, e a catastrofização, descrita como sentimentos de desamparo e concentração excessiva na convicção da incapacidade de controlar a dor, assumem um papel preditor de mau prognóstico. Pacientes com uma percepção clara da localização de sua dor estão mais propensos a desenvolverem sentimentos cinesiofóbicos, mesmo após a recuperação do tecido lesionado biologicamente (KORI, MILLER, TODD et al., 1990; TROCOLI e BOTELHO, 2016).

Considerando que o perfil psicológico do indivíduo com DLCI influencia o prognóstico, a adesão e o sucesso do tratamento, a Educação em Neurociência da Dor (PNE) do inglês *Pain Neuroscience Education* é defendida como uma ferramenta promissora capaz de reduzir níveis de cinesiofobia. Eficaz no manejo de dores musculoesqueléticas crônicas a PNE, possibilita ao paciente a compreensão da neurofisiologia e neurobiologia da dor atuando como um facilitador na construção de novas crenças (LOUW et al., 2016; MALFLIET et al., 2018).

Frequentemente utilizada para no tratamento de pacientes com dor lombar, a Terapia Manual (TM) que dispõe de manipulações dos tecidos corporais, músculos e ossos por mãos ou equipamentos, é uma abordagem que vem se consolidando entre os fisioterapeutas por demonstrar efeitos terapêuticos positivos na redução da dor, aumento da amplitude de movimento e melhora da incapacidade (HIDALGO et al., 2014; RUDDOCK et al., 2016).

Por se tratar de um problema de saúde global que despense altos custos financeiros com consultas, intervenções e exames, a DLCL acumula altos prejuízos econômicos por afetar negativamente a produtividade laboral e a qualidade de vida. Este trabalho tem como objetivo analisar a eficácia da associação de educação em neurociência da dor e terapia manual na redução da dor e dos sintomas cinesiofóbicos em pacientes com dor lombar crônica.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, com artigos selecionados no período entre março e maio de 2021, sobre a aplicação fisioterapêutica da terapia manual associada a educação em neurociência da dor em pacientes cinesiofóbicos e com dor lombar crônica. Realizando uma pesquisa nas bases de dados: Pubmed, Cochrane Library, LILACS e PEDro. Utilizando a estratégia PICO descrita no quadro abaixo para orientar a pesquisa (Quadro 1).

Quadro 1- Descrição da estratégia Pico da pesquisa

BASE DE DADOS	DESCRIÇÃO
P	adultos com dor lombar crônica inespecífica
I	educação em neurociência da dor com terapia manual
C	exercício terapêutico
O	redução da dor e níveis de cinesiofobia

Fonte: As autoras, 2021.

A pesquisa utilizou as seguintes palavras-chaves: Manual Therapy, Musculoskeletal Manipulation, Neuroscience Education, Chronic Low Back Pain, Lumbago. Que foram cruzadas conforme as estratégias relacionadas abaixo (Quadro 2).

Quadro 2 - Estratégia de busca do estudo

BASE DE DADOS	ESTRATÉGIA
PUBMED	Manual Therapy or Musculoskeletal Manipulation and Neuroscience Education and Chronic Low Back Pain or Lumbago
COCHRANE	Manual Therapy and Neuroscience Education and Chronic Low Back Pain
LILACS	Manual Therapy and Neuroscience Education and Chronic Low Back Pain
PEDro	Manual Therapy, Neuroscience Education, Chronic Low Back Pain

Fonte: Autoras, 2021.

Foram considerados elegíveis apenas ensaios clínicos randomizados que analisaram a eficácia da associação de terapia manual e educação em neurociência da dor em pacientes com dor lombar crônica inespecífica tendo como desfecho primário ou secundário a redução da dor e cinesiofobia. Publicados nos últimos cinco anos, sem restrição de idioma e que não apresentasse conflito de

interesse. Não houve restrição com relação ao comparador, sendo aceitos qualquer intervenção de terapia manual.

Como critério de exclusão foram utilizados os seguintes parâmetros: guias de prática clínica, protocolos para ensaios clínicos, estudos de viabilidade e predição de incapacidade, tratamentos medicamentosos, estudos que avaliaram outro tipo de disfunção que não a DLCl e que não utilizaram a TM em associação com PNE como intervenção.

3. RESULTADOS

Inicialmente foram localizados 62 estudos, dos quais 55 foram excluídos por não se enquadrarem na proposta da pesquisa e 4 por estarem duplicados nas bases de dados. Desta forma, 3 estudos foram considerados nesta pesquisa. A descrição das etapas de coleta, filtragem e seleção dos artigos obedeceu a ordem de acordo com o fluxograma abaixo (Figura 1).

Os 3 estudos selecionados foram avaliados com base na Escala PEDro, que tem como objetivo de auxiliar na identificação da qualidade metodológica dos estudos, bem como se a estatística é suficiente para a interpretação dos resultados e sua aplicabilidade (Tabela 1). De acordo com esta escala todos os estudos mostram-se consideravelmente adequados por apresentaram Score $\geq 6/10$. Tal pontuação é obtida a partir da contagem do número de critérios da lista de verificação que são satisfeitos no relatório do ensaio (de MORTON, 2009; SHIWA et al., 2011).

Tabela 1 - Avaliação dos estudos com base na Escala PEDro.

Artigos	Critérios da escala PEDro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saracoglu et al.,2020a	NC	S	S	S	N	N	S	S	N	S	S
Saracoglu et al.,2020b	NC	S	S	S	N	N	S	S	N	S	S
Grande-Alonso et al.,2019	NC	S	N	S	N	N	N	S	S	S	S

Legenda: S, Sim; N, Não; NC, Não contribuiu para a pontuação total

Fonte: Base de Dados PEDro, 2021.

Após a análise dos resultados obtidos através dos artigos selecionados. O autor, ano de publicação, objetivo, amostra, intervenção e resultados foram descritos na (Tabela 2).

Tabela 2 - Características dos estudos selecionados

AUTOR (ANO)	OBJETIVO	AMOSTRA	INTERVENÇÃO	RESULTADO
Saracoglu et al., (2020a)	Investigar os efeitos de curto e médio prazo da combinação PNE e TM, na redução da intensidade da dor, desempenho das costas, deficiência e cinesiofobia em pacientes com DLCI	n= 57 GI formado por G1: n=20 Idade: 39,67±13,71 anos. G2: n=19 Idade:41,38 ± 12,70 anos. GC formado por G3: n=18 Idade: 40,25 ± 9,70 anos.	G1: PNE+MT+HEP PNE: Através de anedotas, metáforas e fotos por slides; MT: Mobilização Articular da coluna lombar; HEP: Alongamento lombar e pélvico + exercícios de aquecimento e fortalecimento; G2:MT+HEP: Idênticos a G1; G3: HEP.	G1: Redução da cinesiofobia na 4 a 12 semanas na comparação com G1 e G3. Sendo a intervenção do G1 mais eficaz na redução da intensidade da dor se comparada aos grupos G2 e G3.
Saracoglu et al., (2020b)	Testar a hipótese que PNE em pacientes com DLCI tratados por meio de técnicas de MT produzirá resultados diferentes em termos de qualidade de vida e intensidade da dor em comparação com TPE.	n= 35 GI: 17 Idade:39.83 ± 14.23 anos. GC:18 Idade:38.91 ± 12.54 anos.	GI: MT+PNE MT: mobilização de nervos, articulações e tecidos moles. PNS: Informação sobre a experiência da dor e o processo neurofisiológico com metáforas, anedotas, gráficos e fotos GC: MT+TPE MT: Idêntico ao GI TPE: Informações sobre anatomia, biomecânica e função das costas, prognóstico, atividades recuperação e prevenção de ocorrência.	Resultados sugerem que PNE aumenta a capacidade dos pacientes de lidar e compreender a dor, promovendo autoconfiança e reduzindo os efeitos negativos das crenças e medos. Além disso a PNE com MT teve um maior efeito na redução da intensidade da dor a curto prazo e melhora na qualidade de vida.

Grande-Alonso et al., (2019)	Comparar a eficácia de uma abordagem biocomportamental com e sem fisioterapia manual ortopédica na intensidade e frequência da dor em pacientes com DLCI.	n= 50 GI: n=25 Idade: 39,88 ± 13,20 anos. GC: n=25 Idade: 38,29 ± 13,10 anos.	GI: PNE+ET+MT PNE: Através de diagramas imagens e texto por slides; ET: Exercícios terapêuticos de estabilização da região lombar; MT: Mobilizações e trações da lombar e técnicas globais de mobilização neural da lombar; GC: ET+PNE ET+PNE: Idênticos ao GI.	Na avaliação individual das intervenções, houve redução estatisticamente significativa da cinesiofobia. Quando comparadas, as intervenções nos GI x GC a redução da cinesiofobia não apresentou diferença significativas. Propondo, que a MT não potencializa os efeitos de um tratamento fisioterapêutico associado a PNE. Ambos os grupos obtiveram melhora superior à mudança mínima na intensidade da dor; uma redução superior a 15,0 mm no VAS.
------------------------------	---	---	--	---

Legendas: CLBP, dor lombar crônica; ET, exercícios terapêuticos G1: grupo 1; G2, grupo 2; G3, grupo 3; GI, grupo intervenção; GC, grupo controle; HEP, programa de exercícios domiciliares; MT, terapia manual; n, número de participantes; PNE, educação em neurociência da dor; TPE: tradicional do paciente.

Fonte: Autoras, 2021.

4. DISCUSSÃO

Esta revisão de literatura objetivou analisar a diminuição da intensidade da dor e cinesiofobia em pacientes com dor lombar crônica inespecífica submetidos a um tratamento baseado na combinação de educação em neurociência da dor e terapia manual de forma isolada ou associada a outras intervenções fisioterapêuticas.

A escassez de estudos, a apresentação de diferentes resultados no pré-tratamento em relação a variável cinesiofobia, a carência de informações sobre a presença de comorbidades entre os participantes, a ausências de grupos controle que avaliassem a associação da TM e PNE e as divergências nas informações sobre a alocação por gênero nos grupos, limitam as conclusões sobre a eficácia da educação em neurociência da dor associada a terapia manual como alternativa para redução de dor e sintomas cinesiofóbicos em pacientes com dor lombar crônica que apresentam ojeriza à realização de movimentos específicos e atividades por medo da dor.

Compreendendo a definição de dor pela Associação Internacional para o Estudo da Dor em 2020 (IASP, do inglês *International Association for the Study of Pain*), que define a dor como: Uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a, ou semelhante àquela associada a, dano real ou potencial ao tecido. Podemos correlacionar a dor ao medo, se levarmos em consideração que os pensamentos são sinais nervosos e que os pensamentos cinesiofóbicos, comuns em pessoas com dor persistente, são capazes de posicionar o indivíduo em um ciclo onde ele não se movimenta por medo da dor e por não se movimentar acaba mais suscetível a episódios dolorosos, levando ao cérebro a mensagem que o corpo está em perigo, contribuindo para que o indivíduo permaneça em um estado de dor constante (VLAEYEN e LYNTON, 2000; DESANTANA et al., 2020).

Sendo o medo uma reação natural do corpo que tem por objetivo protegê-lo, é importante compreender quando esse medo passa a ser considerado um transtorno ao tratar pacientes com DLCl. Estudos recentes encorajam a consideração da cinesiofobia durante a avaliação preliminar e ao traçar o plano de tratamento para estes pacientes, cujo o medo tornou-se um fator que prejudica a qualidade de vida, interrompe o andamento dos tratamentos e incapacita o profissional de exercer suas atividades laborais (LUQUE-SUAREZ; MARTINEZ; FALLA, 2017).

Perante o que foi apresentado e considerando o conjunto de características psicológicas dos indivíduos com DLCl, a aplicação da PNE tem por objetivo incentivar que o manejo da dor e da cinesiofobia nestes pacientes seja realizado através de um modelo biopsicossocial onde a busca pela

causa da dor, as questões psicológicas e as limitações nas atividades sociais converjam para o mesmo ponto, que é a recuperação do paciente.

Por conseguinte, a proposta do PNE é explicar ao paciente sobre os processos fisiológicos e psicológicos relacionados a sua dor, reassegurando que suas dores são reais mesmo que não haja dano ao tecido, que o cérebro tem a capacidade de aumentar ou diminuir as mensagens de perigo através de uma abordagem capaz de reconceituar e contestar o conhecimento já existente, tornando o medo da dor menos ameaçador. Subestimar a capacidade de compreensão dos pacientes sobre a neurofisiologia da dor é a barreira mais comumente encontrada para justificar a falta de aplicação do PNE, mesmo quando as evidências disponíveis favorecem sua aplicação na prática clínica (LUNDBERG et al., 2011; MOSELEY, 2003).

Mediante a análise dos artigos, o estudo de Saracoglu et al. (2020a), concluiu que o programa multimodal do grupo que associou PNE e TM além de exercícios domiciliares em seu protocolo foi responsável por uma redução relevante, para a prática clínica, do nível de cinesiofobia e dor quando comparado ao grupo que agregou terapia manual a exercícios domiciliares, e ao grupo que realizou apenas de exercícios domiciliares. Esses achados, corroboram com os resultados obtidos na revisão por Louw et al., (2016) e Puentedura e Flynn, (2016) cujas evidências apoiam o uso da PNE para redução dos fatores psicossociais e da TM para redução da intensidade da dor, por produzir efeitos mecânicos locais, capazes de atender as expectativas do paciente mesmo que a curto prazo.

Fortalecendo os resultados de Saracoglu et al., (2020a) outro estudo do mesmo autor Saracoglu et al., (2020b) sugere mais evidências no que diz respeito a implementação da PNS e TM no tratamento de pacientes com DLCl. Os resultados obtidos propõem que a união das abordagens é capaz de promover sentimentos de autoconfiança, aumentar a consciência sobre o controle da dor e redução do medo, reduzir a intensidade da dor e melhorar a qualidade de vida. Tais descobertas estão em conformidade com os resultados da revisão sistemática de Watson et al., (2019) na qual demonstra que o uso da PNE para distúrbios musculoesqueléticos crônicos, apresentou ter um efeito clinicamente relevante na redução da cinesiofobia podendo melhorar a reconceitualização da dor. Bem como os estudos de Malfliet et al., (2018) e Fletcher; Bradnam, Barr (2016) no qual relatam que o PNE como parte de um aprendizado combinado foi capaz de melhorar significativamente a cinesiofobia quando comparado a educação fundamentada no modelo biomédico. Sendo assim, a utilização de uma estratégia educativa sobre a neurofisiologia da dor é capaz de contribuir para a redução dos níveis de evitação e medo.

Os resultados obtidos, contrastam com os alcançados por Grande-Alonso et al., (2019) nos quais a análise individual dos grupos controle e intervenção demonstraram uma diminuição estatisticamente significativa na variável cinesiofobia e intensidade da dor. Contudo, na comparação inter-grupal o acréscimo da TM ao protocolo de tratamento não foi capaz de potencializar os efeitos do tratamento fisioterapêutico baseado na PNE. Todavia podemos atribuir esse resultado as diferenças nos níveis de cinesiofobia pré-intervenção que apresentavam variações entre os grupos. Ainda assim, podemos observar que para este estudo a aplicação da TM foi capaz de desempenhar uma influência positiva na satisfação do paciente, podendo resultar em maiores chances de adesão ao tratamento.

Explorando a heterogeneidade entre os estudos e de acordo com as alocações dos grupos controle e intervenção descritos na (Tabela 2), podemos observar que Saracoglu et al., (2020a) durante 4 semanas, apresenta uma intervenção composta por sessões de TM, realizadas 2 vezes por semana com duração de 30 minutos, PNE realizada 1 vez por semana com duração aproximada de 45 minutos, e exercícios domiciliares realizados 3 vezes ao dia. Diferentemente de Grande-Alonso et al., (2019) que durante as mesmas 4 semanas, contou com 5 sessões de PNE nas sessões 1, 3, 5, 7 e 8, alternadas pelas sessões 2, 4 e 6 onde eram revisados os conhecimentos adquiridos na sessão anterior, exercícios terapêuticos assim como TM, realizados 2 vezes por semana com duração aproximada de 25 minutos. Contrastando com Saracoglu et al., (2020b) que contou com 1 sessão semanal de PNE por aproximadamente 45 minutos, 2 sessões semanais de TM com duração aproximada de 45 minutos e 1 sessão de educação tradicional realizada antes da primeira sessão de TM.

Os desfechos de interesse para este estudo foram a redução da cinesiofobia, avaliada pela aplicação da Escala de Tampa para Cinesiofobia (TSK), um questionário composto por 17 questões, capazes de prever os níveis de cinesiofobia que geram maior incapacidade. Sendo atualmente um dos instrumentos mais empregados para avaliar a crença de medo e a evitação da dor. O score final pode ser de no mínimo 17 pontos e no máximo 68 pontos. Quanto maior a pontuação maior o nível de cinesiofobia.

Para avaliar a dor, foram utilizadas as escalas: Visual Analogue Scale (VAS) que consiste na aferição da intensidade de dor pelo paciente, através de uma linha reta medindo 10 cm, onde uma extremidade indica a ausência de dor e na extremidade oposta a pior dor possível, e Numeric Pain Rating Scale (NPRS) instrumento em que os pacientes avaliam a sua dor em uma escala de 0 a 10 (SOUZA E SILVA,2005; SIQUEIRA, F.B; TEIXEIRA-SALMELA, L. F.; MAGALHÃES,2007).

A totalização da alocação por gênero nos GC e GI, não foi possível em dois dos três estudos pois o detalhamento demográfico dos participantes não foi atualizado no decorrer das perdas amostrais, sendo considerado as características do número de participantes do grupo inicial.

Quanto a atribuição dos resultados aos efeitos clínicos, podemos supor que como a avaliação da cinesiofobia através da Escala de Tampa foi realizada em apenas dois dos três dos estudos, para estes, a análise quantitativa dos dados fornece informações que a PNE é eficaz na redução da cinesiofobia. Para o estudo restante a avaliação torna-se mais subjetiva pois foi realizada de forma qualitativa ao sugerir a redução das crenças negativas e do medo. Para o construto dor, a avaliação mesmo que realizada por escalas diferente foi capaz de mensurar quantitativamente que a intensidade da dor apresentou reduções expressivas para a prática clínica em todos os estudos.

No que refere-se as limitações dos estudos incluídos nesta revisão, apenas um estudo avaliou de forma isolada da eficácia da PNE associada a TM como comparador de outras intervenções, porém, não avaliou o desfecho cinesiofobia, amostras de tamanho muito pequenas que pode gerar resultados não representativos da população em geral acometida por dor lombar crônica, a associação de manipulação e exercícios de estabilização dentro do mesmo grupo, a consideração que os exercícios podem influenciar os resultados em relação a redução da intensidade da dor devido a liberação de substâncias analgésicas com a possível promoção de autonomia funcional para este paciente, e a ausência de uma classificação específica por subgrupos que leve em consideração a realização de manipulações para pacientes com dor lombar crônica considerando a cinesiofobia como barreira para a realização de movimentos.

Com relação às limitações desta revisão, é importante mencionar a escassez de estudos que analisem a educação em neurociência da dor e terapia manual como intervenção para pacientes com dor lombar crônica e cinesiofóbicos, e a heterogeneidade dos estudos incluídos, principalmente no que se refere aos tipos de intervenção. Dessa forma, ressaltamos a importância de considerar essas limitações antes de interpretar os resultados desta revisão.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desta maneira, as evidências disponíveis favorecem o uso de educação em neurociência da dor quando associada a terapia manual no tratamento de pacientes cinesiofóbicos com dor lombar crônica para redução da dor e níveis de cinesiofobia.

Contudo, faz-se necessário que novos ensaios clínicos sejam desenvolvidos, com maior rigor metodológico, com maiores amostras, que considerem a cinesiofobia como barreira para a prática de exercícios e que avaliem a eficácia da educação em dor e da terapia manual de maneira isolada de outras intervenções para se compreender melhor a ocorrência do medo do movimento e sua relação com a dor.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, I. C. G. B.; SÁ, K.N., SILVA, M.; BAPTISTA, A.; MATOS, M. A.; LESSA, Í. Prevalência de dor lombar crônica na população da cidade de Salvador. *Revista Brasileira de Ortopedia* [online], Brasil, v.43, n.3, pp. 96-102, Março, 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0102-36162008000200007>. Acesso em 13/10/2020.
- ALTUG, F.; ÜNAL, A.; KILAVUZ, G.; KAVLAK, E., ÇITISLI, V.; CALAK, U. Investigation of the relationship between kinesiophobia, physical activity level and quality of life in patients with chronic low back pain. *Journal of back and musculoskeletal rehabilitation, Turkey*, v.29, n.3, p.527–531, August, 2016.
- DESANTANA, J. M.; PERISSINOTTI, D. M. N.; OLIVEIRA, J. J. O de.; CORREIA, L. F.; OLIVEIRA, C. M.; FONSECA, P. R. B da.; Definição de dor revisada após quatro décadas. *BrJP* [online], Brasil, v.3, n3, p.197-198, Jul-Set, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.5935/2595-0118.20200191>. Acesso em 15/10/2020.
- DONATTI, A.; ALVES, É.; TERASSI, M. L.; MORETTI, B.; PAVANINI, S. C. L.; INOUE, K. Relação entre a intensidade de dor lombar crônica e limitações geradas com os sintomas depressivos. *BrJP* [online], Brasil, v.2 n.3, p.247-254, Jul- Set, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.5935/2595-0118.20190044>. Acesso em 15/10/2020.
- FLETCHER, C.; BRADNAM, L.; BARR, C. The relationship between knowledge of pain neurophysiology and fear-avoidance in people with chronic pain: A point in time, observational study. *Physiother Theory Pract.*, Australia, v.32, n.4, p.271-276, April, 2016.
- GRANDE-ALONSO, M.; SUSO-MARTÍ, L.; CUENCA-MARTÍNEZ, F.; PARDO-MONTERO, J.; GIL-MARTÍNEZ, A.; LA TOUCHE R. Physiotherapy based on a biobehavioral approach with or without orthopedic manual physical therapy in the treatment of nonspecific chronic low back pain: a randomized controlled trial. *Pain Med.*, Spain, v.20, n.12, p.2571-2587, December, 2019.
- HIDALGO, B.; DETREMBLEUR, C.; HALL, T.; MAHAUDENS, P.; NIELENS, H. The efficacy of manual therapy and exercise for different stages of nonspecific low back pain: an update of systematic reviews. *J Man Manip Ther.*, Belgium, v.22, p.59– 74, May, 2014.
- KORI, S.; MILLER, R.; TODD, D. Kinesiophobia: a new view of chronic pain behavior. *Pain Manag.* 1990;v.3, n.1, p.35–43, 1990.
- LOUW, A.; ZIMNEY, K.; PUENTEDURA, E. J; DIENER, I. The efficacy of pain neuroscience education on musculoskeletal pain: A systematic review of the literature. *Physiother Theory Pract.*, E.U.A, v.32, n.5, p. 332-355, July, 2016.
- LUNDBERG, M.; FRENNERED, K.; HAGG, O; STYF, J. The impact of fear-avoidance model variables on disability in patients with specific or nonspecific chronic low back pain. *Spine (Phila Pa 1976)*, Sweden, v.36, n.19, p.1547-1553, September, 2011.
- LUQUE-SUAREZ, A.; MARTINEZ-CALDERON, J.; FALLA, D. Role of kinesiophobia on pain, disability and quality of life in people suffering from chronic musculoskeletal pain: a systematic review. *Br J Sports Med.*, Spain, v.53, n.9, p.554-559, May, 2019.

MAHER, C.; UNDERWOOD, M.; BUCHBINDER, R. Nonspecific low back pain, *The Lancet*, Australia, v.18, n.18, p.736-747, February, 2017.

MALFLIET, A.; KREGEL, J.; MEEUS, M.; ROUSSEL, N.; DANNEELS, L.; CAGNIE, B.; DOLPHENS, M.; NIJS, J. Blended-Learning Pain Neuroscience Education for People With Chronic Spinal Pain: Randomized Controlled Multicenter Trial. *Phys Ther.*, Belgium, v.98, n.5, p.357-368, May, 2018.

de MORTON, N. A. "The PEDro scale is a valid measure of the methodological quality of clinical trials: a demographic study." *The Australian journal of physiotherapy*, Australia, v. 55, n.2, p.129-133, 2009.

MOSELEY, L. Unraveling the barriers to reconceptualization of the problem in chronic pain: the actual and perceived ability of patients and health professionals to understand the neurophysiology. *J Pain*, Australia, v.4, n.4, p.184-189, May, 2003.

NASCIMENTO, P. R. C. do; COSTA, L. O. P. Prevalência da dor lombar no Brasil: uma revisão sistemática. *Cad. Saúde Pública*, Brasil, v. 31, n. 6, p. 1141-1156, Junho, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-311X00046114>. Acesso em 13/10/2020.

PUENTEDURA, E.J.; FLYNN, T. Combining manual therapy with pain neuroscience education in the treatment of chronic low back pain: A narrative review of the literature. *Journal Physiotherapy Theory and Practice*, v.32, p.408-414, 2016

RUDDOCK, J. K; SALLIS, H.; NESS, A.; PERRY, R. E. Spinal manipulation vs sham manipulation for nonspecific low back pain: a systematic review and meta-analysis. *J Chiropr. Med.*, UK, v.5, p.165– 183, September, 2016.

SARACOLU, I.; ARIK, M. I.; AFSAR, E.; GOKPINAR, H. H. The effectiveness of pain neuroscience education combined with manual therapy and home exercise for chronic low back pain: A single-blind randomized controlled trial. *Physiother Theory Pract.*, Turkey, v.19, p.1-11, August, 2020a.

SARACOGLU, I.; ARIK, M. I.; AFSAR, E.; GOKPINAR, H. H. The short-term effects of neuroscience pain education on quality of life in patients with chronic low back pain: A single-blinded randomized controlled trial. *European Journal of Integrative Medicine*, Turkey, v.33, ISSN 1876-3820, January, 2020b.

SHIWA, S. R.; COSTA, L. O. P.; MOSER, A. D. L; AGUIAR, I. C; OLIVEIRA, L. V. F. de. Pedro: a base de dados de evidências em fisioterapia. *Fisioterapia em Movimento*, Brasil, v. 24, n. 3 p. 523-533, Setembro, 2012

SIQUEIRA, F.B; TEIXEIRA-SALMELA, L. F.; MAGALHÃES, L. C. Análise das propriedades psicométricas da versão brasileira da Escala Tampa de Cinesiofobia. *Acta Ortop Bras.*, Brasil, v.15, n.1, p.19-24, 2007.

SOUSA, F. F.; SILVA, J. A. A métrica da dor (dormetria): problemas teóricos e metodológicos. *Revista DOR*, Brasil, v.6, n.1, p.469-513, 2005.

STOPA, S. R.; SZWARCOWALD, C. L; OLIVEIRA, M. M.; GOUVEA, E. C. D, P.; VIEIRA, M. L. F. P.; FREITAS, M. P. S., SARDINHA, L. M. V.; MACÁRIO, E. M. Pesquisa Nacional de Saúde 2019: histórico, métodos e perspectivas. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*, Brasil, v.29, n.5, 2020. Disponível em: http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S167949742020000500035&lng=pt&nrm=iso. Acessado em 04/04/ 2021.

TROCOLI, T. O.; BOTELHO, R. V. Prevalência de ansiedade, depressão e cinesiofobia em pacientes com lombalgia e sua associação com os sintomas da lombalgia. Rev. Bras. Reumatologia, Brasil, v. 56, n. 4, p. 330-336, Fevereiro, 2016.

VLAEYEN, J. W. S.; LINTON, S. J. Fear-avoidance and its consequences in chronic musculoskeletal pain: a state of the art. Pain, Sweden, v. 85, n. 3, p. 317-332, April, 2000

WATSON, J. A.; RYAN, C. G.; COOPER, L.; ELLINGTON, D.; WHITTLE, R.; LAVENDER, M.; DIXON, J.; ATKINSON, G.; COOPER, K.; MARTIN, D. J. Pain Neuroscience Education for Adults With Chronic Musculoskeletal Pain: A Mixed-Methods Systematic Review and Meta-Analysis. J Pain, UK, v. 20, n. 10, p. 1140.e1-1140.e22, October, 2019.

ANEXOS

ANEXO A- Escala PEDro de avaliação.

Escala de PEDro – Português (Brasil)

1. Os critérios de elegibilidade foram especificados	não ☐ sim ☐ onde:
2. Os sujeitos foram aleatoriamente distribuídos por grupos (num estudo cruzado, os sujeitos foram colocados em grupos de forma aleatória de acordo com o tratamento recebido)	não ☐ sim ☐ onde:
3. A alocação dos sujeitos foi secreta	não ☐ sim ☐ onde:
4. Inicialmente, os grupos eram semelhantes no que diz respeito aos indicadores de prognóstico mais importantes	não ☐ sim ☐ onde:
5. Todos os sujeitos participaram de forma cega no estudo	não ☐ sim ☐ onde:
6. Todos os terapeutas que administraram a terapia fizeram-no de forma cega	não ☐ sim ☐ onde:
7. Todos os avaliadores que mediram pelo menos um resultado-chave, fizeram-no de forma cega	não ☐ sim ☐ onde:
8. Mensurações de pelo menos um resultado-chave foram obtidas em mais de 85% dos sujeitos inicialmente distribuídos pelos grupos	não ☐ sim ☐ onde:
9. Todos os sujeitos a partir dos quais se apresentaram mensurações de resultados receberam o tratamento ou a condição de controle conforme a alocação ou, quando não foi esse o caso, fez-se a análise dos dados para pelo menos um dos resultados-chave por “intenção de tratamento”	não ☐ sim ☐ onde:
10. Os resultados das comparações estatísticas inter-grupos foram descritos para pelo menos um resultado-chave	não ☐ sim ☐ onde:
11. O estudo apresenta tanto medidas de precisão como medidas de variabilidade para pelo menos um resultado-chave	não ☐ sim ☐ onde:

A escala PEDro baseia-se na lista de Delphi, desenvolvida por Verhagen e colegas no Departamento de Epidemiologia, da Universidade de Maastricht (Verhagen AP et al (1988). *The Delphi list: a criteria list for quality assessment of randomised clinical trials for conducting systematic reviews developed by Delphi consensus. Journal of Clinical Epidemiology*, 51(12):1235-41). A lista, na sua maior parte, baseia-se num “consenso de peritos” e não em dados empíricos. Incluíram-se na escala de PEDro dois itens adicionais, que não constavam da lista de Delphi (os itens 8 e 10 da escala de PEDro). À medida que forem disponibilizados mais dados empíricos, pode vir a ser possível ponderar os itens da escala de forma a que a pontuação obtida a partir da aplicação da escala PEDro reflita a importância de cada um dos itens da escala.

O objetivo da escala PEDro consiste em auxiliar os utilizadores da base de dados PEDro a identificar rapidamente quais dos estudos controlados aleatorizados, ou quase-aleatorizados, (ou seja, ECR ou ECC) arquivados na base de dados PEDro poderão ter validade interna (critérios 2-9), e poderão conter suficiente informação estatística para que os seus resultados possam ser interpretados (critérios 10-11). Um critério adicional (critério 1) que diz respeito à validade externa (ou “potencial de generalização” ou “aplicabilidade” do estudo clínico) foi mantido para que a *Delphi list* esteja completa, mas este critério não será usado para calcular a pontuação PEDro apresentada no endereço PEDro na internet.

A escala PEDro não deverá ser usada como uma medida da “validade” das conclusões de um estudo. Advertimos, muito especialmente, os utilizadores da escala PEDro de que estudos que revelem efeitos significativos do tratamento e que obtenham pontuação elevada na escala PEDro não fornecem, necessariamente, evidência de que o tratamento seja clinicamente útil. Adicionalmente, importa saber se o efeito do tratamento foi suficientemente expressivo para poder ser considerado clinicamente justificável, se os efeitos positivos superam os negativos, e aferir a relação de custo-benefício do tratamento. A escala não deve ser utilizada para comparar a “qualidade” de estudos clínicos realizados em diferentes áreas de terapia, principalmente porque algumas áreas da prática da fisioterapia não é possível satisfazer todos os itens da escala.

Modificada pela última vez em 21 de Junho de 1999

Tradução em Português vez em 13 de Maio de 2009

Ajustes ortográficos para a versão Português-Brasileiro em 12 de Agosto de 2010

Indicações para a administração da escala PEDro:

- Todos os critérios **A pontuação só será atribuída quando um critério for claramente satisfeito.** Se numa leitura literal do relatório do ensaio existir a possibilidade de um critério não ter sido satisfeito, esse critério não deve receber pontuação.
- Critério 1** Este critério pode considerar-se satisfeito quando o relatório descreve a origem dos sujeitos e a lista de requisitos utilizados para determinar quais os sujeitos eram elegíveis para participar no estudo.
- Critério 2** Considera-se que num determinado estudo houve alocação aleatória se o relatório referir que a alocação dos sujeitos foi aleatória. O método de aleatoriedade não precisa de ser explícito. Procedimentos tais como lançamento de dados ou moeda ao ar podem ser considerados como alocação aleatória. Procedimentos de alocação quase-aleatória tais como os que se efetuam a partir do número de registo hospitalar, da data de nascimento, ou de alternância, não satisfazem este critério.
- Critério 3** *Alocação secreta* significa que a pessoa que determinou a elegibilidade do sujeito para participar no ensaio desconhecia, quando a decisão foi tomada, o grupo a que o sujeito iria pertencer. Deve atribuir-se um ponto a este critério, mesmo que não se diga que a alocação foi secreta, quando o relatório refere que a alocação foi feita a partir de envelopes opacos fechados ou que a alocação implicou o contato com o responsável pela alocação dos sujeitos por grupos, e este último não participou do ensaio.
- Critério 4** No mínimo, nos estudos de intervenções terapêuticas, o relatório deve descrever pelo menos uma medida da gravidade da condição a ser tratada e pelo menos uma (diferente) medida de resultado-chave que caracterize a linha de base. O examinador deve assegurar-se de que, com base nas condições de prognóstico de início, não seja possível prever diferenças clinicamente significativas dos resultados, para os diversos grupos. Este critério é atingido mesmo que somente sejam apresentados os dados iniciais do estudo.
- Critérios 4, 7-11** *Resultados-chave* são resultados que fornecem o indicador primário da eficácia (ou falta de eficácia) da terapia. Na maioria dos estudos, utilizam mais do que uma variável como medida de resultados.
- Critérios 5-7** *Ser cego para o estudo* significa que a pessoa em questão (sujeito, terapeuta ou avaliador) não conhece qual o grupo em que o sujeito pertence. Mais ainda, sujeitos e terapeutas só são considerados "cegos" se for possível esperar-se que os mesmos sejam incapazes de distinguir entre os tratamentos aplicados aos diferentes grupos. Nos ensaios em que os resultados-chave são relatados pelo próprio (por exemplo, escala visual análoga, registo diário da dor), o avaliador é considerado "cego" se o sujeito foi "cego".
- Critério 8** Este critério só se considera satisfeito se o relatório referir explicitamente *tanto* o número de sujeitos inicialmente alocados nos grupos *como* o número de sujeitos a partir dos quais se obtiveram medidas de resultados-chave. Nos ensaios em que os resultados são medidos em diferentes momentos no tempo, um resultado-chave tem de ter sido medido em mais de 85% dos sujeitos em algum destes momentos.
- Critério 9** Uma análise de *intenção de tratamento* significa que, quando os sujeitos não receberam tratamento (ou a condição de controle) conforme o grupo atribuído, e quando se encontram disponíveis medidas de resultados, a análise foi efetuada como se os sujeitos tivessem recebido o tratamento (ou a condição de controle) que lhes foi atribuído inicialmente. Este critério é satisfeito, mesmo que não seja referida a análise por intenção de tratamento, se o relatório referir explicitamente que todos os sujeitos receberam o tratamento ou condição de controle, conforme a alocação por grupos.
- Critério 10** Uma *comparação estatística inter-grupos* implica uma comparação estatística de um grupo com outro. Conforme o desenho do estudo, isto pode implicar uma comparação de dois ou mais tratamentos, ou a comparação do tratamento com a condição de controle. A análise pode ser uma simples comparação dos resultados medidos após a administração do tratamento, ou a comparação das alterações num grupo em relação às alterações no outro (quando se usou uma análise de variância para analisar os dados, esta última é frequentemente descrita como interação grupo versus tempo). A comparação pode apresentar-se sob a forma de hipóteses (através de um valor de p, descrevendo a probabilidade dos grupos diferirem apenas por acaso) ou assumir a forma de uma estimativa (por exemplo, a diferença média ou a diferença mediana, ou uma diferença nas proporções, ou um número necessário para tratar, ou um risco relativo ou um razão de risco) e respectivo intervalo de confiança.
- Critério 11** Uma *medida de precisão* é uma medida da dimensão do efeito do tratamento. O efeito do tratamento pode ser descrito como uma diferença nos resultados do grupo, ou como o resultado em todos os (ou em cada um dos) grupos. *Medidas de variabilidade* incluem desvios-padrão (DP's), erros-padrão (EP's), intervalos de confiança, amplitudes interquartis (ou outras amplitudes de quantis), e amplitudes de variação. As medidas de precisão e/ou as medidas de variabilidade podem ser apresentadas graficamente (por exemplo, os DP's podem ser apresentados como barras de erro numa figura) desde que aquilo que é representado seja inequivocamente identificável (por exemplo, desde que fique claro se as barras de erro representam DP's ou EP's). Quando os resultados são relativos a variáveis categóricas, considera-se que este critério foi cumprido se o número de sujeitos em cada categoria é apresentado para cada grupo.

Capítulo 6

10.37423/210804665

RECURSOS ELETROTHERAPÊUTICOS NO TRATAMENTO DE HIPERIDROSE PRIMÁRIA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Roberto Oliveira de Moura Junior

Centro Universitário Estácio do Recife

Ivone de Oliveira Mendes

Centro Universitário Estácio do Recife

Nely Dulce Varela

Centro Universitário Estácio do Recife

Resumo:

Introdução: A hiperidrose se refere ao suor excessivo acometidos em lugares como mãos, pés, abdômen, costas, axilas. Pode atingir os membros na mesma proporção de forma isolada ou associada a outros membros. **Objetivo:** Analisar os recursos eletroterapêuticos que podem auxiliar no tratamento de hiperidrose primária. **Método:** Foram selecionados artigos nas bases de dados Lilacs, Google Acadêmico e Scielo, publicados nos anos entre 2010 a 2018. Utilizamos os descritores: terapia por estimulação elétrica, hiperidrose, qualidade de vida. **Resultados:** Foram selecionados quatro artigos para o respectivo estudo, observando que tratamentos para hiperidrose utilizando os recursos de eletroterapia têm uma redução significativa no quadro de suor excessivo e não houve efeitos adversos nos estudos pesquisados. **Considerações finais:** O tratamento de Hiperidrose Primária com o uso da corrente galvânica é uma opção de tratamento eficaz, segura, não invasiva e com expressivo grau de satisfação, melhorando assim a qualidade de vida das pessoas que possuem essa patologia.

Palavras-Chave: Hiperidrose; Terapia por Estimulação Elétrica.

1 INTRODUÇÃO

Uma das formas para a regulamentação da temperatura corpórea do ser humano é o suor. Quando este sistema não apresenta homeostase, resulta em uma transpiração exagerada. A mesma é causada pela hiperatividade nas glândulas sudoríparas, uma vez que elas trabalham em excesso para manter a temperatura do corpo. Esse distúrbio é denominado hiperidrose, afetando negativamente os aspectos emocional, profissional e social do indivíduo ⁽¹⁾.

Por ser uma doença comum e pouco compreendida, está comumente associada à hiperatividade do sistema nervoso simpático, que gera hipertrofia glandular e hipersecreção ⁽²⁾. As áreas mais acometidas são as regiões palmares, axilares, plantares e a face, ocorrendo de forma focal, bilateral e/ou simétrica, entretanto ela pode se desenvolver em qualquer região do corpo. Estima-se que 3% da população sofre com essa patologia. Não há estudos que comprovem qual gênero é o mais acometido pela HP, porém são as mulheres que mais buscam tratamento ⁽¹⁾.

Não há conhecimento sobre a origem da hiperidrose primária (HP), porém, sabe-se que está ligada à hiperatividade do sistema nervoso simpático, gerando uma hipertrofia glandular e hipersecreção. Pode-se cogitar que a hiperidrose primária é uma doença benigna, com características não controladas de suor excessivo ⁽³⁾. Nesse contexto, Ro et al. ⁽⁴⁾ concluíram que “HP primária palmar é uma desordem hereditária, com prevalência variável, e sem prova de transmissão ligada ao sexo”.

Os sintomas aparecem devido às alterações emocionais, ao consumir alimentos condimentados ou bebidas alcoólicas e se inicia antes dos 25 anos. Em muitos depoimentos é perceptível que indivíduos portadores de HP possuem baixa estima, pois o suor excessivo chega a prejudicar sua relação com outras pessoas. Em alguns casos, a HP é acompanhada pela bromidrose, uma condição crônica que afeta as pessoas principalmente após a puberdade, sendo ocasionada pelo acúmulo de fungos na região afetada, causando um mau cheiro/odor, interferindo drasticamente suas relações interpessoais ^(3, 12).

Em relação a tratamentos, podemos citar as cirurgias de lipoaspiração, aplicações de Botox, tratamento medicamentosos sistêmicos, com utilização de drogas antidepressivas, ansiolíticas e anticolinérgicas, entre outros. No entanto, o conceito de tratamento vem mudando com a participação da Fisioterapia Dermato-Funcional, mostrando resultados significativos com diversos tratamentos, como o uso da corrente galvânica propriamente dita, ou associada à iontoforese, e com as correntes diadinâmicas de Bernard ⁽⁵⁾.

Por ser um tratamento convencional e alternativo, a corrente galvânica também denominada corrente contínua, define-se como aquela em que o movimento das cargas de mesmo sinal se desloca no mesmo sentido, e que possuem intensidade fixa. Este conceito mostra que a intensidade elétrica é estável e traz consigo vários benefícios, o uso do eletrodo negativo promove hidratação, maior fluxo sanguíneo e no eletrodo positivo ocorre uma vasoconstrição e analgesia, entre outros efeitos ^(6, 11).

Normalmente, a penetração percutânea de fármacos é restrita pela epiderme, então a iontoforese e fonoforese tornam-se métodos não invasivos para administração de moléculas pelo tegumento, intensificando sua penetração através de folículos pilosos ou ductos sudoríparos. A iontoforese utiliza corrente elétrica de baixa intensidade (corrente galvânica), que transporta drogas pelo gradiente formado, já a fonoforese emprega o uso do ultrassom para ampliar a absorção percutânea de fármaco ^(21, 22).

Estudos de Bisschop, Bisschop e Commandré (2001) ^(16,), apontam que as técnicas de iontoforese com aplicação de água corrente com correntes polarizadas têm alta melhora nos tratamentos das hiperidroses principalmente a plantar e palmar, o tratamento pode ser feito em uma semana com melhora de 10 a 20 dias, depois desse tempo é preciso voltar mensalmente e depois semestralmente para regular a hiperidrose.

Neste contexto, este estudo tem como objetivo geral discutir, por meio de uma revisão bibliográfica, os recursos eletroterapêuticos que são utilizados para o tratamento de hiperidrose primária. Como objetivos secundários, pretende-se descrever os principais instrumentos utilizados para tratar dessa afecção, contribuindo assim, para o perfil científico na nossa área.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizada uma revisão da literatura, no período de fevereiro a junho de 2018, onde a descrição geral do processo de revisão encontra-se ilustrada na figura 1. Para a identificação dos artigos, foi utilizada busca nas bases de dados Lilacs, Google acadêmico e Scielo, utilizando os seguintes descritores: terapia por estimulação elétrica, hiperidrose.

Foram incluídos artigos publicados em português, inglês e espanhol, no período de 2010 a 2018, realizados em voluntários portadores de hiperidrose primária. Foram excluídos os artigos de revisão da literatura. Os dados foram coletados por meio da leitura de artigos na íntegra, sendo descritos com as seguintes informações: autor; ano de publicação; população de estudo; objetivo do estudo; recurso eletroterapêutico utilizado e resultados. Foi então realizada uma revisão crítica dos artigos

selecionados por dois profissionais, de forma independente, considerando as semelhanças e diferenças entre os delineamentos de pesquisa.

Figura 1 - Descrição sobre as etapas do processo de revisão bibliográfica.

Fonte: Mendes e Moura, 2018.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após avaliação dos critérios de elegibilidade, foram identificados apenas quatro artigos experimentais que abordaram o tema proposto, entre os anos 2010 a 2017. Dentre eles apenas um estudo falava da corrente galvânica como recurso isolado para tratamento de HP, outro estudo correlacionava o uso da corrente galvânica em comparação ao TENS (eletroestimulação transcutânea), um estudo descreveu apenas o uso da iontoforese, e outro estudo faz o comparativo da iontoforese com fonoforese.

Na busca pela melhora da qualidade de vida, pessoas com HP se submetem a diversos tratamentos paliativos ou definitivos, clínicos e cirúrgicos que já foram desenvolvidos. Como tratamentos paliativos

há o uso de antitranspirantes, medicamentos, uso de botox. Em contrapartida, os tratamentos que são considerados definitivos são a simpatectomia e a lipoaspiração. Para essas técnicas podem vir a surgir complicações como hiperidrose compensatória, em outros termos, quando o indivíduo deixa de suar no local tratado e começa a compensar em outra região antes não acometida ⁽⁹⁾.

Há também outras alternativas clínicas e cirúrgicas para o tratamento da hiperidrose palmar. O uso topicamente do cloreto de alumínio (20-30%) é o mais empregado, tem limitada ação oclusiva e causa irritação local; outras formulações que são comercializadas, é o ácido tânico, metenamina, formaldeído, ácido bórico, resorcinol, glutaraldeído e permanganato de potássio ⁽¹⁴⁾.

Andrade et al, (2011) ⁽¹⁵⁾, selecionaram quatro pacientes universitários hígidos, com hiperidrose palmar primária bilateral, sem tratamentos prévios, evidenciada pelo teste de Minor a fim de avaliar a eficácia da onabotulinumtoxinA na redução da hiperidrose palmar. Dois pacientes foram submetidos ao protocolo de iontoforese, sob regime de corrente de 0,4-0,5A, por 15 minutos em cada mão, durante dez dias consecutivos. Dois pacientes foram submetidos à fonoforese, por dez minutos em cada mão, modulação contínua, frequência de 1MHz, intensidade de 0,4W/cm², durante dez dias consecutivos. Associado ao recurso eletroterapêutico usaram um frasco de BTX (Botox 100UI, Allergan Inc.) que foi dissolvido em 1,5ml de soro fisiológico estéril e depois incorporado a 200g de gel de carbopol 1%, utilizado em todas as sessões. Todos os pacientes relataram melhora de 70-80% e nenhum referiu efeitos adversos decorrentes do tratamento e todos os resultados foram observados por 16 semanas após o término das sessões.

Para diagnóstico da hiperidrose palmar se usa o teste de baixo custo que é o Teste de Minor, onde é aplicado uma solução de iodo puro no local onde quer se identificar se ocorre a hiperidrose, logo após é pulverizado amido em pó (geralmente Maisena®) onde ocorre a patologia fica uma área azul-acinzentada, se o teste for negativo o local onde foi aplicado o iodo e o amido ficam de coloração normal ⁽¹⁷⁾. Esse teste foi apenas utilizado no estudo de Andrade et al ⁽¹⁵⁾.

Contradizendo Andrade et al. ⁽¹⁵⁾, Machado e Varela (2010) ⁽⁵⁾ citaram em seu estudo, que seus pacientes apresentaram efeitos adversos, sentiram sensações de formigamento e hiperemia local, causadas pelo aumento da circulação sanguínea. Já Barbosa ⁽⁶⁾ relatou em seu artigo que, como se trata de uma corrente de baixa intensidade, não se corre o risco de ter efeitos adversos, não sendo necessária também a retirada de anéis, pulseiras, objetos metálicos.

Estudo realizado por Machado e Varela (2010) ⁽⁵⁾, constou de três voluntários do gênero masculino, que apresentavam HP na região palmar e axilar, com o objetivo de avaliar a eficácia da corrente galvânica na redução da HP. Foi aplicado um questionário de qualidade de vida, antes e após as dez sessões, o modo de operação utilizado foi de 70 a 100 uA, com tempo de aplicação em média de 14 min. Pela análise do questionário, os autores relataram que houve uma melhora após as sessões realizadas, notou-se a diminuição de suor nas regiões palmar e axilar, melhorando assim a qualidade de vida, redução nas queixas principais, aumentando com isso sua autoconfiança para retornar a realizar suas atividades de vida diária e laborais.

Esses mesmos autores ⁽⁵⁾, relataram que o suor excessivo está associado à angústia emocional, concordando com o estudo de Broilo ⁽⁸⁾, que explanou a relação entre a HP e fatores emocionais. De acordo com o estudo de Baroncello ⁽⁹⁾ e Silva ⁽¹³⁾ quando o sujeito realiza tratamento para HP após o procedimento, o mesmo é reavaliado e em todos os casos o grau de satisfação são sempre altos. Há uma melhora nas relações interpessoais, promovendo uma melhora na qualidade de vida.

Macedo (2013) ⁽⁷⁾ citou em seu artigo que a corrente galvânica apresenta polaridades fixa. No pólo negativo traz como efeito fisiológico o aumento do aporte circulatório e hidratação, enquanto o pólo positivo vasoconstrição e analgesia. Tem ação bactericida, anti-inflamatória, analgésica. Low e Reed et al. ⁽¹⁸⁾ descrevem que o uso de correntes galvânicas com o método de Iontoforese com água corrente tem uma agressão menor ao paciente e com grande eficiência no tratamento, pacientes submetidos a esse tratamento tem uma melhora na diminuição do suor de até 34 dias para a palma das mãos e na região plantar tem uma melhora de 47 dias, com apenas uma sessão de 30 minutos.

Aragão (2016) ⁽¹⁰⁾ realizou um estudo do tipo ensaio clínico, placebo controlado, randomizado, com cinco pacientes do sexo feminino e idade variando entre 18 a 30 anos. O objetivo do estudo era aplicação da corrente contínua no tratamento de HP, e para isso os pacientes foram divididos em dois grupos. Um grupo recebeu estímulo elétrico com o tens e o outro com a corrente galvânica. Os pacientes que foram submetidos ao estímulo da corrente galvânica apresentaram melhora no quadro de suor excessivo, enquanto os que receberam estímulo elétrico do tens, não obtiveram melhora.

Robinson ⁽¹⁹⁾, relatam que o tratamento de hiperidrose palmar tem bons resultados com aplicações diárias entre 8 a 20 dias, após esse tempo de tratamento, o intervalo das sessões deve ser mensal e depois semestral para apenas manutenção, esse tratamento consiste na técnica de Iontoforese com água corrente nas esponjas e acopladas nas palmas das mãos com a primeira metade do tratamento

os eletrodos trabalhem com a corrente catódica e metade final com a corrente anodal, em seus estudos mostram que tem formação de tampões ceratinosos e assim bloqueando os ductos sudoríparos e impedindo que suor chegue até a palma das mãos.

De acordo com Toro et al. (2001) ⁽²⁰⁾, estudos com 24 pacientes de hiperidrose palmar alcançou uma eficácia no tratamento com iontoforese de 80 a 95% com três a sete sessões, após três meses de tratamento o suor diminuiu e em dois pacientes houve fim da produção de suor nas palmas das mãos.

O tratamento da hiperidrose primária por meio do uso da corrente galvânica associada ou não a iontoforese, se mostrou uma opção bastante benéfica, segura e não invasiva e, portanto, com um elevado grau de satisfação, fazendo com que os pacientes retomem sua autoestima que antes o privavam de certas atividades. Observamos através da literatura que, o resultado obtido por esses recursos eletroterapêuticos apresentou-se muito satisfatório.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Existem poucos estudos realizando tal procedimento, porém, a área da Fisioterapia Dermato-Funcional demonstrou ser uma alternativa para tratar a hiperidrose, somando assim mais um tratamento eficaz evitando a necessidade de o paciente passar pela cirurgia de simpatectomia anulando o risco de passar por uma hiperidrose reflexa ou compensatória.

A Fisioterapia Dermato-Funcional abre novos caminhos para tratamentos com a corrente galvânica, iontoforese e fonoforese em pacientes com hiperidrose primária, mas é sabido que há poucas pesquisas desenvolvidas nesta área, na abordagem desses recursos em hiperidrose primária. Por esse motivo, é restrito o material didático disponível para essa pesquisa, fica aqui a sugestão para pesquisas experimentais, ensaios clínicos que ajudem a divulgar experiências clínicas na nossa área, com procedimentos não invasivos, gerando hipóteses para pesquisas futuras, com maiores números de amostras.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1 - Dornelas MT, Machado DC, Gonçalves ALCP, Mauês GL, Correa MPD. Tratamento da hiperidrose axilar com lipoaspiração. Revista Brasileira Cirurgias Plásticas. 2008; Vol. 23 Nº 3:145-8.
- 2 - Cardoso PO, et al. Avaliação de pacientes submetidos a tratamento cirúrgico de hiperidrose palmar quanto à qualidade de vida e ao surgimento de hiperidrose compensatória. Rev. Col. Bras., Belo Horizonte, v. 1, n. 36, p.14-18, 2009.
- 3 - Reis GMD, Guerra ACS, Ferreira JPA. Estudo de pacientes com hiperidrose, tratados com toxina botulínica: análise retrospectiva de 10 anos. Revista Brasileira de Cirurgia Plástica. 2011; 26(4): 582-90.
- 4 - RO KM, et al. Hyperidrosis: Evidence of Genetic Transmission. J. Vasc. Surg. California. 4p. 2002.
- 5 - Machado ADD, Varela ND. A utilização da corrente galvânica no tratamento de Hiperidrose Primária. Nova Fisio. Junho, 2010.
- 6 - Barbosa DF, Campos LG. Os efeitos da corrente galvânica através da técnica de eletrolifting no tratamento do envelhecimento facial. Revista Inspirar – Movimento & Saúde, Vol. 5, Nº 1, Edição 22, Janeiro/Fevereiro 2013.
- 7 - Macedo ACB, Cunico F, Sassi L, Albuquerque J, Borges F. Efeitos da aplicação da corrente polarizada e da iontoforese na gordura localizada em mulheres. Fisioterapia em movimento. Vol. 26 Nº. 3. Curitiba Julho/Setembro 2013.
- 8 - Broilo C, Hubner M, Kriese PR, Schneider A. Qualidade de vida em pacientes com hiperidrose primária e comparação entre duas técnicas. Revista da AMRIGS, Porto Alegre, 50 (3): 205-210, Jul-set. 2006.
- 9 - Baroncello JB, Baroncello LRZ, Schneider EGF, Martins GG. Avaliação da qualidade de vida antes e após simpatectomia por videotoracoscopia para tratamento de hiperidrose primária. Ver. Col. Bras. Cir. 2014; 41(5): 325-330.
- 10 - Aragão T, Guerino M. Aplicação da corrente contínua no tratamento da Hiperidrose Primária. Anais do Congresso Brasileiro de Fisioterapia. XXI Congresso Brasileiro de Fisioterapia; 2016, ago 31-set 03, Recife: Pernambuco, 2016. V. 1, n. 1, 2016.
- 11 - Galdino APG, Dias KM, Caixeta A. Análise comparativa do efeito da corrente microgalvânica: Estudo de caso no tratamento de estrias atróficas. Revista eletrônica Saúde CESUC – Centro de Ensino Superior de Catalão, Ano 1, Nº 1, 2010.
- 12 - Sobrinho SLS, Fiorelli RKA, Morard MRS. Avaliação da qualidade de vida de pacientes portadores de hiperidrose primária submetidos à simpatectomia videotoracoscópica. Rev. Col. Bras. Cir. 2017; 44(4): 323-327.
- 13 - Silva LA, et al. Simpaticectomia torácica toracoscópica em doentes com hiperidrose palmar: avaliação da qualidade de vida após a cirurgia. v. 13, n. 2, 2017

- 14 - Reisfeld R, Berliner KI. Evidence-based review of the nonsurgical management of hyperhidrosis. *Thorac Surg Clin*. 2008;18:157-66.
- 15 - ANDRADE, Patrícia Cristina et al. Tratamento da hiperidrose palmar com onabotulinumtoxina veiculada por iontoforese ou fonoforese: relato de casos. *An. Bras. Dermatol*. [online]. 2011, vol.86, n.6, pp. 1243-1246. ISSN 03650596.
- 16 - BISSCHOP, Guy; BISSCHOP, Éric; COMMANDRÉ; Francisque. Eletrofisioterapia. 1ªed. São Paulo: Santos, 2001. 194p
- 17 - ROTTA, O. DERMATOLOGIA: Clínica, Cirurgia e Cosmiátrica. 1ªed. São Paulo: Manole, 2008. 725p.
- 18 - LOW, John; REED, Ann. Eletroterapia Explicativa: princípios e prática. 3ªed. São Paulo: Manole, 2001. 472p.
- 19 - ROBINSON, Andrew J.; SNYDER-MACKLER, Lynn. ELETROFISIOLOGIA CLINICA. 2ªed. Porto Alegre: Artmed, 2001. 426p.
- 20 - TORO, Rojo J. et al. Tratamiento iontoforético de la hiperhidrosis palmoplantar. *Rehabilitación(Madrid)* 2001;35(4):219-224
- 21 - Roberts D. Transdermal drug delivery using iontophoresis and phonophoresis. *Orthop Nurs*. 1999;18:50-4.
- 22 - Karatay S, Aygul R, Melikoglu MA, Yildirim K, Ugur M, Erdal A, et al. The comparison of phonophoresis, iontophoresis and local steroid injection in carpal tunnel syndrome treatment. *Joint Bone Spine*. 2009;76:719-21.