CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: AS DIVERSAS MANIFESTAÇÕES DA VIDA

VOLUME III

EDITORA CONHECIMENTO LIVRE

Frederico Celestino Barbosa

Ciências biológicas: as diversas manifestações da vida

1ª ed.

Piracanjuba-GO
Editora Conhecimento Livre
Piracanjuba-GO

1ª ed.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Barbosa, Frederico Celestino
B238C Ciências biológicas: as diversas manifestações da vida
/ Frederico Celestino Barbosa. – Piracanjuba-GO

Editora Conhecimento Livre, 2021

91 f.: il

DOI: 10.37423/2021.edcl348

ISBN: 978-65-89955-95-5

Modo de acesso: World Wide Web

Incluir Bibliografia

1. flora 2. fauna 3. organismos-vivos I. Barbosa, Frederico Celestino II. Título

CDU: 570

<https://doi.org/10.37423/2021.edcl348>

O conteúdo dos artigos e sua correção ortográfica são de responsabilidade exclusiva dos seus respectivos autores.

EDITORA CONHECIMENTO LIVRE

Corpo Editorial

Dr. João Luís Ribeiro Ulhôa

Dra. Eyde Cristianne Saraiva-Bonatto

Dr. Anderson Reis de Sousa

MSc. Frederico Celestino Barbosa

MSc. Carlos Eduardo de Oliveira Gontijo

MSc. Plínio Ferreira Pires

Editora Conhecimento Livre

Piracanjuba-GO

2021

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1	5
TOXOPLASMOSE NO ENSINO DE BIOLOGIA: PERSPECTIVA DO PROFESSOR EM FORMAÇÃO.	
Lana Brenda da Silva Furtado	
Luciana de Nazaré Farias	
Bruno Rafael Ribeiro de Almeida	
Tânia Elizette Barata Pereira	
DOI 10.37423/211004837	
CAPÍTULO 2	36
SAZONALIDADE DAS FAMÍLIAS DE DIPTERA NO REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE DOS CAMPOS DE PALMAS – PR	
Diane Cortese	
Adriana Couto Pereira	
Laercio Peixoto do Amaral Neto	
DOI 10.37423/211004855	
CAPÍTULO 3	51
OFICINA PEDAGÓGICA COMO FERRAMENTA DE ENSINO NA MICOLOGIA: APRENDENDO A CULTIVAR COGUMELOS COMESTÍVEIS	
Marina de Souza Falcão	
Bruna Lucia Laindorf	
Lilian Pedroso Maggio	
Jair Putzke	
DOI 10.37423/211004890	
CAPÍTULO 4	64
LEVANTAMENTO FITOSSOCIOLÓGICO DA PRAÇA UNIVERSITÁRIA NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA – GO	
Jefferson Barbosa da Silva	
DOI 10.37423/211004916	
CAPÍTULO 5	73
CARACTERIZAÇÃO DA COMUNIDADE FITOPLANCTÔNICA NO RESERVATÓRIO DE SOBRADINHO, SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO, DURANTE O PERÍODO DE VAZÃO REDUZIDA	
Maristela Casé	
Maria Eduarda Souza Gomes	
DOI 10.37423/211004942	

CAPÍTULO 6 80

**MICROALGAS PLANCTÔNICAS EM EVENTO DE FLORAÇÃO DE ESPÉCIE INVASORA EM
RESERVATÓRIO HIDROELÉTRICO NO SEMIÁRIDO NORDESTINO**

Maria Eduarda Souza Gomes

Luane dos Santos Simplício

Thaís Silva Lima

Aline Teixeira de Andrade

Maristela Casé

DOI 10.37423/211004951

Capítulo 1

10.37423/211004837

TOXOPLASMOSE NO ENSINO DE BIOLOGIA: PERSPECTIVA DO PROFESSOR EM FORMAÇÃO.

Lana Brenda da Silva Furtado

Universidade do Estado do Pará

Luciana de Nazaré Farias

Universidade do Estado do Pará

Bruno Rafael Ribeiro de Almeida

*Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Pará*

Tânia Elizette Barata Pereira

Secretaria de Estado de Educação

Resumo: O *Toxoplasma gondii* é um protozoário causador da toxoplasmose, uma zoonose de acometimento mundial e com alta prevalência na região amazônica, sendo sua soroprevalência de 70%. No entanto, apesar desse cenário, pouco se é falado/estudado sobre o assunto, logo esse estudo buscou realizar o levantamento da opinião dos graduandos de Biologia a respeito do ensino sobre toxoplasmose, visando a implementação de ações educativas no formato de uma cartilha digital interativa sobre a temática, para que tal material possa auxiliá-los em suas aulas. Para tal, foi realizado uma pesquisa de caráter qualitativa do tipo exploratória com 29 graduandos dos curso de Licenciatura Plena em Ciências Naturais com Habilitação em Biologia e Licenciatura Plena em Ciências Biológicas da Universidade do Estado do Pará, onde por meio de questionários, os participantes puderam expor suas percepções sobre o ensino de toxoplasmose e recursos didáticos alternativos para o ensino. Como resultado, foi observado que há a falta de abordagem da temática pelos professores, tanto do ensino básico, como na própria graduação, levando à dificuldade de caracterizar a doença pelos graduandos. Para além os recursos didáticos alternativos, tais como cartilhas, jogos e vídeos mostraram-se um grande atrativo para o ensino-aprendizagem da toxoplasmose.

Palavras-chave: Toxoplasmose. Recursos Didáticos Alternativos. Cartilha Digital.

INTRODUÇÃO

A toxoplasmose é causada pelo protozoário *Toxoplasma gondii*, de formato cilíndrico ou ovóide com núcleo central e uma extremidade mais arredondada e outra mais afinada (complexo apical), esse complexo permite a penetração do agente em outras células, sendo essa a sua forma mais frequente e de rápida proliferação. Esse parasita, para se perpetuar, necessita estar dentro de uma célula, geralmente de organismos com endotérmicos. Sendo assim uma vez presente dentro da célula do hospedeiro, o agente causa a ruptura dessa devido ao seu alto processo de replicação, promovendo a contaminação das células vizinhas, tendo preferência por macrófagos, neurônios e células musculares estriadas, tanto as do coração como as esqueléticas. Esse parasita apresenta três linhagens: os taquizoítos, os bradizoítos e os oocistos. Os taquizoítos são a linhagem de proliferação mais rápida, responsável pelo rompimento das células dos hospedeiros. Os bradizoítos são responsáveis pela formação dos cistos teciduais, esses crescem lentamente e podem chegar a centenas de parasitas por célula e podem permanecer nos hospedeiros por anos. Os oocistos, contendo os esporozoítos, é a linhagem que apresenta maior resistência ambiental, podendo permanecer intactos no solo, sendo responsável pela contaminação dos alimentos (AMATO NETO et al., 1995). Este último segundo Miller, Frenkel, Dubey (1972; 1988 apud LOPES; BERTO, 2012, p.1) “São resultados da reprodução sexuada, formados somente no trato digestório de felídeos, os quais são seus hospedeiros definitivos”.

Figura 1 - Ciclo da Toxoplasmose

Fonte: Elaborada pela autora

Há três meios de contaminação pelo *Toxoplasma gondii*, sendo por infecção congênita, ou seja, por via transplacentária, pela ingestão de tecidos infectados com os cistos do parasita e pela ingestão dos oocistos, estando estes presentes nos alimentos e águas contaminadas com fezes de gatos (DUBEY; JONES, 2008).

No homem, essa doença se apresenta de formas diferentes, podendo ser caracterizada de modo prático das seguintes formas: toxoplasmose febril aguda, onde a infecção inicial pode ser assintomática, no entanto pode apresentar casos de pneumonia difusa, miocardite, miosite, hepatite, encefalite e exantema máculo- papular; linfadenite toxoplásmica, onde geralmente é caracterizado por linfadenopatia localizada ou em casos raros por linfadenopatia generalizada; toxoplasmose ocular, onde cerca de 30 a 60% dos casos de coriorretina está associado à toxoplasmose, podendo gerar dois tipos de lesões, na primeira a retina apresenta-se aguda com inflamação, e na segunda o paciente apresenta retinite crônica, podendo levar a cegueira; toxoplasmose neonatal, onde ocorre a infecção intra-uterina, podendo ser assintomática ou fatal dependendo do mês de gestação ao qual o feto foi exposto à doença, alguns dos sintomas que o mesmo pode apresentar são: prematuridade, estrabismo, pneumonia, anemia, miocardite, encefalite com convulsões, calcificações cerebrais, entre outros. (BRASIL, 2002). A toxoplasmose, segundo Dubey e Lindsay, Speed (1998, p.267), “surtiu como uma das infecções oportunistas mais comuns em pacientes com AIDS. A toxoplasmose em pacientes com AIDS é considerada resultado da reativação da infecção latente”.

JUSTIFICATIVA

CASOS REGISTRADOS DE TOXOPLASMOSE

Como a toxoplasmose é de acometimento mundial, Dias e Freire (2005), fizeram um levantamento nas literaturas de alguns casos de surtos da doença, onde se observou que em 1997, trinta e sete pessoas foram infectadas pelo parasita em Atlanta, Geórgia (EUA), no qual o principal motivo da contaminação foi pelos oocistos, associados ao gato, por via aerógena e ingestão devido à má higienização das mãos. Outro caso apresentado ocorreu em 1978 na Califórnia (EUA), onde dez das vinte e quatro pessoas de um grupo familiar apresentaram a doença, sendo o motivo da contaminação a ingestão de leite cru de cabra. Também em Greater Victoria, Canadá, cem pessoas foram infectadas apresentando sintomas de toxoplasmose aguda, isso se deu devido à ingestão da água contamina do reservatório municipal da região, um dos fatores da contaminação do reservatório foi a presença de felídeos no local.

No Brasil, alguns casos foram levantados por Lopes e Berto (2012), O primeiro caso ocorreu em 1967, em Bragança Paulista (SP), onde houvera trinta pessoas infectadas. Em 1993, em Bandeirantes (SP), houve dezessete casos de toxoplasmose aguda, devido à ingestão de carne crua contaminada. No período de 2001 e 2002, quatrocentos e vinte e seis pessoas foram infectadas na cidade de Santa Isabel do Ivaí (PR), por causa da contaminação da água do reservatório da cidade por oocistos. Em 2006 houve cento e sessenta e oito casos de toxoplasmose no município de Anápolis (GO), concluiu-se que a contaminação se deu pela ingestão de quibe cru. No mesmo ano, em Goiânia (GO), onze pessoas foram infectadas devido a ingestão de carne contaminada, sendo observado que as pessoas infectadas nos dois casos consumiram carne proveniente do mesmo açougue. Malta et al. (2019) apresentaram um caso de surto de toxoplasmose ocorrido em 2015, no município de Gouveia (MG), onde cinquenta pessoas foram infectadas e apresentaram alguns sintomas, como febre, cefaleia, mialgia, astenia, linfadenopatia e retinocoroidite toxoplasmática. Acredita-se que a principal causa da contaminação se deu pelo consumo de água e linguiça contaminada. Um caso mais recente de surto de toxoplasmose se deu em Santa Maria, (RS) em 2018, onde até o dia 10 de agosto no mesmo a secretaria de saúde do estado emitiu um boletim, onde se constatava seiscentos e quarenta e sete casos confirmados da doença e quinhentos e quinze casos sobre investigação (RIO GRANDE DO SUL, 2018). Mais recentemente, em Santa Maria (RS), houve novecentos e dois casos confirmados, esse surto teve relação com a distribuição de água, sendo esse o maior caso de surto de toxoplasmose no mundo (CASTRO, 2019).

No Pará, houve surto de toxoplasmose evidenciado por Carmo et al. (2010), em 2004, no Distrito de Monte Dourado, Município de Almerim, com quarenta casos confirmados de pacientes infectados, no qual a grande causa da contaminação se deu pelo contato com oocistos, devido à elevada população de felinos que contaminaram o solo e os alimentos. Outro caso na região foi exposto por Carmo et al. (2016), no período de 2010 a 2012, no município de Novo Repartimento, microrregião de Tucuruí, onde foram estudados quatrocentos e vinte e sete indivíduos, dos quais 81,96%, equivalente a trezentos e cinquenta pacientes, apresentaram soroprevalência pra *T. gondii*. A contaminação das pessoas dessa região foi associada ao contato com os gatos da vizinhança e pelo consumo de carne de caça. Ainda na região, foi apresentado por Moraes et al. (2016), um caso que ocorreu no município de Ponta de Pedras, Arquipélago do Marajó, em 2013, onde em uma investigação prévia foram registrados setenta e três casos da doença, com os indivíduos apresentando alguns sintomas como febre, cefaleia, linfadenomegalia e perda de peso. Segundo o mesmo, até 2016 foram registrados mais

dezessete novos casos, totalizando noventa casos de toxoplasmose na região, nesse evento a principal causa do surto se deu devido ao consumo do açaí contaminada com oocistos da toxoplasmose.

Em Belém, Bichara et al. (2012) observaram que há um alto índice de toxoplasmose na região, principalmente a toxoplasmose congênita, que é condizente com o índice observado na Amazônia brasileira, em especial no estado do Pará, onde esses casos se dão devido às condições ambientais ideais para a sobrevivência do parasita, além dos hábitos alimentares da população e a presença de uma provável cepa atípica e altamente virulenta.

A FALTA DE CONHECIMENTO SOBRE A TOXOPLASMOSE

É preocupante o fato de tantos casos de toxoplasmose terem ocorrido no Brasil, e não se observa um maior conhecimento sobre a doença pela população. Leão, Meirelles Filho e Medeiros (2004), investigaram que duzentos e cinco mulheres que acabaram de dar a luz pelo Sistema Único de Saúde nos Estados de Cuiabá (MT), das quais apenas 21,9% estão cientes sobre a toxoplasmose, enquanto que as demais afirmaram nunca terem ouvido falar sobre a doença. Outro levantamento a respeito do conhecimento da doença foi feito por Nunes et al (2009) em Garanhuns (PE), no qual foi analisado o conhecimento dos idosos sobre as profilaxias e zoonoses parasitárias, e dentre essas estava a toxoplasmose, sendo obtidos os seguintes resultados: dos cinquenta e sete idosos entrevistados, quarenta e sete ignoraram completamente o assunto ao serem questionados sobre o que era toxoplasmose, e cinquenta e cinco não souberam informar o meio de transmissão da toxoplasmose. Outro estudo foi realizado por Rodrigues (2015), no município de Mossoró (RN), onde trezentos e oitenta e quatro mulheres, na faixa etária de 18 a 49 anos de idade, participaram da pesquisa, foi observado que dessas, duzentos e trinta e quatro já ouviram falar sobre a toxoplasmose, no entanto dessas apenas sessenta e duas afirmaram saber o que é a doença.

TOXOPLASMOSE E EDUCAÇÃO

As escolas possuem um importante papel na disseminação do conhecimento, pois por meio dessa se faz capaz a interação com a geração futura, que será uma grande perpetuadora dos conhecimentos obtidos no ambiente escolar. Chassot (2003), nos fala que:

[...] é permitido reivindicar para a escola um papel mais atuante na disseminação do conhecimento. Sonhadamente, podemos pensar a escola sendo pólo de disseminação de informações privilegiadas.

LIVRO DIDÁTICO

Uma análise de 15 livros didáticos utilizados na disciplina de Biologia no Ensino Médio, realizado por Carvalho (2016), revelou que a morfologia do *Toxoplasma gondii* foi apresentada de maneira genérica, onde ele era exposto apenas como um integrante da classe Sporozoa, além de apenas um livro apresentar uma imagem de microscopia eletrônica, e em alguns livros, a doença foi abordada dentro da unidade de ensino destinada ao estudo do reino Protista ou Protoctista. Também foi observado que a Toxoplasmose não é mencionada em todos os livros da coleção aprovada pelo Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), ou sendo tratados de maneira superficial, entre outros aspectos insatisfatórios, como a abordagem errônea de alguns termos, tais como o termo cisto sendo usado para se referir aos oocistos, o termo esporo sendo relacionados a fungos e às bactérias, a utilização genérica (forma contaminante), dificultando a identificação de qual forma do *T. gondii* o livro está se referindo, além de apontar o gato como o único hospedeiro definitivo, não falando dos felídeos no geral, concluindo que o tema Toxoplasmose não é abordado de forma adequada o que acaba por professores e alunos terem que buscar informação em outras fontes de pesquisa.

NAS UNIVERSIDADES

Um estudo realizado em 2013, por Inagaki *et. al* (2015), na Universidade Federal de Sergipe com 46 estudantes o curso de enfermagem e 61 do curso de medicina, evidenciou que esses possuem um conhecimento insatisfatório sobre a toxoplasmose no que se refere ao modo de transmissão, as formas contaminantes, as medidas de prevenção, como a doença é diagnosticada e o seu tratamento, mesmo, segundo os autores, com o conteúdo sobre a toxoplasmose sendo abordado nas disciplinas de parasitologia e em algumas outras como Saúde Coletiva III, Enfermagem em Saúde Pública e Enfermagem em Obstetrícia e Genecologia, demonstrando a necessidade de apropriação do conhecimento teórico.

No entanto, apesar da apropriação do conhecimento teórico, é importante salientar como o assunto é abordado dentro das disciplinas de cada curso e se de fato são contemplados. Para isso se faria necessário uma avaliação por parte desses alunos sobre o método de ensino sobre a toxoplasmose nesses cursos.

Outro estudo realizado na Universidade Federal de Tocantins, por Lima *et al.* (2020), a fim de analisar o conhecimento da comunidade acadêmica da UFT sobre a toxoplasmose, demonstrou que apesar de grande partes dos entrevistados conhecerem essa doença, tópicos como a prevenção primária, a

cadeia epidemiológica, a profilaxia e a participação do gato no ciclo da doença se mostraram desconhecidos ou associados erroneamente pelos participantes da pesquisa, demonstrando a necessidade de ações educativas direcionadas para a prevenção e controle da doença.

Sendo a toxoplasmose uma das zoonoses de maior difusão no mundo, as pesquisas nessa área são de extrema importância (SILVEIRA, 2001), e na Amazônia brasileira chega a alcançar uma taxa de soroprevalência acima de 70%. (CARMO et al., 2010). Sendo assim as Universidades têm grande importância na disseminação desse conhecimento, onde segundo Silva Neto et al. (2002 apud MOREIRA et al., 2013, p. 67), “Levar informação para determinadas comunidades é um dos papéis fundamentais das instituições de ensino superior, melhorando as condições de vida da população e levando seus estudantes a colocar em prática os ensinamentos teóricos.”

De acordo com a Carta de Búzios proposta para o controle da toxoplasmose no Brasil, uma de suas propostas é investir em programas de prevenção primária, ou seja, na divulgação de informações nas escolas a respeito da toxoplasmose, abordando as suas formas de contaminação, a importância na prevenção durante a gestação, incluir também o tema em programas de ensino regular e em cursos de graduação da área de saúde e ciências biológicas, também aborda a realização de atividades de educação continuada para profissionais de saúde, além do lançamento periódico de cartilhas informativas e incluir o assunto sobre a toxoplasmose como tema a ser discutido nos grupos de pré-natal (LAGO, 2010).

O ensino/(re) construção de conhecimento é um dos métodos mais efetivos para que haja a prevenção de algo. Sendo as escolas e universidades, disseminadoras de conhecimento, é importante que esse assunto seja plenamente abordado nesses locais. Também se faz necessário a formação de professores capacitados para abordar esse conteúdo dentro de sala e para além, o uso de materiais educativos/informativos que os auxiliem, para que a aula seja a mais dinâmica e interativa, de modo a conceituar o conteúdo de acordo com a realidade desses alunos, promovendo assim a aprendizagem significativa.

OBJETIVO

OBJETIVO GERAL

A presente pesquisa tem como objetivo o levantamento da percepção dos graduandos de Biologia da Universidade do Estado do Pará a respeito do ensino da Toxoplasmose, visando a implementação de ações educativas no formato de uma cartilha digital interativa sobre toxoplasmose com a finalidade

de que tal material sirva como auxiliar nas aulas sobre o tema, pretendendo assim a abordagem efetiva da temática na graduação e a diminuição dos casos na região.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Levantar os dados sobre a opinião dos graduandos em Biologia sobre o ensino da Toxoplasmose na graduação.
2. Elaborar uma cartilha digital interativa sobre toxoplasmose e disponibilizá-la para os participantes da pesquisa de modo a promover a (re) construção do conhecimento sobre a temática.
3. Avaliar a relevância e o uso da cartilha digital interativa sobre toxoplasmose pelos participantes.

METODOLOGIA

Esta é uma pesquisa de caráter qualitativa do tipo exploratória, tal tipo de pesquisa busca as possíveis causas de um determinado evento, buscando conhecer com maior profundidade determinado assunto, buscando torna-lo mais claro, de aprofundar conceitos preliminares de determinada temática, contribuindo para o esclarecimento de questões abordadas de maneira superficial sobre o assunto. (RAUPP; BEUREN, 2006; ROSA, 2013).

PESQUISAS BIBLIOGRÁFICAS SOBRE A TOXOPLASMOSE

Foi realizado um levantamento de materiais bibliográficos sobre o *Toxoplasma gondii*, referente à sua morfologia, ciclo de vida, sintomas, o seu acometimento, o conhecimento da doença pela população e sua abordagem na educação, em plataformas digitais, tais como: o Google Acadêmico e o SciELO, utilizando palavras-chaves como: *Toxoplasma gondii*, formas de contaminação, toxoplasmose e educação, ocorrências de toxoplasmose e recurso alternativos para o ensino de ciências. Com esses materiais foi possível obter fundamentos teóricos para embasar o estudo, além de oferecer recursos que auxiliaram na análise dos dados obtidos. (LIMA ; MIOTO, 2007).

CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL DA PESQUISA E PÚBLICO ALVO

A pesquisa foi realizada na Universidade do Estado do Pará – Centro de Ciências Sociais e Educação, com um graduandos dos cursos de Licenciatura Plena em Ciências Naturais com Habilitação em Biologia e Licenciatura Plena em Ciências Biológicas.

ELABORAÇÃO DO QUESTIONÁRIO SOBRE O ENSINO DE TOXOPLASMOSE

Foi formulado um questionário utilizando a escala de Likert, que segundo Júnior e Costa (2014), foi desenvolvida por Rensis Likert em 1932, e permite que o respondente seja capaz de se posicionar de acordo com uma medida de concordância atribuída a cada item/pergunta. Por exemplo, no item que pergunta sobre a importância do estudo sobre a toxoplasmose, e o respondente terá que escolher a intensidade de sua resposta dentro de 5 pontos, onde 1 corresponde a nenhuma importância e 5 corresponde a muita importância. Para além, pediu-se que também aos respondentes que justificassem suas respostas, de modo a se obter dados qualitativos de grande importância para a pesquisa.

ELABORAÇÃO DA CARTILHA INFORMATIVA INTERATIVA SOBRE TOXOPLASMOSE

Foi produzido um material digital com informações sobre a toxoplasmose, produzido com o auxílio de literaturas a respeito do assunto, de maneira a facilitar o entendimento sobre o mesmo, além de apresentar jogos e interações com outras plataformas, tais como o aplicativo Kahoot, o qual contém perguntas sobre o assunto e recursos visuais utilizando QRCode.

ELABORAÇÃO DO QUESTIONÁRIO AVALIATIVO DA CARTILHA

Foi elaborado um questionário utilizando a mesma escala do anterior, escala Likert, e suas justificativas de modo a verificar a eficácia quanto à transmissão do assunto e satisfação na utilização do material proposto.

APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS E A CARTILHA DIGITAL INTERATIVA SOBRE TOXOPLASMOSE

Primeiramente, ocorreu o envio do primeiro questionário de modo a ser respondido antes da apresentação da cartilha aos participantes da pesquisa. Em seguida, ocorreu o envio da cartilha informativa interativa sobre Toxoplasmose aos participantes. E por fim, foi pedido aos alunos da graduação que respondessem o segundo questionário sobre a cartilha utilizada na aula, de modo a avaliá-la.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Dos 29 graduandos que participaram da pesquisa, apresentaram uma média de idade de 23 anos. O sexo predominante foi o feminino com 72% (21), seguido do masculino com 24% (7), e 4% (1) preferiu

não declarar. Quanto ao tempo de docência desses graduandos, uma vez que alguns desses já lecionam durante o período do estágio não obrigatório, apresentando uma média de 0,55 anos.

Quando aplicado o primeiro questionário sobre o ensino de Toxoplasmose, na primeira pergunta “Durante o seu período de estudante do ensino básico, o quão importante era o estudo sobre o parasita *Toxoplasma gondii*, causador da Toxoplasmose, na sua concepção quanto aluno?”, observou-se que 31% (9) considerado de importância moderada, enquanto que 7% (2) e 24% (7), consideraram com nenhuma importância e às vezes importante, respectivamente, totalizando 31% de opinião negativa quanto ao assunto. Das alternativas positivas referente a esta pergunta, 10% (3) e 28% (8), responderam que era importante e muito importante, respectivamente, totalizando 38%. Como observado no gráfico abaixo.

Gráfico 1 - Durante o seu período de estudante do ensino básico, o quão importante era o estudo sobre o parasita *Toxoplasma gondii*, causador da Toxoplasmose, na sua concepção quanto aluno?

Fonte: Elaborado pela autora

Ao pedir que justificassem suas repostas, algumas delas se sobressaíram e mostraram-se de grande relevância para o entendimento da percepção quanto aluno sobre o assunto e como eles observavam tal tema sendo abordado em sala de aula, durante o ensino básico.

Tabela 1 – Algumas justificativas do gráfico 1

Respostas	Alternativas	Justificativa
Resposta 15	Às vezes importante (2)	Não me recorro de ter estudado esse assunto específico durante estar cursando o ensino básico. Se chegou a ser abordado, foi uma abordagem bem vazia.
Resposta 23	Às vezes importante (2)	Acredito que nessa época não dava tanta importância, por conta da professora explicar sobre várias doenças por parasitas ao mesmo tempo, sem contextualizar, então eu apenas decorava o conteúdo
Resposta 19	Moderado (3)	No ensino básico raramente tinha ouvido falar sobre toxoplasmose, e quando ouvi sempre pensei que fosse algo muito distante da minha realidade
Resposta 22	Muito Importante (5)	Durante meu Ensino infantil e fundamental muito se faltava nos cuidados para evitar parasitas. Os professores de ciências focavam muito nesse tema.
Resposta 27	Muito Importante (5)	Foi uma forma de prevenção contra esta doença, pois moro em um região em que esta doença é bastante frequente

Fonte: Elaborada pela autora

Como exposta na tabela 1, as justificativas que desencadearam uma resposta negativa para tal pergunta, mostra-se intimamente ligada com a falta da abordagem do tema Toxoplasmose durante a sua formação básica, ou então, a rasa abordagem por parte dos professores, o que prejudicou o entendimento e a curiosidade dos alunos sobre o assunto. Em contra partida, nas respostas de caráter positivo, as justificativas mostraram que a importância dada ao assunto por parte dos alunos está ligada as suas vivências, como a fala presente da resposta 27, onde ocorreu prevalência da doença na região do pesquisando, ou pelo enfoque do professor, onde se abordava as medidas profiláticas das doenças parasitárias. Os participantes que responderam que davam a importância moderada sobre a Toxoplasmose, também apontam a superficialidade da abordagem durante a sua educação escolar, ou mesmo apenas o suficiente para passar de ano ou para prestar o vestibular. Assim sendo, analisando tais justificativas, é perceptível que a falta de abordagem e importância era bem frequente durante a sua educação básica dos respondentes.

Na segunda pergunta “A respeito dos seus professores do ensino básico. O quanto de importância dada pelo professor, que você pode observar durante as aulas cujo enfoque eram as doenças parasitárias, em específico a Toxoplasmose?”, observou-se que 41% (12), indicaram importância moderada, enquanto que 14% (4) e 34% (10) apontaram nenhuma importância e às vezes importante, respectivamente, somando assim 48% das opções negativas. Quanto às opções positivas, apenas 10% (3) escolheram a opção importante, e nenhum participante escolheu a opção muito importante, ficando assim com 0% (0). Como observado no gráfico abaixo.

Gráfico 2 - A respeito dos seus professores do ensino básico. O quanto de importância dada pelo professor, que você pode observar durante as aulas cujo enfoque eram as doenças parasitárias, em específico a Toxoplasmose?.

Fonte: Elaborado pela autora

Para a segunda pergunta, também foi pedido que os participantes justificassem suas escolhas. A partir dessas é possível analisar suas opiniões quanto a abordagem sobre Toxoplasmose por parte de seus professores na educação básica.

Tabela 2 – Algumas justificativas do gráfico 2

Respostas	Alternativas	Justificativa
Resposta 6	Às vezes importante (2)	Era algo visto de forma bem superficial, sem dar muito enfoque
Resposta 17	Nenhuma Importância (1)	Na minha época de escola, não teve nenhum cuidado ou enfoque dado pelos professores nesse assunto, inclusive só vim descobrir sobre essa doença no ensino superior.
Resposta 9	Moderado (3)	Não era dado tanta importância porque o assunto acabava equiparado aos outros, com a finalidade de concluir a grade curricular, sem explorar a essência do que é repassado.
Resposta 26	Moderado (3)	Acredito que meu professor tenha seguido o livro didático do período em uma aula normal.
Resposta 22	Importante (4)	Os professores incentivavam muito os cuidados para a não contaminação por parasitas .

Fonte: Elaborada pela autora

Analisando as justificativas, observa-se que dos 48% das repostas negativas (tabela 2) estão ligadas diretamente ao fato do conteúdo ser abordado apenas de maneira superficial, não dando a devida importância sobre o assunto, ou até mesmo nunca ter visto o tema em sala de aula, a mesma situação

encontra-se nas respostas neutras, fator preocupante, uma vez que se trata de uma zoonose de com alto índice de soroprevalência na região amazônica. Quando se trata de currículo e como esse assunto deve ser abordado no ensino básico tem-se o Parâmetro Curricular Nacional. No (PCN) do ensino médio, está presente entre as competências e habilidades a serem desenvolvidas de Biologia, a necessidade de investigação e compreensão, onde os aluno deve utilizar noções e conceitos de Biologia em novas situações de aprendizado, além disso ser capaz de utilizar a contextualização sócio-cultural, para assim poder julgar as ações de intervenções, identificando aqueles que visam à preservação e à implementação da saúde individual e coletiva (BRASIL, 2002). Tende o Parâmetro como base, é uma grande oportunidade para promover a temática de saúde com esses alunos, objetivando a utilização de conceitos previamente estudados e aplicando-os as doenças que acometem a região amazônica, neste caso, podendo abordar a toxoplasmose como parte do currículo escolar desses alunos. O Parâmetro Curricular Nacional para o ensino fundamental apresenta mais possibilidades de abordar o tema sobre toxoplasmose, onde no eixo temático vida e ambiente apresenta a importância de se trabalhar questões ambientais para assim ter a capacidade de análise no estudo sobre processos naturais que atingem o homem, como relação de parasitismo e seleção natural. Ainda no PCN do ensino fundamental, o tema transversal saúde deve abordar as relações entre problemas de saúde e fatores econômicos, políticos, sociais e históricos, com a necessidade de promover a saúde e a prevenção de doença. No quarto ciclo os temas e problemas que analisam a realidade local e regional, são estudadas as manifestações, as causas e as políticas de saúde pública, preventiva ou emergencial, relativas às doenças que os estudantes encontram no seu meio de convívio para assim poder ajudar no controle (BRASIL, 1998). Com as respostas positivas, observa-se o papel fundamental do professor para a abordagem do conteúdo sobre toxoplasmose em sala de aula, promovendo a disseminação desse.

Na terceira pergunta “Qual a importância para o ensino de ciências com o uso de materiais alternativos, como jogos, histórias em quadrinhos e folhetos informativos que auxiliem os professores a ministrar suas aulas a respeito da Toxoplasmose?”, têm-se 0% dos participantes indicando ser de nenhuma importância ou às vezes importantes, sendo essas opções negativas. Já na opção moderada, 3% (1), a escolheu, enquanto que das opções positivas, 10% (3) e 86% (25), sendo importante e muito importante, respectivamente, foram escolhidas, como indicado no gráfico abaixo.

Gráfico 3 - Qual a importância para o ensino de ciências com o uso de materiais alternativos, como jogos, histórias em quadrinhos e folhetos informativos que auxiliem os professores a ministrar suas aulas a respeito da Toxoplasmose?

Fonte: Elaborado pela autora

Para essa pergunta, também foi pedido aos participantes que justificassem suas escolhas, para melhor análise de suas opiniões como se pode observar na tabela abaixo.

Tabela 3 - Algumas justificativas do gráfico 3

Respostas	Alternativas	Justificativa
Resposta 5	Muito Importante (5)	É importante apresentar alternativas para o ensino, visto que cada aluno aprende de uma maneira diferente.
Resposta 6	Muito Importante (5)	Os recursos Pedagógicos devem sempre estar aliados as aulas dos professores, principalmente em uma aula de toxoplasmose onde pouco se é explorado.
Resposta 9	Muito Importante (5)	É de extrema importância, sobretudo para turmas como do ensino fundamental, através do ensino lúdico, torna-se mais marcante e efetivo na aprendizagem.
Resposta 17	Muito Importante (5)	Utilizar materiais alternativos é de extrema relevância, pois contribui de forma significativa para os diferentes tipos de aprendizagem.
Resposta 27	Muito Importante (5)	É uma maneira dinâmica de ensinar sobre toxoplasmose sem encher o aluno apenas com conteúdos teóricos e disponibiliza para o estudante uma ferramenta de estudo para outros assuntos

Fonte: Elaborada pela autora

Como observado na tabela anterior, os materiais alternativos apresenta grande importância no ensino de ciências, de modo a auxiliar nas aulas, pois ajuda na compreensão do assunto, tornando-o mais interessante e mais “marcante”, como diz um dos participantes da pesquisa, na aprendizagem significativa. Os respondentes apontam também a importância do lúdico na absorção e fixação dos

conteúdos. Nas respostas de número 6 e 27, tais recursos devem ser sempre aliados às aulas, principalmente quando se fala de toxoplasmose, sendo esse um assunto pouco explorado, permitindo que o mesmo seja trabalhado de maneira mais dinâmica, permitindo a maior interação entre aluno e professor, assim como a desmitificação sobre as doenças. Também é apontado pelo participante a importância de tais recursos, mas infelizmente a sua não utilização durante o seu ensino básico por seus professores.

Tais justificativas torna possível a visualização da real importância desse recurso para a compreensão do conteúdo, seja ele do assunto específico de toxoplasmose, como também de outros conteúdos abordados no ensino de Biologia. Segundo Marasini (2010), a supervalorização do livro didático limitam os temas a serem trabalhados em sala de aula, assim com a forma de e o conteúdo da avaliação. Também, segunda a autora, há diversas possibilidades que permitem o afastamento do padrão clássico da aula expositiva, tais como a experimentação e a utilização de laboratório, jogos didáticos, histórias em quadrinhos, excursões e trabalho de campo. Mas é sabido que, infelizmente, nem todas as escolas possuem estruturas que possibilitem a utilização de tais recursos, para isso uma boa alternativa, que pode ser produzida pelo próprio professor, é a confecção de cartilha informativas, além de outros recursos como mapas mentais e conceituais, que podem ser aplicados dentro de sala de aula com custo relativamente baixo. É importante ressaltar também a importância do digital nos dias atuais, uma vez que a cada dia é perceptível a maior utilização de smartphones e a internet pelos alunos.

Na quarta pergunta “Quanto a sua formação como professor de Biologia. Que ideias você expressa sobre o estudo da Toxoplasmose no Ensino Básico?”, obteve-se as seguintes respostas presentes na tabela 4.

Tabela 4 – Quanto a sua formação como professor de Biologia. Que ideias você expressa sobre o estudo da Toxoplasmose no Ensino Básico?

Respostas	
Resposta 2	O estudo de toxoplasmose no ensino básico é de suma importância para que as crianças e jovens entendam sobre parasitas e aprendam a se cuidar
Resposta 3	Acho um tema importante, porém nunca tive maiores informações sobre, ou seja, em nenhum dos meus períodos de ensino eu tive contato direto com o tema. E talvez por ter negligenciando o estudo por conta própria referente a essa temática, eu ainda saiba muito pouco.
Resposta 17	o estudo da toxoplasmose é pouco discutido no ensino básico, por isso há tantas dúvidas, tanta falta de conhecimento, acrescentando a pouca informação disponível. A Toxoplasmose por ser uma doença infecciosa não contagiosa adquirida na maioria dos casos por via oral, ou seja, ela ingestão de carnes cruas ou mal passadas de hospedeiros intermediários que contêm cistos do protozoário está presente no cotidiano do aluno, desse modo deveria ser trabalhada de forma contextualizada a fim de suprir essa falta de conhecimento empírico.
Resposta 24	No meu ponto de vista, de maneira superficial com auxílio de alguma TIC.
Resposta 28	Creio que seja um assunto importante de ser abordado em sala de aula, principalmente pela forma de contaminação, logo é necessário deixar os alunos atentos ao assunto.

Fonte: Elaborada pela autora

É notável que a maioria dos participantes indicaram que a Toxoplasmose é um assunto de grande importância para se trabalhar no ensino básico, para promover o entendimento sobre parasitas e o autocuidado, principalmente por se tratar de um doença que está presente no cotidiano da população e podendo ser assintomática na maioria dos casos, mas letal para alguns grupos. Eles expressam a necessidade da abordagem completa sobre o assunto, principalmente os meios de contaminação e prevenção, podendo esse último ser demonstrado com a representação da lavagem correta de frutas e verduras, com a utilização de recursos audiovisuais, como os vídeos. Alguns dos respondentes dizem que tal conteúdo é importante de se abordado, pois esse não foi visto de maneira completa durante o seu período como estudante do ensino básico, e como consequência, apresenta hoje dificuldades com a temática. Mas ainda persiste a ideia da abordagem superficial, como observado na resposta 24, com o auxílio da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Mas é importante perceber que mesmo quando o participante fala da abordagem “superficial”, há em sua fala a utilização das TIC’s, que mesmo de maneira “rasa”, se assim pode se dizer, ainda haverá grande relevância para os seus alunos, ao entrarem em contato com novos recursos de ensino.

Na quinta pergunta ao indagar “Quais recursos eram utilizados por seus professores para ministrar as aulas sobre Toxoplasmose?”, os principais recursos apontados pelos participantes foram o Slide, o Quadro Branco, o Livro Didático, Apostilas e Revista Científica, como demonstrado no gráfico 4. Nota-

se que o recurso mais utilizado foi o slide, seguido do quadro branco e o livro didático, recursos esses mais facilmente encontrado nas escolas. Dos 29 participantes, 3 desse indicaram nunca terem visto esse assunto no ensino básico, e mesmo durante a sua graduação, apenas ao se preparar para o vestibular.

Gráfico 4 – Quais recursos eram utilizados por seus professores para ministrar as aulas sobre Toxoplasmose?

Fonte: Elaborado pela autora

Segundo Bandeira (2009), o material didático é uma ferramenta institucional elaborado com uma finalidade didática, podendo ser impresso, audiovisual e novas tecnologias. Visando saber quais recursos didáticos são mais utilizados pelos professores, Costa e Sampaio (2018), realizaram um estudo com 20 professores da rede pública de ensino do município de Humaitá, Amazonas, no ano de 2013, no qual o livro didático se mostrou ser o mais utilizado dentre os recursos impressos, enquanto que o quadro branco aparece como o mais utilizado dentre os recursos não impressos, seguido do data show. Quando esses professores foram questionados sobre o uso do livro didático, eles apontaram que as escolas não possuem recursos multimídia, ou por ser um recurso que não exige tempo para se preparar, como os equipamentos, ou mesmo eles utilizam tal recurso por hábito, preferindo aulas tradicionais uma vez que não possuem motivação para inovar, além da falta de tempo para se preparar as aulas, tornando-as estritamente expositivas com a mínima participação dos alunos no processo de aprendizagem.

Na sexta pergunta, “Atualmente, com os métodos utilizados por seus professores, durante a sua formação, é satisfatório para a compreensão sobre a Toxoplasmose?”, 31% (9), indicaram satisfatório e 14% (4) indicaram muito satisfatório, totalizando 45% (13) das respostas positivas, enquanto que 24% (7), escolheram a alternativa neutra, já 17% (5) e 14% (4), indicaram nada satisfatório e um pouco satisfatório, respectivamente, totalizando 31% (9) das respostas negativas.

Gráfico 5 – Atualmente, com os métodos utilizados por seus professores, durante a sua formação, é satisfatório para a compreensão sobre a Toxoplasmose?

Fonte: Elaborado pela autora

Para sexta pergunta, também foi pedido aos participantes que justificassem suas respostas, podendo ser visualizadas na tabela abaixo.

Tabela 5 – Algumas justificativas do gráfico 5

Resposta	Alternativas	Justificativa
Resposta 3	Nada Satisfatório (1)	Não lembro de ter tido contato com o tema durante a graduação
Resposta 14	Nada Satisfatório (1)	As poucas informações que tenho sobre a doença foram adquiridas em outros locais.
Resposta 17	Nada Satisfatório (1)	NÃO, não foi utilizado nenhum método e não foi discutido sobre o tema.
Resposta 23	Neutro (3)	O datashow com o slide é uma alternativa muito viável para exibir imagem e vídeos, mas não deveriam se limitar a apenas isso
Resposta 18	Muito Satisfatório (5)	Pois o método de ensino era suficiente para o meu aprendizado e entendimento do assunto

Fonte: Elaborada pela autora

Na tabela 5, com as respostas negativas, é possível encontrar justificativas que apontam a não abordagem do conteúdo durante a graduação, e quando abordado é de maneira muito restrita e superficial, sem a utilização de materiais que auxiliassem nas aulas. O mesmo cenário é encontrado ao se analisar as respostas neutras, onde além do conteúdo ser abordado de maneira superficial, não é utilizado métodos alternativos. Com as respostas positivas, é interessante notar que somente os métodos tradicionais continuam a serem utilizados, no entanto para esses participantes é o suficiente para o entendimento do conteúdo, principalmente aos que indicaram estarem muito satisfeitos, enquanto que aos que indicaram satisfeitos com os métodos utilizados, ainda há o desejo por novos métodos como cartilhas e outros alternativas mais interativas.

Isso mostra que diferentes pessoas aprendem de maneiras diferentes. Segundo Moreira (1999), há três tipos de aprendizagens: a cognitiva, a afetiva e a psicomotora. Onde o primeiro se refere ao resultado do armazenamento de informações na mente do indivíduo que está aprendendo, o segundo é identificado como experiências dos indivíduos, como dor, alegria e ansiedade, e o terceiro envolve repostas musculares provenientes de treino e prática. Sendo essas três componentes da aprendizagem significativa de Rogers. Essas são apenas alguns dos diferentes tipos de aprendizagens, sendo assim, a utilização de diferentes recursos se fazem necessários para que se possa contemplar um maior número de pessoas.

Ao se falar da não abordagem do assunto, aponta-se que o curso de Licenciatura Plena em Ciências Naturais com Habilitação em Biologia, possui em sua grade curricular disciplinas que permitem a abordagem do conteúdo. Como apresentado no Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Naturais da Universidade do Estado do Pará, com a disciplina Temas de Biologia II, onde em sua ementa apresenta a abordagem dos organismos com agentes patogênicos de doenças, também tem a disciplina Diversidade da Vida II – Animais, onde pode se abordar os filos representantes do reino Animália, e a disciplina Agentes Infeciosos e Parasitários, onde se aborda os conceitos básicos de agentes infecciosos e parasitários, os tipos de relação parasito-hospedeiro-ambiente, além das principais doenças tropicais causadas por: vírus, bactérias, protozoários, helmintos, fungos e artrópodes e suas profilaxias. E no curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, com as disciplinas de Invertebrados I e II, além da disciplina de Parasitologia, como apresentado no Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Biológicas da Universidade do Estado do Pará.

Na sétima pergunta “Você concorda que recursos didáticos alternativos tornariam as aulas mais interessantes, ajudando na compreensão do assunto sobre Toxoplasmose?”, 93% (27) dos

pesquisando responderam concordarem totalmente, 3% (1), respondeu concordo, totalizando assim 96% (28) das respostas positivas, enquanto que 3% (1), respondeu não estar decidido e nenhum dos participantes escolheram as respostas negativas, discordo e discordo totalmente, como apresentado no gráfico 6, abaixo.

Gráfico 6 - Você concorda que recursos didáticos alternativos tornariam as aulas mais interessantes, ajudando na compreensão do assunto sobre Toxoplasmose?

Fonte: Elaborado pela autora

Para a sétima pergunta, ao pedir que justificassem suas respostas os participantes indicaram o seguinte, como observado na tabela abaixo.

Tabela 6 – Algumas justificativa do gráfico 6

Resposta	Alternativas	Justificativa
Resposta 14	Não estou decidido (3)	Acredito que tanto o método tradicional quanto as propostas de intervenção podem despertar o interesse dos alunos.
Resposta 1	Concordo Totalmente (5)	Porque assim é muito mais democrático e atinge um número maior de alunos.
Resposta 5	Concordo Totalmente (5)	Os recursos didáticos alternativos nos tiram da zona de conforto, em muitos casos nos ensinam mais que a própria aula e apresentam os assuntos de maneiras diversas.
Resposta 26	Concordo Totalmente (5)	Estamos vivendo um período de pandemia, que nos obrigou a utilizar cada vez mais recursos tecnológicos e com certeza é válido bons matérias que utilize esses recursos.
Resposta 27	Concordo Totalmente (5)	É uma maneira dinâmica de ensinar sobre toxoplasmose sem encher o aluno apenas com conteúdos teóricos e disponibiliza para o estudante uma ferramenta de estudo para outros assuntos.

Fonte: Elaborada pela autora

Ratificando a importância dos recursos didáticos alternativos para o ensino e aprendizagem de ciências durante o seu ensino básico aplicado ao ensino de Toxoplasmose, como visto na terceira

pergunta representada no gráfico 3, e agora trazendo para o seu ensino superior, os participantes em sua maioria apresentaram uma visão positiva à utilização de tais recursos para a sua formação, tabela 6.

Foi apontado que tais recursos por serem mais diferenciados, trazem maior interesse e dinamicidade às aulas, tendo como consequência a maior assimilação da temática, para além, foi apontado por um dos participantes (resposta 26) a importância dos recursos tecnológicos em tempos de pandemia vivenciados nos anos de 2020 e 2021, anos esses em que as Tecnologias de Informação e Comunicação (TDIC) se mostraram grandes aliadas da educação, diminuindo o distanciamento entre alunos e instituições de ensino. Tais tecnologias sempre tiveram presentes na vida dos alunos, no entanto ainda haviam grande relutância em utiliza-las por parte dos professores, principalmente o uso dos celulares, como mostra Conforto e Vieira (2015), na fala de um professor onde esse diz não concordar com a utilização de celulares em sala de aula, com a justificativa que os alunos apenas utilizariam tal recurso para trocar mensagens e “colar” durante as provas. Corroborante com a utilização da TDIC em tempos de pandemia, Cani et al. (2020), fala que:

[...] Embora já lidassem com as tecnologias digitais em determinados momentos, os profissionais da educação se deparam com a obrigatoriedade de se adaptarem, de modo radical, a esses recursos [...] Diante desse cenário, a pandemia acelerou um processo que já estava em curso: a integração das TDIC com a educação [...].

Ao se falar de recursos didáticos alternativos para o ensino de ciências e biologia, foi pedido aos participantes que respondessem na oitava pergunta, “Você já pensou em utilizar ou já utilizou recursos, como folhetos informativos, jogos educativos, peças teatrais, entre outros, que lhe auxiliasse em suas aulas?”, 79% (23) indicaram que sim, enquanto que 21% (6) assinalaram que não utilizaram e nem pensaram em usar tais recursos, como indicado no gráfico 7.

Gráfico 7 – Você já pensou em utilizar ou já utilizou recursos, como folhetos informativos, jogos educativos, peças teatrais, entre outros, que lhe auxiliasse em suas aulas?

Fonte: Elaborado pela autora

Na nona e última pergunta do questionário sobre o ensino de Toxoplasmose, foi pedido que os participantes indicassem quais recursos eles utilizariam para ensinar sobre Toxoplasmose em suas aulas e qual conteúdo específico dentro da temática, obtendo os seguintes resultados como os encontrados no gráfico 8 e 9.

Gráfico 8 – Que recursos didáticos você utilizaria para ensinar o assunto Toxoplasmose para os seus alunos?

Fonte: Elaborado pela autora

Os participantes indicaram os jogos como recurso auxiliar em suas aulas, seguindo de vídeos/documentários e as cartilhas/panfletos, quanto aos conteúdos os participantes apontaram o modo de Transmissão como principal conteúdo a ser abordado, seguido da Profilaxia e a Temática como um todo.

Nota-se que devido os jogos serem um tipo de recurso com grande atratividade, ele também permite uma maior interatividade dos alunos com o assunto, devido a própria dinâmica, onde os alunos devem ter conhecimento do conteúdo estudado para poder jogar, garantindo maior fixação do assunto, assim como os recursos áudio visuais, quando bem usados pelos professores.

Gráfico 9 – Qual conteúdo, sobre a Toxoplasmose, você teria como foco em sua aula?

Fonte: Elaborada pela autora

Quanto aos conteúdos, é notável a maior preocupação em se trabalhar o modo de transmissão e a sua profilaxia. Tais pontos em questão apresentam relevância quando se trata de doenças, pois ao saber como determinada doença é transmitida e os cuidados que se deve ter para evita-la, torna mais fácil o seu controle.

QUESTIONÁRIO DE DIAGNOSE DA CARTILHA DIGITAL INTERATIVA SOBRE TOXOPLASMOSE

O segundo questionário, referente a diagnose da cartilha digital interativa, possui 5 perguntas, das quais valem destacar 3, sendo a segunda, terceira e quarta pergunta, as quais referem-se ao entendimento da Toxoplasmose após a utilização da cartilha, se o participante utilizaria a cartilha em suas aulas e o quão satisfatório foi a utilização da cartilha, respectivamente.

Na segunda pergunta, “Você concorda que após a leitura da cartilha informativa digital sobre Toxoplasmose, o seu entendimento sobre o assunto ficou mais claro?”, 7% (2) apontaram a opção neutra, enquanto que 7% (2) e 86% (25) responderam concordarem e concordarem totalmente, totalizando 93% (27) das opções positivas, como observado no gráfico 10.

Gráfico 10 - Você concorda que após a leitura da cartilha informativa digital sobre Toxoplasmose, o seu entendimento sobre o assunto ficou mais claro?

Fonte: Elaborado pela autora

Ao pedir que os participantes justificassem suas respostas, eles apontam que a cartilha apresenta uma boa explicação sobre a temática, além da sua organização e a presença de ilustrações, contendo também tópicos poucos abordados nos livros didáticos, quando se fala sobre Toxoplasmose, permitindo assim um maior entendimento sobre o assunto. Essas justificativas também se fazem presentes na terceira e quarta pergunta.

Na terceira pergunta, “Você utilizaria a cartilha informativa digital como material auxiliar em suas aulas sobre toxoplasmose?”, 97% (28) dos participantes responderam que sim, e 3% (1) disse que não, com a justificativa de não ministrar aulas sobre a temática, como observado no gráfico 11.

Gráfico 11 - Você utilizaria a cartilha informativa digital como material auxiliar em suas aulas sobre toxoplasmose?

Fonte: Elaborado pela autora

Já na quarta pergunta, “O quão satisfatório foi a utilização da cartilha informativa digital para o entendimento da Toxoplasmose?”, 14% (4) e 86% (25) dos participantes responderam estarem satisfeitos e muito satisfeitos, respectivamente, totalizando 100% (29) das opções positivas, como mostra o gráfico 12.

Gráfico 12 - O quão satisfatório foi a utilização da cartilha informativa digital para o entendimento da Toxoplasmose?

Fonte: Elaborado pela autora

Segundo Marteis, Makowski e Domingos (2011), as cartilhas são instrumentos que facilitam as atividades do professor, pois funcionam como ferramenta mediadora da discussão entre o docente e

os discentes sobre determinada temática, além de atuar no auxílio do desenvolvimento de estratégias educativas ou de motivação, sendo conclusivo no processo de sensibilização da população, e por seu formato e tamanho serem semelhantes ao de revistas, permite que o assunto abordado seja trabalhado de maneira mais detalhada.

Para além de todas as possibilidades que a cartilha permite ao se trabalhar determinada temática, neste caso a Toxoplasmose, é importante também que a sua distribuição seja a mais ampla possível, e na atualidade o digital está bastante presente no cotidiano dos professores, e principalmente dos alunos, garantindo a facilidade de distribuição dessas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar da toxoplasmose ser uma zoonose de acometimento mundial e com alta prevalência na região amazônica, nota-se que pouco se é falado sobre o assunto, seja nos livros didáticos, como também pela falta de iniciativa na abordagem da temática pelos professores, sendo essa última situação presente tanto no ensino básico, como na própria graduação, tendo como consequência a deficiência na caracterização da doença.

Sendo assim, é necessário que desde a graduação haja a devida abordagem do assunto, para que assim formem-se professores devidamente capacitados para trabalhar a temática nas escolas. Logo, os recursos didáticos alternativos, como vídeos, jogos, revistas científicas, cartilhas e entre outros, mostraram-se ser um grande atrativo para o ensino aprendizagem de ciências. No presente trabalho, a cartilha digital interativa, fazendo parte dos recursos didáticos alternativos, também se mostrou eficiente para o entendimento sobre toxoplasmose.

REFERÊNCIAS

AMATO NETO, Vicente et al. Doenças Infecciosas. 1 ed. São Paulo: Sarvier, 1995. BANDEIRA, Denise. Materiais Didáticos. Curitiba: IESDE, 2009.

BICHARA, Cléa Nazaré Carneiro et al. Incidence of congenital toxoplasmosis in the city of northern Brazil, determined by a neonatal screening program: preliminary results. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, Uberaba, v. 45, n. 1, p. 122-124, Fev. 2012. Disponível em:

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003786822012000100024&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 9 out. 2019. <http://dx.doi.org/10.1590/S0037-86822012000100024>.

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Ciências. Ensino Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/ciencias.pdf>. Acesso em: 02 mar. 2021.

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais + (PCN+). Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Brasília: MEC, 2002. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/ciencian.pdf>. Acesso em: 02 mar. 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Doenças Infecciosas e parasitárias, de vigilância epidemiológica e de controle: Guia de Bolso. Brasília, DF: Ministério da Saúde 2002. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_infecciosas_parasitaria_guia_bolso.pdf. Acesso em: 14 out. 2019.

CANI, Josiane Brunetti et al. Educação e Covid-19: A Arte de Reinventar a Escola mediando a Aprendizagem “prioritariamente” pelas TDIC. Revista IfesCiência. v. 6, Edição Especial n. 1, p. 23–39, 2020. Disponível em: <https://ojs.ifes.edu.br/index.php/ric/article/view/713/484>. Acesso em: 27 mar. 2021.

CARMO, Ediclei Lima do et al. Surto de toxoplasmose humana no Distrito de Monte Dourado, município de Almeirim, Pará, Brasil. Revista Pan-Amazônica de Saúde, Ananindeua, v. 1, n. 1, p. 61-66, Mar. 2010. Disponível em:

http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S217662232010000100009&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 9 out. 2019. <http://dx.doi.org/10.5123/S2176-62232010000100009>.

CARMO, Ediclei Lima do et al. Soroepidemiologia da infecção pelo Toxoplasma gondii no Município de Novo Repartimento, Estado do Pará, Brasil. Revista Pan-Amazônica de Saúde, Ananindeua, v. 7, n. 4, p. 79-87, dez. 2016. Disponível em

http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S217662232016000400079&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 9 out. 2019. <http://dx.doi.org/10.5123/s2176-62232016000400010>.

CARVALHO, Adeilton Vinicius A. de. Abordagem da toxoplasmose nos livros de Biologia do Ensino Médio – Toxoplasmose o Parasita da Morte. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Biológicas) – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2016. Disponível em: <http://www.ccen.ufpb.br/cccb/contents/monografias/2016/abordagem-da-toxoplasmose-nos-livros-de-biologia-do-ensino-medio-toxoplasma-o-parasita-da-morte.pdf>, Acesso em: 26 nov. 2020.

CASTRO, Juliano. Secretário de Saúde de Santa Maria diz que água disseminou surto de toxoplasmose. In: G1. Rio Grande do Sul, 28 março 2019. Disponível em: <https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2019/03/28/secretario-de-saude-de-santa-maria-diz-que-origem-do-surto-de-toxoplasmose-foi-a-agua.ghtml>. Acesso em: 14 out. 2019.

CHASSOT, Attico. Alfabetização científica: uma possibilidade para a inclusão social. Revista Brasileira de Educação, v. 22, p. 89-100, 2003. Disponível em:

<https://www.scielo.br/pdf/rbedu/n22/n22a09.pdf>. Acesso em: 18 dez. 2020.

CONFORTO, Débora; VIEIRA, Maristela Compagnoni. Smartphone na Escola: Da Disciplinar para a Pedagógica. Latin American Journal of Computing. v. II, n. 3, p. 43-54, Nov. 2015. Disponível em: <https://lajc.epn.edu.ec/Volumenes/LAJC%20vol2no3.pdf#page=45>. Acesso em: 27 mar. 2021.

COSTA, Edno Soares da; SAMPAIO, Irene Cibelle Gonçalves. Utilização dos Recursos Didáticos no Ensino de Ciências e Biologia na Rede Pública da Zona Urbana de Humaitá/AM. Revista Ensino de Ciências e Humanidades. v. II, n. 2, p. 153-162, 2018. Disponível em:

<https://periodicos.ufam.edu.br/rech/article/view/5153>. Acesso em: 01 abr. 2021.

DIAS, Rafael André Ferreira; FREIRE, Roberta Lemos. Surtos de toxoplasmose em seres humanos e animais. Semina: Ciências Agrárias, Londrina, v. 26, n. 2, p. 239- 247, abril-junho, 2005. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/4457/445744076015.pdf>. Acesso em: 9 out. 2019.

DUBEY, Jitender. P.; JONES, J. L. Toxoplasma gondii infection in humans and animals in the United States. International journal for parasitology, Austrália, v. 38, n. 11, p. 1257-1278, Set. 2008. Disponível em: <https://naldc.nal.usda.gov/download/18549/PDF>. Acesso em: 11 out. 2019.

DUBEY, Jitender. P.; LINDSAY, David. S.; SPEER, C. A. Structures of Toxoplasma gondii tachyzoites, bradyzoites, and sporozoites and biology and development of tissue cysts. Clinical microbiology reviews, Estados Unidos, v. 11, n. 2, p. 267-299, Abr. 1998.

INAGAKI, Ana Dorcas de Melo et al. Conhecimento dos Acadêmicos de Enfermagem e Medicina Sobre a Toxoplasmose. Revista de Enfermagem UFPE On Line, Recife, v.9, n.10, p.9469-9477, out. 2015. DOI:10.5205/reaoul.7944-69460-1-SM.0910201507.

JÚNIOR, Severino Domingos da Silva; COSTA, Francisco José. Mensuração e escalas de verificação: uma análise comparativa das escalas de Likert e Phrase Completion. PMKT – Revista Brasileira de Pesquisa de Marketing, Opinião e Mídia, São Paulo, v.15, p.1-16, 2014. Disponível

em: http://www.revistapmkt.com.br/Portals/9/Volumes/15/1_Mensura%C3%A7%C3%A3o%20e%20Escalas%20de%20Verifica%C3%A7%C3%A3o%20uma%20An%C3%A1lise%20Comparativa%20das%20Escalas%20de%20Likert%20e%20Phrase%20Completion.pdf. Acesso em: 18 dez. 2020.

LAGO, Eleonor G. Carta de Búzios: proposta para o controle da toxoplasmose no Brasil. Scientia Medica, Porto Alegre, v.20, n.1, p.5-8, 2010. Disponível em:

<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-567149>. Acesso em: 26 nov. 2020.

LEAO, Paulo Roberto Dutra; MEIRELLES FILHO, José; MEDEIROS, Sebastião Freitas de. Toxoplasmose: soroprevalência em puérperas atendidas pelo Sistema Único de Saúde. *Revista Brasileira Ginecologia e Obstetrícia*, Rio de Janeiro, v. 26, n.8, p.627-632, Sept. 2004. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010072032004000800006&lng=en&nrm=iso. Acesso em 9 out. 2019. <http://dx.doi.org/10.1590/S0100-72032004000800006>.

LIMA, Telma Cristiane Sasso; MIOTO, Regina Célia Tamaso. Procedimentos metodológicos na construção do conhecimento científico: a pesquisa bibliográfica. *Revista Katál*, Florianópolis, v.10, n. esp, p. 37 – 45, 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rk/v10nspe/a0410spe>. Acesso em: 20 nov. 2019. LOPES, Cristiane Claudino Heil; BERTO, Bruno Pereira. Aspectos associados à toxoplasmose: Uma referência aos principais surtos no Brasil. *Saúde & Ambiente em Revista*, Duque de Caxias, v. 7, n. 2, p. 1-7, jul-dez. 2012. Disponível em:

<http://publicacoes.unigranrio.edu.br/index.php/sare/article/view/1466/908>. Acesso em: 9 out. 2019. MALTA, Juliane Maria Alves Siqueira et al. Surto de toxoplasmose no município de Gouveia, Minas Gerais. *Journal of Health & Biological Sciences*, v. 7, n. 3, p. 233-241, jul-set. 2019. Disponível em:

<https://periodicos.unichristus.edu.br/jhbs/article/view/2375/867>. Acesso em: 9 out. 2019.

MARASINI, Alessandra Brochier. A Utilização de Recursos Didáticos-Pedagógicos no Ensino de Biologia. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Biológicas) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010. Disponível em:

<https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/35273/000781693.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 20 mar. 2021.

MARTEIS, L. S.; MAKOWSKI, L. S.; SANTOS, R. L. C. Abordagem sobre dengue na Educação Básica em Sergipe: análise de cartilhas educativas. *Scientia Plena*, v. 7, n.6, 2011. Disponível em: <https://www.scientiaplenu.org.br/sp/article/view/191/148>. Acesso em: 01 mai. 2021.

MORAIS, Rafaela dos Anjos Pinheiro Bogoevich et al. Surto de toxoplasmose aguda no Município de Ponta de Pedras, Arquipélago do Marajó, Estado do Pará, Brasil: características clínicas, laboratoriais e epidemiológicas. *Revista Pan-Amazônica de Saúde*, Ananindeua, v. 7, p. 143-152, dez. 2016. Disponível em: <http://scielo.iec.gov.br/pdf/rpas/v7nesp/2176-6223-rpas-7-esp-00143.pdf>. Acesso em: 9 out. 2019.

MOREIRA, Faviano Ricelli da Costa et al. Transmissão do conhecimento de algumas zoonoses para alunos de escolas públicas nos municípios de Apodi, Felipe Guerra e Severiano Melo. *HOLOS*, [S.l.] v. 2, p. 66-78, maio 2013. Disponível em:

<http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/view/1077/661>. Acesso em: 14 out. 2019.

MOREIRA, Marco Antônio. Teoria da Aprendizagem. São Paulo: Editora Pedagógica e Universitária, 1999.

NUNES, Elâne Rafaella Cordeiro et al. Percepção dos idosos sobre o conhecimento e profilaxia de zoonoses parasitárias. In: JORNADA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, 9., 2009, Pernambuco. Anais eletrônicos [...]. Pernambuco: Universidade Federal Rural de Pernambuco, 2009. Disponível em: <http://www.eventosufrpe.com.br/jepex2009/cd/resumos/r0706-1.pdf>. Acesso em: 14 out. 2019.

PAIXÃO, Karollyne Santana et al. Perspectiva da Comunidade Acadêmica da Universidade Federal do Tocantins - Campus Araguaína (Unidade Cimba) sobre a Toxoplasmose. *Facit Business and Technology Journal*, v. 2, n. 16, 2020. Disponível em:

<https://jnt1.websiteseuro.com/index.php/JNT/article/view/598/450>. Acesso em: 26 nov. 2020.

RAUPP, Fabiano Maury; BEUREN, Ilse Maria. Metodologia da Pesquisa Aplicável às Ciências. Como Elaborar Trabalhos Monográficos em Contabilidade: Teorias e Práticas. São Paulo: Atlas, p. 76-97, 2006.

RIO GRANDE DO SUL. Secretaria da Saúde. Relatório de atualização de investigação de surto. Santa Maria, RS: Secretaria de Saúde, 2018.

RODRIGUES, Débora Nair Jales. Avaliação do conhecimento da população sobre formas de transmissão e medidas preventivas da toxoplasmose em Mossoró-RN. 2015. 104f. Dissertação (Mestrado em: Ambiente, Tecnologia e Sociedade) – Programa de Pós – Graduação em Ambiente, Tecnologia e Sociedade, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Rio Grande do Norte, 2015.

ROSA, Paulo Ricardo da Silva. Uma Introdução à Pesquisa Qualitativa em Ensino de Ciências. Campo Grande: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 2013.

SILVEIRA, Claudio Alberto Magalhaes. Toxoplasmose: levantamento bibliográfico de 1997 a 2000. *Arquivos Brasileiros de Oftalmologia*, p. 263-270, 2001.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ. Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Naturais. Belém, 2009.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ. Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas. Belém, 2017.

Capítulo 2

10.37423/211004855

SAZONALIDADE DAS FAMÍLIAS DE DIPTERA NO REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE DOS CAMPOS DE PALMAS – PR

Diaine Cortese

Universidade Federal da Grande Dourados

Adriana Couto Pereira

Instituto Federal do Paraná

Laercio Peixoto do Amaral Neto

Instituto Federal do Paraná

Resumo - Levantamentos faunísticos de Diptera são essenciais, pois apenas uma parte pequena da diversidade desses insetos é conhecida, tendo em vista que o número de espécies seja muitas vezes maior que a quantidade conhecida. Neste trabalho buscou-se conhecer a diversidade e abundância das famílias de Diptera. Foram realizadas coletas sazonais entre dezembro de 2013 á setembro de 2014, utilizando armadilha Malaise em três fragmentos de vegetação, em uma Unidade de Conservação, localizado na região sul do estado do Paraná. As armadilhas foram expostas em pares de dois em cada fragmento, onde ficaram por uma semana. As amostragens resultaram em 6.485 indivíduos, distribuídos em 52 famílias de Diptera. As famílias mais abundantes foram Sciaridae, Phoridae, Cecidomyiidae e Chironomidae. Primavera foi à estação mais abundante em indivíduos, porém verão é a que obteve maior riqueza. Para a diversidade o índice de Simpson inverno foi à estação mais diversa enquanto para Shannon foi verão. Em relação às áreas de coleta campo foi a mais diversa para ambos os índices. No estudo os dípteros apresentaram grande sobreposição de nicho. Com tudo isso a Unidade de Conservação abriga grande diversidade de dípteros, sendo necessário reforçar a conservação deste ambiente.

Palavras-chave: diversidade, conservação, abundância, estações do ano.

INTRODUÇÃO

A ordem Diptera é uma das ordens megadiversas de insetos, este grupo é bastante estudado. Os dípteros são relativamente pequenos e possuem corpo mole, são caracterizados por possuírem duas asas funcionais e asas reduzidas conhecidas por halteres ou balancins (Triplehorn & Johnson, 2011). Mundialmente são constituídas 160 famílias, na região neotropical 118 famílias e no Brasil atualmente 96 famílias, mas estes dados podem variar pela incipiência dos estudos (Buzzi, 2010; Carvalho et al., 2012).

Dentre todas as ordens de insetos, a ordem Diptera destaca-se como a quarta ordem em número de espécies, apresenta uma distribuição cosmopolita e tem como fonte alimentar uma grande diversidade de substratos que estão associados tanto á áreas naturais ou com ação antrópica. Os dípteros desempenham papel importante para a dinâmica dos ecossistemas (Sousa et al., 2014).

Esta ordem tem grande importância para o homem, devido a veiculação e transmissão de agentes etiológicos, bem como pragas de diferentes cultivos, principalmente em frutíferas (Marcondes, 2001; Nakano et al., 2002). Além disso, muitas espécies são usadas para controle biológico, como bioindicadoras de preservação ambiental, e ainda para compreensão de processos genéticos, e na elucidação de casos forenses (Carvalho et al., 2012). Pode-se perceber que é de grande importância à realização de pesquisas e estudos com esta ordem.

No Brasil, os estudos faunísticos para a ordem Diptera, se direcionada para famílias específicas que então diretamente relaciona ao homem, como de importância médica (Culicidae, Psychodidae, Simuliidae, e Tabanidae), econômica (Tephritidae, Drosophilidae e Lonchaeidae), Ambiental (Cecidomyiidae, Chironomidae e Syrphidae), Forense (Calliphoridae, Sarcophagidae, e Muscidae), entre outros (Tauhyl & Guimarães, 2012).

Ferraz (2011) indica que os estudos com a ecologia de dípteros em ambientes florestais que apresentam fragmentos ainda são poucos, portanto os levantamentos da biodiversidade de áreas ecótonos são fundamentais, principalmente, para conhecer as espécies ou famílias que ocupam diferentes habitats e padrões de distribuição, onde muitas podem atuar como bioindicadoras de preservação ambiental, fortalecendo assim a elaboração de políticas de conservação.

Levantamentos faunísticos de Diptera na região Neotropical são indispensáveis, pois somente uma parte da diversidade biológica do grupo é conhecida, com estimativas que um grande número de espécies de dípteros ainda não seja conhecida (Tauhyl & Guimarães, 2012; Amorim et al., 2002).

Considerando que a área de estudo é uma unidade de conservação e apresentar ali características únicas de fitosionomias, é de suma importância estudar a fauna deste local a fim de conhecer a diversidade das espécies ali presentes e reforçar a conservação. O objetivo desta pesquisa foi fazer um levantamento faunístico da sazonalidade das famílias de Diptera, para estudos de diversidade e a abundância de famílias de Diptera na região, oferecendo suporte para futuros estudos taxonômicos mais específicos.

MATERIAL E MÉTODOS

O presente estudo foi realizado na Unidade de Conservação (UC) Refúgio de Vida Silvestre dos Campos de Palmas (RVS-CP), que se localiza na cidade de Palmas, no estado Paraná. Apresenta 1035 metros de altitude, abrangendo uma área de 16.582 hectares, coordenadas entre (26°34'59"S e 51°36'16"W). A área de vegetação é caracterizada por fragmentos de Mata Atlântica com fitofisionomias de floresta ombrófila mista com predominância de Campos Sulinos (Miranda, 2006; Martins, 2009).

São características da região o frio intenso e umidade no inverno, marcado com geadas e neve, verões brandos, sem estações de seca definidos, de acordo com a classificação de Köppen é de Cfb, temperatura média no mês mais frio inferior a 18°C e temperatura média no mês mais quente inferior a 22°C, com participação pluviométrica média em torno de 2250mm (CEPAGRI, 2010).

Foram realizadas quatro coletas uma por cada estação do ano com início em dezembro de 2013 e término em setembro de 2014. Cada coleta teve a duração de uma semana e foram realizadas nos dias 09 de dezembro de 2013 (primavera), 07 de março de 2014 (verão), 17 de junho de 2014 (outono), e 15 de setembro de 2014 (inverno).

As coletas foram realizadas utilizando seis armadilhas Malaise que dispuseram aos pares em três ambientes diferentes, denominadas A1 e A2 para fragmento dentro de mata, B1 e B2 para borda de fragmento (entre campo e mata), e C1 e C2 para campo aberto. Foram montadas e posicionadas no interior de cada paisagem florística distinta, com sete dias de antecedência. A delimitação das áreas considerou a abertura de dossel e composição florística do entorno conforme proposto por (Wheater et al., 2012) .

A área de mata apresentava abertura dossel de 10% e vegetação composta por grandes árvores com um porte maior de 2 metros de altitude. Ao que desrespeita a área borda de mata apresentava abertura dossel intermédio entre 10 % a 80% e vegetação composta por árvores, arbustos e a presença de gramíneas entre outras plantas que tem espécies rasteiras. A área de Campo apresentava o dossel

acima de 80% e sua vegetação é composta por gramíneas e plantas herbáceas rasteiras, assim caracterizando os campos de altitude.

As dimensões das armadilhas Malaise são de: 1,70m de altura, 1,65m de comprimento e 0,9m de largura. A distância entre os fragmentos é de 300m, aproximadamente, exceto a área de mata, devido ao tamanho do fragmento de mata.

O material coletado foi armazenado em álcool 70%, e levado até o Laboratório de Zoologia do Instituto Federal do Paraná, Câmpus Palmas. Para a triagem e identificação manual das famílias de dípteros foi utilizado um estereomicroscópio para analisar minuciosamente cada inseto, e a chave taxonômica proposta por Carvalho et al., (2012). Após a identificação, os insetos foram devidamente depositados em álcool, em frascos do tipo eppendorf de capacidade 1,5 ml ou 2 ml, com etiquetas contendo nome da família pertencente, data de coleta e identificação da área de coletada, e previamente depositados em um refrigerador.

Para as análises estatísticas dos dados foram construídas cinco tabelas diferentes, em Microsoft Excel 2010. A partir das tabelas foram calculados os índices de Simpson e Shannon para a diversidade das famílias por estação ou por área com o auxílio do programa (R Core Team, 2017). Para a distribuição das famílias em estações/áreas foi feito um teste de qui-quadrado.

Foram realizadas análises de complementaridade de nicho (H_2') que é utilizado geralmente em estudos de redes de polinização e mede o grau de complementaridade que as espécies de uma comunidade em relação à utilização dos recursos disponíveis. Esse índice varia de zero a um com os valores menores indicando que as espécies apresentam uma grande sobreposição de seus nichos, ou seja, utilizam os mesmos recursos, e valores próximos a um indicando uma grande complementaridade de nicho, com espécies utilizando recursos diferentes (Bluthgen, 2010). No presente trabalho consideramos como nicho o habitat (área) em que as famílias ocorrem e a estação do ano, dessa forma o índice de complementaridade (H_2') indica se as famílias de Diptera apresentam um padrão de sobreposição de nicho no qual a maior parte delas ocorre nas mesmas áreas/estações que as demais ou se a distribuição apresenta complementaridade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No Total foram coletados 6.485 indivíduos distribuídos em 52 famílias pertencentes á ordem Diptera (Tab.1). As famílias de Diptera variam durante as estações do ano e os ambientes de coleta, porém algumas famílias foram bem representadas durante todo o ano, como Sciaridade, Phoridae,

Cecidomyiidae, e Chironomidae. Os dados de Silva et al., (2011) colaboram para a compreensão da presença de algumas famílias coletados em todas as estações, pois é muito comum a distribuição dos dípteros ao longo das estações do ano.

Tabela 1. Número total de dípteros coletados apresentados por famílias nas quatro estações do ano.

Famílias de Díptera	Primavera	Verão	Outono	Inverno	Total
Acaliptrate não identificado	232	29	0	5	266
Acroceridae	0	0	0	2	2
Agromyzidae	5	9	1	0	15
Anthomyiidae	47	6	1	0	54
Asilidae	33	16	0	3	52
Bibionidae	2	0	19	1	22
Bombilidae	15	6	0	1	22
Calliphoridae	26	5	1	4	36
Cecidomyiidae	74	207	50	89	420
Ceratopogonidae	88	41	4	53	186
Chironomidae	45	99	156	111	411
Chloropidae	112	18	13	9	152
Clusiidae	3	3	0	0	6
Conopidae	3	5	0	0	8
Corethrellidae	0	0	1	0	1
Culicidae	0	10	2	0	12
Ditomyiidae	0	5	3	5	13
Dixidae	1	0	0	0	1
Dolichopodidae	46	38	5	14	103
Drosophilidae	34	11	6	7	58
Empididae	18	9	11	8	46
Ephydriidae	0	0	4	0	4
Fanniidae	213	7	9	44	273
Heleomyzidae	1	2	1	0	4
Hybotidae	0	1	0	0	1
Keroplastidae	47	74	11	13	145
Lauxaniidae	3	7	3	0	13
Limoniidae	18	27	23	82	150
Lygistorrhinidae	3	0	0	0	3
Milichiidae	0	4	0	0	4
Muscidae	208	52	22	55	337
Mycetophilidae	23	38	20	72	153
Nematocera não identificado	14	0	299	0	313
Odiniidae	0	2	1	0	3
Phoridae	178	182	167	38	565
Pipunculidae	0	2	0	0	2
Platystomatidae	0	2	0	0	2
Psychodidae	7	1	14	14	36
Rhinophoridae	1	0	0	0	1

Richardiidae	0	2	0	0	2
Sarcophagidae	148	17	8	10	183
Scatopsidae	10	2	1	0	13
Sciaridae	1045	291	331	207	1874
Sciomyzidae	0	1	0	0	1
Sepsidae	10	1	2	0	13
Simuliidae	2	0	13	0	15
Sphaeroceridae	106	1	4	0	111
Stratiomyiidae	0	1	0	0	1
Syrphidae	42	5	0	5	52
Tabanidae	78	6	0	0	84
Tachinidae	52	84	7	49	192
Tephritidae	3	3	0	9	15
Tipulidae	14	4	0	0	18
Ulidiidae	10	4	2	0	16
TOTAL de famílias	41	45	34	26	52
TOTAL de dípteros	3020	1340	1215	910	6485

Na coleta de primavera 09/12/2013, foram amostrados 3020 indivíduos distribuídos em 39 famílias, das quais as mais abundantes foram Sciaridae com n=1045; 34,60%, Muscidae n= 208; 6, 88%; e Phoridae n= 178; 5,89%.

Na coleta de verão 07/03/2014, apesar do número de indivíduos terem sido menor obteve-se maior riqueza em famílias, sendo então 1340 dípteros distribuídos em 44 famílias. As famílias mais abundantes durante o verão foram Sciaridae n=291; 21,7%, Cecidomyiidae n= 207; 15,4%, e Phoridae n= 182; 13,5%.

A coleta realizada no outono 17/06/2014 foi amostrada 1215 dípteros de 33 famílias, das quais Sciaridae com n=331; 27,2%, Phoridae n=167; 13,7%, Chironomidae n=156; 12,8 % foram as mais abundantes.

Por fim na estação do inverno 15/09/2014 foi coletado 910 dípteros, distribuídos em 25 famílias, sendo as mais abundantes, novamente Sciaridae com n=207; 22,7%, Cecidomyiidae n=89; 9,7%, Limoniidae n=82; 9,0%.

As famílias mais abundantes durante todo ano foram Sciaridae que do total de dípteros coletados foram 1874 sciarídeos, representando 28, 87% do total, Phoridae com um total de 565 representou 8,71% do total, Cecidomyiidae com 420 indivíduos, representou 6,47% e Chironomidae com 411 teve uma abundância de 6,33% do total de dípteros. Os sciarídeos são muito pouco estudados, no que se sabe são dípteros que ocupam vários habitats, as larvas de algumas espécies são fungívoras crescendo

em plantas em decomposição e até mesmo em tecidos vegetais de plantas vivas. Os adultos ocupam lugares sombreados e com umidade (Mcalpine & Wood, 1989; Amorin, 1992; Carvalho et al., 2012).

A família Phoridae é uma família cosmopolita que apresenta um grande número de espécies descritas, sendo uma das maiores famílias de Diptera. São considerada uma das famílias com a mais variada biologia entre os insetos e são encontrados nos mais diferentes habitats como corpos em decomposição, ninhos de roedores e de aves, flores, fungos, ninhos de vespas, cupins, formigas, e em cavernas (Carvalho et al., 2012).

A família Cecidomyiidae são dípteros galhadores onde muitas espécies tem grande especificidade em suas plantas hospedeiras, sendo mais abundantes em ambientes perturbados, muitas espécies são consideradas importantes pragas agrícolas (Araújo & Santos, 2009; Fernandes et al., 2009; Maia, 2005). Contudo são esperados esses dípteros com abundância, pois a região é caracterizada com ações antrópicas.

Quanto à família Chironomidae são encontrados em diferentes ambientes. Algumas espécies possuem larvas com hábitos aquáticos, e essas larvas são usadas como bioindicadoras na verificação de ambientes aquáticos perturbados, suas larvas podem ainda serem semi-terrestres e totalmente terrestres, tanto que algumas se desenvolvem em placas fecais de bovinos. Os adultos desta família apresentam hábito crepuscular ao voarem em enxames ao anoitecer (Brown et al., 2009; Aburaya & Callil, 2007; Gazagnes & Laville, 1985; Trivinho-Strixino & Strixino, 2005). Todos os aspectos ambientais citados são encontrados aos arredores da Unidade de Conservação onde foram realizadas as coletas.

As famílias com menor abundância foram Corethrellidae, Dixidae, Hybotidae, Rhinophoridae, Sciomyzidae, Stratiomyiidae, com semente um indivíduo de cada representando 0,15% do total. Acredita-se que pelo fato deste trabalho ter realizado somente uma coleta para cada estação obteve-se um único indivíduo para estas famílias, não significando que estas não são frequentes no ambiente de coletas.

A estação que apresentou maior abundância de dípteros foi primavera, mas em relação à riqueza verão obteve maior número de famílias coletadas, ficando então outono e inverno com menor abundância e riqueza. Esses resultados eram esperados, pois as estações de primavera e verão são mais quentes e chuvosas onde acontece grande reprodução dos insetos, ocorrendo um grande número de espécimes, a menor abundância e riqueza foram no inverno e outono devido às estações serem marcadas de frio intenso. Tauhyl et al (2012) apresentou dados semelhantes em relação a abundância das estações e as famílias mais coletadas, utilizando a mesma metodologia, porém com

um esforço amostral de quatro Malaises por área, diferente deste trabalho que utilizou seis armadilha Malaise.

Em geral á muito poucos estudo de levantamento de famílias de Diptera, isso implica em lacunas no conhecimento de trabalhos científicos. Muitos trabalhos publicados consistem em inventários centrados em famílias específicas as quais apresentam importância agrícola, médica ou econômica. Os poucos trabalhos científicos de levantamento ou sazonalidade de dípteros não utilizaram a mesma metodologia, esses por sua vez mostram que diferentes metodologias de coleta influenciam diretamente na abundância e a riqueza dos dípteros como observado nos trabalhos de Sousa et al., (2014) e Azevedo et al., (2015). Além de diferentes metodologias é necessário levar em consideração os ambientes de coleta visto que os estudos foram em diferentes biomas brasileiros que apresentam aspectos de fauna e flora específicos. Para tanto, conhecer a estrutura e a composição de uma comunidade de dípteros pode sugerir meios de inferir a estabilidade ambiental de um determinado ambiente em que o levantamento fora realizado, reforçando assim a sua conservação.

A abundância dos dípteros obtidos variou também por fragmentos. As maiores abundâncias foram observadas nos fragmentos de borda, seguido de mata, campo obteve a menor abundância, porém borda e campo tiveram 43 famílias presentes enquanto mata apresentou somente 34 famílias presentes (Tab.2). (Ferraz et al., 2011) cita muitos trabalhos que falam a respeito do efeito de borda para a captura de dípteros, afirma ainda que estudos sobre efeitos de borda são importantes, pois esses microambientes apresentam uma transição abrupta entre floresta e o habitat ao redor na formação de duas fitofisionomias distintas que podem disponibilizar diferentes recursos alimentares, tornando assim diferentes habitats comportando um número maior de espécimes.

Tabela 2. Total de dípteros de diferentes famílias por área independente de estação do ano.

Famílias de Diptera	MATA	BORDA	CAMPO
Acroceridae	0	2	0
Agromyzidae	0	5	10
Anthomyiidae	2	4	48
Asilidae	20	28	4
Bibionidae	0	3	19
Bombilidae	0	8	14
Calliphoridae	3	19	14
Cecidomyiidae	124	199	97
Ceratopogonidae	54	113	19
Chironomidae	83	279	49
Chloropidae	17	68	67

Clusiidae	2	3	1
Conopidae	0	2	6
Corethrellidae	0	1	0
Culicidae	0	3	9
Ditomyiidae	2	11	0
Dixidae	0	0	1
Dolichopodidae	15	46	42
Drosophilidae	18	35	5
Empididae	20	15	11
Ephydriidae	2	2	0
Fanniidae	105	68	100
Heleomyzidae	2	0	2
Hybotidae	0	0	1
Keroplatidae	4	139	2
Lauxaniidae	3	8	2
Limoniidae	80	50	20
Lygistorrhinidae	0	3	0
Milichiidae	0	4	0
Muscidae	63	197	77
Mycetophilidae	23	127	3
Odiniidae	1	0	2
Phoridae	261	276	28
Pipunculidae	0	2	0
Platystomatidae	0	0	2
Psychodidae	15	19	2
Rhinophoridae	0	0	1
Richardiidae	0	0	2
Sarcophagidae	12	62	109
Scatopsidae	3	4	6
Sciaridae	807	974	93
Sciomyzidae	0	0	1
Sepsidae	1	3	9
Simuliidae	0	1	14
Sphaeroceridae	9	102	0
Stratiomyiidae	1	0	0
Syrphidae	3	26	23
Tabanidae	12	66	6
Tachinidae	9	100	83
Tephritidae	1	5	9
Tipulidae	0	10	8
Ulidiidae	1	2	13
TOTAL de dípteros	1778	3094	1034
TOTAL de famílias	34	43	43

Os dados de diversidade das famílias por estação para o índice de Simpson foram maiores no inverno, no entanto para o índice de Shannon os dados de maior diversidade das famílias de Diptera foram no verão. Em relação os fragmentos de coleta a diversidade foi diferente para cada estação. No fragmento de mata a maior diversidade foi no inverno tanto para o índice de Simpson quanto para o de Shannon. No fragmento de borda que é um ambiente entre campo e mata os valores para maiores de diversidade para os dois índices foram à estação de primavera, sendo esse resultado também para área campo. Para a diversidade das famílias com as áreas somadas independente das estações do ano, os índices de diversidade indicam que o fragmento de campo foi o mais diverso (Tab. 3).

Tabela 3. Diversidade das famílias por estação e área (Fam- Famílias; est-Estação).

	Primavera		Verão		Outono		Inverno	
	Simpso n	Shanno n	Simpso n	Shanno n	Simpson n	Shanno n	Simpso n	Shanno n
Fam/est geral	5,94	2,52	8,92	2,66	5,02	2,16	9,35	2,56
Fam/est mata	1,98	1,29	5,10	2,00	4,13	1,79	8,80	2,38
Fam/est borda	7,46	2,58	7,43	2,48	4,63	2,07	6,93	2,33
Fam/est campo	10,31	2,71	4,70	2,02	8,79	2,69	9,68	2,43
Áreas								
	Mata		Borda		Campo			
	Simpso n	Shanno n	Simpson n	Shanno n	Simpso n	Shanno n	Simpso n	Shanno n
Fam/área	4,11	2,07	7,50	2,62			15,81	3,05

Os índices de diversidade levam em consideração dois fatores importantes que são o número de espécies e sua equabilidade, visto que este segundo componente refere-se ao quão as espécies estão representadas em uma comunidade, devido a isso foi utilizado dois índices de diversidade o de Simpson e o de Shannon. Os índices levam em consideração critérios de avaliação diferentes para análises de diversidade de comunidades. O índice de Simpson diferencia-se basicamente ao peso dado as espécies ou famílias raras que tem um peso menor, diferente do índice de Shannon que o peso dado é intermediário (Melo, 2008).

Como pode se observar na (tab.1) a estação de inverno foi a que obteve mais equidade nos dados das famílias, sendo que o número representativo de cada família não varia muito, diferente das estações de primavera e verão que á um número exagerado de uma única família, isso talvez explique a diversidade ter dado maior no índice de Simpson nas famílias por estação geral. A coleta de inverno foi realizada em setembro, quando há o aumento da temperatura o que proporciona maior

forrageamento dos insetos e consequentemente uma maior atividade nas a proximidade das armadilhas da mata (Taylor, 1963). No verão foram coletadas muitas famílias com somente um indivíduo isso corrobora para o índice de Shannon ter maior valor de diversidade no verão.

A diversidade de famílias dos fragmentos de borda e campo foram maiores na primavera isso talvez tenha ocorrido pelo fato que esta estação é marcada de floração que são características dos fragmentos e muitas famílias coletadas nestes ambientes são polinizadoras, coincidindo com os dados das áreas somas independentes de estação onde a diversidade maior também foi no ambiente de campo.

A distribuição dos indivíduos de cada família é influenciada pela estação e pelas áreas de coleta, pois os valores do teste de Qui-quadrado foram todos significativos (Tab.4). Esses dados foram representativos porque que muitas famílias ocorrerem somente em uma única estação do ano ou área de coleta.

Tabela 4. Análise do Qui-quadrado para verificação da distribuição dos indivíduos das famílias por estação e áreas de coleta.

	Valor de Qui-quadrado	Graus de Liberdade	Probabilidade
Famílias por estação geral	2286,8	153	<0,05
Família por estação mata	1442,7	99	<0,05
Famílias por estação borda	1120,7	126	<0,05
Famílias por estação campo	1076,8	126	<0,05
Famílias por área	1999,0	102	<0,05

Os resultados para a complementariedade de nicho dos dípteros não foram significativos. Para os dados das famílias por estação geral foi obtido o valor de 0,150, já para as famílias por estação área mata= 0,290, borda= 0,140, campo= 0,380 e para as famílias soma das áreas independentes de estação a complementariedade de nicho foi de 0,150.

O valor mais próximo de um foi às famílias por estação área de campo, sendo assim há uma maior complementariedade de nicho entre os dípteros nas estações no fragmento de campo. No que desrespeita os outros resultados os valores foram muito baixos isso significa que acontece grande sobreposição de nichos entre as famílias, entre os ambientes e as estações coletadas, portanto há um padrão de sobreposição de nichos nesta comunidade de dípteros. Bluthgen, (2010), indica que o índice de complementariedade de nicho (H_2') geralmente é mais utilizado em redes de polinização, servindo

como medida para o grau de complementariedade das espécies de uma comunidade, revelando aspectos ecológicos entre as espécies.

É importante conhecer a complementariedade de nicho das espécies de uma comunidade afim de conhecer a dinâmica populacional, pois em locais com fatores limitantes que atuam intensamente e com competição interespecífica costumam apresentar baixos índices de diversidade, aumentando assim o número de espécies comuns e diminuindo as espécies raras, podendo até ocasionar extinções (D'Almeida & Almeida, 1998; Ferraz, 2011).

Os modelos matemáticos de estudos ecológicos utilizados nesta pesquisa proporcionam uma ideia da estrutura e composição da comunidade de dípteros, porém para o melhor conhecimento dos fatores ecológicos que estruturam a comunidade de dípteros, seria necessário um maior número de coletas durante as estações e a continuação do trabalho para mais anos, assim a biodiversidade da comunidade de dípteros poderá ser mais bem compreendida.

CONCLUSÕES

Com esse estudo foram coletados 6485 dípteros no total que estão distribuídos em 52 famílias, às famílias mais representes nas coletas foram Sciaridae, Phoridae, Cecidomyiidae e Chironomidae. Para a sazonalidade dos dípteros, a estação com maior riqueza foi verão e primavera obteve maior abundância. Para os índices de diversidade, Simpson indica inverno como a estação com mais diversidade de famílias, enquanto Shannon indicou a estação de verão. Para os locais de coleta o campo foi o que apresentou maior diversidade nos dois índices de diversidade. No presente estudo pode-se concluir que a distribuição das famílias é influenciada pelas estações do ano e para os diferentes ambientes coletados.

Com o estudo da biodiversidade da ordem Diptera pode-se concluir uma necessidade da preservação dessas áreas e aponta a importância de estudos contínuos nesta Unidade de Conservação, para o melhor conhecimento da fauna e dar suporte para novos estudos taxonômicos.

AGRADECIMENTOS

Ao CNPq, pela concessão da bolsa de Iniciação Científica ao primeiro autor, ao ICMbio pelas ajudas nas coletas e aos colegas da UFPR, na confirmação da identificação de algumas famílias de Diptera, João Manuel Fogaça, Ândrio Zafalon, e Lucas Roberto Gomes.

REFERÊNCIAS

- ABURAYA, F. H. E CALLIL, C.T. Variação temporal de larvas de Chironomidae (Diptera) no Alto Rio Paraguai (Cáceres, Mato Grosso, Brasil). *Revista Brasileira de Zoologia*, v.24, n.3, p.565-572. 2007.
- AMORIM, D. S. A Catalogue of the Family Sciaridae (Diptera) of the Americas South of the United States. *Revista Brasileira de Entomologia*, v.36 n.1, p55 – 77. 1992.
- AMORIM, D. S., Silva, V. C. e Balbi, M. I. Estado do conhecimento dos dípteros neotropicais. *Proyecto de Red Iberoamericana de Biogeografía y Entomología Sistemática*. v.2 p.29-36. 2002.
- ARAÚJO, W. S; SANTOS, B. B. Efeitos da sazonalidade e do tamanho da planta hospedeira na abundância de galhas de Cecidomyiidae (Diptera) em *Piper arboreum* (Piperaceae). *Revista Brasileira de Entomologia*, v.53 n.2 p300–303. 2009.
- AZEVEDO, F.R; AZEVEDO, R; SANTOS, C.A.M.; MOURA, E.S; NERE, D.R. Análise faunístico e flutuação populacional da Dipterofauna de ecossistemas da área de proteção Ambiental do Araripe, Barbalha, CE. *Entomo Brasiliis*. v.4, n.2, p.117-124, 2015.
- BLUTHGEN, N. Why network analysis is oftendis connected from community ecology: A critique and an ecologist' s guide. *Elsivier*. v.11, p.185-195, 2010.
- BROWN, B.V; BORKENT, A; CUMMING, J.M; WOOD, D.M; WOODLEY, N.E; ZUMBADO, M.A. *Manual of Central America Diptera*. NRC Research Press Ottawa. v.1. 2009. 437p.
- BUZZI, Z.J. *Entomologia didática*. Curitiba: UFPR, 2010p.
- CARVALHO, C.J.B; RAFAEL, J.A; COURI, M.S; SILVA, V.C. *Diptera Linnaeus, 1758. Insetos do Brasil: Diversidade e Taxonomia*. Holos Editora, Ribeirão Preto, 2012. 810p.
- CEPAGRI. 2010. Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas aplicadas a Agricultura. Disponível em: < <http://www.cpa.unicamp.br/> >. Acesso em: 30 out. 2017.
- D'ALMEIDA, J.M; ALMEIDA, J.R. Nichos trópicos em dípteros caliptrados, no Rio de Janeiro, RJ. *Revista Brasileira de Biologia*, São Carlos, v. 58, n. 4, p. 563-570, 1998.
- FERNANDES, G.W; CARNEIRO, M.A.A; BRANCO, C.S.A; BRAGA, C.E.D; ALMADA, E.D; COSTA, M.B.M; MAIA, V.C. Are gallmidg especies (Diptera, Cecidomyiidae) host-plants pecialists?. *Revista Brasileira de Entomologia*, v.53, n.3, p.365-378, 2009.
- FERRAZ, A.C.P. Efeitos de borda em florestas tropicais sobre artrópodes, com ênfase nos dípteros ciclorafofos. *O ecologia Australis*. v.15, n.2, p.189-198, 2011.
- GAZAGNES, G; LAVILLE, H. Étude faunistiquedes Chironomides (Diptera) de la Haute Neste d'Aure (Pyrénées Centrales): impactde saména gementshydro électriciques. *Ann. Limnol*. v.21. 1985. 149-159p.
- MAIA, V.C. Catálogo dos cecidomyiidae (Diptera) do estado do Rio de Janeiro. *Biota Neotropica*. v.5, n.2, p.1-15, 2005.
- MARCONDES, C.B. *Entomologia Médica e Veterinária*. São Paulo: editora Atheneu, 2001.

MARTINS, E.S. Refúgio de vida silvestre, espécie de unidade de conservação e a efetividade nos campos de Palmas. 77 f. Trabalho de graduação - Curso de Direito, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, como requisito à obtenção do título de bacharel em Direito, Curitiba, 2009.

MCALPINE, J.F; WOOD, D.M. Manual of Nearctic Diptera. Agriculture Canada, Research Branch Monograph. n.1, 1989. 684p.

MELO, A.S. O que ganhamos ‘confundindo’ riqueza de espécies e equabilidade em um índice de diversidade?. Biota Neotropica. v.8, n.3, p.21-27, 2008.

MIRANDA, J.M.D; LEITE, A.P; RIOS, R.F.M; PASSOS, F.C. Primeiro registro de *Histiogaster montanus* (Phillips & Landbeck) para o estado do Paraná, Brasil (Chiroptera, Vespertilionidae). Revista Brasileira de Zoologia. p.584- 587, jun. 2006. Disponível em:

< <http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/zoo/article/viewFile/6038/4315> > Acesso em: 30 mar. 2015.

NAKANO, O; SILVEIRO NETO, S; CARVALHO, R.P.L; BAPTISTA, G.C; BERTI FILHO, E; PARRA, J.R.P; ZUCCHI, A.R; ALVES, B.S; VENDRAMIM, J.D; MARCHINI, L.C; LOPES, J.R.S; OMOTO, C. Entomologia Agrícola. Piracicaba-SP: ESALQ, 2002.

R CORE TEAM (2014). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL <http://www.R-project.org/>.

SILVA, N.A.P; FRIZZAS, M.R; OLIVEIRA, C.M. Seasonality in insect abundance in the “Cerrado” of Goiás State, Brazil. Revista Brasileira de Entomologia. v.55, n.1, p.79-87, 2011.

SOUSA, J.E.N; FARIA, L.S; MENDES, J; SOARES, S.N. Riqueza de dipterofauna associada à matéria orgânica em decomposição em fragmentos de Floresta Estacional Semidecidual no sul de Goiás. Biotemas. v.27, n.4, p.73-81, 2014.

TAUHYL, L.G.M; GUIMARÃES, M.V.U. Dipterofauna de fragmentos vegetacionais da UFSCar – Campus Sorocaba, SP, Brasil. Revista Trópica: Ciências Agrárias e Biológicas. v.6, n.2, p.79-88, 2012.

TAYLOR, L.R. Analysis of the effect of temperature on insects in flight. Journal of Animal Ecology, v.32, n.1, p.99-117, 1963.

TRIPLEHORN, C.A; JOHNSON, N.F. Estudo dos insetos. São Paulo, Cengage Learning, 2011. 809 p.

TRIVINHO-STRIXINO, S. E STRIXINO, G. Chironomidae (Diptera) do Rio Ribeira (Divisa dos Estados de São Paulo e Paraná) numa avaliação ambiental faunística. Entomological Vectors, v.12, n.2, p243-253. 2005.

WHEATER, C.P; BELL, J.R; COOK, P.A. Practical Field Ecology - A project guide. Oxford: Wiley-Blackwell, 2012.

Capítulo 3

10.37423/211004890

OFICINA PEDAGÓGICA COMO FERRAMENTA DE ENSINO NA MICOLOGIA: APRENDENDO A CULTIVAR COGUMELOS COMESTÍVEIS

Marina de Souza Falcão

Universidade Federal do Pampa

Bruna Lucia Laindorf

Universidade Federal do Pampa

Lilian Pedroso Magglo

Universidade Federal do Pampa

Jair Putzke

Universidade Federal do Pampa

Resumo: Os fungos comestíveis, em especial, os cogumelos, são apreciados pela sua aplicação em culinária e sabor desde as primeiras civilizações. Assim, o estudo e a aplicação de técnicas caseiras no cultivo de cogumelos podem ser considerados uma forma de difundir o conhecimento em relação aos fungos. Portanto, este trabalho objetivou realizar uma oficina sobre as técnicas de cultivo de *Pleurotus ostreatoroseus*. O trabalho foi desenvolvido durante a Jornada Acadêmica da Biologia, destinada aos alunos de graduação da Universidade Federal do Pampa - São Gabriel. A oficina contou com a presença de 20 acadêmicos, tendo suas atividades desenvolvidas no laboratório de Botânica. Houve a apresentação do Reino Fungi e suas aplicações e ensino das técnicas de cultivo utilizadas na fungicultura. Os discentes tiveram a oportunidade de trabalhar com as etapas do cultivo, colocando em prática a técnica, onde há a propagação do fungo de maneira assexuada, e o preparo da semente "Spawn". Finalizadas as etapas de cultivo, os participantes foram convidados a retornar ao laboratório para acompanhar o crescimento da espécie inoculada. Conclui-se que atividades como a oficina pedagógica são de extrema importância para promover a divulgação da micologia, em especial à área da micologia, ainda pouco explorada no mundo acadêmico

Palavras-chave: Cultivo, Cogumelos, Spawn, Ensino

INTRODUÇÃO

O Reino Fungi pertencente ao Domínio Eukarya, (CAVALIER-SMITH, 1998), está presente em todos ecossistemas terrestres, desempenhando importante papel ecológico (BONONI et al., 1999; TEIXEIRA et al., 2001). Através da decomposição de matéria orgânica, constituindo relações simbióticas com outros seres e servindo como fonte de nutrientes para animais silvestres, entre outras atribuições, são imprescindíveis às relações ecológicas, logo, instituindo equilíbrio ambiental. (PUTZKE; PUTZKE, 2018).

Os fungos apresentam enorme diversidade morfológica, podem ser desde leveduras (unicelulares) dependendo das condições ambientais, exemplo da espécie *Saccharomyces cerevisiae* (PARAPOULI et al., 2020), filamentosos durante todo estágio de vida ou quando as condições abióticas estiverem favoráveis, e em alguns grupos com o desenvolvimento da estrutura macroscópica, o basidioma para fins reprodutivos (PUTZKE; PUTZKE 2008). Por último, estes despertam interesse econômico devido a sua aplicabilidade nas mais diversas áreas.

Os fungos comestíveis, em especial, os cogumelos, são apreciados pela sua aplicação culinária e sabor desde os primórdios da civilização (VARGAS et al. 2013). Ainda hoje os cogumelos silvestres são coletados a campo em várias culturas e produzidos para serem mercados e restaurantes. Os mais famosos na culinária gourmet são as trufas (*Tuber melanosporum* e *Tuber magnatum*) que, por sua vez, vivem em associação micorrizica com raízes de árvores (AZEVEDO; BARATA, 2018).

O Filo Basidiomycota possui espécies de cogumelos comestíveis que permitem o cultivo de seus basidiomas de forma artificial, desde que se recrie os parâmetros ambientais para o desenvolvimento do organismo em estufa (URBEN, 2017), com a intenção de comercialização em mercado e feiras orgânicas (AZEVEDO et al., 2014).

Segundo a Associação Nacional dos Produtores de Cogumelos – ANPC (2018), as espécies mais cultivadas no Brasil são *Agaricus bisporus* (Lange), *Pleurotus* spp. (Singer), *Lentinula edodes* (Berk) e *Agaricus blazei* (Muriel).

O cultivo de cogumelos comestíveis é um tema transversal para várias áreas de conhecimento, configurando-se como instrumento de ensino-aprendizagem das Ciências da Natureza e da Agroecologia (CRISTINO et al. 2019).

No processo de ensino-aprendizagem sobre o Reino Fungi, o docente pode utilizar de diversas metodologias, entre elas o uso de oficinas. Segundo Paviani & Fontana (2009), as oficinas pedagógicas

promovem a interação entre o pensar e o agir, o que requer um conjunto de fatores que irão impulsionar o indivíduo a executar uma determinada tarefa, tratando-se da construção do conhecimento por meio da ação, considerando sua natureza teórica. Além disso, Freire (2003) destaca que a formação do conhecimento deve ocorrer de forma participativa e colaborativa, o que torna o sujeito protagonista da construção do seu conhecimento. Assim, as oficinas pedagógicas têm papel fundamental na construção de conhecimento de forma livre e criativa.

Tendo em vista as áreas abrangentes e a importância da micologia para a vida como um todo, as oficinas pedagógicas têm papel fundamental na construção de conhecimento de forma livre e criativa.

Assim, o estudo e a aplicação de técnicas caseiras no cultivo de cogumelos podem ser considerados uma forma de difundir o conhecimento em relação aos fungos e incorporar na dieta uma alimentação saudável.

Desta forma, o trabalho teve como objetivo estudar e apresentar as técnicas de cultivo do cogumelo *Pleurotus ostreatoroseus* Singer, como uma ferramenta para facilitar o processo de ensino-aprendizagem acerca da temática.

MATERIAL MÉTODOS

A oficina foi aplicada durante a Jornada Acadêmica da Biologia, destinada aos alunos de graduação da Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA, localizada no município de São Gabriel, RS. As atividades foram desenvolvidas no laboratório de Botânica para 20 acadêmicos dos cursos de Biotecnologia, Ciências Biológicas e Engenharia Florestal, e planejada pelo Laboratório de Taxonomia de Fungos para ocorrer em três momentos.

DESENVOLVIMENTO

A sequência didática almejou propiciar condições para que os alunos pudessem aplicar em sua vida cotidiana os conhecimentos adquiridos na oficina.

1º momento: Introdução aos Fungos

- Houve a apresentação do Reino Fungi - o que é, qual a importância dos fungos para o equilíbrio ecológico, quais Filos o constituem e suas diferenças;

- Apresentação das características gerais do Filo Basidiomycota, de interesse para oficina. Estas foram, morfologia micro e macroscópica, hábitos e ciclo de vida, importância destes organismos para vida humana;
- Exposição sobre os cogumelos comestíveis, representantes silvestres, e os cuidados a serem tomados quando coletado na natureza.
- Exposição sobre os cogumelos comestíveis, representantes comerciais, como são apresentados ao mercado brasileiro e quais espécies mais consumidas no país;
- Finalizando a introdução do tema da oficina, houve a explanação sobre a espécie a ser utilizada *Pleurotus ostreatoroseus*, sua importância econômica e nutricional, bem como a produção industrial e caseira deste cogumelo.

2º momento: Técnicas de cultivo apresentadas

Com o término da introdução sobre os fungos, houve a apresentação aos discentes sobre as técnicas comumente utilizadas no cultivo de cogumelos, tanto em cultiva laboratorial, a cargo de conhecimento, quanto ao cultivo caseira, estas aplicadas nas atividades propostas pela oficina.

- Seringa de Esporos

Isolar um cogumelo a partir da seringa de esporos é uma técnica conhecida por gerar variabilidade genética, pois faz com que esporos monocarióticos (n) de diferentes polaridades germinem, se encontrem no substrato, se fundam e passem a crescer de forma dicariótica ($2n$), com grampos de conexão, sendo assim a forma assexuada de reproduzir fungo artificialmente (URBEN, 2017).

Figura 1 – Desenvolvimento da coleta de esporos e aplicação via seringa em substrato.

Fonte: Falcão et. al., 2021

Este procedimento consiste em coletar o cogumelo, destacar o píleo (vulgarmente chamado de chapéu), sobrepor o píleo em uma folha laminada, em seguida, alocar o cogumelo com a folha laminada em um recipiente fechado, junto a pedaços de papel umedecidos, aguardar no mínimo 24 h, para assim, a esporada ser liberada pelo fungo. Após liberada a esporada é necessário lavar, com água filtrada, a folha laminada contendo o carimbo de esporos em um recipiente limpo e recolhe-lo com uma seringa, para posteriormente inocular em Spawn (PUTZKE: PUTZKE, 2008).

- Isolado de cogumelo

O isolado de cogumelo é adquirido a partir de reprodução assexuada, advém da fragmentação do contexto do basidioma (parte interior do fungo), ou pela repicagem da fase “vegetativa”, denominada micélio. Esta técnica é a mais difundida no meio comercial. Entretanto, há a necessidade de cuidar quantas vezes se realiza este método em uma mesma linhagem, pois, esta pode perder vigor e produtividade com o passar do tempo (URBEN, 2017).

O primeiro passo é escolher um cogumelo vistoso, retirar qualquer tipo de contaminante que venha a ter (galhos, poeira, insetos, areia, etc.). Em seguida partir o cogumelo ao meio utilizando as mãos, sem encostar no interior do fungo exposto, retirar um fragmento do interior do cogumelo e inocular no substrato pretendido (URBEN, 2017), na oficina pedagógica os discentes inocularam os fragmentos em embalagens de polietileno contendo grãos de arroz com casca.

- Preparo do Substrato

O preparo do substrato ocorre de acordo com a necessidade do fungo a ser cultivado, significa, que há qualificação das condições de crescimento do fungo sejam ideais, neste procedimento é adicionado humidade aos grãos, característica importante para os fungos se desenvolverem. Para a oficina pedagógica foi utilizado grãos de arroz com casca, primeiramente por ser uma cultura difundida na região sul e segundo pela espécie *P. ostreatoroseus* ser decompositora de lignina e celulose.

Os métodos apresentados na oficina para o preparo dos substratos foram escolhidos por serem de fácil acesso de forma caseira, sem deixar de serem eficientes.

1ª Alternativa

A fervura dos grãos é o método mais utilizado por quem cultiva cogumelos, pois é rápido e permite que o substrato seja totalmente preparado em 24h.

Figura 2 – Representação dos grãos de casca de arroz que foram cozidos em panela com água fervente.

Fonte: Falcão et. al., 2021.

Preparo do substrato em panela com água fervente, é necessário cozinhar o grão por 10-15 minutos ou até que o grão solte um pouco da casca. Para depois levar a esterilização.

2ª Alternativa

Esta opção é para quem prefere dispensar o uso da panela e do fogo, ou prefere utilizar somente a casca do grão para suplementar, os substratos.

Figura 3 – Grãos de casca de arroz, imersos em arroz até que adquiram umidade.

Fonte: Autores.

Este procedimento consiste em imergir os grãos em recipiente com água filtrada. Deixar de molho os grãos de 12h a 24h, até que os grãos inchem, indicando a absorção de umidade, retirar a água que sobrar e levar os grãos para esterilizar.

- Esterilização

A esterilização do substrato é etapa fundamental na produção de cogumelos, neste procedimento se elimina os microrganismos contaminantes da matéria orgânica a ser colonizada, deixando os grãos utilizados prontos para serem colonizado pelo fungo de interesse, sem que haja competição entre este e o contaminante, que pode vir a matar a espécie comestível (URBEN, 2017).

Figura 4 – Imagem contendo os materiais comumente utilizados para esterilizar o substrato.

Fonte: Autores

Aos acadêmicos que participaram da oficina foi recomendado que meios de cultivo líquidos permaneçam na panela de pressão por 30 a 45 minutos. Para potes com até 1 litro em volume contendo grãos: 90 a 120 minutos. Pacotes propileno, como os utilizados na oficina, com até 2kg de grãos ou serragem suplementada: 120 a 240 minutos.

3º momento: Desenvolvimento da atividade (alunos cultivando)

Por fim, os alunos foram convidados a desenvolver, de forma prática, as atividades. Durante a realização da atividade, foi possível observar que os acadêmicos construíram o conhecimento e sanaram suas dúvidas e curiosidades durante a oficina.

Nesta etapa, os acadêmicos realizaram o cozimento dos grãos de arroz, logo em seguida, a esterilização dos grãos de arroz, após serem alocados embalagens de polietileno, esterilização do local onde estavam desempenhando a atividade, seguindo protocolo proposto durante a oficina. Bem

como, após o resfriamento do substrato houve a inoculação do cogumelo *P. ostreatoroseus* nos grãos de arroz com casca.

Figura – 5 Discentes realizando as atividades propostas pela oficina pedagógica, desenvolvida pelo Laboratório de Taxonomia de Fungos

Fonte: Autores.

Os discentes tiveram a oportunidade de trabalhar com as etapas do cultivo, colocando em prática a técnica *in-vitro*, onde há a propagação do fungo de maneira assexuada, e o preparo da semente "Spawn". Em seguida, houve a inoculação de fragmentos de micélio oriundos de "Spawn" em embalagens de polipropileno contendo substrato de palha de arroz para a formação do basidioma (cogumelo)

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Apresentar aos acadêmicos do ensino superior uma forma diferente de entender a micologia, corrobora com o que descreve Cachapuz (2011), ensinar a ciência a todos é fundamental para que possam a compreender, valorizar sua relação e implicações na sociedade. Oportunizar aos discentes a um contato direto com o organismo modelo do ensino, em laboratório, (KRASILCHIK 2011), exemplo das oficinas pedagógicas, faz com que os alunos se tornem agentes ativos na aprendizagem.

Pelo método de observação, notoriamente ao decorrer das etapas de cultivo os acadêmicos demonstravam interesse sobre os processos, por exemplo, quanto tempo até colonização total dos cogumelos no colonizar o substrato de palha de arroz, levando a reflexão da importância dos fungos

na decomposição de matéria orgânica, pois a espécie *P. ostreatoroseus* é saprofítica, decompositora de matéria orgânica (PUTZKE; PUTZKE, 2008).

Houve a explanação sobre qual local adequado para deixar a embalagem colonizada, foi uma das questões abordadas durante o curso, pois, os fungos necessitam de condições especiais para seu desenvolvimento, cada um com sua particularidade (URBEN, 2017), o cuidado para que não houvesse contaminações no substrato surgiu logo no final das atividades,

A oficina pedagógica, segundo Zabala (1998), tem importância na formação de futuros formadores, pois os coloca em direta posição de aprendizagem, sendo assim, constroem sua própria interpretação do que foi abordado. Freire (1978), aborda a prática de ensino dinâmica e criativa, faz com que haja participação coletiva de forma prazerosa e descontraída, se tornando uma via facilitadora na compreensão das mais diversas atividades. Encorajando o pensar e a discussão das visões dos colegas presentes.

Sendo assim, após finalizadas as etapas de cultivo, os participantes foram convidados a retornarem ao laboratório para acompanhar o crescimento da espécie inoculada no decorrer da oficina. Fazendo com que o interesse e aprendizagem, perpassassem o objetivo de cumprir as atividades. Assim, foi possível notar pelo método de observação, o interesse dos alunos pelas técnicas de cultivo, este, demonstrado pela participação dos mesmos com dúvidas e relatos pessoais no decorrer da oficina.

Figura 6 – Postagem do desenvolvimento dos cogumelos compartilhado por discentes que participaram da oficina.

Fonte: Autores. Compilação de imagens a partir das postagens dos discentes participantes da oficina.

CONCLUSÃO

Desta forma, conclui-se que atividades como a oficina pedagógica desenvolvida durante a Jornada Acadêmica da Biologia são de extrema importância para promover a divulgação da micologia, em especial à área da fungicultura, ainda pouco explorada no mundo acadêmico. Da mesma forma praticamente todos os aspectos sobre o crescimento e desenvolvimento dos fungos pôde ser trabalhado em apenas um turno de maneira prática e com excelente assistência e assimilação por parte dos inscritos.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao Laboratório de Taxonomia de Fungos pelos materiais cedidos, supervisão e assistência referente a logística e realização da oficina pedagógica.

REFERÊNCIAS

- ANPC. O Setor de Cogumelos. Disponível em: <<https://www.anpccogumelos.org/cogumelos>>. Acesso em: 2 out. 2021.
- ASTOLFI, J. P. & DEVELAY, M. A didática das Ciências. 16 ed. São Paulo: Papirus, 1990.
- AZEVEDO, Denise B.A. et al. CADEIA DE PRODUÇÃO DO COGUMELO ORGÂNICO: O ESTUDO DE CASO DA EMPRESA COGUMELOS BRASILIENSES. Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade – GeAS, [s. l.], v. 3, ed. 1, 2014. DOI: <https://doi.org/10.5585/geas.v3i1.77>. Disponível em: <https://periodicos.uninove.br/geas/article/view/9846>. Acesso em: 8 out. 2021.
- AZEVEDO, E.; BARATA, M. Diversidade no reino Fungi e aplicações à Indústria. Ciência Elementar, [s. l.], v. 6, ed. 4, 2018. DOI <http://doi.org/10.24927/rce2018.077>. Disponível em: <https://rce.casadasciencias.org/rceapp/art/2018/077/>. Acesso em: 8 out. 2021.
- CACHAPUZ, A. F. Perspectivas de Ensino. Porto: Eduardo & Nogueira, 2000. 79p.
- CACHAPUZ, A.; GIL- PÉREZ, D.; CARVALHO, A. M P de.; PRAIA, J. e VILCHES, A. (org.). A necessária renovação do ensino das ciências. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2011.
- CARVALHO, A. M. P. Termodinâmica: um ensino por investigação. São Paulo: Feusp, 1999.
- CAVALIER-SMITH, T. A revised six-kingdom system of life. Biology Review Cambrige, Phil. Soc. 73, 203–266, 1998.
- CRISTINO, E.M.; SILVA, M.C.S; JUNIOR, P.P.; ZANELLI, F.V.; ANDRADE, F.M.C. 2019. Cultivo de Cogumelos Comestíveis como Proposta de Ensino de Ciências da Natureza e da Agroecologia na Escola Família Agrícola Puris. Revista Brasileira de Extensão Universitária. V. 10, n. 2 p. 55-62. ISSN 2358-0399. DOI: <https://doi.org/10.24317/2358-0399.3019v10i2.10706>
- BONONI VR, CAPELARI M, MAZIEROR, TRUFEEM SFB. Cultivo de cogumelos comestíveis. Ícone. 1999. São Paulo, 206 p.
- DIÁRIO DA SAÚDE (2009). Alimentos orgânicos ganham preferência do consumidor brasileiro. Obtido em: <http://www.diariodasaude.com.br/news.php?article=alimentos-organicospreferencia-consumidor-brasileiro&id=3694>. Acesso em: 2 out. 2021.
- FREIRE, P. Política e Educação. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2003.
- FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 5. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1978. (Coleção O mundo, hoje, v. 21).
- KRASILCHIK, M. Prática de Ensino de Biologia. 4 ed. rev.e ampl., 3ª reimp., São Paulo: Ed. USP, 2011.
- GLOBO RURAL ONLINE (2011). Produção de orgânicos no Brasil deve crescer 40% em 2011. Retrieved from: <http://revistagloborural.globo.com/Revista/Common/0,,EMI23752018078,0OPRODUCAO+DE+ORGANICOS+NO+BRASIL+DEVE+CRESCER+EM.html> Acesso em: 28 set. 2021.

PARAPOULI, M.; VASILEIADIS, A.; AFENDRA, AS; HATZILOUKAS, E. *Saccharomyces cerevisiae* and its industrial applications. *AIMS Microbiol*, [s. l.], v. 6, n. 1, p. 1-31, 2020. DOI doi: 10.3934/microbiol.2020001. Disponível em:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7099199/>. Acesso em: 8 out. 2021.

PAVIANI, N. M. S; FONTANA, N. M. Oficinas pedagógicas: relato de uma experiência. *Conjectura: Filosofia e Educação*, v. 14, n. 2, p. 77-88.

PEREIRA, A.B. 1988. O gênero *Pleurotus* (Fr.) Kummer no Rio Grande do Sul, Brasil. *Caderno de Pesquisa série Botânica* n.1, p.19–45.

PUTZKE, J.; PUTZKE, M. T. L. Os reinos dos fungos. 3ª ed., Santa Cruz do Sul, Editora da Universidade de Santa Cruz do Sul, 606. 2008.

TEIXEIRA H, CHITARRA LG, ARIAS SMS, MACHADO JC. Efeito de diferentes fontes de luz no crescimento e esporulação in vitro de fungos fitopatogênicos. *Ciência Agrotécnica*. 2001;25(6):1314-1320.

URBEN, A. F. (2017) Produção de cogumelos por meio de tecnologia chinesa modificada. Brasília: EMBRAPA Recursos Genéticos e Biotecnologia, p.186.

VARGAS-ISLA, Ruby; ISHIKAWA, N. K.; PY-DANIEL, V.r. CONTRIBUIÇÕES ETNOMICOLÓGICAS DOS POVOS INDÍGENAS DA AMAZÔNIA.. *Biota Amazônia* (Biote Amazonie, Biota Amazonia, Amazonian Biota), [S.l.], v. 3, n. 1, p. 58-65, jul. 2013. ISSN 2179-5746. Disponível em: <<https://periodicos.unifap.br/index.php/biota/article/view/612>>. Acesso em: 29 set. 2021. doi:<http://dx.doi.org/10.18561/2179-5746/biotaamazonia.v3n1p58-65>.

ZABALA, Antoni. *A Prática Educativa: como ensinar*. Porto Alegre: Artmed, 1998.

Capítulo 4

10.37423/211004916

LEVANTAMENTO FITOSSOCIOLOGICO DA PRAÇA UNIVERSITÁRIA NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA – GO

Jefferson Barbosa da Silva

Universidade Federal de Viçosa

INTRODUÇÃO

Diversas são as definições para o termo Fitossociologia. A área envolve o estudo de fenômenos que se relacionam com a vida das plantas dentro das unidades sociais, além de retratar o complexo vegetação, solo e clima. Pode ser definida como o estudo das comunidades vegetais do ponto de vista florístico, ecológico, corológico e histórico (CHAVES et al., 2013)

Para Martins (1989), a Fitossociologia envolve o estudo das inter-relações de espécies vegetais dentro da comunidade vegetal no espaço e no tempo, referindo-se ao estudo quantitativo da composição, estrutura, funcionamento, dinâmica, história, distribuição e relações ambientais da comunidade vegetal, sendo justamente esta ideia de quantificação que a distingue de um estudo florístico.

A fitossociologia, como ciência, é uma área muito ampla e complexa, pois estuda o agrupamento das plantas bem como sua inter-relação e dependência aos fatores bióticos em determinado ambiente (BRAUN-BLANQUET, 1979). A vegetação não varia somente com a composição florística, mas com a riqueza de espécies, produtividade (estrutura) e grau de predominância de cada espécie (AUSTIN & GREIG-SMITH, 1968).

A Fitossociologia envolve o estudo das inter-relações de espécies dentro da comunidade vegetal no espaço e no tempo. Refere-se ao estudo quantitativo da composição, estrutura, funcionamento, dinâmica, história, distribuição e relações ambientais da comunidade vegetal. Apoia-se muito na Taxonomia Vegetal e tem estreitas relações com a Fitogeografia e as Ciências Florestais (MARTINS, 1989).

Estudos fitossociológicos dão subsídios para que o potencial de cada espécie seja conhecido, bem como suas características e peculiaridades em cada ambiente, permitindo assim a intervenção de forma correta e sensata no ecossistema. Mesmo sabendo da importância de estudos sobre a composição florística das áreas florestais, são poucos os trabalhos desenvolvidos e publicados na área que abrangem os remanescentes da Floresta Ombrófila Mista em seus distintos estágios, bem como nos demais biomas (VALÉRIO et al., 2008).

O levantamento florístico é um dos estudos iniciais para o conhecimento da flora de uma determinada área e implica na produção de uma lista das espécies que se encontram presentes, sendo de fundamental importância a correta identificação taxonômica dos espécimes e a manutenção de exsicatas em herbário, que poderão contribuir para o estudo dos demais atributos da comunidade (MARTINS, 1990). É importante salientar que a flora do Bioma Cerrado ainda é parcialmente

conhecida, sendo poucas as tentativas de compilação da sua composição florística (FINGER, 2008) e estrutura (FELFILI e SILVA JR., 1993).

Sendo assim, o estudo fitossociológico além de fornecer informações sobre a estrutura da comunidade de uma determinada área, fornece também as possíveis afinidades entre espécies ou grupos de espécies, acrescentando dados quantitativos a respeito da estrutura da vegetação (SILVA et al., 2002).

Hack et al. (2005), descreveu em seu trabalho alguns parâmetros fitossociológicos para caracterizar um estágio de sucessão, como por exemplo: densidade, dominância, frequência, índice de valor de importância e índice de valor de cobertura.

Densidade é o número de indivíduos de cada espécie na composição da comunidade e a dominância expressa a proporção de tamanho, de volume ou de cobertura de cada espécie, em relação ao espaço ou volume da fitocenose. Frequência é definida como a probabilidade de se amostrar determinada espécie numa unidade de amostragem. Densidade e Frequência de indivíduos de cada espécie estão relacionadas com o padrão de distribuição das mesmas em um fragmento. O índice de valor de importância (IVI) é a combinação dos valores fitossociológicos relativos de cada espécie, com finalidade de atribuir um valor para elas dentro da comunidade vegetal a que pertencem. O Índice de Valor de Cobertura (IVC) de cada espécie é obtido pela soma dos valores relativos de densidade e dominância. (JANKAUSKIS, 1990; KUPPER, 1994; MARTINS, 1990; MATTEUCCI & COLMA, 1982).

Os fatores condicionantes para a ocorrência da vegetação e riqueza de espécies no cerrado vêm despertando há muito tempo o interesse dos pesquisadores (MEIRA NETO e JÚNIOR, 2002). Para Felfili e Resende (2003), a partir da aplicação de um método fitossociológico pode-se fazer uma avaliação momentânea da estrutura da vegetação, ocorrentes em uma dada comunidade. Sabe-se que as diferentes condições de localidades contribuem para o surgimento de uma estrutura sob forma de mosaicos de vegetação, e as espécies ocorrem em longa escala geográfica (FINGER, 2008).

Portanto, para realizar uma análise da estrutura horizontal das comunidades vegetais, utilizam-se os parâmetros de frequência, densidade, dominância, valor de importância e valor de cobertura, que revelam informações sobre a distribuição espacial das populações e sua participação no contexto do ecossistema (LONGHI, 1997).

O presente estudo tem como objetivo caracterizar a diversidade de espécies bem como as famílias botânicas e espécies que exercem fator dominante na composição da Praça Universitária no município

de Goiânia, Estado de Goiás e contribuir para o conhecimento de aspectos silviculturais importantes para a manutenção deste local.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado na Praça Universitária (16°40'37"S 49°14'37"W) da região central da cidade de Goiânia, Estado de Goiás. O fragmento está localizado entre as faculdades PUC Goiás e UFG.

Tipicamente esta região apresenta clima temperado húmido com Verão temperado, com período seco e baixa intensidade e regularidade pluviométrica. Para caracterização da área de estudo, foram demarcadas de maneira sistemática 9 unidades amostrais de 9 x 100 metros (900m²), perfazendo um total de 0,90 ha. Em cada unidade, foram mensuradas todas as espécies arbóreas e arbustivas com CAP (circunferência a altura do peito). Todos os dados para a realização desse trabalho foram obtidos no trabalho de DOSSA *et al.* (2015).

A diversidade de espécies vegetais foi avaliada através dos parâmetros fitossociológicos de: Densidade Absoluta (DA), Densidade Relativa (DR), Frequência Absoluta (FA), Frequência Relativa (FR), Dominância Absoluta (DoA), Dominância Relativa (DoR), Índice de Valor de Importância – IVI e Índice de Valor de Cobertura – IVC. Para a análise dos dados, utilizou-se o programa EXCEL 2016.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Praça Universitária foram mensurados no levantamento florístico 172 indivíduos arbóreos, distribuídos em 12 famílias e 31 espécies. A família Fabaceae foi a que apresentou maior número de espécies (10 spp., 32%), seguida de Malvaceae (6 spp., 20%) e Myrtaceae e Bignoniaceae (3 spp., 10%) (Fig. 1).

Figura 1: Riqueza específica por família registrada na área de estudo.

FAMÍLIA BOTÂNICA

As espécies com maior número de indivíduos presente na área estudada foram *Handroanthus avellanadae*, com 23 indivíduos, *Syagrus oleracea*, com 22 e *Pachira aquatica*, com 20 indivíduos. *Poincianella pluviosa* é responsável pelo domínio da família Fabaceae no que se refere ao número de indivíduos.

As espécies que se destacam pela maior densidade no fragmento são *Handroanthus avellanadae*, *Syagrus oleracea*, *Pachira aquatica*, *Poincianella pluviosa*, e *Tibouchina granulosa* com 24,73; 23,65; 21,50; 17,20 e 11,83 árvores/ha, respectivamente (Tabela 1). Apenas quatro das espécies encontradas esteve presente em todas as parcelas do levantamento, o que evidencia a grande variação encontrada ao longo do povoamento.

Martins (1990) considera as espécies com baixos valores de densidade e frequência são comumente denominadas raras. Estas espécies são raras apenas no conceito numérico para uma determinada área num determinado momento, e não necessariamente do ponto de vista biológico, visto que podem ocorrer em florestas próximas a área de estudo. Porém, foram estas espécies que determinaram a elevada diversidade na praça. Neste grupo, devem existir algumas espécies verdadeiramente raras, considerando suas características biológicas, como aquelas de baixa densidade local por motivos sucessionais, além daquelas que apresentam baixa densidade por serem espécies de outras formações. Espécies como *Anacardium occidentale*, *Enterolobium contortisiliquum*, *Swietenia*

macrophylla e *Tabebuia roseoalba*, apresentaram baixos valores de densidade e frequência, podendo, portanto, serem consideradas as espécies mais raras do fragmento estudado.

Quanto à dominância, *Delonix regia* possui a maior dominância relativa (22,74%), seguida por *Ceiba speciosa* e *Tabebuia roseoalba* (12,70%). A dominância destas espécies se dá principalmente devido ao número de indivíduos presentes no fragmento, o que também explica a elevação do índice de valor de importância (IVI) e do índice de valor de cobertura (IVC) destas duas espécies em especial. Por ordem de Valor de Importância, tem-se *Delonix regia*, *Syagrus oleracea* e *Handroanthus avellanedae* com 35,39; 22,92% e 22,40 do IVI total. Entretanto, estas três espécies em conjunto representam 80,71 do IVI total do povoamento. A *Syagrus oleracea*, é a segunda mais abundante, no que se refere ao número de indivíduos, e apresentar a terceira maior densidade da área, se encontra também entre as de maior valor de importância. Isto se deve provavelmente por esta apresentar baixa dominância (1,20%) e frequência alta (100%).

Delonix regia apresenta-se a primária em espécie para o índice de valor de cobertura (VC) e índice de valor de importância (IVI), apresentando 28,55 e 35,39 respectivamente total da área. Estes valores comprovam a grande diversidade da espécie na área.

Tabela 1. Estimativas dos parâmetros fitossociológicos das espécies encontradas na Praça Universitária, em Goiânia-GO.

NOME CIENTÍFICO	N	DA	DR	FA	FR	DoA	DoR	IVC	IVI
<i>Anacardium occidentale</i>	1	1,07	0,58	11	0,97	1,7	3,5	4,08	5,05
<i>Araucaria angustifolia</i>	5	5,38	2,91	44	3,91	4,84	9,9	12,81	16,72
<i>Bastardiopsis densiflora</i>	1	1,07	0,58	11	0,97	1,28	2,7	3,28	4,25
<i>Bauhinia forficata</i>	1	1,07	0,58	11	0,97	1,29	2,7	3,28	4,25
<i>Cassia ferruginea</i>	1	1,07	0,58	11	0,97	1,02	2,1	2,68	3,65
<i>Cassia grandis</i>	6	6,45	3,5	55	4,84	1,08	2,2	5,7	10,54
<i>Ceiba speciosa</i>	4	4,3	2,32	22	1,95	6,23	12,7	15,02	16,97
<i>Cupressus sempervirens</i>	2	2,15	1,16	22	1,95	0,29	0,6	1,76	3,71
<i>Delonix regia</i>	10	10,75	5,81	77	6,84	11,2	22,74	28,55	35,39
<i>Dipteryx alata</i>	1	1,07	0,58	11	0,97	0,37	0,74	1,32	2,29
<i>Enterolobium contortisiliquum</i>	1	1,07	0,58	11	0,97	0,01	0,02	0,6	1,57
<i>Eugenia uniflora</i>	1	1,07	0,58	11	0,97	0,11	0,22	0,8	1,77
<i>Guazuma ulmifolia</i> Lam.	1	1,07	0,58	11	0,97	0,38	0,8	1,38	2,35
<i>Handroanthus avellanedae</i>	23	24,73	13,37	100	8,92	0,05	0,11	13,48	22,4

Handroanthus									
impetiginosus	6	6,45	3,5	44	3,91	0,06	0,13	3,63	7,54
Hymenaea courbaril	4	4,3	2,32	33	2,93	0,16	0,33	2,65	5,58
Libidibia ferrea	1	1,07	0,58	11	0,97	0,02	0,04	0,62	1,59
Mangifera indica	8	9,68	4,65	55	4,88	0,19	2,84	7,49	12,37
Pachira aquatica	20	21,5	11,63	100	8,92	0,6	1,22	12,85	21,77
Poecilanthe parviflora	5	5,38	2,91	33	2,93	0,04	0,31	3,22	6,15
Poincianella pluviosa	16	17,2	9,3	100	8,92	0,05	0,12	9,42	18,34
Pseudobombax									
grandiflorum	1	1,07	0,58	11	0,97	0,33	0,7	1,28	2,25
Psidium guajava	1	1,07	0,58	11	0,97	0,02	0,44	1,02	1,99
Sapindus saponaria	5	5,38	2,91	33	2,93	0,05	0,12	3,03	5,96
Sterculia striata	3	3,22	1,74	22	1,95	0,33	0,7	2,44	4,39
Swietenia macrophylla	1	1,07	0,58	11	0,97	4,68	9,51	10,09	11,06
Syagrus oleracea	22	23,65	12,8	100	8,92	0,58	1,2	14	22,92
Syzygium cumini	1	1,07	0,58	11	0,97	0,2	2,6	3,18	4,15
Tabebuia roseoalba	1	1,07	0,58	11	0,97	6,23	12,7	13,28	14,25
Terminalia catappa	8	8,6	4,65	55	4,88	2,26	4,6	9,25	14,13
Tibouchina granulosa	11	11,83	6,4	77	6,84	0,09	1,41	7,81	14,65
Total	172	185,93	100	1126	100	45,74	100	200	300

N = número de indivíduos; DA = densidade absoluta; DR =densidade relativa (%); DoA= dominância absoluta; DoR = dominância relativa (%); FA = frequência absoluta; FR = frequência relativa (%); IVI = índice de valor de importância; IVC = índice de valor de cobertura.

CONCLUSÕES

A área apresenta elevada diversidade florística, com distribuição relativamente uniforme de indivíduos em relação ao número de espécies, de forma que não há espécies com um domínio expressivo, capaz de caracterizar o fragmento. As famílias Fabaceae, Malvaceae, Bignoniaceae e Myrtaceae são as mais representativas da área estudada.

As espécies com maior valor de importância do fragmento estudado *Delonix regia*, *Syagrus oleracea* e *Handroanthus avellanadae*, estas três juntas representam apenas 80,71 do Índice de Valor de Importância (IVI) total do fragmento, comprovando a homogeneidade da praça.

A alta dominância relativa de *Delonix regia* e a alta densidade relativa de *Handroanthus avellanadae* foram os fatores determinantes para que ambas as espécies obtivessem os dois mais altos valores de importância, permitindo dessa maneira que fossem classificadas como as duas principais espécies.

REFERÊNCIAS

- AUSTIN, M. P.; GREIG-SMITH, P. The application of quantitative methods to vegetation survey: II. Some methodological problems of data from rain forest. *The Journal of Ecology*, p. 827-844, 1968.
- BRAUN-BLANQUET, Josias; LALUCAT JO, Jorge. *Fitosociología: bases para el estudio de las comunidades vegetales/Pflanzensoziologie*. 1979.
- CHAVES, Alan Del Carlos Gomes, et al. A importância dos levantamentos florístico e fitossociológico para a conservação e preservação das florestas. *Agropecuária Científica no Semiárido*, v. 9, n. 2, p. 43-48, 2013.
- DOSSA, Nayara Letícia B. et al. Levantamento e identificação das espécies vegetais na praça universitária, Goiânia–GO. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO AMBIENTAL. 2015.
- FELFILI, Jeanine Maria; DA SILVA, Manoel Claudio. A comparative study of cerrado (sensu stricto) vegetation in Central Brazil. *Journal of tropical ecology*, v. 9, n. 3, p. 277-289, 1993.
- FINGER, Zenesio et al. *Fitossociologia de comunidades arbóreas em Savanas do Brasil Central*. 2008. Tese de Doutorado. Universidade Federal de Santa Maria.
- HACK, Cristiano et al. Análise fitossociológica de um fragmento de floresta estacional decidual no município de Jaguari, RS. *Ciência Rural*, v. 35, p. 1083-1091, 2005.
- JANKAUSKIS, Juris. Avaliação de técnicas de manejo florestal. *SUDAM*, 1990.
- KUPPER, A. Recuperação vegetal com espécies nativas. *Silvicultura*, São Paulo, v. 15, n. 58, p. 38-41, 1994.
- LONGHI, Solon Jonas. Agrupamento e análise fitossociológica de comunidades florestais na sub-bacia hidrográfica do rio Passo Fundo-RS. 2013. Tese de Doutorado. Universidade Federal do Paraná, Curitiba.
- MARTINS, F. R. Atributos de comunidades vegetais. *Quid Teresina*, v. 9, p. 12-17, 1990.
- MARTINS, F. R. *Fitossociologia de florestas do Brasil: um histórico bibliográfico*. Pesquisas, São Leopoldo, v. 40, p. 103-164, 1989.
- MATTEUCCI, Silvia D.; COLMA, Aida. *Metodologia para o estudo da vegetação*. Washington, DC: Secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos, 1982.
- MEIRA NETO, João Augusto Alves; SAPORETTI JÚNIOR, Amilcar Walter. Parâmetros fitossociológicos de um cerrado no Parque Nacional da Serra do Cipó, MG. *Revista Árvore*, v. 26, p. 645-648, 2002.
- SILVA, Lucivânio Oliveira et al. Levantamento florístico e fitossociológico em duas áreas de cerrado sensu stricto no Parque Estadual da Serra de Caldas Novas, Goiás. *Acta Botanica Brasilica*, v. 16, p. 43-53, 2002.
- FELFILI, J. M.; REZENDE, R. P. *Conceitos e métodos em fitossociologia*. Brasília: Universidade de Brasília, Departamento de Engenharia Florestal, 2003.

VALÉRIO, Álvaro Felipe et al. Análise da composição florística e da estrutura horizontal de uma Floresta Ombrófila Mista Montana, município de Irati, PR–Brasil. Revista Acadêmica Ciência Animal, v. 6, n. 2, p. 137-147, 2008.

Capítulo 5

10.37423/211004942

CARACTERIZAÇÃO DA COMUNIDADE FITOPLANCTÔNICA NO RESERVATÓRIO DE SOBRADINHO, SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO, DURANTE O PERÍODO DE VAZÃO REDUZIDA

Maristela Casé

Universidade do Estado da Bahia

Maria Eduarda Souza Gomes

Universidade do Estado da Bahia

INTRODUÇÃO

Os reservatórios são ecossistemas aquáticos são de extrema importância, utilizados para fins específicos, como geração de energia, contenção de enchentes, abastecimento público. Na região do semiárido Nordeste brasileiro, os reservatórios são caracterizados como os mais complexos do Brasil, apresentando características peculiares como elevadas temperaturas, balanço hídrico negativo, forte insolação, irregularidades pluviométricas, bem como reservas de águas insuficientes em seus mananciais e problemas na qualidade da água (MOURA et al., 2007). Composto de todas essas características a região semiárida vem enfrentando nos últimos anos, condições hidrológicas adversas, com chuvas abaixo da média, causando a redução dos níveis de armazenamento dos reservatórios instalados na bacia do rio São Francisco. Tal situação tem levado a ações de flexibilização das vazões mínimas defluentes dos reservatórios, especificamente o de Sobradinho, considerado o primeiro em cascada do Submédio São Francisco, com valor menor que os $1.300 \text{ m}^3/\text{s}$ (CHESF, 2018).

Segundo dados do Plano de Gerenciamento para Segurança Hídrica na Bacia do São Francisco (2015), elaborado pela Companhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF), desde 2013 a bacia do rio São Francisco e isso tem causado uma redução dos níveis de armazenamento dos reservatórios instalados na bacia. Tendo em vista essa redução da vazão o reservatório e as mudanças provocadas nas comunidades aquáticas, estudos nessa região tornam-se necessários, desempenhando um importante papel na minimização dos impactos que são provocados pela escassez de água que ocorrem na região, garantindo o abastecimento de água com boa qualidade, protegendo e gerenciando o ecossistema aquático (GUNKEL, 2003; ALMEIDA et al., 2009).

Movido pela grave situação do período de seca em que nos encontramos na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, a CHESF promoveu um teste visando à redução da vazão para $650 \text{ m}^3/\text{s}$, no trecho do rio entre os reservatórios de Sobradinho (BA) e Itaparica (PE).

Houve uma reavaliação da operação dos reservatórios da Bacia do Rio São Francisco, coordenada pela Agência Nacional de Águas (ANA), juntamente ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Ministério de Minas e Energia, Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS, Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF), Ministério da Integração Nacional (MI), entre outros órgãos, entidades civis e usuárias. Considerando isso, a CHESF foi autorizada pelo IBAMA e pela ANA para executar novo teste de redução da vazão das usinas de Sobradinho (BA) e de Xingó (SE), no Rio São Francisco, até o limite de $660 \text{ m}^3/\text{s}$. O objetivo de tal procedimento foi garantir

o uso múltiplo das águas do Rio São Francisco no Nordeste, priorizando o abastecimento humano e produção de alimentos, avaliando a seca no Reservatório de Sobradinho, o maior da Região, em decorrência das condições hídricas críticas que tem ocorrido nos últimos anos.

Dentre os reservatórios inseridos na bacia do rio São Francisco está o reservatório Sobradinho, ambiente do estudo, que está localizado, no estado da Bahia, a 748 km de sua foz, distando cerca de 40 km a montante das cidades de Juazeiro (BA) e Petrolina (PE). Com capacidade de armazenamento de 34,1 milhões de m³ e área de drenagem de 498.968 km².

Abrange 13 municípios em seu curso, que vai de Barra até Xique-Xique, onde juntamente com o reservatório de Três Marias/CEMIG, perfaz uma vazão regularizada de 2.060 m³/s nos períodos de estiagem, permite a operação de todas as usinas da CHESF situadas ao longo do rio São Francisco.

Diante disto, estudos com comunidades biológicas, em especial, o fitoplâncton no reservatório de Sobradinho se faz necessário, pois refletem no conhecimento da diversidade, estrutura e dinâmica do corpo d'água, tendo em vista que a ausência e a presença de comunidades aquáticas servem como bioindicadoras da qualidade da água, funcionando como sensor das propriedades ambientais (LIRA, 2009; ALMEIDA et al., 2012). O fitoplâncton compreende organismos fotossintetizantes, que vivem flutuantes na coluna d'água sendo adaptados a viver em parte ou continuamente em águas abertas e são um dos principais produtores primários nos ecossistemas aquáticos. Dessa forma, torna-se importante o estudo da comunidade fitoplanctônica e o impacto da vazão defluente nessa comunidade, no reservatório de Sobradinho. O objetivo do trabalho é avaliar as consequências das alterações das condições hidrológicas do reservatório na estrutura da comunidade fitoplanctônica no reservatório de Sobradinho.

MATERIAIS E MÉTODOS

ÁREA DE ESTUDO

O estudo foi realizado no reservatório Sobradinho, localizado, no estado da Bahia, a 748 km de sua foz, distando cerca de 40 km a montante das cidades de Juazeiro (BA) e Petrolina (PE). Com capacidade de armazenamento de 34,1 milhões de m³ e área de drenagem de 498.968 km². Abrange 13 municípios em seu curso, que vai de Barra até Xique-Xique, onde juntamente com o reservatório de Três Marias/CEMIG, perfaz uma vazão regularizada de 2.060 m³/s nos períodos de estiagem, permite a operação de todas as usinas da CHESF situadas ao longo do rio São Francisco.

COLETA E ANÁLISE DOS DADOS

As coletas foram realizadas entre os anos de 2014 a 2017, em períodos quadrimestrais, totalizando 12 campanhas. Foram realizadas em 28 estações, com coletadas, utilizando a rede de fitoplâncton com malha de $20\ \mu\text{m}$, com fluxômetro acoplado, por meio de arrastos verticais e horizontais, e acondicionadas em recipiente de polietileno 250 mL, ocorrendo preservação com lugol acético a 1%. As análises foram realizadas no Laboratório de Biologia Vegetal, localizado no Campus VIII da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Paulo Afonso (BA).

As análises quantitativas, seguiram o de acordo com os métodos de concentração e de contagem do fitoplâncton seguiram as recomendações descritas nos itens 10200 C e F do APHA (2005) - Standard Methods for the Analysis of Water and Wastewater, por meio da câmara Palamer Malony, por meio de transectos ou campos aleatórios até a obtenção de no mínimo 100 células/mL (LUND et al., 1958). Utilizando Literaturas especializadas, com o Sistema de Classificação de Medlin e Kaczmarek (2004) para enquadramento taxonômico das Bacillariophyta; Komárek et al. (2014) para Cyanophyta; o de Buchheim et al. (2001) para Chlorophyta; e o de Van den Hoek et al. (1995) para os demais grupos taxonômicos. Como riqueza de espécies foi considerada o número de táxons infragenéricos presentes em cada amostra. Foram estimadas a riqueza taxonômica (número de táxons infragenéricos), densidade (célula.mL⁻¹), frequência de ocorrência dos táxons, determinada segundo (MATEUCCI e COLMA, 1982), considerando o número de amostras em que cada táxon ocorreu em relação ao número total de amostras coletadas. O seguinte critério foi estabelecido: muito frequente ($\geq 70\%$), frequente ($\geq 40\% < 70\%$), pouco frequente ($\geq 10\% < 40\%$) e raro ($< 10\%$).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A comunidade fitoplanctônica durante a vazão reduzida, esteve constituída de 152 táxons infragenéricos distribuídos em sete divisões: Chlorophyta (66), Bacillariophyta (37), Cyanophyta (32), Euglenophyta (07), Dinophyta (06), Cryptophyta (3), e Xantophyta (01). As Clorofíceas foi a classe se destacou entre as demais, apresentando maior riqueza, com 16 gêneros e 50 espécies, totalizando (43%) dos táxons, sendo predominante durante todo o período estudado. A classe Bacillariophyceae, foi a segunda em termos de riqueza, com 16 gêneros e 21 espécies, com (25%) dos táxons, seguida da classe Cyanophyceae que registrou 11 gêneros e 19 espécies com (21%) dos táxons. A classe Xantophyceae apresentou a menor riqueza entre as classes, registrando apenas 01 gêneros durante o estudo, com presença em duas campanhas do estudo, abril/15 e março/16. As Clorofíceas é um grupo

de algas verdes, consideradas uma das mais abundantes e diversificados em número de espécies planctônicas em águas continentais brasileiras, sendo comumente encontradas em diversos reservatórios do Nordeste, estão aptas a colonizar todos os meios aquáticos. (TUCCI et al., 2006; RODRIGUES et al., 2010).

Temporalmente, a comunidade fitoplanctônica apresentou maior riqueza no mês de abril/15 e março/16 com 57 e 61 táxons respectivamente, com menor riqueza no mês de jan/2016, apresentando apenas 30 táxons. A maior riqueza de espécies foi registrada nos pontos SOB14, SOB18, SOB20 (7 espécies) e a menor no ponto SOB25 (2 espécies). De uma forma geral a contribuição na riqueza de espécies entre as classes variou o seu padrão, com maior diversidade de Bacillariophyceae, seguida por Chlorophyceae.

Assim como na riqueza, a densidade fitoplanctônica foi um parâmetro que variou ao longo do tempo, oscilando entre a menor densidade no mês de janeiro/16 composta por 8 células/mL a valores mais elevados no mês de março/2019 com 595.386 células/mL. Em termos de densidade por divisão, as Cianobactéria apresentaram valores mais elevados com 1.303.140 células/mL, seguida de Bacillariophyta com 145.063 células/mL e Chlorophyta com 91.188 células/mL. As espécies responsáveis por essa elevada densidade das Cianobactérias foi *Cylindrospermopsis raciborskii* (295.249 células/mL), *Aphanocapsa delicatissima* (16.664 células/mL), *Choococcus minutus* (12.451 células/mL) no mês de dez/14; *Microcystis weserbergii* (290.104 células/mL), *Microcystis protocystis* (93.381 células/mL) no mês de abri/215 e *Microcystis aeruginosa* (236.026 células/mL), *Oscillatoria princeps* (120.813 células/mL), *Microcystis wesenbergii* (83.484 células/mL), no mês de mar/2017.

A elevada densidade por meio da *Cylindrospermopsis raciborskii*é dividido a espécies ser fixadora de nitrogênio é associada a uma diversificada adaptação às variáveis ambientais (BONILLA et al., 2012; BITTENCOURT-OLIVEIRA et al., 2010). Além disso, a espécie possui uma capacidade de tolerar elevadas temperaturas da água, baixas concentrações de nutrientes, baixa transparência da água (BONILLA ET AL.; 2012)

Diferente da riqueza espécies, as estações com maior densidade foram SOB 14, SOB 16, e SOB 18, com valores de (38.665 células/mL), (45.143 células/mL) e (29.748 células/mL).

Apresentando menores densidades nas estações SOB 03(302 células/mL), SOB 09 (156 células/mL), SOB 24 (308 células/mL) e SOB 25 (165 células/mL), respectivamente. Mais uma vez, a classe Cyanophyceae foi a maior contribuinte para a densidade durante o período estudado, com 130.314 células/mL, seguida de Bacillariophyta com 13.188 células/mL e Chlorophyta com 9.095 células/mL.

Em termos de densidade por divisão, as Cianobactéria apresentaram valores mais elevados com 1.303.140 células/mL, seguida de Bacillariophyta com 145.063 células/mL e Chlorophyta com 91.188 células/mL. As espécies responsáveis por essa elevada densidade das Cianobactérias foi *Cylindrospermopsis raciborskii* (295.249 células/mL), *Aphanocapsa delicatissima* (16.664 células/mL), *Choococcus minutus* (12.451 células/mL) no mês de dez/14; *Microcystis weserbergii* (290.104 células/mL), *Microcystis protocystis* (93.381 células/mL) no mês de abri/215 e *Microcystis aeruginosa* (236.026 células/mL), *Oscillatoria princeps* (120.813 células/mL), *Microcystis wesenbergii* (83.484 células/mL), no mês de mar/2017.

As cianobactérias constituem um grupo de algas extremamente oportunistas. A presença destas ocorre largamente em diversos ecossistemas, especialmente em ambientes lênticos, se desenvolvendo em variados habitats, além das espécies serem produtoras de toxinas, podendo causar danos a saúde pública (FERNANDES et al., 2009).

Entretanto, a avaliação da frequência de ocorrência, demonstrou que 94% dos táxons foram enquadrados na categoria Esporádica, com apenas 6% dos táxons, considerado como Pouco Frequente, sendo eles: *Cylindrospermopsis raciborskii*, *Microcystis aeruginosa*, *Oscillatoria princeps*, *Pseudanabaena* sp. (cianofíceas); *Aulacoseira granulata*, *Nitzschia* sp., *Ulnaria ulna*, (diatomáceas) e *Gonatozygon aculeatum*, *Monactinus simplex* (Clorofíceas).

Ausência de táxons considerado Frequente ou Muito Frequente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A comunidades fitoplanctônica no reservatório de Sobradinho, sofreu alterações temporais e espaciais durante o estudo, possivelmente devido às condições climáticas, e o período de seca prologada na região, podendo assim, ter influenciado na estrutura e dinâmica do fitoplâncton.

A importância de estudos dessa comunidade consiste em importante estratégia de gerenciamento de ecossistemas aquáticos, pois espécies potencialmente tóxicas foram observadas nesse estudo, que podem oferecer riscos à saúde da população que utiliza essa água para consumo, principalmente, sem tratamento prévio.

Palavras-chave: Monitoramento ambiental; Semiárido; Chlorophyta.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, L. R.; COSTA, I. S.; ESKINAZI-SANT'ANNA, E. M. Composition and abundance of zooplankton community of an impacted estuarine lagoon in Northeast Brazil. *Braz. J. Biol.* vol. 72, no. 1, p. 13-24, 2012.
- GUNKEL, G.; RUETER, K.; CASALLAS, J.; SOBRAL, M. C. Estudos da limnologia do reservatório de Tapacurá em Pernambuco: problemas da gestão de reservatórios no Semi-árido brasileiro. *Anais...XV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos*, Curitiba, Brazil, 2003.
- KOMÁREK, J. & FOOT, B. Chlorophyceae (Grünalgen). Ordnung: Chlorococcales. In *Das Phytoplankton des Süßwassers*, ed. G. Huber-Pestalozzi, Part. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, v. 7, n. 1, p. 1-1044. E. 1983.
- MOURA, A. N.; BITTENCOURT-OLIVEIRA, M. C.; DANTAS, E. W.; ARRUDA-NETO, J. D. T. Phytoplanktonic association: a tool to understanding dominance events in a tropical Brazilian reservoir. *Acta Botanica Brasílica*, v. 21, p. 641-654. 2007.
- LIRA, G.A. S.T.; BITTENCOURT-OLIVEIRA, M.C.; MOURA, A.C. Structure and Dynamics of Phytoplankton Community in the Botafogo Reservoir Pernambuco – J. Brazil. v. 52, n. 2, p. 493-501, 2009.
- APHA. Standard Methods for the Examination of water & Wastewater. 21 ed. 2005.
- CHESF – Companhia Hidroelétrica do São Francisco. Descrição do aproveitamento de Luíz Gonzaga. RECIFE – PE. Disponível em: < <http://www.chesf.gov.br/portal/page/portal> > Acesso em: 12 fev. 2017.
- ESTEVES F.A. Fundamentos de Limnologia. 2ª ed. Rio de Janeiro: Interciência, 1998.
- MATSUMURA-TUNDISI T. Diversidade de zooplâncton em represas do Brasil. In: HENRY R. eds. *Ecologia de reservatórios: estrutura, função e aspectos sociais*. Botucatu, FUNDBIO/FAPESP. p.39-54, 1999.
- LOBO, E. A.; LEIGHTON, G. Estrutura de las fitocenoses planctónicas de los sistemas de desembocaduras de ríos y esteros de la zona central de Chile. *Revista de Biología Marina*, v. 22, n. 1, p. 143-170, 1986.
- MATEUCCI, S.D.; COLMA, A. La metodología para el estudio de la vegetación. *Colectión de Monografías Científicas, Serie Biología*, v. 22, n.1, p. 1-168, 1982.
- FERNANDES, V.O.; CAVATI, B.; SOUZA, B.D.; MACHADO, R.G.; COSTA, A.G. Lagoa Mãe-Bá (Guarapari – Anchieta, ES): Um ecossistema com Potencial de Florações de Cianobactérias?. *Oecologia Brasiliensis* 13:366-381. 2009.
- BITTENCOURT-OLIVEIRA, M. C.; SANTOS, D. M. S.; MOURA, N. A. Toxic cyanobacteria in reservoirs in northeastern Brazil: detection using a molecular method. *Brazilian Journal of Biology*, v.70, n.4, p.1005-1010, 2010.
- BONILLA, S.; AUBRIOT, L.; SOARES, M. C. S.; GONZÁLEZ-PIANA, M.; FABRE, A.;
- HUSZAR, V. L. M.; LÜRLING, M.; ANTONIADES, D.; PADISÁK, J.; KRUK,
- C. What drives the distribution of the bloom-forming cyanobacteria *Planktothrix agardhii* and *Cylindrospermopsis raciborskii*? *FEMS Microbiology Ecology*, v.79, n.3, p.594- 607, 2012.

Capítulo 6

10.37423/211004951

MICROALGAS PLANCTÔNICAS EM EVENTO DE FLORAÇÃO DE ESPÉCIE INVASORA EM RESERVATÓRIO HIDROELÉTRICO NO SEMIÁRIDO NORDESTINO

Maria Eduarda Souza Gomes

Universidade do Estado da Bahia

Luane dos Santos Simplício

Universidade do Estado da Bahia

Thaís Silva Lima

Universidade Federal de Pernambuco

Aline Teixeira de Andrade

Universidade do Estado da Bahia

Maristela Casé

Universidade do Estado da Bahia

Resumo: O consumo sem preocupação sustentável tem levado nos últimos anos a severos desequilíbrios ambientais que prejudicam os diversos ecossistemas. Em locais de escassez de água, como no semiárido nordestino, a água apresenta um valor superestimado, sendo os reservatórios utilizados para múltiplos usos. Por isso, a garantia da qualidade da água é primordial para a sobrevivência dos organismos que dependem direta e indiretamente desse recurso. Uma das consequências do gerenciamento inadequados dos recursos naturais é o aparecimento de espécies invasoras. Esses organismos competem com as espécies nativas, e no caso dos ambientes aquáticos, podem levar a prejuízos para os usos da água. Em abril de 2015 uma “mancha negra” foi detectada no reservatório Xingó, devido a presença da microalga planctônica invasora *Ceratium furcoides*. Um monitoramento intensivo foi realizado objetivando compreender as causas que favoreceram o evento. Um total de 50 amostras de fitoplâncton foram coletadas entre 15 de abril e 07 de setembro de 2015. As coletas foram realizadas em superfície e em profundidade, com rede de plâncton com fluxômetro acoplado. As análises seguiram as recomendações de APHA (2005). A comunidade fitoplanctônica esteve composta por 70 táxons infragenéricos, distribuídos nas divisões Chlorophyta (30 táxons), Cyanophyta (19 táxons), Bacillariophyta (13 táxons), Dinophyta (5 táxons), Cryptophyta (2 táxons) e Chrysophyta (1 táxon). Apesar da maior riqueza de clorofíceas e visível ocorrência do dinoflagelado *C. furcoides*, a cianobactéria potencialmente produtora de toxina *Cylindrospermopsis raciborskii* e a diatomácea *Fragilaria crotonensis* foram as espécies classificadas como muito frequentes, presentes em quase a totalidade das amostras.

Palavras-chave: *Ceratium furcoides*, Dinoflagelados, *Cylindrospermopsis raciborskii*, Cianobactérias, Reservatório Xingó.

INTRODUÇÃO

Os ecossistemas aquáticos têm sofrido forte pressão de atividades antrópicas (MORENO e CALLISTO, 2005). Alguns dos principais impactos decorrentes destas atividades, que alteram o funcionamento dos ecossistemas aquáticos de forma mais frequente, são as fontes de poluição industrial, urbana, agropecuária e de mineração; a regulação da vazão dos rios, através da construção dos barramentos (represas e reservatórios); a sedimentação, decorrente da supressão da vegetação e da ocorrência de processos erosivos, dentre outros (QUEIROZ et al., 2008).

Os efeitos combinados da urbanização e das demais atividades antrópicas, associados ao rápido crescimento populacional, são facilmente visualizados nos ecossistemas aquáticos (POMPEU et al., 2005; KÖNIG et al., 2008). Dessa forma, o planejamento e a gestão dos recursos hídricos dependem de informações confiáveis, relacionadas à qualidade e à quantidade de água (BRAGA et al., 1999).

Um dos problemas relacionados às alterações na qualidade da água é a ocorrência de florações de algas. De acordo com Torgan (1989), as florações de algas são fenômenos passíveis de ocorrer em sistemas aquáticos naturais, relacionados, ou não, a atividades humanas. Outros autores definem as florações de algas, como o crescimento explosivo, auto limitante e de curta duração, de microrganismos de uma ou de poucas espécies, frequentemente produzindo coloração visível nos corpos d'água naturais.

A ocorrência de florações pode estar relacionada a diversos fatores, tais como: aumento da temperatura da água; variações nas concentrações de nutrientes (notadamente fósforo e nitrogênio); circulação da água, que podem trazer nutrientes às camadas superiores; variação na salinidade, entre outros (TEIXEIRA e TUNDISI, 1981; SCHWARZBOLD et al, 1986; ESTEVES, 1988).

Dentre as consequências mais comuns das florações, destacam-se a modificação da cor, transparência e turbidez da água, com alteração simultânea de seu gosto e odor. A saturação ou depleção de oxigênio, também são outras possíveis consequências (TORGAN, 1981), bem como a possibilidade de mortandade de organismos no meio aquático, em função das alterações nas concentrações de oxigênio e, também, pela ação de toxinas liberadas por algumas espécies fitoplanctônicas, em floração.

Existem diversos relatos de ocorrência de florações de cianobactérias e microalgas, em diversos corpos d'água do Brasil e do mundo. O relato mais recente ocorreu em abril/2015, no rio São Francisco, na área de influência do reservatório da Usina Hidro Elétrica (UHE) de Xingó. De acordo com as

informações divulgadas, foi registrada em 10/04/2015 a ocorrência de uma “mancha negra” no rio São Francisco, decorrente da superpopulação do dinoflagelado invasor *Ceratium furcoides*.

Dinoflagelados do gênero *Ceratium* são predominantemente encontrados em ambientes marinhos, com poucas espécies consideradas invasivas em águas interiores. Nas últimas décadas, as espécies de água doce *Ceratium hirundinella* e *Ceratium furcoides* colonizaram e invadiram diversas bacias da América do Sul. *Ceratium furcoides* é conhecida por desenvolver florações devido à sua mobilidade, resistência à sedimentação e uso otimizado dos recursos. Embora não tóxico, as florações da espécie causam muitos problemas tanto para os ecossistemas naturais quanto para os usuários de água, promovendo condições anóxicas e causando a morte de populações de animais locais (PITCHER e PROBYN, 2011; MEICHTRY et al., 2016).

Em função desse fato, a Companhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF) realizou um monitoramento para entender os motivos que levaram a essa superpopulação, bem como encontrar alternativas que minimizem os impactos ambientais decorrentes dessa floração.

O presente estudo tem como objetivo apresentar a composição fitoplanctônica durante uma floração de *Ceratium furcoides* no reservatório Xingó.

METODOLOGIA

O rio São Francisco possui 2.700 km de extensão, abrangendo 521 municípios, em seis estados brasileiros e o Distrito Federal. Entre as cabeceiras, na Serra da Canastra, em Minas Gerais e a foz, no Oceano Atlântico, localizada entre os estados de Sergipe e Alagoas, o rio São Francisco percorre drenam em sua bacia, uma área de 638.576 km², o que equivale a 8,0% do território nacional. Está dividida em quatro unidades hidrográficas: Alto São Francisco, Médio São Francisco, Submédio São Francisco e Baixo São Francisco (ANA, 2015).

O reservatório Xingó (9°37' S e 37°47'W) está localizado entre os estados de Alagoas e Sergipe, a 179 km da foz do São Francisco, no trecho final do cânion que se inicia em Paulo Afonso. Apresenta uma superfície aproximada de 60 km², com capacidade de armazenamento de 3,8 bilhões m³ (BRASIL, 2016).

O monitoramento foi realizado entre 15 de abril e 07 de setembro de 2015, em seis estações de amostragens no reservatório Xingó e uma após o barramento (Figura 1 e Tabela 1). Um total de 50 amostras foram coletadas, em 3 períodos: 1 – 30 amostras em dias consecutivos; 2 – 9 amostras a cada 3 dias; e 3 – 11 amostras a cada 7 dias.

Figura 1. Localização do reservatório Xingó, rio São Francisco, Brasil.

Tabela 1. Localização geográfica das estações de amostragem no reservatório Xingó, rio São Francisco, Brasil.

Estação	Latitude (Sul)	Longitude (Oeste)
01	09°26'26"	38°09'18"
02	09°26'13"	38°05'51"
03	09°31'33"	37°59'22"
04	09°27'29"	38°01'59"
05	09°30'31"	37°51'24"
06	09°38'45"	37°47'23"

As amostras foram obtidas por arrasto horizontal e vertical (10 metros de profundidade ou 1 metro acima da profundidade total quando menor que 10 metros) de rede de plâncton com abertura de malha de 20µm, com fluxômetro acoplado. As amostras foram preservadas com lugol e examinada em microscópio ótico (Zeiss/Axioskop).

Os métodos de concentração e de contagem das amostras do fitoplâncton seguiram as recomendações descritas nos itens 10200 C e F da segunda edição do Standard Methods for the Analysis of Water and Wastewater (APHA, 2005). A contagem e a identificação dos organismos foram

realizadas em câmaras de sedimentação sob microscopia. O sistema de classificação adotado seguiu Van den Hoek et al. (1995) para as classes Cryptophyceae, Dinophyceae, Chrysophyceae, Euglenophyceae, Chlorophyceae and Zygnematophyceae. Round et al. (1990) foi usado para Coscinodiscophyceae, Fragilariophyceae and Bacillariophyceae, e para Cyanobacteria, Komárek and Anagnostidis (2000, 2005).

A frequência de ocorrência (F.O.) de cada táxon foi calculada de acordo com Matteucci e Colma (1982), considerando o número de amostras em que cada táxon ocorreu em relação ao número total de amostras coletadas. O seguinte critério foi estabelecido: muito frequente ($\geq 70\%$), frequente ($\geq 40\%$ <70%), pouco frequente ($\geq 10\%$ <40%) e raro (<10%).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise da composição fitoplanctônica para seis estações de amostragem no reservatório de Xingó e Baixo São Francisco mostrou que o fitoplâncton esteve representado por 70 táxons. O monitoramento realizado com frequência diária apresentou maior composição específica, totalizando 57 táxons, ocorrendo uma redução para 20 táxons, nas amostragens de três em três dias, e elevando-se para 35, ao longo do monitoramento semanal.

De forma geral, as clorófitas ocorreram com riqueza mais elevada. Na amostragem diária elas prevaleceram com maior número de táxons (Período 1), sendo seguidas pelas cianobactérias, que se igualaram na amostragem de três em três dias (Período 2), e apresentaram aumento no monitoramento semanal (Período 3).

Em relação a frequência de ocorrência, duas espécies ocorreram nas seis estações de amostragem, ao longo de todo período de monitoramento (*Cylindrospermopsis raciborskii* e *Fragilaria crotonensis*).

Dinoflagelados são descritos como organismos unicelulares, assimétricos, tecados ou não, com dois flagelos diferentes na forma e função (ESTEVES, 2011). Seu crescimento é controlado por variáveis como pH, temperatura, concentração de matéria orgânica, íons e formas de nitrogênio e fósforo (GIL et al., 2012). Registros de presença atual de *C. furcoides* na América do Sul abrangem uma ampla diversidade de ambientes em termos de geomorfologia, hidrologia, sedimento transporte e química da água, sugerindo uma alta grau de adaptabilidade ecofisiológica deste dinoflagelados (ZABULÍN et al., 2016).

Figura 2. Distribuição da riqueza fitoplanctônica por divisão no reservatório Xingó durante a floração de *Certaium furcoides*.

Tabela 2. Composição fitoplanctônica frequência de ocorrência (F.O.) no reservatório Xingó durante a floração de *Certaium furcoides*.

Táxons	Período 1	Período 2	Período 3
Cyanophyta			
<i>Anabaena planctonica</i>	-	16,7	16,7
<i>Anabaena</i> sp.	66,7	-	16,7
<i>Aphanocapsa delicatissima</i>	66,7	-	50,0
<i>Chroococcus dispersus</i>	-	50,0	50,0
<i>Chroococcus limneticus</i>	-	16,7	33,3
<i>Chroococcus</i> sp.	50,0	33,3	16,7
<i>Cylindrospermopsis raciborskii</i>	100,0	100,0	100,0
<i>Geitlerinema</i> sp.	66,7	-	-
<i>Lyngbya limnetica</i>	16,7	-	-
<i>Microcystis aeruginosa</i>	-	-	16,7
<i>Microcystis wesenbergii</i>	50,0	16,7	50,0
<i>Microcystis</i> sp.	-	-	50,0
<i>Oscillatoria</i> sp.	33,3	-	-
<i>Phormidium</i> sp.	16,7	-	16,7
<i>Pseudanabaena catenata</i>	-	-	33,3
<i>Pseudanabaena mucicola</i>	16,7	-	-
<i>Pseudanabaena</i> sp.	16,7	-	66,7
<i>Sphaerospermopsis torques-reginae</i>	100,0	100,0	66,7
<i>Radiocystis</i> sp.	16,7	-	-
Cryptophyta			
<i>Cryptomonas</i> sp.	16,7	-	16,7

Táxons	Período 1	Período 2	Período 3
<i>Rhodomonas lacustris</i>	16,7	-	-
Crysophyta			
<i>Dinobryon cylindricum</i>	16,7	-	-
Bacillariophyta			
<i>Aulacoseira distans</i>	16,7	-	-
<i>Aulacoseira granulata</i>	100,0	100,0	66,7
<i>Aulacoseira granulata</i> var. <i>angustissima</i>	16,7	-	16,7
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	-	-	33,3
<i>Cyclotella</i> sp.	16,7	-	-
<i>Eunotia camelus</i>	16,7	-	-
<i>Fragilaria crotonensis</i>	100,0	100,0	100,0
<i>Navicula</i> sp.	33,3	-	-
<i>Nitzschia</i> sp.	33,3	-	-
<i>Pinnularia</i> sp.	66,7	50,0	66,7
<i>Pleurosira laevis</i>	16,7	-	-
<i>Surirella</i> sp.	16,7	-	-
<i>Ulnaria ulna</i>	100,0	100,0	33,3
Dinophyta			
<i>Ceratium furcoides</i>	100,0	83,3	100,0
<i>Ceratium hirundinella</i>	16,7	-	-
<i>Gymnodinium</i> sp.	-	-	16,7
<i>Peridinium inconspicuum</i>	16,7	-	33,3
<i>Peridinium</i> sp.	50,0	50,0	83,3
Chlorophyta			
<i>Acanthosphaera</i> sp.	16,7	-	-
<i>Actinastrum aciculare</i>	33,3	-	-
<i>Botryococcus braunii</i>	-	16,7	16,7
<i>Botryococcus</i> sp.	16,7	-	-
<i>Closterium</i> sp.	33,3	-	-
<i>Coelastrum</i> sp.	33,3	-	-
<i>Desmidium</i> sp.	-	-	16,7
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	16,7	-	-
<i>Eurastrum</i> sp.	16,7	-	-
<i>Eutetramorum planctonicus</i>	83,3	-	-
<i>Gloeocystis</i> sp.	66,7	-	-
<i>Monactinus simplex</i>	100,0	16,7	-
<i>Monoraphidium arcuatum</i>	16,7	-	-
<i>Monoaphidium contortum</i>	100,0	83,3	83,3
<i>Monoaphidium convolutum</i>	50,0	-	50,0
<i>Monoaphidium tortile</i>	-	-	16,7
<i>Oocystis</i> sp.	50,0	-	-
<i>Planktosphaeria gelatinosa</i>	16,7	-	-
<i>Radiococcus</i> sp.	-	33,3	-
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	50,0	-	-
<i>Scenedesmus</i> sp.	50,0	16,7	16,7
<i>Sphaerocystis schroeteri</i>	16,7	-	16,7
<i>Staurostrum biwaensis</i>	16,7	-	-
<i>Staurostrum leptachantum</i>	16,7	-	100,0

Táxons	Período 1	Período 2	Período 3
<i>Staurastrum leptocladum</i>	100,0	50,0	100,0
<i>Staurastrum nudibrachiatum</i>	16,7	-	100,0
<i>Staurastrum sebaldi</i>	16,7	-	-
<i>Staurastrum tetracerum</i>	100,0	-	-
<i>Staurastrum</i> sp.	33,3	-	-
<i>Stauridium tetras</i>	100,0	100,0	-

Ceratium tem sido considerado invasor em vários países, sendo registrado em regiões temperadas e subtropicais, em ambientes especializados ricos em espécies cosmopolitas e pantropicais (GIL et al., 2012; SILVA et al., 2012). Para o Brasil, Branco e colaboradores (1963) relatam o gênero como importante para o tratamento de água e esgoto. Ferrareze e Nogueira (2006) registraram *C. hirundinella* na bacia do rio Paranapanema. No ano seguinte a presença desse gênero, predominantemente marinho, ocorreu no reservatório Furnas - MG (SANTOS-WISNIEWSKI et al., 2007). Sua presença foi registrada também na represa Billings – SP (MATSUMURA-TUNDISI et al., 2010).

No Nordeste, *Ceratium* (*Ceratium furcoides* e *Ceratium hirundinella*) foi observado nos reservatórios Sobradinho, Itaparica, Complexo Paulo Afonso e Xingó, e nos rios Moxotó e Contas (OLIVEIRA et al., 2011), decorrente de Programa de Monitoramento da Chesf.

O crescimento dos dinoflagelados é controlado por variáveis físicas e químicas, tais como pH, temperatura e concentração de matéria orgânica, cálcio, cloreto, e formas de nitrogênio e fósforo (GIL et al., 2012). Além desse, a intensidade da luz, mudança de espectro de luz na coluna de água e concentração de oxigênio dissolvido podem afetar a presença de dinoflagelados (POPOVSKY, 1990).

Silva e colaboradores (2012) associaram a ocorrência de *Ceratium furcoides* no reservatório Furnas a locais próximos da descarga constante de esgoto doméstico sem tratamento. Da mesma forma, na represa Billings, as densidades mais elevadas de *C. furcoides* ocorreram no braço Taquacetuba, local onde ocorreram as concentrações mais elevadas de fósforo (MATSUMURA-TUNDISI et al., 2010). Este reservatório urbano, especialmente construído para a geração de energia e abastecimento de água, recebe quantidades substanciais de empregados domésticos e de esgoto industrial. Nos dois reservatórios citados os autores indicam a presença de atividade humana, sobretudo a descarga de esgoto sem tratamento, como uma das causas principais para a proliferação dos organismos nos reservatórios.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Habitats de água doce são particularmente suscetíveis à invasão por microrganismos, uma vez que sua dispersão é geralmente despercebida e favorecida pelo fluxo de água (ZABURLÍN et al., 2016). A introdução de espécies exóticas pode ter impactos significativos nos ambientes naturais, podendo afetar irreversivelmente o funcionamento ecológico dos ecossistemas, levando a mudanças na diversidade, composição local de espécies, dominância e produtividade primária (MACK et al. 2000; GOZLAN et al. 2010; STRAYER, 2010; SILVA et al. 2012). Qualquer mudança qualitativa e ou quantitativa na comunidade fitoplanctônica podem ter importante significado para vários componentes do ecossistema e, até mesmo, inviabilizar o uso da água (TUCCI, 2002).

A dispersão de espécies do gênero *Ceratium* inclui atividades geralmente consideradas como vetores de espécies em ecossistemas de água doce, por exemplo, navegação, pesca comercial e esportiva, comércio ornamental, ecoturismo, atividades recreativas (INCAGNONE et al. 2015). A presença do gênero *Ceratium* tem sido associada também a ambientes oligo e mesotróficos (SILVA et al., 2012). No Brasil os registros de ocorrência de florações foram observados em compartimentos que recebiam despejo de efluentes domésticos sem tratamento (SANTOS-WISNIEVSKI et al., 2007; MATSUMURA-TUNDISI et al., 2010; SILVA et al., 2012).

A presença de *Ceratium furcoides* (espécie invasora) associada a *Cylindrospermopsis raciborskii* (espécie produtora de cianotoxina) no reservatório Xingó alerta para a importância da manutenção da qualidade da água em reservatórios de múltiplos usos, tendo como ponto principal a diminuição dos impactos das atividades antrópicas realizadas na área de influência desses ambientes.

As autoras agradecem a Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF) pela disponibilização dos dados.

REFERÊNCIAS

- Agência Nacional de Águas (Brasil). Conjuntura dos recursos hídricos no Brasil: regiões hidrográficas brasileiras – Edição Especial. -- Brasília: ANA, 2015.
- BRANCO, S.M.; BRANCO, W.C.; LIMA, H.A.S., MARTINS, M.T. Identificação e importância dos principais gêneros de águas de interesse para o tratamento de águas e esgoto. Revista Departamento de Águas e Esgotos. v. 48-50, p.1-59. 1963.
- BRESSANE, L. W.; SANTOS, R. M.; MENDES, R. B. Análise da comunidade fitoplanctônica na represa de Furnas em Barranco Alto – MG. IX Fórum Ambiental da Alta Paulista, v. 9, n. 2, 2013, p. 51-68. ISSN 1980-0827.
- CASSOL, A. P. V. Impacto da espécie invasora *Ceratium furcoides* (Levander) Langhans 1925 em duas represas do Alto Jacuí, RS. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Agrobiologia. Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria, 2014. 90p.
- CAVALCANTE, K. P. et al. First record of expansive *Ceratium* Schrank, 1793 species (Dinophyceae) in Southern Brazil, with notes on their dispersive patterns in Brazilian environments. Check List, v.9. n.4, p.862–866, 2013.et al., 2013.
- CHESF. Xingó. Net. 2016. Disponível em:
<https://www.chesf.gov.br/SistemaChesf/Pages/SistemaGeracao/Xingo.aspx> . Acesso em:02.04.2016.
- DE-CARLI, B. P. Heterogeneidade espacial e temporal da comunidade zooplanctônica do sistema Cantareira, São Paulo, Brasil. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais). Sorocaba: Campus Experimental de Sorocaba, UNESP - Universidade Estadual Paulista, 2016. 77p.
- ESTEVEZ, F. A. Fundamentos de Limnologia. 3ª ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2011.
- FERRAREZE, M.; NOGUEIRA, M.G. Phytoplankton assemblages and Limnological characteristics in lotic systems of the Paranapanema Basin (Southeast Brazil). Acta Limnologica Brasiliense, v.18, n.4, p.389-405, 2006.
- FERRAREZE, M.; NOGUEIRA, MG. Phytoplankton assemblages in lotic systems of the Paranapanema Basin (Southeast Brazil). Acta Limnologica Brasiliensia. v. 18, n. 4, p. 389-405. 2006.
- GIL, C. B.; RESTREPO, J. J. R.; BOLTOVSKOY, A.; VALLEJO, A. Spatial and temporal change characterization of *Ceratium furcoides* (Dinophyta) in the equatorial reservoir Riogrande II, Colombia. Acta Limnologica Brasiliensia. v. 24. n. 2. p.207-219. 2012
- GINKEL, C.E.; HOHLS, B.C.; VERMAAK, E. A. *Ceratium hirundinella* (O.F. Müller) bloom in Hartbeespoort Dam, South Africa. Water SA. v. 27, n. 2, p. 1-8, 2001.
- MATSUMURA-TUNDISI, T.; TUNDISI, J.G.; LUZIA, A.P., DEGANI, R.M. Occurrence of *Ceratium furcoides* (Levander) Langhans 1925 bloom at the Billings Reservoir. Brazilian Journal of Biology.v. 70, n. 3 (suppl.), p. 825-829. 2010.

MOSCHINI-CARLOS, V.; SANTOS, L.G.; POMPEO, M. 2015. Trophic Descriptors Of A Series Of Reservoirs In Cantareira System (São Paulo, SP, Brazil). In: SEFS 9 -Symposium for European Freshwater Sciences, Geneva, Switzerland, July 5-10, p.115.

OLIVEIRA, F. H. P. C.; MACÊDO, I. M. E.; MOREIRA, C. H. P.; SHINOHARA, N. K. S.; LIRA, O. O.; RAMALHO, W. P. Occurrence of *Ceratium furcoides* (Levander) Langhans 1925 (Dinophyceae: Ceratiaceae) in Two Reservoirs of the Capibaribe Watershed Located in Semiarid Region. *Revista Geama*, v.2, n.3, jul-set, 2016.

OLIVEIRA, H. S. B., MOURA, A. N.; CORDEIRO-ARAÚJO, M. K. First record of *Ceratium* Schrank, 1973 (Dinophyceae: Ceratiaceae) in freshwater ecosystems in the semiarid region of Brazil. *Check List*, v. 7. n. 5. p. 626-628. 2011.

POPOVSKÝ, J. 1990. Dinophyceae (Dinoflagellida). In PASCHER, A. Süßwasserflora von mitteleuropa. Jena: Ed. Gustav Fischer Verlag. p. 207-211.

SANTOS-WISNIEWSKI, M.J., SILVA, L.C., LEONE, I.C., LAUDARESSILVA, R.; ROCHA, O. First Record of the occurrence of *Ceratium furcoides* (Levander) Langhans 1925, an invasive species in the hydroelectricity power plant Furnas Reservoir, MG, Brazil. *Brazilian Journal of Biology*. v. 67, n. 4, p. 791-793. 2007.

SEVERIANO, J.S., MOURA, A.N., OLIVEIRA, H.S.B., CORDEIRO-ARAÚJO, M.K; DANTAS, E.W. Micro-phytoplankton richness in Contas River, state of Bahia, northeastern Brazil. *Check List*, 8,2: 218-223, 2012.

SILVA, L. C.; LEONE, I. C.; SANTOS-WISNIEWSKI, M. J. Invasion of the dinoflagellate *Ceratium furcoides* (Levander) Langhans 1925 at tropical reservoir and its relation to environmental variables. *Biota Neotropica*. v. 12, n. 2, p. 93-100. 2012.

TUCCI, A. Sucessão da Comunidade Fitoplanctônica de um Reservatório Urbano e Eutrófico, São Paulo, SP, Brasil. Tese de doutorado, Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho, Rio Claro, 2002. ZABURLÍN, N. M.; VOGLER, R. E.; MOLINA, M. J.; LLANO, V. M. Potential distribution of the invasive freshwater dinoflagellate *Ceratium furcoides* (Levander) Langhans (Dinophyta) in South America. *Journal of Phycology*. v. 52, p. 200–208. 2016.