TÓPICOS EM ENGENHARIA AGRÍCOLA E AGRONOMIA

Frederico Celestino Barbosa

Tópicos em engenharia agrícola e agronomia

1ª ed.

Piracanjuba-GO
Editora Conhecimento Livre
Piracanjuba-GO

1ª ed.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Barbosa, Frederico Celestino
B238T Tópicos em engenharia agrícola e agronomia

/ Frederico Celestino Barbosa. – Piracanjuba-GO

Editora Conhecimento Livre, 2021

109 f.: il

DOI: 10.37423/2021.edcl397

ISBN: 978-65-5367-040-2

Modo de acesso: World Wide Web

Incluir Bibliografia

1. cultivo 2. solo 3. safra 4. tecnologia 5. agroindústria I. Barbosa, Frederico Celestino II. Título

CDU: 630

<https://doi.org/10.37423/2021.edcl397>

O conteúdo dos artigos e sua correção ortográfica são de responsabilidade exclusiva dos seus respectivos autores.

EDITORA CONHECIMENTO LIVRE

Corpo Editorial

Dr. João Luís Ribeiro Ulhôa

Dra. Eyde Cristianne Saraiva-Bonatto

MSc. Frederico Celestino Barbosa

MSc. Carlos Eduardo de Oliveira Gontijo

MSc. Plínio Ferreira Pires

Editora Conhecimento Livre

Piracanjuba-GO

2022

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1	6
EFEITO DO MECANISMO REDUTOR DE VAZÃO NO DESEMPENHO DE UM SPRAYER SETORIAL DE IRRIGAÇÃO	
Marcelo Carazo Castro	
Maurílio de Faria Vieira Júnior	
Jean Santiago Sabença Esteves	
Larissa Nunes Pereira Leite	
DOI 10.37423/211205143	
CAPÍTULO 2	13
APLICAÇÃO DE MANIPUEIRA EM COLUNAS DE SOLO CULTIVADO COM CAPIM MOMBAÇA	
EDMILSON CESAR BORTOLETTO	
MARIELY VANESSA MIYACHI	
DOI 10.37423/211205146	
CAPÍTULO 3	31
QUANTIFICANDO CONHECIMENTOS CONSTRUÍDOS POR ALUNOS DE ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL SOBRE AS NOVAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS	
Neuza Rejane Wille Lima	
DOI 10.37423/211205149	
CAPÍTULO 4	57
FERRAMENTAS DA QUALIDADE APLICADAS NO PROCESSO DE COLHEITA MECANIZADA DE SOJA	
Felipe Carnacini	
Murilo Aparecido Voltarell	
DOI 10.37423/211205156	
CAPÍTULO 5	64
ALTERAÇÕES EM SOLO FERTIRRIGADO COM EFLUENTE DE BOVINOCULTURA	
Cíntia Cármem de Faria Melo	
Danilo Silva Amaral	
Luis César Dias Drumond	
Alberto Carvalho Filho	
DOI 10.37423/211205159	

CAPÍTULO 6	70
AVALIAÇÃO DO EFEITO DE DOSES DE FÓSFORO E POTÁSSIO NO CULTIVO DE COENTRO EM LATOSSOLO AMARELO DISTRÓFICO	
MATHEUS MIRANDA CANIATO	
RODRIGO RENER COSTA LEITÃO	
MARCOS VINICIUS TRINDADE FILHO	
JOÃO SOARES DE ARAÚJO	
FRANCISCO PEREIRA DE BRITO JÚNIOR	
DOI 10.37423/220105194	
 CAPÍTULO 7	 81
TESTE DE TETRAZÓLIO PARA AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE DE SEMENTES DE ARROZ	
Carla Aparecida Ascoli	
DOI 10.37423/220105198	
 CAPÍTULO 8	 100
AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE QUEIJO COALHO IMERSO EM SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL	
Auriana de Assis Regis	
Elisabeth Mariano Batista	
Zulene Lima de Oliveira	
Luísa Kélbia Maia	
Raimunda Valdenice da Silva Freitas	
Pahlevi Augusto de Souza	
DOI 10.37423/220105207	

Capítulo 1

10.37423/211205143

EFEITO DO MECANISMO REDUTOR DE VAZÃO NO DESEMPENHO DE UM SPRAYER SETORIAL DE IRRIGAÇÃO

Marcelo Carazo Castro

Instituto Federal do Rio de Janeiro

Maurílio de Faria Vieira Júnior

Instituto Federal do Rio de Janeiro

Jean Santiago Sabença Esteves

Instituto Federal do Rio de Janeiro

Larissa Nunes Pereira Leite

Instituto Federal do Rio de Janeiro

Resumo: Este trabalho objetivou avaliar o efeito da regulação de vazão sobre a uniformidade de distribuição de água de um sprayer setorial de irrigação. Foram realizados ensaios individuais do sprayer, em malha quadrada com 0,25 m de lado e coletor com diâmetro de abertura de 0,098 m, em seis posições de regulação de vazão nos ângulos de abertura do bocal variando entre 69° e 1100° (abertura plena). O Coeficiente de Uniformidade de Christiansen (CUC) foi determinado em cada posição de abertura e pressão para espaçamentos quadrados referentes ao raio efetivo irrigado, determinado conforme NBR 8026, da abertura própria e da abertura plena (1100°). Observou-se a existência de diferença estatística significativa ao nível de 5% de probabilidade pelo teste T das médias dos CUCs para cada regulação de vazão, tendo-se obtido o melhor valor do CUC na abertura intermediária (550°). Deve-se evitar regulação inferior a 138° (1/8 da abertura máxima), uma vez que produz elevada desuniformidade de distribuição de água inviabilizando seu uso para irrigação.

Palavras-chave: aspersor fixo de irrigação, coeficiente de uniformidade, recursos hídricos

INTRODUÇÃO:

A irrigação é atualmente o maior consumidor de água no Brasil, sendo responsável por 52% do total de água retirada. Além disso, a perspectiva brasileira é de um aumento em 24% no consumo hídrico global até 2030 (ANA, 2018), o que agravará a disputa por este recurso, forçando ao uso de técnicas e tecnologias mais eficientes. Na busca de melhor aproveitamento da água na agricultura irrigada, deve-se utilizar os sistemas mais adequados às condições socioeconômicas locais, além de proceder a um manejo cuidadoso da irrigação. No caso da irrigação por aspersão, o conhecimento dos valores da uniformidade de distribuição de água é imprescindível na definição da lâmina bruta a ser aplicada e no tempo necessário para operação otimizada do sistema (COELHO & SILVA, 2013), influenciando os custos com energia e da própria água consumida, tendo importância maior ainda onde a conservação da água é enfatizada (FISCHER & WALLENDER, 1988). Alguns fabricantes de aspersores, cientes da importância da conservação da água, produzem seus emissores com mecanismos capazes de reduzir a vazão dos mesmos, o que proporciona, por exemplo, uma menor perda de água por escoamento superficial, mas não apresentam geralmente informações sobre a sua forma de distribuição de água. Assim, este trabalho objetivou avaliar a interferência de um mecanismo redutor de vazão de um sprayer de irrigação sobre a sua uniformidade de distribuição de água.

MATERIAL E MÉTODOS:

Os trabalhos foram realizados no laboratório de irrigação do IFRJ campus Pinheiral. Foi utilizado um sprayer (aspersor fixo) de irrigação, marca Fabrimar, modelo Sempre Verde, setorial de 90°, instalado a uma altura de 0,282 m. Este emissor possui um dispositivo de redução de vazão por meio de um parafuso que permite o ajuste de vazão desde a saída plena de água até seu total fechamento (Figuras 1a e 1b), tendo um ângulo de abertura total de aproximadamente 1100°. Avaliou-se, então, nas pressões de 150 kPa e 300 kPa, as características de distribuição de água, com o parafuso de regulação de vazão ajustado para abertura plena (1100°), e aproximadas de 3/4 (825°), 1/2 (550°), 1/4 (275°), 1/8 (138°) e 1/16 (69°) da abertura total por meio do dispositivo mostrado na Figura 1c. Foram utilizados coletores de PVC com altura de 0,155 m e diâmetro de abertura de 0,098 m, dispostos em malha quadrada com 0,25 m de lado, em ensaios com uma hora de duração, e realizado o monitoramento das temperaturas do ar e da água, bem como da umidade relativa, conforme orientações apresentadas pela ABNT (2016).

FIGURA 1. Sprayer utilizado nos ensaios mostrando: (a) parafuso central totalmente aberto em posição de vazão máxima; (b) parafuso central totalmente fechada em posição de vazão nula; (c) mecanismo de regulagem aproximada da abertura do parafuso central com chave de fenda e transferidor de 0º a 1170º.

Com os volumes coletados e corrigidos pela evaporação média observada, foram determinados o raio efetivo irrigado, de acordo com ABNT (2016), e simulados o Coeficiente de Uniformidade de Christiansen (CUC), dado pela equação 1 segundo BERNARDO et al. (2005), no espaçamento quadrado utilizando o raio efetivo irrigado da abertura plena (1100º) e aquele referente a cada abertura específica, com o auxílio da planilha eletrônica Excel®. Em cada abertura do parafuso e cada pressão, foi determinada ainda a vazão do sprayer, durante a realização do respectivo ensaio, com o auxílio das leituras de um hidrômetro analógico residencial de DN ½” ligado ao circuito hidráulico do ensaio e um cronômetro.

$$CUC = \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^N |L_i - L_m|}{N * L_m} \right) * 100 \quad (1)$$

em que,

CUC – coeficiente de uniformidade de Christiansen, %;

N – número de coletores;

L_i – lâmina coletada no ponto “i”, mm, e

L_m – lâmina média de todas as observações, mm.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Na Figura 2 são apresentadas as relações entre o ângulo de abertura do bocal, a vazão dela oriunda e o raio efetivo irrigado (alcance). Observa-se que tanto a vazão quanto o raio efetivo tendem a se estabilizar com uma abertura mínima de ¼ (275º), após um pronunciado crescimento inicial.

FIGURA 2. Resultados da relação: a) abertura X vazão; b) abertura X alcance.

A Tabela 1 apresenta um resumo do teste das médias para o CUC com abertura do bocal entre 138° (1/8) e 1100°, com auxílio do teste T ao nível de 5% de significância. Observa-se a existência de diferença estatística entre os coeficientes de uniformidade, tendo a abertura de 550° (1/2) e a de 1100° (total), proporcionado respectivamente o maior e o menor valor de CUC. O CV na abertura de 138° foi o maior observado, o que significa menos confiança na precisão de medição para essa abertura em comparação com as aberturas maiores, devido a uma maior influência da pressão e do espaçamento utilizados na determinação do CUC. Por outro lado, nas aberturas maiores que 138°, o valor do CV mais baixo indica que as pressões e os espaçamentos utilizados exerceram pouca influência nos valores do CUC simulados. Na Tabela 1, excluiu-se os resultados observados na abertura de 69° (1/16) devido ao pequeno raio irrigado e a grande irregularidade de molhamento nas duas pressões avaliadas, proporcionando sempre alguma área seca na sobreposição mesmo em espaçamento quadrado com distância equivalente ao próprio raio efetivo irrigado. Nessa abertura de 69°, independente da pressão, o emissor mostrou comportamento semelhante a um aspersor sob baixa pressão, conforme apresentado por BERNARDO et al. (2005).

TABELA 1. Síntese dos valores do teste de médias para os Coeficientes de Uniformidade de Christiansen (CUC) em função dos ângulos de abertura entre 138° e 1100° nas duas pressões avaliadas.

Ângulo de Abertura (°)	CUC Médio*	Desvio Padrão (%)	Coeficiente de Variação
138	45,77a	4,44	0,10
275	45,20ab	1,43	0,03
550	49,83	1,94	0,04
825	42,70abc	2,26	0,05
1100	42,09ac	1,31	0,03

* as médias seguidas de mesma letra não apresentam diferença significativa a 5%.

CONCLUSÕES:

Nas condições dos ensaios realizados, a uniformidade de distribuição de água é afetada pelo mecanismo de ajuste da vazão do emissor, tendo melhor resultado para abertura intermediária (550°), devendo ser evitada regulagem inferior a 138° (1/8 da abertura máxima), uma vez que produz elevada desuniformidade de distribuição de água inviabilizando seu uso para irrigação.

REFERÊNCIAS:

ABNT. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 8026:2016 - Equipamentos de irrigação agrícola - Sprayers - requisitos gerais e métodos de ensaio. 1a ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2016. 20p.

ANA. AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS. Conjuntura dos recursos hídricos no Brasil 2018: informe anual. Brasília: ANA, 2018. 72p.

BERNARDO, S.; SOARES, A. A.; MANTOVANI, E. C. Manual de Irrigação. 7a ed. Viçosa: Ed. UFV, 2005. 611p.

COELHO, E. F.; SILVA, A. J. P. Manejo, eficiência e uso da água em sistemas de irrigação. Cruz das Almas: EMBRAPA Mandioca e Fruticultura, 2013. 26 p. (Documentos, 206).

FISCHER, G. R.; WALLENDER, W. W. Collector size and teste duration effects on sprinkler water distribution measurement. Transactions of the ASAE, St. Joseph, v. 31, n. 2, p. 538- 542, 1988.

Capítulo 2

10.37423/211205146

APLICAÇÃO DE MANIPUEIRA EM COLUNAS DE SOLO CULTIVADO COM CAPIM MOMBAÇA

EDMILSON CESAR BORTOLETTO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

MARIELY VANESSA MIYACHI

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Resumo: A manipueira, efluente gerado no processamento da mandioca, possui elevado potencial poluidor. Por outro lado, apresenta em sua composição diversos nutrientes, sendo sua aplicação no solo uma alternativa aos fertilizantes minerais. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos da aplicação de manipueira em diferentes concentrações de Nitrogênio sobre o crescimento do capim mombaça, e potenciais riscos de contaminação das águas subterrâneas por este elemento. O experimento foi realizado no Campus do Arenito – UEM, situado no município de Cidade Gaúcha, PR. Para tal, foram utilizados 20 tubos de PVC de 0,10m de diâmetro e 0,60 m de altura cada, preenchidos com solo coletado na área do Campus, classificado como Latossolo Vermelho Distrófico, sendo semeado capim mombaça. O efluente foi coletado na lagoa de tratamento de uma agroindústria de mandioca, localizada na região noroeste do Paraná. Durante o crescimento do capim foram aplicadas doses crescentes do efluente, equivalentes a 0, 45, 90, 135 e 180 kg.ha⁻¹ de NTK. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com quatro repetições para cada dose do efluente. No efluente percolado foi analisado o teor de NTK. De acordo com os resultados obtidos a maior dose de NTK (180 kg.ha⁻¹) proporcionou maior produtividade média de massa fresca da parte aérea (MFPA) do capim mombaça. Para a massa seca da parte aérea (MSPA) a maior produtividade foi obtida na dose de 135 kg.ha⁻¹ de NTK. No efluente percolado não foi observada diferença significativa entre as médias de concentração de NTK nos tratamentos. Desta forma, os resultados obtidos indicaram que o uso da manipueira como fonte de NTK promoveu expressivo crescimento do capim mombaça com o aumento das doses de efluente. Além disso, para as doses e condições experimentais analisadas, a aplicação da manipueira não proporcionou aumento do teor de NTK no efluente percolado, minimizando os riscos de contaminação de águas subterrâneas por este elemento.

1 INTRODUÇÃO

Os resíduos agroindustriais são gerados durante o processamento dos produtos, podendo ser eles: alimento, madeira, fibra, couro, dentre outros. Geralmente, os resíduos líquidos resultam da lavagem do produto, escaldamento, cozimento, pasteurização, resfriamento e lavagem do equipamento de processamento e das instalações (MATOS, 2005)

A mandioca (*Manihot esculenta* Crantz) é amplamente utilizada na alimentação humana e animal, além de matéria-prima para diversos produtos industriais, sendo os mais importantes a farinha de mandioca e o amido (AVANCINI et al., 2007).

A manipueira é o líquido residual gerado na prensagem da massa ralada para a produção da farinha de mesa ou extrato do amido (EMBRAPA, 2001), sendo gerada em média 600 L por tonelada de raízes processadas para a produção de fécula (MATOS, 2011).

Na Tabela 1 estão apresentadas as características físicas e químicas da manipueira, conforme trabalho de Barreto et al. (2013).

Tabela 1. Características físicas e químicas da manipueira

Parâmetros	Teor
Sólidos totais (mg.L ⁻¹)	65.773,5
Sólidos totais voláteis (mg.L ⁻¹)	47.327,0
Sólidos totais fixos (mg.L ⁻¹)	18.446,5
DQO (mg de O ₂ .L ⁻¹)	82.871,1
DBO (mg de O ₂ .L ⁻¹)	44.624,2
Condutividade elétrica (dS. m ⁻¹)	7,81
pH	5,83
K (mg.L ⁻¹)	5.900,0
N (mg.L ⁻¹)	1592,3
P (mg.L ⁻¹)	667,5
Na (mg.L ⁻¹)	126,0
Mg (mg.L ⁻¹)	1532,3
Ca (mg.L ⁻¹)	379,0

Fonte: Barreto et al. (2013)

Verifica-se na Tabela 1 que a manipueira possui elevado valor de DQO e DBO, indicando, segundo Tschoeke et al. (2017), que este efluente apresenta potencial poluidor dezena de vezes maior do que o esgoto doméstico.

De acordo com EMBRAPA (2016), além da presença de elevados teores de matéria orgânica, a manipueira contém ácido cianídrico, sendo que o acúmulo em pequenas áreas ou despejo em corpos d'água (rios e lagos), pode causar grande dano ao meio ambiente. Matos (2011) também relata que este efluente pode apresentar pH abaixo de 4,0, conferindo-lhe alto poder corrosivo.

Destaca-se também nas características químicas da manipueira (Tabela 1) a presença de diversos nutrientes. De acordo com Dantas et al. (2014), este efluente pode fornecer nutrientes ao solo e, conseqüentemente, às plantas, tornando-se uma alternativa aos fertilizantes minerais.

A utilização de águas residuárias tratadas para fins agrícolas pode se tornar uma opção para a conservação da qualidade dos corpos hídricos e da biota aquática, assim como um alívio na demanda e preservação da oferta de água para uso mais restritivo (CARVALHO et al., 2013). Porém, segundo Jesus et al. (2020), ainda existem diversos problemas associados a essa prática, principalmente quanto à origem dos efluentes, eficiência dos tratamentos, forma de aplicação e manejo agrícola.

A aplicação de manipueira como fonte de nutrientes tem sido relatada em diferentes culturas, como pimenta e coentro (COSTA, 2020), feijão (ARAUJO et al., 2017), milho (CARDOSO, 2005), girassol (DANTAS et al., 2017) e *Brachiaria Brizantha* cv Marandu (BEZERRA, 2017).

A aplicação de efluente no solo pode causar contaminação de águas superficiais e subterrâneas. Bortoluzzi et al. (2018) observaram aumento expressivo da concentração de NTK (Nitrogênio Total Kjeldahl) no percolado de colunas de solo que receberam manipueira, com o aumento das doses aplicadas, indicando que o uso da manipueira para fertirrigação deve ocorrer de forma cautelosa.

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos da aplicação de manipueira em diferentes concentrações de Nitrogênio sobre o crescimento do capim Mombaça (*Panicum Maximum* cv Mombaça), e potenciais riscos de contaminação das águas subterrâneas por este elemento.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 DESCRIÇÃO DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DO EXPERIMENTO

O experimento foi realizado em ambiente protegido - Casa de vegetação (Figura 1) no Campus do Arenito – UEM, localizado no município de Cidade Gaúcha – PR, situado na rodovia PR 482, Km 45.

Figura 1. Casa de Vegetação.

2.2 SOLO

A coleta do solo utilizado nos experimentos foi realizada de acordo com o procedimento descrito por Lozano et al. (2015). O solo foi coletado de uma única área, continua e uniforme, até a profundidade de 0,50 m. Este foi coletado separadamente, nas camadas de 0-0,25 m e de 0,25-0,50 m (Figura 2), sendo seco por aproximadamente 60 horas ao ar livre e depois peneirado.

O solo possui granulometria média da camada de 0,00-0,25 m de 88%, 1% e 11% de areia, silte e argila, respectivamente. A camada de 0,25-0,50 m corresponde a 79% de areia, 2% de silte e 19% de argila (PANINI et al., 2015).

Segundo EMBRAPA (2006) esse solo é classificado como Latossolo Vermelho Distrófico, conforme o sistema brasileiro de classificação de solos.

Figura 1. Camada de solo seca em ar ambiente: A) 0,00-0,25m; B) 0,25-0,50m.

2.3 COLUNAS DE SOLO

Para a realização deste experimento foram utilizadas 20 colunas de PVC com 0,10 m de diâmetro e 0,60 m de altura (Figura 3). De modo a reproduzir semelhantemente a mesma ordem sequencial dos horizontes na condição ambiente, o solo foi acondicionado nas colunas de forma gradual, em duas camadas. As colunas de solo foram mantidas em ambiente protegido no decorrer do experimento, sobrepostos em tijolos para que não ocorresse contato com a superfície do solo e houvesse maior facilidade na coleta do percolado (LOZANO et al., 2015).

Para obter melhor aderência do solo com a parede do tubo e minimizar caminhos preferenciais do efluente, este foi lixado de maneira a promover ranhuras internas. Na parte inferior das colunas de solo foram adaptadas telas de nylon, de malha de 1 mm, papel filtro e pratos plásticos perfurados para evitar extravasamento de material e também para permitir a percolação do efluente disposto na coluna de solo (BORTOLUZZI et al., 2018).

Figura 3. Colunas de tubo de PVC preenchidas com solo.

2.4 EFLUENTE

O efluente utilizado na fertirrigação do capim mombaça foi coletado na lagoa de tratamento de uma agroindústria de mandioca (Figura 4), localizada na região noroeste do Paraná. O efluente foi transportado para o Laboratório de Qualidade de Água do Departamento de Engenharia Agrícola/UEM, para determinação da concentração de NTK.

Figura 4. Lagoa de tratamento do efluente gerado na fecularia.

2.5 AVALIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE NTK NO PERCOLADO

Após o plantio do capim mombaça foi efetuada a aplicação da manipueira nas colunas de solo, sendo realizada manualmente com auxílio de regadores, de forma que a distribuição da mesma fosse homogênea. A aplicação foi realizada de forma parcelada, com intervalo de dois dias, totalizando 5 aplicações. Durante o experimento, quando necessário, adicionou-se água destilada (aproximadamente 210 mL) para complementar a necessidade hídrica da planta.

A coleta do efluente percolado foi feita no final do experimento, aplicando-se um volume de água de 1,5 L que permitiu percolação na extremidade inferior das colunas de solo. As amostras foram armazenadas em recipientes plásticos devidamente esterilizados e vedados, permanecendo refrigeradas até a realização da análise.

Foi realizada análise de N-total no efluente bruto aplicado nas colunas de solo e no percolado, para verificar a absorção dos nutrientes pelo solo e pela planta. A determinação de nitrogênio foi realizada por meio do método “nitrogênio total kjeldahl (NTK)” (APHA, 1998). Este método consiste na digestão da amostra com ácido sulfúrico concentrado. A amostra foi destilada recebendo ácido bórico, no destilador de nitrogênio modelo MA-36, Marconi, e titulada por solução de NaOH, sendo calculada pela equação 1:

$$NTK = \frac{(V_1 - V_2)}{V} * N_a * 14000 \quad (1)$$

Em que:

N_{NTK} representa a concentração do nitrogênio total kjeldahl”, em $\text{mgN-NH}_4^+/\text{L}$;

V_1 – volume da solução de ácido utilizado para titular a amostra (mL);

V_2 – volume da solução de ácido utilizado para titular o *branco*(mL);

V – volume da amostra (mL);

N_a – normalidade da solução de ácido utilizado na titulação;

14000 é o equivalente-grama do nitrogênio contido no NH_4^+ .

2.6 PRODUÇÃO DO CAPIM MOMBAÇA

Para semeadura foram dispostas aproximadamente 30 sementes de capim mombaça, por coluna de solo. Com 15 dias após a emergência das plantas foi realizado o desbaste, restando apenas 3 plantas por coluna.

Após 45 dias do início da aplicação da água residuária nas colunas de solo foi efetuada a colheita da parte aérea das plantas. Para isto, a coluna de solo com a planta foi cuidadosamente retirada do tubo de PVC (Figura 5). As raízes foram desagregadas do solo, sendo lavadas e separadas dos colmos. Ambas as amostras foram acondicionadas em sacos de papel e colocadas em estufa de circulação forçada de ar (temperatura de 65°C), até peso constante, para a obtenção da massa seca da parte aérea e massa seca da raiz (em gramas). Para a obtenção da massa fresca da raiz e parte aérea, as plantas foram pesadas logo após a colheita. Este procedimento foi adaptado do trabalho de Bortoluzzi et al. (2018).

Figura 5. Coluna de solo com a planta, retirada do tubo de PVC.

2.7 DOSES DE NTK UTILIZADAS NOS EXPERIMENTOS

O experimento foi composto por cinco tratamentos (Tabela 2) com quatro repetições inteiramente casualizados (DIC), sendo os tratamentos constituídos com doses crescentes de nitrogênio (BORTOLUZZI et al., 2018), T₀ (testemunha) no qual recebeu somente água destilada, T₁, T₂, T₃ e T₄, equivalentes a doses crescentes de nitrogênio total (kg.ha⁻¹), após a semeadura do capim.

Tabela 2. Doses de NTK aplicadas em função dos tratamentos

TRATAMENTOS	DOSES (Kg.ha ⁻¹)
T ₀	0
T ₁	45
T ₂	90
T ₃	135
T ₄	180

2.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS

Os resultados obtidos nas análises de NTK do efluente percolado e produção de matéria fresca e seca da planta e da raiz foram submetidos a uma análise de variância (ANOVA), para verificar diferenças entre os tratamentos quanto às concentrações de Nitrogênio e entre os parâmetros de produção da planta em cada tratamento. Para tal foi utilizado o software estatístico SISVAR (versão 5.4), com nível de significância de 5%.

Para a análise dos parâmetros de produção da planta utilizou-se o teste de regressão e para a análise de variância de NTK no efluente percolado, teste de Tukey com nível de significância de 5%.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 ANÁLISE DOS PARÂMETROS DE PRODUÇÃO DA PLANTA

Os dados obtidos nos ensaios em colunas de solo para produção média de massa do capim estão apresentados na Tabela 3. A análise de variância dos parâmetros de produção da planta está contida na Tabela 4.

Tabela 3. Produção média de massa fresca e seca do capim mombaça em função das doses de NTK

Tratamentos	Doses de N (kg.ha ⁻¹)	Médias observadas			
		MFPA (g)	MSPA (g)	MFR (g)	MSR (g)
T ₀	0	0,9856	0,3590	1,6723	0,5228
T ₁	45	4,3478	1,3745	5,7583	1,5649
T ₂	90	8,9247	2,8642	8,2558	2,2395
T ₃	135	12,9622	4,6085	9,2224	3,67282
T ₄	180	14,1579	4,2957	9,8769	4,3906

MFPA=massa fresca da parte aérea, MSPA=massa seca da parte aérea, MFR=massa fresca da raiz, MSR=massa seca da raiz.

Tabela 4. Análise de variância dos parâmetros de produção da planta.

PARÂMETROS	COEFICIENTE DE VARIÂNCIA	Pr>F
MFPA	14,62	<0,0001
MSPA	23,11	<0,0001
MFR	44,06	<0,0111
MSR	20,91	<0,0001

Observa-se, pelos dados da Tabela 4, que houve efeito significativo ($P<0,05$) das doses de nitrogênio utilizadas, resultando em um aumento na produção de massa fresca e seca tanto da parte aérea como da raiz (Tabela 3). Isso se explica pelo fato de a adubação nitrogenada acelerar o crescimento, a produção de folha e com isso a expansão da parte aérea (FREITAS, et al.,2007).

Para avaliar o comportamento da produção da planta em função das doses de NTK utilizadas, foi realizada análise de regressão nos dados obtidos, de acordo com as Figuras 6 a 9, em que os valores de R^2 foram elevados, demonstrando uma relação muito forte entre os parâmetros da produção da planta e as doses crescentes de manipueira. Em todos os parâmetros de produção da planta o modelo estatístico que melhor se ajustou aos dados foi o quadrático: $y=B_0+B_1 \cdot x+B_2 \cdot x^2$.

Figura 6. Massa fresca da parte aérea (MFPA) do capim mombaça em função das doses de nitrogênio.

Figura 7. Massa seca da parte aérea (MSPA) do capim mombaça em função das doses de nitrogênio.

Figura 8. Massa fresca da raiz (MFR) do capim mombaça em função das doses de nitrogênio.

Figura 9. Massa seca da raiz (MSR) do capim mombaça em função das doses de nitrogênio.

Em relação aos valores médios de massa fresca da parte aérea da planta nos diferentes tratamentos (Figura 6), observa-se que o maior valor médio ocorreu nas plantas que receberam uma dose de 180 kg.ha⁻¹ de NTK, equivalente ao tratamento 4. Verifica-se que o aumento das doses de efluente ocasionou um acréscimo significativo na massa fresca do capim mombaça, sendo que na ausência do efluente a média da MFPA foi igual a 0,9856 (g) e quando foi aplicada a maior dose (180 kg.ha⁻¹ de NTK), o valor médio foi de 14,1579 g (Tabela 2), um aumento de aproximadamente 93%. Dessa forma,

nas condições avaliadas, pode-se afirmar que a variação da dosagem do efluente proveniente da agroindústria de mandioca interferiu significativamente na produção de massa fresca da parte aérea do capim mombaça (Figura 10).

Figura 10. Colunas de solo que receberam 0, 45, 90, 135 e 180 kg.ha⁻¹ de nitrogênio, após 45 dias.

Os resultados obtidos neste experimento também são semelhantes aos encontrados por Cardoso et al. (2009) ao constatarem que em plantas de milho cultivadas em área adubada com manipueira apresentaram maior produção de matéria fresca da parte aérea que as plantas cultivadas em solo adubado com fertilizante mineral, sendo o aumento creditado aos nutrientes presentes na manipueira, sobretudo nitrogênio.

Verifica-se na Figura 7 que a média da massa seca da parte aérea da planta em função das doses de nitrogênio, para T3, diferiu significativamente dos tratamentos T0, T1, T2 e T4, apresentando uma maior produtividade com uma dose de 135 Kg.ha⁻¹ de NTK. Constata-se também que a MSPA apresentou uma resposta quadrática para as doses de efluente e um coeficiente de regressão de 0,94, ou seja, observa-se uma tendência de aumento contínuo no intervalo de dose estudado, variando de 0,3590 a 4,6084 g, para gerar a máxima produção de matéria fresca e decaindo para 4,2957 (g) no tratamento 4, equivalente a dosagem de 180 kg.ha⁻¹ de NTK.

Observa-se na Figura 8 os valores médios da massa fresca da raiz (g) do capim mombaça, em relação aos tratamentos. A curva de regressão das doses aplicadas apresentou coeficiente R² de 0,99, observando-se valores mínimos e máximos de 1,6723 e 9,8769 g. Nota-se ainda que até o tratamento T2 houve um aumento significativo de MFR, sendo esta taxa de crescimento bem menor de T2 para T3 e T3 para T4. Verificou-se comportamento semelhante com o observado na massa fresca da parte aérea do capim mombaça.

De acordo com a Figura 9 verifica-se uma tendência de aumento contínuo da massa seca da raiz do capim mombaça em função das dosagens, variando de 0,5228 a 4,3906 g, gerando a máxima produção de matéria seca equivalente no tratamento de 180 Kg.ha⁻¹(T4). Dessa forma, pode-se afirmar que a

aplicação de doses crescentes de manipueira promoveu maior acúmulo de massa seca da raiz do capim mombaça. Na Figura 11 estão apresentadas as raízes retiradas das colunas de solo após o término dos ensaios, sendo possível notar o aumento da massa de raiz com o aumento da dose de efluente.

Figura 11. Raízes retiradas das colunas de solo após o término dos ensaios

3.2 ANÁLISE DE VARIÂNCIA NAS CONCENTRAÇÕES MÉDIAS DE NTK DO EFLUENTE PERCOLADO

Na Figura 12 estão apresentadas as concentrações médias de NTK do percolado, nos diferentes tratamentos. Os valores de NTK no percolado variaram entre 0,84 (T1) e 1,07 mg.L⁻¹ (T2). Porém, pelo teste de Tukey ao nível de 0,05 de significância, não houve diferença entre as médias dos tratamentos. O aumento de dosagem de manipueira, e consequentemente a aplicação de maior teor de NTK, não contribuiu para o aumento de NTK no efluente percolado, o que provavelmente está relacionado a maior absorção pela planta, visto que ocorreu o crescimento da parte aérea e raiz com o aumento das doses de NTK.

Figura 12. Concentração média de NTK do percolado, em função dos tratamentos realizados

Diante destes resultados, pode-se afirmar que no intervalo de dosagem utilizado o aumento da concentração de NTK não proporcionou maior teor do elemento no efluente percolado, o que indica que nas condições avaliadas a aplicação da manipueira em doses crescentes não aumentou o risco de contaminação de águas subterrâneas. Ressalta-se que a aplicação de maiores teores de NTK deve ser avaliada quanto aos riscos de percolação deste nutriente.

4. CONCLUSÃO

Ao se avaliar diferentes doses de manipueira em colunas de solo, verificou-se que a maior dose de NTK (180 Kg.ha^{-1}) proporcionou maior produtividade média de massa fresca da parte aérea (MFPA) do capim mombaça. Para a massa seca da parte aérea (MSPA) a maior produtividade foi obtida na dose de 135 Kg.ha^{-1} de NTK. As doses crescentes de efluente promoveram um aumento contínuo de MFR e MSR nas colunas de solo.

No efluente percolado não foram observadas diferenças significativas entre as concentrações médias de NTK no percolado, como função de doses crescentes de manipueira nas colunas de solo.

Desta forma, os resultados obtidos indicaram que o uso da manipueira como fonte de NTK promoveu expressivo crescimento do capim mombaça com o aumento das doses de efluente. Além disso, para as doses e condições experimentais analisadas, a aplicação da manipueira não proporcionou aumento do teor de NTK no efluente percolado, minimizando os riscos de contaminação de águas subterrâneas por este elemento.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

APHA (American Public Health Association). Standard methods for examination of water and wastewater. 20th ed. Washington D.C, 1998.

ARAÚJO, N. C. ; LIMA, V. L. A.; ANDRADE, E. M. G.; OLIVEIRA, S. J. C.; CARDOSO, J. A. F.; SENA, L. F. Crescimento inicial de feijão Vigna fertirrigado com urina e manipueira. Revista Espacios. v. 38, n. 13, 2017.

AVANCINI S. R. P.; FACCIN G. L.; VIEIRA M. A.; ROVARIS A. A.; PODESTÁ R.; TRAMONTE R.; DE SOUZA N. M.; AMANTE E. R. Cassava starch fermentation wastewater: characterization and preliminary toxicological studies. Food Chem Toxicol. Nov;45(11):2273-8, 2007.

BARRETO, M. T. L.; ROLIM, M. M.; PEDROSA, E. M. R.; MAGALHÃES, A. G.; TAVARES, U. E.; DUARTE, A. S. Atributos químicos de dois solos submetidos à aplicação de manipueira. Revista Brasileira de Ciências Agrárias, vol. 8, núm. 4, pp. 528-534, 2013.

BEZERRA, M. G. S.; SILVA, G. G. C.; DIFANTE, G. S.; EMERENCIANO NETO, J. V.; OLIVEIRA, E. M. M.; OLIVEIRA, L. E. C.. Cassava wastewater as organic fertilizer in 'Marandu' grass pasture. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental. v.21, n.6, p.404-409, 2017.

BORTOLUZZI, D. D. ; TERASSI, D. S. ; SILVA, F. S. ; BORTOLETTO, E. C. . Qualidade do percolado e resposta do capim mombaça submetido a diferentes doses de manipueira. Journal of Agronomical Sciences , v. 7, p. 115-122, 2018.

CARDOSO, E. Uso de manipueira como biofertilizante no cultivo do milho: avaliação no efeito do solo, nas águas subterrâneas e na produtividade do milho. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) – Universidade do Extremo Sul Catarinense, Criciúma, 2005.

CARDOSO, E.; CARDOSO, D.; CRISTIANO, M.; SILVA, L.; BACK, A. J.; BERNADIM, A. M.; PAULA, M. M. S. Use of manihot esculenta, crantz processing residue as biofertilizer in corn crops. Research Journal of Agronomy, v.3, p.1-8, 2009.

CARVALHO, R.S.; SANTOS FILHO, J.S.; SANTANA, L.O.G.; GOMES, D.A.; MENDONÇA, L.C.; FACCIOLI, G.G. Influência do reuso de águas residuárias na qualidade microbiológica do girassol destinado à alimentação de animal. Revista Ambiente & Água, Taubaté, v.8, n.2, p 157-167, 2013.

COSTA, A. G. Caracterização da manipueira e sua utilização para a produção do coentro 'verdão' e da pimenta 'biquinho'. Tese (Doutorado em Engenharia Agrícola) - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas, 2020.

DANTAS, M. S. M.; ROLIM, M. M.; DUARTE, A. S.; SILVA, E. F. F.; PEDROSA, E. M. R.; DANTAS, D. C.; Chemical Attributes of Soil Fertilized with Cassava Mill Wastewater and Cultivated with Sunflower. The Scientific World Journal, Article ID 279312, 10 p., 2014.

DANTAS, M. S. M., ROLIM, M. M., PEDROSA, E. M. R., SILVA, M. M., DANTAS, D. C. Growth and seed yield of sunflower on soil fertilized with cassava wastewater. Rev. Caatinga, Mossoró, v. 30, n. 4, p. 963 – 970, out. – dez., 2017.

EMBRAPA (Empresa Brasileira De Pesquisa Agropecuária). Uso da manipueira (tucupi) como fonte de nutrientes para o cultivo da mandioca. Comunicado Técnico, n.59, junho/2001, p.1-4. Disponível em <<http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/40143/1/ComTec59.pdf>>. Acesso em: 16 de dezembro de 2021.

EMBRAPA (Empresa Brasileira De Pesquisa Agropecuária). Centro Nacional de Pesquisa de Solos. Sistema brasileiro de classificação de solos. 2 ed., Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2006, 306 p.

EMBRAPA (Empresa Brasileira De Pesquisa Agropecuária). A manipueira na adubação da mandioca. 2016. Disponível em:

<https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/138820/1/folder-manipueira-018-15Publica-MautoDiniz.pdf>. Acesso em 15/12/2021

FREITAS, K.R.; ROSA, B. RUGGIERO J.A; NASCIMENTO, J.L.; HEINEMAM, A.B.; MACEDO, R.F.; NAVES, M.A.T.; OLIVEIRA, I.P. Avaliação da composição químico-bromatológica do capim mombaca (*Panicum maximum*) submetidos a diferentes doses de nitrogênio. Bios. J., Uberlândia, v.23, n. 3, p1 -10. July/sept., 2007.

JESUS, F. L. F.; SANTOS, O. N. A.; TALAMINI JUNIOR, M. V.; GOMES, T. M.; ROSSI, F.; ROMÁN, R. M. S. Águas residuárias para irrigação no Brasil: uma abordagem química, física e microbiológica. Irriga, Botucatu, v. 25, n. 3, p. 562-589, julho-setembro, 2020.

LOZANO, C.L.; TONELLO, T.U.; BORTOLETTO, E.C.; ARAÚJO, M.A.; TONELLO, A.P. Resposta do capim mombaça (*Panicum maximum* cv. Mombaça) submetido à aplicação de água residuária de abatedouro de aves. Enciclopédia Biosfera, Centro Científico Conhecer, Goiânia, v.11, n.22, p. 3796-3805, 2015.

MATOS, A. T. Tratamento de resíduos agroindustriais. Curso sobre tratamento de resíduos agroindustriais. Fundação Estadual do Meio Ambiente. Universidade Federal de Viçosa, 2005.

MATOS, A. T. Poluição Ambiental – Impactos no meio físico. Editora UFV, 206 p., 2011.

PANINI, R. L.; ARAUJO, M. A; BERTOLDI, I. R; MORAES JÚNIOR, J. C; USHIWATA, S. Y; SOUZA, S. L. Levantamento de uso atual e classificação dos solos do campus do arenito em Cidade Gaúcha – PR. In: IX Encontro Internacional de Produção Científica UniCesumar – IX EPCC, 2015. Editora UniCesumar, Maringá – PR, 2015.

TSCHOEKE, I. C. P.; SILVA, L. F.; SANTOS, A. F. M. S.; SOUZA, T. P. C. Análise da carga orgânica da manipueira em casas de farinha. Revista Brasileira de Agrotecnologia, v. 7, n. 2, p. 228 – 232, 2017.

Capítulo 3

10.37423/211205149

QUANTIFICANDO CONHECIMENTOS CONSTRUÍDOS POR ALUNOS DE ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL SOBRE AS NOVAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS

Neuza Rejane Wille Lima

Universidade Federal Fluminense

Resumo: As práticas de cultivar e coletar plantas de modo sistematizado remontam a tempos de difícil datação, sendo atribuído ao momento que o homem deixou de ser, tipicamente, coletor-caçador e passou a construir cidades. Provavelmente, essa prática ocorreu há cerca de 12 mil anos. Ao longo deste percurso, o homem tem selecionado e criado fenótipos de vegetais que são mais nutritivos, palatáveis, com baixa ou nenhuma toxicidade, mais facilmente digeríveis *in natura* ou de fácil cozimento. Assim, surgiu a agricultura cujas técnicas de cultivo de plantas têm sido alteradas por novas práticas agrícolas, hoje cada vez mais assessoradas pelas tecnologias vigentes. O objetivo deste artigo foi relatar as (re)construções dos conhecimentos de alunos de uma turma de primeiro período do Curso de Bacharelado em Engenharia Agrícola e Ambiental, da Universidade Federal Fluminense. Para tanto, foi aplicado um questionário *online*, contendo 42 perguntas, sendo 14 questões abertas e nove fechadas sobre o tema em questão, as demais (n=19) sobre o perfil, os aspectos autoavaliativos e de avaliação do próprio questionário. O questionário foi aplicado após duas aulas com duas horas de duração cada, ministradas num intervalo de sete dias. As duas aulas sobre a temática mencionada foram ministradas em 20 e 27 de outubro de 2021, de modo síncrono e remoto, em função da pandemia causada pelo SARS-CoV-2. Os resultados do questionário revelaram que os alunos (n=39) escreveram ou escolheram as respostas, preferencialmente, de modo correto sobre as diversas práticas agrícola e foram capazes de, individualmente, discernir sobre as diferenças e semelhanças entre os métodos empregados no cultivo de plantas. Os alunos, cada um a seu modo, entenderam e construíram novas visões e conhecimentos sobre o surgimento e a evolução dessa nobre e imprescindível atividade humana – a agricultura.

Palavras-chave: Ensino de biologia, Nuvens de palavras, Drones, Agricultura 4.0, Agricultura 5.0.

AS NOVAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS

Quanto tipos de agricultura existem? Essa parece ser uma pergunta facilmente respondível: monocultura comercial ou agricultura de subsistência familiar. Porém, por ser essa prática milenar, cujos primeiros registros datam, oficialmente, de 12 mil anos, envolvendo diferentes povos e regiões geográficas e climáticas, tem-se observado a adoção de diferentes técnicas de tratamento do solo para obter os alimentos de origem vegetal. Assim, caçadores-coletores se tornaram nômades, se fixando nas terras agricultáveis, sedimentando as primeiras civilizações, no Oriente Médio, Mesopotâmia (atual território iraquiano), como foi explicado na primeira aula da atividade (LIMA, 2021).

Há registros indicando que no terceiro milênio a.C. os mesopotâmios praticavam a agricultura de irrigação, cultivando trigo, cevada, linho, árvores frutíferas, raízes, legumes e gergelim para produção de azeite para alimentação e iluminação. Nas regiões áridas, os sistemas hidráulicos agrários, com cultivos de inundação ou irrigados por queda, possibilitaram a agricultura na era neolítica (do 10º ao 3º milênio a.C), principalmente em seu período final, nos vales dos rios Nilo e Indu, o mais longo e mais importante sistema fluvial do Paquistão. Da mesma forma aconteceu nos oásis e vales do Império Inca (do atual Equador até o Norte do Chile), em uma extensão norte-sul de quase 5 mil quilômetros (MAZOYER; ROUDART, 2010).

Além destas áreas, há registros de que em regiões tropicais úmidas, como China, costa da Guiné, na África, Índia, Indonésia, Madagascar, Vietnã, Tailândia, houve desenvolvimento de práticas agrícolas. Dentre essas práticas, a rizicultura aquática, em espaços mais regados e drenados como as planícies e interflúvios. Em seguida houve esforços nos espaços acidentados como a montante dos vales e a jusante dos vales e deltas de rios - áreas de difícil proteção e drenagem como os espaços que exigiam irrigação. Nesses processos houve a evolução na construção de inúmeras ferramentas e equipamentos com ou sem participação da tração animal (MAZOYER; ROUDART, 2010).

As diversas terras cultiváveis ou especialmente preparadas para tal prática adotam diferentes classificações conforme informam inúmeros documentos livremente disponibilizados no *site* da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa. Essa empresa, genuinamente brasileira, produz e divulga variados produtos técnicos e científicos sobre a agropecuária, informando, sobre o tema que, basicamente, existem dois grupos de agricultura:

- **Grupo 1** - Agricultura de Subsistência ou Agricultura Familiar

- **Grupo 2** - Agricultura Comercial ou Agricultura Moderna

As subclassificações destes dois grupos de agricultura variam muito de autor para autor e até se sobrepõem, tendo em vista que as áreas são muito variáveis e as metodologias podem ser muito semelhantes ou complementares, conforme indica o quadro a seguir.

Quadro 1. Tipos de agriculturas praticadas.

Tipo	Objetivo Principal
Familiar	- Representa cerca de 80% da produção mundial de alimentos, sendo, portanto, de extrema importância para a economia baseada na subsistência. Sua base é nos núcleos familiares. Não aplica uso de fertilizantes químicos nem técnicas para correção do solo.
Orgânica ou Natural	- Organicidade e sanidade da produção de alimentos vivos para garantir a saúde dos seres humanos, sem o uso de defensivos orgânicos. Sempre emprega recursos naturais e humanos locais.
Biodinâmica	- Não utiliza adubos químicos, venenos herbicidas, sementes transgênicas, antibióticos ou hormônios. Foi criada em 1924, por Rudolf Steiner, durante o Congresso de Pentecostes, na Polônia, como um ramo da Antroposofia. ¹
Regenerativa	- Reúne Agrofloresta, Agroecologia, Agricultura Sintrópica e outras, visando sempre a regeneração do solo para mitigação climática.
Agroecologia	- Conceito que foi desenvolvido pelo pesquisador Howard, em 1934. Em 1950, entretanto, o termo "agroecologia" foi apropriado pelo pesquisador Lysenko e passou a ser utilizado em cursos de agronomia até 1964, reunindo formas de agricultura sustentáveis que agregam os resultados científicos e os conhecimentos tradicionais.
Agrofloresta ou Sistema Agroflorestal	- Conjunto de técnicas que reúne agricultura e preservação ou recomposição ecológica, considerando a dinâmica de sucessão de espécies da flora nativa, agregando os benefícios para a saúde do solo e dos produtos vegetais coletáveis.

	- Essa atividade recupera antigas técnicas de povos tradicionais de cada região, e os associa aos resultados científicos sobre ecofisiologia das espécies vegetais, bem como as suas interações positivas ou negativas com a fauna nativa.
Agricultura Sintrópica	- Em 1982, o pesquisador e agricultor suíço, formado em ciência genética, Ernst Götsch, se mudou para Pirai do Norte, conhecida região produtora de cacau na Bahia, Brasil. - Nessa região ele desenvolveu a agricultura regenerativa que utiliza um conjunto de princípios teóricos e práticos, baseados em processos naturais de práticas agrícolas, tanto na forma, função ou dinâmica. - No agrossistêmico sintrópico (o inverso de entropia, desorganização), os cultivos são baseados na mesma produção, concomitante, de frutas, hortaliças, culturas anuais etc, visando criar condições ambientais e sustentáveis para a recuperação de áreas degradadas, auxiliar no reflorestamento. - Este termo 'sintropia' é o inverso de entropia, que significa desorganização, degradação, perda de energia. A agricultura sintrópica se propõe a reordenar e restaurar o ecossistema natural, tornando a área capaz de produzir e entregar benefícios sustentáveis ao ambiente.
Comercial	- Monocultura que utiliza grandes extensões de terra para o abastecimento, principalmente, do mercado externo geralmente. Emprega intensa mecanização, defensivos agrícolas, visando altos índices de produtividade. Provoca impactos no ambiente: desmatamento, esgotamento dos solos, contaminação de rios, lagos lençóis freáticos pelo uso abusivo de fertilizantes e pesticidas.
- Permacultura	- Termo criado em 1978 pelo Dr. Bill Mollison, cientista e naturalista, cujo objetivo é a permanência do ser humano nas suas terras, compreendendo as características dos padrões ecológicos, usando os recursos naturais de maneira racional pela prática do desenvolvimento sustentável, sempre promovendo interações equilibradas entre homem e o ambiente. - Práticas: banheiro seco que visa à diminuição do uso de água e tratamento das fezes, horta mandala para produção de alimentos de maneira sustentável, uso de minhocário para produção de húmus, compostagem de toda qualquer matéria orgânica.

Fonte: AGROINSIGHT (2021), BUCK (2020), LEGNAIOLI (s/d.), PARKER (s/d.),

O QUE SE SABEMOS SOBRE AS NOVAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS?

No contexto cibernético, novas técnicas agrícolas foram desenvolvidas em todo mundo, propiciando identificação dos problemas nos cultivos, através de nova prática agrícola caracterizada como: Agricultura Digital ou 4.0 (Quadro 2), Agricultura de Precisão (BRASIL, 2012) (Quadro 3) e Agricultura 5.0 (Quadros 4 e 5), como sintetizado em Lima (2021).

Quadro 2. Características básicas da Agricultura Digital ou 4.0.

• Conjunto de tecnologias que auxiliam o produtor a acompanhar mais de perto as atividades rurais, envolvendo <i>softwares</i> e dispositivos responsáveis pela coleta e processamento de dados de produtividade da fazenda.
• Monitorada por pessoa no campo através do processamento de dados via <i>tablet</i>, computadores, celulares, podendo estar associada a <i>drones</i>
• Atender às maiores necessidades dos produtores, como atingir elevados tetos produtivos, otimizar o uso de recursos nas áreas de plantio (solos, águas, florestas, polinizadores) e ter um melhor trato com o solo, novas técnicas foram implementadas na agricultura digital.
• A inovação na agricultura digital é um dos principais objetivos para facilitar e orientar o produtor na lavoura a tomar decisões estratégicas, com dados de campo automatizados, informações precisas e em tempo real.

Fonte: BUCK (2020).

Quadro 3. Características básicas da Agricultura de Precisão.

• Busca de maior eficiência, quando agricultores passaram a cuidar de seus campos de forma customizada, analisando a necessidade específica de cada talhão, ao invés de olhar para a área como única.
• Aplicação de insumos nas áreas que apresentam maior potencial produtivo como dados georreferenciados para o uso da agricultura de precisão e ferramentas de agricultura digital, como mapas, imagens de satélite, fotografias, sensores, câmeras e demais <i>hardwares</i> e <i>softwares</i> que contribuem para o acompanhamento da lavoura.
• Faz uso sistema de gerenciamento agrícola que considera as particularidades de cada ponto da propriedade.
• Os primeiros mapas de monitoramento de produtividade foram gerados na Europa, nos anos 1980, ao mesmo tempo em que começava uma estratégia de aplicação de insumos em taxa variável nos Estados Unidos.
• Nos anos 1990, as propriedades brasileiras, iniciaram as aplicações intensificadas de tecnologia com o aprimoramento do GPS - Sistema de Posicionamento Global por Satélites – possibilitando a instalação de

receptores em semeadoras, colheitadeiras e pulverizadores, associando todos os dados de produtividade às coordenadas geográficas, através do auxílio de satélite.
Sistemas que integram de forma coordenada e simultânea as funções de coleta, transmissão e processamento de dados podem fornecer informações agrometeorológicas atualizadas em tempo real.

Fonte: BRASIL (2012), BUCK (2020).

As informações obtidas pelas práticas Agrometeorológicas possibilitam realizar atividades básicas que contam com a atuação, imprescindível de drones. As principais atividades são:

1. preparo do solo;
2. semeadura;
3. adubação;
4. irrigação;
5. controle fitossanitário (métodos utilizados para evitar propagação de pragas e doenças nas plantações);
6. colheita dos produtos;
7. estimativas de produtividade;
8. contabilidade da qualidade da produção;
9. estimativas dos dados meteorológicos;
10. monitoramento da propriedade para evitar invasões, incêndios, fuga de animais, oferta de venda etc.

Quadro 4. Etapas realizadas pelo monitoramento através de drones na Agricultura 4.0

Análise da plantação, detectar pragas e doenças, falhas de plantio, excesso de irrigação, entre outros.
Demarcação de áreas de plantio, através das imagens captadas. Indica quais áreas da fazenda são mais propícias à semeadura.
Acompanhar o desenvolvimento da safra, captando imagens, periodicamente, possibilitando análises cronológicas computadorizadas.
Pulverização, por meio de <i>drone</i>, encontra-se na fase de protótipos que conseguem embarcar até 18 litros de soluções químicas.
Monitorar as pastagens, através de análises detalhadas que possibilitam escolher amostras em pontos estratégicos da fazenda, para coleta de água, solo e porções de plantas que podem ser enviadas para laboratórios.
Cuidar do território plantado, no caso de invasão, devido a conflitos, guerras, proteção de áreas de fronteiras.
Monitorar ocorrência de focos de incêndio e sobrevoar queimadas.
Auxiliar na telemetria que facilita a venda da fazenda com a possibilidade de gravar imagens e leva-las aos interessados e divulgar na internet.

Fontes: BUCK (2020).

Quadro 5. Agricultura 5.0.

• Produção agrícola que utiliza banco de dados e inteligência artificial para atingir alta precisão e performance no campo, contribuindo para o aumento da produtividade.
• Apesar da pandemia causada pelo SARS-CoV-2, em 2021, a Agricultura gerados por satélites para fazer o mapeamento de áreas. a análises [r1]georreferenciadas dos solos, estratégias de fertilização e irrigação, a pulverização com drones, a biomedicina de alta precisão para monitorar as plantações etc.
• A grande relevância da Agricultura 5.0 está no uso de ferramentas digitais, contribuindo para tomadas de decisões mais assertivas, transferindo tarefas desempenhadas por agricultores para as máquinas. Com isso, podem proporcionar maior precisão e alta performance na produtividade. Neste cenário, é esperado do agricultor que saiba interpretar dados, consiga identificar os problemas recorrentes em sua plantação.

Fonte: BRASIL (2012), DIÁRIO AGRÍCOLA (2021); INSUMO AGRÍCOLA (2021)

Um conjunto de resultados gerados pela Embrapa, envolvendo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – Inpe, tem listado as inúmeras informações sobre os antigos e modernos tipos de agricultura, conforme reportou Lima (2021). Nos documentos são apresentadas as inúmeras formas de se empregar drones nas atividades agrícolas (Quadro 6).

Quadro 6. Por que utilizar *drones* na agricultura?

• Facilidade de comunicação e acesso à informação - proporcionada pela internet - representam a principal porta de entrada para introduzir o agricultor nessas novas tecnologias digitais.
• Agilizar a comunicação na hora de contratar serviço, pesquisar preço de insumo ou conduzir a propriedade com outros “olhos”, mapeando a lavoura, planejando a atividade e tomando decisões mais assertivas. A agricultura digital é uma das principais aliadas da produtividade agrícola.
• Mais de 70% dos produtores rurais informaram que acessam a internet para interesses gerais sobre agricultura, como obter ou divulgar informações relacionadas à propriedade, comprar insumos ou vender sua produção.
• Cerca de 40% dos produtores disseram que usam novas tecnologias como canal para a compra e venda de insumos e produção.
• Aproximadamente 30% dos agricultores consultam informações digitais com o objetivo de mapear a lavoura, vegetação e previsão de riscos climáticos.

Fonte: BRASIL (2012); BASTOS (2016); EQUIPE FIELDVIEW (2021).

Nesse contexto, este capítulo objetivou quantificar as (re)construções dos conhecimentos de alunos de uma turma de primeiro período do Curso de Bacharelado de Engenharia Agrícola e Ambiental, da Universidade Federal Fluminense.

PROCEDIMENTOS

A atividade foi conduzida após duas aulas remotas e síncronas, em outubro de 2021, quando foram apresentados vídeos (Quadro 7) e *slides* sobre os tipos atuais de agricultura.

Quadro 7. Lista de vídeos que foram utilizados para compor a aula e disponibilizados para consultas posteriores sobre tipos atuais de agricultura.

1) Monocultura & Exportação de Soja – 1 minuto de duração, apresentado em aula. https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6709905668687589376/?msgControlName=reply_to_sender&msgConversationId=6714893928853762050&msgOverlay=true
2) Agroecologia – 27 minutos de duração, orientado para assistir em casa. https://www.youtube.com/watch?v=FajlJZnnBJI
3) Agroecologia - 4 minutos de duração. apresentado em aula. https://www.youtube.com/watch?v=jTzu9eBYW4Q
4) O que é Agricultura Sintrópica?   Globo Rural   Fazenda Ouro Fino – 14 minutos de duração, apresentado em aula. https://www.youtube.com/watch?v=3P1DjXEfY84&t=8s
5) Agricultura Sintrópica – Globo Rural – 32 minutos de duração, orientado para assistir em casa. https://globoplay.globo.com/v/6059535/programa/

Após apresentação e discussão dos vídeos (Quadro 7), os alunos receberam um questionário construído no *Google Form* contendo 42 perguntas para:

1. que os participantes concordassem em participar da pesquisa proposta (n= 10);
2. caracterizar o perfil básico dos participantes (n= 3);
3. avaliar os conhecimentos construídos pela turma sobre a temática “Novas Práticas Agrícolas no Brasil”, através de perguntas abertas (n=14) e fechadas (n= 9);
4. verificar quais foram as fontes de pesquisa consultadas pela turma (n= 1);
5. identificar perguntas mais fáceis (n= 1), mais difíceis (n= 1) e o grau de dúvida que a turma teve (n= 1), além de indicar se gostariam de relatar algo sobre a atividade (n = 1);

6. qual foi a avaliação que a turma fez do questionário (n= 1) e da sua própria participação ao responder o questionário aplicado (n= 1).

O conjunto das repostas obtidas através do questionário foi exposto sem a identificação dos autores, com as devidas explanações sobre os critérios de avaliação adotados: (i) nuvem de palavras (ii) gráfico de frequência (iii) percentual de respostas esperadas.

ANÁLISES E REVELAÇÕES DOS PRINCIPAIS RESULTADOS

Os alunos envolvidos no estudo estavam, em sua grande maioria, no primeiro período do Bacharelado de Engenharia Agrícola e Ambiental (97,4%), distribuídos em 46,2% (declararam ser do gênero feminino) e 53,8% (masculino), com idades variando entre 18 e 42 anos, sendo que 69,2% estavam entre 18 a 20 [18 (30,8%) – 19 (17,9%) - 20 (20,5%)].

Através da aplicação e análise das 14 perguntas abertas através da nuvem de palavras (www.wordart) e gráfico de frequência (Excel, 2010) (Tabela 1), se observa que, de um modo geral, os alunos foram assertivos nas escolhas das palavras para expressar seus conhecimentos construídos.

Tabela 1. Avaliação de 14 perguntas abertas por análises semi- qualitativas: (a) nuvens das palavras (b) frequência de palavras que foram respondidas (n= 39).

1. O que é monocultura?

Total = 695 Palavras / No. Palavras na Nuvem = 163 / Mais citadas=10

(a)

(b)

2. Aponte um fator positivo relacionado à prática da Monocultura

(a) $\text{Total} = 445 \text{ Palavras} / \text{N}^{\circ} \text{ Palavras na Nuvem} = 110 / \text{Mais citadas} = 12$

(b)

3. Aponte um fator negativo relacionado à prática da Monocultura

Total = 358 Palavras / N° Palavras na Nuvem = 62 / Mais citadas=11

(b)

4. O que é Agroecologia?

Total = 1075 Palavras / N° Palavras na Nuvem = 141 / Mais citadas = 10
(a)

(b)

5. Aponte um fator positivo relacionado à prática da Agroecologia

Total = 635 Palavras / N° Palavras na Nuvem = 69 / Mais citadas = 11
(a)

(b)

6. Aponte um fator negativo relacionado à prática da Agroecologia

Total = 449 Palavras /Nº Palavras na Nuvem = 85 /Mais citadas= 11

(a)

(b)

7. O que Agricultura Sintrópica?

Total = 1057 Palavras / N^o Palavras na Nuvem = 165 / Mais citadas = 12
(a)

(b)

8. Aponte um fator positivo relacionado à prática da Agricultura Sintrópica

Total = 691 Palavras /Nº Palavras na Nuvem = 91 /Mais citadas= 10

(a)

(b)

9. Aponte um fator negativo relacionado à prática da Agricultura Sintrópica

Total = 287 Palavras /Nº Palavras na Nuvem = 52 /Mais citadas= 14

(a)

(b)

10. Como o Brasil tem se comportado nos últimos cinco anos em relação à produção de soja, considerando os outros países?

Total = 999 Palavras / N^o Palavras na Nuvem = 32 / Mais citadas = 12
(a)

(b)

11. Aponte um fator positivo para a produção de soja no Brasil

Total = 530 Palavras /No. Palavras na Nuvem = 75 /Mais citadas= 5

(a)

(b)

12. Aponte um fator negativo para a produção de soja no Brasil

Total = 425 Palavras /Nº Palavras na Nuvem = 67 /Mais citadas= 7B

(a)

(b)

13. Comente: O Crédito Rural foi o instrumento adotado pelo governo militar, entre 1965 e 1979, para incentivar o desenvolvimento agropecuário, sendo responsável pela utilização intensiva de fertilizantes, mecanização e abertura de novas frentes no mercado internacional.

(a) $\text{Total} = 1628 \text{ Palavras} / \text{N}^{\circ} \text{ Palavras na Nuvem} = 155 / \text{Mais citadas} = 9$

(b)

14. Comente: O Brasil do Segundo Reinado é objeto de relatos de viajantes britânicos e norte-americanos, produzidos no contexto

imperialista do século XIX. Na busca por mercados produtores e consumidores, a vocação agrícola brasileira é abordada pelos viajantes, articulada à influência britânica mantida no Brasil e à crescente confiança dos Estados Unidos em ampliar as relações com o Império brasileiro, no jogo de interesses geopolíticos e econômicos em que o país atuava como fornecedor de produtos agrícolas e matérias-primas. Parte de seu aparato produtivo e infraestrutura voltavam-se ao atendimento da procura desses gêneros nos países de origem dos viajantes.

Total = 1468 Palavras /No. Palavras na Nuvem = 160 /Mais citadas= 8
(a)

(b)

Através das 14 perguntas fechadas (Tabela 2) foi possível verificar, para a grande maioria delas (n=12), que à exceção das perguntas 3 e 9, os alunos, positivamente, construíram conhecimentos esperados apontando sobre as perguntas:

- 1 - A variabilidades nas características climáticas do nordeste brasileiro (72%);
- 2 - Características empobrecidas do solo amazônico (79%);
- 4 - Riqueza nutricional dos solos do Centro-Oeste brasileiro (79%);
- 5 - Riqueza nutricional dos solos do estado de São Paulo (81%);
- 6 - O Brasil é o maior exportador de soja (92%);

- **7** - O Brasil não é o celeiro do mundo, pois não é o maior produtor do mundo (82%);
- **8** - Somente 51% concordaram em que não é necessário mais desmatamento ou expansão em áreas florestais no Brasil.
- **10** - “Brasil, o celeiro do mundo” foi um jargão criado pelo Estado (1937-1945), quando entramos no mercado internacional (87%).

A pergunta 3 (Tabela 1) questionou sobre as possíveis semelhanças entre a colonização alemã no Rio Grande do Sul e a italiana, em São Paulo, no uso da terra. Somente 50% dos alunos discordaram, pois entenderam que os italianos, diferentemente dos alemães, foram praticamente escravizados.

Tabela 2. Análise das dez[r2] perguntas fechadas sobre as atividades agrícolas no Brasil que foram respondidas (n= 39)

1 - No Nordeste do Brasil existem pelo menos quatro diferenças, em termos climáticos, que definem as práticas agrícolas e o desenvolvimento econômico.

Resposta Esperada: **SIM**

2 - O solo da região amazônica é riquíssimo e poderia se cultivar qualquer planta comestível.

Resposta Esperada: **NÃO**

2 - A colonização alemã no Rio Grande do Sul e a italiana em São Paulo apresentam semelhanças no uso das terras.

Resposta Esperada: **NÃO**

2 - O Centro-Oeste brasileiro apresenta riqueza nutricional dos solos que favorecem a pecuária.

Resposta Esperada: **SIM**

5 - As atividades vulcânicas que ocorreram há de 80 milhões só favoreceram o território do Estado de SP

Resposta Esperado: **NÃO**

3 - Atualmente, o Brasil é o maior exportador de soja do mundo, trazendo imensas vantagens para seu povo.

Resposta Esperada: **SIM**

7 - O Brasil é considerado o celeiro do mundo por ser o maior produtor, principalmente porque tem muitos recursos hídricos.

Resposta Esperada: **NÃO**

8 - No Brasil, já existem 79 milhões de hectares de áreas que plantadas. Portanto, não é necessário que se faça mais desmatamento ou expansão em áreas florestais para que o crescimento da produção.

Resposta Esperada: **SIM**

9 - Ao longo dos anos mais autoritários do governo de Getúlio Vargas (o Estado Novo - 1937/1945), a ditadura ganhou apoios que se justificaram pelo acelerado crescimento econômico do Brasil e sua entrada no mercado internacional que contou, principalmente, com a produção de trigo, soja e milho, em grande escala, justificando a célebre expressão nacional - "Brasil, o celeiro do mundo"

Resposta Esperada: **SIM**

Os alunos também consideram como questões mais difíceis as de número 15 e 14 (Tabela 1) e 9 (Tabela 2):

- 71,8% - (15) Comente: O Brasil do Segundo Reinado é objeto de relatos de viajantes britânicos e norte-americanos, produzidos no contexto imperialista do século XIX. Na busca por mercados

produtores e consumidores, a vocação agrícola brasileira é abordada pelos viajantes, articulada à influência britânica mantida no Brasil e à crescente confiança dos Estados Unidos em ampliar as relações com o Império brasileiro, no jogo de interesses geopolíticos e econômicos em que o país atuava como fornecedor de produtos agrícolas e matérias-primas. Parte de seu aparato produtivo e infraestrutura voltavam-se ao atendimento da procura desses gêneros nos países de origem dos viajantes.

- 64,1% - (14) Comente: O Crédito Rural foi o instrumento adotado pelo governo militar, entre 1965 e 1979, para incentivar o desenvolvimento agropecuário, sendo responsável pela utilização intensiva de fertilizantes, mecanização e abertura de novas frentes no mercado internacional.
- 59,0% - (9) Ao longo dos anos mais autoritários do governo de Getúlio Vargas (o Estado Novo – 1937/1945), a ditadura ganhou apoios que se justificaram pelo acelerado crescimento econômico do Brasil e sua entrada no mercado internacional que contou, principalmente, com a produção de trigo, soja e milho em grande escala, justificando a célebre expressão nacional - “Brasil, o celeiro do mundo”

Por outro lado, as questões que os alunos consideram como as mais fáceis foram aquelas numeradas de 1 a 5 (Tabela 1):

- 89,7% - (1) “O que é Monocultura?”
- 71,8% - (2) “Aponte um fator positivo relacionado à prática da Monocultura”
- 71,8% - (3) “Aponte um fator negativo relacionado à prática da Monocultura”
- 64,1% - (4) “O que é Agroecologia?”
- 61,5% - (5) “Aponte um fator positivo relacionado à prática da Agroecologia”

Para as questões avaliativas do questionário, os 39 alunos atribuíram:

- 1) Cinco notas diferentes para avaliar a própria participação no questionário (**10**: 48,7%; **9**: 15,4%; **8**: 15,6%; **7**: 12,9%; **6**: 7,7%);
- 2) Três notas diferentes para qualidade do questionário (**10**: 66,7%; **9**: 28,2%; **8**: 5,1%).

Quanto às fontes de pesquisas que utilizaram como apoio para responder o questionário: internet (83%), professora (21%), vídeos que a professora transmitiu *online* (20%), livros do ensino médio (5%), revistas da área de agricultura (4%), entre outros.

Os alunos que participaram desta atividade construíram, positivamente, conhecimentos sobre a temática abordada. Através de intervenções orais e notações via *chat*, durante as aulas e depois de tomarem ciência dos acertos em relação às respostas esperadas do questionário, a turma, como um todo, demonstrou satisfação com as estratégias adotadas e elogiou as informações veiculadas através dos vídeos selecionados e materiais disponibilizados via *Google Class*. Desse modo, a professora considerou que as duas aulas atingiram os seus propósitos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Associada às práticas médicas, à evolução do domínio de selecionar e cultivar as plantas permitiu ao homem o estabelecimento em cidades, viver mais e prover mais conforto aos seus e aos animais de criação domesticados, deixando de lado as práticas nômades de caçadores-coletores. Em tempos atuais, ainda existem grupos nômades, porém, representam minoria.

Desse modo, gradativamente, o nomadismo passou a ser abandonado. Por volta de 10 mil anos atrás, quando o homem desenvolveu e dominou as técnicas de plantio e seus conhecimentos se expandiram, ele passou a estabelecer trocas e, posteriormente, venda dos produtos agrícolas, pecuários, envolvendo, inclusive a criação de outras espécies, como peixes e rãs, entre outros.

Essas considerações, aliadas ao debate das repostas esperadas sobre velhas e novas tecnologias de cultivo, monitoramento ou e coleta de produtos agriculturáveis, propiciaram a construção do conhecimento dos alunos sobre a agricultura.

REFERÊNCIAS

AGRO 5.0: o que esperar do futuro da tecnologia no campo. Disponível em:

<https://networdagro.com.br/blog/agro-5-0/> Acesso em: 29 out. 2021.

AGROINSIGHT. Você sabe o que é agricultura sintrópica? 2021. Disponível em:

<https://agroinsight.com.br/voce-sabe-o-que-e-agricultura-sintropica/>

AGRO 4.0. Rumo à agricultura digital. Disponível em:

<https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/166203/1/PL-Agro4.0-JC-na-Escola.pdf>
Acesso em: 30 out. 2021.

ANAIS XXX CONEEAGRI 2017 - CONGRESSO NACIONAL DE ENGENHARIA AGRÍCOLA E ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL: Tecnologias e Inovações no Campo Moderno da Agricultura. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Jose-Vieira-Neto-2/publication/332179711_SISTEMA_PARA_LOGISTICA_DE_PRODUTOS_AGRICOLAS_ATRAVES_DE_QRCODES/links/5ca4b9ec458515f78520d86d/SISTEMA-PARA-LOGISTICA-DE-PRODUTOS-AGRICOLAS-ATRAVES-DE-QRCODES.pdf Acesso em: 30 out. 2021.

BASTOS, Teresa Raquel. 15 funções de drones na agricultura e pecuária. Globo Rural. 2016. <https://ruralpecuaria.com.br/tecnologia-e-manejo/novas-tecnologias/15-funcoes-de-drones-na-agricultura-e-pecuaria.html>

BRASIL. Portarias de 20 de setembro de 2012. 2012. O Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no uso da atribuição que confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, tendo em vista o que consta do Processo nº 21000.005375/2012-88, resolve: Criar a Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão – CBAP. Disponível em:

<https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=2&pagina=6&data=21/09/2012>
Acesso em: 30 out. 2021.

BUCK, Guilherme. Agricultura digital, agricultura 4.0 e agricultura de precisão o que é? ClimateView. 2020. Disponível em: <https://blog.climatefieldview.com.br/agricultura-de-precisao-e-agricultura-digital-4-0-e-a-mesma-coisa>

CONECTARAGRO. Como a Agricultura Digital está mudando o Agronegócio. Disponível em: <https://blog.conectaragro.com.br/agricultura-digitalxagricultura-precisao/> Acesso em: 30 out. 2021.

CONBAP 2016 Anais. Disponível em: https://asbraap.org/files/arquivo/arquivo_cmXlLtQe.pdf Acesso em: 30 out. 2021.

CONBAP 2018 Anais. Disponível em: https://asbraap.org/files/arquivo/arquivo_Zjvd9IEh.pdf Acesso em: 30 out. 2021.

DIÁRIO AGRÍCOLA. Agricultura 5.0 já realidade para muitos produtores rurais. Cooperativas, Notícias, Tecnologia. 2021. <https://www.agroplanning.com.br/2021/01/04/agricultura-5-0-ja-realidade-para-muitos-produtores-rurais/>

EQUIPE FIELDVIEW. Maiores produtores agrícolas do mundo e o que eles ensinam sobre agricultura digital. 2021. <https://blog.climatefieldview.com.br/maiores-produtores-agricolas-mundo>

INSUMO AGRÍCOLA. Agricultura 5.0: o momento é agora! 2021. Disponível em:

https://www.insumoagricola.com.br/blog/Agricultura_5.0:_o_momento_%C3%A9_agora! Acesso em: 30 out. 2021.

LEGNAIOLI, Stella. O que é agroecologia? e-Cycle. s/d. Disponível em:

<https://www.ecycle.com.br/agroecologia/>

LIMA, Neuza Rejane Wille. Coconstrução de conhecimento sobre novas práticas agrícolas nas aulas de biologia para engenharia agrícola e ambiental, no modo remoto em tempo real. In: Ciências Biológicas: as diversas manifestações da vida – volume IV. Editora Conhecimento Livre. Piracanjuba, GO. 2021 (in press).

MAZOYER, Marcel, ROUDART, Laurence. História das agriculturas no mundo: do neolítico à crise contemporânea. Tradução de Cláudia F. Falluh Balduino Ferreira. São Paulo: Editora UNESP; Brasília, DF: NEAD, 2010. %2021.

PARKER, Edward Agrofloresta. WWF-Brasil. s/d. Disponível em:

https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/reducao_de_impactos2/agricultura/agr_acoes_resulta_dos/tecnicas_que_unem_agricultura_e_conservacao/

SOARES FILHO, Romeu, DA CUNHA, João P. A. R. Agricultura de precisão: particularidades de sua adoção no sudoeste de Goiás – Brasil. Journal of the Brazilian Association of Agricultural Engineering, v.35, n. 4, p. 689-698, 2015. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/eagri/a/PSDTZRmBFrCdxTsJFwSVbZm/?lang=pt&format=pdf> Acesso em: 29 out. 2021

Capítulo 4

10.37423/211205156

FERRAMENTAS DA QUALIDADE APLICADAS NO PROCESSO DE COLHEITA MECANIZADA DE SOJA

Felipe Carnacini

Faculdades Integradas de Bauru

Murilo Aparecido Voltarell

Universidade Federal de São Carlos

Resumo: O agronegócio brasileiro é um pilar da economia. Possíveis perdas durante o processo produtivo podem ser diminuídas e sanadas, com a identificação das possíveis causas raízes. Algumas ferramentas de qualidade nos auxiliam como *Brainstorming*, PDCA (*to Plan, to Do, to Check, to Act*), 5W2H, Diagrama de Ishikawa, Diagrama de Pareto, GUT (Gravidade, Urgência e Tendência) e Programa 8S. Por meio do Manual de Boas Práticas Agrícolas foi possível identificar deficiências no parâmetro de qualidade. Houve a identificação de três possíveis causas de diminuição da perda de produtividade na lavoura de soja. Foi utilizado o GUT para priorizar o fator mais crítico e desta forma criar um plano de ação. Era necessário um plano de manutenção (manutenção preventiva) para suas máquinas e, se possível for realizar o próprio tratamento de suas sementes, para diminuir os custos por conta das variações do preço da semente e irrigação artificial.

Palavras-chave: Padronização, Ferramentas de qualidade, Desperdício.

INTRODUÇÃO:

O agronegócio é um dos pilares da economia brasileira. Em 2020, a participação no PIB subiu 4,62% (entre janeiro e maio). A soja elevou em 19% quando comparado de janeiro a maio de 2020 em relação a janeiro a maio de 2019, havendo uma projeção de elevar 25% no faturamento desse setor (PIB DO AGRONEGOCIO, 2020). As perdas que ocorrem durante a colheita mecanizada da soja implicam grandes prejuízos, que ultrapassam 2,4 bilhões (Menezes, 2018). Isso gera impacto negativo na receita dos empresários e famílias agrícolas. Assim Mesquita *et al.* (2001) afirma que as perdas podem ser evitadas parcialmente, gerando diminuição dos custos de produção e aumento no lucro. Com a aplicação do ciclo PDCA, para identificação do problema, observação, análise, montagem de um plano de ação, executando-o, e assim fazendo sua verificação é possível padronizar o sistema. Inicialmente para expor ideias, é utilizado o *Brainstorming*. 5W2H é aplicado para identificar e rastrear os dados. Com o Diagrama de Ishikawa é possível analisar e listar os principais problemas, tomando as decisões de caráter eliminatório. O diagrama de Pareto demonstra em porcentagens o impacto de cada causa. A Matriz G.U.T é aplicada para priorizar os problemas. Para a padronização do sistema é inserido a metodologia 8S. A falta de padronização e qualidade nos processos agrícolas implica em grandes quantidades de desperdício de alimentos, gerando aumento do custo da produção e consequentemente é repassado ao consumidor, causando aumentos dos preços, retrabalho e uma série de fatores que afetam o crescimento da indústria (Mesquita *et al.*, 2001). Neste contexto, objetivou-se neste trabalho utilizar ferramentas da qualidade para levantar informações sobre o processo de colheita mecanizada de soja, a fim de melhorar a gestão agrícola.

MATERIAL E MÉTODOS:

Foi utilizado o Método de Análise de Solução de Problemas (MASP) gerando os resultados necessários, sobre as informações provenientes da colheita mecanizada de soja. O estudo foi feito em área agrícola do município de Jacuba-SP. Foi utilizado um questionário montado a partir do Manual de Boas Práticas Agrícolas (MBPA) e Sistema APPCC (Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle) (EMBRAPA, 2004) juntamente com o ciclo PDCA. Desta forma foi possível o mapeamento de como o produtor conduz seu processo de colheita. Por meio dos dados levantados elencou-se possíveis sugestões de melhorias por meio das ferramentas de gestão de qualidade. O MBPA foi aplicado como norteador, identificando as possíveis deficiências do processo. O *Checklist* é uma ferramenta dedicada a observações para detalharmos corretamente cada item observado. Após a aplicação do questionário, com os dados levantados, mostrou-se as possíveis deficiências do processo de colheita de soja. Assim aplicou-se o

GUT (Gravidade, Urgência e Tendência), classificando os fatores (com notas entre 1 a 5) que mais impactam na produtividade, gerando entendimento das atividades prioritárias (Cesar, 2013). A escala da Matriz varia de 0 a 25, por meio da soma das notas atribuídas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Observou-se que a primeira causa raiz foi o meio ambiente, pois o clima tem grande impacto nos resultados visto que o produtor não possui sistemas de irrigação. O impacto causado disto é a perda de qualidade se houver temperaturas diferentes de 20 a 30 °C e variação diferentes de 450 a 800mm de chuva por ciclo produtivo.

A segunda causa raiz foram as máquinas, visto que o produtor não apresentava manutenção preventiva, gerando paradas não programadas e assim maiores custos. O plano de manutenção preventiva evita esse fator. A Terceira causa foi a matéria-prima, pois o produtor sofre com a alta variação de preço dos fornecedores, onde ele reconhece que poderia realizar o próprio processo de tratamento das suas sementes no pré-plantio. Com esse tratamento diminuiria consideravelmente o valor investido.

Utilizando a metodologia PDCA, foi criado o seguinte plano de ação para o processo:

- To *Plan*: Com a fusão do *Brainstorming* e MBPA como parâmetro de qualidade, e a metodologia 5W2H (adaptada para 5W1H) foi criada uma tabela para registros e avaliação de melhorias, e também para encontrar as possíveis causas-raízes.
- To *Do*: utilizando o Diagrama de Ishikawa, foi definido as três possíveis causas raízes.

Figura 1. Estrutura do Diagrama de Ishikawa

- *To Check*: Utilizando a Matriz G.U.T checou-se e classificou-se os fatores que mais impactam na produtividade, para assim poder priorizá-los.

TABELA 1. Matriz G.U.T para o Meio Ambiente

PROBLEMAS	NOTAS
Chuva Excessiva	5
Falta de chuva	5
Excesso de umidade	4
Alta temperatura	5
TOTAL	19

TABELA 2. Matriz G.U.T para Máquinas

PROBLEMAS	NOTAS
Máquina descalibrada	5
Falta de lubrificação	4
Reservatório da semeadora entupido	5
Disco da semeadora amassado	4
TOTAL	18

TABELA 3. Matriz G.U.T para Materiais

PROBLEMAS	NOTAS
Soja Contaminada	4
Soja Ardida	3
Alto Preço	3
Baixa Pureza	4
TOTAL	14

- *To Act*: A partir do 5W2H foi montado o plano de ação, referente as principais causas raízes (Meio Ambiente e Máquinas).

CONCLUSÕES:

A sequência de atuação por meio da Matriz G.U.T: Meio Ambiente 19,0 > Máquina 18,0 > Materiais 14,0. Nota-se ainda a importância da demonstração da influência do clima como sendo um dos maiores problemas que o pequeno produtor é impactado; com isso levando a reflexão sobre investir no sistema de irrigação. Em relação as máquinas, manutenções preventivas (ação planejada e feita periodicamente) podem oferecer boas respostas ao controle de custos, em relação a manutenção corretiva. Em relação aos materiais, o produtor investindo no tratamento e armazenamento das sementes, não seria impactado pela variação dos preços.

REFERÊNCIAS:

CESAR, F.I.G. Ferramentas Gerenciais da Qualidade. 1º. ed. São Paulo: Biblioteca24horas, Seven System International Ltda., 2013.

EMBRAPA. Manual de Boas Práticas Agrícolas e Sistema APPCC Brasília: EMBRAPA/SEDE, 2004. 101 p. (Qualidade e Segurança dos Alimentos). Projeto PAS campo. Convênio CNI/SENAI/SEBRAE/EMBRAPA

MENEZES, PC. Aplicação de Ferramentas da Qualidade na Colheita Mecanizada de Soja. 2018. Tese (Doutor em Agronomia) – Universidade Estadual Paulista, Jaboticabal.

MESQUITA CM, COSTA NP, PEREIRA JE, MAURINA AC & ANDRADE JG. Perfil da colheita mecânica da soja no Brasil: Perdas e qualidades físicas do grão relacionadas à características operacionais. 2001. In: 30º Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola, Foz do Iguaçu. Anais, Jaboticabal: Sociedade Brasileira de Engenharia Agrícola. Acesso em 19.ago.2020.

PIB DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO: O Cepea calcula o PIB do Agronegócio com apoio financeiro da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). 2020. Disponível em:<http://https://www.cepea.esalq.usp.br/br/pib-do-agronegocio-brasileiro.aspx>. Acesso em: 28 ago. 2020.

Capítulo 5

10.37423/211205159

ALTERAÇÕES EM SOLO FERTIRRIGADO COM EFLUENTE DE BOVINOCULTURA

Cíntia Cármem de Faria Melo

*Universidade Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho*

Danilo Silva Amaral

*Universidade Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho*

Luis César Dias Drumond

*Universidade Federal de Viçosa Campus Rio
Paranaíba*

Alberto Carvalho Filho

*Universidade Federal de Viçosa Campus Rio
Paranaíba*

Resumo: Com vista à crescente escassez de água e a busca por fontes alternativas para adubação de cultivos, a fertirrigação com efluentes apresenta grande potencial. O presente estudo teve como objetivo avaliar as alterações ocasionadas pela aplicação de efluentes de bovinocultura em um Latossolo, cultivado com a forrageira *Cynodon dactylon* cv. Vaquero, com três formas de adubação: T1) Via adubos comerciais; T2) Via efluente de bovinocultura T3) Mescla de adubos comerciais e efluente, distribuídos ao acaso nas parcelas (lisímetros de drenagem), com três repetições. Foram avaliados os teores de argila dispersa em água (ADA), P, K, Ca, Mg, Na, CTC, matéria orgânica do solo (MOS), e as concentrações de NO_3^- e fósforo na solução do solo. Foi realizada a análise de variância *on ranks* dos dados, e as médias comparadas pelo teste SNK a 5% de probabilidade. A ADA, o teor de Mg no solo, e o teor de NO_3^- da solução do solo foram significativamente maiores nos tratamentos com aplicação de efluente, com média de 3,9 e 4,7 g dm^{-3} para ADA, 0,22 e 0,39 mg L^{-1} de NO_3^- para T2 e T3, respectivamente. A fertirrigação com efluente de bovinocultura aumentou o teor de Mg e a dispersão de argila do solo, mas não apresentou risco de contaminação do solo ou águas freáticas.

Palavras-chave: biofertilizante, fertirrigação, lixiviação de nitrato.

INTRODUÇÃO:

O reuso de efluentes é uma prática que contribui com a gestão sustentável dos recursos hídricos. As captações de água para irrigação foram identificadas como a principal causa de redução dos níveis das águas subterrâneas em todo o mundo (Burek et al, 2016), evidenciando a importância de sua reutilização dentro dos sistemas de produção. A disposição de águas residuárias no sistema solo-planta pode trazer benefícios, como aporte de nutrientes e água para as plantas, redução do uso de fertilizantes e de seu potencial poluidor, baseado na capacidade depuradora do sistema através de reações químicas e processos microbiológicos (Erthal et al., 2010). A aplicação de efluentes pode inclusive incorporar quantidades significativas de matéria orgânica ao solo (Matos e Matos, 2017). Porém, deve-se empregar critérios técnicos para realizar sua disposição de forma que não cause problemas de contaminação do solo ou da água subterrânea, preconizando a preservação desses recursos. Nesse contexto, se evidencia a importância de estudar as formas e doses mais adequadas para aplicação de efluentes em solo, verificando o potencial de reuso dessas águas. Assim, objetivou-se avaliar as alterações em atributos químicos e a dispersão de argila de um Latossolo sob aplicação de efluente de bovinocultura, bem como a lixiviação de nitrato e fósforo como indicadores de risco ambiental.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi conduzido um experimento na área experimental da Universidade Federal de Viçosa, Campus Rio Paranaíba, MG, de maio a novembro de 2018, sob altitude de 1100 m. Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado, com três tratamentos e três repetições, sendo utilizado lisímetros de drenagem como unidades experimentais, cultivados com a forrageira *Cynodon dactylon* cv. Vaquero. Os tratamentos foram três formas de adubação: T1) Via adubos comerciais; T2) Via efluente de bovinocultura, e T3) Mescla de adubos comerciais e efluente na proporção 1:1. O efluente apresentava 169, 10, 580, 97, 90, 12 e 62 mg L⁻¹ de N, P, K, Ca, Mg, S e Na, respectivamente, pH 7, CE 0,38 mS m⁻¹ e RAS de 11. As doses de nutrientes foram calculadas pelo método do balanço de massa, visando a produção de forragem para 3 unidades animal por hectare (UA ha⁻¹) em T1 e T2, e 6 UA ha⁻¹ em T3, considerando a demanda de 20 kg de N, 2 kg de P e 25 kg de K por tonelada de MS (Werner et al., 1996). Em T2 e T3 a demanda de P da forrageira foi suprida através do efluente, para simular um possível risco de lixiviação de formas orgânicas de P, desta forma o N e o K foram aplicados sabidamente em excesso. As quantidades aplicadas de N, P e K foram as seguintes: 963 kg de N, 57 kg de P e 3.295 kg de K por ha⁻¹ ano⁻¹, e no tratamento 3, aplicou-se 1.926 kg de N, 114 kg de P e 6.590

kg de K por ha-1 ano-1. Os adubos comerciais utilizados foram ureia, superfosfato simples e cloreto de potássio. Trabalhou-se com um turno de rega de três dias, repondo 120% da evapotranspiração, que foi monitorada através de estação meteorológica. As irrigações e aplicações de efluente foram realizadas manualmente com auxílio de regador. O lixiviado foi coletado semanalmente para avaliação de NO₃- e P. Ao final dos seis meses de aplicação, foi feita a amostragem do solo nas profundidades de 0-10 e 10-30 cm. Foram determinados os teores de P, K, Ca, Mg, Na, carbono orgânico do solo e ADA (Donagema et al., 2011; Silva, 2009), bem como a concentração de NO₃- e P na solução lixiviada do solo (Donagema et al., 2011). Calculou-se a capacidade de troca catiônica (CTC) e a matéria orgânica do solo (MOS). Os dados foram submetidos à análise de variância on ranks, e as medias comparadas pelo teste Student Newman-Keuls a 5% de probabilidade. Quando uma transformação 'rank' é utilizada para satisfazer os pressupostos ou em casos de experimentos com poucas unidades experimentais, a ANOVA por postos e os testes posteriores podem ser considerados não paramétricos (Conover e Iman, 1981). Para realização dos testes foi utilizado o software SPEED Stat (Carvalho et al., 2020).

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Para a maioria das variáveis analisadas não foi verificada diferenças significativas, exceto para ADA de 0-10 cm, teor de Mg do solo de 10 a 30 cm, e concentração de NO₃- da solução do solo, como descrito na Tabela 1.

TABELA 1. Resumo da análise de variância (valor F) e teste de médias para os parâmetros: potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg), sódio (Na), capacidade de troca de cátions total (T), fósforo (P), enxofre (S), argila dispersa em água (ADA), matéria orgânica do solo (MOS) do solo, nitrato (NO₃-) e P no lixiviado; médias da razão de adsorção de sódio (RAS) e porcentagem de sódio trocável (PST) no solo

Profundidade (cm)	Solo								Lixiviado		
	K	Ca	Mg	Na	T	P	S	ADA	MOS	P	NO ₃ ⁻
	-----cmol _c dm ⁻³ -----				mg dm ⁻³		g dm ⁻³		-----mg L ⁻¹ -----		
0 - 10	1,03 ^{Ns}	1,78 ^{Ns}	0,17 ^{Ns}	1,11 ^{Ns}	0,8 ^{Ns}	2,74 ^{Ns}	0,36 ^{Ns}	4,14*	1,32 ^{Ns}	4,11 ^{Ns}	10,1**
	54	49	61	56	56	45	58	32	55	41	27
10-30	0,1 ^{Ns}	0,14 ^{Ns}	6,94*	1,41 ^{Ns}	0,46 ^{Ns}	4,11 ^{Ns}	0,03 ^{Ns}	0,51 ^{Ns}	0,67 ^{Ns}		
	62	61	34	54	58	41	62	58	58		
Média geral	0,5	3,7	1,3	0,06	8,5	24,5	40,7	4,0	25	0,3	0,2
Tratamentos	ADA		Mg		NO ₃ ⁻		RAS		PST		
	g kg ⁻¹		cmol _c dm ⁻³		mg L ⁻¹				%		
Adubação convencional	2,77	b	0,67	b	0,07	b		0,08	0,43		
Adubação via efluente	3,92	a	1,0	a	0,22	a		0,22	1,29		
Adubação conv. + efluente	4,72	a	1,0	a	0,39	a		0,11	0,61		

Médias seguidas por letras iguais na coluna não diferem entre si pelo teste SNK 5% probabilidade. ^{Ns}: não significativo (P>0,05); * : significativo (P<0,05); ** : significativo (P<0,01); C.V.: coeficiente de variação.

ADA, teor de Mg no solo e NO_3^- no lixiviado foram maiores em T2 e T3, sob aplicação do efluente. A ADA em superfície chegou a $4,72 \text{ g dm}^{-3}$, corroborando com Erthal et al. (2010) que encontraram maior dispersão de argila na camada de 0 a 10 cm, em Argissolo sob aplicação de efluente de bovinocultura. O teor de Mg foi maior de 10 a 30 cm, similar aos resultados de Cabral et al. (2011), que obtiveram aumento do Mg na camada de 0-20 cm, com a aplicação de ARS. Erthal et al., (2010) também observaram maiores concentrações de Mg nos tratamentos que receberam água residuária, com valores acima de $0,90 \text{ cmolc dm}^{-3}$, próximo do encontrado no presente trabalho, que foi de $1,0 \text{ cmolc dm}^{-3}$. O fato de não haver diferenças entre os tratamentos para os demais atributos do solo, pode estar relacionado ao tempo de avaliação, já que o fator tempo pode ter maior magnitude que as doses sobre o comportamento das variáveis (Erthal et al., 2010; Condé et al., 2012). A concentração de NO_3^- no lixiviado em T2 e T3, nos quais houve aplicação de 963 e $1926 \text{ kg ha}^{-1} \text{ ano}^{-1}$ de N, foi de $0,22$ e $0,39 \text{ mg L}^{-1}$, respectivamente, muito abaixo do limite crítico para a saúde humana, que é de 10 mg L^{-1} (Ministério da Saúde, 2011), evidenciando o baixo risco de contaminação de águas freáticas. Essa lixiviação pode ter aumentado devido às doses de N aplicadas e não pela natureza química ou orgânica do fertilizante, como explicado por Fernandes et al. (2017). O nitrato é bastante móvel no solo, por sua baixa carga residual, sendo rapidamente lixiviado com a água da chuva ou altas lâminas de irrigação (Capoane et al., 2017), por isso, deve-se preconizar a aplicação de N em taxas que correspondam à absorção pelas culturas, independente da fonte utilizada. A concentração de fósforo não sofreu influência dos tratamentos, e ressalta-se que a maior concentração encontrada de P foi no T3, com $0,6 \text{ mg L}^{-1}$ de P no lixiviado, inferior ao encontrado por Maggi et al. (2011), que relatam $1,2 \text{ mg L}^{-1}$ de P no lixiviado de um Latossolo sob aplicação de efluente de suinocultura.

CONCLUSÃO

A fertirrigação com efluente de bovinocultura aumentou o teor de Mg do solo e a dispersão de argila em superfície, sem apresentar risco de contaminação de águas por nitrato ou fósforo orgânico.

REFERÊNCIAS

- Burek P.; Satoh Y.; Fischer G.; Kahil T.; Nava Jimenez L.; Scherzer A.; Tramberend S.; Wada Y.; Eisner S.; Flörke M.; Hanasaki N.; Magnusziewski P.; Cosgrove W.; Wiberg D. Water futures and solution fast track initiative. International Institute for Applied Systems Analysis, Copyright, Laxenburg, Austria, 2016. 115p.
- Cabral, J.R.; Freitas, P.S.L.; Rezende, R.; Muniz A.S.; Bertonha A. Impacto da água residuária de suinocultura no solo e na produção de capim-elefante. *Revista Brasileira Engenharia Agrícola e Ambiental*, v.15, n.8, p.823–831, 2011.
- Capoane, V.; Tales T.; Zafar M; Santos D.R. Impacto da atividade de suinocultura intensiva na qualidade da água de uma bacia hidrográfica do Médio Alto Uruguai. Editora URI, Cap. 9, p. 162-182, 2017.
- Carvalho, A. M. X. D.; Mendes, F. Q.; Mendes, F. Q.; Tavares, L. D. F. SPEED Stat: A free, intuitive, and minimalist spreadsheet program for statistical analyses of experiments. *Crop Breeding and Applied Biotechnology*, v. 20, n.3, 2020.
- Conover Wj, Iman RL. Rank Transformations as a bridge between parametric and nonparametric statistics. *The American Statistician*, v. 35, n. 3, p. 124-134, 1981.
- Condé M.S.; Almeida Neto O.F.; Homem B.G.C.; Ferreira I.G.; Silva M.D. Impacto da fertirrigação com água residuária da suinocultura em um Latossolo vermelho-amarelo. *Revista Vértices*, v.15, n. 2, p. 161-178, 2013.
- Donagema, G.K.; Campos, D.V.B.; Calderano, S.B.; Texeira, W.G.; Viana, J.H.M. Manual de Métodos de Análise de Solos. 3 ed. Embrapa Solos. Rio de Janeiro, 230 p., 2011.
- Erthal, V. J.; Ferreira, P. A.; Matos, A. T.; Pereira, O. G. Alterações físicas e químicas de um Argissolo pela aplicação de água residuária de bovinocultura. *Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental*, v.14, n.5, p.467–477, 2010.
- Maggi C.F.; Freitas P.S.L.; Sampaio S.C.; Dieter J. Lixiviação de nutrientes em solo cultivado com aplicação de água residuária de suinocultura. *Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental*, v.15, n.2, p. 170-177, 2011.
- Matos, A.T.; Matos, M.P. Disposição de águas residuárias no solo e em sistemas alagados construídos. Viçosa, MG: Editora UFV, 2017. 371p.
- Ministério da Saúde. Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011. Disponível em: <http://site.sabesp.com.br/site/uploads/file/asabesp_doctos/PortariaMS291412122011.pdf> Acesso em: 17 junho, 2021.
- Silva, F.C. Manual de Análises Químicas de Solos, Plantas e Fertilizantes. 2 ed. Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, 627p., 2009.
- Werner, J.C.; Paulino, V.T.; Cantarella, H.; Andrade, N.O.; Quaggio, J.A. Forrageiras. In: Van Raij, B.; Cantarella, H.; Quaggio, J.A.; Furlani, A.M.C. Recomendações de adubação e calagem para o Estado de São Paulo. 2 ed. Campinas: IAC, Boletim técnico 100, 1996. 285 p.

Capítulo 6

10.37423/220105194

AVALIAÇÃO DO EFEITO DE DOSES DE FÓSFORO E POTÁSSIO NO CULTIVO DE COENTRO EM LATOSSOLO AMARELO DISTRÓFICO

MATHEUS MIRANDA CANIATO

IFAM/ CMZL

RODRIGO RENER COSTA LEITÃO

IFAM/CMZL

MARCOS VINICIUS TRINDADE FILHO

IFAM/CMZL

JOÃO SOARES DE ARAÚJO

IFAM/CMZL

FRANCISCO PEREIRA DE BRITO JÚNIOR

IFAM/CMZL

Resumo: Sabe-se que a adubação é uma das principais tecnologias usadas para aumentar a produtividade e a rentabilidade das culturas e as plantas necessitam de diversos nutrientes para o crescimento adequado, dentre eles o fósforo e o potássio. Assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito de diferentes doses de fósforo (P) e potássio (K) no cultivo de coentro em latossolo amarelo. Quanto ao fósforo o modelo que melhor se ajustou foi o linear, indicando resposta positiva à adubação fosfatada até a maior dose avaliada (200 kg ha^{-1}). Para o potássio a análise de regressão foi não significativa. Em relação ao fósforo novos estudos devem ser realizados de forma a se observar a resposta do coentro à utilização de doses mais elevadas nas condições edafoclimáticas avaliadas. Já para o potássio pode-se recomendar que a aplicação desse elemento seja realizada de forma a repor a quantidade extraída durante o ciclo de cultivo da cultura quando o nível de K_2O no solo for médio.

Palavras-chave: adubação, produtividade, *Coriandrum sativum* L.

INTRODUÇÃO

O coentro (*Coriandrum sativum* L.) é uma espécie vegetal pertencente à família Apiaceae (Costa, 2002). No Brasil, as folhas são bastante apreciadas nas diversas regiões (CAVALCANTE NETO et al., 2010) e seu cultivo se dá principalmente, no Norte e Nordeste (PEREIRA et al., 2011). No Amazonas o cultivo de coentro é bastante difundido, principalmente entre os pequenos agricultores que praticam a chamada agricultura familiar, os quais utilizam a cultura tanto para subsistência como para a obtenção de renda.

Neste contexto, sabe-se que a adubação é uma das principais tecnologias usadas para aumentar a produtividade e a rentabilidade das culturas (SEVERINO et al., 2006) e as plantas necessitam de diversos nutrientes para o crescimento adequado, dentre eles o fósforo e o potássio, os quais desempenham papéis de suma importância no contexto da fisiologia vegetal.

Apesar da grande importância do fósforo e do potássio para o desenvolvimento das culturas agrícolas, dentre elas o coentro, não há trabalhos que visam avaliar tipos e doses desses elementos para essa espécie nas condições edafoclimáticas do Amazonas, sendo este o primeiro a buscar fornecer informações técnicas sobre a utilização de adubos fosfatados e potássicos nessa cultura. Além disso, não foram encontrados na literatura dados sobre recomendação de adubação com P e K em solos com alto teor desse elemento para o cultivo do coentro. Aliado a importância do fósforo para o desenvolvimento vegetal reside o fato de que ele é o nutriente que mais limita a produção vegetal em regiões tropicais (NOVAIS e SMYTH, 1999; RAIJ, 1991), em função da baixa quantidade desse elemento nos solos altamente intemperizados dessas regiões. Além disso, somente uma pequena parte do fósforo aplicado ao solo fica disponível para as plantas. Para Malavolta (1989), as plantas não conseguem aproveitar mais que 10% do fósforo total aplicado, pois nos solos tropicais ácidos, ricos em ferro e alumínio, ocorre a adsorção deste elemento.

O potássio, por sua vez, é um elemento essencial de suma importância, pois atua na regulação da turgidez celular (HOPKINS, 1995), controlando conforme mencionado por Thaiz e Zeiger, (2004) a abertura e fechamento dos estômatos. Além das funções mencionadas é considerado como ativador de enzimas envolvidas na respiração e fotossíntese (Meurer, 2006) e responsável pela translocação e armazenamento de fotoassimilados (Meurer, 2006; YAMADA, 1995; MALAVOLTA et al., 1997). Vale destacar também que o potássio aumenta a resistência ao acamamento (Marschner, 1995), a qual é uma importante característica para espécies como o coentro que apresentam facilidade de tombamento e com isso maior contato das folhas com o solo o que pode provocar doenças foliares.

Assim como para qualquer nutriente, o excesso de potássio pode provocar o desequilíbrio nutricional, o que pode reduzir a absorção de cálcio e magnésio (MALAVOLTA et al., 1997; FONTES, 1999).

Vale mencionar que a busca pelas doses corretas de fertilizantes pode ser uma aliada para se obter alta produtividade e plantas com alta qualidade comercial. Assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito de diferentes doses de fósforo e potássio no cultivo de coentro verdão em latossolo amarelo distrófico.

MÉTODO OU FORMALISMO

Os experimentos foram realizados nos meses de outubro e novembro de 2019 no município de Manaus, estado do Amazonas, no setor de Horticultura e Irrigação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Zona/Leste (IFAM/CMZL). As coordenadas geodésicas da área experimental são: 3°04'43,55" S e 59°56,04'20" W. Segundo a classificação climática de Köppen-Geiger, o clima predominante na região é o Tropical Monçônico (Am).

Para a verificação da influência das doses de fósforo e potássio, foram realizados dois experimentos isoladamente, mas simultaneamente no mesmo período.

O delineamento experimental adotado em ambos os experimentos foi em bloco casualizado com 5 tratamentos (doses) 4 repetições (blocos), totalizando 20 unidades experimentais. Os tratamentos avaliados foram: 0, 50, 100, 150 e 200 kg ha⁻¹ de P₂O₅ e K₂O. Cada unidade experimental possuía 1m² e era constituída por quatro linhas, espaçadas entre si 0,20 m. Considerou-se como área útil da parcela as duas fileiras centrais. A semeadura foi realizada em 02/10/2019, distribuindo-se manualmente 2,5 g sementes m⁻² no sulco de semeadura.

No experimento de avaliação do efeito de diferentes doses de fósforo (P) sobre o desenvolvimento das plantas foi utilizado o superfosfato simples como fonte de P₂O₅. A caracterização físico-química do solo foi a seguinte: pH (CaCl₂) = 6,0; MO = 2,20 dag kg⁻¹; P (Mehlich-1) = 45,0 mg dm⁻³; K = 60 mg dm⁻³; Ca = 6,0 cmolc dm⁻³; Mg = 1,75 cmolc dm⁻³; Na = 46 mg dm⁻³; Al = 0,0 cmolc dm⁻³; V = 76,49 %, textura muito argilosa (74% de argila, 9% de silte e 16,6% de areia) e densidade = 0,95 g cm⁻³. Com base nos dados fornecidos pela análise de solo, procedeu-se a adubação de pré-plantio aplicando-se as 150 kg ha⁻¹ de N e 90 kg ha⁻¹ de K₂O. A fonte de nitrogênio foi a uréia (45% de N) totalizando 35 g m⁻², sendo a aplicação parcelada em 4 vezes: 20% da dose em pré-plantio (7 g m⁻²), 20% na 1ª adubação de cobertura (7 g m⁻²), 30% na 2ª cobertura (10,5 g m⁻²) e 30% na 3ª.

Já no segundo experimento foi avaliado o efeito de diferentes doses de potássio (K), sendo utilizado o cloreto de potássio como fonte de K. A caracterização físico-química do solo foi à seguinte: pH (CaCl₂) = 5,8; MO = 2,60 dag kg⁻¹; P (Mehlich-1) = 182,0 mg dm⁻³; K = 50 mg dm⁻³; Ca = 8,40 cmolc dm⁻³; Mg = 0,90 cmolc dm⁻³; Na = 45 mg dm⁻³; Al = 0,0 cmolc dm⁻³; V = 77,64 %, textura muito argilosa (75,1% de argila, 9,5% de silte e 15,4% de areia) e densidade = 0,97 g cm⁻³. Com base nos dados fornecidos pela análise de solo, procedeu-se a adubação de pré-plantio aplicando-se as 150 kg ha⁻¹ de N e 50 kg ha⁻¹ de P₂O₅. A fonte e a forma de parcelamento da adubação nitrogenada são as mesmas utilizadas no experimento de adubação fosfatada.

Cabe mencionar que em função da saturação por bases dos solos de ambos os experimentos, não houve necessidade de realização de calagem. As capinas foram realizadas manualmente, duas vezes por semana, de forma a evitar a competição por água, luz e nutrientes com as plantas invasoras. A irrigação foi realizada por meio de microaspersão (Microsapensor hadar 7110 NaanDanJain®, vazão de 180 l h⁻¹ a 1,0 bar) fornecendo uma lâmina de água de 5 mm, duas vezes por dia, no início da manhã e no fim da tarde, quando necessário.

Tanto no primeiro como no segundo experimentos foram avaliadas as seguintes variáveis: número de folhas (NF), número de hastes (NH), altura da planta (AP) e massa fresca do molho (MFM).

A colheita para avaliação foi realizada 35 dias após a semeadura. A AP foi avaliada através da medição da planta desde o solo até a última folha com auxílio de régua milimetrada. O NF foi mensurado pela contagem de todas as folhas. O NH pela contagem das hastes. A massa fresca do molho foi obtida pela pesagem de todas as plantas de uma das linhas centrais (1 m).

Os dados obtidos foram submetidos à análise de regressão utilizando-se o programa de análises estatísticas Assistat 7.7 beta (SILVA e AZEVEDO, 2016).

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Quanto ao fósforo, o modelo de regressão que melhor se ajustou às variáveis com exceção da AP foi o linear.

Em relação à altura da planta pode-se verificar que o coeficiente de determinação foi bastante elevado $R^2=0,97$, indicando que 97% do incremento observado na altura da planta estão relacionados às doses de fósforo avaliadas. Além disso, por meio da equação de regressão pode-se estimar a melhor dose em 196,73 kg ha⁻¹ com altura da planta estimada em 36,07 cm (Figura 1A).

Quanto ao número de hastes apesar da regressão ter sido significativa o coeficiente de determinação foi baixo ($R^2 = 0,45$), indicando que alta houve interferência de um ou mais fatores sobre essa variável. Por meio da equação de regressão pode-se estimar que a cada aumento de 1 kg ha^{-1} na dose de P ocorra um incremento de $0,0039$ hastes planta $^{-1}$. O número máximo de hastes estimado para a maior dose (200 kg ha^{-1}) foi de $5,22$ hastes planta $^{-1}$, enquanto para a testemunha foi de $4,44$ hastes planta $^{-1}$. Isso equivale a um incremento da ordem de $17,56\%$ (Figura 1B).

No que tange ao número de folhas planta pode-se verificar que o coeficiente de determinação foi bastante elevado $R^2=0,93$, indicando que 93% do incremento observado no NF estão relacionados às doses de fósforo. Além disso, por meio da equação de regressão pode-se estimar que a cada aumento de 1 kg ha^{-1} na dose de P haja um incremento de $0,11$ folhas planta $^{-1}$. Além disso, o número máximo de folhas estimado para a maior dose (200 kg ha^{-1}) foi de $36,68$ folhas planta $^{-1}$, enquanto para a testemunha foi de $14,44$ folhas planta $^{-1}$. Isso equivale a um incremento da ordem de $154,01\%$ (Figura 1C).

Em relação à massa fresca do molho pode-se observar que o coeficiente de determinação foi elevado $R^2=0,84$, indicando que 84% do incremento observado na MFM estão relacionados às doses de fósforo. Além disso, por meio da equação de regressão pode-se estimar que a cada aumento de 1 kg ha^{-1} na dose de P haja um incremento de $1,3 \text{ g m}^{-2}$ na MFM (Figura 1D). Já a massa fresca do molho estimada para a maior dose (200 kg ha^{-1}) foi de $502,91 \text{ g molho}^{-1}$, enquanto para a testemunha foi de $242,43 \text{ g molho}^{-1}$, o que equivale a um incremento de $107,45\%$.

Figura 1. Análises de regressão conforme doses de P₂O₅ aplicadas em coentro verdão referentes às variáveis: A. Altura da planta (AP); B. Número de hastes (NH); C. Número de folhas (NF); D. Massa fresca do molho (MFM).

Diversos autores têm mencionado resposta do coentro a adubação fosfatada e, assim como neste trabalho as médias obtidas por Oliveira et al. (2004) para a altura de plantas em função das doses de P₂O₅ ajustaram-se a modelo quadrático de regressão, onde calculou-se a dose de 93 kg ha⁻¹ como aquela responsável pela altura máxima das plantas (63 cm). Por outro lado, conforme dados obtidos pelos mesmos autores, as médias do rendimento da massa verde no coentro também se ajustaram a modelo quadrático de regressão, calculando-se a dose de 112 kg ha⁻¹ como a responsável pelo rendimento máximo estimado de massa verde de 51 t ha⁻¹, sendo que esse ajuste difere do obtido neste trabalho o qual se mostrou linear para massa verde.

Vale mencionar que estes autores realizaram as pesquisas em solos com teor de fósforo baixo ou médio e não em solos com alto teor desse elemento. Neste trabalho, embora o solo já apresentasse teor muito bom de P disponível (45 mg dm⁻³), o coentro respondeu positivamente. Apesar de não ter sido encontrado na literatura especializada referências sobre a resposta do coentro a adubação fosfatada em solo com alto teor desse elemento, em estudos realizados com outras culturas diversos autores já observaram este efeito. Neste contexto, Schumacher (2004), menciona que em trabalho avaliando a influência de doses de P no crescimento de mudas de angico-vermelho (*Parapiptadenia rigida* (Bentham) Brenan) foi verificada resposta a aplicação de fosforo mesmo o solo não

apresentando baixo valor de P disponível ($29,5 \text{ cmolc L}^{-1}$). Da mesma forma Bonela (2010), em trabalho intitulado “Adubação fosfatada e potássica para alface em latossolo com teores altos de P e K disponíveis”, menciona resposta linear a adubação fosfatada para matéria fresca e seca da alface com a aplicação de doses de até 300 kg ha^{-1} de P_2O_5 .

É válido ressaltar que outros trabalhos como o de Santini et al. (2020) demonstram o contrário, ou seja, a falta de resposta a adubação fosfatada em solos com alto teor de P. Estes autores avaliando a eficiência de doses e fontes de fósforo em solos de alta fertilidade não evidenciaram efeito da adubação fosfatada na cultura da soja em solo do cerrado com alto teor de fósforo disponível.

Vale destacar o fato de somente cerca de 10 a 20% do fósforo aplicado no solo via adubação ficar disponível para as plantas. Assim, levando em consideração essa informação a quantidade disponível de P_2O_5 prontamente disponível para as plantas seria de apenas 20 a 40 kg ha^{-1} , o que pode justificar a resposta obtida.

Entretanto, outros estudos devem ser realizados de forma a se elucidar os mecanismos responsáveis pela utilização de grande quantidade de adubo fosfatado pelo coentro, em um

Figura 2. Análises de regressão conforme doses de K_2O aplicadas em coentro verdão referentes às variáveis: A. Altura da planta (AP); B. Número de hastes (NH); C. Número de folhas (NF); D. Massa fresca do molho (MFM).

Quanto ao potássio, diferentemente do que foi observado neste trabalho, Reis et al (2015) verificaram que a aplicação de K_2O influenciou significativamente no rendimento de massa verde do coentro verdão, e que suas médias, em função das doses de K_2O , ajustaram-se ao modelo quadrático de regressão, onde pela derivada da equação calculou-se a dose de 97 kg ha^{-1} como aquela responsável pelo rendimento máximo estimado de massa verde $44,35 \text{ t ha}^{-1}$.

Por fim cabe destacar que apesar do teor de potássio estar inserido na classe média não houve resposta a esse elemento, o que pode indicar que nas condições edafoclimáticas avaliadas o teor de K do solo (50 mg dm^{-3}) já seja suficiente para o desenvolvimento das plantas de forma que as mesmas completem seu ciclo. Assim, em função da falta de resposta, pode-se recomendar que a aplicação desse elemento seja realizada de forma a repor a quantidade extraída durante o ciclo de cultivo da cultura quando o nível de K_2O no solo for médio, em solos de textura muito argilosa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O coentro, nas condições edafoclimáticas estudadas respondeu positivamente a aplicação de fósforo, mesmo como o solo apresentando teor muito bom desse elemento.

Para o potássio não foi observado efeito das doses sobre o desenvolvimento das plantas.

AGRADECIMENTOS

A todos aqueles que contribuíram de maneira relevante à elaboração deste trabalho.

REFERÊNCIAS

- BONELA, G. D. Adubação fosfatada e potássica para alface em latossolo com teores altos de P e K disponível. 2010. Dissertação (Mestrado em Ciência do Solo) - Universidade Estadual Paulista, Jaboticabal.
- CAVALCANTE NETO, J.G. et al. Cultivo do coentro com e sem cobertura do solo em diferentes espaçamentos. *Revista Engenharia Ambiental*, v.7, n.4, p.106-12, 2010.
- COSTA, A.F. *Farmacognosia* 6.ed. Lisboa: Fundation Calouste Gulbenkian, 2002. 1031p.
- FONTES, P.C.R. Alface. In: RIBEIRO, A.C.; GUIMARÃES, P.T.G.; ALVAREZ V.; V.H. *Recomendações para o uso de corretivos e fertilizantes em Minas Gerais*. Viçosa: CFSEMG, 1999. p.177.
- HOPKINS, W. G. *Introduction to plant physiology*. New York: John Wiley & Sons, 1995. 464 p
- MALAVOLTA, E. *ABC da adubação*. São Paulo: Ed. Agronômica Ceres, 1989. 292 p.
- MALAVOLTA, E.; VITTI, G.C.; OLIVEIRA, S. *Avaliação do estado nutricional das plantas: princípios e aplicações*. 2.ed. Piracicaba: POTAFÓS, 1997. 319 p.
- MARSCHNER H. 1995. *Mineral nutrition of higher plants* London: Academic Press. 889p.
- MELO, E.A. et al. Antioxidant activity of coriander extracts (*Coriandrum sativum* L.). *Ciência e Tecnologia de Alimentos*, v.23, p.195-9, 2003.
- MEURER, E. J. Potássio. In: FERNANDES, M. S. (Ed.). *Nutrição mineral de Plantas*. SBCS, 2006. p. 281-298.
- NOVAIS, R. F.; SMYTH, T. J. *Fósforo em solo e planta em condições tropicais*. Viçosa: UFV, 1999. 399 p.
- OLIVEIRA, A.P.; ARAÚJO, L.R.; MENDES, J.E.M.F.; DANTAS JÚNIOR, O.R.; SILVA, M.S. Resposta do coentro à adubação fosfatada em solo com baixo nível de fósforo. *Horticultura Brasileira*, Brasília, v. 22, n. 1, p. 87-89, jan-mar 2004.
- PEREIRA, M. F. S. et al. Qualidade fisiológica de sementes de coentro [*Coriandrum sativum* (L.)]. *Revista Brasileira de Plantas Mediciniais*, v. 13, p. 518-522, 2011. Número especial.
- RAIJ, B. van. *Fertilidade do solo e adubação* Piracicaba: Potafos, 1991. 343 p.
- REIS, I. S.; SILVA, A. R. A.; FURTADO, M. B.; FARIAS, M. F.. Rendimento do Coentro Verdão em função da adubação potássica em Latossolo Amarelo. In: XXXV Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, 2015, Natal - RN. *Anais do XXXV Congresso Brasileiro de Ciência do Solo*, 2015.
- SANTINI, J. M. K.; BUZETTI, S.; PERIN, A.; CASTRO, C. F. S.; FURQUIM, L. C.; NUNEZ, D. N. C.; SILVEIRA, F. O.; FILHO, L. C. L.; CABRAL, A. C. Dinâmica do fósforo em solos de alta fertilidade: fontes e doses fosfatadas em cultivo da cultura da soja no cerrado. *Científic@ Multidisciplinary Journal*, v.7, n.2, p.14 – 23v, 2019.

SEVERINO, L.S.; FERREIRA, G.B.; MORAES, C.R. de A.; GONDIM, T.M. de S.; CARDOSO, G.D.; VIRIATO, J.R.; BELTRÃO, N.E. de M. Produtividade e crescimento da mamoneira em resposta à adubação orgânica e mineral. *Pesquisa Agropecuária Brasileira*, v.41, p.879-882, 2006.

SCHUMACHER, M.V., CECONI, D.E., SANTANA, C.A. Influência de diferentes doses de fósforo no crescimento de mudas de angico-vermelho (*Parapiptadenia rigida* (Benth) Brenan). *Revista Árvore*, 2004, vol.28, no.1, p.149-155

SILVA, F. A. S.; AZEVEDO, C. A. V. The Assistat Software Version 7.7 and its use in the analysis of experimental data. *African Journal of Agricultural Research*, v. 11, n. 39, p. 3733-3740, 2016.

TAIZ, L.; ZEIGER, E. *Fisiologia vegetal*. 3. Ed. Porto Alegre: Artmed, p. 719, 2004.

YAMADA, T. Potássio: funções na planta, dinâmica no solo, adubos e adubação potássica. Uberlândia: UFU, 1995. notas de aula.

Capítulo 7

10.37423/220105198

TESTE DE TETRAZÓLIO PARA AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE DE SEMENTES DE ARROZ

Carla Aparecida Ascoli

*Universidade Federal de Mato Grosso -
UFMT*

Resumo: O teste de tetrazólio é um teste bioquímico que pode ser usado quando as sementes necessitam ser semeadas logo após a colheita ou quando apresentam dormência, como ocorre na cultura do arroz, é um método rápido que estima a viabilidade das sementes de forma segura. Baseado na importância da qualidade fisiológica das sementes de arroz e do uso do teste topográfico de tetrazólio objetivou-se determinar o potencial fisiológico das sementes de três genótipos de arroz por meio de diferentes testes de vigor e germinação e correlacionar com os índices de viabilidade obtidos através do teste de topográfico de tetrazólio e comprovar a eficiência da metodologia aplicada para sementes de arroz. O teor de água e os testes de primeira contagem de germinação, germinação padrão, emergência em areia, tetrazólio e envelhecimento acelerado seguiram metodologia descrita por Brasil (2009) com alterações. Adotou-se o delineamento inteiramente casualizado para todas as avaliações realizadas. As médias foram comparadas pelo Teste de Tukey, a 5 % de significância e pela correlação linear e teste de eficiência. Concluiu-se que o teste de tetrazólio é eficiente para determinar o potencial fisiológico das sementes testadas e a viabilidade das sementes de arroz pode ser determinada com sementes descascadas e submetidas ao pré-umedecimento por imersão em 20 mL de água por 18h a 20 °C e posterior corte longitudinal e coloração em solução com concentração de 1% do sal tetrazólio por 2 horas, no escuro a 35 °C.

Palavras-chave: *oryza sativa*; tetrazólio; qualidade fisiológica;

1. INTRODUÇÃO

A relação entre a produtividade das culturas e a utilização de sementes de alta qualidade tem sido destacada por vários pesquisadores e observada frequentemente pelo setor produtivo (PESKE; BARROS; SCHUCH, 2010; SCHEEREN et al., 2010).

A qualidade fisiológica da semente define sua capacidade de desenvolver suas funções vitais (POPINIGIS, 1985). Dentro da qualidade fisiológica são abordados os conceitos de vigor, germinação e viabilidade.

A viabilidade muitas vezes é semelhante a germinação, mas não necessariamente igual, pois nem toda semente viável irá germinar (FRANZIN; ROVERSI, 2001).

Nesse âmbito o teste topográfico de tetrazólio (TZ) se apresenta como um determinador da viabilidade de sementes, sendo descrito como rápido e preciso, segundo a definição apresentada por ISTA (2003) e Brasil (2009).

O teste topográfico de tetrazólio é um método rápido que estima a viabilidade das sementes, em um período inferior a 24 h, baseando-se principalmente na distribuição dos tecidos vivos e mortos do embrião. Além disso, por proporcionar o exame detalhado das estruturas essenciais da semente, contribui para identificar fatores que são responsáveis pela redução da qualidade fisiológica, perfazendo um nítido mapeamento topográfico do embrião (DELOUCHE, 1976; FRANÇA NETO et al., 1998; FRANÇA NETO, 1999).

É um teste bioquímico que pode ser usado quando as sementes necessitam ser semeadas logo após a colheita, quando apresentam dormência ou para resolver problemas encontrados no teste de germinação, como, por exemplo, presença de um grande número de plântulas anormais (BRASIL, 2009). Também pode ser usado para determinar a viabilidade das sementes após tratamentos pré-germinativos, danos por secagem, por insetos, por processo de contração e retração causado por umidade inadequada e para detectar danos mecânicos de colheita e/ou beneficiamento.

O teste de tetrazólio baseia-se na atividade de enzimas desidrogenases, essas enzimas catalisam reações respiratórias nas mitocôndrias e quando em contato com o sal de tetrazólio alteram sua coloração, possibilitando correlacionar a viabilidade das sementes com as modificações na cor dos tecidos vivos.

Quando a semente é imersa na solução incolor de 2, 3, 5 - trifenil-tetrazólio ocorrem alterações de coloração nos tecidos vivos, que refletem a atividade das enzimas desidrogenases envolvidas na

atividade respiratória. Estas enzimas, particularmente a desidrogenase do ácido málico, catalisam a reação dos íons H^+ liberados pela reação dos tecidos vivos com o sal, essa reação de redução forma um composto vermelho, estável e não difusível conhecido por trifenílformazan (FRANÇA NETO, 1999; CARVALHO et al., 2013).

A formação do trifenílformazan indica que há atividade respiratória nas mitocôndrias e, portanto, há viabilidade celular e do tecido. A coloração dos tecidos viáveis varia de espécie para a espécie, pois colorem em velocidades características para cada espécie em uma dada temperatura e concentração da solução de tetrazólio (FRANÇA NETO et al., 1998).

A identificação das sementes viáveis e não viáveis é diferente de espécie para espécie. No geral, os tecidos não viáveis não reagem e, conseqüentemente, não são coloridos, enquanto a formação de um vermelho carmim claro indica tecido vigoroso e a formação de um vermelho mais intenso é indicativo de tecido em deterioração.

Além dos tecidos não viáveis, geralmente, não colorirem, apresentando coloração branco leitoso, são moles e flácidos, permitindo assim delimitar tecidos vivos a partir desses tecidos que permanecem não coradas ou apresentam coloração anormal (ELIAS et al., 2012, MARCOS FILHO, 2015).

Tecidos viáveis com boa viabilidade colorem de forma contínua e uniforme, começando pela superfície exposta e prosseguindo gradualmente para o interior da semente. Tecidos viáveis também tendem a ser firmes e resistentes (ISTA, 2003; BRASIL, 2009).

Para a cultura do arroz as técnicas gerais para o uso do teste de tetrazólio já estão definidas nas Regras e Manuais para Análise de Sementes (ISTA, 2003; BRASIL, 2009; AOSA, 2010) que recomendam pré-condicionamento de 18 h a 20 ou 25 °C, com posterior corte longitudinal e imersão das sementes em solução de tetrazólio a concentração de 0,1 a 1,0% durante 2 a 4 h a 30-35 °C.

Porém para garantir a eficiência do teste em avaliar a viabilidade das sementes é necessário que o método seja adaptado de modo a definir as condições apropriadas para o preparo, a hidratação (pré-condicionamento), a coloração (concentração, tempo e temperatura de exposição) e a avaliação das sementes (ZORZAL et al., 2015).

Classificar o potencial de viabilidade das sementes é essencial para garantir o controle de qualidade, bem como ter respostas rápidas em fase de pré-colheita. Para sementes que apresenta dormência quando recém colhidas, como ocorre na cultura do arroz (MENEZES; FRANZIN; BORTOLOTTI, 2009) o

teste de tetrazólio viabiliza a determinação da qualidade durante a fase em que a semente apresentar suspensão temporária da germinação.

Visando a grande aplicabilidade do teste de tetrazólio e a importância da determinação da viabilidade de sementes de arroz recém colhidas e posteriormente durante seu armazenamento e a importância de definir as condições apropriadas para condução do teste, objetivou-se determinar o potencial fisiológico das sementes de três genótipos de arroz por meio de diferentes testes de vigor e germinação e correlacionar com os índices de viabilidade obtidos através do teste de topográfico de tetrazólio, além, de comprovar a eficiência da metodologia definida e aplicada para sementes de arroz.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido na região de transição Cerrado-Amazônia, na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) campus de Sinop/MT (11,42° S; 55,27° W).

Foram selecionados aleatoriamente 9 lotes (3 lotes de cada cultivar) de sementes de arroz de sequeiro, cultivar A, B e C. O campo de produção está localizado no município de Nova Santa Helena-MT, tendo a cultivar A ciclo de 112 dias e as cultivares B e C ciclo de 115 dias.

O solo da área é do tipo Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico, de classe textural argilosa. Segundo a classificação de Koppen, o tipo climático predominante na região é o Aw (clima tropical úmido), com estação seca bem definida, com precipitação média anual em torno de 1.940 mm, sendo que 85% desse total se concentram no período de outubro a março (SOUZA et al., 2013).

As amostras de sementes de todos os genótipos usadas em todo o experimento foram armazenadas em câmara fria (15 oC e 40% UR), no Laboratório de Análise de Sementes, durante a condução total do experimento, sendo realizadas as seguintes determinações:

2.1 UMIDADE OU TEOR DE ÁGUA (U)

Para a determinação da umidade das sementes foi utilizada uma estufa com circulação forçada de ar e regulada a 105 ± 3 °C por 24 h. Foram utilizadas- quatro subamostras de 5 g de sementes para cada lote, pesadas em balança analítica com resolução de 0,0001 g, baseando-se nas recomendações da Regra de análises de sementes (BRASIL, 2009), com alterações, determinando-se a porcentagem de umidade em base úmida.

2.2 PRIMEIRA CONTAGEM DO TESTE PADRÃO DE GERMINAÇÃO

A primeira contagem do teste padrão de germinação foi realizada conjuntamente com o teste de germinação, foi determinada a porcentagem de plântulas normais ao sétimo dia após a instalação do experimento (BRASIL, 2009). Considerando-se nesse caso apenas as plântulas normais que apresentam raiz primária, partes aéreas bem desenvolvidas e raízes secundárias. O número de plântulas normais removidas na primeira contagem foi considerado como indicativo do vigor do lote de sementes.

2.3 TESTE PADRÃO DE GERMINAÇÃO

Conduzido com 400 sementes para cada lote (4 repetições de 100 sementes), sendo a semeadura realizada entre papel germitest umedecido com água destilada (pH 5) na proporção de 2,5 vezes a massa do papel seco. Após a semeadura foram confeccionados rolos, os quais permaneceram em germinador tipo BOD sob luz com fotoperíodo de 8 h e temperatura constante de 25 ± 1 °C.

A avaliação de germinação foi realizada no 14º dia após a semeadura, computando-se a porcentagem de plântulas normais, conforme Brasil (2009).

Foram consideradas plântulas normais àquelas que alcançaram o estágio em que todas as estruturas essenciais podem ser precisamente verificadas, para a semente do arroz consideram-se as estruturas morfológicas: presença da raiz primária e parte aérea bem desenvolvida.

2.4 EMERGÊNCIA EM AREIA

O teste de emergência em areia foi conduzido com o uso de bandejas de plástico com 10 cm de profundidade, 4 repetições de 100 sementes por lote foram semeadas a 3 cm de profundidade entre areia fina lavada. As bandejas permaneceram em germinador tipo BOD sob luz com fotoperíodo de 8 h e temperatura constante de 25 ± 1 °C. O volume de areia utilizado foi umedecido com água a 50% de sua capacidade de campo e umedecidos novamente sempre que necessário. Contabilizando-se as plântulas emergidas aos 7 e 14 dias após a semeadura.

2.5 ENVELHECIMENTO ACELERADO (EA)

Procedeu-se o teste de EA com o uso de caixas plásticas do tipo gerbox (11 x 11 x 3 cm), com bandeja telada e tampas. Foram adicionados 40 mL de água destilada no fundo das caixas e cerca de 25 g de sementes por lote foram distribuídas uniformemente sobre a tela, em seguida, as caixas tampadas

permaneceram em estufa tipo BOD sem iluminação, pelo período de 120 h a temperatura de 42°C (VIEIRA et al., 2011; KRZYZANOWSKI et al., 1999). Após esse período, quatro repetições de 100 sementes foram submetidas ao teste de germinação, conduzido de acordo com o item 2.3 desse capítulo, o número de plântulas normais removidas na primeira contagem, sete dias após a semeadura, fornece o resultado e é expresso em porcentagem (BRASIL, 2009).

2.6 TETRAZÓLIO

Foram descascadas quatro repetições de cerca de 130 sementes para cada lote, em descascador para arroz, marca ZACCARIA, modelo PAZ 1-DT. U

Utilizou-se trinta por cento a mais de sementes como uma medida de segurança pela ocorrência de sementes que deixaram de ser descascadas e aquelas que apresentavam algum dano na região do embrião, além da margem de segurança para eventuais erros na preparação (corte).

O teste foi realizado utilizando-se 100 sementes, divididas em duas subamostras de 50 sementes para cada repetição de cada lote. As sementes foram submetidas ao pré-umedecimento mediante imersão em 20 mL de água e mantidos à temperatura de 20 °C durante 18 h (BRASIL, 2009). Decorrido esse período, as sementes foram separadas da água e em seguida foi realizado corte longitudinal no centro do embrião (Figura 1), com auxílio de uma lâmina, retirando e descartando 1/2 da largura da semente.

Figura 1. Corte longitudinal em sementes de arroz (*Oryza Sativa*). (Fonte: o autor).

Após esta etapa as mesmas foram submersas em solução 1% de cloreto 2, 3, 5 trifenil tetrazólio por duas horas, mantidas no escuro a 35 °C (BRASIL, 2009). Após o período de coloração, as sementes foram lavadas em água corrente e avaliadas individualmente, observando-se a coloração do embrião, sendo classificadas em viáveis e não viáveis de acordo com a coloração apresentada no eixo embrionário, computando-se a porcentagem de sementes viáveis.

2.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA

O experimento foi conduzido segundo o delineamento inteiramente casualizado para todas as avaliações realizadas.

A normalidade dos dados foi verificada pelo teste de Shapiro-Wilk para Normalidade ao nível de significância de 5%.

Os dados que não seguiram a distribuição normal foram submetidos a transformação pela raiz quadrada, que é indicada para dados obtidos por processo de contagem (Equação 1), aonde X é o dado transformado e x o dado lido.

$$X = \sqrt{\frac{x}{100}} \quad \text{Equação 1}$$

As médias foram submetidas à análise de variância – ANOVA, constatando-se diferença estatística, foram comparadas pelo Teste de Tukey, a 5% de significância.

Realizou-se análise de correlação linear entre os índices de germinação e vigor e os testes de tetrazólio. Para análise da eficiência do teste de tetrazólio em comparativo aos demais teste, foi utilizada a equação 2, aonde G é a porcentagem de plântulas normais obtidas no teste de vigor e germinação conduzidos, e TZn é a porcentagem de sementes viáveis obtidas nos testes de tetrazólio.

$$ETZ = \left[1 - \left(\frac{|G - TZn|}{G} \right) \right] * 100 \quad \text{Equação 2}$$

A ANOVA bem como o teste de comparação de médias – Teste de Tukey e o teste de Shapiro-Wilk para Normalidade foi ajustado pelo pacote estatístico Sisvar, versão 5.6, Build 86.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A umidade foi determinada em base úmida, ou seja, é razão entre o peso da água presente na amostra e o peso total dessa amostra. Entre os lotes de uma mesma cultivar houve variação significativa de umidade, assim como entre as diferentes cultivares (Tabela 1).

Tabela 1. Umidade (porcentagem em base úmida) de diferentes cultivares de arroz, 45 dias após o armazenamento em condições refrigeradas.

	Umidade (%)			
	Lote 1	Lote 2	Lote 3	Média
A	11,44 Aa	11,83 Bb	11,86 Bb	11,71 B
B	11,63 Ba	11,48 Aa	11,53 Aa	11,55 AB
C	11,26 Aa	11,73 Bb	11,41 Aa	11,47 A
Média	11,44 a	11,60 b	11,68 b	
CV%	0,92	0,92	0,92	
dms	0,18	0,18	0,18	

Médias seguidas de mesma letra (maiúscula na coluna e minúscula na linha) não diferem entre si pelo Teste Tukey a 5% de probabilidade.

Mesmo com diferenças significativas, ressalta-se que os dados obtidos para o teor de água das sementes são semelhantes para os 9 lotes, com variação de até 0,45 pontos percentuais. Essa variação é inferior à amplitude máxima aceitável, que é de 1 a 2 pontos percentuais para não interferência nos fatores avaliados nos testes de qualidade fisiológica (MARCOS FILHO, 1999).

Este fato é importante para a execução das avaliações de envelhecimento acelerado, considerando-se que a uniformização do teor de água das sementes é imprescindível para a padronização e obtenção de resultados consistentes de acordo com Marcos Filho (2005), dentro de certos limites, as sementes mais úmidas são mais afetadas pelas condições do teste.

De acordo com Tunes et al. (2009), para sementes de cevada, quando o teor de água das sementes é relativamente baixo, em torno de 12,0%, como ocorreu nos lotes das sementes de arroz, é permitida uma maior confiabilidade aos resultados obtidos nos testes de qualidade fisiológica.

Em relação ao teste de tetrazólio para as sementes de arroz, sabe-se que ele é capaz de estimar para determinado lote, de forma indireta os índices de viabilidade das sementes. A interpretação baseia-se na coloração das estruturas morfológicas vitais das sementes (coleóptilo, plúmula, raízes seminais,

radícula e escutelo) descritos na Figura 2, de acordo com recomendações da ISTA (2003), observando-se a presença e a localização de danos e de áreas não coloridas, além das condições físicas das estruturas embrionárias.

Figura 2. Morfologia da semente de arroz (*Oryza sativa*), por meio do corte longitudinal destacando o embrião (Fonte: o autor).

Na Figura 3 estão apresentadas imagens de sementes de arroz com as estruturas morfológicas vitais intactas, sementes que não apresentaram danos (A) ou apresentaram danos leves como áreas com coloração vermelho mais escuro (B e C) ou pequenas áreas não coloridas (D), nas extremidades da radícula ou escutelo, sem atingir a região vital, o que não interferem na sua viabilidade.

Figura 3. Morfologia da semente de arroz (*Oryza sativa*), por meio do corte longitudinal durante a avaliação do teste de tetrazólio destacando-se o embrião com estruturas normais e viáveis: Não apresentam danos (A), apresentam danos leves (B e C) ou pequenas áreas não coloridas (D). (Fonte: o autor).

A morfologia de sementes mortas e inviáveis pode ser constatada na Figura 4. São sementes que apresentaram danos superiores a 1/3 do escutelo não colorido e/ou raízes seminais e plúmula não coloridas de acordo com recomendações da ISTA (2003). De forma geral as sementes classificadas como não viáveis apresentaram ausência de embrião (Figura 4A), tecidos deteriorados com aspecto mole e flácido (Figura 4B e 4C), tecido morto apresentando coloração branco leitoso (Figura 4D), além de sementes que apresentam características de má formação, anormalidade no embrião (Figura 4E) e

sementes que apresentam anormalidades no embrião e indicativos de deterioração, com tonalidade vermelho escuro, como pode ser observado nas Figuras (4F, 4G e 4H).

Figura 4. Morfologia das sementes de arroz (*Oryza sativa*), por meio do corte longitudinal na avaliação do teste de tetrazólio destacando-se o embrião, com estruturas: Ausência de embrião (A), tecido deteriorado (B e C), tecido morto (D), anormalidade do embrião (E) e anormal e inviável (F, G e H). (Fonte: o autor).

Na Tabela 2 estão apresentados os resultados para os índices de sementes viáveis contabilizadas no teste de tetrazólio. A cultivar B apresentou os maiores índices de viabilidade entre as 3 cultivares, 92,75% lote 1, 94,75% lote 2 e 94% lote 3. Para os 3 lotes estudados, a cultivar A apresentou índices de vigor intermediários, 86,75% para o lote 1, 86,75% para o lote 2 e 90% para o lote 3, enquanto a cultivar C apresentou os menores índices de sementes viáveis, 82,25% lote 1, 83,5% lote 2 e 80,5% lote 3.

Tabela 2. Viabilidade das sementes de diferentes cultivares de arroz submetidas ao Teste de tetrazólio.

	Lote 1	Lote 2	Lote 3	Média
A	86,75 Ba	86,75 Aa	90,00 Bb	87,83 B
B	92,75 Ca	94,75 Ba	94,00 Ca	93,83 C
C	82,25 Aab	83,50 Ab	80,50 Aa	82,08 A
Média	87,25 a	88,33 a	88,13 a	
CV%	1,93	1,93	1,93	
Dms	2,97	2,97	2,97	

Médias seguidas de mesma letra (maiúscula na coluna e minúscula na linha) não diferem entre si pelo Teste Tukey a 5% de probabilidade.

Comparando-se os lotes de uma mesma cultivar, observamos que para a cultivar A o lote 3 apresentou o maior índice de viabilidade (90%). Para a cultivar B não houve diferenciação entre os lotes e para a cultivar C o lote 1 apresenta índices de viabilidade menores que os demais.

Na Tabela 3 estão apresentados os resultados dos testes de tetrazólio (TT), primeira contagem do teste padrão de germinação (TPG PC), teste padrão de germinação (TPG G) e emergência em areia, primeira (TEA PC) e segunda contagens (TEA G), onde pode ser vista a semelhança entre os resultados dos diferentes testes dentro da mesma cultivar.

Tabela 3. Comparativo das médias por testes do desempenho fisiológicos das sementes de diferentes cultivares de arroz.

	TPG G	TPG PC	TEA G	TEA PC	EA	TT
A						
L1	87,75 bc	79,75 ab	90,25 c	72,75 a	81,25 bc	86,75 bc
L2	87 ab	79 a	91,5 b	82,25 ab	83 b	86,75 ab
L3	89,75 bc	76,25 a	91,75 c	81,25 ab	82,75 bc	90 bc
B						
L1	93,25 b	86 ab	93 b	80,75 a	88,75 b	92,75 b
L2	93,25 ab	86,25 ab	95,75 b	85,25 a	88,25 ab	94,75 ab
L3	95,5 c	82,5 a	91,25 abc	85,75 ab	87,75 abc	94 bc
C						
L1	81,25 b	71 a	88,25 b	67 a	74,25 b	82,25 b
L2	83,75 b	71,25 a	86 b	69 a	82,5 b	83,5 b
L3	80,5 c	70,25 ab	81,75 c	68,5 a	74,75 bc	80,5 c
Média	88 b	78,03 a	89,94 b	76,94 a	82,58 b	87,92 b

Médias seguidas de mesma letra (minúscula na linha) não diferem entre si pelo Teste Tukey a 5% de probabilidade.

* TPG G (teste padrão de germinação), TPG PC (teste padrão de germinação primeira contagem), TEA PC (teste de emergência em areia primeira contagem), TEA G (teste de emergência em areia germinação) e TT (teste de tetrazólio).

Observa-se que os resultados apresentados para o teste de tetrazólio para as cultivares A, B e C, corroboram com os resultados dos demais testes de qualidade fisiológica considerados, dentro de seu nível de avaliação, não havendo diferença estatística significativa entre os distintos testes.

Da mesma forma são observadas para as cultivares a mesma atuação para os testes considerados, ou seja, há coerência de resultados entre os testes realizados destacando a cultivar B com melhor desempenho fisiológico e a cultivar C com o pior desempenho fisiológico.

Quando comparamos o teste de tetrazólio com os testes de vigor (Primeira contagem do teste padrão de germinação e primeira contagem da emergência em areia) observamos que não há diferença estatística significativa, embora ocorram diferença numérica, pois os testes apresentam princípios de avaliação distintos, consideram o vigor enquanto o teste de tetrazólio considera as sementes viáveis, o mesmo ocorre quando analisamos o teste de envelhecimento acelerado.

Quando comparamos o teste de tetrazólio com os testes de germinação (Teste padrão de germinação e emergência em areia) nota-se também que não são observadas diferenças significativas, em nenhum dos casos (Tabela 3) e que as diferenças numéricas se reduzem.

O período de duração do teste de germinação, favorece a expressão do potencial máximo das sementes. Esse potencial máximo se assemelha ao potencial de viabilidade, mesmo para aquelas sementes que tenham menor vigor.

De forma geral observou-se que o teste de tetrazólio está condizente com todos os testes fisiológicos de germinação e vigor conduzidos, sendo parâmetros confiáveis para a análise qualitativa dos lotes e das cultivares.

A variação entre os resultados obtidos nos testes é justificada pelo fato de cada teste ter um princípio metodológico diferente e fornece informações complementares para a decisão a respeito da qualidade e do destino final de comercialização de cada lote de semente da cultura.

Na tabela 4 estão apresentados os resultados de eficiência, que variando de acordo com o teste comparado.

Tabela 4. Resultado da eficiência do teste de tetrazólio (TT) em comparativo com os testes de desempenho fisiológicos das sementes de diferentes cultivares de arroz.

	*TT x TPG G	TT x TPG PC	TT x TEA G	TT x TEA PC
A				
Lote 1	98,86	91,22	96,12	80,76
Lote 2	99,71	90,19	94,81	94,53
Lote 3	99,72	81,97	98,09	89,23
B				
Lote 1	99,46	92,15	99,73	85,14
Lote 2	98,39	90,14	98,96	88,86
Lote 3	98,43	86,06	96,99	90,38
C				
Lote 1	98,77	84,15	93,20	77,24
Lote 2	99,70	82,81	97,09	78,99
Lote 3	100,00	85,41	98,47	82,48
Média	99,23	87,12	97,05	85,29

* TPG G (teste padrão de germinação), TPG PC (teste padrão de germinação primeira contagem), TEA PC (teste de emergência em areia primeira contagem) e TEA G (teste de emergência em areia germinação).

Comparando a média dos resultados obtidos pelo teste padrão de germinação com a média do teste de tetrazólio dos lotes avaliados, verificou-se diferença de apenas 0,08 pontos percentuais, indicando que há similaridade entre os resultados, comprovando assim que o teste de tetrazólio foi eficiente, obtendo-se alta eficiência de 99,23% para esse teste fato esse que torna o processo confiável.

A menor eficiência de forma geral foi encontrada para a primeira contagem do teste de emergência em areia, com 85,29%, seguido pela primeira contagem do teste padrão de germinação com 87,12% e pela segunda contagem do teste de emergência em areia com 97,05% de eficiência.

Mediu-se também a relação existente entre os testes através do coeficiente da correlação de Pearson, sendo os resultados apresentados na Tabela 5.

Tabela 5. Coeficiente de correlação entre as médias dos testes de desempenho fisiológicos das sementes das diferentes cultivares de arroz.

	TPG G	TEA PC	TEA G	EA	TT
TPG PC	0,91	0,84	0,88	0,88	0,92
TPG G	-	0,90	0,82	0,93	0,99
TEA PC	-	-	0,81	0,85	0,91
TEA G	-	-	-	0,78	0,88
EA	-	-	-	-	0,92

*TPG PC (teste padrão de germinação primeira contagem), TPG G (teste padrão de germinação), TEA PC (teste de emergência em areia primeira contagem), TEA G (teste de emergência em areia germinação) e TT (teste de tetrazólio).

O teste de tetrazólio apresentou maior correlação com o teste padrão de germinação, na ordem de 99%. Apresentou alta correlação também com a primeira contagem do teste padrão de germinação e envelhecimento acelerado, na ordem de 92%. Para o teste de emergência em areia primeira contagem e germinação a correlação ficou na ordem de 91% e 88,7% respectivamente.

Foram consideradas de maior importância somente as correlações que apresentaram valores iguais ou superiores a 0,6, pois de acordo com Markus (1973) são valores mínimos para aceitação da associação entre testes correlacionados, sendo observado que o teste de tetrazólio apresentou correlação superior a 0,6%, ficando acima de 0,88 para todos os testes avaliados.

4. CONCLUSÕES

O teste de tetrazólio é eficiente para determinar o potencial fisiológico das sementes através da viabilidade para os genótipos de arroz estudados.

A viabilidade das sementes de arroz pode ser determinada com sementes descascadas e submetidas ao pré-umedecimento por imersão em 20 mL de água por 18h a 20 °C e posterior corte longitudinal e coloração em solução com concentração de 1% de sal tetrazólio por 2 horas, no escuro a 35 °C.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

POPINIGIS, F. Fisiologia da semente. Brasília: AGIPLAN. 289 p. 1985.

PESKE, S. T.; BARROS, A. C. A.; SCHUCH, L. O. B. Benefícios e obtenção de sementes de alta qualidade. Seed News. Reportagem de capa. Ano XIV, n. 5 set/out 2010.

SCHEEREN, B. R. et al. Qualidade fisiológica e produtividade de soja. Revista Brasileira de Sementes, Brasília, vol. 32, nº 3 p. 035-041, 2010.

FRANZIN, S. M., ROVERSI, T. O que é vigor?, Sementes UFMS, in: <http://coral.ufsm.br/sementes/>, acesso em 27/12/2019, UFSM, 2001.

BRASIL, Regras para análise de sementes. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sistema BINAGRI-SISLEGIS, instrução normativa – IN 6/2009 de 18 de fevereiro de 2009.

INTERNATIONAL SEED TESTING ASSOCIATION – ISTA. In: ISTA Working Sheets on Tetrazolium Testing. Bassersdorf: ISTA, v.1, 2003. 171p.

FRANÇA NETO, J. B.; KRZYŻANOWSKI, F. C.; COSTA, N. P. da. O teste de tetrázólio em sementes de soja. Londrina: EMBRAPA-CNPSo, 1998. 72 p.

FRANÇA NETO, J.B. Testes de tetrázólio para determinação do vigor de sementes. In: KRZYŻANOWSKI, F.C.; VIEIRA, R.D.; FRANÇA NETO, J.B. Vigor de sementes: conceitos e testes. Londrina: ABRATES, 1999. cap.8, p.1-7.

DELOUCHE, J.C. Standardization of vigor tests. Journal of Seed Technology, Spring Field, v. 1, n.2, p. 75-85, 1976.

CARVALHO, T. C.; KRZYŻANOWSKI, F. C. S.; OHLSON, O. C. PANOBIANCO M. Tetrazolium test adjustment for wheat seeds. Journal of Seed Science, Londrina v. 35, n. 3, p. 361-367, 2013

ELIAS, S.G; COPELAND, L.O; McDONALD, M.B; BAALBAKI, R.Z. Seed testing: principles and pratices, Michigan, 2012.

MARCOS FILHO, J. Fisiologia de sementes de plantas cultivadas. Londrina-PR: 2. ed., 2015. 660p.

AOSA - ASSOCIATION OF OFFICIAL SEED ANALYSTS. Tetrazolium Testing Handboook. Assoc.Offic. Seed Analyst, Ithaca, 2010.

MENEZES, N. L.; FRANZIN, S. M.; BORTOLOTTTO, R. P. Dormência de sementes em arroz: causas e métodos de superação. Revista de Ciências Agro-Ambientais, v. 07, n. 1, p. 35-44, 2009.

SOUZA A. P. Classificação climática e balanço hídrico climatológico no estado de mato grosso, Nativa, Sinop, v. 01, n. 01, p.34-43, out./dez., 2013.

VIEIRA, A. R. et al. Qualidade de sementes de arroz irrigado produzidas com diferentes doses de silício. Revista Brasileira de Sementes, Brasília, v. 33, n. 3, p. 490-500, 2011.

KRZYZANOWSKI, F.C., VIEIRA, R.D., FRANÇA NETO, J.B. Vigor de sementes e testes. Londrina: ABRATES, 1999. 218p.

MARCOS FILHO, J. Teste de vigor: importância e utilização. In: KRZYZANOWSKI, F.C.; VIEIRA, R.D.; FRANÇA NETO, J.B. (Ed.). Vigor de sementes: conceitos e testes. Londrina: ABRATES, 1999. 218p. Cap.1, p.1-21.

MARCOS FILHO, J. Fisiologia de sementes de plantas cultivadas. Piracicaba: Fealq. 495 p. 2005.

TUNES, L.M.; BADINELLI, P.G.; OLIVO, F. E BARROS, A.C.S.A. (2009) - Teste de envelhecimento acelerado em cevada. *Magistra*, 21: 111-119.

MARKUS, R. Elementos de estatística aplicada. Porto Alegre: DALC, 1973. 329 p.

ZORZAL, T. A.; FANTINATO, D. E.; CAMPOS, L. M.; LUZ, A. C. C. da; CORTE, V. B. Teste do tetrazólio para estimativa da viabilidade de sementes. *Natureza online*, v.13, n.3, p.144-149, 2015.

Capítulo 8

10.37423/220105207

AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE QUEIJO COALHO IMERSO EM SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL

Auriana de Assis Regis

Universidade Estadual de Ponta Grossa-UEPG

Elisabeth Mariano Batista

Universidade Estadual do Ceará-UFC

Zulene Lima de Oliveira

Universidade Federal de Santa Maria-UFSM

Luísa Kélbia Maia

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará-IFCE

Raimunda Valdenice da Silva Freitas

Universidade Federal da Paraíba-UFPB

Pahlevi Augusto de Souza

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte-IFRN

Resumo: Objetivou-se avaliar a qualidade microbiológica e físico-química do queijo coalho imerso em suco de uva tinto integral com a finalidade de agregar valor ao produto. Os queijos foram elaborados de acordo com Nassu; Macedo e Lima (2006) com adaptações. O pH variou de 6,12 a 6,49 e acidez titulável foi de 1,92 a 2,77% de ácido láctico. Os teores de umidade dos queijos variaram de 39,53% a 41,52%, o tratamento T1 apresentou diferença significativa ($p>0,05$) entre os demais tratamentos. O percentual de Proteína em estudo, foi de 17,90 % a 22,55% e os tratamentos T1 e T3 diferiram estatisticamente. O teor de Gordura ou lipídios foi de 37,5% para todos os tratamentos e estes não diferenciaram estatisticamente entre si. As cinzas apresentaram valores de 2,77 a 3,07%. Ausência de coliformes totais (35° C) e termotolerantes (45 °C), de *Salmonella* sp., e de bolores e leveduras entre as amostras. Os valores de proteína aumentaram com duas horas de imersão dos queijos no suco. O suco de uva integral conferiu atividade antimicrobiana no queijo coalho, sendo uma alternativa promissora a ser aplicada nesse produto.

Palavras-chave: Agroindústria; Alimento funcional; Tocoferol.

INTRODUÇÃO

O queijo coalho é típico da região Nordeste, sendo amplamente consumido em todo território brasileiro. A maior parte da produção de queijo de coalho (85%) é realizada com leite cru ou “in natura”, apesar de ser recomendado no Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de queijo de coalho, que o leite deve ser submetido a processos mecânicos apropriados e tratamento térmico ou pasteurização. Podendo-se evidenciar que, a matéria-prima utilizada para a produção do queijo não atente as normas de higiene e sanitização vigentes (BRASIL, 2001; DANTAS, 2012).

Nesta perspectiva, a contaminação do leite por bactérias patogênicas fica mais difíceis. No que diz respeito às técnicas de processamento, o queijo de coalho apresenta-se como um produto de intensa manipulação durante o processo de fabricação, desprovido das condições higiênicas necessárias, ademais, há não conformidades em relação às condições sanitárias de transporte e armazenamento, tornando-se dessa forma, um potente veículo de contaminantes, o que expõe consequentemente a sociedade a possíveis Doenças Veiculadas por Alimentos-DVAs, repercutindo no âmbito de saúde pública (DUARTE et al., 2005 e OPAS, 2009).

O queijo coalho é um alimento muito consumido em suas diferentes formas: natural, assada ou frita pela população regional, principalmente nos estados do Ceará Rio Grande do Norte Pernambuco e Paraíba, este, é considerado como um patrimônio da população nordestina, desperta o interesse não somente dos produtores, mas, de instituições públicas e privados (MENEZES, 2011). O conhecimento sobre as características físico-químicas do pH, umidade, acidez titulável, proteínas, entre outros, do queijo de coalho é de grande importância já que estes influenciam diretamente na qualidade final do queijo (GOMES et al., 2011).

O suco de uva tinto integral apresenta uma concentração e composição natural, límpido ou turvo, não sendo permitida a adição de outro tipo de açúcar. É considerada uma bebida distinta, tanto sob o aspecto energético quanto nutricional e terapêutico. Os bioflavonóides, os taninos e o resveratrol encontrados na fruta são os responsáveis pelos benefícios à saúde. A substância mais importante é o resveratrol, um composto fenólico encontrado na casca da uva. Ele funciona como um protetor do alimento contra o ataque de vírus e fungos (RIZZON; MENEGUZZO, 2007).

O objetivo desta pesquisa foi avaliar a qualidade físico-química e microbiológica do queijo coalho imerso em suco de uva tinto integral. Apesar de sua grande expressão do queijo coalho, ainda não existe estudo envolvendo sua imersão em suco de uva ou de outras frutas.

MATERIAL E MÉTODOS

A presente pesquisa foi conduzida nos Laboratórios do curso superior de Tecnologia de Alimentos do Instituto Federal do Ceará-IFCE, Campus Limoeiro do Norte-CE, durante março de 2018.

O queijo coalho foi elaborado com leite cru integral refrigerado, obtido de vacas mestiças (zebu-holandês) proveniente de uma associação de produtores da zona rural de Limoeiro do Norte- CE. Na etapa de imersão dos queijos foi utilizado o suco de uva tinto integral da marca Sinuelo®, adquirido no comércio local, sendo este, um produto não fermentado, não alcoólico, composto apenas pelo suco natural de uva sem adição de açúcar. A figura 1 apresenta os queijos Coalhos imersos em suco de uva tinto integral fatiados e em cubos.

Os queijos foram elaborados de acordo com a metodologia de Nassu; Macedo e Lima (2006) com adaptações. Os mesmos apresentaram rendimento de 550g/unidade aproximadamente. Após a fabricação, os queijos foram armazenados por 5 dias em câmara fria a 4°C para maturação.

Figura 1 – Queijo coalho imerso em suco de uva tinto integral.

Fonte: Autores.

Em seguida, foram fatiados com a finalidade de aumentar a superfície de contato, melhorando a homogeneização da cor do produto e foram imersos em suco de uva tinto integral. Posteriormente, mantidos em refrigeração por 24 horas para secagem da superfície.

Os tratamentos utilizados foram compostos pelo tempo de imersão dos queijos no suco de uva tinto integral: Tratamento 1 (1h de imersão); tratamento 2 (2h); tratamento 3 (3h) e tratamento 4 (4h), com três repetições de quatro queijos, sendo um queijo por parcela para cada tratamento. Após a secagem as fatias foram cortadas em formato de cubo (2 cm) e armazenados sobre refrigeração a 8°C, permanecendo até o momento das análises microbiológicas e físico-químicas.

Foram realizadas as análises de contagem de bolores e leveduras, coliformes totais (35 °C), coliformes termotolerantes (45 °C) e *Salmonella* sp.

Os resultados foram tratados estatisticamente através de análise de variância (ANOVA) e comparação das médias pelo teste de Tukey ($p < 0,05$) de probabilidade. Para isso, utilizou-se o programa STATISTICA versão 7.1 sob a plataforma Windows 10®.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Conforme a Tabela 1, o pH do tratamento T1 diferiu estatisticamente dos demais, embora o resultado tenha sido aproximado.

Tabela 1. Características físico-químicas de queijos Coalho imersos em suco de uva tinto integral.

Parâmetros	Tratamentos			
	T1	T2	T3	T4
pH	6,49 ^a ($\pm 0,03$)	6,19 ^b ($\pm 0,04$)	6,14 ^b ($\pm 0,03$)	6,12 ^b ($\pm 0,02$)
Acidez Titulável	2,06 ^a ($\pm 0,04$)	1,92 ^b ($\pm 0,04$)	1,94 ^b ($\pm 0,04$)	2,77 ^b ($\pm 0,02$)
Umidade	39,53 ^b ($\pm 0,36$)	41,12 ^a ($\pm 0,52$)	41,52 ^a ($\pm 0,38$)	41,21 ^a ($\pm 0,13$)
Proteína	17,90 ^c ($\pm 0,32$)	23,02 ^a ($\pm 0,55$)	21,44 ^b ($\pm 0,15$)	22,55 ^a ($\pm 0,22$)
Gordura	37,5 ^a ($\pm 0,00$)	37,5 ^a ($\pm 0,00$)	37,5 ^a ($\pm 0,00$)	37,5 ^a ($\pm 0,00$)
Cinzas	3,07 ^a ($\pm 0,04$)	2,80 ^b ($\pm 0,04$)	2,78 ^b ($\pm 0,07$)	2,77 ^b ($\pm 0,07$)

Médias com letras diferentes na mesma linha diferem entre si significativamente ($p < 0,05$) pelo teste de Tukey.

Fonte: Autores (2018).

Os teores de Umidade dos queijos de Coalhos avaliados apresentaram variação de 39,53% a 41,52%, o tratamento T1 apresentou diferença significativa ($p > 0,05$) entre os demais tratamentos. Os queijos de coalho analisados foram classificados como queijo de média umidade (entre 36,0% e 45,9%), conforme legislação vigente. Inocente, Biasutti e Comuzzo (2007), obtiveram valores próximos ao do presente estudo: 31,06%, 32,30% e 30,47%.

O percentual de Proteína em estudo, foi de 17,90% a 22,55% e os tratamentos T1 e T3 diferiram estatisticamente. Pimental (2019), encontrou valores para o teor proteico equivalentes ao desse estudo, entre 21,09 a 21,26. Enquanto, Filho et. al (2020) revelou valores superiores ao desta pesquisa, 33,08 a 33,52. O teor de proteína varia muito e isso pode estar relacionado com a qualidade da alimentação do rebanho.

O teor de Gordura ou lipídios foi de 37,5% para todos os tratamentos e estes não diferenciaram estatisticamente entre si. De acordo com a legislação em vigor, o queijo coalho deve apresentar um teor de gordura entre 35,0% e 60,0%, podendo ser definido como semi-gordo (25,0% a 44,9%), gordo (45,0 a 59,9%) ou extragordo (mínimo de 60,0%), (BRASIL, 2001). Pimentel (2019) e Souza et. al., (2021)

detectaram valores inferiores ao desta pesquisa, respectivamente (23,23% a 26,55%) e (23,83% a 26,00%). Filho, et. al., (2021), encontrou valores próximos aos obtidos nesta pesquisa, 31,03 a 31,86%.

As cinzas apresentaram valores de 2,77 a 3,07%. O tratamento T1 diferiu estatisticamente em relação aos demais tratamentos. Este resultado pode ter sido influenciado pelo baixo tempo (1h) de imersão do queijo coalho. Contribuindo para que os compostos orgânicos presentes no suco (compostos bioativos, vitaminas, minerais, substâncias nitrogenadas, entre outros) aderissem à massa superficial e interna do queijo.

Conforme as Tabelas 2, os resultados analíticos para obtenção da qualidade microbiológica dos queijos de coalho analisados neste estudo, não foi detectada contaminação por coliformes totais (35° C) e termotolerantes (45 °C) em (NMP/g). Os tratamentos (T1, T2, T3 e T4) estavam em conformidade com os padrões exigidos pela legislação vigente: RDC nº 12 (BRASIL, 2001). Este aprova o Regulamento Técnico sobre Padrões Microbiológicos para Alimentos e estabelece o limite de *Coliformes* a 45 °C/g, *Estafilococos* coagulase positiva/g e *Salmonella* spp./25 g em queijos de muita alta umidade (55%), como queijo de coalho, minas frescal, mussarela, entre outros.

Tabela 2. Contagem de coliformes totais (35° C) e termotolerantes (45 °C) em (NMP/g) dos queijos coalhos imersos em suco de uva integral.

Tratamentos	Tratamentos (horas)				Legislação (5 x 10 ³ NMP/g)
	1h	2h	3h	4h	
T1	< 3	< 3	< 3	< 3	-
T2	< 3	< 3	< 3	< 3	-
T3	< 3	< 3	< 3	< 3	-
T4	< 3	< 3	< 3	< 3	-

NMP = Número Mais Provável. **Legislação:** RDC nº 12, de 21 de fevereiro de 2001. T1: queijo imerso em suco de uva integral durante 1h; T2: queijo imerso em suco de uva integral durante 2h; T3: queijo imerso em suco de uva integral durante 3h.

Meira Júnior, Sousa e Costa (2021), analisando o desenvolvimento e a aplicação de revestimentos comestíveis em queijo de coalho, também observaram que o resultado para coliformes termotolerantes (45°C) se mostrou em conformidade com os padrões estabelecidos pela legislação.

A contaminação de queijos pode ocorrer através de matéria-prima de má qualidade, manipulação e armazenamento inadequados. Microrganismos como *Salmonella* sp., *Escherichia coli*, *Listeria monocytogenes* e *Staphylococcus aureus* estão envolvidos em casos de toxinfecções alimentares pelo consumo de leite e derivados (COUTINHO et al., 2020). A tabela 3, apresenta os resultados para pesquisa de *Salmonella* sp., nos tratamentos analisados na presente pesquisa.

Em relação à análise de *Salmonella* sp., verificou-se nesta pesquisa a ausência do microrganismo em 25g das amostras para todos os tratamentos. Tal resultado demonstra a concordância com os padrões exigidos pela legislação vigente. Conforme Claudino (2018), a ocorrência de *Salmonella* sp. evidencia a falta de boas práticas de fabricação do produto, as condições precárias de higiene, armazenamento e falta de refrigeração na comercialização, que culminam no comprometimento da qualidade microbiológica.

Tabela 3. Pesquisa de *Salmonella* sp. em queijo coalho, imerso em suco de uva integral.

Tratamentos	Tratamentos (horas)				Legislação*
	1h	2h	3h	4h	
T1	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausência em 25g
T2	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausência em 25g
T3	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausência em 25g
T4	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausência em 25g

T1: queijo imerso em suco de uva integral durante 1h; T2: queijo imerso em suco de uva integral durante 2h; T3: queijo imerso em suco de uva integral durante 3h; T4: queijo imerso em suco de uva integral durante 4h. *RDC nº 12, de 21 de fevereiro de 2001.

Os tratamentos analisados também não apresentaram crescimento de colônia de bolores e leveduras (Tabela 4), indicando, portanto, que o queijo de coalho se apresentou em condições microbiológicas adequadas, tendo em vista a atividade antimicrobiana dos compostos fenólicos presentes no suco de uva integral.

Tabela 4. Resultado da análise de Bolores e Leveduras (UFC/g) em queijo coalho, imerso em suco de uva integral

Tratamentos	Tratamentos (horas)				Legislação (Não estabelecido) (UFC/g)
	1h	2h	3h	4h	
T1	-	-	-	-	-
T2	-	-	-	-	-
T3	-	-	-	-	-
T4	-	-	-	-	-

UFC/g – Unidades Formadoras de Colônias por grama. **Legislação:** RDC nº 12, de 21 de fevereiro de 2001. T1: queijo imerso em suco de uva integral durante 1h; T2: queijo imerso em suco de uva integral durante 2h; T3: queijo imerso em suco de uva integral durante 3h; T4: queijo imerso em suco de uva integral durante 4h.

A uva é considerada uma fruta com maior teor de antioxidantes, destacando os compostos fenólicos como os flavonóis, antocianinas, taninos, ácidos fenólicos e estilbenos (DROSOU et al., 2015; LINGUA et al., 2016; MANCONI et al., 2017). Tais compostos possuem em sua estrutura química grupos que dão a característica responsável por sua atividade antimicrobiana (NOGALES B. L, et al., 2017).

CONCLUSÕES

Os percentuais de gordura dos queijos não diferenciaram entre si, enquanto, os valores de proteína aumentaram com duas horas de imersão dos queijos no suco.

Os resultados desta pesquisa, demonstraram que o suco de uva integral apresentou importante atividade antimicrobiana no queijo coalho, sendo uma alternativa promissora a ser aplicada nesse produto.

A busca e estudo do uso de compostos antimicrobianos contidos em produtos de frutas como o suco de uva integral, mostra-se como uma alternativa promissora do ponto de vista tecnológico, favorecendo o surgimento de novas alternativas capazes de controlar o desenvolvimento de microrganismos de importância em alimentos como em queijos coalho.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Leis, decretos, etc. Resolução RDC n. 12 de 02 de janeiro de 2001. Aprova o regulamento técnico sobre padrões microbiológicos para alimentos. Diário Oficial da União, Brasília-DF, n. 7-E, seção 1, p. 45-53, 10 de janeiro de 2001.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa nº 30, de 26 de junho de 2001. Anexo II - Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Queijo de Coalho. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. DF, 16 jul. 2001.

CLAUDINO, A. R. F. Pesquisa de Salmonella spp. em queijos de coalho comercializados em feiras livres de Garanhuns-PE. 2018. 49f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Medicina Veterinária). – Departamento de Medicina Veterinária, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Garanhuns, 2018.

COUTINHO, M. G. S.; NEVES, A. M.; BATISTA, A. S. M.; FONTENELLE, R. O. S. Utilização de óleos essenciais na conservação de queijos: revisão. Revista do Instituto Candido Tostes, Juiz de fora, MG. v. 75, n. 2, p. 126-141, abr. jun. 2020.

DANTAS, D. S. Qualidade Microbiológica do queijo de coalho comercializado no Município de Patos, PB. 2012. 79 p. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) - Universidade Federal de Campina Grande, Centro de Saúde e Tecnologia Rural, Campina Grande, 2012.

DROSOU, C.; KYRIAKOPOULOU, K.; BIMPILAS, A.; TSIMOGIANNIS, D.; KROKIDA, M. A. study comparative on different extraction techniques to recover red grape pomace polyphenols from vinification by products. Industrial Crops and Products. v. 75, p. 141-149, 2015.

DUARTE, D. A. M.; SCHUCH, D. M. T.; SANTOS, S. B.; RIBEIRO, A. R.; VASCONCELOS, A. M. M.; SILVA, J. V. D.; MOTA, R. A. Pesquisa de Listeria monocytogenes e microrganismos indicadores higiênico-sanitários em queijo de coalho produzido e comercializado no Estado do Pernambuco. Arquivos do Instituto Biológico, São Paulo, v. 72, n. 3, p. 297-302, 2005.

GOMES, F. C. O; MOREIRA, V. G.; ROSA, C. A.; SILVA, C. L. C; WALTER, M. E. Avaliação microbiológica, físico-química e sensorial de amostras de queijo minas artesanal, comercializadas em mercado público de Belo Horizonte, MG. Revista Higiene Alimentar, v.25, n. 192/193, p. 97- 101, 2011.

INNOCENTE, N.; BIASUTTI, M.; COMUZZO, P. Characterization of a traditional semi-hard Italian cheese produced by soaking in wine. Comuzzo Department of Food Science, University of Udine, Via Marangoni 97, 33100 Udine, Italy. 5p, 2007.

LINGUA, M. S.; FABANI, M. P.; WUNDERLIN, D. A.; BARONI, M. V.; In vivo antioxidante activity of grape, pomace and wine tree varieties grow in Argentina: Is relationships to phenolic profile. Journal of functional foods. v. 20, p. 332-345, 2016.

MANCONI, M.; MARONGIU, F.; MANCA, M. L.; CADDEO, C.; SARAIS, G.; CENCETTI, C.; PUCCI, L.; LONGO, V.; BACCHETA, G.; FADA, A. M. Nanoincorporação of bioactive compounds from red grape pomaces: In vitro and ex vivo evaluation antioxidante activity. International Journal of Pharmaceutics. v. 523, p. 159-166, 2017.

MEIRA JÚNIOR, D. B.; SOUSA, S.; COSTA, G. F. Aplicação de revestimentos comestíveis na qualidade e conservação de queijo coalho. Boletim CEPPA, Curitiba, PR. v. 37, n. 1, jun. 2021.

MENEZES, S. S. M. Queijo de coalho: tradição cultural e estratégia de reprodução social na região Nordeste. Revista de Geografia (UFPE), v. 28, n.1, p. 40-56, 2011.

NOGALES B. L.; BACA BOCANEGRA, B.; ROONEY, A.; HERNANDEZ-HIERRO, J. M.; BILE, H. J.; HEREDIA, F. J. Study of phenolic extractibility in grape seeds by means of ATR- FIR and Raman spectroscopy. Food Chemistry. v. 232, p. 602-609, 2017.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE. Guias para o gerenciamento dos riscos sanitários em alimentos. Rio de Janeiro: Área de Vigilância Sanitária, Prevenção e Controle de Doenças - OPAS/OMS; 2009.

PIMENTEL, E. T. Qualidade de queijo coalho comercializado em Manaus-AM. Universidade Federal do Amazonas. Faculdade de Ciências Agrárias. Programa de Pós-graduação em Ciência Animal (Dissertação). 51p. 2019.

RIZZON, L. A; MENEGUZZO, J. Suco de uva. Brasília: Embrapa, 2007. p.50 (Coleção Agroindústria Familiar). Disponível em:

<http://www.bdpa.cnptia.embrapa.br/consulta/busca?b=ad&id=542040&biblioteca=vazio&busca=542040&qFacets=542040&sort=&paginacao=t&paginaAtual=1>. Acesso em: 14 de Setembro de 2021.