SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM- SAE

Fernanda Matheus Estrela
Marcia Gomes Silva
Tania Maria de Oliveira Moreira
Adriana Braitt Lima

EDITORA CONHECIMENTO LIVRE

Fernanda Matheus Estrela
Marcia Gomes Silva
Tania Maria de Oliveira Moreira
Adriana Braitt Lima

Sistematização da Assistência de Enfermagem- SAE

1ª ed.

Piracanjuba-GO
Editora Conhecimento Livre
Piracanjuba-GO

1ª ed.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

E82S Estrela, Fernanda Matheus
Sistematização da Assistência de Enfermagem- SAE
/ Fernanda Matheus Estrela. Marcia Gomes Silva. Tania Maria de Oliveira Moreira. Adriana Braitt
Lima. – Piracanjuba-GO
Editora Conhecimento Livre, 2021
164 f.: il
DOI: 10.37423/2021.edcl403
ISBN: 978-65-5367-035-8
Modo de acesso: World Wide Web
Incluir Bibliografia
1. enfermagem 2. cuidados-de-enfermagem 3. processo-de-enfermagem I. Estrela, Fernanda
Matheus II. Silva, Marcia Gomes III. Moreira, Tania Maria de Oliveira IV. Lima, Adriana Braitt V.
Título

CDU: 613

<https://doi.org/10.37423/2021.edcl403>

O conteúdo dos artigos e sua correção ortográfica são de responsabilidade exclusiva dos seus respectivos autores.

EDITORA CONHECIMENTO LIVRE

Corpo Editorial

Dr. João Luís Ribeiro Ulhôa

Dra. Eyde Cristianne Saraiva-Bonatto

MSc. Frederico Celestino Barbosa

MSc. Carlos Eduardo de Oliveira Gontijo

MSc. Plínio Ferreira Pires

Editora Conhecimento Livre

Piracanjuba-GO

2022

CAPÍTULO 1 7

SISTEMATIZAÇÃO DO CUIDADO DE ENFERMAGEM A PESSOA COM AGRAVOS RENAIIS PAUTADO EM CALISTA ROY

Tania Maria de Oliveira Moreira
Emanuelle de Oliveira Moreira
Carleone Vieira dos Santos
Amanda Cibeles Gaspar dos Santos
Deliane Souza Santos
Naiara Dantas Damasceno Najar
Ana Carla Barbosa de Oliveira
Tamires Jesus Sousa
Dilmara Pinheiro Carvalho
Daniela Fagundes de Oliveira
DOI 10.37423/220105189

CAPÍTULO 2 21

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO TRANSOPERATÓRIO DE COLEDOLITÍASE

Isabela Paixão de Jesus
Monalisa Gois Brito
Amanda Pereira de Oliveira
Maria Helena Assis Oliveira Melo
Suzane de Almeida Santos Barbosa
Fernanda Matheus Estrela
Tânia Maria de Oliveira Moreira
Yasmim Lima da Silva Rocha
Lizandra de Almeida Costa dos Santos
DOI 10.37423/220105201

CAPÍTULO 3 36

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA PRESTAÇÃO DE CUIDADOS AO PACIENTE COM HEPATOPATIA GRAVE FUNDAMENTADA PELA TEORIA DA ADAPTAÇÃO DE ROY

Vanessa Marcela Lima dos Santos
Vivian Manuela Lima dos Santos
Samara Santos Silva
Lorena Santana Oliveira
Beatriz Carvalho dos Santos
Ana Clara Farias de Oliveira
Tânia Maria de Oliveira Moreira
Fernanda Matheus Estrela
DOI 10.37423/220105202

CAPÍTULO 4 49

APLICAÇÃO DA TEORIA DE ROY À UMA IDOSA COM COMPLICAÇÕES DA COVID-19

Fernanda Matheus Estrela
Ayla Melo Cerqueira
Déborah de Oliveira Souza
Íris Cristy da Silva e Silva
Analu Sousa de Oliveira
Vanessa Sena da Silva
Elidelma dos Santos Pinheiro
Sthefane Nogueira de Azevedo
Victória Freitas de Oliveira
Carleone Vieira dos Santos Neto
DOI 10.37423/220105206

CAPÍTULO 5 75

APLICAÇÃO DA TEORIA DE WANDA HORTA À PESSOA SUBMETIDA A LAPAROTOMIA SECUNDÁRIA A ABDOME AGUDO: ESTUDO DE CASO

Tânia Maria de Oliveira Moreira
Ayane Gaspar Ferreira do Vale
Giovanna Calixto dos Santos
Nathália Yasmim dos Santos Assis
Roseane Dantas Amorim Barbosa
Quécia da Paixão Araujo
DOI 10.37423/220105215

CAPÍTULO 6 96

COMPLICAÇÕES OCASIONADAS POR LESÃO IATROGÊNICA DE VIAS BILIARES PÓS COLECISTECTOMIA LAPAROTÔMICA: UM RELATO DE CASO

Isabel Guedes de Souza
Tainá Rios da Silva
Gisana Santos da Silva
Valquíria de Araújo Hora
Erika Maelle dos Santos Reis
Fernanda Matheus Estrela
DOI 10.37423/220105218

CAPÍTULO 7 112

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM LESÕES CEREBRAIS METASTÁTICAS.

Ariane Oliveira Pereira
Érica Bispo Santos
Pamula Andrade Lisboa Bacellar
Rebeca Moreira Santos
Ialú Cruz Pereira
Fernanda Matheus Estrela
Márcia Gomes Silva

DOI 10.37423/220105224

CAPÍTULO 8 127

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM APLICADA EM UM CASO DE PÓS-OPERATÓRIO DE LAPAROTOMIA EXPLORATÓRIA SECUNDÁRIA A ABDOME AGUDO INFLAMATÓRIO

Sthefane Nogueira de Azevêdo
Analu Sousa de Oliveira
Vanessa Sena da Silva
Ivana Caroline Andrade do Nascimento
Kellen Tiffany Araujo Lima Paixão
Ayla Melo Cerqueira
Déborah de Oliveira Souza
Íris Cristy da Silva e Silva
Fernanda Matheus Estrela
Marcia Gomes Silva

DOI 10.37423/220105227

CAPÍTULO 9 148

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À PESSOA COM HEMORRAGIA SUBARACOIDEA: RELATO DE ESTUDANTES DE ENFERMAGEM

Denise Lima da Silva Brasileiro
Laura Rosane Duarte Zahreddine
Caio Moura dos Santos
Valéria Barbosa da Silva
Luane Neves Xavier
Samara Gonçalves de Souza
Adriana Braitt Lima

DOI 10.37423/220105232

Capítulo 1

10.37423/220105189

SISTEMATIZAÇÃO DO CUIDADO DE ENFERMAGEM A PESSOA COM AGRAVOS RENAIS PAUTADO EM CALISTA ROY

Tania Maria de Oliveira Moreira

*Universidade Estadual de Feira de Santana,
Feira de Santana, Bahia, Brasil.*

Emanuelle de Oliveira Moreira

UNIFTC

Carleone Vieira dos Santos

*Secretaria Municipal de Saúde de Salvador,
Salvador, Bahia, Brasil.*

Amanda Cibeles Gaspar dos Santos

*Universidade Federal da Bahia, Salvador,
Bahia, Brasil*

Deliane Souza Santos

Maternidade Climerio de Oliveira

Naiara Dantas Damasceno Najar

Hospital Universitário Professor Edgar Santos

Ana Carla Barbosa de Oliveira

*Universidade Estadual de Feira de Santana,
Feira de Santana, Bahia, Brasil.*

Tamires Jesus Sousa

Universidade Federal da Bahia, Bahia, Brasil

Dilmara Pinheiro Carvalho

Maternidade Clímério de Oliveira

Daniela Fagundes de Oliveira

*Universidade Federal da Bahia, Salvador,
Bahia, Brasil*

Resumo: Introdução: A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é uma metodologia de trabalho fundamental para nortear as ações do cuidado de enfermagem ao indivíduo no contexto saúde-doença tendo como objetivo reunir as atividades de enfermagem para que não sejam feitas de forma isolada e façam parte de um processo. Dessa forma, a necessidade de aplicar à SAE às pessoas com agravos renais é necessária devido à elevada morbimortalidade relacionada às doenças renais. Urge que os profissionais de enfermagem estejam capacitados para prestar um cuidado de qualidade, integral e humanizado às pessoas com agravos renais e suas famílias. Objetivo: O objetivo desse trabalho é descrever a sistematização da Assistência de Enfermagem ao paciente renal pautado na teoria de Calista Roy. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência através da aplicação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), voltado para os cuidados paliativos do paciente no contexto hospitalar. Resultados e discussão: Foi aplicado a teoria da adaptação nas seis fases da Teoria de Calista Roy e foi elaborado diagnósticos de enfermagem para os quatro modos de adaptação: fisiológico, interdependência, autoconceito e função de papel. Considerações finais: Ao aplicar a SAE no indivíduo com agravos renais a enfermeira deve realizá-lo em todas as suas etapas, e utilizar os protocolos para oferecer um cuidado holístico e integral, visando a promoção da saúde, prevenção de risco potencial e adaptação diante das necessidades em saúde.

Palavras chaves: enfermeira; cuidado; família; renal.

INTRODUÇÃO

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é uma metodologia de trabalho fundamental para nortear as ações do cuidado de enfermagem ao indivíduo no contexto saúde-doença tendo como objetivo reunir as atividades de enfermagem para que não sejam feitas de forma isolada e façam parte de um processo. Este é denominado processo de enfermagem, podendo ser compreendido como um instrumento de trabalho da enfermagem, orientado pelo menos por uma teoria, sendo composto por etapas ordenadas, dinâmicas, interacionadas e independentes podendo ocorrer em qualquer cenário da atenção direta ao cliente (TANURE, PINHEIRO, 2019). A SAE favorece uma prática assistencial pautada no conhecimento científico contribuindo positivamente para o paciente, família, a equipe de enfermagem bem como para o serviço de saúde, tendo como foco o cuidado (ALFARO LEFREVE, 2014). Para Waldow (1998) o cuidado é a nossa prática e se caracteriza por ações e comportamentos realizados na intenção de favorecer, manter e melhorar o processo de viver-morrer, proporcionando atenção às necessidades biopsicossociais e espirituais das pessoas.

Dessa forma, a necessidade de aplicar à SAE às pessoas com abordagem clínicas e cirúrgicas dos agravos renais é necessária devido considerando que são diversas as doenças renais que acometem a população brasileira. São exemplos: cálculos renais, doenças glomerulares, insuficiência renal, transplante de rim, tumores renais, câncer de bexiga, entre outros. Segundo a sociedade brasileira de nefrologia, a prevalência da doença renal crônica no mundo é de 7,2% para indivíduos acima de 30 anos e 28% a 46% em indivíduos acima de 64 anos. No Brasil, a estimativa é de que mais de dez milhões de pessoas tenham a doença (BRASIL, 2018). Urge que os profissionais de enfermagem estejam capacitados para prestar um cuidado de qualidade, integral e humanizado às pessoas com agravos renais assim como aprimorar as ações de prevenção para o agravo.

Considerando a necessidade constante de mudança e melhoria na assistência à saúde, as quais vêm sendo influenciadas pelo contexto histórico, político, econômico, cultural e social, o processo de enfermagem vem sendo aprimorado (CARPENITO, 2018). Por seguinte, o processo de enfermagem é referido pelo Conselho de Enfermagem que o denomina Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), considerando esta ser uma atividade privativa da enfermeira (o), regulamentada pela Lei do exercício profissional (BRASIL, 1986), complementada pela Resolução nº 358/2009 do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN, 2009). Logo, a SAE emerge como ferramenta operacionalizadora do processo de enfermagem, através da organização do trabalho, quanto ao método, instrumentos e pessoal, devendo ser realizada em todos os ambientes, públicos ou privados, no qual ocorre o cuidado

de enfermagem (COFEN, 2009). Consequentemente, o processo de enfermagem através da SAE, é um método para atender o outro de forma mais organizada e sistemática alicerçado nas seguintes etapas: histórico; diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação (ALFARO-LEFEVRE, 2014). Já a teoria de enfermagem funciona como um alicerce estrutural para implementar a SAE, considerando a importância de um marco conceitual que fundamente o cuidado e organização que o serviço almeja alcançar (TANURE, PINHEIRO, 2019). A partir dos pressupostos da teoria empregada, a enfermeira pode alinhar as atividades assistenciais e gerenciais, possibilitando a implementação de cuidados efetivos, eficientes, com foco no paciente e seguros.

Considerando a trajetória histórica, a referência pioneira é Florence Nightingale, em 1854 com adoção de práticas de enfermagem pautada no conhecimento científico através das técnicas de limpeza e organização do ambiente, importantes na prevenção de infecções sendo um marco a teoria ambientalista (NIGHTINGALE, 1898). Em 1955, Lydia Hall descreve pela primeira vez três fases para o processo de enfermagem: o histórico; o planejamento; e, avaliação (CAMPOS; DUTRA; ARAÚJO, 2004). Entretanto, o termo processo de enfermagem somente é definido pela primeira vez por Ida Orlando, em 1961, para explicar o cuidado de enfermagem. Três anos depois, em 1964, Wanda Horta inicia seus estudos e publicações e, apresenta aqui no Brasil, em 1970, o seu modelo para desenvolvimento do processo de enfermagem, fundamentado em uma abordagem humanista e empírica, a partir da teoria da motivação humana de Maslow (LEOPARDI, 1988). Seu modelo baseia-se nas leis do equilíbrio, da adaptação e do holismo. Segundo a autora (1979), a enfermagem deve reconhecer o ser humano, que tem necessidades humanas básicas, as quais são classificadas em psico-biológicas, psicossociais e psico-espirituais.

O objetivo desse trabalho é descrever a sistematização da Assistência de Enfermagem ao paciente renal pautado na teoria de Calista Roy.

METODOLOGIA

Trata-se de um relato de experiência que busca compreender e considerar a complexidade do ser humano, contribuindo para a aproximação da teoria com a prática. Este relato poderá subsidiar a qualidade do cuidado em saúde através da aplicação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), voltado paciente renal no contexto hospitalar.

Considerando a importância de se aliar uma teoria de enfermagem ao à pessoa com agravos renais a teoria da adaptação de Calista Roy (1991), propõe que o paciente é um ser biopsicossocioespiritual

com interações a depender das mudanças em sua vida e preconiza quatro modelos de adaptação: necessidades fisiológicas, autoconceito, papel funcional, interdependência. O primeiro modelo ou necessidades fisiológicas se organizam em cinco necessidades básicas: oxigenação; nutrição; eliminação; atividade e repouso; proteção. O segundo modelo é o modo de autoconceito que evidencia os aspectos psicológicos e espirituais do ser humano. Já o terceiro modelo divide-se em comportamentos instrumentais que se refere ao conjunto de papéis que o sujeito desempenha na sociedade e comportamentos expressivos que se relacionam às emoções, e os feedbacks. O último modelo é o modo de interdependência ou modo social que se relacionam às necessidades afetivas satisfeitas, de dar e receber afeto, amor, afeição, afirmação (ROY, ANDREWS, 1991). Roy propôs em sua teoria um processo de enfermagem composto por 6 fases.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A coleta de dados ou histórico de enfermagem do processo de enfermagem corresponde a 1ª e 2ª etapa do MAR. Vale ressaltar que nessa etapa é necessário considerar as informações que permeiam as dimensões subjetivas, objetivas, históricas e atuais da vida dos indivíduos. É um momento importante de contato e imersão com as crenças e costumes, hábitos e necessidades do outro.

É necessário, estar atenta às essas informações de cunho biomédico, dentre outras, como estado emocional e as condições de entendimento do indivíduo quanto ao procedimento a ser realizado, bem como envolver a família no processo do cuidado. No MAR, estaria incluso nessa etapa a avaliação dos estímulos, que auxilia o profissional de enfermagem a identificar circunstâncias internas ou externas que atuarão nos seus comportamentos. Nesta etapa, a teoria afirma existir três estímulos, o focal, o contextual e o residual. O primeiro, refere-se a própria condição da pessoa ou o contexto inserido ou ainda como isso vai impactar nos comportamentos assumidos, os quais foram avaliados na primeira fase. O contextual são aqueles elementos que permeiam diretamente o focal, interferem no modo de adaptação do indivíduo, a exemplo da idade, sexo, família, etnia e outros. Por último, os residuais são os estímulos indiretos, muitas vezes, não percebidos pela pessoa, mas que também contribuem no processo adaptativo (ROY, 1981).

Para tanto, a comunicação entre profissional e indivíduo deve se dar de maneira dialógica e negociada possibilitando a construção de um saber sobre o processo-saúde e doença mútua (ALVES, 2005). Desse modo, a enfermeira pode apropriar-se dos determinantes e condicionantes de saúde dos indivíduos e assim, planejar suas ações em consonância com as necessidades, na perspectiva do fomento a

autonomia e consequente melhoria e manutenção da saúde. A coleta de dados refere-se a coleta de informações sobre o estado de saúde a partir de dados coletados de forma direta ou indireta (outras fontes como familiares, amigos, prontuário). Nessa etapa o enfermeiro identifica indícios e realiza inferências. Após essa etapa é importante a confirmação dos dados e posterior agrupamento a depender da teoria utilizada, identificando os fatores causais e comunicando e registrando os dados em prontuário para se assegurar da continuidade da assistência (TANURE, PINHEIRO, 2019). Salienta-se que essa investigação deve ser guiada por teorias de enfermagem, inclusive com instrumento de coleta de dados, normas, rotinas e protocolos inerentes a mesma. No caso dos agravos renais, essa coleta de dados deve ser baseado nos quatro modelos de adaptação: necessidades fisiológicas, autoconceito, papel funcional, interdependência.

O exame físico quem vai dar os subsídios sobre as características fisiológicas da pessoa, como inspeção, ausculta, percussão e palpação. A palpação direta pode auxiliar a determinar o tamanho e mobilidade dos rins. À doença renal pode produzir dor sobre o ângulo costovertebral, o qual se situa onde à 12ª ou última costela se une à coluna vertebral. À ausculta do abdome (exatamente um pouco à direita e à esquerda da linha média em ambos os quadrantes superiores) é empreendida para avaliar sopros (sons murmurantes de baixa intensidade que indicam estenose da artéria renal ou um aneurisma de aorta. O paciente deve ser avaliado quanto ao edema e ganho de peso. É importante resgatar também o histórico completo de uso de medicações, além de cirurgias ou hospitalizações para tratar de problemas renais. Deve-se ser questionado sobre diversas questões como o seu padrão nutricional, padrão de eliminação, padrão de atividade e exercícios, padrão de sono, padrão cognitivo, dentre outros.

Nesse momento à enfermeira irá coletar dados e os principais problemas encontrados são: Pressão alta; Inchaço ao redor dos olhos e nas pernas; Fraqueza constante; Náuseas e vômitos frequentes; Dificuldade de urinar; Queimação ou dor quando urina; Urinar muitas vezes, principalmente à noite; Urina com aspecto sanguinolento; Urina com muita espuma; Dor lombar, que não piora com movimentos; História de pedras nos rins. dentre outros.

Cabe salientar que esses dados, somados à questões de ordem psicológica, social e espiritual darão subsídios para a formulação de diagnósticos, considerando que as enfermeiras tratam respostas humanas a problemas de saúde e/ou processos de vida com base na análise clínica e reflexiva das informações retidas. Cabe ressaltar que a realização do histórico precede de um roteiro que auxilia e

ordena a enfermeira para a coleta, validação, agrupamento e registro dos dados (CAMPOS; DUTRA; ARAÚJO, 2004).

Assim, ao término da coleta de dados, a enfermeira resume para o indivíduo o que foi dito, abrindo espaço para esclarecimentos e negociação, oportunizando a realização da educação em saúde já desde o início do processo (DAVINI, 2019; BRASIL, 2009).

A 2ª etapa do PE corresponde a 3ª fase do MAR ou diagnóstico de enfermagem estão ligados aos problemas encontrados e a elaboração de diagnósticos conforme adaptação positiva ou negativa do paciente, problemas potenciais e situações de bem estar referentes as condições biológicas, psíquicas, sociais e espirituais, uma vez que o foco do atendimento é a pessoa e não a doença. Essa etapa culmina na tomada de decisão ou seja: as respostas da pessoa, família ou coletividade humana que constituem a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados. Cabe salientar que os diagnósticos devem ser apresentados por prioridade e o grande diferencial do enfermeiro para o médico é eles diagnosticam doenças e nós diagnosticamos respostas humanas decorrentes de problemas de saúde e processos de vida, Essa fase será baseada na taxonomia II da NANDA International (*North American Nursing Diagnosis Association*) e deverá pautar-se nos quatro modelos de adaptação. A estrutura do NANDA-I contém sete eixos ou dimensões da resposta humana. Na taxonomia atual são organizados e aprovados 244 diagnósticos, distribuídos em 13 domínios e 47 classes. O diagnóstico de enfermagem é formado de componentes estruturais: título do diagnóstico, definição, fatores relacionados, características definidoras, condições associadas, fatores de risco e população em risco. Estes componentes estruturais irão compor 3 tipos de diagnósticos (1-Diagnostico com foco no problema- composto de título, fator relacionado e característica definidora, 2- Diagnósticos de risco- composto de título e fatores de risco e diagnósticos de promoção a saúde- composto de título, fator relacionado e característica definidora).

Os principais diagnósticos de enfermagem elaborados para à pessoa com agravos renais são:

Volume de líquidos excessivos relacionado à: Mecanismo regulador comprometido Evidenciado por: Edema; Ruído respiratório. adventício (sibilo); oligúria.

Padrão Respiratório Ineficaz Evidenciada por: Padrão respiratório anormal

Relacionado à: Fadiga

Troca de gases prejudicada evidenciada por: Padrão respiratório anormal

Relacionado à: Desequilíbrio na relação ventilação-perfusão

Risco de lesão por pressão evidenciado por restrição ao leito.

Risco de quedas devido à idade avançada.

Disposição para controle da saúde melhorado relacionado pelo desejo de melhorar o controle de regimes prescritos

Risco de religiosidade prejudicada evidenciado pela necessidade de participar de celebrações religiosas

Processos familiares interrompidos relacionados ao comprometimento do estado de saúde de um membro da família evidenciado por interrupção nas atividades sociais de costume.

A 3ª etapa do PE corresponde a 4 fase do MAR ou estabelecimento das metas são os resultados esperados ou comportamento final que se deseja alcançar. Essa fase é realizada após formular os diagnósticos estabelecendo objetivos e resultados esperados, e implantação e desenvolvimento de intervenções específicas. As intervenções de enfermagem são realizadas por meio das prescrições de enfermagem, com base no planejamento realizado (ALFARO-LEFEVRE, 2014). O resultado esperado deve ter relação com o diagnóstico de enfermagem, ser centrado no paciente, ser alcançável, conter limite de tempo, ser mensurável e ser objetivo. O registro e o monitoramento dos resultados esperados (RE) possibilitam obter indicadores capazes de apontar o quanto a equipe de enfermagem contribui para o atendimento das necessidades apresentadas por aqueles que demandam seus cuidados. Dessa forma os profissionais de enfermagem devem evitar que os diagnósticos de risco evoluam para problemas, minimizar ou solucionar os problemas e manter um diagnóstico com foco na promoção. O resultado esperado deve ser pautado no Nursing Outcomes Classification (NOC), o qual é uma taxonomia complementar a taxonomia da NANDA-I, dividida em 7 domínios (saúde funcional, saúde fisiológica, saúde psicossocial, conhecimento em saúde, saúde percebida, saúde familiar e saúde comunitária) e 32 classes, com 490 resultados de enfermagem (MOORHEAD et al., 2016). Dessa forma o enfermeiro pode avaliar suas condutas, mantê-las ou modifica-las de modo a melhorar a qualidade do cuidado prestada pela equipe de enfermagem.

Alguns resultados esperados dos diagnósticos do modo fisiológico.

Volume de líquidos excessivos Relacionado à: Mecanismo regulador comprometido Evidenciado por: Edema; Ruído respiratório. adventício (sibilo); oligúria. RE- Restaurar balanço hídrico. Indicador- balanço hídrico dentro do padrão de normalidade.

Padrão Respiratório Ineficaz Evidenciada por: Padrão respiratório anormal

Relacionado à: Fadiga. RE- Padrão respiratório dentro do padrão de normalidade. Indicador padrão respiratório entre 18 e 20 inc/min.

Troca de gases prejudicada Evidenciada por: Padrão respiratório anormal

Relacionado à: Desequilíbrio na relação ventilação-perfusão. RE- Melhora a troca de gases. Indicador: relação ventilação/ perfusão dentro da normalidade.

Risco de lesão por pressão evidenciado por restrição ao leito. RE- pele e mucosas não comprometidas. Indicador- integridade tecidual não comprometida.

Risco de quedas devido à idade avançada. RE- Ocorrências de queda: nenhuma; indicador: nenhuma queda da cama.

Disposição para controle da saúde melhorado relacionado pelo desejo de melhorar o controle de regimes prescritos. RE- Melhorar a condição de saúde. Indicador: Saúde melhorada.

Risco de religiosidade prejudicada evidenciado pela necessidade de participar de celebrações religiosas. RE- Saúde espiritual não comprometida. Indicador: interação com líderes espirituais não comprometido.

Processos familiares interrompidos relacionados ao comprometimento do estado de saúde de um membro da família evidenciado por interrupção nas atividades sociais de costume. RE- Processos familiares não comprometidos. Indicador: bem estar familiar.

A 4ª etapa do PE corresponde a 5ª etapa do MAR ou intervenção são os cuidados de enfermagem propriamente ditos para o alcance das metas.

Os cuidados relacionados aos diagnósticos são:

Volume excessivo de líquidos- Monitorar ingesta e eliminação; Monitorar albumina sérica e níveis proteicos totais; Monitorar a pressão sanguínea, frequência cardíaca e estado respiratório; Monitorar quanto a veias distendidas no pescoço, ruídos nos pulmões e edema periférico; Restringir e determinar ingesta de líquidos, conforme adequado; Realizar diálise, conforme prescrito, anotando as reações da paciente; Avaliar local e extensão de edema; Verificar a alimentação com a nutricionista: hipossódica e hipoprotéica.

Padrão respiratório ineficaz- Monitorar SSVV; principalmente FR e sat de O₂, Monitorar sons pulmonares; Posicionar a paciente para minimizar o esforço respiratório; Iniciar e manter o uso de oxigênio suplementar, conforme prescrito.

Troca de gases prejudicada-Monitorar o estado respiratório e de oxigenação; Instalar oxigenoterapia, conforme prescrição médica; Monitorar o fluxo de oxigênio; Aspiração conforme produção de muco; Administração de nebulização, conforme prescrição médica; Administração de, corticoides, antibióticos, conforme prescrição médica.

Risco de lesão por Pressão- Aplicar escala de braden, mudança de decúbito, uso de coxins e colchão pneumático, orientações de educação e saúde para pacientes e familiares sobre prevenção de lesões.

Risco de quedas- Aplicar escalas de risco de queda diariamente, deixar grades levantadas, orientar pacientes e familiares sobre ações preventivas para evitar quedas.

Disposição para controle da saúde melhorado- Estimular que a pessoa melhore as condições de saúde por meio do conhecimento, encaminhar para serviços que sejam necessários para sua melhora/ cura, incentivar o uso de medicações prescritas e terapêuticas.

Risco de religiosidade prejudicada- Autorizar a entrada do padre, estimular paciente a continuar suas orações, solicitar a família objeto que relembre sua fé (terço ou similares).

Processos Familiares interrompidos- Estimular a presença dos familiares; Otimizar um sono tranquilo, alívio da dor, controle emocional; Monitorar padrão de sono e quantidade de horas dormidas; Proporcionar ambiente calmo e seguro

A 5ª etapa do PE, corresponde a 6ª fase do MAR ou avaliação refere-se ao julgamento da eficácia das intervenções propostas. Ressalta-se que essa etapa é um processo contínuo de verificação de mudanças nas respostas do indivíduo para determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado. (COELHO, MENDES, 2011- <https://doi.org/10.1590/S1414-81452011000400026>).

Após a realização das intervenções, é realizado o acompanhamento e avaliação do cuidado ofertado, verificando se cada resultado foi alcançado (BRUNNER & SUDDARTH'S, 2018). Nos casos negativos, a enfermeira deverá avaliar novamente os resultados esperados e trabalhar junto com a equipe de saúde na formulação/mudanças nas ações para melhoria da condição de saúde deste indivíduo, e assim realizar o planejamento para a alta do indivíduo. A alta hospitalar é uma etapa importante da SAE, pois direciona o plano e a implementação das ações, no decorrer do período entre admissão e alta hospitalar, com a finalidade de prever a continuidade do cuidado ao cliente no domicílio (PEREIRA e col., 2007). A enfermeira através da identificação das necessidades do indivíduo na coleta de dados durante o histórico desenvolve um plano de ação completo para melhoria da saúde dessa pessoa. O

planejamento da alta é um acordo entre enfermeira, indivíduo e familiar desenvolvido ainda no hospital e que se estenderá à casa do indivíduo após sua alta. Segundo a OMS (2002) o planejamento da alta se torna uma estratégia de preparo do indivíduo e família para assumir responsabilidades pela continuidade do cuidado. Aspectos da educação em saúde são indispensáveis para a continuidade desses cuidados. A enfermeira durante o plano de alta, poderá formular um roteiro para ser entregue ao indivíduo contendo informações sobre o procedimento que foi realizado, os cuidados necessários além da orientação que qualquer alteração que seja identificada, retorne à unidade. A enfermeira desenvolve então seu planejamento visando adaptar o indivíduo promovendo medidas de enfrentamento à nova problemática.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entretanto, apesar dos avanços no conhecimento científico e tecnológico do profissional de enfermagem e do desenvolvimento de ferramentas que viabilizam a melhoria do seu serviço, as ações da enfermeira na atualidade estão quase sempre estabelecidas no modelo assistencial hegemônico, seguindo uma lógica tecnicista e intervencionista. Deste modo, a SAE ocorre de maneira fragmentada e sem continuidade das ações e avaliação dos resultados esperados, observando o indivíduo apenas pelo problema de saúde exibido e, trabalhando só com as necessidades fisiológicas, sem se atentar para as necessidades sociais, espirituais e emocionais dos indivíduos com agravos renais. Ao aplicar a SAE no indivíduo com agravos renais a enfermeira deve realizá-lo em todas as suas etapas, e utilizar os protocolos para oferecer um cuidado holístico e integral, visando a promoção da saúde, prevenção de risco potencial e adaptação diante das necessidades em saúde. Cabe ressaltar que a utilização da Prática baseada em evidências compreende o processo que integra a competência clínica individual e os resultados de pesquisa bem fundamentados (pautado em 5 etapas: definição do problema, identificação das informações necessárias, busca de estudos, avaliação da aplicabilidade dos dados obtidos e determinação de sua utilização para o paciente). Desta forma, urge que os enfermeiros realizem pesquisas para extrair os melhores níveis de evidência para prestar um cuidado seguro aos pacientes.

Para além da SAE ser trabalhada pautada na teoria da adaptação e com foco nas evidências, cabe salientar a importância da educação em saúde, a qual se constitui uma ferramenta importante para melhoria do cuidado e das condições de saúde e vida. A educação em saúde desenvolvida pela enfermeira é garantida pela lei do exercício profissional no artigo 8ª, onde a enfermeira participa de

atividades de educação em saúde, proporcionando uma melhor qualidade de vida do indivíduo, família e comunidade.

Por fim, cabe ressaltar que todo o processo de enfermagem voltado para a teoria da adaptação deve levar em consideração a segurança do paciente com estratégias voltadas para a gestão de riscos que têm sido implementadas a partir de padrões de acreditação hospitalar, criações de protocolos, guias, manuais e bundles. Todas essas estratégias podem estar atreladas aos diagnósticos de enfermagem de modo a minimizar complicações e assegurar maior segurança ao cuidado prestado.

REFERENCIAS

BRASIL. Conselho Federal de Enfermagem. Resolução 358/2009 Dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, e dá outras providências. Dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem e dá outras providências. Brasília, 2009. Disponível em: http://www.cofen.gov.br/resoluo-cofen-3582009_4384.html

BRASIL. Ministério da Saúde. Documento de referência para o Programa Nacional de Segurança do Paciente / Ministério da Saúde; Fundação Oswaldo Cruz; Agência Nacional de Vigilância Sanitária. – Brasília: Ministério da Saúde, 2014.

BOHLKE, M. Diagnóstico e tratamento da insuficiência renal aguda. Rev. Med. UCPel, Pelotas, v. 1, n. 1, jul./dez. 2003.

CHANES, M. SAE Descomplicada. São Paulo: Guanabara Koogan, 2018.

LEITE FCS, Estrela FM, Silva Júnior GM, Cerqueira MOS, Miranda MC, Oliveira TSR de, et al. Sistematização da Assistência de Enfermagem aplicada ao idoso com sepse. Rev enferm UFPE on line. 2020;14:e244715. DOI: <https://doi.org/10.5205/1981-8963.2020.244715>

LEOPARDI, M. T. Sister Callista Roy – teoria da adaptação. In: Teorias em enfermagem: instrumentos para a prática. Florianópolis: Papa-Livros, 1999. p.109-114.

MAZONI, Simone Roque et al . Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem e a contribuição brasileira. Rev. bras. enferm., Brasília , v. 63, n. 2, p. 285-289, Apr. 2010 .

NANDA. Diagnóstico de enfermagem da NANDA: definições e classificação 2018-2020.

ROY, S.C. ANDREWA, H. A. The Roy Adaptation Model. 2 ed. Stamford, Connecticut: Appleton & Lange, 1999.

TANNURE, MC, GONÇALVES, AMP. SAE - Sistematização Da Assistência De Enfermagem - 2ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2021.

ROTHROCK, J. C. Alexander - Cuidados de Enfermagem ao Paciente Cirúrgico. 13ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.

SILVA, Natália Chantal Magalhães da; OLIVEIRA, Ana Railka de Souza; CARVALHO, Emília Campos de. Conhecimento produzido sobre os resultados da "Nursing Outcomes Classification - NOC": revisão integrativa. Rev. Gaúcha Enferm., Porto Alegre , v. 36, n. 4, p. 104-111, Dec. 2015 .

SMELTZER, S. C.; BARE, B .G. BRUNNER & SUDDARTH. Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 12ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara -Koogan, 2011.

SOLANO, J.P.C. Frequência de sintomas no último ano de vida de idosos: avaliação de Necessidades em cuidados paliativos. 2009. 97p. Dissertação (Mestrado em Ciências). Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2009.

PRADO, Marta Lenise do et al . Arco de Charles Maguerez: refletindo estratégias de metodologia ativa na formação de profissionais de saúde. Esc. Anna Nery, Rio de Janeiro , v. 16, n. 1, p. 172-177, Mar. 2012 .

SANTOS, OFP et al. Insuficiência Renal Aguda. In: Condutas no Paciente Grave. 3ª ed. São Paulo: Atheneu, 2006, v.1.

SHARON, L. L. et.al. Tratado de enfermagem médico cirúrgica: avaliação dos Problemas clínicos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013- 1802p

TANNURE, MC, GONÇALVES, AMP. SAE - Sistematização Da Assistência De Enfermagem - 2ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2021.

Capítulo 2

10.37423/220105201

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO TRANSOPERATÓRIO DE COLEDOCOLITÍASE

Isabela Paixão de Jesus

Universidade Estadual de Feira de Santana

Monalisa Gois Brito

Universidade Estadual de Feira de Santana

Amanda Pereira de Oliveira

Universidade Estadual de Feira de Santana

Maria Helena Assis Oliveira Melo

Universidade Estadual de Feira de Santana

Suzane de Almeida Santos Barbosa

Universidade Estadual de Feira de Santana

Fernanda Matheus Estrela

Universidade Estadual de Feira de Santana

Tânia Maria de Oliveira Moreira

Universidade Estadual de Feira de Santana

Yasmim Lima da Silva Rocha

Universidade Estadual de Feira de Santana

Lizandra de Almeida Costa dos Santos

Universidade Estadual de Feira de Santana

Resumo: Introdução: a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é uma metodologia assistencial realizada por meio do Processo de Enfermagem. Consegue-se, por meio da SAE, a enfermeira implantar e operacionalizar o cuidado, possibilitando a identificação das necessidades humanas básicas afetadas nos pacientes internados nas unidades específicas, minimizando complicações. Objetivo: descrever a sistematização da assistência de enfermagem no transoperatório de coledocolitíase. Método: trata-se de um estudo qualitativo, descritivo tipo estudo de caso, realizado no setor do centro cirúrgico, no transoperatório, em um hospital geral de alta complexidade, por cinco discentes de Enfermagem, respeitando os aspectos éticos. Obtiveram-se a história clínica e a coleta de outras informações da paciente por meio de busca em prontuário. Aplicou-se, de modo a melhorar o cuidado prestado à paciente por meio da Sistematização da Assistência de Enfermagem. Resultados: apresentam-se, como resultados, os diagnósticos de Enfermagem, as intervenções de enfermagem. Conclusão: podem-se corroborar, deste feito, as intervenções propostas pelo plano assistencial de Enfermagem por meio da literatura, concluindo-se que o estudo atendeu ao seu objetivo e contribuiu para a formação acadêmica dos envolvidos, reafirmando o papel da Enfermagem como ciência.

Descritores: Enfermagem; Processo de Enfermagem; centro cirúrgico; coledocolitíase

INTRODUÇÃO

Sabe-se que a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é uma metodologia assistencial realizada por meio do Processo de Enfermagem. Por meio da SAE, a enfermeira consegue implantar e operacionalizar o cuidado, possibilitando a identificação das necessidades humanas básicas afetadas nos pacientes internados nas unidades específicas, minimizando complicações (TANURE, PINHEIRO, 2019). Acrescenta-se, dessa forma, que a Enfermagem consegue prestar o cuidado de forma profissional, científica, ética, com vistas à promoção, proteção, prevenção, reabilitação e recuperação da saúde.

O processo de enfermagem é constituído de um conjunto de etapas: coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação e avaliação, que focalizam a individualização do cuidado mediante uma abordagem de solução de problemas, a qual se fundamenta em teorias e modelos conceituais de enfermagem. Dentre essas etapas, o diagnóstico de enfermagem tem merecido destaque por se tratar de uma etapa dinâmica, sistemática, organizada e complexa do processo de enfermagem, significando não apenas uma simples listagem de problemas, mas uma fase que envolve avaliação crítica e tomada de decisão (GALDEANO, 2003). Dessa forma, a North American Nursing Diagnosis Association International (NANDA), fundado em 1982, formalizou um sistema de classificação que visa descrever e desenvolver uma fundamentação científica para a assistência em enfermagem e atender as respostas humanas e problemas de saúde e/ou processos da vida dos pacientes (GARCIA; NOBREGA, 2009).

O período transoperatório, que corresponde ao momento em que o paciente é recebido no Centro Cirúrgico até sua transferência para a Unidade de Recuperação Anestésica, é considerado um período crítico para o paciente, podendo levar a complicações no pós-operatório (GALDEANO et al, 2003). Diante disso, a implementação do processo de enfermagem neste período é de suma importância, pois irá subsidiar a equipe de enfermagem a identificar precocemente os problemas já existentes e os potenciais, de modo a intervir para reduzir possíveis danos e prejuízos. Brecho et al (2010) ressalta que o objetivo da enfermagem no transoperatório é a organização da assistência dentro de uma equipe multiprofissional, como meios para a implementação de seu processo de trabalho, através dos conhecimentos adquiridos na formação acadêmica, prática diária e de educação continuada.

Deste modo, o referido estudo pretende aplicar a SAE a um paciente com diagnóstico de coledocolitíase, doença que tem como principal etiologia a migração do cálculo da vesícula biliar para o colédoco. Cerca de 6 a 10% da população desenvolverá colelitíase, e, desses, 10% evoluirá com

coledocolitíase. Em aproximadamente 50% dos casos de coledocolitíase, os pacientes são assintomáticos, o que implica uma melhor avaliação de todo paciente com colelitíase (MELO et al, 2017).

Os critérios clínicos mais importantes são a presença de sinais como icterícia, colestase (colúria e acolia fecal) e colangite. Brasil (2019) ressalta que além desses sinais e sintomas os pacientes com coledocolitíase também podem apresentar dor abdominal em cólica no hipocôndrio direito, febre, náuseas e vômitos e alteração da função hepática (detectada pela elevação nos exames laboratoriais hepáticos) ou pancreática. Como critérios laboratoriais, baseia-se nos níveis elevados de bilirrubina total e direta, gama-glutamil transferase (gama-GT), fosfatase alcalina, transaminase oxalacética (TGO) e transaminase pirúvica (TGP). A ultrassonografia abdominal (USG) tem sido o exame de imagem mais usado para investigação primária da coledocolitíase, sendo de importante valor quando há dilatação da via biliar ou cálculo presente na mesma (VILELA et al, 2005). Faz –se necessário a compreensão desses critérios para que possa ser prestada uma boa assistência de enfermagem.

Outro método complementar para o diagnóstico de coledocolitíase é a colangiopancreatografia por ressonância magnética (CPRM), este apresenta uma sensibilidade de 95%, não é invasivo, é livre de radiação e tem baixos riscos. Pacientes com alto risco de apresentar cálculos biliares comuns e com vesícula biliar intacta geralmente realizam colangiopancreatografia endoscópica retrógrada (CPRE) com remoção de cálculos, seguida de colecistectomia eletiva, ou submetidos a colecistectomia com colangiografia intra-operatória, seguida de CPRE intraoperatória ou pós-operatória (BRASIL, 2019). Durante o procedimento a enfermeira observa rigorosamente quanto os sinais de depressão do sistema respiratório e nervoso central, hipotensão, sedação excessiva e vômitos, além de monitorar os líquidos intravenosos, administra os medicamentos e posiciona o paciente.

A vivência das discentes na assistência a paciente em transoperatório de coledocolitíase, gerou inquietações relacionadas ao tipo de assistência de enfermagem prestado a essa paciente. A complexidade de cuidados requeridos no período transoperatório, cujas condições de saúde podem variar de minuto a minuto, necessitando de intervenções de enfermagem fundamentadas em um método que privilegia a tomada de decisão, despertou o interesse em organizar a assistência de enfermagem com base no processo de enfermagem. Em virtude do exposto, este estudo de caso tem como objetivo geral descrever a sistematização da assistência de enfermagem no transoperatório de coledocolitíase.

METODOLOGIA:

Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo, tipo estudo de caso, que busca compreender e considerar a complexidade do ser humano, contribuindo para a aproximação da teoria com a prática. Poder-se-á este estudo subsidiar a qualidade do cuidado em saúde por meio da aplicação da SAE, com ênfase à pessoa com coledocolitíase no transoperatório.

Vivenciou-se o referido estudo por cinco discentes de Enfermagem da Universidade Estadual de Feira de Santana, em Feira de Santana (BA) - durante a carga horária prática (120h) do componente curricular Enfermagem na Saúde do Adulto e do Idoso II. Informa-se que o estudo de caso ocorreu no setor do centro cirúrgico de um hospital geral de alta complexidade, o qual atende à demanda espontânea da capital e do interior do Estado da Bahia.

Respeitaram-se os aspectos éticos da Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde no que tange aos princípios da bioética: autonomia; beneficência; não maleficência e justiça. Aprovou-se o estudo pelo comitê de Ética da Universidade Estadual de Feira de Santana sob o protocolo nº 3.706.976/2019.

Informa-se que o estudo de caso relatado foi de uma paciente com coledocolitíase para realização de colangiopancreatografia retrógrada Endoscópica (CPRE) para realizar Coledocolitíase.

Utilizou-se a SAE à paciente com choque séptico pautada nas seguintes etapas: 1) Histórico de Enfermagem: que se constitui pela coleta de dados da paciente e a busca por informações básicas sobre a mesma por meio de anamnese e exame físico a fim de definir os cuidados da equipe de Enfermagem; 2) Diagnóstico de Enfermagem: processo de agrupamento e interpretação dos dados coletados, promovendo o levantamento de problemas e a adequação desses a diagnósticos que vão nortear as intervenções de Enfermagem; 3) Planejamento de Enfermagem: nesta etapa, são determinados os resultados esperados e quais ações serão necessárias para tanto; 4) Implementação de Enfermagem: é a etapa de realização das ações de intervenção pensadas na etapa anterior; 5) Avaliação de Enfermagem: esta última trata do registro das ações de intervenção e de uma análise reflexiva sobre a efetividade e resultados dessas medidas a fim de que a assistência se aprimore.

RESULTADOS

Paciente M.S.F, procedente do município de Ichu – Ba, sexo feminino, 17 anos, solteira, parda, estudante (2º ano do ensino médio). Deu entrada no pronto atendimento do Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA) em ambulância via regulação. Apresentando dor abdominal em hipocôndrio direito

com sensação de peso, náuseas e hipertermia (38°C), sendo transferida para a sala Amarela Cirúrgica (SAC). Relatou sentir dor há mais de 1 (um) ano e que nas crises dolorosas recorria ao hospital da cidade de Ichu.

Após procedimento cirúrgico, paciente no 21 DIH. Encontrada no leito em pré-operatório imediato de colecistectomia, acompanhada pela mãe, em dieta zero a 12 horas. Consciente, orientada em tempo e espaço, respondendo às solicitações verbais. Acianótica, anictérica, eupnéica. Normotensa. Condições higiênicas satisfatórias. Pele íntegra, hidratada, Mucosa oral e ocular normocrômicas. Mantendo AVP em MSD. Ao exame do aparelho respiratório: tórax anterior normolíneo, íntegro e expansibilidade simétrica. Ausculta pulmonar: MVBD por todo o tórax. Ausculta cardíaca: bulhas rítmicas, normofonéticas (B1 e B2), ausência de sopros. Abdome plano, flácido, RHA hipoativos, dor à palpação em hipogástrio associado a cólica menstrual (SIC). Refere realizar eliminações urinárias frequentes, porém sem eliminações intestinais há 3 (três) dias. MMII: musculatura eutrófica, ausência de cianose, edemas e/ou varizes. SSVV: P.A: 110x70mmHg; FC:61bpm T: 36,3°C; FR: 10 inc/min P:69.

Exames laboratoriais revelam: Cálculos na vesícula biliar, pequena falha de enchimento no colédoco distal, proporcionando dilatação de vias biliares. Foi aplicado a SAE a referida paciente. Foi aplicado as cinco etapas da SAE.

Diagnóstico de enfermagem e cuidados de enfermagem:

PROBLEMA DE ENFERMAGEM	DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM SEGUNDO REFERENCIAL DA NANDA	CUIDADOS DE ENFERMAGEM
DIFICULDADE DE RESPIRAR	Troca de gases prejudicada Relacionada a: efeito sedativo de anestésicos Evidenciado por: suporte de O₂ Meta: Proporcionar troca gasosa adequada - Manter a permeabilidade das vias aéreas	✓ Conferir e testar, sempre antes de iniciar os exames, o aspirador, o oxigênio e o kit de intubação ✓ Instalar cateter de O₂ a 2l/min ou conforme recomendação médica ✓ Avaliar padrão respiratório (frequência e amplitude) ✓ Monitorizar a administração e eficácia de oxigenoterapia ✓ Avaliar o nível de consciência antes que sedativos sejam administrados

		✓ Monitorizar a gasometria arterial e a saturação de O₂ por oximetria capilar ✓ Avaliar sinais de insuficiência respiratória (respiração artificial, ruídos, estertores, batimento de asa do nariz)
HIPOTENSÃO	Débito cardíaco diminuído Relacionado a: uso de anestésicos e analgésicos opióides; Evidenciado por: Alteração na pressão arterial. Metas: controlar as oscilações da pressão arterial e evitar possíveis complicações.	✓ Checar e atentar para um bom funcionamento dos aparelhos na sala cirúrgica antes do procedimento cirúrgico; ✓ Verificar SSVV antes da cirurgia e de 15 em 15 minutos durante o procedimento, atentando para a variação da PA; ✓ Checar carrinho de emergência para possíveis complicações; Atentar para os fármacos utilizados e a administração, observando reações adversas e possíveis interações com outros fármacos.
DOR	Dor aguda Relacionado a: doença de base Evidenciado por: relato verbal de dor e expressão facial, sinal de Murphy + Meta: Reduzir a dor	✓ Avaliar características, intensidade e local da dor ✓ Aplicar escala numérica de dor ou outra escala pertinente ✓ Considerar escore de dor relatado pelo paciente ✓ Avaliar alterações de sinais vitais (pressão arterial, temperatura, frequências cardíaca e respiratória) ✓ Investigar fatores que aliviam/pioram a dor; ✓ Administrar analgésicos conforme prescrição médica ✓ Reavaliar dor após administração da medicação

LESÃO NA PELE	Integridade da tissular prejudicada Relacionado a: procedimento cirúrgico Evidenciado por: dano em membrana mucosa Meta: Propiciar a recuperação adequada da mucosa	✓ Auxiliar o médico da endoscopia na execução do procedimento; ✓ Avaliar condições da incisão cirúrgica ✓ Monitorar temperatura da pele do paciente ✓ Intervir e notificar possíveis intercorrências.
RISCO	Risco para lesão de posicionamento Relacionado a: transtornos sensoriais/perceptivos decorrentes da anestesia Evidenciado por: imobilidade na mesa cirúrgica	--

RISCO	Risco de hipotermia Relacionado a: anestesia local e geral combinadas Evidenciado por: Meta: Promover termorregulação - Promover conforto	✓ Controlar temperatura a cada 15 minutos e sucessivamente a cada 30 minutos ✓ Cobrir o paciente com cobertores ✓ Instalar manta térmica, se disponível ✓ Evitar descobrir o paciente desnecessariamente ✓ Monitorar cor, temperatura e umidade da pele ✓ Avaliar perfusão periférica ✓ Realizar todos os registros pertinentes no prontuário do paciente, relacionados aos diagnósticos identificados, às condutas tomadas pela equipe e às respostas do paciente
RISCO	Risco para infecção no sítio cirúrgico Relacionado a: procedimento invasivo, alteração na integridade da pele e exposição a patógenos. Evidenciado por: Metas: Prevenir infecção evitável	✓ Monitorar sinais e sintomas de infecção (dor, hiperemia, hipertermia e edema); ✓ Monitorar temperatura e frequência respiratória. ✓ Utilizar técnica asséptica durante a manipulação dos dispositivos invasivos; ✓ Registrar no prontuário o aspecto da pele, dispositivo invasivo; higienizar corretamente as mãos e utilizar luvas ao manipular os dispositivos;

RISCO	Risco para aspiração Relacionada a: nível de consciência diminuído, secundário a anestesia; Evidenciado por: intubação endotraqueal; Meta: Prevenir broncoaspiração - Prevenir complicações	✓ Monitorar nível de consciência, reflexo de tosse, náusea e capacidade de deglutir ✓ Posicionar o paciente em decúbito de 45°, no mínimo ✓ Manter a cabeça do paciente lateralizada, quando recomendado ✓ Manter aspirador disponível
RISCO	Risco para desequilíbrio de volume de líquidos Metas: Manter o equilíbrio hídrico Manter equilíbrio eletrolítico e ácido-básico	✓ Administrar hemoderivados se necessário e segundo prescrição médica ✓ Verificar condições de hidratação do paciente (mucosas, edema, pulso e frequência cardíaca) ✓ Monitorar níveis de eletrólitos séricos ✓ Verificar presença de sangramentos ✓ Realizar balanço hídrico
RISCO	Risco de choque Relacionado a: hipovolemia Evidenciado por: hemodinâmica intraoperatória Meta: Controle da hemorragia	✓ Monitorar a ocorrência de sinais de choque (p. ex., dificuldade respiratória, arritmias cardíacas, convulsões e hipotensão);
RISCO	Risco de temperatura corporal alterada Relacionado a: Evidenciado por: Meta: Prevenir alteração da temperatura	✓ Monitorar temperatura, padrão respiratório, pressão arterial e pulso - Avaliar cor, temperatura e umidade da pele ✓ Monitorar sinais e sintomas de hipotermia (queda de temperatura, tremor, piloereção) e de hipertermia (aumento de temperatura, rubor facial, sudorese)

RISCO	Desobstrução ineficaz de vias aéreas Relacionado a: efeito sedativo de anestésicos Evidenciado por: intubação Meta: Manter vias aéreas desobstruídas	✓ Monitorizar secreções respiratórias ✓ Monitorar a presença de cianose central e periférica ✓ Observar presença de secreções nasais e orais. ✓ Monitorização com oximetria de pulso; ✓ Avaliar a perfusão periférica
RISCO	Risco para reação alérgica Relacionado a: exposição a alérgeno. Evidenciado por: reação extrapiramidal a antiemético Meta: Controle da anafilaxia	✓ Identificar e remover a fonte do alérgeno, se possível; ✓ Iniciar infusão IV de solução salina normal, Ringer lactato ou expansor plasmático, conforme apropriado; ✓ Monitorar a ocorrência de sinais de choque (p. ex., dificuldade respiratória, arritmias cardíacas, convulsões e hipotensão); ✓ Administrar espasmolíticos, anti-histamínicos ou corticosteróides diante da presença de urticária, angioedema ou broncoespasmo, conforme indicado

FONTE: elaboração própria

DISCUSSÃO

Diante dos resultados obtidos, podemos analisar que a competência e atribuições da(o) enfermeira(o) vão além da checagem, anotações, manutenção e reposição de materiais e medicamentos em sala cirúrgica, pois cabe ao mesmo, durante o transoperatório, assegurar a integridade física do paciente, tanto pelo procedimento cirúrgico, como a agressão que podem ser causadas pelo ambiente do CC. O Sistema de Assistência de Enfermagem Perioperatória (SAEP) busca promover a assistência integral, continuada, participativa, individualizada, documentada e avaliada, no qual o paciente é singular e a assistência de enfermagem é uma intervenção conjunta que promove a continuidade do cuidado,

além de proporcionar a participação da família do paciente e possibilitar a avaliação da assistência prestada (FONSECA, PENICHE, 2009).

O enfermeiro é o responsável pelo planejamento e pela implementação de intervenções de enfermagem que previnam as complicações decorrentes do procedimento anestésico-cirúrgico, prestando assistência ao paciente juntamente com a equipe multiprofissional, ou seja, com o cirurgião, o anestesista e os técnicos de enfermagem. Desta forma, o enfermeiro identifica as alterações anatômicas e fisiológicas do paciente associadas ao tipo de anestesia, tempo cirúrgico e procedimento a que será submetido, para que não apresente complicações no pós-operatório. (MIRANDA, FOGAÇA et al, 2016)

A assistência de enfermagem no período transoperatório está diretamente ligada aos diagnósticos de enfermagem. Dentre os mais frequentes, foram elencados cinco diagnósticos reais: (Débito cardíaco diminuído troca de gases prejudicados, dor aguda, integridade tissular prejudicada e desobstrução ineficaz de vias aéreas), e nove diagnósticos de riscos: (risco para lesão perioperatória de posicionamento, risco de hipotermia, risco para infecção no sítio cirúrgico, risco para aspiração, risco para desequilíbrio de volume de líquidos, risco de sangramento, risco de choque, risco de temperatura corporal alterada e risco para reação alérgica).

A respiração por meio de uma sonda traqueal não é fisiológica, porém necessária, em muitas situações. O conhecimento da morbidade das vias aéreas relacionada à intubação e a compreensão da fisiopatologia das lesões e dos fatores predisponentes associados permitem-nos adotar medidas profiláticas, que certamente auxiliarão na redução dessas complicações.

A hipotermia é definida como temperatura central corporal menor que 36°C e consiste em evento comum para o paciente cirúrgico. Durante o procedimento anestésico cirúrgico, a hipotermia ocorre principalmente devido as alterações induzidas pelos agentes anestésicos sobre a fisiologia da termorregulação, a diminuição do metabolismo do paciente e a sua exposição ao ambiente frio da sala de cirurgia.(...) Talvez por ser um evento tão comum, frequentemente os profissionais de saúde consideram a hipotermia como algo inerente ao procedimento anestésico cirúrgico, ou talvez pela falta de conhecimento das complicações associadas a este evento ou ausência por parte da instituição de saúde de investimento técnico e financeiro na compra de sistemas efetivos. (POVEDA; GALVÃO, 2010). A manutenção da normotermia no período transoperatório é indispensável e o profissional de enfermagem pode utilizar de vários materiais de equipamentos para evitar grandes oscilações da

temperatura de pacientes. Compete a(ao) enfermeira(o) a identificação de fatores que podem levar a uma hipotermia e sua prevenção, assim, evitando complicações decorrentes deste evento.

Diante disso, observa-se que no período transoperatório a maioria dos diagnósticos de enfermagem encontrados são de risco, ou seja, os que podem ser evitados através da identificação precoce e da implementação de intervenções desempenhadas no plano de cuidados, o que ressalta a importância do processo de enfermagem na assistência prestada ao paciente cirúrgico.

CONCLUSÃO

O presente estudo de caso colaborou para o desenvolvimento do conhecimento teórico- científico sobre a coledocolitíase, no qual foi possível correlacionar a sua fisiopatologia com as manifestações clínicas apresentadas, bem como os problemas, diagnósticos e fatores de risco em sala cirúrgica. Sabe-se que a enfermagem exerce um papel importante na prevenção de agravos à saúde, realizando as intervenções necessárias de modo a evitá-los através da SAEP.

A assistência de enfermagem no perioperatório fornece ao paciente um entendimento completo do processo cirúrgico, preparando-o, fisicamente, bem como, psicologicamente para o enfrentamento de todo o processo. Nessa etapa é possível a criação de um vínculo de confiança entre paciente e profissional, favorecendo dessa forma a prestação de uma assistência individualizada, buscando prevenir futuros problemas de enfermagem e possibilitando uma melhor recuperação. Por fim, o estudo de caso permite que se analise o prognóstico, observando a eficiência ou não de toda sistematização realizada.

REFERÊNCIAS

BABULAL J. Colelitíase e Coledocolitíase em Doente Jovem. Tese de Mestrado. ICBAS. Jul. 2008/2009. Disponível em:<

<https://repositorioaberto.up.pt/bitstream/10216/21093/2/colelitiasecoledocolitiasedoentejovemfinal.pdf>> . Acesso em: 23 de Nov. 2019.

BARRETO, R.A.S.S; et al. A necessidade de informação do cliente em pré-operatório de colecistectomia. Rev.Min.Enf. v.13,n.3. Disponível em:< www.reme.org.br/artigo/detalhes/128> . Acesso em: 04 dez 2019

BRASIL. Ministério da Saúde. Colangiopancreatografia endoscópica retrógrada précirúrgica no tratamento de coledocolitíase. Relatório de recomendação- CONITEC. Brasília- DF. Abr. 2019. Disponível em:<file:///C:/Users/CCE/Downloads/Relatorio_colangiopancreatografia_endoscopica_retrograda_coledocolitiae_CP_32_2019.pdf>. Acesso em: 23 de Nov 2019.

BRASIL. Ministério da Saúde. Colangiopancreatografia endoscópica retrógrada précirúrgica no tratamento de coledocolitíase. Relatório de recomendação- CONITEC. Brasília- DF. Abr. 2019. Disponível em:<file:///C:/Users/CCE/Downloads/Relatorio_colangiopancreatografia_endoscopica_retrograda_coledocolitiae_CP_32_2019.pdf>. Acesso em: 23 de Nov 2019

FONSECA, R. M. P; PENICHE, A de C. G. Enfermagem em centro cirúrgico: trinta anos após criação do Sistema de Assistência de Enfermagem Perioperatória. Artigo de Revisão. Acta paulista enfermagem. São Paulo, SP. v.22, n. 4, pág:428-33.2009.

FONSECA, R. M. P; PENICHE, A. C. Enfermagem em centro cirúrgico: trinta anos após criação do Sistema de Assistência de Enfermagem Perioperatória. Acta paul. enferm. vol.22 no.4 São Paulo, 2009.

GALDEANO, L.E. et al. Diagnóstico de enfermagem de pacientes no período transoperatório de cirurgia cardíaca. Rev. Latino-Am. Enfermagem. vol.11 no.2. Ribeirão Preto, Mar./Abr. 2003. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1590/S0104-11692003000200009>>. Acesso em: 06 de dez. 2019.

GARCIA, T. R; NOBREGA, M. M. L. Processo de enfermagem: da teoria à prática assistencial e de pesquisa. Esc Anna Nery Rev Enferm jan/mar 2009; 13 (1): 188-193.

GIL, S.M, et al; Estudo da incidência de coledocolitíase em pacientes com colecistite calculosa aguda e crônica submetidos à colecistectomia vídeolaparoscópica. Rev. Col. Bras. Cir. vol.34 no.4 Rio de Janeiro Jul/Ago. 2007. Disponível em:<<http://dx.doi.org/10.1590/S0100-69912007000400003>>. Acesso em: 23 de Nov 2019.

LACY, C. F; ARMSTRONG, L. L; GOLDMAN, M. P; LANCE, L. L. Medicamentos Lexi-Comp Manole. 1ªedição. Barueri: Manole, 2009.

MELO, G.C; et al. Coledocolitíase: da suspeita ao diagnóstico. Arq. Med. Hosp. Fac. Cienc. Med. Santa Casa São Paulo. 2017; 62 (1): 35-41.

MELO, MC. Estado atual do tratamento da coledocolitíase. Ver. Bras. Videocir. 2003: 1(2): 71-76.

SMELTZER, S.C; BARE, B.G. Brunner & Suddarth: Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 9 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. vol. II;

VILELA, V.M; et al. Conduta na Coledocolitíase. Rev. Hosp. Univ. Juiz de Fora.vol 31, set/dez 2005.

Capítulo 3

10.37423/220105202

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA PRESTAÇÃO DE CUIDADOS AO PACIENTE COM HEPATOPATIA GRAVE FUNDAMENTADA PELA TEORIA DA ADAPTAÇÃO DE ROY

Vanessa Marcela Lima dos Santos

Universidade Estadual de Feira de Santana

Vivian Manuela Lima dos Santos

Universidade Estadual de Feira de Santana

Samara Santos Silva

Universidade Estadual de Feira de Santana

Lorena Santana Oliveira

Universidade Estadual de Feira de Santana

Beatriz Carvalho dos Santos

Universidade Estadual de Feira de Santana

Ana Clara Farias de Oliveira

Universidade Estadual de Feira de Santana

Tânia Maria de Oliveira Moreira

Universidade Estadual de Feira de Santana

Fernanda Matheus Estrela

Universidade Estadual de Feira de Santana

1 INTRODUÇÃO

A implantação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) subsidia maior qualidade na atenção em saúde uma vez que confere embasamento científico, respaldo e ordem ao serviço, bem como, metodiza o cuidado em etapas para identificação dos problemas, estabelecimento de diagnósticos, planejamento, implementação da assistência e avaliação crítica dos cuidados prestados ao paciente com hepatopatia. Segundo George *et al.* (2000) o Processo de Enfermagem (PE) proposto por Roy tem como foco a capacidade de adaptação do indivíduo em situações de doença e, a fim de auxiliar positivamente nesse processo, o PE subdivide-se em 6 fases, compreendidas como: avaliação do comportamento, avaliação do estímulo, diagnóstico de enfermagem, estabelecimento de metas, intervenção e avaliação da assistência (GEORGE *et al.*, 2000).

Pode-se considerar a hepatopatia avançada como uma condição crônica, desencadeada por diferentes patologias hepáticas capazes de afetar a funcionalidade, principalmente metabólica, do fígado. A integridade desse órgão, comprometida em algumas doenças, é de suma relevância para o seu adequado funcionamento (VERAS *et al.*, 2018). O paciente em questão possui hepatopatia avançada associada à cirrose hepática (CH), bem como agravos dela decorrentes: varizes esofágicas, encefalopatia, ascite e suspeita de peritonite bacteriana.

A CH é uma alteração na estrutura histológica do fígado, substituindo células funcionais por tecidos fibrosos incapazes de realizar funções de síntese e excreção. A cirrose causada pela ação tóxica do álcool trata-se da 10ª maior causa de morte e se apresenta através de náuseas, vômitos, anorexia, perda de peso e astenia. Há fatores de risco genéticos (sexo, hereditariedade), sociais e psicológicos, além dos relacionados a hábitos de risco, como o etilismo. Os meios de prevenção residem na adoção de um estilo de vida mais saudável e o tratamento se dá por meio da identificação da causa e suspensão da exposição, farmacoterapia, e realização de exames para a análise da evolução do quadro (GONÇALVES, 2009).

As varizes esofagianas são vasos sanguíneos dilatados na submucosa do esôfago, com surgimento em consequência da hipertensão Portal- aumento anormal da pressão sanguínea em veias calibrosas. Na maioria dos casos, os sinais e sintomas mais comuns são a hematêmese, melena, fraqueza e confusão mental, evidenciados apenas em estágios mais avançados onde os vasos sanguíneos rompem-se promovendo uma hemorragia digestiva. O tratamento consiste no manejo dos sintomas e, quando

não se consegue fazer o controle da pressão interna das varizes através do uso de farmacoterapia, intervenção cirúrgica (LABRECQUE *et al.*, 2014).

A formação da ascite é compreendida como uma complicação decorrente de hepatopatias e, de acordo com Silva (2008), conceitua-se enquanto “excesso de líquido na cavidade peritoneal”. O fígado pode reduzir-se ou distorcer-se na ocorrência de destruição progressiva de hepatócitos, ocasionando assim a hipertensão portal- principal fator para desencadear o quadro. Em pacientes com cirrose, a ascite pode acontecer em 50% dos casos. Para detectar o quadro ascético, é necessário realizar ultrassonografia e paracentese, e a forma de tratamento é realizada com diuréticos (diuréticos e espironolactona). Vale ressaltar que o tratamento é ineficaz em 15% dos pacientes (REIS *et al.*, 2019).

A Encefalopatia Hepática (EH) trata-se de um distúrbio neurológico desencadeado pela disfuncionalidade do fígado, podendo associar-se à cirrose, sangramento varicoso e ascite. Sendo o fígado responsável pela biotransformação e excreção de uma variedade de metabólitos, o comprometimento de sua função pode culminar no acúmulo de toxinas, principalmente amônia, desencadeando efeitos danosos à função cerebral. Alguns fatores, como infecções e sangramento gastrointestinal, são principiantes para episódios de EH. As manifestações envolvem alteração no padrão de sono e no nível de consciência, são reversíveis e manejáveis por meio de terapêutica nutricional e medicamentosa (BRANDÃO NETO, 2020a).

A Peritonite Bacteriana Espontânea (PBE) foi colocada enquanto suspeita diagnóstica, levando em conta as manifestações clínicas do paciente e o fato da hepatopatia avançada ser um fator de risco para o surgimento da infecção. A PBE consiste na contaminação do líquido ascítico presente na cavidade peritoneal, é uma complicação recorrente em pacientes acometidos por cirrose hepática grave com ascite, geralmente é acompanhada por sintomas como febre, dor abdominal e confusão mental. A principal forma de diagnóstico é a análise do líquido ascítico, no qual as células polimorfonucleares estão aumentadas. O tratamento se dá por meio da antibioticoterapia, onde é preferível o uso de cefalosporinas de terceira geração, onde destaca-se a ceftriaxona (BRANDÃO NETO, 2020).

O presente estudo justifica-se pela importância da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) na prestação do cuidado ao cliente com hepatopatia avançada nos serviços de saúde, embasada pela Teoria da Adaptação de Callista Roy. A escassez de pesquisas recentes acerca da temática também foi um fator inquietante durante a realização da busca do referencial teórico para a construção do estudo. Face ao exposto, o estudo objetiva relatar a experiência da Sistematização da Assistência de

Enfermagem ao paciente com hepatopatia avançada, fundamentada na aplicação da Teoria da Adaptação de Callista Roy.

2 METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem qualitativa, do tipo relato de experiência, que consiste em compartilhar uma vivência prática estabelecendo fundamentação teórica pertinente para descrevê-la e explorar suas especificidades, estando previstos a narração e reflexão em detrimento de experimentos.

O estudo foi realizado entre os dias 05 e 07 de outubro de 2021, durante prática hospitalar da disciplina obrigatória *Enfermagem na saúde do Adulto II*, ofertada no sexto semestre da graduação em Enfermagem na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), no Centro Cirúrgico de um Hospital Geral porta-aberta. A abordagem do paciente se deu, inicialmente, no Centro Cirúrgico- formada por diferentes espaços, com capacidade de proporcionar cuidado e recuperação do paciente, por meio de procedimento cirúrgico- e, posteriormente, na Sala Amarela masculina- destinada para pacientes estáveis.

O paciente estudado trata-se de um idoso, morador de uma cidade do interior da Bahia, do sexo masculino, negro, com histórico de etilismo e hepatopatia, portador de Diabetes Mellitus tipo 2 e Hipertensão Arterial Sistêmica, com múltiplas entradas hospitalares prévias para manejo dos sintomas e, principalmente, para a realização de Paracentese: procedimento para a retirada de líquido na cavidade peritoneal, denominado por Ascite (DECS, 2017).

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) ocorreu por meio da implementação das etapas abaixo:

1. Coleta de dado/ Histórico de Enfermagem;
2. Diagnósticos de Enfermagem;
3. Planejamento;
4. Implementação;
5. Avaliação.

Primeiramente, ocorreu coleta dos dados do prontuário (exames laboratoriais, prescrição médica e evolução de enfermagem), de informações com a acompanhante (filha) do paciente e, posteriormente, exame físico e anamnese. Em seguida, foi realizada a identificação dos problemas e

elaboração de diagnósticos segundo a Taxonomia II da *North American Nursing Diagnosis Association* (NANDA). O planejamento das intervenções foi feito embasando-se na Classificação de Intervenções de Enfermagem (*Nurse Interventions Classification* - NIC) e os resultados esperados foram determinados de acordo com a Classificação de Resultados de Enfermagem (*Nurse Outcomes Classification* - NOC). A partir disso, foram implementados os cuidados pertinentes e, posteriormente, ocorreu a avaliação da eficácia das medidas instituídas (BULECHEK, BUTCHER, DOCHTERMAN, 2016; HERDMAN, KAMITSURU, 2018; MOORHEAD *et al.*, 2018)

O estudo foi elaborado pelas docentes, do componente curricular anteriormente citado, como maneira de ampliar o conhecimento sobre a prática vivenciada e a aplicação de Teorias de Enfermagem na assistência ao paciente. Para a realização do relato foram seguidas as orientações da Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012).

3 RESULTADOS

Para facilitar o entendimento e expressar o que foi encontrado de maneira mais clara, os resultados serão expressos através da síntese do histórico de enfermagem do paciente e a evolução de enfermagem realizada em um dia de acompanhamento. Além disso, a sistematização da assistência será apresentada em quadros que detalham o estado do paciente e como a SAE foi implementada para atender as demandas do cuidado, com base no que foi proposto por Roy em sua teoria da adaptação.

3.1 HISTÓRICO DE ENFERMAGEM

P.A.C., 61 anos, sexo masculino, casado, lavrador aposentado, diabético, hipertenso, etilista, natural do município do interior da Bahia, 9º DIH. Foi atendido na UPA e encaminhado para o hospital, sendo admitido na sala vermelha apresentando afasia e inconsciência. No dia seguinte apresentou melhora, foi transferido para a Sala Amarela Masculina (SAM), onde começou a apresentar episódios de hematêmese. Desconhece patologias na família. Atualmente se encontra dependente para os cuidados de higiene, relata bom apetite e se alimenta adequadamente com dieta hipossódica. Refere sono satisfatório. Histórico de múltiplas paracenteses em internações anteriores. Emocionalmente, demonstra irritação e tristeza.

3.2 EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM

P.A.C. 8:00. Paciente internado na Sala Amarela Masculina (SAM), no 9º DIH, decorrente de hepatopatia avançada, LOTE, apresenta episódios de agitação, afebril, normotenso, taquipneico, restrito ao leito. Relata sono e apetite mantidos, diurese e dejeções presentes apresentando melena. Ao exame físico: apresenta cabelos encaracolados, grisalhos e bem distribuídos, pupilas isocóricas, mucosas normocrômicas, face simétrica; tórax plano, simétrico, indolor à palpação, ausência de ruídos adventícios e presença de ginecomastia; aparelho cardiovascular, ictus cordis palpável no 4º EICE, pulsação supra-esternal palpável, B1 e B2 rítmicos e normofonéticos; abdome doloroso e globoso, pele íntegra com coloração escurecida, cicatriz umbilical à esquerda da linha média devido à abaulamento na região umbilical relacionado à hérnia, RHA hipoativos em todos os quadrantes, som timpânico em todos os quadrantes, hepatimetria= 10 cm; geniturinário, em uso de fralda e SVD; MMSS em uso de AVP em antebraço E, extremidades acianóticas, sensibilidade tátil e dolorosa preservadas, força motora diminuída; MMII - Extremidades cianóticas e ictéricas com pequenas manchas hiperocrômicas espalhadas na região plantar, sensibilidade tátil e dolorosa conservadas, força motora diminuída. SSVV: Temp. 35,8 °C, PA: 110x80mmHg, FR: 23bpm.

3.3 CUIDADO SISTEMATIZADO

De acordo com os dados obtidos através do Histórico e Evolução de Enfermagem, foram listados problemas, estímulos e diagnóstico de enfermagem através da taxonomia NANDA-I (2018-2019), sendo categorizados de acordo com o modo adaptativo proposto por Callista Roy, que inclui o fisiológico, autoconceito, função do papel e interdependência (Quadro 1). Já no (Quadro 2), trata-se de diagnósticos baseados na taxonomia NANDA-I (2018-2019), resultados esperados obtidos através do NOC e intervenções de acordo com o NIC.

Quadro 1 - Modo adaptativo, estímulos e diagnósticos relacionados aos problemas identificados no paciente.

MODO ADAPTATIVO	PROBLEMA	ESTÍMULOS	DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM (NANDA)
FISIOLÓGICO	Hematêmese e melena	Focal: êmese e fezes com presença de sangue; Contextual: Redução do volume sanguíneo	Risco de sangramento evidenciado por hemorragia digestiva
	Volume abdominal aumentado	Focal: Ascite. Contextual: Hepatopatia avançada devido consumo abusivo de álcool.	Volume de líquidos excessivo relacionado a entrada excessiva de líquidos evidenciado por inquietação.
	Alteração na função neurológica	Focal: Inquietação; agitação. Contextual: Disfuncionalidade na função hepática (Encefalopatia Hepática).	Confusão aguda relacionada a alteração da função metabólica evidenciada por agitação
AUTOCONCEITO	Enfrentamento ao agravo de saúde	Focal: Apreensão; Resistência. Contextual: Inadaptação à rotina de procedimentos de tratamento à saúde.	Medo relacionado a reação aprendida a uma ameaça evidenciado por comportamentos de esquiva e estado de agitação
FUNÇÃO DO PAPEL	Restrição ao ambiente hospitalar	Focal: Angústia; Aborrecimento; Contextual: Dificuldade em estabelecer comunicação verbal	Interação social prejudicada relacionada a barreira ambiental evidenciada por função social prejudicada
INTERDEPENDÊNCIA	Relação familiar	Focal: Comunicação afetuosa. Contextual: Presença contínua de familiares acompanhantes.	Disposição para processos familiares melhorados evidenciado por (paciente) expressa desejo de melhorar a dinâmica familiar

Fonte: Autores e diagnósticos adaptados de NANDA.

Quadro 2 - Ordem de prioridade dos diagnósticos, resultados esperados e intervenções.

PRIORIDADE	Diagnóstico (NANDA)	Resultados Esperados (NOC)	Intervenções (NIC)
1	Risco de sangramento evidenciado por hemorragia digestiva	Controlar náuseas e vômitos; Promover estado de conforto; Melhorar coagulação sanguínea (hemostasia)	• Monitorar a ocorrência de perda repentina de sangue, desidratação grave ou sangramento persistente; • Checar todas as secreções quanto a sangue franco ou oculto; • Repor volume de sangue.
2	Volume de líquidos excessivo relacionado a entrada excessiva de líquidos evidenciado por inquietação.	Promover equilíbrio hídrico; Estabelecer sinais vitais.	• Administrar medicamentos diuréticos, conforme prescrição; • Solicitar ao nutricionista prescrição de dieta hipossódica; • Proporcionar conforto ao paciente.
3	Confusão aguda relacionada a alteração da função metabólica evidenciada por agitação	Proporcionar estado neurológico de consciência; Reduzir nível de agitação; Melhorar função gastrointestinal (excreção de toxinas).	• Monitorar condição neurológica; • Estabelecer comunicação simples e clara; • Manter condição hemodinâmica satisfatória; • Monitorar condição respiratória; • Administrar medicamentos, conforme prescrição médica.
4	Medo relacionado a reação aprendida a uma ameaça evidenciado por comportamentos de esquiva e estado de agitação	Melhorar autocontrole do medo; Aumentar autoestima; Favorecer enfrentamento	• Usar abordagem calma e tranquilizadora; • Tentar compreender a perspectiva do paciente em relação à situação temida; • Encorajar a expressão de percepções e medos; • Reduzir ou eliminar estímulos geradores de medo ou ansiedade; • Encaminhar para atendimento psicológico.
5	Interação social prejudicada relacionada a barreira ambiental evidenciada por função social prejudicada	Melhorar envolvimento social; Estabelecer habilidades de interação social.	• Estimular a interação com outras pessoas; • Promover a visita de um líder religioso (no caso do paciente ser pertencente à alguma religião); • Melhorar as habilidades de comunicação.
6	Disposição para processos familiares melhorados evidenciado por (paciente) expressa desejo de melhorar a dinâmica familiar	Favorecer bem-estar familiar; adaptar enfrentamento familiar.	• Encorajar a manutenção do contato com os membros da família; • Manter as oportunidades de visitas flexíveis para o atendimento das necessidades dos familiares e do paciente.

Fonte: Adaptado de NANDA, NIC e NOC.

4 DISCUSSÃO

A teoria da adaptação une à equipe de enfermagem com meios para prestação de cuidados que se valem da capacidade de enfrentamento do indivíduo. Segundo George (2000) a assistência de enfermagem embasada em Roy tem por objetivo promover à saúde do indivíduo através da oportunização de respostas adaptativas, dessa forma, o engajamento do paciente nas etapas de identificação dos comportamentos, dos estímulos, no estabelecimento das metas, nas intervenções e na avaliação deste tratamento é importante para que ele seja eficaz. As etapas do PE de Roy, as classificações de diagnósticos (NANDA-I), intervenções (NIC) e resultados de enfermagem (NOC) foram empregadas em vista da prestação de uma assistência integral e científica.

A presença de hematemese e melena, está ligada intimamente com a presença de varizes esofágicas ocasionadas pela hipertensão portal que é um quadro grave na evolução progressiva da cirrose hepática (LABRECQUE et al., 2014). Levando-se em consideração os fatores supramencionados, o paciente possui um risco iminente de sangramento, evidenciado por hemorragia digestiva alta. Desse modo, a monitorização da ocorrência de perda repentina de sangue, a checagem de todas secreções para avaliar se há presença de sangue franco ou oculto, consistem nas intervenções adotadas pela equipe de enfermagem no cuidado ao paciente hepatopata. O reestabelecimento do volume de sangue adequado se dá, entre outras maneiras, através da administração de hemoderivados (BUOZI et al., 2019).

Para o problema de ascite foi atribuído o diagnóstico de volume de líquidos excessivo, esse volume se concentra na cavidade abdominal e desdobra-se como um sintoma desconfortável, por conseguinte, o paciente pode ficar inquieto e irritado. Podemos observar que há uma lacuna no NANDA, pois não há um fator relacionado há patologias no fígado ou alteração na função metabólica. Nesse caso, foi estabelecido como objetivo o equilíbrio hídrico e como ações pertinentes oferecer dieta hipossódica para evitar a retenção hídrica, realizar a monitoração hídrica, administrar diuréticos (conforme prescrição médica) e proporcionar conforto ao paciente (REIS et al., 2019).

O paciente apresentava leve confusão aguda -distúrbio breve e reversível de consciência provavelmente associado à toxicidade, caracterizado por sinais e sintomas desencadeados no sistema nervoso central- expresso por comportamento agitado. No referido caso, a principal meta é que o paciente alcance estado de consciência, para isso há prescrição de cuidados como a avaliação neurológica (utilizando instrumentos como a Escala de Glasgow) e administração de fármacos pertinentes. A equipe médica apostou na Lactulose, mesmo havendo baixas evidências sobre a sua

eficácia, para diminuir a concentração de substratos prejudiciais. Em avaliação posterior, constatou-se adaptação satisfatória às ações implementadas, sendo observada melhora significativa do quadro, manifestada por estado calmo e lúcido (BITTENCOURT et al., 2011; HERDMAN, 2018)

O medo frente ao problema de saúde vivenciado foi perceptível no comportamento do paciente, provavelmente relaciona-se à alterações na função metabólica e tem por características definidoras a apreensão e resistência ao tratamento oferecido. Com isso, faz-se pertinente intervir a fim tornar o paciente mais confiante quanto a efetividade do tratamento ofertado, trazer informações que melhorem o autocontrole físico-emocional, tal qual promover o enfrentamento à condição crônica. O profissional de saúde tem papel fundamental no sucesso das ações, para isso, deve prestar assistência calma e tranquilizadora, tentando compreender a perspectiva do paciente em relação à situação temida, encorajar a expressão dos sentimentos e reduzir os estímulos geradores de medo ou ansiedade (HERDMAN; KAMITSURU, 2018).

O processo de adoecimento e necessidade de hospitalização culminam em mudança abrupta nas relações interpessoais, exemplificado através do afastamento do seio familiar, distanciamento dos demais grupos em que se insere e perda progressiva da autonomia social. A partir do momento que ocorre a restrição hospitalar, o paciente pode apresentar dificuldade em estabelecer vínculos de interação social, isso está intimamente ligado às condições ambientais e fisiológicas (OLIVEIRA et al., 2020). Nesse cenário, é válido frisar a importância da enfermagem na inserção de intervenções que busquem melhorar a sociabilidade, tais como habilidades de comunicação, a promoção da visita de algum líder religioso, no caso do cliente ser pertencente à alguma religião, além de incentivar a interação social com a equipe multidisciplinar, baseada em um diálogo franco e esclarecedor (BULECHEK; BUTCHER; DOCHTERMAN, 2016).

O âmbito familiar configura-se como uma rede de apoio dotada de vínculos afetivos, crenças e valores, sendo responsável pelo acolhimento e tomada de decisão. Cada núcleo familiar possui entendimentos distintos em relação ao processo de saúde-doença, fator contribuinte para atitudes tomadas frente a cada situação vivenciada. Tomando como base o modo adaptativo de interdependência, o paciente expressou sentimento voltado ao desejo de melhorar a dinâmica familiar. Sendo assim, foram elencadas metas que proporcionam bem-estar à família, além de promover a adaptação familiar frente ao quadro de doenças. Vale ressaltar a necessidade de encorajar o contato familiar, sempre que possível proporcionar visitas ao paciente, por conseguinte, estreitamento os laços e ampliando a interação com vistas na melhora do paciente. (CEGANO; SOUZA; JARDIM, 2008).

Diante da gama problemas apresentados pelo paciente, foram escolhidos os problemas principais para que se direcionasse o cuidado de forma a abranger os fatores biopsicossociais, focando sempre na busca por intervenções que tivessem impacto real, se não na recuperação do estado de saúde, na adaptação do paciente a sua condição crônica. A sistematização é um instrumento que proporciona cuidado mais metódico e, por isso, com mais chances de resultados eficazes. Salientamos, ainda, que a prestação de cuidados com respaldo científico, proporciona segurança maior tanto para o cuidador quanto para o cliente.

O presente estudo tem como ponto forte o fato de planejar e implementar um cuidado pensando no indivíduo como um ser integral. No que tange às limitações, infere-se que não é passível de generalizações, uma vez que se trata de estudo qualitativo que relata a experiência do cuidado a um único indivíduo.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através do estudo, evidenciou-se a importância da Sistematização da Assistência em Enfermagem (SAE) no cuidado ao paciente com hepatopatia avançada, de acordo com a implementação das Taxonomias NANDA-I, NIC e NOC, promovendo um cuidado mais científico e menos intuitivo.

A partir dos modos preconizados por Roy aplicados ao paciente, emergiram os modos fisiológicos, autoconceito, função do papel e interdependência, fatores que contribuíram para o cuidado integral, melhoria dos aspectos biopsicossociais, promoção do conforto e minimização de complicações futuras do cliente. A utilização da teoria de Callista Roy, propiciou a visualização da adaptação do paciente na prática.

Levando-se em consideração a necessidade de capacitação e desenvolvimento de criticidade na Enfermagem, nota-se a relevância de disponibilização de qualificar os profissionais por meio de ações que capacitem para a implementação da SAE. Destaca-se a importância de produção de conhecimento capaz de promover a disseminação de informações acerca da temática, uma vez que, durante a elaboração do estudo, pôde-se observar a escassez de pesquisas científicas recentes relacionadas a aplicabilidade da Teoria da Adaptação de Callista Roy.

REFERÊNCIAS

BITTENCOURT, P. L. et al. Encefalopatia hepática: relatório da 1ª reunião monotemática da Sociedade Brasileira de Hepatologia. GED gastroenterol. endosc. dig, p. 3-33, 2011. Disponível em: <http://files.bvs.br/upload/S/0101-7772/2011/v30nSep.1/a2801.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2021

BRANDÃO NETO, R. A. Encefalopatia hepática. In: VELASCO, T. D. et al. (ed.). Medicina de emergência: abordagem prática. 14ª Ed. São Paulo: Manole, 2020a, p.1040-1049.

BRANDÃO NETO, R. A. Peritonite bacteriana espontânea. In: VELASCO, T. D. et al. (ed.). Medicina de emergência: abordagem prática. 14ª Ed. São Paulo: Manole, 2020b, p.1040-1049.

BRASIL. Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 466 do Conselho Nacional de Saúde de 12 de dezembro de 2012. Aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Brasília, 2012. Disponível em:

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2013/res0466_12_12_2012.html. Acesso em: 16 out. 2021.

BULECHEK G.M.; BUTCHER H.K.; DOCHTERMAN J.M. Classificação das Intervenções de Enfermagem - NIC. 5. ed. São Paulo: Elsevier, 2016.

BUOZI, B. C. et al. Adequação das atividades da intervenção “administração de hemoderivados” da classificação das intervenções de enfermagem para pacientes adultos. Revista Mineira de Enfermagem, v. 23, p. 1-6, 2019. Disponível em: <https://www.reme.org.br/artigo/detalhes/1404>. Acesso em: 27 de out. 2021.

CEGANO, S., SOUZA, M. D., JARDIM, V. M. R. Compreendendo o contexto familiar no processo saúde-doença. Acta Scientiarum. Health Sciences. Rio Grande do Sul. v. 26, n. 1, p. 107-112, 4 abr. 2008. Disponível em: <https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciHealthSci/article/view/1622>. Acesso em: 23 out. 2021.

DESCRITORES EM CIÊNCIAS DA SAÚDE: DeCS. Paracentese. ed. rev. e ampl. São Paulo: BIREME / OPAS / OMS, 2017. Disponível em: <http://decs.bvsalud.org>. Acesso em: 09 de out. 2021.

GEORGE, J. B. Callista Roy. In: GEORGE, Julia B. et al. Teorias de enfermagem: os fundamentos para a prática profissional. 4ª Ed. Porto Alegre, ARTMED, 2000, p. 203-224.

GONÇALVES, L. I. B. Alcoolismo e cirrose hepática. Tese (Doutorado Integrado em Medicina) - Universidade da Beira Interior, (Covilhã), 2009. Disponível em:

<https://ubibliorum.ubi.pt/bitstream/10400.6/947/1/MESTRADO%20LISA%20GON%C3%87ALVES.pdf>. Acesso em: 22 de out. 2021.

HERDMAN, T.H.; KAMITSURU, S. Diagnósticos De Enfermagem da NANDA: Definições e Classificação. 11.ed. Porto Alegre: Artmed; 2018.

LABRECQUE, D. et al. Esophageal varices. World Gastroenterology Organization Practice Guidelines (WGO), v. 2014, p. 1-14, 2014. Disponível em:

<https://www.worldgastroenterology.org/UserFiles/file/guidelines/esophageal-varices-portuguese-2014.pdf> Acesso em: 16 de mar. 2021.

MOORHEAD, S. et al. Classificação dos resultados de enfermagem - NOC.5 ed. São paulo: Elsevier, 2010.

OLIVEIRA, F. A. de et al. O processo de transição saúde/doença em pacientes renais crônicos: contribuições para assistência de enfermagem. Revista da Escola de Enfermagem da USP, v. 54, 2020. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/reeusp/a/gNFZfZgDqk3JzRTmBJyPL6d/abstract/?lang=pt>. Acesso em 28 de out. 2021. REIS, S. P. et al. Ascite: complicação da cirrose. Cadernos da Medicina-UNIFESO, v. 2, n. 1, 2019. Disponível em:

<http://www.revista.unifeso.edu.br/index.php/cadernosdemedicinaunifeso/article/view/1351>. Acesso: 25 de out. 2021. SILVA, L. S. Manejo prático da ascite. Revista do Hospital Universitário Getúlio Vargas, v. 7, n. 1 e 2, p. 27-32, 2008. Disponível em:

<https://periodicos.ufam.edu.br/index.php/revistahugv/article/view/9604>. Acesso em: 23 de out. 2021. VERAS, R.S. C. et al. Perfil das doenças hepáticas crônicas no ambulatório do Unifeso. Cadernos da Medicina-UNIFESO, v. 1, n. 1, 2018. Disponível em:

<https://www.unifeso.edu.br/revista/index.php/cadernosdemedicinaunifeso/article/view/752>. Acesso em: 23 de out. 2021.

Capítulo 4

10.37423/220105206

APLICAÇÃO DA TEORIA DE ROY À UMA IDOSA COM COMPLICAÇÕES DA COVID-19

Fernanda Matheus Estrela

Universidade Estadual de Feira de Santana

Ayla Melo Cerqueira

Universidade Estadual de Feira de Santana

Déborah de Oliveira Souza

Universidade Estadual de Feira de Santana

Íris Cristy da Silva e Silva

Universidade Estadual de Feira de Santana

Analú Sousa de Oliveira

Universidade Estadual de Feira de Santana

Vanessa Sena da Silva

Universidade Estadual de Feira de Santana

Elidelma dos Santos Pinheiro

Universidade Estadual de Feira de Santana

Sthefane Nogueira de Azevedo

Universidade Estadual de Feira de Santana

Victória Freitas de Oliveira

Universidade Estadual de Feira de Santana

Carleone Vieira dos Santos Neto

Prefeitura Municipal de Salvador

Resumo: A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), é uma ferramenta para organização do cuidado que garante seguir com base no conhecimento técnico-científico um cuidar humano, eficaz e seguro. Assim, o presente estudo objetiva: desenvolver a SAE a uma paciente portadora de IRA e ICC- secundárias à covid-19, pautada na Teoria de Adaptação de Callista Roy e subsidiar a adaptação da paciente frente a sua condição clínica atual. Trata-se de um estudo de caso desenvolvido no setor Clínica Médica de um Hospital Geral Público do município de Feira de Santana-BA, por cinco discentes e uma docente de Enfermagem da Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS, através do componente curricular Enfermagem na Saúde do Adulto e Idoso II, no período de outubro a novembro de 2021, respeitando os aspectos éticos das resoluções 466/12 e 510/16. Como resultados estão apresentados os medicamentos em uso, diagnósticos e intervenções de enfermagem baseadas na teoria de Roy. É válido destacar que, os cuidados de enfermagem prescritos buscam promover uma adaptação do ser ao ambiente em que se encontra. Portanto, os objetivos foram alcançados, visto que houve a aplicabilidade da SAE à paciente apresentada, entretanto a teoria proposta deveria ser discutida dentro do meio acadêmico, assim como institucionalizada nos serviços de saúde, já que tal permite a abordagem completa ao paciente.

Palavras-chave: Cuidados de Enfermagem. Covid-19. Teoria de Enfermagem.

1. INTRODUÇÃO

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), é uma ferramenta para organização do cuidado que garante seguir com base no conhecimento técnico-científico, de forma que possa ser institucionalizado em qualquer ambiente hospitalar e ambulatorial, protocolos para que seja fornecido um cuidar humano, eficaz e seguro (DOTTO, 2017; QUEIROZ et al, 2020).

Dessa forma, ao sistematizar a assistência há uma promoção de um modelo integral rompendo as concepções do modelo biomédico (BARROS; LOPES, 2010), pois requer do enfermeiro uma aproximação e sensibilidade do paciente a qual possibilita a adaptação eficaz da pessoa enferma a situação na qual a mesma se encontra (SILVA et al, 2011).

Assim, o Processo de Enfermagem (PE) deve ser intencional, sistemático, flexível, dinâmico e baseado em uma teoria, com a finalidade de reduzir as necessidades individuais do paciente (SILVA; SILVA; GONZAGA, 2017). E para que isto aconteça de forma universal a Resolução N° 358 de 2019 dispõe que o PE é constituído de cinco etapas que se interrelacionam, são interdependentes e recorrentes: coleta/histórico de dados de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação e avaliação de enfermagem (COFEN, 2009).

Diante do exposto, o cuidado prestado a pacientes suspeitos, diagnosticados ou com complicações da Covid-19 deve ser pautado em um PE, com identificação de problemas, riscos e eventuais condições de promoção à saúde, onde a tomada de decisão da equipe multiprofissional deve ser feita baseada no conhecimento científico e na ética profissional (QUEIROZ et al, 2020).

Frente ao supracitado, a covid-19 é caracterizada por uma infecção respiratória aguda grave causada pelo vírus SARS-CoV-2, ocasionando diversos sinais e sintomas como: fadiga, febre, tosse, dor de garganta, cefaleia, diarreia e muitos indivíduos evoluem clinicamente para complicações secundárias à tal patologia (MORAES et al, 2020).

A IRA pode ser definida como uma patologia em que há uma redução abrupta da taxa de filtração glomerular (TFG), esta oriunda da infecção por covid-19 é multifatorial sendo provocada por citocinas que acarreta em uma inflamação renal, reduzindo aporte de oxigênio causando dano em múltiplos órgãos, ocasionando efeitos sistêmicos como uma desregulação inflamatória (SUASSUNA et al, 2020; POLONI; JAHNKE; ROTTA, 2020; GUEDES et al, 2017).

Neste cenário, a insuficiência cardíaca (IC) passa a chamar atenção, visto que pode ser um agravante para o desenvolvimento da infecção pandêmica, quanto uma das suas graves consequências, visto que

quando a cascata inflamatória é ativada, ocorre um impulso neuro-humoral fazendo com que o mecanismo fisiológico da covid-19 favoreça o desenvolvimento ou a descompensação da IC (GOLDRAICH et al, 2020).

Diante do exposto, esta patologia se caracteriza por sinais e sintomas como: dispneia, ortopneia e fadiga, havendo uma justaposição da sintomatologia de IC e covid-19 sendo para tal necessária a testagem maciça da população enferma a fim de um diagnóstico precoce ou eventual que descarte a hipótese das patologias mencionadas, sendo a investigação complementada com análise dos exames laboratoriais e de imagem (ROHDE et al, 2018).

Sendo assim, a progressão da covid-19 apresenta-se em três fases que podem ou não se sobrepor: infecção precoce, fase pulmonar e a hiperinflamação (FERNANDES et al, 2020), sendo esta intimamente relacionada com desenvolvimento de Insuficiência Renal Aguda, uma vez que as características fenotípicas da covid-19 aumentam o risco do desenvolvimento de tal complicação (SUASSUNA et al, 2020).

É válido ressaltar que a SAE possui um papel fundamental dentre os cuidados prestados para prevenir a IRA associada a infecção por SARS-CoV-2. Logo, destaca-se a relevância desses cuidados, tendo em vista que tais profissionais são responsáveis por diminuir a ansiedade, avaliar, planejar, dar continuidade e, até mesmo, modificar às intervenções que são fornecidas diretamente a pessoa enferma, viabilizando a melhora e adaptação do cliente no período de hospitalização (NOBRE et al, 2021).

Isso posto, a motivação para tal estudo surgiu diante do contexto epidemiológico em que nos encontramos frente a um período pandêmico e suas repercussões no processo saúde-doença de uma idosa portadora de complicações secundária à infecção por coronavírus, uma vez que a mesma não possuía tais patologias antes da hospitalização atual, que já dura em média dois meses.

Frente às considerações supracitadas, resolvemos desenvolver o estudo aplicando o PE baseado na Teoria da Adaptação, através da Taxonomia de Diagnósticos de Enfermagem propostos pela *North American Nursing Diagnosis Association* (NANDA). Assim, o presente trabalho objetiva: desenvolver a SAE a uma paciente portadora de IRA e ICC - secundárias à covid-19, pautada na Teoria de Callista Roy.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 TEORIA DA ADAPTAÇÃO DE CALLISTA ROY

As teorias de enfermagem subsidiam cientificamente o PE de modo a tornar a assistência integrada e individual. Especificamente a teoria de Callista Roy desvela a influência do ambiente no processo de saúde e adoecimento dos indivíduos, sendo a adaptação necessária para enfrentamento de tal situação, possibilitando ressignificar o quadro clínico apresentado (SOUSA et al, 2020).

Sendo assim, o modelo proposto por Roy perpassa pelos aspectos constitutivos: ambiente - influências externas que contribuem para alteração no prognóstico do indivíduo; saúde - manifestação do estado pontual; pessoa - possui particularidades, os quais geram metas de enfermagem diferentes que objetivam promover que os indivíduos possam responder adequadamente aos quatro modos adaptativos: fisiológico, autoconceito, função de papel e interdependência (SILVA et al, 2020).

O modo de adaptação fisiológico corresponde como o organismo da pessoa reage às influências ambientais, sendo composta por: nutrição, oxigenação, atividade e repouso, eliminação e proteção. O autoconceito refere-se aos aspectos psíquicos dos seres humanos. A função de papel diz respeito às funções que o ser desempenha na sociedade e a sua integração e relação com o meio social. O modelo de interdependência está voltado para as necessidades afetivas como amor e afeto (COELHO; MENDES, 2011).

Por conseguinte, toda resposta é desencadeada por meio de um estímulo que de acordo com Roy é dividido em: focais - refere-se aos problemas atuais apresentados e os mais difíceis dos indivíduos se adaptarem; contextuais - trata-se dos fatores envolvidos no ambiente ao qual o ser está inserido; e residuais - configuram-se como estímulos pautados na subjetividade que se relacionam ao problema, entretanto a mensuração é delicada (SOUZA et al, 2020).

Frente ao supracitado, a assistência de enfermagem com base na teoria de Roy visualiza o ser humano como alguém que deve ser cuidado em todas as dimensões. O indivíduo é submetido a uma situação que afeta a sua rotina e desenvolvimento e assim precisa se adaptar à nova circunstância. Desta forma, o restabelecimento das funções sociais através da manutenção do equilíbrio biopsicossocioespírito (BARBOSA; SILVA, 2018; IBIAPINA et al, 2016).

2.2. APLICABILIDADE DA TEORIA DE ROY À COVID-19

A aplicação da teoria proposta por Roy demonstrou-se eficaz para pacientes com covid-19 e que apresentem eventuais complicações da mesma, uma vez que sua concepção perpassa o cuidado integral e universal onde o indivíduo é receptor dos cuidados de enfermagem. Além disso, detém possibilidade de adaptação ao meio ao qual está inserido intervindo em tal situação a fim de contribuir para melhora do prognóstico clínico (BAVARESCO, 2020; PEREIRA et al, 2020).

O vírus da covid-19 ao infectar o corpo humano provoca alterações hemodinâmicas importantes, principalmente se o indivíduo já possuir comorbidades interferindo na fisiologia, nas relações afetivas e interações sociais. Além do psicológico, emocional e religiosidade que também serão impactados uma vez que em caráter de hospitalização faz-se necessário uma adaptação global, pois a homeostase corpórea e os fatores biopsicossociais e espirituais reduzem a probabilidade de agravamento do quadro clínico geral do paciente (ALMEIDA et al, 2020).

Frente ao supracitado, o modelo de Callista Roy relaciona-se intimamente com algumas interdependências da covid-19, uma vez os estímulos focais há uma correlação com os sinais e sintomas da covid-19. Já os estímulos contextuais estão ligados às comorbidades, como hipertensão e diabetes, e, além disso, ainda existem os estímulos residuais que são definidos como os fatores internos e externos relacionados à doença (ALMEIDA et al, 2020).

É válido ressaltar que, devido a diminuição do contato interpessoal proporcionado tanto pela covid-19, suas complicações e a hospitalização torna-se difícil a adaptação do indivíduo a sua nova condição clínica e limitações advindas da infecção que por vezes podem acarretar numa negação da mudança da rotina (LEANDRO; DUARTE, 2021). Dessa forma, a teoria da adaptação de Roy é extremamente válida para aplicação do PE do paciente que agora possui demais comorbidades causadas por um vírus ainda pouco conhecido.

3. METODOLOGIA

O presente trabalho é um estudo de caso que tem a finalidade de possibilitar o conhecimento detalhado acerca das necessidades e especificidades do indivíduo, viabilizando a elaboração de estratégias para resolução da problemática em questão (AGUIAR; CORREIA, 2019).

Sendo assim, este foi desenvolvido no setor Clínica Médica de um Hospital Geral Público do município de Feira de Santana-BA, por cinco discentes e uma docente do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS. Isso foi possível através da componente

curricular obrigatório Enfermagem na Saúde do Adulto e Idoso II mediante a carga horária prática de 120hs, no período de outubro a novembro de 2021.

O estudo foi realizado com uma paciente do sexo feminino, idosa, diagnosticada com HAS, DM, Colite, Obesidade, Covid-19 e como sequela de tal infecção: ICC e IRA. Dessa forma, utilizou-se a SAE e suas etapas: Coleta de dados de enfermagem- busca e investigação de elementos do biopsicossocioespiritual do indivíduo sendo subsidiado por fontes de anamnese, exame físico e prontuário; Diagnóstico de enfermagem- levantamento de problemas que fornecem recursos para intervenções pautadas no processo saúde doença do indivíduo; Planejamento de enfermagem- elencar metas e intervenções para resolução dos problemas diagnosticados em questão; Implementação- execução das intervenções planejadas; Avaliação- analisar se os resultados foram alcançados e os problemas solucionados (COFEN, 2009).

Diante do exposto, a coleta de dados foi realizada mediante anamnese com a paciente e acompanhante familiar da mesma para conhecimento acerca da história clínica e especificidades socioespirituais, realização de exame físico da paciente, além disso uma busca ativa no prontuário para conferir e obter informações acerca dos medicamentos em uso, evolução de enfermagem, registro dos sinais vitais (SSVV). É válido ressaltar que não foram encontrados os exames laboratoriais e de imagens nos registros da paciente.

Por conseguinte, para elencar os diagnósticos de enfermagem foi utilizado a NANDA, possibilitando elaboração de cuidados voltados para sanar os problemas do paciente e consequentemente traçar o plano assistencial com metas a serem desenvolvidas a fim de atender o indivíduo nas esferas fisiológicas, psíquicas, comportamentais, afetivas e sócio espirituais através da implementação da assistência planejada e posterior análise da resolutividade dos problemas e o prognóstico alcançado.

Dessa maneira o estudo seguiu a Teoria da Adaptação de Callista Roy, por se tratar de um olhar holístico que considera as particularidades da paciente, de modo a proporcionar uma adaptação à nova situação clínica que a mesma se encontra diante das limitações proporcionadas pelas comorbidades atuais, que quando se somam às pré-existentes promovem uma obrigatória mudança na rotina de vida (DANTAS et al, 2017).

Assim, o trabalho foi elaborado em consonância com a bioética, garantindo a execução dos princípios de beneficência, justiça, autonomia, não maleficência e equidade, respeitando as resoluções 466/12 e 510/16 que dispõem sobre as normas de pesquisas envolvendo seres humanos (BRASIL, 2012; BRASIL, 2016).

4. RESULTADOS

Nesta seção serão abordados os resultados analisados com base na Teoria da Adaptação de Callista Roy a qual possibilita o reconhecimento das necessidades adaptativas que são estimuladas através de alterações no ambiente externo e interno do indivíduo (SILVA et al, 2020).

4.1 HISTÓRIA CLÍNICA

Paciente do sexo feminino, 61 anos, com diagnóstico médico de: diabetes mellitus tipo 2 (DM2), hipertensão arterial sistêmica (HAS), insuficiência cardíaca congestiva (ICC), colite, obesidade e insuficiência renal aguda (IRA).

Foi admitida em 27 de agosto de 2021 na ala covid-19 devido a fadiga, entretanto diante do agravamento do quadro clínico no dia 15 de setembro a mesma foi transferida para UTI covid e com a melhora desta patologia e a suspeita de complicação renal. A mesma foi encaminhada para UTI normal onde recebeu o diagnóstico de IRA, já apresentando uma lesão por pressão (LPP) estágio 1 na região sacra. Com a estabilização do quadro clínico foi transferida para clínica médica, porém apresentou melena o que levantou a hipótese diagnóstica de colite e doença de Crohn. Portanto, recebeu o diagnóstico de colite assim foi encaminhada para estabilização e iniciou a diálise devido piora dos marcadores renais, sem melhora. A referida paciente foi transferida novamente para UTI onde realizou uma colonoscopia no dia 20 de outubro de 2021 para elucidação da hipótese diagnóstica de Doença de Crohn. Cabe salientar que com estabilização do quadro clínico e exames laboratoriais foi transferida para clínica médica (onde foi encontrada pelas autoras deste estudo) no dia 23 de outubro sendo que neste foi realizado balanço hídrico, devido a oligúria. No dia 25 fez uso de duas bolsas de hemoconcentrado possivelmente por conta da baixa de hemoglobina (Hb) e hematócritos (Ht). No dia 27 realizou diálise e, posteriormente a mesma rejeitou os cuidados da equipe. No dia 31 do referido mês foi realizado desbridamento cirúrgico da LPP que já encontrava-se em estágio 2. É válido ressaltar que a mesma teve alta hospitalar em 02 de novembro de 2021.4.2

4.2 EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM

09:00h - 28/10/2021: Paciente 62° DIH, diagnosticada com: DM2, HAS, ICC, colite, obesidade e IRA evoluindo nas últimas 24h consciente, lúcida, orientada em tempo e espaço, com leve **hipotensão no momento**, normocárdica, afebril, eupneica. Ao exame físico: hipocorada, mucosas hipocrômicas, pupilas simétricas e fotorreagentes; tórax simétrico e expansivo, MVBD; BCNF em 2T; abdome

globoso, flácido, indolor com presença de **equimose em região periumbilical**, cicatriz de cesárea em região suprapúbica, cicatriz em fossa ilíaca esquerda e RHA normoativos; presença de **LPP estágio 2** em região sacra com presença de tecido de granulação (70%) e esfacelo (30%), moderado exsudativo, com bordas bem definidas; MMSS força muscular preservada e presença de **equimose em dorso da mão D**; MMII com **força muscular diminuída, edema (+++/++++)**, extremidades acianóticas. Refere **eliminações intestinais diarreicas** de aspecto amarelado em uso de fralda. Em **uso de CVC** em femural E e **catéter de Sorensen** em femural D sem sinais flogísticos. Queixa-se de diarreia e **dor em região da LPP (7/10)**. Refere **tristeza decorrente a hospitalização desejo de receber alta hospitalar, saudade da igreja e dos familiares, medo de cair ao deambular**; SSVV: P.A= **90x50mmHg**; P= 76bpm; T= 37,7°C; FC: 61bpm; FR: 20inc/min.

Frente às considerações supracitadas e do caso clínico apresentado por meio da análise e observação do prontuário, exame físico e anamnese, foram elaborados os QUADROS 1 e 2 relacionados aos medicamentos em uso e problemas de enfermagem com aplicabilidade da Teoria de Roy.

QUADRO 1. Características farmacodinâmicas e farmacocinéticas dos medicamentos utilizados pela paciente.

FÁRMACOS	CLASSE	MECANISMO DE AÇÃO	INDICAÇÕES	REAÇÕES ADVERSAS	CUIDADOS DE ENFERMAGEM
Eritropoetina Humana Recombinante	Estimulante da eritropoiese (Hormônio glicoproteico)	Estimula a produção de EPO ao ligar-se aos receptores da mesma	Tratamento de anemia causada por IRC para indivíduos pré ou em diálise	Bradicardia, hipertensão arterial, diarreia, náuseas, policitemia, isquemia cerebral	Monitorar a PA; verificar sintomatologia característica de anemia; em casos de hipertensão, comunicar ao médico.
Insulina NPH	Antidiabético	Liga-se ao receptor insulínico na célula permitindo a entrada de glicose na mesma através do transportador GLUT-4	Tratamento do diabetes mellitus	Área eritematosa, prurido, lipodistrofias, resposta inflamatória ou infecções e hipoglicemia	Instruir o paciente sobre a importância de seguir o regime terapêutico e alimentar; o que fazer quando ocorrer hipoglicemia ou hiperglicemia e quais os sinais e sintomas; orientar sobre a automonitorização glicêmica.
Floralon	Probiótico	Propicia o desenvolve	Alterações momentâneas	Não foi descrito nenhum relato em	Caso haja a persistência dos

		nto da flora intestinal fisiológica, dificultando a proliferação de microorganismos maléficos ao TGI.	da flora intestinal e auxiliar no tratamento da diarreia causada por <i>Clostridium difficile</i> .	adultos até o momento.	sintomas por mais de 5 dias após o início da terapêutica, deve-se rever o diagnóstico para modificar o tratamento; Ter cuidado com interações medicamentosas.
Hidralazina	Antihipertensivo vasodilatador periférico de ação direta	Redução da pressão arterial em pacientes com HAS e da pós-carga em pacientes com IC	Hipertensão moderada e grave e IC alheia à terapia convencional	Palpitações; taquicardia, náuseas, dispneia, tontura, edema;	O uso do medicamento não deve ser suspenso de forma abrupta; orientar quais as reações comuns ao uso do fármaco e que o mesmo deve ser administrado na dose prescrita.
Isossorbida Minotrato	Vasodilatador coronariano	Acarreta a vasodilatação e diminui a pressão e o volume diastólico(a) final do VE, o que torna o consumo de oxigênio moderado	Controle preventivo e duradouro da angina pectoris.	Hipotensão, taquicardia, desmaio, dor abdominal, náusea, vertigem, cefaleia e tremor.	Informar ao paciente para não descontinuar o tratamento, mesmo que alcance melhora; Instruir a mudança de postura para reduzir a hipotensão postural.
Clopidogrel	Antiagregante e plaquetário	Inibe a ligação do difosfato de adenosina (ADP) ao seu receptor impedindo a agregação plaquetária,	Redução de eventos ateroscleróticos, como o IAM e AVC e morte cerebral	Cefaléia, tontura, fraqueza, síncope e maior risco de sangramento	Informar ao paciente sobre as reações adversas; Auxiliar na deambulação e transporte em caso de tontura; Administrar com alimentos para evitar dor epigástrica
Anlodipino	Antihipertensivo bloqueador dos canais de cálcio	Antagoniza o canal de cálcio e impossibilita entrada de tal íon para o interior do músculo cardíaco liso	Angina estável ou angina variante	Cefaleia, edema, vertigem, fadiga, sonolência.	Orientar sobre a importância do uso adequado do fármaco; monitorar interações medicamentosas, reações adversas e pressão arterial.

Vancomicina	Antibiótico	Possui ação bactericida, que ao ligar-se a parede bacteriana causa lise celular;	Tratamento de infecções potencialment e fatais;	Hipotensão, nefrotoxicidade, leucopenia, flebite, dor nas costas e pescoço;	Administrar conforme prescrição; informar sobre os efeitos adversos; avaliar sinais de infecção e superinfecção antes da administração, caso sejam detectados o tratamento deve ser suspenso.

Fonte: Realizada pelos autores através de busca no prontuário, baseada em MARTINS, A. C. et al (2019).

Nota: Na tabela não constam todos os medicamentos utilizados pela paciente no âmbito hospitalar, os quais totalizavam 15.

enfermagem e o método de ajuda envolvidos em cada ação e as respectivas intervenções necessárias para o alcance das metas.

QUADRO 2. Diagnósticos e metas do cuidados de Enfermagem com base na Teoria da Adaptação de Roy.

PROBLEMAS DE ENFERMAGEM	DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM	MODO ADAPTATIVO	ESTÍMULOS	INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO
Hipotensão	Débito Cardíaco Diminuído; <i>Relacionado à:</i> alteração da pressão arterial; <i>Evidenciada por:</i> hipotensão;	Fisiológico	Focal	Exame Físico
Hipocorada Mucosas hipocrômicas	Perfusão tissular periférica ineficaz <i>Relacionada à:</i> Insuficiência cardíaca, hipertensão e diabetes melito; <i>Evidenciada por:</i> Mucosas hipocrômicas e pele hipocorada;	Fisiológico	Focal	Exame Físico
Equimose em região periumbilical e em dorso da mão esquerda	Integridade da pele prejudicada <i>Relacionado à:</i> Punção arterial <i>Evidenciada por:</i> Equimose em região periumbilical e em dorso da mão esquerda	Fisiológico	Focal	Exame Físico
Diarreia	Diarreia <i>Relacionado à:</i> Inflamação gastrointestinal e irritação gastrointestinal; <i>Evidenciada por:</i> Evacuação de fezes líquidas;	Fisiológico	Focal	Anamnese
LPP em região sacra	Integridade tissular prejudicada <i>Relacionada à:</i> Mobilidade e circulação prejudicada; <i>Evidenciada por:</i> LPP estágio 2 em região sacra;	Fisiológico	Focal	Exame Físico
Edema	Volume de líquido excessivo; <i>Relacionada à:</i> Mecanismo de regulação comprometido, IRA;	Fisiológico	Focal	Exame Físico

	<i>Evidenciado por:</i> Edema			
Força muscular diminuída	Mobilidade física prejudicada; <i>Relacionada à:</i> Força muscular diminuída; <i>Evidenciado por:</i> diminuição da amplitude do movimento;	Fisiológico	Focal	Exame Físico
Uso de CVC e catéter de soro	Risco de infecção <i>Relacionada à:</i> Procedimento invasivo;	Fisiológico	Focal	Exame Físico
Dor em região da LPP	Dor aguda <i>Relacionada a:</i> Lesão por pressão; <i>Evidenciado por:</i> Relato de dor em escala 7/10;	Fisiológico	Focal	Anamnese
Tristeza decorrente da hospitalização	Baixa autoestima situacional; <i>Relacionada a:</i> alteração no papel social, doença física; <i>Evidenciado por:</i> relato verbal;	Interdependência	Residual	Anamnese
Saudade da igreja	Religiosidade prejudicada <i>Relacionado a:</i> barreira ambiental à prática da religião; <i>Evidenciado por:</i> relato da paciente;	Autoconceito	Contextual	Anamnese
Desejo de receber alta	Disposição para controle da saúde melhorado <i>Relacionado a:</i> desejo de receber alta; <i>Evidenciado por:</i> relato da paciente	Função de papel	Contextual	Anamnese
Saudade dos familiares	Processos familiares interrompidos <i>Relacionado a:</i> mudança do estado de saúde de um membro da família <i>Evidenciado por:</i> mudança no padrão de comunicação e mudança nos padrões de relacionamento	Interdependência	Contextual	Anamnese

Medo de cair ao deambular	Medo <u>Relacionado a:</u> separação do sistema de apoio <u>Evidenciada por:</u> relato verbal de sensação de medo	Autoconceito	Contextual	Anamnese

Fonte: Autoria própria baseada nos Diagnósticos de enfermagem da NANDA-I (HERDMAN e KAMITSURU, 2018), na Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC) (BULECHEK, G. M.; BUTCHER, H. K.; DOCHTERMAN, J. M, 2010) e na Teoria da Adaptação de Callista Roy (ROY, 2001).

O QUADRO 3 elenca as metas e intervenções de enfermagem necessárias para promover a adaptação da paciente, mediante os problemas de enfermagem apresentados anteriormente.

QUADRO 3: Metas e intervenções de enfermagem para o caso clínico apresentado

DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM	META	RESULTADOS ESPERADOS	INTERVENÇÕES	APRAZAMENTO
Débito Cardíaco Diminuído Relacionado à: alteração da pressão arterial; Evidenciada por: hipotensão;	Promover a manutenção de débito cardíaco suficiente;	Garantir a perfusão sanguínea adequada;	Prioritária: Avaliar os SSVV a cada 6h Complementar/adicional: Monitorar e Avaliar os sinais e sintomas de hipotensão; Realizar uma avaliação abrangente da circulação periférica a cada 6h; Orientar família quanto aos sinais de alterações do sistema cardiovascular ; Monitorar o equilíbrio hidroeletrólítico;	08h; 14h; 20h; 02h; No período; 08h; 14h; 20h; 02h; No período; No período;
Perfusão tissular periférica ineficaz <u>Relacionada à:</u> Insuficiência cardíaca, hipertensão e diabetes melito;	Restabelecer perfusão tissular;	Propiciar perfusão tissular eficaz;	Prioritária: Posicionar o paciente para uma perfusão excelente; Adicional/ Complementar: Monitorar as mucosas, turgor da pele e sede;	No período; No período;

<u>Evidenciada por:</u> Mucosas hipocrômicas e pele hipocorada;			Investigar as mucosas orais do paciente, a esclerótica e a pele em busca de indicações de equilíbrio hídrico alterado;	No período;
Integridade da pele prejudicada <u>Relacionado à:</u> Punção arterial <u>Evidenciada por:</u> Equimose em região periumbilical e em dorso da mão esquerda	Restabelecer integridade da pele;	Garantir continuidade integral da pele;	Prioritária: Manter uma hidratação adequada para diminuir a viscosidade do sangue; Complementar/adicional: Comparar e registrar regularmente todas as mudanças na lesão; Implementar o cuidado das feridas, conforme apropriado.	No período; No período; No período;
Diarreia <u>Relacionado à:</u> Inflamação gastrointestinal e irritação gastrointestinal; <u>Evidenciada por:</u> Evacuação de fezes líquidas;	Promover motilidade gastrointestinal suficiente;	Propiciar eliminações dentro da normalidade;	Prioritária: Monitorar a ocorrência de sinais e sintomas de diarreia. Complementar/adicional: Avisar o médico sobre aumento na frequência ou intensidade dos sons intestinais; Realizar atividades que proporcionem descanso intestinal (p. ex., NPO, dieta líquida); Orientar sobre dieta com baixo teor de fibras, elevado teor proteico e calórico, conforme apropriado.	No período; No período; No período; No período;
Integridade tissular prejudicada <u>Relacionada à:</u> Mobilidade e circulação prejudicada;	Restabelecer a integridade tissular	Estabelecer perfusão sanguínea suficiente para atender as demandas teciduais;	Prioritária: Realizar troca do curativo diariamente ou conforme necessidade e com técnica asséptica; Complementar/adicional: Mudança de decúbito a cada duas horas;	10h; 8h; 10h; 12h; 14h; 16h; 18h; 20h; 22h; 00h;

<u>Evidenciada por:</u> LPP estágio 2 em região sacra;			Estimular deambulação; Hidratar a pele. Manter roupas de cama limpa, seca e esticadas; Iniciar programa de fortalecimento da musculatura respiratória diariamente após banho;	No período; No período; No período; 8:30h;
Volume de líquido excessivo; <u>Relacionada à:</u> Mecanismo de regulação comprometido, IRA; <u>Evidenciado por:</u> Edema;	Promover redução do edema em MMII	Promover menor retenção de fluídos;	Prioritária: Monitorar a ingestão e eliminação de líquidos; Complementar/adicional: Monitorar a ocorrência de sinais de sobrecarga hídrica (p. Ex., roncos, distensão da veia jugular, edema e aumento das secreções pulmonares); Avaliar a localização e extensão do edema, se presente;	No período; No período; No período
Mobilidade física prejudicada; <u>Relacionada à:</u> Força muscular diminuída; <u>Evidenciado por:</u> diminuição da amplitude do movimento;	Reestabelecer a mobilidade física;	Promover mobilidade adequada;	Prioritária: Estimular aumento de mobilidade e exercícios, conforme apropriado; Adicional/ Complementar: Auxiliar o paciente a deambular usando o corpo como muleta humana, conforme apropriado; Dar encorajamento ao paciente quando aprender a transferir-se de forma independente;	No período No período No período
Risco de infecção <u>Relacionada à:</u> Procedimento invasivo;	Evitar que a infecção se instale;	Evitar infecção durante o período de internação;	Prioritária: Manter técnica asséptica sempre que manipular o dispositivo de acesso venoso. Complementar/adicional: Monitorar aparecimento de sinais e sintomas	No período; No período;

			associados a infecção local e sistêmica (p. Ex., hiperemia, edema, sensibilidade, febre, mal-estar); Trocar cateter, curativos e protetores conforme o protocolo da instituição; Manter a permeabilidade com solução salina, conforme indicado;	No período; No período;
Dor aguda <u>Relacionada a:</u> Lesão por pressão; <u>Evidenciado por:</u> Relato de dor em escala 7/10;	Promover o alívio da dor	Assegurar ausência de dor;	Prioritária: Administrar analgésico conforme prescrição médica; Adicional/ Complementar: Realizar uma avaliação completa da dor; Reduzir ou eliminar fatores que precipitam ou aumentam a experiência de dor; Aplicar métodos não farmacológicos como controle da luminosidade;	No momento e S/N; No período; No período; No período;
Baixa autoestima situacional; <u>Relacionada a:</u> alteração no papel social, doença física; <u>Evidenciado por:</u> relato verbal;	Promover melhora da autoestima da paciente durante período de internação;	Recuperar autoestima e mantê-la durante hospitalização;	Prioritária: Facilitar um ambiente e atividades que aumentem a autoestima. Adicional/ Complementar: Transmitir confiança na capacidade do paciente para lidar com a situação; Auxiliar o paciente a aceitar a dependência dos outros, conforme apropriado; Monitorar os níveis de autoestima ao longo do tempo, conforme apropriado.	No período; No período; No período; No período;
Religiosidade prejudicada <u>Relacionado a:</u> barreira ambiental à prática da religião; <u>Evidenciada por:</u> relato da paciente;	Possibilitar que a paciente consiga manter sua religiosidade dentro do ambiente hospitalar;	Favorecer manutenção da espiritualidade durante o processo de hospitalização;	Prioritária: Investigar e encorajar comportamentos que contribuam ao crescimento e desenvolvimento da fé. Complementar/adicional: Auxiliar a identificar recursos que ofereçam a “segurança” religiosa e o apoio do indivíduo e do grupo;	No período; No período;

			Flexibilizar visita de líder religioso; Oferecer apoio interpessoal com regularidade, conforme a necessidade; Oferecer-se para rezar por relações saudáveis e de oferecimento da vida consigo, com Deus/Poder Maior e com outros, conforme apropriado.	No período; No período; No período;
Disposição para controle da saúde melhorado <u>Relacionado a:</u> desejo de receber alta; <u>Evidenciada por:</u> relato da paciente	Promover educação em saúde voltado ao quadro clínico da paciente;	Encorajar empenho da paciente em cuidar adequadamente da sua saúde;	Prioritária: Orientar o paciente quanto a seu quadro clínico; Adicional/ Complementar: Estimular o autocuidado; Conscientizar da importância da manutenção do tratamento; Identificar as necessidades de ensino do paciente para o cuidado após a alta.	No período; No período; No período;
Processos familiares interrompidos <u>Relacionado a:</u> mudança do estado de saúde de um membro da família <u>Evidenciada por:</u> mudança no padrão de comunicação e mudança nos padrões de relacionamento	Assegurar continuidade do vínculo familiar apesar da hospitalização;	Estimular interação familiar de modo a melhorar o estado biopsicossocioespíritoal do paciente;	Prioritária: Providenciar mecanismos para que os membros da família mantenham a comunicação com outros familiares; Adicional/ Complementar: Manter as oportunidades de visitas flexíveis para o atendimento das necessidades dos familiares e do paciente; Encorajar a manutenção do contato com os membros da família, conforme apropriado.	No período; S/N; No período;
Medo <u>Relacionado a:</u> separação do sistema de apoio <u>Evidenciada por:</u> relato verbal de sensação de medo	Assegurar a segurança do paciente	Restabelecer confiança do paciente para deambulação	Prioritária: Reduzir ou eliminar estímulos geradores de medo ou ansiedade. Adicional/ Complementar: Promover expectativas otimistas, mas realistas; Dar oportunidade para a discussão de fatores que influenciam o medo de cair;	No período; No período; S/N;

			Estimular programas de exercícios de baixa intensidade, com oportunidades para partilhar sensações.	No período;

Fonte: Autoria própria baseada nos Diagnósticos de enfermagem da NANDA-I (HERDMAN e KAMITSURU, 2018), na Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC) (BULECHEK, G. M.; BUTCHER, H. K.; DOCHTERMAN, J. M, 2010) e na Teoria da Adaptação de Callista Roy (ROY, 2001).

5. DISCUSSÃO

O PE baseado na Teoria da Adaptação é constituído por fases: avaliação comportamental, de estímulos, elaboração dos diagnósticos de enfermagem, a partir de então há estipulação de ações e objetivos, para posteriormente ocorrer a implementação e avaliação (DANTAS et al, 2017).

Dessa maneira, as etapas primordiais se baseiam na análise de reações comportamentais do indivíduo frente a estimuladores internos e externos. Tal fato corrobora para aprimoramento de intervenções e planejamento que contemple o ser humano abrangendo todos os seus âmbitos (SILVA et al, 2020).

No estudo de caso apresentado a paciente desenvolveu novas patologias em decorrência da infecção por covid-19, apresentando problemas de enfermagem relacionados ao modo adaptativo fisiológico como: retenção de líquidos, fraqueza muscular, palidez e hipotensão. Partindo desse pressuposto, o foco das ações de enfermagem devem ser pautadas nos mecanismos biológicos reguladores, tendo em vista que estes podem ser estimulados tanto por fatores internos como externos (COSTA, 2019).

Por conseguinte, Silva e colaboradores (2020), refere que a equipe de enfermagem deve articular-se com as demais categorias profissionais a fim de debater não somente o quadro fisiopatológico em questão, mas os aspectos subjetivos dos indivíduos que também contribuem para melhor ou pior prognóstico clínico adaptando os cuidados e abordagens de acordo com a especificidade de cada um.

Isso posto, de modo para promover uma adaptação fisiológica, o enfermeiro deve atuar monitorando constantemente os sinais vitais do paciente, equilíbrio hidroeletrolítico, ingestão de líquidos, bem como administrar medicamentos para que o organismo do paciente atinja uma austeridade.

Dessa forma, para que a adaptação do cliente ocorra de forma efetiva, tal profissional deve prestar cuidados que visem os aspectos externos que interferem em mudanças fisiológicas, facilitando interações familiares posto que as patologias dificultam a expressão do afeto, o desenvolvimento da função na sociedade, além da interposição na auto imagem que geram sentimentos negativos impactando na melhora do prognóstico (JESUS; SANTOS; BRANDÃO, 2015).

Logo, na elaboração dos diagnósticos de enfermagem é importante que os mesmos sejam voltados não somente para problemas reais ou de risco, mas promoção da saúde de modo a pensar no indivíduo integralmente como propõe a teoria de Roy. Os diagnósticos voltados a: processos familiares interrompidos, disposição para controle da saúde melhorado e religiosidade prejudicada dão ênfase que o sujeito é um ser biopsicossocioespiritual.

Dessa maneira, são pensadas intervenções para os modos adaptativos: autoconceito, interdependência e função de papel que corroboram para uma melhora do quadro fisiopatológico. Isso porque quando o indivíduo se vê como participante ativo do meio em que está inserido e do seu processo saúde-doença, bem como a integração, apoio familiar e espiritual durante o período de recuperação hospitalar propiciam um fortalecimento biopsicológico.

Frente ao supracitado, por meio da observação, relato, planejamento e implementação é possível identificar fomentos que influenciam na resposta individual do enfermo e, consequentemente, na SAE, pois a mesma deve-se basear nas necessidades que o cliente apresenta com finalidade de desenvolver uma adaptação eficiente para lidar com a nova rotina imposta (COSTA, 2019).

É válido destacar que, estudos demonstram que os seres humanos inseridos no contexto hospitalar precisam de uma escuta qualificada quanto às suas demandas individuais, pois esta auxilia na promoção de conforto psicológico, implicando em melhora da interação social e facilitando o processo de aceitação e adaptação ao ambiente qual o mesmo está imerso (JESUS et al, 2019).

Assim, o processo do tratamento do indivíduo o faz perceber-se de maneira diferente afetando diretamente seu humor, disposição física e psíquica, pois o mesmo não se reconhece como protagonista do seu processo saúde doença, dessa maneira fortalecer os laços familiares, de amizade e fé auxiliam para que este sujeito se auto identifique para além da sua patologia (MARTINS et al, 2019)

Frente a hospitalização e as mudanças abruptas da rotina é comum a ocorrência de sentimentos negativos relacionados ao medo e incapacidade que podem ser transformados em adaptações positivas ou não, perante essa situação, o suporte familiar torna-se imprescindível para adequação do cliente à nova realidade e suas demandas, intervindo decisivamente para aceitação e melhora no prognóstico (SILVA et al, 2020).

Portanto, o enfermeiro necessita englobar na sua prescrição de enfermagem cuidados que atendam as especificidades fisiológicas, psicológicas e sociais, à medida que não se limitem às tecnologias duras, mas instituem na prática de forma corriqueira uma assistência humanizada que não seja terapia, mas terapêutica (MOFFAT et al, 2018).

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do estudo de caso apresentado pode-se concluir que o mesmo contribui para uma reflexão acerca dos impactos da covid-19 nos serviços de saúde, assim como na individualidade de cada pessoa,

visto que a mesma proporciona não só uma mudança fisiológica, mas também nos modos de se relacionar e se perceber dentro da sociedade.

Por conseguinte os objetivos propostos foram alcançados, visto que houve a aplicabilidade da SAE à paciente apresentada, além de promover intervenções qualificadas para promoção da adaptação a descontinuidade da rotina que o indivíduo obtinha anteriormente, promovendo melhor harmonia quanto a percepção da pessoa ao ambiente qual a mesma está inserida.

Dessa maneira, o uso da teoria de Roy permite uma observação acerca da importância do uso de tal teoria na enfermagem, à medida que a mesma não se limita a diagnósticos reais e de risco, mas também o diagnósticos de promoção à saúde o que provavelmente ocasiona um melhor prognóstico de pacientes em tais situações de hospitalização ao passo que quando é proporcionada uma adaptação social, afetiva e psicológica ao contexto em que está imerso, adaptações fisiológicas são facilitadas.

Todavia, este estudo apresentou algumas limitações devido a restrição de informações presentes no prontuário, sendo válido ressaltar que o mesmo não continham exames laboratoriais e de imagens importantes frente aos diagnósticos médicos e problemas de enfermagem presentes o que impacta na visão holística do indivíduo e consequentemente repercute no cuidado prestado.

Este estudo viabilizou conhecer em profundidade os aspectos fisiopatológicos de um determinado caso, com ênfase em suas singularidades, promovendo a ampliação da visão sobre o paciente como ser individual e permitindo a elaboração de estratégias de cuidados integrais de enfrentamento com base no contexto em que o fenômeno acontece, o que constitui sua condição específica de contribuição à construção do conhecimento científico

Frente ao supracitado, a utilização da Teoria da Adaptação de Callista Roy deveria ser discutida dentro do meio acadêmico, assim como institucionalizada nos serviços de saúde, já que tal permite a abordagem completa ao paciente em concordância com os princípios de integralidade e universalidade do Sistema Único de Saúde (SUS), promovendo uma eficácia e continuidade dos cuidados de enfermagem.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, J. G.; CORREIA, Paulo Rogério Miranda. Um novo olhar sobre a vida acadêmica: estudo de caso sobre as concepções de docentes 1. Educação e Pesquisa, v. 45, 2019.

ALMEIDA, I. J. S. de et al. Pandemia pelo coronavírus à luz de teorias de enfermagem. Revista Brasileira e Enfermagem , v. 73, 2020.

BARBOSA, V. M. S; SILVA, John Victor dos Santos. Utilização de teorias de enfermagem na sistematização da prática clínica do enfermeiro: Revisão integrativa. Rev. enferm. atenção saúde, p. 260-271, 2018.

BARROS, A. L. B. L; LOPES, J. L.. A legislação e a sistematização da assistência de enfermagem. Enfermagem em foco, v. 1, n. 2, p. 63-65, 2010.

BARROS, J. P. G; ERRANTE, P. R. INSULINAS UTILIZADOS NO CONTROLE DA GLICEMIA EM PACIENTES COM DIABETES MELLITUS TIPO 1. UNILUS Ensino e Pesquisa, v. 16, n. 44, p. 161-172, 2019.

BAVARESCO, M. et al. Complicações na estomia intestinal de eliminação e pele periestomia: processo de (in) adaptação à luz de Roy. 2020.

BENSILATO DE ANLODIPINO: comprimidos. Responsável técnico Marcos A. Silveira Jr.. Rio de Janeiro: PHARMACODE, 1999. 1 bula de remédio, 5 p.

BRASIL. Ministério da Saúde. Resolução CNS 466/12. Conselho Nacional de Saúde. Comissão Nacional de Ética e Pesquisa com Seres Humanos. 2012. Disponível em: <http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf>. Acesso em: 13 jun. 2021.

BRASIL. Resolução nº 510, de 07 de abril de 2016. Dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 24 maio 2016.

BULECHEK, G. M.; BUTCHER, H. K.; DOCHTERMAN, J. M. Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC). 5ª edição. Porto Alegre: Elsevier, 2010.

COELHO, S. M. S; MENDES, I. M. D. M. Da pesquisa à prática de enfermagem aplicando o modelo de adaptação de Roy. Escola Anna Nery [online] , v. 15, n. 4, pp. 845-850, 2011.

COFEN. Conselho Federal de Enfermagem. Resolução COFEN-358/2009, de 15 de outubro de 2010. Dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, e dá outras providências.

COSTA, A. C. A. Prevenção e detecção precoce da lesão renal aguda em contexto de cuidados hospitalares. Orientador: Maria Saraiva. 64 f. Dissertação (Mestrado), ESEL - Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, Lisboa, 2019.

CURIATI, M. N. C. et al. Comparação entre BNP e NT-proBNP quanto à concordância e quanto à influência das variáveis clínicas e laboratoriais. Einstein (São Paulo), v. 11, p. 273-277, 2013.

DANTAS, A. L. M. et al. Diagnósticos de enfermagem e modelo adaptativo de Roy: análise em pacientes críticos. Aquichan, v. 17, n. 3, p. 316-327, 2017.

DOCHETERMAN, J. M.; BULECHEK, G. M. Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC). 6ª edição. Porto Alegre: Elsevier, 2016.

DOTTO, J. I. et al. Sistematização da assistência de enfermagem: ordem, desordem ou (re) organização?. Rev. enferm. UFPE on line, p. 3821-3829, 2017.

LEANDRO, F. A K.; CASTRO D. A. Intervención de enfermería en salud mental, para fortalecer las estrategias de afrontamiento y adaptación al estrés en tiempos del COVID-19, dirigido al personal administrativo de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica.

FERNANDES, F. et al. Afecções pericárdicas em pacientes com COVID-19: uma possível causa de deterioração hemodinâmica. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 115, p. 569-573, 2020.

GOLDRAICH, L. A. et al. Tópicos Emergentes em Insuficiência Cardíaca: COVID-19 e Insuficiência Cardíaca. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 115, p. 942-944, 2020.

GUEDES, J. R. et al. Incidência e fatores predisponentes de insuficiência renal aguda em unidade de terapia intensiva. Cogitare Enfermagem, v. 22, n. 2, 2017.

HECKLER, A. M; HAHN, S. R. Implementação de um protocolo de monitorização terapêutica de vancomicina em adultos. Revista de Epidemiologia e Controle de Infecção, v. 10, n. 3, p. 263-269, 2020.

HERDMAN, T. H.; KAMITSURU, S. Diagnósticos de enfermagem da NANDA-I: definições e classificação 2018-2020 [recurso eletrônico] / [NANDA International]; tradução: Regina Machado Garcez; revisão técnica: Alba Lucia Bottura Leite de Barros... [et al.]. – 11. ed. – Porto Alegre: Artmed, 2018.

IBIAPINA, L. G. et al. Assistência de enfermagem às adolescentes gestantes sob a ótica de Callista Roy. Enfermagem em Foco, v. 7, n. 3/4, p. 46-50, 2016.

JESUS, N. M.,. Quality of life of individuals with chronic kidney disease on dialysis. Brazilian journal of Nephrology, v. 41, n. 3, p. 364-374, 2019.

JESUS, P. B. R.; SANTOS, I. BRANDÃO, E. S.. A autoimagem e a autoestima das pessoas com transtornos de pele: uma revisão integrativa da literatura baseada no modelo de Callista Roy. Aquichan, v. 15, n. 1, p. 75-89, 2015.

LI, P. K. T.; BURDMANN, E. A; MEHTA, R. L. Injúria Renal Aguda: um alerta global. J Bras Nefrol, V. 35, N. 1, P. 1-5, 2013

LORGA, F. A. M. et al. Diretrizes brasileiras de antiagregantes plaquetários e anticoagulantes em cardiologia. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 101, n. 3 suppl 3, pp. 01-95, 2013

MARTINS, A. C (edt.) et al. AME: dicionário de administração de medicamentos na enfermagem / AME - 11 ed. São Paulo. Martinari, 2019.

MARTINS, J. D. N. et al. Contribuições da enfermagem na potencialização do processo de adaptação ao paciente com doença renal crônica. Nursing (São Paulo), p. 3199-3203, 2019.

MATTOS, L. B. R. F. et al. Avaliação do custo-benefício de suplementos probióticos vendidos nas farmácias pagamento em Maceió-AL. 2019.

MOFFAT, H. et al. Using the Frailty Assessment for Care Planning Tool (FACT) to Screen Elderly Chronic Kidney Disease Patients for Frailty: The Nurse Experience. *Clinical interventions inaging*, v. 13, p. 843 - 852 , 2018.

MORAES, E. N. et al. COVID-19 nas instituições de longa permanência para idosos: Estratégias de rastreamento laboratorial e prevenção da propagação da doença. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 25, p. 3445-3458, 2020.

NOBRE, V. N. N. et al. Lesão renal aguda: assistência de enfermagem durante a sessão de hemodiálise em Unidade de Terapia Intensiva. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 8, p. e12910817108-e12910817108, 2021.

OLIVEIRA, W. V. et al. Inflamação e má resposta ao uso de eritropoetina na doença renal crônica. *Brazilian Journal of Nephrology*, v. 37, p. 255-263, 2015.

PEREIRA, C. S. et al. Medidas de enfrentamento para idosos com covid-19 a luz da teoria adaptativa de callista roy. *Brazilian Journal of Health Review*, v. 3, n. 5, p. 13424-13435, 2020.

POLONI, J. A. T.; JAHNKE, V. S.; ROTTA, L. N. Insuficiência renal aguda em pacientes com COVID-19. *RBAC*, V. 52, N. 2, p. 160- 167, 2020.

QUEIROZ, A. G. S. et al. Diagnósticos de enfermagem segundo a taxonomia da NANDA internacional para sistematização da assistência de enfermagem a COVID-19. *Journal of Health & Biological Sciences*, v. 8, n. 1, p. 1-6, 2020.

RIBEIRO, J. C.; RODRIGUES, C. M.; NETO, A. L. S. Uso de eritropoetina recombinante humana exógena no tratamento da anemia em renais crônicos. *Revista Ciência e Saúde On-line*, v. 6, n. 2, 2021.

RIBEIRO, L. A. P. Um estudo sobre Insuficiência renal. *Anais da Academia de Ciência e Tecnologia de São José do Rio Preto*, 2008.

ROHDE et al. Comitê Coordenador da Diretriz de Insuficiência Cardíaca. *Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica e Aguda*. *Arq Bras Cardiol*, v. 111, n. 3, p. 436-539, 2018.

ROHDE, L. E. P. et al. Diretriz brasileira de insuficiência cardíaca crônica e aguda. *Arquivos Brasileiros de Cardiologia*, v. 111, n. 3, p. 436-539, 2018.

ROY, C. O. Modelo de Adaptação de Roy na investigação da enfermagem. Roy C, Andrews, HA. *Teoria da enfermagem: o Modelo de Adaptação de Roy*. Lisboa: Instituto Piaget, p. 499-514, 2001.

SILVA, C. O. et al. Sistematização da assistência de enfermagem com paciente oncológico em cuidados paliativos: sob um olhar referencial na teoria de adaptação de Callista Roy. *Revista Recien-Revista Científica de Enfermagem*, v. 10, n. 31, p. 155-164, 2020.

SILVA, E. G. C. et al. O conhecimento do enfermeiro sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem: da teoria à prática. *Rev Esc Enferm USP*, v. 45, n. 6, p. 1380-6, 2011.

SILVA, J; SILVA, J. J.; GONZAGA, M.F.N. ETAPAS DO PROCESSO DE ENFERMAGEM. Revista Saúde em Foco, nº 9 2017.

SILVA, P. S. et al. Teoria da adaptação: elementos identificados em pacientes pediátricos em terapia renal substitutiva. Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento , v. 9, n. 9, pág. e324997104-e324997104, 2020.

SILVA, P. S. et al. Teoria da adaptação: elementos identificados em pacientes pediátricos em terapia renal substitutiva. Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento , v. 9, n. 9, pág. e324997104-e324997104, 2020.

SILVA, R. R et al. As teorias de enfermagem de Roy e Orem Intrínsecas à sistematização da assistência de enfermagem para promoção da saúde. Brazilian Journal of Development, v. 6, n. 7, p. 52049-52059, 2020.

SILVEIRO, S. P.; SATLER, F. Rotinas em endocrinologia . Artmed Editora, 2015.

SOUSA, R. M. M de et al. APLICABILIDADE DA TEORIA DE CALLISTA ROY NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19: REFLEXÃO DE ALUNOS DE GRADUAÇÃO SOBRE A MONITORIA. In: Conexão Unifametro 2020 - Fortaleza- CE , 2020.

SOUZA, T. C. F et al. Vivências de familiares de crianças com fibrose cística à luz de Callista Roy. Revista Brasileira de Enfermagem, v. 73, 2020.

SUASSUNA, J. H. R et al. Nota técnica e orientações clínicas sobre a Injúria Renal Aguda (IRA) em pacientes com Covid-19: Sociedade Brasileira de Nefrologia e Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Brazilian Journal of Nephrology, v. 42, p. 22-31, 2020.

TELLO, B. S et al. Anemia e Disfunção Renal na Insuficiência Cardíaca. Rev SOCERJ, v.20, n.6, p.434-442, 2007.

Capítulo 5

10.37423/220105215

APLICAÇÃO DA TEORIA DE WANDA HORTA À PESSOA SUBMETIDA A LAPAROTOMIA SECUNDÁRIA A ABDOME AGUDO: ESTUDO DE CASO

Tânia Maria de Oliveira Moreira

Universidade Estadual de Feira de Santana

Ayane Gaspar Ferreira do Vale

Universidade Estadual de Feira de Santana

Giovanna Calixto dos Santos

Universidade Estadual de Feira de Santana

Nathália Yasmim dos Santos Assis

Universidade Estadual de Feira de Santana

Roseane Dantas Amorim Barbosa

Universidade Estadual de Feira de Santana

Quécia da Paixão Araujo

Universidade Estadual de Feira de Santana

Resumo: O estudo de caso, objetivou aplicar a teoria de Wanda Horta à pessoa submetida a laparotomia exploratória secundária a abdome agudo. Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo e exploratório, desenvolvido na clínica cirúrgica II de um hospital público do interior da Bahia em 2021. Os dados foram coletados através de entrevista, anamnese, exame físico e dados do prontuário. Este estudo de caso contou com a participação de uma paciente com diagnóstico médico de abdome agudo, acompanhada no pós-operatório de laparotomia exploratória por lesões císticas em ovário esquerdo, o que permitiu a utilização da Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória, a qual foi elencada conforme suas cinco etapas (visita, planejamento, implementação, avaliação e reformulação da assistência), norteando, dessa forma, a prestação de cuidados, possibilitando, portanto, minimizar os impactos e complicações, a fim de proporcionar uma melhor qualidade de vida. Com a construção desse material, pode-se afirmar que a realização do estudo de caso proporcionou a implementação da SAEP durante o processo, trazendo maior autonomia e organização às discentes, colaborando também com o atendimento individual, qualificado e humanizado à paciente estudada. Através da pesquisa, alinhada ao contexto patológico pelo qual a paciente estava submetida, mostrou-se evidente a contribuição para uma formação pautada em cuidado contínuo, acentuando o olhar das mesmas para um conjunto de ações que aproximam as discentes à paciente. Logo, tal processo favoreceu a formação, trazendo, portanto, aproximação das discentes graduandas em enfermagem tanto à vivência hospitalar prática quanto ao estímulo à busca por conhecimento, demonstrando, através disso, a sua relevância acadêmica.

Palavras-chave: Bacharelado em Enfermagem. Abdome Agudo. Teoria de Enfermagem. Estudo de Caso. Cuidados.

INTRODUÇÃO

O abdome agudo (AA) se refere a uma gama de enfermidades e lesões abdominais, que exigem o diagnóstico e intervenções precoces, a fim de minimizar ou eliminar a possibilidade de complicações, de modo a assegurar um melhor prognóstico ao paciente (MOURA, 2018). Sua ocorrência pode estar relacionada a uma série de etiologias que irão incluir processos inflamatórios, infecciosos, hemorrágicos, isquêmicos, ou que podem ainda, estar associadas à presença de obstruções a nível intestinal ou a ocorrência de perfurações viscerais em que haja o extravasamento de líquido para a cavidade abdominal (COLOGNESI et al., 2020).

Dentre as suas possibilidades, o abdome agudo também pode se manifestar de maneira secundária às patologias ginecológicas, como cistos ovarianos caracterizados por estruturas que acumulam líquido em seu interior (MAGALHÃES, et al., 2011), tendo como manifestações queixas dolorosas de característica aguda, principalmente no terço inferior da região abdominal e também na região pélvica, podendo levar a complicações como a sua rotura, se persistentes (CÂNDIDO; SANTIAGO; FILHO, 2019). Desse modo, o abdome agudo ginecológico exige intervenções cirúrgicas de emergência, a exemplo da laparotomia exploratória.

No que se refere aos seus aspectos epidemiológicos, tem-se que o abdome agudo por causa ginecológica é responsável por cerca de 7 a 10% das ocorrências em prontos atendimentos acometendo, principalmente, mulheres jovens em idade reprodutiva (COLOGNESI; et al., 2020). Haja vista, o abdome agudo ginecológico corresponde a um problema comum na sociedade, o que torna evidente a necessidade de reconhecer suas manifestações, compreender os seus métodos diagnósticos, para o melhor entendimento da sua causa, a fim de que sejam adotadas condutas terapêuticas adequadas ao caso (CÂNDIDO; SANTIAGO; FILHO, 2019).

Conforme dito anteriormente, uma vez diagnosticado o abdome agudo ginecológico por meio da anamnese, exame físico e exame de imagem, tem-se a necessidade de intervir por meio de abordagens cirúrgicas mais ou menos invasivas, de modo que haja a resolução do quadro clínico. Uma das modalidades de intervenção consiste na cirurgia aberta, também conhecida como Laparotomia Exploratória (LE) que possibilita uma melhor visualização do compartimento abdominal, a revisão das estruturas anatômicas, bem como a ressecção de lesões ou a retirada de estruturas (MOURA, 2018).

A discussão acerca de procedimentos cirúrgico-anestésicos, envolvem diretamente a assistência prestada pelos profissionais de enfermagem. Assim como nos mais diversos âmbitos, a enfermagem

exerce papel fundamental no período perioperatório, uma vez que deve prestar uma assistência sistematizada e holística pautada na Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória (SAEP), que objetiva organizar e sistematizar a assistência de enfermagem, de modo a minimizar os riscos aos quais o paciente é exposto, além de garantir a continuidade e integralidade da assistência, a fim de que a intervenção cirúrgica possa ser ainda mais segura (GONÇALVES; et al., 2021).

Para além disso, a assistência de enfermagem também se estrutura por meio de teorias que visam organizar o processo de enfermagem (PE) que de acordo com a Teoria de Wanda Horta se estrutura por meio de 06 etapas - histórico, diagnóstico de enfermagem, plano assistencial, plano de cuidados, evolução e prognóstico - de modo a atender às demandas do paciente (MARQUES; MOREIRA; NÓBREGA, 2008). Nesse sentido, a teórica Wanda Horta busca assegurar que a enfermagem atenda às necessidades biopsicossocioespirituais de cada indivíduo, de modo a garantir o seu completo bem-estar, respeitando a unicidade, individualidade, autenticidade e integralidade da pessoa a ser assistida, além de incentivar a participação ativa no seu autocuidado (SANTOS; et al., 2019).

A escolha do caso clínico adveio da observação de uma paciente do sexo feminino, no centro de recuperação pós-anestésica (CRPA) de um hospital público no município de Feira de Santana - Bahia, em pós-operatório imediato (POI) de LE secundária a abdome agudo, para ressecção de cisto ovariano à esquerda. Através disso, foi possível fazer uma associação entre o conhecimento da história clínica da paciente com a patologia anteriormente citada e as manifestações clínicas apresentadas pela mesma, despertando nas estudantes o interesse em estudar tal temática de maneira mais aprofundada.

Nessa perspectiva, esse estudo visa responder à seguinte questão norteadora: Como aplicar a Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Wanda Horta à pessoa em pós-operatório imediato de LE, secundário a abdome agudo por cistos ovarianos? Nesse tocante, o estudo apresenta como objetivo geral: aplicar a teoria de Wanda Horta à pessoa submetida a laparotomia exploratória secundária a abdome agudo.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo do tipo qualitativo descritivo e exploratório, na modalidade de estudo de caso que utilizou a teoria de Wanda Horta para embasamento, e, adotou o Processo de Enfermagem para identificar as necessidades básicas afetadas da pessoa acometida por Abdome Agudo secundário a Cisto Ovariano.

Segundo Andrade e colaboradores (2017), o estudo de caso é um método muito utilizado na educação em enfermagem, já que o pesquisador busca responder as questões que possam explicar as circunstâncias que levaram a tal problema. É considerado um método que promove melhoria das práticas assistenciais por meio da aproximação de múltiplas fontes de dados, o que proporciona ao pesquisador uma ampla variedade de conhecimento acerca do fenômeno.

O critério de escolha do sujeito deste estudo, deu-se pela paciente encontrar-se no pós operatório imediato, durante a prática hospitalar da disciplina de Enfermagem na Saúde do Adulto e Idoso II, o que propiciou a utilização da Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória (SAEP) para a aplicação do Processo de Enfermagem. Após consentimento da mesma para o estudo, aplicou-se o instrumento Processo de Enfermagem proposto por Wanda Horta, com ênfase na SAEP, a fim de identificar problemas que pudessem corroborar para planejar a assistência de Enfermagem no pós operatório imediato para reduzir os riscos de complicações.

A pesquisa desenvolveu-se em um hospital público no interior da Bahia, na unidade do Centro Cirúrgico, no Centro de Recuperação Pós Anestésica (C.R.P.A). Durante o mês de novembro do ano de 2021. Sendo construído a partir da experiência vivida por acadêmicas do 6º (sexto) semestre do curso de Bacharelado em Enfermagem da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Bahia, no componente curricular obrigatório Enfermagem na Saúde do Adulto e do Idoso II, durante a prática hospitalar.

A paciente do caso investigado trata-se de uma pessoa adulta, do sexo feminino, 48 (quarenta e oito) anos que deu entrada na unidade de emergência, com quadro de dor abdominal esporádica e com imagens de ultrassonografia (USG) sugestivas de tumoração cística de anexos uterinos residuais a esquerda. Com autorização para cirurgia eletiva de retirada de cisto ovariano com indicação de laparotomia exploratória.

O presente estudo cumpriu os aspectos éticos da Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, a qual abrange as referências bioéticas, tais como os princípios da autonomia, não maleficência, beneficência, justiça e equidade e outros, e visa assegurar os direitos e deveres que dizem respeito aos participantes da pesquisa, à comunidade científica e ao Estado (BRASIL, 2012).

Realizou-se, ainda, o esclarecimento à paciente e ao acompanhante sobre o objetivo e relevância deste estudo, assegurou-se da sua autonomia quanto à participação da pesquisa mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O estudo não passou pelo Comitê

de Ética em Pesquisas com Seres Humanos (CEPSH), por se tratar de uma atividade prática da disciplina de Enfermagem na Saúde do Adulto e Idoso II.

Para a coleta de dados, utilizou-se instrumentos como: prontuário completo, observação direta a paciente, ações executadas pela equipe, prescrições médicas, dietoterapia, intercorrências e complicações apresentadas pela paciente, bem como, também colheu-se dados da ficha de registro do pronto atendimento, exames laboratoriais e de imagem, prescrições médicas, relatórios médicos e evoluções de enfermagem, visitas a paciente na CRPA, unidade de Clínica Cirúrgica, entrevista, exame físico, para identificação dos problemas e os diagnósticos de enfermagem.

RESULTADOS

HISTÓRICO DE ENFERMAGEM:

Paciente R.M.S.L., 48 anos, sexo feminino, parda, 1º grau completo, em união estável, dona de casa, católica, natural de Salvador - Bahia, nega comorbidades, em 1º dia de pós-operatório (DPO). Refere antecedentes familiares de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) (mãe, pai e irmã), nega comorbidades e confirma sedentarismo. Não possui restrição alimentar e costuma ter alimentação rica em lipídeos, carboidratos, pobre em nutrientes e fibras. Na sua rotina doméstica, costuma apresentar sono e repouso satisfatórios.

Foi admitida na sala amarela cirúrgica (SAC) no dia 02 de novembro de 2021, às 07:27, encaminhada via ACCR (Acolhimento com Classificação de Risco), para realização de cirurgia eletiva, referindo histórico de fortes dores abdominais, associadas à náuseas frequentes e febre (não mensurada). Consciente, respondendo às solicitações verbais, referindo dores abdominais esporádicas e com diagnóstico médico de cisto ovariano. Foi admitida no Centro Cirúrgico do Hospital Geral Clériston Andrade no mesmo dia às 16:07 para realização do procedimento cirúrgico de retirada de cisto do ovário segundo informações coletadas (SIC), com indicação de Laparotomia por abdome agudo secundária a cisto ovariano à esquerda. Após cirurgia, apresentando Glasgow 15, seguiu o pós-operatório no Centro de Recuperação Pós Anestésica (CRPA), enquanto aguardava vaga na enfermaria da Clínica Cirúrgica II, sem queixas.

Em uso de dreno portovac em região suprapúbica drenando aproximadamente 50ml de secreção sanguinolenta, sonda vesical de demora drenando 400ml de diurese com coloração amarelada, acesso venoso periférico (AVP) em MSE fluindo SRL 500ml e penso cirúrgico com secreção serosanguinolenta,

proveniente da ferida cirúrgica. Evolui com hemodinâmica de PA= 112 x 65 mmHg, FC= 69 bpm, P= 79 ppm, FR= 15 inc/min e SPO2= 97%.

Evolução de Enfermagem

● 04 de novembro de 2021 às 07:40 em Clínica Cirúrgica II:

Paciente internada em Clínica Cirúrgica II, no 1º DPO de laparotomia exploratória secundária a abdome agudo e lesões císticas no ovário E. Encontrada no leito em decúbito dorsal, eupneica, normotensa, afebril, lúcida e orientada. Refere dor em região abdominal e constipação há 02 dias. Refere alergia medicamentosa à Profenid e Dipirona. Nega comorbidades. Em dieta zero, aguardando avaliação nutricional. Ao exame físico: mucosas hipocrômicas, pele ressecada, turgor e elasticidade conservados, pupilas isocóricas e fotorreagentes, globo ocular móvel, acuidade visual preservada, edema em pálpebra E (+/4+). Tórax simétrico e expansivo, indolor à palpação, frêmito tóraco-vocal normal, som claro pulmonar em toda extensão torácica, MVBD. Ictus cordis invisível, bulhas rítmicas e normofonéticas em 2T. Abdome globoso, flácido, refere dor à palpação em toda região abdominal (5/10), presença de FO mediana localizada na região mesogástrica a suprapúbica, penso cirúrgico com secreção sanguinolenta em pouca quantidade, sinal de Cullen (-) e Grey-Turner (-). Deambula com auxílio, integridade preservada nos MMSS e MMII. Em uso de AVP em MSE, fluindo bem, sem sinais flogísticos, sonda vesical de demora (SVD) drenando urina amarelo escuro, dreno de portovac localizado em incisão cirúrgica na região suprapúbica bilateral, drenando secreção serosanguinolenta. Evolui com hemodinâmica de: PA: 130 x 70 mmHg, P: 79 ppm, FC: 80 bpm, FR: 18 inc/ min, T: 36.8 °C, HGT: 96 mg/dL.

Após a coleta de dados por meio da anamnese e exame físico, foram elencados alguns problemas de enfermagem manifestados pela paciente em POI de LE secundário à abdome agudo por cisto ovariano, a fim de traçar os diagnósticos de enfermagem com base na Taxonomia NANDA (2018), além de reconhecer a necessidade humana afetada com base na Teoria de Wanda Horta que compreende o ser humano como fruto das suas necessidades que incluem a fisiologia, segurança, amor, relacionamento, estima e realização social (SANTOS; et al., 2019).

Quadro 1: Problemas e diagnósticos de enfermagem segundo o NANDA com base na Teoria Necessidades Humanas Básicas de Wanda Horta.

	NECESSIDADES HUMANAS AFETADAS	PROBLEMAS DE ENFERMAGEM	DIAGNÓSTICO DA NANDA
PSICOBIOLOGICO	Integridade Física.	Dor na região abdominal (5/10).	Dor aguda <u>relacionada a</u> intervenção cirúrgica <u>evidenciada por</u> autorrelato de dor (5/10) à palpação abdominal.
	Eliminações.	Constipação há 2 dias.	Constipação <u>relacionada ao</u> procedimento cirúrgico <u>evidenciada por</u> ruídos hidroaéreos diminuídos e autorrelato de constipação.
	Locomoção.	Deambula com auxílio.	Deambulação prejudicada <u>relacionada ao</u> efeito das medicações e procedimento cirúrgico, <u>evidenciada por</u> episódio de vertigem ao levantar-se.
PSICOSSOCIAL	Autoimagem.	Aparência e extensão de ferida operatória.	Risco de baixa autoestima situacional <u>relacionada a</u> alteração na imagem corporal.
	Segurança	Ansiedade	Ansiedade <u>relacionada ao</u> desejo de alta, <u>evidenciada por</u>

			relato verbal.
PSICOESPIRITUAL	Religiosidade.	Saudades dos hábitos religiosos.	Religiosidade prejudicada <u>relacionada ao</u> processo de hospitalização <u>evidenciada por</u> auto desejo de reconectar-se com costumes anteriores.

Fonte: (HORTA, 2011; NANDA, 2018; MATOS et. al., 2015)

Considerando o processo de enfermagem (PE) como sendo um instrumento fundamental para a organização e qualificação do cuidado prestado, tem-se a necessidade de utilizá-lo a fim de planejar a assistência a ser prestada a paciente em POI de laparotomia exploratória, de modo a garantir uma atenção à saúde individualizada pautada nas necessidades de cada pessoa (Santos; *et al.*, 2017). Nesse sentido, uma vez levantado os problemas e diagnósticos de enfermagem, é hora de elencar o plano assistencial e plano de cuidados que devem ser realizados pela equipe de enfermagem no cuidado à paciente.

Quadro 2: Plano assistencial e intervenções de enfermagem segundo a NIC com base na Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Wanda Horta.

	DIAGNÓSTICO DA NANDA	PLANO ASSISTENCIAL	PLANO DE CUIDADO
PSICOBIOLOGICAS	Dor aguda <u>relacionada a</u> intervenção cirúrgica <u>evidenciada por</u> autorrelato de dor (5/10) à palpação abdominal.	Minimizar a dor.	1. Investigar a dor (intensidade, características e fatores que potencializam e atenuam a dor); 2. Administrar analgésicos, conforme prescrição; 3. Promover conforto ao paciente; 4. Reavaliar a queixa dolorosa após a adoção das demais medidas.
	Constipação, <u>relacionada ao</u>	Estabelecer padrão de	1. Monitorar os ruídos hidroaéreos por meio

	procedimento cirúrgico <u>evidenciada por</u> ruídos hidroaéreos diminuídos e autorrelato de constipação;	eliminação satisfatório.	da ausculta; 2. Orientar para movimentação no leito; 3. Estimular a deambulação; 4. Aplicar calor na região abdominal.
	Deambulação prejudicada <u>relacionada ao</u> efeito das medicações e procedimento cirúrgico, <u>evidenciada por</u> episódio de vertigem ao levantar-se.	Melhorar a qualidade da deambulação;	1. Solicitar o acompanhamento da equipe de fisioterapia; 2. Promover o posicionamento adequado no leito; 3. Verificar quais os medicamentos prescritos causam desconforto e perda de equilíbrio; 4. Monitorar SSVV;
PSICOSSOCIAIS	Risco de baixa autoestima situacional <u>relacionada a</u> alteração na imagem corporal.	Promover e estimular o autocuidado, e auto aceitação da imagem corporal.	1. Solicitar avaliação psicológica; 2. Estimular e orientar para o autocuidado; 3. Oferecer apoio emocional e escuta qualificada; 4. Estimular socialização com os familiares durante as visitas; 5. Orientar quanto a importância do convívio social.
	Ansiedade <u>relacionada ao</u> desejo de alta, <u>evidenciada por</u> relato verbal;	Controlar a ansiedade	1. Usar abordagem calma e tranquilizadora; 2. Estabelecer relação de confiança; 3. Provocar comportamentos que sejam condicionados a produzir relaxamento;

PSICOESPIRITUAL	Religiosidade prejudicada, <u>relacionada ao processo de hospitalização evidenciada por auto desejo de reconectar-se com costumes anteriores</u>	Garantir disposição emocional melhorada devido a otimização das questões religiosas.	1. Incentivar o paciente a conversar sobre sua religião; 2. Oferecer visita de líder religioso; 3. Oferecer realizar leitura de livros religiosos; 4. Escutar a paciente, sem julgá-la.

Fonte: (NIC, 2008).

No que se refere às prescrições médicas no pós-operatório de laparotomia exploratória secundária à abdome agudo por cistos ovarianos da paciente, pode-se destacar que seguiram sem alterações, ao longo dos dias 02 ao dia 04 de novembro de 2021: dieta zero, 500 ml de Ringer Lactato, EV, 8/8h; dipirona sódica 500mg/ml, EV, 6/6h; tramadol 500mg/ml, EV, se dor intensa refratária à dipirona, 8/8h; bromoprida 5mg/ml, EV, alternar com metoclopramida, 6/6h; metoclopramida 5mg/ml, EV, alternar com bromoprida, 6/6h; ondansetrona 2mg/ml, EV se náuseas ou vômitos refratários a bromoprida e metoclopramida, 8/8h; HGT 6/6h; insulina regular 100UI/ml, SC conforme o HGT; glicose 25%, EV caso HGT seja menor ou igual a 70mg/dL; cloridrato de clonidina 0,150 mg, EV (se PAD > 110 e/ou PAS > 170 mmHg); ceftriaxona sódica 1000mg, EV, 12/12h, metronidazol 500mg, EV, 8/8h; verificação dos sinais vitais de 6/6h, banho no leito 1x/dia e curativo 1x/dia.

Quadro 3: Medicamentos em uso no PO de laparotomia exploratória, secundária à abdome agudo por cistos ovarianos.

Medicação	Indicação	Diluição	Reação Adversa
<u>Ringer Lactato</u> 500ml	Reposição hidroeletrolítica, desidratação, profilaxia e tratamento da acidose metabólica;	Pronto para uso	Febre, hipervolemia, desequilíbrio eletrolítico e sinais flogísticos no local da injeção;
<u>Dipirona sódica</u> 500mg/ml, ampola de 2ml;	Analgésico, antipirético e antitérmico, indicado se dor ou febre;	AD ou SF 8ml	Reação alérgica grave, diminuição dos glóbulos brancos do sangue, erupção na pele, pressão baixa;

<u>Tramadol</u> 50mg/ml, ampola de 2ml, 100mg ampola	Analgésico opióide. Utilizado se dor moderada a grave em cirurgia, traumatologia, oncologia, ginecologia	AD ou SF 100ml	Náusea, tontura, cefaleia, e sonolência;
<u>Bromoprida</u> 5mg/ml, ampola de 2ml	Antiemético, utilizado se náuseas ou vômitos;	AD ou SF 8ml	Agitação, ansiedade, sonolência;
<u>Metoclopramid</u> a 5mg/ml, ampola de 2ml	Antiemético, utilizado se náuseas, refluxo gastroesofágico ou vômitos;	AD ou SF 18ml	Sintomas extrapiramidais: tremor de extremidade, aumento do estado de contração do músculo, rigidez muscular, sonolência;
<u>Ondansetrona</u> Sol. injetável, 2mg/ml, ampola 4ml	Antiemético, utilizado se náuseas ou vômitos;	AD ou SF 100ml	Hipertermia, constipação, sinais de infecção no local de administração do fármaco (dor, edema, eritema);
<u>Insulina</u> <u>regular</u> 100UI/ml, frasco de 10ml	Melhora de controle glicêmico em pacientes com diabetes mellitus;	Pronto para uso	Hipoglicemia, tremores, tonturas, fadiga;
<u>Glicose</u> Sol. Injetável 25%, ampola 10ml 25%	Suplementação calórica por via injetável, fonte ideal de carboidratos. A solução hipertônica de glicose, administrada por via IV, provoca desidratação celular,	Pronto para uso	Dor local, irritação da veia, tromboflebite (processo inflamatório da veia) e necrose do tecido, quando ocorrer transvasamento de solução. Se administrada rapidamente, pode levar à síndrome hiperosmolar (confusão mental, inconsciência),

	podendo assim beneficiar no tratamento de edema cerebral, choque e colapso circulatório;		especialmente em pacientes com uremia crônica;
<u>Clonidina</u> <u>Cloridrato</u> de 0,150 mg, Sol. Injetável, ampola 1ml	É um anti-hipertensivo, utilizado para diminuir a pressão arterial;	AD ou SF 18ml	Tontura, sedação, hipotensão ortostática, boca seca, depressão, distúrbio do sono, cefaleia, constipação, náusea, dor nas glândulas salivares, emese, disfunção erétil, fadiga;
<u>Ceftriaxona</u> <u>sódica</u> 1000mg, frasco-ampola, IV-diluyente 10ml	Antibacteriano, utilizado para tratar infecções bacterianas;	AD ou SF 20ml	Eosinofilia, leucopenia, trombocitopenia, diarreia, fezes amolecidas, aumento das enzimas hepáticas e erupção cutânea;
<u>Metronidazol</u> Sol. injetável, 500mg frasco-ampola com 100ml	Antibacteriano, utilizado para tratar infecções causadas por bactérias anaeróbicas;	Pronto para uso	Náuseas, alterações no paladar, cefaleia, escurecimento da urina, dormência e formigamento dos membros inferiores e superiores;

Fonte: Prontuário da paciente, 2021.

O planejamento, implementação dos cuidados prestados ao paciente, as intervenções realizadas de acordo às suas necessidades, são algumas das etapas que possibilitam o processo em enfermagem, que integram o cuidado, essas ações poderão refletir nos resultados apresentados pelo indivíduo, e serão avaliados ao final do processo, objetivando a promoção da cura e reabilitação. Com a avaliação desses resultados, possibilita a criação de uma estimativa, relacionada à capacidade demonstrada para o autocuidado, a dependência ou não para realização das atividades básicas, o que possibilitou os cuidados prestados, um prognóstico. O prognóstico de enfermagem integra-se como umas das etapas do processo de enfermagem baseado na teoria das Necessidades Humanas Básicas de Wanda Horta, e é responsável pela avaliação da capacidade do indivíduo para realização das necessidades básicas

modificadas pela prestação de cuidados de enfermagem, a partir da evolução e implementação. (WANDA, 1974).

DISCUSSÃO

Este estudo de caso contou com a participação de uma paciente com diagnóstico médico de abdome agudo, acompanhada no pós-operatório de laparotomia exploratória por lesões císticas em ovário esquerdo, o que permitiu a utilização da Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória, a qual foi elencada conforme suas cinco etapas (Visita, planejamento, implementação, avaliação e reformulação da assistência), norteando, dessa forma, a prestação de cuidados, possibilitando, portanto, minimizar os impactos e complicações, a fim de proporcionar uma melhor qualidade de vida.

Em vista disso, sabe-se que o processo cirúrgico-anestésico afeta a homeostase e hemodinâmica corporal como um todo, podendo causar desequilíbrio hidroeletrolítico e alterações dos SSVV. Em face a isso, torna-se necessário a realização de ações, a partir do levantamento de dados do paciente com o Histórico de Enfermagem, com o intuito de minimizar possíveis desconfortos e complicações e, em seguida, traçar o plano de cuidados no pós-operatório imediato (POI).

De acordo com Santos (*et al.*, 2019), a Teoria das Necessidades Humanas Básicas proposta pela teórica Wanda Horta compreende que o completo bem-estar do ser humano está relacionado à perfeita harmonia entre os três principais campos formadores do indivíduo: psicobiológico, psicossocial e psicoespiritual, e que a medida que o primeiro campo é atendido, os demais, também, exigem intervenções a fim de atender às suas necessidades específicas. Portanto, nesse sentido, foram elencados alguns problemas de enfermagem que visam atender as demandas dos diferentes campos formadores.

No que se refere ao campo psicobiológico, a queixa dolorosa, segundo Meier (*et al*, 2017, *apud* IASP, 1979) se manifesta de uma maneira multidimensional e corresponde a “uma experiência sensorial e emocional desagradável”. Em se tratando do período pós-operatório, tem-se que a dor aguda aparece como sendo um dos diagnósticos de enfermagem mais comum, uma vez que ela apresenta-se como uma consequência direta das intervenções cirúrgicas, sendo mais especificamente resultado de uma manipulação de tecidos e órgãos (ROCHA; MORAES, 2010).

Tem-se a constipação como outro problema de enfermagem que compromete diretamente a necessidade fisiológica das eliminações intestinais, a qual possui relação com o pós-operatório. Conforme Bertinello (*et al.*, 2014) a constipação intestinal ocorre devido a redução dos movimentos

peristálticos, que no contexto pós-operatório está relacionado a mudança na alimentação, a deambulação reduzida e aos efeitos colaterais dos fármacos anestésicos. Em paralelo com a paciente em POI, este diagnóstico estava associado a dieta zero, a mobilidade reduzida e aos fármacos anestésicos utilizados no procedimento cirúrgico.

Ainda em relação às necessidades psicobiológicas, tem-se a deambulação prejudicada. De acordo com Luvisotto, Carvalho e Galdeano (2007) este diagnóstico de enfermagem, pode estar relacionado a extensão da incisão cirúrgica, ao estado de sonolência causado pelo uso de fármacos analgésicos e sedativos, além da presença de drenos, sonda e cateteres em uso. O que pode ser visualizado no caso da paciente em questão, uma vez que sua ferida operatória iniciava-se na região hipogástrica terminando na região suprapúbica, com presença de dreno portovac na ferida operatória e SVD, além do AVP em MSE.

Em termos das necessidades psicossociais, pode-se identificar que a paciente apresenta um risco de baixa autoestima situacional, definido pela NANDA (2008) como sendo a suscetibilidade de desenvolver uma percepção negativa sobre si própria, em decorrência da extensão e aparência da ferida operatória na região abdominal, o que compromete a sua autoimagem. Nesse sentido, Melo, Carneiro e Pedroso (2019) discursam que a fragilidade psicológica ao longo do período perioperatório pode contribuir para o surgimento de sentimentos negativos, capazes de desencadear no paciente diversos problemas, não somente de cunho psicológico, mas também social.

Além dessa questão, a paciente apresentou episódios de ansiedade no pós-operatório, ligados diretamente ao desejo de alta. A ansiedade é caracterizada pela antecipação de uma ameaça futura, envolvendo de forma complexa sentimentos como medo, apreensão e preocupação, os quais podem interagir com componentes fisiológicos, cognitivos e comportamentais do indivíduo (American Psychiatric Association, 2014).

Partindo para as necessidades psicoespirituais, o problema encontrado foi religiosidade prejudicada. Compreende-se que a religiosidade tem um papel fundamental, a qual contribui no processo de aceitação diante de um diagnóstico, provocando no indivíduo atitudes de autoafirmação e podendo beneficiar diretamente na cura e reabilitação, além de colaborar também para o enfrentamento das adversidades encontradas no ambiente hospitalar (PINHO et. al., 2015). Correlacionando com a paciente em questão, o diagnóstico apresentado liga-se à dificuldade relatada em conectar-se às suas crenças no ambiente, devido a falta de privacidade e concentração, além da saudade da comunidade religiosa a qual está inserida por conta do apoio que encontrava.

Diante dos diagnósticos pontuados é possível perceber que, embora o objetivo maior do ambiente hospitalar seja a manutenção à vida, as ações de cuidado psicobiológico, psicossocial e psicoespiritual, baseadas na teoria de Wanda Horta estão diretamente ligadas entre si. Deste modo, quando o paciente apresenta diagnósticos como, por exemplo, religiosidade prejudicada, pode-se entender que há uma falha na atenção às necessidades humanas básicas, sem levar em consideração que a falta de percepção sobre um dos cuidados pode influenciar diretamente na melhora dos demais (BENEDET; BRASIL, 2017).

Ao que concerne a utilização da prescrição medicamentosa da paciente em questão, tem-se o uso da solução de Ringer Lactato comumente utilizada para a reposição hidroeletrólítica nos casos em que há a perda de íons de cloreto, cálcio, potássio e sódio, além de ser utilizado para reidratação, que no caso da paciente citada justifica-se pelo longo período em dieta zero em que esta foi submetida. Os fármacos prescritos foram: analgésicos - dipirona e tramal -, sendo que o primeiro, além de ter sua função analgésica também atua no organismo como antitérmico e antipirético, enquanto o segundo tem como finalidade o alívio da dor, de moderada a grave, no pós cirúrgico, respectivamente. A prescrição dessa classe medicamentosa se deve às dores que decorrem após o procedimento cirúrgico, que é causada pela ferida operatória segundo relato verbal da paciente.

Além dos já citados anteriormente, foram prescrito também antieméticos - bromoprida, metoclopramida e ondansetrone -, cuja indicação é voltada para o tratamento de náuseas e prevenção de vômitos, utilizados no pós-operatório como prevenção desses desconfortos durante o processo pós-anestésico. Enquanto os antibacterianos - ceftriaxona sódica e metronidazol -, são indicados para evitar possíveis infecções hospitalares, além de fazer parte do protocolo pós-cirúrgico do hospital. O anti-hipertensivo - cloridrato de clonidina - tem indicação para os casos de picos hipertensivos. A insulina regular e a glicose a 25% são prescritos seguindo protocolo da unidade hospitalar, para uso em eventuais situações de hiperglicemia e hipoglicemia, respectivamente.

Seguindo a Teoria de Wanda Horta, tem-se que a sua última etapa se refere ao prognóstico de enfermagem, definido por Marques, Moreira e Nóbrega (2008) como sendo uma avaliação da capacidade do paciente atender a todas as suas necessidades básicas, após a implementação dos cuidados. Sendo assim, conclui-se que a paciente é parcialmente dependente para a realização das atividades implementadas pelos cuidados de Enfermagem, uma vez que a mesma apresentava sonolência, e ao levantar do leito nos primeiros dias alegava náusea. No entanto, com a diminuição de alguns medicamentos ao longo dos dias, demonstrou-se melhor, mais ativa e disposta,

movimentando-se no leito com maior conforto. Além disso, após 2 dias, conseguiu estabelecer suas eliminações de modo satisfatório e seguiu sob cuidados e orientações da equipe. Não sendo possível detectar nenhum agravo secundário ao procedimento cirúrgico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante o processo de construção do estudo, utilizou-se a SAEP à paciente de POI submetida à laparotomia exploratória, secundária a abdome agudo e cisto ovariano, tendo como base norteadora a teoria de Wanda Horta, a qual possibilitou identificar e elencar as necessidades básicas afetadas no âmbito psicossocial, psicobiológico e psicoespiritual. A partir disso, os resultados encontrados para os diagnósticos reais de enfermagem foram dor aguda, constipação, deambulação prejudicada, ansiedade e religiosidade prejudicada e como diagnóstico de risco a baixa autoestima situacional.

A aplicabilidade da teoria de Wanda Horta, Teoria das Necessidades Humanas Básicas, tem grande relevância no tocante à assistência em enfermagem, de um modo geral, e nota-se que com a assistência ao paciente em pós-operatório não é diferente. Deste modo, com a utilização de conhecimentos no estudo de caso acerca desta teoria, contribuem de forma positiva para a formação das acadêmicas em enfermagem, que se empenharam em busca dos conceitos associados à pessoa - elencando o estudo da patologia, conhecimento da teoria e sua aplicabilidade a pacientes que necessitam de cuidados de forma minuciosa em unidade de internamento hospitalar.

Este estudo contou com algumas limitações, como a não obtenção de alguns dados da paciente devido ao seu estado clínico. Durante a coleta de dados a paciente encontrava-se sonolenta e sob efeito de medicamentos, relatando muitas náuseas, resultando, dessa forma, na dificuldade para obtenção de dados fidedignos referentes à história prévia ao internamento hospitalar. Além disso, seu acompanhante não estava presente durante as visitas, o que dificultou ainda mais a interação entre as discentes pesquisadoras e a família, para que houvesse maiores informações prestadas e colhidas.

Entretanto, é evidente que o conhecimento das patologias e sua correlação a outros potenciais agravos à saúde da paciente estudada foram de suma relevância, visto o caráter excêntrico das patologias identificadas. Constata-se ainda que a colaboração, ainda que prejudicada, dos envolvidos tornou o estudo ainda mais rico, ao que concerne contextualizar e construir a abordagem clínica, tornando o processo facilitado.

Diante do exposto, é possível afirmar que a realização do estudo de caso proporcionou a implementação da SAEP durante o processo, trazendo maior autonomia e organização às discentes,

colaborando também com o atendimento individual, qualificado e humanizado à paciente estudada. Através da pesquisa, alinhada ao contexto patológico pelo qual a paciente estava submetida, mostrou-se evidente a contribuição para uma formação pautada em cuidado contínuo, acentuando o olhar das mesmas para um conjunto de ações que aproximam as discentes à paciente. Logo, tal processo favoreceu a formação, trazendo, portanto, aproximação das discentes graduandas em enfermagem tanto à vivência hospitalar prática quanto ao estímulo à busca por conhecimento, demonstrando, através disso, a sua relevância acadêmica.

REFERÊNCIAS

1. ANDRADE, S. R. et al. O ESTUDO DE CASO COMO MÉTODO DE PESQUISA EM ENFERMAGEM: UMA REVISÃO INTEGRATIVA. Texto & Contexto - Enfermagem [online]. 2017, v. 26, n. 4. Acesso em 19 Nov 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/0104-07072017005360016>>.
2. AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION: Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais- DSM-5 (5.ed.). Porto Alegre: Artmed, 2014. Acesso em: 27 Nov 2021. Disponível em: <<http://www.niip.com.br/wp-content/uploads/2018/06/Manual-Diagnostico-e-Estatistico-de-Transtornos-Mentais-DSM-5-1-pdf>>.
2. BENEDET, Silvana Alves; BRASIL, Nicole. A sistematização da assistência de enfermagem e as necessidades de cuidados de pacientes internados em terapia intensiva. Revista Eletrônica Gestão & Saúde. 2017, v. 03, n. 02. p. 522–537. Disponível em: <<https://periodicos.unb.br/index.php/rgs/article/view/122>>. Acesso em: 26 nov. 2021.
3. BERTONCELLO, K. C. G.; SÁVIO, B.; FERREIRA, J. M.; AMANTE, L. N.; NASCIMENTO, E. R. P. Diagnósticos e propostas de intervenções de enfermagem aos pacientes em pós operatório imediato de cirurgia eletiva. Cogitare enferm. Florianópolis. v. 19. p. 582-589, 2014. Disponível em: <<https://revistas.ufpr.br/cogitare/article/viewFile/33676/23251>>.
4. BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Trata de pesquisa em seres humanos e atualiza a resolução 196. Resolução CNS n. 466, 12 dez. 2012. Brasília, Diário Oficial da União, 2012. Acesso em: 19 Nov 2021. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2013/res0466_12_12_2012.html>.
5. BULECHEK, G. M.; BUTCHER, Howard K; DOCHTERMAN, Joanne McCloskey. Classificação das intervenções de enfermagem (NIC); [tradução Soraya Imon de Oliveira... et al]. 5 ed, Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.
6. BULECHEK, G.M.; BUTCHER, H.K.; DOCHTERMAN, J. Classificação das intervenções de enfermagem (NIC). 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
7. CÂNDIDO, Eduardo Batista; SANTIAGO, Aline Evangelista; SILVA FILHO, Agnaldo Lopes da. Abdome agudo em ginecologia. Femina, p. 902-908, 2019. Acesso em: 16 nov. 2021.
8. COLOGNESI, Lara Maria Souza Marcondes; et al. Abdome agudo de origem ginecológica em paciente gestante: relato de caso. Brazilian Journal of Development, v. 6, n. 10, p. 83922-83932, 2020. Disponível em: <<https://www.brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/view/19181>>. Acesso em: 15 nov. 2021.
9. Diagnósticos de enfermagem da NANDA-I: definições e classificação 2018-2020 [recurso eletrônico] / [NANDA International]; tradução: Regina Machado Garcez; revisão técnica: Alba Lucia Bottura Leite de Barros... [et al.]. – 11. ed.– Porto Alegre: Artmed.

10. GONÇALVES, Maria Helane Rocha Batista; et al. Percepção dos enfermeiros do interior do Ceará acerca da SAEP. Revista Recien-Revista Científica de Enfermagem, v. 11, n. 33, p. 342-349, 2021. Disponível em: <<https://www.recien.com.br/index.php/Recien/article/view/503>>. Acesso em: 16 nov. 2021.
11. LUVISOTTO, M. M.; CARVALHO, R. de; GALDEANO, L. E. Transplante renal: diagnósticos e intervenções de enfermagem de pacientes no pós-operatório imediato. Einstein. São Paulo; v. 5. p. 117-122, 2007. Disponível em: <http://apps.einstein.br/revista/arquivos/PDF/441-Einstein5-2_Online_AO441_pg117-122.pdf>.
12. HORTA, W. A. Enfermagem: teoria, conceitos, princípios e processo. Revista Esc. Enf. USP. São Paulo, v. 8, n. 1, p. 7-15, 1974.
13. MAGALHÃES, Maria de Lourdes Caltabiano; et al. Ginecologia baseada em problemas. Fortaleza: Editora LCR, 2011. 470p.
14. MARQUES, D. K. A, MOREIRA, G. Â. C., NÓBREGA, M. M.L. da. Análise da teoria das necessidades humanas básicas de Horta. Rev Enferm UFPE [online]. 2008 out./dez.; 2(4):481-88. DOI: 10.5205/reuol.336-11493-1-LE.0204200820.
15. MATOS, Eliane et. al. DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM DA NANDA-I COM BASE NOS PROBLEMAS SEGUNDO TEORIA DE WANDA HORTA. Cogitare Enfermagem, Florianópolis, v. 20, n. 4, p. 687-694, 2015. Disponível em: <<https://www.redalyc.org/pdf/4836/483647681006.pdf>>. Acesso em: 26 Nov 2021.
16. MEIER, Alcione Carla; et al. Análise da intensidade, aspectos sensoriais e afetivos da dor de pacientes em pós-operatório imediato. Revista Gaúcha de Enfermagem, 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rgenf/a/zmHgXYBPNHVxdRHBwszBDTM/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 12 Jan. 2022.
17. MELO, C.; CARNEIRO, B. A.; PEDROSO, S. M. D. ASPECTOS PSICOLÓGICOS E A DEPRESSÃO EM INDIVÍDUOS PÓS-CIRÚRGICOS. Anais da Jornada Científica dos Campos Gerais, v. 17, 2019.
18. MOURA, Nayara Corrêa Lobo. ABDOME AGUDO NÃO OBSTÉTRICO E GINECOLÓGICO NA GESTAÇÃO: UMA REVISÃO DE LITERATURA. 2018. Disponível em: <<https://rosario.ufma.br/jspui/bitstream/123456789/2393/1/Nayara%20Corr%C3%AAa.pdf>>. Acesso em: 15 Nov. 2021.
19. PINHO, Clarissa Mourão; et al. Religiosidade prejudicada e sofrimento espiritual em pessoas vivendo com HIV/aids. Revista Gaúcha de Enfermagem, v. 2, n. 33, p. 1-7. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/rgenf/a/Hr4BWHghMW3dYZmm76PgZ9v/?format=pdf&lang=pt>>. Acesso em: 25 Nov. 2021.
20. ROCHA, Luana de Souza; MORAES, Márcia Wanderley de. Assistência de enfermagem no controle da dor na sala de recuperação pós-anestésica. Revista Dor, 2010, p. 254-258. Disponível em: <http://files.bvs.br/upload/S/1806-0013/2010/v11n3/a1472.pdf>. Acesso em: 12 Jan. 2022.

21. SANTOS, Emília Conceição Gonçalves dos; et al. Processo de Enfermagem de Wanda Horta- Retrato da obra e reflexões. *Temperamentvm*, v. 15, p. e12520-e12520, 2019. Disponível em: <http://ciberindex.com/index.php/t/article/view/e12520>>. Acesso em: 16 Nov. 2021.
22. SANTOS, Marisa Gomes dos, et al. Etapas do processo de enfermagem: uma revisão narrativa. *Enfermagem em Foco*, v. 8, n. 4, 2017.

Capítulo 6

10.37423/220105218

COMPLICAÇÕES OCASIONADAS POR LESÃO IATROGÊNICA DE VIAS BILIARES PÓS COLECISTECTOMIA LAPAROTÔMICA: UM RELATO DE CASO

Isabel Guedes de Souza

Universidade Estadual de Feira de Santana

Tainá Rios da Silva

Universidade Estadual de Feira de Santana

Gisana Santos da Silva

Universidade Estadual de Feira de Santana

Valquíria de Araújo Hora

Universidade Estadual de Feira de Santana

Erika Maelle dos Santos Reis

Universidade Estadual de Feira de Santana

Fernanda Matheus Estrela

Universidade Estadual de Feira de Santana

Resumo: Objetivo: Descrever a aplicação da Sistematização da Assistência de Enfermagem a um paciente com complicações ocasionadas por lesão iatrogênica de vias biliares pós colecistectomia laparoscópica. Metodologia: Relato de experiência realizado na clínica cirúrgica de um hospital público, o qual atende demanda espontânea da capital e do interior do estado da Bahia. O período de realização do estudo foi em outubro de 2021, na cidade de Feira de Santana-BA. Esta experiência foi fruto da vivência de acadêmicos de enfermagem do 6º semestre da Universidade Estadual de Feira de Santana. Foram respeitados os aspectos éticos da Resolução 466/2012. Resultados: Foi aplicada a Sistematização da Assistência de Enfermagem na clínica cirúrgica a um paciente submetido a colecistectomia laparoscópica, conforme cinco fases do processo de enfermagem: Histórico, Diagnóstico, Planejamento, Implementação e Avaliação. Conclusão: Este estudo pretende contribuir como instrumento gerencial e de cuidado relevante que visem acelerar o tempo de alta, minimizar o risco de complicações, reduzir os custos e favorecer a qualidade de vida dos pacientes submetidos a colecistectomia laparoscópica. 456

Palavras-chave: Assistência de enfermagem. Complicações. Colecistectomia.

INTRODUÇÃO:

A SAE é atualmente uma ferramenta de uso profissional, a partir da qual os profissionais de enfermagem norteiam-se acerca dos riscos a que os pacientes estão expostos durante a assistência à saúde para a partir dela realizarem uma assistência integral e individualizada contribuindo para a garantia da segurança (PEREIRA et al., 2017).

De acordo com a Resolução COFEN 358/2009, a Sistematização da Assistência de Enfermagem funciona como estratégia de organização do serviço de enfermagem, dado que orienta quanto aos métodos e aos instrumentos, de forma a padronizar e qualificar o trabalho dos profissionais, tendo em vista, que a Enfermagem enquanto ciência necessita de embasamento teórico o qual é ofertado pela SAE.

Sob essa ótica, o cenário hospitalar é um dos ambientes onde a sistematização dos cuidados de enfermagem é imprescindível. Onde pode ser empregada visando a minimização dos riscos e complicações, além de buscar a adesão, adaptação e recuperação do paciente por meio da transformação do processo do cuidar em um sistema dividido em etapas que permitirão atender adequadamente às necessidades do paciente com enfoque em sua singularidade (SAMPAIO et al., 2016). Sendo a SAE, portanto um mecanismo capaz de organizar o cuidado em suas mais diversas vertentes, salienta-se sua importância em questões como as complicações ocasionadas por lesão iatrogênica de vias biliares pós colecistectomia laparoscópica.

A lesão iatrogênica de via biliar (LIVB) é uma das complicações mais temidas associadas à colecistectomia. A partir dessa complicação pode ocorrer uma cascata de problemas partindo da estenose de vias biliares, levando a coledocolitíase que causa a obstrução parcial ou total dos ductos biliares, podendo ainda dar origem a colangite, essas complicações correspondem respectivamente ao estreitamento, obstrução e infecção dos ductos biliares. Uma vez que instaladas essas complicações ocorrem manifestações como: icterícia progressiva, colúria, acolia fecal, prurido, distensão abdominal e exames de imagem revelando dilatação de via biliar intra-hepática (LINHARES, 2011; FERNANDES, 2010; SAMPAIO, 2010; BROLLO, 2014).

Mediante o exposto, é essencial ressaltar que o estudo em questão refere-se a uma paciente com complicações ocasionadas por lesão iatrogênica de vias biliares pós colecistectomia laparotômica, acompanhada na clínica cirúrgica de um hospital de alta complexidade. Em vista disso, essa é uma temática de grande relevância, visto que se trata de danos causados por iatrogenia, o que nos dá

subsídio para identificar essa situação como passível de prevenção, sendo evidente a necessidade de maior cautela por parte dos profissionais durante a realização do procedimento. A importância do estudo é trazer reflexão para os profissionais e estudiosos da saúde acerca dessas situações. Portanto, são traçados como objetivos deste estudo descrever a aplicação da Sistematização da Assistência de Enfermagem a um paciente com complicações ocasionadas por lesão iatrogênica de vias biliares pós colecistectomia laparoscópica.

METODOLOGIA:

Trata-se de um estudo de caso do tipo descritivo observacional cujo objetivo é descrever a aplicação da Sistematização da Assistência de Enfermagem a um paciente com complicações ocasionadas por lesão iatrogênica de vias biliares pós colecistectomia laparoscópica. A pesquisa foi desenvolvida no mês de outubro de 2021, em um hospital de alta complexidade e que também atende à demanda espontânea, situado no interior do estado da Bahia, na cidade de Feira de Santana. O presente estudo foi produzido a partir de vivências de acadêmicos do 6º semestre do curso de Bacharelado em Enfermagem da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), no componente curricular obrigatório Enfermagem na Saúde do Adulto e do Idoso II, durante a prática hospitalar.

A disciplina supracitada tem carga horária de 180 horas e objetiva preparar os discentes quanto ao processo saúde-doença nos seus vários níveis de complexidade, englobando ações de planejamento, organização e coordenação, com atividades de natureza preventiva, propedêutica e terapêutica específicas em situações cirúrgicas, clínicas, gerontológicas e neurológicas, utilizando a SAE como base teórico científica visando a segurança do paciente. Foram respeitados os aspectos éticos da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, baseando-se nos princípios da bioética que norteiam as discussões, decisões, procedimentos e ações na esfera dos cuidados da saúde. São eles: beneficência, não-maleficência, autonomia e justiça ou equidade (KOERICH, 2005). Foi realizado o esclarecimento tanto a paciente quanto ao seu acompanhante acerca do objetivo e relevância do estudo bem como da sua autonomia quanto a participar ou não da pesquisa e a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

O estudo foi realizado baseado na Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), no qual tivemos como instrumentos de coleta de dados para desenvolvimento do presente estudo, o prontuário completo com exames laboratoriais e de imagem, prescrições médicas, relatórios médicos e evoluções de enfermagem. Assim sendo, foram seguidas as 5 fases do Processo de Enfermagem. No

histórico de enfermagem, foi realizado o levantamento de informações acerca da identificação da paciente, história clínica, exame físico, hábitos e cuidados, bem como suas necessidades psicossociais e quaisquer informações que fossem relevantes no processo de sistematização da assistência.

Após o levantamento de dados e sua análise subsequente foram elencados os diagnósticos de enfermagem com base na NANDA. Foi elaborado o planejamento de enfermagem determinando as intervenções que seriam realizadas frente às necessidades da paciente, família ou coletividade humana identificadas na fase referida anteriormente.

Depois disso partiu-se para a realização das ações ou intervenções determinadas na etapa de Planejamento de Enfermagem, que corresponde a quarta fase que é a implementação, a SAE foi finalizada com a avaliação de enfermagem, quinta fase do PE, onde foram verificadas possíveis alterações nas respostas da paciente e necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do Processo de Enfermagem.

4. RESULTADOS

O referido caso clínico foi realizado com o intuito de aplicar sistematização da assistência de enfermagem como ferramenta norteadora dos cuidados dos cuidados prestados à pessoa com estenose benigna da via biliar precedida de coledocolitíase e colangite, secundária a uma lesão iatrogênica após cirurgia de colecistectomia. Efetuou-se a busca ativa em prontuário, coleta de dados e histórico de enfermagem, levando-se em conta as particularidades encontradas no exame físico realizado, juntamente com os sinais e sintomas apresentados e relatados pela paciente e familiar.

A pesquisa foi desenvolvida a partir do caso de uma mulher adulta de 59 anos, hipertensa, com histórico de colecistectomia laparotômica em Jacobina-BA, sucedida de complicações em pós operatório tardio, após realizado colangiorressonância magnética sem contraste (CPRM) com evidência de estenose de vias biliares, foi solicitada a regulação da paciente 19 dias após colecistectomia para avaliação de cirurgia geral com diagnóstico inicial de complicação não especificada de cuidados médicos e cirúrgicos, onde devido a queixas de dores intensas na região abdominal (9/10) e icterícia progressiva foi regulada para hospital de alta complexidade.

Cerca de 9 dias após pedido de regulação, a paciente foi admitida na emergência amarelo cirúrgica do referido hospital, onde evoluiu clínica e hemodinamicamente estável referindo manter colúria e acolia fecal, exames laboratoriais indicaram elevado aumento nas taxas de bilirrubina (19,5 mg/dL), fosfatase alcalina (1536 U/L), Lipase (87 U/L) e pequeno aumento nas taxas de RNI (1,13), redução nos níveis de

Hemoglobina (9,4g/dL) e Hematócrito (26%). No dia seguinte paciente referiu má diurese e apresentou abdome levemente doloroso à palpação em HCD, as condutas prescritas pelo médico frente a situação foram: prescrição de ceftriaxona para profilaxia para colangite, introdução de vitamina K, profilaxia para TEV, CPRE e encaminhar para clínica cirúrgica.

Paciente transferida 3 dias após avaliação médica para clínica cirúrgica II para realização de colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) com indicação tanto diagnóstico quanto terapêutica, onde a encontramos orientada, responsiva, colaborativa e ictérica (++++/4+). CPRE realizada 9 dias após admissão na clínica cirúrgica, sem sucesso na cateterização das vias biliares, paciente transferida para clínica cirúrgica I em pré operatório de cirurgia biliodigestiva no dia seguinte. Após cirurgia realizada, paciente seguiu sob cuidados da equipe e aguardando realização de ultrassonografia para verificação de êxito do procedimento realizado.

Exames Laboratoriais

EXAMES	VALOR ENCONTRADO	VALOR DE REFERÊNCIA
Hemoglobina	9,4g/dL	12,0 - 16,0g/dL
Hematócrito	26%	35,0 - 46,0%
Leucócito	7.110mm ³	4.000 - 10.000mm ³
Plaquetas	356.000mm ³	150.000 - 450.000mm ³
Protrombina	82%	maior ou igual a 70%
RNI (Relação Normalizada Internacional)	1,13	0,8 - 1,0
TTPA	30,6	24 a 35s
Uréia	14mg/dL	16 - 40 mg/dL
Creatinina	0,5 mg/dL	0,4 - 1,4 mg/dL
Sódio	136	135-146 mEq/L

Potássio	4 mmol/L	3,5 - 5,0 mmol/L
Fosfatase alcalina	1536 U/L	45-115 U/L
Gama GT	2918 U/L	05/43 U/L para mulheres
Amilase	53 U/L	151 U/L
Lipase	87 U/L	60 U/L
Bilirrubina total	19,5 mg/dL	0,1 - 1,0 mg/dL

Medicação em uso no HGCA

Medicação	Via	Posologia	Indicação
Cloreto de sódio 0,9% 500ML sistema fechado de transferência 0,9%	EV	12/12H	Indicado para o restabelecimento de fluido e eletrólitos.
Dipirona sódica 500mg/ml Ampola de 2ml, 2G ampola(s) SOS	EV	6/6H SOS	Indicado como antitérmico e analgésico.
Atenolol 50mg comprimido 1 comprimido	VO	1 VEZ/DIA	Indicado para controle da hipertensão arterial.
Metoclopramida 5mg/ml ampola com 2ml,10MG ampola SOS	EV	8/8H SOS	Antiemético indicado para o alívio de náuseas e vômitos.
Tramadol 50 MG/ML ampola 2ML 100mg ampola, 100MG ampola SOS	EV	8/8H SOS	Analgésico indicado para o alívio da dor de intensidade moderada a grave.

Ceftriaxona sódica 100mg frasco-ampola IV-diluyente 10ml, 01ampola	EV	1 VEZ/DIA	Antibiótico indicado para eliminar uma grande variedade de microrganismos/bactérias responsáveis por diversos tipos de infecções.
Fitometadiona (vitamina K) SOL. INJETÁVEL 10MG/ML I.V ampola 1ML 10mg/ml ampola de 1ml intramuscular; sexta, sábado E domingo, após 1x na semana às sextas.	IM	1 VEZ/DIA	Indicado no tratamento de hemorragia ou risco de hemorragia como resultado de severa hipoprotrombinemia (deficiência ou diminuição de fatores de coagulação no sangue).
Enoxaparina sol. injetável 40 MG/0,4ML em seringa preenchida conforme NR 32 40mg/0,4ml ampola	SC	1 VEZ/DIA	Anticoagulante indicado para evitar que o sangue coagule.

4.4 EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM

Paciente evolui no 5º DIH no PO tardio de colecistectomia laparotômica, aguardando realização de CPRE. Encontrada no leito em decúbito dorsal, orientada em tempo e espaço, deambula com ajuda, BEG, Refere fadiga ++/++++, nega alergias, relata uso de propranolol de 50mg para controle de HAS. ao exame físico: Mucosas hipocrômicas, pele ressecada, turgor e elasticidade preservados, icterícia generalizada, pupilas isocóricas e fotorreagentes, globo ocular móvel, acuidade visual diminuída OD, traqueia móvel, tireoide visível e palpável, tórax simétrico e expansivo, expansibilidade normal bilateralmente, indolor à palpação, frêmito toracovocal normal, som claro pulmonar em toda extensão do tórax, MVBD. Ictus cordis invisível, levantamento sistólico, pulsação epigástrica e supraesternal visíveis, ART, BRN em 2T, abdome plano com presença de cicatriz no QSD, ruídos hidroaéreos, normoativos em QSE e QIE e ausentes em QSD e QID, indolor à palpação. Apresenta colúria e acolia fecal. Membros com musculatura eutrófica, tônus normal, pulsos presentes rítmicos e de amplitude normal, sinal de Babinski positivo, godet ausente. Manteve-se calma e colaborativa durante todo o atendimento, segue aguardando realização de tratamento por CPRE.

DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM/PLANO ASSISTENCIAL

No intuito de sistematizar a Assistência de Enfermagem à pessoa com Complicações Ocasionadas por Lesão Iatrogênica de Vias Biliares Pós Colectomia Laparotômica foi elencado os seguintes problemas de enfermagem e diagnósticos com as suas respectivas metas.

PROBLEMA DE ENFERMAGEM	DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM SEGUNDO REFERENCIAL DA NANDA	PLANO ASSISTENCIAL	INTERVENÇÕES
Hipertensão	Débito cardíaco diminuído relacionada hipertensão evidenciado por aumento da pressão arterial	Meta: Restaurar PA dentro dos padrões de normalidade.	• Administrar anti-hipertensivo segundo prescrição médica; • Realizar monitorização de níveis pressóricos aferindo a PA frequentemente;
Pele ressecada	Volume de líquidos deficiente relacionada a ingestão de líquido insuficiente evidenciado por visualização da pele ressecada	Meta: Proporcionar a hidratação da pele	• Manter a hidratação da pele; • Orientar para a importância da boa ingestão hídrica; • Utilizar cremes para promover a hidratação da pele.

Fadiga	Fadiga relacionada à complicação cirúrgica, evidenciado pelo cansaço ao realizar pequenos esforços.	Meta: Proporcionar melhora da fadiga	• Permitir ao paciente um ambiente favorável ao descanso e recuperação; • Monitorar o estado respiratório e de oxigenação para que essa fadiga não evolua para uma insuficiência respiratória; • Posicionar o paciente para minimizar os esforços respiratórios (p. ex., elevar a cabeça em relação ao leito e fornecer um apoio para o paciente se inclinar); • Observar sinais e sintomas de redução do débito cardíaco; • Ajustar o ambiente (p. ex., luz, barulho, temperatura, colchão e leito) para promover o sono.
Risco de queda	Risco de queda relacionada a mobilidade prejudicada	Meta: prevenir a queda e promover a segurança do paciente.	• Acompanhar o paciente em seus deslocamentos; • Manter os pertences próximos ao paciente; • Manter cama travada e com grades levantadas; • Manter o chão limpo e seco.
Vulnerabilidade de flebite	Risco de infecção relacionado ao procedimento invasivo	Meta: Evitar infecção.	• Escolher veias calibrosas diminuindo as chances de perda de acesso e/ou cateter;

			- Realizar rodízio do local puncionado; - Realizar a higienização do cateter; - Monitorar para sinais de flebite (p. ex., dor, rubor, aumento da temperatura local, edema) - Manter a permeabilidade do AVP, realizando troca após 72h ou caso apresente sinais flogísticos.
Falta de conhecimento acerca da patologia	Disposição para conhecimento melhorado relacionado à hospitalização evidenciado por vontade a aprender sobre a patologia	Meta: gerar conhecimento sobre a patologia	Sanar dúvidas sobre a patologia

4.6 PLANO DE CUIDADO DE ENFERMAGEM

PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM	APRAZAMENTO
Avaliar SSVV (principalmente PA e FC)	6/6 horas (08:00, 14:00, 18:00, 00:00, 06:00)

Administrar medicação (anti-hipertensivo)	08:00
Observar AVP atentar-se quanto aos sinais flogísticos	No período (M-T-N)
Estimular a ingesta hídrica e a hidratação da pele	No período (M-T-N)
Orientar a paciente e acompanhante quanto aos riscos e prevenção de queda.	No período
Posicionar paciente no leito	No período
Ajustar luz do ambiente e reduzir fontes de ruído	No período
Realizar educação em saúde acerca da patologia	10:00 horas

DISCUSSÃO

A aplicabilidade das etapas da SAE, foram de suma importância para que o processo do cuidar se desenvolvesse de maneira mais eficiente, humana e segura, de forma que os estudantes obtiveram a oportunidade para aperfeiçoamento do pensamento crítico, trabalhar sua autonomia e utilizar o método científico como uma estratégia alicerçante, como forma de garantir a efetividade da assistência.

Durante o levantamento de dados verificou-se uma série de acontecimentos. Inicialmente, foi possível perceber que o problema foi desencadeado durante um procedimento cirúrgico, colecistectomia, tal cirurgia é o único tratamento definitivo para casos de cálculos biliares e é indicada para a maioria dos pacientes sintomáticos (SANTOS, 2008). Sendo assim, a LIVB é uma das complicações mais temidas

associadas à colecistectomia e que por sua vez pode levar a uma estenose de via biliar, podendo ainda evoluir gradativamente com quadros de coledocolitíase e colangite com frequência e causar consequências desastrosas como cirrose biliar e até a morte do paciente (LINHARES, 2011).

Em face ao supracitado, faz-se necessário averiguar tais possibilidades, sempre que após uma colecistectomia o paciente apresentar manifestações como dor, febre e icterícia, pois esses sinais e sintomas são indicativos dessas complicações. Essa cascata de acontecimentos problemáticos adequa-se perfeitamente nesse caso onde após a manifestação desses sinais e sintomas foi realizado uma colangiorressonância magnética sem contraste (CPRM) que evidenciou a estenose de vias biliares, detectando dilatação das vias biliares intra e extrahepática. Já quanto aos exames laboratoriais indicaram elevado aumento nas taxas de bilirrubina (19,5 mg/dL) e fosfatase alcalina (1536 U/L) que a literatura traz como alterações laboratoriais mais comuns em casos de lesões das vias biliares.

Na maioria das vezes os pacientes com LIVB evoluem com sinais de icterícia obstrutiva causada pelo aumento dos níveis de bilirrubina no sangue e sintomas como dor em hipocôndrio direito podendo apresentar febre que pode ser um sinal de colangite (SALIM, 2008). Nesses casos existe um alto risco de desenvolverem complicações infecciosas, devido à constante presença de bactérias na bile, essas complicações infecciosas são minimizadas com a utilização de antibioticoprofilaxia no caso realizada com o uso de Ceftriaxona sódica 100mg, já no caso das coagulopatias deve ser administrada vitamina K para realizar sua correção, bem como as medicações analgésicas para promover maior conforto a paciente (COELHO & FREITAS, 1997).

Como medida terapêutica para referida situação foi indicado a realização de uma colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE), técnica especializada usada para estudar os ductos da vesícula biliar e realizar sua desobstrução, o que na paciente em questão não foi possível já que não foi obtido sucesso em sua realização (ANTONELLO, 2020). Frente a essa realidade foi constatada a necessidade eminente de realização de cirurgia biliodigestiva para e remover os cálculos e realizar um procedimento de drenagem para permitir a eliminação de quaisquer cálculos residuais ou recorrentes, restabelecendo a função dos ductos biliares e revertendo o quadro clínico da paciente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A limitação do estudo está atrelada ao fato do método escolhido ser um estudo descritivo observacional, onde é feita uma análise detalhada de um caso específico, impossibilitando a comparação com uma população de referência. Sendo assim, gerando informações insuficientes para

determinar a veracidade dos diagnósticos. Ademais, a presença de diagnóstico contidos no prontuário de forma fragmentada e inconclusiva, complicaram a busca por estudos acerca do problema vivenciado pela paciente e de realizar conexões entre a sintomatologia e as causas

Haja vista a imprescindibilidade da SAE quando diz respeito a um cuidado integral, eficiente e eficaz. Sua aplicação mostrou-se válida na referida paciente, pois possibilitou a organização de toda a assistência prestada, facilitando aos estudantes que compreendessem a paciente, enquanto ser biopsicossocial de forma a atender todas as suas necessidades. Visto que, em virtude da grande demanda e da falta de um planejamento, muitos profissionais acabam não se atentando para fatores importantes no processo saúde-doença, vivenciado pelos pacientes.

Destaca-se ainda, que embora a assistência tenha sido realizada de forma eficiente, todos esses problemas vivenciados pela paciente poderiam ter sido evitados, uma vez que tiveram origem a partir de uma iatrogenia. Portanto, embora esse estudo tenha sido realizado com a finalidade de descrever a aplicação da Sistematização da Assistência de Enfermagem, possibilitou-se a realização de reflexões e pensamentos críticos acerca da temática.

Esse trabalho mostrou-se essencial para compreensão sobre a importância da implementação da SAE e do papel da enfermagem, enquanto cuidadores, pesquisadores e formadores de opinião na área da saúde.

REFERÊNCIAS:

ANTONELLO, Giovanni de Marco. Análise do Perfil de Pacientes Submetidos à Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica em um Centro de Tratamento Quaternário. Monografia (Programa de Aperfeiçoamento nos Moldes Fellow em Endoscopia Digestiva Oncológica) — Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), Rio de Janeiro, 2020.

BARROS, Alba Lucia Bottura Leite. Anamnese e exame físico – avaliação diagnóstica de enfermagem no adulto. 3. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2016.

BROLLO, Flávia Moojen et al. Colangite aguda: uma emergência potencialmente fatal. Acta méd. Porto Alegre, v. 35, p. 5-5, 2014.

COELHO, Julio C.U; FREITAS, Alexandre T. Tratamento cirúrgico das icterícias obstrutivas.

Medicina, Ribeirão Preto, 30: 220-233, abr./jun. 1997.

Conselho Federal de Enfermagem. Resolução 358/2009. Dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, e dá outras providências [Internet]. [citado em 2021 out 29]. Disponível em: http://www.cofen.gov.br/resoluco-cofen-3582009_4384.html

Diagnósticos de enfermagem da NANDA-I: definições e classificação 2018-2020 [recurso eletrônico] / [NANDA International]; tradução: Regina Machado Garcez; revisão técnica: Alba Lucia Bottura Leite de Barros... [et al.]. – 11. ed. – Porto Alegre: Artmed, Editado como livro impresso em 2018.

FERNANDES, Rui Alexandre Anastácio. Litíase biliar – casuística de uma série hospitalar. Serviço Integrado das Bibliotecas da Universidade de Coimbra (SIBUC). Coimbra, 2010.

KOERICH, Magda Santos et al. Ética e bioética: para dar início à reflexão. Texto Contexto Enfermagem. V.14, n.1 p.106-10, 2005.

LINHARES, Bruno Lima et al. Lesão iatrogênica de via biliar pós-colecistectomia. Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, Ceará, v.38, n.2, p. 095-099, 2011.

Patrícia Madalena Vieira Hermida; Izilda Esmênia Muglia Araújo. Sistematização da Assistência de Enfermagem: subsídios para implantação. Revista Brasileira de Enfermagem. Campinas, v.59, n.5, p.675, mar 2006.

PEREIRA, Gleidson do Nascimento et al. RELAÇÃO ENTRE SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM E SEGURANÇA DO PACIENTE. Enfermagem em foco, Ceará, v. 8, n. 2, p. 21-25, 10 maio 2017.

SALIM, MT; CUTAIT, R. Complicações da cirurgia videolaparoscópica no tratamento de doenças da vesícula e vias biliares. Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva. 21(4):153-7. São Paulo, 2008.

SAMPAIO, José Artur et al. Estenoses biliares benignas: reparação e resultados com o uso de silastic transhepático transanastomótico. Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva. São Paulo, v.23, n.4 p.259-265, 2010.

SAMPAIO, Kamille Ribeiro et al. Implementação da sistematização da assistência de enfermagem em clínica médico-cirúrgica: limites e possibilidades. Suplemento - Artigos de revisão, Ceará, p. 37-44, Julho 2016.

SANTOS, José Sebastião et al. Colecistectomia: aspectos técnicos e indicações para o tratamento da litíase biliar e das neoplasias. Medicina (Ribeirão Preto) 2008; 41 (4): 449-64

VENTURA, Magda Maria. O Estudo de Caso como Modalidade de Pesquisa. Rev SOCERJ. Rio de Janeiro, v.20 n.5, p.383-386, 2007.

Capítulo 7

10.37423/220105224

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM LESÕES CEREBRAIS METASTÁTICAS.

Ariane Oliveira Pereira

Universidade Estadual de Feira de Santana

Érica Bispo Santos

Universidade Estadual de Feira de Santana

Pamula Andrade Lisboa Bacellar

Universidade Estadual de Feira de Santana

Rebeca Moreira Santos

Universidade Estadual de Feira de Santana

Ialú Cruz Pereira

Universidade Estadual de Feira de Santana

Fernanda Matheus Estrela

Universidade Estadual de Feira de Santana

Márcia Gomes Silva

Universidade Estadual de Feira de Santana

Resumo: O estudo tem como objetivo descrever a Sistematização da Assistência de Enfermagem, respaldada na Teoria do Autocuidado, a um paciente idoso com diagnóstico de lesões metastáticas no cérebro. **Método:** trata-se de um estudo qualitativo, descritivo tipo estudo de caso, elaborado em uma unidade de emergência na Sala Amarela Cirúrgica, em um hospital geral de alta complexidade, por cinco discentes do Curso de Enfermagem. As informações foram obtidas através da aplicação do histórico de enfermagem, exame físico, história clínica e a coleta de outras informações do paciente por meio do prontuário e do familiar acompanhante. Buscando garantir um cuidado melhor por meio da Sistematização da Assistência de Enfermagem, aplicou-se a Teoria do Autocuidado de Dorothea Orem, que se fraciona em três teorias inter-relacionadas. **Resultados:** Apresentam-se, como resultados, os diagnósticos de Enfermagem, as intervenções sob a ótica da Teoria do Autocuidado de Dorothea Orem e a prescrição de Enfermagem. **Conclusão:** Conclui-se dessa forma, que este estudo é de fundamental importância para a Enfermagem, a medida que a construção do mesmo, desde o processo de coleta até a discussão dos resultados foram realizadas com base em evidências científicas, através da elaboração da SAE respaldada em uma teoria de enfermagem.

Descritores: Enfermeira; Metástases Cerebrais; Processo de Enfermagem; Teoria da Enfermagem.

INTRODUÇÃO

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), coordena o processo de assistência das trabalhadoras do campo da enfermagem, possibilitando as mesmas realizar o Processo de Enfermagem (PE), que é entendido como um método capaz de solucionar os problemas evidenciados através do uso de teorias práticas durante à assistência, sendo a SAE composta por meio de cinco etapas: histórico de Enfermagem; diagnóstico; planejamento; implementação e avaliação de enfermagem (LEITE *et al.*, 2020).

A resolução COFEN 358/2009 normatiza a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e implementa o PE em todas as instituições de saúde que tenham atividade de enfermagem (SILVA *et al.*, 2021). O Processo de Enfermagem é um instrumento que orienta o cuidado, assim deve ser baseado em conhecimentos técnicos-científicos, sendo imprescindível que as trabalhadoras do campo da enfermagem possuam o conhecimento teórico, e saiba quais etapas compõem este PE, uma vez que é essencial sua implementação na prestação de serviço (SILVA *et al.*, 2021).

Desse modo, realizou-se a Sistematização da Assistência em Enfermagem a um paciente idoso com lesões metastáticas no cérebro. Sabe-se que, essas lesões são tipos de tumores secundários, que se desenvolvem a partir de estruturas localizadas fora do encéfalo, podendo ocorrer lesões metastática no encéfalo a partir de neoplasias de pulmão, mama, trato gastrointestinal inferior, pâncreas, rim e pele (BRUNNER E SUDDARTH, 2016).

O câncer configura-se como o principal problema de saúde pública mundial, estando entre as quatro causas mais recorrentes de mortalidade antes dos 70 anos de idade. O aumento nas taxas epidemiológicas de incidência, prevalência e mortalidade pode ser explicado por fatores relacionados ao desenvolvimento socioeconômico dos países. Em uma avaliação realizada em 2018, foram identificados cerca de 18 milhões de casos novos de cânceres, e 9,6 milhões de óbitos. A incidência no sexo masculino é maior que no feminino, sendo o câncer de próstata o mais recorrente entre eles, com cerca de 9,5 milhões de casos novos, independente do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país. Para o Brasil a estimativa é que tenha em 2022 cerca de 625 mil novos casos gerais de câncer (BRASIL, 2019).

O câncer do Sistema Nervoso Central (SNC) está na décima terceira posição de incidência dos que mais acometem homens. Cerca de 162 mil casos novos foram diagnosticados em homens no ano de 2018, o que confere um risco estimado de 4,2 casos por 100 mil homens. No Brasil, ocorreram

aproximadamente 4.795 óbitos por câncer do SNC em pessoas do sexo masculino no ano de 2017 (BRASIL, 2019). Deste modo, pode-se compreender que os gastos, ainda que não estabelecidos com os cânceres do SNC, trás impactos aos cofres públicos devido ao alto custo com os tratamentos e na promoção da assistência ao indivíduo.

As metástases cerebrais configuram-se como umas das principais consequências neurológicas, ocorrendo em 25% dos casos de câncer, tendo em vista que são causadoras dos sintomas não tratáveis e que pode levar à morte, por este motivo, muitos profissionais de saúde acabam por não dar continuidade com o tratamento farmacológico e adotam medidas paliativas (SANTOS *et al.*, 2001).

O tratamento do câncer metastático paliativo envolve minimizar os efeitos dos sintomas graves, utilizando por exemplo medicamentos como os corticosteróides que são úteis no alívio da cefaléia e de alterações do nível de consciência. Outros medicamentos que podem ser empregados na terapêutica medicamentosa são os agentes osmóticos (para diminuir o conteúdo de líquido cérebro) e anticonvulsivantes. Além disso, o diagnóstico das lesões metastáticas se dá a partir de Tomografia Computadorizada (TC) e Ressonância Magnética (RM) (BRUNNER E SUDDARTH, 2016).

Demonstra-se que a compreensão da temática possibilita além do conhecimento amplo da fisiopatologia, o aprofundamento na Sistematização da Assistência em Enfermagem, os cuidados voltados para as necessidades apresentadas pelo paciente. Este estudo foi motivado devido a complexidade do caso, visto que dispunha de um prognóstico ruim, o que proporciona estabelecimento de diferentes medidas para resolução dos problemas identificados, porquanto as metas a serem alcançadas correspondiam ao bem-estar do paciente e não à restauração fisiológica do quadro.

Diante do exposto o estudo foi desenvolvido com a aplicação do PE, com base na Teoria de Dorothea Orem, a um paciente com metástase cerebral, através da aplicação da Taxonomia de Diagnósticos de Enfermagem propostos pela North American Nursing Diagnosis Association (NANDA, 2018), com a determinação de metas, implementadas por meio do plano assistencial, projetado para garantir melhores condições de saúde e o conforto deste paciente. Por meio do presente estudo pode-se relacionar os saberes teóricos adquiridos durante a graduação em enfermagem com o cenário identificado na prática hospitalar, permitindo aprofundar os conhecimentos acerca dos achados, com as recentes literaturas, a fim de contribuir para a formação profissional. Confirma-se assim, que a

atuação da enfermeira é essencial no processo de cuidado a um paciente com metástase cerebral, por meio da sua assistência, supervisão e gerência.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo, tipo estudo de caso, que tem como objetivo observar, descrever e desenvolver uma compreensão mais elucidativa sobre determinado fenômeno, buscando aproximar a teoria e a prática (ANDRADE *et al.*, 2017). O presente estudo visa a implementação da Sistematização da Assistência em Enfermagem (SAE), com ênfase a um paciente idoso com diagnóstico de lesões metastáticas no cérebro.

O presente estudo foi vivenciado por graduandas de Enfermagem da Universidade Estadual de Feira de Santana, localizada em Feira de Santana (BA) – no decorrer da carga horária prática (120h) do componente curricular Enfermagem na Saúde do Adulto e do Idoso II, no período de novembro e dezembro de 2019. O estudo de caso ocorreu em uma unidade de emergência na Sala Amarela Cirúrgica (SAC), em um hospital geral de alta complexidade, o qual atende à demanda espontânea da capital e do interior do Estado da Bahia. A SAC tem como finalidade prestar assistência pré-operatória a pacientes que necessitam de atendimento prioritário, de acordo com a gravidade clínica.

A SAE foi regulamentada no Brasil através da Resolução nº358/2009 do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN, 2009), preconizando que fosse implementado em todas as unidades de atendimento à saúde que prestassem assistência de enfermagem. Implementou-se a SAE ao paciente com diagnóstico de lesões metastáticas no cérebro, pautando-se nas seguintes etapas: 1) Coleta de Dados ou Histórico de Enfermagem: é um processo sistemático e contínuo, cuja finalidade é a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou coletividade, sobre suas respostas durante o processo saúde e doença; 2) Diagnóstico de Enfermagem: processo de agrupamento e interpretação dos dados coletados, que irá direcionar para a tomada de decisão, e que se constitui-se como base para as ações e intervenções necessárias; 3) Planejamento de Enfermagem: nesta etapa, são determinados os resultados esperados e como serão alcançados;

4) Implementação de Enfermagem: é a etapa da realização das intervenções e ações estabelecidas na etapa anterior; 5) Avaliação de Enfermagem: última etapa é a verificação de mudanças nas respostas durante o processo saúde e doença, para comprovar se as ações e intervenções de enfermagem realizadas foram positivas ou se há a necessidade de aprimoramento (COFEN, 2009).

As informações foram obtidas através da aplicação do histórico de enfermagem e exame físico, além disso a história clínica e a coleta de outras informações do paciente por meio do prontuário, verificando as informações relevantes ao estudo, como prescrição médica, evolução de enfermagem, exames laboratoriais e exames de imagens, e também a entrevista com o familiar acompanhante para tentar obter outras informações que não foram coletados anteriormente, possibilitando compreender melhor o processo de início da doença e as demais causas envolvidas.

Dessa maneira, empenhou-se em proporcionar um serviço de Enfermagem de maneira individualizada e humanizada, buscando o bem estar físico e psicológico do mesmo. Através da Taxonomia I da NANDA (2018), foram relacionados os diagnósticos de Enfermagem, por meio dos problemas que foram levantados durante o estudo, possibilitando desenvolver os planos assistencial e o plano de cuidado para o paciente, com o objetivo de melhorar a sua recuperação. Por fim, buscou-se avaliar a assistência prestada e articular-se para retificar as possíveis falhas, que durante o processo fosse possível.

Buscando garantir um cuidado melhor por meio da SAE, aplicou-se a Teoria do

Autocuidado de Dorothea Orem, que se fraciona em três teorias inter-relacionadas: 1) Teoria do Autocuidado – retrata como e por que as pessoas cuidam de si; 2) Teoria do Déficit de Autocuidado – caracteriza como a enfermagem pode contribuir para essas pessoas que têm o déficit de se autocuidar; 3) Teoria dos Sistemas de Enfermagem – refere-se quais as relações precisam ser constituídas e mantidas para que se conceba a enfermagem como ciência (HERNÁNDEZ; PACHECO; LARREYNAGA, 2017).

Dentre essas teorias a que tem maior destaque neste estudo é a Teoria do Déficit de Autocuidado, visto que o paciente tem algumas debilitações e limitações devido ao seu estado de saúde fragilizado, impossibilitando cuidar de si. A ideia geral dessa teoria é a relação entre a demanda de cuidados de enfermagem e as habilidades desenvolvidas para o autocuidado, as quais não são congruentes para atender algumas ou todas as necessidades existentes para o indivíduo cuidar de si (HERNÁNDEZ; PACHECO; LARREYNAGA, 2017). O cuidado de Enfermagem e as limitações apresentadas pelo indivíduo, são o centro dessa teoria, e procura-se sempre motivar o indivíduo a cuidar de si mesmo.

Diante do exposto elaborou-se o plano de cuidados de Enfermagem, fundamentado nos cuidados convenientes à sua condição de saúde, tendo em vista que o mesmo era dependente para o autocuidado. Além disso, procurou-se embasar o estudo de caso baseado nas produções científicas disponíveis

RESULTADOS

O PE foi fundamentado na Teoria de Dorothea Orem que visa identificar as deficiências do autocuidado, com foco em estabelecer quais serão as condutas adotadas pelo indivíduo, daqueles que estão ao seu redor e da enfermeira, buscando contemplar as necessidades durante a assistência e no seio familiar (OREM, 1980). O presente estudo foi realizado portanto com base nas evidências científicas acerca da Metástase Cerebral e dos princípios fundamentais da Teoria do Autocuidado.

Deste modo, inteira-se que se trata de um idoso do sexo masculino, com 72 anos, hipertenso e dislipidêmico; oito dias antes do internamento havia passado por uma cirurgia de desbridamento de próstata. Deu entrada na unidade hospitalar, vindo da sua residência, dirigindo seu veículo automotor, sozinho. Foi encaminhado à Sala Amarela com tensão em MMSS, fraqueza em MMII e confusão mental, com suspeita diagnóstica, inicial, de Acidente Vascular Encefálica Isquêmica (AVE-I). Após a realização de exame de imagens e laboratorial, um possível diagnóstico foi levantado, o de abscesso cerebral. Para elucidação do caso, novos exames de imagens foram solicitados, com a Ressonância Magnética, um novo diagnóstico foi considerado, tumor cerebral. Sem um diagnóstico fechado, pela terceira vez, novos exames de imagens foram requeridos, inclusive, Tomografia Computadorizada (TC) dos pulmões. A TC mostrou uma massa na base pulmonar direita. A partir disso a equipe multidisciplinar conjecturou sobre a possibilidade de metástase cerebral, sendo o foco primário a massa pulmonar. Até o término da prática das discentes nenhum diagnóstico foi fechado.

Ao exame físico de Enfermagem, paciente restrito ao leito, movimentando-se, apenas, com auxílio, força muscular reduzida nos MMSS e MMII e mobilidade reduzida nos MMII, em dieta oral, dejeções ausentes há 5 dias e em uso de fralda. Apresenta-se ao exame físico com a memória recente e retrógrada preservada; estado de vigília, perceptividade, reatividade e deglutição preservada; normocárdico, ausculta cardíaca BCNF em 2T; ausculta pulmonar MVBD sem RA; ausculta abdominal RHA hipoativos; FC: 86 bpm; FR: 20 inc/min; T: 35,8°C; PA: 120x80 mmHg.

Com o levantamento de problemas de enfermagem, lista-se os prioritários, para a construção da Sistematização de Assistência de Enfermagem à pessoa com metástase cerebral, traçando o plano assistencial e indicando as intervenções para alcançar as metas estabelecidas, conforme a tabela 1, a seguir.

Tabela 1 - Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) baseada na Teoria do Autocuidado, de Dorothea Orem. Feira de Santana, Bahia, 2019.

Problema de Enfermagem	Diagnóstico de Enfermagem	Plano Assistencial	Plano de cuidados
Força reduzida em MMII	Mobilidade física prejudicada relacionada a paresia, perda do equilíbrio, da coordenação, espasticidade, evidenciado por Escala de Rossi e Mistrorigo grau 2; Déficit no autocuidado, relacionado à fraqueza muscular evidenciado por déficit para banho, higiene íntima, alimentar-se, vestir-se; Risco de queda, relacionado a redução da força em extremidade inferior.	a) Meta: estimular a musculatura. b) Sistema de Enfermagem envolvido: parcialmente compensatório, apoio-educação. c) Método de ajuda: agir, orientar e apoiar.	-Orientar e ajudar o paciente na realização de exercícios para estímulo da função motora; -Proporcionar a higiene oral antes e após as refeições; -Realizar banho no leito; -Monitorar a limpeza das unhas; -Monitorar a umidade dos lábios, se necessário, aplicar lubrificante oral.

Risco de lesão por pressão Em uso de fralda	Risco de lesão por pressão, relacionado a redução da mobilidade física.	a) Meta: prevenir o aparecimento de LPP b) Sistema de Enfermagem envolvido: parcialmente compensatório; apoio- educação c) Método de ajuda: agir e orientar	- Investigar as condições da pele do cliente e documentar os achados; - Promover e orientar quanto a importância da mudança de decúbito a cada duas horas; - Orientar o paciente e acompanhante quanto a importância da hidratação da pele a base de óleos de vegetais; - Proteger eminências ósseas; - Manter as roupas de cama sempre limpas e secas; - Manter o paciente seco e limpo, realizando a troca de fraldas a cada 3 horas

Choroso, emocionalmente	instável	Síndrome do idoso frágil relacionado a tristeza, imobilidade, isolamento social, evidenciado por momentos de choro.	a) Meta: Restabelecer o equilíbrio emocional. b) Sistema de Enfermagem envolvido: apoio-educação. c) Método de ajuda: orientar e apoiar.	-Encorajar o paciente a reconhecer e a discutir pensamentos e sentimentos; -Ajudar o paciente a identificar sentimentos normais sobre si mesmo; -Ajudar o paciente a identificar o impacto da doença no autoconceito; -Ajudar o paciente a reexaminar percepções negativas de si mesmo; -Ajudar o paciente a identificar uma fonte de motivação; -Ajudar o paciente a identificar comportamentos autodestrutivos; -Partilhar observações ou pensamentos sobre comportamentos ou reações do paciente.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

O autocuidado pode ser entendido como as ações realizadas pelos indivíduos que são indispensáveis à manutenção da vida, do desenvolvimento e do seu bem-estar biopsicossocial (GALVÃO; JANEIRO, 2013).

De acordo com Orem (1980) o autocuidado são atividades pelas quais as pessoas iniciam e realizam operações essenciais em seu próprio favor para a preservação da vida. Sendo assim, ainda, segundo, Orem, existe a demanda terapêutica de autocuidado, presente frente a uma demanda relacionada ao autocuidado, quando existe por parte do indivíduo uma resposta ativa a essa demanda, ele consegue responder adequadamente, quando essa resposta é percebida, pela enfermeira, como inadequada, há um déficit de autocuidado. Sendo, portanto, este o alvo da enfermeira.

Dessa forma, identificar as necessidades do indivíduo, em processo de adoecimento, é essencial para planejar intervenções que visem, sempre, a melhora do quadro clínico do cliente, levando em conta suas limitações na capacidade do autocuidado. Essas intervenções podem ser realizadas em conjunto profissional-paciente ou realizadas totalmente pela enfermeira.

Para isso, Orem (1980) define três tipos de sistema de enfermagem, totalmente compensatório, parcialmente compensatório e sistema educativo de apoio. No sistema totalmente compensatório o cliente não possui recursos para alcançar a demanda terapêutica exigida para estabelecer o autocuidado, devendo, então, as demandas serem realizadas pela enfermeira. No sistema parcialmente compensatório o indivíduo consegue alcançar algumas demandas do autocuidado, uma vez que, são acessíveis a sua capacidade, mas ainda possui demandas que não consegue alcançar, essas são realizadas pela enfermeira. Já no sistema educativo de apoio, o cliente possui recursos para atingir as demandas de autocuidado, mas ainda precisa da assistência da enfermeira para tomada de decisões, para adquirir habilidades e conhecimentos.

Utilizando a Teoria do autocuidado é possível dar destaque ao cliente e suas capacidades e não só planejar, estabelecer e executar as intervenções a serem realizadas pela enfermeira. O cliente deixa de ser um agente passivo e passa a ser atuante e decisivo para restauração ou manutenção de sua saúde.

Revelou-se, no caso clínico do paciente estudado, um possível diagnóstico médico de tumor cerebral secundário a um câncer de pulmão. Apesar do diagnóstico médico não ter sido estabelecido, estudos

revelam que o câncer de pulmão é o tumor primário responsável por 30% a 60% de todas as metástases cerebrais (FERRELLI *et al.*, 2018; ARAÚJO *et al.*, 2019;

BARBOSA *et al.*, 2012). A apresentação clínica desta patologia pode evoluir em semanas ou meses, dentre as manifestações 65% dos clientes apresentam alterações cognitivas, 40% apresentam déficit neurológico focal (hemiparesia ou afasia), um dos sintomas mais recorrente é cefaleia, presente em 50% dos casos, a convulsão aparece em 15 a 20% dos pacientes (TAVARES, 2009).

De acordo com Silva *et al.* (2008) as alterações psicológicas como medo e tristeza estão presentes e são reações comuns e esperadas em pacientes que obtêm o diagnóstico de câncer. A própria mudança na rotina gera impactos psicológicos na pessoa em processo de internamento. Apresentaram-se neste caso alterações que corroboraram com a literatura. O cliente do caso apresentou alterações motoras, paresia em membros superiores e inferiores que levou aos seguintes diagnósticos da NANDA (2018), Mobilidade física prejudicada, Déficit no autocuidado e Risco de queda.

O comprometimento na capacidade de responder a algumas demandas como vestir-se, banhar-se evidenciam uma resposta inadequada à demanda terapêutica de autocuidado, ou seja, a enfermeira passa a assumir a responsabilidade de realizá-las enquanto o indivíduo não consegue reproduzi-las. Sendo assim, é necessário estabelecer um método de ajuda baseado no agir, nas atividades que ele não consegue atingir, e orientar e apoiar, nas atividades que ele consegue realizar. Diante destes diagnósticos é possível destacar as principais intervenções, a orientação e ajuda na realização de exercícios para estímulo da função motora, a promoção da higiene oral antes e após as refeições e na realização do banho de leito.

Sabe-se que, com redução da mobilidade física e a restrição ao leito facilita o processo de cisalhamento, um dos grandes agentes causadores de lesão por pressão. De acordo com o diagnóstico da NANDA (2018), prescreve-se, Risco de Lesão por Pressão, com a meta de prevenir o aparecimento dessas lesões. Tendo como cuidados a investigação nas condições da pele do cliente e documentação dos achados; a promoção e orientação quanto a importância da mudança de decúbito a cada duas horas; proteção de eminências ósseas; e manutenção das roupas de cama sempre limpas e secas.

Elenca-se, ainda, o diagnóstico de Síndrome do idoso frágil, relacionado a tristeza, isolamento social, a hospitalização, evidenciado por episódios de choro. As intervenções: encorajar o paciente a reconhecer e a discutir pensamentos e sentimentos; a identificar sentimentos normais sobre si mesmo e o impacto da doença no autoconceito; e reexaminar percepções negativas de si mesmo, evidenciam

o método de ajuda fundamentado em orientar e apoiar. Torna-se, dessa forma, a Teoria do Autocuidado o sustentáculo fundamentador na construção deste estudo de caso.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio deste estudo foi possível retificar a relevância da SAE para ordenação e garantia da qualidade da assistência, visto que, é por meio da identificação de problemas e por seguinte através do estabelecimento de diagnósticos que a enfermeira pode determinar e gerir os cuidados de enfermagem que serão prestados por todas as trabalhadoras do campo de enfermagem. Ademais, o PE quando fundamentado em uma das teorias de enfermagem, neste caso a do Autocuidado, permite que as metas e cuidados estabelecidos estejam de acordo com a clínica do paciente, assim, esse cuidado é realizado não somente pela equipe de saúde, mas também pelos familiares, tendo em vista que o paciente se encontra dependente para realizar as atividades de vida diária.

Ao mesmo tempo, este estudo de caso permite a correlação dos achados clínicos identificados no paciente, com os saberes teóricos adquiridos durante o componente curricular, na assistência e dos referenciais teóricos.

Através do caso clínico podemos visualizar brevemente a clínica do paciente, toda a sua complexidade e suspeitas levantadas sobre a sua patologia base, que ainda não havia sido estabelecida até o final do período de estágio hospitalar. Contudo o seu prognóstico mostrou-se ruim, levando a família a solicitar a alta hospitalar, a qual juntamente com a equipe médica fez a solicitação para participar do programa Internação Domiciliar (ID), destinado a pacientes que se encontram estáveis clinicamente, com diagnóstico estabelecido, que ainda necessita de algum cuidado, e também podem se beneficiar pacientes terminais que necessitam de cuidados paliativos, como o paciente em estudo (BRASIL, 2016). Mediante a isto, ressalta-se a atribuição da enfermeira em instruir os familiares e responsáveis pelo paciente as condutas que serão realizadas durante a ID, uma vez que é esta trabalhadora possui total respaldo científico em orientar os cuidados de modo assertivo e específicos para o quadro clínico do indivíduo.

Conclui-se dessa forma, que este estudo é de fundamental importância para a Enfermagem, a medida que a construção do mesmo, desde o processo de coleta até a discussão dos resultados foram realizadas com base em evidências científicas, através da elaboração da SAE respaldada em uma teoria de enfermagem.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDRADE, S. R. et al. O estudo de caso como método de pesquisa em enfermagem: uma revisão integrativa. *Texto & Contexto – Enfermagem*, v. 26, n. 4, 2017. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/tce/a/8fLRLYFMZLVwT3BxBHCJRSs/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 6 jan. 2022.

ARAÚJO, M. A. et al. Metástase Cerebral de Carcinoma Pulmonar Mimetizando um Meningioma. Relato de caso e revisão de literatura. *J Bras Neurocirur*, Barreiras/BA, v. 30, n. 2, p. 121-127, 2019. Disponível em:

<https://jbnc.emnuvens.com.br/jbnc/article/view/1831/1677>. Acesso em: 10 jan. 2022.

BARBOSA, F. P. et al. Metástase cerebral como manifestação clínica inicial de câncer de esôfago - raro Relato de Caso. *Revista Científica da FMC, Campo dos Goytacazes/RJ*, v. 7,

n. 2, p. 12-15, 2012. Disponível em: <http://www.fmc.br/ojs/index.php/RCFMC/article/view/87/68>. Acesso em: 10 jan. 2022.

BRASIL, Ministério da Saúde. Estimativa de 2020: incidência de câncer no Brasil. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), Rio de Janeiro, 2019.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria nº 825, de 25 de abril de 2016. Brasília, 2016.

BRASIL. Conselho Federal de Cofen (COFEN). Resolução Cofen-358/2009. Dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem-SAE nas instituições de saúde brasileiras.

Brasília, 2019. Disponível em: http://www.cofen.gov.br/resoluo-cofen-3582009_4384.html. Acesso em: 07 jan. 2022.

BRUNNER, L. S.; SUDDARTH, D. S. Tratado de Enfermagem Médico Cirúrgica. v. 1 e 2, 13. ed - Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.

NORTH AMERICAN NURSING DIAGNOSIS ASSOCIATION (NANDA). Diagnósticos de enfermagem da NANDA-I: definições e classificação 2018-2020. NANDA International. 11. ed. Tradução: Regina Machado Garcez. Porto Alegre: Artmed, 2018.

FERRELLI, R. S. et al. Perfil clínico dos pacientes submetidos à Radiocirurgia Estereotáxica como tratamento de Metástase Cerebral. *Arq. Catarin Med*, v. 47, n. 2, p. 182-193, 2018.

Disponível em: <http://www.acm.org.br/acm/seer/index.php/arquivos/article/view/335>. Acesso em: 10 jan. 2022.

GALVÃO, M. T. R. S. L. S.; JANEIRO, J. M. S. V. O autocuidado em enfermagem: autogestão, automonitorização e gestão sintomática como conceitos relacionados. *Rev. Min. Enferm, Lisboa-Portugal*, v. 17, n. 1, p. 225-230, 2013. Disponível em:

<http://www.reme.org.br/artigo/detalhes/593>. Acesso em: 10 jan. 2022.

GEORGE, J. B. Teorias de enfermagem. Tradução Regina Machado Garces. Porto Alegre: Artes Médicas, 1993.

HERNÁNDEZ, Y. N.; PACHECO, J. A. C.; LARREYNAGA, M. R. The self-care deficit nursing theory: Dorothea Elizabeth Orem. *Gaceta Médica Espirituana*, v. 19, n. 3, 2017.

Disponível em: <http://scielo.sld.cu/pdf/gme/v19n3/GME09317.pdf>. Acesso em: 8 jan. 2022.

LEITE, F. C. S. et al. Sistematização da Assistência de Enfermagem aplicada ao idoso com sepse. *Rev enferm UFPE [online]*, v. 14, 2020. DOI: <https://doi.org/10.5205/1981-8963.2020.244715>.

OREM, D. E. *Nursing: Concepts of Practice*. New York: McGraw Hill, 1980.

SANTOS A. J. et al. Metástases Cerebrais. *Revista Neurociências*, v. 9, p. 20-26, 2001. Disponível em: <https://periodicos.unifesp.br/index.php/neurociencias/article/view/8929>. Acesso em: 8 jan. 2022.

SILVA, S. S.; AQUINO, T. A.V.; SANTOS, R. M. O paciente com câncer: cognições e emoções a partir do diagnóstico. *Revista Brasileira de Terapias Cognitivas*, v. 4, n. 2, p. 73- 88, 2008. Disponível em: [http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-](http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-56872008000200006)

56872008000200006. Acesso em: 10 jan. 2022.

SILVA, A. M. et al. Percepções dos enfermeiros acerca da implementação do processo de enfermagem em uma unidade intensiva. *Rev Gaúcha Enferm*, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/1983-1447.2021.20200126>.

TAVARES, W. M. Achados clínicos: Metástases Cerebrais. In: *Medicinanet*. São Paulo/SP, 2009. Disponível em:

https://www.medicinanet.com.br/conteudos/revisoes/1525/metastases_cerebrais.htm. Acesso em: 10 jan. 2022.

Capítulo 8

10.37423/220105227

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM APLICADA EM UM CASO DE PÓS-OPERATÓRIO DE LAPAROTOMIA EXPLORATÓRIA SECUNDÁRIA A ABDOME AGUDO INFLAMATÓRIO

Sthefane Nogueira de Azevêdo

Universidade Estadual de Feira de Santana

Analú Sousa de Oliveira

Universidade Estadual de Feira de Santana

Vanessa Sena da Silva

Universidade Estadual de Feira de Santana

Ivana Caroline Andrade do Nascimento

Universidade Estadual de Feira de Santana

Kellen Tiffany Araujo Lima Paixão

Universidade Estadual de Feira de Santana

Ayla Melo Cerqueira

Universidade Estadual de Feira de Santana

Déborah de Oliveira Souza

Universidade Estadual de Feira de Santana

Íris Cristy da Silva e Silva

Universidade Estadual de Feira de Santana

Fernanda Matheus Estrela

Universidade Estadual de Feira de Santana

Marcia Gomes Silva

Universidade Estadual de Feira de Santana

Resumo: Trata-se de um estudo descritivo do tipo estudo de caso, que viabiliza descrever a Sistematização de Assistência em Enfermagem (SAE), com foco à pessoa no período pós-operatório submetido a laparotomia exploratória secundária a AAI e diverticulite aguda. Teve como objetivo descrever a Sistematização da Assistência de Enfermagem no pós operatório de um paciente submetido a laparotomia exploratória secundária a AAI e diverticulite aguda. O cenário de desenvolvimento da pesquisa foi um hospital geral de alta complexidade que se situa no interior do estado da Bahia, na cidade de Feira de Santana. O estudo foi desenvolvido entre 03 a 18 de novembro de 2021 no setor de Clínica Cirúrgica, a partir de vivências de acadêmicos do curso de Bacharelado em Enfermagem da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), no componente curricular obrigatório Enfermagem na Saúde do Adulto e do Idoso II, durante a prática hospitalar. O trabalho abordou a fisiopatologia, manifestações clínicas, uso de medicação, sinais vitais, exame físico, laboratoriais e de imagem. Além de realizar a SAE com foco na melhora e recuperação cirúrgica realizando o cuidado de forma humanizada, integral e holística.

Descritores: Sistematização da Assistência de Enfermagem, Abdome Agudo Inflamatório, Apendicite, Diverticulite.

1 INTRODUÇÃO

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) foi introduzida no Brasil no final da década de 70, por Wanda de Aguiar Horta através da Teoria das Necessidades Humanas Básicas (SAMPAIO; CARVALHO; PINTO, 2016). Em 2002, a SAE foi regulamentada pelo Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), através da resolução 272/2002. Posteriormente, no ano de 2009, o COFEN lançou a resolução 358/2009, revogando a anterior e obrigando a implantação da mesma em ambientes públicos e privados (COFEN, 2009).

Diante desse cenário, a SAE tem como base o raciocínio clínico e individual, possibilitando o cuidado crítico-reflexivo, qualificado e organizado, permitindo a operacionalização e a implementação do Processo de Enfermagem (PE) (SAMPAIO; CARVALHO; PINTO, 2016). O PE se configura como um instrumento metodológico que tem como objetivo orientar o cuidado de enfermagem, e é formado pelas etapas de coleta de dados, diagnóstico de enfermagem (DE), planejamento, implementação e avaliação de enfermagem (COFEN, 2009).

A NANDA International Inc. (NANDA-I) se constitui como uma referência consolidada para a classificação do DE, e os designa através do uso de uma linguagem padronizada e taxonomias. Definindo o DE como: “[...] julgamento clínico sobre uma resposta humana a condições de saúde/processos da vida, ou uma suscetibilidade a essa resposta por um indivíduo, família, grupo ou comunidade.” Portanto, configura-se como a base para determinar o plano de cuidados apropriado, orientando as intervenções e os resultados do paciente, pelos quais os enfermeiros são encarregados (NANDA, 2018).

Destarte a isso, em nossa vivência enquanto discentes de enfermagem, numa atividade curricular prática realizada no setor de clínica cirúrgica em um Hospital Geral do interior da Bahia, selecionamos o caso clínico do paciente descrito neste estudo, e pudemos realizar a implementação da SAE na fase do pós operatório (PO) de laparotomia exploratória secundária a Abdome Agudo Inflamatório (AAI) e diverticulite aguda.

A laparotomia exploratória é caracterizada como uma intervenção cirúrgica de abertura da cavidade abdominal com a finalidade de acessar órgãos internos, estabelecer um diagnóstico e verificar a extensão da doença, através da exploração da cavidade (TAZIMA; VICENTE; MORIYA, 2011). Neste caso, o procedimento foi indicado para o tratamento das patologias apresentadas pelo indivíduo.

O Abdome Agudo Inflamatório (AAI) é caracterizado por um quadro de dor súbita e/ou progressiva na cavidade abdominal (MAGALHÃES; AZEVEDO; CUNHA, 2019). O quadro apresentado é resultante de processos inflamatórios/infecciosos nos órgãos desta região, que na maior parte dos casos necessita de intervenção cirúrgica para resolução (LOPES; REIBSCHEID; SZEJNFELD, 2006).

Febre e dor são os sintomas mais prevalentes dos pacientes com AAI, estando a localização da dor relacionada ao órgão afetado. Além destes, sintomas como náuseas, peritonite, e anormalidades nas fezes e urina, descrevem as manifestações clínicas da patologia (LOPES; REIBSCHEID; SZEJNFELD, 2006).

Dentre as causas mais comuns do AAI estão a diverticulite aguda, apendicite aguda, pancreatite aguda e colecistite aguda (FILHO, 2018). No caso do estudo, a principal causa do AAI foi a diverticulite aguda que trata-se de uma patologia que costuma afetar indivíduos acima dos 50 anos, de ambos os sexos, sendo o sexo masculino acometido mais precocemente e corresponde ao processo inflamatório e infeccioso dos divertículos, herniações formadas na parede do tubo intestinal. (LEHMANN et al., 2017; SEIXAS, 2019).

O diagnóstico do AAI e diverticulite é realizado por meio de uma anamnese precisa, exame físico completo, manifestações clínicas, exames de laboratório e de imagem, sendo o principal achado dos exames laboratoriais a leucocitose com desvio à esquerda. Na diverticulite aguda, os exames de imagem, essencialmente a tomografia computadorizada (TC) de abdômen evidenciam com maior especificidade o diagnóstico, acoplado ao exame físico (LEHMANN et al., 2017). É válido ressaltar que a identificação das patologias devem ocorrer de forma rápida e eficaz, visando o não agravamento do prognóstico do paciente (MAGALHÃES; AZEVEDO; CUNHA, 2019).

Em geral, pacientes com diverticulite referem dor na região da fossa ilíaca esquerda, febre, náuseas, vômitos, distensão abdominal, flatulências, constipação e sinais de inflamação peritoneal (LEHMANN et al., 2017). Quando classificada como diverticulite complicada, ou seja, quando há perfuração, obstrução ou abscesso, os pacientes podem apresentar aumento da secreção de muco, diarreia e obstrução no trato gastrointestinal (FANTOZZI; SOUSA, 2021).

Na diverticulite complicada há necessidade de internamento hospitalar com intervenção cirúrgica, conforme grau de contaminação peritoneal, dado pelo estadiamento dos critérios de Hinchey, distribuído em 4 estágios. No estágio IV, apresentado pela paciente do estudo em questão, deve ser realizada a cirurgia de Hartmann com ressecção do cólon acometido e colostomia terminal (FANTOZZI; SOUSA, 2021).

Tendo em vista a dimensão do quadro de abdome agudo como problema de saúde bastante incidente, principalmente nos serviços de urgência e emergência, é necessário que haja uma atuação consistente dos profissionais de enfermagem. Para que tomem decisões assertivas, os componentes da SAE devem ser implementados, levando em consideração que é no histórico clínico onde serão colhidas informações relevantes acerca das principais queixas, características, início e duração da dor, dos vômitos e outros sintomas. Com base nesses aspectos, são feitas DE, planejadas ações e metas para que sejam implementadas visando promover conforto e não agravamento do quadro clínico apresentado (WOSNY et al., 2013).

Diante disso, esse trabalho se justifica com base na importância dessa temática e na contribuição para estudantes e profissionais de enfermagem que prestam assistência aos pacientes desde ao atendimento de urgência e emergência, mas sobretudo, na clínica cirúrgica, salientando a essencialidade da implementação da SAE para promover um cuidado qualificado aos indivíduos com AAI e diverticulite aguda.

Logo, este estudo de caso tem o objetivo de descrever a SAE a um paciente submetido a laparotomia exploratória secundária a Abdome Agudo Inflamatório e diverticulite aguda.

2 METODOLOGIA

A pesquisa realizada trata-se de um estudo de caso com abordagem descritiva, que pode ser definido como um método de pesquisa estruturado que possui características próprias, capaz de ser utilizado em múltiplos contextos e busca compreender os fenômenos individuais ou grupais (ANDRADE et al., 2017).

Este trabalho foi desenvolvido por cinco discentes e uma docente do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), através do componente curricular obrigatório Enfermagem em Saúde do Adulto e Idoso II. O período de realização deste estudo foi de 03 a 18 de novembro de 2021 durante a prática hospitalar no campo da Clínica Cirúrgica II. Mais especificamente no dia 03 de novembro, pois no dia seguinte a paciente foi transferida para outra instituição a fim de realizar exames complementares, assim o grupo não conseguiu acompanhar o restante do caso.

A pesquisa foi realizada na Clínica Cirúrgica de um hospital geral de alta complexidade, localizado no interior da Bahia, em Feira de Santana, que atende demandas do município e região. Este setor conta com uma equipe multiprofissional, composta pela equipe de enfermagem, nutricionistas,

fisioterapeutas e médicos de diferentes especialidades, e visa promover o atendimento às necessidades em saúde dos pacientes admitidos. Possui enfermarias femininas e masculinas, sendo duas delas enfermarias para pré e pós-operatório de cirurgias eletivas, uma ala destinada somente para ortopedia/trauma. Nesta unidade há uma alta rotatividade de pacientes, que se encontram no pré ou pós-operatório.

O sujeito estudado é uma paciente do sexo feminino, 40 anos, no 6º dia de pós-operatório (DPO) de laparotomia exploratória, secundária a AI e diverticulite aguda, casada, mãe de dois filhos, dona de casa, procedente da cidade de Irará, no interior da Bahia - localizada a cerca de 40 km de Feira de Santana.

O estudo foi elaborado em duas etapas: inicialmente foram utilizados instrumentos de coleta de dados, como o histórico de enfermagem, anamnese e entrevista com a paciente, exame físico, prontuário completo com exames laboratoriais, prescrições, relatórios médicos e evoluções de enfermagem, selecionados de modo a consolidar o estudo com base nas etapas presentes na SAE. Em seguida, foi realizada uma busca na literatura acerca da temática.

Após a primeira fase da visita e levantamento dos problemas, foram determinados os DE com base na taxonomia I da NANDA, e o planejamento das ações fundamentadas na teoria das necessidades humanas básicas de Wanda Horta. O plano de cuidados foi elaborado com o intuito de viabilizar resolutividade para os problemas listados, de modo a possibilitar a evolução e melhora do quadro clínico, além de promover bem-estar físico, psíquico, social e a humanização da assistência à saúde.

3 RESULTADOS

HISTÓRIA CLÍNICA

J.G.S, 40 anos, sexo feminino, com história de dores abdominais no terço inferior do abdômen, hipertermia e disúria desde o dia 09/10/2021. No dia 16/10/2021 buscou atendimento no hospital municipal de sua cidade, mas não obteve resultados com o tratamento prescrito, o que resultou na persistência dos sintomas, agravando-se com constipação, náuseas e vômitos. No dia 25/10/2021 a paciente realizou uma USG de abdome total com recursos próprios. Encaminhou-se para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município de Feira de Santana no dia 27/10/2021, foi regulada para a emergência do Hospital Geral de Feira de Santana, no dia 28/10, e nesta mesma data foi admitida no centro cirúrgico para uma cirurgia de urgência de laparotomia exploratória secundária a abdome agudo inflamatório e diverticulite; sendo posteriormente admitida na clínica cirúrgica do mesmo serviço.

03/11/2021 08:00 - Paciente evolui no 6º DPO de laparotomia secundária a AAI e diverticulite, encontrada no leito, lúcida, orientada em tempo e espaço, afebril, eupneica, normocárdica. Deambulando, nutrida, em dieta branda, higiene satisfatória. Alega estar ansiosa devido ao tempo de internação, com medo de complicações do procedimento anestésico-cirúrgico, refere dor abdominal com escala verbal numérica 7/10 e falta de apetite. Refere dejeções presentes (colostomia produtiva no momento da visita), diurese presente e sem alterações. Ao exame físico: mucosas hipocrômicas (++)/++++), pele seca e icterícia (++)/++++), tórax simétrico, murmúrios vesiculares presentes, abdome globoso, RHA diminuídos, ausentes no QSD, som timpânico em QSD, semi maciço em QID e QIE, presença de ferida operatória na região epigástrica à hipogástrica apresentando deiscência em dois pontos da incisão cirúrgica com secreção piosanguinolenta, bolsa de colostomia em QSE. Aguarda avaliação do médico plantonista. Realizada punção venosa com AVP jelco 20G pela técnica de enfermagem, fluindo medicamento.

11:00h - FC: 72 bpm; FR: 16 inc/min; PA: 110x60 mmHg; T: 36,3°C; HGT: 110 mg/dL.

Quadro 1 – Particularidades do exame físico

Inspeção	Lúcida, orientada em tempo e espaço, consciente. Mucosas: hipocrômicas (++)/++++). Pele: Seca, acianótico, icterícia (++)/+++++) e afebril. Tórax: Simétrico. Abdome: Globoso, bolsa de colostomia no QSE, e Ferida Operatória (FO) na região epigástrica e hipogástrica. Uso de Acesso Venoso Periférico (AVP) em MSE.
Palpação	Tórax: Boa expansibilidade. Abdome: Doloroso à palpação.
Percussão	Tórax: som timpânico. Abdome: semi maciço em QID e QIE.
Ausculta	Pulmonar: murmúrios vesiculares presentes. Cardíaca: Bulhas rítmicas e normofonéticas em 2 tempos. Abdome: RH diminuídos, ausente no QSD.

Fonte: OLIVEIRA et al., 2021.

Quadro 2 – Alterações nos exames laboratoriais e possíveis relações com o caso.

Exames	Resultados	Valores de referência	Relação com o caso
Plaquetas	949,00 mil/mm	150 - 400 mil/mm	A trombocitose (aumento do número de plaquetas) é causada por hemorragia, anemia ferropriva, inflamação ou esplenectomia.

Hemácias	3,97 milhões/mm	4,0 - 5,0 milhões/mm	A diminuição do número de hemácias ocorre na anemia, está associada a destruição celular, perda de sangue ou carência alimentar de ferro ou de algumas vitaminas essenciais para a produção de hemácias.
Hematócrito	35,20%	37 - 47%	A diminuição do hematócrito indica anemia.
Hemoglobina	11,40 g/dL	11,5 - 15,5 g/dL	Indica anemia leve possivelmente causada pela perda sanguínea
Leucócitos totais	29.850 mm ³	4.000 - 10.000 mm ³	Resposta a um processo infeccioso ou inflamatório
Leucócitos segmentados	22.984,50 mm ³	2.610 - 6.600 mm ³	Resposta a um processo infeccioso ou inflamatório
Leucócitos eosinófilos	597,00 mm ³	90 - 400 mm ³	Resposta a um processo infeccioso ou inflamatório
Linfócitos típicos	4.477,50 mm ³	900 - 3.000 mm ³	Resposta a um processo infeccioso ou inflamatório
Monócitos	1.791,00 mm ³	180 - 800 mm ³	Indica fase de defesa em processo infeccioso.
Sumário de Urina	Aspecto ligeiramente turvo Proteína presente Células epiteliais Piócitos 06 p/c Bactérias numerosas	Ausente Ausente Inferior a 4 piócitos p/c Ausente	A turvação da urina pode ser causada por presença de hemácias, leucócitos, células epiteliais ou bactérias. A proteinúria é um sinal de infecção.

Fonte: prontuário da paciente; FISCHBACH, 2016.

Quadro 3 - Prescrição médica e características dos fármacos utilizados

Fármaco	Dipirona sódica 500 mg/ml EV (antitérmico e analgésico)
Indicação	Indicado para dor e febre
Mecanismo de ação	A dipirona é uma pró-droga cuja metabolização gera a formação de vários metabólitos entre os quais há 2 com propriedades analgésicas; 4-metil-amino-entipirina (4-MAA) e 4-amino-antipirina
Reações adversas	Hipotensão, tontura, boca seca, reações cutâneas, distúrbios cardíacos e etc.
Cuidados	Atentar para a forma de apresentação, dosagem, via de administração, diluição e aparecimento de sinais e sintomas sugestivos de efeitos colaterais; Verificar o prazo de validade.
Relação com o caso	Controle de dor e febre
Fármaco	Ceftriaxona sódica 1000mg, 01 amp (antimicrobiano)
Indicação	Infecções de pele e tecidos moles; infecções ósseas; infecção articular; infecção do trato urinário; meningite outras infecções do SNC; pneumonia; doença de Lyme.
Mecanismo de ação	Inibição da síntese da parede celular da bactéria.
Reações adversas	Trombocitopenia, diarreia, erupção cutânea, infecção fúngica no trato urinário, cefaléia, náusea, vômito, prurido, flebite e etc.
Cuidados	Atentar para a forma de apresentação, dosagem, via de administração, diluição e aparecimento de sinais e sintomas sugestivos de efeitos colaterais; Verificar o prazo de validade.
Relação com o caso	Tratamento e prevenção de infecções intra-abdominais.
Fármaco	Metronidazol 500mg, 01 amp EV (antimicrobiano)
Indicação	Profilaxia e tratamento de infecções causadas por bactérias anaeróbias e infecções pós-cirúrgicas.

Mecanismo de ação	O produto da redução desse fármaco tem propriedades citotóxicas que interagem com o DNA, inibindo a síntese do AC, ceifando a célula.
Reações adversas	Diarréia, náuseas, vômitos, boca seca, alterações no paladar, neuropatia periférica, cefaléia, astenia, ataxia e etc.
Cuidados	Atentar para a forma de apresentação, dosagem, via de administração, diluição e aparecimento de sinais e sintomas sugestivos de efeitos colaterais; Verificar o prazo de validade.
Relação com o caso	Tratamento e prevenção de infecções intra-abdominais.
Fármaco	Tramadol 50 mg/ml SN EV (analgésico)
Indicação	Tratamento da dor de intensidade moderada à grave
Mecanismo de ação	Além de ser um agonista puro não-seletivo dos receptores opióides, o fármaco inibe a recaptação neuronal de noradrenalina e o aumento da liberação de serotonina.
Reações adversas	Náusea, vômito, taquicardia, hipotensão postural, dispneia e etc.
Cuidados	Atentar para a forma de apresentação, dosagem, via de administração, diluição e aparecimento de sinais e sintomas sugestivos de efeitos colaterais; Verificar o prazo de validade.
Relação com o caso	Controle da dor conforme intensidade
Fármaco	Metoclopramida 500mg, 01 amp EV (antiemético)
Indicação	Distúrbios de motilidade gastrointestinal. Tratamento de náuseas e vômitos de origem central e periférica (cirurgias, doenças metabólicas e infecciosas)
Mecanismo de ação	A priori, desconhecido. Suspeita-se de sensibilização para a atividade da acetilcolina.
Reações adversas	Sonolência, sintomas extrapiramidais, síndromes parkinsonianas, actasia, distonia e etc.

Cuidados	Atentar para a forma de apresentação, dosagem, via de administração, diluição e aparecimento de sinais e sintomas sugestivos de efeitos colaterais; Verificar o prazo de validade.
Relação com o caso	Controle de náuseas e vômitos.
Fármaco	Insulina regular SN SC (hipoglicemiante)
Indicação	Manutenção dos níveis glicêmicos adequados
Mecanismo de ação	Por meio das fosforilações que ocorrem na célula, a insulina, desencadeia diversos efeitos, sendo o último deles, o deslocamento de transportadores de glicose, como o GLUT 4, para a membrana celular, provocando a diminuição da glicose do sangue e um aumento do glicogênio dos tecidos.
Reações adversas	Hipoglicemia, edema, distúrbios de refração, eritema, edema e prurido no local da injeção, sudorese, palpitações e etc
Cuidados	Atentar para a forma de apresentação, dosagem, via de administração, diluição e aparecimento de sinais e sintomas sugestivos de efeitos colaterais; Verificar o prazo de validade.
Relação com o caso	Controle glicêmico
Fármaco	Glicose 25% SN EV (hiperglicemiante)
Indicação	Indicado como fonte calórica em nutrição parenteral, atuando no tratamento da redução de carboidratos e fluidos
Mecanismo de ação	A solução hipertônica de glicose, administrada por via intravenosa, provoca desidratação celular, assim, durante o processo metabólico, a glicose libera energia que é rapidamente absorvida no trato gastrointestinal.
Reações adversas	Dor local, irritação da veia, tromboflebite, confusão mental, inconsciência e etc.
Cuidados	Atentar para a forma de apresentação, dosagem, via de administração, diluição e aparecimento de sinais e sintomas sugestivos de efeitos colaterais; Verificar o prazo de validade; Não utilizá-lo se o recipiente estiver violado e se a solução apresentar turvação

Relação com o caso	Suplementação calórica

Fonte: Prontuário da paciente; ANVISA, 2021.

Quadro 4 - Diagnóstico de Enfermagem e intervenções de enfermagem com dimensões bio-psico-emocional-sócio-espirituais no período pós-operatório

Problemas de enfermagem	Diagnóstico de enfermagem	Plano assistencial
Ferida Operatória Deiscência	Integridade tissular prejudicada relacionada ao procedimento cirúrgico evidenciado por ferida operatória	Promover a integridade tissular
Risco de infecção	Risco de infecção relacionado ao procedimento invasivo	Prevenir a infecção
Dor	Dor aguda relacionado a procedimento cirúrgico evidenciado por relato verbal da intensidade da dor	Reduzir a dor
Ansiedade	Ansiedade relacionado ao tempo de internamento evidenciado por preocupação	Promover a redução da ansiedade.
Medo	Medo relacionado a complicações pós cirurgia evidenciado por relato do paciente	Minimizar o sentimento de medo
Risco de motilidade gastrointestinal disfuncional	Risco de motilidade gastrointestinal disfuncional relacionado a colostomia	Garantir a adequada motilidade intestinal
Alimentação reduzida	Nutrição desequilibrada menor do que as necessidades corporais relacionada à ingestão alimentar insuficiente evidenciado por interesse insuficiente pelos alimentos	Promover alimentação adequada às necessidades da paciente

Náuseas	Náusea relacionado ao procedimento anestésico-cirúrgico evidenciado pôr a ânsia de vômito	Prevenir náuseas e vômitos
Conhecimento insuficiente sobre a patologia e procedimento realizado	Conhecimento deficiente relacionado a informações insuficientes evidenciado por relato verbal da paciente	Promover educação em saúde sobre o diagnóstico e os procedimentos realizados

Fonte: NANDA, 2018.

Quadro 5 - Prescrição de enfermagem no período pós-operatório

Prescrição de enfermagem	Aprazamento
Aferir sinais vitais	06, 12, 18, 24
Encaminhar para banho de aspersão	09
Realizar curativo de FO com técnica asséptica e atentar para sinais flogísticos	09:30
Realizar e trocar o AVP conforme protocolo da instituição e observar sinais de flebite.	A cada 96h 03/11 - 07/11
Atentar para queixas de dor e ADM analgesico prescrito	No Período
Explicar todos os procedimentos, inclusive sensações que o paciente possa ter durante o procedimento.	No Período
Oferecer informações reais sobre diagnóstico, tratamento e prognóstico.	No Período
Identificar mudanças no nível de ansiedade com anamnese e escuta qualificada	No Período
Monitorar as complicações pós-operatórias, como obstrução intestinal, íleo paralítico, vazamentos anastomóticos, ou separação mucocutânea, conforme apropriado.	No Período
Orientar o paciente quanto ao uso da bolsa de colostomia e cuidados com o ostoma	No Período

Monitorar a cicatrização do estoma/tecido circunjacente e a adaptação/troca do dispositivo de ostomia.	08 - 16 - 24
Trocar, esvaziar e observar a bolsa de colostomia, aspectos das dejeções (coloração e quantidade) e mensurar em folha apropriada.	08 - 16 - 24
Apresentar os alimentos de forma atraente, agradável, levando em conta a cor, a textura e a variedade.	08 - 12 - 15 - 18 - 21

Fonte: BULECHEK, 2010

4 DISCUSSÃO

J.G.S evolui na clínica cirúrgica, no 6º DPO de laparotomia exploratória, onde apresentou dor abdominal relacionada ao procedimento cirúrgico; deiscência de ferida operatória (FO); medo de complicações da cirurgia; ansiedade relacionada ao período de internamento e preocupação e saudade da família; apetite reduzido; risco de infecção; conhecimento insuficiente sobre a patologia e procedimento realizado.

O PO consiste no período a partir da saída da Sala de Operação (SO) até a recuperação total do indivíduo, é dividido em: imediato, até 24 horas após à cirurgia; mediato, de 24 horas e até 7 dias depois do procedimento cirúrgico; e tardio, classificado após 7 dias da alta hospitalar. A assistência à saúde no PO visa identificar, prevenir e intervir nas principais complicações e desconfortos relacionados aos procedimentos anestésico-cirúrgicos e restabelecer o equilíbrio hemodinâmico do paciente (BRASIL, 2003). A paciente do estudo encontra-se no pós-operatório mediato, logo necessita da vigilância da equipe de saúde quanto a cicatrização da FO e deiscência, e outros aspectos.

A assistência de enfermagem durante todo período PO abrange a identificação precoce e a prevenção de complicações. Estas complicações podem estar associadas a diferentes fatores, tais quais aqueles referentes a patologia clínica associada, tipo de anestesia, estágio do agravo e aos cuidados PO. Devido ao seu estado clínico pré-operatório, alguns pacientes apresentam maior risco de complicações, como por exemplo, indivíduos anêmicos e imunodeprimidos (TORRES et al., 2020).

A classificação das Necessidades Humanas Básicas (NHB) de Wanda Horta foi adaptada para o contexto da Enfermagem brasileira, e é inspirada na categorização Abraham H. Maslow e de João Mohana, em:

psicobiológicas, psicossociais e psicoespirituais. As necessidades psicobiológicas estão relacionadas com o corpo físico, a exemplo da alimentação e eliminações; as psicoespirituais envolvem valores e crenças; enquanto que as psicossociais estão relacionadas com a convivência e os papéis em sociedade (FREITAS; COELHO, 2019).

Dentre as NHB identificadas no momento da avaliação da paciente, encontram-se alteradas: necessidades psicobiológicas do tipo integridade cutâneo-mucosa, como ferida operatória e risco de infecção relacionado a procedimento invasivo; o tipo percepção dolorosa ou integridade física relacionada à dor; de eliminação e nutrição com o risco de motilidade gastrointestinal disfuncional e náuseas. Quanto às necessidades biopsicossociais, pode-se citar: as alterações relacionadas à segurança, como o medo e a ansiedade; e o tipo de aprendizagem atrelado ao conhecimento insuficiente sobre a patologia e procedimento realizado.

Conforme descrito, dentre as necessidades psicobiológicas afetas na paciente, a integridade cutâneo-mucosa foi uma das principais, visto que, a deiscência se constitui uma frequente complicação no PO. Caracterizada pela ruptura parcial ou total de quaisquer camadas do sítio cirúrgico (FERREIRA; ANDRADE, 2006), se configura como uma emergência cirúrgica pelo risco de evisceração, que normalmente acontece entre o 4º e o 14º dia após a cirurgia, onde a contaminação bacteriana da cavidade abdominal poderá gerar complicações que impedem a cicatrização por fechamento primário (SILVA; CROSSETTI, 2012).

A paciente em questão, apresentava cicatrização comprometida com deiscência em 2 pontos da incisão cirúrgica e afirmou troca de curativos com drenagem de secreção pela equipe médica e de enfermagem sempre que necessário, além de estar sob uso de antibiótico. Tal complicação pode-se justificar com base na extensão da ferida e alimentação reduzida.

Para além disso, alguns dos fatores que complicam a cicatrização de feridas são: o tempo de evolução da ferida, profundidade, pressão contínua sobre a área lesada, infecção, técnica inadequada de curativos, idade, aporte nutricional inadequado, anemia, uso de medicamentos sistêmicos (anti-inflamatórios, imunossupressores, entre outros), estresse, ansiedade e depressão (BRASIL, 2002).

A International Association for the Study of Pain (IASP), define a dor como uma experiência sensorial e emocional desagradável que geralmente é associada a lesões reais ou potenciais, porém, de maneira subjetiva e multidimensional em sua interpretação. A dor pós operatória é caracterizada como uma dor aguda, que possui uma natureza nociceptiva, inflamatória, resultante de lesões teciduais

produzidas por instrumentos perfuro/cortantes, utilizados no procedimento cirúrgico (CUNHA; SILVA, 2017), comumente associada a um elevado índice de ansiedade (PIMENTA et al., 2001).

O fator psicológico afeta diretamente o prognóstico do paciente, e causa impactos negativos sobre estabilidade da doença, qualidade de vida e aderência ao tratamento (Cordeiro et al., 2015). Logo, quando uma pessoa está em internação hospitalar para realizar qualquer tipo de tratamento, seu equilíbrio psicológico, tanto quanto o fisiológico, encontra-se abalado (GOMES; FRAGA, 1997). Portanto, o medo e a ansiedade sentidos durante o período de internação aliados a um conhecimento insuficiente sobre a patologia podem vir a interferir no processo de recuperação PO, visto que, o mesmo pode ser prolongado aos olhos dos pacientes requerendo paciência e cuidados específicos (COIRO; RUSCHEL, 2019).

Wanda de Aguiar Horta traz em sua Teoria das Necessidades Humanas Básicas (NHB) as leis gerais do equilíbrio, adaptação e holismo. Tendo como princípio norteador o homem como ser único, autêntico e individual, o qual está sujeito a estados de equilíbrio e desequilíbrio no tempo e no espaço e ao mesmo tempo causa estes estados em seu dinamismo (HORTA, 1979).

Por conseguinte, ter saúde significa estar em equilíbrio, enquanto o desequilíbrio gera necessidades que precisam ser satisfeitas para voltar ao seu ponto de homeostase. Quando as necessidades são negligenciadas ocorre prolongamento da doença. A enfermagem, como parte constituinte da equipe de saúde, possui fundamental papel no impedimento da progressão da doença através do cuidado, levando o indivíduo ao retorno do seu equilíbrio e completo bem estar (HORTA, 1974).

Tendo em vista que o homem é um ser biopsicossocial, e, portanto, faz parte de uma família e comunidade, a enfermagem deve prestar cuidados ao Homem e não à sua doença ou desequilíbrio. Segundo Horta (1974) são funções da enfermeira: assistir o paciente atendendo às suas necessidades básicas e buscando torná-lo independente, por meio do ensino do autocuidado; promover, manter e recuperar a saúde, em parceria com equipe multiprofissional; realizar atividades de pesquisa, ensino, gerenciamento e participação social.

Para que a assistência seja dada de maneira resolutive e qualificada, faz-se necessário que haja uma metodologia de trabalho baseada em evidências científicas. Neste caso, utiliza-se a SAE, com o levantamento de dados para identificação de problemas, e determinação dos DE, avaliando as necessidades daquele indivíduo e estabelecendo um plano assistencial. Logo após, é idealizado o plano

de cuidados, com ações e execução de cuidados a fim de atender as necessidades do indivíduo de maneira adequada (HORTA, 1974).

Por fim, deve ser feita uma avaliação diária do plano e relatando as mudanças, implementação e avaliação da assistência na última etapa do PE, a evolução de enfermagem (HORTA, 1974). Tais ações são fundamentais para a evolução clínica e o bem-estar do indivíduo, além de impactar diretamente na qualidade da assistência prestada.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho trouxe conceitos intrínsecos ao saber e à prática clínica da enfermagem, como o cuidar, a SAE, além da importante discussão acerca do procedimento cirúrgico, fisiopatologia e manifestações clínicas apresentadas, características dos fármacos utilizados pela paciente, entre outros.

Logo, nota-se que tais aspectos são fundamentais para compreender como a SAE é operada e articulada, expondo sua importância ao identificar as necessidades básicas de cuidado ao indivíduo, planejando e implementando ações que possam contribuir para a saúde e bem-estar do sujeito, além da avaliação de seu prognóstico.

Ademais, percebe-se a importância do período PO na assistência prestada aos sujeitos para avaliar a evolução após procedimentos anestésico-cirúrgicos, prevenir intercorrências e reduzir os índices de mortalidade. O paciente submetido a uma laparotomia exploratória requer inúmeros cuidados e atenção constante, haja vista a magnitude e extensão do procedimento, bem como as complicações potenciais secundárias às patologias e dispositivos em uso. Portanto, o PO é o momento de implementar ações de manejo e prevenção de complicações, criar vínculos com o paciente, orientar e esclarecer dúvidas.

Em relação ao prognóstico é indefinido, pois o grupo acompanhou o caso em apenas um dia, o que impossibilitou a avaliação futura. Trata-se de uma paciente, conforme já descrito, com evolução do caso e sob os cuidados da equipe.

No que cerne à formação acadêmica, este estudo de caso contribuiu com o conhecimento teórico-prático acerca da patologia e a SAE, as relações interpessoais entre discentes e a equipe do serviço, assim como a rotina e o processo de trabalho em enfermagem dentro de um hospital geral público no interior da Bahia.

A realização desta pesquisa oportunizou a observação da eficiência e desafios enfrentados no processo de sistematização da assistência, e expõe a necessidade de desenvolver novos estudos acerca da temática, devido a escassez de referências bibliográficas atualizadas. Desse modo, nota-se a importância de mudanças focadas na humanização e melhoria do atendimento às necessidades em saúde do indivíduo no período PO.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, S. R. de et al. O estudo de caso como método de pesquisa em enfermagem: uma revisão integrativa. *Texto & Contexto-Enfermagem*, v. 26, 2017. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/tce/a/8fLRLYFMZLVwT3BxBHCJRSs/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em: 17 de novembro de 2021.

ANVISA. Consultas. Disponível em: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/>. Acesso em: 19 de novembro de 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Departamento de Gestão da Educação na Saúde. Profissionalização de auxiliares de enfermagem: cadernos do aluno: saúde do adulto, assistência cirúrgica, atendimento de emergência. Brasília: Ministério da Saúde; Rio de Janeiro: Fiocruz, 2. ed., 2003. p. 96 p. Disponível em:

https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/profae/pae_cad5.pdf. Acesso em: 19 de novembro de 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Departamento de Atenção Básica. Manual de condutas para úlceras neurotróficas e traumáticas. Brasília: Ministério da Saúde, 2002.

BULECHEK, Gloria M. et al. Classificação das intervenções de enfermagem (NIC). Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

COIRO, Camila da Luz; RUSCHEL, Patricia Pereira. Ansiedade e dor no pós-operatório de cirurgia cardíaca: existe diferença entre os gêneros?. *Psicologia Hospitalar*, v. 17, n. 1, p. 02-16, 2019.

Conselho Federal de Enfermagem (COFEN). Resolução COFEN nº 358/2009. Dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, e dá outras providências [Internet]. Brasília: COFEN; 2009.

CORDEIRO, A. L. L. et al. Aplicação do questionário de ansiedade cardíaca no pós-operatório de cirurgia cardíaca. *Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício*, v. 9, n.56, p. 592-596, 2015.

CUNHA, T. G.; SILVA, G. B. Atuação da Enfermagem no Controle da Dor Pós-Operatória. *Revista Revela*, v. 21, p. 49-59, 2017.

FANTOZZI, B. G.; DE SOUSA, A. V. Doença Diverticular e Diverticulite Aguda: atualização de manejo e métodos cirúrgicos indicados. *Brazilian Journal of Development*, v. 7, n. 4, p. 42844-42855, 2021.

FERREIRA, A. M.; ANDRADE, D. Sítio cirúrgico: avaliação e intervenções de enfermagem no pós-operatório. *Arquivos de Ciência da Saúde*, v. 13, n.1, p. 27-33, 2006.

FILHO, F. E. V. de. Abordagem inicial do abdome agudo cirúrgico. Trabalho de Conclusão de Residência Médica (Residência Médica em Cirurgia Geral) – Hospital Geral de Fortaleza, Fortaleza, 2018.

FISCHBACH, F. T.. Exames laboratoriais e diagnósticos em enfermagem. 9 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.

FREITAS, A. A. S.; COELHO, M. J. Necessidades humanas de cuidado no homem em tratamento cirúrgico oncológico: implicações para a enfermagem. *Revista de Pesquisa: Cuidado é Fundamental*, p. 481-487, 2019.

GOMES, L. C.; FRAGA, M. N. O. Doenças, Hospitalização e Ansiedade: Uma Abordagem em Saúde Mental. *Revista Brasileira de Enfermagem*. Brasília, v. 50, n. 3, p. 425-440, 1997.

HORTA, W. A. Enfermagem: teoria, conceitos, princípios e processo. *Revista da Escola de Enfermagem da USP*, v. 8, n. 1, p. 7-17, 1974.

HORTA, W. A. *Processo de Enfermagem*. São Paulo: EPU, 1979.

LEHMANN, D. E. F. de et al. Diverticulite aguda. *Acta méd.(Porto Alegre)*, p. [7]-[7], 2017.

LOPES, A. C; REIBSCHEID S; SZEJNFELD J. *Abdome Agudo: Clínica e Imagem*. Editora Atheneu, São Paulo, 2006.

MAGALHÃES, B S; AZEVEDO, A. R.; CUNHA, A. G. Perfil clínico-epidemiológico dos pacientes acometidos por abdome agudo em um hospital de referência em Salvador. *Medicina (Ribeirão Preto)*, v.52, n.3, p.193-200, 2019.

NANDA Internacional. *Diagnósticos de Enfermagem NANDA: definições e classificação 2018-2020*. Porto Alegre, Artmed, 11ed. 2018.

PIMENTA, C. A. M. et al. Controle da dor no pós-operatório. *Revista da Escola de Enfermagem da USP*, v. 35, n. 2, p. 180-3, 2001.

SAMPAIO, K. R.; CARVALHO, I. L. N; PINTO, A. G. A. Implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem em Clínica Médico-Cirúrgica: limites e possibilidades. *Revista Saúde (Santa Maria)*, Suplemento-Artigos de revisão, p. 37-44, 2016.

SEIXAS, P. P. *A abordagem da diverticulite aguda*. Mestrado Integrado em Medicina, 2019.

SILVA, C. G.; CROSSETTI, M. G. O. Curativos para tratamento de feridas operatórias abdominais: uma revisão sistemática. *Revista Gaúcha de Enfermagem*, v.33,n. 3, p. 182-189, 2012.

TAKESAKI, N. A. Apendicite aguda em pediatria: estudo clínico-epidemiológico e avaliação de marcadores laboratoriais de risco para gravidade. *Dissertação (Mestrado)- Universidade Estadual de Campinas, Campinas*, 2018.

TAZIMA M. F. G. S., VICENTE Y. A. M. V., MORIYA T. *Laparotomia*. *Medicina (Ribeirão Preto)*, v.44, n.1, p.33-38, 2011.

TORRES, R. L. N. et al. Assistência de enfermagem perioperatória ao paciente submetido. *Enfermagem: Inovação, Tecnologia e Educação em Saúde*, p.1-15, 2020.

WOSNY, A. M. et al. *Curso de Especialização em Linhas de Cuidado em Enfermagem: O cuidado nas urgências e emergências: cirúrgicas, gineco-obstétricas, psiquiátricas, pediátricas e demais agravos*. Florianópolis (SC): Universidade Federal de Santa Catarina/Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, p. 1-81, 2013.

Capítulo 9

10.37423/220105232

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À PESSOA COM HEMORRAGIA SUBARACOIDEA: RELATO DE ESTUDANTES DE ENFERMAGEM

Denise Lima da Silva Brasileiro

Universidade Estadual de Feira de Santana

Laura Rosane Duarte Zahreddine

Universidade Estadual de Feira de Santana

Caio Moura dos Santos

Universidade Estadual de Feira de Santana

Valéria Barbosa da Silva

Universidade Estadual de Feira de Santana

Luane Neves Xavier

Universidade Estadual de Feira de Santana

Samara Gonçalves de Souza

Universidade Estadual de Feira de Santana

Adriana Brait Lima

Universidade Estadual de Feira de Santana

INTRODUÇÃO

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) “configura-se como uma metodologia para organizar e sistematizar o cuidado, com base nos princípios do método científico” (TRUPPEL, *et al.*, 2009, p. 222). A SAE está centrada na melhoria da qualidade da assistência, ela irá auxiliar o enfermeiro a identificar os problemas e os cuidados de enfermagem de cada paciente, e a partir daí os profissionais iram definir as intervenções, prevenção e recuperação da saúde do paciente, ações que modificam o estado de saúde dos indivíduos. A SAE será constituída pelas etapas do Processo de Enfermagem (PE) que são: a fase do histórico, do diagnóstico de enfermagem, do planejamento e a avaliação de enfermagem.

Sistematizar o cuidado também permite a padronização da linguagem, o que facilita comunicação eficaz e faz com que os termos empregados tenham o mesmo significado para todos os profissionais, facilitando a comunicação entre todos e conferindo a cientificidade do cuidado. (TRUPPEL, *et al.*, 2009).

Dentre a organização dos cuidados por meio da SAE, em relação à pessoa acometida por Traumatismo Cranioencefálico (TCE) a otimização da assistência o mais precoce possível será uma possibilidade de identificação de problemas de enfermagem e soluções, contribuirá para o prognóstico positivo da pessoa cuidada.

Entende-se por TCE todo trauma que atinge o encéfalo, alterando principalmente os níveis de consciência e que pode ter como causas: quedas, acidentes automobilísticos e agressões. O Hematoma Subdural agudo (HSDA) ocorre em pacientes que sofreram TCE severo, resulta da lesão de pequenos vasos, artérias ou veias, causando o acúmulo de sangue entre a membrana dural e o espaço subaracnóideo e posteriormente o aumento da pressão intracraniana, pois o crânio tem tamanho fixo, então qualquer edema, hematoma ou líquido que não tenha para onde se expandir, acaba aumentando a pressão intracraniana, com isso a função cerebral pode ser imediatamente alterada por lesão do tecido cerebral. O hematoma toma forma de bicôncavo e tende a se localizar do mesmo lado do trauma. O Hematoma Subdural Agudo Traumático (HSAT) ocorre em cerca de 1 a 5% de todas as lesões traumáticas sobre o crânio e em 22% dos TCE graves (BADKE; PERDONSSINI; DALMOLIN; SASSI, 2013)

O TCE divide-se em leve, moderado e grave. No TCE leve enquadram-se os indivíduos com nível de consciência entre 13 e 15 na avaliação da Escala de Coma de Glasgow, no TCE moderado os níveis de

consciência encontram-se entre 9 e 12 e no TCE grave entre 6 a 9 na Escala de Coma de Glasgow (BADKE; PERDONSSINI; DALMOLIN; SASSI, 2013).

Ambrosi e colaboradores (2020) corroboram que os principais sinais e sintoma do HSAT são cefaleia diária e intensa, sonolência excessiva ou insônia, irritabilidade, ansiedade, desmaio, fraqueza, diminuição da força nas pernas, formigamento, dificuldade de falar ou entender, de memória, distúrbio de personalidade ou de comportamento, confusão mental ou piora progressiva da consciência, náuseas, vômitos, tontura ou confusão, hemiparesia leve a moderada e convulsões. Para o diagnóstico médico, inclui-se a anamnese, exame clínico do doente, incluindo história do trauma e achados da avaliação inicial e exames complementares. A avaliação neurológica abrange a avaliação dos componentes da Escala de Coma de Glasgow e resposta oculomotora, ocorre em intervalos frequentes (por exemplo, a cada 15 a 30 minutos inicialmente e, então, a cada 1 h após a estabilização), considerando que a melhora ou piora subsequente ajuda a estimar gravidade e prognóstico da lesão.

Esses mesmos autores referem que a avaliação por imagem deve ser realizada pela tomografia computadorizada (TC) pelo seu baixo grau de invasividade, rapidez e alta resolubilidade. A TC além de diagnosticar fraturas ósseas, também pode avaliar lesões parenquimatosas e hemorragias ou coleções extra-axiais. Por outro lado, a Ressonância Magnética (RM) pode fornecer informações superiores às da TC em relação ao parênquima cerebral e ao espectro típico de hiperintensidade (e crescentado) no parênquima cerebral devido ao efeito de massa significativo. O HSAT é clinicamente diagnosticado por lesões com desvio das estruturas medianas inferior a 5 mm, volume inferior a 30cm³ (quando supratentorial) ou 16cm³ (quando infratentorial) (AMBROSIA *et al.*, 2020).

Alguns dos fatores de risco são idade avançada e etilismo crônico. Devido à atrofia cerebral, que resulta em uma motilidade maior do órgão, dentro do crânio e aumentando as chances de lesão pós-traumática. O tratamento pode ser feito de modo conservador ou cirúrgico (mais recomendado). O tratamento é mais recomendado para pacientes em que o hematoma não apresenta desvio da linha média nem aumento da pressão intracraniana. Nos outros casos, a cirurgia deve ser realizada de forma a drenar e descomprimir a região (SANTOS *et al.*, 2020)

A motivação para desenvolver este estudo surgiu durante a prática hospitalar do componente curricular Enfermagem na Saúde do Adulto e Idoso, onde estudantes de enfermagem de uma instituição de ensino pública deveriam escolher um caso para a elaboração da SAE. Estavam

retornando de um período pós-pandemia COVID-19, cerca de um ano e meio afastados do contato com o hospital, urgiam de vontade de prestar cuidados, mas não deixaram de dispensar atenção para as medidas necessárias de biossegurança.

Assim, a pessoa D.C.O.A. com diagnóstico médico de HSA por queda da própria altura, os chamou a atenção durante o primeiro contato na unidade de neurologia. Não apenas pelas questões neurológicas que os atraiu para estudo aprofundado, mas também, pelas necessidades de cuidados quanto a lesão por pressão e ferida cirúrgica precisando da retirada dos pontos. Se sentiram inquietos em responder à questão de pesquisa: Como processaremos a SAE a pessoa D.C.O.A. com HSA secundária a TCE? Nessa perspectiva, elaborou-se o objetivo: descrever a SAE de pessoa acometida por HSD secundária a TCE.

Decerto que ao estudarem o processo do tratamento de D.C.O.A. se poderá compreender as formas mais eficientes de prover o melhor cuidado, ao mesmo tempo, já pautados do embasamento científico terão a segurança e garantia dos métodos. Todavia, estarão explorando o que concerne mais evidente aos problemas levantados e nesse caminho estarão explorando ao que se mostra ao olhar para o cuidado biopsicossocial de acordo com a realidade em que está inserido, visando à recuperação de D.C.O.A. e o engrandecimento do conhecimento.

Com isso, beneficiaremos não somente a pessoa estudada como outros profissionais de enfermagem a partir da reflexão dos resultados apresentados, aumentando os seus saberes científicos e também futuras pessoas que serão tratados por estes profissionais.

METODOLOGIA

Trata-se de pesquisa qualitativa tipo estudo de caso que significa uma análise de modo detalhado do caso de um único indivíduo, buscando explicar a patologia de uma doença e a sua dinâmica, contribuindo para o conhecimento científico do fenômeno a ser estudado (VENTURA, 2007).

A pesquisa ocorreu no período de outubro de 2021, em que foi prestado o cuidado por 3 dias. O local de estudo foi a clínica neurológica do Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA). O HGCA foi inaugurado em 1984, é um hospital de grande porte, porta aberta, além de ser a maior unidade pública hospitalar no interior do Estado, e ainda, é campo de aprendizagem para estudantes estagiários (BRASIL, 2021).

O participante da pesquisa é um idoso de 64 anos, possui oito filhos e é procedente de Serrinha-BA. Acompanhante relata que o paciente apresentou crise convulsiva quando estava dormindo referente a alta ingestão de bebida alcoólica, deu entrada no hospital de Serrinha e passou três dias

desacordado, foi encaminhado para o Hospital Geral Clériston Andrade passando mais 16 dias desacordado. Posteriormente passou por uma cirurgia de drenagem de hematoma subdural secundário a Trauma Cranioencefálico e seguiu seu pós-operatório na clínica neurológica.

A coleta de dados foi realizada através do histórico de enfermagem, em que conversamos com o acompanhante do paciente e foi revelado a história clínica do mesmo. Além disso, foi realizado a anamnese e o exame físico durante todos os dias da pesquisa, e ainda, utilizando como fonte de dados, foi verificado o prontuário observando a prescrição médica, evolução de enfermagem, exames laboratoriais e exames de imagem.

O sujeito da pesquisa possui histórico de etilismo crônico e crises convulsivas recorrentes, história pregressa de Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus.

Para a fundamentação teórica dessa pesquisa foi utilizado a Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Wanda de Aguiar Horta. A teoria de Horta visa estudar o indivíduo além da sua patologia, olhar ele como um todo, buscando prever e prover os cuidados, numa perspectiva de saúde e doença, mas também de aspectos ambientais, psicológicos, sociais. (MARQUES, MOREIRA E NÓBREGA, 2008)

Além disso, a sistematização do processo de enfermagem foi propelida pela autora, buscando colocar em prática o seu processo de enfermagem, composto hoje pelo histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, plano assistencial, plano de cuidados ou prescrição de enfermagem, evolução e prognóstico de enfermagem (MARQUES, MOREIRA E NÓBREGA, 2008).

Foi elaborado um termo de consentimento livre e esclarecido o qual foi assinado pelo responsável acompanhante do paciente do nosso estudo de caso, o termo foi elaborado em duas vias, o qual uma via ficou com o responsável e outra com os pesquisadores do estudo (ANEXO 1)

Todas as técnicas adotadas nessa pesquisa estão de acordo com as orientações éticas previstas na Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, a qual relata que o pesquisador é responsável pela integridade, confidencialidade e conforto do participante da pesquisa, sabendo reconhecer a sua vulnerabilidade e assegurando a sua vontade e disponibilidade de continuar ou não na pesquisa (BRASIL, 2012).

RESULTADOS

História Clínica: Acompanhante relata que o paciente D.C.O.A. foi encontrado caído em crise convulsiva (eram recorrentes), quando estava dormindo, referente a alta ingestão de bebida alcoólica,

deu entrada no hospital de Serrinha e passou 3 dias desacordado, foi encaminhado para o HGCA passando mais 16 dias desacordado. **Evolução de Enfermagem: 05/10/2021 – 11h.** Paciente encontrado no leito, acamado em semifowler, emagrecido, letárgico, obnubilado, orientado no espaço, compreende comando respondendo a solicitações verbais com dificuldade. ECG: 14. Apresenta ferida cirúrgica limpa e seca em região parietal E, couro cabeludo com presença de sujidade e saliência devido a craniectomia descompressiva. Mucosas normocrômicas e pupilas levemente anictéricas. Pele seca, com turgor e elasticidade diminuídos. Apresenta LPP em região sacra de grau 3, cobertura primária. LPP em região maleolar E e no calcâneo D e E, ambos com boa cicatrização. Em uso de SNE com dieta contínua de 50ml/h e dispositivo urinário com bom funcionamento, apresentando diurese de 100ml de coloração amarelada. AVP em dorso da mão D com venóclise com boa evolução. Relata desconforto suportável em ferida operatória e polidipsia. Ao exame físico: pupilas anisocóricas, reflexo cutâneo plantar diminuído, murmúrios vesiculares e ruídos hidroaéreos presentes, tosse preservada. SSVV: PA: 130X80mmHg, T: 35,7°, FC: 68bpm, SaO2: 95% Glicemia pós-prandial: 111mg/dL.

06/10/2021 - 11h. Encontrado acamado em semifowler, emagrecido, acordado, responsivo e pouco comunicativo. Apresenta ferida cirúrgica limpa e seca em região parietal E e couro cabeludo com sujidade e saliência devido a craniectomia descompressiva. Mucosas normocrômicas. Pele seca e com turgor e elasticidade diminuídos. Apresenta ferida na narina E. Apresenta LPP nas regiões maleolar esquerda e calcâneo esquerdo e direito, ambos com boa cicatrização. LPP em região sacra de grau 3. Em uso de SNE com dieta contínua de 50ml/h e dispositivo urinário com bom funcionamento, desprezado mais ou menos 400ml de diurese, pelo acompanhante, de cor amarelo ouro com presença de sedimentos. Apresenta CVP em dorso da mão direita com venóclise evoluindo bem. Acompanhante relata desconforto do paciente com a SNE e dificuldade de defecar na fralda. Realizado auxílio em banho de aspersão, paciente não colaborativo, sem intercorrências, nota-se: paciente estava sentado na cadeira. Realizado curativo em região sacra pelo enfermeiro Elykleiton Torres. Realizado a troca do dispositivo urinário. Foi aplicada Escala de Brades - Avaliação da Pele: totalizando um escore de 15 pontos, evidenciando um risco leve (15 a 15 pontos). SSVV: PA: 130x80mmHg; T:35.3°C; FC: 55bpm; SaO2: 99%; HGT: 96mg/dL.

07/10/2021 – 09:20h. Paciente acamado em semifowler, emagrecido, acordado, responsivo, comunicativo e ansioso. Apresenta ferida cirúrgica limpa e seca no couro cabeludo e saliência devido craniectomia descompressiva. Mucosas normocrômicas, língua com sujidades. Pele seca com turgor e

elasticidade diminuídos. LPP em regiões maleolar E e calcâneo E e D, ambos com boa cicatrização. LPP em região sacra em estágio 3. Em uso de dispositivo urinário em bom funcionamento, desprezado 1000mL de cor amarelo ouro. Apresenta CVP em dorso da mão D com venoclise evoluindo bem. Realizado banho de asperção, paciente colaborativo sem intercorrências, nota-se: paciente sentado na cadeira. Realizado curativo em região sacra, limpeza com SF 0,9%, usado oxido de zinco + nistatina para barreira hidrofóbica e collagenase para cobertura primária. Realizado troca de dispositivo urinário. SSVV: PA: 120x90mmHg; T: 34,6°C.

Diagnóstico Médico: Hematoma subdural secundário TCE decorrente queda da própria altura.

Quadro 01. Medicações em uso:

MEDICAÇÃO	APRAZAMENTO	VIA DE ADM
DIPIRONA SÓDICA 500mg/mL amp de 2mL	ACM	EV
METOCLOPRAMIDA 5mg/mL amp de 2mL	ACM	EV
FENITOÍNA 100mg comp.	12/12h	VO
INSULINA REGULAR – HGT < 200	ACM	SC
GLICOSE 25% 10mL	ACM	EV
ENALAPRIL, MALEATO 20mg	12/12h	VSNE
DEXTRANO 70 + HIPROMELOSE 0,1% + 0,3% FRASCO DE 15mL – 1 gota	6/6h	OCUL
ANLODIPINO BESILATO 5mg 2 comp	1x	VSNE
SINVASTATINA 40mg comp	1x	VSNE

HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25mg 2 comp	8/8h	VSNE
ENOXAPARINA SÓDICA 60mg/0,6mL	12/12h	IV sol. Injetável
METOPROLOL, SUCCINATO 100mg	1x	VSNE
ESPIRONOLACTONA 25mg comp.	1x	VSNE
AVALIAÇÃO DO FONO		

Dieta: Presença de SNE fluindo dietoterapia 50mL/h. **Complicações:** O paciente chegou no HGCA desacordado, realizou a cirurgia e continuou desacordado por mais 16 dias em coma na UTI, após esse período foi encaminhado para a clínica neurológica, onde evoluiu bem e com melhoras significativas no seu quadro clínico. Não houve complicações neurológicas e psicomotoras. Evoluiu com LPP em região sacra de estágio 3 e em região maleolar E e necrose de coagulação em calcâneos D e E.

Prognóstico Médico: Paciente realizou drenagem de hematoma subdural secundário TCE decorrente queda da própria altura. Apresentou melhora neurológica, compreende comandos e responde quando solicitado. Segue com bom prognóstico e boa evolução.

Prognóstico de Enfermagem: Paciente dependente, em uso de dispositivo urinário e fralda. Seu banho era no leito, mas após a implementação do plano assistencial e sua evolução resolveu-se encaminhá-lo para o banho de aspersão com ajuda onde o mesmo vai na cadeira de rodas para o local do banho. Com o passar dos dias da implementação do plano assistencial, o paciente se apresentou mais ativo, com boa evolução, apesar de ainda utilizar o dispositivo urinário e precisar de auxílio no banho, o mesmo já se alimenta sem o uso da SNE e segue com boa evolução.

Exames: Foi realizado raio-x e TC de crânio no hospital de Serrinha, observado edema cerebral que levou ao aumento da PIC. Após ser encaminhado para o HGCA, em Feira de Santana, foi realizado outro raio-x confirmando diagnóstico, onde o paciente seguiu para uma craniectomia descompressiva para retirada da calota.

Cuidados de Enfermagem: O paciente estava internado na clínica neurológica após cirurgia de craniectomia descompressiva. Foi realizado um plano de cuidados para que fosse possível observar uma melhora do paciente. Ao chegar no

primeiro dia para acompanhar DCOA, foi observado que o paciente se encontrava hipoativo e não estavam trocando o curativo da SNE e o dispositivo urinário, então foi realizado um plano assistencial para sanar as necessidades do paciente visando a sua melhora e estimulando a comunicação do paciente com a equipe e sua família. Para além dessas alegações, os demais cuidados estavam sendo realizados da melhor forma e foi possível observar a melhora do paciente em decorrência destes.

Problemas enumerados pelo médico: Drenagem de hematoma subdural e craniectomia descompressiva; TCE grave secundário queda da própria altura; Crise convulsiva; TVP em MIE; Etilista crônico. **Problemas de Enfermagem elencados:** Incontinência urinária; Caquexia; Polidipsia; Pupilas pouco anisocóricas; LPP em região sacra, maleolar E e calcânea D e E; Pele seca com turgor e elasticidade diminuídos; Dependência para autocuidado; Obnubilado; Uso de SNE; Couro cabeludo com sujidade; Bradicardia; Limitação de movimento entre duas superfícies próximas; Hipoativo.

Quadro 2. Problemas de Enfermagem e cuidados:

PROBLEMAS	CUIDADOS
Incontinência urinária	Controle e monitoração hídrica; Orientar sobre boa alimentação;
Caquético	Solicitar consulta com fisioterapeuta e nutricionista; Aconselhamento nutricional; Assistência no autocuidado: alimentação;
Bradicardia	Monitorar SSVV a cada 30 minutos;
Polidipsia	Solicitar que o paciente informe quando estiver com sede e oferecer sempre água para o mesmo;
Pupilas pouco anisocóricas	Realizar exame neurológico e solicitar consulta com neuro;

LPP em região sacra, maleolar E e calcânea D e E	Realizar a troca de curativo – administração de medicamentos: tópico – e a troca de decúbito a cada 2 horas;
Pele seca com turgor e elasticidade diminuídos	Após o banho, fazer uso de creme corporal;
Dependência para autocuidado	Promover assistência no autocuidado – auxiliar paciente no banho e na higiene bucal;
Obnubilado	Escuta ativa; estimular conversação com o paciente;
Desconforto em uso de SNE	Realizar troca de curativo da SNE; Controle e monitorização nutricional;
Couro cabeludo com sujidade	Promover assistência no autocuidado - realizar lavagem do couro cabeludo;
Limitação de movimento	Solicitar consulta com o fisioterapeuta; Promover assistência no autocuidado – Auxiliar paciente na locomoção e estimular e incentivar a sua dependência.

Quadro 3. Diagnósticos de Enfermagem:

PROBLEMAS	DIAGNÓSTICOS
Etilismo crônico	Comportamento de saúde propenso a risco relacionado a estressores evidenciado por abuso de substâncias;
Bradicardia	Débito cardíaco diminuído relacionado ao índice cardíaco diminuído evidenciado por alteração na frequência cardíaca;
Caquexia	Nutrição desequilibrada: menor do que as necessidades corporais relacionado a ingestão alimentar insuficiente evidenciado pela incapacidade de ingerir os alimentos;
Desconforto em uso de SNE	Conforto prejudicado relacionado a utilização de SNE evidenciado por desconforto em uso de SNE;
Limitação de movimento	Capacidade de transferência prejudicada relacionado a falta de condicionamento físico e força muscular insuficiente evidenciado por alteração na função cognitiva;
Incontinência urinária	Eliminação urinária prejudicada relacionada a incontinência urinária evidenciado por dano sensório-motor;

Polidipsia	Risco de boca seca relacionado a desidratação evidenciado por incapacidade de alimentar-se por via oral;
Dependência para o autocuidado	Déficit no autocuidado para banho relacionado a fraqueza evidenciado por alteração na função cognitiva;
Pele seca com turgor e elasticidade diminuídos	Risco da integridade da pele prejudicada relacionado a pressão sobre saliência óssea associada a alterações no turgor da pele;
Lesão por pressão	Integridade da pele prejudicada relacionada a pressão sobre saliência óssea associada a alteração no turgor da pele;
Couro cabeludo com sujidade	Déficit no autocuidado para banho relacionado a fraqueza evidenciado por sujidade em couro cabeludo;
Hipoativo/Obnubilado	Disposição para comunicação melhorada.

Evolução do paciente: Ao acompanhar o paciente durante os três dias foi possível observar uma excelente evolução do mesmo, visto que a princípio o paciente estava pouco responsivo e comunicativo, obnubilado e em uso de dispositivo urinário e SNE e no último dia de acompanhamento ele já demonstrava mais atividade, melhorou consideravelmente a comunicação e começando a sentir as suas próprias vontades. Evoluiu bem em relação a dieta, onde no primeiro dia estava a base de SNE e ao longo dos dias fomos observando o desmame da SNE e a introdução de água líquida e comida pastosa por VO. Paciente respondia bem às conversações e demonstrava vontade de querer ir para casa, o que nos revela uma melhora significativa no quadro do mesmo.

DISCUSSÃO

O paciente apresentou um hematoma subdural secundário a Traumatismo Crânioencefálico decorrente de queda da própria altura, possivelmente relacionado ao seu etilismo crônico. Segundo o Ministério da Saúde (2015), cerca de 30% das causas de Traumatismo Crânioencefálico estão relacionados a quedas, principalmente ligadas a pacientes idosos. Além disso, complementa que, 72% dos casos ocorre em associação com bebidas alcoólicas.

Diversas características são consideradas fatores de risco para o hematoma subdural agudo, sendo as mais comuns: idade avançada, queda, traumatismo crenioencefálico, drogas anticoagulantes e antiagregantes plaquetários, etilismo, epilepsia, hipotensão intracraniana e hemodiálise (PEREIRA, *et al.*, 2005)

Desses itens citados acima, o paciente do caso apresentava 5 deles, a idade avançada, 64 anos, o acompanhante relata que ele tinha crises convulsivas de rotina, etilismo crônico, teve queda da própria altura durante uma crise convulsão enquanto dormia após o ingerir grande quantidade de bebida alcoólica levando a um traumatismo crânioencefálico.

O TCE é considerado a primeira causa das complicações do HSDC e suas causas diversificam pelo uso de anticoagulantes orais, raquianestesia, etilismo crônico e crises convulsivas (Neto; Barros; Moraes, 2021 apud. Santana Silva & Carvalho Filha, 2017), sendo as duas últimas os motivos que levaram a queda do paciente, visto que este foi encontrado no chão em crise convulsiva em decorrência do abuso de álcool. O TCE pode resultar em diversas dificuldades, podendo apresentar déficit cognitivo, físico e comportamental (BRASIL, 2015), como pode ser observado no paciente do caso, em que ele no primeiro dia de cuidados estava letárgico, obnubilado, responsivo apenas a comandos verbais, restrito ao leito e possuía déficit do autocuidado.

A escala de coma de Glasgow (ECG) é utilizada para classificar a gravidade do TCE, onde permite a mensuração da evolução do quadro clínico do paciente (BRASIL, 2015), o mesmo em questão apresentou Escala de Coma de Glasgow 14, com abertura ocular espontânea (quatro), melhor resposta verbal (quatro) e melhor resposta motora (seis), sabendo-se que ele não estava orientado no tempo.

De acordo com Pereira (2009) uma das apresentações clínicas mais comuns em idosos é a alteração do nível de consciência (50% - 70%) que pode se apresentar em diversos graus, como o estado de coma, o que foi visto no paciente D.C.O.A., o qual ficou 19 dias em coma, sendo eles três dias no hospital em Serrinha e 16 dias no HGCA em Feira de Santana.

A condição subaguda ou crônica do trauma pode desencadear diversas complicações por todo o corpo, podendo ser observadas alterações esqueléticas, distúrbios cardiovasculares, endócrinos, alteração do trato urinário e intestinal e padrão respiratório (BRASIL, 2015, apud, DELISA; GANS, 2002; GEURTS *et al.*, 1996; RADER; ALSTON; ELLIS, 1989). E ainda, pessoas com TCE tem como uma das sequelas a disfagia orofaríngea, que altera o processo de deglutição comprometendo as características nutricionais do indivíduo. (BRASIL, 2015, apud, MACIEL; OLIVEIRA; TADA, 2008; PADOVANI *et al.*, 2007; SILVA *et al.*, 2012).

Diante disso, podemos destacar diversos fatores no paciente da pesquisa que evidenciam esses achados, como a presença da caquexia, visto que, esse trauma provoca alterações esqueléticas, associando ao aspecto de pele com turgor e elasticidades diminuídos. Decorrente dessa disfunção, a movimentação do paciente estava prejudicada, portanto, ficou restrito ao leito, apenas saía para o banho de aspersão, mas era levado em assento, sendo dependente para o cuidado.

Em consequência da soma de todos os fatores já citados, o paciente desenvolveu uma lesão por pressão (LPP) na região sacra, em três, e, LPP em região maleolar E e calcâneo E e D com necrose por coagulação. Visto que, a lesão por pressão ocorre quando uma força excessiva é feita sobre uma proeminência óssea por um determinado tempo (SANTOS, 2016).

Devido a LPP apresentada pelo paciente, orientou-se o acompanhante a elevar os MMII do paciente e a realizar a troca de decúbito a cada 2 horas, evidenciando que o paciente não poderia ficar por muito tempo na posição dorsal pois poderia incentivar o estagiamento da LPP. Segundo Santos (2016), todas essas medidas são utilizadas para prevenir as LPP, assim como evitar o seu agravamento.

Além disso, apresentou disfagia, corroborando para o processo de emagrecimento. Por apresentar essa dificuldade de deglutição, o paciente fazia uso de sonda nasoenteral para auxiliar em sua hidratação e nutrição. No entanto, foi perceptível uma evolução clínica rápida, ele estava apresentando polidipsia, esse fator, com o auxílio da avaliação fonoaudiológica, foi prescrita retirada da sonda.

Ademais, foi evidenciado alterações do trato urinário, em que o paciente apresentava incontinência urinária, apesar de mencionar que estava com vontade de urinar, não conseguia controlar essa função, por isso, fazia uso de dispositivo urinário. Com relação ao trato intestinal, apresentou motilidade normal, com dejeções presentes em todos os dias e presença de ruídos hidroaéreos à ausculta.

No segundo dia ainda permaneceu pouco comunicativo, mas já no terceiro dia de cuidados apresentou-se bem comunicativo, referindo querer ir logo para casa e ligar para os filhos dele irem busca-lo. Ajudou de forma colaborativa, mas ainda prejudicada, no banho, demonstrando um prognóstico bom.

Outro achado foi relacionado aos distúrbios cardiovasculares, no qual, ao segundo dia de cuidados o paciente apresentou uma bradicardia, evidenciada pela frequência cardíaca em 55bpm, mas não houveram achados clínicos suficientes que justificassem o seu aparecimento correlacionado com o hematoma subdural secundário ao TCE .

Por fim, foi perceptível a participação constante da família, o paciente estava acompanhado por seus dois filhos, os quais eram bem receptivos e solícitos, fazendo questionamentos sobre todas as ações que seriam realizadas. Isso traz uma perspectiva fundamental para a reabilitação do paciente, pois, ao compreender a doença, a importância dos cuidados, entre outros aspectos, facilita a interação multidisciplinar e os cuidados em sua residência (BRASIL, 2015).

Além disso, foi ressaltado a importância de estimular a conversação com o paciente a fim de melhorar suas respostas verbais, bem como auxiliar em suas atividades, mas sempre promovendo a sua dependência para que pudéssemos observar o quanto antes a melhora dele.

Logo, é indispensável que esse paciente faça reabilitação para enfrentar o seu etilismo crônico, visto que, foi um dos motivos que o levou a crise convulsiva e queda. Além disso, fazer acompanhamento de rotina para saber a etiologia de suas crises convulsivas recorrentes, relatadas pelo acompanhante em sua história clínica.

CONCLUSÃO

O objetivo desse trabalho foi descrever a Sistematização da Assistência de Enfermagem de pessoa acometida por hematoma subdural secundário ao traumatismo crânioencefálico através de um estudo de caso. O estudo de caso permitiu a análise crítica do diagnóstico trazendo a perspectiva para a realidade e fazendo uma conexão com a literatura.

Com base nos dados citados ao decorrer de toda a escrita, fica evidente que o trauma enfrentado pelo paciente em questão trouxe sequelas para sua qualidade de vida, evidenciadas por déficit no seu autocuidado, visto que para atender as suas necessidades básicas o indivíduo precisava constantemente de ajuda, além de estar com sua mobilidade física prejudicada evidenciada pelo

paciente estar parcialmente restrito ao leito. No entanto, com o acompanhamento e cuidados realizados ao paciente, foi perceptível a sua melhora, em nível cognitivo e físico.

Fica claro a forma indispensável de aplicação dos cuidados de enfermagem, assim como as etapas que emergem o seu processo, pois tornou-se evidente o quanto essas práticas influenciaram na boa evolução do paciente. A história clínica, anamnese, exame físico, evolução, plano de cuidados são técnicas que avaliam o processo de evolução no indivíduo, fazendo com o profissional de enfermagem tenha uma visão mais geral do quadro clínico do cliente, elaborando assim uma assistência de forma integral e individualizada do cuidado o que favorece o processo evolutivo do mesmo.

Após realizar o estudo de caso foi possível relacionar a teoria da patologia e dos cuidados assistenciais a prática realizada, pois ficou evidente o quanto o plano assistencial é importante para uma melhor organização dos cuidados e melhor resultados/prognósticos do paciente.

REFERÊNCIAS

- AMBROSI, et al. Hematoma subdural agudo em paciente pediátrico: um relato de caso. *Braz. J. Hea. Rev.*, Curitiba, v. 3, n. 5, p. 14774-14784, set./out. 2020.
- BADKE, et al. Hematoma subdural agudo traumático: Um Estudo de Caso. *Revista Contexto & Saúde*, v. 11, n. 20, p. 999–1004, 2013. BRASIL. Hospital Geral Clériston Andrade. Secretaria de saúde. 2021. Disponível em: <http://www.saude.ba.gov.br/hospital/hgca/> Acesso em: 16 de outubro de 2021.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Diretrizes de atenção à reabilitação da pessoa com traumatismo cranioencefálico / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. – Brasília: Ministério da Saúde, 2015.
- BULECHEK, et. al. NIC: Classificação das Intervenções de Enfermagem. Tradução 6ªed. 2016, 1411p.
- NORTH AMERICAN NURSING DIAGNOSIS ASSOCIATION (NANDA). Diagnósticos de enfermagem da NANDA-I: definições e classificação 2018-2020 [recurso eletrônico] / [NANDA International]; organizadoras: T. Heather Herdman, Shigemi Kamitsuru; tradução: Regina Machado Garcez; revisão técnica: Alba Lucia Bottura Leite de Barros... [et al.]. – 11. ed. – Porto Alegre: Artmed, 2018.
- MARQUES, D. K. A, MOREIRA, G. Â. C., NÓBREGA, M. M.L. da. Análise da teoria das necessidades humanas básicas de Horta. *Rev enferm UFPE [online]*. 2008 out./dez.; 2(4):481-88. DOI: 10.5205/reuol.336-11493-1-LE.0204200820
- NETO, J. C; DE OLIVEIRA, L. B.; DE MORAIS, S. S. F. Assistência ao Hematoma Subdural Crônico: Perfil de pacientes e diagnósticos de enfermagem segundo a NANDA-I. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 9, 2021.
- PEREIRA, C. U. et al. Apresentação clínica e prognóstico dos pacientes com hematoma subdural crônico. *Salud (i) ciencia (Impresa)*, p. 651-653, 2010.
- SANTOS, L.M. Orientação para prevenção de lesão por pressão em domicílio: Guia para o cuidador/familiar. Rio de Janeiro. 2016. SANTOS, et al. Vista do Hematoma subdural crônico secundário a trauma automobilístico: relato de caso. *Jornal Memorial da Medicina*, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 48–50, 2020. DOI: 10.37085/jmmv2.n1.2020.pp.48-50.
- TRUPPEL, et al. Sistematização da Assistência de Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva. *Rev Bras Enferm*, Brasília. v. 62, n.2, p. 221-7, mar-abril 2009. VENTURA, M. M. O estudo de caso como modalidade de pesquisa. *Revista SoCERJ*. v. 20, n. 5, p.383-386, 2007.