CIÊNCIAS AGRÁRIAS: A MULTIDISCIPLINARIDADE DOS RECURSOS NATURAIS

—
VOLUME I

Frederico Celestino Barbosa

Ciências agrárias: a multidisciplinaridade dos recursos naturais

1ª ed.

Piracanjuba-GO
Editora Conhecimento Livre
Piracanjuba-GO

1ª ed.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Barbosa, Frederico Celestino
B238C Ciências agrárias: a multidisciplinaridade dos recursos naturais
/ Frederico Celestino Barbosa. – Piracanjuba-GO

Editora Conhecimento Livre, 2021

271 f.: il

DOI: 10.37423/2021.edcl234

ISBN: 978-65-89145-90-5

Modo de acesso: World Wide Web

Incluir Bibliografia

1. agronomia 2. engenharia-florestal 3. engenharia-agrícola 4. medicina-veterinária 5. engenharia-de-pesca I. Barbosa, Frederico Celestino II. Título

CDU: 630

<https://doi.org/10.37423/2021.edcl234>

O conteúdo dos artigos e sua correção ortográfica são de responsabilidade exclusiva dos seus respectivos autores.

EDITORA CONHECIMENTO LIVRE

Corpo Editorial

Dr. João Luís Ribeiro Ulhôa

Dra. Eyde Cristianne Saraiva-Bonatto

MSc. Anderson Reis de Sousa

MSc. Frederico Celestino Barbosa

MSc. Carlos Eduardo de Oliveira Gontijo

MSc. Plínio Ferreira Pires

Editora Conhecimento Livre

Piracanjuba-GO

2020

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1	8
IDENTIFICAÇÃO DAS LÍNGUAS NEGRAS PROVENIENTES DAS GALERIAS PLUVIAIS E BACIAS HIDROGRÁFICAS NAS PRAIAS URBANAS DE MACEIÓ-AL	
Bruno Timóteo Rodrigues	
Adelmo Lima Bastos	
Mikael Timóteo Rodrigues	
DOI 10.37423/210403802	
CAPÍTULO 2	20
BIOMETRIA DE FRUTOS E SEMENTES DE JATOBÁ (HYMENAEA COURBARIL) E OS EFEITOS DA ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA COMO TRATAMENTO PRÉ-GERMINATIVO	
João Victor de Lima Santos	
Rooslany Queiroz Barreira	
Laryany Farias Vieira Fontenele	
Westefann dos Santos Sousa	
DOI 10.37423/210403803	
CAPÍTULO 3	31
OLHARES DA RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO E MUNDO DO TRABALHO NA JUVENTUDE RURAL	
MÁRCIO AURÉLIO CARVALHO DE MORAIS	
PEDRO MIGUEL DE MORAIS TAVARES	
RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA	
DANIEL SILVA VERAS	
LILIAN FRANCISCA SOARES MELO	
THALES RANNIERE COELHO AMORIM	
DOI 10.37423/210403816	
CAPÍTULO 4	44
TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA NO POVOADO TERRA CAÍDA, MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE: UMA ALTERNATIVA DE DESENVOLVIMENTO PARA SUPERAÇÃO DA POBREZA	
MARY NADJA LIMA SANTOS	
JOÃO LUIZ SANTANA BRAZIL	
BENTO RAFAEL SANTANA DA CRUZ	
MARTA SANTOS REIS	
DOI 10.37423/210403827	
CAPÍTULO 5	58
POLÍTICAS PÚBLICAS E O MODELO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL	
Thaís Veiga Barros	
Leonardo Melo Brito Cardoso	
José aparecido da Silva Gama	
Adelmo Lima Bastos	
DOI 10.37423/210403863	

CAPÍTULO 6 68

O USO DA PLANTA SPONDIAS MOMBIN L. COMO UMA TECNOLOGIA ALTERNATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO DA CAPRINOCULTURA.

Anna Jacinta Dantas de Medeiros

Francisco Marlon Carneiro Feijó

Genevile Carife Bergamo

Gardenia Silvana de Oliveira Rodrigues

Nilza Dutra Alves

Jonas dos Santos Silva

Leon Denner Moreira Benício

Caio Sérgio Santos

Jaécio Carlos Diniz

JAMILE RODRIGUES COSME DE HOLANDA

DOI 10.37423/210403891

CAPÍTULO 7 99

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DE FRUTOS DE NONI (MORINDA CITRIFOLIA L.) EM ESTÁDIO DE MATURAÇÃO FISIOLÓGICA

Lucas Figueira da Silva

Mateus Madruga da Silva

José Carlos da Silva

Wellkens David da Silva Praxedes

Amanda Reges de Sena

José Marcílio da Silva

DOI 10.37423/210403905

CAPÍTULO 8 106

A REFLECTÂNCIA ESPECTRAL DE FOLHAS DE PLANTAS DO AMENDOIM EM FUNÇÃO DA ADUBAÇÃO FOSFATADA

Morgana Lígia de Farias Freire Freire

DOI 10.37423/210403908

CAPÍTULO 9 119

COMPOSTAGEM COMO ALTERNATIVA DE ANÁLISE-AÇÃO-PARTICIPATIVA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Amanda Furtado Luna

Francisco Ivan da Silva

Carlos Pereira da Silva

DOI 10.37423/210403915

CAPÍTULO 10	132
AVALIAÇÃO MINERAL DE SORGO SUBMETIDO A SALINIDADE E COMPOSTOS ORGÂNICOS	
ROBSON ALEXSANDRO DE SOUSA	
CHERLYSON CUNHA DE MEDEIROS	
DOI 10.37423/210403918	
CAPÍTULO 11	141
DETERMINAÇÃO DE METAIS PESADOS NO SEDIMENTO DO ARROIO PELOTAS, PELOTAS – RS	
Pedro José Sanches Filho	
Daniele Martin Sampaio	
Eduarda Medran Rangel	
Glauco Rasmussen Betemps	
Juliana Rampinini de Moura de Castro	
Lutiana Carvalho da Costa	
DOI 10.37423/210403922	
CAPÍTULO 12	156
AS TRANSFORMAÇÕES NO AMBIENTE / TURISMO DE PORTO NACIONAL APÓS 10 ANOS DA FORMAÇÃO DO LAGO DA BARRAGEM DE LAJEADO	
José Miranda de Souza	
Lucivania Pereira Glória	
Sinara Carvalho de Oliveira	
Vonínio Brito de Castro	
DOI 10.37423/210403923	
CAPÍTULO 13	171
A CONTRIBUIÇÃO DA MINERAÇÃO DE DADOS NO PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO DOS CURSOS SUPERIORES DO INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE	
Leopoldo Ramos Oliveira	
Fausto Bernard Melo Soares	
José Damião de Melo	
Patrick Henrique da Silva Brito	
DOI 10.37423/210403924	
CAPÍTULO 14	182
EFEITOS DO USO DE SILICATO E CALCÁRIO LÍQUIDO SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DE FERTILIDADE DO SOLO E O DESENVOLVIMENTO DO CAPIM-MARANDU	
Alexandre Mendes Bento da Silva	
Geraldo Bento	
DOI 10.37423/210403927	

CAPÍTULO 15	197
MONITORAMENTO DA QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA DE UMA FONTE HÍDRICA SUBTERRÂNEA PÚBLICA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AREIA-PB	
Thaís do Carmo Oliveira Silva	
Thamara do Carmo Oliveira Silva	
Giovanna de Fátima Abrantes Oliveira	
Tatianna de Oliveira Duarte	
Tereziana Silva da Costa	
Maria Betania Hermenegildo dos Santos	
DOI 10.37423/210403932	
CAPÍTULO 16	218
PREVALÊNCIA E ETIOLOGIA DA MASTITE BOVINA PELA TÉCNICA ACCUMAST®	
Sabrina Resende Guimarães	
Betânia Glória Campos	
DOI 10.37423/210403933	
CAPÍTULO 17	220
SISTEMA MICROCONTROLADO PARA POSICIONAMENTO DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS	
Francisco de Assis M. Serejo	
Lucilene Ferreira Mouzinho	
DOI 10.37423/210403971	
CAPÍTULO 18	229
UTILIZAÇÃO DA AEROPONIA PARA O CULTIVO EM AMBIENTE ESPACIAL	
Fernanda de Sousa Sales Mendes	
Ivysson Fernandes de Queiroz Uchôa	
Lauro Cristiano Marculino Leal	
Marcos Antônio Cardoso Pereira	
DOI 10.37423/210503995	

CAPÍTULO 19 239

REVISÃO DE LITERATURA DO SCHIZOLOBIUM PARAHYBA VAR. AMAZONICUM (HUBER EX DUCKE) BARNEBY, GÊNERO EUCALYPTUS E HÍBRIDO EUCALYPTUS UROGRANDIS

HYGOR GOMES DE ALMEIDA SOUSA

MARISTELA LIMA FIGUEIREDO GUIMARÃES EPIFANIO

IGOR VIANA SOUZA

FLÁVIA BEZERRA SOUZA

BRUNO AURÉLIO CAMPOS AGUIAR

GABRIELLA RAYSSA ANTUNES DA SILVA OLIVEIRA

ANA CLARA CARNEIRO FONSECA

MIRLLA RAYRA REIS SOUSA

MILLENA OLIVEIRA XAVIER

PRISCILA BEZERRA DE SOUZA

DOI 10.37423/210503993

CAPÍTULO 20 253

POLIFENÓIS E ATIVIDADE ANTIRRADICAL LIVRE DO CÁLICE DA VINAGREIRA (HIBISCUS SABIDARIFFA, L).

Larissa Lages Rodrigues

Maria Marcia Dantas de Sousa

Jurandy do Nascimento Silva

Fhanuel Silva Andrade

Dilson Cristino da Costa Reis

Yago Luís Pessoa Barbosa

Daniella dos Santos Silva

Alessandro de Lima

DOI 10.37423/210503994

CAPÍTULO 21 262

DIAGNÓSTICO DAS CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS DA PRESENÇA DE INFANTOJUVENIL NO ATERRO SANITÁRIO DE BOA VISTA - RORAIMA

Daniela Cristina da Silva Melo

Antonia Raniely de Almeida Silva

Leovergildo Rodrigues Farias

DOI 10.37423/210503999

Capítulo 1

10.37423/210403802

IDENTIFICAÇÃO DAS LÍNGUAS NEGRAS PROVENIENTES DAS GALERIAS PLUVIAIS E BACIAS HIDROGRÁFICAS NAS PRAIAS URBANAS DE MACEIÓ-AL

Bruno Timóteo Rodrigues

Adelmo Lima Bastos

Mikael Timóteo Rodrigues

*Universidade Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho, Faculdade de Ciências
agronômicas de Bmicas
Instituto Federal de Alagoas - Campus
Marechal Deodoro*

Fundação Parque Tecnológico Itaipu, Brasil

Resumo: O termo “línguas negras” designa, em linguagem popular, as águas residuais sem tratamento e qualquer tipo de esgoto que deságue em rios, mares, valas, canais, lagos e lagoas. Este trabalho teve como objeto de estudo a identificação e mapeamento das “línguas negras” existentes nas praias urbanas de Maceió utilizando técnicas de geoprocessamento. Na convergência dos fatores mencionados, o trabalho demanda diagnosticar, por meio de mapeamento e geoprocessamento, a situação ambiental das “línguas negras” existentes nas praias urbanas de Maceió. Diante da formação desse fato, passou-se a investigar os indicadores formadores e de contribuição, a saber: as galerias pluviais e as bacias hidrográficas formadoras dessas “línguas negras”. A pesquisa foi realizada através de levantamentos feitos em bancos de dados de empresas e órgãos públicos, trabalho de campo, análises estatísticas e interpretações de documentos cartográficos digitais, tendo como produto, diferentes mapeamentos das variáveis espaciais definidoras do problema estudado. Com o auxílio de um GPS, as línguas negras foram georreferenciadas e plotadas na base cartográfica de Maceió, definindo assim, a área de estudo. O estudo demonstrou que a maioria das línguas negras encontra-se exatamente no final das galerias pluviais, evidenciando assim, a possibilidade da existência de ligações clandestinas nesta rede de galerias.

Palavras-chave: Línguas Negras, Mapeamento, Bacias hidrográficas de contribuição, Identificação e constatação

1. INTRODUÇÃO

As “línguas negras” estão inscritas na literatura como grave indicador de degradação ambiental dos territórios nos quais são inseridas, por conter mistura de elementos físico-biológicos de forte poder de contaminação das águas e, no caso particular do estudo, de comprometimento das condições de vida marinha. Além do que, os vetores de contaminação presentes nas “línguas negras” incidem diretamente na saúde humana, respondendo por doenças de origem parasitária.

A pesquisa demanda identificar as “línguas negras” existentes nas praias do perímetro urbano da cidade de Maceió.

Este trabalho teve como principais objetivos elaborar um mapeamento das “línguas negras” nas praias do perímetro urbano de Maceió, abarcando neste mapeamento os indicadores das áreas correspondentes que possam indicar as origem desses dejetos. Para tanto foi-se necessário coletar, analisar e avaliar toda documentação cartográfica existente, relativa à temática e definir e delimitar as bacias hidrográficas formadoras de línguas negras;

2. MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi realizado no município de Maceió, estendendo-se entre os paralelos 09°21'31" e 09°42'49" de latitude Sul e os meridianos 35°33'56" e 35°38'36" de longitude Oeste. O local estudado encontra-se entre os bairros do Pontal e Cruz das Almas, com coordenadas iniciais de 09°40'23,7' latitude Sul e 35°44'57,3" de longitude Oeste, e coordenadas finais de 09°37'48,6' de latitude Sul e 35°41'43,8" de longitude Oeste.

Posteriormente seguiu-se as etapas de tabulação e análise dos dados dos indicadores das línguas negras e do esgotamento sanitário da cidade de Maceió-AL com base nos dados da pesquisa documental e paralelamente a isto o mapeamento de indicadores em mapa.

Para a obtenção e geração dos dados foram realizados: trabalho de campo, análises estatísticas e interpretações de documentos cartográficos digitais, consultas a bancos de dados de empresas e órgãos tendo, como produto final, o mapeamento das variáveis definidoras do problema a ser estudado.

Foram usados para geração dos dados, construção da base de dados digital, banco de dados dos indicadores e definição dos elementos para delimitação da área, através de procedimentos específicos em *softwares* de manipulação de bancos de dados e mapeamento/geoprocessamento.

2.1. MATERIAL UTILIZADO:

Foram utilizadas bases cartográficas digitas que após manipulação e formatação destas resultaram no material cartográfico deste artigo. Essas bases foram obtidas através de pesquisa aos acervos documentais e digitais dos órgãos posteriormente citados.

Base Cartográfica de Maceió escala 1:2000 formato DWG subdividida por bairros e Georreferenciada (2000). Prefeitura de Maceió.

Base cartográfica da Rede Coletora Tronco de Esgotos e Estações Elevatórias de Esgotos (E.E.E.) de Maceió, escala 1:25000 e na Projeção UTM DATUM-SAD-69, em formato DWG. CASAL 2008.

Base cartográfica da Rede Coletora Tronco de Esgotos e Estações Elevatórias de Esgotos (E.E.E.) de Maceió, escala 1:25000 e na Projeção UTM DATUM-SAD-69, em formato DWG. CASAL 2008.

Para a manipulação desses dados foram utilizados os softwares AutoCAD MAP 2008, Terraview, Google Earth e gvSIG.

2.2. DADOS OBTIDOS/GERADOS EM ETAPAS DE CAMPO:

As atividades foram realizadas em duas etapas:

1. Levantamento e reconhecimento da realidade ambiental, utilizando-se mapas que orientaram as inspeções.
2. Executada por terra com registros feitos com aparelho de GPS (Garmim eTrex Vista Cx) para posteriormente serem assinalados e plotados sobre a base cartográfica, seguida de análise e detalhadamente dos locais de ocorrência das línguas negras para validar e calibrar o modelo com a realidade.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. IDENTIFICAÇÃO DAS LÍNGUAS NEGRAS E AS GALERIAS PLUVIAIS

Foram identificadas em campo 30 línguas negras localizadas desde a praia do Sobral até a praia de Cruz das Almas. Este levantamento foi realizado com uso de GPS, estando, portanto, georreferenciadas. Posteriormente foram plotadas na base cartográfica de Maceió, definindo, assim, a área e os pontos de estudo (Figura 1), cujas coordenadas obtidas constam na Tabela 1.

Tabela 1 - Coordenadas Geográficas e UTM das Línguas Negras – Maceió-AL

LINGUAS NEGRAS			COORDENADAS LATLONG		COORDENADAS UTM - FUSO 25	
Nº LN	BAIRRO	LOCALIZAÇÃO	LATITUDE SUL	LONGITUDE OESTE	X	Y
1ª	PRADO	EM FRENTE AO SAEM	09°40'23,7"	35°44'57,3"	198288	8929494
2ª	PRADO	EM FRENTE À LOMBADA ELETRÔNICA	09°40'23,2"	35°44'53,4"	198405	8929509
3ª	PRADO	EM FRENTE À FÁBRICA DE GELO	09°40'22,3"	35°44'52,0"	198447	8929538
4ª	CENTRO	EM FRENTE À RUA DA S. M. DE SAÚDE	09°40'14,1"	35°44'30,0"	199118	8929796
5ª	CENTRO	EM FRENTE ÀS LOJAS AMERICANAS	09°40'10,5"	35°44'07,3"	199810	8929913
6ª	CENTRO	EM FRENTE AO MUSEU THEO BRANDÃO	09°40'10,3"	35°43'57,0"	200123	8929920
7ª	JARAGUÁ	RIACHO SALGADINHO	09°40'10,2"	35°43'50,2"	200331	8929926
8ª	JARAGUÁ	AO LADO DA FAVELA DO JARAGUÁ	09°40'20,9"	35°43'31,8"	200894	8929600
9ª	JARAGUÁ	EM FRENTE À FAVELA DO JARAGUÁ	09°40'26,3"	35°43'23,2"	201160	8929441
10ª			09°40'26,7"	35°43'22,5"	201180	8929427
11ª			09°40'27,4"	35°43'21,5"	201211	8929407
12ª			09°40'28,1"	35°43'20,6"	201239	8929385
13ª			09°40'28,8"	35°43'19,9"	201260	8929365
14ª	PAJUÇARA	AO LADO DO DNIT	09°40'26,3"	35°43'00,1"	201864	8929441
15ª	PAJUÇARA	EM FRENTE AO RESTAURANTE DRAGÃO	09°40'22,1"	35°42'57,9"	201929	8929573
16ª	PAJUÇARA	EM FRENTE AO MONUM. TEOTONIO VILELA	09°40'11,5"	35°42'50,5"	202154	8929899
17ª	PAJUÇARA	EM FRENTE AO BANCO ITAÚ	09°40'04,9"	35°42'44,9"	202323	8930102
18ª	PAJUÇARA	EM FRENTE AO HOTEL PRAIA BONITA	09°39'59,3"	35°42'40,2"	202463	8930276
19ª	PONTA VERDE	PRAIA DE 7 C. - EM FRENTE AO BANCO. 24H	09°39'48,3"	35°42'14,3"	203250	8930621
20ª	PONTA VERDE	AO LADO DO POSTO POLICIAL	09°39'51,1"	35°41'44,4"	204164	8930542
21ª	PONTA VERDE	EM BAIXO DA BARR. DO RICON ARGENTINO	09°39'30,2"	35°41'51,6"	203938	8931184
22ª	PONTA VERDE	EM FRENTE AO FOCA BIER	09°39'25,4"	35°41'52,0"	203925	8931329
23ª	PONTA VERDE	BARRACA COQUEIRAL	09°39'18,5"	35°41'52,9"	203897	8931542
24ª	JATIÚCA	EM FRENTE AO RESIDENCIAL JTR	09°39'05,8"	35°41'54,9"	203833	8931933
25ª	JATIÚCA	PASSEIO ESTELA MARES	09°38'42,6"	35°41'56,3"	203785	8932644
26ª	JATIÚCA	AO LADO DO ANTERIOR	09°38'41,3"	35°41'56,0"	203792	8932685
27ª	CRUZ DAS ALMAS	EM FRENTE AO CHALÉ BAR	09°38'12,5"	35°41'51,6"	203921	8933571
28ª	CRUZ DAS ALMAS	RIACHO DO FERRO	09°38'05,1"	35°41'50,7"	203946	8933799
29ª	CRUZ DAS ALMAS	EM FRENTE AO NOVO RITZ	09°37'55,1"	35°41'46,5"	204071	8934108
30ª	CRUZ DAS ALMAS	AO LADO DO MATSUBARA HOTEL	09°37'48,6"	35°41'43,8"	204152	8934309

Fonte: Aparelho de GPS (Garmim eTrex Vista Cx). Pontos coletados pelo autor.

Diante das identificações em campo dessas línguas negras pode-se afirmar que os dejetos podem ser provenientes de ligações clandestinas feitas nas galerias pluviais, demonstrando à falta de fiscalização dos órgãos competentes.

O acima exposto pode ser constatado quando se observa na Figura 1 a justaposição na qual a maioria das línguas negras encontra-se exatamente no final das galerias pluviais. Quanto à rede de galerias pluviais, estas são definidas como um sistema de drenagem com dutos subterrâneos destinados à captação das águas das chuvas que escoam pelas ruas, calçadas e sarjetas e que são coletadas pelas

bocas coletoras ou bocas de lobo e, no caso de Maceió como sendo uma cidade litorânea, é escoado para o mar.

Figura 1 - Mapa da Rede de Galerias Pluviais e ocorrência de Línguas Negras.

Fonte: Plantas das Galerias Pluviais de Maceió (SOMURB 2004). Gerado e adaptado pelo autor (2009).

3.2. BACIAS HIDROGRÁFICAS FORMADORAS DE LÍNGUAS NEGRAS.

É importante salientar que das trinta línguas negras mapeadas no estudo há dois casos que apresentam suas particularidades, que são as línguas negras do Riacho do Salgadinho e a língua negra do Riacho do Ferro. Essas duas línguas negras são as que apresentam as maiores vazões de esgotos, pois compreendem duas bacias hidrográficas.

A bacia hidrográfica do Reginaldo, que por sua vez origina o Riacho do Salgadinho (Figura 2), está inserida na porção central da área urbana de Maceió, possui uma área aproximada de 24,95 km² e seu curso d'água principal, possui cerca de 29,84 km de extensão. Esses dados estão de acordo com

Almeida (2011) ao estudar a Ocupação em áreas de preservação permanente das bacias hidrográficas na área urbana de Maceió, Alagoas.

Já o Riacho do Ferro (também conhecido como Riacho Ferrugem ou Riacho das Águas Férreas) possui uma área de 3,81 km², definida por um perímetro de 9,52 km de extensão (ALMEIDA, 2011) e apresenta uma vazão de 27 l/s aproximadamente; esses dados estão de acordo com Torres e Petta, (2003).

Essas duas línguas negras se diferenciam das outras quanto à origem de seus dejetos, que são provenientes da área de delimitação de suas respectivas bacias hidrográficas, se diferenciando assim das outras línguas negras, que são provenientes da área onde abrange as galerias pluviais de suas respectivas áreas de contribuição para formação de línguas negras, decorrentes de ligações clandestinas.

Figura 2 – Riacho Salgadinho, proveniente da área de delimitação de sua respectiva Bacia Hidrográfica. Local da foto: Ponte da Avenida Buarque de Macedo.

Fonte: Fotografia Gerada pelo autor (dezembro de 2011)

Na figura 3 observa-se, a foz do Riacho Gulandim, este sendo afluente do Riacho Salgadinho e pertencentes à bacia hidrográfica do Reginaldo formadora da Língua Negra (LN nº 7).

Figura 3 – Foz do Riacho Gulandim, um dos afluentes do Riacho Salgadinho (LN nº 7).

Fonte: Fotografia Gerada pelo autor (dezembro de 2011)

Na Figura 4 pode-se observar claramente a vazão dos efluentes provenientes da bacia hidrográfica do Riacho do Ferro, essa imagem foi capturada em cima da ponte da Avenida Comendador Gustavo Paiva - Cruz das Almas.

Também foi produzida a bacia hidrográfica do Riacho do Ferro, tomando como base rios, riachos e córregos, curvas de nível e os dados obtidos na SEMPLA para formar uma bacia adequada para a escala (1:2000) utilizada pelo projeto.

Figura 4 – Riacho do Ferro - LN nº 28, proveniente da área de delimitação de sua respectiva Bacia Hidrográfica.

Fonte: Fotografia Gerada pelo autor (dezembro de 2011)

Essas Bacias Hidrográficas de contribuição foram delimitadas tomando como base fatores como rios riachos e córregos, curvas de nível e galerias pluviais. Com esses dados foi feito uma comparação com os dados obtidos da prefeitura, SEMPLA (Secretaria Municipal de Planejamento de Maceió), para que fosse elaborada a bacia do Vale do Reginaldo, elaborando assim uma nova base de dados dessa bacia hidrográfica, bem mais detalhada juntamente com os riachos Gulandin e do Sapo (Figura 5); sendo esses dois afluentes do Reginaldo, formando os três juntos a Língua Negra do Salgadinho (LN nº 7).

Figura 5 - Mapa das Bacias Hidrografias – Vale do Reginaldo e Riacho do Ferro - contribuintes das Línguas negras.

Fonte: Base cartográfica das bacias hidrográficas contribuintes das línguas negras 7 e 28: gerada pelo autor (2009)

As áreas de contribuição para alimentação das línguas negras 7 e 28 (Mapa das Bacias Hidrografias – Vale do Reginaldo e Riacho do Ferro) coincidem com o divisor de águas das bacias Hidrográficas do Vale do Reginaldo e do Riacho do Ferro. As demais línguas negras também foram delimitadas sobre segmentação de suas áreas de contribuição.

6. CONCLUSÕES

Acredita-se que os objetivos foram atingidos nesse estudo, levando a confirmação da presença das línguas negras, nas praias urbanas de Maceió, apontando a existência de 30 Línguas Negras no total.

O estudo demonstrou que a maioria das línguas negras encontra-se exatamente no final das galerias pluviais, evidenciando assim a possibilidade da existência de ligações clandestinas nesta rede de galerias.

Pode-se apontar, devido à falta de fiscalização dos órgãos competentes, facilidade encontrada para jogar o efluente na rede de galerias pluvial e, também, com a ausência da rede coletora de esgoto próxima, propiciando assim, o lançamento indevido nesses sistemas de galerias.

No território usado, apropriado pelas empresas seguida da sociedade, as línguas negras simbolizam a materialização da ausência de políticas públicas e falta de fiscalização dos órgãos competentes.

REFERÊNCIAS

ALAGOAS; CASAL (2008). Base cartográfica da Rede Coletora Tronco de Esgotos e Estações Elevatórias de Esgotos (E.E.E.) de Maceió, escala 1:25000 e na Projeção UTM DATUM-SAD-69, em formato DWG.

ALAGOAS; PREFEITURA DE MACEIÓ (2000). Base Cartográfica de Maceió escala 1:2000, formato DWG subdividida por bairros e Georreferenciada. 2000.

ALAGOAS; SOMURB (Projeto Mar Aberto 2004). Plantas das galerias pluviais da cidade de Maceió, nas escalas 1:4.000 e 1:10.000 e na Projeção UTM –DATUM-SAD-69, em formato DWG, com área de abrangência - bairro de Jaraguá até o bairro de Cruz das Almas.

BRASIL. Fundação Nacional de Saúde. Manual de Saneamento. 3. ed. ver. – Brasília: Fundação Nacional de Saúde, 2006.

CASAL (2004). Companhia de Abastecimento de Água e Saneamento do Estado de Alagoas.<<http://www.casal.al.gov.br/atuacao/esgotamento-capital/>> Acesso em 12/12/2011

MONTE, B. Balneabilidade nas praias de Alagoas. Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade Federal de Alagoas – UFAL. Maceió. 2010.

SANEAGO - Saneamento de Goiás S/A – Cartilha da água: água tratada é saúde. Disponível em: www.saneago.com.br. Acesso em: 14 de setembro de 2005.

TORRES, J.B. e PETTA, R. J. 2003. Desempenho e Avaliação da Estação Elevatória de Esgotos em Tempo Seco do Riacho Ferrugem: Uma Solução Alternativa para a Melhoria dos Indicadores de Balneabilidade dos Corpos Hídricos de Maceió. Trabalho apresentado como requisito para conclusão do curso de especialização em Engenharia Ambiental.

XAVIER DA SILVA, J. Geoprocessamento para Análise Ambiental. Rio de Janeiro: edição do autor, 2001.

Capítulo 2

10.37423/210403803

BIOMETRIA DE FRUTOS E SEMENTES DE JATOBÁ (HYMENAEA COURBARIL) E OS EFEITOS DA ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA COMO TRATAMENTO PRÉ-GERMINATIVO

João Victor de Lima Santos

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará - IFPA

Rooslany Queiroz Barreira

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará - IFPA

Laryany Farias Vieira Fontenole

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará - IFPA

Westefann dos Santos Sousa

Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"

Resumo: O jatobá (*Hymenaea courbaril*) apresenta um crescimento vegetativo lento e suas sementes compreendem um tegumento duro e impermeável, apresentando dormência física causada pelo impedimento da entrada de água em seu interior, o que dificulta e retarda a emergência de suas plântulas. A observação dos aspectos biométricos de seus frutos e sementes, além de testes de germinação, pode fornecer informações padrões para diferenciação de espécies de um mesmo gênero. Diante destas perspectivas, objetivou-se com este estudo avaliar os efeitos da escarificação mecânica para a germinação das sementes de jatobá coletadas em um fragmento florestal do município de Conceição do Araguaia - Pará, estabelecendo os aspectos biométricos dos frutos e sementes encontrados. Como procedimento biométrico, os frutos e sementes foram caracterizados quanto a massa, comprimento, largura, espessura, sementes por fruto e porcentagem de sementes danificadas. As características dos frutos apontaram as médias de aproximadamente 73,72 g, 12,29 cm, 4,70 cm e 3,07 cm respectivamente, enquanto os dados para as sementes resultaram em médias de aproximadamente 3,32 g, 2,20 cm, 1,63 cm e 1,17 cm para a mesma ordem. A porcentagem de sementes danificadas correspondeu a 10,18% do total de sementes analisadas, com uma média de 6,3 sementes para os 53 frutos. Nos testes de germinação, os processos de escarificação mecânica utilizados nos tratamentos para a superação da dormência não demonstraram eficiência sob as circunstâncias relativas ao experimento, tampouco os tratamentos sem escarificação. Logo, evidencia-se a hipótese de que, mesmo sob condições ambientais semelhantes, o desenvolvimento pleno de espécies florestais pode ser impactado negativamente quando há variáveis que ainda não foram analisadas experimentalmente, como a procedência e maturidade fisiológica das sementes, fenologia e maturidade fisiológica da árvore progenitora. Essa constatação é importante para orientar investigações científicas que objetivem um novo arranjo da pesquisa tentando reparar e suprimir os resultados insatisfatórios encontrados no presente estudo.

Palavras-Chave: *Fabaceae*. Germinação. Espécies Florestais.

1. INTRODUÇÃO

O jatobá (*Hymenaea courbaril*), também conhecido como jataí, jataí-amarelo, jataí-peba, jataí vermelho, jitaí, farinheira, jataíba, burandã, imbiúva, jatobá-miúdo, jatobá da caatinga (Lorenzi, 2002), é uma espécie encontrada comumente desde o Sul do México até grande parte da América do Sul, como no cerrado brasileiro, apresentando ampla ocorrência da região Norte ao Sudeste do país (MELO e MENDES, 2005).

Pertencente à família *Fabaceae*, é uma árvore de grande porte com múltiplos usos, tendo sua importância desde a medicina popular, onde diversas partes vegetais estão associadas às propriedades de seu óleo essencial rico em terpenos, apresentando ação antisséptica, depurativa e anti-inflamatória (Pereira *et al.*, 2007), por vezes utilizadas para tratar problemas gastrointestinais e outras disfunções.

Para o Informativo Técnico, Rede de Sementes da Amazônia (Melo e Mendes, 2005), a potencialidade agronômica está relacionada à monocultivos, espécie clímax em sistemas agroflorestais, ou associada em pastagens de sistemas silvipastoris, sendo também recomendada para arborização de parques e recuperação de áreas degradadas, pela grande capacidade de produção de biomassa. As características de sua madeira, como a alta densidade básica, fazem a importância para a exploração vegetal nos setores da construção civil e marcenaria.

O jatobazeiro apresenta um crescimento vegetativo lento e suas sementes possuem, de acordo com Almeida *et al.* (1999), tegumento duro e impermeável, ou seja, manifestam dormência causada pelo impedimento da entrada de água em seu interior, o que dificulta e retarda a germinação, porém, garante maior longevidade, permitindo que germinem mesmo decorrido muito tempo da dispersão. Fowler e Bianchetti (2000) decorrem que as características estabelecidas pela impermeabilidade do tegumento são o mecanismo mais comum de dormência, sendo uma estratégia benéfica para os processos relativos à perpetuação da espécie.

Para que ocorra o desenvolvimento das plantas com essas características, torna-se necessário o rompimento dessa barreira à passagem da água, que pode ser acelerado por escarificação ao nível de laboratório (Lopes *et al.*, 2006) através de testes de germinação. Este tipo de tratamento pré-germinativo pode se constituir como eficiente para a superação da dormência, propiciando alta porcentagem de germinação, em curto espaço de tempo (MARTINS *et al.*, 1992).

A biometria de frutos e sementes de *H. courbaril*, além do teste de germinação, também deve ser considerada, pois, estas observações podem fornecer informações e padrões para diferenciação de espécies de um mesmo gênero (Cruz *et al.*, 2001). Desta forma, assim como os trabalhos voltados para a avaliação da germinação contribuem para a melhoria dos métodos utilizados, o levantamento dos aspectos biométricos faz-se importante, devido à grande variedade botânica que pode ser encontrada na mesma localidade.

Diante essas perspectivas, objetivou-se realizar um estudo sobre os efeitos da escarificação mecânica para a germinação das sementes de jatobá coletadas em um fragmento florestal do município de Conceição do Araguaia, estado do Pará, estabelecendo os aspectos biométricos dos frutos e sementes encontrados e associando os diferentes tratamentos com as taxas de germinação a serem alcançadas.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Para o andamento do estudo, coletaram-se os frutos maduros e abscidos de três árvores de um fragmento de floresta nativa do Centro Experimental Agroecológico do Araguaia - CEAGRO. Após a coleta, os frutos foram armazenados em sacos e transportados ao Laboratório de Botânica do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Pará - IFPA, *Campus* Conceição do Araguaia, para o beneficiamento e condução da pesquisa.

Os dados da biometria foram obtidos de amostras casuais de 53 frutos e 300 sementes viáveis, levantando o número de sementes por fruto e porcentagem de sementes danificadas, além da mensuração do comprimento, aferido da base até o ápice; largura, determinado na maior extremidade horizontal; espessura, medida no ponto mediano central e massa, utilizando paquímetro e balança analítica com precisão de 0,001 g para o levantamento dessas características.

Após esta etapa, houve a extração e limpeza das sementes, quando se contabilizou o número de sementes por fruto e quantificaram-se as sementes danificadas para a verificação dos aspectos biométricos. As demais foram tratadas com hipoclorito de sódio (NaClO) a 1%, realizando-se a esterilização superficial com imersão por 1 minuto, seguida por lavagem em água destilada para o início do processo de escarificação.

A massa e o volume de 100 sementes foram levantados utilizando oito repetições com a mesma quantidade de sementes puras, sendo o volume determinado através de uma proveta com capacidade para 1.000 cm³, de acordo com o manual de Regras para análise de sementes (BRASIL, 2009).

Após o beneficiamento e análise biométrica da amostra, determinou-se o teste de superação de dormência para as sementes, quando estas foram submetidas a 6 tratamentos pré-germinativos, permeando as metodologias descritas por Tiago *et al.* (2013) de escarificações mecânicas, utilizando lixas d'água número 120 para friccionar manualmente as sementes até a ruptura do tegumento e aparecimento dos tecidos cotiledonares do lado oposto ao hilo, evitando danificar o embrião.

Os tratamentos consistiram em: T1 – escarificação das sementes, seguida de imersão em água destilada por 24 horas; T2 – escarificação das sementes, seguida de imersão em água destilada por 48 horas; T3 – escarificação das sementes, sem imersão em água destilada; T4 – imersão das sementes em água destilada, sem escarificação, por 24 horas; T5 – imersão das sementes em água destilada, sem escarificação, por 48 horas; T6 – sementes sem escarificação e sem imersão em água destilada (controle).

O teste de germinação foi conduzido em bandejas plásticas, as quais foram preenchidas com 2 kg do substrato areia lavada cada, previamente peneirada e esterilizada em estufa a 200 °C durante 2 horas, de modo a eliminar os microrganismos presentes. A manutenção da umidade do substrato durante o experimento foi feita com o fornecimento de 351,6 mL de água destilada por bandeja a cada 48 horas (BRASIL, 2009).

As condições para a germinação plena foram fornecidas em germinadores do tipo *Biochemical Oxygen Demand* (B.O.D.), regulado para regimes de temperatura de 25°C e fotoperíodo de 12 horas, durante 30 dias. As variáveis pretendidas foram: germinação - número de sementes germinadas; início da germinação - emergência da primeira plântula e tempo médio de germinação.

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, composto por 5 repetições de 10 sementes, totalizando 300 sementes para os seis tratamentos. Os resultados obtidos seriam submetidos à análise de variância pelo teste F e comparação de médias pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, com auxílio do programa estatístico Sisvar (FERREIRA, 2011).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao observar os dados biométricos dos 53 frutos de *H. courbaril*, pode-se constatar que os mesmos apresentaram massa média de 73,72 g, variando de 14,02 a 183,66 g; comprimento médio de 12,29 cm, com variação de 8,85 a 19,20 cm; largura média de 4,70 cm, permeando-se entre 3,20 a 6,70 cm; e espessura média de 3,07 cm, com variação de 2,20 a 3,87 cm (Figura 1).

Figura 1. Valores frequentes para massa (A), comprimento (B), largura (C) e espessura (D) de frutos de jatobá (*Hymenaea courbaril*).

No levantamento da biometria das sementes, foi observado uma massa média de 3,32 g, variando de 0,669 a 5,673 g; comprimento médio de 2,20 cm, diferenciando-se de 0,15 a 2,90 cm; largura média de 1,63 cm, permeando-se de 1,00 a 2,67 cm; e espessura média de 1,17 cm, com variação de 0,50 a 2,29 cm.

Figura 2. Valores frequentes para massa (A), comprimento (B), largura (C) e espessura (D) de sementes de frutos de jatobá (*Hymenaea courbaril*).

Verificou-se que os frutos analisados neste trabalho divergiram quanto ao comprimento e largura, quando comparados com aqueles estudados por Andrade *et al.* (2010) para a mesma espécie, que apresentaram valores médios de comprimento menores, 11,57 cm, e largura maiores, 6,21 cm. Pereira *et al.* (2011), em frutos da espécie *H. stigonocarpa*, mesmo gênero do objeto do estudo, verificaram médias maiores para o comprimento e espessura, 13,62 cm e 3,46 cm respectivamente e semelhantes para largura, 4,83 cm.

Santos *et al.* (2019) determinou dados semelhantes para avaliações biométricas de sementes da mesma espécie, apontando médias superiores para massa e comprimento, com 3,32 g e 2,20 cm respectivamente. Em espessura, a média manteve-se abaixo, com 1,17 cm, enquanto a média para as larguras das sementes foi a mesma, 1,63 cm. Segundo Abreu *et al.* (2017) esta variação dos valores

atua como indicativo de heterogeneidade nas dimensões das sementes, podendo estar apontada em amostras da mesma espécie e de localidades distintas.

O volume médio de 100 sementes equivaleu a 195,7 cm³, enquanto a massa média resultou em 330,0 g (Tabela 1), o que permite inferir que 1 quilograma de sementes de *H. courbaril* possa conter aproximadamente 302 sementes. A porcentagem de sementes danificadas correspondeu a 10,18% do total de 334 sementes, que quando eliminadas, resultaram em uma amostra de 300 sementes viáveis ao teste de germinação.

Tabela 1. Valores mínimo, máximo e médio de algumas características físicas de sementes de jatobá (*Hymenaea courbaril*).

Característica	Valores		
	Mínimo	Máximo	Médio
Volume de 100 sementes (cm ³)	192,9	198,5	195,7
Massa de 100 sementes ¹ (g)	323,0	337,0	330,0
Sementes por fruto (unidade)	2	15	6,3
Sementes danificadas (%)	-	-	10,1

¹Desvio padrão (DP) = 2,68 e Coeficiente de variação (CV) = 7,95%.

Ao executar os métodos relativos aos testes de germinação para as sementes, observou-se que todos os tratamentos aos quais foram submetidos à escarificação mecânica não apresentaram resultado satisfatório para o objetivo do trabalho, demonstrando nenhuma evidência para o desenvolvimento de plântulas durante o período em que as condições para a germinação plena foram fornecidas no germinador. Esse resultado foi mantido nos tratamentos que não utilizaram a escarificação como método de tentativa para a superação da dormência, impedindo a realização da análise de variância para as variáveis de germinação pretendidas.

A não germinação das sementes pode estar ligada a contradições relacionadas a vários aspectos, tais como a própria espécie estudada, a época de coleta, o estágio de maturação das sementes, a procedência, a temperatura (Azeredo *et al.*, 2010), ou a própria metodologia pretendida para a superação da dormência. Freitas *et al.* (2013) também evidenciou que a escarificação pode afetar a germinação quando há a danificação do embrião durante o processo de rompimento do tegumento, levando à morte das sementes.

Uma das maiores dificuldades em relação ao desenvolvimento de espécies florestais é a superação da dormência física, características de suas sementes, fator que sofre influência genética, sendo variável

entre as espécies e as variedades de cada espécie, com influência das condições ambientais durante o estágio de maturação e o armazenamento das sementes e como métodos de superação de dormência utilizados (LOPES *et al.*, 2006; LORENZI e MATOS, 2008; BEWLEY e BLACK, 2013).

4. CONCLUSÃO

Embasado nos resultados apresentados neste estudo, é possível ressaltar que os frutos e sementes de *Hymenaea courbaril* apresentam ampla variação quanto aos aspectos biométricos. As características dos frutos apontaram massa média de 73,72 g; comprimento médio de 12,29 cm; largura média de 4,70 cm; e espessura média de 3,07 cm, enquanto os dados para as sementes ressaltaram massa média de 3,32 g; comprimento médio de 2,20 cm; largura média de 1,63 cm; e espessura média de 1,17 cm. A porcentagem de sementes danificadas correspondeu a 10,18% do total de 334 sementes analisadas, com uma média de 6,3 sementes para os 63 frutos.

Nos testes de germinação, os processos de escarificação mecânica utilizados nos tratamentos para a superação da dormência não demonstraram eficiência sob as circunstâncias relativas ao experimento, tampouco os tratamentos sem escarificação. Logo, evidencia-se a hipótese de que, mesmo sob condições ambientais semelhantes, o desenvolvimento pleno de espécies florestais pode ser impactado negativamente quando há variáveis que ainda não foram analisadas experimentalmente, como a procedência e maturidade fisiológica das sementes, fenologia e maturidade fisiológica da árvore progenitora. Essa constatação é importante para orientar investigações científicas que objetivem um novo arranjo da pesquisa tentando reparar e suprimir os resultados insatisfatórios desta, sob as mesmas metodologias para os testes de germinação.

5.REFERÊNCIAS

- ABREU, D. C. A.; PORTO, K. G.; NOGUEIRA, A. C. Métodos de superação da dormência e substratos para germinação de sementes de *Tachigali vulgaris* LG Silva & HC Lima. *Floresta e Ambiente*, v. 24, 2017.
- ALMEIDA, M. J. B.; FERRAZ, I. D. K.; BASSIN, F. Estudos sobre a permeabilidade do tegumento e a germinação de sementes de *Hymenaea courbaril* L. (Caesalpiniaceae), uma espécie de uso múltiplo. *Revista da Universidade do Amazonas*, v. 8, n. 1-2, p. 63-71, 1999.
- ANDRADE, L. A.; BRUNO, R. L. A.; OLIVEIRA, L. S. B.; SILVA, H. T. F. Aspectos biométricos de frutos e sementes, grau de umidade e superação de dormência de jatobá. *Acta Scientiarum. Agronomy*, v. 32, n. 2, p. 293-299, 2010.
- AZEREDO, G. A.; PAULA, R. C.; VALERI, S. V.; MORO, F. V. Superação de dormência de sementes de *Piptadenia moniliformis* Benth. *Revista Brasileira de Sementes*, v. 32, n. 2, p. 49-58, 2010.
- BEWLEY, J. D.; BLACK, M. *Seeds: physiology of development and germination*. Springer Science & Business Media, 2013.
- BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Regras para análise de sementes. Secretaria de Defesa Agropecuária, 2009.
- CRUZ, E. D.; MARTINS, F. O.; CARVALHO, J. E. U. Biometria de frutos e sementes e germinação de jatobá-curuba (*Hymenaea intermedia* Ducke, Leguminosae - Caesalpinoideae). *Revista Brasileira de Botânica*, v. 24, n. 2, p. 161-165, 2001.
- FERREIRA, D. F. Sisvar: a computer statistical analysis system. *Ciência e agrotecnologia*, v. 35, n. 6, p. 1039-1042, 2011.
- FOWLER, J. A. P.; BIANCHETTI, A. Dormência em sementes florestais. Embrapa Florestas-Documents (INFOTECA-E), 2000.
- FREITAS, A. R.; LOPES, J. C.; MATHEUS, M. T.; MENGARDA, L. H. G.; VENANCIO, L. P.; CALDEIRA, M. V. W. Superação da dormência de sementes de jatobá. *Pesquisa Florestal Brasileira*, v. 33, n. 73, p. 85-90, 2013.
- LOPES, J. C.; DIAS, P. C.; MACEDO, C. M. P. Tratamentos para acelerar a germinação e reduzir a deterioração das sementes de *Ormosia nitida* Vog. *Revista Árvore*, v. 30, n. 2, p. 171-177, 2006.
- LORENZI, H. *Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas nativas do Brasil*. Instituto Plantarum, v. 2, n. 2, 2002. 368p.
- LORENZI, H.; MATOS, F. J. A. *Plantas medicinais no Brasil: nativas e exóticas*. Instituto Plantarum, n. 2, 2008. 544p.
- MARTINS, C. C.; CARVALHO, N. M.; OLIVEIRA, A. P. Quebra de dormência de sementes de sabiá (*Mimosa caesalpiniaefolia* Benth). *Revista Brasileira de Sementes*, v. 14, n. 1, p. 5-8, 1992.
- MELO, M. G. G.; MENDES, A. M. S. Jatobá: *Hymenaea courbaril* L. Informativo Técnico Rede de Sementes da Amazônia, n. 9, 2005.

PEREIRA, C. K. B.; RODRIGUES, F. F. G.; MOTA, M. L.; SOUSA, E. O.; LEITE, G. O.; BARROS, A. R.C.; LEMOS, T. L. G.; COSTA, J. G. M. Composição química, atividade antimicrobiana e toxicidade do óleo essencial de *Hymenaea courbaril* (jatobá). 30ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química. QUÍMICA, SBD Águas de Lindoia-SP, 2007.

PEREIRA, S. R.; GIRALDELLI, G. R.; LAURA, V. A.; SOUZA, A. L. T. Tamanho de frutos e de sementes e sua influência na germinação de jatobá-do-cerrado (*Hymenaea stigonocarpa* var. *stigonocarpa* Mart. ex Hayne, Leguminosae - Caesalpinoideae). *Revista Brasileira de Sementes*, v. 33, n. 1, p. 141-148, 2011.

SANTOS, J. C. C.; SILVA, D. M. R.; COSTA, R. N.; SANTOS, S. A.; SANTOS SILVA, L. K.; SILVA, J. V. Biometria de frutos e sementes e tratamentos pré-germinativos em sementes de *Hymenaea courbaril*. *Revista em Agronegócio e Meio Ambiente*, v. 12, n. 3, p. 957-979, 2019.

TIAGO, P. V.; TIAGO, A. V.; CARPEJANI, A. A.; SILVA, B. M.; DARDENGO, J. F. E.; ROSSI, A. A. B. Quebra de dormência e germinação de Jatobá. I Seminário de Biodiversidade e Agroecossistemas Amazônicos, Alta Floresta-MT, 2013.

Capítulo 3

10.37423/210403816

OLHARES DA RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO E MUNDO DO TRABALHO NA JUVENTUDE RURAL

MÁRCIO AURÉLIO CARVALHO DE MORAIS

Instituto Federal do Piauí

PEDRO MIGUEL DE MORAIS TAVARES

Centro Universitário UNINOVAFAPÍ

RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA

Instituto Federal do Piauí

DANIEL SILVA VERAS

Instituto Federal do Piauí

LILIAN FRANCISCA SOARES MELO

Instituto Federal do Piauí

THALES RANNIERE COELHO AMORIM

Instituto Federal do Piauí

Resumo: O presente trabalho trata dos olhares da relação entre educação e o mundo do trabalho a partir da ótica da juventude rural e tem por objetivo investigar e analisar as causas e implicações que levam os jovens rurais a buscar na cidade um futuro melhor, perpassando pela educação e o mundo do trabalho. A metodologia utilizada consta de uma abordagem qualitativa por meio de um estudo de caso onde se analisa as vozes dos jovens rurais e inter-relaciona com os fundamentos teóricos pertinentes a temática em estudo. Observou-se que o êxodo rural e falta de perspectiva na vida do campo são elementos importantes na busca de novos horizontes na cidade e que tal comportamento passa necessariamente pela educação profissionalizante, que propõe inseri-lo no mundo do trabalho.

Palavras-chave: Educação, juventude rural, mundo do trabalho, novos olhares.

1. INTRODUÇÃO

Os estudos contemporâneos na área da Geografia que tratam da questão do urbano e do rural têm observado que suas fronteiras estão cada vez mais próximas, e diferentes universos culturais entrelaçam-se, as dificuldades inerentes à vida e ao trabalho no meio rural expõem novas perspectivas e dilemas para os que vivem da agricultura, especialmente os mais jovens. A transferência de jovens para os espaços urbanos, mais do que parte do movimento demográfico geral do processo de urbanização das sociedades industrializadas contemporâneas, tem sido vista como um problema, na medida em que contribui para o esvaziamento do meio rural (FERREIRA e ALVES, 2009).

De acordo com Silva (2002, p.97),

No momento em que as fronteiras entre o rural e o urbano diminuem cada vez mais de diferentes universos culturais se interpenetram, as dificuldades socioeconômicas dificultam a vida de quem vive da agricultura, emerge a juventude rural como uma população profundamente afetada por estes processos.

Hoje no Brasil, aproximadamente oito milhões de jovens brasileiros vivem em áreas rurais. Dentre as principais questões acerca do êxodo rural, percebe-se que a mobilidade dos/das jovens rurais para o urbano tem sido um fator de grande influência (CASTRO et al 2009). Isso fica claro ao constatar que os maiores índices de migração no meio rural brasileiro ocorrem entre homens de 20 a 24 anos e entre mulheres de 15 a 19 anos. (MDA, 2009).

Notadamente, alguns autores da área apresentam fundamentos que tentam explicar as causas que agravam essa situação, como o pensador Carneiro (p. 97) que diz (...) “a juventude rural salta aos olhos como a faixa demográfica que afetada de maneira mais dramática por essa dinâmica de diluição das fronteiras entre os espaços rurais e urbanos, combinada com agravamento da situação de falta de perspectivas para os que vivem da agricultura”.

Nota-se com isso que para os jovens que vivem no meio rural, as oportunidades de trabalho e construção de autonomia são mais difíceis, pois se inserem em padrões culturais, que operam com a lógica da continuidade da atividade agrícola, em estreita relação com o tamanho da terra a que estejam vinculados por laços de família. Assim, a transmissão da propriedade – e sua continuidade –, que passa pelos critérios de sucessão/herança, constitui um dos fatores que provocam a desestabilização da agricultura familiar e o afastamento dos jovens das lidas agrícolas. Dentre esses dados, o conjunto de desigualdades e a falta de condições dignas de vida no meio rural do Brasil, além

de demonstrar dificuldades, apresentam um cenário propenso para a criação e a consolidação de políticas públicas que estimulem a permanência dos jovens no meio rural. (FERREIRA; ALVES, 2009).

Essa realidade brasileira faz suscitar desafios nos âmbitos das políticas públicas voltada para esse público alvo de jovens e adultos, capazes de enfrentar e resolver de forma adequada essa problemática contemporânea.

Pode-se dizer que as políticas públicas representam os instrumentos de ação dos governos, numa clara substituição dos “governos por leis” pelos “governos por políticos”. O fundamento mediato é fonte de justificação das políticas públicas, é o Estado social, marcado pela obrigação de implementação dos direitos fundamentais positivos aqueles que exigem uma prestação positiva do poder público conforme Azevedo (2001).

Como definição de políticas públicas, apresenta-se Cury (2005) que diz, políticas públicas são “programas de ação governamental”, visando a coordenar os meios a disposição do Estado e as atividades privadas, para a realização dos objetivos socialmente relevantes e, politicamente, determinados.

Nesse sentido, pode-se entender que as políticas públicas são um conjunto de planos e programas de ação governamental, voltadas à intervenção no domínio social, por meio dos quais são traçadas as diretrizes e metas a serem fomentadas pelo Estado, sobretudo na implementação dos objetivos e direitos fundamentais dispostos na Constituição.

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO E OBJETIVO DO ESTUDO

O presente trabalho tem por problematização a investigação da relação entre Educação e Mundo do Trabalho a partir da visão da Juventude Rural e se propõe como objetivo investigar e analisar as causas e implicações que levam os jovens rurais a buscar, por meio da educação, trabalho nos centros urbanos.

2. A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PROFISSIONALIZANTE

De acordo com Documento Base do Ministério da Educação a respeito da PROEJA - Programa Nacional de Integração Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos de 2007:

A educação de jovens e adultos (EJA) no Brasil, como modalidade nos níveis fundamental e médio, é marcada pela descontinuidade e por tênues políticas públicas, insuficientes para dar conta da demanda potencial e do cumprimento

do direito, nos termos estabelecidos pela Constituição Federal de 1988. Essas políticas são, muitas vezes, resultantes de iniciativas individuais ou de grupos isolados, especialmente no âmbito da alfabetização, que se somam às iniciativas do Estado. No entanto, as políticas de EJA não acompanham o avanço das políticas públicas educacionais que vêm alargando a oferta de matrículas para o ensino fundamental, universalizando o acesso a essa etapa de ensino ou, ainda, ampliando a oferta no ensino médio, no horizonte prescrito pela Carta Magna (2007, p.9).

Há uma preocupação com a Educação de Jovens e Adultos quanto às políticas públicas na questão de oferta de vagas no segmento, apesar de estar respaldada em nossa lei maior. Uma preocupação que vai além do Ministério da Educação e mobiliza todos aqueles que acreditam que cidadania se faz com participação. De acordo com Pinto (1994), a importância do adulto na sociedade se faz de todas as formas: como trabalhador, como chefe de família, como administrador, sendo dessa forma o responsável pelo espelho de uma sociedade que compreende a educação de adultos como:

A educação de adultos não é uma parte complementar, extraordinária do esforço que a sociedade aplica em educação. É parte integrante desse esforço, parte essencial, que tem obrigatoriamente que ser executada paralelamente com a outra, pois do contrário esta última não terá o rendimento que dela se espera. Não é um esforço marginal, residual, de educação, mas um setor necessário do desempenho pedagógico geral, ao qual a comunidade se deve lançar. (PINTO, 1994, p. 82). Pierro (2001) também enfatiza que a Educação de Jovens e Adultos deve ser compreendida como um processo de formação continuada:

...jovens e adultos são cognitivamente capazes de aprender ao longo de toda a vida e que as mudanças econômicas, tecnológicas e socioculturais em curso nesse final de milênio impõem a aquisição e atualização constante de conhecimentos pelos indivíduos de todas as idades, propugna-se conceber todos os sistemas formativos nos marcos da educação continuada.” (PIERRO et al. 2001, p. 70).

Desta forma, a contemporaneidade exige dos jovens e adultos muito mais que simplesmente mão-de-obra qualificada, mas sim sujeitos autônomos, criativos, colaborativos, cooperativos, reflexivos, críticos, que buscam informações e as transformam em conhecimentos, aplicando-os na sua prática cotidiana.

Então, é necessário repensar as práticas pedagógicas desenvolvidas na Educação de Jovens e Adultos, visando o perfil do profissional que queremos formar.

Carmo (2008) nos auxilia quando escreve que:

Em passado recente, o adestramento permitia aos trabalhadores fazerem a mesma coisa durante toda a sua vida. Hoje a revolução tecnológica que não para de acontecer exige evolução de habilidades que dependem muito mais de formação e atualização do que de mero adestramento. (CARMO, 2008, p. 50)

Assim sendo, Freire (2002) reforça que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua produção ou a sua construção” (FREIRE, 2002, p.25). Então é urgente também redefinir o papel do educador, pois segundo ele (2002) “Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender” (Ibidem, p.25). O autor mostra a dialeticidade dos processos de ensinar e de aprender. A ideia de Freire nos faz perceber o quanto é importante valorizar os saberes dos educandos dessa modalidade de ensino, uma vez que os mesmos além de aprender também ensinam. Diante do contexto, é que se faz necessário um estudo sobre as concepções dos docentes em relação à origem do conhecimento acreditando que estas fundamentam e orientam as práticas pedagógicas do PROEJA.

3. MATERIAL E MÉTODOS

O método de pesquisa utilizado foi o estudo de caso exploratório. A opção pelo estudo de caso se fundamenta na visão de Yin (2005), para quem “o estudo de caso é uma investigação empírica que busca investigar um fenômeno no contexto de vida real, em que as fronteiras entre fenômenos e contexto não são claramente definidos”. Ainda para esse autor,

O estudo de caso como estratégia de pesquisa compreende um método que abrange tudo - tratando da lógica do planejamento, das técnicas de coleta de dados e das abordagens específicas à análise dos mesmos (p.33).

O estudo de caso, dada sua natureza qualitativa, de acordo com Yin (2005), é uma estratégia de investigação mais adequada quando queremos saber o “como” e o “por que” de acontecimentos atuais sobre os quais o investigador tem pouco ou nenhum controle. Para Yin (idem, ibidem), o objetivo do estudo de caso pode ser conduzido para um dos três propósitos básicos: explorar, descrever e explicar.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 OUVINDO AS VOZES DOS JOVENS RURAIS

A priori, na entrevista com o jovem rural T.R.C.A solicitou-se que o mesmo relatasse como era sua vida no campo antes de ir para a cidade. Tal fala está retratada a seguir:

“Nasci em Vale do Guariba - PI, na zona rural de Brejo Seco, na cidade de São João do Piauí. Minha família é pobre onde eu sou o mais velho de cinco irmãos, então tinha a responsabilidade de cuidar deles, e de ajudar meu pai no roçado, lá a situação era difícil, na nossa casa só tinha uma cama de solteiro onde dormiam os menores, os outros com meus pais dormiam em redes. Demorou um tempo para comprarmos uma TV, antes só tínhamos um rádio velho em casa. Teve vezes que já passei fome, devido a seca não colhíamos nada, e sem o dinheiro mal dava para alimentar a todos. Apesar de tudo meus pais faziam questão que todos estudassem, eu particularmente sempre gostei, mas existiam mais obstáculos, como falta de material escolar, a distância para o colégio demorava uma hora de pé, e quando tinha os carros disponibilizados pelo governo eram sucateados e fazíamos viagem, literalmente “enganchados” no carro, com partes do corpo para fora do veículo lotado. Quando chegávamos deparávamos com uma escola sem estrutura e defasada, sem livros, e carteiras adequadas, e sem merenda, com os anos graças a Deus teve uma melhora, mas nunca desisti dos estudos”.

A apresentação do texto demonstra uma situação de dificuldade e falta de perspectivas e estrutura é uma constante para o jovem que vive no campo. Nesse sentido, nota-se que essa realidade é atual e está presente em muitas outras localidades.

De acordo com Dedita (2012, p. 109) a parte dominante da pobreza rural encontra-se localizada na Região Nordeste, podendo ser tomada como expressão do desenvolvimento regional desequilibrado do período 1930-1980, o qual foi reiterado, nas últimas décadas, pela situação de crise e pelas transformações produtivas recentes ocorridas no campo.

Ainda segundo o autor

A prevalência da elevada pobreza no campo encontra-se associada às transformações econômicas ocorridas no campo ao longo do Século XX, problema que não apresenta extensão mais expressiva em razão das políticas de proteção social adotadas pelo país a partir da Constituição Federal de 1988. Como apontado anteriormente, as transformações econômicas recentes produziram uma estrutura produtiva de maior complexidade, mas também com maior heterogeneidade, processo que, articulado com os resultados do desenvolvimento econômico 1930- 1980 se associaram a uma configuração social semelhante. DEDECCA (2012, p.109)

Ferreira e Alves (2009, p. 247) apontam que “diferentes estudos mostram que a busca por maiores níveis de escolaridade é um fator importante na saída de jovens do mundo rural para os centros urbanos. Mais do que prepará-los para um retorno ao campo, à educação oferecida nos centros urbanos raramente privilegia aspectos que possam ser transpostos ou que valorizem a realidade rural. Além disso, o ensino rural, mais que o urbano, padece de qualidade e, quase como regra, não dispõe de instalações, materiais e equipamentos suficientes e adequados”. Além disso, os autores retratam que

obstáculos de ordem econômica e cultural estão presentes, destacando-se: a escassez de recursos financeiros da família, que não lhes permite custear a passagem de ônibus até a cidade; a necessidade da presença mais permanente de jovens nas atividades agropecuárias; as dificuldades de acesso à escola – longas distâncias, falta de transporte ou precárias condições da estrada; e o desinteresse pelo estudo, pois os conteúdos das disciplinas não estão adaptados à sua realidade social. (FERREIRA E ALVES, 2009, P. 247).

Essa condição fica bem clara no depoimento do sujeito investigado é emblemático, porque traz à tona, em toda sua plenitude, a questão dos problemas com a educação no campo, que vai desde a falta de infraestrutura física adequada até a questão da evasão escolar.

A despeito disso, Leite (1999) afirma que os problemas apresentados para a educação, no meio rural, tais como a precariedade das instalações físicas da maioria das escolas, as dificuldades de acesso dos alunos às escolas, bem como a interferência direta de instituições governamentais, acabam por restringir a ação da escola. Ainda segundo esse autor,

a evasão e a repetência escolar no meio rural apresentam altas taxas e suas causas são relacionadas à escolaridade/produção, pois, na escola, o que ensinam pouco ou nada a ver com a vida extraescolar dos rurícolas. Além disso, o calendário escolar é impróprio para o meio, confrontando-se com as épocas de forte trabalho. (LEITE, 1999)

Outro aspecto que pontuamos acerca perspectiva de educação para os jovens rurais é o fato que a oportunidade de formação qualificada ainda comumente encontra-se na cidade como bem enfatiza Takahashi (2010):

As escolas capazes de ampliar as perspectivas de empregabilidade dos jovens rurais, normalmente encontram-se nas cidades e para isso outros obstáculos de ordem econômica e cultural precisam ser superados tais como: as limitações financeiras da família, que não permitem custear a passagem de ônibus até a cidade, a necessidade da presença do jovem nas atividades, enfim uma série de empecilhos que fazem com que boa parte deste jovem pare de estudar.

Frente ao processo de crescente exclusão social e educacional que o jovem rural enfrenta no seu cotidiano, a esperança de um dia poder concluir os estudos é fator muitas vezes de superação desses atores, até porque, para esses jovens rurais educação é válvula de escape para que eles saiam dessa condição de miséria. E isso fica bem claro, no depoimento de T.R.C.A quando perguntado que motivos o levaram a ir morar em Teresina.

“Como já mencionei sempre gostei de estudar, mas na minha cidade não tem universidade pra eu fazer um curso superior, pra “ser alguém na vida”, como dizem. Então voltar formado e ajudar minha família e minha terra, queria fazer cursos como Veterinária ou Agronomia, mas primeiro que terminar meus estudos, sabe terminar o ensino médio. E quando me formar eu quero transformar a vida daquelas pessoas assoladas pela seca, em algo digno de se

viver, ver suas criações gordas, suas terras irrigadas, onde possam dar o que comer para seus filhos com fartura”

Observa-se que o ideal desse jovem ao sair de sua cidade para estudar na em Teresina é melhorar suas condições de vida e de sua família. E isso fica bem claro para Carneiro (1998), quando relata que o jovem rural, além de outros, possui o desejo de melhorar o padrão de vida, de serem algo na vida, e a obrigação com a família.

No entanto, segundo Silva et. al.(2006) ausência de políticas públicas no Brasil, da dificuldade e insuficiência aos serviços educação de boa qualidade tem reduzido a vontade de esses jovens permanecerem vivendo na zona rural.

Uma questão peculiar que comumente são abordados nas pesquisas sobre juventude rural no país, bem como no depoimento do sujeito da pesquisa é que como aponta Carneiro (1998) o fator para o êxodo rural, além da formação profissional é a falta de espaços que tragam cultura e lazer para o campo, pois são fatores de descontração e socialização que aliviam o estresse causado pelo desgaste do dia-a-dia de trabalho no campo, assim como a ansiedade e a depressão.

E que segundo ainda a autora, os jovens rurais procuram na cidade a realização dessas atividades de cultura e lazer (festas, prática de esportes, cinema, etc.), já que o campo é tido como um lugar de tranquilidade e descanso, ao contrário disto, os citadinos que querem deixar um pouco de lado o estresse do dia-a-dia da cidade acabam procurando o campo justamente por ser um lugar descanso.

“Conseguí vir pra cá graças à ajuda de professores que me apoiavam. Meus pais, mesmo com poucos recursos, e com economias que fiz trabalhando para os outros. Moro na casa de parentes, acabei de concluir o ensino médio profissionalizante, e pretendo prestar vestibular pra Agronomia ou Veterinária para me qualificar e aprender técnicas pra tratar da terra e dos animais lá. Mas além de terminar meus estudos e me formar, eu vim pra cidade também pra curtir, pra ir pra baladas e pro shopping que vai demorar um milhão de anos pra chegar à minha terra”.

Portanto, é crucial e nefrágico aqui destacar a questão da qualificação profissional e aumento da escolarização desses jovens rurais. E as atuais políticas educacionais, apontam para essa perspectiva, sendo que a educação profissional tem uma dimensão social intrínseca, ela extrapola a simples preparação para uma ocupação específica no mundo do trabalho e “postula a vinculação entre a formação técnica e uma sólida base científica, numa perspectiva social e histórico-crítica, integrando a preparação para o trabalho à formação de nível médio” (MANFREDI, 2003, p. 57).

A dimensão da qualificação profissional é também assegurada pela LDBEN Nº 9394/96 quando as reverencia nos artigos 39º, 40º e 41º. No seu parágrafo único apregoa que “o aluno matriculado ou

egresso do ensino fundamental, médio e superior, bem como o trabalhador em geral, jovem ou adulto, contará com a possibilidade de acesso à educação profissional”.

Segundo Frigotto (2004), faz-se necessário saber a origem desses jovens e, principalmente entender suas particularidades e assim desenvolver uma política para inseri-los no mercado de trabalho.

os jovens têm “rosto definido”. Pertencem à classe de filhos de trabalhadores assalariados ou conduzem a vida de forma precária por conta própria, no campo ou na cidade em regiões diversas particularidades socioculturais e étnicas. Compõe um universo de seis milhões de crianças e jovens que têm inserção precoce no mundo do emprego ou subemprego. Inserção que não é uma escolha, mas uma imposição de sua origem social e do tipo de sociedade que se construiu no Brasil. (FRIGOTTO, 2004, p.181)

Para esse autor, é fundamental garantir a esses mesmos jovens a continuidade e conclusão de seus estudos para lhes proporcionar uma melhor capacitação e uma melhor perspectiva de ingresso no mercado de trabalho bem como uma ação reflexiva de sua real função na construção de uma sociedade onde os sujeitos protagonizem as mudanças para a formação do sujeito cidadão.

Segundo Frigotto (2004),

“Para jovens de 18 a 24 anos, deve – se garantir a possibilidade de continuidade de escolaridade até a conclusão do ensino médio. Essa direção de política pública, levando – se em conta as particularidades dos diferentes tipos de jovens,...Haverá então a formação de um jovem ‘técnico-dirigente’, sujeito autônomo e protagonista de cidadania ativa e não reduzido a um ‘cidadão - produtivo’, explorado, obediente, despolitizado e que faça “bem – feito” que o mercado determina.” (FRIGOTTO, 2004, p.212-213)

Destarte, é válido considerar que as políticas públicas educacionais levam para essa ótica e que esses jovens rurais não precisam sair de suas localidades em direção à cidade. Aqui podemos citar algumas dessas políticas, como o PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA, PROEJA,

PRONACAMPO, entre outras. E que para Abramovay (1999), a responsabilidade de educação rural é preparar os jovens para viver num meio rural em que a agricultura será cada vez menos importante, em que novas oportunidades de trabalho e de prestação de serviço envolvendo não só o campo, mas também as áreas dos pequenos municípios.

Reconhecendo que em todos os indicadores sociais e educacionais as populações do campo estão em desvantagem, sejam eles, relativos à matrícula, ao desempenho educacional dos alunos ou à infraestrutura, o governo federal por meio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, (SECAD) criou em 2005, o Programa Saberes da Terra com o objetivo de desenvolver uma política que fortalecesse e ampliasse o acesso dos jovens agricultores (as) familiares. A partir de 2007

o Saberes da Terra passou a integrar o Programa Nacional de Inclusão de Jovens e passou a denominar-se Projovem Campo Saberes da Terra.

Percebe-se que na implantação do programa há um novo olhar na concepção de educação do campo quando compreende que:

“não basta a mera oferta de escolarização, como extensão de uma escola urbana. É preciso que seja uma política adequada aos povos do campo e que integre os conhecimentos próprios do ensino fundamental e os de qualificação social e profissional visando o desenvolvimento da solidariedade e emancipação”. (Projeto Base Saberes da Terra-2005).

Neste sentido o propósito é a formação integral do jovem do campo por meio da escolarização, qualificação social e profissional de agricultores familiares, potencializando-os para o desenvolvimento de ações sustentáveis nos seus respectivos núcleos familiares por meio de atividades curriculares e pedagógicas, em conformidade com o que estabelecem as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo e Resolução CNE/CEB Nº1 de 03/04/2002.

O Programa Projovem Campo Saberes da Terra teve a sua implementação fundamentada nos pressupostos de que a educação como direito dos jovens do campo, assim como a escolarização, o trabalho e qualificação sócio profissional; a educação do campo como afirmação, reconhecimento, valorização e legitimação das diferenças culturais, étnico-raciais, de geração, de gênero, de orientação sexual e socioambiental.

Portanto é preciso lutar por uma educação rural e não por uma educação do campo. “A emergência de um novo paradigma tecnológico na agricultura, baseado na sustentabilidade, exige uma mudança fundamental no padrão de ensino rural”. (ABRAMOVAY, 1999). Essa situação educacional se agrava ainda mais quando comparamos os indicadores das populações rurais e urbanas, refletindo a carência de políticas públicas de educação voltadas para os povos do campo. Segundo Arroio (2000) , a escola rural é considerada “a escolinha do cai não cai onde o professor que quase não sabe, ensina a alguns a quase não saber ler”.

Percebe-se no texto acima que é fundamental garantir a esses mesmos jovens a continuidade e conclusão de seus estudos para lhes proporcionar uma melhor capacitação e uma melhor perspectiva de ingresso no mercado de trabalho bem como uma ação reflexiva de sua real função na construção de uma sociedade onde os sujeitos protagonizem as mudanças para a formação do sujeito cidadão.

“Logo quando terminar o curso eu quero ganhar conhecimento trabalhando fora do estado onde tem mais oportunidades, depois que eu tiver um pouco estabilizadas pretendo retornar para ajudar a minha terra, ver o que posso fazer para melhorar a qualidade de vida dos meus conterrâneos que mesmo com todos esses planos do governo ainda sofrem muito com a seca e a pobreza, então isso que espero do meu futuro, e com fé conseguirei.”

Notadamente, deve-se garantir a esses mesmos jovens a continuidade e conclusão de seus estudos para lhes proporcionar uma melhor capacitação e uma melhor perspectiva de ingresso no mercado de trabalho bem como uma ação reflexiva de sua real função na construção de uma sociedade onde os sujeitos protagonizem as mudanças para a formação do sujeito cidadão.

5. CONCLUSÕES

É recomendável que as políticas de formação profissional estejam articuladas às políticas de desenvolvimento econômico locais, regionais e nacionais, ao sistema político de emprego, trabalho e renda, sem o que não será possível oferecer perspectivas de melhoria da qualidade de vida, geração de emprego e renda. A inclusão social requer, portanto, políticas integradas de educação básica de qualidade, formação profissional e complementação de renda, indispensáveis à cidadania.

Nota-se que o êxodo rural somado a falta de trabalho e perspectiva no meio rural são fatores determinantes na busca por novos lugares junto à cidade e para tanta a educação torna-se o grande instrumental capaz de fazê-los compreender e desenvolver uma profissão e consequente inserção no mercado de trabalho.

As políticas públicas são instrumentos do Estado na confecção das respostas necessárias ao enfrentamento da realidade em que vive o jovem rural, na medida em que os programas educacionais se tornem cada vez mais programas de Estado e não apenas de “governos”, onde esses mesmo jovens tenham condições e oportunidades de estudarem e trabalharem no campo ou na cidade, conforme suas orientações vocacionais.

REFERÊNCIAS

ABRAMOVAY, R.; SILVESTRO, M.; CORTINA, N.; BALDISSERA, I. T.; FERRARI, D. TESTA, V. M. Juventude e agricultura familiar: desafio dos novos padrões sucessórios. Brasília: Unesco, 1998. 104 p.

ARROYO, Miguel. Ofício de Mestre. Petrópolis: Vozes, 2000.

AZEVEDO, Janete M.L. de. A educação como política publica. 2º ed.Campinas. Autores associados, 2001(coleção polemica do nosso tempo: 56).

_____,Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº9394/96

_____, Programa Projovem Campo Saberes da Terra, Documento Base Brasília,2008.

CARMO, Paulo Sérgio do. Tecnologia e Trabalho: a máquina substituirá o homem? In: KUPSTAS, Márcia (Org.). Trabalho em Debate. São Paulo: Moderna, 2008. p. 39-55.

CARNEIRO, Maria José. Ruralidade: novas identidades em construção. Estudos Sociedade e Agricultura, n.11, Rio de Janeiro: CPDA/UFRRJ, 1998.

CURY, Carlos Roberto. Políticas inclusivas e compensatórias na educação básica. Fundação Carlos Chagas. Cadernos de Pesquisa, vol.35. nº 124,São Paulo, jan/abr.2005.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa.24 ed.São Paulo: Paz e Terra, 2002.

FRIGOTTO, Gaudêncio. Juventude e Sociedade: Trabalho, educação, cultura e participação/ organizadores Regina Novaes e Paulo Vannuchi- São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2004.

MANFREDI, Silvia Maria. *Educação profissional no Brasil*. São Paulo: Cortez, 2003.

PIERRO, Maria Clara de; JOIA, Orlando; RIBEIRO,Vera Masagão. Visões da Educação de Jovens e Adultos no Brasil. Caderno Cedes, ano XXI, nº 55, novembro/2001.

PINTO, Álvaro Vieira. Sete lições sobre educação de adultos. São Paulo: Cortez, 1994.

SANTOS, Simone Valdete dos. A Educação de 1º Grau na Fábrica: para além das competências e da qualidade total. Educação de Jovens e Adultos no Brasil: a trajetória do ensino fundamental tardio Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Educação- UFRGS, 1998.

TAKAHASHI,C. N. Economia solidária e juventude rural: possibilidades para o desenvolvimento local da microrregião Entre Rios - Pr. 2010. 130 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Programa de Pós-graduação em Geografia, Universidade Estadual de Maringá, Paraná. 2010.

IBGE - Censo Demográfico 2010.

Lei complementar nº87 de 22 de agosto de 2007-Piauí

PLANAP- Plano de ação para o Desenvolvimento Integrado da Bacia do Parnaíba. Síntese executiva Território Vale do rio Guaribas/CODEVASF-Brasília 2006.

Capítulo 4

10.37423/210403827

TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA NO POVOADO TERRA CAÍDA, MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE: UMA ALTERNATIVA DE DESENVOLVIMENTO PARA SUPERAÇÃO DA POBREZA

MARY NADJA LIMA SANTOS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

JOÃO LUIZ SANTANA BRAZIL

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

BENTO RAFAEL SANTANA DA CRUZ

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

MARTA SANTOS REIS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

Resumo: O litoral sergipano representado pela região turística Polo Costa dos Coqueirais, vem recebendo investimentos nacionais (Estado) e internacionais (BID e BIRD) em infraestrutura desde 2001, mediante Programa de Desenvolvimento do Turismo-PRODETUR-NE e, mais recentemente, conta com recursos advindos do Ministério do Turismo (2008-2011); o que desperta em locais até então pouco explorados às atividades turísticas. O povoado de Terra Caída, município de Indiaroba/SE tem singularidades expressivas no que diz respeito ao patrimônio natural e cultural apresentando-se vocacionado para o desenvolvimento da comunidade no âmbito do **ecoturismo** e, conseqüentemente, vislumbra-se nessa prática benefícios econômicos para superação da pobreza. Diante disso, este projeto tem como objetivo analisar as instâncias de governança do ponto de vista político e social, além disso, avalia-se o patrimônio natural, seus costumes e tradições do citado povoado, na perspectiva de subsidiar aos governantes e líderes local o turismo de base comunitária. Para este projeto utilizou-se a estratégia tipo pesquisa-participante, complementada pela pesquisa descritiva e o uso de dados técnicos dos organismos oficiais (IBGE, IPH, IDH, FIRJAN), entre outros. Os resultados obtidos validaram a dinâmica do controle social e governança da localidade para com os seus atrativos e das decisões políticas para melhoria das condições de vida da população, vislumbrando oportunidades para o desenvolvimento econômico, social e ambiental - Visão de Futuro.

Palavras-chave: costumes e tradição cultural, desenvolvimento local, turismo comunitário.

1. INTRODUÇÃO

O município de Indiaroba situa-se na porção meridional do estado de Sergipe, e integra a microrregião Geográfica de Estância. Segundo IBGE (2010), a referida região está composta pelos municípios de Estância, Indiaroba, Itaporanga D'Ajuda e Santa Luzia do Itanhy. Indiaroba é parte integrante do Complexo Estuarino Piauí-Real, com quem mantém forte ligação.

A economia municipal apresenta em seus aspectos gerais uma composição setorial que evidencia grande importância para as atividades ligadas ao setor primário (38,16%), enquanto que as, as atividades secundárias (5,45%) e terciárias (56,39%) participam no contexto econômico municipal (SERGIPE, 2007).

A estrutura agrária do município evidencia diversidade no tamanho das propriedades onde são executadas atividades ligadas a agricultura, pecuária, pesca e, mas recentemente, a carcinicultura. Diante disso, a atividade pesqueira tem caráter artesanal e por outro lado vale ressaltar que esta atividade é realizada como forma de subsistência de algumas famílias, que utilizam os excedentes para geração de renda e aquisição de outros gêneros alimentícios (ALMEIDA e VIEIRA, 2010, p.286).

O município encontra-se na Área de Preservação Ambiental do Litoral Sul do Estado de Sergipe, criada pelo Decreto Governamental Nº 13.468, de 21 de janeiro de 1993, constituída por manguezais, estuários, dunas, restingas, lagoas e remanescentes de Mata Atlântica, que se encontram conservados no entrono do povoado.

Nesse sentido, o estudo é realizado no povoado Terra Caída, Indiaroba, e localiza-se a 95 km da capital Aracaju. O município se encontra na região turística do Polo Costa dos Coqueirais e foi contemplada pelo projeto Destinos Indutores do Plano Nacional de Turismo (2007-2010) do Ministério do Turismo e beneficiado pelo Programa de Desenvolvimento do Turismo-PRODETUR-SE (2002-2005).

O turismo em Terra Caída apresenta desta forma como alternativa de desenvolvimento contra um sistema caracterizado pela crise da pesca, especulação imobiliária, pela expulsão dos nativos de suas terras, pela falta de participação efetiva dos moradores na tomada de decisão em instâncias diversas. Esse contexto tem provocado uma nova lógica de estruturação do turismo no litoral sergipano e desperta estudos de potencialidades turísticas e impactos ambientais que passam a ser utilizadas pelo turismo com a elaboração de novas rotas e/ou incorporadas a outras já existentes.

No intuito de clarear as justificativas expostas, *mister* se faz trazer estratégias e bases conceituais para a construção de um projeto turístico socialmente responsável e participativo denominado de turismo

de base comunitária. “O turismo comunitário ou de base comunitária pode ser definido como aquele onde as sociedades locais possuem controle efetivo sobre seu desenvolvimento e gestão. E por meio do envolvimento participativo desde o início, projetos de turismo devem proporcionar a maior parte de seus benefícios para as comunidades locais” (WWF-BRASIL, 2001, p.14). Além disso, respeita as heranças culturais e as tradições do local e, dessa forma, pode servir de veículo para revigorá-las, e até mesmo resgatá-las.

Assim, a condição para o turismo de base comunitária é o “encontro” entre identidades, no sentido de compartilhamento e aprendizagem mútua. Neste caso, seu planejamento deve considerar “o compromisso ético, de respeito e engajamento de ‘quem está’ e de ‘quem vem’ e o intercâmbio real entre os sujeitos ‘que recebem’ e os que ‘são recebidos’ e, destes, com o ambiente no qual interagem. Sem essa interação, a troca de valores não se efetiva e o ‘espaço da interação’ ganha contornos apenas circunstanciais” (IRVING, 2008 p.114).

Endossando a afirmação anterior, o Ministério do Turismo, em suas ações vem fortalecer a importância da superação da pobreza a partir da inclusão social da comunidade.

O modelo de desenvolvimento proposto pelo governo contempla e harmoniza a força e o crescimento do mercado com a distribuição de renda e a redução das desigualdades, integrando soluções nos campos econômicos, social, político, cultural e ambiental. (...) o turismo pode ser uma importante ferramenta para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, particularmente com relação à erradicação da extrema pobreza e da fome, à garantia de sustentabilidade ambiental e ao estabelecimento de uma parceria mundial para o desenvolvimento (BRASIL, 2007, p.15).

O objetivo geral desse projeto é analisar o Turismo de Base Comunitária como alternativa para o desenvolvimento socioeconômico no povoado Terra Caído em Indiaroba/SE. A correlação entre os objetivos gerais e os específicos estão dispostos a seguir:

- Caracterizar os costumes, tradição sociocultural, econômicos, políticos e ambientais do município de Indiaroba/SE;
- Inventariar os produtos turísticos do espaço estudado;
- Verificar as instâncias de governança e controle social da comunidade local;
- Avaliar os impactos socioeconômicos a partir do aumento da visitação turística (visão de futuro);

- Criar um roteiro ecoturístico integrado aos potenciais turísticos do município, tendo como centro de referência o povoado Terra Caída.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O estudo tem por objetivo geral analisar o Turismo de Base Comunitária como alternativa para o desenvolvimento socioeconômica no povoado Terra Caída em Indiaroba/SE. A partir daí, será apresentando os caminhos estruturantes da pesquisa no que concerne aos aspectos metodológicos. Nesse contexto, o trabalho de campo, implica num processo que antecede as oficinas e que é decisivo na conquista e confiança dos agentes locais – a sensibilização. Após essa demanda, de tempestade de ideias configuradas em forma de painéis, separando os pontos fortes e fracos (análise interna); ameaças e oportunidades que a comunidade enfrenta (análise externa), na perspectiva de coletar informações e indicativos de mudanças efetivas de desenvolvimento.

Endossa o pensamento anterior Santos (2009, p. 36-37) :

As oficinas co-participantes serão utilizadas para descrever, contar (*brainstorm*) e apreender a sua realidade em bases cidadãos, mesmo que a lei de mercado abafe as vozes das comunidades tradicionais, que historicamente são silenciadas por natureza.

Foi utilizado o método fenomenológico-hermenêutico que se constitui numa interpretação científica, onde de acordo com Spósito *apud* Santos (2009, p. 35), a hermenêutica “constitui uma reflexão filosófica interpretativa ou compreensiva sobre os símbolos e os mitos em geral”. O projeto fenomenológico se define como uma ‘volta às coisas mesmas’, isto é, aos fenômenos, aquilo que aparece à consciência, que se dá como seu objeto intencional.

Segundo Spósito (*apud* SANTOS 2009, p. 35) diz ainda que o conceito de intencionalidade ocupa um lugar central na fenomenologia, definindo a própria consciência como intencional, como voltada para o mundo. Acima de tudo, é preciso ressaltar que a fenomenologia consiste num método e numa forma de pensar, nos quais a ‘intencionalidade da consciência’ é considerada chave.

Sob a perspectiva da pesquisa-ação para realizar um estudo de uma comunidade, identificando os seus pontos fortes e a problemática local, deve-se realizar uma intervenção benéfica para a melhoria das condições de todos, e isso só se justifica a partir da ação daqueles que vivem na própria região. Assim, junto com eles a implementar esse processo, promove-se ou mesmo apoia-se encontros informais na comunidade, com o intuito de extrair dali o máximo de informações, que deem sustentação nos resultados da pesquisa (campo teórico-empírico) (THIOLLENT, 1997).

Assim, para obter os resultados da pesquisa com vistas a propor uma rota turística e de desenvolvimento para o município serão utilizadas as seguintes dimensões de análise:

- Dimensionamento da demanda turística atual e futura
- Levantamento dos pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças da atividade turística na região.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 ANÁLISE QUALI-QUANTITATIVA

“Quais os indicadores socioeconômicos da região estudada e mais especificamente o município de Indiaroba?”

O território do Litoral Sul é definido e distribuído pelos seguintes municípios: Itaporanga d'Ajuda, Estância, Santa Luzia do Itanhy e Indiaroba. Esse tópico traz dados significativos no que diz respeito ao Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal e confrontá-los, aos dados colhidos e discutidos com a comunidade pesquisada.

Em termos de análise quali-quantitativa, os indicadores analisados retratam a realidade de muitos municípios do Estado de Sergipe e do Brasil, no qual, nota-se a discrepâncias, principalmente se tomar por base Aracaju, capital de Sergipe.

Situado entre os rios real e Piauí, o município de Indiaroba é considerado pelo governo municipal de expressivo atrativo natural com perspectiva de criação de um parque ecológico, pois possui uma área de manguezal ainda preservada e conservada; faz divisa com Sergipe e Bahia e, por isso, houve investimentos substanciais de estradas que ligam ambos os Estados (Linha Verde).

Segundo os indicadores que serão apresentados na tabela 01, o Estado de Sergipe no *ranking* nacional; observa-se um aumento, a partir do IFDM, 2005 (0,6456) para IFDM, 2009 (0,6709), comparativamente às mudanças no cenário nacional, regional e local. Quanto aos municípios pesquisados no litoral sergipano, Aracaju permanece na 1ª posição do ranking estadual com o IFDM 0,7926; entre os Municípios situados no litoral Sul do Estado o Município de Estância está melhor colocado na 17ª posição, os demais municípios da região encontra-se entre os últimos colocados no Estado, sendo: Indiaroba na 60ª posição, Santa Luzia do Itanhy na 63ª e Itaporanga d'Ajuda na 67ª posição.

Tabela 1 – Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal

Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal 2005- 2009	SERGIPE	IFDM 2005	IFDM 2009	Emprego & Renda 2005	Emprego & Renda 2009	Educação 2005	Educação 2009	Saúde 2005	Saúde 2009
	SERGIPE	0,6456	0,6709	0,6060	0,6005	0,6178	0,6561	0,7130	0,7560
	Mediana	0,5411	0,5800	0,3496	0,3732	0,6105	0,6562	0,6499	0,7303
	Máximo	0,7988	0,7926	0,8851	0,8957	0,7237	0,7611	0,8458	0,9473
	Mínimo	0,4431	0,5072	0,1488	0,2622	0,4832	0,4808	0,4738	0,5815

Ranking IFDM		UF	Ranking Ordem Alfabética SERGIPE - Ano 2009	IFDM	Emprego & Renda	Educação	Saúde
Nacional	Estadual						
275º	1º	SE	Aracaju	0,7926	0,8957	0,6726	0,8097
4680º	67º	SE	Itaporanga d'Ajuda	0,5332	0,2822	0,6183	0,6993
2458º	17º	SE	Estância	0,6545	0,5423	0,6774	0,7439
4546º	63º	SE	Santa Luzia do Itanhy	0,5409	0,3678	0,6283	0,6264
4433º	60º	SE	Indiaroba	0,5482	0,3807	0,5722	0,6918

Fonte: IFDM – Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal, 2012. Base de dados: 2005-2009

“Quais os pontos fortes referentes aos atrativos turísticos?”

Entre os atrativos citados nas oficinas participativas merecem destaque o singular ecossistema, especialmente os manguezais que margeiam os rios Piauí e Real, rios estes, propícios a diversas atividades como passeios de barco, pescaria, esportes aquático, banho entre outras. Outro atrativo que a comunidade fez questão de destacar a culinária, recheada de ingredientes típicos da região e responsável por absorver grande parte do pescado, uma das principais fontes de renda dos moradores.

“Quais os pontos fracos referentes aos atrativos?”

Os problemas foram elencados pela comunidade, representando barreiras para o desenvolvimento do turismo na região. Entre os problemas apontados destaca-se: **falta de organização civil**, o que impede de ter representações para reivindicar melhorias para comunidade; **infraestrutura básica deficiente**, os moradores reclamam da insuficiência do serviço de água e esgoto e coleta de lixo, que representa uma ameaça ao ecossistema de manguezais que cercam a comunidade; **falta capacitação profissional** para melhor atender os visitantes e um **centro de apoio ao turista**. Além disso, o turismo local sofre com a falta de divulgação e de articulação com as agências que promovem roteiros na região.

“Quais as oportunidades reveladas e que levam ao desenvolvimento local?”

O povoado de Terra Caída representa um grande potencial para o desenvolvimento do turismo, assim, há várias oportunidades que a princípio foram elencadas pela comunidade, e que se espera com o trabalho desenvolvido na localidade render frutos, fortalecendo assim, a economia local. A

Gastronomia local, um dos principais atrativos, com capacitação e melhoria de seus serviços, pode representar um crescimento e atrair uma maior demanda de visitantes para a localidade.

Para o surgimento e fortalecimento das oportunidades foi discutida na oficina a possibilidade de parcerias com empresas e instituições para colocar definitivamente Terra Caída no roteiro das agências.

Entre os serviços que tendem a crescer e render divisas significativas para a economia da região é o serviço de transporte terrestre e, principalmente, fluvial, pois junto com os serviços de Alimentos e Bebidas representam várias possibilidades de roteiros fluviais.

“Quais as ameaças que impedem o desenvolvimento local”?

Dentre os obstáculos enumerados pelos participantes da oficina merece destaque a falta de organização comunitária no sentido da divulgação dos roteiros e serviços, além da falta de parcerias para capacitação de mão de obra, resultando num deficiente atendimento ao turista.

A comunidade sofre com a escassez de programas e projetos que beneficiem seus moradores, de acordo com os participantes da oficina, a comunidade foi contemplada com alguns projetos através de editais, a exemplo do projeto para o desenvolvimento do turismo de base comunitária do Ministério do Turismo e BNB Cultura, ambos não houve continuidade. A comunidade conta ainda com programas como o PRONAF, FUNDEC, e o PEAC.

“De que forma o município vem tratando de melhorias em seus equipamentos e serviços turísticos e infraestrutura”?

Entre os equipamentos turísticos merecem destaque os restaurantes, são de pequeno a médio porte, possui pousadas com estrutura e serviços simples. Possuem ainda embarcações como lanchas, catamarã, escuna e barcos de pequeno porte. A região do litoral sergipano vem sendo beneficiada desde a década de 2000 com obras de infraestrutura de acessibilidade aos municípios de Itaporanga D` Ajuda, Estância, Santa Luzia do Itanhi, Indiaroba através de investimentos do Programa de Desenvolvimento do Turismo-PRODETUR/SE. Atualmente, os investimentos se voltam para a construção da ponte Gilberto Amado que liga a SE-100 à Linha Verde, rodovia que liga a região Sul do Estado à Bahia.

3.2 ESTUDO DE MERCADO: DIMENSIONAMENTO DA DEMANDA TURÍSTICA

- **Demanda Atual**

Para a conclusão deste resultado foram pesquisados 30 turistas/visitantes. O fluxo de turistas/visitantes para o povoado Terra Caída no município de Indiaroba/SE é predominantemente nacional, majoritariamente da cidade de Aracaju (27% do total), seguido de Estância (20%). Isso se dá, devido a primeira ser a capital e a maior emissora de turistas no Estado e a segunda por fazer fronteira com o município e manter relações econômicas, educacionais e de negócios. As cidades de Umbaúba/SE, Salvador/BA e Camaçari/BA apareceram com 13% do número de visitantes, devido a relações de negócios e pesquisa. E, outras cidades, como: Conde/BA e Esplanada/BA somaram juntas 14%. A pesquisa de procedência nos leva a considerar a importância do município de Aracaju por ser a capital de Sergipe para a visita do povoado Terra Caída. De acordo com a ocupação, observou-se que há uma equivalência entre o fluxo de visitantes assalariados da iniciativa privada (47%), pública (20%), aposentados (13%) e estudante (13%).

Observou-se que o grau de instrução do visitante em Terra Caída em sua maior parte (46%) concluiu a graduação; logo em seguida 40% dos entrevistados concluíram o ensino médio, significando bom grau de instrução. Quanto ao sexo, revelou-se certo desequilíbrio, uma vez que 67% dos visitantes entrevistados foram do sexo masculino enquanto que 33% são do sexo feminino.

A pesquisa revelou certo desequilíbrio, uma vez que 67% dos visitantes entrevistados foram do sexo masculino enquanto 33% do sexo feminino. Além disso, considerou os visitantes maiores de 18 anos, divulgando dados apenas a partir desta idade. Uma leitura desta informação permite concluir que o contingente de visitantes de 18 a 24 anos representa 33% do total, enquanto o maior fluxo de visitantes por faixa etária se encontra entre 24 a 44 anos (53%).

Dos entrevistados a motivação da viagem para Terra Caída é fortemente orientada para negócios e trabalho (33%), além disso, como: estudos/pesquisas e visitas a familiares/amigos somaram juntas (40%). Observou-se que 40% permanecem menos de 24hs no local o que caracteriza o visitante como excursionista e não como turista. Por outro lado, 40% dos entrevistados passaram entre 2 a 3 dias.

Os visitantes utilizam como principal meio de transporte particular (87%), explicado devido à relação distância-tempo-custo das cidades de procedência. Por outro lado, 13% dos entrevistados citaram ter utilizado ônibus de linha. A utilização dos meios de hospedagem revela que 47% dos visitantes optam por casas de amigos, parentes ou segundas residências. Além disso, 40% não optaram por meios de hospedagem, explicado devido à maior parte dos visitantes serem de cidades circunvizinhas, principalmente, Estância, não permanecendo no local por mais de 24hs. Um dado interessante

encontra-se que 13% hospedaram-se em pousadas de municípios vizinhos, devido à falta de pousada que consiga receber o fluxo turístico.

- **Demanda Futura da Região do Litoral**

Para levantar os dados da demanda futura foi aplicado 30 questionários as pessoas que circulam na rodoviária capital de Sergipe, Aracaju (amostragem), em setembro de 2011. As questões de pesquisa que se destacam foram: **(i) Qual a frequência média/mês de viagens a cidade do interior de Sergipe? (ii) Qual o destino mais visitado? (iii) Quais os principais motivos de sua viagem para o interior de Sergipe? (iv) Como geralmente organiza suas viagens? (v) Quais suas prioridades mínimas de infraestrutura básica para o atendimento no local? (vi) Para realização de um roteiro de Turismo Comunitário, o que lhe motivaria?** Dentro dessa ordem pode-se perceber que 40% dos entrevistados viajam com frequência de três a quatro dias ao interior de Sergipe; e 30% corresponde, igualmente, pelo menos a uma viagem ao interior do Estado e pelo menos duas vezes, o que totaliza 60%. Na sequência, percebe-se, que os municípios de Estância e Canindé juntos somam (40%) como destino mais visitado, devido à facilidade de meios de transporte, bom acesso e atrativos turísticos naturais e culturais e os demais destinos Tomar de Geru, Nossa Senhora da Glória, Própria, Santa Luzia, São Cristóvão e Pirambu somam-se igualmente 10% cada, totalizando-se 60%.

Quando perguntados quais segmentos turístico o entrevistado teria interesse de visitar confirmamos que 40% tem interesse pelo Turismo de Eventos, motivados, principalmente, pelas festividades juninas, porém, um dado interessante apareceu em relação à segunda principal motivação, o Turismo Religioso e Lazer, quando somados chegam a 40% de interesse. Já o Turismo Comunitário representa 10% dos entrevistados. Aqueles que se manifestaram com interesse pelo turismo comunitário 50% do total dos entrevistados disseram que aprecia a culinária, seguido à vivência do homem com a natureza (40%). Não menos importante com 10% que aprecia as atrações e manifestações culturais.

3.3 PROPOSTA DE ROTEIRO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA-SERGIPE

O roteiro turístico proposto corresponde a um roteiro autoguiado, onde o turista será acompanhado por um condutor da própria localidade. O roteiro terá início com a saída da capital Aracaju às 07:00 min cumprindo o deslocamento terrestre até a Sede do município de Indiaroba no apórtico da Orla (**Ponto A**) com chegada prevista para as 08:30 min, com redução prevista para 01:00 após a conclusão da Ponte Gilberto Amado. A partir deste ponto dar-se-á início ao roteiro fluvial que poderá ser feito com embarcação de pequeno porte como lancha e barco de pesca ou embarcação de médio porte a exemplo de Tototó e Catamarã; a saída da embarcação seguirá pelo rio Piauí até o Povoado Preguiça

(**Ponto B**), oportunidade de vivenciar os costumes de uma comunidade tradicional, além de banhar-se nas águas do rio Real. Ainda no município de Indiaroba por volta das 11:00 horas segue o curso até Pontal (**Ponto C**), para banho, almoço (culinária típica) na comunidade e visita a loja de artesanato, seguindo para o Mangue Seco, Bahia às 13:00 horas (**Ponto D**), visitando a vila dos pescadores, lojas de artesanato e banho. Este destino é muito divulgado em todo território nacional e também com visibilidade internacional. Segue o roteiro pela Ilha do Sossego e, dependendo da maré, aporta nesse local para banho e contemplação (**Ponto E**), aqui o turista terá cerca de 01 hora para completar essa parte do roteiro.

Partindo da Ilha do Sossego as 14:30min a embarcação seguirá até a Praia do Saco (**Ponto F**) e passa pelo Porto dos Cavalos, povoado Porto do Mato, Estância, Sergipe (**Ponto G**), as margens domanguezal muito bem preservado, onde será possível contemplar, observar seu ecossistema e ouvir o canto dos pássaros. Seguir-se-á após a saída destas localidades partiremos pelo rio Real até o município de Indiaroba mais precisamente no Povoado Terra Caída (**Ponto H**), o desembarque acontecerá às 16:00min e seguirá até o Restaurante Frutos do Mar, caracterizado pela culinária típica famosa na região, além de ser o único da localidade que possui infraestrutura para receber o maior fluxo de pessoas.

O **Ponto I** do roteiro é opcional, pois será no município de Santa Luzia do Itanhy, no Povoado Crasto. Nesta localidade o turista tem a opção de desenvolver a prática de pesca, a atividade tem duração de 01 hora e retorno a capital de Aracaju, com previsão de chegada as 18:30 minutos

Seguindo a parte final do roteiro, de volta para o município de Estância em Porto dos Cavalos onde será finalizado o roteiro fluvial aproximadamente as 16:00min. A partir deste ponto acontecerá o retorno para Capital Aracaju com previsão de chegada 17:30min.

Em seguida visualiza-se a proposta de Roteiro Turístico sinalizado, conforme figura 01.

Figura 01: Roteiro Turístico de Indiaroba, Integrado à Região do Litoral, ago., 2012.

6. CONCLUSÕES

Atualmente, de acordo com relatos dos pescadores do Povoado Terra Caída, a quantidade do pescado reduziu de forma significativa e a pesca não apresenta mais rentabilidade como em anos anteriores. Nesse sentido, devido à queda dos recursos pesqueiros na comunidade existe busca por alternativas de trabalho e renda. A comunidade local percebeu o potencial natural e cultural do povoado que poderia ser melhor aproveitado pela atividade turística.

A estruturação do turismo de base comunitária no Povoado Terra Caída está diretamente relacionada à principal atividade econômica da região, a pesca artesanal, uma cadeia que se apresenta organizada em forma de associação, facilitando a transparência e envolvimento dos agentes locais no desenvolvimento do projeto. Além disso, a SE-100 e a ponte Gilberto Amado (obra em andamento), possibilita o incremento da prática do turismo na localidade.

A potencialidade do turismo no município de Indiaroba foi confirmada pelos participantes nas oficinas, onde foram citados diversos atrativos considerados pontos fortes para o desenvolvimento do turismo. No entanto, a comunidade encontra-se com dificuldades de organização civil, fator relevante para a

inserção do Turismo de Base Comunitária, além disso, foram elencados outros pontos fracos tais como: infraestrutura básica deficiente e falta de capacitação.

A comunidade necessita de investimento em infraestrutura para o turismo e melhoria dos serviços, recursos provenientes de iniciativa pública e privada como: melhorias no saneamento básico, programas de capacitação, incentivo aos pequenos produtores e prestadores de serviços, além de aquisição de novos barcos, construção e melhoria de novos meios de hospedagem e restaurantes.

Espera-se que estes resultados possam oportunizar aos gestores públicos e líderes comunitários oportunidades de negócios, acolhendo de forma dinâmica o aumento da demanda de visitantes na região, fortalecendo assim, a economia local.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, GERALDA; VIEIRA, LÍCIO V. L. Da pesca ao turismo com base comunitária no povoado de terra caída Indiaroba/SE: o espaço rural com “outras caras”. In: VILAR, José W. C., ARAÚJO, Hélio M. de. (orgs.). Território, Meio Ambiente e Turismo no Litoral Sergipano. Cap. XIII. São Cristovão: UFS, 2010.

BRASIL. Estimativa da População. IBGE, 2010. Censo Demográfico, 2010.

_____. Ministério do Turismo. Plano Nacional do Turismo 2007-2010. Brasília, MTUR: 2007

BURSZTYN, Ivan. Políticas públicas de turismo visando a inclusão social. Rio de Janeiro, 2005.

SANTOS, Mary N. L. Políticas territoriais de turismo e investimentos no Polo Costa dos Coqueirais. In: VILAR, José W. C., ARAÚJO, Hélio M. de. (orgs.). Território, Meio Ambiente e Turismo no Litoral Sergipano. Cap. XII. São Cristovão: UFS, 2010.

SANTOS, Mary N. L. Políticas territoriais de turismo: investimentos no Polo Costa dos Coqueirais, Sergipe, Brasil. São Cristóvão: UFS. 243 fl., 2009. Tese de Doutorado. (Programa de Pós-Graduação em Geografia).

WWF-BRASIL. Certificação em Turismo: Lições mundiais e recomendações para o Brasil. SALAZAR, Sergio (Coord.). Brasília: WWFBrazil, 2001.

Capítulo 5

10.37423/210403863

POLÍTICAS PÚBLICAS E O MODELO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Thaís Veiga Barros

Tribunal de Justiça de Alagoas

Leonardo Melo Brito Cardoso

Secretaria de Segurança Pública de Alagoas

José aparecido da Silva Carne

*Instituto Federal de Alagoas, Campus
Marechal Deodoro*

Adelmo Lima Bastos

*Instituto Federal de Alagoas, IFAL, Campus
Marechal Deodoro*

Resumo: A economia de um país se faz necessário para seu próprio desenvolvimento através da produção de tecnologias, exploração de matéria-prima de grande escala para exportação, com isso, gera grande demanda de exploração e degradação dos recursos naturais, trazendo consequências desagradáveis para o meio ambiente. Este estudo teve como objetivo abordar as relações sociais, e principalmente do modo como a sociedade se comporta quando se trata de consumo, do modelo econômico que degrada o meio ambiente, além do modelo econômico sustentável. O presente estudo foi realizado, através de materiais bibliográficos, utilizando-se da literatura relacionada ao tema e dados sobre o Modelo Econômico Sustentável. A importância da criação de políticas públicas que sejam adotadas por empresários, onde junto com o governo transformem o modo como se gera a economia em um país que apresenta tanta biodiversidade, além da sociedade que apresenta um alto padrão de consumo, os resíduos sólidos produzidos por esta classe social serão lançados no meio ambiente, ao final do processo. Conclui-se com isso que as tecnologias ambientais se tornaram indispensáveis para a conservação dos recursos naturais e do meio ambiente, fazendo os países se preocuparem mais com as gerações futuras, buscando uma “produção limpa”, para a promoção do desenvolvimento sustentável, trazendo preocupações a níveis sociais, além de ambientais.

Palavras-Chave: Desenvolvimento sustentável, economia, políticas públicas

1 INTRODUÇÃO

O processo atual de desenvolvimento do país e do mundo, de uma maneira geral, ainda é baseado em um modelo socioeconômico onde concentra a riqueza na mão de alguns poucos e deixa a grande maioria em condições desiguais, além de ser um sistema que utiliza dos recursos naturais para manter a geração de economia atual. É o sistema econômico inserido em um meio externo passivo que aceita, sem maior preocupação, diferentes níveis de degradação. Um desenvolvimento baseado em degradar os recursos oferecidos pela natureza, desequilibrando os ecossistemas, climas, qualidade de vida humana, enfim, provocando nas pessoas movidas pelo sentimento de preservação do meio ambiente, práticas que mantenham o meio ambiente equilibrado e menos degradado através de ações sustentáveis que visem à diminuição das ações antrópicas causadoras de tamanha degradação, até porque, eliminar essas ações antrópicas degradantes é praticamente impossível, vivendo no modelo econômico atual, onde se visa o lucro com custos menores e para isso, lança-se mão matéria-prima vinda dos recursos naturais.

Com essa nova preocupação da **“sociedade moderna” surge um modelo econômico** baseado na integração da sustentabilidade econômica, social e ambiental nas diversas ações de desenvolvimento econômico, e também de conservação ambiental, representando dessa forma uma mudança de paradigma. Para a estruturação dessa nova perspectiva, é preciso que ocorra um desenvolvimento, na política ambiental e econômica, através de políticas públicas que visem proporcionar a esse modelo econômico baseado no tripé da sustentabilidade, maior ênfase e consolidação na sociedade atual, e desenvolva resultados favoráveis ao meio ambiente. Os administradores públicos e grandes empresários têm um importante papel a desempenhar no sentido de desenvolver tais políticas públicas de desenvolvimento sustentáveis, em termos de produção e consumo, responsabilidade social e preservação dos recursos naturais para estruturação de uma sociedade sustentável.

Este estudo teve como objetivo abordar as relações sociais, e principalmente o modo como a sociedade se comporta quando se trata de consumo, do modelo econômico que degrada o meio ambiente, além do modelo econômico sustentável.

2. MATERIA E MÉTODOS

O presente artigo foi elaborado utilizando a pesquisa Teórica, analisando a teoria de que o mundo vive em um modelo econômico que é sustentado pela degradação dos recursos naturais disponíveis para

manter o equilíbrio e a vida na terra, e de como o modelo econômico sustentável pode ser a opção mais eficaz na transformação do sistema econômico através de práticas sociais e ambientais.

Para a elaboração dessa pesquisa foi utilizado materiais de pesquisa bibliográfica (teses, artigos e documentos digitais) que abordam os referidos assuntos.

3. RESULTADO E DISCUSSÃO

DESENVOLVIMENTO X MEIO AMBIENTE

A Globalização, a tecnologia e o lucro promovem impactos ao meio social e isso ocorre quando uma parcela maior da sociedade mundial não tem acesso a esses instrumentos, tornando cada vez maior o índice de desigualdade, além do grande índice de consumo por parte das pessoas que estão cada vez mais comprando e produzindo grandes quantidades de dejetos poluidores que causam fortes transformações no meio ambiente provocando o seu desequilíbrio. Arruda, D.; Espíndola, M (2008) afirma que, o desenvolvimento econômico da produção capitalista tem assim, mediante todos os complexos aspectos citados, sua centralidade na acumulação de riqueza através do trabalho humano, já que as novas tecnologias vigentes ainda não dispensam totalmente a presença do homem no meio produtivo, necessitando, agora, de sua inteligência para fiscalizar, ajustar e até fazer funcionar determinada máquina.

Os países mais desenvolvidos se preocupam mais com o desenvolvimento econômico, geração de lucro, instigação do consumo da sociedade, desenvolvimento dos produtos, com custos cada vez menores e cada vez mais obsoletos, sem se preocupar com as consequências a nível social e ambiental, que são nesse caso os mais afetados por esse sistema econômico atual, que se baseia no lucro e geração de riqueza.

Todo problema social é um problema ambiental, ou seja, os problemas sejam eles econômicos, sociais, raciais, territoriais, religiosos ou qualquer outro, são problemas ambientais porque afetam nosso meio ambiente. Não se devem limitar os problemas ambientais somente a natureza em si, os problemas ambientais vai mais além, por exemplo, a fome é causada pelo desemprego, o desemprego é causado pela globalização que utiliza mão de obra barata e necessita de novos mercados consumidores, geram desemprego, fome e violência, e todos esses problemas sociais atingem o meio ambiente, se for pensar na fome, ela necessita de grandes extensões de terras, produtos químicos como agrotóxicos que por sua vez alteram os ecossistemas existentes na área e se consolida um problema ambiental.

Relações socioambientais, são necessárias para que se produzam ações que contribuam para um desenvolvimento baseado em proteção ao meio ambiente e dessa forma atinja as camadas sociais menos favoráveis, não são produtos ecologicamente corretos com custos altos que representam as ações sociais, pelo contrário, só distancia a ideia de desenvolvimento sustentável que tem como princípio o tripé da sustentabilidade, gerar lucros de maneira que não agrida o meio ambiente mantendo a responsabilidade social.

O MODELO ECONÔMICO QUE TRANSFORMA

A economia precisa ser gerada, promovendo o desenvolvimento econômico, ou seja, a economia não pode se manter estagnada, se não causariam efeitos devastadores, fornecendo a sociedade pior qualidade de vida; é por isso que se fala em desenvolvimento sustentável, capaz de proporcionar transformações que priorizam a qualidade de vida, desde social até ambiental.

Brown (2001) diz que o destino da economia atual não apresenta mais nenhuma perspectiva de progresso. Essa economia se “sustenta” no desmatamento das florestas, extinção de espécies e poluição das águas, o que ocasiona efeitos maléficos como aumento da temperatura e desertificação do solo.

Seriam necessários maiores avanços tecnológicos que auxiliem essa ideia de desenvolvimento sustentável, tecnologias essas que satisfaçam a demanda atual e que ao mesmo tempo produza efeitos parecidos na captação de lucros e preserve os recursos naturais que são tão exploradas pelo sistema econômico atual.

O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

O ano de 2012 foi marcado pela Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio +20), que apresentou o conceito de Desenvolvimento Sustentável como o modelo que prevê a integração entre economia, sociedade e meio ambiente, em outras palavras, é a noção de que o crescimento econômico deve levar em consideração a inclusão social e a proteção ambiental. A economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza tem o tripé da sustentabilidade que é baseado, no lucro, responsabilidade social e meio ambiente, ou seja, para ser sustentável uma organização ou negócio deve ser financeiramente viável, socialmente justo e ambientalmente responsável.

Tendo como base a Conferência de Estocolmo (Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano 1972), que reuniu diversos países para discutir assuntos de interesse mundial, que seria

desenvolvimento e crescimento acelerado da economia, principalmente para os países ricos, portanto, meio ambiente não era uma preocupação, tendo em vista que o importante é garantir que os países emergentes apresentassem uma renda *per capita* igual a dos países ricos. A questão foi que nessa reunião houve uma divisão no que se diz respeito às prioridades, de um lado continuar o progresso e crescimento da economia mundial era o primordial enquanto do outro lado, afirmava-se sobre as consequências dessa exploração dos recursos naturais para gerar o desenvolvimento sem haver preocupações para mantê-los e garantir a sobrevivência do meio ambiente para as gerações atuais e futuras.

No entanto, Ignacy Sachs (2002) afirma que deveria haver o estabelecimento de um aproveitamento racional e ecologicamente sustentável da natureza em benefício das populações locais, levando-as a incorporar a preocupação com a conservação da biodiversidade aos seus próprios interesses, como um componente de estratégia de desenvolvimento.

Promover o desenvolvimento sustentável é necessário que atinja a sociedade, através de estratégias de conscientização, para que esta auxilie esse modelo econômico, atinja também as grandes empresas geradoras de riqueza, que elas se adéquem com tecnologias limpas que não desperdiçam os recursos naturais e ainda diminuam exploração de matéria-prima, e por fim, produzir políticas públicas com o intuito de que as futuras gerações possam utilizar o meio ambiente equilibrado e conservado.

POLÍTICAS E AÇÕES PÚBLICAS NAS ÁREAS URBANAS

No quadro abaixo, apresentado por BEZERRA, M. ; SANTOS, F (2004), ela apresenta de maneira bem sintética que no processo produtivo em que vivemos, devolve ao meio ambiente o que já foi retirado antes como matéria-prima e devolvendo como dejetos, assim, utilizar de maneira regular a matéria e a energia produzidas pela natureza, é essencial para a continuidade da economia e para a promoção do desenvolvimento sustentável, ou seja, continuar promovendo a geração de economia só que agora de maneira equilibrada.

QUADRO 1: Balanço de Matéria e Energia

Fonte: LEAL, 1986 (apud BEZERRA, M. ; SANTOS, F., 2004, p.5)

Assim, utilizando-se de políticas e ações públicas que visem o desenvolvimento sustentável de tecnologias limpas que ajudem a atuar a favor do desenvolvimento de maneira ecologicamente correta e com base aos princípios que tiveram como base na criação das cidades europeias sustentáveis, como:

1. Princípio de Gestão Urbana: A gestão urbana para a sustentabilidade é um processo político e administrativo com vista à formulação de políticas urbanas sustentáveis.
2. Princípio de Integração Política: É preciso que as ações aconteçam por meio de sinergia dos governos nacionais, regionais, locais e entidades supranacionais.
3. Princípio de Reflexão Eossistêmica: A cidade é um sistema complexo caracterizado pelos processos contínuos de transformação e desenvolvimento. O consumo de energia, dos recursos naturais, a produção de resíduos, regulamentação do tráfego e transportes, são elementos de reflexão ecossistêmica.
4. Princípio de cooperação e parcerias: A sustentabilidade é uma responsabilidade partilhada, por isso a cooperação e parcerias em diferentes níveis de organizações e interesses é essencial para o desenvolvimento urbano sustentável.

Pode-se afirmar que para as cidades brasileiras, seria um desafio em torná-las sustentáveis, exigindo para isso a integração do Governo na idealização de Políticas Públicas Sustentáveis desde locais e

regionais até a nível federal para uma excelência em efetivação de tais ações, além do apoio das grandes empresas que são as grandes geradoras da economia do país e responsáveis pela alta escala em degradação ambiental, é preciso que elas queiram atuar junto nesse modelo de sustentabilidade, tendo que transformar toda a sua composição no que se diz respeito à produção, e por fim o apoio da sociedade, a grande consumidora dos produtos e serviços causadores de danos ambientais, que a sociedade atue junto no sentido de querer um novo padrão de consumo. Vitte (2010, p.82) diz que, construir e morar em cidades implica viver de forma coletiva; na cidade nunca se está só, ainda que muitos sejam solitários: o indivíduo é um fragmento de um conjunto, do coletivo.

Então, morar em centros urbanos significa viver em conjunto com a sociedade, com poluições, engarrafamentos, violência, desemprego, ou seja, poluição dos solos, águas e ar causada principalmente pelo lançamento de efluentes indústrias e domésticos sem um devido tratamento, lançamento de gases tóxicos na atmosfera devido ao intenso fluxo de automóveis e pela grande concentração de indústrias. Outros problemas ambientais decorrentes da urbanização são: impermeabilização do solo, poluição visual, poluição sonora, alterações climáticas, efeito de estufa, chuva ácida, ausência de saneamento ambiental, destinação e tratamento dos resíduos sólidos, entre outros.

4.CONCLUSÃO

Não se faz desenvolvimento sustentável apenas com discursos, reuniões e discussões tratando do assunto, se faz desenvolvimento sustentável através de ações públicas que priorizem o conceito de preservação ambiental aliado a responsabilidades sociais e que gerem lucros, dessa forma, que se pretende com este artigo é proporcionar a ideia de que é possível aliar a geração de riquezas ao mesmo tempo em que se consegue estabelecer um equilíbrio entre a sociedade e meio ambiente, transformando o modelo econômico consumista e de produtos obsoletos em um modelo que satisfaça as demandas atuais. Com isso a integração do governo, grandes empresas e a sociedade se faz necessário nessa luta pela manutenção da vida no planeta.

A estrutura econômica não se muda da noite para o dia, é preciso que ocorra o desejo de se fazer economia que provoquem crescimentos na economia gerando, desta forma, crescimento com qualidade de vida. Assim, investimentos em tecnologias limpas de baixo custo que possa ser utilizado por todas as classes sociais, norteiam o desenvolvimento econômico sustentável, pois introduz relação de responsabilidade social.

Finalmente pode-se afirmar que cabe ao governo, por meio de políticas públicas, estabelecer as estratégias nacionais de inserção da economia regional nos novos Modelos Econômicos Sustentáveis. Para tanto, é necessário inserir tecnologia aos processos produtivos existentes incluindo todos os segmentos sociais. Assim, projetos devem ser desenvolvidos para que isso ocorra, as cidades terão que se adequar as demandas da situação atual do Brasil, a começar pelas desigualdades urbanas, áreas que sofrem por desastres ambientais, como morros e barreiras, áreas de fácil alagamento por chuvas, e que apresentam riscos a vida humana.

REFERÊNCIAS

Arruda, D.; Espíndola, M. Desenvolvimento sustentável no modo de produção capitalista. Revista Visões 4ª Edição, Nº4, Volume 1 - Jan/Jun 2008.

BEZERRA, M. ; SANTOS, F. Tecnologia limpa em favor do desenvolvimento sustentável. Crato-CE, 2004.

BRASIL. Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio +20). <http://www.rio20.gov.br/sobre_a_rio_mais_20/desenvolvimento-sustentavel> Acessado em: 23 Agosto 2012.

BROWN, L. Os últimos 65 milhões de Salvador, 2001; entrevista publicada pelo Worldwatch/UMA Universidade da Mata Atlântica. Disponível no site:

<http://www.wwiuma.org.br/entr_lesterbrown.html> Acessado em: 15 Julho 2012.

SACHS, I. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: Garamond, 2002.

VITTE, C. Cidadania, qualidade de vida e produção do espaço urbano: desafios para a gestão urbana e para o enfrentamento da questão social BAENINGER, R. (Org.) População e Cidades: subsídios para o planejamento e para as políticas sociais- Campinas: Núcleo de Estudos de População-Nepo/Unicamp; Brasília: UNFPA, 2010, 304p.

Capítulo 6

10.37423/210403891

O USO DA PLANTA SPONDIAS MOMBIN L. COMO UMA TECNOLOGIA ALTERNATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO DA CAPRINOCULTURA.

Anna Jacinta Dantas de Medeiros

Instituto Federal do Rio Grande do Norte

Francisco Marlon Carneiro Feijó

Universidade Federal Rural do Semi-Árido

Genevile Carife Bergamo

Universidade Federal Rural do Semi-Árido

Gardenia Silvana de Oliveira Rodrigues

Universidade Federal Rural do Semi-Árido

Nilza Dutra Alves

Universidade Federal Rural do Semi-Árido

jonas dos santos silva

Universidade Federal Rural do Semi-Árido

Leon Denner Moreira Benicio

Universidade Federal Rural do Semi-Árido

Caio Sergio Santos

Universidade Federal Rural do Semi-Árido

Jaecio Carlos Diniz

Universidade Estadual do Rio Grande do Norte

JAMILE RODRIGUES COSME DE HOLANDA

*FACULDADE DE ENFERMAGEM E
MEDICINA NOVA ESPERANÇA*

Resumo: Esse trabalho teve como objetivo pesquisar a ação antisséptica dos extratos das folhas de *Spondias purpurea* L. (siriguela), *Spondias mombin* L. (cajá) e *Azadirachta indica* A. (nim) sobre cepas bacterianas isoladas de caprinos, como também avaliar os critérios de aceitabilidade do uso de extratos vegetais. A metodologia consistiu na aplicação de questionários aos assentados. Também foram realizadas avaliações laboratoriais “in vitro” e “in vivo” do potencial antimicrobiano das plantas. Para preparar os extratos vegetais hidroalcoólicos a 1%, 2% e 3% de p/v coletou-se folhas de siriguela, cajá e nim. Em seguida, realizou-se o teste de sensibilidade aos extratos por difusão em ágar baseados na metodologia do Teste de Sensibilidade a Antimicrobianos por Disco-difusão. O extrato que apresentou melhor ação foi utilizado na avaliação “in vivo” que consistiu na aplicação em grupos formados por 3 animais, de extrato de cajá a 3%, iodo a 2% e água durante 28 dias consecutivos, com coletas de leite e swabs das tetas direita e esquerda nos dias 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24 e 28. Observou-se que as maiores dificuldades para aceitabilidade do produto são as práticas de manejo ineficientes e o risco de toxicidade do produto. Entre os aspectos benéficos está o fácil acesso dos assentados ao produto, a possível redução de resíduos no leite, a diminuição de custos e o controle dos patógenos. Sobre a microbiota bacteriana isolada, identificou-se: *Bacillus megaterium*, *Bacillus* sp., *Corynebactérias*, *Enterobacter* sp., *Cellulomonas* sp., *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus* sp. e *Staphylococcus coagulase* negativa. Dentre os extratos, apenas o cajá apresentou atividade, tendo melhor ação sobre a *S. coagulase* negativa (15, 18 e 20 mm) e *Streptococcus* sp. (18, 19 e 20 mm) respectivamente a 1%, 2% e 3% ($p < 0.05$). Quanto a avaliação “in vivo”, obtiveram-se as seguintes médias, em UFC, para a contagem de mesófilas por tratamento: Cajá 3% = 2170,17, Iodo 2% = 5005,33 e Água = 31704,29. Existiu diferença significativa ($p = 0,0147$) entre os produtos testados. Não houve diferença entre os produtos ($p = 0,1280$) para a análise de coliformes totais. Os coliformes termotolerantes, foram identificados apenas nos animais que receberam água como tratamento. Conclui-se que o extrato do cajá apresentou potencial antimicrobiano, sugerindo a possível aplicação do antisséptico na prevenção e tratamento de infecções relacionadas a caprinocultura.

Palavras-chave: Caprinocultura, Aceitabilidade de tecnologia, Antissépticos, *Spondias purpurea* L., *Spondias mombin* L., *Azadirachta indica* A.

1 INTRODUÇÃO

A criação de caprinos na região Semiárida brasileira é caracterizada por práticas de manejo inadequadas, o que interfere de sobremaneira na produtividade do rebanho, ocasionando sérios prejuízos aos produtores, chegando a inviabilizar essa atividade pecuária (ALENCAR et al., 2010). Paralelamente, insere-se que essa atividade além da notória importância social e econômica para a região, tem aumentado sua participação no cenário agropecuário brasileiro de forma bastante significativa nos últimos tempos, observando-se maior exigência do mercado consumidor por produtos de qualidade.

Visto a abrangência da caprinocultura e partindo da problemática apresentada, é necessária a inserção de novas tecnologias de convivência com o Semiárido, ou seja, produtos, técnicas ou metodologias replicáveis, desenvolvida na interação com a comunidade e que representem efetivas soluções de transformação social, técnicas que busquem e valorizem alternativas sustentáveis para o desenvolvimento do Semiárido, enfatizando os aspectos da inclusão social, da valorização da cultura e da identidade sertaneja; bem como a preservação dos recursos naturais, tendo uma atitude propositiva de alternativas de desenvolvimento regional, condizente com a visão complexa da realidade e que expresse a preocupação com a tal realidade sociocultural e ambiental do Semiárido (SILVA, 2006).

Nessa óptica, uma das fontes de pesquisa de tecnologias alternativas encontra-se nas plantas do Semiárido. A história nos mostra que ao longo dos anos, as plantas foram os primeiros recursos terapêuticos utilizados, sendo, em muitos momentos única forma de prevenção, tratamento e cura para a humanidade. De acordo com Agra et al. (2007), a influência das culturas indígenas, européias e africanas sobre os usos das plantas utilizadas na medicina popular pode ser reconhecida na origem tupi dos nomes populares das plantas cujos usos também estão associados a rituais místicos e religiosos.

Paralelamente a cultura popular, de acordo com Albuquerque e Andrade (2002), as plantas estão sendo pesquisadas no intuito de avaliar suas atividades farmacológicas, para a obtenção de novas substâncias antimicrobianas, devido ao surgimento de cepas resistentes aos diversos tipos de drogas.

Para Pereira (2007) a resistência antimicrobiana, juntamente com as limitações como custos e a demanda por tecnologias adequadas ao sistema de produção agroecológico, motivam o desenvolvimento de pesquisa buscando novos princípios ativos.

Além disso, Vieira (1991) e Costa e Vieira (1984) ressaltam que o uso de extratos de plantas diminuem os custos com a produção leiteira, além de destacar que os medicamentos convencionais tem a capacidade de permanecer por um período prolongado no organismo animal. Isso ocasiona um maior período para a sua eliminação, contribuindo para uma presença de seus resíduos no leite e derivados que se destinam ao consumo humano, causando sérios danos ao meio ambiente e saúde pública.

Diante das demandas para o desenvolvimento de novas tecnologias, o incentivo ao uso de extratos de plantas do semiárido torna-se uma ação benéfica ao sertanejo que sobrevive da caatinga, visto que as alternativas convencionais, muitas vezes são impróprias às condições socioambientais. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial tecnológico e social do uso de plantas do Semiárido como antisséptico para caprinocultura.

2 MATERIAL E MÉTODOS

O local de estudo foi o Assentamento Independência localiza-se às margens da BR 405 entre os municípios de Mossoró e Apodi. Está disposto geograficamente na longitude 37°26'14" e 05°12'37", distando 13 km do município de Mossoró. As folhas das plantas *Spondias purpurea* L., *Spondias mombin* L. e *Azadirachta indica* A. foram coletadas às 05 horas da manhã no Centro Zoobotânico do Campus Central da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), no município de Mossoró, Rio Grande do Norte. Acondicionou-as em sacos de cor preta para serem levadas ao Laboratório de Microbiologia Veterinária (LAMIV) na UFERSA para o processo de secagem e o processamento dos extratos.

AMOSTRAS BACTERIANAS

As cepas bacterianas, isoladas dos tetos direito e esquerdo das cabras, foram coletadas com o auxílio de suabes estéreis. Tal procedimento ocorreu através da fricção dos suabes sobre a superfície dos referidos tetos. Nas amostras de leite, desprezou-se o primeiro jato de leite. Ordenhou-se as tetas ejetando 10 mL do segundo jato em um tubo de ensaio estéril, previamente identificado. Os tubos foram armazenados em uma caixa térmica refrigerada até o processamento.

Com relação as amostras de água, foram coletados 100 mL da água utilizada na alimentação dos animais, em um balão de fundo chato vedado de forma asséptica para inibição de contaminação, cado em uma caixa térmica e encaminhado para análise.

Foram coletadas amostras da superfície dos recipientes de armazenamento de água através de suabes estéreis (figura1)

Figura 1: (a) Coleta de bactérias dos tetos das cabras, (b) Coleta da amostra de leite.

Amostras da superfície das mãos, um suaber foi utilizado para coletar debris da região palmar das mãos do ordenhador. Este suabe foi rotacionado da região superior para a região inferior da palma da mão.

Todos os materiais coletados foram acondicionados em caixa isotérmica e encaminhados ao Laboratório de Microbiologia Veterinária (UFERSA) para processamento das amostras.

PREPARO DOS EXTRATOS

A preparação dos extratos foi realizada no Laboratório de Cromatografia da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte – UERN. As amostras vegetais foram levadas a estufa para secagem a uma temperatura de 60 °C por 72 horas. Quando secas, as folhas passaram pelo processo de trituração em liquidificador industrial e posteriormente foram pesadas em balança semi-analítica séria UX-620H, capacidade 620g e precisão 0,001g. Após pesadas, cada uma das amostras foi acondicionadas em frasco de vidro de 5 litros cor âmbar. Foi preparado um solvente hidroalcoólico à 70 %, suficiente para cobrir a amostra vegetal, e o mesmo foi adicionado em cada um dos frascos por um período de 72 horas. Cada planta foi processada por sessões com três extrações. As extrações iniciaram com uma filtração à vácuo, seguida por uma filtração simples e por último o extrato foi colocado no Rotaevaporador de Marca Fisatom, Modelo 802, rotação média de 90 rpm, com o banho-maria a uma temperatura de 60 +/- 5 °C, para a eliminação do álcool. A parte líquida restante foi evaporada em banho-maria, em uma temperatura média de 45 °C. O extrato resultante foi estocado em recipientes adequados e em ambiente refrigerado com uma temperatura compreendida entre 0 a 8 °C, até seu uso (Figura 9).

Figura 2: (a) Concentração do extrato no rotaevaporador e (b) Extrato concentrado.

Posteriormente os extratos foram produzidos nas seguintes concentrações: 1%, 2% e 3% de p/v. utilizando-se como referência MacFaddin (2000) para os cálculos de elaboração dos extratos nas concentrações em porcentagem de peso/volume ou grama/100mL

A fórmula utilizada: gramas de soluto= $\%(p/v) \times \text{volume}/100\text{mL}$, onde:

Gramas de soluto = peso do extrato seco, $\%(p/v)$ = valor da concentração pré-estabelecida *volume* = quantidade em mL do solvente necessária para dissolver o soluto a determinada concentração.

PROCESSAMENTO DAS AMOSTRAS

Foi adicionado 1 mL da amostra de leite em eppendorf identificado. Em seguida, os “eppendorfs” foram levados ao processo de centrifugação por um tempo de 5 minutos a uma rotação 14.000 rpm. O material precipitado foi retirado com o auxílio da alça de platina e semeado no meio ágar sangue e ágar MacConkey. As bactérias que cresceram em um meios de culturas citados a 37 °C foram semeadas no caldo BHI para crescimento bacteriano e posterior visualização das formas bacterianas e provas fisiológicas.

Na contagem de contagem coliformes totais e coliformes termotolerantes, nas amostras da água, foi utilizada a metodologia de tubos seriados. Foram realizados os teste presuntivo, onde inicialmente 1 mL da amostra de água foi depositada em tubos de 10 mL de água estéril. Posteriormente, a partir dessa solução, foram produzidas diluições 10^{-1} , 10^{-2} e 10^{-3} . 1mL de cada diluição foi pipetado e semeado em uma série de três tubos de 9ml do Caldo Lauril Sulfato de Sódio (LSS) contendo tubo de Durham invertido, homogeneizando e incubando os tubos de ensaio em banho-maria a 37 °C durante 48 horas. Os tubos com Caldo Lauril Sulfato de Sódio (LSS) com produção de gás nos tubos de fermentação (tubo de Durham) eram considerados como positivos.

No teste confirmativo para coliformes totais, dos tubos de LSS com produção de gás 1 mL foi transferido para tubos com 9mL de Caldo Verde Brilhante (VB) e incubou-se a 37 °C por 24 a 48 horas e observou-se a produção de gás, os quais eram considerados positivos.

Para verificar a presença de coliformes termotolerantes, foi transferido 1 mL dos tubos positivos do caldo Verde Brilhante para tubos contendo 9 mL de caldo *Escherichia coli* (EC) e incubados a 44,5 °C por 24 a 48 horas, sendo observado a produção de gás em tubos de Durham, os quais eram considerados positivos. Foi anotado o número de tubos de EC com gás e determinado o Número Mais Provável (NMP) em uma tabela adequada às diluições utilizadas.

Amostras positivas no EC (*Escherichia coli*) foram semeadas em Caldo Triptona e incubadas a 45 °C por 24 a 48 horas. Nesses tubos foi adicionado o reativo de reagente de Kovacs. A formação de um anel vermelho foi a indicação de um resultado positivo para a quantificação de *Escherichia coli*. Para a leitura do número de coliformes totais, coliformes termotolerantes e *Escherichia coli* foi utilizada uma tabela referenciada de acordo com o número de tubos positivos em cada diluição.

CONTAGEM DE BACTÉRIAS

As amostras dos suabes das mãos, das tetas e dos recipientes de armazenamento de água inicialmente foram lavados em 2 ml de água estéril. Em seguida 1mL dessa solução foi transferida para um tubo de ensaio com 10 mL. Posteriormente, foram feitas as diluições 10^{-1} , 10^{-2} , 10^{-3} , 10^{-4} e 10^{-5} . De cada uma das diluições foi retirado 1 ml que foram distribuídos em placas de ágar Mueller Hinton, cada uma das placas foi identificada com o valor da diluição correspondente. As placas foram colocadas em estufa a 37 °C por 24 horas para a contagem de bactérias. Foram contadas as colônias com limite entre 30 – 300 de acordo com a metodologia da instrução normativa IN 62.

IDENTIFICAÇÃO DE BACTÉRIAS

As bactérias de origem das amostras de leite, água, mãos de ordenhadores e recipientes de água foram identificadas através da citologia e provas bioquímicas.

As amostras com crescimento bacteriano no caldo BHI foram submetidas à coloração de Gram. Uma alíquota da suspensão da referida amostra foi depositada sobre uma lamina, fixado sobre a chama do bico de Bunsen e submetida a seguinte sequência: cristal violeta – um minuto; lugol – um minuto; álcool – um minuto; safranina – 30 segundos.

Após identificadas as características morfo-tintoriais das amostras, as bactérias foram divididas em quatro grupos principais: cocos Gram positivos, bacilos Gram positivos em cadeia, bacilos Gram positivos pleomórficos e bacilos Gram negativos. Todas as bactérias foram submetidas a provas bioquímicas para identificação de acordo com MacFaddin (2000). Para os cocos Gram positivos realizaram-se as seguintes provas: catalase, coagulase, oxidase, fermentação de açúcar (glicose), produção de urease, NaCl 5% e motilidade.

Para os bacilos Gram positivos em cadeia foram realizadas, catalase, fermentação de açúcar (glicose), produção de urease, motilidade, fermentação do manitol. Para os bacilos Gram positivos pleomórficos foram realizadas as mesmas provas feitas para os bacilos Gram positivos em cadeia, substituindo-se a prova da fermentação do manitol pela hidrólise da esculina.

E para os bacilos Gram negativos realizaram-se, além das provas da catalase, da fermentação da glicose, da oxidase, produção de urease e motilidade, as provas de citrato, descarboxilação de aminoácido (lisina), desaminação da fenilalanina, hidrólise da gelatina e produção de H₂S (meio SIM).

DETERMINAÇÃO “IN VITRO” DA MELHOR CONCENTRAÇÃO DOS EXTRATOS

A metodologia do teste de sensibilidade aos extratos por difusão em ágar foi baseada na metodologia do Teste de Sensibilidade a Antimicrobianos por Disco-difusão descrito pelo NCCLS (2003), adaptado de acordo com Carvalho et al. (2010).

DETERMINAÇÃO “IN VIVO”

Foi utilizado o extrato com melhor resultado testado “*in vitro*” quanto a concentração de acordo com o tamanho do halo produzido.

Na obtenção e contagem das bactérias antes da aplicação dos extratos, foram selecionados 09 animais de forma aleatória e de cada um deles foram colhidas amostras da superfície do teto através de suabe estéril e leite do teto direito e teto esquerdo e enviadas em caixas isotérmicas, em ambiente refrigerado, ao laboratório de Microbiologia Veterinária para a contagem. Esse procedimento foi feito antes da aplicação dos extratos e a determinação do número de bactérias foi feita através de contagem em placa.

Seguindo o princípio da causalidade, foi feito um sorteio entre 09 cabras leiteiras em estado hígido, para decidir qual o “tratamento” que cada uma receberia como avaliação. Em cada 3 animais, respectivamente, aplicou-se extrato de cajá (*Spondias mombin* L.) a 3%, iodo a 2% e água destilada

estéril durante 28 dias consecutivos. Os extratos foram aplicados em ambas as tetas, após a ordenha, com a imersão das tetas em canecas apropriadas a execução do pós-dipping.

Figura 3: Canecas utilizadas para a imersão das tetas em (I) água, (II) cajá e (III) iodo.

Antes de cada ordenha, nos dias 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24 e 28 , foram colhidas amostras bacterianas da superfície do teto e leite do teto direito e teto esquerdo das cabras e enviadas ao Lamiv, em caixa isotérmica sob refrigeração, para a contagem das bactérias mesófilas pelo método do numero mais provável para a quantificação das bactérias sobre os tetos e contagem de coliformes totais e termotolerantes através da técnica do número mais provável.

ANÁLISE FITOQUÍMICA

A prospecção fitoquímica foi realizada no Laboratório de Cromatografia da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte – UERN. Para a identificação dos constituintes foi utilizado o extrato hidroalcoólico de cajá (*Spondias mombin* L.) e seguida a metodologia proposta por Matos (1997).

INTERAÇÃO COM OS PROPRIETÁRIOS E AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES HIGIÊNICAS SANITÁRIAS E SOCIOAMBIENTAL

Foram convidados a realizar a entrevista 30 proprietários de lotes da comunidade Independência, com idade igual ou superior a 18 anos, do sexo feminino ou masculino. Esse número representa o total de proprietários do assentamento. Os questionários foram aplicados durante as visitas às casas dos proprietários em lugar reservado da referida residência com condições ambientais adequadas, as quais fossem satisfatoriamente confortáveis, assegurando a privacidade dos indivíduos entrevistado, como forma de conhecimento sobre as condições higiênicas sanitários dos tetos das cabras de aptidão

leiteira, como também as características socioambientais e a aceitabilidade de uso de antissépticos naturais para a ordenha de cabras.

Não foram feitas entrevista com os proprietários que não concordaram com a pesquisa, que mesmo concordando não assinaram o “Termo de Consentimento Livre e Esclarecimento” (TCLE) e, menores de 18 anos, portadores de deficiência mental ou que tivessem alguma relação de dependência.

ANÁLISE ESTATÍSTICA

A análise dos questionários junto aos moradores do assentamento em estudo foi submetida a o teste de Teste exato de Fisher e o ao Teste t-Student.

Os tratamentos “in vitro” foram submetidos à análise estatística ao nível de 5% utilizando-se o Teste do Qui-quadrado. Para a análise dos testes “in vivo”, os dados analisados resultaram da média aritmética de 7 coleta realizadas em duas tetas durante 28 dias. Foi utilizado um delineamento inteiramente ao acaso com três repetições (animais) e para comparação de médias o teste de Student Newman Keuls (SNK) pelo emprego do programa R (R Development Core Team (2012)).

SUBMISSÃO AO COMITÊ DE ÉTICA

O presente trabalho foi submetido ao Comitê de Ética no Uso de Animais da UFERSA (CEUA-UFERSA) na data de 08 de junho de 2011, sendo aprovado em 22 de novembro de 2011 sob o Parecer Nº 40/2011/ Processo Nº 23091.002285/2011-16. Também foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UERN em 19 de maio de 2012, sendo aprovado em 06 de novembro de 2012 sob o Parecer 146.259.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

ASPECTOS DA ACEITABILIDADE DA NOVA TECNOLOGIA DE ANTISSEPSE

A partir da realização de entrevistas, buscou-se as condições de aceitabilidade da comunidade do Assentamento Independência quanto ao uso de antissépticos naturais nas práticas de manejos e de ordenha de cabras. Quanto à forma de renda, 47,00 % da comunidade têm na agricultura o seu modo de sustento, 20,00 % trabalham com a criação de caprinos e bovinos, 13,00 % são aposentados e os outros 20,00 % dividem-se entre as mais variadas atividades, como pedreiro, padeiro, professor, corte de lenha e como empregadas domésticas.

Observou-se que a pecuária caprina no Assentamento Independência vem enfrentando inúmeros problemas que repercutem negativamente na situação socioeconômica dos assentados. Quando

questionados, os produtores enumeraram os seguintes entraves para o desenvolvimento dessa atividade: a falta de crédito, problemas climáticos, a falta de assistência técnica e problemas sanitários. Mesmo com dificuldades na organização, produtores e os demais assentados se estruturaram em associações no intuito de se fortalecerem e buscar apoio ao crédito, adesão a políticas públicas e demais benefícios a comunidade.

Quanto ao consumo de leite no assentamento, que é de 1,8 litros por lote/dia, 6,67 % afirmam usar como alimentação apenas leite de cabra, 86,67 % o leite de vaca e 6,67 % utilizam os dois tipos. O que demonstra o baixo consumo de leite de cabra pelos assentados. Os principais consumidores são os próprios produtores.

Dos 400 entrevistados, 68,8% afirmam nunca ter consumido leite caprino, 4,5% se classificaram como assíduos consumidores e o percentual restante como consumidores esporádicos. Esses mesmos autores indicaram a questão cultural, o odor, o sabor e *Marketing* como fatores essenciais na decisão de consumir ou não o leite caprino.

Em relação aos problemas oriundos de práticas sanitárias inadequadas, percebeu-se em verificação “in loco” que aspectos como lavagem das mãos e dos utensílios, higienização frequente das instalações e cuidados sanitários na ordenha não são práticas habituais no manejo de grande parte das propriedades. O manejo sanitário inadequado e a deficiência de técnicas de prevenção à patologias propiciam o surgimento de enfermidades que aumentam o custo da produção, uma vez que se torna necessário o uso de antimicrobianos (CORASSIN e OLIVEIRA, 2000).

Em todas as propriedades a ordenha era realizada manualmente. Apenas 25% das propriedades apresentavam sala e plataforma de ordenha e, somente estas propriedades realizavam a prática de pós-dipping após a ordenha. Ainda nessa óptica, observa-se que a água utilizada no consumo dos animais era acondicionada, na grande maioria, em condições inapropriadas. Tem-se que 62,5% armazenava água em baldes, o restante (37,5%) utilizava-se de mangueiras, fator que dificulta a circulação da água e facilita a contaminação.

Referente à utilização de vestimenta de segurança e higienização, em 75% das propriedades não havia uso de vestimentas como botas, luvas e fardamento; os 25% restantes utilizavam-se somente de botas (Figura 4).

Figura 4: Ordenha do leite caprino no Assentamento Independência sem a utilização de luvas.

No tocante ao nível de instrução, os assentados foram divididos em seis grupos de escolaridade: analfabeto (20,00 %), fundamental incompleto (40,00 %), fundamental completo (3,33 %), médio incompleto (10,00 %), médio completo (23,33 %) e nível superior (3,33 %).

Em relação ao conhecimento dos assentados sobre as formas de higienização e conservação do leite, 73,33% dos entrevistados disseram saber como é feita a higienização, outros 26,67% não souberam. Todos os indivíduos que disseram ter conhecimento, citaram a fervura e o resfriamento como opção de higienização e conservação do leite. Ao cruzar os dados de grau de escolaridade com o conhecimento sobre o processo de higienização não foi encontrada associação ($p = 0,6339$) (Tabela 1), mostrando não haver relação entre o nível de escolaridade e o conhecimento sobre o processo de higienização do leite. Observa-se ainda na tabela, a predominância do baixo nível educacional dos assentados. Educação essa que é um importante papel no desenvolvimento econômico e social.

Tabela 1: Relação entre a escolaridade e o conhecimento dos assentados sobre o processo de higienização do leite.

Higienização do leite (conhecimento)	Escolaridade						Total
	ANF	EFI	EFC	EMI	EMC	ES	
Não	2	0	5	0	1	0	8
Sim	4	1	7	3	6	1	22
Total	6	1	12	3	7	1	30

Teste exato de Fisher ($p < 0,05$) ($p = 0,6339$)

ANF – Analfabeto EFI – Ensino Fundamental Incompleto EFC – Ensino Fundamental Completo EMI – Ensino Médio Incompleto EMC – Ensino Médio Completo ES – Nível Superior

Sobre a técnica de antissepsia dos tetos das cabras, essa é feita com água em 75% das propriedades e as outras 25% realizam-na com alguma outra substância, como hipoclorito de sódio diluído ou iodo. O iodo é adquirido pelos proprietários de duas maneiras: através da distribuição pelas cooperativas e principalmente pela compra, gerando gastos a produção.

O uso do antisséptico natural, ou de extratos naturais, é uma tecnologia alternativa que vem sendo estudada para fins de apropriação pelo produtor leiteiro do Semiárido no intuito de prevenir e tratar enfermidades. Além disso, essa apropriação busca diminuir ou substituir o uso de iodo e antimicrobianos em animais e dessa forma contribuir para o aproveitamento de recursos naturais de forma sustentável, a diminuição de contaminação do leite e de custos.

A busca por essas tecnologias é evidenciada nas palavras de Moraes et al. (2009) que relata que cada vez mais é preciso incrementar tecnologias próprias às condições ecológicas do Semiárido. Os mesmos autores ainda citam que há necessidade dessas tecnologias serem específicas ao lugar, geradas na própria região e/ou adaptadas através de pesquisas quando há a importação de outras localidades.

Nesse sentido, os assentados foram questionados sobre o conhecimento do uso de extratos de plantas na assepsia caprinos de aptidão leiteira, sendo que 30% dos entrevistados disseram saber sobre extratos que são usados como antissépticos em animais e 70% disseram não ter conhecimento. Entre os extratos citados e aprovados pelos assentados, estavam os derivados de nim, babosa e ameixa. Sendo o nim utilizado por eles principalmente como carrapaticida e a babosa e a ameixa como anti-inflamatórios.

Buscou-se avaliar se o tempo de moradia indivíduos no assentamento Independência teria influência sobre o conhecimento do uso de extratos na caprinocultura. A média de permanência no Assentamento Independência é de 12,1 anos, sendo o número de indivíduos por lote de 4,5 pessoas. Em relação à idade, a média é de 48,27 anos. De acordo com a Tabela 2, os maiores percentuais de faixas de idade encontram-se de 30 a 39 anos (20,00 %) e dos 50 a 59 anos (26,67 %).

Tabela 2: Número de indivíduos e porcentagem da faixa etária dos assentados entrevistados.

Faixa etária	Número de pessoas	%
20 a 29	4	13,33
30 a 39	6	20,00
40 a 49	5	16,67
50 a 59	8	26,67
60 a 69	4	13,33
70 a 79	3	10,00
	30	100,00

Não houve diferença estatística ($p = 0,3317$) quanto a correlação entre o tempo de moradia e conhecimento de extratos (Figura 5). Também não houve associação no cruzamento dos dados do nível de escolaridade e o conhecimento de extrato pelo assentado ($p = 0,1042$) (Tabela 3). Esses dados evidenciam a falta de conhecimento dos assentados sobre o uso dos recursos naturais no manejo da caprinocultura tanto quanto ao aspecto do tempo de permanência no assentamento e escolaridade. Figura 5: Relação entre o tempo de moradia e o conhecimento do uso de extratos em animais pelos assentados.

Teste t-Student ($p < 0,05$ %) ($p = 0,3317$).

Tabela 3: Relação entre a escolaridade e o conhecimento dos assentados sobre o conhecimento de extratos para uso animal.

Extrato (Conhecimento)	Escolaridade						Total
	ANF	EFI	EFC	EMI	EMC	ES	
Não	6	0	6	3	5	1	21
Sim	0	1	6	0	2	0	9
Total	6	1	12	3	7	1	30

exato de Fisher ($p < 0,05$) ($p = 0,1042$)

ANF – Analfabeto EFI – Ensino Fundamental Incompleto EFC – Ensino Fundamental Completo
EMI – Ensino Médio Incompleto EMC – Ensino Médio Completo ES – Ensino Superior

Ainda quando consultados sobre o uso de extratos, os entrevistados desconheciam algum antisséptico de origem vegetal que tenha ocasionado problemas em caprinos. Entretanto, a adoção do uso de qualquer planta exige a realização de testes de toxicidade que comprovem a segurança ao animal (CARNEIRO et al., 2012).

Dos assentados sabedores do uso de extratos, 45% disseram acreditar que a ação deste extrato é melhor que a do iodo por ser um produto natural e não industrializado, afirmando que utilizariam extratos vegetais na assepsia dos animais. Outros 22 % disseram não acreditar na eficácia e 33 % não soube opinar. Esses dados refletem que parte dos assentados buscariam nos recursos naturais o tratamento e a prevenção de enfermidades.

Quanto ao custo do uso de antissépticos, 43,33% afirmaram que a utilização do iodo apresenta maior custo que o do extrato vegetal. Outros 6,67% afirmam que o extrato apresenta maior custo e os 50,00% restantes não souberam opinar. Provavelmente, esse número se dê devido a obtenção das plantas ser, na grande maioria, de fácil acesso e a técnica de produção dos extratos simplificada, muitas vezes necessitando apenas da parte vegetal (folha, raiz, fruto ou caule), água e/ou álcool. Além de que alguns extratos são produzidos no momento do uso, não necessitando de conservação.

Diante dessas discussões, observa-se que as dificuldades encontradas para a aceitabilidade dessa tecnologia é a dificuldade de acesso às informações, as práticas de manejo ineficientes e a necessidade de mudanças de hábitos; a adequação e apropriação da técnica de produção do extrato ao cotidiano da comunidade e o risco de toxicidade do produto, o qual exige maior detalhamento.

Entre os aspectos benéficos está o fácil acesso dos assentados ao produto, a possibilidade de redução de resíduos antimicrobianos e de iodo no leite devido ao uso dos recursos naturais, a melhoria da produtividade, a diminuição de custos e o controle dos agentes causadores de doenças em detrimento das mudanças de hábito.

DESCRIÇÃO MICROBIOLÓGICA

Foram isoladas 82 bactérias das amostras de suabes dos tetos e amostras de leite caprino, utensílios e das mãos dos ordenhadores, sendo identificados os seguintes micro-organismos: *Bacillus megaterium*, *Bacillus* sp., bactérias do grupo das corineformes, *Cellulomonas* sp., *Corynebacterium* sp., *Enterobacter* sp., *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus* coagulase negativa e *Streptococcus* sp. (Tabela 4). Sendo o *Staphylococcus* coagulase negativa encontrado em maior frequência, 39 (47,56%) das cepas, seguido de *Cellulomonas* sp. (16/19,51%), *Bacillus* sp. (10/12,20%), *Staphylococcus aureus* (8/9,76%), *Streptococcus* sp. (2/2,44%), *Enterobacter* sp. (2/2,44%), *Corynebacterium* sp. (2/2,44%), Corineformes (2/2,44%) e *Bacillus megaterium* (1/1,22%).

Tabela 4: Determinação do número e porcentagem de bactérias isoladas no Assentamento Independência em Mossoró-RN.

BACTÉRIAS	QUANTIDADE	%
<i>Staphylococcus coagulase negativa</i>	39	47,56
<i>Cellulomonas</i> sp.	16	19,51
<i>Bacillus</i> sp.	10	12,20
<i>Staphylococcus aureus</i>	8	9,76
<i>Streptococcus</i> sp.	2	2,44
<i>Enterobacter</i> sp.	2	2,44
<i>Corynebacterium</i> sp.	2	2,44
Corineformes	2	2,44
<i>Bacillus megaterium</i>	1	1,22
TOTAL	82	100

Esses dados são justificados pelos resultados de Correa et al. (2010) que isolou 37 (27,2%) amostras de *Staphylococcus coagulase negativo*, o principal agente da mastite subclínica, afecção com ocorrência tanto no Brasil, como em outros países. De acordo com os mesmos autores, os patógenos de maior importância no desenvolvimento da mastite são os *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactia* e *Escherichia coli*.

Neves et al. (2010), em um trabalho realizado com nove rebanhos de cabras leiteiras no Semiárido paraibano identificou que das 261 amostras de leite, 30 (11,49%) apresentaram crescimento bacteriano, sendo 25 (83,33%) *Staphylococcus aureus* negativo, e em apenas 5 (16,66%) amostras foram identificados *Staphylococcus aureus*.

Quanto a origem das bactérias isoladas, 42 (51,22%) das bactérias foram provenientes dos tetos, 21 (25,61%) foram isoladas do leite, 6 (7,32%) da superfície dos bebedouros e 13 (15,85%) das mãos dos ordenadores (Tabela 5).

Em relação aos tetos, os micro-organismos identificados foram os *Staphylococcus coagulase negativa* (18/42,86%), *Staphylococcus aureus* (5/11,90%), *Bacillus* sp. (7/16,67%), *Enterobacter* sp. (1/2,38%), *Bacillus megaterium* (1/2,38%), *Corynebacterium* sp. (2/4,76%), grupo das corineformes (2/4,76%) e *Cellulomonas* sp. (6/14,29%). Esses dados são justificados pelos resultados encontrados nos estudos de Neves et al. (2010) onde estudaram sobre a etiologia da mastite caprina.

Tabela 5: Número e porcentagem de bactérias por origem isoladas em propriedades criadoras do Assentamento Independência/Mossoró-RN.

ORIGEM	BACTÉRIAS IDENTIFICADAS		TOTAL	
	TIPO	Nº	%	Nº %
TETO	<i>Staphylococcus coagulase negativa</i>	18	42,86	42 51,2
	<i>Staphylococcus aureus</i>	5	11,90	
	<i>Bacillus</i> sp.	7	16,67	
	<i>Enterobacter</i> sp.	1	2,38	
	<i>Bacillus megaterium</i>	1	2,38	
	<i>Corynebacterium</i> sp.	2	4,76	
	Grupo das corineformes	2	4,76	
	<i>Cellulomonas</i> sp.	6	14,29	
LEITE	<i>Staphylococcus coagulase negativa</i>	9	42,86	21 25,6
	<i>Staphylococcus aureus</i>	2	9,52	
	<i>Streptococcus</i> sp.	1	4,76	
	<i>Cellulomonas</i> sp.	6	28,57	
	<i>Enterobacter</i> sp.	1	4,76	
	<i>Bacillus</i> sp.	2	9,52	
BEBEDOU-RO	<i>Staphylococcus coagulase negativa</i>	4	66,67	6 15,9
	<i>Cellulomonas</i> sp.	2	33,33	
MÃO	<i>Staphylococcus coagulase negativa</i>	8	61,54	13 7,3
	<i>Staphylococcus aureus</i>	1	7,69	
	<i>Streptococcus</i> sp.	1	7,69	
	<i>Bacillus</i> sp.	1	7,69	
	<i>Cellulomonas</i> sp.	2	15,38	
TOTAL		82		82 100,0

Sobre a análise do leite, detectou-se as cepas de *Staphylococcus coagulase negativa* (9/42,86%), *Staphylococcus aureus* (2/9,52%), *Streptococcus* sp. (1/4,76%), *Cellulomonas* sp. (6/28,57%), *Enterobacter* sp. (1/4,76%) e *Bacillus* sp. (2/9,52%). Já no bebedouro dos animais isolou-se apenas o *Staphylococcus coagulase negativa* (4/66,67%) e *Cellulomonas* sp. (2/33,33%).

Nas mãos dos ordenhadores foram encontradas o *Staphylococcus coagulase negativa* (8/61,54%), *Staphylococcus aureus* (1/7,69%), *Streptococcus* sp. (1/7,69%), *Bacillus* sp. (1/7,69%) e *Cellulomonas* sp. (2/15,38%). Observa-se que o *Staphylococcus coagulase negativa* (SCN) foi encontrado nas quatro origens pesquisadas, tetos, leite, bebedouros e mãos dos ordenhadores. Enquanto que o *Staphylococcus aureus* só não estava presente nos bebedouros.

Anderson et al. (2005), citam os SCN como os principais agentes isolados na mastite e relata ainda que o *Staphylococcus aureus* é bastante comum na pele e nas mucosas de cabras e ovelhas. Em um trabalho feito por Olivindo et al. (2009), foi detectada a ocorrência de *Staphylococcus aureus* em amostras de mãos de ordenhador, tetos das cabras, leite, ordenhadeira e água em salas de ordenha de leite de cabra. Nesse estudo, as mãos do ordenhador caracterizaram-se como ponto crítico de controle, pois se destacaram como iniciador de contaminação nas amostras *Staphylococcus aureus*.

De acordo com Vittori et al. (2008), ao avaliarem a qualidade microbiológica do leite UHT caprino, identificaram em seu trabalho a ocorrência de *Bacillus* sp. nas amostras, mesmo após tratamento térmico, justificando os dados encontrados no Assentamento Independência.

Quanto ao *Bacillus megaterium*, é uma bactéria geralmente proveniente do solo, mas podendo ser encontrada em alimentos desidratados, água marinha, sedimentos, peixes, flora normal e até mesmo mel de abelha. Essa é uma bactéria gram-positiva, aeróbica, formadora de endósporos, utilizada na secreção de proteínas recombinantes (SUAREZ et al., 2012). Provavelmente, esse micro-organismo veio a habitar a superfície do teto através do contato das cabras com o solo. Esses micro-organismos também já foram isolados a partir de amostras de abelhas sadias, favo com crias e outras fontes do apiário e de moscas da espécie *Musca domestica* (PICCINI et al., 2004). Sobre o gênero *Enterobacter* sp., gênero de bactérias gram negativas, foi isolado de uma amostra da superfície do teto e de uma amostra de leite. Segundo Fonseca e Santos (2007), esses micro-organismos são do grupo dos coliformes, os quais normalmente habitam o solo e o intestino de animais de sangue quente; se acumulam e se multiplicam no esterco e na cama. Desta forma, o fato de serem isolados em uma amostra de teto está relacionado à contaminação da superfície deste teto. Os estudos de Cavalcanti (2008) sobre prevalência e etiologia da mastite em rebanhos caprinos isolaram bactérias do gênero *Enterobacter* sp. em amostras de leite, concordando com o resultado obtido nesse trabalho.

Dois micro-organismos do gênero *Corynebacterium* sp. foram isolados de amostras de teto. Uma espécie deste gênero, *Corynebacterium bovis*, é encontrado principalmente no interior da glândula mamária e ducto do teto e sua alta incidência em um rebanho indica deficiência na desinfecção dos tetos pós ordenha (SILVA, 2006). De acordo com Fonseca e Santos (2007), o gênero *Corynebacterium* é uma das causas mais freqüentes de mastite (20 a 30%), devido a sua baixa patogenicidade e alta contagiosidade detectado principalmente na forma subclínica da doença.

Neves et al. (2010) em um estudo sobre etiologia da mastite subclínica caprina no Estado da Paraíba, isolou amostras de *Corynebacterium* sp. associadas a *Staphylococcus* sp, *Streptococcus* sp. e *Micrococcus* sp. em amostras de leite coletadas em algumas propriedades.

Outras duas bactérias isoladas dos tetos foram identificadas como pertencentes ao grupo das corineformes (4,76%). Os micro-organismos do gênero *Cellulomonas* sp., que também pertencem ao grupo das corineformes, foram isolados em amostras dos tetos, leite, bebedouros e mãos. Todas as bactérias desse grupo têm em comum serem bacilos gram-positivos de morfologia irregular, crescimento aeróbico, não formadores de esporos e com ácido-álcool resistência variável (BERNARD, 2005; FUNKE e BERNARD, 2007).

Micro-organismos do gênero *Streptococcus* sp. foram isolados de uma amostra de leite e uma de mão. Concordando com os resultados obtidos neste trabalho, Neves et al. (2010) isolaram bactérias do gênero *Streptococcus* sp. a partir de amostras de leite de cabra obtidas de propriedades do Estado da Paraíba.

CONTAGEM DE MESÓFILAS NAS MÃOS DOS ORDENHADORES E BEBEDOURO DOS ANIMAIS

Na contagem de bactérias mesófilas verificou-se a qualidade das características microbiológicas das mãos dos ordenadores e também dos bebedouros de água dos animais em oito propriedades do Assentamento Independência, assim como, comparou-se os resultados das mesmas. Os resultados das contagens encontram-se na tabela 6, sendo expresso em termos de UFC/ml. O pior resultado foi atribuído à propriedade E, provavelmente devido às más condições de higiene de ordenha ou das más condições de higienização do bebedouro. Enquanto que o melhor resultado foi o encontrado na propriedade A.

Tabela 6: Contagem de mesófilas das mãos dos ordenhadores e do bebedouro de propriedades criadoras de caprinos no Assentamento Independência /Mossoró-RN, 2011.

PROPRIEDADES	ME (UFC)	MD (UFC)	BEB (UFC)
A	$6,0 \times 10^1$	$2,0 \times 10^1$	$8,0 \times 10^2$
B	$1,0 \times 10^3$	$1,0 \times 10^3$	$2,5 \times 10^4$
C	$1,0 \times 10^3$	$1,0 \times 10^3$	$1,0 \times 10^2$
D	$1,0 \times 10^3$	$1,0 \times 10^3$	$1,0 \times 10^3$
E	$1,0 \times 10^4$	$3,2 \times 10^5$	$3,9 \times 10^5$
F	$1,0 \times 10^3$	$1,0 \times 10^1$	$1,0 \times 10^5$
G	$1,0 \times 10^5$	$1,0 \times 10^5$	$1,0 \times 10^5$
H	$1,0 \times 10^4$	$1,0 \times 10^4$	$1,0 \times 10^4$

ME – mão esquerda; MD – mão direita; BEB – bebedouro.

De acordo com a tabela 7, em 43,75% das amostras das mãos, foi observada uma contagem de 1×10^3 UFC/mL, enquanto que 37,5% das amostras apresentaram valores acima de 1×10^3 UFC/mL e 18,75% abaixo desse valor. Já em relação ao bebedouro, a contagem de mesófila esteve compreendida entre 1×10^2 e $3,9 \times 10^5$ UFC/mL.

Tabela 7: Porcentagem de mesófilas encontradas nas mãos dos ordenhadores de propriedades criadoras de caprinos no Assentamento Independência /Mossoró-RN, 2011.

MD/ME (UFC)	%
$< 1 \times 10^3$	18,75
$= 1 \times 10^3$	43,75
$> 1 \times 10^3$	37,5

ME – Mão Esquerda; MD – Mão Direita.

As mãos apresentam, principalmente, dois tipos diferentes de populações microbianas: residente e transitória. A primeira é constituída por micro-organismos com baixa virulência, como os *Staphylococcus* coagulase negativa, corinebactérias e micrococos, sendo mais difícil de ser removida pela higiene das mãos com água e sabão, uma vez que coloniza as camadas mais internas da pele. A segunda coloniza as camadas mais superficiais da pele e, portanto, é mais facilmente removida pela higiene das mãos com água e sabão quando comparada à residente.

Diante de tais evidências, os resultados obtidos das contagens de mãos, nesse trabalho, podem ser comparados ao encontrados por Silva et al. (2011), os quais constataram a contagem de cerca de $2,4 \times 10^5$ UFC/mL de micro-organismos aeróbios mesófilos e de $2,4 \times 10^5$ UFC/mL de psicotróficos isolados de amostras de mãos de ordenhador, antes da ordenha, de propriedades leiteiras do Agreste Pernambucano. Os mesmos autores ainda relatam que após a ordenha houve redução nas contagens, justificando que parte dessa contaminação provavelmente foi incorporada aos tetos e ao leite durante esse procedimento.

Numa pesquisa onde se fez o monitoramento microbiológico das mãos de manipuladores de leite de pequenos ruminantes e de queijo fresco de ovelha e cabra em Portugal, obteve-se contagens de mãos de manipuladores entre 1×10^1 a $2,1 \times 10^5$ (PONCIANO, 2010). Ambos os dados apresentam resultados comparativos aos descritos neste trabalho.

DETERMINAÇÃO DE COLIFORMES TOTAIS E TERMOTOLERANTES NA ÁGUA

Em setenta e cinco por cento das amostras de água analisadas foi detectada a presença de coliformes totais, sendo as propriedades F e H as que apresentaram maiores contagens: ambas com 150 NMP/100mL. Das propriedades positivas para coliformes totais, todas, exceto a D, apresentaram também presença de coliformes termotolerantes em suas amostras de água. A propriedade E foi a que mostrou as maiores contagens, cerca de 15 NMP/100mL; as outras variaram entre 3,6 a 9,2 NMP/100mL. Somente as amostras provenientes das propriedades F e H apresentaram-se como positivas para detecção de *E. coli*, apontando contagens de 9,2 e 3,6 NMP/100mL, respectivamente. As amostras de água das propriedades A e C foram negativas para detecção de coliformes (tabela 8)

Tabela 8: Determinação da presença de coliformes totais, coliformes termotolerantes e *Escherichia coli* em água proveniente de propriedades criadoras de caprinos no Assentamento Independência/Mossoró-RN.

PROPRIEDADES	Coliformes totais (NMP/100mL)	Coliformes termotolerantes (NMP/100mL)	<i>Escherichia coli</i> (NMP/100mL)
A	0,0	0,0	0,0
B	23,0	3,6	0,0
C	0,0	0,0	0,0
D	3,6	0,0	0,0
E	150,0	15,0	0,0
F	93,0	9,2	9,2
G	11,0	7,4	0,0
H	150,0	7,4	3,6

NMP/mL – número mais provável/mililitro.

Em estudo sobre a quantificação de coliformes em diferentes etapas da produção de queijo fresco de leite de cabra, detectou-se que na água utilizada para a limpeza, proveniente de um poço artesiano, havia presença de coliformes totais e termotolerantes, em contagens médias, respectivamente, de 129,8 UFC/100 mL e 10 UFC/100 mL. Essa água era utilizada para higienização das mangueiras que entravam em contato com o leite durante a produção, sendo considerada um ponto de entrada de coliformes no produto produzido (PICOLI et al., 2006).

As origens da água avaliada nas propriedades deste trabalho eram duas: poços (62,5%) e distribuição pública por meio da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN) (37,5%). De

acordo com Amaral et. al, (2003), as principais fontes de abastecimento de água no meio rural são os poços rasos e nascentes, as quais são bastante susceptíveis à contaminação.

Como medidas de prevenção contra contaminação direta dos poços, Gomes et al. (2011) defendem que a proteção das fontes de abastecimento pode preservar a qualidade da água no meio rural onde a desinfecção não é realizada. Dentre algumas fontes de prevenção citadas tem-se: calçada ao redor da fonte, tampa, parede externa acima do solo, revestimento interno, localização no ponto mais alto do terreno, fossa com distância > 30 m (AMARAL et al., 2003).

AVALIAÇÃO “IN VITRO” DA AÇÃO ANTIMICROBIANA DOS EXTRATOS VEGETAIS

Em relação aos resultados do teste de difusão em ágar para os extratos das folhas de *Spondias purpurea* L.(sirigueleira), *Spondias mombin* L. (cajá) e *Azadirachta indica* A. (nim) , iodo a 1% - controles positivo -, água destilada estéril - controle negativo, os mesmos estão apresentados na Tabela 9. Os dados demonstram a ausência de inibição por parte dos extratos de nim e siriguela nas concentrações usadas (1%, 2% e 3%).

Quanto ao teste de sensibilidade, utilizando-se os extratos de nim, discordam do trabalho realizado por Alves et al. (2009), no qual os extratos hidroalcoólicos de folhas de nim a 70% e 80% (v/v) de etanol 96% apresentaram atividade contra *Staphylococcus aureus*. Esses resultados são diferentes provavelmente devido ao diferente percentual utilizado, podemos observar que nos os percentuais deste último trabalho citado são muitos elevados, tornando-se tóxicos se utilizados “in vivo”, como pode se observado por Mourão et al. (2004) que estudaram a toxicidade aguda e crônica dos extratos de sementes e de folhas do nim, em fêmeas do ácaro *Oligonychus ilicis*, obtendo 50% e 99% de mortalidade dos indivíduos em todos os extratos após 72 horas de exposição, nas concentrações 0,02; 15,9 e 121,4 mg/mL e 10,9; 520,9 e 277,4 mg/mL, respectivamente.

Quanto a siriguela, Brito (2010) relata que o extrato das suas folhas e da casca é utilizado como antipirético e antidiarréico, além do tratamento de infecções na gengiva, erupções cutâneas e sarampo. O óleo essencial dessa planta possui os terpeno α -humuleno e β -cariofileno, que sugerem a ação antimicrobiana da planta. Os resultados deste trabalho discordam dessa hipótese sugerida por Brito (2010).

Sobre a ação antimicrobiana dos extratos da cajazeira, esses demonstraram inibição em todas as concentrações utilizadas (1%, 2% e 3%) diante todas as cepas bacterianas testadas (Figura 6). Os halos de inibição originados pelo iodo foram significativamente maiores do que os halos originados pelo

extrato de cajazeira, independente da concentração utilizada, frente às diferentes bactérias isoladas de propriedade criadoras de caprinos. Não houve diferenças significativas dos tamanhos dos halos de inibição entre as três concentrações (1%, 2% e 3%) de extratos de cajazeira testadas. Houve uma maior inibição dos cocos, *Staphylococcus coagulase negativa*, *Staphylococcus aureus* e *Streptococcus* sp. Os bacilos restantes apresentaram halos de menor inibição. Nota-se, na maioria dos testes, uma relação crescente e proporcional entre o tamanho do halo e a concentração.

Figura 6: Halos de inibição formados pelo cajá a 1%, 2% e 3% em torno da bactéria semeada *Cellulomonas* sp.

Tabela 9: Diâmetro dos halos de inibição dos extratos diluídos em água das folhas de nim, cajazeira e siriguela nas concentrações de 1, 2 e 3% frentes às bactérias isoladas em caprinos.

BACTÉRIA	NIM (mm)			CAJAZEIRA (mm)			SIRIGUELA (mm)			IODO A 1% (mm)	ÁGUA DESTILADA (mm)
	1%	2%	3%	1%	2%	3%	1%	2%	3%		
<i>Staphylococcus coagulase</i> negativa	0 ^a	0 ^a	0 ^a	15 ^b	18 ^b	20 ^b	0 ^a	0 ^a	0 ^a	45 ^c	0 ^a
<i>Staphylococcus aureus</i>	0 ^a	0 ^a	0 ^a	14 ^b	15 ^b	20 ^b	0 ^a	0 ^a	0 ^a	50 ^c	0 ^a
<i>Bacillus sp</i>	0 ^a	0 ^a	0 ^a	6 ^b	8 ^b	12 ^b	0 ^a	0 ^a	0 ^a	45 ^c	0 ^a
<i>Cellulomonas sp.</i>	0 ^a	0 ^a	0 ^a	13 ^b	15 ^b	18 ^b	0 ^a	0 ^a	0 ^a	50 ^c	0 ^a
<i>Enterobacter sp</i>	0 ^a	0 ^a	0 ^a	5 ^b	7 ^b	9 ^b	0 ^a	0 ^a	0 ^a	50 ^c	0 ^a
<i>Corynebacterium sp</i>	0 ^a	0 ^a	0 ^a	8 ^b	9 ^b	11 ^b	0 ^a	0 ^a	0 ^a	55 ^c	0 ^a
<i>Streptococcus sp</i>	0 ^a	0 ^a	0 ^a	18 ^b	19 ^b	20 ^b	0 ^a	0 ^a	0 ^a	54 ^c	0 ^a

Letras diferentes comparam o efeito dos extratos sobre diferentes tipos de bactérias e representa significância estatística pelo Teste do Qui-quadrado para $p < 0,05$.

AVALIAÇÃO “IN VIVO” DA AÇÃO ANTIMICROBIANA DO CAJÁ

De acordo com os resultados obtidos, a análise de variância, do logaritmo do número de Unidades Formadoras de Colônia (UFC), demonstrou existir diferença significativa ($p = 0,0147$), ao nível de 5%, entre os produtos analisados (Figura 7). Na comparação das médias, o cajá e o iodo não apresentaram diferença e ambos diferem da água, a qual possui um número maior de UFC. Observa-se também que as médias, em UFC, para a contagem de mesófilas foram as seguintes: cajá 3% = 2170,17, iodo 2% = 5005,33 e água = 31704,29 (Tabela 10).

Esses dados estão de acordo com Brito (2010) que identificou na espécie *Spondias mombin* L o terpeno β -cariofileno e que sugere ensaios para testar possíveis inibições antibacterianas, uma vez que as pesquisas relacionadas a ação do cajá são escassas, existindo questionamentos a serem respondidos.

Figura 7: Comparação entre as médias do número de Unidade Formadora de Colônias (UFC) de acordo com os produtos (Iodo 2%, Cajá 3% e Água destilada).

A análise de variância, do logaritmo do número de UFC, demonstrou existir diferença significativa ($p = 0,0147$), ao nível de 5%, entre os produtos analisados.

Tabela 10: Médias do número de Unidade Formadora de Colônias (UFC) e de Coliformes Totais (CT) de acordo com os produtos (Iodo 2%, Cajá 3% e Água destilada)

Produto	UFC	CT
Iodo 2 %	5005,33 ^b	5,03 ^a
Cajá 3 %	2170,17 ^b	2,84 ^a
Água destilada	31704,29 ^a	11,70 ^a

As médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Student Newman Keuls, ao nível de 5% de significância.

Quanto à contagem do número de coliformes totais (VB), não houve diferença entre os produtos ($p = 0,1280$), embora o número de coliformes seja maior para os animais que receberam a água como tratamento. Obtiveram-se as seguintes médias em UFC por tratamento: Cajá 3% = 5,03 NPM, Iodo 2% = 2,84 NPM e Água = 11,70 NPM.

Quanto aos coliformes termotolerantes, esses foram identificados apenas nos animais que receberam água como antisséptico, respectivamente, cabra 1 da Água (7,4 NPM /Col. 8), cabra 2 da Água (3,6 NPM /Col. 8) e Cabra 2 da Água (3 NPM/Col. 2, 3,6 NPM/Col. 6 e 15 NPM/Col. 8), verificando que o extrato de cajá provavelmente diminuiu os índices de coliformes.

AValiação Fitoquímica do Cajá

Em relação às análises farmacognósticas, realizadas com os extratos vegetais, obtiveram-se os resultados mostrados na Tabela 11. Entre os grupos químicos pesquisados neste trabalho, a espécie *S. mombin* (Cajá) apresentou-se positiva para taninos pirogálicos (devido à presença de precipitado escuro de tonalidade azul), flavonoides (devido a presença de cor vermelho-laranja em meio básico com pH igual a 11), catequinas (presença de cor pardo-amarelada em meio ácido), flavanonas (presença de cor vermelho-laranja em meio básico), xantonas (aparecimento de cor vermelha) e esteroides livres (presença de coloração azul evanescente seguida de verde permanente). Entretanto, obteve-se resultados negativos para fenóis, antocianinas, antocianidinas, leucoantocianidinas, saponinas, alcaloides e quinonas.

Tabela 11: Resultados dos testes farmacognósticos empregados para o extrato hidroalcolico das folhas do cajá.

TESTE DE IDENTIFICAÇÃO	<i>Spondias mombin</i> L.
Fenóis	-
Taninos	+
Antocianinas	-
Antocianidinas	-
Flavonóides	+
Leucoantocianidinas	-
Catequinas	+
Flavanonas	+
Xantonas	+
Esteróides livres	+
Saponinas	-
Alcalóides	-
Quinonas	-
(+) Positivo (-) Negativo	

Esses resultados estão de acordo com Santos-Serejo et al. (2009), que descrevem que nos últimos anos, descobriu-se que os extratos das folhas e dos ramos da cajazeira contém taninos com propriedades medicinais para o controle de bactérias gram positivas e negativas. De acordo com Acciolly et al. (2012), a análise fitoquímica do extrato metanólico da *S. mombin* revelou além da presença de taninos hidrolisáveis (formação de precipitado de cor azul escuro na reação com uma solução de ácido hidro-alcoólico de FeCl_3), a saponinas (formação de espuma estável por agitação com água). Enquanto que Ayoka et al. (2006), confirmou pela avaliação de extratos aquosos, metanólicos e etanólicos do cajá, a presença de taninos, antraquinonas, flavonóides, glicosídeos, saponinas e compostos fenólicos. Enquanto que os alcaloides estavam ausentes nos três extratos.

CONCLUSÕES

Sobre a avaliação da aceitabilidade do uso de extratos, observa-se que as maiores dificuldades encontradas para a adoção dessa tecnologia são as práticas de manejo ineficientes, a necessidade de mudanças de hábito, a adequação e apropriação da técnica de produção do extrato ao cotidiano da comunidade e o risco de toxicidade do produto. Entre os aspectos positivos para a sua aceitação está o fácil acesso dos assentados ao produto, a possível redução de resíduos no leite, a melhoria da produtividade, a diminuição de custos e o controle dos micro-organismos responsáveis por enfermidades animais.

Sobre a microbiota bacteriana identificada no Assentamento Independências, isolou-se: *Bacillus megaterium*, *Bacillus sp.*, *Corynebactérias*, *Enterobacter sp.*, *Cellulomonas sp.*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus sp.* e *Staphylococcus coagulase* negativa. Destacando-se o *Staphylococcus coagulase* negativa, indicado como um dos principais causadores da mastite.

Quanto a contagem de mesófilas nas mãos dos ordenhadores e bebedouro dos animais, todas as amostras apresentaram elevado número de bactérias.

A maioria das amostras apresentaram coliformes totais. Das propriedades positivas para coliformes totais, todas, exceto uma, apresentaram também presença de coliformes termotolerantes em suas amostras de água.

Dentre os extratos estudados, apenas o cajá apresentou atividade antibacteriana, tendo melhor ação sobre a *S. coagulase* negativa e o *Streptococcus sp.* espectralmente.

Quanto à avaliação “in vivo”, existiu diferença significativa entre os produtos água, iodo e cajá para a contagem de mesófilas. O cajá diminuiu o número de bactérias mesófilas. Não houve diferença entre

os produtos para a análise de coliformes totais. Os coliformes termotolerantes, foram identificados apenas nos animais que receberam água como tratamento.

Em relação a análise fitoquímica, a espécie *S. mombin* (Cajá) apresentou-se positiva para taninos pirogálicos, flavonoides, catequinas, flavanonas, xantonas e esteroides livres (presença de coloração azul evanescente seguida de verde permanente). Entretanto, obteve-se resultados negativos para fenóis, antocianinas, antocianidinas, leucoantocianidinas, saponinas, alcaloides e quinonas.

Diante disso, sugere-se que sejam feitas pesquisas sobre a toxicidade dos extratos, uma avaliação dos custos para a adoção do uso dos extratos e agregação de valor ao produto através de uma abordagem junto as empresas que comercializam o leite.

REFERÊNCIAS

- AGRA, M.F.; BARACHO, G.S.; NURIT, K.; BASÍLIO, I.J.L.D.; COELHO, V.P.M. Medicinal and poisonous diversity of the flora of “Cariri Paraibano”. *Journal of Ethnopharmacology*, v.111, p.383-395, 2007.
- ALBUQUERQUE, A.P.; ANDRADE, L.H.C. Uso de recursos vegetais da caatinga: o caso do Agreste do estado de Pernambuco. *Revista de Ciencia y Tecnologia de América*.v. 27, n. 7, p. 336-346, 2002.
- ALENCAR, S.P.; MOTA, R.A.; COELHO, M.C.O.C; NASCIMENTO, S.A.; ABREU, S.R.O; CASTRO, R.S. Perfil sanitário dos rebanhos de caprinos e ovinos no sertão de Pernambuco. *Ciência Animal Brasileira*, Goiânia, v. 11, n. 1, p. 131-140, 2010.
- ALVES, P. D.; BRANDAO, M. G. L.; NUNAN, E. A.; VIANNA-SOARES, C. D. Chromatographic evaluation and antimicrobial activity of Neem (*Azadirachta indica* A. Juss., Meliaceae) leaves hydroalcoholic extracts. *Brazilian Journal of Pharmacognosy*. v. 19, n. 2b, p. 510-515, 2009.
- AMARAL, L. A. et al. Água de consumo humano como fator de risco à saúde em propriedades rurais. *Revista de Saúde Pública*, v. 37, n.4, p. 510-514, 2003.
- ANDERSON, D. E.; HULL, B. L.; PUGH, D. G. Enfermidades da glândula mamária. In: PUGH, D. G. (Ed.). *Clínica de ovinos e caprinos*. São Paulo: Roca, 2005, p.513.
- AYOKA A. O.; AKOMOLAFE R. O.; IWALEWA E. O.; AKANMU M. A.; UKPONMWAN O. E. Sedative, antiepileptic and antipsychotic effects of *Spondias mombin* L. (Anacardiaceae) in mice and rats. *Journal of Ethnopharmacology*. v.103, n. 2, p.166 – 175, 2006.
- BERNARD, K. A. *Corynebacterium* species and coryneforms: an update on taxonomy and diseases attributed to these taxa. *Clinical Microbiology Newsletter*, v. 27, p. 9-18, 2005.
- BRITO, H. R. Caracterização química de óleos essenciais de *Spondias mombin* L., *Spondias purpurea* L. e *Spondias* sp (cajarana do sertão). Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, Paraíba. 2010. 67 p.
- CARNEIRO, S.M.P; CARVALHO, F.A.A.; SANTANA, L.C.L.R.; SOUSA, A.P.L.; NETO, J.M.M.; CHAVES, M.H. The cytotoxic and antileishmanial activity of extracts and fractions of leaves and fruits of *Azadirachta indica* (A Juss.). *Biology Research*, v. 45, n. 2, p. 111-116, 2012.
- CARVALHO, L. D. Ressignificação e reapropriação social da natureza: Práticas e Programas de Convivência com o Semiárido no Território de Juazeiro – Bahia. Tese de Doutorado, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, Sergipe. 2010. 342 p.
- CORASSIN, C. H.; OLIVEIRA, C. Aplicabilidade dos conjuntos para detecção de resíduos de antibióticos no leite em propriedades leiteiras. *Revista O Biólogo*, v. 62, n. 1, 2000.
- COSTA, H. M. DE A. & VIEIRA, L. Da S. Ectoparasitos permanentes de caprinos e ovinos em Sobral-CE. *Pesquisa Agropecuária Brasileira*, v. 19, p. 639-646, 1984.
- FONSECA, L. F. L.; SANTOS, M. V. Qualidade do leite e controle de mastite. São Paulo: Lemos Editorial, 2000. 176 p.

FUNKE, G.; BERNARD, K. A. Coryneform gram-positive rods. In: MURRAY, P. R.; BARON, E. J.; JORGENSEN, J. H.; LANDRY, M. L.; PFALLER, M. A. (eds) Manual of clinical microbiology. 9.ed. Washington, D.C.: American Society for Microbiology, 2007, p. 485-514.

GOMES, M.C.R.L.; SOUZA, J.B.; FUJINAGA, C.I. Estudo de caso das condições de abastecimento de água e esgotamento sanitário dos moradores da estação ecológica de Fernandes Pinheiro (PR). *Ambiência Guarapuava*, v. 7, n. 1, p. 25-28, 2011.

MATOS FJ. Introdução à fitoquímica experimental. 2a.ed. Fortaleza: Edições UFC; 1997. 141p.

MORAIS,V.M; FREITAS, F,L.A.; ARRUDA, I.A; AMORIM, J.D.C.; MARACAJÁ,P.B. Tecnologias de convivência com o Semi-árido, alternativas Viáveis para a agricultura familiar no oeste do Rio Grande do Norte. *Infotecnario*, v.3, n.1, p. 12-24, 2009.

MOURÃO, S.A. et. Seletividade de extratos de nim (*Azadirachta indica* A. Juss.) ao ácaro predador *Iphiseiodes zuluagai* Denmark & Muma (Acari: Phytoseiidae). *Neotropical Entomology*, v. 33, n. 5, p. 613-617, 2004.

NCCLS. 2003. Performance standards for antimicrobial susceptibility testing: eleventh informational supplement M100-S11. NCCLS, Wayne, Pa.

NEVES, P. B.; MEDEIROS, E. S.; SÁ, VALEZKA, V.; CAMBOIM, E. K.A. ; GARINO JR, F.; MOTA, R.A.; AZEVEDO, S. S. Cellular and microbiological profiles and risk factors for subclinical mastitis in goats in the semi-arid region of Paraíba. *Pesquisa Veterinária Brasileira*, v. 30, p.379-338, 2010.

OLIVINDO, C. de S.; CHAPAVAL, L.; VILLARROEL, A. B. S.; ALVES, F. S. F.; SOUSA, F. G. C. de; FERNANDES, F. E. P. Detecção de *Staphylococcus aureus* utilizando a técnica de REP-PCR no monitoramento da qualidade do leite de cabra. *Revista Brasileira de Zootecnia*, v. 38, p. 1317-1321, 2009.

PEREIRA, M S. V. Atividade antimicrobiana do extrato de *Anacardium occidentale* Linn. em amostras multiresistentes de *Staphylococcus aureus*. *Revista Brasileira de Farmacognosia*, v. 17, n. 4, p. 572-577, 2007.

PICCINI, C.; ANTÚNEZ, K.; ZUNINO, P. An approach to the characterization of the honeybee hive bacterial flora. *Journal of Apicultural Research*, v. 43, p. 101–104, 2004.

PICOLI, S. U. et al. Quantificacao de coliformes, *Staphylococcus aureus* e mesofilos presentes em diferentes etapas da produção de queijo fresco de leite de cabra em laticínios. *Ciência e Tecnologia de Alimentos*, v. 26, p. 64-69, 2006.

PONCIANO, R. J. F. Avaliação da qualidade higiênica da produção de leite de pequenos Ruminantes e de queijo fresco da região do Rabaçal. 2010. 112f. Dissertação de Mestrado em Segurança Alimentar, Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa, 2010.

SANTOS-SEREJO, J.A.; DANTAS, J.L.L.; SAMPAIO, C.V.; COELHO, Y.S. Fruticultura Tropical: espécies regionais e exóticas. EMBRAPA, Brasília, 2009, 25 p.

SILVA, A. Q., SILVA, H. Cajá, uma frutífera tropical. *Informativo SBF*, v. 14, n.4, 1995.

SILVA, L. C. C. da; BELOTI, V.; TAMANINI, R.; D'OVIDIO, L.; MATTOS, M. R. de; ARRUDA, A. M. C. T. de; PIRES, E. M. F. Rastreamento de fontes da contaminação microbiológica do leite cru durante a ordenha em propriedades leiteiras do Agreste Pernambucano, *Ciências Agrárias*, v. 32, n. 1, p. 267-276, 2011.

SILVA, M.A. Avaliação do potencial inseticida de *Azadirachta indica* (Meliaceae) visando ao controle de moscas-das-frutas (Diptera:Tephritidae). Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo, Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", Piracicaba, São Paulo, 2010. 159 p.

SILVA, R.M.A. Entre o combate a seca e a convivência com o Semiárido: transições paradigmáticas e sustentabilidade para o desenvolvimento. Tese de doutorado, UNB, Brasília, 2006. 298 p.

SUAREZ, C. A.G.; MONTANO, I.D.; CAVALCANTI, N.; ROMANO, E.; COSTA, I.M.R.C. GIORDANO, R.L.C.; GIORDANO, R.C. Assessment of the metabolismo of diferente strains of *Bacillus megaterium*. *Brasilian Archives of Biology and Technology*, v. 55, n. 4, p. 485-490, 2012

VIEIRA, L. S. Epidemiologia e controle das principais endoparasitoses de caprinos e ovinos. In: Reunião anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia, 28, João Pessoa, PB. Sociedade Brasileira de Zootecnia. Caprinocultura e Ovinocultura. 1991. p. 27-36.

VITTORI, J.; SCHOCKEN-ITURRINO, R. P.; POIATTI, M. L.; PIGATTO, C. P.; CHIODA, T. P.; RIBEIRO, C. A. M.; GARCIA, G. R.; RAGAZANI, A. V. F. Qualidade microbiológica de leite UHT caprino: pesquisa de bactérias dos gêneros *Staphylococcus*, *Bacillus* e *Clostridium*, *Ciência Rural*, v. 38, n. 3, p. 761-765, 2008.

Capítulo 7

10.37423/210403905

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DE FRUTOS DE NONI (MORINDA CITRIFOLIA L.) EM ESTÁDIO DE MATURAÇÃO FISIOLÓGICA

Lucas Figueira da Silva

*Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Pernambuco*

Mateus Madruga da Silva

*Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Pernambuco*

José Carlos da Silva

*Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Pernambuco*

Wellkens David da Silva Praxedes

*Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Pernambuco*

Amanda Reges de Sena

*Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Pernambuco*

José Marcílio da Silva

*Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Pernambuco*

Resumo: O Noni é uma fruta exótica originária do Sudoeste da Ásia rica em vitamina C e carotenóides e contém muitas sementes em seus frutos. Objetivando avaliar a caracterização física foram colhidos 50 frutos de noni aleatoriamente, com boas características externas de qualidade, proveniente de 12 plantas em estágio de maturação fisiológica, os quais foram pesados em balança semi-analítica e medidos os diâmetros longitudinal e transversal com auxílio de um paquímetro. Os frutos de Noni apresentaram um formato ovalado, de coloração amarela clara e branca esverdeado. O peso médio dos frutos é de 189,83 g com um tamanho médio de 11,30 cm de comprimento por 5,41 cm de diâmetro transversal médio. Os frutos são impróprios para o consumo *in natura* devido seu forte odor único e distinto e desagradável quando maduros, e são fibrosos contendo pouco líquido.

Palavras-chave: fruto exótico, *Morinda citrifolia* L., qualidade física, semente.

1. INTRODUÇÃO

O Noni (*Morinda citrifolia* L.) é um arbusto originário do Sudoeste da Ásia (Indonésia) e Austrália, onde é utilizada na medicina popular para o tratamento de diversas enfermidades, foi descoberto na Polinésia Francesa e Havaí e tem sido utilizada com êxito há mais de 2000 anos em outros países. Nas últimas décadas, observou-se um aumento significativo do interesse comercial em relação aos produtos contendo essa planta, principalmente o suco das frutas do Noni.

A planta alcança aproximadamente 3 a 10 metros de altura, apresenta flores pequenas e brancas e o fruto contém muitas sementes, e tem um forte odor, quando maduro. Há muitos séculos é usada como planta medicinal devido a seu efeito terapêutico (BARROS et al., 2008), e produz o ano inteiro. Pertence à família das rubiaceae, sendo difundida pelo homem através da Índia, e do Oceano Pacífico. É uma planta tropical com fruto verde, nodoso, colhido em média a cada 90 dias quando atinge a coloração amarela e depois fica branco, cresce abundantemente nos solos não contaminados das ilhas da Polinésia Francesa do Tahiti. Por séculos, os taitianos viveram em plena harmonia com sua apreciada planta (noni), beneficiando-se de suas propriedades nutritivas.

Apesar da literatura científica sobre essa espécie vegetal ser extensa, especialmente em relação aos possíveis efeitos farmacológicos e usos terapêuticos, a quantidade de publicações que avaliaram sua segurança é limitada (WEST et al., 2006).

O fruto do Noni é de formato ovalado, e quando surge apresenta uma cor verde, mudando para amarela clara e por fim, quase branco, quando os frutos deverão ser colhidos (maturação fisiológica). O fruto reúne as melhores características físicas visando ao consumo in natura (SILVA, et al., 2009) e apresenta propriedades terapêutico-preventivas em relação à prevenção do câncer, problemas cardíacos, desordens digestivas, diabetes, transtornos auto-imunológicos, problemas de peso, cabelos, pele, TPM, hemorróidas, entre outros (PLANTAS e ERVAS, 2009) e é rica em vitamina C contém betacaroteno, precursor da vitamina A, a presença de ômega 6 e óxido nítrico, dilatador dos vasos sanguíneos. Contém alcalóides que ajudam ao corpo humano a regenerar as células danificadas e a incrementar as defesas do mesmo, de forma natural.

O Noni é uma fonte rica de uma proteína chamada Bromelaína que retarda o envelhecimento do corpo e ajuda na digestão e absorção de nutrientes. Entretanto, com o intuito de proteger e promover a saúde da população, os produtos contendo Noni não devem ser comercializados no Brasil como

alimento até que os requisitos legais que exigem a comprovação de sua segurança de uso sejam atendidos (ANVISA, 2008).

Os trabalhos sobre frutos de Noni são raros e, é notória ainda, a falta de estudos sistemáticos avaliando o suco de noni em humanos nos países onde o produto é comercializado, tornando-se necessário um aprofundamento deste fruto exótico para que o seu cultivo seja intensificado. Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi avaliar as qualidades físicas de frutos de Noni colhidos no Campus Barreiros do IFPE em estágio de maturação fisiológica.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi realizado no Laboratório de Bromatologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, Campus Barreiros, localizado no município de Barreiros, Pernambuco, cujas coordenadas geográficas são 08°49' de Latitude Sul (S) e 35°11' de Longitude Oeste (W), com altitude média de 22 m e relevo ondulado a fortemente ondulado. Segundo a classificação de Köppen-Geiger, o clima predominante na região é do tipo tropical (As), denominado úmido com chuvas de outono-inverno, com precipitação média anual de 1.500 mm e temperaturas médias anuais entre 25° C.

Foram utilizados como matéria prima 50 frutos de Nonis em fase de maturação fisiológica, colhidos em doze (12) plantas com boas características externas de qualidade (Figura 1), localizadas no campo experimental do IFPE/Campus Barreiros. Posteriormente, foram conduzidos ao laboratório de Bromatologia do IFPE/Campus Barreiros para realização das análises. De cada fruto (Figura 2), foi determinado o peso, com auxílio de balança semi-analítica, o comprimento (diâmetro longitudinal) e o diâmetro transversal superior, mediano e inferior do fruto, com auxílio de um paquímetro metálico. A análise descritiva dos estratos estudados foi realizada pela estatística clássica, onde foram calculados a média, mediana, desvio padrão, valores mínimos e máximos e o coeficiente de variação.

Figura 1 – Planta com frutos de Noni (*Morinda citrifolia* (L.)) em estágio de maturação fisiológica plantada na área experimental do Campus Barreiros

Figura 2 – Fruto de Noni (*Morinda citrifolia* (L.)) em estágio de maturação fisiológica colhido na área experimental do Campus Barreiros

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os valores médios da análise descritiva para as variáveis estudadas estão apresentados na Tabela 1. As variáveis avaliadas apresentaram valores da média e mediana próximos, indicando distribuição simétrica. O maior coeficiente de variação (CV) foi observado para o peso dos frutos (27,34%). O tamanho médio dos frutos do noni foi de 11,30 cm de comprimento por 5,41 cm de diâmetro médio, variando entre 7,69 cm e 14,07 cm e 4,48 cm e 6,63 cm, respectivamente, definindo segundo Silva et al., (2009) o noni como um fruto de formato ovalado. Os frutos de noni avaliados apresentaram uma média de 248,22 sementes por fruto, com uma variação entre 216 e 275 sementes, com um diâmetro médio longitudinal (comprimento) e transversal de 1,07 cm e 0,56 cm, respectivamente (Tabela 1). Segundo Chitarra e Chitarra (2005), o diâmetro longitudinal (comprimento) e o diâmetro transversal do fruto representam, em conjunto, o tamanho e a sua relação dá ideia da forma do produto. O peso médio dos frutos de noni foi de 189,83 g, apresentando uma variação entre 99,04 g e 310,00 g. Os resultados encontrados neste trabalho corroboram com os resultados obtidos por Maia et al., (2009), que encontraram um peso médio de 195,54 g em frutos com 11,96 cm por 5,98 cm de diâmetro médio.

Tabela 1 - Estatística descritiva das características físicas do fruto de noni (*Morinda citrifolia* L.) obtidos através da média de 50 frutos em estágio de maturação fisiológica

Características Físicas	Média	Mediana	δ	Valor Mínimo	Valor Máximo	CV (%)
Peso do fruto (g)	189,83	181,69	51,90	99,04	310,00	27,34
Comprimento do fruto (cm)	11,30	11,11	1,47	7,69	14,07	13,02
Diâmetro do fruto (cm)	5,41	5,41	0,46	4,48	6,63	8,46
Quantificação de sementes	248,22	253,00	22,30	216,00	275,00	8,99
Comprimento da semente (cm)	1,07	1,11	0,09	0,88	1,17	8,64
Diâmetro da semente (cm)	0,56	0,55	0,03	0,53	0,61	5,50

δ : Desvio padrão; CV: Coeficiente de variação.

4. CONCLUSÕES

As características físicas mostraram que os frutos de Noni são fibrosos contendo pouco líquido e são impróprios para o consumo *in natura*.

As evidências científicas avaliadas até o momento não comprovam a segurança dos produtos contendo *Morinda citrifolia* para uso como alimento. Assim, tornam-se necessários estudos posteriores que visem o processamento das fibras para ser utilizadas na fabricação de medicamentos.

AGRADECIMENTOS

Ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) *Campus* Barreiros, pelo espaço físico do Laboratório de Bromatologia e concessão da área de implantação da cultura do Noni.

REFERÊNCIAS

- ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Esclarecimentos sobre as avaliações de segurança realizadas de produtos contendo Morinda citrifolia (noni). Informe Técnico n. 25, maio. 2007, atualização: jun./2008.
- BARROS, S. P. N. B.; MAIA, G. A.; BRITO, E. S. de.; NETO, M. A. de. S.; SOUZA, J. A.
- Caracterização físico-química da polpa de noni (Morinda citrifolia L.). In: XX CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 2008, Vitória. Anais... Vitória: Centro de Convenções de Vitória, 12 a 17 de outubro, 2008. CD-ROM.
- CHITARRA, A. B.; CHITARRA, M. I. F. Pós-colheita de frutos e hortaliças: fisiologia e manuseio. Lavras: UFLA, 2. ed., 2005, 785 p.
- MAIA, L. D. M.; SOUZA, W. C. O.; VILAR, F. C. R.; ALMEIDA, M. B.; LIMA, L. O. Descrição morfológica e caracterização química do noni (Morinda citrifolia). In: IV CONGRESSO DE PESQUISA E INOVAÇÃO DA REDE NORTE E NORDESTE DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, 2009, Belém. Anais... Belém: IFPA. CD-ROM.
- PLANTAS E ERVAS. Morinda citrifolia (noni). n. 2, p. 18-20, São Paulo, 2009.
- SILVA, L. R.; MEDEIROS, P. V. Q.; LEITE, G. A.; SILVA, K. J. P.; MENDONÇA, V.; SOUSA, J.
- A. Caracterização do fruto de noni (Morinda citrifolia L.). In: 49º CONGRESSO BRASILEIRO DE OLERICULTURA, 2009, São Paulo. Anais... Horticultura Brasileira, v. 27, n.2, p. 267-271, agosto, 2009. CD-ROM.
- SOLOMON, N. O fruto tropical de 101 aplicações medicinais: suco de noni fruto insular. Ed. Marajó, 46 p.
- TAIZ, L.; ZEIGER, E. Fisiologia Vegetal. 3. ed. Porto Alegre, Artmed, 2004. 718 p.
- WEST, B. J.; JENSEN, C. J.; WESTENDORF, J.; WHITE, L. D. A Safety Review of Noni Fruit Juice. Journal of Food Science, v. 71, 2006.

Capítulo 8

10.37423/210403908

A REFLECTÂNCIA ESPECTRAL DE FOLHAS DE PLANTAS DO AMENDOIM EM FUNÇÃO DA ADUBAÇÃO FOSFATADA

Morgana Lígia de Farias Freire Freire

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA

Resumo: A avaliação das diferenças dos níveis de nutrientes das plantas pode ser detectada por meio de sensores remotos. Por isso a análise das respostas espectrais pode ser um bom indicador das mudanças que ocorrem nas culturas, particularmente, para o fenômeno da adubação. O objetivo geral deste trabalho foi analisar a reflectância espectral de folhas de plantas do amendoim submetido a diferentes doses de P_2O_5 incorporadas ao material do solo, em diferentes bandas estreitas, nas regiões do visível e infravermelho próximo durante a fase de crescimento das plantas. Para isso foi realizado um experimento em casa-de-vegetação. A cultivar objeto de estudo foi a BR-1, que é de ciclo curto (98 dias), sugerido para condições de sequeiro. O experimento constou de 4 tratamentos correspondentes a cinco doses crescentes de P_2O_5 : 0; 50; 100; 150 $kg.ha^{-1}$, que foi incorporado ao material do solo. As unidades experimentais foram vasos de 22 litros e as doses de P_2O_5 foram aplicadas em cobertura na semeadura. As médias realizadas corresponderam a reflectância de uma folha individual durante o ciclo da cultura do amendoim obtidas com um espectroradiômetro portátil, com uma resolução espectral de 2 nm. A resposta espectral das plantas do amendoim, em todos os tratamentos testados, segue padrões típicos da vegetação verde sadia, e sofrem mudanças nos valores reflectância conforme as variações das doses de P_2O_5 aplicados ao material do solo, principalmente na região do visível.

Palavras-chave: Sensoriamento Remoto, Reflectância, Adubação. Cultivar BR-1.

INTRODUÇÃO

O sensoriamento remoto pode ser definido como a ciência e a arte de obter informação sobre um objeto, área ou fenômeno através da análise de dados adquiridos por um instrumento, que não entra em contato direto com o objeto, área ou fenômeno em investigação (LILLESAND e KEIFIR, 1979). Sendo que o “elemento” fundamental no qual baseiam as técnicas de sensoriamento remoto é a radiação eletromagnética (REM). É através dela que a energia se propaga a partir de uma fonte, diretamente através do espaço, ou indiretamente pela sua reflexão quando incidente nas mais variadas superfícies. Da interação desta energia com a matéria constituinte dos objetos é que se fundamenta o sensoriamento remoto.

A agricultura, que integra o rol das ciências que lidam com recursos naturais pode se beneficiar com o uso do sensoriamento remoto (propriedades espectrais), para estudar e solucionar problemas que necessitam serem tratados harmônica e rapidamente. Além disso, o sensoriamento remoto é uma importante fonte de dados para a agricultura, tendo se mostrado uma das técnicas mais promissoras, e podendo suprir, desde que com técnicas adequadas, algumas das necessidades deste sistema. As importantes características do sensoriamento remoto são a rapidez e a representatividade com que se consegue obter informações sobre a cultura em curto espaço de tempo; possibilitando um acompanhamento das condições da cultura. Sendo assim, essas características são extremamente úteis no estudo do estado nutricional da planta, podendo substituir métodos convencionais, tornando o processo menos demorado e até mesmo dispendioso.

A avaliação das diferenças dos níveis de nutrientes das plantas pode ser detectada por meio de sensores remotos. Diferenças nos níveis de nitrogênio das plantas, devido à adubação, já foram enfoques em vários trabalhos (JENSEN et al., 1990; FERNÁNDEZ et al., 1994; FONSECA et al., 2002). Assim, a análise das respostas espectrais pode ser um bom indicador das mudanças que ocorrem no dossel, particularmente, para o fenômeno da adubação.

A detecção do nitrogênio é possível devido a sua influência tanto na taxa de expansão quanto na divisão celular, determinando assim o tamanho final das folhas. Então, o nitrogênio é um dos fatores determinantes da taxa de acúmulo de biomassa (JENSEN et al., 1990). A detecção é obtida sabendo que à medida que aumenta os níveis de adubação nitrogenada, observa-se uma diminuição da reflectância em todos os comprimentos de onda da região do visível, devido ao aumento da quantidade de folhas e cloroplastos para interagir com a radiação (JENSEN et al., 1990; FERNÁNDEZ et al., 1994).

O nutriente enfatizado nesta pesquisa foi o P_2O_5 e as folhas das plantas analisadas foi a do amendoimzeiro. A escolha deste nutriente foi devido à importância do fósforo, pois quando esse nutriente se encontra ausente no substrato, ou não é fornecido na adubação em quantidade suficiente, o sistema radicular apresenta-se pouco desenvolvido, especialmente as raízes secundárias, reduzindo assim, a capacidade da muda em absorver água e nutrientes.

O objetivo geral deste trabalho foi analisar a reflectância espectral de folhas de plantas do amendoim submetido a diferentes doses de P_2O_5 incorporadas ao material do solo, em diferentes bandas estreitas, nas regiões do visível e infravermelho próximo durante a fase de crescimento das plantas.

METODOLOGIA

O experimento foi realizado na casa-de-vegetação, no Centro Nacional de Pesquisa de Algodão (CNPA), da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), localizada em Campina Grande – PB com a cultura do amendoim (*Arachis hypogaea* L.), usando a cultivar BR-1 que é de ciclo curto (98 dias), sugerido para condições de sequeiro.

O experimento constou de cinco tratamentos correspondentes as cinco doses de P_2O_5 : 0; 50; 100; 150 $kg.ha^{-1}$, que foi incorporado ao material do solo. Houve também a utilização do nitrogênio e do sulfato de amônio (20% de N), em dose única de 20 $kg.ha^{-1}$ para todos os tratamentos, no início da floração. O tipo de solo utilizado foi o neossolo, também conhecido como regossolo, este solo é encontrado na região do agreste e brejo paraibano, mas especificamente na cidade de Lagoa Seca–PB.

As unidades experimentais foram vasos de 22 litros, pintados de cor cinza metálica ou prata, os quais possuem furos que tem por finalidade facilitar a drenagem e lixiviação. As doses de P_2O_5 foram aplicadas em cobertura na semeadura.

Portanto, foram tomados todos os cuidados para a maior precisão experimental dos resultados, como por exemplo, as unidades experimentais com a mesma cor, dispostas ao longo da bancada sentido Norte-Sul, acompanhando o comprimento maior da casa de vegetação para uma distribuição uniforme da luz e irradiância solar e outros (BELTRÃO et al., 2002).

As variáveis espectrais que correspondem às medidas de reflectância e de transmitância de uma folha individual durante o ciclo da cultura do amendoim com um integrador esférico interligado a um espectralradiômetro portátil com um cabo de fibra ótica. Para isso, foi utilizada uma fonte de luz artificial, simulando a luz do sol. O espectralradiômetro é um equipamento não imageador, que produz uma curva espectral que caracteriza as grandezas radiométricas (reflectância, transmitância ou

absortância), com uma resolução espectral de 2 nm, o qual possui um sensor denominado de cosseno coletor, que possibilita variar o ângulo de visada do alvo.

Estas medidas foram feitas em casa de vegetação (*in situ*) na superfície adaxial em uma folha individual, realizadas semanalmente, a cada sete dias, dos 28 aos 91 DAE, durante o ciclo da cultura do amendoim.

Com o espectraloradiômetro foi possível medir a reflectância [$r(\lambda)$] e a transmitância da folha [$t(\lambda)$], em que a obtenção da absortância [$a(\lambda)$] pode ser dada pela Lei de Kirchoff [$a(\lambda) + r(\lambda) + t(\lambda) = 1$], sendo λ o comprimento de onda, pois estas grandezas são espectrais.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados obtidos foram exibidos através de gráficos, nas Figuras 1 a 10, que representam a reflectância das folhas do amendoim em função do comprimento de onda para vários DAE. Nesse caso a assinatura espectral refere-se as das folhas das plantas do amendoim devido a incorporação do P_2O_5 que é a fonte de fósforo, nas doses de 0, 50, 100 e 150 $kg.ha^{-1}$.

Figura 1: Curvas da reflectância em função do comprimento de onda das folhas do amendoim aos 28 DAE que receberam os tratamentos de 0, 50, 100 e 150 $kg.ha^{-1}$ de P_2O_5 .

Figura 2: Curvas da reflectância em função do comprimento de onda das folhas do amendoim aos 35 DAE que receberam os tratamentos de 0, 50, 100 e 150 kg.ha⁻¹ de P₂O₅.

Figura 3: Curvas da reflectância em função do comprimento de onda das folhas do amendoim aos 42 DAE que receberam os tratamentos de 0, 50, 100 e 150 kg .ha⁻¹ de P₂O₅.

Figura 4: Curvas da reflectância em função do comprimento de onda das folhas do amendoim aos 49 DAE que receberam os tratamentos de 0, 50, 100 e 150 kg.ha⁻¹ de P₂O₅.

Figura 5: Curvas da reflectância em função do comprimento de onda das folhas do amendoim aos 56 DAE que receberam os tratamentos de 0, 50, 100 e 150 kg.ha⁻¹ de P₂O₅.

Figura 6: Curvas da reflectância em função do comprimento de onda das folhas do amendoim aos 63 DAE que receberam os tratamentos de 0, 50, 100 e 150 kg.ha⁻¹ de P₂O₅.

Figura 7: Curvas da reflectância em função do comprimento de onda das folhas do amendoim aos 70 DAE que receberam os tratamentos de 0, 50, 100 e 150 kg.ha⁻¹ de P₂O₅.

Figura 8: Curvas da reflectância em função do comprimento de onda das folhas do amendoim aos 77 DAE que receberam os tratamentos de 0, 50, 100 e 150 kg ha⁻¹ de P₂O₅.

Figura 9: Curvas da reflectância em função do comprimento de onda das folhas do amendoim aos 84 DAE que receberam os tratamentos de 0, 50, 100 e 150 kg.ha⁻¹ de P₂O₅.

Figura 10: Curvas da reflectância em função do comprimento de onda das folhas do amendoim aos 91 DAE que receberam os tratamentos de 0, 50, 100 e 150 kg.ha⁻¹ de P₂O₅.

Nos 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84 e 91 DAE as plantas do amendoim apresentaram o comportamento espectral representados pelas curvas espectrais de reflectância, evidenciadas nas Figuras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, respectivamente, considerando cada tratamento.

Conforme pode ser visto em cada curva a reflectância é muito baixa na região do visível do espectro eletromagnético, a qual é influenciada, principalmente, pelos pigmentos existentes nos cloroplastos amplamente encontrados nas células do mesófilo das folhas (KNIPLING, 1970). Ainda tem-se que na faixa do verde, centralizada em, aproximadamente, 0,55µm, a reflectância é máxima, daí a razão da cor verde ser a cor visualizada pelos vegetais.

Na região do infravermelho próximo, o aumento nos valores de reflectância da curva característica deve-se ao fato de estarem relacionadas à estrutura interna celular da folha (GATES, 1965). Também, tem-se que esta alta reflectância é importante para que a folha mantenha o equilíbrio no balanço de energia e não se superaqueça, evitando assim a destruição da clorofila.

As medidas radiométricas ao nível terrestre podem ser um bom indicador para o acompanhamento da nutrição mineral do amendoim, mostrando um comportamento que pode estar correlacionado com parâmetros agrônômicos que seja de interesse.

Pode-se verificar que o comportamento das reflectâncias das folhas em função das doses de P₂O₅ de aplicadas ao material do solo para o comprimento de onda de 550nm corresponde à região do visível foi bastante satisfatório porque em metade das amostras percebe que quando se aplicou a dose de 100 kg.ha⁻¹ t se teve uma produção máxima. Já para o comprimento de onda de 870 nm que

corresponde ao infravermelho próximo verificou que para certificar-se em que momento a produção seria máxima, precisava-se de valores mais elevados que a dose de 150 kg.ha⁻¹.

CONCLUSÃO

Através do uso do sensoriamento remoto, pode-se obter informações de um valor inestimável para a agricultura. Para o caso em questão, fazendo uso das técnicas do sensoriamento remoto percebe-se que o óxido de fósforo (P₂O₅) pode alterar a reflectância das folhas das plantas do amendoim, em maior ou menor “grau” dependendo da fase temporal da cultura.

A resposta espectral das plantas do amendoim, em todos os tratamentos testados, segue padrões típicos da vegetação verde sadia, e sofrem mudanças nos valores reflectância conforme as variações das doses de P₂O₅ aplicadas ao material do solo, principalmente, na região do infravermelho próximo.

A reflectância média das regiões do visível e do infravermelho próximo expressa por valores mínimos, quando ajustadas segundo uma curva polinomial de segundo grau, em torno dos valores de P₂O₅ em que a produção de vagens é máxima. Dentre as duas regiões a que apresentou melhores resultados foi a do infravermelho próximo. E quanto aos dias após a emergência das plantas recomenda-se que as medidas de reflectância seja realizado dos 63 aos 77.

REFERÊNCIAS

- BELTRÃO, N. E. M.; FIDELES FILHO, J.; FIGUEIREDO, I. C. M. Uso adequado de casa-de-vegetação e de telados na experimentação agrícola. *Revista Brasileira de Engenharia Agrícola Ambiental*, Campina Grande, v.6, n.3 p. 547-552, 2002.
- FERNÁNDEZ, S.; VIDAL, D.; SIMÓN, E.; SOLÉSUGRAÑES, L. Radiometric characteristics of Triticum Oestivum cv. Astral under water and nitrogen stress. *International Journal of Remote Sensing*. London, v. 15, n.9, p. 1867-1884, 1994.
- FONSECA, E. L.; ROSA, L. M. G.; FONTANA, D. C. Caracterização Espectral de Paspalumnotatum em diferentes níveis de adubação nitrogenada. *Pes. Agropec. Bras.*, Brasília, v. 37, n. 3, p. 365-371, mar, 2002.
- GATES, D. M.; KEEGAN, H. J.; SCHLETER, J. C.; WEIDNER, V. R. Spectral properties of plants. *Applied Optics*, v. 4, n. 1, p. 11-20, 1965.
- JENSEN, A.; LORENZEN, B. OSTERGAARD, H. S.; HVELPLUND, E. K. Radiometric estimation of biomass and nitrogen content of barley grown at different nitrogen levels. *International Journal of Remote Sensing*, London, v. 11, n. 10, p. 1809-1820, 1990.
- KNIPLING, E. B. Physical and physiological basis for the reflection of visible and near infrared radiation from vegetation, *Remote Sensing of Environment*, v. 1, p. 155-159, 1970.
- LILLESAND, T., M.; KEIFIR, R. W. Remote sensing and image interpretation. John Wiley & Sons, Inc. New York, 1979.

Capítulo 9

10.37423/210403915

COMPOSTAGEM COMO ALTERNATIVA DE ANALISE-AÇÃO-PARTICIPATIVA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Amanda Furtado Luna

Universidade Federal do Piauí

Francisco Ivan da Silva

Instituto Federal do Piauí

Carlos Pereira da Silva

Instituto Federal do Piauí

Resumo: Os problemas ambientais vêm se alastrando a cada dia, ao passo que a conscientização da população sobre esse aspecto não tem ocorrido na mesma proporção. Em virtude deste aspecto, o trabalho foi desenvolvido objetivando uma conscientização dos estudantes do Ensino Médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI) – Campus Teresina Sul sobre a problemática do lixo, tendo em vista principalmente os resíduos orgânicos, analisando soluções para a diminuição destes, além da produção de adubo. A análise foi desenvolvida utilizando uma metodologia pesquisa-ação-participativa, que tem como principal objetivo a produção de conhecimentos, aliando a ação educativa, com a participação dos alunos envolvidos. A pesquisa foi fundamentada em duas partes: a primeira estava relacionada ao conhecimento que os discentes tinham sobre o processo de reciclagem e a segunda fundamentou-se na produção de adubo a partir do lixo orgânico proveniente do refeitório desta instituição. Os resultados revelam que os participantes demonstraram pouco conhecimento sobre os materiais que podem ser reciclados, assim como os que podem fazer parte da produção de adubos. No processo da produção do composto orgânico a aprendizagem foi significativa, visto que eles uniram os conhecimentos adquiridos nas aulas com a prática, mostrando comprometimento e preocupação com o procedimento de reciclagem constatando o despertar da conscientização ambiental.

Palavras- Chaves: compostagem, conscientização, educação ambiental.

INTRODUÇÃO

Atualmente, temas relacionados ao meio ambiente geram grandes preocupações que afligem a sociedade. O acúmulo de lixo é um dos principais tópicos envolvidos nos problemas ambientais em especial em países industrializados e muitos populosos o acúmulo de lixo vem aumentando drasticamente além da grande demanda de plásticos que duram inúmeros anos para ser consumido pelo a natureza (MALHEIROS, 2021;RODRÍGUEZ, 2021).

Há uma pequena conscientização da atual situação, pois existem atitudes de algumas pessoas que envolvem a preservação ambiental gerando espaço para abordagens mais racionais e sistemáticas para os problemas acarretados pela poluição, desse modo, pode-se falar em conscientização da atual situação, visto à intenção de proteger e cuidar do ambiente no qual está inserido. (FERNANDES, et al., 2003; VALLE, 2004).

A educação ambiental tem adquiridos inúmeros resultados nas pesquisas de novas maneiras de cuidado com o meio ambiente, a partir do aumento de estudos relacionados à este tema. No início de 2021, houveram mais de 1500 trabalhos acadêmicos na plataforma do *Google Acadêmico* sobre o tema de educação ambiental (VIEIRA, 2021;DE MIRANDA, 2021).

As diversas conferências internacionais sobre o meio ambiente recomendam a implantação de mudanças nas práticas das pessoas, porém isso não é tarefa fácil (BARBO, 2009). No entanto, “[...] mudar é difícil, mas é possível” (FREIRE, 2002). Baseado nisso, espera-se que ocorram transformações significativas, a começar pelas instituições de ensino, como acreditam os educadores ambientais. Sob esse aspecto, evidencia-se a importância da Educação Ambiental.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA

O melhor ambiente para implementar a consciência de futuro da humanidade é na escola e para isso, é necessário que a escola trabalhe com atitudes, formação de valores, habilidades, procedimentos e não somente informações e conceitos, pois o futuro depende da relação estabelecida entre a natureza e o uso dos recursos naturais pelo homem (MEC, 2000). Porém, esses valores precisam estar associados a práticas das pessoas, por exemplo, as formas de manutenção da limpeza do ambiente escolar, como jogar lixo de preferência nos cestos de reciclagem ambiental, cuidar das plantas da escola, manter o banheiro limpo e formas de evitar o desperdício.

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), a educação ambiental deve ser um processo constante em que os indivíduos e a comunidade tomam consciência do seu meio ambiente. De tal

maneira, é necessário que a escola proporcione um ambiente escolar saudável e coerente com aquilo que pretende que seus alunos aprendam, a fim de que possa contribuir para a formação de cidadãos conscientes de suas responsabilidades com o meio ambiente (MEC, 2000).

É importante que seja incluído no projeto pedagógico das escolas estudos sobre educação ambiental, cujo objetivo principal seja proporcionar autoconhecimento, socialização e aprendizado. E que tudo isso leve a um conhecimento ambiental despertando uma consciência capaz de modificar comportamentos e atitudes de todos que os cercam.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA

O melhor ambiente para proporcionar a consciência no futuro da humanidade é na escola. E para isso, é necessário que a ela trabalhe com atitudes, formação de valores, habilidades, procedimentos e não somente informações e conceitos, pois o futuro depende da relação estabelecida entre a natureza e o uso dos recursos naturais pelo homem (MEC, 2000). Porém, esses valores precisam estar associados às práticas das pessoas, por exemplo, as formas de manutenção da limpeza do ambiente escolar e formas de evitar o desperdício.

As várias disciplinas do ensino médio e fundamental podem trabalhar os aspectos da educação ambiental através dos temas transversais, segundo o Ministério da Educação, são aqueles que estão focados na compreensão da realidade. É relevante identificar os temas voltados para o meio ambiente, que sejam trabalhados a partir das áreas afins com as Ciências, como as disciplinas de geografia, biologia, principalmente (DE SOUZA PINHEIRO, 2021; DA SILVA, 2021).

COMPOSTAGEM

Sérios riscos ao homem e ao meio ambiente são formados quando resíduos urbanos são depositados de forma desordenada, originando a formação de chorume e gases tóxicos, além da poluição dos solos, das águas e do ar, proliferando microorganismos patógenos. Uma forma eficiente de minimizar o problema é reciclar os resíduos sólidos em fertilizantes orgânicos, através do processo de compostagem (VESPAS, 2000; PEREIRA NETO, 1998).

Apesar da cidade de Teresina produzirem média 1,2 mil toneladas de lixo por dia de uma forma geral no qual sua maior parte são de resíduos domiciliares com 543 toneladas por dia em média segundo a SEMDUH somente em 2019 a cidade tem disposição de aterros sanitários como uma maneira de tentar diminuir o problema dos lixões seria minimizar a produção de resíduos sólidos orgânicos, por

exemplo, restos de comidas, vegetais, folhas e derivados, através de um tipo de reciclagem, a compostagem(SEMDUH, 2021).

A compostagem é uma forma de decomposição biológica de materiais orgânicos controlados pela ação de micro-organismos que transforma os resíduos em um produto diferenciado do de origem, os primeiros relatos da utilização de compostagem são relatados na china por volta de 2000 anos(FIGUEIRA JÚNIOR, 2012; AVERSARI, 2018).

Segundo Kiehl (1998), existem algumas etapas para a formação do composto. A fase inicial de fitotoxicidade ou de composto cru é acelerada, acompanhada da fase semicrua ou bioestabilização, para abranger a humificação, terceira etapa, seguida da mineralização de componentes da matéria orgânica. Após certo período, obtém como resultado um fertilizante orgânico que fornece sais minerais essenciais para a nutrição da planta, funcionando também como um condicionador de propriedades biológicas e físicas do solo, estando assim apto a ser utilizado em solos agrícolas, produção de mudas e na recuperação de áreas degradadas.

Em virtude desse aspecto, este trabalho foi desenvolvido objetivando uma conscientização dos estudantes do Ensino Médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI) – Campus Teresina Sul sobre a problemática do lixo, tendo em vista principalmente os resíduos orgânicos, analisando soluções para a diminuição destes, além da produção de adubo.

COMPOSTAGEM

Sérios riscos ao homem e ao meio ambiente são formados quando resíduos urbanos são depositados de forma desordenada, originando a formação de chorume e gases tóxicos, além da poluição dos solos, das águas e do ar, proliferando microorganismos patógenos. Uma forma eficiente de minimizar o problema é reciclar os resíduos sólidos em fertilizantes orgânicos, através do processo de compostagem (VESPAS, 2000; PEREIRA NETO, 1998).

A cidade de Teresina não dispõe de aterros sanitários e uma maneira de tentar diminuir o problema dos lixões seria minimizar a produção de resíduos sólidos orgânicos, por exemplo, restos de comidas, vegetais, folhas e derivados, através de um tipo de reciclagem, a compostagem.

A compostagem é uma forma de decomposição biológica de materiais orgânicos controlados pela ação de micro-organismos que transforma os resíduos em um produto diferenciado do de origem.

Segundo Kiehl (1998), existem algumas etapas para a formação do composto. A fase inicial de fitotoxicidade ou de composto cru é acelerada, acompanhada da fase semicrua ou bioestabilização, para abranger a humificação, terceira etapa, seguida da mineralização de componentes da matéria orgânica. Após certo período, obtém como resultado um fertilizante orgânico que fornece sais minerais essenciais para a nutrição da planta, funcionando também como um condicionador de propriedades biológicas e físicas do solo, estando assim apto a ser utilizado em solos agrícolas, produção de mudas e na recuperação de áreas degradadas.

Em virtude desse aspecto, este trabalho foi desenvolvido objetivando uma conscientização dos estudantes do Ensino Médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI) – Campus Teresina Sul sobre a problemática do lixo, tendo em vista principalmente os resíduos orgânicos, analisando soluções para a diminuição destes, além da produção de adubo.

MATERIAL E MÉTODOS

Para atender aos objetivos propostos o trabalho fundamentou-se na pesquisa-ação participativa, uma metodologia qualitativa, que envolve a compostagem. Este modelo de pesquisa tem por finalidade explorar um conjunto de opiniões e representações sociais sobre o tema a ser tratado, buscando pontos em comuns da dimensão das opiniões, apesar das singularidades próprias da biografia de cada interlocutor (MINAYO, 2007; PEDRINI e JUSTEN, 2006). Segundo Demo (1992), tal metodologia possibilita articular a pesquisa na produção de conhecimentos, aliando a ação educativa com a participação dos envolvidos.

A pesquisa foi desenvolvida com o auxílio de 15 alunos do Ensino Médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Do Piauí (IFPI) Campus Teresina Zona Sul.

A realização do estudo foi feita em duas etapas: a primeira objetivava em saber os conhecimentos prévios dos sujeitos envolvidos acerca da reciclagem, do processo de compostagem e dos tipos de materiais possíveis para a produção de adubo orgânico a partir de questionários. A segunda parte foi o desenvolvimento de um adubo orgânico derivado de restos de alimentos feito pelos alunos envolvidos na pesquisa.

COLETA DA MATÉRIA ORGÂNICA

Os resíduos de sólidos orgânicos foram coletados no refeitório do IFPI – Campus Teresina Zona Sul. Foram feitas cinco coletas, que girou em torno de 50 kg de resíduo sólido orgânico. O material foi

acondicionado em sacos plásticos e levado até o local de fazer a compostagem, sendo esse o próprio terreno da instituição de ensino.

A seleção do material foi feita utilizando 1/3 de carbono e nitrogênio, relação estabelecida por estudiosos. Para isso, foi pesquisada a relação de carbono/nitrogênio que apresentavam nos alimentos presentes no refeitório da instituição, além da utilização de esterco de boi e folhas secas para auxiliarem no processo.

COMPOSTEIRAS

Para a montagem das composteiras, local onde se armazena o lixo orgânico sob forma de pilha/pirâmide, levou-se em consideração a oferta de água do local, exposição à luz e aos ventos excessivos, a quantidade e a qualidade do material que seria compostado.

Os resíduos sólidos orgânicos passaram por um processo simples de fermentação, cuja temperatura chegou a 40 °C (termômetro de 100°C). O tempo de fermentação durou aproximadamente 15 dias, determinados pela quantidade de composto (visto que esse processo pode durar vários dias). Logo após, quando o composto tornou-se estabilizado, ou seja, quando a fermentação havia cessado, ele foi armazenado em sacos plásticos para posterior utilização em hortas que serão desenvolvidas posteriormente nesta instituição de ensino.

RESULTADOS

ANÁLISES DOS QUESTIONÁRIOS

A interpretação dos dados foi baseada na análise dos conteúdos dos resultados presentes nos questionários. A principal pergunta girava em torno de saber se eles sabiam quais os tipos de material era possível ser reciclado. Foram dados alguns exemplos e eles indicavam qual acreditava ser possível sofrer o processo de reciclagem. A figura 1 mostra os resultados obtidos.

Figura 1: Representação das indicações dos alunos sobre os materiais recicláveis.

De acordo com os resultados, percebe-se que todos os estudantes sabem da existência do processo da separação do lixo por reciclagem e que possuíam razoável facilidade para discernir o que pode ser utilizado no processo de reciclagem. Todos os dos alunos responderam que papéis são recicláveis, resultado que, provavelmente, relaciona-se com a difusão desta informação na mídia e também com o contato com os símbolos da reciclagem em materiais didáticos.

Dentre os itens não recicláveis, como espelho, etiquetas, fotografias e papel higiênico nenhum desses ficou isento de indicação, demonstrando a necessidade de trabalhos que envolvam a familiarização dos estudantes com materiais que não apresentam características recicláveis. Considera-se que os baixos percentuais obtidos para fotografias, papel higiênico e etiquetas, como sendo possivelmente recicláveis, certamente pela associação com a sua composição de papel. Pode-se notar, então, a capacidade dos estudantes em associar o “ser de papel” e o “ser reciclável”.

Tendo em vista os resultados obtidos a respeito dos estudantes compreenderem o que é a reciclagem, assim como os materiais possíveis para a realização deste processo, verificou-se posteriormente o conhecimento dos mesmos sobre quais materiais poderiam ser utilizado para a produção de adubo. A Figura 2 retrata as respostas encontradas para este novo dado.

Figura 2: Porcentagem sobre as concepções dos alunos a respeito dos materiais que produzem adubo.

Primeiramente, a produção de adubo é feita a partir de matéria orgânica, ou seja, material proveniente diretamente de origem animal ou vegetal. A principal análise desta Figura consiste em averiguar se os alunos compreendem de que se trata a “matéria orgânica”.

Nota-se que alguns alunos tiveram dificuldade em identificar tais elementos, que favoreciam a produção do adubo, visto que indicaram os objetos: papel, cinzas e metal, os quais são inviáveis para a formação do composto.

Verificando a existência de algumas dificuldades com o tema proposto, foram ministradas aulas, principalmente levantamento de questões que pudessem enriquecer o conhecimento e compreensão sobre a compostagem e a produção de adubo orgânico.

As exposições feitas retratavam que o processo de compostagem era realizado com restos de alimentos, exceto carnes que poderia atrair roedores e prejudicar o processo; cascas de frutas e vegetais; folhas secas e esterco também auxiliariam o processo por conter quantidades significativas de nitrogênio, necessário para a consistência do produto. Depois de sanadas as dúvidas foi iniciado a produção do composto.

COMPOSTAGEM NO AMBIENTE ESCOLAR

O projeto promoveu a articulação do ensino, por tratar-se de uma atividade didática pedagógica à comunidade escolar no tocante às ações educativas.

Considerando que algumas metas foram atingidas, como o despertar da conscientização dos alunos, evidenciado pela boa aceitação ao projeto, fica comprovado ser possível trabalhar a Educação Ambiental como tema transversal.

Segundo Alencar (2005), trabalhar com a realidade local oferece um universo acessível e passível de ser campo de aplicação do conhecimento. Ter uma visão contextualizada da realidade ambiental, além do aspecto físico e das condições sociais e culturais oferece aos alunos uma maior diversidade de experiência fazendo com que os alunos possam compreender a complexidade e a amplitude das questões ambientais.

Observou-se, ainda, que as dificuldades para implementar qualquer mudança na dinâmica do ensino passam por diversos motivos como: falta de tempo para o preparo das atividades extracurriculares propostas, baixa carga horária de algumas disciplinas, falta de apoio institucional, desmotivação de alguns alunos, e até mesmo falta de fundamentação teórica para alguns.

Pelo aspecto de aceitação e execução do projeto, pode-se aferir que há a necessidade de um trabalho mais prolongado com os alunos, a partir de constantes reformulações nos planejamentos elaborados e aprofundamento no estudo de conteúdos específicos e também das metodologias para este fim.

Ao final do processo de compostagem desenvolvido o adubo orgânico produzido foi armazenado para a utilização em hortas que serão utilizadas na própria instituição e, posteriormente, verificando a qualidade do composto produzido verifica-se a possibilidade de arrecadação de fundos pela venda do material.

A formação do composto proveniente dos resíduos orgânicos contribuiu como um elemento que reduz os danos causados pela disposição desordenada do lixo no meio urbano; problemas de saneamento ambiental, proporcionar a recuperação de solos agrícolas (LIMA, 2004). No caso dos alunos do IFPI-Teresina Zona Sul houve a conscientização e aprendizagem sobre a reciclagem, especificamente a compostagem.

CONCLUSÕES

A escola tem um papel fundamental na formação e conscientização dos alunos, sendo essencial o trabalho com temas que envolvam o cotidiano destes, principalmente, relacionados à contribuição que eles podem oferecer para minimizar os problemas ambientais.

A compostagem feita no IFPI – Teresina Zona Sul contribuiu para a formação de cidadão consciente dos problemas ambientais, mostrando uma forma de diminuir com a produção de lixo gerada diariamente pela população.

A partir da metodologia abordada, verificou-se uma aprendizagem significativa a partir do envolvimento, comprometimento e responsabilidade que eles demonstraram ter com o processo de reciclagem.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALENCAR, M. M. M. Reciclagem de lixo numa escola pública do município de Salvador. Candombá – Revista Virtual, v.1, n.2, p. 96-113, dez. 2005.

AVERSARI, Marcos et al. Aquicultura de microalgas: uma proposta para a melhoria na qualidade de vida de pescadores do Nordeste do Brasil. 2018. 57f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente). Universidade Federal da Paraíba.

BARBO, I. P. P. O despertar da consciência ambiental: um diagnóstico das práticas de educação ambiental formal. Anápolis, GO, 2009. 161f. Dissertação (Mestrado em Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente). Centro Universitário de Anápolis.

da SILVA, Paulo Sérgio Araújo; DA CRUZ, Lucas de Jesus Soares. Problematizando concepções de professores de ciências sobre Educação Ambiental e cidadania crítica: uma parceria entre o engenheiro ambiental e a escola. Revista Brasileira de Educação Ambiental (RevBEA), v. 16, n. 2, p. 488-500, 2021.

DE MIRANDA, Donizeti Leão et al. Educação Ambiental a partir da Agenda 2030: experiências da conscientização e do uso racional da água na educação municipal de Varginha (MG). Revista Brasileira De Educação Ambiental (RevBEA), v. 16, n. 2, p. 174-190, 2021.

DEMO, P. Metodologia científica em ciências sociais. 2 ed., São Paulo: Atlas, 1992.

DE SOUZA PINHEIRO, Alexsandra Alves; DE OLIVEIRA NETO, Benjamim Machado; MACIEL, Nara Maria Tavares Câmara. A importância da educação ambiental para o aprimoramento profissional, docente e humano. Ensino em Perspectivas, v. 2, n. 1, p. 1-12, 2021.

FERNANDES, R. S.; SOUZA, V. J.; PELISSARI, V. B., Percepção ambiental dos alunos da faculdade brasileira – UNIVIX, Vitória, E. S. Congresso Brasileiro de Pesquisas Ambientais e Saúde. 3: Anais e Resumo Núcleo de Pesquisas Ambientais da Baixada Santista, jul. 2003. Santos, SP.

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 2002.

FIGUEIRA JÚNIOR, Edson Alves et al. Projeto industrial para aeração automática de leiras de compostagem orgânica. 2012. 86f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica). Universidade Federal de Uberlândia.

KIEHL, E. J. Manual de Compostagem: maturação e qualidade do composto. Piracicaba, 1998.

LIMA, C. R. C. Estudo comparativo entre adubação orgânica e inorgânica, na conservação de solos agrícolas, através de indicadores de sustentabilidade. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Geoquímica e Meio Ambiente) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA, 2004.

MALHEIROS, Edwin Hennington Pereira; CORRADI, Analaura; ASSUMPÇÃO, Douglas Junio Fernandes. COMPORTAMENTO DE CONSUMIDORES E CARACTERÍSTICAS NO DESCARTE DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EM BAIRRO RESIDENCIAL DE BELÉM-PARÁ. Revista Augustus, v. 26, n. 53, p. 44-62, 2021.

MEC. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: meio ambiente: saúde. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2000.

MINAYO, M.C.S. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 2007. PEDRINI, A.G.; JUSTEN, L. Avaliação em EA no contexto ibero-americano: estudoexploratório. Anais do Congresso Ibero-americano de Educação Ambiental, 2006.

PEREIRA NETO, J. T. Lixo Urbano no Brasil: Descaso, Poluição Irreversível e Mortalidade Infantil. Ação Ambiental - Universidade Federal de Viçosa, agosto/setembro, p. 8-11. 1998.

RODRÍGUEZ, Camila Segovia et al. Poluição por resíduos plásticos no oceano: o dever jurídico de aplicação do princípio da precaução para impedir os danos ao ambiente marinho. 2021.168f. Dissertação (Mestrado em Direito). Universidade Federal de Santa Catarina.

SEMDUH, disponível em <https://semduh.teresina.pi.gov.br/>. Acesso em 23 abr. de 2021.

VALLE, C. E. Qualidade ambiental: ISO 14000. 5. ed. São Paulo: Senac, 2004.

VESPA, I.C.G. Escola limpa: Reciclagem de lixo. 1º Simpósio da Unesp sobre o Lixo e suas Múltiplas Destinações. Águas de São Pedro, 2000.

VIEIRA, Solange Reiguel; CAMPOS, Marília Andrade Torales. Contribuições do debate sobre avaliação de políticas públicas para o campo da Educação Ambiental. Revista Brasileira De Educação Ambiental (RevBEA), v. 16, n. 2, p. 248-258, 2021.

Capítulo 10

10.37423/210403918

AVALIAÇÃO MINERAL DE SORGO SUBMETIDO A SALINIDADE E COMPOSTOS ORGÂNICOS

ROBSON ALEXSANDRO DE SOUSA

*UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO
GRANDE DO NORTE*

CHERLYSON CUNHA DE MEDEIROS

*UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO
GRANDE DO NORTE*

Resumo: O objetivo deste trabalho foi verificar os efeitos da salinidade da água de irrigação e de compostos orgânicos sobre a composição mineral do sorgo cv BRS Ponta Negra. As plantas foram cultivadas em vasos contendo 23 kg de solo arenoso, em casa de vegetação. Os níveis de salinidade foram 0,2; 2,0; 4,0; e 6,0 dS m⁻¹. Os compostos orgânicos foram o esterco bovino curtido e o biofertilizante Ative®. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com cinco repetições, em esquema fatorial 4 x 3. Avaliou-se os teores de K⁺ nos colmos + bainhas e nos limbos foliares. O aumento da salinidade da água mostrou o efeito antagônico do íon potássio com o sódio, pois ocorreram decréscimos no acúmulo de K⁺ na parte aérea das plantas de sorgo, entretanto, na presença do esterco bovino e biofertilizante houve tendência de aumento deste íon.

Palavras-chave: Irrigação; Matéria orgânica; Minerais.

INTRODUÇÃO:

A porção semiárida do Nordeste brasileiro apresenta um complexo quadro de escassez de água. Com o intuito de superar esse quadro, a prática de irrigação consiste na melhor maneira de garantir a produção agrícola com segurança. No entanto, irrigar sem o manejo adequado aliado a existência de elevada evapotranspiração e de precipitações insuficientes para lixiviar os sais do solo contribuem para o acúmulo destes no solo, causando a salinização das áreas irrigadas (NOBRE et al., 2011). Varias alternativas vem sendo testadas, entre elas a aplicação de matéria orgânica como forma de mitigar os efeitos deletérios da salinidade (YIP; ELIMELECH, 2013). A matéria orgânica do solo é considerada como todo material no solo que contém carbono orgânico, incluindo os microrganismos vivos e mortos, resíduos de plantas e animais em estágios variados de decomposição, a biomassa microbiana, as raízes e a fração mais estável, denominada húmus. São divididas em três frações com distintas características físico-químicas: ácidos fúlvicos, ácidos húmicos e humina, contribuindo com cerca de 85 a 90% do carbono orgânico total, são os principais componentes da matéria orgânica do solo (PRIMO et al., 2011). Os benefícios da adubação nas características biológicas do solo são também bastante amplos, pois eleva os teores de matéria orgânica e adiciona substrato (fonte de alimento) para os microrganismos do solo. A maior atividade desses microrganismos no solo aumenta a disponibilidade de nutrientes para as plantas através da ação dos microrganismos decompositores (AMJAD et al., 2014). Freire et al. (2013) avaliando a nutrição mineral e teores de pigmentos fotossintetizantes à época da primeira floração do maracujazeiro amarelo, submetido a irrigação com águas de baixa e alta salinidade, sem e com biofertilizante bovino, e sem e com cobertura morta, concluíram que a irrigação com água salina provocou desequilíbrio na acumulação foliar de potássio, cálcio e magnésio e o biofertilizante bovino atenuou os efeitos depressivos dos sais nos teores dos pigmentos clorofilianos e carotenoides do maracujazeiro amarelo. Em regiões semiáridas, o acúmulo de sais, especialmente o Na^+ e Cl^- , tem afetado o funcionamento da raiz pela redução do potencial osmótico devido a um maior desequilíbrio iônico no solo, o que reduz a absorção de outros nutrientes minerais, principalmente K^+ e Ca^{2+} (TERCEIRO NETO et. al., 2014). O sorgo tem potencial para se desenvolver e se expandir em regiões que apresentam risco de ocorrência de deficiência hídrica, distribuição irregular de chuvas e altas temperaturas, condições que caracterizam o semiárido, que ocupa 49% da região Nordeste do Brasil, com uma precipitação pluviométrica de 300 a 700 mm, de distribuição irregular, ocorrendo em um período de três a cinco meses, seguido de sete a nove meses de seca prolongada (SANTOS et al., 2007). Apresentando uma moderada resistência à seca, o sorgo possui uma característica bromatológica semelhante ao milho o que favorece ao processo de silagem

além de apresentar uma tolerância moderada ao estresse salino (COELHO et al., 2014). Diante do exposto, a finalidade deste trabalho foi avaliar o acúmulo do íon potássio em partes vegetativas do sorgo cv BRS Ponta Negra submetido a dois compostos orgânicos e irrigado com água salina, em casa de vegetação, no intuito de avaliar o efeito dos compostos orgânicos na mitigação da salinidade na planta.

METODOLOGIA:

O experimento foi conduzido em casa de vegetação localizada na Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias - UFRN, em Macaíba –RN. Utilizou-se a cultura do sorgo cv. BRS Ponta Negra, classificada na categoria forrageiro de pequeno porte. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com cinco repetições no esquema fatorial 4 x 3, totalizando doze tratamentos. Foram estudados quatro níveis de salinidade da água de irrigação (0,2; 2,0; 4,0 e 6,0 dS m⁻¹); e, dois compostos orgânicos: sem composto orgânico (testemunha), esterco bovino curtido (20 t ha⁻¹) e biofertilizante Ative® (50 L ha⁻¹). Para o preparo das soluções salinas, foram utilizados os sais de NaCl, dissolvidos em água de açude, obedecendo-se à relação entre a condutividade elétrica da água de irrigação (CEa) e sua concentração (mg L⁻¹ = 640 x CE). Na Tabela 1, observa-se a composição química das águas utilizadas para a irrigação no experimento.

Tabela 1. Composição química das águas de irrigação usadas no experimento.

Água	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Cl ⁻	CO ₃ ²⁻	HCO ₃ ⁻	pH	CEa (dS m ⁻¹)	RAS
	mmol _c L ⁻¹									
S0	0,15	0,22	0,85	0,20	1,12	0,00	0,42	7,0	0,20	1,11
S1	0,50	0,50	21,35	0,15	19,81	0,00	0,33	6,4	2,00	15,69
S2	0,70	0,30	41,39	0,16	38,50	0,00	0,28	6,2	4,00	26,85
S3	0,50	0,50	56,35	0,15	54,15	0,00	0,24	6,2	6,00	37,03

Fonte: Laboratório de Análises de Solo, Água e Planta – EMPARN. CEa = condutividade elétrica da água de irrigação; RAS = relação de adsorção de sódio. S0 = água de açude do Bebo; S1 = solução salina 1; S2 = solução salina 2; S3 = solução salina 3.

O turno de rega foi diário. A quantidade de água aplicada no experimento foi estimada com o objetivo de o solo alcançar a sua capacidade de campo e o excesso de água percolasse adicionando-se uma fração de lixiviação de 15%, aproximadamente. Até o desbaste, utilizou-se água de Açude do Bebo (S0) para a irrigação. Para a instalação do experimento, colocou-se aproximadamente 23 kg de solo arenoso (Tabela 2) em vasos plásticos de 32 cm de diâmetro na base maior e 24 cm de diâmetro na base menor e altura 34 cm, perfurados na face inferior.

Tabela 2. Atributos químicos e classificação textural do solo utilizado no experimento.

Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	H ⁺ +Al ³⁺	Al ³⁺	SB	t	P	pH	CE _{es}	PST	V	Dg	T
cmol _c kg ⁻¹								(mg dm ⁻³)		(dS m ⁻¹)	(%)		(g cm ⁻³)	
0,8	0,7	0,05	0,13	1,82	0,65	1,7	3,5	1,31	5,0	0,1	1,0	49	1,46	Areia

Fonte: Laboratório de Solos e Água – DCS/CCA/UFC. SB = soma de bases; t = capacidade de troca catiônica efetiva; pH = pH em água (1:2,5); CE_{es} = condutividade elétrica do extrato de saturação; PST = porcentagem de sódio trocável; V = saturação por bases; Dg = densidade global; T = textura

Antes da semeadura, em fundação, aplicou-se o equivalente a 20 t ha⁻¹ de esterco bovino curtido, sendo homogeneizado na camada de 0-0,20 m nos vasos correspondentes a esse tratamento, cuja análise química está na Tabela 3.

Tabela 3. Composição química do esterco bovino utilizado no experimento.

N	P	P ₂ O ₅	K ⁺	K ₂ O	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Fe	Cu	Zn	Mn	CE _{eb}
g kg ⁻¹							mg kg ⁻¹				(dS m ⁻¹)
5,9	2,4	5,5	0,8	1,00	14,1	4,7	1.150,80	19,8	135	145,9	2,63

Fonte: Laboratório de Solos e Água – DCS/CCA/UFC. CE_{eb} = condutividade elétrica do esterco bovino

A aplicação do biofertilizante Ative[®], Tabela 4, iniciou-se vinte dias após a semeadura, na dose de 50 L ha⁻¹, segundo recomendação do fabricante, nos vasos correspondentes a esse tratamento, colocando-se em cada vaso 0,5 mL de biofertilizante.

Tabela 4. Composição química do biofertilizante Ative[®] concentrado utilizado no experimento.

Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Cl ⁻	CO ₃ ²⁻	HCO ₃ ⁻	pH	CE _b	RAS _b
mmol _c L ⁻¹								(dS m ⁻¹)	
246,6	80,4	70,11	10,3	900,00	0,00	0,00	2,8	704,00	5,5

Fonte: Laboratório de Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas – DCAT/UFERSA. CE_b = condutividade elétrica do biofertilizante. RAS_b = Relação de adsorção de sódio do biofertilizante

A semeadura foi realizada colocando-se dez sementes de sorgo em cada vaso. A germinação ocorreu cinco dias após o plantio, sendo o desbaste realizado após dez dias, deixando-se duas plantas por vaso. Em seguida, iniciou-se a aplicação de água salina nos tratamentos correspondentes. A adubação química constituiu na aplicação de ureia (0,94 g vaso⁻¹), cloreto de potássio (0,49 g vaso⁻¹) e superfosfato simples (1,96 g vaso⁻¹), seguindo a recomendação para a cultura. Aos sessenta dias após a semeadura, procedeu-se a coleta do experimento. O material coletado após pesagem foi acondicionado em sacos de papel e levados a estufa com circulação forçada, a 65 °C, por um período

de sete dias, quando se constatou o peso constante das amostras, para obtenção da matéria seca total. E a partir desta foram finamente triturados em moinho tipo Willey, preparou-se o extrato para a determinação dos teores de K^+ . O extrato foi preparado utilizando 200 mg do pó diluído em 15 mL de ácido clorídico 1 N e, em seguida, agitado por 60 minutos e filtrado, utilizando-se papel de filtro de filtragem rápida (MIYAZAWA et al., 1984). Os teores de K^+ foram determinados através de fotometria de chama (MALAVOLTA et al., 1989). Os resultados das variáveis foram submetidos à análise de A semeadura foi realizada colocando-se dez sementes de sorgo em cada vaso. A germinação ocorreu cinco dias após o plantio, sendo o desbaste realizado após dez dias, deixando-se duas plantas por vaso. Em seguida, iniciou-se a aplicação de água salina nos tratamentos correspondentes. A adubação química constituiu na aplicação de ureia (0,94 g vaso⁻¹), cloreto de potássio (0,49 g vaso⁻¹) e superfosfato simples (1,96 g vaso⁻¹), seguindo a recomendação para a cultura. Aos sessenta dias após a semeadura, procedeu-se a coleta do experimento. O material coletado após pesagem foi acondicionado em sacos de papel e levados a estufa com circulação forçada, a 65 °C, por um período de sete dias, quando se constatou o peso constante das amostras, para obtenção da matéria seca total. E a partir desta foram finamente triturados em moinho tipo Willey, preparou-se o extrato para a determinação dos teores de K^+ . O extrato foi preparado utilizando 200 mg do pó diluído em 15 mL de ácido clorídico 1 N e, em seguida, agitado por 60 minutos e filtrado, utilizando-se papel de filtro de filtragem rápida (MIYAZAWA et al., 1984). Os teores de K^+ foram determinados através de fotometria de chama (MALAVOLTA et al., 1989). Os resultados das variáveis foram submetidos à análise de

variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey com $p < 0,05$ (comparação dos compostos orgânicos) utilizando-se o programa ASSISTAT 7.6 Beta. A análise de regressão foi empregada para a avaliação dos efeitos da salinidade da água de irrigação e da interação, quando significativa.

Resultados e Discussão: Na Figura 1A, verifica-se sem a presença dos compostos orgânicos decréscimo no teor do íon potássio no colmo + bainhas de 87%, até atingir a $CEa = 3,85 \text{ dS m}^{-1}$, onde se constata o ponto de mínimo do modelo quadrático, ocorrendo a partir deste nível aumento de 69% até a máxima salinidade aplicada. A presença do esterco bovino, contribuiu para o decréscimo de 72% no teor de potássio no colmo + bainhas quando houve o incremento da salinidade até a $CEa = 3,55 \text{ dS m}^{-1}$, ocorrendo então aumento no teor de potássio no colmo + bainhas de 58% no tratamento de maior salinidade (Figura 1A). O efeito do biofertilizante foi irregular no teor de potássio no colmo + bainhas (Figura 1A), explicado por modelo de regressão cúbico.

Figura 1. Teor de potássio colmo + bainhas (A) e nos limbos foliares (B) de plantas de sorgo cv. BRS Ponta Negra em função da salinidade da água de irrigação. SC = testemunha; EB = esterco bovino; Bio = biofertilizante Ative®. CEa = condutividade elétrica da água de irrigação. *Significativo pelo teste F a 5%; ** Significativo pelo teste F a 1%.

O comportamento do íon potássio nos limbos foliares (Figura 1B) demonstra que sem aplicar nenhum composto orgânico houve decréscimo de 47% nos primeiros níveis de salinidade até a CEa = 3,25 dS m⁻¹ atingindo neste ponto o valor mínimo de 7,9 g kg⁻¹ MS, no entanto, houve acréscimo de 42% na maior salinidade. Nos tratamentos com esterco bovino, a salinidade reduziu em 24% o teor de potássio nos limbos foliares até a CEa = 2,65 dS m⁻¹, passando a partir deste nível ocorrer acréscimo de 37% no nível de salinidade mais elevado (Figura 1B). O teor de potássio nos limbos foliares apresentou comportamento semelhante ao teor de potássio no colmo + bainhas, quando se aplicou o biofertilizante, representado por modelo cúbico de regressão (Figura 1B). O comportamento do teor de potássio tanto no colmo + bainhas como nos limbos foliares indica o efeito antagônico que o K⁺ tem com o íon sódio (TERCEIRO NETO et. al., 2014), no entanto, a utilização do esterco bovino e do biofertilizante proporcionam aumento de K⁺ nos limbos foliares, mas sem representar diminuição nos efeitos deletérios da salinidade.

CONCLUSÕES:

O aumento da salinidade da água mostrou o efeito antagônico do íon potássio com o sódio, pois ocorreram decréscimos no acúmulo de K⁺ na parte aérea das plantas de sorgo, entretanto, na presença do esterco bovino e biofertilizante houve tendência de aumento deste íon.

AGRADECIMENTOS:

CAPES, INCT-Sal, EAJ-UFRN

REFERÊNCIAS:

AMJAD, M.; AKHTAR, J.; RASHID, M. S. Evaluating the effectiveness of biofertilizer on salt tolerance of cotton (*Gossypium hirsutum* L.). Archives of Agronomy and Soil Science, (ahead- of-print), p.1-13, 2014.

COELHO, D. S.; SIMÕES, W. L.; MENDES, A. M. S.; DANTAS, B. F.; RODRIGUES, J. A.

S.; SOUZA, M. A. Germinação e crescimento inicial de variedades de sorgo forrageiro submetidas ao estresse salino. Revista Brasileira Engenharia Agrícola e Ambiental, v.18, n.1, p.25-30, 2014.

FREIRE, J. L. O.; CAVALCANTE, L. F.; NASCIMENTO, R.; REBEQUI, A. M. Teores de clorofila e composição mineral foliar do maracujazeiro irrigado com águas salinas e biofertilizante. Revista de Ciências Agrárias, v.36, n. 1, 57-70, 2013.

MALAVOLTA, E.; VITTI, G. C.; OLIVEIRA, S. A. Avaliação do estado nutricional das plantas: Princípios e Aplicações. Associação Brasileira para Pesquisa da Potassa e do Fosfato. Piracicaba, SP, 1989. 201p.

MIYAZAWA, M.; PAVAN, M. A.; BLOCH, M. F. M. Avaliação de métodos com e sem digestão para extração de elementos em tecidos de plantas. Ciência e Cultura, v.36, p.1953-1958, 1984.

NOBRE, R. G.; GHEY, H. R.; SOARES, F. A. L.; CARDOSO, J. A. F. Produção de girassol sobestresse salino e adubação nitrogenada. Revista Brasileira de Ciências do Solo, Viçosa, v. 35, p. 929-937, 2011.

PRIMO, D. C.; MENEZES R. S. C.; SILVA T. O. Substâncias húmicas da matéria orgânica do solo: uma revisão de técnicas analíticas e estudos no nordeste brasileiro. Scientia Plena v. 7, n. 5, 2011.

SANTOS, F. G.; RODRIGUES, J. A. S.; SCHAFFERT, R. E.; LIMA, J. M. P.; PITTA, G. V. E.;

CASELA, C. R.; FERREIRA, A. S. BRS Ponta Negra variedade de Sorgo Forrageiro. Comunicado Técnico, EMBRAPA, Sete Lagoas, MG, setembro, 2007. 6p.

TERCEIRO NETO, C.P.C.; MEDEIROS, J. F.; GHEYI, H. R.; DIAS, N. S; OLIVEIRA, F. R.

A. Crescimento e composição mineral do tecido vegetal do melão ‘pele de sapo’ sob manejos de água salina. Irriga, v.19, n.2, p.255. 2014.

YIP, N. Y; ELIMELECH, M. Influence of Natural Organic Matter Fouling and Osmotic Backwash on Pressure Retarded Osmosis Energy Production from Natural Salinity Gradients. Environmental Science Technology, v. 47, p.12607-12616, 2013.

Capítulo 11

10.37423/210403922

DETERMINAÇÃO DE METAIS PESADOS NO SEDIMENTO DO ARROIO PELOTAS, PELOTAS – RS

Pedro José Sanches Filho

*Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia Sul-rio-grandense*

Daniele Martin Sampaio

*Instituto Federal de Educação, Ciência e
tecnologia Sul-rio-grandense*

Eduarda Medran Rangel

*Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia Sul-rio-grandense*

Glauco Rasmussen Betemps

*Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia Sul-rio-grandense*

Juliana Rampinini de Moura de Castro

*Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia Sul-rio-grandense*

Lutiana Carvalho da Costa

*Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia Sul-rio-grandense*

Resumo: Dada a importância Ambiental do Arroio Pelotas, considerado patrimônio cultural do estado além de importante recurso natural, foi desenvolvido neste trabalho a quantificação dos metais Cd, Cu, Cr, Pb e Zn, em seus sedimentos. Esta determinação, tem considerável importância, pois contribui para avaliação da qualidade da água, sendo essa utilizada para abastecimento de parte do município de foram avaliados a granulometria e matéria orgânica total. As amostras sofreram digestão pseudototal nítrico perclórica sendo os extratos resultantes analisadas por Espectrofotometria de Absorção Atômica em chama. Dos analitos apenas o Cd não foi detectado. O Pb foi determinado nos pontos próximos a chegada do Arroio ao canal são Gonçalo variando de 0,8 a 9,7 mg kg⁻¹. Os metais Cu, Cr e Zn apresentaram concentrações nas faixas de 0,6 a 6,2 mg kg⁻¹, 3,8 a 7,6 mg kg⁻¹ e 0,7 a 27,0 mg kg⁻¹ respectivamente, sendo o Zn o elemento majoritário na maioria dos pontos. Estes valores quando comparados ao Guia do Índice de Qualidade para Sedimentos do Canadá indicaram que as concentrações destes metais, não apresentaram risco a vida aquática no Arroio Pelotas. Porém os dados permitiram identificar pontos de entrada destes analitos relacionados a atividades antropogênicas.

Palavras chave: Absorção atômica, metais tóxicos, recursos hídricos.

1. INTRODUÇÃO

Pelo significado cultural, natural e ambiental, o Arroio Pelotas foi declarado como bem integrante do patrimônio cultural do estado, por intermédio da Lei 11.895/2003, de autoria de Bernardo de Souza, o arroio está indissociavelmente ligado à história de Pelotas e do Rio Grande do Sul. Esta lei segue a tendência do Direito Ambiental, que se manifesta através de legislações de incentivo e educativas, já que punir os danos ambientais, ainda que necessário, é insuficiente aos seus objetivos.

Para reafirmar a importância natural e ecológica do Arroio Pelotas, basta lembrar que se trata de um caso raro de curso d'água (no Brasil e no planeta) ainda vivo: em suas águas, em suas margens e em sua bacia são mais de trezentas as espécies animais (afora os insetos) identificadas (ARNDT., 2011). Segundo a autarquia responsável pelo abastecimento público para a região (SANEP), são captados do Arroio Pelotas cerca de 36 milhões de litros de água/dia para abastecimento, sendo o recurso hídrico que mais fornece água bruta para as estações de tratamento.

O Arroio Pelotas possui mais de uma nascente, e estas se encontram no município de Canguçu a nordeste da zona urbana, onde se localiza a nascente do arroio Pelotas-Mirim. O Arroio Pelotas começa a ser chamado com tal após a união do arroio Pelotas-Mirim e Caneleiras, ao sul do Parque Farroupilha, no município de Pelotas. Além de sua riqueza natural e fonte de água potável, o Arroio Pelotas está profundamente ligado às origens de Pelotas. A bacia do Arroio Pelotas é drenada pela região geomorfológica do planalto Sul-rio-grandense e pela planície costeira interna, em relação à Laguna dos Patos, conforme figura 1, mudando a paisagem ao longo de seu curso até sua foz no Canal São Gonçalo, sofrendo influências das variações que ocorrem no canal e, como consequência, na região estuarina da Laguna dos Patos (PIEDRAS et al., 2007).

Figura 1. Localização geográfica dos Pontos de amostragem no Arroio Pelotas – Rs.

Fonte: adaptado de Megiato e Moura, 2019.

Os rios representam a principal ligação entre o continente e o mar na maioria dos ciclos biogeoquímicos. Por outro lado, os rios são também a principal via de contaminação de áreas costeiras e estuarinas por poluentes gerados no continente (LACERDA; MALM, 2008).

O crescimento da população mundial estimula o aumento das atividades industriais, comerciais e agropecuárias. O desenvolvimento dessas atividades, de forma não sustentável, contribui para a contaminação dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos em decorrência do lançamento de rejeitos contendo metais, matérias orgânicas, fertilizantes, pesticidas, óleos, percolados tóxicos de lixões, entre outros. (SARAIVA et al. 2008).

Metais, especialmente metais-traço estão entre os contaminantes ambientais mais comuns e seu comportamento em diversos compartimentos ambientais merece destaque, principalmente por serem não degradáveis, permanecendo por longos períodos no ambiente, principalmente nos sedimentos e, portanto, representam ameaça potencial tanto à biodiversidade como aos ecossistemas (OLIVEIRA; MARINS, 2011; SILVA; HANSTED; TONELLO et al., 2019).

Entre as fontes destes elementos-traço para o ambiente costeiro estão o intemperismo de rochas e a erosão de solos ricos nestes elementos. Por outro lado, este aumento populacional e a necessidade de água levam ao represamento das bacias em grandes reservatórios que alteram os fluxos a jusante, particularmente em períodos de estiagem (OLIVEIRA; MARINS, 2011).

A lixiviação de solos pelas chuvas e as consequentes águas de escoamento superficial (runoff) fluem para os cursos d'água, transportando a matéria orgânica, que aparece sob as formas dissolvida e particulada, esse tipo de contribuição é considerada de origem externa (fonte alóctone). A contribuição de matéria orgânica de origem interna (fonte autóctone) é representada pela decomposição da biota aquática presente no corpo aquático (FELICE; SILVEIRA; ISIDORO et al., 2018).

As propriedades acumulativas e de redistribuição das espécies químicas nos sedimentos os qualificam como de extrema importância em estudos de impacto ambiental, registrando em caráter mais permanente os efeitos da contaminação (QUEIROZ, 2006; BAGGIO; HEINRICH, 2012). Sendo assim refletem a qualidade corrente do sistema aquático e, podem ser usados para detectar a presença de contaminantes que não permanecem solúveis após o seu lançamento em águas superficiais.

Além disso, os sedimentos agem como carreadores de possíveis fontes de poluição, como os metais pesados, que não são permanentemente fixados por eles e podem ser redistribuídos para a água através de mudanças nas condições ambientais tais como: pH, potencial redox ou a presença de quelantes orgânicos (MEURER et al., 2000). Tornando-se insolúvel em águas com pH neutro ou básico os metais pesados ao invés de se dissolverem, são adsorvidos rapidamente pelo material particulado orgânico se incorporando ao sedimento de fundo ou são assimilados por organismos participando assim da cadeia alimentar (NASCIMENTO; NASCIMENTO; CUNHA, 2020; SHEYKHI; MOORE, 2013).

Às margens do Arroio Pelotas existem atividades Industriais, bem como um número considerável de residências, que possuem contato com a água que é utilizada nos processos industriais, pesqueiro e lazer. Considerando a importância do corpo hídrico e a falta de dados sobre a qualidade de seus sedimentos este trabalho teve como objetivo avaliar os níveis dos metais Cd, Cr, Cu, Pb e Zn nos sedimentos ao longo do Arroio Pelotas, verificando assim a qualidade deste corpo hídrico em relação a este parâmetro.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1. ÁREA DE ESTUDO

A Bacia Hidrográfica do Arroio Pelotas (BHAP) se localiza na região sudeste do Estado Rio Grande do Sul, onde abrange quatro municípios: Canguçu, Morro Redondo, Arroio do Padre e Pelotas. Possui uma área total de aproximadamente 91000 ha. A BHAP está situada entre 31º e 32º sul e entre 52º e 53º oeste (Figura 1). As nascentes do principal afluente da BHAP, encontram-se grande parte no município

de Canguçu. O Arroio Pelotas possui uma extensão de aproximadamente 99 km e deságua no Canal São Gonçalo no município de Pelotas (MEGIATO; MOURA, 2019).

1.2 COLETA E PRESERVAÇÃO DAS AMOSTRAS

Foram analisadas amostras de água e sedimento de oito pontos de um determinado segmento do Arroio Pelotas, em dezembro de 2011, em triplicata obtendo um total de 24 amostras, conforme a Figura 1.

O sedimento superficial foi amostrado com o auxílio de uma draga de aço inoxidável tipo “*VanVeen*”, e as amostras de água foram coletadas da superfície do arroio.

Os pontos de amostragem foram distribuídos ao longo do Arroio Pelotas: P1 próximo a chegada do arroio ao canal São Gonçalo; P2 as margens de um conjunto residencial; P3 próximo ao desague de fluentes oriundo de uma empresa de beneficiamento de arroz; P4 próximo as instalações de um Frigorífico; P5 e P6 porção do arroio que atravessa uma zona rural; P7 a montante da ponte “Estrada do Cotovelo” (estrada não pavimentada zona rural) e P8 sob da “Ponte do Retiro” sobre a rodovia BR 116. A amostra final de cada ponto é o resultado da média amostral.

Após a coleta, as amostras foram armazenadas sob refrigeração a $\pm 4^{\circ}\text{C}$. Todos os pontos foram georreferenciados com utilização de um GPS modelo GARMIN Etrex Vista®, os dados estão apresentados junto a figura 1.

Todo o material utilizado neste trabalho foi previamente descontaminado por imersão em ácido nítrico (HNO_3) a 10%, por 24 horas com a finalidade de evitar a contaminação das amostras.

O preparo das amostras de sedimento para extração dos metais consistiu na secagem em estufa à 60°C por 48 horas, em seguida, foram maceradas em almofariz e peneiradas sendo a fração utilizada $<63\mu\text{m}$

Para digestão pseudo total ácida, foram pesadas 2 g de cada amostra, em triplicata, adicionou-se 1 mL de ácido perclórico, 8 mL de água régia 50%, levadas à banho-maria à 90°C por 30 minutos após filtração os extratos foram avolumados a 25,0mL com água Milli-Q, segundo o procedimento de Hortellani et al. (2005), com adaptações. Em paralelo a cada extração foram realizadas análises de brancos.

A determinação dos metais, foi realizada por espectrofotometria de absorção atômica em chama, em um espectrofotômetro GBC 932 Plus, com as condições operacionais referidas na Tabela 1.

Tabela 1. Condições operacionais utilizadas no espectrofotômetro de absorção atômica para a análise dos metais.

Elemento	Comprimento de onda (nm)	Largura da fenda (nm)	Energia da lâmpada (mA)	Gás-combustível
Cu	324,7	0,5	3,0	Ar-acetileno
Cr	425,4	0,2	6,0	N ₂ O-acetileno
Pb	217,0	1,0	5,0	Ar-acetileno
Zn	213,9	0,5	5,0	Ar-acetileno
Cd	228,8	0,5	3,0	Ar-acetileno

Para avaliar a exatidão do método foi utilizado o material de referência para solo e sedimento Natural Matrix Certified Reference – Materials Metals on soil/sediment #4 (NMCR#4) – Ultra Scientific Analytical Solutions.

Através de dez leituras do branco o limite de detecção (LD) foi calculado usando a soma da média do sinal do branco mais três vezes o seu desvio padrão, enquanto que o limite de quantificação (LQ) foi calculado pela soma da média do sinal do branco mais dez vezes seu desvio padrão (IUPAC 1997).

1.2 DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS

Durante a coleta foram determinados *in loco* pH e temperatura da água, nos sedimentos foram determinados pH, granulometria, umidade e matéria orgânica.

Os parâmetros físico-químicos foram medidos “*in loco*”. Os equipamentos utilizados para tais análises foram pHmêtro (Lutron/PH-206) e termômetro de mercúrio (ASTM-12C/Incoterm). O pH do sedimento foi medido usando a mistura sedimento/água local na proporção de 1:2 descrito por Yoon et. al (2006).

A determinação da granulometria das amostras de sedimento foi feita pela técnica do peneiramento seco do sedimento, sendo os percentuais obtidos relacionados à escala de Wentworth (SUGUIO, 1973). As peneiras utilizadas foram: 2mm; 1mm; 500µm; 250µm; 125µm; 63µm;

A determinação da umidade foi realizada por método gravimétrico com cerca de 20g de amostra e secagem em estufa a 105°C até peso constante. E a matéria orgânica total foi determinada através da perda de voláteis onde 2,0g de sedimento seco de cada ponto foram calcinados a 550°C por 4h (APHA, 2005).

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1. CARACTERIZAÇÃO PRELIMINAR FÍSICO –QUÍMICAS

A Tabela 2 apresenta os resultados para as determinações físico químicas realizadas nas amostras água e sedimento.

Tabela 2. Parâmetros físico-químicos do sedimento.

	Sedimento				Água	
	pH	Umidade (%)±RSD%	Matéria Orgânica (%)±RSD%	T*°C	pH	Profundidade (m)
P1	7,8	64,8±2,3	6,9±3,6	22,4	8,2	3,8
P2	7,5	61,5±2,5	2,9±3,2	23,8	7,2	4,6
P3	7,3	53,3±3,4	9,3± 1,9	24,2	7,3	5,0
P4	7,3	24,9±3,5	1,0±4,1	25,2	7,3	4,5
P5	7,2	23,7±4,4	0,2±4,3	25,0	7,7	3,5
P6	7,1	22,7±3,8	0,3±4,4	25,0	7,4	3,4
P7	7,2	51,7±1,2	3,0±3,2	24,4	7,3	2,2
P8	7,5	49,6±3,8	3,6±2,8	23,4	7,7	0,5

*T: Temperatura

Podemos observar que pH tanto nas águas como no sedimento apresentaram o mesmo comportamento ao longo do corpo hídrico apresentando pH de neutro a levemente alcalino com valores mais alto junto ao ponto 1 de 7,8 para o sedimento e 8,2 para água, provavelmente em função da influência das águas do canal São Gonçalo. As variações climáticas na região influenciam no volume de água doce de origem continental drenada pela BHAP.

Quando há a diminuição do volume de água doce de origem continental, pode ocorrer o aumento na concentração de alguns íons na água do Arroio Pelotas, ao mesmo tempo em que as regiões situadas próximas à foz podem sofrer a influência de água salinizada do Canal São Gonçalo, tais como cloreto, sódio, magnésio, potássio e cálcio (ARNDT, 2011). As amostragens do presente estudo foram realizadas em período de baixa precipitação pluviométrica. Este fato, também foi confirmado junto ao P8 (Ponte do Retiro), através da baixa profundidade (0,45m), pois o nível do Arroio Pelotas encontrava-se baixo.

Os Valores de umidade variaram de 22,7% a 64,8% de forma geral este parâmetro relaciona-se com a granulometria, quanto maior o teor de finos, maior a umidade maior resultado de uma maior quantidade de água intersticial. A matéria orgânica apresentou uma variação de 0,2%. A 6,9 % esses valores revelam sedimentos de natureza mineral, com moderado conteúdo de matéria orgânica, pois

apresentam menos de 10% de matéria orgânica em peso (PIERANGELI et al, 2005). Sedimentos com baixos teores de MO, resultam em uma elevada disponibilidade dos metais para o ambiente aquático, o que pode facilitar um processo de biomagnificação (MARONEZI; SANTOS; FARIA et al., 2019; SUJATHA et al, 2008).

A incorporação de metais no sedimento pode ocorrer através de processos de adsorção e complexação, sendo que apresentam grande capacidade de acumulação aqueles sedimentos com teor elevado de matéria orgânica e de granulometria fina, devido à elevada área superficial situação constatada em vários trabalhos como, por Rangel e Sanches Filho (2014) em estudos de canais de drenagem pluvial. Quinália et al, (2010) em seus estudos nos sedimentos do Lago Itaipú. A figura 2 apresenta a distribuição granulométrica média para os sedimentos amostrados.

Figura 2. Distribuição granulométrica média para os sedimentos amostrados

Os resultados sugerem que os pontos 1, 2, 7 e 8 apresentam condições de baixa turbulência o que favorece a deposição do material em suspensão já os pontos 5 e 6 apresentam uma granulometria predominantemente arenosa fina e baixíssimo nível de matéria orgânica. Os valores encontrados para os Pontos 1, e 8, indicam os locais de mais baixa turbulência, favorecendo a concentração de metais junto ao sedimento. A fração <63µm corresponde ao material mais fino (silte e argila), apresentando maior poder de adsorção para metais do que em outras frações granulométricas maiores (BARROS; AZEVEDO; BASTOS et al., 2021; LEMES et al, 2003). Segundo Lima (2005), a tendência natural dos complexos metálicos é de se adsorverem à matéria orgânica ou mesmo aos sedimentos de granulometria fina e, nesses casos, podem ser assimilados por organismos, tornando-se parte da cadeia trófica.

Segundo CONAMA nº 454 (2012), se a granulometria do material a ser dragado tiver 50% da sua composição areia grossa, muito grossa, cascalho ou seixo, fica dispensado de caracterização química, ecotoxicológica, o que não ocorreu em nenhum dos pontos do Arroio Pelotas.

Os resultados das análises dos metais, Cd, Cr, Cu, Pb e Zn, no sedimento do Arroio Pelotas, realizadas neste trabalho são apresentados na Tabela 3. Foi utilizado como parâmetro o Guia de Qualidade dos Sedimentos Estuarinos do Canadá (CCME EPC-98E, 1999) (Tabela 3), que estabelece o ISQG – Índice de Qualidade do Sedimento, PEL (Probable effect level) – Valor acima do qual efeito adverso é esperado em mg Kg⁻¹. A Tabela 3 também mostra os coeficientes de correlação e os limites de detecção (LD) e quantificação (LQ).

Tabela 3. Resultados das Análises de Metais Pesados no Arroio Pelotas (mg Kg⁻¹ ± RSD %), se Coeficiente de correlação linear (r²); coeficiente angular (a); coeficiente linear (b); limites de detecção (LD) e de quantificação (LQ), ambos em mg kg⁻¹.

	(mg Kg ⁻¹)				
	Cu (mg Kg ⁻¹)	Cr (mg Kg ⁻¹)	Pb (mg Kg ⁻¹)	Zn (mg Kg ⁻¹)	Cd (mg Kg ⁻¹)
P1	6,2 ± 5,1	7,64 ± 3,7	9,7±5,5	20,9 ± 1,4	Nd
P2	1,1 ± 8,6	5,24 ± 4,5	2,5±9,9	7,2 ± 1,9	Nd
P3	4,5 ± 6,3	8,92 ± 9,3	1,8±3,7	27,0 ± 3,4	Nd
P4	0,55 ± 9,5	3,82 ± 13,1	0,8±10,6	2,9 ± 7,9	Nd
P5	Nd	Nd	Nd	0,7 ± 12,6	Nd
P6	Nd	Nd	Nd	Nd	Nd
P7	1,1 ± 10,3	4,73 ± 8,3	Nd	8,8 ± 1,32	Nd
P8	2,4 ± 13,6	5,60 ± 6,30	Nd	14,7 ± 0,98	Nd
a	0,0652	0,0156	0,0020	0,1489	0,1228
b	0,0048	0,0027	0,0004	0,0427	0,0323
r ²	0,998	0,996	0,994	0,994	0,997
LD	0,2	0,5	0,3	0,4	0,3
LQ	0,5	1,6	0,7	0,9	1,4
TEL	18,7	52,3	30,2	124,0	0,7
PEL	108,0	160,0	112,0	271,0	4,2
Material de referência certificado					
Valor certificado	36,4	48,1	95,3	133,5	0,82
Intervalo de confiança	34,8 – 37,9	43,4 – 52,8	90,0 – 101,0	126,0 – 141,0	-----
Valor obtido	35,8 ±1,89	44,1 ±2,60	96,3 ±1,54	124,4 ±5,35	Nd
Rec. %	98	92	101	93	Nd

TEL: Threshold Effects Levels, PEL: Probable effect level, Nd: Não detectado, Rec%: percentual de recuperação.

Pode-se observar uma resposta linear para faixa de trabalho com Coeficientes de correlação linear entre 0,994 e 0,998. Os LD e LQ foram encontrados para o Cu (0,2 e 0,5 mg Kg⁻¹) enquanto o cromo apresentou maiores valores (0,5 e 1,6 mg Kg⁻¹).

A Tabela 3 apresenta os níveis de metais no sedimento de referência, os valores encontrados e os valores da matriz de referência. Os resultados obtidos demonstram que o método de extração foi adequado ao experimento. Os valores de recuperação variaram de 75,02 a 103,49%, sendo considerados por Jesus et al. (2004) como satisfatórios, tornando assim desnecessário quaisquer correções nas amostras. Dentre todos os metais analisados apenas o Cd não foi detectado em nenhum dos pontos.

Observa-se forte correlação entre a Matéria orgânica (MO) e o total metais presentes no sedimento indicado pelo valor de 0,97 para o coeficiente correlação de Pearson. Fazendo este estudo de correlação entre cada metal e a matéria orgânica e cada metal e o teor de finos observa-se que o Cu apresenta forte correlação com ambos apresentando coeficientes correlação de Pearson de 0,76 com o teor de finos e 0,91 com a MO. Já o Cr e Zn apresentaram fortes correlações com a MO com valores de 0,92 e 0,99 respectivamente. O Pb apresentou um comportamento diferente: não sendo encontrado na porção superior do Arroio, começa a aparecer de forma crescente nos pontos 4, 3, 2, e 1 apresentando uma correlação mais forte com os finos 0,77 do que com a MO.

É possível verificar que o Ponto 1, apresentou valores consideráveis para as concentrações de Zn, Cu e Cr, sendo o Zn o metal de maior predominância. No Ponto 1 é onde ocorre o encontro do Arroio Pelotas com o Canal São Gonçalo, portanto sua influência deve ser considerada nos resultados obtidos. Também comentado anteriormente a elevada concentração de MO e Finos favorece a deposição dos metais transportados de condições de alta turbulência. Já o Ponto 2 apresentou valores mais baixos, para a maioria dos metais, em relação aos Pontos 1 e 3, e mantendo o Zn como majoritário. No Ponto 2 é possível sugerir que a presença dos metais nesta área é atribuída ao aporte de efluentes domésticos do condomínio residencial, localizado às margens do arroio, bem como atividades náuticas. O Chumbo neste ponto foi superior ao ponto 3. Sanches Filho, Ziebell e Betemps (2015) em seu estudo nos sedimentos do Arroio São Lourenço descreveram as maiores concentrações de chumbo em área próxima ao estaleiro relacionando este metal com as embarcações.

A partir do ponto 4 seguindo para 3,2 e 1, constata-se o enriquecimento dos analitos refletindo os resultados das atividades antrópicas em suas margens

O Ponto 7 (Estrada do Cotovelo) e Ponto 8 (Ponte do Retiro), seguiram o mesmo padrão em relação as concentrações encontradas nos Pontos 1, 2 e 3, sendo que no Ponto 7 e Ponto 8 o Zn novamente foi o metal com maior concentração detectado. Os dados sugerem uma diluição dos metais no sentido dos pontos 8, 7, 6 e 5. No caso do Zn, este foi o metal majoritário encontrado na maioria dos pontos analisados, estando em acordo com os resultados apresentados por Betemps e Sanches Filho (2012), que também aponta o Zn como elemento majoritário no seu estudo como resultado da geologia da região.

Os pontos P4 (próximo a um frigorífico), o Cromo aparece como elemento majoritário, No P5 (Zona Rural) apenas o Zn foi detectado e no P6 nenhum dos analitos foi detectado.

De acordo com os resultados expostos, verificou-se que os níveis de metais quantificados seguiram os mesmos padrões em relação às análises de matéria orgânica e fração granulométrica ($<63\mu\text{m}$) dos sedimentos analisados.

Nenhum dos analitos apresentou valores superiores ao TEL descrito no Guia de Qualidade dos Sedimentos Estuarinos do Canadá (CCME EPC-98E, 1999). Sendo assim, de acordo com os dados apresentados neste trabalho, verificamos que o Arroio Pelotas não se encontra impactado para estes analitos.

4. CONCLUSÃO

Os metais com maiores níveis detectados (Cu, Zn e Cr) nos pontos analisados, merecem atenção devido aos seus altos potenciais toxicológicos quando em grandes concentrações. Os pontos onde a concentração desses metais foi identificada são locais onde há interferências antrópicas, tais como: indústrias, condomínios habitacionais.

Sendo assim, embora este estudo preliminar aponte para baixas concentrações de metais pesados, indicando a não contaminação do ambiente, se faz necessário o monitoramento contínuo do Arroio Pelotas, devido a sua grande importância ambiental e como fonte de água doce para a cidade de Pelotas.

5. REFERÊNCIAS

APHA, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21^o edition, 2005.

ARNDT, A. L. Diagnóstico hidroquímico das águas superficiais do Arroio Pelotas, Pelotas, RS. 2011. 94f. Dissertação (Mestre) - Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, 2011.

BAGGIO, H.; HEINRICH, H. Natural and anthropogenic contributions to concentration and distribution of heavy metals in surface water and in stream sediments in the Formoso River, Buritizeiro municipality-Minas Gerais State, Brazil. *Comunicações Geológicas*, v. 99, n. 2, p. 71-78, 2012.

BARROS, A. B.; AZEVEDO, J. A. M.; BASTOS, A. L.; NASCIMENTO, V. X. Caracterização e biodisponibilidade de metais no mangue da foz do Rio Meirim, Maceió-AL v. 7, n. 2, p. 20133-20147, 2021. *Brazilian Journal of Development*. <http://dx.doi.org/10.34117/bjdv7n2-586>.

BETEMPS, G. R.; SANCHES FILHO, P. J.. Estudo Sazonal de metais pesados no sedimento do Saco do Laranjal - Pelotas -RS. *Ecotox - Brasil, Pelotas-rs*, v. 7, n. 2, p.91-96, 13 fev. 2012.

CCME- Canadian Enviromental Quality Guidilines. Disponível em <http://st-ts.ccme.ca/>

BRASIL. Resolução n^o 454, de 1^o de novembro de 2012. Estabelece as diretrizes gerais e os procedimentos mínimos para a avaliação do material a ser dragado em águas jurisdicionais brasileiras, e dá outras providências. Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), Brasília, 2012.

FELICE, Jéssica Giacchetto; SILVEIRA, Alexandre; ISIDORO, Jorge Manuel Pereira Guieiro; GONÇALVES, Flávio Aparecido; SILVA, Antônio Marciano da. Simulação do transporte de partículas em suspensão e de poluentes dissolvidos pelo escoamento em superfícies impermeáveis: uma contribuição ao saneamento urbano. *Engenharia Sanitaria e Ambiental*, v. 23, n. 2, p. 405-414, mar. 2018. *FapUNIFESP (SciELO)*. <http://dx.doi.org/10.1590/s1413-41522018173838>.

HORTELLANI, M.A., SARKIS, J.E.S., ABESSA, D.M.S. & SOUZA, E.C.M., 2008, Avaliação da contaminação por elementos metálicos dos sedimentos do Estuário Santos – São Vicente. *Química Nova*, 31(1):10-19.

IUPAC - International Union of Pure and Applied Chemistry, 1997, *Chemistry Compendium of Chemical Terminology* 2nd Edition.

JESUS, H.C., COSTA E.A., MENDONÇA, A.S.F. & ZANDONADE, E., 2004 distribuição de metais pesados em sedimentos do sistema estuarino da Ilha de Vitória-ES. *Química Nova*, 27(1): 378-386.

LACERDA, Luiz Drude de; MALM, Olaf. Contaminação por mercúrio em ecossistemas aquáticos: uma análise das áreas críticas. *Estudos Avançados*, v. 22, n. 63, p. 173-190, 2008. *FapUNIFESP (SciELO)*. <http://dx.doi.org/10.1590/s0103-40142008000200011>.

LEMES, M.J.L., FIGUEIREDO FILHO, P.M.; PIRES, M.A.F., 2003, Influência da mineralogia dos sedimentos das bacias hidrográficas dos rios Mogi-Guaçu e Pardo na composição química das águas de abastecimento público. *Química Nova* 26(1): 13-20.

LIMA, E. A. R. de; SIQUEIRA, G. W.; LIMA, W. N. de. Utilização dos critérios de avaliação ambiental de metais pesados nos sedimentos de fundo da plataforma continental do Amazonas. *SciELO*, Bélem, v. 1, n. 1, p.105-114, 19 abr. 2005.

MARONEZI, Vanessa; SANTOS, Marília Mayumi Augusto dos; FARIA, Danielle Bittencourt; ROSA, Maria Isabel Garcia; SHINZATO, Mirian Chieko. Mecanismos de remoção de Cromo(VI) do solo pela interação entre matéria orgânica e Ferro(III). *Revista do Instituto Geológico*, v. 40, n. 2, p. 17-33, 1 out. 2019. Instituto Geológico. <http://dx.doi.org/10.33958/revig.v40i2.645>.

MEGIATO, Érica Insaurriaga; MOURA, Nina Simone Vilaverde. Mapeamento geomorfológico da Bacia Hidrográfica do Arroio Pelotas, RS. *Geografia (Londrina)*, v. 28, n. 1, p. 151, 5 fev. 2019. Universidade Estadual de Londrina. <http://dx.doi.org/10.5433/2447-1747.2019v28n1p151>.

MEURER, E. J.; BASSANI, C. A.; SELBACH, P. A. Poluentes dos solos e do ambiente. In: MEURER, E. J. *Fundamentos de química dos solos*. Porto Alegre: Gênese, 2000. P. 151-174.

NASCIMENTO, Alana Rayza Vidal Jerônimo do; NASCIMENTO, Clístenes Williams Araújo do; CUNHA, Karina Patrícia Vieira da. Solos de minas de scheelita como fontes de contaminação por metais pesados. *Engenharia Sanitaria e Ambiental*, v. 25, n. 4, p. 555-556, ago. 2020. <http://dx.doi.org/10.1590/s1413-41522020179736>.

OLIVEIRA, R. C. B. de; MARINS, R. V.. Dinâmica de Metais-Traço em Solo e Ambiente Sedimentar Estuarino como um Fator Determinante no Aporte desses Contaminantes para o Ambiente Aquático: Revisão. *Revista Virtual de Química*, Fortaleza - CE, v. 2, n. 3, p.88-102, 30 jun. 2011.

PIERANGELI, M. A. P.; Guilherme, L. R. G.; Curi, N.; Silva, M. L. N.; Lima, J. M.; Costa, E. T. S.; *Rev. Bras. Ciênc. Solo* 2005, 29, 523.

QUEIROZ, M.T.A. Bioacumulação de metais pesados no Rio Piracicaba, Minas Gerais, aplicando a análise por Ativação Neutrônica Instrumental. 2006. 92 f. Dissertação (Mestre) - Centro Universitário Do Leste De Minas Gerais, Coronel Fabriciano, 2006.

QUINÁIA, A B., PÉRCIO S., PLETSCHE, A. L. Avaliação da contaminação de metais em sedimentos superficiais das praias do lago de Itaipu. *Quim. Nova*, Vol. 33, No. 3, 613-617, 2010

PIEDRAS, S.R., BAGER, A. & CORRÊA, F. 2007. Ocorrência de *Limnoperna fortunei* (Dunker, 1857) (Mytilidae) durante um período de salinização do baixo Arroio Pelotas, Pelotas, Rio Grande do Sul. *Bol. Inst. Pesca*. 33(1):121-125.

RANGEL, E. M.; SANCHES FILHO, P. J.; Determinação de metais traço no sedimento do canal prolongamento da avenida Bento Gonçalves, Pelotas. *Revista Ibero-Americana de Ciências Ambientais*, Aquidabã, v.5, n.1, 2014. p 230 – 241, 2014.

SANCHES FILHO, P. J.; ZIEBELL, R.; BETEMPS, G. R. Determinação de metais pesados no sedimento do Arroio São Lourenço - São Lourenço do Sul (RS). *Revista Ibero-Americana de Ciências Ambientais* v. 6, n. 1 (2015).

SARAIVA, Vanessa Kelly et al. Avaliação da qualidade de Sedimento - Estudo de caso: sub-bacia do Ribeirão Espírito Santo, afluente do Rio São Francisco. *Química Nova*, Três Marias - Mg, v. 32, n. 8, p.1995-2002, 14 maio 2008.

SHEYKHI V., MOORE F. Evaluation of potentially toxic metals pollution in the sediments of the Kor river, southwest Iran. *Environ. Monit. Assess.* V.185, n 3219, 2013.

SILVA, T. J.; HANSTED, F.; TONELLO, P. S.; GOVEIA, D. Fitorremediação de Solos Contaminados com Metais: Panorama Atual e Perspectivas de uso de Espécies Florestais. *Rev. Virtual Quim.*, 2019, 11 (1), 18-34.

SUGUIO, K., 1973, Introdução à sedimentologia, São Paulo, 317p.

SUJATHA, C. H.; ANEESHKUMAR, N. E; RENJITH, K. R. Chemical assessment of sediment along the coastal belt of Nagapattinam, Tamil Nadu, India, after the 2004 tsunami. *Current Science*, 95: 382–385, 2008.

YOON, J.; CAO, X.; ZHOU, Q.; MA, L. Q.. Accumulation of Pb, Cu, and Zn in native plants growing on a contaminated Florida site. *Science of the Total Environment*. v.368, p.456–464, 2006. DOI: <http://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2006.01.016>

Capítulo 12

10.37423/210403923

AS TRANSFORMAÇÕES NO AMBIENTE / TURISMO DE PORTO NACIONAL APÓS 10 ANOS DA FORMAÇÃO DO LAGO DA BARRAGEM DE LAJEADO

José Miranda de Souza

Instituto Federal do Tocantins -IFTO

Lucivania Pereira Glória

Instituto Federal do Tocantins -IFTO

Sinara Carvalho de Oliveira

Instituto Federal do Tocantins -IFTO

Vonínio Brito de Castro

Instituto Federal do Tocantins -IFTO

Resumo: O escopo deste trabalho foi analisar as transformações no ambiente/turismo de Porto Nacional, após 10 anos do lago/reservatório da barragem de Lajeado, além de: descrever o ambiente e o turismo de Porto Nacional; identificar as transformações no ambiente e turismo local e comparar as informações coletadas com as percepções dos sujeitos pesquisados. . Hipótese: Os impactos advindos do lago da barragem de Lajeado no ambiente de Porto Nacional transformaram o turismo local. O estudo é uma abordagem qualitativa descritiva e usou o método etnográfico com algumas técnicas do Diagnóstico Rural Participativo (DRP): tempestade de ideias e visita *in loco*. As técnicas foram cruciais na coleta de dados. Elaboramos relatórios de observação *in loco* e realizamos entrevistas semi-estruturadas. Os interlocutores são moradores que desenvolvem o comércio turístico da cidade desde o período anterior ao lago. Os resultados mostram que a praia é a principal fonte turística local, embora existam o centro histórico, eventos típicos tradicionais ao longo do ano e etc. O turismo não avançou ao longo dos dez anos do reservatório da UHE de Lajeado; os problemas herdados pelos moradores e comerciantes continuam e pouco se fez para minimizar os impactos nos imóveis do centro histórico, praia, compensações aos comerciantes, impactos imateriais como o rompimento nas relações sociais. As análises mostram que para reativação do turismo local é necessário explorar o comércio turístico por meio de incentivos e valorização de quem desenvolve o comércio turístico local na orla, no centro histórico e praia, recuperação e divulgação de todos os potenciais turísticos, como eventos tradicionais, organização da praia artificial para atrair os turistas durante todo o ano. Porto Nacional, sendo rota para o Jalapão, polo turístico do estado do Tocantins, torna-se primordial investir na infraestrutura e logística dos valores culturais da cidade.

Palavras-chave: economia, impactos, transformação, turismo.

1. INTRODUÇÃO

A implantação de barragens começou há milhares de anos, alimentada por diversos interesses, dentre eles, o de represar água dos rios com o objetivo de produção de energia elétrica, atender a demanda populacional no consumo de água, atender as indústrias e o agronegócio por meio de irrigações. Para esses atores sociais, a construção de barragens traz muitas vantagens, no entanto, nem tudo parece positivo, estudos sobre os últimos 50 anos desse empreendimento, mostram impactos de natureza ambiental, social, econômico e cultural.

Junto com os empreendimentos, a discussão quanto às vantagens e desvantagens da existência de grandes barragens para o desenvolvimento socioeconômico de determinada região é crescente entre os críticos, partidários das barragens e oponentes. As ações de mitigação dos impactos são importantes, embora insuficientes para conter e mitigar os inúmeros impactos. Um estudo de impactos na metrópole de Belém realizado por um grupo de pesquisa do PRONEX (1999) aponta que “ações tornaram-se ícones da busca de um desenvolvimento econômico com consequente desenvolvimento urbano na metrópole, por meio do fortalecimento do turismo, através da construção de complexos turísticos ligados à história do município [...]” (LIMA, et al 1999 p.122).

O rio Tocantins, como alvo desses grandes empreendimentos teve seu layout deformado pelo reservatório das UHEs. Além de inundar áreas de agricultura de subsistência, arquipélagos, e propriedades das populações ribeirinhas comprometendo o modo de vida, as relações sociais, costumes locais e o turismo das cidades ribeirinhas, as barragens comprometem a vida e acultura local desses povos.

O reservatório da Usina de Lajeado atingiu cidades históricas, uma delas, Porto Nacional que no seu contexto histórico, surgiu há mais de dois séculos. A cidade é tombada como Patrimônio Nacional em função da importância histórica da região e do país, através dos monumentos históricos coloniais, também, cachoeiras, ruínas de Pontal e praias. Conforme Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente - RIMA da usina, a cidade teve a área de 2.694,9m²¹ coberta pelo reservatório e atingiu 347 famílias urbanas e 417 famílias rurais.

Como maior parte das cidades localizadas às margens do rio, Porto Nacional nasceu da relação com o rio Tocantins, e pode-se entrever que o rio é parte da identidade portuense. Com a formação do reservatório, inúmeros problemas socioeconômicos surgiram, além de ter alterado o modo de vida da população e do cotidiano dessas famílias que dependiam do comércio turístico local para sobreviver.

A infraestrutura do ambiente e turismo da cidade depende dos investimentos do poder público, no entanto, a economia produzida pelo turismo chegou a R\$ 556.157, 19. Em 2002, um ano após o reservatório/lago, não houve arrecadação. No estudo inclui a perda de riquezas naturais do município, como as praias locais “Porto Real”, e “Carreira Comprida”, ainda, a degradação nos imóveis do centro histórico, alterações no modo de vida dos ribeirinhos urbanos, fator que pode ter configurado mudanças no turismo e na economia local da cidade. Essas consequências foram observadas ao longo dos dez anos do reservatório no município de Porto Nacional. Rodrigues e Souza(2008,p.2) já afirmam que a cidade já era um “tradicional polo turístico da região antes do alagamento”. As alterações no ambiente e turismo de Porto Nacional aconteceram rapidamente, pois a construção da usina teve duração de apenas 39 meses, sendo administrada por uma empresa que deixou a desejar na condução das desapropriações e negociação com famílias atingidas.

Portanto, neste trabalho se propôs analisar as transformações no ambiente/turismo de Porto Nacional, após 10 anos do lago da barragem de Lajeado. Tornou-se necessário o estudo para a compreensão das três esferas da pesquisa: A cidade de Porto Nacional, o turismo e a hidrelétrica de Lajeado. A hipótese adotada no trabalho foi de que os impactos advindos do lago da barragem de Lajeado no ambiente de Porto Nacional transformaram o turismo local. Teve como objetivo geral: Analisar as transformações no turismo de Porto Nacional após 10 anos do lago da barragem da Hidroelétrica de Lajeado. Objetivos específicos: descrever o ambiente e o turismo de Porto Nacional; identificar as transformações no ambiente e turismo local e por último, comparar as informações coletadas com as percepções dos sujeitos pesquisados.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O estudo baseou-se no método etnográfico, com o uso das técnicas: tempestade de ideias, (*Brainstorming*) do Diagnóstico Rural Participativo-DRP. Verdejo (2007), define DRP por meio das seguintes características:

- a. É um processo de pesquisa e coleta de dados, que pretende incluir as perspectivas de todos os grupos de interesse integrados pelos homens e pelas mulheres rurais.
- b. Impulsiona uma mudança nos papéis tradicionais do pesquisador e dos pesquisados, já que ambos participam da determinação de quais e como coletar os dados; é um processo de dupla via
- c. Reconhece o valor dos conhecimentos dos/as comunitários/as.
- d. Funciona como meio de comunicação entre aqueles que estão unidos por problemas comuns. Esta comunicação coletiva chega a ser uma ferramenta

útil para identificar soluções. (VERDEJO, 2007, APUD CASTRO E PEREIRA, 2010, p. 36).

Em função da complexidade do objeto e da heterogeneidade dos sujeitos da pesquisa, as técnicas do DRP permitem a preparação dos sujeitos com instrução ou sem instrução para participação de entrevistas, uma vez, que possibilitam esses a compartilharem saberes e experiências de forma tranquila, no próprio ambiente e contexto. Faria e Neto (2006) o uso das técnicas do DRP são usadas considerando as seguintes razões:

Trabalhar com uma linguagem comum ao grupo de discussão; permitir a participação de alfabetizados ou não, num mesmo grupo; facilitar o diálogo entre os participantes e destes com a equipe de pesquisadores; despertar a discussão sobre problemas e potencialidades da realidade em questão; permitir o levantamento e a análise do conhecimento coletivo; trabalhar com as percepções das pessoas que residem no local; e facilitar a verificação de informações obtidas no processo de diagnóstico. (ibid, p.17)

Foi feito um estudo bibliográfico relacionado à temática abordada, estudo de campo, com visitas e entrevistas abertas e semiabertas a 15(quinze) representantes das famílias que são moradores e que desenvolvem o comércio turístico local de antes e depois do lago. Em função de ser uma pesquisa qualitativa, adotou-se a análise descritiva nos dados coletados.

2.1 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

Relatório de observação, in loco realizado, por meio das visitas aos pontos turísticos de Porto Nacional; conversa com os moradores comerciantes (restaurantes na orla, barraqueiros da praia “Porto Real” e proprietários dos imóveis do centro histórico) e; relatório das entrevistas com perguntas não estruturadas, estruturadas e semiestruturadas;

2.2 TÉCNICAS UTILIZADAS

Tempestade de ideias (*Brainstorming*). Através de um warm up (palavras de estímulos e introdução de ideias) sobre as atividades comerciais realizadas e o ambiente do rio Tocantins, de forma que os sujeitos sentissem estimulados a lembrarem de falar dos eventos ocorridos desde o período anterior ao reservatório.

Visita in loco- Todos os pontos turísticos foram visitados e conversas informais foram realizadas com os moradores e proprietários dos imóveis do centro histórico, barraqueiros da praia “Porto Real”, antigos moradores que trabalhavam com o turismo antes do reservatório e que hoje não atuam mais nas mesmas atividades, e os órgãos públicos ligados ao turismo da região.

Crítérios de Seleção dos sujeitos

Pessoas que vivem das atividades comerciais turísticas desde o período anterior ao reservatório foi o critério utilizado na seleção dos interlocutores para esta pesquisa. Em função do pequeno número de famílias identificadas, apenas 15 adultos foram entrevistados. São representantes, líderes cujas famílias dentre elas, os barraqueiros da praia “Porto Real”, moradores do centro histórico, e proprietários dos restaurantes da orla.

2.3 PROCEDIMENTO DA PESQUISA DE CAMPO

Foram realizadas visitas aos vários pontos turísticos da cidade que, direta ou indiretamente, estão ligados ao lago da barragem; seleção e Identificação dos sujeitos para entrevista; encontro com cada família para a realização da entrevista; elaboração dos relatórios e descrição e análise das informações coletadas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os principais impactos ambientais, culturais e sociais da construção da Usina Hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães no município de Porto Nacional identificados, conforme instrumentos de coleta de dados estão evidentes tanto nas entrevistas como no relatório de observação in loco. O desaparecimento da antiga praia Porto Real e Carreira Comprida devido à construção do lago, a descaracterização do centro histórico em função de imóveis seculares que foram destruídos, sendo que alguns que resistiram, ainda apresentam problemas em suas estruturas internas e externas, em função dos impactos das máquinas pesadas durante a construção da Avenida Beira Rio; o deslocamento de barraqueiros, e comerciantes que comercializavam seus produtos às duas margens do rio, e tiveram que ser removidos para assentamentos ou para a periferia da cidade sem o consentimento dos mesmos. As medidas mitigatórias previstas no RIMA incluem a “execução do Projeto da reurbanização, que deverá prever uma Avenida Marginal delimitando a área comercial, habitacional e de serviços, e um parque entre o reservatório e a Avenida” (RIMA p.126).

3.1 O AMBIENTE E O TURISMO DE PORTO NACIONAL ANTES DO LAGO.

O ambiente (paisagem formada pelas matas ciliares, o rio e a praia) foi permanentemente alterado com o alagamento. Ficou evidente nas visitas in loco e nas entrevistas com os interlocutores, que os mesmos apreciavam com admiração o ambiente local antes da formação do lago. Contemplavam a beleza das águas e areias finas, matas ciliares, árvores frutíferas e plantações. “*Enchia os olhos de*

qualquer pessoa” [S1]. Para os interlocutores, o conjunto formado pelos imóveis do centro histórico com sua localização estratégica situada às margens do Rio Tocantins tornavam o ambiente da cidade único, sem dimensionar a importância cultural desses espaços. Dados do IBGE também ratificam tais impactos ambientais e subjetivos.

“E o Rio Tocantins modificado pelo crescimento desenvolvimentista, abrigando usinas hidroelétricas, agora sem praias, ainda teimosamente se impõe como o principal elemento no universo simbólico portuense” (IBGE, 2010)

Em torno da beleza natural configuravam-se o ambiente e o turismo, pois, segundo os mesmos interlocutores, era na temporada de praia que a cidade exercia suas maiores atividades econômicas e emergia sua cultura por meio do turismo. *“Naquela época foi uma oportunidade pra mim. O movimento na praia só crescia e as barracas que tinha lá não dava conta de atender tudo”* [S6].

Todos entrevistados confirmaram que o ambiente e o turismo de Porto Nacional na temporada de praia eram destaques na região norte do país, influenciados pelo favorecimento do clima quente e ensolarado. Embora não foram encontrados dados de todos os anos após o alagamento, o Turismo, principalmente, na temporada de praia (junho-setembro) era fomentador determinante da economia da região antes da formação do reservatório. Os últimos dados são de 2001, chegou a R\$ 556.157, 19 segundo dados do IBGE.

Valor Presente (VP) da renda gerada na praia Porto Real Estimada de 1999 a 2001.

Anos	(VP) Renda estimada em R\$
1998	448.640,00
1999	484.531,20
2000	523.293,70
2001	565.157,19
2002	0,00

Tabela 2- Renda na praia de Porto Real antes do lago.

Fonte: SOUZA, 1998 apud 2003.

Frequentadores de diversos estados e países aqueciam a economia da cidade, por meio do comércio que variava entre alimentação, roupas de praia, hotéis, embarcações com travessia do rio e atividades diversas que aumentavam positivamente a cada ano e consequentemente, os moradores, barraqueiros e comerciantes locais compartilhavam muitas perspectivas positivas ao perceber o aumento progressivo de suas economias no período de praia.

Além do fortalecimento da economia da cidade, o convívio com turistas e o laser também foram apontados como importantes. Os sujeitos apontaram que a participação da população era bem efetiva, atraídos pelo clima e as pessoas.

3.2 AS TRANSFORMAÇÕES NO AMBIENTE E TURISMO LOCAL APÓS A BARRAGEM

O descontentamento da população com as transformações tanto no ambiente como no turismo da cidade refere-se à queda no comércio de vendas de produtos diversos a turistas durante o ano e principalmente durante a temporada de praia. Para eles, vários fatores influenciaram, dentre os quais, a demolição de construções seculares e do Coreto² durante a construção da orla, na avenida beira rio, causou grande insatisfação nos moradores e proprietários dos imóveis, *“Olha, essas parede aqui está rachada de cima a baixo por causa das máquinas da construção da orla. Nunca ninguém me deu um tostão para arrumar isso aí”*(S1). As narrativas dos interlocutores ratificam os dados coletados no relatório de observação:

O centro histórico de Porto Nacional sofreu uma profunda descaracterização, e houve um imediato processo de alteração no cenário da cidade, a velha paisagem com o rio ao fundo se transformou em um grande lago, foram destruídos casarões do período colonial e o velho coreto na Praça. (RELATÓRIO DE OBSERVAÇÃO)

Tais transformações no ambiente físico geraram expectativas negativas nos moradores com a construção da orla. Entrevê-se, que a situação colaborou a não aceitação do atual projeto da orla. Naquele período, algumas manifestações populares contrárias à demolição do coreto evidenciaram a revolta da população proporcionada pelos impactos oriundos da formação do lago.

Conforme relatório, a primeira temporada na ilha artificial *“Porto Real”* em 2003 causou frustração tanto para a população local quanto aos turistas. Uma dos fatos que impulsionaram tanta rejeição diz respeito ao local da nova ilha. Os interlocutores apontaram e também se constatou durante as visitas in loco e em documentos oficiais que, a praia foi construída no espaço onde funcionava o matadouro municipal da cidade, já desativado, e que no local existiam residências e inúmeras concentrações de fossas sépticas. Dados da ²UNITINS analisaram e constataram com laudo que a água do lago estava contaminada e imprópria para o banho e poderia ocasionar doenças na pele. Justifica-se, desta forma, a revolta e desconforto da população e principalmente dos barraqueiros que percebiam o afastamento dos turistas e, conseqüentemente, o impacto negativo nas vendas dos produtos. A falta de informações sobre dados da participação do turismo na economia anual da cidade demonstra que teve um grande impacto negativo, e notou-se que a redução contínua do número de turistas nesses

espaços é percebida pelos comerciantes e moradores. *“A quantidade de turistas diminuiu, assim como os atrativos também. A renda nem se fala eu que dependia mais da metade da renda que tinha na antiga praia. A minha barraca era pequena, mais ajudava no sustento da minha família”* [S4]. Alguns estabelecimentos comerciais tiveram que fechar suas portas, a exemplo de lojas de moda praia, restaurantes e hotéis com o declínio da economia.

Os comerciantes de peixes que mantinham o sustento de suas famílias com a venda de pescados, e aqueles que comercializavam frutas e agricultura, sofreram com o deslocamento e perda de renda, também o fato de não continuarem com as mesmas atividades econômicas: *“O povo pegava fruta para vender. Muitos traziam do outro lado para vender e ganhava um dinheirinho”* [S6]. Os indenizados foram transferidos para assentamentos ou bairro da periferia da cidade. Durante as observações realizadas percebeu-se a falta de estrutura e planejamento desses assentamentos e bairros. Os antigos ribeirinhos foram alocados em terras inférteis, o que impossibilitou a continuidade das atividades.

As pessoas que participavam diretamente do turismo como os barqueiros, barraqueiros, os comerciantes e donos de hotéis foram fortemente atingidos e tiveram suas rotinas modificadas pelo desaparecimento das praias e os rendimentos diminuídos. As expectativas que a população tinha durante todo o ano para a temporada de praia se extinguiram junto com a antiga praia.

3.3 O ATUAL CONTEXTO DO TURISMO E DOS COMERCIANTES IMPACTADOS PELO LAGO

As respostas objetivas dos entrevistados revelam o atual contexto do turismo local; notou-se que de fato, na percepção dos interlocutores, não existem turistas atraídos pela nova praia, e que os eventos (shows, festivais, em temporada de praia) proporcionados pelo poder público local, com pretensão em alavancar o turismo e a movimentação na praia atual, como era antes do lago, não está correspondendo. *“A prefeitura de Porto Nacional tenta fazer com que a ilha “porto real” seja referência no estado na época da temporada de praia, faz shows, promove gincana esportiva, mas ainda assim, a água em si não é a atração da praia”* [S8].

A interrupção das atividades turísticas, responsável pela manutenção de muitas famílias, tais como, o comércio de vendas e de recepção às visitas no centro histórico, e à praia local, proporcionou o isolamento e insatisfação dos moradores que tiveram que ser retirados em função do reservatório. *“Antes do lago as vendas em minha loja era melhor, depois do lago decadência (acabei tendo que fechar)”* [S15].

As medidas de mitigação não abrangem a recuperação dos imóveis deteriorados ao longo do reservatório, o documento aponta as ações previstas: *“I. Elaboração do Cadastro Socioeconômico; II. Dimensionamento dos grupos de famílias por alternativa escolhida; III. Elaboração dos projetos de remanejamento para cada grupo identificado; IV. Identificação, seleção e compra de áreas; V. Implantação dos projetos. [...]”* (RIMA, 1996, p.134).

No que tange às indenizações, consta no relatório para esse fim, o desenvolvimento de programas cadastramento das famílias, cujas propriedades serão atingidas: *“[...] indenização das Propriedades Atingidas, contendo critérios bem definidos e discutidos com a população diretamente atingida”* (ibid, 1996, p.58). O relatório aponta que foi discutido: *“Os impactos identificados foram discutidos pelos membros da equipe técnica, sendo selecionados aqueles considerados mais relevantes e significativos”* (ibid, p 64). Está explícito no documento que o *“Enchimento do Reservatório” interfere com todos os fatores ambientais, e que todas as ações interferem principalmente nos fatores socioeconômicos*” (ibid p.72). Ainda que estava previsto, as famílias afirmam que o atual contexto do turismo local é desmotivador. As insatisfações de um modo geral são para com a forma como foi conduzido todo o processo de construção da UHE de Lajeado, discussão e indenização. Esta ocorreu de forma injusta e a modificação do projeto da orla e da praia, *“Nada! o que eles fez só foi mesmo essa orla”* [S6].

A construção da orla como medida mitigatória e compensatória aos moradores que tiveram suas propriedades e modo de vida socioeconômico alterado pelos danos socioambientais causados pelo empreendimento, não têm compensado os problemas herdados, alguns irreversíveis. Além de ter sido construída em local impróprio, em função do acúmulo de lixo no ribeirão São João, a orla não está sendo vista como um lugar seguro por parte dos moradores, pois, notou-se aumento de violência e falta de segurança pública. Desta forma, as expectativas da população não foram concretizadas.

O— RIMA descreve os impactos físicos, biótico e socioeconômico do empreendimento na região atingida, no entanto, além de ser incompleto por não apontar os impactos imateriais (memória coletiva, costumes, etc), quanto às atividades turísticas, as informações são insuficientes, pois abordam de forma geral e não apresentam medidas de mitigação dos impactos nessas atividades. *“[...] Perda das atividades econômicas e do lazer da população associados às praias fluviais do rio Tocantins pelo seu desaparecimento no estirão do reservatório”* (ibid p.75). O documento aponta que os convênios com as prefeituras são feitos através de pagamento dos impostos devidos, no entanto, não há desde o enchimento do reservatório programas de recuperação dos imóveis do Centro Histórico.

O Relatório prevê que “[...] as praias de Porto Nacional e de Palmas serão inundadas. Isto também significará o desaparecimento das atividades de comércio e serviço, como também os empregos produzidos pelas mesmas”(ibid p.95), no entanto, a medida de compensação é somente com a recomposição das praias, ficando as expectativas econômicas futuras dos barraqueiros comprometidas.

Assim, as insatisfações com as medidas compensatórias são grandes, porém, os portuenses se vem sem forças diante dos interesses do Estado e desses grandes empreendimentos. Não acreditam nas alternativas de reversão e redução dos impactos, nem que há benefícios do empreendimento, tais como, as compensações financeiras vinda da usina para o município. A sociedade portuense reconstrói suas histórias e aprende a conviver com o lago utilizando os potenciais que ele oferece.

6. CONCLUSÕES

Ao considerar as análises das entrevistas, relatórios de visitas e de observação in loco, alguns pontos surgiram como cruciais no que tange o perfil do turismo e do ambiente de Porto Nacional:

Percebeu-se ainda grande insatisfação dos moradores e comerciantes diretamente ligados ao turismo da cidade, mesmo após os dez anos da barragem; Um número bem pequeno de moradores e comerciantes que viviam do turismo antes da barragem continua dependendo desse comercio, porém, com muito mais dificuldades que antes, em função da redução dos lucros obtidos; embora a orla tenha sido apontada como medida de mitigação para os impactos causados no turismo; as compensações têm sido inexistentes e/ou insuficientes, tanto na mitigação dos impactos ambientais, quanto aos comerciantes e moradores que dependiam do turismo e que hoje desenvolvem outras atividades econômicas;

Maior número de moradores não recebeu qualquer compensação, esses alegam que nenhuma medida foi apresentada. Contudo, os resultados mostram que tais medidas tem sido insuficientes.

No que tange ao turismo, percebe-se que a falta de registros que nas informações relativas à participação do turismo na economia da cidade, bem como os quantitativos de antes do reservatório pode ter sido uma forma de não tornar os problemas, ainda existentes, acessíveis à população local.

Os movimentos organizados que representavam os atingidos não existem ou se dissolveram em decorrência da não continuidade de grande parte dos seus membros. O deslocamento dos moradores que viviam às margens do rio e a falta de apoio indenizatório aos comerciantes corroboraram para tanto.

Constatou-se que a praia era a principal atração turística local e fonte de renda para os comerciantes da praia e do centro histórico. Mas este não é explorado pelo turismo atualmente, e os proprietários dos imóveis do centro histórico não usufruem desse patrimônio como fonte de renda, e a falta de interesse dos turistas em visitar esse setor, está aliada à degradação dos imóveis desde a construção da orla.

O relatório de impacto ambiental prevê uma melhoria significativa no turismo em toda região do empreendimento, no entanto, a orla e atual praia “Porto Real” possuem estrutura favorável ao turismo, porém estão sendo usufruída somente pela população local e mais, frequentemente, durante a temporada (de junho a setembro).

Para reativação do turismo local é necessário explorar o comércio turístico por meio de incentivos aos comerciantes e divulgação dos potenciais turísticos locais, como o centro histórico, as festas tradicionais, a organização da praia artificial de forma que possa atrair turistas durante o ano e não somente na temporada de praia, considerando que é uma vantagem da praia artificial. Os moradores percebem que é possível aperfeiçoar a utilização do espaço da praia por todo ano, através de implementações de ações que incluam a prática de esportes (campeonatos), a recepção aos turistas com restaurantes de comidas típicas, e shows regionais com danças e demonstrações culturais.

Sendo rota de passagem para o Jalapão, o que representa um grande polo turístico do estado do Tocantins, torna-se primordial o investimento na infraestrutura local para elevar o turismo da cidade como também, incentivos financeiros e de logística para eventos culturais da cidade, além da valorização do artesanato que pode ser uma fonte de turismo.

É consenso entre todos moradores e comerciantes, de que não mais serão compensados pelos prejuízos herdados antes e após os dez anos do reservatório. Entendem que os problemas são irreparáveis, mas acreditam que é possível reestabelecer o turismo da cidade.

Para que o turismo se torne viável deve-se incluir a limpeza do local de banho e de recuperação das águas do rio São João que desagua suas águas no lago, o que compromete a qualidade da água para os banhistas. Pode-se estabelecer esta medida através de programa que esquematize a coleta de lixo bem como o desvio dos esgotos que são naturalmente jogados no reservatório.

As medidas de mitigação não abrangem a recuperação dos imóveis deteriorados ao longo do reservatório, o que comprometeu a continuidade das famílias atingidas de exercerem suas atividades comuns. O processo de indenização não foi consensual como sugere o RIMA, houve o cadastramento,

porém as indenizações somente previam as perdas de atividades concretas e valoráveis, os critérios já estavam previamente definidos.

A pesquisa foi limitada a 15 sujeitos (famílias). Portanto, este estudo não é algo acabado, espera-se que as discussões sobre o resgate do turismo local de Porto Nacional e região nesta pesquisa sejam base para outros estudos, de forma que se estimulem as sugestões de melhorias e aplicação de medidas compensatórias que possam mitigar os impactos oriundos da construção da Usina de Lajeado e se pensar em alternativas de geração de energia com menor impacto ambiental e turístico.

REFERÊNCIAS

ALVES, A.C.. O meio ambiente urbano e a proteção ambiental: a questão metropolitana: o grande desafio do século XXI. Fórum de Direito Urbano e Ambiental, Belo Horizonte, v. 1, n. 2, mar. 2002. Disponível em: <<http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/29399>>. Acesso 01/12/ 2010.

BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1986.

COMISSÃO MUNDIAL DE BARRAGENS (CMB). Barragens e desenvolvimento: um novo modelo para tomada de decisões. Disponível em: <http://www.dams.org>, 2000

FARIA, A.A. C. e NETO P.S.F. Ferramentas do diálogo – qualificando o uso das técnicas do DRP: diagnóstico rural participativo – Brasília: MMA; IEB, 2006.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICAS DO BRASIL disponível em :

<http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=171820#> acessp e, 20 de abril de 2012.

LIMA J.J. F. CARDOSO, A. C. D. HOLANDA, A. C. G.. Impasses e desafios na gestão da Região Metropolitana de Belém. Cadernos Metrópole, nº 1, pp.103-126. São Paulo, Educ/Fapesp. 1999.

LIRA, E. O. A Construção da UHE de Lajeado e os Impactos Sócio-Territoriais no Espaço Urbano de Porto Nacional. Tese (mestrado em Desenvolvimento Regional e Agronegócio) Universidade Federal do Tocantins, Palmas, 2010.

MAGALHÃES, G.S. Estudo dos Impactos sociais e ambientais decorrente dos projetos hidrelétricos de Jirau e Santo Antônio. 2006. 15p. Artigo (mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio ambiente) Universidade Federal de Rondônia, Porto Velho, 2006.

NATURATINS – Instituto Natureza do Tocantins. Estudo de Impacto Ambiental-EIA/RIMA da UHE de Lajeado.

PEREIRA, L. ALMEIDA, M. G. de. Minaçu - go: paisagens e percepções nas perspectivas do turismo in Caminhos de Geografia Uberlândia v. 11, n. 34 junho/2010 p. 190 - 202 P.190

RODRIGUES, Waldecy; SOUZA, E. C. Valoração dos danos ambientais causados pela implantação da usina hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães no município de Porto Nacional –, TO. Uma aplicação do método de valoração contingente In: SOBER – XLVI CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E SOCIOLOGIA RURAL 2008, Rio Branco p 1-15.

SEVÁ, O. F. Conhecimento crítico das mega-hidrelétricas: para avaliar de outro modo alterações naturais, transformações sociais e a destruição dos monumentos fluviais. In: SEGUNDO ENCONTRO NACIONAL DA ANPPAS – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS GRADUAÇÃO E PESQUISA EM AMBIENTE E SOCIEDADE. 2004, Indaiatuba. p 1-20.

CASTRO, V.B. E PEREIRA S.P. As transformações no mundo do trabalho e no ambiente da pesca no Povoado Cajueiro, Palmeirante-TO. Dissertação de Mestrado, UFAM, 2010.

COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - RIMA. Relatório de

Impacto sobre o Meio Ambiente- Usina de Lajeado, THEMAG Engenharia, 1996. Disponível em http://www.investco.com.br/empresa/documentos_oficiais/eia_rima/pdf/rima_rel_impacto_sobre_meio_ambiente.pdf

Capítulo 13

10.37423/210403924

A CONTRIBUIÇÃO DA MINERAÇÃO DE DADOS NO PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO DOS CURSOS SUPERIORES DO INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE

Leopoldo Ramos Oliveira

INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE

Fausto Bernard Melo Soares

INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE

José Damião de Melo

INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE

Patrick Henrique da Silva Brito

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

Resumo: Este capítulo tem como foco a avaliação institucional, que é um dos componentes do instrumento de avaliação das instituições de ensino superior (IES), previsto no SINAES (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior). O presente trabalho analisou os resultados da avaliação realizada pelos discentes, quanto aos cursos superiores do IFS (Instituto Federal de Sergipe), no processo de autoavaliação desta instituição no contexto da IA (inteligência artificial). Para a construção da metodologia da pesquisa foi definida uma estratégia de ação de cunho experimental, utilizando a mineração de dados e a técnica de classificação através do algoritmo árvore de decisão (*decision tree*) implementado empiricamente com os dados do domínio de testes e validação no software *Rapidminer* (versão 5.2). Como resultados da pesquisa e com especial atenção ao processo de Mineração de dados, foi possível descobrir a relevância dos atributos envolvidos no processo de autoavaliação, com o objetivo de detectar fragilidades e potencialidades dos cursos superiores da IES analisada e assim, fornecer aos gestores subsídios para tomada de decisão com maior grau de assertividade e confiança.

Palavras- chave: Avaliação, SINAES, Mineração de dados, Árvore de Decisão.

1. INTRODUÇÃO

O SINAES foi instituído pela lei 10.861, de 14 de abril de 2004 com os objetivos de promover a melhoria da qualidade da educação superior e orientar a sua expansão, bem como oferecer as instituições de ensino superior (IES) a oportunidade do autoconhecimento acerca das suas potencialidades e fragilidades. O processo de autoconhecimento é obtido através da avaliação interna realizada pelas IES de acordo com as normas estabelecidas no roteiro de autoavaliação que foi concebido a partir da lei supra mencionada.

As IES encontram dificuldades para análise e interpretação dos dados obtidos durante o processo de Autoavaliação, pois o mesmo contém uma grande base de dados. tendo em vista que toda a comunidade acadêmica participa da autoavaliação. Nesse contexto, o processo de descoberta de conhecimento (KDD) pode contribuir com a descoberta de informações muitas vezes “escondidas” nessas bases de dados, pois quando se utilizam apenas as técnicas triviais da estatística, as mesmas normalmente não são percebidas. A mineração de dados como a principal etapa do KDD utiliza técnicas automáticas para extrair novos padrões e relações entre as variáveis (atributos) da base analisada. Em geral, as técnicas utilizadas são: Análise de agrupamentos, Estatística descritiva, Regras associativas e Árvore de decisão.

O presente trabalho utiliza o método de pesquisa experimental, através do software RAPID MINER versão 5.2, um ambiente para aprendizagem de máquina e realização de mineração de dados, com o objetivo de verificar as vantagens e desvantagens de modelos criados a partir dos algoritmos de classificação. O processo de descoberta de conhecimento gerado através dos atributos da base obedece as seguintes fases: Seleção dos dados, Limpeza dos dados, Enriquecimento dos dados, Transformação dos dados, Mineração dos dados e por fim a Apresentação e Análise dos dados.

A mineração de dados deste trabalho tem como foco a avaliação dos cursos superiores do IFS com o objetivo de descobrir novos conhecimentos e dessa forma contribuir positivamente para a tomada de decisão da IES, visando a corrigir fragilidades e manter ou melhorar as potencialidades, rumo ao ensino de excelência.

1.1- AVALIAÇÃO INTERNA OU AUTOAVALIAÇÃO.

A avaliação interna ou autoavaliação é um processo que permiti que a IES construa o conhecimento sobre sua realidade, com o objetivo de cumprir com qualidade o seu papel no contexto social onde está inserida. A análise e interpretação dos dados obtidos na avaliação visam detectar potencialidades

e fragilidades da IES e servir como referencial para a tomada de decisão no sentido de corrigir os pontos fracos da instituição e implementar políticas educacionais que atendam as demandas da comunidade. Esses dados também são utilizados para retroalimentar o planejamento estratégico da IES (SINAES, 2004).

“A avaliação é um processo cíclico, criativo, e renovador de análise, interpretação e síntese das dimensões que definem a IES”(SINAES, 2004. p.11).

1.1.1 - REQUISITOS DA AUTOAVALIAÇÃO

Para que autoavaliação alcance bons resultados é imprescindível que as seguintes condições sejam atendidas em sua totalidade. (SINAES, p. 12, 2004)

- Existência de uma equipe de coordenação;
- Participação de integrantes de todos os segmentos da IES;
- Compromisso explícito dos gestores da IES;
- Informações, coleta e dados sejam confiáveis;
- Uso efetivo dos resultados da avaliação.

1.1.1.1 - ETAPAS DA AVALIAÇÃO INTERNA

Os resultados da autoavaliação serão submetidos aos especialistas no momento da avaliação externa designada pelo MEC. assim, é preciso que esses dados reflitam a realidade da IES e que todas as ações decorridas face as avaliações internas estejam bem evidenciadas no relatório de autoavaliação e sejam amplamente divulgadas para comunidade. Recomendações de especialistas no momento da visita externa podem ajudar a IES a consolidar o seu processo de Autoavaliação (SINAES, 2004).

Para garantir um processo de avaliação interna que atenda as exigências do MEC é necessário que ocorra as seguintes etapas:

- 1ª etapa: Preparação
 - Constituição de uma comissão composta por membros da comunidade acadêmica;
 - Sensibilização de todos os participantes da autoavaliação;
 - Elaboração do projeto de autoavaliação;
- 2ª Etapa:Desenvolvimento
 - Coerência entre as ações planejadas, a metodologia adotada e articulação entre os participantes;
 - Levantamento de dados e informações;

- Análise das informações e elaboração de relatórios parciais.
- 3ª Etapa: Consolidação
 - Relatório final contendo uma análise crítica e isenta apontando ações de melhorias para IES;
 - Divulgação dos resultados da avaliação a comunidade acadêmica;
 - Balanço crítico do processo de auto avaliação.

1.2 – O PROCESSO DE DESCOBERTA DE CONHECIMENTO (KDD)

Criado para auxiliar o ser humano em descobrir informações ocultas em bases de dados, tais como tipos de padrões comportamentais dos dados, o processo de “descoberta de conhecimento em bases de dados” (KDD – Knowledge Discovery in Database) (Fayyad, 1996) transforma dados em informação, podendo ser analisados e desta forma se tornar conhecimento útil. Segundo Carvalho (2001), esse processo é interdisciplinar e envolve diversas áreas, entre elas, estatística, matemática, banco de dados, aprendizado de máquina e reconhecimento de padrões.

O processo de KDD, vislumbrado na Figura 1, é composto das atividades de Seleção, Processamento, Transformação, Mineração de dados e Interpretação (Kumar, 2006) e são definidas como:

1. Seleção de dados: trata-se da seleção e coleta do conjunto de dados necessários à descoberta de conhecimento.
2. Pré-Processamento e limpeza (Processamento): aqui são removidas as informações desnecessárias e são definidas estratégias para o tratamento de informações não consistentes e irrelevantes.
3. Transformação: nesta etapa objetiva-se contornar eventuais limitações presentes em algoritmos de descoberta de padrões que serão utilizados na fase de mineração de dados. Para isso os dados são transformados para um formato adequado para aplicação do algoritmo selecionado. Dentre os tipos mais comuns, pode-se citar a normalização e discretização de atributos quantitativos.
4. Mineração de dados: é a etapa do processo de descoberta de conhecimento, foco do presente trabalho, na qual ocorre a extração de padrões que não estão explícitos nos dados trabalhados. Esses padrões podem ser extraídos através de técnicas de classificação, agrupamento ou sumarização (Fayyad, et al, 1996).

5. Interpretação: neste momento os resultados obtidos são avaliados e interpretados cujo objetivo é a transformação em conhecimento útil para o apoio a decisões.

Figura 1 - Etapas do processo de KDD. Fonte: FAYYAD et al, 1996

Algumas tarefas podem ser definidas como foco da mineração de dados, são elas: classificação, associação e agrupamento (ou clusterização) (Kumar, et al., 2006). A classificação trata-se da alocação de dados a partir de um conjunto de dados, previamente utilizados como entrada ao classificador chamado de base de treinamento. Assim, a tarefa de classificação é dividida em duas etapas: fase de treinamento e fase de teste. Na primeira, os dados são apresentados ao algoritmo de aprendizagem para que este, por sua vez, efetue a construção de um modelo de classificação. Enquanto que na segunda etapa, o modelo é submetido a dados ainda desconhecidos pelo mesmo, e tem a finalidade de alocar esses dados em classes (HAN, KAMBER, 2006).

Para medição de desempenho do algoritmo de aprendizagem utilizado na mineração de dados utilizou-se a matriz da confusão, que se trata de uma ferramenta de visualização usada tipicamente dentro aprendizagem supervisionada. Cada coluna da matriz representa os exemplos em uma classe predita pelo classificador, quando cada linha representar os exemplos em uma classe real. Um benefício de uma matriz de confusão é que é fácil ver se o sistema estiver confundindo duas classes (isto é, geralmente mislabelling um como outro).

2. MATERIAL E MÉTODOS

No presente trabalho foi utilizado o algoritmo C4.5 (Quinlan, 1993) para construção de árvore de decisão, que é uma representação simples utilizada por vários sistemas de aprendizagem de máquina e assim efetuar a classificação de dados, objetivando a busca pela relevância dos atributos envolvidos no processo de autoavaliação. O método prático utilizado será a pesquisa experimental, na qual foram feitos experimentos baseados nas aplicações do algoritmo.

2.1- ETAPAS DO PROCESSO DE DESCOBERTA DE CONHECIMENTO NA BASE DE DADOS DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DO IFS DO ANO DE 2012

Durante o processo de descoberta de conhecimento seguiu-se as 4 etapas descritas no item 1.2, que podem ser vislumbradas detalhadamente a seguir.

2.1.1 ETAPA 1: SELEÇÃO DE DADOS

Nessa etapa foi obtida a base de dados da Avaliação Institucional do Instituto Federal de Sergipe do ano de 2012, estando a mesma com a extensão .sav, fruto do software SPSS, até então utilizado na instituição para realizar a tarefa de tabulação dos dados, bem como a análise estatística dos mesmos.

Assim a base de dados escolhida para participação neste processo se refere a avaliação dos discentes quanto ao seu curso, cujos instrumentos de avaliação possuem como respostas notas variando de 1 a 5, onde:

1. Desconheço;
2. Ruim;
3. Regular;
4. Bom;
5. Muito Bom.

2.1.2 ETAPA 2: LIMPEZA E TRANSFORMAÇÃO DOS DADOS

De posse da escolha do domínio a ser abordado (Avaliação Institucional, mais precisamente avaliação dos discentes dos cursos superiores do Instituto Federal de Sergipe) é obtida a base de dados e será executada a limpeza dos mesmos, para a definição de campos (atributos) relevantes ao processo de Descoberta de Conhecimento e conversão do rótulo dos mesmos, da modalidade de questões numeradas para atributos nominais, ficando assim mais significativos.

Também foi criado um atributo chamado Avaliação Curso para atuar como classe na base de conhecimento, atributo cujo qual será classificado o Curso em: Ruim, Regular, Bom, Muito Bom.

A base resultante desse processo contém 321 registros rotulados de acordo com os seguintes atributos:

- Estrutura Curricular;
- Carga Horária das Disciplinas;
- Carga Horária Total;

- Laboratórios Informática;
- Número Docentes;
- Qualificação Docentes;
- Promoção de Extensão;
- Envolvimento Prof./Pesquisa;
- Envolvimento Alunos/Pesquisa;
- Articulação de Conteúdos;
- Laboratórios Específicos;
- Aulas Práticas de campo;
- Curso e Mercado de Trabalho;
- Contribuição Disciplinas para Formação;
- Avaliação Curso (Classe).

2.1.3 ETAPA 3: MINERAÇÃO

Através do software Rapid Miner 5.2, um ambiente de trabalho com algoritmos de aprendizagem de máquina, foi realizada a mineração de dados, etapa principal do processo de Descoberta de Conhecimento. A ferramenta supracitada fornece recursos de importação de dados, algoritmos de classificação de dados, algoritmos de agrupamento, entre outros de grande utilidade no processo de descoberta de conhecimento.

No presente trabalho foram utilizados os operadores: *Decision Tree*, *Apply Model*, *Performance*, *Weight by Relief*.

Assim, construiu-se um modelo (Figura 2) de árvore de decisão aplicando o algoritmo C4.5 e posteriormente verificou-se a sua exatidão quanto a predição da classe (Avaliação Curso) da base de conhecimento, através de um recurso chamado matriz de confusão.

Figura 2: Processo no Rapid Miner para construção da Árvore de Decisão

Em seguida, na Figura 3, foi calculado o peso relativo aos atributos (questões), e gerada a tabela 2 com os valores já normalizados.

Figura 3 - Cálculo dos pesos dos atributos no Rapid Miner.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A matriz de confusão da tabela 1 revela que a árvore de decisão representa adequadamente os dados obtidos na avaliação institucional, tendo em vista a precisão de 94,39% do classificador. Ressalta-se que o conceito muito bom teve uma previsão de 71,43% devido ter apenas (5 dos 7 casos) na base em estudo. A tabela 2 mostra os pesos relativos aos atributos da base revelando a importância dos mesmos no processo de autoavaliação, numa escala de zero(0) a um (1)

Tabela 1 - Matriz de Confusão

Accuracy: 94,39%					
	True Bom	True Regular	True Muito Bom	True Ruim	Class precision
Pred. Bom	153	3	2	0	96,84%
Pred. Regular	6	131	0	1	94,93%
Pred. Muito Bom	1	0	5	0	83,33%
Pred. Ruim	2	3	0	14	73,58%
Class Recall	94,44%	95,62%	71,43%	93,33%	

Tabela 2 - Matriz com pesos e normalização dos Atributos.

Atributo	Peso	Normalização	Frequência
Qualificação Docentes	0	0	0,00%
Carga Horária Total	0,34	0,05	5,23%
Carga Horária Disciplinas	0,06	0,01	0,92%
Promoção de Extensão	0,249	0,04	3,83%
Laboratórios Específicos	0,247	0,04	3,80%
Estrutura Curricular	0,431	0,07	6,63%
Contribuição Disciplinas para Formação	0,436	0,07	6,71%
Aulas Práticas de Campo	0,483	0,07	7,43%
Número Docentes	0,517	0,08	7,96%
Curso e Mercado de Trabalho	0,565	0,09	8,69%
Articulação de Conteúdos	0,635	0,10	9,77%
Laboratórios de Informática	0,711	0,11	10,94%
Envolvimento Prof/Pesquisa	0,825	0,13	12,69%
Envolvimento Alunos/Pesquisa	1	0,15	15,39%

6. CONCLUSÕES

Após análise dos resultados obtidos através da mineração de dados, com a utilização do Rapid Miner foi necessário normalizar os dados da tabela 2 para um melhor entendimento dos resultados obtidos, visando a dar semântica aos mesmos e identificar os problemas de relevância da avaliação dos discentes, quanto aos cursos do IFS. Os pesos atribuídos aos atributos da base devem servir como estudo por parte dos gestores do IFS e também como ferramenta de apoio a tomada de decisão.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto-Lei n.10.861, de 14 de abril de 2004. Institui o Sistema Nacional de Educação Superior – SINAES - e dá outras providências.

_____. Portaria n. 2.501, de 9 de julho de 2004. Regulamenta os procedimentos de avaliação do Sistema nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), instituída na Lei n. 10.861 de 14 de abril de 2004.

BRASIL. MEC. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior. Roteiro de auto-avaliação institucional. Brasília: Editoria, 2004.

FAYYAD, et al. Advances in Knowledge and data mining. AAAI Press/MIT Press, 1996.

HAN, Jiawei; KAMBER, Micheline. Data Mining Concepts and Techniques. 2. Ed. San Francisco: Elsevier, 2006

KUMAR, Vipin; STEINBACH, Michael; TAN, Pang-Ning; Introduction to Data Mining. Pearson Education, 2006.

MITCHELL, TOM. Machine Learning. New York: McGraw-Hill, 1997.

Capítulo 14

10.37423/210403927

EFEITOS DO USO DE SILICATO E CALCÁRIO LÍQUIDO SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DE FERTILIDADE DO SOLO E O DESENVOLVIMENTO DO CAPIM-MARANDU

Alexandre Mendes Bento da Silva

Centro Universitário de Patos de Minas

Geraldo Bento

Centro Universitário de Patos de Minas

Resumo: O capim-marandu é uma planta forrageira que exige solos de média para alta fertilidade, sendo que a acidez do solo pode alterar sua disponibilidade de nutrientes e, consequentemente, o desenvolvimento das plantas. Sendo assim, objetivou-se avaliar os efeitos da aplicação de calcário líquido; calcário convencional e silicato de Ca e Mg na correção da acidez do solo e desenvolvimento inicial do capim-marandu. Para isso, utilizou-se o delineamento experimental inteiramente casualizado, com quatro repetições, sendo os dados obtidos comparados pelo teste de Scott e Knott, a 5% de significância. Sessenta dias após aplicação dos corretivos, o calcário líquido não corrigiu a acidez do solo, apenas elevando os teores de Ca. A aplicação de calcário convencional e silicato proporcionou correção da acidez do solo e elevação da saturação de bases, sendo mais eficientes em melhorar as características de fertilidade do solo. A altura de plantas, altura de colmo e relação folha/colmo não foram influenciados pelos tratamentos ($P>0,5$). O uso de 2,2 t ha⁻¹ de silicato de Ca e Mg proporcionou maior comprimento de raiz, massa seca de raízes, produção de MS, comprimento da última folha expandida, densidade populacional de perfilhos e peso/perfilho ($P<0,05$). O uso de silicato de Ca e Mg se mostrou eficiente na melhoria das características do solo e desenvolvimento do capim-marandu, podendo substituir o calcário convencional, enquanto o uso de calcário líquido se mostrou menos eficiente.

Palavras-Chave: acidez do solo; matéria seca; pastagem, saturação de bases.

INTRODUÇÃO

A grande maioria dos solos de Minas Gerais e, notadamente os da região de cerrado, que cada vez mais são utilizados na atividade agropecuária, mesmo dotados de boas propriedades físicas, apresentam, em geral, características químicas inadequadas, tais como: elevada acidez (baixo pH), altos teores de Al trocável e deficiência de nutrientes, especialmente de Ca, Mg e P. Tais características resultam em baixa produção dos pastos em consequência do menor enraizamento das plantas, prejudicando a absorção de água e nutrientes (FONTANA, 2006).

No entanto, solos com essas características, uma vez corrigidos quimicamente, apresentam grande potencial de produção, possibilitando uma agropecuária tecnificada e com elevadas produtividades. Isso ocorre, pois, o aumento do pH do solo altera a disponibilidade de nutrientes, causando aumentos na disponibilidade de N (Gedi, 2008), P, K, Ca e Mg, além de melhor enraizamento das plantas. Sendo assim, muitos trabalhos e publicações tem demonstrado a necessidade de calagem nos solos brasileiros, com intuito de corrigir sua acidez, melhorando suas características químicas de fertilidade e, conseqüentemente, sua produtividade.

Os corretivos da acidez do solo mais usados são rochas calcárias moídas, constituídas por misturas de minerais como a calcita e a dolomita, os quais possuem em sua composição carbonatos de cálcio e/ou magnésio, que são pouco solúveis em água. Para que a acidez do solo seja neutralizada, as partículas de solo devem entrar em contato com o calcário ou com os produtos de sua transformação. Decorre daí a necessidade de incorporar o calcário no solo da melhor forma possível, o que nem sempre se consegue fazer em condições de campo.

Atualmente, algumas empresas comercializam corretivos de solo na forma líquida, chamado de calcário líquido e, de acordo com as mesmas, seus resultados no solo são mais rápidos e duradouros em relação ao calcário em pó, tendo a finalidade de corrigir a acidez do solo, fornecer Ca^{2+} e Mg^{2+} e neutralizar os efeitos fitotóxicos do Al^{3+} no solo (BURG *et al.* 2013). No entanto, o uso do calcário líquido ainda não tem sua eficácia comprovada, pois poucas são as informações encontradas em relação ao seu uso, comparando com o calcário convencional.

Os resíduos de siderurgia, a exemplo da escória de aciaria (silicato de Ca e Mg), lama cal e alguns lodos de esgoto têm a capacidade de neutralizar a acidez e possibilitar o deslocamento de nutrientes no perfil do solo e podem ser usados como materiais alternativos ao calcário, uma vez que disponibilizam Ca^{2+} e Mg^{2+} e por existir em sua composição CaO, CaOH, SiCO_3 , NaOH, além de CaCO_3 e MgCO_3

(OLIVEIRA *et al.*, 2002; CARVALHO-PUPATTO, 2004; RAMOS *et al.*, 2006). Adicionalmente, é provável que a escória de aciaria tenha a vantagem de reduzir a acidez do solo mais rapidamente que o calcário, até mesmo em profundidade, uma vez que contêm silicatos, compostos mais solúveis que os carbonatos do calcário, permitindo que os produtos da reação de dissociação apresentem maior mobilidade no solo (ALCARDE, 1992; QUAGGIO, 2000).

Nesse sentido, a utilização de produtos que corrijam a acidez do solo e reduzam os teores de alumínio tóxico, fornecendo Ca e Mg, se torna uma ferramenta de grande importância na agropecuária. No entanto, o uso da escória de aciaria com este propósito ainda é pequeno, embora grandes quantidades sejam geradas nas siderúrgicas de aço. Quanto ao calcário líquido, seu uso é recente e poucas informações estão disponíveis sobre sua utilização. Sendo assim, o objetivo do trabalho foi avaliar o poder corretivo de acidez do solo e o desenvolvimento inicial da *Brachiaria brizantha* cv. Marandu, em solo de elevada acidez e baixa saturação de bases, o qual foi corrigido com calcário, calcário líquido e silicato de Ca e Mg.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido entre 03 de março a 21 de agosto de 2019, em uma fazenda da região de Patos de Minas - MG, cujo clima, segundo classificação de Köppen (1948) é do tipo Aw, caracterizado por grande concentração de chuvas durante o verão.

Foi utilizado o Delineamento Inteiramente Casualizado – DIC, com seis tratamentos e quatro repetições, totalizando 24 unidades experimentais, as quais foram constituídas por vasos plásticos com capacidade de 5 dm³. Os tratamentos foram caracterizados na tabela 1.

As quantidades usadas de calcário convencional e silicato de Ca²⁺ e Mg²⁺, o qual continha 38% de CaO, 9% MgO, 22% SiO₂ e PRNT de 79%, foram determinadas utilizando-se o método de saturação por bases. Para isso considerou-se a elevação de saturação de bases para 60% (1,5 t/ha de silicato) e para 80%, tanto para o uso do calcário quanto do silicato (2,2 t ha⁻¹). Quanto ao calcário líquido utilizou-se a recomendação do fabricante (10 L ha⁻¹) e outra, com quantidade superior à recomendada.

Tabela 1. Tratamentos utilizados no experimento conduzido em vasos na fazenda Cabeceira do Chumbo, entre 03/03/2019 a 21/08/2019. Patos de Minas/MG.

TRATAMENTO	ESPECIFICAÇÕES
Controle	Solo sem uso de corretivo
Silicato 2,2 t ha ⁻¹	Uso de 2,2 t ha ⁻¹ de silicato
Silicato 1,5 t ha ⁻¹	Uso de 2,2 t ha ⁻¹ de silicato
Calcário líquido 10 L ha ⁻¹	Uso de 10 L ha ⁻¹ de calcário líquido
Calcário líquido 15 L ha ⁻¹	Uso de 15 L ha ⁻¹ de calcário líquido
Calcário convencional 2,2 t ha ⁻¹	Uso de 2,2 t ha ⁻¹ de calcário convencional

Para avaliação dos efeitos dos corretivos sobre as características de fertilidade do solo e sobre o desenvolvimento inicial do capim-marandu, utilizou-se um solo proveniente de uma pastagem degradada.

Antes da aplicação dos corretivos de acidez, uma amostra de solo foi encaminhada para a Central de Análises de Fertilidade do Solo - CeFert, do Centro Universitário de Patos de Minas/UNIPAM, para determinação de suas características químicas e de fertilidade, as quais estão apresentadas na tabela 1.

Tabela 2 - Análise química de fertilidade do solo

Análise	Valor
pH água	5,65
M.O.	2,20dag kg ⁻¹
P-rem	13,14 mg L ⁻¹
P-meh	0,50 mg dm ⁻³
K ⁺	10,52 mg dm ⁻³
Ca ²⁺	0,6 cmol _c dm ⁻³
Mg ²⁺	0,00 cmol _c dm ⁻³
Al ³⁺	0,09 cmol _c dm ⁻³
H + Al	2,60 cmol _c dm ⁻³
SB	0,63 cmol _c dm ⁻³
T	0,72 cmol _c dm ⁻³
T	3,23 cmol _c dm ⁻³
V	19,43%
M	12,55%

SB = Soma de Bases / t = CTC efetiva / T = CTC a pH 7,0 / V = Sat. de bases / m = Sat. por alumínio; P, K = [Mehlich - 1, HCl 0,05mol L⁻¹ + H₂SO₄ 0,0125 mol L⁻¹], S-SO₄²⁻ = [Fosfato Monobásico Cálcio 0,01 mol L⁻¹; Ca, Mg, Al = [KCl 1 mol L⁻¹]; H + Al = [Solução Tampão - SMP a pH 7,5]; M.O. = Método Titulométrico.

Nos tratamentos que envolvem o uso de corretivos de acidez, o solo foi misturado e homogeneizado com os respectivos corretivos, usando-se um saco com capacidade para cinco litros. Após a homogeneização, os vasos foram preenchidos com o solo mais os corretivos, 60 dias antes da data prevista para a semeadura, e irrigados duas vezes por semana. Decorrido este período, foram colhidas amostras de solo de cada vaso, formando uma amostra composta de cada tratamento, as quais foram encaminhadas para análise na Central de Análises de Fertilidade do Solo - CeFert, do Centro Universitário de Patos de Minas/UNIPAM, com objetivo de avaliar os efeitos dos corretivos sobre as características químicas e de fertilidade do solo.

Em seguida, procedeu-se a semeadura, no dia 05 de junho de 2019, a qual foi realizada diretamente em sulcos abertos no solo contido nos vasos, o qual foi adubado segundo as exigências de fertilidade do capim-marandu. Após a semeadura, os vasos foram irrigados quatro vezes na semana, com a mesma quantidade de água em cada vaso, durante todo o período experimental. Trinta dias após a germinação foi realizado um desbaste, deixando-se em cada vaso, 10 plantas.

Os dados meteorológicos (figura 1) durante o período em que o componente vegetal foi avaliado (semeadura até as avaliações) foram coletados no site do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Figura 1. Médias de temperatura máxima e mínima (°C) e umidade relativa do ar (%).

Decorridos 60 dias após a germinação foram avaliadas as seguintes variáveis:

- Massa seca de raízes: obtido por meio da lavagem de todo o sistema radicular das plantas presentes em cada balde e, posteriormente, secagem em estufa a 60°C;

- Comprimento de raízes: medindo-se desde a base da planta até a ponta da raiz mais longa;
- Produção de matéria seca (MS): obtido por meio da colheita da parte aérea das plantas e secagem em estufa a 60°C;
- Densidade populacional de perfilhos (DPP): obtido por meio da contagem dos perfilhos vivos contidos em cada vaso;
- Altura de plantas e comprimento de colmo: medindo-se a altura da planta desde sua base até a ponta da folha mais alta e, medindo-se o colmo, desde a base da planta, até a inserção (lígula) da última folha expandida, em cinco perfilhos tomados aleatoriamente, em cada vaso;
- Comprimento da última folha expandida: obtido por meio da mensuração do comprimento da última folha expandida, em cinco perfilhos tomados aleatoriamente em cada balde;
- Relação folha:colmo: obtido por meio da pesagem separada de todas as folhas e colmos de cada um dos perfilhos tomados para análise e, posteriormente, dividindo-se o peso seco das folhas pelo peso seco de colmos;
- Peso por perfilho: obtido por meio da divisão da produção de MS da parte aérea, pela DPP.

Para apresentação e discussão dos dados referentes às características químicas e de fertilidade do solo, utilizou-se a análise descritiva. Quanto aos dados referentes ao desenvolvimento inicial do capim-marandu, os dados obtidos foram tabulados e, posteriormente, submetidos à análise de variância. Quando observado efeito significativo dos tratamentos, os mesmos foram submetidos ao teste Scott-Knott, adotando-se 5% como nível de significância, utilizando-se o software Sistema de Análise de Variância – SISVAR (FERREIRA, 2014).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados referentes às características químicas e de fertilidade do solo, antes e após a aplicação dos corretivos de acidez estão apresentados na tabela 2.

Todos os corretivos foram eficientes em elevar o índice de saturação por bases do solo (V%), se levado em consideração os tratamentos com corretivo em relação ao controle, os níveis de saturação por bases subiram 282%, 236%, 365%, 188%, 235%, para silicato 2,2 t ha⁻¹, silicato 1,5 t ha⁻¹, calcário convencional, calcário líquido 10 L ha⁻¹, calcário líquido 15 L ha⁻¹, respectivamente, especialmente o calcário convencional e o uso de 2,2 t ha⁻¹ de silicato de Ca e Mg, em função da presença de Ca e Mg

nos corretivos e também em função da maior disponibilização de outras bases, após correção da acidez.

Tabela 3 - Análise química de fertilidade do solo, antes e 60 dias após aplicação dos corretivos.

Análise	Tratamentos					
	S 2,2 ¹	S 1,5 ²	C.C ³	C.L 10L ⁴	C.L 15L ⁵	Test. ⁶
pH água antes	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
pH água após	5,60	5,80	6,40	5,27	5,51	5,64
M.O. (dag kg ⁻¹) antes	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
M.O. (dag kg ⁻¹) após	2,00	2,10	1,95	2,25	1,95	2,11
P-rem (mg L ⁻¹) antes	13,14	13,14	13,14	13,14	13,14	13,14
P-rem (mg L ⁻¹) após	18,61	15,40	14,57	13,02	18,08	13,09
P-meh (mg dm ⁻³) antes	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
P-meh (mg dm ⁻³) após	0,77	0,67	2,70	1,07	1,28	0,43
K ⁺ (mg dm ⁻³) antes	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52
K ⁺ (mg dm ⁻³) após	25,25	23,27	16,37	17,36	17,36	10,50
Ca ²⁺ (cmol _c dm ⁻³) antes	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Ca ²⁺ (cmol _c dm ⁻³) após	1,40	1,30	1,20	1,30	1,20	0,59
Mg ²⁺ (cmol _c dm ⁻³) antes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mg ²⁺ (cmol _c dm ⁻³) após	1,20	0,60	2,20	0,10	0,70	0,00
Al ³⁺ (cmol _c dm ⁻³) antes	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Al ³⁺ (cmol _c dm ⁻³) após	0,02	0,00	0,01	0,03	0,03	0,09
H+Al (cmol _c dm ⁻³) antes	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,61
H+Al (cmol _c dm ⁻³) após	2,20	2,30	1,40	2,50	2,30	2,60
SB (cmol _c dm ⁻³) antes	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
SB (cmol _c dm ⁻³) após	2,66	1,96	3,44	1,44	1,94	0,62
t (cmol _c dm ⁻³) antes	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
t (cmol _c dm ⁻³) após	2,68	1,96	3,45	1,47	1,97	0,74
T (cmol _c dm ⁻³) antes	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23
T (cmol _c dm ⁻³) após	4,86	4,26	4,84	3,94	4,24	3,21
V (%) antes	19,43	19,43	19,43	19,43	19,43	19,43
V (%) após	54,78	46,00	71,09	36,62	45,81	19,31
m (%) antes	12,65	12,65	12,65	12,65	12,65	12,65
m (%) após	0,74	0,00	0,29	2,03	1,52	12,16

SB = Soma de Bases / t = CTC efetiva / T = CTC a pH 7,0 / V = Sat. de bases / m = Sat. por alumínio; P, K = [Mehlich - 1, HCl 0,05mol L⁻¹ + H₂SO₄ 0,0125 mol L⁻¹], S-SO₄²⁻ = [Fosfato Monobásico Cálcio 0,01 mol L⁻¹; Ca, Mg, Al = [KCl 1 mol L⁻¹]; H + Al = [Solução Tampão - SMP a pH 7,5]; M.O. = Método Titulométrico.

1 – Silicato de Ca e Mg 2,2 t/ha / **2** – Silicato de Ca e Mg 1,5 t/ha / **3** – Calcário convencional 2,2 t/ha / **4** – Calcário líquido 10 litros/ha / **5** – Calcário líquido 15 litros/ha / **6** – Testemunha.

Ambos os corretivos também apresentaram melhores resultados quanto à redução na saturação por alumínio (m%). Segundo Segundo Doner & Lynn, (1989), calcita e a dolomita presentes no calcário apresentam em grande parte da sua constituição, o carbonato de cálcio e magnésio. Esses carbonatos reagem com a água no solo, liberando uma hidroxila que reage com o alumínio, formando o hidróxido de alumínio, o qual não é absorvido pelas plantas e neutraliza a acidez do solo.

Em relação ao pH, o calcário convencional foi o mais eficiente em elevar este parâmetro, saindo de 5,6 no tratamento testemunha; para 6,4, no tratamento que recebeu 2,2 t ha⁻¹ de calcário, subindo 14%. Isso pode explicado, pois o corretivo que mais reduziu os valores de H+Al foi o calcário convencional, o que resulta em maiores valores de pH. Segundo Alcarde (1992), o silicato pode aumentar o pH do solo em função do poder neutralizante da base SiO₃²⁻. No entanto, esse efeito não ficou tão evidenciado neste trabalho.

Os teores de Ca²⁺ e de Mg²⁺ foram influenciados positivamente pelos corretivos, tendo dobrado os valores de Ca²⁺ e aumentado os teores de Mg²⁺, enquanto que os teores de Al³⁺ e H+Al decresceram, resultando em maiores valores de soma de bases (SB) e estão de acordo com aqueles encontrados por Araújo et al. (2009), Fageria et al. (2010) e Auler et al. (2011).

De forma geral, os resultados obtidos são satisfatórios quando se utilizou silicato ou calcário convencional. Estes resultados já eram esperados uma vez que, segundo Oliveira et al. (2000), a calagem apresenta benefícios diretos às culturas mediante correção da acidez do solo, diminuição da toxidez por Al e Mn, e aumento dos teores de Ca e Mg disponíveis às plantas. Além disso, a calagem pode aumentar a disponibilidade de N, P, S e reduzir a disponibilidade de Fe, Cu, Mn e Zn, além de aumentar a CTC e a mineralização da matéria orgânica do solo, conforme foi observado.

Estudos com escórias aplicadas ao solo têm demonstrado aumento de pH e redução do H+Al (Prado & Fernandes, 2003), em razão da presença de agente neutralizante da acidez como o SiO₃²⁻ (Alcarde, 1992), e incrementos na disponibilidade de P (Prado et al., 2002), Ca e Mg (Prado & Fernandes, 2000), o que também foi observado.

O uso do calcário líquido proporcionou ligeira redução de pH, o que não era esperado, e incremento na disponibilidade de Ca²⁺ e Mg²⁺, resultado já esperado, devido ao produto conter nano partículas de cálcio e magnésio associados a carbonatos. Quando utilizado na quantidade recomendada pelo fabricante (10 l/ha), o calcário líquido foi o menos eficiente em reduzir os teores de H+Al e o índice de saturação por alumínio, e menos eficiente em aumentar a soma de bases, a CTC efetiva, a CTC a pH 7,0 e o índice de saturação por bases.

Os dados referentes ao comprimento de raízes, massa seca de raízes e produção de matéria seca da parte aérea foram influenciadas pelos tratamentos ($P < 0,05$) e estão apresentados na tabela 3.

Tabela 4. Comprimento de raiz, massa seca de raiz e produção de matéria seca do capim-marandu em função dos tratamentos

Tratamento	Comprimento de raiz (cm)	Massa seca de raiz (g/vaso)	Massas seca (g/vaso)
Silicato 2,2 t ha ⁻¹	61,00 a	15,65 a	33,40 a
Silicato 1,5 t ha ⁻¹	41,50 b	15,57 a	23,57 b
Calcário 2,2 t/ha ⁻¹	43,75 b	15,54 a	24,05 b
Calcário líquido 15 L ha ⁻¹	36,75 b	11,48 b	13,88 c
Calcário líquido 10 L ha ⁻¹	28,63 c	9,37 b	17,21 c
Testemunha	30,50 c	11,62 b	15,46 c
CV %	13,49	13,57	14,76

Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de significância.

Maior comprimento de raiz foi observado quando se utilizou 2,2 t ha⁻¹ de silicato, enquanto a massa seca de raiz foi maior quando se utilizou silicato ou calcário convencional. Segundo Alcarde (1992), o silicato de Ca é 6,78 vezes mais solúvel que o carbonato de Ca. No entanto, a solubilidade é bastante variável em função da fonte. As escórias de alto forno apresentam alto teor de Si, mas baixa solubilidade; as escórias de aciaria apresentam menor teor de Si, porém melhor solubilidade, enquanto as escórias da produção do aço inox são as que apresentam o Si na forma mais solúvel. Sendo assim, é possível que a solubilidade do silicato utilizado fosse maior que a do calcário, disponibilizando mais Ca²⁺ no solo, conforme se pode observar na tabela 2, proporcionando maior crescimento radicular. Resultado semelhante foi encontrado por Fortes (2006) o qual observou que a elevação do Ca²⁺ (1,35 cmolc/dm³) e do fósforo para o capim-marandu foi suficiente para obter maior produção de massa seca da parte radicular.

A produção de MS foi 116,04% maior ($P < 0,05$) quando se utilizou 2,2 t/ha de silicato quando comparado a não correção do solo, sendo próximo ao encontrado por Fonseca et al. (2009). A produção da parte aérea, de certa forma é reflexo do desenvolvimento radicular. Nesse sentido, o maior comprimento de raízes observado quando se utilizou 2,2 t/ha de silicato contribuiu para a maior absorção de água e nutrientes, consequentemente, gerando maior desenvolvimento da parte aérea, o que pode ser comprovado na tabela 5, na qual se observa que este tratamento proporcionou maior DPP e maior peso/perfilho.

Segundo Sherman & Riveros (1990), a temperatura ideal para o crescimento do capim-marandu é de 30 a 35 °C, com mínima de 15 °C. Sendo assim, é possível inferir que o pequeno desenvolvimento observado é consequência das condições climáticas durante o período experimental, no qual a temperatura, com média ao redor dos 22 °C (figura 1) gráfico foi limitante ao desenvolvimento do capim e, consequentemente, à produção de MS.

A altura de plantas e o comprimento de colmo não foram influenciados pelos tratamentos ($P>0,05$), porém, observou-se efeito significativo ($P<0,05$) entre os para o comprimento da última folha expandida (Tabela 4).

Tabela 5. Altura de plantas, comprimento de colmo e comprimento da última folha expandida do capim-marandu em função dos tratamentos

Tratamento	Altura de plantas (cm)	Comprimento de colmo (cm)	Comprimento da última folha expandida (cm)
Silicato 2,2 t/ha ¹	49,50	12,98	30,98 a
Silicato 1,5 t/ha ¹	43,25	8,49	25,78 b
Calcário 2,2 t/ha ¹	47,75	12,77	25,53 b
Calcário líquido 15l/ha ¹	42,00	9,55	24,70 b
Calcário líquido 10l/ha ¹	43,75	9,83	20,33 b
Testemunha	42,27	9,17	21,45 b
CV %	18,14	18,15	18,68

Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de significância.

Embora sem efeito estatístico, observou-se que o uso de 2,2 t/ha de silicato proporcionou um incremento de 17,86% na altura de plantas quando comparado ao valor mais baixo, observado quando se utilizou 15 l/ha de calcário líquido. Em relação ao comprimento de colmo, o uso de 2,2 t/ha de silicato proporcionou um incremento de 52,88% no comprimento de colmo, quando comparado ao valor mais baixo, observado quando se usou 1,5 t/ha de silicato.

Quanto ao comprimento da última folha expandida, o uso de 2,2t/ha¹ de silicato proporcionou maior comprimento ($P<0,05$). A maior disponibilização de P e mineralização da matéria orgânica, disponibilizando mais N podem ter contribuído para que comprimento da última folha expandida fosse maior, além da disponibilidade de Ca e Mg.

Na tabela 5 estão apresentados os dados referentes à relação folha/colmo, densidade populacional de perfilhos e peso/perfilho, na qual nota-se que a relação folha/colmo não foi influenciada pelos tratamentos ($P>0,05$).

Tabela 6. Relação folha/colmo, densidade populacional de perfilhos (DPP) e peso/perfilho do capim-marandu em função dos tratamentos

Tratamento	Folha/colmo	DPP (perfilhos/vaso)	Peso/perfilho (g)
Silicato 2,2 t/ha ¹	0,90	15,75 a	2,11 a
Silicato 1,5 t/ha ¹	0,93	13,25 a	1,78 b
Calcário 2,2 t/ha ¹	0,96	14,75 a	1,63 c
Calcário líquido 15 l/ha ¹	0,85	10,00 b	1,46 c
Calcário líquido 10 l/ha ¹	0,90	10,75 b	1,38 c
Testemunha	0,96	10,50 b	1,34 c
CV	11,57	10,39	11,19

Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de significância.

De acordo com Sbrissia & Da Silva (2001), a relação folha/colmo apresenta relevância variada de acordo com a espécie forrageira e período do ano, sendo menor em espécies de colmo tenro e de menor lignificação. Essa variável pode ser utilizada como índice de valor nutritivo da forragem, pois, assim como a altura do pasto e disponibilidade de massa seca, facilita a apreensão de forragem pelo animal e, dessa forma o seu comportamento durante o pastejo (ALDEN & WHITAKER, 1970). Portanto, maiores valores de relação folha/colmo são aquelas que proporcionam melhor eficiência de pastejo e, conseqüentemente, melhor desempenho animal.

A DPP foi superior ($P < 0,05$) quando se utilizou silicato ou calcário convencional, o que pode ser explicado pela melhor condição de solo gerado quando do uso desses corretivos. Segundo Da Silva & Sbrissia, (2000), produção de forragem em uma pastagem é definida, em parte, pelo número de perfilhos existentes na área, o qual, por sua vez, é determinado pelo estágio fisiológico da planta, sendo interessante alta DPP, principalmente na fase de estabelecimento, o que garante boa cobertura do solo, evitando possíveis erosões, uma vez que a formação de pastagens ocorre na estação chuvosa. Considerando a produção de forragem, a maior DPP observada com o uso de silicato e calcário convencional explicam, em parte, a maior produção de MS observada para estes tratamentos (tabela 3).

O peso/perfilho foi maior ($P < 0,05$) quando se utilizou 2,2t/ha de silicato, o que pode ser explicado, embora sem efeito significativo, pela altura de planta, comprimento de colmo e comprimento da última folha expandida, comprovando ser perfilhos maiores e, conseqüentemente, mais pesados.

CONCLUSÕES

O uso de silicato de Ca e Mg se mostrou eficiente na melhoria das características de fertilidade do solo e desenvolvimento do capim-marandu, podendo substituir o calcário convencional. O uso do calcário líquido não se mostrou eficiente.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALCARDE, J.C. Corretivo de acidez do solo: características e interpretações. São Paulo: Associação Nacional para Difusão de Adubos e Corretivos Agrícolas, 1992. 26p. (Boletim Técnico, 6).
- ALDEN, W.G.; WHITAKER, I.A. The determinants of herbage intake by grazing sheep: the inter relationship of factors influencing herbage intake and availability. *Australian Journal of Agricultural Research*, v.21, n.5, p.755-766, 1970.
- ARAÚJO, S. R.; DEMATTÊ, J. A. M; GARBUIO, F. J. Aplicação do calcário com diferentes graus de reatividade: alterações químicas no solo cultivado com milho. *Revista Brasileira de Ciência do Solo*, v.33, p.1755-1764, 2009.
- AULER, P. A. M.; NEVES, C. S. V. J.; FIDALSKI, J.; PAVAN, M. A. Calagem e desenvolvimento radicular, nutrição e produção de laranja “Valência” sobre porta-enxertos e sistemas de preparo do solo. *Pesquisa Agropecuária Brasileira*, v.46, p.254-261, 2011.
- BURG, G.; DEAK, E.; SCHMIDT, M. R.; BEUTLER, A. N.; GALON, L.; GIACOMELI, R. Efeito do calcário líquido nas características químicas do solo. *Revista Salão de Pesquisa*, Itaquí-RS, v. 5 n. 2, p. 93, 2013.
- CARVALHO-PUPATTO, J.G. et al. Atributos químicos do solo, crescimento radicular e produtividade do arroz de acordo com a aplicação de escórias. *Pesquisa Agropecuária Brasileira*, v.39, p.1213-1218, 2004.
- DA SILVA, S.C.; SBRISIA, A.F. A planta forrageira no sistema de produção. In: PEIXOTO, A.M.; PEDREIRA, C.G.S.; MOURA, J.C.; FARIA, V.P. (Eds.). *SIMPÓSIO SOBRE MANEJO DA PASTAGEM: a planta forrageira no sistema de produção*, 17, Piracicaba, 2000. Anais... Piracicaba: FEALQ, p. 3-20, 2000.
- DONER, H.E. & LYNN, W.C. Carbonate, halide, sulfate and sulfide minerals. In: DIXON, J.B. & WEED, S.B., eds. *Minerals in soil environments*. 2.ed. Wisconsin, Soil Society of America, 1989. p.279-324.
- FAGERIA, N. K.; SANTOS, A. B. DOS; MOREIRA, A. Yield, nutrient uptake and changes in soil chemical properties as influenced by liming and iron application in common bean in a no tillage system. *Communications in Soil Science and Plant Analysis*, v.41, p.1740-1749, 2010.
- FERREIRA, D.F. *Sisvar: a Guide for its Bootstrap procedures in multiple comparisons*. *Ciênc. agrotec*, vol.38, n.2 p. 109-112, 2014.
- FONSECA, I. M., PRADO, R. D. M., VIDAL, A. D. A., & NOGUEIRA, T. A. R. (2009). Efeito da escória, calcário e nitrogênio na absorção de silício e na produção do capim-marandu. *Bragantia*, pag. 221-232.
- FORTES, C.A. Correção do solo com silicato de cálcio e magnésio para produção de gramíneas forrageiras. 2006. 137f. Dissertação (Mestrado em Solos e Nutrição de Plantas) – Universidade Federal de Lavras, Lavras.
- FONTANA, Ademir et al. Atributos de fertilidade e frações húmicas de um Latossolo Vermelho no Cerrado. *Pesquisa Agropecuária Brasileira*, v. 41, n. 5, p. 847-853, 2006.
- GOODROAD, L.L. & JELLUM, M.D. Effect of N fertilizer rate and soil pH on N efficiency in corn. *Plant Soil*, 106:85-89, 1988.

GEDI JORGE SFREDO. Soja no brasil: calagem, adubação e nutrição mineral. Documento 305. v. 1, p. 107. INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA. INMET, 2018. Disponível em:

<<http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=estacoes/estacoesAutomaticas/>>. Acesso em: 25 de Agosto de 2019.

OLIVEIRA, F.C.; MATIAZZO, M.E.; MARCIANO, C.R. & ROSSETO, R. Efeitos de aplicações sucessivas de lodo de esgoto em Latossolo Amarelo distrófico cultivado com cana-de-açúcar: carbono orgânico, condutividade elétrica, pH e CTC. Revista Brasileira de Ciências do solo, 26:505-519, 2002.

Capítulo 15

10.37423/210403932

MONITORAMENTO DA QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA DE UMA FONTE HÍDRICA SUBTERRÂNEA PÚBLICA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AREIA-PB

Thaís do Carmo Oliveira Silva

Universidade Federal da Paraíba

Thamara do Carmo Oliveira Silva

Universidade Federal da Paraíba

Giovanna de Fátima Abrantes Oliveira

Universidade Federal da Paraíba

Tatianna de Oliveira Duarte

Universidade Federal da Paraíba

Tereziana Silva da Costa

Universidade Federal da Paraíba

Maria Betania Hermenegildo dos Santos

Universidade Federal da Paraíba

Resumo: A água é um recurso natural fundamental para a manutenção da vida na Terra. No entanto, sua distribuição é realizada de maneira irregular, muitas vezes devido a fatores climáticos, demográficos e geográficos, resultando na necessidade da exploração de águas subterrâneas, que mesmo estando localizadas no subsolo, está propensa a sofrer contaminações. Logo, surge a necessidade da realização das análises físico-químicas. Portanto, o presente trabalho teve como objetivo monitorar a qualidade físico-química da água de uma fonte hídrica subterrânea pública, localizada na cidade de Areia-PB, para verificar a conformidade com os padrões exigidos pelas legislações vigentes no país. As análises foram realizadas entre os meses de julho e dezembro de 2019, com um total de seis coletas. O preparo das soluções e análises das amostras foram realizadas nos Laboratórios de Química Analítica (LQA) e Biologia e Tecnologia Pós-Colheita (LBTPC) do Departamento de Química e Física (DQF), do Centro de Ciências Agrárias (CCA), da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Os parâmetros analisados foram pH, turbidez, condutividade, salinidade, oxigênio dissolvido, cloro residual, alcalinidade total, dureza total, cloretos, fósforo total, amônia, nitrato e sólidos totais dissolvidos. A partir dos resultados obtidos observa-se que a água da fonte analisada se encontra dentro dos padrões estabelecidos pela legislação, exceto pelo pH, que apresentou valores abaixo das normas vigentes.

Palavras-Chave: Águas Subterrâneas. Características Físico-Químicas. Potabilidade.

1 INTRODUÇÃO

Segundo o Manual de Educação para o Consumo Sustentável (BRASIL, 2005a), a água é um recurso natural extremamente importante para a manutenção da vida na Terra. Constituindo cerca de 70% do corpo humano, ela é responsável por diversas funções no nosso organismo, como o controle da temperatura corporal e o transporte de substâncias. A água também é fundamental para a preservação dos ciclos biológicos, geológicos e químicos, contribuindo para o equilíbrio dos ecossistemas (BAIRD; CANN, 2011).

Embora a água seja encontrada em grande quantidade em nosso planeta, apenas uma pequena parcela é doce. Estima-se que o planeta Terra possui aproximadamente 1,4 bilhões de km³ de água. No entanto, cerca de 97,5% desse recurso tão importante encontra-se nos oceanos e mares, na forma de água salgada, tornando-se imprópria para o consumo humano, e apenas 2,5% encontra-se na forma de água doce. Desse total de água doce, cerca de 68,9% está em calotas polares, sendo inviáveis para utilização; 29,9% está em águas subterrâneas, 0,9% em pântanos e na humidade do solo, e somente 0,3% corresponde a água doce superficial de rios e lagos (GRASSI, 2001; TOFOLI, 2010).

De acordo com a Lei nº 9.433 de 8 de janeiro de 1997, que constitui a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), a água é um bem público e um recurso natural limitado e ter acesso a ela é um direito de todos (BRASIL, 1997). No entanto, sua distribuição é realizada de maneira irregular, muitas vezes devido a fatores climáticos, demográficos e geográficos, ocasionando na necessidade da exploração de águas subterrâneas presentes nos lençóis freáticos e aquíferos, sendo esta a principal fonte de recursos hídricos do mundo.

No Brasil, estima-se que 51% do suprimento de água potável seja proveniente de recursos hídricos subterrâneos. A água subterrânea é utilizada em diversas atividades, inclusive para o consumo humano, e embora esteja localizada no subsolo da terra, ainda está propensa a sofrer contaminações, muitas vezes decorrentes de lixões, efluentes domésticos, uso inadequado de fertilizantes, resíduos de atividades industriais, entre outros, e por isso é necessário seguir os parâmetros estabelecidos pela Portaria de Consolidação nº 5 de 2017 (BRASIL, 2017) que determinam se a água está ou não própria para utilização (FOSTER; HIRATA, 1993).

Desta forma, surge a necessidade da realização das análises físico-químicas, pelas quais é possível indicar o nível da qualidade de um corpo hídrico, comparando os valores obtidos com os valores

máximos permitidos de cada parâmetro analisado, conforme os especificados pela legislação (BORTOLI, 2016).

Portanto, o presente trabalho teve como objetivo monitorar a qualidade físico-química da água de uma fonte subterrânea pública, localizada no município de Areia (PB), para verificar a conformidade com os padrões exigidos pelas legislações vigentes no país.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo foi realizado na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), no Centro de Ciências Agrárias (CCA), Campus II, localizado na cidade de Areia, estado da Paraíba. Foram efetuadas as coletas das amostras de água de uma fonte hídrica subterrânea de domínio público, utilizada pela população areiense para diversos fins, inclusive a ingestão.

As análises foram realizadas mensalmente entre os meses de julho e dezembro de 2019, com um total de seis coletas, respeitando uma distribuição uniforme ao longo do período.

As amostras de água foram coletadas aproximadamente às 07h, em três frascos de vidro de 500 mL anteriormente higienizados. Em seguida, foi realizada a identificação das amostras com etiquetas contendo procedência, data, horário, responsável pela coleta e temperatura, sendo esta aferida ainda no local da coleta, com termômetro de mercúrio.

O preparo das soluções e análises das amostras foram realizados nos Laboratórios de Química Analítica (LQA) e Biologia e Tecnologia Pós-Colheita (LBTPC) do Departamento de Química e Física (DQF), do Centro de Ciências Agrárias, da UFPB. Foram utilizados métodos volumétricos, instrumentais e colorimétricos, nos quais os parâmetros químicos analisados foram pH, turbidez, condutividade, salinidade, oxigênio dissolvido, cloro residual, alcalinidade total, dureza total, cloretos, fósforo total, amônia, nitrato e sólidos totais dissolvidos.

As análises foram realizadas de acordo com a metodologia estabelecida no *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater* (APHA; AWWA; WEF, 1998), com exceção do parâmetro amônia, que foi analisado de acordo com os procedimentos do *Standard Test Methods for Ammonia Nitrogen In Water* (ASTM D1426-08). Todas as análises foram realizadas em triplicata.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos a partir das análises foram comparados com a Resolução nº 396 de 2008 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e a Portaria de Consolidação 5/2017 do Ministério

da Saúde, que dispõe sobre a qualidade da água utilizada pela população e determinam os padrões de potabilidade.

- pH

Na Figura 1 são observados os valores obtidos para o potencial hidrogeniônico (pH), referente a concentração de íons hidrogênio H^+ em solução com a finalidade de indicar sobre as condições da água em termos de acidez, neutralidade e alcalinidade. De acordo com a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA, 2013), o pH varia entre 0 e 14, em que os valores abaixo de 7 representam condições ácidas, igual a 7 neutra e superiores a 7 indicam situação básica.

Figura 1 – Valores obtidos do pH.

Fonte: Dados da pesquisa.

A Portaria de Consolidação 5/2017 do Ministério de Saúde estabelece que o pH da água esteja na faixa de 6,0 a 9,5. Logo, os resultados obtidos para os meses de setembro, novembro e dezembro estão abaixo do proposto pela portaria, sendo as amostras analisadas consideradas levemente ácidas.

Esses valores de pH podem ter sido influenciados devido às condições climáticas e os tipos de rochas existentes na região semiárida do Nordeste, atuando assim na acidez da água. Além do mais, os valores de pH para águas subterrâneas são menores que os das águas superficiais, por causa do aprisionamento do CO_2 (OLIVEIRA, 2018).

Além disso, é importante considerar que a água do poço analisado fica nas proximidades de uma lavanderia pública, assim, substâncias podem entrar em contato com essas águas acidentalmente, como por exemplo o amaciante de roupas, que possui pH na faixa de 3 a 7 (PACHECO; PALLADINO, 2013).

Resultados semelhantes foram obtidos por Monteiro (2018) na avaliação da água de poços do tipo cacimba, localizados na cidade de Areia-PB, cujo valores de pH dos dois poços ficaram abaixo de 7.

Logo, há a possibilidade de que as amostras presentes estejam sofrendo tais influências, resultando assim no pH ácido da fonte analisada.

- Turbidez

A turbidez é entendida como a presença de partículas insolúveis que resultam em interferências na passagem da luz através da água, partículas essas como areia, argila, microrganismos, matérias orgânicas, entre outras, ocasionando o desvio da luz que penetra na água, podendo ser prejudicial à fotossíntese, além de influenciar no aumento da temperatura superficial (TOFOLI, 2010).

Seus valores elevados provocam sabor e odor característico na água, devido à presença de matéria orgânica. Contudo, as amostras analisadas encontram-se dentro do valor estabelecido pela legislação vigente. Na Figura 2 é observado os valores referentes à análise de turbidez.

Figura 2 – Resultados obtidos de turbidez.

Fonte: Dados da pesquisa.

Os resultados obtidos variaram entre 2,19 e 3,27 UNT, sendo observado um valor mais elevado no mês de julho, período de inverno, no qual provavelmente devido às chuvas pode ter ocorrido o carregamento de partículas sólidas em suspensão para dentro da fonte, resultando nesse pequeno aumento da turbidez da água.

O valor máximo estipulado pelas normas vigentes referente à turbidez é de até 5 UNT, logo, é observado que todas as amostras coletadas apresentaram valores dentro do estabelecido.

Observando os resultados obtidos em amostras de poços artesianos do município de Imigrantes (RS), analisados por Zerwes *et al.* (2015), verifica-se que dos dez poços analisados pelos autores, sete obtiveram resultados de turbidez inferiores a 3 UNT. Ainda comparando os resultados obtidos a partir da análise da turbidez com os resultados de dois poços da zona rural, analisados por Andrade, Silva e Araújo (2020), identifica-se um valor de 2,77 UNT, mostrando assim serem relativamente próximos, respeitando os critérios estabelecidos pela legislação.

- Condutividade elétrica

A condutividade elétrica consiste na sua capacidade de conduzir corrente elétrica a partir das substâncias dissolvidas que estão presentes na água, e podem se dissociar em cátions e ânions, ou seja, ela é proveniente da concentração iônica da solução, e quanto maior a quantidade de íons dissolvidos, melhor a ação eletrolítica e maior a corrente elétrica (FUNASA, 2014). A Figura 3 expõe os resultados obtidos para este parâmetro.

Figura 3 – Resultados obtidos da condutividade elétrica.

Fonte: Dados da pesquisa.

Ao analisar o gráfico da Figura 3 percebe-se que em média os valores da condutividade elétrica ficaram em 310,57 μS/cm, sendo superiores aos encontrados por Monteiro (2018), cujos valores médios para os poços A e B foram 156,13 μS/cm e 179,94 μS/cm, respectivamente.

O aumento da condutividade elétrica da fonte analisada pode estar relacionado com ambientes poluídos por esgotos domésticos, tendo em vista que a fonte em questão está localizada próximo de casas residenciais e ao lado de uma lavanderia, podendo ser atingida por esses resíduos contendo uma grande quantidade de matéria orgânica, o que facilita a entrada de espécies iônicas nos corpos d'água.

Essa elevação também pode acontecer devido a fatores climáticos, uma vez que o aumento da temperatura em períodos mais quentes e sem a presença de chuva possibilita uma maior quantidade de sais (OLIVEIRA, 2018).

Embora não exista um valor máximo permitido para o parâmetro de condutividade elétrica, é fundamental realizar o seu monitoramento uma vez que águas muito salobras apresentam condutividade consideravelmente alta, sendo impróprias para o consumo humano.

Esse parâmetro não possibilita identificar quais são os íons que estão presentes na água, no entanto, proporciona o cálculo da salinidade total das amostras, além de ser um importante indicador de fontes poluidoras (ZUIN *et al.*, 2008).

- Salinidade

A salinidade consiste na quantidade de sais dissolvidos na água, e geralmente sua medição é realizada através da condutividade elétrica, densidade, índice de refração ou velocidade sonora (FEITOSA *et al.*, 2008). A Figura 4 mostra os valores de salinidade obtidos a partir da condutividade elétrica.

Figura 4 – Resultados obtidos da salinidade.

Fonte: Dados da pesquisa.

Segundo o CONAMA 357/2005 (BRASIL, 2005b), a água do território brasileiro pode ser classificada a partir da sua salinidade. A água doce possui salinidade inferior ou igual a 0,5‰, água salobra apresenta salinidade entre 0,5‰ e 30‰, e a água salina contém salinidade igual ou superior a 30‰. De acordo com a Figura 4 é possível observar que todas as amostras se encontram dentro dos valores estabelecidos, sendo classificadas como água doce.

Segundo Santos (2012), em determinadas regiões onde existe a presença de rochas cristalinas no subsolo, as águas subterrâneas podem apresentar altos teores de sais, uma vez que a água da chuva passa por uma drenagem natural do solo, passando por diversas camadas do substrato, podendo arrastar esses sais para a água (SUASSUNA, 2019).

A frequente ingestão da água com elevadas concentrações de sais pode levar a ocorrência de distúrbios no estômago, devido a grandes concentrações de cloreto, além de possuir sabor desagradável (SUASSUNA, 2019).

- Oxigênio dissolvido

O oxigênio dissolvido (OD) representa a quantidade de oxigênio dissolvido na água, sendo este um gás pouco solúvel. Essa solubilidade pode variar de acordo com a temperatura e sais dissolvidos. Os resultados obtidos para o OD estão expressos na Figura 5.

Figura 5 – Resultados obtidos de oxigênio dissolvido.

Fonte: Dados da pesquisa.

Ao observar a Figura 5, nota-se que houve uma pequena variação nos valores obtidos, sendo de 5,03 a 5,77 mg O₂/L. Feitosa *et al.* (2008) explanam que normalmente as concentrações de OD presentes em águas subterrâneas são entre 0 e 5 mg/L, e que as baixas concentrações são justificadas pela ação dos microrganismos que decompõem a matéria orgânica e as reações de oxidação de alguns minerais existentes. No entanto, as amostras apresentaram OD um pouco acima do valor sugerido pelos autores, indicando que provavelmente a água dos poços analisados é livre de contaminações. Apesar disso, a Portaria de Consolidação 5/2017 do Ministério de Saúde, bem como a Resolução nº 396/2008, não estipulam um valor mínimo permitido para este parâmetro.

- Cloro residual

O cloro residual é um composto químico utilizado com a finalidade de desinfetar a água, provocando a destruição de organismos patogênicos existentes. Os produtos mais utilizados são o hipoclorito de sódio e de cálcio, cal clorada e cloro gasoso, sendo os mais utilizados em Estações de Tratamento de Água - ETA (PALUDO, 2010).

Nas análises realizadas referentes à água subterrânea não foi identificada a presença de cloro residual, sendo uma resposta já esperada, uma vez que esse elemento é comumente encontrado quando a água é submetida a algum tratamento sanitário (OLIVEIRA, 2018).

Observando os dados das análises realizados por Oliveira (2018), Monteiro (2018) e Gomes (2017), nota-se que também não obtiveram a presença de cloro residual em suas respectivas amostras.

- Alcalinidade total

Os resultados obtidos em relação a alcalinidade total estão expostos na Figura 6, sendo essa definida como o conjunto das concentrações de hidróxidos, carbonatos e bicarbonatos, expressa em termos de carbonato de cálcio, e caracterizada por sua capacidade em neutralizar os ácidos ali existentes (FUNASA, 2013).

Figura 6 – Valores obtido de alcalinidade total.

Fonte: Dados da pesquisa.

Nas águas naturais, a alcalinidade tem origem a partir de ácidos fracos, como o ácido carbônico, que surge devido à dissolução do gás carbônico e algumas bases fortes, levando à formação dos carbonatos

e bicarbonatos citados anteriormente, e de minerais existentes nos solos (LENZI; FAVERO; LUCHESE, 2009).

Os valores obtidos a partir das análises realizadas para a alcalinidade total oscilaram entre 16,68 e 40,62 mg CaCO₃/L (Figura 6). Embora a legislação vigente não estabeleça um valor máximo permitido para este parâmetro, Coelho *et al.* (2017) afirmam que normalmente os valores resultantes das análises de águas naturais apresentam alcalinidade na faixa de 30 a 500 mg L⁻¹ de CaCO₃. Os resultados obtidos por esses autores a partir de suas amostras variando entre 22,9 e 53,44 mg CaCO₃/L.

Os valores médios obtidos por Blank e Vieira (2014) e Silva *et al.* (2019) foram de 32,27 e 42,67 mg CaCO₃/L, respectivamente, sendo também semelhantes aos valores obtidos no presente trabalho.

A alcalinidade pode ser influenciada por fatores como o desgaste de rochas e a decomposição de matérias orgânicas em contato com as águas. Valores altos de alcalinidade podem conferir um sabor característico à água, entretanto, em concentrações moderadas não causam danos à saúde (BRASIL, 2006).

- Dureza total

A dureza total é definida pela concentração de sais de íons cálcio e magnésio presentes na água (FUNASA, 2013). A Figura 7 expressa os valores obtidos.

Figura 7 – Resultados obtidos da dureza total.

Fonte: Dados da pesquisa.

Segundo a Portaria nº 5/2017, o valor máximo permitido para a dureza total é de 500 mg de CaCO_3/L ; logo, de acordo com os resultados expostos na Figura 7, os dados encontrados estão de acordo com a norma estabelecida.

A dureza da água é classificada em mole ou branda: < 50 mg/L de CaCO_3 ; moderada: entre 50 mg/L e 150 mg/L de CaCO_3 ; dura: entre 150 mg/L e 300 mg/L de CaCO_3 ; e muito dura: > 300 mg/L de CaCO_3 (BRASIL, 2006).

A dureza elevada da água pode resultar em formação de biofilmes, implicar na capacidade de formar espuma por sabão, causar incrustações em tubulações industriais, além de influenciar nas características organolépticas da água, causando sabor desagradável (COELHO *et al.*, 2017; MEDEIROS FILHO, 2009).

Resultados semelhantes foram encontrados por Monteiro (2018) em estudos referentes à análise de poços, nos quais foram obtidos valores de dureza por volta de 46 mg CaCO_3/L .

- Cloreto

Segundo a Portaria nº 5/2017 do Ministério da Saúde, o valor máximo permitido de Cloretos na água é de até 250 mg Cl^-/L . A Figura 8 mostra os valores obtidos a partir da análise realizada.

Figura 8 – Resultados obtidos de cloretos.

Fonte: Dados da pesquisa.

É observado que em todas as amostras coletadas, os teores de cloreto estão de acordo com o valor estabelecido pela legislação vigente, variando de 54,32 a 68,13 mg Cl^-/L . De acordo com Feitosa *et al.* (2008), geralmente as águas subterrâneas possuem teores de cloretos abaixo de 100 mg Cl^-/L .

O íon cloreto se movimenta com facilidade em solução, logo, quando ele está no solo e entra em contato com água por algum meio infiltra-se e atinge as águas subterrâneas provocando a mudança do seu padrão de qualidade (SILVA *et al.*, 2008; ANDRADE *et al.*, 2009).

As concentrações do cloreto estão presentes em águas brutas em diferentes quantidades, constituída por cloretos de cálcio, sódio e magnésio. O cloreto em altas concentrações na água pode causar sabores característicos e efeitos laxativos (FUNASA, 2013). Além de serem um excelente indicador de poluição para lixões e aterros sanitários (FEITOSA *et al.*, 2008).

Blank e Vieira (2014) obtiveram resultados semelhantes aos encontrados nessa pesquisa, em suas amostras, sendo 43,13 e 41,48 mg Cl-/L, bem como Oliveira (2018), que obteve quantidade de cloretos nas amostras entre 30 e 50 mg Cl-/L.

- Fósforo total

O fósforo total é classificado como um dos elementos fundamentais para os seres vivos, sendo um constituinte das membranas celulares e participando de inúmeros processos biológicos (MARONEZE *et al.*, 2014). Os resultados obtidos para este parâmetro estão na Figura 9.

Figura 9 – Resultados obtidos do fósforo.

Fonte: Dados da pesquisa.

Embora os documentos utilizados para comparação não objetam um valor máximo para este parâmetro, o seu monitoramento é de extrema importância, uma vez que o fósforo é um dos principais indicadores de contaminação. Os valores obtidos para o fosfato oscilaram entre 0,09 e 0,54 mg P/L (SILVA *et al.* 2019).

Valores de fósforo acima de 1,0 mg/L para águas naturais são considerados um indicativo de contaminação, podendo ser proveniente de descarte de efluentes domésticos e industriais (FEITOSA *et al.*, 2008).

A existência do fósforo na água pode estar associada a processos naturais como decomposição da matéria orgânica, chuva e desgastes de rochas, e também a processos provocados pelas ações humanas como lançamentos de fertilizantes, esgotos, pesticidas, entre outros (BRASIL, 2006).

- Amônia

Na Figura 10 são expressos os resultados referentes à variação de amônia na fonte hídrica analisada.

Figura 10 – Resultados obtidos da amônia.

Fonte: Dados da pesquisa.

De acordo com os valores mostrados na Figura 10, houve uma maior variação nos meses de agosto e novembro, sendo 0,11 e 0,12 mg NH₃/L, respectivamente. Nos meses citados, as coletas foram realizadas em dias de chuva, justificando a possível variação, uma vez que a água da chuva pode arrastar essa substância de áreas contaminadas.

Segundo a Portaria nº 5/2017 do Ministério da Saúde, o valor máximo permitido em relação a amônia é 1,5 mg NH₃/L, logo, os resultados obtidos estão dentro do permitido pela legislação.

A amônia encontra-se naturalmente em corpos hídricos, como resultado da degradação de compostos orgânicos e inorgânicos do solo e da água, sendo consequência da excreção da biota, redução do nitrogênio gasoso da água por microrganismos ou por trocas gasosas com a atmosfera. Essa substância

também é comum em esgoto sanitário, sendo consequência direta de descargas de efluentes domésticos e industriais (REIS; MENDONÇA, 2009).

- Nitrato

A presença de nitrogênio na água pode ocorrer nas formas de nitrogênio orgânico, amoniacal, nitrito e nitrato, sendo esse último originado de diversas fontes antrópicas como o vazamento das redes coletoras de esgoto, utilização de fossas sépticas, depósitos de lixo, e principalmente por atividades agropecuárias, podendo atingir o lençol freático e ocasionar a contaminação das águas subterrâneas (FEITOSA *et al.*, 2008; PINTO *et al.*, 2013).

Segundo Feitosa *et al.* (2008), a presença de nitrato na água em pequenas concentrações representa a última etapa da oxidação da matéria orgânica, e como é possível observar na Figura 11, todos os valores analisados encontram-se em quantidades relevantes.

Figura 11 – Resultados obtidos do nitrato.

Fonte: Dados da pesquisa.

O valor estabelecido pela norma vigente em relação à quantidade de nitrato na água é de 10 mg/L N-NO₃⁻, e de acordo com a Figura 11, nas análises realizadas é possível observar que os valores encontrados não ultrapassaram o permitido.

Os nitratos são compostos extremamente tóxicos para o organismo humano e o consumo da água com elevadas concentrações dessa substância pode causar sérios danos à saúde, como o desenvolvimento da metemoglobinemia, que consiste em uma doença bastante delicada, na qual acontece a redução do oxigênio no sangue, a partir da redução do nitrato a nitrito, e ao entrar na

corrente sanguínea causa a oxidação do Fe (II) da hemoglobina para Fe (III), gerando a metehemoglobina, molécula que não possui a capacidade de transportar oxigênio (SILVA *et al.*, 2019).

Essa doença é ainda mais severa em bebês menores de seis meses de idade devido à deficiência de algumas enzimas, deixando a pele da criança azulada e, desta forma, sendo conhecida também como síndrome do bebê azul (SILVA *et al.*, 2019).

A ingestão da água com grandes teores de nitrato também pode levar ao desenvolvimento de câncer, uma vez que ele pode ser convertido a nitrosaminas, sendo um composto altamente cancerígeno (GUIMARÃES; NOUR, 2001).

- Sólidos Totais Dissolvidos

Segundo Feitosa *et al.* (2008), os Sólidos Totais Dissolvidos (STD) consistem na massa total dos componentes minerais presentes na água por unidade de volume. Eles apresentam partículas de diâmetro menor que 10-3µm, que permanecem em solução mesmo depois da filtração. Os resultados obtidos de STD estão na Figura 12.

Figura 12 – Resultados obtidos dos STD.

Fonte: Dados da pesquisa.

Na Figura 12 são expressos os resultados referentes à variação de STD. Segundo a Resolução nº 396/2008 do CONAMA (BRASIL, 2008), o valor máximo estabelecido para STD é de 1000 mg/L. Como é possível observar nessa figura, houve maiores alterações nos meses de setembro e dezembro, indo de 718,67 a 439,73 mg/L. No entanto, todos os valores obtidos permanecem de acordo com o permitido (SILVA *et al.*, 2017).

O STD na água pode se originar de processos naturais como erosivos, detritos orgânicos e organismos, ou ainda pela ação antropogênica, como a presença de lixos e esgotos (SILVA *et al.*, 2017).

4 CONCLUSÃO

A partir dos resultados obtidos e através da comparação com a normativa vigente, em relação ao pH, verificou-se que os meses de setembro, novembro e dezembro encontram-se ligeiramente abaixo do estabelecido. No entanto, essa leve acidez identificada não influencia a utilização da água para o consumo humano.

Em relação a Condutividade Elétrica, Oxigênio Dissolvido, Alcalinidade e Fósforo não existem valores estabelecidos pela portaria, porém, é de extrema importância realizar o seu monitoramento, pois alterações relevantes podem indicar contaminação.

Quanto aos valores dos demais parâmetros, todos encontram-se dentro dos padrões exigidos pela norma vigente, apontando que não há riscos de utilização da água para abastecimento humano.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, A. M. C; SILVA, D. A.; ARAÚJO, N. M. C. Avaliação da turbidez de águas de poços da zona rural do município de Caruaru-PE. Brazilian Journal Of Health Review, Caruaru, v. 3, n. 2, p. 1933-1942, 2020.

ANDRADE, E. M; et al. Impacto da lixiviação de nitrato e cloreto no lençol freático sob condições de cultivo irrigado. Ciência Rural, Santa Maria, v. 39, n. 1, p. 88-95, 2009. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/cr/v39n1/a14v39n1.pdf>. Acesso em: 23 abr. 2021.

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 20th ed., Washington, D.C: American Public Health Association/ American Water Works Association/ Water Environment Federation, 1998.

ASTM D 1426. Standard Test Methods for Ammonia Nitrogen in Water. ASTM International, 2008.

BAIRD, C.; CANN, M. Química ambiental. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. BLANK, D. E.; VIEIRA, Juliana G. Caracterização físico-química e microbiológica de água de poços rasos do bairro Três Vendas, Pelotas-RS. Revista de Ciências Exatas e Engenharias, Rio Grande, v. 24, n. 1, p. 2-17, fev. 2014.

BORTOLI, J. Qualidade físico-química e microbiológica da água utilizada para consumo humano e dessedentação animal em propriedades rurais produtoras de leite na região do Vale do Taquari/RS. 2016. 152 f. Dissertação (Mestrado em Ambiente e Desenvolvimento) – Centro Universitário UNIVATES, Lajeado, 2016. Disponível em:

<https://www.univates.br/bdu/bitstream/10737/1068/1/2016JaquelineDeBortoli.pdf>. Acesso em: 03 jan. 2020.

BRASIL. Ministério da Educação. Ministério do Meio Ambiente. Manual de educação para o consumo sustentável. Brasília: Consumers International/ MMA/ MEC/ IDEC, 2005a. 160 p. Disponível em:

<http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/publicacao8.pdf>. Acesso em 22 abr. 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017. Consolidação das normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde. Diário Oficial da União. 5 Set 2017. Disponível em:

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0005_03_10_2017.html. Acesso em: 21 abr. 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Vigilância e controle da qualidade da água para consumo humano. Brasília: Secretaria de Vigilância em Saúde. 2006. 213p. Disponível em:

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/vigilancia_controle_qualidade_agua.pdf. Acesso em: 23 abr. 2021. BRASIL. Ministério do Meio Ambiente dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal. Lei n. 9.433: Política Nacional de Recursos Hídricos. Brasília: Secretaria de Recursos Hídricos, 1997. 72p. Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=370>. Acesso em: 22 abr. 2021. BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Resolução CONAMA nº 357, de 15 de junho de 2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.

Brasília, 2005b. Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=459>. Acesso em: 23 abr.2021. BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Resolução nº 396, 3 de abril de 2008. Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências. Brasília, 2008. Disponível em:

<http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=562>. Acesso em: 21 abr. 2021. COELHO, S. C.; et al. Monitoramento da água de poços como estratégia de avaliação sanitária em Comunidade Rural na Cidade de São Luís, MA, Brasil. Ambiente e Água - An Interdisciplinary Journal Of Applied Science, Taubaté, v. 12, n. 1, p. 156, 1 jan. 2017. Disponível em:

<https://www.scielo.br/pdf/ambiagua/v12n1/1980-993X-ambiagua-12-01-00156.pdf>. Acesso em: 23 abr. 2021.

FEITOSA, F. A. C. et al. Hidrogeologia: conceitos e aplicações. 3. ed. Rio de Janeiro: CPRM: LABHID, 2008. FOSTER, S.; HIRATA, R. Determinação do risco de contaminação das águas subterrâneas: um método baseado em dados existentes. São Paulo. Instituto Geológico. 1993. 96 p. Disponível em: https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/wp-content/uploads/sites/233/2019/02/Boletim_IG_10_Determinacao_de_Riscos_de_Contaminacao_das_Aguas_Subterraneas-1994.pdf. Acesso em: 22 abr. 2021.

FUNASA – Fundação Nacional de Saúde. Manual de Controle da Qualidade da Água para Técnicos que Trabalham em ETAS. 1. ed. Brasília, p.20. 2014. Disponível

em:<http://www.funasa.gov.br/documents/20182/38937/Manual+de+controle+da+qualidade+da+%C3%A1gua+para+t%C3%A9cnicos+que+trabalham+em+ETAS+2014.pdf/85bbdcbb-8cd2-4157-940b-90b5c5bcfc87>. Acesso em: 23 abri. 2021.

FUNASA - Fundação Nacional de Saúde. Manual Prático de Análise de Água. 4. ed. rev. Brasília, p.150, 2013. Disponível em:

<http://www.funasa.gov.br/documents/20182/38937/Manual+pr%C3%A1tico+de+an%C3%A1lise+de+%C3%A1gua++2013.pdf/218a4d92-bb9d-45c7-a0c0-fda6dbe6f368>. Acesso em: 22 abr. 2021. GOMES, F. D. C. Avaliação das características físico-químicas da água de poço e cisterna. 2017. 26 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Química Industrial) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2017. Disponível em:

<http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/bitstream/123456789/14312/1/PDF%20-%20Fellype%20Diorgennes%20Cordeiro%20Gomes.pdf>. Acesso em: 23 abr. 2021. GRASSI, M. T. As águas do planeta terra. Química Nova na Escola, São Paulo, maio 2001. Disponível em: <http://qnesc.sbq.org.br/online/cadernos/01/aguas.pdf>. Acesso em: 22 abr. 2021. GUIMARÃES, J. R.; NOUR, E. A. A. Tratando nossos esgotos: processos que imitam a natureza. Cadernos Temáticos de Química Nova na Escola: Edição especial, São Paulo, [s. l], p. 1-12, maio 2001. Disponível em: <http://qnesc.sbq.org.br/online/cadernos/01/esgotos.pdf>. Acesso em: 23 abr. 2021.

LENZI, E.; FAVERO, L. O. B.; LUCHESE, E. B. Introdução à Química da água: ciência, vida e sobrevivência. Rio de Janeiro: LTC, 2009.

MARONEZE, M. M. et al. A tecnologia de remoção de fósforo: Gerenciamento do elemento em resíduos industriais. *Revista Ambiente e Água*, Taubaté, v. 9, n. 3, 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/ambiagua/v9n3/07.pdf>. Acesso em: 23 abr. 2021.

MEDEIROS FILHO, C. F. Abastecimento de Água. Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. Campina Grande – PB, 2009. Disponível em: <https://www.docsity.com/pt/abastecimento-de-agua-carlos-fernandes-de-medeiros-filho/5746243/>. Acesso em: 23 abr. 2021. MONTEIRO, G, F. Análises físico-químicas das águas de poços tipo cacimba na cidade de Areia - PB. 2018. 65 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Química), Universidade Federal da Paraíba, Areia, 2018. Disponível em:

<https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/11100/1/GFM03082018.pdf>. Acesso em: 22 abr. 2021.

OLIVEIRA, V. S. Qualidade de água de poços tubulares utilizada no cultivo de hortaliças. 2018. 36 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Agronomia) - Universidade Federal da Paraíba, Areia-PB, 2018. Disponível em:

<https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/11100/1/GFM03082018.pdf>. Acesso em: 22 abr. 2021. PACHECO, P. Y.; PALLADINO, F. Estudo de um projeto para produção de amaciante de roupas a base de cloreto de di (cetil – estearil) dimetil amônio com arnica. *Revista Engenharia*, Jundiaí, v. 7, p. 89-109, abr. 2013. PALUDO, D. Qualidade da água nos poços artesianos do município de Santa Clara do Sul. 2010. 75 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Química Industrial) - Centro Universitário Univates, Lajeado, 2010. Disponível em:

<https://www.univates.br/bdu/bitstream/10737/458/3/DiegoPaludo.pdf>. Acesso em: 23 abr. 2021. PINTO, M. C. K. et al. Contaminação das águas subterrâneas por nitrogênio devido à irrigação com efluente do tratamento de esgoto. *Irriga*, Botucatu, v. 18, n. 2, p. 270-281, abr. 2013. Disponível em: <https://revistas.fca.unesp.br/index.php/irriga/article/view/430/366>. Acesso em: 23 abr. 2021

REIS, J. A. T.; MENDONÇA, A. S. F. Análise técnica dos novos padrões brasileiros para amônia em efluentes e corpos d'água. *Eng. Sanit. Ambient.*, Rio de Janeiro, v. 14, n. 3, p. 353-362, jul./set., 2009. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/esa/v14n3/v14n3a09.pdf>. Acesso em: 23 abr. 2021. SANTOS, N. M. de S. S. Salinidade da água na adaptabilidade de ovinos e respectivos dejetos no crescimento de plântulas de milho. 2012. 72 f. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal) - Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF, Petrolina, 2012. Disponível em: <http://www.univasf.edu.br/~tcc/000002/00000276.pdf>. Acesso em: 23 abr. 2021. SILVA, A. B. da; et al. Parâmetros físico-químicos da água utilizada para consumo em poços artesianos na cidade de Remígio-PB. *Águas Subterrâneas*, Campina Grande, v. 31, n. 2, p. 109-118, 6 abr. 2017. Disponível em: <https://aguassubterraneas.abas.org/asubterraneas/article/view/28807/18715>. Acesso em: 23 abr. 2021. SILVA, A. B. da; et al. Química ambiental: monitoramento físico-químico da água de um poço artesiano na cidade de Remígio-PB. *Águas Subterrâneas*, Campina Grande, v. 33, n. 3, p. 2-10, 18 ago. 2019. Disponível em: <https://aguassubterraneas.abas.org/asubterraneas/article/view/29583>. Acesso em: 23 abr. 2021.

SILVA, M. O.; et al. Composição do lixiviado de quatro solos do Rio Grande do Norte irrigados com águas salinas. *Revista Caatinga*, v. 21, n. 1, p. 189-203, 2008. Disponível em:

<https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CPATSA/36069/1/OPB1355.pdf>. Acesso em: 23 abr. 2021. SILVA, T. do C. O. et al. Investigação de contaminantes em fontes hídricas subterrâneas no município de Areia-PB. Meio Ambiente: Uma visão interativa I, João Pessoa, v. 1, p. 396-409, 2019. Disponível em: <https://cinasama.com.br/wp-content/uploads/2020/08/MEIO-AMBIENTE-UMA-VIS%C3%83O-INTERATIVA-v1.pdf>. Acesso em: 23 abr. 2021. SUASSUNA, J. O Processo de Salinização das Águas Superficiais e Subterrâneas no Nordeste Brasileiro. Fundação Joaquim Nabuco. 2019. Disponível em: <https://www.fundaj.gov.br/index.php/artigos-joao-suassuna/9463-o-processo-de-salinizacao-das-aguas-superficiais-e-subterraneas-no-nordeste-brasileiro>. Acesso em: 23 abr. 2021. TOFOLI, L. A. de. Monitoramento da qualidade da água em mananciais pertencentes à bacia hidrográfica do Tietê – Botucatu, SP. 2010. 116 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Botucatu, 2010. Disponível em:

https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/90487/tofoli_la_me_botfca.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 22 abr. 2021. ZERWES, C. M. et al. Análise da qualidade da água de poços artesanais do município de Imigrante, Vale do Taquari/RS. Ciência e Natura, Santa Maria, v. 37, n. 4, p. 651-663, set. 2015. Disponível em: <https://core.ac.uk/reader/231208560>. Acesso em: 22 abr. 2021. ZUIN, V. G. et al. O Emprego de Parâmetros Físicos e Químicos para a Avaliação da Qualidade de Águas Naturais: Uma Proposta para a Educação Química e Ambiental na Perspectiva CTSA. Química Nova na Escola, São Paulo, v. 31, n. 1, p. 3-7, 25 ago. 2008. Disponível em:

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc31_1/02-QS-5507.pdf. Acesso em: 23 abr. 2021.

Capítulo 16

10.37423/210403933

PREVALÊNCIA E ETIOLOGIA DA MASTITE BOVINA PELA TÉCNICA ACCUMAST®

Sabrina Resende Guimarães

*Centro Universitário de Patos de Minas -
UNIPAM*

Betânia Glória Campos

*Centro Universitário de Patos de Minas -
UNIPAM*

A mastite é a enfermidade que mais se destaca na bovinocultura leiteira, por causar enormes prejuízos econômicos. Vários métodos de meio de cultura se tornaram disponíveis para identificação de patógenos na própria fazenda, no entanto sem validação de sua acurácia. Recentemente, o teste de Accumast® tem se tornado uma das ferramentas mais recomendadas para a identificação de patógenos na fazenda, de forma rápida e precisa. Este trabalho teve como objetivo verificar a prevalência e etiologia infecciosa da mastite bovina em propriedades leiteiras na região de Patos de Minas, Minas Gerais. Para o estudo foi realizado o levantamento de 200 resultados de exames microbiológicos positivos, oriundos de animais com mastite clínica ou com contagem de células somáticas (CCS) superior a 250.000 céls/ml. Os exames foram realizados adotando-se a técnica do Accumast®, no período de dezembro de 2018 a agosto de 2019. Quanto ao sistema de produção, as fazendas se categorizavam em sistema de semi-confinamento (animal criado a pasto com ração e silagem no cocho) ou *Compost Barn*. Foi observada maior prevalência para os microrganismos *Streptococcus Agalactiae* (47%), *Streptococcus spp.* (22%) e *Streptococcus Aureus* (15%). Nas fazendas com adoção do sistema *Compost Barn* observou-se maior prevalência de agentes causadores de mastite contagiosa, ao passo que nos sistemas de semi-confinamento, verificou-se maior prevalência de agentes causadores da mastite ambiental. Portanto, a identificação do agente etiológico é uma excelente ferramenta para a realização de tratamento específico, evitando o uso indiscriminado de antibióticos e diminuindo os custos com medicamentos.

Palavras-chave: Infecção; microrganismo; semi-confinamento; *Compost-Barn*.

Capítulo 17

10.37423/210403971

SISTEMA MICROCONTROLADO PARA POSICIONAMENTO DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS

Francisco de Assis M. Serejo

*Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão*

Lucilene Ferreira Mouzinho

*Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão*

Resumo: Este trabalho tem por finalidade o desenvolvimento de um sistema autônomo e microcontrolado para posicionamento de painéis fotovoltaicos em relação a luz do sol. Com isso, espera-se elevar a eficiência dos painéis, tornando a utilização de energia solar mais viável. Para tal, utilizaram-se sensores fotovoltaicos para o sensoriamento e um servo motor para a movimentação, ambos controlados por um microcontrolador ATmega328.

Para agilizar o desenvolvimento do sistema, o microcontrolador foi utilizado em uma plataforma aberta de desenvolvimento de hardware chamada Arduino. Os resultados são obtidos através de dados colhidos durante o funcionamento do sistema e serão apresentados neste artigo em forma de gráficos e imagens.

Palavras-Chave: Microcontrolador, Energia Solar, Painéis fotovoltaicos.

INTRODUÇÃO

Quando, durante a década de 60, se começava a falar em usar o sol como fonte de energia, a ideia passou a ser descartada devido aos baixos preços do petróleo e as comodidades dessa tecnologia (DIENSTMANN,2009). Atualmente, com a escassez dos combustíveis fósseis, o aproveitamento da energia gerada pelo sol, tanto como fonte de calor e luz quanto na produção de energia elétrica se tornou uma das alternativas energéticas mais promissoras.

Somente parte da energia solar proveniente do sol atinge a superfície a terra e, mesmo assim, estima-se que a energia solar incidente sobre a superfície terrestre seja da ordem de 10 mil vezes o consumo energético mundial.

A energia solar fotovoltaica é obtida através do efeito fotovoltaico que é a conversão direta da luz em eletricidade. Esse efeito foi relatado pela primeira vez por Edmond Becquerel em 1839 e ocorre quando há o aparecimento de uma diferença de potencial nos extremos de uma estrutura semicondutora, produzida pela absorção de luz.

O desempenho de um sistema de painéis fotovoltaicos depende não apenas da eficiência dos painéis, mas sim do sistema como um todo. Além de problemas com os painéis, a causa do baixo desempenho do sistema pode estar na escolha dos componentes, na arquitetura do sistema ou na escolha do próprio painel. O grande desafio é projetar um sistema que tenha o máximo de eficiência para o ambiente escolhido

Dentre os fatores do sistema, um dos fatores de maior relevância é a escolha do ângulo de inclinação da célula. O melhor ângulo de inclinação para um painel é aquele que produz o máximo de energia possível. A razão entre a intensidade da radiação solar em uma superfície horizontal e a radiação atingindo uma superfície perpendicularmente ao sol é igual ao cosseno do ângulo entre os raios solares e a superfície horizontal (DIENSTMANN,2009). Desta forma, para ter uma melhora considerável na eficiência dos painéis, ele sempre deve estar perpendicular aos raios solares.

Os microcontroladores são pastilhas inteligentes, que têm um processador, pinos de entradas/saídas e memória. Por meio da programação dos microcontroladores pode-se controlar duas saídas, tendo como referência as entradas ou um programa interno (MARTINS,2005).

Um Servo motor é um dispositivo eletromecânico que possibilita o posicionamento preciso de um eixo em qualquer ângulo entre 0° e 180°. O controle é feito através de um sinal PWM produzido por um circuito externo.

Este trabalho tem por finalidade o desenvolvimento de um sistema microcontrolado que execute a escolha do melhor ângulo de inclinação de um painel fotovoltaico através do sensoriamento da intensidade da radiação solar na superfície do mesmo. O objetivo do sistema é utilizar sempre um alto grau de eficiência do painel na geração de energia Elétrica. Para isso, foram utilizados sensores fotovoltaicos para informar a intensidade da radiação em pontos das placas. Esses dados são processados por um microcontrolador ATmega328 que escolhe a melhor inclinação para o painel. A movimentação é feita através de um servo motor. Através de dados colhidos durante o funcionamento do sistema, espera-se observar uma maior produção de energia Elétrica.

MATERIAIS E MÉTODOS

MATERIAIS

- 1 painel fotovoltaico 5V/400mA (13x13 cm)
- 1 Microcontrolador ATmega328
- 2 sensores de luminosidade (LDR 5 mm)
- 1 servo motor HX5010 – 6,9 kg – 39 g.
- 1 plataforma de prototipagem Arduino UNO
- Multímetro Digital
- Luxímetro INSTRUTHERM – LD220
- Fonte regulável de tensão DC
- Fios para contato

MÉTODOS

O desenvolvimento do projeto iniciou-se com um levantamento bibliográfico sobre o comportamento da incidência de raios solares na superfície terrestre. Após o estudo, observou-se que o sistema poderia ser desenvolvido baseado em dois princípios: No calculo da posição relativa do sol para um determinado local e um determinado horário ou no sensoriamento da incidência de raios solares em pontos do painel. Como algumas condições climáticas como nuvens e neblina influenciam na eficiência energética do painel e são difíceis de serem previstas, a opção de um sensoriamento da luminosidade mostrou-se mais efetiva e por isso foi escolhida.

Após a escolha do método a ser seguido, foi feito um levantamento de quais componentes seriam utilizados para o desenvolvimento do sistema. O objetivo foi escolher componentes com o menor gasto de energia possível para não diminuir a eficiência do sistema. Para a computação de dados, escolheu-se trabalhar com a plataforma de prototipagem Arduino baseada em um microcontrolador ATmega328. A escolha foi baseada na eficiência em descobrir erros de desenvolvimento utilizando essa ferramenta. Para o sensoramento, foram utilizados Resistores dependes de luz (LDR) devido ao baixo custo e facilidade de manuseio. Já para a movimentação e inclinação da célula, escolheu-se um servo motor HX5010 por apresentar a precisão e torque necessário para o sistema.

Em seguida ao levantamento dos componentes, iniciou-se o desenvolvimento do sistema. Para a fixação do painel, foi construído uma base de sustentação com um eixo móvel que permite a variação do ângulo de inclinação do painel. Sensores de luminosidade foram colocados nos dois lados da placa. Os dados são enviados para o microcontrolador onde são comparados. Se os valores lidos dos dois sensores forem próximos e dentro da margem de erro, o painel continua com a mesma inclinação. Quando a diferença entre os valores lidos se encontra fora da margem de erro, o painel modifica sua inclinação até que os valores se igualem. Dessa forma, o painel sempre receberá a radiação de forma homogênea e mais ortogonal possível.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O desenvolvimento do sistema foi finalizado dentro dos objetivos propostos, tornando possível a realização de testes para obtenção de dados. Na Figura 1, pode-se observar o sistema pronto e sendo testado em laboratório.

Figura 1 – Sistema microcontrolado.

Para obter resultados, testes foram realizados em laboratório utilizando uma fonte de luz artificial em diferentes distâncias da placa com o sistema ligado e desligado. A partir da aquisição de dados, um gráfico foi gerado para a observação dos resultados, conforme ilustrado na Figura 2.

Figura 2 – Gráfico da tensão gerada pelo painel com o sistema ligado e desligado.

Pode-se observar, da Figura 2, que quando ativado, o sistema aumentou a eficiência energética do painel. Em alguns pontos o aumento foi próximo de 11%, o que representa um bom resultado. Pode-se observar também que, com o sistema ligado, a captação de energia se torna mais linear, facilitando assim a realização de cálculos necessários para o armazenamento e aproveitamento dessa energia.

CONCLUSÃO

Através dos resultados obtidos nesse trabalho, pode-se defender a teoria de que painéis fotovoltaicos que apresentam algum tipo de sistema de movimentação baseado no rastreamento solar são mais eficientes do que os que permanecem imóveis.

A maior preocupação que se deve ter em implementações deste tipo é tornar o sistema autossuficiente. O uso de um sistema simples de controle e componentes de baixa potência garantem o baixo consumo de energia do sistema, aumentando a eficiência do mesmo.

Outros tipos de movimentação podem ser feitos juntamente com o grau de inclinação do painel para aumentar ainda mais a eficiência do sistema.

Para trabalhos futuros, espera-se unir o sistema criado com um sistema de armazenamento e controle, tornando assim o projeto economicamente viável.

AGRADECIMENTOS

A Fundação de Amparo a Pesquisa e Desenvolvimento Científico do Maranhão (FAPEMA) pelo financiamento da pesquisa por meio do programa PIBIC.

REFERÊNCIAS

1. DIENSTMANN, G., Energia Solar: Uma comparação de tecnologias. Porto Alegre, 2009. Projeto de diplomação-Engenharia Elétrica-Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
2. BARREIRA, H. E.; RIBEIRO, O. Implementação de um sistema de calculo para sistemas de energia solar. Porto, 2006. Relatório de Estágio Final-Engenharia Eletrotécnica-Universidade do porto.
3. MARTINS, N. A., Sistemas Microncotrolados. Novatec Editora. São Paulo-SP, 2000.
4. CLARKE, A.W., World Energy Council. Disponível em:

<http://www.worldenergy.org/publications/survey_of_energy_resources_2007/default.asp>. Acesso em: 13 de Jul 2013.
5. NASCIMENTO, C. A., Principio de Funcionamento da Célula fotovoltaica. Lavras, 2004. Monografia – Engenharia- Universidade Federal de Lavras.

Capítulo 18

10.37423/210503995

UTILIZAÇÃO DA AEROPONIA PARA O CULTIVO EM AMBIENTE ESPACIAL

Fernanda de Sousa Sales Mendes

Universidade Federal de Campina Grande

Ivysson Fernandes de Queiroz Uchôa

Escola João Rique Ferreira

Lauro Cristiano Marculino Leal

Universidade Federal da Paraíba

Marcos Antônio Cardoso Pereira

Escola João Rique Ferreira

INTRODUÇÃO

A aeroponia é um método que permite cultivar plantas sem a necessidade de solo para a fixação das raízes. Seu cultivo pode ser feito por meio de nebulização de solução com os nutrientes essenciais para o desenvolvimento das plantas. Este método é ideal para ambientes extremos, como espaçonaves em órbita, já que ela otimiza o espaço de cultivo, permitindo melhor aproveitamento do ambiente destinado para o crescimento dos vegetais.

Apesar da pesquisa conter um teor futurista, talvez longínquo na nossa realidade, no entanto, as viagens espaciais são uma realidade consolidada. A partir deste ponto e da necessidade de oferecer soluções aos problemas vivenciados no espaço, nos aprofundamos no problema gerado em missões de longa duração, que é o de como melhorar os métodos de cultivo em órbita. Para isso, nos baseamos em dois projetos que tiveram sucesso em sua execução, sendo eles a missão Centenária de Marcos Pontes¹ e o Veggie² da NASA³ produzidos respectivamente nos anos de 2005 e 2015, na qual conseguiram cultivar as primeiras plantas no ambiente de microgravidade.

Com base no Projeto Veggie, buscamos aprimorar os métodos de cultivo no espaço para ter uma produção suficiente para a alimentação dos tripulantes da EEI⁴, contribuindo no cultivo das plantas em ambientes inóspito. Desta forma, desenvolvemos um protótipo que se demonstrou mais eficiente e com um custo de produção menor, visando a efetiva utilização do equipamento em locais como espaçonaves, ou mesmo em missões de longas distâncias tripuladas.

METODOLOGIA

O objeto desta pesquisa é o estudo feito do processo de cultivo por aeroponia, no entanto, visando sua utilização em ambientes internos, especialmente os que possuem características extremas. O estudo está relacionado à junção de duas problemáticas bases, que são a necessidade de prover alimentação à humanos em locais de impossibilidade de cultivo tradicional, como também o criar a estrutura para a substituição do solo. Assim, tivemos como base artigos ligados a pesquisas que já apresentaram êxito no uso deste método de plantio, assim neste momento o estudo possuem característica bibliográfica e documental, já que revisamos os resultados dos projetos que foram o ponto de partida da nossa investigação. A busca resultou em análises comparativas dos resultados que proporcionaram a confecção de protótipo funcional, que simula o cultivo de plantas em ambiente semi-controlado, para que fosse possível constatar sua viabilidade. A pesquisa resultou na criação de modelo virtual e em seguida em protótipo físico que utilizou materiais recicláveis, no entanto, tendo

como base modelos aeropônicos já existentes e utilizados nas fazendas convencionais, os quais serviram como parâmetro para o uso em ambiente espacial, isso levando em consideração a microgravidade, a estrutura e a temperatura necessária para a sobrevivência das plantas.

Em seguida a pesquisa enveredou à exploração dos segmentos da botânica e agricultura, visando determinar qual tipo de vegetal ou erva atendia os principais critérios estabelecidos para serem considerados aptos para o uso em ambientes rigorosos. Dentro da análise da literatura específica, foram verificados os elementos nutricionais e de produção do vegetal, utilizando pesquisa documental de caráter quantitativo.

DESENVOLVIMENTO

Durante o período referente a fase inicial da pesquisa, foi priorizado a busca por dados que permitissem compreender o comportamento de plantas em um ambiente extremo, as condições na qual os astronautas ficam submetidos e métodos de cultivo que pudessem ser adaptados para o ambiente espacial. A partir desse estudo foi obtido uma base que permitisse o avanço suficiente da pesquisa para a criação das primeiras hipóteses e ideias acerca da criação de um método de cultivo próprio para o objetivo visado.

Com destaque para o sistema de hidroponia¹ e mais a frente o sistema de aeroponia, foi entendido-se a viabilidade, desta forma, a pesquisa foi aprofundada para avaliação do seu funcionamento e sua atual estrutura, assim como suas vantagens e desvantagens sobre outros sistemas de cultivo analisados até aquele momento. Dessa forma, já compreendendo o funcionamento e estrutura do sistema de aeroponia e das condições necessárias para o desenvolvimento de plantas dentro e fora da Terra, foi projetado com auxílio de um programa de design, um modelo conceitual em três dimensões, o qual foi nomeado de *Groot*.

Imagem 1 - Protótipo *Groot* desenvolvido em modelo 3D.

Juntamente com a criação do modelo em 3D, percebeu-se a necessidade de definir plantas que conseguissem ser cultivadas facilmente e que atingissem resultados satisfatórios em ambientes extremos, já que ela estaria fora do seu cultivo natural, isto é, sem o estrato comum que é o solo, e produzido em local artificial, e que fosse adaptável ao protótipo do modelo tridimensional. Assim, para que houvesse maior agilidade no andamento da pesquisa foi limitado o número à três diferentes espécies que possuíssem características que as permitissem sobreviver às condições extremas na terra, dotando-as de atributos que as qualificariam ao uso no espaço. Estas propriedades estão baseadas na facilidade do cultivo, resistência, pouca utilização de água e boa fonte de nutrientes e minerais necessários ao ser humano. Dentre as plantas analisadas foram selecionados a alface vermelho, a rúcula e a beldroega², recebendo maior destaque essa última devido a seus aspectos que lhe oferece vantagens para seu cultivo no espaço, tais como, sua fácil adaptação a diferentes solos e baixa necessidade de luz solar e água para se desenvolver.

Sua escolha também atendeu a interesses secundários, já que ele é considerada sudorífica, anti-inflamatória, diurética, vermífuga, antipirética e antibacteriana, sendo empregada internamente contra disenteria (principalmente infantil), enterite aguda, mastite e hemorróidas. As folhas são indicadas também contra cistite hemóptica, cólicas renais, queimaduras e úlceras. As sementes são

considieradas emanagoga, diurética e anti-helmítica (MANGOBA, 2015), considerando também que segundo LORENZI (2008, *Apud* MANGOBA), estudos clínicos tem mostrado que esta planta é um fonte rica de ácidos graxo omega-3, substância importante na prevenção de infartos e no fortalecimento do sistema imunológico.

A partir da necessidade da execução de testes práticos, buscou-se produzir a primeira versão do protótipo *Groot* com base no modelo 3D, já produzindo com materiais de baixo custo e que permitissem uma fácil montagem para os experimentos, deste modo, obtendo uma estrutura feita a partir de materiais recicláveis e de fácil obtenção, como cano de PVC e a caixa de disco de freio de carros. Além desses objetos também foi necessária a obtenção de um nebulizador, responsável pela umidificação do interior do protótipo e fornecimento de nutrientes para as plantas.

Com a montagem do protótipo foram iniciados experimentos com a beldroega, que consistiu em expor mudas ao *Groot* em um ambiente semi-controlado durante um período de horas em certos dias da semana. Após alguns testes com o protótipo foram necessárias pequenas alterações em sua estrutura a fim de melhorar a obtenção de informações sobre o desenvolvimento das beldroegas.

Imagem 2 - Portulaca oleracea, também conhecido como beldroega comum,

Imagem 3 - Primeiro modelo físico do protótipo Groot feito a partir de materiais recicláveis.

Imagem 4 - Primeiro modelo do protótipo *Groot* após alterações. Na foto testes com as beldroegas.

Com o intuito de ampliar a pesquisa em dados, foi feita uma reunião com o pesquisador em solos e nutrição de plantas da Embrapa Algodão de Campina Grande Gilvan Barbosa³ que nos permitiu lhe apresentar os resultados obtidos até aquele momento e nos auxiliou com dados úteis para o desenvolvimento da pesquisa e melhora no protótipo *Groot*.

Imagem 6 - Apresentação da pesquisa ao pesquisador Gilvan Barbosa na Embrapa de Campina Grande.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com base dos testes executados com o protótipo *Groot* e com as beldroegas, obteve-se resultados satisfatórios para a pesquisa, considerando os materiais utilizados durante todo o processo de experimentação e o tempo disponível para todo o desenvolvimento da pesquisa. Durante a execução dos experimentos pode ser percebida a baixa necessidade de água utilizada para manter as raízes das plantas úmidas por seções de 1 a 2 horas intercaladas com intervalos de aproximadamente 30 minutos. Em contrapartida, foi percebido a perda de parte da umidade interna do protótipo causada pelas aberturas laterais destinadas à sustentação das plantas, esse mesmo problema pôde ser resolvido com a redução das aberturas utilizando chumaços de algodão, que além de evitar perda excessiva de umidade permitiu o acúmulo de água próxima das raízes durante os intervalos em que a nebulização estava desligada. Por meio da ajuda do pesquisador Gilvan Barbosa durante a visita à Embrapa foi possível obter valiosos dados acerca de novas adaptações e alterações no *Groot*, além de informações sobre o desenvolvimento de plantas e dicas para a nutrição das mesmas. Apesar do

protótipo ter apresentado resultados positivos quanto à possibilidade do cultivo da beldroega não houve nenhum crescimento significativo que pôde ser identificado nas plantas durante os testes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante a realização do trabalho, assumimos o desafio de desenvolver uma ideia que permitisse o crescimento de plantas no espaço de modo prático e eficiente. Assim, através de estudos de artigos relacionados ao tema e métodos de cultivo, foi possível construir um protótipo semelhante ao modelo 3D, nomeado *Groot*. A partir de experimentos feitos no protótipo periodicamente em ambiente semi-controlado com plantas selecionadas, e por meio das discussões com a Embrapa em torno da pesquisa, analisou a possibilidade real e ampla da visão do comportamento vegetal em órbita espacial. Com isso, percebemos que apesar da idéia original da pesquisa ser voltada para o cultivo de plantas em ambientes extremos, como o espaço, o protótipo pode ser utilizado na Terra, servindo como possível segunda fonte de alimentação e produção de oxigênio em locais como estações de pesquisas nas regiões polares (Polo Sul e Norte), assim como, podendo ser utilizada abrigos subterrâneos, muito comuns para proteção de ataques de bombas ou desastres naturais.

Desta forma, o protótipo *Groot* é uma possibilidade de continuidade de vida onde a mesma já não oferece as melhores condições de sua conservação, ela atende a parâmetros mínimos de eficácia e funcionalidade, sendo ele um equipamento compatível para as intempéries que a condição humana possa proporcionar.

Palavras-chave: Aereponia; Microgravidade; Cultivo-Espacial; Beldroega.

REFERÊNCIAS

BARROS, Douglas Lima, DE AMORIM, Paulo Henrique Costa;TARGINO, Alessio Torquato; NELO, João Victor Aleixo. AEROPONIA–PLANTAÇÃO SUSTENTÁVEL E ECÔNOMICA. Revista do Programa Educativo e Social JC na Escola: Ciência Alimentando o Brasil Disponível em:

<http://www.agbbauru.org.br/publicacoes/Alimentando2ed/pdf/Alimentando2ed-40.pdf>

CARVER, J.A., MASSA, G.D., DUFOUR, N.F, HUMMERICK, M.E., WHEELER, R.M.,

MORROW, R.C., SMITH, T.M. VEG-01: Veggie Hardware Validation Testing on the International Space Station.

FACTOR, T. L., DE ARAÚJO, J. A. C., & COELHO, F. P. Produção de minitubérculos de batata-semente básica em sistemas hidropônicos NFT, DFT e Aeroponia. Disponível em:

http://www.abhorticultura.com.br/EventosX2/EventosX/Trabalhos/EV_1/A116_T1114_Comp.pdf

MANGOBA, P. M. A. Prospecção de características fitoquímicas, antibacterianas e físico- químicas de portulaca oleracea l.(beldroega). Disponível em: <http://hdl.handle.net/10183/115207>

MASSA, G. D., NEWSHAM, G., HUMMERICK, M. E., CARO, J. L., STUTTE, G. W.,

MORROW, R. C., & WHEELER, R. M. Preliminary species and media selection for the Veggie space hardware. Disponível em:

<http://www.gravitationalandspacebiology.org/index.php/journal/article/view/616>MASSA,G.D., NEWSHAM, G., HUMMERICK, M. E., MORROW, R. C., & WHEELER,

R. M. Plant pillow preparation for the veggie plant growth system on the international space station. Disponível em : <http://gravitationalandspacebiology.org/index.php/journal/article/view/749/777>

SALGADO ORNELAS, S. M., SANDOVAL, R., & DE GUADALUPE, A. S. Aeroponia.

Elaboración de diseños para prototipos de agricultura urbana. Disponível em:

<http://hdl.handle.net/20.500.11777/3787>

URBANIAK, C., MASSA, G., HUMMERICK, M., KHODADAD, C., SCHUERGER, A., &

VENKATESWARAN, K. Draft genome sequences of two *Fusarium oxysporum* isolates cultured from infected *Zinnia hybrida* plants grown on the International Space Station.

Disponível em: <https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5958250/>

NOTAS

Nota 1

De acordo com Factor (2007), dentre os vários métodos alternativos de cultivo empregados ao redor do mundo destacam-se os sistemas hidropônicos, comumente confundidos com os sistemas de aeroponia. A hidroponia ou sistema hidropônico é um termo de origem grega que possui dois radicais (hydro-água e ponia-trabalho). Apud.TARGINO, BARROS, NELO, AMORIM. Aeroponia–Plantação Sustentável e Econômica.

Nota 2

A *Portulaca Oleracea* L. (beldroega) pertence a família *Portulacaceae* é comumente conhecida como erva daninha anual, herbácea e suculenta, que apresenta uma elevada taxa de crescimento e eficiência do uso da água mesmo em áreas secas. O uso desta planta hortalça, especiaria e na medicina tradicional é conhecido desde os tempos antigos egípcios. MANGOBA, 2015. p. 18.

Nota 3

Possui graduação em Agronomia pela Universidade Federal da Paraíba (1995), mestrado em Agronomia (Solos e Nutrição de Plantas) pela Universidade Federal de Viçosa (1998) e doutorado em Agronomia (Solos e Nutrição de Plantas) pela Universidade Federal de Viçosa (2003). Atualmente é pesquisador a (referência pa02) da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, professor da Faculdade Roraimense de Ensino Superior e professor de ensino superior do Centro Universitário Estácio da Amazônia. Tem experiência na área de Agronomia, com ênfase em Fertilidade do Solo e Adubação, atuando principalmente nos seguintes temas: nutrição mineral, *Gossypium hirsutum*, nitrogênio, fertilidade do solo e potássio. Informações do Portal Oficial da Embrapa Campina Grande. Acesível em: <https://www.embrapa.br/equipe/-/empregado/306521/gilvan-barbosa-ferreira>

Capítulo 19

10.37423/210503993

REVISÃO DE LITERATURA DO SCHIZOLOBIUM PARAHYBA VAR. AMAZONICUM (HUBER EX DUCKE) BARNEBY, GÊNERO EUCALYPTUS E HÍBRIDO EUCALYPTUS UROGRANDIS

HYGOR GOMES DE ALMEIDA SOUSA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS

MARISTELA LIMA FIGUEIREDO GUIMARÃES EPIFANIO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS

IGOR VIANA SOUZA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS

FLÁVIA BEZERRA SOUZA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS

BRUNO AURÉLIO CAMPOS AGUIAR

INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS

GABRIELLA RAYSSA ANTUNES DA SILVA OLIVEIRA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS

ANA CLARA CARNEIRO FONSECA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS

MIRLLA RAYRA REIS SOUSA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS

MILLENA OLIVEIRA XAVIER

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS

PRISCILA BEZERRA DE SOUZA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS

Resumo: O reflorestamento ou plantio comercial de espécies arbóreas quando comparado com outras atividades de uso da terra, é a atividade que é mais recomendada para conservar o solo, recuperar áreas que sofreram processo de degradação e proteção de mananciais. O gênero *Eucalyptus* se destaca principalmente pelo seu rápido crescimento, produção de biomassa, resistência a geadas e déficit hídrico e por se adaptar a variadas condições ambientais, sendo considerado uma das espécies mais plantadas no mundo. Nessa perspectiva, o *Schizolobium parahyba* var. *amazonicum* vem ganhando destaque nos últimos anos pelo seu rápido crescimento, resistência ao ataque de pragas e doenças, elevada produtividade em conjunto com uma madeira de qualidade com propriedades adequadas a laminação. Dessa forma, esse trabalho teve como propósito realizar uma revisão bibliográfica sobre características de um modo geral do *Eucalyptus* e o *Schizolobium parahyba* var. *amazonicum*. O *Schizolobium parahyba* var. *amazonicum* pertence à família Leguminosae e a subfamília Caesalpinoideae, as árvores dessa família atingem altura próxima aos 40 m e cerca de 100 cm de DAP na idade adulta. A utilização dessa espécie é bastante voltada para a produção da parte interna de compensados ou lâminas médias, portas, caixotaria leve e parquet, onde o aproveitamento da madeira durante o processo de laminação pode-se alcançar rendimento entorno de 80%. O gênero *Eucalyptus* pertence à família Myrtaceae, com cerca de 700 espécies e subespécies, apresentando ampla dispersão mundial e crescendo de forma satisfatória em diferentes situações edafoclimáticas. As espécies do gênero *Eucalyptus* são árvores típicas de florestas altas, com alturas que variam de 10 a 50m. O gênero é indicado para diversos usos em geral, muito utilizado para laminação, componente de estruturas para laminação, caixotaria, mourões, escoras, papel e celulose, lenha, carvão. O *Eucalyptus urograndis* é um híbrido resultado do cruzamento do *Eucalyptus grandis* x *Eucalyptus urophylla*. O intuito desse cruzamento foi obter um aumento da densidade básica da madeira (melhor rendimento em celulose) e um bom crescimento, característica do *Eucalyptus grandis* e maior resistência ao déficit hídrico, rusticidade e propriedades da madeira são características do *Eucalyptus urophylla*. As duas espécies tem apresentado grande destaque no setor florestal, principalmente pelo seu rápido crescimento, no entanto, necessita-se de novos estudos quanto ao *Schizolobium parahyba* var. *amazonicum* a fim de conhecer mais suas especificidades e novas potencialidades.

Palavras-chaves: Crescimento; Florestas; Reflorestamento.

1.INTRODUÇÃO

Especialmente nas últimas décadas, constatou-se um progresso na silvicultura brasileira, no que diz respeito ao melhoramento florestal, nos tratos culturais, sobretudo para exploração de madeiras com crescimento rápido e incremento anual (MALAGI, 2015).

De acordo com a IBÁ (2019) existem 90.811 ha de *Schizolobium parahyba* var. *amazonicum* plantados no Brasil, na qual seu crescimento médio gira em torno de 20 a 30 m³/ha/ano, evidenciando um crescimento semelhante a espécies como pinus que é de 25 a 30 m³/ha/ano e chegando a superar a *Tectona grandis* com 15 a 20 m³/ha/ano. O seu rápido crescimento permite que a espécie atinja grandes alturas em pouco tempo, apresentando potencial silvicultural e tecnológico para ser utilizada em atividades voltadas para o reflorestamento (VIDAURRE, 2012).

Desde o início do seu cultivo o *Eucalyptus urograndis* trouxe grande homogeneização as florestas plantadas, na qual hoje já são mais de 600.000 ha cultivados (XAVIER, 2013). Portanto, quando comparado a outras espécies convencionais o crescimento e rendimento é superior (20% superior a outras espécies convencionais), podendo alcançar 15% mais do que a altura convencional. Esse híbrido se adaptou em quase todas as regiões do país, com exceção ao sul, uma vez que é considerado sensível a geadas severas (BENTEC, 2020). Nesse sentido, o *Eucalyptus urograndis* é bastante cultivado no Brasil sobretudo por se adaptar a diferentes condições climáticas e ser resistente a muitas doenças (CARDOSO et al., 2019).

Para as plantas se adaptarem a luminosidade elas necessitam da adequação do seu aparelho fotossintético, para que essa luz possa ser usada com eficiência máxima, na qual, durante o seu crescimento a planta irá apresentar respostas sobre essa adequação. Nesse sentido, a eficácia do desenvolvimento pode estar vinculada com a forma que as mudas se adaptaram as restrições dos diferentes tipos de luminosidade do ambiente (OLIVEIRA et al., 2012).

Dessa forma, é de suma importância estabelecer medidas para entendimento das circunstâncias a respeito do crescimento de mudas de qualidade sob diferentes tipos de restrição luminosa, tamanho dos recipientes e insumos. A compreensão de origem, costumes e mudanças morfológicas das mudas são extremamente importantes para auxiliar programas de reflorestamento e crescimento constante em campo (BUTZKE et al., 2018).

Nesse sentido, esse trabalho teve como propósito realizar uma revisão bibliográfica sobre características de um modo geral do *Eucalyptus* e o *Schizolobium parahyba* var. *amazonicum*.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 *SCHIZOLOBIUM PARAHYBA* VAR. *AMAZONICUM* (HUBER EX DUCKE) BARNEBY

2.1.1 DESCRIÇÃO BOTÂNICA

Schizolobium parahyba var. *amazonicum* conhecido popularmente como paricá, bandarrra, faveira, pinho-cuibano, ocorre em locais de terra firme até várzeas altas em solos de baixa e alta fertilidade. O mesmo concentra-se na Amazônia Brasileira, com ocorrência na Colômbia, Venezuela, Peru e Bolívia (GAZIEL FILHO et al., 2007). O *Schizolobium parahyba* var. *amazonicum* pertence à família Fabaceae subfamília Caesalpinioideae, as árvores dessa família atingem altura próxima aos 40 m e cerca de 100 cm de DAP na idade adulta. O tronco é do tipo cilíndrico, reto, de cor verde acentuada e marcas transversais resultado da queda das folhas, podendo ter 25 m de comprimento do fuste, a casca de até 25 mm de espessura, as folhas são longipeciouladas, bipinadas, raque lenhoso com 15 a 20 pares de folíolos (AMATA, 2009).

Os órgãos reprodutivos são caracterizados por apresentar inflorescência em forma de panículas, com cerca de 15 a 30 cm de comprimento, as flores medem 2 a 2,2 cm de comprimento, de cor amarelo-clara, zigomorfa, os frutos são do tipo deiscentes capazes de produzir uma a duas sementes por frutos e quando expostos ao sol liberam suas sementes com facilidade, as sementes medem de 16 a 21 mm de comprimento por 11 a 14 mm de largura e são cobertas com um endocarpo (AMATA, 2009).

Schizolobium parahyba var. *amazonicum* floresce entre junho e julho, e comumente é polinizada por pequenos insetos e abelhas, anualmente ela frutifica no período de julho a setembro, com propagação entre agosto e novembro, na qual pode ser afetada pela distribuição do período chuvoso, apresenta dispersão autocórica, do tipo barocórica (gravidade) e anemocórica (vento). Essa espécie possui grande semelhança com o *Schizolobium parahyba* var. *parahyba*, (guapuruvu), sobretudo no que se refere as utilizações da sua madeira (AMATA, 2009).

Figura 1- Distribuição geográfica de *Schizolobium parahyba* var. *amazonicum*

(Fonte: Reflora)

2.1.2 UTILIZAÇÕES DO GÊNERO

A utilização dessa espécie é bastante voltada para a produção da parte interna de compensados ou lâminas médias, portas, caixotaria leve e parquet, onde o aproveitamento da madeira durante o processo de laminação pode-se alcançar rendimento entorno de 80% (MARQUES et al., 2006).

Schizolobium parahyba var. *amazonicum* pode ser usado na produção de papel e celulose, característica resultado da facilidade pelo braqueamento e utilizada para produção energética. Algumas propriedades medicinais podem ser encontradas na casca, recomendada para curar diarreia (CARVALHO, 2007).

De acordo com o autor citado acima, essa espécie é recomendada para recuperar áreas degradadas. Pelo fato de ser uma espécie pioneira, o *Schizolobium parahyba* var. *amazonicum* na maioria dos solos amazônicos apresenta um bom desenvolvimento, cooperando com o sombreamento, fator essencial para o estabelecimento de espécies clímax que se desenvolvem no local.

Além dos usos citados anteriormente, o *Schizolobium parahyba* var. *amazonicum* tem se destacado para o artesanato, sendo utilizado para produção de brinquedos e saltos para calçados (SOUZA et al., 2003).

2.1.3 PRODUÇÃO DE MUDAS

O processo produtivo de mudas de *Schizolobium parahyba* var. *amazonicum* por sementes é a forma mais utilizada, no entanto, corrobora com povoamentos florestais pouco uniformes (CORDEIRO et al., 2002). Nesse sentido, é de suma importância a busca por tratamentos pré-germinativos com o intuito de superar a dormência, já que as sementes apresentam dormência tegumentar, o que é normal na família Leguminosae, dessa forma, quando não se busca esse tipo de alternativa para superar a dormência, a germinação ocorre muito lenta (CRUZ; CARVALHO, 2006).

Segundo Souza et al. (2003) para superar a dormência dessa espécie é recomendado os tratamentos do tipo escarificação manual rompendo o tegumento do lado oposto ao hilo, o método térmico com imersão em água fervente em descanso durante 24 horas, escarificação química utilizando ácido sulfúrico concentrado durante cinco minutos.

De acordo com Lameira et al. (2000) a escarificação mecânica quanto química tem se mostrado como tratamento pré-germinativo de maior eficácia, pelo fato que as sementes apresentarem altas taxas de germinação, que varia de 80% a 90%. Dessa forma, é recomendado semear de uma a duas sementes em sacos de polietileno, com dimensão de 18 cm de largura por 25 cm de comprimento, ou em tubetes grandes, sem muita requisição quanto ao substrato e as mudas podem permanecer em pleno sol ou em viveiro com 50% de sombreamento (CARVALHO, 2007), portanto, quando houver necessidade, a repicagem deve ser executada quando as plantas atingirem altura de 9 cm, entre uma semana a 71 dias após a germinação (GIBSON; LEÃO, 1997).

O *Schizolobium parahyba* var. *amazonicum* apresenta alguns embates para o seu manejo, por ter um elevado teor de umidade, vulnerabilidade ao ataque de microorganismos, além da dormência tegumentar, sendo necessário realizar a superação da dormência (CARVALHO, 2007).

2.1.4 PRAGAS E DOENÇAS

Devido a peculiaridades favoráveis, como uma gama de usos para diversos fins, as áreas de plantios do *Schizolobium parahyba* var. *amazonicum* tem aumentado bastante nos últimos tempos nos estados do Maranhão e Pará, no entanto, não tem sido implementadas medidas sanitárias com o propósito de monitorar pragas da cultura. Em municípios como Dom Eliseu, Paragominas, Ulianópolis e Rondon do Pará, todos no estado do Pará, foi notado a presença de pragas e doenças até mesmo no plantio inteiro, gerando enormes prejuízos (TREMACOLDI et al., 2009; LUNZ et al., 2010).

Em muitos povoamentos de *Schizolobium parahyba* var. *amazonicum* tem sido constante o surgimento da espécie *Quesada gigas* conhecida popularmente por “cigarras”, considerada uma das principais pragas dessa cultura (SOARES et al., 2008), chegando a causar perdas em torno de 20%, segundo estimativa das empresas reflorestadoras (LUNZ et al., 2010). Segundo Zanuncio et al. (2004) as cigarras agem atacando o sistema radicular, sugando a seiva e em seguida causando a morte das árvores, os principais sintomas são queda das folhas e diminuição do crescimento, isso ocorre durante o estágio ninfa do inseto. Em sua grande maioria, as plantas são atacadas a partir dos três anos de idade. Lunz et al. (2010) concluíram que os inseticidas Carbofuran e Thiamethoxam são promissores e que abrir uma trincheira com tratores é uma maneira eficiente para monitorar as ninfas e avaliar a eficácia do princípio ativo usado para controlar as cigarras.

Na região de Paragominas- PA e no norte do Mato Grosso, foi constatado a presença de bastante broca no broto terminal. Por conta do estresse, a planta é muito susceptível a doenças fúngicas. Na haste, foram detectadas *Fusarium* sp. E *Botryodiplodia* sp., e nas raízes, *Rosellinia* sp. e *Botryodiplodia* sp. (CARVALHO, 2007).

2.2 GÊNERO EUCALYPTUS

2.2.1 DESCRIÇÃO BOTÂNICA

O gênero *Eucalyptus* com origem australiana, pertence à família Myrtaceae, subfamília Myrtoideae com cerca de 700 espécies e subespécies, apresentando ampla dispersão mundial e crescendo de forma satisfatória em diferentes situações edafoclimáticas (MALAGI, 2015).

As espécies do gênero *Eucalyptus* são árvores típicas de florestas altas, com alturas que variam de 10 a 50m. O mesmo possui forte dominância apical, porte elevado e frutos lenhosos, de forma levemente cônica, compondo-se de válvulas que se abrem para liberar as sementes (ESALQ, 2015). As folhas se caracterizam pela presença de cavidades secretoras lisígenas que na maioria das espécies se encontram abaixo da epiderme e espalhadas nos tecidos parenquimáticos. Suas folhas quando estão jovens são opostas, podendo ser ovais ou arredondadas, mas ao atingir cerca de dois anos de crescimento, a maioria das espécies apresentam folhas alternadas, lanceoladas a falciformes, estreitas e pendidas a partir de longos pecíolos (CASTRO e MACHADO, 2006).

Figura 2- Distribuição geográfica do gênero *Eucalyptus*

(Fonte: Reflora)

2.2.2 UTILIZAÇÕES DO GÊNERO

A madeira do gênero *Eucalyptus* pode ser destinada para diversos fins, no entanto, existe limitações para o seu uso de forma maciça por causa da existência de propensão à defeitos, na qual são provocados especialmente pela retratibilidade elevada e pela liberação das tensões de crescimento (ELEOTÉRIO et al., 2014).

O gênero é indicado para diversos usos em geral, muito utilizado para laminação, componente de estruturas para laminação, caixotaria, mourões, escoras, papel e celulose, lenha, carvão (SILVA, 2011). Além disso, outros usos não menos importantes como propriedades antissépticas, anti-inflamatória, adstringente, antimicrobiana, antioxidante, repelente, cicatrizante e desinfetante, além de ser utilizado como descongestionante nasal e para garganta na forma de inalações e expectorante pulmonar, pesquisas apontam que as folhas podem ser utilizadas como aditivos para alimentos e os extratos aplicados em formulações para cosméticos (MALINOWSKI et al., 2009).

2.2.3 PRODUÇÃO DE MUDAS

Para o processo de implantação de um povoamento florestal, a produção de mudas é uma das primeiras etapas a ser realizada. Essa etapa é de extrema importância e muito decisiva, porque o

sucesso de uma floresta bem formada, homogênea é resultado dentre outros fatores, da qualidade das mudas plantadas (FARIA, 2013).

Nas últimas décadas os métodos de produção de mudas passaram por grandes mudanças, sobretudo no que diz respeito a novas técnicas de produção de mudas conhecidas como miniestaquia e microestaquia (WALKER et al., 2011). A produção de mudas de eucalipto na maioria das empresas florestais é realizada principalmente por propagação vegetativa (ZANARDI; GARLET, 2014)

A propagação vegetativa por meio de estacas enraizadas vem sendo utilizada em grande escala por diversas empresas do ramo florestal, devido aos bons resultados que essa prática proporciona em curto espaço de tempo, tanto em volume quanto em qualidade de madeira, com isso após selecionar os melhores indivíduos com características desejadas, eles são derrubados e deixados a rebrotar, esse material da rebrota será enraizado e utilizados na formação de áreas de multiplicação clonal. O corte é realizado a uma altura de 20 cm do solo, e após 55 dias os brotos são coletados e transportados para um viveiro, nesse sentido, a melhor época de coleta dos brotos depende da região, os brotos são divididos em estacas com duas folhas e se as folhas são grandes, elas são reduzidas com o intuito de reduzir a transpiração (MOURA; GUIMARÃES, 2003).

Tendo em vista que a vermiculita tem sido bastante utilizada no processo de formação dessas mudas, porém, outros substratos como terra de subsolo misturado com moinha de carvão e outros compostos orgânicos também são utilizados como substrato, dessa forma, durante o período em casa de vegetação as mudas recebem fertilização com NPK (5-7-13) dissolvidos em 100 litros de água, sequencialmente após o período de enraizamento as mudas são colocadas a pleno sol com o intuito de rustificá-las (CALDEIRA et al., 2013; LÔBO et al., 2014).

2.2.4 PRAGAS E DOENÇAS

Com a expansão da eucaliptocultura no Brasil, tornou-se favorável o crescimento populacional de diversas pragas (MAFIA; ABAD; FERREIRA, 2013).

A mancha bacteriana é causada por *Pseudomonas* spp. e *Xanthomonas* spp. e pode ocorrer tanto em mudas quanto em plantios na qual pode vir a provocar danos expressáveis em materiais genéticos suscetíveis que se encontram em condições propícias a infecção, como temperatura e umidade (FURTADO et al., 2009). Os sintomas são lesões encharcadas, dispostas na nervura principal quanto nas margens da folha, com a progressão da doença as lesões ficam ressecadas com uma cor marrom

clara. Essa doença reduz a área fotossintética, diminuindo o crescimento, especialmente viveiros, onde as mudas ficam frágeis e inaptas para o plantio em campo (ALFENAS et al., 2009).

De acordo com Romeiro (2011) o ideal é eliminar as plantas doentes e até mesmo não plantar a mesma espécie naquele local onde houve infecção, em virtude disso, medidas fitossanitárias é o foco para controlar a doença, dentre elas estão a eliminação das folhas doentes, propagação de clones suscetíveis em épocas desfavoráveis à infecção e uso de ferramentas de podas livres de patógenos.

As formigas cortadeiras são responsáveis por grandes perdas no setor florestal, desde a fase de viveiro até a rotação final da cultura, por sua vez, o desfolhamento causado por formigas pode reduzir a produção de madeira no ano seguinte em um terço e, se isto ocorrer no primeiro ano de plantio, a perda total do ciclo pode chegar a 13% da colheita (PIRES et al., 2008).

As medidas de controle mais usuais podem ser do tipo mecânico, com o uso do arado durante o preparo do solo e o controle químico, por meio da aplicação de inseticidas pós secos, líquidos termonebulizáveis e iscas formicidas (DELLA LUCIA, 2011).

2.3 O HÍBRIDO: *EUCALYPTUS UROGRANDIS*

A hibridação é utilizada no ramo florestal por meio do cruzamento de espécies com características de interesse que se complementam e da origem a indivíduos com características almejadas para o plantio (FILHO e SANTOS, 2011).

O *Eucalyptus urograndis* é um híbrido resultado do cruzamento do *Eucalyptus grandis* x *Eucalyptus urophylla*, visto que o primeiro plantio foi realizado no estado do Espírito Santo em 1979, no entanto, a partir da década de 1990 que esse híbrido estimulou o crescimento florestal, proporcionando uma maior homogeneização das florestas plantadas, na qual, já são mais de 600.000 ha cultivados (XAVIER, 2013).

O *Eucalyptus urograndis* se destaca nas regiões tropicais, livres de geadas, com precipitações anuais superiores a 1200 mm. Em vista disso, o intuito desse cruzamento foi obter um aumento da densidade básica da madeira (melhor rendimento em celulose) e um bom crescimento, característica do *Eucalyptus grandis* e maior resistência ao déficit hídrico, rusticidade e propriedades da madeira são características do *Eucalyptus urophylla* (MALAGI, 2015). No entanto, essa combinação interespecífica teve como efeito, plantas que são amplamente utilizadas em plantios comerciais que tem como objetivo a produção de matéria prima como celulose, carvão e madeira serrada. Além do mais, com a clonagem desse híbrido, foi de suma importância para o estabelecimento dos plantios comerciais no

Brasil, uma vez que ele é tolerante ao cancro causado pelo *Cryphonectria cubensis* (PALUDZYSZYN et al., 2004).

De acordo com Montanari et al. (2007) afirmam que o híbrido dispõe de características satisfatórias no que diz respeito a sua adequação aos diferentes sítios florestais, além disso, apresenta melhores características quando se trata da madeira, em comparação a outras espécies do gênero *Eucalyptus*.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As duas espécies têm apresentado grande destaque no setor florestal, principalmente pelo seu rápido crescimento, no entanto, necessita-se de novos estudos quanto ao *Schizolobium parahyba* var. *amazonicum* a fim de conhecer mais suas especificidades e novas potencialidades.

REFERÊNCIAS

- ALFENAS, A.C.; ZAUZA, E. A. V.; MAFIA, R. G.; ASSIS, T. F. Clonagem e doenças do eucalipto. 442 p. Viçosa, MG: Editora UFV, 2009.
- ALMEIDA, D. H.; SCALIANTE, R. M.; MACEDO, L. B.; MÂCEDO, A. N.; DIAS, A. A.; CHRISTOFORO, A. L.; JUNIOR, C. C. Caracterização completa da madeira da espécie amazônica paricá (*Schizolobium amazonicum* Herb) em peças de dimensões estruturais. *Revista Árvore*, v.37, n.6, p.1175- 1181, 2013
- AMATA: Revisão sobre paricá: *Schizolobium amazonicum* Huber ex Ducke. 2009. Disponível em:< <https://amatabrasil.com.br/download-arquivo?id=1028>>. Acesso em 07 de jul 2020.
- AMORIM, L. R. Educação Ambiental nos Assentamentos de Trabalhadores Rurais do Município de Buritis- MG: Qualificação Tecnológica para a Preservação do Bioma Cerrado. 2016. 167f. Dissertação(mestrado)- Universidade Americana.
- ARRUDA, Henrique Silvano et al. Development and sensory evaluation of products containing the Brazilian Savannah fruits araticum (*Annona crassiflora* Mart.) and cagaita (*Eugenia dysenterica* Mart.). *Brazilian Journal Of Food Technology*, [s.l.], v. 19, p.1-7, 2016. FapUNIFESP (SciELO).
- BASSO, V. M. et al. Influência da certificação florestal no cumprimento da legislação ambiental e trabalhista na região amazônica. *Acta Amazonica*, v.41, n.1, p.69-76, 2011.
- CARVALHO, P. E. R. Paricá (*Schizolobium amazonicum*). Colombo: Embrapa Florestas. 2007. 8p. (Circular Técnica, 142).
- CASTRO, M. M.; MACHADO, S. R. Células e tecidos secretores. In: APPEZZATO--, B.; CARMELLO-GUERREIRO, S. M. *Anatomia vegetal*. 2ª ed. Viçosa: Ed. UFV, 2006. p. 179-204.
- CORDEIRO, I. M. C. C.; LAMEIRA, O. A.; LOPES, S. C.; RIOS, M. S. Germinação in vitro de paricá *Schizolobium amazonicum* Huber ex Ducke. *Revista Biotecnologia Ciência & Desenvolvimento*, v.5, n.27, p.58-61, 2002.
- CRUZ, E. D.; CARVALHO, J. E. U. Methods of overcoming dormancy in *Schizolobium amazonicum* Huber ex Ducke (Leguminosae – Caesalpinioideae) seeds. *Revista Brasileira de Sementes*, v.28, n.3, p.108-115, 2006.
- DELLA LUCIA, T. M. C (2011) As formigas cortadeiras: da bioecologia ao manejo. Viçosa, Editora UFV. 421p.
- ELEOTÉRIO, J. R.; HORNBERG, K. F.; REICHERT, D; BAGATTOLI, T. R.; MENEGHELLI, I. Efeito da espécie e da condição de secagem na formação de defeitos na madeira serrada de eucalipto. *Scientia Forestalis*, Piracicaba, SP, v. 42, n. 101, p. 41- 47. 2014.
- ESALQ - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz". *Botânica de Eucalyptus spp*. Universidade de São Paulo. Disponível em: Acesso em: junho de 2015.
- FARIA, J. M. R. de C. Severidade e controle da bacteriose foliar em mudas de *Eucalyptus urophylla* x *Eucalyptus grandis* em função do nível tecnológico do viveiro. 2013. 45f. Dissertação (Mestrado em

Ciências Florestais) Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” Faculdade de Ciências Agrônomicas Campus de Botucatu, 2013.

FURTADO, E. L. et al. Doenças do eucalipto no Brasil. Botucatu: O autor, 2009. 74 p.

GAZEL FILHO, A. B.; CORDEIRO, I.M.C.; ALVARADO, J.R.A.; SANTOS, B.G. F. Produção de Biomassa em Quatro Procedências de Paricá (*Schizolobium parahyba* var. *amazonicum* (Huber ex Ducke). Revista Brasileira de Biociências, Porto Alegre, v. 5, supl. 2, p. 1047-1049, jul. 2007.

GIBSON, A. G. E. C.; LEÃO, N. V. M. Produção de mudas de seis espécies de importância silvicultural para a amazônia. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SEMENTES, 10., 1997, Foz do Iguaçu. Informativo Abrates, Brasília, v. 7, n. 1/2, 226p.1977.

INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ÁRVORES (IBÁ). Anuário estatístico do IBÁ 2016 - ano base 2015. Brasília: IBÁ. 2016. 80 p

LAMEIRA, O. A.; GOMES, A. P. R.; LOPES, S. C.; LEÃO, N. V. M. Efeito da escarificação sobre a germinação de sementes de paricá (*Schizolobium amazonicum*) in vitro. Belém: Embrapa Amazônia Oriental, 2000. 3 p. (Embrapa Amazônia Oriental. Comunicado Técnico, 21).

LUNZ, A.M.; BATISTA, T. F. C.; ROSÁRIO, V. S. V.; MONTEIRO, O. M.; MAHON, A. C. Ocorrência de *Pantophthalmus kerteszi* e *P. chuni* (Diptera: *Pantophthalmidae*) em paricá, no Estado do Pará. Revista Pesquisa Florestal Brasileira., v. 30, n. 61, p. 71-74, 2010.

MAFIA, R. G; ABAD, J. I. M.; FERREIRA, M. A. Desafios e perspectivas para o controle de doenças do eucalipto. In: SANTOS, Bárbara Alves dos et al. Patologia florestal: Desafios e perspectivas. Lavras: Lavras: Núcleo de Estudos em Fitopatologia, 2013. Cap. 15. p. 119-133.

MARQUES, L. C. T.; YARED, J. A. G.; SIVIERO, M.A. A evolução do conhecimento sobre o paricá para reflorestamento no Estado do Pará. Embrapa Amazônia Oriental, 2006. 5 p. (Comunicado Técnico, 158).

MELO, R.R. Avaliação de variáveis tecnológicas na produção de painéis LVL confeccionados com paricá (*Schizolobium amazonicum* Huber ex Ducke). 2012.164f. Tese (Doutorado em Ciências Florestais) - Universidade de Brasília, Brasília.

MONTANARI, R.; MARQUES, J.; COSTA C.; CÉSAR, M.; CAVALCANTE, L.; HERBERT, I. Níveis de resíduos de metalurgia e substratos na formação de mudas de eucalipto (*Eucalyptus urograndis*). Revista de Biologia e Ciências da Terra, vol. 7, núm. 1, pp. 59-66, 2007.

NEWBOLD, T; HUDSON, L. N.; ARNELL, A. P.; CONTU, S.; PALMA, A. de; FERRIER, S.; HILL, S. L. L.; HOSKINS, A. J.; LYSENCO, I.; PHILLIPS, H. R. P.; BURTON, V. J.; CHNG, C. W. T.; EMERSON, S.; GAO, D.; PASK-HALE, G.; HUTTON, J.; JUNG, M.; SANCHEZ-ORTIZ, K.; SIMMONS, B. I.; WHITMEE, S.; ZHANG, H.; SCHARLEMANN, J. P. W.; PUVIS, A. Has land use pushed terrestrial biodiversity beyond the planetary boundary? A global assessment. Science, v. 353, n. 6296, p. 288-291, jul. 2016. DOI: <https://dx.doi.org/10.1126/science.aaf2201>.

PALUDZYSZYN, E.; RODRIGUES, A.; CORDEIRO, D. Estrategia para o melhoramento de eucaliptos tropicais na embrapa. Paraná: EMBRAPA. 2004.

PIRES, E. M.; SANTOS, G. P.; ZANUNCIO, J. C.; ZANUNCIO, T.V. Pragas do eucalipto. Informe Agropecuário, Belo Horizonte, v .29, n. 242, p., 2008.

ROMEIRO, S. R. Bactérias fitopatogênicas. 2. ed. Viçosa, MG: Ed. UFV, 2011. 417 p.

SCALON, S.P.Q. et al. Germinação e crescimento inicial da muda de orelha-de-macaco (*Enterolobium contortisiliquum* (Vell.) Morong): efeito de tratamentos químicos e luminosidade. Revista Árvore, v.30, n.4, p.529-536, 2006.

SILVA, J. C. Manual Prático do Fazendeiro Florestal Produzindo Madeira com Qualidade. 3 .ed. rev. e ampli. Viçosa, MG: FGV, 2011.

SOARES, V.P.; ZANETTI, L.Z.; SANTOS, N.T.; LEITE, H.G. Análise espacial da

distribuição de cigarras (*Quesada gigas* Oliver) em povoamentos de paricá (*Schizolobium amazonicum* Huber ex Ducke) na região de Dom Eliseu, PA. Revista Árvore, v.32, n.2, p.251-258, 2008.

SOUZA, C. R.; ROSSI, L. M. B.; AZEVEDO, C. P.; VIEIRA, A. H. Paricá: *Schizolobium parahyba* var. *amazonicum* (Huber x Ducke) Barneby. 1 ed. Manaus: EMBRAPA: Dezembro, 2003. (Circular Técnica, 18).

TREMACOLDI, C.R.; LUNZ, A.M.; COSTA, R.F.S. Cancro em Paricá (*Schizolobium parahyba* var. *amazonicum*) no estado do Pará. Pesquisa Florestal Brasileira, n. 59, p.69-73, 2009.

WALKER, C. et al. Viveiro florestal: evolução tecnológica e legalização. Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável, v. 6, n. 5, p. 08-14, 2011.

ZANARDI, O. C.; GARLET, J. Levantamento de doenças em viveiro florestal clonal no cone sul de Rondônia. Enciclopédia Biosfera, Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.10, n.19; p. 1241, 2014.

ZANUNCIO, J.C.; PEREIRA, F.F.; ZANUNCIO, T.V.; MARTINELLI, N.M.; PINOM, T.B.M.; GUIMARÃES, E.M. Ocurrence of *Quesada gigas* on *Schizolobium amazonicum* trees in Maranhão and Pará States, Brazil. Pesquisa Agropecuária Brasileira, n. 39, p.943-945, 2004.

ZHANG, S. R. et al. Lanthanum tolerance and accumulation characteristics of two eucalyptus species. Ecological Engineering, v. 77, p. 114-118, 2015.

ZOBEL, B. J.; WYK, G. van; STAHL, P. Growing exotic forests. New York: Wiley, 1987. 508 p.

Capítulo 20

10.37423/210503994

POLIFENÓIS E ATIVIDADE ANTIRRADICAL LIVRE DO CÁLICE DA VINAGREIRA (HIBISCUS SABIDARIFFA, L).

Larissa Lages Rodrigues

Universidade Federal do Piauí

Maria Marcia Dantas de Sousa

Universidade Federal do Piauí

Jurandy do Nascimento Silva

*Instituto Federal do Piauí/Campus Teresina
Zona Sul*

Fhanuel Silva Andrade

*Instituto Federal do Piauí/Campus Teresina
Zona Sul*

Dilson Cristino da Costa Reis

*Instituto Federal do Piauí/Campus Teresina
Zona Sul*

Yago Luís Pessoa Barbosa

*Instituto Federal do Piauí/Campus Teresina
Zona Sul*

Daniella dos Santos Silva

Universidade Paulista

Alessandro de Lima

*Instituto Federal do Piauí/Campus Teresina
Zona Sul*

Resumo: Os antioxidantes agem nos organismos vivos por meio de diferentes mecanismos com o intuito de neutralizar os radicais livres, combatendo assim as diversas doenças crônicas não transmissíveis. O objetivo deste estudo foi avaliar a atividade antioxidante e quantificar os fenólicos totais do cálice da vinagreira (*Hibiscus sabidariffa* Linn.) e comparar diferentes extratos. O preparo dos extratos se deu com a utilização 20 g da amostra, previamente triturada, e 100 mL de solvente (água, etanol e acetona). A atividade antioxidante foi realizada utilizando-se o método ABTS e os resultados expressos em equivalência ao padrão Trolox[®]. Os valores de TEAC encontrados foram de 99,4; 101,4 e 132,1 mM/g de amostra, respectivamente, para os extratos aquoso, etanólico e acetônico. Os fenólicos totais foram analisados por espectrofotometria utilizando o reagente de Follin Dennis, obtendo-se os valores de 79,2; 83,6 e 80,0 mg/100g de amostra para os extratos aquoso, etanólico e acetônico respectivamente. Pode-se concluir com os resultados obtidos nesse trabalho que o cálice da vinagreira (*H. sabidariffa* L.) possui uma considerável capacidade antioxidante e apresenta-se como uma fonte de compostos fenólicos, com destaque para o extrato acetônico que apresentou melhor ação inibitória dos radicais ABTS^{•+}.

Palavras-chave: ABTS, antioxidante, cálice, fenólicos

1. INTRODUÇÃO

Apesar de todo desenvolvimento tecnológico e da realização de diversas pesquisas concretizadas até hoje, as informações existentes ainda são insuficientes para desvendar a função de todos os alimentos no organismo humano. Os pesquisadores vêm analisando cada vez mais os chamados alimentos funcionais, dentre os quais, os estudos dos alimentos que atuam como antioxidantes no organismo combatendo radicais livres e por consequência prevenindo o surgimento de diversas doenças crônicas não transmissíveis, como aterosclerose, doenças cardiovasculares e o câncer. Todos os estudos mostram que o sistema de defesa antioxidante humano endógeno não é completo, necessitando, portanto, dos antioxidantes dietéticos, o que confirma a importância da ingestão diária destes compostos. Dessa forma, o consumo de antioxidantes apresenta vários benefícios, proporcionando uma melhoria na qualidade de vida da população (RATNAM et al., 2006).

Sies e Stahl (1995) conceituam antioxidante como qualquer substância que, presente em baixas concentrações, quando comparada a do substrato oxidável, atrasa ou inibe a oxidação deste substrato de maneira eficaz. Já Oga; Camargo e Batistuzzo (2008) conceituam radical livre como qualquer espécie química capaz de existir independentemente, que contenha um ou mais elétrons não pareados ocupando orbitais atômicos ou moleculares. Em geral essas espécies são instáveis, têm meia-vida muito curta e reagem rapidamente com diversos compostos e alvos celulares, podem ser formados pela perda ou adição de um único elétron a um composto não radicalar.

Os antioxidantes, de acordo com sua forma de neutralização dos radicais livres, podem ser classificados em duas categorias principais: antioxidantes primários e antioxidantes secundários. São considerados primários os compostos capazes de inibir ou retardar a oxidação por inativação de radicais livres graças à doação de átomos de hidrogênio ou de elétrons, o que transforma os radicais em substâncias estáveis. Os antioxidantes secundários apresentam uma grande variedade de modos de ação: ligação de íons metálicos (alteração de valência); inativação de EROs, conversão de hidroperóxidos em espécies não-radicalares ou absorção de radiação UV (MAISUTHISAKUL; SUTTAJIT e PONGSAWATMANIT, 2007). Esses antioxidantes agem nos organismos vivos por meio de diferentes mecanismos. Dentre estes, podem ser citados: a complexação de íons metálicos, a captura de radicais livres, a decomposição de peróxidos, a inibição de enzimas responsáveis pela geração de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio e a modulação de vias sinalizadoras celulares (VASCONSELOS; SILVA e GOULART, 2006).

A formação de radicais livres *in vivo* ocorre via ação catalítica de enzimas, durante os processos de transferência de elétrons que ocorrem no metabolismo celular e pela exposição à fatores exógenos. Contudo, na condição de pró-oxidante a concentração desses radicais pode aumentar devido à maior geração intracelular ou pela deficiência dos mecanismos antioxidantes (CERUTTI, 1991, 1994).

Os constituintes alimentares mais estudados atualmente que apresentam propriedades antioxidantes são os compostos fenólicos que atuam como sequestradores de radicais e como quelantes de metais de transição, agindo tanto na etapa de iniciação, como na de propagação do processo oxidativo. Isto leva a produção de produtos intermediários, relativamente estáveis devido à ressonância do anel aromático apresentada por estas substâncias (NAWAR, 1985).

A vinagreira também chamada de azedinha, azeda-da-guiné, caruru-azedo, caruruda-guiné, cha-da-jamaica, pampolha, pampulha, papoula, papoula-de-duas-cores, quiabeiro-azedo, quiabo-azedo, quiabo-de-angola, quiabo-róseo, quiabo-roxo, rosélia e vinagreira”. É um arbusto perene, que pode atingir cerca de 2 a 3m de altura, sendo cultivada devido ao interesse em suas folhas, cálices, sementes e fibras, que são utilizados na alimentação de animais, como fonte de fibras para a indústria de tecido e papel e para preparar bebidas com objetivos culinários e medicinais.

Diante da relevância que tem alcançado as análises à procura de alimentos como fonte de antioxidantes, este trabalho teve como objetivo quantificar o teor de fenólicos totais, assim como avaliar a atividade antioxidante do cálice da vinagreira (*Hibiscus sabidariffa* Linn.).

2. MATERIAL E MÉTODOS

Os Cálices da vinagreira (*H. sabidariffa* L.) foram adquiridos no mercado central de Teresina, de onde foram transportados para o Laboratório de Alimentos do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Piauí – IFPI, Campus Teresina Zona Sul, onde foram higienizados com água clorada (50 ppm) e triturados em moinho analítico, seguido da retirada de alíquotas para o preparo dos extratos.

A obtenção dos extratos aquoso, etanólico e acetônico do cálice da vinagreira (*H. sabidariffa* L.) foi realizado partindo da mistura de 20 g da amostra com 100 mL do solvente extrator, na proporção de 1:10 (amostra : solvente). Os solventes utilizados foram acetona P.A, álcool etílico absoluto P.A e água destilada. As amostras foram submetidas à agitação constante, em mesa agitadora do tipo orbital, durante uma hora e em seguida filtradas empregando vácuo e utilizando papel filtro qualitativo Whatman nº4. Os extratos obtidos foram armazenados em frascos de vidro âmbar e estocados sob refrigeração até o momento das análises.

Para a verificação da atividade antioxidante, usou-se a metodologia descrita por Re *et al.* (1999), onde inicialmente gerou-se o radical a partir da reação de 7 mM de ABTS^{•+} com 2,45 mM de persulfato de potássio (**Figura 1**), deixando-se em seguida a solução incubada à temperatura ambiente e na ausência de luz por 12 horas. Transcorrido esse tempo, a solução foi diluída em etanol até obter-se uma solução com absorvância de $0,70 \pm 0,01$, a 734 nm.

Figura 1. Estabilização do radical ABTS^{•+} por um antioxidante e sua formação pelo persulfato de potássio.

Fonte: Adaptado de RUFINO et al. (2007).

Para realizar as leituras, foram adicionados 40 µL da amostra a 1.960 µL da solução de ABTS^{•+}. Determinou-se a absorbância em espectrofotômetro a 734 nm, nos tempos de 2, 5, 10, 20, 30 minutos de reação. Como solução padrão, usou-se o antioxidante sintético trolox nas concentrações de 2,5 - 15 µM em etanol. Todas as leituras foram realizadas em triplicata, e os resultados foram expressos em mM de Trolox[®] por grama de amostra.

Para determinação dos compostos fenólicos totais, seguiu-se a metodologia proposta por Swain (1959), adaptada por Lima (2008). De cada extrato utilizou-se 0,5 mL e adicionou-se 8 mL de água destilada e 0,5 mL do reagente Folin Ciocalteu. Procedeu-se homogeneizando a solução e, após 3 minutos, colocou-se 1 mL da solução de NaCO_3 . Transcorrido 1 hora em repouso no escuro, foram realizadas as leituras das absorbâncias em espectrofotômetro a 720 nm, como solução padrão utilizou-se o ácido gálico, para construção da curva de calibração nas concentrações de 5, 10, 20, 40, 60 e 80 mg/L. Os resultados foram expressos como média $\pm$ desvio padrão, e submetidos a análise estatística de variância (ANOVA), seguido de teste de múltiplas comparações de Tukey para avaliar possíveis diferenças estatísticas ($p < 0,05$).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados da atividade antioxidante frente ao radical livre sintético ABTS^{•+}, encontram-se descritos na **Tabela 1**. Os resultados deste estudo foram expressos como valor de TEAC (atividade antioxidante

total equivalente ao Trolox®) que é dito como a concentração de Trolox que apresenta o mesmo percentual de inibição que uma concentração de 1nM do composto utilizado como referência.

Verificou-se que os três extratos estudados apresentaram elevada capacidade de inibir os radicais ABTS^{•+} com valores TEAC variando de 34,925 mM/g, aos 2 minutos, a 99,425 mM/g aos 30 minutos para o extrato aquoso. O extrato etanólico apresentou valores TEAC que variaram de 59,925 mM/g, no tempo 2 minutos, a 101,425 mM/g no tempo 30 minutos; Já o extrato acetônico apresentou maior atividade antioxidante ($p < 0,05$) em relação aos demais extratos estudados, com uma variação nos valores TEAC de 87,675 a 132,175 mM/g, nos tempos de 2 e 30 minutos, respectivamente.

Lima (2008) avaliando polpas das frutas do pequizeiro encontrou valores TEAC de 2,27 e 0,92 no tempo de 30 minutos para os extratos aquoso e etanólico respectivamente. Já Vieira et al. (2011) analisando extrato aquoso de polpas de frutas obteve TEAC de (1,605) acerola, (0,094) bacuri, 0,198 para goiaba, (0,140) cajá, (0,212) caju e (0,075) para tamarindo. Demonstrando que o cálice da vinagreira possui uma elevada capacidade em combater os radicais livres, possuindo um alto potencial a ser explorado como alimento funcional.

Tabela 1. Valor TEAC (Capacidade Antioxidante Total Equivalente ao TROLOX), expressos em mM de trolox / g de amostra fresca pelo método ABTS para os extratos aquoso, etanólico e acetônico do cálice da vinagreira (*H. sabidariffa* L.).

Extratos	VALOR TEAC (mM de trolox/g de amostra fresca)				
	2 min	5 min	10 min	20 min	30 min
Aquoso	34,93±0,01 ^a	81,68±0,02 ^a	90,93±0,04 ^a	97,18±0,04 ^a	99,43±0,04 ^a
Etanólico	59,93±0,04 ^b	84,68±0,03 ^b	89,93±0,03 ^b	96,93±0,03 ^b	101,43±0,03 ^b
Acetônico	87,68±0,05 ^c	122,18±0,02 ^c	125,18±0,02 ^c	130,18±0,01 ^c	132,18±0,00 ^c

^{a,b,c} Médias seguidas de letras iguais, nas colunas, indicam que não apresentam diferença estatística entre si pelo teste estatístico de múltiplas comparações de Tukey, ANOVA ($p > 0,05$).

Na **Figura 2** é possível se visualizar a curva cinética da atividade antioxidante dos extratos do cálice da vinagreira. O padrão Trolox® reage rapidamente com radicais livres e aos 2 minutos praticamente e estabiliza-se. Os extratos aquoso, etanólico e acetônico reagem mais rapidamente até os 5 minutos com os radicais livres e permanecem reagindo até 30 minutos só que de forma menos acentuada.

Figura 2. Curva cinética do potencial antioxidante do extrato aquoso, atanolico e acetônico da cálice da vinagreira (*H. sabidariffa* L.).

Na **Tabela 2** podem ser visualizados os valores encontrados para quantificação de fenólicos totais dos extratos do cálice da vinagreira (*H. sabidariffa* L.), na qual se constatam que os teores de fenólicos totais para os três extratos ficaram muito próximos (entre 79,22 a 80,02mg/100g), não havendo diferença estatística entre os mesmos ($p>0,05$). A maior parte dos compostos fenólicos não é encontrada no estado livre na natureza, mas sob a forma de ésteres ou heterosídeos sendo, portanto, solúveis em água e em solventes orgânicos polares.

Tabela 2. Teores de fenólicos totais (expresso em equivalente de ácido gálico) no extrato aquoso, etanolico e acetônico do cálice da vinagreira (*H. sabidariffa* L.).

Extratos	Teores de fenólicos totais em mg/100g da amostra
Aquoso	79,22±9,90 ^a
Etanolico	83,63±14,20 ^a
Acetônico	80,02±2,74 ^a

a,b,c Médias seguidas da mesma letra nas colunas não diferem estatisticamente entre si, pelo teste estatístico de múltiplas comparação de Tukey, ANOVA ($p>0,05$).

Duzzioni et al. (2010) avaliando o extrato acetônico de frutas cítricas obteve 648,6 mg/100g para valência, 551,9 mg/100g para murcote e 455,2 mg/100g para o limão Taiti, valores superiores ao encontrados neste estudo para o cálice da vinagreira.

Soares et al. (2008) descreve que as discrepâncias nos valores de teores de compostos fenólicos totais podem ser influenciadas por diversos fatores como: a maturação, a espécie, práticas de cultivo, origem

geográfica, estágio de crescimento, condições de colheita e processo de armazenamento das frutas, além da peculiaridade metodológica relacionada ao solvente extrator e aos fenólicos usados como padrão para a quantificação dos compostos fenólicos.

6. CONCLUSÕES

Pode-se concluir com os resultados obtidos nesse trabalho que o cálice da vinagreira (*H. sabidariffa* L.) possui uma considerável capacidade antioxidante e apresenta-se como uma fonte de compostos fenólicos, com destaque para o extrato acetônico que apresentou melhor ação inibitória dos radicais ABTS^{•+}. Faz-se necessário a realização de estudos posteriores para identificação desses metabólitos secundários com atividade anti-radicais livres e utilização de outras metodologias a fim de melhor caracterizar a espécie vegetal estudadas.

REFERÊNCIAS

- CERUTTI, P. A. Oxidant stress and carcinogenesis. *European Journal of Clinical Investigation*, v. 21, n. 1, p. 1-5, 1991.
- CERUTTI, P. A. Oxy-radicals and cancer. *Lancet*, v. 344, n. 8926, p. 862-3, 1994.
- DUZZIONI, G. A.; FRANCO, A. G.; DUZZIONI, M.; SYLOS, C. M. Determinação da atividade antioxidante e de constituintes bioativos em frutas cítricas. *Revista Alimentos e Nutrição*, v. 21, n. 4, p. 643-649, 2010.
- LIMA, A. Caracterização química, avaliação da atividade antioxidante in vitro e in vivo, e identificação dos compostos fenólicos presentes no pequi (*Caryocar brasiliense*, Camb.). Tese (doutorado) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2008.
- MAISUTHISAKUL, P.; SUTTAJIT, M.; PONGSAWATMANIT, R. Assessment of phenolic content and free radical-scavenging capacity of some Thai indigenous plants. *Food Chemistry*, v. 100, n. 4, p. 1409-1418, 2007.
- NAWAR, W.W. Lipids. In: FENNEMA, O.R. (Ed.). *Food Chemistry*. 2.ed. New York: Marcel Dekker, 1985.
- OGA, S.; CAMARGO, M. M. A.; BATISTUZZO, J. A. O. Fundamentos da toxicologia . 3 ed. São Paulo: Ateneu, 2008.
- RATNAM, D.; ANKOLA, D. D.; BHARDWAJ, V.; SAHANA, D. K.; KUMAR, M. N. V. R. Role of antioxidants in prophylaxis and therapy: A pharmaceutical perspective. *Journal of Controlled Release*, v. 113, n. 3, p. 189-207, 2006.
- RE, R.; PELLEGRINI, N.; PROTEGGENTE, A.; PANNALA, A.; YANG, M.; RICE-EVANS, C. Antioxidant activity applying an improved ABTS radical cation decolorization assay. *Free Radical Biology & Medicine*, v. 26, n. 9-10, p. 1231-1237, 1999.
- RUFINO, M. S. M.; ALVES, R. E.; BRITO, E. S.; MORAIS, S. M.; SAMPAIO, C. G.; PÉREZ - JIMÉNEZ, J.; SAURA-CALIXTO, F. D. Metodologia científica: determinação da atividade antioxidante total em frutas pela captura do radical livre ABTS⁹⁺. Fortaleza, Embrapa Agroindústria Tropical, jun., 2007. Comunicado Técnico: 128.
- SIES, H.; STAHL, W. Vitamins E and C, beta-carotene, and other carotenoids as antioxidants. *American Journal of Clinical Nutrition*, v. 62, n. 6, p. 1315S-1321S, 1995.
- SOARES, M.; WELTER, L.; KUSKOSKI, E. M.; GONZAGA, L.; FETT, R. Compostos fenólicos e atividade antioxidante da casca de uvas niágara e isabel. *Revista Brasileira de Fruticultura*, v. 30, n. 1, p. 59-64, 2008.
- VASCONCELOS, S. M. L.; SILVA, M. A. M.; GOULART, M. O. F. Pró-antioxidantes e antioxidantes de baixo peso molecular oriundos da dita: estrutura e função. *NUTRIRE: Revista da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição*, v. 31, n. 3, p. 95-118, 2006.
- VIEIRA, M. L.; SOUSA, M. S. B.; MANCINI-FILHO, J.; LIMA, A. Fenólicos totais e capacidade antioxidante in vitro de polpas de frutos tropicais. *Revista Brasileira de Fruticultura*, v. 33, n. 3, p. 888-897, 2011.

Capítulo 21

10.37423/210503999

DIAGNÓSTICO DAS CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS DA PRESENÇA DE INFANTOJUVENIL NO ATERRO SANITÁRIO DE BOA VISTA - RORAIMA

Daniela Cristina da Silva Melo

Instituto Federal de Roraima

Antonia Raniely de Almeida Silva

Instituto Federal de Roraima

Leovergildo Rodrigues Farias

Instituto Federal de Roraima

Resumo: O crescimento das cidades de forma acelerada e desordenada vem sendo um dos principais fatores que tem ocasionado problemas, tanto no âmbito social como no ambiental. Esses fatores têm repercutido de diversas maneiras na sociedade, em especial, no que se refere à falta de emprego. Assim sendo, esta pesquisa tem como objetivo diagnosticar a presença de infantojuvenil no aterro sanitário do município de Boa Vista – Roraima, bem como, suas causas e consequências. Para realização desta pesquisa, utilizaram-se como metodologia informações baseadas em materiais bibliográficos, bem como, dados coletadas em visitas *“in loco”*, que tiveram o intuito de identificar a presença da problemática na área estudada. Os resultados da pesquisa demonstram que há a presença desses infantojuvenis no aterro municipal de Boa Vista e que a relação entre eles e o lixo, ao qual estão expostos, exerce grande influência em sua saúde, bem como, em sua segurança e educação. Por fim, a pesquisa aponta para a necessidade de criação de políticas públicas que busquem minimizar esses impactos.

Palavras-chave: infantojuvenil, aterro sanitário, saúde

1. INTRODUÇÃO

O crescimento das cidades de forma acelerada e desordenada vem sendo um dos principais fatores que vem ocasionando problemas sociais e ambientais. Estes fatores têm repercutido de diversas maneiras na sociedade, em especial, no que se refere à falta de emprego. Com o “inchaço” dos centros urbanos, as pessoas acabam ficando sem muitas perspectivas de trabalho e buscam alternativas em ambientes insalubres, como por exemplo, em aterros sanitários e lixões a céu aberto, em busca de alimento e, ainda, para o reaproveitamento do lixo, que posteriormente pode se transformar em fonte de renda para o sustento da família. Por isso, é comum verificar a presença de pessoas com baixo poder aquisitivo em aterros sanitários, buscando suprir suas necessidades básicas e financeiras.

O estado de Roraima, em especial sua capital Boa Vista, vem passando por esse processo de crescimento de forma desorganizada desde o seu surgimento, provocado pela vinda de imigrantes, principalmente nordestinos, em busca de melhor qualidade de vida no ambiente urbano. Tal fator acaba desencadeando o inchamento da cidade e a falta de oportunidades de emprego, levando a população a buscar meios para suprir suas necessidades em ambiente insalubre como os aterros sanitários.

Neste cenário, é importante ressaltar que a inter-relação direta do homem com o lixo acarreta diversos malefícios para sua saúde. E no que diz respeito à presença de infantojuvenil em ambiente de trabalho insalubre, consideram-se os mais vulneráveis, visto que, o menor trabalhando nessas condições sofre mais com o efeito dos riscos a que estão expostos do que o adulto (COSTA, 2008).

Assim sendo, este estudo tem como objetivo verificar a ocorrência da presença de infantojuvenil nas dependências do Aterro Sanitário de Boa Vista - Roraima e observar a relação entre jovens, crianças e o ambiente ao qual estão expostos (aterro sanitário), visto que sua presença nesse meio insalubre pode acarretar diversos malefícios e, ainda, influenciar negativamente no processo de formação de sua vida.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de uma pesquisa de campo de caráter descritivo com enfoque qualitativo, tendo sido empregado o referencial bibliográfico a fim de adquirir embasamento teórico que ofertasse parâmetros para o desenvolvimento da pesquisa.

Também se fez necessário, visitas ao aterro sanitário de Boa Vista - Roraima, que está localizado na BR – 174, quilômetro 494, a 11 km da capital.

Foram realizadas entrevistas com algumas crianças e jovens, a fim de correlacionar a percepção com as opiniões expostas por meio dos relatos, seguindo-se sempre um roteiro semiestruturado.

Como suporte à pesquisa, utilizou-se reportagens oficiais publicadas em jornais de grande circulação da região.

É importante mencionar ainda que, no espaço físico estudado, variadas situações observadas foram registradas por meio de fotografias e que os dados obtidos foram tabulados para uma melhor análise e exposição dos resultados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na última década, houve uma grande expansão da cidade de Boa Vista, no sentido zona sul, nos setores oeste e sudoeste da cidade, acompanhada de um considerável crescimento populacional. Segundo Burg (2011), a partir da década de 80, o crescimento urbano tomou direção sudoeste e oeste da cidade de Boa Vista, com uma impressionante velocidade, em especial pelas classes menos favorecidas. É importante mencionar que é neste setor que se localiza o aterro sanitário da cidade, conforme o observado na figura 1.

Figura 1 Localização do aterro sanitário de Boa Vista- RR

Fonte: Recorte da Carta do IBGE – Boa Vista – Folha NA 20-X-D-I-(MI 54)

Atualmente, a cidade de Boa Vista é uma das que mais vem crescendo em Roraima, em termos populacionais e econômicos. Segundo o SEPLAN (2010), Boa Vista “[...] comporta 63,32% da população do Estado, concentrando ainda, 72,83% do Produto Interno Bruto estadual”.

No entanto, nessa configuração espacial estão presentes sérios problemas ambientais e sociais como: ocupação desordenada do solo, mau saneamento básico, poluição dos corpos hídricos que cortam o município e que deságuam na bacia do Rio Branco, bem como, a falta de emprego, entre outros.

No que se refere aos problemas ocasionados pela ocupação rápida e desordenada do município de Boa Vista, relacionada à falta de perspectiva de vida de parte da própria população, observar-se que,

grande parcela da mesma, busca em ambientes inadequados ou insalubres a sua sobrevivência, cito: áreas de preservação permanente, aterros sanitários ou controlados, visto que há a falta de investimentos públicos no que se refere ao desenvolvimento urbano de forma a integrá-lo com a saúde e a educação. Ainda em relação ao assunto, Falcão et al. (2008) apud Acselrad (2001), diz que “quando o crescimento urbano não é acompanhado por investimentos em infra-estrutura, a oferta de serviços urbanos não atende o crescimento e a demanda”.

No que diz respeito à falta de meios para suprir necessidades básicas da entidade familiar, muitas vezes os membros da família (pai/mãe) vêm no lixo uma forma de solucionar o seu problema, buscando então no aterro sanitário, no aterro controlado, bem como, no lixão a céu aberto, uma renda, conforme demonstra a figura 2.

Figura 2 Catadores de lixo no aterro sanitário, Boa Vista – 2012.

Vale enfatizar, ainda, que segundo o IBGE com base na Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB, 2000), há uma situação exageradamente favorável, no que se refere à quantidade de lixo conduzida para as unidades de destinação final, pois, mais de 69% de todo os resíduos coletados em nosso país, estariam tendo um destino final adequado, em aterros sanitários e/ou controlados, no entanto, em relação aos municípios, esse índice alcança aproximadamente 64% para resíduos destinados ao lixão.

Porém, é importante enfatizar que, para se tornar um destino adequado, o aterro sanitário tem que suprir necessidades que vão além dos impactos causados ao meio ambiente, pois, de acordo com Philippi Jr. (2005), não pode haver a presença de pessoas em aterros sanitários, visto ser um ambiente insalubre.

Segundo a PNSB (2000), a problemática da presença de pessoas que trabalham catando os recicláveis nos aterros e lixões é um dos aspectos mais degradantes no serviço de limpeza urbana, visto que há pessoas de todas as idades, misturadas ao lixo, entre animais e máquinas e em condições de

insalubridade e risco, lutando pela sua sobrevivência. Destaca-se que há danos acarretados à saúde dessas pessoas, pois, de acordo com Philippi (2005), “A exposição humana a poluentes no ar, na água, no solo e nos alimentos é um grande contribuinte, direto e indireto, para o aumento da morbidade e da mortalidade”.

Sobre essa problemática, salienta-se, de acordo com Campani (2005), “Soma-se ao aspecto ambiental o aspecto social, pois os lixões muitas vezes surgem como único meio de sobrevivência para milhares de pessoas, inclusive crianças”.

Na capital de Roraima esse cenário não é diferente. O aterro sanitário da cidade – que foi criado tendo como um de seus objetivos o fechamento da lixeira pública que funcionava na área que atualmente é denominada bairro São Bento e previa, também, a necessidade de organizar as famílias que ali trabalhavam, para que elas pudessem sobreviver da sua atividade, só que de uma forma mais organizada, saudável e mais qualificada, visando erradicar a pobreza do lixão de Boa Vista, bem como, o trabalho infantil através do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) - (CIDADES DO BRASIL, 2003) – foi inaugurado em dezembro de 2002 e está localizado às margens da BR – 174, com uma área de 94 hectares, sendo um local restrito, cercado por uma tela alambrada (Falcão et al., 2012). No entanto, segundo reportagem divulgada pelo jornal Folha de Boa Vista (2009), foi identificada a presença de crianças e jovens no aterro sanitário, onde se relatou que estes arriscavam suas vidas ao revirarem os resíduos sólidos que são descartados diariamente, em busca de algo que pudesse ser vendido ou reaproveitado, ou mesmo utilizado como alimento, conforme pode ser observado na figura 3.

Figura 3 Criança no aterro sanitário de Boa Vista- RR.

Fonte: Chales Bispos, 2009.

Com o objetivo de verificar se a problemática ainda vem acontecendo, realizaram-se diversas visitas “*in loco*”, onde se observou a presença de crianças e jovens trabalhando na área de estudo, bem como,

percebeu-se que mesmo sendo uma área restrita, eles quebram a tela alambrada que protege o aterro e entram, conforme pode ser verificado nas figuras 4 e 5.

Figura 4 Jovens e crianças no aterro sanitário.

Figura 5 Criança em ambiente insalubre Boa Vista.

Durante as observações e conversas informais, constatou-se que grande parte do grupo infantojuvenil presente no aterro é composta por meninas e meninos de diferentes idades, que estão desde muito cedo expostos aos perigos dos movimentos de caminhões e de máquinas, à poeira, ao fogo, aos objetos perfuro cortantes contaminados e aos alimentos apodrecidos. Segundo relatos, as crianças e os jovens, em sua maioria, auxiliam seus pais ou irmãos mais velhos a catarem pesados fardos e alimentos contaminados e vencidos, que podem acarretar a um curto ou longo prazo, malefícios à saúde, visto que são caracterizados como lixo ou resíduos sólidos imprestáveis, ou seja, aqueles que já não têm utilidade alguma para o consumo humano (PHILIPPI, 2005, apud BASTOS, 1999).

É de suma importância destacar que grande parte dessas crianças e jovens, que trabalham no aterro sanitário, tem acesso a ele pelos fundos e acabam tendo contato direto com o chorume, que segundo Philippi (2005), é um líquido escuro e mal cheiroso, altamente poluidor, gerado pela decomposição de matéria orgânica. Este problema está presente na área de estudo, visto que o aterro está operando sem uma adequada impermeabilização das paredes e fundo e sem um eficiente sistema de coleta e tratamento do chorume antes da sua destinação final, conforme pode ser observado nas figuras 6 e 7.

Figura 6 Chorume exposto no solo.

Figura 7 Chorume e lixos expostos.

Por fim, sobre a problemática em discussão, é importante destacar que Costa (2008) afirma que o menor trabalhando nessas condições insalubres, sofre mais com o efeito dos riscos a que estão expostos do que o adulto.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O artigo 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – Lei 8.069/90 – assegura que “A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência”.

De acordo com o observado e com o explicito no Decreto nº 3.597, de 12 de setembro de 2000, em seu artigo 3º, é considerado como a expressão das piores formas de trabalho infantil, aquela que abrange “o trabalho que, por sua natureza ou pelas condições em que é realizado, é suscetível de prejudicar a saúde, a segurança ou a moral das crianças”.

Ainda em relação ao assunto, expressa o inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal - CF, a “proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos”.

Assim sendo, constata-se que a presença de infantojuvenil em aterro sanitário é inapropriada, visto que este ambiente é totalmente insalubre, principalmente, no que se refere ao mau armazenamento dos resíduos, conforme observado na figura 8, podendo representar um risco para a saúde e influenciar negativamente na formação psicossocial de crianças e adolescentes.

Figura 8 Lixo armazenado incorretamente, aterro sanitário de Boa Vista, 2012.

Logo, torna-se perceptível a necessidade da criação e/ou intensificação de políticas públicas que permitam melhor qualidade de vida, visando acabar ou amenizar o problema em tela, bem como, propor a organização e realização de palestras voltadas à educação ambiental, para tentar, assim, sensibilizar aquela população sobre o uso de equipamentos de segurança adequada para o serviço com o intuito de minimizar os impactos em sua saúde.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 08 Jul. 2012.

BRASIL. LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>.

Acesso em: 07 abr. 2012.

BRASIL. DECRETO Nº 3.597, DE 12 DE SETEMBRO DE 2000. Disponível em: <http://www.legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%203.597-2000?OpenDocument>. Acesso em: 02 ago. 2012.

BURG, Iranilde Paz. O Uso do Sistema de Informação Geográfica (Sig) como ferramenta para análise da expansão urbana, recursos hídricos e APP em Boa Vista-RR. Boa Vista, 2011.

CAMPANI, D. B. et. al. Programa Nacional Lixo & Cidadania. Porto Alegre –RS – Brasil. Disponível em: <<http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/mexico2005/campani2.pdf>>. Acesso em: 03 ago. 2012.

COSTA, Thiago Braz da Costa. Direito ao meio ambiente de trabalho salubre, seguro e adequado. SP: Presidente Prudente, 2008.

FALCÃO, Márcia Teixeira et. Al. Impactos Ambientais no Igarapé Wai Grande em Boa Vista - Roraima decorrentes da influência do Aterro Sanitário. REVISTA GEONORTE, Edição Especial, V.3, N.4, p. 199-207, 2012.

GESTÃO DAS CIDADES. Inclusão Social. Cidades do Brasil. Disponível em:

< <http://cidadesdobrasil.com.br/cgicn/news>>. Acesso em: 07 ago. 2012.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pesquisa Nacional de Saneamento básico 2010. Rio de Janeiro, 2002.

PHILIPPI, Arlindo Junior. Saneamento, Saúde e Ambiente. São Paulo: Manole, 2005.

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA (SEPLAN). Informações Socioeconômicas do Município de Boa Vista – RR 2010. Boa Vista, 2010.

TRAJANO, Andrezza. Promotoria investiga crianças no lixão. Folha de Boa Vista. Disponível em: <www.folhabv.com.br>. Acesso em: 03 ago. 2012.