CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: AS DIVERSAS MANIFESTAÇÕES DA VIDA

EDITORA CONHECIMENTO LIVRE

Frederico Celestino Barbosa

Ciências biológicas: as diversas manifestações da vida

1ª ed.

Piracanjuba-GO
Editora Conhecimento Livre
Piracanjuba-GO

1ª ed.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Barbosa, Frederico Celestino
B238C Ciências biológicas: as diversas manifestações da vida
/ Frederico Celestino Barbosa. – Piracanjuba-GO

Editora Conhecimento Livre, 2021

64 f.: il

DOI: 10.37423/2021.edcl268

ISBN: 978-65-89955-20-7

Modo de acesso: World Wide Web

Incluir Bibliografia

1. flora 2. fauna 3. organismos-vivos I. Barbosa, Frederico Celestino II. Título

CDU: 570

<https://doi.org/10.37423/2021.edcl268>

O conteúdo dos artigos e sua correção ortográfica são de responsabilidade exclusiva dos seus respectivos autores.

EDITORA CONHECIMENTO LIVRE

Corpo Editorial

Dr. João Luís Ribeiro Ulhôa

Dra. Eyde Cristianne Saraiva-Bonatto

Dr. Anderson Reis de Sousa

MSc. Frederico Celestino Barbosa

MSc. Carlos Eduardo de Oliveira Gontijo

MSc. Plínio Ferreira Pires

Editora Conhecimento Livre

Piracanjuba-GO

2021

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1	5
FREQUÊNCIA DE BLASTOCYSTIS HOMINIS E OUTROS ENTEROPARASITAS EM PACIENTES HOSPITALIZADOS	
Fernanda Pereira Rigon	
Thiago Luiz Fucuta de Moraes	
Ana Paula Pivotto	
Veridiana Lenartovicz Boeira	
DOI 10.37423/210604292	
CAPÍTULO 2	20
RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS COMO MEIO SUSTENTÁVEL PARA PRODUÇÃO DE PROTEASE MICROBIANA	
FABIANE PAULA WERLANG SCHUSTER	
DOI 10.37423/210604293	
CAPÍTULO 3	29
MODELAGEM GEOAMBIENTAL APLICADA À FAVORABILIDADE DE OCORRÊNCIA DE CARRAPATOS VETORES DE FEBRE MACULOSA NO MUNICÍPIO DE SEROPÉDICA, RJ	
ANDREA KILL SILVEIRA	
THIAGO BERNARDO-PEDRO	
DOI 10.37423/210604368	
CAPÍTULO 4	47
COMPORTAMENTO DE CALOPSITAS (NYMPHICUS HOLLANDICUS) MANTIDAS EM CATIVEIRO: UMA OBSERVAÇÃO PRELIMINAR	
Inaê Carolina Sfalcin	
DOI 10.37423/210604392	
CAPÍTULO 5	58
LEVANTAMENTO DA POPULAÇÃO ACARINA (ACARI: PYROGLYPHIDAE) NOS COLETIVOS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE	
LOIVA BORBA	
HELENA SOUTO	
XÊNIA ALVES	
DIVÂNIA OLIVEIRA	
AURISTELA ALBUQUERQUE	
UBIRANY FERREIRA	
DOI 10.37423/210704416	

Capítulo 1

10.37423/210604292

FREQUÊNCIA DE BLASTOCYSTIS HOMINIS E OUTROS ENTEROPARASITAS EM PACIENTES HOSPITALIZADOS

Fernanda Pereira Rigon

*Universidade Estadual do Oeste do Paraná -
UNIOESTE*

Thiago Luiz Fucuta de Moraes

*Universidade Estadual do Oeste do Paraná -
UNIOESTE*

Ana Paula Pivotto

*Universidade Estadual do Oeste do Paraná -
UNIOESTE*

Veridiana Lenartovicz Boeira

*Universidade Estadual do Oeste do Paraná -
UNIOESTE*

Resumo: Mediante a um estudo transversal, retrospectivo e descritivo entre o período de janeiro de 2014 a dezembro de 2018, objetivou-se determinar a frequência de infecções por *Blastocystis hominis* bem como a prevalência de outros enteroparasitas em pacientes internados em um hospital do Paraná, Brasil. Foram utilizados prontuários e o sistema eletrônico Tasy® como ferramentas de apoio. Dentre os prontuários que apresentaram positividade nos exames parasitológicos, totalizaram-se 238 amostras apresentando diversas estruturas parasitárias, onde obteve-se 74 amostras (23,13%) com positividade para o *Blastocystis hominis*, sendo o terceiro parasita mais encontrado, após *Giardia lamblia* (37,19%) e *Endolimax nana* (27,19%). As demais 164 amostras apresentaram positividade para outros parasitas (68,91%). Considerando a alta prevalência observada, a aplicação de medidas higiênico-sanitárias pode contribuir para mitigar a disseminação de infecções parasitárias. Ademais, ao observar o *Blastocystis hominis* como um dos mais predominantemente encontrados, mais estudos são necessários para definir fatores de virulência e diferenciação de possíveis genótipos patogênicos e não patogênicos, objetivando a inclusão desse parasita na patologia clínica, visando reduzir a prevalência dos casos de blastocistose.

Palavras-chave: *Blastocystis hominis*. Parasitas. Trato Gastrointestinal.

INTRODUÇÃO

As parasitoses intestinais representam um problema de saúde pública considerado endêmico em diferentes regiões do Brasil em consequência às diversas condições de vida das populações como saneamento básico precário, baixo nível educacional, falta de higiene doméstica e pela ingestão de alimentos ou água contaminada por fezes humanas ou de animais¹⁻²⁻³. Com uma ampla distribuição geográfica, as infecções parasitárias podem acometer áreas urbanas e rurais, com múltiplas alterações em relação ao ambiente e espécie de parasita envolvido⁴.

Segundo dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), entre os anos de 2014 a 2018, as doenças infecciosas e parasitárias representaram a sexta causa de morbidade no país, totalizando 3.968.854 internações, o que corresponde a 6,93% da morbidade hospitalar no período. No Paraná, essa proporção também é considerada elevada, visto que tais doenças representaram 4,99% das internações, ocupando o sétimo lugar entre as principais causas de morbidade hospitalar no estado, superando transtornos mentais e doenças do sistema nervoso⁵.

Um dos parasitas mais frequentemente encontrados isolados em amostras fecais humanas é o protozoário *Blastocystis hominis*. O seu índice de prevalência constitui-se variável entre os países, tendo uma maior concentração naquelas áreas em que há poucos cuidados em relação à higiene pessoal e ao vasto consumo de alimentos e água contaminados, como ocorre nos países em desenvolvimento onde a população é pouco instruída⁶. A frequência desse parasita em determinada população evidencia um baixo desenvolvimento socioeconômico, diretamente associado a déficits educacionais além de precárias condições sanitárias⁷.

Desde 1991, *Blastocystis hominis* é considerado um possível agente etiológico de doenças intestinais. Contudo, o seu conhecimento ainda é considerado controverso devido ao seu pleomorfismo e classificação taxonômica pouco elucidada, bem como diversos aspectos associados considerando patogenicidade, tratamento, sintomatologia e relevância clínica⁸⁻⁹⁻¹⁰. Determinados estudos demonstram que a presença deste parasita quando em alta carga parasitária é capaz de causar algumas manifestações clínicas como diarreia, dor abdominal, náusea, febre e vômito. Entretanto, o mecanismo exato pelo qual produz esses sintomas ainda não é esclarecido, assim surge a necessidade de estudos mais aprofundados em termos de patogenicidade, pois os sintomas inerentes à blastocistose podem ser os mesmos de outras doenças sendo estas infecciosas ou não^{3,11-12}.

Redução da imunidade pode ser um fator crucial para o aumento da suscetibilidade do paciente em adquirir infecções oportunistas intestinais causadas principalmente por parasitas unicelulares, os quais apresentam a diarreia como principal manifestação clínica. No entanto, apesar de exprimir uma condição significativa, poucos consideram os parasitas intestinais como causadores de distúrbios intestinais¹³.

O diagnóstico de parasitoses intestinais através de exames parasitológicos das fezes se torna necessário para escolha do tratamento e prevenção efetivos, reduzindo desta forma a prevalência de doenças parasitárias, bem como índices epidêmicos¹⁴. Entretanto, alguns estudos denotam a ideia do microrganismo *Blastocystis hominis* ser considerado um parasita comensal, uma vez que geralmente não há diferenças na prevalência entre populações sintomáticas e assintomáticas, o que evidencia dúvidas sobre a atribuição de tratamento para blastocistose^{11,15-16}.

Desta maneira, o presente estudo teve por objetivo, através de busca retrospectiva, transversal e descritiva, determinar a frequência de infecções por *Blastocystis hominis*, bem como de outros parasitas em exames parasitológicos realizados em pacientes hospitalizados entre janeiro de 2014 e dezembro de 2018.

METODOLOGIA

Características do local

A região onde encontra-se o hospital apresenta 24°57'21"S de latitude, 53°27'19"O de longitude e 781 metros de altitude¹⁷. O clima predominante é subtropical úmido mesotérmico, com verões quentes, sem estação seca e com poucas geadas¹⁸.

Análise de prontuários

Foi realizada uma pesquisa em prontuários eletrônicos através de consulta ao sistema eletrônico Tasy® dos resultados de exames parasitológicos das fezes de pacientes que foram internados em um hospital universitário localizado na região oeste do Paraná, abrangendo o período de janeiro de 2014 a dezembro de 2018.

COLETA DE DADOS

A coleta dos dados foi realizada por meio de um estudo transversal, retrospectivo e descritivo dos prontuários de todos os pacientes que realizaram os exames parasitológicos de fezes no período, revisando-os em sua totalidade com parasitismo exclusivo ou não para *Blastocystis hominis*, descrevendo características peculiares como sexo e idade.

Dentre aqueles que apresentaram positividade dos exames, foram considerados os que obtiveram parasitismo exclusivo confirmado do parasita em questão, sendo analisada a descrição da sintomatologia apresentada pelos pacientes, bem como os resultados característicos da amostra, incluindo análise físico-química relatando aspecto, consistência, cor, odor e pH (potencial hidrogeniônico).

As análises coproparasitológicas de todas as amostras foram submetidas a diferentes metodologias padronizadas pelo laboratório de análises clínicas do hospital, como o método direto a fresco, que consiste no esfregaço de uma pequena quantidade de fezes a uma gota de solução de Lugol em lâmina / lamínula; Método de sedimentação espontânea em água (*Hoffmann, Pons e Janer ou Lutz*), o qual baseia-se na sedimentação por ação da gravidade dos ovos e larvas de helmintos e cistos de protozoários; E método de centrifugo-flutuação (*Faust*), que por sua vez, consiste na deposição através da centrifugação e lavagem do material com solução de Sulfato de Zinco a 33% que retém os artefatos vegetais e toda gordura contida na amostra durante a centrifugação da suspensão de fezes. O método direto a fresco é considerado o de escolha para a identificação de *Blastocystis hominis*, pois não necessita de diluições como as outras metodologias, que podem lisar a forma vacuolar do parasita em questão podendo gerar resultados falso-negativos, sendo essa a forma mais detectada nos exames parasitológicos de fezes^{3,19-20-21}.

O projeto teve autorização do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do Centro Universitário Fundação Assis Gurgacz, aprovado dia 02 de julho de 2018, sob o parecer 2.748.340 (CAAE: 90422318.3.3004.0107), sendo dispensado de TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido).

RESULTADOS

Durante o período de janeiro de 2014 a dezembro de 2018, um total de 935 amostras fecais foram analisadas correspondentes a pacientes com solicitação de exame parasitológico de fezes em seus prontuários, de diversos setores de atendimento do hospital como pediatria, UTI geral, pronto

socorro, clínica médica/cirúrgica, ortopedia/neurologia, ambulatório, medicina ocupacional, tomografia e psiquiatria.

Desse total, 238 amostras (25,45%) apresentaram diferentes estruturas parasitárias, onde foram identificadas 178 amostras com monoparasitismo (contaminação por apenas um parasita) o que equivale a 74,79%, 46 com biparasitismo (contaminação por dois parasitas) o que representa 19,33%, e 14 com poliparasitismo (contaminação por mais de dois parasitas) representando 5,88%. Dessas 238 amostras parasitadas, a maioria apresentou positividade para outros parasitas que não o *Blastocystis hominis*. Os resultados podem ser observados na Tabela 1.

Tabela 1. Frequência de amostras positivas e negativas para *Blastocystis hominis* em pacientes hospitalizados durante o período de janeiro de 2014 a dezembro de 2018.

Amostras positivas para <i>Blastocystis hominis</i>	FA	FR (%)
Positivo	74	31,09
Negativo	164	68,91
Total	238	100

Legenda: (FA) Frequência absoluta. (FR) Frequência relativa.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Obteve-se 74 amostras (23,13%) com positividade para o *Blastocystis hominis*, sendo o terceiro parasita mais encontrado, após *Giardia lamblia* (37,19%) e *Endolimax nana* (27,19%). As outras 164 amostras apresentaram positividade para outros parasitas (68,91%), sendo eles, *Entamoeba histolytica*/dispar, *Entamoeba coli*, *Strongyloides stercoralis*, *Ascaris lumbricoides*, Ancilostomídeos, *Trichuris trichiura*, *Cystoisospora belli*, *Cyclospora cayetanensis* e *Enterobius vermicularis* (Tabela 2).

Tabela 2. Frequência de parasitas encontrados em amostras fecais de pacientes hospitalizados, durante o período de janeiro de 2014 a dezembro de 2018.

Parasitas	FA	FR (%)
<i>Giardia lamblia</i>	119	37,19
<i>Endolimax nana</i>	87	27,19
<i>Blastocystis hominis</i>	74	23,13
<i>Entamoeba histolytica</i>/dispar	15	4,69
<i>Entamoeba coli</i>	14	4,38
<i>Strongyloides stercoralis</i>	3	0,94
<i>Ascaris lumbricoides</i>	2	0,63

Ancilostomídeos	2	0,63
<i>Trichuris trichiura</i>	1	0,31
<i>Cystoisospora belli</i>	1	0,31
<i>Cyclospora cayetanensis</i>	1	0,31
<i>Enterobius vermicularis</i>	1	0,31
Total	320	100,00 %

Legenda: (FA) Frequência absoluta. (FR) Frequência relativa. Dados incluem amostras positivas monoparasitadas, biparasitadas e poliparasitadas.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Considerando as 74 amostras positivas para *Blastocystis hominis*, 52,70% correspondiam ao sexo feminino e 47,30% ao sexo masculino, mesmo sendo mais frequente no sexo feminino, essa diferença é considerada pouco elevada. Conforme a faixa etária estabelecida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente *Lei N° 8.069 de 13 de julho de 1990* ²² e pelo Estatuto do Idoso *Lei N° 10.741 de 1 de outubro de 2003* ²³, foi observado neste estudo uma predominância de adultos entre 19 e 59 anos (representando 50% de sua totalidade), seguindo de adolescentes entre 12 a 18 anos (22,98%), crianças com até 12 anos incompletos (14,86%) e uma menor quantidade de idosos com 60 anos ou mais (12,16%).

Do total de pacientes que apresentaram positividade para *Blastocystis hominis*, 26 (35%) estavam relacionados a um ou mais sintoma(s) característicos da blastocistose incluindo diarreia, dores abdominais, febre, náuseas e vômito. Dos outros 27 (37%) pacientes não haviam relatos de sintomas característicos do protozoário e em 21 (28%) pacientes não foram encontradas as manifestações clínicas descritas no sistema eletrônico Tasy® (Figura 1).

Figura 1. Relato dos sintomas apresentados pelos 74 pacientes que apresentaram positividade para *Blastocystis hominis*.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Considerando somente as amostras com a sintomatologia dos pacientes identificada e descrita no sistema, totalizam-se 53 amostras onde 26 (49,06%) eram de pacientes que apresentaram um ou mais sintoma(s) característicos da blastocistose e 27 (50,94%) eram de pacientes assintomáticos em relação ao parasita em questão. A diferença entre a quantidade de pacientes sintomáticos e assintomáticos corresponde a 1,88%, sendo considerado pouco significativo. Adicionalmente, entre os indivíduos com taxas positivas de *Blastocystis hominis*, a prevalência das fezes de consistência formada, semi-formada e diarreica foi de 24 (32,43%), 40 (54,05%) e 10 (13,51%) respectivamente. Somente as fezes de consistência semi-formada se mostrou relevante entre os pacientes.

DISCUSSÃO

Blastocystis hominis é um parasita protozoário anaeróbico que afeta o intestino de homens e animais, apresenta acentuada variedade genética (genótipos) e múltiplas morfologias (vacuolar, granular, multivacuolar, amebóide e cística), portanto, é considerado um parasita polimórfico com diferentes estratégias de replicação. A forma vacuolar é a mais prevalente nos exames parasitológicos de fezes, com característica esférica, de 6 a 15 micras, apresentando um vacúolo central e uma camada superficial de espessura variável com múltiplos e pequenos núcleos. Sua forma de transmissão ainda não foi definida, mas acredita-se que a infecção humana ocorra via fecal-oral através de água não tratada ou pela ingestão de alimentos contaminados com fezes apresentando cistos de *Blastocystis hominis* que se estabelecem posteriormente no íleo e cólon do intestino, local onde pode alterar sua morfologia para a forma vacuolar^{11-12,15,24-25-26-27}.

Os resultados demonstram que nos últimos cinco anos, o *Blastocystis hominis* foi um dos parasitas intestinais de maior frequência, sendo o terceiro predominante após *Giardia lamblia* e *Endolimax nana*. Esse resultado coincide com o trabalho de outros pesquisadores brasileiros, que também indicaram o protozoário como sendo um dos mais prevalentes ao investigar a ocorrência de parasitas intestinais em idosos residentes na mesma região deste estudo²⁸. Alguns estudos realizados em outros países também demonstram o mencionado, como o trabalho realizado em Assunção, no Paraguai, onde 40% dos indivíduos estavam parasitados por *Blastocystis hominis* e o estudo em Cartagena das Índias, na Colômbia, em que 60,2% em um total de 207 crianças apresentavam parasitose intestinal pelo mesmo parasita²⁹⁻³⁰.

Resultados diferentes foram obtidos em outros lugares do Brasil, como em Minas Gerais, onde avaliaram o índice de parasitoses intestinais em zonas urbana e rural do município de Caputira, em

que foram encontrados *Ascaris lumbricoides* (93,40%), *Schistosoma mansoni* (50%), *Entamoeba histolytica*/dispar (33,40%) e *Giardia lamblia* (33,40%) em predominância³¹. Em outro estudo na Bahia, foram identificados os protozoários *Entamoeba coli* (44,6%), *Endolimax nana* (21,7%) e *Iodamoeba butschlii* (14,5%) em alta frequência entre os enteroparasitas presentes em idosos do município de Aiquara³². Um levantamento realizado na cidade de Eurinepé, no Amazonas, evidenciou *Ascaris lumbricoides* (35,6%), *Entamoeba coli* (24,9%) e ovos de *Trichuris trichiura* (18,6%) como os mais prevalentes³³. Nos estados de Minas Gerais e Amazonas não foram identificados os protozoários *Blastocystis hominis* e *Endolimax nana*, e na Bahia, além de *Blastocystis hominis* também não foi identificado *Giardia lamblia*. Essas variações de parasitas predominantes em diferentes regiões do país são visualizadas devido as diferentes condições socioculturais, socioeconômicas, sociodemográficas e higiênico-sanitárias que caracterizam cada população³¹⁻³²⁻³³.

Giardia lamblia foi o parasita encontrado com mais frequência nessa pesquisa. Um estudo realizado por pesquisadores mexicanos considera que este protozoário teve sua patogenicidade sendo discutida durante décadas até ser considerado um patógeno para o homem, e acredita que o mesmo está acontecendo com o *Blastocystis hominis*, o qual é considerado pelos pesquisadores sendo o responsável pela metade dos pacientes parasitados em uma região do México³⁴. Outros estudos realizados na Colômbia, Venezuela, Peru e Brasil, destacam a prevalência desse parasita na população a nível mundial e ressaltam a importância da patogenicidade do *Blastocystis hominis* ser confirmada e relatada³⁵⁻³⁶⁻³⁷⁻³⁸.

Dos resultados obtidos entre as 53 amostras com a sintomatologia identificada no sistema eletrônico de busca, quase a metade dos voluntários infectados (49,06%) eram sintomáticos e foi estabelecida associação significativa entre diarreia, dores abdominais e vômito com infecção parasitária por blastocistose. Esses dados contrastam com estudos anteriores que vincularam a presença do parasita aos sintomas de dor abdominal e diarreia^{34-35,39-40-41}. De outro modo, pesquisadores de um estudo evidenciaram em sua pesquisa que os protozoários são capazes de produzir proteases, e estas conseguem degradar fatores imunológicos do hospedeiro, como IgA. Assim, como foi relatado que todos os indivíduos sintomáticos apresentam essa Imunoglobulina A, sugere-se que o protozoário não ataca o hospedeiro e sim que o hospedeiro ataca o protozoário por mecanismos de defesa do mesmo e isso explicaria o motivo de alguns indivíduos apresentarem o parasita sem expressar sintomas⁴². Entretanto, a presença do *Blastocystis hominis* não significa necessariamente ser a principal causa de sintomas, o que caracteriza a necessidade de se realizar novos estudos para contemplar essa relação.

Um fator limitante desta pesquisa foi a escassez de informações obtidas pelo sistema eletrônico de busca, no qual 28% dos pacientes, entre os 74 positivos para *Blastocystis hominis*, não foi possível obter relatos de sintomas. Também foram obtidas escassas informações sobre o tratamento instituído, onde em alguns casos observou-se a prescrição de medicamentos como por exemplo metronidazol ou nitazoxanida para os pacientes em estudo e por meio de alguns dados foi possível observar que a atribuição de tratamento para blastocistose se torna algo facultativo por ocasionalmente não se considerar o *Blastocystis hominis* como um potencial patógeno causador de sintomas gastrointestinais, como é descrito por alguns autores^{8-9,15,34,43}. Devido ao mesmo motivo, pesquisadoras brasileiras relataram em um estudo que muitas vezes esse parasita é incomum de ser mencionado nos laudos de exames parasitológicos, não somente devido a sua patogenicidade como também devido a falhas no seu diagnóstico¹². Contudo, é importante e desejável que o conhecimento do *Blastocystis hominis* seja disseminado para evitar a concessão de tratamentos sem necessidade ou inadequados no contexto de saúde¹⁵.

Acredita-se que a maior parte da população estudada seja proveniente da área urbana, que possui um sistema de cobertura de serviços básicos de saneamento, entretanto, devido à falta de acesso a informações detalhadas do ambiente de vida dos indivíduos, o estudo não permite determinar uma associação entre o parasitismo intestinal e diferentes fatores de risco como a falta de acesso ou má qualidade de água potável e falta de destinação adequada de excrementos e lixo, os quais poderiam estar relacionados com a prevalência do parasita como alguns autores relatam em seus trabalhos^{12,34,41}. Sabe-se que o hospital correspondente a essa pesquisa atende indivíduos de diversas regiões próximas a sua localidade, podendo contemplar também uma população oriunda de área rural o que poderia ser um fator a ser avaliado.

Nessa pesquisa também não foram considerados critérios de exclusão para a presença de outras patologias que poderiam atuar propiciando o surgimento de sintomas gastrointestinais como, HIV/AIDS por exemplo, de acordo com o exposto pelos autores de alguns estudos^{10,35,44}. Apesar do *Blastocystis hominis* atuar como oportunista em imunodeprimidos como é citado por diferentes pesquisadores^{8,13,44-45}.

Diversos autores consideram que pacientes com infecções parasitárias podem apresentar vários sintomas semelhantes a um distúrbio gastrointestinal denominado síndrome do intestino irritável (SII ou IBS), responsável por desencadear dor abdominal crônica associada a constipação, diarreia ou inchaço e alterações na defecação. A SII pode acometer todas as faixas etárias, sendo uma condição

ainda não totalmente compreendida pelos pesquisadores. É definida de acordo com bases clínicas e dependendo da frequência e consistência das fezes é classificada em diferentes subtipos, seguindo os critérios de Roma III (Diretriz para o Diagnóstico de Desordens Gastrointestinais Funcionais), os quais também são válidos para infecções parasitárias. Alguns estudos associam a presença do *Blastocystis hominis* com a SII, porém, essa relação ainda é controversa, pois estudos propõem que uma exposição persistente aos antígenos de *Blastocystis hominis* pode causar uma inflamação de baixo grau na mucosa intestinal o que pode ocasionar sintomas de SII, outra situação que justificaria essa relação controversa é o fato do *Blastocystis hominis* também ser frequentemente encontrado em indivíduos assintomáticos. Contudo, estudos adicionais incluindo as diferenças genotípicas entre isolados sintomáticos e assintomáticos são necessários na determinação de sua patogenicidade^{24-25-26,39,46}.

Os resultados da pesquisa apontaram uma prevalência equivalente a estudos semelhantes já existentes. O índice significativo de sintomas correlacionados com a presença do parasita mesmo com suas limitações, foram satisfatórios.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A alta frequência de infecções parasitológicas apresentadas pelos pacientes internados no hospital do Paraná, demonstra este ser ainda um problema de saúde pública na região e no país. Ao observar a alta prevalência de *Giardia lamblia*, *Endolimax nana* e *Blastocystis hominis* que são possivelmente provenientes dos hábitos populacionais, socioculturais e higiênico-sanitários, a aplicação de medidas preventivas pode contribuir para mitigar a disseminação de infecções parasitárias causadas por enteroparasitas.

Ademais, ao observar o *Blastocystis hominis* como um dos mais predominantemente encontrados, mesmo não sendo observada uma diferença significativa entre pacientes sintomáticos e assintomáticos, denota-se a importância da realização de exames diagnósticos laboratoriais com a inclusão de técnicas na rotina laboratorial que possibilitem a detecção do parasita, ressaltando a necessidade de uma maior significância dada pelos profissionais da saúde. Mais estudos são necessários para definir seus fatores de virulência e diferenciação de possíveis genótipos patogênicos e não patogênicos objetivando a inclusão desse parasita na patologia clínica, visando reduzir a prevalência dos casos de blastocistose.

REFERÊNCIAS

1. Belo VS, Oliveira RB, Fernandes PC, Nascimento BWL, Fernandes FV, Castro CLF, et al. Fatores associados à ocorrência de parasitoses intestinais em uma população de crianças e adolescentes. *Rev paul pediatr*. 2012 Jun;30(2):195-201.
2. Nakandakari MD, De la Rosa DN, Beltrán-Fabián M. Enteroparasitosis en niños de una comunidad rural de Lima-Perú. *Rev Med Hered*. 2016 Abr;27(2):96-99.
3. Cabrine-Santos M, Cintra EN, Carmo RA, Nascentes GAN, Pedrosa AL, Correia D, et al. Occurrence of Blastocystis spp. in Uberaba, Minas Gerais, Brazil. *Rev Inst Med Trop São Paulo*. 2015 Jun;57(3):211-214.
4. Macharetti H, Norberg AN, Martins JSA, Oliveira JTM, Helena AAS, Maliska C, et al. Protozoários e helmintos em interação com idosos albergados em lares geriátricos no Estado do Rio de Janeiro, Brasil. *Rev UNIABEU*. 2014 Ago;7(16):103-112.
5. Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. Morbidade Hospitalar do SUS. Brasília, DF: DATASUS [Internet]; [citado em 23 set. 2018]. Disponível em:
6. <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sih/cnv/niuf.def>.
7. Ibrahim AN, AL-Ashkar AM, Nazeer JT. Additional Glance on the Role of Dientamoeba fragilis & Blastocystis hominis in Patients with Irritable Bowel Syndrome. *Iran J Parasitol*. 2018 Jan-Mar;13(1):100-107.
8. Barbosa CV, Barreto MM, Andrade RJ, Sodr F, d-Avila-Levy CM, Peralta JM, et al. Intestinal parasite infections in a rural community of Rio de Janeiro (Brazil): Prevalence and genetic diversity of Blastocystis subtypes. *Plos One*. 2018 Mar;13(3):1-12.
9. Basak S, Rajurkar MN, Mallick SK. Detection of Blastocystis hominis: a controversial human pathogen. *Parasitol Res*. 2014 Jan;113(1):261-265.
10. Sekar U, Shanthi M. Consensus of treatment and controversies. *Tropic Parasitol*. 2013 Jun;3(1):35-39.
11. Zierdt CH. Blastocystis hominis – Past and future. *Clin Microbiol Ver*. 1991;4(1):61-79.
12. Eymael D, Schuh GM, Tavares RG. Padronização do diagnóstico de Blastocystis hominis por diferentes técnicas de coloração. *Rev Soc Bras de Med Trop*. 2010 Mai-Jun;43(3):309-312.
13. Miné JC, Rosa JA. Frequency of Blastocystis hominis and other intestinal parasites in stool samples examined at the Parasitology Laboratory of the School of Pharmaceutical Sciences at the São Paulo State University, Araraquara. *Rev Soc Bras Med Trop*. 2008;41(6):565-569.
14. Bednarska M, Jankowska I, Pawelas A, Piwczynska K, Bajer A, Wolska-Kuśnierz B, et al. Prevalence of Cryptosporidium, Blastocystis, and other opportunistic infections in patients with primary and acquired immunodeficiency. *Parasitol Res*. 2018 Jun;117(9):2869-2879.

15. Pittner E, Moraes IF, Sanches HF, Trincaus MR, Raimondo ML, Monteiro MCM. Enteroparasitoses em crianças de uma comunidade escolar na cidade de Guarapuava, PR. Rev Salus. 2007 Jun;1(1):97-100.
16. Bustelo MAM, Joga MM, Sánchez SG, López EB, Taboada JL. Blastocystis hominis, un gran desconocido. Rev Pediatr Aten Primaria. 2015 Mar;17(65):39-44.
17. Muñoz V, Frade C. Blastocystis hominis: parasito enigmático. Cuad Hosp Clín. 2005;50(1):78-87.
18. Latitude e Longitude das Cidades Brasileiras [Internet]; [citado em: 24 maio 2019]. Disponível em: <https://www.apolo11.com/latlon.php?uf=pr&cityid=3244>.
19. Secretaria da Cultura do Paraná. História do Paraná. Curitiba: Governo do Estado do Paraná [Internet]; [citado em 24 maio 2019]. Disponível em:

<http://www.cultura.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1>.
20. De Carli GA. Parasitologia clínica: seleção de métodos e técnicas de laboratório para o diagnóstico das parasitoses humanas [Internet]. São Paulo: Editora Atheneu; 2001; [citado em 10 julho 2019]. Disponível em: https://www.academia.edu/28431021/Parasitologia_Cl%C3%ADnica-Geraldo_Atilio_de_Carli_biomedlivros.
21. Nascimento SA, Moitinho MLR. Blastocystis hominis and other intestinal parasites in a community of Pitanga City, Paraná State, Brazil. Rev Inst Med Trop São Paulo. 2005;47(4):213-217.
22. Neves DP, Melo AL, Linardi PM, Vitor RWA. Parasitologia humana [Internet]. 11. ed. Rio de Janeiro: Editora Atheneu; 2005; [citado em 10 novembro 2019]. Disponível em: http://tga.blv.ifmt.edu.br/media/filer_public/7e/78/7e783c68-e298-4d4a-8294-2da4e23b706b/neves_-_parasitologia_humana_-_11ed.pdf.
23. BRASIL. Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Brasília. 2019. Disponível em: <https://www.mdh.gov.br/todas-as-noticias/2019/maio/governo-federal-lanca-nova-edicao-do-estatuto-da-crianca-e-do-adolescente-eca/ECA2019digital.pdf>.
24. BRASIL. Lei n. 10.741, de 1 de outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Brasília. 2003. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.741.htm.
25. Ibarra C, Herrera V, Arce EP, Gil LC, Madrid AM, Valenzuela L, et al. Parasitosis y síndrome de intestino irritable. Rev chil infectol. 2016 Jun;33(3):268-274.
26. Silva-Díaz H, Flores-Esqueche L, Llatas-Cancino D, Vásquez GG, Silva-García T. Frecuencia y susceptibilidad antiparasitaria in vitro de Blastocystis hominis en pacientes admitidos en el Hospital Regional Lambayeque, Perú. Rev gastroenterol Perú. 2016 Set;36(3):197-202.

27. Yakoob J, Jafri W, Jafri N, Khan R, Islam M, Beg MA, Zaman V. Irritable bowel syndrome: in search of na etiology: role of Blastocystis hominis. The Amer. Soc of Trop Med and Hyg. 2004;70(4):383-385.
28. Inaba MHM, Oliveira CS, Seo NM, Chiu WC, Takizawa MGMH. Identificação de Blastocystis hominis em amostras coletadas em bairros da região oeste de Cascavel-PR. Rev Varia Scientia. 2016;2(1):16-22.
29. Sampietro V, Takizawa LHH, Takizawa MG. Enteroparasitoses e aspectos epidemiológicos na população geronte de uma unidade básica de saúde de Cascavel, Paraná. Rev Thêma et Scientia. 2013 Jun;3(1):130-138.
30. Melgarejo-Touchet N. Parasitosis intestinal en adolescentes de 10 a 19 años, que habitan el área de influencia de la USF Santa María. Asunción, Paraguay. Rev Inst Med Trop. 2019 Jun;14(1):29-39.
31. Pedraza B, Suarez H, De-la-Hoz I, Fragoso P. Prevalencia de parásitos intestinales en niños de 2-5 años en hogares comunitarios de Cartagena de Indias, Colombia. Rev chil nutr. 2019 Jun;46(3):239-244.
32. Oliveira ESL, Silva JS. Índice de parasitoses intestinais nas zonas urbana e rural do município de Caputira – estado de Minas Gerais. Rev Pensar Acadêmico. 2016 Dez;14(2):143-152.
33. Santos PHS, Barros RCS, Gomes KVG, Nery AA, Casotti CA. Prevalência de parasitoses intestinais e fatores associados em idosos. Rev bras geriatra gerontol. 2017;20(2):244-253.
34. Araujo CF, Fernández CL. Prevalência de parasitoses intestinais na cidade de Eirunepé, Amazonas. Rev Soc Bras Med Trop. 2005 Fev;38(1):69-69.
35. Rodríguez E, Mateos B, González JC, Aguilar YM, Alarcón E, Mendoza AA, et al. Transición parasitaria a Blastocystis hominis en niños de la zona centro del estado de Guerrero, México. Parasitol latinoam. 2008;63(1-2-3-4):20-28.
36. Carvajal-Restrepo H, Orrego-Morales C, Vega-Orrego T, Arango-Arango S, Buitrago-Agudelo D, Maya-Betancourt MC, et al. Screening for intestinal parasites in adults from three different regions of Colombia. Infect. 2019 Mar;23(1):33-38.
37. Miranda JAN. Prevalencia de parasitosis intestinales en unidades educativas de ciudad Bolívar, Venezuela. Rev Cuid. 2015 Dez; 6(2):1077-1084.
38. Del Pino JRM. Parasitosis intestinal en preescolares y escolares atendidos en el centro médico EsSalud de Celendin, Cajamarca. Horiz Med. 2016 Set;16(3):35-42.
39. Neto VA, Alarcon RSR, Gakiya E, Ferreira CS, Bezerra RC, Santos AG. Elevada porcentagem de blastocistose em escolares de São Paulo, SP. Rev Soc Bras Med Trop. 2004 Ago;37(4):354-356.
40. Miller SA, Rosario CL, Rojas E, Scorza JV. Intestinal parasitic infection and associated symptoms in children attending day care centres in Trujillo, Venezuela. Europe J Tropical Med and Inter Health. 2003;8(4):342-347.

41. Barahona L, Maguiña C, Náquira C, Terashima A, Tello R. Sintomatología y factores epidemiológicos asociados al parasitismo por Blastocystis hominis. *Parasitol latinoam*. 2002 Jul;57(3-4):96-102.
42. Wang KX, Li CP, Wang J, Cui YB. Epidemiological survey of Blastocystis hominis in Huainan City, Anhui Province, China. *World J Gastroenterol*. 2002;8(5):928-932.
43. Dogruman-Al F, Kustimur S, Yoshikawa H, Tuncer C, Simsek Z, Tanyuksel M, et al. Blastocystis subtypes in irritable bowel syndrome and inflammatory bowel disease in Ankara, Turkey. *Mem Inst Oswaldo Cruz*. 2009 Ago;104(5):724-727.
44. Vasquez-Rios G, Machicado JD, Terashima A, Marcos LA. Irritable bowel syndrome and intestinal parasites: a view from South America. *Rev gastroenterol Perú*. 2016 Jun;36(2):153-158.
45. Salinas JL, Gonzales HV. Infección por Blastocystis. *Rev gastroenterol Peru*. 2007;27(3):264-274.
46. Neto VA, Alarcon RSR, Gakiya E, Bezerra RC, Ferreira CS, Braz LMA. Blastocistose: controvérsias e indefinições. *Rev Soc Bras Med Trop*. 2003 Ago;36(4):515-517.
47. Yakoob J, Jafri W, Beg MA, Abbas Z, Naz S, Islam M, Khan R. Irritable bowel syndrome: is it associated with genotypes of Blastocystis hominis. *Parasitol Res*. 2010;106(5):1033-1038.
48. Yakoob J, Jafri W, Beg MA, Abbas Z, Naz S, Islam M, Khan R. Irritable bowel syndrome: is it associated with genotypes of Blastocystis hominis. *Parasitol Res*. 2010;106(5):1033-1038.

Capítulo 2

10.37423/210604293

RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS COMO MEIO SUSTENTÁVEL PARA PRODUÇÃO DE PROTEASE MICROBIANA

FABIANE PAULA WERLANG SCHUSTER

*Universidade do Estado de Santa Catarina –
UDESC*

Resumo: Matérias primas agroindustriais e os resíduos gerados nos processos podem ser utilizados de forma eficiente e sustentável. A produção de protease microbiana por bioprocessos (fermentação) é uma alternativa com elevado potencial usando-se como insumo os resíduos agroindustriais. Esta revisão da literatura recente tem o objetivo de apresentar resultados obtidos em diversos países, usando diferentes resíduos, métodos operacionais, condições de processo e micro-organismos para produção de proteases com boa estabilidade e alta atividade. Meios à base de resíduos de cereais como farelos, bagaços e cascas tem apresentado ótimos resultados, são fontes abundantes e seguras de carbono e atuam também como suporte para desenvolvimento de fungos. Os resíduos de frigoríficos, curtumes, laticínios e indústria pesqueira são ricos em proteínas, tornando-se assim ótima fonte para suplementação de nitrogênio no meio fermentativo e resultam em extratos enzimáticos com ótima atividade proteolítica. Com base na revisão, conclui-se que todo resíduo tem potencial aplicação na produção de proteases mediante fermentação em condições adequadas com microrganismos capazes de sintetizar a enzima desejada a partir do meio proposto.

Palavras-chave: meio fermentativo, atividade proteolítica, bioprocessos.

INTRODUÇÃO

Proteases são enzimas que catalisam reações químicas e bioquímicas que envolvem proteínas. Elas representam mais de 60 % do mercado de enzimas industriais (ADRIO e DEMAINE, 2014), e estima-se que o faturamento total do mercado de enzimas alcance \$ 6 bilhões em 2018 (MISCHRA, 2016). A ação hidrolítica destas sobre as ligações peptídicas resulta na liberação de aminoácidos e formação de peptídeos de cadeia e massa molecular menores. São denominadas proteases neutras quando tem ação em pH neutro ou próximo da neutralidade (ZHU *et al.*, 2013), ácidas quando sua atividade é favorecida em pH ácido (LARIO *et al.*, 2015) ou alcalinas quando tem maior atividade em pH alcalino (YAO *et al.* 2012). A aplicação de proteases é ampla, engloba indústria de alimentos e bebidas, farmacêutica, cosmética, curtumes, produtos de limpeza, tratamento de efluentes e outros. Podem ser extraídas de plantas, animais e micro-organismos, tendo este último mostrado grande potencial produtor tendo em vista suas características bioquímicas diversas e os avanços ligados à manipulação genética a qual os micro-organismos são susceptíveis (CASTRO *et al.*, 2014), além da facilidade do cultivo em larga escala e com alto rendimento (KUMAR *et al.*, 2005).

Os micro-organismos produzem protease quando devidamente estimulados nos processos de fermentação sob condições controladas em meios que forneçam carbono, nitrogênio e micronutrientes diversos necessários ao seu desenvolvimento e a síntese deste metabólito. Os resíduos agroindustriais tem elevada carga orgânica com potencial poluidor se dispostos inadequadamente no ambiente. São ricos em nutrientes e, portanto, podem servir como meio de fermentação para produção de proteases microbianas. Resíduos da industrialização de cereais, laticínios, frigoríficos, indústria sucroalcooleira, processamento de óleos, de vegetais e de bebidas são abundantes no Brasil e a principal destinação é a produção de ração animal e compostagem, embora esta agregue pouco valor ao resíduo.

A produção microbiana possibilita a obtenção de enzimas específicas, com elevado índice de pureza, baixo custo de produção, ótima estabilidade, seguindo preceitos de sustentabilidade e com mínimo impacto ambiental, especialmente ao usar como substrato, suplemento e suporte de crescimento resíduos agroindustriais. Assim, esta revisão da literatura recente, objetiva a apresentação de resultados relacionados a pesquisas para produção de protease microbiana por fermentação, usando resíduos agroindustriais diversos como substrato, suporte ou suplemento.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa, cujas referências foram obtidas na busca por assunto no portal de periódicos da CAPES nas seguintes bases: ScienceDirect, Scopus, Springer, InterScience, Wiley Online Library e Academic Search Premier. Usou-se como critérios de busca artigos publicados a partir do ano de 2000, cujo assunto esteja relacionado com produção de protease (*protease production*) e resíduos agroindustriais (*waste*). A pesquisa foi realizada no período entre dezembro de 2016 e maio de 2017.

RESULTADOS

Produção de protease em meios compostos por resíduos do processamento de vegetais

A fermentação em estado sólido (SSF) é um método muito empregado quando o meio é de resíduos vegetais, especialmente farelos, cascas, sementes e tortas. Zhu *et al.* (2013) otimizou as condições de processo para produção de protease neutra por *Bacillus subtilis* testando como meio fermentativo polpa de mandioca (resíduo da produção de polvilho), farelo de trigo e farinha de soja. O estudo demonstrou que o meio contendo 37,78 g/L de polpa de mandioca, 15 g/L de farinha de soja foi a melhor combinação. Nas condições previstas como ótimas, o uso da polpa de mandioca como meio levou atividade proteolítica de 4,107 U/mL, mostrando potencial deste resíduo industrial, até então usado apenas em compostagens, apesar do seu elevado teor de nutrientes que o torna um resíduo orgânico com grande potencial poluidor se disposto inadequadamente no ambiente. A Tabela 1 sintetiza mais resultados observados usando (SSF), usando como meio resíduos da indústria de processamento de cereais.

Tabela 1: Produção de protease microbiana em SSF com resíduos de cereais.

Composição do meio	Micro-organismo	Atividade proteolítica	Referência
Farelo de trigo	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	582,25 U/mL*	MEENA <i>et al.</i> 2013
Farelo de trigo	<i>Aspergillus niger</i>	186,42 U/g **	CASTRO <i>et al.</i> 2014
Farelo de trigo e soja	<i>Aspergillus oryzae</i>	8.64 x 10 ⁵ U/g **	VISHWANATHA, K. S. <i>et al.</i> 2010
Farinha de torta de soja	<i>Aspergillus niger</i>	152,38 U/g **	CASTRO <i>et al.</i> 2014

Farinha de bagaço de algodão	<i>Aspergillus niger</i>	118,83 U/g **	CASTRO <i>et al.</i> 2014
Resíduo de café e sabugo de milho	<i>Bacillus sp.</i>	220 U/mL*	KANDASAMY, S. <i>et al</i> 2016
Bagaço de malte cervejeiro	<i>Monascus purpureus</i>	117 U/g**	HAQUE, M. A. <i>et al.</i> 2016
Bagaço de malte e trub de cervejarias	<i>Aspergillus niger</i>	0.36 U/gdm.h	HASAM, S. D. M. <i>et al</i> , 2013

*por mL de extrato obtido - **por grama de substrato

Avaliando 11 diferentes substratos para produção de protease por fermentação em estado sólido por *Aspergillus sp.* SHIVAKUMAR (2012) constatou que a farinha de trigo, farelo de trigo e farinha de soja tiveram produção superior da enzima, com atividades de 320, 280 e 160 U/g de substrato respectivamente.

Em pesquisa realizada na Índia por Mishra (2016), o autor usou um micro-organismo isolado de água residual de indústria têxtil (*Brevibacillus brevis*) e o inoculou em meio contendo farinha de soja (7,5 g/L) e amido solúvel (12,5 g/L), pH ajustado para 8,5 e temperatura de fermentação de 46 °C e obteve nestas condições a produção de protease alcalina termotolerante com atividade de 115 U/mL, e 128,5 U/mL. Usando resíduos do processamento de ervilhas, bagaço laranja e bagaço de abacaxi para produzir a mesma enzima, JOHNVESLY *et al.* (2002) obtiveram atividade de 120 U/mL, 95 U/mL e 80 U/mL respectivamente, mostrando que o uso de resíduos apresenta-se como uma boa opção em substituição à produtos comerciais como a farinha de soja e o amido. Os autores testaram ainda farelo de trigo e de arroz, farinha de bagaço de cana-de-açúcar e obteve resultados consideráveis também com estes resíduos.

PRODUÇÃO DE PROTEASE COM MEIOS COMPOSTOS POR RESÍDUOS DA INDÚSTRIA DE PROCESSAMENTO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

A produção de carne de aves está em constante expansão no Brasil e estima-se que em 2014 esta prática tenha gerado 600 toneladas de penas como resíduo. Oliveira *et al.* (2016), usaram penas inteiras e farinha de penas como meio de fermentação para produção de proteases. A bactéria do gênero *Bacillus aerius* isolada de penas se destacou como potencial produtor de protease a partir da degradação das penas inteiras e farinha de penas. Após 4 dias de fermentação, o micro-organismo solubilizou 29 % da massa inicial de penas, chegando a 75 % e 95 % de degradação após 6 e 9 dias de

cultivo respectivamente. A produção de enzimas proteolíticas atingiu valores máximos após 216-240 h de crescimento chegando a 250 U/mL. Os autores concluíram que os resíduos de penas e farinha de penas podem ser substratos para obter inestimáveis produtos biotecnológicos. Estes resultados vem a corroborar com Thys *et al.* (2006) que obtiveram extrato com atividade proteolítica de 202,7 U/mL usando meio com 12,5g/L de farinha de pena, fermentado por *Microbacterium sp* a 25 °C, pH 7,0 por 48 horas.

Farinha de sangue resultante da secagem de sangue residual do abate de suínos contém teores de proteína de até 850 g/Kg de farinha, além de pequenas quantidades de lipídios e minerais. Composta principalmente por hemoglobina, a farinha de sangue não é absorvida pelo organismo dos animais, sendo necessária hidrólise prévia da hemoglobina, transformando esta biomacromolécula em peptídeos com massa molecular reduzida. Estas características levaram YAO *et al.* (2012) a estudarem a atividade proteolítica de extrato obtido através da fermentação desta farinha com *Bacillus pumilus* em condições controladas de pH, temperatura e agitação. Estes observaram que, após 36 horas, 82 % da hemoglobina havia sido hidrolisada e a atividade proteásica no extrato da fermentação chegou a 35,437 U/mL nas condições otimizadas, o que levou os autores a concluírem que a degradação microbiana da hemoglobina é um processo seguro, tem baixo custo e condições de operação/reação amenas.

Resíduos de curtumes são ricos em proteínas e apresentam elevado teor de umidade, com geração de 30 % sobre o couro processado. Usando SSF e *Bacillus cereus*, RAVINDRAN *et al.* (2011) obtiveram atividade proteásica de 12,31 U/g de resíduo fermentado. KUMAR *et al.* (2009), obtiveram resultados ainda mais significativos, chegando a 745-755 U/g de resíduo fermentado em estado sólido por *Synergistes sp.*

Além de resíduos de frigoríficos e curtumes, águas residuais de laticínios, soro da industrialização de queijos, resíduos da indústria pesqueira também são excelente fonte de Nitrogênio para o meio fermentativo destinado a produção de proteases por micro-organismos.

CONCLUSÃO

A revisão da literatura resultou em dados que comprovam o uso efetivo de resíduos agroindustriais como suporte para o desenvolvimento de micro-organismos, substrato ou suplemento para o meio na produção de proteases microbianas. Este mostrou-se um tema atual, pesquisado em diversos países e com amplo potencial de estudos mais aprofundados para otimizar meio de fermentação, condições

de processo e uso de micro-organismos que tenham afinidade com o meio para síntese do metabólito desejado.

REFERÊNCIAS

- ADRIO, J. L.; DEMAINE, A. L. Microbial enzymes: tools for biotechnological processes. *Biomolecules*, v.4, p. 117-139, 2014.
- CASTRO, R. J. S.; NISHIDE, T. G.; SATO, H. H. Production and biochemical properties of proteases secreted by *Aspergillus niger* under solid state fermentation in response to different agroindustrial substrates. *Biocatalysis and Agricultural Biotechnology*, v. 3, p. 236–245, 2014.
- HAQUE, M. A. et al. Valorization of bakery waste for biocolorant and enzyme production by *Monascus purpureus*. *Journal of Biotechnology*, v. 231, p. 55–64, 2016.
- HASAM, S. D. M. et al. Brewery-residue utilization of a freshly isolated *A. niger* sp. upt-03 for protease production under solid-state fermentation. *ENGEVISTA*, v. 15, n. 1. p. 61-71, 2013.
- JOHNVESLY, B.; MANJUNATH, B. R.; NAIK, G. R. Pigeon pea waste as a novel, inexpensive, substrate for production of a thermostable alkaline protease from thermoalkalophilic *Bacillus* sp. JB-99. *Bioresource technology*, v. 82, p. 61 -64, 2002
- KANDASAMY, S. et al. Optimization of protease production from surface-modified coffee pulp waste and corncobs using *Bacillus* sp. by SSF. *3 Biotechnology*, v. 6, p. 167, 2016.
- KUMAR, A. G. et al. Utilization of tannery solid waste for protease production by *Synergistes* sp. in solid-state fermentation and partial protease characterization. *Engeniering Life Science*, v. 9, No. 1, p. 66–73, 2009.
- KUMAR, S. et al. . Extracellular acid protease from *Rhizopus oryzae*: purification and characterization. *Process Biochemistry*, v. 40, p. 1701–1705, 2005.
- LARIO, L. D. et al. Production, purification, and characterization of na extracellular acid protease from the marine Antarctic yeast *Rhodotorula mucilaginosa* L7. *Fungal Biology*, v. 119, p. 1129 – 1136, 2015.
- MEENA, P. et al. Utilization of agro-industrial waste (wheat bran) for alkaline protease production by *Pseudomonas aeruginosa* in SSF using Taguchi (DOE) methodology. *Biocatalysis and Agricultural Biotechnology*, v. 2, p. 210 -216, 2013.
- MISHRA, V.K. Otimization of thermotolerant alkaline protease production from *Brevibacillus brevis* strain BT2 using surface responce methodology. *Biocatalysis and agricultural biotechnology*, v. 7, p. 87-94, 2016.
- OLIVEIRA, C. T. et al. Screening of bacteria for protease production and feather degradation. *Waste Biomass Valorization*, v. 7, p. 447–453, 2016.
- RAVINDRAN, B. et al. Solid-state fermentation for the production of alkaline protease by *Bacillus cereus* 1173900 using proteinaceous tannery solid waste. *Current Science*, v.100, p.726-730, 2011.
- SHIVAKUMAR, S. Production and characterization of an acid protease from a local *Aspergillus* sp. by solid substrate fermentation. *Archives of Applied Science Research*. v. 4, p. 188–199, 2012.

THYS, R. C. S. et al. Optimization of protease production by *Microbacterium* sp. in feather meal using response surface methodology. *Process Biochemistry*, v. 4, p. 67–73, 2006.

VISHWANATHA, K. S.; RAO, A. G. A.; SINGH, S. A. Acid protease production by solid-state fermentation using *Aspergillus oryzae* MTCC 5341: optimization of process parameters. *Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology*, v. 37, p. 129–138, 2010.

YAO, D. et al. Production and characterization of alkaline protease from hemoglobin-degrading *Bacillus pumilus* NJM4 to produce fermented blood meal. *Journal of Food Science Technology*, v. 49, p. 626–631, 2012.

ZHU, M. et al. Optimization of neutral protease production from *Bacillus subtilis*: using agroindustrial residues as substrates and response surface methodology. *Biotechnology and Applied Biochemistry*, v. 60, n. 3, p. 336–342, 2013.

Capítulo 3

10.37423/210604368

MODELAGEM GEOAMBIENTAL APLICADA À FAVORABILIDADE DE OCORRÊNCIA DE CARRAPATOS VETORES DE FEBRE MACULOSA NO MUNICÍPIO DE SEROPÉDICA, RJ

ANDREA KILL SILVEIRA

*UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO
DE JANEIRO - RJ*

THIAGO BERNARDO-PEDRO

*UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO
DE JANEIRO - RJ*

1. INTRODUÇÃO

O modelo atual de sociedade tem aumentado a demanda de recursos, acelerando a degradação ambiental e a fragmentação dos habitats. Por outro lado, nos últimos anos, em áreas urbanas e rurais, as ações de preservação dos recursos naturais, de seu uso sustentável e de atividades de turismo ecológico e rural propiciaram maior contato entre os organismos vivos dos ambientes silvestres, rurais e urbanos, inserindo a população humana na cadeia epidemiológica de algumas enfermidades, antes restritas aos ambientes naturais (BRADLEY;ALTIZER, 2007).

A diversidade, distribuição e abundancia dos agentes patogênicos estão relacionadas as de seus hospedeiros, portanto o equilíbrio harmonioso da biodiversidade desempenha importante papel na distribuição e prevalência de doenças. Nos ecossistemas não perturbados a biodiversidade tende a ser maior e em equilíbrio. Em contraposição, em áreas perturbadas pode haver o domínio de uma ou poucas espécies generalistas, proporcionando o aumento de intensidade e a dispersão de patógenos específicos (SCHIMIDT; OSTFELD, 2001; ROSA; PUGLIESE, 2007; ESTRADA-PENA, 2009).

Neste contexto, os carrapatos tem desempenhado papel importante na manutenção e transmissão de patógenos, entre animais silvestres, de produção e companhia e para humanos.

Os carrapatos são importantes hospedeiros, vetores e amplificadores de patógenos por estarem distribuídos por todo o planeta, com ampla diversidade de hospedeiros, e grande amplitude de nichos (ESTRADA-PENA, 2003; RANDOLPH, 2004; GUGLIELMONE et al., 2010). Para compreender melhor as interações entre os hospedeiros e os agentes patogênicos nos diferentes ecossistemas faz-se necessária a análise integradora de dados.

A Analise Multicritério e um instrumento matemático que auxilia na comparação de diferentes cenários, fundamentados em muitos critérios, com a finalidade de conduzir os tomadores de decisão a uma escolha mais sensata. Os métodos multicritério conjugam aspectos objetivos (quantitativos) e subjetivos (qualitativos), permitindo estruturar as possibilidades com uma gama de critérios de avaliação, cuja estrutura serve de apoio a tomada de decisão (PADILHA et al., 2014).

A principal finalidade do apoio a decisão multicritério e contribuir para a melhor saída que atenda inteiramente a todos os critérios. A principal regra, nesse caso, e que não há solução excelente, pois os critérios são conflituosos. O que ha e uma alternativa que se adequa melhor as exigências do agente de decisão e que seja coerente com os critérios de avaliação que foram previamente estabelecidos (DIAS, 2015).

Por um lado, todos os critérios devem refletir alternativas de preferência, tão detalhadas quanto possível for; porém, por outro lado, o número de critérios deve ser o menor possível para que seja mais fácil operacionaliza-los. Desse modo, torna-se essencial alinhar a escolha e número de critérios com a escolha e número de alternativas (FRODELL, 2011).

Diversas técnicas utilizando os Sistemas Geográficos de Informação (SIG) tem sido utilizadas nas áreas ecológicas e epidemiológicas. Com a utilização do SIG é possível identificar, quantificar e investigar associações entre as variáveis envolvidas na ocorrência de fenômenos ambientais (XAVIER-DA-SILVA et al., 2001). A integração entre os métodos de análise multicritério e os SIG promove a sistematização e transformação de dados espaciais em uma resposta para a tomada de decisão. Nesse caso, o que determina as regras de decisão são as relações entre os dados espaciais (mapas de entrada) e os dados de saída (mapas finais) (MALCZEWSKI, 2004).

A modelagem de distribuição geográfica de espécies e uma técnica relativamente recente e tem se tornado uma ferramenta amplamente utilizada em estudos ecológicos e programas de conservação de espécies (PETERSON, 2006). Os modelos são também utilizados com sucesso para estudo de associações de variáveis com os agravos a saúde, na predição e controle de doenças (ESTRADA-PENA, 2003; LAMBIN et al., 2010; VANWAMBEKE et al., 2010). Segundo Lambin et al. (2010), os atributos associados ao ciclo de transmissão de patógenos estão relacionados com atributos da paisagem, padrão espacial e conectividade do habitat, vias de transmissão de patógenos entre vetores e hospedeiros, escala, uso do solo e ocupação e desenvolvimento humano.

Na Europa e nos Estados Unidos, diversos modelos tem sido usados para verificar a distribuição de carrapatos e a possibilidade de estabelecimento de doenças zoonóticas. Em áreas rurais da Letônia, a modelagem através de SIGs foi utilizada para a identificação de fatores de risco na transmissão de encefalites transmitidas por carrapatos (TBE). As variáveis utilizadas foram as relacionadas com a característica da paisagem e o perfil socioeconômico.

Os resultados evidenciaram que a TBE foi significativamente maior em áreas com maior proporção de florestas e seu entorno, os autores relacionaram estas áreas como as que tem maior abundância de carrapatos e seus hospedeiros (VANWAMBEKE et al., 2010).

Na Escócia, os fatores ambientais foram determinantes na abundância de ninfas de *Ixodes ricinus* e na incidência de *Borrelia burgdorferi*, como demonstrado por James et al. (2013). Os autores verificaram associação positiva dos carrapatos com a alta abundância de hospedeiros, como, veados e roedores. Também com floresta decídua e mista, quando comparado com florestas de coníferas, em áreas onde

há o crescimento de vegetação gramínea e herbáceas, e locais que apresentam baixa umidade e altitude.

A modelagem para a verificação da extensão geográfica dos carrapatos *Amblyomma sculptum* e *Ixodes*, foi utilizada no México e Texas. Os autores utilizaram variáveis bioclimáticas e topográficas e percebeu-se que nesta região a espécie *A. sculptum* está relacionada às áreas de varzea, mangue, pantano, cerrado e floresta decídua, em locais com alta temperatura, e baixa altitude, principalmente entre 200 m e 1 000 m. Já *Ixodes* está associado a maiores altitudes, áreas com até 3 600 m (ILLOLDI-RANGEL et al., 2012).

Atributos, como, tipo de solo, cobertura vegetal, altitude e distância de corpos d'água e de florestas foram utilizados por Bunnell et al. (2003) para analisar a distribuição espacial de *Ixodes ricinus* nos Estados Unidos. Os autores verificaram uma associação positiva entre a abundância de carrapatos e a distância de floresta decídua, corpos d'água, tipo de solo e altitude. O modelo identificou que áreas com solo arenoso, ou de alta granulometria, ou mesmo em locais com baixa altitude e moderada distância da floresta e corpos d'água representam fatores positivos para o risco de infestação por carrapatos *I. ricinus*. Os fatores protetores, ou seja, negativamente associados, são as áreas com altitude elevada, solos com silício e muito argilosos, áreas pantanosas e grande distância de corpos d'água e floresta.

A relação entre a presença de hospedeiros e carrapatos também foi estudada por Ferreira (2006) no município de Piracicaba/SP. A autora criou inicialmente um modelo preditivo de distribuição de capivaras e um mapa com a densidade de equinos no município. Com os mapas de ocorrência dos hospedeiros e outras variáveis, como características da paisagem, geomorfologia e climáticas, foi possível identificar áreas favoráveis para o desenvolvimento da população de *A. sculptum* e o risco para infestação humana por este carrapato. A autora sugere que as áreas ocupadas por pastagem, remanescentes de florestas e áreas em recuperação apresentam uma maior favorabilidade para o crescimento da população de *A.*

sculptum. Indicou também que as áreas favoráveis estavam localizadas na periferia da cidade e que o aumento da favorabilidade esteve relacionado com o aumento da biomassa vegetal, associado ao aumento da temperatura.

Pedro (2015) utilizou modelagem de regressão para estudar a relação entre a distribuição de ocorrência de carrapatos *A. sculptum* adultos e diferentes características de paisagem, além da presença de hospedeiros, no município de Seropédica/RJ. O autor utilizou as seguintes variáveis explicativas:

altitude, declividade, unidade geomorfológica, tipo de solo, presença de hospedeiros (equinos e capivaras) e favorabilidade de ocorrência de *A. sculptum*. Todas as variáveis foram consideradas estatisticamente significativas para a ocorrência de carrapatos, e declividade se mostrou como a variável independente de maior importância para a ocorrência de *A. sculptum* no município estudado.

O objetivo do presente trabalho foi analisar a favorabilidade para a ocorrência *A. sculptum* no município de Seropédica, RJ.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

O município de Seropédica está localizado na região metropolitana do Rio de Janeiro, ocupa uma área de aproximadamente 284 km² e população de 78 186 habitantes (IBGE, 2010). O clima, típico de regiões tropicais, com verões chuvosos e invernos secos, a precipitação média anual é de aproximadamente 1 200 mm, a temperatura média anual de 25° C (MATTOS et al., 1999). O bioma da região é definido como de Floresta Atlântica, embora atualmente exista poucos fragmentos dessa vegetação (VELOSO et al., 1991). Parte da economia do município está relacionada a extração mineral, com destacada importância para a extração de areia, que é desenvolvida por um grande número de empresas, com mais de 80 cavas (ou lagoas) em atividade (MARQUES et al., 2012). Durante o processo histórico de ocupação dessa região houve uma fase de grande atividade agrícola, atualmente essa atividade é pequena e restrita a poucas culturas. A criação de gado é pequena, com aproximadamente 8 mil cabeças (LIMA; SANTOS, 1998; IBGE, 2006). A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro também contribui para o desenvolvimento urbano desta região e para economia, movimentando o comércio local (IBGE, 2010). Também há presença das Forças Armadas, neste município está localizado o Depósito Central de Munição do Exército Brasileiro (DCMun).

2.2. MODELAGEM AMBIENTAL POR GEOPROCESSAMENTO

Como a distribuição e abundância de carrapatos *A. sculptum* está diretamente relacionada com a presença de, pelo menos um de seus hospedeiros principais, como, equinos e/ou capivaras, tornou-se necessária inserção de dados sobre hospedeiros no modelo. Por falta de dados referentes a distribuição de equinos no município de Seropédica, optou-se pela modelagem sobre a favorabilidade de ocorrência de capivaras, para dar apoio ao modelo favorabilidade de ocorrência do carrapato (SILVEIRA; FONSECA, 2013). A modelagem da distribuição espacial de carrapatos foi desenvolvida pelo

Sistema de Análise Geoambiental SAGA/UFRJ da Universidade Federal do Rio de Janeiro (LAGEOP, 2007). Para tal modelagem, três etapas foram necessárias, sendo, a definição das variáveis utilizadas, o processo de avaliação multicritério das variáveis e a assinatura ambiental.

Os mapas representativos das variáveis consideradas relevantes para a favorabilidade de ocorrência de carrapatos formaram uma Base de Dados Georreferenciados (BDG). A BDG para carrapatos composta pelas variáveis, (1) uso de solo e cobertura e vegetal, (2) favorabilidade de ocorrência de capivaras, (3) geomorfologia, (4) solo e (5) declividade.

Todos os mapas com resolução espacial de 25 m e escala cartográfica de 1: 50 000, georreferenciados na projeção Universal Transverse Mercator (UTM), fuso 23 Sul, Datum SAD69.

No procedimento de avaliação multicritério, para cada variável foi atribuído uma nota percentual que variou de 0 a 100%, com o objetivo de representar a possibilidade de ocorrência do fenômeno em avaliação. Após, foi criada uma árvore de gestão especializada, onde os mapas temáticos da BDG foram organizados de acordo com a importância para a ocorrência do evento. Após a distribuição dos pesos também foi realizado uma atribuição de notas, na escala de 0 a 10, para as categorias que compõem cada variável. Estas notas devem representar a possibilidade de ocorrência do fenômeno em avaliação, nas diferentes áreas geográficas relativas a cada categoria apresentada nos mapas temáticos. Após a atribuição de pesos e notas esses mapas, foram sendo combinados em todos os níveis, até gerar uma síntese avaliativa do produto da integração de todos os mapas constituintes da árvore de gestão especializada. Todo esse processo é fundamentado na experiência profissional de membros da equipe de trabalho, bem como por consulta a literatura científica (XAVIER-DA-SILVA, 2001).

No procedimento de avaliação multicritério o programa SAGA/UFRJ utiliza um algoritmo que gera um valor para cada elemento da matriz A pela multiplicação do valor da avaliação geral de cada mapa, que é o seu peso (parcela do intervalo entre 0 e 1) pelo valor (nota) relativo a categoria da legenda do mapa que tenha sido atribuído a cada elemento da matriz A. Com a formulação, a seguir é criada a avaliação de cada elemento da matriz e, conseqüentemente, o mapeamento avaliativo final:

$$A_{i,j} = \sum_{k=1}^n (P_{ij(k)} \cdot N_{ij(k)}), \text{ onde:}$$

$A_{i,j}$ = possibilidade de ocorrência do evento analisado no elemento (pixel) i,j da matriz (mapa) resultante;

n = numero de variáveis (mapas) utilizadas;

$P_{ij(k)}$ = peso (percentual) da contribuição do parâmetro “k” , em relação aos demais, para a ocorrência do evento analisado;

$N_{ij(k)}$ = nota, segundo os avaliadores, dentro da escala de 0 a 10, da ocorrência do evento analisado, na presença da classe encontrada na linha i, coluna j do mapa k.

Por fim, é realizado o procedimento de assinatura ambiental que corresponde a uma investigação empírica por varredura das características ambientais com maior probabilidade de influenciar no fenômeno analisado. Este programa gera um conjunto de tabelas que mostram a matriz das assinaturas que constam nos resultados. Esta etapa fornece apoio e segurança aos procedimentos avaliativos que definem a situação ambiental.

2.2.1. MODELAGEM GEOAMBIENTAL PARA FAVORABILIDADE DE OCORRÊNCIA DA ESPÉCIE *AMBLYOMMA SCULPTUM*

Para a geração do mapa de favorabilidade de ocorrência de carrapatos da espécie *A. sculptum* utilizamos a BDG composta pelas variáveis, uso do solo e cobertura e vegetal, favorabilidade de ocorrência de capivaras, geomorfologia e solo. A árvore de gestão espacializada para a adoção de pesos está descrita na Tabela 1. E as notas são mostradas na Tabela 2.

Tabela 1. Árvore de gestão especializada para a adoção de pesos para a modelagem da favorabilidade de ocorrência de *Amblyomma sculptum* no município de Seropédica, RJ.

Variáveis	Pesos (%)
Uso do solo e Cobertura Vegetal	32
Favorabilidade de ocorrência de capivaras	30
Geomorfologia	15
Solo	13
Declividade	10
Total	100

Tabela 2. Notas atribuídas as categorias que compõem os mapas utilizados na análise favorabilidade de ocorrência de *Amblyomma sculptum* no município de Seropédica, RJ.

Variáveis	Categorias		
	1-3	4-7	8-10
Uso do solo e cobertura vegetal	Áreas alagáveis/Área urbana/Área industrial /Afloramento rocha/Solo exposto/ Extrativismo mineral	Cultivo/Eucalipto	Pastagem/ Vegetação herbácea e arbustiva/Fragmento de vegetação arbórea/
Declividade	> 40%	11-40%	0-10%
Geomorfologia	Encostas de Talus/Borda dissecada de planalto	Rampas de colúvio/Patamar dissecado em colinas e vales estruturais/Planície flúvio lacruste deltaica	Colinas/Planície colúvio-aluvial/ Planície aluvionar de cobertura/
Tipo de solo	Neossolo flúvico	Associação entre cambissolo e argissolo vermelho-amarelo distrófico/Associação entre argissolo vermelho-amarelo distrófico, cambissolo e Argissolo vermelho distrófico/Plintossolo/ Gleissolo/Organossolo/ Neossolo	Associação entre cambissolo e neossolo litólico/Planossolo
Favorabilidade Capivara		Baixa e Moderada favorabilidade	Alta e Altíssima favorabilidade

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. ESTUDO DA GEODIVERSIDADE AMBIENTAL PARA O MUNICÍPIO DE SEROPÉDICA, RJ

As assinaturas realizadas nos mapas representativos das variáveis contidas neste estudo revelaram que o município de Seropédica possui área de pastagem equivalente a 7 828 há (27%), o cultivo ocupa uma área de 4 229 ha (16%) a área com fragmento de vegetação arbóreo corresponde a 2 885 ha (11%). O solo predominante e o planossolo (42%) seguido do argissolo vermelho-amarelo distrófico (27%). E as feições geomorfológicas predominantes são as planícies colúvio-aluvionar (32%) e aluvionar de cobertura (21%) que fazem parte do sistema geomorfológico definido como Baixada de Sepetiba e também uma área de borda dissecada de planalto estrutural (13%) que faz parte do sistema

de Encosta da Serra do Mar. A declividade de 0-2,5% ocupa 52% de todo o município indicando a característica de baixada.

3.2. MODELAGEM GEOAMBIENTAL PARA FAVORABILIDADE DE OCORRÊNCIA DE *AMBLIOMMA SCULPTUM* NO MUNICÍPIO DE SEROPÉDICA, RJ

O mapeamento classificatório das áreas com favorabilidade para a ocorrência de *A. sculptum* identificou que aproximadamente 87% do município de Seropédica foi favorável ou muito favorável para a ocorrência da espécie (Tabela 3).

Tabela 3. Valores obtidos pela assinatura ambiental indicando os graus de favorabilidade e as categorias mais relevantes relacionadas a ocorrência de *Amblyomma sculptum* no município de Seropédica, RJ.

Favorabilidade	Variáveis					
	Área em ha (%)	Declividade (%)	Solo (%)	Geomorfologia (%)	Favorabilidade ocorrência de capivaras	Uso do solo e cobertura vegetal
Baixa	2 949 (13%)	20-40 m (43%)	Planossolo (31%)	Borda dissecada de planalto estrutural (48%)	Baixa favorabilidade (58%)	Extrativismo mineral (44%)
Favorável	10 052 (46%)	0-2,5 m (43%)	Argissolo Vermelho-Amarelo	Planície colúvio-aluvionar (25%)	Moderada favorabilidade (34%)	Cultivo e propriedades rurais (31%)
			Distrófico (29%)	Borda dissecada de planalto estrutural (19%)	Alta favorabilidade (27%)	Pastagem (20%)
			Planossolo (28%)			
Muito	8 878 (41%)	0-2,5 m (61%)	Planossolo (54%)	Planície colúvio-aluvionar (54%)	Alta favorabilidade (67%) Altíssima favorabilidade (23%)	Pastagem (57%) Vegetação herbácea-arbustiva (20%)

A representação da favorabilidade de ocorrência de *A. sculptum* e apresentada na Figura 1.

Figura 1. Representação da favorabilidade de ocorrência de *Amblyomma sculptum* no município de Seropédica, RJ.

As áreas com baixa favorabilidade se localizaram principalmente em locais com extrativismo mineral, intensa movimentação de caminhões, pouca vegetação, alta declividade e baixa favorabilidade para a ocorrência de capivaras. Embora *A. sculptum* seja um carrapato frequentemente coletado em áreas antropizadas, e também generalista quanto ao hospedeiro, algumas exigências para seu ciclo de vida são necessárias, ou seja, no presente trabalho as áreas identificadas como de baixa favorabilidade não apresentam vegetação suficiente para a manutenção dos estádios de vida dos carrapatos e também não há possibilidade da presença de hospedeiros, características indicadas por Szabo et al. (2009) e Veronez et al. (2010) como importantes para a presença de carrapatos numa determinada área.

Já as áreas favoráveis para a ocorrência de carrapato foram indicadas em locais de pastagem e propriedades agrícolas com alta, ou altíssima favorabilidade de ocorrência de capivaras. Essas áreas possivelmente podem manter populações de carrapatos, pois segundo Labruna et al. (2001) a presença de pastagem é uma variável importante para a manutenção da população de *A. sculptum*. E hospedeiros como equinos, bovinos e capivaras podem frequentar o local. De acordo com os achados de Cançado et al. (2008) e Szabo et al. (2009) os animais citados acima são hospedeiros potenciais para aquela espécie de carrapato. As áreas de cultivo também foram indicadas como favoráveis. Nestes locais pode ocorrer a presença de capivaras, que podem carrear carrapatos. Entretanto, segundo Souza et al. (2009) e Queirogas et al. (2012) sem a frequência dos hospedeiros, a população de carrapatos também não se estabeleceria.

As áreas muito favoráveis para a ocorrência de carrapatos localizam-se, principalmente, em locais com pastagem e alta ou altíssima favorabilidade de ocorrência de capivaras. A verificação de que áreas de pastagem mal manejadas e altamente favorável para a ocorrência de carrapatos foi relatada por Labruna et al. (2001) e Silveira e Fonseca (2013). E o município de Seropédica possui uma grande área de pastagem em seu território, essa pastagem é ocupada por bovinos e equinos (IBGE, 2006).

A categoria de vegetação herbácea arbustiva também teve destacada importância para a ocorrência de carrapatos. A assinatura deste tipo de vegetação foi contrastada com a favorabilidade de capivaras (SILVEIRA, 2014), pois verificou-se que 65% dela está em áreas com alta ou altíssima favorabilidade para a ocorrência de capivaras, ou seja, tem-se neste tipo de cobertura vegetal, assim como nas áreas com gramínea alta ou pastagem mal manejada, além da presença de hospedeiro, a formação vegetal que forma um tampão absorvendo a radiação solar durante o dia, reduzindo a perda de calor durante a noite e mantendo a umidade relativa. Assim, atuam diretamente no desenvolvimento e

sobrevivência dos estádios de vida livre e regulam a disponibilidade de estádios evolutivos nos diferentes ambientes (SONENSHINE, 1993).

Uma variável importante citada por Bunnell et al. (2003) para a ocorrência de *I. ricinus* e a distância de florestas e corpos d'água. No presente trabalho não utilizamos essas variáveis.

Mas elas estão intimamente relacionadas a favorabilidade de capivaras. A capivara é hospedeiro primário de *A. sculptum*, e já foi confirmado que esta espécie de hospedeiro mantém o carrapato no município de Seropédica (Silveira; Fonseca, 2013). Em locais próximos às áreas de mata e/ou capoeira e também cursos d'água, onde há presença de capivaras, há um grande número de carrapatos. A observação de que áreas de capoeira, vegetação densa e áreas de ecótonos são favoráveis para a ocorrência de carrapatos, também foi verificada por Ferreira (2006), Estrada-Pena et al. (2004) e Vanwambeke et al. (2010).

De acordo com os achados de Pedro et al. (2016), planossolo e o tipo de solo que mais favorece a ocorrência de carrapatos *A. sculptum* adultos no município de Seropédica, pois, segundo os autores, este tipo de solo permite que o microclima próximo à superfície permaneça mais úmido, o que facilita aos carrapatos manterem a hidratação. Ainda segundo Bunnell et al. (2003), a espécie de carrapato *I. ricinus*, nos Estados Unidos, tem associação positiva com solo arenoso ou de alta granulometria. No presente trabalho, verifica-se que as áreas com alta favorabilidade de ocorrência de *A. sculptum* estão em solo classificado como planossolo, este tipo de solo é caracterizado como arenoso, concordando com os dados apresentados para *I. ricinus*. Vale destacar que a classificação pouco favorável também é caracterizada por solo planossolo, mas a combinação de todas as variáveis daquela classe não favorece o desenvolvimento do carrapato. São vários os fatores que contribuem para o desenvolvimento e estabelecimento de uma população e não apenas um fator isolado (ILLOLDI-RANGEL et al., 2012).

O modelo indicou que o município de Seropédica tem grande favorabilidade para a ocorrência de carrapatos. É importante destacar que o município está num processo acelerado de expansão urbana, com incentivo à industrialização do município e de municípios vizinhos como Itaguaí e Paracambi, levando a um aumento populacional em Seropédica. Normalmente, o aumento da população se dá em áreas periféricas, onde podem ocorrer diversos problemas com o aumento de carrapatos. Em Piracicabas, a área de maior risco de infestação por carrapatos são as áreas periféricas do município, no entorno da área urbana (FERREIRA, 2006). Vanwambeke et al. (2010) também observou que nas áreas rurais da Letônia, onde a população possui escolaridade de até 4 anos, o risco de TBE (Encefalite

Transmitida por Carrapatos) foi maior. Dantas-Torres et al (2012) verificaram que fragmentos florestais proporcionam um ambiente favorável para carrapatos e pequenos mamíferos, que são altamente expostas a rickettsias. Também indicam que fragmentos florestais em áreas rurais são normalmente associados com maior diversidade de pequenos mamíferos, assim como taxas de densidade de carrapatos mais elevados.

Ha uma relação entre a presença de hospedeiros e carrapatos, essa relação ja foi relatada por Szabo et al. (2007) e Veronez et al. (2010) no bioma do cerrado e por Szabo et al. (2009) na Mata Atlântica. Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2019) três casos de febre maculosa foram confirmados no município de Seropédica, sendo 2 deles no ano de 2007 e 1 no ano de 2017. Embora não seja possível identificar em qual ambiente houve a infecção, ou se os casos foram autóctones, há necessidade de monitoramento constante da ocorrência de capivaras, importante hospedeiro de *A. sculptum* e hospedeiro amplificador da bactéria *R. rickettsii* agente etiológico da FMB.

A área onde se localiza o DCMUN está localizada numa região com alta favorabilidade de ocorrência de carrapatos, neste local a presença constante de capivaras, além de cavalos. Silveira e Fonseca (2013) coletaram uma grande quantidade de carrapatos *A. sculptum* no DCMun. Esta área possui características que favorecem a presença de carrapatos desta espécie, como a formação de mosaicos de paisagens, geralmente com gramínea alta e/ou outras herbáceas e arbustos, e proximidade com área de capoeira e/ou fragmento de mata secundária e/ou reflorestamento. Esses ambientes, além de fornecerem um microclima adequado para o desenvolvimento de *A. sculptum*, também fornecem abrigo e alimento para os hospedeiros, como equinos, bovinos e principalmente capivaras, registrados nestes locais durante as coletas.

Importante salientar o que os militares, deste e de outros batalhões, utilizam a área para atividades de treinamento militar, o que deixa essa população exposta ao contato direto com os carrapatos. Ainda segundo Silveira e Fonseca (2013) os estádios imaturos, mais generalistas quanto aos hospedeiros, estão presentes principalmente nos meses mais secos do ano. Uma amostra de larvas do carrapato *Amblyomma* positiva para a presença de bactérias do gênero *Rickettsia* spp. foi encontrada no DCMUN na estação do outono, numa área de bambuzal (SILVEIRA; FONSECA, 2013), enfatizando a necessidade de monitoramento da população que frequenta o local e exigindo, assim, maior cuidado dos frequentadores deste local, nesta época do ano.

Com a análise geoambiental foi possível concluir que o município de Seropédica, RJ, tem ampla área de favorabilidade de ocorrência de carrapatos. Tal informação poderá contribuir para um amplo

espectro de ações e intervenções antrópicas referentes ao habitat e ao perfil de comportamento da referida espécie. Então, o presente trabalho pode contribuir para mostrar que a utilização de metodologias que envolvem modelos geoambientais podem ajudar no monitoramento da ocorrência de parasitos e hospedeiros. Com estes modelos, os recursos financeiros investidos para o controle e erradicação de doenças podem ser devidamente alocados, sem o desperdício de dinheiro e força de trabalho.

Agradecimentos: Pelo suporte financeiro, do Curso de Pós-graduação em Ciências Veterinárias - UFRRJ, da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo a Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro - FAPERJ, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq.

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] BRADLEY, C.A.; ALTIZER, S. Urbanization and the ecology of wildlife diseases. *Trends in Ecology & Evolution*, v. 22, p. 95-102, 2007.
- [2] BRASIL. Ministério da Saúde. Febre Maculosa - Casos confirmados notificados no sistema de informação de agravos de notificação – Sinan. Disponível em:
<http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/tabnet/dh?sinan/fmaculosa/bases/febremaculosabr.def>. Acesso em: 29 abr. 2019.
- [3] BUNNEL, J.E.; PRICE, S.D.; DAS, A.; SHIELDS, T.M.; GLASS, G.E. Geographic information systems and spatial of adult *Ixodes scapularis* (Acari: Ixodidae) in the middle Atlantic Region of the U.S.A. *Journal of Medical Entomology*, v. 40, n. 4, p. 570-576, 2003.
- [4] CANÇADO, P.H.D.; PIRANDA, E.M.; MOURÃO, G.M.; FACCINI, J.L.H. Spatial distribution and impact of cattle-raising on ticks in the Pantanal region of Brazil by using the CO2 tick trap. *Parasitology Research*, v. 103, n. 2, p. 371-377, 2008.
- [5] DANTAS-TORRES, F.; ALÉSSIO, F.M.; SIQUEIRA, D.B.; MAUFFREY, J.F.; MARVULO, M.F.V.; MARTINS, T.F.; MORAES-FILHO, J.; CAMARGO, M.C.G.O.; D'AURIA, S.R.N.; LABRUNA, M.B.; SILVA, J.C.R. Exposure of small mammals to ticks and rickettsiae in Atlantic Forest patches in the metropolitan area of Recife, northeastern Brazil. *Parasitology*, v. 139, n. 1, p. 83-91, 2012.
- [6] DIAS, E.M.P.S. Modelo de apoio à decisão multicritério para seleção de fornecedores de azeite. 2015, 56 f. Dissertação (Mestrado em Modelação, Análise de Dados e Sistemas de Apoio à Decisão) – Faculdade de Economia, Universidade do Porto, Porto, 2015.
- [7] ESTRADA-PEÑA, A. Diluting the dilution effect: a spatial Lyme model provides evidence for the importance of habitat fragmentation with regard to the risk of infection. *Geospatial Health*, v. 3, p. 143-155, 2009.
- [8] ESTRADA-PEÑA, A.; GUGLIELMONE, A.A.; MANGOLD, A.J. The distribution and ecological 'preferences' of the tick *Amblyomma sculptum* (Acari: Ixodidae), na ectoparasite of humans and other mammals in the Americas. *Annals of Tropical Medicine & Parasitology*, v. 98, n. 3, p. 283-292, 2004.
- [9] ESTRADA-PEÑA, A. The relationships between habitat topology, critical scales of connectivity and tick abundance *Ixodes ricinus* in a heterogeneous landscape in northern Spain. *Ecography*, v. 26, n. 5, p. 661-671, 2003.
- [10] FERREIRA, P.M. Uso do geoprocessamento na identificação de áreas de risco para a infestação humana pelo *Amblyomma sculptum* (Acari: Ixodidae) no município de Piracicaba, SP. 2006, 94 f. Tese (Doutorado em Medicina Veterinária) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006.
- [11] FRÖDELL, M. Criteria for achieving efficient contractor-supplier relations. *Engineering, Construction and Architectural Management*, v. 18, p. 381-393, 2011.

- [12] GUGLIELMONE, A.A.; ROBBINS, R.G.; APANASKEVICH, D.A.; PETNEY, T.N.; ESTRADA-PEÑA, A.; HORAK, I.G.; SHAO, R.; BARKER S. The Argasidae, Ixodidae and Nuttalliellidae (Acari: Ixodidae) of the world: a list of valid species names. *Zootaxa*, v. 2528, p. 1-28, 2010.
- [13] ILLOLDI-RANGEL, P.; RIVALDI, C.L.; SISSEL, B.; FRYXELL, R.T.; GORDILLOPÉREZ, G.; RODRÍGUEZ-MORENO, A.; WILLIAMSON, P.; MONTIEL-PARRA, G.; SÁNCHEZ-CORDERO, V.; SARKAR, S. Species distribution models and ecological suitability analysis for potential tick vectors of Lyme disease in Mexico. *Journal Of Tropical Medicine*, v. 2012, n. 2012, p. 1-10, 2012.
- [14] INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Base de informações por setor censitário. Censo demográfico 2010. Resultados do universo, Rio de Janeiro. IBGE, Rio de Janeiro, 2010.
- [15] INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Censo agropecuário. Disponível em: <http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=330555&idtema=3&search=rio-dejaneiro|seropedica|censoagropecuario2006> Acesso em 14 de out. 2013.
- [16] JAMES, M.C.; BOWMAN, A.S.; FORBES, K.J.; LEWIS, F.; MCLEOD, J.E.; GILBERT, L. Environmental determinants of *Ixodes ricinus* ticks and the incidence of *Borrelia burgdorferi* sensu lato, the agent of Lyme borreliosis, in Scotland. *Parasitology*, v. 140, n. 2, p. 237–246, 2013.
- [17] LABRUNA, M.B.; KERBER C.E.; FERREIRA, F.; FACCINI, J.L.H.; WAAL, D.T.; GENNARI, S.M. Risk factors to ticks infestations and their occurrence on horses in the state of São Paulo, Brazil. *Veterinary Parasitology*, v. 97, n. 1, p. 1-14, 2001.
- [18] LAGEOP- Laboratório de Geoprocessamento/UFRJ. Vista Saga 2007. Disponível em: <http://www.lageop.ufrj.br/downloads.php> Acesso em: 30 jun 2013.
- [19] LAMBIN, E.F.; TRAN, A.; VANWAMBEKE, S.O.; LINARD, C.; SOTI, V. Pathogenic landscapes: Interactions between land, people, disease vectors, and their animal hosts. *International Journal of Health Geographics*, v. 9, n. 54, p. 54-67, 2010.
- [20] LIMA, J.P.C.; SANTOS, L.A.F. Floresta nacional Mário Xavier uma proposta de planejamento e de gestão ambiental – justificativa. *Floresta e Ambiente*, v. 5, n. 1, p. 216-218, 1998.
- [21] MALCZEWSKI, J. GIS-based land-use suitability analysis: a critical overview. *Progress in Planning*, v. 62, n. 1, p. 3-65, 2004.
- [22] MARQUES, E.D.; TUBBS-FILHO, D.; GOMES, O.V.O.; SILVA-FILHO, E.V. Impactos das cavas de extração de areia sobre a química das águas subterrâneas na região da Piranema, bacia sedimentar de Sepetiba, Rio de Janeiro. In: TUBBS-FILHO, D; ANTUNES, J.C.O.; VETTORAZZI, J.S. Bacia hidrográfica dos rios Guandu, da Guarda e Guandu Mirim. Experiências para a gestão dos recursos hídricos. Rio de Janeiro: INEA, 2012, p. 215-237.
- [23] MATTOS, C.L.V.; SILVA, M.A.R.; OLIVEIRA, M.N. Boletim agrometeorológico – UFRRJ – 1997. *Floresta e Ambiente*, v. 6, n.1, p. 149-158, 1999.

- [24] PADILHA, D.G.; TREVISAN, M.L.; CRUZ, J.C. Sensibilidade do modelo de fragilidades ambientais à ponderação multicriterial: aspectos físicos da bacia hidrográfica do Alto Uruguai. *Floresta*, v. 44, n. 3, p. 535-548, 2014.
- [25] PEDRO, T.B. Estudo dos fatores climáticos e ambientais associados à ocorrência de carrapatos *Amblyomma sculptum* (Acari: Ixodidae) adultos na mesorregião Metropolitana do Rio de Janeiro. 2015, 40 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Veterinárias) – Instituto de Veterinária, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2015.
- [26] PEDRO, T.B.; SILVEIRA, A.K.; TASSINARI, W.S. Landscape features associated to the occurrence of *Amblyomma sculptum* ticks: an application of zero inflated regression models. *Revista Brasileira de Medicina Veterinária*, v. 38, supl. 3, p. 80-84, 2016.
- [27] PETERSON, A.T. Uses and requirements of ecological niche models and related distributional models. *Biodiversity Informatics*, v. 3, n. 1, p. 59-72, 2006.
- [28] QUEIROGAS, V.L.; DEL-CLARO, K.; NASCIMENTO, A.R.T.; SZABÓ, M.P.J. Capybaras and ticks in the urban areas of Uberlândia, Minas Gerais, Brazil: ecological aspects for the epidemiology of tick-borne diseases. *Experimental and Applied Acarology*, v. 57, n. 1, p. 75-82, 2012.
- [29] RANDOLPH, S.E. Ticks ecology: processes and patterns behind the epidemiological risk posed by ixodid ticks as vectors. *Parasitology*, v. 129, p. 37-65, 2004.
- [30] ROSÀ, R; PUGLIESE, A. Effects of tick population dynamics and host densities on the persistence of tick-borne infections. *Mathematical Biosciences*, v. 208, p. 216-240, 2007.
- [31] SCHIMIDT, K.A.; OSTFELD, R.S. Biodiversity and the dilution effect in disease ecology. *Ecology*, v. 82, p. 609-619, 2001.
- [32] SILVEIRA, A.K. Distribuição espacial e flutuação sazonal de carrapatos e modelo geoambiental sobre a favorabilidade de ocorrência de *Hydrochoerus hydrochaeris* e *Amblyomma cajennense*. 2014, 76 f. Tese (Doutorado em Ciências Veterinárias) – Instituto de Veterinária, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2014.
- [33] SILVEIRA, A.K.; FONSECA, A.H. Caracterização de ambientes com potencial para ocorrência de carrapatos transmissores de agentes patogênicos para humanos. *Boletim do Parque Nacional do Itatiaia, Itatiaia*, v. 13, nov. 2011. Disponível em:
http://www.icmbio.gov.br/parnaitatiaia/images/Boletins_de_Pesquisa/bpni_v13.pdf Acesso em: 25 jun. 2013.
- [34] SILVEIRA, A.K.; FONSECA, A.H. Distribuição, diversidade e sazonalidade de carrapatos em ambientes institucionais com diferentes graus de intervenção humana no estado do Rio de Janeiro, Brasil. *Revista Brasileira de Medicina Veterinária*, v. 35 (supl. 2), p. 1-12, 2013.
- [35] SONENSHINE, D.E. *Biology of ticks*. New York: Oxford University Press, 1993, v. 2, 465 p.
- [36] SOUZA, C.E.; MORAES-FILHO, J.; OGRZEWALSKA, M.; UCHOA, F.C.; HORTA, M.C.; SOUZA, S.S.L.; BORBA, R.C.M.; LABRUNA, M.B. Experimental infection of capybaras *Hydrochoerus hydrochaeris* by

Rickettsia rickettsii and evaluation of the transmission of the infection to ticks *Amblyomma sculptum*. *Veterinary Parasitology*, v. 161, n. 1-2, p. 116-121, 2009.

[37] SZABÓ, M.P.J.; CASTRO, M.B.; RAMOS, H.G.C.; GARCIA, M.V.; CASTAGNOLLI, K.C.; PINTER, A.; VERONEZ, V.A.; MAGALHÃES, G.M.; DUARTE, J.M.B.; LABRUNA, M.B. Species diversity and seasonality of free-living ticks (Acari: Ixodidae) in the natural habitat of wild Marsh deer (*Blastocerus dichotomus*) in Southeastern Brazil. *Veterinary Parasitology*, v. 143, p. 147-154, 2007.

[38] SZABÓ, M.P.J.; LABRUNA, M.B.; GARCIA, M.V.; PINTER, A.; CASTAGNOLLI, K.C.; PACHECO, R.C.; CASTRO, M.B.; VERONEZ, V.A.; MAGALHÃES, G.M.; VOGLIOTTI, A.; DUARTE, J.M.B. Ecological aspects of the free-living ticks (Acari: Ixodidae) on animal trails within Atlantic rainforest in south-eastern Brazil. *Annals of Tropical Medicine and Parasitology*, v. 103, n. 1, p. 57-72, 2009.

[39] VANWAMBEKE, S.O.; SUMILO, D.; BORMANE, A.; LAMBIN, E.F.; RANDOLPH, S.E. Landscape predictors of tick-borne encephalitis in Latvia: land cover, land use, and land ownership. *Vector-Borne and Zoonotic Diseases*, v. 10, n. 5, p. 497-506, 2010.

[40] VELOSO, H.P.; RANGEL-FILHO, A.L.R.; LIMA, J.C.A. *Classificação da Vegetação Brasileira, Adaptada a um Sistema Universal*. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1991, 124 p.

[41] VERONEZ, V.A.; FREITAS, V.B.; OLEGÁRIO, M.M.M.; CARVALHO, W.M.; PASCOLI, G.V.T.; THORGA, K.; GARCIA, M.V.; SZABÓ, M.P.J. Ticks (Acari: Ixodidae) within various phytophysiognomies of a Cerrado reserve in Uberlândia, Minas Gerais, Brazil. *Experimental and Applied Acarology*, v. 50, n. 2, p. 169-179, 2010.

[42] XAVIER-DA-SILVA, J. *Geoprocessamento para análise ambiental*. Rio de Janeiro: J. Xavier da Silva, 2001. 228 p.

[43] XAVIER-DA-SILVA, J.; PERSSON, V.G.; LORINI, M.L.; BERGAMO, R.B.A.; RIBEIRO, M.F.; COSTA, A.J.S.T.; IERVOLINO, P.; ABDO, O.E. Índices de Geodiversidade: aplicações de SIG em estudos de biodiversidade. In: GARAY, I.; DIAS, B. *Conservação da Biodiversidade em Ecossistemas Tropicais*. Petrópolis: Vozes, 2001, p. 299-316

Capítulo 4

10.37423/210604392

COMPORTAMENTO DE CALOPSITAS (NYMPHICUS HOLLANDICUS) MANTIDAS EM CATIVEIRO: UMA OBSERVAÇÃO PRELIMINAR

Inaê Carolina Sfalcin

*Universidade Regional Integrada do Alto
Uruguai e das Missões*

Resumo: A preocupação com o bem-estar de aves mantidas em cativeiro vem crescendo no meio científico. As pesquisas etológicas com psitacídeos cativos buscam relatar as mudanças comportamentais desses animais fora de seu ambiente natural, identificando possíveis anormalidades que possam ser corrigidas a fim de contribuir com o desenvolvimento de ambientes melhorados e com a promoção de saúde e bem-estar à essas aves. Neste contexto, este trabalho buscou realizar uma investigação exploratória preliminar do comportamento de um casal de *Nymphicus hollandicus* mantidos em cativeiro doméstico. A metodologia utilizada foi do animal-focal e registro contínuo, por meio de filmagem, obtendo a duração dos estados comportamentais avaliados, quais sejam: alimentação, descanso, eliminatório, hidratação, movimentação, manutenção, social e vocalização. Utilizou-se um etograma adaptado às condições do experimento. Um esforço amostral total de 12 horas de observação foi atingido ao longo de dois dias, distribuído nos períodos da manhã, tarde e anoitecer. Os dados finais foram relativos à média de duração dos comportamentos de ambas aves para o período observado. Obteve-se as taxas de: descanso (37%); alimentação (26%); vocalização (12%); movimentação (11%); manutenção (8%); social (4%); hidratação (1%) e eliminatório (1%). A interação social foi pouco manifestada, embora os psitacídeos sejam indivíduos muito sociáveis. A literatura relata resultados semelhantes para os outros comportamentos avaliados, sugerindo que a falta de estímulos no cativeiro tende a deixar as aves ociosas, por isso passam a maior parte do tempo inativas. Também reproduzem com maior frequência os comportamentos alimentares como forma de distração quando estão entediadas, e vocalizam em busca de interação. Ainda, a pouca movimentação pode ser ocasionada pela falta de possibilidades de exploração do meio, que não é enriquecido. Portanto, os resultados sugerem que as aves encontram-se em uma condição de ociosidade, uma vez que a manifestação dos comportamentos indicou uma preferência ao ócio do que à atividade. O descanso obteve a maior taxa para o período observado, seguido da alimentação, enquanto os comportamentos ativos de manutenção da plumagem, movimentação, interação social e vocalização ficaram em segundo plano. Estudos mais detalhados, com uma quantidade maior de aves em um período mais prolongado de avaliação, são necessários para elucidar os estados comportamentais em longo prazo, além da ocorrência do ócio exagerado no cativeiro, embora tenha ficado evidente a necessidade de um ambiente melhorado que ofereça possibilidades de ocupação dessas aves e a manifestação de comportamentos relativos ao seu bem-estar.

Palavras-chave: Aves cativas. Bem-estar animal. Etologia. Ociosidade.

1. INTRODUÇÃO

A Calopsita (*Nymphicus hollandicus*) é uma ave australiana, pertencente à ordem Psittaciforme, à família Psittacidae e à subfamília Cacatuidae. Os membros desta ordem incluem araras, papagaios, periquitos, cacatuas e caturras/calopsitas (CARVALHO *et al.*, 2015). Apesar da grande variação do tamanho e da coloração das penas, as aves desta ordem apresentam características morfológicas muito marcantes. O bico é adaptado para quebrar sementes duras, possuindo formato curto, com a base larga e o maxilar curvado. Os pés são zigodáctilos, com o segundo e o terceiro dedo voltados para frente e o primeiro e quarto para trás. Estas características permitem que sejam hábeis em escalar árvores e que possuam grande destreza na manipulação dos alimentos (GRESPLAN; RASO, 2014).

Dentre todas as famílias de aves, a família *Psittacidae* possui o maior número de espécies ameaçadas de extinção (26% de cerca de 350 espécies) (ALMEIDA, 2016), e é no Brasil que se encontra o maior número de representantes da família: são 87 espécies de psitacídeos listadas para o país, segundo o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO, 2015).

Estas aves são muito populares devido sua inteligência, habilidade, além da facilidade de manutenção da espécie em pequenos ambientes (DUGLOZ *et al.*, 2015). No Brasil, a calopsita é considerada ave doméstica (de estimação) pela Portaria nº 93, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, de 7 de julho de 1998 (IBAMA, 1998). No entanto, embora a criação de psitacídeos em cativeiro seja liberada no território nacional, a mesma pode trazer prejuízos à ave.

Os psitacídeos possuem alta capacidade cognitiva e necessitam de estímulos para manter o bom funcionamento de suas funções nervosas (ALMEIDA, 2016). Desta forma, a ausência de estímulos ambientais adequados gerados pelo confinamento pode predispor esses animais a quadros característicos de estresse, decorrente do tédio e frustração, deixando-os suscetíveis ao desencadeamento de doenças (DUGLOSZ *et al.*, 2015; HAWKINS, 2010). Segundo Carvalho *et al.* (2015), quando o animal é impedido de realizar atividades em que é altamente motivado em fazer, passa a ocorrer a estereotipia, um estado comportamental decorrente do estresse do cativeiro.

Neste sentido, pesquisas etológicas buscam relatar as mudanças comportamentais desses animais fora de seu ambiente natural. Esta análise do comportamento do animal é um instrumento importante para a avaliação dos padrões e respostas comportamentais, permitindo informações relevantes das adaptações e funções biológicas dos animais estudados de forma não invasiva (PEREIRA-JÚNIOR *et al.*, 2013).

Os dados obtidos com estas observações podem orientar corretamente o manejo dessas aves em cativeiro (MURPHYA; BRAUNB; MILLAM, 2011), fornecendo condições apropriadas de manutenção e bem-estar às mesmas (QUEIROZ *et. al*, 2014). Tais pesquisas também visam a colaborar no desenvolvimento de ambientes projetados que atendam às necessidades das aves (OLIVEIRA; SOUZA; SILVA, 2014) por meio de técnicas de enriquecimento ambiental. A implantação do enriquecimento ambiental em um cativeiro busca modificar o ambiente e aumentar a sua complexidade, estimulando comportamentos naturais exploratórios, alimentares, físicos e sensoriais (QUEIROZ *et al.*, 2014).

Embora seja bem conhecida a importância das pesquisas etológicas, estudos comportamentais com calopsitas (*Nymphicus hollandicus*) em cativeiro são escassos (CARVALHO *et. al*, 2015). Diante disso, esse trabalho buscou realizar investigação exploratória preliminar do comportamento de um casal de *N. hollandicus* mantidos em cativeiro doméstico, em São Miguel das Missões - RS.

2. METODOLOGIA

O estudo foi realizado *in situ* no viveiro onde as aves são mantidas, sob cuidados humanos, no município de São Miguel das Missões, Rio Grande do Sul, Brasil. Trata-se de um viveiro de dimensões 80cm X 1m X 1,20m (LxAxC), revestido por tela de arame na base e nas laterais, e coberto por telhas de fibrocimento. Suspenso a 60 cm do chão, o viveiro encontra-se em um quintal à céu aberto, em propriedade particular.

Foram objetos deste estudo um casal de calopsitas (Figura 1), possuindo a fêmea aproximadamente 6 anos de idade, enquanto que se desconhece a idade do macho. Ambos são alimentados com ração comercial constituída de farelos, grãos, sementes e outros compostos. Além das aves, dentro da gaiola há duas tigelas para alimento, uma tigela de água e cinco gravetos de madeira em alturas variadas, os quais servem de poleiro.

Para as observações comportamentais foi utilizado o método do animal focal, com registro instantâneo (YOUNG, 2003). Na amostragem focal observa-se apenas um indivíduo do grupo de cada vez, por um período específico de tempo e anota-se todos comportamentos desejados de cada categoria específica (ALTMANN, 1974). Os procedimentos de observação foram realizados ao longo de dois dias, por meio de filmagens com câmera digital DSLR, alocada a 2 m do viveiro sobre tripé. A filmagem foi utilizada para que a presença do observador não causasse influência no comportamento das aves.

Cada ave foi observada separadamente durante 3h/dia, nos mesmos horários, nos períodos da manhã, tarde e entardecer, totalizando 12 horas de esforço amostral. Foram avaliados comportamentos relativos à alimentação, descanso, eliminatório, hidratação, manutenção de penas, movimentação, vocalização e interação social entre as aves. Para isso, utilizou-se um etograma adaptado de Assis *et al.* (2016) e Victoria (2017), e uma planilha de registro (*Check Sheet*) para o registro contínuo dos estados comportamentais expressos pelas aves. A anotação dos comportamentos e sua duração foi feita a cada 12 minutos de observação, através das filmagens.

Figura 1: Calopsitas (*N. Hollandicus*) empoleiradas no viveiro. Aves utilizadas para o estudo comportamental, em São Miguel das Missões – RS. Fonte: A autora.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados finais foram relativos à média de duração dos comportamentos avaliados nas duas aves para o período observado, expressos em percentual (Figura 2). Durante o período experimental, as aves apresentaram maior repouso (37%) do que comportamentos relativos à atividade, como movimentação, manutenção e interação social (23%). Observou-se que, mais de um terço do tempo das aves foi investido no descanso. A falta de estímulos no cativeiro tende a deixar as aves ociosas, o

que as leva a passar maior parte do tempo inativas. Como consequência da falta de interação com o meio, a ave torna-se sedentária (BRIGIDA *et al.*, 2010).

Assim, o ócio exagerado das aves estudadas pode ser atribuído ao baixo enriquecimento ambiental do viveiro, o qual não fornece possibilidades de exploração do meio, deixando os animais entediados. Isso também é explicado pela pouca movimentação: apenas 11% do tempo foi dedicado ao deslocamento dentro do viveiro, incluindo chão e poleiros. Em um estudo com o psitacídeo *Amazona pretrei* (Papagaio-charão) (Prestes, 2000), o descanso também apareceu entre as maiores taxas de ocorrência.

Figura 2: Gráfico da duração dos estados comportamentais (%) avaliados em calopsitas mantidas em cativeiro doméstico, no município de São Miguel das Missões – RS.

O segundo estado comportamental de maior ocorrência no cativeiro foi a alimentação (26%). Embora psitacídeos gastem em média 67% do tempo no forrageio, dedicando apenas uma ínfima parcela ao descanso (BAUCK, 1998), os comportamentos alimentares podem ser reproduzidos com maior frequência no cativeiro quando as aves estão entediadas, como uma forma de distração. Field e Thomas (2000) relatam que os papagaios do zoológico de Edimburgo ficavam cerca de 90% do tempo se alimentando ou arrumando as próprias penas, antes da implantação de um programa de

enriquecimento ambiental. Sendo assim, por não apresentarem opções de atividades no cativeiro, estas aves passavam muito tempo expressando poucos e repetidos comportamentos (TELLES, 2010).

Se faz necessário atentar que, no cativeiro, as demandas energéticas de uma ave reduzem substancialmente em relação às suas necessidades em vida livre (FRANCISCO, 2012). O excesso na ingestão de alimento provoca acúmulo de tecido adiposo no abdômen e região pericloacal, fígado, tórax e em volta do pericárdio, o que pode ter consequências graves na reprodução e no desencadeamento de doenças (MACHADO; SAAD, 2000).

Psitacídeos são muito sociáveis e vivem em bando, estabelecendo relações de dominância dentro do grupo por meio da interação social (FAGUNDES, 2013). Mesmo assim, a interação entre as duas aves deste estudo foi pouco manifestada (4%). Essas interações de comportamentos sociais são particularmente importantes para aves monogâmicas e para aves formadoras de bandos como as calopsitas, além de serem indicadoras de bem-estar elevado em determinado ambiente (HIRSCHENHAUSER *et al.*, 2000). Desta maneira, o comportamento social das aves estudadas parece estar sofrendo uma influência negativa pelo estresse do cativeiro. De qualquer forma, uma análise criteriosa é necessária para maiores conclusões.

A vocalização, por sua vez, ocupou 12% do tempo observado. Da Silva, Campodonio e Leonardo (2015), também obtiveram resultado semelhante em seu estudo com calopsitas e periquitos mantidos em ambiente não enriquecido. Quando enjaulados e distanciados, os psitacídeos vocalizam em busca da interação com os demais da sua espécie ou do seu grupo social (Wiki Aves, 2020). A vocalização excessiva geralmente está relacionada com a busca por atenção e pelo instinto de coesão do grupo, mas pode ocorrer também por medos ou fobias (AFONSO, 2016).

A limpeza das penas costuma ser uma das atividades que mais ocupa o tempo de psitacídeos. Ela geralmente ocorre após o descanso, possivelmente para preparar o corpo para o voo ou outra atividade (BERGMAN; REINISCH, 2006; AFONSO, 2016). A manutenção da plumagem foi pouco expressiva neste estudo (8%). Por ser uma atividade relativa ao bem-estar das aves, sua baixa ocorrência pode ser um indicativo de problemas comportamentais. Hidratação (1%) e eliminatório (1%), por sua vez, foram os comportamentos menos expressos no estudo e estão relacionados à funções vitais normais. Em uma observação comportamental preliminar de *N. hollandicus* cativas, Brigida *et. al* (2010) também obtiveram os comportamentos de ingestão de água e eliminatório, bem como de manutenção, como os menos frequentes.

Foi observado, ainda, uma preferência das aves em ocupar os poleiros mais altos do viveiro, onde passaram boa parte do período do estudo repousando. As aves só desciam até a base do viveiro para se alimentar ou ingerir água. Queiroz et al. (2014) explica que isso é um indicativo de que a característica natural da espécie de sentir-se mais protegida em locais elevados esteve mantida enquanto no cativeiro, preferindo o solo apenas ao forrageio. Comportamentos análogos à estereotipia não foram visualizados durante o estudo.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos no estudo sugerem que as aves encontram-se em uma condição de ociosidade, uma vez que a manifestação dos comportamentos indicou uma preferência ao ócio do que à atividade. O descanso obteve a maior taxa para o período observado (63%), seguido da alimentação (26%), enquanto os comportamentos ativos de manutenção da plumagem, movimentação, interação social e vocalização ficaram em segundo plano.

Um estudo mais detalhado, com uma quantidade maior de aves em um período mais prolongado de avaliação, é necessário para elucidar a ocorrência de estresse no cativeiro e dos estados comportamentais em longo prazo, embora tenha ficado evidente a necessidade de um ambiente melhorado que ofereça possibilidades de ocupação dessas aves e a manifestação de comportamentos relativos ao seu bem-estar.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AFONSO, B.C. Influência da Alimentação no Bem-Estar de Papagaios (*Amazona Aestiva* Linnaeus, 1758) (Aves, Psittacidae) em Gaiolas. Tese de Doutorado. Universidade Federal do Espírito Santo. Alegre: 2016.
- ALMEIDA, A.C. Influência do enriquecimento ambiental em Araras Canindé (*Ara ararauna*). Universidade Federal do Paraná. Curitiba: 2016.
- ALTMANN, J. Observational Study of Behavior: Sampling Methods. *Behaviour*, Vol.49, No. 3/4. 1974.
- ASSIS, V.D.L. Enriquecimento ambiental no comportamento e no bem-estar de calopsitas (*Nymphicus hollandicus*). *Arq. Bras. Med. Vet. Zootec.* vol.68 no.3. Belo Horizonte: 2016.
- BAUCK, L. Psittacine Diets and Behavioural Enrichment. *Seminars in Avian and Exotic Pet Medicine*, v.7, n. 3, p. 135- 140, 1998.
- BERGMAN, L.; REINISCH, U. S. Comfort behavior and sleep. , In: LUESCHER, A. U. *Manual of parrot behavior*. Ames: Blackwell Publishing, 2006. cap. 7, p. 59-62.
- BRASIL. Portaria IBAMA nº 93, de 07 de Julho de 1998. IBAMA. Disponível em: <http://www.ibama.gov.br/fauna/legislacao/port_93_98.pdf> acesso em 18 nov 2018.
- BRIGIDA, D.J.; CORDEIRO, M.B.; VIEIRA, F.A.S.; COUTINHO, L.A.F.; MAESTÁ, S. Observação Comportamental de Calopsita (*Nymphicus Hollandicus*) em Ambiente Doméstico. VI Simpósio de Ciências da Unesp – Dracena; VII Encontro de Zootecnia – Unesp. Dracena: 2010. CARVALHO, T.S.G.; ZANGERONIMO, M.G.; SAAD, C.E.P.; ALVARENGA, R.R.; ASSIS, V.D.L.; PEREIRA, V.M.; SCALON, J.D.; SILVA, J.P. Comportamento de calopsita (*Nymphicus hollandicus*) sob duas temperaturas em cativeiro. *Animal Science and Technology and Inspection of Animal Products. Arq. Bras. Med. Vet. Zootec.* 67 (6). 2015. Doi: 10.1590/1678-4162-7892.
- CBRO. Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos. Lista das aves do Brasil. Disponível em <http://www.cbro.org.br/CBRO/listabr.htm>. Acesso em 28 de junho de 2021.
- DA SILVA, J.C.; CAMPODONIO, L.M.; LEONARDO, J.M.L.O. Análise do Comportamento dos Psitacídeos em Cativeiro e Implantação de Enriquecimento Ambiental. X EPCC – Encontro Internacional de Produção Científica. UniCesumar, n. 9, p. 4-8. 2015. ISBN 978-85-8084-996-7.
- DUGLOSZ, A.P; SANTIN, E; HAYASHI, R.M.; LOURENÇO, M.C.; SILVA, A.B. Prevalência de *Salmonella* sp. em calopsitas mantidas em cativeiro comercial. *Archives of Veterinary Science*, vol. 20, nº 2, p. 155 a 160. 2015.
- FAGUNDES, N. Síndrome do arrancamento de penas em psitacídeos: revisão de literatura. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Federal do Rio Grande do sul. Porto Alegre: 2012.
- FRANCISCO, L.R. Resposta reprodutiva de psitacídeos neotropicais em cativeiro à retirada de ovos e filhotes. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Paraná. Curitiba: 2012.

GRESPLAN, A.; RASO, T. F. Psittaciformes (araras, papagaios, periquitos, calopsitas e cacatuas). In: CUBAS, Z. S.; SILVA, J. C. R.; CATÃO-DIAS, J. L. Tratado de animais selvagens: medicina veterinária. 2. ed. São Paulo: Roca, 2014. v. 1, cap. 28, p. 550-589.

HAWKINS, P. The Welfare Implications of Housing Captive Wild and Domesticated Birds in Duncan IJH, Hawkins P (eds.) The Welfare of Domestic Fowl and Other Captive Birds, Springer Science, p.53- 57. 2010.

HIRSCHENHAUSER, K.; MOSTL, E.; WALLNER, B.; DITTAMI, J. e KOTRSCHAL, K. Endocrine and Behavioural Responses of Male Greylag Geese (*Anser anser*) to Pairbond Challenges during the Reproductive Season. *Ethology*. v.106, p. 63-77, 2000. MACHADO, P.A.R., SAAD, C.E.P. O futuro das rações para aves ornamentais e silvestres no Brasil. *Rev Sul America Ornitofilia*, v.3, p.37-40, 2000.

MURPHYA, S. M., BRAUNB J. V., MILLAM, J. R. Bathing behavior of captive Orange-winged Amazon parrots (*Amazona amazonica*). *Applied Animal Behaviour Science*, 132 (3-4), 200-210; 2011.

OLIVEIRA, H.S.; SOUZA, D.R.A; SILVA, M.N. Etograma do Carcará (*Caracara Plancus*, Miller, 1777) (Aves, Falconidae), em cativeiro. *Rev. etol.*, v. 13, n. 2, p. 1-9. São Paulo: 2014.

PEREIRA-JÚNIOR, E.R.; MELLO, H.E.S.; CIPRESTE, C.F. Avaliação comportamental de animais em cativeiro: estudo de caso do cachorro-do-matovinagre (*Speothos venaticus*, Lund 1842). *E-Scientia*, v.6, n.1, p.36-43, 2013.

PRESTES, N. P. Descrição e análise quantitativa do etograma de *Amazona pretrei* em cativeiro. *Ararajuba*, 8(1), 25-42. 2000.

QUEIROZ, B.C.; GENARO, G.; QUEIROZ, V.S.; TOKUMARU, R.S. Quantificação e descrição dos principais comportamentos de papagaios-chauá (*Amazona rhodocorytha*, Salvadori, 1890) cativos. *Rev. etol.*, vol.13, no.1, São Paulo: 2014

TELLES, L.F. Etologia e perfil de corticosterona nas excretas de maritacas (*Aratinga leucophthalma*) em cativeiro com arrancamento de penas psicogênico tratadas com haloperidol e enriquecimento ambiental. Dissertação de Mestrado. UFMG: Escola de Veterinária. Belo Horizonte, 2010.

VICTORIA, L.M. Avaliação de diferentes enriquecimentos ambientais para arara-canindé (*Ara ararauna* Linnaeus, 1758). Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis: 2017.

WIKI AVES. A Vocalização das Aves. 2015. Disponível em

https://www.wikiaves.com.br/wiki/a_vocalizacao_das_aves. Acesso em 28/06/2021.

YOUNG, R. Environmental enrichment for captive animals. Oxford: Blackwell Science, 2003. 228 p.

Capítulo 5

10.37423/210704416

LEVANTAMENTO DA POPULAÇÃO ACARINA (ACARI: PYROGLYPHIDAE) NOS COLETIVOS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE

LOIVA BORBA

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

HELENA SOUTO

Universidade de Pernambuco

XÊNIA ALVES

Universidade Federal de Pernambuco

DIVÂNIA OLIVEIRA

Universidade de Pernambuco

AURISTELA ALBUQUERQUE

Universidade Federal Rural de Pernambuco

UBIRANY FERREIRA

Universidade de Pernambuco

Resumo: Os ácaros possuem enorme diversidade de formas, cores e tamanhos estando presentes em quase todos os locais acessíveis ao homem inclusive nos coletivos. Podendo ser disseminadores de patogenias ao homem. Comprovadamente, os ácaros encontrados em poeira são produtores de alérgenos inalantes que acarretam o desenvolvimento de doenças relacionadas ao sistema respiratório. O objetivo desta pesquisa foi de determinar a população acarina presente nos coletivos da região metropolitana do Recife. Nos coletivos o material (poeira), foi coletado nos bancos, pegamão, maleiro, ductos de ar e metrô. Para que se realizasse a coleta foram utilizados sacos coletores de papel acoplados em aspirador de pó. Após a coleta procedeu-se a catação dos mesmos com o auxílio de lupa, pinça e estilete entomológico para que posteriormente fosse realizada a fixação em laminas (com gotas do liquido de Hoyer's, vedados com esmalte incolor e levado a estufa). Na etapa seguinte identificou-se os ácaros através de chaves taxonômicas como resultado foi evidenciado a presença de ácaros no material coletado com a predominância das seguintes espécies: *Cheyletus mallacencis*, *Dermatophagoides farinae*, *Blomia tropicallis*, *Dermatophagoides pterinyssus*.

Palavras chave: poeira, ácaro, *Blomia*, *Dermatophagoides*, *Cheyletus*.

1 INTRODUÇÃO

Na região Metropolitana do Recife a população humana está distribuída de forma desordenada, em áreas que não são adequadas ao convívio humano, fato esse que eleva a incidência de doenças das mais variáveis possíveis, dentre elas pode ser citada as de caráter respiratório (Flechtmann, 1986). Como conseqüências podem evidenciar desde um simples incômodo que proporciona uma fadiga ou mal-estar até o comprometimento do sistema imunológico o que favorece infecções bacterianas (Hughes, 1976). De acordo com Dutra et al. (2001) conhecimento dos alérgenos e o grau de exposição nos diferentes ambientes são fundamentais para o diagnóstico e tratamento das doenças alérgicas. Os ácaros compõem o largo filo dos artrópodes, subclasse Acari e classe Arachnida. Distinguem-se por apresentar tamanhos, cores e formatos variados (Flechtmann, 1986). Quanto às formas, normalmente são transparentes a semitransparentes com habitats e comportamentos diversificados (Hughes, 1976). Distinguem-se dos insetos de maneira geral, pela ausência de segmentação e por apresentarem 4 pares de patas no estágio adulto. A perda de segmentação caracteriza-os como sendo um dos artrópodes mais especializados e que muito se afastou na linha da evolução (Flechtmann, 1986). No mundo inteiro, pesquisadores dedicam-se ao desenvolvimento de trabalhos na tentativa de ajudar na medida do possível a sanar males por eles provocados, quando não minimizar suas ocorrências em determinados ambientes. No Brasil as espécies mais comuns detectadas são *Blomia tropicalis*, *Dermatophagoides pterinysus* (Galvão, 1986). Existe uma grande lacuna a ser preenchida com informações gerais destes organismos no estado de Pernambuco. Este trabalho oferece dados de uma região pouco explorada neste aspecto.

2 METODOLOGIA

A coleta do material (poeira) foi realizada em quatro empresas da RMR (METROREC, Transcol, RCR, 1002), num período compreendido entre outubro de 2005 a julho de 2006. Os coletivos pesquisados foram escolhidos ao acaso, abrangendo transportes exclusivos para funcionários da empresa, coletivos públicos e o metrô. A poeira foi coletada em locais pré-determinados (ductos de ar, bancos, pega-mão e maleiros), associou-se as coletas a entrevistas realizadas com funcionários visando estabelecer uma relação com os métodos de assepsia adotados pela empresa, possíveis doenças e medicações utilizadas pelos funcionários que usufruam dos coletivos. Para as coletas utilizou-se o aspirador de pó manual, da marca ARNO, acoplado com sacos de papel individualizados para cada coleta. Os referidos sacos foram etiquetados e em seguida, o material foi encaminhado ao Laboratório de Entomologia UFRPE (Universidade Federal Rural de Pernambuco), onde se processou as catações

com o auxílio de lupa, pinça e estiletes entomológicos. Procedeu-se a fixação das espécies acarinas com líquido de Hoyer's, sobrepondo à lâmina com lamínula. Posteriormente o material foi colocado em uma estufa com temperatura média de 40°C durante 48h. Na etapa seguinte, realizadas as identificações com o uso de chaves taxonômicas. As entrevistas realizadas durante as coletas foram analisadas para obter-se informações que foram confrontadas com a população acarina identificada.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram encontradas sete espécies, pertencentes a três gêneros, apresentando indivíduos predominantemente na fase adulta. Os ácaros não se desenvolvem somente em domicílios podendo aparecer também, em grandes concentrações nos coletivos. Podendo desenvolver-se em locais úmidos e freqüentados pelo homem (Flechtmann, 1986). Das quatro empresas analisadas foi evidenciada uma concentração mais significativa nos bancos e maleiros, sendo que *Blomia tropicallis* apresentou maior número de indivíduos (25%), seguida de *Blomia sp* (20%), *Dermatophagoides sp* (17,5%) *Cheyletus sp* (12,5%), *Dermatophagoides pteronyssus* (12,5%) *Dermatophagoides farinae* (7,5%), *Cheyletus mallacensis* (7,5%), e cerca de 7,5 das amostras não foram identificadas.

Crowther et al (2006), relata resultados semelhantes ao desta pesquisa, tendo encontrado o gênero *Dermatophagoides* na UK, em poeira domiciliar. Os coletivos da RMR podem apresentar condições favoráveis para que eles se proliferem, Arlian et al (1992) descreve um ambiente favorável a vida dos ácaros em locais úmidos, moradias humanas e locais onde há pouca ou nenhuma água para se beber. Voorhorst et al. (1964, 1967), demonstra que pacientes podem contrair asma e bronquites quando entram em contato com *D. pteronyssus*, espécie também encontrada nesta pesquisa. Galvão et al. (1986) relatou a existência no Recife *D. pteronyssus*, *B. tropicallis* e *C. mallacensis* e também a presença de outra espécie evidenciada pelo autor, em áreas circunvizinhas como em Natal e Maceió foi *D. farinae*. As entrevistas confrontam os resultados analisados, pois somente um funcionário da RCR, entre as quatro empresas analisadas relatou sinusite crônica, podendo não ter sido adquirida durante o exercício de sua função como motorista. Os ácaros possuem então, grande importância por se concentrar em todos os locais e possuir ampla distribuição no mundo (Keh, 1973).

4 CONCLUSÃO

As espécies dos gêneros *Blomia* e *Dermatophagoides* encontradas nesta pesquisa são comprovadamente causadores de doenças de caráter respiratório em humanos. Tais fatos servem de alertas para as empresas, funcionários e passageiros dos coletivos.

Os resultados indicam a necessidade de estender tais estudos nos coletivos de outras empresas com o intuito de se observar a presença de espécies que desencadeiam processos alérgicos em passageiros destes coletivos sensíveis aos alérgenos inalantes. Desta maneira, procedimentos preventivos poderão ser adotados nas empresas garantindo desta forma a diminuição das populações acarinas e possíveis agravos a saúde humana.

REFERÊNCIAS

- ARLIAN, L. G. 1992. Waterbalance and humidty requirements of house dust mites. J. MED. ENTOMOL. 16:15-35.
- ARLIAN, L. G. 2002. Arthropod allergens and human health. Annual review of entomology 47:395-433.
- Binotti, Raquel S et al. House dust mites in Brazil - an annotated bibliography. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz [online]. 2001, v. 96, n. 8 [Accessed 26 June 2021] , pp. 1177-1184. Available from: <<https://doi.org/10.1590/S0074-02762001000800027>>. Epub 08 Jan 2002. ISSN 1678-8060. <https://doi.org/10.1590/S0074-02762001000800027>.
- BISCHOFF, E. R. C.; FISCHER, A.; LIEBENBERG, B. 2005. Assessment of mites numbers: new methods of results. J. MED. ENTOMOL. 16:1-14.
- CROWTHER, D. T. WILKINSON, P. BUDDULPH, T. ORESZCYN & S. PRETLOVE. 2006. A simple model for predicting the effect of hygrothermal conditions on populations of house dust mite *Dermatophagoides pteronyssinus* (acarí: Pyroglyphidae). J. MED. ENTOMOL., 39:127-148.
- DUTRA, B. M. R. S.; FILHO, N. A. R. & ZAVADNIAK. 2001. Alérgenos inaláveis em Curitiba: uma revisão de sua relevância clínica. Res. bras. Alerg. Imunopatol. 24:189-195.
- EZEQUIEL O. S.; GAZELA, G. S.; AMORIM, M.; SERRA-FREIRE, M. N. 2001. Evaluation of the Acarofauna of the domiciliary ecosystem in Juiz de For a, state Minas Gerais, Brazil MEM. INST. OSWALDO CRUZ 96:911-916
- FLECHTMAMN, C. H. W. 1986. Ácaros em Produtos Armazenados e na Poeira Domiciliar. Escola Superior de agricultura Luiz Queiroz.
- FURUMIZO, R. T. 1975. geographical DISTRIBUTION OF HOUSE DUSTMITES (ACARINA:PYROGLYHIDAE) in Callifornia. Calif. Vect. Views 22:89-95.
- FURUMIZO, R. T. & THOMAS, V. 1977. Mites of house dust. J. TROP. MED. PUBLIC 8:411-12
- GALVÃO, A. B. & GUTTON, N. 1986. Ácaros em poeira domiciliar das capitais brasileiras e Ilha de Fernando de Noronha. MEM. INST. OSWALDO CRUZ 81:417-30
- HUBERT, J. Z.; MUNZBERGOVA, Z.; KUCEROVA, Z. & STEJSKAL, V. 2006 Comparison of communities of stored product mites in grain mass and grain residues in the Czech Republic. J. MED. ENTOMOL. 36:149-158.
- HUGHES, A. M. 1976. The mites of stored food and houses. Ministry of Agriculture, fisheries and food.
- KEH, B.1973. The common house dust mites of the genus *dermatophagoides* (ACARINA: PYROGLYPHIDAE). Californ. Vect. Views 20:37-45.
- LANG, J. D. & M. S. MULLA. 1978. Seasonal dynamics of house dust mites, *Dermatophagoides* spp in homes in southern Callifornia. Environ Entomol. 7:281-86.

- LARSON, D. G.; WILLIAMS, F. & WARTON, G. W. Preliminary studies on *Dermatophagoides farinae* (HUGHES, 1961) Acari and house dust allergy. J. Med. Entomol. 6:295-299.
- LINDQUIST E. E. 1978. Acari. Mem. Entomol. Soc. 108:252-90.
- MATSUOKA, H. & N. MAEDA, N. 1995. Seasonal fluctuations of *Dermatophagoides* mites population in house dust J. MED. SCI. BIOL. 48:103-115.
- SAKAKI, I.; SUTO, C. & ITO, H. 1990. Studies on the occurrence and termination of quiescence and nymphs of *Dermatophagoides farinae*. Jap. J. Sanit. Zool. 41:227-34.
- SHARP, J. L. & HARAMOTO, F. H. 1970. *Dermatophagoides pteronyssinus* (Trouessart) and other acarina in house dust in Hawaii. Entomol. Soc. 20:583-589
- STEWART, G. A.; BIRD, C. H.; KRISKA, K. D. & COLLOFF, M. J. 2005. A comparative study of allergenic and potentially allergenic enzymes from *Dermatophagoides pteronyssinus*, *D. farinae* and *Euroglyphus maynei*. J. MED. ENTOMOL. 16:165-180.
- SUGGARS, A. L. 1988. A survey of house dust mites in north Carolina. Pest. Manage 7: 38-41.
- WALZL, M. G. 1992. Ultrastructure of the reproductive system of the house dust mites *Dermatophagoides farinae* and the *D. pteronyssinus* (Acari: Pyroglyphidae) with remarks on spermatogenesis and oogenesis. J. MED. ENTOMOL. 16:85-116.