CIÊNCIAS DA TERRA: PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

VOLUME III

EDITORIA CONHECIMENTO LIVRE

Frederico Celestino Barbosa

Ciências da Terra: princípios fundamentais

1ª ed.

Piracanjuba-GO
Editora Conhecimento Livre
Piracanjuba-GO

1ª ed.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Barbosa, Frederico Celestino
B238C Ciências da Terra: princípios fundamentais

/ Frederico Celestino Barbosa. – Piracanjuba-GO

Editora Conhecimento Livre, 2021

70 f.: il

DOI: 10.37423/2021.edcl267

ISBN: 978-65-89955-26-9

Modo de acesso: World Wide Web

Incluir Bibliografia

1. rochas 2. atmosfera 3. oceanos 4. geociências I. Barbosa, Frederico Celestino II. Título

CDU: 550

<https://doi.org/10.37423/2021.edcl267>

O conteúdo dos artigos e sua correção ortográfica são de responsabilidade exclusiva dos seus respectivos autores.

EDITORA CONHECIMENTO LIVRE

Corpo Editorial

Dr. João Luís Ribeiro Ulhôa

Dra. Eyde Cristianne Saraiva-Bonatto

Dr. Anderson Reis de Sousa

MSc. Frederico Celestino Barbosa

MSc. Carlos Eduardo de Oliveira Gontijo

MSc. Plínio Ferreira Pires

Editora Conhecimento Livre

Piracanjuba-GO

2021

CAPÍTULO 1	5
AVALIAÇÃO DE DIFERENTES TIPOS DE SUBSTRATOS ORGÂNICOS NA PRODUÇÃO DE MUDAS DE ALFACE (LACTUCA SATIVA L.).	
Matheus Miranda Caniato	
Francisco Pereira de Brito Junior	
Nailson Celso da Silva Nina	
João Soares de Araújo	
DOI 10.37423/210604268	
 CAPÍTULO 2	 13
ANÁLISE DOS MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS NO PLANO NACIONAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE NA REGIÃO METROPOLITANA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	
Caroline Ribeiro de Araujo	
Thaciana Ribeiro Martins	
Gustavo Lagoeiro	
Roberto Moura Barros	
DOI 10.37423/210604296	
 CAPÍTULO 3	 26
ESTRUTURA DIAMÉTRICA DE UM REMANESCENTE DE CERRADO DA AMAZÔNIA LEGAL	
HYGOR GOMES DE ALMEIDA SOUSA	
MILLENA OLIVEIRA XAVIER	
VALÉRIA CARDOSO LOPES	
BRUNO AURÉLIO CAMPOS AGUIAR	
FLÁVIA BEZERRA SOUZA	
GABRIELLA RAYSSA ANTUNES DA SILVA OLIVEIRA	
ANA CLARA CARNEIRO FONSECA	
DANIEL RAMOS DE SOUZA	
JOÃO PEDRO NOLETO BARBOSA	
PRISCILA BEZERRA DE SOUZA	
DOI 10.37423/210604332	
 CAPÍTULO 4	 45
ANÁLISE DE IMAGENS DE PLÂNTULAS PARA AVALIAÇÃO DO VIGOR DE SEMENTES DE MORINGA OLEIFERA LAM.	
Marcio Dias Pereira	
Josefa Patricia Balduino Nicolau	
André Dantas de Medeiros	
Francisca Adriana Ferreira de Andrade	
Alessandra Mendes Pacheco Guerra vale	
Andressa Vasconcelos Flores	
DOI 10.37423/210604342	

Anne Sales Barros

Lúcia Taíse de Oliveira Alves

Éllida Cilene de Oliveira Dantas

Guilherme Ferreira de Brito

Vandiler Ferreira Junior

Luís Gustavo de Lima Sales

DOI 10.37423/210604361

Capítulo 1

10.37423/210604268

AVALIAÇÃO DE DIFERENTES TIPOS DE SUBSTRATOS ORGÂNICOS NA PRODUÇÃO DE MUDAS DE ALFACE (LACTUCA SATIVA L.).

Matheus Miranda Caniato

Francisco Pereira de Brito Junior

Nailson Celso da Silva Nina

João Soares de Araújo

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus - Zona Leste.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus - Zona Leste.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus - Zona Leste.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus - Zona Leste.

Resumo: A utilização de substratos orgânicos se mostra como uma alternativa ambientalmente correta e é a base do cultivo agroecológico de hortaliças. Dessa forma, este trabalho teve como objetivo avaliar a hipótese que substratos orgânicos produzidos de forma artesanal in loco podem ser superiores ao substrato comercial BASAPLANT® para a produção de mudas de alface. O experimento foi disposto inteiramente ao acaso, com quatro tratamentos representados pelos substratos BASAPLANT®, composto, vermicomposto e 50% VC e três repetições. Foram avaliados os seguintes parâmetros: altura da planta, comprimento do sistema radicular, número de folhas, comprimento das folhas, largura das folhas, massa seca da parte aérea, massa seca do sistema radicular e estabilidade do torrão. Os substratos 50% VC, vermicomposto e BASAPLANT® foram superiores ao composto, mas não diferiram estatisticamente entre si em relação a variável altura da planta. Já para comprimento do sistema radicular os tratamentos não diferiram entre si. Quanto ao número de folhas o tratamento com substrato 50% VC apresentou a maior média, diferindo estatisticamente da testemunha. Para o parâmetro comprimento das folhas o tratamento 50% VC se destacou entre os demais. Quanto à estabilidade do torrão todos os substratos utilizados apresentaram alta estabilidade e receberam nota três. Assim, todos os substratos avaliados podem ser utilizados pelo produtor em substituição ao substrato comercial BASAPLANT®.

Palavras-chave: Vermicomposto, composto orgânico, BASAPLANT®

INTRODUÇÃO

A alface (*Lactuca sativa* L.) é uma hortaliça folhosa bastante apreciada em diversas regiões do mundo incluindo o Brasil onde a produção e o consumo dessa hortaliça são elevados. A produção de mudas consiste em uma das etapas mais importantes do processo produtivo, pois a utilização de mudas de qualidade possibilitará conforme mencionado por CAMARGO et al., (2011) a formação de um estande, com alto percentual de sobrevivência em campo, que será capaz de expressar todo seu potencial genético, alcançando sua máxima produtividade.

A utilização de substratos para produção de mudas é uma técnica amplamente empregada na maioria dos países com horticultura avançada e a escolha correta do substrato está intimamente relacionada ao sucesso na formação das mudas (Ensinas; Júnior; Ensinas, 2011, COSTA E CAMARGO, 2009).

O substrato é todo material sólido, natural, sintético, residual, mineral ou orgânico (ABAD e NOGUERA, 1998) utilizado como matéria-prima ou mistura de matérias-primas que substituem o solo no cultivo (ZORZETO, 2011), e deve ter a finalidade de garantir a manutenção mecânica do sistema radicular da planta, tendo a capacidade de manter um adequado suprimento de água e nutrientes, bem como permitir trocas gasosas das raízes com o ar externo (MINAMI e PUCHALA, 2000). Dentro do contexto agroecológico, vários são os materiais que podem ser usados como substrato, dentre eles o composto e o vermicomposto, os quais tem uso permitido pela Instrução Normativa Nº 46 de 6 de outubro de 2011 que estabelece o Regulamento Técnico para os Sistemas Orgânicos de Produção, bem como as listas de substâncias e práticas permitidas para uso nestes sistemas.

O composto pode ser produzido a partir de matérias-primas de origem animal ou vegetal (BRASIL, 2011), contém altos teores de matéria orgânica (CLEMENTE et al., 2012) e contribui para o aumento da capacidade de troca de cátions - CTC (JIMÉNEZ BECKER et al., 2010), disponibilidade de nutrientes (BALDI et al., 2010; CLEMENTE et al., 2012) e maior atividade e biomassa microbiana (BRAVO et al., 2012)

O húmus de minhoca ou vermicomposto vem sendo bastante estudado para a elaboração de substratos para produção de mudas. Este material produzido por minhocas, geralmente da espécie *Eisenia foetida* (minhoca vermelha da Califórnia), é em média, setenta por cento mais rico em nutrientes que o húmus não produzido por minhocas. Além disso, apresenta maior riqueza em bactérias e outros microrganismos e, ainda, a vantagem de possuir pH próximo de 7,0 (LONGO, 1987).

A formulação de um substrato adequado está baseada principalmente na pesquisa de melhores fontes e combinações de materiais que sejam permitidos dentro do contexto agroecológico levando-se em consideração os preceitos legais da produção orgânica de hortaliças. Dessa forma, este trabalho avaliou a hipótese que substratos orgânicos produzidos de forma artesanal in loco pelo agricultor pudessem ser semelhantes ou superiores ao substrato comercial BASPLANT® para a produção de mudas de alface.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado, em 2017, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM), Campus Manaus/ Zona Leste, situado no município de Manaus –AM. Tanto o composto como o vermicomposto utilizados na pesquisa foram obtidos junto ao setor de Permacultura do IFAM/CMZL.

O experimento foi disposto inteiramente ao acaso, com quatro tratamentos representados pelos substratos (BASAPLANT®, vermicomposto, composto e 50% vermicomposto + 50 % composto) e quatro repetições sendo cada repetição constituída de uma bandeja.

As mudas foram produzidas em bandejas de isopor (128 células), nas quais foram semeadas duas sementes por célula, com posterior desbaste aos sete dias. As avaliações foram realizadas vinte e um dias após a semeadura. Para a avaliação foram retiradas, ao acaso, 15 plantas de cada bandeja sendo avaliados os seguintes parâmetros: altura da planta (AP), comprimento do sistema radicular (CSA), número de folhas (NF), comprimento das folhas (CF), largura das folhas (LF), massa seca da parte aérea (MSPA), e massa seca do sistema radicular (MSSR) e estabilidade do torrão (ET).

A altura da planta (AP) foi mensurada por meio da medição desde o colo até a gema apical da plântula, utilizando uma régua milimetrada. Já o comprimento do sistema radicular (CSR) foi medido desde o colo até a parte distal da raiz, utilizando uma régua milimetrada. A quantificação do número de folhas foi realizada pela contagem das folhas verdadeiras completamente expandidas. Para avaliação do comprimento e largura das folhas foi realizada a medição da primeira folha verdadeira. As massas secas da parte aérea e do sistema radicular foram obtidas pela secagem das plântulas em estufa com circulação forçada de ar a 65 °C por 48 h com posterior pesagem em balança analítica de precisão (0,001 g). A estabilidade do torrão considerando a sua coesão ao retirar a plântula do recipiente, foi avaliada conforme escala de notas adaptada de Gruszynski (2002) onde 1 = mais de 50% do torrão

ficou retido no recipiente; 2 = o torrão se destacou do recipiente, mas não permaneceu coeso e 3= todo o torrão foi destacado do recipiente e mais de 90% dele permaneceu coeso.

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância pelo Teste F e as médias comparadas pelo teste Tukey ao nível de 5 % de probabilidade utilizando o programa ASSISTAT 7.7 beta (Versão 2015).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na tabela 1 são apresentados os resultados referentes aos parâmetros avaliados. Em relação a variável AP houve diferença significativa entre os tratamentos composto e vermicomposto sendo que este último proporcionou o melhor resultado. Entretanto, nenhum dos substratos avaliados diferiu da testemunha. Os resultados obtidos neste trabalho, para a variável AP diferem daqueles encontrados por Monteiro et al., (2012), os quais avaliando diferentes substratos para a produção de mudas de alface observaram que o tratamento representado por composto orgânico 100% (100RO) se mostrou superior ao substrato comercial PLANTMAX para a variável AP. Valem mencionar que a altura da planta não é o parâmetro mais importante na avaliação e podem apresentar maior altura em função do estiolamento. O ideal é que as mudas sejam compactas e com o maior número de folhas e raízes.

Quanto a variável comprimento do sistema radicular não houve diferença significativa entre os tratamentos BASAPLANT, vermicomposto, composto e 50% VC.

Para a variável NF o tratamento com substrato 50% VC apresentou a maior média diferindo estatisticamente da testemunha. Esses resultados corroboram com aqueles obtidos por Silva et al, (2014) avaliando a produção de mudas de alface (*L. sativa*) utilizando diferentes substratos, os quais obtiveram valores superiores para a variável NF, em relação ao substrato comercial utilizado, para os substratos produzidos a partir de húmus + 25% casca de arroz carbonizada, húmus + 50% casca de arroz carbonizada e 100% húmus

Para o parâmetro comprimento das folhas foi observada diferença significativa, entre o tratamento 50% VC, o qual apresentou a maior média, e os demais tratamentos. Já em relação à largura das folhas os tratamentos composto, vermicomposto e 50% VC diferiram significativamente da testemunha, mas não entre si.

A maior produção de massa seca da parte aérea foi observada no tratamento 50% VC, o qual diferiu significativamente dos demais. Os tratamentos a base de composto e vermicomposto, por sua vez, foram superiores estatisticamente à testemunha. Em relação à produção de massa seca do sistema radicular não foi observada diferença significativa entre os tratamentos.

Tabela 1. Médias das variáveis: altura da planta (AP), comprimento do sistema radicular (CSR), número de folhas (NF), comprimento da folha (CF), largura da folha (LF), massa seca da parte aérea (MSPA) e massa seca do sistema radicular (MSSR) referentes ao desenvolvimento de plântulas de alface. Manaus-AM. 2017.

Tratamentos	AP (cm)	CSR (cm)	NF	CF (cm)	LF (cm)	MSPA (g)	MSSR (g)
Basaplant®	0,50 ab	8,34 a	2,8 b	2,89 c	1,27 b	0,144 c	0,016 a
Vermicomposto	0,43 ab	7,64 a	3,13 ab	3,85 b	1,92 a	0,169 b	0,017 a
Composto	0,40 b	7,39 a	3,23 ab	3,74 b	1,97 a	0,170 b	0,019 a
50% VC	0,56 a	7,96 a	3,4 a	4,54 a	2,41 a	0,198 a	0,018 a
MG	0,47	7,83	3,14	4,19	1,89	0,168	0,017
CV (%)	12,81	8,27	6,69	4,03	11,28	11,54	21,76

*Médias seguidas pelas mesmas letras nas colunas não diferem estatisticamente pelo teste Tukey ao nível de 5% de probabilidade.

Quanto à estabilidade do torrão todos os substratos utilizados apresentaram alta estabilidade e receberam nota três (3), sendo que todo o torrão foi destacado do recipiente e mais de 90% dele permaneceu coeso e aderido ao sistema radicular das plântulas.

Por fim cabe destacar que assim como evidenciado neste trabalho diversas são as pesquisas que demonstram que tanto o composto como o vermicomposto apresentam características químicas, físicas e biológicas que os tornam substratos adequados para a produção de mudas de hortaliças, entre elas a alface (Silva et al, 2014; Monteiro et al., 2012; Moraes et al 2010). Dessa forma, os três substratos avaliados podem ser utilizados pelo produtor dentro do sistema agroecológico para produção de mudas de alface em substituição ao substrato comercial proporcionando resultados satisfatórios.

CONCLUSÕES

O substrato 50% VC apresentou o melhor resultado. Entretanto, os tratamentos a base de vermicomposto e composto também proporcionaram bom desenvolvimento das plântulas de alface quando comparados ao substrato comercial BASAPLANT®.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABAD, B. M.; Nogueira, M.P. Substratos para el cultivo sin suelo y fertirrigación. In: Cadahia, C. Fertirrigación: Cultivos hortícolas y ornamentales. Madrid: Mundi-Prensa, 1998. p.287-339.
- BALDI, E.; TOSELLI, M.; MARCOLINI, G.; QUARTIERI, M.; CIRILLO, E.; INNOCENTI, A.; MARANGONI, B. Compost can successfully replace mineral fertilizers in the nutrient management of commercial peach orchard. *Soil Use and Management*, Oxford, v. 26, n. 3, p. 346-353, 2010.
- BRAVO, K.; TOSELLI, M.; BALDI, E.; MARCOLINI, G.; SORRENTI, G.; QUARTIERI, M.; MARANGONI, B. Effect of organic fertilization on carbon assimilation and partitioning in bearing nectarine trees. *Scientia Horticulturae*, Amsterdam, v. 137, p. 100-106, 2012.
- CAMARGO LKP; RESENDE JTV; TOMINAGA TT; KURCHAIT SM; CAMARGO CK; FIGUEIREDO AST. 2011. Postharvest quality of strawberry fruits produced in organic and conventional systems. *Horticultura Brasileira* 29: 000-000.
- CLEMENTE R.; WALKER, D.J.; PARDO, T.; MARTÍNEZ-FERNÁNDEZ, D.; BERNAL, M.P. The use of a halophytic plant species and organic amendments for the remediation of a trace elements contaminated soil under semi-arid conditions. *Journal of Hazardous Materials*, Amsterdam, v. 223-224, p. 63-71, 2012.
- COSTA, T.R.; CAMARGO, R. Produção de mudas de pinhão manso (*Jatropha curcas* L.) em tubetes a partir de diferentes fontes de matéria orgânica. *Revista Horizonte Científico*, Uberlândia, v.3, n.1, 2009.
- ENSINAS, S. C.; JUNIOR, M. T. M.; ENSINAS, B. C. Desenvolvimento de mudas de rúcula em diferentes combinações de substrato. *Revista Científica Eletrônica de Agronomia*, Garça, v.18, n.1, p.1-7, jun, 2011
- JIMÉNEZ BECKER, S.; EBRAHIMZADEH, A.; PLAZA HERRADA, B. M.; AND LAO, M. T. Characterization of compost based on crop residues: changes in some chemical and physical Soil Science and Plant Analysis, New York, v. 41, n. 5-8, p. 696-708, 2010.
- LONGO A. D. 1987. Minhoca: de fertilizadora do solo a fonte alimentar. São Paulo: Ícone. 79p.
- MONTEIRO, G. C.; CARON, B. O.; BASSO, C. J.; ELOY, E.; ELLI, E. F. Avaliação de substratos alternativos para produção de mudas de alface. *Avaliação de substratos alternativos para produção de mudas de alface. ENCICLOPÉDIA BIOSFERA*, Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.8, N.14; p. 140, 2012.
- MORAES, J. R. de et al. Produção de mudas de alface em diferentes formulações de substratos orgânicos no sistema de bandejas flutuantes. In: CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 19.; ENCONTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO, 12.; MOSTRA CIENTÍFICA, 2., 2010, Pelotas. Anais...Pelotas: UFPel, 2010.
- SILVA, S.; FERRAZ, R. M.; FONSECA, R.; PEREIRA, L. F. G¹; FERRAZ, R. M¹; GONÇALVES, L. D. Produção de mudas de alface (*Lactuca sativa*) utilizando diferentes substratos. In: VII Semana de Ciência e Tecnologia IFMG - campus Bambuí, 2014.

STEFFEN, G. P. K. Substratos à base de casca de arroz e esterco bovino para a multiplicação de minhocas e produção de mudas de alface, tomateiro e boca-de-leão. Dissertação (Mestrado em Ciência do Solo) – Centro de Ciências Rurais, Universidade Federal de Santa Maria, 2008, Santa Maria.

ZORZETO, T. Q. Caracterização física e química de substratos para plantas e sua avaliação no rendimento do morangueiro (*Fragaria* – *Ananassa duch*). Dissertação de Mestrado (Agricultura Tropical e Subtropical). Campinas; 2011.

Capítulo 2

10.37423/210604296

ANÁLISE DOS MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS NO PLANO NACIONAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE NA REGIÃO METROPOLITANA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Caroline Ribeiro de Araujo

Universidade Estácio de Sá

Thaciana Ribeiro Martins

Universidade Estácio de Sá

Gustavo Lagoeiro

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Roberto Moura Barros

Universidade Estácio de Sá

Resumo: A tuberculose é uma doença infecciosa e de fácil transmissão que afeta principalmente os pulmões, apesar de ser uma doença tratável e curável ainda há altos índices de mortalidade, segundo pesquisa realizada pelo Ministério da saúde, ocorre cerca de 6 milhões de novos casos em todo mundo levando mais de 1 milhão de pessoas a óbito. E no Brasil não é diferente a tuberculose adquiriu status de doença prioritária pelo ministério da saúde que por ano recebem notificações de cerca de 70 mil novos casos, tendo cerca de 4 mil mortes. A geotecnologia vem no sentido de cada vez mais por meio de suas ferramentas, contribuir na gestão, no controle e manejo de serviços públicos de saúde, auxiliando através dos dados e gerando informações que venham potencializar o controle de TB, com raízes sociais profundas no cenário nacional e com foco na região metropolitana do Rio de Janeiro. Na melhor percepção da temática os usos da geotecnologia com dados socioeconômicos como o de renda, índice de Gini e dados de casos de tuberculose nas cidades prioritárias no controle de tuberculose do Estado de Rio de Janeiro.

Palavras-chave: *Tuberculose¹; Geoprocessamento²; Saude³; Geografia⁴.*

INTRODUÇÃO

O Estado do Rio de Janeiro nos apresenta, de acordo com o Ministério da saúde, um dos maiores índices de tuberculose no Brasil, os dados observados revelam que o estado apresenta a segunda maior incidência de tuberculose de todas as formas, só perdendo para o estado do Amazonas.

Se tratando de regiões metropolitanas o estado aparece também nas primeiras posições de grande incidência de TB, mostrando que mesmo com sua herança desde os tempos de capital federal, e os atuais grandes investimentos na área da saúde, em contrapartida de outras regiões metropolitanas nacionais, retrata o quadro de enorme relevância da tuberculose no Estado.

Atualmente com 12 milhões de habitantes a Região metropolitana do Rio Janeiro a segunda maior do Brasil, apresenta grande fluxo de deslocamentos pendulares dos trabalhadores entre as cidades aumentando o risco de maior transmissão e disseminação desta doença altamente contagiosa.

Este trabalho tem como fim mostrar a importância das geotecnologias na produção de informações e construção de medidas mitigadoras para o maior controle da tuberculose, em uma análise sócio espacial integrando aspectos socioeconômicos na avaliação dos dados sobre a incidência da doença nos municípios.

Temos o objetivo de mostrar uma análise socioeconômica da tuberculose na RMRJ, comparando as questões de renda per capita, desigualdade de renda (Gini), e os casos totais de tuberculose no período de 2013 – 2014. Atualizando a real situação da tuberculose nas 14 cidades prioritárias do Rio de Janeiro. Incluímos as cidades de Maricá e Itaguaí com mais de 100 mil habitantes, que não estavam no panorama elaborado pelo ministério da saúde como cidades prioritárias publicadas em 2014, com dados de 2012/2013.

Através da observação dos dados socioeconômicos como a renda média domiciliar mensal, e o índice de Gini (desigualdade social) dos municípios prioritários segundo o Ministério da Saúde dentro do seu PNCT (Programa Nacional de Controle da Tuberculose), que define essas cidades com os critérios para o estabelecimento de municípios prioritários para a intensificação das ações de controle da tuberculose. Os critérios adotados foram os seguintes: Ser capital da unidade federada; ou apresentar população igual ou maior do que 100 mil habitantes e pelo menos um dos dois critérios seguintes:

- Coeficiente de incidência (todas as formas) superior a 80% do coeficiente nacional (32 casos novos por 100 mil habitantes), de acordo com dados do SINAN, em 2007;

- Coeficiente de mortalidade por tuberculose superior ao coeficiente nacional (2,5 óbitos por 100 mil habitantes), de acordo com dados do SIM, em 2007.

A Tuberculose é grande transtorno para a saúde mundial, precisando do desenvolvimento de estratégias para o seu controle considerando aspectos humanitários, econômicos e de saúde pública.

A tuberculose pulmonar compromete as vias aéreas levando ao edema de mucosa, hipertrofia e hiperplasia de glândulas mucosas, aumenta a secreção de muco e hipertrofia muscular lisa. Isto afeta o calibre das vias aéreas, aumenta a resistência e diminui o fluxo aéreo. Assim, quanto mais tardio for o diagnóstico de tuberculose, piores serão os danos pulmonares com grande prejuízo de qualidade de vida.

A TB é uma doença infectocontagiosa, causada por uma bactéria que se encontra no ar ambiente, *Mycobacterium tuberculosis*, transmitida por via aérea na maioria da totalidade dos casos. A infecção ocorre a partir da inalação de núcleos secos de gotículas contendo bacilos expelidos pela tosse, fala ou espirro de doente com tuberculose ativa de vias respiratórias. Os doentes bacilíferos, isto é, aqueles cuja baciloscopia de escarro é positiva, são a principal fonte de infecção.

Segundo Silveira (2000), quanto mais prolongado e próximo for o contato de um doente de tuberculose, maior será a probabilidade de infecção dos contactantes. Fatores como aeração do ambiente, correntes de ar dispersando as partículas e a luz ultravioleta do Sol que destrói os bacilos, diminuem a possibilidade de infecção. Ambientes confinados como enfermarias, asilos e prisões, facilitam a propagação da doença.

Tal doença esta frequentemente associada à pobreza, mas muitos outros determinantes contribuem de modo importante para sua prevalência, como a falta de educação em saúde da sociedade, na prevenção da tuberculose.

No plano político, o Ministério da Saúde tem tido decisiva atuação desde que, em 2003, elegeu a tuberculose como problema prioritário de saúde pública a ser combatido. O Programa Nacional de Controle da Tuberculose – PNCT foi aumentado consideravelmente, quando comparado ao ano anterior à eleição da tuberculose a categoria de doença prioritária, e tem estimulado firmemente a organização e a participação da sociedade civil no controle social da tuberculose.

A compreensão do espaço geográfico e as relações da sociedade e o ambiente onde vivem, com a sua produção e reprodução deste, envolvem um conjunto de articulados processos que necessitam sempre de pesquisas e análises para a melhor percepção de suas evoluções, necessitando assim de

ferramentas que auxiliam esses estudos. Na ciência geográfica não há melhor ferramenta que o mapa para asseverar as pesquisas, através de sua leitura abre um leque de análises acerca dos objetos e processos de estudo.

Com o advento da evolução tecnológica no final do século XX e início do XXI, como retrata SANTOS (1998) no qual conceitua em “meio técnico-científico-informacional” este momento histórico que cada vez mais a ciência e a técnica vão ser a base para a construção e reconstrução do espaço, temos agora a disposição de nossa ciência, principalmente pela expansão da rede mundial de computadores e programas como o Google Earth e as imagens de satélites, o surgimento e a popularização de novas ferramentas de análises geográficas, deixando pra trás o predomínio do “mapa de mão” como único instrumento, fazendo agora qualquer um usuário, leitor e indagador de informações acerca do que observou nas imagens. Surge aí ampla utilização das Geotecnologias que vão servir para a tomada de decisões em várias áreas da sociedade, desde fins militares a questões de saúde pública.

As geotecnologias conforme FITZ (2008) são novas tecnologias ligadas às geociências que trazem relevantes desenvolvimentos nas pesquisas, ações de planejamento, gestão, manejo e outros aspectos relacionados à estrutura do espaço geográfico, a interdisciplinaridade é uma característica fundamental já que profissionais de diversas áreas atuam pontualmente com questões espaciais. E se tratando de saúde pública as geotecnologias são de extrema relevância na implantação de medidas que possam auxiliar no planejamento e atuação das equipes multidisciplinares na área de saúde.

PROCEDIMENTOS EXECUTADOS

Neste material foram utilizadas as bases de dados nacionais do Sistema de Informações de Agravos de Notificação (Sinan), dados do Censo e das estimativas populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes ao período de janeiro de 2013 a dezembro de 2014.

O trabalho foi pautado em duas etapas, uma de revisão bibliográfica dos conceitos e temas aqui abordados, e na segunda pesquisa, manipulação e análise de dados relacionados a população (IBGE, Censo 2010) e a tuberculose nas cidades prioritários no PNCT na Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro.

Na primeira etapa foi feita o recorte espacial deste trabalho com a RMRJ e as cidades prioritárias segundo o Ministério da Saúde dentro do seu PNCT (Programa Nacional de Controle da Tuberculose) e a leitura referencial.

Na segunda etapa determinamos os dados a serem pesquisados e mapeados como os índices de Gini, renda media domiciliar per capita , casos totais de tuberculose dos anos de 2013 e 2014 ao qual foram somados, devido algumas cidades nao terem notificações sobre a doença entres os anos colhidos, foram escolhidos mapear os casos a cada 10 mil habitantes em razão do grande número de casos diretamente ligados a população que vive na cidade do Rio de Janeiro.

Foram amplamente utilizadas às ferramentas do SIG, para aquisição e manipulação dos dados obtidos na pesquisa, com o uso do programa ARCGIS 9.3, no qual foram elaborados os mapas que ilustram e corroboram os resultados apresentados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram elaborados 3 mapas, na realização deste trabalho. Para assim podermos salientar os principais problemas de saúde públicas que fazem da tuberculose um dos agravos fortemente influenciados pela determinação social e relação direta com a pobreza.

O mapa 1 é de renda media domiciliar per capita das cidades prioritárias no controle de tuberculose da região metropolitana do Rio de Janeiro, no qual estipulamos 4 classes , realizando-as de acordo com as rendas e classificações decididas pelos autores. Começando por Japeri com a renda de 386,61 reais, e terminando com a cidade de Niterói de maior renda, de 1951,11 reais. A segunda classe agregou os maiores números de cidades, com renda de 500 a 700 reais. Todos esses dados foram obtidos no IBGE – Censo 2010.

Figura 1: Mapa renda média domiciliar per capita

O mapa 2 é o índice de Gini que retrata a desigualdade social, neste também estipulamos 4 classes para melhor visualização dos parâmetros, que foram feitas de acordo com os dados retirados do IBGE – Censo 2010. Já o mapa 3 nos mostra os casos de tuberculose a cada 10 mil habitantes.

Ao analisar os mapas vemos que a cidade do Rio de Janeiro e Niterói destacam-se pela alta renda, mas no índice de Gini que retrata a desigualdade social se observa que há uma grande diferença social entre as populações ricas e pobres, que só ajuda a evidenciar as condições precárias de moradia, saneamento, acesso à saúde pública e mobilidade nas cidades , justificando o grande índice da doença nessas cidades, em especial a capital.

As cidades da baixada fluminense se destacam pela renda média domiciliar baixa, ao qual sinaliza as condições precárias aos itens já citados acima, tendo que recorrer a hospitais na capital, que mesmo com números elevados de sua população recebem demanda dessas cidades.

O número de casos em Nova Iguaçu, Duque de Caxias e Belford Roxo também merecem destaques, a cidade de Belford Roxo que apresenta grande abandono no tratamento da tuberculose, como se nota na tabela 1.

Na tabela 2 de infecção da tuberculose por idade, encontra-se o destaque da população de 15 a 59 anos, na qual se configura a maior parcela da população economicamente ativa que se deslocam diariamente para suas atividades, geralmente é realizado de forma intermunicipal, o que amplia a potencialidade de infecção e contágio da TB.

Tabela 1: O panorama da tuberculose 2013 -1014 cidades prioritárias RMRJ

Município 2013-2014	Casos confirmados	Cura	Abandono/ tratamento	Óbito
Belford Roxo	500	207	170	9
Duque de Caxias	1701	640	177	74
Itaboraí	256	120	7	4
Itaguaí	175	58	9	-
Japeri	175	107	16	4
Magé	260	1	5	-
Marica	108	20	11	1
Mesquita	244	117	36	4
Nilópolis	274	64	13	3
Niterói	873	203	43	61
Nova Iguaçu	1131	481	150	31
Queimados	74	43	55	1
Rio de Janeiro	13220	4553	1123	476

São Gonçalo	926	288	98	14
São Joao de Meriti	718	288	127	7

Tabela 2 :casos por idades das cidades prioritárias RMRJ

Município 2013-2014	0-4	5-14	15-39	40-59	60 e mais
Belford Roxo	7	7	287	146	33
Duque de Caxias	24	33	870	576	189
Itaboraí	2	24	117	87	25
Itaguaí	-	2	52	60	12
Japeri	-	4	94	58	19
Magé	10	4	122	90	34
Marica	1	-	43	43	21
Mesquita	-	2	124	85	33
Nilópolis	2	11	129	99	33
Niterói	12	11	573	346	131
Nova Iguaçu	16	9	580	386	139
Queimados	4	1	41	22	6
Rio de Janeiro	246	317	6839	4235	1582
São Gonçalo	6	12	438	325	145
São Joao de Meriti	3	7	380	258	97

Figura 2: Mapa de Indice de Gini

Figura 3: Casos de tuberculose a cada 10 mil habitantes.

Ao elaboramos o mapa de renda media mensal domiciliar per capita, e do índice de Gini dos municípios da Região metropolitana do Rio de janeiro que são prioritários no tratamento de tuberculose e o mapa dos casos de TB por 10000 habitantes, observamos nos mapas produzidos que esses dados podem ser interpretados para a explicação dos altos índices de tuberculose, já que cidades com baixa renda os

cidadãos tem dificuldade ao acesso de tratamento e cura. O índice avalia a desigualdade social nestas cidades, principalmente as mais ricas, revelando as condições precárias de suas populações mais pobres.

O mapa de casos de tuberculose a cada 10 mil habitantes mostra que não só a capital com elevada população apresenta consideráveis números de casos da doença.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar da visível melhoria na assistência da tuberculose, em relação ao passado de tantas mortes, ainda há muito a se fazer para um pleno controle da doença e a geotecnologia é uma importante ferramenta na elaboração da informação através de dados que cada vez mais tem que ser pesquisados para a melhora do planejamento ao controle de tuberculose e outras muitas doenças.

As políticas de saúde pública precisam dar mais atenção para a melhoria de qualidade de vida da sociedade, tendo maior cuidado na busca de novos casos, políticas de prevenção, diagnóstico e tratamento, bem como as operações de promoção de saúde. Aqui está o ponto ao qual devemos utilizar amplamente as geotecnologias para geração de informações juntamente com medidas públicas para melhorar a qualidade de vida da população.

São necessárias melhorias por parte do poder público nas estruturas das unidades básicas de saúde. Destacam-se entre elas: a maior oferta de funcionários, a agilidade nos processos de exames, a maior disponibilidade e a variedade de materiais para coleta de exames e tratamento. Também se faz necessário proporcionar constantes atualizações aos profissionais de saúde, visando ao melhor preparo dos mesmos.

REFERÊNCIAS

BRASIL, Ministério da Saúde, Fundação Nacional de Saúde, Centro de Referência Prof. Hélio Fraga. Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Controle da Tuberculose: uma proposta de integração ensino-serviço. Rio de Janeiro: FUNASA/CRPHF/SBPT; 2002.

BRASIL, Ministério da saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Manual de recomendações para o controle da tuberculose no Brasil, 2011

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. Panorama da tuberculose no Brasil: indicadores epidemiológicos e operacionais / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. – Brasília : Ministério da Saúde, 2014.

FITZ, P. R. . Geoprocessamento sem complicação. 1. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2008. 160p .

MENESES, P. R. ; ALMEIDA, T. . Introdução ao Processamento de Imagens de Sensoriamento Remoto. 1. ed. Brasília: CNPq, 2012. v. 1. 256p .

PINA, Maria de Fátima de Conceitos básicos de Sistemas de Informação Geográfica e Cartografia aplicados à saúde. Maria de Fátima de Pina e Simone M. Santos. Brasília: OPAS, 2000.

SANTOS, M. Técnica, Espaço, Tempo: Globalização e meio técnico-científico informacional. 4 ed. São Paulo: Hucitec, 1998.

SILVEIRA, IC; O pulmão na pratica medica sintoma diagnostico e tratamento. 4ª edição vol.1 Rio de Janeiro. Editora de publicações biomedicas 2000.

Capítulo 3

10.37423/210604332

ESTRUTURA DIAMÉTRICA DE UM REMANESCENTE DE CERRADO DA AMAZÔNIA LEGAL

HYGOR GOMES DE ALMEIDA SOUSA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS

MILLENA OLIVEIRA XAVIER

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS

VALÉRIA CARDOSO LOPES

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS

BRUNO AURÉLIO CAMPOS AGUIAR

INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS

FLÁVIA BEZERRA SOUZA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS

GABRIELLA RAYSSA ANTUNES DA SILVA OLIVEIRA *UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS*

ANA CLARA CARNEIRO FONSECA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS

DANIEL RAMOS DE SOUZA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS

JOÃO PEDRO NOLETO BARBOSA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS

PRISCILA BEZERRA DE SOUZA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS

Resumo: A estrutura diamétrica de um fragmento de cerrado *sensu stricto*, fornece informações relevantes sobre estágios sucessionais, estado de conservação da floresta e grupos ecológicos de espécies, entretanto, essas informações disponíveis ainda são insuficientes para a compreensão da dinâmica destes fragmentos. Objetivou-se realizar um levantamento florístico e fitossociológico de um remanescente de cerrado *sensu stricto* para avaliar a estrutura diamétrica com o intuito de fornecer informações sobre o equilíbrio ou desequilíbrio deste fragmento de Cerrado inserido na Amazonia Legal. Foram instaladas cinco parcelas permanentes com dimensões de 50 x 20 m cada, sendo amostradas todas as espécies arbustivas-arbóreas vivas e mortas em pé com circunferência ≥ 10 cm, medidos a 1,30 m do solo. Foi realizada uma análise dos valores absolutos e relativos de densidade, frequência, dominância, índice de valor de importância (IVI), índice de diversidade de Shannon (H') e equabilidade de Pielou (J'). O levantamento registrou 1.033 indivíduos, distribuídos em 94 espécies e 57 famílias botânicas. A altura média encontrada foi de 5,5 m e um diâmetro médio de 9,5 cm, com área basal de 10,5 m². O índice de diversidade de Shannon (H') foi de 3,54 e equabilidade de Pielou (J') 0,78. As espécies que mais se destacaram em valor de importancia foram *Callisthene major*, *Byrsonima pachyphylla* e *Copaifera langsdorffii*, sendo assim as mesmas podem ser indicadas para recuperação de areas degradadas pois *Copaifera langsdorffii*, restabelece o equilíbrio ecológico da área em recuperação, *Byrsonima pachyphylla* é um espécie que atrai muitos polinizadores, sendo essa característica muito importante para a manutenção da biodiversidade e *Callisthene major* é indicada para recuperação de áreas de matas de galeria, além de possuir um rápido crescimento. E por fim observou-se dois padrões de distribuição diamétrica, sendo um em J invertido e o outro com uma distribuição diamétrica descontínua.

Palavras-chave: Análise fitossociológica; Diversidade florística; Estrutura horizontal; Indicador ambiental.

INTRODUÇÃO

O domínio Cerrado localizado na região central do Brasil está distribuído em uma ampla variedade de paisagens e fisionomias, com formações florestais, savânicas e campestres dependendo do tipo de solo e recursos hídricos da região. Suas formações savânicas se encontra entre as mais ricas em biodiversidade florística do mundo com mais de 12.000 espécies vegetais (MENDONÇA et al., 2008; SILVA et al., 2015). A Amazônia Legal ocupa uma área corresponde a 61% do território brasileiro, contendo 20% do domínio Cerrado, transições entre fitofisionomias são recorrentes e suas mudanças ocorrem de forma progressiva e suave, com aumento em tamanho dos indivíduos arbóreos, diminuição do número de arbustos, subarbustos e ervas, até que surja um estrato arbóreo definitivo, no qual se torna possível distinguir-se uma camada contínua de copas que caracterizam um dossel (SOUZA et al., 2008).

O cerrado *sensu stricto* é uma das fitofisionomias que mais se sobressai, devido sua aptidão para moderna agricultura comercial, fato esse explicado pelos relevos pouco acidentados e classes de solos aptos a intensa mecanização. Nesse sentindo toda a extensão do domínio Cerrado vem sofrendo constante pressão em função da expansão agrícola, esse cenário faz com que 47,84 % da sua cobertura vegetal original tenha já tenha sido alterada (SANO et al., 2007).

O estado Tocantins possui 91 % da sua área total composto pelo domínio Cerrado, sendo o estado brasileiro com maior cobertura desse bioma, e além de possuir os maiores índices de vegetação remanescente do Cerrado (79%) (SANO et al., 2008). Paralelo aos avanços do agronegócio no estado, pesquisas sobre a estrutura fitossociológica desse bioma são indispensáveis para fundamentar planos e iniciativas de preservação e conservação, contribuído assim para o avanço de projetos de recuperação de áreas degradadas e utilização sustentável dos recursos naturais (SANTOS-DINIZ et al., 2012).

Os inventários fitossociológicos em áreas remanescentes podem ser empregados para compreensão da composição arbórea e seus estágios sucessionais, através de abordagens quantitativas e qualitativas (SANTOS et al., 2010).

Com base na medição dos diâmetros em um processo de inventário florestal, é possível conhecer a distribuição diamétrica de um povoamento, consiste na distribuição de frequência ou número de árvores por classes de diâmetros previamente estabelecidas por unidade de área, que no caso do sistema métrico equivale ao hectare (ha) (MACHADO et al., 2009).

A estrutura diamétrica de um fragmento de cerrado *sensu stricto*, irá fornecer informações relevantes sobre a tipologia vegetal, estágios sucessionais, estados de conservação da floresta, grupos ecológicos de espécies, regimes de manejo, dinâmica de crescimento, usos da floresta, dentre outros, entretanto, as informações disponíveis atualmente ainda são insuficientes para a compreensão das dinâmicas destas fitofisionomias quando comparadas outras coberturas vegetais (SOUZA et al., 2012).

Dessa forma, objetivou-se realizar um levantamento florístico e fitossociológico de um remanescente de cerrado *sensu stricto* para avaliar a estrutura diamétrica com o intuito de fornecer informações sobre o equilíbrio ou desequilíbrio deste fragmento de Cerrado inserido na Amazonia Legal.

MATERIAIS E MÉTODOS

O presente trabalho foi realizado em uma área de Reserva Legal, sendo esta um remanescente de Cerrado fisionomia cerrado *sensu stricto*, inserido dentro da região da Amazônia Legal no sul do estado do Tocantins, município de Cariri do Tocantins – TO (Figura 1).

O clima da região segundo Köppen é do tipo AW, definido como tropical úmido com estação chuvosa no verão e seca no inverno, sua precipitação varia entre 1.400 mm a 1.500 mm a altitude média de 295 m e predominância de solos do tipo argissolo, latossolos e plintosolos (SEPLAN, 2003).

Figura 1: Localização do município de Cariri do Tocantins e área de estudo. **Fonte:** Autor (2019).

A amostragem foi realizada em uma área de Reserva Legal que totaliza 23,2 hecatres do Dominio Cerrado, fisionomia cerrado *sensu stricto*. Foram instaladas sistematicamente cinco parcelas permanentes com dimensões de 50 x 20m (1000 m²) cada, totalizando 0,5 hectare, sendo distanciadas uma da outra e da borda 10 m (MUELLER-DOMBOIS; ELLENBERG, 1974) (Figura 2).

Foram amostradas todas as espécies arbustivas-arbóreas arbustivas-arbóreas vivas e mortas em pé com circunferência ≥ 10 cm, medidos a 1,30 m do solo.

Figura 2: Disposição das parcelas na área de estudo município Cariri do Tocantins. **Fonte:** Autor (2019).

As espécies arbustivas-arbóreas coletadas na área de estudo foram identificadas taxonomicamente por meio de comparações com o material do herbário de Porto Nacional, da Universidade Federal do Tocantins, literatura especializada e consulta a especialistas, quando necessário. O sistema Angiosperm Phylogeny Group III para classificar as famílias botânicas (APG III, 2009). Todos os nomes das espécies e seus respectivos autores e sinônimos foram confirmados e atualizados pelo site da Lista de Espécies da Flora do Brasil (REFLORA, 2020).

Os valores para análise fitossociológica como densidade relativa, densidade absoluta, dominância relativa, dominância absoluta, frequência relativa, frequência absoluta, índice de valor de importância (IVI), índices de diversidade de Shannon (H') e equabilidade de Pielou (J') foram obtidos a partir do programa Fitopac versão 2.1.2 (SHEPPERD, 2010).

A distribuição diamétrica foi realizada mediante o cômputo dos indivíduos amostrados de cada espécie dentro da classe diamétrica a que pertencessem (HARPER, 1977). As classes de diâmetro foram estabelecidas com amplitude de 5 cm, a partir do diâmetro mínimo de 3 cm e as classes de altura foram estabelecidas com amplitude de 3 m a partir da altura mínima de 1,3 m. Para obtenção dos gráficos de distribuição diamétrica foi utilizado o programa MSEXcel (Microsoft. 2013).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Levantamento Florístico e Fitossociológico

O levantamento florístico e fitossociológico registrou um total de 1.033 indivíduos em uma área de 0,5 ha, dos quais 977 vivos e 57 mortos em pé, distribuídos em 94 espécies, referentes a 57 famílias botânicas. O diâmetro médio encontrado foi de 9,5 cm e área basal de 10,5 m². O valor de riqueza observado na área avaliada corrobora com um trabalho realizado em área de cerrado *sensu stricto*. (FERREIRA et al., 2015; FERREIRA et al., 2020).

Os indivíduos mortos em pé somaram 5,51% da amostragem, vale ressaltar que os indivíduos mortos em pé apresentaram elevada frequência, ou seja, 100% de presença em todas as parcelas amostradas indicando um remanescente sem perturbações localizadas, desta forma a ocorrência de árvores mortas pode estar ligada a acidentes como ventanias, doença, plantas parasitas, perturbações antrópicas ou morte naturais. Semelhante ao a outros trabalhos no domínio Cerrado que foram realizados por Ferreira et al. (2015) onde obtiveram 4,19%, Silva Neto et al. (2016) com 7,21% e Aguiar et al. (2018) 4,19%, cabe ressaltar que os indivíduos mortos em pé apresentaram elevada frequência, ou seja, 100% de presença em todas as parcelas amostradas indicando um remanescente sem perturbações localizadas, desta forma a ocorrência de árvores mortas pode estar ligada a acidentes como ventanias, doença, plantas parasitas, perturbações antrópicas ou morte naturais. As espécies mortas em pé podem apresentar valores ecológicos para fauna silvestre, com abrigo, local de nidificação e fontes indiretas de alimento (LOPES et al., 2002).

Das 57 famílias amostradas apenas seis apresentaram maiores números de espécies como Fabaceae (14), Myrtaceae (6), Rubiaceae (5), Vochysiaceae (4), Malvaceae (4) e Bignoniaceae (4) representando 38,7% do total das espécies amostradas, na área de estudo. Essas famílias que foram encontradas no presente estudo são comumente encontradas em áreas de cerrado *sensu stricto* e apresentam altos valores de riqueza florística (NETTESHEIM et al., 2010; FINA; MONTEIRO, 2013; ROCHA et al., 2014; SILVA NETO et al., 2016).

Do total das famílias amostradas, quatro representaram 41,5% do índice de valor importância sendo elas Vochysiaceae (22,9%), Fabaceae (8,6%), Malvaceae (5,1%) e Malpighiaceae (4,9%) (Tabela 1). A família Vochysiaceae foi composta por 78% dos indivíduos da espécie *Callisthene* major, fato esse associado a alta dominância relativa dessa família no remanescente de estudo. Os resultados obtidos são semelhantes aos encontrados por Finger e Finger (2015), que obtiveram as famílias Fabaceae, Myrtaceae e Vochysiaceae entre as mais representativas.

As famílias Vochysiaceae, Fabaceae, Myrtaceae, Sapindaceae, Rubiaceae, Malpighiaceae, Malvaceae, Proteaceae, Rhamnaceae, Dilleniaceae e Rubiaceae tiveram 100% de frequência absoluta (Tabela 1), indicando uma ampla distribuição dessas famílias na área estudada. Dados estes que corroboram com Silva et al. (2017) que em seu estudo obtiveram 100% de frequência em um levantamento realizado em um cerrado sensu stricto no sul do Tocantins para as famílias Vochysiaceae, Fabaceae, Myrtaceae, Sapindaceae, Anacardiaceae e Rubiaceae.

Quanto ao número de indivíduos as famílias mais bem representadas foram Vochysiaceae (254), Fabaceae (114), Malpighiaceae (78) e Malvaceae (51) totalizando assim 48,1 % dos indivíduos amostrados. Isso se deve ao fato de possuírem estratégias reprodutivas adaptadas às condições climatológicas do Cerrado, apresentando dispersão das sementes no início da estação chuvosa, boa germinação e ausência de dormência nas sementes (OLIVEIRA, 2008).

Tabela 1: Parâmetros fitossociológicos das famílias arbustivas-arbóreas amostradas no remanescente de Cerrado, da Amazonia Legal, Cariri do Tocantins – TO. Onde: NI = número de indivíduos; NSp = número de espécies; DA = densidade absoluta (número de indivíduos/ha); DR = densidade relativa (%); FrA = frequência absoluta (unidade de amostra/total de amostra); FR = frequência relativa (%); DoA = dominância absoluta (m²/ha); DoR = dominância relativa (%) e IVI = índice de valor de importância (%).

Famílias	NI	NSp	DA	DR	FrA	FR	DoA	DoR	%IVI
Vochysiaceae	254	4	508	24,6	100,0	3,5	8,5	40,4	22,9
Fabaceae	114	14	228	11,0	100,0	3,5	2,4	11,4	8,6
Malvaceae	51	4	102	4,9	100,0	3,5	1,4	6,7	5,1
Malpighiaceae	78	1	156	7,6	100,0	3,5	0,8	3,7	4,9
Morta	57	1	114	5,5	100,0	3,5	0,8	3,9	4,3
Rubiaceae	52	1	104	5,0	100,0	3,5	0,7	3,3	4,0
Sapindaceae	35	2	70	3,4	100,0	3,5	0,8	3,6	3,5
Proteaceae	32	1	64	3,1	100,0	3,5	0,6	3,1	3,2
Myrtaceae	50	6	100	4,8	100,0	3,5	0,3	1,3	3,2
Burseraceae	41	1	82	4,0	80,0	2,8	0,5	2,3	3,0
Anacardiaceae	25	3	50	2,4	100,0	3,5	0,6	2,8	2,9
Dilleniaceae	24	1	48	2,3	100,0	3,5	0,5	2,2	2,7
Bignoniaceae	25	4	50	2,4	80,0	2,8	0,5	2,2	2,5

Rhamnaceae	23	1	46	2,2	100,0	3,5	0,3	1,3	2,4
Rubiaceae	21	5	42	2,0	100,0	3,5	0,1	0,7	2,1
Loganiaceae	22	1	44	2,1	80,0	2,8	0,2	1,1	2,0
Combretaceae	10	1	20	1,0	80,0	2,8	0,4	1,8	1,9
Polygonaceae	16	1	32	1,5	60,0	2,1	0,3	1,2	1,6
Annonaceae	13	2	26	1,3	80,0	2,8	0,2	0,7	1,6
Lythraceae	13	1	26	1,3	80,0	2,8	0,1	0,5	1,5
Outras	77	39	154	7,5	980,0	34,8	1,2	5,8	16,0
TOTAL	1,03	94	2,06	100	2,82	100	21,1	100	100

As famílias botânicas Vochysiaceae e Fabaceae aparecem entre as mais representativas famílias do cerrado *sensu stricto*, comumente podendo ser encontradas em outras fitofisionomias do Domínio Cerrado. A família Vochysiaceae no presente estudo teve elevada representatividade. A presença da família Myrtaceae e Fabaceae é comumente encontrada em fragmentos de cerrado *sensu stricto* em sua maioria com elevado índice de valor de importância, tendo sido observado em diversos trabalhos (ALMEIDA et al., 2014; FINGER; FINGER, 2015; SILVA NETO et al., 2016).

As famílias Vochysiaceae e Fabaceae estiveram entre as mais ricas, do mesmo modo outro levantamento realizado no município de Iporá – GO se destacou em relação ao número de espécies de um remanescente de mata seca semidecídua, demonstrando ampla ocorrência destas famílias em diferentes fitofisionomias do Domínio Cerrado (SANTOS-DINIZ et al., 2012).

A família Vochysiaceae no presente estudo teve elevada representatividade, sendo comumente encontrada em outros levantamentos florísticos em regiões de cerrado *sensu stricto* (FERREIRA et al., 2015). Essa família é amplamente registrada na regiões do planalto central brasileiro e atualmente no cerrado da região Norte do país, localizado na Amazônia Legal por (SILVA et al., 2017) e (RÊGO et al., 2015), pois apresenta uma adaptabilidade diferente das formações vegetais, como uma alta capacidade de acumular alumínio geralmente encontrados nos solos fracos em nutrientes comumente ricos em alumínio, muitas espécies da família Vochysiaceae acabam por se restringir a estes tipos de solos, criando uma vantagem entre as demais espécies que promovem a propagação nesses tipos de solos ácidos (MIGUEL et al., 2010).

A família Fabaceae tem elevada presença nos trabalhos realizados em cerrado *sensu stricto* e em outros fragmentos florestais, tanto em riqueza de espécies quanto em valores de importância, esse sucesso adaptativo se deve ao estabelecimento de relações simbióticas com microrganismos que aumentam a capacidade de absorção de fósforo e nitrogênio, elementos encontrados em baixas concentrações nos solos oligotróficos do domínio Cerrado que são fundamentais para o crescimento

e estabelecimento das espécies (FRANCO, 2002). Essa agressividade das leguminosas pode ser atribuída à capacidade de fixação biológica de nitrogênio de muitas espécies desta família, facilitando a regeneração em solos pobres e degradados (SOUZA et al., 2010).

Das 94 espécies amostradas na área de estudo, apenas 17 estiveram presentes em todas as parcelas, evidenciando uma distribuição irregular de 81,9% das espécies no fragmento, referente ao pequeno número de espécie por unidade de área.

A espécie que se destacou com maior número de indivíduos foi *Callisthene major* com total 198 indivíduos, 100% de frequência absoluta em todas parcelas e maior índice de valor de importância (19,2%) fato esse que pode ser explicado pelo alto número de indivíduos desta espécie na área amostrada (Tabela 2).

Tabela 2: Parâmetros fitossociológicos para espécies arbustivas-arbóreas amostradas no remanescente de Cerrado da Amazônia Legal, Cariri do Tocantins- TO. Onde: NI = número de indivíduos; DA = densidade absoluta (número de indivíduos/ha); DR = densidade relativa; FrA = frequência absoluta (unidade de amostra/total de amostra); FrR = frequência relativa; DoA = dominância absoluta (m^2/ha); DoR = dominância relativa; %IVI = Percentagem índice de valor de importância.

Espécies	NI	DA	DR	FA	FR	DoA	DoR	%IVI
<i>Callisthene major</i> Mart	198	396	19,2	100,0	2,2	7,6	36,1	19,2
<i>Byrsonima pachyphylla</i> A.Juss.	78	156	7,6	100,0	2,2	0,8	3,7	4,5
<i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.	45	90	4,4	100,0	2,2	1,4	6,5	4,3
Morta	57	114	5,5	100,0	2,2	0,8	3,9	3,9
<i>Alibertia</i> sp.	52	104	5,0	100,0	2,2	0,7	3,3	3,5
<i>Roupala montana</i> Aubl.	32	64	3,1	100,0	2,2	0,6	3,1	2,8
<i>Protium heptaphyllum</i> (Aubl.) Marchand	41	82	4,0	80,0	1,7	0,5	2,3	2,7
<i>Magonia pubescens</i> A.St.-Hil.	26	52	2,5	100,0	2,2	0,7	3,1	2,6
<i>Curatella americana</i> L.	24	48	2,3	100,0	2,2	0,5	2,2	2,2
<i>Qualea multiflora</i> Mart.	35	70	3,4	60,0	1,3	0,4	1,9	2,2
<i>Luehea grandiflora</i> Mart. & Zucc.	21	42	2,0	100,0	2,2	0,5	2,1	2,1
<i>Qualea parviflora</i> Mart.	18	36	1,7	100,0	2,2	0,5	2,2	2,0
<i>Pseudobombax tomentosum</i> (Mart.) A.Robyns	15	30	1,5	100,0	2,2	0,5	2,4	2,0
<i>Rhamnidium elaeocarpus</i>	23	46	2,2	100,0	2,2	0,3	1,3	1,9
<i>Pseudobombax longiflorum</i> (Mart.) A.Robyns	14	28	1,4	100,0	2,2	0,4	2,1	1,9
<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	17	34	1,6	80,0	1,7	0,4	1,9	1,8
<i>Antonia ovata</i> Pohl	22	44	2,1	80,0	1,7	0,2	1,1	1,6
<i>Terminalia argentea</i>	10	20	1,0	80,0	1,7	0,4	1,8	1,5
<i>Vatairea macrocarpa</i> (Benth.) Ducke	14	28	1,4	60,0	1,3	0,3	1,5	1,4
<i>Coccoloba mollis</i> Casar.	16	32	1,5	60,0	1,3	0,3	1,2	1,4
<i>Myrcia glabra</i> (O.Berg) D.Legrand	13	26	1,3	100,0	2,2	0,1	0,4	1,3
<i>Tabebuia roseoalba</i> (Ridl.)	14	28	1,4	80,0	1,7	0,2	0,8	1,3

Outras Espécies	248	496	24,0	2.600,0	56,8	3,2	15,0	31,9
Total	1,03	2,06	100	4,58	100	21,1	100	100

O segundo maior valor de importância foi para *Byrsonima pachyphylla* com (4,5%) único representante da família Malpighiaceae, na sequência *Copaifera langsdorffii* obteve o terceiro maior IVI entre as espécies (4,3%). Essa última espécie apresenta elevado valor econômico devido seu óleo resina e madeira de alto de valor econômico (HECK et al., 2012).

Do total das espécies amostradas 91,3% apresentaram IVI entre 1,3 e 4,5, sendo 21 espécies, inclusive o grupo de mortas. Já os 8,6% apresentaram um IVI maior que 19. Sendo a espécie *Callisthene major* Mart, com um IVI de 19,2% e o grupo de outras espécies com IVI de 31,9%.

Excluindo os indivíduos mortos em pé, 17 espécies de diferentes famílias apresentaram 100% de frequência absoluta, sendo comuns em todas as cinco parcelas entre elas estão *Callisthene major*, *Byrsonima pachyphylla*, *Alibertia* sp., *Copaifera langsdorffii*, *Roupala montan*, *Magonia pubescens*, *Rhamnidium elaeocarpus*, *Curatella americana*, *Luehea grandiflora*, *Qualea parviflora*, *Pseudobombax tomentosum*, *Pseudobombax longiflorum*, *Myrcia glabra*, *Plathymenia reticulata*, *Machaerium acutifolium* e *Dilodendron bipinnatum*.

Dentre as 94 espécies amostradas, 42 apareceram apenas com um ou dois indivíduos por espécie, totalizando 44,6% das espécies encontradas no remanescente estudado. Valores semelhantes encontrados por (AGUIAR et al., 2018). Cabe ressaltar que é um número muito elevado de espécies que ocorrem com poucos indivíduos, indicando uma alta susceptibilidade à extinção local dessas espécies, caso ocorra morte ou corte desses indivíduos.

No presente estudo, foi amostrada a espécie *Myracrodruon urundeuva* com apenas dois indivíduos com IVI menor que (1%), espécie está listada oficialmente pelo do Ministério do Meio Ambiente das espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção.

Os valores encontrados mostram um ambiente rico e diverso, que corroboram com outras áreas de cerrado *sensu stricto* (AGUIAR et al., 2018). Dessa forma, pode-se deduzir que o número de espécies encontradas seja reflexo do bom estado de conservação que estão submetidas às áreas avaliadas, uma vez que não foram observadas atividades que pudessem interferir de forma negativa nos valores de riqueza, como por exemplo, o corte seletivo de certas espécies, ocorrência de fogo, atividades de cunho extrativista ou pastoreio por animais de grande porte como bovinos.

Diante dos resultados, pode inferir-se que o número de espécies encontradas na área avaliada é alto, apresentando uma grande diversidade e riqueza uma vez que os índices de riqueza levam em

consideração o número de espécies, gêneros e famílias, além da forma como os mesmos estão distribuídos na comunidade avaliada.

O índice de diversidade de Shannon (H') encontrado foi de 3,54 e o índice de equabilidade de Pielou (J') de 0,781, indicando que a diversidade da área amostral foi de 78% da máxima possível (MAGURRAN 1988).

Segundo Scolforo et al. (2008), quanto maior o índice de Shannon, maior será a diversidade florística da área de estudo. Valores esses semelhantes aos encontrados constantemente em áreas de cerrado *sensu stricto* da Amazônia Legal, porém esses índices são representados por poucos indivíduos, o que pode torna insustentável a regeneração dessas espécies no fragmento.

DISTRIBUIÇÃO DIAMÉTRICA

As espécies presentes nesse trabalho foram distribuídas em nove classes de diâmetro, com 5 cm de amplitude, a partir de 3 cm até a classe de 30 cm (Figura 3).

As espécies com maior valor de IVI foram *Callisthene major*, *Byrsonima pachyphylla* e *Copaifera langsdorffii* e apresentaram diâmetro médio de 12,1 cm, 7,7 cm e 11,9 respectivamente. A espécie *Callisthene major* esteve predominante em todas as classes de diâmetro (3 a 26,9) cm seguido por *Byrsonima pachyphylla* que apresentou menor número de indivíduos na primeira classe do que na segunda, apresentando uma distribuição diamétrica errática, indicando que novos indivíduos estão se estabelecendo na área em proporção pequena.

A *Copaifera langsdorffii* Desf. por ser caracterizada em estágio sucessional que varia de secundária tardia a clímax apresenta adaptabilidade em diferentes fitofisionomias precisando de sombreamento. Além disso, pode ser encontrada em áreas de solo fértil e bem drenado a áreas de solo muito pobre, ácido e álico se adequando a arranjos diferenciados de plantios e associadas a outras espécies do Cerrado, restabelecendo o equilíbrio ecológico da área em recuperação (TOMAZ, 2017).

Além disso, outra característica que a torna com potencial para uso em áreas de recuperação é suas sementes, que podem ser amplamente disseminadas por pássaros, pois ela é bastante palatável, e eles comem o arilo envolvente. Assim facilita a propagação da espécie quando adulta (LORENZI, 1992).

O gênero *Byrsonima*, cuja espécies são conhecidas popularmente como murici, ocorre principalmente no cerrado (LORENZI & MATOS, 2002).

Esse gênero pertence a família Malpighiaceae, sendo esta polinizada por abelhas das família Apidae, tribos Centridini, Tetrapediini e Tapinotaspidini. (BUCHMANN, 1987).

Esse fenômeno e dependência entre os dois indivíduos é de extrema importância para a manutenção da biodiversidade e propagação da espécie. A *Byrsonima pachyphylla* além de atrair animais e insetos pode ser utilizada na recuperação de áreas degradadas.

A *Callisthene major* é uma espécie de rápido crescimento em áreas naturais de matas de galeria (FELFILI, 1993, 1994). Sendo assim, indicada para recuperação dessas áreas degradadas.

O formato da curva “J” invertido, pode ser observado nas espécies *Copaifera langsdorffii*, *Protium heptaphyllum*, *Qualea multiflora*, *Rhamnidium elaeocarpus*, *Curatella americana* e *Qualea parviflora* indicando uma regeneração satisfatória nas populações destas espécies. Essas espécies possuem diversas finalidades, desde um grande uso medicinal, até utilização madeireira. A espécie *Copaifera langsdorffii*, é amplamente utilizada medicinalmente e também possui uso madeireiro. O óleo da espécie possui propriedades anti-inflamatória, analgésica e antiedêmica e comatividades antimicrobiana, antibacteriana e insetífuga (VEIGA JÚNIOR; PINTO, 2002). O crescimento das mudas no campo é variável, atingindo cerca de 4 m aos 8 anos (TOLEDO FILHO, 1988). A copaíba é espécie plástica quanto às condições edáficas, ocorrendo tanto em áreas de solo fértil e bem drenado como em áreas de solo muito pobre, ácido e álico do Cerrado (CARVALHO, 2003). Dessa forma possui potencial para plantio mediante realização de manejo.

A espécie *Protium heptaphyllum*, exsuda uma resina oleosa e amorfa, cujas aplicações gerais vão desde a fabricação de vernizes e tintas, na calafetagem de embarcações, em cosméticos e em repelentes de insetos (MAIA et al., 2001; MARQUES et al., 2010).

É uma espécie arbórea típica de matas estacionais do Cerrado com populações bem estruturadas e pode ser manejada visando o seu múltiplo. Para o manejo a retirada de espécies lenhosas no raio de 1m em relação a indivíduos de *Protium heptaphyllum* combinada com o corte de cipós nas parcelas promove um incremento diamétrico, sem interferir negativamente na dinâmica da população. Evidenciando a relevância do manejo da floresta visando maior produção florestal (NETO et al., 2015).

A *Qualea multiflora* é uma espécie nativa do bioma Cerrado, que possui potencial medicinal e aptidão para regeneração de ambientes degradados. Conhecida como pau-terra-multiflora, pau-terra-liso, cinzeiro e pau-terra-do-campo (RISSI; CAVASSAN, 2013).

Ademais possui uso medicinal e madeireiro a *Qualea multiflora* e outras espécies do gênero apresentam aptidão para utilização em reflorestamentos, recomposição de áreas degradadas e também paisagismo. Assim, é considerado um gênero importante no cerrado, sendo alvo de constantes estudos (BILIO et al., 2013).

A *Rhamnidium elaeocarpus* produz frutos apreciados pela fauna e muito utilizado pela comunidade. Mais indicado para a recuperação de áreas degradadas.

A *Curatella Americana* possui propriedades medicinais além de ser um bioindicador da presença de ouro o solo. A planta que se localiza na região próxima de depósitos auríferos absorve partículas de ouro, não sendo necessário movimentar o solo, para a descoberta do ouro, pois a planta consegue absorver material de uma grande extensão do terreno (MELO et al., 1990; SILVA et al., 2006).

Os compostos das folhas da espécie também apresentam grande potencial herbicida (BARBOSA et al., 2008).

A *Qualea parviflora* apresenta propriedades medicinais, uso madeireiro e também pode se utilizado na recuperação de áreas degradadas. Sua madeira é leve, mole e pouco durável sendo empregada na produção de carvão vegetal, caixotes, brinquedos e canoas (POTT; POTT, 1994)

Figura 3: Distribuição diamétrica dos indivíduos de uma área de cerrado sensu stricto Cariri do Tocantins – TO.

Fonte: Autor, (2019).

A distribuição do diâmetro no remanescente ficou definido pela forma de J-invertido caracterizando uma curva exponencial, 69,2% dos indivíduos mediram menos de 10 cm de diâmetro. Conforme esperado, a distribuição dos diâmetros do remanescente florestal em questão assumiu o padrão típico de distribuição diamétrica das florestas naturais, no formato de J-invertido (ou exponencial negativa), onde há um elevado número de indivíduos nas primeiras classes diamétricas com diâmetro menores, menor número de indivíduos nas classes de diâmetros maiores assim como o observado por diversos autores (RÊGO et al., 2015) (Figura 4).

Os valores de altura dos indivíduos está de acordo com estagio de crescimento vertical das espécies arbóreas. Os indivíduos foram distribuídos em seis classes de altura da menor altura de (1,6 m) a maior altura de (13,6 m) com amplitude de 2 m (Figura 4). A altura média do remanescente foi de 5,5 m, tendo uma maior concentração no segundo e terceiro intervalo de classe do estrato arbóreo, o que evidencia que 78,7% destes indivíduos apresentaram uma variação de altura entre 3,6 e 7,6 m. Na classe de (1,6 a 3,6 m) as espécies *Callisthene major*, *Byrsonima pachyphylla*, *Myrcia glabra* e o gênero *Alibertia* sp. compuseram (45%). Na classe (3,6 a 5,6 m), as espécies *Callisthene major*, *Byrsonima pachyphylla* e *Protium heptaphyllum* compuseram (31,5%). Na classe (5,6 a 7,6 m) *Callisthene major*, *Byrsonima pachyphylla*, *Luehea grandiflora*, *Roupala montana*, *Qualea multiflora* e *Copaifera langsdorffii* compuseram (42,9%). Na classe (7,6 a 9,6 m), as espécies *Callisthene major*, *Copaifera langsdorffii*, *Vatairea macrocarpa* e *Terminalia argentea* compuseram (61,8%). Na classe (9,6 a 11,6m), apenas 18% do total das espécies foram registradas, e na última classe (11,6 a 13,6 m), somente *Copaifera langsdorffii* esteve presente, vale ressaltar que *Callisthene major* esteve presente em todas as classes de altura de 1,6 a 11,6 m).

Como reflexo do alto número de indivíduos amostrados e, conseqüentemente, uma evidência da sua boa adaptação à área de estudo constituída por formação de cerrado. Espécies afins, como *Callisthene fasciculata* são consideradas como indicadoras de solos ricos em cálcio, podendo sugerir que os solos onde ocorrem apresentam características mesotróficas (FELFILI; SILVA JÚNIOR, 2001).

A distribuição do diâmetro no fragmento ficou definido pela forma de J-invertido caracterizando uma curva exponencial, 69,2% dos indivíduos mediram menos de 10 cm de diâmetro.

A distribuição do diâmetro no remanescente ficou definido pela forma de J-invertido indicando uma autorregeneração do cerrado *sensu stricto* no presente trabalho, corroborando com (RÊGO et al., 2015).

Figura 4: Distribuição diamétrica das classes de altura dos indivíduos de uma área de cerrado *sensu stricto* Cariri do Tocantins – TO.

Fonte: Autor, (2019).

CONCLUSÃO

Pode-se inferir que o remanescente de cerrado *sensu stricto* da Reserva Legal estudada apresentou alta diversidade de Shannon-Wiener e equabilidade dentro dos padrões de Cerrado.

As espécies que mais se destacaram em valor de importância foram *Callisthene major*, *Byrsonima pachyphylla* e *Copaifera langsdorffii*, sendo assim as mesmas podem ser indicadas para recuperação de áreas degradadas pois *Copaifera langsdorffii*, restabelece o equilíbrio ecológico da área em recuperação, *Byrsonima pachyphylla* é uma espécie que atrai muitos polinizadores, sendo essa característica muito importante para a manutenção da biodiversidade e *Callisthene major* é indicada para recuperação de áreas de matas de galeria, além de possuir um rápido crescimento.

O diâmetro no remanescente ficou definido pela forma de J-invertido indicando uma autorregeneração do cerrado *sensu stricto*. Onde assumiu o padrão típico de distribuição diamétrica das florestas naturais. O índice de diversidade de Shannon (H') indicou alta diversidade florística e o índice de equabilidade de Pielou (J') que a diversidade da área amostral foi de 78%.

REFERÊNCIAS

- AGUIAR, B. A. C.; CAMARGO, M. O.; FERREIRA, R. Q. S.; TEIXEIRA, P. R.; SILVA, R. S.; SOUZA, P. B. Florística e estrutura do componente arbustivo-arbóreo de um remanescente de cerrado sensu stricto, Gurupi, Tocantins. *Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável*, Pombal, v. 13, n. 1, p. 45-51, 2018.
- ALMEIDA, R. F.; FAGG, C. W.; OLIVEIRA, M. C.; MUNHOZ, C. B. R.; LIMA, A. S.; OLIVEIRA, L. S. B. Mudanças florística e estruturais no cerrado sensu stricto ao longo de 27 anos (1985-2012) na Fazenda Água Limpa, Brasília, DF. *Revista Rodriguésia*, Rio de Janeiro, v. 65, n. 1, p. 1-19, 2014.
- APG III. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG III. *Botanical Journal of the Linnean Society*, London, v. 161, p. 105-121, 2009.
- BARBOSA, C. S.; MAIA, F.; SANTOS, D. Q.; TERRONES, M. G. H. Potencial herbicida do extrato diclorometanólico de folha da lixeira (*Curatella americana* L.). XII Seminário de Iniciação Científica, p. 1-10, 2008.
- BILIO, R. S.; GUIMARÃES, S. C.; CALDEIRA, S. F. *Qualea grandiflora* Mart.: Temperatura na Germinabilidade de Sementes. *Ciência Florestal*, Santa Maria, v. 23, n. 1, p. 245-251, jan.-mar., 2013.
- BUCHMANN, S. L. The ecology of oil flowers and their bees. *Annu. Rev. Ecol. Evol. Syst.* v. 18, n. 1, p. 343-369, 1987.
- CARVALHO, E. R. *Espécies arbóreas brasileiras*. Brasília, DF: Embrapa Informação
- FELFILI, J. M. Structure and dynamics of a gallery forest in central Brazil. Oxford. U. K; Univerity of Oxford,. 1993. 180 p. Ph.D. Thesis.
- FELFILI, J. M.; SILVA JÚNIOR, M. C. Biogeografia do Bioma Cerrado: estudo fitofisionômico na Chapada do Espigão Mestre do São Francisco. Brasília: Universidade de Brasília, 2001. 152 p.
- FELFILI, J. M.; SILVA JÚNIOR, M. C. Floristic composition, phytosociology and comparison of cerrado and gallery forests at Fazenda Água Limpa, Federal District, Brazil. In: FURLEY, P. A.; PROCTOR, J. A.; RATTER, J. A. *Nature and dynamics of forest-savanna boudaries*. London: Chapman & Hall, 1992. p. 393-415.
- FELFILI, J. M.; SILVA JÚNIOR, M. C.; REZENDE, A. V.; NOGUEIRA, P. E.; WALTER, B. M. T.; SILVA, M.; ENCINAS, J. I. Comparação florística e fitossociológica do Cerrado nas Chapadas Pratinha e dos Veadeiros. In: LEITE, L.; SAITO, C. H. (Ed.). *Contribuição ao conhecimento ecológico do cerrado*. Brasília: Ed. Universidade de Brasília, 1997. p. 6-11.
- FELFLI, J. M. Growth, recruitment and mortality of the Gama galery forest in central Brazil. *Journal of Tropical Ecology*, Cambridge, UK, v. 11, p. 67-83, 1994.
- FERREIRA, Q. S. F.; OLIVEIRA, C. M.; SOUZA, P. B.; ANDRADE, V. C. L. Fitossociologia e estrutura diamétrica de um cerrado sensu stricto, Gurupi – TO. *Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável*, Pombal, v. 10, n. 1, p. 229-235, 2015.

- FINA, G. B.; MONTEIRO, R. Análise da estrutura arbustivo-arbórea de uma área de cerrado sensu stricto, município de Aquidauana – Mato Grosso do Sul. *Revista Árvore*, Viçosa, v. 37, n. 4, p. 577-585, 2013.
- FINGER, Z.; FINGER, F. A. Fitossociologia em comunidades arbóreas remanescentes de cerrado sensu stricto no Brasil Central. *Floresta*, Curitiba, v. 45, n. 4, p. 769-780, 2015.
- FRANCO, A. C. Ecophysiology of woody plants. In: OLIVEIRA, P. S.; MARQUIS, R. J. (Ed.). *The cerrados of Brazil*. New York: Columbia University Press, 2002. p. 178-197.
- HARPER, J. L. *Population biology of plants*. London: Academic Press, 1977. 891 p.
- HECK, M. C.; VIANA, L. A.; VICENTINI, V. E. P. IMPORTÂNCIA DO ÓLEO DE *Copaifera* sp. (COPAÍBA). *SaBios: Revista de Saúde e Biologia*, Campo Mourão, v. 7, n. 1, p. 82-90, 2012.
- LOPES, W. P.; SILVA, A. F. da; SOUZA, A. L. de; MEIRA NETO, J. A. A. Florística e fitossociologia de um trecho de vegetação arbórea no Parque Estadual do Rio Doce, Minas Gerais. *Acta Botanica Brasilica*, Belo Horizonte, v. 16, n. 4, p. 443-456, 2002.
- LORENZI, H. & MATOS, F. L. *Plantas medicinais no Brasil: nativas e exóticas*. Ed. Plantarum. Nova Odessa, São Paulo. 512 p. 2002.
- LORENZI, H. *Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas nativas do Brasil*. Nova Odessa: Instituto Plantarum, 1992. 382p.
- MACHADO, S. A.; AUGUSTYNICZIK, A. L. D.; NASCIMENTO, R. G. M.; FIGURA, M. A.; SILVA, L. C. R.; MIGUEL, E. P.; TEO, S. J. Distribuição diamétrica de *Araucaria angustifolia* (Bert.) O. Ktze. em um remanescente de floresta ombrófila mista. *Scientia Agraria*, Curitiba, v. 10, n. 2, p. 103-110, 2009.
- MAGURRAN, A. E. 1988. *Ecological Diversity and Its Measurement*. Dordrecht: Springer Netherlands. <https://doi.org/10.1007/978-94-015-7358-0>
- MAIA, R. M., et al. Triterpenos da resina de *Protium heptaphyllum* March (Burseraceae): Caracterização em mistura binárias. *Quím. Nova*, v. 23, p. 623-626, 2000.
- MARQUES, D.D. et al. Chemical composition of the essential oils from two subspecies of *Protium heptaphyllum*. *Acta Amaz*, V. 40, p. 227-230, 2010.
- MELO, J. T. et al. Coleta, propagação e desenvolvimento inicial de espécies do Cerrado. In: SANO, S. M., ALMEIDA, S. P. (Ed.). *Cerrado: ambiente e flora*. Planaltina: EMBRAPA-CPAC, 1990.
- MENDONÇA, R. C.; FELFILI, J. M.; WALTER, B. M. T.; SILVA JÚNIOR, M. C.; REZENDE, A. V.; FILGUEIRAS, T. S.; NOGUEIRA, P. E.; FAGG, C. W. Flora vascular do cerrado: checklist com 12.356 espécies. In: SANO, S. M.; ALMEIDA, S. P.; RIBEIRO, J. F. (Ed.). *Cerrado: ecologia e flora*. Planaltina: EMBRAPA-CPAC, 2008. p. 417-1279.
- MIGUEL, P.; GOMES, F.; ROCHA, W.; MARTINS, C.; CARVALHO, C.; OLIVEIRA, A. Efeitos tóxicos do alumínio no crescimento das plantas: mecanismos de tolerância, sintomas, efeitos fisiológicos, bioquímicos e controle genético. *CES Revista*, Juiz de Fora, v. 24, p. 13-30, 2010.

- MUELLER-DOMBOIS, D.; ELLENBERG, H. Aims and methods of vegetation ecology. New York: J. Wiley, 1974. 547 p.
- NETO, C. de M. e S.; VENTUROLI, F.; BASTOS G. B.; FERREIRA, G. A. Incremento diamétrico de *Protium heptaphyllum* (aubl.) Marchand em floresta estacional semidecídua sob manejo, em Pirenópolis, Goiás, Brasil. *Interciência*, v. 40, n. 8, p. 564-569, 2015.
- NETTESHEIM, F. C. Estrutura e florística do estrato arbóreo no cerrado sensu stricto de Buritis, Minas Gerais, Brasil. *Rodriguésia*, Rio de Janeiro, v. 61, n. 4, p. 731-748, 2010.
- OLIVEIRA, P. E. A. M. Fenologia e biologia reprodutiva das espécies de cerrado. In: SANO, S. M.; ALMEIDA S. P.; RIBEIRO J. F. (Ed.). *Cerrado: ecologia e flora*. Planaltina: EMBRAPA-CPAC, 2008. p. 273-290.
- POTT, A.; POTT, V. Plantas do pantanal. Corumbá-MT: Centro de Pesquisa Agropecuária do Pantanal, Embrapa - SPI, 1994. 320 p
- REFLORA. Flora do Brasil 2020 em construção. Rio de Janeiro: Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em <<http://floradobrasil.jbrj.gov.br/>>.
- RÊGO, A. B. M. L.; SOUZA, P. B.; SILVA, R. R.; RÊGO, P. L. Composição florística e estrutural de um componente arbóreo em área de cerrado, Paranã – TO. *Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável*, Pombal, v. 10, n. 5, p. 108-114, 2015.
- RISSI, M.N.; CAVASSAN, O. Uma proposta de material didático baseado nas espécies de Vochysiaceae existentes em uma trilha no cerrado de Bauru – SP. *Biota Neotrop*, v.13, n.1, 2013.
- ROCHA, E.; REYS, P.; SILVA, P. O.; SOARES, M. P. Florística e fitossociologia de um remanescente de cerrado no sudoeste de Goiás. *Revista Global Science Technology*, Rio Verde, v. 7, n. 3, p. 110-118, 2014.
- SANO, E. E.; ROSA, R.; BRITO, J. L. S.; FERREIRA, L. G. Mapeamento de cobertura vegetal do bioma cerrado: estratégias e resultados. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2007. 30 p.
- SANO, E. E.; ROSA, R.; BRITO, J. L. S.; FERREIRA, L. G. Mapeamento semi-detalhado do uso da terra do Bioma Cerrado. *Pesquisa Agropecuária Brasileira*, Brasília, v. 43, n. 1, p. 153-156, 2008.
- SANTOS, L. J.; MARMONTEL, C. V. F.; MARTINS, T. M.; MELO, A. G. Fitossociologia de cerrado sensu stricto localizado no município de Carbonita – MG. *Revista Científica Eletrônica de Engenharia Florestal*, Garça, v. 15, n. 1, p. 77-90, 2010.
- SANTOS-DINIZ, V. S.; SILVA, A. R. L.; RODRIGUES, L. D. M.; CRISTOFOLI, M. Levantamento florístico e fitossociológico do Parque Municipal da Cachoeirinha, município de Iporá, Goiás. *Revista Enciclopédia Biosfera*, Goiânia, v. 8, n. 14, p. 1310, 2012.
- SEPLAN – SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO DO TOCANTINS. Atlas do Tocantins: subsídios ao planejamento da gestão territorial. 3 ed. Palmas: SEPLAN, 2003. 49 p.
- SHEPHERD, G. J. FITOPAC 2.1.2: Manual do usuário. Campinas: UNICAMP, 2010.

SILVA NETO, V. L.; OLIVEIRA, A. L.; FERREIRA, R. Q. S.; SOUZA, P. B.; VIOLA, M. R. Fitossociologia e distribuição diamétrica de uma área de cerrado sensu stricto, Dueré – TO. Revista de Ciências Ambientais, Canoas, v. 10, n. 1, p. 91-106, 2016.

SILVA, C. H. et al. Província aurífera Cuiabá - Poconé - estágio atual do conhecimento geológico dos depósitos de ouro. In: FERNANDES, C. J.; VIANA, R. R. (Ed.). Coletânea Geológica de Mato Grosso: províncias e distritos auríferos de Mato Grosso. Cuiabá: UFMT, 2006. v. 2, p. 35-51

SILVA, G. O.; SOUZA, P. B. Fitossociologia e estrutura diamétrica de um fragmento de cerrado sensu stricto, Gurupi – TO. Desafios: Revista Interdisciplinar da Universidade Federal do Tocantins, Palmas, v. 3, n. Especial, p. 22-30, 2016.

SILVA, R. B. M.; FRANCELINO, M. R.; MOURA, P. A.; MOURA, T. A.; PEREIRA, M. G.; OLIVEIRA, C. P. Relação solo/vegetação em ambiente de cerrado sobre influência do grupo Urucuaia. Ciência Florestal, v. 25, n. 2, p. 363-373, 2015.

SOUZA, P. B.; MEIRA NETO, J. A. A.; SILVA, A. F.; SOUZA, A. L. Composição florística da vegetação arbórea de um remanescente de cerradão, Paraopeba, MG. Revista Árvore, Viçosa, v. 32, p. 771-780, 2008.

SOUZA, P. B.; MEIRA NETO, J. A. A.; SOUZA, A. L. Diversidade florística e estrutura fitossociológica de um gradiente topográfico em Floresta Estacional Semidecidual Submontana, MG. Cerne, Lavras, v. 19, p. 489-499, 2012.

SOUZA, P. B.; SAPORETTI JUNIOR, A. W.; SOARES, M. P.; VIANA, R. H. O.; CAMARGOS, V. L.; MEIRA NETO, J. A. A. Florística de uma área de cerradão na Floresta Nacional de Paraopeba – Minas Gerais. Cerne, Lavras, v. 16, n. 1, p. 86-93, 2010. Tecnológica, 2003. 1039 p.

TOLEDO FILHO, D. V. Competição de espécies arbóreas do cerrado. São Paulo : Boletim Técnico do Instituto Florestal. v. 42, p. 61-70, maio 1988.

TOMAZ, D. J. Influência da massa de semente e da fertilidade do solo no desempenho de espécies arbóreas em restauração de área ripária. 2017. 50f. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de São Carlos, São Carlos – SP.

VEIGA JÚNIOR, V. F.; PINTO, A. C. O gênero *Copaifera* L. Química Nova, v. 25, p. 273-286, 2002.

Capítulo 4

10.37423/210604342

ANÁLISE DE IMAGENS DE PLÂNTULAS PARA AVALIAÇÃO DO VIGOR DE SEMENTES DE MORINGA OLEIFERA LAM.

Marcio Dias Pereira

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Josefa Patricia Balduino Nicolau

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

André Dantas de Medeiros

Universidade Federal de Viçosa

Francisca Adriana Ferreira de Andrade

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Alessandra Mendes Pacheco Guerra vale

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Andressa Vasconcelos Flores

Universidade Federal de Santa Catarina

Resumo: A utilização de técnicas que envolvem a análise computadorizada de plântulas na avaliação da qualidade de lotes de sementes tem se mostrado muito eficiente. O objetivo deste trabalho foi verificar a eficiência do Sistema de Análise de Plântulas (SAPL) na detecção de diferenças de vigor entre lotes de sementes de moringa em comparação com as informações fornecidas por testes de vigor tradicionalmente utilizados. Para tanto, determinou-se a sua qualidade fisiológica pelos testes de germinação, primeira contagem de germinação, índice de velocidade de germinação, emergência, índice de velocidade de emergência, envelhecimento acelerado tradicional, envelhecimento acelerado com solução salina e com o SAPL. O delineamento foi o inteiramente casualizado com quatro repetições. Os parâmetros obtidos na análise computadorizada aos oito dias (comprimento da parte aérea, comprimento da raiz primária, comprimento total de plântula, índice de crescimento, índice de uniformidade e índice de vigor) como o software SAPL foram eficientes para diferenciar os lotes não somente entre lotes de baixo e alto vigor, mas também em lotes de qualidade intermediária.

Palavras-chave: Análise computadorizada; germinação; envelhecimento acelerado.

INTRODUÇÃO

A *Moringa oleifera* Lam. vem ganhando destaque, principalmente no semiárido brasileiro, por ser uma espécie que, além de se adaptar bem as condições de restrição hídrica, pode ser utilizada para fins farmacêuticos, alimentação humana e animal, como também em diferentes tipos de indústrias. Com o aumento da procura pelas partes utilizadas da planta, tem crescido a demanda por mudas da espécie para plantios domiciliares e comerciais. Entretanto, são escassos os estudos relacionados à tecnologia de produção e métodos padronizados para a avaliação da qualidade das sementes dessa espécie, material imprescindível para sua propagação.

Novas técnicas de avaliação da qualidade de sementes podem ser associadas a testes cujas metodologias já são consagradas, conferindo a elas mais rapidez ou precisão. Entre os testes utilizados na análise de sementes, pode-se destacar envelhecimento acelerado, utilizando água ou pela substituição dela por solução saturada de NaCl, que é um dos mais tradicionais e eficientes para a avaliação do vigor de sementes de várias espécies (BAALBAKI et al., 2009). Embora o procedimento para a realização dos vários testes de vigor esteja estabelecido e forneça dados confiáveis (MARCOS FILHO;

KIKUTI; LIMA, 2009), uma das deficiências para o aplicação destes testes de vigor estão relacionadas com o tempo gasto para a execução e a subjetividade da análise (MARCOS FILHO, 2015).

Contudo, técnicas de análise computadorizadas de imagens utilizadas para a avaliação de imagens de plântulas, e associadas aos testes tradicionais, podem minimizar essas limitações, pois destacam-se por sua precisão e objetividade (SAKO et al., 2001), entretanto, é necessário adaptá-las as diferentes espécies vegetais. Dentre os softwares disponíveis no mercado, destaca-se o Seed Vigor Imagin System (SVIS), criado pela Universidade Estadual de Ohio (OSU) e que tem servido de base para a criação de outros sistemas semelhantes. Entre os sistemas desenvolvidos a partir do proposto por SAKO et al. (2001) está o Sistema Análise de Plântulas (SAPL), que fornece dados do comprimento da parte aérea, raiz primária e total, índices de vigor, de crescimento e de uniformidade da plântula. O presente estudo teve como objetivo verificar a eficiência do Sistema de Análise de Plântulas (SAPL) na detecção de diferenças de vigor entre lotes de sementes de moringa em comparação com as informações fornecidas por testes de vigor tradicionalmente utilizados.

METODOLOGIA

O estudo foi realizado no Laboratório Análise de Sementes (LAPS) na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), localizado em Macaíba, RN, Brasil. Utilizaram-se quatro lotes de sementes de *Moringa oleifera* cujos frutos foram coletados manualmente em árvores matrizes isoladas no município de Limoeiro do Norte/CE. A qualidade fisiológica das sementes de cada lote foi avaliada por meio dos testes a seguir:

Teste de germinação e primeira contagem de germinação: quatro repetições com 25 sementes para cada lote foram distribuídas em rolos de papel toalha (Germitest®) umedecidos com água destilada na quantidade equivalente a 2,5 vezes o peso do papel seco. Os rolos foram acomodados em sacos plásticos transparentes (24 x 34 cm), e acondicionados em germinador tipo B.O.D. (Biochemical Oxygen Demand) regulado à temperatura de 30°C aos 12 dias.

As contagens das sementes germinadas foram realizadas no sétimo (primeira contagem) e no 12º dia (germinação) após a instalação do teste. Os resultados foram expressos em porcentagem de plântulas normais, de acordo com as recomendações para a espécie, sugeridas por Bezerra et al. (2004).

Índice de velocidade de germinação (IVG): foi conduzido junto com o teste de germinação com contagem diária do número de sementes que emitiram raiz primária igual ou superior a 1 mm e calculando-se o IVG de acordo com a fórmula proposta por Maguire (1962).

Emergência de plântulas: foi conduzido em casa de vegetação com quatro repetições de 25 sementes para cada lote, distribuídos em bandejas plásticas (15 x 21 x 5 cm) contendo areia fina (0,2 mm). A porcentagem de emergência de plântulas foi determinada aos 14 dias.

Índice de velocidade de emergência (IVE): realizado concomitante ao com o teste de emergência e determinado a partir da contagem diária do número de plântulas emergidas, sendo o IVE calculado de acordo com a fórmula proposta por Maguire (1962). Envelhecimento acelerado tradicional (EAT): uma camada de sementes foi distribuída sobre uma tela de metal acoplada em uma caixa plástica do tipo gerbox (11 x 11 x 3,5 cm) contendo 40 mL de água destilada no fundo. Cada caixa foi coberta e exposta a temperatura de 40 °C por 72 horas em germinadores do tipo B.O.D. (MEDEIROS, 2015); posteriormente, conduziu-se os testes para a determinação do teor de água e da porcentagem de germinação com contagem final aos oito dias.

Envelhecimento acelerado com solução salina (EAAS): Conduzido de forma semelhante ao procedimento tradicional, porém, com o uso de 40 mL de solução saturada de NaCl (40 g de NaCl em

100 mL de água), em substituição a água destilada (JIANHUA; MCDONALD, 1996). Análise computadorizada de imagens de plântulas pelo SAPL: trata-se de um sistema automatizado de análise de plântulas, a partir de imagens digitais, desenvolvido na EAJ/UFRN pelo Grupo de Estudos em Tecnologia de Sementes (GETSem) e o Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (TADS).

Para as análises, quatro repetições de 20 plântulas de cada lote de sementes provenientes dos testes de germinação, envelhecimento acelerado tradicional e envelhecimento acelerado com solução salina, aos oito dias após a instalação dos testes de germinação, foram submetidas a análise de vigor a partir do SAPL. Para que as imagens pudessem ser capturadas por meio de fotografia digital, as plântulas de cada repetição foram transferidas do papel toalha (Germitest®) para um fundo azul, constituído de uma folha de papel EVA de coloração azul (40 x 60 cm) contendo dez células (5 cm de largura cada) separadas por uma faixa branca. Cada plântula foi colocada em uma célula, e na primeira célula (da direita para a esquerda, colocou-se uma métrica, formada por dois pontos, distantes um centímetro um do outro, além da identificação das plântulas e das repetições (Figura 1).

Figura 1. Fundo azul de papel EVA para captação de imagens com plântulas a serem analisadas pelo SAPL

Ao iniciar o programa, após a tela inicial, selecionou-se a espécie que seria analisada. Em seguida, preencheu-se com os valores mínimos, determinados para a espécie, do comprimento da parte aérea e da raiz primária para uma plântula da espécie. Para a moringa, considerou-se como tamanho mínimo de plântula aceitável, 0,4 e 0,2 cm para a parte aérea e para a raiz, respectivamente, de acordo com o sugerido por Rocha (2015). Na mesma tela, preencheu-se o peso do crescimento e da uniformidade no cálculo do índice de vigor, que neste trabalho foram definidos na proporção 70:30 (crescimento: uniformidade), como proposto por GOMES JUNIOR et al. (2009).

Depois de registrados esses valores, iniciou-se o carregamento das imagens das plântulas por repetição, e posteriormente, o processamento de cada plântula a ser analisada. Os resultados são automaticamente salvos em um arquivo do tipo Excel e arquivados na pasta correspondente ao lote analisado. Os arquivos fornecem os resultados da avaliação das plântulas, sendo, comprimento da parte aérea, da raiz primária e da plântula inteira, além dos índices de crescimento (IC), uniformidade (IU) e de vigor (IV), de acordo com os cálculos propostos por Sako et al. (2001), e gerados automaticamente pelo programa.

O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado com quatro repetições por tratamento. Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e, ao se verificar efeito significativo dos tratamentos, as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% ou pelo teste de Kruskal- Wallis a 5% de probabilidade. Para todas as análises, utilizou-se do programa estatístico ASSISTAT (CTRN/UFCG), versão 7.7 beta.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Tabela 1, encontram-se os resultados dos parâmetros relacionados à caracterização fisiológica das sementes de moringa. Pelos testes de germinação e primeira contagem não foi possível diferenciar lotes entre si, apresentando baixas porcentagens de germinação. Marcos Filho (1999) afirma que o resultado do vigor das sementes está associado diretamente à influência do ambiente e, por conseguinte, testes baseados no desenvolvimento de plântulas em laboratório, como primeira contagem, IVG e o próprio teste de germinação podem não apresentar exatidão para detectar diferenças pouco acentuadas no potencial fisiológico das sementes.

Tabela 1. Germinação (G), primeira contagem (PCG), índice de velocidade de germinação (IVG), emergência (E), e índice de velocidade de emergência (IVE), germinação após o envelhecimento acelerado tradicional (EAT) e germinação após o envelhecimento acelerado com água salina (EAAS) de sementes de *Moringa oleifera* de quatro lotes de sementes.

Lotes	G (%)	PCG (%)	IVG	E (%)	IVE	EAT (%)	EAAS (%)*
1	38 a	38 a	2,70 a	76 a	2,62 a	25 a	22 a
2	39 a	39 a	3,84 a	44 b	1,63 b	17 a	14 ab
3	62 a	62 a	4,64 a	71 a	2,47 a	21 a	9 b
4	49 a	49 a	3,89 a	62 a	2,19 ab	13 a	12 ab
CV (%)	26,17	26,17	29,30	12,88	14,33	40,7	-

Letras minúsculas iguais não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ($P < 0,05$).

*Letras iguais não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Kruskal-Wallis ($P < 0,05$).

Delouche e Baskin (1973), afirmam que lotes com potencial fisiológico diferentes podem apresentar germinação semelhante, o que acontece devido à ausência de precisão do teste de germinação em distinguir diferenças de vigor entre lotes, tendo em vista que a perda da capacidade de germinação é um dos últimos estágios no processo de deterioração de sementes.

Para o teste de emergência em casa de vegetação (Tabela 1), observou-se que os lotes 1, 3 e 4 diferiram do lote 2. No IVE, também observou-se diferença entre os lotes, sendo o lote 2 o que apresentou menor índice. Estudos realizados por Guedes et al. (2009) confirmaram que os testes de emergência e índice de velocidade de emergência também foram eficientes para determinação do vigor de lotes de sementes de *Erythrina velutina* Willd, indicando que este teste é mais eficiente do que o teste de germinação para a distinção do vigor entre lotes de sementes. Fica evidente no presente estudo que os testes de vigor para as sementes de moringa relacionados à emergência em campo foram os mais eficazes para ranquear os lotes em diferentes níveis de vigor, quando comparados aos testes realizados em laboratório.

Para todos os lotes, no teste de emergência em casa de vegetação (média de 63,25%) obteve-se maior percentual de plântulas normais em relação ao teste de germinação (média de 47%) (Tabela 1), a temperatura e umidade mais elevadas no rolo de papel toalha podem ter interferido na taxa de germinação em laboratório. No teste de germinação com sementes submetidas ao envelhecimento

acelerado tradicional (EAT), os lotes não se diferenciaram, entretanto, no teste de germinação com sementes submetidas ao envelhecimento acelerado com água salina (EAAS) observa-se diferenciação entre os lotes, sendo o lote 1 com a maior taxa de germinação, os lotes 2 e 4 intermediários (Tabela 1). Quando comparado o EAAS com a taxa de germinação, emergência, primeira contagem em laboratório, índice de velocidade de emergência, massa seca em laboratório observa-se que o EAAS foi mais eficaz em detectar diferenças entre o potencial fisiológico dos lotes de semente de moringa (Tabela 1). De acordo com Baalbaki et al.(2009), o teste de envelhecimento acelerado com solução saturada de NaCl, é um dos mais eficientes para determinar o vigor entre os lotes.

Segundo Tekrony (2003), o vigor das sementes não está relacionado com uma única característica mensurável, como germinação, mas um conceito que descreve várias características relacionadas com um ou mais fatores do desempenho do lote de sementes; portanto, o conjunto dessas informações pode estabelecer o comportamento de sementes mais vigorosas.

Os resultados da avaliação das plântulas obtidas após o oitavo dia de instalação do teste de germinação, pelo método tradicional, e analisadas pelo SAPL estão apresentados na Tabela 2, para os quatro lotes de sementes de moringa. Observa-se que, para o comprimento da raiz primária não se identificou diferenças entre os quatro lotes. Porém, para a parte aérea, o comprimento total, os índices de uniformidade e vigor houve diferenciação entre o lote 3 e os demais lotes. Para o índice de crescimento, observou-se melhor desempenho do lote 3, em comparação com os lotes 1, 2 e 4. A utilização do índice de crescimento também foi eficaz para a avaliação do vigor de sementes de *Impatiens wallerana* (OAKLEY et al., 2004), em um sistema de análise computadorizada de imagens de plântulas semelhante ao SAPL. Segundo aqueles autores, a avaliação do crescimento de plântulas após a germinação pode ser considerado um teste de vigor significativo. Há um fundamento de que o crescimento das plântulas diminui com o aumento da deterioração das sementes, e que os lotes de sementes mais vigorosas devem deteriorar-se de modo mais lento que as menos vigorosas (SILVA; CICERO, 2014).

Tabela 2. Comprimento da parte aérea (CPA), da raiz primária (CRP) e da plântula total (CPT), índices de uniformidade (IU), crescimento (IC) e vigor (IV) de sementes de Moringa oleifera através da avaliação do uso do SAPL a partir de plântulas obtidas pelo teste de germinação.

Lote	CPA	CRP	CPT	IU	IC	IV
	cm					
1	2,95 b	2,93 a	5,89 b	827,55 a	253,60 b	586,87 a
2	3,64 b	2,96 a	6,60 b	780,85 a	252,10 b	554,15 a
3	5,61 a	3,76 a	9,37 a	646,92 b	337,10 a	470,17 b
4	3,70 b	2,86 a	6,57 b	791,92 a	274,90 ab	562,60 a
CV %	21,11	21,84	13,87	4,71	13,39	4,55

Letras minúsculas iguais não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ($P < 0,05$).

Para análise pelo SAPL na germinação de plântulas de moringa com sementes submetidas ao envelhecimento acelerado tradicional, não foi detectado diferenças estatísticas nos comprimentos (aérea, radicular e total) e nos índices (uniformidade, crescimento e vigor) os quatro lotes de sementes (Tabela 3).

Tabela 3. Comprimento da parte aérea (CPA), da raiz primária (CRP) e da plântula total (CPT), índices de uniformidade (IU), crescimento (IC) e vigor (IV) de sementes de Moringa oleifera através da avaliação do uso do SAPL a partir de plântulas obtidas pelo teste de germinação de sementes submetidas ao teste de envelhecimento acelerado tradicional.

Lote	CPA	CRP	CPT	IU*	IC	IV
	cm					
1	2,74 a	3,13 a	5,87 a	880,32 a	215,20 a	623,27 a
2	2,86 a	3,70 a	6,56 a	854,70 a	271,40 a	606,47 a
3	2,63 a	3,80 a	6,44 a	829,02 a	250,50 a	586,75 a
4	2,43 a	1,99 a	4,43 a	600,12 a	194,60 a	605,45 a
CV %	24,99	35,46	22,27	-	31,07	9,71

Letras minúsculas iguais não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ($P < 0,05$).

*Letras iguais não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Kruskal-Wallis ($P < 0,05$).

Os resultados da avaliação de germinação de plântulas de sementes de moringa submetidas ao envelhecimento acelerado com solução de NaCl analisadas pelo sistema SAPL estão apresentados na Tabela 4. Para o comprimento da parte aérea observa-se que o lote 1 apresentou diferenças significativas dos lotes 2, 3 e 4. Para a parte radicular o lote 1 ainda demonstrou diferenças significativas entre os lotes 2 e 3, entretanto o lote 4 demonstrou resultados intermediários entre o lote com maior

parte radicular (lote 1) e os lotes com menores comprimentos radiculares (lote 2 e 3). As médias dos comprimentos totais das plântulas apresentaram diferença entre os lotes, sendo o lote 1 aquele com maior comprimento, os lotes 3 e 4 intermediários e o lote 2 com menor comprimento. A avaliação do comprimento de plântula por softwares pode ser considerado eficiente para identificar diferenças no potencial fisiológico de sementes de várias espécies (NAKAGAWA, 1999). Além dessa sensibilidade, seus resultados podem resultar estreita relação com a emergência de mudas no campo (VANZOLINI et al., 2007).

Tabela 4. Comprimento da parte aérea (CPA), da raiz primária (CRP) e da plântula total (CPT), índices de uniformidade (IU), crescimento (IC) e vigor (IV) de sementes de Moringa oleifera através da avaliação do uso do SAPL a partir de plântulas obtidas pelo teste de germinação de sementes submetidas ao teste de envelhecimento acelerado com solução salina de NaCl.

Lote	CPA	CRP	CPT*	IU	IC*	IV*
	cm					
1	3,92 a	3,80 a	7,72 a	834,25 a	295,80 a	592,82 a
2	2,65 b	1,78 b	4,43 b	864,72 a	165,80 b	504,75 a
3	2,77 b	2,16 b	4,93 ab	862,10 a	182,60 ab	608,92 a
4	2,57 b	2,85 ab	5,42 ab	903,70 a	298,70 a	641,55 a
CV %	17,86	22,35	-	4,49	-	-

Letras minúsculas iguais não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ($P < 0,05$).

*Letras iguais não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Kruskal-Wallis ($P < 0,05$).

Quando avaliadas as médias dos índices de crescimento (IC) de plântulas oriundas de sementes germinadas a partir do EAAS, notou-se uma diferença significativa entre os lotes, onde o lote 1 e 4 com maiores índices, o lote 3 com índices intermediários e o lote 2 com menor índice. Os índices de uniformidade (IU) e vigor (IV) não apresentaram diferenças significativas entre os lotes.

A avaliação com sementes submetidas ao envelhecimento acelerado com solução de NaCl apresentou uma melhor estratificação de lotes, diferenciando os mesmo não somente entre lotes de baixo (lote 2) e alto (lote 1) vigor, mas também em lotes de qualidade intermediária (lotes 3 e 4) (Tabela 4).

Estudos comparando o vigor de lotes de sementes de pimentão (PANOBIANCO; MARCOS FILHO, 1998) e sementes de couve-brócolos (MARTINS et al. 2002), também observaram que testes usando o envelhecimento acelerado (41°C por 72 h) com solução salina foram mais eficazes na detecção de diferenças de qualidade de lotes que o envelhecimento acelerado tradicional.

Entretanto, em estudo realizado com sementes *Tabernaemontana fuchsiaefolia* A. DC o envelhecimento acelerado tradicional foi eficiente para avaliar o vigor, e o envelhecimento acelerado com solução salina de NaCl não foi eficiente para avaliar o vigor de sementes (MORAES et al., 2016).

Conclusão

A análise de imagens de plântulas através SAPL permitiu a identificação de lotes não só com alto (lote 1) e baixo (lote 2) vigor, mas também lotes intermediários (lotes 3 e 4). A identificação dos lotes com baixo vigor podem contribuir para a melhoria da eficiência dos sistemas de produção, tornando possível a escolha correta dos lotes para semeadura. É importante destacar que sementes menos vigorosas podem levar mais tempo para estabelecer, isso pode favorecer ataque patógenos, os quais normalmente já estão presentes no solo e podendo causar o tombamento de mudas ou até mesmo a morte da semente, afetando diretamente na produção.

REFERÊNCIAS

- BAALBAKI, R.; ELIAS, S.; MARCOS FILHO, J.; MCDONALD, M. B. Seed vigor testing handbook. Ithaca: Association of Official Seed Analysts, 2009. 341 p.
- BEZERRA, A.M.E.; MOMENTÉ, V.G.; MEDEIROS FILHO, S. Germinação de sementes e desenvolvimento de plântulas de moringa (*Moringa oleifera* Lam.) em função do peso da semente e do tipo de substrato. *Brasília, Horticultura Brasileira*, v.22, n.2, p. 295-299, 2004.
- DELOUCHE, J.C.; BASKIN, C. C. Accelerated aging techniques for predicting the relative storability of seed lots. *Seed Science and Technology*, v. 1, n. 2, p. 427-52, 1973.
- GOMES JUNIOR, F.G.; MONDO, V. H. V.; CICERO, S.M.; MCDONALD, M. B.; BENNETT, M.A. Evaluation of priming effects on sweet corn seeds by SVIS. *Seed Technology*, Lincoln, v.31, n.1, p. 95-100, 2009.
- GUEDES, R. S.; ALVES, E. U.; GONÇALVES, E. P.; SANTOS, S. R. N.; LIMA, C. R. Testes de vigor na avaliação da qualidade fisiológica de sementes *Erythrina velutina* Willd. (Fabaceae - Papilionoideae). *Ciência e Agrotecnologia*, Lavras, v. 33, n. 5, p. 1360-1365, 2009.
- JIANHUA, Z.; MCDONALD, M.B. The saturated salt accelerated aging test for small-seeded crops. *Seed Science and Technology*, v.25, p. 123-131, 1996.
- MAGUIRE, J. D. Speed of germination aid in selection and evaluation for seedling emergence and vigor. *Crop Science*, v.2, n.2, p. 176-177, 1962.
- MARCOS FILHO, J. Seed vigor testing: an overview of the past, present and future perspective. *Scientia Agricola*, Piracicaba, v.72, n.4, July/Aug. 2015.
- MARCOS FILHO, J. Teste de envelhecimento acelerado. In: KRZYZANOWSKI, F.C.;
- VIEIRA, R. D.; FRANÇA NETO, J.B. (Ed.) Vigor de sementes: conceitos e testes. Londrina: ABRATES, 1999. p. 1.1-1.21.
- MARCOS FILHO, J.; KIKUTI, A. L.; LIMA, L. B. Métodos para avaliação do vigor de sementes de soja, incluindo a análise computadorizada de imagens. *Revista Brasileira de Sementes*, Brasília, DF, v. 31, n. 1, p. 102-112, 2009.
- MARTINS, C. C; MARTINELU-SENE, A.; CASTRO, M. M.; NAKAGAWA, J.; CAVARIANI, C. Comparação entre métodos para a avaliação do vigor de lotes de sementes de couvebrócolos (*Brassica oleracea* L. var. *itálica* Plenck). *Revista Brasileira de Sementes*, Londrina, v.24, n.2, p. 96-101, 2002.
- MEDEIROS, M. L. S. Testes para a avaliação da qualidade fisiológica de sementes de *Moringa oleifera* Lam. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Unidade Acadêmica Especializada Em Ciências Agrárias - UECIA. Pós-Graduação Em Ciências Florestais. Macaíba, RN, 2015.
- MORAES, C. E.; LOPES, J. C.; FARIAS, C. C. M.; MACIEL, K. S. Qualidade fisiológica de sementes de *Tabernaemontana fuchsiaefolia* A. DC em função do teste de envelhecimento acelerado. *Ciência Florestal*, Santa Maria, v. 26, n. 1, p. 213-223, 2016.

NAKAGAWA, J. Testes de vigor baseados no desempenho de plântulas. In: KRZYZANOWSKI, F. C., VIEIRA, R. D.; FRANÇA NETO, J. B. Vigor de Sementes: conceitos e testes. Londrina: ABRATES, Comitê de Vigor de Sementes. 1999. 218 p.

OAKLEY, K.; KESTER, S. T.; GENEVE, R. L. Computeraided digital image analysis of seedling size and growth rate for assessing seed vigour in Impatiens. Seed Science and Technology, v. 32, n. 3, p. 837-845, 2004.

PANOBIANCO, M.; MARCOS-FILHO, J. Comparação entre métodos para avaliação da qualidade fisiológica de sementes de pimentão (*Capsicum annuum* L.) Revista Brasileira de Sementes, Brasília, v.20, n.2, p. 306-310, 1998.

ROCHA, T. G. F. Qualidade fisiológica de sementes e plântulas de Moringa oleifera LAM. por meio da técnica de análise de imagens. Dissertação (Mestrado) – Universidade

Federal do Rio Grande do Norte. Unidade Acadêmica Especializada Em Ciências Agrárias - UECIA. PósGraduação Em Ciências Florestais. Macaíba, RN, 2015.

SAKO, J. F.; MCDONALD, M. B.; FUJIMURA, K.; EVANS, A. F.; BENNET, M. A. A system for automated seed vigor assessment. Seed Science and Technology, Zurich, v. 29, n. 3, p. 625- 636, 2001.

SILVA, V. N.; CICERO, S. M. Image seedling analysis to evaluate tomato seed physiological potential. Revista Ciência Agronômica, v. 45, n. 2, p. 327-334, 2014.

TEKRONY, D. M. Precision is an essential component in seed vigour testing. Seed Science and Technology, v. 31, n. 2, p. 435-447, 2003.

VANZOLINI, S; ARAKI, C. A. S.; SILVA, A. C. T. M.; NAKAGAWA, J. Teste de comprimento de plântula na avaliação da qualidade fisiológica de sementes de soja. Revista Brasileira de Sementes, Brasília, v. 29, n. 2, p. 90-96, 2007.

Capítulo 5

10.37423/210604361

CARTOGRAFIA DO RISCO: EROSÃO COSTEIRA NO LITORAL PARAIBANO

Anne Sales Barros

Universidade Federal de Campina Grande

Lúcia Taíse de Oliveira Alves

Universidade Federal de Campina Grande

Éllida Cilene de Oliveira Dantas

Universidade Federal de Campina Grande

Guilherme Ferreira de Brito

Universidade Federal de Campina Grande

Vandiler Ferreira Junior

Universidade Federal de Campina Grande

Luís Gustavo de Lima Sales

Universidade Federal de Campina Grande

Resumo: A faixa litorânea brasileira concentra uma enorme urbanização, contendo várias metrópoles por toda sua extensão, portanto com essa preocupação com possíveis transtornos que a erosão costeira pode causar ao longo do tempo nessa área, foi realizado um estudo na cidade de João Pessoa-PB na praia do Bessa, onde reflete algumas vertentes que acontecem em todo litoral do país. A erosão costeira é um fenômeno frequente na ocupação do litoral, devido ao aumento do valor econômico das regiões costeiras e do seu desenvolvimento. Diante da problemática imposta nesse contexto, há a necessidade para realização deste estudo visando compreender o quanto a erosão está avançando, abrangendo uma análise multidisciplinar, permitindo uma visão mais crítica, com fundamentos para obter prováveis soluções futuras. Para obtenção das informações necessárias foram utilizadas diversas metodologias e técnicas, com o intuito de se aprofundar o conhecimento sobre erosão, como: declividade da praia, determinação da granulometria, grau de vulnerabilidade, campos de dunas, método da velocidade e direção dos ventos pelo anemômetro e biruta/bússola e a análise da vegetação que é um indicador visual de erosão costeira. De acordo com os dados obtidos nesse trabalho, observou-se que o mapeamento da área nos permite ter mentalidade mais cautelosa diante dos perigos identificados. Já para as autoridades responsáveis, as informações mapeadas servirão para identificar os pontos vulneráveis nesse ambiente, fazendo com que haja uma preocupação maior nesses pontos, tornando-se a primeira medida prevencionista. Encontrar soluções práticas para eliminar os riscos, ou quando não for possível, ao menos controlá-los, melhorando o ambiente e as condições.

Palavras-chave: Mapeamento; Declividade, Erosão, Estudo de campo, Litoral.

INTRODUÇÃO

A faixa litorânea brasileira concentra uma enorme urbanização, contendo várias metrópoles por toda sua extensão, portanto com essa preocupação de possíveis transtornos que a erosão costeira pode causar ao longo do tempo nessa área, foi realizado um estudo na cidade de João Pessoa-PB na praia do Bessa onde reflete algumas vertentes que acontecem em todo litoral do país.

Atualmente as alterações espaciais da linha de costa constituem-se um problema sério em todo o mundo. A erosão costeira é um fenômeno frequente e quanto mais o litoral é ocupado, mais se acentua o problema, devido ao aumento do valor econômico das regiões costeiras e da forma que assume o desenvolvimento. Este fenômeno, pela complexidade das interações entre os diversos fatores naturais e antrópicos, tem sido nos últimos tempos um maior relevo das planificações das atividades de desenvolvimento e principalmente de ordenação da zona costeira, já que a própria obra pode ser afetada por estes fatores ou provocar a intensificação da erosão e gerar perdas para outros setores da costa adjacente (FARIAS, 2008 apud MAIA, 2005).

É importante frisar que os problemas ambientais ocorridos estão intimamente ligados a interferência antrópica por meio da urbanização do litoral, desde da década de 70 quando ocorreu a difusão generalizada das modernizações tanto no campo como na cidade a construção de edificações cresceu gradativamente.

Diante da problemática imposta nesse contexto, há a necessidade para realização deste estudo visando compreender o quanto essa erosão está avançando, abrangendo uma análise multidisciplinar que permite visão mais crítica e com fundamentos para obter prováveis soluções futuras.

METODOLOGIA

- **Área de Estudo**

O estudo foi realizado na praia do Bessa, norte do litoral pessoense, localizada em João Pessoa na Paraíba, apresenta 6 km de extensão com areias claras e batidas, águas calmas e recifes. É uma praia considerada urbana, o Bessa é uma das praias mais procuradas, visitadas e conhecidas do litoral e situa-se no bairro de mesmo nome (Bessa).

- **Metodologia da coleta e análise**

Para a obtenção das informações necessárias, foram utilizadas diversas metodologias e técnicas, com o intuito de se aprofundar no conhecimento sobre a erosão costeira:

- Declividade da praia;
- Grau de vulnerabilidade;
- Campos de dunas;
- Método da velocidade e direção dos ventos;
- Vegetação.

DECLIVIDADE DA PRAIA

A declividade da praia se deu por meio da escolha do equipamento topográfico economicamente mais barato e de fácil manuseio. Diante disto, o aparelho rudimentar, popularmente conhecido como “pé-de-galinha”. Para a confecção do aparelho utilizou-se materiais de alvenaria, tais, como: três ripas de madeira (duas com 2,10 m de comprimento e a outra com 1,20 m de comprimento), parafusos, barbante de náilon e um peso quaisquer, de massa aproximadamente, 500 g. De modo que o equipamento possua o formato representativo da letra “A” (Figura 01).

Fig.01 Representação do aparelho “Pé de Galinha”.

No levantamento topográfico, foram realizadas observações do ponto de maior cota em cada gleba, onde será centralizado e nivelado o equipamento. Inicia-se um seguimento de reta em direção ao ponto de menor cota, medindo-se, com régua graduada sequencialmente a diferença de nível entre as extremidades do aparelho em cada ponto. O nivelamento e a centralização do equipamento são realizados em cada ponto (estação) de modo que o barbante sempre esteja equidistante das extremidades do aparelho, ou seja, centralizado. Assim, com o somatório das diferenças de alturas (d) e o comprimento de cada ponto (N) será obtido respectivamente a diferença de nível total do terreno (Z) e seu comprimento de rampa (H).

A declividade do terreno foi calculada de acordo com Oliveira et. al. (2010), sendo que o declive da área em porcentagem (D) é igual a divisão entre a diferença de nível total (Z) e a distância horizontal (H), multiplicado por 100, como expresso pela equação para obtenção da declividade da área de estudo. Equação – Cálculo para obtenção da declividade da área de estudo

$$D = (Z/H) * 100$$

CAMPOS DE DUNAS

Este método foi realizado de modo visual/fotográfico, os cordões dunares, que bordejam a linha de praia, representam barreiras protetoras contra erosão e inundação (Bauer & Sherman 1999), com isso a importância de obter o resultado desta análise a sua vulnerabilidade se deu por meio de:

Vulnerabilidade:

- I. BAIXA: Grande extensão de campos de dunas.
- II. MODERADA: Dunas de baixas altitudes.
- III. ALTA: Sem dunas

MÉTODO DA VELOCIDADE E DIREÇÃO DOS VENTOS PELO ANEMÔMETRO E BIRUTA/BÚSSOLA

Cada área analisada na região estudada foi georreferenciada a partir de pontos em cada litoral, a velocidade será dada pelo instrumento anemômetro, e a direção pela bússola tradicional/ biruta.

VEGETAÇÃO

Indicador visual de erosão costeiras nos litorais, pode-se considerar uma das mais importantes, pois define claramente o estado possível do local, segue a forma de definir o grau de intensidade da erosão.

- I. Intensidade baixa: Vegetação rasteira de duna ou restinga soterrada com raízes expostas.
- II. Intensidade baixa: Escarpa erosiva nas dunas.
- III. Intensidade média: Árvores na face da praia ou com raízes expostas.
- IV. Intensidade média: Marcas de erosão na base de muros residenciais.
- V. Intensidade média: Pós praia estreita ou inexistente.
- VI. Intensidade média: Obras não estruturais de proteção costeira².
- VII. Intensidade alta: Obras estruturais de proteção costeira.

VIII. Intensidade alta: Destruição de estruturas artificiais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

VENTOS

De acordo com Neves (2003), predominam os ventos do quadrante SE durante todo o ano com frequência em média 64% e velocidade média de 3m/s sendo as maiores velocidades registradas nos meses de novembro, dezembro janeiro e fevereiro seguidos pelos ventos do nordeste nos meses de julho e agosto, setembro e outubro com frequência de 13,3% e velocidade média de 3,5m/s. Os ventos do sul apresentam frequências de 10,2% e velocidade média de 2,5m/s. Os ventos do leste exibem frequência de 3,4% e velocidade média de 3,0m/s enquanto os do sudeste com frequência de 0,6% e velocidade de 1m/s.

De acordo com os dados de Reis (2001), referente ao ano de 1999 a velocidade média mensal destes ventos foi de 6,0m/s, atingindo valores maiores que 9m/s na época chuvosa que é entre os meses de julho e agosto, com mínimas de 3m/s no mês de maio.

Conforme os parâmetros estabelecidos por Neves e Reis para velocidade dos ventos no litoral paraibano os resultados obtidos nos três pontos analisados obtiveram um pequeno aumento em relação aos padrões (Tabela 01).

Tabela 01: Velocidade e direção dos ventos.

	Área 1	Área2	Área3
<i>Média velocidade dos ventos</i>	5,5m/s	6,42m/s	4,7m/s
<i>Direção dos ventos em cada área</i>	167°S	158,3°SE	139,4°SE

Fonte: Elaborada pelo autor

Esse aumento se dá pelo fato de se aproximar o período chuvoso da região sendo capaz de alcançar cerca de mais de 9 m/s, a predominância no estudo realizado nas áreas 1,2 e 3 na praia do Bessa evidenciaram ventos com sentido SE, esses ventos influenciam na dinâmica costeira gerando ondas com baixa a alta intensidade (dependendo do período do ano estudado) que agem no aporte de sedimentos acelerando a erosão costeira.

ONDAS

As ondas são formadas pela ação conjunta de vento e água, seus efeitos são notados em ambientes lacustres, litorâneos e margens de rios. O embate das águas (fluxo e refluxo) nas margens provoca o desagregamento de material, permanecendo este suspenso e sendo depositado posteriormente no fundo dos rios, lagos, mares e etc.

A erosão costeira é provocada principalmente pelo impacto das ondas que quebram no litoral, e pelas correntes marítimas. Também contribuem para o processo erosivo o movimento de subida e descida das marés, o trabalho de erosão que é executado pelas ondas, também é chamado de abrasão.

Segundo Christtianne (2008) as alturas das ondas foi de 0,50m e o período de onda média anual do litoral paraibano foi de 10,0s, sendo que o período mínimo (mensal) foi de 5,1s, no inverno, e máximo de 14,2s no verão.

Conforme os parâmetros estabelecidos por Christtianne (2008) para o período das ondas no litoral paraibano, os resultados obtidos durante o estudo nos três setores analisados obtiveram valores relativamente próximos dos padrões estabelecidos (Tabela 02).

Tabela 02: Período da onda.

	<i>Setor 1</i>	<i>Setor 2</i>	<i>Setor 3</i>
<i>Período médio da onda</i>	10s	Sem presença de ondas	6,2s

Fonte: Elaborada pelo autor

O entendimento da frequência que as ondas incidem sobre a costa litorânea é de extrema importância pois, com a velocidade dos ventos que incidem sobre o mar causando as ondas influenciam na dinâmica de sedimentos fornecidos e retirados da praia, e com isso são afetados.

VEGETAÇÃO E DUNAS

O método foi realizado pelo procedimento da percepção visual, e de maneira prática, sabendo que as dunas são formadas por sedimentos depositados na praia seca, e após isso transportadas pelo vento, nos três setores não haviam nenhuma taxa mínima que pudesse ser comparada a dunas, ou seja, sem dunas que nos faz perceber a grande vulnerabilidade à erosão que a praia tem tido.

Já em relação a vegetação, obtivemos tais resultados: O primeiro setor (vegetação rasteira de dunas ou restinga soterrada com raízes expostas, pós praia estreita ou inexistente, árvores na face da praia ou com raízes expostas, obras não estruturais de proteção costeira) foi encontrado indicadores de intensidades baixas e médias em relação a erosão local.

O segundo setor (vegetação rasteira de dunas ou restinga soterrada com raízes expostas, pós praia estreita ou inexistente, marcas de erosão na base de muros residenciais, obras estruturais de proteção costeira) foi encontrado indicadores de intensidades baixas, médias e altas em relação a erosão local.

O terceiro setor (vegetação rasteira de dunas ou restinga soterrada com raízes expostas, pós praia estreita ou inexistente, marcas de erosão na base de muros residenciais, obras não estruturais de proteção costeira, destruição de estruturas artificiais) foi encontrado indicadores de intensidades baixas, médias e altas em relação a erosão local (Figura 2).

Figura 2: Vegetação local do setor 3, na praia do Bessa/PB

Fonte: Luíz Gustavo Lima

DECLIVIDADE

A metodologia utilizada em três setores da praia do Bessa/PB, durante a coleta de dados, foi observada o pós-praia, berma e praia, obtendo a diferença significativa que existe em função do berma (Figura 3 e Figura 3.1), a declividade do terreno foi calculada de acordo com Oliveira et. al. (2010) $D = (Z/H) * 100$ (Tabela 3 e Tabela 4).

Tabela 3: Declividade

<i>Setor 1 (10:44 horas)</i>		<i>Setor 2 (11:17 horas)</i>		<i>Setor 3 (12:45 horas)</i>	
<i>Distância vertical (m)</i>	<i>Distância horizontal (m)</i>	<i>Distância vertical (m)</i>	<i>Distância horizontal (m)</i>	<i>Distância vertical (m)</i>	<i>Distância horizontal (m)</i>
BERMA	22 m	BERMA	10 m	BERMA	34 m
1,07 m		1,21 m		1,58 m	

$\sum 3,53 \text{ m}$	60 m	$\sum 2,23 \text{ m}$	42 m	$\sum 3,42 \text{ m}$	82 m
-----------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	------

Fonte: Elaborada pelo autor

Tabela 4: Resultados realizados através da equação

Setores	1	2	3
Declividade total(%)	5,88	5,30	4,17

Fonte: Elaborada pelo autor

De acordo com as classes de declividade (EMBRAPA, 1979), os três setores da praia do Bessa, tem o revelo suave-ondulado (entre 3% e 8%), e a principal limitação destes solos é a sua moderada fragilidade ambiental, condicionada basicamente pelo maior comprimento de rampa, que os torna moderadamente suscetíveis à erosão.

Figura 3: Berma

Fonte: Luiz Gustavo Lima

Figura 3.1: Medição do Berma

Fonte: Luiz Gustavo Lima

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com os dados obtidos neste trabalho, pode ser observado que pela assertiva de uma metodologia para a investigação das causas da nocividade da erosão na praia do Bessa /PB só irá ter uma maior efetividade quando acompanhada de mais estudos aprofundados, a erosão costeira tem sido grande enfoco nos debates sociais, com isso vemos o total apoio e necessidade de prosseguir conferindo o entendimento na organização das áreas estudadas.

O mapeamento dessa área nos permite ter mentalidade mais cautelosa diante dos perigos identificados, é importante visar a parte socioambiental, pois com o auxílio da sociedade teríamos um melhor êxito, a conscientização da sustentabilidade, e formas alternativas para o desenvolvimento da área urbana na zona costeira, já para as autoridades responsáveis, as informações mapeadas servirão para identificar os pontos vulneráveis nesse ambiente, fazendo com que haja uma preocupação maior nesses pontos, de forma a se tornar a primeira medida prevencionista.

As metodologias aplicadas mostraram ainda mais a realidade já compreendida visualmente, é fundamental que o trabalho contra este fenômeno seja iniciado rapidamente, encontrar soluções práticas para eliminar os riscos, ou, quando não for possível, ao menos controlá-los, melhorando o ambiente e as condições.

REFERÊNCIAS

Utilização de aparelho topográfico rudimentar para adoção de práticas conservacionistas. Medeiros, J. L. S., Silva, T. J. R. D., Dourado, M.F., Campos, G. M., Jesus, I. S., Dantas, J.S. Semiárido Brasileiro – Volume 2/Organização Editora Poisson – Belo Horizonte - MG: Poisson, 2019

Medeiros, J. L. S., Silva, T. J. R. D., Dourado, M.F., Campos, G. M., Jesus, I. S., Dantas, J.S. Utilização de aparelho topográfico rudimentar para adoção de práticas conservacionistas. Semiárido Brasileiro – Volume 2/Organização Editora Poisson – Belo Horizonte - MG: Poisson, 2019

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA. Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solos (Rio de Janeiro, RJ). Súmula da 10. Reunião Técnica de Levantamento de Solos. Rio de Janeiro, 1979. 83p. (EMBRAPA-SNLCS. Micelânea, 1).

George Martine, Gordon McGranahan. Urbanização do Território. Portal São Francisco ,20 de jun 2009. Disponível em:<<https://www.portalsaofrancisco.com.br/geografia/urbanizacao-do-territorio>> Acesso em 29 de jun de 2019

Christianne Maria Moura Reis. Litoral de João Pessoa (PB). Frente ao problema de erosão costeira, 2008. Disponível em <https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/6203/1/arquivo3905_1.pdf> Acesso em 29 de junho de 2019