A low-angle, upward-looking photograph of a dense forest. Numerous tall, slender tree trunks rise from the bottom towards the top of the frame, creating a strong sense of height and verticality. The canopy is thick with green leaves, and sunlight filters through in dappled patterns. The overall color palette is dominated by greens and browns, with bright highlights where the sun hits.

VOLUME III

**CIÊNCIAS AGRÁRIAS:
A MULTIDISCIPLINARIDADE
DOS RECURSOS NATURAIS**

EDITORA CONHECIMENTO & LIVRO

Frederico Celestino Barbosa

Ciências agrárias: a multidisciplinaridade dos recursos naturais

3ª ed.

Piracanjuba-GO
Editora Conhecimento Livre
Piracanjuba-GO

3ª ed.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Barbosa, Frederico Celestino
B238C Ciências agrárias: a multidisciplinaridade dos recursos naturais
/ Frederico Celestino Barbosa. – Piracanjuba-GO

Editora Conhecimento Livre, 2021

129 f.: il

DOI: 10.37423/2021.edcl338

ISBN: 978-65-89955-82-5

Modo de acesso: World Wide Web

Incluir Bibliografia

1. agronomia 2. engenharia-florestal 3. engenharia-agrícola 4. medicina-veterinária 5. engenharia-de-pesca I. Barbosa, Frederico Celestino II. Título

CDU: 630

<https://doi.org/10.37423/2021.edcl338>

O conteúdo dos artigos e sua correção ortográfica são de responsabilidade exclusiva dos seus respectivos autores.

EDITORA CONHECIMENTO LIVRE

Corpo Editorial

Dr. João Luís Ribeiro Ulhôa

Dra. Eyde Cristianne Saraiva-Bonatto

Dr. Anderson Reis de Sousa

MSc. Frederico Celestino Barbosa

MSc. Carlos Eduardo de Oliveira Gontijo

MSc. Plínio Ferreira Pires

Editora Conhecimento Livre

Piracanjuba-GO

2021

CAPÍTULO 1	7
PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS ALUNOS DO COLÉGIO ESTADUAL ZACARIAS DE GÓIS – LICEU PIAUIENSE SOBRE TRÁFICO DE ANIMAIS SILVESTRES	
Leide Daiane Alves da Silva José Williams Gomes de Oliveira Filho DOI 10.37423/211004869	
CAPÍTULO 2	21
SUPERAÇÃO DA DORMÊNCIA DE SEMENTES DE APEIBA TIBOURBOU AUBL.	
Ana Clara Carneiro Fonseca Bruno Aurélio Campos Aguiar Hygor Gomes de Almeida Sousa Milena Oliveira Xavier Priscila Bezerra de Souza DOI 10.37423/210804646	
CAPÍTULO 3	26
ESTIMATIVA VOLUMÉTRICA PARA ALSOPHILA SETOSA KAULF EM FRAGMENTO DE FLORESTA OMBRÓFILA MISTA	
Jocasta Lerner Isabel Homczinski Keyla Karine Michalichen Rafael Henrique Roque Fábio Gomes Monteiro Aparecida Juliana Martins Correa Antonio Higo Moreira de Sousa Maranhão Aline Beatriz do Vale DOI 10.37423/211004786	
CAPÍTULO 4	36
ESTIMATIVA VOLUMÉTRICA PARA DICKSONIA SELLOWIANA (PRES.) HOOK EM FRAGMENTO DE FLORESTA OMBRÓFILA MISTA	
Jocasta Lerner Keyla Karine Michalichen Rafael Henrique Roque Fábio Gomes Monteiro Aparecida Juliana Martins Correa Antonio Higo Moreira de Sousa Maranhão Aline Beatriz do Vale DOI 10.37423/211004787	

CAPÍTULO 5	46
ESTUDO GENÉTICO DE UMA POPULAÇÃO DE PERACUCA (KALYPTODORAS BAHIENSIS) COLETADOS A MONTANTE DE UMA BARRAGEM NO RIO PARAGUAÇU.	
Thiago Silva Oitaven Duarte Joemille Silva dos Santos Clarita Silveira Reis Ricardo Franco Cunha Moreira Soraia Barreto Aguiar Fonteles DOI 10.37423/211004834	
CAPÍTULO 6	63
UTILIZAÇÃO DE MICRORGANISMOS PROMOTORES DE CRESCIMENTO NA CULTURA DO TOMATE	
Hygo Rafael Ramos de Jesus Jonatas Barros dos Santos Alberto do Nascimento Silva José de Oliveira Cruz Rodrigo Barros dos Santos Lincon Rafael da Silva Cleuber Oliveira de Sousa DOI 10.37423/211004863	
CAPÍTULO 7	75
APLICAÇÃO DO DIAGNÓSTICO RÁPIDO DA ESTRUTURA DO SOLO (DRES) NO PROJETO DE ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO	
Thamires Oliveira Gomes Gleidson Marques Pereira Thayrine Silva Matos Jhuan Santana Silva Brito Seidel Ferreira dos Santos DOI 10.37423/211004868	
CAPÍTULO 8	85
EFEITO DA PROFUNDIDADE E VELOCIDADE DE SEMEADURA NO DESENVOLVIMENTO E PRODUTIVIDADE DE SORGO	
Tiago Pereira da Silva Correia Leandro Augusto Felix Tavares Saulo Fernando Gomes de Sousa Paulo Roberto Arbex Silva Samantha Vieira da Almeida Patrícia Pereira Dias DOI 10.37423/211004875	

CAPÍTULO 9 92

ANÁLISE SENSORIAL DE SUCO DE GRAVIOLA (ANONNA MURICATA L.) NA REGIÃO DE BELÉM

Ivan Carlos da Costa Barbosa
Diego Fabrício Santa Rosa Cardoso
José Marcos Nobre de Moura Junior
Ewerton Carvalho de Souza
Antonio dos Santos Silva

DOI 10.37423/211004903

CAPÍTULO 10 100

COMPORTAMENTO AGRONÔMICO DO COENTRO SOBRE DIFERENTES TIPOS DE ADUBAÇÕES: ANÁLISE DOS PARÂMETROS MORFOLÓGICOS E DE PRODUTIVIDADE

Gabriel Damasceno Ferreira Cunha
Andrey Gabriel Camelo Mastop
José Igor Reis de Araújo
César Dias Pantoja
Jessivaldo Rodrigues Galvão

DOI 10.37423/211004905

CAPÍTULO 11 107

SACARIFICAÇÃO DA CASCA DO CUPUAÇU (THEOBROMA GRANDIFLORUM SCHUM) ATRAVÉS DE HIDRÓLISE ÁCIDA

Gustavo Henrique Barroso da Silva
Erika Santiago da Silva
Gabriel Vinicius Barroso da Silva
Carlos Henrique dos Santos Barbosa
Giovana Lima de Souza
Anderson Mathias Pereira
Leiliane do Socorro Sodré de Souza

DOI 10.37423/211004914

CAPÍTULO 12 118

ÁGUAS ARMAZENADAS EM CISTERNAS E VIABILIDADE DA DESINFECÇÃO SOLAR NO SEMIÁRIDO

Ana Luiza da Silva
Walter Santos Evangelista Júnior
Lourinalda Luiza Dantas da Silva Selva de Oliveira
Alessandra Quirino Bertoso dos Santos Jardim
Jorge Luiz Schirmer de Mattos

DOI 10.37423/211004926

Capítulo 1

10.37423/211004869

PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS ALUNOS DO COLÉGIO ESTADUAL ZACARIAS DE GÓIS – LICEU PIAUIENSE SOBRE TRÁFICO DE ANIMAIS SILVESTRES

Leide Daiane Alves da Silva

INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ

José Williams Gomes de Oliveira Filho

INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ

Resumo: O tráfico de animais é um grave problema no que diz respeito á manutenção e função ecológica da biodiversidade, gerando um desequilíbrio no local em que o animal foi retirado, e consequentemente podendo levar a extinção do animal capturado, pois muitas vezes essas capturas de animais silvestres servem para a fabricação de ferramentas usando partes desses animais, utilizadas para transportar drogas sendo introduzidos em um habitat diferente do seu, levando-os a não adaptação e consequentemente a morte. Essa questão está atualmente sendo debatida na sociedade e ate nas escolas a fim de alertar e informar sobre esses problemas, principalmente pela Superintendência do IBAMA no Piauí que desenvolve atividades educativas sobre o tráfico de animais através do Projeto Liberdade e Saúde. É uma iniciativa pioneira que se vale da formação de multiplicadores para alertar a sociedade sobre os danos provocados pelo tráfico de animais silvestres a nossa biodiversidade. Este trabalho teve como finalidade levar alunos do 3º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Zacarias de Góis, à central do IBAMA em Teresina-Pi, para assistirem uma Palestra sobre o tráfico de animais silvestres. Para que os alunos pudessem compreender a importância da manutenção do equilíbrio ecológico e possibilitar ações que evitem a destruição da natureza. Com a palestra os alunos puderam compreender a importância da manutenção do equilíbrio ecológico e também do combate ao trafico de animais silvestres que prejudica o ecossistema e consequentemente a humanidade.

Palavras chaves: tráfico de animais, desequilíbrio, biodiversidade, palestra.

1. INTRODUÇÃO

No Brasil a cultura de domesticação de animais perdura por um longo período, sendo que essa deu início com os índios onde os mesmos utilizavam parte dos animais para fabricação de ferramentas, penas para ornamentação indígena, em rituais e, depois da chegada dos colonizadores esta ação predatória tornou-se mais intensa pelo fato de imaginar que a fauna brasileira por ser diversificada é também inesgotável. Todos os anos milhões de animais são retirados de nossas matas. Sendo vítimas do tráfico de animais silvestres.

A diversidade proporciona condições para que a própria humanidade adapte-se às transformações em seus meios físico e social e disponha de recursos que atendam a suas novas exigências. Assim, uma alteração considerável na diversidade das espécies afeta a qualidade dos ecossistemas de resistência como, por exemplo, ter mecanismo para habituar-se a poluição, manter a produtividade do solo, purificar a água, ou seja, a sua capacidade de adequação se torna mitigada, e isso afeta diretamente na vida do ser humano (GABRIELA, 2007).

Os animais retirados da natureza deixam de cumprir seu papel ecológico, prejudicando a manutenção da biodiversidade e conseqüentemente o equilíbrio do local que o animal foi retirado. Retirar um animal da natureza é delito federal, passível de multa que pode chegar a cinco mil reais, se a espécie estiver ameaçada de extinção.

O comércio ilegal de animais silvestres está vinculado a outros tipos de atividades ilegais, tais como drogas, armas, álcool e pedras preciosas. Na América do Sul, os cartéis de drogas têm amplo envolvimento com o comércio ilegal de fauna silvestre, muitas vezes se utilizam da fauna para conduzirem seus produtos. Frequentemente, são localizadas drogas dentro de animais vivos ou em suas peles (Toufexis, 1993; Le Duc, 1996).

Contudo, faz-se necessário o entendimento sobre as diferenças existentes entre os animais domésticos, da fauna silvestre nativa e exótica proporcionando conhecimento as pessoas antes de adquirirem um animal para que possam fazer a escolha adequada.

Conforme a Portaria Portaria/IBAMA nº 93, de 07 de Julho de 1998 (BRASIL, 1998) são considerados:

Fauna Silvestre Brasileira: são todos aqueles animais pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do Território Brasileiro ou águas jurisdicionais brasileiras.

Fauna Silvestre Exótica: são todos aqueles animais pertencentes às espécies ou subespécies cuja distribuição geográfica não inclui o Território Brasileiro e as espécies ou subespécies introduzidas pelo homem, inclusive domésticas em estado asselvajado ou alçado. Também são consideradas exóticas as espécies ou subespécies que tenham sido introduzidas fora das fronteiras brasileiras e suas águas jurisdicionais e que tenham entrado em Território Brasileiro.

Fauna Doméstica: Todos aqueles animais que através de processos tradicionais e sistematizados de manejo e/ou melhoramento zootécnico tornaram-se domésticas, apresentando características biológicas e comportamentais em estreita dependência do homem, podendo apresentar fenótipo variável, diferente da espécie silvestre que os originou. De acordo com a RENCITAS - Rede nacional contra o Tráfico de Animais Silvestres - os números mais recentes indicam que cerca de 38 milhões de animais silvestres são contrabandeados anualmente. A maior parte proveniente de países de fauna privilegiada como o Brasil.

Desde 2006, a Superintendência do IBAMA no Piauí desenvolve o Projeto Liberdade e Saúde. É uma ação precursora que se vale da formação de multiplicadores para alertar a sociedade sobre os agravos provocados pelo tráfico de animais silvestres a nossa biodiversidade.

O Projeto Liberdade e Saúde tem sido modelo para outras iniciativas por todo o Brasil. Dentro de sua programação o projeto promove palestras sobre o tráfico de animais silvestres a qual foi disponibilizada pelo IBAMA para os alunos envolvidos nessa pesquisa. O presente trabalho busca desenvolver as habilidades e competências pertinentes a área de acordo com o PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) e, compreender a importância da manutenção do equilíbrio ecológico promovendo ações que evitem a destruição da natureza através dessa ferramenta pedagógica (palestra) que possibilita efeitos educativos sobre o indivíduo e a sociedade e, assim sensibilizar o público-alvo dessa pesquisa os alunos do Colégio Estadual Zacarias de Góis – Teresina – Piauí do 3º ano do Ensino Médio da Educação Básica sobre os problemas relacionados com tráfico de animais que afeta o equilíbrio do ecossistema e consequentemente afeta a humanidade.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Relatos históricos garantem que desde os primórdios da colonização, o fascínio provocado pelos recursos naturais encontrados no território brasileiro, ocasionou o contrabando de espécies da fauna e da flora, bem como materiais preciosos aqui existentes (CALHAU, 2004).

O Brasil, desde a sua colonização, sempre teve seus recursos naturais explorados de forma arbitrária e irracional. Imaginava-se que os nossos recursos eram ilimitados e automaticamente renováveis. Com a destruição gradativa de nossas matas, a fauna silvestre, como componente do ecossistema, foi sensivelmente prejudicada, pois com a desintegração de seus habitats, os animais não se reproduziam como antigamente. Além da caça indiscriminada, muitos dos animais silvestres eram, e continuam sendo, levados para o exterior ou mesmo comercializados internamente no comércio ilícito. Desde o século dezoito já se registrava de forma crítica sobre o desmatamento e a degradação ambiental, observando, de certa forma, a necessidade da preservação da natureza para o desfrute das gerações futuras (JAMIL, 2006).

No Brasil, a questão do tráfico ilegal é inquietante, haja vista ser um dos países mais requisitados quando da procura por fauna e flora silvestres. Além disso, importante ressaltar que, a atitude da sociedade perante toda essa irregularidade, é a de impunidade, de forma que é comum a permanência de feiras, lojas irregulares e criadouros clandestinos, que tão somente encoraja o comércio ilegal (GABRIELA, 2007).

Segundo o que preceitua o Art. 29 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, conhecida como Lei dos Crimes Ambientais, considera-se crime, matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente (BRASIL, 1998).

A fauna silvestre tem importância essencial na manutenção e preservação da biodiversidade, operando sobre a vegetação e a cadeia alimentar, retirando dela energia para garantir sua sobrevivência. Ela também é de extrema importância para o turismo, pois a cada ano cresce o número de pessoas que buscam os parques naturais para ver os animais silvestres, o que representa um potencial econômico importantíssimo, pois necessitam usar hotéis e o comércio próximo às áreas de observação, sem contar a pesca para alimentação em áreas naturais que também gera milhões de dólares em todo o mundo. Além desse aspecto, a pesca esportiva pode se tornar enorme fonte de renda para o Estado por meio de impostos e para milhões de pessoas ou empresas ligadas direta ou indiretamente a ela (DANIANE, 2008).

No Brasil existem vários órgãos de combate ao tráfico de animais e proteção entre eles está a RENCTAS - Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres - é uma instituição sem fins lucrativos, que tem por objetivo aglutinar o setor público, o setor privado e a sociedade civil constituída no sentido de elaborarem ações e estratégias contra o comércio ilegal da fauna brasileira. Desde o seu

lançamento oficial, em 14 de janeiro de 1999, a RENTAS buscou formalizar várias parcerias, com instituições governamentais e não governamentais, para alcançar seus objetivos e estabelecer canais imutáveis para a permuta de informações e apoio mútuo. Tornou-se, assim, uma referência nacional e internacional nas questões ligadas à preservação da fauna brasileira (RENTAS, 2001).

A Educação Ambiental, rotineiramente, tem se oferecido como um conjunto de técnicas para decidir problemas ambientais, partindo de aspectos ecológicos, científicos e tecnológicos, e também tem salientado o contexto sócio-histórico no qual se geram e desenvolvem as problemáticas que procura resolver, visto que um povo que não possui memória histórica está condenado a repeti-la constantemente. Desde o início, a Educação Ambiental está sujeita a várias tendências, tantas são as visões que têm coexistido sobre a relação sociedade – natureza. Com esta perspectiva podemos identificar duas correntes a conservacionista e a transformadora. A corrente Conservacionista, a educação fixa sua função social na precisão de gerar uma consciência ambiental para a proteção das espécies em ameaça de extinção e daqueles recursos não renováveis, para impedir seu esgotamento, baseada num conhecimento fechado e objetivo, a partir de uma perspectiva biologicista e simplista da realidade ambiental (JEFERSON, 2008).

A Corrente conservacionista não colabora para uma apreciação mais intensa dos problemas ambientais, pois esta discute apenas problemas de conservação e não faz a discussão dos problemas sociais, políticos, econômicos e do próprio princípio econômico vigente que é responsável pela destruição do meio ambiente, ou seja, é uma corrente que não amplia o pensamento crítico do educando e não faz com que aconteça a emancipação (JEFERSON, 2008). No entanto a corrente transformadora analisa a educação como uma práxis social, que coopera para o processo de constituição de uma sociedade regulada por novos patamares civilizacionais e societários diferentes dos atuais, na qual a sustentabilidade da vida, a atuação política consciente e a construção de uma ética que se garanta como ecológica sejam seu cerne (JEFERSON, 2008).

Na Educação Formal é importante que a Educação Ambiental transformadora seja trabalhada, pelo fato de que a perspectiva crítica e histórica implica entender as relações existentes entre educação, sociedade, trabalho e natureza, em um processo global de aprendizagem imutável em todas as esferas da vida, com implicações societárias (JEFERSON, 2008).

A corrente transformadora envolvida com a educação ambiental faz uso do princípio de incerteza racional (MORIN, 2002, p.26), ou seja, de uma racionalidade que constitui o diálogo entre a idéia e o real objetivo, sendo teórica, prática, crítica a realidade e ao seu próprio movimento que é parte dessa

mesma realidade. De uma racionalidade aberta que nega a racionalização trancada do mundo por desconsiderar tudo aquilo que não cabe em seu modelo hermético e objetivo. De uma racionalidade ambiental que determina um conhecimento dinâmico, metodologicamente arquitetado por meio de permanentes interrogações sobre o mundo, a sociedade, a espécie e o próprio conhecimento (JEFERSON, 2008).

3. METODOLOGIA

O recurso utilizado para realização desse trabalho foi feito através de uma palestra realizada no auditório do IBAMA e ministrada pela equipe do projeto Liberdade e Saúde cujo tema é “Tráfico de animais silvestres” tendo como palestrantes os analistas ambientais Fabiano Barbosa Pessoa e Sandoval Gonçalves de Moura da Superintendência do IBAMA no Piauí. O endereço do local é Av. Homero Castelo Branco, 2240 – Horto Florestal. Para que o IBAMA pudesse agendar a palestra se fez necessário um ofício dirigido ao superintendente do IBAMA no estado do Piauí Romildo Macedo Mafra fazendo a solicitação da mesma com os dias e horário previsto para a realização da palestra, materiais expositivos e o número de alunos que irão assistir à palestra. O deslocamento dos alunos para o local da palestra foi feito através de um ônibus.

A quantidade de alunos que assistiram à palestra foram 40 alunos do Colégio Estadual Zacarias de Góis no município de Teresina-PI, sendo que a palestra foi realizada na seguinte data 28/09/2011 tendo início às 15h com duração de 1h 30min. Os alunos estavam acompanhados da Professora de biologia Yara Ferreira Lima, que faz parte do corpo docente ao qual pertencem os alunos e dos bolsistas do programa de iniciação a docência do Instituto Federal do Piauí – IFPI.

Os materiais pedagógicos (elaboradas e fornecidas pela equipe do projeto Liberdade e Saúde - IBAMA) utilizados durante a palestra foram jogos educativos, cartazes, folhetos e vídeos.

Foi usado um questionário contendo 8 perguntas objetivas sobre o tema tráfico de animais silvestres, sendo aplicado antes e depois da palestra com o intuito de avaliar o rendimento dos alunos a respeito da palestra ministrada.

4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS

Durante o período de trabalho realizado com as turmas de 3º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Zacarias de Góis observou-se o interesse dos alunos (Figura 1) sobre o assunto em questão. Com isso promovemos uma palestra (Figura 2) e no decorrer da mesma os alunos estavam bastante

participativos e atentos às informações sobre o tema e às fotos que mostravam a realidade triste e cruel desses animais.

Figura 1 - Alunos assistindo a palestra

Fonte: Auditório do IBAMA

Figura 2 - Explicação da palestra

Fonte: Auditório do IBAMA

Durante a explicação da palestra foram mostrados slides, vídeos, fotos, sites, folhetos informativos e gibis sobre o tráfico de animais silvestres. O questionário (Figura 3) elaborado para o desenvolvimento da pesquisa era composto por 8 questões sobre o tema sendo aplicado antes e depois da palestra com objetivo de avaliar o rendimento dos alunos em relação à mesma. Com os questionamentos abordados podemos analisar o nível de conhecimento adquirido pelos alunos.

Figura 3 - Alunos respondendo o questionário

Fonte: Sala de aula do Colégio Estadual Zacarias de Góis

A primeira pergunta do questionário foi se eles sabiam o que era tráfico de animais silvestres, 95% (Figura 4) dos estudantes responderam que “sim”, após a palestra todos compreenderam o que era o tráfico de animais. De acordo com Daniane, grande parte das pessoas que têm animais da fauna silvestre os adquire ilicitamente, não tendo consciência de estar cometendo um crime ambiental e, além disso, acreditam estar protegendo esses animais sem levar em consideração outros fatores tais como: a aflição e estresse do animal, as doenças que podem ser transmitidas ao ser humano, como por exemplo, a raiva febre amarela hepatite A e tuberculose, que pode ser transmitida pelos primatas, salmonelose, verminose e micose, pelos répteis e toxoplasmose, zoonoses que podem ser transmitidas pelas aves; e as consequências para o meio ambiente, como por exemplo, a perda da biodiversidade, o desequilíbrio ecológico e a extinção das espécies.

Figura 4 – Opinião dos alunos sobre o que é tráfico de animais silvestres

Ao serem questionados antes e depois da explicação do tema se traficar animais silvestres é crime, todos os alunos responderam que sim, isso mostra que eles compreendem que existe uma lei que proíbe o trafico conforme preceitua o Art. 29 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, conhecida como Lei dos Crimes Ambientais, considera-se crime, matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar

espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente (BRASIL, 1998).

Antes da palestra ao serem questionados se possuíam noção do prejuízo ambiental que causa o tráfico de animais silvestres 77% (Figura 5) responderam que “sim”, após a palestra os 23% que haviam respondido “não”, compreenderam tal prejuízo. Ribeiro e Silva afirmam que dentre os impactos mais significativos gerados pelo comércio ilegal de fauna destacam-se a diminuição da abundância de determinadas populações incluindo o risco de extinção, alterações na estrutura dos ecossistemas.

Figura 5 – Opinião dos entrevistados sobre a noção prejuízo ambiental causado pelo tráfico de animais silvestres.

Ao serem indagados sobre quais animais são mais atingidos pela ação do tráfico 77% afirmaram que a espécie mais atingida seria as aves, 18% mamíferos e 5% répteis (Figura 6). De acordo com a RENCTAS os produtos de fauna silvestre são muito utilizados para produzir adereços e artesanatos. As espécies envolvidas variam ao longo dos tempos, de acordo com os costumes e os mercados da moda. Normalmente, se comercializam couros, peles, penas, garras, presas, além de diversos outros. Todos esses produtos entram no mercado de moda e souvenir para turistas. No Brasil, podemos destacar os psitacídeos como fornecedores de penas, os répteis e mamíferos, como principais fornecedores de peles.

Figura 6 - Opinião dos entrevistados de espécies de animais mais atingidas devido à ação do tráfico.

Ao serem questionados sobre quem deveria ser punido pelo crime de tráfico de animais 85% (Figura 7) responderam que os quem vende e quem compra são culpados e devem ser punidos, após a palestra todos responderam que ambos vendedor e comprador são culpados e devem responder pelo crime cometido. Segundo o Artigo 29 inciso III da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

Figura 7 – Opinião dos entrevistados sobre quem deve ser punido pelo crime de traficos de animais.

Ao serem indagados sobre a diferença de um animal silvestre e do doméstico, 80% (Figura 8) responderam que sim, e após as palestras todos distinguiram essa diferença. A fauna silvestre é um dos recursos naturais que se tornou vítima da ganância humana. A fauna silvestre é um dos recursos naturais que se tornou vítima da ganância humana. Hoje em dia é fato comum nas famílias brasileiras às pessoas terem em suas casas animais da fauna silvestre mantidos como animais de estimação. Para um melhor entendimento, é importante o conhecimento das diferenças existentes entre animais domésticos (estreita dependência do homem), da fauna silvestre nativa (animais pertencentes às espécies nativas que tenham seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do Território Brasileiro) e exótica (animais pertencentes às espécies ou subespécies cuja distribuição geográfica não inclui o Território Brasileiro), visando uma escolha correta no momento de obter estes animais (DANIANE, 2008).

Figura 8 – Opinião dos entrevistados sobre a diferença entre animal silvestre e o que pode ser criado em casa.

Ao serem indagados se palestras, ou qualquer informação sobre o tema é importante para conscientizar a população sobre o tráfico de animais que causa desequilíbrio ecológico, todos responderam que sim, isso mostra que os alunos compreendem o valor da difusão de informações.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando o presente trabalho concluiu-se que o mesmo alcançou o objetivo desejado, pois este teria como meta a conscientização sobre o tráfico de animais silvestres, animais esses que são mantidos como animais de estimação em casas, abrigos onde à realidade em que se encontram são trágicas e desesperadoras. É importante enfatizar que para amenizar os problemas existentes é necessário começar a mudar os comportamentos e atitudes em relação ao meio ambiente, repensar a ideia de manipulação do homem sobre a natureza.

A realidade do meio ambiente hoje nos conduz a preservar e respeitar a harmonia entre a natureza e o homem, para assim possuímos um meio ambiente ecologicamente equilibrado e saudável; e, com isso viabilizar um desenvolvimento social e ambiental sustentável, contribuindo para a melhor qualidade de vida da sociedade. É viabilizado por lei através da Constituição Federal, consagrar o meio ambiente equilibrado ecologicamente dando direto a todos, para o bem de uso comum e de importância fundamental para uma melhor qualidade de vida, onde as atribuições dessas responsabilidades dentre elas o “preservar e defender”, se deve a todos, inclusive ao Estado.

As leis que são elaboradas devem ser cumpridas rigorosamente ,pois se não for dessa forma não terá sentido a sociedade ser regida por legislações que não funcionam ,devendo ser levado em consideração que o crime pelo qual é pautado na palestra é contra indivíduos indefesos e que sem nenhum remorso pessoas maltratam ,matam ,mutilam sem a menor compaixão ,isso é inaceitável em

um país onde se tem órgãos e leis que cuidam de crimes como esses. O Poder Público deve desempenhar rigorosamente sua função, fazer com que a sociedade cumpra as leis através de fiscalizações e com penas mais rigorosas contra os criminosos envolvidos, para isso requer da sociedade a colaboração com esses órgãos através de denúncias e é devido isso que a palestra em si tem caráter de conscientização e que leva a população a tomar a decisão de não obter esses animais assim como também fiscalizar e agir diante dessa triste realidade.

A problemática desenvolvida na palestra leva os alunos a pensarem em desenvolvimento sustentável, que é o meio pelo qual é dada continuidade ao desenvolvimento do nosso meio que vivemos sem destruí-lo; e, para que assim não se esvaíam os recursos e falem para as futuras gerações, alterando os comportamentos sociais e os valores culturais da sociedade. Porém para que isso seja viável é necessário mudanças de comportamentos e atitudes, ou seja, uma transformação da educação geral, em todas as suas diretrizes e modalidades, uma educação mais compromissada com a formação e desenvolvimento da cidadania, pois somente os seres humanos interferem na ordem, no equilíbrio e na evolução natural dos animais e no meio em que vivem ; então, somente a eles cabem promover medidas preventivas e soluções para os efeitos de seus comportamentos. É interessante mencionar novamente que a palestra analisada teve valor significativo nessa educação e que a proposta estabelecida pela mesma foi passada adiante e aceita pelos ouvintes, já que os mesmos assimilaram bem o que foi relatado e pelos resultados passaram a frente essas informações, desempenhando o seu papel, contribuindo assim também juntamente com os órgãos competentes para o combate ao crime de tráfico de animais silvestres.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Portaria IBAMA nº 93, de 07 de Julho de 1998. IBAMA. Disponível em:

<http://www.ibama.gov.br/fauna/legislacao/port_93_98.pdf>. Acesso em: 23 de set. de 2011.

IBAMA. Lei nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998. Lei dos Crimes Ambientais. Presidência da República Federativa do Brasil. Disponível em: < http://www.ibama.gov.br/fauna/legislacao/lei_9605_98.pdf >. Acesso em: 28 de set. 2011.

CALHAU, Lélío Braga. Meio ambiente e tutela penal nos maus-tratos contra animais. Jus Navigandi, Teresina, ano 8, n. 410, 21 ago. 2004. Disponível em: <<http://jus.com.br/revista/texto/5585/meio-ambiente-e-tutela-penal-nos-maus-tratos-contr-animais>>. Acesso em: 26 set. 2011.

LIMA, G.G.B. A conservação da fauna e da flora silvestres no Brasil: a questão do tráfico ilegal de plantas e animais silvestres e o desenvolvimento sustentável. REV. JUR., Brasília, 9 (86): 134-150, 2007.

LE DUC, J.P. (1996) "Trafficking in animals and plants: a lucrative form of crime". International Criminal Police ICPO nº 458/459: p. 19-31.

RENTAS. 1º Relatório Nacional sobre o Tráfico de Fauna Silvestre. 2001. Disponível em: < http://www.rentas.org.br/files/REL_RENTAS_pt_final.pdf > Acessado em 24 de set. de 2011.

REDFORD, K.H. "The empty forest". BioScience, 42(6): 412- 422, 1992.

RIBEIRO, L.B.; SILVA, M.G. O comércio ilegal põe em risco a diversidade das aves no Brasil. Ciências e Cultura, Campinas, 59 (4): 4-5, 2007.

SAAB, J.J. Tráfico ilícito de animais silvestres: a Resposta penal segundo a lei 9.605/98. REV. CIÊNC. HUM., Taubaté, 2 (1): 61-66, 2006.

SOUZA C. J. Consciência ambiental entre professores e alunos da Escola Estadual Básica Dr.Paulo Devanier Lauda. 2008. 11 a 13p. Disponível em:

< <http://jararaca.ufsm.br/websites/unidadedeapoio/download/JefersonCava..pdf> >. Acessado em: 25 set. 2011.

TOUFEXIS, A. "All God's creatures priced to sell". Time 142 (3): 36-41, 1993.

ZAGO, D.C. Animais da fauna silvestre mantidos como Animais de estimação. 2008. 39 p. Monografia (Especialização em educação ambiental). Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Disponível em:<

<http://jararaca.ufsm.br/websites/unidadedeapoio/download/Daniane.pdf>>. Acessado em: 26 set. 2011

Capítulo 2

10.37423/210804646

SUPERAÇÃO DA DORMÊNCIA DE SEMENTES DE APEIBA TIBOURBOU AUBL.

Ana Clara Carneiro Fonseca

Universidade Federal do Tocantins

Bruno Aurélio Campos Aguiar

Universidade de Brasília

Hygor Gomes de Almeida Sousa

Universidade Federal do Tocantins

Milena Oliveira Xavier

Universidade Federal do Tocantins

Priscila Bezerra de Souza

Universidade Federal do Tocantins

Resumo: *Pente-de-macaco (Apeiba tibourbou Aubl.) é uma espécie florestal, distribuída nas matas de restingas do Maranhão, nas matas ripárias do Cerrado do Centro- Oeste e no bioma Mata Atlântica. Objetivou-se neste trabalho avaliar a eficiência de tratamentos pré-germinativos para superar a dormência de suas sementes, foram estudados 8 tratamentos pré-germinativos: escarificação química com imersão por 5 minutos em H₂SO₄ nas concentrações de 50% e 25%, imersão em GA₃ na concentração de 1g/L1 por 24 e 48 horas, choque térmico à 80°C e 100°C, imersão em água destilada por 24 e 48 horas, além da testemunha. Foram avaliados as porcentagens de germinação e o índice de velocidade de germinação das sementes. Os tratamentos escarificação química com imersão em H₂SO₄, imersão em água destilada e testemunha não obteve resultados, imersão em GA₃ por 24 e 48 horas ambos tempos somente uma semente germinou, choque térmico à 80°C germinou 9,16% das sementes. Portanto, o choque térmico em água a 100°C foi o tratamento mais eficaz para a superação da dormência de sementes de Apeiba tibourbou Aubl.*

1. INTRODUÇÃO

Apeiba tibourbou Aubl. é uma espécie florestal, conhecida popularmente como pau-de-jangada, pente-de-macaco, embira branca ou jangadeira, ocorre desde o Norte do Brasil até Minas Gerais e São Paulo, a espécie está distribuída nas matas de restingas do Maranhão, nas matas ripárias do Cerrado do Centro-Oeste do Brasil e no bioma Mata Atlântica (BARBOSA et al., 2005).

A espécie em questão pertence à família Malvaceae, apresentando dormência por impermeabilidade do tegumento à água, característica desta família e de outras como Leguminosae, Geraniaceae, Chenopodiaceae, Convolvulaceae, Solanaceae e Liliaceae (Carvalho e Nakagawa, 2000).

Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar a eficiência de tratamentos pré-germinativos visando aumentar e uniformizar a germinação de sementes de *Apeiba tibourbou* Aubl. (pente-de-macaco).

2. METODOLOGIA

As sementes de *Apeiba tibourbou* Aubl. provenientes de cinco árvores matrizes, foram coletadas na Fazenda Mata do Sossêgo localizada no Distrito de Buritirana -TO à 65,2 km de Palmas. A pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de Pós-colheita de Produtos Agrícolas do CEULP/ULBRA, em Palmas – TO. O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, com 6 repetições e 8 tratamentos. Os testes de germinação realizados foram com Ácido Sulfúrico (H_2SO_4) nas concentrações 25% e 50% por cinco minutos cada e lavadas em água corrente, Ácido Giberélico (GA3) pré- embebição em GA3 na concentração de 1g/L1 por 24 e 48 horas, Imersão em Água Destilada por 24 e 48 horas, Imersão em Água quente a 80° e 100°C e a Testemunha.

Foi determinado no presente trabalho a estimativa da velocidade e porcentagens de germinação de acordo com a fórmula de Maguire (1962).

Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA), e as médias comparadas pelo teste Tukey a 5% de probabilidade.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os tratamentos com ácido sulfúrico, o tempo de imersão de 1 minuto testado por Pacheco e Matos (2009) foi suficiente para desencadear o processo de germinação das sementes de *A. tibourbou*. No entanto, quando se aumentou o tempo de imersão no ácido sulfúrico para 5 e 10 minutos, a porcentagem de germinação reduziu de 70 para 24 e 14%, respectivamente, comprovando que grande

parte das sementes foi danificada. Porém diverge do presente trabalho, pois os resultados obtidos com concentrações do ácido sulfúrico definida em 50% e 25% respectivamente, imersos por 5 minutos, não obteve sucesso, visto que o IVG foi 0% e também 0% de porcentagem germinação (Tabela 1).

O ácido giberélico que funciona como um hormônio para algumas espécies, em *Apeiba tibourbou* Aubl. não se mostrou eficaz, pois apenas uma 0,83% de germinação da quantidade total (Tabela 1), resultado para ambos tempos de exposição de 24 e 48 horas, as demais sementes não chegaram ao desenvolvimento da plântula.

Vieira e Gusmão (2006) concluíram que o GA3 não estimula nem a porcentagem de germinação, nem a velocidade de emergência das plântulas de *Genipa americana* L. Portanto o GA3 não é eficaz na germinação de sementes de pente-de-macaco.

Neste trabalho o tratamento que apresenta maior eficácia para superar a dormência de *Apeiba tibourbou* Aubl. foi o choque térmico a 100°C tendo maior índice de germinação 78,33% (Tabela 1). Também obteve germinação o choque térmico a 80°C com 9,16% de germinação (Tabela 1), porém ainda não se considera a temperatura de 80°C ideal para superar a dormência de pente-de-macaco, pois o IVG é baixo.

Tabela 1. – Índice de velocidade de germinação de sementes de *Apeiba tibourbou* Aubl. e porcentagem de germinação em função de diferentes métodos pré-germinativos.

Tratamentos	IVG	G (%)
Testemunha	0,0 c	0,0 c
Ácido Sulfúrico (H ₂ SO ₄) 25%	0,0 c	0,0 c
Ácido Sulfúrico (H ₂ SO ₄) 50%	0,0 c	0,0 c
Ácido Giberélico (GA3) 24 horas	0,16 bc	0,83 bc
Ácido Giberélico (GA3) 48 horas	0,16 bc	0,83 bc
Imersão em Água Destilada 24 horas	0,0 c	0,0 c
Imersão em Água Destilada 48 horas	0,0 c	0,0 c
Imersão em Água quente 80°C	1,83 b	9,16 b
Imersão em Água quente 100°C	15,66 a	78,33 a
CV%	46,27	46,27

Médias de seis repetições. Valores seguidos pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si foi aplicado o Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade ($p < 0,05$). CV = (coeficiente de variação)

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O melhor método de superação da dormência em *Apeiba tibourbou* Aubl. (pente- de-macaco) foi a imersão em água quente a 100°C, considerado significativo na porcentagem de germinação.

5. REFERÊNCIAS

CARVALHO, N.M.; NAKAGAWA, J. Sementes: ciência, tecnologia e produção. 4.ed. FUNEP: Jaboticabal, 2000. 588p.

PACHECO, M. V.; MATOS, V. P. Método para superação de dormência tegumentar em sementes de Apeibatibourbou Aubl. Revista Brasileira de Ciências Agrárias, v.4, n.1, p.62-66, 2009.

VIEIRA, F.A., GUSMÃO, E. Efeitos de giberelinas, fungicidas e do armazenamento na germinação de sementes de Genipa americana L. (Rubiaceae). Cerne, v. 12, n. 2, p. 137- 144, 2006.

Capítulo 3

10.37423/211004786

ESTIMATIVA VOLUMÉTRICA PARA ALSOPHILA SETOSA KAULF EM FRAGMENTO DE FLORESTA OMBRÓFILA MISTA

Jocasta Lerner

*Universidade Estadual do Centro-Oeste,
campus de Irati*

Isabel Homczinski

*Universidade Estadual do Centro-Oeste,
campus de Irati*

Keyla Karine Michalichen

*Universidade Estadual do Centro-Oeste,
campus de Irati*

Rafael Henrique Roque

Universidade de São Paulo

Fábio Gomes Monteiro

*Universidade Estadual do Centro-Oeste,
campus de Irati*

Aparecida Juliana Martins Correa

Universidade Federal de São Carlos

Antonio Higo Moreira de Sousa Maranhão

*Universidade Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho*

Aline Beatriz do Vale

*Universidade Estadual do Centro-Oeste,
campus de Irati*

Resumo: As samambaias arborescentes fazem parte do sub-bosque da Floresta Ombrófila Mista, e dentre estas espécies tem-se *Alsophila setosa*. Sua biologia é carente de informações o que inclui sua biometria e volumetria. Objetivou-se estimar o volume de *A. setosa* para a Floresta Nacional de Irati (Paraná) por meio de 37 unidades amostrais de 10 m x 50 m cada. Foram identificados e mensurados todos os indivíduos com altura acima de 1,3 m e posteriormente o volume foi estimado, além de calculada a densidade e a estrutura populacional em classes de altura. Foram estimados 1536 indivíduos/ha que totalizaram 54,58 m³/ha, em que mais de 20 m³/ha estão concentrados nas classes de alturas de 4,3 a 6,3 m que representam cerca de 30% da população.

Palavras-chave: samambaia arborescente; floresta secundária; sub-bosque; equação volumétrica.

INTRODUÇÃO E REVISÃO DE LITERATURA

Segundo Campanili e Prochnow (2006), o sub-bosque da Floresta Ombrófila Mista é constituído por indivíduos de diversas espécies arbóreas, além de samambaias arborescentes das famílias Cyatheaceae e Dicksoniaceae e de outras pteridófitas com hábito herbáceo. No estado do Paraná existem 13 espécies de samambaias arborescentes, dentre elas destaca-se *A. setosa*. (KAEHLER et al., 2014).

Os indivíduos da espécie *A. setosa* possuem cáudice de até 10 m de altura, com espinhos nigrescentes sobre as bases dos estípetes remanescentes das frondes caídas. Os espinhos são curvos na porção inferior dos estípetes e na parte basal exibem de 2 a 4 pares de aflébias. As frondes podem chegar a 3 m de comprimento (SCHMITT, 2005). Estudo acerca dessa espécie de samambaia são escassos na literatura, podendo ser verificado 38 o trabalho de Schmitt e Windisch (2005) que estudaram os aspectos ecológicos de *A. setosa* no estado do RioGrande do Sul e descreveram sobre a estrutura populacional (amplitude da altura, densidade, classes de altura) além de outros dados como a arquitetura das partes subterrâneas.

Entretanto, para manejar uma dada espécie primeiramente é necessário conhecer a sua biologia. Para isto pode-se utilizar da mensuração de dados como o diâmetro à altura do peito (DAP), a altura, número de indivíduos, entre outros que venham a formar um banco de dados qualitativos e quantitativos. O banco de dados é indispensável para poder propor um sistema de manejo com importância local, regional ou nacional.

A medição de variáveis biométricas constitui-se em uma atividade básica e essencial nos trabalhos de inventário florestal. O inventário florestal é uma atividade que objetiva informar de maneira qualitativa sobre os recursos madeireiros e não madeireiros de uma área pré-especificada. Essas informações servem como base para implantar planos de manejo, além de formular políticas florestais (PÉLLICO-NETO; BRENA, 1997).

As variáveis biométricas que podem ser obtidas de forma direta e indireta são o diâmetro à altura do peito, medido a 1,30 m do solo; altura total e comercial e diâmetro da copa. Posteriormente, com estas informações torna-se possível mensurar área de copa em m²; área transversal em m² e por meio de equações de volume e relações hipsométricas, o volume e a altura, respectivamente (GOMES et al., 2009).

Machado e Figueiredo Filho (2003) ressaltaram que nos inventários em florestas nativas, geralmente não é permitida a derrubada de árvores para realizar a cubagem, ou seja, seccionar a árvore em n seções (toras) levando à medição de diâmetros sucessivos ao longo do tronco de maneira previamente estabelecida. Em tais situações, instrumentos que medem diâmetros à distância podem ser utilizados. Outra alternativa seria a realização de cubagem com a árvore em pé, utilizando-se equipamentos especiais de escalada. Após a realização da cubagem são ajustadas equações de volume para possibilitar a sua estimativa. O emprego de tais funções facilita e diminui o custo dos inventários florestais (THORNLEY, 1999). Sendo assim, o objetivo deste estudo foi estimar o volume (m^3/ha) para a espécie de samambaia arborescente *A. setosa* na Floresta Nacional de Irati, estado do Paraná.

MATERIAL E MÉTODOS

ÁREA DE ESTUDO

A Floresta Nacional de Irati (FLONA) de Irati possui 3.495 hectares, com maior concentração de mata nativa. Possui tipo climático subtropical úmido mesotérmico, com verões frescos, geadas severas e frequentes e sem estação seca (ICMBIO, 2013).

Foram avaliadas 37 unidades amostrais (UA) de 10 m x 50 m cada, distribuídas sistematicamente (Figura 01) dentro de parcelas permanentes de 25 hectares instaladas em 2002 na FLONA de Irati, sem intervenção antrópica desde os anos 1940.

Figura 01: Croqui dos 25 ha de parcelas permanentes na FLONA de Irati. Em vermelho, destacam-se as unidades amostrais da faixa 1 e em verde da faixa 2 dos respectivos blocos.

Figure 01: Sketch of 25 ha of permanent plots in the FLONA de Irati. In red, the sample units of strip 1 and green of strip 2 of the respective blocks are highlighted.

Para facilitar o trabalho em campo, adotou-se o limite de inclusão de acordo com Mantovani (2004), sendo mensurados e identificados todos os indivíduos acima de 1,3 m de altura.

ESTIMATIVAS

Para realizar a estimativa do volume, adotou-se o modelo ajustado por Lerner (2016), Stoate recalculado, 81 com Coeficiente de Determinação (R^2_{aj}) de 0,92 e Erro Padrão da Estimativa em Porcentagem (Syx%) de 18,18%. 82 O modelo é demonstrado a seguir: $v=0,00005 \cdot (d^2 \cdot h)+0,003349 \cdot h$

Além do volume também foram obtidos dados sobre o diâmetro à altura do peito (DAP), a altura, a densidade, área basal, classes diamétricas e classes de altura. Para as classes diamétricas foi utilizado intervalo de 4 cm. Para as classes de altura foi utilizado intervalo de 1 m, adaptado de Mantovani (2004).

Para samambaias arborescentes utilizou-se a distribuição em classes de alturas para caracterizar a população, ciente de que a altura representa de forma mais adequada a idade. Esse método foi desenvolvido inicialmente por Tanner (1983) e consiste em dividir a população de samambaias arborescentes em classes com amplitude de 80 cm, mensurando todos os indivíduos, inclusive os espécimes que ainda não iniciaram seu ciclo reprodutivo (SCHMITT; WINDISCH, 2005). Porém também é possível utilizar outros métodos para definir as classes de altura como a fórmula de Sturges (LERNER, 2016) ou considerar cada metro como uma classe (MANTOVANI, 2004).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram mensurados 2842 indivíduos de *A. setosa* em 35 das 37 UA nos 18500 m² de área amostrada em Fragmento de Floresta Ombrófila Mista. Na Tabela 01 são demonstrados os valores mínimos, médios e máximos das variáveis descritoras, em que a amplitude total para o DAP é de 12,4 cm e para a altura é de 7,6 m.

Tabela 01: Valores mínimos, médios e máximos para variáveis descritoras da samambaia arborescente *Alsophilasetosa* na FLONA de Irati, Paraná.

Table 01: Minimum, mean and maximum values for descriptive variables of the tree fern *Alsophila setosa* in the FLONA de Irati, Paraná

Variáveis / Valores	Mínimo	Médio	Máximo
DAP (cm)	5,7	10,8	18,1
Área transversal (m ²)	0,0025	0,0093	0,0259
Área Basal UA (m ²)	0,0128	0,7134	1,9301
Área Basal (m ² /ha)	0,1285	14,2687	38,6029
Altura total (m)	1,3	3,8	8,9
Densidade UA (n)	2	76,8	210
Densidade (n/ha)	20	1536	4200
Volume total individual (m ³)	0,0068	0,0355	0,1684
Volume total UA (m ³)	0,0370	2,8850	8,0336
Volume total (m ³ /ha)	0,3706	54,5825	146,8987

UA – unidade amostral de 10 m x 50 m cada. Plots of 10 m x 50 m each.

Uma possível explicação para a alta densidade, é a sua hábil reprodução vegetativa por meio de ramificações estoloníferas que costumeiramente formam densos agrupamentos (reboleiras) em formações florestais secundárias, sendo que este comportamento foi descrito por Schmitt e Windisch (2005), ao estudarem a ecologia de *A. setosa* no Estado do Rio Grande do Sul. Os autores ainda relatam que este modo reprodutivo demonstra a eficiente capacidade de ocupar novos nichos, o que vem a corroborar com a realidade encontrada para esta espécie na FLONA de Irati (PR).

Nas duas UA (bloco 24 e 25, Figura 01) que não foram encontrados indivíduos desta espécie ocorre presença expressiva de taquara-lixá (*Merostachys multiramea* Hack.), o que pode justificar, pois indivíduos de espécies arbóreas também são pouco expressivos nestas UA.

Mesmo ciente de que a altura representa mais adequadamente a variável idade para samambaias arborescentes, analisou-se a estrutura populacional por classe diamétrica (Tabela 02) para viabilizar possíveis comparações com espécies arbóreas.

Tabela 02: Classes diamétricas com os valores para as variáveis número de indivíduos (N), área basal (G) e volume 120 para a samambaia arborescente *Alsophila setosa* na FLONA de Irati, Paraná. 121

Table 02: Diametric classes with values for the number of individuals (N), basal area (G) and volume for the tree 122 fern *Alsophila setosa* in the FLONA de Irati, Paraná.

Centro de Classe de DAP (cm)	N	G UA (m ²)	G (m ² /ha)	Volume UA (m ³)	Volume (m ³ /ha)
6	79	0,3466	0,1874	1,5290	0,8265
10	2208	18,6165	10,0630	72,9848	39,4512
14	548	7,2765	3,9332	25,9403	14,0218
18	7	0,1576	0,0852	0,5237	0,2831
Total	2842	26,3973	14,2687	100,9778	54,5825

UA – unidade amostral de 10 m x 50 m cada. Plots of 10 m x 50 m each.

A Classe diamétrica com centro de classe de 10 cm, é a mais expressiva com cerca de 78% dos espécimes de *A. setosa* e consequentemente possuindo a maior área basal e também o maior volume. A segunda classe diamétrica mais representativa, é a do centro de classe de 14 cm com aproximadamente 19% dos indivíduos amostrados.

Schwartsburd e Labiak (2007) relataram que no Parque Estadual de Vila Velha (Paraná) os indivíduos de *A. setosa* podem chegar a até 10m de altura, porém não relataram amplitude diamétrica. Já Schmitt (2005), em seu estudo no Estado do Rio Grande do Sul, encontrou indivíduos de *A. setosa* com alturas superiores a 10 m, porém também não relatou sobre a amplitude diamétrica, mesmo a amplitude sendo uma variável descritora básica para o conhecimento da espécie.

A respeito da densidade e área basal de *A. setosa*, existem estudos referentes a fitossociologia em que não é raro esta espécie ocupar os primeiros lugares por possuir um dos maiores Índice da Valor de Importância, a exemplo dos estudos de Reginato e Goldenberg (2007), Caglioni (2013) e Lerner (2016).

Sobre estudos de estimativa de volume, Lerner (2016) ao realizar estudo no mesmo local, FLONA de Irati, porém com 25 UA, encontrou 50,5 m³/ha juntamente com uma densidade menor (1345,6 indivíduos/ha). Essa diferença pode indicar que a espécie ainda não tenha estabilizado sua expansão dentro da comunidade, ou 140 até mesmo que tenha comportamento agressivo.

Como o modelo volumétrico utilizado possui um erro de 18,18%, dos 54,5825 m³/ha estimados tem-se o erro de 9,9231 m³/ha, portanto uma amplitude de 44,6594 a 64,5056 m³/ha de *A. setosa* na FLONA de Irati.

Como a área estudada é um fragmento de mata nativa, espera-se que a estrutura diamétrica seja em “J invertido”, pois indivíduos mais jovens costumam ser mais numerosos. Neste caso, quando analisada a estrutura populacional por meio das classes de altura, é possível observar este decréscimo de indivíduos conforme aumenta a altura (Tabela 03).

Tabela 03: Classes de altura com os valores para as variáveis número de indivíduos (N), área basal (G) e volume para a samambaia arborescente *Alsophila setosa* na FLONA de Irati, Paraná.

Table 03: Height classes with values for the number of individuals (N), basal area (G) and volume for the tree fern *Alsophila setosa* in the FLONA de Irati, Paraná.

Classes de Altura (m)	N	G UA (m²)	G (m²/ha)	Volume UA (m³)	Volume (m³/ha)
1,3 + 2,3	738	6,9025	3,7310	12,0479	6,5123
2,3 + 3,3	513	4,7368	2,5604	13,0993	7,0807
3,3 + 4,3	489	4,3242	2,3374	16,6089	8,9778
4,3 + 5,3	462	4,1089	2,2210	19,9279	10,7718
5,3 + 6,3	350	3,2834	1,7748	18,8082	10,1666
6,3 + 7,3	193	1,9424	1,0499	12,5865	6,8035
7,3 + 8,3	84	0,9289	0,5021	6,0662	3,5709
8,3 + 9,3	13	0,1697	0,0917	1,2925	0,6986
Total	2842	26,3973	14,2687	100,9778	54,5825

UA – unidade amostral de 10 m x 50 m cada. Plots of 10 m x 50 m each.

Schmitt e Windisch (2005) e Lerner (2016), mesmo empregando métodos diferentes para a elaboração das classes de altura (método de Tanner (1983) e fórmula de Sturges, respectivamente) encontraram dados corroborativos com o presente estudo. Mais detalhadamente, que as classes de alturas menores possuem a maior parte dos indivíduos, pois representa os indivíduos mais jovens, sendo que no caso deste estudo, a primeira classe representa cerca de 26%, a segunda 18%, a terceira 17%, a quarta 16% e juntas, representam aproximadamente 77% da população de *A. setosa* da FLONA de Irati (PR).

Vale ressaltar que a quarta e a quinta classes de altura representam juntas cerca de 28% da população, porém são as classes de altura que possuem a maior parte do volume, aproximadamente 38%, somando mais de 20 m³/ha. Essa semelhança em volume, apesar da diferença em número de indivíduos pode ser justificada pela diferença na altura, mais exatamente, o que na quinta classe há a mais em altura, compensa o número maior de indivíduos da quarta classe.

CONCLUSÕES

A espécie *A. setosa* apresenta 1536 indivíduos por hectare que totalizam uma estimativa de 54,5825 m³/ha, sendo que 38% deste volume está concentrado nas classes de alturas de 4,3 a 6,3 m que representam cerca de 30% da população.

AGRADECIMENTOS

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e a Fundação Araucária pela concessão do auxílio.

REFERÊNCIAS

- CAGLIONI, E. Florística e Fitossociologia do Componente Arbóreo e Epifítico em Segmento de Encosta e Margem de Rio no Parque Nacional da Serra do Itajaí – SC. 2013, 93 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Florestal) Universidade Federal do Paraná, Curitiba. 2013.
- CAMPANILI, M; PROCHNOW, M. 2006. Mata Atlântica – Uma rede pela floresta. Rede de ONGs da Mata Atlântica, [on line], 2006, 332p.
- GOMES, P.A., et al. Uso de Variáveis Dendrométricas na Estimativa de Serrapilheira em Área de Floresta 182 Secundária Inicial e Floresta Madura. Revista de Ciências Agro-Ambientais, Alta Floresta, v.7, n.1, p.13 – 21, 183 2009.
- ICMBIO. Plano de Manejo da Floresta Nacional de Irati – Volume I. [on line]. Dezembro 2013.
- KAEHLER, M.; et al. Plantas vasculares do Paraná. 1ed, Curitiba: Universidade Federal do Paraná, 2014, 186 p.198.
- LERNER, J. Modelagem biométrica e Fitossociologia de Pteridófitas Arborescentes em Floresta Ombrófila 188 Mista. 2016, 89 p. Dissertação (Mestrado) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, PR. 2016.
- MACHADO, S.A.; FIGUEIREDO FILHO, A. Dendrometria. Curitiba, 2003. 309p.
- MANTOVANI, M. Caracterização de populações naturais de xaxim (*Dicksonia sellowiana* (Presl.) Hooker), em diferentes condições edafo-climáticas no Estado de Santa Catarina. Florianópolis. 2004, 105 p. Dissertação (Mestrado em Recursos Genéticos Vegetais) Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. 193 2004.
- PÉLLICO NETO, S.; BRENA, D. A.. Inventário Florestal. Curitiba, 1997. 316 p.
- REGINATO, M.; GOLDENBERG, R. Análise florística, estrutural e fitogeográfica da vegetação em região de transição entre as Florestas Ombrófilas Mista e Densa Montana, Piraquara, Paraná, Brasil. Hoehnea, [s.l.], 34(3): 349-364. 2007.
- SCHMITT, J. L. Estudos florísticos, ecológicos e do desenvolvimento em Cyatheaceae (Pteridophyta) no Rio Grande do Sul, Brasil. 2005,167 p. Tese (Doutorado em Botânica) Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 200 Porto Alegre. 2005.
- SCHMITT, J. L.; WINDISCH, P. G. Aspectos ecológicos de *Alsophila setosa* Kaulf. (Cyatheaceae, Pteridophyta) no Rio Grande do Sul, Brasil. Acta bot. bras., [s.l.], 19(4): 859-865. 2005.
- SCHWARTSBURD, P. B.; LABIAK, P. H. Pteridófitas do Parque Estadual de Vila Velha, Ponta Grossa, Paraná, Brasil. Hoehnea, [s.l.], 34(2): 159-209, 2007.
- THORNLEY, J.H.M. Modeling stem height and diameter growth in plants. Annals of Botany, [s.l.], v.84, p.205, 1999.

Capítulo 4

10.37423/211004787

ESTIMATIVA VOLUMÉTRICA PARA DICKSONIA SELLOWIANA (PRES.) HOOK EM FRAGMENTO DE FLORESTA OMBRÓFILA MISTA

Jocasta Lerner

*Universidade Estadual do Centro-Oeste,
campus de Irati*

Keyla Karine Michalichen

*Universidade Estadual do Centro-Oeste,
campus de Irati*

Rafael Henrique Roque

Universidade de São Paulo

Fábio Gomes Monteiro

*Universidade Estadual do Centro-Oeste,
campus de Irati*

Aparecida Juliana Martins Correa

Universidade Federal de São Carlos

Antonio Higo Moreira de Sousa Maranhão

*Universidade Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho*

Aline Beatriz do Vale

*Universidade Estadual do Centro-Oeste,
campus de Irati*

Resumo: As samambaias arborescentes fazem parte do sub-bosque da Floresta Ombrófila Mista, e dentre estas espécies tem-se *Dicksonia sellowiana*. São escassas as informações sobre sua biologia, biometria e volumetria. Objetivou-se estimar o volume de *D. sellowiana* para a Floresta Nacional de Irati (Paraná) por meio de 37 unidades amostrais de 10 m x 50 m cada. Foram identificados e mensurados todos os indivíduos com altura acima de 1,3 m e posteriormente o volume total e o volume comercial foram estimados empregando-se modelos volumétricos foram também calculados a densidade e estrutura populacional em classes de altura. Foram estimados 83,24 indivíduos/ha que totalizaram 19,8680 m³/ha para o volume total e 11,8243 m³/ha para o volume comercial, sendo que mais de 60% destes volumes estão concentrados nas classes de alturas de 3,3 m a 6,3 m que representam cerca de 40% da população.

Palavras-chave: samambaia arborescente; floresta secundária; equação volumétrica; sub-bosque.

INTRODUÇÃO E REVISÃO DE LITERATURA

Segundo Campanili e Prochnow (2006), o sub-bosque da Floresta Ombrófila Mista é constituído por indivíduos de diversas espécies arbóreas, além de samambaias arborescentes das famílias Cyatheaceae e Dicksoniaceae e de outras pteridófitas com hábito herbáceo. No estado do Paraná existem 13 espécies de samambaias arborescentes, dentre elas destaca-se *D. sellowiana* (KAEHLER et al., 2014).

Os indivíduos desta espécie distinguem-se das outras samambaias arborescentes por apresentar a porção ereta do caule com muitas raízes adventícias, pois não possui casca (SAKAGAMI, 2006). Devido ao valor econômico, foi muito explorada para a produção de vasos e substratos utilizados no cultivo de plantas ornamentais (MONTAGNA et al, 2012). Suas frondes (folhas) também são úteis, pois na última década por meio de pesquisas realizadas foi desenvolvido um medicamento para a asma, utilizando o princípio ativo presente nas frondes (AGÊNCIA, 2006).

Entretanto, para manejar uma dada espécie necessariamente é preciso conhecer a sua biologia. Para isto é possível mensurar dados como o diâmetro à altura do peito (DAP), a altura, número de indivíduos, entre outros que venham a formar um banco de dados qualitativos e quantitativos. O banco de dados é imprescindível para poder propor um sistema de manejo com importância local, regional ou nacional.

A medição de variáveis biométricas constitui-se em uma atividade básica e essencial nos trabalhos de inventário florestal. O inventário florestal é uma atividade que objetiva informar de maneira qualitativa sobre os recursos madeireiros e não madeireiros de uma área pré-especificada. Essas informações servem como base para implantar planos de manejo, além de formular políticas florestais (PÉLLICO-NETO; BRENA, 1997).

As variáveis biométricas que podem ser obtidas de forma direta e indireta são o diâmetro à altura do peito, medido a 1,30 m do solo; altura total e comercial. Posteriormente, com estas informações torna-se possível mensurar área transversal em m^2 e por meio de equações de volumétricas, o volume (GOMES et al., 2009).

Machado e Figueiredo Filho (2003) ressaltaram que nos inventários em florestas nativas, geralmente não é permitida a derrubada de árvores para realizar a cubagem, ou seja, seccionar a árvore em n seções (toras) levando à medição de diâmetros sucessivos ao longo do tronco de maneira previamente estabelecida. Uma alternativa seria a realização de cubagem com a árvore em pé, utilizando-se

equipamentos especiais de escalada. Após a realização da cubagem são ajustadas equações de volume para possibilitar a sua estimativa. O emprego de tais funções facilita e diminui o custo dos inventários florestais (THORNLEY, 1999). Sendo assim, objetivou-se estimar o 60 volume total e comercial (m^3/ha) para a espécie de samambaia arborescente *D. sellowiana* na Floresta Nacional 61 de Irati, estado do Paraná.

MATERIAL E MÉTODOS

ÁREA DE ESTUDO

A FLONA de Irati possui 3.495 hectares, com maior concentração de mata nativa. Possui tipo climático subtropical úmido mesotérmico, com verões frescos, geadas severas e frequentes e sem estação seca (ICMBIO, 2013). Foram avaliadas 37 unidades amostrais (UA) de 10 m x 50 m cada, distribuídas sistematicamente (Figura 01) dentro de parcelas permanentes de 25 hectares instaladas em 2002 na FLONA de Irati, que não sofre intervenção antrópica desde os anos 1940.

Figura 01: Croqui dos 25 ha de parcelas permanentes na FLONA de Irati. Em vermelho, destacam-se as unidades amostrais da faixa 1 e em verde da faixa 2 dos respectivos blocos.

Figure 01: Sketch of 25 ha of permanent plots in the FLONA de Irati. In red, the sample units of strip 1 and green of strip 2 of the respective blocks are highlighted.

Para facilitar as tarefas em campo, utilizou-se o limite de inclusão descrito por Mantovani (2004), sendo mensurados e identificados todos os indivíduos acima de 1,3 m de altura.

ESTIMATIVAS

Para realizar a estimativa do volume total, adotou-se o modelo ajustado por Lerner (2016), com Coeficiente de Determinação (R^2_{aj}) de 0,96 e Erro Padrão da Estimativa em Porcentagem ($Syx\%$) de 16,33%. O modelo é demonstrado a seguir:

$$v = -0,1048 + 0,002889.(DAP.h) + 0,154971.\left(\frac{1}{h}\right)$$

Para a estimativa do volume comercial também se adotou o modelo ajustado por Lerner (2016), com Coeficiente de Determinação (R^2_{aj}) de 0,97 e Erro Padrão da Estimativa em Porcentagem (Syx%) de 16,31%. O modelo é demonstrado a seguir:

$$v = 0,001606.(D_{base}.h_{com}) + 0,000001.(D_{base}.h_{com})^2$$

Além do volume total e comercial também foram obtidos dados sobre o diâmetro de base, o diâmetro à altura do peito (DAP), a altura, a densidade, área basal, classes diamétricas e classes de altura. Para as classes 90 diamétricas foi utilizado intervalo de 10 cm. Para as classes de altura foi utilizado intervalo de 1 m, adaptado de Mantovani (2004).

A altura comercial foi mensurada de acordo com Mantovani (2004) e Biondi et al. (2009), ou seja, considerou-se a altura do cáudice medido do solo até as primeiras cicatrizes deixadas pelas folhas mortas. Para obter a altura da coroa, subtraiu-se a altura comercial da altura total. Para samambaias arborescentes se empregou a distribuição em classes de alturas para caracterizar a população, pois a altura representa de forma mais adequada idade. Esse método foi desenvolvido primeiramente por Tanner (1983) no qual faz-se a divisão da população de samambaias arborescentes em classes com amplitude de 80 cm, mensurando todos os indivíduos (SCHMITT; WINDISCH, 2005). Entretanto, também é possível utilizar outros métodos para determinar as classes de altura como a fórmula de Sturges (LERNER, 2016) ou ponderar cada metro como uma classe (MANTOVANI, 2004).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram mensurados 152 indivíduos de *D. sellowiana* em 27 das 37 UA nos 18500 m² de área amostrada em fragmento de Floresta Ombrófila Mista. Na Tabela 01 são demonstrados os valores mínimos, médios e máximos das variáveis descritoras, em que a amplitude para o diâmetro de base (D_{base}) é de 57,2 cm, para o DAP 46,8 cm e para as alturas total, comercial e da coroa, é de 6,19 m, 5,32 m e 4,45 m respectivamente.

Tabela 01: Valores mínimos, médios e máximos para variáveis descritoras da samambaia arborescente *Dicksonia sellowiana* na FLONA de Irati, Paraná.

Table 01: Minimum, mean and maximum values for descriptive variables of the tree fern *Dicksonia sellowiana* in the FLONA de Irati, Paraná.

Variáveis / Valores	Mínimo	Médio	Máximo
D _{base} (cm)	15,2	35,3	69,4
DAP (cm)	11,6	26,9	58,4
Área transversal (m ²)	0,0106	0,0649	0,2680
Área Basal UA (m ²)	0,1064	0,2702	3,0487
Área Basal (m ² /ha)	2,1281	5,4060	48,0224
Altura total (m)	1,30	3,22	7,49
Altura comercial (m)	0	1,97	5,32
Altura da coroa (m)	0,25	1,22	4,70
Densidade UA (n)	1	4,16	29
Densidade (n/ha)	20	83,24	460
Volume total individual (m ³)	0,0394	0,2386	0,9988
Volume total UA (m ³)	0,4156	0,9934	11,2151
Volume total (m ³ /ha)	8,3136	19,8680	180,1069
Volume comercial individual (m ³)	0	0,1420	0,6850
Volume comercial UA (m ³)	0,1821	0,5912	7,0799
Volume comercial (m ³ /ha)	3,6428	11,8243	111,3937

UA – unidade amostral de 10 m x 50 m cada. Plots of 10 m x 50 m each.

Biondi et al. (2009) em seu estudo na Fazenda Experimental de Rio Negro, da Universidade Federal do Paraná com três tratamentos para verificar o efeito das roçadas sobre *D. sellowiana*, utilizaram a fórmula do tronco de cone para obter o volume e não trabalhou com modelos matemáticos e encontraram valor médio 0,04 m³ por indivíduo, mas não realizaram a estimativa para hectare. No presente estudo os indivíduos de *D. sellowiana* possuem porte maior o que justificaria a diferença dos resultados com os encontrados por Biondi et al. (2009).

Como a equação para estimar o volume total utilizado possui um erro de 16,33%, dos 19,8680 m³/ha estimados tem-se o erro de 3,2445 m³/ha, portanto uma amplitude de 16,6235 a 23,1125 m³/ha de *D. sellowiana* na FLONA de Irati. Na equação para estimar o volume comercial tem-se o erro de 16,31%, portanto para os 11,8243 m³/ha o erro é de 1,9285 m³/ha, perfazendo uma amplitude de 9,8958 a 13,7528 m³/ha.

Nas dez UA que não foram encontrados indivíduos desta espécie, em três delas (blocos 9, 24 e 25, Figura 01) ocorre presença de taquara-lixá (*Merostachys multiramea* Hack.), o que pode justificar, pois indivíduos de espécies arbóreas também são pouco expressivos nestas UA, em especial nos blocos 24 e 25 onde a presença de taquara-lixá é mais expressiva.

Apesar de se saber que a altura representa de forma mais adequada a variável idade para samambaias arborescentes, analisou-se a estrutura populacional por classe diamétrica (Tabela 02) para viabilizar possíveis comparações com espécies arbóreas.

A classe diamétrica que possui maior volume é a que possui o centro de classe de 35 cm, totalizando aproximadamente 28% do volume estimado e também possui a maior área basal amostrada, embora as classes diamétricas com centro de classe 15 cm e 25 cm possuam a maior quantidade dos indivíduos amostrados (cerca de 30% e 35%, respectivamente).

Tabela 02: Classes diamétricas por número de indivíduos (N), área basal (G) e volume para a samambaia arborescente *Dicksonia sellowiana* na FLONA de Irati, Paraná.

Table 02: Diametric classes for the number of individuals (N), basal area (G) and volume for the tree fern *Dicksonia sellowiana* in the FLONA de Irati, Paraná.

Centro de Classe de DAP (cm)	N	G -UA (m ²)	G (m ² /ha)	Volume Total -UA (m ³)	Volume Total (m ³ /ha)	Volume comercial UA (m ³)	Volume comercial (m ³ /ha)
15	47	1,1022	0,5958	3,8514	2,0819	1,8501	1,0000
25	54	2,6453	1,4299	9,5968	5,1875	5,7259	3,0951
35	30	2,6694	1,4429	10,2465	5,5387	6,3552	3,4352
45	17	2,5767	1,3928	9,7137	5,2507	5,9638	3,2237
55	4	1,0074	0,5446	3,3474	1,8094	1,9801	1,0703
Total	152	10,0011	5,4060	36,7559	19,8680	21,8750	11,8243

UA – unidade amostral de 10 m x 50 m cada. Plots of 10 m x 50 m each.

Como a área avaliada é um fragmento de mata nativa em monitoramento desde 2002, espera-se que a estrutura diamétrica seja em “J invertido”, pois indivíduos mais jovens tendem a ser mais numerosos. Neste caso, quando analisada a estrutura populacional por meio das classes de altura, é possível notar este decréscimo de indivíduos logo que aumenta a altura (Tabela 03).

Tabela 03: Classes de altura por número de indivíduos (N), área basal (G) e volume para a samambaia arborescente *Dicksonia sellowiana* na FLONA de Irati, Paraná.

Table 03: Height classes for the number of individuals (N), basal area (G) and volume for the tree fern *Dicksonia sellowiana* in the FLONA de Irati, Paraná.

Classes de Altura (m)	N	G UA (m ²)	G (m ² /ha)	Volume Total UA (m ³)	Volume Total (m ³ /ha)	Volume Comercial UA (m ³)	Volume Comercial (m ³ /ha)
1,3 + 2,3	52	1,4355	0,7760	4,1955	2,2678	2,0726	1,1203
2,3 + 3,3	34	1,7830	0,9638	5,2844	2,8564	3,5045	1,8944
3,3 + 4,3	30	2,5495	1,3781	8,6816	4,6928	5,1089	2,7615
4,3 + 5,3	21	1,7228	0,9312	7,5027	4,0555	4,5673	2,4688
5,3 + 6,3	11	1,7469	0,9443	7,5702	4,0920	4,6780	2,5287
6,3 + 7,3	3	0,5995	0,3240	2,6171	1,4147	1,4278	0,7718
7,3 + 8,3	1	0,1639	0,0886	0,9043	0,4888	0,5158	0,2788
Total	152	10,0011	5,4060	36,7559	19,8680	21,8750	11,8243

UA – unidade amostral de 10 m x 50 m cada. Plots of 10 m x 50 m each.

A classe de altura de 3,3 m a 4,3 m possui a maior quantidade de volume total (cerca de 25%) mesmo não sendo a classe que possui o maior número de indivíduos que neste caso é a classe 1,3 m a 2,3 m, com 34% dos indivíduos aproximadamente. As duas classes de altura de 4,3 m a 6,3 m possuem valores próximos apesar da diferença nas alturas e na quantidade de indivíduos representantes, ou seja, o maior número de uma é compensado pela maior altura da outra classe.

Para o volume comercial, nota-se que a classe de altura de 3,3 m a 4,3 m possui maior quantidade (23%) e as classes de altura de 4,3 m a 6,3 m possui valores próximos entre si (com aproximadamente 21% do volume comercial, cada). Mantovani (2004) encontrou, também no Estado de Santa Catarina, espécimes de *D. sellowiana* com amplitude diamétrica de 12,3 a 56 cm e altura máxima de 7m.

Gaspar et al. (2011) encontraram no inventário de *D. sellowiana* em Santa Catarina indivíduos com DAP entre 10 e 77 cm e média de 67,5 cm e uma altura mediana para as amostras de 3 m e altura mínima de 1,5m, e ainda relataram que das 6 classes de altura, as classes 1 e 2 tinham 76% dos xaxins amostrados com até 3,5 m de altura, configurando potencial de regeneração.

Mantovani (2004) e Lerner (2016), mesmo utilizando métodos distintos para a elaboração das classes de altura (classes de metro em metro e fórmula de Sturges, respectivamente) encontraram dados corroborativos com o presente estudo, assim como os dados de Gaspar et al. (2011) também são

corroborativos. Mais detalhadamente, que as classes de alturas menores possuem a maior parte dos indivíduos, pois representa os indivíduos mais jovens, sendo que no caso deste estudo, a primeira classe representa aproximadamente 34%, a segunda 22% e a terceira 20% e juntas, representam perto de 75% da população de *A. setosa* da FLONA de Irati (PR).

CONCLUSÕES

A espécie *D. sellowiana* apresenta 83,24 indivíduos por hectare que totalizam a estimativa de 19,8680 m³/ha para o volume total e 11,8243 m³/ha para o volume comercial, sendo que mais de 60% destes volumes estão concentrados nas classes de alturas de 3,3 m a 6,3 que representam aproximadamente 40% da população.

AGRADECIMENTOS

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e a Fundação Araucária pela concessão do auxílio.

REFERÊNCIAS

- AGÊNCIA Estadual de Notícias. Cultivo de xaxim e bambu poderá gerar renda no Paraná. 2006. Disponível em: 183 <<http://www.historico.aen.pr.gov.br>>. Acesso em: 21/novembro/2013.
- BIONDI, D. et al. Caracterização dendrométrica de *Dicksonia sellowiana* Hook. em povoamento de *Araucaria 185 angustifolia* (Bertol.) Kuntze. *Cerne*, Lavras, v. 15, n. 4, p. 453-459. 2009.
- CAMPANILI, M; PROCHNOW, M. 2006. Mata Atlântica – Uma rede pela floresta. Rede de ONGs da Mata 187 Atlântica, [on line], 2006, 332p.
- GASPER, A. L. et al. Inventário de *Dicksonia sellowiana* Hook. em Santa Catarina. *Acta Botanica Brasilica*, 189 [s.l.], 25(4): 776-784. 2011.
- GOMES, P.A., et al. Uso de Variáveis Dendrométricas na Estimativa de Serrapilheira em Área de Floresta 191 Secundária Inicial e Floresta Madura. *Revista de Ciências Agro-Ambientais, Alta Floresta*, v.7, n.1, p.13 – 21, 192 2009.
- ICMBIO. Plano de Manejo da Floresta Nacional de Irati – Volume I. [on line]. Dezembro 2013.
- KAEHLER, M. et al. Plantas vasculares do Paraná. 1ed, Curitiba: Universidade Federal do Paraná, 2014, p.198.
- LERNER, J. Modelagem biométrica e Fitossociologia de Pteridófitas Arborescentes em Floresta Ombrófila 196 Mista. 2016. 89 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, PR. 197 2016.
- MACHADO, S. A.; FIGUEIREDO FILHO, A. Dendrometria. Curitiba, 2003. 309p.
- MANTOVANI, M. Caracterização de populações naturais de xaxim (*Dicksonia sellowiana* (Presl.) Hooker), 200 em diferentes condições edafo-climáticas no Estado de Santa Catarina. Florianópolis. 2004, 105 p. 201 Dissertação (Mestrado em Recursos Genéticos Vegetais) Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. 202 2004.
- MONTAGNA, T. et al. A Importância das Unidades de Conservação na Manutenção da Diversidade Genética de 204 Xaxim (*Dicksonia sellowiana*) no Estado de Santa Catarina. *Biodiversidade Brasileira*, [s.l.], 2(2), 26-32, 2012.
- PÉLLICO NETO, S.; BRENA, D. A.. Inventário Florestal. Curitiba, 1997. 316 p.
- SAKAGAMI, C. R. PTERIDÓFITAS DO PARQUE ECOLÓGICO DA KLABIN, TELÊMACO BORBA, 207 PARANÁ, BRASIL. 2006, p. 212. Dissertação de Mestrado em Botânica pelo Setor de Ciências Biológicas da 208 Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR. 2006.
- SCHMITT, J. L.; WINDISCH, P. G. Aspectos ecológicos de *Alsophila setosa* Kaulf. (Cyatheaceae, Pteridophyta) 210 no Rio Grande do Sul, Brasil. *Acta bot. bras.*, [s. l.], 19(4): 859-865. 2005.
- THORNLEY, J.H.M. Modeling stem height and diameter growth in plants. *Annals of Botany*, [s.l.], v.84, p. 212 205, 1999.

Capítulo 5

10.37423/211004834

ESTUDO GENÉTICO DE UMA POPULAÇÃO DE PERACUCA (KALYPTODORAS BAHIENSIS) COLETADOS A MONTANTE DE UMA BARRAGEM NO RIO PARAGUAÇU.

Thiago Silva Oitaven Duarte

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

Joemille Silva dos Santos

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

Clarita Silveira Reis

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

Ricardo Franco Cunha Moreira

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

Soraia Barreto Aguiar Fonteles

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

Resumo: *Kalyptodoras bahiensis* é uma espécie de peixe endêmica do rio Paraguaçu, popularmente conhecida como Peracuca e atualmente está ameaçada de extinção. Ao longo da bacia do rio Paraguaçu encontra-se 37 barragens de portes variados. A existência de barreiras geográficas isola populações de peixes, podendo gerar polimorfismos intraespecíficos e divergências genéticas entre populações ao longo do tempo. O objetivo deste trabalho foi caracterizar a diversidade genética de uma população da espécie *Kalyptodoras bahiensis* presente a montante de uma barragem na região do médio Paraguaçu. Foram coletadas amostras da nadadeira caudal de 42 indivíduos, posteriormente, submetidas à extração de DNA segundo o protocolo de fenol/clorofórmio, à técnica de amplificação de PCR e eletroforese em gel de agarose utilizando marcadores ISSR. Os cinco *primers* utilizados geraram um total de 79 *loci*, onde 91,1% deles foram polimórficos, com tamanho de pares de base variando entre 210pb e 1750pb, o que demonstra uma alta variabilidade genética dentro da população. O PIC (Índice de Conteúdo Polimórfico) ou diversidade genética do loco, variou de 0,42 (ISSR 3) à 0,91 (ISSR 13), com média de 0,65, sendo considerados muito informativos, e comprovando a eficiência dos *primers*. O Índice de *Shannon* e Heterozigosidade (H) apresentaram valores considerados médio a alto com relação à variação genética, 0,5561 e 0,3697, respectivamente. A análise de coordenadas principais (PCoA) mostra divisão dos indivíduos em três grupos distintos e a proximidade do grupo com mais indivíduos, indicando uma similaridade genética mais elevada entre eles. Esses resultados sugerem níveis de diversidade genética intrapopulacional elevados, sendo este de grande importância para a manutenção da viabilidade e sobrevivência da espécie, contribuindo para a conservação do potencial biológico das populações selvagens de peixes.

Palavras-chaves: Ictiogenética; variabilidade genética; PIC.

1. INTRODUÇÃO

As águas continentais cobrem menos de 1% da superfície da terra. Abrigam aproximadamente 10% de todas as espécies de animais conhecidas, o que inclui cerca de 40% de todos os peixes do mundo (POFF *et al.*, 2012). Os peixes dependem da acessibilidade a áreas de desova para realizar o processo reprodutivo (AGOSTINHO *et al.*, 1993; AGOSTINHO *et al.*, 2004). Porém, mesmo nos casos em que há essa acessibilidade os indivíduos são frequentemente limitados na sua capacidade de se mover a montante e a jusante, porque as características biofísicas naturais podem constituir barreiras (PRINGLE, 2003).

O barramento de um rio é uma ação tão intensa que resulta na criação de um novo ecossistema, com estrutura biota e funcionamento particulares, sendo assim impactos ambientais ocorrem em todos os barramentos (AGOSTINHO *et al.*, 2008). As espécies que são incapazes de superar essas barreiras terão que tolerar mudanças das condições ambientais locais ou, eventualmente, adaptar-se geneticamente a elas (POFF *et al.*, 2002; ALLAN *et al.*, 2005).

Dudgeon (2006) comenta que a perda de hábitat é considerada a principal causa de extinção de peixes de água doce no mundo e acordo com Piroli e Zanata (2014) a existência de barreiras geográficas isola populações de peixes, podendo gerar polimorfismos intraespecíficos e divergências genéticas entre populações ao longo do tempo.

No percurso da Bacia do Paraguaçu foram construídas várias barragens utilizadas para abastecimento de água, que aliada à poluição vem provocando muitos problemas de ordem ambientais que ocasionam o desaparecimento de diversas espécies da fauna e flora local (PALMA, 2003). As 37 barragens ao longo desta bacia, possuem portes variados, dentre as quais estas merecem destaque: Angico, Apertado, Bandeira De Melo, Boa Vista Do Tupim, França, Juracy Magalhães, Pedra Do Cavalo, São José do Jacuípe e Valente (INEMA, 2013).

O rio Paraguaçu é o maior rio que corta a Bahia, é exclusivamente baiano. Possui cerca de 600 km de extensão, mas só é navegável em seu baixo curso, que vai da foz até as cidades de São Félix e Cachoeira. A maior parte de seu território encontra-se situada na região da Chapada Diamantina e, nele é encontrada uma grande diversidade ictiológica (IBGE, 1993). Abriga uma espécie popularmente conhecida como peracuca, *Kalyptodoras bahiensis*, que pertence à família Doradidae. A espécie foi observada pela primeira vez a partir de exemplares coletados durante a pré-construção da barragem

de Pedra do Cavalo no baixo curso do rio, e desde então vem apresentando um declínio nos estoques de suas populações naturais (SANTOS, 2005).

Os peixes desse grupo são conhecidos como bagres, eles são animais que habitam regiões escuras entre rochas nos fundos dos rios (FERRARIS,

2007), eles possuem grande importância tanto para a pesca comercial como na de subsistência (FERREIRA, 2007). É uma espécie ameaçada de extinção, essa ameaça se dá devido à pesca predatória aliada a construção de barragens ao longo do curso do rio, já que, segundo Machado *et al.* (2008), os membros de médio porte da família tem como preferência ambientes com grandes correntes sendo assim o represamento de alguns trechos do rio pode vir a causar a extinção dessas espécies de médio porte.

Diante da problemática do risco de extinção de espécies, diversas técnicas moleculares estão disponíveis atualmente auxiliando na sistemática de grupos e estudos de variabilidade genética em populações de peixes (MULLER *et al.*, 2017). O desenvolvimento e uso de marcadores moleculares para a detecção e exploração de polimorfismos do DNA é um dos avanços mais significativos no campo da genética molecular. Isto porque a utilização de marcadores localizados no DNA fornece um número praticamente ilimitado de informação distribuído ao longo do genoma (TURCHETTO *et al.*, 2017).

As variações genéticas existentes entre populações que podem indicar níveis de isolamento genético são evidenciadas por marcas presentes ao longo do genoma mitocondrial e nuclear. O isolamento leva a mudanças nas frequências gênicas de populações e ao acúmulo de novas mutações que não são compartilhadas pelo processo de fluxo gênico (HILSDORF, 2011).

O geoprocessamento possui uma grande eficiência em diagnósticos ambientais, apresenta um grande potencial de monitoramento, graças aos diversos dados, informações e sua representação cartográfica (PIROLI, 2013).

Dentro do geoprocessamento os SIGs (Sistema de Informações Geográficas) têm sido amplamente adotados como uma ferramenta essencial para o uso eficaz e exibição de informação sobre os recursos hídricos (MEDEIROS *et al.*, 2016) essas ferramentas utilizam dados e mapas digitais para se analisar vários elementos do terreno a ser estudado.

O uso das ferramentas de georreferenciamento em conjunto com estudos envolvendo marcadores moleculares, formam uma técnica promissora na indicação de isolamento de populações de peixes que sofreram separações por meio de barramentos artificiais. Assim, o presente estudo tem como

objetivo caracterizar a diversidade genética de uma população da espécie *Kalyptodoras bahiensis* presente a montante de uma barragem na região do médio Paraguaçu.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. ANÁLISE ATRAVÉS DE SIG

A área de estudo foi delimitada através dos limites fornecidos pelos arquivos *Shapefile*, disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE), onde também foram adquiridos os principais cursos d'águas presentes na área de estudo e a localização das barragens presentes na área de estudo. Foram utilizadas ainda imagens de satélite referentes à área de estudo disponibilizadas pelo Google Maps.

Os arquivos referentes aos dados da bacia do Paraguaçu e as imagens de satélite, foram utilizados para a elaboração de mapas digitais da área em estudo através do software QGIS 3.4.5, disponibilizado gratuitamente, onde todos os arquivos foram carregados no programa e a partir dos dados foi realizada a montagem do mapa mostrando a área da bacia do Paraguaçu, os cursos de água e as barragens presentes dentro dessa área, após a construção do mapa foi realizada uma fotointerpretação para identificação e caracterização das Barragens a fim de determinar quais são mais viáveis para a realização do presente estudo.

A bacia hidrográfica do Paraguaçu (Figura 1) está localizada na região central do Estado, entre as coordenadas 12°40' e 13°40'S e 41°15' e 41°40'O, ela é composta por mais de 150 rios, que nutrem 86 municípios baianos. Segundo o Inema (2006) a área banhada por ela é de 54.877 km², o que corresponde a cerca de 10% do território do Estado.

Figura 1 - Mapa da localização e dos recursos hídricos da Bacia do Paraguaçu, Bahia.

Fonte: Elaborado pelos autores.

A barragem de Bandeira de Melo fica na região do semiárido no município de Itaetê e tem como principal função regularizar a vazão do rio, Pedra do Cavalo, por sua vez, está numa zona climática intermediária e recebe a contribuição de praticamente todos os rios da bacia, ela é de extrema importância visto que sua principal função é o abastecimento de vários municípios e a geração de energia, além de exercer um papel no controle das enchentes, que afetaram as cidades de Cachoeira e São Félix.

2.2. COLETAS E PROCESSAMENTO DAS AMOSTRAS

O estudo foi realizado no município de Itaetê, no Centro Sul Baiano, localizado a montante da barragem Bandeira de Melo, banhado pelo rio Paraguaçu. As coletas foram realizadas em Agosto de 2019 em apenas um ponto, de coordenadas 12°58'17.0"S 40°59'38.8"O (Figura 2). Este local foi indicado pelos pescadores locais e devidamente georreferenciado com um GPS Garmim modelo 60CSx.

Figura 2- Posição geográfica do local de Coleta.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Para a captura dos indivíduos, foram utilizadas redes de emalhar com uma isca de sangue cozido preparada pelos próprios pescadores locais. A pesca possibilitou a coleta de 42 amostras da nadadeira caudal, foram então armazenadas em tubos do tipo *Eppendorf* de 2 ml contendo etanol absoluto 99,5%. Por se tratar de um tecido de baixo risco, não necessita uso da eutanásia nos animais. O material biológico foi levado para o Laboratório de Genética de Organismos Aquáticos (LAGOA) na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, mantido sob refrigeração para realização da pesquisa.

2.3. EXTRAÇÃO DO DNA

As extrações de DNA ocorreram por meio do protocolo de Fenol/Clorofórmio adaptado de Sambroock *et al.*, 1989. Posteriormente, foram submetidas a eletroforese por meio do gel de agarose 1% contendo 100ml de tampão TBE 1X, 1g de agarose e 1,5µL de Brometo de Etídio, o DNA foi corado com Azul de Bromofenol para possibilitar a visualização no gel. As amostras foram então submetidas

a corridas eletroforéticas na cuba de eletroforese (DIGEL- Locus biotecnologia) com voltagem 100 v por 40 minutos usando tampão TBE 1X para análise de integridade e quantificação. Os géis foram visualizados sob luz ultravioleta, fotografado em sistema de fotodocumentação por meio de um Transluminador UV L.PIX Locus Biotecnologia – Molecular Imaging, indicando se há presença ou não de DNA para posterior amplificação por meio da técnica de PCR.

2.4. AMPLIFICAÇÃO DO DNA

As amplificações de PCR foram realizadas em Termociclador *ProFlex™ PCR System* (*Applied Biosystems*) e consistiram numa etapa inicial de desnaturação do DNA a 94°C por 4 minutos; seguido por 35 ciclos, cada um apresentando 40 segundos de desnaturação a 94°C; 30 segundos pareamento do *primer* a temperatura específica de cada *primer* finalizando com 1:30 minutos de extensão do fragmento a 72°C; seguido de uma extensão final por 7 minutos a 72°C e um período final de 4°C ∞.

Foram realizados testes utilizando um total de 13 *primers* do tipo ISSR, sendo selecionados para o desenvolvimento do presente trabalho os 5 *primers* que se apresentaram mais informativos (Tabela 1).

Tabela 1 - *Primers* utilizados na pesquisa com suas respectivas sequências e temperatura de anelamento para amplificação de DNA da espécie *K. bahiensis*.

<i>Primer</i>	Sequência 5' – 3'	Temperatura de anelamento (°C)
ISSR 1	(AG)8T	50,4°
ISSR 3	(GA)8T	50,4°
ISSR 13	(GGAC)3 ^a	51°
ISSR 21	(AAGC)4	51°
ISSR 29	ACTTCCCCCAGGTTAACCAC	51°

A mistura de reação teve como volume final 30µL, dos quais: 3µL de DNA, 13,8µL de Água Milli-Q, 2,5µL de solução tampão (10x), 3µL MgCl2 mM), 5µL de dNTP (100 mM), 2,5µL de *primer* (50µM) e 0,2µL de Taq DNA polimerase. As amplificações de PCR foram realizadas em Termociclador *ProFlex™ PCR System* (*Applied Biosystems*).

Os fragmentos amplificados foram separados por eletroforese em um gel de agarose a 2% contendo 100 ml de tampão TBE 1X, 2g de agarose e corado 3,0µL de Brometo de Etídio submetido a 100V por 2 horas, os poços do gel foram preenchidos com 15µL da amostra corada com azul de bromofenol. Foi utilizado o marcador DNA *Ladder* 100 pb como padrão molecular para auxiliar a estabelecer o tamanho das bandas. Em seguida foi realizada a foto documentação dos géis em Sistema L-PIX Locus Biotecnologia com luz ultravioleta.

2.5. ANÁLISES DE DADOS

O tamanho dos fragmentos de DNA foi estimado por comparação com o padrão DNA *Ladder* de 100 pb. Os resultados adquiridos a partir da visualização das bandas de DNA nos géis foram transformados em matrizes numéricas binárias caracterizadas pela presença (1) ou ausência de banda (0).

Os principais parâmetros para a análise da variabilidade genética para a população foram determinados pela: porcentagem de bandas polimórficas (PBP), Índice de Conteúdo Polimórfico (PIC), Índice de marcador (MI), a razão multiplex efetiva (EMR) e o número de *locus* polimórficos por *Primer* (n), os testes de atribuição foram calculados com o programa POPGENE versão 1.32 (YEH *et al.*, 1999).

O PIC foi utilizado para avaliar a eficiência dos *primers* utilizados, e foi calculado pela fórmula $PIC = \frac{1}{n}$, esse valor está relacionado com o número de alelos, que se relaciona diretamente com a divergência genética e ao número de genótipos em estudo (MALONE *et al.*, 2007). O MI mede a eficiência global de uma técnica de marcadores moleculares, foi obtido pela multiplicação do PIC médio pela EMR (POWELL *et al.*, 1996).

A partir de uma matriz de dissimilaridade gerada a partir da matriz numérica foi feita uma análise de coordenadas principais (PCoA), que consiste em um método de análise multivariada que permite visualizar a distribuição dos dados avaliados, com base em suas diferenças e semelhanças genéticas, atribuindo para cada item, uma localização em um gráfico.

O dendrograma foi construído a partir do programa MEGA 6.06 (TAMURA *et al.*, 2013), utilizando o método UPGMA (Unweighted Pair Group Method Using an Arithmetic Average).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Através dessa pesquisa com o uso dos SIG foi possível determinar o ponto de coleta a montante da barragem bandeira de melo, no município de Itaetê, nas coordenadas 12°58'17.0"S 40°59'38.8"O, onde foram coletados os indivíduos a fim de se realizar a caracterização genética da população

daquela região. Bezerra (2010) aplicou o SIG para avaliar as características de temperatura, oxigênio dissolvido, salinidade, transparência, pH e nutrientes, juntamente com a legislação ambiental, para determinar os melhores locais para o cultivo de peixes marinhos no litoral de Pernambuco. Em relação aos ecossistemas aquáticos, as técnicas de geoprocessamento têm sido mais aplicadas ao gerenciamento da exploração dos recursos pesqueiros e da produção aquícola (LEAL, 2011).

A partir dos 42 indivíduos amostrados foi possível montar um banco de tecidos “in vitro” e um banco de DNA, ambos armazenados no Laboratório de genética de organismos aquáticos (LAGOA) da UFRB.

Os cinco *Primers* utilizados geraram um número total de 79 fragmentos de bandas, sendo 72 polimórficos (91,1%), com tamanho de pares de base variando entre 210 pb e 1750 pb (Tabela 2), onde a maior amplitude alélica ou tamanho dos fragmentos foi identificada para o *locus* ISSR 21 (300 – 1750 pb) e a menor, para o ISSR 1 (250 – 700 pb).

Tabela 2 - *Primers* selecionados na análise de variabilidade genética da população da espécie *K. bahiensis* e suas características moleculares.

<i>Primer</i>	NBP	NBM	TF (pb)	P (%)	PIC	EMR	MI	RP
ISSR 1	17	0	210-700	100	0,82	9,03	7,40	5,53
ISSR 3	6	4	410-1500	60	0,42	3,12	1,32	6,38
ISSR 13	33	0	210-1500	100	0,91	34,0	31,1	8,56
ISSR 21	7	2	300-1750	77,8	0,54	2,53	1,37	4,84
ISSR 29	9	1	210-1200	90	0,57	3,12	1,78	5,13
Total	72	7	-	91,14	3,27	7,23	5,81	30,44
Média	-	-	-	-	0,65	1,45	1,16	6,09

NBP: N° de bandas polimórficas; NBM: N° de bandas monomórficas; TF: Tamanho dos fragmentos; P(%) percentual de bandas polimórficas; PIC: Conteúdo de Polimorfismo; EMR: Razão Multiplex Efetiva; MI: Índice do marcador, RP: Poder de resolução.

Bignotto *et al.* (2009) ao trabalhar com indivíduos da família siluriforme obteve uma amplitude alélica que variou entre 400 e 2000 pares de bases, valores semelhantes aos do presente trabalho, porém a porcentagem de bandas polimórficas foi de apenas 70% em média, valores consideravelmente menores que o encontrado neste trabalho.

O número total de *loci* variou de acordo com os *Primers*, sendo o maior número de *loci* produzidos pelo ISSR 13 e o menor pelo ISSR 21. Para os *loci* avaliados, o PIC variou de 0,42 para o ISSR 3 à 0,91 para o ISSR 13, com média de 0,65. Os marcadores moleculares ISSR mostraram-se úteis neste estudo, pois permitiram observar alta porcentagem de polimorfismo, demonstrando uma variabilidade genética intrapopulacional elevada, o PIC é um valor que auxilia na classificação dos *primers* conforme a eficiência na detecção do polimorfismo, servindo de parâmetro para a seleção dos *primers*.

Bulasag *et al.*, 2015 encontrou valores de PIC de 0,46 e 0,47 para duas espécies de siluriformes, valores que ainda foram considerados informativos, principalmente quando associados aos valores de heterozigotidade presentes no trabalho, confirmando o alto nível informativo dos valores encontrados no presente trabalho.

Do ponto de vista molecular, a diversidade genética é o polimorfismo entre indivíduos de uma população, em um ou mais fragmentos de DNA demonstrado pela presença e ausência de bandas no caso de marcadores dominantes (RAMALHO *et al.*, 2012). A análise do percentual de *loci* polimórfico dos indivíduos foi superior a 90%, o que demonstra uma alta variabilidade genética dentro da população.

Utilizando o software PopGene 1.32 (YEH *et al.*, 1999) foi realizado o cálculo dos principais parâmetros de variabilidade genética com marcadores moleculares dominantes, sendo esses, o número de alelos observados (*na*), o número de alelos efetivos (*ne*), a diversidade genética de Nei (*h*) e o índice de Shannon (*I*), representados na tabela 3.

Tabela 3 – Diversidade genética da população de *K. bahiensis*.

Nº de alelos observados (Na)	Nº de alelos efetivos (Ne)	Diversidade genética (h)	Índice de Shannon (I)
2,0 ($\sigma \pm 0,0$)	1,59 ($\sigma \pm 0,079$)	03697 ($\sigma \pm 0,031$)	0,5561 ($\sigma \pm 0,034$)

Tamanna *et al.* (2012) encontraram valores do índice de Shannon entre 0,327 e 0,403 ao trabalhar com 3 espécies de siluriformes, e apesar dos valores, que são considerados baixos, afirmou que há uma grande variação genética nas populações, pois de acordo com Jamago (2003) valores do índice de Shannon entre 0,50 e 0,75 são considerados médios, sendo assim os valores encontrados no presente trabalho, 0,556, é considerado um valor médio.

De acordo com Oliveira (2016), em um trabalho com Characiformes a diversidade genética de Nei (h), variou entre 0,1462 e 0,2017 para as populações estudadas, apresentando valores mais baixos quando comparados aos do presente trabalho (0,3697), indicando um nível de variabilidade genética mais alta.

A partir desses dados, foi possível obter um dendrograma (Figura 3), que ilustra graficamente a divergência encontrada entre os Indivíduos amostrados, onde se pode verificar que houve a formação de três grupos distintos e mostrando que os grupos 1 (Amarelo) e 2 (Azul) são as mais similares geneticamente, indicando que os mesmos compartilham alelos em comum, enquanto o grupo 3 (Vermelho) é composto por somente 4 indivíduos, formando um ramo isolado do dendrograma indicando a dissimilaridade entres esses indivíduos e os demais grupos.

Figura 3 - Dendrograma derivado através de UPGMA (Unweighted Pair Group Arithmetic Mean) da população de *K. bahiensis*.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Estudos genéticos em peixes são importantes em diversas situações, principalmente em relação aos processos reprodutivos, no qual tem papel fundamental na conservação de populações selvagens onde pode ser avaliado o impacto determinado por mudanças no ambiente sobre as populações naturais (ALLENDORF, 2017).

Na figura 4 são apresentados os agrupamentos pelo método UPGMA, gerado a partir da PCoA, confirmando a divisão dos indivíduos em três grupos distintos e a proximidade dos grupos com mais indivíduos, indicando uma similaridade genética mais elevada entre eles.

Figura 4 - Análise de Coordenadas Principais (PCoA) da população de *K. bahiensis*

Grupos de indivíduos, grupo 1 (Amarelo), grupo 2 (Azul) e grupo 3 (Vermelho).

Fonte: Elaborado pelos autores.

Através dessas análises, foi possível observar uma grande variabilidade genética interpopulacional, caracterizada pelo alto número de *loci* polimórficos presentes e o valor elevado de diversidade genética de Nei presentes na população estudada.

4. CONCLUSÃO

A técnica ISSR mostrou-se eficiente para análise da variabilidade genética da referida espécie, a qual apresentou alto nível de polimorfismo. Isto sugere níveis de diversidade genética intrapopulacional elevados, que é de grande importância para manutenção da viabilidade e sobrevivência da espécie, contribuindo para a conservação do potencial biológico das populações selvagens de peixes.

Os valores dos indicadores de diversidade genética também se mostraram altamente informativos para a população estudada, apresentando sempre valores considerados altos e demonstrando uma elevada variabilidade genética entre os indivíduos.

Dada à falta de trabalhos envolvendo a espécie alvo do trabalho, da família Doradidae, e visto o risco de extinção a que a espécie alvo do estudo está sujeita, é necessário um aumento no número de pesquisas envolvendo espécies endêmicas da América do Sul, e que, assim como a *K. bahiensis* possam vir a ser extintas caso não tenham devida importância a caracterização e preservação das mesmas.

5. AGRADECIMENTOS

Apoio e agradecimentos: FAPESB e LAGOA.

6. REFERÊNCIAS

- AGOSTINHO, A. A.; GOMES, L.C.; OKADA, E. K.; VAZZOLER, A. E. A. (1993). Estratificación espacial y comportamiento de *Prochilodus scrofa* em distintas fases del ciclo de Vida, en la planicie de inundación del alto rio Paraná y embalse de Itaipu, Paraná, Brasil. *Revue D'Hydrobiologie Tropicale*, v. 26, p. 79-90.
- AGOSTINHO, A. A.; GOMES, L. C.; OKADA, E. K.; VERÍSSIMO, S. (2004). Flood regime, dam regulation and fish in the Upper Paraná River: effects on assemblage attributes, reproduction and recruitment. *Reviews in Fish biology and Fisheries*, v. 14, n. 1, p. 11-19, 2004.
- AGOSTINHO, A. A.; PELICILE, F.M.; GOMES, L.C. (2008). Dams and the fish fauna of the neotropical region: impacts and management related to diversity and fisheries. *Brazilian journal of Biology*, 68 (4. Suppl.), 1119-1132.
- ALLAN, J.D.; ABELL, R.; HOGAN, Z.; REVENGA, C.; TAYLOR, B.W.; WELCOMME, R.L.; WINEMILLER, K. (2005). Overfishing of Inland Waters. *BioScience*, v. 55, n. 12, p. 1041-1051.
- ALLENDORF, F.W. (2017). Genetics and the conservation of natural populations: allozymes to genomes. *Molecular Ecology*, 26(2), 420-430.
- BEZERRA, T.R.Q. (2010). Uso de sistemas de informação geográfica na seleção de áreas propícias para a piscicultura marinha no litoral de Pernambuco. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal Rural de Pernambuco. Recife, 2010.
- BIGNOTTO, T.S.; PRIOLI, A.J.; PRIOLI, SMAP.; MANIGLIA, TC.; BONI, TA.; LUCIO, LC.; GOMES, V.N.; PRIOLI, R.A.; OLIVEIRA, AV.; JÚLIO-JUNIOR, H.F. AND PRIOLI, LM. (2009). Genetic divergence between *Pseudoplatystomacorruscans* and *Pseudoplatystomareticulatum* (Siluriformes: Pimelodidae) in the Paraná River Basin. *Braz. J. Biol.*, 69(2, Suppl.): 681-689.
- BULASAG, A.S.; DEL AGUA.; N.T.; PUNONGBAYAN, A.S.; DIAZ, M.G.Q. (2015). Development of microsatellite markers for genetic diversity analysis in *Glossogobius giuris* (Hamilton, 1822) and *Rhinogobius giurinus* (Rutter, 1897). *International Journal of Philippine Science and Technology*, Vol. 08, No. 2.
- CAMARGO, M.U.C. (1997). Os Sistemas de Informações Geográficas como Instrumentos de Gestão em Saneamento. Rio de Janeiro: ABES, 1997.
- COSTA, M.R.; MOURA, E.F. (2001). Manual de extração de DNA. Belém: Embrapa Amazônia Oriental, 2001. 24p. (Embrapa Amazônia Oriental. Documentos, 89).
- CRUZ, C.D.; FERREIRA, F.M.; PESSONI, L.A. (2020). Biometria aplicada ao estudo da diversidade genética. - Viçosa : UFV, 2020. xxx. : il. CDD 22 ed.576.54. ISBN: 978-85-60249-70-1
- DUDGEON, D.A.H.; ARTHINGTON, M.O.; GESSNER, Z.; KAWABATA, D.J.; KNOWLER, C.; LÉVÊQUE, R.J.; NAIMAN, A.; PRIEUR-RICHARD, D.; SOTO, M.L.J.; STIASSNY & C.A. SULLIVAN. (2006). Freshwater biodiversity: importance, threats, status and conservation challenges. *Biological Review* V.81 p.163–182.

FERRARIS JR.; C.J. (2007). Checklist of catfishes, recent and fossil (Osteichthyes: Siluriformes), and catalogue of siluriform primary types. *Zootaxa*, 1418: 1- 628.

FERREIRA, S.R.B. (2007). Variabilidade Genética Da Dourada (*Brachyplatystoma rousseauxii* - Siluriformes: Pimelodidae), Na Bacia Do Rio Branco, Roraima, Amazônia Brasileira. Dissertação. Universidade Federal de Roraima.

HILSDORF, A.W.S.; ORFÃO, L.H. (2011). Aspectos gerais do melhoramento genético em paixes no Brasil. *Revista Brasileira de Zootecnia* V.40, p.317-324.

IBGE. Diagnóstico Geoambiental e Sócio-Econômico da Bacia do Paraguaçu. Coleção Ibgeana; Estudos e pesquisas em geociências, ISSN 0103-7447. Nº 1. Rio de Janeiro, 1993.

INEMA – INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. 2013. CBH Paraguaçu. Disponível em: <<http://www.inema.ba.gov.br/gestao-2/comites-de-bacias/comites/cbhparaguacu/>>. Acessado em 16 de abril de 2019.

JAMAGO, J.M. (2003). Morpho-agronomic and molecular diversity of the Philippine mungbean (*Vigna radiata* L.) germplasm, *Philippine Journal of Crop Science* University of the Philippines Los Banos, The Philippines, p.174, 2003.

LEAL, A.L.G. Uso de SIG na seleção de áreas para repovoamento no reservatório de Moxotó - 2011.

MACHADO, A.B.M.; DRUMMOND, G. M.; PAGLIA, A. P. (2008). Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção. 1.ed. - Brasília, DF: MMA; Belo Horizonte, MG: Fundação Biodiversitas, 2008. 2v.

MAGUIRE, D.; GOODCHILD, M.F.; RHIND, D.W. (1993). Geographical informations systems. Principles and applications. Longman Scientific & technical. New York. P.638.

MALONE, G.; ZIMMER, P.D.; CASTRO, M.A.S.; ARIAS, L.N.; GERI EDUARDO MENEGHELLO, G.E.; PESKE, S.T. (2007). Caracterização bioquímica e molecular de acessos de arroz vermelho coletados no Estado do Rio Grande Do Sul. Goiânia-GO, Brasil – www.agro.ufg.br/pat Pesq Agropec Trop 37(2): 77-85, jun. 2007.

MULLER, L.P.; OLIVEIRA, A.V.; ALVES, N.D.; PETRY, A.C. et al. (2017). AVALIAÇÃO DA DIVERSIDADE GENÉTICA DE POPULAÇÕES DE CICHLA (PERCIFORMES: CICHLIDAE) INTRODUZIDAS NO RESERVATÓRIO DE JUTURNAÍBA E RIO SÃO JOÃO.. In: ANAIS DO ENCONTRO INTERNACIONAL DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA, 2017, . Anais eletrônicos... Campinas, Galoá, 2017. Disponível em: <<https://proceedings.science/epcc/papers/avaliacao-da-diversidade-genetica-de-populacoes-de-cichla-%28perciformes%3A-cichlidae%29-introduzidas-no-reservatorio-de-jutur?lang=pt-br>>. Acesso em: 07 out. 2021.

MEDEIROS, C. L.; GUEDES, J.C.F; OLIVEIRA, A. M.; COSTA, D. F. S. (2016). Uso De Sig Na Análise Dos Recursos Hídricos No Município De Caicó (Rn) Geoambiente online.

OLIVEIRA, C.S.T. (2016). CARACTERIZAÇÃO GENÉTICA DAS POPULAÇÕES DE TAMBAQUI (*Colossoma macropomum*, CUVIER, 1818) CULTIVADAS EM ESTAÇÕES DE PISCICULTURA DA BAHIA PESCA, BAHIA Tese: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas-BA.

- PALMA, E.G.A. (2003). Gestão do Território em Unidades de Conservação: O caso da APA Lago de Pedra do Cavalo. Monografia de Especialização em Geografia do Semi-árido Brasileiro. Universidade Estadual de Feira de Santana. Feira de Santana-BA.
- PIROLI, E.L. (2013). Geoprocessamento aplicado ao estudo do uso da terra das áreas de preservação permanente dos corpos d'água da bacia hidrográfica do rio Pardo. 2013. 150 f. Tese (Livre-docência em Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento) – Universidade Estadual Paulista, Ourinhos, 2013.
- PIROLI, E.; ZANATA, J. (2014). Hydrography update and study of the permanent preservation areas from a remote sensing of high spatial resolution. Revista Brasileira de Tecnologia Aplicada nas Ciências Agrárias. 7. 10.5935/PAeT.V7.N1.01.
- POFF, N.L. (2002). Ecological response to and management of increased flooding caused by climate change. PHILOS T R SOC A. V.360, p.1497–1510.
- POFF, N.L.; M. BRINSON, AND J.B. DAY. (2012). Freshwater and coastal ecosystems and global climate change: a review of projected impacts for the United States. Pew Center on Global Climate Change.
- POWELL, W.; MORGANTE, M.; ANDRÉ, C.; HANAFEY, M.; VOGEL, J.; TINGEY S.; RAFALSKI A. (1996). A comparação de marcadores RFLP, RAPD, AFLP e SSR (microssatélites) para análise de germoplasma. Molecular Procriar. 2 : 225–238
- PRINGLE, C. (2003). What is hydrologic connectivity and why is it ecologically important?. Hydrological Processes, v. 17, n. 13, p. 2685-2689, 2003.
- RAMALHO, M.A.P.; SANTOS, J.B.; PINTO, C.A.B.P. (2012). Genética na agropecuária. 5.Ed. Lavras: UFLA, 566p. 2012.
- SAMBROOCK, J. F.; RITSCH, E. F.; MANIATIS, T. (1989). Molecular Cloning. A laboratory manual. 2° ed., Cold Spring Harbor: Cold Spring Harbor Laboratory Press.
- TAMURA, KOICHIRO E STECHER, GLEN E PETERSON, DANIEL E FILIPSKI, ALAN E KUMAR, SUMITXL. (2013). MEGA6: Molecular Evolutionary Genetics Analysis Version 6.0. Molecular biology and evolution. 30. 10.1093/molbev/mst197.
- SANTOS, A.C.A.S. (2005). Distribuição e ecologia da peracuca, *Kalyptodoras bahiensis* Higuchi, Britski&Garavello, (Siluriformes, Doradidae) na bacia do rio Paraguaçu, no estado da Bahia. Boletim Sociedade Brasileira de Ictiologia. N.80. p. 5.
- TURCHETTO-ZOLET, A.C.; TURCHETTO, C.; ZANELLA, C.M E PASSAIA, G. (2017). Marcadores Moleculares na Era genômica: Metodologias e Aplicações. Ribeirão preto: Tiago Campos Pereira.
- YEH F. C.; BOYLE R.; YANG R. C.; YE Z.; MAO J. X.; YEH D. (1999). POPGENE version 1.32. Programa de computador e documentação distribuídos pelo autor. Disponível em: <<https://sites.ualberta.ca/~fyeh/popgene.html>> Acessado em 16 de abril de 2019.

Capítulo 6

10.37423/211004863

UTILIZAÇÃO DE MICRORGANISMOS PROMOTORES DE CRESCIMENTO NA CULTURA DO TOMATE

Hygo Rafael Ramos de Jesus

Faculdade São Francisco de Barreiras-BA

Jonatas Barros dos Santos

Universidade de Brasília - UnB

Alberto do Nascimento Silva

Universidade de Brasília - UnB

José de Oliveira Cruz

Universidade de Brasília - UnB

Rodrigo Barros dos Santos

Faculdade São Francisco de Barreiras-BA

Lincon Rafael da Silva

Universidade de Brasília - UnB

Cleuber Oliveira de Sousa

Universidade do Estado da Bahia - UNEB

Resumo: Diante do contexto da produção sustentável no país e redução do uso de produtos químicos, o objetivo deste artigo foi avaliar os efeitos da utilização de microrganismos como promotores de crescimento na cultura do tomateiro. Foram utilizadas sementes de tomate da variedade Santa Cruz Kada Gigante. As sementes foram tratadas com *Trichoderma harzianum*, *Paecilomyces lilacinus* e *Bacillus subtilis*. No laboratório de sementes foram realizados os testes de germinação, onde houve a embebição das sementes com microrganismos. Foram analisadas as variáveis: índice de germinação, massa fresca da parte aérea, massa fresca da raiz e comprimento radicular. Em outro ensaio realizado em ambiente protegido utilizando os mesmos tratamentos biológicos, foram avaliadas a emergência, índice de velocidade de emergência, diâmetro do colo, altura de planta. Aos 76 dias após o transplântio realizou-se as análises destrutivas, para determinação da massa fresca da parte aérea, massa fresca da raiz e comprimento radicular. Os tratamentos avaliados proporcionaram aumento da altura de plantas. *B. subtilis* e *T. harzianum* promoveram efeitos positivos no diâmetro do colo do tomateiro. *Trichoderma* aumentou ainda a emergência e o índice de velocidade de emergência das sementes de tomate em comparação com os demais tratamentos.

Palavras-chave: *Bacillus*; desenvolvimento vegetativo; *Paecilomyces*; *Trichoderma*.

INTRODUÇÃO

A cultura do tomateiro (*Lycopersicum esculentum* Miil.), está entre as olerícolas de maior importância no ramo do agronegócio das hortaliças, sendo cultivada em quase todo o mundo e consumida na forma in *natura*, processados ou através de derivados. Nos últimos anos, o avanço da agricultura vem se estabelecendo de maneira rápida com constantes modernização no processo produtivo (INCAPER, 2010).

Segundo o Instituto Brasileiro Geográfico Estatístico – IBGE (2020), no ano de 2019 a cultura do tomate foi cultivada em uma área superior a 58 mil hectares, com produção de 4 milhões de toneladas. Conforme Treichel et al., (2016), em estimativa do Conselho Mundial de Tomate para Processamento – WPTC, o Brasil está em oitava posição da lista da WPTC, com aproximadamente 1,3 milhão de toneladas. Sendo que de acordo com IBGE (2020), os estados que assumem o ranking nacional de maiores produtores são: Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, e Santa Catarina.

Devido aos seus diversos mecanismos de ação, os microrganismos utilizados na agricultura apresentam grande potencial de associações benéficas para a promoção de crescimento nas plantas cultivadas.

O estudo destes microrganismos vem ganhando destaque em razão da necessidade por tecnologias sustentáveis, que podem contribuir na redução dos custos da produção (GOMES et al., 2016). As populações de microrganismos que compõem a rizosferas são de grande importância seja pela sua ação antagonista a diversos outros microrganismos patogênicos ou pela atuação na ciclagem dos nutrientes, produzindo metabólitos secundários como antibióticos e enzimas que atuarão na degradação de substâncias complexas como celulose, lignina, lignocelulose e xilana que desempenham papel fundamental na matéria orgânica do solo (PETROSYAN et al., 2003; DING et. al., 2004; SOUSA et al., 2008). Há ainda microrganismos como os do gênero *Bacillus*, que produzem metabólitos secundários nos quais podem ser encontradas substâncias que agem na indução de crescimento, oriundos da sua capacidade de solubilização de fosfato ou da produção de hormônios vegetais, como o ácido indolacético e as giberelinas (ADESEMOYE et al., 2008).

Os fungos do gênero *Trichoderma* são os mais estudados e tiveram seu primeiro produto biológico comercial lançado no ano de 1987 no Brasil (MORANDI, BETIOL, 2009). Por possuir diversas formas de ação, este fungo é muito utilizado visando principalmente o controle biológico de fitopatógenos, proporcionando um melhor crescimento radicular e desenvolvimento da parte aérea da planta, além

de poder atuar como indutor de resistência (HARMAN, 2006). A bactéria *Bacillus subtilis* está presente no meio ambiente, sendo facilmente encontrada no solo e na água, é saprófita e não é patogênica a animais vertebrados (LOGAN; de VOS, 2009). *B. subtilis* produz muitos metabólitos secundários quimicamente diversificados de interesse químicos e biólogos (WANG et al., 2015), promovendo o crescimento vegetal e agindo como antagonista a patógenos (FERRAZ, BROWN, 2016).

Paecilomyces lilacinus, recentemente reclassificado como *Purpureocillium lilacinum*, é isolado do solo, de materiais vegetais em decomposição, insetos, nematoides, podendo ainda ser patogênico ao homem e outros vertebrados (LUANGSA-ARD et al., 2011). É um fungo que pode colonizar a rizosfera das plantas e é um parasita de ovos e cistos de nematoides, sendo muito estudado na área agrícola em diversas culturas devido a esta capacidade (ALMEIDA et al., 2016, PAZ FILHO et al., 2019). É bastante competitivo em campo, adaptando-se a uma ampla faixa de pH do solo e possui fácil crescimento in vitro (ATKINS et al., 2003; JACOBS et al., 2003). Segundo Santos et al., (2019), este microrganismo melhorou as características agrônômicas de plantas de soja, sendo assim favorável para o uso no plantio.

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA (2016), em relatório publicado com resultados de análises de resíduos de agrotóxicos, foi constatado o uso de 63 agrotóxicos diferentes no tomateiro, e 4 das amostras analisadas, 200 apresentaram como agrotóxicos não autorizados para cultura do tomate, o que corresponde a uma porcentagem de 21% de agrotóxicos não permitidos. Portanto, é necessário buscar melhores métodos para produção que possuam baixo custo e propicie melhores resultados produtivos dentro da cadeia da olericultura, e principalmente no ramo da tomaticultura. Assim, o uso de microrganismos eficientes na agricultura pode propiciar a diminuição de uso dos agrotóxicos, pois este, além de promover o crescimento das plantas são capazes de atuar no controle de pragas, podendo obter os mesmos níveis de controle ou até níveis superiores do que os produtos químicos convencionais, contudo, sem prejudicar o meio ambiente.

Dessa forma o objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos da utilização de diferentes microrganismos promotores de crescimento na cultura do tomateiro.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido na Faculdade São Francisco de Barreiras (FASB), situada no município de Barreiras, Bahia. O local caracteriza por apresentar latitude: 12°10'29,1" S longitude: 45°00'40,9" W, altitude: 452 metros. O período da realização do experimento foi entre os meses de abril a setembro

de 2018, e foi dividido em duas etapas, sendo uma etapa em viveiro telado e outra no laboratório de sementes.

Os microrganismos avaliados como promotores de crescimento nos experimentos foram: *Trichoderma harzianum*, *Bacillus subtilis* e *Paecilomyces lilacinus*, obtidos de formulações comercializadas na região. A variedade do tomateiro utilizado foi a do grupo Santa Cruz, cultivar Santa Cruz Kada Gigante, da marca Feltrin.

EXPERIMENTO EM VIVEIRO TELADO

O solo utilizado foi coletado na área experimental na profundidade de 0 a 20 cm, e uma amostra foi encaminhada ao laboratório para determinação das características físicas e químicas (Tabela 1).

Tabela 1. Análise física e química do solo usado no experimento na profundidade de 0 a 20 cm.

pH	Ca ²⁺	Mg ²⁺	H+Al	K ⁺	P	S	Argila	Limo	Areia
(CaCl ₂)	-----cmol _c /dm ³ -----			-----mg/dm ³ -----			-----(%)-----		
7,11	3	0,9	0,7	0,28	14,90	4,90	30,9	6,9	62,2

pH em CaCl₂; Ca: Cálcio; Mg: Magnésio; K: Potássio P: fosforo S: Enxofre.

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, com quatro tratamentos e oito repetições, totalizando 32 unidades experimentais. Os tratamentos utilizados foram: T1- Testemunha; T2- *Trichoderma harzianum*; T3- *Bacillus subtilis*; T4- *Paecilomyces lilacinus*, diluídos em água e inoculados no solo. O preparo da calda de cada microrganismo foi feita seguindo a recomendação do fabricante conforme as seguintes proporções:

Microrganismo	Dose
<i>Trichoderma</i>	5 g L ⁻¹
<i>Paecilomyces lilacinus</i>	10 g L ⁻¹
<i>Bacillus subtilis</i>	5 mL L ⁻¹ (1x10 ⁹ UFC)

As mudas de tomateiro foram produzidas em recipientes plásticos com volume de 250 cm³, utilizando o substrato comercial Biogrow. Após 22 dias de cultivo, as mudas foram transplantadas para vasos com capacidade e preenchidos com 10 litros de solo.

A aplicação dos microrganismos seguiu as recomendações do fabricante, sendo feita diretamente no solo 20 dias após o transplante, utilizando-se 5 mL das soluções descritas anteriormente, sendo realizadas duas aplicações com intervalo de 15 dias.

Avaliou-se à altura das plantas e diâmetro do colo medido a 5 cm do solo, ambas realizadas a cada 10 dias até o 40º dia após o transplântio (DAT). Aos 76 (DAT), foram realizadas análises destrutivas, com a retirada das plantas dos vasos, separação da parte aérea e da raiz, pesou-se a massa fresca da parte aérea, massa fresca da raiz e mediu-se comprimento da parte aérea e radicular.

EXPERIMENTO EM AMBIENTE PROTEGIDO

Avaliou-se a influência dos microrganismos descritos na germinação de sementes de tomate. Para tanto foram utilizadas 50 sementes por tratamento e cinco repetições em delineamento experimental inteiramente casualizados. A calda foi preparada de acordo com as especificações citadas anteriormente. As sementes foram embebidas na calda correspondente aos tratamentos por 30 minutos. Em caixas gerbox previamente sanitizadas, as sementes foram distribuídas entre 2 folhas de papel germitest, umidificados com 15 mL de água. A contagem da germinação foi realizada ao 7º dia e expressa em porcentagem (BRASIL, 2009).

Para avaliar a emergência de plântulas, foram utilizadas 5 repetições de 50 sementes por tratamento, em delineamento em blocos ao acaso. As sementes foram embebidas na calda com os microrganismos por 30 minutos. Após isso, foram semeadas na profundidade de 2 cm, em substrato areia, previamente esterilizada, disposta em bandejas plásticas com 3 litros de capacidade. Foram realizadas irrigações diárias, sempre que necessário. As contagens das plântulas normais emersas foram feitas diariamente até o 21º dia após a semeadura. O resultado foi expresso em porcentagem de emergência de plântulas.

O índice de velocidade de emergência foi realizado juntamente com o teste de emergência. Foram realizadas contagens diárias das plântulas emersas e os dados foram submetidas a fórmula proposta por Maguire (1962). Ao final dos 21 dias, 15 plântulas foram retiradas aleatoriamente do substrato de cada repetição (bloco), para avaliação da altura, comprimento da raiz e número de folhas de cada plântula.

Os dados coletados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, através do programa estatístico AgroEstat 1.0 (BARBOSA; MALDONADO JÚNIOR, 2011). Para avaliação dos efeitos dos microrganismos em função da altura e do diâmetro, foi realizado a análise de regressão, sendo os modelos polinomiais escolhidos de acordo com a significância dos coeficientes e com melhor ajuste dos coeficientes de determinação (R²).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Experimento em viveiro telado: A altura de planta e o diâmetro do colo do tomateiro ajustaram-se significativamente ($p < 0,05$) ao modelo linear (Figura 1). Não houve diferença significativa para as demais variáveis MFPA, MFR e CR.

Figura 1. Valores médios de altura de planta (cm) e o diâmetro do colo (mm) em função do tempo e dos tratamentos avaliados (T1- Testemunha; T2- *Trichoderma harzianum*; T3- *Bacillus subtilis*; T4- *Paecilomyces lilacinus*).

Com relação à altura de plantas todos os tratamentos foram significativos ($p < 0,05$). É possível observar que dentre o período avaliado houve um vigoroso crescimento vegetativo, expresso pela altura de plantas, porém, isto não refletiu da mesma maneira sobre as demais variáveis, onde apenas o diâmetro de colo (DC), apresentou diferença significativa entre os tratamentos à base de *Trichoderma* e *B. subtilis*.

Fontenelle et al., (2011), selecionou 12 isolados de *Trichoderma* com a capacidade de promover o aumento da massa seca das plantas de tomate em mais de 100%, e de controlar *Xanthomonas euvesicatoria* em até 95,94% e *Alternaria solani* em até 95,23%, mostrando o grande potencial destes isolados. Há diversos relatos na literatura demonstram o porquê *Trichoderma* spp. promove o crescimento das plantas e os mecanismos envolvidos nisso. HARMAN, (2006), descreve um aumento da absorção de nutrientes e inibição de microrganismos nocivos na rizosfera. Guzmán-Guzmán et al. (2019) descrevem a produção de uma grande variedade de reguladores de crescimento, como fitormônios que aumentam a taxa de germinação e a massa da planta.

Para as demais variáveis, em que não houve significância, os resultados se assemelharam aos encontrados por Fernandes et al., (2014) e por Ferreira e Mendonça (2016), em que ambos não

obtiveram aumento significativo para a MFPA e para o CR, em plantas de tomate tratadas com *B. subtilis*.

Apesar de Santiago et al., (2006), ter observado maior peso de matéria fresca da parte aérea de plantas de tomate tratadas com *P. lilacinus*, não foi observado correlação entre os tratamentos com *P. lilacinus* e o crescimento do tomateiro.

Estes resultados corroboram com o que foi descrito por Machado et al., (2012), em que a ação desses microrganismos depende de vários fatores como a cultura, o ambiente, substrato, temperatura e umidade. Além disso, há as capacidades inter e intra-especificamente de cada microrganismos que podem apresentar grande variabilidade. Fica evidente o quanto as condições bióticas e abióticas envolvidas no processo são importantes para o sucesso do controle biológico, neste artigo, visando apenas a promoção de crescimento, e de que forma a pesquisa pode contribuir com isso, buscando isolados de microrganismos adaptados as culturas e ambientes específicos.

Experimento em ambiente protegido: Os resultados obtidos para o experimento em ambiente protegido demonstraram que para as variáveis comprimento de parte aérea (CPA), emergência (E) e índice de velocidade de emergência (IVE) existiu diferenças estatísticas entre os tratamentos avaliados (Tabela 2).

Tabela 2. Valores médios de germinação, comprimento da parte aérea, emergência e índice de velocidade de emergência do tomateiro cultivado com diferentes microrganismos promotores de crescimento.

Tratamentos	GER (%)	CPA	E (%)	IVE
T1- Testemunha	75,2 a	4,20 b	39,5 b	4,45 ab
T2- <i>Trichoderma harzianum</i>	81,2 a	5,75 a	73,00 a	4,81 a
T3- <i>Paecilomyces lilacinus</i>	66,4 a	5,40 a	65,5 ab	3,94 ab
T4- <i>Bacillus subtilis</i>	65,2 a	5,20 ab	64,00 ab	3,80 b
CV (%)	10,71	17,75	11,76	13,17
Média	72,00	5,14	60,5	11,37

CPA: comprimento da parte aérea; GER: germinação; E: Emergência; IVE: Índice de velocidade de emergência. As médias seguidas das mesmas letras não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5%.

Para as variáveis germinação, altura de plântulas e número de folhas não houve diferença estatística entre os tratamentos avaliados. ETHUR et al., (2008), verificou efeito contrário do que foi observado

neste estudo, onde os tratamentos à base de *Trichoderma* não promoveram efeitos positivos na germinação e na emergência de plântulas do tomateiro, reduzindo-os em alguns casos e provocando aumento da percentagem de plântulas anormais e menor desenvolvimento de radícula.

Para o comprimento de parte aérea os fungos *T. harzianum* e *P. lilacinus* diferiram estatisticamente dos demais tratamentos. Carvalho et al., (2011) verificaram aumento do comprimento de plantas de feijão quando tratadas com diferentes isolados de *Trichoderma*. Um isolado de *Trichoderma* avaliado por Pereira et al., (2019), apresentou resultados significativos de crescimento em alface americana em condições de laboratório e de campo.

Para o teste de emergência verificou-se que o fungo *Trichoderma* apresentou os melhores resultados, diferenciando-se dos demais produtos biológicos e principalmente do tratamento controle, o que também ocorreu para a variável índice de velocidade de emergência. Rocha et al., (2017), encontrou resultados semelhantes na cultura do feijão onde o *Trichoderma* também promoveu aumento no IVE.

Sendo o IVE um teste de vigor para as sementes (NAKAGAWA, 1999) e sendo o vigor construído durante o processo de produção, com influência principalmente das condições de cultivo, Ferraresi et al., (2017) apontam que produtos utilizados no tratamento de sementes não interferem nessa variável, porque o vigor da semente é construído durante sua produção. Evidenciou-se o oposto disto neste trabalho, onde o tratamento biológico a base de *T. harzianum* apresentou emergência superior em 54% e um IVE também superior quando comparados a testemunha.

No entanto, essa afirmação, mais uma vez, é o resultado do produto utilizado e das características bióticas e abióticas envolvidas no processo de germinação. Uma vez que ocorre a emergência da radícula e há a capacidade de colonização e desenvolvimento por parte dos microrganismos na rizosfera, estes poderiam competir com os patógenos de solo e atuar de forma simbiótica com as plantas.

CONCLUSÕES

Os microrganismos avaliados promoveram aumento na altura das plantas. Para o diâmetro do colo *T. harzianum* e *B. subtilis* apresentaram resultados significativos. O fungo *T. harzianum* ainda proporcionou emergência superior em 54% quando comparado a testemunha e um índice de velocidade de emergência superior aos demais tratamentos.

REFERÊNCIAS

- ADESEMOYE, A. O.; OBINI, M.; UGOJI, E.O. Comparison of plant growth-promotion with *Pseudomonas aeruginosa* and *Bacillus subtilis* in three vegetables. *Brazilian Journal of Microbiology*, v. 39, n. 3, p. 423-426. (2008). <https://doi.org/10.1590/S1517-83822008000300003>
- ALMEIDA, J. A., J. C. SOUZA, ARAÚJO. F. G. Tratamento de sementes com abamectina e *Paecilomyces lilacinus* no manejo de *Heterodera glycines* na cultura da soja. *MultiScience Journal*, v. 1, p. 62-65. 2016.
- ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Programa de análise de resíduos de agrotóxicos em alimentos (PARA). Brasília, DF: 2016. Disponível em:
- <http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Relat%C3%B3rio+PARA+2013-2015_VERS%C3%83O-FINAL.pdf/494cd7c5-5408-4e6a-b0e5-5098cbf759f8>. Acesso em: 18 jun. 2019.
- ATKINS, S. D.; HIDALGO-DIAZ, L.; KALISZ, H.; MAUCLINE, T. H.; KIRSCH, P. R.; HERRY, B. R. Development of a new management strategy for the control of root-knot nematodes (*Meloidogyne* spp.) in organic vegetable production. *Pest Management Science*, v. 59, n. 2, p. 183-189, 2003.
- BARBOSA, J. C.; MALDONADO JÚNIOR, W. AgroEstat: sistema para análise estatística de ensaios agrônômicos. Versão 1.0. Jaboticabal: FCAV/Unesp, 2011
- MORANDI, M. A. B.; BETTIOL, W. Controle Biológico de Doenças de Plantas no Brasil. In: BETTIOL, W.; MORANDI, M. A. B. (Org.). Biocontrole de Doenças de Plantas: uso e perspectivas. Jaguariúna-SP: Embrapa Meio Ambiente, 2009 p. 7-14.
- BRASIL. Ministério da Agricultura e Reforma Agrária. Regras para análise de sementes. Brasília, DF: 2009. Disponível em:
- <www.agricultura.gov.br/assuntos/insumos.../2946_regras_analise__sementes.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2020.
- CARVALHO, D. D.C.; MELLO, S. C. M.; LOBO JÚNIOR, M.; SILVA, M. C. Controle de *Fusarium oxysporum* f.sp. *phaseoli* in vitro e em sementes, e promoção do crescimento inicial do feijoeiro comum por *Trichoderma harzianum*. *Tropical Plant Pathology*, v. 36, n. 1, p. 28-34. 2011. <https://doi.org/10.1590/S1982-56762011000100004>
- DING, C. H.; JIANG, Z. Q.; LI, X. T.; LI, L. T.; KUSAKABE, I. High activity xylanase production by *Streptomyces olivaceoviridis* E-86. *World Journal of Microbiology and Biotechnology*, v. 20. n. 1, p. 7-10, 2004.
- ETHUR, L. Z.; BLUME, E.; MUNIZ, M. F. B.; CAMARGO, R. F.; FLORES, M.G.V.; CRUZ, J. L.G.; MENEZES, J. P. *Trichoderma harzianum* no Desenvolvimento e na Proteção de Mudanças contra a Fusariose do Tomateiro. *Ciência e Natura*, (I): p. 57-69. 2008. <http://dx.doi.org/10.5902/2179460X9837>
- FERNANDES, R. H.; VIEIRA, B. S.; FUGA, C. A. G.; LOPES, E. A. *Pochonia chlamydosporia* e *Bacillus subtilis* no controle de *Meloidogyne incognita* e *M. javanica* em mudas de tomateiro. *Bioscience Journal*, v. 30, n. 1, 2014.

FERRAZ, L. C. C. B.; BROW, D. J. F. Nematologia de plantas: fundamentos e importância. Manaus: Norma editora, 2016. Disponível em: <docentes.esalq.usp.br/sbn/ferbro/FerrazBrown2016v02.pdf>. Acesso em: 01 jun. 2020.

FERRARESI, S. T.; ALCAMIM, T. G.; ZORZZI, I. C.; DALACOSTA, N. L.; MAZARO, S. M.; POSSENTI, J.C. Efeito de produtos biológicos e bioestimulantes no desenvolvimento inicial de plântulas de soja. IV Congresso de Ciência e Tecnologia da UTFPR-DV. 2017.

FERREIRA D. C; MENDONÇA R. M. Crescimento de mudas de tomateiro tratadas com Rizolyptus®. In: Congresso Brasileiro de Olericultura, 2016. Disponível em:

<http://www.abhorticultura.com.br/EventosX2/EventosX/Trabalhos/EV_8/A6643_T10249_Comp.pdf> Acesso em: 17 fev. 2020.

FONTENELLE, A.D.B.; GUZZO, S.D.; LUCON, C.M.M.; HARAKAVA, R. Growth promotion and induction of resistance in tomato plant against *Xanthomonas euvesicatoria* and *Alternaria solani* by *Trichoderma* spp. *Crop Protection* v. 30, n. 11, p. 1492-1500. 2011. <https://doi.org/10.1016/j.cropro.2011.07.019>

GOMES, E. A.; SILVA, U. de C.; PAIVA, C. A. O.; LANA, U. G. de P.; MARRIEL, I. E.; SANTOS, V. L. Microrganismos promotores do crescimento de plantas. Sete Lagoas: Embrapa Milho e Sorgo, 2016.

HARMAN, G. E. Overview of Mechanisms and Uses of *Trichoderma* spp. *Phytopathology*, v. 96, n. 2, p.190-194, 2006.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Levantamento Sistemático da Produção Agrícola - março 2020. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/home/lspa/brasil> Acesso em: 25 abril. 2020.

INCAPER - Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural. Tomate. Vitória, ES, 2010. Disponível em: <biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/bitstream/item/793/1/Livro-Tomate-Incaper.pdf>. Acesso em: 26 jan. 2020.

INMET - Instituto Nacional de Meteorologia. 2018. Normais Climatológicas do Brasil 1961-1990. Disponível em: <<http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=clima/normaisClimatologicas>>. Acesso em: 18 out. 2019.

JACOBS, H.; GRAY, S. N.; CRUMP, D. H. Interactions between nematophagous fungi and consequences for their potential as biological agents for the control of potato cyst nematodes. *Mycological Research*, v. 107, n. 1, p. 47-56, 2003.

LUANGSA-ARD, J.; HOUBRAKEN, J.; VAN DOORN, T.; HONG, S.; BORMAN, A. M.; HYWEL-JONES, N. L.; SAMSON, R. A. *Purpureocillium*, a new genus for the medically important *Paecilomyces lilacinus*, *FEMS Microbiology Letters*, v. 321, n. 2, p. 141-149, 2011. <https://doi.org/10.1111/j.1574-6968.2011.02322.x>

LOGAN, N. A.; de VOS, P. Genus I. *Bacillus* Cohn 1872, *Bergey's Manual of Systematic Bacteriology*. 174 AL. Vol3. The firmicutes 2nd Edition. Springer. 2009

MAGUIRE, J. D. Velocidade de seleção e avaliação da ajuda na germinação para emergência e vigor de plântulas. *Crop Science*. 1962. Disponível em:

<<http://dx.doi.org/10.2135/cropsci1962.0011183X000200020033x>>. Acesso em: 15 dez. 2019.

MACHADO, D. F. M.; PARZIANELLO, F. R.; SILVA, A. C. F.; ANTONIOLLI, Z. I. Trichoderma no Brasil: O fungo e o bioagente. Revista de Ciências Agrárias, v. 35, n.1, 2012.

NAKAGAWA, J. Testes de vigor baseados no desempenho de plântulas. In: KRZYZANOWSKI, F.C.; VIEIRA, R.D.; FRANÇA NETO, J.B. (Ed.). Vigor de sementes: conceitos e testes. Londrina: ABRATES, 1999. cap.2, p.1-24

PAZ FILHO, E. R.; MUNIZ, M. F. S.; ALMEIDA, A.V. D. L.; SOARES, N. H. M.; MOURA FILHO, G.; ROCHA, F. S. *Purpureocillium lilacinum* (Lilacel®) in the treatment of banana plantlets infected by plant-parasitic nematodes. Nematropica, v. 49, p. 134-139. 2019.

PEREIRA, F. T.; OLIVEIRA, J. B.; MUNIZ, P. H. P. C.; PEIXOTO, G. H. S.; GUIMARÃES, R. R.; CARVALHO, D. D. C. Promoção do crescimento e da produtividade de alface pelo emprego de cepas comerciais de *Trichoderma* spp. Horticultura Brasileira, v. 67, n. 1, p. 69-74. 2019

PETROSYAN, P.; GÁRCIA-VARELA, M.; LUZ-MADRIGAL, A.; HUITRÓN, C.; FLORES, M.E. *Streptomyces mexicanus* sp., a xylanolytic micro-organism isolated from soil. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. v.53, p.269-273, 2003.

ROCHA, W. S.; SAKAI, T. R.; SOUZA, D. L. A.; CHAGAS JUNIOR, A. F.; SANTOS, M. M. Efeito da microbiolização na germinação e crescimento inicial de feijão caupi no Estado do Tocantins. Tecnologia e Ciência Agropecuária, v. 11, n. 6, p.41-47. 2017.

SANTIAGO, D. C.; HOMECHIN, M.; SILVA, J. F. V.; RIBEIRO, E. R.; GOMES, B. C.; SANTORO, P. H. Seleção de isolados de *Paecilomyces lilacinus* (Thom.) Samson para controle de *Meloidogyne paranaenses* em tomateiro. Ciência Rural, v. 36, n. 4, 2006.

SANTOS, A. R. B.; ALMEIDA, F. A.; LEITE, M. L. T.; FONSECA, W. L.; ALCÂNTARA NETO, F.; PEREIRA, F. F.; CARVALHO, R. M.; BARRETO, A. F.; SANTOS, T. S. Biocontrole no manejo de *Pratylenchus brachyurus* na soja. Revista de Ciências Agrárias, v. 42, n. 3, p. 201-210. 2019.

<https://dx.doi.org/10.19084/rca.17201>

SOUSA, C. S., SOARES, A. C. F., GARRIDO, M. S. (2008). Characterization of streptomycetes with potential to promote plant growth and biocontrol. Scientia Agricola, v. 65. n. 1, p. 50-55. <https://doi.org/10.1590/S0103-90162008000100007>

TREICHEL, M. et al. Anuário brasileiro de tomate 2016. Santa Cruz do Sul: Ed. Gazeta Santa Cruz do Sul, 2016. Disponível em:

<<http://www.editoragazeta.com.br/flip/anuario-tomate-2016/files/assets/basic-html/page31.html>>. Acesso em: 03 mai. 2020.

WANG, T.; LIANG, Y.; WU, M.; CHEN, Z.; LIN, J.; YANG, L. Natural products from *Bacillus subtilis* with antimicrobial properties. Chinese Journal of Chemical Engineering. v. 23. p. 744–754. 2015.

Capítulo 7

10.37423/211004868

APLICAÇÃO DO DIAGNÓSTICO RÁPIDO DA ESTRUTURA DO SOLO (DRES) NO PROJETO DE ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO

Thamires Oliveira Gomes

Universidade do Estado do Pará

Gleudson Marques Pereira

Universidade do Estado do Pará

Thayrine Silva Matos

Universidade do Estado do Pará

Jhuan Santana Silva Brito

Universidade do Estado do Pará

Seidel Ferreira dos Santos

Universidade do Estado do Pará

Resumo: O fator que mais influencia a formação do solo é seu material de origem onde sua composição química e inicial e sua composição mineralógica determinam a textura do solo, sua mineralogia e a riqueza de nutrientes. Existem dois aspectos pelo qual a estrutura do solo pode ser analisada sendo elas “avaliação de parâmetros relacionados à forma da estrutura, como densidade do solo e porosidade e avaliações de parâmetros relacionados à estabilidade da estrutura”. A busca por processos rápidos e de baixo custo tem se tornado a melhor alternativa, como por exemplo, o uso do Diagnóstico Rápido da Estrutura do Solo (DRES). Diante disso, o objetivo do trabalho foi qualificar a estrutura do solo no projeto de assentamento (PA) Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no município de Marabá, no Sudeste Paraense, de forma interpretativa, através do método de campo (DRES) proposto pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Foi realizada a coleta de amostras de solo em três tratamentos na área, sendo área de sistema agroflorestal (P1) com implantação de cinco anos de idade, área de pastagem (*Brachiaria brizantha*) abandonada (P2) e área de reserva legal (P3), ambas com processo de regeneração natural de seis e dez anos respectivamente. A partir dos resultados pode-se observar que os dois primeiros tratamentos P1 e P2 apresentaram indicativos de degradação e muita compactação, sendo o tratamento P1 o que evidenciou mais baixa qualidade que pode estar relacionado com a recente queima da área, causando a médio e longo prazo à deterioração das propriedades químicas do solo e reduzindo seu potencial produtivo. O solo P3 apresentou evidências de conservação e maiores quantidades de matéria orgânica, presença de raízes superficiais, os agregados com características grumosas, tendo o solo menos compactado. Assim, o DRES permitiu de maneira rápida e simples a caracterização e análise da qualidade estrutural do solo, sendo possível por meio dele à indicação preliminar de formas de manejo a serem implantadas para a melhoria das propriedades do solo.

Palavras-Chave: Física do solo; diagnóstico rápido; manejo.

INTRODUÇÃO

O solo é um sistema constituído por partes sólidas, físicas e gasosas oriundas de fontes minerais e orgânicas, e o mesmo é também formado por horizontes, que possibilitam diferenciar e classificar os tipos de solo (MENDONÇA, 2010). O fator que mais influencia a formação do solo é seu material de origem, onde sua composição química inicial e sua constituição mineralógica determinam a textura do solo, sua mineralogia e a riqueza de nutrientes (RAIJ, 2011). Entretanto, as práticas de manejo do solo e das culturas podem provocar alterações nos atributos do solo, podendo causar perda de qualidade, afetando a sustentabilidade ambiental e econômica da atividade no qual o solo esteja submetido (NIERO et al 2010).

Esses índices de degradação ou conservação do solo podem ser averiguados e corrigidos de acordo com a sua estrutura, pois estas estão intimamente ligadas com os processos físicos, químicos e biológicos (GENNARO et al., 2015). Segundo Dexter (2004), quando se melhora a qualidade física de determinado solo, indiretamente ocorre à melhoria de suas condições biológicas e químicas, uma vez que esses aspectos de qualidade do solo são interdependentes.

Diante disso, para realizar a análise do solo a fim de melhorá-lo existem vários métodos, porém que demandam tempo em laboratório e gastos com diversos materiais. Por isso, a busca por processos rápidos e de baixo custo tem se tornado a melhor alternativa, como por exemplo, o uso do Diagnóstico Rápido da Estrutura do Solo (DRES). Esse método se trata de um processo que caracteriza as camadas superficiais do solo nos primeiros 25 cm, a partir de avaliação visual do tamanho dos torrões ou agregados bem como outros atributos presentes, tais como: atividade biológica, tamanho das raízes pivotantes, entre outros (RALISCH et al., 2017). Ressalta-se que o DRES, pode ser conduzido sem auxílio técnico, ou seja, qualquer pessoa pode realizar os procedimentos de diagnóstico do solo, além disso, é uma metodologia pouco evasiva. Com esse método é possível identificar áreas que necessitam de estudos mais detalhados ou uma readequação do solo.

Levando em consideração esses aspectos, o objetivo do trabalho foi qualificar a estrutura do solo no projeto de assentamento (PA) Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, de forma interpretativa, através do método de campo (DRES) proposto pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Segundo Albuquerque et al., (1995), existem dois aspectos pelo qual a estrutura do solo pode ser analisada sendo elas “avaliação de parâmetros relacionados à forma da estrutura, como densidade do

solo e porosidade, e avaliações de parâmetros relacionados à estabilidade da estrutura”. Esta última, por sua vez, aumenta quanto maior a quantidade de matéria orgânica presente no solo. Isto permite melhor estabilidade aos agregados que são formados (COSTA et al., 2004).

Silva et al., (2017) ao realizarem um diagnóstico rápido do solo em uma área de soja, e em uma área de frutíferas concluíram que após o diagnóstico a área apresentava características estruturais adequadas para o plantio da soja necessitando apenas de um sistema de aporte de fitomassa e raízes (gramíneas). E o solo avaliado em área de frutíferas também apresentava características estruturais favoráveis, sendo necessária a inserção de mais culturas a área e a gradagem do solo. O uso do DRES se constitui em uma ferramenta promissora que pode reduzir práticas mecanizadas desnecessárias e auxiliar na identificação da camada afetada a ser corrigida.

METODOLOGIA

DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

Segundo o Instituto de Terras do Pará – ITERPA (2017), projeto de assentamento

(PA) Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizado no município de Marabá (sudeste paraense), foi criado em 1999, contendo 58 famílias distribuídas em um total de 1.629,9452 hectares. O estudo foi conduzido no lote 23, da assentada Marina Santos Silva, situada à latitude 5°17'57" (S) e longitude 49°08'58" (W).

PROCEDIMENTO DE COLETA

O solo em que predomina na região pertence ao grupo Latossolo Vermelho-Amarelo, o terreno está dividido em uma área de sistema agroflorestal (P1) com implantação de cinco anos de idade, área de pastagem (*Brachiaria brizantha*) abandonada (P2) e área de reserva legal (P3), ambas com processo de regeneração natural de seis e dez anos respectivamente.

As coletas foram realizadas no mês de setembro, denominadas de P1, P2 e P3, evitou-se o período muito úmido ou de estiagem, para não influenciar nos resultados, pois o teor de água solo pode promover o esboroamento e a manipulação das amostras, interferindo no resultado final, sendo necessário se realizar a coleta nas condições mais próximas da consistência friável.

Anteriormente a coleta se fez a limpeza da área a ser coletada, retirando a cobertura vegetal presente. O delineamento utilizado para a escolha dos pontos de coleta foi inteiramente casualizado, evitando

linhas de acesso, áreas em erosão, pontos de acúmulo de matéria orgânica. Foi utilizada a metodologia de Ralisch et al. (2017) utilizada pela Embrapa no documento sobre DRES. Abrindo-se minitrincheiras (Figura 01a) de 40 cm de comprimento, 30 cm de largura e 30 cm de profundidade, com o auxílio de enxada e pá de corte, sendo feita a remoção das amostras perpendicularmente as linhas de cultivo, evitando a quebra da superfície das duas paredes de maior comprimento para não influenciar na análise das amostras. Em seguida foi realizada a remoção do bloco com 10 cm de espessura, 20 cm de largura e 25 cm de profundidade (Figura 01b), sendo retirado da parede de maior comprimento e menos danificado, utilizando uma pá de corte reta. O bloco foi colocado em uma bandeja plástica de 25 cm de largura, 50 cm de comprimento e 15 cm de altura, para se realizar a fragmentação do bloco do centro para as laterais da bandeja, aplicando força com as mãos para o rompimento dos blocos para identificar pontos de menor coesão na amostra.

Figura 01, a e b - Abertura da minitrincheira e retirada do bloco de solo. Fonte: Própria

ANÁLISE DAS AMOSTRAS

Após a coleta se realizou a avaliação visual das amostras (Figura 02), levando em consideração as evidências de degradação ou conservação/recuperação do solo e proporção visual da ocorrência dos diferentes tamanhos de agregados após a manipulação da amostra. Atribuindo-se notas de um a seis as camadas (Qe0), tendo nota seis às amostras com maiores índices de conservação e igual ou inferior a três com indicativos de degradação.

Figura 02: Análise de presença de raízes. Fonte: Própria

Utilizam-se as notas para calcular o índice de qualidade estrutural do solo da amostra (IQEA) e índice de qualidade estrutural do solo (IQES). De acordo com as equações a seguir:

$$\text{IQEA} = [(\text{Ec1} * \text{Qec1}) + (\text{Ec2} * \text{Qec2}) + (\text{Ec3} * \text{Qec3})] / \text{Etotal}$$

Onde:

IQEA: índice de qualidade estrutural do solo da amostra;

Ec: espessura da camada em centímetros;

Qec: nota de qualidade estrutural de cada camada;

Etotal: espessura ou profundidade total da amostra.

$$\text{IQES} = (\text{IQEA1} + \text{IQEA2} + \dots + \text{IQEA}_n) / n$$

Onde:

IQES: índice de qualidade estrutural do solo na gleba avaliada

n : número total de amostras.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

EVIDÊNCIAS DE DEGRADAÇÃO OU CONSERVAÇÃO DA ESTRUTURA DO SOLO

O solo P3 apresentou evidências de conservação/recuperação (Figura 03), observando-se maiores quantidades de matéria orgânica, presença de raízes superficiais, e nos agregados com características

grumosas, apresentando o solo menor grau de compactação, e ainda apresenta uma transição gradual entre suas camadas, havendo evidências de atividades biológicas devido ser uma área em fase de regeneração.

As áreas P1 e P2 mostraram-se com indicativos de degradação (Figura 03), ambas apresentando nas duas camadas com alto grau de compactação, com presença de raízes superficiais tortas, achatadas e crescendo preferencialmente nas fissuras no P2, e quase inexistente no P1. O ponto P2 apresentou atividades biológicas explicado pela alta disponibilidade de material para decomposição evidenciando uma pequena camada de matéria orgânica. Para Redin et al, (2011), tal fato explicado em áreas de pastagem com indicadores de degradação está mais relacionada com a questão de química de solo do que de estrutura. E na área P1, baixa qualidade relacionado com a recente queima da área, provocando a médio e longo prazo à deterioração das propriedades químicas do solo com redução do seu potencial produtivo.

Figura 03 – Distinção de camadas de solo com diferentes características morfológicas. Fonte: Própria

CLASSES DE TAMANHO DE AGREGADOS

O tamanho dos agregados facilita a identificação visual e determinação das situações de degradação ou conservação/recuperação do solo. Nas camadas de P1 se obtiveram valores considerados como evidencia de degradação, sendo valores acima de 7 cm. Representando a compactação excessiva desse solo causada por ações de manejo inadequadas, tendo ainda um potencial de regeneração mais lento, segundo Freddi et al., (2015), essas propriedades influenciam de maneira negativa nas propriedades do solo e consequentemente sendo prejudicial no desenvolvimento vegetal

No P2 ambas as camadas apresentaram classe de agregados com medida entre 4 e 7 cm, sendo típicos de solo que estão em processo de compactação ou se recuperando de alguma intempérie para retornar a sua condição natural, confirmando as condições dessa área de pastagem abandonada. É

comum nessas áreas se encontrar presença de raízes em desenvolvimento combinada com a deposição de uma camada vegetal, propiciando matéria orgânica necessária para a recomposição desse solo.

Quanto ao tamanho dos agregados, nas duas camadas separadas de P3, a superficial e a mais profunda obtém variância de medida de 2 a 4, respectivamente. Scapinelli et al., (2016) considera uma condição de boa qualidade do solo, quando combinada com outras características favoráveis nas propriedades físicas e biológicas do solo potencializam a sua fertilidade e ocasionando no aumento da produtividade das culturas. Porém somente a medida do agregado não confere índices de conservação no solo, pois é necessário se ter a combinação de outras características para atribuir nota que define qualidade neste solo.

IQEA E IQES

Posteriormente a análise de qualidade visual dos três tratamentos se realizou a atribuição de notas às camadas dos solos, realizando os cálculos de IQEA (Tabela 01), atribuindo-se para Ec e Etotal os valores de 12,5 e 25 cm, respectivamente, pois com a separação das amostras em duas camadas de 12,5 cm, totalizando os 25 cm. A partir dos valores de IQEA, se calculou o IQES, somando-se o primeiro valor do IQEA com o total de amostras, obtendo-se o valor de 3,16, sendo considerado de acordo com a metodologia de Ralisch et al., (2017), de qualidade estrutural regular, evidenciando a necessidade de aprimorar os sistemas de produção e manejo com a diversificação de culturas com capacidade produtiva de biomassa e evitar atividades mecanizadas no preparo do solo afim de diminuir a compactação desse solo.

Tabela 01: Resultados do calculo de IQEA, a partir dos valores atribuídos às camadas. Fonte: Própria

Ponto	Qec1	Qec2	Ec (cm)	Etotal (cm)	IQEA
P1	2	2	12,5	25	2
P2	3	3	12,5	25	3
P3	5	4	12,5	25	4,5

CONCLUSÕES

Com a determinação de solos com sinais de degradação, o método de campo DRES permitiu de maneira rápida e simples a caracterização da qualidade estrutural do solo, sendo possível por meio dele à indicação preliminar de formas de manejo a serem implantadas para a melhoria da qualidade do solo em pequenas áreas. Motivo do DRES caracterizar mais um auxílio para as análises, identificando áreas que necessitam de estudos, ou ações mitigadoras de manejo, mas não eliminando a necessidade da aplicação de avaliações mais detalhadas das propriedades do solo. Para uma gestão segura dos recursos naturais, a análise quantitativa e a interpretação dos atributos físicos do DRES estabelecem uma inovação tecnológica nas práticas conservacionista do solo.

REFERÊNCIAS

- ALBUQUERQUE, J. A.; REINERT, D. J.; FIORIN, J. E.; RUEDELL, J.; PETRERE, C.; FORTINELLI, F. Rotação de culturas e sistemas de manejo do solo: efeito sobre a forma da estrutura do solo ao final de sete anos. *Revista Brasileira de Ciência do Solo*, Campinas, v. 19, n. 1, p. 115-119, 1995.
- COSTA, F. Z. BAYER, C. ALBUQUERQUE, J. A. FONTOURA, S. M. V. Aumento de matéria orgânica num Latossolo bruno em plantio direto. *Ciência Rural*, Santa Maria, v. 34, n. 2, p. 587-589, 2004.
- DEXTER, A. R. Soil physical quality. Part I. Theory, effects of soil texture, density, and organic matter, and effects on root growth. *Geoderma*, Amsterdam, v. 120, p. 201-214, jun. 2004.
- FREDDI, O. S.; CENTURION, J. F.; ALMEIDA, C. X. Compactação de um Latossolo Vermelho de textura argilosa afetando o sistema radicular e a produtividade do milho. *Revista Ceres*, 56(5). 2015.
- GENNARO, L. A.; SOUZA, Z. M.; SILVA, L. F. S.; COOPER, M.; CAMPOS, M. C. C. Estrutura do solo sob feijão irrigado e diferentes manejo do solo. *Revista Brasileira de Ciência do Solo*, 39(2). 2015.
- MENDONÇA, J. F. B. Solo: substrato da vida. 2. ed. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica, 2010, 129 f.
- MUELLER, L.; KAY, B. D.; DEEN, B.; HU, C.; ZHANG, Y.; WOLFF, M.; EULENSTEIN, F.; SCHINDLER, U. Visual assessment of soil structure: Evaluation of methodologies on sites in Canada, China and Germany: Part I: Comparing visual methods and linking them with soil physical data and grain yield of cereals. *Soil & Tillage Research*, v. 103, p.178- 187, 2009.
- NIERO, L. A. C.; DECHEN, S. C. F.; COELHO, R. M.; MARIA, I. C. de. Avaliações visuais como índice de qualidade do solo e sua validação por análises físicas e químicas em um latossolo vermelho distroférico com usos e manejos distintos. *Revista Brasileira de Ciência do Solo*, Viçosa, v. 34, n. 4, p.1772-1782, ago. 2010.
- RALISCH, R.; DEBIASI, H.; FRANCHINI, J. C.; TOMAZI, M.; HERNANI, L. C.; MELO, A. S.; SANTI, A.; MARTINS, A. L. S.; BONA, F. D. Diagnóstico Rápido da Estrutura do Solo – DRES. 1. ed. Londrina: Embrapa Soja, 2017, 64 f.
- REDIN, M.; SANTOS, G. F.; MIGUEL, P.; DENEGA, G. L.; LUPATINI, M.; DONEDA, A.; SOUZA, E. L. Impactos da queima sobre atributos químicos, físicos e biológicos do solo. *Ciência Florestal*, 21(2), 381-392. 2011.
- SCAPINELLI, A.; DEINA, F. R.; JUNIOR, D. D. V.; VALADÃO, F. C. A.; PEREIRA, L. B. Sistema radicular e componentes produtivos do girassol em solo compactado. *Revista Bragantia*, 75(4), 474-486. 2016.
- SILVA, B. P. P. C. da; SOARES, L. M.; SOUSA JUNIOR, A. N. J. I.; BARBOSA, I. C. C. Avaliação estrutural do solo em uma área de soja através de um diagnóstico rápido. In: II CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIENCIAS AGRARIAS, 3., 2017, Natal. Anais. Natal, 2017. p. 1 - 6. VAN RAIJ, B. Fertilidade do solo e manejo de nutrientes. International Plant Nutrition Institute, 2011.

Capítulo 8

10.37423/211004875

EFEITO DA PROFUNDIDADE E VELOCIDADE DE SEMEADURA NO DESENVOLVIMENTO E PRODUTIVIDADE DE SORGO

Tiago Pereira da Silva Correia

Universidade de Brasília - UnB

Leandro Augusto Felix Tavares

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM

Saulo Fernando Gomes de Sousa

Faculdade de Ciências Agrônomicas - FCA/Unesp

Paulo Roberto Arbex Silva

Faculdade de Ciências Agrônomicas - FCA/Unesp

Samantha Vieira da Almeida

Faculdade de Tecnologia de Itapetininga - FATEC

Patrícia Pereira Dias

Faculdade de Ciências Agrônomicas - FCA/Unesp

Resumo: Dentre outros importantes fatores relacionados a operação de semeadura a regulação de profundidade de deposição das sementes e velocidade de deslocamento são possivelmente decisivas para obtenção ou não de sucesso produtivo de culturas graníferas. O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da profundidade e velocidade de semeadura do sorgo na emergência, população de plantas e produtividade de grãos. O trabalho foi conduzido na Fazenda Experimental Lageado, pertencente a Faculdade de Ciências Agronômica de Botucatu-SP. As sementes utilizadas foram do sorgo granífero AG1080, semeadas em preparo convencional do solo com semeadora-adubadora de linhas espaçadas em 0,4 m e densidade de semeadura de 7,6 sementes m^{-1} . O delineamento experimental adotado foi o de blocos ao acaso com parcelas subdivididas em esquema fatorial 3 x 3, três profundidades de deposição (2, 4 e 6 cm) e três velocidades de semeadura (4, 5 e 6 $km\ h^{-1}$), com quatro repetições. Foram avaliados índices de velocidade de emergência (IVE), estande inicial de plantas (plantas ha^{-1}) e produtividade de grãos ($kg\ ha^{-1}$). Os resultados indicaram que profundidade e velocidade de semeadura não interagem para IVE, estande inicial de plantas e produtividade de grãos de sorgo. Menor IVE e produtividade de grãos de sorgo ocorrem na maior profundidade de semeadura. As velocidades não influenciaram os resultados.

Palavras-chave: Plantabilidade, semeadura, deposição, velocidade, sorgo.

INTRODUÇÃO

A qualidade da operação de semeadura de uma cultura é fundamental para garantir estande adequado de plantas, e consequentemente extrair o máximo potencial produtivo da cultura. Inúmeras variáveis podem afetar a qualidade da semeadura, sendo a velocidade de semeadura uma das mais importantes (KURACHI et al., 2006).

Mantovani et al. (1999) observaram que o aumento da velocidade de deslocamento do conjunto trator e semeadora modifica a velocidade periférica do disco dosador, causando falhas na distribuição e danos mecânicos às sementes. Estudos conduzidos por Reynaldo et al. (2016), demonstraram que a produtividade de soja foi maior quando utilizada velocidade de 4 km h^{-1} na semeadura, obtendo 3.610 kg ha^{-1} , na velocidade de 12 km h^{-1} , os autores verificaram 4,75% de redução na produtividade de grãos.

Devido à presença da cobertura vegetal e características físicas do solo relacionadas ao sistema de plantio direto, o processo de semeadura sofreu várias transformações relacionadas com a adaptação das máquinas e dificuldade na regulagem de profundidades de deposição das sementes no sulco de semeadura. Silva et. al (2008) citam a profundidade de semeadura como o fator que mais influência na emergência e no desenvolvimento vegetativo da cultura do milho, o que, mostra a relativa importância de uma regulagem correta de profundidade para garantir um bom estande de plantas. De acordo com Tollenaar (1999), a velocidade de germinação e emergência são aspectos limitantes para qualquer cultura, geralmente uma germinação rápida associada à emergência uniforme, são duas características de grande importância para alcançar altas produtividades de grãos.

Estudos realizados por Sangoi et al. (2004) com a cultura do milho, identificaram que o aumento na profundidade de semeadura de 2,5 cm para 10 cm reduziu em 5% a percentagem de plantas emergidas e o crescimento inicial da cultura.

Devido serem restritas as informações científicas sobre semeadura de sorgo, o objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da profundidade e velocidade de semeadura na emergência, população de plantas e produtividade de grãos.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi conduzido durante a safra 2017/2018 na Fazenda Experimental Lageado, pertencente a Faculdade de Ciências Agronômica de Botucatu-SP. O delineamento experimental adotado foi o de

blocos ao acaso com parcelas subdivididas em esquema fatorial 3 x 3, três profundidades de deposição (2, 4 e 6 cm) e três velocidades de semeadura (4, 5 e 6 km h⁻¹), com quatro repetições.

A semeadura do sorgo foi realizada em campo com uma semeadora-adubadora modelo SHM15/17, equipada com cinco linhas de semeadura espaçadas em 0,4 m, regulada para deposição de 7,6 sementes por metro e 200 kg ha⁻¹ de fertilizante NPK 08-28-16, conforme análise de solo da área e recomendação agrônômica para a cultura. As sementes de sorgo utilizadas foram do híbrido AG1080.

Foram coletados dados de índice de velocidade de emergência (IVE), estande inicial de plantas e produtividade de grãos.

O IVE foi contabilizado utilizando o método proposto por Maguire (1962), onde o índice de velocidade de emergência de plântulas foi avaliado em cinco metros nas duas linhas centrais de cada parcela, totalizando 10 metros de avaliação. Excluiu-se 2 metros da bordadura de cada parcela para diminuir o erro experimental. A contagem das plântulas emergidas foi realizada diariamente até 15 dias após a semeadura. Para estimativa do IVE utilizou-se a Equação 1.

$$IVE = E_1/N_1 + E_2/N_2 + E_3/N_3 + \dots E_N/N_N \quad (1)$$

Em que: IVE é o índice de velocidade de emergência (Plântulas dia⁻¹); E₁, E₂, E_N é o número de plântulas emergidas, na primeira, segunda,..., última contagem; N₁, N₂, N_N é o número de dias da semeadura a primeira, segunda,..., última contagem.

O estande inicial de plantas foi obtido pela contagem das plantas existentes em cinco metros nas duas linhas centrais de cada parcela, totalizando 10 metros de avaliação, aos 10 dias após a semeadura. A produtividade de grãos foi obtida através da colheita manual dos grãos de todas as plantas contadas na avaliação de estande de plantas, sendo os grãos debulhados, pesados e corrigido o teor de água para 13%.

Visando eliminar a influência de outros fatores que não as velocidades e profundidades de semeadura, os tratamentos foram semeados em mesmo tipo de solo, Latossolo vermelho distrófico, mesmo preparo convencional do solo com duas gradagens intermediária e uma niveladora, e receberam mesma adubação e controle químico de plantas daninhas.

Os dados foram analisados estatisticamente através da análise de variância, utilizando-se o teste F. Os valores de F obtidos foram considerados significativos ao nível de 5% (P<0,05), sendo as médias comparadas através do teste de Tukey.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 1, e não apresentaram interação significativa entre profundidade e velocidade de semeadura para as avaliações realizadas.

TABELA 1. Análise de variância e teste de médias para o índice de velocidade de emergência (IVE), estande inicial de plantas e produtividade de grãos de sorgo.

FATOR	IVE (Planta dia ⁻¹)	Estande inicial (Plantas ha ⁻¹)	Produtividade (Kg ha ⁻¹)
Profundidade (P)			
2	12,38 a	185,6 a	3240,7 a
4	11,21 a	184,2 a	3286,4 a
6	7,21 b	182,9 a	2750,2 b
Velocidade (V)			
4	10,05 a	185,1 a	3155,2 a
5	10,52 a	184,7 a	3110,5 a
6	9,55 a	184,1 a	2987,3 a
P	12,26 *	9,62 ^{NS}	2,09 *
V	2,99 ^{NS}	3,33 ^{NS}	0,92 ^{NS}
P x V	2,34 ^{NS}	2,77 ^{NS}	2,54 ^{NS}
C.V. (%)	6,0	9,8	13,7

^{NS}: não significativo (P>0,05); *: significativo (P<0,05); **: significativo (P<0,01); C.V.: coeficiente de variação.

O fator profundidade de semeadura apresentou menor IVE, 7,21 plantas por dia, na profundidade de 6 cm, sendo o valor 41,7 e 35,6 % menor que o IVE de 2 e 4 cm respectivamente. O estande inicial de plantas não foi influenciado pela profundidade de semeadura, entretanto, a produtividade de grãos foi reduzida na maior profundidade, obtendo 2750 kg ha⁻¹, valor 14,3 e 16,3 % menor que as produtividades obtidas nas profundidades 2 e 4 cm respectivamente.

Os resultados influenciados pela profundidade de semeadura podem ser compreendidos pelo que descreve Pereira e Cruz (2000). Em estudo com milho, os autores ressaltam que a semeadura deve ser mais superficial em solos pesados, ao redor de 3 a 5 cm, maiores profundidades dificultam a emergência das plântulas em vencer a pressão do solo. Silva et al. (2008) destacam que a profundidade de deposição das sementes pode afetar sua germinação, condicionada pela temperatura, teor de água, peculiaridades da semente, propriedades físicas e químicas do solo, clima e manejo da cultura, dentre outros fatores.

Weirich Neto et al. (2007) afirmam que, quanto maior a profundidade de deposição, maior o consumo de energia na emergência, além de prejuízos causados por baixas temperaturas e baixos níveis de oxigênio; já quanto menor a profundidade, maior a susceptibilidade da semente a estresses hídricos.

Fornasiere Filho (1992) atenta ao fato de que a semeadura profunda pode, em certos casos, impedir totalmente e emergência da plântula pela incapacidade de alongarem-se até alcançarem a luz.

O fator velocidade de semeadura não apresentou diferenças no IVE, estande de plantas e produtividade de grãos para as velocidades estudadas.

CONCLUSÕES

Profundidade e velocidade de semeadura não interagem para IVE, estande de plantas e produtividade de grãos de sorgo. Menor IVE e produtividade de grãos de sorgo ocorrem na maior profundidade de semeadura. As velocidades não influenciaram os resultados.

REFERÊNCIAS:

KURACHI, S. A. H. et al. Avaliação tecnológica de semeadoras e ou adubadoras: Tratamento de dados de ensaio influência da velocidade de deslocamento na semeadura do milho. Engenharia Agrícola, Jaboticabal, v. 26, n. 2, p. 520-527, 2006.

MAGUIRE, J. D. Speed of germination-aid in selection and evaluation for seedling emergence and vigor. Crop Science, Madison, v. 2, p.176-177, 1962.

SILVA, R. P. et al. Efeito da profundidade de semeadura e de rodas compactadoras submetidas a cargas verticais na temperatura e no teor de água do solo durante a germinação de sementes de milho. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 32, n. 3, p. 929-937, 2008.

WEIRICH NETO, P. H. et al. Profundidade de deposição de semente de milho na região dos campos gerais, Paraná. Engenharia Agrícola, Jaboticabal, v. 27, n. 3, p. 782-786, 2007.

FORNASIERE FILHO, D. A cultura do milho. Jaboticabal: FUNEP, 1992. 273 p.

PEREIRA, I.A.; CRUZ, J.C. Plantio, espaçamento, densidade, quantidade de sementes. Sistema de produção. Embrapa Milho e Sorgo, 2000. Disponível em:

<http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Milho/CultivodoMilho/plantespaca.htm>
. Acesso em: Abril de 2018.

TOLLENAAR, M.; WU, J. Yield improvement in temperate maize is attributable to greater stress tolerance. Crop Science, Madison, v. 39, p.1597-1604, 1999.

SANGOI, L.; ALMEIDA, .M. L; HORN, D.; BIANCHET, P.; GRACIETTI, A.; SCHMITT, A.; SCHWEITZER, C. Tamanho de semente, profundidade de semeadura e crescimento inicial do milho em duas épocas de semeadura. Revista Brasileira de Milho e Sorgo, v.3, n.3, p.370-380, 2004.

Reynaldo, E. F.; Machado, T. M.; Taubinger, L.; Quadros, D. Influência da velocidade de deslocamento na distribuição de sementes e produtividade de soja. Revista Engenharia na Agricultura, Viçosa,v.24, n.1, p.63-67, 2016.

Capítulo 9

10.37423/211004903

ANÁLISE SENSORIAL DE SUCO DE GRAVIOLA (ANONNA MURICATA L.) NA REGIÃO DE BELÉM

Ivan Carlos da Costa Barbosa

Universidade Federal do Pará,

Diego Fabrício Santa Rosa Cardoso

Universidade Federal Rural da Amazônia

José Marcos Nobre de Moura Junior

Universidade Federal do Pará

Ewerton Carvalho de Souza

Universidade Federal Rural da Amazônia

Antonio dos Santos Silva

Universidade Federal do Pará

Resumo: A graviola é uma fruta consumida em larga escala na região norte e nordeste do Brasil, através de mudanças nos hábitos de consumo o uso de polpas industriais cresceu. Nessa perspectiva, foi feita análise sensorial com 100 indivíduos não treinados de duas polpas industriais de marcas competitivas visando determinar a qualidade do suco produzido pela polpa por meio de parâmetros como cor, aroma, textura e paladar. Utilizou-se um questionário como objeto de pesquisa e os resultados foram submetidos à análise. Obteve-se boa aceitação global para a marca H, que esclarecia ser um produto industrial, em detrimento da marca M que alegava ser um produto in natura. Dessa forma, o estudo aponta que a maior presença de material fibroso no constituinte da polpa resultou na baixa aceitação do produto M, logo o mercado deve-se nortear para a distribuição de polpas com maior processamento a fim de obter maior competitividade.

Palavras chaves: Amazônia; bebida não alcoólica; frutas.

INTRODUÇÃO

A graviola (*Annona muricata* L.) é uma cultura típica da região das Antilhas localizadas na América Central, mas seu consumo é plenamente difundido pelo mundo e em especial no Brasil, onde detém excelente grau de aceitação no mercado. Dentre as principais variedades consumidas nacionalmente, estão as chamadas graviola comum, a lisa e a morada que são cultivadas em diversas regiões brasileiras, como na Amazônia, no Nordeste e no Cerrado (SILVA; SOUZA, 1999).

Entretanto, bem como ao ocorrido a outras culturas, o consumo da graviola vem sofrendo a mudança de uma oferta antes *in natura*, para formas processadas pela indústria. Sobre isto Santos et al. (2014) explica que, em todo o mundo se observa um aumento do consumo de frutas e, esse interesse não se estende somente para frutas tropicais frescas, mas também para sucos processados.

Portanto a polpa da graviola vem sendo cada vez mais utilizada na indústria para produção de sucos concentrados, néctar, geleias, cremes e bebidas (NUNES, 2015), bem como para produção de diuréticos e xaropes antiescorbúticos. Com base nisso, o presente trabalho tem como objetivo elucidar o grau de satisfação sensorial e analisar a aceitabilidade de duas marcas da polpa industrializadas comercializadas na região metropolitana de Belém.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Segundo Meletti (2011), o consumo de frutas e seus derivados no Brasil demanda grande esforço coletivo na produção em larga escala desses produtos a fim de garantir o fornecimento para esse mercado. Para Claro e Monteiro (2010), para graviola o cenário do mercado ainda é afetado negativamente pela histórica inserção desse alimento na dieta básica dos brasileiros através do consumo do produto na forma *in natura*.

No entanto, como afirmam Aquino e Philippi (2002), essa forma de consumo está em transformação, passando a ser mais frequente a utilização de polpas industrializadas. E essa mudança decorre das facilidades no preparo e na obtenção desses insumos.

Segundo Oliveira et al. (2017), outro ponto é que atualmente a indústria de bebidas não alcoólicas como sucos, néctares e refrescos tem se preocupado cada vez mais com a demanda dos consumidores que a cada dia são mais exigentes com os produtos que consomem. Logo análises sensoriais são necessárias para boa aceitação destes produtos no mercado.

METODOLOGIA

As polpas industrializadas da graviola (*Annona Muricata*) foram adquiridas em lojas na cidade de Belém- Pará. Dispensados os nomes comerciais, as duas polpas adquiridas foram identificadas como amostra H e M. O preparo dos sucos H e M obedeceram a constantes para quantidade de água, sacarose e polpa. A proporção se deu em 100 g de polpa para 200 mL de água para cada 90 g de açúcar comum refinado (sacarose).

A análise sensorial decorreu na Universidade Federal do Pará, no dia 03 de dezembro de 2018, em dois prédios específicos, o prédio mirante do Rio e o Instituto de ciências Biológicas. A escolha dos entrevistados baseou-se no método descritivo do Instituto Adolfo Lutz (2008), onde foram selecionados de maneira randômica frequentadores da universidade e, a análise sensorial foi realizada através do método de aceitação por escala hedônica (BRASIL, 2005).

Para cada um dos 100 entrevistados, sendo destes 47 mulheres e 53 homens na faixa etária de 18 a 30 anos, foram entregues 3 copos com capacidade de 50 mL cada, sendo dois copos contendo aproximadamente 25 mL dos sucos H e M e um terceiro contendo aproximadamente 40 mL de água, sendo este oferecido entre os outros dois para que o provador tomasse água entre os dois sucos, e, assim, dessensibilizasse suas pupilas gustativas. A abordagem era estabelecida da seguinte forma, um breve resumo sobre o trabalho seguido da entrega dos copos contendo os sucos com as amostras H e M.

Cada participante avaliou cor, textura, aroma e sabor da amostra, além de mostrar o grau de satisfação quanto às características mencionadas, apontando por meio de classificação, com notas de 1 a 9, partindo da nota mais baixa como desgostei extremamente para a mais alta como gostei extremamente. Intercalando a experimentação entre as amostras foi oferecido copo com 40 ml de água para limpar o paladar e otimizar o estudo.

Por finalidade os indivíduos não treinados marcaram uma alternativa referente a possibilidade de introdução daquele elemento em sua dieta estabelecido pelo teste de aceitação, condicionado pela escala hedônica. O formulário respondido por cada participante está exposto na Figura 01.

Figura 01: O formulário de pesquisa.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ – INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – FACULDADE DE FARMÁCIA
DISCIPLINA: PIPAP II
PESQUISA DE ACEITAÇÃO DE SUCO DE GRAVIOLA

ENTREVISTADO: _____ DATA: _____ IDADE: _____ SEXO: () M () F

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa de aceitação de um produto (SUCO DE GRAVIOLA), caso você aceite participar desta pesquisa, saiba que seu nome não será divulgado, apenas sua opinião fará parte de um banco de dados que será utilizado para fins de elaboração de trabalho da disciplina PIAP II e possivelmente de trabalho em congresso. Você não terá nenhuma despesa com essa pesquisa, mas também não receberá nenhum provento financeiro por participar dela.

1- Por favor, avalie a amostra servida e indique o quanto você gostou ou desgostou de cada um dos atributos sensoriais do produto (sabor, aroma, textura e cor) dando notas de acordo com a escala abaixo.

(1) Desgostei extremamente	Amostra H	Amostra M
(2) Desgostei muito	a) Cor Nota: _____	a) Cor Nota: _____
(3) Desgostei moderadamente		
(4) Desgostei ligeiramente	b) Aroma Nota: _____	b) Aroma Nota: _____
(5) Nem desgostei, nem gostei		
(6) Gostei ligeiramente	c) Textura Nota: _____	c) Textura Nota: _____
(7) Gostei moderadamente		
(8) Gostei muito	d) Sabor Nota: _____	d) Sabor Nota: _____
(9) Gostei extremamente		

2- Por favor, após degustar a amostra servida, marque a alternativa que melhor corresponde ao seu julgamento (atitude).

() Beberia isso sempre que tivesse oportunidade.	() Beberia isso sempre que tivesse oportunidade.
() Beberia isso muito frequentemente.	() Beberia isso muito frequentemente.
() Beberia isso frequentemente.	() Beberia isso frequentemente.
() Beberia de vez em quando.	() Beberia de vez em quando.
() Beberia isso se tivesse acessível, mas não me esforçaria para isso.	() Beberia isso se tivesse acessível, mas não me esforçaria para isso.
() Não gostei disso, mas beberia ocasionalmente.	() Não beberia disso, mas comeria ocasionalmente.
() Raramente beberia isso.	() Raramente beberia isso.
() Só beberia isso se não pudesse escolher outro alimento.	() Só beberia isso se não pudesse escolher outro alimento.
() Só beberia isso se fosse forçado(a).	() Só beberia isso se fosse forçado(a).

H M

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao fim da aplicação dos formulários foram obtidos os resultados preliminares, com pontuações para cada parâmetro analisado em cada amostra, esses dados passaram pelos cálculos de média, sendo assim, as pontuações finais em médias gerais de cada parâmetro, analisados nas amostras H e M estão expostas na Figura 02.

Figura 02: Resultados do teste sensorial.

A amostra H obteve aprovação de 88 % dos entrevistados ao considerar positiva avaliações acima de 6 dos resultados individuais em todos os parâmetros. Para a amostra M obteve-se uma aceitação de 55 %, prosseguindo com a mesma metodologia.

No parâmetro sabor observou-se a maior diferença entre as médias obtidas para cada amostra, a amostra H obteve nota média de 7,59 enquanto a amostra M obteve uma média de 5,49, o que denota a preferência dos participantes, no parâmetro sabor, pela amostra H e isto pode ser explicado, pela afirmação dos participantes de terem sentido um sabor fermentado que teria sido apresentado pela marca M.

A segunda maior diferença entre as pontuações das marcas H e M decorre sob o parâmetro textura com notas 7,32 e 5,59 respectivamente, o que condiz com a segunda maior reclamação relacionada a quantidade presente de material fibroso, natural para o suco da graviola, na amostra M. Logo, esse dado demonstra uma preferência por sucos com maior processamento.

Quanto aos parâmetros cor e aroma os resultados obtidos mantiveram o mesmo comportamento, resultando na preferencia pela marca H. As notas obtidas no parâmetro cor foram de 7,43 para marca H e 6,43 para marca M, enquanto em relação ao aroma H obteve 7,22 e M 5,58. Quanto aos resultados obtidos pela escala Hedônica, as pontuações obtidas por cara marca estão expostas na Figura 03.

Figura 03: Resultados da escala Hedônica.

Os resultados obtidos demonstraram que dentre os questionamentos realizados a amostra M obteve maiores pontuações entre questões entendidas como ruins a marca, como: “Raramente beberia isso” ou “Beberia se tivesse acessível, mas não me esforçaria para isso”. O que é uma evidencia de baixa

aceitação do mercado pelo produto desta marca. Enquanto a amostra H obteve pontuações maiores entre questionamentos considerados bons a marca como: “Beberia isso sempre que tivesse oportunidade” ou “Beberia isso com muita frequência”

CONCLUSÕES

A marca H deteve características que mais agradaram dentro dos parâmetros analisados e apresentou menor avaliação negativa sobre sua inserção no consumo regular. Logo é importante consolidar essas preferências nos produtos comerciais ofertados a fim de aumentar a competitividade das marcas e melhorar o grau de aceitabilidade. Ademais se ressalta que os produtos devem estar permanentemente acompanhando a evolução da demanda dos mercados, que é cada vez mais específica e exigente.

REFERÊNCIAS

- AQUINO, R. de C. de; PHILIPPI, S. T. Consumo infantil de alimentos industrializados e renda familiar na cidade de São Paulo. *Revista de Saúde Pública*, v. 36, p. 655-660, 2002.
- BRASIL. Métodos Físico-químicos para análise de alimentos. Brasília: Ministério da Saúde 2005 (Série A. Norma e Manuais Técnicos). IV edição.
- CLARO, R. M.; MONTEIRO, C. A. Renda familiar, preço de alimentos e aquisição domiciliar de frutas e hortaliças no Brasil. *Revista de Saúde Pública*, v. 44, p. 1014-1020, 2010.
- INSTITUTO ADOLFO LUTZ (São Paulo). Métodos físico-químicos para análise de alimentos, São Paulo: Instituto Adolfo Lutz, 2008.
- MELETTI, L. M. M. Avanços na cultura do maracujá no Brasil. *Revista Brasileira de Fruticultura*, v. 33, n. SPE1, p. 83-91, 2011.
- NUNES, C. dos R. Estudo Químico e Avaliação da Atividade Antineoplásica de *Annona muricata* L. (Tese) Universidade Estadual Do Norte Fluminense Darcy Ribeiro. Campos Dos Goytacazes - RJ, MARÇO – 2015.
- OLIVEIRA, F. A. A. de; OLIVEIRA, E. N. A. de; RODRIGUES, F. F. G.; FEITOSA, B. F.; ALMEIDA, F. L. C. Caracterização físico-química e sensorial de bebidas funcionais mistas de graviola com água de coco. *Energ. Agric., Botucatu*, vol. 32, n.3, p.301-308, julho-setembro, 2017.
- SANTOS, D. da C.; MOREIRA, A. da S.; OLIVEIRA, E. N. A. de; SANTOS, Y. M. G. dos. Elaboração de bebida tipo néctar de graviola adoçada com mel de *Apis mellifera*. *Revista Caatinga*, Mossoró, v. 27, n. 4, p. 216 – 225, out. – dez, 2014.
- SILVA, S. E. L. da; SOUZA, A. das G. C. de. Avaliação preliminar de cinco tipos de graviola (*Annona muricata* L.) nas condições de Manaus-AM. EMBRAPA. Boletim de Pesquisa Número 2. ISSN 1517-2457 setembro, 1999.
- SOUZA, A. de M.; PEREIRA, R. A.; YOKOO, E. M.; LEVY, R. B.; SICHIERI, R.. Alimentos mais consumidos no Brasil: Inquérito nacional de alimentação 2008-2009. *Revista de Saúde Pública*, v. 47, p. 190s-199s, 2013.

Capítulo 10

10.37423/211004905

COMPORTAMENTO AGRONÔMICO DO COENTRO SOBRE DIFERENTES TIPOS DE ADUBAÇÕES: ANÁLISE DOS PARÂMETROS MORFOLÓGICOS E DE PRODUTIVIDADE

Gabriel Damasceno Ferreira Cunha

Universidade Federal Rural da Amazônia

Andrey Gabriel Camelo Mastop

Universidade Federal Rural da Amazônia

José Igor Reis de Araújo

Universidade Federal Rural da Amazônia

César Dias Pantoja

Universidade Federal Rural da Amazônia

Jessivaldo Rodrigues Galvão

Universidade Federal Rural da Amazônia

INTRODUÇÃO

Coentro é uma planta glabra, da família Apiaceae, originário da região oeste do Mediterrâneo e oeste da Ásia, de flores róseas ou alvas, pequenas e aromáticas, cujo fruto é diaquênio e cuja folha, usada como tempero ou condimento, exala odor característico. O coentro é uma hortaliça folhosa cultivada e consumida em quase todo o mundo, sendo rica em vitaminas A, B1, B2 e C, e boa fonte de cálcio e ferro, seu cultivo visa a obtenção de massa verde utilizada na composição de diversos pratos, molhos e saladas, e no tempero de peixes e carnes (Marsaro et. al, 2014).

É uma das hortaliças mais comercializadas, formando juntamente com a cebolinha a dupla “cheiro-verde”, como é popularmente conhecida nas regiões Norte e Nordeste do Brasil (Santos, K.P.D, 2009). O coentro (*Coriander sativum* L.) é uma olerícola de grande valor e importância comercial, no Brasil, tem sido cultivado por pequenos e médios produtores, tanto para a produção de massa verde, comercializada em feiras livres e supermercados, como também para a produção de frutos, utilizado nas indústrias alimentícias e cosméticas.

Segundo Santos (2009), a atividade olerícola no Brasil desempenha papel de grande importância social e econômica, proporcionando geração de emprego, renda e aumento na qualidade da alimentação humana. As oleráceas representam o grupo de plantas que fornecem a principal fonte de algumas vitaminas e sais minerais indispensáveis na alimentação humana podendo contribuir para amenizar o desequilíbrio nutricional da população.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A maior parte da produção é executada por pequenos e médios produtores rurais ou até mesmo de hortas que são desenvolvidas na área urbana, estando com isso mais próximo do consumidor.

Para o seu desenvolvimento, as hortaliças necessitam de macronutrientes e micronutrientes, sendo os minerais Nitrogênio (N), Fósforo (P) e Potássio (K) os mais utilizados em adubações de oleráceas. A aplicação de P e K no plantio e o N em cobertura, favorecem as plantas quanto ao crescimento vegetativo e o volume de folhas produzidas (Santos, 2009). Segundo Linhares et. al (2015), o cultivo orgânico de olerícolas tem crescido gradativamente durante os últimos anos, devido aos efeitos benéficos que o material orgânico causa, sendo que esse tipo de fertilização não só acrescenta produtividade, mas também permite a produção de plantas com características qualitativas diferentes daquelas adubadas exclusivamente com fertilizantes minerais.

Logo, como fontes de nutrientes, os resíduos orgânicos podem apresentar quantidades expressivas de nitrogênio, fósforo e potássio, mostrando-se como boas alternativas para fornecer esses minerais às hortaliças. Determinar qual o tratamento mais adequado para o melhor desenvolvimento da cultivar de coentro Verdão é essencial para que pequenos produtores possam potencializar sua produção, além de baratear os custos da mesma através de técnicas alternativas e eficazes de adubação. Diante disso, fica claro o intuito desse trabalho em indicar o melhor tratamento para o produtor da região amazônica para o cultivo de *Coriander sativum* L, de modo com que se obtenha melhores índices de produtividade.

METODOLOGIA

O experimento foi conduzido na horticultura do sítio Santa fé do Sr. José Maria, localizado na PA 408 km 08, bairro Abril Vermelho, lote 297, no município de Santa Bárbara do Pará, situado na região metropolitana de Belém. Localiza-se a uma latitude 01°13'25" sul e a uma longitude 48°17'40" oeste, estando a uma altitude de 21 metros, possui clima equatorial e solo do tipo latossolo amarelo.

O preparo do plantio consistiu em preparo da área, com a limpeza da área, tal como a capina manual com enxada e revolvimento da terra. Logo após, foi realizada a calagem uma semana após a limpeza para os canteiros que receberam o plantio, sendo que o canteiro que não recebeu adubação também não recebeu a correção, permanecendo as características naturais do solo. O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado, contando com 3 tratamentos e 10 repetições. Para o experimento foi necessária a incorporação do fertilizante químico e orgânico, sendo que o primeiro foi 400 g por metro quadrado de NPK (18 18 18) e a cama de aviário cerca de 2 litros por metro quadrado, descansado em ambiente controlado. No dia 18/06/2018 foi realizada a abertura dos sulcos com profundidade de 4 cm e conduzida a semeadura com aproximadamente 109 sementes por sulco e espaçamento de 22 cm entre fileiras.

Os dados foram submetidos a análise de variância e a comparação das médias realizadas pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para avaliação do comportamento agrônomo do Coentro nas adubações com esterco de cama de aviário e NPK foram analisados os seguintes parâmetros: altura de plantas (gráfico 1); massa verde da parte aérea e massa verde da raiz (gráfico 2) e relação parte aérea/raiz.

O primeiro parâmetro observado foi a altura das plantas de *Coriandrum Sativum* L., em que houve maior destaque das repetições com tratamento contendo esterco de aves, os quais apresentaram maiores valores de média, apresentando diferenças significativas quando comparados ao tratamento controle, seguidos pelas plantas com adubação por NPK. Pode-se verificar que as plantas com esterco de cama de aviário tiveram maior crescimento vegetativo, similar aos resultados encontrados por Santos (2009), em que as alturas de suas plantas oscilaram de 9,83 a 22,02 e 22,08 cm em relação à testemunha nos tratamentos com esterco de aves e NPK. Sendo assim, as alturas obtidas nos dois experimentos confirmam os benefícios das doses de nitrogênio presente nas duas adubações no crescimento do Coentro.

Gráfico 1: Altura da planta de Coentro (*Coriandrum sativum* L.) em função de diferentes tratamentos: A- Tratamento com cama de aviário; B- Tratamento com NPK; C- Tratamento Controle.

Fonte: Própria (2019)

No gráfico a seguir, foram registradas as médias encontradas com relação à massa verde da parte aérea do Coentro sobre as três adubações testadas, mais uma vez o teste feito com esterco de cama de aviário foi o que se mostrou mais eficaz, juntamente com o fertilizante químico NPK, ambos apresentando valores médios significativos com relação à testemunha. Andrade et. al (2015) observou em seus estudos que a massa verde da parte aérea foi a variável que apresentou mais diferenças

significativas com tratamento de doses de 100% de nitrogênio, sendo que 0,597 kg/m⁻¹ foi o rendimento máximo obtido. Tais resultados corroboram com a análise supracitada, já que o esterco de aves é um fertilizante muito rico em nitrogênio em termos nutricionais (EMBRAPA, 2006) e este elemento químico acaba por auxiliar o crescimento vegetativo das plantas. No que diz respeito à massa verde da raiz, houveram diferenças significativas entre as adubações usadas e o tratamento controle, sendo que o tipo A (esterco de cama de aviário) apresentou maior média em relação aos outros tratamentos pelo teste Scott-Knott, tal teste apresentou coeficiente de variação (CV) de 37,03%. Santos (2009) não encontrou características estatísticas significativas quanto ao peso seco de raízes quando submetido as adubações com NPK, esterco de aves e composto, se opondo à análise do presente trabalho, em que o esterco de aves apresentou maior destaque.

Gráfico 2: Massa verde da parte aérea e de raiz de planta de Coentro (*Coriandrum sativum* L.) em função de diferentes tratamentos: A- Tratamento com cama de aviário; B- Tratamento com NPK; C- Tratamento Controle.

Fonte: Própria (2019)

Quanto ao parâmetro relação parte aérea/raiz, não foram obtidos dados significativos, as médias não oscilaram tanto entre os tratamentos, obtendo um valor alto de CV (41,79%) e uma significância ultrapassando os 5% determinados pelo teste Scott-Knott, chegando a 59% e considerado assim como altamente inconfiável.

CONCLUSÕES

De acordo com as análises do trabalho, foi possível perceber que o valor do tratamento controle quando comparado à adubação com cama de aviário, possuiu uma melhor desenvoltura. Para as condições climáticas de Santa Bárbara do Pará, a adubação com cama de aviário se apresenta como melhor alternativa para o aumento da produtividade de coentro, quando comparado com as demais, sendo assim, significativo para a produção e comercialização. Apesar do período de alta precipitação, a incidência de pragas e doenças no cultivo dos tratamentos com as diferentes adubações, não foram notadas ameaças significativas à produção.

Dessa forma, com os resultados conquistados no presente trabalho, é recomendado a adição de adubação de cama de aviário, pois ela proporciona efeitos positivos em todos os parâmetros analisados, possibilitando assim aos seus produtores um rendimento satisfatório, principalmente em relação à altura da planta, tendo em vista sua maior importância para a comercialização.

REFERÊNCIAS

- ADEMAR, P.O; LUCIANA R.A; JUSSARA, E.M. F; MENDES, O.R. DANTAS JÚNIOR; MARCELO S.S. Resposta do coentro à adubação fosfatada em solo com baixo nível de fósforo. Universidade Federal Da Paraíba. 2004
- ADEMAR P.O; VIRNA R.F.S; CLAUDIOMIR S.S; JUCILENE S.A; JOÃO T.N. Produção de coentro cultivado com esterco bovino e adubação mineral. Universidade Federal Da Paraíba. 2002
- LINHARES, P.C.F; PERREIRA, M.F.S; DIAS, M.A.V; HOLANDA, A.K.B; MORREIRA, J.C. Rendimento do coentro em sistema de adubação verde com a planta jitrana. Universidade Federal Rural do Semi-árido departamento de fitotecnia, Mossoró/RN. 2011.
- LINHARES, P.C.F; PERREIRA, M.F.S; MORREIRA, J.C; PAIVA, A.C.C. Rendimento do coentro adubado com esterco bovino em diferentes doses e tempos de incorporação em solos. Universidade Federal Rural do Semi-árido departamento de fitotecnia, Mossoró/RN. 2011.
- RICARDO, M; KAMILLA; D.A.M; SANTINO; S.J; LUCIANA, S.B. Produção de cultivares de coentro em diferentes telados aberto. Cultivando o saber, Cáceres/ MT.2014.
- SANTOS, K.P. Desempenho agrônomo submetido a diferentes adubações. Universidade Federal Do Pará Campo Universitário De Altamira. Altamira\PA. 2009.
- SOUTO, P. C.; SOUTO, J. S.; SANTOS, R. V.; ARAUJO, G. T.; LAUTER, S. S.
- Decomposição de esterco dispostos em diferentes profundidades em área degradada no semi-árido da Paraíba. Revista Brasileira de Ciências do Solo. v. 29 no 1, p. 48-53, 2005.

Capítulo 11

10.37423/211004914

SACARIFICAÇÃO DA CASCA DO CUPUAÇU (THEOBROMA GRANDIFLORUM SCHUM) ATRAVÉS DE HIDRÓLISE ÁCIDA

Gustavo Henrique Barroso da Silva

Universidade Federal do Amazonas

Erika Santiago da Silva

Universidade Federal do Amazonas

Gabriel Vinicius Barroso da Silva

Universidade Federal do Amazonas

Carlos Henrique dos Santos Barbosa

Universidade Federal do Amazonas

Giovana Lima de Souza

Universidade Federal do Amazonas

Anderson Mathias Pereira

Universidade Federal do Amazonas

Leiliane do Socorro Sodré de Souza

Universidade Federal do Amazonas

Resumo: O processo de sacarificação conduz a transformação de celulose, de material lignocelulósico, em açúcares fermentescíveis e estes açúcares, por sua vez, podem ser convertidos em etanol através dos processos de fermentação já amplamente estudados, assim os materiais lignocelulósicos que antes eram desperdiçados agora podem se transformar em fonte energética renovável. Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo avaliar a potencialidade da casca de cupuaçu como precursor para a produção de açúcares fermentescíveis visando à produção de bioetanol. Inicialmente, as cascas de cupuaçu passaram por um pré-tratamento físico que consistiu na retirada da polpa residual encontrada nas cascas, seguido pelo fracionamento, desidratação a 50°C e fracionamento em moinho de facas. Em seguida foi determinada a composição centesimal da casca do cupuaçu moída, indicando um teor de umidade de 5,9%, um teor de cinzas de 1,72% e um teor de lipídeos de 2,94%. A hidrólise ácida foi preparada a partir da casca de cupuaçu, utilizando ácido sulfúrico diluído como catalisador para o processo. Os ensaios foram realizados variando as concentrações de ácido sulfúrico (1,0 M, 1,5 M e 2,00 M) e mantendo constante a razão sólido/líquido (5% m/v), a temperatura do processo (120°C), e o tempo de duração (60 minutos) para todas as reações. Na sacarificação foi avaliado o efeito da concentração de ácido na produção de açúcares redutores. Os resultados foram analisados através de tratamento estatístico, a um nível de significância de 95 % ($p < 0,05$), que mostrou que a concentração de ácido tem efeito significativo na produção de açúcar redutor. A maior concentração de açúcar redutor (25,17 g/L) foi obtida com a menor concentração de ácido (0,25M). Os dados obtidos indicaram que a casca do cupuaçu avaliada apresenta grande potencial para utilização em biorrefinarias lignocelulósicas.

Palavras Chaves: sacarificação, cupuaçu, material lignocelulósico, açúcares

1. INTRODUÇÃO

O Brasil possui a maior biodiversidade vegetal do mundo, contendo mais de 55 mil espécies catalogadas. Entretanto, apenas 0,2%, da produção frutífera nacional é composta pela fruticultura amazônica (CANUTO et al., 2010). O cupuaçu (*Theobroma grandiflorum* Schum), é um dos frutos mais importantes e apreciados da região, sendo nativo do sul e sudeste da Amazônia (GONÇALVES et al., 2013). Esta fruta, rica em compostos polifenólicos, tem sido comercializada no mercado nacional e internacional devido às suas propriedades nutricionais (PUGLIESE et al., 2013).

A fruta possui uma casca dura e lenhosa de cor castanho-escuro, entretanto, facilmente quebrável, onde se encontra as sementes, envolvidas por uma polpa branca, ácida e aromática e com sabor muito agradável. A polpa corresponde a 35% da fruta, as cascas a 45% e as sementes a 20% (SOUZA e SOUSA, 2002; CARVALHO et al., 2008; MATOS et al., 2008).

O Estado do Amazonas é segundo maior produtor de cupuaçu, atrás apenas do Estado do Pará (IBGE, 2010). Em 2017 a estimativa de produção, somando todos os municípios produtores de cupuaçu do Amazonas, foi de 1.345,14 toneladas (t) de fruta inteira, resultando em 470,80 t de polpa e 605,31 t de casca (IDAM, 2017).

A casca do cupuaçu é um resíduo lignocelulósico valioso desperdiçado, pois poderia ser convertida em produtos que agregariam valor a toda produção (HOWARD et al., 2003; SÁNCHEZ, 2009). A biomassa lignocelulósica é formada principalmente pelos componentes químicos celulose, hemicelulose e lignina, e em pequena quantidade por cinzas, extrativos, proteínas e amido. Os polissacarídeos provenientes dos resíduos de biomassas agrícolas representam uma fonte potencial para a produção, por meio da hidrólise ácida, de substâncias tais como etanol, açúcares redutores e ácidos orgânicos (SCHEUFELE et al., 2012).

O presente trabalho teve como objetivo realizar a hidrólise da fração celulósica da casca do cupuaçu para obtenção de um hidrolisado com potencial de utilização em processos de fermentação visando a produção de etanol, transformando este resíduo agrícola em um subproduto para a indústria alcooleira, desta forma, reduzindo os problemas ambientais causados pelo acúmulo desse resíduo.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Processos de Separação (LABPROS) vinculado ao curso de Engenharia de Alimentos da Faculdade de Ciências Agrárias (FCA) na Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

2.1. MATÉRIA PRIMA

As cascas do cupuaçu foram obtidas nas feiras abertas da cidade de Belém-Pa, Brasil, entre os meses de dezembro a janeiro. No laboratório, as cascas passaram por uma limpeza que consistiu da retirada da polpa residual. A matéria prima in natura foi fracionada com o auxílio de uma faca e submetida à secagem em estufa com circulação forçada de ar (NOVA ÉTICA, 3958) a 50 °C por período de 48 horas. Em seguida foi triturada em moinhos de facas (TECNAL, Mod. 680), peneirada em malha de 2,5 mm, acondicionada em becker de plástico a temperatura ambiente (25 ± 2 °C) e reservada para uso posterior. A Figura 1 ilustra o moinho de facas utilizado para o pré-tratamento físico.

Figura 1. Moinho de facas

Fonte: Autor, 2020.

2.2 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DA CASCA DE CUPUAÇU

As análises de umidade, lipídeos e cinzas foram realizadas no LABPROS, todas as análises foram feitas em triplicatas e seguiram as metodologias oficiais da Association of Official Agricultural Chemists (AOAC).

2.2.1 UMIDADE

O Teor de umidade foi determinado em estufa a 105°C, de acordo com o método 925.10 da AOAC (1997). A Figura 2 ilustra os cadinhos na estufa onde foi realizada a análise de umidade.

Figura 2. Cadinhos

Fonte: Autor, 2020.

2.2.2 CINZAS

O teor de cinzas foi determinado através de calcinação em mufla a 550°C (Figura 3), seguindo o método 923.03 da AOAC (1997).

Figura 3. Determinação do teor de cinzas.

Fonte: Autor, 2020.

2.2.3 LIPÍDIOS

A análise de lipídeos seguiu o método AOAC Ba 3-38 de extração a quente utilizando o equipamento extrator Soxhlet (Figura 4) (TECNAL, TE-188).

Figura 4. Extração com solvente.

Fonte: Autor, 2020.

2.2.4 DETERMINAÇÃO DE LIGNINA EM DETERGENTE ÁCIDO (LDA)

Para determinação do teor de lignina utilizou-se a metodologia descrita por SLUITER et al. (2010).

2.2.5 DETERMINAÇÃO DE FIBRA BRUTA

A determinação de fibras foi realizada utilizando o método fibra em detergente ácido (FDA) (SILVA e QUEIROZ, 2002).

2.2.6 PRODUÇÃO DO HIDROLISADO

A hidrólise foi preparada a partir da casca de cupuaçu, sendo acondicionada em pote de vidro com tampa de metal. O catalisador para o processo foi o ácido sulfúrico (H_2SO_4). Os ensaios foram realizados obedecendo às seguintes condições: concentração de ácido sulfúrico: 1,0 M, 1,5 M e 2,00 M; razão sólido/líquido: 5% m/v; temperatura do processo: 120°C, e o tempo de duração para todas as reações foi de 60 minutos. Ao final de cada processo de hidrólise o recipiente foi resfriado em banho de água fria e a solução foi neutralizada utilizando hidróxido de sódio (NaOH) a 2N.

2.2.7 AÇÚCARES REDUTORES

As concentrações de açúcares redutores (AR) foram quantificadas pelo método ácido dinitrossalicílico (DNS), no início e no final do processo (MILLER, 1959).

2.2.8 POTENCIAL HIDROGENIÔNICO (PH)

Para medição do pH foi utilizado o pHmetro digital (KASVI, K39-0014).

2.2.9 SÓLIDOS SOLÚVEIS (°BRIX)

A análise foi realizada através da leitura direta em refratômetro Abbé (Arealitic Jean) a 20 °C, seguindo o método 932.12 da AOAC (1997).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta seção, serão apresentados e discutidos os resultados obtidos na caracterização da casca do cupuaçu.

3.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DA CASCA DO CUPUAÇU

Os resultados da análise físico-química de umidade, cinzas e lipídeos da casca do cupuaçu desidratada e moída foi representado pela média aritmética entre as repetições em triplicata. Os dados, mostrados na Tabela 1, fornecem informações pertinentes em relação a qualidade da biomassa.

Tabela 1: Valores percentuais de umidade, cinzas e lipídeos do tucumã.

Amostra	Umidade%	Cinzas%	Lipídios%
	Média ± Desvio Padrão	Média ± Desvio Padrão	Média ± Desvio Padrão
	(b.s.).	(b.s.).	(b.s.).
Casca de Cupuaçu	5,9 ± 0,02	1,72 ±	2,94 ±
		0,05	0,84

Fonte: Autor, 2020.

b.u.: base úmida; b.s.: base seca; todos os resultados estão expressos em média

A casca do cupuaçu apresentou um teor de umidade baixo, o que equivale uma boa estabilidade em relação às degradações e o desenvolvimento de microrganismos capazes de deteriorar a biomassa e produzir compostos indesejáveis que podem prejudicar a fermentação dos polissacarídeos à bioetanol, assim como representa uma baixa quantidade de água que pode diluir o ácido sulfúrico no processo de hidrólise.

De acordo com Carneiro (2011), a desidratação é uma alternativa para evitar o desenvolvimento de microrganismos deteriorantes, no caso da casca de cupuaçu analisada, a cominuição mecânica no moinho de facas se dá diante da matéria-prima já desidratada, este fato contribui para o baixo teor de umidade determinado, 5,9%. O teor de umidade da casca do cupuaçu não desidratada é acima de 40%.

Análogo, o teor de cinzas, 1,72%, é um resultado relevante, pois os compostos inorgânicos na forma de resíduos de minerais que resistiram à temperatura próxima de 550°C podem servir de nutrientes para as leveduras na etapa de fermentação. O teor de lipídeos determinado foi de 2,94%. Os lipídeos representam uma classe de compostos orgânicos altamente energéticos, solúveis em solventes orgânicos e insolúveis em água. Vale ressaltar que não foram encontrados trabalhos de caracterização da casca do cupuaçu, apenas do fruto na forma in natura ou desidratado.

Determinação dos açúcares redutores

Os açúcares redutores obtidos, conforme observado na Tabela 2, foram determinados através da equação da reta referente a curva padrão de glicose, no qual, substitui-se os valores de absorbância para obter os de concentração de glicose.

Tabela 2. Açúcares redutores obtidos no processo de hidrólise.

Experimento	T (°C)	C.A*	R.S.L**	Glicose (g/L) (Média ± Desvio Padrão)
1	120°C	0,25M	1:10	25,17 ± 0,30
2	120°C	0,5M	1:10	22,57 ± 0,41
3	120°C	1M	1:10	20,03 ± 0,34

Fonte: Autor, 2020.

*C. A= Concentração de ácido; **R.S. L= Razão sólido- líquido

Os dados mostram que o fator de maior relevância, a um nível de significância de 95 % ($p < 0,05$), foi a concentração de ácido. Com base nas definidas concentrações de ácido, esta variável tem grande influência na formação e degradação de açúcares, isso é resultante da força do ácido que quebra as ligações de hidrogênio da celulose liberando a glicose para o meio, contudo, também degrada os açúcares redutores formados no decorrer da reação (SAHA et al., 2005; CAMPOS et al., 2005).

A maior produção de açúcar redutor (25,17 g/L) ocorreu no experimento com a menor concentração de ácido (0,25M). Isto significa que a menor concentração de ácido aplicado neste estudo foi suficiente para a hidrólise da casca do cupuaçu, e representa uma diminuição de custo promovida pela economia deste solvente. Por esses fatores que existem tecnologias como a hidrólise ácida extra-diluída que utiliza temperaturas elevadas objetivando preservar o açúcar fermentescível produzido.

Tabela 3. Análises realizadas nos pós-hidrolisados.

Experimento	Análises (Média $\pm$ Desvio Padrão)	
	pH (adm.)	°Brix
1	6,8 $\pm$ 0,5	9,5 $\pm$ 0,1
2	6,5 $\pm$ 0,3	9,3 $\pm$ 0,2
3	6,2 $\pm$ 0,2	9,2 $\pm$ 0,5

Fonte: Autor, 2020.

Pode-se observar (Tabela 3) que o teor de compostos solúveis na solução açucarada comportou-se de forma proporcional em relação ao pH, observando-se valor máximo de rendimento no pH mais próximo da neutralidade (6,8). Este resultado sugere que, existe um equilíbrio entre a concentração de ácido e concentração de açúcar redutor que pode permanecer no meio sem ser degradado pelo ácido remanescente.

4. CONCLUSÃO

O estudo realizado nesse trabalho determinou que o uso da hidrólise ácida sobre a casca do cupuaçu mostrou ser viável, pois resultou na obtenção de um hidrolisado contendo valores consideráveis de açúcares redutores, alcançando teores de até 25,17 g/L de açúcar no hidrolisado. Analisando as condições operacionais utilizadas na hidrólise foi possível constatar que a casca de cupuaçu mostrou melhores concentrações de açúcar quando hidrolisada em concentração de ácido de 0,25 M. Com os resultados obtidos é possível concluir que a casca de cupuaçu é uma matéria-prima promissora para utilização em aplicações mais sofisticadas e de maior valor agregado em biorrefinarias lignocelulósicas, como a produção de etanol de segunda geração.

REFERÊNCIAS

- AOAC International. Official methods of analysis. 16^a ed., 3^a rev. Gaithersburg: Published by AOAC International, v.2.1997.
- CAMPOS, I. D.; ALEGRÍA, I.; ZAZPE, M.; ECHEVERRIA, M.; ECHEVERRIA, I. Diluted acid hydrolysis pretreatment of agri-food wastes for bioethanol production. *Industrial Crops and Products*, v. 24, p. 214–221, 2005.
- CANUTO, G. A. B.; XAVIER, A. A. O.; NEVES, L. C.; BENASSI, M. T. Caracterização físico-química de polpas de frutos da Amazônia e sua correlação com a atividade anti-radical livre. *Revista Brasileira de Fruticultura*, v. 32, p. 1196-1205, 2010.
- CARNEIRO, T. B.; CARNEIRO, J. G. de M. Frutos e polpa desidratada buriti (*Mauritia flexuosa* L.): Aspectos físicos, químicos e tecnológicos. *Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável*, Mossoró, v. 6, n. 2, p. 105-111, abr/jun, 2011.
- CARVALHO, A.; GARCIA, N.; HORACIO, P.; FÁRFAN, J. Proteínas da semente de cupuaçu e alterações devidas à fermentação e à torração. *Ciência Tecnologia de Alimentos*, 28 (4), 986–993, 2008.
- GONÇALVES, M. V. V. A.; SILVA, J. P. L.; MATHIAS, S. P.; ROSENTHAL, A.; CALADO, V. M. A. Caracterização físico-química e reológicas da polpa de Cupuaçu congelada (*Theobroma grandiflorum* schum). *Exatas & Engenharia*, 3(7):46-53, 2013.
- HOWARD, R. L.; ABOTSI, E.; van RENSBURG J. E. L.; HOWARD, S.; Lignocellulose biotechnology: issues of bioconversion and enzyme production. *Afr. J. Biotechnol*, 2:602 – 619, 2003.
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). População por município 2010, disponível em <http://www.ibge.gov.br/estatística/população/censo2010/>. Acesso: 16/06/2020: 11:31 da manhã.
- Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Estado do Amazonas (IDAM). Relatório de acompanhamento trimestral, jan-dez/2017. Disponível em <http://www.idam.am.gov.br/wp-content/uploads/2018/05/Agroindustrializa%C3%A7%C3%A3o-2017.pdf>. Acesso: 16/06/2020; 11:57 da manhã.
- MATOS, C.; SOUZA, C.; FARIA, J.; OLIVEIRA, S.; SANTO, L.; SACRAMENTO, C. Características físicas e físico-químicas de cupuaçus de diferentes formatos. *Rev. Ciênc. Agrár.* 50, 35-45, 2008.
- MILLER, G. L. Use of dinitrosalicylic acid reagent for determination of reducing sugar. *Analytical chemistry*, v. 31, n. 3, p. 426-428, 1959.
- PUGLIESE, A. G.; TOMAS-BARBERAN, F. A.; TRUCHADO, P.; GENOVESE, M. I. Flavonoids, proanthocyanidins, vitamin C, and antioxidante activity of *Theobroma grandiflorum* (Cupuassu) pulp and seeds. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 61(11), 2720-2728, 2013.
- SAHA, C. B. I; ITEN, L. B; COTTA, M. A.; WU, Y. V. Dilute acid pretreatment, enzymatic saccharification and fermentation of wheat straw to ethanol. *Process Biochemistry*, n°40, p. 3693–3700, 2005.
- SANTOS, F. A.; DE QUEIRÓZ, J. H.; COLODETTE, J. L.; MANFREDI, M.; QUEIROZ, M. E. L. R.; CALDAS, C. S.; SOARES, F. E. F.; *Quim. Nova.* 37, 56, 2014.

SCHEUFELE, F.B., BUTZKE, A.S., MARRA, I.F., HASAN, S.D.M. & FIORESE, M.L. Otimização dos parâmetros de hidrólise enzimática do bagaço de cana-de-açúcar. *Engevista*, 14(3):310-321, 2012.

SILVA, D. J.; QUEIROZ, AC de. *Análise de alimentos: métodos químicos e biológicos*. 3a Edição. Viçosa: UFV, imp. univ, p. 165, 2002.

SLUITER, J. B.; RUIZ, R. O.; SCARLATA, C. J.; SLUITER, A. D.; TEMPLETON, D. W. Compositional analysis of lignocellulosic feedstocks. 1. Review and description of methods. *Journal of agricultural and food chemistry*, v. 58, n. 16, p. 9043-9053, 2010.

SOUZA, A.; SOUSA, N. Cupuaçuzeiro. In: Bruckner, C.H. (Ed.), *Melhoramento de fruteiras tropicais*. Editora UFV, Viçosa, pp. 251–266, 2002.

Capítulo 12

10.37423/211004926

ÁGUAS ARMAZENADAS EM CISTERNAS E VIABILIDADE DA DESINFECÇÃO SOLAR NO SEMIÁRIDO

Ana Luiza da Silva

Universidade Federal Rural de Pernambuco

Walter Santos Evangelista Júnior

Universidade Federal Rural de Pernambuco

Lourinalda Luiza Dantas da Silva Selva de Oliveira

Universidade Federal Rural de Pernambuco

Alessandra Quirino Bertoso dos Santos Jardim

Universidade Federal Rural de Pernambuco

Jorge Luiz Schirmer de Mattos

Universidade Federal Rural de Pernambuco

Resumo: Na região semiárida do Brasil, pela pouca disponibilidade de água durante o ano, é comum a construção de cisternas como forma de minimizar e garantir água nos períodos de seca. Porém, um dos grandes problemas no consumo desta água armazenada está relacionado a qualidade, pois devido as ações antrópicas ou por questões naturais, muitos destes reservatórios estão microbiologicamente contaminados. Em análises foram encontrados vários microrganismos patogênicos presentes na água: *Salmonella typhi*, *Vibrio cholerae*, *Shigella dysenteriae*, *Escherichia*, *Leptospira*, numerosos vírus entéricos como o vírus da hepatite infecciosa e os protozoários *Entamoeba histolítica* e *Giardia lamblia*, todos possivelmente originários de fezes humanas. Uma das soluções seria o uso de tecnologia alternativa de baixo custo como a desinfecção solar.

Palavras-Chave: Coliformes Totais; Coliformes Termotolerantes; Uso de Água de Chuva; SODIS.

INTRODUÇÃO

As populações que residem na região semiárida têm suas condições de vida afetadas de forma severa com a falta de água ocasionada pelas altas taxas de evaporação e concentração das precipitações em curtos períodos. Estima-se que mais de 27 milhões de pessoas (12% da população do Brasil) moram no semiárido brasileiro (BRASIL, 2018). De acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária do Semiárido (EMBRAPA/SEMIÁRIDO), três meses após o encerramento das precipitações, cerca de 550 mil localidades rurais nessa região ficam sem qualquer tipo de recurso hídrico para consumo animal ou humano.

A água contaminada é veículo para uma série de doenças para quem a consome. Por isso, a água domiciliar deve ser potável e deverá atender aos padrões de qualidade das águas destinadas ao abastecimento (CARVALHO; SILVA, 2014). Entretanto, a garantia de fonte de água adequada ao consumo humano e produção de alimentos vem sendo diminuída devido ao crescimento da populacional, às altas taxas de consumo de água, ao modelo de desenvolvimento adotado e à contaminação dos recursos hídricos pelas ações antrópicas (CRISPIM; SOUZA, 2016).

O método SODIS pode ser facilmente aplicado nas comunidades tradicionais, nos assentamentos rurais dos municípios da semiárida em Pernambuco, em virtude do alto índice de radiação solar dessa região. A energia solar pode ser utilizada para uso na desinfecção de águas como ferramenta disponível em abundância e facilmente aplicável em comunidades carentes de recursos e de estrutura.

Nesse sentido, estudos envolvendo a qualidade microbiológica da água em comunidades rurais deveriam levar em conta procedimentos metodológicos adequados de modo a: i) caracterizar a qualidade microbiológica das águas armazenadas em cisternas; ii) identificar fatores de risco na possível contaminação das águas armazenadas pelas famílias nas comunidades; iii) uso do método simplificado SODIS como alternativa acessível na destruição de patógenos veiculados pela água armazenada e de procedência imprecisa.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Uma das medidas básicas para a promoção de saúde e prevenção de doenças é o provimento de água em quantidade e qualidade adequada, sendo que a manutenção da potabilidade da água é uma medida prioritária para a qualidade da saúde coletiva.

Como alternativa de abastecimento de água em regiões que possuem escassez hídrica os governos municipal, estadual e federal e organizações não governamentais, fomentam e incentivam a construção e a distribuição de cisternas (Figura 1).

Figura 1 - Modelo de parceria entre instituições envolvidas na distribuição de cisternas no semiárido brasileiro

Fonte: Santana (2019).

As cisternas são construídas com o intuito de captar água de chuva e armazená-la para os meses de seca. Além das cisternas as comunidades rurais utilizam águas acumuladas em açudes e barreiros para beber e cozinhar. Essas águas, mesmo sem potabilidade, são utilizadas pelas famílias que não dispõem de métodos de desinfecção para consumi-la com segurança. (IBGE, 2011).

A análise da qualidade sanitária da água envolve o isolamento de bactérias intestinais, genericamente denominadas de coliformes, considerando que a sua presença na água e em alimentos seja indicador de poluição por dejetos humanos e animais e do perigo de disseminação de doenças entéricas. (JAWETZ *et al.*, 2014). Vários microrganismos patogênicos presentes na água são originários de fezes humanas: *Salmonella typhi*, *Vibrio cholerae*, *Shigella dysenteriae*, *Escherichia*, *Leptospira*, numerosos vírus entéricos, como o vírus da hepatite infecciosa e os protozoários *Entamoeba histolítica* e *Giardia lamblia*. Espécies da família *Enterobacteriaceae* são patogênicas para o homem sendo a causa de

grande parte das infecções hospitalares e as principais responsáveis por infecções intestinais no Brasil. (BRASIL, 2015).

A falta de qualidade microbiológica da água pode trazer diversas consequências indesejáveis como contaminação de alimentos e utensílios domésticos e provocar doenças parasitárias e enterobacterioses. Uma alternativa para tais situações é o uso do método simplificado de desinfecção com energia solar (*Solar Water Disinfection* - SODIS) que se mostra efetivo na inativação de diversos microrganismos patogênicos de veiculação hídrica (Quadro 1).

Quadro 1- Microrganismos patogênicos desativados por meio da desinfecção solar.

Agentes patogênicos	Doenças	Redução pelo SODIS (6 h de exposição à 40°C)
Bactérias: <i>Escherichia coli</i> , <i>Salmonella</i> spp., <i>Shigella</i> spp., <i>Vibrio cholerae</i>	Infecções sistêmicas, Tifo, Cólera, Doenças diarreicas	3-4 log (99,9-99,99%) Inativação dos agentes etiológicos de riscos biológicos
Vírus: Rotavirus,, Poliovirus, HAV, HBV, HCV, HDV,HEV,	Poliomielite, Diarreias Hepatites virais	
Protozoários: <i>Giardia</i> spp. <i>Cryptosporidium</i> spp.	Giardíase, Cryptosporidíase	

Fonte: Meierhofer e Martin (2002).

No Brasil, a desinfecção solar da água, por meio do método SODIS, já foi experimentada em vários municípios. Oliveira *et al.* (2015) utilizaram com sucesso a metodologia no povoado de São Tomé de Cima, meio rural do município de Alagoa Nova-PB, para análise microbiológica de águas de cisternas. Nos municípios paraibanos de São José do Sabugi e Campina Grande a aplicação do SODIS reuniu instituições como: o Instituto Nacional do Semiárido (INSA), o Coletivo Regional das Organizações da Agricultura Familiar e as Instituições de Ensino Superior, tais como Universidade Federal de Campina grande (UFCG) e a Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), que ao se agregaram desenvolveram uma cartilha para orientação do público dessa tecnologia social. (BRASIL, 2019). Na Zona Rural Petrolina – PE, Pereira *et al.* (2014) utilizaram o SODIS como forma de tratamento alternativo para eliminação de patógenos microbiológicos de águas de cisternas do Assentamento Serra da Santa.

Os resultados iniciais deste estudo comprovaram a contaminação das amostras de águas de cisternas, mas que também após a desinfecção pelo protocolo do SODIS apresentaram viabilidade para consumo humano. Vilarim (2012), considera o uso do método de desinfecção solar (SODIS) como uma das várias

tecnologias sociais que tentam mitigar o problema da escassez da água de qualidade para as famílias do Sertão do Seridó. Azevedo (2014) ao utilizar essa tecnologia social no povoado de Lajedo do Cedro no município de Caruaru – PE, confirmou a eficácia de sua utilização na inativação de patógenos da água de cisternas. Por se tratar de uma metodologia de simples aplicabilidade e considerável eficiência na desinfecção de águas armazenadas, o método SODIS melhora a qualidade microbiológica da água potável, usando radiação solar ultravioleta A (UV-A) e temperatura para desativação dos patógenos causadores de doenças entéricas.

O método simplificado de desinfecção é acessível, pois reutiliza materiais que seriam descartados, como também evita o uso de produtos químicos. De simples aplicabilidade pelas famílias, o método SODIS melhora significativamente a qualidade microbiológica da água, promovendo benefícios à saúde destas. Os únicos recursos necessários são a luz solar e garrafas transparentes. O impacto esperado com a implantação do modelo simplificado de filtração solar é que este sirva como facilitador para a educação sanitária e de saúde nas comunidades rurais que utilizam águas armazenadas para consumo doméstico.

METODOLOGIA

Para desenvolver um trabalho com enfoque no aproveitamento e melhoria da qualidade da água com impacto positivo e benefícios para as comunidades recomendamos a realização de ações divididas em, pelo menos, cinco etapas principais: diagnóstico, análise microbiológica, construção de estratégias de melhoria do uso da água com as comunidades rurais, oficinas sobre o método SODIS e avaliação participativa das ações com cada comunidade rural.

O diagnóstico rural participativo (DRP) tem sido usado em comunidades rurais. Durante o DRP ocorre a capacitação da equipe de trabalho, seguida pela realização de contatos com organizações governamentais e não governamentais que atuam junto as comunidades e as lideranças da comunidade. Além desse momento inicial o DRP também propõe outros dois momentos ou fases, ambas de forma participativa, com a comunidade: levantamento das problemáticas da comunidade e possíveis soluções.

Porém, o mais importante é o convívio com as comunidades, pois proporciona momentos de troca de saberes entre a equipe técnica e as pessoas que conhecem a realidade e vivem no local.

Assim, diagnosticar as formas de acesso à água, sua utilização e qualidade, por meio de visitas *in loco*, utilizando ferramentas do diagnóstico rural participativo é indispensável no trabalho comunitário (MARTINS; KATO, 2018).

No desenvolvimento do DRP as ferramentas que podem ser utilizadas são: reuniões, entrevistas, árvore de problemas, mapa da comunidade, rotina do homem e da mulher, caminhada transversal, além de atividades mais didáticas como FOFA e o Diagrama de Venn (PINHEIRO *et al.*, 2011). Em análises de águas de cisternas devem ser realizadas três coletas em diferentes momentos, das mesmas cisternas.

O processamento das análises microbiológicas deve ser realizado de acordo com a metodologia descrita por SILVA, JUNQUEIRA e SILVEIRA (2001). As análises de Coliformes Totais e Termotolerantes devem ser feitas por meio da técnica do Número Mais Provável (NMP).

Em análises de águas de cisternas devem ser realizadas três coletas em diferentes momentos, das mesmas cisternas. O processamento das análises microbiológicas pode ser realizado de acordo com a metodologia descrita por SILVA, JUNQUEIRA e SILVEIRA (2001) (Figura 3). As análises de Coliformes Totais e Termotolerantes devem ser feitas por meio da técnica do Número Mais Provável (NMP).

Figura 3: Esquema ilustrativo do processamento das análises microbiológicas

Fonte: Silva, Junqueira e Silveira (2001).

Em laboratório, deve ser realizado o procedimento de limpeza da área externa dos frascos com etanol 70%. Homogeneizada, a amostra deve ser submetida a diluições de 10^{-1} a 10^{-4} em tubos com 9ml de água peptonada. Depois de realizadas as diluições, deve ser inoculado 1mL de cada diluição em 9 tubos contendo 9mL de Caldo Lauril Sulfato Triptose (LST) (Himedia)[®] e os tubos de Durhan invertidos. Os tubos LST devem ser incubados a 35°C por 24 horas, em seguida, examinados para verificar se houve crescimento e produção de gás. Os tubos que apresentarem resultados negativos devem ser reincubados por mais 24 horas e, novamente, deve se proceder a leitura dos mesmos. Os tubos com resultados positivos devem ser submetidos à contagem de coliformes totais. As amostras que apresentarem crescimento e produção de gás nos tubos de Caldo Lauril Sulfato Triptose (LST) (Himedia)[®], em até 48 horas, devem ser submetidas ao teste confirmativo de coliformes totais a 35°C. A partir de cada tubo positivo de LST, deve ser transferida uma alçada da cultura para tubos de Caldo Verde Brilhante Bile (Himedia)[®]. Os tubos devem ser incubados a 35°C por 24 a 48 horas. Após esse tempo, deve ser verificado se há crescimento com produção de gás, confirmando assim, os coliformes totais presentes na amostra. O número de tubos positivos de VB deve ser anotado para a determinação do número mais provável (NMP) de coliformes totais por mililitro da amostra, de acordo com uma tabela apropriada para combinações positivas e negativas de três porções de 10mL de cada amostra. Os tubos positivos para o teste presuntivo serão repicados para tubos contendo caldo *E. coli* (EC) (Himedia)[®], adotando-se o mesmo procedimento de repique utilizado para a determinação de coliformes totais, e em seguida, devem ser incubados em banho-maria a 44,5°C por 24 ou 48 horas para observação de crescimento com produção de gás. O número de tubos EC positivos deve ser anotado e usado para a determinação do NMP/mL como descrito no item anterior. De cada tubo EC com produção de gás, em 24 ou 48 horas, deve ser estriada uma alçada da cultura em placas de Petri contendo meio Ágar Eosina Azul de Metileno (Micromed)[®]. As placas devem ser incubadas a 35°C por 24 horas e observadas para o desenvolvimento de colônias típicas de *Escherichia coli*, que são colônias nucleadas com centro preto, com brilho verde metálico.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Construir estratégias de melhoria do uso da água com as comunidades rurais, com base nos relatos sobre a quantidade e a qualidade da água utilizada para consumo doméstico e outros usos, obtidas pelo diagnóstico rural participativo nas comunidades, acompanhado dos resultados das análises microbiológicas, desencadeia-se um processo de problematização com as comunidades com o objetivo de identificar as melhores estratégias de resolver o problema da contaminação da água. E,

programar práticas sustentáveis de melhoria de uso e qualidade dessa água, percebendo as peculiaridades de cada comunidade, atrelando a estas as demandas de trabalho (SCHERER, 2016).

As oficinas sobre o método SODIS devem apresentar de forma educativa seus benefícios e seus limites. Devem constar de momentos pedagógico, envolvendo a implementação de práticas sustentáveis para melhoria do uso e da qualidade das águas. Devem apresentar de forma prática o método alternativo de desinfecção e a pasteurização por luz solar (SODIS).

Demonstrar que o uso de maneira sinérgica da radiação ultravioleta (UV-A) e da radiação infravermelha na água, servem para tornar a água própria para o consumo doméstico de maneira segura. As oficinas tornam-se porta de entrada para educação sanitária das famílias (FEP-BA, 2018). E isso deve ocorrer de modo que os indivíduos consumidores da água tratada, se percebem sujeitos responsáveis pela melhoria da sua qualidade de vida, uma vez que passarão a ter acesso a uma metodologia que facilmente pode ser replicada a todos os membros da família, não requer recursos financeiros, pois o uso de luz solar poupa o consumo de outras fontes de energia, além de reduzir a poluição e o consumo de espécies vegetais nativas para combustível.

Nas oficinas ainda devem ser expostos os limites do método SODIS, uma vez que esse método não trata grandes volumes de água, não altera a qualidade química da água, necessitando que a água esteja em nível tolerável de turbidez e a radiação solar precisa ser suficiente para que ocorra a sinergia entre a radiação e a temperatura atingida (CAVALLINI *et al.*, 2018).

Assim como em todas as etapas da metodologia, a imersão no território se revela condição essencial para o sucesso da avaliação participativa. A avaliação participativa deve ocorrer em todas as etapas do trabalho, constando de reuniões dialógicas por exemplo, sobre os resultados das análises da água, interpretação do resultado das entrevistas etc., mas principalmente do aprendizado ao final das ações. Mas tanto os resultados laboratoriais devem ser revelados de maneira acessível à compreensão dos moradores da comunidade, de modo a mostrar que existe alternativa fácil e sem custos faz da ação, quanto o resultado das entrevistas deve ser tratado sob uma linguagem de fácil entendimento das pessoas da comunidade (RODRIGUES, 2011).

Trata-se de uma fase complementar ao DRP, pois interessa nesse momento avaliar o desempenho da equipe, o envolvimento dos membros da comunidade e, principalmente, as perspectivas futuras de continuidade da prática de desinfecção da água pela comunidade.

CONCLUSÕES

As comunidades rurais não dispõem de recursos financeiros para realizar investimentos particulares e melhorar a qualidade microbiológica da água que consomem. Assim sendo, faz-se necessário o uso de metodologias de baixo custo na busca de solução para esta problemática. Neste contexto o método de tratamento alternativo da água, por meio de desinfecção solar (SODIS) é uma alternativa para mitigar a problemática da falta de qualidade na água de consumo humano nas comunidades rurais. Pois, o SODIS é um método comprovadamente eficiente que melhora a qualidade da água para consumo humano.

Como aspecto facilitador a desinfecção com o uso da luz solar é acessível a todos e de fácil compreensão, podendo ser replicada entre as famílias das comunidades rurais. Não requer investimentos ou infraestrutura dispendiosa. Não é poluente, pois não utiliza fontes tradicionais de energia como gás, fogo a lenha ou querosene. O método independe de ações do sistema público, entretanto implica no compromisso da comunidade na obtenção de água de melhor qualidade para seu próprio consumo.

REFERÊNCIAS

- AZEVEDO, R. C. M. Uso de Tecnologias Sociais para Adequação da Qualidade da Água Armazenada em Cisternas para Consumo Humano. UFPE-CAA, 2014.
- BRASIL. Ministério da Integração Social – SUDENE - Nova Delimitação Semiárido. Brasília, 2018.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador. Análise de Indicadores Relacionados à Água para Consumo Humano e Doenças de Veiculação Hídrica no Brasil. Brasília, 2015.
- BRASIL, Ministério do Desenvolvimento Regional. Semiárido Brasileiro. Publicado em 13 de março de 2019. <https://www.mdr.gov.br/irrigação/semiaridobrasileiro>. Acesso em: 25/07/2020.
- CARVALHO, L. A.; SILVA, D. D. Avaliação da Qualidade de Águas de Cisternas da Zona Rural e Urbana do Município de Cuité – PB. Educação Ciência e Saúde, Campina Grande v.1, n.1, p.1-18, 2014.
- CAVALLINI, G. S.; ARAÚJO, D. B. L. S.; LIMA, J. G. S. Desinfecção de Água de Poço por Radiação Solar (SODIS): um Estudo na Região Sul do Tocantins. Revista Desafios, v. 5, n. especial, p.66-73, 2018.
- CRISPIM A. B.; SOUZA, M. N. Degradação, Impacto Ambiental e Uso da Terra em Bacias Hidrográficas: o Contexto da Bacia Pacoti/CE, ACTA Geográfica, Boa Vista, v. 10. n. 22, p. 17-33, 2016.
- IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico 2010. Características da População e dos Domicílios. Rio de Janeiro, 2011. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br>. Acesso em: 08 jul. 2019.
- JAWETZ, E.; MELNICCK, J. L.; ADELBERG, E. A. Microbiologia Médica. 26. ed. Rio de Janeiro: ArtMed, 2014. 568p.
- MEIERHOFER, R.; MARTIN, W. Guia de desinfecção Solar da água. Guia de Aplicações do SODIS. Dübendorf: Instituto Federal Suíço de Ciência e Tecnologia Aquática (EAWAG).
- Departamento de Saneamento e água para países em desenvolvimento (SANDEC). 2002. OLIVEIRA, C. S.; SOUZA, N. C.; LUIZ, M. R. Avaliação da Eficiência do Método SODIS com e sem o uso de Concentrador Solar para Desinfecção de Água da Cisterna Localizada na Zona Rural de Alagoa Nova – PB. In: XX CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA QUÍMICA, 2014, Florianópolis. Anais do XX Congresso Brasileiro de Engenharia Química. Florianópolis, 2015.
- PEREIRA, L. A. et al. Avaliação de Tratamento Simplificado da Água de Cisternas: Desinfecção Solar (SODIS) para Consumo Humano. In: IX Simpósio Brasileiro de Captação e Manejo de Água de Chuva, 2014, Feira de Santana. Anais do IX Simpósio Brasileiro de Captação e Manejo de Água de Chuva. UEFS. 2014.
- PINHEIRO, A. A. et al. A Utilização de Metodologias Participativas na Construção do Conhecimento Agroecológico: o Caso da Comunidade Serra do Abreu. Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável – Grupo Verde de Agricultura Alternativa, v. 6, n. 5. p. 74-79. 2011.

SANTANA, V. L. Tecnologias sociais de acesso à água para o meio rural: a contribuição do Programa Cisternas e os desafios para o próximo ciclo. *Revista de Políticas Públicas e Gestão Governamental*, v.16, n.1, p.58-72, Jan.-Jun. 2019.

SILVA, N.; JUNQUEIRA, V. C. A.; SILVEIRA, N. F. A. Manual de métodos de análise microbiológica dos alimentos. São Paulo: Ed. Varela, 2001. 295p.

SCHERER, K. et al. Avaliação Bacteriológica e Físico-Química de Águas de Irrigação, de Solo e Alface (*Lactuca sativa* L.). *Revista Ambiente & Água*, v. 11, n. 3, 2016.

VILARIM, I. B. O que há de Tecnologia Social no P1MC? Uma Análise da Experiência com as Cisternas de Placas no Sertão Paraibano. 2012. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional) – Universidade Federal de Campina Grande.