A photograph showing a caregiver in a green uniform from behind, assisting an elderly person in a wheelchair. The caregiver's hand is on the wheelchair's handle. The elderly person has white hair and is wearing a plaid shirt. They are outdoors on a grassy area with trees in the background.

Laércio Deleon de Melo
Raquel de Oliveira Martins Fernandes
Eliana Amaro de Carvalho Caldeira

ENFERMAGEM GERONTOLÓGICA E A ABORDAGEM DAS DOENÇAS CRÔNICAS: APONTAMENTOS AO CUIDADO ESPECIALIZADO EM SAÚDE

EDITORA CONHECIMENTO LIVRE

Laércio Deleon de Melo
Raquel de Oliveira Martins Fernandes
Eliaana Amaro de Carvalho Caldeira

Enfermagem Gerontológica e a Abordagem das Doenças Crônicas: Apontamentos ao Cuidado
Especializado em Saúde

1ª ed.

Piracanjuba-GO
Editora Conhecimento Livre
Piracanjuba-GO

1ª ed.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Melo, Laércio Deleon de
M528E Enfermagem Gerontológica e a Abordagem das Doenças Crônicas: Apontamentos ao
Cuidado Especializado em Saúde
/ Laércio Deleon de Melo. Raquel de Oliveira Martins Fernandes. Eliana Amaro de Carvalho
Caldeira. – Piracanjuba-GO

Editora Conhecimento Livre, 2021

108 f.: il

DOI: 10.37423/2021.edcl351

ISBN: 978-65-89955-90-0

Modo de acesso: World Wide Web

Incluir Bibliografia

1. enfermagem-geriátrica 2. enfermagem-oncológica 3. doença-crônica 4. insuficiência-renal-
crônica 5. diálise-renal I. Melo, Laércio Deleon de II. Fernandes, Raquel de Oliveira Martins III.
Caldeira, Eliana Amaro de Carvalho IV. Título

CDU: 613

<https://doi.org/10.37423/2021.edcl351>

O conteúdo dos artigos e sua correção ortográfica são de responsabilidade exclusiva dos seus respectivos autores.

EDITORA CONHECIMENTO LIVRE

Corpo Editorial

Dr. João Luís Ribeiro Ulhôa

Dra. Eyde Cristianne Saraiva-Bonatto

Dr. Anderson Reis de Sousa

MSc. Frederico Celestino Barbosa

MSc. Carlos Eduardo de Oliveira Gontijo

MSc. Plínio Ferreira Pires

Editora Conhecimento Livre

Piracanjuba-GO

2021

CAPÍTULO 1	6
CONTRIBUIÇÕES DA ENFERMAGEM AO CLIENTE RENAL CRÔNICO NA ADESÃO AO TRATAMENTO HEMODIALÍTICO.	
Ana Luiza de Souza e Silva	
Raquel de Oliveira Martins Fernandes	
Laércio Deleon de Melo	
Eliana Amaro de Carvalho Caldeira	
Camila Cristina Gregório de Assis	
Larissa Gracioso Teixeira	
Maiara Luci Silva Costa	
Lara de Oliveira Loures	
Beatriz Machado Cabral	
Giane Aparecida Delfino Neves	
DOI 10.37423/211004871	
 CAPÍTULO 2	 39
PAPEL DA ENFERMAGEM FRENTE A QUALIDADE DE VIDA DA DOENÇA RENAL CRÔNICA EM TRATAMENTO	
Ediléa Maria da Silva	
Eliana Amaro de Carvalho Caldeira	
Raquel de Oliveira Martins Fernandes	
Laércio Deleon de Melo	
Leone Mendes Dias	
Camila Cristina Gregório de Assis	
Juliana de Lima Brandão	
Joana Carvalho Barros	
Josilene Sobreira Rodrigues	
Loiane Aparecida de Freitas Silva	
DOI 10.37423/211004872	
 CAPÍTULO 3	 52
HUMANIZAÇÃO E CUIDADOS ONCOLÓGICOS: SUBSÍDIOS PARA A ATUAÇÃO DE ENFERMAGEM	
Rafael da Silva Ferreira	
Laércio Deleon de Melo	
Eliana Amaro de Carvalho Caldeira	
Raquel de Oliveira Martins Fernandes	
Thaís Vidal de Oliveira	
Bianca Silva Duque Souza	
Paulo Henrique Bezerra da Silva	
Camila Cristina Gregório de Assis	
Osiele de Carvalho Petermann	
Joana Carvalho Barros	
DOI 10.37423/211004873	

CAPÍTULO 4	70
ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE LESÃO POR PRESSÃO	
Daniela Aparecida Zaquini	
Joana da Silva Fernandes	
Nantile Teixeira Moura	
Thaís Almeida Sudré	
Raquel de Oliveira Martins Fernandes	
Eliana Amaro de Carvalho Caldeira	
Laércio Deleon de Melo	
Camila Cristina Gregório de Assis	
Beatriz Machado Cabral	
Nataniel de Sousa Rodrigues	
DOI 10.37423/211004874	
 CAPÍTULO 5	 96
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO IDOSO RENAL CRÔNICO EM TRATAMENTO HEMODIALÍTICO	
Marciana Faria Oliveira	
Laércio Deleon de Melo	
Raquel de Oliveira Martins Fernandes	
Eliana Amaro de Carvalho Caldeira	
Camila Cristina Gregório de Assis	
Fernanda Ferreira Krepker	
Paulo Henrique Bezerra da Silva	
Josilene Sobreira Rodrigues	
Felipe Eduardo Taroco	
Bruno de Souza	
DOI 10.37423/211004883	

Capítulo 1

10.37423/211004871

CONTRIBUIÇÕES DA ENFERMAGEM AO CLIENTE RENAL CRÔNICO NA ADESÃO AO TRATAMENTO HEMODIALÍTICO.

Ana Luiza de Souza e Silva

Faculdade Venda Nova do Imigrante

Raquel de Oliveira Martins Fernandes

Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Brasil.

Laércio Deleon de Melo

Doutorando em Enfermagem pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil.

Eliana Amaro de Carvalho Caldeira

Doutoranda em Saúde Coletiva pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Brasil

Camila Cristina Gregório de Assis

Mestranda em Enfermagem pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Brasil

Larissa Gracioso Teixeira

Graduada pelo Centro Universitário Estácio de Juiz de Fora, Brasil

Maiara Luci Silva Costa

Centro Universitário Estácio de Juiz de Fora, Brasil.

Lara de Oliveira Loures

Pós-Graduada em Urgência e Emergência pelo Centro Universitário União das Américas

Beatriz Machado Cabral

Acadêmica de Enfermagem pelo Centro Universitário Estácio de Juiz de Fora, Brasil.

Giane Aparecida Delfino Neves

Acadêmica de Enfermagem pela Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora-Suprema

Resumo: Introdução: Este estudo apresenta as contribuições do enfermeiro diante do tratamento de hemodiálise que tem como finalidade a manutenção da vida do cliente renal crônico, tornando-se necessário a adaptação destes às modificações do cotidiano e aderência ao tratamento a fim de melhorar a qualidade de vida. **Objetivo:** Evidenciar as contribuições do enfermeiro ao cliente renal crônico na adesão do tratamento hemodialítico. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão bibliográfica da literatura no qual utilizou-se 30 artigos científicos publicados entre os anos de 2008 a 2018, encontrados no acesso eletrônico das bases de dados: Sistema Latino Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (LILACS), Banco de Dados em Enfermagem (BDENF) e na biblioteca eletrônica Scientific Electronic Library Online (SciELO). **Revisão:** A partir da análise dos artigos foram destacadas as contribuições do enfermeiro diante dos fatores potencialmente influenciáveis na adesão do tratamento de hemodiálise, como: aceitação da doença, religião, nível de escolaridade, ambiente de hemodiálise, tratamento prolongado, esquema medicamentoso terapêutico, suporte familiar e confiança no enfermeiro. **Conclusão:** O conhecimento do enfermeiro sobre fatores potencialmente influenciáveis na adesão da terapêutica contribui para implementação de estratégias educativas com a finalidade de desenvolver uma assistência de enfermagem de qualidade, com vistas ao cuidado humanizado e integral, reduzindo o abandono ao tratamento e melhorando a qualidade de vida destes clientes.

1 INTRODUÇÃO

A doença renal crônica (DRC) consiste em uma lesão renal com perda gradual e irreversível, com duração de três meses ou mais, acarretando retenção de substâncias prejudiciais ao organismo comprometendo todo o sistema orgânico (BRANCO; LISBOA, 2010). No estágio mais avançado da DRC pode-se dizer que o cliente apresenta insuficiência renal crônica (IRC) já que os rins não conseguem mais manter suas funções adequadamente, sendo necessário que esses indivíduos sejam submetidos a uma das modalidades da Terapia Renal Substitutiva (TRS) (HIGA et al., 2008).

De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), em julho de 2016, o total estimado de clientes em diálise no Brasil foi de 122.825 pessoas. Este número representa um aumento de 31,5 mil (6,3%) renais crônicos entre os anos de 2011 a 2016. A taxa de prevalência e incidência de clientes em diálise em 2016 foi, respectivamente, de 596 e 193 por milhão da população (pmp).

O crescente aumento de clientes com doença renal crônica em estágio avançado, necessitando de TRS, pode ser explicado pela transição demográfica, em que há o aumento da expectativa de vida e como consequência o envelhecimento populacional. Os idosos são mais susceptíveis a comorbidades como hipertensão arterial sistêmica (HAS) e diabetes mellitus (DM), doenças que são principais fatores de risco para a DRC (KUSUMOTA et al., 2008).

Dentre os fatores de risco para DRC pode-se destacar: glomerulonefrites, doença renal policística, infecções urinárias de repetição, uropatias obstrutivas, malformações congênitas, diabetes mellitus, hipertensão arterial e histórico familiar de lesões renais (FRAZÃO; RAMOS; LIRA, 2011; ARAÚJO et al., 2014).

O cliente com doença renal crônica em estágio avançado necessita de tratamento dialítico, também chamado de terapia renal substitutiva que tem como finalidade filtrar o sangue, eliminando as substâncias tóxicas acumuladas no organismo. É um tratamento que não substitui a função renal por completo, mas alivia os sintomas e oferece ao indivíduo melhor qualidade de vida (RIEGEL; SERTÓRIO; SIRQUEIRA, 2018). Como TRS pode-se citar três modalidades: Hemodiálise (HD), Diálise Peritoneal (DP) e Transplante Renal (Tx) (BRANCO; LISBOA, 2010).

Se tratando de uma doença incurável, os clientes com IRC serão dependentes de uma das modalidades da terapia renal substitutiva por toda a vida. Para a escolha da terapia deve-se considerar a singularidade de cada um observando as características clínicas, sociais e emocionais dos clientes

(FRAZÃO; RAMOS; LIRA, 2011). Dentre as modalidades de TRS, a hemodiálise (92%) é a mais utilizada (SBN, 2017).

A hemodiálise é o tratamento que substitui parcialmente a função renal, realizada por meio da conexão de um acesso vascular do cliente à máquina de hemodiálise, com objetivo de eliminar os solutos tóxicos do organismo. O processo é realizado por uma membrana semipermeável denominada dializador, o procedimento dura em média 4 horas, realizado três vezes por semana, no qual o sangue é purificado pelo circuito extracorpóreo e retorna para cliente livre de resíduos prejudiciais (DEBONE et al., 2017).

A hemodiálise é desgastante, na qual ocorrem modificações no cotidiano causando problemas físicos, psicológicos, sexuais, familiares e sociais (SILVA, A. et al., 2011). O novo estilo de vida gera sentimentos como medo, ansiedade, insegurança, raiva e culpa (FRAZÃO; RAMOS; LIRA, 2011). Sentimentos que causam como consequência solidão, por conta do afastamento social, incapacidade para trabalhar, depressão, pessimismo, desânimo e abandono do tratamento (MACIEL et al., 2015).

O incentivo do enfermeiro ao autocuidado garante ao cliente maior independência, auxiliando na redução do sentimento de impotência, ansiedade, medo e perdas que atuam como estressores e dificultam a adesão ao tratamento (BERTOLIN et al., 2011). A aderência ao tratamento está relacionada com o entendimento entre as orientações educativas dadas pelo enfermeiro com a conduta dos clientes perante essas orientações, a fim de minimizar o desgaste físico, psíquico e social causado pela IRC. Diante desta relação o indivíduo é capaz de se adaptar ao tratamento e melhorar qualidade de vida (BEUTER et al., 2013).

Desta forma, o enfermeiro deve prestar um atendimento humanizado, direcionando a assistência de acordo com individualidade de cada cliente, aplicando o processo de enfermagem que consiste em: coleta dos dados, diagnóstico de enfermagem, planejamento do cuidado, implementação e avaliação das intervenções dos cuidados prestados, a fim de oferecer uma assistência de enfermagem de qualidade, favorecendo a manutenção da vida dos clientes com insuficiência renal crônica e como consequência redução do abandono ao tratamento (DEBONE et al., 2017).

A motivação da escolha do tema surgiu a partir da visita técnica a uma clínica de hemodiálise situada na cidade de Juiz de Fora/ MG, na disciplina de Ensino Clínico IV, Saúde do Adulto e do Idoso, do curso de Enfermagem do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, sendo percebido que a hemodiálise é um tratamento desgastante que gera limitações, mudanças do cotidiano e dependência da vida a uma máquina, torna-se necessário à adaptação as novas condições de vida e a aderência ao tratamento,

Por esse entendimento, pode-se destacar a relevância deste estudo para a prática clínica do enfermeiro na terapia hemodialítica, visto que o enfermeiro está constantemente com o cliente esse pode contribuir na adesão do tratamento e como consequência melhorar a qualidade de vida. Diante do exposto, tem-se como objetivo desse estudo, evidenciar as contribuições do enfermeiro ao cliente renal crônico na adesão do tratamento hemodialítico.

Este estudo trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica, a fim de analisar estudos anteriores sobre o delimitado tema obtendo a discussão entre os autores para atingir o objetivo proposto resultando em uma consideração final (MINAYO, 2010). Para orientar a busca dos estudos na literatura foi elaborada a questão norteadora: Como o enfermeiro contribui para adesão do renal crônico no tratamento de hemodiálise?

O levantamento das publicações foi realizado nos meses de agosto a outubro de 2018, utilizou-se o acesso eletrônico das seguintes bases de dados: Sistema Latino Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (LILACS), Banco de Dados em Enfermagem (*BDenf*) e *Scientific Electronic Library Online (SciELO)*.

Para identificação e seleção das publicações, foram utilizados os descritores em português cadastrados nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Insuficiência renal crônica; Diálise renal; Enfermeiro; Cooperação e Adesão ao Tratamento; Qualidade de vida; Unidades hospitalares de hemodiálise, no qual foram combinados por meio do conector booleano “AND”. Cada combinação, de acordo com a Tabela 1, foi pesquisada igualmente nas bases de dados citadas acima.

Tabela 1 – Combinações dos descritores para busca dos artigos nas bases de dados DeCS

Cooperação e Adesão ao Tratamento “AND” diálise renal “AND” qualidade de vida
Cooperação e Adesão ao Tratamento “AND” diálise renal
Insuficiência renal crônica “AND” diálise renal “AND” enfermeiro
Diálise renal “AND” qualidade de vida “AND” enfermeiro
Unidades hospitalares de hemodiálise “AND” insuficiência renal crônica

Fonte: A autora, 2018.

Os critérios de inclusão definidos para a busca em todas as bases de dados foram: artigos que destacassem a adesão e/ou qualidade de vida do cliente na hemodiálise associados à enfermagem; idioma português; publicados nos últimos 10 anos (2008 a 2018); documentos oficiais como: Diretrizes

Clínicas do Ministério da Saúde e Portarias associadas ao cuidado ao cliente com doença renal crônica; artigos produzidos no Brasil; disponíveis em sua versão integral e gratuita on-line.

Foram excluídos artigos publicados antes de 2008; artigos que não respondiam a questão norteadora da pesquisa; artigos encontrados somente em inglês ou espanhol; indisponíveis na versão completa; produzidos em países estrangeiros; artigos desassociados com a área de enfermagem e artigos que não abordassem os objetivos do tema pesquisado.

Após o cruzamento dos descritores o número total de artigos encontrados nas três bases de dados, de acordo com a Figura 1, foi de 572 artigos. Aplicando os critérios de inclusão e exclusão, desse total, foram selecionados 12 (40%) publicações da base de dados da SciELO, 11 (36,7%) na LILACS seguido pela BDeinf com 7 (23,3%) publicações, totalizando 30 artigos para análise deste estudo.

Figura 1- Diagrama do resultado da aplicação dos critérios de inclusão e exclusão

Fonte: A autora, 2018.

2 DESENVOLVIMENTO

A partir da análise dos dados coletados os 30 artigos selecionados, foram organizados no *Microsoft Office Excel* 2010 por: autores, periódico, ano, título, objetivos e resultados dos estudos, de acordo

com o Quadro 1, para facilitar a análise dos artigos. Os resultados foram interpretados e discutidos a fim de atingir o objetivo proposto deste estudo e contribuir cientificamente para prática clínica da enfermagem.

Quadro 1- Síntese dos artigos selecionados para a revisão bibliográfica

Autores/ Periódico/ano	Título	Objetivos	Resultados
ALVES, L.O.; GUEDES C.C.P.; COSTA B.G. Revista de pesquisa: Cuidado é Fundamental Online 2016	As ações do enfermeiro ao paciente renal crônico: reflexão da assistência no foco da integralidade	Identificar e discutir as ações assistenciais do enfermeiro ao paciente renal crônico em tratamento hemodialítico.	Ampliar o foco de atenção dos serviços de hemodiálise implica em promover um arranjo das práticas de cuidar com sentido a proposta de integralidade, a qual agrega ao conhecimento técnico um olhar sob as dimensões socioculturais das necessidades dos usuários.
ARAÚJO, R.C.S.; SILVA, R.A.R.; BEZERRA, M.X.; ONOFRE, M.S.; ARAÚJO, A.L.V.; SILVA, K.M.P. Revista de pesquisa: Cuidado é Fundamental Online/ 2014	Itinerário terapêutico de pacientes renais crônicos em tratamento dialítico	Conhecer o itinerário terapêutico de pacientes portadores de insuficiência renal crônica (IRC) em diálise.	O estudo evidenciou que o itinerário terapêutico dos pacientes entrevistados foi marcado pela descoberta da doença renal, a busca pela assistência à saúde, o tratamento dialítico e perspectivas futuras. A maioria dos entrevistados foram encaminhados tardiamente para o especialista. O transplante caracterizou-se como a esperança de uma melhor qualidade de vida e da libertação da terapia dialítica.
BERTOLIN, D.C.; PACE, A.E.; KUSUMOTA, L.; HAAS, V. Revista da Escola de Enfermagem da USP/ 2011	Associação entre os modos de enfrentamento e as variáveis sociodemográficas de pessoas em hemodiálise crônica	Verificar a associação entre os modos de enfrentamento das pessoas em hemodiálise crônica e as variáveis sociodemográficas.	Os modos de enfrentamento mais referidos foram enfrentamento focado na emoção; sendo que os escores médios mais elevados foram para as mulheres em todos os fatores e para as pessoas que expuseram ter companheiro, morar com familiares e ter apoio no tratamento; e foram comuns os maiores escores para os fatores confronto, autocontrole e suporte social.
BEUTER, M.; MULLER, L.R.; BRONDANI, C.M.; PAULETT, M.R.; TIMM, A.M.B.; PERLINI, N.M.O.G. Revista de pesquisa: Cuidado é Fundamental Online/ 2013	A adesão de indivíduos em terapia hemodialítica	Analisar os indicadores de adesão relacionados com o perfil sociodemográfico de indivíduos submetidos ao tratamento hemodialítico.	Existem vários fatores envolvidos na adesão ao tratamento hemodialítico agindo de forma interrelacionada. Cada indivíduo segue o tratamento de forma única e singular, influenciado por inúmeros fatores adquiridos ao longo da vida. Essas particularidades condicionam a resposta ao tratamento e devem ser entendidas pelos profissionais de saúde.

BRANCO, J.M.A. LISBOA, M.T.L. Revista de Enfermagem UERJ/ 2010	Adesão de clientes renais crônicos ao tratamento hemodialítico: estratégias de enfermagem	Identificar os fatores que contribuem para a adesão e não adesão dos clientes renais crônicos ao tratamento hemodialítico e avaliar as repercussões quando não ocorre a adesão.	Os depoimentos evidenciaram que situações novas, referentes às alterações na saúde dos clientes, geram medo, expectativas e ansiedade, levando a comportamentos não cooperativos por parte dos mesmos, o que refletirá na adesão ao tratamento, estando relacionada neste estudo, principalmente, às variáveis socioeconômicas.
Autores/ Periódico/ano	Título	Objetivos	Resultados
CORDEIRO, J.A.B.L.; BRASIL, V.V.; SILVA, A.M.T.C.; OLIVEIRA, L.M.A.; ZATTA, L.T.; SILVA, A.C.C.M. Revista Eletrônica de enfermagem/ 2009	Qualidade de vida e tratamento hemodialítico: avaliação do portador de insuficiência renal crônica	Avaliar a QV dos portadores de doença renal crônica em hemodiálise, por meio do instrumento KDQOL-SF.	Os maiores escores foram obtidos nas Dimensões “Estímulo por Parte da Equipe de Diálise”, “Qualidade da Interação Social” e “Função Cognitiva”. As Dimensões “Função Física” e “Papel Profissional” obtiveram os menores escores. A percepção dos indivíduos nas Dimensões do KDQOL-SF foi influenciada pela religião, gênero, idade, tempo de tratamento, presença de companheiro fixo, escolaridade, se residia sozinho e pelo trabalho.
DEBONE, M.C.; PEDRUNCCI, E.S.N.; CANDIDO, M.C.P.; MARQUES, S.; KUSUMOTA, L. Revista Brasileira de Enfermagem/ 2017	Diagnósticos de enfermagem em idosos com doença renal crônica em hemodiálise	Identificar os principais diagnósticos de enfermagem (DEs) em pacientes idosos em tratamento hemodialítico.	Foram elencados sete DEs diferentes, sendo que tanto o Risco de infecção quanto o Volume de líquidos excessivo e Risco de desequilíbrio eletrolítico, em idosos, considerados como os principais DEs. Tais resultados podem colaborar na sistematização da assistência do idoso em tratamento hemodialítico.
EVERLING, J.; GOMES, J.S.; BENETTI, E.R.R.; KIRCHNER, R.M.; BARBOSA, D.A.; STUMM, E.M.F. Avances em Enfermería/ 2016	Eventos associados à hemodiálise e percepções de incômodo com a doença renal	Caracterizar idosos que hemodialisam em uma Unidade Nefrológica para identificar eventos associados à hemodiálise e percepções de incômodo com os efeitos da doença renal.	As complicações referidas pelos idosos foram fraqueza e câibras. A doença renal interfere na alimentação, na capacidade de trabalhar em casa e na aparência pessoal dos idosos. A identificação das permite à equipe que cuida, especialmente à enfermagem, direcionarem ações com o intuito e proporcionar bem-estar e melhorar a qualidade de vida dos idosos em hemodiálise.
FERNANDES, L.P.; MARINS, K.Y.M.; CARMO, H.O.; SILVA, S.R.S.; FARIAS, S.M.C.; SILVA, C.F.G. Enfermería Nefrológica/ 2018.	Necessidades de ações educativas- terapêuticas em um serviço de diálise renal no Brasil	Investigar as dúvidas e/ou necessidades das pessoas com DRC e a existência de um programa educacional em um serviço de HD.	Os participantes revelaram a ausência e/ou conhecimento limitado sobre as questões que envolvem a DRC, identificaram-se através dos discursos, nove necessidades de esclarecimentos, principalmente sobre como se desenvolve, diagnóstico precoce, prevenção e tratamentos. Apontaram que, o profissional de enfermagem foi o precursor na prestação de informação relativo à doença e autocuidado.

FRAZÃO, C.M.F.Q.; RAMOS, V.P.; LIRA, A.L.B. Revista de enfermagem UERJ/ 2011	Qualidade de vida de pacientes submetidos à hemodiálise	Investigar a qualidade de vida de pacientes diagnosticados com a doença renal crônica, em tratamento de hemodiálise, por meio questionário SF-36.	Dos domínios do SF-36, as dimensões da vitalidade e saúde mental, tiveram as médias mais altas e capacidade funcional e aspectos sociais tiveram as mais baixas, foi explicado a baixa QV, devido as sucessivas situações que comprometem o físico e o psicológico, com repercussões pessoais, familiares e sociais.
Autores/ Periódico/ano	Título	Objetivos	Resultados
HIGA, K.; KOST, M.T.; SOARES, D.M.; MORAIS, M.C.; POLINS, B.R.G. Acta Paulista de Enfermagem/ 2008	Qualidade de vida de pacientes portadores de insuficiência renal crônica em tratamento de hemodiálise	Analisar a qualidade de vida de pacientes com insuficiência renal crônica, em tratamento de hemodiálise.	Os melhores resultados obtidos pertencem aos domínios psicológicos e social, relacionados à crença na cura para a insuficiência renal crônica através de um transplante renal, proporcionando aos pacientes, confiança no processo dialítico.
KUSUMOTA, L.; MARQUES, S.; HAAS, V.J.; RODRIGUES, R.A.P. Acta Paulista de Enfermagem/ 2008	Adultos e idosos em hemodiálise: avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde	Avaliar e descrever as diferenças na Qualidade de Vida Relacionada à Saúde (QVRS) desses pacientes.	Foram encontradas diferenças entre os escores médios dos adultos e idosos nas dimensões do KDQOL-SFTM: Funcionamento físico, Função física, emocional, Sobrecarga da doença renal e Estímulo da equipe de diálise. Os resultados podem subsidiar a atuação dos profissionais da saúde para atender as necessidades iminentes, prevenir complicações, enfim almejar uma melhor QVRS.
LINS, S.M.S.B.; LEITE, J.L.; GODOY, S.; TAVARES, J.M.A.; ROCHA, R.G.; SILVA, F.V.C. Acta Paulista de Enfermagem/ 2018	Adesão de portadores de doença renal crônica em hemodiálise ao tratamento estabelecido	Identificar o comportamento de adesão do paciente renal crônico ao regime terapêutico nas suas quatro dimensões: hemodiálise, uso de medicamentos, dieta e restrição hídrica.	O domínio que apresentou maior percentual de pacientes não aderentes foi a hemodiálise, com 32%. Já a medicação foi o domínio com maior percentual de pacientes aderentes, 93,6%. A adesão à terapêutica é um comportamento dinâmico e, como tal, merece monitorização constante.
LOPES, J.M.; FUKUSHIMA, R.L.M.; INOUE, K.; PAVARINI, S.C.L.; ORLANDI, F.S. Acta Paulista de Enfermagem/ 2014	Qualidade de vida relacionada à saúde de pacientes renais crônicos em diálise	Avaliar a qualidade de vida relacionada à saúde de pacientes renais crônicos em diálise.	Qualidade de vida mostrou-se comprometida nos domínios: “Função Física, Situação de Trabalho e Funcionamento Físico”. As melhores percepções ocorreram: “Função Cognitiva, Suporte Social e Função Sexual”. A qualidade de vida apresentou maior comprometimento nos domínios físicos.

MACIEL, C.G.; FERRAZ, R.N.; BORBA, A.K.O.T.; FRAZÃO, I.S.; FRANÇA, V.V. Revista Cogitare Enfermagem/ 2015	Adesão ao tratamento hemodialítico: percepção dos pacientes renais crônicos	Identificar fatores que interferem na adesão ao tratamento hemodialítico na percepção dos pacientes renais crônicos.	Os principais fatores que influenciaram na adesão foram: dificuldade de transporte, déficit de conhecimento sobre a doença, limitações do tratamento, transtornos vivenciados nas sessões de hemodiálise, controle das taxas pelos exames laboratoriais, fé, máquina de hemodiálise e suporte social.
Autores/ Periódico/ano	Título	Objetivos	Resultados
MADEIRO, A.C.; MACHADO, P.D.L.C.; BONFIM, I.M.; BRAQUEAIS, A.R.; LIMA, F.E.T. Acta Paulista de Enfermagem/ 2010	Adesão de portadores de insuficiência renal crônica ao tratamento de hemodiálise	Avaliar a adesão do cliente com insuficiência renal crônica (IRC) ao tratamento de hemodiálise.	Principais dificuldades de adesão: transporte; tempo das sessões; dor da punção da fístula; fatores financeiros; dependência de acompanhantes e déficit de conhecimento. Estratégias de adesão: medo da morte; fé em Deus; esperança de transplante e suporte familiar. Constatou-se que o cliente portador de IRC adere ao tratamento para sobreviver, mas muitos não se adaptam.
MALDANER, C.R.; BEUTER, M.; BRONDANI C.M.; BUDÓ, M.L.D.; PAULETTO, M.R. Revista Gaúcha de Enfermagem/ 2008	Fatores que influenciam a adesão ao tratamento na doença crônica: o doente em terapia hemodialítica.	Identificar os principais fatores que influenciam a adesão ao tratamento na doença crônica	Os resultados indicaram nove fatores que influem na adesão ou não ao tratamento: confiança na equipe, redes de apoio, nível de escolaridade, aceitação da doença, efeito colateral da terapêutica, falta de acesso aos medicamentos, tratamento longo, esquema terapêutico complexo e ausência de sintomas.
OLIVEIRA, A.P.B.; SCHMIDT, D.B.; AMATNEEKS, T.M.; SANTOS, J.C.; CAVALLET, L.H.R.; MICHEL, R.B. Jornal Brasileiro de Nefrologia/ 2016	Qualidade de vida de pacientes em hemodiálise e sua relação com mortalidade, hospitalizações e má adesão ao tratamento.	Compreender a relação entre a QV do paciente em hemodiálise e as taxas de mortalidade, hospitalização e faltas.	As hospitalizações diminuem a QV do questo emocional e físico e as faltas estão diretamente relacionadas ao suporte social e à idade. O estudo buscou, por meio dos dados, levantar subsídios para o trabalho dos aspectos que necessitam de estimulação e adaptação na vida dos pacientes, proporcionando um maior equilíbrio na vida do indivíduo.
PILGER, C., RAMPARI, E.M., WIDMAN, M.A.P.; CARREIRA, L. Revista de Enfermagem da Escola Anna Nery/ 2009	Hemodiálise: seu significado e impacto para a vida do idoso	Compreender o significado da hemodiálise para o idoso renal-crônico e o impacto dessa modalidade terapêutica em sua vida.	Como resultado, obtemos duas categorias: o significado de ser idoso em tratamento hemodialítico; e o impacto da hemodiálise na vida dos idosos. A pesquisa revelou que a hemodiálise afeta o cotidiano dos idosos, pois causa limitações sociais, envolvendo seu trabalho, hábitos alimentares, culturais, além do impacto na saúde mental.

QUINTANA, J.M.; HAMMERSCHMID T, K.S.A.; SANTOS, S.S.C. Revista Eletrônica de enfermagem 2014	Percepções de idosos que vivenciam o cuidado de enfermagem durante a hemodiálise	Identificar percepções de idosos sobre o cuidado de enfermagem em hemodiálise.	Identificou-se ambiguidade de sentimentos vivenciada pelos idosos relacionados ao cuidado de enfermagem, especificamente, à competência profissional e às relações interpessoais no ambiente. A relação entre os dois eixos temáticos emergentes apresenta-se como o cuidado de enfermagem ideal percebido pelos idosos.
Autores/ Periódico/ano	Título	Objetivos	Resultados
RIEGEL, F.; SERTÓRIO, F.C.; SIRQUEIRA, D.S. Revista de Enfermagem da UFPI/ 2018	Intervenções de enfermagem frente às complicações em hemodiálise	Evidenciar na literatura científica as principais complicações que ocorrem durante a hemodiálise e as intervenções de enfermagem implementadas.	Dentre as complicações mais frequentes destacou-se: hipertensão e hipotensão seguidos de câimbras e cefaléia. Este estudo traz para reflexão e sugere a necessidade de capacitar pacientes e equipes de saúde para prevenir, identificar e tratar possíveis complicações que ocorrem durante a sessão de hemodiálise.
ROCHA, M.L.; VIEIRA, S.S.; BRAGA, S.O.; POVEDA, V.B.; SANCHEZ, E.H. Revista de Enfermagem UFPE Online/ 2009	Início do tratamento hemodialítico: qualidade de vida, sentimentos e dificuldades	Conhecer a percepção do paciente renal crônico sobre qualidade de vida	A necessidade de hemodiálise foi recebida com sentimentos diversos como, aceitação, apreensão, tristeza, entre outros. A acolhida e a reciprocidade dos profissionais da saúde, assim como o apoio familiar são fatores que contribuem para uma melhor adesão ao tratamento ajudando-os a conviver com os sentimentos conflitantes, melhorando assim sua qualidade de vida.
ROCHA, R.P.F.; SANTOS, I. Revista de pesquisa: Cuidado é Fundamental Online/ 2009	Necessidades de autocuidado entre clientes com doença renal crônica: Revisão integrativa de literatura	Identificar necessidades de autocuidado de clientes com DRC em tratamento de hemodiálise relacionando-as à sua qualidade de vida.	Mediante análise de conteúdo originaram 4 categorias referentes às alterações: nos aspectos financeiros do cliente; na saúde, essas alterações demandam necessidades de orientação de enfermagem para o autocuidado, pois influenciam a qualidade de vida dos clientes.
RODRIGUES, T.A.; BOTTI, N.C.L. Acta Paulista de Enfermagem/ 2009	Cuidar e o ser cuidado na hemodiálise	Identificar a representação do cuidar na hemodiálise para a equipe de enfermagem e para o cliente em tratamento dialítico.	Foi encontrado a ideia do cuidar para equipe de enfermagem como estabelecimento de relação terapêutica, de confiança e técnica. Para o cliente, ser cuidado significa estabelecer relacionamento interpessoal, aderir ao tratamento e ter sua vida prolongada.

SANTOS, I.; ROCHA, R.P.F.; BERARDINELLI, L.M..M. Revista de Enfermagem da Escola Anna Nery/ 2011	Qualidade de vida de clientes em hemodiálise e necessidades de orientação de enfermagem para o autocuidado	Relacionar necessidades de orientação de enfermagem com a qualidade de vida de clientes com DRC , em hemodiálise, considerando conceitos de autocuidado de Orem.	Aplicando KDQOL-SF, obtiveram-se os menores escores nas dimensões: física; emocional; condição de trabalho; capacidade funcional. Esses resultados foram relacionados aos obtidos com as necessidades de orientação de enfermagem para nutrição, ingestão de líquidos, complicações da hemodiálise, anticoagulação, atividade física, de lazer e associação a grupos, concluindo-se que esses clientes encontram-se no Sistema de Autocuidado totalmente compensatório.
Autores/ Período/ano	Título	Objetivos	Resultados
SILVA, A.S.; SILVEIRA, R.S.; FERNANDES, G.F.M.; LUNARDI, V.L.; BACKES, V.M.S. Revista Brasileira de Enfermagem/ 2011	Percepções e mudanças na qualidade de vida de pacientes submetidos à hemodiálise	Conhecer as percepções dos pacientes com Insuficiência Renal Crônica no tratamento de hemodiálise, identificando os elementos que influenciam a sua qualidade de vida.	Os resultados evidenciaram que os sentimentos iniciais de indignação e negação se modificam, enquanto os pacientes se fortalecem para o enfrentamento da doença. Restrições dos hábitos alimentares e hídricos, incapacidade ou limitação das atividades físicas, profissionais e de lazer foram as principais dificuldades identificadas. O apoio dos familiares e dos profissionais da saúde pode contribuir para a superação dessas limitações e adaptação ao novo estilo de vida.
SILVA, K.A.L.; CARGNIN, M.C.S.; VENTURA, J.; PAULA, S.F.; GROOS, J.V. Revista de Enfermagem UFPE Online/ 2017	Qualidade de vida de pacientes com insuficiência renal em tratamento hemodialítico	Avaliar a qualidade de vida de pessoas com Insuficiência Renal Crônica em tratamento	As dimensões do KDQOL-SF com menores escores foram: função emocional, função física, sobrecarga da doença renal e papel profissional. Maiores escores foram: função social, dor, estímulo da equipe de diálise e função cognitiva. A qualidade de vida dos pacientes apresenta-se comprometida em diversos aspectos avaliados pelo KDQOL-SF.
SILVA, M.C.O.S.; SILVA, K.L.; SILVA, P.A.B.; VAZ, F.M.O. Revista de pesquisa: Cuidado é Fundamental Online/ 2013	A sala de espera como espaço de educação e promoção de saúde à pessoa com insuficiência renal crônica em hemodiálise	Relatar experiência educativa em sala de espera com pacientes renais crônicos.	O projeto sala de espera atingiu pacientes e familiares, possibilitando trocas de informações entre a tríade pacientes/familiares/profissionais de saúde. Entretanto, para a concretização deste projeto houve limitações definidas pela própria instituição, impactando esta realidade na assistência de enfermagem em ato.
SILVA, R.A.R.; SOUZA, V.L.; OLIVEIRA, J.N.; SILVA, B.C.; ROCHA, C.C.T.; HOLANDA, J.R.R. Revista de Enfermagem da Escola Anna Nery/ 2016	Estratégias de enfrentamento utilizadas por pacientes renais crônicos em tratamento hemodialítico	Conhecer as estratégias de enfrentamento utilizadas por pacientes renais crônicos submetidos ao tratamento hemodialítico, frente às dificuldades inerentes à doença.	Categorias que emergiram de estratégias de enfrentamento dos entrevistados foram: apoio familiar; apego à religião/crença; negação e esquiva; e resiliência. A forma para manejar as dificuldades inerentes à doença revelou-se por estratégias de enfrentamento tanto baseadas na emoção, como no problema.

TAKEMOTO, A.Y.; OKUBO, P.; BEDENDO, J.; CARREIRA, L. Revista Gaúcha de Enfermagem/ 2011	Avaliação da qualidade de vida em idosos submetidos ao tratamento hemodialítico	Avaliar a qualidade de vida dos idosos com IRC, submetidos ao tratamento hemodialítico.	Analizando os domínios do questionário, o maior escore diz respeito ao domínio social e o menor, ao domínio físico. Assim, a qualidade de vida desses idosos apresentou-se baixa, com variações de acordo com o domínio analisado.
--	--	--	--

Fonte: A autora, 2018.

Com relação ao ano de publicação dos artigos selecionados, se destacou os anos de 2009 e 2011, ambos com 5 (16,7%) publicações, 2016 com 4 (13,4%), os anos de 2008, 2014

e 2018 com 3 (10%) publicações cada, seguidos dos anos de 2010, 2013, 2017 com 2 (6,6%) publicações cada e o ano de 2015 com 1 (3,4%) das publicações.

Analizando os artigos científicos selecionados nos quais as publicações foram veiculadas, pode-se verificar que a Revista Científica Acta Paulista de Enfermagem se destacou com 6 (20%) das publicações, seguido pela Revista de pesquisa: Cuidado é Fundamental Online com 5 (16,6%), a Revista de Enfermagem da Escola Anna Nery com 3 (10%), a Revista de Enfermagem UFPE Online, Revista De Enfermagem UERJ Online, Revista Gaúcha de Enfermagem, Revista Brasileira de Enfermagem, Revista Eletrônica de enfermagem com 2 (6,6%) das publicações cada periódico e por fim Revista Cogitare Enfermagem, Revista da Escola de Enfermagem da USP, Jornal Brasileiro de Nefrologia, Revista de Enfermagem da UFPI, Avances en Enfermería e Enfermería Nefrológica com 1 (3,4%) das publicações cada.

Quanto ao conteúdo dos artigos, evidenciou-se que o conhecimento produzido congregou temas principais como fatores que influenciam na adesão ao tratamento de hemodiálise, na qualidade de vida e a importância da equipe de enfermagem no autocuidado.

2.1 DOENÇA RENAL CRÔNICA

A doença renal crônica tornou-se um problema de saúde pública e está recebendo cada vez mais atenção devido a sua alta taxa de morbimortalidade (MALDANER et al., 2008). De acordo com dados obtidos pela Sociedade Brasileira de Nefrologia (2017), entre os anos de 2011 a 2016, o número de clientes dialíticos teve um aumento de 31,5 mil e a taxa de mortalidade bruta apresentou-se constante, entre 2012 a 2016, correspondendo a 18,2% de mortes ao ano.

Segundo Kusumota et al. (2008) e Everling et al. (2017) com o avanço de novas tecnologias na área da saúde a expectativa de vida está aumentando e como consequência à população idosa está crescendo, com isso os indivíduos ficam mais vulneráveis ao aparecimento de doenças, principalmente, hipertensão arterial sistêmica e a diabetes mellitus que são doenças de base para DRC.

A DRC se caracteriza pela perda total ou redução da função renal, que perdura por três meses ou mais, ocasionada por uma lesão irreversível do órgão (DEBONE et al., 2017). Na fase mais avançada da DRC o cliente se encontra em insuficiência renal crônica, que se caracteriza pela redução das funções renais como: função tubular, endócrina e capacidade excretória (filtração glomerular) mecanismos que são responsáveis pela excreção de solutos tóxicos gerados pelo organismo como, por exemplo, ureia, creatinina, fosfato, sódio, potássio e líquidos excessivos ocasionando desequilíbrio hidroeletrólítico, provocando alterações nas funções de todo organismo (RIEGEL; SERTÓRIO; SIRQUEIRA, 2018).

Os rins são órgãos que tem a função de manter a homeostase interna corporal a partir da filtração sanguínea e excreção de metabólitos pela urina, mantendo o equilíbrio hidroeletrólítico do organismo, destaca-se também pela função endócrina e relação direta com a regulação da pressão arterial (ALVES; GUEDES; COSTA, 2016).

De acordo com artigo 4º da Portaria nº 389, de 13 de março de 2014, a doença renal crônica é classificada por estágio de acordo com a taxa de filtração glomerular (TFG) (BRASIL, 2014), destacado no Quadro 2.

Quadro 2- Classificação da DRC de acordo com TFG

Estágio	TFG (ml/min/1,73 m ²)
1	≥ 90 na presença de proteinúria e/ou hematúria ou alteração no exame de imagem
2	60 – 89
3a	45 – 59
3b	30 – 44
4	15 – 29
5	< 15

Fonte: Brasil, 2014.

O diagnóstico da DRC é realizado exclusivamente por um médico nefrologista, que avalia alterações do volume urinário, coloração, dor renal, edema e história pregressa. De acordo com a perda da função glomerular o cliente será classificado quanto ao estágio da doença e encaminhado para o melhor tratamento, podendo este ser conservador, por meio de medicação e dieta ou terapia renal

substitutiva composta pela diálise peritoneal, hemodiálise e transplante renal (FRAZÃO; RAMOS; LIRA, 2011).

A DRC é classificada em cinco estágios, no estágio de 1 a 3 é indicado o tratamento conservador com acompanhamento em uma unidade básica de saúde (UBS), nos estágios 4 e

5 (não dialítico) é considerado pré-diálise com acompanhamento por uma equipe multiprofissional mantendo vínculo com a UBS, quando o cliente renal crônico se encontra em estágio 5 dialítico é considerado insuficiente renal crônico terminal necessitando ser submetido a uma das modalidades de terapia renal substitutiva (BRASIL, 2014).

Cientes com doença renal crônica em estágio 5D (dialíticos) serão dependentes de um regime terapêutico complexo que incluem uso de vários medicamentos, controle da alimentação, consumo hídrico restrito e realização de uma das modalidades de TRS. Para manter sua sobrevivência, a aderência a este regime terapêutico é essencial, pois favorece a qualidade de vida desses clientes (LINS et al., 2018).

A doença renal crônica é silenciosa, sendo assim, quando indivíduo apresenta sinais e sintomas à perda da função renal já está comprometida. Como sinais e sintomas da DRC se destacam: edema dos olhos, pés e pernas, cefaleia, náuseas, perda de peso, fadiga, fraqueza, alteração do estado mental, alteração da diurese, aumento da pressão arterial, coloração pálida da pele e hálito urêmico (SILVA, A. et al., 2011; ARAÚJO et al., 2014).

Em meio aos fatores de risco associadas à DRC os mais predominantes nos estudos brasileiros analisados foram HAS seguida da DM (ROCHA et al., 2009; FRAZÃO; RAMOS; LIRA, 2011; BEUTER et al., 2013; LOPES et al., 2014) resultados semelhantes foram obtidos pela Sociedade Brasileira de Nefrologia (2017). Essas doenças crônicas quando não controladas, podem causar um desequilíbrio em todo o organismo e sobrecarregar a função renal, causando falência dos rins (FRAZÃO; RAMOS, LIRA, 2011).

Neste contexto pode-se destacar a importância do enfermeiro na atenção básica, frente ações assistenciais de promoção de saúde e prevenção de doenças detectando precocemente alterações renais e até mesmo evitando o desenvolvimento da doença a partir da conscientização da prevenção, por meio do controle dos fatores de risco como: estimular atividade física, alimentação saudável e acompanhamento de hipertensos e diabéticos com controle glicêmico e de pressão arterial (SILVA, A. et al., 2011).

No estudo de Araújo et al. (2014) realizado na clínica de diálise em Natal/RN foi percebido que a grande maioria dos clientes entrevistados dependentes de diálise, não fizeram acompanhamento na atenção básica, pois não apresentaram sinais e sintomas e os que realizaram acompanhamento não tiveram resolutividade, devido ao tratamento inadequado das doenças de base como HAS e DM, além da detecção e encaminhamento tardio da doença ao especialista.

Os mesmos autores do estudo citado anteriormente evidenciaram que existem falhas nas ações da atenção básica a saúde quanto à busca ativa de indivíduos com fatores de riscos para DRC e controle desses, assim como, encaminhamento tardio para o médico nefrologista. Devido a isso, desencadeia um quadro renal avançado sendo o cliente encaminhado com urgência para unidades hospitalares onde descobre em fase avançada a doença renal devendo iniciar um tratamento de diálise de urgência (ARAÚJO et al., 2014).

Segundo Silva, A. et al. (2011) e Beuter et al. (2013), uma estratégia para reduzir os encaminhamentos dos clientes renais crônicos para atenção de saúde de alta complexidade é investir nas ações primárias conscientizando a população quanto à importância da promoção da saúde e prevenção de doenças.

O investimento nas ações de atenção primária, promoção da saúde e prevenção de doenças, diminuiria os gastos públicos com o tratamento de alta complexidade da hemodiálise, visto que é uma doença que gera gastos de saúde pública, em razão da alta tecnologia, além de evitar as consequências físicas, psicológicas e sociais que são causadas pelo tratamento, proporcionando a população melhor qualidade de vida (SILVA, A. et al., 2011).

2.2 TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA

Quando a capacidade excretora renal está diminuída há um acúmulo de substâncias tóxicas no organismo, sendo necessária uma intervenção denominada de terapia renal substitutiva, um tratamento que não visa à cura, mas tem a finalidade de aliviar os sintomas urêmicos, consistindo em um procedimento que exerce parcialmente a função renal, podendo ser dividida em: diálise peritoneal, hemodiálise e transplante renal (SILVA, K. et al., 2017).

A atenção à saúde na alta complexidade, ao qual são submetidos os clientes em diálise, tem como objetivo aumentar a sobrevida, reduzir a morbidade e melhorar a qualidade de vida por meio da garantia do acesso e qualidade do tratamento, além de assegurar equidade na entrada da lista de espera para o transplante renal, para que esses objetivos sejam alcançados é preciso comprometimento da adesão do cliente com o tratamento (ARAÚJO et al., 2014).

Dentre as modalidades de TRS mais utilizadas encontra-se a hemodiálise, a qual os usuários serão dependentes por toda vida ou até serem submetidos a um transplante renal bem sucedido (MADEIRO et al., 2010). De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia (2017), 92% das pessoas com IRC estavam em hemodiálise, 8% em diálise peritoneal e 29.268 (24%) pessoas estavam em fila de espera para transplante.

A hemodiálise é o procedimento que substitui, parcialmente, a função renal, removendo substâncias prejudiciais acumuladas no sangue como, por exemplo: ureia, creatinina, líquido excessivo, potássio e fosfato (ROCHA et al., 2009). Segundo Frazão, Ramos e Lira (2011), a hemodiálise em épocas passadas tinha como propósito apenas evitar a morte por excesso de líquido, sódio e potássio no organismo, com o avanço da tecnologia, nos dias atuais, além de reverter sintomas urêmicos, tem como objetivo reduzir as complicações causadas pela falência renal, diminuir o risco de mortalidade e melhorar a qualidade de vida reintegrando o cliente socialmente.

Para se conectar a máquina e iniciar a hemodiálise, o cliente deve ter um acesso vascular, seja uma fístula arteriovenosa (FAV), cateter duplo lúmen (CDL) ou enxerto. Como o procedimento é extracorpóreo o sangue é impulsionado por uma bomba em que passa por uma membrana semipermeável denominada dialisador, que interage com o dialisato, solução da diálise, responsável por eliminar as substâncias acumuladas no sangue que é filtrado e retorna para o cliente em sessões com duração média de quatro horas realizadas três vezes na semana (DEBONE et al., 2017).

O acesso vascular é de extrema importância, pois na ausência deste é impossível realizar a sessão de hemodiálise, levando o indivíduo a óbito. O cateter duplo lúmen é um acesso de uso imediato do cliente a máquina, podendo ser puncionado na veia subclávia, femoral ou jugular interna, esse tipo de acesso é mais susceptível a infecções devido a sua exposição. A FAV é a conexão de uma veia com uma artéria, necessitando de tempo para maturação que dura em torno de dois a três meses, este acesso tem maior vida útil e é o mais indicado para clientes em hemodiálise (RIEGEL; SERTÓRIO; SIRQUEIRA, 2018).

Durante as sessões de hemodiálise podem ocorrer complicações como: hipotensão arterial, câimbras, náuseas, vômitos, prurido, dor lombar e no peito (RIEGEL; SERTÓRIO; SIRQUEIRA, 2018). Além das complicações, clientes com insuficiência renal crônica sofrem diversas mudanças no cotidiano, que geram frustrações e limitações por conta das restrições alimentares e hídricas, alterações da imagem corporal, diminuição da atividade física, perda da autonomia, isolamento social, perda do emprego, dependência da previdência social afetando diretamente a qualidade de vida (PILGER et al., 2010).

Estudos com resultados semelhantes foram analisados e evidenciaram que a capacidade funcional dos clientes renais crônicos, que compreende atividades realizadas no cotidiano, é o principal fator da interferência negativa na qualidade de vida, devido às limitações que a doença lhes impõe (CORDEIRO et al., 2009; FRAZÃO; RAMOS; LIRA, 2011; SANTOS; ROCHA; BERARDINELLI, 2011; TAKEMOTO et al., 2011; LOPES et al.,

2014; SILVA, K. et al., 2017). Isto pode ser justificado, pois após sessões de hemodiálise podem surgir sintomas como: cansaço, mal-estar, fadiga, fraqueza, náuseas, câimbras e dor, dificultando a realização das atividades diárias (KUSUMOTA et al., 2009).

De acordo com Maciel et al. (2015) e Alves, Guedes e Costa (2016) pela hemodiálise ser um tratamento que envolve mudanças no estilo de vida pode-se destacar não apenas o impacto físico na qualidade de vida como também os aspectos psicossociais. Assim como afirma Rocha et al. (2009, p. 224) “[...] Há incidência de mal estar emocional em decorrência de mal estar físico [...]”. Por este entendimento, um problema não pode ser considerado isoladamente, devendo o indivíduo ser tratado na sua integralidade pela equipe de enfermagem (ALVES; GUEDES; COSTA, 2016).

Diante do exposto, fica evidente a importância da assistência integral do enfermeiro ao cliente em hemodiálise abrangendo os aspectos físicos, psíquicos e sociais, além das ações educativas, incentivando o autocuidado com o acesso vascular, orientando sobre alimentação, atividade física, estimulando a autonomia do cliente, ajudando-o a conviver com as dificuldades impostas pela doença e como consequência há a redução das complicações, da mortalidade e melhora da qualidade de vida (ALVES; GUEDES; COSTA, 2016).

2.3 IMPORTÂNCIA DO ENFERMEIRO NA ADEÇÃO AO TRATAMENTO

De acordo com o artigo 19 da Portaria nº 389, de 13 de março de 2014, a equipe de enfermeiros da assistência de alta complexidade que oferta hemodiálise é constituída por um enfermeiro especialista em nefrologia para cada 35 clientes, em cada turno, e um enfermeiro responsável técnico.

A hemodiálise é um tratamento desgastante tanto em relação ao físico quanto ao emocional, visto que o tempo gasto com o procedimento causa alterações do cotidiano do indivíduo e toda sua vida está voltada para o tratamento, como: consultas médicas, frequência na unidade de hemodiálise, restrições hídricas e alimentares, além de impossibilidade de execução de atividades do cotidiano que exijam muito esforço, dificultando o desempenho normal das atividades diárias e consequente rompimento do convívio social (BRANCO; LISBOA, 2010). Desencadeando sentimentos negativos como

angústia, pânico, depressão, ansiedade, desânimo, dependência e medo da morte (SILVA, A. et al., 2011).

Devido às alterações do cotidiano, o cliente renal crônico sofre impacto biopsicossocial que interfere na adesão ao tratamento, nas ações de autocuidado, nas relações sociais entre familiares e amigos (SILVA, M. et al., 2013). Neste contexto, o enfermeiro exerce funções administrativas, assistenciais e educativas que se mostra importante na adesão do cliente com insuficiência renal crônica ao tratamento, as ações educativas devem ser realizadas por meio de uma comunicação compreensível e simples para que haja a assimilação das orientações dadas, visando a melhor qualidade de vida para os clientes (FERNANDES et al., 2018).

O modo de enfrentar a doença renal crônica assim como os fatores que interferem na adesão ao tratamento deve ser visto pelo profissional enfermeiro com empatia e sensibilidade para que possam atuar junto ao cliente utilizando estratégias para aceitação e aderência ao tratamento (ROCHA et al., 2009; MADEIRO et al., 2010). A educação em saúde fornecida pelo enfermeiro ajuda a diminuir os estressores que possam ocasionar o abandono da terapia, melhora o autocuidado e autonomia, diminui intercorrências causadas pela terapêutica, favorecendo a qualidade de vida desses indivíduos (ROCHA; SANTOS, 2009).

Os clientes renais crônicos se tornam desanimados e desacreditados frente ao tratamento, seja por falta de orientação ou por negligência, ocasionando o abandono da terapêutica. Neste cenário, o enfermeiro entra como incentivador e estimulador das capacidades que são prejudicadas mediante a doença, com a finalidade dos clientes se adaptarem, assumindo o controle da doença e do tratamento (FRAZÃO; RAMOS; LIRA, 2011).

A adesão ao tratamento depende de como o indivíduo se relaciona com a doença. A aceitação e compreensão das orientações dadas pelo enfermeiro, assim como, a adaptação às novas condições que a doença lhes impõe são de extrema importância para manutenção da vida destes clientes, objetivando minimizar as complicações da doença, promover a autonomia e melhorar a qualidade de vida (MACIEL et al., 2015).

Cada cliente tem uma percepção diferente sobre a doença e como esta impacta em sua vida, sendo assim a aderência ou abandono do tratamento, depende das particularidades de cada indivíduo, do seu enfrentamento diante da doença, da importância da vida, do apoio familiar e de amigos e do relacionamento com a equipe de saúde (BRANCO; LISBOA, 2009). O conhecimento e compreensão dessas particularidades contribuem para que a equipe de saúde desenvolva uma assistência

continuada, segura e de qualidade com vista ao cuidado humanizado e integral que contribui para o alcance da adesão a terapêutica (BEUTER et al., 2013).

Para o estabelecimento de uma assistência de qualidade, o enfermeiro deve aplicar consultas de enfermagem com base na humanização do cuidado, tratando o indivíduo como um todo. A consulta de enfermagem tem grande importância na adesão do cliente ao tratamento, assim como destacaram Lins et al. (2018), que clientes diabéticos que realizaram três consultas de enfermagem, por três meses, tiveram um aumento na taxa de adesão passando de 83,87% para 96,78%, resultado semelhante com clientes com insuficiência cardíaca, indicando que o aumento na taxa de aderência ao tratamento se deu por conta da consulta de enfermagem que é atividade privativa do enfermeiro.

De acordo com Alves, Guedes e Costa (2016) o cuidado de enfermagem ao cliente em hemodiálise envolve: acolhimento, ações educativas de autocuidado, avaliação do cuidar frente ao tratamento, auxílio no enfrentamento da rotina desestimulante, inserção social e técnicas especializadas direcionadas para as ações humanas permitindo o estabelecimento de um vínculo terapêutico entre cliente e equipe, proporcionando uma assistência integral.

Com a análise dos artigos foi percebido fatores potencialmente influenciáveis na adesão ao tratamento de hemodiálise como: aceitação da doença, religião, nível de escolaridade, ambiente de hemodiálise, tratamento prolongado, esquema medicamentoso terapêutico, suporte familiar e confiança na equipe de saúde.

2.3.1 ACEITAÇÃO DA DOENÇA

Ao ser diagnosticado com IRC e encaminhado para o tratamento de hemodiálise os clientes sofrem um conflito interno de vários sentimentos. De acordo com Silva, R. et al. (2016), os sentimentos mais frequentes são negação, raiva, barganha, depressão, isolamento e aceitação, a maneira pela qual esses sentimentos perduram dependem de como cada indivíduo lida com as situações estressantes.

No estudo de Madeiro et al. (2010), realizado em uma unidade de hemodiálise situado na cidade de Fortaleza/CE, evidenciou diversas reações diante do diagnóstico, entre elas estavam o medo e a rejeição ao tratamento, algumas pessoas negaram o seu estado patológico por sentirem medo e outras negavam desconhecimento da doença.

Resultado semelhante, ao mencionado pelo autor acima, foi encontrado no estudo realizado no Centro de Nefrologia e Diálise de um hospital localizado na cidade do Rio Grande/RS constatando que após a descoberta da doença os clientes renais crônicos apresentaram diferentes reações frente ao

tratamento. No primeiro momento sentiram medo pelo desconhecimento, mas com apoio da equipe de saúde passam a entender a patologia, os agravos que possam ocorrer com a não aderência ao tratamento e diante disso apresentaram melhor aceitação (SILVA, A. et al., 2011).

Na tentativa de aceitar a doença, o indivíduo busca mecanismos de enfrentamento, como por exemplo, a negação, agindo como se a doença não interferisse em sua vida, deixando de buscar ajuda para saúde prejudicando a qualidade de vida (MALDANER et al., 2008).

O modo como cada indivíduo enfrenta a doença é individual, alguns se mostram interessados em conhecer e enfrentar a doença, outros focam a enfermidade na emoção e no sofrimento, dificultando a aderência ao tratamento, por isso deve ser levado em consideração pelos enfermeiros para a realização da assistência do cuidar: às crenças, cultura, personalidade e capacidade de tolerar as mudanças de cada cliente (FERNANDES et al., 2018).

Rocha et al. (2009), destacaram que o enfermeiro deve prestar uma assistência integral, considerando tanto os aspectos físicos quanto os sentimentos dos clientes, pois um suporte emocional favorece o enfrentamento da doença, além do acolhimento que possibilita um relacionamento entre cliente e profissional, podendo contribuir para a aceitação da doença e consequente adesão ao tratamento.

2.3.2 NÍVEL DE ESCOLARIDADE

Segundo Frazão, Ramos e Lira (2011) e Maciel et al. (2015), a baixa escolaridade influencia a adesão ao tratamento, pois afirmam que há dificuldades dos clientes em compreenderem as orientações dadas pela equipe de saúde influenciando negativamente no autocuidado, no entendimento da patologia e seus agravantes, além da dificuldade de compreender a importância do controle das principais doenças de bases para a DRC.

Estudos analisados evidenciaram que o nível de escolaridade tem influência sobre a adesão da terapia, quanto mais baixo o nível de escolaridade maior é abandono do tratamento (MALDANER et al., 2008; ROCHA et al., 2009; MADEIRO et al., 2010; FRAZÃO; RAMOS; LIRA, 2011; BEUTER et al., 2013; MACIEL et al., 2015).

No entanto, segundo Beuter et al. (2013), a baixa escolaridade isoladamente não é um fator que leva ao indivíduo adoecer, mas o maior nível de escolaridade proporciona um melhor entendimento sobre a doença e assimilação das orientações dadas. Além de assimilar as orientações, o alto grau de instrução educacional está relacionado com aspectos emocionais permitindo ao cliente melhor

adaptação as novas condições de vida que a hemodiálise lhes proporciona (ROCHA et al., 2009; MADEIRO et al., 2010; SILVA, M. et al., 2013).

De acordo com Maldaner et al. (2008) independente do grau de escolaridade, o enfermeiro deve exercer seu papel de educador em todas as fases do tratamento de forma contínua e dinâmica devendo respeitar o nível sociocultural de cada um, utilizando uma linguagem simples para o melhor entendimento da sua enfermidade e melhor adesão deste ao tratamento.

2.3.3 RELIGIÃO

Alguns autores (CORDEIRO et al., 2009; MADEIRO et al., 2010; BEUTER et al., 2013; ARAÚJO et al., 2014; MACIEL et al., 2015; SILVA, R. et al., 2016) por meio de estudos afirmaram que a fé se mostrou como um facilitador no enfrentamento das dificuldades da doença renal crônica beneficiando a adesão ao tratamento. O aparecimento de doenças reforça a busca por Deus por meio da crença e da religiosidade servindo de conforto e esperança tanto para os clientes de hemodiálise quanto para seus familiares, sustentando a continuidade da terapêutica (BEUTER et al., 2013).

A fé e a crença em um ser divino são estratégias utilizadas pelos clientes para encarar os eventos adversos da doença de maneira positiva, evitando o abandono do tratamento, beneficiando a adaptação às mudanças ocasionadas pela terapia e favorecendo a qualidade de vida (MADEIRO et al., 2010; ARAÚJO et al., 2014).

O enfermeiro deve observar o impacto que a espiritualidade e religião causam na vida dos enfermos e familiares, considerando-as no plano de assistência de cuidados terapêuticos, valorizando as crenças de cada um, respeitando as questões éticas relacionadas às doutrinas religiosas, visto que a fé, religião e a espiritualidade são estímulos que encorajam o melhor enfrentamento da doença contribuindo para a adesão e reabilitação do cliente renal crônico ao tratamento (MACIEL et al., 2015).

Durante a assistência de enfermagem deve-se observar sentimentos depressivos, de desesperança e desânimo dos clientes diante ao tratamento, avaliar as práticas religiosas, visto que cada um tem uma forma única de lidar com a doença podendo esta ser vista de forma negativa e interferir na adesão do tratamento, desta forma, o enfermeiro deve oferecer apoio para prevenir atitudes negativas frente a doença e as práticas religiosas consideradas saudáveis devem ser encorajadas e reforçadas, além de implementadas na assistência do cuidar para a promoção da saúde (SILVA, R. et al., 2016).

O enfrentamento religioso como: frequentar grupos de oração, igrejas, cultos, garantem aos enfermos maiores capacidades de adaptação à nova situação de vida a ser encarada (SILVA, R. et al., 2016). Além

de destacar a importância da religião para saúde mental, pois o apego a um ser divino concede forças para o enfrentamento da doença, evitando o sentimento de solidão e desamparo, proporcionando a redução da ansiedade, depressão e do estresse permitindo uma melhora da qualidade de vida e melhor adesão ao tratamento (MADEIRO et al., 2009; FRAZÃO; RAMOS; LIRA, 2011).

2.3.4 AMBIENTE DE HEMODIÁLISE

O cotidiano do cliente com insuficiência renal crônica após o início da hemodiálise passa a ser monótono e com muitas restrições, acarretando em sentimento de incapacidade frente a sua própria vida, necessitando de estímulo e incentivo para prosseguir o tratamento (TAKEMOTO et al., 2011).

Na sala de hemodiálise não há grande rotatividade dos clientes, o que permite que esses estejam em contato direto e constante com a equipe de enfermagem e entre si (SILVA,

A. et al., 2011). Diante do exposto, é destacada a importância da sala de hemodiálise, onde serão realizadas as trocas de informações da equipe de saúde com os clientes e a comunicação desses, entre si, favorecendo as trocas de experiências que contribuem para o compartilhamento de sentimentos, auxiliando no enfrentamento da doença e potencializando a aderência terapêutica (MACIEL et al., 2015).

Estudo de Rocha et al. (2009), destacaram a recepção no ambiente de hemodiálise como um dos meios de adesão ao tratamento, indicando que o acolhimento feito pelos enfermeiros minimiza a sobrecarga negativa na sala da terapia, pois estes passam a serem vistos como pessoas comprometidas no cuidar, possibilitando aos clientes a encarar a doença de uma forma mais leve estabelecendo um vínculo de amizade com a equipe, minimizando o estresse de frequentar a clínica três vezes na semana oferecendo-lhes um maior conforto nas salas de hemodiálise durante as sessões.

Segundo Alves, Guedes e Costa (2016), durante a hemodiálise o cliente permanece um longo período de tempo sem qualquer atividade na unidade de nefrologia, visto que o enfermeiro passa a maior parte do tempo com os esses clientes na sala de hemodiálise, este profissional deve elaborar estratégias de abordagem a fim de melhorar o processo do cuidar, sugerindo atividades de interação entre os clientes e estes com a equipe de saúde por meio, por exemplo, de salas de espera, conversas individuais e planejamento de cartilha com informações sobre a doença e seus agravos. Segundo Lins et al. (2018), estas estratégias reforçam a importância da adesão ao tratamento conscientizando os clientes sobre a sua participação ativa e responsabilidade na terapêutica.

A sala de espera no ambiente de hemodiálise é uma estratégia para o desenvolvimento das ações educativas do enfermeiro com os clientes, por meio do acolhimento dos usuários permitindo a escuta terapêutica, a transmissão de orientações sobre a doença e redução dos sentimentos que induzem a não aderência ao tratamento (SILVA, M. et al., 2013).

No estudo de Alves, Guedes e Costa (2016), a música no ambiente de hemodiálise foi destacada como estratégia para ocupar o indivíduo no tempo que está realizando o tratamento, proporcionando um ambiente mais confortável. Segundo Silva, M. et al. (2013), tal estratégia foi capaz de acalmar os clientes e diverti-los, diminuindo a ansiedade e as complicações que possam ocorrer durante a hemodiálise, fazendo-os distanciar da realidade do ambiente hospitalar.

2.3.5 ESQUEMA MEDICAMENTOSO TERAPÊUTICO

O tratamento da doença renal está associado ao elevado número de medicamentos diários, visto que a DRC está normalmente relacionada a outras comorbidades como hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus, estas que demandam também controle medicamentoso, repercute em grandes quantidades de medicações por dia, podendo causar como consequência o esquecimento de alguns medicamentos e efeitos adversos ao organismo, refletindo na baixa aderência ao tratamento (MALDANER et al., 2008).

O regime terapêutico medicamentoso varia de acordo com as comorbidades e com a gravidade da doença de cada um, e inclui uma quantidade de fármacos consideravelmente alta como: quelantes de fósforo, vitaminas, anti-hipertensivos, insulina, eritropoetina humana recombinante, diuréticos, estatinas, entre outros (BEUTER et al., 2013). A quantidade de medicamentos e variedades assim como os efeitos colaterais de alguns medicamentos, pouco toleráveis, dificulta a adesão do tratamento (MALDANER et al., 2008).

Segundo Madeiro et al. (2009), o enfermeiro é educador e é responsável pela transmissão de conhecimentos sobre a doença aos clientes e seus familiares a fim de orientá-los para melhorar o convívio com a doença renal crônica e aderir ao tratamento de hemodiálise. O cliente precisa ser o protagonista das ações que visam melhorar a qualidade de vida e para isso o enfermeiro oferece as informações necessárias e corretas incentivando o tratamento permitindo ao cliente o poder de decidir se irá seguir ou não as orientações. Esse deve ser conscientizado desde o início do tratamento e estar ciente que a negligência a terapia acarretará em complicações e agravos da doença.

Diante deste fato, pode-se destacar a importância do enfermeiro nas ações educativas quanto ao uso correto dos medicamentos, orientando sobre horários, incompatibilidade de fármacos, reações adversas que possam vir a ocorrer. A dificuldade de compreensão da importância do uso desses medicamentos acarretará em não adesão adequada do tratamento, podendo surtir efeitos negativos e aparecimento de agravos e novas doenças, podendo levar este ao óbito (SANTOS; ROCHA; BERARDINELLI, 2011).

2.3.6 TRATAMENTO PROLONGADO

O indivíduo com insuficiência renal crônica se submete a um tratamento doloroso, desgastante que dura por toda a vida ou até serem submetidos a um transplante renal. A hemodiálise ocasiona alterações do cotidiano, comprometendo a liberdade e independência do cliente que necessita de uma máquina para preservar sua vida e requer adaptação e apoio da família e amigos para adesão do tratamento (MALDANER et al., 2008).

De acordo com Cordeiro et al. (2009), quanto maior o tempo de permanência na hemodiálise, maiores são as estratégias criadas para enfrentar a doença e o tratamento. Resultado semelhante encontrado no estudo (FRAZÃO; RAMOS; LIRA, 2011), realizado na unidade de hemodiálise localizado em Recife, destacaram que com o passar do tempo do tratamento, o cliente se torna mais conformado com a doença, suportando melhor a rotina da hemodiálise, porém os aspectos emocionais e sociais continuam comprometidos. Já os clientes com pouco tempo de tratamento obtiveram maior resistência quanto à terapêutica, apresentando desconforto, irritação e intolerância.

Segundo Silva, A. et al. (2011), no primeiro momento, o diagnóstico da insuficiência renal crônica e o início do tratamento de hemodiálise podem ser encarados com muita dificuldade ocorrendo sofrimento físico, emocional e social nos clientes, mas percebeu-se que esses sentimentos se modificavam ao longo do tratamento, desaparecendo, tornando as sessões de hemodiálise menos angustiantes e a terapia sendo compreendido como essencial para a vida dos clientes renais crônicos.

Conforme Beuter et al. (2008) e Madeiro et al. (2010), o longo período de tratamento é o fator de agravamento de comorbidades associadas à DRC, apresentando diversas complicações relacionadas à perda da função renal, alterações de metabolismo, complicações no acesso vascular, desnutrição, anemia e infecções, essas complicações podem influenciar na qualidade de vida independente da adesão ao tratamento.

Após um longo tratamento, os clientes passam a ver a hemodiálise como significado de sobrevivência para obtenção do seu bem-estar, enfrentando a doença como essencial para manter-se vivo (ARAÚJO et al., 2014). Para prolongar a vida é fundamental adaptação às novas condições com a execução correta das orientações de autocuidado dadas pelo enfermeiro para obter uma adesão efetiva do tratamento (FRAZÃO; RAMOS; LIRA, 2011).

2.3.7 SUPORTE FAMILIAR

O apoio familiar é fundamental, pois ajuda o cliente renal crônico em tratamento de hemodiálise a enfrentar os medos, já que a família e amigos são o suporte para o enfrentamento de dificuldades, sendo o alicerce da vida significando proteção. O suporte familiar é essencial para favorecer a melhor aceitação da doença e do tratamento (LOPES et al., 2014).

Estudos (KUSUMOTO et al., 2008; MADEIRO et al., 2010; FRAZÃO; RAMOS; LIRA, 2011; TAKEMOTO et al., 2011; LOPES et al., 2014; MACIEL et al., 2015; SILVA,

R. et al., 2016; OLIVEIRA et al., 2016; SILVA, K et al., 2017) destacaram que a maioria dos clientes em hemodiálise tem companheiros fixos ou são casados, evidenciando a importância deste apoio familiar que contribui no auxílio ao cuidado do cliente renal crônico, favorecendo na adesão do tratamento.

Maldaner et al. (2008), destacaram que o apoio dos familiares aos clientes renais crônicos ajuda no enfrentamento das dificuldades ocasionadas pela doença, pois estes necessitam de cuidados, além da clínica de hemodiálise, que são realizados pelos familiares ou cuidadores em domicílio. A aderência é responsabilidade do cliente, no entanto, a família, amigos e o enfermeiro necessitam estar envolvidos neste processo, pois esses encorajam ao seguimento do tratamento e no enfrentamento dos sintomas, favorecendo a qualidade de vida.

No estudo de Oliveira et al. (2016), observou-se que durante uma entrevista quando questionados sobre a rotina de hemodiálise, os clientes em tratamento afirmaram que era o mais normal possível e que a presença da família diante desse processo era de extrema importância para encarar a doença de forma positiva, sendo a fonte para o enfrentamento das situações impostas pela doença.

A rotina do cliente em tratamento de hemodiálise é desestimulante, devido às adaptações físicas, psicológicas e sociais ocasionadas pela doença ocorrem problemas como depressão, ansiedade, isolamento social, desemprego e abandono do tratamento e é neste cenário que família e o enfermeiro atuam incentivando, encorajando e resgatando a esperança, autoestima, a inserção social

e a preservação da vida durante o tratamento auxiliando no estabelecimento de sentimentos positivos para continuidade da terapêutica (MACIEL et al., 2015).

O enfermeiro deve envolver a família do cliente em terapia hemodialítica, formando o suporte de apoio desses indivíduos, a família possibilitará no auxílio de identificação de problemas relacionados à doença do seu familiar contribuindo para uma assistência de enfermagem voltada para as dificuldades enfrentadas pelo cliente, possibilitando a elaboração de intervenções para a adesão ao tratamento (MALDANER et al., 2008).

2.3.8 CONFIANÇA NO ENFERMEIRO

Sabendo que cada indivíduo encara a doença de uma forma diferente, é fundamental que o enfermeiro tenha sensibilidade e empatia para reconhecer os problemas enfrentados pelos clientes para auxiliar na elaboração de intervenções que possibilitem melhor aderência ao tratamento e como resultado melhor qualidade de vida (MADEIRO et al., 2011). A hemodiálise reflete de forma direta na qualidade de vida dos renais crônicos necessitando do suporte da equipe multiprofissional na tentativa de minimizar os agravantes (OLIVEIRA et al., 2016).

O enfermeiro e o cliente tem convívio direto e constante pela baixa rotatividade na sala de hemodiálise proporcionando a formação de um vínculo afetivo com os profissionais, porém deve-se tomar cuidado para que esse vínculo não se torne uma relação de dependência e sim um vínculo para melhorar à terapêutica que irá refletir na saúde emocional, favorecendo a qualidade de vida dos clientes em hemodiálise (SANTOS; ROCHA; BERARDINELLI, 2011).

Assim como evidenciado em um estudo quantitativo, realizado em uma clínica renal na região noroeste do Rio Grande do Sul, no qual foi avaliada a qualidade de vida dos clientes com insuficiência renal crônica em terapia hemodialítica pelo instrumento Kidney Disease and Quality of Life – Short Form (KDQOL-SF™ 1.3) e um dos melhores escores apresentados foi o estímulo da equipe de diálise, que se destacou pela assistência de qualidade e pela construção do vínculo com o cliente, possibilitando o reconhecimento de situações estressantes que possam vir a ocasionar abandono do tratamento (SILVA, K. et al., 2017).

Para alcançar a efetividade na assistência dos cuidados de enfermagem, o enfermeiro deverá trabalhar com dedicação, responsabilidade, interação, contato, escuta, respeito, empatia e apoio ao cliente, estabelecendo relações de amizade e confiança. Por frequentar, em média três vezes por semana, a clínica de hemodiálise é vista pelo cliente como uma segunda casa e os profissionais como uma

segunda família e como resultado o enfermeiro passa a ser visto como um amigo de confiança. Diante disso, o cliente se sente confortável para relatar seus medos, ideias, problemas emocionais, sociais e dificuldades enfrentadas, favorecendo a terapêutica e melhorando a adesão ao tratamento (QUINTANA; HAMMERSCHMIDT; SANTOS, 2014).

Destacados por Maciel et al. (2015), a escuta terapêutica e o diálogo estabelecido entre profissional e cliente permite o compartilhamento de dúvidas, sentimentos negativos que possam interferir no tratamento beneficiando a assistência do cuidar e desta forma, o enfermeiro é capaz de buscar estratégias que possam minimizar os fatores que interferem no tratamento oferecendo ao cliente melhor qualidade de vida.

De acordo com Alves, Guedes e Costa (2016) o cuidado de enfermagem ao cliente em hemodiálise envolve: acolhimento, técnicas especializadas, autocuidado, avaliação do tratamento, relação interpessoal, auxílio ao enfrentamento da rotina desgastante e na inserção social. O cuidado não consiste, apenas, no uso de técnicas especializadas, amenizando a dor a partir da execução de procedimentos, mas deve ser ressaltado o ser humano na sua totalidade abrangendo os aspectos físicos, psicológicos e sociais respeitando as experiências de vida de cada ser humano, as crenças e valores permitindo, desta forma, o estabelecimento de um vínculo terapêutico entre cliente e equipe proporcionando uma assistência segura, integral e humanizada que é capaz de melhorar a adesão ao tratamento (RODRIGUES; BOTTI, 2009; QUINTANA; HAMMERSCHMIDT; SANTOS, 2014).

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base no desenvolvimento deste estudo, constatou-se que a doença renal crônica diminui a capacidade renal e é classificada em estágios, quando em estágio mais avançado o indivíduo é considerado insuficiente renal crônico dialítico necessitando de TRS. A hemodiálise é a terapia mais utilizada causando limitações físicas, afastamento social, alterações na imagem e transtornos psicológicos. É um tratamento desgastante devido a mudanças bruscas na rotina, dependência a máquina e a necessidade de aderência para a manutenção da vida.

A aderência ao tratamento é um processo gradativo e existem fatores que podem influenciar nesta adesão como: aceitação da doença, religião, nível de escolaridade, ambiente de hemodiálise, tratamento prolongado, esquema medicamentoso terapêutico, suporte familiar e confiança no enfermeiro.

Pelo convívio constante do enfermeiro com clientes renais crônicos na clínica de hemodiálise, pode-se destacar a educação em saúde com orientações, transmissão de conhecimento e estímulo ao autocuidado, pois ajuda na redução do estresse causado pela doença, melhora a autonomia e diminui as complicações durante o tratamento, beneficiando a qualidade de vida e a adesão à terapêutica.

Aderir ou não a terapêutica varia de indivíduo para indivíduo já que é um processo único e subjetivo, devendo o enfermeiro ser o educador e orientador, mas entendendo que a reponsabilidade de adesão também é do cliente que deve executar as orientações e seguir o tratamento adequadamente.

O conhecimento do enfermeiro sobre os fatores potencialmente influenciáveis na adesão da terapêutica contribui para compreender as falhas desse processo e implementar estratégias educativas com a finalidade de desenvolver uma assistência continuada, segura e de qualidade com vista ao cuidado humanizado e integral favorecendo ao alcance da adesão a terapêutica, reduzindo o abandono ao tratamento e melhorando a qualidade de vida destes clientes.

REFERÊNCIAS

1. ALVES, L.O.; GUEDES C.C.P.; COSTA B.G. As ações do enfermeiro ao paciente renal crônico: reflexão da assistência no foco da integralidade. Revista de pesquisa: Cuidado é Fundamental Online, Rio de Janeiro, v. 8, n.1, p. 3907-3921, jan./mar. 2016. Disponível em:

<http://www.seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental/article/view/3945/pdf_1809> Acesso em: 11 de setembro de 2018.

2. ARAÚJO, R.C.S.; SILVA, R.A.R.; BEZERRA, M.X.; ONOFRE, M.S.; ARAÚJO, A.L.V.; SILVA, K.M.P. Itinerário terapêutico de pacientes renais crônicos em tratamento dialítico. Revista de pesquisa: Cuidado é Fundamental Online, Rio de Janeiro, v. 6, n. 2, p. 525-538, abr./jun. 2014.

Disponível em:

<http://www.seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental/article/view/3179/pdf_1237> Acesso em: 02 de setembro de 2018.

3. BERTOLIN, D.C.; PACE, A.E.; KUSUMOTA, L.; HAAS, V. Associação entre os modos de enfrentamento e as variáveis sociodemográficas de pessoas em hemodiálise crônica. Revista Escola de Enfermagem USP, São Paulo, v. 45, n. 5, p. 1070-1076, out. 2011. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S008062342011000500006>. Acesso em: 21 de agosto de 2018.

4. BEUTER, M.; MULLER, L.R.; BRONDANI, C.M.; PAULETT, M.R.; TIMM, A.M.B.; PERLINI, N.M.O.G. A adesão em de indivíduos terapia hemodialítica. Revista de pesquisa: cuidado é fundamental online, Rio de Janeiro, v. 5, n. 2, p. 3558-3566, abr./jun. 2013. Disponível em:

<http://www.seer.unirio.br/index.php/%20cuidadofundamental/article/view/2147/pdf_723>. Acesso em: 02 de setembro de 2018.

5. BRANCO, J.M.A. LISBOA, M.T.L. Adesão de clientes renais crônicos ao tratamento hemodialítico: estratégias de enfermagem. Revista de enfermagem UERJ, Rio de Janeiro, v. 18, n. 4, p. 578-83, out/dez; 2010. Disponível em:

<<http://www.facenf.uerj.br/v18n4/v18n4a13.pdf>>. Acesso em: 22 de agosto de 2018.

6. BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria nº 389, de 13 de março de 2014. Define os critérios para a organização da linha de cuidado da Pessoa com Doença Renal Crônica (DRC) e institui incentivo financeiro de custeio destinado ao cuidado ambulatorial pré-dialítico. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 14 de março de 2014, p.34.

7. CORDEIRO, J.A.B.L.; BRASIL, V.V.; SILVA, A.M.T.C.; OLIVEIRA, L.M.A.; ZATTA, L.T.; SILVA, A.C.C.M. Qualidade de vida e tratamento hemodialítico: avaliação do portador de insuficiência renal crônica. Revista Eletrônica de Enfermagem [Internet], v.11, n. 4, p. 785-793, 2009. Disponível:

<https://projetos.extras.ufg.br/fen_revista/v11/n4/pdf/v11n4a03.pdf>. Acesso em: 18 de setembro de 2018.

8. DEBONE, M.C.; PEDRUNCCI, E.S.N.; CANDIDO, M.C.P.; MARQUES, S.; KUSUMOTA, L. Diagnósticos de enfermagem em idosos com doença renal crônica em hemodiálise. Revista

Brasileira de Enfermagem, Internet, v. 70, n. 4, p. 833-839, jul./ago. 2017. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2017-0117>>. Acesso em: 13 de outubro de 2018.

9. EVERLING, J.; GOMES, J.S.; BENETTI, E.R.R.; KIRCHNER, R.M.; BARBOSA, D.A.; STUMM, E.M.F. Eventos associados à hemodiálise e percepções de incômodo com a doença renal. *Avances em Enfermería*, Bogotá, v. 34, n. 1, p. 48-57, jan. 2016. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.15446/av.enferm.v34n1.41177>>. Acesso em: 14 de setembro de 2018.

10. FERNANDES, L.P.; MARINS, K.Y.M.; CARMO, H.O.; SILVA, S.R.S.; FARIAS, S.M.C.; SILVA, C.F.G. Necessidades de ações educativas-terapêuticas em um serviço de diálise renal no Brasil. *Enfermería Nefrológica*, Madrid, v. 21, n. 1, p. 53-62, mar. 2018. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.4321/s2254-28842018000100007>>. Acesso em: 09 de setembro de 2018.

11. FRAZÃO, C.M.F.Q.; RAMOS, V.P.; LIRA, A.L.B. Qualidade de vida de pacientes submetidos à hemodiálise. *Revista de enfermagem UERJ*, Rio de Janeiro, v. 19, n. 4, p. 577-582, out./dez. 2011. Disponível em: <<http://www.facenf.uerj.br/v19n4/v19n4a12.pdf>>. Acesso em: 29 de agosto de 2018.

12. HIGA, K.; KOST, M.T.; SOARES, D.M.; MORAIS, M.C.; POLINS, B.R.G. Qualidade de vida de pacientes portadores de insuficiência renal crônica em tratamento de hemodiálise. *Acta Paulista enfermagem*, São Paulo, v. 21, n. spe, p. 203-206, 2008. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1590/S0103-21002008000500012>>. Acesso em: 23 de agosto de 2018.

13. KUSUMOTA, L.; MARQUES, S.; HAAS, V.J.; RODRIGUES, R.A.P. Adultos e idosos em hemodiálise: avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde. *Acta paulista enfermagem*, São Paulo, v. 21, n. spe, p. 152-159, 2008. Disponível em:

<<http://dx.doi.org/10.1590/S0103-21002008000500003>>. Acesso em: 31 de agosto de 2018.

14. LINS, S.M.S.B.; LEITE J.L.; GODOY S.; TAVARES, J.M.A.B.; ROCHA, R.G.; SILVA, F.V.C. Adesão de portadores de doença renal crônica em hemodiálise ao tratamento estabelecido. *Acta paulista de enfermagem*, São Paulo, v. 31, n. 1, p. 54-60, fev., 2018. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1590/1982-0194201800009>>. Acesso em: 8 de outubro de 2018.

15. LOPES, J.M.; FUKUSHIMA, R.L.M.; INOUE, K.; PAVARINI, S.C.L.; ORLANDI,

F.S. Qualidade de vida relacionada à saúde de pacientes renais crônicos em diálise. *Acta Paulista Enfermagem*, São Paulo, v. 27, n. 3, p. 230-236, jun. 2014. Disponível em:

<<http://dx.doi.org/10.1590/1982-0194201400039>>. Acesso em: 25 de setembro de 2018.

16. MACIEL, C.G.; FERRAZ, R.N.; BORBA, A.K.O.T.; FRAZÃO, I.S.; FRANÇA, V.V. Adesão ao tratamento hemodialítico: percepção dos pacientes renais crônicos. *Revista Cogitare Enfermagem*, Paraná, v. 20, n. 3, p. 540-547, jul./set. 2015. Disponível em:

<<https://revistas.ufpr.br/cogitare/article/view/41112>>. Acesso em: 28 de agosto de 2018.

17. MADEIRO, A.C.; MACHADO, P.D.L.C.; BONFIM, I.M.; BRAQUEAIS, A.R.; LIMA, F.E.T. Adesão de portadores de insuficiência renal crônica ao tratamento de hemodiálise. *Acta Paulista Enfermagem*,

São Paulo, v.23, n.4, p.546-551, 2010. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1590/S0103-21002010000400016>>. Acesso em: 13 de setembro de 2018

18. MALDANER, C.R.; BEUTER, M.; BRONDANI C.M.; BUDÓ, M.L.D.; PAULETTO, M.R. Fatores que influenciam a adesão ao tratamento na doença crônica: o doente em terapia hemodialítica. Revista Gaúcha de Enfermagem, Porto Alegre (RS), v. 26, n. 4, p.647-653, dez. 2008. Disponível em:

<<https://seer.ufrgs.br/RevistaGauchadeEnfermagem/article/view/7638/4693>>. Acesso em: 10 de outubro de 2018.

19. MINAYO, M.C.S.O. Desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 12ed. São Paulo: Hucitec, 2010.

20. OLIVEIRA A.P.B.; SCHMIDT, D.B.; AMATNEEKS, T.M.; SANTOS, J.C.; CAVALLET, L.H.R. MICHEL, R.B. Qualidade de vida de pacientes em hemodiálise e sua relação com mortalidade, hospitalizações e má adesão ao tratamento. Jornal Brasileiro de Nefrologia, São Paulo, v. 38, n. 4, p. 411-420, 2016. Disponível em:

<<http://dx.doi.org/10.5935/0101-2800.20160066>>. Acesso em: 13 de outubro de 2018.

21. PILGER, C., RAMPARI, E.M., WAIDMAN, M.A.P.; CARREIRA, L. Hemodiálise: seu significado e impacto para a vida do idoso. Escola Anna Nery, Rio de Janeiro, v. 14, n. 4, p. 677-683, out./dez. 2010. Disponível: <<http://dx.doi.org/10.1590/S1414-81452010000400004>>. Acesso em: 16 de setembro de 2018.

22. QUINTANA, J.M.; HAMMERSCHMIDT, K.S.A.; SANTOS, S.S.C. Percepções de idosos que vivenciam o cuidado de enfermagem durante a hemodiálise. Revista Eletrônica de Enfermagem, Internet, v. 16, n. 3, p.662-670, jul./set. 2014.

Disponível em: <<https://doi.org/10.5216/ree.v16i3.21543>>. Acesso em: 16 de setembro de 2018.

23. RIEGEL, F.; SERTÓRIO, F.C.; SIRQUEIRA, D.S. Intervenções de enfermagem frente às complicações em hemodiálise. Revista de Enfermagem UFPI, Piauí, v.7, n. 1, p. 63-70, jan./mar. 2018. Disponível em: <<https://doi.org/10.26694/2238-7234.7163-70>>. Acesso em: 04 de setembro de 2018.

24. ROCHA, M.L.; VIEIRA, S.S.; BRAGA, S.O.; POVEDA, V.B.; SANCHEZ, E.H. Início do tratamento hemodialítico: qualidade de vida, sentimentos e dificuldades. Revista enfermagem UFPE online, Recife, v. 3, n. 2, p. 223-229, abr./jun., 2009. Disponível em:

<<https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/5668/4888>>. Acesso em: 16 de setembro de 2018.

25. ROCHA, R.P.F.; SANTOS, I. Necessidades de autocuidado entre clientes com doença renal crônica: Revisão integrativa de literatura. Revista de pesquisa: Cuidado é Fundamental Online, Rio de Janeiro, v. 1, n.2, p. 423-433, set./dez. 2009. Disponível em:

<<http://www.seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental/article/view/444/398>>. Acesso em: 29 de setembro de 2018.

26. RODRIGUES, T.A.; BOTTI, N.C.L. Cuidar e o ser cuidado na hemodiálise. Acta Paulista Enfermagem, São Paulo, v. 22, n. spe, p. 528-530, 2009. Disponível em:

<<http://dx.doi.org/10.1590/S0103-21002009000800015>>. Acesso em: 9 de outubro de 2018.

27. SANTOS, I.; ROCHA, R.P.F.; BERARDINELLI, L.M..M. Qualidade de vida de clientes em hemodiálise e necessidades de orientação de enfermagem para o autocuidado. Escola Anna Nery, Rio de Janeiro, v. 15, n.1, p. 31-38, jan./mar. 2011.

Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1590/S0034-71672011000200018>>. Acesso em: 14 de setembro de 2018.

28. SILVA, A.S.; SILVEIRA, R.S.; FERNANDES, G.F.M.; LUNARDI, V.L.; BACKES,

V.M.S. Percepções e mudanças na qualidade de vida de pacientes submetidos à hemodiálise. Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília, v. 64, n. 5, p.839-844, set./out. 2011. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1590/S0034-71672011000500006>>. Acesso em: 9 de setembro de 2018.

29. SILVA, K.A.L.; CARGNIN, M.C.S.; VENTURA, J.; PAULA, S.F.; GROOS, J.V. Qualidade de vida de pacientes com insuficiência renal em tratamento hemodialítico. Revista de Enfermagem UFPE Online, Recife, v.11, n. 11, p. 4663-4670, nov. 2017. Disponível em:

<<https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/download/231207/25210>>. Acesso em: 2 de setembro de 2018.

30. SILVA, M.C.O.S.; SILVA, K.L.; SILVA, P.A.B.; VAZ, F.M.O. A sala de espera como espaço de educação e promoção de saúde à pessoa com insuficiência renal crônica em hemodiálise. Revista de pesquisa: Cuidado é Fundamental Online, Rio de Janeiro, v. 5, n. 3, p. 253-263, jul./set. 2013. Disponível em:

<http://www.seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental/article/view/1745/pdf_864>. Acesso em: 25 de setembro de 2018.

31. SILVA, R.A.R.; SOUZA, V.L.; OLIVEIRA, J.N.; SILVA, B.C.; ROCHA, C.C.T.; HOLANDA, J.R.R. Estratégias de enfrentamento utilizadas por pacientes renais crônicos em tratamento hemodialítico. Escola Anna Nery, Rio de Janeiro, v. 20, n. 1, p. 147-154, jan./mar. 2016. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.5935/1414-8145.20160020>>. Acesso em: 12 de setembro de 2018.

32. SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA. Inquérito Brasileiro de Diálise Crônica 2016. Brasil Jornal Brasileiro de Nefrologia, 2017. Disponível em:

<<http://dx.doi.org/10.5935/0101-2800.20170049>>. Acesso em: 20 de agosto de 2018.

33. TAKEMOTO, A.Y.; OKUBO, P.; BEDENDO, J.; CARREIRA, L. Avaliação da qualidade de vida em idosos submetidos ao tratamento hemodialítico. Revista Gaúcha de Enfermagem, Porto Alegre, v. 32, n. 2, p. 256-262, jun. 2011. Disponível em:

<<http://dx.doi.org/10.1590/S1983-14472011000200007>>. Acesso em: 8 de outubro de 2018.

Capítulo 2

10.37423/211004872

PAPEL DA ENFERMAGEM FRENTE A QUALIDADE DE VIDA DA DOENÇA RENAL CRÔNICA EM TRATAMENTO

Ediléa Maria da Silva

Graduada pelo Centro Universitário Estácio de Juiz de Fora, Brasil

Eliana Amaro de Carvalho Caldeira

Doutoranda em Saúde Coletiva pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Brasil.

Raquel de Oliveira Martins Fernandes

Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Brasil.

Laércio Deleon de Melo

Doutorando em Enfermagem pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil.

Leone Mendes Dias

Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Brasil.

Camila Cristina Gregório de Assis

Mestranda em Enfermagem pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Brasil.

Juliana de Lima Brandão

Doutoranda em Enfermagem pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil.

Joana Carvalho Barros

Acadêmica em Enfermagem. Centro Universitário Estácio de Juiz de Fora, Brasil.

Josilene Sobreira Rodrigues

Acadêmica de Enfermagem pelo Centro Universitário Estácio de Juiz de Fora, Brasil.

Loiane Aparecida de Freitas Silva

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Estácio de Juiz de Fora, Brasil.

Resumo:

INTRODUÇÃO: A doença renal crônica se refere a uma lesão com perda progressiva e irreversível do funcionamento dos rins. É considerado um problema de saúde pública mundial devido a sua elevada prevalência. Dentre a Terapia Renal Substitutiva temos a hemodiálise, a diálise peritoneal, hemofiltração e transplante renal. A hemodiálise é o tratamento mais utilizado para pacientes que se encontram necessitando de TRS. **DESENVOLVIMENTO:** O presente estudo teve como objetivo apresentar a evolução da Terapia Renal Substitutiva e destacar as atribuições do enfermeiro em Centro de Hemodiálise para a melhora da qualidade de vida do paciente. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica realizada a partir de uma revisão de literatura. Sabe-se que existe uma grande escassez em relação à ausência do autocuidado, gerado principalmente pela falta da informação, desta forma é papel do enfermeiro é prestar e garantir aos seus pacientes um cuidado biopsicossocial. **CONCLUSÃO:** Conclui-se que o enfermeiro contribui na promoção da qualidade de vida de pacientes renais crônicos ao garantir segurança e bem-estar durante o tratamento dialítico. E ainda, possui papel fundamental na educação em saúde, ajudando o paciente a se adaptar na sua nova condição, de modo empático e humanizado, no momento em que se encontra fragilizado emocionalmente.

Palavras chave: Enfermeiro. Hemodiálise. Qualidade de vida.

INTRODUÇÃO

O sistema urinário possui a função de remover do organismo humano as substâncias em excesso e os produtos residuais do metabolismo, através da urina, o que contribui para a manutenção da homeostase. Este sistema é composto por um par de rins e ureteres, uma bexiga e uma uretra. A urina é produzida nos rins, passa pelos ureteres até a bexiga, onde é armazenada, sendo lançada ao exterior por meio da uretra (MONTANARI, 2016).

Nos rins há duas estruturas essenciais para o seu funcionamento, o córtex e a medula renal. O córtex possui estruturas vasculares, os corpúsculos renais onde o sangue é filtrado. O líquido formado percorre um sistema tubular na região cortical e medular, que se modifica e se torna a urina. Os túbulos da medula constituem em estruturas cônicas denominadas de pirâmides medulares, sendo o rim humano multilobar por possuir de seis a dezoito pirâmides medulares. Os ductos coletores da urina abrem-se na extremidade da papila, formando a área crivosa, que se projeta em um cálice menor desembocando na pelve renal (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013).

A unidade funcional dos rins é formada pelo túbulo urinífero, constituído pelo néfron e pelo tubo coletor. O néfron é composto pelo corpúsculo renal, túbulo proximal, alça de *Henle* e túbulo distal. O lóbulo renal é a parte do órgão em que os néfrons drenam para o mesmo tubo coletor, onde vários néfrons se desembocam. O corpúsculo renal consiste no glomérulo e na cápsula de *Bowman*, que apresenta um polo vascular (MONTANARI, 2016).

A Doença Renal Crônica Terminal (DRC) também denominada de Insuficiência Renal Crônica (IRC) consiste em uma lesão na estrutura do rim, com dano progressivo e irreversível da função do corpúsculo renal. E quando os rins não conseguem exercer suas funções, este evolui para o estado terminal da doença, sendo necessária a Terapia Renal Substitutiva (TRS), que utiliza as modalidades de hemodiálise, diálise peritoneal ou transplante para substituir a função dos rins (MARINHO et al., 2018).

A falência renal pode ocorrer devido à glomerulonefrite crônica, pielonefrite, depleção de sódio e água, distúrbios vasculares, uropatia obstrutiva, doença renal consequente de droga ou agente tóxico e infecções. A hipertensão arterial sistêmica (HAS), a infecção urinária de repetição, a doença de próstata, o diabetes mellitus, a litíase renal, a doença policística renal, dentre outras causas, podem levar a um quadro de depressão da habilidade de excreção de substâncias tóxicas dos rins, caminhando,

portanto para uma hiperfostatemia e um aumento do paratormônio (hormônio da paratireoide) sendo necessário o tratamento dialítico (SILVA; BRUNE, 2011).

Nos últimos anos, a DRCT vem se tornando um problema de saúde pública mundial, devido ao elevado impacto da morbimortalidade relacionada à doença e ao grande número de indivíduos acometidos na população. Visto que a assistência à saúde se tornou um item indispensável, pois esta enfermidade gera aos pacientes limitações físicas, sociais e emocionais que interferem de modo direto na sua qualidade de vida e que gera aumento de custos aos sistemas de saúde (ALVES et al., 2017).

A taxa de incidência da DRCT em países da Europa e nos Estados Unidos da América (EUA) é elevada. Entre 2008 a 2013, nos EUA houve um aumento crescente, em média de 3% na taxa de prevalência da doença. No Brasil, nos últimos cinco anos houve um aumento de 31,5 mil pacientes portadores de DRC, o que representou um crescimento em torno de 6,3% (PINHO; SILVA e PIERIN, 2015; MARINHO et al., 2018).

O portador de DRCT tende a ter dificuldade de se adaptar a sua nova condição, pois a doença causa restrições e o tratamento gera outras limitações como: restrição alimentar, hídrica, perda da autonomia, afastamento da família e necessidade de uso do acesso vascular temporário e/ou confecção de fístula arteriovenosa (FAV). Essas limitações podem ocasionar no indivíduo uma dificuldade na sua capacidade de conduzir e direcionar suas atividades diárias, dificultando a sua adesão ao tratamento e comprometendo a sua qualidade de vida (SILVA; BRUNE, 2011).

O tratamento pode afetar a vida do paciente em diferentes aspectos, por ser um tratamento que gera implicações físicas, psicológicas e socioeconômicas, tanto para o indivíduo acometido pela doença quanto para as famílias e sociedade. O diagnóstico da DRC é feito através do cálculo da taxa de filtração glomerular (TFG), do exame de elementos anormais de sedimentos (EAS) e de exame de imagem, como a ultrassonografia dos rins e das vias urinárias (LOPES; FRANÇA; TELES, 2018).

Para a hemodiálise é necessário utilizar um acesso ao sistema circulatório, pois se trata de um elemento crítico essencial para o início e a manutenção do tratamento. O Cateter Temporário Duplo Lúmen (CTDL) é o acesso mais utilizado para iniciar a terapia. A FAV é um acesso permanente realizado cirurgicamente que une uma artéria a uma veia, considerada o melhor tipo de acesso venoso vascular para hemodiálise, pois apresenta uma taxa menor de complicação e alta durabilidade (MARINHO et al., 2018).

O presente estudo teve como objetivo a apresentar a evolução da Terapia Renal Substitutiva e destacar as atribuições do enfermeiro em Centro de Hemodiálise para a melhora da qualidade de vida do portador de Doença Renal Crônica Terminal. Torna-se relevante o respectivo estudo por se tratar de um problema de saúde pública grave, que requer conhecimento científico por parte do enfermeiro e do envolvimento da equipe de enfermagem para a manutenção da saúde do paciente.

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, no período de 01 de fevereiro a 31 de maio de 2019, a partir da revisão textual na base de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), *Scientific Electronic Library Online* (SciELO) e Biblioteca Virtual da saúde (BVS), e legislações vigentes. A seleção dos textos ocorreu com o auxílio dos descritores “enfermeiro”, “hemodiálise” e “qualidade de vida”.

Para a seleção dos textos utilizou-se como critério de inclusão as publicações no idioma português, artigos publicados em revistas indexadas, com afinidade com o tema, além de livros e documentos publicados pelo Ministério da Saúde e Conselho Federal de Enfermagem. Foram excluídas todas as publicações que não atenderam aos critérios de inclusão.

Após a seleção textual, passou-se a leitura em profundidade, seguida de uma análise crítico-reflexivo condizente com os objetivos elencados. Foi elaborado o referencial teórico com base na apresentação evolução da Terapia Renal Substitutiva e nas atribuições do enfermeiro em centro de hemodiálise, para melhora da sua qualidade de vida.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1. A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA

O médico holandês *Willem Kolff* foi o pioneiro na construção da máquina de hemodiálise, fato este ocorrido durante a Segunda Guerra Mundial, possibilitando assim o início do tratamento da DRC. A partir de então iniciou vários estudos a respeito da terapia para o tratamento da doença renal. Fato este, considerado um dos maiores avanços da medicina, desde então as máquinas passaram por diversas transformações, sendo vista como modernas e seguras (SANTOS et al., 2017).

A Terapia Renal Substitutiva é composta por hemodiálise, diálise peritoneal, hemofiltração e transplante renal. Os pacientes em TRS, como a hemodiálise, apresentam uma variedade de sinais e sintomas, sendo o mais comum os decorrentes da uremia, que consiste em uma intoxicação sistêmica gerada por substâncias nitrogenadas, geralmente excretadas pelos rins. Porém, ainda existem sinais e

sintomas que o profissional de saúde não pode desprezar, como as alterações hemodinâmicas e o estado clínico do paciente (MOURA-NETO; OLIVEIRA, 2014).

A hemodiálise é um processo mecânico, no qual uma máquina é responsável pela retiradas de líquido em excesso, existente no metabolismo, promovendo a filtração sanguínea através de um hemodialisador. O acúmulo exagerado de líquido em pacientes com insuficiência renal e que estão em tratamento hemodialítico, ocasiona diversas complicações como a hipotensão e câibras, gerado devido à retirada de líquidos e eletrólitos, podendo vir a surgir alterações cardiovasculares severas e irreversíveis (CASTRO et al., 2018).

Para que seja realizado as sessões de hemodiálise de forma eficaz torna-se necessário que o paciente tenha um acesso vascular, esse acesso se dá através anastomose subcutânea de uma artéria por uma veia nativa adjacente, permitindo o fluxo direto da artéria para a veia (Daugidars, 2010). Esse tipo de acesso vascular através da FAV consente uma excelente permeabilidade sendo considerada a modalidade de melhor escolha, com menor associação à morbimortalidade e também permitindo assim um tratamento mais longínquo para o paciente.

2.2 A DIFÍCIL ACEITAÇÃO DO PACIENTE QUANTO À NECESSIDADE DE REALIZAR O PROCESSO DE DIÁLISE

Por ser uma doença silenciosa, a DRCT leva o paciente a perceber a doença somente quando apresenta alteração da função renal. A partir de então começa o aparecimento dos primeiros sintomas urêmicos, ou seja, quando os rins perdem 50% da sua função, encaminhando, portanto para o estágio final da doença. Sendo necessário começar uma intervenção terapêutica como diálise peritoneal para o resto da vida ou transplante renal. As complicações da hemodiálise estão relacionadas ao enfrentamento diante das repercussões psicológicas e sociais da doença. É comum que os pacientes apresentem desânimo frente ao tratamento dialítico. Ainda assim, existe uma grande escassez em relação à ausência do autocuidado, gerado principalmente pela falta da informação (FERNANDES et al., 2018).

As intercorrências nos quadros clínicos durante o processo dialítico, podem desencadear desequilíbrio hidroelétrico como a hiponatremia, no qual o paciente apresenta sinais e sintomas como: cefaléia, náuseas, vômitos, sede intensa e até a presença de convulsões. A hiponatremia causa hipotensão, arritmia cardíaca, astenia, câibras e algumas possíveis paralisias, isso acontece devido às complicações causadas durante o tratamento dialítico. Devido a essas complicações a taxa de mortalidade apresenta uma porcentagem de 20% no primeiro ano de tratamento e ocorre um aumento de 70% nos cinco

anos subseqüentes em pacientes idosos e portadores de doença crônica não transmissível, tais como: o diabetes *mellitus* e as doenças cardiovasculares (SILVA et al., 2016).

Os principais grupos que podem vir a desenvolver as DRC são idosos, com histórico familiar de nefropatia, pacientes portadores de diabetes *mellitus* e hipertensão arterial. A hemodiálise é um dos métodos de terapia mais desgastante e agressiva em comparação com as demais, pois afeta o paciente fisicamente, emocionalmente e socialmente. Diante disso, a família deve se envolver no tratamento e se adaptar a uma nova realidade, que pode causar transtorno financeiro e psicológico, diante das modificações causadas na rotina da família (BIANCHI et al., 2016).

O processo de realização das sessões de hemodiálise vem acompanhado de uma difícil aceitação da doença renal gerando conflito, medo e incerteza, além de sentimento de tristeza, revolta e isolamento social, o que pode levar o paciente a abandonar o tratamento, gerando nesse indivíduo um sentimento de desesperança, sabendo que é uma doença grave que pode levar a morte. Portanto ocorre uma mudança radical no seu cotidiano devido ao fato de ter que conviver com as limitações impostas pela doença, sendo então obrigado a enfrentar um tratamento contínuo que irá influenciar de forma negativa a sua qualidade de vida (BIANCHI et al., 2016).

Nesse sentido, os indivíduos que vivenciam enfermidades crônicas perdem vínculos e o controle da sua autonomia. Dentre as perdas mais comuns, está o sentimento de medo pela incapacidade de não conseguir mudar o futuro diante do estado em que se encontra. Diante do que concede ao doente renal crônico, em tratamento de hemodiálise, estes perdem a vontade de trabalhar e a plenitude, resultando no impacto psicossocial da doença que traz diversos prejuízos psicológicos, além das consequências físicas ao indivíduo, impactando no seu cotidiano (FARIAS et al., 2018).

Portanto, torna-se necessário que o diagnóstico precoce e o início do tratamento da doença sejam imediatos, ou seja, assim que surgirem os sintomas urêmicos ou quando os exames demonstrarem a necessidade de terapia dialítica, o que pode aumentar a sua sobrevivência. Quando o diagnóstico não acontece precocemente, o paciente tem uma grande chance de evoluir para a morte. Este tratamento tem como base terapêutica as sessões de hemodiálise em pacientes em que a condição cardíaca está estabilizada. Neste processo, ocorre a filtração do sangue, eliminando da corrente sanguínea a ureia e a creatina que são as substâncias tóxicas e que contribui para a estabilidade hemodinâmica (SILVA et al., 2016).

2.2 ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE DIALÍTICO NA SALA DE HEMODIÁLISE E EXTRA MUROS

A assistência de enfermagem prestada aos pacientes renais crônicos ocorre através de uma enfermagem sistematizada, apoiada pela Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), pois possibilita a organização do trabalho do enfermeiro e da equipe de enfermagem, tornando possível a operacionalização do Processo de Enfermagem (PE). O PE é o conjunto de ações executadas pela equipe de enfermagem diante das necessidades do paciente, como ser biopsicossociocultural (GUIMARAES et al., 2014).

O papel da enfermagem é prestar e garantir aos seus pacientes um cuidado biológico e psicológico, possuindo uma visão holística, a fim de minimizar os efeitos da evolução da doença no indivíduo. Ressalta-se, portanto que a assistência de enfermagem deverá estar direcionada as reais necessidades do paciente, sendo um tratamento que exige uma equipe especializada, levando em conta não apenas a doença, mas a sua complexidade e o estado emocional do paciente (FARIAS et al., 2018).

O atendimento do enfermeiro ao indivíduo portador da doença renal crônica deverá ser pautado na identificação das suas necessidades humanas básicas, pois o indivíduo começará a tomar consciência a respeito da doença e do tratamento que irá seguir, promovendo o seu autocuidado. A SAE possibilitou aos enfermeiros a conquista de um modelo próprio de linguagem. De acordo com o modelo conceitual a teoria se fundamenta na teoria de Motivação Humana de *Maslow* tendo como base o conceito de hierarquia das necessidades humanas básicas (NHB). As NHB existem em cinco níveis de prioridade, porém inclui o nível básico, que são as necessidades fisiológicas, de segurança, de amor e o gregarismo, as necessidades de autoestima e por fim as necessidades de auto realização (HORTA, 1979; GUIMARÃES et al., 2014).

O paciente com DRCT devido a todas as alterações que a patologia irá ocasionar necessitará de um cuidado direto do profissional enfermeiro e este é um profissional que estará muito próximo do paciente, oferecendo-lhe uma escuta qualificada, com a identificação das demandas para o profissional habilitado (SILVA et al., 2016).

Lopes et al., (2018), reafirmam a teoria de Wanda Horta (HORTA, 1979), As necessidades humanas básicas baseiam-se em um estado de tensões, conscientes e não inconsciente resultante do desequilíbrio hemodinâmico de fenômenos vitais de cada indivíduo. A família e a comunidade desenvolvem ações que exige decisões conscientes, verbalizados ou não, visto como problemas de

enfermagem e classificados como latentes, universais, vitais, flexíveis, constantes, infinitas, cíclicas, inter-relacionadas, dinâmicas, energéticas e hierarquizadas, podendo haver peculiaridades individuais decorrente da interação do meio interno e externo. Essa manifestação gera desequilíbrio, o que interfere na individualidade, conforme a idade, sexo, cultura, fatores socioeconômicos, ciclo saúde-enfermidade e ambiente físico.

O enfermeiro é o profissional que tem maior contato com o paciente. Pois cabe a este a implantação, o planejamento, a organização, a execução e avaliação do processo de enfermagem direcionado ao paciente. Tais como conhecimento para empregar estratégias e procedimentos para identificar situações de saúde e doença, colaborando para a promoção, recuperação, prevenção e reabilitação da saúde do indivíduo. É necessário que no planejamento sejam verificados os possíveis resultados das ações, através das respostas do paciente e da família em relação ao processo saúde-doença. Diante disso, o enfermeiro deve ter conhecimento dos hábitos individuais para que o plano de cuidado prestado ao paciente submetido à hemodiálise seja de qualidade (FREITAS et al., 2018).

Uma das atuações do enfermeiro no tratamento hemolítico é identificar as principais orientações prestadas ao paciente durante a sessão de hemodiálise se refere a assepsia da região da fístula, atentar para o esvaziamento da bexiga, verificar o peso do paciente antes e pós a sessão de diálise e aferição dos sinais vitais (LINARDI, 2004). Cabe ao enfermeiro também a observância da máquina de hemodiálise durante toda a sessão quanto à temperatura da solução dialisadora, bem como o funcionamento da máquina (rolete, fluxo de sangue, fluxo dialisado) (BRANCO, 2005). Também é de suma importância observar o prime (quantidade de líquido dentro do dialisador), e checar níveis tensionais para decisão de uso de heparinização (SILVA, 2011).

Um dos cuidados de enfermagem ao paciente e à família deste se refere sobre os cuidados com a FAV, em não permitir que o paciente permita aferição de Pressão arterial no referido membro, cuidados a fim de evitar impactos sobre a FAV e a realização de exercícios de pressão com a bola de borracha, através de flexionar e estender durante três vezes ao dia durante 15 minutos a fim de se obter uma FAV pérvia, a presença de sinais inflamatórios como calor, rubor, tumor e dor no local da FAV, o vínculo e a educação em saúde pode evitar que sinais de alarme que possam passar despercebidos (OLIVEIRA et al, 2018).

É sabido que a doença renal crônica terminal causa um impacto no modo de vida das pessoas e dos familiares, se instalando de modo repentino e modificando seu estilo de vida, fazendo com que os pacientes se adaptem as limitações que a doença e o tratamento impõem, visto que esses pacientes

são diferenciados, exigindo da equipe uma atenção diferenciada em busca da melhoria da qualidade de vida destes pacientes (FERREIRA et al., 2014).

CONCLUSÃO

O presente estudo possibilitou uma reflexão sobre o papel do enfermeiro na assistência à saúde, sobretudo na qualidade de vida dos portadores de DRCT. O enfermeiro desempenha suas práticas assistenciais acerca da doença, contribuindo para a identificação dos sinais e sintomas favorecendo para um tratamento e uma assistência de qualidade. Analisando o contexto atual, observou-se que o papel do enfermeiro é de extrema importância na vida dos pacientes, sendo necessário desenvolver ações educativas de promoção, prevenção e tratamento, a fim de que estas ações possam melhorar a qualidade de vida e a assistência prestada, garantindo principalmente segurança ao paciente em relação ao tratamento.

É necessário avaliar as condições relacionada com a dependência do tratamento, a debilidade e a elevada mortalidade proveniente de diversos fatores associados a DRC e ao tratamento que interferem na qualidade de vida. O enfermeiro tem papel primordial, pois ele é o profissional que estará constantemente com o paciente, identificando os aspectos emocionais, educando o paciente e a família. A assistência prestada pela enfermagem ao paciente renal crônico em tratamento hemodialítico não se baseia apenas em cuidados técnicos, sendo necessário que o enfermeiro preste um cuidado integral de forma a perceber o paciente como um ser único, que necessita de uma assistência humanizada, diminuindo o medo que o paciente possa ter diante do tratamento.

O processo de enfermagem veio para regularizar e estabelecer que a assistência de enfermagem fosse usada para aprimorar o autocuidado e o atendimento das reais necessidades dos pacientes, seus familiares e a sociedade. Cabe exclusivamente ao profissional de enfermagem o uso do processo de enfermagem, que objetiva aperfeiçoar a qualidade do conhecimento do profissional de saúde, mas também de aprimorar a sua assistência, pois este procedimento possibilita o diagnóstico das necessidades de intervenção para a melhoria da saúde do paciente.

REFERÊNCIAS

ALVES, LF; ABREU, TT; NEVES, NCS; MORAIS, FA; ROSIANY, IL; JÚNIOR, WV; PINTO, SWL; OTONI, A. Prevalência da doença renal crônica em um município do sudeste do Brasil. J Bras Nefrol. São Paulo, v. 39, n. 2, p. 126-134, 2017. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/jbn/v39n2/pt_0101-2800-jbn-39-02-0126.pdf Acessado em: 27 maio 2019.

BIANCHIA, M; NOGUEIRA, YL; NASCIMENTO, TD; MENEGÓCIO, AM. Identificação dos Diagnósticos de Enfermagem nos Pacientes em Hemodiálise. Ensaios Cienc., Cienc. Biol. Agrar. Saúde. Campo Grande, v. 20, n. 1, p. 24-29, 2016. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/ape/a/fssg5MvZs4Qx3XSXybGdQ4k/?lang=pt&format=pdf> Acessado em: 20 maio 2019.

BRANCO, J. M. A.; RANCIARO, D. C. Assistência de Enfermagem no Cuidado ao Cliente Renal Crônico com Infecção de Fístula Artériovenosa. Revista Nursing, v. 27, n.3, p. 12-30, 2005. Disponível em: <http://revista.universo.edu.br/index.php?journal=1CAMPOSDOSGOYTACAZES2&page=article&op=viewFile&path%5B%5D=6024&path%5B%5D=3151> Acessado em: 20 maio 2019.

CASTRO, RVRS; ROCHA, RLP; ARAUJO, BFM; PRADO, KF; CARVALHO, TFS.

A percepção do paciente renal crônico sobre a vivência em hemodiálise. Revista de Enfermagem do Centro-Oeste Mineiro. São João Del Rei, v. 8, e. 2487, 2018. Disponível em: <http://www.seer.ufsj.edu.br/index.php/recom/article/view/2487> Acesso em: 20 maio 2019.

DAUGIRDAS JOHN; BLAKE, PETER, TODD,. S. Manual de Diálise. Guanabara Koogan, (2010).

FARIAS, MS; MAIA, ICG; FERREIRA, GMS; PINTO, JR; FERREIRA, FIS. Sentimentos de Pessoas em Hemodiálise que Esperam por um Transplante Renal. R bras ci Saúde. V. 22, n. 4, p. 357-362, 2018. Disponível em: <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2018/11/964233/28164-97571-1-pb.pdf#:~:text=Esses%20pacientes%20podem%20apresentar%20sentimentos,qualidade%20e%20expectativa%20de%20vida>. Acessado em: 06 maio de 2019.

FERNANDES, LP; MARINS, KYM; CARMO, HO; SILVA, SRS; FARIAS, SMC; SILVA, CFG. Necessidades de ações educativas-terapêuticas em um serviço de diálise renal no Brasil. Enferm Nefrol. São Paulo, v. 21, n.1, p. 53-62, jan-mar 2018. Disponível em: <https://scielo.isciii.es/pdf/enefro/v21n1/2255-3517-enefro-21-01-53.pdf> Acessado em: 15 maio 2019.

FREITAS, EA; SANTOS, MF; FÉLIS, KC; FILHO, IMM. Assistência de enfermagem visando a qualidade de vida dos pacientes renais crônicos na hemodiálise. Rev Inic Cient e Ext. v1, n. 2, p. 114-121, jul-dez 2018. Disponível em: <https://revistasfasesa.senaaires.com.br/index.php/iniciacao-cientifica/article/view/59/24> Acessado em: 12 maio de 2019.

GUIMARÃES, GL; MENDOZA, IYQ; GOVEIA, VR; BARONI, FCA; GODOY, SCB; MATOS, SS. Diagnósticos de enfermagem em hemodiálise fundamentados na teoria de Horta. Rev enferm UFPE. Recife, v. 8, n. 10, p. 3444-3451, out 2014.

Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/viewFile/10989/12339> Acesso em: 20 abril 2019.

HORTA, V. A. Processo de enfermagem. Wanda de Aguiar Horta, com a colaboração de Brigitta E. P. Castellanos. - São Paulo: EPU 1979.

JUNQUEIRA, LC; CARNEIRO, J. Histologia Básica. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. p. 368. Acessado em: 25 abril 2019.

LEITE, D. S. et. al. Repercussões vasculares do uso de CDL em pacientes hemodialítico: análise ecográfica dos sítios de inserção. Sociedade Brasileira de Nefrologia, v.36, n. 3, p.320-324, 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/jbn/a/7wMm7YTwnfsTXVqVG7bs9dd/?lang=pt&format=pdf> Acesso em 07 maio 2019.

LINADI, F. et al. Programa de melhoria continuada em acesso vascular para hemodiálise. Disponível em: J. vasc. Bras, v.3, n.3, p.191, 2004. Disponível em:

<https://app.periodikos.com.br/article/5df0f0250e8825473bb5f733/pdf/jvb-3-3-191.pdf> Acesso em 07 maio 2019.

LOPES, LNA; FRANÇA, RF; TELES, TRD. Assistência de Enfermagem Associada a Qualidade de Vida dos Portadores de Doença Renal Crônica. Revista Saúde em Foco. Teresina, n. 9, p. 1009-1026, 2018. Disponível em:

https://portal.unisepe.com.br/unifia/wpcontent/uploads/sites/10001/2018/12/114_ASSIST%C3%8A NCIA-DE-ENFERMAGEM-ASSOCIADA-A-QUALIDADE-DE-VIDA-DOS-PORTADORES-DE-DOEN%C3%87A-RENAL-CR%C3%94NICA.pdf Acessado em: 07 maio 2019.

MARINHO, CLA; OLIVEIRA, JF; BORGES, JES; FERNANDES, FECV; SILVA, RS. Associação entre características sociodemográficas e qualidade de vida de pacientes renais crônicos em hemodiálise. Rev Cuidarte. Colômbia, v. 9, n. 1, p.2017-2029, 2018. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.15649/cuidarte.v9i1.483> Acessado em: 20 abril 2019.

MONTANARI, T. Histologia: texto, atlas e roteiro de aulas práticas. 3.ed. Porto Alegre: Ed. da autora, 2016. p. 229. Disponível em: <http://www.ufrgs.br/livrodehisto> Acessado em: 21 abril 2019.

MOURA-NETO, JA; OLIVEIRA, GM. Modalidade de terapia renal substitutiva como preditora de sintomas depressivos. Jornal brasileiro de psiquiatria. São Paulo, v 63, n. 4, p. 354-359, dez 2014. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/272397736> Acesso em: 20 maio 2019.

OLIVEIRA, S.C.F., RODRIGUES, A. A., FERREIRA, L. F. Atuação do enfermeiro nos cuidados a pacientes com fístula arteriovenosa. Journal of Specialist Scientific Journal – v. 2, n. 2, Abr/Jun, p.1-14, 2018. Disponível em: <https://revistacientifica.facmais.com.br/wp-content/uploads/2017/09/1.-Atua%C3%A7%C3%A3o-do-Enfermeiro-no-Cuidado-da-F%C3%ADstula-Arteriovenosa-em-Tratamentos-Hemodial%C3%ADticos.pdf> Acesso em: 06.05.2019

PINHO, NA; SILVA, GV; PIERIN, AM. Prevalência e Fatores Associados com Doença Renal Crônica, em Pacientes Hospitalizados no Hospital Universitário na Cidade de São Paulo, Brasil. J. Bras. Nefrol. São Paulo, v. 37, n. 1, p. 91-97, 2015. Disponível em:

<http://dx.doi.org/10.5935/0101-2800.20150013> Acessado em: 06 maio 2019.

SANTOS, BP; OLIVEIRA, VA; SOARES, MC; SCHWARTZ, EDA. Doença renal crônica: relação dos pacientes com a hemodiálise. ABCS Health Sci. Pelotas, v. 42, n. 1, p. 8-14, 2017. Disponível em: <https://www.portalnepas.org.br/abcshs/article/view/943> Acesso em: 19 maio 2019.

SILVA, MMH; BRUNE, MFS. Importância do cálculo da taxa de filtração glomerular na avaliação da função renal de adultos. Rev Bras Farm. Rio de Janeiro, v. 92, n.3, p.160- 165, 2011. Disponível em: <http://www.rbfarma.org.br/files/rbf-2011-92-3-13.pdf> Acessado em: 22 maio 2019.

SILVA, K.A.; NUNES, Z. B. As intervenções de enfermagem mais prevalentes em um serviço de hemodiálise frente às intercorrências com a fístula arteriovenosa durante a sessão de hemodiálise. J Health Sci Inst, v.29,n. 2, p. 110-113, 2011. Disponível em: https://repositorio.unip.br/wp-content/uploads/2020/12/V29_n2_2011_p110-113.pdf Acesso em: 22 maio 2019.

SILVA, MS; MARINI, TSO; SILVA, CFB. Enfermagem e Suas Intervenções Nas Principais Complicações Ocorridas Durante a Sessão de Hemodiálise. Rev. Enfermagem e Saúde Coletiva. Rio de Janeiro, v.1, n. 2, p. 45-60, 2016.

Disponível em: [file:///C:/Users/Eliana/Desktop/Downloads/7-33-1-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Eliana/Desktop/Downloads/7-33-1-PB%20(1).pdf) Acesso em: 20 abr 2019.

SIVIERO, PCL; MACHADO, CJ; CHERCHIGLIA, ML. Insuficiência Renal Crônica no Brasil segundo enfoque de causas múltiplas de morte. Cad. Saúde Colet. Rio de Janeiro, v. 22, n.1, p.75-85, 2014. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/cadsc/v22n1/1414-462X-cadsc-22-01-00075.pdf> Acessado em: 27 maio 2019.

Capítulo 3

10.37423/211004873

HUMANIZAÇÃO E CUIDADOS ONCOLÓGICOS: SUBSÍDIOS PARA A ATUAÇÃO DE ENFERMAGEM

Rafael da Silva Ferreira

*Enfermeiro. Graduado pelo Centro
Universitário Estácio de Juiz de Fora, Brasil.*

Laércio Deleon de Melo

*Doutorando em Enfermagem pela
Universidade do Estado do Rio de Janeiro,
Brasil*

Eliana Amaro de Carvalho Caldeira

*Doutoranda em Saúde Coletiva pela
Universidade Federal e Juiz de Fora, Brasil.*

Raquel de Oliveira Martins Fernandes

*Mestre em Enfermagem pela Universidade
Federal de Juiz de Fora, Brasil.*

Thaís Vidal de Oliveira

*Mestre em Enfermagem pela Universidade
Federal de Juiz de Fora, Brasil.*

Bianca Silva Duque Souza

*Mestranda em Saúde Coletiva pela
Universidade Federal de Juiz de Fora, Brasil.*

Paulo Henrique Bezerra da Silva

*Acadêmico de Enfermagem pelo Centro
Universitário Estácio de Juiz de Fora, Brasil.*

Camila Cristina Gregório de Assis

*Mestranda em Enfermagem pela
Universidade Federal de Juiz de Fora, Brasil.*

Osiele de Carvalho Petermann

*Graduada em Enfermagem pelo Centro
Universitário Estácio Juiz de Fora, Brasil.*

Joana Carvalho Barros

*Acadêmica em Enfermagem. Centro
Universitário Estácio de Juiz de Fora, Brasil.*

Resumo: Introdução: a assistência multiprofissional como abordagem interdisciplinar e humanizada ao paciente oncológico deve contemplar as dimensões e diretrizes da Política Nacional de Humanização que engloba o acolhimento, a clínica ampliada, a cogestão, a defesa dos direitos do usuário, com ações que foquem sobre o desenvolvimento de novas pesquisas e investimentos que sejam capazes de abarcar os diferentes grupos de fragilidade e sofrimento humano. **Objetivo:** descrever os cuidados de enfermagem aos pacientes oncológicos hospitalizados, ressaltando-se os objetivos da política de humanização para o planejamento do cuidar. **Metodologia:** foi realizada uma pesquisa bibliográfica, a partir de uma revisão de literatura, nas seguintes base de dados eletrônicas, Biblioteca Virtual da Saúde (BVS), base de dados da Enfermagem (Bdenf), e Scientific Eletronic Library Online (SciELO), através dos descritores de ciências da Saúde: “Humanização da Assistência”, “Cuidados de Enfermagem” e “Enfermagem Oncológica” no período de 05 de julho a 20 de setembro de 2021. **Desenvolvimento:** a assistência interdisciplinar e humanizada ao paciente oncológico deve contemplar as dimensões e diretrizes da Política nacional de Humanização, a saber: acolhimento; clínica ampliada; cogestão; defesa dos direitos dos usuários e redes; valorização do trabalho e do trabalhador e; construção da memória do SUS. **Considerações Finais:** o enfermeiro deve ter como foco principal o acolhimento, aos princípios do Sistema Único de Saúde dos direitos do usuário, atuação clínica de forma multidimensional, para a (eliminação/minimização) (prevenção/alívio) do sofrimento humano, na qual a filosofia de cuidados paliativos merece destaque.

Palavras-chave: Humanização da Assistência; Cuidados de Enfermagem; Enfermagem Oncológica.

1 INTRODUÇÃO

O conceito de câncer engloba cerca de 100 patologias que envolvem a ocorrência de um crescimento desordenado e acelerado das células. Essas alterações podem caracterizar-se em tumores benignos, neste caso não ocorre a invasão de tecidos adjacentes, e malignos, os quais possuem a capacidade de invasão e de se espalharem por outros órgãos e estruturas corpóreas, conhecido como metástases, que possuem causas multifatoriais para o seu surgimento. Este pode acometer diversos órgãos do corpo e as três principais causas por gênero envolvem, para os homens, próstata (29,2%), traqueia, brônquios, pulmão (7,9%), colon e reto (9,1%) e; mulheres: mama (29,7%), cólon e reto (9,2%) e colo de útero (7,5%) (BRASIL, 2020).

Estima-se que para o ano de 2030 em relação ao câncer, no mundo equivalem ao surgimento de 27 milhões de novos casos, 17 milhões de óbitos e uma média de 75 milhões de pessoas em tratamento anual. O Instituto Nacional do Câncer (INCA) em suas previsões para o Brasil nos anos de 2020/2022, realizadas em 2019, foram equivalentes ao surgimento de 62.5000 novos casos de câncer ao ano (BRASIL, 2020).

A significância do câncer e de suas estatísticas assusta de modo a direcionar a sociedade sobre novas discussões, investimentos e estudos a respeito de novos tratamentos, possibilidades de cura e prognóstico apropriado aos diferentes tipos de câncer. No entanto, muitas vezes, o tratamento se torna difícil e a morte como desfecho (trocaria resultado final por desfecho) é reafirmada como algo inevitável que requer apenas uma questão de tempo no que tange as neoplasias (os tumores malignos).

Neste âmbito, o processo de adoecimento por câncer pode abreviar o tempo de vida, e por essa razão, o paciente necessita de um cuidado interdisciplinar com abordagem paliativa, visando a humanização e a qualidade de vida (ALVES et al., 2019).

A incidência do câncer tem aumentado a demanda por serviços especializados e humanizados, para o paciente e sua família, pois ambos vivenciam diversas hospitalizações decorrentes do tratamento e intercorrências relacionadas ao curso da doença.

O Enfermeiro deve estar atento aos cuidados paliativos com foco nos princípios que incluem: reafirmar a importância da vida, considerando a morte como um processo natural; estabelecer um cuidado que não acelere a morte, nem a prolongue com medidas desproporcionais; propiciar alívio da dor e de outros sintomas causadores de sofrimento; integrar os aspectos psicológicos e espirituais na estratégia

do cuidado; oferecer apoio à família para que ela possa enfrentar a doença do paciente e sobreviver ao período de luto (D'ALESSANDRO, et, al., 2021).

A dinâmica dos cuidados oncológicos pode ser inserida ainda no contexto da Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde (ANPPS) do Ministério da Saúde (MS), que possui como um dos eixos temáticos chaves, relacionados ao objeto desta investigação, a abordagem das Doenças Crônicas Não-transmissíveis (DCNT's) com ações que foquem sobre o desenvolvimento de novas pesquisas e investimentos que sejam capazes de abarcar os diferentes graus de fragilidade e do sofrimento humano (BRASIL, 2018).

Indo de encontro a ANPPS, tem-se à assistência oncológica que envolve uma abordagem ampla cujo foco está no atendimento dos cuidados prioritários ao paciente e a seus familiares. Para tanto a equipe de atendimento precisa ser composta de forma multidisciplinar sendo preciso que os profissionais atuem de forma interdisciplinar e possuam uma postura voltada aos cuidados hospitalares visando à dignidade e totalidade do ser humano, de modo que se envolva na relação interpessoal entre os profissionais que cuidam e aqueles que são cuidados, sendo as intervenções técnicas consideradas secundárias em relação ao bem estar do paciente, conforme visão paliativa na abordagem das neoplasias (MOLIM, et, al., 2021).

Em 2018, foram lançadas cinco recomendações *Choosing Wisely* Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB) das quais três são referentes à temática de cuidados oncológicos no contexto da UTI, a saber: não manter o paciente imobilizado no leito sem a devida indicação; não utilizar ou manter dispositivos invasivos caso não haja critérios precisos de sua necessidade e não oferecer suporte avançado de vida a pacientes que não tenham a possibilidade de recuperação (LOBO, et, al., 2020).

Sendo assim, a relevância da presente investigação, além de estar alinhada com a ANPPS (BRASIL, 2018), está na possibilidade de contribuir para que os enfermeiros se municiem e sejam implementados recursos humanizados de cuidado na sua atuação diante de pacientes oncológicos, trazendo seus benefícios a pacientes e familiares nos diversos ambientes onde seja dispensado o cuidado de enfermagem, suprimindo uma demanda que ao longo do tempo será cada vez maior (PAIVA, 2021; SOUZA, 2021)

A justificativa desta está no fato de minha mãe ter sido acometida por uma doença oncológica, tendo sido hospitalizada, onde eu identifiquei uma carência de cuidados humanizados por parte dos profissionais atuantes no hospital. A partir de então, me mobilizei quanto a necessidade de um saber

aprimorado sobre a humanização dos enfermeiros para pacientes oncológicos, que se encontram na fase final de vida.

Diante do exposto, foram questões de pesquisa motivacionais à construção desta investigação: como ocorre o processo de humanização nos cuidados oncológicos a pacientes oncológicos hospitalizados? Quais são os subsídios da política de humanização capazes de contribuir para a atuação do enfermeiro no contexto de cuidados oncológicos?

Nesta perspectiva, o objeto desta investigação foram os cuidados humanizados em oncologia e seus subsídios para a atuação do enfermeiro. Sendo assim o objetivo desta revisão foi descrever os cuidados de enfermagem aos pacientes oncológicos hospitalizados, ressaltando-se os subsídios da política de humanização para o planejamento do cuidar em enfermagem.

Trata-se de um artigo de revisão da literatura que reúne achados de estudos desenvolvidos mediante diferentes metodologias, permitindo aos autores sintetizar e reduzir os resultados, sem ferir a origem científica das investigações incluídas. A escolha deste método inclui: análise de pesquisas relevantes que dão suporte para a tomada de decisão e a melhoria da prática clínica; possibilidades de síntese do estado da arte a respeito de determinado objeto, captar lacunas do conhecimento científico que precisam ser preenchidas com a realização de novas pesquisas, e possibilita conclusões gerais a respeito de uma temática particular de investigação (SOUSA et al., 2018; CASARIN et al., 2020; MELO et al., 2021)

Foram seguidas as seguintes etapas: 1) identificação do tema e seleção da questão de pesquisa; 2) elaboração de critérios para inclusão/exclusão de estudos/amostragem ou busca na literatura; 3) definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados/categorização dos estudos; 4) análise dos dados (avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa); 5) interpretação dos resultados; e 6) apresentação da revisão/síntese do conhecimento (SOUSA et al., 2018; CASARIN et al., 2020; MELO et al., 2021).

Foram critérios de inclusão: a) disponíveis online na íntegra em todos os idiomas b) apresentar os descritores: “Humanização da Assistência”, “Cuidados de Enfermagem” e “Enfermagem Oncológica”, de acordo com os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), com auxílio do operador Booleano *AND* e como recurso de pesquisa às opções: texto completo – disponível; limites – humanos; idioma - todos e; tipo de documento - artigo; c) ter sido publicado nos últimos seis anos; d) estar publicado em forma de artigo científico. O critério de exclusão abarcou as produções repetidas nas bases de dados ou indexadas em mais de um idioma.

Foi realizada busca das produções na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) a partir da base de dados Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), Base de Dados da Enfermagem (Bdenf) e *Scientific Eletronic Library Online (SciELO)*. Foram encontrados 119 artigos científicos, destes foram selecionados 19, conforme critérios de inclusão e exclusão estabelecidos e que foram capazes de responder ao objetivo desta investigação, no período de 05 de julho a 20 de setembro de 2021.

2 DESENVOLVIMENTO

No desenvolvimento da temática em resposta ao objetivo desta investigação optou-se pela apresentação dos resultados de forma estruturada em: contextualização do câncer; assistência interdisciplinar e humanizada em oncologia e; cuidados de enfermagem e humanização da assistência oncológica, conforme apresentado a seguir.

2.1- CONTEXTUALIZANDO DO CÂNCER

De acordo o INCA o termo câncer surgiu do grego *karkínos*, cujo significado é caranguejo. O médico e pesquisador, considerado pai da medicina, Hipócrates, foi quem se referiu ao tema pela primeira vez. Hipócrates viveu no período de 460 e 377 A.C., o que demonstra que a doença não é recente, pelo contrário, estudos demonstram que este foi detectado ainda em múmias egípcias o que evidencia que este já acometia o homem há mais de 3 mil anos a.C. (BRASIL, 2010).

Desta forma, percebe-se que desde a antiguidade, o câncer esteve presente de forma na vida do ser humano. Com o desenvolver de hábitos e costumes de cada civilização, ela passa a ser vivenciada de formas diferentes, despertando em sua trajetória o temor do sofrimento e da morte (Borges, et al., 2018). Durante muitos anos, o câncer foi compreendido como um mal que atingia todo o corpo do indivíduo, devido ao desequilíbrio orgânico, de fatores ambientais ou hereditários (ABEN-ATHAR, et al., 2021).

Na visão de Martins (2021), o câncer pode ser considerado como uma doença genética, onde as células se dividem duplicando seu genoma; durante o processo de cópia, genes podem ser alterados. Ocorre que a célula defeituosa começa a multiplicar o seu defeito dando lugar a outros, numa cadeia que vai sempre resultando em mais defeitos.

Tem-se como sinais nestes casos, a autossuficiência em sinais de crescimento, insensibilidade para sinais de inibição de crescimento, evasão da morte celular programada, potencial ilimitado de replicação, angiogênese sustentada, capacidade de invadir tecidos e criar metástases. Os sintomas

mais comuns são dor, perda de peso, febre, hemorragia, inchaço anormal em determinados locais, sudorese, entre outros, conforme o diagnóstico (BRASIL, 2020).

2.2- ASSISTÊNCIA INTERDISCIPLINAR E HUMANIZADA EM ONCOLOGIA

A interdisciplinaridade não é um termo fácil de conceituar por não apresentar um único sentido. É algo dinâmico que requer o envolvimento e esforço de várias pessoas, considerado específico e necessário nos diferentes campos de atuação, seja no âmbito do ensino, da pesquisa ou nos ambientes de trabalho, promovendo uma assistência de qualidade e efetiva (ZANELLI, et al., 2021).

Os profissionais que devem atuar de maneira interdisciplinar são todos os envolvidos no cuidado, na qual as atribuições da equipe deverão ser compatíveis com as necessidades individuais de cada paciente e sua família (MOLIM, et al., 2021).

A interdisciplinaridade é o grau mais elevado de interação entre as disciplinas, pois defende o compartilhamento destas profissões na mesma plataforma de trabalho, com foco em conceitos comuns onde a humanização e a assistência ao paciente são o centro do atendimento. O trabalho em equipe resgata o processo de aprender a aprender, principalmente no convívio, tornando-se um desafio para os que atuam como enfermeiro (ZANELLI, et al., 2021).

Para Ribeiro (2021) é preciso que a equipe multiprofissional tenha experiência em promover o cuidado paliativo na UTI aos pacientes fora de possibilidades terapêuticas curativas, relacionando aos seguintes temas: paliar: controlar sintomas, humanização da assistência; vivenciar o processo de morte, ressignificar o cuidado e desafios para a equipe multiprofissional no cuidado paliativo.

Os cuidados paliativos surgiram como uma modalidade terapêutica, cujo propósito visa melhorar a qualidade de vida através do alívio do sofrimento dos pacientes e seus familiares mediante o enfrentamento de doenças que ameaçam a continuidade da vida. Ao enfrentar a doença oncológica, o paciente e familiar se depara com sofrimentos de diversas origens (MOLIM, et al., 2021).

Compreende-se como cuidados paliativos toda atitude realizada no paciente cuja doença não respondeu ao tratamento curativo, estando este sob o controle da dor e de outros sintomas como: problemas psicológicos, sociais e espirituais, com o propósito de alcançar maior qualidade de vida para o paciente e sua família (ALVES, et al., 2019).

Estes cuidados envolvem o conceito de humanização sendo esta uma estratégia presente na atenção à saúde. Conforme (VARGENS, et al., 2017) ressalta que “a humanização no atendimento ao paciente

é uma estratégia que deve estar presente nos diversos níveis de atenção à saúde”. Desse modo, faz-se necessário um cuidado que envolva múltiplos profissionais de modo que se contemplem as diferentes dimensões afetadas devido ao surgimento e enfrentamento do câncer e possibilite o compartilhamento de informações e conhecimentos visando à promoção do bem estar do paciente.

Segundo Campos (2021), o Programa Nacional de Humanização (PNH) tem como propósito colocar em prática os princípios do SUS nos serviços de saúde prestados à comunidade, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. Um dos princípios norteadores do SUS está no princípio da integridade que coloca como prioridade a concepção de saúde/doença, o funcionamento dos serviços de saúde em rede, a organização do processo de trabalho no campo da saúde.

A assistência multiprofissional de forma interdisciplinar e humanizada ao paciente oncológico deve contemplar as dimensões e diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH), a saber, acolhimento, clínica ampliada, cogestão, defesa dos direitos do usuário, fomento de grupidades, coletivos e redes, valorização do trabalho e do trabalhador e construção da memória do SUS (BRASIL, 2010).

No que tange a humanização em oncologia é consensual que para se adquirir um atendimento adequado é preciso que haja uma capacitação da equipe com frequente treinamento em serviço, disseminação da política de humanização da assistência, redução da rotatividade e dos remanejamentos entre os funcionários da equipe de enfermagem, investimento no quantitativo de recursos humanos e existência de leitos para acolher especificamente as pessoas em cuidados paliativos (MOLIM, et al, 2021).

Esta perspectiva de cuidados oncológicos de forma interdisciplinar, cujas ações do enfermeiro e sua equipe são pautadas nos princípios da humanização.

2.3 - CUIDADOS DE ENFERMAGEM E HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA

A humanização faz parte da história da enfermagem, uma vez que, o princípio da profissão é a abordagem dos pacientes respeitando-se sua singularidade, individualidade, história de vida, seus diferentes pudores e intimidades, preservando-se sua autonomia e estimulando-se o autocuidado. O paciente precisa ser identificado como indivíduo que tem buscado enfrentar as diferentes barreiras propostas pela doença. Sendo assim, a indicação do cuidar da enfermagem para levar conforto e segurança, tanto para o paciente quanto a seus familiares (SILVA, 2021).

A capacidade de ouvir o paciente pode se tornar uma possibilidade de cura tornando-se um fator importante para o profissional da saúde, que ao desenvolver essa habilidade, conseguirá uma maior visão sobre a necessidade de não estar sozinho no ato de cuidar. A comunicação pode ser realizada de diversas formas, mas sempre como um mecanismo de manifestação e validação dos direitos do paciente (LIVIAS, et al., 2021).

Para que os procedimentos e intervenções de enfermagem possam ocorrer de forma adequada e humanizada é preciso que as habilidades do enfermeiro sejam voltadas para a avaliação sistemática dos sinais e sintomas no intuito de promover um cuidado integral focando sempre as prioridades para cada indivíduo, considerando a interação da dinâmica familiar e especialmente para o reforço das orientações clínicas, a fim de que os objetivos terapêuticos traçados pela equipe multiprofissional sejam alcançados (DA ROSA, et al., 2021).

Os cuidados de enfermagem de forma humanizada são na verdade, cuidados sensíveis e de educação, que necessitam de ações de proximidade física e afetiva para que muitas orientações se efetivem na prática. Desta forma, como uma das competências relacionadas ao enfermeiro recebe destaque a filosofia dos Cuidados Paliativos. Cabe mencionar ainda que, “Tanto para a equipe, quanto para o paciente e para a instituição, é necessário que este profissional tenha habilidades de comunicação, pois estas asseguram o melhor desenvolvimento de suas práticas clínicas” (DA ROSA, et al., 2021).

“O enfermeiro tem papel fundamental nos cuidados paliativos assim como na aceitação do diagnóstico e auxílio para conviver com a doença” (Paiva et al., 2020). Desta forma ele irá desenvolver uma assistência integral ao paciente e seus familiares, através da escuta atenta com intuito de minimizar ansiedade de todos devido ao medo da doença e do futuro do paciente.

Os pacientes acometidos por esta patologia sofrem com dores constantes de origens físicas, psicogênicas e sociais. As psicogênicas têm origem na dor psicológica, pois o enfermo sofre influências de diversos fatores, como medo, angústia, ansiedade, solidão, isolamento, além de conflitos internos que envolvem aspectos espirituais e sociais, o que provoca uma síndrome dolorosa denominada dor psicossocial (DE CASTRO, 2021).

O paciente oncológico pode vir a sofrer de dor crônica, sendo um dos sintomas que mais levam ao sofrimento tanto do paciente como de seus familiares, cabendo destacar que o controle e o alívio da dor, a minimização do desconforto e do sofrimento é uma das preocupações mais presentes do profissional de enfermagem nas unidades de cuidados paliativos (DE PAULA SANTOS, et al., 2021).

O enfermeiro possui capacidade para identificar, avaliar e manejar o controle de dor do paciente, administrando os medicamentos prescritos, assim como gerenciando as medidas não farmacológicas. Estas medidas são muitas das vezes prescritas por outros profissionais não médicos, enfatizando a importância do trabalho interdisciplinar (ARAUJO, et al., 2021).

Quem direciona o gerenciamento da dor do paciente é o enfermeiro, para tanto há uma necessidade de maior conhecimento de estratégias para o exercício da assistência qualificada para o controle e manejo da dor (ARAUJO, et al., 2021).

Nesta perspectiva, a dor é considerada um dos motivos do sofrimento humano, uma vez que ela pode levar ao surgimento de incapacidades, comprometer a qualidade de vida e ocasionar repercussões psicossociais e econômicas. A dor aguda pode mudar os hábitos diários do paciente como o sono, apetite, libido, irritabilidade, alterações de energia, reduzir a capacidade de concentração, além de ocasionar dificuldades em atividades familiares, profissionais e sociais (DE CASTRO, 2021).

O enfermeiro precisa explorar a queixa de dor, coletando dados sobre fatores agravantes, atenuantes e concomitantes, verificando os antecedentes pessoais e familiares, classificando a dor a partir de escalas padronizadas, de modo que a promoção do alívio da dor exige habilidades, conhecimentos, compromisso com o cuidado e, tomada de decisão por parte do enfermeiro (DE CASTRO, 2021).

No que se refere à parte social e familiar, lidamos com o binômio paciente e família, considerados também como foco de atenção e cuidados durante todo o processo de cuidado. O familiar está presente na maior parte dos atendimentos e muitas das vezes se envolve nas situações causadoras de sofrimento. Vale ressaltar que em leitos humanizados, e em leitos que possuem visita ampliada, deve-se ter o cuidado em alguns casos, de não considerar a presença de familiares ou do cuidador como, por exemplo, durante intervenções, procedimentos e atendimento a intercorrências (SILVA et al., 2019).

Na abordagem de Beserra (2020), o câncer traz uma perceptiva de futuro incerto para os pacientes e familiares, podendo ser um fator de estresse físico e psicológico, pois percebem-se vulneráveis quanto a reflexão da possibilidade da morte e da terminalidade da vida. Situações estas que merecem atenção especial do enfermeiro e um acompanhamento mais próximo e íntimo das etapas do processo de morrer. Sendo fica evidente a importância do suporte psicológico para a equipe de enfermagem e para o paciente e seus familiares.

Pelo exposto, é preciso que o profissional de enfermagem aprenda a lidar com as perdas em um contexto de doença sem prognóstico ou fora de possibilidades terapêuticas. O cuidar de pessoas com doenças terminais e seus familiares é uma atividade ou um modelo de atenção à saúde ou de cuidados paliativos, fato que ainda é considerado um desafio aos diferentes profissionais no contexto intensivo, uma vez que, a formação capacita o profissional para tratar e curar e ainda identificamos algumas lacunas referentes à formação profissional no que tange o lidar com a perda e com o luto de cada paciente que culmina no óbito rotineiramente nos diferentes contextos (LIMA, et al., 2020).

Em muitos casos torna-se nítido o cuidado dos profissionais com as pessoas fora de possibilidades terapêuticas, por meio de dedicação e esforço para assumem um trabalho árduo, complexo e que demanda o domínio de muitas habilidades do enfermeiro para a sua efetivação (LIMA, et al., 2020).

Na visão de Silva (2020) as intervenções de enfermagem à família ou ao paciente em fase terminal visam ajudá-los a lidar com a situação e melhorar a sua qualidade de vida. Tais intervenções são: capacitação; conhecimento da família; compreensão; escuta sensível; acompanhamento; envolvimento nos cuidados; suporte emocional; promoção de informação e educação, cuidados espirituais e a promoção de momentos de descanso e/ou privacidades no contato familiar.

Os cuidados espirituais envolvem a religiosidade e a espiritualidade destes e de seus familiares. Elementos estes que são considerados uma importante aliada para os pacientes e seus familiares e requer uma atenção do olhar do enfermeiro ao planejar o cuidado. Como fatores positivos desta dimensão de cuidado, evidências científicas apontam que gera melhoras na saúde mental, redução de estresse, e maior cooperação e envolvimento do paciente no tratamento (MARTINS, et al., 2021).

De modo a englobar-se a espiritualidade do paciente aos cuidados oferecidos, os cuidados paliativos possuem sua filosofia voltada para os cuidados que irão avaliar o paciente dentro das dimensões que o compõem, oferecendo aos pacientes um conforto e alívio necessário, buscando diminuir os efeitos decorrentes de uma situação fisiológica desfavorável, oriunda de um quadro patológico que não responde mais a intervenções terapêuticas curativas (DE LIMA BRANDÃO et al., 2020).

É preciso que a equipe de enfermagem leve em consideração o contexto social que os pacientes oncológicos vivem, para que estejam habilitados para o atendimento destes, agregando a este e sua família, um possível processo de morte que evidenciem as crenças e valores, respeitando-os e acolhendo-os. A equipe precisa ser multiprofissional com condições de promover os aspectos voltados à filosofia religiosa, respeito às crenças e valores do enfermo (CHEMIN et al., 2020).

Estes cuidados estão relacionados ao ato de preocupar-se com os pacientes sem possibilidades de cura. Os pacientes paliativos são os que mais necessitam de cuidados especiais. A equipe direcionada aos pacientes oncológicos não podem ter como foco a cura da patologia, pois nem sempre será possível, mas o foco está no cuidado com os pacientes e familiares (COUTINHO, et al., 2020).

A efetivação do cuidado irá contribuir para a humanização da assistência em pacientes oncológicos tendo como suporte a perspectiva verbal e corporal, o ato de ficar ao lado, dar suporte, tocar o paciente e estar sempre sorrindo, o toque e a escuta que integram a assistência do cuidado sendo considerados como recursos fundamentais para o processo de cura, reabilitação ou prognóstico de bem estar do paciente (ANACLETO, et al., 2020).

Para que o enfermeiro consiga dar suporte adequado a estes pacientes ele precisa estar preparado, psicologicamente, com treinamentos e capacitações que demonstrem aos mesmos, forma de agir e cuidar do paciente oncológico. O aperfeiçoamento e a reciclagem do aprendizado elevam a compreensão da importância dos cuidados paliativos e buscam minimizar desgaste emocional do enfermeiro que enfrentará suas próprias angústias e preconceitos (MARTINS, et al., 2021).

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os subsídios da política de humanização para o planejamento do cuidar em enfermagem de forma direcionada aos pacientes oncológicos hospitalizados devem estar pautados na assistência interdisciplinar de modo a se contemplar as dimensões e diretrizes da PNH.

O Enfermeiro deve ter como foco principal: acolhimento, respeito aos princípios do SUS, defesa dos direitos do usuário e; atuação clínica de forma multidimensional cujo principal objetivo seja a eliminação/minimização do sofrimento humano, na qual a filosofia de cuidados paliativos merece destaque.

Visto que, a maioria dos pacientes em cuidados oncológicos, sofrem com dores crônicas que possui diferentes origens, o controle da dor e a promoção do conforto e qualidade de vida devem ser prioritários no planejamento das intervenções do Enfermeiro e sua equipe. O que se espera da liderança do Enfermeiro sobre seu setor e equipe é que este seja instrumento da viabilização do cuidado multidimensional baseado no conceito ampliado de saúde que vise à promoção do bem-estar físico, mental, bio-psico-sócio-cultural e espiritual.

Reconhece-se como possíveis limites desta investigação: o recorte de tempo escolhido, uma vez que não foram utilizadas todas as publicações existentes independente do tempo de publicação; a inclusão

dos artigos apenas na língua portuguesa, uma vez que o predomínio de publicações ocorre nos demais idiomas.

Como sugestão dos autores, acredita-se que os resultados desta investigação possam servir de motivadores para futuras pesquisas de em unidades hospitalares que possuam a prática de cuidados oncológicos implantadas com base na PNH como rotina terapêutica.

REFERÊNCIAS

Aben-Athar CYUP, Sousa MM, Costa MSCR, Ueno TMRL, Sousa FJD, Ferreira GRON, Ramos AMPC. Conhecimento de enfermeiros sobre genética e genômica aplicados ao câncer de mama. REME - Rev Min Enferm. 2021. Acessado em 27 de setembro 2021. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/FabianneSousa/publication/354037232_NURSE'S_KNOWLEDGE_ABOUT_GENETICS_AND_GENOMICS_APPLIED_TO_BREAST_CANCER/links/612664601027f73d367cffee/NURSES-KNOWLEDGE-ABOUT-GENETICS-AND-GENOMICS-APPLIED-TO-BREAST-CANCER.pdfDOI: 10.5935/1415.2762.20210028

ALVES, Railda Sabino Fernandes et al. Cuidados paliativos: alternativa para o cuidado essencial no fim da vida. Psicologia: Ciência e Profissão, v. 39, 2019. Acesso em 16 setembro 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pcp/a/NSScM87z94MQRGL8RPtBGzJ/?lang=pt&format=html>

ANACLETO, Graziela; CECCHETTO, Fátima Helena; RIEGEL, Fernando. Cuidado de enfermagem humanizado ao paciente oncológico: revisão integrativa. Revista Enfermagem Contemporânea, v. 9, n. 2, p. 246-254, 2020. Acesso em 27 setembro 2021. Disponível em:

file:///C:/Users/enfermagem/Downloads/2737-Texto%20do%20Artigo-20860-1-10-20201027.pdf

ARAÚJO, Luanne Gomes et al. Cuidados paliativos em pacientes oncológicos: uma abordagem do conhecimento dos enfermeiros. Revista Eletrônica Acervo Saúde, v. 12, n. 11, p. e4663-e4663, 2020. Acesso em 16 setembro 2021. Disponível em:

<https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/4663/3136>

BESERRA, Jessica Helaine Gomes Nascimento; AGUIAR, Ricardo Saraiva. Sentimentos vivenciados pela equipe de enfermagem perante o tratamento de pacientes com câncer: revisão integrativa. Revista de Divulgação Científica Sena Aires, v. 9, n. 1, p. 144-155, 2020. Acesso em 27 setembro 2021. Disponível em: <http://revistafacesa.senaaires.com.br/index.php/revisa/article/view/485>

BORGES, Jean Elyson Rodrigues. (Re) pensando a morte: uma análise sócio-histórica sobre a relação do homem com sua condição de finitude. 2018. Acesso em 16 setembro 2021. Disponível em: http://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/41451/1/2018_tcc_jerborges.pdf

BRASIL. Ministério da Saúde (MS). Agenda de Prioridades de Pesquisa do Ministério da Saúde – APPMS. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Departamento de Ciência e Tecnologia – Brasília: MS, 2018. 26p.: il. ISBN 978-85-334-2680-1. Modo de acesso: World Wide Web: http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/agenda_prioridades_pesquisa_ms.pdf> Acesso em: 05 Abril. 19.

BRASIL. Instituto Nacional de Câncer (Brasil). ABC do câncer: abordagens básicas para o controle do câncer. Instituto Nacional de Câncer. Rio de Janeiro: Inca, 2020

<https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files//media/document//livro-abc-6-edicao2020.pdf> Acesso em 07. setembro. 21

BRASIL. Ministério da Saúde (MS). Agenda de Prioridades de Pesquisa do Ministério da Saúde – APPMS. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Departamento de Ciência e Tecnologia – Brasília: MS, 2018. 26p.: il. ISBN 978-85-334-2680-1. Modo de acesso: World Wide Web:

http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/agenda_prioridades_pesquisa_ms.pdf> Acesso em: 05 Abril. 19.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização. Humaniza SUS: Documento base para gestores e trabalhadores do SUS / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização. – 4. ed. 4. reimp. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2010

CAMPOS, Marcelly André; DA SILVA, Livio Junio Rocha; OLIVEIRA, Guilherme Sacheto. HUMANIZAÇÃO: UMA REFLEXÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DO CUIDADO NA ENFERMAGEM. Revista Transformar, v. 15, n. 1, p. 447-455, 2021. Acesso em 27 Setembro 2021. Disponível em:

<file:///C:/Users/bianca/Downloads/508-1128-1-SM.pdf>

CASARIN, S. T., PORTO, A. R., GABATZ, R. I. B., et al. Tipos de revisão de literatura: considerações das editoras do Journal of Nursing and Health. Journal of Nursing and Health, v.10, n.5, p.e20104031, 2020. Acesso em 03 Setembro 2021. Disponível em:

<https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/enfermagem/article/view/19924/11995>

COUTINHO, Verailza Santos; DOS SANTOS MAIA, Luiz Faustino. PACIENTES ONCOLÓGICOS TERMINAIS: DESAFIOS DO ENFERMEIRO NA PERCEPÇÃO E ENFRENTAMENTO DOS CUIDADOS PALIATIVOS. Revista Atenas Higeia, v. 2, n. 2, p. 27-32, 2020. Acesso em 27 setembro 2021. Disponível em: <http://atenas.edu.br/revista/index.php/higeia/article/view/45/47>

CHEMIN, Marcia Regina Chizini; SOUZA, Waldir. Assistência espiritual em cuidados paliativos como uma atuação profissional. REVER-Revista de Estudos da Religião, v. 20, n. 2, p. 153-169, 2020. Acesso em 27 setembro 2021. Disponível em:

<https://revistas.pucsp.br/index.php/rever/article/view/50691/33113>

DA ROSA, Naiane Maia et al. O PAPEL DA EQUIPE DE ENFERMAGEM FRENTE AOS CUIDADOS PALIATIVOS EM PACIENTES ONCOLÓGICOS. DêCiência em Foco, v. 4, n. 2, p. 82-93, 2021. Acesso em 27 setembro 2021. Disponível em

<http://revistas.uninorteac.com.br/index.php/DeCienciaemFoco0/article/view/532>

DE LIMA BRANDÃO, Juliana et al. Espiritualidade e Religiosidade no contexto da integralidade da assistência: reflexões sobre o cuidado integral em saúde e enfermagem. Research, Society and Development, v. 9, n. 10, p. e5499108780-e5499108780, 2020. Acesso em 27 setembro 2021. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/8780/7913>

DE CASTRO, Maria Cristina Freitas et al. Dor total e teoria do conforto: implicações no cuidado ao paciente em cuidados paliativos oncológicos. Revista Gaúcha de Enfermagem, v. 42, 2021. Acesso em 27 setembro 2021. Disponível em: <https://www.seer.ufrgs.br/rgenf/article/view/117694>

D’ALESSANDRO, M. P. S., PIRES, C. T., FORTE, D. N., et al. Manual de Cuidados Paliativos. - São Paulo: Hospital Sírio Libanês / MS; 2020. 175p. Acesso em: 30 Abril 2021. Disponível em: <https://antigo.saude.gov.br/images/pdf/2020/September/17/Manual-CuidadosPaliativos-vers--o-final.pdf>

DE PAULA SANTOS, Letícia et al. Manejo seguro de opioides usados no cuidado paliativo: revisão narrativa. Revista Eletrônica Acervo Saúde, v. 13, n. 6, p. e7665-e7665, 2021. Acesso em 16 setembro 2021. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/7665/4918>

LIMA, Maria Costa; DE ARAÚJO, Andrey Hudson Interaminense Mendes; MENDES, Mariana Ildnês de Oliveira Interaminense. A INFLUÊNCIA DOS CUIDADOS DE ENFERMAGEM E A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NO LUTO DA FAMÍLIA: UMA REVISÃO DA LITERATURA. Revista JRG de Estudos Acadêmicos, v. 3, n. 7, p. 516-534, 2020. Acesso em: 27 Setembro 2021. Disponível em: <http://www.revistajrg.com/index.php/jrg/article/view/80>

LIVIAS, ABNER FONSECA et al. Capacidade de comunicação e satisfação dos pacientes em serviços de ambulatório. Revista de Saúde Pública, v. 24, n. 1, pág. 72-81, 2020. Acesso em: 16 Setembro 2021. Disponível em: [file:///C:/Users/bianca/Downloads/27378-Texto%20del%20art%C3%ADculo-87212-1-10-20200507%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/bianca/Downloads/27378-Texto%20del%20art%C3%ADculo-87212-1-10-20200507%20(3).pdf)

LOBO, Suzana Margareth; MENDES, Ciro Leite; REZENDE, Ederlon. Choosing Wisely para a medicina intensiva. Revista Brasileira de Terapia Intensiva, v. 32, p. 11-13, 2020. Acesso em: 27 Setembro 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbti/a/pdsFKnZXzsxRhx9f57g6mmz/?format=html&lang=pt>

MARTINS, Joyce Santos et al. Espiritualidade no enfrentamento do tratamento oncológico: revisão integrativa da literatura. Revista Pró-univerSUS, v. 12, n. 1, p. 116-124, 2021. Acesso em: 27 Setembro 2021. Disponível em: <file:///C:/Users/enfermagem/Downloads/2765-Texto%20do%20artigo-13503-1-10-20210622.pdf>

MARTINS, Amália Fernandes. Intervenção do enfermeiro na capacitação do cuidador informal para cuidar do doente em últimos dias e horas de vida no contexto domiciliário. 2021. Tese de Doutorado. Acesso em: 27 Setembro 2021. Disponível em: <https://repositorio.ipcb.pt/handle/10400.11/7509>

MARTINS, André Ricardo Alves et al. Os genes e o câncer: estudando e construindo histórias em quadrinhos para compreender o câncer como uma doença genética. 2021. Acesso em: 27 Setembro 2021. Disponível em:

https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:UHjBWT0wKYMJ:scholar.google.com/+c%C3%A2ncer+doen%C3%A7a+gen%C3%A9tica+duplica%C3%A7%C3%A3o+celular&hl=pt-BR&as_sdt=0,5&as_ylo=2020

MELO, L. D., SOUZA, A. A. G., MAGALHÃES, D. M., et al. Anxiety of family members of children with heart disease in the preoperative phase: Reflections on the role of nurses. Research, Society and Development, v.10, n.5, p. e16210514882, 2021b. Acesso em: 03 Setembro 2021. Doi:<http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i5.14882>

MOLIN, Alana et al. Cuidados Paliativos na assistência hospitalar: A percepção da equipe multiprofissional. Brazilian Journal of Health Review, v. 4, n. 1, p. 1962-1976, 2021. Acesso em: 16 Setembro 2021. Disponível em

<https://www.brazilianjournals.com/index.php/BJHR/article/view/23718>

PAIVA, C. F., SANTOS, T. C. F., APERIBENSE, P. G. G. S., et al. Historical aspects in pain management in palliative care in an oncological reference unit. Rev. Bras. Enferm., v.74, n.5, 2021. Acesso em: 05 Setembro 2021. Doi: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2020-0761>

PAIVA, Carolina Fraga et al. Reconfiguração dos cuidados paliativos de enfermagem oncológica: contribuições da enfermagem. Revista Brasileira de Enfermagem, v. 73, 2020. Acesso em 27 setembro 2021. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/reben/a/QRcBNhQ5wFKmKhZ3sLp7N5s/?lang=pt&format=html>

RIBEIRO, Aline Lima et al. Cuidados paliativos: percepção da equipe multiprofissional atuante em uma Unidade de Terapia Intensiva. *Saúde e Pesquisa*, v. 14, n. 4, p. 1-12, 2021. Acesso em 27 setembro 2021. Disponível em: <https://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/saudpesq/article/view/8857>

SILVA, Adriana Gaspar. Cuidados nos últimos dias ou horas de vida: diagnósticos e intervenções de enfermagem. 2020. Tese de Doutorado. Acesso em 27 setembro 2021. Disponível em: <https://repositorio.ipcb.pt/handle/10400.11/7090>

SILVA, Tamires; FOGER, Debora; SANTOS, Paulo. Despersonalização do paciente oncológico hospitalizado: uma revisão integrativa. *Psicologia, Saúde & Doenças*, v. 20, n. 3, p. 651-658, 2019. Acesso em 27 setembro 2021. Disponível em: [esearchgate.net/profile/Tamires-Silva4/publication/337702365_DESPERSONALIZACAO_DO_PACIENTE_ONCOLOGICO_HOSPITALIZADO_UMA_REVISAO_INTEGRATIVA_DEPERSONALIZATION_OF_HOSPITALIZED_PATIENTS_AN_INTEGRATIVE_REVIEW/links/5f9ebaaa458515b7cfaf0fc9/DESPERSONALIZACAO-DO-PACIENTE-ONCOLOGICO-HOSPITALIZADO-UMA-REVISAO-INTEGRATIVA-DEPERSONALIZATION-OF-HOSPITALIZED-PATIENTS-AN-INTEGRATIVE-REVIEW.pdf](https://searchgate.net/profile/Tamires-Silva4/publication/337702365_DESPERSONALIZACAO_DO_PACIENTE_ONCOLOGICO_HOSPITALIZADO_UMA_REVISAO_INTEGRATIVA_DEPERSONALIZATION_OF_HOSPITALIZED_PATIENTS_AN_INTEGRATIVE_REVIEW/links/5f9ebaaa458515b7cfaf0fc9/DESPERSONALIZACAO-DO-PACIENTE-ONCOLOGICO-HOSPITALIZADO-UMA-REVISAO-INTEGRATIVA-DEPERSONALIZATION-OF-HOSPITALIZED-PATIENTS-AN-INTEGRATIVE-REVIEW.pdf)

SILVA, Ariclens dos Santos. OLIVEIRA, Thais Carneiro Ferreira Silva. MAIA, Ana Margarete Cordeiro da Silva. Assistência humanizada de enfermagem ao paciente e a família frente ao diagnóstico de câncer. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano 06, Ed. 03, Vol. 15, pp. 18-33. Março de 2021. ISSN: 2448-0959, Acesso em: 16 Setembro 2021 Link de acesso: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/saude/assistencia-humanizada>, DOI:

10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/saude/assistencia-humanizada

SOUSA, L. M. M., FIRMINO, C. F., MARQUES-VIEIRA, C. M. A., et al. Revisões da literatura científica: tipos, métodos e aplicações em enfermagem. *Revista Portuguesa de Enfermagem de Reabilitação*, v.1, n.1. p.45-54, 2018. Acesso em: 03 Setembro 2021. Disponível em:

<https://rper.aper.pt/index.php/rper/article/view/20/12>.

SOUZA, R. L. A., MUTTI, C. F., SANTOS, R. P., et al. Hospitalization perceived by children and adolescents undergoing cancer treatment. *Rev. Gaúcha Enferm*, v.42, e20200122, 2021. Acesso em: 05 Setembro 2021. Doi: <https://doi.org/10.1590/1983-1447.2021.20200122>

VARGENS, Octavio Muniz da Costa; SILVA, Alexandra Celento Vasconcellos da; PROGIANTI, Jane Márcia. The contribution of nurse midwives to consolidating humanized childbirth in maternity hospitals in Rio de Janeiro-Brazil. *Escola Anna Nery*, v. 21, 2017. Acesso em 27 setembro 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ean/a/dfNt7rwTQn7p63DYNMTC99q/?lang=en&format=html>

ZANELLI, Tauane Letícia Pinto et al. Cuidado interdisciplinar em uma clínica ensino: Percepções e processos de trabalho. *Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento*, v. 10, n. 4, pág. e31210414206-e31210414206, 2021. Acesso em: 16 Setembro 2021. Disponível em: <https://www.rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/14206/12722>

Capítulo 4

10.37423/211004874

ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE LESÃO POR PRESSÃO

Daniela Aparecida Zaquini

*Acadêmica de Enfermagem. Centro
Universitário Estácio de Juiz de Fora, Brasil.*

Joana da Silva Fernandes

*Acadêmica de Enfermagem. Centro
Universitário Estácio de Juiz de Fora, Brasil.*

Nantile Teixeira Moura

*Acadêmica de Enfermagem. Centro
Universitário Estácio de Juiz de Fora, Brasil.*

Thaís Almeida Sudré

*Acadêmica de Enfermagem. Centro
Universitário Estácio de Juiz de Fora, Brasil.*

Raquel de Oliveira Martins Fernandes

*Mestre em Enfermagem pela Universidade
Federal de Juiz de Fora, Brasil.*

Eliana Amaro de Carvalho Caldeira

*Doutoranda em Saúde Coletiva pela
Universidade Federal de Juiz de Fora, Brasil.*

Laércio Deleon de Melo

*Doutorando em Enfermagem pela
Universidade do Estado do Rio de Janeiro,
Brasil.*

Camila Cristina Gregório de Assis

*Mestranda em Enfermagem pela
Universidade Federal de Juiz de Fora, Brasil.*

Beatriz Machado Cabral

*Acadêmica de Enfermagem. Centro
Universitário Estácio de Juiz de Fora, Brasil.*

Nataniel de Sousa Rodrigues

*Enfermeiro. Graduado pelo Centro
Universitário Estácio de Juiz de Fora, Brasil.*

Resumo

Introdução: o presente estudo apresenta a atuação do enfermeiro na prevenção e no tratamento da lesão por pressão e as contribuições deste profissional durante a assistência prestada. Isso se deve ao fato de que é o principal gestor do cuidado por ser o profissional que atua 24 horas ao lado do paciente e tem autonomia para tratar lesões pautado na evidência científica. **Objetivo:** evidenciar a atuação do enfermeiro na prevenção e no tratamento da lesão por pressão. **Metodologia:** trata-se de uma revisão bibliográfica da literatura do tipo integrativa em que foram utilizados 16 artigos científicos, publicados entre 2016 e 2021, encontrados no acesso eletrônico das bases de dados: Sistema Latino Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (LILACS) e na biblioteca eletrônica *Scientific Electronic Library Online* (SciELO). **Revisão:** a partir da análise dos artigos a atuação do enfermeiro na prevenção e no tratamento de lesão por pressão obteve destaque. O enfermeiro apresentou importante contribuição no gerenciamento do cuidado prestado, na liderança da equipe e no tratamento propriamente dito por ser o profissional com capacitação técnica científica para avaliar as lesões por pressão. **Considerações Finais:** o enfermeiro é o gestor do cuidado, um facilitador na prevenção da lesão, perpassando pela admissão do paciente, período de hospitalização e podendo estender aos cuidados domiciliares, já que é o único profissional capacitado para avaliar a lesão e o com presença mais frequente, o que possibilita a avaliação de risco, a implementação e o gerenciamento do cuidado.

Descritores: Úlcera por Pressão; Prevenção; Tratamento; Cuidados de Enfermagem; Avaliação de Risco.

1 INTRODUÇÃO

De acordo com a *European Pressure Ulcer Advisory Panel/ National Pressure Ulcer Advisory Panel* (EPUAP/NPUAP), as lesões por pressão (LPP) são definidas como lesões cutâneas e/ou de tecidos subjacentes, que se localizam, normalmente, sobre proeminência óssea, em consequência da pressão ou de uma combinação entre esta e a força de torção. As LPP estão associadas também ao uso de dispositivo médico ou outro artefato (LARANJEIRA; LOUREIRO, 2017; MEIRELES; BALDISSERA, 2019).

As alterações moleculares ou estruturais nas células que se encontram em equilíbrio homeostático são responsáveis pelas formas de lesões tissulares. Dentre os principais fatores que podem causar a LPP, destacam-se a hipóxia, contato com agentes físicos, químicos e drogas, infecciosos, reações imunológicas e desequilíbrio nutricional (SILVA; FIGUEIREDO; MEIRELES, 2008).

Estudos internacionais apontam que as LPP tendem a surgir dentro de 72 horas após a internação. No Brasil, os estudos revelam que a prevalência de LPP na UTI variou entre 35,2% e 63,6% e a incidência entre 11,1% e 64,3%. Já nos hospitais de ensino, a incidência de LPP oscilou entre 23,1% e 62,5% (VASCONCELOS; CALIRI, 2017).

Dados relativos à LPP em domicílio no Brasil apontam risco para desenvolvimento de 41,2% a 59%, com prevalência entre 8% e 23% (MEIRELES; BALDISSERA, 2019). Já nas unidades de Terapia Intensiva, a ocorrência de LPP se torna mais frequente devido o perfil dos pacientes, ao tempo de internação e à restrição de mobilidade (VASCONCELOS; CALIRI, 2017).

As regiões mais afetadas são os locais com maior predisposição de distribuição desigual do peso corporal ou excesso de pressão, sendo a região sacral a mais comum (INOUE; MATSUDA, 2016).

Ressalta-se que a ocorrência da LPP gera repercussões consideráveis na qualidade de vida do paciente e dos familiares, aumentando relativamente a mortalidade e os custos nas instituições hospitalares. Diante da magnitude de tais impactos gerados pela LPP, a prevenção é destacada como a melhor intervenção, visto que objetiva evitar e/ou minimizar a ocorrência das LPPs (TONOLE; BRANDÃO, 2018; VASCONCELOS; CALIRI, 2017).

A prevenção de LPP envolve algumas medidas que devem ser adotadas pelos enfermeiros e pela equipe responsável pelo cuidado do paciente, como mudança de decúbito, ou decúbito de execução relativamente simples, tratamento tópico, controle da umidade da pele e aporte nutricional (GONÇALVES et al., 2020).

A consulta de Enfermagem é uma ferramenta para identificação de problemas de saúde e tomada de decisão que, segundo a Resolução do Cofen nº 358/2009, organiza-se em cinco etapas, sendo a coleta de dados, o diagnóstico de enfermagem, o planejamento de enfermagem, a implementação e a avaliação de enfermagem (COREN-MG, 2020).

A etapa de coleta de dados objetiva a obtenção de dados sobre o paciente e sobre a família. No que se refere à prevenção ou aos cuidados de LPP já existentes, corresponde ao momento da avaliação do paciente e dos riscos para desenvolver lesão ou avaliação da pessoa com lesão instalada (COREN-MG, 2020).

O diagnóstico de Enfermagem é o processo de interpretação dos dados coletados na primeira etapa, que determina a tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem. É a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados (COREN-MG, 2020).

Na terceira etapa, realiza-se o planejamento de Enfermagem, ou seja, a definição das ações ou das intervenções de enfermagem. É a fase em que o enfermeiro deve prescrever ações de enfermagem para a prevenção e/ou cuidados com as lesões cutâneas (COREN-MG, 2020).

A implementação corresponde ao período em que são adotadas as ações ou intervenções definidas na etapa de Planejamento de Enfermagem, por meio das prescrições de enfermagem. É neste momento que acontecem as ações de prevenção ou o curativo da lesão propriamente dito (COREN-MG, 2020).

Por fim, na avaliação de enfermagem, o enfermeiro reavalia o paciente, o risco e/ou a lesão e verifica se há necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do Processo de Enfermagem, bem como alteração do plano de cuidados ou prescrição de coberturas ou produtos adjuvantes para o tratamento de lesões, diante das alterações do leito da lesão (COREN-MG, 2020).

Neste contexto, buscou-se destacar a prática do enfermeiro integrante da equipe multiprofissional de saúde, líder da equipe de enfermagem e gestor do cuidado, responsável pela tomada de decisão que propicia a escolha da melhor prática do cuidado com embasamento científico para prevenção e melhor tratamento de LPP (SOUSA; FAUSTINO, 2019).

O enfermeiro como líder da equipe de enfermagem necessita constantemente desenvolver, atualizar, aprimorar práticas de gerenciamento do serviço, supervisionar a assistência, com objetivo de obtenção, manutenção e/ou melhoria de recursos físicos, tecnológicos, humanos e de informação

para assegurar maior segurança ao paciente, à sua família e a todos envolvidos no processo do cuidado, objetivando também a prevenção de LPP (INOUE; MATSUDA, 2016).

A motivação para a escolha do tema surgiu a partir das vivências e experiências nas práticas profissionais exercidas em unidades de internação. Percebemos e experienciamos a atuação do enfermeiro e da equipe de enfermagem na prevenção e tratamento das lesões.

Desta forma, o objetivo do estudo é evidenciar a atuação do enfermeiro na prevenção e no tratamento de LPP a partir da questão norteadora: “Como é a atuação enfermeiro na prevenção e no tratamento da lesão por pressão?”.

O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica da literatura do tipo integrativa. Foram atendidas as seis etapas da metodologia, como descrito a seguir: 1) identificação do tema e seleção da questão norteadora; 2) estabelecimento dos critérios de inclusão, amostra e buscas; 3) definição de informações, a serem extraídas dos artigos selecionados e categorização dos estudos; 4) avaliação dos artigos; 5) interpretação dos resultados e, por fim 6) apresentação da síntese do conhecimento científico (MARTINS, 2018).

Para tanto, o levantamento das publicações foi realizado durante o mês de março de 2021 através do acesso eletrônico das seguintes bases: Sistema Latino Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (LILACS) e *Scientific Electronic Library Online* (SciELO).

Para a identificação e seleção das publicações, foram utilizados os descritores em português cadastrados nos Descritores em Ciências de Saúde (DeCS): Úlcera por Pressão, Prevenção, Tratamento, Cuidados de Enfermagem e Avaliação de Risco que foram combinados através do conector booleano “AND”. As combinações constam na Tabela 1. Ressalta-se que as pesquisas foram realizadas igualmente nas duas bases de dados.

Tabela 1. Combinações dos descritores para busca dos artigos nas bases de dados

Descritores em Ciências da Saúde
Úlcera por Pressão AND Prevenção
Úlcera por Pressão, Prevenção
Úlcera por Pressão AND Tratamento
Úlcera Por Pressão, Tratamento
Úlcera por Pressão AND Avaliação de risco
Úlcera por Pressão, Avaliação de Risco
Cuidados de Enfermagem AND Úlcera por Pressão
Cuidados de Enfermagem, Úlcera por Pressão

Fonte: As autoras, 2021.

Os critérios definidos para a busca em todas as bases de dados foram: artigos que destacassem a atuação do enfermeiro na prevenção e no tratamento de LPP utilizando a Escala de Braden na avaliação de risco; publicados nos últimos cinco anos (2016 - 2021); textos disponíveis gratuita e integralmente online e no idioma português. Também foram utilizadas outras referências extraídas do *National Pressure Ulcer Advisory Panel* (NPUAP), do *European Pressure Ulcer Advisory Panel* (EPUAP) e do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais (COREN-MG).

Foram excluídas publicações anteriores a 2016; artigos que não respondiam à questão norteadora da pesquisa; artigos publicados apenas em inglês ou espanhol; indisponíveis na íntegra; desassociados com a área de enfermagem; artigos que não abordassem os objetivos do tema pesquisado e artigos em duplicidade nas bases de dados.

Através do cruzamento dos descritores, o número total de artigos encontrados nas duas bases de dados, de acordo com a Figura 1, foi de 971 artigos. Aplicando os critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 27 artigos, sendo 22 publicações da base de dados LILACS e 5 publicações da base de dados SciELO. Após leitura na íntegra foram incluídos 16 artigos neste estudo.

Figura 1. Combinações dos descritores para busca dos artigos nas bases de dados

Fonte: As autoras, 2021.

2 DESENVOLVIMENTO

A partir da análise dos dados coletados, os 16 artigos selecionados foram organizados no *Microsoft Office Word* 2010 por: autores, periódico, ano, título, objetivos e resultados dos estudos, para facilitar a análise dos artigos, conforme apresentado no Quadro 1. Os resultados foram interpretados e discutidos com a finalidade de atingir o objetivo proposto deste estudo, e contribuir cientificamente para a prática clínica da enfermagem.

Quadro 1. Síntese dos periódicos selecionados para revisão.

AUTORES/ ANO/ PERIÓDICOS	TÍTULO	OBJETIVOS	RESULTADOS
LARANJEIRA; LOUREIRO, 2017 Revista Salud Pública	Fatores de risco das úlceras de pressão em doentes internados num hospital português.	Identificar e caracterizar os fatores de riscos das úlceras de pressão (UP) em doentes com UP, internadas em hospital central português.	Os pacientes já apresentam UP na entrada do serviço, na maioria dos casos. O risco de desenvolver UP aumenta concomitante ao aumento do tempo de internação. Os locais mais comuns são: sacro e calcâneos. Doença respiratória diabetes e hipertensão são as condições mais comuns.
GONÇALVES et al., 2020 Revista Nursing	A mudança de decúbito na prevenção de LPP em pacientes na terapia intensiva.	O objetivo deste estudo consistiu em identificar os motivos que possam estar relacionados à dificuldade da realização da	O enfermeiro é responsável por avaliar os fatores de risco para LPP na admissão, a integridade da pele, além dos resultados esperados. Ressalta-se a importância do

		mudança de decúbito de pacientes em terapia intensiva.	profissional e sua equipe participarem de programas educativos a fim de executarem as medidas preventivas de maneira correta.
ALMEIDA et al., 2020 Revista Rene	Escalas para prevenção de lesão por pressão em unidades de terapia intensiva: revisão integrativa.	Descrever os elementos constitutivos do cuidado de enfermagem presentes nas escalas de avaliação do risco de LPP usadas em unidades de terapia intensiva.	A escala de Braden foi a escala mais frequentemente utilizada. A avaliação estruturada do risco, a avaliação da pele e tecidos, o reposicionamento no leito, dentre outros foram os elementos constitutivos do cuidado de enfermagem.
OLIVEIRA et al., 2020 Revista Online de Pesquisa	Variáveis associadas à prevenção das lesões por pressão: conhecimento para o cuidado de enfermagem.	Identificar na literatura científica as variáveis associadas à prevenção da LPP para subsidiar o cuidado de enfermagem.	Observou-se uma predominância de valorização da literatura associada à dimensão técnico-científica. Percebe-se, portanto que a prevenção está relacionada aos procedimentos para aliviar a pressão.
CARVALHO et al., 2019	Prevenção de lesão por pressão: conhecimento de	Conhecer as ações realizadas no domicílio para prevenção de	Os resultados obtidos foram divididos nas categorias: 1) análise do risco de

Journal Health NPEPS	ações e pacientes domiciliares.	LPP na Estratégia de Saúde da Família (ESF).	desenvolvimento de LPP; 2) percepção dos pacientes domiciliares e cuidadores acerca das ações para a prevenção de LPP na ESF. Os participantes se mostraram eficientes no uso de condutas preventivas de LPP.
CORREIA; SANTOS, 2019 Revista Brasileira de Ciências da Saúde.	Lesão por pressão: medidas terapêuticas utilizadas por profissionais de enfermagem	Verificar a prática de avaliação da pele e do risco de desenvolvimento de LPP, identificar as medidas preventivas adotadas pela equipe; investigar as dificuldades no cuidado de LPP devido as condições de trabalho.	De acordo com o estudo, os cuidados realizados pela equipe de enfermagem ao paciente com LPP foram, majoritariamente, de avaliação da pele, sendo o momento de banho no leito o melhor para tal avaliação que, por sua vez, foi realizada com a escala de Braden.
SOARES et al., 2018a Revista Cogitare Enfermagem	Prática educativa com enfermeiros da atenção primária: não a lesão por pressão.	Analisar, a partir da visão dos enfermeiros da atenção primária, as contribuições da prática educativa na prevenção da	Os dados foram analisados e resultaram em duas categorias: “diga não à Lesão por Pressão” e “a prática do enfermeiro na prevenção da LPP e promoção da saúde na

		LPP e promoção da saúde.	APS". O estudo destacou a importância da educação continuada para atualização profissional dos enfermeiros e consequente eficiência na prática assistencial.
VASCONCELOS; CALIRI, 2017 Escola Ana Nery	Ações de enfermagem antes e após um protocolo de prevenção de lesão por pressão em terapia intensiva.	Avaliar as ações dos profissionais de enfermagem antes e após utilização de protocolo de prevenção de LPP, em Unidade de Terapia Intensiva.	Observou-se maior frequência das ações: avaliação do risco de LPP após admissão, aplicação de hidratante, proteção das proeminências ósseas do joelho, elevação do calcâneo e elevação do paciente do leito.
INOUE; MATSUDA, 2016 Revista Brasileira de Enfermagem	Custos de cobertura para a prevenção de úlcera por pressão sacral	Identificar os custos com coberturas na prevenção de úlcera por pressão sacral em uma Unidade de Terapia Intensiva para adultos do Paraná – Brasil.	O custo médio/paciente foi de R\$23,17 para uso do filme transparente e de R\$ 190,40 para uso de hidrocolóide. O deslocamento da cobertura foi o principal motivo para a sua troca.
MEIRELES; BALDISSERA, 2019	Qualidade da atenção aos idosos: risco de lesão por pressão	Analisar a qualidade dos cuidados prestados na	Observou-se ausência de avaliação de risco de LPP, escassez de recursos, falta de apoio

Revista Rene	como condição marcadora.	atenção primária á saúde aos idosos frágeis com risco para LPP.	aos cuidadores e familiares, demora no atendimento e déficit de conhecimento por parte dos profissionais.
SOARES et al., 2018b Online Brazilian Journal Of Nursing	Incorporação do protocolo de lesão por pressão na gerencia do cuidado: teoria fundamentada nos dados.	Compreender o significado da incorporação do protocolo de LPP na gerência do cuidado realizada pelo enfermeiro.	Necessário ressaltar a importância do protocolo de LPP para qualificação do enfermeiro. Uma ferramenta de ensino importante também para a segurança do paciente e para correto gerenciamento do cuidado.
MENDONÇA et al., 2018 Revista Texto Contexto Enfermagem	Prevenção de lesão por pressão: ações prescritas por enfermeiros de centros de terapia intensiva.	Descrever ações de enfermagem prescritas por enfermeiros para a prevenção de LPP e sua ocorrência em centros de terapia intensiva.	Foi encontrada associação estatística entre as ações de mudança de decúbito, a aplicação de cobertura hidrocolóide em região sacral, a realização de higiene externa, a troca de fixação do cateter orotraqueal e /ou cateter nasoenteral e a inspeção da pele com ausência de LPP.
MANGANELLI et al., 2019	Intervenções de enfermeiros na prevenção de lesão por pressão	Caracterizar a população estudada e descrever as	Houve predomínio de participantes do sexo feminino. O cuidado apontado com maior

Revista de Enfermagem da UFSM	em uma unidade de terapia intensiva.	intervenções dos enfermeiros para a prevenção de LPP em uma Unidade de Terapia Intensiva adulto.	frequência foi avaliação da mobilidade. Como cuidados preventivos: manutenção da pele hidratada, mudança de decúbito, higiene corporal e utilização de colchão piramidal.
OLKOSKI; ASSIS, 2016 Escola Anna Nery	Aplicação de medidas de prevenção para úlcera por pressão pela equipe de enfermagem antes e após uma campanha educativa.	Avaliar a efetividade de uma campanha para a prevenção de úlcera por pressão em hospital de ensino de Curitiba.	O aumento no percentual de adesão foi estatisticamente significativo para reposicionamento, angulação de lateralização e elevação de cabeceira e de calcâneos. O setor que apresentou melhores índices de adesão foi o que teve a equipe mais envolvida nas discussões durante a capacitação.
TONOLE; BRANDÃO, 2018 Revista de Enfermagem UFPE Online	Recursos humanos e materiais para a prevenção de lesão por pressão.	Refletir acerca da importância dos recursos humanos e materiais na perspectiva da prevenção de LPP.	Os recursos humanos e materiais são essenciais nas ações preventivas de LPP. Avaliar tais recursos contribui com um cenário onde o cliente está inserido, viabilizando uma

			assistência segura e livre de danos.
SOUSA; FAUSTINO, 2019 Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental (Online)	Conhecimentos de enfermeiros sobre prevenção e cuidados de lesão por pressão.	Identificar o conhecimento dos enfermeiros assistenciais quanto à prevenção e aos cuidados com LPP em unidades de clínica médica e cirúrgica de um hospital universitário de Brasília.	O estudo encontrou um déficit de conhecimento dos enfermeiros quanto à prevenção e aos cuidados de LPP. Esse déficit pode comprometer a prática assistencial, principalmente, dos pacientes com risco para desenvolvimento de LPP.

Fonte: As autoras, 2021.

Com relação ao ano de publicação dos artigos selecionados, se destacou o ano de 2019, com 7 publicações (43,75%); 2017 com 3 publicações (18,75%), seguidos do anos de 2016, 2018 e 2020 com 2 publicações cada (12,5%).

Analisando os periódicos selecionados nos quais as publicações foram veiculadas, pode-se verificar que 1 artigo foi publicado na Revista de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria, 2 artigos na Revista Rene, 1 na Revista Enfermagem UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro), 1 publicação na Revista Brasileira de Ciências da Saúde, 1 na Revista Brasileira de Enfermagem (REBEN), 1 na Revista *Nursing*, 1 em Revista Salud Pública, 1 na Cogitare Enfermagem, 1 na Revista Texto Contexto Enfermagem, 1 na *Online Brazilian Journal of Nursing*, 1 na *Journal Health NPEPS* (Núcleo de Pesquisas e Extensão em Política Planejamento, Organização e Práticas (individual e coletiva) em Saúde), 1 estudo na Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental (Online), 1 artigos na Revista Online de Pesquisa e 2 na Escola Anna Nery Revista de Enfermagem.

2.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE LESÃO POR PRESSÃO

A pele é o maior órgão do corpo humano, sendo responsável pelo revestimento do organismo e, consequentemente, pelo isolamento de seus componentes orgânicos do meio externo. A pele é composta por três camadas, sendo a epiderme (camada externa), a derme (camada intermediária) e a hipoderme (camada interna) e exerce diferentes funções como proteção, termorregulação e percepção (LARANJEIRA; LOUREIRO, 2017).

De acordo com a *European Pressure Ulcer Advisory Panel /National Pressure Ulcer Advisory Panel* (EPUAP/NPUAP), Lesão por Pressão (LPP) e/ou cutânea corresponde à alteração da pele em tecidos subjacentes e proeminências ósseas devido à força prolongada, cisalhamento e fricção (LARANJEIRA; LOUREIRO, 2017).

A compressão prolongada em proeminências ósseas (como região escapular, sacrococcígea, trocanter, maléolos e calcâneos) leva à hipóxia, ou seja, a uma restrição do fluxo sanguíneo e aporte de oxigênio que, por sua vez, gera isquemia tecidual, com sinais de edema, endurecimento da área afetada, aumento da temperatura local e desenvolvimento do processo inflamatório. Além da pressão nessas proeminências ósseas, também são apontadas como causadoras das LPP, as forças de cisalhamento, que correspondem a estresses mecânicos decorrentes do deslizamento do paciente no leito, e a fricção que compreende os estresses mecânicos durante a movimentação do paciente no leito realizado pelos profissionais (GONÇALVES et al., 2020).

Dentre as causas de desenvolvimento de LPP podemos citar também os fatores intrínsecos como a presença de edema, alterações de estado mental e nutricional, idade avançada, incontinência, hidratação precária, nível de consciência alterado, perfusão tecidual e motricidade reduzidas. Os fatores extrínsecos são as condições externas ao indivíduo como cisalhamento, imobilidade, umidade da pele, pressão e fricção. Além disso, o surgimento da LPP também está associado ao uso de dispositivo médico ou outro artefato (GONÇALVES et al., 2020; MEIRELES; BALDISSERA, 2019).

Diante disso, cabe ao enfermeiro realizar uma avaliação estruturada para identificação do risco de desenvolvimento de LPP, com maior exatidão, devendo ser realizada no período máximo de oito horas após a admissão. Recomenda-se que o enfermeiro repita a avaliação sempre que necessário, considerando o nível de acuidade e alterações significativas do paciente. É imprescindível acrescentar uma avaliação completa da pele em todas as avaliações para detectar possíveis alterações em pele

intacta e, assim, documentar através da evolução de enfermagem todas as avaliações de risco executadas (NPUAP/EPUAP/PPPIA, 2014).

É recomendada ao profissional enfermeiro a utilização da escala de Braden para detecção precoce dos indivíduos em risco de desenvolver LPP. O uso de escala está entre as principais medidas de prevenção, pois possibilita uma abordagem estruturada, sistematizada e individualizada (ALMEIDA et al., 2020; MEIRELES; BALDISSERA, 2019).

De acordo com o conhecimento de enfermagem a respeito de medidas preventivas, são apresentadas como efetivas a mudança de decúbito para redução e distribuição da pressão corporal, a hidratação da pele com óleo, colchão caixa de ovo e o uso de coxins (OLKOSKI; ASSIS, 2016).

Em LPP relacionadas a dispositivos ou artefatos médicos, recomenda-se inspecionar e avaliar a pele ao redor do dispositivo no mínimo duas vezes ao dia para identificar sinais de lesão. Manter a pele limpa e seca, reposicionar o cliente ou o dispositivo para redistribuir a pressão e reduzir forças de cisalhamento também são importantes recomendações (NPUAP/EPUAP/PPPIA, 2014).

As LPPs podem ser classificadas em estágios I (pele íntegra apresentando eritema vermelhidão que não é branquiável), II (apresenta perda parcial da superfície dérmica, flictena rompida ou intacta com coloração vermelho, exsudato no centro da lesão), III (total perda da espessura tecidual e o tecido adiposo se torna visível, porém não há exposição de ossos, tendões ou músculos), IV (total perda da espessura tecidual, sendo visível a parte óssea, tendões e músculos), LPP Tissular Profunda (apresenta coloração vermelha, marrom que não esbranquece) e LPP não classificável (aquelas que não podem ser classificadas apresentando esfacelos) (CORREIA; SANTOS, 2019; SES-DF, 2019).

No ano de 2016, duas novas classificações foram implementadas, sendo LPP por dispositivo médico, causada por dispositivos médicos, objetos do dia a dia de finalidade terapêutica que geram pressão sobre a pele ocasionando LPP e a LPP em mucosa, que são lesões que ocorrem com o uso de dispositivos médicos como tubos e cateteres em membranas (COREN-MG, 2020).

A literatura internacional aponta um elevado número de casos de LPP em unidades de terapia intensiva de 25,6% a 28,6%. Essa alta incidência foi associada ao estado crítico e à instabilidade hemodinâmica apresentada pelos pacientes. Não obstante, os pacientes estão mais suscetíveis pela alteração do nível de consciência, uso de sedativos, drogas vasoativas, suporte ventilatório, e restrições de movimentos por um longo período. Estudos no Brasil apontam a prevalência de LPP em

unidades de terapia intensiva variando entre 35,2% e 63,6% e a incidência entre 11,1% e 64,3% (MANGANELLI et al., 2019; VASCONCELOS; CALIRI, 2017).

Além de todas as repercussões já mencionadas, as LPPs são responsáveis por elevado custo financeiro. Um estudo realizado em um hospital brasileiro apontou que o tratamento de LPP é muito oneroso para o sistema de saúde. Em LPP estágio II, a variação de gastos foi de R\$ 67,69 a 172,32; a LPP de estágio III dispendeu de R\$29,02 a R\$96,38; as de estágio IV variaram entre R\$ 20,04 e R\$ 225,34; e as LPPs não classificáveis custaram entre R\$ 16,41 e R\$ 260,18 (MENDONÇA et al., 2018).

No Brasil apesar de insatisfatória a notificação de LPP em âmbito domiciliar, a incidência é de 20% e a prevalência próxima a 23,52% (SOARES et al., 2018a). Não obstante, ressalta-se que com o aumento da prevalência de pacientes acompanhados pelo serviço de Atenção Domiciliar (SAD), há uma preocupação quanto ao cuidado familiar e doméstico prestado, pois esses pacientes apresentam risco de 70,2% de desenvolver LPP (CARVALHO et al., 2019).

2.2 PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE LESÃO POR PRESSÃO

A prevenção das lesões representa um grande e importante desafio aos profissionais de saúde, visto que causam danos emocionais ao paciente, familiares, dor, infecções e aumento da morbimortalidade, elevam os custos das instituições com o prolongamento da internação e aumentam o risco desenvolver complicações que podem levar a óbito (ALMEIDA et al., 2020; COREN-MG, 2020).

Considerada como um evento adverso, sua prevenção é vista como meta de segurança do paciente, e responsabilidade de toda equipe multiprofissional em todos os níveis de atenção em saúde (COREN-MG, 2020).

Com o intuito de garantir a segurança do paciente, o Ministério da Saúde criou o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), com protocolos de prevenção de incidentes de LPP (OLKOSKI; ASSIS, 2016). Instituído pela Portaria MS/GM nº 529/2013, o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), além de protocolos de prevenção, monitora a incidência, e elabora planejamento institucional para minimizar agravos durante a hospitalização (OLIVEIRA et al., 2020).

Avaliar o risco do paciente é o primeiro passo para prevenir lesões. Mas, é importante que o enfermeiro e a equipe estejam atentos à individualidade de cada cliente elaborando, assim, medidas preventivas individualizadas, ou seja, de acordo com os fatores de risco detectados. É importante destacar também a necessidade de correção e diminuição de fatores de risco intrínsecos e extrínsecos (TONOLE; BRANDÃO, 2018).

A maioria das LPPs podem ser evitadas através da avaliação do cliente, identificação dos riscos e implementação da assistência com objetivo de prevenção. De acordo com o protocolo do ministério da saúde, destacam-se como principais medidas de prevenção de LPP avaliar o paciente em risco, o estado nutricional, hidratação, inspeção diária da pele, o controle da umidade e a redistribuição da pressão sobre a pele (COREN-MG, 2020; OLKOSKI; ASSIS, 2016).

Desenvolvida em 1987 por Bergstrom, a escala de Braden, surgiu como uma alternativa para aprimorar a adoção de estratégias de prevenção e diminuir a incidência de LPP. Esse instrumento tem sido utilizado no Brasil, em várias instituições de saúde desde 1999 (BERGSTROM et al., 1987; COREN-MG, 2020).

A Escala de Braden é um importante instrumento na avaliação de pacientes, uma vez que analisa 6 fatores: umidade, percepção sensorial, mobilidade, nutrição, atividade, fricção e cisalhamento. As pontuações podem variar de 1 a 4, para cada fator (Tabela 2). Os pontos somados determinam qual o risco do cliente desenvolver LPP, podendo variar de 4 a 23 pontos (Tabela 3). Quando a soma varia entre 19 a 23 pontos o paciente não apresenta risco de desenvolver LPP. O risco é pequeno quando a soma varia entre 15 a 18 pontos, moderado quando varia de 13 a 14 pontos, alto quando varia entre 10 e 12 pontos, e muito alto de 6 a 9 pontos. Ou seja, quanto maior for a pontuação, menor o risco de desenvolver LPP (BERGSTROM et al., 1987; GONÇALVES et al., 2020).

Tabela 2. Escala de Braden (Fatores de risco para Lesão por Pressão) –versão resumida

Fatores	1 ponto	2 pontos	3 pontos	4 pontos
Percepção Sensorial	Totalmente limitado	Muito limitado	Levemente limitado	Nenhuma limitação
Umidade	Completamente molhado	Muito molhado	Ocasionalmente molhado	Raramente molhado
Atividade	Acamado	Confinado a cadeira	Anda ocasionalmente	Anda frequentemente
Mobilidade	Totalmente imóvel	Bastante limitado	Levemente limitado	Não apresenta limitações
Nutrição	Muito pobre	Provavelmente inadequada	Adequada	Excelente
Fricção e Cisalhamento	Problema	Problema Potencial	Nenhum problema	-

Fonte: Bergstrom et al., 1987.

Tabela 3. Classificação de Risco Conforme o Escore Obtido com a Escala de Braden.

Classificação De Risco	ESCORE
Sem Risco	19 A 23
Risco Baixo	15 A 18
Risco Moderado	13 A 14
Risco Elevado	10 A 12
Risco Muito Elevado	6 A 9

Fonte: COREN-MG, 2020.

O enfermeiro utiliza a escala de Braden para identificar precocemente o risco de LPP, com a finalidade de uma abordagem sistemática para prevenção e cuidado adequado (MEIRELES; BALDISSERA, 2019).

Além da escala de Braden, o enfermeiro pode utilizar a escala de Braden Q para avaliar o risco de LPP em crianças com idade de um a cinco anos. Ela foi desenvolvida por Curley e Quigley e traduzida e adaptada transculturalmente para o Brasil em 2007 por Maia Ferreira Blanes e Dini (COREN-MG, 2020).

Além dos seis parâmetros encontrados na Escala de Braden, recomenda-se também a avaliação de perfusão tecidual e oxigenação que incluem a saturação de oxigênio, o nível de hemoglobina e o PH sérico. A pontuação total varia entre 7 a 28, conforme demonstrado na Tabela 4 (COREN-MG, 2020).

Tabela 4. Classificação de Risco Conforme o Escore Obtido Com a Escala de Braden Q.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	ESCORE
Sem risco	22 a 28
Em risco	21 a 25
Risco moderado	17 a 21
Risco alto	7 a 16

Fonte: COREN-MG, 2020.

A identificação de LPP em centros cirúrgicos é realizada por meio da escala Escala de Avaliação de Risco para o Desenvolvimento de Lesões Decorrentes do Posicionamento Cirúrgico do Paciente (ELPO), desenvolvida em 2014 por Lopes e colaboradores. Através da escala são avaliados sete itens, sendo: tipo de posição cirúrgica, tempo de cirurgia, tipo de anestesia, superfície de suporte, posição dos membros, comorbidades e idade da pessoa. A pontuação de cada item varia de 1 a 5 pontos e a pontuação total de 7 a 35. Na escala ELPO, quanto maior a pontuação, maior é o risco de desenvolvimento de LPP (COREN-MG, 2020; LOPES et al., 2016).

Na tentativa de reduzir o risco de desenvolvimento de lesão, tecnologias diversas estão sendo elaboradas e utilizadas, como o uso de colchão de ar, coxins e protocolos de prevenção, como a mudança de decúbito cada duas horas que é fortemente recomendada (GONÇALVES et al., 2020).

Para o tratamento, novas diretrizes foram publicadas recomendando a avaliação do paciente de risco para desenvolver LPP e a adoção de cuidados com a lesão, incluindo limpeza/avaliação e tratamento da infecção, desbridamento e curativos e monitorização da cicatrização, sendo que o tratamento de LPP é específico de acordo com o estagiamento da lesão. Para LPP com pele íntegra e eritema que não esbranquece, o uso do filme semipermeável, mudança de decúbito, colchão pneumático e ácido graxo essencial (AGE) são indicados. Já LPP com perda da pele em sua espessura parcial e exposição da derme, indicam-se a mudança de decúbito e o AGE. Naquelas em que há necrose, as recomendações são de desbridamento químico e mecânico e uso do Hidrogel, e nas lesões com presença de tecido de granulação é utilizado soro fisiológico a 0,9%, AGE e creme de barreira (CORREIA; SANTOS, 2019).

Para a realização de um cuidado individualizado de qualidade e aplicação das medidas preventivas é necessária uma adequação dos recursos humanos, já que a falta deles compromete a assistência de qualidade. Fatores dificultadores, como a sobrecarga de trabalho ocasionada pelo déficit de recursos geram danos diretos aos profissionais de saúde, tendo como consequência fadiga, cansaço, e diminuição da capacidade de atenção, resultando em eventos adversos, dentre eles a ocorrência de LPP (MANGANELLI et al., 2019; TONOLE; BRANDÃO, 2018).

Além disso, ressalta-se a presença de danos indiretos referentes ao cliente e à família, como dificuldade no planejamento diário das medidas de prevenção, na solicitação de materiais, na orientação aos cuidadores e familiares no ambiente hospitalar e domiciliar, na avaliação das medidas preventivas e na avaliação dos resultados obtidos. Por fim, destaca-se que a omissão ou a não

realização de cuidados pela equipe de enfermagem para prevenir lesões também são dificuldades apontadas (MANGANELLI et al., 2019; TONOLE; BRANDÃO, 2018).

2.3 ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA LESÃO POR PRESÃO

O enfermeiro faz parte da equipe multiprofissional liderando a equipe de enfermagem e gerenciando os cuidados prestados ao cliente, sendo responsável por tomar decisões para o melhor cuidado prestado durante a hospitalização. Ademais, busca uma melhor qualidade da assistência que, por sua vez, requer embasamento científico em evidências relacionado à LPP (CORREIA; SANTOS, 2019).

Quando se fala em cuidado, o enfermeiro é o profissional responsável pela prevenção e tratamento das LPP, pois é o único com capacitação técnica científica para prevenir a lesão através da elaboração de um plano de cuidados de enfermagem, que deve contemplar o risco de desenvolvimento de lesões (ALMEIDA et al., 2020).

A prevenção é estabelecida através do conhecimento técnico científico e da habilidade da enfermagem que está na assistência direta e individualizada ao paciente, com o objetivo de minimizar a ocorrência de LPP. Portanto, é importante que os profissionais trabalhem com evidências científicas para planejar o cuidado e implementar as medidas preventivas (OLIVEIRA et al., 2020).

A sistematização da Assistência de Enfermagem é uma atribuição complexa do enfermeiro, visto que envolve relações de causa e efeito em evidências científicas da prática gerencial. Assim, cabe aos enfermeiros desenvolver assistência de enfermagem nos espaços de atenção à saúde. Por meio da Sistematização da Assistência de Enfermagem e do Processo de Enfermagem, o enfermeiro implementa estratégias com o objetivo de adequar o cuidado de acordo com as principais tendências e demandas do processo de trabalho (SOARES et al., 2018a, 2018b).

Portanto, o Processo de Enfermagem constituído por cinco etapas já mencionadas anteriormente, utiliza-se da ciência para elaborar o cuidado de forma individualizada, de acordo com a avaliação de risco durante a consulta de enfermagem (COREN-MG, 2020).

Os protocolos assistenciais que promovem o planejamento do cuidado são exemplos de estratégias, pois são instrumentos de apoio que contribuem para a qualidade da assistência e permitem a sistematização e padronização da prática de enfermagem (SOARES et al., 2018b).

É importante ressaltar a importância da integração do enfermeiro com familiares/cuidadores ou acompanhantes através de ações socioeducativas no planejamento estratégico do enfermeiro para a

prevenção de LPP. Além disso, é necessário que os gestores valorizem a atuação dos profissionais de enfermagem dando-lhes condições de trabalho adequadas e planejando a contratação de mais profissionais quando necessário (GONÇALVES et al., 2020).

O enfermeiro membro da Estratégia de Saúde da Família é responsável pelo gerenciamento do cuidado e tomada de decisão que direciona a melhor prática do cuidado a ser empregada. Dessa forma, é o responsável pela prevenção, promoção e tratamento da lesão, o que exige o domínio de conhecimentos técnicos e práticos para assistir o paciente em domicílio. Não obstante, é imprescindível que sua formação seja fundamentada em estratégias de políticas de saúde e de atenção à saúde da população (SOARES et al., 2018).

Segundo Soares et al. (2018), na assistência em domicílio, cabe ao enfermeiro da Atenção Primária à Saúde (APS) orientar as pessoas e familiares cuidadores quanto a medidas de prevenção, como reposicionamento no leito, aporte nutricional adequado e cuidados com a pele. Assim, é possível a troca de conhecimentos entre profissional-pacientes/cuidadores e entre profissional-profissional.

O profissional enfermeiro é, inclusive, o responsável por capacitar e atualizar sua equipe através de métodos de ensino e aprendizagem com o objetivo de proporcionar a equipe novos conhecimentos. Esse incentivo à educação permanente é essencial para a manutenção e aperfeiçoamento dos conhecimentos dos profissionais, cuidadores e familiares envolvidos no cuidado (SOARES et al., 2018a, 2018b).

Não apenas, o enfermeiro é o profissional responsável pela assistência ao paciente, definindo estratégias para prevenção, avaliação e tratamento no cuidados das lesões, ações estas regulamentadas pela resolução COFEN nº 567/2018. Para tal, compete ao enfermeiro a elaboração de protocolos, participação na avaliação, indicação de novas medidas para prevenção e tratamento de lesões, prescrição e execução de curativos em todos os tipos de lesões, além de, como já foi exposto, supervisão e coordenação da equipe de enfermagem (COREN-MG, 2020).

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base no desenvolvimento deste estudo, constatou-se que o enfermeiro é um profissional habilitado para prevenir e para tratar LPP tendo autonomia para definir o melhor tipo de cobertura através de evidências científicas de acordo com o a classificação da lesão.

Sua atuação ética é comprometida com o bem estar do paciente, familiar e de toda equipe, sendo responsável pela equipe que lidera em todos os momentos, desde a admissão do paciente até a alta.

Além disso, pode estender o acompanhamento a nível domiciliar, orientando os familiares e cuidadores no cuidado da pele.

O enfermeiro concretiza a ação e também sensibiliza toda a equipe envolvida na prevenção e no tratamento desta prática, tanto para o paciente quanto para o familiar. Desta forma, o objetivo do trabalho foi alcançado e obtivemos resposta para a questão norteadora, quando evidenciamos, na pesquisa, a atuação do enfermeiro na prevenção e tratamento da LPP.

Compreendemos que a atuação do enfermeiro ocupa um lugar de destaque e de suma importância junto ao paciente e familiar por ser o profissional que atua 24 horas ao lado do mesmo no âmbito hospitalar, avaliando o risco, prescrevendo o cuidado de individualizado de acordo com a necessidade e o grau de risco de cada paciente, perpassando todos os atendimentos individuais ou em grupo. Não apenas, atua esclarecendo dúvidas durante o período de internação oferecendo orientações para o cuidado pós-alta.

Seu lugar lhe coloca em posição priorizada, mas também com a grande responsabilidade de propiciar a prevenção e o efetivo tratamento da LPP. Precisa cumprir o dever de atuar junto à equipe multidisciplinar e também nas famílias assistidas, possibilitando que o paciente, sua família e toda a equipe de saúde favoreçam e concretizem a prevenção e tratamento durante a hospitalização. Então, cabe ressaltar que os conhecimentos científicos inerentes à profissão, a boa gestão do cuidado e sua prática humanizada são diferenciais para que este objetivo seja alcançado.

Não foram encontradas dificuldades na busca e seleção dos artigos para realização da revisão de literatura, pois existem muitas publicações envolvendo a temática da atuação do enfermeiro na prevenção e tratamento de LPP. Entretanto, foram encontradas, nos artigos, dificuldades para aplicar a prática da prevenção de LPP. As principais dificuldades envolveram número reduzido de profissionais, o que gera sobrecarga de trabalho e dificulta a execução da mudança de decúbito em pacientes debilitados a cada duas horas. Essas limitações abrem possibilidades para que os gestores hospitalares e as autoridades competentes revejam o quantitativo de profissionais para, então, garantir melhor assistência aos pacientes e familiares envolvidos no cuidado uma vez que tal dado se reflete no mercado de trabalho nas instituições de saúde.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Í. L. S. DE et al. Escalas para prevenção de lesão por pressão em unidades de terapia intensiva: revisão integrativa. *Revista Rene*, v. 21, p. e42053, 2020. Disponível em: <<http://periodicos.ufc.br/rene/article/view/42053/100061>>. Acesso em: 22 de mar. 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria no27, de 15 de janeiro de 2019. Brasília,

2019. Disponível em: <<http://www.saude.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/04/Seguranca-do-Paciente-prevencao-de-Lesao-por-Pressao-LP-2.pdf>>. Acesso em: 17 de abr. 2021.

CARVALHO, T. B. et al. Prevenção de lesão por pressão: conhecimento e ações de cuidadores e pacientes domiciliares. *Journal Health NPEPS*, v. 4, n. 2, p. 331–344, 2019. Disponível em: <<https://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/01/1047657/3981-14878-1-pb-1.pdf>>. Acesso em: 22 de mar. 2021.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM -MG. Cuidado à pessoa com lesão cutânea: manual de orientações quanto à competência técnico-científica, ética e legal dos profissionais de enfermagem. Belo Horizonte: Coren-MG, 2020.

Disponível em:

<<https://www.corenmg.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/MANUAL-DE-CUIDADO-A-PESSOA-COM-LESAO-CUTANEA.pdf>>. Acesso em: 17 de abr. 2021.

CORREIA, A. D. S. B.; SANTOS, I. B. DA C. Lesão Por Pressão: Medidas Terapêuticas Utilizadas por Profissionais de Enfermagem. *Revista Brasileira de Ciências da Saúde*, v. 23, n. 1, p. 33–42, 2019. Disponível em:

<<https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/rbcs/article/view/36793-p4/2232>>. Acesso em: 22 de mar. 2021.

European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Ulcer Advisory Panel. Treatment of pressure ulcers: quick reference guide. Washington DC (US): National Pressure Ulcer Advisory Panel, 2014. Disponível em: <<https://www.epuap.org/wp-content/uploads/2016/10/portuguese-quick-reference-guide-jan2016.pdf>>. Acesso em: 22 de mar. 2021.

GONÇALVES, A. D. C. et al. A mudança de decúbito na prevenção de lesão por pressão em pacientes na terapia intensiva. *Revista Nursing*, v. 23, n. 265, p. 4151–4160, 2020. Disponível em:

<<http://www.revistanursing.com.br/revistas/265/pg68.pdf>>. Acesso em: 22 de mar.

2021.

INOUE, K. C.; MATSUDA, L. M. Custos de coberturas para a prevenção de úlcera por pressão sacral. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 69, n. 4, p. 641–645, 2016. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/reben/v69n4/0034-7167-reben-69-04-0641.pdf>>. Acesso em: 22 de mar. 2021.

LARANJEIRA, C. A.; LOUREIRO, S. Fatores de risco das úlceras de pressão em doentes internados num hospital Português. *Revista de Salud Publica*, v. 19, n. 1, p. 161–170, 2017. Disponível em: <<https://scielosp.org/pdf/rsap/2017.v19n1/99-104>>. Acesso em: 22 de mar. 2021.

MANGANELLI, R. R. et al. Intervenções de enfermeiros na prevenção de lesão por pressão em uma unidade de terapia intensiva. *Revista de Enfermagem da UFSM*, v. 9, p. e41, 2019. Disponível em:

<<https://periodicos.ufsm.br/reufsm/article/view/33881/pdf>>. Acesso em: 22 de mar.

2021.

MARTINS, M. D. F. M. Estudos de Revisão de Literatura. *Fiocruz*, p. 37, 2018. Rio de Janeiro, 2018. Disponível em: <

https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/29213/2/Estudos_revisao.pdf>. Acesso em: 22 de mar. 2021.

MEIRELES, V. C.; BALDISSERA, V. D. A. Quality of care for the elderly: pressure injury risk as a marking condition. *Revista Rene*, v. 20, p. e40122, 2019. Disponível em:

<<http://periodicos.ufc.br/rene/article/view/40122/pdf>>. Acesso em: 22 de mar. 2021.

MENDONÇA, P. K. et al. Prevention of pressure injuries: Actions prescribed by intensive care unit nurses. *Texto e Contexto Enfermagem*, v. 27, n. 4, p. 1–10, 2018. Disponível em: <

<https://www.scielo.br/j/tce/a/Z9CwyVqcD8MJqtqhy8gYjMG/?lang=pt&format=pdf>>. Acesso em: 22 de mar. 2021.

OLIVEIRA, T. DA S. et al. Variables associated with pressure injury prevention: knowledge for nursing care. *Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental Online*,

p. 1172–1178, 2020. Disponível em: <

http://www.seer.unirio.br/cuidadofundamental/article/view/8036/pdf_1>. Acesso em: 22 de mar. 2021.

OLKOSKI, E.; ASSIS, G. M. Application of measures for preventing pressure ulcers by the nursing team before and after an education campaign. *Escola Anna Nery - Revista de Enfermagem*, v. 20, n. 2, p. 363–369, 2016. Disponível em:

<<http://www.scielo.br/pdf/ean/v20n2/1414-8145-ean-20-02-0363.pdf>>. Acesso em:

22 de mar. 2021.

SILVA, R. C. L. et al. Feridas: Fundamentos e Atualizações em Enfermagem. 2. ed. São Caetano do Sul: Yendis, 2011.

SOARES, C. F. et al. Prática Educativa com Enfermeiros da Atenção Primária: Não à Lesão por Pressão. *Cogitare Enfermagem*, v. 23, n. 3, 2018a. Disponível em:

<<http://www.revenf.bvs.br/pdf/ce/v23n3/1414-8536-ce-23-3-e55197.pdf>>. Acesso em: 22 de mar. 2021.

SOARES, R. S. DE A. et al. Incorporação do protocolo de lesão por pressão na gerência do cuidado: Teoria Fundamentada nos Dados. *Online Brazilian Journal of Nursing*, v. 16, n. 4, p. 389, 2018b. Disponível em:

<http://www.objnursing.uff.br/index.php/nursing/article/view/5643/html_2>. Acesso em: 22 de mar. 2021.

SOUSA, R. C. DE; FAUSTINO, A. M. Conhecimento de enfermeiros sobre prevenção e cuidados de lesão por pressão. *Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental (Online)*, v. 11, n. 4, p. 992–997, 2019. Disponível em: <<http://www.seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental/article/view/6832/pdf>>.

Acesso em: 22 de mar. 2021.

TONOLE, R.; BRANDÃO, E. D. S. Recursos humanos e materiais para a prevenção de lesão por pressão. *Revista de Enfermagem UFPE on line*, v. 12, n. 8, p. 2170, 2018. Disponível em:

<<https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/download/235091/29751>>. Acesso em: 22 de mar. 2021.

VASCONCELOS, J. DE M. B.; CALIRI, M. H. L. Nursing actions before and after a protocol for preventing pressure injury in intensive care. *Escola Anna Nery – Revista de Enfermagem*, v. 21, n. 1, p. 1–9, 2017. Disponível em:

<<http://www.scielo.br/pdf/ean/v21n1/1414-8145-ean-21-01-e20170001.pdf>>. Acesso em: 22 de mar. 2021.

Capítulo 5

10.37423/211004883

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO IDOSO RENAL CRÔNICO EM TRATAMENTO HEMODIALÍTICO

Marciana Faria Oliveira

Enfermeira. Graduada pelo Centro Universitário Estácio de Juiz de Fora, Brasil.

Laércio Deleon de Melo

Enfermeiro. Doutorando em Enfermagem pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil.

Raquel de Oliveira Martins Fernandes

Enfermeira. Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Brasil.

Eliana Amaro de Carvalho Caldeira

Enfermeira. Doutoranda em Saúde Coletiva pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Brasil.

Camila Cristina Gregório de Assis

Enfermeira. Mestranda em Enfermagem pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Brasil.

Fernanda Ferreira Krepker

Enfermeira. Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Brasil.

Paulo Henrique Bezerra da Silva

Acadêmico de Enfermagem. Centro Universitário Estácio de Juiz de Fora, Brasil.

Josilene Sobreira Rodrigues

Acadêmica de Enfermagem. Centro Universitário Estácio de Juiz de Fora, Brasil.

Felipe Eduardo Taroco

Acadêmico de Fisioterapia. Centro Universitário Estácio de Juiz de Fora, Brasil.

Bruno de Souza

Acadêmico de Enfermagem. Centro Universitário Estácio de Juiz de Fora, Brasil.

Resumo: Introdução: a Doença Renal Crônica consiste em um problema de saúde pública no Brasil. O declínio das funções orgânicas, no qual a doença renal está inserida, correlaciona-se muitas vezes com a progressão do processo de envelhecimento humano, que possui ritmos variáveis entre órgãos e pessoas da mesma idade. **Objetivo:** descrever a assistência de enfermagem aos pacientes idosos submetidos à diálise renal. **Metodologia:** revisão integrativa realizada nas bases de dados SciELO e Lilacs, fazendo uso do operador booleano AND e como recurso de pesquisa à opção “termo exato”. Incluídos: artigos científicos, disponíveis online na íntegra, publicados entre 2010 e 2019, na língua portuguesa. **Desenvolvimento:** foram encontrados 89 artigos e elegíveis seis para integrarem a investigação. O enfermeiro é responsável por agir e intervir junto aos pacientes que estão em terapia renal substitutiva. A atividade laboral do enfermeiro requer uma visão abrangente, conhecimento técnico e científico em relação às diversas nuances do paciente idoso em diálise, de modo a se planejar e intervir sobre as respostas humanas aos diferentes contextos. **Considerações finais:** as ações prioritárias do enfermeiro versam sobre a segurança do paciente, garantia da eficácia terapêutica, promoção do bem-estar, do conforto e da qualidade de vida a todas as pessoas em diálise. A pessoa idosa requer cuidados especializados frente ao conjunto de comorbidades e peculiaridades de demandas assistências, dados os procedimentos técnicos, supervisão, orientação e liderança da equipe.

Palavras-chave: Enfermagem Geriátrica; Enfermagem em Nefrologia; Cuidados de Enfermagem; Idoso; Diálise Renal.

1 INTRODUÇÃO

O declínio das funções orgânicas correlaciona-se por vezes com a progressão do envelhecimento humano. O aumento do número de pessoas com idade maior igual a 60 anos, consideradas idosas segundo critérios etários nacionais, está relacionado as mudanças na pirâmide etária brasileira, como a redução da taxa de crescimento populacional frente a queda da fecundidade e redução da mortalidade (BRASIL, 2018a; MELO et al., 2020).

Com o aumento do número de pessoas idosas no país, surge a demanda de atenção especial às Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT's), dentre as quais está a Doença Renal Crônica (Mendes, 2018). A DRC constitui-se em um problema de saúde pública brasileira. Estudos que colocam em perspectiva a situação da doença renal crônica e seu impacto no sistema de saúde do Brasil apontam que no ano de 2019, o número total estimado de pessoas em diálise era de aproximadamente 140 mil. Dos pacientes prevalentes, 93,2% estavam em hemodiálise e 6,8% em diálise peritoneal, e 23,6% em fila de espera para transplante (NEVES et al., 2021).

A DCR e seu tratamento impõe um conjunto de mudanças na vida das pessoas e em sua rede familiar, sejam elas de cunho físico, psicológico e socioculturais. As limitações provocadas pela doença e seu tratamento tendem a aumentar com o envelhecimento e, conseqüentemente, gerar maior possibilidade do acometimento de múltiplas comorbidades (PILGER et al., 2017).

Mediante a relevância apresentada, o Ministério da Saúde (MS) estabeleceu na Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde (ANPPS) alguns eixos temáticos chaves no qual o objeto investigado correlaciona-se a abordagem das DCNT's, a saúde do idoso e a estruturação de programas e políticas públicas de saúde. Tais eixos visam o atendimento dos diferentes níveis de fragilidade, vulnerabilidade e sofrimento humano, de modo que haja priorização de ações nos diferentes níveis de atenção à saúde (BRASIL, 2018b).

Nem sempre os idosos foram priorizados em relação à realização de exames e no tratamento de diferentes patogenias, a exemplo da DRC. As justificativas para a mudança de prioridades no atendimento incluem o crescente número de pacientes idosos e melhorias no entendimento social dos países subdesenvolvidos cuja diálise em idades avançadas proporciona melhorias sobre sua sobrevivência (FERNANDES; FRANCO, 2013).

Com base no exposto, justifica-se a relevância da temática e a necessidade de direcionamento do olhar dos diferentes profissionais de saúde, em especial a enfermagem. Frente a complexidade do quadro

clínico das pessoas que possuem a DRC, o profissional enfermeiro é capaz de identificar e tratar os fenômenos decorrentes do tratamento dialítico, utilizando estratégias capazes de captar as respostas humanas dos idosos com ênfase na promoção e qualidade de vida (FLORENCIO et al., 2021).

Nesse sentido, identificou-se a necessidade da realização de uma revisão integrativa em busca de evidências científicas atualizadas a respeito da temática capazes de fornecer subsídios a atuação do enfermeiro referente aos cuidados direcionados ao idoso que possui DRC e está em terapia renal substitutiva na modalidade hemodiálise.

Os cuidados especializados de enfermagem aos pacientes idosos renais crônicos em tratamento dialítico foram concebidos como componentes do objeto desta investigação; sendo, portanto, o objetivo deste estudo descrever a assistência de enfermagem aos pacientes idosos submetidos à diálise renal.

Artigo do tipo revisão integrativa da literatura. Sua escolha baseou-se na concepção deste estudo como uma análise da literatura científica, que seja capaz de auxiliar na tomada de decisão a partir da discussão dos resultados encontrados, podendo a partir desta revisão, identificar lacunas no conhecimento científico e possibilitar elaboração de novos objetos de investigação para pesquisas de campo (MENDES et al., 2008).

Para a manutenção do rigor científico, foram respeitadas as seguintes etapas: 1) Identificação do tema e seleção da questão de pesquisa; 2) Estabelecimento dos critérios de inclusão e de exclusão; 3) Identificação das investigações pré-selecionadas; 4) Categorização das investigações selecionadas; 5) Análise e interpretação dos resultados e; 6) Apresentação da revisão com síntese do conhecimento (BOTELHO et al., 2011).

A pesquisa ocorreu no período de fevereiro a maio de 2019, na qual foram utilizados os descritores: “cuidado de enfermagem”, “idoso” e “diálise renal”, obtidos a partir dos Descritores em Ciências da Saúde (Decs) da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Estes foram cruzados entre si, nas bases de dados SciELO e Lilacs, fazendo uso do Operador Boleano AND e como recurso de pesquisa à opção “termo exato” na qual os artigos indexados em mais de uma base de dados foram considerados apenas uma vez.

Foram incluídos: artigos científicos, disponíveis online na íntegra, publicados entre 2010 e 2019, na língua portuguesa. Foram excluídas investigações que não responderam à questão de pesquisa ou com metodologia mal definida.

2 DESENVOLVIMENTO

Após leitura na íntegra dos 89 artigos encontrados por dois pesquisadores, foram elegíveis seis para integrar este estudo. Para melhor compreensão dos resultados encontrados sobre o objeto de investigação e apresentação dos resultados com a síntese do conhecimento, este capítulo foi apresentado de forma estruturada: 1) Fisiopatologia da doença renal e as formas de tratamento do paciente portador de doença renal e; 2) Assistência de enfermagem aos pacientes idosos submetidos à diálise renal.

2.1- FISIOPATOLOGIA DA DOENÇA RENAL E AS FORMAS DE TRATAMENTO DO PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA RENAL

A Doença Renal (DR) é considerada uma lesão renal que tende a se desenvolver após uma injúria renal inicial seguida de perda lenta, progressiva e irreversível das funções desse órgão, sendo caracterizada como um tipo de síndrome metabólica (EVANGELISTA et al., 2018).

A DR se desenvolve quando os rins já não são capazes de executar as funções regulatórias, excretórias e endócrinas de maneira eficaz. Quando isso ocorre às substâncias que deveriam ser eliminadas pela urina passam a se acumular metabolicamente, podendo ocasionar distúrbios endócrinos, metabólicos, hidroeletrólíticos, acidobásicos e hipervolemia (CARVALHO et al., 2010; RIBEIRO, 2012).

As pessoas que apresentam maior vulnerabilidade para o desenvolvimento de uma doença renal e se encontram alocadas no grupo considerado de risco que são portadores de: a) DM Tipos I e II; b) HAS; c) idosos (idade ≥ 60 anos no Brasil); d) obesidade ($\text{IMC} \geq 30 \text{ Kg/m}^2$); e) histórico de doenças do aparelho circulatório; f) histórico de DRC na família; g) tabagismo; e h) uso prolongado ou contínuo de fármacos nefrotóxicos (BRASIL, 2014).

O diagnóstico da DRC deve ser realizado por profissional médico nefrologista, utilizando-se dos seguintes parâmetros: a) Taxa de Filtração Glomerular (TFG) alterada; e b) TFG normal ou próxima do normal, acompanhada de evidência de lesão renal parenquimatosa ou alteração no exame de imagem renal (BRASIL, 2014).

A partir das Diretrizes Clínicas para o cuidado ao paciente com DRC no Sistema Único de Saúde (SUS) é considerado portador de DRC qualquer pessoa que, independente da causa, apresente uma TFG $< 60 \text{ ml/min/1,73m}^2$, por um período ≥ 3 meses consecutivos e; em pacientes com TFG $\geq 60 \text{ ml/min/1,73m}^2$, associada a pelo menos um marcador de dano renal parenquimatoso ou ainda alguma alteração no

exame de imagem; sendo que após confirmação diagnóstica o tratamento pode resultar na necessidade de realização de um processo dialítico (BRASIL 2014; EVANGELISTA et al., 2018).

Dentre os tratamentos disponíveis estão os processos dialíticos (hemodiálise ou diálise peritoneal) ou ainda o transplante renal como forma de substituição parcial da função renal perdida (Brasil, 2014). A escolha do tipo de tratamento depende das condições clínicas e psicológicas do paciente e foram abordadas a seguir.

A literatura traz conceitos diferenciados sobre as duas formas de tratamento dialítico, ambas utilizadas em casos já avançados na doença, onde a maior diferença entre qual tipo adotar no quesito escolha está na comodidade para o paciente (BRASIL, 2014).

A diálise peritoneal é realizada pela filtração dos líquidos extracorporais do sangue. Está é multifatorial e abarca questões financeiras e culturais, contudo é um procedimento pouco utilizado devido à pouca disponibilidade de uma equipe adequada e do alto custo para o governo, desta forma, são poucas as pessoas que tem acesso a este tipo de tratamento (FERNANDES; FRANCO, 2013).

A diálise renal ou hemodiálise é realizada em local adequado sobre os cuidados de uma equipe interdisciplinar preparada para este atendimento, após avaliação criteriosa e prescrição dialítica proveniente de um Nefrologista. Quando a opção de tratamento prescrita for à diálise peritoneal, o próprio paciente e seu familiar e/ou principal cuidador são encaminhados, para treinamento realizado pela equipe interdisciplinar de saúde (BRASIL, 2014).

A principal forma de tratamento da DRC é a hemodiálise que simula o processo fisiológico de filtração glomerular, baseado no mecanismo de difusão (transposição do sangue através de uma membrana semipermeável artificial imersa em uma solução eletrolítica que permite a filtração das toxinas por diferença de concentração e a perda de líquidos é controlada por pressão exercida sobre o sistema) (FRAZÃO et al., 2014).

Na hemodiálise a filtração extracorpórea do sangue por intermédio de uma máquina de diálise do filtro a algumas substâncias tóxicas como: ureia, creatinina, metabólitos, excretas e o excesso de líquidos; por meio de um filtro de hemodiálise conhecido como capilar. Este processo pode resultar em alterações no processo saúde-doença, capazes de comprometer as dimensões físicas, biológicas, psicológicas e sociais com repercussões sobre a qualidade de vida individual, social e familiar. A HD supre as funções renais através das sessões semanais que ocorrem em média três vezes por semana com duração média de quatro horas (BRASIL, 2014).

Por outro lado, os critérios indicativos para o transplante renal representam a última intervenção, a qual configura-se como alternativa quando o tratamento já não é suficiente para manter o mínimo de qualidade de vida e conforto ao paciente ou ainda quando o paciente se encontra em estado avançado da DRC (EVANGELISTA, 2018).

2.2 ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AOS PACIENTES IDOSOS SUBMETIDOS À DIÁLISE RENAL

Na visão de Alves, Guedes, Costa (2016) é mediante o princípio da integralidade que se desenvolve a prática assistencial em saúde e aos cuidados especializados ocorrem mediante conhecimento técnico e científico, levando-se em consideração as necessidades bio-psico-sócio-culturais e espirituais do paciente.

Tem-se nestas concepções, uma perspectiva que pode modificar a prática assistencial realizada aos pacientes em tratamento dialítico, de modo que se promovam melhorias sobre a atenção em saúde ao paciente renal, seu bem-estar e qualidade de vida mediante o conceito ampliado de saúde. Para tanto, os profissionais de enfermagem, presentes na linha de frente de cuidados, durante cada sessão de diálise, necessitam estar qualificados, seguros de sua prática, dotados de conhecimentos técnico-científicos para que possam atuar com qualidade e segurança para com os pacientes em terapia dialítica (ALVES; GUEDES; COSTA, 2016).

Um das funções do enfermeiro e de sua equipe engloba a monitorização clínica e hemodinâmica do paciente de forma contínua e integral, durante todo o ciclo de hemodiálise, identificando possíveis anormalidades, sejam em relação aos sinais vitais, sinais e sintomas, alterações hemodinâmicas ou laboratoriais; de modo a corroborar com a identificação precoce e atendimento imediato com rápida intervenção de forma eficaz as possíveis intercorrências junto à equipe interdisciplinar de forma segura para com o paciente dialítico (NETO; SOARES; GONÇALVES, 2017).

O enfermeiro precisa também estar atento a fatores externos que podem dificultar a adesão ao tratamento do idoso renal crônico em terapia dialítica como, por exemplo: as condições de acesso, o apoio social e familiar, condições econômicas; sua crença religiosa e suporte espiritual; comportamentos de possível negação e esquia ao tratamento; dificuldades em se adaptar a terapia, suporte psicológico; História Patológica Pregressa (hábitos de vida, patogenias, cirurgias pregressas, medicações de uso contínuo, alergias medicamentosas); histórico social (hábitos alimentares, atividade física e sedentarismo, tabagismo, etilismo e uso de drogas ilícitas) e resiliência. Tais fatores não se apresentam isoladamente, uma vez que, alguns deles se caracterizam como dificuldades

inerentes à doença, enquanto que outras se apresentam como consequência destas (EVANGELISTA et al., 2018).

Durante o procedimento de diálise renal podem ocorrer algumas complicações, que justificam a presença do enfermeiro para a tomada de decisão, com intervenções especializadas de forma rápida e precisa, principalmente no que se referem aos principais sinais e sintomas que podem ocorrer, a exemplo: hipotensão ou hipertensão, taquicardia ou bradicardia, hipoglicemias, algias torácicas e lombares, presença de câimbras musculares, náuseas e vômitos, cefaleia, prurido, febre, calafrios, dentre outros (NETO; SOARES; GONÇALVES, 2017).

O enfermeiro é o profissional capacitado para agir e intervir junto aos pacientes que estão em terapia de hemodiálise. Visto que este possui uma visão abrangente e conhecimento técnico e científico em relação às diversas nuances do paciente idoso em tratamento dialítico, de modo a se planejar e intervir sobre as respostas humanas aos diferentes contextos (DEBONE et al., 2017).

Entretanto, na perspectiva da assistência em terapia dialítica, a questão que também deve-se levar em consideração, é o despertar dos órgãos de classe, como o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) e a Sociedade Brasileira de Enfermagem em Nefrologia (Sben), a respeito da urgência e da relevante necessidade de se planejar e implementar uma cultura da presença contínua de enfermeiros nefrologistas na terapia dialítica. Este é o profissional mais indicado para realizar o procedimento dialítico mediante a complexidade que envolve o cuidado, prezando pela segurança do paciente, sendo incoerente delegar tal ação para auxiliares ou técnicos de enfermagem (MELO et al., 2020b).

Todavia, a participação do enfermeiro nefrologista na assistência e no diagnóstico precoce de possíveis infecções relacionadas a assistência, é crucial para o prognóstico do paciente, assim, considerando a possibilidade de reversibilidade, contribuindo para prevenção de complicações futuras, uma vez que, ele apoia a tomada de decisões terapêuticas com maior embasamento teórico e científico (MELO et al., 2020b).

O enfermeiro precisa ficar atento à hipotensão, onde os procedimentos adequados são: infusão de soro fisiológico, posicionamento do paciente na posição de Trendelenburg, oxigenoterapia conforme necessidade, monitorar pulso; já os cuidados com os pacientes com hipertensão estes serão realizados pela correção da causa e pela administração de hipotensores, a exemplo da nifedipino e o captopril conforme prescrição. As hipoglicemias deveram ser corrigidas de forma imediata, mediante glicose, conforme prescrição (NETO; SOARES; GONÇALVES, 2017).

Para isso, ressalta-se a importância do uso de uma taxonomia que respalde o estabelecimento das etapas da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) dentro do Processo de Enfermagem (PE) com diagnósticos de enfermagem específicos que instrumentalize o planejamento da assistência, cujas intervenções e cuidados de enfermagem, prescritos tenham o intuito de alcançar os resultados esperados, de modo a padronizar os cuidados de enfermagem dentro da individualidade e peculiaridade de cada paciente em hemodiálise e se possibilite ainda uma avaliação da eficiência do cuidado prestado (DEBONE et al., 2017; MELO; SILVA; JEREMIAS, 2021).

A enfermagem corrobora ainda com a prevenção da DRC, intervindo de modo a controlar/minimizar os diferentes fatores de risco do desenvolvimento ou agravamento da doença renal, a exemplo: HAS, DM, dislipidemia, sobrepeso, Doença Cardiovascular (DCV), tabagismo, etilismo, hábitos alimentares, entre outras. Há também uma necessidade de orientação voltada à utilização de medicamentos de forma correta e a minimização ou cessar do uso de fármacos nefrotóxicos como antibióticos, contrastes, anti-inflamatórios e analgésicos de forma desnecessária (BRASIL, 2014).

Entre os cuidados que o enfermeiro precisa ter com os pacientes em terapia renal podem ser citados ainda o acolhimento, estabelecimento de vínculo, estímulo ao autocuidado, preservação da autonomia, resgate da cidadania, promover o cuidado de forma integral e avaliar o paciente de forma multidimensional conforme conceito ampliado de saúde, planejando intervenções mediante os eixos acometidos. Cabe destaque ainda as intervenções planejadas do enfermeiro em relação à educação continuada de sua equipe, do paciente portador de doença renal, de seus familiares, cuidadores em relação a monitorização, intervenções, terapia implementada, curso da doença e potenciais complicações e como se proceder mediante a estas (NETO; SOARES; GONÇALVES, 2017).

O aspecto essencial da assistência do cuidar em enfermagem é capaz de fazer com que o enfermeiro reconheça o paciente e seu cuidador como agentes participantes em seu próprio tratamento, e não somente como um mero receptor de cuidados. Tem-se ainda na dimensão educacional das intervenções de enfermagem os cuidados em relação ao Acesso Vascular de Hemodiálise (HD), região da Fístula Arteriovenosa (FAV) ou ainda cateter totalmente implantado, que requer avaliação contínua, curativo em técnica estéril, cuidados em relação à manutenção deste e orientações ao familiar cuidador e paciente (ALVES; GUEDES; COSTA, 2016).

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A assistência de enfermagem aos pacientes idosos submetidos à diálise renal ocorre de forma multidimensional desde a identificação e controle dos fatores de risco ao desenvolvimento da DRC, diagnóstico, tratamento clínico e medicamentoso e perpassa pela terapia dialítica que no âmbito da hemodiálise envolve a monitorização clínica e hemodinâmica do paciente de forma contínua e integral, durante todo o ciclo de hemodiálise, identificando possíveis anormalidades, sejam em relação aos sinais vitais, sinais e sintomas, alterações hemodinâmicas ou laboratoriais; de modo a corroborar com a identificação precoce e atendimento imediato com rápida intervenção de forma eficaz as possíveis intercorrências junto à equipe interdisciplinar de forma segura para com o paciente dialítico.

Cabe mencionar que as ações prioritárias do enfermeiro versam sobre a segurança do paciente, garantia da eficácia terapêutica, promoção do bem estar, do conforto e da qualidade de vida a todas as pessoas em hemodiálise na qual o idoso merece especial atenção mediante seu conjunto de comorbidades e peculiaridades de demandas assistências, sem que se perca de vista, os procedimentos técnicos como, por exemplo, os cuidados com a fístula ou cateter de diálise, operacionalização dos equipamentos de diálise além é claro da supervisão, orientação e liderança da equipe.

Como limites desta investigação, reconhece-se a inclusão de apenas manuscritos em língua portuguesa e o recorte de tempo, visto que, não foi possível realizar a cobertura de toda a literatura crítica disponível. Tem-se como proposta para futuros estudos a realização de pesquisas de campo envolvendo a temática de forma mais ampla a partir dos resultados da presente pesquisa.

A contribuição da presente pesquisa para a enfermagem e profissionais da saúde impacta na qualidade da assistência ao paciente ao apontar como pontos a serem considerados no cuidado ao idoso em HD fatores físicos, psicofisiológicos, emocionais, espirituais e condição econômicos e sócias.

REFERENCIAS

ALVES, L. O; GUEDES, C. C. P; COSTA, B. G. As ações do enfermeiro ao paciente renal crônico: reflexão da assistência no foco da integralidade. J. Res.: Fundam. Care., v. 8, n.1, p. 3907-21, 2016. Acesso em: 11 Março 2019. Disponível em

<http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IscScript=iah/iah.xis&src=google&base=BDENF&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=27384&indexSearch=ID>.

BOTELHO, L. L. R; CUNHA, C. C. A; MACEDO, M. O método da revisão integrativa nos estudos organizacionais. Gestão e sociedade. v. 5, n. 11, p. 121-36, 2011. Acesso em: 11 Março 2019. Disponível em <https://www.gestoesociedade.org/gestoesociedade/article/view/1220>

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Projeções da população: Brasil e unidades da federação: revisão 2018 /IBGE, Coordenação de População e Indicadores Sociais. 2. ed. - Rio de Janeiro: IBGE, 2018a. 58 p. Acesso em: 11 Março 2019. Disponível em: <http://impar.online/wp-content/uploads/2018/07/liv101597.pdf>.

BRASIL. Ministério da Saúde (MS). Agenda de Prioridades de Pesquisa do Ministério da Saúde – APPMS. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Departamento de Ciência e Tecnologia – Brasília: MS, 2018b. 26p. Acesso em: 11 Março 2019. Disponível em:

http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/agenda_prioridades_pesquisa_ms.pdf

BRASIL. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Especializada e Temática. Diretrizes Clínicas para o Cuidado ao paciente Doença Renal Crônica- DRC no Sistema Único de Saúde. Departamento de Atenção Especializada e temática. Brasília: MS, 2014. Acesso em: 11 Março 2019. Disponível em:

https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_clinicas_cuidado_paciente_renal.pdf

CARVALHO, G. M. C; LIMA, F. E. T; BARBOSA I. V; MELO, E. M. Estudos brasileiros sobre nefrologia nas teses e dissertações de enfermagem. Rev. Bras. Enferm., v. 63, n. 6, p. 1052-55, 2010 . Acesso em: 11 Março 2019. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71672010000600028&lng=en&nrm=iso

DEBONE, M, C; PEDRUNCCI, E. S. N; CANDIDO, M. C. P; MARQUES, S; KUSUMOTA, L. Diagnósticos de enfermagem em idosos com doença renal crônica em hemodiálise. Rev Bras Enferm, Vol. 70, n º 4, p. 833-890, 2017. Acesso em: 11 Março 2019. Disponível em:

http://www.scielo.br/pdf/reben/v70n4/pt_0034-7167-reben-70-04-0800.pdf

EVANGELISTA, R. A; PIRES, N. C. SILVA, C. S. B; ASSIS, A; ALMEIDA, L. Domínios afetados na qualidade de vida do paciente renal crônico em tratamento hemodialítico: revisão sistemática. Rev Enferm Atenção Saúde, v. 7, n. 3, p. 150-64, 2018. Acesso em: 11 Março 2019. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-970411>

FERNANDES, N. M. S; FRANCO, M; R. G. Diálise no paciente idoso: um desafio do século XXI - revisão narrativa. J Bras Nefrol, v. 35, n. 2, p. 132-41, 2013. Acesso em: 11 Março 2019. Disponível em

<http://bjn.org.br/details/1548/pt-BR/dialise-no-paciente-idoso--um-desafio-do-seculo-xxi---revisao-narrativa>

FLORENCIO, A. C. B; ALENCAR, B. T; MARINS, E. G; ALENCAR, R. T; CAMPOS, S. M. G; HARTWI, S. V. Percepção dos idosos em tratamento de hemodiálise. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 4, p. e23310414010-e23310414010, 2021. Acesso em: 11 Março 2019. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i4.14010>

FRAZÃO, C. M. F. Q; DELGADO, M. F; ARAÚJO, M. G. A; SILVA, F. B. B. L; SÁ, J. D; LIRA, A. L. B. C. Cuidados de enfermagem ao paciente renal crônico em hemodiálise. *Rev Rene*. Vol. 15, n 4, 701-709, 2014. Acesso em: 11 Março 2019. Disponível em <http://www.periodicos.ufc.br/rene/article/view/1113>

MELO, L. D; SILVA, D. A; JEREMIAS, J. S. Cuidados Intensivos de Enfermagem ao Paciente em Pós-operatório Cardíaco. *Revista de Pesquisa: Cuidado é Fundamental*, v. 13, p. 467-476, 2021. Acesso em: 11 Setembro 2021. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1151558>

MELO, L. D; ARREGUY-SENA, C; GOMES, A. M. T; PINTO, P. F; SILVA, G. A; PARREIRA, P. M. D. Crenças de Rokeach segundo Idosos: Análise Hierárquica a Luz das Teorias do Envelhecimento Humano. *Enfermagem Brasil*, v. 19, p. 220-229, 2020. Acesso em: 11 Setembro 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.33233/eb.v19i3.3254>

MELO, G. A. A; OLIVEIRA, C. V. F; PEREIRA, F. G. F; ALENCAR FILHO, W. L; MELO, D. G; MORAIS, J. B. Enfermagem em nefrologia: percepções sobre as competências no manejo da injúria renal aguda. *Cienc Cuid Saude*, v. 19, p. e50245, 2020b. Acesso em: 11 Outubro 2021. Disponível em: <http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude>

MENDES, E. V. A abordagem das condições crônicas pelo Sistema Único de Saúde. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 23, p. 431-436, 2018. Acesso em: 11 Março 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232018232.16152017>

MENDES, K. D. S; SILVEIRA, R. C. C. P; GALVÃO, C. M. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. *Texto contexto - enferm.*, v. 17, n. 4, p. 758-64, 2008. Acesso em: 11 Março 2019. Disponível em

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-07072008000400018

NETO, I. R. L; SOARES, G. L; GONÇALVES, A. S. O papel do enfermeiro de uma unidade de terapia intensiva na hemodiálise. *Revista UNINGÁ Review.*, v. 31, n. 1, p. 40-4, 2017. Acesso em: 11 Março 2019. Disponível em https://www.mastereditora.com.br/periodico/20170801_220045.pdf.

NEVES, P. D. M. M; SESSO, R. C. C; THOMÉ, F. S; LUGON, J. R; NASCIMENTO, M. M. et al. Inquérito brasileiro de diálise 2019. *Revista Brasileira de Nefrologia*, v. 43, n. 2, p. 217-27, 2021. Acesso em: 11 Setembro 2021. Disponível em: 10.1590 / 2175-8239-JBN-2020-0161

PILGER, C; SANTOS, R. O. P; LENTSCK, M. H; MARQUES, S; KUSUMOTA, L. Bem-estar espiritual e qualidade de vida de idosos em hemodiálise. *Revista brasileira de enfermagem*, v. 70, p. 689-696, 2017. Acesso em: 11 Março 2019. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/reben/a/fmyxsMPB4YCLNNmxMGk3w7G/?lang=pt>

RAMOS, B. L. Participação da família junto ao paciente em tratamento dialítico. Monografia (Curso de Pós-graduação em Nefrologia) Universidade Paulista. Centro de Consultoria Educacional. Recife: Ed. do Autor, 2009.

RIBEIRO, D. F. Processo de cuidar do idoso em diálise peritoneal ambulatorial continua no domicílio. 2009_ IN RAMOS, Bruno Leal. Participação da família junto ao paciente em tratamento dialítico. Monografia (Curso de Pós-graduação em Nefrologia) Universidade Paulista. Centro de Consultoria Educacional. Recife: Ed. do Autor, 2012.