The background of the entire cover is a microscopic image of numerous green, rod-shaped bacteria. Some are in sharp focus, showing their textured surface, while others are blurred in the background, creating a sense of depth. The bacteria are oriented in various directions, some parallel to the edges and others diagonally.

VOLUME IV

**CIÊNCIAS BIOLÓGICAS:
AS DIVERSAS MANIFESTAÇÕES
DA VIDA**

EDITORA CONHECIMENTO LIVRE

Frederico Celestino Barbosa

Ciências biológicas: as diversas manifestações da vida

4ª ed.

Piracanjuba-GO
Editora Conhecimento Livre
Piracanjuba-GO

4ª ed.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Barbosa, Frederico Celestino
B238C Ciências biológicas: as diversas manifestações da vida
/ Frederico Celestino Barbosa. – Piracanjuba-GO

Editora Conhecimento Livre, 2021

56 f.: il

DOI: 10.37423/2021.edcl377

ISBN: 978-65-5367-036-5

Modo de acesso: World Wide Web

Incluir Bibliografia

1. flora 2. fauna 3. organismos-vivos I. Barbosa, Frederico Celestino II. Título

CDU: 570

<https://doi.org/10.37423/2021.edcl377>

O conteúdo dos artigos e sua correção ortográfica são de responsabilidade exclusiva dos seus respectivos autores.

EDITORA CONHECIMENTO LIVRE

Corpo Editorial

Dr. João Luís Ribeiro Ulhôa

Dra. Eyde Cristianne Saraiva-Bonatto

MSc. Frederico Celestino Barbosa

MSc. Carlos Eduardo de Oliveira Gontijo

MSc. Plínio Ferreira Pires

Editora Conhecimento Livre

Piracanjuba-GO

2022

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1	5
IDENTIFICAÇÃO DOS MICRORGANISMOS E DA ATIVIDADE MICROBIANA DO SOLO EM SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE CAFÉ ORGÂNICO E CONVENCIONAL	
Ana Cecilia Matias Mira	
Ricardo Carvalho Ferreira	
Hadassa Cristhina de Azevedo Soares dos Santos	
Paula Rachel Rabelo Correa	
Polyana Placedino Andrade	
DOI 10.37423/211105079	
 CAPÍTULO 2	 15
PLANTAS ESPONTÂNEAS EM ÁREAS DE PASTAGENS NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA – UFRA, CAMPUS DE BELÉM, PARÁ, BRASIL	
Jonilson Ribeiro Trindade	
Rielly Jivago Lima Nunes	
Valdir Souza e Silva Junior	
Kaléo Dias Pereira	
Rafael Amaral Cardoso	
Rafael Gomes Viana	
Wilson José Mello Maia	
Maria Auxiliadora Feio Gomes	
Ely Simone Cajueiro Gurgel	
João Ubiratan Moreira dos Santos	
DOI 10.37423/211205080	
 CAPÍTULO 3	 42
COCONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO SOBRE NOVAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS NAS AULAS DE BIOLOGIA PARA ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL, NO MODO REMOTO EM TEMPO REAL	
Neuza Rejane Wille Lima	
DOI 10.37423/211205084	

Capítulo 1

10.37423/211105079

IDENTIFICAÇÃO DOS MICRORGANISMOS E DA ATIVIDADE MICROBIANA DO SOLO EM SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE CAFÉ ORGÂNICO E CONVENCIONAL

Ana Cecília Matias Mira

*Centro Universitário do Sul de Minas -
UNIS/MG*

Ricardo Carvalho Ferreira

*Centro Universitário do Sul de Minas -
UNIS/MG*

Hadassa Cristhina de Azevedo Soares dos Santos

*Centro Universitário do Sul de Minas -
UNIS/MG*

Paula Rachel Rabelo Correa

*Centro Universitário do Sul de Minas -
UNIS/MG*

Polyana Placedino Andrade

*Centro Universitário do Sul de Minas -
UNIS/MG*

Resumo: Os diferentes manejos do solo e das culturas podem alterar sua comunidade microbiana, com efeito direto sobre o funcionamento de todo sistema de produção. O presente estudo abordou a existência de microrganismos no solo em diferentes sistemas de produção de café, sendo eles café orgânico e convencional. O objetivo do trabalho foi avaliar solos em sistemas de produção de café orgânico e convencional por meio da identificação dos microrganismos e da atividade microbiana presente nos mesmos. Para isso, foram coletadas amostras em solos de cultivo de café orgânico e convencional em duas áreas diferentes na região de São Gonçalo do Sapucaí-MG, para análise comparativa, seguindo as técnicas descritas por Serrat et al. (2002). A pesquisa demonstrou uma prevalência no crescimento de microrganismos nas amostras de solo orgânico quando comparado ao solo convencional. No entanto, a partir desses resultados, observa-se a necessidade de aplicar diluições menores devido ao grande crescimento de microrganismos, que impossibilitou a identificação destes nas amostras analisadas.

Palavras-chave: Microbiota; Bioprospecção; Fungos; Bactérias; Cafeeiro.

1 INTRODUÇÃO

O solo constitui-se de um dos recursos naturais mais importantes, sendo fundamental para a manutenção da vida de ecossistemas naturais e do sucesso de empreendimentos agropecuários e florestais. Dessa forma, é importante conhecer suas características e suas propriedades químicas e físicas (PRIMAVESI, 2005). Apresenta-se como um dos principais pilares de sustentabilidade de todo sistema de produção da cafeicultura, e deve propiciar um ambiente favorável ao pleno desenvolvimento do cafeeiro, devendo assim, possuir as características físicas, químicas e biológicas necessárias para o bom desenvolvimento da planta (MESQUITA et al., 2016).

O Brasil é o maior exportador de café no mercado mundial e ocupa a segunda posição entre os países consumidores da bebida. Responde também por um terço da produção mundial de café, o que o coloca como maior produtor mundial, posto esse que detém há mais de 150 anos. Conforme dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), a cafeicultura brasileira é uma das mais exigentes do mundo, em relação às questões sociais e ambientais, e há uma preocupação em se garantir a produção de um café sustentável (ABIC, 2020).

Os sistemas mais utilizados na produção de café são os sistemas de produção convencional e orgânica. A cafeicultura convencional gera impacto sobre o ambiente, devido ao intenso revolvimento do solo, aplicação de fertilizantes e agrotóxicos ao solo. Esses sistemas se diferem em vários aspectos de produção, principalmente pelo fato de que o sistema de produção orgânica não utiliza defensivos sintéticos, enquanto o sistema convencional utiliza intensivamente agroquímicos em seus controles (PROCAFE, 2017).

As comunidades microbianas contidas no solo desempenham um papel importante nos sistemas agrícolas devido ao seu envolvimento em diversos processos e funções do solo. Estas comunidades são os motores que conduzem à transformação e liberação de nutrientes, sendo indiretamente envolvido em muitos outros serviços ecossistêmicos, além de muitos traços biológicos, químicos e físicos, assim um solo fértil que abriga uma comunidade microbiana abundante, ativa, diversa e adaptativa ao funcionamento do solo (LORI et al., 2017). Os diferentes tipos de manejos do solo e das culturas podem alterar sua comunidade microbiana, com efeito direto sobre o funcionamento de todo sistema de produção. Segundo Øvreås (2000), a caracterização da diversidade é importante para aumentar o conhecimento das fontes na comunidade do solo, entendendo os padrões de distribuição relativa dos microrganismos, aumentando o conhecimento da diversidade microbiana do solo, identificando as diferenças associadas a distúrbios causados por práticas de manejo, entendendo

a regulação da biodiversidade no funcionamento e na sustentabilidade do ecossistema. Nas últimas décadas, numerosos estudos têm dado importância às medidas da variação da diversidade de microrganismos no solo e ao seu papel na saúde e nos demais funcionamentos no meio ambiente (LAMBAIS et al., 2005).

Este trabalho analisou a diversidade microbiana do solo na cultura do café nos sistemas de manejo convencional e orgânico e avaliou se os diferentes tipos de manejo alteram a comunidade microbiana, produzindo um efeito direto sobre o funcionamento de todo sistema de produção. Tal abordagem justifica-se pelo fato dos microrganismos do solo atuar nos processos de decomposição da matéria orgânica, participando diretamente no ciclo dos nutrientes e, conseqüentemente, mediando a sua disponibilidade no solo.

Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi identificar e avaliar a atividade microbiana em solos com culturas de café em sistemas de manejo convencional e orgânico.

2 MATERIAL E MÉTODOS

2.1 ORIGENS DAS AMOSTRAS

Para a realização da pesquisa, foram selecionadas duas áreas em diferentes locais na região de São Gonçalo do Sapucaí, MG, sendo uma área com cultivo de café orgânico e outra com cultivo de café convencional.

As amostras dos solos, convencional e orgânico, foram coletadas entre setembro e outubro de 2020. Em cada uma das áreas selecionadas foram demarcados dois talhões, dentro dos quais foram realizadas coletas, ao todo foram 20 amostras aleatórias e simples, que ao se misturarem formaram a amostra composta, conforme descrito por Serrat et al. (2002). O solo orgânico foi coletado na profundidade entre 0 a 5 cm e o solo convencional foi coletado entre 0 a 20 cm de profundidade, segundo indicação de Castellan e Vidor (1990a).

2.2 PREPARAÇÕES DAS AMOSTRAS

Após homogeneização das amostras de solo (300g), elas foram acondicionadas em sacos plásticos e em papel Kraft e levadas ao laboratório da Cidade Universitária do Unis para análise. Foram pesados 10g de solo previamente tamisado em peneira número 2, em duplicata. Uma parte (10g) destinada a contagem de bactérias e outra (10g) para determinação da massa seca do solo. Com auxílio de funil o solo (10g) foi transferido para um Erlenmeyer de 250 ml, contendo 90 mL de solução salina esterilizada

(diluição 1:10). Depois 15 minutos de agitação a 200 rpm e após precipitação das partículas maiores, com uma micropipeta contendo ponteiros esterilizados, foi transferido 0,1 mL de suspensão do Erlenmeyer para um Eppendorf contendo

0,9 mL de solução salina esterilizada, dispersada manualmente cinco vezes (diluição 1:100). Com uma micropipeta, contendo outra ponteira esterilizada, foi transferido da solução anterior para outro Eppendorf contendo 0,9 mL de solução salina esterilizada e agitada manualmente cinco vezes (diluição 1:1000). Este procedimento foi repetido várias vezes até ser obtido as diluições 1:10.000, 1:100.000 e 1:1.000.000. Com micropipeta, contendo ponteiros esterilizados, foram transferidos 0,05 mL das respectivas diluições para placas de Petri, contendo o meio de cultura Agar Batata Dextrosado (BDA). Com auxílio de uma alça de Drigalski, cuidadosamente esterilizada por flambagem antes e após cada procedimento, o inóculo foi espalhado por cada placa.

Para cada diluição foram montadas três placas incubadas a 25 °C. As placas devidamente identificadas foram mantidas incubadas aproximadamente uma semana e foram selecionadas as diluições que continham entre 10 e 100 colônias (UFC), contadas com auxílio de um contador de colônias.

Para o cálculo das colônias foi utilizada a seguinte fórmula:

$$\text{UFC g}^{-1} = (\text{média das contagens} \times \text{diluição selecionada} \times \text{alíquota da diluição})$$

UFC (Unidade Formadora de Colônia)

3 RESULTADO E DISCUSSÃO

Pode-se observar a contagem individual dos microrganismos encontrados nas amostras de solo orgânico e convencional (Tabela 1).

Tabela 1: Contagem individual dos microrganismos encontrados nas amostras e formação dos grandes grupos.

Microrganismos	Solo orgânico Talhão 1 (0 - 5 cm)		Solo orgânico Talhão 1 (0 - 20 cm)		Solo orgânico Talhão 2 (0 - 5 cm)		Solo orgânico Talhão 2 (0 - 20 cm)		Solo convencional Talhão 1 (0 - 20 cm)		Solo convencional Talhão 2 (0 - 20 cm)	
	10 ⁻³	10 ⁻⁴	10 ⁻³	10 ⁻⁴	10 ⁻³	10 ⁻⁴	10 ⁻³	10 ⁻⁴	10 ⁻³	10 ⁻⁴	10 ⁻³	10 ⁻⁴
M1	50	40	56	44	30	10	20	10	33	10	55	10
M2	60	40	67	42	20	10	20	10	35	50	20	0
M3	10	10	20	20	10	0	0	0	0	0	0	0
M4	35	30	20	20	10	0	0	0	5	10	0	0
M5	0	10	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0

Fungo 1	0	0	0	10	10	20	0	0	0	0	10	0
Fungo 2	0	0	10	20	10	20	0	0	10	0	0	0
Fungo 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
Fungo 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
Fungo 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
Fungo 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
Fungo 7	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fungo 8	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0
Fungo 9	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Caracterização dos microrganismos encontrados nas amostras: Microrganismo1: branco leitoso gelatinoso regular. Microrganismo 2: amarelo claro leitoso gelatinoso regular. Microrganismo 3: branco brilhante gelatinoso irregular. Microrganismo 4: amarelo ouro brilhante gelatinoso regular. Microrganismo 5: amarelo fosco em forma de caracol. Fungo 1: Verde musgo algodoado. Fungo 2: branco prensado irregular com halo de antibiótico. Fungo 3: branco cotonoso em forma de raio. Fungo 4: *Fusarium*. Fungo 5: cinza amarelo pulverulento. Fungo 6: branco algodoado pulverulento preto. Fungo 7: irregular transparente brilhante. Fungo 8: preto pulverulento. Fungo 9: cinza cotonoso.

A maioria dos microrganismos foi identificada sendo separados em grandes grupos, uma vez que esta estratégia atendia aos objetivos do trabalho. Após a realização da caracterização morfológica dos grupos foi realizada então a contagem total de UFC (Tabela 2).

Tabela 2: Contagem de Unidade formadora de colônias (UFC) nas amostras de solo com manejo convencional e orgânico

Identificação Amostra	Contagem de Microrganismos (UFC mL ⁻¹)	
	Bactérias Totais	Fungos Totais
Orgânico T1 (0-5 cm)	3,1 x 10 ⁶	2,00 x 10 ⁵
Orgânico T1 (0-20 cm)	3,26 x 10 ⁶	4,00 x 10 ⁵
Orgânico T2 (0-5 cm)	1,40 x 10 ⁶	8,00 x 10 ⁵
Orgânico T2 (0-20 cm)	8,00 x 10 ⁵	ND*
Convencional T1 (0-20 cm)	1,46 x 10 ⁶	2.00 x 10 ⁵
Convencional T2 (0-20 cm)	1,50 x 10 ⁶	1.00 x 10 ⁶

*ND: Não detectável.

De acordo com as análises, o solo convencional apresentou uma biodiversidade menor que a encontrada nos solos com cultivo orgânico (27 % menor), chamando atenção para o número de fungos que foi 63% menor no solo convencional. Essa diferença corrobora outros trabalhos realizados para

medir biodiversidade em solos com os diferentes tipos de manejos, diferentes tipos de implementos e defensivos, conforme exposto por De Melo (2009).

Segundo Gama-Rodrigues et al. (2005) a qualidade e a quantidade de resíduos agrícolas adicionados com teor de matéria orgânico e ainda somados às práticas de manejo, são fatores que influenciam na diversidade e na atividade da microbiota do solo. Os resultados apresentados revelaram que os atributos biológicos do solo são bastante sensíveis aos manejos adotados. Revelaram, também, que a microbiota do solo muda muito facilmente em decorrência da mudança do manejo do solo, resultado corroborado por Freire et al. (2018).

Os resultados revelaram também que as propriedades biológicas do solo servem como excelentes indicadores da qualidade do solo esta qualidade estão diretamente ligada ao sistema de manejo utilizado na cultura. Graças a esta sensibilidade a qualidade e quantidade de microrganismos podem ser utilizadas no monitoramento de alterações ambientais decorrentes do uso agrícola.

Na tabela 3, contem os valores da atividade microbiana (RBS) das amostras, onde podemos observar uma quantidade superior no solo orgânico. O trabalho de atividade microbiana foi realizado pelo grupo Solilactis, usando a metodologia de Alef (1995).

Tabela 3: Resultado na respiração basal (RBS) dos solos em manejo convencional e orgânico

Identificação da Amostra	Cultivar	Respiração Basal do Solo (RBS)
Convencional Talhão 1	Café	65,502
Convencional Talhão 2	Café	63,719
Orgânico Talhão 1 (0-5cm)	Café	126,19
Orgânico Talhão 2 (0-5cm)	Café	92,814
Orgânico Talhão 1 (0-20cm)	Café	79,756
Orgânico Talhão 2 (0-20cm)	Café	88,109

Esta tabela é consultada utilizando como referência o padrão apresentado no Quadro 1

Quadro 1	Padronização dos Resultados na atividade microbiana (RBS) (Lopes, 2012)		
Atributos	Valores das Atividades ou teores no solo		
Nível	Baixo	Médio	Alto
Respiração Basal	≤ 40	40 a 100	> 100
Escala de cor			

Os resultados apresentados na tabela 3 revelaram que existem diferenças na atividade microbiana dependente do manejo utilizado no plantio. Revelam também que os talhões de plantio de café sob o manejo orgânico apresentaram atividade microbiana maior do que o solo sob manejo convencional e, que esses resultados foram ainda maiores, quando a coleta do solo foi realizada entre 0-5cm de profundidade.

4 CONCLUSÃO

Os melhores resultados no plaqueamento e na contagem dos microrganismos foram obtidos com diluição a 10^{-3} . Nas condições deste experimento observou-se uma maior biodiversidade e atividade microbiana nas placas de solo orgânico coletadas de 0 a 5 cm de profundidade.

5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABIC. (s.d.). O café brasileiro na atualidade. Acesso em 2 de Junho de 2020, disponível em ABIC: <https://www.abic.com.br/o-cafe/historia/o-cafebrasileiro-na-atualidade-2/>

ALEF, K. Estimation of soil respiration. In: ALEF, K.; NANNIPIERI, P. (Eds.). *Methods in soil microbiology and biochemistry*. New York: Academic, p. 464-470. 1995.

CATTELAN, A. J.; VIDOR, C. Sistemas de culturas e a população microbiana do solo. *Revista Brasileira de Ciência do Solo*, Campinas, v. 14, n. 2, p. 125-132, 1990a.

CONTERATO, M. A. e FILIPI, E. E. Teorias do Desenvolvimento. SEAD. Editora UFRGS. 2009 DE MELO, Fernando Vaz et al. A importância da meso e macrofauna do solo na fertilidade e como bioindicadores. Embrapa Florestas-Artigo em periódico indexado (ALICE), 2009.

DERPSCH, R. Expansão mundial do plantio direto. *Revista Plantio Direto*, Passo Fundo, v. 59, n. 1, p. 32 - 40, 2000.

EMBRAPA. (29 de Dezembro de 2017). NASA confirma dados da Embrapa sobre área plantada no Brasil. Acesso em 15 de junho de 2020, disponível em EMBRAPA: <https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/30972114/nasa-confirma-dados-daembrapa-sobre-area-plantadano-brasil>

EMBRAPA. (1998). Sistema orgânico de produção de café. Acesso em 16 de Junho de 2020, disponível em EMBRAPA:

<https://www.embrapa.br/busca-de-solucoes-tecnologicas/-/produtoservico/37/sistemaorganico-de-producao-de-cafe>.

EMBRAPA. (26 de Junho de 2019). Área explorada com produção dos Cafés do Brasil ocupa 1,84 milhão de hectares em 2019. Acesso em 15 de Junho de 2020, disponível em Embrapa: <https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/44441879/area-explorada-comproducao-dos-cafes-do-brasil-ocupa-184-milhao-de-hectares-em-2019>

FREIRE, Talita Maia et al. Respiração microbiana do solo em diferentes manejos e cobertura vegetal. Tocantins: UNITINS. 2018.

GAMA-RODRIGUES, Emmanuela Forestieri da et al. Nitrogênio, carbono e atividade da biomassa microbiana do solo em plantações de eucalipto. *Revista brasileira de Ciência do Solo*, v. 29, n. 6, p. 893-901, 2005.

LAMBAIS, M. R.; CURY, J. C.; MALUCHE-BARETTA, C. R.; BULL, R. C. Diversidade microbiana nos solos: definindo novos paradigmas. In: *Tópicos em ciência do solo*. v.4, p.42- 84. 2005

LORI, M.; SYMNACZIK, S.; DEYN, G.; GATTINGER, A. Organic farming enhances soil microbial abundance and activity – A meta-analysis and meta-regression. *Plosone*., July 12, p.1-25, 2017.

MESQUITA, CM de et al. Manual do café: implantação de cafezais *Coffea arábica* L. Belo Horizonte: EMATER-MG, v. 50, 2016. 11.

PRIMAVESI, Ana Cândida et al. Métodos de análise de solos. Embrapa Meio Ambiente Capítulo em livro científico (ALICE), 2005.

SERRAT, B. M. et al. Amostragem do solo: perguntas e respostas. Curitiba: UFPR, 2002. SHIKI, S. Sistema agroalimentar no cerrado brasileiro. In: SHIKI, S.; SILVA, J.G. da; ORTEGA,

A.C. (Org.). Agricultura, meio ambiente e sustentabilidade do cerrado brasileiro. Uberlândia: UFU, 1997. p.135-166.

Capítulo 2

10.37423/211205080

PLANTAS ESPONTÂNEAS EM ÁREAS DE PASTAGENS NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA – UFRA, CAMPUS DE BELÉM, PARÁ, BRASIL

Jonilson Ribeiro Trindade

Museu Paraense Emilio Goeldi

Rielly Jivago Lima Nunes

Universidade Federal Rural da Amazônia

Valdir Souza e Silva Junior

Universidade Federal Rural da Amazônia

Kaléo Dias Pereira

Universidade Federal de Viçosa

Rafael Amaral Cardoso

Universidade Federal Rural da Amazônia

Rafael Gomes Viana

Universidade Federal Rural da Amazônia

Wilson José Mello Maia

Universidade Federal Rural da Amazônia

Maria Auxiliadora Feio Gomes

Universidade Federal Rural da Amazônia

Ely Simone Cajueiro Gurgel

Museu Paraense Emilio Goeldi

João Ubiratan Moreira dos Santos

Universidade Federal Rural da Amazônia

Resumo: As plantas espontâneas, também conhecidas como plantas daninhas ou invasoras, são vegetais pertencentes a vários grupos taxonômicos, que apresentam em comum a capacidade de crescerem em áreas agrícolas e em outros ambientes antrópicos, sem serem cultivadas. Em áreas de pastagens, a infestação por plantas espontâneas, além de reduzir a produtividade e oferta de alimentos para os animais, pode também interferir na saúde deles. Neste contexto, este trabalho teve por objetivo realizar um levantamento das espécies de plantas espontâneas ocorrentes em três áreas de pastagens localizadas na Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA, Campus de Belém, pois acredita-se ser primordial a sua identificação botânica precisa, para posterior tomada de medidas visando seu controle de forma mais eficaz e menos agressiva ao meio ambiente. Sendo assim, foram realizadas coletas de material botânico com o auxílio de um quadrado medindo 0,5 x 0,5 m (0,25 m²), lançado, aleatoriamente, por dez vezes em cada uma das três áreas, perfazendo uma área amostral total de 2,5 m². Foram identificadas 10 famílias botânicas, sendo elas: Asteraceae, Boraginaceae, Convolvulaceae, Cyperaceae, Fabaceae, Linderniaceae, Onagraceae, Poaceae, Rubiaceae e Solanaceae. Distribuídas 15 gêneros, 20 espécies em um total de 600 indivíduos levantados. Sendo a espécie com maior número de amostras foram o capim de botão (*Cyperus luzulae*), com 118 indivíduos, seguido do junquinho (*Cyperus brevifolius*) com 117 indivíduos, ambas pertencentes a família Cyperaceae e presentes nas três áreas, a terceira com maior ocorrência foi poaia do brejo (*Diodia saponariifolia*) da família Rubiaceae, com 65 indivíduos, presente apenas na área 1.

Palavras-chave: Amazônia. Biodiversidade. Levantamento florístico. Plantas daninhas.

INTRODUÇÃO

Plantas cultivadas são vegetais que após o processo de domesticação realizado pelo ser humano, adquiriram características inteiramente dependentes (Barbieri & Stumpf, 2008). Enquanto plantas espontâneas, também conhecidas como daninhas, são vegetais que apresentam em comum à capacidade de crescerem em áreas antropizadas e outros ambientes sem serem cultivadas (Huber, 1900; Marques et al. 2013).

As plantas espontâneas podem ainda ser tóxicas, contendo substâncias nocivas, ou ainda serem invasoras, advindas de outras regiões, sendo estas muito competitivas, e uma vez instaladas nas áreas agrícolas, interferem diretamente ou indiretamente no desenvolvimento de espécies cultivadas (Bacchi et al. 1972; Dias-Filho, 1990; Falcão-da-Silva et al., 2016; Giulietti et al. 2018; Kissman, 1991; Lorenzi, 2006; Lorenzi, 2008; Matos et al. 2011).

Em pastagens, as espécies espontâneas rivalizam com as plantas de pastagem por meio de uma competição interespecífica entre a planta invasora e a forrageira, disputando recursos presentes no solo e no ar, sendo que as plantas cultivadas geralmente possuem menor habilidade de captação dos recursos no ambiente do que as espécies invasoras que são mais rústicas (Brighenti & Oliveira, 2011; Deuber, 1992). Para Brighenti & Oliveira (2011), elas podem ainda: reduzir a capacidade de lotação dos pastos, conferir sabor desagradável ao leite, ferir animais (dependendo de sua estrutura) ou levá-los à morte (em se tratando de plantas tóxicas).

Segundo Constantin (2011), para reduzir o número e o desenvolvimento dessas espécies, a fim de impedir a interferência sobre as plantas cultivadas, deve-se adotar a integração de medidas de controle: biológicas, culturais, físicas, mecânicas e químicas. Contudo, a aplicação dessas medidas, principalmente a química, deve ser racional, levando em conta que as espécies de plantas a serem controladas e a cultura trabalhada (Pereira & Silva, 2000).

Portanto, é necessária a identificação precoce das espécies espontâneas para a eficácia dos métodos de controle, prevenindo a competição interespecífica com as espécies forrageiras e, conseqüentemente, o malefício aos animais de interesse econômico.

Diante do que foi exposto, este estudo tem por objetivo realizar o levantamento das espécies de plantas espontâneas ocorrentes em 3 áreas de pastagens (denominadas pastagem 1, 2 e 3) da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) campus Belém. Para tal, foram realizadas coletas nas áreas para posteriores estudos e identificação das espécies, utilizando técnicas usuais em botânica,

como uso de chaves dicotômicas e confecção de exsicata das espécies espontâneas encontradas nas áreas de pastagens avaliadas.

MATERIAL E MÉTODOS

As coletas dos dados de campo para esta pesquisa ocorreram durante o período de fevereiro de 2016 a junho de 2017, no *campus* sede da Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA (Figura 1), localizado no município de Belém, Estado do Pará, nas coordenadas 1°27'22"S 48°26'14"W, altitude de aproximadamente 10 m. Para tal, foram selecionadas três áreas de pastagens de capim braquiária (*Urochloa* spp.) localizadas no *campus*, que foram denominadas de pastagem 1, pastagem 2 e pastagem 3.

Figura 1. Mapa de localização da UFRA – *campus* de Belém e áreas de pastagens (Fonte: Autores).

O *campus* de Belém da UFRA, compreende uma área total de 196 hectares, sendo apenas 71 ha de terra firme, onde se localiza as áreas dos dados levantados neste trabalho, o restante da área corresponde a áreas de igapó, várzea ou de preservação ambiental (Santos, 2014). O solo predominante da região é do tipo latossolo amarelo de textura argilosa, o clima é do tipo tropical chuvoso Afi de acordo com a classificação de Köppen, com temperatura média anual de 27 °C, umidade relativa do ar em torno de 85% e precipitação pluvial média anual de 3.000 mm (Bastos et al. 2002).

Nestas áreas foram realizadas coletas de material botânico segundo técnicas tradicionais em taxonomia vegetal (Fidalgo & Bononi, 1989; Martins-da-Silva et al. 2014). Com o objetivo de estimar os níveis de infestação das diferentes espécies avaliadas, bem como discutir os dados gerados a fim de obter informações que auxiliem no manejo integrado das espécies. Para tal, foi realizado o levantamento fitossociológico através do método do quadrado de Gardner (1967), aplicado por meio de um quadrado de tubo pvc, medindo 0,50 x 0,50 m, que foi lançado aleatoriamente 10 vezes para cada área avaliada, totalizando uma área amostral de 2,5 m², em cada uma das 3 áreas de pastagens. As espécies espontâneas encontradas no interior do quadrado, em cada lançamento, foram cortadas rente ao solo, armazenadas em sacos plásticos identificados e conduzidas para o Laboratório de Botânica no *campus* de Belém da UFRA, onde foram separadas por espécies, quantificados os indivíduos e fotografados para facilitar sua identificação posteriormente. As melhores amostras foram armazenadas em jornais e prensas, para secagem e confecção de exsiccatas de acordo com Martins-da-Silva (et al. 2014).

As plantas foram identificadas em espécie, nome comum, família, hábito e origem (Tabela 1), através do uso de literaturas especializadas (Falcão-da-Silva, 2016; Lorenzi, 2006; Lorenzi, 2008) e comparações com material de herbários. A classificação botânica segue o sistema APG IV (2016), os nomes científicos e foram conferidos de acordo com sites base de dados *online* de referência Tropicos (2021) e Flora do Brasil (2021). Bem como estas e demais informações também foram disponibilizadas on line e podem ser acessadas por QR Code.

Figura 2. Pastagem da UFRA – Campus Belém (Fonte: Autores).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram identificadas 10 famílias botânicas, sendo estas: Asteraceae, Boraginaceae, Convolvulaceae, Cyperaceae, Fabaceae, Linderniaceae, Onagraceae, Poaceae, Rubiaceae e Solanaceae. Distribuídas 15 gêneros, 20 espécies em um total de 600 indivíduos levantados.

Tabela 1. Aspectos das 20 espécies encontradas nas pastagens (1, 2 e 3) da UFRA – campus Belém.

Nome científico	Nome comum	Família	Hábito	Origem
<i>Borreria verticillata</i>	Vassourinha	Rubiaceae	subarbusto	nativa
<i>Cyperus brevifolius</i>	Junquinho	Cyperaceae	Erva	nativa
<i>Cyperus esculentus</i>	Tiriricão	Cyperaceae	Erva	exótica
<i>Cyperus iria</i>	Tiririca	Cyperaceae	Erva	exótica
<i>Cyperus luzulae</i>	Cortadeira	Cyperaceae	Erva	nativa
<i>Cyperus sphacelatus</i>	Tiririca	Cyperaceae	Erva	nativa
<i>Desmodium adscendens</i>	Carrapicho	Fabaceae	erva, subarbusto	nativa
<i>Diodia saponariifolia</i>	poaia do brejo	Rubiaceae	Erva	nativa
<i>Elephantopus mollis</i>	língua de vaca	Asteraceae	Erva	nativa
<i>Eleusine indica</i>	capim pé de galinha	Poaceae	Erva	exótica
<i>Heliotropium indicum</i>	Jacuacanga	Boraginaceae	Erva	exótica
<i>Ipomoea asarifolia</i>	salsa brava	Convolvulaceae	erva, liana	nativa
<i>Ludwigia octovalvis</i>	cruz de malta	Onagraceae	erva, arbusto	nativa
<i>Mimosa pudica</i>	malícia roxa	Fabaceae	erva, arbusto	nativa
<i>Rhynchospora pubera</i>	capim estrela	Cyperaceae	Erva	nativa
<i>Senna occidentalis</i>	lava pratos	Fabaceae	arbusto, subarbusto	nativa
<i>Senna reticulata</i>	mata pasto	Fabaceae	arbusto, subarbusto árvore	nativa
<i>Sphagneticola trilobata</i>	mal me quer	Asteraceae	Erva	nativa
<i>Solanum satramoniifolium</i>	Jurubeba	Solanaceae	Arbusto	nativa
<i>Torenia crustacea</i>	Orelha de rato	Linderniaceae	Erva	ativa

Espécie: *Borreria verticillata* (L.) G. Mey. **(Figura 3.a-b)**

Nome comum: vassoura de botão

Família: Rubiaceae Juss.

Características: Erva perene com 30-60 cm de altura. Caule ereto, ramificado e base lenhosa. Folhas simples, sem pecíolo, de filotaxia verticilada. Inflorescência em glomérulos globosos com flores de coloração branca. Fruto do tipo cápsula.

Origem e distribuição: Nativa do Continente Americano, é encontrada desde a América Central até América do Sul; no Brasil encontra-se distribuído por todo seu território.

Forma de propagação: Por sementes e vegetativamente.

Figura 3. *Borreria verticillata*: a) hábito; b) inflorescência. (Fonte: Autores)

Espécie: *Cyperus brevifolius* (Rottb.) Endl. ex Hassk. **(Figura 4.a-b)**

Nome comum: junquinho

Família: Cyperaceae Juss.

Características: Erva perene, medindo entre 10-40 cm de altura. Caule ereto, triangular e sem nós. Folhas rosuladas na base do caule, em número de 2 a 3 e com formato linear, contém no seu ápice

uma série de 4 brácteas, sendo duas maiores, uma mediana e a outra muito curta e estreita, todas lineares. Inflorescência é do tipo espiga oblonga, constituída por numerosas flores não vistosas. Fruto é do tipo núcula.

Origem e distribuição: É uma espécie nativa do Continente Americano e que se desenvolve por todas as regiões do Brasil.

Forma de propagação: Por sementes e vegetativamente.

Figura 4. *Cyperus brevifolius*: a) hábito; b) inflorescência. (Fonte: Autores).

Espécie: *Cyperus esculentus* L. (Figura 5.a-b)

Nome comum: tiririca amarela

Família: Cyperaceae Juss.

Características: Erva perene, medindo 20-90cm de altura. Caule triangular, ereto, glabro, sem ramificações ou nós. Folhas da base da planta rosuladas, em número de 3, lineares. Inflorescência o tipo espiga, de coloração amarelada; flores numerosas, não vistosas, desprovidas de perianto. Fruto do tipo núcula.

Origem e distribuição: É uma planta nativa da América do Norte e dispersa por todo planeta. No Brasil pode ser encontrada em todas as regiões.

Forma de propagação: Por sementes e vegetativamente.

Figura 5. *Cyperus esculentus*: a) hábito; b) inflorescência. (Fonte: Autores).

Espécie: *Cyperus iria* L. (Figura 6.a-b)

Nome comum: junquinho

Família: Cyperaceae Juss.

Características: Erva anual, com 30-50 cm de altura. Caule do tipo colmo, triangular. Folhas lineares e basais, mais curtas que o caule em número de 2-3, contendo em seu ápice de 7 a 8 brácteas. Inflorescência do tipo espiga achatada, de coloração amarelo-ferrugínea, com numerosas e não vistosas. Fruto do tipo aquênio.

Origem e distribuição: É originária da Eurásia e está dispersa por todo o Brasil, encontrada com frequência na Amazônia.

Forma de propagação: Por sementes e vegetativamente.

Figura 6. *Cyperus iria*: a) hábito; b) inflorescência. (Fonte: Autores).

Espécie: *Cyperus luzulae* (L.) Rottb. ex Retz. (**Figura 7.a-b**)

Nome comum: cortadeira

Família: Cyperaceae Juss.

Características: Erva perene com 30-60 cm de altura. Caule triangular, sem nós, esverdeado. Folhas basais, lineares, ásperas, em número de 5-9. Inflorescência em umbela de espiguilhas com flores amarelo pardas. Fruto do tipo núcula.

Origem e distribuição: Nativa do continente americano e distribuída em todas as regiões do Brasil, é particularmente abundante em pastagens da região Amazônica.

Forma de propagação: Por sementes e vegetativamente.

Figura 7. *Cyperus luzulae*: a) hábito; b) inflorescência; c) núcula. (Fonte: Autores).

Espécie: *Cyperus sphacelatus* Rottb. (Figura 8.a-b)

Nome comum: tiririca

Família: Cyperaceae Juss.

Características: Erva anual/perene de crescimento cespitoso, com 18-41 cm de altura. Caule triangular, pode ser liso ou glabro. Folhas de cor verde, subuladas com bainha de 3-6 cm de comprimento. Inflorescência de 2 ordens, a 1a ordem em antelódio ou espiga e a 2a ordem em espiga; possui aproximadamente 5 brácteas involucrais de tamanhos similares. Fruto em forma de aquênio.

Origem e distribuição: Espécie neotropical e africana, está distribuída em todo território nacional.

Forma de propagação: Por sementes e vegetativamente.

Figura 8. *Cyperus sphacelatus*: a) hábito; b) inflorescência. (Fonte: Autores).

Espécie: *Desmodium adscendens* (Sw.) DC (Figura 9.a-b)

Nome comum: carrapicho

Família: Fabaceae Lindl. (Leguminosae Juss.)

Características: Erva perene, com 30-60 cm de altura. Caule prostrado, amplamente ramificado, de ramos cilíndricos; de coloração verdes a ferrugíneos. Folhas alternadas, compostas, trifoliadas. Inflorescência terminal do tipo cacho com flores pedunculadas e cálice com 5 sépalas. Fruto é seco do tipo lomento, constituído em média por 3 artículos.

Origem e distribuição: Américas Central e do Sul, Índias Ocidentais, Ásia a África, ocorrendo por todo o Brasil, no qual é naturalizada.

Forma de propagação: Por sementes e vegetativamente.

Figura 9. *Desmodium adscendens*: a) hábito; b) flor; c) semente. (Fonte: Autores).

Espécie: *Diodia saponariifolia* (Cham. & Schltdl.) K.Schum. (**Figura 10.a-b**)

Nome comum: poaia do brejo

Família: Rubiaceae Juss.

Características: Erva perene de 50-100 cm de altura. Caule cilíndrico, não ramificado, glabro. Folhas sésseis a curto-pecioladas de filotaxia oposta. Flores sésseis com quatro pétalas de coloração branca. Fruto ovado-oblongo com sementes estreito-oblongas.

Origem e distribuição: Nativa do Continente Americano, no Brasil encontra-se nas Regiões: Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste.

Forma de propagação: Por sementes e vegetativamente.

Figura 10. *Diodia saponariifolia*: a) hábito; b) flor. (Fonte: Autores).

Espécie: *Elephantopus mollis* Kunth (Figura 11.a-b)

Nome comum: língua-de-vaca

Família: Asteracea Bercht. & J. Presl. (Compositae Giseke)

Características: Erva perene, com 40-100 cm de altura. Caule ereto, de base lenhosa. Folhas basais são rosuladas e as caulinares são alternas e reduzidas. Inflorescência ocorre em glomérulo terminal. Fruto ocorre em cipsela.

Origem e distribuição: Nativa do continente Americano. É encontrada em todo Brasil

Forma de propagação: Por sementes e vegetativamente.

Figura 11. *Elephantopus mollis*: a) hábito; b) inflorescência. (Fonte: Autores).

Espécie: *Eleusine indica* (L.) Gaertn. (**Figura 12 a-b**)

Nome comum: capim pé de galinha

Família: Poaceae Barnhart

Características: Erva anual, cespitosa. Caule do tipo colmo, eretos ou prostrados, geniculados, ramificados, achatados e de coloração verde, forma risomas. Folhas com duplicadas, apresentam formato lanceolado, com base levemente arredondada, ápice agudo, faces glabras e margens serrilhadas; cor verde. Inflorescência racemosas, com espigas longas e estreitas, de coloração verde quando imatura e marrom quando madura; apresenta geralmente 3 espigas no ápice do colmo e mais uma espiga situada bem abaixo das demais no caule, daí a origem do seu nome comum.

Origem e distribuição: Planta exótica, originária da Ásia, de ampla distribuição por todo o globo. No Brasil encontra-se presente em todos os estados.

Forma de propagação: Por sementes e vegetativamente.

Figura 12. *Eleusine indica*: a) hábito; b) inflorescência. (Fonte: Autores).

Espécie: *Heliotropium indicum* L. (**Figura 13.a-b**)

Nome comum: jacuacanga

Família: Boraginaceae Juss.

Características: Erva anual, de 40-80 cm de altura. Caule muito ramificado, ramos cilíndricos de coloração verde e recobertos por pelos brancos. Folhas de filotaxia alterna helicoidal, simples, lanceoladas ou ovaladas. Inflorescência terminal longa, com a ponta enrolada para baixo e flores de coloração branca, rósea ou lilás. Fruto é um esquizocárpico liso; a semente tem um formato elipsoide.

Origem e distribuição: É uma espécie exótica originária do Sudeste Asiático, disseminada por mais de 30 países; sendo encontrada em todas as regiões do Brasil.

Forma de propagação: Por sementes.

Figura 13. *Heliotropium indicum*: a) hábito; b) inflorescência. (Fonte: Autores).

Espécie: *Ipomoea asarifolia* (Desr.) Roem. & Schult. (**Figura 14.a-b**)

Nome comum: salsa brava

Família: Convolvulaceae Juss.

Características: Erva perene. Caule trepador volúvel ou cresce apoiada ao solo, emitindo raízes adventícias. Folha são alternadas, pecioladas e com formato cordiforme, reniforme com ou sem aurículas e ovalada com ou sem aurículas. Flores grandes e vistosas, de coloração rósea ou azulada, com 5 sépalas pilosas. Fruto do tipo cápsula e a semente um indumento pubescente.

Origem e distribuição: É uma espécie nativa da América Tropical, no Brasil ocorre principalmente nas regiões Norte e Nordeste.

Forma de propagação: Por meio de sementes.

Figura 14. *Ipomoea asarifolia*: a) hábito; c) flor. (Fonte: Autores).

Espécie: *Ludwigia octovalvis* (Jacq.) P.H. Raven. (**Figura 15.a-b**)

Nome comum: cruz de malta

Família: Onagraceae Juss.

Características: Erva perene com 50-120 cm de altura. Caule bastante ramificado, de base lenhosa e coloração ferrugínea. Folhas inteiras de filotaxia alternas helicoidais. Flores isoladas, axilares e de coloração amarela. Fruto do tipo cápsula alongada, com 8 ângulos.

Origem e distribuição: Nativa da América Tropical e distribuída por quase todo o país.

Forma de propagação: Por sementes.

Figura 15. *Ludwigia octovalvis*: a) hábito; b) flor. (Fonte: Autores).

Espécie: *Mimosa pudica* L. (Figura 16.a-b)

Nome comum: malícia roxa

Família: Fabaceae Lindl. (Leguminosae Juss.)

Características: Erva perene, podendo chegar a 2 m de altura. Caule prostrado, espinhento e muito ramificado. Folha alternadas, bipinadas ou recompostas, normalmente com 4 folíolos ou pinas. Inflorescência globosa de coloração rósea; com flores numerosas, congestas e sésseis. Fruto seco do tipo craspédio.

Origem e distribuição: Originária da América Tropical, no Brasil está presente nas Regiões Norte, Sudeste, Sul e no Estado da Bahia.

Forma de propagação: Por sementes e vegetativamente.

Figura 16. *Mimosa pudica*: a) hábito; b) inflorescência. (Fonte: Autores).

Espécie: *Senna occidentalis* (L.) Link. (**Figura 18.a-b**)

Nome comum: lava pratos

Família: Fabaceae Lindl. (Leguminosae Juss.)

Características: Arbusto anual, medindo 1-2 m de altura. Caule bastante ramificado, de característica lenhosa. Folhas de filotaxia alterna, composta, paripinada, com o ápice dos folíolos em ângulo agudo. Inflorescência terminal do tipo cacho, com flores pedunculadas de coloração amarela. Fruto tipo vagem levemente encurvado e achatado, contendo numerosas sementes de coloração castanha.

Origem e distribuição: Nativa do Continente Americano, encontra-se presente em todas as regiões do Brasil.

Forma de propagação: Por sementes.

Figura 18. *Senna occidentalis*: a) hábito; b) flor. (Fonte: Autores).

Espécie: *Senna reticulata* (Willd.) H.S.Irwin & Barneby. (**Figura 19.a-b**)

Nome comum: mata pasto

Família: Fabaceae Lindl. (Leguminosae Juss.)

Características: Arbusto perene, medindo 1,2-3 m de altura. Caule com ramos glabros a pubérulos; apresenta estípulas triangulares, provavelmente nectaríferas. Folha de filotaxia alterna, composta paripinada, com folíolos oblongos. Inflorescência em racemos com flores de coloração amarelada, usualmente agrupadas no ápice. Fruto em vagem com numerosas sementes de coloração castanha.

Origem e distribuição: É uma planta nativa da América do Sul. Está distribuída por todas as regiões do Brasil.

Forma de propagação: Por sementes.

Figura 19. *Senna reticulata*: a) hábito; b) inflorescência; c) vagem. (Fonte: Autores).

Espécie: *Sphagneticola trilobata* (L.) Pruski (**Figura 20.a-b**)

Nome comum: mal me quer

Família: Asteracea Bercht. & J. Presl. (Compositae Giseke)

Características: Erva perene, medindo entre 40-80 cm. Caule prostrado com enraizamento ao longo dos nós e ramos de coloração verde ou avermelhada. Folhas simples, opostas cruzadas, com limbo ovalado e 3 lobos. Inflorescência axilar do tipo capítulo, a coloração de ambas as flores é amarelada. Fruto é do tipo cipsela.

Origem e distribuição: Nativa do Continente Americano; desenvolve-se por todas as regiões brasileiras, por onde tem preferência por solos úmidos em especial várzeas litorâneas.

Forma de propagação: Por sementes e vegetativamente.

Figura 20. *Sphagneticola trilobata*: a) hábito; b) inflorescência. (Fonte: Autores).

Espécie: *Solanum stramonifolium* Jacq. (Figura 21 a-c)

Nome comum: jurubeba

Família: Solanaceae Juss.

Características: Arbusto perene com 1-2 m de altura. Caule ereto e ramificado, com espinhos. Folhas inteiras, simples, palmadas com espinhos. Inflorescência em cimeira, e flores brancas. Fruto é uma baga globosa, sementes de formato oval a reniformes.

Origem e distribuição: Originária da América neotropical, esta espécie está distribuída desde a América Central até a América do Sul. No Brasil encontra-se nas Regiões Norte, Nordeste e Sudeste.

Forma de propagação: Por sementes.

Figura 21. *Solanum stramonifolium*: a) hábito; b) flor. (Fonte: Autores).

Espécie: *Torenia crustacea* (L.) Cham. & Schltdl. (**Figura 22.a-b**)

Nome comum: orelha de rato

Família: Lindernaceae Borsch, Kai Müll. & Eb. Fisch.

Características: Erva anual, com 3-10 cm de altura. Caule prostrado, ramificado de coloração verde a roxa. Folhas simples de filotaxia oposta, com a margem serrilhada. Flores ocorrem nas axilares, são solitárias com sépalas fundidas; a corola tem coloração branca, roxo para azul pálido. Semente do tipo cápsula globosa.

Origem e distribuição: É uma espécie de distribuição pantropical. No Brasil encontra-se em todos os estados da Região Norte e Centro-Oeste.

Forma de propagação: Por sementes e vegetativamente.

Figura 22. *Torenia crustacea*: a) hábito; b) flor. (Fonte: Autores).

CONCLUSÕES

A espécie com maior número de amostras foi o capim de botão (*Cyperus luzulae* (L.) Retz.), representada por 118 indivíduos, a segunda foi o junquinho (*C. brevifolius* (Rottb.) Endl. ex Hassk.) com 117 indivíduos, ambos presentes em todas as três áreas e pertencentes a família Cyperaceae, a terceira com maior ocorrência foi poaia do brejo (*Diodia saponariifolia* (Cham. & Schltdl.) K. Schum.) da família Rubiaceae, com 65 indivíduos, presente apenas na área 1.

E através dos dados obtidos nesta pesquisa, percebe-se há diversificados e elevados números de espécies de plantas espontâneas nas áreas de pastagens da UFRA – Campus Belém, sendo *C. luzulae*, *C. brevifolius* e *D. saponariifolia* as principais espécies.

REFERÊNCIAS

- Angiosperm Phylogeny Group - APG. (2016). An update of the Angiosperm Phylogentic Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV. *Botanical Journal of the Linnean Society*, 181(1): 1-20 p.
- Bacchi, O.; Leitão Filho, H.F.; Aranha, C. (1972). Plantas invasoras de culturas. vol. 1. HUCITEC: São Paulo. 272 p.
- Barbieri, R.L.; Stumpf, E.R.T. (2008). Origem e evolução de plantas cultivadas. Embrapa Informação Tecnológica: Brasília-DF. 909 p.
- Bastos, T.X.; Pacheco, N.A.; Nechet, D.; Sá, T.D.A. (2002). Aspectos climáticos de Belém nos últimos cem anos. 1. ed. Belém, PA: Embrapa Amazônia oriental. 31 p.
- Brighenti, A. M.; Oliveira, F. F. *Biologia de Plantas Daninhas. In: Oliveira Júnior R.S., Inoue M.H., editores. (2011). Biologia e Manejo de planta Daninhas. Curitiba, PR: Omnipax. p.1-36.*
- Constantin, J. Métodos de Manejo. *In: Oliveira Júnior R.S., Inoue M.H., editores. (2011). Biologia e Manejo de planta Daninhas. Curitiba, PR: Omnipax. p.67-78.*
- Deuber, R. (1992). *Ciência das plantas daninhas: Fundamentos*. 1. ed. Jaboticabal, SP: FUNEP. 431 p.
- Dias-Filho, M. B. (1990). Plantas invasoras em pastagens cultivadas da Amazônia: estratégias de manejo e controle. Embrapa: Belém-PA. 103 p.
- Falcão-da-Silva, M.; Souza Filho, A. P. S.; Gurgel, E. S. C.; Bastos, M. N. C; Santos, J. U. M. (2016). Plantas Daninhas na Amazônia. 1. ed. Museu Paraense Emílio Goeldi: Belém-PA. 188 p.
- Fidalgo, O.; Bononi, V. L. (1984). Técnicas de coleta, preservação e herborização de material botânico. São Paulo, SP: Instituto de Botânica. 61 p.
- Flora do Brasil (em construção). Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <<http://floradobrasil.jbrj.gov.br/>>. Acesso em: 01 dez. 2021.
- Gardner, A.L. (1967). Estudio sobre métodos agronómicos para la evaluación de pastures. Montevideo, Uruguay: Instituto Interamericano de Ciências Agrícolas de la O.E.A. 77 p.
- Giulietti, A. M.; Abreu, I; Viana, P. L.; Furtini Neto, A. E.; Siqueira, J. O.; Pastore, M.; Harley, R. M.; Mota, N. F. O.; Watanabe, M. T. C.; Zappi, D. C. (2018). Guia das espécies invasoras e outras que requerem manejo e controle no S11D, Floresta Nacional de Carajás, Pará. Instituto Tecnológico Vale (ITV): Belém-PA. 160p
- Huber, J. (1900). *Arboretum Amazonicum: Iconographia do mais importantes vegetais espontaneos e cultivados da região amazônica*. 1-4 década. Museu Paraense Emílio Goeldi: Belém-PA. 40 p.
- Kissmann, K. G. (1991). Plantas infestantes e nocivas. Tomo I. BASF Brasileira S. A.: São Paulo-SP. 603p.
- Lorenzi, H. (2006). Manual de identificação e controle de plantas daninhas: plantio direto e convencional. 6. ed. Instituto Plantarum de Estudos da Flora: Nova Odessa-SP. 383 p.

Lorenzi, H. (2008). Plantas daninhas do Brasil: terrestres, aquáticas, parasitas e tóxicas. 4. ed. Instituto Plantarum de Estudos da Flora, Nova Odessa-SP. 620 p.

Marques, C.T.S.; Silva, F.; Maia, R.S.; Teles, S. (2013). Plantas espontâneas: identificação, potencialidades e uso. UFRB: Cruz das Almas-BA. 88 p.

Matos, F. J. A.; Lorenzi, H.; Santos, L. F. L.; Matos, M. E. O.; Silva, M. G. V.; Sousa, M. P. (2011). Plantas tóxicas: estudos de fitotoxologia química de plantas brasileiras. 1. ed. Instituto Plantarum de Estudos da Flora: Nova Odessa-SP. 256 p.

Pereira, J. R.; Silva, W. (2000). Controle de plantas daninhas em pastagens. Juíz de Fora, MG: Embrapa Gado de Leite. 2 p.

Santos, W. H. (2014). Registros históricos: contribuição à memória da Universidade Federal Rural da Amazônia. Belém: Universidade Federal Rural da Amazônia. 186 p.

Tropicos. Missouri Botanical Garden. Disponível em: < <http://www.tropicos.org/>>. Acesso em: 01 dez. 2021.

Capítulo 3

10.37423/211205084

COCONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO SOBRE NOVAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS NAS AULAS DE BIOLOGIA PARA ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL, NO MODO REMOTO EM TEMPO REAL

Neuza Rejane Wille Lima

Universidade Federal Fluminense

Resumo: Os conhecimentos sobre a relação entre as ações do homem, no que se refere à produção de alimentos e à conservação ambiental, são vitais para a formação de estudantes de Engenharia Agrícola e Ambiental, uma vez que envolvem importantes implicações econômicas, sociais e éticas. Atualmente, esse conhecimento está diretamente subordinado aos avanços tecnológicos. Exemplos disso envolvem Agricultura Digital, Agricultura de Precisão, Agricultura 4.0, Agricultura 5.0 e seus desdobramentos como aplicação de drones e uso de dados georreferenciados. O objetivo deste capítulo é reportar a estratégia coconstrução coletiva do conhecimento de estudantes de uma turma de primeiro período de do curso de Engenharia Agrícola e Ambiental, sobre a história da agricultura e a evolução dos métodos na produção de alimentos, utilizando a dinâmica remota em tempo real, ao construir uma aula através de perguntas, respostas e detecção de novas dúvidas. Uma análise qualitativa indicou que os estudantes demonstram interesse pelo tema, uma vez que foi relatado que as atividades realizadas foram importantes para aprimorar sua formação profissional e habilidades como pesquisadores do conhecimento.

Palavras-chave: Agricultura; Ensino remoto, Pandemia, Sars-CoV-2, Perguntas, Respostas.

INTRODUÇÃO

Abordar e discutir tópicos de Ciências Biológicas para turmas de Engenharia Ambiental têm se mostrado um desafio construtivo, gerador de práticas didáticas remodeladas, que se apoiam nas Tecnologias da Informação e da Comunicação - TICs e podem ser potencializadas pelo ensino remoto que vem inovando as formas de compartilhar conhecimentos (MEC, 2021).

Durante o contexto das dificuldades e novas soluções advindas da Pandemia causada pelo novo coronavírus Sars-Cov-2 (Lima; Rezende, 2020a, b; Lima, Gomes, 2020; Lima; Paixão, 2021) que a estratégia aqui apresentada foi desenvolvida e validada em aulas da Disciplina de Biologia Geral II (GBG – 00054), do Instituto de Biologia da Universidade Federal Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro, com base em Lima (2021).

ESTRATÉGIA EMPREGADA

A atividade foi realizada, sem aviso prévio e com duração de 4 horas, através do ensino remoto e síncrono, sendo gravada na íntegra e disponibilizada na sala virtual, por meio do *Class Room* - plataforma Google, via Universidade Federal Fluminense. A atividade contou com a participação de 34 graduandos em Engenharia Agrícola e Ambiental que, em sua grande maioria (96%) estava cursando o primeiro período do bacharelado, no segundo semestre de 2021.

Ao longo da aula expositivas, foram lançadas perguntas que foram respondidas em parte pelos graduandos. Estes tinham a liberdade de recorrer a fontes na internet ao longo da construção do conhecimento - o que suscitou em uma coconstrução. Não havia limite de tempo para cada resposta.

Para a coconstrução, os alunos receberam, paulatinamente, 16 perguntas que eram pesquisas em tempo real e através de diversas fontes disponíveis na internet: *sites*, *blogs*, artigos, *e-books*, portfólios e mesmo material didático do ensino médio. As respostas foram obtidas, anotadas, reelaboradas, complementadas ou corrigidas pela professora responsável pela disciplina e também pelos próprios graduandos. Essas respostas estão apresentadas neste capítulo.

Preferencialmente, utilizou-se o *chat* - a sala de aula remota e, eventualmente, perguntas ou complementação mediante solicitação virtual (“levantar a mão”). A aula coconstruída está relatada a seguir e contou, em grande parte, com as informações disponibilizadas no *site* da EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) que abriga ótimos produtos técnico-científicos sobre o tema tratado.

A estratégia de aula desenvolvida e aplicada se pautou em atividades de coconstrução do conhecimento que foram realizadas nos formatos presencial ou remoto em turmas de graduação em Ciências Biológicas, Engenharia Agrícola e Ambiental e Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental da Universidade Federal (Lima, 2017; Sodré et al., 2019; Campos et al., 2020; Hazan et al., 2020; Lima, 2021; Mancebo; Lima, 2021).

Os materiais acessados foram, preferencialmente, aqueles publicados por: Marcílio (2020a, b), EMBRAPA (2021)

PERGUNTAS LANÇADAS E RESPOSTAS CONSTRUÍDAS

Na sequência, serão apresentas 16 perguntas e respostas coconstruídas juntamente com os 34 graduandos da disciplina - ainda em curso e será finalizada em janeiro de 2022.

As ponderações relativas a cada uma das perguntas respondidas se referem ao momento imediatamente anterior ao início das pesquisas - desencadeadas pelas dúvidas ou necessidades de confirmação da resposta inicialmente dada.

1. Quando e onde surgiu a agricultura?

Resposta: A agricultura existe há mais de 12 mil anos atrás. A adoção de diferentes técnicas para cultivo do solo permitiu que as comunidades, que eram majoritariamente nômades, pudessem se fixar em terras agricultáveis, possibilitando a constituição das primeiras civilizações.

Ponderações: Os graduandos tiveram muitas dúvidas.

2. Onde teria começado a prática da agricultura?

Resposta: Acredita-se que o cultivo do solo tenha sido adotado em diferentes partes do mundo e em diferentes momentos. Porém, registros arqueológicos indicam que a prática agrícola surgiu em uma área conhecida como Crescente Fértil, banhada pelos rios Tigre e Eufrates, no Oriente Médio, na Mesopotâmia.

Ponderações: Muitos graduandos responderam e tiveram poucas dúvidas.

3. Qual é a importância da Mesopotâmia na História da Agricultura?

Resposta: Em grego, a palavra Mesopotâmia significa “terra entre rios”. Ficava entre os rios Eufrates e Tigre, sendo considerada como um dos berços da civilização. Em meados do terceiro milênio a.C. os mesopotâmios praticavam a agricultura de irrigação, cultivando trigo, cevada, linho, árvores frutíferas, raízes, legumes e gergelim (para produção de azeite para alimentação e iluminação). Hoje, essa região constitui o território do Iraque.

Ponderações: Os graduandos tiveram muitas dúvidas.

4. O desenvolvimento da agricultura também aconteceu às margens do rio Nilo, no Egito?

Resposta: Sim, numa faixa de terra cuja largura média entre 10 e 20 quilômetros e que se estendia por cerca de mil quilômetros. Os egípcios exploraram o rio Nilo para práticas agrícolas, pecuária, transporte de mercadorias e comunicação entre as diversas cidades.

Ponderações: Muitos graduandos responderam corretamente.

5. Qual foi a importância do desenvolvimento da agricultura egípcia?

Resposta: A alta produtividade agrícola, estoque de grãos e frutas secas, controle populacional permitiram que houvesse disponibilidade de recursos e mão de obra, o que viabilizou a construção das pirâmides e palácios, o desenvolvimento do artesanato, da ourivesaria e as guerras de expansão.

Ponderações: Os graduandos tiveram muitas dúvidas.

6. Qual é a importância da Primeira Revolução Agrícola?

Resposta: No período entre 8 mil a.C. e 5 mil a.C. ocorreu um fenômeno denominado Primeira Revolução Agrícola. Foi nessa fase que o homem descobriu o domínio do fogo - que permitiu dominar a produção de alimentos e o maior aproveitamento energético dos alimentos.

Ponderações: Os graduandos tiveram muitas dúvidas e poucos souberam responder.

7. Qual foi a importância do desenvolvimento da pecuária?

Resposta: Além da agricultura, o homem passou a **criar animais**. Os dois fatores foram decisivos para a redução dos deslocamentos em busca de água e alimentos. As tribos deixam de ser essencialmente caçadoras e coletoras.

Ponderações: A grande maioria respondeu corretamente.

Assim, pontuou-se que nasciam as duas principais atividades primárias da economia: a **agricultura** e a **pecuária**. Práticas que sempre caminharam lado a lado, uma vez que são realizadas pelo produtor rural, muitas vezes no mesmo espaço produtivo.

8. Quando ocorreu a Segunda Revolução Agrícola?

Resposta: Essa revolução foi marcante e ocorreu na Europa, entre os séculos XVIII e XIX, com o objetivo de aumentar a produção e a produtividade, implantando técnicas de rotação de cultura, diversificando sementes e melhorando o aproveitamento das terras, envolvendo a pecuária de modo mais estreito.

Ponderações: Os graduandos tiveram muitas dúvidas e ninguém soube responder.

Com o desenvolvimento da Segunda Revolução Agrícola, algumas transformações básicas ocorreram nas práticas de produção de alimentos:

1. Uso de cavalos, que aumentou a produtividade e reduziu a necessidade da força humana empregada desde o plantio até a colheita;
2. Plantio em larga escala de novos produtos, entre os quais batata e milho;
3. Concentração de terras com formação de latifúndio;
4. Aumento da atividade pecuária;
5. Investimento em pesquisas serviram para reduzir o empobrecimento do solo;
6. Produção de fertilizantes artificiais para enriquecer o solo e assegurar a produção de alimentos.

Essas práticas foram os principais pilares para o desenvolvimento da Terceira Revolução Agrícola.

9. O que foi a Terceira Revolução Agrícola? A Revolução Verde?

Resposta: Essa revolução ocorreu no início dos anos 1901, com a introdução do motor a combustão e outras mudanças, em decorrência da criação de máquinas durante a Primeira Revolução Industrial, iniciada no século XVIII. Assim, a tração animal foi eficazmente, substituída por máquinas a gasolina.

Ponderações: Os graduandos tiveram muitas dúvidas e ninguém soube responder.

10. Quais foram as etapas importantes no processo do desenvolvimento da Terceira Revolução Agrícola?

- a. Novos tratores substituíram enormes modelos movidos a vapor e passaram a ser responsáveis por rebocar e reabastecer semeadeiras, colheitadeiras, pulverizadores, entre outras máquinas. Isso aumentou a produção em um nível nunca antes visto. Deste modo, são galgadas novas formas de transformações profundas nas práticas de produção agropecuária, então conhecidas como Revolução Verde.
- b. O processo de mudanças ganhou força após a Segunda Guerra Mundial, preparando o setor agrícola para suportar a explosão demográfica registrada na segunda metade do século.
- c. Paralelamente, avançavam as pesquisas com defensivos e fertilizantes. A Revolução Verde foi caracterizada por um forte processo de modernização da agricultura, que permitiu aumentar a produção de alimentos a partir da década de 1960.

Ponderações: Os graduandos tiveram muitas dúvidas e alguns souberam responder.

No Brasil, as iniciativas estratégicas para o fortalecimento da agricultura ocorreram no início com a criação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, em 1972 (EMBRAPA, 2021). Esta importante empresa vem divulgando em seu site e através de suas publicações técnico-científicas que, recentemente, a Agricultura Digital e a de Precisão vêm sendo adotadas e exploradas por pessoa, no campo, através do processamento de dados via tablet, computadores, celulares e até drones e máquinas coordenadas remotamente via programação digital.

As transformações tecnológicas das últimas décadas fizeram com que o agronegócio passasse por diversas transformações, envolvendo o melhor trato e aproveitamento do solo e dos recursos hídricos. Nesse caminho, pretende-se atender às maiores necessidades dos produtores. Isso envolve atingir elevados tetos produtivos, otimizar o uso de recursos nas áreas de plantio, o melhor trato com o solo,

além de novas técnicas implementadas com a agricultura digital. O resultado desse processo é vermos “as valiosas mãos do campo” aprendendo e operando de modo eficaz a Agricultura 4.0, através de maquinários modernos coordenados pela tecnologia cibernética.

10. O que é a Agricultura Digital?

Resposta: A Agricultura Digital ou Agricultura 4.0 representa um conjunto de tecnologias que auxiliam o produtor a acompanhar mais de perto as atividades rurais, envolvendo *softwares* e dispositivos responsáveis pela coleta e processamento de dados de produtividade da fazenda.

Ponderações: Os graduandos tiveram muitas dúvidas e alguns souberam responder.

A inovação na *Agricultura Digital* é uma das principais metas para facilitar e orientar o produtor, na lavoura, a tomar decisões estratégicas com dados de campo automatizados, com informações precisas e em tempo real.

11. Qual o objetivo da Agricultura Digital?

Resposta: Facilitar e orientar o produtor da lavoura na tomada de decisões estratégica, com base nos dados de campo automatizados e que possuem informações precisas e em tempo real.

Ponderações: Os graduandos tiveram muitas dúvidas e grande parte soube responder

12. Agricultura de Precisão. O que é?

Resposta: Embora alguns possam confundir os conceitos de agricultura de precisão e agricultura digital, tendo em vista que utilizadas de modo conjunto em muitas propriedades rurais -, não se trata da mesma coisa, sendo necessário entender o papel de cada uma e seus benefícios para a produção agrícola.

Ponderações: Os graduandos tiveram muitas dúvidas e uma pequena parte soube responder

A **Agricultura de Precisão** considera e está embasada na aplicação de insumos em áreas que apresentam maior potencial produtivo. Por exemplo, podemos utilizar dados georreferenciados para o uso da agricultura de precisão - obtidos com ferramentas de **Agricultura Digital**, como mapas, imagens de satélite, fotografias, sensores, câmeras e demais *hardwares* e *softwares* que contribuem para o acompanhamento da lavoura.

Esse tipo de agricultura nasceu da busca de maior eficiência, quando agricultores passaram a cuidar de seus campos de forma customizada, analisando a necessidade específica de cada talhão, ao invés de olhar para a área como única. O gerenciamento agrícola que considera as particularidades de cada ponto da propriedade, não sendo algo propriamente novo, pois há relatos do seu uso nas fazendas nos Estados Unidos da América do Norte e em outros países ainda no início do século XX (Marcílio, 202a, b)

A Agricultura Digital e a Agricultura de Precisão podem ser grandes parceiras do produtor, pois a coleta e o processamento de informações em plataformas digitais podem ajudar no monitoramento da fazenda. Entenda a importância do monitoramento em cada talhão (porção de terreno entre dois regos ou sulcos destinados ao cultivo).

13. Como a Agricultura Digital e a Agricultura de Precisão se integram?

Resposta: A Agricultura Digital e a Agricultura de Precisão podem ser grandes parceiras do produtor. Vejamos a seguir, como a coleta e o processamento de informações em plataformas digitais podem ajudar no monitoramento da fazenda.

Ponderações: Os graduandos tiveram muitas dúvidas e ninguém soube responder

Portanto, tudo aquilo que agrega precisão e otimiza recursos para convergir em maior produtividade e sustentabilidade com o uso da tecnologia, pode ser classificado como Agricultura de Precisão. Assim, as ferramentas digitais que produzem dados para ajudar na tomada de decisão entram no universo da Agricultura Digital.

14. Quais são as diferenças primordiais entre Agricultura Digital (Agricultura 4.0) e Agricultura de Precisão?

Resposta: Embora alguns possam confundir os conceitos de Agricultura de Precisão e Agricultura Digital, uma vez que são usadas de maneira conjunta em muitas propriedades rurais, não se trata da mesma coisa, sendo preciso entender o papel de cada uma e seus benefícios para a produção agrícola.

Ponderações: Os graduandos tiveram algumas dúvidas e souberam responder a partir das respostas coconstruídas anteriormente (Perguntas de 10 a 13).

Redefinindo as informações supracitadas, resumidamente, a Agricultura de Precisão:

1. Envolve tudo aquilo que agrega maior precisão na obtenção dos dados, otimizando os recursos para convergir informação em aumento na produtividade e sustentabilidade com o uso da tecnologia.
2. Considera a aplicação de insumos nas áreas que apresentam maior potencial produtivo. Um exemplo: podemos utilizar dados **georreferenciados** para o uso da agricultura de precisão.

15. O que são e para que servem os dados georreferenciados?
a. São obtidos com ferramentas de Agricultura Digital, como mapas, imagens de satélite, fotografias, sensores, câmeras e demais <i>hardwares</i> e <i>softwares</i> que contribuem para o acompanhamento da lavoura.
b. As ferramentas digitais que produzem dados para ajudar na tomada de decisão entram no universo da Agricultura Digital.
c. O monitoramento agrometeorológico que consiste na coleta sistemática e contínua de dados meteorológicos é essencial na produção de alimentos.
d. Produção de informações de interesse ou uso agrícola, através de sistemas que integram de forma coordenada e simultânea as funções de coleta, transmissão e processamento de dados, pode fornecer dados agrometeorológicos atualizados em tempo.
Ponderações: Os graduandos tiveram algumas dúvidas e souberam responder a partir das respostas coconstruídas anteriormente (Perguntas de 10 a 14).

A agricultura mecanizada, tecnologicamente amparada e monitorada, minimiza a dependência no ponto mais crítico da agricultura: depender das condições climáticas, uma vez que a mesma influencia crescimento, desenvolvimento e produtividade das plantas, assim como afeta a relação das plantas com os insetos e os microrganismos - o que pode favorecer a ocorrência de pragas, doenças e perda de produtos-alvo: folhas de alface, raiz da mandioca, fruto do cacau, casca da árvore que produz a canela etc.

As informações agrometeorológicas possibilitam ações, relacionadas às seguintes atividades:

1. Preparação do solo;
2. Processo de adubação;
3. Realização da semeadura;
4. Técnicas de irrigação;

5. Tipos e manejos no controle fitossanitário que visam evitar a propagação de pragas e doenças nas plantações;
6. Estratégia na colheita dos produtos;
7. Cálculos das estimativas de produtividade;
8. Realização da contabilidade quanto qualidade nutricional e higiênica da produção;
9. Prognósticos de dados meteorológicos;
10. Investimentos necessários e economicamente cabíveis na produção da próxima safra.

Imagens fornecidas por drone que monitoram as plantações via Tecnologia 4.0, são muitíssimo importantes por auxiliar em inúmeras tarefas, sendo um dos instrumentos mais conhecidos e empregados em inúmeras funções. São aliadas a *softwares* para análise das imagens captadas. Do alto, é possível analisar a coloração da planta para detectar a presença de fungos, por exemplo. Além disso, as aplicações feitas via drone podem ser mais eficientes pela proximidade das plantas e mais segura por não ter um piloto embarcado.

16. Onde os drones são empregados na agricultura?
a. Análise da plantação, detecção de pragas e doenças, falhas de plantio, excesso de irrigação, entre outros.
b. Demarcação as áreas de plantio através das imagens captadas, que podem indicar quais são as áreas da fazenda que estão mais propícias à semeadura.
c. Acompanhar o desenvolvimento da safra, captando imagens, periodicamente, possibilitando análises cronológicas computadorizadas.
d. A pulverização, através de drones, encontra-se na fase de protótipos que conseguem embarcar até 18 litros de soluções químicas.
e. Acompanhamento de pastagem, por meio de análises detalhadas que possibilitam escolher amostras, em pontos estratégicos da fazenda, para coleta de água, solo e porções de plantas que podem ser enviadas para laboratórios.
f. Monitorar desmatamento pelo sobrevoo que oferece uma visão ampla de lugares distantes e de difíceis acessos, auxiliando na localização de nascentes de água que podem estar em matas fechadas, identificar as melhores coordenadas lugares para abertura de estradas.
g. Vigilância do território plantado no caso de invasão, devido a conflitos, proteção de áreas de fronteiras.

h. Monitorar ocorrência de focos de incêndio e sobrevoar queimadas.
i. Fazer a telemetria de propriedades, usando as imagens de alta qualidade do drone.
j. Facilitar na venda da propriedade rural, com a possibilidade de gravar imagens e levá-las aos interessados e divulgar na internet.
k. Tocar uma boiada. Essa utilização é pouco conhecida. Contudo, já é possível tocar a boiada apenas com o drone e muita habilidade. Porém, especialistas em bem-estar animal ponderam sobre essa função do equipamento, que pode estressar os bichos, causando prejuízos.
l. Contar a boiada. Com as imagens aéreas é possível contar o rebanho sem precisar deslocar um peão para isso.
m. Busca de animais perdidos - caso um animal se desgarre do rebanho, o drone pode buscá-lo e até tocá-lo de volta para o bando.
n. Facilita a venda da fazenda - ao invés de deslocar o comprador para sua fazenda, é possível gravar imagens e levá-las ao interessado.
Ponderações: Os graduandos tiveram várias dúvidas e souberam responder, em grande parte, com base nas respostas coconstruídas anteriormente (Perguntas de 10 a 15).

CONCLUSÃO

Desse modo, diferente das técnicas tradicionais de plantio, que consideram a média do tamanho da propriedade para a aplicação de insumos, a Agricultura de Precisão leva em consideração as diferenças na produtividade da fazenda, mesmo entre talhões próximos. Essas diferenças podem levar a custos desnecessários quando a utilização de insumos acontece de forma sempre uniforme.

Nesse aspecto, uma dica seria o produtor olhar para a propriedade e fazer a aplicação apenas nos pontos necessários. Entre as culturas de grãos, soja e milho têm registrado bons resultados com a estratégia de considerar as particularidades de cada ponto da fazenda. Assim, demonstrou-se através de metodologia ativa do ensino, com suporte das TICs, que a maior quantidade de informações qualificadas e a evolução de estudos sobre o uso de tecnologias avançadas e aliadas às características ambientais de capa núcleo de produção de alimentos, têm incentivado os produtores a investir nas novas estratégias de cultivo e suas possíveis táticas adaptadas para cada realidade econômica, cultural e ambiental.

Quanto maior volume de informações, através da Agricultura Digital, melhor será o uso de dados no campo para o manuseio da Agricultura de Precisão, podendo reduzir a degradação do solo e dos

recursos hídricos, culminando na esperada redução de impactos ambientais e geração de fazendas mais sustentáveis, otimizando todo o processo da produção agropecuária. Ficou evidente para os graduandos de Engenharia Agrícola e Ambiental que aparatos com sensores e câmeras utilizados nos maquinários, semeadoras, colheitadeiras e pulverizadores, permitem gerir análises, investimentos e possíveis correções, uma vez que os dados gerados e processados, através dos dispositivos e plataformas digitais, permitem reprogramar ações necessárias ao acompanhamento e salvamento do cultivo de vegetais e criação de animais.

AGRADECIMENTOS

Agradeço, imensamente, a turma (2021/2) de graduandos de Engenharia Agrícola e Ambiental da Universidade Federal Fluminense pela participação entusiástica e críticas construtivas que permitiram a realização do presente estudo. “Nada sobre nós, sem nós”.

REFERÊNCIAS

CAMPOS, L. V.; LIMA, H. R. R.; FERAH, P. C.; PERDIGAO, L. T.; LIMA, N. R. W.

Construção colaborativa do conhecimento sobre o conceito de plasticidade fenotípica do boldo brasileiro quanto ao crescimento e à reprodução. *Revista Ciências & Ideias*, v. 11, p. 282-297, 2020. Disponível em: <http://revistascientificas.ifrj.edu.br/revista/index.php/reci/article/view/1172/816> Acesso em 29 de out. de 2021.

EMBRAPA. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuárias. Agricultura Digital. 2021. Disponível em: <https://www.embrapa.br/agricultura-digital> Acesso em 29 de out. de 2021.

HAZAN, A.; CAMPOS, L. V.; GUIMARAES, S. M.; LIMA, N. R. W. Reconstrução dos conhecimentos sobre pesca acidental de tartarugas marinhas. *Brazilian Journal of Development*, v. 6, p. 31217 - 31233, 2020. Disponível em: <http://www.brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/view/10684/8920> Acesso em 29 de out. de 2021.

MANCIBO, S. S. S.; LIMA, N. R. W. Conhecimentos de estudantes do curso de Engenharia Agrícola e Ambiental sobre a biotecnologia através do ensino e da mídia. *Revista Ciências & Ideias*, v. 12, p. 162 - 174, 2021. Disponível em:

<http://revistascientificas.ifrj.edu.br/revista/index.php/reci/article/view/1254/1131> Acesso em 29 de out. de 2021.

MARCÍLIO, R. Agricultura: sistemas agrícolas e modos de produção. 2020a. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=bsybqtxDjyk> Acesso em 29 de out. de 2021.

MARCÍLIO, R. Agricultura do Brasil: produções agrícolas regionais. 2020b. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=DsKcv2cyUFQ> Acesso em 29 de out. de 2021.

MEC. Na rede pública, tecnologia atende 24 milhões de alunos. 2021. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/33994> Acesso em 29 de out. de 2021.

LIMA, N. R. W. Boldo mirim em diferentes ambientes: Práticas educacionais, estímulos sensoriais e construção do conhecimento. 1 ed. Niterói: ABDIn/PERSE, v. 1, 2017. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/325428232_Boldo_Mirim_em_Diferentes_Ambientes_Praticas_Educacionais_Estimulos_Sensoriais_e_Construcao_do_Conhecimento Acesso em 29 de out. de 2021.

LIMA, N. R. W.; GOMES, S. A. O. Extensão universitária à distância: o corona vírus. O que pensa um biólogo diante uma pandemia? *Revista de Extensão UENF*, v. 5, p. 42-62, 2020. Disponível em: <http://uenf.br/publicacoes/revista-de-extensao/wp-content/uploads/sites/4/2020/12/Revista-de-Extens%C3%A3o-UENF-v.-5-n.-2-comprimido.pdf> Acesso em 29 de out. de 2021.

LIMA, N. R. W. Coconstrução do conhecimento sobre a evolução do homem no cenário das graves doenças através do ensino remoto em tempos de pandemia In: *Educação: processo de ensino e aprendizagem - Vol. II.1 ed.* Piracanjuba: Editora Conhecimento Livre, v. II, p. 401-430, 2021. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/354587006_Neuza_Rejane_Wille_Lima_Izabel_Christina

_Nunes_de_Palmer_Paixao_VIVENDO_A_NOSSAVIGESIMA_PRIMEIRA_PANDEMIA_E_AS_OUTRAS_DOENÇAS_TRANSMISSIVEIS_1_ed_Piracanjuba-GO_Editora_Conhecimento_Livre_Piracanjuba Acesso em 29 de out. de 2021.

LIMA, N. R. W.; PAIXÃO, I. C. N. P. Vivendo a nossa vigésima primeira pandemia e as outras doenças transmissíveis. Piracanjuba: Editora Conhecimento Livre, v.1. p. 310. 2021. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/354587006_Neuza_Rejane_Wille_Lima_Izabel_Christina_Nunes_de_Palmer_Paixao_VIVENDO_A_NOSSAVIGESIMA_PRIMEIRA_PANDEMIA_E_AS_OUTRAS_DOENÇAS_TRANSMISSIVEIS_1_ed_Piracanjuba-GO_Editora_Conhecimento_Livre_Piracanjuba Acesso em 29 de out. de 2021.

LIMA, N. R. W.; REZENDE, C. E. Extensão universitária & divulgação científica: quais são as diferenças? Reflexões a partir de uma LIVE promovida pelo Projeto Além do Lattes (UENF/LCA/PPGERN). Revista de Extensão UENF, v. 5, p. 98 - 121, 2020a. Disponível em:

[http://https://www.researchgate.net/publication/342747071_Extensao_Universitaria_Divulgacao_Cientifica_Quais_sao_as_diferencas_Reflexoes_a_partir_de_uma_LIVE_promovida_pelo_Projeto_Ale_m_do_Lattes_UENFLCAPPGERN](https://www.researchgate.net/publication/342747071_Extensao_Universitaria_Divulgacao_Cientifica_Quais_sao_as_diferencas_Reflexoes_a_partir_de_uma_LIVE_promovida_pelo_Projeto_Ale_m_do_Lattes_UENFLCAPPGERN) Acesso em 29 de out. de 2021.

LIMA, N. R. W.; REZENDE, C. E. SARS-CoV-2. Revista de Ciência Elementar, v. 8, p.1-12, 2020b. Disponível em: <http://https://rce.casadasciencias.org/rceapp/pdf/2020/065> Acesso em 29 de out. de 2021.

SODRÉ, G. A.; LIMA, H. R. R.; PERDIGAO, L. T.; LIMA, N. R. W. Construção de conceitos biológicos de espécie e plasticidade fenotípica com base em uma aula teórico-prática com duas espécies de boldo *Plectranthus neochilus* e *P. barbatus*. Revista Ciências & Ideias, v.10, p.118 - 136, 2019. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/332669992_CONSTRUCAO_DE_CONCEITOS_BIOLOGICOS_DE_ESPECIE_E_PLASTICIDADE_FENOTIPICA_COM_BASE_EM_UMA_AULA_TEORICO_PRATICA_COM_DUAS_ESPECIES_DE_BOLDO Acesso em 29 de out. de 2021.