Clinical and therapeutical aspects of dental impaction

Aspecte clinico-terapeutice în incluzia dentară

Mioara Decusară, Cerasella Dorina Șincar, Gabriel Valeriu Popa

Departamentul de Medicină Dentară, Facultatea de Medicină și Farmacie,
Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați, România

ABSTRACT

Introduction. Dental impaction represents the group of isolated dental anomalies characterized by retention of a tooth with a fully formed root in the jaw bone, after the eruption period has passed. This anomaly may affect deciduous teeth, permanent or supernumerary teeth causing aesthetic and / or functional disorders.

Case report. The case presents a clinical situation of a girl who presented two maxillary teeth impacted (a central incisor and a cuspid) who underwent surgical exposure and orthodontic treatment for their arch alignments.

Conclusions. Impacted teeth may produce dental malpositions or root resorption of the adjacent teeth, cysts or chronic local infections, which carry out a surgical orthodontic treatment, complex and for a long term, depending on the clinical situation existing.

Keywords: dental impaction, orthodontic treatment

REZUMAT

Introducere. Incluzia dentară se încadrează în grupa anomaliilor dentare izolate de erupție, fiind caracterizată prin retenția unui dinte cu rădăcina complet formată în interiorul osului alveolar, după ce termenul de erupție a trecut. Această anomalie poate afecta dinții de lapte, dinții permanenți sau supranumerari, determinând tulburări estetice și/sau funcționale.

Prezentare de caz. Cazul prezintă situația clinică a unei paciente cu doi dinți maxilari incluși (un incisiv central și un canin), la care s-a efectuat expunerea chirurgicală a acestora și tratament ortodontic pentru alinierea pe arcadă.

Concluzii. Dinții incluși pot determina malpoziții dentare sau resorbții radiculare ale dinților adiacenți, chisturi sau infecții cronice locale, ceea ce impune efectuarea unui tratament ortodontico-chirurgical, complex și de lungă durată, în funcție de situația clinică existentă.

Cuvinte cheie: incluzie dentară, tratament ortodontic

INTRODUCERE

Prezența dinților în cavitatea bucală este rezultatul unui proces fiziologic complex reprezentat de erupția dentară. Retenția unor dinți în osul alveolar este influențată de factori locali-regionali sau generali, care pot modifica dinamica erupției dentare (1).

Factorii locali incriminați sunt:

- poziția intraosoasă profundă a mugurelui dentar;
- obstacole în calea de erupție a dintelui (chisturi, tumori, dinți supranumerari, odontoame, fibromucoasă densă etc.);

- malformații ale germenilor dentari (coronare, radiculare sau corono-radiculare);
- micșorarea spațiului necesar erupției (din cauza macrodonției, dezvoltării insuficiente a maxilarelor în plan transversal, a meziopozității generalizate, determinată de pierderea precoce a dinților de lapte din zona de sprijin prin rizaliză patologică sau extracții);
- pierderea provizorie sau definitivă a potențialului de erupție a dintelui.

Ca factori generali amintim:

- tulburări endocrine, metabolice, neuro-psihi-ce, avitaminoze, malnutriția;

Corresponding author:

Șef Lucr. Dr. Mioara Decusară

E-mail: mioaradecu@yahoo.com

Article History:

Received: 2 September 2017

Accepted: 20 September 2017

- sindroame genetice (Down, Turner);
- dizostoza cleidocraniană;
- despicături labio-maxilo-palatine;
- ereditatea (2,3).

La examenul clinic intraoral se constată persistența pe arcadă a dintelui de lapte sau absența dintelui definitiv, cu sau fără prezența unor malpoziții dentare, procese inflamatorii ale mucoasei orale, examenul radiologic fiind indispensabil pentru stabilirea diagnosticului cert de incluzie și a poziției dintelui inclus (4,5).

Incluzia dentară apare de regulă la dinții definitiv, în ordinea frecvenței distribuția fiind următoarea: molarii de minte mandibulari, molarii de minte maxilari, caninii maxilari, premolarii mandibulari și maxilari, incisivii centrali maxilari, caninii mandibulari, incisivii mandibulari, primii molari superiori și inferiori și molarii secunzi superiori și inferiori (6,7,8).

PREZENTARE DE CAZ

Pacienta G.F., de 11 ani, s-a prezentat la cabinetul de ortodonție, la recomandarea medicului stomatolog, din cauza persistenței lui 61, fără mobilitate fiziologică. Ca antecedente personale, mama a

afirmat că, la vârsta de 3 ani, pacienta, prin cădere, a suferit un traumatism dentar la incisivii maxilari.

La examenul clinic intraoral s-a constatat (Fig. 1):

- dentiție mixtă, cu prezența lui 61 și 63 fără mobilitate fiziologică;
- fractura marginii incizale la nivelul lui 61, fără sensibilitate dentară;
- 36 cu leziune carioasă profundă, netratată, complicată cu fenomene inflamatorii pulpare;
- înclinarea mezială a coroanei lui 22 determinată, cel mai probabil, de dinții adiacenți definitiv incluși;
- ocluzie statică neutrală la nivel molar și canin, bilateral, și la nivel frontal;
- corespondența liniilor mediane și interincisive intermaxilare;
- supraacoperire frontală în limite normale.

Pe ortopantomogramă s-a remarcat (Fig. 2):

- distrucția coronară importantă la 36, cu absența radiotransparenței periapicale, determinată de o eventuală inflamație periapicală;
- resorbție radiculară fiziologică redusă la nivelul lui 62 și 63;
- 21 și 23 incluși, cu 21 disto-înclinat 30° față de mediana maxilară și 23 mezio-înclinat 45° față de paralela la mediana maxilară, coroa-

FIGURA 1. Vedere laterală și frontală a ocluziei statice a pacientei G.F., la începutul tratamentului ortodontic

nele suprapunându-se radiografic la nivelul jumătății coronare, spre incizal;

- 22 mezio-înclinat 45° față de paralela la mediana maxilară și aproape paralel ca poziție cu 23 inclus, fără să se observe rizaliza patologică a lui 22, de către coroana supraiacentă a lui 23;
- molarii secunzi definitivivi cu apexul aproape închis;
- prezența celor patru molari de minte, coroanele fiind mineralizate.

FIGURA 2. Ortopantomograma pacientei G.F. la începutul tratamentului ortodontic

În urma examenului clinic, a analizei modelelor de studiu și a ortopantomogramei, planul de tratament propus și acceptat de către pacientă și părinți a fost:

- tratamentul leziunii carioase de la nivelul lui 36;
- igienizarea cavității bucale (detartraj și periaj profesional);
- aplicare aparat ortodontic fix la arcada superioară;
- extracția lui 61 și 63 (Fig. 3).

FIGURA 3. Dinți de lapte 61 și 63 extrași - se observă gradul redus de rizaliză fiziologică produs de 11 și 13 incluși

- abordare vestibulară chirurgicală cu descoperirea coroanelor lui 21 și 23 și aplicare de

atașe ortodontice cu ligatură metalică pentru tracțiunea ortodontică a dinților incluși (Fig. 4)

Figura. 4 Descoperirea chirurgicală a coroanelor lui 21 și 23, cu aplicare de atașe ortodontice

- având în vedere poziția coroanelor dinților incluși, s-a efectuat tracțiunea elastică, cu vestibularizare și distalizare a coroanei lui 23 și ulterior vestibularizarea și extruzia lui 11 (Fig. 5).
- pe parcursul tratamentului ortodontic au fost efectuate radiografiile retroalveolare pentru controlul statusului parodontal și radicular al dinților 21, 22 și 23 (Fig. 6).
- după alinierea dinților incluși maxilari, la 26 de luni s-a aplicat aparat ortodontic fix și la arcada dentară mandibulară, pentru obținerea relațiilor neutrale la nivel molar și canin, corespondența liniilor mediane și interincisive, menținerea supraacoperirii frontale de 1/3, cu intercuspidare maximă și mișcări funcționale mandibulare în limite normale (Fig. 7 și Fig. 8).
- după 40 de luni de terapie ortodontică fixă bimaxilară au fost îndepărtate aparatele fixe, s-a aplicat contenție linguală fixă canin-canin, pacientei fiindu-i recomandat control periodic la 6 luni (Fig. 9).

FIGURA 5. Etape din tratamentul ortodontic pentru tracțiunea ortodontică și alinierea lui 21 și 23 – de remarcat îndepărtarea bracketului de pe 22 și neangajarea lui 22 în arcul ortodontic, astfel încât, prin mișcările ortodontice ale dinților vecini incluși, rădăcina acestuia să fie cât mai puțin expusă riscului de rizaliză patologică

FIGURA 6. Radiografii periapicale de control efectuate pe parcursul tracțiunii ortodontice a dinților incluși 21 și 23.

FIGURA 7. Imaginea arcadei dentare după alinierea arcadei dentare maxilare

FIGURA 8. Radiografia panoramică înaintea îndepărtării aparatului ortodontic fix

CONCLUZII

Tratamentul incluziei dentare reprezintă o provocare pentru practicieni, deoarece necesită stabilirea unui diagnostic precis, a unui plan de tratament complex care necesită o bună colaborare între medicii specialiști în ortodonție, chirurgie dento-alve-

olară și parodontologie. Abordarea terapeutică a dinților incluși în zona anterioară necesită adeseori o atenție deosebită, astfel încât rezultatul să satisfacă cerințele esteticii dentare ale pacientului, dar să asigure și o bună funcționalitate a aparatului dento-maxilar (9).

FIGURA 9. Vedere laterală și frontală a arcadelor dentare la finalul tratamentului ortodontic

BIBLIOGRAFIE

1. **Dorobăț V., Stanciu D.** Ortodonție și ortopedie dento-facială, Ed. Medicală, București, 2003.
2. **Ionescu E.** Anomaliile dentare. Ed. Cartea Universitară, București, 2006.
3. **Roberts-Harry D, Sandy J.** *Orthodontics*. Part 10: impacted teeth. *Br Dent J* 2004;196(6):319-327.
4. **Zetu I., Păcurar M.** Ortodonție, vol. II –Tehnica arcului drept, Ed. Lyra, Tg-Mureș, 2000.
5. **Decusară Mioara, Milicescu Viorica.** Valoarea investigației ortopantomografice în diagnosticul și tratamentul anomaliilor dento-maxilare. *Revista Română de Stomatologie*, 2011, 57(4):253-258 . ISSN : 1843-0805 2069-6078.
6. **Dachi S.F., Howell F.V.** A survey of 3874 routine full-month radiographs II. A study of impacted teeth, *Oral Surg Oral Med Oral Path* 1961;14:1165-1169.
7. **Ericson S., Kurol J.** Longitudinal study and analysis of clinical supervision of maxillary canine eruption. *Community Dent Oral Epidemiol* 1986; 14:172-176.
8. **Lacoste J.L.** Désinclusion et mis en place des dents retenues. *Encycl Med Chir (Elsevier Paris), Stomatologie-Odontologie II* 1988; 23-492-A-10.
9. **Șincar Dorina-Cerasella, Chiscop Iulia, Rusu Magdalena, Decusară Mioara, Nicolau Al.-M., Leață R.** Ethiopatogenic and imagistic considerations în the impaction of the wisdom teeth. *Revista Română de Anatomie funcțională și clinică, macro- și microscopică și de Antropologie*, 2016, XV(2):18, ISSN: 1583-4026.

Conflict of interest: none declared
Financial support: none declared