معالجة الدوال المنطقية المحددة جزئياً في التحليل المقارن الوصفي باشتقاق المجموعات الأصغرية للمتغيرات الداعمة قبل إيجاد المجاميع غير الوافرة

علي محمد علي رشدي و رائد صالح بدوي

قسم الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات، كلية الهندسة، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، 21589، المملكة

العربية السعودية

arushdi@kau.edu.sa

المستخلص. نستخدم صورة معيارية منتظمة من خريطة كارنوه ثمانية المتغيرات لاستكشاف واحدة من أكبر المسائل النمطية المطروقة في التحليل المقارن الوصفي (ح ق و). نتعامل مع الدالة البولانية المحددة جزئياً التي تصف هذه المسألة بأسلوب جديد يتطلب أولاً اشتقاق جميع المجموعات الأصغرية للمتغيرات الداعمة، ثم يتبع ذلك بإيجاد جميع المجاميع غير الوافرة التي تمثل الدالة البولانية لكل من هذه المجموعات. هذا الأسلوب يختلف عن أسلوب التصغير الأعظمي الشائع استخدامه عند تصميم الدوائر الرقمية، والذي (أ) يتسم بوجود مجموعة وحيدة للمتغيرات الداعمة تضم كل المتغيرات، و(ب) يعنى بإيجاد مجموع أصغري واحد من بين المجاميع غير الوافرة. نوجه نقداً للتيار الغالب على التحليل المقارن الوصفي لأنه قلد بدون تبصر أسلوب التعامل مع الدوال البولانية المتبع في تصميم الدوائر الرقمية، وذلك بهدف الوصول بسرعة إلى نتيجة واحدة قوية ولكنها غير مبررة. وفي الحقيقة، فإن مزاعم القوة التي أسبغت على التحليل المقارن الوصفي لا تصح على إطلاقها، وإنما فقط حين يمكن (تبرير) وصف الدالة البولانية المستخدمة بمجموعة أصغرية وحيدة للمتغيرات الداعمة والتعبير عنها بمجموع غير وافر وحيد يمثل مجموعاً أصغرياً وحيداً هو المجموع الكامل أو صيغة بليك الإسنادية. يتم توضيح جميع القضايا المذكورة من خلال الحل الخريطي التفصيلي للمسألة النمطية سألقة الذكر ومقارنة هذا الحل بالحل التقليدي الآلي الذي تم الحصول عليه في الدراسات السابقة. لا نضطر في هذا الحل إلى عمل إجراء التصغير الأعظمي إلا بعد تصغير حجم الخريطة باختزال متغيراتها إلى المتغيرات الداعمة فحسب.

كلمات مفتاحية: خريطة كارنوه ثمانية المتغيرات، التحليل المقارن الوصفي، الدالة البولانية المحددة جزئياً، المتغيرات الداعمة، المجموع غير الوافر، المجموع الأصغري، المجموع الكامل (صيغة بليك الإسنادية).

1- المقدمة

وبرغم أن أدبيات الموضوع تزخر باستخدام جداول الصدق لدراسة التحليل البولاني، فإن قليلاً من هذه الدراسات ما يحاول أن يذكر الوسائل التصويرية المعينة، وهذا القليل يركز على استخدام خريطة كارنوه التي تستعمل على نطاق واسع في تصميم الدوائر الرقمية. ومن الغريب أن خريطة كارنوه لم تشتهر حتى الآن خارج النطاق المذكور إلى حد أن هناك من يشكو من قلة استعمالها في الرياضيات [13, 14]. أما استعمال الخريطة في العلوم الإنسانية والسياسية والاجتماعية والطبية ونحوها فلا زال شحيحاً للغاية [7]. نلاحظ أن قصر استعمال الخريطة على مسائل التصميم الرقمي، وهي مسائل يغلب عليها أن تكون كبيرة (بل وكبيرة للغاية) أدى إلى محدودية تطبيقاتها، بحيث اقتصرَت بشكل أساسي على توفير رؤية تبصيرية وتحقيق أغراض تعليمية أخرى مثل إظهار المفاهيم وإثبات النظريات وتوضيح الإجراءات واستكشاف البنى المعيارية أو المتكررة أو المتماثلة. بينما يتم تقويض مهمة التصغير الأعظمي الفعلية للمسائل ذات العدد الكبير من المدخلات بلا منازع إلى الخوارزميات الآلية، والتي لا تحاكي بالضرورة إجراءات الخريطة، ولكنها تحتوي على مفاهيم وأساليب أكثر عمقاً [15].

نشأ التحليل البولاني (ح ب) منذ أكثر من نصف قرن لتعميم تحليل رسوم القياس (Scalogram) المتمتع بخاصية الترتيب الجزئي (partial order). يفيد التحليل البولاني بصفة خاصة في معالجة البيانات التسلسلية (hierarchical) وبصفة أعم في كافة البيانات التي يمكن وصفها كأرقام ثنائية [1]. انبثق عن التحليل البولاني نوع جديد من التحليل يُسمى التحليل المقارن الوصفي (ح ق و) [2, 3] وجد استخدامات واضحة في العلوم الاجتماعية والسياسية والإنسانية والطبية، ثم بدأ مؤخراً يقتحم مجال التطبيقات الهندسية [4-11]. وقد تفرع هذا التحليل المقارن الوصفي الآن إلى ثلاثة أنواع، أولها يختص بالمجموعات الجاسئة (crisp)، وثانيها يتعامل مع المجموعات المضببة (fuzzy)، أما ثالثها فيعنى بالمتغيرات عديدة القيم (multi-valued). وبينما يهتم هذا التحليل بدراسة قيمة متغير تابع معين بدلالة عدد من المتغيرات المستقلة، يوجد تحليل آخر يسمى تحليل التوافق (Coincidence) يوفر علاقة بين مجموعة من المتغيرات دون تمييز بينها ليحدد بعضاً منها يمكن أن يوصف كتابع للبعض الآخر [12].

[29-35]، ومع عدم اضطرارنا لرسم حلقات على الخريطة إلا بعد اختزالها لخريطة أصغر (كثيراً؟) متغيراتها تنتمي لمجموعة أصغرية للمتغيرات الداعمة أو المساندة (supporting variables)، وهذه نتيجة طبيعية لكون خريطة كارنوه المستخدمة يكثر فيها الخلايا ذات القيم التي لا يُعبأ بها.

وثمة سبب آخر لتفضيلنا للخريطة على البرمجيات المنافسة، وهو أن منهجية ح ق و عملية كثيفة المهام فضلاً عن كونها تقاعلية وتكرارية وإبداعية في نفس الوقت [36]. لا تمثل مهمة التصغير المنطقي عنق الزجاجة في هذه العملية، ولا تساهم أتمتة هذه المهمة في توفير وقت كبير للعملية برمتها. يتم تحقيق توفير غير ذي بال للوقت من خلال الأتمتة على حساب فقدان البصيرة والمرونة والتحكم المكتسبة من خلال استخدام الخريطة، وعلي حساب القفز المتكرر المرهق بين المهام اليدوية والآلية [1].

إن خريطة كارنوه تُعد بديلاً متفوقاً للوسائل التصويرية الشهيرة الأخرى، مثل خريطة كارول ومخطط فن ومخطط أولير. تُعتبر خريطة كارنوه جدولاً للصدق يستفيد من بُعدي مسطح الورقة التي تُرسم عليها الخريطة، ويرتب خلاياه وفقاً للترتيب الثنائي المنعكس (reflected binary code). ومن ثم توفر الخريطة ظاهرة هامة هي ظاهرة التجاور المنطقي (قدر الإمكان) بين الخلايا المتجاورة فيزيائياً، مع ملاحظة أن الخريطة وإن كانت تُرسم على مستوى

إن التحليل البولاني (وبصفة خاصة التصغير الأعظمي البولاني) يختلف اختلافاً كثيراً في التحليل المقارن الوصفي (ح ق و) عنه في تصميم الدوائر الرقمية (انظر جدول 1). إن واحداً من أبرز الاختلافات بين هذين النوعين من التحليل يتعلق بعدد المتغيرات. وعلى خلاف الدوائر الرقمية التي يبلغ عدد متغيراتها أرقاماً هائلة، فإن طبيعة مسائل ح ق و ألا يكون عدد المتغيرات المدخلة في مسائل "الحياة الواقعية" فيها كبيراً على الإطلاق. وعلى سبيل المثال، قام ماركس وآخرون [16] بمسح ما يقرب من خمسمائة ورقة بحثية لتطبيقات ح ق و في العلوم السياسية خلال الفترة 2003-2011، فوجدوا أن عدد الشروط (المتغيرات المستقلة) المستخدمة في كل من هذه الأوراق تراوح من 3 إلى 10. ووجد رشدي وبدوي [1] أن متوسط قيمة ن في المسح المذكور أعلاه يزيد قليلاً عن 5 ويقل قطعاً عن 6. لا يوجد سبب لتوقع أن يختلف عدد المتغيرات المستقلة بشكل كبير لتطبيقات ح ق و في المجالات الأخرى غير السياسية، أو خلال فترات ما بعد الفترة 2003-2011. بل إننا في بحثنا عن مسألة ح ق و تبلغ فيها ن ثمانية فأكثر لم نجد سوى مراجع قليلة منها المراجع [17-28]. نتناول هنا المسألة التي تم حلها في المرجعين [23, 28]، وهي مسألة يبلغ عدد متغيرات الدخل فيه ثمانية. وهو عدد يمكننا عنده استخدام خريطة كارنوه بسهولة ويسر، خاصة مع توفر صورة معيارية منتظمة من الخريطة

كانت كبيرة) كما يتضح لنا هنا. ومن ناحية أخرى، فإن مسائل ح ق و التي يمكن الركون إلى نتائجها تتعامل مع دوال ليست لها ضامانات أولية غير ضرورية، بل تكون جميع ضاماناتها الأولية ضرورية (essential prime implicants) [33-35]، ومن ثم لا يكون لها سوى مجموع غير وافر وحيد، يمثل مجموعاً أصغرياً (minimal sum) وحيداً هو في الوقت ذاته المجموع الكامل (complete sum) أي صيغة بليك الإسنادية (Blake Canonical Form) [39]. وهذا يعني، أنه حين يمكن الوثوق بنتائج ح ق و، فلن نحتاج من خريطة كارنوه سوى خطواتها التمهيديّة الخوارزمية حيث نستغني تماماً عن خطواتها اللاحقة التجريبية.

ومن مزايا استعمال خريطة كارنوه تيسيرها التعامل الآني مع متغير للخرج والمتغير المكمل له (complementary) يمثلان مؤشري الوجود والغياب لظاهرة معينة، بحيث يتم حفظ علاقة التكملة بين هذين المتغيرين (بأن يكونا متنافيين (مضروبهما المنطقي صفر) ومستنفدين (مجموعهما المنطقي واحد)) [15]. نلاحظ أن كثيراً من أبحاث ح ق و (كالتّي في المرجعين [22, 40]) لا تهتم بحفظ علاقة التكملة بين متغير الخرج ومكمّله لأنها تصر على التصغير الأعظمي لكل منهما على حدة، ومن ثمّ تجيز تعيين البواقي المنطقية (الحالات التي لا يُعبأ بها) بصورة متناقضة فيهما.

ثنائي البعد، فإنها يمكن تصورها على مجسم على هيئة أسطوانة يتلاقى طرفاها حلقياً أي على شكل طارة (torus). وينقسم أسلوب التصغير الأعظمي على خريطة كارنوه المستخدم في التصميم الرقمي إلى خطوتين متباينتين. الخطوة الأولى خوارزمية (algorithmic) ويتم فيها تغطية حلقات الخريطة التي تمثل ضامانات أولية ضرورية. والذي يجعل من أي من هذه الضامانات ضرورياً هو تفردّه بتغطية خلية منعزلة نسبياً. أما الخطوة الثانية فهي خطوة تنقيبية تجريبية (heuristic) يتم السعي فيها لتغطية باقي خلايا الخريطة التي لم يسبق تغطيتها بأقل عدد من الحلقات ذوات الحجم الأكبر. وهذا الأسلوب يفترض أن جميع المتغيرات هي متغيرات داعمة (supporting variables)، أي أنه يتعذر جعل الدالة البولانية مستقلة عن أي منها، كما يفترض أن المستهدف هو تغطية الدالة بمجموع أصغري وحيد [37]، وكلا الافتراضين لا يصح في حالة ح ق و [34, 35]. إن الأسلوب الراجح صحته في التعامل مع الدالة البولانية المحددة جزئياً التي تصف أية مسألة من مسائل ح ق و يتطلب أولاً اشتقاق جميع المجموعات الأصغرية للمتغيرات الداعمة [38]، ثم يتبع ذلك بإيجاد جميع المجاميع غير الوافرة (irredundant sums, irredundant disjunctive forms)، التي تمثل الدالة البولانية لكل من هذه المجموعات [34, 35, 38]. وهذا الأسلوب يمكن تنفيذه بكل يسر باستخدام خريطة كارنوه (حتى لو

علاته)، هو سرد ذلك العدد الأساسي من الدوال كحلول عديدة محتملة، وهذا السرد ^[1, 7, 41] يضمن الرصانة الرياضية ولكنه يُضخّم الأمور ولا يبسطها، وهذا يفسر إحجام التيار الرئيس في باحثي ح ق و عن التجاوب معه.

وثمة ميزة أخرى لخريطة كارنوه وهي إمكانية الاستقادة منها في إجراء توسعات غير تقليدية أو مألوفة أو مشهورة على التحليل البولاني التقليدي. في هذا الإطار، أجرى رشدي وبديوي ^[1] المحاولات التالية:

- محاولة جعل متغير المخرج مستقلاً عن بعض المدخلات حيث يعنى النجاح في هذه المحاولة وجود نقص قادح في قدر المعلومات التي تمت ملاحظتها، أو وجود خلل في الدراسة الأصلية التي أمدتنا بجدول الصدق لدلالة ذلك على أن المدخلات المزعومة يمكن استبعادها من مجموعة المتغيرات الداعمة لمتغير المخرج، أما فشل المحاولة فله دلالة إيجابية على رصانة الدراسة الأصلية، وعلى أنه يمكن التعويل على الملاحظات التي تمت لعمل استنباطات يمكن الركون إليها.

- محاولة جعل دالة المخرج موجبة أو سالبة في بعض المدخلات، وهي محاولة تظهر هل يقتصر اعتماد دالة المخرج على متغير المدخل في صورته الموجبة X_k فقط أو في صورته المعكوسة $\overline{X_k}$ فقط، أم أن هذا الاعتماد خليط بين هاتين الصورتين، ويتحدد من ذلك كون المدخل أحادي الصيغة (mono-

تعطي خريطة كارنوه رأياً حاسماً في قضية إهمال البواقي المنطقية (الحالات التي لا يُعَبَأُ بها)، حيث تغند الأسلوب المتبع حالياً في كثير من مراجع التحليل البولاني التي تهمل البواقي المنطقية، بدعوى أنه لا يصح إسباغ قيم محددة على حالات لم يتم ملاحظتها. المأخذ على هذه الدعوى أنها تسبغ (دون أن تدري) قيمة الصفر على هذه الحالات بدون أي مبرر لهذه القيمة، وتختار لهذا الإسباغ المؤشر الموجب (مؤشر الوجود) للظاهرة محل الدراسة دون المؤشر السالب (مؤشر الغياب) لهذه الظاهرة. إن أي اختيار آخر لقيم هذه الحالات مساوٍ في أرجحيته لهذا الاختيار. ومن ثم فإن التصغير الأعظمي للدالة محل الدراسة بتحديد قيم ملائمة للحالات غير الملحوظة هو اختيار يكافئ في أرجحيته تماماً اختيار إهمال البواقي المنطقية. والواقع أن التمثيل الأمين لدالة المخرج يمكن أن يتم كدالة بولانية محددة جزئياً يمثل جزؤها المؤكد اتحاد الأسباب المتيقنة للظاهرة ويمثل جزؤها الذي لا يُعَبَأُ به اتحاداً لأسبابها المحتملة غير المتيقنة. وهذا التمثيل ما هو إلا حيلة رياضية لتوحيد عدد ^ك2 من الدوال في صيغة شاملة واحدة (حيث ك عدد البواقي المنطقية)، ومن المؤسف أن تخذعنا الحيلة فنتوهم أن هذه الدوال هي مجرد دالة واحدة. إن الاقتصار على دالة واحدة من هذه الدوال يحتاج تبريراً لا تكلف منهجية ح ق و نفسها القيام به على نحو واف ومقبول، وقد يكون الحل المعقول لهذه المشكلة (على

في بحث ح ق و منشور لم يتجاوز العشرة. نلاحظ أن كبر حجم الخريطة يهون من حدته كثرة الخلايا ذات القيم التي لا يُعبأ بها، الأمر الذي يسمح باختزال الخريطة إلى خريطة أصغر يتم الاختصار فيها على المتغيرات الداعمة.

نلفت النظر هنا الى وجود عدد من الحزم البرمجية^[28, 50-52] التي يفترض أن تؤدي نفس وظيفة خريطة كارنوه بل وبشكل أسرع وأدق، ولكننا نلاحظ عليها ما يلي:

○ هذه الحزم البرمجية لا ضرورة ملحة لها اللهم سوى الرغبة في الفخامة والجزالة^[53]، لأن عدد المتغيرات في التحليل المقارن الوصفي لا يتجاوز العشرة، وهو عدد لا تنوء خريطة كارنوه التقليدية بتناوله، طالما أنها تمثل دالة بولانية محددة جزئياً بصورة تسمح بجعلها مستقلة عن بعض المتغيرات.

○ التحليل المقارن الوصفي يحتاج إلى جهد بشري يدوي مكثف لا يمكن أتمتته (على الأقل في الوقت الحاضر)، ولا تفيد مقاطعة هذا الجهد اليدوي باللجوء إلى الحسابات الآلية في خطوة وسيطة، خاصة أن هذه المقاطعة تفقد المستخدم التبصر النافع الذي كان حافظ عليه طيلة التحليل.

○ لاحظنا قصوراً واضحاً في وظائف بعض هذه البرمجيات، لأنها لا تنظر من البداية لقضية تصغير مجموعة المتغيرات الداعمة، بل تقدم عليها

(form) أم ثنائي الصيغة (bi-form) في دالة المخرج. وثمة أهمية للدوال التي تكون جميع مدخلاتها أحادية الصيغة، فهذه الدوال الأحادية (unate) تنضوي تحت (لكنها لا تستنفد) الدوال التي جميع ضاماناتها الأولية ضرورية، وهي الدوال التي تجعل منهجية ح ق و معتداً بها معولاً عليها^[33-35].

• محاولة جعل دالة المخرج متماثلة (symmetric) في بعض المدخلات.

• محاولة الحصول على تمثيل لدالة المخرج كدالة حدية أو عتبية (threshold function) أي دالة تتوقف قيمتها على أوزان للمدخلات مع قيمة عتبية أو حدية معينة يتعين على المجموع الموزون للمدخلات ألا يقل عنها.

اعتمدنا في ورقة البحث هذه على استخدام الصورة النمطية أو التقليدية لخريطة كارنوه^[42-47] التي أفادتنا في التعامل مع مسألة صغيرة الحجم نسبياً ذات ثمانية من المتغيرات^[29-35]. وثمة إمكان لاستعمال صورة غير نمطية لخريطة كارنوه هي خريطة كارنوه متغيرة المحتويات للتعامل مع مسائل متوسطة الحجم قد يصل عدد متغيراتها الى اثني عشر متغيراً^[48, 49]. هاتان الصورتان لخريطة كارنوه تكفيان تماماً للتعامل مع كافة مسائل التحليل المقارن الوصفي التي تستعمل عدداً محدوداً من المتغيرات بالضرورة. وكما أسلفنا، فإن بحثنا المستقصي في أدبيات الموضوع دل على أن أكبر عدد من المتغيرات استُخدم

مجموعاً أصغرياً وحيداً هو المجموع الكامل أو صيغة بليك الإسنادية. يتم توضيح جميع القضايا المذكورة من خلال الحل الخريطي التفصيلي للمسألة النمطية سألغة الذكر ومقارنة هذا الحل بالحل التقليدي الآلي الذي تم الحصول عليه في الدراسات السابقة.

تم تنظيم بقية هذه الورقة على النحو التالي. يقدم الفصل 2 مسألة ح ق و ثمانية المتغيرات سبق حلها في المرجعين [23, 28]، لتكون مثلاً نستعمله هنا بصورة مضطربة. يقدم الفصل 3 الصورة المنتظمة من خريطة كارنوه ثمانية المتغيرات المستخدمة هنا. يمكن توسعة هذه الخريطة من الخريطة (على الأقل نظرياً) لتشمل عدداً أكبر من المتغيرات، بحيث تتضمن هذه التوسعة جميع الخرائط الأصغر كحالات خاصة. يعيد الفصل 4 النظر في مسألة ح ق و المذكورة في الفصل 2 من منظور خريطة كارنوه، ويناقش كيفية حساب بعض الحلول السابقة في المرجعين [23, 28]، مع نقد هذه الكيفية، ثم يستنتج بعضاً من الحلول المنافسة. تنتهي الورقة بالفصل 5 الذي يعطي بعض الاستنتاجات ومسارات العمل المستقبلي.

1. المثال المستعمل في هذه الدراسة

يبين جدول 2 جدول الصدق (truth table) لمثال ح ق و المستعمل هنا نقلاً عن [28, 23]. هذا الجدول يعطي العلاقة بين مخرج واحد Z بدلالة ثمانية مخرجات $(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7, X_8)$.

قضية التقليل الأعظمي لعدد الضامات الأولية ثم لعدد الأحرف الواردة فيها، وهذا ما يتضح من المثال الذي ندرسه هنا.

نستخدم صورة معيارية منتظمة من خريطة كارنوه ثمانية المتغيرات لاستكشاف واحدة من أكبر المسائل النمطية المطروقة في التحليل المقارن الوصفي (ح ق و). نتعامل مع الدالة البولانية المحددة جزئياً التي تصف هذه المسألة بأسلوب جديد يتطلب أولاً اشتقاق جميع المجموعات الأصغرية للمتغيرات الداعمة، ثم يتبع ذلك بإيجاد جميع المجاميع غير الوافرة التي تمثل الدالة البولانية لكل من هذه المجموعات. هذا الأسلوب يختلف عن أسلوب التصغير الأعظمي الشائع استخدامه عند تصميم الدوائر الرقمية، والذي (أ) يتسم بوجود مجموعة وحيدة للمتغيرات الداعمة تضم كل المتغيرات، و(ب) يعني بإيجاد مجموع أصغري واحد من بين المجاميع غير الوافرة. نوجه نقداً للتيار الغالب على التحليل المقارن الوصفي لأنه قلد بدون تبصر أسلوب التعامل مع الدوال البولانية المتبع في تصميم الدوائر الرقمية، وذلك بهدف الوصول بسرعة إلى نتيجة واحدة قوية ولكنها غير مبررة. وفي الحقيقة، فإن مزاعم القوة التي أسبغت على التحليل المقارن الوصفي لا تصح على إطلاقها، وإنما فقط حين يمكن (تبرير) وصف الدالة البولانية المستخدمة بمجموعة أصغرية وحيدة للمتغيرات الداعمة والتعبير عنها بمجموع غير وافر وحيد يمثل

سوف نقارن هذه الحلول بالأسلوب المعتمد هنا، والذي يتطلب أولاً اشتقاق جميع المجموعات الأصغرية للمتغيرات الداعمة، ثم يتبع ذلك بإيجاد جميع المجاميع غير الوافرة التي تمثل الدالة البولانية لكل من هذه المجموعات [38]. يتضح لنا أنه لا جدوى من إيراد الحلول الستة الأخرى غير الحل الخامس في جدول 2 برغم أن بعضها يتفوق على الحل الخامس في ناحية الأصغرية (minimality). كما يتضح لنا وجود مجموعات أصغرية أخرى للمتغيرات الداعمة، وهذه لا يمكن إغفالها بدعوى ضعف تنافسيتها في توليد حلول أصغرية.

2. حول الصورة المنتظمة من خريطة كارنوه

ثمانية المتغيرات المستخدمة هنا

يوضح شكل 1 الصورة المنتظمة من خريطة كارنوه ثمانية المتغيرات المستخدمة هنا، والتي تتكون من 2^8 أي من 256 من الخلايا. للتيسير أوضحنا القيم الست عشرية لمجموعتي الأرقام العليا أو الأفقية والأرقام الدنيا أو الرأسية $X_H = (X_1, X_2, X_3, X_4)$ و $X_L = (X_5, X_6, X_7, X_8)$. وكل خلية فيها لها ثمانية من الخلايا الملاصقة والمجاورة منطقياً، نسمي كلا منها بالجار من الدرجة الأولى (first-degree neighbor). ومع وصفنا للخلية بسلسلة من ثمانية بتات أو رقنات، فإن كل جار مباشر لها يختلف عنها في بت (رقن) واحد ويتفق معها في بقية البتات (الرقنات)، ويقال إن خليتين متجاورين مباشرة تقعان

يوفر جدول 3 ترجمة للرموز التذكيرية (mnemonic) المستخدمة في [28] إلى رموزنا المجردة المبسطة. يتم تقسيم مجموعة المدخلات إلى مجموعتين متابعتين هما مجموعة المدخلات العليا $X_H = (X_1, X_2, X_3, X_4)$ ومجموعة المدخلات الدنيا $X_L = (X_5, X_6, X_7, X_8)$. تمثل المجموعة الأولى المتغيرات الأفقية في خريطة كارنوه، بينما تمثل المجموعة الثانية المتغيرات الرأسية فيها (انظر شكل 1). إن كل سطر في جدول 2 يعبر عن رقم ثنائي (binary number) $(X_1 X_2 X_3 X_4 X_5 X_6 X_7 X_8)_2$ مكون من ثمانية بتات أو رقنات (binary digits or bits) أو رقم ست عشري (hexadecimal number) $(X_H X_L)_{16}$ ، حيث (جدول 4)

$$X_H = 2^3 X_1 + 2^2 X_2 + 2^1 X_3 + 2^0 X_4 = 8X_1 + 4X_2 + 2X_3 + X_4, \quad (1)$$

$$X_L = 2^3 X_5 + 2^2 X_6 + 2^1 X_7 + 2^0 X_8 = 8X_5 + 4X_6 + 2X_7 + X_8. \quad (2)$$

يوضح جدول 5 سبعة حلول للمسألة وردت في [28] حيث تم الحصول عليها بطريقة آلية، وهي صيغ مجاميع غير وافرة (irredundant sums). أضفنا في الجدول مقابل كل حل مجموعة المتغيرات الداعمة التي استلزمها الحل، واتضح أن المجموعة الخاصة بالحل الخامس تحتويها أي من المجموعات الأخرى، وسوف نبين باستخدام الخريطة أن هذه المجموعة هي مجموعة أصغرية للمتغيرات الداعمة.

للقيم الأصلية (المكملات إلى الواحد في النظام الثنائي، وإلى خمسة عشر في النظام الست عشري). يعتمد إنشاء خريطة كارنوه على مفكوك بول-شانون (Boole-Shannon Expansion) الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمفهوم الدالة الفرعية (subfunction) [59]، الذي يُعرّف أيضاً بخارج القسمة البولانية (Boolean quotient) [39, 60]. يأخذ هذا المفكوك

$$f(X) = (\bar{X}_k \wedge f(X|0_k)) \vee (X_k \wedge f(X|1_k)). \quad (3)$$

يعبر مفكوك بول-شانون عن الدالة البولانية $f(X)$ بدلالة الدالتين الفرعيتين اللتين تنشآن بتقييد المتغير X_k فيها إلى 0 وإلى 1، وهما يسميان بخارجي قسمتها على هذا المتغير في صورتيه المعكوسة $\bar{X}_k$ والعادية X_k

$$f(X|0_k) = f(X)/\bar{X}_k = f(X)|\{X_k = 0\}, \quad (4)$$

$$f(X|1_k) = f(X)/X_k = f(X)|\{X_k = 1\}. \quad (5)$$

إن كلا من هاتين الدالتين الفرعيتين تمثل أحد نصفي خريطة كارنوه للدالة الأصلية، فأولاهما تمثل الإقليم الخارجي للمتغير X_k وثانيتها تمثل إقليمه الداخلي. وبالمطابق فإن كلا منهما تعتمد على المتغيرات X باستثناء المتغير X_k . إن شرط استقلال الدالة الأصلية $f(X)$ عن المتغير X_k هو أن تتحقق العلاقة التالية كمتطابقة

$$f(X)/\bar{X}_k = f(X)/X_k. \quad (6)$$

على مسافة هامينغ (Hamming Distance) [54-58] تساوي الوحدة. يوضح شكل 2 إحدى الخلايا وجيرانها الثمانية (منطقياً) من الدرجة الأولى. هذه الخلية يصفها الرقم

$$\begin{aligned} (X_H X_L)_{16} &= (A4)_{16} \\ &= (X_1 X_2 X_3 X_4 X_5 X_6 X_7 X_8)_2 \\ &= (10100100)_2 \end{aligned}$$

نلاحظ على سبيل المثال أن الرقن الثالث X_3 يساوي الواحد، وهذا يعني أن الخلية المذكورة تقع داخل الإقليم الداخلي للمتغير الثالث. يمكننا أن نجد جارا مباشرا لهذه الخلية يخالفها في قيمة المتغير الثالث ويوافقها في قيم المتغيرات الأخرى. يقع هذا الجار في الموقع $(10000100)_2 = (84)_{16}$ ومن ثم فهو يشارك الخلية الأصلية في انتماءاتها الإقليمية عدا أنه يقع في الإقليم الخارجي للمتغير الثالث. هذان الجاران أحدهما صورة مرآة مستوية (mirror image) للآخر بالنسبة لأقرب حدود المتغير الثالث، وهو الخط الرأسى الأحمر الأيمن. بالمثل يمكننا تحديد بقية الجيران المباشرة للخلية الأصلية كما في شكل 2، كما يمكننا تحديد جيرانها من الدرجات الأعلى التي تقع على مسافات هامينغ ك تتراوح من اثنين إلى ثمانية. أعداد هذه الجيران لمسافة ك هي ثمانية توافق ك، وتنتج من السطر الثامن في مثلث الكرخي المعروف اصطلاحاً بمثلث باسكال (Pascal's Triangle). أبعد الجيران هو خلية وحيدة على مسافة ثمانية هي $(01011011)_2 = (5B)_{16}$ التي تأخذ قيم المكملات

المخرج تمثيلاً فعلياً. يوضح شكل 5 تعذر تطابق الإقليمين الخارجي والداخلي لثلاثة من المتغيرات هي $\{X_1, X_2, X_7\}$ ، ومن ثم تعذر أن تستقل دالة المخرج عن أي من هذه المتغيرات، وينشأ عن ذلك وجوب انتماء هذه المتغيرات الثلاثة لأيّة مجموعة للمتغيرات داعمة للدالة. وبعبارة أخرى، يلزم أن تكون المجموعة $\{X_1, X_2, X_7\}$ مجموعة جزئية (subset) من أيّة مجموعة أصغرية للمتغيرات الداعمة للدالة الأصلية. يوضح شكل 5 أيضاً إمكانية تطابق الإقليمين الخارجي والداخلي لأي من المتغيرات الخمسة الأخرى، وبصفة خاصة للمتغير X_5 . وهذا يعني أن المجموعة $\{X_1, X_2, X_5, X_7\}$ الواردة في جدول 5 ليست المجموعة الأصغرية الوحيدة للمتغيرات الداعمة للدالة الأصلية.

يفرض شكل 6 استقلال دالة المخرج التي بشكل 5 عن المتغير X_6 من خلال اختيارات ملائمة للقيم التي لا يُعبأ بها في نصفي الخريطة (المقسمة بالنسبة لهذا المتغير)، وبذلك يتم استبعاد هذا المتغير من مجموعة المتغيرات الداعمة للدالة الجديدة، ولم يسفر الأمر عن دخول متغير آخر في المجموعة. يكرر شكل 7 الأمر بفرض استقلال دالة المخرج التي بشكل 6 عن المتغير X_8 ، ولا زالت مجموعة المتغيرات الداعمة تحتوي المجموعة $\{X_1, X_2, X_7\}$ ، مع ضمان استبعاد المتغير X_6 والمتغير X_8 منها. يكرر شكل 8 الأمر مرة أخرى بفرض استقلال دالة المخرج التي

وفي حالة هذا التحقق تصبح الدالة الأصلية $f(X)$ مساوية لأي من دالتيها الفرعيتين. تساعدنا هذه المعلومات لتحديد هل يجب أن ينتمي المتغير X_k لمجموعة المتغيرات الداعمة للدالة الأصلية $f(X)$ أم يتسنى استبعاده منها. تجيبنا خريطة كارنوه على هذا السؤال إذا قمنا بنظرة فاحصة لنصفي الخريطة كما تقسمها حدود المتغير X_k . لو تعذر تطابق الإقليمين الخارجي والداخلي لهذا المتغير (بوجود خليتين ذاتي مدخلين متعارضين تقع إحداهما كصورة مرآة للأخرى بالنسبة لبعض حدود هذا المتغير)، لتعذر أن تستقل الدالة المعنية عن هذا المتغير، ولوجب انتماء هذا المتغير لمجموعة المتغيرات الداعمة للدالة. وبخلاف ذلك، يكون في وسعنا (لو رغبتنا) فرض استقلال الدالة عن هذا المتغير من خلال اختيارات ملائمة للقيم التي لا يُعبأ بها في نصفي الخريطة بالنسبة لهذا المتغير، وعندئذ يتم استبعاد هذا المتغير من مجموعة المتغيرات الداعمة للدالة.

3. دراسة المثال المستعمل في هذه الدراسة

بالطريقة المستحدثة لخريطة كارنوه

لقد تم تمثيل أي سطر في جدول الصدق (جدول 2) برقم ست عشري من شأنه تيسير تحويل هذا الجدول إلى خريطة كارنوه، حيث نستعمل شكل 3 لتحديد مواقع الخلايا ذات القيم المؤكدة العالية (1) والخلايا ذات القيم المؤكدة المنخفضة (0) في مثال ح ق و المستعمل، بينما نستخدم شكل 4 ليمثل دالة

يستكمل تغطيته بضامن أولي غير ضروري هو $X_3 \overline{X_7}$ (حلقة الخلايا الثماني المظلمة بالأزرق)، والمجموع الآخر يستخدم الحلقة $X_3 X_5$ (الخلايا الأربع المظلمة بالأصفر مع الخلايا الأربع تحتها المظلمة بالأزرق). يوضح شكل 12 الحل المعتمد على المجموعة الأصغرية للمتغيرات الداعمة $\{X_1, X_2, X_5, X_7\}$ ، وهو مجموع غير وافر وحيد يمثل الحل الخامس في جدول 5، يشمل هذا المجموع ثلاثة ضامانات أولية كلها ضرورية هي $X_1 \overline{X_5}$ (الحلقة الخضراء)، و $X_2 X_7$ (الحلقة الحمراء)، وهما مشتركان مع الحل في شكل 11، ولكن يضاف لهما هنا $\overline{X_1} X_5 \overline{X_7}$ (الحلقة المظلمة بالأزرق). نلاحظ أننا قد شرحنا كيفية نشأة ثلاثة من المجاميع السبعة الواردة في جدول 5، ويمكننا أن نشرح كيفية نشأة المجاميع الأربعة الأخرى، ولكننا نحجم عن هذا الشرح، ليس نقادياً للتكرار والتطويل فحسب، وإنما لأننا ننكر إيراد الحلول المتعددة في جدول 5، لأن الحل الخامس يفضل بقية الحلول جميعها، لأن مجموعة متغيراته الداعمة أصغرية، وهي مجموعة جزئية من أية مجموعة أخرى للمتغيرات الداعمة وردت في الجدول. ولكن هذا الحل الخامس يفتقر إلى ميزة أخرى مطلوبة، وهي موافقته لاشتراطنا أن تكون الدالة البولانية ذات ضامانات أولية كلها ضرورية [33-35]، فرغم أن الدالة البولانية في شكل 12 تمت تغطيتها بضامانات أولية كلها ضرورية، إلا أن لها أكثر من

بشكل 7 عن المتغير X_4 ، ولا زالت مجموعة المتغيرات الداعمة تحتوي المجموعة $\{X_1, X_2, X_7\}$ ، مع ضمان استبعاد المتغير X_6 والمتغير X_8 والمتغير X_4 منها. يمكننا هنا (شكل 9) أخذ مجموعة المتغيرات الداعمة لتكون $\{X_1, X_2, X_3, X_5, X_7\}$ ، وهي المتضمنة في الحل الأول من جدول 5، ولكن دون ضمان أن تكون مجموعة أصغرية. ولكن خلافاً لذلك يفرض شكل 10 استقلال دالة المخرج التي بشكل 8 عن المتغير X_3 من خلال اختيارات ملائمة للقيم التي لا يُعَبَأُ بها في نصفي الخريطة (المقسمة بالنسبة لهذا المتغير)، وبذلك يتم استبعاد هذا المتغير أيضاً من مجموعة المتغيرات الداعمة للدالة الجديدة، ويسفر هذا الأمر عن دخول المتغير X_7 في هذه المجموعة، ومن ثم تنشأ المجموعة الأصغرية $\{X_1, X_2, X_5, X_7\}$ ، وهي المجموعة التي تصف الحل الخامس في جدول 5. ولكون هذه المجموعة محتواة في المجموعة الداعمة في شكل 9، يتأكد أن تلك المجموعة التي بشكل 9 ليست أصغرية. يمثل الشكل 11 والشكل 12 اختزالين متتابعين للشكل 9 والشكل 10 على الترتيب. يصف الشكل 11 الحل المعتمد على المجموعة غير الأصغرية للمتغيرات الداعمة $\{X_1, X_2, X_3, X_5, X_7\}$ ، وهو أحد مجموعين غير وافرين يمثلان الحل الأول والثالث في جدول 5، وكلا المجموعين يشمل ضامنين أوليين ضروريين هما $X_1 \overline{X_5}$ (الحلقة الخضراء)، و $X_2 X_7$ (الحلقة الحمراء). أحد هذين المجموعين

ضامن أولي غير ضروري بل هو قابل للحذف مطلقا (absolutely eliminable) في أية تغطية غير وافرة للدالة [32, 41, 43, 61-63].

وبرغم ما ذكرنا، فإن الحل الخامس ليس هو الحل الوحيد للمسألة محل الاعتبار، بل تُوجد حلول تتافسه منافسة غير محسومة، ويمكننا الآن أن نوجد بعضاً منها. كنا قد أسلفنا القول إن شكل 5 يوضح إمكانية تطابق الإقليمين الخارجي والداخلي X_5 . يقوم شكل 13 بفرض قيم محددة (باللون الأحمر) على خلايا كانت قيمها لا يُعبأ بها في شكل 4، بحيث صارت الدالة متماثلة حول الخط الأحمر القرمزي الذي يفصل الإقليمين الداخلي والخارجي للمتغير الخامس X_5 (نصفي الخريطة العلوي والسفلي)، وتبعا لذلك صارت الدالة مستقلة عن هذا المتغير، كما لزم (بدليل الخلايا الملونة بالأصفر) أن ينتمي المتغير الثالث X_3 لمجموعة المتغيرات الداعمة التي صارت مرحليا تحتوي $\{X_1, X_2, X_3, X_7\}$ بينما لازال الأمر غير محسوم للمتغيرات الثلاثة الباقية. يكرر شكل 14 الأمر بفرض قيم محددة (باللون الأحمر) على خلايا كانت قيمها لا يُعبأ بها في شكل 13، بحيث صارت الدالة متماثلة حول الخطين الأحمرين القرمزيين اللذين يفصلان الإقليمين الداخلي والخارجي للمتغير السادس X_6 (نصف الخريطة الأفقي الأوسط وربيعها العلوي والسفلي)، وتبعا لذلك صارت الدالة مستقلة عن هذا المتغير فضلا عن استقلالها السابق عن X_5 ، ولا زالت

مجموعة المتغيرات الداعمة تحتوي المجموعة $\{X_1, X_2, X_3, X_7\}$ بينما لازال الأمر غير محسوم للمتغيرين الباقيين X_4 و X_8 ، وإن كان ليس ثمة ما يمنع أن تستقل الدالة عن أحدهما (دون الآخر). يتولى شكل 15 إثبات إمكان جعل الدالة في شكل 14 مستقلة عن المتغير الرابع X_4 من خلال فرض قيم محددة (باللون الأحمر) على خلايا كانت قيمها لا يُعبأ بها في شكل 14، بحيث صارت الدالة متماثلة حول الخطوط الحمراء القرمزية التي تعد حدودا لهذا المتغير، كما لزم (بدليل الخلايا الملونة بالأصفر) أن ينتمي المتغير الثامن X_8 لمجموعة المتغيرات الداعمة، وتبعا لذلك تأكد أن مجموعة المتغيرات الداعمة $\{X_1, X_2, X_3, X_7, X_8\}$ هي مجموعة أصغرية، وهي مجموعة لم يتعرف عليها البرنامج المستخدم في [28]. ولا ينقص من تنافسية هذه المجموعة مع المجموعة الأصغرية المتضمنة في [28] $\{X_1, X_2, X_5, X_7\}$ كونها ذات تعدادية (cardinality) أكبر. المستفاد حتى الآن هو أن المخرج يعتمد بالضرورة على المتغيرات الثلاثة X_1, X_2, X_7 مضافا لها إما المتغير X_5 وحده أو المتغير X_3 مضافا له المتغير X_8 . يقسم شكل 16 الخريطة الناتجة في شكل 15 تبعا لمجموعة المتغيرات الداعمة الأصغرية الجديدة $\{X_1, X_2, X_3, X_7, X_8\}$. يختزل شكل 17 الخريطة الناتجة في شكل 16 تبعا لمجموعة المتغيرات الداعمة الأصغرية الجديدة هذه. تعيد الأشكال الثلاثة اللاحقة فعل الأشكال الثلاثة

المسائل النمطية المطروقة في التحليل المقارن الوصفي (ح ق و). تعاملنا مع الدالة البولانية المحددة جزئياً التي تصف هذه المسألة بأسلوب جديد يتطلب أولاً اشتقاق جميع المجموعات الأصغرية للمتغيرات الداعمة، ثم يتبع ذلك بإيجاد جميع المجاميع غير الوافرة التي تمثل الدالة البولانية لكل من هذه المجموعات. قمنا بشرح خريطي لهذا الأسلوب الجديد، ونفذنا حلاً خريطياً تفصيلياً للمسألة النمطية سالفة الذكر مع مقارنة هذا الحل بالحل التقليدي الآلي الذي تم الحصول عليه في الدراسات السابقة. شرحنا كيف يمكن للخريطة استعادة هذا الحل بكل تفصيلاته، وكشفنا أن هذا الحل يغفل أو يتجاهل وجود حلول أخرى تقف على قدم المساواة معه، وتعطي مجموعات أصغرية أخرى للمتغيرات الداعمة، ومن ثم تعطي تفسيرات مختلفة للظاهرة محل الدراسة. والخلاصة نجد أن أسلوب ح ق و قد يعجز في حالة الدوال البولانية المحددة جزئياً عن إخبارنا بمجموعة المتغيرات التي يعتمد عليها المخرج، ناهيك عن أن يحدد الدالة التي تصف مثل هذا الاعتماد.

إن ورقة البحث هذه جزء من نشاط مستمر يسعى إلى تطويع أساليب التصغير الأعظمي البولانية في تطبيقات ح ق و. الأطروحة التي نقدمها هنا (وتتسجم مع تلك التي في [37]) هي أنه لا يمكن استعارة هذه الأساليب كما هي دون تعديل من مجال التصميم الرقمي للاستخدام في سياق ح ق و. إن

السابقة مع مبادلة دوري المتغيرين X_4 و X_8 . يتولى شكل 18 إثبات إمكان جعل الدالة في شكل 14 مستقلة عن المتغير الثامن X_8 من خلال فرض قيم محددة (باللون الأحمر) على خلايا كانت قيمها لا يُعبأ بها في شكل 14، بحيث صارت الدالة متماثلة حول الخطوط الحمراء القرمزية التي تعد حدوداً لهذا المتغير، كما لزم (بديل الخلايا الملونة بالأصفر) أن ينتمي المتغير الرابع X_4 لمجموعة المتغيرات الداعمة، وتبعاً لذلك تأكد أن مجموعة المتغيرات الداعمة $\{X_1, X_2, X_3, X_4, X_7\}$ هي مجموعة أصغرية، وهي مجموعة لم يتعرف عليها البرنامج المستخدم في [28] أيضاً. ومرة أخرى لا ينقص من تنافسية هذه المجموعة مع المجموعة الأصغرية المتضمنة في [28] $\{X_1, X_2, X_5, X_7\}$ كونها ذات تعدادية (cardinality) أكبر. المستفاد الذي استجد الآن هو أن المخرج الذي يعتمد بالضرورة على المتغيرات الثلاثة X_1, X_2, X_7 قد يحتاج معها (فضلاً عن الاحتمالين السابقين) للمتغير X_3 مضافاً له المتغير X_4 . يقسم شكل 19 الخريطة الناتجة في شكل 18 تبعاً لمجموعة المتغيرات الداعمة الأصغرية الجديدة $\{X_1, X_2, X_3, X_4, X_7\}$. يختزل شكل 20 الخريطة الناتجة في شكل 19 تبعاً لمجموعة المتغيرات الداعمة الأصغرية الجديدة هذه.

4. خاتمة واستنتاجات واستشراف للعمل المستقبلي

استخدمنا صورة معيارية منتظمة من خريطة كارنوه ثمانية المتغيرات لاستكشاف واحدة من أكبر

تتقريبية تؤدي نفس الدور الذي تلعبه خوارزمية قوانين-ماكلوسكي (Quine-McCluskey algorithm) [37] لإيجاد جميع المجاميع غير وافرة لدالة بولانية محددة جزئياً. وهذا الأسلوب كاف بحد ذاته في مسائل التصميم الرقمي حيث لا يوجد سوى مجموعة أصغرية واحدة للمتغيرات الداعمة، هي تلك التي تشتمل على كل المتغيرات. إن الزيادة في الأسلوب الخريطي المستحدثة هاهنا تلعب الدور نفسه الذي يمكن أن تؤديه خوارزمية الأمثلة بالبرمجة الخطية الصحيحة (integer linear programming) [38] لإيجاد جميع المجموعات الأصغرية للمتغيرات الداعمة للدالة. الخطوة التالية لعملنا هنا هو عمل برنامج جديد للتحليل البولاني يجمع بين الخوارزميتين سالفتي الذكر، ثم تجربة هذا البرنامج بصورة مستقصية على مسائل ح ق و المعروفة (والتي تُعد بالآلاف)، وذلك لتحديد نسبة المسائل التي نقي بشرطنا الصارم [33-35] أن تكون للدالة البولانية مجموعة أصغرية واحدة للمتغيرات الداعمة، ثم بعد ذلك تكون جميع ضاماناتها الأولية ضرورية.

النموذج الأكثر ملاءمة لمسائل ح ق و (الذي كان معروفاً منذ فترة طويلة [38]) هو تحديد جميع المجموعات الأصغرية من المتغيرات الداعمة، ثم الحصول على جميع المجاميع غير الوافرة لكل مجموعة من هذه المجموعات. عادة ما يتعارض هذا النموذج مع الغرض المعلن من قبل ح ق و، وهو البحث عن إجابة وحيدة (بغض النظر عما إذا كانت مبررة أم لا). وفي الواقع، لا تزال مسألة طبيعة الدالة البولانية التي تلائم ح ق و مثيرة للحيرة والبلبل وقابلة للنقاش والخلاف. يبدو لنا أن أسلوب ح ق و لا يمكن الوثوق به إلا في ظل شرط صارم للغاية، وهو أن يتعامل مع دالة بولانية تتعلق بمجموعة وحيدة من المتغيرات الداعمة، وجميع ضاماناتها الأولية ضرورية، أي دالة يصفها مجموع غير وافر واحد، يمثل مجموعاً أصغرياً هو نفسه المجموع الكامل (صيغة بليك الإسنادية).

نؤكد أن الأسلوب الخريطي المستعمل هنا يضيف زيادة غير معتادة على الأسلوب الخريطي التقليدي. فهذا الأسلوب التقليدي هو وسيلة خوارزمية-

جدول 1. مقارنة بين صورتَي التحليل البولاني المستخدمتين في تصميم الدوائر الرقمية والتحليل المقارن الوصفي.

التحليل المقارن الوصفي (ح ق و)	تصميم الدوائر الرقمية	سلوك الدالة عندما يتم تحديدها أو تعريفها
مستنتج بالملاحظة والتجريب	موصوف ومحدد سلفاً	سلوك الدالة عندما لا يتم تحديدها أو تعريفها
غير معروف ولكنه ذو صلة وأهمية، ويمكن الحصول عليه بواسطة ملاحظات إضافية قد تتطلب أوقاتاً طويلة جداً	لا يُعبأ به وليس بذى أهمية ويستحيل تحديده فيما بعد	هل يمكن تحديد سلوك الدالة في أسطر لجداول الصدق لم يكن محدداً فيها
نعم	لا	

الهدف الواقعي: الحصول على نظرة عامة على عائلة الدوال هذه مع ملاحظة السمات المشتركة بين أفراد هذه العائلة. الهدف المزعوم: تحديد صيغة معينة لفرد وحيد من هذه العائلة.	اختيار الدالة المثلى بين عائلة الدوال التي تمثل امتداداً لدالة بولانية معرفة جزئياً (محددة بصورة غير مكتملة)	هدف الدراسة
أولا التصغير الأعظمي لمجموعات المتغيرات المساندة، ثم ثانياً تغطية الدالة الناتجة لكل مجموعة بمجموع غير وافر	التصغير الأعظمي لمجموع المضارب	المستهدف في خوارزمية الأمثلة
غالباً مجموعات ذات تعداديات مختلفة، بمعنى أنه يتسنى جعل الدالة البولانية مستقلة عن بعض المتغيرات بطرق مختلفة	عادة مجموعة وحيدة كاملة التعدادية (ينتمي لها جميع المتغيرات)، بمعنى أنه يتعذر جعل الدالة البولانية مستقلة عن أي متغير	المجموعات الأصغرية للخوارزميات المساندة
البواقي المنطقية	الحالات التي لا يُعْبَأُ بها (حالات يستحيل حدوثها أو يكون الخرج عندها غير محدد)	الأسماء المعطاة لأسطر جدول الصدق التي لا تتحدد عندها الدالة
رموز تذكيرية مطولة	رموز قصيرة مجردة بسيطة	رموز المتغيرات
بين الثلاثة والعشرة	عادة كبير أو كبير جداً	عدد المتغيرات

جدول 2. جدول الصدق للمثال المستعمل هنا نقلاً عن [23, 28].

X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	X_7	X_8	X_H	X_L	Z
0	1	0	1	1	1	1	0	5	E	1
1	1	0	0	1	1	1	0	C	E	1
1	0	0	1	0	0	0	0	9	0	1
1	1	0	0	1	1	0	0	C	C	0
1	0	1	0	0	0	1	1	A	3	1
1	0	0	0	1	1	1	0	8	E	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0
0	1	0	0	0	1	1	0	4	6	1
0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0
1	0	1	0	0	1	0	0	A	4	1
0	1	0	0	0	0	1	0	4	2	1
0	0	0	0	1	1	1	0	0	E	0
1	1	0	0	1	0	0	1	C	9	0
1	0	0	0	1	0	0	1	8	9	0
1	0	0	1	0	0	1	1	9	3	1
1	1	0	0	1	0	1	1	C	B	1
1	1	0	1	1	0	1	1	D	B	1
0	0	1	0	0	0	1	1	2	3	0
1	1	1	1	0	0	1	1	F	3	1
1	0	0	1	0	0	1	1	9	3	1
0	0	1	0	1	1	0	0	2	C	1
0	0	0	0	1	1	1	0	0	E	0

جدول 3. ترجمة الرموز التذكيرية في [28] إلى رموز مجردة لدينا.

الرموز لدينا	الرموز لدى [28]	المعنى بالإنجليزية	المعنى بالعربية
X_1	PG	Percentage growth in the municipality's population	نسبة النمو في عدد السكان
X_2	RB	Percentage change in the population living in densely populated areas	التغير في النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون في مناطق مكتظة بالسكان
X_3	EL	Percentage change in the population with a higher education	التغير في النسبة المئوية في عدد السكان الحاصلين على تعليم عالي
X_4	SE	Proportion of people leaving state church	نسبة الأشخاص الذين يغادرون كنيسة المنطقة
X_5	CS	Proportion of Christian associations	نسبة الجمعيات المسيحية
X_6	OD	Organization density rate	معدل كثافة المنظمة
X_7	PC	Proportion of associations covering a smaller area than the entire municipality	نسبة الجمعيات التي تغطي مساحة أصغر من البلدية بأكملها
X_8	UP	Urban proximity	القرب الحضري
Z	GR	Outcome set	مجموعة النتائج

جدول 4. رموز الأرقام الست عشرية بدلالة الأرقام العشرية والأرقام الثنائية.

الأرقام الثنائية	الأرقام العشرية	رموز الأرقام الست عشرية
0000	0	0
0001	1	1
0010	2	2
0011	3	3
0100	4	4
0101	5	5
0110	6	6
0111	7	7
1000	8	8
1001	9	9
1010	10	A
1011	11	B
1100	12	C
1101	13	D
1110	14	E
1111	15	F

جدول 5. حلول المسألة في [28] التي تم الحصول عليها بطريقة آلية.

صيغة المجموع غير الوافر	مجموعة المتغيرات الداعمة
$S_1: X_1 \overline{X_5} \vee X_2 X_7 \vee X_3 X_5$	$\{X_1, X_2, X_3, X_5, X_7\}$
$S_2: X_1 \overline{X_5} \vee X_2 X_7 \vee X_3 X_6$	$\{X_1, X_2, X_3, X_5, X_6, X_7\}$
$S_3: X_1 \overline{X_5} \vee X_2 X_7 \vee X_3 \overline{X_7}$	$\{X_1, X_2, X_3, X_5, X_7\}$
$S_4: X_1 \overline{X_5} \vee X_2 X_7 \vee X_3 \overline{X_8}$	$\{X_1, X_2, X_3, X_5, X_7, X_8\}$
$S_5: X_1 \overline{X_5} \vee X_2 X_7 \vee \overline{X_1} X_5 \overline{X_7}$	$\{X_1, X_2, X_5, X_7\}$ مجموعة أصغرية تحتويها أي من المجموعات الأخرى
$S_6: X_1 \overline{X_5} \vee X_2 X_7 \vee \overline{X_2} X_5 X_6 \overline{X_7}$	$\{X_1, X_2, X_5, X_6, X_7\}$
$S_7: X_1 \overline{X_5} \vee X_2 X_7 \vee \overline{X_2} X_5 \overline{X_7} \overline{X_8}$	$\{X_1, X_2, X_5, X_7, X_8\}$

			X ₁																
			X ₃									X ₃							
			0	1	3	2	6	7	5	4	C	D	F	E	A	B	9	8	
X ₅	X ₇	0																	
		1																	
		3																X ₈	
		2																	
		6																	
		7																	
		5																X ₈	
		4																	
	X ₇	C																	
		D																	X ₈
		F																	
		E																	
		A																	
		B																	X ₈
		9																	
		8																	
			X ₄					X ₄		X ₄						X ₄			
								X ₂											

شكل 1. الصورة المنتظمة من خريطة كارنوه ثمانية المتغيرات المستخدمة هنا. للتيسير أوضحنا القيم الست عشرية لمجموعتي الأرقام العليا أو الأفقية والأرقام الدنيا أو الرأسية.

$$X_H = (X_1, X_2, X_3, X_4) \quad X_L = (X_5, X_6, X_7, X_8)$$

			X ₁															
			X ₃								X ₃							
			0	1	3	2	6	7	5	4	C	D	F	E	A	B	9	8
X ₅	X ₇	0													A0			
		1																
		3																
		2													A6			
	X ₇	6																
		7													A5			
		5																
		4				24								E4	A4	B4		84
	X ₇	C														AC		
		D																
		F																
		E																
	X ₇	A																
		B																
		9																
		8																
			X ₄				X ₄				X ₄				X ₄			
			X ₂															
			Z															

شكل 2. الصورة المنتظمة من خريطة كارنوه ثمانية المتغيرات الواردة في شكل 1 موضحة عليها حدود المتغير الثالث (أربعة خطوط رأسية حمراء) وإقليمه الداخلي ($X_3 = 1$) وإقليمه الخارجي ($X_3 = 0$) وموضح أيضا إحدى الخلايا وجيرانها الثمانية (منطقيا) من الدرجة الأولى.

			X ₁															
			X ₃								X ₃							
			0	1	3	2	6	7	5	4	C	D	F	E	A	B	9	8
X ₅	X ₇	0															90	
		1																
		3			23								F3		A3		93	X ₈
		2	02						42									
	X ₇	6							46									
		7																
		5																X ₈
		4	04												A4			
	X ₇	C			2C						CC							
		D																
		F																X ₈
		E	0E						5E		CE							8E
	X ₇	A									CB	DB						
		B																
		9									C9							89
		8																
			X ₄				X ₄				X ₄				X ₄			
			X ₂															
			Z															

شكل 3. تحديد مواقع الخلايا ذات القيم المؤكدة العالية (1) والخلايا ذات القيم المؤكدة المنخفضة (0) في مثال ح ق و المحلول هنا والمنقول من [28].

			X_1																	
			X_3										X_3							
			0	1	3	2	6	7	5	4	C	D	F	E	A	B	9	8		
X_5	X_7	0																1		
		1																		
		3				0								1		1		1		
		2	0							1										
		6								1										
	X_7	7																		
		5																		
		4	0													1				
		C				1						0								
		D																		
X_7	F																			
	E	0						1			1							0		
	A																			
	B										1	1								
	9										0							0		
	8																			
				X_4					X_4		X_4						X_4			
								X_2												
			Z																	

شكل 4. تحديد الخلايا ذات القيم المؤكدة العالية (1) والخلايا ذات القيم المؤكدة المنخفضة (0) في مثال ح ق و المحلول هنا والمنقول من [28]. هذا الشكل يمثل دالة المخرج Z تمثيلاً فعلياً.

			X_1																
			X_3								X_3								
			0	1	3	2	6	7	5	4	C	D	F	E	A	B	9	8	
X_5	X_7	0																1	
		1																	
		3				0								1			1		
		2	0							1									
		6								1									
	X_7	7																	
		5																	
		4	0													1			
		C				1					0								
		D																	
X_7	F																		
	E	0							1		1							0	
	A																		
	B									1	1								
	9										0							0	
8																			
			X_4				X_4				X_4				X_4				
			X_2																
			Z																

شكل 5. تعذر تطابق الإقليمية الخارجي والداخلي لثلاثة من المتغيرات هي $\{X_1, X_2, X_7\}$ ومن ثم تعذر أن تستقل دالة المخرج عن أي من هذه المتغيرات، ووجوب انتماء هذه المتغيرات الثلاثة لأية مجموعة للمتغيرات داعمة للدالة.

[illegible]

شكل 6. فرض استقلال دالة المخرج التي بشكل 5 عن المتغير X_6 من خلال اختيارات ملائمة للقيم التي لا يُعَبَأُ بها في نصفي الخريطة (المقسمة بالنسبة لهذا المتغير)، وبذلك يتم استبعاد هذا المتغير من مجموعة المتغيرات الداعمة للدالة الجديدة، ولم يسفر الأمر عن دخول متغير آخر في المجموعة.

[illegible]

شكل 7. فرض استقلال دالة المخرج التي بشكل 6 عن المتغير X_8 من خلال اختيارات ملائمة للقيم التي لا يُعَبَأُ بها في نصفي الخريطة (المقسمة بالنسبة لهذا المتغير)، وبذلك يتم استبعاد هذا المتغير أيضاً من مجموعة المتغيرات الداعمة للدالة الجديدة، ولم يسفر الأمر عن دخول متغير آخر في المجموعة.

										X_1							
		X_3								X_3							
X_7		0	0	0	0								1	1	1	1	
		0	0	0	0								1	1	1	1	
	X_7	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		0	0	0	0								1	1	1	1	
		0	0	0	0								1	1	1	1	
	X_5		1	1	1	1					0	0	0	0	0	0	0
			1	1	1	1					0	0	0	0	0	0	0
X_7		0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
		0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
		0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
		0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
		1	1	1	1					0	0	0	0	0	0	0	0
		1	1	1	1					0	0	0	0	0	0	0	0
					X_2												
Z																	

شكل 10. فرض استقلال دالة المخرج التي بشكل 8 عن المتغير X_3 من خلال اختيارات ملائمة للقيم التي لا يُعَبَأُ بها في نصفي الخريطة (المقسمة بالنسبة لهذا المتغير)، وبذلك يتم استبعاد هذا المتغير أيضاً من مجموعة المتغيرات الداعمة للدالة الجديدة، ويسفر هذا الأمر عن دخول المتغير X_7 في هذه المجموعة، ومن ثم تنشأ المجموعة الأصغرية $\{X_1, X_2, X_5, X_7\}$ وهي المجموعة التي تصف الحل الخامس في جدول 5.

						X_1			
		X_3				X_3			
X_5	X_7	0**						1	1**
		0	0		1		1	1	1
		0			1	1*			0*
			1			0*			0**
				X_2					

$$Z = X_1 \overline{X_5} \vee X_2 X_7 \vee X_3 X_5 \text{ OR } Z = X_1 \overline{X_5} \vee X_2 X_7 \vee X_3 \overline{X_7}$$

شكل 11. الحل المعتمد على المجموعة غير الأصغرية للمتغيرات الداعمة $\{X_1, X_2, X_3, X_5, X_7\}$ ، وهو أحد مجموعين غير وافرين يمثلان الحل الأول والثالث في جدول 5، وكلا المجموعين يشمل ضامنين أوليين ضروريين هما $X_1 \overline{X_5}$ (الحلقة الخضراء)، و $X_2 X_7$ (الحلقة الحمراء). أحد هذين المجموعين يستكمل تغطيته بضامن أولي غير ضروري هو $X_3 \overline{X_7}$ (حلقة الخلايا الثماني المظلمة بالأزرق)، والمجموع الآخر يستخدم الحلقة $X_3 X_5$ (الخلايا الأربع المظلمة بالأصفر مع الخلايا الأربع تحتها المظلمة بالأزرق).

				X_1	
X_5	X_7	0^{**}			1^*
		0	1	1	1
		$0''$	1	$1'$	$0'$
		$1''$		$0'$	0^{**}
		X_2			
$Z = X_1 \overline{X_5} \vee X_2 X_7 \vee \overline{X_1} X_5 \overline{X_7}$					

شكل 12. الحل المعتمد على المجموعة الأصغرية للمتغيرات الداعمة $\{X_1, X_2, X_5, X_7\}$ ، وهو مجموع غير وافر وحيد يمثل الحل الخامس في جدول 5، يشمل هذا المجموع ثلاثة ضامانات أولية كلها ضرورية هي $X_1 \bar{X}_5$ (الحلقة الخضراء)، و $X_2 X_7$ (الحلقة الحمراء)، وهما مشتركان مع الحل في شكل 11، ولكن يضاف لهما هنا $\bar{X}_1 X_5 \bar{X}_7$ (الحلقة المظللة بالأزرق). يوجد ضامنان أوليان $\bar{X}_1 X_2$ و $X_2 \bar{X}_5$ غير ضروريين بل هما قابلان للحذف مطلقاً (absolutely eliminable).

		X_1																
		X_3								X_3								
		0	1	3	2	6	7	5	4	C	D	F	E	A	B	9	8	
X_5	X_7	0															1	X_8
		1								0							0	
		3			0					1	1	1		1		1		
		2	0						1									
		6	0					1	1	1							0	
		7																
		5																
		4	0		1					0				1				
	X_7	C	0		1						0				1			X_8
		D																
		F																
		E	0					1	1	1							0	
		A	0						1									
		B			0						1	1	1		1		1	
		9									0						0	
		8														1		
		X_4				X_4				X_4				X_4				
		X_2																

Z

شكل 13. فرض قيم محددة (باللون الأحمر) على خلايا كانت قيمها لا يُعَبَأُ بها في شكل 4، بحيث صارت الدالة متماثلة حول الخط الأحمر القرمزي الذي يفصل الإقليميين الداخلي والخارجي للمتغير الخامس X_5 (نصفي الخريطة العلوي والسفلي)، وتبعاً لذلك صارت الدالة مستقلة عن هذا المتغير، كما لزم (بدليل الخلايا الملونة بالأصفر) أن ينتمي المتغير الثالث X_3 لمجموعة المتغيرات الداعمة التي صارت مرحلياً تحتوي $\{X_1, X_2, X_3, X_7\}$ بينما لا زال الأمر غير محسوم للمتغيرات الثلاثة الباقية.

																X_1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				X_3										X_3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				0	1	3	2	6	7	5	4	C	D	F	E	A	B	9	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
X_5	X_7	0	0				1						0				1		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

Z

شكل 14. فرض قيم محددة (باللون الأحمر) على خلايا كانت قيمها لا يُعَبَأُ بها في شكل 13، بحيث صارت الدالة متماثلة حول الخطين الأحمرين القرمزيين اللذين يفصلان الإقليميين الداخلي والخارجي للمتغير السادس X_6 (نصف الخريطة الأفقي الأوسط وربيعها العلوي والسفلي)، وتبعاً لذلك صارت الدالة مستقلة عن هذا المتغير فضلاً عن استقلالها السابق عن X_5 ، ولا زالت مجموعة المتغيرات الداعمة تحتوي المجموعة $\{X_1, X_2, X_3, X_7\}$ بينما لا زال الأمر غير محسوم للمتغيرين الباقيين X_4 و X_8 ، وإن كان ليس ثمة ما يمنع أن تستقل الدالة عن أحدهما (دون الآخر)، وهو ما يتجلى في الأشكال اللاحقة.

		X ₁																	
		X ₃										X ₃							
		0	1	3	2	6	7	5	4	C	D	F	E	A	B	9	8		
X ₅	X ₇	0	0	0	1	1					0	0			1	1	1	1	X ₈
		1									0	0					0	0	
		3			0	0					1	1	1	1	1	1	1	1	
		2	0	0				1	1		1	1					0	0	
		6	0	0				1	1		1	1					0	0	
		7			0	0					1	1	1	1	1	1	1	1	
		5									0	0					0	0	
		4	0	0	1	1					0	0			1	1	1	1	
	X ₇	C	0	0	1	1					0	0			1	1	1	1	X ₆
		D									0	0					0	0	
		F			0	0					1	1	1	1	1	1	1	1	
		E	0	0				1	1		1	1					0	0	
		A	0	0				1	1		1	1					0	0	
		B			0	0					1	1	1	1	1	1	1	1	
		9									0	0					0	0	
		8	0	0	1	1					0	0			1	1	1	1	
		X ₄				X ₄				X ₄				X ₄					
						X ₂													
Z																			

شكل 15. إثبات إمكان جعل الدالة في شكل 14 مستقلة عن المتغير الرابع X_4 من خلال فرض قيم محددة (باللون الأحمر) على خلايا كانت قيمها لا يُعبأ بها في شكل 14، بحيث صارت الدالة متماثلة حول الخطوط الحمراء القرمزية التي تعد حدوداً لهذا المتغير، كما لزم (بديل الخلايا الملونة بالأصفر) أن ينتمي المتغير الثامن X_8 لمجموعة المتغيرات الداعمة، وتبعاً لذلك تأكد أن مجموعة المتغيرات الداعمة $\{X_1, X_2, X_3, X_7, X_8\}$ هي مجموعة أصغرية، وهي مجموعة لم يتعرف عليها البرنامج المستخدم في [28].

			X ₁																
			X ₃								X ₃								
			0	1	3	2	6	7	5	4	C	D	F	E	A	B	9	8	
X ₅	X ₇	0	0	0	1	1					0	0			1	1	1	1	
		1									0	0					0	0	
		3			0	0					1	1	1	1	1	1	1	1	
		2	0	0					1	1	1	1					0	0	
		6	0	0					1	1	1	1					0	0	
		7			0	0					1	1	1	1	1	1	1	1	
		5									0	0					0	0	
		4	0	0	1	1					0	0			1	1	1	1	
	X ₇	C	0	0	1	1					0	0			1	1	1	1	
		D									0	0						0	0
		F			0	0					1	1	1	1	1	1	1	1	1
		E	0	0					1	1	1	1						0	0
		A	0	0					1	1	1	1						0	0
		B			0	0					1	1	1	1	1	1	1	1	1
		9									0	0						0	0
		8	0	0	1	1					0	0				1	1	1	1
			X ₄				X ₄				X ₄				X ₄				
			X ₂																
			Z																

شكل 16. الخريطة الناتجة في شكل 15 مقسمة تبعاً لمجموعة المتغيرات الداعمة الأصغرية الجديدة $\{X_1, X_2, X_3, X_7, X_8\}$.

		X_1				X_3			
		X_3				X_3			
X_7	X_8	0*	1			0*		1	1*
						0			0*
			0			1	1	1	1
		0			1	1			0*
		X_2							

Z

شكل 17. الخريطة الناتجة في شكل 16 مختزلة تبعا لمجموعة المتغيرات الداعمة الأصغرية. $\{X_1, X_2, X_3, X_7, X_8\}$. يمكن التعبير عن دالة الخريطة بعدة مجاميع غير وافرة.

		X_1																	
		X_3												X_3					
		0	1	3	2	6	7	5	4	C	D	F	E	A	B	9	8		
X_5	X_7	0	0		1					0				1		1	0	X_8	X_6
		1	0		1					0				1		1	0		
		3	0		0			1	1	1	1	1		1		1	0		
		2	0		0			1	1	1	1	1		1		1	0		
		6	0		0			1	1	1	1	1		1		1	0		
		7	0		0			1	1	1	1	1		1		1	0		
		5	0		1					0				1		1	0		
		4	0		1					0				1		1	0		
	X_7	C	0		1					0				1		1	0	X_8	
		D	0		1					0				1		1	0		
		F	0		0			1	1	1	1	1		1		1	0		
		E	0		0			1	1	1	1	1		1		1	0		
		A	0		0			1	1	1	1	1		1		1	0		
		B	0		0			1	1	1	1	1		1		1	0		
		9	0		1					0				1		1	0		
		8	0		1					0				1		1	0		
		X_4				X_4				X_4				X_4					
		X_2																	

Z

شكل 18. إثبات إمكانية جعل الدالة في شكل 14 مستقلة عن المتغير الثامن X_8 من خلال فرض قيم محددة (باللون الأحمر) على خلايا كانت قيمها لا يُعبأ بها في شكل 14، بحيث صارت الدالة متماثلة حول الخطوط الحمراء القرمزية التي تعد حدودا لهذا المتغير، كما لزم (بدليل الخلايا الملونة بالأصفر) أن ينتمي المتغير الرابع X_4 لمجموعة المتغيرات الداعمة، وتبعا لذلك تأكد أن مجموعة المتغيرات الداعمة $\{X_1, X_2, X_3, X_4, X_7\}$ هي مجموعة أصغرية، وهي مجموعة لم يتعرف عليها البرنامج المستخدم في [28].

X_1																				
		X_3						X_3												
		0	1	3	2	6	7	5	4	C	D	F	E	A	B	9	8			
X_5	X_7	0	0		1					0				1		1	0	X_8		
		1	0		1					0				1		1	0			
X_5	X_7	3	0		0			1	1	1	1	1		1		1	0	X_8		
		2	0		0			1	1	1	1	1		1		1	0			
		6	0		0			1	1	1	1	1		1		1	0			
		7	0		0			1	1	1	1	1		1		1	0			
		5	0		1					0				1		1	0			
	X_7	4	0		1					0				1		1	0	X_6		
		C	0		1					0				1		1	0			
		D	0		1					0				1		1	0			
		F	0		0			1	1	1	1	1		1		1	0			
		E	0		0			1	1	1	1	1		1		1	0			
		A	0		0			1	1	1	1	1		1		1	0			
		B	0		0			1	1	1	1	1		1		1	0			
		9	0		1					0				1		1	0			
		8	0		1					0				1		1	0			
				X_4				X_4				X_4				X_4				
				X_2																
Z																				

شكل 19. الخريطة الناتجة في شكل 18 مقسمة تبعا لمجموعة المتغيرات الداعمة الأصغرية $\{X_1, X_2, X_3, X_4, X_7\}$.

					X_1				
		X_3					X_3		
X_7	X_4	$0^\wedge$	$1^\wedge$			0^*		1	$**0$
									$**1$
					1	1	1		1
		0	$0''^\wedge$		1	1^*		$1''$	$0''^*$
				X_2					
$Z = X_4 \vee X_1 X_3 \vee X_2 X_7 \vee X_3 \overline{X_7}$									

شكل 20. الخريطة الناتجة في شكل 19 مختزلة تبعا لمجموعة المتغيرات الداعمة الأصغرية $\{X_1, X_2, X_3, X_4, X_7\}$. تمت تغطية دالة الخريطة بأربعة ضامانات أولية كلها ضرورية، غير أن ثمة ضامن أولي $X_2 X_3$ غير ضروري بل هو قابل للحذف مطلقا (absolutely eliminable).

المراجع

- [12] **Rushdi, A. M. A.**, and **Badawi, R. M.-S.** (2017) Karnaugh map utilization in Coincidence Analysis, *Journal of King Abdulaziz University: Faculty of Computers and Information Technology Sciences*, **6**(1-2): 37-44.
- [13] **Wheeler, R. F.** (1981) *Rethinking Mathematical Concepts*, Ellis Horwood, Chichester, West Sussex, England, UK.
- [14] **Rushdi A. M. A.** (1996) Karnaugh map, *Encyclopedia of Mathematics*, Supplement Volume I: 1: 327-328, Hazewinkel, M. (Ed.) Kluwer Academic publishers, Boston, USA. Available at: www.encyclopediaofmath.org/index.php/Karnaugh_map.
- [15] **Rushdi, A. M. A** and **Badawi, R. M.-S.** (2019) Computer engineers look at Qualitative Comparative Analysis, *International Journal of Mathematical: Engineering and Management Sciences (IJMEMS)*, **4**(4): 851-860.
- [16] **Marx, A., Rihoux, B.** and **Ragin, C. C.** (2014) The origins, development, and application of Qualitative Comparative Analysis: The first 25 years. *European Political Science Review*, **6**(1): 115-142.
- [17] **Fischer, J., Kaiser, A.** and **Rohlfingm, I.** (2006) The push and pull of ministerial resignations in Germany, 1969-2005, *West European Politics*, **29**(4): 709-735.
- [18] **Dumont, P.** and **Bäck, H.** (2006) Why so few, and why so late? Green parties and the question of governmental participation, *European Journal of Political Research*, **45**: S35-S67.
- [19] **Gherghina S.** (2009) The helping hand: the role of the EU in the democratization of post-communist Europe. *Romanian Journal of Political Sciences*, **2009**(02): 65-79.
- [20] **Jang, D. H.** (2009) Significance of variations between income transfers and social care services development, *Journal of Comparative Social Welfare*, **25**(1): 37-48.
- [21] **Valtonen, K., Padmore, J. C., Sogren, M.** and **Rock, L.** (2009) Lived experiences of vulnerability in the childhood of persons recovering from substance abuse, *Journal of Social Work*, **9**(1): 39-60.
- [22] **Delreux, T.** (2009) The EU negotiates multilateral environmental agreements: explaining the agent's discretion, *Journal of European Public Policy*, **16**(5): 719-737.
- [23] **Wollebæk, D.** (2010) Volatility and growth in populations of rural associations, *Rural Sociology*, **75**(1): 144-166.
- [24] **Schensul, J. J., Chandran, D., Singh, S. K., Berg, M., Singh, S.** and **Gupta, K.** (2010) The use of qualitative comparative analysis for critical event research in alcohol and HIV in Mumbai, India, *AIDS and Behavior*, **14**(1): 113-125.
- [25] **Avdagic, S.** (2010) When are concerted reforms feasible? Explaining the emergence of social pacts in Western Europe, *Comparative Political Studies*, **43**(5): 628-657.
- [1] **Rushdi, A. M. A.**, and **Badawi, R. M.-S.** (2017) Karnaugh map utilization in Boolean analysis: the case of war termination, *Journal of Qassim University: Engineering and Computer sciences*, **10**(1): 53-88.
- [2] **Ragin, C. C., Mayer, S. E.,** and **Drass, K. A.** (1984) Assessing discrimination: A Boolean approach, *American Sociological Review*, **49**(2): 221-234.
- [3] **Ragin, C. C.** (1987) The Comparative Method: Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies, *University of California Press*, Berkeley, CA, USA.
- [4] **Jordan, E., Gross, M. E., Javernick-Will, A. N.** and **Garvin, M. J.** (2011). Use and misuse of Qualitative Comparative Analysis, *Construction Management and Economics*, **29**(11): 1159-1173.
- [5] **Choi, J. O., O'Connor, J. T.** and **Kim, T. W.** (2016) Recipes for cost and schedule successes in industrial modular projects: Qualitative comparative analysis. *Journal of Construction Engineering and Management*, **142**(10), 04016055: 1-9.
- [6] **Ahuja, R., Sawhney, A.** and **Arif, M.** (2017) Driving lean and green project outcomes using BIM: A Qualitative Comparative Analysis. *International Journal of Sustainable Built Environment*, **6**(1): 69-80.
- [7] **Rushdi, R. A.** and **Rushdi, A. M.,** (2018) Karnaugh-map utility in medical studies: The case of Fetal Malnutrition. *International Journal of Mathematical, Engineering and Management Sciences (IJMEMS)*, **3**(3): 220-244.
- [8] **Torre, R. D. L., Alcaide-Muñoz, C.** and **Ollo-Lopez, A.** (2019) A review of intellectual property management practices using qualitative comparative analysis. *International Journal of Intellectual Property Management*, **9**(3-4): 264-286.
- [9] **Kumbure, M. M., Tarkiainen, A., Luukka, P., Stoklasa, J.** and **Jantunen, A.** (2020) Relation between managerial cognition and industrial performance: An assessment with strategic cognitive maps using fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis, *Journal of Business Research*, **114**: 160-172.
- [10] **Verweij, S., Loomans, O.** and **Leendertse, W.** (2020) The role of the public partner in innovation in transport infrastructure PPPs: A Qualitative Comparative Analysis of nine Dutch DBFM projects, *Public Works Management & Policy*, **25**(1): 5-32.
- [11] **Chong, H. Y., Liang, M.,** and **Liao, P. C.** (2021) Normative visual patterns for hazard Recognition: A crisp-set Qualitative Comparative Analysis approach, *KSCE Journal of Civil Engineering*, **25**(5), 1545-1554.

- [40] **Chan, S.** (2003) Explaining war termination: A Boolean analysis of causes, *Journal of Peace Research*, **40**(1): 49-66.
- [41] **Rushdi, A. M. A.** (2018) Utilization of Karnaugh maps in multi-value qualitative comparative analysis, *International Journal of Mathematical, Engineering and Management Sciences (IJMEMS)*, **3**(1): 28-46.
- [42] **Lee, S. C.** (1978) *Modern Switching Theory and Digital Design*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, NJ, USA.
- [43] **Muroga, S.** (1979) *Logic Design and Switching Theory*, Wiley, New York, NY, USA.
- [44] **Rushdi, A. M. A. and Ba-Rukab, O. M.** (2003) Two-level multiple-output logic minimization using a single function, *International Journal of Computer Mathematics*, **80**(8): 977-983.
- [45] **Rushdi, A. M. A. and Ba-Rukab, O. M.** (2007) A purely map procedure for two-level multiple-output logic minimization, *International Journal of Computer Mathematics*, **84**(1): 1-10.
- [46] **Roth, C. and Kinney, L.** (2014) *Fundamentals of Logic Design*, 7th Edition, Cengage Learning, Stamford, CT, USA.
- [47] **Thiem, A.**, (2015) Parameters of fit and intermediate solutions in multi-value Qualitative Comparative Analysis, *Quality & Quantity*, **49**(2): 657-674.
- [48] **Rushdi, A. M. A.** (1987) Improved variable-entered Karnaugh map procedures, *Computers and Electrical Engineering*, **13**(1): 41-52.
- [49] **Rushdi, A. M. A. and Al-Yahya H. A.** (2000) A Boolean minimization procedure using the variable-entered Karnaugh map and the generalized consensus concept, *International Journal of Electronics*, **87**(7): 769-94.
- [50] **Weitzman, E. A. and Miles, M. B.** (1995) *Computer Programs for Qualitative Data Analysis: A Software Sourcebook*, Thousand Oaks, CA: Sage.
- [51] **Thiem, A. and Dusa, A.** (2013) QCA: A package for Qualitative Comparative Analysis, *The R Journal*, **5**(1), 87-97.
- [52] **Thiem, A. and Dusa, A.** (2013) *Qualitative Comparative Analysis with R: A User's Guide*, New York, NY: Springer.
- [53] **Blank, G.** (1991) Why sociological computing gets no respect, *Social Science Computer Review*, **9**(4), 593-611.
- [54] **Hamming, R. W.** (1950) Error detecting and error correcting codes, *The Bell System Technical Journal*, **29**(2): 147-160.
- [55] **Rushdi, A. M. A. and Ghaleb, F. A. M.** (2014) The Walsh spectrum and the real transform of a switching function: A review with a Karnaugh-map perspective. *Journal of Engineering and Computer Sciences, Qassim University*, **7**(2): 73-112.
- [26] **Van der Maat, E.** (2011) Sleeping hegemony: Third-party intervention following territorial integrity transgressions, *Journal of Peace Research*, **48**(2): 201-215.
- [27] **Sager, F. and Anderegg, C.** (2012) Dealing with complex causality in realist synthesis: The promise of Qualitative Comparative Analysis, *American Journal of Evaluation*, **33**(1): 60-78.
- [28] **Thiem, A. and Duşa, A.** (2013) Boolean minimization in social science research: A review of current software for Qualitative Comparative Analysis (QCA), *Social Science Computer Review*, **31**(4): 505-521.
- [29] **Halder, A.K.** (1982) Karnaugh map extended to six or more variables, *Electronics Letters*, **18**(20): 868-870.
- [30] **Motil, J. M.** (2017) Views of digital logic & probability via sets, *numberings*. Available at <http://www.csun.edu/~jmotil/ccSetNums2.pdf>.
- [31] **Rushdi, A. M. A. and Alsayegh, A. B.** (2019) Reliability analysis of a commodity-supply multi-state system using the map method, *Journal of Advances in Mathematics and Computer Science*, **31**(2): 1-17.
- [32] **Rushdi, A. M. A., and Zagzoog, S. S.,** (2019) Logical design of n-bit comparators: Pedagogical insight from eight-variable Karnaugh maps, *Journal of Advances in Mathematics and Computer Science*, **32**(3): 1-20.
- [33] **Rushdi, A. M. A. and Zagzoog, S. S.** (2021) Utilization of Eight-Variable Karnaugh Maps in the Digital Design of n-bit Comparators: Chapter 5 in Theory and Practice of Mathematics and Computer Science, *Book Publisher International*, Hooghly, West Bengal, India, **8**: 68-96.
- [34] **Rushdi, A. M. A. and Badawi, R. S.** (2021) Utilization of eight-Variable Karnaugh maps in the exploration of problems of Qualitative Comparative Analysis. *Asian Journal of Research in Computer Science*, **8**(2): 57-84.
- [35] **Rushdi, A. M. A. and Badawi, R. S.** (2021) Using eight-Variable Karnaugh maps to unravel technicalities in Qualitative Comparative Analysis, *Asian Journal of Education and Social Studies*, **17**(2): 26-42.
- [36] **Rihoux, B.** (2006) Qualitative Comparative Analysis (QCA) and related systematic comparative methods: Recent advances and remaining challenges for social science research. *International Sociology*, **21**(5): 679-706.
- [37] **Thiem, A., Mkrtchyan, L., Haesebrouck, T. and Sanchez, D.** (2020) Algorithmic bias in social research: A meta-analysis, *PloS One*, **15**(6): e0233625.
- [38] **Crama, Y., Hammer, P. L. and Ibaraki, T.** (1988) Cause-effect relationships and partially defined Boolean functions, *Annals of Operations Research*, **16**(1): 299-325.
- [39] **Brown, F. M.** (1990) *Boolean Reasoning: The Logic of Boolean Equations*, Kluwer Academic Publishers, Boston, USA.

- [60] **Rushdi, A. M.** and **Rushdi, M. A.** (2017) Switching-Algebraic Analysis of System Reliability. Chapter 6 in Ram, M. and Davim, P. (Editors), *Advances in Reliability and System Engineering*, Management and Industrial Engineering Series, Springer International Publishing, Cham, Switzerland: 139-161.
- [61] **Socher-Ambrosius, R.** (1988) Using theory resolution to simplify interpreted formulae. In *Künstliche Intelligenz* (pp. 179-185). Springer, Berlin, Heidelberg.
- [62] **Hong, S. J.** and **Muroga, S.** (1991) Absolute minimization of completely specified switching functions, *IEEE Computer Architecture Letters*, **40**(01): 53-65.
- [63] **Yamamoto, Y.** and **Mukaidono, M.** (1992) P-functions-ternary logic functions capable of correcting input failures and suitable for treating ambiguities, *IEEE Computer Architecture Letters*, **41**(01): 28-35.
- [56] **Rushdi, A. M. A.** and **Ba-Rukab, O. M.** (2017) Map calculation of the Shapley-Shubik voting powers: An example of the European Economic Community, *International Journal of Mathematical, Engineering and Management Sciences (IJMEMS)*, **2**(1): 17-29.
- [57] **Rushdi, A. M. A.** and **Ba-Rukab, O. M.** (2017) Calculation of Banzhaf voting indices utilizing variable-entered Karnaugh maps, *British Journal Mathematics and Computer Science*, **20**(4): 1-17.
- [58] **Rushdi, A. M. A.** and **Ba-Rukab, O. M.** (2020) Translation of Weighted Voting Concepts to the Boolean Domain: The Case of the Banzhaf Index, Chapter 10 in *Advances in Mathematics and Computer Science Vol. 2*, Book Publisher International, Hooghly, West Bengal, India: 122-140.
- [59] **Rushdi, A. M. A.** and **Ghaleb, F. A. M.** (2016) A tutorial exposition of semi-tensor products of matrices with a stress on their representation of Boolean functions. *Journal of King Abdulaziz University: Computers and Information Technology Sciences*, **5**(1-2): 3-30.

Handling Partially-Defined Boolean Functions in Qualitative Comparative Analysis by Deriving the Minimal Sets of Supporting Variables before Identifying the Irredundant Sums

Ali Muhammad Rushdi and Raid Salih Badawi

Department of Electrical and Computer Engineering, Faculty of Engineering, King Abdulaziz University, P. O. Box 80204, Jeddah, 21589, Saudi Arabia

arushdi@kau.edu.sa

Abstract. We use a standardized version of an eight-variable Karnaugh map to explore one of the largest stereotypical issues involved in Qualitative Comparative Analysis (QCA). We deal with a partially-defined Boolean function that describes this problem in a new way that requires first deriving all the minimal sets of the supporting variables, then it follows that by finding all the irredundant sums that represent the Boolean function for each of these sets. This method differs from the minimization approach commonly used in the design of digital circuits, which (a) is characterized by the existence of a unique minimal set of supporting variables, to which all the variables belong, and (b) involves finding a single minimum sum from among the irredundant sums. We criticize mainstream Qualitative Comparative Analysis because it blindly imitated the method of dealing with Boolean functions used in designing digital circuits, with the aim of quickly arriving at a single strong (albeit unjustified) conclusion. In fact, the powerfulness claims attributed to Qualitative Comparative Analysis are not valid in their entirety, but only when it is possible (to justify) the description of the Boolean function used via a single minimal set of supporting variables with a single irredundant sum that constitutes a minimal sum as well as the complete sum or Blake's Canonical Form. All the issues mentioned are clarified through the detailed map solution of the aforementioned typical problem and comparing this solution with the traditional automated solution obtained earlier. In this solution, we do not have to implement the minimization procedure except after decreasing the map size by reducing its set of variables to one of supporting variables only.

Keywords: Eight-variable Karnaugh map, Qualitative Comparative Analysis, Partially-defined Boolean function, Supporting variables, Irredundant sum, Minimal sum, Complete sum (Blake Canonical Form).