تقييم الجودة الميكروبيولوجية لسلطة التتبيل بمدينة جدة

إبراهيم إسماعيل شباج

قسم العلوم البيئية، كلية الأرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة، جامعة الملك عبدالعزيز، جدة،
المملكة العربية السعودية

المستخلص. تضمن البحث تتبع التلوث الميكروبي في بعض عينات سلطة التتبيل جمعت من إثني عشرة موقع بمدينة جدة، تمثل ستة أحياء في جدة مرتين كل شهر لمدة ثلاثة أشهر. وجد أن متوسطات أعداد المجاميع الميكروبية (البكتريا الحية الكلية، والكوليفورم، الكلي والكوليفورم البرازي، والسالمونيلا، والاستافيلوكوكس) في العينات المأخوذة وقت الذروه كانت أقل من العينات المأخوذة وقت ركود البيع. كما وجدت أعلى متوسطات المجاميع الميكروبية المدروسة في العينات المأخوذة وت ركود البيع من المواقع الشعبية. وقد وجد أعلى متوسط لأعداد البكتريا الكلية الحية في العينات المأخوذة في الشهر الأول من حي مشرفة. في حين كانت أعلى المتوسطات لمجموعة الكوليفورم الكلي (٨٠٨٦٦) ومجموعة الكوليفورم البرازي (٢٨٦٣٣) بين العينات المأخوذة من حي قويزة في الشهر الأول، ومن حي الروابي في الشهر الثاني، على التوالي. ومن ناحية أخرى، كانت متوسطات اعداد العينات المأخوذة من حي الرحاب في الشهر الثالث (٣٥٥٠٠)، ومن نفس الحي في الشهر الثاني (٢٥٠٠٠) تمثل مجموعة السالمونيلا والاستافيلوكوكس، على التوالي.

وعليه يوصى بالعناية باختيار أماكن شراء الأغذية المجهزة، وكذلك تناول المباشر لها أو حفظها بالتبريد لحين الاستخدام، وذلك لتلافي حدوث العدوى أو التسمم الغذائي.

الكلمات المفتاحية: سلطة التتبيل، المجاميع الميكروبية، طرق العد الميكروبي، العدوي الغذائية، التسمم الغذائي.

المقدمة

تستخدم سلطة التتبيل لإضفاء نكهات مميزة للوجبات الغذائية، ويمكن لها أن تكون مصدر لتلوث الأغذية التي تضاف لها. التلوث العرضي Cross contamination هو تلوث المنتج الغذائي من مصدر آخر. وهناك ثلاثة طرق رئيسة للتلوث العرضي الذي يمكن أن يحدث وهي: تلوث الغذاء من غذاء آخر، أو تلوث الغذاء من الإنسان، أو تلوث الغذاء من المعدات المستخدمة في الأعداد. يحدث التلوث العرضي نتيجة لنقل ملوثات ميكروبية أو كيميائية إلى المنتجات الغذائية من المواد الخام، أو متداولي

الغذاء، أو البيئة التي يتم فيها تداول الأغذية. ويعتبر نمط التلوث العرضي مسؤولاً بشكل متكرر عن الأمراض المنقولة بواسطة الأغذية نتيجة انتقال الميكروبات المرضية إلى الأغذية سابقة التحضير. تمثل الكائنات الحية الدقيقة المنقولة بواسطة الهواء في أماكن تحضير الأغذية خطورة كبيرة للمشاكل الصحية والاقتصادية التي يمكن أن تسببها. وبالإضافة إلى الميكروبات الموجودة طبيعياً في الهواء الجوي فإن العطس واستعمال معاطف ملوثة وكذلك تناثر الملوثات من الأيدي والأذرع يساهم في تلوث هواء أماكن تصنيع الأغذية. ومن المعروف أن

التحاليل والاختبارات الميكروبيولوجية سلطة التتبيل

١- تقدير العدد الحي الكلي للبكتيريا Total Viable Bacterial Count

تم استعمال بيئة الأجار المغذي Nutrient Agar (Oxoid Manual, 1991) لتقدير العدد الكلي للبكتيريا الحية، تبعاً للطريقة التي أقرتها رابطة الصحة العامة الأمريكية (APHA, 1991) مع التحضين لمدة ٤٨ ساعة على درجة ٣٠°م.

٢- تقدير العدد الحي لبكتيريا القولون الكلية والبرازية Viable Count of Total Coliform and Fecal Coliform

تم عد بكتيريا القولون الكلية والبرازية الحية تبعاً لهاريجان (1998) Harrigan ، مع استعمال بيئة متخصصة VRB Agar (Oxoid Manual, 1991) والتحضين لمدة ٤٨ ساعة، على درجة حرارة ٣٧°م، لتقدير بكتيريا القولون الكلية، وعلى درجة ٤٠°م في حالة بكتيريا القولون البرازية.

٣- تقدير العدد الحي لبكتيريا السالمونيلا Viable Count of Salmonella

تم عد بكتيريا السالمونيلا تبعاً لهاريجان (1998) Harrigan واستعمال البيئة المتخصصة Brilliant green agar (modified) (Oxoid Manual, 1991) والتحضين لمدة ٤٨ ساعة على ٣٧°م.

٤- تقدير العدد الحي للاستافيلوكوكس Viable count of Staphylococcus

تم عد بكتيريا الاستافيلوكوكس تبعاً لهاريجان (1998) Harrigan، وقد استعملت بيئة متخصصة هي Baird Parker Agar (Oxoid Manual, 1991) والتحضين لمدة ٤٨ ساعة على درجة حرارة ٣٥°م.

التحليل الإحصائي

تم استخدام تجربة عاملية في تصميم عشوائي كامل بثلاث مكررات Factorial experiment in completely randomized design with three replicates. أجرى التحليل الإحصائي طبقاً للنحلاوي (2010) El-Nakhlawy باستعمال برنامج التحليل الإحصائي الإلكتروني ساس (SAS, 2000).

النتائج والمناقشة

بعض أنواع البكتيريا المنقولة بواسطة الهواء مثل *Bacillus anthracis* و *Staphylococcus aureus* وجراثيم بكتيريا *anthracis* المسببة لمرض الجمرة الخبيثة تتواجد في الهواء ويمكن أن تكون مصدر للتلوث العرضي. ويمثل تكون الفيلم العضوي Biofilm المحتوي على الميكروبات في بيئة العمل وعلى أدوات تحضير المنتجات الغذائية مصدراً لتلوث هذه الأغذية المنتجة. وتعتبر أسطح الأدوات المستخدمة في تداول وتصنيع وتخزين الأغذية، وتعتبر كذلك المواد الخام المستخدمة في تحضير سلطة التتبيل مصدراً رئيساً للتلوث الميكروبي (Ehaval, et al., 2007).

الهدف من هذا البحث هو تقدير تأثير كل من مواقع تقديم سلطات التتبيل ومستواها ووقت جمع العينات على صفات الجودة الميكروبيولوجية سلطات التتبيل.

المواد وطرق البحث

العينات

تم دراسة الجودة الميكروبية سلطة التتبيل لانتشار تقديمها مع الوجبات الغذائية بجدة وكونها لم تدرس باستفاضة. تم أخذ ٥٠ جرام من كل عينة بطريقة معقمة، ووضعت في ورق زجاجي معقم به ٤٥٠ مل محلول فسيولوجي معقم، وتم رج العينة جيداً لتوزيع الميكروبات توزيعاً عادلاً في المعلق لتعطي تخفيف العينة (١٠/١)، وتعتبر كعينة أصلية (Cheesbrough, 1993).

جمع العينات

تم جمع عينات سلطة التتبيل مرتين كل شهر لمدة ثلاثة أشهر من إثني عشرة موقع بمدينة جدة، تمثل ستة أحياء في جدة (تقع في حي الرحاب، حي مشرفة، حي النزهة، حي الروضة، حي قويزة، حي الروابي)، حيث تم أخذ العينات من كل حي من موقعين أحدهما متميز والآخر شعبي. وقد تم اختيار المواقع المميزة والشعبية عشوائياً بعد حصر المحلات التي تقدم سلطة التتبيل وتقسيمها بناء على استطلاع رأي المستهلكين والمظهر العام إلى مجموعتين مميزة وشعبية.

الميكروبية بين العينات المأخوذة من المواقع المميزة والشعبية. بينما لم يظهر التفاعل بين عوامل الدراسة اختلافات معنوية لمتوسطات أعداد مجاميع الكوليفورم الكلية والبرازية في عينات سلطة التتبيل، مما يدل على أن التلوث غالباً راجع لسلوكيات العمالة المسؤولة عن تحضيرها. ويعزى ذلك غالباً لعدم توافر الاشتراطات الصحية الخاصة بالنظافة الشخصية للعمالة القائمة على تحضير سلطة التتبيل حسب ما ذكره ريتشاردسون (Richardson, 1975).

جدول رقم (١) يوضح تحليل التباين بين العوامل المختلفة التي تم دراستها من حيث شهور أخذ العينة (ثلاثة أشهر)، ووقت أخذ العينات (الذروة والركود)، ومستوى المنافذ (مميز وشعبي)، والأحياء التي تم أخذ العينات منها. يظهر من الجدول وجود اختلافات معنوية بين متوسطات أعداد المجاميع الميكروبية للعينات ما عدا بكتريا القولون البرازية في الأحياء المختلفة، وكذلك المتوسطات أثناء الذروة والركود، كما وجدت اختلافات معنوية لمتوسطات كل المجاميع

جدول (١). تحليل التباين للعوامل المختلفة التي تم دراستها من حيث شهور أخذ العينة (ثلاثة أشهر)، ووقت أخذ العينات (ذروة وركود)، ومستوى المنافذ (مميز وشعبي)، وأحياء أخذ العينات للمجاميع الميكروبية، العدد الكلي الحي TVC، الكوليفورم الكلي TC والبرازي FC والسالمونيلا Sal والاستافيلوكوكس Staph.

S.O.V.	df	MS				
		TVC	TC	FC	Sal	Staph
Replicates	2	39010046 ^{NS}	85668071713 ^{NS}	149916713 ^{NS}	420324 ^{NS}	134351991 ^{NS}
M	2	281944491*	21339222824 ^{NS}	163895046 ^{NS}	35713935**	585489213 ^{NS}
Error "a"	4	39485046	21334842130	160910810	158310	143420185
I	1	9057230046**	2328540000**	795417824 ^{NS}	627985602**	2310843750**
M*I	2	142144491 ^{NS}	69755138 ^{NS}	153128380*	7179213**	662145972*
Error "b"	6	50724120	173954953.7	195970000	96759	662145972
D	5	8496365491**	1811852851**	437407935 ^{NS}	534849157**	899548491**
M*D	10	45688157 ^{NS}	89526935.185 ^{NS}	158227324 ^{NS}	14984769**	595069435**
I*D	5	746207491**	50824000 ^{NS}	219767935 ^{NS}	21887380**	523920194**
M*I*D	10	79425935 ^{NS}	8033472.2222 ^{NS}	159176324 ^{NS}	6020157**	547162750
Error "c"	60	44974583	81915861.111	167033667	717593	140116093
L	1	83390670417**	13122726667**	1846260417**	1082278935**	3118280046**
M*L	2	261414306**	877365416**	158887639 ^{NS}	4746435**	504827824*
I*L	1	465520417**	98415000 ^{NS}	145533750 ^{NS}	77824 ^{NS}	694450417*
D*L	5	302992750**	154944444 ^{NS}	204677861 ^{NS}	62596491 ^{NS}	535442269**
M*I*L	2	15634306 ^{NS}	18302916 ^{NS}	158427639 ^{NS}	2502824**	530925139**
M*D*L	10	72897306 ^{NS}	26935861 ^{NS}	161148583 ^{NS}	2708824**	559500713**
I*D*L	5	525038750**	6293000 ^{NS}	176597861 ^{NS}	34956046**	600288861**
M*I*D*L	10	127593306**	10468250 ^{NS}	158777583 ^{NS}	1650880*	604991917**
Error "d"	72	47212963	104204629.63	156899583	257083	140935787
LSD		11221	16669	20455	828	6130

M: شهر أخذ العينات؛ وقت أخذ العينة في الذروة أو الركود / D: الحي / L: المستوى متميز أو شعبي. **، *، p≤0.05 توجد معنوية عند / NS: لا توجد معنوية عند

جدول (٣). تأثير أخذ العينات وقت الذروة ووقت الركود على متوسطات أعداد المجاميع الميكروبية تحت الاختبار.

I	Means*				
	TVC	TC	FC	Sal	Staph
1	112777 _b	45606 _b	16525 _a	19547 _b	15816 _b
2	125728 _a	52173 _a	20363 _a	22957 _a	22357 _a

* المتوسطات المتوقعة بنفس الحرف لا تختلف معنوياً تبعاً لاختبار L.S.D عند مستوى معنوية $p \leq 0.05$.

TVC: العدد الكلي الحي، TC: الكوليفورم الكلي، FC: الكوليفورم البرازي، Sal: السالمونيلا، Staph: الاستافيلوكوكس.

1: وقت الذرة

2: وقت الركود

يوضح الجدول رقم (٤) تأثير وقت أخذ العينات في الذروة والركود والأحياء التي أخذت منها العينات ومواقع أخذ العينات المميزة والشعبية على أعداد المجاميع الميكروبية تحت الاختبار. وعند دراسة ومقارنة نتائج الجدول، يتضح أن متوسطات العدد الكلي الحي لعينات سلطة التتبيل يتراوح بين ٦٥٨٦٦ خلية/ جم من الموقع المميز بحي مشرفة وقت الذروة في الشهر الأول، وبين ١٦٩٦٠٠ خلية/ جم من الموقع الشعبي بحي الرحاب وقت الركود في الشهر الأول أيضاً. ويمكن أن يفسر ذلك إلى تزايد أعداد البكتيريا أثناء فترة عدم البيع وكذلك عدم اتباع الاشتراطات الصحية لحفظ الأغذية (Adams and Moss, 2005).

ويتضح كذلك من الجدول أن أعلى متوسطات بكتيريا الكوليفورم الكلية الحية لعينات سلطة التتبيل (٨٠٨٦٦ خلية/جم) وجدت في الموقع الشعبي وقت الركود (حي قويزة) بين عينات الشهر الأول، وأقلها (٢٠٠٠٠) في الموقع المميز وقت الذروة (حي الروابي)، بينما كان أعلى متوسط للكوليفورم البرازي (٢٨٦٣٣ خلية/جم) في الموقع الشعبي وقت الركود (حي الرحاب) بين عينات الشهر الثاني، وأقلها (١١٦٣٣ خلية/جم) في الموقع المميز وقت

الجدول رقم (٢) يوضح تأثير شهور أخذ العينة على متوسطات أعداد المجاميع الميكروبية تحت الاختبار. يتضح من الجدول تواجد جميع المجاميع الميكروبية المختبرة مع عدم وجود اختلافات معنوية بين متوسطات أعداد مجاميع بكتيريا القولون الكلية والبرازية والاستافيلوكوكس في العينات المأخوذة في الشهور الثلاث. بينما لوحظت اختلافات معنوية ($p \leq 0.05$) بين متوسطات أعداد البكتيريا الحية الكلية في الشهر الثاني (١١٧٠١٧ وحدة مكونة للمستعمرة/ جم، سوف يستخدم تعبير خلية / جم بدلاً من وحدة مكونة للمستعمرة/ جم في باقي البحث) وبين متوسطات الأعداد في الشهر الأول والثالث (١٢٠٧٧٩، ١١٩٩٦١ خلية/ جم، على التوالي). كذلك وجدت اختلافات معنوية ($p \leq 0.05$) بين متوسطات أعداد السالمونيلا بين الأشهر الثلاث لأخذ العينات، وتدل هذه النتائج على عدم إتباع الاشتراطات الصحية السليمة لإنتاج الأغذية (Troller, 1983).

جدول (٢). تأثير شهور أخذ العينة على متوسطات أعداد المجاميع الميكروبية تحت الاختبار.

Months	Means*				
	Total Viable Count	TC	FC	Sal	Staph
1	120779 ^a	29040 ^a	17581 ^a	20656 ^c	17529 ^a
2	117017 ^b	57879 ^a	20186 ^a	22029 ^a	22378 ^a
3	119961 ^a	59750 ^a	17565 ^a	21072 ^b	17353 ^a

* المتوسطات المتوقعة بنفس الحرف لا تختلف معنوياً تبعاً لاختبار L.S.D عند مستوى معنوية $p \leq 0.05$.

TVC: العدد الكلي الحي، TC: الكوليفورم الكلي، FC: الكوليفورم البرازي، Sal: السالمونيلا، Staph: الاستافيلوكوكس.

الجدول رقم (٣) يظهر متوسطات أعداد المجاميع الميكروبية المختبرة عند أخذ العينات وقت الذروة ووقت الركود. يتضح من الجدول وجود اختلافات معنوية ($p \leq 0.05$) بين متوسطات أعداد المجاميع الميكروبية المختلفة ما عدا الكوليفورم البرازي أثناء وقت الذروة ووقت الركود حيث تزايدت المتوسطات في أوقات الركود، مما يدل على سوء حفظ السلطة أثناء عدم البيع.

الذروه (حي الروابي) بين عينات الشهر الأول. نتائج متوسطات الأعداد الحية لبكتريا السلمونيلا تظهر أن أعلى متوسطات بكتريا السلمونيلا الحية لعينات سلطة التتبيل كانت في الموقع الشعبي وقت الركود (حي الرحاب) بين عينات الشهر الثالث بقيمة (٣٥٥٠٠ خلية/جم)، وأقلها في الموقع المميز وقت الذروه (حي مشرفة) بين عينات الشهر الثاني بقيمة (١٠٣٠٠ خلية/جم). ومن المعروف أن ميكروبات السلمونيلا من الميكروبات المسببة للعدوى الغذائية الميكروبية food infection إلا أن الأعداد المتواجدة في العينات الموجبة (ينصح بعدم تناولها لاشتراط معظم المواصفات الخلو من السالمونيلا) كانت أقل بكثير من الأعداد اللازمة لإحداث العدوى الغذائية والتي لا تقل عن 10^6 - 10^9 خلية/جم (Doyle, 1989; Eley, 1996).

أما أعلى متوسطات بكتريا الاستافيلوكوكس الحية لعينات سلطة التتبيل (٢٥٠٠٠ خلية/جم) فقد وجدت في الموقع الشعبي وقت الركود (حي الرحاب) بين عينات الشهر الثاني، وكانت قيمة أقل المتوسطات هي ٩٠٠٠ خلية/جم في الموقع المميز (حي مشرفة) وقت الذره من بين عينات الشهر الثاني.

جدول (٤). تأثير شهور أخذ العين ووقت أخذ العينات في الذروة والركود وأحياء أخذ العينات ومواقع أخذ العينات المميزة والشعبية على أعداد المجاميع الميكروبية تحت الاختبار.

Month	Intensity	Distinct	levels	Means				
				TVC	TC	FC	Sal	Staph
1	I1	D1	L1	108066	27000	13300	23000	18000
			L2	119966	37000	16733	25000	19000
		D2	L1	65866	17666	14133	13000	9300
			L2	133266	21000	16233	19933	12000
		D3	L1	85933	16333	12833	16000	13000
			L2	123666	36300	19600	19000	17000
		D4	L1	115600	26300	13666	21100	17000
			L2	150266	31000	20300	22900	20300
		D5	L1	100333	32000	20833	12000	15000
			L2	142000	35333	23666	19866	21000
		D6	L1	100333	20000	11633	18000	14000
			L2	145200	22000	14866	19000	17000
	I2	D1	L1	110266	31333	16433	25000	21000
			L2	169600	43000	21033	35000	30000
		D2	L1	74600	21333	17433	20300	10300
			L2	103133	27333	18166	22000	13000
		D3	L1	84000	26666	12966	18000	14000
			L2	145200	40333	21166	20300	19300
		D4	L1	120933	30466	16833	23033	20500
			L2	155400	38633	22766	24300	23000
		D5	L1	119433	32333	22433	15000	16000
			L2	160066	37666	25300	23000	23000
		D6	L1	112166	20933	13533	20000	16000
			L2	153400	25000	16066	21000	22000
2	I1	D1	L1	100666	48000	13200	24500	13466
			L2	121000	62000	17100	27500	19500
		D2	L1	70000	34333	14033	10300	9000
			L2	112600	53266	16433	21000	11000
		D3	L1	74600	35200	12733	18000	15500
			L2	114000	62200	20100	21000	17000
		D4	L1	111000	53000	13666	18000	16000
			L2	137000	65000	19933	20300	19500
		D5	L1	100200	53633	20966	15000	16000
			L2	142000	73000	24000	23000	22300
		D6	L1	93200	42800	12266	19000	12000
			L2	145000	62333	14566	22000	16000
	I2	D1	L1	118000	56000	16300	29500	22500
			L2	159266	78333	28633	37000	25500
		D2	L1	77333	37333	17300	20000	13000

جدول (٤). تابع.

			Levels	Means						
				TVC	TC	FC	Sal	Staph		
			L2	119000	59666	18400	22300	15000		
		D3	L1	79000	41333	13100	22000	16000		
			L2	136666	74200	21066	23000	137000		
		D4	L1	124000	59866	17100	23300	20800		
			L2	157000	79666	22500	26000	22000		
		D5	L1	113000	60333	22400	17000	18000		
			L2	151000	80866	25166	25000	25000		
		D6	L1	97266	47200	13500	20000	14000		
			L2	155600	65333	16000	24000	21000		
		3	I1	D1	L1	95600	47733	13200	26000	13000
					L2	123000	68533	17166	27300	22000
D2	L1			76000	37666	13833	13000	9300		
	L2			106333	50166	16333	21000	13000		
D3	L1			87000	42333	12733	16000	15000		
	L2			116333	61766	20000	21000	18000		
D4	L1			112333	55100	13666	22000	17000		
	L2			144000	70866	19766	23000	20300		
D5	L1			109000	58333	20800	12000	13000		
	L2			143000	74666	23933	22000	19000		
D6	L1			97000	45333	12100	15000	13000		
	L2			138600	62633	14566	17000	16900		
I2	D1		L1	120000	56666	16366	27000	23000		
			L2	165000	83200	20633	35900	29300		
	D2		L1	81000	42000	17266	18066	12000		
			L2	114600	54200	18000	23366	15000		
	D3		L1	93000	48000	13200	20966	17300		
			L2	140000	74200	21033	23633	21000		
	D4		L1	126666	61533	17066	21333	16766		
			L2	157600	78066	22733	24100	23800		
	D5		L1	122333	61666	22433	13600	15600		
			L2	152666	82000	25333	23700	22000		
	D6		L1	110000	51666	13466	18500	15000		
			L2	148000	65666	15933	20266	16200		
LSD (0.05)				11221	16669	20455	828	6130		

TVC: العدد الكلي الحي، TC: الكوليفورم الكلي، FC: الكوليفورم البرازي، Sal، السالمونيلا، Staph: الاستافيلوكوكس، I1: وقت الذروة، I2: وقت الركود.

D1: الرحاب، D2: مشرفة، D3: النزهة، D4: الروضة، D5: قويزة، D6: الروابي، L1: موقع مميز، L2: موقع شعبي.

الأعداد المتواجدة في العينات الموجبة كانت أقل من 10^6 خلية/جم، وهي الأعداد اللازمة لإنتاج كمية

ومن المعروف أن ميكروبات الاستافيلوكوكس من الميكروبات المفترزة لسموم خارجية مسببة للتسمم الغذائي بالتوكسين، إلا أن

- Cheesbrough, M.** (1993) *Medical laboratory manual for tropical countries*. Vol II: Microbiology. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Doyle, M.P.** (1989) *Foodborne Bacterial Pathogens*. Dekker, New York, USA.
- Eley, A.** (1996) *Microbial Food Poisoning*. 2nd edition. Chapman and Hall, London.
- El-Nakhlawy, F.S.** (2010). Experimental design and analysis in the Scientific Research. Sci.Pub. Center, KAU, Jeddah, Saudi Arabia.
- Harrigan, W.F.** (1998) *Laboratory Methods in Food Microbiology*. Academic Press, 525 B Street, Suit 1900, San Diego, California 92101-4495, USA
- Oxoid Manual** (1991) *The Oxoid Manual of Culture*. Media and Other Laboratory Services. Fourth Edition.
- Richardson, T.** (1975) *Sanitation for Foodservice Workers*. Boston, Mass, USA.
- SAS** (2000) *Statistical Analysis System*. SAS User's Guide Release 6. 04 Edition Statistics SAS institute Inc. Editors, CARY, NC.
- Steel, R.G.D. and Torrie, J.H.** (2000) *Principles and Procedures of Statistics, A Biometrical Approach*. 4th edition, McGraw Hill Inc: New York.
- Troller, J.A.** (1983) *Sanitation in Food Processing*. New York, USA, Academic press.

توكسين كافية لإحداث التسمم الغذائي التوكسيني (Doyle, 1989; Eley, 1996).

التوصيات

يوصى بشراء الأغذية المجهزة وقت الذروه، والعناية عند اختيار مكان الشراء، وكذلك سرعة تناولها أو حفظها بالتبريد في حالة عدم الاستعمال السريع لها، وذلك لتلافي تزايد أعداد الميكروبات وبالتالي حدوث العدوى أو التسمم الغذائي، كما يجب الاهتمام بنشر الوعي الغذائي والصحي عن طرق الوقاية من التسممات الغذائية وتقليل التلوث ونمو الميكروبات في الأغذية بين المشتريين والقائمين على إنتاج الأغذية. كما يوصى بإحكام مراقبة منشآت إنتاج الأغذية من حيث تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بالمواد الخام والأدوات المستخدمة في الإنتاج والنظافة الشخصية للقائمين على الإنتاج.

شكر وتقدير

المشروع ممول من عمادة البحث العلمي، جامعة الملك عبد العزيز، بالمنحة البحثية رقم (١٤٣٤/١٥٥/١٠٣). ولذلك يقر الباحث مع الشكر الدعم التقني والمادي لعمادة البحث العلمي.

References

- Adams, M. and Moss, M.** (2005) *Food Microbiology* 2nd print. New Age International (p) Limited Pub. New Delhi, India.
- APHA** (1991) American Public Health Association. *Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods*. 3rd Ed., Washington, DC, 20005.

Assessment of Microbial Quality of seasoning Salad in Jeddah city

Ibraheem Ismail Shabbaje

*Environmental sciences Dept., Faculty of Meteorology, Environment and Arid Land Agriculture,
King Abdulaziz Univ., Jeddah, Saudi Arabia*

Abstract. This research was conducted to follow up the microbial contamination samples of some seasoning salad samples collected twice monthly for three months from twelve locations representing six districts in Jeddah. It was found that the counts of microbial groups (total viable bacteria, total coliform, fecal coliform, *Salmonella* and *Staphylococcus*) in the sample taken at rush hours were higher than those collected at calm time of selling. Also the highest means of all studied microbial groups were found in the samples taken from traditional locations at calm time of selling. The highest mean of total viable bacterial count (169600 cfu/gm) was found in the samples of Mashrafa District in the first sampling month. Whereas, the highest means of total coliform group (80866 cfu/gm) and fecal coliform group (28633 cfu/gm) were found in the samples taken from traditional locations in Guesa at the first sampling month and in Al-Rwaubi district at the second sampling month, respectively. On the other hand, Samples' means of from traditional locations taken from Al-Rehab district at the third month of sampling (35500 cfu/gm) and from the same district at the second sampling month (25000 cfu/gm) represented *Salmonella* and *staphylococcus* groups, respectively. It is recommended to take care about purchasing of ready to eat food and the direct eating or cold preservation until using to avoid food infection or poisoning.

Keywords: Seasoning salad, Microbial groups, Microbial countin methods, food infection and food poisoning.