Al-Rub Al-Khali Climate Southeast of Saudi Arabia

Abdullah Almisnid

*Department of Geography, College of Arabic Language and Social Studies, Qassim University,
Qassim, Kingdom of Saudi Arabia*

Abstract. This paper aims to study the climatic conditions of the world largest continuous sand desert the Rub Al-Khali which is located in the southeast of the Arabian Peninsula. The study area is almost devoid of any meteorological stations, therefore this analysis depends primarily on data from four stations surroundings to it for the period 1981-2010. The reanalysis datasets from the National Centers for Environmental Prediction and the National Center for Atmospheric Research (NCEP/NCAR) as well as data from the Climatic Research Unit (CRU) at the University of East Anglia are also used. Rub Al-Khali is the hottest area in the Arabian Peninsula with an annual average surface temperature of 27-32°C which tends to increase further in both winter and spring seasons. Rainfall is infrequent with a mean annual amount of 45mm at Shaiba station which confirms the severe dry conditions in the region. The climate of Rub Al-Khali is influenced partly by the movement of Mediterranean cyclones during the winter season when they are following southerly and southeasterly tracks, and partly by the presence of the Red Sea thermal lows. Occasionally, this region is affected by the extraordinary passage of tropical cyclones from the Arabian Sea as in the case of September 1992. This study shows that the annual average surface air temperature has been risen by about 0.1 - 0.8°C during the study period compared with the period 1950-1980. The maximum increase in the surface temperature exceeds the average global temperature increase over the past century.

ثانيًا: المراجع الأجنبية

- climatology of Saudi Arabia for 1979-2009", *Atmospheric Research*, **111**, pp: 29-45.
- McClure, H.** (1984) Late Quaternary palaeoenvironments of the Rub'al Khali. PhD thesis, London, University of Central London.
- National Centers for Environmental Prediction/ National Weather Service/NOAA/U.S. Department of Commerce.** 1994, updated monthly. NCEP/NCAR Global Reanalysis Products, 1948-continuing. Research Data Archive at the National Center for Atmospheric Research, Computational and Information Systems Laboratory. <http://rda.ucar.edu/datasets/ds090.0/>. Accessed 01 June 23, 2015.
- The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)**(2015)<http://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/availability/2008-11-02>.
- www.cru.uea.ac.uk/cru/data/hrg
- Al-Sayari, S.S. and Zötl, J.G.** (1978) Quaternary period in Saudi Arabia: 1. sedimentological, hydrological, hydrochemical, geomorphical and climatological investigations in central and eastern Saudi Arabia. Springer Verlag, p. 334.
- Google Earth Pro**, 4.2.0180.1134.
- Joint Typhoon Warning Center** (2013) "Joint Typhoon Warning Center Mission Statement", Retrieved July 17.
- Laboun, A.A.** (1988) The distribution of the Carboniferous-Permian siliciclastics in the Greater Arabian Basin, *Geological Society of America Bulletin*, **100** (3): 362-373.
- Almazroui, M., Islam, M.N., Athar, H., Jones, P.D. and Rahman, M.A.** (2012a) "Recent climate change in the Arabian Peninsula: annual rainfall and temperature analysis of Saudi Arabia for 1978–2009", *Int. J. Climatol*, doi:10.1002/joc, pp: 34-46.
- Almazroui, M., Islam, M.N., Athar, H., Jones, P.D. and Rahman, M.A.** (2012b) "Recent climate change in the Arabian Peninsula: Seasonal rainfall and temperature

قورنت بزيادة درجة الحرارة على سطح الكرة ٠,٦ درجة مئوية خلال القرن السابق.

المراجع

أولاً: المراجع العربية

الأيوبي، فضل، والمسند، عبدالله (٢٠١٢م) جبل المحجة دراسة في الجغرافيا الطبيعية، مجلة العلوم العربية والإنسانية، المجلد ٦ العدد ١، جامعة القصيم، السعودية.

الحميري، محمد بن عبدالمعظم (١٩٨٠م) لروض المعطار في خبر الأقطار، المحقق: إحسان عباس، مؤسسة ناصر للثقافة، ط٢، بيروت.

الراشد، محمد، والغنيان، عبدالله (٢٠١١م) الربع الخالي بحر الرمال العظيم، المساحة الجيولوجية السعودية. الغنيم، عبدالله (١٩٨١م) أقاليم الجزيرة العربية بين الكتابات العربية القديمة والدراسات المعاصرة، الجمعية الجغرافية الكويتية، الكويت.

الوليبي، عبدالله (١٩٩٤م) بحار الرمال في المملكة العربية السعودية، الجمعية الجغرافية الكويتية، جامعة الكويت، الكويت.

المسند، عبدالله (٢٠١٢م) جغرافية العواصف والأعاصير المدارية، إصدارات في الثقافة الجغرافية (٥)، الجمعية الجغرافية السعودية، جامعة الملك سعود، الرياض.

المسند، عبدالله (٢٠١٣م) الربع الخالي مشاهد وخواطر <http://www.almisnid.com/almisnid/article161.html>
<http://www.alriyadh.com/856578>

وزارة التعليم العالي (١٩٩٩م) أطلس المملكة العربية السعودية، الرياض.

وزارة الدفاع، الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المملكة العربية السعودية، البيانات المناخية لمحطات الرصد الجوي في المملكة العربية السعودية للفترة ١٩٨٥-٢٠١٠م.

بالربع الخالي تابعة للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة. كما تم الاستعانة ببيانات على نقاط شبكية من المركز الوطني الأمريكي للتوقعات البيئية (NCEP / NCAR reanalysis)، وكذلك ببيانات للتغيرات في متوسط درجة الحرارة السطحية من وحدة أبحاث المناخ CRU بجامعة إيست أنجليا ببريطانيا. وخلص البحث إلى أن الربع الخالي أكبر مسطح رملي متصل في العالم وأنه أشد المناطق ارتفاعاً لدرجة الحرارة في شبه الجزيرة العربية بمعدل سنوي بلغ ٢٧-٣٢م خاصة في فصلي الشتاء والربيع. وأظهرت النتائج أن أمطار الربع الخالي قليلة جداً مما أدى الى حدوث الجفاف الشديد في تلك المنطقة. كما أظهرت النتائج أن الربع الخالي يتأثر أحياناً بمنخفضات البحر المتوسط الحركية القوية خلال فصل الشتاء عندما يكون مسارها جنوبي شرقي، ومنخفضات البحر الأحمر الحرارية، كما يعتبر مركزاً للمنخفض الجوي في فصل الصيف ويمكن أن يُطلق عليه منخفض الربع الخالي. وأنه نادراً ما يتأثر بالأعاصير والعواصف المدارية القادمة من بحر العرب، كما حدث في سبتمبر ١٩٩٢م عندما توغلت عاصفة مدارية حتى بلغت شمال الربيع الخالي. وبالنسبة للتغير المناخى فقد أظهرت النتائج أن متوسط درجة الحرارة السطحية قد ارتفعت في منطقة الدراسة خلال الفترة الممتدة بين عامي ١٩٨١-٢٠١٠م مقارنةً بالفترة الممتدة بين عامي ١٩٥٠-١٩٨٠م بمقدار يقع بين ٠,١ - ٠,٨ درجة مئوية، وهي زيادة كبيرة إذا ما

فصل الخريف تشير إلى أن نسبة الزيادة في المتوسط قد بلغت نحو ٠,١ - ٠,٦ درجة مئوية خلال الثلاثين سنة الأخيرة والمنتية بعام ٢٠١٠م، ومن ثم فتعتبر التغيرات المناخية لدرجة الحرارة في فصل الربيع هي الأكبر وهي زيادة كبيرة اذا ما قورنت بزيادة درجة الحرارة على سطح الكرة ٠,٦ درجة مئوية خلال مئة العام السابقة.

شكل (٢٢). متوسط درجة الحرارة (a) للفترة من ١٩٥١-١٩٨٠م و(b) للفترة من ١٩٨١-٢٠١٠م و(c) الشذوذ بين الفترتين في فصل الخريف.

المصدر: www.cru.uea.ac.uk/cru/data/hrg

الملخص والاستنتاجات

يهدف هذا البحث إلى دراسة مناخ الربع الخالي جنوب شرق المملكة العربية السعودية. وقد تم الاعتماد على بيانات محطة الشبية التابعة لشركة أرامكو السعودية، إضافة إلى ثلاث محطات محيطية

وبالنسبة لفصل الصيف (يونيو، يوليو وأغسطس) فيوضح الشكل رقم (٢١ a,b,c) أن التغيرات الحرارية لمتوسط درجة الحرارة السطحية بين الفترتين خلال فصل الصيف تشير إلى أن نسبة الزيادة في المتوسط قد بلغت نحو ٠,١ - ٠,٥ درجة مئوية خلال الثلاثين سنة الأخيرة والمنتية بعام ٢٠١٠م، وهي تغيرات أقل من مثيلتها في فصل الربيع وقريبة من التغيرات في فصل الشتاء.

شكل (٢١). متوسط درجة الحرارة (a) للفترة من ١٩٥١-١٩٨٠م و(b) للفترة من ١٩٨١-٢٠١٠م و(c) الشذوذ بين الفترتين في فصل الصيف.

المصدر: www.cru.uea.ac.uk/cru/data/hrg

يبين الشكل رقم (٢٢ a,b,c) التغيرات في متوسط درجة الحرارة فصل الخريف (سبتمبر، أكتوبر ونوفمبر)، يتبين من الشكل أن التغيرات الحرارية لمتوسط درجة الحرارة السطحية بين الفترتين خلال

الربيع أن قيمة الزيادة في متوسط درجة الحرارة في الربع الخالي قد بلغ نحو ٠,٤ - ٠,٨ درجة مئوية خلال الثلاثين سنة الأخيرة والمنتية بعام ٢٠١٠م، وهي تغيرات تفوق مثيلتها في فصل الشتاء.

شكل (١٨). مسار العاصفة المدارية التي توغلت إلى اليابس السعودي في ٢٩ سبتمبر ١٩٩٢م.

المصدر: Joint Typhoon Warning Center. "Joint Typhoon Warning Center Mission Statement". Retrieved July 17, 2013.

سابعاً: التغيرات المناخية في متوسط درجة الحرارة

توضح مخرجات CRU (شكل ١٩) أن متوسط درجة الحرارة السطحية خلال فصل الشتاء (ديسمبر، يناير وفبراير) في منطقة الدراسة قد تغيرت، وارتفعت قليلاً بين الفترة الأولى والواقعة بين سنتي ١٩٥١ - ١٩٨٠م (شكل ١٩a)، والفترة الثانية الواقعة بين سنتي ١٩٨١ - ٢٠١٠م (شكل ١٩b)، بينما يوضح الشكل ١٩c) الشذوذ الحراري لمتوسط درجة الحرارة بين الفترتين خلال فصل الشتاء، وهو ما يكشف بجلاء بأن قيمة التغيرات في متوسط درجة الحرارة السطحية في الربع الخالي قد ارتفع بنحو ٠,٢ - ٠,٥ درجة مئوية خلال الثلاثين سنة الأخيرة والمنتية بعام ٢٠١٠م. وما يقال في نتائج فصل الشتاء ينسحب بشكل عام على فصل الربيع (شكل ٢٠a,b,c) إذ يوضح إن الشذوذ الحراري لمتوسط درجة الحرارة السطحية بين الفترتين خلال فصل

شكل (١٩). متوسط درجة الحرارة (a) للفترة من ١٩٥١ - ١٩٨٠م و (b) للفترة من ١٩٨١ - ٢٠١٠م و (c) الشذوذ بين الفترتين في فصل الشتاء.

المصدر: www.cru.uea.ac.uk/cru/data/hrg

شكل (٢٠): متوسط درجة الحرارة (a) للفترة من ١٩٥١ - ١٩٨٠م و (b) للفترة من ١٩٨١ - ٢٠١٠م و (c) الشذوذ بين الفترتين في فصل الربيع.

المصدر: www.cru.uea.ac.uk/cru/data/hrg

سادساً: الربع الخالي والأعاصير المدارية

للعواصف والأعاصير المدارية فوق حوض المحيط الهندي الشمالي، وبحر العرب موسمان، الأول يبدأ من شهر أبريل حتى يونيو، والموسم الثاني من شهر سبتمبر حتى ديسمبر، وعلى وجه العموم في نصف الكرة الشمالي معظم الأعاصير تنشأ بين يونيو ونوفمبر، وأكثر ما تكون في سبتمبر (المسند، ٢٠١٠م). وأحياناً تتحرك تلك العواصف، والأعاصير المدارية باتجاه جنوب شبه الجزيرة العربية، فتضرب سلطنة عمان أو اليمن، وفي حالات قليلة تتوغل لتؤثر على أجزاء من الربع الخالي، وقد تهطل الأمطار المتفرقة جراء تأثر الربع الخالي بنشاط العاصفة أو الإعصار المداري بعد أن يضعف بسبب دخوله إلى البر، وعلى سبيل المثال وفي ٢٩ سبتمبر ١٩٩٢م توغل إعصار مداري بشكل نادر حتى أثر على أجواء الربع الخالي، وتمكن من الصمود في هيئته الدائرية حتى وصل شمال الربع الخالي (شكل ١٧ و ١٨).

شكل (١٧). عاصفة مدارية تتوغل إلى اليابس السعودي في ٢٩ سبتمبر ١٩٩٢م.

كما يبين الشكل أن الأحساء شمال الربع الخالي الأكثر والأوفر أمطاراً خلال السنة بمعدل سنوي ضعيف إذ بلغ ٨٣ ملم، تليها شرورة بحوالي ٧٣ ملم، ثم الشبية بحوالي ٤٥ ملم، وأخيراً وادي الدواسر بحوالي ٢٩ ملم فقط. يتضح أيضاً أن شهري مارس وأبريل الأغزر أمطاراً في كل المحطات، بينما يتفرد شهر ديسمبر أنه الأغزر بالنسبة لمحطة الأحساء. واتضح من السجلات المناخية أن عدد الأيام التي يهطل فيها أمطار في محطة الشبية بلغت ٨ أيام فقط في السنة. وأمطار الربع الخالي غالباً تنتمي إلى منخفضي البحر المتوسط، والبحر الأحمر بصفة عامة (شكل ١٦) بالإضافة إلى تأثير العواصف والأعاصير المدارية والتي - أحياناً - تتوغل وتصل أطراف الربع الخالي الجنوبية.

شكل (١٦). صورة فضائية توضح اندماج منخفضي البحر المتوسط مع البحر الأحمر، وآثارهما على الأطراف الشمالية والوسطى من الربع الخالي (٢ نوفمبر ٢٠٠٨م).

المصدر: The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)(20015).

رابعاً: الرطوبة النسبية

نظراً لبعد الربع الخالي عن المؤثرات البحرية نسبياً فإنه يحظى بأجواء جافة جداً في فصل الصيف على وجه التحديد لاسيما أن الرياح السائدة شمالية بوجه عام وقادمة من الصحراء السعودية مما يساعد ويؤدي الى زيادة الجفاف. وبارسة الشكل رقم (١٤) والذي يجمع محطة الشبية المناخية بالمحطات القريبة من الربع الخالي، نستنتج أن محطة الأحساء الأعلى رطوبة في كل الفصول الأربعة، نظراً لقربها لمسطح الخليج العربي، بينما تتداخل قيم المحطات الثلاث المتبقية فيما بينها، وتختلف من فصل لآخر، ويتضح أن محطة الشبية شرق الربع الخالي تحظى بقيمة رطوبة أعلى من شرورة، ووادي الدواسر في فصلي الصيف والخريف، هذا وتعد الشبية أقرب للبحر من وادي الدواسر وشرورة، وقد تكون الشبية في مجال هبوب الرياح الموسمية الصيفية الرطبة.

شكل (١٤). المتوسطات الشهرية للرطوبة النسبية للمحطات المختارة.

خامساً: الأمطار

تعتبر منطقة الربع الخالي أكثر المناطق جفافاً في شبه الجزيرة العربية، وذلك لبعدها عن مسار المنخفضات الجوية الحركية للبحر المتوسط والتي تؤثر على مناخ شمال ووسط السعودية خلال فصل الشتاء، كما أنها تقع إلى الشرق من مسار منخفض البحر الأحمر الحراري (منخفض السودان) والذي يؤثر بدوره على كمية الأمطار في السعودية خلال فصلي الشتاء والربيع، هذا وتتسم أمطار الربع الخالي بالذبذبة الشديدة من سنة لأخرى، بل ويذكر بعض سكان الربع الخالي من البدو أنه قد تمضي سنتان أو ثلاث دون أن تمطر. يوضح الشكل رقم (١٥) المتوسطات الشهرية للأمطار على المحطات المختارة ويتضح من الشكل أن معدل سقوط الأمطار ضعيف جداً مما يؤدي إلى حدوث جفاف وظهور ذلك جلياً في تحليل متوسطات الأمطار.

شكل (١٥). المتوسطات الشهرية للأمطار للمحطات المختارة.

يتضح من تحليل ودراسة المتوسطات الشهرية لدرجة الحرارة للمحطات المختارة أن محطة الشبية تُسجل أعلى متوسط في الفصول كلها، وتشاركها محطة شرورة فقط في فصل الشتاء؛ لبعدها عن الكتل الهوائية الشمالية الباردة، كما يكشف الرسم البياني أن محطة الأحساء هي الأقل في درجة الحرارة في فصلي الشتاء والربيع؛ لكونها شمالية الموقع، وهي أقرب المحطات المتأثرة بالكتل الهوائية الشمالية الباردة (شكل ١٣).

شكل (١٣). المتوسطات الشهرية لدرجة الحرارة (مئوي) في المحطات المختارة.

ولإعطاء مؤشراً عن مدى ارتفاع معدلات درجة الحرارة في الربع الخالي مقارنةً بأماكن أخرى من السعودية تكفي المقارنة بين المعدل السنوي لدرجة الحرارة في محطة الشبية ٣٠م، مع المعدل السنوي للرياض ٢٧م، والظهران ٢٧م، والقصيم ٢٥م، وحائل ٢٣م.

يُدعى بمنخفض الهند الموسمي، والذي يتوسع ويتمدد بشكل كبير في فصل الصيف.

شكل (١١). معدلات درجة الحرارة خلال فصل الصيف (مئوية) في منطقة الدراسة خلال الفترة من عام ١٩٧٠-٢٠١٤م.

بينما لا يوجد تغير كبير في سلوك درجة الحرارة وخصائصها في فصل الخريف عن فصل الصيف من ناحية توزيع الحرارة جغرافياً في منطقة الدراسة، كما يوضح الشكل رقم (١٢).

شكل (١٢). معدلات درجة الحرارة خلال فصل الخريف (مئوية) في منطقة الدراسة خلال الفترة من عام ١٩٧٠-٢٠١٤م.

٣٢م، بينما محطة الشبية ٣١م، ومحطة شرورة ٣٠م، مقارنة بمحطة الأحساء الواقعة شمال الربع الخالي حيث سجلت ٢٧م، ومحطة وادي الدواسر الواقعة غرب الربع الخالي حيث سجلت ٢٩م.

شكل (١٠). معدلات درجة الحرارة الموسمية خلال فصل الربيع في منطقة الدراسة خلال الفترة من عام ١٩٧٠-٢٠١٤م.

يوضح الشكل رقم (١١) متوسط درجة الحرارة لفصل الصيف (يونيو، يوليو وأغسطس) خلال الفترة ١٩٧٠-٢٠١٤م. يتبين من الشكل أن الربع الخالي يبقى الأشد حرًا في الجزيرة العربية مع المنطقة الشرقية، وجنوب وشرق الوسطى من السعودية، وكذلك دول الخليج وجنوب العراق؛ إذ يبلغ المتوسط الصيفي لدرجة الحرارة ٣٥-٣٧م، بينما محطة الشبية ٣٩م، ومحطة شرورة ٣٥م، مقارنةً بمحطة الأحساء الواقعة شمال الربع الخالي حيث سجلت ٣٧م، ومحطة وادي الدواسر الواقعة غرب الربع الخالي سجلت ٣٦م، حيث تصبح المنطقة تلك جزءً من حيز جغرافي جوي ضخم

الدراسة تبقى هي الأشد حرًا في الجزيرة العربية مع ساحل تهامة، إذ يبلغ المتوسط الشتوي لدرجة الحرارة ١٨-٢٢م، بينما محطة الشبية ٢١م، ومحطة شرورة ٢١م، مقارنة بمحطة الأحساء شمال الربع الخالي حيث سجلت ١٦م، ومحطة وادي الدواسر غرب الربع الخالي ١٩م.

شكل (٩). معدلات درجة الحرارة خلال فصل الشتاء (موسمية) في منطقة الدراسة خلال الفترة من عام ١٩٧٠-٢٠١٤م.

ويرجع ذلك للعوامل السالفة الذكر من جهة، من جهة أخرى بعد الربع الخالي عن تأثير الكتلة الهوائية الباردة والقادمة من سيبيريا، وأحيانًا من أوراسيا. يوضح الشكل رقم (١٠) متوسط درجة الحرارة الموسمية لفصل الربيع (مارس، أبريل ومايو) خلال الفترة ١٩٧٠-٢٠١٤م على منطقة الشرق الأوسط. يتبين من الشكل أن الربع الخالي يبقى أيضًا الأشد حرًا في الجزيرة العربية على الإطلاق، إذ يتراوح متوسط درجة الحرارة في فصل الربيع بين ٢٨-

الحرارة لعوامل جغرافية منها أن منطقة الربع الخالي تعتبر جيومورفولوجياً حوضاً منخفضاً جداً، بل أن الجزء الشمالي الشرقي منه (سبخة الحمر) أقل انخفاضاً من سطح البحر بنحو ٢٤م.

شكل (٨). معدلات درجة الحرارة (مئوية) في منطقة الدراسة خلال الفترة من عام ١٩٧٠-٢٠١٤م.

كما يساهم الموقع الفلكي للربع الخالي بارتفاع درجة الحرارة كونها منطقة مدارية تتعامد الشمس عليها آخر فصل الربيع، وأول فصل الصيف، وعليه تحظى بكميات هائلة من الإشعاع الشمسي. من جهة أخرى يعتبر النهار طويلاً في معظم الفصول (المعدل السنوي ١٢,٥ ساعة وفقاً لمحطة الشيبية)، كما تخلو سماء الربع الخالي من السحب التي تحجب أشعة الشمس، وقد تمضي بضعة أشهر دون تشكل سحب في سمائه. يبين الشكل رقم (٩) متوسط درجة الحرارة المئوية لفصل الشتاء (ديسمبر، يناير وفبراير) خلال الفترة ١٩٧٠-٢٠١٤م على منطقة الشرق الأوسط. يتضح من الشكل أن منطقة

يكون اتجاه الرياح السائدة متقلب كما فصل الربيع حيث يمثلان مرحلة انتقالية بين الصيف والشتاء.

شكل (٧). معدلات اتجاه الرياح السطحية في منطقة الدراسة خلال الفترة من عام ١٩٧٠-٢٠١٤م للفصول الأربعة.

المصدر: المركز الوطني الأمريكي للتوقعات البيئية (NCEP).

ثالثاً: درجة الحرارة

يوضح الشكل رقم (٨) متوسط درجة الحرارة المئوية السنوي خلال الفترة ١٩٧٠-٢٠١٤م في منطقة الشرق الأوسط، ويتبين من الشكل أن منطقة الدراسة من أشد المناطق حرّاً في الجزيرة العربية على الإطلاق، بل في منطقة الشرق الأوسط، إذ يبلغ المعدل السنوي ٢٧-٣٢م، بينما سجلت محطة الشيبية ٣٠م، ومحطة شرورة ٢٨م، مقارنة بمحطة الأحساء شمال الربع الخالي ٢٧م، ومحطة وادي الدواسر غرب الربع الخالي ٢٨م. ويرجع الارتفاع الشديد في درجة

وشدة الرياح يوضح الشكل رقم (٧) أن اتجاه الرياح السائدة على الربع الخالي في فصل الصيف شمالي إلى شمالي شرقي بصفة عامة وأن متوسط سرعة الرياح السنوي يبلغ ١٤ كم في الساعة وفقاً لمحطة الشبية.

شكل (٦): معدلات الضغط الجوي لفصل الصيف (مليبار) في منطقة الدراسة للفترة من عام ١٩٧٠-٢٠١٤م.

المصدر: المركز الوطني الأمريكي للتوقعات البيئية (NCEP).

ثانياً: اتجاه الرياح

يوضح الشكل رقم (٧) متوسط اتجاه الرياح السطحية الفصلي خلال الفترة ١٩٧٠-٢٠١٤م في منطقة الشرق الأوسط، ويتبين من الشكل أن اتجاه هبوب الرياح السائدة بمنطقة الدراسة المستهدفة (الربع الخالي) خلال فصل الشتاء شمالي شرقي إلى شرقي، في حين تكون متقلبة في فصل الربيع، بينما في فصل الصيف تكون شمالية بوجه عام، وفي فصل الخريف

الخالي يتأثر بالكتلة السيبيرية الباردة في فصل الشتاء بشكل نسبي، خاصة أجزائه الشمالية، وبصفة عامة تهب الرياح الشمالية الباردة والجافة خلال هذا الفصل والتي تسبب انخفاض درجات الحرارة، وارتفاع قيم الضغط الجوي في المنطقة، لذا فإن أفضل وقت لزيارة الربع الخالي تكون خلال هذا الفصل من السنة حيث تعتدل درجة الحرارة نسبياً. يوضح الشكل رقم (٥) بعد منطقة الدراسة عن تأثير المنخفض الحراري (منخفض السودان) والذي يؤثر على حوض البحر الأحمر وما حوله. ويمكن تقدير ومعرفة متوسط الضغط الجوي لمنطقة الربع الخالي من معرفة قيمه لأقرب محطات أرصاد له وهي شرورة والإحساء ووادي الدواسر فمثلاً متوسط قيم الضغط الجوي خلال فصل الشتاء لمحطة شرورة هو ١٠١٤ هيكتوباسكال، بينما في الأحساء ١٠١٨ هيكتوباسكال، ووادي الدواسر ١٠١٥ هيكتوباسكال.

يوضح الشكل رقم (٦) التوزيع الأفقي للضغط الجوي خلال فصل الصيف (يونيو، يوليو وأغسطس) للفترة من ١٩٧٠-٢٠١٤م. يبين الشكل أن منطقة الدراسة تقع ضمن مركز للضغط الجوي المنخفض ٩٩٩ هيكتوباسكال، وهو بالمناسبة أعمق من منخفض الهند الموسمي، ويمكن أن يُطلق عليه منخفض الربع الخالي، حيث يمثل المركز الأساسي والقلب النابض، وهذا يعكس جلياً تموضع كتلة هوائية حارة جداً رقيقة (حتى ارتفاع ٨٥٠ هيكتوباسكال) فوق منطقة الدراسة. وبالنسبة لاتجاه

على خلو هذه المساحة الجغرافية كلها من الاستيطان البشري القديم والحديث. وخصائص المناخ الحالي في الربع الخالي وما جاوره من المناطق الجغرافية في الجزيرة العربية، ليست سوى امتداداً لفترة الجفاف التي أعقبت الفترة المطيرة للهولوسين الأدنى، بل قد تكون أشد فترات الجفاف التي عرفها الزمن الجيولوجي الرابع (الأيوبي وآخرون، ٢٠١٢م).

أولاً: توزيع الضغط الجوي

يوضح الشكل رقم (٥) التوزيع الأفقى للضغط الجوي على منطقة الدراسة لفصل الشتاء (ديسمبر، يناير وفبراير) للفترة (١٩٧٠-٢٠١٤م).

شكل (٥): معدلات الضغط الجوي (مليبار) لفصل الشتاء في منطقة الدراسة للفترة من عام ١٩٧٠-٢٠١٤م.
المصدر: البيانات الرقمية على نقاط شبكية من المركز الوطني الأمريكي للتوقعات البيئية (NCEP).

يتضح من الشكل أن منطقة الدراسة (الربع الخالي) تقع في الحافة الجنوبية لمركز الضغط الجوي المرتفع الكائن شرق تركيا، بقيم تتراوح بين ١٠١٦-١٠١٧ مل هيكتوباسكال. وعليه فإن الربع

يُصنف مناخ الربع الخالي في كل المقاييس المناخية، والمعايير الجغرافية بأنه حار جداً، وأمطاره قليلة شحيحة، وشديد الجفاف، وقد يبلغ المتوسط السنوي للأمطار أقل من ٥٠ ملم، (Almazroui, et al., 2012a) و (Al-Sayari, et al., 1978)، وقد تسقط الأمطار القليلة في موسم الأمطار المعتاد في السعودية من شهر أكتوبر حتى شهر مايو، وربما يسقط على الربع الخالي أمطار في فصل الصيف (Almazroui, et al., 2012b) وذلك عندما تندفع التيارات الهوائية المحملة ببخار الماء من بحر العرب والمتمثلة بالرياح الموسمية، فتتأثر بها اليمن، وعمان، ومنها الربع الخالي بأمطار رعدية عادة تكون كثيفة، وسريعة تحدث خلال بضع ساعات فقط. وقد ينقضي عام أو يزيد لا ينزل المطر في بعض نواحي الربع الخالي كما ذكر هذا بدو الربع الخالي^(٣) (الراشد وآخرون، ٢٠١١م). وينتمي الربع الخالي إلى المناخ المداري شديد الجفاف، وتأثره بالمسطحات المائية المجاورة محدود نظراً لبعدها، وضيق مساحتها كالخليج العربي أو بحر عمان. وقد انعكس الموقع الجغرافي للربع الخالي البعيد عن المؤثرات الجوية المحفزة لتكون السحب وهطول الأمطار على حدوث جفاف شديد رسم لنا أكبر صحراء جافة ومتصلة في العالم. كما انعكس أيضاً

(٣) تم مقابلة بعض بدو الربع الخالي خلال زيارتي الميدانية الاستطلاعية إلى الربع الخالي خلال عامي ٢٠١٣م و٢٠١٥م.

صفحة ١٠٩، وذلك بسبب عدم توفر البيانات المناخية، وقلة الكتب التي تصف مناخ الربع الخالي الحالي. وعليه استهدف هذا البحث دراسة مجملته عن ملامح مناخ الربع الخالي، ولعل من أكبر العقبات التي واجهت البحث خلو منطقة الدراسة من محطات مناخية أرضية يُعتمد عليها في التحليل والدراسة. وحيث إن الربع الخالي يخلو من المدن، والمحافظات، والسكان لذا لا توجد محطات مناخية يعتمد عليها الباحثون، والدارسون في الشأن المناخي من أجل وصف وتحليل مناخ الربع الخالي. ولدى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية محطتان قديمتان ومطمورتان تحت الرمال الأولى هي محطة عبيلة وتقع شمال الربع الخالي، والثانية محطة شواله وتقع شرق الربع الخالي (شكل ٤).

شكل (٤): محطات الرصد المختارة في هذه الدراسة.

ولا توجد سجلات مناخية لتلك المحطتين، عدا بيانات متقطعة في الإنترنت تمثل بضعة أشهر لا يمكن الاعتماد عليها ولا الثقة فيها مما دفع الباحث إلى الاعتماد على محطة الشبية التابعة لشركة

أرامكو السعودية جنوب شرق منطقة الدراسة. وأتضح أن بداية البيانات لديهم فقط من عام ٢٠٠٠م، كما اتضح أن البيانات تعرض فقط المتوسطات اليومية، دون تسجيل للقيم الصغرى والكبرى، وعليه اعتمد الباحث في وصفه وشرحه وتحليله لمناخ الربع الخالي على بيانات محطة الشبية المتواضعة، مقارنة بالمحطات المناخية المتاخمة لمنطقة الربع الخالي، التابعة للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مثل محطة شرورة والتي تقع بالقرب من الحد الجنوبي الغربي من الربع الخالي، قرب الحدود السعودية اليمنية، ومحطة الأحساء والتي تبعد عن الحد الشمالي من منطقة الربع الخالي نحو ٢٨٠ كم، ومحطة وادي الدواسر والتي تبعد عن حد الربع الخالي الغربي نحو ٢٠٠ كم (شكل ٤). من جهة أخرى تم الاعتماد أيضاً على البيانات المعادة التحليل NCEP / NCAR reanalysis^(١) من المركز الوطني الأمريكي للتوقعات البيئية والبيانات الشبكية المقاسة من قبل وحدة أبحاث المناخ (CRU)^(٢) بجامعة إيست أنجليا ببريطانيا.

مناخ الربع الخالي

(1) National Centers for Environmental Prediction/National Weather Service/NOAA/U.S. Department of Commerce. 1994, updated monthly. *NCEP/NCAR Global Reanalysis Products, 1948-continuing*. Research Data Archive at the National Center for Atmospheric Research, Computational and Information Systems Laboratory. <http://rda.ucar.edu/datasets/ds090.0/>. Accessed 01 June 23, 2015.

(2) www.cru.uea.ac.uk/cru/data/hrg

منه (المسند، ٢٠١٣م) و(الراشد وآخرون، ٢٠١١م). ومن خلال دراسة الخرائط الطبوغرافية والاستعانة ببرنامج (Google Earth)، ومن خلال الزيارات الميدانية إلى الربع الخالي تبين القول أن ارتفاع سطح الربع الخالي متباين، ففي الشرق مع الحدود الإماراتية تتراوح الارتفاعات المتوسطة بنحو ١٠٠م فوق سطح البحر، مقابل ١٠٠٠م في الأطراف الغربية للربع الخالي شرق نجران (شكل ٣)، وهذه التباينات الطبوغرافية قد تؤثر على عنصر درجة الحرارة في الربع الخالي.

شكل (٣). ميل حوض الربع الخالي من الغرب إلى الشرق.

مصادر البيانات المناخية

تعد الدراسات الجغرافية المناخية عن الربع الخالي قليلة وشحيحة، وحسب علم الباحث لا يوجد بحث أو كتاب متخصص ومتفرد عن مناخ الربع الخالي؛ وأن أوسع وأشمل كتاب باللغة العربية كُتب عن الربع الخالي صدر من المساحة الجيولوجية السعودية ٢٠١١م ويقع في ٤١٢ صفحة، خلا من الحديث عن مناخ الربع الخالي عدا بضعة أسطر مجملة في

الأربع (السعودية، الإمارات، عمان واليمن) نحو ٥٩٠ ألف كلم²، أي تعادل مساحة فرنسا وتزيد قليلاً، ويحده من الشمال هضبتا نجد والصمان، ومن الغرب هضبتا نجران وعسير، ومن الجنوب هضاب اليمن وعمان، ومن الشرق مرتفعات عمان وسهل الإمارات. ويعتبر نصيب السعودية من مساحة الربع الخالي أكثر من ٨٠٪، ويبلغ أقصى طول له فقط في الأراضي السعودية نحو ١٢٨٥ كم، ومع جزء الإمارات نحو ١٣٢٠ كم، ويبلغ أقصى عرض له نحو ٦٠٠ كم (شكل ٢).

شكل (٢). الطرق المعبدة المحيطة بالربع الخالي، والمواد الترابية الرئيسية التي تعبر الربع الخالي، والآبار (القلمات) المائية، (هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، ٢٠١١م).

والربع الخالي في الأراضي السعودية يتوزع على ثلاث مناطق: منطقة الرياض الجزء الشمالي الغربي ويمثل أقل من ١٠٪، منطقة نجران الجزء الجنوبي الغربي ويمثل نحو ٢٥٪، المنطقة الشرقية ولها الجزء الأكبر من الربع الخالي إذ تشغل حوالى ٦٥٪

شكل (١). الصحاري الرملية الرئيسة في المملكة العربية السعودية (وزارة التعليم العالي، ١٩٩٩م).

وتشير المخرجات العلمية، والدلائل الميدانية لكثير من المصادر الجغرافية أن أصل أرض الربع الخالي قاع وحوض رسوبي منخفض، يقع ضمن الصفيحة الجيولوجية العربية، وتشكل إبان حقبة الحياة الحديثة (Cenozoic) (اللعبون، ١٩٨٨م)، وينحدر جهة الشرق والشمال الشرقي، وكانت تغطيه مياه الخليج العربي قبل ملايين السنين، ثم انحسرت المياه تدريجياً عن الربع الخالي وعن شرق الجزيرة العربية كما يرى ذلك مكلور (McClure, 1984) وغيره.

حدود ومساحة الرُّبْع الخَالِي

تقع منطقة الربع الخالي في الجزء الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة العربية (السعودية، اليمن، عمان، الإمارات)، وتغطي ربع المساحة الكلية للجزيرة العربية تقريباً، والربع الخالي حوض جغرافي منخفض واسع، ممتلئ بمليارات الأطنان من الثرب الرملية المنقولة والمشكّلة للكثبان. وتبلغ مساحته في الدول

الخلي (الوليبي، ١٩٩٤م)، ومن ثم يمكن القول أن التسمية لم تكن غريبة في الأصل بل قد تكون عربية (والله أعلم). وتُسمى بعض المصادر القديمة الربع الخالي بـ "الأحقاف" (الحميري، ١٩٨٠م)، وأظن أن مصطلح "الأحقاف" لا يُطلق على كل منطقة الربع الخالي، بل على جهته الجنوبية فقط، وهي الصحاري الواقعة بين السعودية، وعمان، واليمن، وهي موطن قوم عاد، وموقع مدينة إرم المدفونة تحت الرمال (والله أعلم). وأرض الأحقاف حالياً خليط بين الرمال المتصلة، والمنفصلة، والهضاب المنبسطة نسبياً، ومنهم من يُسمى الربع الخالي كله أو جزءاً منه: برملة يام، ورملة يبرين أو جبرين، والدھماء، ومفازة صيهده، ولكن الاسم السائد والمشتهر لدى مراكز الأبحاث العربية والأجنبية هو الربع الخالي (المسند، ٢٠١٣م). وقد تبين من خلال دراسة الصور الجوية عبر Google Earth وكذلك زيارة الباحث للربع الخالي عامي ٢٠١٣م و ٢٠١٥م أن الربع الخالي أكبر مسطح رملي متصل في العالم (الوليبي، ١٩٩٤م)، إذ يبلغ طوله نحو ١٣٢٠ كم، وعرضه نحو ٦٠٠ كم (شكل ١).

مناخ الربع الخالي جنوب شرق المملكة العربية السعودية

عبدالله المسند

قسم الجغرافيا، كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية، جامعة القصيم، المملكة العربية السعودية

المستخلص. يهدف البحث الى دراسة مناخ الربع الخالي جنوب شرق شبه الجزيرة العربية، وذلك بتحليل الخصائص المناخية، وخلق منطقة الدراسة من محطات مناخية أرضية يُعتمد عليها في التحليل؛ فقد تم الاعتماد على بيانات أربع محطات مناخية محيطة بالربع الخالي. كما تم الاستعانة ببيانات على نقاط شبكية من المركز الوطني الأمريكي للتوقعات البيئية (NCEP/NCAR)، وكذلك ببيانات من وحدة أبحاث المناخ بجامعة إيست أنجليا ببريطانيا. وخلص البحث إلى أن الربع الخالي أشد المناطق حرًا في شبه الجزيرة العربية بمعدل سنوي بلغ ٢٧-٣٢م، ويحتل المركز الأول في ارتفاع الحرارة في فصلي الشتاء والربيع، كما أن أمطاره نادرة تؤكد سمة الجفاف الشديد، إذ يبلغ معدل الأمطار السنوي في محطة الشبية ٤٥ ملم فقط. ويتأثر الربع الخالي جزئيًا بمنخفضات البحر الأبيض المتوسط الحركية القوية خلال فصل الشتاء، عندما يكون مسارها جنوبي شرقي، ومنخفضات البحر الأحمر الحرارية، كما يتأثر وبشكل نادر بالأعاصير والعواصف المدارية القادمة من بحر العرب، كما حدث في سبتمبر ١٩٩٢م. وقد توصل البحث الى أن متوسط درجة الحرارة السطحية قد ارتفعت في منطقة الدراسة خلال الفترة الممتدة بين عامي ١٩٨١-٢٠١٠م مقارنةً بالفترة الممتدة بين عامي ١٩٥٠-١٩٨٠م بمقدار يقع بين ٠,١ - ٠,٨ درجة مئوية، وهي زيادة كبيرة إذا ما قورنت بزيادة درجة الحرارة على سطح الكرة الأرضية خلال القرن السابق.

المقدمة

أو خلوه من الحياة النباتية، والحيوانية على حدٍ سواء. وأورد الأستاذ الدكتور عبدالله الوليعي في كتابه "بحار الرمال" نقلاً عن الأستاذ الدكتور عبدالله الغنيم (الغنيم، ١٩٨١م) أن مسمى الرُّبْع الخَالِي قد ورد في كتاب الفوائد في أصول علم البحر والقواعد، الذي كتبه البحار أحمد بن ماجد عام ٨٩٥هـ وسماه بالربع

سُمي الربع الخالي (The Empty Quarter - The Rub' al Khali) بهذا الاسم لأنه يشكل ربع الجزيرة العربية تقريباً، وسُمي بالخالي لخلوه من الاستيطان البشري الدائم، إلا من عدد لا يكاد يُذكر من البدو الرحل، هذا من جهة، من جهة أخرى فقره