المسح الميكروبي والكيميائي للمياه الجوفية والسطحية في المنطقة الزراعية المحيطة بالمدينة المنورة

نايف حمود المكيشة

قسم العلوم البيئية، كلية الأرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة، جامعة الملك عبدالعزيز، جدة، المملكة العربية السعودية

المستخلص: تنتشر الأمراض المرتبطة باستخدام المياه الملوثة التي تحتوي على نسبة من العناصر الكيميائية السامة إضافة إلى العدوى التي تنقلها العديد من الميكروبات الممرضة. وذلك نتيجة للاستخدامات البشرية المختلفة لمياه قد تكون اختلطت بمياه صرف صحي أو تعرضت لتلوث جراء الأنشطة الصناعية المختلفة القريبة من المصدر المائي. في هذا البحث تم جمع (١٢) عينة مختلفة من مواقع متفرقة محيطة ببعض المزارع في منطقة المدينة المنورة. وكانت العينات عبارة عن مياه آبار (جوفية) من آبار مختلفة إضافة إلى بعض المياه السطحية مجهولة المصدر من مساحات متباعدة. تم الكشف الميكروبي المبدئي لصلاحية استخدام هذه المياه بالتحري عن وجود بكتيريا القولون، والبكتيريا البرازية. تشير النتائج إلى وجود تلوث ببكتيريا القولون والبكتيريا البرازية في المياه السطحية مجهولة المصدر، كما بينت النتائج أيضاً وجود التلوث ذاته في عينات مياه الآبار. وأشارت النتائج إلى وجود تباين في معدل العدد الأكثر احتمالاً للبكتيريا في عينات الآبار مقارنة بعينات المياه السطحية. أما التلوث بالعناصر الكيميائية فقد تضمن قياس أيونات الكاديوم Cd^{+2} ، وأيونات الكروميوم Cr^{3+} ، وأيونات النحاس Cu^{2+} ، وأيونات الحديد Fe^{2+} ، وأيونات المنجنيز Mn^{2+} ، وأيونات النيكل Ni^{2+} ، وأيونات الرصاص Pb^{2+} ، أيونات الزنك Zn^{2+} ، وأيونات الزرنيخ As^{3-} . اتضح من نتائج الفحص الكيميائي أن جميع الأيونات السامة السابق ذكرها ذات تراكيز منخفضة مقارنة بتركييزات النشرة القياسية الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO)، إلا أن نسبة الملوحة في جميع العينات كانت عالية نسبياً إضافة إلى ارتفاع نسبة أيونات الحديد. وبالتالي تشير الدراسة وبناءً على العينات التي تم فحصها بأن المياه السطحية ومياه الآبار ملوثة ميكروبياً ببكتيريا القولون والبكتيريا البرازية في حين أن التشخيص الكيميائي للعينات يشير إلى انخفاض نسبة التلوث بالعناصر السامة إلا أنها ذات ملوحة مرتفعة وتحتوي على نسبة عالية من أيونات الحديد.

الكلمات الدالة: الميكروبات الممرضة، التلوث الميكروبي، المعادن الثقيلة، مياه الري.

المقدمة

وذلك لاعتبارات عدة من أبرزها أن تكون هذه الآبار قريبة من مصادر مختلفة للتلوث كالأنشطة البشرية المختلفة مما يؤدي إلى تسرب هذه الملوثات سواء من المخلفات الصناعية لمحطات تنقية المياه أو مخلفات التلوث الزراعي والأنشطة الحيوانية المختلفة، وما هو أخطر من ذلك هو تداخل مياه الصرف الصحي واختلاطها بالمياه الجوفية. إضافة إلى استخدام مياه الصرف الصحي والذي يحتوي على نسب عالية من بكتيريا القولون والبكتيريا البرازية في عمليات الري الزراعي المختلفة [WHO, 2008; Grabow, 1996]. وإعادة استخدام

تعد المياه الجوفية أحد أهم مصادر المياه في الطبيعة، وتكتسب مياه الآبار أهمية عالية حيث تعتبر من المخزون المائي الذي يستخدم في العديد من الأغراض سواء كانت زراعية أو صناعية محلية خصوصاً في حال ندرة المياه السطحية في المناطق الجافة. ومنذ زمن بعيد كانت مياه الآبار من مصادر المياه النقية والتي نادراً ما يحدث بها تلوث نظراً لتأثير النظام الترشيحي للتربة. غير أن الدراسات البيئية الحديثة التي جرت على مياه الآبار تشير إلى تعرض مياه الآبار للتلوث سواءً بيولوجياً أو كيميائياً

استعمال الأسمدة الكيميائية والمبيدات الزراعية المختلفة بممارسات خاطئة يساهم في وصول بعض الأيونات السامة مثل الرصاص الكاديوم وغيرها إلى التربة ومن ثم تنتقل إلى مياه الآبار [Mench et al., 1994]. وعلى الرغم من ذلك فإنه وفي الأونة الأخيرة انتشرت عمليات استخدام مياه الصرف الصحي في أنشطة الري الزراعية في مناطق الأراضي الجافة على وجه الخصوص، وتنتشر في حوالي أكثر من ٤٦ دولة من دول العالم حيث يتم استخدامها في ري ما يقدر بحوالي ٢٠ مليون هكتار من مساحة الأراضي الزراعية [Hamilton et al., 2007]. وتعتبر استخدامات مياه الصرف الصحي للري دون تنقية لها هي أحد الحلول التي تم اللجوء لها لاستخدامها لأغراض زراعية على الرغم من أن لها جوانب إيجابية وسلبية على حد سواء. فعلى سبيل المثال فإن الآثار الإيجابية للري بمياه الصرف الصحي هي إنتاج عالي من المحاصيل إضافة إلى تعزيز خصوبة التربة بسبب وجود العناصر الغذائية والمحفزات الميكروبيولوجية والتي تساهم في تنشيط الكائنات. ولكن وجود الملوثات في مياه الصرف الصحي مثل المعادن الثقيلة والمواد العضوية ومسببات الأمراض الأخرى من كائنات دقيقة وما إلى ذلك قد يدخل في تركيبة النباتات والتربة والمياه الجوفية وبالتالي سيصل في هذه الحالة إلى السلسلة الغذائية للإنسان بما يهدد الصحة العامة (Chávez, et al., 2012). إلى جانب ذلك فإن ارتفاع ملوحة مياه الصرف الصحي سيساهم وبشكل كبير في رداءة مستوى التربة المستخدمة في الزراعة بما يهدد أيضاً بمشكلة جفاف الأرض الزراعية وانخفاض مستوى الإنتاجية [Tripler, et al., 2011]. وفقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية فإن الري بمياه الصرف الصحي أو الصناعي له تأثير سلبي عالي الخطورة على الصحة خصوصاً في حالة استخدامها بطرق مباشرة دون المعالجة اللازمة لها مما يؤدي إلى التأثير السلبي على نوعية الحياة عموماً. وبسبب هذه الآثار والمخاطر السلبية يجب أن تعالج مياه الصرف الصحي في حالة استخدامها وفي نطاق ضيق جداً في لأغراض الري قبل استخدامها لضمان محدودية

مياه الصرف الصحي الناتجة من الأنشطة الصناعية والمنزلية بعد معالجتها من أحد أهم الاهتمامات الرئيسية للمجتمع العلمي والباحثين، خصوصاً بأن هذا النوع من المياه يحتوي بشكل عام على عدد كبير من الملوثات العضوية وغير العضوية والبيولوجية التي تساهم بشكل كبير في انتشار الأوبئة والأمراض، إضافة إلى أنها تساهم وبمفهوم واسع في نشوء آثار خطيرة على نظام المعيشة (Deng, et al., 2017). وقد تم التوصل إلى أن مياه الصرف الصحي تحتوي بيولوجياً على كميات كبيرة من السلالات البكتيرية الممرضة للإنسان والتي تنتقل مباشرة إلى الإنسان اما بتناول منتج غذائي ملوث بهذا النوع من المياه أو بشرب المياه مباشرة من الآبار الملوثة. ومن أبرز أنواع البكتيريا التي تم عزلها من مياه الصرف الصحي جنس *Vibro* [Farmer et. al., 2003 and Farmer et. al., 2005] وجنس *Salmonella* [Le Minor, 2003; Popoff and Le Minor, 2005]، وجنس *Shigella* [Kapperud, et al., 1995 and Strockbine, 2005] والسلالات الممرضة من بكتيريا القولون *Escherichia coli* مثل السلالات (ETEC) [Bettelheim, 2003 and WHO (a), 2010] والسلالة (EHEC) [Health Canada, 2006 and WHO (b), 2010]، والسلالة (EIEC) [FDA, 2010]. وتؤدي الإصابة بهذه الأنواع الميكروبية أو غيرها من المتواجدة في مياه الصرف الصحي إلى تدهور الصحة العامة وانتشار الأمراض مثل حالات التسمم المختلفة والدوسنتاريا والتيفويد إضافة إلى الإصابة بالديدان الطفيلية أو الالتهابات الفيروسية المختلفة [Cray and Moon, 1995 and Noor et al., 2013]. وتواجد هذه الملوثات الميكروبية أو بعض العناصر الكيميائية المختلفة كالمعادن الثقيلة في المياه المستخدمة لأغراض الزراعة أو مياه الآبار مؤشر يدل على وصول مخلفات الصرف الصحي أو الصناعي لها وفي كلا الحالات لابد من معالجة هذه المياه بالطرق العلمية المناسبة والتأكد من صلاحيتها قبل استخدامها لتفادي التداعيات الخطيرة التابعة لها [Alexander, 2002]. كما أن

اختيرت سبعة آبار في منطقة زراعية بالمدينة المنورة إضافة إلى خمسة مواقع للمياه السطحية مجهولة المصدر من مساحات ومواقع مختلفة ذات مسافة قريبة من موقع الآبار كما هو موضح في الجدول رقم (١) لدراسة التلوث الميكروبي والكيميائي في هذه العينات. وضعت العينات في زجاجات معقمة ومحكمة الغلق لمنع التلوث الخارجي للعينات. تم بعد ذلك نقل العينات إلى المعمل بعد وضعها في صندوق مغلق يحتوي على الثلج للمحافظة على العينات والحد من أي نشاط ميكروبي أثناء نقلها.

تأثيراتها الضارة ولتفادي مخاطرها المختلفة [WHO, 2006].

تم في المملكة العربية السعودية تشييد العديد من محطات معالجة مياه الصرف الصحي (WWTP) Wastewater Treatment Plant والتي تعمل على تنقية مياه الصرف الصناعية والمنزلية؛ وبعد ذلك يتم استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة عمومًا في الري الزراعي والتشجير وبعض الاستخدامات الصناعية الأخرى (Chowdhury, et al., 2015).

المواد وطرق العمل

جمع العينات:

جدول (١). بيانات جمع العينة من منطقة زراعية بالمدينة المنورة، ونوع العينة، وتاريخ جمع العينة إضافة إلى درجة الحرارة المحيطة أثناء أخذ العينة والمواقع المختلفة التي تم جمع العينة منها.

رقم العينة	نوع العينة	تاريخ أخذ العينة	موقع العينة	وقت جمع العينة	درجة الحرارة
١	مياه آبار	31 Dec 2016	24°34'23" N 39°34'47" E	≈01:04 pm	±18°C
٢	مياه آبار	31 Dec 2016	24°34'23" N 39°34'47" E	≈01:04 pm	±18°C
٣	مياه آبار	31 Dec 2016	24°34'23" N 39°34'47" E	≈01:04 pm	±18°C
٤	مياه سطحية مجهولة المصدر	31 Dec 2016	24°34'23" N 39°34'47" E	≈01:04 pm	±18°C
٥	مياه سطحية مجهولة المصدر	31 Dec 2016	24°34'23" N 39°34'47" E	≈01:04 pm	±18°C
٦	مياه سطحية مجهولة المصدر	31 Dec 2016	24°34'23" N 39°34'47" E	≈01:04 pm	±18°C
٧	مياه آبار	31 Dec 2016	24°33'50" N 39°34'31"E	≈01:26 pm	±18°C
٨	مياه آبار	31 Dec 2016	24°33'50" N 39°34'31"E	≈01:26 pm	±18°C
٩	مياه سطحية مجهولة المصدر	31 Dec 2016	24°33'50" N 39°34'31"E	≈01:26 pm	±18°C
١٠	مياه سطحية مجهولة المصدر	31 Dec 2016	24°33'50" N 39°34'31"E	≈01:26 pm	±18°C
١١	مياه آبار	31 Dec 2016	24°35'21" N 39°34'13"E	≈01:49 pm	±18°C
١٢	مياه آبار	31 Dec 2016	24°35'21" N 39°34'13"E	≈01:49 pm	±18°C

صبغة جرام، كما تم فحص الخلايا باستخدام المجهر الضوئي والتعرف على أشكالها إضافة إلى توصيفها الظاهري.

٢- الكشف عن بكتيريا القولون الكلية والبرازية

:Total and fecal coliform

الاختبارات البكتريولوجية:

١- الاختبارات المورفولوجية:

أجريت بعض الاختبارات المورفولوجية في وذلك لتحديد صفات السلالات التي تم عزلها من العينات الموجبة لبكتيريا القولون البرازية باستخدام

ومصدر الإشعاع، لتحليل المعادن تبعاً لملدبيكوف وأخرين (Meldebekova et al. (2008).

النتائج والمناقشة

التلوث الميكروبي للمياه الجوفية (مياه الآبار) والمياه السطحية

تشير النتائج المتحصل عليها إلى وجود تلوث ميكروبي وذلك لاحتواء العينات المتحصل عليها على بكتيريا القولون Coliform وبكتيريا القولون البرازية Fecal coliform، وهناك عدة أسباب من المعتقد أن تكون هي المسبب الرئيس لهذا النوع من التلوث. من أهمها أن مواقع الآبار المختلفة حول منطقة زراعية قد تكثر فيها المخلفات الحيوانية نتيجة لأنشطة الرعي، إضافة إلى استخدام بعض الأسمدة المضافة إلى التربة والتي عن طريقها تنتقل ميكروبات هذه المخلفات إلى المياه الجوفية ومن ثم ارتفاع اعداد هذه البكتيريا في مياه الآبار كما هو الحال في النتائج المتحصل عليها في دراسة [Entry and Farmer, 2000]. حيث ذكرت هذه الدراسة أن زيادة معدل تلوث المياه الجوفية ببكتيريا القولون والبكتيريا البرازية يكون غالباً نتيجة لتعرضها لمخلفات الحيوانات البرازية أو اختلاطها بمياه صرف صحي وذلك لأن مجموعة بكتيريا القولون Coliform group ويندرج من ضمنها بكتيريا القولون البرازية Fecal coliform تتواجد على شكل فلورا طبيعية في أمعاء الإنسان والحيوانات وظهورها في النتائج العملية لفحص عينات المياه مؤشر واضح على وصول المخلفات البرازية بأي شكل من الأشكال للمياه وتلويثها. كما أظهرت النتائج المتحصل عليها في هذه الدراسة بعد تحليل عينات المياه السطحية مجهولة المصدر والقريبة من الآبار والمنطقة الزراعية كما هو موضح في الشكل رقم ١ (أ)، والشكل رقم ١ (ب)، احتوائها على معدل أعلى من مجموعة بكتيريا القولون والبكتيريا البرازية عن ذلك المعدل المتحصل عليه في مياه الآبار. وذلك قد يعود إلى أن هذه المياه السطحية هي عرضة للتلوث البرازي المباشر سواء بفعل المخلفات البرازية الحيوانية أو قد يكون على الأرجح قد اختلطت بمياه صرف صحي بطريقة مباشرة مما أدى إلى ارتفاع

تضمنت التحاليل البكتريولوجية لتحديد مدى جودة عينات المياه الكشف عن بكتيريا القولون الكلية Total coliform والبرازية Fecal coliform عن طريق سلسلة من الاختبارات على جميع العينات سواءً على المياه الجوفية (مياه الآبار) أو المياه السطحية (مجهولة المصدر) وقد اشتملت هذه الاختبارات على ذلك على الفحص الافتراضي Presumptive test، والفحص التأكيدي Confirmatory test والفحص التكميلي Complementary test، كما تم عد بكتيريا القولون وذلك باستخدام طريقة حساب العدد الأكثر احتمالاً Most Probable Number [A.P.H.A., 2005].

٣- الاختبارات الكيميائية

تم تقدير الاحتياج الكيميائي للأكسجين (COD) Chemical Oxygen Demand حيث تم قياس الكربون العضوي باستخدام الأكسدة الكيميائية باستخدام حمض الكبريت المحتوي على دايكرومات البوتاسيوم، وتقدير كمية دايكرومات البوتاسيوم المستخدمة تم تحديد الكربون المؤكسد. إجراء هذا الاختبار كان لمعرفة متوسط المحتوى الأكسجيني للماء حيث إنه يعتبر مؤشر للمكون العضوي القابل للتحلل بالأكسدة الكيميائية في عينات الماء، كما أنه يدل على كميات هذه المكونات العضوية. وبالتالي فإنه كلما كان تركيز محتوى الأكسجين الكيميائي مرتفع في العينة فإن ذلك يعني أن العينة تحتوي على مركبات عضوية غير قابلة للتحلل البيولوجي أو مواد حرارية تشير إلى أن العينة اختلطت بمياه صرف صناعي.

تقدير تراكيز العناصر السامة

تم الكشف عن التلوث بالعناصر الكيميائية وذلك بتقدير نسبة الأيونات السامة (mg/L) التالية: أيونات الكاديوم Cd^{2+} ، أيونات الكروميوم Cr^{+3} ، أيونات النحاس u^{2+} ، أيونات الحديد Fe^{+2} ، أيونات المنجنيز Mn^{+2} ، أيونات النيكل Ni^{+2} ، أيونات الرصاص Pb^{+2} ، أيونات الزنك Zn^{+2} ، أيونات الزرنيخ As^{-3} باستخدام مطياف الامتصاص الذري [Atomic absorption spectrophotometer (A. Analyst 700, Perkin Elmer, USA) المجهز بالمواد القياسية، وهواء لهب الأستيلين ومصابيح الكاثود الجوفاء،

التربة بالتالي تسربها إلى مياه الآبار الجوفية. أو انتقالها بطريقه مباشرة وخلطها بمياه الآبار عن طريق المزارعين للاستفادة منها في عمليات الري.

أعداد البكتيريا الملوثة عن مياه الآبار. وبالتالي ونظرًا لقرب هذا النوع من المياه السطحية بمنطقة الآبار فإنه لا يستبعد أن تكون هذه المياه هي مصدر تلوث الآبار المحيطة نتيجة لانتقالها إما عن طريق

شكل (١). منطقة جمع العينات في منطقة زراعية في المدينة المنورة حيث (أ) تمثل صورة لأحد الآبار التي تم جمع العينات منها. أما (ب) تمثل صورة لمياه سطحية في مجرى قريب من منطقة الآبار والمنطقة الزراعية.

يعتقد أنه مصدر المياه السطحية الجارية مجهولة المصدر إضافة إلى عوامل أخرى كاختلاف قيم الرقم الهيدروجيني أو اختلاف درجات الحرارة لمياه الآبار المختلفة حيث إن اختلاف درجات حرارة المياه تؤثر على صلاحية المياه وتساهم في تثبيط أو تحفيز النمو البكتيري بها بما يتوافق مع الدراسة [Borelia, et al., 2004]. وتوصي التقارير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية (WHO) ووكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) [WHO, 2000] على أن تقدير بكتيريا القولون في عينات المياه مؤشراً مناسباً للتعرف على مدى صلاحية المياه لاستخدامها للأغراض البشرية المتنوعة، وذلك لسهولة الكشف عنها وتقدير معدلاتها إذ أنها تظهر بالفحص المجهرى كخلايا عصوية غير متجترمة سالبة لصبغة جرام تنمو وتخمّر اللاكتوز وتحوله إلى حامض اللاكتيك وغاز مما يشير إلى وجودها في العينة.

الفحص التأكيدي Confirmed test لخلايا بكتيريا القولون البرازية *Escherichia coli*:

بعد أخذ مسحات مختلفة من الأنابيب ذات النتائج الإيجابية في اختبار الكشف عن بكتيريا القولون الافتراضي وتنميتها على البيئة الانتخابية Eosin methylene blue (EMB) للكشف عن بكتيريا *Escherichia coli* أظهرت النتائج مستعمرات بكتيرية ذات لون أخضر فلزي لامع كما هو موضح

العدد الأكثر احتمالاً لبكتيريا القولون الكلية بمياه الآبار أظهرت النتائج تباين واضح في معدل العدد الأكثر احتمالاً لبكتيريا القولون الكلية (MPN) بمياه الآبار للعدد الكلي لبكتيريا القولون كما هو موضح في الجدول رقم (٢) ويوضح الجدول نتائج عينات المياه السطحية مجهولة المصدر رقم (٤، ٥، ٦)، وعينات لنفس المصدر من موقع مختلف برقم (٩، ١٠) والتي تظهر ارتفاع نسبة التلوث بخلايا بكتيريا القولون مقارنة بعينات الآبار المختلفة حيث أن معدل اعداد البكتيريا في عينة مياه الآبار القريبة من مصدر المياه السطحية كانت على النحو التالي: البئر رقم (١) والبئر رقم (٢) والبئر رقم (٣) هي الأكثر عددًا وبالتالي تحتوي على نسبة تلوث أعلى حيث بلغ عدد الخلايا البكتيرية (١٧ خلية/١٠٠مل)، (١٧ خلية/١٠٠مل) و(١٤ خلية/١٠٠مل) على التوالي. في حين كان عدد الخلايا في عينات الآبار الأبعد من مصدر المياه السطحية أقل نسبياً (١١ خلية/١٠٠مل) لعينة البئر رقم (٧) و (٧ خلية/١٠٠مل) لعينة البئر رقم (٨). بينما انعدم وجود التلوث الميكروبي لبكتيريا القولون في الآبار البعيدة من مصدر المياه السطحية حيث كان عدد الخلايا (أقل من ٢ خلية/١٠٠مل) لعينة البئر رقم (١١) ونفس العدد لعينة البئر رقم (١٢). وبالتالي يمكن استنتاج أن سبب التباين في نسبة أعداد الخلايا البكتيرية قد يعود إلى مدى القرب أو البعد عن مصدر التلوث والذي

رقم العينة	العدد الأكثر احتمالاً لبكتيريا القولون الكلية/١٠٠ مل
١	١٧
٢	١٧
٣	١٤
٤	١٧
٥	١٧
٦	$1800 <$
٧	١١
٨	٧
٩	$1800 <$
١٠	$1800 <$
١١	$2 >$
١٢	$2 >$

في الشكل رقم (٢) كمؤشر واضح على تلوث العينات الإيجابية ببكتيريا القولون نتيجة لتعرضها لتلوث برازي، حيث تم بعد ذلك أخذ مسحات من مستعمرات عشوائية بواسطة ابرة الحقن وبعد صبغ الخلايا بصبغة جرام اتضح إنها عبارة عن خلايا عصوية قصيرة غير متجترمة سالبة لصبغة جرام تتشابه في مواصفاتها بخلايا بكتيريا القولون البرازية. وبالتالي فإن وجود هذا النوع من البكتيريا يدل على تلوث هذه المياه سواءً كانت الجوفية والمتمثلة في مياه الآبار أو السطحية غير معروفة المصدر وبالتالي يشير ذلك إلى عدم صلاحية هذه المياه للاستخدامات الأدمية المتنوعة بطريقة مباشرة كالشرب مثلاً أو بطريقة غير مباشرة كاستخدامها في عمليات الري. وتتفق هذه النتائج مع الدراسة [Leclerc, et al., 2001] حيث إن استخدام المياه الملوثة ببكتيريا القولون البرازية يؤدي إلى انتشار الأمراض المختلفة خصوصاً الإسهال الدموي الذي تسببه بكتيريا القولون البرازية. فضلاً عن ذلك فإنه وبمجرد وجود دلالات ومؤشرات بتلوث المياه ببكتيريا القولون البرازية فإنه لا يستبعد بأي حال من الأحوال وجود أنواع أخرى خطيرة من الكائنات الدقيقة والفيروسات الممرضة [Barrel, et al., 2002].

الجدول (٢). نتائج عد بكتيريا القولون الكلية باستخدام طريقة العدد الأكثر احتمالاً (MPN)، حيث تمثل العينات رقم (١، ٢، ٣) الآبار القريبة من المياه السطحية مجهولة المصدر، بينما تمثل العينات رقم (٧، ٨) عينات الآبار البعيدة نسبياً عن مصدر المياه السطحية، أما العينات رقم (١١، ١٢) فهي تمثل مياه الآبار البعيدة عن مصدر المياه السطحية. كما يوضح الجدول نتائج عينات المياه السطحية مجهولة المصدر رقم (٤، ٥، ٦)، وعينات لنفس المصدر من موقع مختلف برقم (٩، ١٠).

الجدول رقم (٣) يوضح قيم الاحتياج الكيميائي للأكسجين للعينات محل الدراسة، ويظهر من الجدول أن قيم الاحتياج الكيميائي للأكسجين في عينات الماء السطحي تتراوح من ٢٧ إلى ٤٧، في حين كانت قيم الاحتياج الكيميائي للأكسجين عالية في معظم عينات الماء الأرضي حيث كانت أعلى قيمة ٢٨٤ مما يدل على زيادة تركيز الملوثات العضوية في عينات الماء الأرضي عن عينات الماء السطحي.

جدول (٣). الاحتياج الكيميائي للأكسجين لجميع العينات سواء كانت عينات مياه الآبار الجوفية أو عينات المياه السطحية مجهولة المصدر.

رقم العينة	الاحتياج الكيميائي للأكسجين (COD)
١	١٢٢
٢	٢٨٤
٣	٥.٢١
٤	٩.٢٧
٥	٢.١٧
٦	٥.٤٧
٧	١٣٥
٨	١٢٥
٩	٨.٣٥
١٠	٢.٣٢
١١	٥.٣٩
١٢	١٤٩

تقدير تراكيز العناصر السامة في عينات المياه جرى تقدير تراكيز تسعة أيونات سامة للتعرف على مدى تلوث عينات المياه المختلفة بالمرَكبات الكيميائية السامة. حيث تم قياس أيونات الكاديوم Cd^{2+} ، وأيونات الكروميوم Cr^{3+} ، وأيونات النحاس Cu^{2+} ، وأيونات الحديد Fe^{2+} ، وأيونات المنجنيز Mn^{2+} ، وأيونات النيكل Ni^{2+} ، وأيونات الرصاص Pb^{2+} ، وأيونات الزنك Zn^{2+} ، وأيونات الزرنيخ As^{3-} كما هو موضح في الجدول رقم (٤). واستناداً إلى مقارنة التراكيز المقدرة بالموصفات العالمية والاشتراطات المسموح بها من هذه الأيونات عن طريق نشرة منظمة الصحة العالمية. أشارت النتائج بأن العينات خالية تماماً من أيونات عناصر الكاديوم

الشكل (٢). خلايا بكتيريا القولون البرازية *Escherichia coli* والتي تم عزلها من العينات الموجبة للاختبار الافتراضي ومن ثم تنميتها كإجراء تأكيد على بيئة EMB حيث إن (أ) عبارة عن مسحة موجبة تحتوي على خلايا القولون البرازية حيث يظهر شكل المستعمرات بلون أخضر لامع، بينما (ب) عبارة عن مسحة سالبة لا تحتوي على خلايا بكتيريا القولون وتظهر المستعمرات غير مصبوغة.

الاحتياج الكيميائي للأكسجين (COD)

تعبير الاحتياج الكيميائي للأكسجين (Chemical Oxygen Demand or COD) هو مقياس للأكسجين المطلوب لأكسدة المواد العضوية الذائبة والمعلقة في الماء. ويعتبر هذا المقياس أحد المعايير الهامة لجودة المياه، حيث إنه يعطي مثل مقياس الاحتياج البيوكيميائي للأكسجين (Biochemical Oxygen Demand (BOD) مؤشر لتقييم مدى تأثير هذه صرف المياه على البيئة. ارتفاع قيمة الاحتياج الكيميائي للأكسجين يدل على زيادة كمية المواد القابلة للأكسدة مما يقلل مستويات الأكسجين الذائب.

لعمليات التجوية [Shah *et al.*, 2002]، ونسبة ضئيلة من أيونات المنجنيز Mn^{2+} وقد يعود هذا التباين إلى تعدد مصادر تلوث المياه. كما أنه من الواضح أن عينات المياه الجوفية (مياه الآبار) تحتوي على نسبة أعلى من المياه السطحية للعناصر المذكورة. وبالتالي فإن طبيعة التلوث تشير على الأرجح إلى أن التلوث الحادث نتيجة لمخلفات صرف صحي ومخلفات صرف صناعي إضافة إلى أن قرب أماكن أخذ العينات من منطقة زراعية تكثر بها الأنشطة البشرية وأنشطة الرعي المختلفة. غير أن عدد من الأبحاث تشير إلى أن التلوث بمياه الصرف الصحي تخلف بقايا من العناصر الكيميائية السامة كما هو الحال في دراسة الإمارة وآخرون (Al-Imara, *et al.*, 2002).

Cd^{2+} ، وأيونات الكروميوم Cr^{3+} ، وأيونات النحاس Cu^{2+} وأيونات النيكل Ni^{2+} وأيونات الزرنيخ As^{3-} . وبالتالي فإن النسبة المحسوبة لهذه الأيونات السامة كانت أقل من المستويات المسموح بها حسب المواصفات العالمية مما يدل على عدم وجود تلوث كيميائي بالأيونات السامة السابق ذكرها في العينات. إلا أن النتائج تشير إلى أن العينات سواء كانت مياه آبار أو مياه سطحية تحتوي على نسبة من أيونات الحديد Fe^{2+} والتي تكون بسبب تلوث صناعي أو لأسباب طبيعية جيولوجية [Gautam and Irfan, 2011]، وأيونات الزنك Zn^{2+} والتي تتواجد أيضاً في المياه نتيجة لتلوث صناعي قريب من المصدر أو لأسباب طبيعية كتفتت الصخور المحيطة نتيجة

جدول (٤). تراكيز أيونات الكاديوم Cd^{2+} ، وأيونات الكروميوم Cr^{3+} ، وأيونات النحاس Cu^{2+} ، وأيونات الحديد Fe^{2+} ، وأيونات المنجنيز Mn^{2+} ، وأيونات النيكل Ni^{2+} ، وأيونات الرصاص Pb^{2+} ، أيونات الزنك Zn^{2+} ، أيونات الزرنيخ As^{3-} ، باستخدام جهاز الامتصاص الذري (Atomic Absorption Spectrophotometry) AAS.

رقم العينة	تركيز العناصر (L/mg)							
	الكاديوم Cd^{2+}	الكروميوم Cr^{3+}	النحاس Cu^{2+}	الحديد Fe^{2+}	المنجنيز Mn^{2+}	النيكل Ni^{2+}	الرصاص Pb^{2+}	الزنك Zn^{2+}
الزرنيخ As^{3-}								
١	٠	٠	٠	٠,٥٧	٠	٠	٠	٠,٣٠
٢	٠	٠	٠	١,٨٩	٠	٠	٠	٠,١٠
٣	٠	٠	٠	١,٤٥	٠	٠	٠	٠,١٠
٤	٠	٠	٠	٠,١٣	٠	٠	٠	٠,٠١
٥	٠	٠	٠	٠,٢٧	٠	٠	٠	٠,٠١
٦	٠	٠	٠	٠,٢٧	٠	٠	٠	٠,٠١
٧	٠	٠	٠	٢,١١	٠	٠	٠	٠,١٠
٨	٠	٠	٠	٢,١١	٠	٠	٠	٠
٩	٠	٠	٠	١,٥٨	٠	٠	٠	٠
١٠	٠	٠	٠	٠,١٢	٠	٠	٠	٠
١١	٠	٠	٠	٠,١٨	٠	٠	٠	٠

٠	٠	٠	٠	٠	٠,١٨	٠	٠	٠	١٢
٠	٠	٠	٠	٠	٠,١٧	٠	٠	٠	١٣

الشكل (٣). يوضح الاختلاف في تراكيز أيونات الحديد في كل من مياه الآبار في العينات (١٢,١١,٨,٧,٣,٢,١) والمياه السطحية المحيطة بها وذلك للعينات (١٠,٩,٦,٥,٤)، حيث يتضح أن مياه الآبار الجوفية ذات محتوى أعلى في مستويات أيونات الحديد عنه في المياه السطحية المحيطة. كما يوضح أيضاً الاختلاف في مستويات أيونات الزنك لنفس العينات حيث يتضح أن العينات التي تمثل مياه الآبار الجوفية (١٢,١١,٨,٧,٣,٢,١) أعلى تركيزاً من العينات التي تمثل المياه السطحية (١٠,٩,٦,٥,٤).

التوصيات

ضرورة توعية المزارعين بمنطقة البحث بعدم استخدام هذه المياه في العمليات الزراعية واستخدامها في أغراض أخرى نظراً لارتفاع التلوث الميكروبي بها، كما يوصى بتوسيع مجال البحث في هذه المنطقة للتعرف على مصادر التلوث وطرق الحد منها.

المراجع

- Barrel, F.J.; Jones, D.M. and Abbott, J.D. (2002). The microbiology of Drinking water. part 10 , methods for the isolation of yersinia , vibrio, and campylobacter by selective enrichment media.
- Bettelheim, K.A. (2003). The genus Escherichia. In The Prokaryotes: An Evolving Electronic Resource for the Microbiological Community, electronic release 3.14, 3th ed.; Dworkin, M., Falkow, S., Rosenberg, E., Eds.; Springer-Verlag: New York, NY, USA.
- Chávez, A.; Rodas, K.; Prado, B.; Thompson, R. and Jiménez, B. (2012). An evaluation of the effects of changing wastewater irrigation regime for the production of alfalfa (Medicago sativa). Agricultural Water Management 113, 76–84.
- Chowdhury, S.; Al-Zahrani, M. (2015). Characterizing water resources and trends of sector wise water consumptions in Saudi Arabia. Journal of King Saud University – Engineering Sciences 27: 68–82.
- Cray, W. C. J., and H. W. Moon (1995) Experimental infection of calves and adult cattle with Escherichia coli O157:H7. Appl. Environ. Microbiol. 61 (4): 1586-1590.
- Deng, M., Zhang, Y., Quan, X.; Na, C., Chen, S., Liu, W., Han, S. and higeki Masunaga, S. (2017) Acute toxicity
- A.P.H.A. (2005). (American Public Health Association), Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water, Twentieth First Edition.
- Alexander (2002). Groundwater Contamination in ventory. A methodological guide IHPVI, Series on Groundwater No.2 UNTSCO.
- Al-Imara, F. J. M.; Mahmood, A.A.K.; Dunia, K.h. and Mithaq, H.S. (2008). Determination of some Physical and chemical parameters in the water of southern Iraqi Marshes.Basrah J.Agric.Sci.,21(Special issue).

- Leclerc, H.; Mossel, D.A.A.; Edbery, S.C. and Struijk, C.B.** (2001) Advances in the bacteriology of the coliform group : their stability as markers of microbial water safety . *Annu .Rev . Microbial .* **55**, 201-234.
- Mench, M.; Didier, V. L.; Gomez A. and Masson, P.** (1994). A mimicked in situ remediation study of metal contaminated soils with emphasis on cadmium and lead. *J. Environ. Qual.* **23**: 58-63.
- Montagna, B. P.; Romano-spica, M.T.; Stampi, V.; Fantuzz, S.T.; Tato, G. and Napoli, D.** (2004). Legionella infection risk from domestic hot water. *Emerg. Infect. Dis.* **10** (3):454-464.
- Noor, R., et al.** 2013. Microbiological study of major sea fish available in local markets of Dhaka city, Bangladesh. *J. Microbiol. Biotech. Food Sci.* **2** (4): 2420-2430.
- Popoff, M.Y.; Le Minor, L.E.** (2005). Genus Salmonella. In *Bergey's Manual of Systematic Bacteriology*, 2nd ed.; Brenner, D.J., Krieg, N.R., Staley, J.T., Eds.; Springer: New York, NY, USA, Volume 2, Part B, pp. 764–799.
- Shah, A.; Niaz, A.; Nazeef Ullah; Rehman, A.; Akhlaq, M.; Zakir, M. and **Khan, M.S. et al.** (2013). "Comparative Study of Heavy Metals in Soil and Selected Medicinal Plants", *Journal of Chemistry*, **5**.
- Strockbine, N.A. and Maurelli, A.T.** (2005). Genus Shigella. In *Bergey's Manual of Systematic Bacteriology*, 2nd ed.; Brenner, D.J., Krieg, N.R., Staley, J.T., Eds.; Springer: New York, NY, USA, Volume 2, Part B, pp. 811–823.
- Tripler, E., Shani, U., Muallem, Y., Ben-Gal, A.** (2011). Long-term growth, water consumption and yield of date palm as a function of salinity. *Agricultural Water Management* **99**, 128–134.
- WHO** (2000). World Health Organization, Water Supply Sanitation and Hygiene Links to Health. Geneva.
- WHO** (2006). Guidelines for the Safe use of Wastewater, Excreta and Greywater, 3rd ed. World Health Organization, Geneva, ISBN 9789241546867.
- WHO** (2008). World Health Organization, Guidelines for Drinking-water Quality, Incorporating 1st and 2nd Addenda, Volume 1, Recommendations, 3rd ed.; WHO: Geneva, Switzerland, Conclusion
- WHO** (2010a). World Health Organization. Enterotoxigenic *Escherichia coli* (ETEC). In *Diarrhoeal Diseases*; Available online: http://www.who.int/vaccine_research/diseases/diarrhoeal/en/index4.html (assessed on 4 September 2010a).
- WHO** (2010b). World Health Organization. Enterohaemorrhagic *Escherichia coli* (EHEC). Fact sheet N°125; Available online: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs125/en/> (assessed on 4 September 2010b).
- reduction and toxicity identification in pigmentcontaminated wastewater during anaerobic-anoxic-oxic (A/A/O) treatment process. *Chemosphere* **168** 1285e1292.
- Entry, J.A. and Farmer, N.** (2000). Influence of aquifers on monement and survival of coliform bacteria round water. *Aqri. Res.* **2**(8):1140-1145.
- Farmer, J.J. and Hickam-Brenner, F.W.** (2003). The Genus *Vibrio* and *Photobacterium*. In *The Prokaryotes: An Evolving Electronic Resource for the Microbiological Community*, electronic release 3.14, 3th ed.; Dworkin, M., Falkow, S., Rosenberg, E., Eds.; Springer-Verlag: New-York, NY, USA.
- Farmer, J.J.; Janda, J.M.; Brenner, F.W.; Cameron, D.N. and Birkhead, K.M.** (2005) Genus *Vibrio*. In *Bergey's Manual of Systematic Bacteriology*, 2nd ed.; Brenner, D.J., Krieg, N.R., Staley, J.T., Eds.; Springer: New York, NY, USA, Volume 2, Part B, pp: 494–546.
- FDA** (2010) Food and Drug Administration. US Department of Health & Human Services, U.S. Enteroinvasive *Escherichia coli* (EIEC); Available online: http://www.fda.gov/Food/FoodSafety/FoodborneIllness/FoodborneIllnessFoodbornePathogensNaturalToxins/Bad BugBook/ucm07129_8.htm (assessed on 4 September 2010).
- Gautam, P. and Irfan, A.** (2011). "Heavy Metals Contamination Assesment of Kanhargon Dam Water Near Chhindwara City", *Acta Chimica and Pharmaceutica Indica*, 7-9, **2**.
- Grabow, W.O.K.** (1996). Waterborne Diseases: Update on Water Quality Assessment and Control. *Water SA*, **22**, 193–202.
- Hamilton, A.J.; Stagnitti, F.; Xiong, X.; Kreidl, S.L.; Benke, K.K. and Maher, P.** (2007). Wastewater irrigation: the state of play. *Vadose Zone Journal* **6**, 823–840.
- Health Canada** (2006). Guidelines for Canadian Drinking Water Quality: Guideline Technical Document. Bacterial Waterborne Pathogens. Current and Emerging Organisms of Concern. Health Canada: Ottawa, ON, Canada.
- Kapperud, G.; Rørvik, L.M.; Hasseltvedt, V.; Hoiby, E.A.; Iversen, B.G.; Staveland, K.; Johnsen, G.; Leitão, J.; Herikstad, H.; Andersson, Y.; Langeland, G.; Gondrosen, B. and Lassen, J.** (1995). Outbreak of *Shigella sonnei* Infection Traced to Imported Iceberg Lettuce. *J. Clin. Microbiol.* **33**, 609–614.
- Le Minor, L.** (2003). The genus *Salmonella*. In *The Prokaryotes: An Evolving Electronic Resource for the Microbiological Community*, electronic release 3.14, 3th ed.; Dworkin, M., Falkow, S., Rosenberg, E., Eds.; Springer-Verlag: New York, NY, USA.

Microbial Screening of Groundwater and Surface Water in Agricultural Region Surrounding Al-Madina Al-Monawara

Naief H. Al-Makishah

*Environmental sciences Dept., Faculty of Meteorology, Environment and Arid Land Agriculture,
King Abdulaziz Univ., Jeddah, Saudi Arabia*

Abstract. As a result of various human uses of water, the diseases, associated with the use of contaminated water, would spread due to the presence of toxic chemical elements, in addition to many pathogens in waters that might have been mixed with sewage water or exposed to contamination from various industrial activities near the water source. In this research, (12) different samples were collected from various locations surrounding some farms in Al-Medina Al-Munawwarah area. Samples include underground water (from various wells) in addition to some surface water of unknown sources from spaced locations. Microbial initial validity of the use of these waters tested to investigate the presence of *E. coli*, and fecal bacteria. The results indicated contamination with *E. coli*, and fecal bacteria in the surface waters of unknown origin. The results also showed similar contamination in well water samples. These results indicated a variation in the rate of the Most Probable Number (MPN) of bacteria in the wells' samples, in contrast with samples of surface water. The Cd^{2+} , Cr^{3+} , Cu^{2+} , Fe^{2+} , Mn^{2+} , Ni^{2+} , Pb^{2+} , Zn^{2+} , As^{3-} Ions were determined. It turned out from the chemical test results that all ions of the toxic aforementioned elements were at low concentrations in comparison with the recommended standards set by the World Health Organization (WHO), but the salinity in all samples was relatively high, in addition to the elevated ratio of iron ions. Based on the results of analysis of these samples, surface and wells' waters were contaminated with *E. coli*, and fecal bacteria. While the chemical analysis of the samples indicated a lower level of contamination with the toxic elements, the salinity was higher and the content of iron ions was elevated.

Keywords: Pathogenic microbes, microbial contamination, heavy metals, irrigation.