التأثيرات الحيوية لجسيمات الفضة متناهية الصغر المحضرة من مستخلص نبات الدفلة الصفراء *Thevetia nerifolia* ضد يرقات بعوض *Culex pipiens* L.

سديم عايض القرشي¹، جازم عبدالله مهيوب¹ وأحمد إبراهيم السقاف²

¹ كلية العلوم، جامعة طيبة، المملكة العربية السعودية

² كلية العلوم، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية

alqurashi.sadeem@gmail.com

المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى استخدام مستخلص نبات الدفلة الصفراء كعامل حيوي لاختزال نترات الفضة إلى جسيمات فضة نانوية وقياس تأثيرها المثبط والذي يمنع اليرقات من الوصول إلى طور البالغ بتعريض طور اليرقي لبعوض *Culex pipiens* لتركيزات مختلفة لكلاً من المستخلص النباتي وجسيمات الفضة النانوية المحضرة منه وفقاً للطريقة القياسية لمنظمة الصحة العالمية. وقد تم تشخيص جسيمات الفضة النانوية باستخدام جهاز مطياف الأشعة المرئية وفوق البنفسجية والمهجر الإلكتروني النافذ ومطياف الأشعة تحت الحمراء. وأظهرت النتائج تفوق جسيمات الفضة النانوية في تثبيط خروج الحشرات الكاملة على المستخلص منفرداً بحوالي 33.33 ضعف حيث بلغت قيم التركيزات المثبطة لخروج 50% من الحشرات الكاملة 85.654 جزء من المليون للمستخلص النباتي و2.57 جزء من المليون لجسيمات الفضة النانوية. كما كشفت نتائج هذه الدراسة عن وجود تشوهات في اليرقات المعاملة بكلاً من المستخلص النباتي وجسيمات الفضة النانوية وامتدت هذه التأثيرات على جميع مراحل النمو مما أدى إلى هلاك الحشرة دون أن تكمل دورة حياتها. الكلمات المفتاحية: بعوضة الكيولكس، جسيمات الفضة النانوية، الدفلة الصفراء، التقييم الحيوي، التصنيع الحيوي.

1. المقدمة

يعد البعوض المنزلي *Culex pipiens* L. (Diptera: Culicidae) أحد أهم النواقل للعديد من مسببات الأمراض مثل فيروس حمى غرب النيل وفيروس حمى الوادي المتصدع وديدان الفيلاريا الطفيلية المسببة لداء الفيل^[1,2]. كما أنه يعتبر أكثر الأنواع انتشاراً في العديد من

المناطق المدارية وشبه المدارية^[2,3]، حيث يتوالد في بيئات مائية عدة سواء كانت نظيفة أو ملوثة ويرتبط تواجده بكثافات عالية في القرى التي لم يدخلها نظام الصرف الصحي أو المدن التي يكون صرفها ضعيف^[4] وغير كافي مثل مدينة جدة والتي تعاني من عدم اكتمال شبكات الصرف الصحي فضلاً عن موقعها على سطح مائي كبير يساهم

في ارتفاع وانخفاض درجتي الحرارة والرطوبة ويجعل من مدينة جدة بيئة ملائمة لتكاثر هذا النوع من البعوض على مدار العام مشكلاً بذلك تهديداً كبيراً على الصحة العامة مما جعل مكافحته ضرورة حتمية للحد من انتشار الأمراض.

وقد تركزت طرق المكافحة في غالبيتها على استخدام المبيدات الكيميائية التقليدية غير أن الاستخدام المتكرر والمكثف غير المقنن لهذه المركبات تراكمت معه العديد من المشكلات؛ فبغض النظر عن تكاليفها الباهظة نجد أن لها تأثيرات واسعة الطيف على الإنسان وغيره من الكائنات الحية غير المستهدفة؛ سواء بالتعرض المباشر أو غير المباشر من خلال الانتقال عبر السلسلة الغذائية فيما يعرف بظاهرة التعاطم الحيوي؛ هذا بالإضافة إلى نشوء صفة المقاومة لدى البعوض ضد بعض هذه المركبات [6,5].

لذلك كانت هناك حاجة ملحة للبحث والتقصي عن بدائل آمنة ومركبات صديقة للبيئة فتوجهت الأنظار نحو استخدام النباتات كمصادر طبيعية يمكن استغلالها للتحكم في هذه الآفات، حيث شجع التنوع الحيوي للغطاء النباتي أعداداً متزايدة من الباحثين للبحث عن مبيدات حشرية جديدة من أصل نباتي وتقييم فاعليتها ضد البعوض كوسيلة آمنة لمكافحته [6,5,3-1].

من جانب آخر حظيت التقنيات متناهية الصغر (تقنية النانو) والتي تختص بالمواد التي يقل أحد أبعادها على الأقل عن مئة نانومتر بالاهتمام الكبير في وقتنا الحاضر نظراً لما أبدته من تطبيقات واعدة شملت العديد من المجالات في جميع نواحي الحياة، ومن بين هذه المجالات تلك الجهود المبذولة لتطوير أحدث الأساليب الفعالة للسيطرة على البعوض والدور المحتمل للجسيمات النانوية المصنعة بطريقة حيوية باستخدام المستخلصات النباتية في مكافحة البعوض [7]. فذكر فيراكومار وآخرون [8] أن لجسيمات الفضة النانوية المحضرة من المستخلص المائي لأوراق نبات *Heliotropium indicum* نشاط إبادي على الأطوار

البالغة لبعوض *An. stephensi* و *Ae. aegypti* و *Cx. quinquefasciatus*. ولاحظ أرجونان وآخرون [9] أن أعمار الأطوار الكاملة لثلاثة أنواع من البعوض والناجمة من اليرقات المعاملة بجسيمات الفضة النانوية قد انخفضت بنسبة 30%. واستخدم سوراش وآخرون [10] المستخلص المائي لجذور نبات *Delphinium denudatum* في اختزال أيونات الفضة إلى جسيمات فضة نانوية ثم قيموا تأثيرها الإبادي على يرقات بعوض *Ae. aegypti* فكانت قيمة التركيز النصف قاتل يبلغ 9.6 جزء من المليون. ووجد أروكياراج وآخرون [11] أن لجسيمات الفضة النانوية المحضرة من مستخلص نبات *Chrysanthemum indicum* تأثيرات قاتلة على الأطوار غير الناضجة لبعوض *An. Stephensi*.

ويهدف هذا البحث إلى مساهمة الاتجاهات الحديثة في مكافحة البعوض من خلال تقييم فاعلية مستخلص نبات الدفلة الصفراء *Thevetia neriifolia* وجسيمات الفضة النانوية Silver nanoparticles المحضرة منه ضد يرقات بعوض *Culex pipiens*.

1. المواد والطرق

تربية البعوض

تم الحصول على كتل البيض لبعوض *Cx. pipiens* بالتنسيق مع مختبر آفات الصحة العامة -أمانة محافظة جدة- وتأسيس مستعمرة تحت ظروف المختبر وفقاً لطريقة برايم وآخرون [1] وذلك بهدف الحصول على العدد الكافي من اليرقات لتنفيذ التجارب.

تجهيز المستخلصات النباتية

جمعت أوراق نبات الدفلة الصفراء من الحرم الجامعي وصنف من قبل المعشبة النباتية بجامعة الملك عبد العزيز قسم علوم الأحياء. تغسل الأوراق جيداً وتترك في درجة حرارة الغرفة حتى تجف تماماً، ثم تطحن بمطحنة كهربائية.

الشكل رقم (1) مستخلص نبات الدفلة الصفراء قبل (أ) وبعد إضافة نترات الفضة (ب) وتكون جسيمات الفضة النانوية

ولتحديد شكل وحجم الجسيمات تذاب كمية من الراسب المجفف في كحول الايثانول ويعرض المعلق لحمام الموجات فوق الصوتية (BRANSON, 1510) ultrasonic bath لمدة نصف ساعة ثم توضع قطرة من المعلق على شبكة نحاسية مغطاة بالكربون وتترك حتى تجف تماماً ثم تفحص بالمجهر الإلكتروني النافذ Transmission electron microscope (JEM-1011, JEOL, Tokyo, Japan) عند جهد متسارع 90 كيلوفولت.

وللتعرف على المجاميع الوظيفية الفعالة التي يحتويها المستخلص النباتي والمسؤولة عن اختزال نترات الفضة إلى جسيمات فضة نانوية استخدم مطياف الأشعة تحت الحمراء المزود بمحول فورييه Fourier spectroscopy transform infrared (FTIR) النباتي قبل وبعد إضافة نترات الفضة ضمن المجال 600-4000 سم⁻¹ بمعدل 16 مرة ودرجة وضوح 4 سم⁻¹ بوضع جزء قليل من المستخلص النباتي الخام في المكان المخصص للعينة، واتبعت الطريقة نفسها مع مسحوق جسيمات الفضة الذي سبق تجفيفه.

وقد جرت عملية الاستخلاص باستخدام جهاز الاستخلاص المستمر Soxhlet Apparatus والكحول الايثيلي المطلق كمذيب عند درجة حرارة 40°م، بعدها ركز المستخلص باستخدام جهاز المبخر الدوراني Rotary Vacuum Evaporator وحفظ في أوعية زجاجية معتمدة اللون داخل الثلاجة لحين إجراء التجارب.

تحضير المحاليل القياسية

حضرت المحاليل القياسية اللازمة لإجراء التجارب بإضافة 1 مل من المستخلص النباتي إلى 99 مل ماء منزوع الأيونات مضافاً إليه 0.5 مل Triton-x100 كمادة مستحلبة تساعد على امتزاج المستخلص النباتي بالماء.

التصنيع الحيوي لجسيمات الفضة متناهية الصغر

حضرت جسيمات الفضة النانوية بإضافة 1 مل من محلول نترات الفضة تركيز 100 ملليمولر إلى 99 مل من المحلول القياسي لمستخلص نبات الدفلة الصفراء والذي سبق تحضيره ويترك في درجة حرارة الغرفة لحين تغير اللون إلى اللون البني دلالة على تكون جسيمات الفضة متناهية الصغر (الشكل 1).

تشخيص جسيمات الفضة متناهية الصغر

تم قياس طيف الامتصاص لكل من محلول نترات الفضة والمستخلص النباتي قبل وبعد إضافة نترات الفضة وظهور اللون باستخدام جهاز مطياف الأشعة المرئية وفوق البنفسجية UV/Vis/NIR Spectrophotometer ضمن المدى 300-800 نانومتر ودرجة وضوح واحد نانوميتر. بعدها جهزت العينات لإجراء باقي الفحوصات بإخضاع محلول جسيمات الفضة النانوية لطرد مركزي بمعدل 7800 دورة/دقيقة لمدة نصف ساعة ثم التخلص من الراشح أما الراسب فجفف.

فضة نانوية وقد أخذ لون المستخلص بالتغير تدريجياً مع مرور الوقت بعد إضافة نترات الفضة

الشكل رقم (2) طيف امتصاص الأشعة الضوئية وفوق البنفسجية لنترات الفضة (AgNO_3) ومستخلص نبات الدفلة الصفراء (*T. neriifolia*) وجسيمات الفضة النانوية المحضرة منه (*T.n.AgNPs*).

حتى وصل إلى اللون البني بعد 24 ساعة. كما أظهرت نتائج تحليل الطيف المرئي وفوق البنفسجية والموضحة في الشكل (2) ظهور قمة امتصاص عند طول موجي 415 نانومتر والتي تشير إلى تشكل جسيمات الفضة النانوية، والتي ظهرت بعد فحصها بالمجهر الإلكتروني النافذ (الشكل 3) كروية الشكل تراوحت أحجامها بين 13-37 نانومتر.

الشكل رقم (3) صورة بالمجهر الإلكتروني لجسيمات الفضة النانوية المحضرة من مستخلص نبات الدفلة الصفراء

التقييم الحيوي ليرقات البعوض

قدّرت حساسية يرقات البعوض *Cx. pipiens* لمستخلص نبات دفلة الصفراء وكذلك لجسيمات الفضة النانوية المحضرة منها، في الظروف المعملية عند درجة حرارة $27 \pm 2^\circ\text{C}$ ، ورطوبة نسبية 60-70% باتّباع الطريقة القياسية لمنظمة الصحة العالمية طريقة الغمر [12] حيث عرضت اليرقات لسلسلة من التركيزات بواقع ثلاثة مكررات لكل تركيز بحيث تحوي المكررة على 20 يرقة هذا بالإضافة إلى ثلاثة مكررات للمجموعة الضابطة. تمت متابعة التجارب وتسجيل النتائج يومياً حتى خروج الحشرات الكاملة لحساب النسب المئوية للتثبيط. عزلت الأطوار الميتة الناتجة عن المعاملات (يرقات - عذارى - حشرات كاملة) وفحصت لتحديد التشوهات التي قد تطرأ على شكلها الظاهري بمجهر تشريحي مزود بكاميرا رقمية ومتصل بجهاز حاسب آلي.

2. التحليل الإحصائي

تم حساب النسب المئوية لتثبيط خروج الحشرات الكاملة لكل تركيز ثم حللت النتائج وفقاً لطريقة فيني [13] باستخدام برنامج LDP line software لاشتقاق القيم والثوابت الإحصائية عند حدود ثقة 95% ومستوى معنوية 0.05. كما تم حساب نسبة التثبيط والفاعلية النسبية بالاعتماد على قيم التركيزات المثبطة لخروج 50% (IC_{50}) من الحشرات الكاملة لكل من المستخلص النباتي ومخلوط المستخلص ونترات الفضة وفقاً لطريقة لي وبيرندلي [14].

3. النتائج والمناقشة

تشخيص جسيمات الفضة النانوية

تضمنت هذه الدراسة استخدام مستخلص نبات الدفلة الصفراء كعامل حيوي لاختزال نترات الفضة إلى جسيمات

التقييم الحيوي ليرقات البعوض

كما شملت هذه الدراسة أيضاً تقييم فاعلية المستخلص الإيثيلي لأوراق نبات الدفلة الصفراء وجسيمات الفضة النانوية المحضرة منه على يرقات بعوض *Cx. pipiens* وأظهرت النتائج والموضحة في الجدول (1)

شكل رقم (4) تحليل طيف الأشعة تحت الحمراء لمستخلص نبات الدفلة الصفراء قبل (أ) وبعد إضافة نترات الفضة (ب) وتكون جسيمات الفضة النانوية

تفوق جسيمات الفضة النانوية في القدرة على تثبيط خروج الحشرات الكاملة من المستخلص نفسه حيث تراوحت التركيزات الفعالة للمستخلص النباتي بين 60 إلى 160 جزء من المليون بلغت فيها النسب المئوية لتثبيط خروج الحشرات الكاملة الناتجة من اليرقات المعاملة والمقابلة لهذه التركيزات

ويوضح الشكل (4) تحليل مطياف الأشعة تحت الحمراء للمستخلص النباتي قبل وبعد إضافة نترات الفضة حيث تظهر قمة امتصاص عريضة لمستخلص نبات الدفلة الصفراء عند العدد الموجي 3391 سم⁻¹، تليها قمم عند 2926، 2854 و 1722 سم⁻¹، والتي تعود إلى وجود المركبات الكحولية والفينولية والأليفاتية ومجاميع الكربونيل؛ وقمم أخرى عند العدد الموجي 1462، 1379 و 1253 سم⁻¹، والتي تعبر عن وجود رابطة C-N في المجاميع الأمينية الأروماتية ورابطة C-C في المجاميع الحلقية الأروماتية.

وبمقارنة تحليل طيف FTIR للمستخلص النباتي قبل وبعد إضافة نترات الفضة وتكون جسيمات الفضة النانوية نلاحظ حدوث إزاحة للقمم من 3391 إلى 3449 سم⁻¹ ومن 2854 إلى 2870 سم⁻¹ مما يشير إلى دور المركبات الفينولية والأليفاتية في استقرار جسيمات الفضة النانوية [15]، [16]. أما مجاميع الكربونيل 1736 سم⁻¹ فقد اضمحلت واصبحت أضعف منها قبل التفاعل مما يوحي بأن مجاميع الكربونيل تلعب دور حاسم في اختزال أيونات الفضة إلى جسيمات فضة نانوية [17]

وقد أشارت العديد من الدراسات إلى إمكانية استخدام المستخلصات النباتية لإنتاج جسيمات النانو المعدنية لاحتوائها على العديد من نواتج الأيض الثانوية والتي تلعب دوراً رئيسياً وفعالاً في تغيير شحنة أيونات المعادن وتحولها إلى جسيمات بحجم النانو [18]. فذكر كاثوري وآخرون [19] أن قدرة مركب *apiin* المعزول من مستخلص أوراق نبات الحناء على الاختزال وإنتاج جسيمات الذهب والفضة النانوية تعود لاحتوائه على مجاميع الكربونيل والهيدروكسيل الثانوية. كما تعمل البروتينات وبعض الأحماض الأمينية الموجودة في مستخلص أوراق فول الصويا *Glycine max* على اختزال أيونات البلاديوم إلى جسيمات بلاديوم نانوية وتمنع تكثفها [20].

اليرقات المعاملة من 36.67%-93.33%. ووفقاً لنتائج التحليل الإحصائي (جدول 2 وشكل 5) كانت قيمة التركيز المثبط لخروج 50% من الحشرات الكاملة بالنسبة لمستخلص أوراق نبات الدفلة الصفراء تساوي 85.654 جزء من المليون، وبلغت قيمة التركيز المثبط لخروج 50% من الحشرات الكاملة المعاملة بجسيمات الفضة النانوية 2.57 جزء من المليون. وبمقارنة التركيزات المثبطة لخروج 50% من الحشرات الكاملة لمستخلص نبات الدفلة الصفراء قبل وبعد إضافة نترات الفضة، نجد أن فاعلية المستخلص زادت بعد تكون جسيمات الفضة النانوية 33.33 ضعف، وهذا يؤكد بأن خلط المستخلص النباتي مع نترات الفضة قد أدى إلى رفع الفاعلية النسبية حيث بلغت قيمة التأثير المشترك +97%

الجدول رقم (2) التحليل الإحصائي لمستوى حساسية يرقات بعوض *Cx. pipiens* لمستخلص أوراق نبات الدفلة الصفراء وجسيمات الفضة النانوية المحضرة منه

المستخلص	التركيزات (جزء من المليون)	النسب المئوية للتثبيط %
الدفلة الصفراء <i>T. actifulia</i>	160	91.67%
	120	80.00%
	100	61.67%
	80	43.33%
	60	21.67%
	Control	3.00%
جسيمات الفضة النانوية المحضرة من نبات الدفلة الصفراء	50	93.33%
	30	86.67%
	10	75.00%
	5	55.00%
	1	36.67%
	Control	0.00%

* التركيزات المثبطة لخروج 50% (IC50) و90% (IC90) من الحشرات الكاملة والنااتجة عن اليرقات المعاملة. ** قيمة مربع كاي المحسوبة أقل من الجدولية والتي تساوي 7.8 مما يدل على أن البيانات متجانسة والخط السمي مثل النتائج تمثيلاً جيداً.

من 21.67 إلى 91.67%. كما تراوحت التركيزات الفعالة لجسيمات

جدول رقم (1) مستوى حساسية يرقات بعوض *Cx. pipiens* لمستخلص أوراق نبات الدفلة الصفراء وجسيمات الفضة النانوية المحضرة منه

القيم الإحصائية	الدفلة الصفراء	جسيمات الفضة النانوية
IC50* حدود الثقة (أدنى - أعلى)	85.654 (90.4725-80.6034)	2.570 (3.491-1.73549)
IC90* حدود الثقة (أدنى - أعلى)	151.1199 (170.3723-138.3491)	41.671 (71.5903-28.2197)
الميل ± الخطأ المعياري	5.197 ± 0.4751	1.0593 ± 0.1093
مربع كاي** (درجة حرية 3)	0.538	3.2612
نسبة التنشيط	33.33	
الفاعلية النسبية	+97%

الشكل رقم (5) منحنى السمية العملية 1-جسيمات الفضة النانوية 2-مستخلص نبات الدفلة

الفضة النانوية بين 1-50 جزء من المليون، بلغت فيها النسب المئوية لتثبيط خروج الحشرات الكاملة الناتجة من

وهو مؤشر Indicator على توافق عملية الخلط وحدث التقوية Potentiation. وقد يعود ذلك إلى التآزر الذي يحدث بين المستخلص وجسيمات الفضة أثناء عملية الاختزال حيث ترتبط المركبات الموجودة بالمستخلص بسطح الجسيمات فتزيد من قوة تأثيرها [21]. أو قد ترجع قوة التأثير إلى صغر حجمها والذي يسهل مرورها من خلال جدار الجسم إلى داخل الخلايا حيث تتعارض مع عملية الانسلاخ والعمليات الفسيولوجية الأخرى، وهذا يتفق مع ما ذكره راجسفارادي وراودي [22] أن فاعلية جسيمات الفضة النانوية المحضرة من مستخلص بذور نبات *Sterculia foetida* كمبيد يرقي لنوعين من البعوض يعود إلى صغر حجمها والذي يزيد من سرعة اختراقها لجدار الجسم كما أن معدل إزالتها من مواقع ارتباطها في جسم الحشرة بطيء. ملاحظة مماثلة سجلها كارثديان وآخرون [23] ذكر فيها أن جسيمات الفضة متناهية الصغر والمصنعة من مستخلص أوراق نبات *Melia dubia* أكثر فاعلية من المستخلص الخام ضد يرقات بعوض *Cx. quinquefasciatus* أيضاً ما ذكره [24] أن لجسيمات الفضة النانوية المنتجة من مستخلص نبات *Nelumbo nucifera* التأثير الأقوى في هلاك نوعين من يرقات البعوض يليها المستخلص الميثانولي ثم المستخلص المائي. كما كشفت نتائج هذه الدراسة عن وجود تشوهات في الشكل الظاهري لليرقات المعاملة بالمستخلص النباتي وجسيمات الفضة النانوية المحضرة منه (شكل 6) تمثلت في قصر وانكماش عقل الجسم خاصة حلقات البطن وخلل في إفراز الصبغات فتكتسب اليرقة بأكملها اللون الأسود أو تظهر على شكل بقع تنتشر في أجزاء من الجسم، أيضاً استطالة في منطقة العنق مقارنة باليرقات غير المعاملة. أما بالنسبة للعداوى المتحولة عن اليرقات المعاملة فتمثلت التشوهات في خروج غير مكتمل للعداء من جليد انسلاخ اليرقة فتموت أثناء عملية الانسلاخ وتبقى أجزاء من الجليد القديم عالقة بها مثل الرأس ومنطقة السيفون، وظهور

عداء ذات لون أبيض شاحب (البينو) فقدت قدرتها على التصلب والاسمرار، وأطوار وسطية تجمع بين صفات العداء والحشرة الكاملة، أيضاً خلل واضطراب في عملية الانسلاخ فنلاحظ خروج غير منتظم للحشرة الكاملة من جليد انسلاخ العداء يبدأ من منطقة البطن في حين أن الوضع الطبيعي لعملية الانسلاخ يبدأ من الناحية الظهرية لمنطقة الرأس صدر للعداء. وبالنسبة للحشرات الكاملة والناجمة عن اليرقات المعاملة فتمثلت التشوهات في التصاق زوائد الجسم بجليد انسلاخ العداء فتبقى الحشرة عالقة عاجزة عن الحركة والطيران. وجميع هذه الحالات أنفة الذكر تموت بسرعة بعد أو أثناء الانسلاخ دون أن تكمل دورة حياتها. حدوث مثل هذه التشوهات لليرقات المعاملة بمستخلص نبات الدفلة والتي امتد تأثيرها على جميع مراحل النمو بما يشابه عمل منظمات النمو Growth Regulators قد تعزى إلى احتوائه على العديد من المركبات والتي تتداخل مع العمليات الفسيولوجية في الحشرة أثناء تطورها Metamorphosis أو قد تتعارض هذه المركبات مع عمل الهرمونات المفردة من الغدد الصم [25] مما يؤدي إلى خلل في عملية النمو وزيادة في هلاك الحشرة. وقد أبدت العديد من المستخلصات النباتية في الكثير من الدراسات نشاطاً مثبطاً للنمو والتطور محدثة بذلك العديد من التشوهات المظهرية في كل أطوار البعوض ومن ذلك ما ذكره أريفولي وتينسون [26] من ظهور أطوار وسطية تجمع بين صفات اليرقة والعداء وأطوار وسطية تجمع بين صفات العداء والحشرة الكاملة وتأخر الفقس وانخفاض معدلته وزيادة في فترة النمو والتطور بعد معاملة ثلاثة أنواع من البعوض ذات الأهمية الطبية بمستخلص نبات *A. indicum*. أما التشوهات المظهرية التي ظهرت على أطوار بعوض *Cx. pipiens* بعد معاملة اليرقات بجسيمات الفضة المحضرة من مستخلص نبات الدفلة الصفراء لم يرد في الدراسات السابقة تأثيراً مشابهاً لها ولكن هناك دراسة نسيجية أجراها فيجايكومار وآخرون [27]

الشكل رقم (6) التشوهات المظهرية التي طرأت على أطوار بعوض *Cx. pipiens* بعد تعريض اليرقات لمستخلص نبات الدفلة الصفراء وجسيمات الفضة النانوية المحضرة منه ويمثل الصف الأول من الأعلى الأطوار غير المعاملة وباقي الصفوف أطوار ناتجة عن يرقات معاملة

- Phragmites australis extracts against the mosquito vector *Culex pipiens*. *Tunisian Journal of Plant Protection*, **4**, 157-172 (2009).
- [2] Zahran, H. E. D. M. and Abdelgaleil, S. A., Insecticidal and developmental inhibitory properties of monoterpenes on *Culex pipiens* L. (Diptera: Culicidae). *Journal of Asia-Pacific Entomology*, **14**, 46-51 (2011).
- [3] Humeres, S. G., Almirón, W. R., Sabattini, M. S. and Gardenal, C. N., Estimation of genetic divergence and gene flow between *Culex pipiens* and *Culex quinquefasciatus* (Diptera: Culicidae) in Argentina. *Memórias do Instituto Oswaldo Cruz*, **93**, 57-62 (1998).
- [4] Seleena, P., Lee, H. L. and Chiang, Y. F., Compatibility of *Bacillus thuringiensis* serovar israelensis and chemical insecticides for the control of *Aedes* mosquitoes. *Journal of vector ecology: journal of the Society for Vector Ecology*, **24**, 216-223(1999).
- [5] Tehri, K. and Singh, N., The role of botanicals as green pesticides in integrated mosquito management–A review. *International Journal of Mosquito Research*, **2**, 18-23 (2015).
- [6] Rawani, A., Haldar, K. M., Ghosh, A. and Chandra, G., Larvicidal activities of three plants against filarial vector *Culex quinquefasciatus* Say (Diptera: Culicidae). *Parasitology research*, **105**, 1411-1417 (2009).
- [7] Priya, S. and Santhi, S., A Review on Nanoparticles in Mosquito Control - A Green Revolution in Future. *International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology*, **2**, 2321-9653 (2014).
- [8] Veerakumar, K., Govindarajan, M. & Hoti, S. L., Evaluation of plant-mediated synthesized silver nanoparticles against vector mosquitoes. *Parasitology research*, **113**, 4567-4577 (2014).
- [9] Arjunan, N. K., Murugan, K., Rejeeth, C., Madhiyazhagan, P. & Barnard, D. R., Green synthesis of silver nanoparticles for the control of mosquito vectors of malaria, filariasis, and dengue. *Vector-Borne and Zoonotic Diseases*, **12**, 262-268 (2012).
- [10] Suresh, G., Gunasekar, P. H., Kokila, D., Prabhu, D., Dinesh, D., Ravichandran, N., Rameshd B., Koodalingamd A. & Siva, G. V., Green synthesis of silver nanoparticles using *Delphinium denudatum* root extract exhibits antibacterial and mosquito larvicidal activities. *Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy*, **127**, 61-66 (2014).
- [11] Arokiyaraj, S., Kumar, V. D., Elakya, V., Kamala, T., Park, S. K., Ragam, M., Saravanan, M., Bououdina, M., Arasu M. V. & Vincent, S., Biosynthesized silver nanoparticles using floral extract of *Chrysanthemum indicum* L. potential for malaria vector control. *Environmental Science and Pollution Research*, **22**, 9759-9765 (2015).

على يرقات بعوض *An. stephensi* و *Cx. quinquefasciatus* ذكر فيها أن جسيمات أكسيد الزنك المحضرة من نبات *P. amboinicus* تسببت في تلف خلايا وأنسجة المعى المتوسطة لليرقات محدثة تغيرات كبيرة منها تمزق وتفكك طبقة الخلايا الطلائية وظهور فجوات خلوية. وكشفت نتائج الأيض في التجارب التي أجراها^[23] عن تغيرات في مستوى الكربوهيدرات والبروتين في يرقات العمر الرابع لبعوض *Cx. quinquefasciatus* بعد 24 ساعة من التعرض لجسيمات الفضة النانوية.

وأخيراً هناك حاجة لدراسات إضافية لإعطاء المزيد من الشرح الدقيق حول الأسباب التي تقف خلف حدوث مثل هذه التشوّهات، فليس من الواضح ما إذا كان هذا يرجع إلى محاكاة عمل الهرمون، أو أن هذه المواد تعمل على تحفيز أو تثبيط إفراز الهرمون، أو أنها تتداخل مع الوظائف والعمليات الفسيولوجية التي تحدث للحشرة أثناء النمو والتطور، فالهدف الفعلي للعمل يحتاج الى المزيد من الدراسات التأكيدية.

وعموماً يمكن القول إن استخدام مستخلص نبات الدفلة الصفراء وجسيمات الفضة النانوية المحضرة منه استراتيجية فعالة قد تساهم في السيطرة على البعوض والتقليل من أضراره وأيضاً للتغلب على المشاكل المرتبطة باستخدام المركبات الكيميائية الاصطناعية في إدارة البعوض.

4. شكر

تتقدم الباحثة بجزيل الشكر والعرفان إلى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدعم هذا المشروع ضمن أبحاث طلاب الدراسات العليا تحت رقم (ط أ / 337/35).
والشكر لجميع من شاركنا أو قدم رأياً أو مشورة في إنجاز هذا البحث.

5. المراجع

- [1] Bream, A. S., Hassan, M. I., Fouda, M. A. and El-Sheikh, T. M., Toxicity and repellent activity of

- [21] Borase, H. P., Patil, C. D., Salunkhe, R. B., Narkhede, C. P., Salunke, B. K. & Patil, S. V., Phyto-synthesized silver nanoparticles: a potent mosquito biolarvicidal agent. *Journal Nanomedine Biotherapeutic Discov*, **3**, 1-7 (2013).
- [22] Rajasekharreddy, P. and Rani, P. U., Biofabrication of Ag nanoparticles using Sterculia foetida L. seed extract and their toxic potential against mosquito vectors and HeLa cancer cells. *Materials Science and Engineering: C*, **39**, 203-212 (2014).
- [23] Karthikeyan, J., Nila, K. M., Thooyavan, G. & Vimalkumar, E., Larvicidal and antibacterial efficacy of green synthesis silver nanoparticles using Mella dubia. *International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences*, **6**, 395-399 (2014).
- [24] Santhoshkumar, T., Rahuman, A. A., Rajakumar, G., Marimuthu, S., Bagavan, A., Jayaseelan, C., Zahir, A.A., Elango, G. & Kamaraj, C., Synthesis of silver nanoparticles using Nelumbo nucifera leaf extract and its larvicidal activity against malaria and filariasis vectors. *Parasitology research*, **108**, 693-702 (2011).
- [25] Bede, J. C. & Tobe, S. S., Insect juvenile hormones in plants, In: Rahman A.u. (Ed.), *Studies in natural products chemistry Bioactive Natural Products (Part C)*, Amsterdam, Elsevier B.V., pp: 369-418 (2000).
- [26] Arivoli, S. and Tennyson, S., Larvicidal and adult emergence inhibition activity of Abutilon indicum (Linn.) (Malvaceae) leaf extracts against vector mosquitoes (Diptera: Culicidae). *Journal Biopestic*, **4**, 27-35 (2011).
- [27] Vijayakumar, S., Vinoj, G., Malaikozhundan, B., Shanthi, S. and Vaseeharan, B., Plectranthus amboinicus leaf extract mediated synthesis of zinc oxide nanoparticles and its control of methicillin resistant Staphylococcus aureus biofilm and blood sucking mosquito larvae. *Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy*, **137**, 886-891(2015).
- [12] World Health Organization, Guidelines for laboratory and field-testing of mosquito larvicides, Geneva: WHO Press, pp: 10-12 (2005).
- [13] Finney, D.J., Probit analysis: a statistical treatment of sigmoid response curve. Cambridge, University Press, (1971).
- [14] Lee, R. M. & Brindley, W. A., Synergist ratios, EPN detoxication, lipid, and drug-induced changes in carbaryl toxicity in Megachile Pacifica. *Environmental Entomology*, **3**, 899-907 (1974).
- [15] Sathyavathi, R., Krishna, B. M. & Rao D. N., Biosynthesis of silver nanoparticles using *Moringa oleifera* leaf extract and its application to optical limiting. *Journal of Nanoscience and Nanotechnology*, **10**, 2031–2035 (2011).
- [16] Suman, T. Y., Elumalai, D., Kaleena, P. K. & Rajasree, S. R. R., GC–MS analysis of bioactive components and synthesis of silver nanoparticle using *Ammannia baccifera* aerial extract and its larvicidal activity against malaria and filariasis vectors. *Industrial Crops and Products*, **47**, 239–245 (2013).
- [17] Dubey, S. P., Lahtinen, M. & Sillanpää, M., Green synthesis and characterizations of silver and gold nanoparticles using leaf extract of *Rosa rugosa*. *Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects*, **364**, 34–41 (2010).
- [18] Makarov, V. V., Love, A. J., Sinitsyna, O. V., Makarova, S. S., Yaminsky, I. V., Taliansky, M. E., & Kalinina, N. O., “Green” Nanotechnologies: Synthesis of Metal Nanoparticles Using Plants. *Acta naturae*, **6**, 35-44 (2014).
- [19] Kasthuri, J., Veerapandian, S. & Rajendiran, N., *Biological synthesis of silver and gold nanoparticles using apiin as reducing agent. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces*, **68**, 55-60 (2009).
- [20] Petla, R. K., Vivekanandhan, S., Misra, M., Mohanty, A. K. & Satyanarayana, N., Soybean (Glycine max) leaf extract based green synthesis of palladium nanoparticles, *Journal of Biomaterials and Nanobiotechnology*, **3**, 14-16 (2011).

**Biological Effects of Synthesized Silver Nanoparticles
using *Thevetia Neriifolia* Extract against Larvae
of *Culex pipiens* L. Mosquito**

Sadeem ALqurashi¹, Jazem Mahyoub², and Ahmed Al- sagga²

⁽¹⁾ Dept. of Biological Science, Taibah Univ., Al Madinah al Munawwarah (KSA)

⁽²⁾ Dept. of Biological Science, King Abdulaziz Univ., Jeddah (KSA).

ABSTRACT. This study aims to use the ethanolic leaves extract of *Thevetia neriifolia* as a bio-factor for the reduction of silver nitrate to silver nanoparticles and evaluate the adult emergence inhibition activity against larvae of house mosquito *Culex pipiens* by exposing larvae to different concentration for each of the plant extract and silver nanoparticles were characterized using the standard WHO method. The silver nanoparticles by UV-Vis spectrum, transmission electron microscopy and Fourier Transform Infrared Spectroscopy. The result showed that the silver nanoparticles synthesized using *T. neriifolia* leaves were more effective than the extract of the plant about 33.33 times with IC50 value 85.654 and 2.57 ppm of plant extract and silver nanoparticles respectively. The results also revealed the existence of morphological deformities in the larval treatment with both the plant extract and silver nanoparticles. These effects extended in all stages of growth, which cause the destruction of the insect without completing their life cycle.

Keywords: Culex pipiens, silver nanoparticles, *Thevetia neriifolia*, Bioassay