DOI: 10.4274/mjima.galenos.2021.2020.24

Mediterr J Infect Microb Antimicrob 2021;10:24

Erişim: <http://dx.doi.org/10.4274/mjima.galenos.2021.2020.24>

Mediterr J Infect Microb Antimicrob 2021 10 :24'de Yayınlanmış Olan İngilizce Yazının Birebir Türkçe Versiyonudur.

Protez Eklem Enfeksiyonlarının Mikrobiyolojik Tanısı

Microbiological Diagnosis of Prosthetic Joint Infections

Burçin ÖZER

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye

Öz

Protez eklem enfeksiyonları (PE) eklem replasman cerrahisinin en önemli komplikasyonlarından birisidir. Protez eklem enfeksiyonlarının tanısı multidisipliner bir yaklaşım ile yapılmalıdır. Etken mikroorganizmaların izole edilmesi ve bu mikroorganizmaların antimikrobiyal duyarlılıklarının belirlenmesi için mutlaka mikrobiyolojik tanı yöntemleri kullanılmalıdır. Protez eklem enfeksiyonlarının preoperatif tanısında kullanılan mikrobiyolojik yöntemler; kan kültürü, eklem sıvısının lökosit sayısı ve tipi ve eklem sıvısının kültürüdür. İntraoperatif tanıda kullanılanlar ise ameliyat sırasında alınan protez ve çevresinden alınan abse, eklem sıvısı, yumuşak doku ve kemiklerden alınan örneklerin kültürüdür. Protez eklem enfeksiyonlarında kullanılan diğer mikrobiyolojik yöntemler mikrokalerimetre, matriks aracılı lazer dezorpsiyon/iyonizasyon uçuş zamanlı kütle spektrometresi, cam boncuk ile doku örneklerinin homojenizasyonu, floresan *in situ* hibridizasyon, sinoviyal biyomarkere bakılması, enzimatik kalıp oluşturma ve amplifikasyonudur. Ayrıca polimeraz zincir reaksiyonu 16S rRNA sekanslama analizi gibi çeşitli moleküler yöntemler PE tanısında kullanılabilir. Bu derlemenin amacı güncel literatürler eşliğinde PE'nin mikrobiyolojik tanı yöntemlerinin tartışılmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Mikrobiyoloji, protez, eklem enfeksiyonları, tanı

Abstract

Prosthetic joint infections (PJI) are the most important complication of joint replacement surgery. Diagnosis of PJI should be made with a multidisciplinary approach. Microbiological diagnostic methods must be used to isolate the causative microorganisms and to determine the antimicrobial susceptibility of these microorganisms. Microbiological methods used in preoperative diagnosis are blood culture, leukocyte count and type in synovial fluid and culture of synovial fluid. Those used in intraoperative diagnosis are cultures of abscesses, synovial fluid, soft tissue and bones located in and around prosthesis taken during the surgery. Other microbiological methods used in diagnosis of PJIs are microcalorimetry, matrix assisted laser desorption/ionization flight time mass spectrometry, homogenization of tissue samples with glass beads, fluorescent *in situ* hybridization, synovial biomarkers, enzymatic template generation and amplification. Also, various molecular methods such as 16S rRNA sequencing analysis and polymerase chain reaction methods can be used for diagnosis of PJI. The aim of this review was to discuss the microbiological diagnostic methods of PJI in the light of current literatures.

Keywords: Microbiology, prosthesis, joint infections, diagnosis

Giriş

Eklem replasman cerrahisi osteoartrit gibi dejeneratif eklem hastalığı olan kişilerde hareketliliği arttırma ve ağrıyı azaltmak için yapılan büyük bir operasyondur^[1]. Protez eklem enfeksiyonları

(PE) eklem replasman cerrahisi sonrası gelişen yüksek morbidite ve yüksek maliyet ile sonuçlanan bir komplikasyondur^[2]. Protez eklem enfeksiyonları hastanede kalış süresini uzatır, ilave cerrahi ve antimikrobiyal tedavi gerektirir, tedavi maliyetini yükseltir ve hatta ölüme yol açabilir^[3].

Atıf: Özer B. Microbiological Diagnosis of Prosthetic Joint Infections. Mediterr J Infect Microb Antimicrob. 2021;10:24.

Yazışma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Burçin Özer, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
Tel.: +90 533 417 11 70 E-posta: burcinozer@yahoo.com
Geliş Tarihi/Received: 01.09.2020 Kabul Tarihi/Accepted: 13.04.2021 ORCID ID: orcid.org/0000-0001-8965-9335
©Telif Hakkı 2017 Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği
Mediterranean Journal of Infection Microbes and Antimicrobials, Galenos Yayınevi tarafından basılmıştır.

Yayınlanma: 16 Nisan 2021

Eğer erken tanı konulabilirse PE için tedavi başarı oranları arttırılabilir. Buna karşı gecikmiş tanı genellikle azalmış fonksiyon, artmış morbidite ve daha karmaşık ameliyat ihtiyacına yol açabilir^[2]. Protez eklem enfeksiyonları tanısında, ideal duyarlılığı, özgüllüğü ve kesin tanısını yapabilecek rutin olarak kullanılan tek bir klinik ve laboratuvar test gösterilmemiştir. Bu yüzden genellikle laboratuvar, histopatolojik, mikrobiyolojik, görüntüleme çalışmalarının bir kombinasyonu gerekmektedir^[4]. Mikrobiyolojik tanı yöntemleri sayesinde etken mikroorganizma saptanabilir ve antimikrobiyal duyarlılığı tespit edilebilir. Mikroorganizmanın antimikrobiyal duyarlılığının bilinmesi tedavideki başarıyı arttırdığı için mikrobiyolojik tanı çok önemlidir^[4-6].

Protez eklem enfeksiyonlarında mikrobiyolojik tanı preoperatif ve intraoperatif olarak ikiye ayrılır^[7,8]. Preoperatif tanıda tarama testleri olarak lökosit sayımı ve C-reaktif protein (CRP) ve eritrosit sedimentasyon hızı (ESH) gibi akut faz reaktanları kullanılır^[9]. Lökosit sayımı ve ESH mikrobiyolojik tanı yöntemleri olmasa da bunlardan da kısaca bahsedilecektir. Kan kültürü, sürüntü kültürü ve eklem sıvısının incelenmesi ve kültürü de preoperatif tanıda faydalanan laboratuvar işlemleridir. İntraoperatif tanıda ise ameliyat sırasında alınan örneklerin kültürü yapılmalıdır^[9,10].

A. Preoperatif Tanıda Kullanılan Testler

Yaygın kullanımı ve düşük maliyetleri sebebiyle PE'de değerlendirmede kullanılan ilk tarama testleri; serum lökosit sayısı ve tipi, CRP ve ESH'dir^[8-10].

Lökosit Sayısı ve Tipi

Protez eklem enfeksiyonlarında serum lökosit sayısının duyarlılığı %55, özgüllüğü %66'dır. Lökosit tipinin ise duyarlılığı %52, özgüllüğü %75'dir. Enfeksiyonu saptamada faydalı olsa da odağı tam gösteremediği için duyarlılık ve özgüllüğü düşüktür^[9,11]. Rutin laboratuvar incelemeleri enfeksiyon lehine bulgular içerse de lökositoz olmayabilir. Yapılan çalışmalarda serum lökosit sayısı ve tipinin PE'lerin tanısında rolü olmadığı belirlenmiştir^[9,11].

Eritrosit Sedimentasyon Hızı

Eritrositlerin salin veya plazma içinde test tüpünün dibine çökme hızıdır. Basit ve ucuz bir testtir. En eski ve sık kullanılan laboratuvar testlerinden biridir^[12]. Normal değeri erkeklerde 15 mm/saat, kadınlarda ise 20 mm/saattir. Yükselmesi sıklıkla enfeksiyonlar, enflamasyonlar, maligniteler ile ilişkilidir^[12]. Eritrosit sedimentasyon hızı cerrahi sonrası yükselir ve uzun süre yüksek kalır. Anemi, makrositoz, polisitemi, sferositoz, akantositoz, mikrositoz, hipoalbuminemi gibi faktörler ESH'yi etkileyeceği ve cerrahi sonrası yükselip tekrar normal değerlere inmesi çok uzun süreceği için PE'lerde duyarlılığı %54-82 ve özgüllüğü %65-85 arasında değişmektedir^[12,13].

C-Reaktif Protein

Karaciğerde sentez edilen globulin yapısındaki bir akut faz reaktandır. İnvazif bakteriyel enfeksiyonlarda normale göre 15-40 kat artabilmektedir. Viral enfeksiyonlarda genel olarak 3-5 kat artar, Sitomegalovirüs gibi viral enfeksiyonlarda ve miyokardit gibi doku tutulumlarında da 10 kattan fazla artış olabilmektedir. Enfeksiyon hastalıkları dışında CRP, sistemik vaskülitlerde ve malignitelerde (özellikle lenfomalarda) 5-20 kat artmaktadır^[14]. Enflamasyon ve doku yıkımı halinde kısa sürede artıp, durum düzelince hızla azalır. Cerrahi sonrası ikinci gün pik yapar, iki üç haftada normale döner. Çoğu zaman ESH ve CRP arasında paralellik bulunsa da; anemi, makrositoz, polisitemi, sferositoz, konjestif kalp yetmezliği, hipergammaglobulinemi gibi durumlardan daha az etkilendiği için CRP iltihabi olaylarda daha spesifik bir göstergedir^[14]. C-reaktif protein PE tanısı koymada daha değerli bir testtir. Duyarlılığı %80-96 ve özgüllüğü %93-100'dür^[15]. 10 mg/dl'den yüksek değerler enfeksiyon lehine yorumlanmalıdır. Protez eklem enfeksiyonu olduğu halde; süpresif antimikrobiyal tedavide, düşük virülanslı patojenlerde, kronik enfeksiyonlar ve fistül ile birlikte olan enfeksiyonlarda düşük olabilir^[15]. Eşlik eden enflamatuvar durumlara bağlı olarak ve primer komplike olmayan artroplasti sonrası çok artabilir. Eritrosit sedimentasyon hızı ve CRP her ikisi de normal değerlerde ise yükselme yok ise periprostetik enfeksiyon ekarte edilebilir^[15]. Her ikisi de yükselmiş ise PE olabilir ileri tetkikler yapılmalıdır. Eritrosit sedimentasyon hızı 30 mm/saat, CRP: 10 mg/dl'den fazla ise PE için duyarlılık %97,6'ya yükselir^[15]. CRP ve ESH değerlerinin tanısız duyarlılığı protez veya cerrahinin tipine bağlı olarak değişebilir. Diz artroplasti ve omurga implant hastalarında gelişen enfeksiyonlarda CRP ve ESH değerlerinin tanısız duyarlılığı kalça PE'deki CRP ve ESH değerlerinin tanısız duyarlılığından fazladır. Omuz artroplasti enfeksiyonlarının tanısında duyarlılığı düşüktür^[15-17]. Bu, omuz artroplasti enfeksiyonunda düşük virülanslı organizma olan *Propionibacterium acnes*'in sık etken olması sonucu olabilir veya omuz artroplasti enfeksiyonu için optimize edilmiş sınır değerlerinin kullanılmaması ile ilgili olabilir^[17]. Amerika Enfeksiyon Hastalıkları Derneği'nin (IDSA) PE'ler için hazırladığı klinik rehberde; klinik olarak tanı açık olmadığı zaman sedimentasyon hızı ve CRP testleri şüpheli PE'li bütün hastalarda yapılması önerilmektedir. Anormal sedimentasyon hızı ve CRP birlikte olması en yüksek duyarlılık ve özgüllüğü sağlar (A-3) (Tablo 1)^[18-20].

İnterlökin-6

İnterlökin-6 (IL-6) makrofaj, Th2 hücreleri, B hücreleri, endotel hücrelerinden salgılanır. Travma, kronik enflamatuvar durumlar ve artroplastiden sonra periferik kandaki konsantrasyonu artar. İnterlökin-6, operasyon sonrası erken dönemde enfeksiyonu belirlemede ve tedavi yanıtını izlemede kullanılabilir. Yüksek CRP düzeyleri ile birlikte 12 pg/ml'nin üzerindeki IL-6 düzeyleri

PE'lerde iyi bir tarama testi olabilir^[3,21,22]. Serum IL-6 seviyesini belirlemenin bir avantajı eklem artroplastisinden kısa süre sonra hızla normale dönmesidir. C-reaktif proteinin yarı ömrü 62 saat iken IL-6'nın yarı ömrü 15 saattir^[23].

Prokalsitonin

Tiroid bezinde sentezlenen kalsitoninin prohormonudur. Bakteriyel lipopolisakkarid ile mononükleer hücrelerden, tümör nekroz faktörü- α (TNF- α) ve IL-6 uyarısı ile karaciğer hücrelerinden salgılanır. Normalde <0,05 ng/ml gibi çok düşük miktarlarda bulunur. Enfeksiyon sırasında bu değer 0,5 ng/ml üzerine çıkmaktadır. Sistemik semptomlar gösteren ciddi enfeksiyonlarda (bakteriyel, parazitik ve fungal) 100 ng/ml'nin üzerine çıkabilir^[8]. Viral enfeksiyonlar, enflamatuvar olaylar ve lokalize bakteriyel enfeksiyonlar hafif artışa yol açarken sistemik bakteriyel enfeksiyonda miktarında ciddi artış olduğu saptanmıştır. Ateşin enfeksiyöz olmayan sebeplerini enfeksiyonlardan ayırmada faydalıdır. Artroplastiden sonra serum prokalsitonin düzeyleri belirgin olarak artmaz. Protez eklem enfeksiyonları tanımlamada değeri bulunmamıştır^[8-11].

Kan Kültürleri

Protez eklem enfeksiyonlarından şüphelenilen olgularda, febril hastalarda, metastatik enfeksiyon şüphesi var ise iki veya daha fazla kan kültür seti veya tekrarlayan örnekler alınmalıdır. Kan kültürü PE olgularının sadece %20'sinde pozitifdir. Sistemik sepsis bulguları olmayan hastalarda ise kan kültürleri nadiren pozitifdir^[19,20]. IDSA rehberinde; ateş, akut başlangıçlı semptomlar varsa, eş zamanlı başka bir enfeksiyonu varsa, patojen (örneğin: *S. aureus*) izole edilmişse, enfektif endokardit şüphesi veya kardiyak pacemaker varsa kan kültürü alınması önerilmektedir^[20].

Preoperatif Alınan Eklem Sıvısı

Kalça protezinde; ESH ve CRP yüksekliği, diz protezinde; ESH ve/veya CRP yüksekliği var ise artrosentez yapılarak eklem sıvısı alınır. Eklem sıvısında lökosit sayımı yapılır. Lökosit sayısı >1700 hücre/ μ l ise PE için duyarlılık %94, özgüllük %88'dir^[15]. Eklem sıvısı Gram ile birlikte Giemsa yöntemi ile boyanarak incelenir.

Lökosit tipleri belirlenir. Nötrofil hakimiyeti %65'den fazla ise PE için duyarlılık %97, özgüllük %98'dir^[15,16]. Mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilen eklem sıvısının kültürü de yapılmalıdır. Eklem sıvısının incelenmesi ile birlikte kültürü de yapılırsa duyarlılık %82-94 ve özgüllük %94-97 olmaktadır. Kültürde mikroorganizmanın üreme şansını arttırmak için pediatrik kan kültür şişesine de ekim yapılmalıdır^[19,20].

Periprotetik frozen dokunun 400 kez büyütmede mikroskopta incelenmesinde her alanda beşden fazla nötrofil saptanmasının duyarlılığı %80'den, özgüllüğü ise %90'dan fazladır. Histopatolojik incelemenin en önemli kısıtlılığı etken mikroorganizmanın tespit edilememesidir. Uygun tedavinin düzenlenmesi için etken mikroorganizmanın izole edilmesi ve antibiyogramının yapılması çok önemlidir^[15,16].

Eklem sıvısının preoperatif aspirasyonu ve kültürünün yapılması ve etken mikroorganizmanın tanımlanmasının duyarlılığı %82-94, özgüllüğü %94-97'dir. Fakat antimikrobikallerin aspirasyondan 2-3 haftadan önce kullanılması, yanlış negatif eklem sıvı kültür sayısını arttırmaktadır^[15].

Amerika Enfeksiyon Hastalıkları Derneği'ne göre, eklem sıvısının analizi aerobik ve anaerobik mikroorganizmalar için yapılan kültür kadar toplam hücre sayımı ve lökosit tipinin tayinini de içermelidir (A-3)^[18-20]. Kültür için eklem sıvısının alınmasından en az iki hafta önce antimikrobiyal tedavinin kesilmesi hastalarda mikroorganizmanın elde edilmesini arttırır (B-3)^[18-20].

Diğer Kültürler

Yüzeysel yara veya sinüs yolu kültürlerinde buraları çevreleyen deriden mikrobiyal kolonizasyon olabilir. Derin enfeksiyonlara sebep olanları saptamadığı için yardımcı değildir. Sinüs yolundan alınan kültürde patojen düşük oranlarda tespit edilebilir. Sinüs yolundan sadece *S. aureus* izolasyonu anlamlıdır^[24]. Aspire edilen eklem sıvısının kültürü mikroorganizmayı %45-100 tespit edebilir, bu oran pediatrik kan kültür şişesine ekim yapılarak arttırılabilir^[25,26]. Eklem sıvısının pediatrik kan kültür şişelerine ve konvansiyonel agar plak yöntemine ekilmesi ve her iki yöntemin sonuçlarının karşılaştırılması ile yapılan bir çalışmada kan

Tablo 1. Önerinin gücü ve kanıt kalitesi

Kategori/Derece	Tanım
Önerinin gücü	
A	Bir öneriyi desteklemek için kullanım lehinde veya aleyhinde iyi kanıtlar
B	Bir öneriyi desteklemek için kullanım lehinde veya aleyhinde orta düzeyde kanıtlar
C	Bir öneriyi destekleyecek zayıf kanıt
Kanıt kalitesi	
1	>1 doğru randomize edilmiş kanıt, kontrollü deneme
2	İyi tasarlanmış 1'den fazla klinik araştırmadan randomizasyon olmadan; kohort veya olgu kontrollü analitik çalışmalardan (tercihen >1 merkezden); çoklu zaman serilerinden; veya kontrolsüz deneylerden dramatik sonuçlardan elde edilen kanıt
3	Klinik deneyim, tanımlayıcı çalışmalar veya uzman komitelerin raporlarına dayanan otoritelerin görüşlerinden kanıt

kültür şişesine ekilenlerde 62 patojen izole edilirken agar plak yönteminde 57 patojen izole edildiği bildirilmiştir^[26]. Örneklerin toplanmasından en az iki hafta önce antibiyotik tedavisi kesilirse mikroorganizmaların elde edilmesi artar^[23].

B. İntraoperatif Tanıda Kullanılan Testler

Kültür

Ameliyat sırasında protez ve çevresinden abse, eklem sıvısı, yumuşak doku, kemiklerden örnek alınabilir^[20]. Protezin komponentleri de çıkarılacak ise laboratuvara kültür için gönderilmelidir. En az üç ayrı yerden biyopsi örneği alınmalıdır. Eküvyonlu çubukla alınan örneklerin kültürlerinin duyarlılığı düşüktür, biyopsi örnekleri tercih edilmelidir. Örnekler ayrı steril aletlerle alınmalı ve ayrı steril kap içine konmalıdır. Olabildiğince hızlı laboratuvara gönderilmelidir. Anaerobik şartlar gerekli ise taşıma besiyeri kullanılmalıdır. Eklem sıvısının pediatrik kan kültür şişelerine inoküle edilmesi ile direkt kültür yöntemlerinden daha fazla patojen tespit edilebilir^[19,20]. İki veya daha fazla bağımsız örnekten aynı mikroorganizmanın izolasyonu enfeksiyonun kuvvetli göstergesidir. Devam eden antibiyotik tedavisinde örnekte organizma tespit etmek güçleşeceği için, kültür için örnek alımından iki hafta önce antibiyotik tedavisi kesilmelidir. Kültür için doku örnekleri alınmadan revizyon cerrahisinde perioperatif profilaksi başlanmamalıdır^[20].

Histopatolojik inceleme PE ve akut enflamasyonun tanımlanmasına yardım edebilir. Ancak etken mikroorganizmayı saptayamaz. Periprotetik dokunun yorumlanmasında periprotetik doku örneklerinin histopatolojik incelemesi güvenilir tanısal testtir^[23]. En az 3 ve optimal olarak 5 veya 6 periprotetik intraoperatif doku örnekleri veya çıkarılmış protezin aerobik ve anaerobik kültürü istenmelidir (B-2)^[18-20]. Antimikrobiyal tedaviden en az iki hafta öncesinde alınan intraoperatif kültür örnekleri organizmanın elde edilmesini arttıracaktır (A-2)^[18-20].

İntraoperatif Gram-boyama ile etkeni hızlı tanımak önerilebilir, ancak Gram-boyama hastaların 1/3'ünden daha azında pozitifdir. Doku örneklerinin Gram-boyaması düşük duyarlılık (%26) ve yüksek özgüllüğe (%97) sahiptir^[13,15,20].

Protez eklem enfeksiyonları gelişim zamanlarına göre erken, gecikmiş ve geç enfeksiyonlar olarak üçe ayrılır^[9,15,16]. Erken enfeksiyonlar üç aydan önce görülen enfeksiyonlardır. Erken enfeksiyonlarda etken genellikle hastanın ve sağlık çalışanlarının florasındaki ve ameliyathanedeki ortamda bulunan mikroorganizmalardır ve direkt inokülasyon ile enfeksiyona yol açarlar^[9,15,16]. Bu dönemde görülen enfeksiyonlarda en sık izole edilen mikroorganizmalar *S. aureus* ve Gram-olumsuz basillerdir^[15,16,20,27]. Gecikmiş enfeksiyonlar üç ay ve iki yıl arasında ortaya çıkar ve bu dönemdeki enfeksiyonlarda en sık izole edilen mikroorganizmalar koagülaz negatif stafilokoklardır.

Geç enfeksiyonlar ise hematojen yolla yayılırlar. Genitoüriner ve gastrointestinal sistem işlemleri ve enfeksiyonları sırasında bu bölgelerden *Enterobacteriaceae* ve *Pseudomonas aeruginosa* başta olmak üzere Gram-olumsuz basiller, *Enterococcus* spp. ve anaerob bakteriler hematojen yolla yayılarak PE'ye yol açabilirler. Dentogingival işlem ve enfeksiyonları sırasında ise viridans streptokoklar, *Peptococcus* spp. ve *Peptostreptococcus* spp. protez eklem enfeksiyonlarına yol açarken piyogenik deri enfeksiyonları sırasında *Streptococcus* spp. enfeksiyona yol açabilir^[15,16]. Polimikrobiyal enfeksiyon ve *Candida* spp. *Brucella* spp ve *Mycobacteria* gibi olağandışı patojenler de bildirilmiştir. Belirgin bir kısmında ise herhangi bir mikroorganizma üretilmez. Bunların büyük bir kısmında antimikrobiyal ajan kullanılmaktadır^[4,15,16,20,27].

Başlangıç zamanı ve klinik belirtilere göre ise PE'ler dörde ayrılır^[27,28].

I. Pozitif intraoperatif kültür: Operasyon sırasında alınan en az iki kültürde aynı mikroorganizmanın üremesi.

II. Erken postoperatif enfeksiyon: Operasyon sonrası bir ay içinde gelişen enfeksiyon. Yüzeysel ve derin erken postoperatif enfeksiyon olarak ikiye ayrılır. Yüzeysel enfeksiyonlarda koagülaz negatif stafilokoklar ve *S. aureus* etkindir. Derin enfeksiyonlarda *S. aureus*, koagülaz negatif stafilokoklar ve Gram-olumsuz basiller etkindir.

III. Akut hematojen enfeksiyon: Fonksiyonu iyi olan bir eklemden akut enfeksiyon semptomlarının bulunduğu enfeksiyon. *S. aureus* ve streptokoklar etkindir.

IV. Geç kronik enfeksiyon: Operasyondan bir ay sonrası gelişen, subakut ve sinsi klinik semptomlarının bulunduğu enfeksiyon. *S. aureus*, koagülaz negatif stafilokoklar ve Gram-olumsuz basiller etkindir.

Örneğin; yanlış alınması, antibiyotik tedavisi uygulanan hastalarda, mikroorganizmaların az sayıda olması, nazlı mikroorganizmalarda, uygun olmayan besiyeri kullanımında, örneğin işlenmesinde gecikme ve biyofilm ile ilişkili PE'de kültür sonucunda mikroorganizma üremeyebilir. Biyofilm ile ilişkili PE'lerde kültür öncesinde uygulanan sonikasyon işlemi ile mikroorganizma izolasyon şansı arttırılabilir^[29].

İmplant ile ilişkili enfeksiyonlara tipik olarak biyofilm olarak bilinen yapılarda büyüyen mikroorganizmalar sebep olurlar. Biyofilm, değiştirilmiş fenotipleri olan yüzeylere bağlı, kendi ürettikleri ekzopolimer sakkaritler ile kendi kendini organize eden mikroorganizmalardan oluşur. Özellikle *S. aureus* ve koagülaz negatif stafilokoklar biyofilm oluşturabilir. Biyofilm mikropları antimikrobiyallere özellikle de hücre duvarına etkili ajanlara 10-1000 kez daha az duyarlıdır. Biyofilmlere gömülü mikroorganizmaları yok etmek için antibakteriyel ajanların yüksek konsantrasyonları gerekebilir^[2].

Protezin Sonikasyonu ve Kültürü

Ameliyat sırasında çıkarılan protezler, eklem komponentleri, kemikler, pim, vida steril kap içine konur. Ringer laktat ya da fizyolojik tuzlu su ile kaplanır. Sonikasyon cihazında beş dakika süre ile 40 ± 2 kHz dalga boyunda ses dalgaları uygulanır^[29]. Sonikasyon öncesi içinde protez olan sıvı vortekslenerek sıvıdan uygun besiyerlerine ekim yapılır. Beş dakika sonikasyon işleminden sonra tekrar vortekslenir ve uygun besiyerlerine ekim yapılır. Sonikasyon sonrası mikroorganizma sayısı artmış ise biyofilm ile ilişkili enfeksiyon vardır^[29]. Periprostetik doku kültürünün duyarlılığı %60,8, özgüllüğü %99,2'dir. Sonikasyon yapılmış sıvı kültürünün duyarlılığı ve özgüllüğü daha fazladır (%78,5-98,8)^[20]. Sonikasyon rutin tanımlama merkezlerinde yaygın olarak kullanılmamaktadır. İşlem sırasında kontaminasyon riski vardır. Vorteksleme işlemi bakterilere zarar vermez. Sonikasyon olmadan da aletin vortekslenmesi faydalı olabilir. Çıkarılan protezin sonikasyonu ile özellikle biyofilm oluşturan bakteri protez yüzeyinden ayrılması sağlanır. Protezin ultrasonik kültürü geleneksel doku kültürleri ile karşılaştırıldığında aerobik ve anaerobik kültürün duyarlılığını arttırabilir^[20].

Doku örneklerinde düşük duyarlılığa sahip olan Gram-boyama rutin tanı testi olarak yararlı değildir. Gram-boyamanın sonikasyon işlemi uygulanmış sıvıdaki duyarlılığı daha fazladır. Laboratuvar kontaminasyonuna bağlı olarak Gram boyamada yanlış pozitiflik olabilir^[20].

Protez ve Bileşenlerinin Ditiyotritol ile Muamelesi

Ditiyotritol (DTT) sonikasyona alternatif olarak kullanılabilir^[30]. Steril fosfat tamponlu salin içinde %0,1'lik DTT protez ve bileşenleri üzerine konur. 80 rpm'de 15 dakika çalkalanır. Aerop ve anaerob bakteriler için kültürleri yapılır. Sonikasyon ve DTT uygulanması, standart doku kültürlerinden daha duyarlıdır. Duyarlılığı %89, özgüllüğü %91'dir^[31].

Yapılan işlemlerin sonuçlarının tanıda kullanılması; Kas İskelet Enfeksiyon Derneği, Uluslararası Uzlaşma Toplantısı'nın PE tanı kriterleri ve skrolama sistemlerinin gösterildiği Tablo 2'de, IDSA, Avrupa Kemik ve Eklem Derneği'nin PE tanı kriterleri ve skrolama sistemlerinin gösterildiği Tablo 3'de özetlenmiştir^[18,19,32-34].

Protez eklem enfeksiyonlarında kullanılan testlerin duyarlılık ve özgüllükleri Tablo 4'te gösterilmiştir.

Tablo 2. Kas İskelet Enfeksiyon Derneği, Uluslararası Uzlaşma Toplantısı'nın protez eklem enfeksiyonları tanı kriterleri ve skrolama sistemleri^[21]

Tanımlama kaynağı	Skrolama sistemi	Majör kriterler	Minör kriterler
MSIS 2011 ^[31]	2 majör kriterden bir tanesinin olması veya 6 minör kriterden ≥ 4 olması	1. Protez ile ilişkili sinüs yolunun olması 2. Protez ekleminden alınmış en az iki ayrı doku veya sıvı örneğin kültüründen bir mikroorganizma izole edilmesi	a. Yükselmiş ESH (>30 mm/h) ve CRP (>10 mg/dl) b. Sinoviyal lökosit sayısının artması c. PNL yüzdesinin artması d. Etkilenen eklemde püy olması e. Periprostetik doku veya sıvının bir kültüründe mikroorganizma izolasyonu f. Periprostetik dokunun x400 büyütme ile histolojik incelenmesinde her alanda beşten fazla nötrofil bulunması
ICM 2018 ^[32]	2 majör kriterden bir tanesinin olması minör kriter skrolaması ≥ 6 ise enfekte, 3-5 arasında olması muhtemelen enfekte, (yeni nesil dizileme gibi ileri moleküler tanıları düşünün) <3 enfekte değil	1. Protezin görüntülenmesi veya kanıtlanmış protez ile ilişkili sinüs yolunun olması 2. Standart kültür yöntemleri kullanılarak aynı mikroorganizmanın iki kere izole edilmesi	a. Yüksek CRP (akut enfeksiyon için; >100 mg/L kronik enfeksiyon için; >10 mg/L) veya D-dimer (akut enfeksiyon eşığı bilinmiyor, kronik enfeksiyon için; >860 g/L) (skor 2) b. Yüksek ESH (akut enfeksiyonda anlamı yok. Kronik enfeksiyon için; >30 mm/s) (skor 1) c. Yüksek eklem lökosit sayısı (akut enfeksiyon için; $>10,000$ hücre/ml, kronik enfeksiyon için; >3000 hücre/ml veya lökosit esterazın akut ve kronik enfeksiyon için; ++ olması veya pozitif alfa-defensin (skor 3) d. Yüksek PNL yüzdesi (akut enfeksiyon için; $>\%90$, kronik enfeksiyon için: $>\%70$) (skor 2) e. Tek bir pozitif kültür (skor 2) f. Pozitif histoloji (skor 3) g. Pozitif intraoperatif püy (skor 3)

C. Protez Eklem Enfeksiyonlarının Tanısında Kullanılabilen Diğer Yöntemler

Mikrokolorimetre

Bölünen mikroorganizmaların çoğalmaları ve metabolizmaları ile ilişkili olarak üretilen ısı yoğunluğunu gerçek zamanlı olarak ölçer. *In vitro* analizler, biyofilmleri saptamada doğru, invaziv olmayan ve gerçek zamanlı bir mikrobiyolojik test olabileceğini göstermiştir. Akut artritli hastalardan alınan eklem sıvılarının mikrokolorimetrik analizi ile septik ve septik olmayan artritlerin 8-10 saat içinde ayrımı yapılabilmektedir^[8].

Matriks Aracılı Lazer Dezorpsiyon/İyonizasyon Uçuş Zamanlı Kütle Spektrometresi

Nükleik asitler ve proteinler dahil büyük makromoleküllerin analizini kolaylaştıran matriks aracılı lazer dezorpsiyon/iyonizasyon uçuş zamanlı kütle spektrometresi (MALDI-TOF MS) yöntemiyle mikroorganizmaların spesifik protein yapılarının iyonize olarak uçuş zamanına göre protein parmak izinin oluşturulması prensibine dayanır. Bu yöntemle patojen mikroorganizmalar hızlı bir şekilde tanımlanabilmektedir. Bu yöntemde mikroorganizmaların protein yapıları, sistemin veri tabanındaki referanslarla karşılaştırılmaktadır^[8,35]. Bu

Tablo 3. Amerika Enfeksiyon Hastalıkları Derneği, Avrupa Kemik ve Eklem Derneği'nin protez eklem enfeksiyonları tanı kriterleri ve skorlama sistemleri^[21]

Tanımlama kaynağı	Skorlama sistemi	Kriterler
IDSA 2013 ^[20]	Birden fazla pozitif kriterin olması	1. Protez ile ilişkili sinüs yolunun olması 2. Protezi çevreleyen diğer etiyolojik etkenler olmadan püy olması 3. Periprostetik dokunun histopatolojik incelenmesinde akut enflamasyon olması 4. İki ve daha fazla intraoperatif kültürde veya preoperatif aspirasyon ve intraoperatif kültürlerde birlikte mikroorganizma. Tek bir doku biyopsi veya eklem sıvısında virülen bir mikroorganizma (örneğin: <i>S. aureus</i>) üremesi de PE göstergesi olarak kabul edilir.
EBJIS 2018 ^[33]	Birden fazla pozitif kriterin olması	1. Protez ve sinüs yolu etrafında püy varlığı 2. Eklem sıvısında yüksek lökosit sayısı (>2000 hücre/ml veya >%70 granülosit) 3. Pozitif histopatoloji 4. Eklem sıvısı, periprostetik doku veya sonikasyon kültüründe mikrobiyal üreme (≥1 örnekte yüksek virülen bir mikroorganizma üremesi veya ≥2 örnekte düşük virülen mikroorganizma üremesi) Sonikasyon kültür pozitifliği; sonikasyon sıvısının kültüründe >50 kob/ml üreme olması)

IDSA: Amerika Enfeksiyon Hastalıkları Derneği, EBJIS: Avrupa Kemik ve Eklem Derneği, PE: Protez eklem enfeksiyonları

Tablo 4. Protez eklem enfeksiyonu tanısında kullanılan testler, duyarlılık ve özgüllükleri

Zamanlama	Testler	Duyarlılık %	Özgüllük %	Kaynak no
Preoperatif	Lökosit sayısı	55	66	9,11
	Lökosit tipi	52	75	9,11
	ESH	54-82	65-85	12,13
	CRP	80-96	93-100	15
	ESH >30 mm/sa, CRP >10 mg/dl	97,6		15
	İnterlökin-6	100	86	20
	Prokalsitonin	33	98	20
	Eklem sıvısında lökosit sayısı >1700 hücre/μl	94	88	15
	Eklem sıvısında nötrofil ≥%65	97	98	15,16
	Eklem sıvısı kültürü	82-94	94-97	19,20
İntraoperatif	Doku örneklerin Gram-boyama ile incelenmesi	26	97	13,15,20
	Periprostetik doku kültürü	60,8	99,2	20
	Protezin sonikasyonu ve kültürü	78,5	98,8	20
	Eklem sıvısının sonikasyonu ve kültürü	78,5	98,8	20
	Protez ve bileşenlerinin ditiyotritol ile muamelesi	89	91	31
	Polimeraz zincir reaksiyonu	91,2	92,3	19,20

CRP: C-reaktif protein, ESH: Eritrosit sedimentasyon hızı

yöntem, kolayca uygulanabilir, pahalı olmayan reaktifler gerektirir ve örnek yüklendikten kısa bir süre sonra 15 ila 30 saniyede mikroorganizmayı tanımlayabilir^[35]. Protez eklem enfeksiyonlarında mikroorganizma erken tanımlanabilirse hedeflenen ampirik tedavi dirençli suşların ortaya çıkışını azaltmak için daha kesin bir şekilde uygulanabilir. Eklem sıvısı ekilmiş pozitif kan kültürlerinin doğrudan MALDI-TOF MS analizi, hızlı patojen tanımlama avantajına sahiptir. Yapılan çalışmalarda, PE'lerde eklem sıvısı ekilmiş pozitif kan kültürlerinde doğrudan MALDI-TOF MS ile tanımlanmasına kadar geçen medyan sürenin önemli ölçüde daha kısa olduğu gösterilmiştir^[35,36].

Cam Boncuk ile Doku Örneklerinin Homojenizasyonu

Biyofilmlerden hücre içi patojenleri serbest bırakmak için doku örneklerinin cam boncuklarla homojenizasyonunu içerir^[8].

Floresan *In Situ* Hibridizasyon

Floresan *in situ* hibridizasyon (FISH) ve peptid nükleik asit probu: FISH, pozitif kan kültürü şişelerinde bir saatten daha kısa sürede spesifik mikroorganizmaları tanımlayabilir. FISH'i konfokal lazer tarama mikroskobu ile birleştirmek antimikrobiyal ajanların etkinliğini değerlendirmeye yardımcı olabilecek ve PE tanısı için büyük bir potansiyel sunan biyofilmlerin 2D ve 3D görüntülerini oluşturur^[8].

Sinoviyal Biyomarkerlar

Sinoviyal biyomarkerların kullanımı PE'de hızlı ve ucuz tanı yöntemleri olarak araştırılmaktadır^[8,34]. Sinoviyal biyomarkerlar iki ana gruba ayrılabilirler: Antimikrobiyal fonksiyonları olan sitokinler ve biyomarkerlar. Eklemde enfeksiyon meydana geldiğinde, interlökin-1b, IL-6, interlökin-8, interlökin-17 ve TNF- α gibi sitokinler, makrofajlardan salgılanırlar. Bu biyomarkerlar romatoid artrit gibi eklemde diğer enflamatuvar hastalıklarında da yükselebildikleri için özgüllükleri düşüktür. Daha spesifik sinoviyal sıvı biyomarkerları lökosit esteraz, insan α -defensin, insan β -defensin, sinoviyal CRP'dir^[37].

Enzimatik Kalıp Oluşturma ve Amplifikasyon

Kan kültür şişelerindeki canlı organizmaların tespiti için yeni ve hızlı bir teknolojidir. Teknik, klinik numuneler içindeki mikrobiyal DNA polimeraz seviyesini üç saatten daha kısa sürede %90,6 duyarlılık ve %99,0 özgüllük ile belirler^[8].

D. Moleküler Yöntemler

Protez eklem enfeksiyonları tanısında polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ve 16S rRNA sekanslama analizi spesifik PZR'leri ve ters transkripsiyon PZR gibi çeşitli moleküler yöntemler kullanılmıştır^[8,34]. Bunlar özellikle kültür-negatif enfeksiyonlarda veya nazlı mikroorganizmaların varlığında önemli olan yöntemlerdir. Sinoviyal sıvı veya doku örnekleri sonikasyon veya boncukla homojenizasyondan sonra sıvı veya intraoperatif doku örnekleri bu teknikler ile araştırılabilir.

Polimeraz zincir reaksiyonunun duyarlılığı %91,2, özgüllüğü ise %92,3'tür^[8,19,20].

Geliştirilme aşamasında potansiyel olarak faydalı diğer teknolojiler mikrodizi, faj kaynaklı empedans dalgalanması analizi, nanotıp ve metabolomikleri içerir^[8]. Bunlar gelecekte potansiyel olarak PE'nin rutin yönetiminde uygulanabilir. Sadece patojenleri tanımlama, virülans faktörlerini ve antimikrobiyal duyarlılıklarını belirlemede değil, aynı zamanda hastalık süreci ve hastalığın ilerlemesinin yanı sıra tedaviye yanıtı da gösterirler.

Sonuç

Protez eklem enfeksiyonlarının tanısını yapabilmek için laboratuvar, histopatolojik, mikrobiyolojik, görüntüleme çalışmalarının bir kombinasyonu gerekmektedir. Etken mikroorganizmanın izole edilmesi ve bu mikroorganizmaların antimikrobiyal duyarlılıklarının belirlenmesi için tanı yöntemleri arasında mutlaka mikrobiyolojik tanı yöntemleri de kullanılmalıdır. Protez eklem enfeksiyonlarının mikrobiyolojik tanı yöntemleri preoperatif ve intraoperatif tanı olarak ayrılır. Preoperatif tanıda tarama testleri olarak lökosit sayımı, CRP ve ESH kullanılır. Preoperatif tanıda faydalanan mikrobiyolojik yöntemler; kan kültürü, eklem sıvısının lökosit sayısı ve tipi ve eklem sıvısının kültürüdür. İntraoperatif tanıda ise ameliyat sırasında alınan protez ve çevresinden abse, eklem sıvısı, yumuşak doku ve kemiklerden alınan örneklerin kültürü yapılmalıdır. Bu örneklerde biyopsi örnekleri tercih edilir. Protez eklem enfeksiyonlarının gelişmesinde özellikle rolü olan mikroorganizmalar tarafından üretilen biyofilm sebebi ile kültürde mikroorganizmalar üretilmeyebilir. Biyofilm tabakanın çözülmesini sağlayan sonikasyon ve DTT ile protez ve bileşenlerinin muamelesi sonrası yapılan kültürlerde izolasyon şansı artmaktadır. Protez eklem enfeksiyonlarında kullanılan diğer yöntemler mikrokalorimetre, matris aracılı lazer dezorpsiyon/iyonizasyon uçuş zamanlı kütle spektrometresi, cam boncuk ile doku örneklerinin homojenizasyonu, FISH, sinoviyal biyomarkerlara bakılması, enzimatik kalıp oluşturma ve amplifikasyonudur. Ayrıca PZR 16S rRNA sekanslama analizi gibi çeşitli moleküler yöntemler PE tanısında kullanılabilir.

Etik

Hakem Değerlendirmesi: Editörler kurulu ve editörler kurulu dışında olan kişiler tarafından değerlendirilmiştir.

Finansal Destek: Çalışma için hiçbir kurum ya da kişiden finansal destek alınmamıştır.

Kaynaklar

1. Tande AJ, Patela R. Prosthetic joint infection. Clin Microbiol Rev. 2014;27:302-45.
2. Esposito S, Leone S. Prosthetic joint infections: microbiology, diagnosis, management and prevention. Int J Antimicrob Agents. 2008;32:287-93.

3. Ersöz G. Orthopedic prosthetic infections. *Klimik Dergisi*. 2013;26:84-93.
4. Cataldo MA, Petrosillo N, Cipriani M, Cauda R, Tacconelli E. Prosthetic joint infection: Recent developments in diagnosis and management. *J Infect*. 2010;61:443-8.
5. Legout L, Senneville E. Periprosthetic joint infections: clinical and bench research. *Scientific World Journal*. 2013;2013:549091.
6. Diktaş H, Turhan V. Orthopedic prosthetic infections: current approaches to diagnosis, treatment and management. *Mediterr J Infect Microb Antimicrob*. 2012;1:12.
7. Miller JM, Binnicker MJ, Campbell S, Carroll KC, Chapin KC, Gilligan PH, Gonzalez MD, Jerris RC, Kehl SC, Patel R, Pritt BS, Richter SS, Robinson-Dunn B, Schwartzman JD, Snyder JW, Telford S, Theel ES, Thomson Jr RB, Weinstein MP, Yao JD. A guide to utilization of the microbiology laboratory for diagnosis of infectious diseases: 2018 update by the Infectious Diseases Society of America and the American Society for Microbiology. *Clin Infect Dis*. 2018;67:e1-94.
8. Saeed K. Diagnostics in prosthetic joint infections. *J Antimicrob Chemother* 2014;69(Suppl 1): i1-i19.
9. Cassar Gheiti AJ, Mulhall J. Peri-prosthetic joint infection: prevention, diagnosis and management. In: Kinov P (ed). *Arthroplasty update*, Chapter: 22. London: Intechopen Publisher, 2013:481-515.
10. Kandemir Ö. Prosthetic joint infections. *ANKEM Derg*. 2014;28(Ek 2):18-26.
11. Toossi N, Adeli B, Rasouli MR, Huang R, Parvizi J. Serum white blood cell count and differential do not have a role in the diagnosis of periprosthetic joint infection. *J Arthroplasty* 2012; 27(Suppl 8):51-4.
12. Kalayoğlu Beşişik S. Erythrocyte sedimentation rate. *Nobel Medicus*. 2005;1:4-9.
13. Otto-Lambertz C, Yagdiran A, Wallscheid F, Eysel P, Jung N. Periprosthetic infection in joint replacement diagnosis and treatment. *Dtsch Arztebl Int*. 2017;114:347-53.
14. Ghanem E, Antoci V, Jr. Pulido L, Joshi A, Hozack W, Parvizi J. The use of receiver operating characteristics analysis in determining erythrocyte sedimentation rate and C-reactive protein levels in diagnosing periprosthetic infection prior to revision total hip arthroplasty. *Int J Infect Dis*. 2009;13:444-9.
15. Esposito S, Leone S. Prosthetic joint infections: microbiology, diagnosis, management and prevention. *Int J Antimicrob Agents*. 2008;32:287-93.
16. Moran E, Byren I, Atkins BL. The diagnosis and management of prosthetic joint infections. *J Antimicrob Chemother*. 2010;65(Suppl 3):iii45-54.
17. Piper KE, Fernandez-Sampedro M, Steckelberg KE, Mandrekar JN, Karau MJ, Steckelberg JM, Berbari EF, Osmon DR, Hanssen AD, Lewallen DG, Cofield RH, Sperling JW, Sanchez-Sotelo J, Huddleston PM, Dekutoski MB, Yaszemski M, Currier B, Patel R. C-Reactive protein, erythrocyte sedimentation rate and orthopedic implant infection. *PLoS One*. 2010;5:e9358.
18. National Center for Health Statistics. National Hospital Discharge Survey: 2004 annual summary with detailed diagnosis and procedure data. National Center for Health Statistics, 2009. Available from: https://www.cdc.gov/nchs/data/series/sr_13/sr13_162.pdf
19. Drago L, Clerici P, Morelli I, Ashok J, Benzakour T, Bozhkova S, Alizadeh C, Del Sel H, Sharma HK, Peel T, Mattina R, Romanò CL. The World Association against Infection in Orthopaedics and Trauma (WAIOT) procedures for Microbiological Sampling and Processing for Periprosthetic Joint Infections (PJIs) and other implant-related infections. *J Clin Med*. 2019;8:1-16.
20. Osmon DR, Berbari EF, Berendt AR, Lew D, Zimmerli W, Steckelberg JM, Rao N, Hanssen A, Wilson WR, Infectious Diseases Society of America. Diagnosis and management of prosthetic joint infection: clinical practice guidelines by the Infectious Diseases Society of America. *Clin Infect Dis*. 2013;56:1-10.
21. Dalkılıç E, Gül C.B, Alkış N. Interleukin-6: One of the Leading Actors on Inflammation. *Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi* 2012;38:157-60.
22. Di Cesare PE, Chang E, Preston CF, Liu CJ. Serum interleukin-6 as a marker of periprosthetic infection following total hip and knee arthroplasty. *J Bone Joint Surg Am*. 2005;87:1921-7.
23. Wirtz DC, Heller KD, Miltner O, Zilkens KW, Wolff JM. Interleukin-6: a potential inflammatory marker after total joint replacement. *Int Orthop*. 2000;24:194-6.
24. Marculescu CE, Cantey JR. Polymicrobial prosthetic joint infections risk factors and outcome. *Clin Orthop Relat Res*. 2008;466:1397-404.
25. Trampuz A, Steckelberg JM, Osmon DR, Cockerill FR, Hanssen AD, Patel R. Advances in the laboratory diagnosis of prosthetic joint infection. *Rev Med Microbiol*. 2003;14:1-14.
26. Hughes JG, Vetter EA, Patel R, C D Schleck, Harmsen S, Turgeant LT, Cockerill FR. Culture with BACTEC peds plus/f bottle compared with conventional methods for detection of bacteria in synovial fluid. *J Clin Microbiol*. 2001;39:4468-71.
27. Gül HC, Artuk C, Yıldız C. Diagnosis, treatment and management of prosthetic infections. *J Clin Anal Med*. 2013;4:332-9.
28. Tsukayama T, Goldberg VM, Kyle R. Diagnosis and Management of Infection After Total Knee Arthroplasty. *J Bone Joint Surg*. 2003;85-A(Suppl 1):75-80.
29. Evangelopoulos DS, Stathopoulos IP, Morassi GP, Koufos S, Albarni A, Karampinas PK, A Stylianakis, S Kohl, Pneumaticsos S, Vlamis J. Sonication: a valuable technique for diagnosis and treatment of periprosthetic joint infections. *Scientific World Journal*. 2013;2013:375140.
30. Drago L, Signori V, De Vecchi E, Vassena C, Palazzi E, Cappelletti L, Romanò D, Romanò CL. Use of dithiothreitol to improve the diagnosis of prosthetic joint infections. *J Orthop Res*. 2013;31:1694-9.
31. Sambri A, Cadossi M, Giannini S, Pignatti G, Marcacci M, Neri MP, Maso A, Storni E, Gamberini S, Naldi S, Torri A, Zannoli S, Tassinari M, Fantini M, Bianchi G, Donati D, Sambri V. Is treatment with dithiothreitol more effective than sonication for the diagnosis of prosthetic joint infection? *Clin Orthop Relat Res*. 2018;476:137-45.
32. Parvizi J, Zmistowski B, Berbari EF, Bauer TW, Springer BD, Della Valle CJ, Garvin KL, Mont MA, Wongworawat MD, Zalavras CG. New definition for periprosthetic joint infection: from the workgroup of the musculoskeletal infection society. *Clin Orthop Relat Res*. 2011;469:2992-4.
33. Romano CL, Al Khawashki H, Benzakour T, Bozhkova S, Del Sel H, Hafez M, Johari A, Lob G, Sharma HK, Tsuchiya H, Drago L, World Association against Infection in Orthopaedics and Trauma (W.A.I.O.T.) Study Group on Bone and Joint Infection Definitions. The W.A.I.O.T. Definition of High-Grade and Low-Grade Peri-Prosthetic Joint Infection. *J Clin Med*. 2019;8:650.
34. George DA, Drago L, Scarponi S, Gallazzi E, Haddad FS, Romano CL. Predicting lower limb periprosthetic joint infections: A review of risk factors and their classification. *World J Orthop*. 2017;8:400.
35. Buchan BW, Ledebor NA. Emerging Technologies for the Clinical Microbiology Laboratory. *Clin Microbiol Rev*. 2014;27:783-822.
36. Wilcox MH. Overcoming barriers to effective recognition and diagnosis of *Clostridium difficile* infection. *Clin Microbiol Infect*. 2012;18(Suppl 6):13-20.
37. Deirmengian C, Hallab N, Tarabishy A, Della Valle C, Jacobs JJ, Lonner J, Booth RE Jr. Synovial fluid biomarkers for periprosthetic infection. *Clin Orthop Relat Res*. 2010;468:2017-23.