I Congresso Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão em Saúde **E-BOOK**

ISBN 978-65-995353-2-1

VOLUME 1

Tripé do Ensino Superior: *Ensino, Pesquisa e Extensão*

editora cubo
soluções para o universo acadêmico

10.4322/978-65-995353-2-1

2021

I CONEPEXSA

E-BOOK

ISBN 978-65-995353-2-1

VOLUME 1

TRIPÉ DO ENSINO SUPERIOR:

Ensino, Pesquisa e Extensão

Organizadores:

Geísa de Moraes Santana

Antônio Lucas Farias da Silva

Nágila Silva Alves

Antonia Mylene Sousa Almeida

Carolina Dourado de Faria

Isabelly Raiane Silva dos Santos

Laísa de Moraes Santana

Maria Bianca de Sousa Oliveira

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

I Congresso Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão
(CONEPEXSA) (09 : 2021 : on-line)

E-book : Tripé do ensino superior : ensino,
pesquisa e extensão [livro eletrônico]. -- 1. ed. --
José de Freitas, PI : Instituto Produzir, 2021.

PDF

Vários autores.

Vários organizadores.

Bibliografia.

ISBN 978-65-995353-2-1

1. Ensino - Congressos 2. Pesquisa - Congressos

I. Título.

21-83696

CDD-370.6

Índices para catálogo sistemático:

1. Educação : Congressos 370.6

Eliete Marques da Silva - Bibliotecária - CRB-8/9380

Instituto Produzir

José de Freitas – Piauí - Brasil

iproduzir@gmail.com

<https://institutoproduzir.com>

Todo o conteúdo dos artigos, dados, informações e correções são de responsabilidade exclusiva dos autores. O download e compartilhamento da obra são permitidos desde que os créditos sejam devidamente atribuídos aos autores. É vedada a realização de alterações na obra, assim como sua utilização para fins comerciais.

Todos os manuscritos foram previamente submetidos à avaliação cega pelos pares, membros do Conselho Editorial deste Evento, tendo sido aprovados para a publicação.

Conselho Editorial

Antônio Lucas Farias Da Silva - <http://lattes.cnpq.br/8449130484297335>

Aryane de Azevedo Pinheiro - <http://lattes.cnpq.br/0272124410737341>

Aurea Lucia de Sousa Barros - <http://lattes.cnpq.br/5094478610769640>

Bruno Abilio da Silva Machado - <http://lattes.cnpq.br/1746947978013446>

Carmem Leticia dos Santos - <http://lattes.cnpq.br/5045879020001308>

Carolina Woinarovicz Meneghetti - <http://lattes.cnpq.br/6650133638964794>

Daniel Charles dos Santos Macedo - <http://lattes.cnpq.br/7569871612440600>

Daniela Alvim Chrisostomo - <http://lattes.cnpq.br/8954568838229072>

Erica Paula Barbosa - <http://lattes.cnpq.br/5251898318361947>

Fernando Soares da Silva Neto - <http://lattes.cnpq.br/5262978414384616>

Geísa De Moraes Santana – <http://lattes.cnpq.br/2761987514713559>

João Caio Silva Castro Ferreira - <http://lattes.cnpq.br/4360322950862352>

Kleber Ribeiro Fidelis - <http://lattes.cnpq.br/2413206173320592>

Lucas Araújo Ferreira - <http://lattes.cnpq.br/2261627842571906>

Letícia Chagas da Silva - <http://lattes.cnpq.br/3985158304822040>

Maria Bianca de Sousa Oliveira - <http://lattes.cnpq.br/7975295782833197>

Maria Gislene Santos Silva - <http://lattes.cnpq.br/9567431578097889>

Milena Roberta Freire da Silva - <http://lattes.cnpq.br/6397038339109151>

Nágila Silva Alves - <http://lattes.cnpq.br/0652604317785338>

Nanielle Silva Barbosa - <http://lattes.cnpq.br/1573380751471631>

Rayssa Hellen Ferreira Costa - <http://lattes.cnpq.br/5471588941355704>

APRESENTAÇÃO

O I Congresso Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPEXSA) foi realizado pelo Instituto Produzir (CNPJ: 40.874.268/0001-77) entre os dias 16 a 18 de Setembro de 2021 pela plataforma Doity. O evento contou com mais de 500 participantes, 295 trabalhos expostos em banners digitais, 20 apresentados na modalidade oral, 93 capítulos de livros e dezenas de palestrantes de diferentes estados do Brasil.

O CONEPEXSA teve como objetivo promover o conhecimento dos discentes, docentes e dos profissionais das diferentes áreas de formação, acerca das inovações multiprofissionais no ensino, pesquisa e extensão, como também discutir a atuação destes profissionais em suas diversas áreas de trabalho, possibilitar a troca de experiências e o aprendizado científico.

Assim, proporcionando um espaço para a apresentação à comunidade acadêmica de novos pesquisadores, bem como um encontro, debates, troca de experiências entre estudantes, profissionais e pesquisadores. Agradecemos imensamente aos palestrantes, participantes, patrocinadores e comissão organizadora pelo apoio e pela dedicação para que o evento fosse um sucesso.

O volume 1 desta obra, Tripé do Ensino Superior: Ensino, Pesquisa e Extensão, é composto por 93 capítulos.

Geísa de Moraes Santana

Antônio Lucas Farias da Silva

PARCEIROS

LIGAS ACADÊMICAS PARCEIRAS

SUMÁRIO

1. A APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO E SUA RELAÇÃO COM DOENÇAS CARDIOVASCULARES -----	15
2. A CONTRIBUIÇÃO DA DANÇA NA AUTOESTIMA E IMAGEM CORPORAL DE PRATICANTES MULHERES -----	24
3. A CONTRIBUIÇÃO DA TERAPIA FOTODINÂMICA NA ENDODONTIA-----	34
4. A IMPORTÂNCIA DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR EM TEMPOS DA COVID-19: REVISÃO DE LITERATURA -----	44
5. A IMPORTÂNCIA DA RUGOSCOPIA PALATINA NA IDENTIFICAÇÃO DE CADAVERES HUMANOS: UMA REVISÃO DE LITERATURA-----	54
6. A IMPORTÂNCIA DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FEIXE CÔNICO NA PREVISÃO DE RISCOS CIRÚRGICOS DURANTE O LEVANTAMENTO DO SEIO MAXILAR: REVISÃO DESCRITIVA-----	62
7. A IMPORTÂNCIA DO ODONTOLEGISTA NA ANÁLISE DE INJÚRIAS FACIAIS DECORRENTES A PROJETEIS DE ARMA DE FOGO-----	72
8. A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -----	82
9. A IMPORTÂNCIA MULTIDISCIPLINAR PARA O TRATAMENTO ODONTOLÓGICO DA SÍNDROME TREACHER COLLINS: REVISÃO DE LITERATURA-----	92
10. A INFLUÊNCIA DA COVID-19 NA PERCEPÇÃO DO TEMPO: REVISÃO DE LITERATURA-----	102
11. A PERCEPÇÃO ACADÊMICA MEDIANTE O ESTUDO HÍBRIDO-----	111
12. A PRÁTICA DO SERVIÇO SOCIAL NO SEIO DA POLÍTICA DE REDUÇÃO DE DANOS-----	121
13. A RELEVÂNCIA DA ODONTOLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES ONCOLÓGICOS-----	131
14. A SAÚDE MENTAL EM TEMPOS DE PANDEMIA-----	139
15. A UTILIZAÇÃO DA LASERTERAPIA QUANTO TRATAMENTO DAS DISFUNÇÕES TEMPOROMANDIBULARES -----	148

16.	ABORDAGENS TERAPÊUTICAS E CIRÚRGICA PARA O TRATAMENTO DA QUEILITE ACTÍNICA: UMA REVISÃO DE LITERATURA-----	158
17.	ACESSIBILIDADE E ACOLHIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE EM MACRORREGIÕES DE SAÚDE DA PARAÍBA-----	168
18.	AÇÕES INTEGRADAS DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO E SUAS CONTRIBUIÇÕES NA FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO GERONTÓLOGO-----	178
19.	ACUPUNTURA AURICULAR COMO FERRAMENTA ASSISTENCIAL PARA ALÍVIO DA DOR DURANTE O PERÍODO PARTURITIVO-----	186
20.	ANÁLISE DA QUALIDADE DO SONO DE ESTUDANTES UNIVESITÁRIOS DA ÁREA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE-----	196
21.	ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DE HEPATITE VIRAIS NO NORDESTE DE 1999 a 2019-----	204
22.	ANÁLISE DOS RISCOS OCUPACIONAIS EM UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO INTERIOR DO PIAUÍ FRENTE À PANDEMIA DA COVID19-----	212
23.	ANGINA DE LUDWIG E SEU DETALHADO PERCURSO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA-----	222
24.	ÂNGULO DE FASE E BIVA EM PESSOAS IDOSAS DE COMUNIDADE: NOVAS PERSPECTIVAS PARA AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL E FUNCIONAL-----	232
25.	AS VIOLAÇÕES DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES: VÍTIMAS OCULTAS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19-----	242
26.	ASPECTOS RELACIONADOS A MORTE MATERNA NO BRASIL NO PERÍODO DE 2016 A 2020-----	252
27.	ATUAÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM NA ASSISTÊNCIA ÀS GESTAÇÕES DE ALTO RISCO-----	260
28.	ATUAÇÃO DE UMA LIGA ACADÊMICA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA PANDEMIA DE SARS-COV-2: RELATO DE EXPERIÊNCIA-----	270
29.	AUDITORIA DE ENFERMAGEM NOS SERVIÇOS DE SAÚDE: SUA IMPORTÂNCIA NA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE-----	279
30.	AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE E PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICA DO MIRIM (<i>Humiria balsamifera</i> – Aubl.)-----	289
31.	BRUXISMO DO SONO E APNEIA DO SONO: REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA-----	299

32.	CONTRIBUIÇÕES DA TERAPIA COM LASER DE BAIXA INTENSIDADE NA MODULAÇÃO DA INFLAMAÇÃO DE LESÕES ORAIS-----	309
33.	CORONECTOMIA: UMA ALTERNATIVA PARA REMOÇÃO DE TERCEIROS MOLARES INFERIORES EM PROXIMIDADE COM O NERVO ALVEOLAR INFERIOR – UMA REVISÃO NARRATIVA-----	320
34.	CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM COVID-19 EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA: REVISÃO INTEGRATIVA-----	326
35.	CUIDADOS DE ENFERMAGEM NO PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIA CARDÍACA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA-----	335
36.	CUIDADOS PALIATIVOS COMO FERRAMENTA DE RECUPERAÇÃO DA ESSÊNCIA DO PROCESSO DE MORRER -----	345
37.	CUIDADOS PRESTADOS AOS PACIENTES COM NECESSIDADE DE REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO-----	355
38.	DESAFIOS A IMPLEMENTAÇÃO DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-----	363
39.	DISFUNÇÃO DO EIXO MICROBIOTA-INTESTINO-CÉREBRO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA-----	371
40.	DISTÚRBIOS OSTEOMUSCULARES RELACIONADOS AO TRABALHO ADQUIRIDOS POR PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM-----	381
41.	EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO FERRAMENTA PARA PROMOÇÃO DOS CUIDADOS AO RN-----	390
42.	EDUCAÇÃO POPULAR COM UM GRUPO DE IDOSOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA-----	398
43.	EFICÁCIA DOS EXERCÍCIOS NA DOR EM PACIENTES COM OSTEOARTRITE DE JOELHO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA COM METANÁLISE-----	406
44.	ENSINO DE LIBRAS NA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DAS TÉCNICAS RADIOLÓGICAS: importância para a proteção radiológica e inclusão social dos surdos-----	416
45.	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR FRENTE AS COMPLICAÇÕES OBSTÉTRICAS DECORRENTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA-----	426
46.	ESTIGMA RELACIONADO AS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E A IMPORTÂNCIA DO TESTE RÁPIDO NA ATENÇÃO BÁSICA: PERCEPÇÃO DE USUÁRIOS E PROFISSIONAIS-----	432

47. ESTRATÉGIAS PARA O TRATAMENTO NÃO FARMACOLÓGICO NA SAÚDE DO IDOSO COM DIABETES MELLITUS-----	441
48. EVIDÊNCIAS ATUAIS EM CRIOTERAPIA E SUAS APLICAÇÕES CLÍNICAS: REVISÃO DE LITERATURA-----	449
49. EXERCÍCIO FÍSICO NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA SAÚDE MENTAL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA-----	459
50. EXPRESSÃO DOS RECEPTORES DE SARS-CoV-2 EM GLÂNDULAS SALIVARES E SUA REPERCUSSÃO NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA-----	469
51. FARMACOCINÉTICA: ABSORÇÃO E VIAS DE ADMINISTRAÇÃO-----	479
52. FARMACOCINÉTICA: DISTRIBUIÇÃO, EXCREÇÃO E ASPECTOS CLÍNICOS-----	489
53. FARMACOCINÉTICA: METABOLIZAÇÃO E ASPECTOS CLÍNICOS----	499
54. HARMONIZAÇÃO DO SORRISO EM DENTES ANTERIORES PELO MEIO DE TÉCNICAS DA INTEGRAÇÃO PERIO-DENTÍSTICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA-----	509
55. IDOSAS PRATICANTES DE DANÇA: UM EXERCÍCIO DE SAÚDE E CIDADANIA-----	518
56. IMPACTO DA COVID-19 NA SAÚDE MENTAL DE CRIANÇAS-----	528
57. IMPACTO DO PRÉ-ATENDIMENTO REMOTO ODONTOLÓGICO EM TEMPOS DE PANDEMIA COVID-19: REVISÃO INTEGRATIVA-----	538
58. INOVAÇÃO EM CIRURGIAS CRANIOFACIAIS, VANTAGENS E INDICAÇÕES DO PLANEJAMENTO CIRÚRGICO TRIDIMENSIONAL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA-----	548
59. “JÁ LAVOU AS MÃOS HOJE?”: COMO A SOBRECARGA DE TRABALHO E INFRAESTRUTURA DEFICIENTE INFLUENCIAM NOS CUIDADOS EM BIOSSEGURANÇA-----	558
60. MANIFESTAÇÕES BUCAIS DO HPV NA INFÂNCIA: REVISÃO DE LITERATURA-----	568
61. MEGAESÔFAGO EM FELINO: RELATO DE CASO-----	578
62. MODIFICAÇÃO DOS HÁBITOS ALIMENTARES E DA SAÚDE MENTAL EM ADULTOS NA PANDEMIA DA COVID-19-----	586
63. MOTIVAÇÃO E ROTATIVIDADE EM ACADEMIAS DE GINÁSTICA----	596
64. MUCORMICOSE EM PACIENTES COM COVID-19-----	606

65.	NEOPLASIAS DO TRATO RESPIRATÓRIO E SUAS RESPECTIVAS CAUSAS: UMA REVISÃO DA INTEGRATIVA DA LITERATURA-----	615
66.	O COMPARTILHAMENTO DE NOTÍCIAS FALSA EM MEIO À PANDEMIA E O IMPACTO NA PROMOÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE-----	625
67.	O CUIDADO MULTIPROFISSIONAL AO PACIENTE ONCOLÓGICO SOB TRATAMENTO-----	635
68.	O DELIRIUM COMO UMA COMPLICAÇÃO EM IDOSOS INTERNADOS NA UTI COM COVID-19-----	645
69.	O ENFERMEIRO NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE-----	654
70.	ODONTOLOGIA BIOLÓGICA COMO PROPOSTA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE BUCAL: UMA REVISÃO NARRATIVA-----	663
71.	OS DESAFIOS DO MÉTODO CANGURU E A ATENÇÃO HUMANIZADA AO RECÉM NASCIDO DE BAIXO PESO: PAPEL DO ENFERMEIRO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA-----	672
72.	OSTEONECROSE DOS MAXILARES INDUZIDA POR MEDICAMENTOS: UMA REVISÃO DE LITERATURA-----	682
73.	PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DA SÍFILIS CONGÊNITA EM UMA REGIÃO DE SAÚDE DO CEARÁ-----	692
74.	PERCEPÇÃO DE MÃES ADOLESCENTES SOBRE O ALEITAMENTO MATERNO NO ÂMBITO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-----	702
75.	PERIODONTITE RELACIONADA ÀS DOENÇAS CARDIOVASCULARES: REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA-----	712
76.	POLÍTICAS PÚBLICAS PARA IDOSOS E ILPI's EM BELÉM/PA: Análise sobre o processo de envelhecimento a partir do Estatuto do Idoso-----	722
77.	PREVALÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DO DIQUE DE BORRACHA EM PROCEDIMENTO ENDODÔNTICO: REVISÃO INTEGRATIVA-----	732
78.	PRINCIPAIS TRAÇOS CLÍNICOS DA SÍNDROME DE STURGE-WEBER: UMA REVISÃO DE LITERATURA-----	742
79.	PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE FRENTE AO IMPACTO DAS QUEIMADURAS EM CRIANÇAS-----	749
80.	PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE NA ESCOLA: RELATO DE EXPERIÊNCIA-----	758

81. PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE NA SALA DE ESPERA: RELATO DE EXPERIÊNCIA-----	768
82. QUALIDADE DE VIDA DE MULHERES MASTECTOMIZADAS SUBMETIDAS À RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA IMEDIATA-----	778
83. RELAÇÃO ENTRE SOFRER VIOLÊNCIA POR PARCEIROS ÍNTIMOS E A IDEACÃO SUICIDA ENTRE MULHERES-----	786
84. RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PROJETO DE EXTENSÃO ANATO ACADEMY: JOVENS DO ENSINO MÉDIO APRENDENDO SOBRE O CORPO HUMANO-----	795
85. RELATO DE EXPERIÊNCIA NA ABLAÇÃO POR REENTRADA NODAL EM LACTANTE COM SÍNDROME DE WOLFF PARKINSON WHITE-----	804
86. REPERCUSSÃO ÓSSEA NOS PACIENTES COM DOENÇA RENAL CRÔNICA-----	810
87. RESPOSTA IMUNOLÓGICA: O POTENCIAL ELO ENTRE SISTEMA ABO E SUSCETIBILIDADE À COVID-19-----	819
88. RISCO DE LESÃO POR PRESSÃO PRECOCE EM PACIENTES COM INCONTINÊNCIA URINÁRIA E FECAL NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA: REVISÃO INTEGRATIVA-----	828
89. SAÚDE MENTAL E SERVIÇO SOCIAL: BREVES REFLEXÕES DA PROFISSÃO NO ESPAÇO SÓCIO-OCUPACIONAL-----	836
90. SEXUALIDADE E INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS NA TERCEIRA IDADE-----	844
91. TECNOLOGIA EDUCATIVA EM SAÚDE COMO UMA FERRAMENTA DE PROMOVER O BEM ESTAR EM TEMPOS DE PANDEMIA DA COVID-19: REVISÃO INTEGRATIVA-----	853
92. UMA ÓTICA EMPÁTICA E CRÍTICA PARA A QUESTÃO DAS DROGAS: VISLUMBRANDO UMA ALTERNATIVA AO MODELO PROIBICIONISTA-----	861
93. USO DA VISCOSSUPLEMENTAÇÃO NO TRATAMENTO DA ARTROCENTESE: REVISÃO DE LITERATURA-----	871

CAPÍTULO 01

A APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO E SUA RELAÇÃO COM DOENÇAS CARDIOVASCULARES

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c01](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c01)

Lara Kaiulani Lamounier¹, Paula Emanuelle de Santana Oliveira Santos², Maria Isabel Fortunato Cavalcante³, Elany Maria Ferreira Portela⁴, Lais Emanuelle Lamounier⁵, Beatriz dos Santos Tavares⁶, Jeanne Beatriz Nunes da Silva⁷, Karoline Antunes Cunha⁸, Beatriz de Araújo Braz⁹, Renato Philipe de Sousa¹⁰

¹Centro Universitário Atenas-UniAtenas, (lklamounier@hotmail.com)

²Centro Universitário Atenas-UniAtenas, (paulinhaesos@hotmail.com)

³Centro Universitário Atenas-UniAtenas, (mariaisabelfortunatocavalcante@gmail.com)

⁴Centro Universitário Atenas-UniAtenas, (elanyportela@gmail.com)

⁵Centro Universitário Atenas-UniAtenas, (laislamounier@gmail.com)

⁶Centro Universitário Atenas-UniAtenas, (beatrizsantostavares@hotmail.com)

⁷Centro Universitário Atenas-UniAtenas, (jeanne.beatriz@outlook.com)

⁸Centro Universitário Atenas-UniAtenas, (antunesc.karoline@gmail.com)

⁹Centro Universitário Atenas-UniAtenas, (bia_araujo_10@hotmail.com)

¹⁰Centro Universitário Atenas-UniAtenas, (r_marcciano@hotmail.com)

Resumo

Objetivo: A apneia obstrutiva do sono (AOS) é caracterizada por episódios de obstrução total das vias aéreas superiores, por pelo menos 10 segundos, esse distúrbio é considerado fator de risco para doenças cognitivas, psiquiátricas e cardiovasculares. O comprometimento da respiração na AOS resulta em aumentar de forma independente o risco cardíaco, causando desregulações cardio-metabólicas. Nesse contexto, o presente artigo visa identificar e analisar a possível relação da AOS com as doenças cardiovasculares. **Método:** Foi realizado uma revisão integrativa da literatura com busca nas bases de dados PUBMED e SCIELO, utilizando os descritores “Sleep Apnea”, “Obstructive” e “Heart Failure”. Foram incluídos artigos publicados no período de 2016 a 2021 em português e inglês, a busca resultou em 262 artigos, destes 35 foram selecionados, os quais estavam alinhados com o objetivo do estudo. **Resultados e conclusões:** A AOS impõe cargas autonômicas, químicas, mecânicas e inflamatórias sobre o sistema cardiovascular, promovendo desregulação local e sistêmica do metabolismo cardíaco,

com isso a AOS está associada ao aumento da incidência de fibrilação atrial, doenças coronárias e insuficiência cardíaca. A hipóxia causada pela AOS gera radicais livres de oxigênio e inflamação, promovendo isquemia miocárdica, arritmia e morte cardíaca. Ademais, a AOS também resulta em alterações da pressão intratorácica, remodelação cardíaca, alterações endoteliais vasculares, alteração metabólica e fragmentação do sono, esses fatores, por diferentes mecanismos, resultam em alterações cardiovasculares. Dessa forma, as doenças cardiovasculares estão relacionadas com a fisiopatologia da AOS e essa associação pode contribuir para a melhora das estratégias de diagnóstico, além disso identificou-se a necessidade de novos estudos sobre essa temática para a formulação de medidas terapêuticas complementares para a AOS.

Palavras-chave: Apneia Obstrutiva do Sono; Transtornos do Sono-Vigília; Doenças Cardiovasculares

Área Temática: Ciências da Saúde.

E-mail do autor principal: kklamounier@hotmail.com

1 INTRODUÇÃO

Na passagem da vigília para o sono acontece naturalmente o aumento da resistência de via aérea superior e concomitante ocorre prejuízo de várias respostas e reflexos protetores, fato esse que interfere na eficácia e manutenção da perviedade da vida aérea superior ao longo da vigília e consequentemente ocasiona os chamados distúrbios respiratórios do sono (DRS) (PALOMBINI, 2010)

Os distúrbios respiratórios do sono, por definição, devem ter ao menos 10s de duração, na população em geral o tipo mais comum de DRS é a Apneia obstrutiva do sono (AOS) episódio caracterizado pela obstrução total das vias aéreas superiores; o fluxo de ar é interrompido embora haja esforços respiratórios contínuos. As pessoas acometidas com apneia obstrutiva do sono, normalmente, têm como característica apresentar ronco, acordar sufocado ou ofegante, dores de cabeça na parte da manhã, interrupção do sono, apneia relatada por um parceiro de cama, sonolência ou fadiga diurna de forma exagerada, dano na memória e soneca sucessiva (SCHMITZ, 2020)

Ademais, a AOS é um dos principais fatores para o risco de doenças, como por exemplo, disfunções cognitivas, psiquiátricas e, principalmente, doenças cardiovasculares (KHALYFA *et al.*, 2016). Uma pesquisa sobre a atual prevalência de AOS indica que um terço dos estudos de sono evidenciaram certo grau de AOS. Perto de 13% dos homens e 6% das mulheres entre 30 e 70 anos têm formas moderadas a graves (PEPPARD *et al.*, 2013)

A AOS compromete a respiração por diferentes mecanismos, mas impõem cargas

autônômicas, químicas, mecânicas e inflamatórias qualitativamente semelhantes sobre o coração e a circulação. Com isso, a AOS é caracterizada por aumentar de forma independente o risco cardíaco, causando desregulações cardio-metabólicas. Nessa perspectiva, observa-se que mais de 50% dos pacientes com insuficiência cardíaca (IC) têm DRS, o que representa cerca de 10 vezes a taxa na população geral. Sendo assim, o comprometimento respiratório associado às doenças cardiovasculares são uma comorbidade frequente e sua prevalência está associada à gravidade do quadro clínico (BELAIDI *et al.*, 2016; MCEVOY *et al.*, 2016; RANA *et al.*, 2020).

Diante disso, o presente trabalho buscou evidenciar a relação entre a Apneia Obstrutiva do Sono e as Doenças cardiovasculares procurando compreender essa associação diante da literatura disponível, bem como analisar fatores de risco e métodos terapêuticos relevantes ao problema aqui apresentado.

2 MÉTODO

A presente revisão de literatura foi realizada por meio do levantamento de publicações científicas nacionais e internacionais. As bases de dados PUBMED e SCIELO foram utilizadas. Foram incluídos artigos em língua portuguesa e inglesa publicados no período de 2016 a 2021, pertinentes aos termos de interesse. A pesquisa foi feita utilizando os seguintes descritores indexados na plataforma de Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) combinados entre si pelo operador booleano “AND”: Sleep Apnea, Obstructive AND heart failure. Foram excluídos artigos inconclusivos e indisponíveis na íntegra. A partir dos 262 artigos encontrados, 50 foram potencialmente escolhidos a partir dos critérios de exclusão. Após a leitura integral dos artigos, 17 foram selecionados, os quais estavam alinhados com o objetivo proposto pelo trabalho.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 EPIDEMIOLOGIA

Pesquisas epidemiológicas indicam que a AOS está associada a aumentos na incidência e progressão de doenças coronárias, insuficiência cardíaca, derrame e fibrilação atrial. Esses desfechos ocorrem com maior frequência quando se tem a associação entre a apneia do sono e a respiração de Cheyne-Stokes (caracterizada por respirações irregulares que se alternam entre crescentes e decrescentes), o que prediz fortemente a mortalidade. No entanto, a AOS causa, de forma independente, rigidez arterial e não queda da pressão arterial, com alteração do ritmo circadiano da PA, criando uma profunda expansão da PA noturna e matinal. Ao analisar a

prevalência de AOS em pacientes com doença cardiovascular tem-se uma variação de 30% (hipertensão) a 60% (AVC ou ataque isquêmico, arritmia e doença renal em estágio terminal (MCEVOY *et al.*, 2016; MEHRA, 2019; RANA *et al.*, 2020; O'DONNELL *et al.*, 2021).

3.2 DIAGNÓSTICO

A condição da apneia obstrutiva do sono permanece subdiagnosticada, podendo passar despercebida pelo paciente. Estudos populacionais americanos mostraram que os médicos diagnosticam a apneia do sono em apenas 2% do total de pacientes com síndrome da apneia obstrutiva do sono (DRAGER *et al.*, 2002)

O exame considerado como teste de ouro para o diagnóstico da Apneia Obstrutiva do sono é a Polissonografia, é um exame que avalia e registra as variações biofisiológicas que ocorrem durante o sono, por exemplo, a pressão arterial e a frequência cardíaca (WANG *et al.*, 2018) A polissonografia anual pode ser indicada durante a triagem de AOS em pacientes suspeitos para a melhoria do subdiagnóstico das síndromes do sono (RANA *et al.*, 2020).

O método diagnóstico mais comum usado para identificar a presença e a gravidade da apnéia do sono, é o índice de apnéia-hipopnéia, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia o somatório das apneias e hipopneias por hora de sono fornece o índice de apneia-hipopneia (IAH). A gravidade da apneia é determinada pelo IAH, grau leve: $5 < \text{IAH} < 15/\text{hora}$; grau moderado: $15 < \text{IAH} < 30/\text{hora}$, grau acentuado: $\text{IAH} > 30/\text{hora}$ (MCEVOY *et al.*, 2016)

3.3 DECORRÊNCIAS FISIOLÓGICAS

O metabolismo normal da interação entre sono e coração é alterado pela apneia obstrutiva do sono, uma vez que ocorre episódios de obstrução completa ou parcial das vias aéreas. Os efeitos pelos quais a AOS leva a um distúrbio cardiovascular são locais e sistêmicos. Além disso, a insuficiência cardíaca pode ser um fator de risco para a AOS, já que na IC os líquidos acumulados na região cervical podem gerar o edema faríngeo (CHADDA *et al.*, 2018).

3.3.1 Efeitos imediatos

A AOS causa ciclos curtos e repetitivos de baixa concentração de oxigênio, seguidos por uma reoxigenação rápida e completa. Esses ciclos ocorrem porque o fluxo de ar está obstruído apesar do esforço torácico e abdominal (MEHRA, 2019). No nível celular a HI, alterações repetitivas na saturação de oxigênio, causa alterações neuro-humorais e bioquímicas (RANA *et al.*, 2020). A HI gera ativação do fator de transcrição pró-inflamatório fator nuclear-KB, célula endotelial e ativação de leucócitos. A disfunção de oxigênio pode diminuir o

fornecimento do oxigênio ao miocárdio, logo expondo o organismo a riscos como isquemia miocárdica, arritmias e morte cardíaca súbita durante o sono devido a geração de radicais livres de oxigênio e inflamação. As vias inflamatórias ativadas de forma seletiva pelas espécies reativas de oxigênio, ativam o fator nuclear kappa B (NFκB) e não o fator-1 indutível por hipóxia (HIF-1), que regula a via adaptativa (ARDELEAN *et al.*, 2019).

O sistema nervoso simpático (SNS) sofre um aumento na AOS, devido a uma redução progressiva, durante a AOS, na pressão parcial de oxigênio e ainda aumento na tensão de dióxido de carbono, essas alterações estimulam a excitação simpática reflexa por meio de quimiorreceptores periféricos e centrais (HARUKI e FLORAS, 2017). As modificações na ativação simpática que ocorrem durante o sono em pacientes com AOS permanecem durante a vigília. A microneurografia da atividade do nervo simpático no nervo fibular revela que a taxa de episódios simpáticos dobra e a amplitude é maior em indivíduos com AOS em comparação com indivíduos sem AOS (MEHRA, 2019).

O esforço respiratório repetitivo, durante o fechamento das vias aéreas superiores, leva a grandes oscilações de pressão intratorácica negativa (até – 65 mmHg de pressão intratorácica na AOS), como reflexo há um aumento da pressão transmural de todas as estruturas intratorácicas, incluindo átrios, ventrículos, aorta intratorácica e vasos pulmonares, com efeitos danosos nessas estruturas. Há um aumento da pós- carga e retorno venoso do ventrículo direito e um desvio anormal para a esquerda do septo interventricular, devido ao aumento da pressão negativa. Dessa forma, gera um aumento no gasto de oxigênio pelo miocárdio, uma diminuição do débito cardíaco, além de comprometimento do relaxamento do músculo do coração (COWIE, 2016; JAVAHERI I *et al.*, 2017)

Tendo em vista que os fenômenos de apneia e hipopneia são recorrentes, o indivíduo portador de AOS não detém uma noite de sono linear e sem interrupções, haja vista que quando os momentos de interrupção do fluxo de ar são grandes o SN envia um estímulo para que ele acorde e assim não venha a óbito. O sono é dividido em quatro estágios, sendo que cada um é dotado de especificidades, como a duração e a área do cérebro mais ativada, esses estágios são diretamente influenciados pela quantidade de oxigênio presente no sangue, portanto, o sono daqueles que possuem AOS não proporciona o descanso necessário ao corpo e à mente (JAVAHERI *et al.*, 2017; ARDELEAN *et al.*, 2019; AURORA *et al.*, 2018).

3.3.2 Efeitos intermediários

A AOS promove a redução da pressão intra-pleural, em função do aumento do esforço de vias aéreas superiores e da redução dos níveis de oxigênio que passam por elas, com isso, é desencadeado o aumento de vasoconstrição, na tentativa de aumentar a absorção do O₂. Como

resultado do aumento do estresse oxidativo é desencadeada a liberação de radicais livres e da cascata de inflamação. Uma vez aumentados os níveis inflamatórios, ocorre a danificação de células endoteliais vasculares, as quais são responsáveis pelo revestimento de veias e artérias, e esta deterioração nos vasos é potencializada pela redução nos níveis de NO, que ocasiona uma disfunção na síntese endotelial. Esse conjunto de acontecimentos faz com que as artérias e veias coronárias fiquem lesionadas, e por isso, há uma redução em seu potencial de atuação e por consequência um problema cardiovascular, caracterizado pela alteração na distribuição de oxigênio, e este problema é agravado pela obesidade (COWIE, 2016; RANA *et al.*, 2020; RAUT *et al.*, 2021)

A hipóxia resistente é um dos principais causadores da maioria dos problemas gerados pela AOS, a nível celular ela causa uma grande desordem metabólica, por interferir no ciclo de Krebs, glicólise e glicólise anaeróbica, que ocasiona problemas energéticos e insulínicos, além de provocar um aumento no nível de oxigênio reativo. Íons como Ca^{2+} e Na^{+} também sofrem influência da hipóxia, a alteração em seus níveis sanguíneos proporciona consequências em todos os locais que eles atuam, como na regulação dos batimentos cardíacos. Ademais, a deficiência prolongada de oxigênio ainda provoca alterações na glicogenólise e na gliconeogênese, mecanismos que alteram também a quantidade de glicose no sangue e pode provocar uma desordem fisiológica em pacientes diabéticos. Além disso, foi comprovado que com o tratamento da AOS a sensibilidade à insulina é aumentada, e favorece o tratamento dos indivíduos insulino-dependente (COWIE, 2016; JAVAHERI *et al.*, 2017)

3.3.3 Efeitos crônicos

Na AOS ocorre remodelação cardíaca, principalmente, em razão da sobrecarga de pressão ou volume. Contudo, exposições a hipoxemia intermitente, excesso de catecolaminas, elevação na pressão arterial e oscilações da pressão intratorácica são as causas primárias desse distúrbio cardíaco. Todas essas alterações levam a modificações estruturais e eletrofisiológicas. Pacientes com AOS, podem predispor hipertrofia cardíaca devido a associação da hipoxia intermitente e o estresse oxidativo. Esta remodelação cardíaca está associada a quinases de sinalização reguladas positivamente por ROS (proteína quinase ativada por mitogênio [MAPK], c-Jun N-terminal quinases [JNK], p38, Akt) e fatores de transcrição (NF- κ B, AP-1, fator de necrose tumoral α [TNF α], fator de crescimento semelhante à insulina II [IGF-II], interleucina-6 [IL-6]), além da apoptose regulada positivamente, também contribuindo para a remodelação estrutural (JAVAHERI *et al.*, 2017; CHADDA *et al.*, 2018)

Levando-se em consideração o fato de que o período de hipóxia pode proporcionar o aumento ou a diminuição da frequência cardíaca, a depender de qual atividade -simpática ou

parassimpática- domina no momento da hipóxia, uma das complicações geradas pela AOS é a arritmia, sendo que podem ocorrer vários tipos, como fibrilação atrial, taquicardia ventricular não sustentada, bigeminia ventricular e trigeminia. As arritmias também podem ocorrer em função do aumento da ativação das vias inflamatórias cardíacas, estiramento miocárdico, isquemia miocárdica e estimulação dos plexos ganglionares, todos esses fatores se encontram desregulados pela AOS^{12,8,2813}. (KASAI e BRADLEY, 2011; COWIE, 2016; JAVAHERI *et al.*, 2017; TUNG *et al.*, 2017)

3.4 TRATAMENTO

A pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP) é o tratamento padrão de primeira linha para a apneia obstrutiva do sono (SEYS *et al.* , 2018). Esta terapêutica, imobiliza as vias aéreas superiores no período do sono e trata de maneira eficaz a sonolência diurna excessiva, reduzindo o SNA muscular associada à diminuição da PA (MCECOY *et al.*, 2016; MEHRA, 2019). Nesse sentido, entende-se que a CPAP é uma terapia para melhoria dos sintomas, não para proteção contra doenças vasculares ou a morte (FRANZ, 2010). Estudos demonstraram, a partir dessa terapêutica, a redução de mediadores inflamatórios e da espessura da íntima-média da carótida, visto que pacientes com AOS apresentam casos de aterosclerose e, conseqüentemente, IC. Apesar disso, seu efeito nas conseqüências cardiovasculares é questionado pela sua baixa adesão: sendo necessário a terapia médica envolver também a perda de peso, uso de fármacos, oxigênio suplementar, tratamentos para melhoria da permeabilidade nasal e terapias posicionais (MEHRA, 2019). Não há dados que comprovem que a terapia com CPAP pode melhorar a progressão da IC em longo prazo, porém, trabalhos demonstram que, em relação à função cardíaca, em que a AOS tende causar uma disfunção no ventrículo esquerdo, pode haver reversão desse quadro (KENDZERSKA *et al.*, 2020; BHALLA *et al.*, 2020). Em associação à CPAP, pesquisas quanto ao tratamento com antioxidantes e anti-inflamatórios, em casos de hipóxia intermitente, são pouco conclusivas (PEPPARD *et al.*, 2013).

4 CONCLUSÃO

A associação entre apneia obstrutiva do sono e doenças cardiovasculares pode contribuir para uma discussão acerca do melhoramento das estratégias de diagnóstico da AOS, visto que, segundo a literatura utilizada, menos de 2% das pessoas com esse quadro são diagnosticadas e mais da metade dos pacientes que apresentam insuficiência cardíaca possuem DRS, demonstrando que a AOS permanece subdiagnosticada. Além disso, sendo a polissonografia -

exame padrão ouro para diagnóstico da AOS - um exame oneroso, é necessário incorporar outras medidas diagnósticas na rotina de avaliação de pacientes que possuem fatores de risco para o desenvolvimento de DRS, como a AOS.

Ademais, estudos sobre a utilização do CPAP para a real compreensão da melhora do quadro de AOS são necessários, pois há uma baixa adesão a essa terapêutica. Por fim, a fisiopatologia da AOS associada ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares explorada nesse estudo, revela a importância de novas pesquisas e de investigações para a formulação de medidas terapêuticas complementares.

REFERÊNCIAS

ARDELEAN, Carmen Loredana *et al*, Particularities of Older Patients with Obstructive Sleep Apnea and Heart Failure with Mid-Range Ejection Fraction, **Medicina**, v. 55, n. 8, p. 449, 2019.

AURORA, R. Nisha *et al*, Obstructive Sleep Apnea during REM Sleep and Cardiovascular Disease, **American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine**, v. 197, n. 5, p. 653–660, 2018.

BELAIDI, Elise *et al*, Targeting the ROS-HIF-1-endothelin axis as a therapeutic approach for the treatment of obstructive sleep apnea-related cardiovascular complications, **Pharmacology & Therapeutics**, v. 168, p. 1–11, 2016.

BHALLA, Sukriti *et al*, Prevalence and Patterns of Obstructive Sleep Apnea in Asian Indians With Congestive Heart Failure, **Cureus**, v. 12, n. 11, p. e11438, 2020.

CHADDA, Karan R. *et al*, Arrhythmogenic mechanisms of obstructive sleep apnea in heart failure patients, **Sleep**, v. 41, n. 9, 2018.

COWIE, Martin R., Sleep-Disordered Breathing—Do We Have to Change Gears in Heart Failure?, **Current Heart Failure Reports**, v. 13, n. 5, p. 255–265, 2016.

DRAGER, Luciano Ferreira *et al*, Síndrome da Apnéia Obstrutiva do Sono e sua Relação com a Hipertensão Arterial Sistêmica: evidências atuais. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, [S.L.], v. 78, n. 5, p. 531-536, maio 2002.

FRANZ, M. Mechano-electrical feedback. **Cardiovascular Research**, [S.L.], v. 45, n. 2, p. 263-266, 14 jan. 2000. .

HARUKI, Nobuhiko; FLORAS, John S.. Sleep-Disordered Breathing in Heart Failure — A Therapeutic Dilemma —. **Circulation Journal**, [S.L.], v. 81, n. 7, p. 903-912, 2017

JAVAHERI, Shahrokh *et al*, Sleep Apnea: Types, Mechanisms, and Clinical Cardiovascular Consequences, **Journal of the American College of Cardiology**, v. 69, n. 7, p. 841–858, 2017.

KASAI, Takatoshi; BRADLEY, T. Douglas, Obstructive Sleep Apnea and Heart Failure: Pathophysiologic and Therapeutic Implications, **Journal of the American College of Cardiology**, v. 57, n. 2, p. 119–127, 2011.

KENDZERSKA, Tetyana *et al*, Cardiovascular consequences of obstructive sleep apnea in women: a historical cohort study, **Sleep Medicine**, v. 68, p. 71–79, 2020.

KHALYFA, Abdelnaby; GILELES-HILLEL, Alex; GOZAL, David. The Challenges of Precision Medicine in Obstructive Sleep Apnea. **Sleep Medicine Clinics**, [S.L.], v. 11, n. 2, p. 213-226, jun. 2016.

MCEVOY, R *et al*, CPAP for Prevention of Cardiovascular Events in Obstructive Sleep Apnea. **New England Journal Of Medicine**, [S.L.], v. 375, n. 10, p. 919-931, 8 set. 2016.

MEHRA, Reena, Sleep apnea and the heart, **Cleveland Clinic Journal of Medicine**, v. 86, n. 9 suppl 1, p. 10–18, 2019.

O'DONNELL, Cliona *et al*, Cardiovascular manifestations in obstructive sleep apnea: current evidence and potential mechanisms. **Polish Archives Of Internal Medicine**, [S.L.], v. 131, n. 6, p. 550-560, 29 jun. 2021.

PALOMBINI, Luciana de Oliveira. Fisiopatologia dos distúrbios respiratórios do sono. **Jornal Brasileiro de pneumologia**, v. 36, p. 4-9, 2010.

PEPPARD, P *et al*, Increased Prevalence of Sleep-Disordered Breathing in Adults. **American Journal Of Epidemiology**, v. 177, n. 9, p. 1006-1014, 14 abr. 2013.

RANA, Dibyata *et al*, Obstructive Sleep Apnea and Cardiovascular Morbidities: A Review Article, **Cureus**, v. 12, n. 9, p. e10424, .

RAUT, Sandeep *et al*, The impact of obstructive sleep apnoea severity on cardiac structure and injury, **Sleep medicine**, v. 77, p. 58–65, 2021.

SCHMITZ, João Ayres de Souza. Avanço maxilomandibular como forma de tratamento da síndrome da apneia obstrutiva do sono. **Odontologia-Tubarão**, 2020.

SEYIS, Sabri *et al*, The Effects of Continuous Positive Airway Pressure on Premature Ventricular Contractions and Ventricular Wall Stress in Patients with Heart Failure and Sleep Apnea, **Canadian Respiratory Journal**, v. 2018, p. 2027061, 2018.

TUNG, Patricia *et al*, Obstructive and Central Sleep Apnea and the Risk of Incident Atrial Fibrillation in a Community Cohort of Men and Women, **Journal of the American Heart Association: Cardiovascular and Cerebrovascular Disease**, v. 6, n. 7, p. e004500, 2017.

WANG, Xiao *et al*, Effect of continuous positive airway pressure on long-term cardiovascular outcomes in patients with coronary artery disease and obstructive sleep apnea: a systematic review and meta-analysis, **Respiratory Research**, v. 19, p. 61, 2018.

CAPÍTULO 02

A CONTRIBUIÇÃO DA DANÇA NA AUTOESTIMA E IMAGEM CORPORAL DE PRATICANTES MULHERES

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c02](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c02)

Amanda Ferreira Costa ¹, Luzia Cleia da Silva ², Josué Tadeu Lima de Barros Dias ³,
Maria Luci Esteves Santiago⁴, Renata Batista dos Santos Pinheiro⁵, Renata Louise
Ferreira Lemos⁶

¹Universidade Estadual do Piauí - UESPI, (amanda.costa2325@gmail.com)

² Universidade Estadual do Piauí - UESPI, (luziaboaventura@gmail.com)

³ Universidade Estadual do Piauí - UESPI, (thadeu_dias_@hotmail.com)

⁴ Universidade Estadual do Piauí - UESPI, (mles_@hotmail.com)

⁵ Universidade Estadual do Piauí - UESPI, (renatapersonal1@hotmail.com)

⁶ Universidade Estadual do Piauí - UESPI, (renatalouise@pcs.uespi.br)

Resumo

Objetivo: analisar a contribuição da prática da dança na ativação do mecanismo da autoestima e na imagem corporal de praticantes mulheres. A dança é considerada como uma atividade física alegre e que estimula o praticante elevando os níveis de autoestima, motivação e autodeterminação. A autoestima é denominada como capacidade de confiar em si próprio, e junto a ela temos a imagem corporal que se associa à projeção mental que fazemos de nós mesmos, ou seja, a imagem que temos do nosso próprio corpo. **Métodos:** Trata-se de um estudo de revisão integrativa, realizado nas bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde - LILACS e na Scientific Electronic Library Online – SciELO, com estudos publicados entre o período de 2011 e 2021. **Resultados e discussão:** A análise dos estudos permite observar resultados positivos na autoestima e na imagem corporal que se estabelece através da prática da dança, nas suas variações de estilos, evidenciando a importância da dança para a melhora da auto-estima de seus praticantes. **Considerações finais:** Os estudos evidenciam que a prática da dança contribui de maneira benéfica no mecanismo da autoestima e na imagem corporal de mulheres praticantes, proporcionando uma melhor qualidade de vida e benefícios como feminilidade, autoimagem, autonomia, entre outros.

Palavras-chave: Dança; Autoestima; Imagem Corporal.

Área Temática: Ciências da Saúde

E-mail do autor principal: amandaferreiracosta@aluno.uespi.br

1 INTRODUÇÃO

A atividade física é utilizada para manter a saúde física, psicológica, bem como prevenir doenças, firmando-se assim como um fator importante na vida das pessoas, pois além de promover benefícios para a saúde física representa também grande melhoria na qualidade de vida (TOSCANO; VEGA, 2008; SARTORI, *et al.*, 2017). A dança por ser considerada uma atividade física alegre e que estimula o praticante, eleva os níveis de autoestima, motivação e autodeterminação, podendo proporcionar liberdade, tranquilidade e realização a mulher madura auxiliando a mesma aceitar de forma melhor a sua idade e suas condições funcionais reduzidas (SZUSTER, 2011).

A autoestima é denominada como capacidade de confiar em si próprio, enfrentando desafios da vida, expressando-se de forma adequada às próprias necessidades, desejos e ainda tendo amor próprio (TESSARI, 2005). Segundo Mosquera e Stobäus (2006) é um coletivo de atitudes que a pessoa tem sobre si mesmo, vista como percepção avaliativa, maneira de ser. Resume-se na ideia a qual a pessoa tem de si mesma, podendo essas serem ideias negativas ou positivas; é um sentimento que têm seu desenvolvimento durante toda a vida (GUILHARDI, 2002). De acordo com Seigley (1999), pessoas com a autoestima elevada, ver a si mesmo como alguém poderoso, competente, valioso e significativo, porém a dependência da autoestima da mulher na aparência, torna vulnerável à imagem corporal negativa (CASTILHO, 2001).

A imagem corporal associa-se à projeção mental que fazemos de nós mesmos, ou seja, a figura que se tem do seu próprio corpo formada em sua mente. Engloba a consciência individual, todas as formas pelas quais uma pessoa vivencia e conceitua seu próprio corpo, juízo de valores e sua relação com o mundo, consciente e inconscientemente (PEREIRA; GAMA, 2017).

Com a relevância da Dança para o bem-estar, melhora da autoestima, da imagem corporal e necessidade de manter uma boa qualidade de vida, surgiu a seguinte questão: Como a prática da dança pode contribuir para a aquisição desses benefícios, em mulheres de idades variadas, trazendo a elas autonomia e autenticidade na imagem do seu corpo, assim conseguindo fazer com que ela possa ter um bem estar consigo e com o meio? Averiguar esse questionamento poderá proporcionar dados significativos para a população feminina. Diante do exposto, essa revisão tem como objetivo analisar a contribuição da prática da dança na ativação do mecanismo da autoestima e na imagem corporal de praticantes mulheres.

2 MÉTODO

24 Esse estudo trata-se de uma revisão integrativa sobre a contribuição da dança na autoestima e imagem corporal de praticantes mulheres. A busca de artigos foi realizada através das bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde - LILACS e na Scientific Electronic Library Online – SciELO e na Scientific Electronic Library Online – SciELO.

Os Descritores em Ciência da Saúde – DECS utilizados na pesquisa foram: “dança”, “autoestima”, “imagem corporal”, “mulheres”. Os mesmos foram combinados com os operadores booleanos OR e AND, construindo a seguinte combinação: (Dança) AND (Autoestima OR Imagem corporal) AND (Mulheres). Os critérios de inclusão foram: artigos originais publicados entre o período de 2011 e 2021, nos idiomas português, inglês e espanhol, em forma de texto completo. Foram descartados todos os estudos que não eram compatíveis com o objetivo dessa pesquisa, assim como as revisões de literatura, teses, dissertações e anais de congresso.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na busca realizada no Google Acadêmico utilizando os descritores mencionados anteriormente, foram encontrados 940 artigos e na SciELO 5 artigos, totalizando 945 artigos, após a leitura do título dos mesmos, apenas 14 foram selecionados, sendo lido seus resumos destes 9 artigos se enquadram com os critérios de inclusão da pesquisa, os quais foram lidos na íntegra. Os artigos selecionados estão descritos nas tabelas que seguem.

Quadro 1- Caracterização dos Estudos selecionados

Autor(es) e ano de publicação	Objetivos	Principais resultados	Conclusão
Montenegro, Z. M. C.; Schneider, R. H. (2014)	Avaliar a relação entre a prática regular da dança, qualidade de vida, autoimagem, autoestima e sintomas depressivos em mulheres pós-menopáusicas.	Das 38 idosas, 28 (73,7%) relataram ter problemas de saúde e 32 (84,2%) faziam uso regular de medicação para doenças cardiovasculares, diabetes mellitus, antidepressivos e doenças osteomusculares. Em relação a qualidade de vida houve melhoras significativas quando considerado o domínio social ($p=0,033$). A Escala de Depressão Geriátrica, aplicada aos sujeitos idosos ($n=23$), e o escore de	A dança melhora a qualidade de vida dos seus praticantes, e que mesmo sem resultados significativos, houve resultado positivo no questionário de autoimagem e autoestima, e as que obtiveram resultados de aumentos na sua autoestima, foram também os que mais melhoraram a sua qualidade de vida após a dança.

		autoimagem e autoestima, neste estudo não apresentou variações significativas aos sujeitos que já tem uma autoestima elevada.	
Aliati, S.; Rossato, V. M. (2017)	Avaliar o nível de autoestima e a autoimagem das alunas participantes das oficinas de dança do programa Ative-se/ Unati-UNICRUZ, do município de Cruz Alta, RS.	O resultado obtido foi que 81,1% das mulheres apresentaram autoestima baixa e a autoimagem se apresentou alta para 56,3% das mulheres. A autoestima baixa pode ser relacionada à fase de envelhecimento.	As oficinas de dança são importantes, pois fazem com que as idosas sejam ativas, criem laços de amizade e pode sim melhorar interferir na autoimagem corporal e também na autoestima, apesar do resultado encontrado serem desfavorável para a autoestima, as oficinas diminuem a ansiedade, contribuindo para o autoconhecimento corporal e auxilia nas expressões emocionais.
Silva <i>et al.</i> , (2017)	Avaliar como a prática de Stiletto Dance pode influenciar e contribuir para a qualidade de vida e a autoestima das praticantes.	O estudo mostra que a autoestima em média, no geral, das mulheres é alta. A prática do stiletto proporciona um contato maior com a própria imagem, adquirindo o desenvolvimento da autoconfiança e sensualidade, acarretando dessa maneira no aumento da autoestima e melhorando a qualidade de vida. A autoestima das mulheres é alta, com 31,7+ -4,9.	O bem-estar e a qualidade de vida que o Stiletto proporciona é demonstrado com o aumento da autoestima que advém da autoconfiança e autonomia que elas adquirem com a prática.
Serretti, A. N. M.; Caramaschi, S. (2015)	Investigar de que modo a dança interfere e transforma quantitativa e qualitativamente a perspectiva que a mulher tem de si mesma e de suas interações com seus pares.	Em relação a “feminilidade” e “alegria a dançar” no questionário fechado teve as maiores pontuações positivas. Em relação a autoestima, a entre outras opções, a primeira é pôr a dança ser feminina.	Foi percebido que através da dança do ventre ocorrem mudanças benéficas nas mulheres; autonomia, superação, autoconfiança, qualidade de vida, melhora a visão autopercepção da aparência, sem esquecer que a autoestima obteve grandes positivos nos resultados pelos questionários. A dança do ventre valoriza a beleza, o equilíbrio e a harmonia.

Ribas <i>et al.</i> , (2016)	Verificar as alterações ocorridas na imagem corporal de mulheres praticantes de Dança do Ventre.	Dentre os entrevistado, 85% acreditam que sua imagem corporal se modificou e 15% não, e 95% das participantes da coleta relatam melhora da imagem corporal, a partir da prática da Dança do Ventre, físicas e emocionais que compõem uma nova autoimagem corporal, 5% não.	A dança do ventre traz resultados benéficos que diz respeito a imagem corporal das praticantes, melhorando a percepção das praticantes na da autoimagem, mudanças de comportamentos que vêm das alterações físicas adquiridas com a prática.
Carmanatti <i>et al.</i> , (2019)	Analisar a influência da dança do ventre na imagem corporal e autoestima das mulheres durante e após o tratamento do câncer de mama.	Não houve alterações significativas na autoestima em ambos os grupos,. No que diz respeito a imagem corporal foram observadas mudanças significativas apenas entre pré e pós-intervenção no grupo de Experimental).	Apesar dos resultados, observou-se através de relatos nas aulas, os benefícios da atividade. As praticantes de dança do ventre mostram feminilidade e confiança, o que está ligada a uma imagem corporal mais favorável, já que a mama é algo importante no corpo feminino. Essa prática desenvolve autoaceitação e estimula a criatividade.
Navalho, A. C. C.; Rosa, J. B. (2016)	Verificar se existem diferenças significativas entre mulheres ativas (praticantes de dança, ou praticantes de outra modalidade) e mulheres sedentárias nas três variáveis em estudo.	No que diz respeito à qualidade de vida, no grupo de dança e no de outra atividade física os níveis foram mais altos do que no grupo sedentário. Os níveis de imagem corporal tiveram resposta negativa em todos os grupos.	A qualidade de vida, imagem corporal e satisfação com a vida apresentam níveis mais favoráveis tanto para o grupo de dança quanto para o grupo que pratica a outra atividade física. Na variável satisfação com a vida, das mulheres sedentárias, observa-se baixos níveis de satisfação e de qualidade de vida.
Godinho, A. P. (2018)	Analisar os efeitos da prática regular de Pole Dance sobre a autoestima e autoimagem de mulheres.	A maior porcentagem são mulheres insatisfeitas com a imagem corporal, 48% por quererem diminuir o tamanho da silhueta, 16% estão insatisfeitas pela magreza e 36% das praticantes estão satisfeitas com a sua imagem corporal no momento. Em relação à autoestima, todas com respostas positivas, 96% tem a autoestima boa e 4% a autoestima elevada.	As contribuições da prática do pole dance, refletem em uma autoestima boa das praticantes, já com relação a auto-imagem, há insatisfação corporal das praticantes, pelo fato das exigências de cada uma consigo mesma, devido ao padrão de corpo imposto pela sociedade.
Leal <i>et al.</i> , (2020)	Verificar o nível de autoestima e satisfação corporal de bailarinas amadoras.	Mais de 40% das bailarinas tem uma insatisfação corporal, tendo baixo nível de autoestima com frequência maior que 90%.	A baixa autoestima das bailarinas advém também da insatisfação corporal e que as bailarinas satisfeitas com o corpo, tem uma autoestima melhor.

Fonte: Costa, 2021.

A análise das pesquisas nos permite observar resultados positivos na autoestima e na imagem corporal que se estabelece através da prática da dança, nas suas variações de estilos, mas também pode-se notar que há alguns resultados de insatisfações em alguns estudos, que advém de fatores não relacionados à prática. Perante a isso, foi analisado cada estudo detalhadamente e no decorrer da discussão foi realizada comparações sobre as semelhanças e diferenças entre os mesmos, os quais foram comparados por determinadas características dominantes, as quais são: *fatores de escolaridade, socioeconômicos e idade, discutido entre os 3 primeiros artigos; vivência com a dança do ventre, que predomina os artigos 4, 5, e 6; a insatisfação e preocupação com padrão de corpo que descreve os artigos 7, 8 e 9.*

No estudo de Aliati e Rossato (2017), observaram que 16 mulheres com idade entre 60 e 75 anos praticantes de dança, o resultado foi positivo em relação à autoimagem corporal, apesar da autoestima não ter sido favorável. Ambos os estudos relacionados tinham como característica amostral mulheres donas de casa, com níveis de escolaridade e renda baixas. Percebe-se que apesar de fatores socioeconômicos a dança estabelece ganhos na vida de quem a realiza. Desta forma, observou-se que a autoimagem das mulheres nesses estudos supracitados está favorável.

Aguiar (2014), apresenta que existe uma relação eficiente entre a prática de atividade física com a melhoria da aparência física e da imagem corporal, impactando positivamente na autoestima. Ainda para o autor, embora não seja uma melhoria notada a curto prazo, essa relação entre saúde física e bem-estar mental, a qual ocasiona a melhoria da autoestima, mostra efeitos positivos em todas as faixas etárias.

De acordo com Veras (2009) autoestima e autoimagem têm ligações com a imagem corporal, esta pode se apresentar ao idoso de forma distorcida, por causa das modificações fisiológicas, socioeconômicas, alterações de estruturas familiares, demandas por políticas públicas e distribuição de recursos na sociedade.

Silva *et al.*, (2017), realizaram estudo com 23 mulheres praticantes de Stiletto Dance, com idade entre 18 a 62 anos, em seus achados observaram que índices elevados de autoestima retratam uma melhor qualidade de vida e que a prática do Stiletto proporciona uma maior aceitação com sua imagem corporal.

Foi observado neste estudo, que as participantes têm um grau de escolaridade alto e que há variações de profissões, como por exemplo, coordenadoras de operações, donas de casas, advogadas, universitárias, pedagogas, nutricionista, entre outras.

Já o estudo realizado por Carminatti *et al.*, (2019), com 19 mulheres praticantes da dança

do ventre, divididas em grupo controle (8 mulheres) e grupo experimental (11 mulheres), mostra que ambos os grupos deste estudo não tiveram resultado significativo em relação à autoestima e apenas no grupo experimental houve mudanças significativas na imagem corporal. O resultado obtido é que a dança do ventre contribui na imagem corporal das mulheres após 12 semanas de prática e que a mesma influência na autoconfiança e feminilidade.

Fazendo uma comparação aos três estudos da prática de dança do ventre, o último pode não ter alcançado um resultado significativo em todos os seus aspectos ou na maioria deles pelo fato da influência maior está relacionada ao câncer de mama, já que a mama é algo crucial na vida feminina, além da doença fazer com que as mulheres sofram outras consequências. A pessoa quando está concentrada nas suas deficiências ou no medo de fracassar, ao invés das qualidades e possibilidades de sucesso, na maioria das vezes contribui para uma baixa autoestima (WEINBERG; GOULD, 2001).

Navalho e Rosa (2016), tiveram como participantes de sua pesquisa 165 mulheres, divididas em 3 grupos, 52 praticantes de dança, 54 pratica outra atividade e 59 que não pratica qualquer atividade física designado por grupo de sedentárias. Teve como resultado de respostas significativas as praticantes de dança e as que pratica outra modalidade de atividade física. O grupo sedentário, quando perguntado por qual motivo não realizavam a prática, foram obtidos diversos fatores que impediam, como a falta de tempo e motivação, além das questões financeiras.

Estudos como o de Godinho (2018), que teve a amostra composta por 25 mulheres que praticam o Pole Dance, notou-se a preocupação com o “padrão de corpo” já pela porcentagem de insatisfeitas com a imagem corporal das praticantes, 48% por quererem diminuir o tamanho da silhueta, 16% insatisfeitas por conta da magreza, apenas 36% se apresentaram satisfeitas com a imagem corporal, mas 96% das praticantes tem a autoestima boa e 4% tem ela elevada.

Essa cobrança consigo mesma pelo padrão de corpo exigido pela sociedade pode por muitas vezes fazer com que a autoestima das mesmas seja baixa, prejudicando assim a qualidade de vida, as tarefas diárias e em outras relações, o que não foi o caso do estudo anterior. Porém, na pesquisa de Leal *et al.*, (2020), realizado com 41 bailarinas amadoras, com idades entre 9 e 59 anos, sendo que 40% estavam insatisfeitas com o corpo, dentre essas mais de 90% das bailarinas se encontraram com baixa autoestima e quanto às bailarinas que apresentaram níveis consideráveis de satisfação com o corpo, observou-se melhor autoestima.

A insatisfação com o corpo vem da preocupação com o peso, podendo estar associado a variação de idade, assim como com as exigências físicas do próprio ballet. O estudo também mostra uma associação entre satisfação corporal com nível de escolaridade das bailarinas.

Mostra-se que o acompanhamento de um profissional de Educação Física, junto a outros, se faz necessário para auxiliar na aceitação da imagem corporal e melhorar assim a autoestima das bailarinas, para assim não haver distúrbios alimentares e problemas psicológicos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se concluir que a dança contribui de maneira benéfica para a autoestima e imagem corporal de mulheres praticantes, em suas diferentes fases de sua vida. Fatores como a autoimagem, autoconfiança, feminilidade, autonomia, superação, entre outros, são adquiridos também através de sua prática, de maneira que auxilia positivamente para se ter uma boa qualidade de vida. Ainda que, fatores psicológicos, baixo nível de escolaridade, fatores socioeconômicos, enfermidades, falta de incentivo e padrões de beleza, possam contribuir negativamente para uma autoestima e imagem corporal positivas, a prática da dança é importante para aos poucos melhorar esses índices.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, S. F. A. **O meu corpo e eu: A imagem corporal e a autoestima na adolescência.**

Dissertação de Mestrado (Mestre na especialidade de Psicologia Clínica)- Instituto Universitário Ciências Psicológicas, sociais e da vida, 2014.

CARMANATTI, M. et al. Effects of belly dancing on body image and self-esteem in women with breast câncer- Pilot study. **Revista Brasileira de Medicina do Esporte.** São Paulo, v. 25, n. 6, nov./dez. 2019. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rbme/a/H4Db5kjmjrHfKv5TYdSB4Mf/?lang=en> . Acesso em: 14 de jul. 2021.

CASTILHO, S. M. **A imagem corporal.** Editora ESETec Editores Associados, Santo André-SP. 100f, 2001.

GUILHARDI, H. J. **Auto estima, Auto confiança e Responsabilidade.** Instituto de Análise de Comportamento. Editora ESETec Editores Associados, Santo André-SP, 2002.

GODINHO, A. P. **Autoimagem e autoestima de mulheres praticantes de pole dance.**

Sul de Santa Catarina, 2018. Disponível em:

<https://www.riuni.unisul.br/handle/12345/7314>. Acesso em: 04 de fev. 2021.

LEAL, R. K. P.; SOUZA, N. S.; SILVA, R. R. V. Autoestima e satisfação corporal de bailarinas. **Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento**. São Paulo, v. 14, n. 85, p. 170-176, mar./abr. 2020. . Disponível em:

<http://www.rbone.com.br/index.php/rbone/article/view/1203>. Acesso em: 14 de jul. 2021.

NAVALHO, A. C. C.; ROSA, J. B. **Satisfação com a vida, qualidade de vida e imagem corporal em mulheres sedentárias, praticantes de dança e de outra atividade física**.

Dissertação (Mestre em Psicologia Clínica e da Saúde) - Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Lisboa, 2016.

PEREIRA, E. S.; GAMA, E. F. Imagem corporal da mulher praticante de exercício físico. **HU Revista**. Juiz de Fora, v. 43, n. 1, p. 5-11, jan./jun. 2017. Disponível em:

<https://periodicos.ufjf.br/index.php/hurevista/article/view/2432> . Acesso em: 14 de jul. 2021.

SARTORI, C. A.; OLIVEIRA, L. P. S.; SANTOS, L. L. M.; NAPOLI, M. C.;

OVANDO, R. G. M. A Influência do Exercício Físico na Autoestima e na Promoção da Saúde de Mulheres Adultas Obesas. **Revista Científica JOPEF**. Curitiba, 16 de jun. de 2017.

Disponível em:

https://www.researchgate.net/publication/320451127_a_influencia_do_exercicio_fisico_na_a_utoestima_e_na_promocao_da_saude_de_mulheres_adultas_obesas. Acesso em: 12 de fev. de 2021.

SEIGLEY, L. A. Self-esteem and health behavior: theoretic and empirical links. **Nursing Outlook**. v. 47, p. 74-77, mar./abr. 1999. Disponível em:

[https://www.nursingoutlook.org/article/S0029-6554\(99\)90073-8/fulltext](https://www.nursingoutlook.org/article/S0029-6554(99)90073-8/fulltext). Acesso em: 14 de jul. 2021.

SILVA, J. C.; PEREIRA, C. A. M.; REBOLHO, A. C. F. **Avaliação da qualidade de vida e da autoestima em mulheres praticantes de stiletto dance**. São Carlos-SP, 2017. Disponível em:

http://static.unicep.edu.br/cenip/docs/revistamulticiencia/Multiciencia_Vol16.pdf#page=39.

Acesso em: 09 de fev. 2021.

SZUSTER, L. **Estudo qualitativo sobre a dança como atividade física em mulheres acima de 50 anos**. 69 f. (Monografia de Bacharel em Educação Física) - Universidade Federal Do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2011.

TESSARI, O. I. **Dirija sua vida sem medo**. 2ª ed. Editora Letras Jurídicas: São Paulo, 2005.

TOSCANO, W.; VEGA, L. **Actividad física y calidad de vida**. n. 9, v. 1, 2008.

VERAS, R. Envelhecimento populacional contemporâneo: demandas, desafios e inovações.

Revista Saúde Pública ;43(3):548-54, 2009. Disponível em:

https://scholar.google.com.br/scholar?q=Envelhecimento+populacional+contempor%C3%A2neo:+demandas,+desafios+e+inova%C3%A7%C3%B5es.+Revista+Sa%C3%BAde+P%C3%BAblica&hl=pt-BR&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart. Acesso em: 14 de jul. 2021.

WEINBERG, R.; GOULD, D. **Fundamentos da Psicologia do Esporte e do Exercício**. 2ª ed. Porto Alegre: Artmed Editora, 2001.

CAPÍTULO 03

A CONTRIBUIÇÃO DA TERAPIA FOTODINÂMICA NA ENDODONTIA

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c03](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c03)

Rafaela Batista Santos¹, Monica Moreno de Carvalho², Mônica Ribeiro de Oliveira Santana³, Eduardo Ponzani Neto⁴, Emily Caroline Gonçalves dos Santos⁵, Diogo Arautara Yamanari Rodarte Kamaiura⁶, Vitória Parmejane de Oliveira⁷, Jéssica Pessoa Rodrigues⁸, Nilton Cesar Pezati Boer⁹, Karina Gonzalez Camara Fernandes¹⁰

¹ Universidade Brasil, (rafaelab.santos013@gmail.com)

² Universidade Brasil, (monicamorenocrv@gmail.com)

³ Universidade Brasil, (monicaribeirode@gmail.com)

⁴ Universidade Brasil, (eduardoponzani@gmail.com)

⁵ Universidade Brasil, (emily.caroline.santos2001@gmail.com)

⁶ Universidade Brasil, (diogokamaiura22@gmail.com)

⁷ Universidade Brasil, (vitoria.parmejane@gmail.com)

⁸ Universidade Brasil, (jessicarodrigs7@gmail.com)

⁹ Universidade Brasil, (niltonpboer@gmail.com)

¹⁰ Universidade Brasil, (karinagcf@yahoo.com.br)

Resumo

Objetivo: A terapia fotodinâmica, que consiste na utilização de uma fonte luminosa associada a substâncias fotossensibilizadoras, tem sido indicada como capaz de eliminar micro-organismos. Diante disso, o presente trabalho tem o objetivo de realizar uma revisão de literatura sobre a terapia fotodinâmica na endodontia. **Método:** Para tanto, foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica, que consistiu na busca em bases de dados, como Pubmed e Scielo, de artigos científicos relacionados ao tema. Os artigos encontrados foram lidos e analisados e, quando relevantes, utilizados na redação deste trabalho. **Resultados:** Por meio dessa pesquisa, foi possível encontrar diferentes trabalhos que evidenciam os efeitos benéficos da terapia fotodinâmica na endodontia, especialmente por estar relacionada à eliminação de bactérias, inclusive resistentes a antibióticos. **Considerações Finais:** Conclui-se que a terapia fotodinâmica pode possuir efeitos positivos na eliminação da dor pós-cirúrgica em pacientes submetidos a tratamentos endodônticos. Isso evidencia a importância dessa técnica que se mostra um interessante coadjuvante na endodontia, com resultados positivos e vantagens para os tratamentos. **Palavras-chave:** Endodontia; Terapia Fotodinâmica; Agente Antimicrobiano.

Área Temática: Ciências da Saúde.

E-mail do autor principal: rafaelab.santos013@gmail.com.

1 INTRODUÇÃO

A endodontia é a especialidade que estuda a morfologia da polpa dentária, realiza o tratamento e a reabilitação das suas consequências nos tecidos periapicais. Para garantir a eficácia do tratamento endodôntico é necessário realizar a limpeza no sistema de canais radiculares para promover a eliminação completa dos micro-organismos (POURHAJIBAGHER *et al.*, 2018).

O tratamento convencional na endodontia estabelece a combinação de instrumentos manuais e mecanizados junto a protocolos de irrigação química, com irritantes antimicrobianos como hipoclorito de sódio (NaOCl) na tentativa de erradicar por completo as bactérias presentes. Com o avanço da tecnologia na área da saúde, a fim de incrementar os procedimentos antimicrobianos e aumentar o índice de sucesso nos tratamentos endodônticos, foram desenvolvidas algumas alternativas auxiliares (STÁJER *et al.*, 2020).

Atualmente a terapia fotodinâmica (PDT) tem se manifestado propícia a terapia antimicrobiana na eliminação de microrganismos existentes nas infecções endodônticas. O tratamento se baseia na influência de três constituintes: corante fotossensibilizador, fonte de luz e oxigênio. Os meios de ação do PDT advém quando o *fotosensitizer* capta fótons da fonte de luz, e adentram os seus elétrons a um estado animado. Devido voltar em sua condição básica, o fotossensibilizante transmite energia a um substrato, tal como o oxigênio, originando radicais livres com alta citotoxicidade, podendo provocar a falência dos microrganismos (DE OLIVEIRA *et.al.*, 2018).

O procedimento apresenta vantagem em relação aos mais convencionais baseado na invasão mínima e preservação dos tecidos saudáveis, também assegurando a esterilidade do conduto radicular, eliminando em grande chance a ocorrência de reinfecções, devido o PDT ser um agente muito eficiente contra bactérias gram-positivas e gram-negativas, em especial *Enterococcus faecalis*, presente nas injúrias endodônticas (OKAMOTO *et al.*, 2018).

2 MÉTODO

Esta revisão narrativa foi realizada através do levantamento bibliográfico na base de dados PubMed e SciELO, onde foram aplicados filtro para selecionar apenas artigos publicados nos últimos 5 anos, nos idiomas português, inglês e espanhol, utilizando os termos descritores

“Endodontics”, “Photodynamic Therapy” e “Antimicrobial Agent” com o boleador “and”. Inicialmente foram encontrados 97 artigos, após passar por uma análise e leitura na íntegra foram selecionados 21 artigos científicos que demonstravam a contribuição da terapia fotodinâmica na área endodôntica para a confecção deste trabalho.

Figura 1: Fluxograma referente ao quantitativo de artigos científicos nas bases de dados conforme os critérios de inclusão.

Fonte: Produzido pelo próprio autor.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dentre os 97 artigos encontrados, foram escolhidos e consultados através de alguns critérios de inclusão e exclusão 21 deles, que se encontram na tabela 1 para análise.

Autor/ano	Tipo de estudo	Resultados
Alfenas et al, 2011	Revisão de Literatura: Estudo buscou sobre a terapia fotodinâmica no combate aos microorganismos causadores da infecção endodôntica.	A PDT não deve substituir os procedimentos dos tratamentos convencionais, mas deve ser aprimorada e ser coadjuvante ao tratamento convencional, já que o laser de baixa intensidade é seguro, de fácil manipulação e aceitação pelo paciente.
Amaral et al, 2010	Revisão de Literatura: O estudo objetiva discutir os principais fatores que envolvem a terapia fotodinâmica e sua utilização no tratamento endodôntico	A terapia fotodinâmica desponta como uma promissora terapia antimicrobiana, sendo utilizada como coadjuvante ao tratamento endodôntico. Consiste numa técnica de fácil e rápida aplicação, que pode ser utilizada em sessão única ou múltiplas sessões.
Bolhari et al, 2021	Pesquisa: Analisar o efeito ex vivo de aPDT em combinação com clorexidina 2,0% (CHX) como uma terapia convencional na contagem de colônias e padrões de expressão de genes associados à formação de biofilme de <i>E. faecalis</i> .	O efeito de sinergismo do ICG-aPDT com CHX 2,0% leva à modulação da virulência do modelo de biofilme das cepas de <i>E. faecalis</i> pela supressão da expressão dos genes associados à formação do biofilme.
De, Oliveira et al, 2018	Relato de caso: Descrever o caso de um paciente submetido a tratamento cirúrgico endodôntico associado ao PDT.	A associação do PDT com o tratamento cirúrgico endodôntico foi eficaz, sugerindo que esta terapia pode proporcionar benefícios adicionais aos pacientes quando comparada com a terapia convencional técnica cirúrgica.
Eduardo et al, 2015	Revisão de Literatura: Apresentar estudos laboratoriais e clínicos relacionados à terapia fotodinâmica em Periodontia, Endodontia e Estomatologia. Apesar da variedade de protocolos utilizados nas recentes pesquisas, a terapia fotodinâmica mostra-se promissora como coadjuvante ao tratamento convencional.	A Terapia Fotodinâmica (PDT) antimicrobiana não é considerada uma substituta aos fármacos antimicrobianos ou de qualquer tratamento convencional, mas sim uma importante modalidade de tratamento complementar de infecções bucais localizadas, principalmente em casos de microorganismos resistentes.
Eslami et al, 2019	Pesquisa: 84 dentes foram estudados e após incubação de <i>E. faecalis</i> e <i>C. albicans</i> nos canais, as amostras foram mantidas em incubadora por 8 semanas para formação do biofilme. controle e grupos tratados com Ca (OH) 2, TAP, TO1, LED, PDT e DL.	Reduções significativas na espessura do biofilme foram observadas no TAP, PDT e LED ($P < 0,05$). A maior redução na espessura do biofilme foi observada no TAP; no entanto, as diferenças entre TAP e PDT e LED não foram significativas ($P > 0,05$).
Ghorbanzadeh et al, 2020	Pesquisa: Neste estudo, o efeito da desinfecção do canal radicular e atividades antivirulência da inativação fotodinâmica (PDI) de <i>E. faecalis</i> utilizando óxido de grafeno reduzido-curcumina (rGO-Cur) como agente fotossensibilizante após irradiação com diodo emissor de luz (LED), em comparação com hipoclorito de sódio (NaOCl) como a solução de irrigação endodôntica tradicional.	A análise de espectros de FTIR, DLS, potencial Zeta, SEM e UV-Vis indicou o sucesso da síntese de rGO-Cur. O MBIC de rGO-Cur foi de 250 µg/ml, o que inibiu o crescimento de <i>E. faecalis</i> . O LED mostrou atividade anti-biofilme insignificante contra <i>E. faecalis</i> mesmo após o tratamento por um longo tempo de irradiação (300 s). De acordo com o ensaio quadriculado, o valor de MBIC de rGO-Cur-PDI foi reduzido visivelmente em comparação com os valores de MBIC individuais de rGO-Cur e LED para <i>E. faecalis</i> .
Karaoglu, et al, 2020	Pesquisa: Foi realizado estudos em 49 dentes.	Com o protocolo realizado proporcionou eficácia antimicrobiana.
Mesquita et al, 2013	Revisão de Literatura: Esclarecer o uso da terapia fotodinâmica na odontologia com alguns estudos realizados nos últimos anos.	Com base nos estudos ainda não existem técnicas padronizadas para seu uso em consultório odontológico. São necessários mais estudos e relatórios de acompanhamento clínico para que a abordagem seja útil no tratamento das diversas situações.

Méndez, <i>et al</i> 2021	Pesquisa: Cultivados em discos de dentina bovina em meio Brain Heart Infusion (BHI) com glicose a 1%	Os resultados mostraram que todas as combinações de aPDT com quelantes reduziram significativamente a viabilidade das células microbianas e a vitalidade dos biofilmes.
Okamoto, <i>et al</i> 2018	Pesquisa: Analisados 5 dentes deciduos e tratados endodonticamente com a técnica convencional, e após o fotossensibilizador foi aplicado dentro do canal radicular.	Os resultados obtidos nesta série de casos, que mostraram redução bacteriana de 37,57% a 100%.
Plotino; Grande; Mercade, 2018	Revisão de literatura: Buscou-se a efetividade TFD na área endodôntica no que diz respeito ao seu mecanismo de ação, fotossensibilizadores e fontes de luz, limitações e procedimentos clínicos.	Embora resultados positivos tenham sido demonstrados <i>in vitro</i> , há consideravelmente menos investigações <i>in vivo</i> .
Pourhajb agher; Bahador, 2018	Pesquisa: Investigou-se o efeito do PAD na redução da diversidade e contagem microbiana, relacionada com infecções endodônticas primárias.	PAD mediado por TBO é eficaz em exibir atividade antimicrobiana eficiente devido à redução substancial da diversidade e contagem microbiana nas infecções endodônticas primárias.
Pourhajb agher; Bahador, 2017	Pesquisa: 16 cepas clínicas de <i>P. gingivalis</i> resistente a PAD que foram isoladas <i>in vivo</i> , foram posteriormente fotossensibilizadas <i>in vitro</i> .	O perfil de expressão gênica foi reduzido nas células bacterianas, em que maior redução foi observada para ICG-sPAD do que TBO- e MB-sPAD.
Pourhajb agher <i>et al</i> , 2016	Pesquisa: O potencial antimetabólico e antibiofilme de ICG-, TBO- e MB-sPDT contra <i>E. faecalis</i> foi analisado em doses subletais.	Doses altas revelaram atividade potencial antimetabólica e antibiofilme, enquanto doses mais baixas tiveram resultados conflitantes.
Pourhajb agher <i>et al</i> , 2018	Pesquisa: Os potenciais antibacteriano e antibiofilme foram avaliados pela contagem das unidades formadoras de colônias e também pelo ensaio de cristal violeta, respectivamente.	PDT tem um alto potencial para eliminação de <i>E. faecalis</i> e é quase equivalente a NaOCl e CHX. Pode ser usado como adjuvante de soluções irrigantes endodônticas convencionais.
Sarda <i>et al</i> , 2019	Pesquisa: Avaliar e comparar a atividade antimicrobiana do laser de diodo, terapia fotodinâmica e hipoclorito de sódio 120 dentes foram avaliados.	o PAD em combinação com NaOCl pode ser uma alternativa e melhor opção para a desinfecção do canal radicular para ambos os patógenos endodônticos, <i>E. faecalis</i> e <i>S. mutans</i> .
Schaeffere <i>et al</i> , 2019	Revisão de Literatura: Baseado nos artigos científicos propõem-se os protocolos para uso da terapia fotodinâmica. Preparo convencional do canal radicular e ao final utilização de EDTA 17%. Secagem do canal radicular. Inserção do fotossensibilizador (Azul de Metileno a 0,01 %) pelo período de 120 a 180 segundos. Irrigação com solução irrigadora para remoção do corante.	A terapia fotodinâmica surge como uma promissora terapia coadjuvante ao tratamento endodôntico convencional, viabilizando a eliminação de microrganismos persistentes após o preparo químico mecânico do sistema de canais radiculares. Mas ainda necessita de mais estudos na literatura.
Stájer <i>et al</i> , 2020	Revisão de Literatura: O estudo objetiva conceitos gerais, vantagens e desvantagens da PDT e fornecer exemplos para as indicações atuais da PDT em várias subespecialidades da odontologia.	Como uma análise final, o fato de que o PDT oferece uma abordagem minimamente invasiva, tem um espectro de ação extremamente amplo contra patógenos sem apresentar resistência, causa poucos efeitos adversos reversíveis e que já está prontamente disponível e com uso econômico sugere que o PDT representa uma ótima utilidade no campo da odontologia.
Tavares <i>et al</i> , 2020	Relato de caso: Paciente com obliteração do canal pulpar (PCO) e periodontite apical foi tratada com endodontia guiada combinada com terapia fotodinâmica antimicrobiana (aPDT)	A combinação dessas técnicas garantiu resultados clínicos, radiográficos e tomográficos bem-sucedidos no acompanhamento de 1 ano.

A PDT (terapia fotodinâmica) nada mais é, que o uso de um fotossensibilizador (corante fotoativo), que é ativado pela luz de um determinado comprimento de onda, e conta com a presença de oxigênio para que aconteça. E, essa luz é responsável por liberar radicais livres e oxigênio singlete, que são, capazes de danificar as moléculas e partes das células microbianas, e isso se deve pela extrema toxicidade e reatividade deles. E com isso, a PDT se mostrou ser uma forte alternativa para o tratamento antimicrobiano (MESQUITA *et al.*, 2013).

A luz já era utilizada em técnicas terapêuticas para tratamento de doenças desde a antiguidade, na Índia, Egito e China são exemplos disso, onde para o tratamento de pele, a luz solar era utilizada. No início do século XX, devido aos avanços da tecnologia e ciência foi

notado os efeitos colaterais letais nas células, devido a interação entre substâncias químicas e a luz. (SCHAEFFER *et al.*, 2019). A partir daí, as terapias com a utilização da luz começaram a ser utilizadas no tratamento de diversas patologias e microrganismos (NUÑEZ; RIBEIRO; GARCEZ, 2013).

Contudo, após o desenvolvimento de outros tipos de terapias para infecções por microrganismos, outros tipos terapias antimicrobianas surgiram, e a terapia fotodinâmica passou a ser deixada de lado, porém, mesmo com essas novas terapias e agentes antibióticos que surgiram com o passar dos anos, alguns microrganismos mostraram resistência a eles, tendo assim uma maior complexidade para sua eliminação, e assim, a PDT voltou a ser usada e se tornando novamente uma alternativa a ser usada (MESQUITA *et al.*, 2013).

Quase todas as bactérias da cavidade oral não são capazes de absorver luz visível, mas as gram-positivas, chamadas de *Actinomycesodontolyticus* e *Porphyromonasgingivalis* possuem essa capacidade. Portanto, devido a isso, os estudos sobre a terapia, são realizados associando-os a corantes, que são capazes de sensibilizar as bactérias e produzir a técnica juntamente com os seus efeitos letais. Tem-se utilizado em grande escala, na endodontia, os fotossensibilizadores de origem de fenotiazinas, heteroaromáticos tricíclicos, como o azul de metileno e o azul de toluidina (AMARAL *et al.*, 2010).

Lâmpadas convencionais, que continham o fator térmico associado e que emitem luz não coerente e policromática eram utilizadas a princípio. Com o avanço da tecnologia foram desenvolvidos os lasers de diodo de baixa intensidade com luz monocromática e coerente, que favoreceu a associação com os fotossensibilizadores. Presentemente, são usufruídos lasers de diodo que são capazes de emitir no espectro vermelho em baixa intensidade. Contudo, os diodos emissores de luz (LEDs), tem potencial para ser utilizado como fonte de luz alternativa, e que tem a capacidade para ser utilizados como fonte de ativação em PDT, com banda estreita de comprimento de onda, baixo componente térmico e luz monocromática (SCHAEFFER *et al.*, 2019).

A molécula do fotossensibilizador muda de um estado de baixa energia, para um estado mais excitado (singleto), devido a irradiação pela luz. A partir desse momento a molécula pode retornar a seu estado fundamental, mas com a emissão de energia na forma de fluorescência ou transformar-se em tripleto, que é o seu estado de maior energia. Nesse estado de maior energia, pode-se reagir com oxigênio formando diversos tipos de radicais livres, que causam uma destruição seletiva do tecido alvo bem acelerada (MESQUITA *et al.*, 2013).

Posteriormente, a molécula excitada irá reagir sobre as biomoléculas de formas distintas, de duas maneiras. Isso pode ocorrer por meio de transferência direta de elétrons, que

causa danos a essas moléculas, ou causa a formação de espécies reativas de oxigênio, que são radicais hidroxila, superóxido e peróxido de hidrogênio, ou então, por meio de trocas de energia de excitação, assim formando-se o oxigênio singleto, que possui propriedades antimicrobianas e possui capacidade de causar danos às moléculas estruturais de fungos e bactérias, mas, esse dano varia de acordo com a potência do fotossensibilizador e da tensão do oxigênio (MESQUITA *et al.*, 2013 ; EDUARDO *et al.*, 2015).

Deste modo, podemos notar que existem diversos aspectos a serem analisados na terapia fotodinâmica, pois, envolve diversos fatores, como à dosimetria de luz, tempo de exposição, comprimento de onda, potência do fotossensibilizador e suas características, tempo de exposição, fluência, características do ambiente e dos microrganismos analisados. Devido a essa imensa variedade de parâmetros e aspectos a serem analisados e discutidos que tem-se esse conflito para a definição de um protocolo clínico para técnica para dessa prática (MESQUITA *et al.*, 2013).

OUADAHI (2020) declara que, clinicamente falando, a terapia fotodinâmica tende a crescer e avançar em todas as áreas, devido à disponibilidade (que é relativamente recente), de fontes de luz portáteis e fiáveis, sendo assim, acessíveis.

A terapia fotodinâmica tende a crescer ainda mais na área odontológica, pois, cirurgiões dentistas estão buscando métodos para aumentar o sucesso de seus procedimentos. E falando especificamente sobre endodontia e falhas dela, onde sabemos que muitas das vezes o insucesso desse procedimento se dá devido a fatores microbianos, (PLOTINO, GRANDE; MERCADE, 2018) e isso serve como incentivo para os profissionais na busca por algo que ajude na eliminação desses microrganismos.

De acordo com diversos estudos analisados, com protocolos e objetivos diferentes a terapia fotodinâmica demonstrou um bom desempenho na inibição do crescimento de microrganismos, diminuição da espessura de biofilme, redução significativa na contagem de *Enterococcus faecalis* e na potencialização da desinfecção dos canais radiculares endodonticamente tratados (OKAMOTO *et al.*, 2018 ; DE OLIVEIRA *et al.*, 2018 ; GHORBANZADEH *et al.*, 2020 ; SARDA *et al.*, 2019 ; ESLAMI *et al.*, 2019), e dessa forma a PDT tem-se mostrado benéfica para a endodontia.

Contudo, a PDT ainda não é algo que possa substituir os métodos convencionais já utilizados atualmente, mas sim, como uma forma de apoio, para ser usado em como coadjuvante a fim de melhorar os resultados já obtidos pelos métodos comumente utilizados. E é importante destacar que os estudos de protocolos da terapia fotodinâmica ainda necessitam de mais resultados de pesquisas (OUADAHI, 2020), e também depende de avanços tecnológicos nos

corantes fotossensibilizadores, nas fontes de luz e oxigênio, antes de sua utilização clínica com 100% garantia de resultados.

4 CONCLUSÃO

Diante do exposto no presente artigo, conclui-se que a terapia fotodinâmica pode ser considerada uma importante aliada no tratamento endodôntico, pois é eficaz na eliminação de microorganismos. Essa ação antibiótica torna-se ainda mais relevante no caso de bactérias resistentes a antibióticos, o que aumenta os efeitos benéficos da terapia fotodinâmica. Ainda, essa técnica vem sendo apontada como positiva para o tratamento de outros fatores, como a dor pós-operatória. A terapia fotodinâmica é segura, de fácil utilização e apresenta boa receptividade dos pacientes e, ainda que não deva substituir os procedimentos convencionais, seu uso como coadjuvante pode ser positivo.

REFERÊNCIAS

ALFENAS, C.F. *et al.* Terapia fotodinâmica na redução de micro-organismos no sistema de canais radiculares. **RBO**, v. 68, n. 1, p. 68-71, 2011.

AMARAL, R.R. *et al.* Terapia fotodinâmica na endodontia: revisão de literatura. **RFO**, v. 15, n. 2, p. 207-211, 2010.

BOLHARI, B. *et al.* Ex vivo assessment of synergic effect of chlorhexidine for enhancing antimicrobial photodynamic therapy efficiency on expression patterns of biofilm-associated genes of *Enterococcus faecalis*. **Photodiagnosis photodyn. ther**, v. 22, n. 1, p. 227-232, 2018.

DE OLIVEIRA, B.P. *et al.* Photodynamic Therapy: A Novel Ally for Surgical Endodontic Treatment? Case Report. **Journal of Lasers in Medical Sciences**, v. 9, n. 4, p. 288-290, 2018.

EDUARDO, C.P. *et al.* A terapia fotodinâmica como benefício complementar na clínica odontológica. **Rev assoc paul circ dent.**, v. 69, n. 3, p. 226-235, 2015.

ESLAMI, L.M. *et al.* The comparison of intracanal medicaments, diode laser and

photodynamic therapy on removing the biofilm of *Enterococcus faecalis* and *Candida albicans* in the root canal system (ex-vivo study). **Photodiagnosis photodyn. ther**, v. 26, n. 1, p. 157-161, 2019.

GHORBANZADEH, R. *et al.* Modulation of virulence in *Enterococcus faecalis* cells surviving antimicrobial photodynamic inactivation with reduced graphene oxide-curcumin: An ex vivo biofilm model. **Photodiagnosis photodyn. ther**, v. 29, n. 1, p. e101643, 2020.

KARAOĞLUA, G.E. *et al.* Efficacy of antimicrobial photodynamic therapy administered using methylene blue, toluidine blue and tetra 2-mercaptopyridine substituted zinc phthalocyanine in root canals contaminated with *Enterococcus Faecalis*. **Photodiagnosis photodyn. ther**, v. 32, n.1, p. e102038, 2020.

MÉNDEZ, D.A.C. *et al.* Effects of curcumin-mediated antimicrobial photodynamic therapy associated to different chelators against *Enterococcus faecalis* biofilms. **Photodiagnosis photodyn. ther**, v. 35, n. 1, p. e 102464, 2021.

MESQUITA, K.S.F. *et al.* Terapia fotodinâmica: tratamento promissor na odontologia? **Faculdade de Odontologia de Lins**, v. 23, n. 2, p. 45-52, 2013.

NÚÑEZ, S.C; RIBEIRO, M.S, GARCEZ, A.S. PDT – Terapia Fotodinâmica antimicrobiana na odontologia. 1ª ed. Rio de Janeiro: **Elsevier**, 2013.

OKAMOTO, C.B. *et al.* Antimicrobial Photodynamic Therapy as a Co-adjuvant in Endodontic Treatment of Deciduous Teeth: Case Series. **Photochemistry and Photobiology**, v. 94, n. 4, p. 760-764, 2018.

OUADAHI, Rayane. Terapia fotodinâmica em endodontia - uma alternativa na desinfecção canal. 2020. f. 29. Dissertação (Ciências da saúde) - Universidade Fernando Pessoa, Porto, 2020.

PLOTINO, G; GRANDE, N.M; MERCADE, M. Photodynamic therapy in endodontics. **International Endodontic Journal**, v. 52, n. 6, p. 760-774, 2018.

POURHAJIBAGHER, M; BAHADOR, A. An in vivo evaluation of microbial diversity

before and after the photo-activated disinfection in primary endodontic infections: Traditional phenotypic and molecular approaches. **Photodiagnosis photodyn. ther**, v. 22, n. 1, p. 19-25, 2018.

POURHAJIBAGHER, M; BAHADOR, A. Gene expression profiling of fima gene encoding fimbriae among clinical isolates of Porphyromonas gingivalis in response to photo-activated disinfection therapy. **Photodiagnosis photodyn. ther**, v. 20, n. 1, p. 1-5, 2017.

POURHAJIBAGHER, M. *et al.* Antibacterial and Antibiofilm Efficacy of Antimicrobial Photodynamic Therapy Against Intracanal Enterococcus faecalis: An In Vitro Comparative Study with Traditional Endodontic Irrigation Solutions. **J Dent** (Tehran), v. 15, n. 4, p. 197-204, 2018.

SARDA, R.A. *et al.* Antimicrobial efficacy of photodynamic therapy, diode laser, and sodium hypochlorite and their combinations on endodontic pathogens. **Photodiagnosis photodyn. ther**, v. 28, n. 1, p. 265-272, 2019.

SCHAEFFER, B. *et al.* Terapia fotodinâmica na endodontia: revisão de literatura. **JOI**, v. 8, n. 1, p. 86-99, 2019.

SILVESTRE, A.L.P. *et al.* Current applications of drug delivery nanosystems associated with antimicrobial photodynamic therapy for oral infections. **International Journal of Pharmaceutics**, v. 592, n. 2. p. 120078, 2021.

STÁJER, A. *et al.* Utility of Photodynamic Therapy in Dentistry: Current Concepts. **Dent J (Basel)**, v. 8, n. 2, p. 43, 2020.

TAVARES, W.L.F. *et al.* Antimicrobial photodynamic therapy and guided endodontics: A case report. **Photodiagnosis photodyn. ther**, v. 31, n. 3, p. 101935, 2020.

CAPÍTULO 04

A IMPORTÂNCIA DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR EM TEMPOS DA COVID-19: REVISÃO DE LITERATURA

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c04](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c04)

Milena Kaory Kazume¹, Mateus dos Santos Rios Matos², Anderson Luís Paschoali³, Abner Samuel dos Santos Lins⁴, Alice Freire dos Santos⁵, Luciana Canela de Siqueira Silva⁶, Mariana Vieira Silva⁷, José Antonio Santos Souza⁸

¹Universidade Brasil - Fernandópolis/SP, (milenakazume07@gmail.com)

²Universidade Brasil - Fernandópolis/SP, (mateusrios1999@gmail.com)

³Universidade Brasil - Fernandópolis/SP, (anderluispaschoali@gmail.com)

⁴Universidade Brasil - Fernandópolis/SP, (abnerlins69@gmail.com)

⁵Universidade de Fortaleza - UNIFOR, Fortaleza, Ceará, (alicefreireds@edu.unifor.br)

⁶Universidade Brasil - Fernandópolis/SP, (lucianacanela6@gmail.com)

⁷Centro Universitário CESMAC - Maceió/AL, (maarivieira15@gmail.com)

⁸Universidade Brasil - Fernandópolis/SP, (jose.ssouza@universidadebrasil.edu.br)

Resumo

Objetivo: Este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão de literatura sobre a importância da equipe multidisciplinar em tempos da COVID-19, a fim de familiarizar os profissionais e estudantes da área da saúde. **Método:** Foi realizado um levantamento bibliográfico por meio de pesquisa nos bancos de dados SciELO, Biblioteca Virtual em Saúde, PubMed e Google Acadêmico, utilizando os termos descritores “Covid-19”, “Equipe Interdisciplinar de Saúde” e “Atendimento Integral à Saúde”. **Resultados:** As diversas pesquisas realizadas na área mostraram que a criação e atuação de equipes multidisciplinares no atendimento de pacientes com COVID-19 é fundamental para a plena recuperação das sequelas que podem vir a acometer estes pacientes. **Conclusões:** Diante da literatura revisada, pode-se concluir que é muito importante o trabalho em equipe de diferentes profissionais que estejam capacitados e que tenham o mesmo objetivo, o que trará eficiência na assistência à saúde.

Palavras-chave: Covid-19; Equipe Interdisciplinar de Saúde; Atendimento Integral à Saúde.

Área Temática: Ciências da Saúde

E-mail do autor principal: milenakazume07@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

Em meados do mês de dezembro de 2019 foram registrados casos de uma nova infecção viral aguda grave em seres humanos na cidade de Wuhan, na China. A Organização Mundial da Saúde (OMS), em janeiro de 2020, declarou a infecção por COVID-19 (SARS-CoV-2) uma emergência de saúde mundial (O'BRIEN *et al.* 2020).

A pandemia se tornou um desafio de saúde pública atingindo vários países nos 5 continentes. No Brasil, foram registrados, até 7 de julho de 2020, 1.755.779 casos e 69.184 mortes, causando assim, consequências sociais, econômicas, políticas, culturais, religiosas e de saúde, sejam físicas ou psicológicas (BELARMINO *et al.*, 2020).

O novo Coronavírus possui uma alta taxa de transmissibilidade e provoca síndromes respiratórias agudas que podem variar de casos leves à casos graves; os leves correspondem a aproximadamente 80% dos casos de contaminação e, os graves aproximadamente 5 a 10% dos casos, sendo que estes últimos são associados à insuficiência respiratória e sua letalidade varia de acordo com as condições sistêmicas de cada indivíduo e faixa etária (GUIMARÃES *et al.*, 2020).

Frente a essa problemática, Moradian (2020) cita uma estrutura de três camadas para colaboração entre diferentes disciplinas. A interdisciplinaridade é uma das 3 camadas citadas, propondo o trabalho conjunto entre profissionais de diferentes áreas de atuação a partir de uma base disciplinar específica, para enfrentar um problema comum.

A atuação de diferentes profissionais no tratamento e reabilitação de pacientes que foram contaminados pelo Coronavírus, vai desde o diagnóstico até a reabilitação completa. Os profissionais da Enfermagem, Farmácia e Medicina fazem parte desta equipe; os profissionais da Fisioterapia e da Educação Física também podem fazer parte destas equipes atuando na reabilitação pulmonar durante e após a contaminação pelo vírus (KAPPEL; SILVA, RECKZIEGEL, 2020).

Nesse contexto, o compartilhamento de informações e conhecimentos entre os diferentes profissionais atuantes no combate à pandemia é de grande importância para a integridade nos cuidados de saúde, tornando-se crucial no combate à COVID-19 (SILVA *et al.*, 2020).

Este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão narrativa sobre a importância da equipe multidisciplinar em tempos da COVID-19, a fim de familiarizar os profissionais e estudantes da área da saúde.

2 MÉTODO

O presente trabalho constituiu-se de uma revisão de literatura, de natureza descritivo-qualitativa. A pesquisa bibliográfica foi realizada nas seguintes Bases de Dados: Scientific Eletronic Library Online (SciELO), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), PubMed e Google Acadêmico. Empregou-se os seguintes descritores: “COVID-19”, “Equipe Interdisciplinar de Saúde” e “Atendimento Integral à Saúde”. O sistema de formulário avançado “AND” para filtragem dos artigos relacionados ao tema foi utilizado.

Os critérios de inclusão foram:

- a) Possuir como temática central a equipe multidisciplinar e a COVID-19;
- b) Artigos publicados no período de 2020 a 2021;
- c) Artigos escritos em inglês, espanhol ou português.

Enquanto, os critérios de exclusão foram:

- a) Teses e Dissertações.
- b) Trabalhos que não compreendiam o tema da saúde.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir de um levantamento na Biblioteca Virtual em Saúde, ao utilizar os descritores citados anteriormente e submeter ao filtro, 2 artigos foram escolhidos para compor esta revisão. Já na plataforma da PubMed, utilizando os mesmos descritores, que passaram pelo filtro, 2 artigos foram selecionados. Na SciELO, utilizando os mesmos descritores e o filtro, para a confecção deste estudo, apenas 1 (um) foi selecionado, considerando a relevância do tema. No Google Acadêmico, 3 artigos foram escolhidos. Portanto, a partir dos critérios de inclusão e exclusão norteados pelo filtro, foram encontrados 54 artigos nas Bases de Dados. Após passar por uma análise e leitura na íntegra foram selecionados 8 artigos científicos que abordam sobre a importância da equipe multidisciplinar em tempos da COVID-19. A descrição dos artigos selecionados para análise encontra-se na Tabela 1.

Tabela 1: Autor/Ano/País, tipo de estudo, objetivo e achados dos artigos selecionados para a presente Revisão de Literatura.

AUTOR/ ANO/ PAÍS	TIPO DE ESTUDO	OBJETIVO	ACHADOS
Belarmino <i>et al.</i> 2020, Brasil	Relato de Experiência	Relatar a vivência de práticas colaborativas no enfrentamento da pandemia de COVID-19.	As práticas colaborativas em equipe foram relevantes para organizar o fluxo de trabalho diante do estresse nas emergências, do medo de contágio e conflitos.
Diaz, et al. 2021, Norway	Relato de Caso	Usar a situação Norueguesa como um caso para explicar a necessidade de uma abordagem interdisciplinar inovadora em nível de sistema global.	A COVID-19 deve ser confrontada por uma abordagem colaborativa interdisciplinar, pois novas perspectivas que abordem como as múltiplas dimensões estruturais da discriminação sistêmica em várias áreas da vida se cruzam para impactar os resultados de saúde são necessárias.
Guimarães <i>et al.</i> 2020, Brasil	Estudo Teórico Reflexivo	Apresentar uma reflexão teórica acerca da abordagem da equipe multiprofissional em Nefrologia no cenário da COVID-19.	A abordagem multiprofissional possibilita pensar em ações estratégicas conjuntas por diversos profissionais que têm um objetivo em comum, compreender o paciente com suspeita ou confirmação de COVID-19 e vincular as ações a todas as esferas de direitos, o que permite alcançar melhores respostas às suas demandas em sua totalidade, e não na perspectiva de fragmentação.
Kappel <i>et al.</i> 2021, Brasil	Relato de Caso	Analisar o cuidado multidisciplinar ao paciente diagnosticado com COVID-19, do diagnóstico à reabilitação pulmonar.	O cuidado ao paciente com COVID-19, do diagnóstico à reabilitação pulmonar, perpassa por diferentes áreas. Durante o período de internação hospitalar, profissionais de Enfermagem, Farmácia, Medicina e Fisioterapia tiveram atuação de destaque, garantido a estabilização do quadro de saúde do paciente.
Moradian <i>et al.</i> 2020, Irã	Relato de Experiência	Discutir a importância de reunir cientistas de todo o mundo para encontrar soluções eficazes para controlar a pandemia.	O papel e a colaboração de Organizações Internacionais relacionadas à Saúde, como a OMS, Organização para Alimentos e Agricultura (FAO), União Internacional de Ciência da Nutrição (IUNS) e Organizações Não Governamentais (ONGs), bem como consórcios internacionais, como Educação Científica Universal e A Rede de Pesquisa (USERN) e academias nacionais e internacionais, têm sido reconhecidas como cruciais para um conhecimento integrado do novo Coronavírus, impactando no manejo efetivo da COVID-19 em todo o planeta.

O'Brien <i>et al.</i> 2020, Irlanda	Revisão de Literatura	Descrever a implantação do Serviço de Recuperação da COVID-19, serviço multidisciplinar para acompanhamento integral de pacientes com diagnóstico hospitalar de pneumonia por COVID-19.	Os autores demonstraram a implementação de uma abordagem multidisciplinar integrada aos pacientes com COVID-19, identificando aqueles com maiores necessidades de saúde física e mental. A experiência inicial dos autores sugere que deficiências físicas, psicológicas e cognitivas significativas podem persistir, apesar da resolução clínica da infecção.
Romeyke <i>et al.</i> 2020, Áustria	Relato de Caso	Relatar um caso de um paciente infectado com síndrome respiratória aguda grave em decorrência da SARS-CoV-2.	A aplicação dos relatos dos pacientes pode ser útil para obter uma imagem mais abrangente de um paciente com COVID-19, em que “o paciente recebe uma voz”, além de ser avaliado por outros. O conhecimento adquirido pode então ser disponibilizado para a equipe interdisciplinar de tratamento para ser incorporado ao plano de tratamento.
Silva <i>et al.</i> 2020, Brasil	Relato de Experiência	Descrever as experiências de residentes multiprofissionais na Estratégia Saúde da Família acerca da aplicação de ações interdisciplinares no enfrentamento do novo Coronavírus.	As práticas interdisciplinares têm se destacado nos mais diversos serviços de saúde como método de ascensão essencial para gestores, profissionais de saúde e estudantes na produção de relações mais atuantes de forma integrada no campo da saúde como um todo, principalmente no enfrentamento da pandemia.

A partir da análise detalhada dos artigos selecionados fica evidente a importância do uso de uma equipe multidisciplinar no atendimento na área da saúde. Isso se tornou ainda mais evidente no período da pandemia da COVID-19, já que a doença é conhecida por deixar sequelas que podem levar a um longo período de tratamento e recuperação, denotando a necessidade da equipe multidisciplinar. Um exemplo dessa necessidade é a atual situação dos migrantes na Noruega; em todo o mundo, migrantes geralmente se enquadram em grupos mais vulneráveis, devido à grande parte advir de área de extrema pobreza ou fugindo de conflitos. Devido a essa vulnerabilidade, essas pessoas tem uma maior chance de adquirir doenças, especialmente as contagiosas como a COVID-19, e maior dificuldade no acesso aos tratamentos. Portanto, se torna indispensável o uso de uma equipe multidisciplinar no acompanhamento desses grupos (DIAZ *et al.*, 2021).

Os pacientes com múltiplas comorbidades representam um outro grupo muito vulnerável à COVID-19, uma vez que esses pacientes possuem inúmeros problemas de saúde que podem ser exacerbados pela infecção respiratória. Romeyke *et al.* (2020) relataram um caso clínico de um paciente, sexo masculino, 84 anos de idade, que apresentava múltiplas comorbidades, dentre elas, pode-se destacar: diabetes mellitus tipo 2, hiperuricemia sintomática, estenose de aorta progressiva, falência renal crônica e hipertensão pulmonar. Seu quadro clínico se agravou pela COVID-19. Diante desse quadro, mostrou-se indispensável o uso de cuidado intensivo supervisionado por uma equipe multidisciplinar para estabilização e recuperação adequada do paciente para sua recuperação e controle das doenças associadas.

A despeito da importância da implantação de equipes multidisciplinares, poucos locais no mundo se dedicaram a essa árdua tarefa. Um ótimo exemplo da adaptabilidade do sistema público de saúde à nova situação foi a Irlanda. O país foi modelo no estabelecimento de um modelo híbrido, composto por clínicas virtuais e presenciais que se complementam no atendimento e prestação dos serviços de saúde. Essas equipes são compostas por serviços respiratórios, de cuidados intensivos, doenças infecciosas, psiquiatria e psicologia. Desse modo, a equipe multidisciplinar é capaz de identificar rapidamente as sequelas geradas pela COVID-19 no paciente e prover a terapêutica adequada a cada caso, maximizando a recuperação plena dos acometidos (O'BRIEN *et al.*, 2020).

Por fim, existem ótimos modelos e experiências de atuação de equipes multidisciplinares no Sistema Único de Saúde (SUS) e seus excelentes resultados para os pacientes atendidos. Recentemente, na capital do Ceará foi documentada a experiência de uso de uma equipe multidisciplinar com práticas colaborativas para atendimento de pacientes com

COVID-19. A equipe é composta por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem que trabalhavam de forma colaborativa usando o enfoque na interprofissionalidade e na interdisciplinaridade, a fim de prover uma melhor assistência à saúde e fortalecer a atuação da equipe. Apesar das dificuldades de implantação, o sistema se mostrou eficiente na melhora da qualidade do atendimento, na limitação de atrasos e erros e no controle do estresse da equipe no contexto dos atendimentos de COVID-19, devido ao medo de contágio e conflitos (BELARMINO *et al.*, 2020).

Mediante a análise da literatura, foi possível constatar vários conceitos relativos à importância da cooperação interprofissional no manejo da COVID-19. De fato, de acordo com Silva *et al.* (2020), a cooperação entre os profissionais é um importante fator modificador das ações de cuidado efetuadas, pois baseia-se na resolução de problemas, potencialização da eficácia e qualidade nos cuidados, por meio da compreensão dos papéis e de competências colaborativas para o trabalho em equipe. Nesse sentido, Diaz (2021) ressalta que a cooperação interprofissional entre categorias surge como resposta à realidade da saúde mundial que exige novas formas de assistência, capazes de lidar com a multiplicidade dos indivíduos portadores, através da atuação de enfermeiros com habilidade em práticas avançadas, médicos, assistentes sociais, odontólogos, nutricionistas, fisioterapeutas e farmacêuticos.

Ademais, a fim de que a efetivação das mudanças na configuração assistencial ocorra, no contexto da COVID-19, Silva *et al.* (2020) verificaram que podem ser realizadas capacitações simuladas, envolvendo a equipe de assistência à saúde, acerca da colocação adequada de equipamentos de proteção individual, intubação orotraqueal e ventilação mecânica, assim como atuação diante de paradas cardiorrespiratórias em pacientes suspeitos.

Dentre as vantagens da prática interprofissional destacadas por Silva *et al.* (2020), ressalta-se a melhoria da experiência do paciente e da família no cuidado à saúde, bem como vantagens na relação custo-efetividade da atenção à saúde. Devido a isso, habilidades de atuação em equipe também devem ser empregadas durante a pandemia da COVID-19, como comunicação, respeito, confiança, conhecimento mútuo, poder, centralização das ações no paciente, características das tarefas e do ambiente.

Segundo Guimarães *et al.* (2020), os artigos relacionados a cuidados de suporte na COVID-19 recomendam que o estado nutricional deve ser avaliado em todos os pacientes infectados na admissão hospitalar e os pacientes em risco nutricional devem receber apoio nutricional o mais breve possível. Por esta razão, a atuação do nutricionista é indispensável.

Já de acordo com Belarmino (2020), a equipe odontológica mostrou-se atuante em atividades generalistas e sanitárias, compondo as equipes de acolhimento, responsáveis pela organização do fluxo e encaminhamento de casos suspeitos para triagem, além de desenvolvimento de material audiovisual sobre a área para ser disponibilizado em redes sociais.

Outrossim, a Enfermagem se destaca na detecção e na avaliação dos casos suspeitos de COVID-19, devido à sua capacidade técnica e por estar mais tempo no acompanhamento do paciente. O profissional do Serviço Social tem a função de mediar, junto à equipe de saúde, a realidade social dos pacientes, buscando atuar nas demandas apresentadas pelo paciente em sua totalidade.

4 CONCLUSÃO

Diante do presente trabalho, pode-se concluir que, atualmente, a realidade da saúde mundial exige novas formas de assistência, e a equipe multidisciplinar é capaz de cooperar para um tratamento mais eficaz durante a doença e identificar rapidamente as sequelas geradas pela COVID-19 no paciente, fornecendo, assim, uma terapêutica adequada a cada caso.

É importante que os profissionais que atuam em equipes multidisciplinares estejam capacitados e que tenham o mesmo objetivo; isso trará eficiência na assistência à saúde, no controle e no combate à COVID-19, seguindo as recomendações estabelecidas pelas autoridades sanitárias competentes.

REFERÊNCIAS

BELARMINO, A. C. *et al.* Práticas colaborativas em equipe de saúde diante da pandemia de COVID-19. **Rev Bras Enferm.** v. 73, p. 1-5, e20200470, ago. 2020. DOI 10.1590/0034-7167-2020-0470.

DIAZ, E. *et al.* Aprendendo com a pandemia COVID-19 entre os migrantes: é necessária uma abordagem inovadora e interdisciplinar em nível de sistema para melhorar a saúde pública. **Scand Journal Pub Health.** p. 1-5, maio 2021. DOI 10.1177/14034948211019795.

GUIMARÃES, A. S. M. *et al.* Atuação da equipe multiprofissional em saúde, no cenário da pandemia por Covid 19. **Health Resid Journal.** v.1, n.2, p. 1-22, maio 2020. DOI 10.51723/hrj.v1i2.37.

KAPPEL, R. H.; SILVA, P. T.; RECKZIEGEL, M. B. Atuação de equipe multidisciplinar no tratamento de um caso de infecção por coronavírus: relato de caso. **Anais do Seminário Científico do Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde da UNISC**, Santa Cruz do Sul, 2020. Disponível em: <https://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/scps/index>. Acesso: 09 de jul. 2021.

MORADIAN, N. *et al.* A necessidade urgente de ciência integrada para combater a pandemia e além. **Journal Transl Med.** v. 18, n. 205, p. 1-7, maio 2020. DOI 10.1186/s12967-020-02364-2.

O'BRIEN, H. *et al.* Um modelo multidisciplinar integrado de cuidados de recuperação COVID-19. **Ir Journal Med Sci**, Irlanda. v. 190, n. 2, p. 461-468, set. 2020. DOI 10.1007/s11845-020-02354-9.

ROMEYKE, T.; NOEHAMMER, E.; STUMMER, H. Relato de caso COVID-19: um homem de 84 anos com exacerbação de múltiplas comorbidades devido ao COVID-19 gerenciado por uma equipe multidisciplinar usando resultados relatados pelo paciente. **Am Journal Case Rep.** v. 21, p. 1-7, e926694, ago. 2020. DOI 10.12659.

SILVA, R. S. *et al.* Práticas interdisciplinares no enfrentamento da COVID-19 na estratégia saúde da família. **Enferm Foco**, Brasília. v. 11, n. 2, p. 246-253, dez 2020. DOI 10.21675/2357-707X.2020.v11.n2.ESP.4220.

CAPÍTULO 05

A IMPORTÂNCIA DA RUGOSCOPIA PALATINA NA IDENTIFICAÇÃO DE CADAVERES HUMANOS: UMA REVISÃO DE LITERATURA

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c05](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c05)

Erick Lúcio Souza Santos¹, Thalita Oliveira da Silva Borba², Letícia Rafaella Marinho Honorato³, Anne Caroline Silva Freire de Sá⁴, Alícia Lima de Lira⁵, Jadson da Silva Santana⁶, André Almeida Antunes⁷, Arthur Mendes Lima⁸, Fernanda Maria Matos Aragão de Souza⁹, Mr. Rafael de Sousa Carvalho Saboia¹⁰

¹Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES, UNITA, (ErickLucioEL@Gmail.com)

²Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA, (Thalita.borba00@gmail.com)

³Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA, (leticiamarinhoh@hotmail.com)

⁴Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA, (annecarolinefreiree@gmail.com)

⁵Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA, (alicialimadl@gmail.com)

⁶Universidade Federal de Pernambuco UFPE, (jadsonufpe@gmail.com)

⁷Centro Universitário de Belo Horizonte Unibh, (andredemu@yahoo.com.br)

⁸Universidade Federal de Juiz de Fora, (arthurmlima@hotmail.com)

⁹Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA, (aragaofernanda22@gmail.com)

¹⁰Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA, (rafaelsaboia@asc.es.edu.br)

Resumo

Objetivo: Realizar uma revisão literária em relação a importância da rugoscopia palatina na identificação de cadáveres e sua aplicabilidade. **Metodologia:** Trata-se de uma Revisão de Literatura com busca de artigos científicos disponíveis no BIREME, Google Acadêmico, SciELO, Science Direct e PubMed. Na seleção dos estudos, foram elencados como critérios de inclusão, para posterior análise e seleção, artigos publicados no período entre 2015 e 2021, nos idiomas inglês, português e espanhol, os quais abordavam os temas associados a Odontologia Legal e à Identificação de Cadáveres, dos quais 24 foram selecionados. **Resultados:** Através do conhecimento de que cada ser humano é único e que há necessidade de distinção dentre eles para confirmação de identidade em determinadas situações como a de identificação de cadáver, é necessária a utilização de diversas metodologias e técnicas da área forense. Tais técnicas

utilizam como banco de dados, materiais do indivíduo armazenados anteriormente, para análise e comparação com as características individuais do cadáver, realizando a identificação do corpo de maneira fidedigna. Contudo, com o Objetivo de se obter uma maior probabilidade de sucesso nas técnicas forenses, elas devem cumprir alguns fundamentos inalteráveis, sendo eles: a “Individualidade”, a “Imutabilidade”, a “Perenidade”, a “Praticabilidade” e a “Classificabilidade”. A rugoscopia palatina, é definida como o estudo e análise das rugas presentes no palato, é um método alternativo utilizado quando há inviabilização de identificação corporal (Ex. Carbonização) por técnicas convencionais, pois as rugas possuem alta resistência a temperatura e são classificadas como uma das características que compõe a identidade genética do indivíduo, por serem intransferíveis e únicas. **Considerações Finais:** A rugoscopia palatina é uma técnica de fácil acesso e de baixo custo, possuindo grande aplicabilidade. Contudo há à necessidade de o dentista realizar de forma adequada o armazenamento dos dados (Ex.: Radiografias, Moldagens, Fotos) para possíveis necessidades.

Palavras-chave: Rugoscopia Palatina; Identificação Humana; Odontologia Forense; Palatal Rugoscopy.

Área Temática: Ciências da Saúde

E-mail do autor principal: ErickLucioEL@Gmail.com

1 INTRODUÇÃO

A humanidade possui uma gama de atributos, diferenciando-se entre si mesmos por meio de características únicas, como impressões digitais, as pregas palatinas e até mesmo o Ácido desoxirribonucleico (DNA). Sendo de extrema importância tais particularidades para diferenciação e reconhecimento de cadáveres ou seres humanos vivos por meio de técnicas singulares (TORRES, et al. 2021; ARGOLLO, et al. 2017).

Em pleno Século XXI, eventualidades que provocam perdas de estruturas, carbonização de corpos e desfigurações apresentam um índice alto na sociedade, como acidentes automobilísticos, assaltos e assassinatos, diversas vezes inviabilizando o reconhecimento de cadáveres. Fazendo-se necessária a implementação de ferramentas e metodologias cujo seja possível analisar e reconhecer as individualidades dos cadáveres de forma eficaz (BARROS, 2017; BASAURI, 1961).

Nos dias atuais, uma das áreas responsável por analisar e reconhecer cadáveres humanos é a Odontologia Legal, realizando métodos comparativos de achados ósseos do indivíduo a registros odontológicos armazenados, como modelos de gesso das arcadas, radiografias e até mesmo fotografias. Contudo, em casos em que há uma acentuada perda de estrutura óssea ou dos elementos dentários das arcadas, faz-se necessário o emprego de técnicas que avaliam

estruturas formadas por tecidos moles (DA PAIXÃO ARGOLLO, et al. 2017; DAS NEVES, 2021).

Um método de identificação alternativo e eficaz na odontologia forense é a rugoscopia palatina, cujo foco de estudo são as pregas palatinas através da análise do formato, posição e tamanho das mesmas. Tal método é aplicado quando a datiloscopia, análise dos arcos dentários e/ou o exame de DNA não conseguem entregar resultados conclusivos (DOS SANTOS, et al. 2021; CORREIA, et al. 2019).

As rugas/pregas palatinas encontram-se no terço anterior do palato, sendo compostas por tecido conjuntivo fibroso encontrado entre a formação óssea da região palatina e um epitélio escamoso de revestimento. Tal formação tem características assimétricas, irregulares e únicas e imutáveis durante toda a vida do ser humano, tornando-as viáveis para identificação e diferenciação de cadáveres. Sua aplicabilidade é de maneira abrangente como na antropologia, genética, anatomia e na odontologia legal (JEDDY; RAVI; RADHIKA, 2017; FURLAN, et al. 2016).

A análise e identificação de cadáveres é uma das áreas cujo a odontologia possui o direito de exercer e atuar de forma legal, tendo como função o presente trabalho destacar a importância de um método alternativo de identificação humana na atualidade.

2 METODOLOGIA

Este estudo trata-se de uma Revisão de Literatura realizada através da busca de artigos científicos disponíveis nas bases de dados BIREME, Google Acadêmico, SciELO, Science Direct e PubMed. Os descritores de busca foram: “Rugoscopia Palatina”, “Identificação Humana”, “Odontologia Forense” e “palatal rugoscopy”. A tática de busca ampla, incluindo diversos descritores e combinações entre esses, teve como objetivo encontrar estudos a respeito da Rugoscopia Palatina como método de identificação humana. Na seleção dos estudos, foram elencados como critérios de inclusão, para posterior análise e seleção, artigos publicados no período entre 2015 e 2021, nos idiomas inglês e português, os quais abordavam os temas associados a Odontologia Legal e à Identificação de Cadáveres. Devido à natureza do tema, decidiu-se incluir na busca artigos originais, revisões de literatura, editoriais e relatos de experiência publicados em periódicos científicos.

3 RESULTADOS

A Odontologia Legal é uma especialidade odontológica que tem como um dos objetivos a identificação de cadáveres. Através do conhecimento de que cada ser humano é único e que há necessidade de distinção dentre eles para confirmação de identidade em determinadas situações como a de identificação de cadáver, é necessária a utilização de diversas metodologias e técnicas da área forense. Tais técnicas utilizam como banco de dados, materiais do indivíduo armazenados anteriormente, para análise e comparação com as características individuais do cadáver, realizando a identificação do corpo de maneira fidedigna (LIMA; MEDEIROS, 2015; LIMA M.V.F.N, et al, 2016).

Com o Objetivo de se obter uma maior probabilidade de sucesso nas técnicas forenses, elas devem cumprir alguns fundamentos inalteráveis, sendo eles a “Individualidade”, cuja definição é ter a unicidade entre os demais indivíduos, possibilitando a identificação, a “Imutabilidade”, sendo essa a inalteração ou modificação da estrutura através do tempo, a “Perenidade”, longevidade da estrutura ao longo do tempo, a “Praticabilidade”, devendo ser viável tanto para comparação das estruturas quanto de maneira financeira, e a “Classificabilidade”, sendo por fim esta a organização e armazenamento dos dados para posterior utilização (TORRES, et al. 2021; MODESTO;JUNIOR FIGUEIRA, 2017; MATUTE, 2015).

A odontologia forense utiliza como principal método de identificação humana os arcos da maxila e mandíbula, tanto pela presença de diversas estruturas que auxiliam na análise do corpo quanto pela possibilidade de utilizá-los mesmo sem a presença de tecidos moles. Contudo, tal método torna-se inviabilizado em casos em que não há estruturas dentárias para análise e identificação, sendo necessária a aplicação de métodos alternativos, como o estudo das rugas palatinas (VANRELL, 2019; SHETTY, et al, 2016).

As rugas Palatinas começam a ser desenvolvidas terceiro mês de vida intrauterina do feto adjunto ao desenvolvimento da “identidade biológica”, onde sua especificidade corporal inicia-se. Uma das características benéficas das rugosidades palatinas é sua localização na região anterior do palato, composto por mucosa corrugada por um conjunto de pregas ligadas ao plano ósseo subjacente, local que as protege tanto de traumas quanto de altas temperaturas. Elas possuem em sua constituição tecido conjuntivo fibroso e denso da submucosa revestindo o osso e algumas vezes sendo confundido com o periósteo (BARROS, 2017; VANRELL,2019; SILVA, A. V., et al, 2020).

As rugas palatinas foram classificadas inicialmente por Carrea (1937), cujo considerava a orientação bilateral das rugosidades, diferente de Martins dos Santos(1946), autor da classificação de maior relevância na odontologia forense da atualidade, cujo estudo fundamenta-se na localização de cada rugosidade de acordo com a posição e possui quatro divisões, a “ruga inicial” (localizada mais anteriormente do lado direito da rafe palatina mediana), as “rugos complementares” (encontradas do lado direito da rafe palatina mediana), a “ruga subinicial” (situada de forma mais anterior possível ao lado esquerdo da rafe palatina mediana), e por fim as “rugos subcomplementares” (posicionadas ao lado esquerdo da rafe palatina mediana) (MARTINS DOS SANTOS, 1946; CARREA, 1937).

A rugoscopia palatina, é definida como o estudo e análise das rugas presentes no palato do ser humano como o nome sugere. Elas são classificadas quanto a posição, forma, tamanho e quantidade, tais particularidades são examinadas e empregadas como pilares para a identificação humana, que possui um protocolo padronizado a ser seguido para análise forense: análise da arcada dentária; inspeção da região oral; avaliação dos registros odontológicos prévios e por último o exame “odontolegal”, cujo define-se como um exame minucioso final. Tal técnica tem como vantagens sua aplicabilidade, podendo ser empregada em situações de carbonização corporal total, comprometendo a região oral e face, sem presença de elementos dentários que permitam a identificação (CARREA, 1920; GARBIN; AMARAL; GRECHI, 2017; MARTINS DOS SANTOS, 1946).

Desse modo, a técnica empregada de rugoscopia palatina é um método alternativo, mas seguro, de identificação de cadáveres. Definido como um método comparativo da estrutura palatina do cadáver com os documentos armazenados prévios (Ex. moldagens, radiografias e fotos), cujo possui uma cópia da estrutura em questão (KAUR, 2021; MANGANOTTI, 2021; SILVA, F. L. M., et al, 2019).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo dos elementos dentários, de exames laboratoriais do DNA e a análise de impressões digitais são métodos de identificação humana com propriedades de serem de fácil acesso, seguros e de baixo custo. A identificação humana é realizada diariamente por meio de métodos corriqueiros que se passam despercebidos na população, como a necessidade de RG, CNH, entre outros documentos com foto. Contudo, há ocorrências onde tais metodologias não são possíveis, necessitando de uma análise mais específica, denominada “identidade biológica”,

na qual a rugoscopia palatina destaca-se em situações de carbonização do corpo e ausência de arcada dentária no indivíduo, pois as rugas são resistentes a altas temperaturas.

Porém para efetiva utilização de tais métodos, faz-se necessária a colaboração do Cirurgião-Dentista para realizar a conservação de tais dados de maneira apropriada. Pois não é rotina de muitos dentistas realizarem o armazenamento correto de moldagens, radiografias e fotografias dos pacientes, inviabilizando a utilização da técnica, não por sua complexidade, mas pela falta do cuidado com métodos de armazenagem de dados. Mesmo com tais dificuldades a técnica apresentada possui um potencial enorme de aplicabilidade na identificação humana.

REFERÊNCIAS

- Argollo, S. D. P., Argollo, B. P., Argollo, P. A. N., & Marques, J. A. M. Utilização da rugoscopia palatina para identificação de corpo carbonizado: Relato de caso pericial. **Revista Brasileira de Odontologia Legal**, v.4, n.1, p. 107-113, 2017.
- BARROS, Isabelle Remígio. A importância da análise da rugoscopia palatina na Odontologia legal. **Acta de Ciências e Saúde**, v. 2, n. 1, p. 1-13, 2017.
- Basauri, C. Forensic odontology and identification. **Int Crim Police Rev**, v.16, 45-51, 1961.
- Carrea JU. La Identificacion humana por las rugosidades palatinas. **Rev Orthodont**, v.1, p.3-23, 1937.
- Carrea, JU. **Ensayos Odontométricos** [tese]. Buenos Aires: Universidade Nacional de Bueno Aires, 1920.
- CORREIA, A. D. M., BARBOSA, D. D. S., ALCÂNTARA, J. A. D. S., FONTENELE, E. H. L., BEZERRA, T. P. Importância do registro das ausências dentais para a identificação humana: relato de caso. **Rev. Bras. Odontol. Leg. RBOL**, p 82-89, 2019.
- DA PAIXÃO ARGOLLO, Selma et al. Utilização da rugoscopia palatina para identificação de corpo carbonizado—relato de caso pericial. **Revista Brasileira de Odontologia Legal**, v. 4, n. 1, 2017.
- DAS NEVES, Isabelle Silva Ramos et al. Rugoscopia palatina e seus desafios na identificação humana: uma revisão integrativa. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 4, p. e23810414090-e23810414090, 2021.

DOS SANTOS, Anderson Nobrega et al. A Queiloscopia como técnica de identificação humana: Uma revisão sistemática da literatura. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 8, p. e50110817401-e50110817401, 2021.

FURLAN, A. C. K., Nogueira, B. S., DEMETRIO, A. T. W., & LOLLI, L. F. Validação do método de carrea na região noroeste do estado do Paraná, **Brasil. Revista Brasileira de Odontologia Legal**, v.3, n. 1, p. 15-23, 2016.

GARBIN, C. A. S., AMARAL, M. A., GREGHI, R. S. S. Análise e classificação da rugosidade palatina em uma população brasileira. **Revista Brasileira de Odontologia Legal – RBOL**, v. 4, n. 3, p. 48-56, 2017.

JEDDY, Nadeem; RAVI, Shivani; RADHIKA, T. Current trends in forensic odontology. **Journal of forensic dental sciences**, v. 9, n. 3, p. 115, 2017.

KAUR, Avineet et al. Palatoscopy (Rugoscopy) assistance in forensic investigations. **IP International Journal of Forensic Medicine and Toxicological Sciences**, v. 6, n. 2, p. 31-35, 2021.

Lima MVFN, Costa GM, Silva VB, Nascimento MR, Moraes HH, Lucena EES. Verificação da praticabilidade e da unicidade na queiloscopia e na palatoscopia como métodos de identificação humana. **Rev Bras Odontol Leg RBOL**, v.3, n.1, p. 5-14, 2016.

LIMA, Hassan Lavalier de Oliveira; MEDEIROS, Urubatan Vieira de. Aplicabilidade do DNA em odontologia forense. **Odontologia Clínico-Científica (Online)**, v. 14, n. 4, p. 801-808, 2015.

MANGANOTTI, Ana Beatriz Manetti et al. Análise e classificação da rugosidade palatina em um grupo de jovens adultas brasileiras. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 1, p. e46810111743-e46810111743, 2021.

MARTINS-DOS-SANTOS, G. Ficha Odonto-Rugopalatina. **Revista Brasileira de Odontologia**, v. 4, n. 1, p. 36-42, 1946.

Matute, G. A. R. La rugoscopia palatina forense como método de identificación humana a través del análisis comparativo. **Revista Científica de la Escuela Universitaria de las Ciencias de la Salud**, v.2, n.1, p. 37-42, 2015.

MODESTO, Tayline de Oliveira Paiva; JUNIOR, Enio Figueira. Identificação humana através da Rugoscopia Palatina. **Revista Interdisciplinar do Direito-Faculdade de Direito de Valença**, v. 11, n. 2, 2017.

Shetty D, Anshi Jain AJ, Khanna KS, Amit Gupta NP, Chowdhary M. Assessment of palatal rugae pattern and their reproducibility for application in forensic analysis. **J Forensic Dent Sci.** v.5, n.2, p. 106-9, 2016.

Silva, A. V., Costa, A. L. P., Silva, M. L. C. A., Oliveira, M. B., Paranhos, L. R., Franco, A. Marques, J. A. M., & Musse, J. Estudo anatômico do padrão labial entre mães e filhas do Nordeste brasileiro. **Research, Society and Development**, v.9, n.11, 2020.

Silva, F. L. M., Antunes, A. A., Carvalho, M. V. D., Soriano, E. P., Saboia, R. S. C., & Porto, G. G. Avaliação do padrão morfológico de rugoscopia palatal em uma população brasileira. **Revista Brasileira de Odontologia Legal**, v.6, n.2, p. 2-12, 2019.

TORRES, José Lucas Medeiros et al. A APLICABILIDADE DA RUGOSCOPIA PALATINA NO PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA POST MORTEM EM ODONTOLOGIA LEGAL. **Jornada Odontológica dos Acadêmicos da Católica**, v. 6, 2021.

VANRELL, J.P. **Odontologia legal & Antropologia forense**, 3.ed., Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.

CAPÍTULO 06

A IMPORTÂNCIA DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FEIXE CÔNICO NA PREVISÃO DE RISCOS CIRÚRGICOS DURANTE O LEVANTAMENTO DO SEIO MAXILAR: REVISÃO DESCRITIVA

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c06](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c06)

Anne Caroline Silva Freire de Sá¹, Thalita Oliveira da Silva Borba², Alícia Lima de Lira³, Arthur Mendes Lima⁴, Erick Lúcio Souza Santos⁵, Fernanda Maria Matos Aragão de Souza⁶, Jadson da Silva Santana⁷, Letícia Rafaella Marinho Honorato⁸, André Almeida Antunes⁹, Diogo de Oliveira Sampaio¹⁰

¹Centro Universitário Tabosa de Almeida / ASCES-UNITA, (annecarolinefreiree@gmail.com)

²Centro Universitário Tabosa de Almeida / ASCES-UNITA, (thalita.borba00@gmail.com)

³Centro Universitário Tabosa de Almeida / ASCES-UNITA, (alicialimadl@gmail.com)

⁴Universidade Federal de Juiz de Fora / UFJF, (arthurmlima_@hotmail.com)

⁵Centro Universitário Tabosa de Almeida / ASCES-UNITA, (ErickLucioEL@Gmail.com)

⁶Centro Universitário Tabosa de Almeida / ASCES- UNITA, (aragaofernanda22@gmail.com)

⁷Universidade Federal de Pernambuco / UFPE, (jadsonufpe@gmail.com)

⁸Centro Universitário Tabosa de Almeida / ASCES-UNITA, (leticiamarinhoh@hotmail.com)

⁹ Centro Universitário de Belo Horizonte / UNIBH, (andredemu@yahoo.com.br)

¹⁰Centro Universitário Tabosa de Almeida / ASCES-UNITA, (diogosampaio@asc.es.edu.br)

Resumo

Objetivo: Revisar a literatura científica sobre importância da tomografia computadorizada de feixe cônico para o prognóstico de riscos cirúrgicos durante o levantamento do seio maxilar.

Método: Foi realizada uma revisão de literatura, com busca por artigos publicados no PubMed e SciELO entre 2015 e 2021, nos idiomas português e inglês. Os artigos foram selecionados através do cruzamento dos descritores “Levantamento do assoalho do seio maxilar”, “Tomografia computadorizada de feixe cônico”, “Complicações pós-operatórias” e “Prevenção de Acidentes”. **Resultados:** Nos artigos incluídos para elaboração do trabalho, verificou-se a existência de correlação entre variações anatômicas com as complicações no levantamento do seio maxilar, e que a avaliação radiográfica baseada em imagens de TCFC ajudam a prever os riscos envolvidos. **Considerações Finais:** Além da avaliação clínica, a tomografia computadorizada de feixe cônico é uma componente essencial para o diagnóstico antes do

levantamento do seio maxilar. Visto que permite avaliar de forma mais precisa a anatomia do seio maxilar e as estruturas adjacentes. Também fornece informações sobre a presença de doenças sinusais. Dessa forma, é possível ter conhecimento de possíveis riscos cirúrgicos, e consequentemente, reduzir as complicações no trans e pós-operatórias.

Palavras-chave: Levantamento do assoalho do seio maxilar; Tomografia computadorizada de feixe cônico; Complicações pós-Operatórias; Prevenção de acidentes.

Área Temática: Ciências da Saúde

E-mail do autor principal: annecarolinefreiree@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

De acordo com o estudo clássico de Hirschfeld, os primeiros dentes a serem perdidos devido à doença periodontal são os primeiros e os segundos molares superiores. Após a perda dos dentes posteriores, o processo alveolar é remodelado levando à reabsorção óssea e pneumatização do seio maxilar, resultando em redução da altura óssea na região posterior da maxila (GARCÍA *et al.*, 2021), e por conseguinte, limita a reabilitação do rebordo maxilar com implantes dentários (ELDIN *et al.*, 2017). Em tal situação, propõe-se o procedimento de levantamento ou elevação do seio maxilar, o qual objetiva aumentar a altura de osso residual na maxila posterior através da elevação da membrana de Schneider e, consequentemente, do assoalho do seio maxilar (BATISTA *et al.*, 2020).

Criada por Dr. Hilt Tatum em 1986, a elevação do seio maxilar com acesso lateral tem como a realização de uma janela óssea através de uma corticotomia na parede lateral do seio, elevando a membrana de Schneider para criar uma cavidade subsinusal. Na cavidade subsinusal, são inseridas as partículas de osso ou um substituto ósseo (MARCELINO *et al.*, 2020). Esta técnica permite melhor controle do sítio cirúrgico e pode ser indicada quando há pouca altura óssea alveolar residual, ou quando se planeja uma reabilitação extensa com implantes (VIEIRA *et al.*, 2021).

Em 1994, Summers modificou esta técnica usando uma abordagem crestal (TING *et al.*, 2017), introduzindo um conjunto específico de osteótomos de diferentes diâmetros para levantar simultaneamente o assoalho do seio maxilar e aumentar a densidade óssea. As técnicas do osteótomo com adição de osso transalveolar (BAOSFE) são mais conservadoras e resultam em menos dor pós-operatória. No entanto, existe um risco aumentado de complicações devido à incapacidade de visualização da membrana Schneideriana, sendo considerado um procedimento “às cegas”. Embora a elevação do seio na janela lateral permita a visualização

direta da membrana Schneideriana, ela é mais invasiva; as desvantagens incluem desconforto pós-operatório, complicações e um risco aumentado de infecção (TSAI *et al.*, 2020).

Até o momento, inúmeras modificações usando ambas as abordagens foram descritas, e a grande maioria delas tiveram alta taxa de sucesso e eficácia ao longo dos anos. No entanto, como já foi dito anteriormente, o procedimento também está associado a várias complicações trans e pós-operatórias, as quais podem resultar em um impacto negativo na qualidade de vida do paciente, o qual pode necessitar de cirurgia adicional, hospitalização ou um tempo de recuperação prolongado. Consequentemente, o resultado dos implantes e o sucesso do procedimento de reconstrução oral podem ser comprometidos (SINDEL; ÖZARSLAN; ÖZALP, 2018)

Portanto, ter conhecimento da anatomia dos seios da face é um pré-requisito para compreender os princípios envolvidos na realização de incisões adequadas e no projeto e gerenciamento da elevação do seio. A imagem diagnóstica é um componente essencial do planejamento do tratamento na reabilitação oral na região posterior da maxila. A tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC) fornece dimensões mais precisas da altura e densidade óssea residual. Também fornece informações sobre a membrana do seio maxilar, as artérias que passam na parede do seio lateral, a presença de patologias e septos no seio maxilar (BATHLA; FRY; MAJUMDAR, 2018). Na imagem 3D, o plano de tratamento pode ser modificado e o resultado da cirurgia pré-protética na maxila posterior pode se tornar mais previsível (SHAHIDI *et al.*, 2016).

Portanto, o objetivo do presente estudo é analisar na literatura disponível, os aspectos da importância de avaliar radiograficamente os riscos cirúrgicos do procedimento de levantamento do seio maxilar, a partir da tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC). Com base nisso, o cirurgião-dentista poderá prevenir o acontecimento de complicações no trans e pós-operatório.

2 MÉTODO

Trata-se de uma revisão de literatura com viés descritivo. Para o levantamento dos artigos foram utilizados como descritores “Levantamento do assoalho do seio maxilar”, “Tomografia computadorizada de feixe cônico”, “Complicações Pós-Operatórias”, “Prevenção de acidentes” e os seus correspondentes em inglês. Realizou-se a busca pelos descritores individualmente. Em seguida, foram realizados os cruzamentos utilizando o operador booleano “AND”. O primeiro resultado sugeriu 344 artigos que atenderam aos critérios dos descritores. Pela leitura de títulos, resumos e artigos na íntegra, foram selecionados 32, os quais, em

suamaioria apresentaram amostra qualitativa, no idioma inglês. Os critérios de inclusão para a seleção da amostra foram: artigos publicados em português e inglês, e indexados nas bases de dados SciELO e PubMed, nos últimos seis anos (2015 a 2021), sendo estes, relatos de caso, ensaios clínicos randomizados, meta-análises e revisão sistemática. Para critério de exclusão, foram deletados estudos realizados com animais, dissertações, monografias, teses e estudos que não condizem com o objetivo.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A perfuração da membrana Schneideriana é a complicação mais frequente no aumento do seio maxilar, com uma incidência de 7–44%. (JORDI *et al.*, 2018). Durante a exposição do seio, as perfurações acidentais da membrana ocorrem devido a características anatômicas individuais, como a espessura da membrana reduzida, friabilidade, elasticidade reduzida e maior aderência à superfície óssea. Além disso, as membranas podem ser danificadas por causas iatrogênicas resultantes da técnica cirúrgica inadequada, manuseio incorreto da membrana ou uso de instrumentais cirúrgicos inadequados (BARBU *et al.*, 2019). E como consequência, podem ocorrer algumas complicações pós-operatórias como sinusite aguda, infecção do biomaterial ou até mesmo o deslocamento do biomaterial para a cavidade sinusal (STROPARO *et al.*, 2021).

A perfuração da membrana é associada a muitos fatores de risco, mas o fator predominante é a presença de variações anatômicas no seio, como os septos (DANDEKERI *et al.*, 2020). Uma alta porcentagem de seios maxilares possui septos ósseos em seu interior, com tamanhos, localizações e espessuras variáveis, tornando-se ainda mais difícil a tarefa de desprender a membrana do assoalho do seio e criar espaço para colocação do enxerto (SOUZA *et al.*, 2019). Além disso, a espessura da membrana diminui na presença de septos. Assim, dificulta ainda mais o levantamento da membrana, e aumenta as chances de a ser perfurada (DANDEKERI *et al.*, 2020).

Outrossim, o sangramento é a segunda complicação intraoperatória mais comum do procedimento de elevação do seio maxilar, e ocorre frequentemente devido ao dano à artéria alveolar antral (AAA). Em alguns casos, o sangramento pode ser difícil de controlar em tempo hábil (SINDEL; ÖZARSLAN; ÖZALP, 2018), e consequentemente, favorece complicações adicionais, como perfuração da membrana sinusal, redução do suprimento sanguíneo e deslocamento do enxerto. Certas variações anatômicas, como o diâmetro e a posição da AAA, juntamente com a proximidade da crista alveolar, podem condicionar o aparecimento deste tipo de complicação (CENTELLES *et al.*, 2016).

A infecção após levantamento do seio maxilar é comum, com incidência de até 21% relatada na literatura. A referida infecção pode ocorrer de duas maneiras: infecção do material do enxerto abaixo da membrana sinusal elevada, e infecção do próprio seio. O primeiro ocorre com muito mais frequência do que o último. Os sintomas relatados de infecção do enxerto sinusal são dor intensa, formação de fístula, edema facial recorrente no pós-operatório de duas a três semanas, abscesso, febre e perda de materiais de enxerto (ON; CHO; YANG, 2019). Os sintomas comuns de infecção sinusal consistem em dor, inchaço, sensibilidade, secreção de pus e exsudato purulento da cavidade nasal (KIM; JANG, 2019).

Ademais, doenças preexistentes no seio maxilar, incluindo rinossinusite aguda e crônica, bola fúngica, infecção, cistos sinusais e pólipos, foram associadas a complicações e falhas nos procedimentos de levantamento do seio (RITTER *et al.*, 2020). Portanto, a avaliação da anatomia do seio maxilar é imprescindível para realizar com sucesso a cirurgia de levantamento do seio e evitar intercorrências no trans e pós-operatórias. A TCFC é considerada a técnica padrão ouro para diagnóstico e planejamento de tratamento em odontologia, incluindo muitas vantagens, como doses mais baixas de radiação, alta precisão e medições tridimensionais (YILDIRIM *et al.*, 2019).

Além da altura e largura do rebordo alveolar residual na região posterior da maxila, várias informações podem ser obtidas a partir da TCFC pré operatória, como a espessura da parede lateral do seio, a presença da artéria alveolar antral e seu diâmetro, a presença de septo, sinusal, a angulação e largura do assoalho do seio, a irregularidade do assoalho sinusal, a íntima relação da membrana schneideriana com as raízes dos dentes adjacentes, qualidade do osso subantral (RAHPEYMA; KHAJEHAHMADI, 2015), e a localização do óstio (VADDI *et al.*, 2021). Podem ser observadas também lesões patológicas no seio maxilar, como por exemplo, cistos e tumores. Uma vez detectados, devem ser tratados antes da cirurgia de levantamento do seio (SAFABAKHSH *et al.*, 2019). A exceção é o cisto de retenção mucoso do seio maxilar, que pode ser drenado ou aspirado simultaneamente com o aumento do seio (KIM; JANG, 2019).

Geralmente a técnica para levantar o seio maxilar é escolhida com base na altura do osso remanescente, uma vez que a abordagem crestal é segura nos casos em que a altura óssea residual é maior que 5 mm, podendo ser obtida altura óssea de 3-4 mm. Já a abordagem lateral é realizada principalmente quando a altura do osso residual é menor que 5 mm, ou quando são observadas condições patológicas no seio (KIM; KU, 2020). No entanto, ao planejar uma janela na parede anterior do seio maxilar, a localização dos septos deve ser levada em consideração para evitar a perfuração da membrana de Schneider (NEYCHEV *et al.*, 2017).

A presença dos septos pode dificultar a criação e a luxação da janela de acesso à parede lateral do seio, bem como a elevação da membrana sinusal. Septos com altura baixa (até 2 mm) não requerem tratamento adicional, pois em casos de rotina a membrana pode ser elevada sem procedimentos adicionais. Os septos de tamanho médio requerem ressecção, pois a área palatina da cavidade sinusal não pode ser alcançada pelos instrumentais. Os septos altos, por sua vez, necessitam da separação parcial ou total da cavidade sinusal, exigindo o preparo de duas ou até três cavidades. A orientação dos septos limita a mobilidade dos instrumentais, resultando na necessidade de aumento do acesso vestibular para manuseio sem complicações e sem criar pressão descontrolada na membrana (ALI *et al.*, 2017). Portanto, a detecção pré-operatória de qualquer septo antral é muito importante para prevenir perfurações inesperadas da membrana (GÜRLER; DELILBAŞI, 2015).

As informações que tratam da localização e diâmetro da AAA também são observadas por causa da relevância cirúrgica, visto que o dano a uma pequena AAA (<1 mm) tem um impacto insignificante nos casos da literatura; mas os danos às artérias maiores dificultam a visualização, e conseqüentemente a realização do procedimento cirúrgico. Portanto, durante o procedimento, os vasos com diâmetros superiores a 2 mm ou 3mm, devem ser evitados para prevenir iatrogenia grave (CENTELLES *et al.*, 2020). Por este motivo, dentre as recomendações gerais para o aumento do seio maxilar, o autor Valente (2016) relatava a preparação cuidadosa da janela óssea, mantendo uma distância segura (> 1 mm) da AAA.

Durante a análise pré-cirúrgica, a membrana Schneideriana desempenha um papel importante. De acordo com alguns autores, a espessura de membrana de até 2 mm é considerada fisiológica. Porém, a espessura da membrana de mais de 5 mm está altamente correlacionada com o risco de patologias inflamatórias, como sinusite ou obstrução do óstio sinusal (TAVELLI *et al.*, 2017). Além disso, Munakata *et al* (2021) relataram que a espessura da membrana está correlacionada com a taxa de perfuração da mucosa. Conforme a membrana se tornou mais fina do que 0,8 mm ou mais espessa do que 2 mm, o risco da taxa de perfuração aumentou. Sendo assim, a espessura da membrana pode representar patologia sinusal ou ser um indicador de complicações.

4 CONCLUSÃO

Com base nos resultados do estudo acima, pode-se concluir que para o levantamento do seio maxilar a avaliação radiográfica pré-cirúrgica através da TCFC é de extrema importância, uma vez que fornece informações tridimensionais da parte interna do seio maxilar sobre as variações anatômicas do paciente, assim como a localização das estruturas anatômicas próxima

a região onde o procedimento será realizado. Tais informações são essenciais para prever os riscos envolvidos e aumentar o sucesso da cirurgia pré-protética e simultaneamente, para limitar as complicações trans e pós-operatórias.

REFERÊNCIAS

ALI, J. A. et al. What is the frequency of anatomical variations and pathological findings in maxillary sinuses among patients subjected to maxillofacial cone beam computed tomography? A systematic review. **Medicina oral, patologia oral y cirurgia bucal**, v. 22, n. 4, p. e400, 2017. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5549512/> Acesso: 4 ago. 2021.

BARBU, H. M. et al. Management of Schneiderian membrane perforations during sinus augmentation procedures: a preliminary comparison of two different approaches. **Journal of clinical medicine**, v. 8, n. 9, p. 1491, 2019. Disponível em: < <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6780245/> > Acesso: 6 ago. 2021.

BATHLA, S. C; FRY, R. R; MAJUMDAR, K. Maxillary sinus augmentation. **Journal of Indian Society of Periodontology**, v. 22, n. 6, p. 468, 2018. Disponível em: < <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6305100/> > Acesso: 5 ago. 2021.

BATISTA, S. G. et al. Levantamento de seio maxilar bilateral por duas técnicas diferentes com concomitante instalação de implantes: relato de caso. **Revista Eletrônica Acervo Odontológico**, v. 2, p. e5878-e5878, 2020. Disponível em: < <https://doi.org/10.25248/reaodonto.e5878.2020> > Acesso: 5 ago. 2021.

CENTELLES, V.P. et al. Distance of the alveolar antral artery from the alveolar crest. Related factors and surgical considerations in sinus floor elevation. **Medicina oral, patologia oral y cirurgia bucal**, v. 21, n. 6, p. e758, 2016. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5116119/> Acesso: 16 ago. 2021.

CENTELLES, P. V. et al. Study of factors influencing preoperative detection of alveolar antral artery by CBCT in sinus floor elevation. **Scientific Reports**, v. 10, n. 1, p. 1-9, 2020. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41598-020-67644-9> Acesso: 21 ago. 2021.

DANDEKERI, S. S. et al. CBCT study of morphologic variations of maxillary sinus septa in relevance to sinus augmentation procedures. **Annals of Maxillofacial Surgery**, v. 10, n. 1, p. 51, 2020. Disponível em < <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7433935/> > Acesso: 11 ago. 2021.

ELDIN, K. B. et al. Maxillary sinus augmentation using a titanium mesh: a randomized clinical trial. **Open access Macedonian journal of medical sciences**, v. 5, n. 3, p. 359, 2017. Disponível em: < <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5503738/> > Acesso: 5 ago. 2021.

GARCÍA, R. A. et al. Sinus Floor Elevation via an Osteotome Technique without Biomaterials. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 18, n. 3, p. 1103, 2021. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7908564/>> Acesso: 4 ago. 2021.

GÜRLER, G.; DELILBAŞI, Ç. Relação entre tomografia computadorizada de feixe cônico pré-operatório e achados intra-operatórios no aumento do seio. **International Journal of Oral and Maxillofacial Implants**, 30 (6), 1244-1248, 2015). Disponível em: <<https://dx.doi.org/10.11607/jomi.3797>> Acesso: 17 ago. 2021.

JORDI, C. et al. Membrane perforation rate in lateral maxillary sinus floor augmentation using conventional rotating instruments and piezoelectric device—a meta-analysis. **International journal of implant dentistry**, v. 4, n. 1, p. 1-9, 2018. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5787532/> Acesso: 9 ago. 2021.

KIM, J; JANG, H. A review of complications of maxillary sinus augmentation and available treatment methods. **Journal of the Korean Association of Oral and Maxillofacial Surgeons**, v. 45, n. 4, p. 220-224, 2019. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6728618/>> Acesso: 4 set. 2021.

KIM, Y. K; KU, J. K. Sinus membrane elevation and implant placement. **Journal of the Korean Association of Oral and Maxillofacial Surgeons**, v. 46, n. 4, p. 292-298, 2020. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7469962/>> Acesso: 8 ago. 2021.

MARCELINO, K. P. et al. Conduta cirúrgica após perfuração da membrana de Schneider durante sinus lift: relato de caso. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 10, p. e9959109425-e9959109425, 2020. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/download/9425/8452/130868> Acesso 15 ago. 2021.

MUNAKATA, M. et al. Factors influencing the sinus membrane thickness in edentulous regions: a cone-beam computed tomography study. **International Journal of Implant Dentistry**, v. 7, n. 1, p. 1-9, 2021. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7921232/>> Acesso: 21 ago. 2021.

NEYCHEV, D. et al. CBCT images: an important tool in the analysis of anatomical variations of maxillary sinus related to Underwood septa features. **Biotechnology & Biotechnological Equipment**, v. 31, n. 6, p. 1210-1215, 2017. Disponível em: <<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13102818.2017.1369902>> Acesso: 24 ago. 2021.

ON, S. W; CHO, S.W; YANG, B. E. A review of rare complications of maxillary sinus floor augmentation. **Journal of the Korean Association of Oral and Maxillofacial Surgeons**, v. 45, n. 6, p. 351-356, 2019. Disponível em:<<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6955423/>> Acesso: 30 ago. 2021.

RAHPEYMA, A; KHAJEHAHMADI, S. Open sinus lift surgery and the importance of preoperative cone-beam computed tomography scan: a review. **Journal of international oral health: JIOH**, v. 7, n. 9, p. 127, 2015. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4589707/> Acesso: 3 ago. 2021.

RITTER, A. et al. Preoperative maxillary sinus imaging and the outcome of sinus floor augmentation and dental implants in asymptomatic patients. **Annals of Otology, Rhinology**

& **Laryngology**, v. 129, n. 3, p. 209-215, 2019. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0003489419883292> Acesso: 4 set. 2021.

SAFABAKHSH, M. et al. Radiographic Evaluation of Maxillary Sinus Surgical Risks in Sinus Lifting Surgery Candidates Using Cone Beam Computed Tomography (CBCT). **Ann. Dent. Spec.**, v. 7, n. 2, p. 1-9, 2019. Disponível em: https://drabc.ir/wp-content/uploads/2020/02/Gallery-ADS_19_3906-1.pdf Acesso: 27 ago. 2021.

SHAHIDI, S. et al. Evaluation of anatomic variations in maxillary sinus with the aid of cone beam computed tomography (CBCT) in a population in south of Iran. **Journal of Dentistry**, v. 17, n. 1, p. 7, 2016. Disponível em: < <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4771057/> > Acesso: 14 ago. 2021.

SINDEL, A; ÖZARSLAN, M. M; ÖZALP, Ö. Management of the complications of maxillary sinus augmentation. In: WANG, T. C. **Challenging Issues on Paranasal Sinuses**. IntechOpen, 2018. p. 27 – 44.

SOUZA, C. F. et al. Analysis of maxillary sinus septa by cone-beam computed tomography. **Revista de Odontologia da UNESP**, v. 48, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rounesp/a/56g9CkTDVNqSsqjs6ySWPwJ/?lang=en> Acesso: 21 ago. 2021.

STROPARO, J. L. O. et al. Levantamento de seio maxilar modificado utilizando a técnica do travesseiro. Relato de caso clínico. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 6, p. e11910615581-e11910615581, 2021. Disponível em: < <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/download/15581/13927/200513> > Acesso: 14 ago. 2021.

TAVELLI, L. et al. Sinus presurgical evaluation: a literature review and a new classification proposal. **Minerva stomatologica**, v. 66, n. 3, p. 115-131, 2017. Disponível em: < <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28206730/> > Acesso: 17 ago. 2021.

TING, M. et al. Maxillary sinus augmentation for dental implant rehabilitation of the edentulous ridge: a comprehensive overview of systematic reviews. **Implant dentistry**, v. 26, n. 3, p. 438-464, 2017. Disponível em: https://journals.lww.com/implantdent/Fulltext/2017/06000/Maxillary_Sinus_Augmentation_for_Dental_Implant.19.aspx Acesso: 20 ago. 2021.

TSAI, C. F. et al. Comparison of 4 sinus augmentation techniques for implant placement with residual alveolar bone height ≤ 3 mm. **Medicine**, v. 99, n. 46, 2020. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7668509/> Acesso: 30 ago. 2021.

VADDI, A. et al. Evaluation of available height, location, and patency of the ostium for sinus augmentation from an implant treatment planning perspective. **Imaging Science in Dentistry**, v. 51, 2021. Disponível em: < <https://www.isdent.org/DOIx.php?id=10.5624/isd.20200218> > Acesso: 17 ago. 2021.

VALENTE, N. A. Anatomical considerations on the alveolar antral artery as related to the sinus augmentation surgical procedure. **Clinical implant dentistry and related research**, v.

18, n. 5, p. 1042-1050, 2016. Disponível em: < <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25965402/>> Acesso: 4 set. 2021.

VIEIRA, I. V. et al. Análise da L-PRF para cirurgia de levantamento de seio maxilar: Revisão Narrativa. Brazilian Journal of Health Review, v. 4, n. 3, p. 10312-10330, 2021. Disponível em: < <https://www.brazilianjournals.com/index.php/BJHR/article/view/29628>> Acesso: 3 set. 2021.

YILDIRIM, T. T. et al. The relationship between maxillary sinus lateral wall thickness, alveolar bone loss, and demographic variables: A cross-sectional cone-beam computerized tomography study. **Medical Principles and Practice**, v. 28, n. 2, p. 109-114, 2019. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30296784/> Acesso: 15 ago. 2021.

CAPÍTULO 07

A IMPORTÂNCIA DO ODONTOLEGISTA NA ANÁLISE DE INJÚRIAS FACIAIS DECORRENTES DE PROJÉTEIS DE ARMA DE FOGO

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c07](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c07)

Nyali Rosa de Castro¹, Eduardo Stehling Urbano²

¹ Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF, (nyalicaastro@gmail.com)

² Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF, (esurss@yahoo.com.br)

Resumo

Objetivo: A seguinte revisão de literatura visa destacar a relevância da atuação do Odontologista na análise de injúrias na face decorrentes de projéteis de arma de fogo (PAF), sendo que ele pode ser o responsável pelo estudo de características importantes como o tipo de arma de fogo utilizada, a distância do disparo e a localização da ferida de entrada e saída.

Método: Foram utilizados estudos relacionados ao tema, encontrados em livros e nas bases de dados: *PubMed/MedLine*, *Scielo* e *Google Scholar*, nos idiomas português e inglês e publicados entre os anos de 1993 e 2021. **Resultados:** Os casos de ferimentos e/ou homicídios decorrentes a projéteis de arma de fogo têm aumentado com o passar dos anos no país. Esses ferimentos podem acometer tanto a região de face, como as demais áreas do corpo, entretanto, quando ocorrem em face, o Odontologista pode atuar na perícia, no vivo ou no cadáver, e cabe a este profissional conhecimentos sobre Balística Forense. **Considerações Finais:** Através da análise das características do ferimento infligido por PAF, o Odontologista é capaz de identificar a ferida de entrada e de saída do PAF, além da distância do disparo. Essas informações são de grande importância médico-legal e podem auxiliar na resolução de uma cena de crime.

Palavras-Chave: Armas de Fogo; Balística Forense; Odontologia Legal.

Área Temática: Ciências da Saúde

E-mail do autor principal:

1 INTRODUÇÃO

A Balística Forense divide-se em: balística interna, balística externa, balística de efeitos e balística final. A Balística Interna é a área que estuda os fenômenos que ocorrem no interior da arma de fogo, até que se produza o tiro, considerando a estrutura, o mecanismo, o funcionamento e a técnica de disparo da arma. A Balística Externa estuda o que ocorre com o PAF em sua trajetória pelo meio externo, desde o momento em que este deixa de sofrer a

interferência direta dos gases resultantes da queima do propelente até atingir o alvo, no caso, o alvo é um ser humano. A Balística de Efeitos, também chamada de Balística Médico-Legal, interessa-se pelos fenômenos que ocorrem quando o projétil atinge o alvo humano, seja transfixante ou não. Caso seja transfixante, o estudo passa a ser de interesse da Balística Final, que abrange tudo que ocorre com o projétil após transfixar o alvo humano até a imobilização final do projétil (MIRANDA, 2014; SOUZA, 2013).

No artigo 54, da Resolução 185/93 do Conselho Federal de Odontologia, a Odontologia Legal é reconhecida como especialidade e dentro de sua área de competência de atuação estão inclusas, dentre outras, a identificação humana, a balística forense e a perícia logística no vivo, no morto, íntegro ou em suas partes em fragmentos (BRASIL, 1993). O principal uso dessa especialidade é voltado à identificação de agressores em processos criminais e vítimas mortais nos casos de catástrofes e conflitos (COUTINHO *et al*, 2013).

Mesmo que o Brasil não passe por conflitos armados de cunho religioso, étnico, territorial ou político, entre 1980 e 2014 morreram 967.851 pessoas em virtude de ferimentos por arma de fogo. Dessa forma, o Brasil está entre os 10 países com maior taxa de homicídio por arma de fogo (MAIA *et al*, 2021).

2 MÉTODO

Para o desenvolvimento desta revisão de literatura, foram feitas pesquisas de estudos, leis, relacionados ao tema de arma de fogo, projéteis de arma de fogo (PAF), injúrias acometidas por PAF em face e atuação do Odontologista nesse caso, em livros e artigos científicos publicados em periódicos nas bases de dados eletrônicas: *PubMed/MedLine*, *Scielo* e *Google Scholar*. Foram utilizadas as palavras chaves em português e seus correspondentes em inglês: Armas de Fogo (*Firearms*); Balística Forense (*Forensic Ballistics*); Odontologia Legal (*Forensic Dentistry*).

Os critérios de inclusão considerados foram: idioma (estudos na língua portuguesa e inglesa foram incluídos) e a data de publicação do estudo (publicado entre os anos de 1993 e 2021). Foram excluídos da revisão artigos que não estavam completos, que não havia possibilidade de acesso ou que não se relacionavam com o tema proposto.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Classificação das armas de fogo

Armas de fogo utilizam-se para expelir seus projéteis, da força expansiva dos gases resultantes da combustão da pólvora. Seu funcionamento, em princípio, não depende do vigor ou da força física do homem (TOCCHETO, 2011).

As armas de fogo podem ser classificadas de acordo com cinco principais aspectos, sendo eles: o tamanho, a portabilidade/mobilidade, o sistema de carregamento, o mecanismo de funcionamento, a alma do cano e a finalidade (GEORG *et al* 2011).

Quanto à portabilidade, enquadram-se nas armas de porte o revólver e a pistola, que podem ser operadas com uma ou com as duas mãos, sem a necessidade de apoio no ombro. O fuzil, a espingarda e a metralhadora, por exemplo, são classificadas como armas portáteis, ou seja, seu peso e dimensão permitem que seja transportada por um único homem, mas ambas as mãos são necessárias para realização eficiente do disparo e necessitam do apoio no ombro (GEORG, *et al* 2011; SOUZA, 2013).

As armas de fogo também podem ser classificadas quanto à alma, que é a parte oca do interior do cano e é destinada a resistir à pressão dos gases produzidos pela combustão da pólvora e outros explosivos e a orientar o projétil (FRANÇA, 2011).

Classificação dos projéteis de arma de fogo (PAF)

Os PAFs podem ser classificados de acordo com sua velocidade: abaixo de 350 m/s são considerados de baixa velocidade, entre 350 e 600 m/s são de média velocidade e aqueles acima de 600 m/s são de alta velocidade (SEGUNDO *et al*, 2013).

A munição das armas de fogo são os cartuchos, que são compostos pelo conjunto de projétil, estojo, espoleta e carga (Figura 1). A munição pode ser constituída por um projétil único ou por projéteis múltiplos, sendo que nesse caso ocorre um padrão de ferimento chamado de rosa de tiro, pois muitos projéteis são lançados juntos e se separam, dando uma área de projeção com diâmetro cada vez maior (SEGUNDO *et al*, 2013).

Figura 1 - Composição de um cartucho. Fonte: autoria própria.

Entre os designs mais comuns estão os projéteis de ponta arredondada, os de ponta oca, os semi-encamisados, os semi-encamisados ocos e os totalmente encamisados de metal, geralmente esse metal é constituído de liga de cobre ou de aço. Os projéteis encamisados ou semi-encamisados possuem uma proteção envolvendo o chumbo, que impede seu derretimento no cano de armas de fogo de alta velocidade (BERRYMAN, 2019). A Tabela 1 demonstra a configuração dos projéteis antes da deformação, em uma vista externa e uma vista interna, e após a deformação, de acordo com seu *design*.

Tabela 1 - Comparação entre os cinco tipos mais comuns de projéteis em suas condições normais, seccionados (vista interna) e a deformação decorrente ao impacto no alvo. Os PAFs de ponta oca são os que sofrem maior deformação, enquanto os totalmente encamisados com ligas metálicas sofrem pequenas deformações. Fonte: autoria própria, adaptação de Berryman, 2019.

Design do projétil	Projétil	Seccionado (vista interna)	Deformado
Ponta arredondada
Ponta oca
Semi-encamisado
Semi-encamisado de ponta oca

Projéteis com ponta plana causam mais danos teciduais do que os projéteis pontiagudos com o mesmo calibre, massa e velocidade (QUEIROZ, 2016). *Queiroz e Hércules* defendem que o *design* do projétil é um fator que exerce grande influência na característica do ferimento. Projéteis expansivos, possuem *design* específico para se deformarem no momento do impacto com o alvo, ficando com aspecto de cogumelo, e, dessa forma, obtém maior transferência de energia e maior dano tecidual. Essa característica pode ser obtida com projéteis ocos (*hollow point*) ou pela composição de uma faixa do projétil com liga de chumbo de resistência menor que o corpo do projétil (*soft point*) (HÉRCULES, 2001; QUEIROZ, 2016). Os projéteis não expansíveis, geralmente, apresentam ponta pontiaguda e são revestidos com liga metálica (BERRYMAN, 2019).

As lesões por projétil de arma de fogo (PAF), sua forma e extensão dependem de três princípios: dissipação da Energia Cinética (e) do projétil na ferida, produção de projéteis secundários e a cavitação, que resultarão no esmagamento, destruição ou perfuração das estruturas. A quantidade de E_c de um corpo é definida por uma fórmula (Figura 2) e é uma função exponencial da velocidade, ou seja, um aumento de três vezes na velocidade resultará em um aumento de nove vezes a dissipação de energia (SEGUNDO *et al*, 2013).

Figura 2 - Fórmula da Energia Cinética aplicada na balística. Observa-se que a velocidade elevada ao quadrado influencia na magnitude da energia cinética. Fonte: autoria própria.

$E_c = \frac{m \cdot v^2}{2}$ <p>Onde: E_c = energia cinética; m = massa; v = velocidade</p>

Características dos ferimentos por PAF

Em geral, o PAF causa um orifício de entrada pequeno, um orifício de saída maior e lesões teciduais à distância em seu trajeto (SILVA, 2013). O ferimento de entrada é a injúria produzida

durante a entrada do(s) projétil(eis), de forma que a ruptura do tecido ocorre em virtude do impacto direto do projétil sobre ele. Apresentará características diversas, dependendo do tipo de projétil, da distância e do ângulo de penetração. (TOCCHETTO, 2011).

Em torno do orifício de entrada, há uma área denominada de anel equimótico ou orla de escoriação, que é formada pela hemorragia na derme, devido à ruptura dos vasos sanguíneos ao redor da ferida, e se apresenta como uma mancha de coloração entre o vermelho e o amarelo. Não é exclusiva dos orifícios de entrada; pode ocorrer também ao redor dos orifícios de saída (BAPTISTA *et al*, 2014; SILVA, 2013).

No disparo de uma arma de fogo, a combustão da pólvora ocorre de forma extremamente rápida e quase completa dentro da arma, deixando resíduos de pólvora não queimada com outros materiais dentro do cano, ou seja, resíduos de arma de fogo. Esses resíduos aderem ao projétil e são lançados para fora do cano da arma. Ao atingirem a pele, esses resíduos sujam e impregnam o orifício de entrada e formam uma zona escura denominada de limpeza do projétil, que é exclusiva do orifício de entrada (BAPTISTA *et al*, 2014).

Quando o projétil passa através da pele, esta, por ser elástica, deforma-se e envolve o projétil, limpando-o e retirando de sua superfície as impurezas. Forma-se, então, a orla de enxugo, que se localiza exclusivamente ao redor do orifício de entrada. Em tiros perpendiculares à superfície da pele, essa zona toma a forma de um anel. Nos tiros inclinados, a forma é excêntrica e elíptica, em forma de meia-lua, indicando com o seu eixo maior a direção do tiro. (TOCCHETTO, 2011).

Os efeitos secundários do tiro, são produzidos pelos elementos que saem da boca do cano da arma além do projétil, como gases e resíduos decorrentes da combustão da pólvora, e só podem ser identificados em tiros de contato ou à curta distância. O alcance dos elementos secundários será variável, assim como os efeitos observados (BAPTISTA *et al*, 2014; TOCCHETTO, 2011).

A zona de chamuscamento é produzida pela ação de gases superaquecidos e inflamados que saem do cano na descarga. A queimadura causa uma dissecação relativamente violenta dos tecidos, com a formação de fissuras entre as camadas da pele, separando a epiderme da derme e se desfazendo em seus elementos constituintes (BAPTISTA *et al*, 2014). A zona de chamuscamento auxilia no diagnóstico do orifício de entrada, da distância e direção do tiro, da quantidade de carga (pólvora) e do ambiente em que foi realizado o tiro (TOCCHETTO, 2011).

Se a região do ferimento estiver coberta por vestes, a ação dos gases e da chama ocorrerá no tecido, podendo não atingir a pele. Entretanto, se as vestes forem de tecido fino, as partículas podem perfurar a camada de tecido e impregnar na cutis. Por esse motivo, deve ser feita uma análise cautelosa das roupas usadas pela vítima (TOCCHETTO, 2011).

A zona de esfumaçamento é produzida por depósitos de fuligem após a combustão da pólvora ao redor do orifício de entrada, que é facilmente removida com a limpeza da região, diferentemente da zona de tatuagem. É claramente observado macroscopicamente quando o pó preto é usado, mas é menos intenso quando o pó químico sem fumaça é empregado (BAPTISTA *et al*, 2014). Nos tiros perpendiculares, dependendo da distância, a forma dessa zona pode não ser circular, mas estrelada. Suas dimensões e seu grau de concentração proporcionam elementos para fundamentar uma convicção quanto à direção e distância do tiro em relação ao alvo (TOCCHETTO, 2011).

A zona de tatuagem é formada pelos resíduos maiores (sólidos) de pólvora incombusta ou parcialmente combusta e pequenos fragmentos que se desprendem do projétil. Devido à maior massa e, conseqüentemente, maior inércia, vencem maior distância e penetram na pele como microprojéteis. Incrustam-se de forma mais ou menos profunda, ocasionando diversos ferimentos puntiformes. Os grãos se incrustam em todo o orifício de entrada e resistem à limpeza, não sendo removidos com lavagem da superfície (BAPTISTA *et al*, 2014; TOCCHETTO, 2011). A análise da zona de tatuagem, pode auxiliar na determinação da distância do tiro, usando-se a mesma arma e a mesma munição em vários tiros de prova, até alcançar um halo de mesmo diâmetro que o original. Nos tiros oblíquos, a tatuagem é mais intensa e menos extensa do lado do ângulo de menor inclinação da arma. (FRANÇA, 2011).

Se o ferimento apresenta bordas regulares e invertidas, possui orla de enxugo e possui efeitos secundários como zona de chamuscamento e zona de tatuagem, muito possivelmente se trata de ferimento de entrada do projétil. Por outro lado, a ausência de tais elementos não significa que o ferimento não seja produzido pela entrada do projétil, uma vez que diversos fatores podem contribuir para a descaracterização do ferimento de entrada do tiro (TOCCHETTO, 2011).

A localização anatômica do orifício de entrada pode auxiliar na determinação da causa do disparo, seja uma tentativa de autoexterminio ou vítima de violência. Nota-se que as feridas de entrada em casos de homicídios variam muito em sua localização, enquanto as feridas de

entrada em casos de suicídio são mais encontradas na região temporal direita, osso frontal ou na cavidade bucal (HUMPREY *et al*, 2017).

Os orifícios de saída são produzidos por projéteis sozinhos ou combinados com elementos que foram carregados em sua trajetória como roupas, botões, ossos, dentes, cartilagem, fragmentos de órgãos e músculos, por exemplo. Eles geralmente mostram bordas evertidas, hemorrágicas e irregulares, e geralmente são maiores em diâmetro do que os orifícios de entrada. Eles não apresentam marcadores de limpeza ou quaisquer efeitos secundários, mas podem ser observados anéis equimóticos ao redor da lesão e pode ocorrer um colar de abrasão se o projétil encontrar resistência nos tecidos ao sair do corpo (BAPTISTA *et al*, 2014).

Nos casos em que há um anteparo apoiando o corpo na região de saída do PAF nota-se uma orla de escoriação e/ou equimose causada pela compressão da pele entre o projétil e o anteparo. Tal escoriação pode muitas vezes imprimir a característica do anteparo na pele da vítima. Ferimentos de saída com essa característica, denominada Sinal de Romanesi, são um forte indicativo, por exemplo, de que a vítima teria sido alvejada depois de já caída, com o chão funcionando como um anteparo que formará, juntamente com a compressão do projétil, o Sinal de Romanesi (LIMA, 2020; TOCCHETTO, 2011).

Pode haver, também, a presença do Sinal do Funil de Bonnet, que acontece quando a tábua óssea no orifício de entrada volta-se para dentro, formando uma espécie de funil, enquanto, no orifício de saída, esse funil ocorre para fora¹⁴. Na lâmina óssea externa, o ferimento de entrada é arredondado e regular. Na lâmina interna, o ferimento é irregular, maior do que o da lâmina externa e com bisel interno bem definido, dando à perfuração a forma de um funil ou de um tronco de cone. O ferimento de saída é exatamente o contrário, como um amplo bisel externo, repetindo a forma de tronco de cone, mas, desta vez, com a base voltada para fora (FRANÇA, 2011).

Distância do disparo

Com relação à distância, os disparos podem ser classificados como de contato, à queima roupa, à curta distância, à média distância e à longa distância que repercutirão nas características do orifício de entrada (SEGUNDO *et al*, 2013). Em situações de tiro encostado na vítima, ocorre uma “explosão dos tecidos” e a ferida de entrada será irregular, ampla, e em regra, maior do que o diâmetro do projétil que o produziu. Nos tiros encostados não há, em geral, zona ou orla de esfumaçamento e de tatuagem (TOCCHETTO, 2011). Nos tiros encostados, ocorre a formação da Câmara de Mina de Hoffman, pois quando o cano da arma se apoia em uma região

em que há um plano ósseo subjacente, os gases, que penetram juntamente com o projétil, ao encontrarem uma estrutura mais rígida se acumulam e inflam o tecido adjacente, produzindo a explosão deles. Como os gases refluem com violência, ocorre o estrelamento e a eversão das bordas da pele. Entretanto, é possível observar que a perfuração da placa óssea subjacente é perfeitamente regular, pois foi produzida pela entrada do projétil (OLIVEIRA, 2016; TOCCHETTO, 2011).

Já o Sinal de Werkgaertner é a queimadura produzida pela extremidade da arma, imprimindo na pele da vítima a marca circular do cano, a massa de mira, além da armação e/ou guia da mola recuperadora, estas duas últimas no caso de pistolas. Esse sinal ocorre nos casos que não há formação da Câmara de Mina de Hoffman, devido à ausência da placa óssea (OLIVEIRA, 2016; TOCCHETTO, 2011).

O Sinal de Benassi é o esfumaçamento no plano ósseo ao redor e no orifício de entrada; típico de um tiro encostado. Seu reconhecimento é muito útil quando as partes moles se encontram em putrefação ou não existem, para identificar lesões de entrada com o cano encostado no alvo (LIMA, 2020; OLIVEIRA, 2016; TOCCHETTO, 2011).

Os tiros distantes são caracterizados pela presença somente dos elementos primários, que não permitem a determinação da distância do tiro. Dessa forma, independentemente da distância, os efeitos serão os mesmos observados, a depender apenas da estabilidade da trajetória do projétil. Para o tiro ser considerado a curta distância o que se analisa não é apenas o elemento espacial entre o cano da arma e o alvo atingido, mas leva-se em consideração o exame dos resíduos encontrados no ferimento e seu aspecto (TOCCHETTO, 2011). A tatuagem é um sinal indiscutível de orifício de entrada em tiros a curta distância (FRANÇA, 2011).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Odontologista está apto a realizar perícias em casos que envolvam injúrias em face acometidas por PAF. Através da análise das características do ferimento, o profissional é capaz de identificar a ferida de entrada e de saída do PAF, além da distância do disparo. Essas informações são de grande importância médico-legal e podem auxiliar na resolução de uma cena de crime.

O grau de extensão da injúria está diretamente relacionado à massa e à velocidade do projétil e à densidade do tecido impactado, entretanto, a morfologia do projétil contribui de forma significativa para sua deformação e ampliação de injúria aos tecidos acometidos. É

possível diferenciar macroscopicamente as feridas de entrada e quando presente as de saída, desta forma estimar a trajetória do projétil e as estruturas anatômicas comprometidas.

REFERÊNCIAS

- BAPTISTA, M.V.; d'ÁVILA, S.C.G.P.; d'ÁVILA, A.M.M.P. Histopathological detection of entry and exit holes in human skin wounds caused by firearms. **J Forensic Leg Med**, 2014; 25:49-52.
- BERRYMAN, H.E. A systematic approach to the interpretation of gunshot wound trauma to the cranium. **Forensic Sci Int**, 2019; 301: 306-317.
- BRASIL. Conselho Federal de Odontologia. Aprova a Consolidação das Normas para Procedimentos nos Conselhos de Odontologia e revoga a Resolução CFO-155/84. Resolução CFO-185/93, de 26 de abril de 1993. Disponível em: [CFO - Consolidação das Normas para Procedimentos nos Conselhos de Odontologia \(usp. https://www.forp.usp.br/restauradora/etica/rcfo185_93.htmbr\)](https://www.forp.usp.br/restauradora/etica/rcfo185_93.htmbr). Acesso em: 22 de agosto de 2020.
- BREEZE, J.; TONG, D.; GIBBONS, A. Contemporary management of maxillofacial ballistic trauma. **Br. J. Oral Maxillofac. Surg.**, 2017; 55(7): 661-665.
- COUTINHO, C.G.V. et al. O papel do odontologista nas perícias criminais. **RFO - UFP**, 2013; 18(2): 217-223.
- FRANÇA, G.V. Medicina Legal. 9ª edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.
- GEORG, N.J.; KELNER, L.; JÚNIOR, J.B.S. Armas de Fogo: Aspectos Técnicos Periciais. **Rev. Jurídica – CCJ**, 2011; 15(30): 137-156.
- HÉRCULES, H.C. Mecanismos do trauma. In: FREIRE, E. Trauma: A doença dos séculos. Ed. Atheneu, v.1, 2001
- HUMPREY, C.; KUMARATILAKE, J.; HENNEBERG, M. Variability of characteristics of cranial projectile trauma in skeletal material. **J. Biol. Clin. Anthropol.**, 2017; 74(4): 283-296.
- LIMA, A.M. Características das Feridas Perfurocontusas Produzidas por Projétil de Arma de Fogo. **Rev Inter da Associação Brasileira de Criminologia**, 2020; 02(04): 124-132.
- MAIA, A.B.P. et al. Non-fatal gunshot wounds among military police in Rio de Janeiro: health as a field of emergency against the naturalization of violence. **Ciência e Saúde Coletiva**, 2021; 26(5): 1911-1922.
- MIRANDA, L.I. Balística forense: do criminalista ao legista. 1ª edição. Rio de Janeiro: Rubio, 2014.
- OLIVEIRA, G.F. Uso da Balística Forense na Elucidação de Crimes. **Acta de Ciências e Saúde**, 2016; 05(02): 182-198.
- QUEIROZ, J.F. Influência do tipo de munição nas características das lesões produzidas por armas de fogo. **Acta de Ciências e Saúde**, 2016; 05(01): 36-39.
- SEGUNDO, A.V.L. et al. Inclusão do estudo da balística no tratamento dos ferimentos faciais por projétil de arma de fogo. **Rev. Cir. Traumatol. Buco-Maxilo-Fac.** 2013; 13(4): 63-70.
- SILVA, U.A. Balística Forense: uma revisão. **Seara Jurídica**, 2013; 1(9):1-9.
- SOUZA, R.W.M. Tiro Policial e Armas de Fogo. 2ª edição. Fortaleza: Eleal, 2013.
- STEFANOPOULOS, P.K. et al. Wound ballistics of firearm-related injuries – Part 1: Missile characteristics and mechanisms of soft tissue wounding. **Int. J. Oral Maxillofac. Surg.**, 2014; 43; 1445-1458.
- TOCCHETTO, D. Balística Forense: aspectos técnicos e jurídicos. 7ª edição. Campinas: Millennium Editora, 2011.

CAPÍTULO 08

A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c08](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c08)

Angelica Ribeiro do Nascimento Oliveira¹, Ana Luisa Mendes Ribeiro², Eliana Luz Lopes³, Lara Beatriz de Sousa Araújo⁴, Maria Cecilia do Nascimento Fontinele⁵, Livia Karen Barbosa de Brito⁶, Rafaela de Jesus Portugal⁷, Sabrina Sousa Fontenele⁸, Ynara Maria Gomes de Sousa⁹, Caroline Taiane Santos da Silva¹⁰

¹Universidade Maurício de Nassau, Unidade Teresina, (angelicalribeiro.ar19@gmail.com)

²Universidade Federal do Piauí, (analuuhm28@gmail.com)

³Universidade Federal do Oeste da Bahia, (eliana.l1930@ufob.edu.br)

⁴Universidade Federal do Piauí, (larabeatriz@ufpi.edu.br)

⁵Universidade Federal do Piauí, (mariacecilia0512@hotmail.com)

⁶ Universidade Federal do Piauí, (liviakarenbb@gmail.com)

⁷Universidade Salvador - UNIFACS, (rafaelaenfermagem2@gmail.com)

⁸Universidade da Amazônia, (sabrinafontnele@gmail.com)

⁹ Universidade Federal do Piauí, (ynara@ufpi.edu.br)

¹⁰ Child Behavior Institute, (carolinetiaiane.enfa@gmail.com)

Resumo

Objetivos: Identificar na literatura científica a importância do trabalho da equipe multidisciplinar no programa saúde da família. **Método:** Trata-se de uma revisão integrativa, utilizando para fins de coleta de dados as bases de dados e bibliotecas *online*, como a Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Aplicando os descritores arrolados na plataforma Decs: Estratégia Saúde da Família; Equipe de assistência ao paciente, atenção primária à Saúde. Os descritores foram combinados entre si pelo operador booleano “AND”. Foram incluídos artigos nos idiomas português e inglês, publicados entre 2011 e 2021. **Resultados:** Evidenciou-se que a presença da equipe multidisciplinar no Programa Saúde da Família proporciona melhor acolhimento, resolução e promoção da saúde nas comunidades em que há equipes interdisciplinares inseridas. Além de promover a integralidade na Atenção Básica e integração com os outros níveis da Rede de Atenção à Saúde. **Conclusão:** Pode-se perceber que todos os profissionais têm um papel relevante na saúde, sabe-se, ainda que é um processo de trabalho contínuo e a equipe multidisciplinar é fundamental na comunidade para promoção da saúde da população.

Palavras-chave: Estratégia Saúde da Família; Equipe de Assistência ao Paciente; Atenção.

Área Temática: Ciências da Saúde

E-mail do autor principal: angelicalribeiro.ar19@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

A Declaração de Alma Ata, em 1978, foi um importante marco para o desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde (APS), na qual defendia a APS como núcleo central de um sistema de saúde, com contribuições para maior eficiência, efetividade e satisfação do usuário (PAIM, 2012). Nesse sentido, desde os anos 1920 até a hodiernidade, vários modelos de tentativas de organização foram implantados na APS em diferentes regiões do país. Entretanto, o marco mais importante da APS ocorreu com a implantação do Programa Saúde da Família (PAIM, 2012; MENDES, 2012), reconhecido hoje como Estratégia Saúde da Família (ESF) pela sua capacidade em orientar a organização do sistema de saúde (MENDES, 2012).

Desde 1994, o Programa Saúde da Família (PSF) é a principal porta de entrada do sistema de saúde, acolhendo e procurando respostas para a maioria dos problemas de saúde da população, a fim de reduzir danos e sofrimentos, e responsabilizando-se pela efetividade do cuidado, ainda que oferecido em outros pontos da rede. Para isso, se faz necessário o trabalho em equipe de profissionais de áreas distintas, para que seus saberes se somem e tornem o cuidado efetivo na sua população alvo (BRANDÃO; OLIVEIRA, 2016).

Historicamente, o modelo prevalente de formação em saúde é biomédico, focalizado nas intervenções dos sintomas e secundarizando os demais aspectos do processo de saúde-doença dos indivíduos (SHIMIZU, CARVALHO JÚNIOR, 2012). Nesse viés, o PSF tem como objetivo priorizar a promoção da saúde, mudando o foco da atenção à saúde centrada no médico e na doença, rompendo com o modelo tradicional e individualista (OLIVEIRA, 2016).

O PSF é um importante modelo para garantir uma Atenção Primária de Saúde (APS) forte no SUS, aliada a políticas que priorizem os atributos essenciais da APS, sobretudo pela inovação em tecnologias assistenciais, de gestão e de comunicação (TASCA, R., et al., 2020). A integração entre os diferentes profissionais da saúde apresenta fortes potencialidades ao programa, trazendo inúmeros benefícios aos usuários (FILHO, SAMPAIO, BRAGA, 2017). Diante do exposto, este estudo tem como objetivo identificar na literatura científica a importância do trabalho da equipe multidisciplinar no programa saúde da família.

2 METODOLOGIA

O presente estudo é uma revisão integrativa da literatura científica, pois contém uma ampla abordagem com rigor metodológico, combinando dados da literatura empírica e teórica, sintetizando resultados obtidos em pesquisas disponíveis sobre a temática, de forma ordenada e abrangente. (SOUZA, 2010). Possui abordagem quantitativa, de natureza exploratória e descritiva. Foi realizada através da busca online de artigos científicos nacionais e internacionais, no período de setembro de 2021.

Esta revisão foi elaborada a partir das seguintes etapas: escolha do tema, construção da pergunta de pesquisa através do acrônimo PICO (paciente, interesse, contexto), escolha dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), definição dos critérios de inclusão/exclusão dos artigos científicos; coleta, análise e discussão dos dados dos estudos selecionados, exposição da síntese das evidências encontradas.

A questão norteadora foi definida a partir do PICO. A população estudada foi a equipe multidisciplinar, com interesse na importância do seu trabalho no contexto do Programa de Saúde da Família. Dessa forma, questionou-se qual a importância do trabalho da equipe multidisciplinar no programa saúde da família?

Após esta etapa foi realizada a busca nas bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO) e na Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), via Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), através dos DeCS: “Estratégia Saúde da Família”, “Equipe de Assistência ao Paciente” e “Atenção Primária à Saúde”, combinados entre si pelo operador booleano and.

Foram definidos como critérios de inclusão os estudos primários e secundários, que abordaram a temática, publicados na íntegra, no idioma português e inglês, entre 2011 e 2021 e como critérios de exclusão, artigos repetidos nas bases de dados. Foram selecionados 09 trabalhos científicos.

Para a seleção dos artigos, leu-se o título e o resumo dos estudos encontrados, observando os critérios de elegibilidade. Em seguida, realizou-se uma leitura criteriosa de todos os artigos e iniciou-se a coleta dos dados. Para tanto, foi elaborado um quadro contendo os autores, revista, título e principais achados.

Como este estudo é uma revisão integrativa da literatura, não houve a necessidade de submissão ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), sendo respeitados os aspectos éticos no que se refere à fidelidade às fontes citadas.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram reunidos 09 artigos com data de publicação entre 2011 e 2021, nos quais evidenciou-se a importância da atuação multiprofissional no Programa Saúde da Família. A presença de profissionais de várias áreas da saúde na atenção primária possibilita uma melhor assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Entretanto, a presença de uma equipe interdisciplinar de saúde ainda não é uma realidade comum em todo o território nacional, visto que ainda há pouca e recente implantação de programas de residência multiprofissional na atenção primária de saúde.

Dessa forma, para a obtenção dos resultados, foi realizada a síntese dos dados coletados com o objetivo de explicar a fundamental importância da atuação da equipe interprofissional no serviço de atenção básica.

Quadro I: Características dos estudos sobre a importância do trabalho da equipe multidisciplinar no programa saúde da família.

AUTORES	REVISTA	TÍTULO	PRINCIPAIS ACHADOS
BEZERRA, R. K. C.; ALVES, A. M. C. V.	Expressão Católica Saúde	A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E SEUS PRINCIPAIS DESAFIOS	A atuação da equipe multiprofissional proporciona maior humanidade nos atendimentos, tornando-os menos medicalizados, além de promover a integralidade, equidade, universalidade, resolubilidade, intersetorialidade e a participação da comunidade nas transformações em saúde. O trabalho em equipe é um dos determinantes para uma boa atuação da equipe multidisciplinar. Entretanto, a falta de uma boa preparação visando o trabalho em equipe ainda é realidade nos cursos de graduação. O déficit na infraestrutura e a falta de recursos necessários para um bom apoio às famílias é também um dos desafios encontrados pela equipe multiprofissional.
PEREIRA, R. C. A.; ROVERA, F. J. U.; ARTMANN, E.	Interface (Botucatu)	O TRABALHO MULTIPROFISSIONAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: ESTUDO SOBRE MODALIDADES DE EQUIPES	A conversação e compartilhamento de experiências e conhecimentos torna a equipe multiprofissional melhor para a promoção da saúde no território. A rotatividade da liderança também é fundamental para o estabelecimento de uma equipe integrada, assim como a interdependência dos trabalhos realizados por cada membro da equipe torna possível a realização das ações de saúde. O trabalho em equipe possibilita maior abrangência das ações em saúde.
ANTUNES, M. D. et al.	Perspectiva: Ciência e Saúde	ATUAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA NA ATENÇÃO BÁSICA – ESF E NASF: UMA REVISÃO DE LITERATURA	O trabalho do fisioterapeuta no NASF converge com os objetivos das outras especialidades da saúde atuantes no Núcleo de Apoio. O fisioterapeuta orienta e presta atendimento à comunidade mediante demanda.
FILHO, E. J. S.; SAMPAIO, J.; BRAGA, L. A. V.	Tempus – Actas De Saúde Coletiva	AValiação de um programa de RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE SOB O OLHAR DOS RESIDENTES.	A implementação de programas de residência multiprofissional representa um avanço na formação profissional, apesar de ainda não fazer parte da realidade de muitas localidades.
BRANDÃO, G. C. G.; OLIVEIRA, M. A. C.	RSC online	O TRABALHO EM EQUIPE EM UNIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA DE UM MUNICÍPIO PARAIBANO.	O relacionamento da equipe está diretamente relacionado com a qualidade dos serviços prestados à comunidade.

SILVA, P.A., et al.	Revista ConScientia e Saúde	ATUAÇÃO EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DE SAÚDE: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA	A atuação da equipe de multiprofissionais para a saúde pública não só torna o atendimento mais completo, como oportuniza outros profissionais de saúde a atuarem na atenção básica de saúde
SILVA, C. M. DA; NASCIMENTO, D. A.; MAIA, L. F. S.	Revista Remecs: Multidisciplinar de Estudos Científicos em Saúde	A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: COM FOCO EM PACIENTES HIPERTENSOS	O papel do enfermeiro como componente da equipe multiprofissional na ESF é de suma importância, uma vez que juntamente com a equipe a qual coordena, exerce um contato direto com o paciente e seus familiares visando a orientação para mudança de estilo de vida e adesão ao tratamento adequado.
LIMA, M. A. M. de. et al.	Tópicos em Ciências da Saúde, Editora Poisson.	EFEITOS DA ATUAÇÃO MULTIPROFISSIONAL NA GARANTIA DE UM ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL: REVISÃO SISTEMÁTICA	As ações educativas desenvolvidas pela equipe multiprofissional na atenção primária contribuem para auxiliar em tratamentos de doenças já existentes, além de reduzir o risco de novas doenças, resultando em uma melhora da qualidade de vida e um processo de envelhecimento saudável.
ARANTES, L. J. et al.	Ciência & Saúde Coletiva	CONTRIBUIÇÕES E DESAFIOS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO BRASIL: REVISÃO DA LITERATURA	A adesão a um modelo de equipe multidisciplinar no PSF levou a um aprimoramento da assistência, devido a interação de diferentes pontos de vista para o desenvolvimento de ações e ideias, e devido ao enfoque familiar agrega positivamente a promoção de saúde à comunidade.

Fonte: Elaborada pelos autores, 2021.

A equipe multiprofissional na garantia da integralidade e qualidade da atenção no Programa de Saúde da Família (PSF)

Através do estudo de BRANDÃO, G. C. G., é possível destacar a característica essencial do trabalho em equipe em prol da assistência eficiente e eficaz ao indivíduo e a comunidade. A diversidade de campos da saúde proporciona ao território maior qualidade de saúde e faz com que os profissionais tenham contato direto com os determinantes da saúde nas localidades.

Diante disso, a forma de trabalho entre a equipe multiprofissional deve ser realizada de forma articulada e conjunta, uma vez que uma equipe integrada é capaz de desenvolver melhores ações de resolução de problemas de saúde e aprimorar a prática de cuidado, resultando na promoção de uma assistência mais integral que visa melhorar a qualidade de saúde e de vida da comunidade (PEREIRA; RIVERA; ARTMANN, 2013).

Dentre os membros da equipe multiprofissional que atua no Programa Saúde da Família (PSF), cabe citar o papel dos enfermeiros que, segundo estudo publicado por Silva, Nascimento e Maia (2017), necessitam coordenar as equipes de forma integrada como participantes ativos no processo de promoção da saúde, uma vez que os enfermeiros assumem o papel primordial de educadores devido ao relacionamento direto com o paciente e a família, buscando a conscientização do paciente a seguir a forma terapêutica adequada e realizar mudanças em

hábitos nocivos, além de serem também responsáveis pelo lado emocional, sempre mantendo um diálogo aberto para que os pacientes desenvolvam confiança e estejam dispostos a compartilhar anseios e dúvidas.

Além disso, o estudo realizado por Antunes *et. al.* (2020) evidencia o papel do fisioterapeuta no Programa Saúde da Família, que contribui não somente na reabilitação, mas também para a promoção de saúde e prevenção de doenças, por meio da orientação através de palestra que tem como alvo os pacientes, cuidadores e familiares, favorecendo a melhoria na qualidade de saúde e de vida da população.

Apesar dos métodos tradicionais de promoção de saúde, a atuação de uma equipe multiprofissional na atenção primária trás abordagens alternativas de cuidado para com a comunidade, como é demonstrado no estudo de Lima *et. al.* (2019) que evidencia que a realização de tratamentos não medicamentoso se mostrou eficaz na prevenção de novas doenças, como dinâmicas em grupo, debates sobre entendimento de saúde e experiências de vida, possibilita tomar conhecimento das necessidades de cada grupo e assim facilita a orientação para adotar melhores hábitos de vida.

Residência Multiprofissional no Programa Saúde da Família

Por meio da avaliação de FILHO, E. J. S., é possível destacar as dificuldades acerca da residência multiprofissional no PSF do estado da Paraíba, por ser uma modalidade ainda recente e escassa, a atuação do profissional residente enfrenta pouco conhecimento não só por parte da população como também pela própria equipe, a qual ainda não encontra-se familiarizada com a atuação de residentes na Atenção Básica.

Desafios enfrentados pela equipe multiprofissional no Programa Saúde da Família (PSF)

De acordo com o estudo realizado por Silva *et. al.* (2013), uma das principais razões para haver dificuldades de trabalhar em uma equipe multiprofissional está atrelada à formação acadêmica dos profissionais da saúde, uma vez que as alterações provocadas desde a criação do SUS e a posterior implantação do PSF modificaram o modelo hospitalocêntrico que era centrado na figura do médico, demandando a partir de então um trabalho conjunto dos profissionais das diversas áreas da saúde. Entretanto, o modelo universitário tradicional permanece voltado para a individualidade da profissão, resultando na dificuldade de trabalhar em equipe e em fornecer um atendimento humanizado e de qualidade aos pacientes.

Além disso, também existem adversidades no cotidiano de trabalho dessas equipes devido à falta de infraestrutura e apoio de gestores, ausência de planejamento de ações, recursos de trabalho insuficientes e inadequados que levam a um desgaste físico e mental dos profissionais (BEZERRA; ALVES, 2019).

Outro desafio presente na atuação da equipe multiprofissional no Programa Saúde da Família (PSF) é a formação de longas filas de espera que, segundo Arantes et. al, (2016), é resultado da carência de serviços especializados para suprir a demanda da comunidade, fator que está relacionado à uma ampliação da atenção primária por meio do PSF mas sem uma expansão simultânea dos profissionais especializados, não atendendo adequadamente à demanda da comunidade.

4 CONCLUSÃO

Diante o exposto, circunstancia-se que o indivíduo em questão no que tange a qualidade de vida, e conforme o ideal de integralidade apontado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), é pertinente fazer a análise de forma conjunta e integral em prol do bem-estar. A saúde é um processo contínuo e cada profissional tem papel relevante tendo como base a formação exercida.

Enfatizar o autocuidado e um bom atendimento da atenção básica é um aspecto essencial, tendo em vista que é justamente nesse processo que a população busca exercer atividades que estabilizam o quadro clínico de saúde. Sendo assim, é imprescindível ampliar ainda mais essa área, a participação de demais profissionais para fazer parte da composição multiprofissionais é algo preciso, e os maiores privilegiados com esse cenário é a comunidade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BEZERRA, R.K.C.; ALVES, A.M.C.V. A importância do trabalho da equipe multiprofissional na Estratégia Saúde da Família e seus principais desafios. **Revista Expressão Católica Saúde**, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 7-15, dec. 2019. ISSN 2526-964X.

PEREIRA, R.C.A.; RIVERA, F.J.U.; ARTMANN, E. O trabalho multiprofissional na estratégia saúde da família: estudo sobre modalidades de equipes. **Interface - Comunicação, Saúde, Educação** [online], v. 17, n. 45, pp. 327-340, 2013.

ANTUNES, M. D. et al. Atuação do fisioterapeuta na Atenção Básica - ESF e NASF: Uma revisão de literatura. **Revista Perspectiva: Ciência e Saúde**, Osório, V. 5 (2): 86-100, Ago 2020.

JOSÉ DOS SANTOS FILHO, E.; SAMPAIO, J.; BRAGA, L. A. V. A avaliação de um programa de residência multiprofissional em Saúde da Família e a comunidade sob o olhar dos residentes. **Tempus – Actas de Saúde Coletiva**, v. 10, n. 4, p. Pág. 129-149, 14 jul. 2017.

BRANDÃO, G.C.G; OLIVEIRA, M.A.C. O Trabalho em equipe em UBS (PB). **RSC online**, 2016; 5(3): p.51-62.

SILVA, P.A et al. Atuação em equipes multiprofissionais de saúde: uma revisão sistemática. **Revista ConScientia e Saúde**, v. 12, n. 1, p. 153-160, 2013.

SILVA, C. M. DA; NASCIMENTO, D. A.; MAIA, L. F. S. A atuação do enfermeiro na estratégia saúde da família: com foco em pacientes hipertensos. **Revista Remecs: Revista Multidisciplinar de Estudos Científicos em Saúde**, v. 2, n. 3, p. 7-17, 2017.

LIMA, M. A. M. de. et al. Efeitos da atuação multiprofissional na garantia de um envelhecimento saudável: revisão sistemática. **Tópicos em Ciências da Saúde, Editora Poisson**, v. 8, ed.1, 2019.

ARANTES, L. J. et al. Contribuições e desafios da estratégia saúde da família na atenção primária à saúde no Brasil: revisão da literatura. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 5, maio, 2016.

MENDES, E.V. A APS no Brasil. O cuidado das condições crônicas na Atenção Primária à Saúde: o imperativo da consolidação da Estratégia da Saúde da Família. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde; 2012. p. 71-137.

OLIVEIRA, C. F.; ARRUDA, G. M. M. S.; MELO, A. L. A., BARCELOS, S. C. Cuidado interprofissional aos portadores de Hipertensão e Diabetes em um grupo de intervenção educacional e terapêutica. **Cadernos ESP**. Ceará. v. 10, n. 2, p. 33-45, 2016.

PAIM, J. S. Atenção Primária à Saúde: uma receita para todas as estações? *Saúde Debate* 2012; 36(94):343-347.

SHIMIZU, H. E.; CARVALHO JUNIOR, D. A. C. O processo de trabalho na Estratégia Saúde da Família e suas repercussões no processo saúde-doença. **Ciência & Saúde Coletiva**. v. 17, n. 9, p. 2405-2414, 2012.

TASCA, R., et al. Recomendações para o fortalecimento da atenção primária à saúde no Brasil. **Rev Panam Salud Publica**, v, 44, ed.4, 2020.

CAPÍTULO 09

A IMPORTÂNCIA MULTIDISCIPLINAR PARA O TRATAMENTO ODONTOLÓGICO DA SÍNDROME DE TREACHER COLLINS: REVISÃO DE LITERATURA

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c09](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c09)

André Almeida Antunes¹, Letícia Rafaella Marinho Honorato², Jadson da Silva Santana³, Anne Caroline Silva Freire de Sá⁴, Thalita Oliveira da Silva Borba⁵, Erick Lúcio Souza Santos⁶, Arthur Mendes Lima⁷, Fernanda Maria Matos Aragão de Souza⁸, Alícia Lima de Lira⁹, Simone Angélica de Faria Amormino¹⁰.

¹Centro Universitário de Belo Horizonte - UniBH, (andredemu@yahoo.com.br)

²Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA, (leticiamarinhoh@hotmail.com)

³ Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, (jadsonufpe@gmail.com)

⁴Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA, (annecarolinefreiree@gmail.com)

⁵Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA, (thalita.borba00@gmail.com)

⁶Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA, (ErickLucioEL@gmail.com)

⁷Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF, (arthurmlima_@hotmail.com)

⁸Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA, (aragaofernanda22@gmail.com)

⁹Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA, (alicialimadl@gmail.com)

¹⁰Professora orientadora do Centro Universitário de Belo Horizonte - UniBH
(simoneamormino@hotmail.com)

Resumo

Objetivo: O presente trabalho objetivou realizar uma revisão da literatura em relação a importância multidisciplinar para o tratamento odontológico da síndrome de Treacher Collins, de modo a compreender, conhecer, descrever seus principais sinais clínicos, suas manifestações orofaciais mais significativas, bem como os parâmetros e manejo a serem aplicados no que tange o planejamento dos pacientes sindrômicos com a STC e das suas limitações. **Método:** A elaboração deste trabalho trata-se de uma revisão de literatura narrativa das principais bases de dados disponíveis como Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e Google Acadêmico, priorizando trabalhos dos últimos vinte anos, a respeito da Síndrome e sua conduta clínica. Empregando as seguintes palavras-chave: “Treacher Collins Syndrome”, “Collins Treacher Syndrome Oral”, “Treacher Collins syndrome and periodontitis”. **Resultados:** O presente

trabalho constatou frente aos achados literários a importância do conhecimento a respeito dos sinais característicos da STC pelos profissionais da saúde, para que possam realizar um diagnóstico diferencial o mais precocemente possível. **Conclusão:** Mesmo com a descoberta constante de mudanças genéticas, devido sua rara incidência e a escassez de difusão das informações, os pacientes acometidos pela a STC não recebem o tratamento mais adequado de forma precoce, agravando diversas vezes o quadro clínico e desfavorecendo seu prognóstico. Ainda assim, é um grande desafio para os atendimentos odontológicos e outros, serem mais eficazes e que possam apresentar resultados positivos que minimiza o estigma social e proporciona aos pacientes e suas famílias qualidade de vida.

Palavras-chave: Síndrome de Treacher Collins; Síndrome de Collins Treacher oral; Doença genética; Diagnóstico precoce; Cavidade oral.

Área Temática: Ciências da Saúde.

E-mail do autor principal: andredemu@yahoo.com.br

1 INTRODUÇÃO

A Síndrome de Treacher Collins (STC), que pode ser também denominada de Disostose Mandibulofacial ou Síndrome Franceschetti-Zwahlen-Klein, é uma patologia rara de origem hereditária e genética, onde o paciente apresenta mutações autossômicas dominantes e recessivas, sem predisposição por sexo ou raça (COBB et al., 2014), caracterizadas clinicamente, principalmente, pela sua anormalidade craniofacial.

A anomalia ocorre devido a falhas no código genético durante o processo de mitose na gestação, com mutações no gene TCOF1, exibido no cromossomo 5, que codifica uma proteína Treacle. O gene mencionado inibe alguns aspectos do desenvolvimento da face, e além desse, atualmente, diferentes mutações em demais genes foram descritas em outros trabalhos (YAN et al., 2018).

Deformidades craniofaciais são frequentemente oriundas da terceira semana do desenvolvimento embrionário, relacionando-se com a migração das células da crista neural. Assim afetando na quarta semana da gestação a formação do sistema nervoso central, com o do tubo neural, bordas e da crista neural no feto, que por sua vez é importante para a origem de grande parte da região craniofacial (VINCENT et al., 2016).

Entre nascidos vivos, a Síndrome de Treacher Collins tem prevalência de 1:50.000, tratando-se de uma doença rara, com 50% dos seus casos surgindo com novas mutações (LEYVA, 2014). Os achados clínicos da STC comuns incluem geralmente bilaterais e relativamente simétricas, sendo caracterizada por inclinação antimongolóide das fissuras palpebrais, coloboma da pálpebra inferior, micrognatia e hipoplasia malar, maxilar, microtia

bilateral ou anotia e fenda palatina, exposição da córnea, diminuição do espaço retrofaríngeo, dificuldade respiratória, perda auditiva, o subdesenvolvimento ou a ausência do osso zigomático, depressões das fissuras palpebrais, subdesenvolvimento da mandíbula, malformação das orelhas externas, ausência do canal auditivo e fendas faciais, variando clinicamente de branda a severa. Tendo como tratamento procedimentos cirúrgicos para a correção das deformidades (SPEZZIA, 2018).

Uma abordagem multidisciplinar, baseado no grau de dismorfologia e de crescimento de cada região anatômica com o intuito de otimizar a reabilitação a nível tanto funcional como estético (POSNICK et al., 2004). Essas alterações fazem com que os indivíduos sindrômicos necessitem de assistência especializada e multiprofissionais, além de intervenções cirúrgicas ao decorrer de suas vidas.

Muitas são as manifestações orofaciais em pacientes com SCT, incluindo hipoplasia de maxila e mandíbula, que geralmente leva ao desalinhamento dentário e abertura e fechamento anterior (MARTELLI et al., 2009). Várias lacunas ao longo da arcada dentária, luxação dos dentes, hipoplasia e hipoplasia do esmalte foram encontradas (TRAINOR et al., 2009). Portanto, as anormalidades craniofaciais nesses pacientes podem causar distúrbios de mastigação, respiração e fala, que devem ser avaliados primeiro (YOSHIDA et al., 2012).

O diagnóstico diferencial deve ser feito com outras entidades clínicas com características comuns de CET, como síndrome de Nager, síndrome de Miller, síndrome de Goldenhar e síndrome de Pierre Robin (SPEZZIA, 2018).

Devido à baixa incidência da STC, nem os profissionais de saúde nem o público em geral sabem a respeito, o que pode fazer com que suas manifestações mais importantes sejam ignoradas no momento do diagnóstico.

Este trabalho objetivou expor de forma simples as características clínicas mais recorrentes e discutir de forma coerente as alterações que as mesmas acarretam na vida dos indivíduos comprometidos; tornando-a assim mais conhecida para que os portadores desta síndrome consigam diagnóstico e, por consequência, tratamento o mais precocemente possível.

2 MÉTODO

O método adotado para o desenvolvimento deste estudo trata-se de uma Revisão de Literatura Narrativa realizada através da pesquisa de artigos científicos disponíveis nas bases de dados. O procedimento para a coleta de dados foi a busca em banco de dados digitais, os quais disponibilizam estudo empíricos e de revisão de literatura sobre o tema abordado no

presente estudo.

Os procedimentos adotados foram a seleção e leitura de artigos, monografias, teses, dissertações e livros que discutem a relação entre ensino e literatura do tema. Nesta seleção foram incluídos estudo que se apresentam de forma integral em domínio público.

Para o desenvolvimento deste estudo foi adotado o método descritivo, com abordagem qualitativa. Para Segundo Gil (1999) a pesquisas descritiva tem por objetivo descrever características de um fenômeno e adotam uma técnica padronizada para coletar dados.

Triviños (1987) afirma que a descrição qualitativa busca captar a aparência do fenômeno e sua essência. Busca também explicar a origem, relações e mudanças e tenta intuir suas consequências.

Para Lakatos e Marconi (2007) este tipo de pesquisa é definido como o levantamento, seleção e documentação da bibliografia que já foi publicada sobre o tema e possibilita que o pesquisador entre em contato com estes materiais e aprofunde os conhecimentos sobre o assunto.

A busca foi realizada em bases de dados como Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e Google Acadêmico. Empregando as seguintes palavras-chave: “Treacher Collins Syndrome”, “Collins Treacher Syndrome Oral”, “Treacher Collins syndrome and periodontitis”, em que foram encontrados: monografias, dissertações e artigos científicos. Os critérios de inclusão dos estudos para o levantamento bibliográfico serão textos completos, na língua portuguesa e inglesa, com acesso livre e gratuito nas bases de dados acima citadas. Os critérios de exclusão foram estudos que não atendam os objetivos do estudo.

Inicialmente, foram identificados 125 artigos na base de dados investigadas, dos quais após feito a leitura do título e objetivo do trabalho, foram descartados 86 trabalhos, sendo assim, dos 39 restantes, foram removidas 8 duplicatas. Após a leitura do resumo completo de cada e a partir dos critérios de elegibilidade, 19 estudos foram excluídos. Foram selecionados 12 estudos para leitura completa e destes, 9 foram elegíveis à revisão integrativa da literatura. A descrição detalhada do processo de seleção pode ser observada no Fluxograma da (Figura 1).

Figura 1 - Artigos encontrados, baixados e selecionados de acordo a metodologia utilizada.

Fonte: Autoria própria, 2021.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A síndrome de Treacher Collins é uma doença congênita associada a estruturas assimétricas bilaterais anormais originadas do primeiro e segundo arcos faríngeos (YOSHIDA et al., 2012). Esta é uma condição com alta penetrância e expressividade variável. Se um dos pais for afetado por essa síndrome, há 50% de chance de que o gene mutado que causa a doença seja passado para a prole (YAN et al., 2018).

O principal gene envolvido no desenvolvimento do CTS é o TCOF1, que existe no braço longo do cromossomo 5 e codifica a proteína Treacle (VINCENT et al., 2016). Embora grande progresso tenha sido feito nas características moleculares da síndrome, ainda não é possível explicar a variabilidade das manifestações clínicas dessa doença, mesmo para pacientes da mesma família (SPEZZIA, 2018).

O diagnóstico da STC é principalmente um diagnóstico clínico, que geralmente é feito logo após o nascimento. Também pode ser realizada por ultrassom e biópsia coriônica antes do parto. Além disso, muitos pesquisadores recomendam testes moleculares para diagnóstico e confirmação. Em alguns casos, uma história familiar detalhada e cuidadosa é necessária porque a TCS e outras síndromes craniofaciais têm múltiplas características fenotípicas (LEYVA, 2014).

O tempo de tratamento desses pacientes é longo, o que causa grande impacto na vida deles e de seus familiares. O tratamento geralmente requer múltiplas cirurgias, e muitas estruturas faciais requerem correção cirúrgica. Portanto, é importante realizá-los em idade adequada para que possam ser realizados sem afetar outros procedimentos que possam ser necessários posteriormente (YOSHIDA et al., 2012). Portanto, a estratégia de tratamento para pacientes com STC requer uma equipe médica multidisciplinar que deve avaliar todos os aspectos da doença.

O tratamento começa desde o pré-natal, e orienta a família a compreender a particularidade da anormalidade e os cuidados necessários para a vida. Esses pacientes podem ter dificuldade para respirar devido a deformidades nos primeiros meses de vida, que podem ser complicadas por resfriados e infecções, principalmente em crianças (COBB et al., 2014).

Se o paciente tem fenda palatina, deve ser tratado de acordo com o plano de tratamento atual, e ortopedia maxilar funcional deve ser usada imediatamente, e o tempo de operação deve ser estendido o máximo possível para fechar a fenda palatina até o início da alfabetização. Mesmo que não haja fissuras, o osso maxilar pode ser remodelado e, por meio da ortodôntica fixa, pode prevenir ou minimizar sobremaneira a deformidade dentária característica da displasia mandibular (MARTELLI et al., 2009).

Problemas mandibulares em pacientes craniofaciais, como as crianças, devem seguir o programa de tração mandibular, sendo uma das indicações importantes da tração mandibular bilateral é a erupção dos primeiros molares permanentes (YOSHIDA et al., 2012).

O crescimento dos ossos faciais em bebês e na infância tem levado a uma melhora nas condições estéticas, que é ainda melhorada pela cirurgia plástica. O tratamento dos tecidos duros e moles da face pode exigir ampla intervenção cirúrgica: primeiro deve ser realizada a correção dos defeitos palpebrais nos primeiros anos de vida (SPEZZIA, 2018). Posteriormente, enxertos de crânio são utilizados para reconstruir a órbita e corrigir o deslocamento lateral do canto; a reconstrução da orelha é realizada entre 5 e 7 anos de idade; cirurgias craniofaciais, odontopediatras e ortodontistas são responsáveis por corrigir a parte inferior da face e mandíbula. Intervenção ortodôntica deve ser realizada no início da erupção dentária (LEYVA, 2014).

Após o alinhamento dos dentes em seu eixo, a parte inferior do tratamento reposicionará a mandíbula e a maxila, com aproximadamente 10 anos de idade. À medida que o rosto da criança continua a crescer, procedimentos adicionais podem ser necessários para corrigir quaisquer anormalidades de desenvolvimento (OLIVEIRA et al., 2003).

As características da síndrome da displasia maxilofacial afetam diretamente a audição,

a fala, os sons, a deglutição e a respiração do paciente. Essas particularidades tornam o papel da Odontologia, fonoaudiologia em uma equipe multidisciplinar extremamente importante para o prognóstico e a qualidade de vida dos pacientes afetados.

Quanto ao efeito da síndrome na audição, pesquisas atuais mostram que as características da síndrome costumam afetar a anatomia do ouvido externo, como a microtia. Existem fatores como o tipo e a gravidade da deformidade (SPEZZIA, 2018). Estudos relacionam deformidades no ouvido à síndrome de Treacher Collins, como a atresia congênita do canal auditivo, que muitas vezes leva à perda auditiva condutiva, seja devido à ausência de aurículas, obstrução do canal auditivo, ou audição anormal (LEYVA, 2014). A perda auditiva unilateral pode levar a dificuldades na localização dos sons e compreensão da fala, principalmente em um ambiente ruidoso, causando prejuízos ao social e ao aprendizado das pessoas afetadas pela síndrome. O diagnóstico precoce da perda auditiva ou surdez e a sua correção, quando possível, são essenciais. Para isso, pode-se utilizar a cirurgia de prótese auditiva ou correção da perda auditiva, o que ajuda o indivíduo a se desenvolver adequadamente (TRAINOR; DIXON; DIXON, 2009).

Na maioria dos estudos incluídos nesta revisão, a importância do prognóstico precoce da Síndrome de Treacher Collins é enfatizada. Portanto, as pessoas nascidas com a STC precisam de um tratamento com abordagem multidisciplinar para redução do tempo de diagnóstico e atingir melhores resultados.

4 CONCLUSÃO

A STC é um distúrbio hereditário caracterizado por anomalias craniofaciais e manifestações de diferentes formas. Com base na literatura revisada, observa-se que há grande dificuldade no convívio social por conta de sua anomalia e também pela dificuldade de falar, ver e ouvir. O tratamento cirúrgico ainda é insuficiente, com a alta incidência de anomalias que a síndrome apresenta, porém faz-se necessário para dar a essas pessoas uma qualidade de vida melhor.

Embora a STC seja uma doença congênita rara, é importante que o profissional esteja devidamente capacitado, tenha o conhecimento dessa síndrome para entendê-la, e assim seja feito o diagnóstico precoce e o melhor plano de tratamento possível, tendo uma abordagem adequada, atendimento individualizado e diferenciado para cada paciente. É imprescindível que o cirurgião dentista perceba e compreenda as limitações de cada indivíduo sindrômico, para a escolha de tratamento seja a menos traumática no atendimento odontológico, visando a

qualidade de vida e à promoção da saúde desses pacientes. Por todo o exposto, o ideal é que o contato do paciente com o dentista se inicie o mais cedo possível, para que se construa uma relação de confiança entre os pais, o dentista e o paciente. Desse modo que a prevenção pode ser iniciada desde muito cedo e a criança se adapta melhor ao ambiente odontológico e hospitalar.

O melhor prognóstico para a síndrome de Treacher Collins se dá por meio do tratamento precoce, assim como pela execução deste tratamento por uma equipe multidisciplinar, a qual promoverá melhora nos aspectos funcionais das malformações faciais e estruturais e também dos aspectos morfológicos, melhorando-os esteticamente, com o intuito de proporcionar as crianças sindrômicas uma interação social mais próxima da normalidade, haja vista que esta síndrome não apresenta comprometimento neurológico do paciente ou qualquer retardo mental.

Nesse caso, novas pesquisas são necessárias para melhor compreender a patogênese da síndrome, que norteará as opções de tratamento para prevenir e corrigir alterações funcionais e estéticas.

As pesquisas sobre a síndrome de Treacher Collins devem continuar aprimorando os métodos atuais de correção funcional e estética, com ênfase no suporte psicossocial e de uma equipe multidisciplinar composta por otorrinolaringologistas, cirurgiões craniofaciais, oftalmologistas, fonoaudiólogos, psicólogos e dos Cirurgiões-dentistas bucomaxilofacial. A descoberta constante de mudanças genéticas promove sobremaneira o diagnóstico precoce e o aconselhamento genético familiar, ajuda a melhorar o tratamento e o prognóstico, minimiza o estigma social e proporciona aos pacientes e suas famílias qualidade de vida.

Mesmo com a descoberta constante de mudanças genéticas, devido sua rara incidência e a escassez de difusão das informações, os pacientes acometidos pela a STC não recebem o tratamento mais adequado de forma precoce, agravando diversas vezes o quadro clínico e desfavorecendo seu prognóstico. Ainda assim, é um grande desafio para os atendimentos odontológicos e outros, serem mais eficazes e que possam apresentar resultados positivos que minimiza o estigma social e proporciona aos pacientes e suas famílias qualidade de vida.

Vale ressaltar também que, como são poucos os estudos sobre a síndrome relacionadas à profissão médica-dentista, fonoaudiologia, fisioterapia e dentre as outras áreas correlacionadas, mais pesquisas devem ser realizadas para aprofundar os diversos aspectos da síndrome e as atividades desses profissionais podem ser utilizadas como medidas de intervenção, tanto na via de facilitar o diagnóstico quanto no aperfeiçoamento de uma reabilitação.

REFERÊNCIAS

COBB, Alistair RM et al. **O tratamento cirúrgico da síndrome de Treacher Collins.**

British Journal of oral and Maxillofacial Surgery, vol. 52, no. 7, pág. 581-589, 2014.

GIL, AC **Métodos e técnicas de pesquisa social.** 5ª ed. São Paulo: Atlas, 1999.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, M. de A. **Fundamentos da metodologia científica.** 5. reimprimir. São Paulo: Atlas, v. 310, 2007.

LEYVA, Juan Carlos; RESTREPO, Gonzalo Mallarino. **Síndrome de Treacher Collins: revisão do tema e apresentação de caso.** Universitas Médica, v. 55, no. 1, pág. 64-70, 2014.

MARTELLI, H. et al. **Características orofaciais da síndrome de Treacher Collins.** Oral Medicine Oral Pathology and Oral Surgery, 2009.

OLIVEIRA, Ana Cristina Borges de; et al. **Síndrome de Treacher Collins em Odontopediatria.** Revista Ibero-americana de Odontopediatria e Odontologia Infantil, vol. 6, não. 31, 2003.

POSNICK, Jeffrey C; TIWANA, Paul S .; COSTELLO, Bernard J. **Síndrome de Treacher Collins: avaliação abrangente e tratamento.** Oral and Maxillofacial Surgery Clinics, vol. 16, não. 4, pág. 503-523, 2004.

SPEZZIA, Sergio. **Repercussões orais da síndrome de Treacher Collins: revisão da literatura.** Journal of Oral Investigations, vol. 7, n. 2, pág. 89-97, 2018.

TRAINOR, Paul A; DIXON, Jill; DIXON, Michael J. **Síndrome de Treacher Collins: etiologia, patogênese e prevenção.** European Journal of Human Genetics, vol. 17, não. 3, pág. 275-283, 2009.

TRIVIÑOS, Augusto Nivaldo Silva. **Pesquisa qualitativa. Introdução à pesquisa em ciências sociais: pesquisa qualitativa em educação.** São Paulo: Atlas, p. 116-173, 1987.

VINCENT, Marie et al. **Síndrome de Treacher Collins: um estudo clínico e molecular baseado em uma grande série de pacientes.** Genetics in Medicine, v. 18, no. 1, pág. 49-56, 2016.

YAN, Zhiqiang et al. **Identificação de uma nova mutação TCOF1 em uma família chinesa com síndrome de Treacher Collins**. Medicina experimental e terapêutica, v. 16, no. 3, pág. 2645-2650, 2018.

YOSHIDA, et al. **Síndrome de Treacher Collins: um desafio para otimizar o tratamento cirúrgico**. Rev Bras Cir Craniomaxilofac, v. 15, no. 2, pág. 64-68, 2012.

CAPÍTULO 10

A INFLUÊNCIA DA COVID-19 NA PERCEPÇÃO DO TEMPO: REVISÃO DE LITERATURA

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c10](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c10)

Maria Gislene Santos Silva¹, José Isaac Pereira Silva², Alana Silva do Desterro³,
Amanda Aguiar Costa⁴, Letícia Emilly Mesquita de Sousa⁵, Silmar Silva Teixeira⁶

¹Universidade Federal do Delta do Parnaíba, (gislene-bj@hotmail.com)

²Universidade Estadual do Piauí, (joseisilva@aluno.uespi.br)

³Universidade Federal do Delta do Parnaíba, (desterroalana@gmail.com)

⁴Universidade Federal do Delta do Parnaíba, (amandacst239@gmail.com)

⁵Universidade Federal do Delta do Parnaíba, (leemilly3535@gmail.com)

⁶Universidade Federal do Delta do Parnaíba, (silmar-teixeira@ufpi.edu.br)

Resumo

Objetivo: Realizar uma revisão de literatura sobre a alteração da percepção temporal no período da COVID-19. **Método:** Foi realizado um levantamento bibliográfico por meio de pesquisa nos bancos de dados PubMed, PsycInfo, CINAHL, Cochrane Library e EMBASE, utilizando os termos descritores (“COVID-19” OR “SARS CoV 2 Infection” OR “COVID-19 Pandemic”) AND (“time perception” OR “temporal perception” OR “temporal processing” OR “time processing”). Como critérios de inclusão: Estudo que apresentassem como temática central a percepção do tempo na população em relação confinamento decorrente da pandemia, estudos experimentais, relatos de caso, revisões e metanálise, escritos em língua inglesa e publicados de 2019 a 2021. Os critérios de exclusão foram teses, dissertações, resenha de livros, anais de congressos e trabalhos com inadequação a questão norteadora. **Resultados:** As diversas pesquisas realizadas na área mostraram que a população apresentou uma alteração na percepção temporal. Além disso, o período de confinamento induziu um aumento na dificuldade de controlar o tempo, os indivíduos relataram dificuldade em reconhecer os dias da semana, dia do mês e hora do dia. Além de relatarem uma expansão de tempo durante a pandemia. **Conclusões:** Houve alteração da percepção temporal na população, afetando os adultos e crianças em idade escolar. Dessa forma, é fundamental, acompanhar o aspecto psicofisiológico da população e realizar mais pesquisas para desenvolver estratégias para reduzir os efeitos psicológicos adversos impactos causados pelo confinamento.

Palavras-chave: Covid-19; Percepção do tempo; Pandemia.

Área Temática: Ciências da Saúde

E-mail do autor principal: gislene-bj@hotmail.com

1 INTRODUÇÃO

Em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declara uma pandemia, devido a COVID-19, causada pelo SARS-Cov-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome – Coronavirus – 2) (ALI *et al.*, 2021; MARI *et al.*, 2020). A pandemia influenciou diretamente os ritmos e estilos de relação emocional, assim como laboral e social (MARI *et al.*, 2020). Com o intuito de reduzir a taxa de infecção, países adotaram medidas de precaução, como o fechamento de todos os espaços públicos; entretanto as alterações sociais e comportamentais foram expressivas (ALI *et al.*, 2021; CELLINI *et al.*, 2020; OGDEN, 2020). Isolamentos sociais anteriores demonstram impactos na saúde mental, mas o confinamento devido a COVID-19 é uma situação diferente, especialmente por sua magnitude global (FIORENZATO *et al.*, 2021). Apesar dessas medidas serem necessárias, essas providências levaram um impacto negativo na saúde mental da população, como ansiedade, transtorno de humor, saúde física, irritabilidade, depressão e alteração de sono e da percepção do tempo (ALI *et al.*, 2021; CELLINI *et al.*, 2020; FIORENZATO *et al.*, 2021).

A percepção temporal (PT) percebida pelos seres humanos é fundamental para a construção da identidade e influencia os projetos para a vida e manutenção do senso moral. Alguns fatores podem alterar a PT, tais como: emoção, capacidade cognitiva e administração de drogas. (HOLMAN; GRISHAM, 2020). Julgar o tempo descreve a velocidade subjetiva na qual o tempo parece estar passando (OGDEN, 2020). A suspensão do fluxo do tempo, pode levar a distorções perceptivas, alterando a ordem do tempo e dos dias, em que podemos perceber o futuro de forma mais rápida (HOLMAN; GRISHAM, 2020). Pessoas que enfrentam traumas cognitivos, em geral apresentam alteração da PT, tal como o trauma coletivo pela pandemia do COVID-19 (HOLMAN; GRISHAM, 2020; OGDEN, 2020). Neste caso, confinamento pode diminuir as habilidades cognitivas, a PT, o sono, além de aumentar o risco de problemas de saúde mental (CELLINI *et al.*, 2020; FIORENZATO *et al.*, 2021), tal como o aumento do tédio e estresse diurno no período pandêmico (ALI *et al.*, 2021). Para compreender a melhor forma de proteger o bem-estar físico e mental público, é necessário o estudo das mudanças nas percepções de tempo e como elas afetam a população (HOLMAN; GRISHAM, 2020). Este trabalho teve o objetivo realizar uma revisão de literatura sobre a alteração da percepção temporal no período da COVID-19.

2 MÉTODO

O presente trabalho constituiu-se de uma revisão de literatura, de natureza descritivo-qualitativa. A pesquisa bibliográfica foi realizada por meio de pesquisa nos bancos de dados PubMed, PsycInfo, CINAHL, Cochrane Library e EMBASE, utilizando os termos descritores (“COVID-19” OR “SARS CoV 2 Infection” OR “COVID-19 Pandemic”) AND (“time perception” OR “temporal perception” OR “temporal processing” OR “time processing”). Como critérios de inclusão: Estudo como temática central a percepção temporal ao confinamento decorrente da pandemia, estudos experimentais, relatos de caso, revisões e metanálise, escritos em língua inglesa e publicados de 2019 a 2021. Os critérios de exclusão foram teses, dissertações, resenha de livros, anais de congressos e trabalhos com inadequação a questão norteadora.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir de um levantamento na Science Direct, ao utilizar os descritores citados anteriormente e submeter ao filtro, 1 artigo foi escolhido para compor esta revisão. Já na plataforma da PubMed, utilizando os mesmos descritores, que passaram pelo filtro, 2 artigos foram selecionados. Na EMBASE, utilizando os mesmos descritores e o filtro, para a confecção deste estudo, apenas 2 artigos foram selecionados, considerando a relevância do tema. Na PsycInfo, utilizando os mesmos descritores e o filtro, para a confecção deste estudo, apenas 2 artigos foram selecionados. Portanto, a partir dos critérios de inclusão e exclusão norteados pelo filtro, foram encontrados 167 artigos nas Bases de Dados. Após passar por uma análise e leitura na íntegra foram selecionados 7 artigos científicos que abordam sobre a alteração da percepção temporal em tempos da COVID-19. A descrição dos artigos selecionados para análise encontra-se na Tabela 1.

Figura 1: Fluxograma da busca e seleção dos estudos.

Fonte: Autoria do pesquisadores.

Tabela 1: Autor/Ano/País, tipo de estudo, objetivo e achados dos artigos selecionados para a presente Revisão de Literatura.

AUTOR/ ANO/ PAÍS	TIPO DE ESTUDO	OBJETIVO	ACHADOS
Ali, <i>et al.</i> , 2021, Paquistão	Estudo transversal	Investigar as correlações entre mudanças no padrão de sono, percepção de tempo e uso de mídia digital.	Verificou uma correlação em relação a percepção temporal, sensação de cansaço e falta de motivação. Além disso, os participantes perceberam uma superestimação temporal no período da pandemia.
Cellini <i>et al.</i> , 2020, Itália	Estudo transversal	Retratar a mudança no uso da mídia digital antes de ir para a cama, na qualidade e no momento do sono e na experiência subjetiva da passagem do tempo e sua relação com os níveis de depressão, ansiedade e estresse.	Aumentou o uso de mídia digital, além de um sono de baixa qualidade, tendo uma maior dificuldade para dormir, com um aumento de depressão, ansiedade e sintomatologia de estresse, associado à sensação de alongamento do tempo.
Holman e Grisham, 2020, Estados Unidos	Estudo Teórico Reflexivo	Apresentar uma reflexão teórica acerca do tempo e orientação futura sobre como as pessoas estão lidando a pandemia.	É fundamental avaliar como as experiências do tempo podem diferir entre os segmentos da população durante a pandemia. Além de examinar se os correlatos de saúde mental da alteração na percepção do tempo têm implicações para a saúde física.
Mari <i>et al.</i> , 2020, Itália	Estudo transversal	Investigar os efeitos da coabitação ocasionada pelo bloqueio COVID-19 em diferentes tipos de convivência, em várias dimensões como estresse, estratégias de enfrentamento, percepção do tempo e avaliação da qualidade da coabitação.	Ocorreu um efeito positivo dado pela presença de crianças. O confinamento direcionou a um intenso estresse, fadiga e ansiedade. O estudo é fundamental para auxiliar protocolos para reduzir o estresse e aumentar a consciência das relações de coabitação.
Fiorenzato <i>et al.</i> , 2021, Itália.	Estudo transversal	Explorar a cognição por meio de queixas subjetivas, devido à inviabilidade de realizar uma avaliação neuropsicológica objetiva durante o bloqueio.	Verificou que as queixas cognitivas incluíam sobretudo habilidades de atenção, funções executivas e orientação temporal. Em relação a percepção temporal, os resultados mostraram que os bloqueios induzem distorção expressiva ao recordar o dia, semana, mês ou hora exata.

Ogden, 2020, Reino Unido	Estudo transversal	Estabelecer como a passagem do tempo foi vivenciada durante o bloqueio da Covid-19 no Reino Unido.	Foi associado que com o aumento da idade, aumento do estresse, redução da carga de tarefas e redução da satisfação com os níveis atuais de interação social ocorreu uma desaceleração da passagem temporal. Os resultados demonstram que mudanças significativas na vida diária têm um impacto significativo na percepção temporal.
Cellini <i>et al.</i> , 2021, Itália	Estudo transversal	Descrever as mudanças no tempo e na qualidade do sono para mãe e filho e seu funcionamento emocional durante o confinamento em casa em comparação com o pré-refinamento.	Observaram mudanças significativas nos hábitos de sono das crianças durante o confinamento domiciliar, com horários mais tardios de dormir e acordar, principalmente em crianças mais velhas. Ademais, as crianças eram menos propensas a respeitar as rotinas diárias e a controlar a passagem do tempo.

A partir da análise detalhada dos artigos selecionados fica evidente a alteração da PT na população durante esse período de pandemia. O confinamento domiciliar por um período duradouro pode apresentar implicações negativas à saúde mental. (CELLINI *et al.*, 2021). Dessa forma, Ogden (2020), constatou que as medidas de distanciamento físico e social tiveram um efeito significativo na experiência das pessoas em relação à passagem do tempo em comparação com o período antes do confinamento. Isso sugere que mudanças fundamentais na vida cotidiana distorcem a experiência temporal (OGDEN, 2020; HOLMAN; GRISHAM, 2020).

Ali *et al.* (2021) relataram que para a população, o tempo está aparentemente passando mais rápido. Além de observarem dificuldade em lembrar sobre qual dia da semana era, bem como uma mudança na percepção do fluxo do tempo. Resultado semelhante foi encontrado por Cellini *et al.* (2020), ao verificarem que o período de confinamento induziu maior dificuldade de controlar o tempo, os participantes do estudo relataram dificuldade em reconhecer os dias da semana, dia do mês e hora do dia. Além de relatarem expansão de tempo durante o bloqueio. Isso se tornou mais evidente em adultos jovens (ALI *et al.*, 2021).

A idade e o nível de satisfação com a interação social foram preditivos para a velocidade relativa com que o tempo passou durante o bloqueio em comparação ao normal. Experimentar o tempo passando rapidamente durante o bloqueio estava, portanto, associado à redução da idade e ao aumento da satisfação com os níveis atuais de interação social (OGDEN, 2020). Visto que o bloqueio levou a intenso estresse, fadiga e ansiedade (MARI *et al.*, 2020). Alterações na realização de tarefas diárias, devido a mudanças nos padrões de trabalho, desemprego, parecem uma consequência corroborável, assim sendo, é possível que essas mudanças alterem a percepção temporal na população (OGDEN, 2021).

A pandemia infligiu uma suspensão duradoura nas rotinas escolares, atividades diárias e conexões com os pares, sendo um relevante fator de risco para a saúde física e mental de crianças e famílias (CELLINI *et al.*, 2021). Ogden (2021) corroborou que indivíduos de 18 a 60 anos vivenciaram o tempo de maneira comparável, entretanto as pessoas com mais de 60 anos experimentaram a desaceleração relativa da passagem do tempo durante o bloqueio, quando comparadas àquelas com menos de 60 anos. Cellini *et al.* (2021) constatou que durante a pandemia crianças em idade escolar também apresentaram alterações subjetivas em relação à PT, além de influenciar no tempo.

Ogden (2020) verificou que a maioria dos participantes relatam que a passagem do tempo pareceu distorcida durante o período de confinamento em comparação com o período antes da pandemia. Em relação ao julgamento temporal dos dias e da semana foi relatado uma alteração da PT. Diferente de outros estudos, as experiências do tempo passando mais rápido

ou mais lentamente foram divididas quase que igualmente entre aqueles que experimentaram a distorção da passagem do tempo. FIORENZATO *et al* (2021) observaram que as restrições de bloqueio impostas tiveram um efeito prejudicial sobre o funcionamento cognitivo subjetivo de sua população. Em que os participantes demonstraram queixa nas atividades que envolviam atenção, orientação temporal e funções executivas.

Além disso, com o distanciamento social e físico, a satisfação com os níveis atuais de interação social interfere diretamente na velocidade da passagem do tempo (OGDEN, 2020). Alterações na PT podem ter implicações significativas para a saúde e bem-estar da população, além de influenciar na saúde mental (HOLMAN; GRISHAM, 2020). O estresse e a carga da tarefa também afetam a passagem no julgam tempo, com o aumento da carga da tarefa e o estresse reduzido sendo associados a uma passagem mais rápida do tempo (OGDEN, 2020).

4 CONCLUSÃO

Concluimos ser necessário o planejamento de estratégias para a população sobre os efeitos negativos do COVID-19, tanto em relação as complicações para a saúde física, quanto as relacionadas à saúde mental. Estratégias que reduzam os efeitos psicológicos adversos impactados pelas restrições sociais no período pandêmico contribuem para a manutenção da saúde mental da população.

REFERÊNCIAS

- ALI, Abraish *et al*. Effects of COVID-19 pandemic and lockdown on lifestyle and mental health of students: A retrospective study from Karachi, Pakistan. **Annales Médico-Psychologiques**, [s. l.], 10 fev. 2021. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0003448721000603>>. Acesso em: 15 ago. 2021.
- CELLINI, Nicola *et al*. Changes in sleep pattern, sense of time and digital media use during COVID-19 lockdown in Italy. **Journal of Sleep Research**, [s. l.], v. 29, ed. 4, 15 maio. 2020. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32410272/>>. Acesso em: 15 ago. 2021.
- CELLINI, Nicola *et al*. Sleep and Psychological Difficulties in Italian School-Age Children during COVID-19 Lockdown. **Journal of Pediatric Psychology**, [s. l.], v. 46, ed. 2, p. 153-157, 09 jan. 2021. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33517438/>>. Acesso em: 15 ago. 2021.

FIORENZATO, Eleonora *et al.* Cognitive and mental health changes and their vulnerability factors related to COVID-19 lockdown in Italy. **Journal Plos One**, [s. l.], 27 jan. 2021.

Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33503055/>>. Acesso em: 15 ago. 2021.

HOLMAN, E. Alison; GRISHAM, Emma L. When Time Falls Apart: The Public Health Implications of Distorted Time Perception in the Age of COVID-19. **Psychological Trauma**, [s. l.], v. 12, ed. S1, 11 jun. 2020. Disponível em:

<<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32525373/>>. Acesso em: 15 ago. 2021.

MARI, Emanuela *et al.* Forced Cohabitation during Coronavirus Lockdown in Italy: A Study on Coping, Stress and Emotions among Different Family Patterns. **Journal of Clinical Medicine**, [s. l.], 01 dez. 2020. Disponível em:

<<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33272002/>>. Acesso em: 15 ago. 2021.

OGDEN, Ruth S. The passage of time during the UK COVID-19 lockdown. **Journal Plos One**, [s. l.], 6 jul. 2020. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32628735/>>.

Acesso em: 15 ago. 2021.

CAPÍTULO 11

A PERCEPÇÃO ACADÊMICA MEDIANTE O ESTUDO HÍBRIDO

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c11](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c11)

**Karem de Carvalho Baia¹, Keury dos Reis Valente², Jhessica Brenda de Souza da Silva³,
Ana Paula dos Santos Adriano⁴, Karen Silva de Castro⁵, Sivaldo Oliveira da Silva
Júnior⁶, Julyany Rocha Barrozo de Souza⁷**

¹Faculdade de Teologia, Filosofia e Ciências Humanas Gamaliel (FATEFIG), Tucuruí, Pará,
Brasil, (karencarvb@gmail.com)

²Faculdade de Teologia, Filosofia e Ciências Humanas Gamaliel (FATEFIG), Tucuruí, Pará,
Brasil, (keurydosreis@gmail.com)

³Universidade do Estado do Pará (UEPA), Tucuruí, Pará, Brasil,
(jhessicabrendass01@gmail.com)

⁴Faculdade de Teologia, Filosofia e Ciências Humanas Gamaliel (FATEFIG), Tucuruí, Pará,
Brasil, (anapaula_adr@outlook.com)

⁵Universidade do Estado do Pará (UEPA), Tucuruí, Pará, Brasil,
(silvakaren2021@gmail.com)

⁶Faculdade de Teologia, Filosofia e Ciências Humanas Gamaliel (FATEFIG), Tucuruí, Pará,
Brasil, (sivaldojunyoor13@gmail.com)

⁷ Escola Superior da Amazônia (ESAMAZ), Tucuruí, Pará, Brasil,
(julyany_rbs@yahoo.com.br)

Resumo

Objetivo: O presente exposto tem como objetivo relatar a experiência dos estudantes das Instituições de Ensino Superior, na cidade de Tucuruí-Pá, vivenciada no contexto da pandemia, analisando a qualidade do ensino e possíveis prejuízos na jornada acadêmica dos discentes por intermédio do estudo híbrido em comparação com a modalidade tradicional. **Método:** Trata-se de um estudo com abordagem qualitativa, onde foi utilizado um questionário misto, com 12 perguntas no total, das quais 04 eram objetivas e 08 subjetivas para realizar a coleta de dados. **Resultados:** Os dados apontam com predominância de que o estudo híbrido contribui sim em alguns aspectos, no que tange o desenvolvimento acadêmico. Entretanto com base nas informações dadas e pelos perfis pesquisados, observasse que mesmo com a praticidade e avanço tecnológico muitos ainda preferem o ensino totalmente presencial, pois mesmo que haja as vantagens de flexibilidade e conforto na modalidade híbrida, os desestabiliza e remove a

concentração que é voltada para as distrações casuais. **Conclusão:** Por fim, pressupõe-se que, para a instalação de um modelo de ensino híbrido, é preciso ir além da utilização de recursos digitais. É necessário um planejamento bem estruturado e adequado, com o objetivo de adaptar e fornecer subsídios tanto para os discentes quanto para o corpo docente.

Palavras-chave: Avaliação do ensino; Desempenho acadêmico; Covid-19.

Área Temática: Ciências da Saúde

E-mail do autor principal: karemcarvb@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

A atual sociedade tem uma necessidade por inovação e ao imediatismo, dessa forma a prática do ensino híbrido vem tomando espaço no meio acadêmico, sendo este intensificado no cenário pandêmico da COVID-19, visto que a principal medida de prevenção a disseminação do vírus é o distanciamento social, impactando dessa forma diretamente a educação e seu meio de propagação.

Segundo Pasini et al. (2020), a pandemia afastou os alunos presenciais, da educação básica e do ensino superior, das salas de aula trazendo uma ressignificação para a educação, momento este impensável, no qual, trouxe consigo aprendizagens emergentes como o ensino híbrido. O quadro de suspensão das aulas presenciais atingiu milhões de estudantes em todo o país, entretanto, a educação não poderia parar, sendo necessário a adaptação dos professores e alunos em relação aos instrumentos tecnológicos e suas modalidades de propagação de conhecimento.

Araújo et al. (2019) aponta que a modalidade híbrida é um método que combina a sala de aula e o ambiente virtual, com a finalidade de cooperar com o aprendizado do aluno, uma vez que a tecnologia possibilita o acesso a uma infinidade de informações de modo rápido e prático. Dessa forma, essa modalidade consegue dinamizar cenários diferenciados com o objetivo de desenvolver as capacidades dos acadêmicos com melhor aproveitamento dos conteúdos (SCHIEHL E.P. et al., 2016).

No entanto, de acordo com Mendes e Lemes (2014), os estudiosos destacam que ainda há uma lacuna entre a realidade da sala de aula presencial e a realidade digital. Sendo esta digitalização um desafio para as escolas, instigando a busca por alternativas que atendam as diversidades e mudanças educacionais e possibilite uma melhora no processo de ensino-aprendizagem.

Lima (2021) reforça a importância da dedicação, do planejamento e de uma estrutura apropriada no ensino híbrido, pois o uso das metodologias de aprendizagem pode influenciar

ou dificultar a participação ativa do estudante, interferindo no conhecimento de novas experiências e recursos fornecidos durante o período pandêmico. Diante disso, o presente exposto tem como objetivo relatar a experiência dos estudantes das Instituições de Ensino Superior, na cidade de Tucuruí-Pá, vivenciada no contexto da pandemia, analisando a qualidade do ensino e possíveis prejuízos na jornada acadêmica dos discentes por intermédio do estudo híbrido em comparação com a modalidade tradicional.

2 METODOLOGIA

Tipo de estudo

O presente estudo é de abordagem quali-quantitativa, que têm por preocupação o ponto de vista do indivíduo: a primeira considera a proximidade do sujeito, por exemplo, por meio da entrevista; na segunda, essa proximidade é medida por meio de materiais e métodos empíricos (KNECHTEL, 2014). Esse tipo de abordagem foi escolhido em razão de a mesma favorecer diferentes interpretações, já que os resultados são baseados nas experiências das pessoas com diferentes pontos de vista acerca do ensino híbrido.

Quanto aos objetivos, é de cunho descritivo, que é um tipo de pesquisa que tem como principal finalidade a descrição de algo, seja um evento, fenômeno ou fato (OLIVEIRA; PONTES; BARBOSA, 2006), ainda segundo esses autores o estudo descritivo pode ser utilizado em pesquisas com amostras não probabilísticas.

Amostra

A amostra total é constituída de 20 estudantes do Ensino Superior dos cursos de Enfermagem e Odontologia, da Faculdade de Teologia e Filosofia e Ciências Humanas Gamaliel, bem como da Universidade do Estado do Pará, e alunos dos cursos de Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Estado do Pará localizados no município de Tucuruí-PA, e participantes do curso de Biomedicina da Universidade do Estado do Pará. A amostragem escolhida foi não probabilística, do tipo amostra proporcional, que “inclui elementos com proporções similares de pessoas com as mesmas características” (OLIVEIRA, 2001).

Instrumento de colheita de dados

O instrumento técnico elaborado pelos pesquisadores para realizar a coleta de dados foi a criação de um questionário misto, com 12 perguntas no total, das quais 04 eram objetivas e 08 subjetivas, que foram feitas a fim de saber as vantagens e desvantagens na modalidade de ensino híbrido na perspectiva dos alunos, idade e qual instituição e curso faziam parte. A coleta de dados foi realizada de forma online por meio da plataforma digital Google Formulários, com veiculação por meio de redes sociais durante o mês de agosto de 2021.

Análise dos dados

Para análise dos dados foi utilizada o método de análise temática, que segundo Braun e Clark (2006) “é um método para identificar, analisar e relatar padrões dentro dos dados. Ela minimamente organiza e descreve o conjunto de dados em detalhes”, utilizada abordagem dedutiva. A análise ocorreu em seis etapas, são elas: 1. Avaliação dos dados: realizado leitura minuciosa dos dados com apontamento das ideias iniciais, 2. Criação de códigos iniciais: foi feita a reunião dos dados importantes dos participantes, 3. Buscando temas, 4. Revisando temas, 5. Definição dos temas: Foram definidas as seguintes temáticas: (a) perfil acadêmico dos participantes da pesquisa; (b) dificuldades apresentadas pelos participantes. (c) perspectiva dos acadêmicos sobre a modalidade do ensino híbrido, e por fim a fase 6. Escrever o relatório. Para o agrupamento dos dados quantitativos foram utilizadas a tabulação simples dos dados para posterior criação dos gráficos que passaram por análise do tipo porcentagem, realizado de forma manual.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Contextualização dos participantes

Figura 1. Gráfico Perfil dos participantes

Fonte: Pesquisa 2021.

Conforme apresentado no gráfico, 80% dos participantes (n=20) pertence ao sexo feminino e os outros 20% dos participantes (n=5) ao sexo masculino. A faixa etária dos acadêmicos varia entre 17 e 38 anos, tendo maior prevalência de indivíduos com 21 anos (n=5) e 24 anos (n=5).

No que se refere a graduação dos participantes, 14 (56%) cursam Enfermagem e 3 (12%) Odontologia na Faculdade de Teologia e Filosofia e Ciências Humanas Gamaliel (FATEFIG), 2 (8%) cursam Enfermagem e 1 (4%) Biomedicina na Universidade do Estado do Pará (UEPA), 2 (8%) cursam Engenharia Mecânica, 2 (8%) Engenharia Elétrica e 1 (4%) Engenharia Sanitária e Ambiental na Universidade Federal do Pará. Tais dados evidenciam uma amostra mesmo que pequena das diversas perspectivas entre os participantes, com a diversidade de instituições públicas e privadas, e seus diversos cursos.

3.2 Dificuldades apresentadas pelos participantes

Figura 2. Gráfico Aspectos de desenvolvimento apresentados pelos participantes

Fonte: Pesquisa 2021.

Os dados apontam com predominância de que o estudo híbrido contribui sim em alguns aspectos, no que tange o desenvolvimento acadêmico, os resultados foram baseados nos seguintes aspectos apresentados no gráfico, estes como, aumento de produtividade, melhoria da interpretação das informações, facilidade de organização das informações ministradas como

material de estudo aulas gravadas entre outros artifícios educacionais, mensurações em cerca de 13 a 14 votos (56%), dentre os participantes acredita ser vantajosa a modalidade de ensino híbrida, pois esta proporciona mais liberdade na forma do estudo, não exigindo obrigatoriamente a presença destes mesmos indivíduos a um local de estudo fixo e específico. Os apresentando novas formas e maneiras de viabilizar seus estudos em horários mais flexíveis ao seu dia.

Entretanto com base nas informações dadas e pelos perfis pesquisados, observa-se que mesmo com a praticidade e avanço tecnológico muitos ainda preferem o ensino totalmente presencial visto que, a mudança de rotina abrupta ocasionada em detrimento do cenário pandêmico da COVID-19, que por medida de segurança tiveram que ser adaptadas em todas as instituições de ensino assim, os participantes alegaram que mesmo com as vantagens de flexibilidade e conforto os desestabiliza e remove a concentração que é voltada para as distrações casuais, trajados do argumento de que a sala de aula é fundamental para o desenvolvimento e reiterar os benefícios do modelo de estudo presencial os dados coletados na pesquisa demonstram no gráfico 3 que a preferência em sua grande parte é pelo ensino presencial não excluindo os benefícios do ensino híbrido.

3.3 Perspectiva dos acadêmicos sobre a modalidade do ensino híbrido.

Figura 3. Gráfico Modelos de ensino abordados.

Fonte: Pesquisa 2021.

O grupo participante apresentou uma maior afinidade com o modelo de ensino ao qual estão habituados sendo de 82,6% dos votos para o modelo presencial e apenas 8,7% para o modelo híbrido, alegando que as dificuldades apresentadas estão relacionadas a concentração durante o estudo e as diversas distrações que os acometiam, retratando que em sala de aula sentem-se mais focados e com a atenção voltada diretamente ao aprendizado e seu desenvolvimento, além de não possuírem material adequado para o ensino híbrido, como falta de computador e acesso à internet adequado para o estudo, acarretando atraso no desenvolvimento destes alunos.

Sendo assim, a dificuldade apresentada em conciliar a prática e a teoria evidencia que o ensino híbrido traz uma percepção diferente da realidade, visto que muitos dos procedimentos, explicados teoricamente, necessitam da prática atrelada para exemplificar com fidelidade a realidade, que em sala de aula pode ser vista e realizada pelos discentes de forma palpável, e além disso as dificuldades observadas com relação a rotina que fica mais atribulada segundo os participantes com a perda da antiga rotina de estudo já formulada em sala de aula presencialmente, fator desestimulante, com base na pesquisa realizada.

O contato físico e direto do aluno com professor possibilita o aumento da concentração e atenção voltada ao que está sendo estudado, uma vez que permite também a interação em grupo e a socialização deste estudante no âmbito social, possibilitando a troca de experiências e a participação em metodologias de ensino e aprendizagem que visam contribuir com a formação profissional (COSTA et al., 2014).

4 CONCLUSÃO

Diante a pesquisa, pode-se certificar que o ensino híbrido se mostrou relevante na formação acadêmica dos discentes entrevistados, principalmente no cenário pandêmico, pois proporciona maior liberdade, flexibilidade e autonomia na forma de estudar. Entretanto, os mesmos ainda preferem a modalidade de estudo totalmente presencial, visto que promove mais estabilidade, constância e contato pessoal e prático, colocando a sala de aula como ferramenta fundamental para o desenvolvimento mais efetivo dos alunos.

Ademais, a falta de infraestrutura adequada prejudica a execução desta forma de ensino, demonstrando uma lacuna entre a ideia e a realidade como Mendes e Lemes apontou em sua pesquisa. Além disso, quando se trata de cursos que demandam mais práticas e contato interpessoal como da área da saúde, a realização dessa modalidade inovadora torna-se ainda mais distante, mesmo com todo avanço tecnológico.

Por fim, pressupõe-se que, para a instalação de um modelo de ensino híbrido, é preciso ir além da utilização de recursos digitais. É necessário um planejamento bem estruturado e adequado, com o objetivo de adaptar e fornecer subsídios tanto para os discentes quanto para o corpo docente e incorporação no contexto escolar, sem esquecer das necessidades imprescindíveis que cada curso de formação pede.

REFERÊNCIAS

ARAUJO, Adriano Rodrigues De et al. Ensino híbrido na universidade: a visão do estudante de licenciatura em matemática. **Anais VI CONEDU**. Campina Grande: Realize Editora, 2019. Disponível em: <https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/60287>. Acesso em: 25 ago. 2021.

BRAUN, Virginia; CLARKE, Victoria. Using thematic analysis in psychology. **Qualitative research in psychology**, v. 3, n. 2, p. 77-101, 2006.

CASTRO, E.A. et al. Ensino híbrido: desafio da contemporaneidade?. **Periódico Científico Projeção e Docência**. v.6, n.2, 2015. ISSN: 2178-6275. Disponível em: <http://revista.faculdadeprojecao.edu.br/index.php/Projecao3/article/view/563/505>. Acesso em: 25 ago. 2021.

COSTA, V. M. F., Schaurich, A., Stefanan, A., Sales, E., & Richter, A. Educação a distância x Educação Presencial: como os alunos percebem as diferentes características. In: **ESUD-XI - Congresso Brasileiro de Ensino Superior a Distância**. Florianópolis, 2014. ISSN 2237-5996 Disponível em: <http://esud2014.nute.ufsc.br/anais-esud2014/> Acesso em: 25 ago. 2021.

LIMA, J. R. R. A implementação do ensino híbrido no período pós-pandemia. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [s. l.], v. 7, n. 2, p. 10, 2021. DOI: <https://doi.org/10.51891/rease.v7i2.667>.

MENDES, S. M. C.; LEME, M. E. G. A Mediação Pedagógica: formação docente para a educação inclusiva frente às novas tecnologias. Brazilian Journal of Technology, Communication, and Cognitive Science - Edição nº 2, Ano II - Agosto 2014. In: **Anais do I Encontro Internacional Tecnologia, Comunicação e Ciência Cognitiva**, São Paulo, 2014. Disponível em: http://revista.teccog.net/index.php/revista_teccog/article/download/29/43. Acesso em: 25 ago. 2021.

OLIVEIRA, T.M.V. de. Amostragem não probabilística: adequação de situações para uso e limitações de amostras por conveniência, julgamento e quotas. 2001. **Administração online**, v. 2, n. 3, 2017. ISSN 15177912 Disponível em: https://gvpesquisa.fgv.br/sites/gvpesquisa.fgv.br/files/arquivos/veludo_-_amostragem_ao_probabilistica_adequacao_de_situacoes_para_uso_e_limitacoes_de_amost ras_por_conveniencia.pdf. Acesso em: 14 ago. 2021.

OLIVEIRA, Marcelle Colares; PONTE, Vera Maria Rodrigues; BARBOSA, João Victor Bezerra. Metodologias de pesquisa adotadas nos estudos sobre Balanced Scorecard. *In: Anais do Congresso Brasileiro de Custos-ABC*. 2006. Disponível em:

<https://anaiscbc.emnuvens.com.br/anais/article/view/1701>. Acesso em: 14 ago. 2021

PASINI, C. G. D.; CARVALHO, E.; ALMEIDA, L.H. C. A educação híbrida em tempos de pandemia: algumas considerações. *In: Observatório Socioeconômico da COVID-19 (OSE)*. 2020. Disponível em:

https://www.osecovid19.cloud.ufsm.br/media/documents/2021/03/29/Textos_para_Discussao_09_-_Educacao_Hibrida_em_Tempos_de_Pandemia.pdf. Acesso em: 25 ago. 2021.

SCHIEHL, Edson Pedro et al. Contribuições do Google Sala de Aula para o Ensino Híbrido. **CINTED-UFRGS**. V. 14 No 2, dezembro, 2016. DOI: <https://doi.org/10.22456/1679-1916.70684>.

STAKE, Robert E. **Pesquisa Qualitativa**: estudando como as coisas funcionam. São Paulo: Penso, 2011. 263 p. Disponível em:

[_legado_S_STAKE_Robert_E_Pesquisa_Qualitativa_Como_Coisas_Funcionam_Liberado_Cap_01.pdf](#) Acesso em: 14 ago. 2021.

SILVA, J. B.; SILVA, D. O.; SALES G. L. Modelo de ensino híbrido: a percepção dos alunos em relação à metodologia progressista x metodologia tradicional. **Revista Conhecimento Online**. Novo Hamburgo. a. 10, v. 2. jul./dez. 2018. DOI:

<https://doi.org/10.25112/rco.v2i0.1318>

CAPÍTULO 12

A PRÁTICA DO SERVIÇO SOCIAL NO SEIO DA POLÍTICA DE REDUÇÃO DE DANOS

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c12](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c12)

Clarice Bezerra¹, Diego Freitas da Silva², Geisa de Moraes Santana³

¹Universidade Federal do Rio Grande do Norte/ UFRN, claricebezerraa@outlook.com

²Universidade Federal do Rio Grande do Norte/ UFRN, diegofreitas0204200@gmail.com

³Universidade Estadual do Piauí/ UEPI, geisasantana97@gmail.com

Resumo

O presente estudo tem como objetivo realizar uma breve análise e questionamento acerca das políticas públicas existentes quando a Lei 11.343/06 e compreender a importância do debate das drogas e sua política de enfrentamento, além da compreensão do fazer profissional do Serviço Social frente essa política. Para obtenção dos resultados o estudo foi fundamentado em ideias e pressupostos de teóricos que apresentam significativas contribuições na definição e construção dos conceitos discutidos nesta análise. Concluindo-se que a Política de Redução de Danos conquistou grandes avanços no campo da saúde e dos Direitos Humanos, garantindo o direito da população usuária de drogas ao um tratamento digno e não punitivo. Porém mesmo inserido no contexto de saúde pública brasileira, as ações estabelecidas pela Política Nacional de Redução de Danos para muitos ainda é um barreira, um entrave para a sua prática e reconhecimento.

Palavras-chave: Redução de Danos; Serviço Social; Direitos.

Área Temática: Ciências Sociais Aplicada.

E-mail do autor principal: claricebezerraa@outlook.com

1 INTRODUÇÃO

No que diz respeito ao uso de drogas, o cenário brasileiro evidencia um crescente aumento de uso de substâncias psicoativas ilícitas e ainda não muito expressivas no âmbito das práticas profissionais do Serviço Social. Discutir sobre a atuação do profissional do Serviço Social nas políticas públicas sobre drogas faz necessário questionar o que se compreende por

Estratégias de Redução de Danos.

Nesse contexto ainda faz necessário maior exploração na temática, assim explorando mais as Políticas Sociais e do Serviço Social, focalizando o intuito de conhecer as estratégias de Redução de Danos, analisando as práticas e implicações das ações na garantia de direitos. É evidente que as questões que são relacionadas a substâncias psicoativas que ao longo das transformações sociais, o tratamento dos usuários vem sofrendo alterações.

Ao longo do tempo e diante as transformações da sociedade, questões relacionadas ao uso de substâncias, principalmente psicoativas, vêm sofrendo alterações no que diz respeito à compreensão e tratamento de usuários. O cenário brasileiro evidencia um crescente aumento do uso dessas substâncias, no entanto ainda não muito expressivo no âmbito das práticas profissionais do Serviço Social. Para discutir sobre a atuação do profissional de Serviço Social nas políticas públicas sobre drogas, se faz necessário questionar o que se compreende por Estratégia de Redução de Danos.

Assim, para responder esses questionamentos, esta pesquisa traz a temática em pauta sobre a redução de danos para fumantes (seja de fumo legal ou ilegal) como forma de explicitar, entender e responder sobre a importância do Assistente Social enquanto garantidor de direitos para estes sujeitos, dado o entendimento e reconhecimento de cidadãos portadores de direitos que independem da condição de usuários de drogas.

Diante disso, esse trabalho tem como objetivo analisar as práticas dos Assistentes Sociais quanto à redução de danos e riscos para usuários de drogas na perspectiva da garantia de direitos desses sujeitos.

2 MÉTODO

Para obtenção dos resultados e respostas acerca da problematização apresentada neste trabalho, foi realizado uma pesquisa exploratória descritiva, com bases em revisões bibliográfica por meio de trabalhos acadêmicos, artigos, livros disponíveis nas plataformas digitais, tais como google academico, scielo e outros periodicos.

Assim sendo, o trabalho transcorre a partir do método conceitual-analítico, visto que se utilizaram conceitos e ideias de outros autores, semelhantes com os objetivos aqui postos, para a construção de uma análise científica sobre o objeto de estudo.

O método de pesquisa escolhido favoreceu uma liberdade na análise de se mover por diversos caminhos do conhecimento, possibilitando assumir várias posições no decorrer do percurso, não obrigando atribuir uma resposta única e universal a respeito do objeto, principalmente por se tratar de algo que até o momento foi pouco debatido e disseminado

enquanto estudo e pesquisa.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Um Resgate Histórico Sobre Drogas e o Proibicionismo no Brasil

Desde as primeiras civilizações foram estabelecidas regras sociais para o uso, produção e distribuição de substâncias psicoativas. Segundo Ribeiro & Araújo (2006), a partir do século XVI com as Grandes Navegações, a Europa teve contato com imensa quantidade de substâncias psicoativas que aos poucos foram sendo inseridas no Velho Mundo. As consequências desta inserção foram diversas, um exemplo foi a chegada do álcool destilado e o surgimento de bebidas com teor alcoólico mais concentrado que repercutiu na saúde pública europeia e americana. Com a industrialização e o processo de exclusão social urbana somado aos altos índices de alcoolismo dos trabalhadores, aumentou também os casos de transtornos psíquicos, problemas clínicos e sociais para estes sujeitos. O mesmo se deu quando, originado das Américas, o uso do tabaco foi popularizado.

E exatamente por essa razão que as regulamentações acerca da produção, uso e comercialização de substâncias psicoativas passam a se tornar caso de saúde pública, especialmente a partir do século XIX.

Ainda de acordo com Ribeiro & Araújo (2006), o surgimento das primeiras políticas públicas que contemplavam as consequências do uso abusivo de drogas, falava a respeito ao alargamento da noção de saúde pública e ao descobrimento de comorbidades associadas ao uso de drogas. Assim, no final do século XIX e no início do século seguinte que um movimento de cunho proibicionista em relação ao uso de determinadas drogas começa a se compor. Os Estados Unidos passa a ser uma grande potência de referência mundial e o pensamento cristão ocidental, amplamente aceito nos diversos setores da sociedade norte-americana e europeia, condena, assim como sempre condenou, o consumo de drogas por entender uma ligação aos rituais pagãos.

Nisso, aliado a psiquiatria contemporânea e o descobrimento que algumas substâncias levavam o usuário à dependência, passa-se a atribuir o uso abusivo de drogas a degradação moral do indivíduo. Isso associa ao usuário dessas substâncias a uma imagem de demonizada, violenta, degradante a amoral e atribuições de aspectos negativos a personalidades destes.

Foi durante o século XX que o consumo de drogas tomou amplitude mundial e propôs mais atenção dos governos porque junto com o vasto consumo acompanharam as atividades mercantis e assim, na contramão do crescimento do consumo e venda, começam as campanhas proibicionistas de forma oficial. No entanto, trata-se de uma prática de restrições pautadas sob

visão moral e política, que encontra assim um aporte legal para se concretizar. Com base mais em preceitos raciais, econômicos, políticos e morais do que de fato científicos. Isso acaba servindo bem mais as grandes indústrias bélicas e farmacêuticas do que propriamente a sociedade (Carvalho et al, 2008).

No final da I Guerra Mundial (1914 -1918), surge a Liga das Nações que em seus encontros discute as possibilidades de repressão ao comércio de determinados psicoativos, como os de maior destaque a cocaína e ópio. Assim, através de decretos, algumas substâncias foram sendo proibidas, tendo autorização para uso apenas para tratamento clínico. E 25 anos depois é criada a Organização das Nações Unidas – ONU, em 1945. Então nesse espaço de tempo, parte das discussões sobre as drogas deu lugar a tensão política que culminou na II Guerra Mundial (1939 -1945). A volta ao debate em relação a oferta, consumo e produção de psicoativos reafirmou a repressão como melhor saída para a problemática das drogas, com os Estados Unidos como matiz ideológica que sustentava tal posicionamento (Ribeiro & Araújo, 2006).

Em contrapartida a conjuntura estabelecida na II Guerra Mundial fez com que uma parcela considerável da sociedade norte-americana e, sobretudo, europeia, se movimentasse e organizasse pela radicalização de direitos sociais e liberdades individuais extintos pelas práticas nazifascistas. Isso proporcionou a retomada do alto consumo de drogas, principalmente na área urbana, sendo compreendido como um direito individual que precisava ser respeitado. No entanto a ONU trabalha na contramão dessa ideologia.

Porém com a retomada intensificada do uso de drogas, observado em movimentos como os Híppies, na década de 1950, os países signatários da ONU começam a se reunir em convenções, depois conhecidas como convenções-irmãs, responsáveis pelo controle do uso, produção e distribuição de drogas. E o Brasil, signatário da ONU, aderiu ao comportamento dos Estados nacionais no enfrentamento da problemática das drogas quanto ao combate, assim como a política norte-americana que serviu de embasamento para consolidação de das definições legais no país.

Assim, surge no Brasil a primeira lei que trata especificamente do controle do uso e da venda de drogas no país – Lei 6.368/76. Essa lei estabelecia as obrigações e as condições as quais o usuário deveria ficar sujeito, inclusive reafirmando o senso-comum do usuário como dependente químico e criminoso. Apenas em 2006. O congresso nacional revogou as leis supracitadas e sancionou a Lei 11.343 que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - SISNAD; que prevê medidas para a prevenção do uso indevido, atenção e

reinserção social de usuários e dependentes de drogas, mas continua proibicionista estabelecendo normas para a repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas.

3.2 REDUÇÃO DE DANOS COMO ESTRATÉGIAS

Silva e Pio (2009), afirmam que o programa de Redução de Danos, surge como política oficial na Inglaterra em 1926, que consistia em uma Lei que dava aos médicos o direito de prescrição aos pacientes adictos de heroína, nos casos onde fosse comprovado que era benéfico para tal. Mas

só por volta de 1984 na Holanda, que a Redução de Danos de fato se efetiva como política pública de saúde, onde visava o controle do crescente número de casos de hepatite entre os usuários de drogas injetáveis. De acordo com o Ministério da Saúde,

Redução de danos pode ser definida como “uma estratégia da saúde pública que visa reduzir os danos à saúde em consequência de práticas de risco”. As ações de redução de danos são consideradas como medidas prioritárias para atuação junto aos usuários de drogas, devendo ser desenvolvidas pelas três esferas de governo e também pelas organizações da sociedade civil. (BRASIL)

A discussão acerca da Redução de Danos se desencadeia na Inglaterra em 1926, com o Relatório de Rolleston definido por um grupo de médicos, reconhecido como o marco para a discussão da RD. Onde estabelecia para os médicos o direito de prescrição de substâncias derivadas do ópio aos sujeitos que eram dependentes químicos, sendo reconhecido que a maneira mais adequada para o tratamento de dependente de Heroína e Morfina era haver uma administração monitorada dessas substâncias, como o objetivo de viabilizar a esses sujeitos uma qualidade de vida estável, assim podendo obter uma vivência mais benéfica (CRUZ, 2011; PASSOS; SOUZA, 2009)

A redução de Danos assumi na década de 1980, um caráter de cunho do movimento político como forma de resposta do alarmante índice de infecção pelo vírus HIV/AIDS nos usuários de drogas injetáveis a Holanda inicia as práticas da RD onde suas principais estratégias era a troca de seringas entre os usuários das drogas injetáveis. Em 1984 na Holanda, é implementado o primeiro programa de trocas de seringas, além das práticas de terapia com os usuários de substituição de drogas e capacitações para os agentes redutores de danos e criações das salas de uso, onde os usuários tinham informações/orientação acerca do uso das drogas e suas consequências, e materiais adequado e esterilizado para um uso seguro assim diminuindo o risco de contaminação naquele momento. (RIBEIRO E ARAÚJO, 2006)

No Brasil a Redução de Danos é adotada como estratégias no ano de 1989, em São Paulo, como alternativa para uma construção de um programa de intervenção integrada, trazendo como ações a promoção a saúde, conscientização e informações sobre o uso de drogas e seus riscos, e atendimentos. Em 2003, o Ministério da Saúde lança a Política de Atenção Integral a Usuários de Álcool e outras Drogas, passando a RD ser reconhecida como estratégias para o tratamento junto dos usuários de drogas, ratificando que a abstinência não é o único e exclusivo caminho nos serviços\tratamento que visam tratar a questão das drogas:

A abstinências não pode ser, então, o único objetivo a ser alcançado. Aliás, quando se trata de cuidar de vidas humanas, termos de, necessariamente, lidar com as singularidades, com as diferentes possibilidades e escolhas questão feitas. As práticas de saúde, em qualquer nível de ocorrência, devem levar em conta esta diversidade. Devem acolher, sem julgamento, o que em cada situação, com cada usuário, é possível, o que é necessário, o que está sendo demandado, o que pode ser ofertado, o que deve ser feito, sempre estimulando a sua participação e o seu engajamento. (BRASIL, 2014:11)

Assim, podemos levar em consideração que os programas começam a focalizar seus trabalhos na prevenção, orientação, tratamento e assistência aos usuários, trazendo medidas que objetivam a minimização dos danos resultantes do uso de drogas. Assim os usuários que não queiram, não conseguem ou que ainda não possam interromper o uso das substâncias psicoativas, ainda assim terão acesso a informação e interação nas atividades que tendem a reduzir os danos derivado do uso. Levando em consideração que o usuário pode ou não atingir a abstinência.

Vale salientar que não podemos confundir a redução de danos com o incentivo às drogas, pois a redução de danos tem o papel fundamental de contribuir para a geração de informações acerca dos riscos, danos, direitos para que indivíduo possa assim fazer suas escolhas e ter consciência da sua inserção social no contexto de garantia de direitos e cidadania. assim ser universal e equitativo, devendo atender as necessidades dos seus usuários como um todo.

Pimenta (2005) ratifica que com a Redução de Danos implementada no Brasil, possibilitou ter significativos avanços, relacionados a saúde como também no campo dos Direitos Humanos, para além das promoções de leis que vem a garantir o direito da população usuária de drogas ao tratamento contra a dependência de forma digna e não punitiva. Porém mesmo inseridas no contexto da saúde pública brasileira, as ações estabelecidas pela Política Nacional de Redução de Danos para muitos profissionais da saúde ainda mesmo que

relativamente ainda fazem parte de uma política nova perante as ações cotidianas destes profissionais, assim dificultando a utilização das práticas e do reconhecimento das estratégias válidas ao cuidado dos usuários. (Morera, Padilha & Zeferino, 2015).

A redução de Danos, visa que com o desenvolvimento das ações seria ideal que os usuários não fizessem uso de drogas, mas se essa prática não for possível que seja feita de forma que venha acarretar menores riscos possíveis. (MARLATT, 1999; NADELMANN, 1999)

De acordo com Marlatt (1999), os princípios básicos da redução de danos são:

- 1. A redução de danos é uma alternativa de saúde pública para os modelos moral/criminal e de doença do uso e da dependência de drogas;*
- 2. A redução de danos reconhece a abstinência como resultado ideal, mas aceita alternativas que reduzam os danos;*
- 3. A redução de danos surgiu principalmente como uma abordagem “de baixo para cima”, baseada na defesa do dependente, em vez de uma política “de cima para baixo” promovida pelos formuladores de políticas de drogas;*
- 4. A redução de danos promove acesso a serviços de baixa exigência como uma alternativa para abordagens tradicionais de alta exigência;*
- 5. A redução de danos baseia-se nos princípios do pragmatismo empático versus idealismo moralista. (Marlatt 1999, p.46)*

Podemos afirmar, que a partir do exposto anteriormente que o princípio central da RD é o respeito à vida e à liberdade de escolha, onde possibilita que sua execução seja apoiada na promoção do exercício e respeito às diferenças, possibilitando o acesso à dignidade e cidadania, tendo umas abordagens de caráter humanitário com aqueles que se encontram em situação de maiores riscos, atuando assim de forma preventiva diretamente ligada às populações que ainda não foram atingidas pelas drogas, priorizando pela vida\qualidade de vida, responsabilidade social, pela saúde, mais do que pela punição decorrentes desses comportamentos julgados inadequados.

3.3 As Práticas Do Assistente Social Na Redução De Danos E Riscos Como Estratégia Para Fumantes Seja De Substâncias Lícitas Ou Ilícitas

De acordo com Petry (2005), o entendimento das competências do profissional do serviço social perpassa pelas dimensões teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-política, baseado em um projeto ético-político sempre na busca de qualificação das ações, assim proporcionando ao usuário um atendimento adequado e de qualidade.

É primordial estabelecer um contínuo repensar dos saberes e práticas profissionais, sempre amparadas pelas mudanças sociais constantes, frente às contradições inerentes à questão

social. Sendo um profissional responsável pela transformação das condições de vulnerabilidade por partes dos usuários de drogas e criação de condições para uma atuação competente, de forma crítica, investigativa e de compreensão da realidade.

Nesse contexto valem destacar a exposição de Petry, 2005 apud Kowalsky (1997), que acrescenta:

É necessário que se invista em profissionais qualificados, que entendam tanto do efeito das drogas no organismo como das suas implicações sociais, pois muitos ainda tendem a se “preocupar” apenas com o aspecto social numa ótica e na outra apenas o biológico, e acabam não compreendendo o movimento das drogas no organismo humano. Em um contexto familiar e social de uma maneira totalizante, ressaltamos que todo o profissional deve estar sempre buscando uma compreensão tanto em relação aos aspectos causais no organismo humano, bem como as suas implicações sociais. (PETRY apud KOWALSKY, 1997, p.24).

A prática profissional do Assistente Social no contexto da política de Redução de Danos, se faz necessária a compreensão das políticas públicas voltadas para esse grupo, a promoção e articulação no que diz respeito a ampliação de cobertura de direitos desses usuários, atendendo o contexto político e socioeconômicos. A intervenção do Serviço Social nesta política deve ser pautada nas ações intersetoriais, com o fim de responder efetivamente as problemáticas e vulnerabilidade de um determinado grupo.

Ao profissional, faz-se necessário a compreensão acerca das políticas direcionadas aos usuários de drogas, para conhecer e dialogar com a política que está sendo articulada e ainda com as demais políticas que perpassam no atendimento a esses sujeitos, além da promoção de articulações intencionadas na garantia e efetivação dos direitos dos usuários. Atentando e analisando o contexto socioeconômico, e para as peculiaridades da comunidade atendidas.

Fonseca e Bastos (2005) aponta que os principais desafios no que perpassam o enfrentamento da política de redução de danos: Resistências políticas à implantação de políticas de RD; segmentos da sociedade civil que atuam no tratamento da dependência química contrários à RD, ainda que esse diálogo tenha melhorado nos últimos anos; Necessidade de intensificar as discussões com instâncias/instituições que trabalham com o uso de drogas e educação; interface com outras populações (presidiários, profissionais do sexo, garimpeiros); Baixa cobertura das ações. Por exemplo, apenas 20 dos 62 municípios com maior número de casos de Aids pertencentes à categoria de exposição UDI, contam com projetos de RD (FONSECA E BASTOS 2005 p. 301).

4 CONCLUSÃO

Durante a pesquisa foi possível compreender que a redução de Danos ainda hoje apesar da sua discussão ser bastante importante nos dias atuais, principal sobre o que diz respeito ao aumento do uso de substâncias psicoativas, ainda existem grandes desafios para ser posta em práticas, tal como a fragilidade das redes de atendimentos que devem ofertar tais serviços. Ainda sobre a redução de danos foi possível compreender que as propostas impostas vêm enfatizando a valorização de liberdade, de autonomia de livre escolha, a necessidade de ampliação acerca do debate, principalmente no quesito do aumento expressivo do uso de tais substâncias na contemporaneidade, e que existe uma grande compressão de cada caso de forma individualizada, pois cada sujeito tem sua singularidade condizentes para a problemática do uso de drogas, é de extrema importância a ampliação do debate que contempla essa temática.

Foi possível perceber que o Programa de redução de danos caminha ainda em pequenos passos, apesar da eminente discussão sobre o crescente aumento do uso de substâncias psicoativas, como desafio para a política aponta a fragilidade da rede de serviços do SUS. Procurou-se centralizar algumas ações pautadas na dimensão teórico-metodológica e técnico-operativa que tem pouca expressão no âmbito das práticas do Serviço Social, as publicações que se remetem ao tema, sobretudo as políticas públicas voltadas ao enfrentamento do uso de drogas, estão em fase de aprimoramento onde a questão social assume novas roupagens e o Serviço Social também sofre com esses novos impactos de uma sociedade que apresenta demandas cada vez, mas contraditórias, exigindo a quebra das práticas rotineira e burocráticas.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. **Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996**. Brasília, jul. 1996. Disponível em: Acesso em: 23 mar 2019.

BRASIL. **A contribuição dos estudos multicêntricos frente à epidemia de HIV/AIDS entre usuários de drogas injetáveis no Brasil: 10 anos de pesquisa e Redução de Danos**. Brasília: Ministério da Saúde - Secretaria de Políticas de Saúde - Coordenação de DST e Aids, 2001a.

BRASIL, Ministério da Saúde. **ESTRATÉGIAS PARA O CUIDADO DA PESSOA COM DOENÇA CRÔNICA: o cuidado da pessoa tabagista**. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2015

BRASIL, **Política de Atenção Integral a usuários de Alcool e Outras Drogas**. Ministério da Saúde, 2004.

CFESS. **Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Política de Saúde**. Brasília: Conselho Federal de Serviço Social, 2010.

FONSÊCA, C. Conhecendo a redução de danos enquanto uma proposta ética. **Psicologia & Saberes**, v.1 n.1, p.11-36, 2012.

IAMAMOTO, Marilda Villela. **O Serviço Social na cena contemporânea. In: Serviço Social: direitos sociais e competências profissionais**. Brasília, 2009. (Publicação do Conselho Federal de Serviço Social – CFESS e Associação Brasileira de ensino e Pesquisa em Serviço Social – ABEPS. V. 1)

JUNQUEIRA L. A. P. **A gestão intersetorial das políticas sociais e o terceiro setor**. Revista Saúde e Sociedade, v. 13, n. 1, p. 25-36, jan./abr. 2004.

MARLATT, G. A. **Redução de danos: Estratégias práticas para lidar com comportamentos de alto risco**. Trad. Daniel Bueno. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999.

MATOS, Maurílio Castro de. **Cotidiano e ética no exercício profissional dos assistentes sociais nos serviços de saúde**. In: Cotidiano, Ética e Saúde: O Serviço Social frente à contra-reforma do Estado e à criminalização do aborto. (Tese) São Paulo: PUC, 2009. (Cap. 2 p. 160-189).

MOTA, Ana Elizabete. **Espaços ocupacionais e dimensões políticas da prática do assistente social**. 7º Seminário Anual de Serviço Social. Serv. Soc. Soc. – Cortez Editora: São Paulo, n. 120, 2014. p. 694-705.

OLIVEIRA, Maria Júlia Inácio de e SANTO, Eniel do Espírito. **A relação entre os determinantes sociais da saúde e a questão social**. In: Caderno de saúde e desenvolvimento. Vol. 2 n. 2, 2013.

PIMENTA, C. Redução de danos: direito à saúde e à prevenção ao HIV/AIDS. In. **Revista da Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids**, ago. 2005.

RIBEIRO, M. M. & ARAÚJO, M. R. **Política Mundial de Drogas Ilícitas: Uma reflexão Histórica**. In: Panorama Atual de Drogas e Dependências. Org. Silveira D. X. Moreira, F. G. 1ª edição. São Paulo: Editora Atheneu, 2006.

CAPÍTULO 13

A RELEVÂNCIA DA ODONTOLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES ONCOLÓGICOS

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c13](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c13)

Gabrielle Holanda Silva¹, Allan Francisco Costa Jaques², Ellen Amanda Silva de Santana³, Hellen Ferrari de Castro⁴, Herika Karollynne Costa Lima⁵, Isabella Pulino Padilha⁶, Rafael Mendonça Santana Corrêa⁷, Rosa Raquel Pinto Guedes Marques⁸, Zildenilson da Silva Sousa⁹, Ana Cláudia da Silva Araújo¹⁰.

¹Universidade Federal de Pernambuco, (gabrielleholanda84@gmail.com)

²Universidade Federal de Pernambuco, (allanjaques1@gmail.com)

³Universidade Federal de Pernambuco, (amaandasilva001@gmail.com)

⁴Universidade Nove de Julho, (hellenferraricastro@icloud.com)

⁵Centro Universitário Tiradentes, (herikacosta20@outlook.com)

⁶Universidade Nove de Julho, (be.pulino@gmail.com)

⁷Universidade Salgado de Oliveira, (rafaelionarasakua@gmail.com)

⁸Universidade Federal Fluminense, (rosa.raquel.marques@gmail.com)

⁹Centro Universitário Maurício de Nassau, (zildenilsonsilva@gmail.com)

¹⁰Universidade Federal de Pernambuco, (acsaodonto@gmail.com)

Resumo

Objetivo: revisar a literatura referente às complicações bucais decorrentes do tratamento oncológico na região de cabeça e pescoço, assim como enfatizar a importância do cirurgião-dentista na equipe de atendimento aos portadores de neoplasias malignas e correlacioná-las com a qualidade da saúde oral do paciente. **Método:** Foi realizado um estudo descritivo, tipo reflexivo para subsidiar a compreensão acerca das complicações bucais decorrentes do tratamento oncológico na região de cabeça e pescoço, fundamentado na análise e interpretação da literatura existente no período de julho a agosto de 2021 utilizando os descritores em saúde (DeCs): Manifestações bucais, neoplasia e tratamento oncológico de forma combinada com o uso do operador Booleano AND. Os critérios de inclusão foram os artigos publicados dentro do recorte temporal de 2015 a 2021, que estavam disponíveis na íntegra e em português nas bases de dados citadas. Trabalhos que não tiveram uma metodologia clara e fundamentada foram excluídos. **Resultados:** A presença de um dentista na equipe multidisciplinar de apoio ao paciente oncológico é fundamental, devido às necessidades bucais apresentadas por esses pacientes. Alguns autores mostraram que os efeitos colaterais orais da quimioterapia são os

mais devastadores no curto e longo prazo precisamente por causa do efeito sobre as ações humanas mais básicas, como comer e se comunicar. Os efeitos adversos graves são a principal causa de interrupção das sessões de radioterapia, fato que repercute negativamente no benefício terapêutico esperado dessas intervenções. **Conclusão:** A inclusão de dentistas na equipe de oncologia é de suma importância para o atendimento ao paciente em todos os estágios da doença. Pacientes com câncer requerem cuidados bucais específicos e devem ser monitorados antes, durante e após o tratamento anticâncer para minimizar os efeitos deletérios da quimioterapia e radioterapia e melhorar sua qualidade de vida.

Palavras-chave: Manifestações bucais; Neoplasia; Tratamento oncológico.

Área temática: Ciências da Saúde

E-mail do autor principal: gabrielleholanda84@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

As doenças crônicas não transmissíveis (DNTs) representam um problema de saúde global e uma ameaça para a saúde e o desenvolvimento humano (CALMON et al., 2016). O câncer refere-se a um conjunto de mais de 100 doenças caracterizadas pelo crescimento desordenado de células, que podem invadir tecidos e órgãos localizados em qualquer parte do corpo (BARBIERI et al., 2020).

Dividindo-se rapidamente, essas células tendem a ser muito agressivas e incontroláveis, determinando o desenvolvimento de neoplasias malignas que persistem de maneira excessiva. As neoplasias de cabeça e pescoço representam um sério problema de saúde pública por sua expressiva incidência e mortalidade (MELO et al., 2020).

É relatado por Barbieri et al. (2020) que as estratégias para o tratamento de doenças malignas são complexas e de diferentes tipos, podem ser realizados individualmente ou em combinação. Dados da literatura mostram que cerca de 40% dos pacientes oncológicos apresentam complicações bucais agudas decorrentes da toxicidade direta ou indireta, como mucosite, xerostomia, infecções fúngicas, virais ou bacterianas. (SASADA et al., 2015).

Entre as condutas terapêuticas para o tratamento de neoplasias localizadas na região de cabeça e pescoço, destaca-se a radioterapia e a quimioterapia, que visa a destruição de células neoplásicas e a inibição de sua proliferação. Ambas as modalidades de tratamento trazem inúmeros efeitos colaterais, visto que não afetam exclusivamente as células tumorais (BARBIERI et al., 2020). A evolução dos protocolos quimioterápico e radioterápico no tratamento das neoplasias tem determinado um aumento progressivo nos índices de cura (SASADA et al., 2015).

É necessário ressaltar, ainda, que os efeitos colaterais que envolve a cavidade oral e a sua severidade estão relacionados à quimioterapia, à radioterapia, ao tipo e à localização do tumor e, ainda, às condições de saúde bucal (BARBIERI et al., 2020). Caso o paciente apresente uma saúde bucal desfavorável, conseqüentemente, apresentará também, um risco maior de desenvolver complicações que podem comprometer as funções sistêmicas durante os períodos de imunossupressão induzidos pela quimioterapia.

Além disso, as manifestações orais associadas à quimioterapia são influenciadas por fatores, incluindo o tipo, dosagem, duração e cronograma de administração de agentes quimioterápicos (DE OLIVEIRA et al., 2016). As alterações podem ser locais e imediatas, como ocorre em casos de tumores na região de cabeça e de pescoço tratados com radioterapia, ou podem ser difusas nos casos de pacientes que recebem quimioterapia e radioterapia (BARBIERI et al., 2020).

Na quimioterapia, alguns medicamentos parecem estar diretamente ligados a redução do potencial mitótico do epitélio da mucosa bucal. Nesse sentido, a diminuição na renovação celular do epitélio pode resultar em atrofia e / ou ulceração da mucosa oral seguido por inflamação (ARAÚJO et al., 2015).

A preparação de um plano de tratamento detalhado e abrangente para pacientes submetidos à quimioterapia contra câncer de cabeça e pescoço é essencial para ajudar a minimizar os riscos de o paciente desenvolver complicações orais decorrentes desse tipo de terapia (MELO et al., 2020).

A toxicidade direta e indireta dos agentes antineoplásicos pode causar dor, mucosite, dificuldades para mastigação e deglutição, disfunções glandulares e alterações no paladar. Diante dessas condições o estado nutricional do paciente pode ser comprometido, prejudicando a recuperação, a evolução do tratamento e, muitas vezes, causando o atraso nos ciclos subsequentes de quimioterapia ou nas sessões de radioterapia (BARBIERI et al., 2020).

Assim, diante do exposto, objetivamos com esse capítulo revisar a literatura referente às complicações bucais decorrentes do tratamento oncológico na região de cabeça e pescoço, assim como enfatizar a importância do cirurgião-dentista na equipe de atendimento aos portadores de neoplasias malignas e correlacioná-las com a qualidade da saúde oral do paciente.

2 METÓDOS

Este trabalho trata-se de um estudo descritivo, tipo reflexivo para subsidiar a compreensão acerca das complicações bucais decorrentes do tratamento oncológico na região

de cabeça e pescoço, fundamentado na análise e interpretação da literatura existente sobre a temática nas bases de dados eletrônica da U.S. National Library of Medicine (PUBMED) e Scientific Electronic Library Online (SCIELO) no período de julho a agosto de 2021, utilizando os descritores em saúde (DeCs): Manifestações bucais, neoplasia e tratamento oncológico de forma combinada com o uso do operador Booleano AND. Ressalta-se que a busca foi direcionada para localizar os termos combinados nos títulos ou nos resumos dos trabalhos científicos. Os critérios de inclusão foram os artigos publicados dentro do recorte temporal de 2015 a 2021, que estavam disponíveis na íntegra nas bases de dados citadas. Trabalhos que não tiveram uma metodologia clara e fundamentada foram excluídos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A presença de um dentista na equipe multidisciplinar de apoio ao paciente oncológico é fundamental, devido às necessidades bucais apresentadas por esses pacientes (SOUTO; SANTOS; CAVALCANTI, 2019). Com o objetivo de obter a cura / controle no tratamento paliativo do câncer, procedimentos cirúrgicos, tratamento de quimioterapia ou radioterapia são frequentemente usados. Cada uma dessas terapias atua de maneira diferente, de modo que cirurgia é restrita ao local do tumor, às vezes causando limitações funcionais e estéticas (MACÊDO et al., 2019).

Um estudo do tipo transversal descritivo realizado por Araújo et al. (2015) consistiu na avaliação de 73 pacientes que foram acometidos por algum tipo de neoplasia maligna e que estavam em tratamento quimioterápico, foi observado que 77,3% desses pacientes apresentaram xerostomia e 22,7% apresentaram mucosite. Durante a terapia antineoplásica, elementos dentários comprometidos, muitas vezes com bordas afiadas, facilitam a perda da integridade da mucosa e consequente infecção, além de processos inflamatórios que acometem polpa pode ser exacerbada (MACÊDO et al., 2019).

Os efeitos adversos graves são a principal causa de interrupção das sessões de radioterapia, fato que repercute negativamente no benefício terapêutico esperado dessas intervenções. Portanto, o envolvimento do cirurgião-dentista na concepção e prática desses protocolos de manejo dentário em pacientes com câncer é tão importante. O controle das condições bucais desfavoráveis antes do tratamento é fator de proteção e condiciona a continuidade e o sucesso terapêutico (GARCIA et al., 2017).

Recentes estudos relatam que a mucosa bucal pode ser diretamente afetada pela quimioterapia. Os fármacos podem apresentar ação direta na mucosa bucal por meio da circulação sanguínea, ou indiretamente, pela secreção das substâncias quimioterápicas pela

saliva (ARAÚJO et al., 2015). A busca por agentes de proteção contra os efeitos nocivos do tratamento contra o câncer continua a ser um desafio para cirurgias orais (BARBIERI et al., 2020).

Alguns autores mostraram que os efeitos colaterais orais da quimioterapia são os mais devastadores no curto e longo prazo precisamente por causa do efeito sobre as ações humanas mais básicas, como comer e se comunicar (CALMON et al., 2016). Um estudo realizado por Hanna et al. (2016) avaliou as manifestações orais em pacientes leucêmicos pediátricos por meio de exame clínico dos componentes estruturais da cavidade oral sendo as principais alterações orais decorrentes da quimioterapia: mucosite, xerostomia, candidíase, alteração do paladar, sangramento nas gengivas, herpes labial, disfagia e dor de dente.

Além disso, Vasconcelos et al. (2009) APUD Martin et al. (2020) concluem que “a terapia antineoplásica pode influenciar a maturidade dentária, interferindo em sua formação e ausência de desenvolvimento de raízes”. Complicações orais concomitantes ao manejo do câncer com radioterapia torna a manutenção da saúde bucal um desafio ao longo da vida para os pacientes (GARCIA et al., 2017).

Os dados obtidos em prontuários mostraram que 83,3% das crianças possuíam registro de alguma manifestação oral, isolada ou em combinação, durante o tratamento. As manifestações mais prevalentes foram mucosite (73,3%), sangramento gengival (30%), infecções herpesvirais (26,7%), candidíase (23,3%) e parotidite (10%) (DE OLIVEIRA et al., 2016). A mucosite pode causar limitações da fala, levar ao isolamento social, problemas nutricionais e enfraquecer os pacientes em geral. Em alguns casos é necessária uma interrupção do tratamento para permitir a mucosa oral para recuperar (CALMON et al., 2016).

A literatura revela vários protocolos para o tratamento da mucosite oral, como o uso de laser de baixa intensidade, enxaguatórios bucais com digluconato de clorexidina ou bicarbonato de sódio, uso sistêmico de analgésicos ou opiáceos, nos casos de mucosite intensa, e anestésicos para uso tópico. O tratamento é baseado nos sintomas, ou seja, uma abordagem terapêutica paliativa com o objetivo de minimizar o desconforto do paciente (MACÊDO et al., 2019).

Além disso, um estudo realizado na população chinesa apresentou que 78% dos pacientes relatavam xerostomia ao administrar antineoplásico. A literatura sugere que a quimioterapia pode alterar, quantitativo e fluxo qualitativo salivar e os componentes da saliva, como a amilase salivar e IgA. Tal fato, pode aumentar a viscosidade e reduzir o fluxo salivar com a consequente sensação de boca seca, bem como predisposição a candidíase oral e disfagia. E, em consequência disso, há um aumento na incidência de infecções bucais por microrganismos (ARAÚJO et al., 2015).

Avaliação e monitoramento constante da higiene bucal e saúde bucal é de extrema importância em pacientes em tratamento para leucemia. Outra importante intervenção é educar, orientar e encorajar os pacientes, seus familiares e a equipe de enfermagem manter um padrão satisfatório de higiene bucal, a fim de prevenir ou minimizar o risco de manifestações orais do tratamento antineoplásico e melhorar a qualidade de vida do paciente (ARAÚJO et al., 2015).

Alterações morfológicas do esmalte e das raízes dos elementos dentários (taurodontia, hipodontia, microdontia, hipoplasia, raízes curtas), sangramento gengival, mucosites, xerostomia e desenvolvimento dentário tardio são evidências que demonstram a importância do acompanhamento multidisciplinar do paciente (MARTINS et al., 2020).

A exposição da mucosa bucal aos medicamentos parece contribuir para o aparecimento de patologias como mucosite, xerostomia e sangramento gengival. O tipo e o grau de malignidade do tumor, bem como a dose dos medicamentos utilizados e a duração da quimioterapia parecem ser fatores determinantes para a severidade das complicações bucais (ARAÚJO et al., 2015).

Segundo Araújo et al. (2015), alguns autores têm demonstrado que a mucosite acomete uma porcentagem grande dos pacientes sob tratamento quimioterápico, contudo, ainda há uma grande discussão sobre as taxas de prevalência dessa lesão nos pacientes em terapia anticâncer. A variação em relação ao manejo, bem como os critérios de diagnóstico utilizados para identificar a mucosite parecem ser um fator complicador na aquisição de dados fidedignos sobre a prevalência da lesão e sua associação com os agentes quimioterápicos. Todavia, tal patologia é considerada uma das mais comuns entre as desordens orais associadas aos medicamentos anticâncer.

É desafio para o cirurgião-dentista atuar em hospitais através da promoção da saúde, prevenção, tratamento de doenças bucais e redução de danos decorrentes de hospitalização. Conhecimento, experiência, interação e integração com a equipe médica fornece a garantia dos melhores cuidados orais e sistêmicos adequados para pacientes hospitalizados (MACÊDO et al., 2019).

O profissional de Odontologia, bem como os médicos oncologistas, devem estar cientes destes dessas complicações bucais decorrentes do tratamento quimioterápico para que, assim, possam ajudar os pacientes (MELO et al., 2020).

4 CONCLUSÃO

Conclui-se que a inclusão de dentistas na equipe de oncologia é de suma importância para o atendimento ao paciente em todos os estágios da doença. Pacientes com câncer requerem

cuidados bucais específicos e devem ser monitorados antes, durante e após o tratamento anticâncer para minimizar os efeitos deletérios da quimioterapia e radioterapia e melhorar sua qualidade de vida.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, T. L. C., *et al.* Manifestaciones orales en pacientes sometidos a quimioterapia. **Revista Cubana Estomatologia**, [S.l.], v. 52, n. 4, p. 16-21, jun. 2015. Disponível em: <<http://www.revestomatologia.sld.cu/index.php/est/article/view/832/218>>. Acesso em: 12 jul. 2021

BARBIERI, T., *et al.* Current alternatives in the prevention and treatment of xerostomia in cancer therapy. **Rgo - Revista Gaúcha de Odontologia**, [S.l.], v. 68, p. 1-12, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rgo/a/YV4zRXyjLHW5TpW5BW3SXJF/?lang=en>. Acesso em: 12 jul. 2021.

CALMON, M., *et al.* Impact of Oral Problems on the Quality Of Life of Women Subjected To Chemotherapy for Breast Cancer: a longitudinal study. **Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clínica Integrada**, [S.l.], v. 16, n. 1, p. 269-278, 2016. Disponível em: Acesso em: <http://revista.uepb.edu.br/index.php/pboci/article/view/3002/pdf>. Acesso em: 12 jul. 2021.

DE OLIVEIRA, M. C., *et al.* Manifestações orais em pacientes pediátricos que recebem quimioterapia para leucemia. **Stomatos**. Canoas, v. 22, n. 43, p. 20-30, Jul./Dez. 2016. 2020. Disponível em: <http://www.periodicos.ulbra.br/index.php/stomatos/article/view/2987/2231>. Acesso em: 12 jul. 2021.

GARCIA, H. G. L., *et al.* Manifestaciones bucales por radioterapia en pacientes geriátricos con cáncer de cabeza y cuello. **Revista Cubana Estomatologia**, Ciudad de La Habana, v. 54, n. 4, p. 1-11, dic. 2017. Disponível em: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75072017000400002&lng=es&nrm=iso. Acesso em: 12 jul. 2021.

HANNA, Lmo *et al.* Oral Manifestations and Salivary pH Changes in Children undergoing Antineoplastic Therapy. **Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clínica Integrada**, [S.l.], v. 16, n. 1, p. 403-410, 2016. Disponível em:

<http://revista.uepb.edu.br/index.php/pboci/article/view/3081/pdf>. Acesso em: 12 jul. 2021.

MACÊDO, T. S., *et al.* Hospital and oncological dental care: a series of cases. **Rgo - Revista Gaúcha de Odontologia**, [S.l.], v. 67, p. 2-7, 2019. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rgo/a/VXYPSK58Kv6pLT3sT7fwkpg/>. Acesso em: 12 jul. 2021.

MARTINS, E. S., *et al.* Agravos bucais e desenvolvimento da dentição em pacientes com leucemia - Revisão Integrativa. **Journal of Health & Biological Sciences**, [S.l.], v. 8, n. 1, p.1-9, 2020. Disponível em: <https://periodicos.unichristus.edu.br/jhbs/article/view/2953>.

Acesso em: 12 jul. 2021.

MELO, T. V.; *et al.* Papel da odontologia no atendimento a pacientes oncológicos em quimioterapia. **Ações Que Ampliam O Acesso e A Qualidade na Atenção Odontológica**, [S.l.], p. 152-167, 3 nov. 2020. Disponível em:

<https://www.researchgate.net/publication/346667659>. Acesso em: 12 jul. 2021.

SASADA, I. N. V., *et al.* Prevenção de intercorrências estomatológicas em oncologia pediátrica. **Revista da Faculdade de Odontologia - Upf**, [S.l.], v. 20, n. 1, p. 105-109, 28 jul. 2015. Disponível em: <http://seer.upf.br/index.php/rfo/article/view/4861>. Acesso em: 12 jul. 2021.

SOUTO, K. C. L.; SANTOS, D. B. N.; CAVALCANTI, U. D. N. T., Dental care to the oncological patient in terminality. **Rgo - Revista Gaúcha de Odontologia**, [S.l.], v. 67, p. 1-5, 2019. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rgo/a/WtjVqmRHNCRzKwrYNMhwFZM/?lang=en>. Acesso em: 12 jul. 2021.

CAPÍTULO 14

A SAÚDE MENTAL E USO DE MÍDIAS SOCIAIS EM TEMPOS DE PANDEMIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c14](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c14)

Nathália Alves Marques¹, Maria Clara Goncalves², Janete Laurentino dos Santos³
Walbelânia da Silva Andrade⁴ **Danielly Soares Diniz**⁵ **Danyelle Dayse de Souza Diniz**⁶
Erijackson de Oliveira Damião⁷ **Valdecir Carneiro da Silva**⁸ **Ardigleusa Alves Coêlho**⁹

¹ Universidade Estadual da Paraíba, (alves7360277@gmail.com)

² Universidade Estadual da Paraíba, (maclaramosg@gmail.com)

³ Faculdade Novo Horizonte, (janlaurentino@gmail.com)

⁴ Universidade Estadual da Paraíba, (walberlaniaandrade1994@gmail.com)

⁵ Universidade Estadual da Paraíba, (daniellysdiniz@hotmail.com)

⁶ Universidade Estadual da Paraíba, (danyellednz@gmail.com)

⁷ Universidade Estadual da Paraíba, (ariano.enfermagem@gmail.com)

⁸ Universidade Estadual da Paraíba, (valdecircarneir@gmail.com)

⁹ Universidade Estadual da Paraíba, (ardigleusacoelho@gmail.com)

Resumo

Objetivo: relatar as ações extensionista acerca do cuidado em saúde mental executadas durante a pandemia do novo coronavírus no ano de 2020. **Método:** Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência sobre a vivência dos extensionistas no projeto "A promoção da saúde no contexto da atenção psicossocial" e as atividades, realizada no quarto ano do Projeto, durante o ano de 2020. O projeto é vinculado a extensão universitária da Universidade Pública Estadual em Campina Grande-PB, que envolveu 3 docentes e 6 discentes do curso Graduação em Enfermagem. As atividades planejadas para execução presencial, foram replanejadas para o formato online, via rede social devido a pandemia da Covid-19. A opção pela modalidade online via Instagram visava construir novas possibilidades de cuidado em saúde mental, além de permitir a interação e a participação do público, através das próprias ferramentas do aplicativo. **Resultados:** A partir do aplicativo Instagram, foram divulgadas publicações semanais, sendo elas, tutoriais para produção de trabalhos manuais, dicas de leituras, exercícios para auxiliar no alívio do estresse e de autocuidado, meditação, respiração guiada, autoavaliação e técnicas artísticas com foco no cuidado em saúde mental em tempos de pandemia e de isolamento social.

Considerações Finais: a oferta de atividades, através de redes sociais, possibilitou atingir usuários em sofrimento psíquico e outros públicos. As atividades realizadas em ambiente digital apresentaram pontos positivos e satisfatórios no estímulo a práticas de cuidado, traduzido no número de seguidores, de visualizações e dos depoimentos deixados pelos seguidores da página. O uso das redes sociais, pode ser é um reinventar para o fazer da promoção da saúde de forma dinâmica e tende a atrair o público-alvo e principalmente para disseminação de conhecimento sobre processo saúde-doença, contudo é imprescindível o compromisso ético com as informações publicadas.

Palavras-chave: Saúde Mental; COVID-19; Mídias Sociais.

Área Temática: Ciências da Saúde.

E-mail do autor principal: alves7360277@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

A pandemia do novo coronavírus modificou os espaços, no ano de 2020, na medida em que restrições sociais foram impostas em vários países para diminuir o contágio e o número de mortes causada pela doença (SCHAEFER, *et al.*, 2020).

O empenho para a contenção da disseminação do COVID-19, inicialmente, utilizou de medidas como higiene das mãos, uso de máscaras e de medidas restritivas que proporcionou a redução do contato social e consequentemente, ocasionou impactos na saúde mental e no bem-estar dos indivíduos que podem até postergar para além da pandemia (ORBEN, TOMOVA, BLAKEMORE, 2020). Por conseguinte, o sistema de educação que era presencial foi suspenso e substituído pelo modo remoto tanto em escolas quanto Universidades, similar ao modelo de Educação a Distância (EAD) (CASTIONI, *et al.*, 2021).

Neste sentido, diversas instituições de ensino superior seguindo as orientações da OMS, a fim de reduzir a disseminação do vírus, suspenderam suas atividades acadêmicas presenciais, bem como qualquer ação que promovesse a aglomeração de pessoas (BRANDÃO, 2020), fazendo com que muitas atividades fossem exercidas de forma virtual pelos docentes e alunos.

Os projetos de extensão universitária foram uma das atividades realizadas de forma remota, tendo em vista o vasto acesso à internet e as várias possibilidades de transmitir informações, especialmente nesse período, que segundo Palácio e Takenami (2020), “tem promovido oportunidades para a rápida distribuição de informações em tempo real e isso fortalece a cooperação humanitária no combate à afecção”, e também pode reduzir o sentimento de solidão e isolamento, ocasionados pelas medidas sanitárias, em especial as redes sociais, que ajudaram a superar o estresse, o trauma e também possibilitou a socialização entre pessoas (SALTZMAN, HANSEL, BORDNICK, 2020).

Nesse contexto, a extensão universitária assume relevância na produção do conhecimento, ao promover um elo entre as pesquisas científicas e a sociedade, tornando-se um dos meios singulares para a promoção de atividades em educação em saúde (GROSSI, *et al*, 2021).

Assim, o projeto de extensão, “a promoção da saúde no contexto da atenção psicossocial” ressignificou a sua prática adotando a mídia social como canal de disseminação de conteúdos voltados ao público em geral, principalmente os discentes da instituição de ensino a qual o projeto estava vinculado e demais pessoas interessadas em tema relacionados a promoção da saúde mental em tempo de pandemia, mediante a propagação de conteúdo informativo e didático com a finalidade de reduzir os impactos negativos causados pelas restrições sociais

Dessa forma, o presente artigo objetivou relatar as ações extensionista acerca do cuidado em saúde mental executadas durante a pandemia do novo coronavírus no ano de 2020.

2 MÉTODO

Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência abordando a vivência dos extensionistas do projeto "a promoção da saúde no contexto da atenção psicossocial" sobre as atividades realizadas em formato online durante o ano de 2020.

O projeto é vinculado a extensão universitária de uma Universidade Pública Estadual localizada em Campina Grande-PB e envolve 3 docentes e 6 discentes do curso de Graduação em Enfermagem.

Iniciado em 2018, o projeto utilizou uma abordagem pedagógica humanística de Carl Rogers (ROGER, 1974; ZIMRING, 2010) e problematizadora conciliar a arte na construção de saberes e práticas para promoção de saúde.

Desde o primeiro ano do projeto até o terceiro, houve a incorporação de atividades de artes no processo de cuidar em saúde mental enquanto estratégia para nortear a subjetividade dos usuários em sofrimento psíquico e a utilização da arte e a cultura como forma de inclusão social do usuário com sofrimento psíquico e sua família, assim como, permitir o envolvimento do corpo docente e o discente no cuidado em saúde mental de modo a minimizar o estigma e o preconceito, reforçando o vínculo entre universidade, serviço e comunidade mediante troca de saberes e práticas. Contudo, no quarto ano do Projeto, as atividades propostas não puderam ser executadas presencialmente, devido a pandemia da Covid -19 e foram modificadas para o formato online, via rede social (*Instagram*).

O *Instagram* do Projeto - @incluart – INCLUIR COM ARTE-UEPB havia sido criado no ano II do projeto como um espaço para dar visibilidade da produção artística do grupo. Assim, o grupo de professores e alunos envolvidos no projeto reuniram-se e reorganizaram as

atividades que consistia em publicações visando nortear o público a cuidar da saúde mental em tempos de pandemia e de isolamento social, as quais foram divulgadas no *Instagram* do projeto.

As atividades realizadas foram planejadas quinzenalmente de forma coletiva pelos docentes e alunas, através de videoconferência, definindo-se temas e responsável pela elaboração da publicação, que era feita a cada 15 dias no *feed*. As imagens em *story* foi uma atividade conjunta de todo o grupo, fazendo um levantamento tanto dos livros que poderiam ser sugeridos quanto os aplicativos a serem indicados aos usuários.

A seleção e indicação de livros e/ou aplicativos considerou os seguintes critérios: o livro deveria ter sido lido previamente e o aplicativo usado pelos envolvidos no projeto. Para seleção dos temas foi realizada um levantamento pelo grupo dos tópicos relacionados à promoção do cuidado da saúde mental e editados de forma prática e clara frisando as formas de enfrentamento dos impactos negativos decorrente da pandemia. Todo o material proposto para publicação nas páginas do Instagram era enviado para o grupo avaliar a qualidade do conteúdo em relação ao tema proposto e somar mais alguma informação, se necessário.

Para a elaboração das artes gráficas foram usados os aplicativos para dispositivos *android*, Canva e *Inshot*. Optou-se por eles devido ao seu fácil manuseio e serem gratuitos, assim todos do grupo poderiam ajudar na elaboração.

O recurso de *story* foi escolhido para publicar dicas literárias, aplicativos que ajudam no alívio da ansiedade entre outros por ser um dos mais usados pelos usuários da rede social, devido a interatividade e de rápida visualização.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A execução das atividades do projeto se deu pelo uso do canal de mídias sociais, em particular via *Instagram*, pois além de ser um veículo de expressão e organização (FORTE e PIRES, 2020), é uma forma de ampliar a promoção e cuidado a um público geral, que se encontrava vulnerável mediante ao processo de isolamento. É válido destacar que este canal já era usado pelo grupo, contudo servia apenas para a divulgação dos trabalhos artesanais que eram feitos nas oficinas pelos usuários, com a pandemia, houve então essa mudança de abordagem tanto de conteúdo quanto de direcionamento do público.

No Quadro 1, observa-se que foram realizadas 21 publicações, sendo elas 4 vídeos, 15 *storys*, 2 postagens em foto no *feed* entre junho de 2020 e novembro do ano de 2020

Quadro 1 – Formato, conteúdo, alcance e período de divulgação das produções no Instagram @incluart, Campina Grande, 2020.

Formato	Conteúdo das Publicações	Alcance	Mês
Story	Dica de leitura: 12 regras para a vida de Jordan B. Peterson	132	Junho
Story	Dicas de leitura: O poder do hábito de Charles Duhigg.	63	Julho
Vídeo	Dicas de alongamento para aliviar o estresse	148	Julho
Story	Dicas de leitura: Em busca de Sentido de Viktor Frankl	50	Julho
Story	Livro: Pais e Filhos de Ivan Turguêniev	43	Julho
Vídeo	Tutorial: marcador de página de feltro	94	Julho
Story	Dicas de leitura: O velho e o mar de Ernest Hemingway	56	Agosto
Story	Sondagem popular: “Como cuidar da saúde mental em tempos de pandemia. Vamos interagir!”	56	Agosto
Story	Sondagem popular: “Como cuidar da saúde mental em tempos de pandemia. Vamos interagir! (Respostas)”	40	Agosto
Vídeo	Tutorial: porta lápis	74	Agosto
Story	Dica de aplicativo: Medite.se	60	Agosto
Story	Dica de aplicativo. Cíngulo: Terapia guiada	51	Setembro
Story	Dica de aplicativo. Yoga I Down Dog	44	Setembro
Vídeo	Vídeo sobre setembro amarelo. Mês de conscientização sobre o suicídio.	78	Setembro
Story	Dica de aplicativo: Fabulous: Motive-me	31	Setembro
Story	Dica de aplicativo. DailyArt	38	Setembro
Story	Dica de aplicativo.: Querida Ansiedade	23	Outubro
Foto em Feed	Mensagem sobre o outubro rosa, dedicado a conscientização do câncer de mama.	7	Outubro
Story	Dica de aplicativo. Be Okay	34	Outubro
Story	Dica de aplicativo. Rootd – Alívio da ansiedade	31	outubro
Foto em Feed	Mensagem sobre o novembro azul, dedicado a conscientização do câncer de próstata.	5	novembro

Fonte: Autores. * Dados de acesso em Julho/2021.

A temática central abordada nos *posts* foi promoção da saúde mental em tempo de pandemia cujos temas contemplavam o autocuidado, técnicas de relaxamento, mensagens motivacionais, dicas de leitura e ainda a tutoriais para execução de artesanato (Quadro 1).

É válido citar também, que os envolvidos no projeto buscaram agregar profissionais de outras áreas para que pudessem, através de vídeos, expor um pouco da sua prática como medida de enfrentamento das situações vivenciadas no período de isolamento social. Assim, uma acadêmica do curso de fisioterapia, demonstrou, por meio de um vídeo, técnicas de alongamento a fim de evitar a tensão muscular, de modo a fomentar uma prática colaborativa e interprofissional (CECCIM, 2018)

A oferta de atividades, por meio de redes sociais, em substituição às oficinas terapêuticas presenciais, possibilitou atingir outro tipo de público. De certo modo, esse veículo se tornou um ponto chave para a propagação de informações no período da pandemia, tornando-se um

ótimo *locus* para a ampliação de medidas prevenção e promoção de saúde mental (MUNHOZ *et al.*, 2021), uma vez que o *Instagram*, é um das redes sociais mais utilizadas no mundo chegando a registrar mais de 1 bilhão de usuários ativos por mês (STATISTA, 2021, tradução nossa).

Um ponto positivo às mudanças de foco de atuação do projeto destaca-se as habilidades das alunas participantes do projeto no uso da rede social, o que potencializou o manuseio dos aplicativos escolhidos para a elaboração das artes gráficas, bem como ajudou na expansão da página do projeto, pois puderam compartilhar com outros usuários a fim de que o perfil tivesse uma maior visibilidade; isso foi notório no aumento de seguidores.

Contudo a ampliação trouxe vários desafios no que se refere a escolha dos temas a serem abordados, a acessibilidade, para que todos pudessem compreender de forma clara, a interatividade, deixar as postagens mais atrativas aos seguidores e aumentar o alcance para outros de forma que se expandisse a outras pessoas para que pudessem ser beneficiadas com o conteúdo.

Quanto à mudança da linguagem, isso foi crucial na elaboração do conteúdo que deveria ser acessível, pois as redes sociais contam com um público heterogêneo, contudo sem tirar o foco que era transmitir a informação da promoção da saúde mental. Sem dúvidas, o grande desafio aos extensionistas foi a adaptar a linguagem acadêmica a mensagens claras, diretas e práticas, bem como o seu formato que deveria ser atrativo e dinâmico. Em consonância com CARVALHO, *et al* (2021) em que:

"Os processos de divulgação dos conteúdos científicos são essenciais e indispensáveis no momento atual, e necessitam ser mais eficientes para desencadear na população uma ação integradora do conhecimento e, consequentemente, a aplicação de estratégias assertivas e corretas".

Neste ponto também pode se acrescentar a dinâmica do conteúdo, à medida que, as publicações deveriam serem atrativas de forma visual a fim de terem maior engajamento do público. Foi nítido que vídeos e *story*, por serem mais animados, tiveram maior número de visualizações que as publicações em texto. Mostra-se assim que nesse formato alcança-se um maior público e deve ser mais utilizado.

Mediante feedback dos seguidores em *story*, de forma anônima, sobre o conteúdo publicado percebe-se significativas proposição para a melhoria do perfil do projeto na rede social e sua contribuição em um momento tão singular como vivenciado em tempos de pandemia:

*Sugestão: buscar promover o autocuidado e o incentivo a fazer o que gosta
Não é uma dúvida, só pra dizer que eu li um dos livros que vocês postaram e amei <3
Exercícios tem salvado minha quarentena, alivia o estresse e ocupa a mente
Parabéns pelo conteúdo, ansiosa por mais dicas e tutoriais.*

4 CONCLUSÃO

O uso da internet e de redes sociais, vem se tomando um grande espaço e aliado à promoção da saúde, principalmente no atual cenário em que o projeto foi operacionalizado, diante das limitações ocasionadas pela pandemia.

Assim, com a reinvenção da atuação do projeto de extensão em tela, foi possível contribuir, através do estímulo e do incentivo a realização de atividades, no auxílio no autocuidado, alívio do estresse, e consequentemente, no cuidado da saúde mental, bem como na descontração e entretenimento dos usuários.

Embora tivessem desafios a serem superados, a oferta de atividades, através de redes sociais, possibilitou atingir usuários em sofrimento psíquico e outros públicos e o cumprimento dos objetivos iniciais do projeto, que é a promoção da saúde mental, extremamente necessária para atenuar os efeitos do isolamento social. As atividades realizadas em ambiente digital apresentaram pontos positivos e satisfatórios no estímulo a práticas de cuidado, traduzido no número de seguidores, de visualizações e dos depoimentos deixados pelos seguidores da página.

O uso das redes sociais, pode ser é um reinventar para a prática da promoção da saúde de forma dinâmica, pois tende a atrair muito mais fácil o público-alvo e, principalmente para disseminação de conhecimento sobre processo saúde-doença, contudo é imprescindível o compromisso ético com as informações publicadas.

REFERÊNCIAS

- BRANDÃO, T. Instituições de ensino superior da Paraíba decidem suspender atividades acadêmicas até o dia 12 de abril. **UEPB**, 2020. Disponível em: <<https://www.uepb.edu.br/instituicoes-de-ensino-superior-da-paraiba-decidem-suspender-atividades-academicas-ate-o-dia-12-de-abril/>> Acesso em: 17 de jul. de 2021.
- CARVALHO, L. D. R de et al. Uso das mídias sociais como estratégia para o auxílio no combate ao covid-19 em estabelecimentos produtores de alimentação: um relato de experiência. **Revista Extensão & Sociedade**, v. 12, n. 1, 2020. Suplemento.
- CASTIONI, R et al. Universidades federais na pandemia da Covid-19: acesso discente à internet e ensino remoto emergencial. **Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação**, v. 29, n. 111, 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0104-40362021002903108>>. Acessado 17 jul. 2021
- CECCIM, R. B. Conexões e fronteiras da interprofissionalidade: forma e formação. **Interface - Comunicação, Saúde, Educação** [online], , v. 22, n. 2, 2018. Suplementos. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/icse/a/XRJVNsrHcqfsRXLZ7RMxCks/?lang=pt#>> . Acessado 30 ago.2021
- FORTE, E. C. N.; PIRES, D. E. P de. Nursing appeals on social media in times of coronavirus. **Revista Brasileira de Enfermagem** [online], v. 73, 2020. Suplemento 2. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/0034-7167-2020-0225>>. Acesso em: 17 de jul. de 2021
- MUNHOZ, T. N et al. A utilização de mídias digitais para divulgação do conhecimento científico sobre saúde mental durante a pandemia do Covid-19. **Expressa Extensão**, v. 26, n. 1, p. 182-192, 2021. Disponível em:<<https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/expressaextensao/article/view/19667>> Acesso em 19 de jul. de 2021
- ORBEN, A.; TOMOVA, L.; BLAKEMORE, S. J. “The effects of social deprivation on adolescent development and mental health”. **The Lancet. Child & adolescent health**, v. 4, n. 8, p. 634-340, 2020. Disponível em:<<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7292584/>>. Acesso em : 17 de jul. de 2021

PALÁCIO, M. A. V.; TAKENAMI, I. Em tempos de pandemia pela COVID-19: o desafio para a educação em saúde. **Vigilância Sanitária Debate**, Paulo Afonso, v. 8, n. 2, p. 10 - 15, 2020.

Disponível em: <<https://visaemdebate.incqs.fiocruz.br/index.php/visaemdebate/article/view/1530/1147>> Acesso em 29 de jul. de 2021

ROGERS, C. **Liberdade para aprender**. 3 ed. Belo Horizonte, Interlivros, 1974.

SALTZMAN, L. Y.; HANSEL, T. C.; BORDNICK, P. S. Loneliness, isolation, and social support factors in post-COVID-19 mental health. **Psychological trauma : theory, research, practice and policy**, v. 12, n. 1, p. 55 - 57, 2020. Disponível em:<

<https://doi.apa.org/fulltext/2020-43457-001.html>> Acesso em: 18 de jul. de 2021

SCHAEFER, B. M et al. Ações governamentais contra o novo coronavírus: evidências dos estados brasileiros. **Revista de Administração Pública [online]**, v. 54, n. 5, 2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/0034-761220200503>> Acesso em: 17 jul. 2021

STATISTA. Leading countries based on Instagram audience size as of July 2021. **Statista Research Department**, 2 Ago . 2021. Disponível em:< <https://www.statista.com/statistics/578364/countries-with-most-instagram-users/>> . Acesso em: 30 de Ago de 21

ZIMRING, F. **Carl Rogers**. Recife, Fundação Joaquim Nabuco, Editora Massangana, 2010.

CAPÍTULO 15

A UTILIZAÇÃO DA LASERTERAPIA QUANTO TRATAMENTO DAS DISFUNÇÕES TEMPOROMANDIBULARES.

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c15](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c15)

Alicia Lima de Lira¹, Anne Caroline Silva Freire de Sá², Letícia Rafaella Marinho Honorato³, Thalita Oliveira da Silva Borba⁴, Erick Lúcio Souza Santos⁵, Fernanda Maria Matos Aragão de Souza⁶, Jadson da Silva Santana⁷, André Almeida Antune⁸, Arthur Mendes Lima⁹, Wilson Rodrigo Muniz Costa¹⁰

¹ Centro Universitário Tabosa de Almeida - ASCES-UNITA
alicialimadl@gmail.com

² Centro Universitário Tabosa de Almeida - ASCES-UNITA
annecarolinefreiree@gmail.com

³ Centro Universitário Tabosa de Almeida - ASCES-UNITA
leticiamarinhh@hotmail.com

⁴ Centro Universitário Tabosa de Almeida - ASCES-UNITA
thalita.borba00@gmail.com

⁵ Centro Universitário Tabosa de Almeida - ASCES-UNITA
ErickLucioEL@gmail.com

⁶ Graduada em Odontologia pelo Centro Universitário Tabosa de Almeida
- ASCES-UNITA
aragaofernanda22@gmail.com

⁷ Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
jadsonufpe@gmail.com

⁸ Centro Universitário de Belo Horizonte - UNIBH
andredemu@yahoo.com.br

⁹ Universidade Federal de Juiz de Fora
arthurmlima_@hotmail.com

¹⁰ Orientador | Especialista em Cirurgia e Traumatologia Buco-maxilo-facial
(UFPE)
wilsonmuniz.dr@gmail.com

Resumo

Objetivo: Realizar estudo retrospectivo da literatura científica sobre a utilização da laserterapia no tratamento das disfunções temporomandibulares (DTM), com a finalidade de compreender os benefícios decorrentes desta terapia. **Método:** Trata-se de estudo de revisão da literatura baseada em artigos científicos, publicados entre os anos de 2008 a 2019, nos idiomas português e inglês. Foram utilizados os bancos de dados Pubmed, Science Direct, e Scielo, utilizando os descritores: disfunção temporomandibular, tratamento e Low-Level Laser Therapy. **Resultados:** Os artigos relatam a eficácia da laserterapia nos tratamentos de disfunções temporomandibulares, como terapia não

invasiva, com expressivos resultados em um curto período de tempo. A melhora na sintomatologia dolorosa e maior amplitude mandibular se deve às propriedades analgésicas, anti-inflamatória e biomoduladora da laserterapia de baixa frequência. **Conclusões:** As DTMs são uma das principais causas de dor não dentária na região orofacial, as quais acometem cerca de 15% da população adulta. Em decorrência da alta prevalência da sintomatologia dolorosa na face, acompanhada de disfunções ósseas, musculares e articulares de etiologia multifatorial, busca-se nos recursos tecnológicos tratamentos não invasivos. Dessa forma, a laserterapia é cada vez mais incluída no protocolo de tratamento das DTMs, proporcionando ação analgésica, anti-inflamatória e anti-edema, além de resultar na redução da dor orofacial e no aumento da amplitude de abertura bucal.

Palavras-chave: Temporomandibular Disorders; Tratamento; Low-Level Laser Therapy.

Área Temática: Ciências da Saúde.

E-mail do autor principal: alicialimadl@gmail.com

1. INTRODUÇÃO

Considera-se disfunções das articulações temporomandibulares, também conhecida como desordens temporomandibulares (DTMs), condições de desequilíbrio fisiológico dos músculos faciais, da articulação temporomandibular (KARIBE; GODDARD; GEAR, 2003), dos músculos da mastigação e das inervações musculares da cabeça e do pescoço (SCRIVANI; KEITH; KABAN, 2008), que caracteriza-se pela presença de dor, especialmente na fase aguda. É válido destacar que a articulação temporomandibular (ATM) é composta anatomicamente pelo disco articular, líquido sinovial, eminência articular do osso temporal, côndilo da mandíbula, cápsula articular e ligamentos, os qual estão inserido na fossa mandibular do osso temporal (LIU & STEINKELER, 2013). Sendo os músculos da mastigação os principais responsáveis pela articulação dessa estrutura (SCRIVANI; KEITH; KABAN, 2008).

A sintomatologia das disfunções temporomandibulares incluem a diminuição da amplitude de movimento da mandíbula, dor nos músculos da mastigação, bem como dor na região de ATM (WADHWA; KAPILA, 2008). Outros sintomas da DTM, segundo Wadhwa e Kapila (2018), são os ruídos articulares associados à função, dores na musculatura da face, limitação funcional, e comumente relatado o desvio da abertura bucal. Dessa forma, a DTM é considerada um processo de causa multifatorial secundário à hiperfunção muscular ou parafunção, lesões traumáticas, influências hormonais e alterações articulares (MOHLIN; KOPP, 1978).

Posto isso, compreende-se que a disfunção temporomandibular pode ser classificada em distúrbios articulares e não articulares, em que Ghali, Miloro e Waite (2012), relatam que mais de cinquenta por cento são distúrbios não articulares, e

apresentam quadro de dores miofasciais com foco nos músculos da mastigação, desencadeado pelo bruxismo e outros hábitos parafuncionais. Estudos mostram correlações entre a oclusão e os sintomas da DTM, segundo os autores de Mohlin e Kopp (1978), há associação entre interferências oclusais, dor miofascial e disfunções. Evidenciando assim, a correlação entre a mordida cruzada posterior com o desconforto muscular (MOHLIN & KOPP 1978).

Diante das sintomatologias relatadas, é fundamental realizar o diagnóstico diferencial com a finalidade de fornecer tratamento eficaz para a DTM (SCRIVANI; KEITH; KABAN, 2008). Dessa maneira, segundo Liu e Steinkeler (2013) o exame físico deve-se iniciar pela análise da cabeça e pescoço, palpação dos músculos da mastigação e da articulação temporomandibular, análise oclusal, exame de abertura e fechamento bucal. Assim, os masseteres deverão ser palpados com os dedos posicionados sobre o ângulo da mandíbula, e em decorrência da disfunção temporomandibular, o paciente poderá sentir leve incômodo a dor intensa.

Em geral, os distúrbios articulares são descritos de acordo com a classificação de Wilkes para distúrbios internos da ATM (tabela 01), as quais são embasadas em achados clínicos, radiológicos e anatômicos (WILKES, 1993), conforme se observa na tabela abaixo:

Tabela 01. Classificação de Wilkes para distúrbios internos da ATM.

Fonte: adaptado do Bronstein S, Merril B. Disorders of the TMJ. Oral and Maxillofacial Surgery Clinics North America. Philadelphia: Saunders; 1989. Disponível em <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23809304/>

Estágio	Apresentação
Estágio I: Estágio inicial	<p>Apresentação clínica: sem dor ou diminuição da amplitude de movimento, possível estalido.</p> <p>Apresentação radiográfica: disco posicionado anteriormente, contornos ósseos normais</p> <p>Correlação anatômica: deslocamento anterior, forma anatômica, forma anatômica normal do osso e do disco.</p>
Estágio II: Estágio inicial/intermediário	<p>Apresentação clínica: episódio de dor, cliques iniciais, travamento intermitente.</p> <p>Apresentação radiográfica: deslocamento anterior do disco, disco posterior espessado, contornos ósseos normais.</p> <p>Correlação anatômica: deformidade inicial do disco, deslocamento anterior, contorno ósseo normal.</p>
Estágio III: Estágio intermediário.	<p>Apresentação clínica: muitos episódios dolorosos, travamento fechado intermitente, múltiplos sintomas funcionais, diminuição da amplitude de movimento.</p> <p>Apresentação radiográfica: deslocamento anterior do disco com deformidade.</p> <p>Correlação anatômica: contornos ósseos normais, e deslocamento do disco que possui deformidade.</p>

Estágio IV: Estágio intermediário / tardio.	<p>Apresentação clínica: intensificação do quadro de dor, em relação aos estágios anteriores.</p> <p>Apresentação radiográfica: alterações ósseas, com eminência achatada, deformidade condilar, alterações osteoescleróticas.</p> <p>Correlação anatômica: aderência do disco, alterações ósseas, evidência de osteoartrite, osteófitos, sem perfuração de disco.</p>
Estágio V: Estágio final.	<p>Apresentação clínica: dor episódica ou contínua, crepitação, amplitude limitada de movimentos em todos os tempos e dificuldades funcionais constantes.</p> <p>Apresentação radiográfica: perfuração de disco, deformidades grosseiras de estruturas ósseas e cartilaginosas, alterações artríticas progressivas.</p> <p>Correlação anatômica: alterações brutas de tecido moles e duros, perfurações, aderências e cistos subcorticais.</p>

O tratamento das disfunções temporomandibulares pode ser dividido em três categorias amplas, sendo elas, o manejo não invasivo, o minimamente invasivo e o invasivo. O plano de manejo específico pode variar dependendo do diagnóstico e da gravidade das DTMs, no entanto, os princípios do tratamento básico aplicam-se universalmente (LIU; STEINKELER, 2013). A terapia a laser de baixa potência (LLLT) tem sido amplamente estudada e empregada em ambientes científicos e clínicos com resultados positivos e satisfatórios frente ao tratamento destas disfunções (RODRIGUES *et al*, 2015).

Entre os tratamentos de manejo não invasivo, está a utilização do laser de baixa intensidade. Segundo os autores Santos *et al* (2013) a principal justificativa quanto ao uso da laserterapia na DTM é decorrente da propriedade analgésica relatada pela maioria dos estudos encontrados na literatura. Ainda assim, merece destaque o fato de que a prática de LLLT em casos de DTM favorece a vascularização, o suporte nutricional e o aumento do fluxo linfático, resultando na redução de edema, dores na articulação temporomandibular, na ampliação da amplitude bucal (COSTA *et al*, 2017), como também em casos de parestesia (SANTOS *et al*, 2010).

2. MÉTODO

A realização deste estudo de revisão de literatura narrativa, é baseada em artigos científicos publicados entre os anos de 2008 e 2019, qualitativos e quantitativos. Para isso foram utilizadas as bases de dados Pubmed, Science Direct, e Scielo. Em que foram encontrados 774 artigos sobre o tema apresentado, mas somente foram selecionados 51 e 25 utilizados neste estudo. Os descritores em saúde (DeCS) utilizados nesta pesquisa foram: "Temporomandibular dysfunction", "DTM", "tratamento", "laserterapia", "Low-level laser therapy", a partir deles analisou-se a literatura nos idiomas Inglês e Português, sendo utilizado predominantemente artigos internacionais quantitativo.

Foi empregue como critério de inclusão a literatura produzida a partir do ano de 2008 até o ano de 2019, classificadas como relato de caso clínico, estudo randomizado e revisão de literatura, priorizando-se artigos que evidenciam a eficácia da laserterapia frente as disfunções temporomandibulares. Por outro lado, foi aplicado o critério de exclusão àqueles classificados como Tese de Conclusão de Curso, Tese de Mestrado, Livros, documentários e publicações científicas inferior ao ano de 2008. Após a busca, os artigos que foram apresentados em mais de uma base de dados foram contabilizados apenas uma vez, evitando assim, a duplicidade. Dessa forma, foram utilizados aqueles em que os descritores, títulos e resumos pertenciam ao tema escolhido, para que houvesse o desenvolvimento assertivo e coerente do trabalho apresentado.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A disfunção temporomandibular é uma das principais causas de dor não dentária na região orofacial (GONÇALVES *et al*, 2011). Estudos de base populacional mostram que a DTM afeta de 10% a 15% dos adultos, mas apenas 5% procuram tratamento (MAIXNER *et al*, 2011). Diante dos estudos realizados por Maixner *et al* (2011), a incidência de DTM atinge o pico na faixa etária de 20 a 40 anos, sendo duas vezes mais comum em mulheres do que em homens, sendo relatado desde leves desconfortos a dor debilitante, incluindo limitações na função mandibular. Com base na literatura utilizada, agrupa-se as evidências científicas na tabela abaixo, indicando as propriedades e efeitos terapêuticos, e os resultados encontrados (Tabela 02).

Tabela 02. Propriedade da laserterapia e resultados na literatura científica.
Fonte: Autoria Própria, 2021.

Evidência científica	Propriedades / efeitos terapêuticos	Resultado
SANTOS, T.S; PIVA, M.R; RIBEIRO, M.H; ANTUNES, A.A; MELO A.R; SILVA, E.D. Lasertherapy efficacy in temporomandibular disorders: control study. Braz J Otorhinolaryngol. 2010 May-Jun;76(3):294-9. PMID: 20658006.	Analgésico e anti-inflamatório	Resultado satisfatório da aplicação de laser de baixa potência em pacientes que apresentaram dor no músculo masseter e na região da ATM. Nesse estudo, houve redução de 43,6% da dor nos pacientes que realizaram uma aplicação de laserterapia, assim como, melhora na amplitude de abertura bucal.
MADANI, A; AHRARI, F; FALLAHRASLEGAR, A; DAGHESTANI, N. A randomized clinical trial comparing the efficacy of low-level laser therapy (LLLT) and laser acupuncture therapy (LAT) in patients with temporomandibular disorders. Lasers Med Sci. 2020	Regenerativo, analgésico, anti-inflamatório e anti-edemas.	Resultado excelente, o qual resultou na redução da dor e no aumento do movimento mandibular excursivo e protrusivo em paciente com DTM. Concluindo que é mais eficaz a terapia a laser de baixo nível (LLLT), quando comparada com a terapia de acupuntura (LAT), porém a combinação das

Feb;35(1):181-192. doi: 10.1007/s10103-019-02837-x. Epub 2019 Aug 8. PMID: 31396794.		duas condutas por 5 semanas resultou em redução da dor nos músculos da mastigação.
PESSOA, D.R.; COSTA, D.R.; PRIANTI, B.M.; COSTA, D.R.; DELPASSO, C.A. ARISAWA, E.Â.L.S; NICOLAU, R.A. Association of facial massage, dry needling, and laser therapy in Temporomandibular Disorder: case report. Cotas. 2018 Nov 29;30(6):e20170265. doi: 10.1590/2317-1782/20182017265. PMID: 30517267.	Fotobioestimuladores	Resultado excelente. Houve diminuição dos locais de dor em 58%, aumento da amplitude da abertura bucal e ganho dos movimentos mandibulares em paciente que apresentou DTM muscular. Importante ressaltar que junto a laserterapia de baixa frequência, houve utilização de massagem facial e agulhamento a seco durante quatro sessões.

Segundo os autores Wadhwa e Kapila (2008), as disfunções temporomandibulares constituem um vasto grupo de desordens clínicas que envolvem a musculatura mastigatória, a articulação temporomandibular e óssea circundante, sendo possível ainda, ser uma combinação desses quadros clínicos em desequilíbrio.

No estudo clínico de levantamento descritivo dos autores Santos *et al* (2010), concluiu-se que a laserterapia diminui os sintomas dolorosos do paciente por meio de seu efeito analgésico, o qual proporciona alívio da dor logo após a administração. Nesse estudo, cinquenta voluntários com disfunção temporomandibular foram divididos em dois grupos (controle e estudo), os quais foram avaliados, nos critérios de amplitude de abertura bucal, movimento de lateralidade direita e esquerda antes e após a aplicação do laser odontológico com potência de máxima de 120 J/cm² por 16 segundos em quatro pontos selecionados em uma sessão, para ser reavaliado após uma semana do procedimento.

Assim, a eficácia da laserterapia foi avaliada por meio da mensuração da amplitude de movimento de abertura bucal, bem como avaliação do movimento de lateralidade esquerda e direita (SANTOS *et al*, 2010). Constatou-se assim, que no grupo de estudo obteve-se um resultado estatisticamente significativo na Escala Visual Analógica de Dor, inicialmente de 5,14 e após reavaliação, de 2,9. Diferentemente do grupo controle, em que o valor médio inicial foi de 5,4 e após reavaliação foi de 4,25. Assim como houve a redução da dor, foi constatado também a redução de 54,1% do estalido mandibular, melhora na amplitude de abertura bucal (3,12%), bem como no movimento de lateralidade do lado direito e esquerdo.

Diante do estudo clínico randomizado realizado pelos autores Madani *et al* (2019), constatou-se a eficácia da utilização da laserterapia de baixa frequência em pacientes com

disfunções temporomandibulares. Realizou-se a determinação dos pontos dolorosos, sendo eles músculos bilaterais, incluindo masseter (origem, corpo e inserção), temporal (anterior, médio, posterior), pterigóide e articulação temporomandibular, nos quais foram administrado a laserterapia no grupo 1, com o laser GaAlAs, nos pontos dolorosos. Por sua vez, os pontos dolorosos localizavam-se na região posterior e superior dos côndilos mandibulares, dentro do meato acústico externo, bem como nos pontos musculares sensíveis definidos durante o exame físico.

Após aplicação por 30 segundos por ponto, a 6 J de energia com densidade de energia de 21 J/cm² para cada área, duas vezes por semana durante 5 semanas, constatou-se a eficácia da terapia não invasiva neste grupo. Segundo Madani *et al* (2019), o laser de baixa frequência apresenta propriedades de ação regenerativa, analgésico, anti-inflamatório e anti-edemas. O que resultou no resultado significativo de melhora no quadro de intensidade da dor, na excursão lateral direita e esquerda, movimento protrusivo da mandíbula e melhora da amplitude de movimento mandibular, porém nesse estudo não foi observado diferença significativa na máxima abertura de boca possível entre o grupo estudo e o grupo placebo, ainda que o estudo indique a eficácia da laserterapia.

O estudo de caso clínico dos autores Pessoa *et al* (2018), foi associado às técnicas de massagem facial, agulhamento a seco e laserterapia em um paciente com DTM de origem muscular, o qual obteve resultados promissores que foram capazes de reduzir a dor, proporcionar ganho de amplitude de abertura máxima bucal, lateralização, protrusão e modulação da atividade eletromiográfica após 4 semanas de tratamento. Neste relato de caso, os resultados expressivos encontrados são atribuídos ao uso de laser de baixa frequência (LLLT), devido aos seus efeitos fotobiomoduladores que desempenham um papel importante na sintomatologia do tratamento de DTM (PESSOA *et al*, 2018).

A eficácia do uso da laserterapia, nesse estudo, é decorrente do efeito fotobiomodulador que ocorre por meio da ativação metabólica após absorção da luz eletromagnética para estimular a cadeia respiratória mitocondrial, a qual aumenta a vascularização periférica local e leva oxigênio às células hipóxicas nas regiões dolorosas (COSTA *et al*, 2017). Dessa forma, constatou-se que a LLLT promove também a redução da dor devido a alterações na permeabilidade da membrana celular, vasodilatação e redução do edema, bloqueando as fibras nervosas em resposta à liberação de opióides endógenos (GARCEZ *et al*, 2012).

Dessa maneira, a literatura corrobora que o LLLT melhora a vasodilatação e a circulação sanguínea, estimula a função dos fibroblastos, inibe a formação de mediadores inflamatórios, como prostaglandina E2 e ciclooxygenase 2 (COX-2), promovendo a produção de opióides endógenos, o bloqueio a neurotransmissão que aumenta a dor (MADANI *et al*, 2019). Vale ressaltar também que diante dos achados literários dos autores Pessoa *et al* (2018), a utilização da laserterapia promove a diminuição da liberação de histamina e acetilcolina, bem como da síntese de bradicinina, redução da produção de fator de necrose tumoral alfa (TNF- α), do fator de crescimento transformador-beta (TGF- β) e das interleucinas IL-1 β e IL-6.

Posto que a ATM e os músculos mastigatórios estão localizados profundamente, entende-se que parte da energia emitida é absorvida na pele e nos tecidos intersticiais, sendo somente uma fração do feixe entregue à área-alvo (JAHANBIN *et al*, 2014). No estudo realizado por Borges *et al* (2018), realizou-se a investigação dos efeitos causados por diferentes dosimetrias de fotobiomodulação, sendo esses 8 J/cm², 60 J/cm² e 105 J/cm² nas disfunções temporomandibulares. A partir desse estudo, constatou-se que todas as doses foram eficazes na redução da dor e dos sintomas de DTM, porém a abertura máxima e a protrusão da mandíbula aumentaram apenas em indivíduos que receberam a dose de 8J/cm².

Por outro lado, na laserterapia os parâmetros físicos devem ser selecionados corretamente para obter um efeito terapêutico eficaz (MADANI *et al*, 2014). A escolha da energia e densidade energética (J/cm², dose ou fluência), bem como o número de sessões de tratamento e o intervalo entre as aplicações do laser são fatores importantes para o sucesso da terapia. Embora a densidade de energia entregue ao tecido tenha sido considerada o parâmetro mais importante na produção de efeitos biológicos, deve-se observar a energia (J), pois é tão importante quanto a dose (J/cm²) e esta pode torna-se facilmente alta usando uma sonda fina (MADANI *et al*, 2019).

4. CONCLUSÃO

A partir do estudo de revisão literária realizado, é possível constatar que as Disfunções Temporomandibulares são de grande incidência na população mundial, podendo-se concluir que são uma das maiores causas de dores não dentárias orofaciais. Devido a essa circunstância, busca-se cada vez mais, técnicas não invasivas para tratar a sintomatologia dolorosa resultante de um desequilíbrio que pode ser muscular, articular e/ou ósseo. Dentre as técnicas não invasivas mais utilizadas, destaca-se a administração

do laserterapia de baixa frequência (LLLT) nos pontos de dor, com doses entre 6 J/cm² e 120 J/cm².

Em suma, LLLT provou ser um tratamento eficaz, sem dor, não agressivo e com boa relação custo-benefício para melhorar os sintomas da DTM em um período de tratamento mais curto proporcionando melhor qualidade de vida para os pacientes. Os resultados evidenciados incluem redução de dor nos locais de sintomatologia, ganho na amplitude do movimento mandibular, protrusão, amplitude de abertura bucal e lateralidade direita e esquerda.

Com base nisso, os resultados apresentados são de grande relevância clínica, pois o tratamento incorreto pode acarretar a diminuição das funções orais básicas, como por exemplo, a mastigação, deglutição e fala. Além disso, nota-se que há controvérsia na literatura a respeito da energia adequada à densidade para atingir o melhor efeito terapêutico, bem como são limitadas evidências científicas sobre o mecanismo de ação. Por fim, mesmo havendo teorias que buscam explicar os efeitos terapêuticos, faz-se necessário o aumento do número dos estudos a esse respeito para que, com isso, melhor se compreenda a complexidade do tema e se alcance um sucesso do tratamento a longo prazo.

REFERÊNCIAS

- BORGES, R.M.M; CARDOSO, D.S; FLORES, B.C. Effects of different photobiomodulation dosimetries on temporomandibular dysfunction: a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. *Lasers Med Sci* 33, 1859–1866 (2018).
- COSTA, D.R; RIBEIRO-COSTA, D; PESSOA, D.R; MASULO, L.J; ARISAWA, E; NICOLAU, R.A. Effect of LED therapy on temporomandibular disorder: a case study. *Sci Med*. 2017;27(2):258-72.
- GARCEZ SILVA, A; SIMÕES, M.R; Núñez SC. Laser de baixa potência: princípios básicos e aplicações clínicas na odontologia. Rio de Janeiro: Elsevier; 2012
- GAUER, R.L; SEMIDEY, M.J. Diagnosis and treatment of temporomandibular disorders. *Am Fam Physician*. 2015 Mar 15;91(6):378-86. PMID: 25822556.
- GHALI, G.E; MILORO, M; WAITE, P.D *et al*. Peterson's principles of oral and maxillofacial surgery. 3rd edition. Shelton (CT): Pmpha USA; 2012.
- GONÇALVES, D.A; CAMPARIS, C.M; SPECIALI J.G *et al*. Temporomandibular disorders are differentially associated with headache diagnoses: a controlled study. *Clin J Pain*. 2011;27(7): 611-615
- JAHAMBIN, A; RAMAZANZADEH, B; AHARI, F; FOROUZANFAR, A; BEIDOKHTI, M. Effectiveness of Er:YAG laser-aided fibrotomy and low-level laser therapy in alleviating relapse of rotated incisors. *Am J Orthod Dentofacial Orthop*. 2014 Nov;146(5):565-72. doi: 10.1016/j.ajodo.2014.07.006. Epub 2014 Oct 28. PMID: 25439206.
- KANTER, R.J.A.M; BATTISTUZZI, P.G.F.C.M; TRUIN, G.J. Temporomandibular Disorders: "Occlusion" Matters! *Pain Res Manag*. 2018 May 15;2018:8746858. doi: 10.1155/2018/8746858. PMID: 29861806; PMCID: PMC5976904.
- LIM, P.F; SMITH, S; BHALLANG, K. *et al*. Development of temporomandibular disorders is associated with greater bodily pain experience. *Clin J Pain*. 2010;26(2):116-120.

- LIU, F; STEINKELER, A. Epidemiology, diagnosis, and treatment of temporomandibular disorders. *Dent Clin North Am.* 2013 Jul;57(3):465-79. doi: 10.1016/j.cden.2013.04.006. PMID: 23809304.
- MADANI, A.S; AHRARI, F; NASIRI, F; ABTAHI, M; TUNÉR, J. Low-level laser therapy for management of TMJ osteoarthritis. *Crânio.* 2014 Jan;32(1):38-44. doi: 10.1179/0886963413Z.0000000004. PMID: 24660645
- MADANI, A.S; AHRARI, F; FALLANHRASLEGAR, A; DAGHESTANI, N. A randomized clinical trial comparing the efficacy of low-level laser therapy (LLLT) and laser acupuncture therapy (LAT) in patients with temporomandibular disorders. *Lasers Med Sci.* 2020 Feb;35(1):181-192. doi: 10.1007/s10103-019-02837-x. Epub 2019 Aug 8. PMID: 31396794.
- MANFREDINI, D; LOMBARD, L; SICILIANI, G. Temporomandibular disorders and dental occlusion. A systematic review of association studies: end of an era? *J Oral Rehabil.* 2017 Nov;44(11):908-923. doi: 10.1111/joor.12531. Epub 2017 Jul 2. PMID: 28600812.
- MANFREDINI, D; FAVERO, L; COCILOVO, F; MONICI, M; GUARDA-NARDINI, L. A comparison trial between three treatment modalities for the management of myofascial pain of jaw muscles: A preliminary study. *Cranio.* 2018 Sep;36(5):327-331. doi: 10.1080/08869634.2017.1349571. Epub 2017 Jul 11. PMID: 28697676.
- MAIXNER, W; DIATCHENKO, L; DUBNER, R; FILLINGIM, R.B; GREENSPAN, J.D; KNOTT, C; OHRBACH, R; WEIR, B; SLADE, G.D. Orofacial pain prospective evaluation and risk assessment study--the OPPERA study. *J Pain.* 2011 Nov;12(11 Suppl):T4-11.e1-2. doi: 10.1016/j.jpain.2011.08.002. PMID: 22074751; PMCID: PMC3233836.
- MOHLIN, B; KOPP, S. A clinical study on the relationship between malocclusion, occlusal interferences, and mandibular pain and dysfunction. *Swed Dent J* 1978; 2:103.
- PERRY, H.T Jr. Relation of occlusion to temporomandibular joint dysfunction: the orthodontic viewpoint. *J Am Dent Assoc.* 1969 Jul;79(1):137-41. doi: 10.14219/jada.archive.1969.0216. PMID: 5254543.
- PESSOA, D.R; COSTA, D.R; PRIANTI, B.M; COSTA, D.R; DELPASSO, C.A; ARISAWA, E.A.L.S; NICOLAU, R.A. Association of facial massage, dry needling, and laser therapy in Temporomandibular Disorder: case report. *Codas.* 2018 Nov 29;30(6):e20170265. doi: 10.1590/2317-1782/20182017265. PMID: 30517267.
- PETRUCCI, A; SGOLASTRA, F; GATTO, R; MATTEI, A; MONACO, A. Effectiveness of low-level laser therapy in temporomandibular disorders: a systematic review and meta-analysis. *J Orofac Pain.* 2011 Fall;25(4):298-307. PMID: 22247925
- RODRIGUES, J.H; MARQUES, M.M; BIASOTTO-GONZALEZ, D.A, MOREIRA, M.S; BUSSADORI, S.K; MESQUITA-FERRARI, R.A. *et al.* Evaluation of pain, jaw movements, and psychosocial factors in elderly individuals with temporomandibular disorder under laser phototherapy. *Lasers Med Sci.* 2015;30(3):953-9. <http://dx.doi.org/10.1007/s10103-013-1514-z>. PMID:2436623
- SANTOS, T.S; PIVA, M.R; RIBEIRO, M.H; ANTUNES, A.A; MELO, A.R; SILVA E.D. Lasertherapy efficacy in temporomandibular disorders: control study. *Braz J Otorhinolaryngol.* 2010 May-Jun;76(3):294-9. PMID: 20658006.
- SHUKLA, D; MUTHUSEKHAR, M.R. Efficacy of low-level laser therapy in temporomandibular disorders: A systematic review. *National Journal of Maxillofacial Surgery.* 2016 Dec; 7 (1): 62-66. DOI: 10.4103/0975-5950.196127
- STONE, J.C; HANNAH, A; NAGAR, N. Dental occlusion and temporomandibular disorders. *Evid Based Dent.* 2017 Oct 27;18(3):86-87. doi: 10.1038/sj.ebd.6401258. PMID: 29075035.
- VILLAÇA, J.L.A. Dental occlusion as one cause of tinnitus. *Med Hypotheses.* 2019 Sep; 130:109280. doi: 10.1016/j.mehy.2019.109280. Epub 2019 Jun 15. PMID: 31383322.
- WADHWA, S; KAPILA, S. TMJ disorders: future innovations in diagnostics and therapeutics. *J Dent Educ.* 2008 Aug;72(8):930-47. PMID: 18676802; PMCID: PMC2547984.

CAPÍTULO 16

ABORDAGENS TERAPÊUTICAS E CIRÚRGICA PARA O TRATAMENTO DA QUEILITE ACTÍNICA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c16](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c16)

Fernanda Maria Matos Aragão de Souza¹, Thalita Oliveira da Silva Borba², Anne Caroline Silva Freire de Sá³, Letícia Rafaella, Marinho Honorato⁴, Jadson da Silva Santana⁵, Erick Lúcio Souza Santos⁶, Alícia Lima de Lira⁷, Arthur Mendes Lima⁸, André Almeida Antunes⁹, Bruno Bezerra de Souza¹⁰

¹ Graduada em Odontologia pelo Centro Universitário Tabosa de Almeida, ASCES-UNITA
(aragaofernanda22@gmail.com)

² Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA, (thalita.borba00@gmail.com)

³ Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA, (annecarolinefreiree@gmail.com)

⁴ Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA, (leticiamarinhoh@hotmail.com)

⁵ Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, (jadsonufpe@gmail.com)

⁶ Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA, (ErickLucioEL@gmail.com)

⁷ Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA, (alicialimadl@gmail.com)

⁸ Universidade Federal de Juiz de Fora, (arthurmlima_@hotmail.com)

⁹ Centro universitário de Belo Horizonte – UNIBH, (andredemu@yahoo.com.br)

¹⁰ Orientador (Brunoodontologia@gmail.com)

Resumo

A queilite actínica (QA) é uma lesão pré-maligna que acomete em especial o lábio inferior, devido a exposição solar contínua. A lesão é comum em agricultores ou outros trabalhadores que se expõem a longos períodos ao sol. Além disso, pessoas de pele clara têm maior predisposição a desenvolver a QA e, quanto maior a idade, em conjunto com demais fatores, maiores as chances de desenvolver a lesão. **Objetivo:** O presente estudo tem por objetivo discutir as abordagens pelo qual pode-se tratar a QA decorrente de processos patológicos

avanzados ou em estágios iniciais. **Método:** Realizou-se uma revisão de literatura, a partir de estudos publicados no PubMed, SciELO e LILACS, nos últimos cinco anos. Os artigos foram filtrados através dos descritores, seguido pela leitura dos títulos, resumos e dos conteúdos na íntegra, nos idiomas português, inglês e espanhol. **Resultados:** Alguns estudos como o gel de diclofenaco de sódio 3%, tratamento cirúrgico, terapia fotodinâmica com luz do dia (TFD-LD) e corticoterapia foram apontadas e estudadas como forma de tratamento para a QA. No entanto, não há um consenso padrão na literatura sobre qual é o método exato para tratar as lesões. **Conclusões:** Os tratamentos por métodos cirúrgicos em alguns estudos se mostram mais efetivos e precisos, principalmente em graus de lesões mais avançadas com potencial maior para desenvolver uma condição maligna, enquanto os tratamentos apenas farmacológicos demonstram uma eficácia reduzida quando comparados com métodos cirúrgicos, restringido então os medicamentos indicados para o caso, apenas em estágios iniciais da lesão.

Palavras-chave: Queilite actínica; Doenças labiais; Neoplasias.

Área Temática: Ciências da Saúde

E-mail do autor principal: aragaofernanda22@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

Devido à destruição da camada de ozônio, a radiação ultravioleta ganhou importância por razões relacionadas aos agravos à saúde, que acarreta riscos principalmente em relação ao câncer de pele. Embora a população esteja ciente desse problema, poucas pessoas associam esse dano cumulativo a outras áreas além da pele, como os lábios. Estima-se que a radiação ultravioleta solar representa aproximadamente 93% dos cânceres de pele e, devido às mutações no DNA, pode induzir o aparecimento de câncer de lábio (OSÓRIO; PALMA; CARTES-VELÁSQUEZ, 2016; SALGUEIRO et al., 2019).

A queilite actínica (QA), é um precursor do carcinoma de células escamosas encontrado nos lábios. Semelhante à ceratose actínica, a QA é uma lesão pré-maligna causada por exposição solar crônica. É mais comum no lábio inferior ao longo da borda vermelha (MUSE; CRANE, 2020). Como a melanina é uma proteção natural contra os raios ultravioleta, as pessoas de pele clara são as mais afetadas por esses distúrbios (MELLO, et al., 2019). Clinicamente, a doença se manifesta com espessamento indolor e descoloração esbranquiçada nas bordas dos lábios e da pele. Consequentemente, a borda do lábio (borda vermelha) se torna mais clara e os lábios podem gradualmente se tornar escamosos e endurecidos. Fatores de risco incluem aumento da idade e trabalhar mais de 25 anos ao ar livre se expondo a raios ultravioletas ou uma história de câncer de pele (MIHIC et al., 2018).

A lesão apresenta alta incidência nos países da América do Sul, principalmente nas

regiões tropicais, onde há um alto nível de radiação solar e que apresentam formas de trabalho comuns nas quais os indivíduos permanecem longos períodos expostos à radiação solar (CALDEIRA et al., 2017). Essa lesão afeta principalmente indivíduos leucodermas, de gênero masculino e com faixa etária acima dos 40 anos. Clinicamente, a QA pode apresentar-se de forma aguda (menos comum) e de forma crônica. A forma aguda está relacionada a episódios de intensa exposição ao sol, além de ser caracterizada pelo surgimento de edema e vermelhidão. Já a forma crônica desenvolve-se como uma elevação do lábio inferior até a comissura, provocada por exposição solar contínua (TENORIO; SANTOS; FERREIRA, 2018).

O diagnóstico dessa condição envolve análise clínica e histopatológica. a QA é diagnosticada principalmente com base em achados clínicos, onde a biópsia só é necessária se a lesão tiver áreas erosivas endurecidas ou persistentes, sugerindo malignização. A biópsia permite uma avaliação histológica adequada da peça e diagnóstico exato, sendo indicado a associação dos achados clínicos com a realização da biópsia (SANTOS, 2019). Embora o tratamento do câncer bucal tenha progredido bem, é necessário que o indivíduo com QA seja diagnosticado precocemente. Portanto, o tratamento deve começar com um exame clínico e, dependendo da gravidade, a QA deve ser tratada e monitorada. As variáveis histológicas, com diferentes graus de queratinização, também são motivos para o diagnóstico precoce e tratamento adequado, prevenindo o carcinoma labial (BARRETO, 2017).

O presente estudo tem como objetivo analisar, de forma clara e sucinta, o manuseio das abordagens terapêuticas e cirúrgicas no tratamento da queilite actínica através de uma revisão de literatura. Ao final do estudo espera-se obter qual o método mais eficaz e sua relevância.

2 MÉTODO

Foi realizada uma revisão de literatura, com busca por artigos científicos publicados nas plataformas PubMed, SciELO e LILACS, entre 2016 e 2020, nos idiomas português, inglês e espanhol. Os artigos foram selecionados através do cruzamento dos descritores “Queilite”, “Tratamento Farmacológico”, “Oncologia”, “Raios ultravioleta”, “Neoplasias Bucais” e os seus correspondentes em inglês e espanhol, combinados pelo operador booleano “AND”. Os artigos foram selecionados seguido pela leitura dos títulos, resumos e, por fim, dos artigos na íntegra. Foram encontrados 111 trabalhos sobre o tema e escolhidos 21, a maior parte deles sendo na língua inglesa. Foram selecionados ensaios clínicos, séries de casos, meta-análises que

abordassem sobre o tema de interesse e excluídos ensaios laboratoriais in vitro e estudos testados em animais.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os achados nas buscas do presente estudo estão dispostos no quadro 1.

Quadro 1. As principais formas de tratamentos para a QA disponível na íntegra estão dispostos abaixo.

Autor	Tipo de estudo	Terapia	Conclusão
GONZAGA et al., 2018	Ensaio clínico	Gel de diclofenaco de sódio 3%	A aplicação tópica da droga proporcionou uma prática conveniente e bem tolerada na maioria dos casos.
CARVALHO; DE MORAIS; LEMOS, 2019	Revisão sistemática e meta-análise	Tratamento cirúrgico comparado ao não cirúrgico	O tratamento cirúrgico foi mais favorável do que o não cirúrgico para QA. No entanto, terapias farmacológicas podem ser uma boa opção para casos em estágios iniciais.
CHAVES et al., 2017	Ensaio Clínico	Terapia fotodinâmica (TFD)	Não foi uma opção terapêutica eficaz para o tratamento de pacientes com QA.
BALTAZAR et al., 2019	Ensaio clínico	Terapia fotodinâmica com luz do dia (TFD-LD)	A terapia mostrou eficácia para o tratamento da QA, principalmente quando é usado em associação de fármacos tópicos.
DE OLIVEIRA et al., 2019	Ensaio clínico	Corticoterapia com a associação da fludroxicortida	As respostas ao tratamento melhoraram quando associado ao Fludroxicortida, principalmente nos casos mais graves de QA.

Fonte: Autores, 2021.

O câncer oral é o principal componente da carga global de neoplasias malignas, doenças potencialmente malignas (DPM) que podem se transformar em cânceres invasivos como resultados de uma exposição longa, repetida e intermitente a certos fatores de risco. DPM incluem leucoplasia, eritroplasia e queilite actínica (OSÓRIO; PALMA; CARTES-VELÁSQUEZ, 2016). Outros fatores que influenciam nos aparecimentos da QA, além da exposição a raios UV, dizem respeito ao estilo de vida, como tabagismo, consumo excessivo de álcool e dieta inadequada, predisposição genética e baixo nível socioeconômico (MELLO; MIGUAL; DUTRA al., 2018). O diagnóstico da lesão deve estar baseado na anamnese, exame físico e exame histopatológico (TENÓRIO et al., 2018). A realização de uma ou mais biópsias, são recomendadas para verificar se há displasia ou carcinoma, mesmo na ausência de sinais clínicos de malignidade (SAMIMI, 2016).

No entanto, o tratamento da QA é difícil devido à proximidade da mucosa, camadas finas da pele e área cosmeticamente sensível. As opções de tratamento cirúrgico são inúmeras, mas podem causar cicatrizes, edema persistente e parestesia em alguns casos. Modalidades conservadoras incluem quimioterapia ou imunoterapia tópica e tratamentos baseados em radiação. Os tratamentos tópicos podem ter eficácia reduzida devido à ingestão ou menor adesão ao tratamento. As evidências sobre a eficácia das opções de tratamento são esparsas e dependem do caso (BELLIO et al., 2020). Assim, não há consenso sobre qual é o padrão de tratamento para a QA em qualquer nível de desenvolvimento da lesão. No entanto, existe na literatura uma variedade de tratamentos, que podem ser escolhidos pelo profissional de acordo com cada particularidade (LAI et al., 2019).

O uso de Gel de diclofenaco de sódio 3% foi proposto em um estudo por Gonzaga et al., (2018) como um tratamento alternativo para a QA. No estudo, 19 pacientes com diagnóstico de QA foram analisados até o fim do tempo estipulado no tratamento. A terapêutica se baseava em aplicação tópica na área alvo três vezes ao dia por 90 dias e obtiveram os seguintes resultados: 10 pacientes tiveram a remissão completa das lesões, 3 tiveram remissão parcial, 5 tiveram reação adversa e 1 a piora dos sintomas, com resultados satisfatórios e efeitos colaterais que foram bem tolerados pela maioria dos pacientes. Ainda, para Varella-Centelles et al., (2020), os medicamentos tópicos podem ajudar no controle do campo da cancerização e sua associação com outras abordagens terapêuticas podem aumentar sua eficácia clínica.

Em relação aos procedimentos cirúrgicos para tratamento da QA incluem laser cirúrgico usando vaporização do laser de CO₂, criocirurgia e vermelhectomia. Os tratamentos cirúrgicos são indicados em casos mais avançados ou com displasia moderada a grave. Devido ao seu potencial para se tornar carcinoma celular escamoso, o tratamento deve se estabelecer o mais

rápido possível (OSÓRIO; PALMA; CARTES-VELÁSQUEZ, 2016). A crioterapia consiste na aplicação tópica de criogênicos, mais comumente nitrogênio líquido, para tratamento da QA a criocirurgia apresenta bons resultados, visto que, a superfície lisa e a umidade das membranas mucosas permitem o seu congelamento rápido. Essa lesão na epiderme faz com que ela se separe da derme, tratando efetivamente o epitélio (CARVALHO; DE MORAES; LEMOS, 2019).

A vermelhectomia vem sendo um dos procedimentos cirúrgicos mais utilizado para essa condição, consiste em um método invasivo, no qual existe o tipo simples, onde apenas o vermelhão é removido a nível do músculo orbicular da boca, e um modificado que pode incluir remoção glândulas e outros tecidos, sendo um procedimento altamente eficaz (OSÓRIO; PALMA; CARTES-VELÁSQUEZ, 2016; CARVALHO; DE MORAES; LEMOS, 2019). De maneira semelhante, Salgueiro et al., (2019) em um estudo que comparou a vermelhectomia com outros métodos de tratamento, em 40 pacientes do grupo tratado com vermelhectomia, a melhoria clínica foi observada em 100% dos pacientes, concluindo que essa modalidade de tratamento foi superior aos tratamentos farmacológicos avaliados no estudo.

Conforme as várias aplicabilidades da laserterapia e apesar da terapia fotodinâmica ser um método terapêutico seguro e gerar resposta clínica positiva para algumas lesões orais, no tratamento da QA a terapia se mostra ineficaz. Esta conclusão é baseada principalmente nos resultados dos estudos feitos por Chaves et al., (2017), acompanhados por ausência de cura histopatológica em todos os sujeitos analisados em uma amostra, e na ausência de imuno-histoquímica antes e depois do tratamento. Em outro estudo feito por Lai et al., (2019) a TFD mostrou níveis relativamente baixos em resposta a QA quando comparada com outras terapias. No entanto, a terapia fotodinâmica com luz do dia (TFD-LD) consiste em uma recente alternativa terapêutica à terapia fotodinâmica convencional, com eficácia no tratamento de queratoses actínicas (graus I e II) de face e de couro cabeludo (BALTAZAR et al., 2019).

A TFD-LD trata-se de método simplificado, mais acessível e com melhor tolerabilidade pelo uso da luz do dia em vez de fonte de luz artificial, o protocolo envolve a aplicação de fator de proteção contra raios UV no paciente, e subsequente, a exposição a luz do dia ambiente dentro de 1 a 2h (MORTON; BRAATHEN, 2018). Segundo um estudo realizado por Martín-Carrasco et al (2020), foram analisados 6 pacientes depois de uma delicada curetagem no local da lesão, aplicando uma quantidade suficiente de creme de metil aminolevulinato e, exposição à luz do dia ambiente por duas horas, durante duas semanas, 4 dos pacientes (67%) mostrou uma resposta completa e 2 uma resposta parcial com uma redução média da área de superfície afetada de um 58,3%. Concluindo, portanto, que a TFD-LD é eficaz e bem tolerada podendo

reduzir o desenvolvimento de novas lesões, além de oferecer fotorejuvenescimento.

Em outro método de estudo terapêutico realizado por de Oliveira et al (2019) usando corticoterapia com a associação da fludroxicortida, 23 pacientes diagnosticados com QA participaram do estudo, eles foram classificados em graus diferentes da lesão, e aqueles com alterações epiteliais moderadas e graves foram divididos em dois grupos: Grupo A de 15 pacientes utilizou o creme dermatológico Fludroxicortida Drenison® 0,125mg três vezes ao dia, com recomendação de evitar a exposição direta ao sol e usar protetor labial antes da exposição solar e um grupo de controle B, composto por 8 pacientes. Como resultado, o medicamento melhorou as lesões labiais (86,6% concordaram, 13,3% nem concordaram nem discordaram), e por fim, 80% dos pacientes estavam satisfeitos com a terapia.

No entanto, qualquer tratamento para a QA apenas será efetivo se o paciente se conscientizar da importância da proteção solar e tiver um acompanhamento clínico constante (DE AZEVEDO, 2020). O uso de filtro solar inibe a transmissão da radiação ultravioleta (UV) na pele evitando que haja reflexão, absorção ou espalhamento dessa radiação. Seu uso com fator de proteção solar de 15 ou mais demonstrou reduzir a incidência de QA em 40%, em comparação com o não uso de proteção solar. O uso diário também reduz a incidência de câncer de células escamosas em 25% (OSORIO; PALMA; CARTES-VELÁSQUEZ, 2016).

Por fim, é crucial o reconhecimento precoce da queilite actínica, pois dessa forma será possível o desenvolvimento de estratégias individuais para cada paciente, e impedir a progressão da doença e promover um tratamento eficaz, aumentando as chances de um prognóstico favorável (CARVALHO; DE MORAES; LEMOS, 2019). Determinar a melhor terapia para tratar lesões de QA ainda é um assunto de debate, e mais ensaios clínicos são necessários para fornecer evidências mais robustas. Futuros estudos devem se concentrar mais especificamente na relevância de alterações histopatológicas e nos tratamentos de doenças potencialmente malignas como a queilite actínica (SALGUEIRO et al., 2019).

4 CONCLUSÃO

Os tratamentos por métodos cirúrgicos se mostram mais efetivos e precisos, enquanto os não-invasivos demonstram serem menos precisos. No entanto, dependendo do grau das lesões por QA, o profissional poderá avaliar se a terapêutica farmacológica será efetiva. Os estudos mostraram que quando as lesões ainda estão em fases iniciais, os medicamentos tópicos como o gel de diclofenaco de sódio 3% e alguns outros tiveram boas respostas. Nos casos mais avançados, a revisão mostrou que as recomendações cirúrgicas como a vermelhectomia, são

indicadas para uma maior margem de confiança e bom prognóstico, visto que, como a lesão é pré-maligna, deve-se optar pelo método mais preciso.

REFERÊNCIAS

BALTAZAR, I.L. et al. Tratamento da queilite actínica com terapia fotodinâmica com a luz do dia - avaliação clínica e histopatológica. **Surg. Cosmet Dermatol**, Rio de Janeiro, v. 11 n.4, p. 295-8, 2019. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5935/scd1984-8773.20191141462>.

Acesso em: 13 maio 2021.

BARRETO, A. C. R. The clinical prevalence of actinic cheilitis among community health agents from the regional V subprefecture of Fortaleza: A prevalência da queilite actínica em agentes comunitários de saúde. **Revista Gaúcha de Odontologia**, Fortaleza, v. 65, n. 2, p. 128-133, 2017. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rgo/a/GbRvGkxnFk7D5cSg6GHfQrH/abstract/?lang=pt#>. Acesso em 3 jun. 2021.

BELLIO, T. M. et al. Queilitis actínica: protectores de rayos ultravioleta que previenen la progresión maligna. Reporte de un caso. **Revista de la División de Ciencias de la Salud**, Colombia, v. 20, 2020. Disponível em:

http://revistas.ustabuca.edu.co/index.php/USTASALUD_ODONTOLOGIA/article/view/2502. Acesso em 23 maio 2021.

CALDEIRA, P. C. et al. Thioredoxin and metallothionein: Homeostasis-related proteins in lip carcinogenesis. **Archives of Oral Biology**, Belo Horizonte, v. 77, p. 75-81, 2017. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28183007/>. Acesso em: 11 maio 2021.

CARVALHO, M. V. et al. Surgical versus non-surgical treatment of actinic cheilitis: A systematic review and meta-analysis. **Oral Diseases**, Camaragibe, v. 25, n. 4, p. 972-981, 2019. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/odi.12916>. Acesso em: 16 maio 2021.

CHAVES, Y. N. et al. Evaluation of the efficacy of photodynamic therapy for the treatment of actinic cheilitis. **Photodermatology, Photoimmunology & Photomedicine**, São Paulo, v. 33,

n. 1, p. 14-21, 2017. Disponível em:

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/phpp.12281>. Acesso em: 20 jun. 2021.

AZEVEDO, M. Queilite Actínica. **Revista Cathedral**, Boa Vista RR, v. 2, n. 1, p. 1-6, fev. 2020. Disponível em: <http://cathedral.ojs.galoa.com.br/index.php/cathedral/article/view/38>. Acesso em: 17 maio 2021.

OLIVEIRA, H. I. B. et al. Fludroxycortide cream as an alternative therapy for actinic cheilitis. **Clinical Oral Investigation**, Natal, v. 23, n. 10, p. 395-3931, 2019. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30673866/>. Acesso em: 14 jun. 2021.

GONZAGA, A. K. G. et al. Diclofenac sodium gel therapy as an alternative to actinic cheilitis. **Clinical Oral Investigation**, Natal, v. 22, p. 1319–1325, 2018. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00784-017-2237-5>. Acesso em: 14 jun. 2021.

LAI, M. et al Treatments of actinic cheilitis: a systematic review of the literature. **Journal of the American Academy of Dermatology**, Itália, v. 83, n. 3, p. 876-887, 2019. Disponível em: [https://www.jaad.org/article/S0190-9622\(19\)32501-0/fulltext](https://www.jaad.org/article/S0190-9622(19)32501-0/fulltext). Acesso em: 8 jun. 2021.

MIHIC, L.L. et al. Differential Diagnosis of Cheilitis - How to Classify Cheilitis?. **Acta clinica Croatica**, Croácia, v. 57, n. 2, p. 342-351, 2018. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/328707343_Differential_Diagnosis_of_Cheilitis_-_How_to_Classify_Cheilitis. Acesso em: 3 maio 2021.

CARRASCO, P. M. et al. Terapia fotodinâmica con luz de día en el tratamiento de la queilitis actínica. **Actas Dermo-Sifiliográficas**, Espanha, 2020. Disponível em: <https://doi.org/doi:10.1016/j.ad.2019.01.026>. Acesso em: 14 jun. 2021.

MELLO, F.W. et al. Actinic cheilitis and lip squamous cell carcinoma: Literature review and new data from Brazil. **Journal of clinical and experimental dentistry**, Florianópolis, v. 11, n. 1, P. 62-69, 2019. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6343992/pdf/jced-11-e62.pdf>. Acesso em: 1 jun. 2021.

MELLO, F. W. et al. Prevalence of oral potentially malignant disorders: A systematic review

and meta-analysis. **Journal of Oral Pathology & Medicine**, Santa Catarina, v. 47, n. 7, p. 633-640, 2018. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29738071/>. Acesso em 20 maio 2021.

MORTON, C. A.; BRAATHEN, L. R. Daylight Photodynamic Therapy for Actinic Keratoses. **American Journal of Clinical Dermatology**, Reino Unido, v. 19, n. 5, p. 647-656, 2018. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29752702/>. Acesso em: 28 maio 2021.

MUSE, M. E.; CRANE, J. S. Actinic Cheilitis. In: *StatPearls*. Treasure Island (FL): **StatPearls Publishing**, 2020. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK551553/>. Acesso em: 15 maio 2021.

OSORIO, C. H.; PALMA, B. F.; CARTES-VELÁSQUEZ, R. Queilite actínica: aspectos histológicos, clínicos e epidemiológicos. **Revista Cubana Estomatología**, Chile, v.53, n.2, p. 45-55, 2016. Disponível em: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75072016000200008. Acesso em 2 jun. 2021.

SALGUEIRO, A. P. et al. Treatment of actinic cheilitis: a systematic review. **Clinical Oral Investigations**, v. 23, n. 5, p. 2041-2053, 2019. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31011833/>. Acesso em 20 jun. 2021.

SAMIMI, M. Chéilites : Orientation diagnostique et traitement. *La Presse Médicale*, França, v. 45, n. 2, p. 240-250, 2016. Disponível em: <https://www.em-consulte.com/article/1037627/cheilites%C2%A0-orientation-diagnostique-et-traitement>. Acesso em: 13 maio 2021.

TENORIO, E.P. et al. Queilite actínica: relato de caso. *Revista Médica de Minas Gerais*, v. 28, p. 1970-1970, 2018. Disponível em: <http://rmmg.org/artigo/detalhes/2394>. Acesso em 5 jun. 2021.

VARELA-CENTELLES, P. et al. Therapeutic approaches for actinic cheilitis: therapeutic efficacy and malignant transformation after treatment. *International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery*, Espanha, v. 49, n. 10, p. 1343-1350, 2020. Disponível em: [https://www.ijoms.com/article/S0901-5027\(20\)30082-5/abstract#%20](https://www.ijoms.com/article/S0901-5027(20)30082-5/abstract#%20). Acesso em: 6 jun. 2021.

CAPÍTULO 17

ACESSIBILIDADE E ACOLHIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE EM MACRORREGIÕES DE SAÚDE DA PARAÍBA

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c17](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c17)

Paula Cristina Nunes Nascimento¹, Janete Laurentino dos Santos², Raissa Karla de Oliveira Araújo³, Maria Luiza Alexandre de Aquino⁴, Vitória Helena Sales Ferreira⁵, Geciana Acelino dos Santos⁶, Alcione Oliveira da Costa⁷, Ardigleusa Alves Coelho⁸

¹Faculdade Novo Horizonte, (paulacriscad26@gmail.com)

² Faculdade Novo Horizonte, (janlaurentino@gmail.com)

³ Faculdade Novo Horizonte, (raissakarla10@gmail.com)

⁴ Faculdade Novo Horizonte, (mlaaquino.152@gmail.com)

⁵Faculdades Integradas de Patos, (vitoriahsf@hotmail.com)

⁶Prefeitura Municipal de Alagoinha, (geciana_acelino@hotmail.com)

⁷Faculdades Integradas de Patos, (alciasb@gmail.com)

⁸Universidade Estadual da Paraíba, (ardigleusacoelho@gmail.com)

Resumo

Objetivo: avaliar a acessibilidade e o acolhimento à rede de serviços de saúde de atenção primária nas macrorregiões de saúde paraibana sob a ótica dos usuários. **Método:** Estudo transversal com abordagem quantitativa, utilizados dados de 5.347 usuários de equipes de atenção primária à saúde, residentes nas macrorregiões da Paraíba, respondentes da avaliação externa do terceiro ciclo do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, realizada no Brasil entre 2015 e 2018. O teste Qui-quadrado foi utilizado para mensurar associação entre as variáveis referentes ao acolhimento e acessibilidade e macrorregiões de saúde. **Resultados:** Verifica-se predomínio do sexo feminino (83,1%), na faixa etária de 20 a 49 anos (66,2%); casados (as) (62,4%); baixa escolaridade (47,5%); participantes do programa bolsa família (50,0%); Sobre a acessibilidade foi constatado distância entre casa e unidade menor do que 30 minutos (86,5%), funcionamento das unidades de saúde nos cinco dias da semana (92,8%); Quanto ao acolhimento, nota-se a clareza dos profissionais nas explicações e orientações (91,3%), a atenção às falas dos usuários (92,7%) e respeito (93,2%); 48,1% dos profissionais quase sempre perguntam sobre outras questões de vida do cliente; o enfermeiro apresenta o menor tempo de espera (1 dia) entre a marcação e o atendimento (58,5%); a escuta à demanda espontânea foi referido por 70,7% dos usuários; a ausência dos profissionais na unidade (34,3%) foi declarado como o principal motivo para não atendimento; 88,8% referiram tempo de espera para atendimento de pessoas sem hora marcada inferior a 60 minutos. **Conclusão:** o acolhimento e acessibilidade a serviços de saúde de atenção primária nas

microrregiões de saúde paraibana foram avaliados positivamente pelos usuários, contudo a ausência de profissionais e problemas organizacionais são fragilidades a ser superadas.

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde; Acesso aos Serviços de Saúde; Equidade em Saúde.

Área Temática: Ciências da Saúde

E-mail do autor principal: paulacriscad26@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

Os sistemas de saúde em países que se orientam principalmente pela Atenção Primária à Saúde (APS) apresentam resultados positivos em saúde no que tange a capacidade do fornecimento de cuidados que atendam as diferentes necessidades dos usuários (GIOVANELLA, et al., 2021).

No contexto brasileiro, o Sistema Único de Saúde (SUS), instituído pela Constituição federal de 1988, com seus princípios e diretrizes (COSTA, et al., 2021; POSTAL, et al., 2021), busca a garantia do direito universal à saúde mediante o acesso à atenção integral à saúde a população. Assim, para a ampliação do acesso à atenção à saúde individual e coletiva houve expansão dos serviços de APS no país (GIOVANELLA, et al., 2018).

A APS é uma das entradas prioritárias do SUS, que se caracteriza por atendimento inicial aos usuários, coordenação da assistência, longitudinalidade e integralidade (POSTAL, et al., 2021) e tem na Saúde da Família sua principal estratégia de expansão e consolidação (BRASIL, 2017). Com a expansão da cobertura da Estratégia de Saúde da Família (ESF), a partir dos anos 2000, houve melhoria significativa em alguns indicadores de mortalidade e de internações (GIOVANELLA, et al., 2021).

É válido salientar, que no contexto da APS, a assistência de qualidade e com equidade é imprescindível e a Equipe de Saúde da Família (eSF) é estratégica prioritária de atenção à saúde. Diante disso se vê a necessidade de avaliação através de diversas perspectivas, como os clientes, os gestores e os profissionais, que contribui diretamente na identificação de problemas e fragilidades no atendimento e pode auxiliar como guia para políticas públicas promovendo mudanças organizacionais e assistenciais, de forma que o cuidado atenda às reais necessidades dos indivíduos, contribuindo para efetividade do serviço e consolidação dos princípios do SUS (PERILLO, et al., 2021).

Para institucionalização de um processo avaliativo no SUS como foco na qualidade de da atenção, foi lançado no ano de 2011 pelo Ministério da Saúde, o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e Qualidade na Atenção Básica (PMAQ-AB) (GUBERT, et al., 2021; LIMA, et al., 2021) com objetivo de aumentar o acesso à serviços de Atenção Básica e melhoria

da qualidade (SILVA, et al., 2021). O terceiro ciclo do PMAQ-AB, realizado entre 2015 e 2018, era dividido em três fases, dentre elas, a avaliação externa, operacionalizada em parceria com instituições de pesquisa e de ensino (TAJRA; CARDOSO; CARDOSO, 2021).

O acesso é caracterizado como a capacidade institucional, para o acolhimento dos usuários, a criação de vínculo e a responsabilização da assistência. Para que se tenha um melhor acesso, deve-se aumentar a qualidade da atenção à saúde. Ainda nesse aspecto, o ambiente também é um fator primordial, sobretudo no que tange ao acolhimento do cliente, além da promoção de conforto aos trabalhadores do local (CATALINO, et al., 2021).

A Política Nacional de Humanização (PNH) prioriza otimizar a gestão, o cuidado prestado e as relações de profissionais e usuários a partir da prática dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) na rotina dos serviços. No contexto da APS, a PNH prever diretrizes específicas que tornam o acolhimento uma prática clínica que deve ser priorizada por qualquer trabalhador de saúde para organização do cuidado e produção de escuta e vínculos (DUARTE; FALCÃO; BELTRÃO, 2017).

Dessa forma, esse estudo busca responder: Como Usuários avaliam o acolhimento e acessibilidade a serviços de saúde de APS nas macrorregiões de saúde paraibana? Assim, objetivou-se avaliar a acessibilidade e o acolhimento à rede de serviços de saúde de atenção primária nas macrorregiões de saúde paraibana sob a ótica dos usuários.

2 MÉTODO

Estudo transversal com abordagem quantitativa realizado nas macrorregiões de saúde da Paraíba. Foram utilizados dados oriundos do banco da Avaliação Externa do PMAQ (3º ciclo), realizada em todo o território nacional entre 2015 e 2018.

A amostra do estudo corresponde a 5347 usuários residentes em municípios do estado da Paraíba respondente da avaliação externa (Modulo III – Entrevista com o usuário na UBS sobre satisfação e condições de acesso e utilização de serviços de saúde) (BRASIL, 2018).

Os dados foram obtidos do banco - Microdados da Avaliação Externa do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, de domínio público, disponibilizado pelo Departamento de Atenção Básica (DAB) do Ministério da Saúde do Brasil, no site: <http://aps.saude.gov.br/ape/pmaq/ciclo3/#collapseThree> (BRASIL, 2021).

As variáveis utilizadas neste estudo foram selecionadas de cinco dimensões do Módulo III, consideradas pelos pesquisadores como sinalizadores do acesso à rede de serviços de saúde de atenção primária. Para análise dos dados, as variáveis foram agrupadas nas dimensões acessibilidade e acolhimento segundo o modelo teórico de Penchansky e Thomas (1981), sendo

adotadas as seguintes definições: acessibilidade: está relacionada à localização do serviço e a localização dos clientes, considerando os recursos com transporte e tempo de viagem, distância e custo; e acolhimento: refere-se à forma como o serviço se organiza para receber o cliente.

Na análise da acessibilidade foram selecionadas variáveis referentes à dimensão: acesso à Unidade de Saúde. As variáveis para avaliação do acolhimento estão incluídas nas dimensões: Acesso aos Serviços de Saúde: Marcação de Consulta e, Demanda Espontânea e Urgências; Utilização: Qualidade nas Consultas, Vínculo, Atividades Coletivas. As variáveis para caracterização sociodemográfica do usuário são oriundas da dimensão: Identificação do Usuário.

As análises das variáveis foram realizadas por meio de cálculo de frequências (absolutas e relativas) segundo Macrorregião de Saúde (PARAÍBA, 2018) utilizando o Programa *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS Inc, Chicago, Estados Unidos, versão 22). Foram excluídos da análise os valores referentes à resposta “não sabe/não respondeu” e “não se aplica”. O teste qui-quadrado de proporções foi usado para verificar diferenças entre as Macrorregiões de Saúde e acolhimento e acessibilidade a serviços de saúde de APS. Adotou-se significância estatística de 5%. A apreciação do estudo pelo Comitê de Ética em Pesquisa foi dispensada, pois o estudo utiliza dados secundários de domínio público e não há identificação dos participantes.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Participaram do estudo 5347 usuários da APS, em três macrorregiões de saúde (1ª - João Pessoa; 2ª - Campina Grande; e 3ª - Patos), no período de 2015 a 2018. Onde, verificou-se que o sexo predominante é o feminino (83,1%), com idade entre 19 a 60 anos ou mais, com concentração na faixa etária de 20 a 49 anos (66,2%), com estado civil casado(a) (62,4%), com pouca escolaridade (47,5%) e maior frequência ensino fundamental incompleto (34,3%) e participantes do programa de transferência de renda (50,0%).

Os achados da pesquisa sobre a caracterização sócio-demográfica são similares a outros estudos realizados no Brasil, que mostram que a maioria da população usuária do SUS é sexo feminino, baixa renda e com baixa escolaridade. No entanto, sobre a idade, outro estudo observou que a faixa etária mais presente está entre 30 e 59 anos (RIBEIRO, et al., 2006; COSTA, et al., 2021).

Tabela 1 - Análise Bivariada entre a opinião dos usuários sobre **acessibilidade** na unidade de saúde de atenção básica por Macrorregião de Saúde, Paraíba, 2015-2018.

Variáveis	Macrorregião (M)
-----------	------------------

		1ª – João Pessoa	2ª – Campina Grande	3ª – Patos	Total	P valor*
Distância em minutos (min.)	n	2335	1489	1410	5234	
< 30 min.	%	86,3	86,6	86,9	86,5	
30 a 60 min.	%	12,4	12,6	12,2	12,4	0,582
> 60 min.	%	1,3	0,8	0,9	1,1	
Funcionamento da unidade de saúde cinco dias na semana	n	2271	1449	1382	5102	
Sim	%	94,7	90,2	92,3	92,8	0,001
Não	%	5,3	9,8	7,7	7,2	
Atendimento das necessidades dos usuários (horário de funcionamento)	n	2366	1518	1435	5319	
Sim	%	76,8	83,0	86,2	81,1	
Não	%	8,8	5,1	4,9	6,7	0,001
Às vezes	%	14,3	11,9	8,9	12,2	

Fonte: Avaliação Externa/PMAQ, 2015-2018. *Quiquadrado de Pearson

A Tabela 1 refere-se à acessibilidade, foi observado que na maioria dos usuários avaliaram a distância da casa à unidade < 30 minutos (86,5%), com predominância de funcionamento da unidade de saúde nos cinco dias da semana (92,8%) e, que o horário de funcionamento atende as necessidades dos usuários (81,1%).

A avaliação do usuário sobre a acessibilidade em relação à distância, podem estar ligadas ao tempo gasto da sua casa para a unidade e a necessidade de utilização de transportes. Verifica-se diferença significativa entre a satisfação dos usuários das macrorregiões e funcionamento das unidades cinco dias da semana e horário de funcionamento ($p = 0,001$, respectivamente). Os achados referentes à distância no 1º ciclo da PMAQ-AB 2012 em Pernambuco, encontrou uma predominância (73,2%) de pessoas que relataram uma distância menor, da residência para a unidade. Dessa maneira, vê-se que a APS está mais próxima da população como preconizado. Outro fator que influencia na satisfação do cliente está relacionado à presença de consultas diárias (CATALINO, et al., 2021; VIEIRA, et al., 2021).

Tabela 2a. Análise Bivariada entre a macrorregião de saúde e opinião dos usuários sobre acolhimento na unidade de saúde de atenção básica, Paraíba, 2015-2018.

Acolhimento		Macrorregião (M)			Total	P valor*
		1ª – João Pessoa	2ª – Campina Grande	3ª – Patos		
Clareza dos profissionais nas orientações e explicações	n	2382	1524	1441	5347	
Sim	%	88,7	92,8	94,2	91,3	
Não	%	11,3	7,2	5,8	8,7	0,001
Atenção às falas do usuário	n	2382	1524	1441	5347	
Sim	%	90,4	94,4	94,8	92,7	
Não	%	9,6	5,6	5,2	7,3	0,001
Respeito pelo usuário	n	2382	1524	1441	5347

Sim	%	92,7	93,5	93,6	93,2	
Não	%	7,3	6,5	6,4	6,8	0,458
Perguntas sobre outras questões da vida do usuário	n	2352	1492	1427	5271	
Sempre	%	43,7%	52,8	50,3	48,1	
Na maioria das vezes	%	18,5	18,1	16,2	17,8	0,001
Quase nunca/nunca	%	37,8	29,1	33,5	34,1	

Fonte: Avaliação Externa/PMAQ, 2015-2018.

Em referência ao acolhimento (Tabela 2a), foi predominante a clareza dos profissionais nas explicações e orientações (91,3%), atenção às falas dos usuários (92,7%), respeito (93,2%). Observou-se que pouco menos da metade dos profissionais perguntam quase sempre (48,1%) sobre outras questões de vida do cliente. Excetuando a variável respeito pelo usuário ($p = 0,458$), verifica-se diferença significativa ($p = 0,001$) entre as macrorregiões regiões de saúde e a satisfação do usuário nos demais aspectos do acolhimento analisados.

Para satisfação da clientela é de extrema importância que o profissional atente sobre as falas deles, sobretudo, quanto ao atendimento das suas necessidades (queixa principal) e outras situações de vida, para que assim o cuidado seja fornecido na APS e quando necessário seja garantida longitudinalidade do cuidado mediante referência e contrarreferência (VIEIRA, et al., 2021).

Tabela 2b. Análise Bivariada entre macrorregião de saúde e opinião dos usuários sobre acolhimento na unidade de saúde de atenção básica, Paraíba, 2015-2018.

Acolhimento		Macrorregião (M)			Total	P valor*
		1ª – João Pessoa	2ª – Campina Grande	3ª - Patos		
Tempo de espera entre a marcação da consulta e o atendimento com o profissional (em dias)	n	2382	1524	1441	5347	
Médico						
1 dia	%	52,7	35,0	67,5	51,6	0,001
2 a 7 dias	%	22,0	28,5	9,0	20,4	
8 a 120 dias	%	25,3	36,4	23,5	28,0	
Enfermeiro						
1 dia	%	63,9	42,3	66,7	58,5	0,001
2 a 7 dias	%	6,6	16,3	3,7	8,6	
8 a 60 dias	%	29,5	41,3	29,6	32,9	
Cirurgião dentista						
1 dia	%	31,0	25,5	43,9	32,9	0,001
2 a 7 dias	%	15,0	14,6	9,7	13,4	
8 a 120 dias	%	54,0	59,9	46,4	53,7	
Escuta do usuário, na maioria das vezes, sem ter hora marcada	n	2092	1327	1213	4632	
Sim	%	67,4	70,4	76,8	70,7	0,001
Não	%	18,9	13,6	10,5	15,2	
Nunca precisou ir à unidade sem hora marcada	%	13,7	16,0	12,7	14,1	

Fonte: Avaliação Externa/PMAQ, 2015-2018.

Na avaliação do tempo de espera entre os profissionais que atendem na unidade (Tabela 2b), detectou-se que o profissional que tem uma menor espera (1 dia) entre a marcação e o atendimento, é o enfermeiro (58,5%), a maior espera (8 a 120 dias) refere-se ao dentista (53,7%). Constatou-se que na maioria das vezes (70,7%) à escuta sem hora marcada é efetuada pelos profissionais.

Corroborando aos achados, outro estudo aponta que demora no atendimento dos profissionais de saúde bucal deve-se às diferenças de formas de atendimento (demanda espontânea e consultas marcadas), que acabam sobrecarregando o serviço. Em consequência disso, muita usuários deixam de utilizar os serviços da unidade devido a problemas organizacionais ou dificuldades relativas à infraestrutura. Outrossim, a escuta sem hora marcada, também é um importante marcador de satisfação. Fica evidente que a maioria da população estudada foi atendida nesse sentido, consequentemente é aumentado o nível de avaliação positiva dos usufrutuários (VIEIRA, et al., 2021).

Tabela 2c - Análise Bivariada entre as macrorregiões de saúde e opinião dos usuários sobre **acolhimento** na unidade de saúde de atenção básica, Paraíba, 2015-2018.

Acolhimento		Macrorregião (M)			Total	P valor*
		1ª – João Pessoa	2ª – Campina Grande	3ª - Patos		
Atendimento na Unidade Básica de Saúde/Posto de Saúde	n	895	544	457	1896	
Sim	%	83,2	87,9	80,1	83,8	0,003
Não	%	16,8	12,1	19,9	16,2	
Motivo do não atendimento	n					
O atendimento é por ordem de chegada	%	8,6	10,2	14,5	10,6	
Não atende urgência	%	38,1	33,9	19,7	32,1	0,009
Não tinha profissional na UBS	%	34,5	40,7	28,9	34,3	
UBS fechada no momento	%	18,7	15,3	36,8	23,0	
Tempo de espera para receber atendimento sem data marcada	n	701	407	333	1441	
< 60 min.	%	87,9	85,5	94,6	88,8	
60 a 120 min.	%	10,0	13,3	4,8	9,7	0,001
> 120 min.	%	2,1	1,2	0,6	1,5	
Tempo de espera entre consulta e atendimento com data marcada	n	2156	1342	1281	4779	
< 60 min.	%	51,3	51,5	62,1	54,2	0,001
60 a 120 min.	%	40,4	41,4	32,8	38,6	
> 120 min.	%	8,3	7,1	5,2	7,1	

Fonte: Avaliação Externa/PMAQ, 2015-2018.

A tabela 2c mostra que 83,8% dos entrevistados referiram ser atendidos na Unidade de Saúde, entretanto nos casos em que não foi possível o atendimento, o principal motivo foi a ausência dos profissionais na unidade (34,3%). Quanto ao tempo de espera, para o atendimento,

destaca-se que este foi menor (< 60 minutos), para pessoas sem hora marcada (88,8%) em comparação aos usuários com consulta agendada (54,2%).

O processo de agendamento é algo difícil em nível mundial. Ao mesmo tempo que maioria dos usuários efetuam o agendamento, o *absenteísmo* na consulta ainda acarreta malefícios ao cliente e a equipe (POSTAL, et al., 2021).

Apesar de ser referido um tempo de espera inferior a 60 minutos, para alguns usuários, independente do agendamento ou não da consulta, ainda esperam mais que 60 minutos, o que pode contribuir, em alguns casos, para o agravamento do estado de saúde (POSTAL, et al., 2021). Entretanto, é importante destacar que ao agendar um consulta ao mesmo tempo que se pretende atender as necessidades de saúde do usuário, busca-se ampliação do acesso aos serviços de modo possibilitar acompanhamento das condições clínicas, qualidade e humanização do cuidado e redução do custos da atenção à saúde.

4 CONCLUSÃO

A qualidade dos serviços é um marcador de extrema importância para os usuários da Atenção Primária à Saúde, tornando-se necessário a avaliação para o melhor controle dos indicadores. No estudo, percebeu-se que o acolhimento e acessibilidade aos serviços de saúde de atenção primária nas microrregiões de saúde paraibana obtiveram uma avaliação positiva dos usuários em função da infraestrutura e presença próxima a comunidade, escuta e atendimentos de livre demanda. No entanto, ainda existe a ausência de profissionais e dificuldades organizacionais, sobretudo no que tange a marcação de consultas na APS, as quais constituem fragilidades a ser superadas. Apesar da robustez do estudo, ainda se fazem necessárias novas pesquisas a fim de buscar novas estratégias para que o atendimento seja cada vez mais completo e resolutivo.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Coordenação Geral de Avaliação e Acompanhamento do Departamento de Atenção Básica. Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ- AB). Microdados da Avaliação Externa. Brasília, Distrito Federal, 2015.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ): manual instrutivo. Brasília: Ministério da Saúde, 2012b. 138 p.

CANTALINO, J. L. R. et al. User satisfaction in relation to Primary Health Care services in Brazil. **Revista de saúde pública**, v. 55, n. 22, 2021.

COSTA, L. B. et al. Avaliação da qualidade da Atenção Primária à Saúde em Fortaleza, Brasil, na perspectiva dos usuários adultos no ano de 2019. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26, n. 6, p. 2083-2096, 2021.

DUARTE, W. B. A; FALCÃO, T. M L; BELTRÃO, A. B. Núcleo de Apoio à Saúde da Família e a transformação do acolhimento na atenção básica. **Saúde em Debate**, v. 41, n. 115, p. 1061-1074, dez. 2017.

GIOVANELLA, L. et al. Cobertura da Estratégia Saúde da Família no Brasil: o que nos mostram as Pesquisas Nacionais de Saúde 2013 e 2019. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26, p. 2543-2556, 2021.

GUBERT, F. A. et al. Qualidade da Atenção Primária à Saúde infantil em estados da região Nordeste. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26, n. 5, p. 1757-1766, 2021.

LIMA, R. T. S. et al. Saúde em vista: uma análise da Atenção Primária à Saúde em áreas ribeirinhas e rurais amazônicas. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26, n. 6, p. 2053-2064, 2021.

PENCHANSKY, R.; THOMAS, J. W. The concept of access: definition and relationship to consumer satisfaction. **Medical care**, v. 19, n. 2, p. 127-140, 1981.

PERILLO, R. D. et al. Fatores associados à avaliação da Atenção Primária à Saúde na perspectiva do usuário: resultados do inquérito telefônico Vigitel, 2015. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26, n.3, p. 961-974, 2021.

POSTAL, L. et al. Sistema de agendamento online: uma ferramenta do PEC e-SUS APS para facilitar o acesso à Atenção Primária no Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26, n. 6, p. 2023-2034, 2021.

RIBEIRO, M. C. S. A. et al. Perfil sociodemográfico e padrão de utilização de serviços de saúde para usuários e não-usuários do SUS-PNAD 2003. **Ciência & saúde coletiva**, v. 11, n. 4, p. 1011-1022, 2006.

SILVA, G. T. et al. Planejamento e apoio no processo de trabalho das equipes de atenção básica no Nordeste: análise do PMAQ-AB (3º ciclo). **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26, n. 5, p. 1749-1755, 2021.

TAJRA, F. S.; CARDOSO, T. Z.; CARDOSO, O. O. Memórias sobre a avaliação externa do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica no Piauí, Brasil. **Interface-Comunicação, Saúde, Educação**, v. 25, 2021.

VIEIRA, N. F. C. et al. Fatores presentes na satisfação dos usuários na Atenção Básica. **Interface-Comunicação, Saúde, Educação**, v. 25, p. e200516, 2021.

CAPÍTULO 18

AÇÕES INTEGRADAS DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO E SUAS CONTRIBUIÇÕES NA FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO GERONTÓLOGO

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c18](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c18)

Maria do Livramento Lima da Silva¹, Maria Eliane de Paulo Albuquerque², Larissi Ellen Sousa da Silva³, Sarah Gaspar de Matos⁴, Tâmila Yasmim Lima Ferreira⁵, Andrea Carvalho Araújo Moreira⁶

¹ Universidade Estadual Vale do Acaraú, (livramentomaria17@hotmail.com)

² Universidade Estadual Vale do Acaraú, (ellie_albuquerque633@hotmail.com)

³ Universidade Estadual Vale do Acaraú, (larissiellen@live.com)

⁴ Universidade Estadual Vale do Acaraú, (sarynha100@gmail.com)

⁵ Universidade Estadual Vale do Acaraú, (tamilayasmim@gmail.com)

⁶ Universidade Estadual Vale do Acaraú, (andreamoreiraueva@gmail.com)

Resumo

Objetivo: Descrever o processo de organização e desenvolvimento de ações de integração de ensino, pesquisa e extensão do Grupo de Pesquisa e Estudo em Vulnerabilidade e Saúde-GEVS, vinculado ao curso de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú-UVA, do norte do Ceará, e sua contribuição na formação do enfermeiro no cuidado ao idoso. **Método:** Trata-se de um relato de experiência acerca de como se deu o processo de organização e desenvolvimento das atividades do tripé ensino-pesquisa-extensão desenvolvido pelo GEVS no curso de enfermagem. As ações foram desenvolvidas durante os anos de 2020 e 2021, a sistematização das atividades produzidas pelos estudantes gerou relatórios semestrais e anuais, e estes constituíram-se fontes das informações deste relato de experiência. Assim sendo, as informações foram agrupadas e categorizadas em: 1. Criação e organização do GEVS; 2. Ações de ensino-pesquisa-extensão com foco na pessoa idosa; 3. Contribuições das ações de ensino-pesquisa-extensão na formação do enfermeiro gerontólogo. **Resultados e Discussões:** Estas foram analisadas conforme os referenciais da Educação na Saúde, Saúde Coletiva e Enfermagem Gerontológica. Diante disso, faz-se necessário enfermeiros qualificados para atuar diante dos desafios que emergem no contexto do envelhecimento populacional. Nessa perspectiva a formação profissional do enfermeiro deve buscar entender a nova conjuntura social, atender os principais pontos nos quais os estudantes possam compreender a pessoa idosa em sua integralidade dentro de seu meio social e reconhecer seu papel como ser ativo e fundamental no processo de formação. **Considerações Finais** Conclui-se que a experiência de estudantes que são posicionados a desenvolver ações de ensino-pesquisa-extensão permite considerar que o trio é indispensável na formação profissional em saúde, dando importância à complexidade das necessidades dos usuários.

Palavras-chave: Vulnerabilidade em Saúde; Enfermagem; Enfermagem Geriátrica; Educação em Saúde

Área Temática: Ciências da Saúde

E-mail do autor principal: livramentomaria17@hotmail.com

1 INTRODUÇÃO

No Brasil, a formação em saúde já passou por diversas transformações, sendo estas ocasionadas pelas mudanças na assistência em saúde, após a institucionalização do Sistema Único de Saúde (SUS) e a implementação da Lei Orgânica da Saúde (LOS) nº 8080/90 (BRASIL, 1990). Nesse contexto, os profissionais e instituições formadoras da área da saúde foram desafiados a adotarem como pressupostos fundamentais dos cuidados em saúde a promoção da saúde e prevenção de doenças (XIMENES, et.al, 2020). Assim, a formação em saúde ocupa uma dimensão importante para o fortalecimento do SUS, de modo que esta deva garantir a formação de profissionais qualificados sob a égide dos princípios da universalidade, integralidade e equidade (MACHADO, VIEIRA, OLIVEIRA, 2015).

Outrossim, com o objetivo de melhorar o ensino em saúde e estabelecer um perfil de profissionais condizentes com as necessidades em saúde, no ano de 2001, por meio do Ministério da Educação, ocorreu a institucionalização das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), como um estímulo para as Instituições de Ensino Superior (IES) reformularem seus Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) e matriz curricular, a fim de estabelecer competências educacionais, além de vigência das descrições curriculares, horas complementares e carga horária necessária (BRASIL, 2001).

Na enfermagem, as DCNs, surgiram com base na educação e saúde, abordando o sentido da atuação multidimensional, tornando-a baseada em competências educacionais, focando na aprendizagem, empoderamento, para promover um cuidado global em que a população assistida tenha garantia e acesso de qualidade. Nessa perspectiva, cada IES deve prover o princípio da indissociabilidade, que rege a tríade acadêmica, com o intuito de definir o papel da universidade perante a comunidade, englobando os aspectos do ensino, pesquisa e extensão, segundo o Art. 207 da Constituição Federal (BRASIL, 1988).

O ensino refere-se à atuação em aulas, desde os docentes e discentes, com enfoque no aprendizado, o segundo pilar engloba a pesquisa universitária, caracterizada pela produção de novos conhecimentos, por meio do trabalho e investigação científica, composto por grupos de pesquisa, iniciação científica e pesquisa de campo, por exemplo. Por fim, tem-se a extensão universitária, sendo o principal meio para difusão de conhecimentos acadêmicos à comunidade, cumprindo a missão das IES, em contribuir de maneira prática e direta compartilhando saberes teóricos em atividades voltadas à sociedade, oferecendo um diferencial, comumente vivenciado nas ligas acadêmicas (BRASIL, 1996).

Sob essa conjuntura, o Grupo de Pesquisa e Estudo em Vulnerabilidade e Saúde (GEVS), vinculado ao curso de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú-UVA, do norte do Ceará, tem reunido docentes e discentes interessados na área da enfermagem gerontológica, na perspectiva de desenvolver ações integradas de ensino, pesquisa e extensão que favoreçam a formação do enfermeiro gerontólogo com atuação crítica e reflexiva para assistir idosos, suas famílias e cuidadores. Desse modo, é indubitável que a implementação do tripé acadêmico torna-se essencial para um cuidado direcionado a essas populações vulneráveis, que atenda às suas particularidades, em especial a pessoa idosa. Reconhece-se a complexidade das situações de vulnerabilidades vivenciadas pela pessoa idosa, seja de cunho social, físico ou mental que requer um agir complexo no cuidado ao idoso.

Sabe-se que o envelhecimento populacional é um fenômeno observado mundialmente, portanto enfatiza-se a necessidade do preparo de profissionais de enfermagem para o cuidado a esse público. Além disso, ressalta-se que a gerontologia envolve tanto a manutenção e promoção em saúde, como prevenção de doenças, promoção do autocuidado, com o objetivo de restaurar e atingir um bom grau de funcionamento, proporcionando independência e autonomia nas atividades diárias, inclui também conforto e dignidade até a morte. O que difere

do cuidado a outros públicos, reafirmando a importância do aprofundamento na área ao longo da formação em enfermagem, proporcionada pelas atividades extracurriculares, embasados no tripé universitário (ELERS, GILBERT, AVILA, 2016).

Sendo assim, o estudo objetivou-se em descrever a experiência dos estudantes de graduação de enfermagem, vinculados ao Grupo de Pesquisa e Estudo em Vulnerabilidade e Saúde (GEVS) no desenvolvimento de ações integradas de ensino, pesquisa e extensão e sua contribuição na formação do enfermeiro no cuidado ao idoso.

2 MÉTODO

Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência desenvolvido durante os anos de 2020 e 2021. As evidências deste estudo descrevem o processo de elaboração e desenvolvimento das atividades do tripé ensino-pesquisa-extensão dos estudantes de enfermagem do Grupo de Estudos e Pesquisa em Vulnerabilidade e Saúde - GEVS da Universidade Estadual Vale do Acaraú.

O GEVS – área temática saúde do idoso é formado por 27 integrantes, no qual participam acadêmicos do curso de enfermagem, bem como estudantes de pós-graduação *stricto-sensu*. O grupo está vinculado ao Curso de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA, em Sobral, no Ceará.

Fundada em 1968, a Universidade tem o tripé-universitário como um fator imprescindível para a sua educação, criando um espaço em que os acadêmicos além de aprenderem como atuar em sua profissão poderão contribuir para o desenvolvimento da sociedade através da pesquisa e da extensão (MONT'ALVERNE; ALBUQUERQUE, 2018).

No que se refere ao curso de enfermagem, este se destaca pelo protagonismo discente, através das ações desenvolvidas pelas ligas acadêmicas e pelos projetos de extensão, que visam principalmente promover saúde à comunidade. Destarte, os grupos de pesquisa do curso têm sido responsáveis pela publicação de diversos estudos de grande relevância na área da saúde, contribuindo assim para a ciência e para a sociedade.

As ações de ensino-pesquisa-extensão foram planejadas de forma remota por meio de encontros quinzenais via *Google Meet*, uma plataforma online de videoconferência (APPS GOOGLE, 2021), dada a necessidade de seguir as recomendações do isolamento social como forma de conter o avanço do vírus (SILVA et al, 2021).

As ações foram estabelecidas de acordo com as necessidades dos integrantes, bem como foram consideradas as vulnerabilidades da pessoa idosa, vivenciadas nesse contexto de pandemia da COVID-19. Para isso, foi elaborado um cronograma que continha prazo e objetivo das atividades.

A sistematização das atividades produzidas pelos estudantes gerou relatórios semestrais e anuais, e estes constituíram-se fontes das informações deste relato de experiência. Assim sendo, as informações foram agrupadas e categorizadas em: 1. Criação e organização do GEVS; 2. Ações de ensino-pesquisa-extensão com foco na pessoa idosa 3. Contribuições das ações de ensino-pesquisa-extensão na formação do enfermeiro gerontólogo. Estas foram analisadas conforme os referenciais da Educação na Saúde, Saúde Coletiva e Enfermagem Gerontológica.

Ressalta-se que o estudo considerou as diretrizes da Resolução 466/12, que regulamenta as pesquisas científicas que envolvem seres humanos, e respeitou os princípios da bioética, a beneficência, não maleficência, Justiça e autonomia (BRASIL, 2012).

Cabe salientar que o contato dos estudantes de enfermagem com os ensinamentos curriculares de enfermagem gerontológica ocorrem durante o sexto semestre da graduação em enfermagem, durante os módulos de Envelhecimento e Vivências de extensão III, em que os alunos são capacitados para lidar com a pessoa idosa nos mais diversos cenários de atuação profissional, de forma a entender o complexo de mudanças inerentes a fase do ciclo de vida e suas repercussões, implicações do adoecimento, promoção e educação em saúde, tendo como objetivo capacitar os

acadêmicos a promoverem ações que visem a implantação de envelhecimento ativo, preservando a funcionalidade dos indivíduos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Criação e organização do GEVS

O Grupo de Pesquisa e Estudo em Vulnerabilidade e Saúde (GEVS) teve seu início durante o ano de 2017, a partir da integração de docentes, que antes desenvolviam suas atividades de pesquisa e extensão separadamente. Desse modo, quatro professores doutores do curso de enfermagem da UVA com expertise nas áreas de Deficiência, Saúde do idoso, Saúde Cardiovascular e Criatividade e Saúde, traçaram como eixo incomum a questão da vulnerabilidade em saúde e resolveram potencializar as atividades do grupo com intuito de fortalecer as atividades de pesquisa e extensão.

Ressalta-se que para a escolha do enfoque às vulnerabilidades em saúde os pesquisadores levaram em consideração suas vivências práticas e científicas, então, as atividades realizadas de ensino, pesquisa e extensão pelos integrantes do GEVS, têm envolvido o cuidado em saúde, buscando o desenvolvimento de tecnologias educativas e em saúde para melhoria da qualidade de vida.

Nesse contexto, o GEVS foi incorporando além dos estudantes de graduação e pós-graduação, os profissionais do serviço de saúde. Portanto, este se apresenta como uma nova forma de imersão dos conteúdos teóricos abordados na graduação, de forma a desenvolver o tripé acadêmico com criticidade, além do desenvolvimento de novas habilidades diferenciais nos participantes com impacto na formação acadêmica e no retorno social por intermédio da pesquisa específica e da extensão.

Ações de ensino-pesquisa-extensão com foco na pessoa idosa

A articulação entre a pesquisa, o ensino e a extensão ultrapassam diversas barreiras. Dando ao profissional a capacidade de contextualizar, compreender e aplicar o conhecimento de maneira multidimensional, transformando o meio social ao qual está inserido, a partir de um olhar crítico e expandido. São atividades que compõem o ensino superior, que se contemplam e se completam, agindo em conformidade. Nesse sentido, a extensão universitária permite que o estudante ajude a sociedade, socialize com os indivíduos os conhecimentos adquiridos ao longo da formação e diminua o espaço entre a universidade e o campo, de forma a levá-la para dentro dos limites da comunidade. Mas a extensão vai além de prestar serviços ao povo, promovendo ações acerca do processo saúde-doença, ela atua também como um ramo expandido do ensino e da pesquisa (COSTA et al, 2013).

Nesse sentido, o grupo tem a intenção de promover ações voltadas para a capacitação dos próprios membros e para a melhoria da qualidade de vida dos idosos, a partir da identificação de suas necessidades. No ano de 2020 e 2021, o grupo da linha saúde do idoso do GEVS realizou dois cursos de extensão referente à pesquisa, um sobre a construção de um projeto de pesquisa com ênfase na pessoa idosa, intitulado Elaboração de Projeto de Pesquisa na Área do Envelhecimento, visando auxiliar o aluno no domínio das diferentes etapas que regem a construção de um projeto, e o outro intitulado Capacitação sobre Estratégia de Busca.

Em julho de 2021, os acadêmicos, sob a orientação da professora coordenadora do grupo, iniciaram um projeto de extensão com idosos, denominado de “Coroas na rede”, cujo um dos seus objetivos é promover a autonomia e independência dos idosos com o manejo das tecnologias. Esse projeto acontece aos sábados, sendo um momento para se trabalhar o uso dos mais diversos dispositivos tecnológicos de fácil alcance que estão disponíveis dentro do meio social. Vale destacar que para criar um vínculo com os idosos que participavam das atividades foi criado um grupo no *WhatsApp*, na qual por meio dele foram enviados os convites dos encontros, os *links* das reuniões e mensagens motivacionais.

Dentre outras ações, o grupo conta com atividades que estimulam a pesquisa científica que preparam o aluno, sendo a porta principal que direciona os estudantes ao aprendizado de técnicas e modelos de pesquisa, trabalhando, assim, sua criticidade e a criatividade, de forma a complementar suas formações (DUMER; SOUZA; ROCHA, 2018). Assim que ingressam no grupo os membros são incentivados a desenvolverem habilidades de pesquisa científica.

Das temáticas trabalhadas no âmbito da pesquisa cita-se: submissão e publicação de artigos em periódicos indexados, como se dá a escrita de resumos científicos e como cadastrar e atualizar o currículo na plataforma *Lattes*, revisões, com destaque a revisão de escopo, tendo em vista que o grupo estava em processo de produção de um *Scoping Review*. Além disso, aprofundamento sobre *software* para análise de estudos quantitativos e qualitativos.

O grupo também participa de editais de fomento. Atualmente uma pesquisa foi contemplada pelo projeto Bolsa de Produtividade em Pesquisa, Estímulo à Interiorização e à Inovação Tecnológica – BPI, com duração de 24 meses, intitulada Enfrentamento da pandemia COVID-19 pela pessoa idosa: levantamento de indicadores e construção de bundles para o cuidado de enfermagem gerontológica, está em processo de desenvolvimento.

Quanto ao ensino, o conhecimento se caracteriza a partir das etapas de produção, compreensão e transmissão, e a sua promoção permite que o emissor das informações capacite e desenvolva suas metodologias, aprimorando a forma como o conhecimento é transmitido, além de garantir a absorção dos mesmos por agentes passivos (SILVA; MENDOZA, 2020).

No sistema curricular do curso de Enfermagem, os conteúdos estão inseridos em um sistema modular integrado, de forma que todos os conhecimentos teóricos e práticos estejam interligados. Assim, o cuidado ao idoso está inserido dentro do módulo de envelhecimento, permitindo que os alunos apropriem-se do amplo campo que são os aspectos da saúde do idoso.

A tríade universitária enfatiza a complementação desses elementos. O ensino superior se desenvolve por meio de estudo científicos primários realizados a partir da inserção dos indivíduos em um meio caracterizado com problemas sociais, onde só são possíveis de serem identificados por meio dos trabalhos de extensão, quando a universidade invade os espaços extramuros (SILVA; MENDOZA, 2020).

Contribuição para a formação do enfermeiro no cuidado ao idoso

A Lei de Diretrizes Curriculares Nacionais, aprovada em 2001, sustenta a necessidade de os princípios e diretrizes do SUS serem inseridos como dispositivos chaves na formação de um profissional, estando apto para intervir no processo saúde-doença, de maneira eficaz, a fim de diminuir os espaços que existem entre a formação e assistência (BRASIL, 2001).

Assim, faz-se necessário enfermeiros qualificados para atuar diante dos desafios que emergem no contexto do envelhecimento populacional. Nessa perspectiva a formação profissional do enfermeiro deve buscar entender a nova conjuntura social, atender os principais pontos nos quais os estudantes possam compreender a pessoa idosa em sua integralidade dentro de seu meio social e reconhecer seu papel como ser ativo e fundamental no processo de formação (ALMEIDA et al, 2018).

Dessa forma, tão importante quanto à formação do estudante por meio do ensino, é a sua inserção nas práticas de extensão, pois é por meio delas que são encontradas as melhores alternativas para enfrentar uma situação problema vivida pelos idosos, e assim compreenda, a partir do uso dos conhecimentos apreendidos ao longo da graduação a vivenciar todos os fenômenos e vulnerabilidades sociais relacionadas às pessoas idosas, tornando as práticas exercidas resolutivas e condizentes com os desafios na articulação entre o SUS e a saúde da pessoa idosa. (ALMEIDA et al, 2018).

Preconceitos associados ao processo de envelhecimento, também são minimizados a partir de uma formação comprometida com as necessidades de saúde dos idosos. A busca por conhecimentos e práticas frente às vulnerabilidades dos idosos fundamentam-se na necessidade

de investir em pesquisas que favoreçam uma formação mais ampla desses futuros profissionais (ALBUQUERQUE et al, 2019).

Por vezes, ao desenvolvimento insuficiente de pesquisas, os enfermeiros se formam com noções errôneas acerca dos idosos, o que leva a enxergá-los como seres idênticos entre si, sem notar suas singularidades, generalizando toda a classe como pessoas iguais quanto às condições físicas, cognitivas, avaliando-os da mesma maneira e traçando os mesmos planos terapêuticos para cada um (SILVA; MENDOZA, 2020).

Essa necessidade é uma entre as inúmeras prioridades da enfermagem, justificando a importância de se desenvolver pesquisas acerca dos idosos, buscando por mudanças na estrutura e na política, de forma a torná-las possíveis e reais, melhorando a qualidade de vida deles. Para uma sociedade com condições mais confortáveis para a pessoa idosa, há uma necessidade de acabar com as noções deturpadas sobre a velhice, a partir de conceitos modernos da ciência (ALBUQUERQUE et al, 2019).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência vivenciada por estudantes de enfermagem no desenvolvimento de ações de ensino-pesquisa-extensão permite considerar que estas são imprescindíveis no processo de formação do profissional de saúde, tendo em vista que para um agir complexo frente às necessidades em saúde de um indivíduo, família ou coletividade são necessárias competências técnicas, científicas e socioemocional.

Assim, foi possível perceber ao longo dessa trajetória que as atividades integradas de ensino-pesquisa-extensão favorecem à formação dos estudantes de enfermagem no cuidado ao idoso, na medida em que promove um maior domínio na área gerontológica, uma visão crítica sobre a atenção a saúde do idoso, possibilitando o desenvolvimento de uma postura ativa no desenvolvimento da ciência em enfermagem, por meio do estabelecimento de critérios científicos para execução da prática, os qualificando enquanto profissionais.

Por fim, ressalta-se que apesar das evidências tratadas neste relato de experiência ter suas limitações, por considerar apenas uma realidade local, os resultados podem ser úteis para motivar a comunidade acadêmica na identificação de estratégias que fortaleçam o tripé universitário com vistas à excelência na formação profissional.

5 REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, E. G. L; MARTINS, J. J; LORENZINI, J. S. A. Políticas públicas de atenção à saúde do idoso: reflexão acerca da capacitação dos profissionais da saúde para o cuidado com o idoso. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, 2007. Acesso em: 16 de Ago. 2021

ALMEIDA, C. A. P. L; MOREIRES, W. C; CARVALHO, A. R. B; LAGO, E. C; AMORIM, F. C. M; ALENCAR, D. C. Formação de estudantes de Enfermagem para atenção integral ao idoso. **Original Articles**, 2018. Acesso em: 18 de Ago. 2021

APPS GOOGLE. O que é o Google Meet. EUA, 2021. Disponível em: <https://apps.google.com/intl/pt-BR/meet/how-it-works/>. Acesso em: 15 Ago. 2021.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. **Diário Oficial da União** 1988; 5 out.

BRASIL. Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. **Diário Oficial da União** 1990;)

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, DF, Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm. Acesso em 16 de Ago. 2021.

BRASIL. **RESOLUÇÃO Nº 466, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012**. Dispõe sobre as normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Conselho Nacional de Saúde. Brasília. 2012. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2013/res0466_12_12_2012.html. Acesso em: 31 Ago. 2021.

BRASIL. **RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 2, DE 11 DE SETEMBRO DE 2001**. Institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Brasília, DF, Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm. Acesso em: 18 de Ago. 2021

COSTA, C. L. N. A; DIVINO, A. E.A; OLIVEIRA, C. E. L; COSTA, C. A. C; NETA, H. R. S; CAMPOS, L. S; MENEZES, R. M. J; CABRAL, S. C. A extensão universitária quebrando barreiras. **Cadernos de Graduação – Ciências Humanas e Sociais – UNIT – SERGIPE**, v. 1, n.2, 2013. Acesso em: 17 de Ago. 2021

DUMER, M.C.R; SOUZA, M.M; CARVALHO, N; ROCHA, L.Q. A relevância da pesquisa científica para o graduando de administração: análise da percepção dos discentes. **Cadernos da FUNCAP**, v.17, n. 31, 2018.

ELERS MASTRAPA, Yenny; GIBERT LAMADRID, María del Pilar; AVILA SANCHEZ, Mario. Da enfermeira geral à enfermeira geriátrica. **Rev Cubana Enfermer**, Cidade de Havana, v. 32, n. 4, dez. 2016 Disponível em <http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192016000400018&lng=es&nrm=iso>. Acessado em 16 de agosto de 2021.

MACHADO MH, Vieira ALS, Oliveira E. Gestão, Trabalho e Educação em Saúde: perspectivas teórico-metodológicas. In: Baptista TWF, Azevedo CS, Machado CV, organizadoras. **Políticas, planejamento e gestão em saúde: abordagens e métodos de pesquisa** Rio de Janeiro: Fiocruz; 2015. p. 294-321.

MONT'ALVERNE, G. G. S; ALBUQUERQUE, I. M. N. **Cinquentenário da Universidade Estadual Vale do Acaraú 1968-2018**. Sobral: Edições UVA, 2018.

SILVA, F. C. DA *et al.* Isolamento social e a velocidade de casos de covid-19: medida de prevenção da transmissão. **Revista Gaucha de Enfermagem**, Rio Grande do Sul, v. 42, p. e20200238, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1983-1447.2021.20200238> . Acesso em: 16 Ago. 2021.

SILVA, M. F; MENDOZA, C. C. G. A importância do ensino, pesquisa e extensão na formação do aluno do Ensino Superior. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**. Ano 05, Ed. 06, Vol. 08, pp. 119-133. Junho de 2020. ISSN: 2448-0959, Acesso em: 16 de Ago. 2021.

XIMENES, F.G.R et al. Reflexões sobre a formação em Enfermagem no Brasil a partir da regulamentação do Sistema Único de Saúde. **Ciência & Saúde Coletiva** [online]. 2020, v. 25, n. 1 [Acessado 1 Setembro 2021] , pp. 37-46. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1413-81232020251.27702019>>. Epub 20 Dez 2019. ISSN 1678-4561. <https://doi.org/10.1590/1413-81232020251.27702019>.

CAPÍTULO 19

ACUPUNTURA AURICULAR COMO FERRAMENTA ASSISTENCIAL PARA ALÍVIO DA DOR DURANTE O PERÍODO PARTURITIVO

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c19](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c19)

Cassia Larissa¹, Maryne Lisboa², Max Oliveira³

¹Universidade Tiradentes, (cassialarissasantos19@gmail.com)

²Universidade Tiradentes (lisboamaryne@outlook.com)

³Universidade Tiradentes, (maxoliver19@hotmail.com)

Resumo

Introdução: A acupuntura auricular é oriunda da Medicina Tradicional Chinesa e é utilizada em várias disfunções do organismo. Foi oficializada pela Organização Mundial de Saúde como um método pouco invasivo e que mostra bons resultados, especialmente para área ginecológica e obstétrica. **Objetivos:** Identificar resultados acerca da acupuntura auricular como ferramenta assistencial para alívio da dor durante o período parturitivo. **Materiais e Método:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, subsidiada por busca nas bases Scientific Electronic Library Online, ScienceDirect, National Library of Medicine e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, nos idiomas inglês e português. A eleição dos estudos ocorreu entre março e maio de 2021. A busca foi refinada por adesão aos Descritores em Ciências da Saúde e ao operador booleano AND. **Resultados:** O levantamento nas bases científicas resultou em seis artigos. A avaliação da dor foi feita por meio da EVA e pela percepção das parturientes antes e após o tratamento. Ao analisar os artigos constatou-se que a auriculoterapia é eficiente no tocante ao alívio da dor com 89,6% de eficácia. Ao considerar que a dor na fase ativa do TP é progressiva, apenas o fato de não ter aumentado a intensidade demonstra eficácia do cuidado. **Considerações finais:** A auriculoterapia mostrou-se eficiente no alívio da dor durante o TP, sem ocasionar efeitos adversos para a mãe ou para o neonato. Desse modo, é imprescindível a busca de subsídios científicos para ampliar a utilização dos métodos não farmacológicos, principalmente para o alívio da dor.

Palavras-chave: Gestação; Trabalho de Parto; Auriculoterapia.

Área Temática: Ciências da Saúde

E-mail do autor principal: cassialarissasantos19@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

O parto pode ser uma experiência emocionante na vida da mulher e família, contudo, também pode estar associado a sentimentos negativos como medo e insegurança, possivelmente envolvidos pelo mito de algo intolerável e doloroso fisicamente (ALMEIDA; OLIVEIRA, 2005; DAVIM et al., 2008; LEMOS et al., 2014).

A dor no trabalho de parto está envolvida com uma complexidade de respostas neurocomportamentais, pessoais e únicas (PEREIRA et al., 2011). Assim, torna-se imprescindível a identificação de fatores estressores, os quais subsidiaram o planejamento de ações para redução de desconfortos e sentimentos negativos, propiciando uma assistência direta, individualizada e humanizada à parturiente (ALMEIDA; OLIVEIRA, 2005; PEREIRA et al., 2011).

A percepção da parturiente sobre a dor não depende somente de fatores biológicos como a intensidade e duração das contrações uterinas, a condição física da gestante, mas também de fatores psíquicos, sociais e culturais, ou seja, das experiências prévias, das expectativas geradas durante a gestação e da ausência do acompanhante (MAFETONI et al., 2019).

Nessa perspectiva, diversos métodos terapêuticos vêm sendo utilizados há milênios, em diversos povos e culturas, para o cuidado, a manutenção e recuperação da saúde (BORGES et al., 2011). Neste âmbito, desde 1970, a Organização Mundial de Saúde (OMS), incentiva o desenvolvimento de políticas públicas para o uso racional e integrado do recurso terapêutico chinês nos sistemas nacionais de atenção à saúde (BRASIL, 2017).

Sabe-se que a Medicina Tradicional Chinesa (MTC) é uma das artes médicas mais antigas da humanidade, presume-se que na idade da pedra, pessoas já utilizavam alguns dos conhecimentos constituintes dessa medicina, com objetivo de aliviar dores (SOUZA; LUIZ, 2011).

No Brasil, desde a década de 80, houve a legitimação e institucionalização das Práticas Complementares em Saúde (BARROS et al., 2007). A 8ª Conferência Nacional de Saúde, por exemplo, foi considerada um marco para introdução de práticas alternativas assistenciais no âmbito público. Em 2006, a Medicina Tradicional Chinesa (MTC) ganhou notoriedade com a

Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) (BRASIL, 2006).

As Práticas Alternativas e Complementares (PAC) consistem em técnicas e métodos capazes de promover a saúde e o bem-estar, baseadas em conhecimentos tradicionais. Estas, são frequentemente utilizadas por enfermeiros obstetras e obstetrizes, com intuito de protagonizar a mulher no período parturitivo, viabilizando uma experiência positiva e humanizada (UPIS, 2019). Ademais, agrega-se características como baixo custo e a elevada efetividade (MONTEIRO, 2012).

No contexto das PAC destaca-se o uso da acupuntura para a promoção, manutenção e recuperação da saúde, com o objetivo terapêutico ou analgésico. Acredita-se que através da estimulação de pontos específicos do corpo, ocorra a liberação de neurotransmissores e substâncias responsáveis pelas respostas de promoção de analgesia, restauração de funções orgânicas para se atingir um efeito terapêutico ou homeostático (BRASIL, 2015).

Dessa forma, sabe-se que essa terapia oferece grande eficácia em diversas afecções, além de inúmeras vantagens a quem as utiliza, como: diminuição no uso de medicamentos, ausência de efeitos colaterais, instrumentação simples, de baixo custo e fácil transporte, e complementaridade terapêutica, quando a medicina convencional não é capaz de proporcionar um tratamento satisfatório (BRASIL, 2017).

Como ramo da acupuntura, a Auriculoterapia foi oficializada pela OMS como terapia de microsistema. Por ser um método pouco invasivo e que mostra bons resultados, tem sido cada vez mais aceito (UPIS, 2019). A auriculoterapia foi batizada por volta de 1950, pelo médico francês Paul Nogier. À época, foi estabelecida uma relação dos pontos do pavilhão auricular com a figura de um feto na posição invertida. Essa técnica é indicada para tratar diversos distúrbios; alívio de dores agudas e crônicas, certos distúrbios mentais, intoxicação por uso de drogas, tabaco e medicação. É realizada com agulhas semipermanentes, instrumentos para estimulação dos pontos, sementes ou imãs (KUREBAYASHI et al., 2012).

O alívio da dor pela auriculoterapia é explicado pela liberação de substâncias opioides como a endorfina, serotonina e encefalina, espécies de analgésicos naturais que propiciam o alívio de dores e a sensação de bem-estar (FERREIRA, 2010; MENEZES; MOREIRA; BRANDÃO, 2010; SECA, 2011; SILVÉRIO; LOPES; SEROISKA, 2013). Dessa forma, a inserção da auriculoterapia no ciclo gravídico e puerperal favorece uma assistência humanizada a gestantes. O enfermeiro obstetra e acupunturista desempenham um importante papel para

diminuição do estado de ansiedade, estresse e dor (HOGA; REBERTE, 2006).

Diante do exposto, torna-se imprescindível conhecer e consolidar dados acerca do efeito da acupuntura auricular para analgesia no período parturitivo, possibilitando a construção de uma boa vivência do trabalho de parto. Assim, surgiu o interesse em “Identificar na literatura nacional e internacional os resultados acerca da acupuntura auricular como ferramenta assistencial para alívio da dor durante o período parturitivo”.

2 MÉTODO

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. É um método de revisão mais amplo, pois permite incluir estudos com diferentes abordagens metodológicas. Os estudos incluídos na revisão são analisados de forma sistemática em relação aos objetivos, materiais e métodos, permitindo que o leitor analise o conhecimento pré-existente sobre o tema investigado (POMPEO; ROSSI; GALVÃO, 2009).

Para tal, foram seguidas seis fases distintas: 1) identificação do tema e seleção de hipóteses ou questão de pesquisa para a elaboração da revisão integrativa; 2) estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos/amostragem ou pesquisa de literatura; 3) definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados/categorização dos estudos; 4) avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa; 5) interpretação dos resultados e 6) apresentação da revisão/síntese do conhecimento (BOTELHO ET AL., 2011; GANONG, 1987; GALVÃO et al., 2004; CROSSETTI, 2012; MENDES et al., 2008; POMPEO et al., 2009; SOUZA et al., 2010).

Diante do exposto, foi lapidada a seguinte questão norteadora: Quais os resultados disponíveis na literatura nacional e internacional acerca da acupuntura auricular como ferramenta assistencial para alívio da dor durante o período parturitivo?

O levantamento de dados foi realizado nas bases de dados: Scientific Electronic Library Online (Scielo), ScienceDirect, National Library of Medicine (Pubmed) e Literatura LatinoAmericana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), além disso, foi utilizado o Google Acadêmico para acesso a literatura cinza. Os descritores utilizados para busca bibliográfica estão de acordo com os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) / Medical Subject Headings (Mesh), assim como o operador booleano AND (Quadro 01).

Quadro 01: Descritores e estratégia de busca da pesquisa, 2021.

DESCRITORES		
DECS/ MESH	PORTUGUÊS	Auriculoterapia, trabalho de parto, alívio da dor, dor.
	INGLÊS	Auriculotherapy, labor, Obstetric, pain relief, pain.
ESTRATÉGIAS DE BUSCAS		
INGLÊS	Auriculotherapy AND Pain AND Labor AND Obstetric Auriculotherapy AND “Pain relief” AND Labor AND Obstetric	
PORTUGUÊS	Auriculoterapia AND dor AND trabalho de parto AND obstétrica Auriculoterapia AND “alívio da dor” AND trabalho de parto AND obstétrica	

Fonte: Elaborado pelas pesquisadoras, 2021.

Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos estudos foram artigos originais, disponíveis na íntegra, gratuitamente, publicados nos idiomas inglês e português, no período de 2009 a 2021. Já os critérios de exclusão foram artigos duplicados, resumos de congresso.

As buscas foram realizadas entre março e maio de 2021 pelas pesquisadoras principais de forma independente. Inicialmente os estudos foram selecionados pela leitura dos títulos e resumos. Em seguida, os estudos nomeados foram conferidos pelos pesquisadores e encaminhados para leitura integral, facilitando a seleção final da amostra.

O estudo não foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), entretanto, os pesquisadores arcam com total responsabilidade em citar todos os autores dos artigos utilizados, seguindo assim os preceitos, diretrizes e normas regulamentadoras da resolução 510/16 do Conselho Nacional de Saúde e Lei nº12.835/13 que relata sobre direitos autorais.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Seis artigos compuseram a amostra dessa revisão, sendo um estudo oriundo da base Scielo, dois na Lilacs e três no Pubmed. Houve predomínio de publicações delineadas como Ensaios Clínicos Randomizados (ECR). Em relação ao qualis interdisciplinar, dois artigos foram A2,

um B2 e três B3. Os estudos foram publicados nas revistas que aborda temas de diversa área da saúde no ano de 2009 a 2019. Para avaliação da intensidade da dor durante o TP, destaca-se nas pesquisas a Escala Visual Analógica (EVA).

Os benefícios da Acupuntura são historicamente reconhecidos. Especificamente na área da saúde da mulher são observados resultados que impactam no equilíbrio do sistema reprodutor, possibilitando até o tratamento de condições associadas a infertilidade. No ciclo gravídico, a acupuntura é uma das práticas alternativas e complementares que viabilizam a homeostase do binômio quando adequada e oportunamente aplicada (CHEROBIN et al., 2016).

Martini et al. (2009) em um estudo de caráter qualitativo, com 31 mulheres com idade entre 12 e 42 assistidas em parto vaginal na maternidade do Hospital Universitário Federal de Santa Catarina (HU) apesar da desinformação acerca da técnica e seus benefícios, as voluntárias acreditaram na possibilidade de analgesia e demonstraram-se dispostas a experimentar. De forma específica, Cherobin et al. (2016) realizaram uma pesquisa convergente assistencial com participação de 19 parturientes admitidas no centro obstétrico, as mesmas possuíam idade entre de 18 a 35 anos. Para a avaliação de dor durante o TP, foi utilizada a EVA.

Para o tratamento da auriculoterapia o tempo mínimo foi estabelecido 30 minutos. A maioria da parturientes 63% (n=12), permaneceu 1h. Apenas 36% (n=7) persistiram até 1h30min, 10,5% (n=2) finalizaram o tratamento com 2h e 5,2% (n=1) das parturientes encerrou após 5h30min. Em relação à análise da redução da dor, foi notório que 79% (n=15) das mulheres obtiveram algum alívio nos 30 minutos iniciais. Após 1h, 46% (n=6) permaneceram com o mesmo grau de dor e 31% (n=4) obtiveram um alívio maior. Após 1h30min, essas parturientes referiram piora no sintoma 31% (n=4). Quando questionadas sobre a eficácia do tratamento durante o trabalho de parto, 89,6% (n=17) das entrevistadas responderam que houve alívio da dor.

Mafetoni et al. (2016) realizaram um estudo clínico randomizado envolvendo 30 parturientes admitidas em um hospital de São Paulo e divididas em três grupos: auriculoterapia por microesferas de cristais, grupo placebo e grupo controle. A avaliação da dor foi realizada por meio da EVA e pela percepção das parturientes antes e após o tratamento em cada grupo.

Os resultados apontaram que 80% das mulheres no grupo intervenção, 70% nos grupos placebo e controle não conheciam esta terapia. A média da intensidade da dor durante o trabalho de parto no grupo intervenção foi de 16,1 minuto a menos que a do grupo placebo e 47,6 minutos

a menos que a do grupo controle, após tratamento. A taxa de cesárea apresentou-se maior no

grupo controle e foi igual no grupo intervenção e placebo.

De forma semelhante, Abedi et al. (2017) elegeram 80 mulheres nulíparas em dois grupos, auriculoterapia (n=40) e controle (n=40). A média da intensidade da dor durante a fase ativa do trabalho de parto foi menor no grupo auriculoterapia em comparação ao grupo controle.

De forma similar Valiani et al. (2018), realizaram um ensaio clínico randomizado com 84 mulheres primíparas com idade entre 18 a 35 anos, divididas em grupo de intervenção (auriculoterapia n=42) e grupo controle (n=42). A avaliação da dor foi o Questionário Padrão Curto de McGill com Escala Visual Analógica (EVA). Após realizar a estimulação com auriculoterapia, a intensidade de dor no grupo de intervenção foi menor do que no grupo controle.

Mafetoni et al. (2019) elegeram 102 parturientes para um estudo clínico randomizado, distribuídas em três grupos: grupo intervenção (GI), com microesferas de cristais polido de 1,5 mm, grupo placebo (GP), com microesferas de vidro e grupo controle (GC) sem intervenção. A equipe de avaliação foi construída por cinco técnicos de enfermagem da unidade obstétrica, que foram treinados para coleta de dados da pesquisa e uso da escala visual e analógica (EVA). As questões pré-elaboradas e a EVA foram aplicadas na admissão das mulheres no estudo e após reaplicada com 30, 60 e 120 minutos. A percepção e intensidade da dor foram menores nas parturientes do grupo intervenção. A redução nos escores da escala visual analógica (EVA) nos períodos estudados foi pequena no GI, entretanto, esta característica não se apresentou no GP e GC, com aumento dos escores da EVA e maior risco de respostas “piorou a dor” entre as participantes. Ao considerar que a dor na fase ativa do TP é progressiva, apenas o fato de não ter aumentado a intensidade demonstra eficácia do cuidado dispensado.

Há na medicina tradicional chinesa, técnicas que auxiliam no controle da dor a partir da estimulação, por pressão de pontos específicos do corpo humano, tais como acupuntura e a auriculoterapia. Elas vêm sendo amplamente estudadas no contexto da ginecologia e da obstetrícia, mostrando-se eficazes e com isso, indicadas durante o trabalho de parto com fins de reduzir a dor e de induzir o parto (MAFETONI et al., 2019; MAFETONI et al., 2016).

Nesse âmbito, as técnicas de acupuntura alojam estimuladores em pontos específicos durante o processo de TP, para amenizar dores e desconfortos durante a expulsão do feto. Uma vez que os canais de energias estão em equilíbrio, a relação materna com o feto se torna mais profunda pelo fato de estar mais preparada para as mudanças fisiológicas, não transferindo estresse ou tensão para o feto (MARTINI; BACKER, 2009).

Salienta-se que o uso dessas técnicas é direcionado para o período parturitivo, pois a estimulação de pontos e áreas auriculares fora dessa fase possibilita contrações e um possível

trabalho de parto pré-termo. Especialistas chamam atenção para a área em torno do punho, pois sua estimulação pode prejudicar o bem-estar do feto através das contrações uterinas (MARTINI; BECKER, 2009).

Com relação a redução da dor na parturiente, a literatura mostra uma similaridade com relação a eficácia da referida técnica. Ressalta-se que além do efeito analgésico, a auriculoterapia também contribui para o aumento das contrações, dilatação, redução do tempo de trabalho de parto, redução da taxa de cesariana (SILVA et al., 2011).

Portanto, existe no sistema único de saúde esse método de tratamento totalmente natural e de fácil acesso que muitas vezes a falta de conhecimento permite o desconhecimento, neste caso, é de extrema importância o acompanhamento de gestação através do pré-natal, a princípio de contribuir no equilíbrio emocional, contato físico com a finalidade de dividir o medo, dor, estresse e ansiedade, somando forças e estimulando positivamente a parturiente nesse momento (OSÓRIO et al., 2012). As técnicas não farmacológicas, em especial a acupuntura auricular, visam o respeito ao processo fisiológico expulsivo, de maneira gradativa, onde o próprio corpo atende a necessidade de equilibrar seus mecanismos desde a primeira fase do TP até a expulsão da placenta (CHEROBIN et al., 2015)

4 CONCLUSÃO

A gestação é marcada por mudanças físicas e emocionais que culminam no parto, principal motivo de tensão e medo. Assim, é imprescindível a busca de subsídios científicos que propiciem ampliação e utilização dos métodos não farmacológicos, sobretudo para alívio da dor. Nesse âmbito, ficou perceptível a eficácia da auriculoterapia como prática alternativa e complementar para analgesia nas parturientes.

As limitações foram em relação a carência de publicações e a demanda para o curto espaço de tempo. Foi evidenciado os empecilhos em relação a auriculoterapia que se refere ao conhecimento restrito dos profissionais e das parturientes desde o pré-natal, dificultando a sua aplicabilidade.

Sugere-se pesquisas e publicações nacionais futuras, com maior abrangência, e que objetivam mostrar a eficácia da auriculoterapia no trabalho de parto. Assim, cada vez mais, poderão ser ofertadas às parturientes maneiras que venham contribuir no alívio da dor no trabalho de parto.

REFERÊNCIAS

ABEDI. P, RASTEGAR H, VALIANI M, SAADATI N. O efeito da auriculoterapia na dor do parto, duração da fase ativa e taxa de episiotomia entre mulheres em idade reprodutiva. **J Fam Reprod Health**; v. 11, n. 4, p. 185-90, 2017.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS**. 92 f. Brasília, 2006.

BRASIL. Conselho Federal de Enfermagem (COFEN). **Resolução nº 585/2018**, de 7 de agosto de 2018. Estabelece e reconhece Acupuntura como especialidade e/ou qualificação do profissional de Enfermagem. Brasília: Cofen.

CHEROBIN, F.; OLIVEIRA, A. R., & BRISOLA, A.M. Acupuntura e auriculoterapia como métodos não farmacológicos de alívio da dor no processo de parturição. **Cogitare Enferm**, v. 21, n. 3, p. 1-8. doi:10.5380/ce.v21i3.45152, 2016.

DAVIM, R.M.B; TORRES, G.V; DANTAS, J.C. Efetividade de estratégias não farmacológicas no alívio da dor das parturientes no trabalho de parto. **Ver. Esc. Enf. USP**, v. 43, n. 2, p. 438-445, 2009.

HOGA, L. A. k.; REBERTE, L. M. Técnicas corporais em grupo de gestantes: a experiência das participantes. Ver. **Bras Enferm**. 2006, v. 59, n.3, p.308-13.

HOGA, L. A. k.; REBERTE, L. M. Técnicas corporais em grupo de gestantes: a experiência das participantes. **Revista Brasileira de Enfermagem**. 2006, v. 59, n.3, p.308-313. MAFETONI, R. R.; RODRIGUES, M. H. JACOB, L. M. da S., & Shimo, A. K. K. (2019).

Efetividade da auriculoterapia sobre a ansiedade no trabalho de parto: ensaio clínico randomizado. **Revista Latino-Americana De Enfermagem**, 26, e3030. DOI: <https://doi.org/10.1590/1518-8345.2471.3030.RO>

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Portaria N° 971** de 3 de maio de 2006. Diário Oficial da União. 2006, 84:20-25.

CAPÍTULO 20

ANALISE DA QUALIDADE DO SONO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA ÁREA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c20](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c20)

Geísa de Moraes Santana¹, Célio Pereira de Sousa Júnior², Carlos Eduardo da Silva Barbosa³, Francisco Mayron de Sousa e Silva⁴, Izadora Ribeiro de Moraes⁵, Jônatas Lucas Marcelino da Silva⁶, Maria Bianca de Sousa Oliveira⁷, Viviane Gomes de Aguiar⁸, Laércio Bruno Ferreira Martins⁹, Antônio Lucas Farias da Silva¹⁰

¹ Universidade Estadual do Piauí, (geisasantana97@gmail.com)

² Universidade Federal do Pará, (academicocelio@gmail.com)

³ Universidade do Grande Rio, (cedsbzs@gmail.com)

⁴ Faculdade de educação São Francisco, (Mayronfisioterapeuta@gmail.com)

⁵ Universidade Federal de Rondonópolis, (izadoraribeiro@outlook.com)

⁶ Universidade Federal de Pernambuco, (jonatas.lucas@ufpe.br)

⁷ Universidade Estadual do Piauí, (mbianca007@gmail.com)

⁸ Universidade Estadual do Piauí, (vivivgaguiar@gmail.com)

⁹ Universidade Estadual do Piauí, (laerciom42@gmail.com)

¹⁰ Centro Universitário UniFacid, (lucas1992farias@gmail.com)

Resumo

Objetivo: O trabalho teve como objetivo avaliar e comparar a qualidade do sono em universitários pendulares e não – pendulares dos cursos da área da saúde. **Método:** Trata-se de uma pesquisa prospectiva, observacional, transversal, descritiva e comparativa. O estudo foi desenvolvido em uma Instituição de Ensino Superior do Piauí, a amostra foi constituída por 28 estudantes pendulares e não – pendulares de estudantes da área da saúde. Foram aplicados o questionário de “Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh” e uma ficha de informações dos participantes elaborada pelas pesquisadoras. **Resultados:** Destes participantes 78,6% eram do sexo feminino e 21,4 % do sexo masculino. Esses acadêmicos são de diferentes cidades, como José de Freitas, Altos, Campo Maior, Demerval Lobão e União, a média distância da cidade onde os acadêmicos moram para o Centro de Saúde da Universidade era de 55,5 Km. No que concerne às horas de sono, a média de sono dos alunos pendulares foi de 5,8 horas (DP: 1,4 horas), devido a grande distância que precisam percorrer diariamente, enquanto os alunos não-pendulares tiveram uma média de 6,7 horas (DP: 1,6 horas). **Considerações Finais:** Este estudo concluiu que uma grande parcela dos acadêmicos pendulares possuem distúrbio do sono e os

demais possuem uma má qualidade do sono e esse fator está intimamente relacionado à distância percorrida diariamente. Porém, os alunos não- pendulares também apresentaram qualidade ruim do sono..

Palavras-chave: Sono; Estudantes de Ciências da Saúde; Privação do Sono.

Área Temática: Ciências da Saúde.

E-mail do autor principal: geisasantana97@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

O sono pode ser definido como suspensão normal e temporária do nível de consciência, faz parte do ciclo vigília - sono, e é regulado por um componente circadiano determinado pelo relógio biológico e por um processo homeostático que é caracterizado pela pressão do mesmo (CRABTREE; WILLIAMS, 2009). É um fenômeno vital, durante o qual se “desligam” ou atenuam-se mecanismos e sistemas orgânicos, com vistas à prevenção da exaustão, e são executados processos de recuperação e compensação de gastos energéticos e bioquímicos, ocorridos no período de atividade (SHUKLA; BASHEER, 2016).

Segundo Mello *et al* (2018), o sono é composto por duas fases importantes, a fase dos movimentos rápidos dos olhos (REM) e a fase sem movimentos rápidos dos olhos (NREM), representando distintos componentes neurais. Atualmente reconhece-se a importância da qualidade de sono, pois, segundo estudos, sabe-se que a má qualidade do sono afeta diretamente a qualidade de vida humana, pois parece estar envolvida com o aumento da morbidade por disfunção autonômica, distúrbios psiquiátricos, acidentes automobilísticos e de trabalho, envelhecimento precoce, depressão, insuficiência renal, intolerância à glicose, hipercortisolemia; e com a diminuição da eficiência laboral, etc (DANDA *et al.*, 2005, QUINHONESMC; OMESM, 2011).

Os universitários devido a rotina de estudo, desafios do ensino superior, estão propensos a obter distúrbios do sono. Esta população que em sua maioria jovem, pode apresentar maior privação de sono com tendência a sonolência diurna excessiva, tem como consequência, problemas de memória, diminuição do rendimento acadêmico, irritabilidade, problemas comportamentais como estresse e ansiedade (MARTINI *et al.*, 2012). Pois, o sono exerce influência nas funções endócrinas, termorregulação, conservação de energia, tem uma função

biológica fundamental na consolidação da memória (RIBEIRO et al, 2014).

Segundo Silva *et al.* (2012), o movimento pendular é o deslocamento frequente temporário entre o município de residência e o município de trabalho ou estudo. Eles podem ocorrer de duas formas: individual ou em grupo de pessoas, por meio de transportes coletivos, privados ou públicos. Continuando, o autor cita que a denominação deriva do seu fenômeno característico, um movimento de vaivém semelhante à oscilação de um pêndulo.

Em decorrência da importância de se ter uma qualidade de vida e de sono, e da grande incidência de acadêmicos que estudam fora do seu domicílio no Piauí, do tempo gasto para esta locomoção diária, do cansaço, da grande carga de estudo e das atividades acadêmicas, surgiu o interesse de investigar qual o impacto do movimento pendular sobre o sono de acadêmicos de uma instituição de ensino superior.

Assim, esse trabalho teve como objetivo avaliar e comparar a qualidade do sono de universitários pendulares e não – pendulares dos cursos da área da saúde.

2 MÉTODO

Trata-se de uma pesquisa observacional, transversal, descritiva e comparativa. O estudo foi desenvolvido em uma Instituição de Ensino Superior do Piauí, a coleta de dados ocorreu no período de setembro de 2017, tendo como parecer de aprovação do CEP a numeração: 1.978.334/2017.

A amostra foi constituída por 14 estudantes pendulares e pelo mesmo número 14, de não-pendulares dos cursos de Psicologia, Fisioterapia, Enfermagem e Medicina, que estudavam em período integral. Não foram incluídos os alunos pendulares que moravam numa distância menor que 40 Km da capital. Como também, aqueles que desistiram da pesquisa, ou não responderam os questionários de forma completa.

Primeiramente foram esclarecidos os objetivos do estudo e procedimentos a serem seguidos, posteriormente foi solicitada a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foram aplicados o questionário de “Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh”, que tem o objetivo de avaliar a qualidade de sono em relação ao último mês e uma ficha de informações dos participantes elaborada pelas pesquisadoras que avalia vários itens, como a distância percorrida, o meio de transporte e o tempo gasto diariamente.

A pesquisa teve como benefício o conhecimento da qualidade do sono desses alunos

para os pesquisadores e gestores das universidades e as orientações ao participante entregue por meio da cartilha ao final da coleta de dados.

Os dados foram inseridos em planilha EXCEL e realizados o tratamento estatístico por meio da análise dos dados pelo programa de estatística BioEstat 5.3. Foram apresentados em média e desvio padrão. Realizou-se correlação de Pearson, considerando forte o $r > 0,70$ e os dados foram comparados com Teste de Mann Whitney, considerando estatisticamente significativo o $p \leq 0,05$.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A população de estudo foi constituída por 28 universitários da área da saúde, destes 14 eram pendulares e 14 não pendulares, sendo 8 acadêmicos de Enfermagem, 6 de Fisioterapia, 2 de Medicina e 12 psicologia, compreendendo do 1º ao 12º período. Destes participantes 78,6% eram do sexo feminino e 21,4 % do sexo masculino. Esses acadêmicos são de diferentes cidades, como José de Freitas, Altos, Campo Maior, Demerval Lobão e União. A tabela 01 apresenta a caracterização dos universitários pendulares e não pendulares, segundo a média de idade e sexo.

Tabela 1: Caracterização das amostras (N= 28).

	Idade	Média de distância percorrida	Média de sono
Pendulares	22, 4 anos $\pm$ 5 anos	55,5 $\pm$ 16	5,8 $\pm$ 1,6
Não - Pendulares	19 anos $\pm$ 1,5 anos	7,5 $\pm$ 3,5	6,7 $\pm$ 1,4

Fontes: Autores

A média de distância da cidade onde os acadêmicos moram para o Centro de Saúde da Universidade é 55,5 Km e com uma duração média de deslocamento diária de 2h e 24 minutos e 92,8% utilizam o transporte público e afirmam ser de péssima qualidade, estes afirmam ficar em média 32 minutos na parada a espera do transporte público. Já os alunos não – pendulares a maioria utiliza carro e a média de deslocamento é de 7, 5 km, com a duração média de 15 minutos.

No que concerne às horas de sono, a média de sono dos alunos pendulares foi de 5,8 horas (DP: 1,4 horas), devido a grande distância que precisam percorrer diariamente para chegar a Universidade, uma média de $55,5 \text{ Km} \pm 16 \text{ Km}$, esse valor é inferior à média geral da população adulta brasileira (7-9 horas) e mundial (6,5-8,5 horas) (AKHLAGI, A, 2009). Enquanto os alunos não-pendulares tiveram uma média de 6,7 horas (DP: 1,6 horas).

Esses valores são inferiores ao recomendado pela National Sleep Foundation, que sugere que a média de sono de adultos jovens e adultos seja entre 7 a 9 horas, dessa forma, considerou-se duração insuficiente o sono de 24 horas inferior a 6 horas/dia para adultos de 18-64 anos, devido as inúmeras repercussões no corpo humano. Mas, foi similar aos resultados encontrados em outros estudos também desenvolvidos com universitários brasileiros da área da saúde, estes constataram que os acadêmicos dormem menos que 7 horas por dia (SENGER, ROCHA, MORSCH, 2019; ARAÚJO, LIMA, 2014).

No período avaliado 42,8% dos universitários pendulares apresentam uma latência de sono, menor que 15 minutos, o que significa uma privação grave do sono, enquanto os alunos não-pendulares 38,7% apresentaram esse nível de privação. Em relação a qualidade subjetiva do sono dos alunos – pendulares, (14,29%) relataram ter um sono muito ruim, (28,57%) ruim, (50%) bom e muito boa (7,14%). Os acadêmicos não pendulares apresentaram (35,7%) de sono ruim, (42,8%) bom e (21,5) muito bom, ao reaplicar o questionário (7,1%) relataram ter um sono muito ruim, (50%) ruim, (35,7) bom e (7,1%) muito bom.

Ao correlacionar a distância percorrida com as variáveis do Questionário de Pittsburgh, constatou-se que existe uma correlação fraca entre distância e a considerado dificuldade para iniciar o sono quando o indivíduo apresentar a percepção de levar mais de 30 minutos entre o preparo para dormir e adormecer (Tabela 2).

Tabela 2: Correlação entre as variáveis do Questionário de Pittsburgh e Distância Percorrida Diariamente (N= 28).

	Coefficiente de Spearman (rs)
Correlação entre a Eficiência Habitual do Sono x Distância Percorrida	0.7003
Correlação entre a Sonolência Diurna x Distância Percorrida	0.1772
Correlação entre Latência do Sono x Distância Percorrida	0.0434

Correlação entre Sonolência x Distância

0.2958

Percorrida

Fonte: Autores

Neste estudo ao compara a Eficiência Habitual do Sono com a distância percorrida diariamente foi encontrada uma relação forte (0,7), então, a distância percorrida diariamente afeta diretamente a qualidade de sono dos universitários pendulares. Em relação a sonolência diurna e sonolência pela Escala de Epworth a correlação foi fraca, porém, ao serem questionados se o fato de ser pendular atrapalha no rendimento acadêmico (85,5%) afirmaram que sim, pois o deslocamento diário por ser demorado e de péssima qualidade causa fadiga, estresse, sobrecarga e diminui o tempo de algumas atividades da Universidade, principalmente por ser tempo integral. E a correlação entre a Latência do sono e Distância Percorrida é moderada (0,4), pois, muitos adormecem menos de 5 minutos ao se deitarem.

Em relação ao entusiasmo para fazer as atividades habituais, (21,4%) dos pendulares relataram ser um problema leve, (50%) um problema razoável e (28,6%) um grande problema. A qualidade do sono entre estudantes da área da saúde é um assunto que vem sendo investigado e explorado nos últimos anos, devido a suas repercussões silenciosas na rotina acadêmica e na vida pessoal dessa população. Assim, a investigação por meio de um instrumento validado para o português do Brasil e com possível quantificação, como o PSQI é de extrema importância para o acompanhamento da saúde do sono desses acadêmicos, auxiliando o planejamento de ações de conscientização dessa problemática, (BERTOLAZI, A. *et al.*, 2011).

Ao fim desta análise dos 14 componentes pendulares do PSQI foi evidenciado que parcela substancial dos universitários investigados (64,2%) possui qualidade ruim do sono (PSQI 5 a 10) e (35,8%) possuem distúrbio do sono (PSQI >10). E dos 14 componentes não – pendulares (36,3%) possuem uma boa qualidade de sono, (50%) possuem uma má qualidade de sono e (13,7%) possuem distúrbio do sono.

A maioria dos alunos pendulares classificaram a qualidade do sono como ruim e os não pendulares como boa, esse dado é alarmante, pois, um dos pilares do padrão de sono humano é determinado justamente pela autoavaliação de satisfação com o sono. Portanto, é importante que o universitário tenha uma autopercepção eficiente acerca do seu sono (ARAÚJO *et al.*, 2013). Ter uma boa qualidade do sono é essencial para a saúde física e saúde mental. Isso influencia a função imunológica, a restauração da energia cerebral, as funções linfáticas cerebrais (para eliminar o desperdício e facilitar a distribuição de vários compostos no cérebro),

revertendo a degradação do desempenho induzido durante o despertar e também plasticidade neuronal (GOMES, 2020).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo concluiu que uma grande parcela dos acadêmicos pendulares possuem distúrbio do sono e os demais possuem uma má qualidade do sono e esse fator está intimamente relacionado à distância percorrida diariamente. Porém, os alunos não- pendulares também apresentaram um sono ruim, o que sugere que os acadêmicos da área da saúde e de tempo integral possuem uma redução do tempo e qualidade do sono. Nesse contexto, faz-se necessário ações de promoção da saúde para que o próprio acadêmico atue na construção da sua qualidade do sono.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO et al. Avaliação da qualidade do sono de estudantes universitários de Fortaleza-CE. **Texto contexto - enferm.** [Online], v. 22, n. 2, p. 352-360, 2013.

CRABTREE, WILLIAMS. Normal sleep in children and adolescents. **Child Adolesc Psychiatr Clin N Am**, v. 18, n. 4, p. 799 – 811, 2009.

DANDA et al. Padrão do ciclo sono-vigília e sonolência excessiva diurna em estudantes de medicina. **J Bras Psiquiatr**, v. 54, n. 2, p. 102 – 106, 2005.

GOMES MM, Unveiling sleep mysteries: functions. **Rev Bras Neurol** [Online], v. 56, n. 1, p.05-10, 2020.

MARTINI M et al. Fatores associados à qualidade do sono em estudantes de Fisioterapia. **Fisioter Pesq.** v. 19, n. 3, p. 261 – 267, 2012.

MELLO et al. Cronotipo e qualidade do sono de acadêmicos do primeiro ano do curso de medicina da cidade de Maringá-PR. **Revista Saúde e Pesquisa**, v. 11, n. 2, p. 287 – 292, 2018.

RIBEIRO et al. O impacto da qualidade do sono na formação médica. **Revista da Sociedade Brasileira de Clínica Médica**, v. 12, p. 8-14, 2014.

SHUKLA, BASHEER. Metabolic signals in sleep regulation: recent insights. **Nat Sci Sleep**, v. 8, p. 9 – 20, 2016.

QUINHONES, GOMES M. Sono no envelhecimento normal e patológico: aspectos clínicos e fisiopatológicos. **Rev Bras Neurol**, v. 47, n. 1, p. 31 – 42, 2011

CAPÍTULO 21

ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DE HEPATITES VIRAIS NO NORDESTE DE 1999 a 2019

DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c21

Thiemmy de Souza Almeida Guedes¹, Caroline Cristina de Oliveira Cunha², Fernanda Beatriz Freitas dos Santos³, Larissa Lima Soares⁴, Livia Maria Tavares Miranda⁵, Rebeca Margarida Silva Santana dos Santos⁶, Angélica Jesus Rodrigues Campos⁷, Caroline Taiane Santos da Silva⁸

¹Faculdade Venda Nova do Imigrante, (thiemmyalmeida@gmail.com)

²Escola Superior Madre Celeste, (caroline.ccunha@gmail.com)

³Universidade Salvador, (ffernandabfreitas@gmail.com)

⁴Faculdade Venda Nova do Imigrante, (larissalyma@hotmail.com)

⁵Faculdade Venda Nova do Imigrante, (livia.miranda12@gmail.com)

⁶Universidade Salvador, (rebecamagsantos@hotmail.com)

⁷Universidade Federal do Piauí, (angelicajesus@ufpi.edu.br)

⁸Child Behavior Institute of Miami, (carolinetiaane.enfa@gmail.com)

Resumo:

Objetivo: Analisar o perfil epidemiológico dos casos de Hepatites Virais no Nordeste entre os anos de 1999 a 2019. **Método:** Trata-se de um estudo epidemiológico de caráter descritivo e quantitativo, que visa relacionar as informações de domínio público disponibilizadas através da plataforma DATASUS. Para coleta de dados, o estudo selecionará as variáveis de todos os municípios brasileiros do Nordeste como região, sexo, classificação da hepatite, faixa etária e taxa de óbito; posteriormente os resultados serão dispostos em tabelas com a ajuda do programa Microsoft Excel. **Resultados:** Após a análise dos dados, verificou-se que o Brasil apresentou um total de 92.582 casos notificados de Hepatites Virais (HV), entre os anos de 1999 a 2019, dentre os quais a Hepatite A, obteve um maior número de notificações, com 50.567 registros; quanto aos números de óbitos, a Hepatite C teve 16.382 registros; em relação ao sexo que registrou maior notificação, com 26.653 casos, foi o masculino; em relação as notificações por região, a Região Sudeste foi a que mais obteve registros, com 272.528 casos, dos quais a Hepatite C é a que mais foi notificada; o estado do Nordeste com grande número de registros foi a Bahia com 23.519 notificações, tendo como prevalente a Hepatite A. **Conclusões:** Diante o exposto, pode-se inferir que atitudes relacionadas à promoção da saúde da população e programas de saneamento básico em conjunto com a vacinação adequada disponível evitaria

números crescentes quanto à contaminação de Hepatites Virais.

Palavras-chave: Hepatite Viral Humana; Epidemiologia; Sistema de Informações em Saúde.

Área Temática: Ciências da Saúde.

E-mail do autor principal: thiemmyalmeida@gmail.com

1. INTRODUÇÃO

As doenças causadas por vírus, particularmente as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), constituem um grave problema de saúde pública a nível mundial devido a sua transmissibilidade. Por isso, uma das doenças que se tornou um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) foram as hepatites. As Hepatites virais, que são geradas por diferentes agentes etiológicos e desenvolvem-se principalmente no fígado, apresentam características clínicas, epidemiológicas e laboratoriais características. Sendo assim, a ONU objetivou a ODS com a finalidade da diminuição do contágio e eliminação da mortalidade relacionada a esta doença.

Estudos apontam que os vírus que mais causam hepatites são: A, B, C, D e E; dos quais os do tipo B, C e D são considerados mais graves pela possibilidade de tornarem-se crônicos (BRASIL, 2005). De acordo com o Ministério da Saúde (2005), as hepatites virais são doenças de notificação compulsória (DNC) e passaram a ser notificadas a partir de 8 de dezembro de 2003; estas notificações ocorrem com o preenchimento de fichas específicas para hepatites virais e demais doenças compulsórias no Sistema Nacional de Agravos e Notificação (SINAN) após investigação e detecção pelos centros de saúde responsáveis (BRASIL, Portaria de nº 2529, de 23 de novembro de 2004).

Um dos aliados para o enfrentamento das hepatites é o Sistema Único de Saúde (SUS), que conta com o Programa Nacional para a Prevenção e o Controle das Hepatites Virais (PNHV), que foi criado pelo Ministério da Saúde em 5 de fevereiro de 2002, visando ações que contribuem para o aprimoramento de intervenções em saúde relacionadas às hepatites; e, com isso, houve a criação de várias políticas públicas de saúde voltadas a prevenção e promoção.

Conforme dados do Boletim Epidemiológico das Hepatites Virais de 2020, de 1999 a 2019, foram notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) 673.389 casos confirmados de hepatites virais no Brasil. Dados tão significativos levaram a Organização Mundial da Saúde (OMS) a assumir, como um dos seus objetivos, eliminar as hepatites virais até 2030. A partir dessas considerações e dada a importância de estudos epidemiológicos acerca das hepatites virais, esta pesquisa vem analisar o perfil epidemiológico

dos casos no Nordeste entre os anos de 1999 e 2019.

2. MÉTODO

Trata-se de um estudo epidemiológico de caráter descritivo e quantitativo, que visa relacionar as informações de domínio público disponibilizadas através da plataforma DATASUS. Segundo Lima-Costa & Barreto (2003) o estudo da epidemiologia é caracterizado através da distribuição e determinantes de enfermidades ou circunstâncias relacionadas à saúde de uma população específica. Sendo assim, esse tipo de pesquisa inclui: vigilância, observação e experimento. Para Knechtel (2014) a pesquisa na modalidade quantitativa, aborda sobre um problema que pode ser humano ou da sociedade, é um estudo com base em variáveis quantificadas, sendo assim, o objetivo é determinar as análises estatísticas.

Para coleta de dados, o presente estudo se propôs a analisar os dados epidemiológicos registrados no Sistema de Indicadores e Dados Básicos das hepatites nos municípios brasileiros nos anos de 1999 a 2019. As variáveis do estudo dizem respeito a região, sexo, classificação da hepatite, faixa etária e taxa de óbito. Os dados então, serão analisados e quantificados em tabelas, utilizando o Microsoft Excel™ versão 2016.

Por se tratar de um banco de dados de domínio público, não foi necessária submissão ao comitê de ética. De acordo com os termos da Lei n° 12.527 de 18 de novembro de 2011 que fundamenta pesquisas com informações de livre acesso (BRASIL, 2011).

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na tabela 1 pode-se verificar, de acordo com o Ministério da Saúde, que o Brasil apresentou um total de 92.582 casos notificados de Hepatites Virais (HV), entre os anos de 1999 a 2019, dentre os quais a Hepatite A, obteve um maior número de notificações, com 50.567 registros, seguindo da Hepatite B com 25.313, Hepatite C com 16.382, e Hepatite D com 229.

As regiões Norte e Nordeste apresentaram 55,7% de todos os casos de Hepatite A durante os anos de 1999 a 2018. A doença tem grande relação com alimentos ou água não seguros, baixos níveis de saneamento básico e de higiene pessoal (OMS, 2019). Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), em 2019, apenas 28,9% da população do Nordeste tinha atendimento de esgotos. Esse déficit de mais de 50% da população nordestina sem a cobertura devida, aumenta a probabilidade de contaminação com inúmeros patógenos prejudiciais à saúde, incluindo a Hepatite A (HV A), onde a transmissão se dá de forma fecal-oral, isto é, partir do contato de fezes com a boca.

De acordo com os dados coletados, no período de 1999 a 2019 foram notificados um total de 92.582 casos de hepatites virais no Brasil, dentre os quais 50.657 pertenciam a HV A, seguindo HV B com 25.313 casos, HV C com 16.382 e HV D com 229 registros de casos. O vírus da hepatite A é o causador mais comum da hepatite viral aguda do mundo. De acordo com uma hipótese realizada pela Organização Pan-americana de Saúde, por ano acontecem no Brasil aproximadamente 130 novos casos de HVA, por 100.000 pessoas. Atualmente, continua sendo um grande desafio de saúde pública no Brasil, e o país é considerado uma área de risco para esta doença (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021).

Tabela 1 - Total de casos notificados entre 1999 a 2019 no Brasil.

Casos de hepatites virais	N	%
A	50. 657	54,71
B	25.313	25,67
C	16.382	17,69
D	229	0,24
Total	92.582	100

Fonte: MS, 2021.

Nota-se que na tabela 2, há um maior número de óbitos por hepatite C, equivalente a 61,12% do total de casos, seguida pela hepatite B com 26,18%. Em comparação, pode-se afirmar que esses dados corroboram com os dados mundiais da Organização Mundial da Saúde (OMS), que revela que as hepatites virais são responsáveis por mais de 1,34 milhão de óbitos anualmente, dos quais 66% são causadas pela hepatite B e 30% pela hepatite C (OMS, 2017), revelando assim, que estes tipos de hepatites são os mais letais.

A hepatite C, por sua vez, caracteriza-se por um processo infeccioso e inflamatório, e que pode se manifestar na forma aguda ou crônica, sendo esta segunda a forma mais comum, sendo 60% a 85% dos casos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021). O Ministério da Saúde, desde 1989, dispõe da vacina da HVB, e desde o ano de 2014 da HVA, as quais proporcionam coberturas vacinais das hepatites B e A. Entretanto, para a hepatite do tipo C não existe uma vacina, por isso, em estudo realizado por CAMPOS (2019), o autor faz uma relação entre este fator com o grande número de infecções e óbitos notificados.

Tabela 2 - Relação entre Classificação da Hepatite e total de óbitos entre 1999-2019.

CLASSIFICAÇÃO DAS HEPATITES VIRAIS	N	%
A	302	5,82
B	1.357	26,18
C	3.479	61,12
D	45	0,86
Total	5.183	100

Fonte: MS, 2021.

Já na tabela 3, pode-se observar que há uma prevalência de maior contaminação em pacientes do sexo masculino. E isto pode ser justificado pelo fato de haver, no caso dos homens, uma exposição a diferentes fatores de riscos, como por exemplo: a não utilização de preservativos durante o ato sexual, uma maior quantidade e rodízio de parceiras(os), considerando que estas estão totalmente relacionadas à transmissão de vírus de HV(DIAS, 2014).

Tabela 3 - Relação entre Classificação da Hepatite e sexo entre 1999-2019.

CLASSIFIC AÇÃO DA HEPATITE	FEMININO		MASCULINO	
	N	%	N	%
A	23.980	47,36	26.653	52,63
B	11.672	46,13	13.629	53,86
C	6.861	41,89	9.516	58,10
D	102	44,54	127	55,45

Fonte: MS, 2021.

Em relação aos números de notificações por região e a classificação das HV, observou-se na Tabela 4 que a Região Sudeste foi a que mais obteve registros, com 272.528 casos, dos quais a Hepatite C é a que mais foi notificada. A Região Sudeste foi seguida pela Região Sul com 179.347 registros, Região Nordeste com 94.163, Região Norte com 92.273, e por último a Região Centro-Oeste com 51.320 casos registrados. Observa-se que nas regiões Sul e Sudeste, ficou evidenciado um maior número de casos diagnosticados, e, dessa forma, possivelmente o sistema de vigilância epidemiológica tenha uma melhor qualidade (NUNES *et al*, 2017).

Tabela 4 - Relação de número notificados por região e classificação de Hepatites Virais 1999-2019.

REGIÃO HEPATITE	NORDESTE	NORTE	SUL	SUDESTE	CENTRO- OESTE
A	50.727	42.655	26.013	30.364	18.716
B	26.140	37.233	80.902	87.044	22.903
C	17.078	9.288	72.171	154.690	9.568
D	218	3.107	261	430	133
Total	94.163	92.273	179.347	272.528	51.320

Fonte:

MS,

2021.

Analisando a tabela 5, pode-se verificar que o estado da região Nordeste que mais teve casos registrados de hepatites virais foi a Bahia, contudo, o estado de Pernambuco foi o que apresentou aumento no número de notificação de Hepatite A; os registros realizados por outros tipos de HV também teve maior incidência no estado da Bahia. Estudos relatam que um grande fator de risco associado, a contaminação pelo vírus hepatite A, é a estrutura do saneamento básico ou até mesmo a falta, visto que a transmissão se dá através da ingestão de água ou alimentos contaminados com matéria fecal (MARTINS, 2020); uma realidade

presente em quase todas as cidades do Brasil.

Tabela 5 - Casos de Hepatites Virais por estados da região Nordeste entre 1999-2019.

CASOS DE HEPATITES VIRAIIS POR ESTADOS	HEP. A	HEP. B	HEP. C	HEP. D	TOTAL
ALAGOAS	4.028	2.366	1.123	18	7.535
BAHIA	9.285	7.773	6.419	42	23.519
CEARÁ	6.687	3.127	2.203	25	12.042
MARANHÃO	6.840	3.694	1.436	41	12.011
PARAÍBA	5.088	1.842	900	14	7.844
PERNAMBUCO	10.894	3.704	2.295	51	16.944
PIAUÍ	3.764	757	479	12	5.012
R. G. NORTE	2.657	888	1.076	8	4.629
SERGIPE	1.484	1.989	1.147	7	4.627

Fonte: MS, 2021.

4. CONCLUSÃO

Diante o exposto, pode-se inferir que atitudes relacionadas à promoção da saúde da população e programas de saneamento básico em conjunto com a vacinação adequada disponível evitaria números crescentes quanto à contaminação de Hepatites Virais.

Dessa forma, conclui-se que se faz relevante a criação de um maior arcabouço teórico sobre a temática com foco na incidência dos casos de hepatites virais na região nordeste, para subsidiar órgãos da vigilância sanitária a detectarem informações sobre prevenção, diagnóstico, tratamento e controle da transmissão da doença. É necessário também atentar-se à subnotificação dos casos, pois, por conta disso, podem ser encontradas incoerências entre dados epidemiológicos registrados e a literatura científica, impossibilitando ações de prevenção em saúde.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso**. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2005.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria nº 2529, de 23 de novembro de 2004**. Institui o Subsistema Nacional de Vigilância Epidemiológica em Âmbito Hospitalar, define competências para os estabelecimentos hospitalares, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, cria a Rede Nacional de Hospitais de Referência para o referido Subsistema e define critérios para qualificação de estabelecimentos. Brasília: Ministério da Saúde, 2004.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Programa Nacional de Hepatites Virais**. Avaliação da Assistência às Hepatites Virais no Brasil. Brasília: Ministério da Saúde, 2002.

CAMPOS, Jessica Freire. et al. Hepatite C: os avanços para o tratamento da doença baseado em pedidos de patentes da vacina e medicamentos contra o vírus. **Revista INGI - Indicação Geográfica e Inovação**, v. 3, n. 4, p. 540-553, 2019. Disponível em: <<http://www.ingi.api.org.br/index.php/INGI/article/view/70>>. Acesso em 20 ago. 2021.

DIAS, Jerusa Araújo; CERUTTI, Crispim; FALQUETO, Aloísio. Fatores associados à infecção pelo vírus da hepatite B: um estudo caso-controle no município de São Mateus, Espírito Santo. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 23, n. 4, p. 683-690, 2014. Disponível em: <<https://doi.org/10.5123/S1679-49742014000400010>>. Acesso em: 20 ago. 2021.

KNECHTEL, Maria do Rosário. Metodologia da pesquisa em educação: uma abordagem teórico-prática dialogada. Curitiba: **Intersaberes**, 2014.

LIMA-COSTA, Maria Fernanda; BARRETO, Sandhi Maria. Tipos de estudos epidemiológicos: conceitos básicos e aplicações na área do envelhecimento. **Epidemiol. Serv. Saúde**, v. 12, n. 4, p. 189-201, 2003. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.5123/S1679-49742003000400003>>. Acesso em: 20 ago. 2021.

MARTINS, F. S.; POTTSCH, D.V.; GASPAR, A. M. Hepatite A: Cuidados com a higiene e o Saneamento Básico. **Boa Saúde**, 2004. Disponível em: <<https://www.boasaude.com.br/artigosde-saude/3973/-1/hepatite-a-cuidados-com-a-higiene-e-o-saneamento-basico.html>>. Acesso em: 23 ago 2021.

NUNES, Heloisa Marceliano. et al. As hepatites virais: aspectos epidemiológicos, clínicos e de prevenção em municípios da Microrregião de Parauapebas, sudeste do estado do Pará, Brasil. **Revista Pan-Amazônica de Saúde**, v. 8, n. 2, p. 29-35, 2017. Disponível em: <<https://dx.doi.org/10.5123/s2176-62232017000200004>>. Acesso em: 20 ago. 2021.

OMS, Organização Mundial da Saúde. **Global hepatitis report**, 2017. Disponível em: <<https://www.who.int/hepatitis/publications/global-hepatitis-report2017/en>>. Acesso em: 20 ago. 2021.

CAPÍTULO 22

ANÁLISE DOS RISCOS OCUPACIONAIS EM UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO INTERIOR DO PIAUÍ FRENTE À PANDEMIA DA COVID19

DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c22

Lauana Maria Marques de Oliveira¹, Josiane Marques das Chagas², Maria de Jesus de Oliveira França³, Nadja Karoline Alves Melo⁴, João Carlos Dias Filho⁵, Jônatas Lucas Marcelino da Silva⁶, Adriana Carvalho Araújo⁷

¹ Enfermeira na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/ Ebserh, (lauana.oliveira@ebserh.gov.br)

² Graduanda em Fisioterapia pela Faculdade de Ensino Superior do Piauí - FAESPI, (josianemarquesdaschagas@gmail.com)

³ Enfermeira pós graduada em Urgência e Emergência pelo Centro Universitário UNINOVAFAPI, (maria-oliveira83@hotmail.com)

⁴ Enfermeira pós graduada em Centro Cirúrgico e Central de Material pelo Centro Universitário UNINOVAFAPI, (nadjakarol@hotmail.com)

⁵ Residente em fisioterapia pela Escola Multicampi de Ciências Médicas - EMCM/UFRJ, (jfilho522@gmail.com)

⁶ Graduando em Saúde Coletiva pela Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, (jonatas.lucas@ufpe.br)

⁷ Enfermeira pós graduada em Unidade de Terapia Intensiva neonatal e pediátrica pela Faculdade Venda Nova do Imigrante - FAVENI, (adriana_carvalhoaraujo@hotmail.com)

Resumo

Objetivo: Objetivando analisar os riscos ocupacionais em Unidades de Atenção Primária à Saúde do interior do Piauí frente à pandemia do covid19. **Método:** traz-se uma pesquisa descritiva e exploratória, com abordagem qualitativa. Os participantes foram os profissionais de saúde destas Unidades, do qual foi realizado uma análise do conteúdo por meio do método de Braun e Clarke, seguindo os aspectos éticos dispostos na Resolução 466/12 do CNS. Participaram desta pesquisa 27 profissionais da saúde, variados entre nível médio, técnico e superior, que citaram diferentes códigos para as ideias das questões apresentadas e estas foram organizadas em mapas. **Resultados:** Atualmente, quando se fala em risco de adoecimento, principalmente relacionado a profissionais de saúde em seu ambiente de trabalho, o risco de contágio de covid19 é o mais citado, porém o acidente com perfuro-cortante é o que mais se destaca. Os locais de trabalho por si já podem comprometer a segurança do trabalhador e seu risco pode ser definido de acordo com a característica da atividade desenvolvida. No contexto da pandemia, muito se tem falado sobre risco de adoecimentos e formas de prevenção nos ambientes de trabalho, já que os profissionais de saúde são a categoria mais exposta, e a exposição é intrínseca à profissão, enfatizando assim a importância dos gestores de saúde como peças fundamentais para a proteção e prevenção dos riscos ocupacionais, e durante a pandemia, diminuir a velocidade de transmissão e achatar a curva de contaminações e mortes, porém a falta de insumos nos ambientes de trabalho ainda é uma das coisas mais citadas. **Conclusões:** Assim podemos observar que alguns profissionais relacionaram o risco ocupacional exclusivamente ao risco de contrair covid19, mostrando a necessidade de treinamento e a marginalização por parte dos próprios profissionais de saúde a respeito deste tema.

Palavras-chave: Riscos ocupacionais; Atenção primária à saúde; Pandemias.

Área Temática: Ciências da Saúde.

E-mail do autor principal: lauana.oliveira@ebserh.gov.br

1. INTRODUÇÃO

Atualmente, médicos e profissionais da saúde encontram-se perante uma pandemia desafiadora causada por uma nova cepa denominada *2019 Novel Coronavirus* (covid-19) da qual causa uma síndrome gripal acompanhada de sintomas respiratórios que podem ser desde leves a graves (NOTA TÉCNICA, 2020).

A China passou a ter transmissão sustentada do Coronavírus em Janeiro de 2020 e, diante desse extenso problema de saúde pública, a Organização Mundial da Saúde (OMS) aumentou o nível de alerta para alto em relação ao risco global do covid19. No Brasil o Ministério da Saúde (MS) confirmou numa quarta-feira (26/2), sendo também o primeiro da América Latina, o primeiro caso de novo coronavírus em São Paulo. Em 03 de fevereiro de 2020 a portaria SVS/MS nº 188 declarou emergência em saúde pública de importância nacional (ESPIN).

Os trabalhadores de saúde, em especial, são os que se encontram mais vulneráveis, e segundo a Nota Técnica: proteção integral a saúde do trabalhador no contexto da pandemia de covid-19 (2020) que, em consonância com a política e as normas de proteção da saúde dos trabalhadores no Brasil, adaptou normas que foram estabelecidas pela *Occupational Safety and Health Administration* (OSHA) órgão do governo federal americano para proteção da saúde dos trabalhadores e classificou os trabalhadores sob perigo de exposição.

Em todo o mundo há uma grande contaminação e adoecimento dos profissionais envolvidos no atendimento aos pacientes acometidos por covid19 (WANG; ZHOU; LIU, 2020). No Brasil o maior número de profissionais acometidos dentro desta categoria é o de nível médio (RAFAEL; NETO; CARVALHO; ET. AL., 2020). Vale ainda lembrar que a concentração de profissionais é tradicionalmente maior nos grandes centros urbanos brasileiros, este cenário complexo impõe desafios adicionais à vigilância epidemiológica, às relações internacionais e à programação de políticas públicas fazendo com que assim haja desigualdade no acesso aos sistemas de saúde e precárias condições de autocuidado.

2. MÉTODO

A pesquisa foi realizada de forma descritiva e exploratória, com abordagem qualitativa, desenvolvida nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidade Mista de Saúde (UMS), de caráter público, situado na cidade de Lagoa Alegre/PI, Brasil. Os participantes incluídos nesse estudo foram todos os profissionais de saúde das Unidades, de ensino fundamental, médio e superior, que estavam regulamente contratados e locados nas Unidades selecionadas. Para esta

pesquisa foi definido como profissionais de saúde todos aqueles que estavam devidamente lotados em uma das Unidades da pesquisa e prestando cuidados diretos ao público. Serão excluídos os profissionais que não forem lotados nas Unidades selecionadas, contratados e/ou concursados e que estejam sob regime de prestação de serviços temporários, ou aqueles que apresentarem-se de férias ou afastados.

A seleção dos participantes ocorreu considerando a disponibilidade e o interesse dos mesmos em participarem da pesquisa, por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), o qual por sua vez, obedece aos aspectos éticos e legais, conforme determinação da Resolução nº 466/12. A análise do conteúdo se dará por meio do método de Braun e Clarke (2006) que sintetizam a Análise temática (AT) em seis etapas: familiarização com dados; gerando códigos iniciais; buscando temas; revisando os temas; definindo e nomeando os temas e produzindo o relatório.

O projeto foi submetido a um Comitê de Ética para a obtenção do conhecimento do conteúdo científico-metodológico desse estudo, por meio da CAAE: 36621020.6.0000.5209. A Secretaria Municipal de Saúde das Instituições escolhidas, comunicada do desejo de realização da pesquisa via ofício, como instituição Co-Participante assinou termo de consentimento favorável.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Participaram desta pesquisa 27 profissionais da saúde, 19 do sexo feminino e 08 do sexo masculino, destes 07 eram do nível médio, 09 do nível técnico e 11 do nível superior. A idade predominante foi 20-29 anos, 20 participantes se consideram pardos/mulatos, 21 eram da religião católica, a maioria dos entrevistados tinham renda de 01-02 salários mínimos, 18 tinham de 3-5 pessoas morando em casa, 10 participantes eram casados e também 10 eram solteiros e cerca de 14 participantes moravam na cidade de Lagoa Alegre.

Fonseca et. al. (2020), numa perspectiva inovadora, define o risco ocupacional como uma probabilidade de algum elemento ou circunstancia no ambiente de trabalho que traga prejuízos ao trabalhador, tais riscos podem ser observados como contaminações, lesões ou quais outros prejuízos a saúde física e mental dos trabalhadores. Durante os questionamentos muitos participantes citaram diversos riscos de adoecimentos ou contaminações em seus ambientes de trabalho, definido o risco ocupacional como um risco que está presente dentro e fora do ambiente de trabalho, que há risco mesmo com o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) ou coletiva (EPC), que a falta de atenção pode contribuir e que varia de acordo com o setor de lotação.

Então, ao analisar as entrevistas e considerando os objetivos propostos neste estudo,

foram citadas pelos participantes diferentes códigos para as ideias das questões apresentadas, que foram organizadas em mapas (figuras de 01 a 04) e um gráfico, de acordo com o proposto por Braun e Clarke (2006). A figura 01 traz a ilustração do que representa os riscos ocupacionais nestas Unidades:

Figura 01: O que é risco ocupacional?

Figura 01: Autores, 2021.

Foi citado ainda o risco de adoecimentos ou lesões, assim como o risco de adoecimento ou contágio de covid19. É evidente que os ambientes de trabalho por si já podem comprometer a segurança do trabalhador e o risco dele pode ser definido de acordo com a característica da atividade desenvolvida. Muito tem-se questionado sobre o risco de adoecimento por covid19 durante as jornadas de trabalho ou a possível contaminação durante o trajeto até o trabalho e a OMS (2019) em seu *Plano de resposta à COVID-19 e prontidão estratégica* traz três objetivos principais, contando com a proteção a saúde dos trabalhadores e a segurança aos pacientes em seu terceiro objetivo.

Além dos riscos de contaminação por covid19, as falas nos trazem os riscos intrínsecos à profissão, aqueles que podem acontecer mesmo com meios de proteção adequados, neste quesito podemos citar o acidente com perfuro-cortante, que é o risco ocupacional que mais se destaca relacionado a profissionais de saúde, principalmente na categoria médica e de enfermagem (GOULART; ROCHA; CARVALHO; ET. AL., 2020), o que traz grandes prejuízos ao trabalhador contando que este se expõe a fluídos biológicos.

Muitos tem se falado sobre a utilização de EPI durante a pandemia e este foi o relato mais citado para o desencadeamento de riscos ocupacionais, já que os profissionais de saúde são a categoria mais exposta a este risco dentro dos ambientes de trabalho, a covid19 é altamente contagiosa e não há como evitar a exposição destes profissionais, já que em alguns casos estes trabalhadores fazem ainda o atendimento direto ao paciente suspeito (VEGAL; ANTONIOLLI; MACEDO; ET. AL, 2021), por isso estes profissionais foram questionados sobre o que poderia desencadear riscos ocupacionais no seu ambiente de trabalho e o que poderia ser feito por eles

para a prevenção destes riscos, dos quais as falas citadas foram ilustradas na figura 02 e 03:

Figura 02: O que desencadeia riscos ocupacionais?

Figura 02: Autores, 2021.

Figura 03: O que pode ser feito para prevenir tais riscos?

Figura 03: Autores, 2021.

Um dos grandes desafios também enfrentados foi a escassez de EPI, já que mesmo após a pandemia de SARS de 2003 os serviços de saúde não conseguiram se organizar (BERLINGER; WYNIA; POWELL; ET. AL., 2020) para uma futura escassez e alta demanda de equipamentos. Mas somente o uso destes equipamentos não isenta estes profissionais dos riscos ou contaminações, Liu et. al. (2020) relatam que a lavagem das mãos inadequadas de profissionais que atendem pacientes acometidos por covid19 traz um risco maior de contrair a contaminação.

A falta de informações da população em geral e a difícil missão de lidar com algo desconhecido também gerava pavor, a falta de investimento em treinamentos adequados pode ter influenciado na falta de destreza por partes dos profissionais. Arons et. al. (2020) traz que a possível contaminação dos profissionais possa ocorrer nas falhas de colocação ou retirada de EPI, o que é confirmado por Berlinger et. al. (2020) quando mostra que cerca de 90% dos profissionais não sabiam seguir a sequência ou técnica correta de colocação ou retirada dos EPIs. O tempo de transmissibilidade do vírus com o paciente ainda assintomático também pode contribuir para a infecção (ARONS; HATFIELD; REDDY; et. AL., 2020).

É notável que a alta carga de trabalho pode ainda atrapalhar no desempenho de atividades de proteção ocupacional dos profissionais, os da saúde costumam atuar em jornadas duplas, com equipes reduzidas, onde há má qualidade de equipamentos por insuficiência ou falta de investimentos, que expõem profissionais a riscos e desmotiva as equipes (PORTO; MARZIALE, 2016).

O cenário pandêmico vivenciado pelos profissionais traz riscos novos, com a

necessidade de identificação destes riscos, mudanças de hábitos e resolução de novas questões, muitos identificam dificuldades não enfrentadas antes, uso de novos recursos, utilizar materiais que não estão disponíveis (ALMEIDA, 2020) e quando se fala em prevenção de riscos ocupacionais, o uso da máscara tanto por parte de profissionais, como dos próprios pacientes neste cenário de pandemia tem sido a fala mais constante.

Ao se tratar de trabalhadores que atendem pacientes críticos, esse risco está relacionado à assistência ao paciente e procedimentos geradores de aerossóis (LIU; HE; HUIGUO; ET. AL., 2020) o que retoma a importância dos EPI como instrumentos intrínsecos a jornada de trabalho, já que a consolidação dos relatos basicamente nos retoma a prevenção de adoecimentos por covid19 associado ao risco ocupacional.

Messias et. al. (2020) nos traz a susceptibilidade dos profissionais de saúde devido a sua atuação direta aos pacientes acometidos por covid19 e a pressão psicológica tem sido algo evidenciado por parte destes profissionais e seus familiares. A higienização dos ambientes, fornecimentos de insumos, redução da carga de trabalho e treinamento dos profissionais foram opções citadas que poderiam amenizar estes riscos ou até mesmo trazer mais segurança e bem estar aos profissionais envolvidos nesta realidade.

Reda, Fisseha, Mengistie, et. al. (2015) reforçam a ideia de que as normas e rotinas bem estabelecidas adequam as condições de trabalho. É importante que profissionais tenham consciência de seus papéis nas prevenções de riscos ocupacionais, a definição de fluxos e a divulgação destes traz conhecimento aos trabalhadores e os empenha a agir de forma correta diante destas exposições. Tais profissionais foram questionados ainda a respeito do papel dos seus gestores na amenização dos riscos ocupacionais aos quais está exposto em seu ambiente de trabalho e os relatos foram evidenciados pela figura 04:

Figura 04: O que os gestores da saúde poreriam fazer para reveter os riscos ocupacionais?

Figura 04: Autores, 2021.

Os gestores de saúde são peças fundamentais para a proteção e prevenção dos riscos ocupacionais, durante a pandemia, diminuir a velocidade de transmissão e achatar a curva de contaminações e mortes têm sido um papel fundamental (ALMEIDA, 2020). A preocupação dos profissionais com a higienização do ambiente e a implementação de protocolos de limpeza

da Unidade só reforçam a preocupação dos profissionais com a possibilidade de contaminações em seu local de trabalho.

A necessidade de os gestores reconhecerem as necessidades da Unidade e estarem presentes também evidencia uma difícil realidade em nosso cenário, onde quem está na ponta dificilmente conhece as necessidades instaladas. Balthazar et. al. (2017) diz que a responsabilidade dos gestores deve dar atenção especial às obrigações legais, também traz programas de treinamentos e utilização de EPIs como imprescindível a sua atuação.

A falta de recursos humanos também tem sido discutida, assim como a falta de incentivo financeiro e carga horária exaustiva. O Senado Federal por meio do Projeto de Lei Nº 1802 de 2020, indica a insalubridade trabalhista no valor de 40% do salário mínimo aos profissionais que estão expostos ao covid19 do setor público e privado.

Podemos observar ainda que pode ter sido evidenciado falhas na comunicação diante do dialogo gestor-trabalhador, trazendo insatisfação a respeito dos riscos ocupacionais diante do cenário que estão expostos e baixas medidas de prevenção existentes, sendo assim, os profissionais foram ainda questionados sobre a utilização de EPI e EPC em seu ambiente de trabalho, a presença de informativos sobre os riscos existentes nas Unidades, a presença de treinamentos e capacitações sobre como preveni-los, que foram ilustrados através de gráfico:

Gráfico 01: A utilização de EPIs, EPCs, treinamentos e disponibilização de informativos nas Unidades de trabalho.

Gráfico 01: Autores, 2021.

Os relatos sobre o recebimento de informes sobre os riscos ocupacionais existentes nas Unidades estão semelhantes, nos trazendo a ideia de que os profissionais de saúde são informados sobre os riscos, porem quando comparamos a utilização de EPIs e EPCs por parte dos profissionais a diferença é estonteante, boa parte dos profissionais responderam que não utilizam EPI coletivo, ou seja, não sabem definir o que seja EPC.

A Fiocruz define EPC como equipamentos utilizados para eliminar ou agentes de risco, protegendo vários indivíduos simultaneamente e reduzindo as consequências em caso de acidentes. Os participantes citaram ainda a utilização apenas de EPI esquecendo os EPCs, ratificando ainda mais o exposto na evidencia anterior. Quando foram indagados sobre os treinamentos sobre a utilização dos meios de proteção, uma pequena parcela apenas cita que recebeu treinamento, e estes foram ainda realizados pela enfermeira da sua própria equipe,

trazendo aqui a enfermagem como protagonista da equipe de Estratégia de Saúde da Família (ESF).

Podemos observar então que o trabalho desenvolvido tange quase que exclusivamente ao assistencialismo deixando de lado a saúde pessoal por parte do próprio trabalhador, alguns apresentam falta de conhecimento, outros, falta de incentivo por parte das próprias Unidades em capacitação e incentivo de desempenho a estes trabalhadores. Machado (2020) mostra que profissionais de saúde têm aumentado a sua carga de trabalho e possuem salários baixos se comparados ao cenário internacional.

A eficácia dos EPIs está relacionada ao fornecimento adequado, treinamentos e uso correto e consciente. O uso racional requer tanto o papel dos gestores em capacitar seus funcionários como dos próprios funcionários em reconhecer as necessidades e utiliza-los de forma adequada. Gallasch et. al. (2020) relata que a legislação trabalhista brasileira, NR32, traz a obrigatoriedade do provimento de EPIs por parte do empregador, e o compromisso do empregado em manter e zelar por ele.

4 CONCLUSÃO

Diante do exposto podemos concluir que a maioria dos profissionais consegue definir risco ocupacional, porém apresentam baixo conhecimento dos riscos que estão expostos em suas Unidades de trabalho, assim como as medidas de proteção e prevenção, atrelando o risco de adoecimento, quase que em sua totalidade, ao risco do acometimento pela covid19, observando assim que pode haver uma marginalização por parte dos próprios profissionais de saúde a respeito deste tema, trazendo uma necessidade de treinamento. No tocante a responsabilidade dos gestores, é interessante citar que os participantes sentem a ausência destes e que a falta de insumos e recursos humanos muito pode atrapalhar o desempenho do trabalhador assim como o risco de acometimento no meio ocupacional.

Tendo em vista a baixa quantidade de estudos relacionados a saúde ocupacional na Atenção Básica (AB) em tempo de pandemia, as indagações sobre esses riscos, maneiras de prevenção e proteção, assim como o papel dos gestores na saúde dos trabalhadores, sugere-se o desenvolvimento de outros estudos que possam evidenciar a necessidade de intervenções que possibilite uma construção maior arranjada no bem estar dos profissionais de saúde brasileiros.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020:** orientações para serviços de saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (sars-cov-2).

ALMEIDA, I. M. **Proteção para a saúde dos trabalhadores da saúde em tempos de COVID-19 e respostas à pandemia. Health protection for healthcare workers in CPVID-19 times and responses to the pandemic.** Botucatu, SP: Dossiê COVID-19 e Saúde do Trabalhador/Ensaio. Rev. bras. saúde ocup. 45, 2020.

ARONS, M. M. et. al. **Presymptomatic SARS-CoV-2 infections and transmission in a skilled nursing facility.** 382: 2081-2090. Massachusetts: N Engl J Med, 2020. 382:2081-90.

BALTHAZAR, M. A. P. et. al. **Gestão dos riscos ocupacionais nos serviços hospitalares: uma análise reflexiva.** v. 11, n. 9. Recife: Revista de enfermagem, 2017.

BERLINGER, N. et. al. **Ethical framework for health care institutions responding to novel coronavirus SARSCoV-2 (COVID-19):guidelines for institutional ethics services responding to COVID-19: managing uncertainty, safeguarding communities, guiding practice.** Garrison: The Hastings Center, 2020.

BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas.** Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. **Portaria nº 485, de 11 de novembro de 2005.** Aprova a norma regulamentadora nº 32 (Segurança e saúde no trabalho em estabelecimentos de saúde) Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília(DF), 2005. Nov 11.

BRAUN, V.; CLARKE, V. **Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology.** v. (2006). Washington: American Psychological Association, 2006. 3(2), 77-101.

CONGRESSO NACIONAL. **Projeto de Lei nº1802, de 2020.** Iniciativa senador Romário (PODEMOS/RJ). Assunto Social – Saúde. Natureza: Norma Geral.

COSTA, D. F. et. al. **Nota técnica: proteção integral a saúde do trabalhador no contexto da pandemia de covid-19 (sars-cov-2).** João Pessoa: DPS/CCM-NESC/CCS-UFPB 2-LASAT/IAM, 2020.

FONSECA, E. C. et. al. **Riscos ocupacionais na sala de vacinação e suas implicações à saúde do trabalhador de enfermagem.** v. 28. Rio de Janeiro: Rev. enferm. UERJ, 2020. 28: e45920.

FONTANELLA, B. J. B. et al. **Amostragem em pesquisas qualitativas: proposta de procedimentos para constatar saturação teórica.** vol.27. Rio de Janeiro: Cad. Saúde Pública, 2011. no.2, p. 389-394.

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ- FIOCRUZ – NUBI. Núcleo de biossegurança. **EPC-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA.** Disponível em:<http://biosseguranca.ensp.fiocruz.br/equipamentos-de-protecao/epc>. Acesso em: 11 de Agosto de 2021.

GALLASCH, C. H. et. al. **Prevenção relacionada à exposição ocupacional do profissional de saúde no cenário de COVID-19.** v. 28. Rio de Janeiro: Rev. enferm. UERJ, 2020. 28: 49596.

LIU, M. et. al. **Clinical characteristics of 30 medical workers infected with new coronavirus pneumonia.** 17;43(0):E016. Chinese, 2020. 43(3):209-14.

MACHADO, M. H. **Os Profissionais de saúde em tempos de COVID19 – a realidade brasileira.**). Observatório Covid-19 Fiocruz, 2020. 3p.

MESSIAS, J. M. A.; SILVA, S. C. C.; PRADO, I. F. **A covid-19 e os riscos ocupacionais para profissionais de enfermagem.** v. 30. Fragmentos de cultura: Revista Interdisciplinar de Ciências Humanas – Interdisciplinary Journal of Human Sciences, 2020. N. 04.

MINISTÉRIO DA SAÚDE/GM. **Portaria Nº 188, de 3 de Fevereiro de 2020.** Diário Oficial da União, publicado em: 04/02/202 | Edição: 24-A | Seção: 1 - Extra | Página: 1.

PORTO, J. S.; MARZIALE, M. H. P. **Motivos e consequências da baixa adesão as precauções padrão pela equipe de enfermagem.** (2016) 37(2):e57395x. Rev. Gaúcha Enferm. Doi: <https://doi.org/10.1590/1983-1447.2016.02.57395>

RAFAEL, R. M. R. et. al. **Epidemiologia, políticas públicas e pandemia de Covid-19: o que esperar no Brasil?** v. 28. Rio de Janeiro: Rev enferm UERJ, 2020. 28:e49570.

REDA, A. A. et. al. **Standard precautions: ocupacional exposure and behavior of health care workers in ethiopia.** Srikanth Tripathy, National AIDS Research Institute. Índia: PLoS One, 2010. 4];5(12):e14420. <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0014420>

VEJA, E. A. U. et. al. **Riscos de adoecimento ocupacional em profissionais da saúde que atendem pacientes com covid-19: revisão integrativa.** v. 29. Rev. Latino-Am. Enfermagem, 2021. 29:e3455. www.eerp.usp.br/rlae.

WANG, J.; ZHOU, M.; LIU, F. **Exploring the reasons for healthcare workers infected with novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) in China.** Edição 1. The Healthcare Infection Society. Published by Elsevier Ltd, 2020. Vol 105, p100-101.

CAPÍTULO 23

ANGINA DE LUDWIG E SEU DETALHADO PERCURSO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c23](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c23)

Robert Wilson da Silva Tostes¹, Nyali Rosa de Castro ², Wesley da Silva de Paiva ³, Paula Mylena Paiva de Souza⁴, Bruno Romano de Oliveira⁵, Laryssa Costa Huguenin França⁶, Ana Paula Silva Carvalho⁷, Karla Arrigoni Gomes⁸, Maria Luíza da Costa Gomes⁹, Eduardo Stehling Urbano¹⁰.

1 Faculdade de Odontologia, Universidade Federal de Juiz de Fora, robert.tostes@odontologia.ufjf.br

2 Faculdade de Odontologia, Universidade Federal de Juiz de Fora, nyali.castro@odontologia.ufjf.br

3 Faculdade de Odontologia, Universidade Federal de Juiz de Fora, Wesley.paiva@odontologia.ufjf.br

4 Faculdade de Odontologia, Universidade Federal de Juiz de Fora, paula.mylena@odontologia.ufjf.br

5 Faculdade de Odontologia, Universidade Federal de Juiz de Fora, bruno.romano@odontologia.ufjf.br

6 Faculdade de Odontologia, Universidade Federal de Juiz de Fora, laryssa.huguenin@odontologia.ufjf.br

7 Faculdade de Odontologia, Universidade Federal de Juiz de Fora, anapaula.carvalho@estudante.ufjf.br

8 Faculdade de Odontologia, Universidade Federal de Juiz de Fora, karla.arrigoni@gmail.com

9 Faculdade de Odontologia, Universidade Federal de Juiz de Fora, marialuiza.gomes@estudante.ufjf.br

10 Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Juiz de Fora, esurss@yahoo.com.br

Resumo

Objetivo: O estudo da Angina de Ludwig (AL) tem por objetivo revisar o percurso da doença, desde sua etiologia, até o tratamento, focando, principalmente, nas formas de manejo mais eficazes na preservação da vida do paciente. **Método:** Foi realizada uma revisão integrativa utilizando as bases de dados: Pubmed, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scopus e Scielo. Foram selecionados artigos publicados entre 2018 e 2021. A palavra-chave utilizada na busca foi “Ludwig’s Angina”. **Resultados:** A maioria dos casos de AL são decorrentes das infecções odontogênicas em molares inferiores que se propagam para os espaços submandibular, sublingual e submentoniano. Devido a tumefação na região cervical e ao deslocamento da língua, um dos sintomas da doença é a dispneia, sendo também um fator de risco à vida do paciente. Assim, a manutenção das vias aéreas é o principal foco no manejo do paciente com AL, sendo associado, na maioria dos casos, à uma antibioticoterapia intravenosa agressiva, à drenagem cirúrgica e à remoção do fator etiológico. **Conclusões:** Em todo o percurso da AL é necessária uma atenção minuciosa, visto que o agravamento da doença tem potencial risco de vida e é potencialmente fatal. A intervenção adequada é de suma importância, pois se feita corretamente e em tempo hábil trará chances promissoras de êxito no tratamento. **Palavras-chave:** Angina de Ludwig; Obstrução das Vias Aéreas; Antibióticos.

Palavras-chave: Angina de Ludwig; Obstrução das Vias Aéreas; Antibióticos.

Área temática: Ciências da saúde

E-mail do autor principal: robert.tostes@odontologia.ufjf.br

1 INTRODUÇÃO

A angina de Ludwig (AL) é uma celulite do assoalho da boca com potencial de risco de vida e foi descrita pela primeira vez pelo médico do exército alemão Wilhelm Frederick von Ludwig em 1836 (KOVALEV, 2020). Envolve os espaços submandibular, sublingual e submentoniano, bilateralmente e simultaneamente, e tende a se espalhar rapidamente ao longo dos planos fasciais (KOVALEV, 2020; BOAMAH *et al.*, 2019; MC DONNOUGH *et al.*, 2019 e OKOJE, AMBEKE e GBOLAHAN, 2018). É geralmente de origem odontogênica (70% - 90% dos casos em vários relatórios) e comumente surge de uma infecção do segundo ou terceiro molares. No entanto, também pode ser causada por trauma, ruptura da mucosa oral e corpos estranhos, como *piercing's* (LI e KIEMENEY, 2019).

A complicação mais temida da angina de Ludwig é a obstrução das vias aéreas, pois a infecção pode se espalhar para os espaços cervicais profundos, produzindo complicações, incluindo edema da língua e faringe (MILLER; VON CROWNS, e WILLOUGHBY, 2018). As taxas de mortalidade relatadas variam de 0,3% a 11,8%. Os pacientes geralmente apresentam febre, dor e inchaço do assoalho da boca. O reconhecimento oportuno e o início do tratamento são fundamentais porque a infecção pode progredir rapidamente. O tratamento inclui antibióticos, corticosteróides, segurança das vias aéreas e desbridamento cirúrgico e drenagem (KOVALEV, 2020). Por isso, realizar o tratamento correto é uma das chaves para o sucesso terapêutico (SIAMSUDIM *et al.*, 2020).

Desse modo, o objetivo deste trabalho é revisar a literatura com o intuito de elucidar a Angina de Ludwig, desde seu processo de formação até a cura, visando fornecer dados que possam auxiliar profissionais de saúde na prática clínica e cirúrgica.

2 MÉTODO

Esta revisão integrativa é fundamentada em princípios propostos pelo *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses Guidelines* - PRISMA (LIBERATI *et al.*, 2009). A questão PICOS foi relatada da seguinte forma: Participantes/população: Pacientes diagnosticados com Angina de Ludwig. Intervenção/exposição: Pacientes diagnosticados com Angina de Ludwig que evoluíram para casos mais graves. Comparação/controles: Pacientes diagnosticados com Angina de Ludwig que não apresentaram maiores complicações. Desfechos: Melhora dos sintomas, alta hospitalar ou óbito.

Métodos de pesquisa para identificação do estudo: As seguintes bases de dados foram pesquisadas, compreendendo o período de 2018 a 2021: Pubmed, Biblioteca Virtual em

Saúde (BVS), Scopus e Scielo. A palavra-chave utilizada foi “ ludwig’s angina” afim de abranger maiores informações sobre a doença, e cada busca foi realizada respeitando-se as particularidades de cada base de dados. Critérios de inclusão e exclusão: Os estudos incluídos deveriam atender às condições previamente especificadas, estudos com amostra composta por pacientes diagnosticados com Angina de Ludwig que evoluíram ou não para casos mais graves; estudos que analisaram os possíveis desfechos. Ademais, foram excluídos estudos que continham na amostra gestantes, crianças e pacientes com problemas mais graves de saúde, estudos sem disponibilidade de acesso e publicados anteriormente ao ano de 2018. Coleta e análise de dados: A descrição da estratégia de busca e seleção dos dados se encontra no Fluxograma 1. Extração e gerenciamento de dados incluíram: Autor, ano, tipo de estudo, tamanho da amostra, gênero, se houve ou não a administração de antibiótico, se ocorreu ou não drenagem, traqueostomia, etiologia, exames complementares e desfecho.

Fluxograma 1. Busca e seleção de estudo.

Fonte: Autores, 2021.

3 RESULTADOS

Autor (Ano)	Tipo de Estudo	Tamanho da amostra	Gênero (M:F)	Antibiótico	Drenagem	Intubação/ Traqueostomia	Etiologia	Exames complementares	Desfecho
BAILY e RENWICK (2020)	Caso Clínico	1	1:0	Sim	Não	Sim – fibra óptica	Infecção molar esquerdo	TC	Alta hospitalar
CARDOSO <i>et al</i> (2020)	Caso Clínico	1	1:0	Sim	Sim - Penrose	Não	Deslocamento de implante	Radiografia panorâmica, TC, exames laboratoriais	Internação para monitoramento
LEE <i>et al</i> (2019)	Caso Clínico	1	0:1	Sim	Não	Sim	Fonte peritonsilar ou faríngea	TC sem contraste e eletroencefalograma	Óbito
MAH e ALI (2020)	Caso Clínico	1	1:0	Sim	Sim	Não	Infecção elemento 36	Diagnóstico clínico	Internação
MILLER, VON CROWNS e WILLOUGHBY (2018)	Caso Clínico	2	1:1	-	-	-	Origem odontogênica	-	2 óbitos
OKOJE, AMBEKE e GBOLAHAN (2018)	Estudo Retrospectivo	13	7:6	Sim (todos)	Sim (todos)	Traqueostomia em 3 pacientes	Foco odontogênico em molares	Hemograma completo; microscopia, cultura e sensibilidade	2 óbitos; 11 pacientes sobreviveram
OTKUSA <i>et al</i> (2019)	Caso Clínico	1	1:0	Sim	Não	Não	Extração terceiro molar	TC com contraste, RM e hemocultura	Melhora sintomas
PARKER e MORTIMORE (2019)	Caso Clínico	1	1:0	-	-	-	Cáries sem tratamento	-	Melhora
POLAT e SADE (2018)	Caso Clínico	1	1:0	Sim	Não	Não	Múltiplas cáries sem tratamento	TC com contraste e RM	Melhora
SAHA e CHONG (2020)	Caso Clínico	1	0:1	Sim	Não	Sim	Infecção molar direito	TC com contraste	Óbito
SIAMSUDIM <i>et al</i> (2020)	Caso Clínico	1	1:0	-	Sim - Penrose	Não	Foco odontogênico em molares	Radiografia, exame de sangue	Alta hospitalar
WATARI e TOKUDA (2018)	Caso Clínico	1	0:1	Sim	Sim	Não	-	TC	Recuperação
WU (2019)	Caso Clínico	1	0:1	Sim	Sim	Não	Extração do terceiro molar	TC com contraste	Melhora

Tabela 1. Encontra-se uma descrição geral dos estudos incluídos.

Fonte: Autores, 2021.

Somando-se os 15 estudos incluídos, foram analisados um total de 26 pacientes. Deste total, observou-se que onze pacientes eram do sexo feminino (42,31%) e quinze eram do sexo masculino (57,69%).

Todos os estudos relataram administração de antibióticos para início do tratamento. Enquanto a realização de drenagem foi realizada somente nos estudos de CARDOSO *et al.* (2020); MIAH e ALI (2020); OKOJE, AMBEKE e GBOLAHAN (2018); SIAMSUDIM, *et al.* (2020); WATARI e TOKUDA (2018) e WU (2019).

No que se refere a intubação, a traqueostomia foi feita nos estudos de BAILY e RENWICK, (2020); LEE *et al.* (2019); OKOJE, AMBEKE e GBOLAHAN (2018) (em 3 dos 13 pacientes) e SAHA e CHONG (2020).

A infecção odontogênica foi principal fator causador da AL, no estudo de CARDOSO *et al.* (2020) a etiologia está associada a um deslocamento de implante e no estudo de LEE *et al.* (2019) tem suspeita de fonte peritonsilar ou faríngea, enquanto todos os outros se originaram de dentes, que em sua maioria eram molares.

No que tange aos exames complementares, os estudos de BAILY e RENWICK (2020); CARDOSO *et al.* (2020); OTKUSA *et al.* (2019); POLAT e SADE (2020); SAHA e CHONG (2020); WATARI e TOKUDA (2020) e WU *et al.* (2020) foram utilizados a tomografia computadorizada para definir o diagnóstico. Nos trabalhos de CARDOSO *et al.* (2020); SIAMSUDIM *et al.* (2020) e OKOJE, AMBEKE e GBOLAHAN (2018) foram utilizados exames laboratoriais juntamente, ou não, com exames radiográficos. No caso clínico de MIAH *et al.* (2020) o diagnóstico foi clínico.

De acordo com a literatura estudada, os desfechos foram: Óbito: LEE *et al.* (2019); MILLER, VON CROWNS e WILLOUGHBY (2018); SAHA e CHONG (2020); OKOJE, AMBEKE e GBOLAHAN (2018). Alta hospitalar: BAILY e RENWICK *et al.* (2020). Melhora dos sintomas: OTKUSA *et al.* (2019); PARKER e MORTIMORE (2019), POLAT e SADE (2018), WATARI e TOKUDA (2018), e WU (2019). Internação: CARDOSO *et al.* (2020), MIAH e ALI (2020).

4 DISCUSSÃO

Bacteriologia

O maior número dos casos de angina de Ludwig é polimicrobiana e inclui bactérias gram-positivas, gram-negativas e anaeróbias. Organismos comumente isolados em ordem de frequência descendente incluem *Streptococcus viridans*, *Staphylococcus aureus*, espécies de

Neisseria, espécies de Haemophilus, espécies de Bacteroides, estreptococos não A β , Streptococcus pyogenes, Fusobacterium, Prevotella e Eikenella (KOVALEV, 2020).

Etiologia

A AL tem até 90% de origem odontogênica, outras causas potenciais incluem abscesso periamigdaliano, fratura mandibular, lesão penetrante no assoalho da boca, osteomielite mandibular, otite média, *piercing* na língua, lacerações orais e sialolitíase das glândulas submandibulares (KOVALEV, 2020 e PARKER e MORTIMORE, 2019).

A maioria das infecções é polimicrobiana e inclui bactérias anaeróbias e aeróbias, em que a complicação mais temida da angina de Ludwig é a obstrução das vias aéreas, pois a infecção pode se espalhar para os espaços profundos do pescoço, produzindo complicações, incluindo edema da língua e faringe (MILLER, VON CROWNS, e WILLOUGHBY, 2018). Outras complicações incluem mediastinite, ruptura da artéria carótida, tromboflebite da veia jugular interna, empiema, fasceíte necrosante, osteomielite, pneumonia por aspiração, pericardite, fasceíte necrosante, empiema pleural e pneumonia (MILLER, VON CROWNS e WILLOUGHBY, 2018; KOVALEV, 2020 e SIAMSUDIM *et al.*, 2020).

Alguns fatores predisponentes colocam os pacientes em um risco maior de desenvolver a doença, como tratamento dentário recente, cárie dentária ou condição de saúde bucal geral ruim, doenças crônicas como diabetes, sendo associado à má cicatrização de feridas, comprometimento da imunidade e aumento da infecção, desnutrição, alcoolismo e um sistema imunológico comprometido, como pessoas com AIDS ou após o transplante de órgãos (PARKER e MORTIMORE, 2019 e OKOJE, AMBEKE e GBOLAHAN, 2018).

Sinais, Sintomas e Riscos

Os pacientes devem ser internados em um ambiente de alta dependência para monitoramento das vias aéreas, pois podem descompensar rapidamente, desenvolvendo complicações como aspiração, pneumonia, empiema, mediastinite, pericardite, trombose ou erosão da artéria carótida ou da veia jugular interna e sepse (PARKER e MORTIMORE, 2019). O comprometimento das vias aéreas geralmente é causado por um deslocamento superior da língua, trismo com abertura limitada da boca e anatomia distorcida do pescoço. A intubação por laringoscopia direta pode causar colapso agudo das vias aéreas, portanto, a intubação com fibra óptica em vigília foi a melhor escolha de primeira linha para o comprometimento das vias aéreas superiores. (SHIH *et al.*, 2019). Em caso de intubação, a segurança da extubação após a cirurgia é determinada pelo exame pré-operatório, extensão da infecção e edema e adequação da drenagem cirúrgica (DOWDY, EMAM e CORNELIUS, 2019).

Os sintomas mais frequentes incluem inchaço e dor no pescoço, dor ao deglutir e dificuldade de falar. Trismo é outra queixa típica, que é causada pela irritação dos músculos da mastigação. O aspecto clínico da condição é frequentemente descrito como “pescoço de touro”, com maior plenitude da área submental e perda de definição do ângulo mandibular. Outros sintomas comuns incluem dor bucal, voz rouca, salivação, inchaço da língua, pescoço duro e dor de garganta (AN, MADEO e SHINGAI, 2021 e LI e KIEMENEY, 2019).

Nas infecções do espaço cervical profundo, a mortalidade ocorre mais frequentemente devido à hipóxia ou asfixia. A infecção também pode causar trismo, edema laríngeo e limitação da mobilidade do pescoço e pode contribuir para o difícil manejo do paciente. A tomografia computadorizada é geralmente indicada no pré-operatório para investigar possíveis problemas nas vias aéreas e envolvimento mediastinal. (DOWDY, EMAM e CORNELIUS, 2019).

Propagação

A erosão do esmalte permite a introdução de bactérias no dente, desencadeando a causa mais comum, a cárie dentária (DOWDY, EMAM e CORNELIUS, 2019). Essas bactérias podem se propagar primeiro para a polpa e, em seguida, para a raiz e tecidos locais, produzindo gengivite ou abscessos dentários. A Angina de Ludwig ocorre quando esta infecção se espalha para os planos fasciais profundos. Fontes comuns de infecção estão relacionadas a procedimentos odontológicos envolvendo o segundo e terceiro molares, porque as raízes desses molares fornecem uma rota direta para o espaço mandibular à medida que se estendem para o músculo milo-hióideo. (PARKER e MORTIMORE, 2019).

Essa infecção progride abaixo da linha milo-hióidea, indicando que se moveu para o espaço sublingual. Como as raízes do segundo e terceiro molares mandibulares estão abaixo desta linha, a infecção desses dentes predispõe à angina de Ludwig. A infecção se espalha pelo espaço lingual ao invés de bucal, pois a lâmina óssea lingual é mais fina. Inicialmente se espalha para o espaço sublingual, progride para o espaço submandibular e chega aos espaços fasciais profundos. (AN, MADEO e SHINGAI, 2021 e PARKER e MORTIMORE, 2019). A estrutura formada pelos planos fasciais contém pelo menos 11 espaços profundos que oferecem potenciais locais de infecção. São os espaços localizados acima do nível do osso hióide: peritonsilar, submandibular, parafaríngeo, bucal, parotídeo e temporal. Existem também os espaços que abrangem totalmente a circunferência do pescoço, incluindo: retrofaríngeo, pré-vertebral e carótida; e o espaço visceral anterior abaixo do nível hióide. (PARKER e MORTIMORE, 2019).

Diagnóstico e Diagnóstico Diferencial

Existem vários diagnósticos diferenciais potenciais a serem considerados, incluindo edema angioneurótico, celulite, carcinoma lingual, linfadenite, abscesso periamigdaliano, abscesso de glândula salivar e hematoma sublingual (DOWDY, EMAM e CORNELIUS, 2019). Quatro critérios foram propostos para ajudar no processo de distinguir a Angina de Ludwig de outras formas de abscessos cervicais profundos. A infecção deve 1) ocorrer bilateralmente em mais de um espaço de tecido profundo; 2) produz infiltração gangrenosa serossanguinolenta, com pouco ou nenhum pus; 3) envolvem tecido conjuntivo, fáscia e músculo, mas não estruturas glandulares; 4) propagação pela continuidade do espaço fascial, e não pelo sistema linfático (PARKER e MORTIMORE, 2019).

O exame de imagem não tem papel na avaliação imediata do paciente. A decisão de entubar é tomada, unicamente, em parâmetros clínicos, pois o envio de um paciente com uma via aérea iminente para realização de tomografias atrasará o tratamento e pode ser letal. Uma vez que as vias aéreas estejam protegidas, um TC do pescoço com contraste intravenoso pode então ser realizado para avaliar a gravidade da infecção e avaliar qualquer abscesso. Os raios-X do pescoço e do tórax podem demonstrar gás nos tecidos no caso de infecções causadas por microbiota anaeróbica (AN, MADEO, SHINGAI, 2021).

Manejo/Antibioticoterapia

Existem três áreas-chave para a gestão da Angina de Ludwig. Primeiro, a manutenção de uma via aérea eficaz, segundo, terapia antibiótica agressiva e, terceiro, descompressão dos espaços submandibulares, sublinguais e submentuais, conforme exigido por intervenção cirúrgica. Em pacientes apropriados, a abordagem conservadora tem sido encorajada, ao invés das estratégias convencionais de manejo agressivo das vias aéreas. Essa abordagem inclui antibioticoterapia intravenosa (IV), observações fechadas das vias aéreas e drenagem de qualquer abscesso coletável (PARKER e MORTIMORE, 2019).

A tomografia computadorizada do tecido mole do pescoço com contraste é preferível se o paciente conseguir sair do pronto-socorro com segurança e tolerar a posição supina. A ultrassonografia no local de atendimento pode ser um complemento útil, principalmente para aqueles que não toleram a posição supina deitada. Devido à ameaça de comprometimento rápido das vias aéreas, a consulta de emergência para anestesia e otorrinolaringologia, se disponível, pode ser útil se uma via aérea definitiva for necessária. Antibióticos de amplo espectro e controle de origem cirúrgica são fundamentais no tratamento da infecção. Esses pacientes devem então ser internados na unidade de terapia intensiva para observação atenta das vias aéreas (BRIDWELL *et al.*, 2020)

A drenagem cirúrgica e o desbridamento são reservados para os casos graves de angina de Ludwig ou nos casos em que não há melhora com antibióticos e corticóides. A intervenção cirúrgica envolve a descompressão dos espaços submentoniano, submandibular e sublingual por incisão externa e drenagem. O controle da fonte também é importante. Como a maioria das infecções são de origem odontogênica, qualquer infecção dentária ou dente fraturado também precisa ser tratada (KOVALEV, 2020).

O ultrassom focalizado também tem sido uma excelente opção de ferramenta para o gerenciamento dinâmico das vias aéreas, que auxiliou na definição da largura traqueal e da distância da pele para prever o tamanho do tubo de traqueostomia e facilitar a traqueostomia. O ultrassom focalizado poderia garantir o posicionamento sem erros da traqueia e evitar o possível acúmulo de pus no pescoço antes e durante o procedimento da traqueostomia (SHIH *et al.*, 2019).

A traqueostomia sob anestesia local é considerada a “padrão ouro” de gerenciamento das vias aéreas em pacientes com angina de Ludwig. Isso pode, no entanto, ser difícil em pacientes que apresentam início avançado de infecção devido à distorção anatômica da região anterior do pescoço, e as abordagens mais conservadoras são agora encorajadas como tratamento de primeira linha (PARKER e MORTIMORE, 2019).

Antes do desenvolvimento de antibióticos, a mortalidade pela infecção excedia 50%. Com o rápido manejo das vias aéreas e a terapia com antibióticos, juntamente com exames avançados de imagem e cirurgia, a mortalidade diminuiu para cerca de 8% (AN, MADEO e SINGHAL, 2021). Eles devem ser iniciados assim que houver suspeita do diagnóstico. Os regimes iniciais comumente recomendados incluem penicilina G, metronidazol, clindamicina e Augmentin IV (KOVALEV, 2020 e BOAMAH *et al.*, 2019). A adição de esteróides tem sido sugerida na literatura para permitir uma intubação mais fácil e, possivelmente, evitar uma via aérea cirúrgica. Os esteróides também podem permitir uma melhor penetração dos antibióticos no espaço fascial, reduzindo o edema (KOVALEV, 2020).

4 CONCLUSÃO

Pôde-se constatar que todo o percurso da AL requer uma minuciosa atenção, visto que o agravamento da mesma pode trazer grandes riscos a vida, pois é potencialmente fatal. É importante que a equipe envolvida no processo tenha domínio das evidências sobre um diagnóstico diferencial, considerando os sinais e sintomas de cada caso, da disposição desses pacientes, das melhores formas de intervenção, seja essa cirúrgica ou farmacológica. Além de

estar atualizado sobre sua etiologia e desenvolvimento. Com a intervenção adequada as chances de êxito no fim do tratamento são promissoras.

REFERÊNCIAS

- AN, J.; MADEO, J.; SINGHAL, M. Ludwig Angina. StatPearls [Internet], Jan. 2021.
- BAILY, D.; RENWICK, S. **A rapidly enlarging neck swelling**. *BMJ*, v. 371, p. 1-2, Out. 2020.
- BLAKSON, P.K. *et al.* Severe odontogenic infections: a 5-year review of a major referral hospital in Ghana. **Pan African Medical Journal**, v. 32, p. 1-8, Fev. 2019.
- BOAMAH, M.O. *et al.* A comparative study of the efficacy of intravenous benzylpenicillin and intravenous augmentin in the empirical management of Ludwig's angina. **Ann Afr Med**, n. 18, p. 65-69, Abr. - Jun. 2019.
- BRIDWELL, R. *et al.* Diagnosis and management of Ludwig's angina: An evidence-based review. **Am J Emerg Med**, n. 41, p. 1-5, Mar. 2021.
- CARDOSO, L.L. *et al.* Successful Management of Ludwig's Angina due to Dental Implant Displacement: A Rare Case Report. **Case Rep Dent**, Fev. 2020.
- DOWDY, R.A.E.; EMAM, H.A.; CORNELIUS, B.W. Ludwig's Angina: Anesthetic Management. **Anesth Prog**, v. 66, p. 103-110, Jun. - Ago. 2019.
- LEE, M.H. *et al.* Fatal deep neck infection and respiratory arrest. **Baylor University Medical Center Proceedings**, n. 0, p. 1-3, Jan. 2019.
- LIBERATI, A. *et al.* The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate health care interventions: explanation and elaboration. **PLoS Med**, v. 6, p. 7, Jul. 2009.
- MCDONNOUGH, J.A. *et al.* Epidemiology and resource utilization of ludwig's angina ED visits in the United States 2006-2014. **Laryngoscope**, n. 129, p. 2041-2044, Set. 2019.
- MIAH, M.R.; ALI, A.S. Ludwig's Angina. **British Dental Journal**, v. 229, n. 5, p. 268, Set. 2020.
- MILLER, C.R.; VON CROWNS, K.; WILLOUGHBY, V. Fatal Ludwig's Angina: Cases of Lethal Spread of Odontogenic Infection. **Acad Forensic Pathol**, n. 8, p. 150-169, Mar. 2018.
- OKOJE, V.N.; AMBEKE, O.O.; GBOLAHAN, O.O. LUDWIG'S ANGINA: AN ANALYSIS OF CASES SEEN AT THE UNIVERSITY COLLEGE HOSPITAL, IBADAN. **Ann Ib Postgrad Med**, n. 16, p. 61-68, Jun. 2018.
- OTSUKA, Y. Ludwig's Angina and Mandibular Osteomyelitis after Dental Extraction. **JMA J**, n. 4, p. 87-88, Mar. 2019.
- PARKER, E.; MORTIMORE, G. Ludwig's angina: a multidisciplinary concern. **British Journal of Nursing**, v. 28, n. 9, p. 547-551, Set. 2019.
- POLAT, G.; SADE, R. Radiologic Imaging of Ludwig Angina in a Pediatric Patient. **The Journal of Craniofacial Surgery**, v. 0; n.5, p.1, Abr. 2018.
- SAHA, B.K.; CHONG, W.H.H. An airway emergency and a preventable death: underutilisation of bronchoscopic intubation. **BMJ Case Rep**, n. 13, p. 1-3, Mar. 2020.
- SJAMSUDIN, E. *et al.* The management of septic shock and Ludwig's angina: A case report of a life-threatening condition. **SAGE Open Med Case Rep**. v.3; n.6; p.20-25; Mar. 2020.
- WATARI, T.; TOKUDA, Y. Double tongue signs in a case of submandibular space infection. **BMJ Case Rep**, n.0, p.1-2, Jun. 2018.
- WU, S.T. Ludwig's Angina. **QJM**, v. 13, n. 4, p. 432-433, Mar. 2020.

CAPÍTULO 24

ÂNGULO DE FASE E BIVA EM PESSOAS IDOSAS DE COMUNIDADE: NOVAS PERSPECTIVAS PARA AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL E FUNCIONAL

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c24](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c24)

Sara Silva Soares¹, Geísa de Moraes Santana², Aurilene Soares de Sousa³

¹Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade/UESPI,
(nutrisarasoares@gmail.com)

²Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade/UESPI,
(geisasantana97@gmail.com)

³Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade/UESPI,
(auri.lene@bol.com.br)

Resumo

Objetivo: Buscar na literatura científica disponível, as novas perspectivas de avaliação do estado nutricional e funcional de idosos vivendo em comunidade, considerando a utilização de dados da bioimpedância elétrica para a geração de ângulo de fase (AF) e análise vetorial de impedância bioelétrica (BIVA). **Método:** Revisão integrativa na qual foi utilizado as bases de dados LILACS, SCIELO e PubMed. Como critérios de inclusão foram selecionados artigos originais, em português e inglês, publicados entre 2011 e 2021. As palavras chaves utilizadas para a busca foram: “ângulo de fase AND idosos”; “BIVA AND idosos”; “*phase angle AND elderly*” e “BIVA AND *elderly*”. **Resultados:** Dez artigos foram selecionados, nos quais, para a análise e síntese dos artigos foi utilizado um quadro sinóptico contendo: nome da pesquisa; nome dos autores; intervenção estudada; resultados; recomendações/conclusões. Dos estudos analisados houve predominância de moderada evidência científica, além de maior percentual de estudos avaliando AF e/ou este e BIVA (80%). Dentre as perspectivas de avaliação do estado nutricional e funcional em idosos em comunidade, a partir desses parâmetros, existe a boa correlação com capacidade funcional, força muscular, qualidade muscular e desempenho físico, possibilidade de monitoramento dos efeitos do treinamento resistido, bem como a capacidade de avaliar a densidade mineral óssea com chances de prever sobre o risco de fratura no colo do fêmur em pessoas idosas. **Conclusões:** A utilização de parâmetros de bioimpedância brutos como a resistência e reatância, para o fornecimento dos indicadores AF e BIVA, sem a utilização de fórmulas preditivas, apresentou resultados promissores para a avaliação do estado nutricional e funcional de idosos residentes em comunidade. Permitindo através da avaliação desses indicadores intervir de forma precoce, visando a prevenção de doença e promoção da saúde. Entretanto são necessários mais estudos da acerca desta temática com idosos em comunidade, bem como pesquisas com maior evidência científica.

Palavras-chave: Composição corporal; Estado Nutricional; Saúde do Idoso.

Área Temática: Ciências da Saúde.

E-mail do autor principal: nutrisarasoares@gmail.com

1. INTRODUÇÃO

O envelhecimento é um processo natural e irreversível que ocorre com todos os seres vivos. Este processo leva a alterações físicas, sociais e psicológicas no indivíduo (MENDES *et al*, 2005) que de acordo com fatores genéticos e hábitos de vida como alimentação, prática de atividade física, independência, lugar onde mora, podem estar relacionados com a presença de patologias, ou não.

Dentre as alterações físicas que acarretam impacto na saúde, a modificação da composição corporal relacionada a senescência também afeta a qualidade de vida e a capacidade funcional de idosos (WOODROW, 2009). Um dos principais métodos utilizados para a avaliação da composição corporal, a bioimpedância elétrica (BIA) é um método não invasivo, rápido e de fácil aplicação, entretanto apresenta necessidade de hidratação constante e equações matemáticas específicas para os grupos avaliados (SCHMIDT *et al*, 2019) o que pode se tornar um desafio para população idosa.

Como forma de superar as limitações da avaliação convencional por BIA em certas populações, como os idosos, pesquisadores sugerem o uso do ângulo de fase (AF) e análise vetorial de impedância bioelétrica (BIVA). Para a obtenção desses parâmetros não são necessárias equações preditivas baseadas na população, sendo utilizado para o cálculo valores brutos gerados dela BIA como: impedância (Z), resistência (R) e reatância (Xc) (MORAIS, 2020).

O AF é resultante de um arco tangencial da relação entre R e Xc (SCHEUNEMANN *et al*, 2008). Valores baixos estão associados a morte celular ou a alterações na permeabilidade seletiva das membranas celulares (DIAS *et al*, 2018). Evidências também sugerem que esse parâmetro está associado a hidratação dos tecidos, massa muscular corporal e força de preensão manual, sendo útil para oferecer uma avaliação indireta do status funcional e nutricional dos indivíduos (MARTIELLO, 2020). Os valores de AF em idosos saudáveis podem variar em homens entre 5,2 e 5,7° e para mulheres entre 5,0 e 5,4°, onde valores abaixo podem indicar a evolução de doenças (EICKEMBERG *et al*, 2011).

A BIVA fornece uma avaliação qualitativa de parâmetros nutricionais da massa celular e da água corporal, utilizando a R e Xc correlacionados com a estatura e comparados em elipses de tolerância (BUFFA *et al*, 2013) gerando um vetor. Neste parâmetro o comprimento do vetor estabelece o nível de hidratação do indivíduo e a migração para os lados o nível de massa celular, portanto também correlacionada com o estado nutricional e funcional do indivíduo.

De acordo com o exposto o presente artigo possui o objetivo de buscar na literatura científica disponível as novas perspectivas de avaliação nutricional e funcional de idosos vivendo em comunidade, considerando a utilização bioimpedância elétrica para geração de ângulo de fase e análise vetorial de impedância bioelétrica.

2. MÉTODO

O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa na qual foi percorrido as seguintes etapas: estabelecimento da questão norteadora e objetivos da revisão integrativa; seleção da amostra com o estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão de artigos; definição das informações a serem extraídas dos artigos selecionados; análise dos resultados; discussão e apresentação dos resultados; finalizando com a interpretação dos resultados.

Como questão norteadora da revisão integrativa formulou-se a seguinte indagação: Quais as novas perspectivas de avaliação nutricional e funcional de idosos vivendo em comunidade, considerando a utilização bioimpedância elétrica para a geração de ângulo de fase e análise vetorial de impedância bioelétrica?

Para a seleção dos artigos foram utilizadas as seguintes bases de dados: LILACS (Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e PubMed. Dessa forma, procurou-se ampliar o âmbito da pesquisa, minimizando possíveis vieses nessa etapa metodológica.

Foram utilizados como critérios de inclusão de artigos: artigos científicos em português e inglês, disponíveis da íntegra ou em forma de resumos nas bases de dados selecionadas, publicadas no período entre 2011 a 2021; que possuíssem o nível de evidência, baseado no sistema GRADE (*Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation*), alto, moderado ou baixo; e que fossem realizadas com idosos vivendo em comunidade.

Os critérios de exclusão utilizados foram: nível de evidência muito baixo e pesquisas que fossem realizadas com idosos de ambiente hospitalar, instituições de longa permanência de idosos ou indivíduos críticos como pacientes oncológicos e transplantados.

As palavras chaves utilizadas para a busca de publicações foram: “ângulo de fase AND idosos”; “BIVA AND idosos”; “*phase angle AND elderly*” e “BIVA AND *elderly*”. A pesquisa

foi realizada no período de agosto de 2021 de modo online, utilizando os citados critérios de inclusão e exclusão. A mostra final desta revisão integrativa foi constituída por dez artigos.

Para a coleta de dados foi utilizado um instrumento contendo a identificação do artigo original, características metodológicas do estudo, avaliação do rigor metodológico, das intervenções mensuradas e dos resultados encontrados.

Objetivando a análise e síntese dos artigos que atenderam aos critérios de inclusão na presente revisão integrativa, foi utilizado um quadro sinóptico contendo os seguintes aspectos, considerados pertinentes: nome da pesquisa; nome dos autores; intervenção estudada; resultados; recomendações/conclusões.

A apresentação dos resultados e discussão dos dados foi realizada de forma descritiva, possibilitando ao leitor a avaliação da aplicabilidade da presente revisão elaborada, de forma a atingir o objetivo de avaliar a utilização da análise ângulo de fase e análise vetorial de impedância bioelétrica como preditores do estado nutricional e funcional de pessoas idosas em comunidade.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dentre os artigos incluídos na presente revisão integrativa, dois foram publicados em português e oito em inglês, sendo dois destes realizados com brasileiros. Este fato indica a necessidade da produção e publicação de mais trabalhos científicos na língua portuguesa acerca de avaliação de AF e BIVA em pessoas idosas vivendo em comunidade. O Quadro 01 apresenta de forma sintetizada os treze artigos analisados.

Quadro 01: Síntese estudos que avaliaram AF e BIVA em idosos vivendo em comunidade.

NOME DO ARTIGO	AUTORES	RELAÇÃO ESTUDADA	RESULTADOS	RECOMENDAÇÕES E CONCLUSÃO
Phase Angle Is Moderately Associated With Muscle Quality and Functional Capacity, Independent of Age and Body Composition in Older Women.	TOMELERI <i>et al</i> , 2019.	AF <i>versus</i> Qualidade muscular e capacidade funcional.	O AF apresentou relação pequena a moderada com a qualidade muscular e capacidade funcional. Essas relações permaneceram significativas após o ajuste para idade, tecido mole magro dos membros inferiores e massa gorda total para qualidade muscular e capacidade funcional	Nossos achados sugerem que idosas saudáveis com maiores valores de AF têm melhor qualidade e funcionalidade muscular, independentemente da idade e da composição corporal.
Relationship between phase angle and physical performance measures in	GERMANO <i>et al</i> , 2021.	AF <i>versus</i> Desempenho físico.	A média da AF entre os homens foi de $5,99 \pm 0,67$, enquanto a média obtida para as mulheres foi de $5,43 \pm 0,70$. A	Os resultados do nosso estudo revelaram que a AF é um bom marcador de desempenho físico

community-dwelling older adults			regressão linear mostrou que a força de preensão manual e velocidade de caminhada foram correlacionados com o AF em ambos os modelos.	para os idosos brasileiros residentes na comunidade estudados.
Changes in phase angle and body composition induced by resistance training in older women	SANTOS <i>et al</i> , 2016.	AF <i>versus</i> Treino resistido (TR).	Desde o início até após o treinamento de força muscular e AF aumentaram. No destreinamento, foram observadas reduções na força muscular e AF juntamente com aumentos R. Do destreinamento para o retreinamento, foi observado aumentos na Xc, AF e força muscular. Embora, nesse caso, com valores de AF, ainda menores do que a linha de base.	Em mulheres idosas não treinadas, um TR está associado a aumentos no AF, enquanto o destreinamento resulta em uma diminuição acentuada no AF, e mais tempo pode ser necessário no retreinamento para neutralizar a influência negativa da ausência de estímulo do exercício.
Phase angle as bioelectrical marker to identify elderly patients at risk of sarcopenia.	BASILE <i>et al</i> , 2014.	AF <i>versus</i> Massa e força muscular.	O menor nível de AF está associado à redução da força de preensão e, ainda mais, com a massa muscular. A análise multivariada confirma essas relações.	O AF está diretamente relacionada à massa e força muscular em idosos e pode ser considerada um bom marcador bioelétrico para identificar pacientes idosos com risco de sarcopenia.
Trunk Skeletal Muscle Mass and Phase Angle Measured by Bioelectrical Impedance Analysis are Associated with the Chance of Femoral Neck Fracture in Very Elderly People.	CHEN <i>et al</i> , 2020.	AF <i>versus</i> Massa muscular esquelética do tronco (tSM) e chance de fratura do colo do fêmur.	O tSM dos pacientes com fratura foi significativamente menor do que o dos controles. No subgrupo sarcopênico, os pacientes com fratura também obtiveram um tSM menor do que os controles. O AF em pacientes com fratura foi significativamente menor do que o dos controles em mulheres e homens. Além disso, por 1 ° de aumento do ângulo de fase no tronco pode diminuir o risco de fratura em 14% para mulheres e 29% para homens.	Este estudo indica que uma diminuição no tSM e AF está significativamente relacionado ao aumento da chance de fratura do colo do fêmur em idosos. O fortalecimento da massa e da força dos músculos esqueléticos do tronco pode ajudar a reduzir o risco de fratura do colo do fêmur em pacientes idosos.
Bioimpedance analysis as an indicator of muscle mass and	MATEO-SIRELLAS <i>et al</i> , 2018.	BIVA <i>versus</i> Massa e força muscular	Quase metade da amostra estava acima do peso e a circunferência da panturrilha não indicou	BIVA distingue os indivíduos com força muscular e massa muscular reduzidas daqueles com valores

strength in a group of elderly subjects			risco de deficiência ou depleção da massa muscular esquelética. No entanto, a BIA e a dinamometria detectaram risco de <u>sarcopenia</u> em mais da metade dos indivíduos. Enquanto a BIVA de corpo inteiro distinguia os indivíduos com perda de massa e força muscular, a BIVA específica (panturrilha) apenas o fazia em indivíduos com perda de massa muscular	normais. A BIVA de corpo inteiro detecta perda de massa e força muscular, enquanto a BIVA localizada apenas distingue indivíduos com perda de massa muscular. A BIVA localizada pode ser uma alternativa à BIA convencional ou BIVA de corpo inteiro para avaliar a composição corporal em idosos.
Efficacy of specific bioelectrical impedance vector analysis (BIVA) for assessing body composition in the elderly	MARINI et al, 2013.	BIVA versus Raios-X de Dupla Energia (DXA) e composição corporal	Em ambos os sexos, a BIVA clássica distinguiu indivíduos com diferentes quantidades de gordura e massa magra (incluindo conteúdo mineral ósseo), de acordo com a DXA, mas não entre aqueles com diferentes proporções de massa gorda (FM%). Valores de BIVA específicos detectaram mudanças na composição corporal.	BIVA clássico deve ser usado com cautela para avaliar a composição corporal em idosos. Já a BIVA específica os resultados são eficazes, promissores e adequada para identificar alterações relacionadas à idade na gordura corporal.
Assessment of Total and Regional Bone Mineral Density Using Bioelectrical Impedance Vector Analysis in Elderly Population	KUAN-LU et al 2021	BIVA e AF versus Densidade mineral óssea (DMO)	Distribuição de BIVA era significativamente diferente para diferentes níveis de DMO. R / H e Xc / H foram correlacionados com DMO em idosos.	A combinação linear de R / H e Xc / H pode prever efetivamente a DMO de todo o corpo, coluna e fêmur proximal, indicando que a BIVA pode ser usado na ferramenta de monitoramento clínico e de uso doméstico para triagem de DMO em idosos no futuro.
Distribution of the bioelectrical impedance vector in brazilian free-living elderly subjects.	PFRIMER et al, 2020.	BIVA e AF em brasileiros	A AF média foi de 5,47° para os homens e 5,0° para as mulheres. Elipses diferentes foram definidas para homens e mulheres, pois existem diferenças na composição corporal de acordo com o gênero.	Os gráficos diferem dos relatados anteriormente na literatura, devido às diferenças étnicas na composição corporal. BIVA e FA permitem a avaliação nutricional e eliminam os erros de predição das fórmulas de

				impedância convencionais.
Análise vetorial de bioimpedância e estado nutricional de idosas de acordo com o índice de massa corporal.	RIBEIRO <i>et al</i> , 2011.	BIVA e A versus IMC	O posicionamento do vetor na bioimpedância apontou menor Xc e maior R para idosas com IMC<23kg/m2. Maiores valores de IMC, ao mesmo tempo em que apontam melhor MC, apontam também maior risco de desenvolvimento de doenças crônicas.	Os resultados ratificam a busca por classificação específica do IMC para idosos e apontam a BIVA como uma alternativa viável na avaliação física e nutricional.

Fonte: Autores, 2021.

A amostra dos trabalhos avaliados foi caracterizada por predominância de trabalhos científicos originais de moderada evidência científica (90%) segundo o sistema GRADE, onde apenas 10% da amostra foi classificada em alta evidência. De acordo com o observado, mesmo a maior parte dos estudos disponíveis serem de evidência moderada, estas devem ser consideradas, no momento atual, como norteadoras da conduta profissional, não descartando a necessidade de maiores estudos de alta evidência científica para consolidação de novas perspectivas de avaliação nutricional e funcional de idosos em comunidade.

Durante as pesquisas nas bases de dados foi observado a predominância de estudos avaliando idosos em estado críticos e/ou hospitalizado, indicando o uso para avaliar patologias como câncer, sarcopenia, Alzheimer, entre outros. Entretanto, poucos foram os estudos encontrados, até a finalização desta revisão integrativa, sobre a utilização de AF e BIVA em idosos vivendo em comunidade; o que demonstra a necessidade de mais pesquisas com esta população, pois seria útil para intervir de forma precoce na prevenção de doenças e na promoção da saúde.

Foi observado que dentre os artigos selecionados houve uma dominância de estudos com AF e/ou este e BIVA (80%). O fato talvez se deva ao AF ser diretamente fornecido relatórios de bioimpedância, sem a necessidade de software específicos ou avaliação de vetores em gráficos, como o corre com o BIVA. Entretanto, apesar da avaliação por estes dois indicadores serem importantes pois eliminam os erros de predição de fórmulas de impedância convencionais, segundo Pfrimer *et al*, 2020, a BIVA é mais precisa quando usada para avaliações longitudinais pois é mais sensível ao estado de hidratação corporal.

Quando avaliamos isoladamente a utilização do AF observamos que este é um preditor significativo de qualidade muscular e capacidade funcional, independente da composição corporal da pessoa idosa, onde mulheres com menor AF podem apresentar baixa massa e força

muscular (TOMELERI *et al*, 2019). Bem como bom marcador de desempenho físico medido pela força de preensão manual e velocidade de caminhada, o relacionando com o estado de saúde do indivíduo idoso (GERMANO *et al*, 2021).

Outro estudo avaliando a mudança no AF pelo treinamento de resistência em mulheres mais velhas não treinadas, indicou que o treinamento estaria associado a aumentos no AF (SANTOS *et al*, 2016). E Chen *et al.*, (2020) ressalta que um grau de aumento no AF em mulheres idosas pode reduzir o risco de fraturas de colo de fêmur em 14%, chegando a 29% em homens. Deve – se ressaltar que apenas medir a massa muscular para determinar o estado do músculo tem desvantagens porque a massa muscular diminuída nem sempre leva ao enfraquecimento da força musculo esquelética. Já o menor AF também estaria relacionado com menor massa e menor força muscular, vindo a ser uma boa ferramenta geriátrica para identificar pacientes em risco de sarcopenia (BASILE *et al*, 2014).

Quando foram analisados os estudos que avaliaram a BIVA, observou-se que isoladamente também está relacionada com a força e massa muscular de pessoas idosas, sendo orientada na avaliação rotineira do estado nutricional geriátrico (MATEO – SILLERAS *et al*, 2018). Entretanto ao se comparar os dois tipos existentes de BIVA, o clássico e o específico, a BIVA específica apresentou maior correlação com os resultados da adsorciometria de raios-X de dupla energia (DXA), método considerado padrão ouro para avaliação corporal (MARINI *et al*, 2012).

A densidade mineral óssea (DMO), também avaliada em pacientes geriátricos devido ao risco de fraturas e osteoporose, possui boa correlação com o AF e BIVA, onde está positivamente correlacionada com reactância ajustada pela altura (Xc/H) e negativamente correlacionada com a resistência ajustada pela altura (R/H).

Dentre os desafios de utilizar a indicadores na prática clínica está a presença de pontos de corte para AF, ou no caso da BIVA gráficos específicos para a população e faixa etária estudada, com a presença ou não de patologias. Pfrimer *et al*, 2018, estabeleceu a distribuição do vetor de impedância bioelétrica em idosos livres brasileiros entre 60 e 70 anos, bem como avaliou o AF para mulheres e homens. Entretanto mais estudos e de maior evidência científica são necessários para estabelecer pontos de corte específicos para esse grupo populacional.

4. CONCLUSÃO

A utilização de dados de bioimpedância brutos como a resistência e reatância, para o fornecimento dos parâmetros AF e BIVA, sem a utilização de fórmulas preditivas, apresentou resultados promissores para a avaliação do estado nutricional e funcional de idosos residentes

em comunidade. Permitindo através da avaliação desses indicadores intervir de forma precoce visando a prevenção de doença e promoção da saúde. Entretanto são necessários mais estudos acerca do tema com idosos residentes em comunidade, bem como pesquisas com maior evidência científica.

REFERÊNCIAS

- BASILE, Claudia *et al.* Phase angle as bioelectrical marker to identify elderly patients at risk of sarcopenia. **Exp Gerontol.** v. 58, p. 6-43, 2014. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25034911/>
- BUFFA, Roberto *et al.* Accuracy of specific BIVA for assessing body composition in the US population. **Plos One.** 2013. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3590169/>
- DIAS, Thaline *et al.* Ângulo de fase e sua relação com albumina e risco nutricional em pacientes hospitalizados. **J BRASPEN.** n.33, p. 93- 188. 2018. Disponível em: <http://arquivos.braspen.org/journal/abr-mai-jun-2018/13-AO-Angulo-de-fase.pdf>
- EICKEMBERG, Michaela *et al.* Bioelectric impedance analysis and its use for nutritional assessments. **Revista. Nutrição.** n. 24, 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rn/a/kK3Hghhg78B8fcBV38QgZSn/abstract/?lang=pt>
- GERMANO, Matheus *et al.* Relationship between phase angle and physical performance measures in community-dwelling older adults. **Gerontologia Experimental.** v. 152 , 2021. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0531556521002485>
- KUAN – LU, Ksueh *et al.* Assessment of Total and Regional Bone Mineral Density Using Bioelectrical Impedance Vector Analysis in Elderly Population. **Scientific Reports.** 2021. Disponível em: <https://www.researchsquare.com/article/rs-558599/v1>
- MATEO-SIRELLAS, Beatriz *et al.* Bioimpedance analysis as an indicator of muscle mass and strength in a group of elderly subjects. **Exp Gerontol.** n.113, p.113-119, 2018. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30278217/>
- MARINI, Elisabetta *et al.* 2013. Efficacy of specific bioelectrical impedance vector analysis (BIVA) for assessing body composition in the elderl. **The journal of nutrition, health & aging.** v.7, p. 515–521, 2013. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23732547/>
- MARTIELLO, Ritta. **Valores de referência do ângulo de fase da Bioimpedância elétrica.** 2020. Tese (Doutorado em Epidemiologia). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul. Disponível em: <https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/216960>

MENDES, Marcia *et al.* A situação social do idoso no Brasil: uma breve consideração. **Acta Paul Enferm.**, v. 18, n. 4., p. 422 – 426, 2005. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ape/a/9BQLWt5B3WVTvKTP3X8QcqJ/?lang=pt>

MORAIS, Marcely. **Alterações antropométricas e bioelétricas em decorrência da sarcopenia em idosos**: International Mobility in Aging Study IMIAS Brasil. 2020. 84f. Dissertação (Mestrado em Nutrição) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Ciências da Saúde, Programa de Pós-Graduação em Nutrição. Natal, RN, 2020.

PFRIMER, Karina *et al.* Distribution of the bioelectrical impedance vector in brazilian free-living elderly subjects. **International Academy Nutrition Aging**. p.20-23, 2020. Disponível em: <https://www.jarlife.net/361-distribution-of-the-bioelectrical-impedance-vector-in-brazilian-free-living-elderly-subjects.html>

SANTOS, L *et al.* Changes in phase angle and body composition induced by resistance training in older women **Eur J Clin Nutr**. v.70, n.12, 2016. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27406159/>

SCHEUNEMANN, Lisiane *et al.* Aplicação do ângulo de fase na prática clínica nutricional. **Rev Bras Nutr Clín**. v.23, n.4 p 7-297, 2008. Disponível em: <http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=557527&indexSearch=ID>

SCHMIDT, Steffen *et al.* Representative body composition percentiles from bioelectrical impedance analyses among children and adolescents. The MoMo study. **Clin Nutr**. v.38, n.6, p. 20-2712, 2019. Disponível em: [https://www.clinicalnutritionjournal.com/article/S0261-5614\(18\)32559-7/fulltext](https://www.clinicalnutritionjournal.com/article/S0261-5614(18)32559-7/fulltext)

RIBEIRO, Sandra *et al.* Análise vetorial de bioimpedância e estado nutricional de idosas de acordo com o índice de massa corporal. **Rev. bras. cineantropom. desempenho hum**. v.13 n. 6, 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbcdh/a/x3Fc8rBWYFyTjJgpWfccQdj/?lang=pt#>

TOMELERELI, Crisieli *et al.* Phase Angle Is Moderately Associated With Muscle Quality and Functional Capacity, Independent of Age and Body Composition in Older Women. **J Geriatr Phys Ther**. v.42, n.4, p. 281-286, 2019. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29210931/>

WOODROW, Graham. Body composition analysis techniques in the aged adult: indications and limitations. **Current Opinion in Clinical Nutrition & Metabolic Care**, v. 12, n. 1, p. 8-14, 2009. Disponível em: https://journals.lww.com/clinicalnutrition/Abstract/2009/01000/Body_composition_analysis_techniques_in_the_aged.3.aspx

CAPÍTULO 25

AS VIOLAÇÕES DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES: VÍTIMAS OCULTAS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c25](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c25)

Carmem Letícia dos Santos¹

¹Graduada em Serviço Social / Centro Universitário Santo Agostinho – UNIFSA (carmemleticiass01@gmail.com);

Resumo

A Covid-19 se tornou um grave problema de saúde pública, impactando milhões de pessoas no mundo. Algumas consequências são bem visíveis no que diz respeito aos sintomas e as manifestações da doença, entretanto, o vírus têm afetado grupos de indivíduos que inicialmente não eram considerados de risco como as crianças e os adolescentes, pois além das consequências clínicas da doença esses sujeitos vivenciaram um lado oculto da pandemia relacionado ao aumento e ao surgimento das violações de direitos. **Objetivo:** Esse estudo evidenciou como ocorreram as violações dos direitos das crianças e dos adolescentes considerados vítimas ocultas durante a pandemia da Covid-19. **Método:** Foi utilizada a pesquisa bibliográfica onde o estudo permitiu o levantamento da problemática do que foi proposto analisar, através de pesquisas que já foram abordadas para a construção de novos conceitos, ampliando o tema para novas discussões e conclusões. **Resultados e Discussões:** Os estudos evidenciaram que as crianças e os adolescentes foram afetados não apenas pelas consequências clínicas da doença, mas, sobretudo, pelas violações de direitos, sendo afetados na renda/sustento, questão socioeconômica devido ao desemprego de seus familiares, (in) segurança alimentar, acesso à educação, exposição ao trabalho infantil, abuso, violência sexual, física e psicológica, dentre outros. Uma realidade que revelou na verdade o que muitas crianças e adolescentes já vivenciavam antes da pandemia. **Considerações Finais:** Com isso, a realidade desses sujeitos em situação de vulnerabilidade e risco já demandavam estratégias de proteção integral, sobretudo, nesse período de crise, tendo-os que serem considerados prioridade na execução da intersetorialidade das políticas públicas como responsabilidade do Estado.

Palavras-chave: Vulnerabilidade; Surto; Manifestações clínicas da doença; Desproteção; Sujeitos de direitos.

Área Temática: Ciências Sociais Aplicadas

E-mail do autor principal: carmemleticiass01@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

Em 2020, nos deparamos com uma grave doença causada por uma síndrome respiratória aguda manifestado pelo vírus da Covid-19 (SARS-COV-2). Sendo transmitido pelo espirro, tosse, gotículas de saliva, aperto de mão, beijos, abraços e contato com superfícies contaminadas. Um vírus altamente contagioso, que por sua dimensão se tornou uma questão de saúde pública, demandando intervenções de prevenção e contenção de sua propagação (FIOCRUZ, 2020).

As suas manifestações clínicas mais conhecidas são: febre, tosse, diarreia, dificuldade de respirar ou falta de ar, perda do paladar ou olfato e outros, indo de manifestações mais leves, moderados, graves e críticos, como internação em unidades de terapia intensiva (XAVIER *et al*; 2020). Por ser considerado um vírus contagioso, foi necessário estabelecer algumas medidas de prevenção e de propagação, assim foram determinados: uso de máscara, isolamento, distanciamento, uso de álcool em gel, lavar as mãos com água e sabão, contudo, à medida que o vírus foi se manifestando e aumentando o nível de contaminação, outras medidas foram instituídas como o fechamento de alguns estabelecimentos, como escolas, comércio, clubes, bares, restaurantes, universidades e outros, mantendo apenas o funcionamento dos serviços essenciais (FIOCRUZ, 2020).

Essas medidas causaram efeitos na população, no que diz respeito a manutenção dos serviços essenciais, afetando os serviços de proteção de combate as violações de direitos que vieram a ocorrer nesse período, sendo então necessário estratégias de como todos passariam por esse período de crise. Inicialmente, alguns grupos seriam os mais afetados pelo vírus, como as pessoas idosas, pessoas com comorbidades, entretanto, hoje se percebe que qualquer pessoa independente da idade pode ser afetada gravemente pela doença. Com o agravamento da doença e dos efeitos das restrições dos serviços ofertados essas medidas chegaram a atingir as crianças e os adolescentes (FIOCRUZ, 2020).

Com isso, a covid-19 se tornou um grave problema de saúde pública, impactando milhões de pessoas no mundo. Algumas consequências são bem visíveis no que diz respeito aos sintomas e manifestações da doença, entretanto, essa realidade têm se expressado em grupos de indivíduos que inicialmente não eram considerados de risco como as crianças e os adolescentes, que além das consequências clínicas da doença esses sujeitos vivenciaram um lado oculto da pandemia relacionado ao aumento e o surgimento das violações de direitos. (UNICEF, 2020).

Pois durante a crise os mais vulneráveis são os que mais sofreram, em destaque aqui as

crianças e os adolescentes. As violações que surgiram e outras que se acentuaram nesse período foram: não acesso a educação, impacto na renda das famílias de crianças e adolescentes, alimentação, aumento da violência sexual, trabalho infantil, pobreza e desigualdade, dentre outros. O título do trabalho na verdade chama a atenção para um olhar mais específico para essas violações de direitos que afetaram as crianças e os adolescentes (UNICEF, 2020). Por essa razão, se justifica expor essa realidade que revela o que muitas crianças e adolescentes já vivenciavam antes da pandemia, sendo vítimas da desproteção e das violações de garantia de direitos.

2 MÉTODO

Trata-se de um estudo de revisão de literatura que permitiu analisar as pesquisas já existentes, na qual se deu através da pesquisa bibliográfica. Uma das vantagens da pesquisa bibliográfica abordada por Lima; Miotto (2007) no procedimento metodológico é a capacidade em da relevância a estudos poucos discutidos e explorados, servindo como auxílio para pesquisas futuras.

Segundo Gil (2008) a pesquisa bibliográfica apresenta as contribuições dos autores com bases fundamentadas, permitindo uma construção de idéias e discussões sobre determinada temática. Com isso esse método permitiu o levantamento da problemática do que foi proposto analisar, através de pesquisas que já foram abordadas para a construção de novos conceitos, ampliando o tema para novas discussões e conclusões.

Sendo que as buscas de dados ocorreram por meio do Scielo, Google acadêmico em busca de artigos científicos, dados estatísticos, leis, documentos e livros eletrônicos (e-book). Os artigos e documentos foram selecionados primeiramente por título, posteriormente por resumo, e por fim, por leitura completa. Após encontrar as pesquisas mais relevantes foram estabelecidos os critérios de inclusão e exclusão.

Sendo incluídos os trabalhos completos, artigos originais, que apresentavam textos de maneira clara, com acesso livre, publicados recentemente, preferencialmente nos últimos 05 anos e que abordavam contundência sobre o problema da pesquisa. Sendo excluídos artigos duplicados, livros, teses e publicações que não apresentavam relação com o tema e que não estivessem em português. Para a construção foram escolhidos 13 documentos e artigos e os demais se deram como bases de leituras.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Enquanto a pandemia evidenciou as consequências do vírus, existiu um lado oculto que se revelou durante esse surto. Tais medidas trouxeram efeitos sobre a vida da população, sobretudo, daqueles sujeitos que já se encontravam em situação de vulnerabilidade e desigualdade como as crianças e os adolescentes e que se agravaram mais ainda durante a pandemia, revelando violações de direitos e a desproteção que já existiam a esses sujeitos. Com o avanço da doença as crianças e os adolescentes também foram afetados pelo vírus, o que exige intervenções de saúde e de cuidado a esses sujeitos, como o acesso básico a água, sabão e outros kits de higiene que permitisse a prevenção ao vírus (FIOCRUZ, 2020).

Segundo a Fiocruz (2020) a covid-19 tem impactado a saúde das crianças e dos adolescentes de forma direta e indireta. Os efeitos diretos correspondem aos efeitos clínicos da doença como: febre, tosse, vômito, diarreia, perda do olfato e do paladar, problemas respiratórios, mialgia, dor abdominal, dentre outros, já as indiretas são: prejuízo no ensino, socialização, afastamento do convívio com os amigos, sintomas de depressão e ansiedade, exagero no uso da internet, aumento da fome, violência e impactos socioeconômicos nas suas famílias.

Entretanto, a pandemia nos mostrou um cenário para além dos efeitos clínicos da doença, como as violações dos direitos vivenciado pelas crianças e os adolescentes durante essa crise. Uma pesquisa realizada pelo Ibope para o Unicef (2020) “Impactos primários e secundários da Covid-19 em crianças e adolescentes” traz alguns pontos onde esses sujeitos e suas famílias mais foram afetados durante a pandemia, como os impactos na renda familiar, (in) segurança alimentar e nutricional e o direito a educação. Indicativos que serão expostos como perspectiva de discussão no contexto atual vivenciado por esses sujeitos.

De acordo com a pesquisa houve uma diminuição de pessoas trabalhando na pandemia, 55% relataram que o rendimento nos seus domicílios diminuiu desde o início da pandemia, afetando cerca de 86 milhões de brasileiros. As famílias com crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, chegou a proporção de 63%, sendo isso gerado pelo desemprego de algum membro da família, redução de salário, redução das horas de trabalho, dentre outros, necessitando de acesso a outras fontes de renda como algum Benefício do Governo Federal, Estadual e Municipal, assim como o Bolsa família, Doação de alimentos, Aposentadoria e Pensão, Seguro desemprego e Benefício de prestação continuada – BPC (UNICEF, 2020).

Essas circunstâncias geradas pela pandemia põem em risco a proteção das famílias aos

seus membros (FIOCURZ, 2020). Consequentemente, isso afetou o consumo alimentar, dando prioridade a alimentos industrializados em maior quantidade como macarrão, biscoito recheado, alimentos enlatados, refrigerantes e bebidas açucaradas, dentre outros. Segundo a pesquisa 49% relataram ter mudado seus hábitos alimentares e entre as famílias que residiam com crianças e adolescentes o percentual chegou até 58%, isso ocorrendo desde o início da pandemia. Outro grupo que residiu com crianças ou adolescentes no percentual de 6% mencionaram que deixaram de comer, pois não havia dinheiro para comprar comida (UNICEF, 2020). Esses dados revelam na verdade uma insegurança alimentar, por não saber como seria a alimentação do dia seguinte, ou durante o mês, ou até mesmo quando se perdurasse a pandemia.

Ainda sobre a pesquisa outro impacto que afetou as condições de vida das crianças e dos adolescentes durante a pandemia foi o acesso a educação, porém, segundo a pesquisa mesmo com toda fragilidade de ensino 91% das famílias que residiam com as crianças e os adolescentes de 04 a 17 anos, afirmaram que eles continuaram realizando as atividades escolares mesmo na pandemia. Sendo que 63% receberam atividades em 05 dias da semana anterior ao estudo; outros 73% declararam que tiveram ajuda de alguém de casa (UNICEF, 2020). Porém, essa realidade demonstrou um contraste, pois muitos dessas crianças durante o fechamento da escola não tiveram acesso a alimentação escolar, afetando seu aprendizado e potencial, pois muito desses sujeitos dependiam da alimentação oferecida pela escola (UNICEF, 2020).

Contudo, essa pesquisa não se aplicou a toda realidade brasileira, o cenário da pandemia revelou que em novembro de 2020, no final do ano letivo, 5.075.294 crianças e adolescentes de 06 a 17 anos estavam fora da escola ou sem atividades, representando cerca de 13,9% dessa população. Essa realidade só aumentou a exclusão escolar, as crianças de 06 a 10 anos que vivem na região Norte e Nordeste foram as mais afetadas na pandemia (UNICEF, 2021). Esse lado evidenciado pela pandemia exige estratégias de como enfrentar a exclusão escolar, como garantia de acesso aos direitos a educação.

Tais estratégias que podem prevenir o aumento da exclusão escolar durante a pandemia pode ser realizado através da busca ativa, entrando em contato com as famílias das crianças e dos adolescentes com a finalidade de entender os desafios e as possibilidades de acesso a educação; comunicação comunitária, através da organização de campanhas públicas para a realização de matrículas; garantia de acesso à internet como investimento em política de conectividade para estudantes e professores; mobilização das escolas para que todos estejam envolvidos para evitar a redução do abandono e o fortalecimento do sistema de garantia de direitos, que envolve a intersetorialidade das políticas públicas (UNICEF, 2021).

Os dados retratados pelo Relatório dos direitos humanos de 2019 revelaram outras violações de direitos cometidos contra crianças e adolescentes. Ressaltamos que esses dados evidenciaram que essas violações de direitos já ocorriam antes da pandemia, sendo as mais cometidas contra as crianças e os adolescentes como a negligência, violência psicológica, violência física, violência patrimonial, violência sexual e violência institucional (RELATÓRIO, 2019).

Em 2019, o disque 100 registrou cerca de 86.837, denúncias de violações de direitos humanos contra crianças e adolescentes, sendo um aumento de 14% comparado ao ano de 2018. Tanto em 2018 como em 2019, a negligência se apresentou como a violação de direito mais cometida contra crianças e adolescentes, em 2018 sendo (21,23%) e em 2019 (38%). Uma outra violação que surgiu através das denúncias em 2019 foi a exploração do trabalho representando cerca de 3%, mesmo em menor percentual essa violação cresceu durante a pandemia (RELATÓRIO, 2019).

As violações de direito como a violência física, sexual e psicológica se intensificou nesse período de pandemia. Vidal; Miranda (2020, p.129) afirmam que as “crianças e adolescentes, submetidos a um confinamento domiciliar, estão sob risco ainda maior de sofrer violência física, sexual e psicológica, tendo em vista que é no próprio ambiente familiar onde ocorre a maior parte das violências contra crianças e adolescentes”. Corroborando, Queiroz (2020) ressalta que o ambiente familiar que se mostra como um espaço seguro, nesse período é onde têm ocorrido os maiores índices de violência e reafirma que tais violências já ocorriam bem antes da pandemia. O Relatório dos direitos humanos de 2019 destacou que os maiores índices de violência ocorreram na casa da vítima sendo representado por 52%, praticada pela mãe, pelo pai, padastro e tio (RELATÓRIO, 2019).

Esses dados revelaram um cenário de violação de direitos dos responsáveis as crianças e os adolescentes. Em um contexto de legislação onde os pais devem zelar e garantir a proteção da vida das crianças e dos adolescentes, quando ocorrem as violações é necessário a denúncia aos órgãos competentes. O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA no seu artigo 5º declara que “nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais” (BRASIL, 1990).

Conforme a Unicef (2020) a medida que foram estabelecidos o fechamento de escolas, e os serviços essenciais foram suspensos, tornando o movimento restrito, as crianças estariam em risco e mais expostas a situações de violações como o aumento do trabalho infantil, abuso, negligência, exploração e violência. Neto (2020, p.16) detalha que “o termo trabalho infantil

compreende a realização de atividades pela criança e adolescente com idade inferior aos dezesesseis anos, visando à obtenção de ganho para prover o sustento próprio e/ou da família, e também a realização de atividades não remuneradas”.

Essa realidade se agravou na pandemia, como meio de complemento a renda da família, ou até mesmo como o único meio provedor de sustento para a família desses sujeitos, que na verdade revelou as estratégias de sobrevivência das famílias para atender as necessidades mais básicas dos seus membros. A Unicef (2020) releva que tais violações são decorrente da pobreza, causando desafios as famílias e aos seus membros no enfrentamento a pandemia, tendo dificuldade em atender as medidas de contenção e de isolamento aumentando então o risco a exposição e infecções do vírus.

A pobreza não se refere apenas à falta de renda, mas se agrava também pelo não acesso aos direitos fundamentais, como a educação, não acesso a informação e a internet, situação de trabalho infantil, moradia inadequada, não acesso a água e saneamento básico, essas condições de agravamento da pobreza são consideradas como privações e violações de direitos (UNICEF, 2018). Essa realidade vivenciada por muitas crianças e adolescentes quer seja antes ou durante a pandemia vai de encontro ao Estatuto da criança e do adolescente, que preza pela proteção integral desses sujeitos (BRASIL, 1990).

Os locais de ocorrências dos meios de sustento acontecem nas áreas rurais: agricultura e pecuária; trabalho autônomo: vendedor ambulante, flanelinha; em áreas públicas urbanas: feiras livres, ruas, avenidas, sinais de trânsito e lixões, assim, como nos ambientes domésticos, sendo este último um dos mais incentivados pela família. O trabalho infantil não se configura como caráter educativo, na verdade, é uma reprodução da exploração, em que muitos chegam até a fase adulta (NETO, 2020). O trabalho só é permitido aos adolescentes na condição de aprendiz, qualquer outra atividade realizada sem essa condição é considerado violação de direito e desproteção aos direitos (BRASIL, 1990).

Ainda recorrendo a Neto (2020) o autor revela que essa condição de situação de trabalho infantil pode levar a gravidade da situação para atividades criminosas, exemplo do tráfico de drogas e pornografia de crianças e adolescentes. Durante a pandemia a exploração sexual tem se revelado nesse período através da internet, facilitando a prática de crimes, ocorrendo por meio de fotos e vídeos, onde essas nomenclaturas são classificadas como “pornografia infantil”. O uso da internet aumentou nesse período de pandemia, exigindo o acompanhamento dos responsáveis, afim de que crianças e adolescentes não fiquem expostos a conteúdos e plataformas digitais que intensificasse a exploração sexual (QUEIROZ, 2020).

Essas violações expostas até aqui, revelou um contexto que na verdade não é tão oculta

assim e que a título de discussão nos leva a perceber o quão desastrosa foi a pandemia para todos, sobretudo, para sujeitos que já se encontravam em situação de vulnerabilidade como as crianças e os adolescentes.

4 CONCLUSÕES

Com a chegada da pandemia a vulnerabilidade de muitos sujeitos se intensificou chegando ao agravamento da pobreza e da desigualdade, causando o aumento das violações de direitos assim como o surgimento de outras violações. Mas do que se prevenir do vírus, as condições de milhões de famílias com crianças e adolescentes demandam prevenção no que diz respeito à fome e ao acesso aos direitos fundamentais, principalmente nesse período. São famílias que por não conseguirem seu próprio sustento/renda ficaram em risco tornando-se desafiador a proteção aos seus membros (crianças e adolescentes).

A pandemia revelou que mesmo depois das legislações vigentes muitas crianças e adolescentes continuaram desprotegidas e sofrendo diversas violações. Tais legislações funcionam como aparato de resistência contra qualquer ação de violência contra esses sujeitos. À medida que a pandemia se perdura é possível que as violações de direitos continuem existindo, com isso, é necessário denunciar as violações de direitos aos órgãos competentes e agir em articulação com as políticas públicas para promoção da proteção integral dos direitos das crianças e adolescentes como responsabilidade do Estado.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. **Casa Civil**. Brasília, DF.1990.

FIOCRUZ. Ministério da Saúde. **COVID-19 e Saúde da Criança e do Adolescente**. Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF), Rio de Janeiro, 2020.

GIL, Antônio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. São Paulo: Atlas, 2008.

LIMA, Telma Cristine Sasso; MIOTO, Regina, Célia Tamasso. Procedimentos metodológicos na construção do conhecimento científico: a pesquisa bibliográfica. **Revista Katállys**,

Florianópolis, v.10, p.37-45, 2007.

NETO, Xisto Tiago de Medeiros. O trabalho infantil: fundamentos e desafios para o seu combate. In: MOTA, Fabiana Dantas Soares Alves da; SOBRINHO, Zéu Palmeira. (Orgs.). **Trabalho infantil e pandemia: diagnóstico e estratégias de combate**. Natal: Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, 2020, p.07-28.

QUEIROZ, Gabriele Nogueira. Exploração sexual infantil e os riscos da internet: vulnerabilidades acentuadas pela pandemia. In: MOTA, Fabiana Dantas Soares Alves da; SOBRINHO, Zéu Palmeira (Orgs.). **Trabalho infantil e pandemia: diagnóstico e estratégias de combate**. Natal: Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, 2020, p.201-225.

RELATÓRIO. **DISQUE DIREITOS HUMANOS**. Brasil: Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, 2019. 155p.

UNICEF. Fundo das Nações Unidas para a Infância. **Pobreza na infância e na adolescência**. Brasil, 2018. 20p.

_____.Fundo das Nações Unidas para a Infância. **Impactos primários e secundários da covid 19 em crianças e adolescentes**. Brasil: IBOPE, Inteligência, 2020. 36p.

_____. Covid-19: Número de crianças vivendo na pobreza pode aumentar em até 86 milhões até o final do ano. **Unicef para cada criança**, 75, Brasil, 28 mai. 2020.

_____. Fundo das Nações Unidas para a Infância. **Cenário da exclusão escolar no Brasil: Um alerta sobre os impactos da pandemia da covid - 19 na educação**. Brasil: CENPEC, Educação, 2021. 58p.

VIDAL, Angélica Rego; MIRANDA, Brenda Almerinda Araújo. O papel da escola na efetivação dos direitos da criança e do adolescente: perspectivas e impactos da ausência do ambiente escolar durante a pandemia do covid-19. In: MOTA, Fabiana Dantas Soares Alves da; SOBRINHO, Zéu Palmeira. (Orgs.). **Trabalho infantil e pandemia: diagnóstico e estratégias de combate**. Natal: Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, 2020, p.122- 141.

XAVIER, Analucia R. et al. COVID-19: manifestações clínicas e laboratoriais na infecção pelo novo coronavírus. **J Bras Patol Med Lab**, Rio de Janeiro, n.56, p.1-9, jun. 2020.

CAPÍTULO 26

ASPECTOS RELACIONADOS A MORTE MATERNA NO BRASIL NO PERÍODO DE 2016 A 2020

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c26](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c26)

Damiana Ramos Brandet¹, Bruna Ramos Caldas², Marcia Batista da Silva³,
Lucas Fernando Ribeiro Queiroz⁴, Fabricio Ramos de Souza⁵

¹(damicabrandet@gmail.com)

²(bruna.ramos@unifesp.br)

³(marcinhadsb@gmail.com)

⁴(lfrq_@hotmail.com)

⁵(fabriciojarc@hotmail.com)

Resumo

Introdução: A diminuição da morte materna no Brasil é um grande desafio para o sistema de saúde se configurando um grave problema de saúde pública, atingindo desigualmente as diferentes regiões brasileiras, nesse contexto, analisar os fatores relacionados a mortalidade é essencial para estratégias de gestão e planejamento. **Metodologia:** Estudo retrospectivo, quantitativo e exploratório, realizado através do DATASUS, no mês de agosto de 2021, utilizando os registros de mortalidade materna. **Resultados e Discussão:** Entre 2016 a 2020 foram notificados 323.971 óbitos maternos no Brasil, sendo a região Sudeste 135.995 (41.98%) e região Nordeste 91.338 (28.19%) destaques na análise, dentre os fatores analisados. destaca-se as causas obstétricas diretas 5.431 (65%) com as doenças hipertensivas 1.585 (29%) e as síndromes hemorrágicas 1.034 (19%) seguido de causas obstétricas indiretas 2.670 (32%) com as doenças do aparelho circulatório com 626 (23%). **Considerações Finais:** Observa-se a importância do fortalecimento das unidades de atendimento a saúde da mulher no período gestacional.

Palavras-chaves: Assistência à Saúde; Cuidado pré-natal; Mortalidade materna; Saúde da Mulher.

Área Temática: Ciências da Saúde.

E-mail do autor principal: damicabrandet@gmail.com.

1. INTRODUÇÃO

A Morte materna é aquela que ocorre durante a gestação ou até 42 dias após o parto, decorrente de qualquer fator relacionado ou que foi agravado pela gestação, excluindo fatores acidentais ou incidentais, constituindo-se um grande desafio para o sistema de saúde e um grave problema de saúde coletiva, afetando desproporcionalmente as diferentes regiões federativas do Brasil (BRASIL, 2020; BRASIL, 2011).

Faz-se importante destacar que, dentro do arcabouço conceitual de morte materna, é necessário considerar os fatores relacionados aos distúrbios oriundos dos problemas às complicações obstétricas que podem ocorrer durante a gestação, concepção e, ainda, durante o lapso temporal compreendido entre o momento do pós-parto e o instante em que o organismo da mulher retorna ao estado de normalidade, onde, tais distúrbios seriam consequências de interferências, omissões, recursos terapêuticos errôneos ou a uma sequência de acontecimentos resultantes relacionados a essas causas, podendo, ainda, a morte materna resultar de patologias pré-existentes à gravidez e que se potencializaram durante o período gestacional (SILVA, 2017). Tal abrangência do conceito de morte materna infere, ainda mais, a exigência de processos eficientes e eficazes no tratamento pré-natal a serem disponibilizados pelos sistemas de saúde públicos e privados.

Países desenvolvidos apresentam uma taxa de mortalidade materna de 12 óbitos para 100 mil nascidos vivos, já os países em desenvolvimento, com taxa de 239 óbitos maternos, por 100 mil nascidos vivos. 20 óbitos maternos, por 100 mil nascidos vivos é considerado um valor razoável. No Brasil, em 2014, foram registrados 1.552 óbitos maternos, por 100 mil nascidos vivos (MARTINS; SILVA, 2018).

Dentro do contexto brasileiro, observa-se uma redução no número de mortalidade materna que apresentou uma redução de 120 óbitos por 100 mil nascidos vivos em 1990, para 69 óbitos por 100 mil nascidos vivos em 2013, exibindo queda de 43% no RMM. Embora o país tenha implementado melhorias no campo da saúde, ainda não atingiu o 5º objetivo do milênio, em que o RMM ficaria na margem de 35 mortes por 100 mil NV, nível elevadamente superior ao objetivo instituído (REZENDE; RODRIGUES; FONSECA, 2015).

A Taxa/Razão de Mortalidade Materna (RMM) é um importante instrumento para avaliar a qualidade da assistência às gestantes durante o parto e nascimento, permitindo mensurar o nível de saúde da população e implementar estratégias de gestão e planejamento no âmbito da atenção obstétrica (BRASIL, 2021).

O cálculo da supra citada taxa é feito relacionando as mortes maternas (por causas obstétricas diretas/indiretas) em um determinado período de tempo por 100 mil nascidos vivos, em um determinado espaço geográfico (BRASIL, 2021).

Constata-se de forma irrefutável que determinadas condições são preponderantes para que haja um incrementato da RMM, dentre as quias podemos citar: baixa condição socioeconômica, baixo nível de escolaridade, dificuldades de acesso à saúde pública e gravidez em mulheres solteiras de camadas mais pobres. Os grupos populacionais, onde estas realidades sociais são mais abrangentes, são aqueles que apresentam expressivos valores na RMM, inclui-se também nesses grupos mulheres que realizaram cesarianas.

A condição de ser um país em desenvolvimento coloca o Brasil numa posição relevantemente desfavorável, pois, por ter grande parte de sua população enquadrada nos grupos que vivem nas condições que maximizam a RMM e, ainda, por ser a sua estrutura de saúde extremamente deficitária e, também, por ter grandes deficiências na consolidação confiável dos dados relativos às notificações dos casos de mortalidade materna, acaba por apresentar medições desfavoráveis e consternadoras desse indicador. Tal realidade torna urgente a implementação de incrementos gerenciais na gestão da saúde pública que permitam a realização de diagnósticos prévios; melhoramentos dos processos hospitalares; e a educação e o planejamento familiar de forma ética e com mais efetividade, objetivando o aperfeiçoamento e o melhoramento da assistência à mulher em todo o processo gestacional do pré ao pós-parto, mitigando as causas desfavoráveis, com vistas a alavancar melhores índices da RMM (TEODORO, et al. 2021).

Assim, deve-se transcender na análise das causas do aumento da RMM, pois, muitos estudiosos afirmam que a fuidéz dos relacionamentos modernos resultaram em relações razas, conflitivas, instáveis e, conseqüentemente, menos duradouros. A relação do núcleo primaz da família está sendo desconsiderado pelas sociedades contemporâneas, tal fato, acaba por inferir a construção de relacionamentos não duradouros, mascados pela falta de certeza e pela insegurança, acabando por resultar em relações marcadas pela superficialidade, falta de compromisso e pela brevidade, o que acaba por colocar a mulher numa posição mais cômoda de optar pela cesariana, tal fato já é congênito na sociedade atingindo todas as classes sociais, determinando assim, um aumento nos índices da RMM (ANDRADE, 2020).

Corroborando com o que foi descrito anteriormente, podemos citar que de acordo com a própria Organização Mundial da Saúde (OMS), a realização de procedimentos cirúrgicos cesáreos não deveria se sobrepor a 15% do universo de partos realizados em determinado país, pois, segundo a OMS, deve-se optar por tal procedimento somente se verificado risco evidente

para mulher ou para o feto (SOUZA, 2020).

Fica evidente que é imperativo esmiuçar os diversos matizes que se incorporam ao tema, pois, a concepção, estruturação e implementação das políticas públicas que visem melhorar os índices de Mortalidade Materna não podem se ancorar em fundamentos empíricos e intuitivos e sim, numa análise científica de dados e evidências que fartamente se apresentam em estudos, artigos, livros e em outras publicações existentes. Dessa forma, este tomo acadêmico busca analisar os fatores relacionados à mortalidade materna no Brasil no período de 2016 a 2020, tais iniciativas são de essencial importância para garantir que as políticas públicas respondam às reais necessidades da população obstétrica.

2. MÉTODO

Trata-se de um estudo retrospectivo e quantitativo, que fundamentou-se através de dados eletrônicos secundários, acessíveis no Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) realizado no mês de agosto de 2021, através de informações arquivadas sobre mortalidade materna no painel de monitoramento, com os seguintes filtros: ano do registro; abrangência; país; indicador de mortalidade; número de óbitos; grupo etário e categoria de óbitos maternos. Utilizou-se como variáveis os valores absolutos do número de óbitos maternos. Para análise e tabulação dos dados utilizou-se Microsoft Excel 2016, consequentemente os dados foram inseridos em gráficos e tabelas com representação numérica, sendo representados em frequências absolutas para cada nível descrito. Utilizou-se com Descritores em Ciências da Saúde (DeCs): Assistência à Saúde; Cuidado pré-natal; Mortalidade materna; Saúde da Mulher. Conforme a Resolução n. 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde, o presente trabalho não necessitou de submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), por se tratar de dados secundários, disponíveis ao público, em que não é possível determinar a identidade do sujeito da pesquisa.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Conforme a análise, para taxa de mortalidade de mulheres em idade fértil (MIF), foram notificados 323.971 (Quadro 1) óbitos maternos entre o período de 2016 a 2020 no Brasil, apresentando disparidades em diferentes regiões brasileiras, sendo a região Norte apresentando um resultado de 28.282 (8.73%), Nordeste 91.338 (28.19%), Sudeste 135.995 (41.98%), Sul 48.204 (13.34%) e Centro Oeste 25.152 (7.76%), observa-se que a região Sudeste e Nordeste apresentaram taxas elevadas em relação às demais regiões entre os períodos

analisados.

Quadro 1: Mortalidade materna no Brasil entre 2016 a 2020.

ANO	2016		2017		2018		2019		2020		TOTAL	
REGIÃO	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
NORTE	5279	8,06%	5439	8,68%	5.532	8,92%	5508	8,79%	6.524	9,17%	28.282	8,73%
NORDESTE	18379	28,07%	17856	28,50%	17443	28,12%	17485	27,89%	20175	28,37%	91338	28,19%
SUDESTE	27617	42,18%	25990	41,48%	25.824	41,63%	26500	42,28%	30.064	42,27%	135.995	41,98%
SUL	9059	13,83%	8619	13,76%	8.362	13,48%	8374	13,36%	8.790	12,36%	43.204	13,34%
CENTRO OESTE	5147	7,86%	4746	7,58%	4.874	7,86%	4816	7,68%	5.569	7,83%	25.152	7,76%
Total	65.481		62.650		62.035		62.683		71.122		323.971	

Fonte: Autores (2021).

A mortalidade materna está relacionada a dois fatores: por causas obstétricas diretas e obstétricas indiretas. A morte materna por causa obstétrica direta advém de complicações que ocorrem durante o período gestacional, parto ou puerpério, enquanto a morte materna obstétrica indireta é resultado de doenças preexistentes antes da gravidez ou que surgiram nesse período.

Nessa ótica, conforme a análise, entre 2016 a 2020, prevaleceram a mortalidade por causas obstétricas diretas com 5.431 (65%), tendo ênfase as doenças hipertensivas com 1.585 (29%) e as síndromes hemorrágicas 1.034 (19%) na gestação (quadro 1), seguido de causas obstétricas indiretas com percentual de 2.670 (32%) destacando-se as doenças do sistema circulatório complicando a gravidez, o parto e o puerpério com 626 (23%) e Aids (3%) impactando o curso gestacional (Quadro 2).

As mortes maternas que ocorrem pela hipertensão e infecção puerperal se relacionam com a falta de acesso aos serviços de saúde em tempo oportuno, falta de adesão a consulta de pré-natal pela gestante, serviços de referência e contrarreferência ausentes. Já a mortalidade por hemorragias se relacionam com a falta de protocolos e manejo adequado nos centros de saúde que recebem essas mulheres assim como a falta de treinamento aos profissionais envolvidos no atendimento (BRASIL. 2020).

Quadro 2: Perfil de mortalidade no Brasil entre 2016 a 2020

INDICADOR	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	
						L	%
Morte materna declarado por causas obstétricas diretas	1.120	1.167	1.114	1.034	996	5.431	65%
Aborto	56	68	68	43	54	289	5,3%

Hemorragia	209	229	225	195	176	1034	19%
Hipertensão	321	332	313	317	302	1585	29%
Infecção puerperal	98	86	106	69	77	436	8,0%
Morte materna declarado por causas obstétricas indiretas	496	489	489	479	717	2670	32%
Aids	17	17	17	12	8	71	3%
Doenças do aparelho circulatório complicando a gravidez, o parto e o puerpério	132	134	141	130	89	626	23%
Morte materna declarados com causas obstétricas não especificadas	50	60	55	62	87	314	12%
Total de Morte Materno declarado	1.666	1.716	1.658	1.575	1.800	8.415	

Fonte: Autores (2021).

Percebe-se que, enquanto as causas de morte materna por hipertensão e infecção puerperal apontam fragilidades na assistência as gestantes e puérperas na atenção primária, esta última tem sua interface com a assistência hospitalar.

A promoção da saúde materna está relacionada, dentre outros aspectos, ao acesso em tempo oportuno da realização do mínimo preconizado de consultas de pré-natal com qualidade e o estabelecimento de diagnóstico e tratamento das complicações da gestação. Doenças cardíacas, neoplasias e outras intercorrências devem ser precocemente identificadas e tratadas no pré-natal em serviços especializados, evitando complicações no parto e no puerpério.

A mortalidade materna continua sendo um problema de saúde pública em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, inclusive no Brasil. Elementos, como falhas no planejamento e estratégias políticas dos profissionais de saúde contribuíram para o Brasil não atingir a meta do milênio de redução do CMM em três quartos. As características sociodemográficas têm sido apontadas como possíveis fatores de risco para tal agravamento, levando à necessidade de repensar estratégias para diminuir o número de óbitos maternos (TEXEIRA et al., 2021).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, foi possível analisar os fatores relacionados a morte materna no Brasil, constatando prevalência de mortalidade por causas obstétricas diretas que são evitáveis, na sua grande maioria, através do diagnóstico precoce e intervenção oportuna. Dessa forma, é fundamental o fortalecimento das unidades de saúde voltadas para um pré-natal seguro.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDRADE, Méric Luzdam Maciel de et al. A realidade das cesarianas no Brasil: reflexões acerca de duas décadas de registros. 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informação de Mortalidade [Internet]. Brasília, 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Manual dos Comitês de Mortalidade Materna. 3ª ed. Brasília: Ministério da Saúde;2007.

BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher: princípios e diretrizes. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Brasília: Ministério da Saúde, 2011. Disponível em: <http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicações/politica_nacional_mulher_principios_diretrizes.pdf>. Acesso: agosto. 2021

BRASIL. Ministério da Saúde. PAINEL DE MONITORAMENTO DE MORTALIDADE MATERNA: 2020. Disponível em <http://svs.aids.gov.br/dantps/centrais-de-conteudos/paineis-demonitoramento/mortalidade/materna/> Acesso em: agosto de 2021.

BRASIL Ministério da Saúde. Saúde Brasil 2019 .Uma análise da situação de saúde com enfoque nas doenças imunopreveníveis e na imunização Disponível em:<https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2019/dezembro/05/Saude-Brasil-2019-imunizacao.pdf>.

MARTINS, A.C.S.& Silva, L.S. (2018). Perfil epidemiológico de mortalidade materna. Rev Bras Enferm [Internet]. 71(supl1):725-31. Acesso em 02.08.19. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/reben/v71s1/pt_0034-7167-reben-71-s1-0677.pdf

RESENDE LV, Rodrigues RN, Fonseca MC. Mortes maternas em Belo Horizonte, Brasil: percepções sobre qualidade da assistência e evitabilidade. Rev Panam Salud Publica [Internet]. 2015 [cited 2017 Sep 4];37(4):218-24. Available from: <https://scielosp.org/pdf/rpsp/v37n4-5/v37n4-5a05.pdf>

SILVA, Diego da Cruz. Avaliação da qualidade pré-natal e perfil das gestantes da ESF Beira Linha, Teresópolis, Rio de Janeiro. 2017.

SOUZA, Ivan Pires de Oliveira Fonseca et al. O EMPODERAMENTO FEMININO E A ESCOLHA PELA VIA DE PARTO. 2020.

TEIXEIRA, Neuma Zamariano Fanaia et al. Mortalidade materna e sua interface com a raça em Mato Grosso. Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil [online]. 2012, v. 12, n. 1 [Acessado 30 Agosto 2021] , pp. 27-35. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1519-38292012000100003>>. Epub 31 Maio 2012. ISSN 1806-9304. <https://doi.org/10.1590/S1519-38292012000100003>.

TEODORO, Matheus Serapião et al. Condicionantes e características da mortalidade materna no Brasil. Revista Eletrônica Acervo Saúde, v. 13, n. 4, p. e7050-e7050, 2021.

CAPÍTULO 27

ATUAÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM NA ASSISTÊNCIA ÀS GESTAÇÕES DE ALTO RISCO

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c27](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c27)

Jaíres Emanuele Nunes de Sousa¹, Angelica Ribeiro do Nascimento Oliveira², Lara Raquel Dias Carvalho³, Maria Dhescyca Ingrid Silva Arruda⁴, Antonia Shabrinna Silva Resende⁵, Lucia Emanuele de Sousa Silva⁶, Sheila Maria Alves de Carvalho Falcão⁷, Larissa Nunes de Alencar⁸, Alexya Ribeiro e Silva⁹, Caroline Taiane Santos da Silva¹⁰.

¹Centro Universitário Unifacid Wyden, (emanuelejaíres@gmail.com)

²Centro Universitário Maurício de Nassau, (angelicalribeiro.ar19@gmail.com)

³ Centro Universitário Unifacid Wyden, (lararaquelmartires1106@outlook.com)

⁴ Faculdade São Francisco da Paraíba, (dhescycaingrid20@gmail.com)

⁵Centro Universitário Unifacid Wyden, (resendesabrina2@gmail.com)

⁶Centro universitário Maurício de Nassau, (manuenfermagem17@gmail.com)

⁷Centro Universitário Unifacid Wyden, (sheilamcarvalho12@gmail.com)

⁸Centro Universitario Unifacid Wyden, (larissadpalencar@gmail.com)

⁹Centro Universitario Unifacid Wyden, (alexxya_rs@hotmail.com)

¹⁰Pós Graduanda na Child Behavior Institute of Miami, Flórida, Estados Unidos,

(carolinetaiane.enfa@gmail.com)

Resumo

Objetivos: Fazer uma análise acerca da atuação da equipe de enfermagem no que se refere a assistência às gestações de alto risco. **Métodos:** Trata-se de uma revisão integrativa, com abordagem qualitativa, onde foi feita análise e busca de material, realizada em 2021, por meio de artigos, livros, revistas e sites, através das bases de dados eletrônicas: Revista Família Ciclos de vida e saúde (REFACS), RegulaSUS, Scientific Eletronic Library Online (SciELO), utilizando descritores, de acordo com Descritores em Ciência da Saúde (DeCS): Gravidez de alto risco, Cuidados de enfermagem, Assistência pré-natal, combinados aos seguintes operadores *booleanos*: AND e OR. Critérios de inclusão, artigos dos últimos 6 anos, disponíveis de forma online e gratuitamente, publicados entre 2015 a 2021, no idioma, português e inglês. Sendo excluído artigos e conteúdos que não abordavam o tema proposto, após leitura do resumo e título. Foi eleita uma soma de 13 artigos para propor respostas e soluções ao tema abordado. **Resultados:** O estudo em questão evidenciou que, a assistência prestada pela equipe de enfermagem contribui para o desenvolvimento saudável da gestação, proporcionando a

qualidade de vida materno-fetal. O papel dos profissionais de enfermagem é ajudar nas forças naturais do parto, criando condições favoráveis ao nascimento e através de uma sistematização, eles podem direcionar este cuidado eficazmente, destacando sua autonomia como profissional. **Considerações Finais:** A equipe de enfermagem é de extrema importância na assistência das

gestantes com gravidez de risco. Embora, tenham limitações para prestar esses cuidados, no entanto, estão se capacitando e buscando autonomia para que tenham mais conhecimento técnico-científico na assistência e atendimento das gestantes, de modo que venha a perceber possíveis problemas de risco para gestação nas primeiras consultas de pré-natal.

Palavras-chave: Gravidez de alto risco; Cuidado pré-natal; Assistência de enfermagem.

Área Temática: Ciências da Saúde

E-mail do autor principal: emanuelejaire@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

É no período gestacional que a mulher carrega no ventre um ou mais conceptos, tornando-se um dos momentos de muitas mudanças para a mulher e sua família. Geralmente, essas mudanças ocorrem como um processo fisiológico, mas pode ser marcado por complicações, tornando-se evento de risco para mãe ou conceito. Quando há risco evidente, é necessária uma assistência qualificada por parte da equipe de saúde, na qual a enfermagem desempenha um papel fundamental, prestando cuidado integral e humanizado para atender as necessidades da gestante e família (GOMES, 2016).

Assim, a assistência qualificada voltada para a gestação de alto risco, principalmente no período pré-natal, pode alterar os prognósticos tanto para a mãe quanto para o feto, contribuindo para que haja maior número de desfechos favoráveis. Nesse contexto, o atendimento inicial a essas mulheres é realizado no nível primário e quando um ou mais riscos são identificados, elas são encaminhadas para níveis mais complexos de atenção à saúde (COSTA et al., 2019).

Desse modo, a gestação de “alto risco” é caracterizada por um quadro de doença materna ou condições psicobiológicas, tornando-se prejudicial no período gestacional, podendo trazer riscos para a saúde da mãe e/ ou bebê. Assim, o histórico de saúde e estilo de vida da gestante são fatores que frequentemente elevam o risco da gestação (GUIMARÃES; GRIBOSKI; DIÓGENES, 2019).

De acordo com SILVA et al., (2017), o atendimento à gestante de alto risco deve ser prestado por uma equipe interdisciplinar, que inclui o profissional enfermeiro, priorizando a troca de informações no decorrer da assistência pré-natal cujo objetivo é reduzir os riscos de um resultado desfavorável para mãe e/ou bebê/feto. Ademais, a equipe de saúde deve estar preparada, com profissionais treinados, para enfrentar quaisquer fatores considerando os

aspectos clínicos, socioeconômicos e emocionais, além de uma assistência qualificada com tecnologias de cuidado. Assim, a gestante de alto risco, deve ser atendida, pela equipe de enfermagem, de forma individualizada, sistemática e voltada para as suas reais necessidades (GOMES, 2016).

O alto risco na gestação podem estar associados a fatores anteriores à gestação, como a história reprodutiva anterior, condições clínicas pré-existentes e condições sociodemográficas desfavoráveis. Em contrapartida, esse quadro pode surgir durante a gestação pela exposição indevida ou acidental a fatores teratogênicos, doenças obstétricas na gravidez atual e intercorrências clínicas (FERNANDES; CAMPOS; FRANCISCO, 2019).

A portaria do Ministério da saúde n. 569, de 1º de junho de 2000 instituiu o Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento (PHPN), garantindo a adoção de medidas destinadas a assegurar a melhoria do acesso, da cobertura e da qualidade do acompanhamento pré-natal, reduzindo as altas taxas de morbimortalidade materna, perinatal e neonatal registradas no Brasil (BRASIL, 2000).

O presente estudo tem como questões norteadoras: “Qual atuação da equipe de enfermagem nos casos de gestação de alto risco?” “Quais os cuidados prestados à gestante de alto risco?” “Como o atendimento pré-natal pode contribuir para minimizar os riscos para mãe e bebê?”.

Decorrentes dessas atribuições, faz-se necessário o conhecimento acerca do cuidado prestado pela equipe de enfermagem no período gestacional de alto risco. Assim, o presente estudo tem como objetivo fazer uma análise acerca da atuação da equipe de enfermagem no que se refere a assistência às gestações de alto risco.

2 MÉTODO

Trata-se de uma revisão integrativa, com abordagem qualitativa, que tem em vista atingir resultados, na pesquisa de maneira abrangente e sucinta, enriquecendo cada vez mais o entendimento da realidade. Para suceder a pesquisa, foram realizadas as seguintes etapas: Preferência da temática, restrição do problema, objetivos da pesquisa, inspeção e discussão dos artigos selecionados. Tendo em vista responder às questões norteadoras selecionadas na introdução.

A análise foi realizada em 2021, por meio de artigos, livros, revistas e sites, através das bases de dados eletrônicas: Revista Família Ciclos de vida e saúde (REFACS), RegulaSUS, Scientific Eletronic Library Online (SciELO), utilizando descritores, de acordo com Descritores

em Ciência da Saúde (DeCS): Gravidez de alto risco, Cuidados de enfermagem, Assistência pré-natal, cominados aos seguintes operadores *booleanos*: AND e OR.

Apresentando como critérios de inclusão, artigos dos últimos 6 anos, disponíveis de forma online e gratuitamente, publicados entre 2015 a 2021, no idioma, português e inglês, que abordou o conteúdo pesquisado encontrando um total de 114 artigos. Sendo excluído artigos e conteúdos que não abordavam o tema proposto, após leitura do resumo e título.

Após análise foi realizada a leitura minuciosa e detalhada dos mesmos, ficando selecionado e organizado todo material obtido. Foi eleita uma soma de 13 artigos para propor respostas e soluções ao tema abordado.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após as buscas realizadas nas bases de dados, foram encontradas 13 produções que se encaixam na temática e respondem à questão norteadora do estudo. A análise dos mesmos foi realizada através da construção de um quadro, contendo as informações de relevância para a pesquisa, conforme descrito no quadro 1.

Quadro 1. Achados da literatura científica acerca da atuação da equipe de enfermagem na assistência às gestações de alto risco

TÍTULO	AUTOR/REVISTA	ANO	PRINCIPAIS CONCLUSÕES
Gestante de Alto Risco – MS	MS Ministério da Saúde, Secretaria na Executiva- Brasília	2001	Mecanismos de implantação de sistemas de referência hospitalar para gestantes à gestante de alto risco .
Atuação do Enfermeiro com gestantes de alto risco : Identificação do IMC e Orientação de Enfermagem	Martins ML, Ribeiro PS.	2015	A identificação do Peso contribui para o desenvolvimento saudável da gestação, proporcionando a qualidade de vida materno-fetal. No entanto, esta identificação nem sempre acontece, pois só é possível se a gestante aparecer em todas as consultas pré-natal, realizando o cálculo de IMC e controle mensal.

Sistematização da Assistência de Enfermagem à gestante de alto risco : Construção e Validação de uma tecnologia para o cuidado	Gomes LFS.	2016	A tecnologia abrangeu, em sua primeira versão, 23 Diagnósticos de enfermagem e suas respectivas características definidoras e fatores relacionados, bem como intervenções de enfermagem e suas ações, sendo bem avaliada quanto à aparência e conteúdo. Já a sua segunda versão contou com ajuda de profissionais como “juizes”, acrescentando à tecnologia conhecimentos e práticas obstétricas para a gestante de alto risco.
Perspectiva do cuidado de enfermagem na gestação de alto risco: Revisão integrativa	Amorim, TV, Souza IEO, Moura MAV, Queiroz ABA, Salimena, AMO. Enfermeria Global	2017	Neste contexto, alguns estudos abordaram as percepções observadas envolviam a Doença Hipertensiva, o que levou ao sentimento das gestantes sobre este processo, onde relataram ansiedade, medo, culpa relacionadas a este processo de alto risco. Outrossim, constatou-se que durante a aplicação do Processo de Enfermagem, o foco principal do enfermeiro eram nas atividades durante a etapa de diagnóstico clínico das pacientes grávidas hipertensas.
O enfermeiro no pré-natal de alto risco : papel profissional	Junior ARF, Filho JTO, Albuquerque RAS, Siqueira DA, Rocha FAA, Rodrigues MENG. Revista Baiana de Saúde Pública	2017	Evidencia-se a necessidade de uma maior protagonismo da enfermagem na atenção ao pré-natal de alto risco, na qual, o profissional participe da assistência exercendo seu conhecimento científico objetivando uma serviço de saúde de qualidade. A atuação do enfermeiro dentro do pré-natal de alto risco apresentou-se limitada, uma vez que, é feita apenas a consulta inicial ou cardiocardiografia ou burocrática.
A importância do Pré-Natal na Toxicemia Grávida e o papel do Enfermeiro.	Silva SN, Santos MAP, Campos NPS, Souza C, Gonzaga MFN, Pereira RSF, Soares APG. Rev Saúde Foco	2017	Objetivando prevenir as complicações decorrentes da toxicemia, observou-se que a educação em saúde é um agente eficaz neste processo. A assistência enfermagem como espinha dorsal desta ação torna-a mais humanizada, pois é nesse momento que as mulheres necessitam de uma rede de apoio para receber informações durante a assistência pré-natal, e ao mesmo tempo trocam vivências, informações que geram meios para transformar suas limitações e desconhecimento.
Assistência de Enfermagem à gestante de alto risco sob a visão do profissional	Errico LSP, Bicalho PG, Oliveira TCFL, Martins EF. Revista Prevenção de Infecção e Saúde	2018	Segundo a visão do profissional de Enfermagem dentro das categorias apresentadas, observou-se obstáculos relacionados à aplicação da SAE, pois a baixa quantidade de pessoal ante a demanda recebida impede o seu sucesso na aplicação.
O trabalho do enfermeiro no pré-natal de alto risco sob a ética das necessidades humanas básicas (NHB)	Nascimento TFH, Araújo FNF, Soares NSCS, Silva FM, Santos MFD, Chaves BJP. Revista brasileira de enfermagem	2018	O trabalho do enfermeiro na Assistência à gestante ao pré-natal de alto risco dentro da NHB mostrou-se fundamental dentro de suas classes destaca-se a importância de sistematizar a assistência de enfermagem –baseado na NHB- para que o cuidado junto à gestante seja feito com base científica e autonomia profissional.
Assistência de Enfermagem ao Pré-Natal de Alto Risco	Lima KMSG, Santos HJ, Pereira J, Barbosa LP, Cabral MCAM, Silva PR, Santos SMM, Souza SJG. Brazilian Journal of Health Review	2019	Nos últimos cinco anos não existe quantidade expressiva de estudos acerca da assistência de Enfermagem ao pré-natal de alto risco. Outro ponto é que, devido as complicações evidenciadas na gestação de alto risco, faz-se necessário um cuidado especializado e integrado num processo de Enfermagem baseado na teoria de Orem, visando um cuidado humanizado.

Cuidado de Enfermagem na ótica das gestantes de alto risco	Fernandes, J A; Campos, GWS Francisco, PMSB Revista Família, Ciclos de Vida e Saúde no Contexto Social	2019	Devido às complicações presentes em uma gestação de alto risco, a necessidade de hospitalização altera o ritmo familiar, como também, o apoio necessário durante todo esse processo. Deste modo, a assistência de enfermagem precisa estar direcionada a amparar e cuidar esta gestante, onde evidenciou-se que, a assistência prestada é satisfatória.
Assistência ao Pré-Natal	GUIMARÃES CP, GRIBOSKI RA DIÓGENES RRL. Revista Família, Ciclos de Vida e Saúde no Contexto Social	2019	A enfermeiras apresentavam pouco conhecimento acerca da HAP (Hipertensão Arterial Pulmonar) . Outrossim, não há incentivo para educação permanente na unidade, onde estas sabem da necessidade da implementação do Processo de Enfermagem, como também, o Nanda e relatam não ter acesso.
Diagnóstico de Enfermagem mais prevalentes em gestantes de Alto Risco	Teles PA, Costa EM, Panobianco MS, Gozco TO, Paterra TSV, Nunes LC. Enfermagem em foco	2019	Os principais diagnósticos de enfermagem classificados foram: conforto prejudicado seguido de risco de infecção, manutenção ineficaz da saúde e dor aguda.
Diagnóstico de Enfermagem em gestantes de alto risco : as necessidades psicossociais em foco.	Santos AB, Almeida JCP, Almeida LY, Oliveira JL, Toledo VP, Sousa J. Enfermagem em Foco	2020	O cuidado deve ser voltado não só para questões fisiopatológicas, mas também atentar-se as alterações subjetivas e que a circundam :emocional, social e espiritual . Todas essas partes , se avaliadas, permitem uma análise mais profunda das necessidades da usuária, colocando um planejamento real, sanando todas os fatores que afetam o processo da gestação, na qual, urje a necessidade de diagnóstico e intervenções voltadas para este novo tipo de classificação .

Fonte: Autores, 2021.

Foi realizada uma análise acerca da atenção às gestantes de alto risco e a atuação da equipe de enfermagem nesse processo. Evidenciou-se que o diagnóstico somado às condições clínicas, determinam uma gestação de alto risco, como também, seu tratamento e isto reitera sua importância dentro da prática de enfermagem, pois culmina numa gestação e nascimento de uma criança saudável (NASCIMENTO et al., 2018).

As ações de educação em saúde na assistência de enfermagem devem ser realizadas de forma humanizada para que a gestante se sinta acolhida durante o processo e haja o repasse de informações acerca do pré-natal. Ademais, diálogo entre profissional-paciente para que façam uma troca de vivências e que adquiram conhecimento em virtude do empoderamento da mulher sobre seus direitos (SILVA, 2017).

Segundo a visão do profissional de Enfermagem, observou-se obstáculos relacionados à aplicação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), pois a baixa quantidade de enfermeiros associados a alta demanda recebida de pacientes impede o sucesso na sua aplicação. Em contrapartida, a uma aproximação na relação entre paciente, contribuindo para sanar as dúvidas e reduzir a angústia em um período da vida dessas mulheres. Da mesma forma, os relatos demonstraram a busca por conhecimento, seja por meio de capacitações, como também através de leituras científicas (ERRICO et al., 2017).

Evidenciou-se uma preocupação sobre as percepções das gestantes e o significado de como era gestar na situação de risco na qual se encontravam. Neste contexto, alguns estudos abordaram as percepções observadas que envolviam a Doença Hipertensiva Específica na gestação, outros debateram acerca da importância da espiritualidade e o processo de gerar bem sem ansiedade. O que leva ao sentimento das gestantes sobre este processo, onde relataram ansiedade, medo, culpa relacionadas a este processo de alto risco (AMORIM et al., 2017).

É perceptível, o pouco protagonismo da enfermagem na atenção ao pré-natal de alto risco, na qual, a atuação do enfermeiro dentro do pré-natal de alto risco apresenta limitações, uma vez que, é feita apenas a consulta inicial ou cardiotocografia ou burocrática. Os profissionais sentiram que faria muita diferença se houvesse consulta de enfermagem de alto risco, com parâmetros de olhar altura uterina, pressão, orientação e depois passaria pro médico (JUNIOR et al., 2017).

Devido às complicações presentes em uma gestação de alto risco, urge a necessidade de hospitalização. Associado a isto, a ansiedade, a solidão somado às complicações geradas na gravidez torna a experiência ainda mais difícil. Deste modo, a assistência de enfermagem precisa estar direcionada a amparar e cuidar da gestante, de forma que ela consiga passar com tranquilidade a fase a qual se encontra (FERNANDES et al., 2019).

Durante a gestação, a identificação e monitoramento do peso da gestante é imprescindível para desenvolvimento saudável do bebê e maior qualidade de vida para a gestante. Porém, a não adesão às consultas pré-natal, exames como cálculo de IMC e exame físico dificulta o monitoramento dos fatores de risco (MARTINS; RIBEIRO, 2015).

Lima (2017) relatou a escassez de estudos nos últimos cinco anos no que se refere a assistência de enfermagem ao pré-natal de alto risco. Diante das complicações apresentadas no quadro de alto risco durante a gestação, é mister o cuidado especializado, integrado e humanizado.

O cuidado prestado à gestante deve ser aplicado de forma holística, atentando às alterações emocionais, sociais e espirituais e não voltado, apenas, para questões fisiopatológicas. Todas essas partes, se avaliadas, permitem uma análise mais profunda das necessidades da usuária, colocando um planejamento real, sanando todos os fatores que afetam o processo da gestação (SANTOS et al., 2020).

Foi descrita uma análise acerca dos conhecimentos voltados para atenção às gestantes de alto risco e como a assistência de enfermagem atua de forma satisfatória dentro deste contex-

to. Evidenciou-se que ante os diferentes resultados apresentados nos estudos os principais diagnósticos de enfermagem classificados foram: conforto prejudicado seguido de risco de infecção, manutenção ineficaz da saúde e dor aguda (TELES et al., 2019).

As enfermeiras demonstram pouca qualificação a cerca da Hipertensão Arterial Pulmonar. Ademais, não há incentivo para educação permanente na unidade, refletindo diretamente na qualificação da assistência. Ressalta-se a necessidade de adquirir atualização e novos conhecimentos sobre a Hipertensão Arterial Pulmonar e assistência às gestantes (GUIMARÃES; GRIBOSKI; DIÓGENES, 2019).

O estudo do GOMES et al., (2016) fala de uma tecnologia que suscita o desenvolvimento de mecanismos relacionados a sistematização da assistência, baseado em estudos sobre o processo de enfermagem dentro da gestação de alto risco, objetivando colaborar acerca da linguagem de enfermagem voltada pro cuidado. Baseado nisso, a presente tecnologia se mostrou eficaz para sistematizar os cuidados de enfermagem, como também, a prática Clínica do Enfermeiro.

4 CONCLUSÃO

Ao final desse estudo, pode-se perceber que a equipe de enfermagem é de extrema importância na assistência das gestantes com gravidez de risco. Ao se enquadrar no pré-natal de alto risco a mulher necessita de cuidados mais específicos, especializados e humanizados, além de uma rede de apoio de modo a evitar as complicações evidenciadas na gestação de alto risco. Embora, esses profissionais tenham limitações para prestar esses cuidados, no entanto, estão se capacitando e buscando autonomia para que tenham mais conhecimento técnico-científico na assistência e atendimento das gestantes, de modo que venha a perceber possíveis problemas de risco para gestação nas primeiras consultas de pré-natal.

A partir dos aspectos explícitos no decorrer do estudo, compreende-se que a enfermagem é de extrema relevância frente à assistência prestada às mulheres, de forma que, uma gestação de alto risco requer intervenções complexas para que haja a diminuição desses riscos e consequentemente um desfecho positivo durante o trabalho de parto. Com uma assistência adequada e humanizada, essa mulher receberá um acompanhamento minucioso para que seja rastreado se há ou não chance de outros possíveis agravos. Faz-se necessário um diálogo durante a prestação desses cuidados para que seja ofertada uma melhor qualidade de vida e experiência à gestante.

REFERÊNCIAS

AMORIM, Thaís Vasconcelos et al. Perspectivas do cuidado de enfermagem na gestação de alto risco: revisão integrativa. **Enfermería Global**, v. 16, n. 2, p. 500-543, 2017.

Assistência Pré-natal: Manual técnico/equipe de elaboração: Janine Schirmer et al. - 3ª edição - **Brasília: Secretaria de Políticas de Saúde - SPS/Ministério da Saúde**, 2000.66p

DO NASCIMENTO, Thaise Fernanda Holanda et al. Assistência de enfermagem à gestante de alto risco sob a visão do profissional. **Revista Prevenção de Infecção e Saúde**, v. 4, 2018.

DOS SANTOS, Celma Aparecida Barbosa et al. Diagnósticos de enfermagem em gestantes de alto risco: as necessidades psicossociais em foco. **Enfermagem em Foco**, v. 11, n. 4, 2020.

ERRICO, Livia de Souza Pancrácio de et al. The work of nurses in high-risk prenatal care from the perspective of basic human needs. **Revista brasileira de enfermagem**, v. 71, p. 1257-1264, 2018.

FERNANDES, Juliana Azevedo; CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa; FRANCISCO, Priscila Maria Stolses Bergamo. Perfil das gestantes de alto risco e a cogestão da decisão sobre a via de parto entre médico e gestante. **Saúde em Debate**, v. 43, p. 406-416, 2019.

FERREIRA, Samuel Vareira et al. Cuidado de enfermagem na ótica das gestantes de alto risco. **Revista Família, Ciclos de Vida e Saúde no Contexto Social**, v. 7, n. 2, p. 143-150, 2019.

Gestante de alto risco: sistemas estaduais de referências hospitalar a gestante de alto risco/**Ministério da Saúde, Secretaria na Executiva- Brasília** : Ministério da Saúde, 2001.32 p

GOMES, Linicarla Fabiole de Souza. Sistematização da assistência de enfermagem à gestante de alto risco: construção e validação de uma tecnologia para o cuidado. 2016.

GUIMARÃES, Carine Pinto; GRIBOSKI, Rejane Antonello; DIÓGENES, Raquel Ribeiro Lira. Cuidados de enfermagem a uma gestante com internação prolongada por diagnóstico de hipertensão arterial pulmonar. **Revista Família, Ciclos de Vida e Saúde no Contexto Social**, v. 7, n. 3, p. 296-305, 2019.

JUNIOR, Antonio Rodrigues Ferreira et al. O enfermeiro no pré-natal de alto risco: papel profissional. **Revista Baiana de Saúde Pública**, v. 41, n. 3, 2017.

LIMA, Kelly Mikaelly de Souza Gomes et al. Assistência de Enfermagem no Pré-Natal de alto risco. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 2, n. 4, p. 3183-3197, 2019.

MARTINS ML, Ribeiro PS. Atuação do enfermeiro com gestantes de alto risco: identificação do IMC e orientação de enfermagem/ Marciana Longo Martins; Priscila de Souza Ribeiro. Lins, 2015. 88p. il. 31cm

SILVA, K. D. M. et al. Intervenções de enfermagem nas gestações de alto risco: estudo bibliométrico. **17º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem.[Internet]**, 2013.

SILVA, Silvanira do Nascimento et al. A importância do pré-natal na prevenção da

toxicemia gravídica e o papel do enfermeiro. **Rev Saúde Foco**, v. 9, p. 16, 2017.

SILVA, Silvanira do Nascimento et al. A importância do pré-natal na prevenção da toxicemia gravídica e o papel do enfermeiro. **Rev Saúde Foco**, v. 9, p. 16, 2017.

TELES, Priscila Alvarenga et al. Diagnósticos de Enfermagem mais prevalentes em gestantes de alto risco. **Enfermagem em Foco**, v. 10, n. 3, 2019.

CAPÍTULO 28

ATUAÇÃO DE UMA LIGA ACADÊMICA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA PANDEMIA DE SARS-COV-2: RELATO DE EXPERIÊNCIA

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c28](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c28)

**Maria Aparecida Melo Moraes¹, Matheus Gomes Andrade², Glória Vanessa Araujo
Silva Sousa³, Anna Beatriz de Almeida Gomes Sousa⁴, Tereza Emanuella Menezes
Santos⁵, Mirelly Shatilla Misquita Tavares⁶, Érica Rodrigues Alexandre⁷, Geovana de
Abreu Braz⁸, Dilene Fontinele Catunda Melo⁹, Rosângela Souza Cavalcante¹⁰**

¹ Faculdade Princesa do Oeste-FPO, (maria.aparecida@alu.fpo.edu.br)

² Faculdade Princesa do Oeste-FPO, (matheusgoms15@gmail.com)

³ Faculdade Princesa do Oeste-FPO, (gloria.tamboril@gmail.com)

⁴ Faculdade Princesa do Oeste-FPO, (annabeatrizs427@gmail.com)

⁵ Faculdade Princesa do Oeste-FPO, (tessemanuella@gmail.com)

⁶ Faculdade Princesa do Oeste-FPO, (mirellymesquita2010@hotmail.com)

⁷ Faculdade Princesa do Oeste-FPO, (ericarodrigues133@gmail.com)

⁸ Faculdade Princesa do Oeste-FPO (geovanabraz45@gmail.com)

⁹ Faculdade Princesa do Oeste-FPO, (dilenemelo@hotmail.com)

¹⁰ Faculdade Princesa do Oeste-FPO, (rosangela.cavalcante@fpo.edu.br)

Resumo

O objetivo do trabalho é relatar experiências vivenciadas nas campanhas de vacinação na pandemia de Sars-coV-2 no município de Crateús-Ceará com o protagonismo de acadêmicos de enfermagem participantes de uma Liga Acadêmica de Saúde da Mulher e da Criança em Enfermagem. Trata-se de um estudo descritivo do tipo Relato de Experiência onde a primeira campanha ocorreu no prédio da faculdade privada na qual os discentes estudam e contemplou pessoas com comorbidades na faixa etária de 35 a 44 anos. Ademais, a vacinação ocorrida em

12 de julho contemplou o público geral de militares colaboradores do 40º Batalhão de Infantaria localizado no município de Crateús. Durante a vacinação observou-se e foram seguidos todos os princípios de biossegurança e boas práticas na administração de vacinas a fim de garantir a imunização do público de forma segura. Além disso, foi fundamental a organização da ação, tendo cuidado em seguir as medidas contra a contaminação do Sars-coV-2, respeitando o distanciamento social e utilizando-se Equipamentos de Proteção Individual como gorro, máscara cirúrgica ou PPF2, jaleco, e higienização das mãos com álcool em gel entre o atendimento de cada indivíduo. Consoante a aplicação dos imunizantes, alguns acadêmicos estiveram responsáveis pelo correto cadastramento das vacinas aplicadas através do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações conforme conferência dos dados como nome completo, número do Cadastro de Pessoa Física e/ou Cadastro Nacional de Saúde, data de nascimento e comprovação de endereço. A experiência vivenciada foi de grande importância para os acadêmicos, pois permitiu a associação teórico-prática e o fortalecimento do tripé ensino-pesquisa-extensão. Além disso, possibilitou uma melhor experiência da vivência relacionada aos diversos setores do cuidado em enfermagem, além de favorecer a participação de discentes em ações onde a teoria e a prática se encontram.

Palavras-chave: Covid-19; Enfermagem; Vacinação.

Área Temática: Ciências da Saúde.

E-mail do autor principal: maria.aparecida@alu.fpo.edu.br

1. INTRODUÇÃO

Em 11 de março de 2020, após a população mundial tomar conhecimento dos primeiros casos de uma síndrome respiratória com evolução para Síndrome Respiratória Aguda Grave na cidade de Wuhan, situada na China, a Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou estado de pandemia de COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) (COUTO; BARBIERI; MATOS, 2021). Desde então, muitas medidas preventivas foram necessárias para impedir a infecção pelo vírus e consequente evolução da doença, entre as recomendações, foi proposta a aceleração das vacinas, medidas terapêuticas e diagnósticas (DOMINGUES, 2021).

Nesse sentido, considerando a imunização por meio de vacinas como um dos métodos mais eficazes no combate a doenças infecciosas, inúmeros esforços foram feitos para que uma vacina eficaz fosse disponibilizada à população (DE FREITAS; DE SOUZA OLIVEIRA *et al.*, 2021).

As vacinas são produtos biológicos que funcionam com base em um conceito de mimetizar a reação imune fisiológica, oferecendo ao sistema imunológico humano o estímulo necessário para que se desenvolva a imunidade sem que o indivíduo tenha que se expor aos riscos da infecção natural. Nesse sentido, cientistas afirmam que a vacina pode evitar a proliferação e os graves danos da COVID-19, protegendo o indivíduo e a coletividade (ANVISA, 2021).

Nesse contexto, após alguns meses do início da Pandemia de COVID-19, e a partir da divulgação pelos laboratórios dos resultados dos ensaios clínicos dos imunobiológicos contra a doença, iniciou-se uma corrida mundial por acordos comerciais a fim de adquirir a tão esperada vacina. Assim, na conjuntura do Brasil, foi compilado um processo de construção de um Plano Nacional de Imunização contra a COVID-19 a fim de definir grupos prioritários para a vacinação baseados em evidências científicas (MACEDO; STRUCHINER; MACIEL, 2021).

Assim, após a comprovação da segurança dos imunizantes, em 17 de janeiro de 2021 a ANVISA autorizou o uso emergencial das vacinas contra a COVID-19 do laboratório *Sinovac Life Sciences Co. LTD* - vacina adsorvida covid-19 (inativada) - e do laboratório *Serum Institute of India Pvt. Ltd* [Oxford] - vacina covid-19 (recombinante) (ChAdOx1 nCoV-19), o que levou ao início da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19 teve início no dia 18 de janeiro de 2021 (BRASIL, 2021).

Desse modo, com a aprovação do uso emergencial das vacinas aprovadas pela ANVISA no Brasil, equipes em todo o país desenvolveram forças tarefas locais para mediar e organizar a administração dos imunobiológicos. Para auxiliar na vacinação, estudantes e profissionais voluntários estão atuando junto às equipes de saúde de cada município nas campanhas de vacinação (BOSSE; MEGIER; PUNGIN *et al.*, 2021).

Nesse cenário, foi necessária a organização das campanhas de vacinação em todo território nacional onde se destaca a competência da equipe de enfermagem o manuseio, conservação, preparo, administração, registro e descarte dos resíduos bem como a avaliação e o monitoramento epidemiológico, e privativamente cabe ao enfermeiro a supervisão do trabalho em sala de vacinação (COFEN, 2021).

Diante do exposto, objetiva-se relatar experiências vivenciadas nas campanhas de vacinação na pandemia de Sars-coV-2 no município de Crateús-Ceará com o protagonismo de acadêmicos de enfermagem participantes da Liga Acadêmica de Saúde da Mulher e da Criança em Enfermagem (LASMCE), entidade não governamental que busca o fortalecimento do tripé universitário e a consolidação teórico-prática.

2 MÉTODO

Trata-se de um estudo descritivo do tipo Relato de Experiência obtido em campo prático na vacinação contra a Covid-19 ocorrida em 28 de junho e 12 de julho de 2021, vivenciada por oito acadêmicos da Liga Acadêmica de Saúde da Mulher e da Criança em Enfermagem que são discentes do Curso de Bacharelado em Enfermagem de uma faculdade privada, situada no município de Crateús-CE. A pesquisa descritiva é construída a partir da descrição cuidadosa dos fatos e efeitos de uma dada situação, com o objetivo de obter informações sobre questões as quais foram definidas como em investigação (AUGUSTO, 2013).

A primeira campanha em que a liga participou no dia 28 de junho de 2021 ocorreu em sala climatizada no prédio da respectiva faculdade privada na qual os discentes estudam e contemplou pessoas com comorbidades na faixa etária de 35 a 44 anos, participaram neste momento seis ligantes. Ademais, a vacinação ocorrida em 12 de julho de 2021 contemplou o público geral de militares colaboradores do 40º Batalhão de Infantaria localizado no município

de Crateús e participaram sete ligantes. Os dois momentos foram supervisionados de forma contínua por duas enfermeiras que são docentes da Instituição, que acompanharam desde a coleta de informações e cadastro dos usuários, coleta de informações do lote até a administração da vacina.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 RELATO DE EXPERIÊNCIA

Na vacinação ocorrida no dia 28 de junho voltada ao público de 35 a 44 anos com comorbidades, os quais tiveram que apresentar atestado médico padrão para COVID-19 no sistema de triagem, foram administradas 200 doses da vacina Janssen imunobiológico de dose única. No dia 12 de julho foram administradas 270 doses da primeira dose da vacina AstraZeneca para o público geral de militares do 40º Batalhão de Infantaria localizado no município de Crateús. Ambos os dias ocorreram conforme a orientação e supervisão do Setor de Imunização do município, de forma a seguir a faixa etária de avanço da imunização, bem como o atendimento aos grupos prioritários conforme o cadastro prévio no site oficial do governo do Estado.

Nesse contexto, alguns acadêmicos ficaram responsáveis pelo preenchimento dos dados no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI), enquanto os demais estavam em sala de vacina seguindo todos os protocolos de biossegurança preconizados para a correta administração de vacinas e realizando as orientações necessárias aos vacinados. Nesse momento, uma situação observada foi as dúvidas acerca dos

imunizantes, contraindicações, possíveis efeitos adversos e eficácia, que foram sanadas com a orientação dos ligantes.

Concernente a vacinação, as diluições das vacinas foram feitas respeitando as orientações do fabricante, sendo os frascos multidose, o que permitiu a vacinação de cinco pessoas por frasco. As doses do imunizante da Janssen estiveram armazenadas em temperatura entre +2°C e +8°C, enquanto que as doses da AstraZeneca encontravam-se em temperatura de 39,2°F, o que equivale a +4°C. Assim, as caixas térmicas portáteis estavam devidamente identificadas com termômetro para correta inspeção da temperatura.

Antes da aplicação da dose do imunizante, as pessoas foram orientadas sobre os efeitos mais comuns da vacina e que cada organismo reage de uma forma diferente e por isso, algumas pessoas poderiam não manifestar sintomas e outras poderiam manifestar efeitos adversos. Nesse contexto, na vacinação com as doses da vacina AstraZeneca foi destacado a necessidade de tomar as duas doses necessárias para a completa resposta imunológica e consequente imunização contra a Covid-19.

Quanto ao procedimento técnico para administração da vacina, realizou-se higienização no terço médio do músculo deltóide com algodão seco na vacinação que ocorreu em sala climatizada ofertada pela faculdade, e com algodão embebido em álcool a 70% na vacinação que ocorreu extramuros. Por tratar-se de uma vacina onde a via de administração é intramuscular, a inserção da agulha foi feita em um ângulo de 90° para garantir a administração do imunizante no músculo e posterior aspiração do êmbolo para uma maior segurança.

Além disso, foi muito evidente a demonstração de sentimentos de gratidão e felicidade com a tomada da vacina, uma vez que foi um momento muito esperado pela maioria dos vacinados. Logo, foi comum a fotografia do momento para registro e compartilhamento e a utilização de cartazes e blusas como forma de homenagear familiares e amigos vítimas da letalidade da pandemia.

Após a vacinação foram retiradas as dúvidas referentes a reações que a vacina pode causar e reforçado a importância da continuidade dos cuidados contra a contaminação pela Covid-19, visto que a vacina protege apenas contra a evolução para uma forma grave da doença e não garante a imunização imediata do organismo. Nesse contexto, notou-se uma falta

de conhecimento da população quanto à continuidade das medidas de proteção, o que confere à retirada de dúvidas um caráter de responsabilidade em desmistificar *fake news* referente à vacinação.

Desse modo, percebeu-se que a participação da liga acadêmica na comunidade foi de extrema magnitude tanto para os ligantes que puderam aprimorar conhecimentos quanto para a população que obteve um serviço de acadêmicos capacitados e comprometidos com a biossegurança e as técnicas corretas de administração de vacinas.

Por fim, infere-se que essa vivência permitiu aos acadêmicos vivenciar o protagonismo de estar inseridos na comunidade para realizar ações de prevenção a saúde por meio de uma campanha de vacinação durante uma pandemia. Reconhecendo a importância dessa vivência para a sua formação, tendo a perspectiva de que é um processo fundamental na atuação profissional enfermeiro dentro do contexto da atuação de prevenção da saúde.

3.2 DISCUSSÃO

As vacinas surgiram como uma forma de minimizar os impactos causados por epidemias avassaladoras. Elas seriam uma medida de controle de doenças de grande impacto nas condições de vida de uma população, funcionando como forma primária de prevenção e erradicação de diferentes patologias (LIMA; DOS SANTOS PINTO, 2017).

Nesse contexto, no que se refere à vacinação contra a Covid-19, o rápido desenvolvimento de vacinas representa um importante avanço da ciência e da saúde pública e alimenta a esperança de superação da pandemia (DE SOUZA; BUSS, 2021). Assim, o sucesso da vacinação depende da adesão da população às campanhas.

É fato que ao se atingir elevadas coberturas vacinais, além de reduzir casos de doença na população-alvo estabelecida para a vacinação, contribui para a diminuição da circulação de agentes infecciosos nas comunidades, impactando positivamente na saúde daqueles que não serão vacinados, uma vez que passam a estar protegidos indiretamente (DOMINGUES, 2021).

Nesse sentido, as campanhas de vacinação contra a Covid-19 se inserem no cenário pandêmico como estratégia de redução da transmissão da doença e consequente proteção da sociedade em geral.

A imunização, por meio da vacinação dos indivíduos de uma sociedade, é entendida como uma atividade da atenção primária à saúde, devendo ser oferecida de forma universal e equânime, obedecendo aos princípios do SUS (PEDREIRA, 2021). Portanto, a experiência relatada apresenta um grande caráter de relevância, uma vez que a forma de administração das vacinas e o entendimento da importância da humanização na realização do procedimento motivam a maior adesão da população à campanha.

4 CONCLUSÃO

A experiência vivenciada foi de grande importância para os acadêmicos ligantes, sobretudo por ter sido em meio a uma pandemia, o que auxiliou no alcance dos índices almejados de imunização daquele município, além de permitir a associação teórico-prática e o fortalecimento do tripé universitário ensino-pesquisa-extensão o qual a liga objetiva para seu crescimento e desenvolvimento. Além disso, possibilitou uma melhor experiência da vivência relacionada aos diversos setores do cuidado em enfermagem e favoreceu a participação de discentes em ações onde a teoria e as práticas se encontram.

Como supracitado, ao colocar em prática a teoria antes aprendida, facilita a melhor compreensão e fixação do conteúdo, como as teorias e técnicas para vacinação que foram postas em prática durante a ação. Ressaltando sempre a importância da biossegurança e das boas práticas na administração de vacinas para garantir a segurança de ambas as partes.

Assim, a extensão da Liga Acadêmica de Saúde da Mulher e da Criança torna-se uma experiência que proporciona aos acadêmicos de enfermagem a participarem das atividades na comunidade fortalecendo a relação interpessoal do profissional com os usuários, resultando numa atenção integral resolutiva pela transformação e qualificação do SUS.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). Relatório-Bases técnicas para decisão do uso emergencial, em caráter experimental de vacinas contra a covid-19. S.I: S.I., 2021.

AUGUSTO, C. A. et al. Pesquisa Qualitativa: rigor metodológico no tratamento de teoria dos custos de transação em artigos apresentados nos congressos da Sober (2007-2011). RESR, Piracicaba-SP; Vol. 51, Nº 4, p.745-764, 2013.

BOSSE, Bruna Rodrigues et al. CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19 EM SANTA MARIA, RIO GRANDE DO SUL: RELATO DE EXPERIÊNCIA. In: Congresso Internacional em Saúde. 2021.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COFEN). Medidas de prevenção e controle para profissionais na vacinação contra covid-19. S.I: S.I., 2021.

COUTO, Marcia Thereza; BARBIERI, Carolina Luisa Alves; MATOS, Camila Carvalho de Souza Amorim. Considerações sobre o impacto da covid-19 na relação indivíduo-sociedade: da hesitação vacinal ao clamor por uma vacina. **Saúde e Sociedade**, v. 30, 2021.

DE FREITAS, Maria Bethânia Alves; DE SOUZA OLIVEIRA, Mikael; MACIEL, Ivana Maria Esteves. Adesão à vacina contra a Covid-19 pela comunidade acadêmica do UNIFUNEC. UNIFUNEC CIÊNCIAS DA SAÚDE E BIOLÓGICAS, v. 4, n. 7, p. 1-14, 2021.

DE SOUZA, Luis Eugenio Portela Fernandes; BUSS, Paulo Marchiori. Desafios globais para o acesso equitativo à vacinação contra a COVID-19. **Cad. Saúde Pública**, v. 37, n. 9, p. e00056521, 2021.

DOMINGUES, Carla Magda Allan Santos. Desafios para a realização da campanha de vacinação contra a COVID-19 no Brasil. 2021.

LIMA, Adeânio Almeida; DOS SANTOS PINTO, Edenise. O contexto histórico da implantação do Programa Nacional de Imunização (PNI) e sua importância para o Sistema Único de Saúde (SUS). **Scire Salutis**, v. 7, n. 1, p. 53-62, 2017.

MACEDO, Laylla Ribeiro; STRUCHINER, Claudio Jose; MACIEL, Ethel Leonor Noia. Contexto de elaboração do Plano de Imunização contra COVID-19 no Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26, p. 2859-2862, 2021.

Ministério da Saúde (MS). PLANO NACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19. Brasília-DF: S.I., 2021.

PEDREIRA, Nábia Pereira et al. Vivência do acadêmico de enfermagem frente à campanha de vacinação ao combate a pandemia da COVID-19. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 13, n. 5, p. e7326-e7326, 2021.

CAPÍTULO 29

AUDITORIA DE ENFERMAGEM NOS SERVIÇOS DE SAÚDE: SUA IMPORTÂNCIA NA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c29](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c29)

Rosinei Nascimento Ferreira¹, Luana Pereira Ibiapina Coelho²

¹Instituto Sagnorelli, (rosineiff2@hotmail.com)

²Instituto Cultus, (luana_ibiapina@hotmail.com)

Resumo

Objetivo: Analisar através de artigos científicos publicados no período de 2014 a 2018 em um banco de dados internacional, a auditoria de enfermagem nos serviços de saúde e sua importância na qualidade de assistência à saúde. **Método:** Para a efetivação deste trabalho, foi realizada uma revisão integrativa de abordagem qualitativa, de natureza exploratória e descritiva, cuja viabilidade se deu por meio de consultas de artigos científicos acerca do tema, dentro do período de 2014 a 2018, no quantitativo de seis artigos, sendo: dois artigos da LILACS; dois da BDENF e dois da MEDLINE. **Resultados:** No que tange assistência de enfermagem como forma de melhoria da qualidade do serviço, os autores nos apontam como estratégia: o planejamento das ações de enfermagem, a padronização das rotinas de trabalho, a utilização de protocolos e indicadores, informatização das anotações e registros de enfermagem, proporcionando uma assistência de qualidade. **Conclusão:** Percebe-se a importância da auditoria de enfermagem nos serviços de saúde, principalmente no que tange no processo de assistência do cuidado ao paciente. Tornando-se uma ferramenta indispensável, e utilizada pelo gestor como fonte de melhoria das ações do cuidado e gestão de qualidade.

Palavras-chave: Enfermagem; Auditoria de enfermagem; Qualidade da assistência à saúde.

Área Temática: Ciências da saúde

E-mail do autor principal: rosineiff2@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

A organização dos sistemas de saúde e oferta de serviços é permeada pelo planejamento e avaliação de aspectos que englobam as demandas assistenciais, para configurar a distribuição dos serviços, gerenciar o financeiro, os quais possuem interface que

impactam na dinâmica e sustentabilidade dos sistemas e repercutem na assistência ao paciente

Cabendo a gestão a adoção de estratégias e instrumentos que direcionem os serviços para favorecer o alcance da qualidade e excelência desejáveis (FABRO et al., 2020).

A auditoria é conceituada como uma avaliação sistemática e formal de uma atividade realizada por pessoas não diretamente envolvidas na sua execução a fim de se determinar se a atividade está de acordo com os objetivos propostos, possibilitando destacar as deficiências e apontar alternativas preventivas e corretivas. A auditoria em enfermagem tem como finalidade normatizar, orientar, disciplinar, racionalizar e identificar as deficiências existentes nos registros hospitalares, intervindo diretamente nos gastos e glosas desnecessários (VIEIRA, 2014).

A auditoria em saúde é considerada um importante instrumento para a esfera do sistema público e suplementar que vem se destacando como um instrumento para auxiliar o processo de gestão com o planejamento, implementação e avaliação das ações e serviços de saúde, contribuindo para o planejamento e prestação dos serviços de saúde, bem como na qualidade destes; associando-se concomitantemente à redução de custos e ao processo de gestão em que seus relatórios têm proporcionado apoio à gestão em saúde, tanto na perspectiva de qualidade assistencial quanto de abordagem financeira (RIBEIRO; SILVA, 2017; LIBERATTI et al., 2019).

Nesse sentido, o processo avaliativo de auditoria realizado nos registros de enfermagem fornece subsídios sobre a qualidade na assistência prestada ao paciente, sobre a necessidade de capacitações da equipe, assim como na importância da qualidade das próprias anotações de enfermagem, sobre o controle de gastos, permite criar estratégias para evitar desperdícios, gera indicadores da assistência, além de dados estatísticos sobre a movimentação financeira e do faturamento hospitalar (PERTILLE; ASCARI; OLIVEIRA, 2018).

Partindo dessa premissa, Figueiredo et al. (2019) pontua que a auditora em enfermagem compete a garantia da qualidade da assistência prestada ao usuário, proporcionando-lhe confiabilidade e segurança, mediante averiguação do que foi anotado no prontuário ou do que nele está contido. Compete, ainda, efetuar levantamento dos custos assistenciais, prover os materiais utilizados, conferir a correta utilização/cobrança dos recursos técnicos, proporcionar educação permanente à operadora e aos prestadores de serviços e realizar visitas de rotina, interligando com as informações recebidas com as que mostram no prontuário.

A enfermagem é protagonista no que se refere à qualidade dos cuidados em saúde, sendo este seu principal instrumento de trabalho. Uma das formas fundamentais de proporcionar a qualidade e a continuidade dos mesmos é por meio da transferência de informações sobre a assistência prestada, as quais podem ser utilizadas para programar, analisar e antecipar os cuidados em saúde (GONZÁLEZ et al., 2018).

Com base em fundamentos da literatura, somos capazes de evidenciar a importância da auditoria em enfermagem para os serviços de saúde, visto que ao aplicá-la de forma sistematizada o enfermeiro é capaz de forma intuitiva promover a qualidade da assistência à saúde ao adapta-se de um modelo teórico para enfrentamento de problemas administrativos e gerenciais, sendo ainda utilizada nos dias atuais para o processo de promoção da excelência do cuidado e preservação das características da profissão de enfermagem.

Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo: analisar através de artigos científicos publicados no período de 2014 a 2018 em um banco de dados internacional, a auditoria de enfermagem nos serviços de saúde e sua importância na qualidade de assistência à saúde.

2 MÉTODO

Para a efetivação deste trabalho, foi realizada uma revisão integrativa de abordagem qualitativa, de natureza exploratória e descritiva.

A pesquisa de abordagem qualitativa permite investigar o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, correspondendo a um espaço mais profundo das relações dos processos e dos fenômenos (MINAYO, 2013).

Para Gil (2009), a pesquisa exploratória tem como finalidade proporcionar maiores informações acerca de determinado assunto e facilitar a delimitação de um tema de trabalho. Geralmente constitui a primeira etapa de uma investigação mais ampla e desenvolve-se com o objetivo de proporcionar uma visão geral, de tipo aproximado, acerca de determinado fato.

A pesquisa descritiva busca descrever, observar, explorar, classificar e interpretar os aspectos de fatos ou fenômenos. Detalhando frequência, características, relação e associação entre as variáveis. Tal modalidade exige o uso de técnicas padronizadas de coletas de dados, como questionário e observação sistemática. (DYNIEWICZ, 2014).

Para a seleção dos artigos foi utilizada consulta no banco de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), no mês de janeiro de 2019, empregando-se as palavras-chaves: enfermagem, auditoria de enfermagem e qualidade da assistência à saúde. A princípio, utilizaram-se os descritores conjugados com o operador booleano AND e filtro com texto

completo, onde foram disponibilizados 4107 artigos. Ao realizar filtro para idioma português, obteve-se o quantitativo de 375 artigos e logo após utilizou-se recorte temporal de cinco anos, obtendo-se 119 artigos.

Como critérios de inclusão utilizaram-se: artigos na íntegra, artigos publicados em idioma português que abordasse o tema da presente revisão, adequação a temática, adequação ao período de publicação de 2014-2018. Como critério de exclusão optou-se por não utilizar artigos que não estivessem disponíveis online na íntegra, repetição dos artigos na base de dados e artigos que não tivessem como cenário a temática do presente estudo.

Ao conjugar os descritores e utilizar os filtros, remeteu-se ao quantitativo de seis artigos, sendo: dois artigos na LILACS; dois na BDENF e dois na MEDLINE. Para avaliação crítica, realizou-se a leitura na íntegra desses estudos e a releitura dos resultados, com finalidade de identificar aspectos relevantes que se repetiam ou se destacavam.

3 RESULTADOS

Na caracterização dos seis artigos selecionados, utilizou-se códigos enumerados de A1 a A6 como forma de facilitar a identificação dos artigos. Observou-se em relação ao ano de publicação: 2014 n=2 (A3, A6); 2015 n=2 (A1, A4); 2017 n=2 (A2, A5). Ao verificar a formação dos autores, foi possível observar que todos os estudos publicados tiveram como pesquisadores profissionais de enfermagem.

Por conseguinte, em relação à força de evidências obtidas nos estudos, encontrou-se n=1 artigos de nível três (A3); n=2 de nível quatro (A5, A6); n= 3 artigos de nível cinco (A1, A2, A4).

Tabela 1. Identificação dos artigos selecionados para o estudo

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORES	ANO	PROCEDÊNCIA	EVIDÊNCIA
A1	Auditoria em saúde: um novo paradigma na qualidade da assistência de enfermagem.	SILVA, J. S.	2015	BDENF	5
A2	Compilação técnico-	MAIA, A.B. B. et al.	2017	BDENF	5

	científico acerca da auditoria e gestão de qualidade: revisão integrativa.				
A4	Manual de monitoramento da qualidade dos registros de enfermagem na assistência domiciliar.	BARBOSA;TRONCHIN	2015	MEDLINE	5
A5	Indicadores para avaliação da qualidade da assistência de enfermagem: estudo descritivo- exploratório	PINTO;FERREIRA	2017	LILACS	4
A6	Qualidade dos registros de enfermagem em terapia intensiva: avaliação por meio da auditoria retrospectiva.	PADILHA;HADDAD;MATSUDA	2014	LILACS	4

Fonte: Autores, 2021.

Segundo Silva (2015), a auditoria representa um importante instrumento de controle e avaliação da gestão para as instituições de saúde, tornando-se uma ferramenta indispensável na transformação dos processos de trabalho, principalmente para hospitais e operadoras de planos de saúde, numa buscando de reestruturação para manter a qualidade do cuidado

prestado e garantir a competitividade no mercado de trabalho.

A auditoria é necessária para as instituições de saúde visto que, ao desempenhá-la de forma sistematizada e formal, permite atender as necessidades do serviço, principalmente, no que tange ao controle dos fatores geradores de alto custo, no levantamento e análise dos serviços, na verificação das deficiências, nas operações e rotinas de trabalho. Ademais favorece os gestores na tomada de decisão, ao utilizar de medidas corretivas e ou preventivas, no intuito de implementar ações capazes melhorar o cuidado (SILVA, 2015).

O estudo de Maia et al. (2017) pontuam que no contexto do cuidado, o enfermeiro apropria-se dessa responsabilidade, mediante ações desenvolvidas na qualidade da assistência prestada no cuidado ao paciente, família e à instituição, obedecendo os princípios da ética, leis e normas da profissão, assim como de forma a contribuir no desempenho da valorização do cuidado e satisfação do usuário.

Para Freitas et al. (2014) quando se refere à gestão de qualidade, esse profissional assume um papel ainda maior na gestão do cuidado, pois ao garantir a qualidade da assistência necessita dispor do uso da maior parte dos materiais de consumo, o que requer atenção aos custos envolvidos no processo de cuidar, no intuito de garantir a provisão e adequação dos recursos.

Sendo assim, os serviços de auditoria em enfermagem, vem sendo utilizados para melhorar os processos de avaliação do cuidado, possibilitando o conhecimento da realidade sobre o processo de trabalho executado, uma vez que favorece na identificação das não conformidades de sua execução, utilizando de intervenções para readequações e aprimoramento do trabalho, no intuito de atender as necessidades e expectativas dos usuários, e conseqüentemente a obtenção da qualidade do cuidado, além de subsidiar ações de educação permanente (SILVA, 2015).

Autores como Barbosa e Tronchin (2015) e Maia et al. (2017) acrescem ainda em seus estudos que AE nos permite obter parâmetros dos aspectos qualitativos e quantitativos relacionados à assistência, envolve a observação de aspectos organizacionais, operacionais e financeiros. Relevância justificável pela sua importância em prevenir possíveis riscos ou prejuízos conseqüentes de uma atividade realizada de forma não adequada. Diante disso, tornam-se fundamentais a aplicação da auditoria e uma gestão de qualidade em enfermagem nos serviços de saúde.

Dessa forma, as atividades do enfermeiro auditor detêm de importante relevância no que condiz a melhorar a qualidade e gestão da assistência do cuidado, visto que, no desenvolvimento do processo de trabalho dentro das instituições, esse profissional tem a

oportunidade de interagir diretamente e de forma contínua com o usuário, refletindo, de forma positiva no cuidado, tomada de decisão e provisão de recursos (SILVA, 2015; MAIA et al., 2017).

Barbosa e Tronchin (2015) enfatizam a importância dos registros para AE e assistência, tornando imprescindível para legitimar todas as ações do profissional junto ao usuário e família. Estes devem ser realizados de maneira clara, objetiva e legível afim de garantir uma comunicação efetiva entre a equipe de enfermagem e a multiprofissional envolvida no processo do cuidar. Além disso, servem de fonte de informações para questões jurídicas, de pesquisas e de educação.

Para Padilha, Haddad e Matsuda (2014), os registros ou anotações de enfermagem consistem em uma importante forma de comunicação escrita das ações realizadas/ observadas e das informações obtidas do paciente/ família, com finalidade essencial de fornecer dados sobre a assistência prestada, assegurar a comunicação entre os membros da equipe de saúde e garantir a continuidade do cuidado.

Barbosa e Tronchin (2015) ainda acrescentam os aspectos referentes aos registros, que são eles: subsidiar a elaboração de plano assistencial; avaliar a qualidade dos serviços prestados; acompanhar a evolução dos participantes do programa; representar um documento legal para o usuário e para a instituição; ser fonte de informação para o processo de auditoria e para o ensino e pesquisa.

Estudos como de Padilha, Haddad e Matsuda (2014) nos apontam que registro incompletos de dados podem causar danos ao paciente, relacionados principalmente, à administração de medicamentos, hemoderivados e coleta de material para exame. Como consequência essas ações podem levar o paciente ao não recebimento dos cuidados necessários à sua condição clínica ou, ainda, induzir a equipe técnica à realização de cuidados diferentes dos prescritos.

Na mesma perspectiva Silva (2015) evidencia que falhas nos registros estão ligadas à ilegibilidade, erros na ortografia, usam de líquido corretivo, terminologias incorretas, siglas não padronizadas e checagens de medicações e procedimentos não realizadas; o que também podem comprometer a qualidade dos cuidados e evolução terapêutica dos pacientes.

Sabemos que parte do pagamento de materiais, medicamentos, procedimentos e outros serviços da assistência estão vinculados aos registros de enfermagem. Portanto, faz-se necessário à implementação de processo na avaliação dos registros de enfermagem, sendo uma ação importante, pois permite verificar não somente a qualidade do seu conteúdo, mas também da prática profissional da equipe (PADILHA;HADDAD;MATSUDA, 2014).

Silva (2015) enfatiza que, os serviços de auditoria de enfermagem necessitam realizar um trabalho proativo com sua equipe, visando à redução dos desperdícios com medicamentos e materiais; para isso é importante a revisão das rotinas e implantação de programas de treinamento para conscientização da equipe quanto à importância dos recursos financeiros do hospital.

Pinto e Ferreira (2017) consideram ainda, a importância do monitoramento dos processos de trabalho nos cuidados assistenciais, através da análise comparativa de resultados de indicadores, os quais são importantes para a avaliação dos serviços hospitalares, entendendo-se que o uso de indicadores de qualidade é valioso para nortear ações no plano de gestão das unidades de saúde.

Sendo assim ao elaborar e utilizar indicadores de avaliação do cuidado ao paciente o enfermeiro consegue demonstrar a importância desse instrumento para a análise dos processos de trabalho, possibilitando reflexões e melhorias, impactando diretamente na segurança do paciente (PINTO; FERREIRA, 2017).

Como estratégia para obter uma real percepção relacionada à qualidade da atenção recebida, Freitas et al. (2014) nos apontam a necessidade da avaliação da satisfação do paciente, com o intuito de adquirir informações que beneficiam a organização dos serviços avaliados.

Outras estratégias são apontadas no estudo de Silva (2015), no qual enfatiza como indispensável, a padronização do processo de trabalho pelo uso de protocolos, a capacitação contínua e sistematizada, a reflexão sobre o conteúdo da informação e dos impressos para anotação. O mesmo acredita que, uma vez que ao revisarem as atividades desenvolvidas, os profissionais alcançarão resultados satisfatórios nos procedimentos futuros, gerando mais interesse na área científica e estabelecendo subsídios técnico e financeiro.

Ademais, o enfermeiro é considerado como responsável no planejamento e organização da unidade e do trabalho da equipe de enfermagem, o que inclui maior atenção ao registro/anotação no prontuário do paciente, visando à diminuição dos desperdícios e maior qualidade no cuidado. O enfermeiro como líder da equipe de enfermagem, deve cooperar com os resultados econômicos da instituição e conduzir a excelência da gestão hospitalar (SILVA, 2015).

Padilha, Haddad e Matsuda (2014) acreditam na necessidade de investir na sensibilização do enfermeiro sobre a realização da auditoria de forma sistematizada, bem como à capacitação do profissional, no sentido de aprimoramento do seu raciocínio clínico. É preciso também, que a equipe técnica reconheça a importância da auditoria e sua repercussão

para o cuidado ao paciente e a organização das ações a serem realizadas na unidade.

Outra proposta apresentada na pesquisa de Silva (2015) estar relacionada com a criação de instrumentos prático e padronizados, além da informatização dos registros, como uma possível solução para melhorar a qualidade nos cuidados de enfermagem.

Através do estudo, observa-se que a AE, por sua vez, é a referência para a avaliação custo-benefício, sendo utilizada como um instrumento de controle da qualidade da assistência prestada. Considerando o enfermeiro auditor mediador, onde através da averiguação efetiva das possíveis inconformidades da assistência de enfermagem, gera um serviço de qualidade e proporciona bem-estar aos usuários atendidos (SILVA, 2015).

4 CONCLUSÃO

Através desse estudo percebe-se a importância da AE nos serviços de saúde, principalmente no que tange no processo de assistência do cuidado ao paciente. Tornando-se uma ferramenta indispensável, e utilizada pelo gestor como fonte de melhoria das ações do cuidado e gestão de qualidade.

Com base na literatura abordada, conclui-se que existem condicionantes condicionantes na assistência, os quais implicam na realização da boa prática e qualidade do cuidado. Há exemplo disso, podemos citar as falhas nas anotações e registros de enfermagem, repercutindo de forma negativa na assistência ao paciente.

Diante do exposto faz-se necessário planejamento e sistematização das ações que envolvam a assistência por parte do enfermeiro, sendo esse o profissional responsável pela equipe de trabalho e dotado de conhecimento técnico-científico.

Por fim, acredita-se que os achados nesse estudo possa contribuir para nortear a melhoria das práticas do cuidado, bem como promover uma reflexão sobre os benefícios da auditoria e como esta pode ser capaz de estabelecer padrões de qualidade para os serviços de saúde.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, S. F.; TRONCHIN, D. M. R. Manual de monitoramento da qualidade dos registros de enfermagem na assistência domiciliar. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 68, n. 2, p. 253-60, mar.-abr., 2015.

DYNIWICZ, A. M. **Metodologia da pesquisa em saúde para iniciantes**. Difusão Editora, São Paulo, 3 ed., 2014.

FABRO, G. C. R. et al. Auditoria em saúde para qualificar a assistência: uma reflexão necessária. **Revista Cuidado em Enfermagem**, v. 14, n. 2, p. 147-55, jul.-dez., 2020.

FIGUEIREDO, T. et al. Avaliação dos registros de enfermagem de pacientes internados na clínica médica de um hospital universitário do norte do Estado de Minas Gerais. **Revista de pesquisa cuidado é fundamental on line**, v. 11, n. 2, p. 390-96, 2019.

FREITAS, J. S. et al. Qualidade dos cuidados de enfermagem e satisfação do paciente atendido em um hospital de ensino. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, v. 22, n. 3, p. 454- 60, mai.-jun. 2014.

GIL, A.C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

GONZÁLEZ, S. M. et al. Precisión y exhaustividad del registro de eventos adversos mediante una terminología de interfase. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 52, p. 1-7, 2018.

LIBERATTI, V. M. et al. Implantação da auditoria operativa em uma Autarquia Municipal. **Revista Enfermagem em Foco**, v. 10, n. 6, p. 199-204, 2019.

MAIA, A. B. B. et al. Compilação técnico-científico acerca da auditoria e gestão de qualidade: revisão integrativa. **Revista de enfermagem UFPE on line**, v. 11, supl. 3, p. 1489-94, mar., Recife, 2017.

MINAYO, M. C. S. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. 13 ed. São Paulo: Hucitec, 2013.

PADILHA, E. F.; HADDAD, M. C. L.; MATSUDA, L. M. Qualidade dos registros de enfermagem em terapia. **Cogitare Enfermagem**, v. 19, n. 2, p. 239-45, abr.-jun., 2014.

PERTILLE, F.; ASCARI, R. A.; OLIVEIRA, M. C. B. A importância dos registros de enfermagem no faturamento hospitalar. **Revista de enfermagem UFPE on line**, v. 12, n. 6, p. 1717- 26, 2018.

PINTO, V. R. S.; FERREIRA, S. C. M. Indicadores para avaliação da qualidade da assistência de enfermagem: estudo descritivo-exploratório. **Journal of Nursing and Health**, v. 16, n. 1, p. 140-151, mar., 2017.

RIBEIRO, B. S.; SILVA, M. C. Auditoria de enfermagem e sua importância no ambiente hospitalar: uma revisão de literatura. **Revista de Enfermagem da FACIPLAC – REFACI**, v. 2, n. 2, p. 1-25, 2017.

SILVA, J. S. Auditoria em saúde: um novo paradigma na qualidade da assistência de enfermagem. **Revista de Enfermagem da UFPI**, v. 4, n. 2, p. 130-4, abr.-jun., 2015.

VIEIRA, A. P. T. Enfermeira auditora uma ferramenta importante para a qualidade do serviço em saúde em hospitais privados. **Revista Especialize On-line IPOG**, Goiânia, v. 1, n. 9, p. 1-13, 2014.

CAPÍTULO 30

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE E PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICA DO MIRIM (*Humiria balsamifera* – Aubl.)

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c30](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c30)

Amanda Caroline de Souza Sales¹, Ana Lídia Pontes Silva², Bruna Sthefanny da Cunha Ferreira³, Gabrielle Damasceno Costa dos Santos⁴, Luís Cláudio Nascimento da Silva⁵, Lucas dos Santos Silva⁶, Saara Emanuele da Silva Flor⁷, Simeone Júlio dos Santos Castelo Branco⁸, Victoria Alves do Nascimento⁹, Adrielle Zagnignan¹⁰.

¹Universidade CEUMA, (amanda_salles15@hotmail.com)

² Universidade CEUMA, (lidia-pontes2010@hotmail.com)

³ Universidade CEUMA, (brnsthefanny@gmail.com)

⁴ Universidade CEUMA, (gabrielledamasceno.nutri@gmail.com)

⁵ Universidade CEUMA, (luiscn.ceuma@ceuma.br)

⁶ Universidade CEUMA, (ls.luscas@gmail.com)

⁷ Universidade CEUMA, (saarafmanu@gmail.com)

⁸ Universidade CEUMA, (simeonecastelo@gmail.com)

⁹ Universidade CEUMA, (alves.victoria.n@hotmail.com)

¹⁰ Universidade CEUMA, (adrielle004602@ceuma.br)

Resumo

Frutos nativos do cerrado contêm substâncias com potencial para fornecer proteção antioxidante ao organismo humano, predominando compostos fenólicos, relevância nutricional e riqueza em compostos bioativos. **Objetivo:** Avaliar a atividade antioxidante e propriedades físico-química do Mirim (*Humiria balsamifera* – Aubl.). **Material e métodos:** coleta manual. Secagem em capela de exaustão por 24 horas, diluição em Salina Tamponada com Fosfato (PBS, pH 7,4), pH determinado em 20 gramas com o acréscimo de 20 mL de água destilada. Acidez estabelecida em 10 gramas com 0,3 mL de solução de fenolftaleína, titulado com solução de Hidróxido de Sódio 0,1M. Umidade através de 5 gramas aquecendo-se em estufa a 105 °C por 4 horas, resfriamento em dessecador e testes em triplicata. Para lipídios, utilizados 15 mL da fase etérea em 105 °C por 30 minutos em estufa. Atividade antioxidante verificada por método DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazilo; Sigma-Aldrich), utilizado nas concentrações

de 31,25 a 500 µg/mL do extrato da polpa. **Resultados:** Umidade com baixo teor de atividade de água favorecendo a prevenção do crescimento microbiano, cinzas com boa quantidade de minerais, lipídios com estabilidade e segurança biológica e significativa atividade antioxidante. **Conclusão:** Os resultados da caracterização física e química, evidenciaram que a polpa do Mirim possui baixa quantidade de água em sua composição possibilitando maior durabilidade do fruto, além de demonstrar melhor potencial antioxidante na fração acetato de etila. Desta forma, os dados obtidos neste trabalho podem contribuir para agregar valor ao fruto, podendo ser utilizados como base para popularização e formulação de novos produtos.

Palavras-chave: *Humiria balsamifera*; Mirim; Antioxidantes.

Área Temática: Ciências da Saúde.

E-mail do autor principal: amanda_salles15@hotmail.com

1 INTRODUÇÃO

O Brasil é um país rico em ecossistemas e biodiversidades, apresentando boas condições ecológicas para produzir frutas de ótima qualidade e com uma variedade de espécies de frutas tropicais, subtropicais e temperadas (FARIAS, 2014).

Apesar de ser um grande produtor de frutos tropicais comestíveis e apreciados por todo mundo, ainda existem várias espécies pouco conhecidas ou pouco exploradas, denominadas como frutos nativos, que vem sendo avaliados como alternativa às espécies tradicionais (FREITAS et al., 2013). Estes contêm várias substâncias que possuem potencial para fornecer proteção antioxidante ao organismo humano, sendo predominante os compostos fenólicos (FARIAS, 2014).

Diversas espécies de frutas vêm sendo utilizadas pelas populações locais em decorrência dos seus aspectos nutricionais e do grande potencial para exploração no mercado, o que permite a aplicação em novos produtos (RUFINO, 2008). No entanto, essas frutas precisam ser preservadas, cultivadas racionalmente e caracterizados através do estudo de suas propriedades, visando seu uso no mercado de alimentos funcionais (RUFINO, 2008).

Nessa perspectiva, o cerrado brasileiro com sua fauna e flora extremamente rica, possui classes de frutos com características sensoriais intrínsecas e com alta qualidade nutricional, os tornando atraentes para serem explorados, pesquisados e comercializados (ANGELLA, 2014; MORZELLE et al., 2015). Logo, a caracterização dos compostos bioativos em frutos do Cerrado é de grande relevância para a busca de fontes alternativas e podem agrupar atributos desejáveis, como propriedades antioxidantes, antimicrobianas, anticarcinogênicas, antidegenerativas e retardadoras do envelhecimento (REIS; SCHMIELE, 2019).

No que diz respeito ao Estado do Maranhão e de acordo com Araújo (2010), este possui uma ampla diversidade de frutas nativas, que aliado ao potencial de aproveitamento comercial

desperta o interesse dos produtores e agroextrativistas, com destaque para as espécies de frutas nativas que apresentam melhor perspectivas em termos de produção e demanda.

A região do Baixo Munim, localizada na Baixada Oriental do estado, apresenta rica biodiversidade de fruteiras nativas por se localizar na zona de transição de diversos biomas e dentre as espécies, temos as da família Humiriaceae (LIMA, 2017).

As árvores da família Humiriaceae caracterizam-se por ser de porte médio a grande, podendo atingir 4 a 25 m de altura e até 1 m de diâmetro. A *Humiria balsamifera*, pertencente à família das Humiriaceae, conhecida como Mirim, apresentam flores brancas e folhas de consistência dura e grossa, frutos maduros negros e comestíveis e é originária do Cerrado Maranhense da região do município de Santo Amaro do Maranhão, sendo muito popular (BASTOS et al., 2003).

Miranda e Rocha (2009) complementam afirmando que, é uma fruta miúda, de cor escura, apreciável por seu sabor doce e cheiro agradável. Seu período de safra é de julho a dezembro e pode ser consumida fresca ou madura, bem como na forma de sucos e preparações como picolé e iogurte. É utilizada também nos ramos da medicina e da agroindústria o que apresenta uma expressiva importância econômica.

Tendo em vista os benefícios de frutos nativos já pesquisados na literatura e, pela escassez de pesquisas de espécies ainda pouco exploradas, como o Mirim, se objetivou, a partir deste estudo, avaliar a atividade antioxidante e propriedades físico-química do Mirim (*Humiria balsamifera*).

2 METODOLOGIA

Pesquisa do tipo analítico, experimental, desenvolvido no Laboratório de Imunologia das Doenças Infecciosas e Parasitárias e no Laboratório de Ciências do Ambiente da Universidade Ceuma, São Luís - MA, no período de agosto de 2019 a março de 2020.

Os frutos do Mirim (*Humiria balsamifera* – Aubl.), foram coletados na região do Cerrado Maranhense, no norte do Estado, que compreende a região de Santo Amaro do Maranhão (Latitude: -2.48785, Longitude: - 43.2928 2° 29' 16" Sul, 43° 17' 34" Oeste). O fruto foi congelado a -18°C e transportado em isopor ao laboratório de Técnica Dietética da Universidade CEUMA e posto na parte inferior de um refrigerador a uma temperatura de 10°C. Posteriormente o fruto foi lavado, macerado manualmente e foi peneirado para obtenção da polpa. Por fim, o material adquirido como polpa, foi armazenado à -20°C para uso posterior.

Antes de realizados os testes, tanto o fruto quanto as folhas, foram identificadas no herbário da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) no Departamento de Biologia (CCBS), tendo sua amostra de *voucher* depositada sob nº 11.541.

Para a preparação dos extratos, após o processo da preparação da polpa, 23 gramas foi misturada com 100 mL de água destilada. A solução foi levada à capela de exaustão e misturada em um funil de decantação com frações químicas de acetato de etila e metanol. Com a decantação das frações, elas foram acondicionadas em recipientes de coletas com seus respectivos pesos anotados. Logo em seguida foram deixadas na capela de exaustão por 24 horas para a secagem da solução para obtenção do peso seco e diluição em Salina Tamponada com Fosfato (PBS, pH 7,4).

Na avaliação bromatológica, foi realizado a mensuração do pH, onde 20 gramas da polpa de fruta do *Humiria balsamifera* (Aubl.) e acrescentados 20 mL de água destilada. Em seguida, fora homogeneizado e assim, determinou-se o pH, em seguida foi realizado o índice de ácidos tituláveis, onde foi pesado 10 gramas da amostra e diluída em 100 mL de água destilada. Transferida para um Erlenmeyer. Adicionado 0,3 mL de solução de fenolftaleína para cada 100 ml da solução a ser titulada. Foi titulado com solução de Hidróxido de Sódio 0,1M sob agitação constante, até coloração rósea persistente por 30 segundos.

Na determinação da umidade foi pesado 5 gramas da amostra em cápsulas de porcelana, previamente aquecidas em estufa a 105 °C, por uma hora, resfriadas em dessecador até a temperatura ambiente. Aqueceu-se em estufa a 105 °C por quatro horas. Resfriou-se em dessecador até a temperatura ambiente, pesou-se, obtendo a massa da amostra ausente de umidade.

Na determinação de cinzas, pesou-se 3 gramas da amostra em cadinho de porcelana, previamente aquecidos em forno mufla a 600 °C, por uma hora, resfriado em dessecador até a temperatura ambiente. Calcinou-se em bico de Bunsen e incinerou-se a 600 °C em forno mufla por quatro horas, resfriou-se a temperatura ambiente em dessecador e foi pesado.

Na determinação de lipídios, pesou-se aproximadamente 10 gramas de amostra, em seguida transferiu-se para provetas graduadas com rolha esmerilhada de capacidade de 100 mL. Adicionou-se 2 mL de hidróxido de amônia, fechou-se as provetas e agitou-se. Em seguida, adicionou-se 10 mL de álcool etílico e agitou-se. Acrescentou-se 25 mL de éter etílico e agitou-se novamente. Adicionou-se, por fim, 25 mL de éter de petróleo e agitou-se mais uma vez. Após uma hora de repouso, fez-se a leitura da solução etérea total e a leitura da fase graxa, e em seguida retirou-se uma alíquota de 15 mL da fase etérea e transferiu-se para cápsulas de porcelana taradas. As cápsulas foram colocadas em banho-maria a 40 °C para evaporação dos

solventes. Após a evaporação dos mesmos, levou-se as cápsulas para estufa a 105 °C por 30 minutos. Passado esse tempo, as cápsulas com as amostras foram colocadas no dessecador para resfriar até a temperatura ambiente para então, serem pesadas novamente (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008).

Ensaio antioxidante *in vitro* com DPPH

Para realização do ensaio da atividade sequestradora de radicais livres dos extratos/frações dos chás, foram medidas usando o radical DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazilo; Sigma-Aldrich) (BLOIS, 1958).

3 RESULTADOS E DISCURSÃO

Quanto a avaliação das características físico-químicas do Mirim, esta fruta apresentou 61,63% de umidade, com teor de cinzas de 0,8%, teor de lipídios de 0,1% e acidez em ácido cítrico de 0,3424 (Tabela 1).

Tabela 1. Características físico-químicas da polpa de fruta *in natura* do Mirim. São Luís, Maranhão, Brasil, 2020.

Caracterização Físico Química (g/100g)	Polpa de Mirim Avaliada (média $\pm$ desvio-padrão)
Acidez em ácido cítrico	0,3424 $\pm$ 0,05
Umidade	61,63 %
Cinzas	0,8 %
Lipídios	0,1 %

Fonte: Autores, 2020.

O cerrado brasileiro é o segundo maior bioma do Brasil depois da Amazônia. Possui características variadas, cores atraentes e sabores incomuns, constitui potenciais fontes de exploração econômica, também em virtude da proeminente diversidade da flora em que, espécies de frutas nativas possuem lugar de destaque neste bioma, são frutos nutritivos e comumente usados na dieta popular (SILVA; FONSECA, 2016).

Assim como o mirim, o murici (*Byrsonima crassifolia* - L.) é uma fruta nativa do cerrado e região amazônica. Seus frutos são produzidos e consumidos de forma *in natura*, com boa aceitação pela população local, porém, ainda com pouca distribuição no país e no mercado internacional (DE SOUZA et. al., 2020).

Carvalho e Nascimento (2016), em estudos sobre características físico-químicas e químicas da polpa dos frutos de cinco genótipos de murucizeiros observaram a diferença significativa entre os genótipos estudados, com valores médios variando de 3,10 a 3,90 no que

diz respeito ao pH. Afirmaram ainda que, em outros estudos sobre a caracterização química da polpa de muruci proveniente do cerrado brasileiro foi observado pH de 4,74.

Com relação a acidez Titulável, os valores variaram de 0,93% a 3,08% de ácido cítrico, teores relatados para os genótipos FCAP-7 e Guataçara 1.1, respectivamente, que são genótipos de murucizeiros da flora Amazônica Oriental (CARVALHO; NASCIMENTO, 2016).

O buriti (*Mauritia flexuosa* Lf.), outro fruto do cerrado, apresenta altos teores de compostos antioxidantes, sendo fonte de carotenoides, vitamina C e compostos fenólicos, podendo ser aplicado em diferentes produtos na indústria de alimentos, atribuindo valor nutricional, viabilizando também a inovação de produtos com aspectos saudáveis (RODRIGUES et al., 2016).

No buriti foram observados altos teores de fibra em detergente neutro (83,59%) e lignina (35,97%), com baixos teores de proteína bruta e extrato etéreo, 3,41 e 2,4%, o que demonstra predominância dos lipídios na polpa. Não consta na literatura pesquisas avaliando a composição química, bem como o valor nutritivo do endocarpo e endosperma do fruto (GARCEZ, 2014).

A Acidez é um dos critérios que afetam a classificação de frutas se baseada no sabor; sendo que frutas com níveis de ácido cítrico variando de 0,08% a 1,95% podem ter sabor classificados como leve e são bem aceitos para consumo de frutas frescas (DE SOUZA et al., 2020).

De acordo com os estudos de Costa et al. (2017), existe uma alta atividade antioxidante dos extratos da entrecasca da *Humiria balsamifera* com teores superiores a outras espécies vegetais com o emprego do DPPH e ainda, que o processo antioxidante ocorre, a partir da coloração da reação alterando de violeta para amarelo e a absorbância torna-se reduzida a 517 nm, evidenciando, através das reações, a presença de substâncias com atuação antioxidante na amostra analisada.

Sobre a caracterização físico-química de polpas de frutos da Amazônia, Canuto et al. (2010), em seus estudos, observaram para polpa de muruci um valor de umidade de 92,8%.

Partindo-se para o fator determinante de Cinzas, neste trabalho, foi encontrado o valor de 0,8% e observou-se que esse resultado é inferior ao encontrado por Nunes et al. (2015) quando do estudo em acerola, adquirida no centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco apresentando um valor de 0,92%.

De maneira geral, as diferenças observadas para as características físico-químicas podem ser atribuídas a fatores genéticos e diferentes condições edafoclimáticas de cultivo e, isso foi considerado quando os estudos foram realizados em diferentes frutos de muricizeiro (CARVALHO; NASCIMENTO, 2010).

Conota-se, como característica do fruto do cerrado quando da análise do murici que, ele representa uma boa fonte de energia, lipídios, fibras alimentares, cálcio (SILVA et al., 2008).

O teste de DPPH com o fruto Mirim (*Humiria balsamifera* - Aubl), nas concentrações de (31,25 a 500 $\mu\text{g/mL}$), demonstrou que a Fração Acetado de Etila (FAE) apresentou atividade antioxidante de 50% e 62% nas concentrações de 250 e 500 $\mu\text{g/mL}$, respectivamente, semelhante ao controle positivo representado pelo ácido gálico. No entanto, a fração metanólica do Mirim não demonstrou atividade antioxidante significativa (Gráfico 1). Com base em outros estudos, os extratos que apresentaram atividade de sequestro do radical DPPH superior a 70% foram considerados eficazes, os extratos que exibiram atividade entre 60-70% apresentaram ação moderada, e aqueles que apresentaram atividade inferior a 60% foram considerados com fraca ação antioxidante (REZENDE, 2010).

Gráfico 1: Determinação da atividade antioxidante da Fração Acetato de Etila (FAE) e Fração Metabólica do Mirim (*Humiria balsamifera* - Aubl). Controle positivo (Ácido Gálico). $p < 0,05$. São Luís, Maranhão, Brasil, 2020.

Fonte: Autores, 2020.

Em estudo para determinação da atividade antioxidante utilizando o método DPPH (2,2 – difenil-1-picril-hidrazil) do extrato aquoso e etéreo obtido da entrecasca da *Humiria balsamifera* (Aubl.), demonstrou 80,8 e 87,3% da capacidade de sequestrar radicais livres, respectivamente (COSTA et al., 2017).

No extrato etanólico obtido das folhas da *Humiria balsamifera* (Aubl.), foi possível verificar atividade antioxidante com EC_{50} de $(33,06 \pm 0,73)$ e presença de flavonoides totais de (7,94 EqR%) (DUTRA et. al., 2013).

O potencial antioxidante de frutas e vegetais têm sido amplamente explorados por sua ação na prevenção e auxílio no tratamento de diversas doenças crônicas, incluindo aterosclerose, diabetes mellitus, câncer, artrite reumatoide, catarata e doença de Parkinson (LI et al., 2016; STELLER et al., 2018).

Nessa perspectiva, em estudos, foram avaliadas as atividades antioxidantes de três frutos do bioma cerrado, a gabirola (*Campomanesia cambessedeanana*), o murici (*Byrsonoma verbascifolia*) e a guapeva (*Pouteria guardneriana*), que apresentaram a capacidade de inibir o desenvolvimento de células cancerígenas hepáticas (células HepG2) (MALTA et al., 2013).

Contudo, a extração se constitui em uma etapa crucial na separação de potenciais compostos bioativos, como carotenoides, flavonoides, dentre outros (PHAM et al., 2016). A extração de compostos bioativos é essencial para que se possam realizar estudos de composição e capacidade antioxidante (CHISTE; DE TOLEDO; MERCADANTE, 2014).

A exploração de frutos do Cerrado apresenta potencial no cenário agroindustrial brasileiro. O processamento e a aplicação vislumbram agregar valor comercial e nutricional, além de conferir aroma, sabor e cor, características únicas e peculiares destes frutos, que apresentam grande perecibilidade (REIS; SCHMIELE, 2019).

4 CONCLUSÃO

Os resultados da caracterização física e química, evidenciaram que a polpa do Mirim possui baixa quantidade de água em sua composição possibilitando maior durabilidade do fruto, além de demonstrar melhor potencial antioxidante na fração acetato de etila. Desta forma, os dados obtidos neste trabalho podem contribuir para agregar valor ao fruto, podendo ser utilizados como base para popularização e formulação de novos produtos.

REFERÊNCIAS

ANGELLA, F.C.O. **Avaliação da atividade antioxidante em extratos de frutas típicas do Cerrado brasileiro**. São Carlos, 2014. 79f. (Dissertação) Mestrado em Ciências, Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2014.

ARAÚJO, J. R. G.; MARTINS, M. R. Fruteiras nativas – ocorrência e potencial de utilização na agricultura familiar do Maranhão. In: MOURA, E. G de. **Agroambientes de transição: entre o trópico úmido e o semiárido**. Atributos; alterações; uso na produção familiar. São Luís: UEMA, p. 257-371, 2010.

BASTOS, M. N. C.; COSTA, D. C. T.; SANTOS, J. U. M. Vegetação de Restinga: aspectos botânicos e uso medicinal. **Catálogo do Museu Paraense Emílio Goeldi**. Belém: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, 23 p., 2003.

BLOIS, M. S. Antioxidant determination by the use of a stable free radical. **Nature**, v.181: p. 1199 – 1200, 1958.

CANUTO, G. A. B.; XAVIER, A. A. O.; NEVES, L. C.; BENASSI, M. T. Caracterização físico-química de polpas de frutos da Amazônia e sua correlação com a atividade antiradical livre. **Revista Brasileira de Fruticultura**, v. 32, n. 4, p. 1196-1205, 2010.

CARVALHO, A.V.; NASCIMENTO, W.M.O. Caracterização físico-química e química da polpa de frutos de muruci. **Boletim de pesquisa e desenvolvimento**. Embrapa Amazônia Oriental, Belém, PA: Embrapa Amazônia Oriental, 2016.

CHISTÉ, Renan Campos; DE TOLEDO BENASSI, Marta; MERCADANTE, Adriana Zerlotti. Efficiency of different solvents on the extraction of bioactive compounds from the Amazonian fruit *Caryocar villosum* and the effect on its antioxidant and colour properties. **Phytochemical analysis**, v. 25, n. 4, p. 364-372, 2014.

COSTA, A.R.C et al. Prospecção de bioativos presentes na entrecasca da *Humiria Balsamifera* (Aubl). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE QUÍMICA, 57º, 2017, Gramado. Artigo. **Anais eletrônicos...** Rio Grande do Sul, 2017.

DE SOUZA, Vanessa Rosse et al. Fruit-based drink sensory, physicochemical, and antioxidant properties in the Amazon region: Murici (*Byrsonima crassifolia* (L.) Kunth and *verbascifolia* (L.) DC) and tapereba (*Spondia mombin*). **Food Science & Nutrition**, 2020.

DUTRA, A. R. et al. Microwave-assisted extraction of metabolites from *Humiria balsamifera* leaves: a rapid and efficient methodology for antioxidant constituents obtainment. **Planta Medical**, v. 79, n. 13, p. PI62, 2013.

FARIAS, E. T. do R. **Compostos bioativos e capacidade antioxidante em frutos de araçá, noni e romã**. Pombal, 2014. 75f. (Dissertação) Mestrado em Sistemas Agroindustriais, Universidade Federal de Campina Grande, Pombal, 2014.

FREITAS, D. G.; MATTIETTO, R. A. Ideal sweetness of mixed juices from Amazon fruits. **Ciência e Tecnologia dos Alimentos**, Campinas, v. 33, n. 1, p. 148-154, fev. 2013.

GARCEZ, B.S.; ALVES, A.A.; MOREIRA FILHO, M.A.; CAVALCANTE, A.F. Características nutricionais de ingredientes de dietas para animais de produção. **Revista Eletrônica Nutritime**. Artigo 238, v. 11, n. 02, p. 3257–3267, março/Abril. 2014.

INSTITUTO ADOLFO LUTZ, I. A. L. Métodos físico-químicos para análise de alimentos. 2008.

LI, Ya et al. Bioactivities and health benefits of wild fruits. **International journal of molecular sciences**, v. 17, n. 8, p. 1258, 2016.

LIMA, C. N. S. et al. Uma experiência com beneficiamento de frutos da floresta na região do Baixo Munim – MA. In: VI CONGRESSO LATINO-AMERICANO, X CONGRESSO BRASILEIRO, V SEMINÁRIO DO DF E ENTORNO, 2017, Brasília. Artigo. **Anais eletrônicos...** Brasília, 2017.

MALTA, Luciana Gomes et al. Assessment of antioxidant and antiproliferative activities and the identification of phenolic compounds of exotic Brazilian fruits. **Food research international**, v. 53, n. 1, p. 417-425, 2013.

MIRANDA, A. R. L.; ROCHA, A. E. Estudo fitossociológico de *Humiria balsamifera* (aubl.) A. St. Hil em área de pasto Apícola em Floresta Ombrofila para determinação de seus usos na Agricultura familiar. **Cadernos de Agroecologia**, v. 4, n. 1, dez. 2009.

MORZELLE, M. C. et al. Caracterização química e física de frutos de curriola, gabioba e murici provenientes do Cerrado brasileiro. **Revista Brasileira de Fruticultura**, v. 37, n. 1, p. 96-103, 2015.

NUNES, J. S; SILVA, F. B.; GOMES, J. P.; SILVA, W. P.; Caracterização físico-química de farinha de resíduo de polpa de acerola. In: Congresso Técnico Científico de Engenharia e Agronomia. **CONTECC**. 2015.Fortaleza-CE. 2015.

PHAM, Hong Ngoc Thuy et al. Influence of solvents and novel extraction methods on bioactive compounds and antioxidant capacity of *Phyllanthus amarus*. **Chemical Papers**, v. 70, n. 5, p. 556-566, 2016.

REIS, A. F.; SCHMIELE, M. Características e potencialidades dos frutos do Cerrado na indústria de alimentos. **Brazilian Journal of Food Technology**, v. 22, mai. 2019.

REZENDE, L.C. **Avaliação da atividade antioxidante e composição química de seis frutas tropicais consumidas na Bahia**. Salvador, 2010. 118f. (Tese) Programa de pós-graduação em Química, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2010.

RODRIGUES, A. M. C., BEZERRA, C. V., SILVA, I. Q., & SILVA, M. H. Propriedades reológicas do suco de buriti (*Mauritia flexuosa*). **Revista Brasileira de Fruticultura**, 2016, p. 176-186.

RUFINO, M. do S. M. **Propriedades funcionais de frutas tropicais brasileiras não-tradicionais**. Mossoró, 2008. 237p. (Tese) Doutorado em Fitotecnia. Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Mossoró, 2008.

SILVA, A.; FONSECA, G.G. Brazilian savannah fruits: Characteristics, properties, and potential applications. **Food science and biotechnology**, v. 25, n. 5, p. 1225-1232, 2016.

SILVA, M. R.; LACERDA, D. B. C. L.; SANTOS, G. G.; MARTINS, D. M. O. Caracterização química de frutos nativos do cerrado. **Ciência Rural**, v. 38, n. 6, p. 1790-1793, 2008.

STELLER, Jon G.; ALBERTS, Jeffrey R.; RONCA, April E. Oxidative stress as cause, consequence, or biomarker of altered female reproduction and development in the space environment. **International journal of molecular sciences**, v. 19, n. 12, p. 3729, 2018.

CAPÍTULO 31

BRUXISMO DO SONO E APNEIA DO SONO: REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA

[DOI: 10.4322/978-65-995353-2-1.c31](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c31)

Tanise de Lima Tadielo¹, Anelise Lunardi Delevati², Elidiane Emanuelli Ficanha³, Felipe Somavilla Binotto⁴, João Víctor de Lara Brum Pedroso⁵, Natália Boessio Tex de Vasconcellos⁶

¹ Universidade Federal de Santa Maria, (tanisellima@gmail.com)

² Universidade Federal de Santa Maria, (anelise.delevati@acad.ufsm.br)

³ Universidade Federal de Santa Maria, (elidiane.emanuelli@acad.ufsm.br)

⁴ Universidade Federal de Santa Maria, (binotto.felipe@acad.ufsm.br)

⁵ Universidade Federal de Santa Maria, (joao-victor.brum@acad.ufsm.br)

⁶ Universidade Federal de Santa Maria, (natisom_vasconcellos@hotmail.com)

Resumo

Objetivo: Este estudo pretende investigar e analisar a literatura disponível acerca dos aspectos que relacionam a apneia obstrutiva do sono (AOS) quanto o bruxismo do sono (BS). **Método:** Realizou-se uma revisão integrativa de literatura, realizada nas bases de dados PubMed, SciELO e Lilacs por meio da associação entre os Descritores em Ciências da Saúde “Sono” [AND] “Bruxismo” [AND] “Apneia”, bem como seus equivalentes nos idiomas inglês e espanhol. Após aplicação dos critérios de inclusão, exclusão e leitura dos textos na íntegra, foram selecionados quatro. **Resultados:** Estudos que relacionam a temática Bruxismo –Apneia são pouco encontrados. Os quatro estudos inferiram correlação entre BS e AOS. Um dos estudos analisou 310 pacientes pediátricos; desses, 128 manifestaram bruxismo, sendo a obesidade um fator de risco ao desenvolvimento de AOS. Outros dois estudos concluíram, respectivamente, que a gravidade da AOS afeta diretamente a incidência de BS, bem como indivíduos com tal associação de distúrbios do sono apresentam maiores excitação respiratória e dessaturação de oxigênio. Um estudo piloto observou a relação temporal entre os distúrbios do sono, sendo o BS secundária à AOS. **Conclusão:** A síntese dos resultados sugere associação entre BS e AOS, analisando-se aumento nos episódios de BS em pacientes com AOS. Além disso, respiração oral e ronco estão relacionadas à ocorrência de BS, enquanto o IMC é fator de risco para o desenvolvimento de BS e AOS conjuntamente. Verificou-se associação de ambos ao aumento da excitação respiratória e dessaturação de oxigênio, além de uma possível relação entre a AOS e comorbidades decorrentes do processo de envelhecimento. Ademais, a gravidade da AOS parece afetar a incidência de BS e pacientes com AOS tendem a apresentar resultados positivos para o teste de ranger os dentes. Por fim, verificou-se que a associação entre BS e AOS ainda é pouco definida e apresenta lacunas.

Palavras-chave: Apneia Obstrutiva do Sono; Bruxismo do Sono; Distúrbios do Sono.

Área Temática: Ciências da Saúde.

E-mail do autor principal: tanise.tadielo@acad.ufsm.br

1 INTRODUÇÃO

O bruxismo do sono é caracterizado pelo contato entre arcada dentária superior e inferior em associação com movimentos dos músculos mastigatórios durante o período noturno. Esses dois fatores culminam no ato de ranger dos dentes, podendo resultar ou não na modificação da qualidade de vida. Desta forma, o bruxismo do sono é considerado um distúrbio apenas quando envolve repercussões biopsicossociais no indivíduo afetado (FURLANETTO, 2018).

Dentre os aspectos genéticos e anatômicos associados ao desenvolvimento do bruxismo do sono encontram-se a redução na metilação do DNA, disfunções temporomandibulares e problemas respiratórios (FURLANETTO, 2018; MAGALHÃES et al., 2018; HOLANDA, 2019). Além disso, características comportamentais - tabagismo, consumo de álcool, sedentarismo e estresse – e sociodemográficas, como nível de escolaridade, também estão relacionadas ao surgimento desse distúrbio (CASTROFLORIO, 2017; PONTES; PRIETSCH, 2019; SILVEIRA, 2018).

A avaliação utilizada para o diagnóstico inclui perguntas subjetivas envolvendo aspectos de vida diária do indivíduo, tais como, presença de cefaléia e mialgia. Além disso, também é realizada a verificação dos aspectos clínicos e anatômicos do sistema estomatognático (ROSSI, 2020). A polissonografia possui papel importante no diagnóstico, pois permite avaliar a atividade muscular, diferenças nos padrões respiratórios e cardíacos além de outras variáveis que podem ser acometidas durante o período de sono (ROSSI, 2020).

Sabe-se que o bruxismo do sono pode afetar indivíduos de diferentes gêneros e faixas etárias, no entanto, não há consenso com relação a prevalência e incidência (DE LIMA et al., 2020; SOUSA et al., 2018). Algumas manifestações provocadas por esse distúrbio incluem a redução da qualidade de vida relacionada à saúde bucal e desgaste no esmalte dos dentes (PONTES; PRIETSCH, 2019; COSTA et al., 2017). A qualidade do sono dos indivíduos também pode ser afetada, ocasionando sonolência excessiva diurna (CÂMARA-SOUZA; FIGUEREDO; GARCIA, 2019). Além disso, a mialgia na região da cabeça e pescoço é frequentemente relatada pelos indivíduos acometidos (COSTA et al., 2017).

Outrossim, a qualidade de vida pode ser afetada por distúrbios respiratórios do sono,

que além de serem complexos, aumentam a morbimortalidade dos pacientes acometidos (CHANG; CHEN; DU, 2020). Um exemplo desse distúrbio respiratório é a AOS, caracterizada pelo estreitamento das vias aéreas superiores, que resulta em prejuízo na ventilação (KAPUR et al., 2017).

A polissonografia é considerada padrão-ouro para o diagnóstico desse distúrbio. Estudos avaliam que a redução na amplitude do sinal de fluxo $\geq 90\%$ da linha de base e duração do evento ≥ 10 segundos, indicam a presença de apneia obstrutiva do sono (BERRY et al., 2012).

Os sintomas mais frequentes da AOS incluem a sonolência diurna, ronco, cefaléia matinal e fadiga, no entanto, muitos pacientes podem ser assintomáticos (NIGRO et al., 2018; GOTTLIEB; PUNJAB, 2020). Essa doença é comum e a prevalência está crescendo, além disso, seu caráter multifatorial está associado a fatores como idade, obesidade, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares e síndrome metabólica. (MAAHS; MAAHS; MAAHS, 2019; SANTOS et al., 2020; CASTANEDA et al., 2018).

Tanto a apneia obstrutiva do sono quanto o bruxismo do sono possuem características capazes de alterar a qualidade de vida dos indivíduos afetados. Sendo assim, o objetivo deste estudo é investigar e analisar a literatura disponível acerca dos aspectos que relacionam ambos os distúrbios.

2 MÉTODO

Realizou-se uma revisão integrativa de literatura. Sendo assim, elaborou-se uma questão de investigação, seguida de amostragem da literatura e coleta de dados. Após a obtenção do material, foram analisados os dados da revisão, a análise crítica dos estudos incluídos e discussão dos resultados (SOUSA et al., 2017).

Em prosseguimento às etapas deste desenho metodológico, a amostragem e coleta de dados foi realizada nas bases de dados PubMed, SciELO e Lilacs por meio da associação entre os Descritores em Ciências da Saúde “Sono” [AND] “Bruxismo” [AND] “Apneia”, bem como seus equivalentes nos idiomas inglês e espanhol. Foram incluídos estudos primários (observacionais ou de intervenção), que apresentassem evidências da relação entre BS e AOS. Além disso, os estudos deveriam ter sido publicados nos últimos cinco anos, ou seja, de janeiro de 2016 até junho de 2021. Foram excluídos estudos de revisão, cartas ao editor, estudos duplicados, cujo tema divergisse do proposto e aqueles que não apresentaram consenso entre

os avaliadores.

Os estudos selecionados foram avaliados em pares a partir dos critérios de inclusão e exclusão. As condições de dúvidas ou falta de descrição dos critérios foram discutidas em consenso pelos avaliadores. Pautou-se a relevância e qualidade do estudo, bem como sua importância para a ciência. Todos os dados encontrados foram analisados e posteriormente documentados no decorrer desta escrita.

A amostra inicial foi composta por 228 estudos. Após a aplicação do filtro para selecionar os artigos dos últimos cinco anos, restaram 87. Seguindo a seleção a partir da leitura de título e resumo, restaram 10 estudos. Após leitura dos textos na íntegra, foram selecionados quatro estudos para comporem a revisão. A síntese dessas etapas pode ser visualizada na Figura 1.

Figura 1. Esquema de seleção dos estudos.

Fonte: Autores, 2021.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os estudos que relacionam a temática Bruxismo –Apneia são pouco encontrados nas bases de dados científicas, apontando lacunas que necessitam ser preenchidas por meio de pesquisas. Os quatro trabalhos selecionados possuem delineamento transversal e foram publicados no idioma inglês, veiculados à Albânia (1), Polônia (1), Singapura (1) e Portugal (1).

Laganà, et al. (2021) objetivaram correlacionar BS e fatores de risco para o desenvolvimento da AOS. Neste estudo, o BS está ligado aos fatores de respiração oral e ronco.

Em seu estudo, Martynowicz, et al. (2019) propuseram-se a associar BS e AOS, onde a prevalência encontrada foi de 83,37% e 50% respectivamente. O índice de episódios de bruxismo aumentou no grupo com apneia obstrutiva do sono. Tan, et al. (2018) exploram a prevalência de BS em asiáticos adultos com AOS, além de examinar a vinculação entre AOS e BS em termos de sono e respiração, resultando em aumento da prevalência em grupos conforme a idade avança, com a AOS associada à comorbidades. Winck, et al. (2017) voltaram suas pesquisas à presença e relação do BS em população com AOS, resultando no teste de ranger de dentes positivo para todos os pacientes com AOS, 9 dos 11 casos averiguados.

A partir da leitura na íntegra, os dados gerais e principais resultados relacionados à relação bruxismo-apneia foram sintetizados através da formulação dos Quadro 1 e Quadro 2.

Quadro 1 – Descrição dos estudos a partir dos autores e ano de publicação, local, título e objetivos.

Autor	Local	Título	Objetivos
Laganà, et al. (2021)	Albânia	Sleep Bruxism and SDB in Albanian Growing Subjects: A Cross-Sectional Study	Examinar uma possível correlação entre o Bruxismo do Sono (BS) e fatores de risco para o desenvolvimento da Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) em uma amostra de indivíduos em crescimento e avaliar a consciência dos pais sobre o Bruxismo do Sono em seus filhos.
Martynowicz, et al. (2019)	Polônia	The Relationship between Sleep Bruxism and Obstructive Sleep Apnea Based on Polysomnographic Findings	Ponderar a relação entre bruxismo do sono e apneia obstrutiva do sono e identificar fatores que afetam essa correlação.
Tan, et al. (2018)	Singapura	Prevalence of Sleep Bruxism and Its Association with Obstructive Sleep Apnea in Adult Patients: A Retrospective Polysomnographic Investigation.	Determinar a prevalência de bruxismo do sono (BS) em uma amostra de pacientes asiáticos adultos com apneia obstrutiva do sono (AOS) e examinar a associação entre AOS e BS em termos de sono e parâmetros respiratórios.
Winck, et al. (20)	Portugal	Sleep bruxism associated with obstructive sleep apnoea syndrome - A pilot study using a new portable device	Avaliar a presença e relação de bruxismo do sono (BS) em uma população com apneia obstrutiva do sono (AOS) usando um dispositivo de poligrafia cardiorrespiratória que monitora o áudio e eletromiografia (EMG) dos músculos masseteres.

Fonte: Autores, 2021.

Quadro 2 – Descrição dos estudos a partir das amostras estudadas e principais resultados.

Estudo	Amostra	Principais Resultados
Laganà, et al. (2021)	Estudo executado a partir de 310 indivíduos analisados, sendo 173 do sexo feminino (56% da amostra) e 137 do sexo masculino (44% da amostra). As crianças tinham de 9 a 12 anos de idade. Média de 8,9 anos (DP=2).	128 indivíduos (41,3%) haviam sido afetados pelo Bruxismo do Sono, incluindo meninas e meninos. A obesidade foi avaliada como fator de risco para o desenvolvimento de Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono. A frequência de amigdalite foi de 23% e a respiração oral foi apresentada em 11% dos indivíduos, dentre esses, 40% tinham bruxismo. 9,7% tinham congestão nasal e 56% já trincaram os dentes. 18% roncavam durante a noite correlacionado ao bruxismo ($p = 0,00$).
Martynowicz, et al. (2019)	A amostra analisada foi de 110 pacientes com idades entre 18 e 90 anos. A média de idade é de $51,02 \pm 14,19$ anos. As mulheres constituem 40% dos participantes (44 indivíduos do total).	A prevalência de Apneia Obstrutiva do Sono (AOS) foi de 86,37% ($n=85$) no grupo estudado, já o Bruxismo do Sono (BS) foi diagnosticado em 50% ($n=55$) dos pacientes. O bruxismo do sono ocorreu com mais frequência no grupo com apneia obstrutiva do sono do que no grupo sem AOS (53,7% vs. 26,7%, $p < 0,05$). A incidência de BS nos grupos com AOS leve, moderada e grave foi de 61,6%, 64,3% e 35,3% respectivamente. O Índice de Episódios de Bruxismo (IEB) aumentou no grupo com AOS leve e moderada (Índice de Apneia Hipopneia (IAH) <30) em comparação com o grupo com AOS grave (IAH ≥ 30). ($5,50 \pm 4,58$ vs. $1,62 \pm 1,28$, $p < 0,05$). O estudo indicou maior IAH no sexo masculino e diabéticos, independentes do índice de episódios de bruxismo <30 . A relação entre AOS e BS depende do grau de gravidade da AOS.
Tan, et al. (2018)	O estudo envolveu 157 pacientes com idades igual ou superior a 25 anos.	Cerca de um terço (33,3%) dos pacientes adultos com Apneia Obstrutiva do Sono (AOS) apresentavam Bruxismo do Sono (BS) concomitante. A maior parte do Músculo Mastigatório Rítmico do Masseter (MMRM) observado em pacientes com AOS e BS era de natureza fásica. Pacientes com Síndrome de Apneia do Obstrutiva do Sono (SAOS) com BS tinham maiores Índice de Excitação Respiratória (IER) ($P = .001$) e Índice de Dessaturação de Oxigênio (IDO) de ($P = .005$).
Winck, et al. (2017)	Análise de 11 pacientes com idades entre 18 e 90 anos, sem doenças prévias importantes. A média de idade era $46,3 \pm 11,3$ anos.	Dos casos estudados, 9 pacientes tinham Síndrome Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS). 55,6% apresentaram critérios de Bruxismo do Sono (BS). 77,8% tinham critérios poligráficos de BS (índice de BS $> 2/h$). O índice médio de BS foi de $5,12 \pm 3,6/h$, os eventos fásicos predominaram (72,7%). O ranger dos dentes teve média de $10,7 \pm 9,2$ por noite. Todos os pacientes com SAOS, exceto dois (77,8%), tiveram mais de dois episódios audíveis de ranger dos dentes. Esses dois pacientes tiveram menor índice de BS.

Fonte: Autores, 2021.

Os quatro estudos mostram a relação entre BS e AOS. Um dos estudos analisou 310 pacientes pediátricos; desses, 128 manifestaram bruxismo, sendo a obesidade um fator de risco

ao desenvolvimento de AOS (LAGANÀ et al., 2021). Outros dois estudos foram realizados com adultos: concluiu-se, respectivamente, que a gravidade da AOS afeta diretamente a incidência de BS, bem como indivíduos com tal associação de distúrbios do sono apresentam maiores excitação respiratória e dessaturação de oxigênio (MARTYNOWICZ et al, 2019; TAN et al., 2018). Um estudo piloto observou a relação temporal entre os distúrbios do sono, sendo o BS secundária à AOS (WINCK et al., 2017).

Esta revisão integrativa investigou a relação entre BS e AOS a partir da avaliação qualitativa e visão geral estruturada dos artigos incluídos. No entanto, informações sobre a ocorrência de BS e AOS são limitadas e fragmentadas; ademais, diferentes metodologias e critérios utilizados para avaliar a relação das afecções dificultam a análise estatística dos resultados e o estabelecimento de achados mais conclusivos.

Nesse sentido, estudos indicam que eventos de apneia precedem o BS: o esforço respiratório gerado é capaz de desencadear excitação da atividade muscular de forma protetiva, abrindo as vias aéreas (HOSOYA et al., 2014; SAITO et al., 2014). Entretanto, outros estudos suportam que os eventos de BS precedem a AOS, induzindo-a por via neural reflexa (SCHAMES et al., 2012). De forma análoga, outra linha de estudos indica nenhuma relação temporal e causal entre BS e AOS, sendo influenciadas por mecanismos diferentes. (SAITO et al., 2016). Análises genéticas depreendem que diferentes genes são responsáveis pela predisposição ao BS, pela patologia do BS e pela associação entre BS e AOS (WIECKIEWICZ et al., 2020)

Diante dos resultados obtidos, observa-se associação entre BS e AOS; além disso, Índice de Massa Corporal e fenótipo da AOS se apresentam como fatores de risco ao seu desenvolvimento. Os achados também indicam que, nas circunstâncias e limitações definidas nesta revisão, BS e AOS devem ser avaliadas conjuntamente a fim de minimizar sua ocorrência e delimitar ações estratégicas de terapêutica e prevenção. No entanto, antes de se estabelecer relação causal direta entre as duas condições, são necessários mais estudos que abordem ambas as desordens, buscando mecanismos compartilhados por esses eventos.

4 CONCLUSÃO

A síntese dos resultados sugere associação entre BS e AOS, analisando-se aumento nos episódios de BS em pacientes com AOS. Além disso, respiração oral e ronco estão relacionadas

à ocorrência de BS, enquanto o IMC é fator de risco para o desenvolvimento de BS e AOS conjuntamente. Verificou-se associação de ambos os distúrbios ao aumento da excitação respiratória e dessaturação de oxigênio, além de uma possível relação entre a AOS e comorbidades decorrentes do processo de envelhecimento. Ademais, a gravidade da AOS parece afetar a prevalência de BS e pacientes com AOS tendem a apresentar resultados positivos para o teste de ranger os dentes, fortalecendo a hipótese apresentada.

Por fim, verificou-se que a associação entre BS e AOS ainda é pouco definida e apresenta lacunas no que concerne à sua relação temporal. Cabe aludir que a escassez de estudos longitudinais relacionando ambas as afecções do sono e o contraste de metodologias utilizadas foram fatores limitantes para a definição da correlação supracitada.

REFERÊNCIAS

BERRY, R. B. et al. American Academy of Sleep Medicine. Rules for scoring respiratory events in sleep: update of the 2007 AASM Manual for the Scoring of Sleep and Associated Events. Deliberations of the Sleep Apnea Definitions Task Force of the American Academy of Sleep Medicine. **JCSM - Journal of Clinical Sleep Medicine** v. 8, n. 5, p. 597-619, 2012.

CÂMARA-SOUZA, M. B.; DE FIGUEREDO, O. M. C.; GARCIA, R. C. M. R. Association of sleep bruxism with oral health-related quality of life and sleep quality. **Clinical Oral Investigations**, v. 23, n. 1, p. 245–251, 2019.

CASTANEDA, A. et al. Correlation between metabolic syndrome and sleep apnea. **World Journal of Diabetes**, v. 9, n. 4, p. 66–71, 2018.

CASTROFLORIO, T. et al. Sleep bruxism and related risk factors in adults: A systematic literature review. **Archives of Oral Biology**, v. 83, p. 25–32, 2017.

CHANG, H. P.; CHEN, Y. F.; DU, J. K. Obstructive sleep apnea treatment in adults. **Kaohsiung Journal of Medical Sciences**, v. 36, n. 1, p. 7–12, 2020.

COSTA, A. R. O. et al. Prevalência e fatores associados ao bruxismo em universitários: um estudo transversal piloto. **Rev. Bras. Odontol.**, Rio de Janeiro, v. 74, n. 2, p. 120-125, 2017.

FURLANETTO, R. M. **Bruxismo: uma revisão de definição, classificação e etiologia**. 2018. 50p. Monografia (Especialização em Ortopedia Funcional dos Maxilares) - Faculdade Sete Lagoas – FACSETE, São Paulo - SP, 2018.

GOTTLIEB, D. J.; PUNJABI, N. M. Diagnosis and Management of Obstructive Sleep Apnea: A Review. **JAMA - Journal of the American Medical Association**, v. 323, n. 14, p. 1380–1400, 2020.

HOLANDA, T. A. **Bruxismo do sono e fatores associados: estudos envolvendo polissonografias**. 2019. 82 p. Dissertação (Mestrado em Clínica Odontológica) - Universidade Federal de Pelotas, Pelotas - RS, 2019.

HOSOYA, H. et al. Relationship between sleep bruxism and sleep respiratory events in patients with obstructive sleep apnea syndrome. **Sleep and Breathing**, v. 18, n. 4, p. 837-844, 2014.

KAPUR, V. K. et al. Clinical practice guideline OSA american academy. **J Clin Sleep Med**, v. 13, n. 3, p. 479–504, 2017.

LAGANÀ, G. et al. Sleep Bruxism and SDB in Albanian Growing Subjects: A Cross-Sectional Study. **Dentistry Journal**, v. 9, n. 3, p. 25-33, 2021.

DE LIMA, M. C. G. et al. A parafuncionalidade do bruxismo: da intervenção terapêutica multiprofissional ao uso da placa miorrelaxante. **Brazilian Journal of Health Review**, Curitiba, v. 3, n. 4, p. 8910–8918, 2020.

MAAHS, T. P; MAAHS, A. P, MAAHS, G.S. Fatores de risco da síndrome da apneia obstrutiva do sono no adulto. **Revista de Ciências Médicas e Biológicas**, Salvador, v. 18, n. 2, p. 266-269, 2019.

MAGALHÃES, B. G. et al. Temporomandibular disorder: otologic implications and its relationship to sleep bruxism. **Brazilian Journal of Otorhinolaryngology**, v. 84, n. 5, p. 614–619, 2018.

MARTYNOWICZ, H. et al. The Relationship between Sleep Bruxism and Obstructive Sleep Apnea Based on Polysomnographic Findings. **Journal of Clinical Medicine**, v. 8, n. 10, p. 1653-1662, 2019.

NIGRO, C. A. et al. The influence of gender on symptoms associated with obstructive sleep apnea. **Sleep and Breathing**, v. 22, n. 3, p. 683–693, 2018.

PONTES, L. DA S.; PRIETSCH, S. O. M. Bruxismo do sono: estudo de base populacional em pessoas com 18 anos ou mais na cidade de Rio Grande, Rio Grande do Sul. **Revista brasileira de epidemiologia**, v. 22, p. e190038, 2019.

ROSSI, S. C. **O bruxismo associado ao stress**. 2020. 59 p. Dissertação (Mestrado em Medicina Dentária) - Instituto Universitário Egas Moniz. 2020.

SAITO, M. et al. Temporal association between sleep apnea-hypopnea and sleep bruxism events. **Journal of Sleep Research**, v. 23, n. 2, p. 196-203, 2013.

SAITO, M. et al. Weak association between sleep bruxism and obstructive sleep apnea. A sleep laboratory study. **Sleep and Breathing**, v. 20, n. 2, p. 703-709, 2016.

SANTOS, L. P. G. et al. Associação entre síndrome metabólica, doença cardíaca e síndrome da apneia obstrutiva do sono. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 3, p. 16634–16651, 2020.

SCHAMES, S. E. et al. Sleep bruxism, an autonomic self-regulating response by triggering the trigeminal cardiac reflex. **Journal of the California Dental Association**, v. 40, n. 8, p. 670-676, 2012.

SILVEIRA, B. P. **Prevalência de bruxismo do sono em pacientes do centro multidisciplinar de dor orofacial (cemdor)**. 2018. 62 p. Trabalho de Conclusão do Curso (Graduação em Odontologia) - Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis - SC, 2018.

SOUSA, H. C. S. et al. Prevalence and associated factors to sleep bruxism in adolescents from Teresina, Piauí. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 21, p. 1–11, 2018.

SOUSA, L. M. M. et al. A Metodologia de Revisão Integrativa de Literatura em Enfermagem. **Revista Investigação em Enfermagem**, v. 21, n. 2, p. 17-26, 2017.

TAN, M. W. Y. et al. Prevalence of Sleep Bruxism and Its Association with Obstructive Sleep Apnea in Adult Patients: A Retrospective Polysomnographic Investigation. **Journal of Oral & Facial Pain and Headache**, v. 33, n. 3, p. 269–277, 2019.

WIĘCKIEWICZ, M. et al. Genetic basis of sleep bruxism and sleep apnea-response to a medical puzzle. **Scientific Reports**, v. 10, n. 1, p. 7497-7510.

WINCK, M. et al. Sleep bruxism associated with obstructive sleep apnoea syndrome - A pilot study using a new portable device. **Revista Portuguesa de Pneumologia**, v. 23, n. 1, p. 22-26, 2017.

CAPÍTULO 32

CONTRIBUIÇÕES DA TERAPIA COM LASER DE BAIXA INTENSIDADE NA MODULAÇÃO DA INFLAMAÇÃO DE LESÕES ORAIS

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c32](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c32)

Ellen Amanda Silva de Santana¹, Allan Francisco Costa Jaques¹, Gabrielle Holanda Silva¹, Rafael Mendonça Santana Corrêa¹, Elen Clayse Ferreira da Hora¹, Gabriel Robson Santos Torres Tiago¹, Diego Motinha Matos³, Tiago José Nascimento de Souza⁴, Liara de Oliveira Teixeira⁵, Ana Cláudia da Silva Araújo¹

¹ Instituição/ Universidade, (amaandasiilva001@gmail.com, allanjaques1@gmail.com, gabrielleholanda84@gmail.com, elenclayse12@gmail.com, gabriel.santostorres@ufpe.br, acsaodonto@gmail.com)

² Universidade Salgado de Oliveira - UNIVERSO, (rafaelionarasakua@gmail.com)

³ Universidade Federal de Juiz de Fora, (diego_motinha@hotmail.com)

³ Centro Universitário Brasileiro - UNIBRA, (tiagojnsouza@gmail.com)

³ Universidade Federal de Santa Maria- UFSM, (liarateixeira6@gmail.com)

Resumo

Objetivo: Relatar, através de uma revisão narrativa de literatura, as contribuições e os efeitos terapêuticos do laser de baixa intensidade quando utilizado em inflamações de lesões orais. **Método:** Para isso, foi realizado uma busca bibliográfica nas plataformas digitais SciELO, Science Direct, MEDLINE, PubMed e LILACS, por meio dos descritores “Terapia a laser”, “Mucosa oral”, “Lesões” e “Odontologia”, onde foram selecionados 18 artigos redigidos em Inglês, Português e Espanhol com lapso temporal entre 2008 e 2021. **Resultados:** O laser de baixa potência, dentre outros princípios, estimula a produção de ATP pela mitocôndria conferindo propriedades terapêuticas importantes como biomodulação dos tecidos afetados, além da ação analgésica e antiinflamatória, sendo fundamental para a remissão completa das lesões ulceradas, inclusive possibilitando a alimentação do paciente e consequentemente, melhorando a qualidade de vida. **Conclusão:** O laser de baixa intensidade apresenta-se como uma alternativa eficaz, não invasiva e de baixo custo, de ampla aplicação para o tratamento de lesões orais ulceradas variando desde a ulceração traumática até a mucosite.

Palavras-chave: Terapia a laser; Mucosa oral; Lesões; Odontologia.

Área Temática: Ciências da Saúde.

E-mail do autor principal: amaandasiilva001@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

Os lasers na odontologia começaram a ganhar popularidade na década de 1990. Desde então, são usados como uma ferramenta de tratamento ou como ferramenta auxiliar, cujo o principal objetivo é superar as desvantagens vivenciadas atualmente nos procedimentos convencionais de tratamento odontológico (LUKE et al., 2019; CAVALCANTI et al., 2011). Diversas especialidades odontológicas, incluindo cirurgia oral, implantodontia, periodontia, pediatria e cirurgia, utilizam da nova tecnologia de laser atual. A capacidade dos lasers de fornecer procedimentos minimamente invasivos com menos desconforto para o paciente tem sido útil no sistema de entrega ao paciente na prática odontológica (LUKE et al., 2019).

Os lasers podem ser classificados de forma geral em: (1) lasers de alta potência ou lasers cirúrgicos ou HILT (high intensity laser treatment), que possuem, por exemplo, indicações cirúrgicas (corte, coagulação, cauterização) e efeitos de ablação (preparos cavitários odontológicos, prevenção); e (2) lasers de baixa potência ou lasers terapêuticos ou LILT (low intensity laser therapy), muito utilizados para fins terapêuticos e bioestimuladores, agindo principalmente como aceleradores em processos cicatriciais. (LUNA-ORTIZ et al., 2019; CAVALCANTI et al., 2011; PROCKT, TAKAHASHI, PAGNONCELLI, 2008).

A palavra LASER é um acrônimo de “Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation”, que traduzido para o português significa “amplificação da luz por emissão estimulada de radiação”. Lasers são feixes intensos produzidos por emissão estimulada de radiação de uma fonte de luz, é caracterizada como uma radiação eletromagnética com características próprias que a diferem de uma luz comum: monocromático, ou seja, todas as ondas têm a mesma energia e frequência; suas ondas propagam-se coerentemente no espaço e no tempo, carregando de forma colimada garantindo o paralelismo das ondas. O desenvolvimento de diferentes tipos de lasers e vários comprimentos de onda da luz laser possibilitou o estudo para utilização em diversos procedimentos terapêuticos e cirúrgicos. Os lasers de baixa potência foram desenvolvidos para uso terapêutico, e vários outros nomes têm sido dados a esses lasers, incluindo laser mole, laser de baixa reatividade, laser de baixa energia, laser frio, e laser de baixa intensidade (LUKE et al., 2019; CAVALCANTI et al., 2011; PROCKT, TAKAHASHI, PAGNONCELLI, 2008).

Os lasers de baixa potência (LBPs) podem ser utilizados em diversos procedimentos odontológicos como diagnóstico de cárie, estimulação da formação de dentina reparadora, redução da sensibilidade dentinária e a dor nos casos de hiperemia, auxílio à anestesia nos casos de pulpite severa, possibilita maior velocidade de reparação do tecido ósseo na região periapical, além de proporcionar menor sangramento e edema nos casos de gengivite e periodontite e diminuir a sintomatologia dolorosa na síndrome da ardência bucal, alveolite, DTM, mucosite e pericoronite (SIQUEIRA et al., 2015; CAVALCANTI et al., 2011).

Os principais efeitos vistos em feridas tratadas com laser de baixa intensidade incluem aumento da formação de tecido de granulação, mais rápida epitelização, aumento da proliferação de fibroblastos e reforço da neovascularização (RAMALHO et al., 2011; ORTEGA-CONCEPCIÓN et al., 2021). Quando a luz laser interage com as células e o tecido na dose adequada, certas funções celulares poderão ser estimuladas, tais como: a estimulação de linfócitos, a ativação de mastócitos, o aumento da produção de ATP mitocondrial e a proliferação de vários tipos de células. Os lasers na faixa do vermelho, no comprimento de onda de 632 a 780 nm, não são capazes de produzir danos aos tecidos como mutações e carcinogênese, podendo ser aplicados nos tecidos moles da cavidade oral nos seguintes casos: herpes, estomatite aftosa recorrente (afta), ulcerações traumáticas, síndrome da ardência bucal, prevenção e tratamento da mucosite (CAVALCANTI et al., 2011; MONTEIRO et al., 2019).

A tendência da odontologia é a incorporação de métodos menos invasivos com a finalidade de minimizar a dor e o desconforto durante e após as intervenções odontológicas. Nesse sentido, a laserterapia pode ser uma excelente opção de tratamento, já que apresenta efeitos benéficos para os tecidos irradiados. Por isso, esse estudo tem como objetivo investigar as contribuições e os efeitos terapêuticos do laser de baixa intensidade quando utilizado em inflamações de lesões orais.

2 MÉTODO

Foi realizada uma revisão narrativa de literatura, na qual foi feita uma busca durante o mês de julho de 2021. Foram coletados 50 artigos nas bases eletrônicas dados SciELO, Science Direct, MEDLINE, PubMed e LILACS, por meio dos descritores “Terapia a laser”, “Mucosa oral”, “Lesões” e “Odontologia”. Excluiu-se aqueles que não faziam correlação com os objetivos, estudos indisponíveis na íntegra, artigos duplicados e artigos que não traziam um bom embasamento sobre o tema. A sintetização da revisão ocorreu a partir da análise detalhada dos trabalhos e na construção da pergunta norteadora: “Quais contribuições e os efeitos

terapêuticos do laser de baixa intensidade quando utilizado em inflamações de lesões orais?". A partir disso, foram selecionados 18 artigos redigidos em Inglês, Português e Espanhol com lapso temporal entre 2008 e 2021, para compor a amostra.

Figura 1. Fluxograma

Fonte: Autor.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A busca constante do equilíbrio biopsicossocial pelo ser humano requer a inserção de novas e eficazes terapias que adentram num moderno e amplo campo da odontologia. Assim, na tecnologia laser novas pesquisas indicam novas formas e técnicas do seu uso pelo cirurgião-dentista. Os fundamentos físicos e a interação dessa luz com os tecidos são conhecimentos que devem ser esclarecidos e dominados por esses profissionais, possibilitando diferentes pesquisas

e consolidando a laserterapia como opção terapêutica na clínica odontológica (CAVALCANTI et al., 2021).

O laser de baixa intensidade age como um fotobiomodulador tecidual, produzindo efeitos terapêuticos. Várias aplicações têm sido descritas na literatura, com variados protocolos de irradiação. Muitos estudos demonstram a sua efetividade, e outros demonstram o contrário. Este artigo é uma revisão bibliográfica da laserterapia, incluindo histórico, tipos de laser de baixa intensidade, características físicas, mecanismos de funcionamento, contraindicações, efeitos e aplicações na cirurgia bucomaxilofacial. As aplicações da laserterapia em implantologia, lesões mucosas, herpes, condução nervosa, cirurgias periodontais, disfunção temporomandibular, apicectomias e cirurgia dentoalveolar serão especificamente abordados. (PROCKT, TAKAHASHI, PAGNONCELLI, 2008)

A interação da luz do laser com tecidos vivos pode levar a resultados diferentes dependendo de vários fatores, como comprimento de onda, dose, potência e estado fisiológico da célula no momento da irradiação. A melhora na cicatrização de feridas e no controle da dor pelo LPT é relatada por diversos estudos na literatura por meio da modulação da inflamação, proliferação de fibroblastos, migração e proliferação de queratinócitos, aumento da microcirculação, liberação de fator de crescimento e síntese de colágeno. A aplicação do LPT no tratamento de úlceras de radiação recalcitrantes na pele tem sido descrita na literatura por alguns autores pode ser um tratamento eficaz, econômico e não invasivo para as deiscências de tecido decorrentes da radioterapia, com as vantagens de segurança e tolerabilidade (RAMALHO et al., 2011; ORTEGA-CONCEPCIÓN et al., 2021).

A cavidade oral inclui uma combinação única de vários tecidos que contribui para a existência de muitas funções fisiológicas como fonação, mastigação ou respiração. No entanto, na presença de estímulos friccionais crônicos, os tecidos orais podem produzir algumas adaptações patológicas resultando em lesões orais, como pólipos fibroepiteliais ou outros crescimentos fibroepiteliais. Lesões ulceradas da cavidade oral têm muitos fatores etiológicos subjacentes, mais comumente infecção, imunidade relacionada, traumática ou neoplásica. A maioria das lesões ulcerativas da mucosa oral se enquadra em uma das quatro categorias: infecção, relacionada ao sistema imunológico, traumática ou neoplásica. Nas últimas décadas, a utilidade do laser tem sido relatada em muitos procedimentos cirúrgicos orais, com várias vantagens em relação aos métodos cirúrgicos clássicos. Essas vantagens incluem a capacidade hemostática que permite um campo cirúrgico incruento, as propriedades de descontaminação, diminuição significativa da dor pós-operatória, inflamação e infecção e cicatrização por

segunda intenção sem necessidade de suturas (MONTEIRO et al., 2019; FITZPATRICK, COHEN, CLARK, 2021).

Em uma revisão bibliográfica, Prockt, Takahashi e Pagnoncelli (2008) afirmam que muitos estudos demonstram a efetividade dos efeitos terapêuticos do laser embora, outros tenham demonstrado o contrário. Nesse mesmo estudo, os autores expõem os efeitos do laser na como um estímulo ao processo metabólico de cicatrização de feridas. Os principais efeitos vistos em feridas tratadas com laser de baixa intensidade incluem aumento da formação de tecido de granulação, rápida epitelização, aumento da proliferação de fibroblastos e reforço da angiogênese.

Em um estudo mais recente, Daugêlaitê et al. (2021) realizaram uma revisão sistemática da literatura e examinaram os métodos de prevenção e tratamento mais eficazes para a mucosite oral induzida por quimioterapia e / ou radioterapia. Os resultados obtidos demonstraram que o laser de baixa potência possui resultados positivos e tem se mostrado como um método eficaz para a mucosite oral, pois reduzem o desenvolvimento e a duração, no entanto, sua eficiência ainda é discutível. Nesse contexto, Cavalcanti et al. (2021) apontam que a laserterapia, em casos de mucosite oral, proporciona alívio da dor, maior conforto ao paciente, controle da inflamação, manutenção da integridade da mucosa e melhor reparação tecidual.

O relato de caso clínico realizado por Rocha et al. (2019), no qual as lesões orais da Síndrome de Stevens-Johnson foram tratadas com o auxílio da terapia de fotobiomodulação, que auxiliou na redução da dor, favoreceu a ingestão de alimentos por via oral e reduziu o tempo de cicatrização das lesões.

Já em câncer de cabeça e pescoço, a utilização do laser de baixa intensidade causa discussões, pois as células tumorais podem estar no campo de irradiação e o laser pode promover a progressão do tumor. Em um estudo in vitro, Schartinger et al. (2012) investigaram o efeito do laser de baixa intensidade na proliferação, distribuição do ciclo celular e apoptose em uma linha de células de carcinoma oral humano (SCC-25), células epiteliais não malignas (BEAS-2B) e fibroblastos, no entanto não foi exibido um efeito de promoção de tumor neste estudo, por terem usado uma dose baixa, não produziu efeitos proliferativos ou antiapoptóticos. Entretanto, outro estudo in vitro feito por Henriques et al., avaliou os efeitos do laser de baixa intensidade na proliferação, invasão e expressão de ciclina D1, E-caderina, β -catenina e MMP-9 em uma linha celular de carcinoma escamoso de língua (SCC25), e foi demonstrado que o laser exerce um efeito estimulador na proliferação e invasão das células SCC25, o que foi associado a alterações na expressão das proteínas estudadas.

Em uma série de casos, Valle et al. (2021), defendem que o uso do laser de baixa intensidade para tratamento de lesões de úlceras traumáticas, de queilite angular e outras relacionadas com a presença de microrganismos é eficaz na aceleração da cura da lesão e remissão dos sintomas e pode ser usado como uma alternativa terapêutica, visto que influencia as células diretamente na indução da analgesia com ação anti-inflamatória e a reparação de tecidos. Além disso, os autores ressaltam que essa terapia proporciona um alívio imediato de dor e desconforto ao paciente obtendo sucesso e satisfação no tratamento.

Em odontopediatria, Silva et al. (2017) demonstrou as implicações clínicas de uma lesão de Riga-Fede e abordagem de tratamento utilizando a laserterapia. O mesmo estudo apontou que a laserterapia mostrou-se uma possível opção de tratamento para lesões de Riga-Fede, reduzindo o tempo de cicatrização para quatro dias, possibilitando o retorno à alimentação e melhora da sintomatologia dolorosa desde o primeiro dia da aplicação.

Carvalho et al. (2021), em um estudo prospectivo, determinou o efeito do laser de baixa potência na prevenção e tratamento da mucosite em pacientes com câncer de cabeça e pescoço em 70 pacientes com neoplasias malignas de cavidade oral ou orofaringe. Os autores concluíram que a terapia com laser de baixa potência durante a radioterapia mostrou-se eficaz no controle da intensidade da mucosite e da dor, pois o laser promove a rápida regeneração dos miofibroblastos com origem nos fibroblastos e os fatores de crescimento desses fibroblastos mantêm o reparo e a proteção citotóxica.

4 CONCLUSÃO

A literatura analisada foi concordante que a terapia por laser de baixa intensidade aumenta o metabolismo celular e é utilizada para induzir a analgesia, a ação anti-inflamatória e a reparação de tecidos. Além disso, outra forma de ação do laser na aceleração da cicatrização de feridas é através de uma maior secreção de fatores de crescimento como o fator de crescimento derivado de fibroblastos (FGF) e o fator de crescimento semelhante à insulina (IGF) que agem na cicatrização de feridas.

Dessa forma, a laserterapia de baixa intensidade pode ser eficaz na modulação de inflamações de lesões na mucosa oral, bem como possui a grande vantagem de não ter efeito colateral ou interações deletérias como ocorre nas intervenções farmacológicas. No entanto, mais estudos são necessários para avaliar a eficiência dessa técnica.

REFERÊNCIAS

AZMA, E.; RAZAGHI, M. Laser treatment of oral and maxillofacial hemangioma. **Journal of lasers in medical sciences**, v. 9, n. 4, p. 228, 2018. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6499563/>. Acesso em: 18 jul. 2021.

CARVALHO, P. A. G. *et al.* Evaluation of low-level laser therapy in the prevention and treatment of radiation-induced mucositis: a double-blind randomized study in head and neck cancer patients. **Oral oncology**, v. 47, n. 12, p. 1176-1181, 2011. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1368837511008104?via%3Dihub>. Acesso em: 18 jul. 2021.

CAVALCANTI, T. M. *et al.* Conhecimento das propriedades físicas e da interação do laser com os tecidos biológicos na odontologia. **Anais Brasileiros de Dermatologia**, v. 86, p. 955-960, 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/abd/a/KH8WDHL5Cv9Q3s5DBxgYJGR/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 18 jul. 2021.

DAUGÉLAITÉ, G. *et al.* Prevention and treatment of chemotherapy and radiotherapy induced oral mucositis. **Medicina**, v. 55, n. 2, p. 25, 2019. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6410239/>. Acesso em: 18 jul. 2021.

FITZPATRICK, S. G.; COHEN, D. M.; CLARK, A. N. Ulcerated lesions of the oral mucosa: clinical and histologic review. **Head and neck pathology**, v. 13, n. 1, p. 91-102, 2019. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s12105-018-0981-8>. Acesso em: 18 jul. 2021.

GONÇALO, C. S.; DE BARROS, N. F. Complementary and integrative practices in oral health: A systematic review. **Brazilian Dental Science**, v. 15, n. 4, p. 21-28, 2012. Disponível em: <https://bds.ict.unesp.br/index.php/cob/article/view/840/771>. Acesso em: 19 jul. 2021.

HENRIQUES, A. C. G. *et al.* Low-level laser therapy promotes proliferation and invasion of oral squamous cell carcinoma cells. *Lasers in medical science*, v. 29, n. 4, p. 1385-1395, 2014. Disponível em: https://repositorio.ufrn.br/bitstream/123456789/21764/1/Low-level%20laser%20therapy%20promotes%20proliferation_2014.pdf. Acesso em: 18 jul. 2021.

LUNA-ORTIZ, K. *et al.* Tumors of the oral cavity: CO2 laser management. **Medicina oral, patologia oral y cirugia bucal**, v. 24, n. 1, p. e84, 2019. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6344001/>. Acesso em: 18 jul. 2021.

LUKE, A. M. *et al.* Lasers: A review with their applications in oral medicine. **Journal of lasers in medical sciences**, v. 10, n. 4, p. 324, 2019. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6885906/>. Acesso em: 18 jul. 2021.

MONTEIRO, L. *et al.* A histological evaluation of the surgical margins from human oral fibrous-epithelial lesions excised with CO2 laser, Diode laser, Er: YAG laser, Nd: YAG laser, electrosurgical scalpel and cold scalpel. **Medicina oral, patologia oral y cirugia bucal**, v. 24, n. 2, p. e271, 2019. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6441595/>. Acesso em: 18 jul. 2021.

ORTEGA-CONCEPCIÓN, D. *et al.* The application of diode laser in the treatment of oral soft tissues lesions - a literature review. **Journal of clinical and experimental dentistry**, v. 9, n. 7, p. e925, 2017. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5549593/>. Acesso em: 18 jul. 2021.

PROCKT, A. P.; TAKAHASHI, A.; PAGNONCELLI, R. M. Uso de terapia com laser de baixa intensidade na cirurgia bucomaxilofacial. **Revista Portuguesa de Estomatologia, Medicina Dentária e Cirurgia Maxilofacial**, v. 49, n. 4, p. 247-255, 2008. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1646289008700542>. Acesso em: 18 jul. 2021.

RAMALHO, K. M. *et al.* Use of laser phototherapy on a delayed wound healing of oral mucosa previously submitted to radiotherapy: case report. **International wound journal**, v. 8, n. 4, p. 413-418, 2011. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1742-481X.2011.00788.x>. Acesso em: 18 jul. 2021.

ROCHA, B. A. *et al.* Terapia de fotobiomodulação no tratamento das lesões orais da síndrome de Stevens-Johnson: relato de caso. **HU Revista**, v. 45, n. 4, p. 478-482, 2019. Disponível em: <https://periodicos.ufjf.br/index.php/hurevista/article/view/25799/20170>. Acesso em: 18 jul. 2021.

SCHARTINGER, V. H. *et al.* Differential responses of fibroblasts, non-neoplastic epithelial cells, and oral carcinoma cells to low-level laser therapy. **Supportive care in cancer**, v. 20, n. 3, p. 523-529, 2012. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Jozsef-Dudas/publication/49854696_Differential_responses_of_fibroblasts_non-neoplastic_epithelial_cells_and_oral_carcinoma_cells_to_low-level_laser_therapy/links/5584123d08ae8bf4ba725821/Differential-responses-of-fibroblasts-non-neoplastic-epithelial-cells-and-oral-carcinoma-cells-to-low-level-laser-therapy.pdf. Acesso em: 18 jul. 2021.

SILVA, D. C. *et al.* Treatment of Riga-Fede disease using laser therapy: clinical case report. **RGO-Revista Gaúcha de Odontologia**, v. 65, p. 87-91, 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rgo/a/SNWVhVXZ3RNZzchjHMQj9rL/abstract/?lang=en>. Acesso em: 18 jul. 2021.

SIQUEIRA, M. B. L. D. *et al.* A terapia com laser em especialidades odontológicas. **Revista Cubana de Estomatología**, v. 52, n. 2, p. 19-24, 2015. Disponível em:

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75072015000200003. Acesso em 19 jul. 2021.

VALLE, L. A. *et al.* Laser de baixa intensidade no tratamento de úlceras traumáticas e queilite angular: relatos de casos. **Revista da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas**, p. 30-34, 2017. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-832075>. Acesso em: 18 jul. 2021.

CAPÍTULO 33

CORONECTOMIA: UMA ALTERNATIVA PARA REMOÇÃO DE TERCEIROS MOLARES INFERIORES EM PROXIMIDADE COM O NERVO ALVEOLAR INFERIOR – UMA REVISÃO NARRATIVA

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c33](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c33)

Jadson da Silva Santana¹, **Letícia Rafaella Marinho Honorato**², **Anne Caroline Silva Freire de Sá**³, **Thalita Oliveira da Silva Borba**⁴, **André Almeida Antunes**⁵, **Erick Lúcio Souza Santos**⁶, **Arthur Mendes Lima**⁷, **Fernanda Maria Matos Aragão de Souza**⁸, **Alícia Lima de Lira**⁹, **Débora Pitta Paraíso Iglesias**¹⁰

¹ Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, (jadsonufpe@gmail.com)

² Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA, (leticiamarinoh@hotmail.com)

³ Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA, (annecarolinefreiree@gmail.com)

⁴ Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA, (thalita.borba00@gmail.com)

⁵ Centro Universitário de Belo Horizonte Unibh, (andredemu@yahoo.com.br)

⁶ Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA, (ErickLucioEL@gmail.com)

⁷ Universidade de Juiz de Fora, (arthurmlima_@hotmail.com)

⁸ Graduada em Odontologia, pelo Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA, (aragaofernanda22@gmail.com)

⁹ Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA, (alicialimadl@gmail.com)

¹⁰ Departamento de Patologia do Centro de Ciências da Saúde da UFPE, (deapitta@hotmail.com)

Resumo

Objetivo: Analisar as remoções cirúrgicas de terceiros molares inferiores com contato ou íntimo contato com o nervo alveolar inferior (NAI), tendo enfoque na escolha da coronectomia como procedimento para evitar ou reduzir os riscos de parestesia do nervo alveolar inferior. **Método:** Realizou-se uma busca de artigos científicos durante o período de junho a julho de 2021 através das bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO); Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs) e PubMed. Para isso, utilizou-se os Descritores em Ciências da Saúde (DeCs): “Mandibular Nerve”, “Paresthesia” e “Surgery Oral”. Tendo como critérios de inclusão para artigos em idioma português, inglês e espanhol, artigos que estivessem na íntegra e publicados nos últimos cinco anos. Como critérios de exclusão foram considerados: os resumos de congressos, publicações que envolvessem relatos de casos e artigos pagos e que não abordassem o assunto coronectomia e lesão do nervo alveolar

inferior. **Resultados:** Apesar da coronectomia ser uma técnica descrita há muitos anos, ainda é objeto de vários estudos como escolha para atenuar os riscos de lesão ao NAI. A literatura atual revela dados que nos fazem acreditar que esta é uma boa escolha para redução de parestesia pós-exodontia de terceiros molares em proximidade com o canal mandibular. **Conclusões:** O procedimento de coronectomia é eficaz no controle da lesão do nervo alveolar inferior após cirurgia de terceiros molares, mas deve ser bem realizado e planejado, pois pode gerar complicações pós-operatórias.

Palavras-chave: Mandibular Nerve; Paresthesia; Surgery Oral.

Área Temática: Ciências da Saúde

E-mail do autor principal: jadsonufpe@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

Conforme Lhano et al. (2019) as exodontias de terceiros molares são um dos procedimentos cirúrgicos mais frequentemente realizados por cirurgiões-dentistas, especialistas orais e bucomaxilofaciais. Assim, como em qualquer outro procedimento cirúrgico, a remoção desses dentes também pode gerar certas complicações e a lesão mais grave que pode acontecer durante a remoção do terceiro molar inferior é a lesão do nervo alveolar inferior (NAI), resultando em dano neurosensorial consequente ao lábio inferior e mento, acarretando um impacto negativo e expressivo na qualidade de vida das pessoas afetadas.

A remoção de um terceiro molar inferior impactado possui o risco potencial de gerar lesões neurológicas temporárias ou permanentes do NAI. O dano neurológico ocorre em 1,3% a 5,3% dos casos, podendo chegar a 19% principalmente por causa da localização das raízes do dente impactado em relação ao canal alveolar inferior antes do procedimento cirúrgico. Inúmeros estudos vêm tentando correlacionar sinais radiográficos à relação do NAI e a raiz do dente, assim esses sinais apontam para os cirurgiões-dentistas um possível risco de danos nos nervos com relação à remoção do siso, mas não ajudam a evitar o déficit do nervo se o dente for retirado (MARTIN et al., 2015; BLONDEAU, DANIEL, 2007).

Após a indicação definitiva da extração, a remoção cirúrgica de um terceiro molar impactado com as raízes com íntimo contato próximo com o NAI deve-se se fazer o máximo para reduzir os riscos de parestesias irreversíveis. A literatura tem apresentado a coronectomia, como meio de redução das complicações neurológicas. Essa técnica supracitada visa a remoção apenas da coroa de um terceiro molar mandibular impactado, deixando a raiz e a polpa íntegras. Após isso, a ferida é desbridada e sofre uma irrigação com solução salina e finalmente é realizada a sutura, diminuindo danos diretos ou indiretos do NAI. Este é um procedimento

cirúrgico alternativo que foi apresentado pela primeira vez em 1984 e até hoje essa técnica continua sendo estudada (MARTIN et al., 2015; SARIKOV, JUODZBALYS, 2014).

De acordo com Martin et al. (2015), nem todos os terceiros molares inferiores são aptos para a coronectomia. Desse modo, dentes com infecção aguda e dentes com mobilidade são excluídos, pois as raízes desses dentes podem ser reconhecidas pelo organismo como corpos estranhos e também dentes retidos horizontalmente ao longo do caminho do canal alveolar inferior tendem a ter mais probabilidade de lesão neurológica.

Definida a decisão da realização da coronectomia, faz-se necessário determinar qual o nível de relação entre as raízes e o canal alveolar inferior. Logo, técnicas radiográficas devem ser utilizadas para fornecer informações concretas sobre a relação do terceiro molar inferior com o canal alveolar inferior, assim prevendo possíveis complicações (MARTIN et al., 2015; BLONDEAU, DANIEL, 2007).

Desta forma, o objetivo desta revisão narrativa foi analisar as remoções cirúrgicas de terceiros molares inferiores com contato ou íntimo contato nervo alveolar inferior (NAI), com enfoque na escolha da coronectomia como procedimento para se evitar ou reduzir significativamente os riscos de parestesia do (NAI).

2 MÉTODO

O estudo é uma revisão narrativa da literatura onde foi realizada uma busca de artigos científicos durante o período de junho a julho de 2021 através das bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO); Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs) e PubMed. Para isso, utilizou-se os Descritores em Ciências da Saúde (DeCs): “Mandibular Nerve”, “Paresthesia” e “Surgery Oral”. Utilizou-se os critérios de inclusão para artigos em idioma português, inglês e espanhol, artigos que estivessem na íntegra e publicados nos últimos cinco anos. Como critérios de exclusão foram considerados: os resumos de congressos, publicações que envolvessem relatos de casos e artigos pagos e também que não abordassem o assunto coronectomia e lesão do nervo alveolar inferior.

Nesta busca, foram inicialmente identificados 3 artigos científicos na base de dados SciELO, 71 artigos na base de dados PubMed e 7 artigos na base de dados Lilacs para leitura exploratória dos resumos e, então, selecionados 12 que foram lidos integralmente. Depois da leitura analítica destes artigos, 8 foram selecionados como objetivo de estudo.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Lesões no nervo alveolar inferior ainda ocorrem em um número significativo de pacientes após exodontia de terceiros molares, com a prevalência podendo variar de 1,5 a 5% dos casos pós-cirúrgicos. Dantas et al. (2020) avaliou em 226 indivíduos que foram submetidos à remoção de 238 terceiros molares mandibulares por vários tipos de técnicas e verificaram que nove desses pacientes (3,9%) informaram algum grau de parestesia na região do NAI. Entretanto, as lesões foram reversíveis, tendo remissão total do sintoma no período de 3,7 meses.

Outros tipos de complicações pós-operatórias foram descritos por Ramadorai et al. (2019). Os autores avaliaram 1276 remoções cirúrgicas de terceiros molares inferiores com utilização de diversas técnicas e apesar do NAI apresentar alterações sensoriais em um pequeno número de casos (8 pacientes, 0,62%) também foi observado em um caso (0,078%) alteração na função sensorial do nervo lingual em uma revisão de 1 semana pós-operatória.

Apesar da coronectomia ser uma técnica descrita há muitos anos, ainda é objeto de vários estudos como escolha para minimizar os riscos de lesão ao NAI. A literatura atual revela dados que nos fazem acreditar que esta é uma boa escolha para redução de parestesia pós-exodontia de terceiros molares em proximidade com o canal mandibular. Tais achados corroboram com o estudo de Singh et al. (2018) que não observaram nenhum caso de parestesia nos 15 indivíduos (33,3% - 5 homens e 66,7% - 10 mulheres) que realizaram a coronectomia e que todos os dentes desses pacientes tinham proximidade bem acentuada ao canal mandibular e grande probabilidade de risco de lesão ao NAI.

Em pacientes com alto risco de lesionar o NAI durante a remoção dos 3º molares a coronectomia foi a técnica escolhida e se evitou a parestesia do NAI, ocorreu uma cicatrização adequada do sítio cirúrgico e não houve nenhuma queixa pós-cirúrgica. No entanto, dois pacientes tiveram falha na coronectomia (10%) devido a mobilização das raízes no intra-operatório e suas raízes foram removidas (MUKHERJEE et al., 2016). Mendes et al. (2020) escolheu a coronectomia como técnica para remoção dos terceiros molares inferiores em contato com o NAI. Dessa forma, a cicatrização estava dentro dos limites normais e não ocorreu lesão permanente do NAI, mas em um dos casos o paciente teve parestesia temporária do NAI por um mês.

Nos pacientes submetidos a coronectomia observou-se uma queixa algica e em um dos pacientes fragmento de esmalte residual. Também ocorreu migração radicular em 89,5% dos indivíduos submetidos à técnica tendo como movimentação média das raízes 3,21 milímetros,

num período de 11 meses. Essa técnica mostrou-se ser uma boa opção, pois gerou poucas complicações (ROSA et al., 2018). Daware et al. (2021) também afirma que a coronectomia é uma técnica de boa escolha para extração dos terceiros molares inferiores, mas pode ocorrer déficit neurológico, sendo mais comum no nervo lingual não no NAI. Alguns pacientes relataram dor leve, edema leve e trismo no momento da remoção dos pontos de sutura.

Mukherjee et al. (2016) relata que a coronectomia diminuiu de forma significativa a lesão no NAI na extração dos terceiros molares inferiores, mesmo em casos onde o risco é muito alto. A coronectomia foi uma opção eficiente nos casos de remoção cirúrgica de dentes posteriores inclusões, que apresentam risco de parestesia associada ao NAI, com um pequeno índice de complicações pós-operatórias. Complicações no pós-operatório ocorreram e foi necessário outras cirurgias (ROSA et al., 2018; MUKHERJEE et al., 2016).

A predominância de parestesia no NAI relacionada a remoção cirúrgica do terceiro molar inferior foi baixa mesmo sendo realizada por alunos, pelo fato dos exames pré-operatórios serem bem realizados (DANTAS et al., 2020). A análise pré-operatória deve ser realizada de forma minuciosa, como o exame radiográfico (ortopantomografia ou tomografia computadorizada), pois o mesmo auxiliou a prever riscos de parestesia na remoção dos terceiros molares inferiores, nesses exames verifica-se sinais que identificam a intimidade do dente com o nervo. A técnica cirúrgica que será empregada na cirurgia deve ser bem escolhida para minimizar os riscos de complicações no NAI. Assim, a coronectomia foi considerada a melhor escolha para a remoção de terceiros molares que estão em íntimo contato ou nas proximidades do NAI. Desse modo, prevenindo possíveis lesões do NAI em terceiros molares impactados (DAWARE et al., 2021; RAMADORAI et al., 2019; FUSARO et al., 2017; SINGH et al., 2018;)

4 CONCLUSÃO

A coronectomia atenua significativamente a lesão do nervo alveolar inferior, mesmo em casos de alto risco e é uma técnica que tem um grande índice de sucesso pós-operatório. No entanto, vale salientar os riscos de complicações potenciais da coronectomia, como falha na coronectomia devido a mobilização das raízes, parestesia temporária do NAI e déficit neurológico, sendo mais comum no nervo lingual. Os exames pré-operatórios têm uma grande importância no auxílio do planejamento da coronectomia, como o exame radiográfico (ortopantomografia ou tomografia computadorizada) que auxilia a verificar sinais que identificam a intimidade do dente com o nervo, assim prevenindo riscos de parestesia na

remoção dos terceiros molares inferiores. Essa técnica quando bem realizada e com auxílio de exames pré-operatórios adequados pode-se evitar a parestesia do NAI na remoção cirúrgica dos terceiros molares inferiores.

REFERÊNCIAS

BLONDEAU, F; DANIEL, N.G. Extração de terceiros molares inferiores inclusos: complicações pós-operatórias e seus fatores de risco. **Journal of the Canadian Dental Association**, v. 73, n. 4, p. 325, 2007.

DANTAS, T.R.S *et al.* Parestesia após a exodontia do terceiro molar: protocolo proposto. **Rev. cir. traumatol. buco-maxilo-fac**, v. 20, n. 3, p. 6-11, 2020.

DAWARE, S.N *et al.* Avaliação do desconforto pós-operatório e lesões nervosas após a remoção cirúrgica do terceiro molar inferior: Um estudo prospectivo. **Journal of Family Medicine and Primary Care**, v. 10, n. 4, p. 1712, 2021.

DEL LHANO, N.C *et al.* Panorâmica versus CBCT usada para reduzir a parestesia do nervo alveolar inferior após extrações de terceiros molares: uma revisão sistemática e meta-análise. **Radiologia Dentomaxilofacial** , v. 49, n. 4, p. 20190265, 2020.

FUSARO, F *et al.* Comparação da ortopantomografia e da precisão da TC na previsão de lesão do nervo alveolar inferior após a extração cirúrgica do terceiro molar inferior. **Minerva stomatologica**, v. 66, n. 5, p.193-200, 2017.

MARTIN, A *et al.* Coronectomy as a surgical approach to impacted mandibular third molars: a systematic review. **Head & face medicine**, v.11, n. 1, p. 1-11, 2015.

MENDES, P.A *et al.* Coronectomia de terceiros molares inferiores parcialmente erupcionados realizada por estudante de graduação em Odontologia: série de casos. **Cirurgia Oral e Maxilofacial** v. 24, n. 4, p. 417-422, 2020.

MUKHERJEE, S *et al.* Avaliação do resultado após coronectomia para o tratamento de terceiros molares inferiores nas proximidades do nervo alveolar inferior. **Jornal de pesquisa clínica e diagnóstica: JCDR**, v. 10, n. 8, p. ZC57-65, 2016.

RAMADORAI, A *et al.* Lesão nervosa após excisão cirúrgica de terceiros molares inferiores sob anestesia local: uma auditoria. **Journal of maxillofacial and oral surgery**, v. 18, n. 2, p. 307-313, 2019.

ROSA, A.A.O; FRANCIO, L.A; MILANI, C.M. Complicações em coronectomia: estudo retrospectivo de 19 casos. **Rev. cir. traumatol. buco-maxilo-fac**, v. 18, n. 1, p. 12-18, 2018.

SARIKOV, R; JUODZBALYS, G. Gintaras. Lesão do nervo alveolar inferior após extração do terceiro molar mandibular: uma revisão da literatura. **Journal of oral & maxillofacial research**, v. 5, n. 4, p. e1, 2014.

SINGH, K *et al.* Impacted mandibular third molar: Comparison of coronectomy with odontectomy. **Indian Journal of Dental Research**, v. 29, n. 5, p. 605, 2018.

CAPÍTULO 34

CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM COVID-19 EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA: REVISÃO INTEGRATIVA

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c34](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c34)

Maria Luiza Alexandre de Aquino¹, Paula Cristina Nunes Nascimento², Raissa Karla de Oliveira Araújo³, Janete Laurentino dos Santos⁴, Alberdânya Jarbelly Moraes⁵, Walbelânia da Silva Andrade⁶, Danielly Soares Diniz⁷, Hislange Queiroz Farias⁸, Maria Clara Gonçalves Ramos⁹, Alex do Nascimento Alves¹⁰

¹Faculdade Novo Horizonte, (mlaaquino.152@gmail.com)

²Faculdade Novo Horizonte, (paulacriscad26@gmail.com)

³Faculdade Novo Horizonte, (raissakarla10@gmail.com)

⁴Faculdade Novo Horizonte, (janlaurentino@gmail.com)

⁵Faculdade Novo Horizonte, (alberdannya16@gmail.com)

⁶Faculdade Novo Horizonte, (walberlaniaandrade1994@gmail.com)

⁷Universidade Estadual da Paraíba, (daniellysdiniz@hotmail.com)

⁸Faculdade Novo horizonte, (hislange12@gmail.com)

⁹Faculdade Novo horizonte, (maclaramosg@gmail.com)

¹⁰Universidade Estadual da Paraíba, (alexi.enf@gmail.com)

Resumo

Objetivo: analisar a literatura científica quanto aos cuidados de enfermagem ao paciente com covid-19 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). **Método:** O estudo trata-se de uma revisão integrativa com abordagem qualitativa. Para a pesquisa utilizou-se realizou-se o operador booleano “AND” com os Descritores de Ciências da Saúde (DeCS): Covid-19; intensive Care units; nursing, nas bases de dados PubMed e os mesmos DeCS em português na SciELO e Bireme. **Resultados:** Foram selecionados 11 artigos para o estudo que atendiam ao proposto objetivo, sendo os principais achados aqueles que elencaram os aspectos éticos e organizacionais dos profissionais que afetam diretamente os cuidados de Enfermagem, assim como aqueles que retrataram os cuidados propriamente ditos. **Conclusão:** A pandemia modificou a forma do cuidado prestado pela equipe de Enfermagem, inserindo-os em uma nova realidade ao qual necessita de mais conhecimento e estratégias.

Palavras-chave: Covid-19; Cuidados Intensivos; Enfermagem.

Área Temática: Ciências da Saúde.

E-mail do autor principal: mlaaquino.152@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

A pandemia causada pelo novo vírus denominado SARS-Cov-2, responsável pela doença conhecida como *Coronavírus Disease 2019* (COVID-19), teve seu início em Whuan, na China, se espalhando rapidamente por todo o mundo. A sua transmissibilidade ocorre de diferentes formas, entre as quais estão: contato com pessoas, objetos e superfícies contaminadas; através do ar; através de secreções por meio de tosse, espirro e saliva; e contato com olhos, boca ou nariz (ALMEIDA, et al., 2020).

Em relação aos sinais e sintomas mais recorrentes relacionados à essa síndrome, verifica-se a mialgia, febre, tosse seca e dispnéia, podendo também ser somado a linfopenia, alterações na coagulação sanguínea ou opacidades em vidro fosco pulmonares bilaterais na tomografia computadorizada de tórax. Sendo o acometimento do sistema respiratório uma das complicações mais preocupantes, relacionadas ao Covid-19, em função do desenvolvimento de SARS-CoV-2 (KÜRTÜNCÜ; KURT; ARSLAN, 2021).

Os índices de morbimortalidade dessa patologia, tem apresentado forte relação com a Síndrome da Dificuldade Respiratória Aguda (SDRA) causada por pneumonia viral aguda, a qual apresenta como sintomatologia marcante, a dispneia e hipoxemia. Sendo assim, responsável por um rápido aumento no número de internações, principalmente de idosos e portadores de comorbidades, em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para o suporte artificial das funções orgânicas dos pacientes mais gravemente enfermos com síndrome respiratória aguda grave (SARS) (RAMALHO NETO, 2020; FRANCISCO, 2021).

Visto que o tempo na UTI, em circunstâncias normais, pode ser bastante desafiador para os pacientes, em tempos pandêmicos, o número de internações nesse setor aumentou drasticamente. Notou-se que na admissão, alguns dos usuários já eram intubados ou sedados, configurando um ritmo acelerado no tocante da progressão dessa doença. Além disso, os pacientes acometidos pela Covid-19 requerem mais tempo de cuidados pela equipe de Enfermagem, do que aqueles sem essa patologia (KÜRTÜNCÜ; KURT; ARSLAN, 2021).

Assim, o cenário de complexidade e imprevisibilidade da pandemia, devido aos índices elevados de infecções pelo novo coronavírus e crescente escassez de leitos, têm colocado demandas diferenciadas sobre os enfermeiros intensivistas. Modificando desse modo, os

processos já existentes para prestação de cuidados, sendo necessário uma busca incessante por novos conhecimentos e habilidades, a fim de prestar a melhor assistência (RAMALHO NETO, 2020; LAUCK, et al., 2021; HAMAMOTO, et al., 2021).

Diante deste cenário, percebe-se a necessidade de novos estudos relativos à assistência, sobretudo do profissional enfermeiro. Esse estudo, portanto, tem por objetivo, analisar a literatura científica quanto aos cuidados de enfermagem ao paciente com covid-19 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

2 MÉTODO

O estudo trata-se de uma revisão integrativa com abordagem qualitativa. Os estudos de revisão integrativa, sintetizam vários tipos de pesquisas, podendo assim haver uma visão geral e robusta sobre assuntos gerais e da saúde. Além disso, as revisões integrativas possibilitam a identificação de lacunas de conhecimento e surgimento de novas pesquisas. (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010; RIBEIRO, 2014).

A revisão foi elaborada por enfermeiras. As fontes de informações utilizadas foram os bancos de dados Biblioteca Virtual em Saúde (Bireme), PubMed e Scientific Eletronic Library Online (SciELO), onde foram realizadas buscas manuais que seguiram etapas e critérios pré-estabelecidos, iniciadas em julho de 2021 e finalizadas em agosto do mesmo ano.

Sendo a questão norteadora: “Quais os cuidados de enfermagem ao paciente com covid-19 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)?”, realizou-se o cruzamento do operador booleano “AND” com os Descritores de Ciências da Saúde (DeCS): Covid-19; intensive Care units; nursing, nas bases de dados PubMed e os mesmos DeCS em português na SciELO e Bireme.

A primeira etapa da seleção dos estudos compreende uma triagem, à qual se analisou os seguintes critérios de elegibilidade: a) estudos contemplando os descritores determinados anteriormente, b) estudos em texto completo c) estudos nos idiomas espanhol, inglês e português, d) estudos com ano de publicação entre 2019 a 2021. No PubMed foi acrescentado como critério de elegibilidade: b) estudos em texto completo grátis. A partir destes critérios, ocorreu a leitura dos títulos, resumos e textos na íntegra dos estudos para conclusão da triagem através da análise dos demais critérios de elegibilidade: e) estudos sobre cuidados de enfermagem relacionados à pacientes com Covid-19 em unidades de terapia intensiva, f) estudos condizentes a artigos científicos, g) verificação e exclusão de estudos duplicados, aos quais foi contabilizada uma única vez. Quanto aos critérios de exclusão foram: estudos duplicados e a literatura cinzenta (dissertação, monografias e outros). Por fim, na análise e tabulação dos dados foi utilizado o *Microsoft Word*.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O resultado da primeira busca nas bases de dados, resultou em 184 artigos na Bireme, 275 na PubMed e 4 na SciELO (total: 463). Após a introdução dos filtros e análise com os critérios da triagem, esses números reduziram para 10, 1 e 1 (total: 12), respectivamente. Posteriormente, foram lidos os textos na íntegra e observados os critérios de inclusão e exclusão totalizando 11 artigos incluídos no estudo, sendo 10 na Bireme, 1 na PubMed e 0 na SciELO (Figura 1).

Figura 1. Fluxograma da pesquisa nas bases de dados PubMed, Scielo e BVS

Fonte: Elaborado pelos autores.

Por fim, os estudos selecionados foram expostos na forma de quadros, dispostos de acordo com a ordem alfabética dos títulos em português, evidenciando o banco de dados, título, autor, ano de publicação e principais resultados dos artigos.

Quadro 1. Descrição da amostra dos artigos, quanto à base de dados, título e autor/ano de publicação, nos anos de 2020 a 2021.

Banco de dados	Título	Autor, ano de publicação
Bireme	The Experiences of COVID-19 Patients in Intensive Care Units: A Qualitative Study.	KURTUNCU, M.; KURT, A.; ARSLAN, N., 2021
Bireme	Survey on the actual number of nurses required for critical patients with COVID-19 in Japanese intensive care units: Preliminary report.	HAMAMOTO, M., et al., 2021
Bireme	Responding to the COVID-19 pandemic: Development of a critical care nursing surge model to meet patient needs and maximise competencies.	LAUCK, S. B., et al., 2021

Bireme	Nursing Management of Prone Positioning in Patients With COVID-19.	BINDA, F., et al., 2021
Bireme	COVID-19 and difficult conversations in critical units: A practical guide for nurses	FELIX, A. M. S., et al., 2021
Bireme	Implementing Prone Positioning for COVID-19 Patients Outside the Intensive Care Unit.	FRANCISCO, M. A., et al., 2021
Bireme	Diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem para pacientes graves acometidos por covid-19 e sepse	RAMALHO-NETO, J. M., et al., 2020
Bireme	Donning and doffing of personal protective equipment protocol and key points of nursing care for patients with COVID-19 in ICU.	YUAN, L.; CHEN, S.; YAFANG, X., 2020
Bireme	COVID-19 in Critical Care Units: Rethinking the Humanization of Nursing Care	BAMBI, S. R. N., et al., 2020
Bireme	Clinical outcome of standardized oxygen therapy nursing strategy in COVID-19.	WENYAN, P. et al, 2020
Bireme	COVID-19: Cuidados de Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva	MORAES, E. M.; ALMEIDA, L. H. A.; GIORDANI, E., 2020
SciELO	Ethical challenges of nurses related COVID-19 pandemic in inpatient wards: An integrative review	FIROUZKOUHI, M., et al, 2021

Fonte: Elaborada pelos autores

De acordo com a nacionalidade dos artigos, no PubMed, 100% (1) é internacional, e na BVS 20% (2) são nacionais e 80% (8) são internacionais. Dessa forma, a amostra é constituída por 81,9% (9) internacionais e 18,1% (2) nacionais. Em relação ao ano dos artigos, houveram 54,5% (6) de 2020 e 45,5% (5) de 2021 .

No tocante a temática geral, todos abordaram a assistência ao paciente acometido pela COVID-19, mas de maneira diferenciada, desde a organização, ética e gerenciamento da equipe para a realização da assistência, até os cuidados de Enfermagem propriamente ditos. Para a análise e discussão dos resultados obtidos, foram estabelecidas duas categorias: cuidados de enfermagem e Ética e organização nesse cuidado.

Ética e organização no cuidado de Enfermagem

A partir do surgimento de um novo vírus, tornou-se necessário um dimensionamento diferenciado da enfermagem devido às urgências e emergências ocasionadas pela COVID. Houve o aumento do número de profissionais para o cuidado de cada paciente acometido pelo vírus, sobretudo para aqueles que estavam com ventilação mecânica, oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO) e em situações mais graves. Observou-se ainda, uma diferença na estrutura de cada unidade hospitalar, algumas onde o cuidado era realizado no ambiente isolado, tipo apartamento, e em outros haviam as enfermarias compartilhadas, o que influenciava na alocação do pessoal de enfermagem (HAMAMOTO et al., 2021).

Outros aspectos relacionados à organização do profissional, para uma prestação de cuidados efetivos ao paciente foram pontuados por um estudo, como: capacitação da equipe, por exemplo em relação ao conhecimento desse profissional quanto a patologia, as tecnologias e domínio dos princípios que regem esse cuidado, a fim de promover um melhor prognóstico; a distribuição equitativa dos EPI's pelos gestores; e a prevenção da disseminação da COVID-19 com a adoção das precauções padrão, de gotículas e aerossóis (MORAES; ALMEIDA,; GIORDANI, 2020).

No entanto, não é sempre possível aumentar o número de profissionais para cada paciente crítico, sobretudo devido a elevação significativa do número de pacientes, além da escassez de recursos o que leva ao enfrentamento de questões éticas, especialmente as de decisões, outrossim questões como segurança profissional, as regras dos hospitais, a angústia familiar e do próprio paciente são vivenciadas, neste contexto (FIROUZKOUHI et al., 2021).

Um estudo aponta a questão da paramentação como um desafio, visto que os profissionais precisam ficar revestidos de máscaras, protetores faciais e aventais, o que acaba dificultando a comunicação com o paciente e gerando angústia por ambas as partes. Nesse cenário, a escuta qualificada e empática, com uma atenção redobrada às necessidades psicológicas e preocupações se fazem necessárias, a fim de reduzir o sofrimento emocional (FIROUZKOUHI et al., 2021).

Além disso, a UTI é um local que propicia pensamentos voltados à solidão, à depressão e ao medo de morte, sem a presença dos seus entes queridos. Dessa forma, torna-se cada vez necessário o cuidado humanizado e a utilização de estratégias que promovam cuidado, como por exemplo, o uso de celulares e a musicoterapia, para assim fornecer ao cliente, um certo nível de conforto, pois de acordo com algumas pesquisas, estes trazem efeitos benéficos (BAMBI et al., 2020).

Quanto ao contexto familiar, com o aumento do número de mortes por covid, a chamada “comunicação de más notícias” tem se tornando cada vez mais comum, em que se necessita de

linguagem corporal e tom de voz adequados, entre outras coisas, as quais, devido a utilização de EPI's tem dificultado ainda mais a comunicação e acolhimento das famílias enlutadas, em que ainda é somada a dor de não poder se despedir fisicamente dos seus familiares (FELIX, et al, 2020).

Cuidados de enfermagem

É notório que os cuidados com a oxigenoterapia tem destaque na assistência ao paciente acometido com a COVID-19, visto que a sintomatologia predominante está relacionada ao sistema respiratório. Estudos apontam que a oxigenoterapia e a ventilação mecânica são medidas básicas e imprescindíveis no suporte respiratório a esses pacientes, desse modo, o profissional deve estar atento desde as indicações, atualizações, rebaixamento até necessidade de desligamento desse suporte, sendo essa terapeutica aplicada de acordo com a gravidade do paciente (PAN, W. et al., 2020).

Em casos mais críticos, onde há hipoxemia e saturação de oxigênio menor que 93%, recomenda-se o uso imediato de suporte ventilatório, através do cateter nasal ou máscara que melhor se adapte. Não sendo recomendada máscara do tipo venturi, devido a alta aerolização, mas deve-se atentar a possível desestabilização, pois o quadro de insuficiência respiratória pode rapidamente se instalar, necessitando de uma intubação orotraqueal rápida (MORAES; ALMEIDA; GIORDANI, 2020).

A utilização de capnógrafo, filtros, circuitos fechados e equipe reduzida, são outros cuidados apontados no estudo, quanto à oxigenoterapia, a fim de reduzir a possibilidade de exposição e aerolização do vírus (MORAES; ALMEIDA; GIORDANI, 2020).

Outra abordagem que objetiva a melhora quanto a hipoxemia em pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo é o decúbito ventral, conhecido como posição prona. Esta promove uma remoção da contrapressão exercida nos pulmões, promovida pelo abdome e transmitida pelo diafragma e coração, também melhorando a relação ventilação-perfusão através da abertura dos alvéolos. Apesar dessa eficácia, é uma técnica ainda pouco esclarecida, mas que tem sido estudada e inserida em protocolos com o intuito de melhorar a assistência (FRANCISCO et al., 2021; MORAES; ALMEIDA; GIORDANI, 2020).

A utilização da ECMO também tem sido um suporte cardiopulmonar eficaz no tratamento da COVID-19, melhorando o quadro de hipóxia e substituindo temporariamente os pulmões para fazer a troca de oxigênio. Nesse cenário, uma pesquisa aponta que a enfermagem necessita monitorar os sinais vitais de forma rigorosa para uma melhor regulação da ECMO, além de atenção redobrada ao uso de anticoagulantes, velocidade da bomba, taxa de fluxo de ar

e mistura ar-oxigênio, pois uma alteração desses parâmetros pode levar o paciente a uma parada cardiorespiratória (YUAN; CHEN; XU, 2020).

Ademais, a manipulação de vias para infusão da terapia medicamentosa também se faz um cuidado importante a esse paciente. É necessário a punção de veias calibrosas, de preferência um acesso central, devido a frequente utilização de sedativos, drogas vasoativas e analgésicos. Neste ponto a equipe de Enfermagem tem um importante papel na manutenção e permeabilidade desse acesso, além da administração dos medicamentos de forma segura e asséptica (MORAES; ALMEIDA; GIORDANI, 2020).

Por fim, uma das premissas necessárias para um cuidado eficaz, está nas práticas de paramentação e desparamentação dos profissionais, visto que, a utilização correta desses, repercute diretamente na diminuição dos índices de infecção e disseminação do vírus. Por isso, as instituições têm aderido a protocolos para correta higienização das mãos e utilização dos EPI's, a fim de proteger não apenas os cuidadores, como evitar agravos aqueles que já se encontram em situação de vulnerabilidade (YUAN; CHEN; XU, 2020).

4 CONCLUSÃO

O cenário pandêmico ocasionado pela COVID-19 tem demandado situações diferenciadas para a equipe de Enfermagem, as quais estão relacionadas a aspectos éticos e organizacionais, levando assim a uma readaptação à nova realidade, modificando o processo do cuidar aos quais estavam acostumados. Nesse tocante o estudo identificou na literatura, alguns cuidados e estratégias que estão sendo utilizadas, pelos profissionais Enfermeiros, além de destacar a necessidade da aquisição de conhecimentos quanto à patologia, a fim de prevenir sua transmissão, minimizar seus efeitos e traçar um plano de cuidados mais efetivos para o paciente.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, I. J. S. et al. Pandemia pelo coronavírus à luz de teorias de enfermagem. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 73, suppl 2, e20200538, 2020.

BAMBI, S. et al. COVID-19 in Critical Care Units: rethinking the humanization of nursing care. **Dimensions Of Critical Care Nursing**, v. 39, n. 5, p. 239-241, 2020.

FELIX, A. M. S. et al. COVID -19 and difficult conversations in critical units: a practical guide for nurses. **Nursing In Critical Care**, v. 26, n. 3, p. 209-211, 2020.

FIROUZKOUHI, M. et al. Ethical challenges of nurses related COVID-19 pandemic in inpatient wards: an integrative review. **Ethics, Medicine And Public Health**, v. 18, p. 100669, 2021.

FRANCISCO, M. A. et al. Implementing Prone Positioning for COVID-19 Patients Outside the Intensive Care Unit. **Journal of Nursing Care Quality**, v. 36, n. 2, p. 105-111, 2021.

HAMAMOTO, M. et al. Survey on the actual number of nurses required for critical patients with COVID-19 in Japanese intensive care units: preliminary report. **Japan Journal Of Nursing Science**, v. 18, n. 3, p. 1-3, 3 jun. 2021.

KÜRTÜNCÜ, M; KURT, A; ARSLAN, N. The Experiences of COVID-19 Patients in Intensive Care Units: a qualitative study. **Omega - Journal Of Death And Dying**, p. 1-15, 2021.

LAUCK, S. B. et al. Responding to the COVID-19 pandemic: development of a critical care nursing surge model to meet patient needs and maximise competencies. **Australian Critical Care**, v. 34, n. 5, p. 1-9, 2021.

MORAES, E. M; ALMEIDA, L. H. A; GIORDANI, E. COVID-19: cuidados de enfermagem em unidade de terapia intensiva. **Scientia Medica**, v. 30, n. 1, p. 1-11, 2020.

PAN, W. et al. Clinical outcome of standardized oxygen therapy nursing strategy in COVID-19. **Annals Of Palliative Medicine**, v. 9, n. 4, p. 2171-2177, 2020.

RAMALHO NETO, J. M. et al. Nursing diagnosis/outcomes and interventions for critically ill patients affected by covid-19 and sepsis. **Texto & Contexto – Enfermagem**, v. 29, p. 1-17, 2020.

RIBEIRO, J. L. P. Revisão de Investigação Científica. **Psicologia, Saúde & Doenças**, Lisboa, v. 15, n. 3, p. 671-682, 2014.

SOUZA, M. T.; SILVA, M. D.; CARVALHO, R. Revisão integrativa: o que é e como fazer. **Einstein (São Paulo)**, v. 8, p. 102-106, 2010.

YUAN, L; CHEN, S; XU, Y. Donning and doffing of personal protective equipment protocol and key points of nursing care for patients with COVID-19 in ICU. **Stroke And Vascular Neurology**, v. 5, n. 3, p. 302-307, 2020.

CAPÍTULO 35

CUIDADOS DE ENFERMAGEM NO PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIA CARDÍACA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c35](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c35)

Samilly Sousa de Oliveira¹, Stefanny Almeida Moura², Vitória Raiane Gomes Aquino³,
Givanildo Carneiro Benicio⁴

¹Centro Universitário Maurício de Nassau/UNINASSAU, (samillyssoliveira@gmail.com)

²Centro Universitário Maurício de Nassau/UNINASSAU,
(stefanny.almeida.moura@gmail.com)

³Centro Universitário Univeritas/UNIVERITAS, (vitoriaaquino222@gmail.com)

⁴Centro Universitário Maurício de Nassau/UNINASSAU, (givanildobenicio.c@gmail.com)

Resumo

Objetivo: Identificar na literatura científica os cuidados de enfermagem no pós-operatório de cirurgia cardíaca na Unidade de Terapia Intensiva. **Método:** Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, realizada entre junho e julho de 2021, por meio de buscas nos seguintes bancos de dados: Bases de Dados de Enfermagem (BDENF), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System on-line (MEDLINE). Foram utilizados como descritores (DeCS) as seguintes expressões: “Cirurgia Cardíaca”, “Cuidados de Enfermagem” e “Cuidados Pós-operatório” e conectadas através do operador booleano AND para definição da amostra. Após a aplicação dos filtros e refinamento de títulos e resumos, obteve-se como resultado 12 artigos que compuseram o corpus de análise deste estudo. **Resultados e Discussão:** Após a análise dos estudos e organização dos dados foi possível destacar as seguintes categorias: cuidados de enfermagem ao paciente no pós-operatório de cirurgia cardíaca, qualificação profissional para o cuidado ao paciente no pós-operatório de cirurgia cardíaca e complicações no pós-operatório de cirurgia cardíaca. **Considerações Finais:** Este estudo possibilitou identificar a importância da prática assistencial necessária para uma atenção à identificação e ao atendimento das necessidades específicas de cada paciente no pós-operatório de cirurgia cardíaca.

Palavras-chave: Cirurgia Cardíaca; Cuidados de Enfermagem; Cuidados Pós-operatório.

Área Temática: Ciências da Saúde.

E-mail do autor principal: samillyssoliveira@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

As cirurgias cardíacas são cirurgias de grande porte, destacando a revascularização miocárdica e as trocas valvares. Para a realização da cirurgia os pacientes são submetidos a uma série de exames e testes no período pré-operatório, a fim de que não haja surpresas e complicações. A Organização Mundial da Saúde (OMS), destaca que uma das causas mais recorrentes de morte no mundo, inclusive no Brasil, são problemas cardíacos, relacionados à má circulação sanguínea (ROCHA, *et al.* 2010).

O paciente que é submetido a cirurgia cardíaca necessita de um pós-operatório eficiente, onde diversos protocolos são instituídos com o intuito de evitar complicações após o procedimento cirúrgico. O monitoramento dos sinais vitais se faz necessário de hora em hora, principalmente quando o paciente apresenta doenças sistêmicas, onde o tempo de internação pode aumentar se fazendo necessário o uso de ventilação mecânica por um tempo maior do que as primeiras horas do pós-operatório imediato (LAIZO; DELGADO; ROCHA, 2010).

A execução de cirurgias desse porte necessita de cuidados imediatos (24 horas antes) e imediatos (24 horas após a cirurgia) essa atenção é desenvolvida na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde cuidados específicos são realizados para a qualidade do tratamento. Nesse contexto, a equipe de enfermagem atua de forma ativa fazendo observações, monitorando a estabilidade hemodinâmica, avaliação do padrão respiratório, entre outros. Se faz presente desde os cuidados imediatos prevenindo complicações até o período de alta do paciente (MARCIA, *et al.* 2021).

A realização da cirurgia cardíaca pode prolongar o tempo de vida de muitas pessoas, as quais são acometidas por problemas circulatórios e que necessitam deste procedimento, pois na grande maioria dos casos o tratamento clínico em si não tem grande eficiência na doença do usuário. A cirurgia reconstrutora é a mais comum onde é realizada a revascularização do miocárdio (MEDEIROS, *et al.* 2012).

Diante disso, a complexidade de cuidados requeridos pelos pacientes no período pós-operatório de cirurgia cardíaca e a equipe de enfermagem é de suma importância para a recuperação do paciente garantindo uma assistência de qualidade com a eficiência do procedimento e boa recuperação do cliente. Por isso, as intervenções de enfermagem são baseadas e fundamentadas na Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), pois ela traz uma estrutura lógica de ações para a organização da assistência de enfermagem e assim de modo a intervir com as reais necessidades do paciente e assim, promover uma rápida e boa recuperação ao paciente (CARVALHO, I.M. *et al.* 2016).

Tendo em vista a severidade das doenças cardíacas e sua importância, surge a necessidade de falar sobre o trabalho da equipe de enfermagem e sobre a complexidade dos cuidados necessários ao paciente em pós-operatório de cirurgia cardíaca, o desenvolvimento de assuntos com esse tema pode subsidiar o olhar individualizado sobre as necessidades de cada paciente e a importância da equipe no auxílio de sua recuperação. O presente se justifica pela importância de se conhecer os cuidados de enfermagem ao paciente no pós-operatório de cirurgia cardíaca para uma conduta rápida e eficaz.

Assim, o objetivo deste estudo é identificar na literatura científica os cuidados de enfermagem no pós-operatório de cirurgias cardíacas na UTI.

2 MÉTODO

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura. Esse tipo de estudo caracteriza-se como uma categoria que tem como finalidade sumarizar resultados obtidos em pesquisas sobre determinado tema ou questão, de maneira sistemática, ordenada e abrangente, oferecendo suporte para a tomada de decisão e a melhoria da prática clínica (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2019).

Para a elaboração deste estudo, foram utilizadas as seguintes etapas: delimitação do problema e do objetivo da pesquisa; elaboração da pergunta norteadora; estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão dos artigos (seleção da amostra); busca na literatura (obtenção dos dados); análise e categorização dos estudos; análise e interpretação dos resultados. O presente estudo norteou-se através da seguinte pergunta norteadora: Quais os cuidados de enfermagem no pós-operatório de cirurgia cardíaca?

Para levantamento dos artigos na literatura, realizou-se uma busca entre junho e julho de 2021, nas seguintes bases de dados: Bases de Dados de Enfermagem (BDENF), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System on-line (MEDLINE). Foram utilizados como descritores (DeCS) as seguintes expressões: “Cirurgia Cardíaca”, “Cuidados de Enfermagem” e “Cuidados Pós-operatório” e conectadas através do operador booleano AND para definição da amostra.

Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos artigos foram: pesquisa científica publicada em formato de artigo, nos idiomas português, inglês e espanhol, disponível nos referidos bancos de dados nos últimos dez anos. Para os critérios de exclusão, utilizou-se: publicações duplicadas e repetidas, revisões bibliográficas, integrativas e sistemáticas e estudos que não concordassem com o objetivo proposto.

Para análise dos dados foi realizada uma leitura crítica e reflexiva dos títulos e resumo de cada artigo encontrado, a fim de verificar a sua adequação com a questão norteadora e

obedecendo todos os critérios de inclusão e exclusão apresentados, assim obteve-se a amostra final de 12 artigos, conforme mostra a figura 1, a seguir.

Figura 1. Síntese dos estudos incluídos na revisão integrativa.

Fonte: Autores, 2021.

Para extração e organização dos dados, os autores desenvolveram um formulário sobre os aspectos variáveis identificados na pesquisa, contemplando, assim: autor, ano, local, periódicos, objetivo e principais resultados; cuidados de enfermagem ao paciente no pós-operatório de cirurgia cardíaca, qualificação profissional e complicações no pós-operatório de cirurgia cardíaca.

A necessidade de sumarização dos dados deu-se em virtude das divergências e aproximações dos conteúdos identificados nos estudos. A análise dos dados deu-se a partir do método de redução, onde os achados foram divididos em três subcategorias temáticas, considerando, cuidados de enfermagem ao paciente no pós-operatório de cirurgia cardíaca, qualificação profissional e complicações no pós-operatório de cirurgia cardíaca. A exposição desta revisão foi promovida por meio de quadros sinópticos descritivos, contemplando as variáveis pertinentes à sapiência do objeto de pesquisa e posterior discussão com a literatura pertinente, apresentadas nas seções a seguir.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a amostra final de 12 artigos, os autores elaboraram um quadro sobre os aspectos identificados na pesquisa, com a finalidade de extração de dados, contemplando, assim: autor e ano, local e periódico de publicação, objetivo e principais resultados. (Quadro 1)

Quadro 1. Dados bibliográficos dos estudos selecionados nesta revisão, Fortaleza, Ceará, Brasil.

Codificação	Autores e Ano	Local e Periódico	Objetivo	Principais resultados
A1	Miranda, <i>et al.</i> (2011)	São Paulo. Rev. Esc. Enferm USP.	Analisar as alterações nos sinais vitais de pacientes em pós-operatório de cirurgias cardíacas, mediante intensidade de dor referida.	Diante deste estudo foi possível identificar que o cuidado prestado é imprescindível ao restabelecimento do estado de saúde do paciente no pós-operatório de cirurgia cardíaca.
A2	Ribeiro, K.R.A. (2017)	Piauí. Rev. Enfermagem da UFPI.	Discorrer sobre as complicações presentes no pós-operatório de revascularização do miocárdio.	Evidenciou-se com este estudo que o conhecimento e identificação das complicações associadas ao pós-operatório de revascularização do miocárdio contribui para a redução do tempo de internação.
A3	Laizo, A.; Delgado, F.E.F.; Rocha, G.M. (2010)	Minas Gerais. Rev. Bras. Cirurgia Cardiovascular.	Apresentar as complicações que aumentam a permanência na UTI dos pacientes submetidos à cirurgia cardíaca.	O presente estudo mostrou que as complicações aumentam de acordo com o tempo de internação e que podem ser relacionadas a função respiratória, a instabilidade hemodinâmica e outros.
A4	Rabelo, A.C.S.; Souza, F.V.F.S.; Silva, L.F. (2017)	Ceará. Revista Gaúcha de Enfermagem.	Conhecer a contribuição da teoria de Watson para o cuidado de enfermagem dirigido ao ser com cardiopatia no pós-operatório de cirurgia cardíaca.	Observou-se que ao utilizar a teoria de Watson no cuidado ao ser com cardiopatia no pós-operatório, foi possível compreender a importância do cuidado transpessoal.
A5	Reisdorfer A.P.; Leal, S.M.C.; Mancina, J.R. (2021)	Rio Grande do Sul. Revista Brasileira de Enfermagem.	Investigar os nós críticos relacionados ao cuidado de enfermagem ao paciente no pós-operatório de cirurgia cardíaca.	Foram identificados os nós críticos e assim a sugestão de investimento em estratégias de educação permanente, criação de instrumentos que orientem a assistência de enfermagem.
A6	Pivoto, F.L. <i>et al.</i> (2010)	Rio Grande do Sul. Acta Paul Enfermagem.	Identificar diagnósticos de enfermagem presentes em pacientes no período pós-operatório de cirurgias cardíacas.	A identificação de diagnósticos de enfermagem nos pacientes em pós-operatório permite um direcionamento no cuidado prestado ao paciente.
A7	Chen, Qiu-Yu <i>et al.</i> (2020)	China. Journal of Cardiothoracic Surgery.	Avaliar o efeito das intervenções de enfermagem contínua no cuidado do pós-operatório de cirurgias cardíacas.	Notou-se que os pacientes com intervenção de cuidados contínuos tiveram uma boa recuperação e que auxiliaram melhora da qualidade de vida.
A8	Lira, A.L.B.C <i>et al.</i> (2012)	Rio Grande do Norte. Revista Rene.	Identificar os cuidados realizados pelos enfermeiros, na UTI e	Este estudo revelou que o conhecimento da prática do enfermeiro frente ao paciente

			compará-los ao evidenciado na literatura.	em pós-operatório de cirurgia cardíaca é de suma importância para identificar falhas na realização desse cuidado.
A9	Duarte, S.C.M. <i>et al.</i> (2012)	Brasil. Esc. Anna Nery.	Descrever as necessidades do paciente no pós-operatório de cirurgia cardíaca identificadas pelos enfermeiros e discutir o cuidado de enfermagem.	Evidenciou-se que a aplicação do processo de enfermagem, valoriza a necessidade da adoção de uma metodologia na assistência de enfermagem durante o pós-operatório de cirurgia cardíaca.
A10	Santos, A.P.A. <i>et al.</i> (2016)	São Paulo. Rev. Esc. Enfermagem USP.	Identificar as competências dos enfermeiros atuantes no pós-operatório de cirurgia cardíaca e as estratégias implementadas para a mobilização dessas competências.	Observou-se necessidade de qualificação para futuros enfermeiros e sobre a necessidade de implementação de programas que visam desenvolver competências nestes profissionais.
A11	Oliveira, D.C. <i>et al.</i> (2010)	São Paulo. Arq. Brasileiro de Cardiologia.	Avaliar a prevalência, a evolução hospitalar e o prognóstico de pacientes que apresentaram sepse no pós-operatório de cirurgia cardíaca.	Notabilizou-se com esse estudo que a complicação de sepse foi considerada rara, e que medidas devem ser aplicadas aos pacientes, pois ajuda na redução da morbidade e mortalidade.
A12	Carvalho, I.M. <i>et al.</i> (2016)	Rio de Janeiro. Rev. Fund. Care Online.	Levantar diagnósticos de enfermagem segundo a taxonomia II da NAND Internacional.	O estudo evidenciou que a SAE, é fundamental no levantamento de diagnósticos de enfermagem para um cuidado individualizado e eficaz.

Fonte: Autores, 2021.

Diante da análise e interpretação dos estudos, emergiram três categorias: cuidados de enfermagem ao paciente no pós-operatório de cirurgia cardíaca, qualificação profissional para o cuidado ao paciente no pós-operatório de cirurgia cardíaca e complicações no pós-operatório de cirurgia cardíaca.

A tabela 1, a seguir, especifica os estudos de acordo com cada categoria.

Tabela 1. Artigos distribuídos por categoria. Fortaleza, Ceará, Brasil, 2021.

Categoria	Artigos	Total
Cuidados de enfermagem ao paciente no pós-operatório de cirurgia cardíaca.	A1, A4, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12.	9
Qualificação profissional para o cuidado ao paciente no pós-operatório de cirurgia cardíaca.	A4, A5, A6, A8, A9, A10.	6

Complicações no pós-operatório de cirurgia cardíaca.	A2, A3, A5, A7, A9, A11.	6
--	--------------------------	---

Fonte: Autores, 2021.

A tabela 2, a seguir, mostra a frequência e a porcentagem das categorias obtidas na amostra de artigos.

Tabela 2. Frequência e percentual de artigos distribuídos por categoria. Fortaleza, Ceará, Brasil 2021.

Categoria	Frequência	Porcentagem
Cuidados de enfermagem ao paciente no pós-operatório de cirurgia cardíaca.	9	75%
Qualificação profissional para o cuidado ao paciente no pós-operatório de cirurgia cardíaca.	6	50%
Complicações no pós-operatório de cirurgia cardíaca.	6	50%

Fonte: Autores, 2021.

3.1 Cuidados de enfermagem ao paciente no pós-operatório

O cuidado ao paciente após cirurgia cardíaca é uma atividade distribuída entre a equipe multiprofissional, porém a equipe de enfermagem, por ser um contingente relevante quando se fala sobre cuidados, merecem atenção. As atividades desenvolvidas no cuidado de enfermagem, tem como base para o cuidado ao paciente no pós-operatório cardíaco a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), que vão desde a coleta de informações sobre o paciente ainda na sala de cirurgia, o preparo da unidade para admissão do paciente até a assistência propriamente dita e alta da unidade (CARVALHO, *et al.* 2016).

Para Oliveira, *et al.* (2012), durante o período de internação do paciente, que vai desde a admissão até a alta, o enfermeiro está lado a lado do mesmo e dos familiares e isso auxilia na observação direta com a finalidade de identificar resposta humanas e traçar diagnósticos de enfermagem para construir o plano de cuidados de forma individualizada e personalizada, a depender do tipo de pós-operatório, ou seja, imediato, mediato ou tardio.

De acordo com o estudo de Duarte, *et al.* (2012) cuidados de enfermagem identificados nesse cenário, podem ser referentes à manutenção do débito cardíaco, da integridade tecidual, do equilíbrio hidroeletrólítico e da oxigenação. Dentro de cada um desses itens, existem cuidados específicos, como: monitorização cardíaca, balanço hídrico, administração de hemoderivados, mudanças de decúbito, uso de curativos protetores, avaliar as condições da pele, observar necessidade de reposição hídrica, coletar e avaliar exames laboratoriais, oferecer oxigenoterapia conforme necessidade, e outros.

O paciente quando submetido à cirurgia cardíaca necessita da utilização de ventilação mecânica no período pós-operatório imediato, em torno de 24 horas após a cirurgia, sendo o período mais crítico que exige uma maior observação da equipe envolvida nos cuidados. Neste sentido, existe uma preocupação ao desenvolver e implementar um protocolo de prevenção de aspiração para pacientes após cirurgia cardíaca, com intenção de reduzir a ocorrência de pneumonia associada à ventilação mecânica (PIVOTO, *et al.* 2010).

Outro cuidado realizado pela equipe de enfermagem, é a prevenção de infecção, devido a fragilidade dos pacientes. Como método adotado é utilizado o protocolo de lavagem das mãos, o uso adequado dos equipamentos de proteção individual e manutenção das técnicas assépticas, a fim de evitar internações desnecessárias (LIRA, *et al.* 2012).

Segundo o estudo de Miranda, *et al.* (2011) alterações podem estar ligadas a dor, por isso, dentro dos cuidados de enfermagem destacamos o controle da dor, já que a mesma influencia as respostas neurovegetativas, e que quando associada a ansiedade, aumenta a frequência cardíaca, o consumo de oxigênio e assim pode gerar uma das complicações frequentes no pós-operatório, a taquicardia sinusal. Para cuidados de controle da dor, além da administração de analgésicos prescritos deve-se estar atento ao manuseio no momento do banho no leito, na troca de curativos, entre outros.

3.2 Qualificação profissional para o cuidado ao paciente no pós-operatório de cirurgia cardíaca

A participação da equipe de enfermagem em unidades hospitalares de grande complexidade está cada vez maior, com isso urge a necessidade de profissionais competentes. Em unidades de pós-operatório cardíaca o enfermeiro assume papel de liderança desenvolvendo diversas práticas de enfermagem, além de atuar no processo de organização, habilidades e assistência ao paciente (SANTOS, *et al.* 2016).

O cuidado da equipe de enfermagem ao paciente pós cirurgia cardíaca é essencial. Além de atuar na realização de procedimentos técnicos, o enfermeiro tem que estar atento à evolução do quadro clínico do paciente. Os enfermeiros que atuam no cuidado do paciente no pós-operatório de cirurgia cardíaca receberam apenas a formação através de sua qualificação profissional ou pelo tempo de experiência, sendo necessário pesquisas e formação ao longo da profissão (LIRA, *et al.* 2012).

Segundo Reisdorfer; Leal; Mancia (2021) o déficit de conhecimento está aliado a necessidade de maior investimento em estratégias de educação permanente em saúde, sendo uma das principais queixas dos colaboradores das unidades de saúde. Além disso, destacam-se também as necessidades de os profissionais antigos realizarem práticas educativas com a

finalidade de repassar seu conhecimento aos outros profissionais dentro do ambiente de trabalho e durante o período de trabalho.

3.3 Complicações no pós-operatório de cirurgia cardíaca

Diante do estudo de LIRA, *et al.* (2012) evidenciou-se que a assistência de enfermagem para o paciente no pós-operatório deve ter em vista a recuperação da anestesia e cirurgia, prevenção e identificação precoce de complicações.

Uma das complicações encontradas nesse tipo de caso é a evolução do paciente para a sepse. A sepse em pacientes pós-cirúrgicos cardíacos é uma das causas que contribuem para o aumento da morbidade e mortalidade. Embora a sepse seja considerada como uma complicação de baixo domínio, suas consequências são graves podendo evoluir para a insuficiência renal aguda, insuficiência cardíaca dentre outros (OLIVEIRA, *et al.* 2010).

De acordo com o estudo de Oliveira, *et al.* (2010) pacientes que apresentam quadros de sepse, é utilizado o tratamento de sepse severa, que consiste em procedimentos que atuam no controle do quadro e na regulação dos padrões hemodinâmicos. As infecções de pós-operatório de cirurgia cardíaca contribuem para elevação da morbidade e mortalidade, do tempo de permanência na UTI e no hospital

O tratamento de sepse severa, está fundamentado nos seguintes procedimentos: ressuscitação volêmica agressiva e precoce, antibioticoterapia precoce, manutenção da hemoglobina acima de 8 gramas, administração de hemoderivados, ventilação mecânica adequada, sedação, analgesia, entre outros métodos. Esse tratamento contribui para a redução da morbidade e mortalidade da sepse severa em situações clínicas diversas (OLIVEIRA, *et al.* 2010).

4 CONCLUSÃO

Com a elaboração deste estudo foi possível identificar que para que o enfermeiro realize uma prática assistencial eficiente faz-se necessário uma atenção à identificação e ao atendimento das necessidades específicas de cada paciente dentro do pós-operatório de cirurgia cardíaca. Assim, para o direcionamento de suas condutas, o enfermeiro utiliza métodos científicos como a sistematização da assistência de enfermagem (SAE), que fornece subsídios para a elaboração de planos de cuidados, implementação das intervenções e avaliação de acordo com as necessidades do cliente e seus familiares.

Com isso, conclui-se que a identificação cabe ao enfermeiro ter habilidades que permitam que o cuidado prestado seja realizado de forma genuína, com amor, praticado com senso de responsabilidade, que deve permear cada ação de cuidado, cada atitude intencional, preocupação e atenção, resultando em ações eficazes para a resolução de problemas.

REFERÊNCIAS

- CARVALHO, I.M. *et al.* Sistematização de enfermagem no pós-operatório mediato de cirurgia cardíaca. **Rev. Fund. Care Online**, Rio de Janeiro, v. 8, n. 4, p. 5062-5067. 2016.
- CHEN, QIU-YU *et al.* Effect of continuous nursing interventions on valve noise-related anxiety and quality of life in patients who underwent mechanical mitral valve replacement. **Journal of Cardiothoracic Surgery**, China, (2020) 15:72.
- DUARTE, S.C.M. *et al.* O cuidado de enfermagem no pós-operatório de cirurgia cardíaca: um estudo de caso. **Esc. Anna Nery**, v. 16, n. 4, p. 657-665. 2012.
- LAIZO, A.; DELGADO, F.E.F.; ROCHA, G.M. Complicações que aumentam o tempo de permanência na unidade de terapia intensiva na cirurgia cardíaca. **Rev. Bra. Cirurgia Cardiovascular**, Minas Gerais, v. 25, n. 2, p.166-171. 2010.
- LIRA, A.L.B.C. *et al.* Mapeamento dos cuidados de enfermagem para pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca. **Rev. Rene**, Rio Grande do Norte, v.13, n. 5, p. 1171-1181. 2012.
- MENDES, K. D. S.; SILVEIRA, R. C. C. P.; GALVÃO, C. M. Uso de gerenciador de referências bibliográficas na seleção dos estudos primários em revisão integrativa. **Texto & Contexto-Enfermagem**, Florianópolis, v. 28, 2019
- MIRANDA, A.F.A. *et al.* Avaliação da intensidade da dor e sinais vitais no pós-operatório de cirurgia cardíaca. **Rev. Esc. Enferm. USP**, São Paulo, v. 45, n. 2, p. 327-333. 2011.
- OLIVEIRA, D.C. *et al.* Sepsis no pós-operatório de cirurgia cardíaca: descrição do problema. **Arq. Bras. Cardiologia**, São Paulo, v. 94, n. 3, p. 352-356. 2010.
- PIVOTO, F.L. *et al.* Diagnósticos de enfermagem em pacientes no período pós-operatório de cirurgias cardíacas. **Acta Paul Enferm**, Rio Grande do Sul, v. 23, n. 5, p. 665-670. 2010.
- RABELO, A.C.S.; SOUZA, F.V.F.S.; SILVA, L.F. Contribuição do cuidado transpessoal ao ser-cardiopata no pós-operatório de cirurgia cardíaca. **Rev. Gaúcha de Enfermagem** Ceará, 2017;38(4):e64743.
- REISDORFER, A.P.; LEAL, S.M.C.; MANCIA, J.R. Nursing care for patient in post operatory heart surgery in the intensive care unit. **Rev. Brasileira de Enfermagem**, Rio Grande do Sul, 2021;74(2):e20200163.
- RIBEIRO, K.R.A. Postoperative complications of coronary artery bypass grafting: implications for the nursing practice. **Rev. Enfermagem da UFPI**, Piauí, v. 6, n. 3, p. 59-64. 2017.
- SANTOS, A.P.A. *et al.* Nurses in post-operative heart surgery: professional competencies and organization strategies. **Rev. Esc. Enfermagem USP**, São Paulo, v. 50, n. 3, p. 472-478. 2016.

CAPÍTULO 36

CUIDADOS PALIATIVOS COMO FERRAMENTA DE RECUPERAÇÃO DA ESSÊNCIA DO PROCESSO DE MORRER

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c36](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c36)

Glória Vanessa De Araujo Silva Sousa¹, Francisco Marcos Moreira Araújo², Isaque Lopes Missias³, Maria Aparecida Melo Moraes⁴, Matheus Gomes Andrade⁵, Socorro Taynara Araújo Carvalho⁶, Marília Vasconcelos Costa⁷, Venícius Bernardo do Nascimento⁸, Ana Cecília Carvalho Soeiro⁹, Andre Sousa Rocha¹⁰

¹ Faculdade Princesa Do Oeste, (gloria.tamboril@gmail.com)

² Faculdade Princesa Do Oeste, (marcosmoreira@gmail.com)

³ Faculdade Princesa Do Oeste, (isaquelopes943@gmail.com)

⁴ Faculdade Princesa Do Oeste, (maria.aparecida@alu.fpo.edu.br)

⁵ Faculdade Princesa Do Oeste, (matheusgoms15@gmail.com)

⁶ Centro Universitário Inta - Uninta, (carvalhotaynara44@gmail.com)

⁷ Universidade Federal do Ceará, (mariliavc111@gmail.com)

⁸ Universidade Federal do Ceará, (bernardopsi@alu.ufc.br)

⁹ Universidade Federal do Ceará, (anaceciliasoeiro@gmail.com)

¹⁰ Universidade São Francisco, (andresousarocha9@gmail.com)

Resumo

Objetivo: O principal objetivo deste estudo é compreender, a partir da literatura nacional, os cuidados paliativos como estratégias para amenizar o sofrimento por meio da assistência no processo de morrer. **Método:** Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura que foi realizado em Maio de 2021. Para isso, foi conduzida uma busca na Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde e das bibliotecas virtuais *Scientific Electronic Library Online* e biblioteca do conhecimento *on-line* com o descritor cadastrado nos Descritores em Ciências da saúde cuidados paliativos e da palavra-chave morrer. Foi utilizado o operador booleano AND. A partir disso, encontraram-se 131 artigos. Na fase de triagem, foram descartados 107 estudos, por não se enquadrarem na proposta, restando então 24 trabalhos. Após uma nova análise, foram eliminados 14 estudos. Dessa forma, restaram 10 para compor a análise final. **Resultados:** Os cuidados paliativos baseiam-se no fornecimento de comunicação eficaz e o diálogo sobre o prognóstico é a característica básica. Entender tal fato

é essencial para determinar as decisões de tratamento que promovem o consentimento preferencial dos pacientes e familiares. **Conclusões:** O estudo permitiu uma oportunidade singular de aprofundar conhecimentos sobre cuidados paliativos no paciente em fase terminal ou qualquer sofrimento antes da morte, destacando a espiritualidade como ferramenta essencial para que esse cuidado ocorra de forma humanizada e com maior sensibilização por parte do profissional.

Palavras-chave: Assistência Paliativa; Fim da Vida; Processo Saúde-Doença

Área Temática: Ciências da saúde.

E-mail do autor principal: gloria.tamboril@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

Os cuidados paliativos são considerados práticas holísticas a todos os indivíduos, independente da faixa etária, mas que possua em comum potenciais sofrimentos relacionados à saúde, especialmente, associados ao fim da vida. Dessa forma, o principal objetivo dessa prática é melhorar o bem-estar do paciente, além de seus familiares e cuidadores. Assim, o conforto e qualidade de vida são propostos de maneira individual e da forma mais adequada a cada paciente, de modo que possa respeitar sua religião, crenças, pensamentos e, não menos importante, deve atender às necessidades para as quais o paciente demandar (GOMES & OTHERO, 2016; OLIVEIRA, 2019).

Nesse sentido, os cuidados paliativos englobam uma série de atividades. Dentre elas, destacam-se ações que objetivam fornecer apoio para subsidiar os pacientes a viver de forma mais plena até a morte e facilitar a comunicação eficaz, de maneira a ajudar esses pacientes bem como seus familiares a pensarem juntos em objetivos para o cuidado. Existe também a não pretensão em prolongar nem adiar a morte, pois uma das premissas dos cuidados paliativos é a afirmação da vida e o reconhecimento da morte como um processo natural e biológico. Além disso, os cuidados podem ser aplicados em ambientes hospitalares ou domiciliar e em todos os níveis da assistência, ou seja, desde o primário e pode se estender ao terciário (MAINGUÉ *et al.*, 2020)

A partir dessa perspectiva, os cuidados paliativos estabelecem relações estreitas com os princípios da bioética: beneficência, não maleficência, autonomia e a justiça. A beneficência e não maleficências são respaldadas pela concepção de que não se deve utilizar equipamentos ou tecnologias que afetem negativamente a saúde do indivíduo. Logo, deve-se pensar em práticas alternativas que tratam o paciente de forma pouco ou nada agressiva. Com isso, o principal foco desses princípios está associado ao bem-estar do paciente. A autonomia

envolve a participação ativa da pessoa em seu processo saúde-doença. Nessa direção, o paciente precisa concordar com o direcionamento do tratamento e se certificar de que está ciente das etapas que irá passar. Em casos em que o paciente não tem tal autonomia, a família deverá ser consultada. Por fim, a justiça é pautada pelo não aceleração nem adiamento da morte, encarando-a como um processo natural da vida (PAIVA; JUNIOR & DAMÁSIO, 2014).

O entardecer da vida é um momento único, pessoal e intransferível uma vez que ninguém pode viver a terminalidade da vida pelo outro. A própria percepção de terminalidade é individual e remete a estruturas construídas internamente que balizam a compreensão sobre vida e morte (CLOS & GROSSI, 2016). Por isso, os fundamentos que regem os cuidados paliativos se apresentam como auxiliares. Desse modo, torna-se mais fácil viabilizar um caminho, no qual fique compreensivo perceber que a morte está chegando e que este processo faz parte da vida (AMARAL & SILVA, 2019).

Acredita-se que para tal compreensão é preciso desconstruir a concepção que a morte apresenta e a maneira como ela é evidenciada, mostrando-a apenas como o fim de um ciclo. Pode-se, analogicamente, comparar-se com o apagar de uma vela, ou até mesmo, mais uma etapa da vida que todo e qualquer indivíduo irá experimentar, e a forma que está vai ser vivida e sentida acontecerá de acordo com a forma que é enxergada, podendo ser calma e tranquila ou assustadora e conturbada (MONTEIRO *et al.*, 2010).

Diante das colocações mencionadas, o principal objetivo deste estudo é compreender, a partir da literatura nacional os cuidados paliativos como estratégias para amenizar o sofrimento por meio da assistência no processo de morrer.

2 MÉTODO

Trata-se de um estudo de Revisão Integrativa da Literatura de cunho qualitativo. Esse tipo de estudo é um método que permite realizar a síntese dos conhecimentos adquiridos, assim como fazer um mapeamento bibliográfico. É uma revisão mais ampla que inclui metodologias de estudos experimentais e não experimentais para compreender o fenômeno que está em análise (SOUZA; SILVA & CARVALHO, 2010).

Recomenda-se seguir algumas etapas para que seja viável a execução de uma revisão integrativa, por exemplo, definir o objetivo de estudo e formular a pergunta de pesquisa; definir os critérios de inclusão e exclusão e como acontecerá a busca na literatura; coletar e organizar as informações encontradas; refletir e avaliar criticamente as informações colhidas, discutir e apresentar a revisão integrativa de literatura (MENDES; SILVEIRA & GALVÃO, 2008).

Inicialmente, por meio da estratégia PICO (acrônimo de população, interesse e contexto), formulou-se a pergunta de partida. A sintaxe de aplicação de tal estratégia pode ser vista no Quadro 1, que apresenta a descrição dos acrônimos correspondentes ao estudo além dos Descritores em Ciência da Saúde (DeCS), que foram utilizados na estratégia de busca.

Quadro 1 - Estratégia PICO

Etapas	Definição	Descrição	Descritores em Ciências da Saúde (DeCS)
P	População	Paciente em cuidado paliativo	Cuidados paliativos and morrer
I	Interesse	Cuidados paliativos	Cuidados paliativos and morrer
Co	Contexto	Processo de morrer	Cuidados paliativos and morrer

Fonte: Autores, 2021.

De modo a seguir a estratégia PICO, intitulou-se o primeiro elemento (P) para Paciente em cuidado paliativo; o segundo (I) para Cuidados paliativos e o terceiro (Co) relacionada-se aos Processo de morrer. Diante disso, a pergunta norteadora do estudo reflete a seguinte questão: Como os cuidados paliativos se relacionam e mostram o processo de morte?

A busca de estudos aconteceu em maio de 2021 a partir da base de dados: Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde (LILACS), e das bibliotecas virtuais *Scientific Electronic Library Online* (SciELO) e biblioteca do conhecimento *on-line* (B-on). No que toca aos descritores, selecionaram-se cuidados paliativos e morte com dignidade, ambos controlados nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). Ademais, foi aplicado o operador booleano AND para unificar os termos e recuperar o máximo de artigos sobre as informações preteridas (Quadro 2). Destaca-se que morte com dignidade não retornava os resultados esperados, portanto utilizou-se a palavra chave morrer.

Quadro 2 - Aplicação da estratégia de busca.

Data	Base de Dados	Estratégia	Termos de Busca	Resultados
21 05	B-on	PICo	Cuidados paliativos and morrer	105
21 05	Lilacs	PICo	Cuidados paliativos and morrer	19
21 05	Scielo	PICo	Cuidados paliativos and morrer	6

Fonte: Autores, 2021.

Os critérios de inclusão para a extração de artigos estavam relacionados a trabalhos que abordavam a temática proposta, publicados a partir de 2016, por considerar que são publicações atualizadas sobre a temática, disponíveis no formato completo na íntegra. Em contrapartida, optou-se por excluir trabalhos que não abordaram o tema proposto, publicados em outros idiomas, duplicados, não disponíveis para leitura completa e literatura não avaliada por pares, ou seja, teses, dissertações, capítulos de livro, editorial, dentre outros que não passaram por critérios rigorosos de avaliação.

Foram encontrados, inicialmente, 131 artigos, sendo seis na Scielo, 19 na LILACS e 105 no B-on. Na fase de identificação, excluíram-se seis na Scielo, 16 na LILACS e 85 no B-on. Assim, na triagem restaram 24 artigos. Desses, 14 foram eliminados por não atender os critérios de inclusão e não abordavam a temática e não apresentavam relatos do processo de morte ativo. Por fim, restaram 10 artigos para compor a análise final deste estudo.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O quadro 3 abaixo sintetiza as principais informações reportadas nos estudos e dividiu-se em quatro categorias com autor(es), ano de publicação do estudo, título do estudo, principais resultados e tipo de estudo.

Quadro 3 – Principais informações extraídas dos artigos selecionados

Autor(es)	Ano	Título	Principais resultados	Tipo de Estudo
------------------	------------	---------------	------------------------------	-----------------------

Andréa Carolina Benites, Carmen Maria Bueno Neme, Manoel Antônio dos Santos, Andréa Carolina Benites, Carmen Maria Bueno Neme, Manoel Antônio dos Santos.	2017	Significados da espiritualidade para pacientes com câncer em cuidados paliativos	Compreensão sobre a importância da dimensão espiritual para que pessoas em condições de extrema vulnerabilidade consigam sobreviver à dor e ao sofrimento cotidiano, ressignificando, a cada momento, as experiências que vivem.	Estudo qualitativo
Michelle Bertóglio Clos, Patricia Krieger Grossi	2016	Desafios para o cuidado digno em instituições de longa permanência	Ampliação dos cuidados paliativos a idosos institucionalizados, proteção social e a implantação de estruturas adequadas	Estudo qualitativo
Isabel Cristina de Oliveira Arrieira, Maira Buss Thofern, Adrize Rutz Porto, Simone Coelho Amestoy, Daniela Habekost Cardoso.	2016	Espiritualidade e o processo de morrer: reflexões de uma equipe interdisciplinar de cuidados paliativos	Os profissionais recebem pouca orientação em relação ao cuidado das necessidades espirituais durante o processo de formação. E a falta de desenvolvimento de competências para abordar tal assunto tanto com o paciente como com a sua família.	Estudo qualitativo
Tiago Henrique Souza Amaral, Betânia Eneida de Moraes Silva.	2019	Os cuidados paliativos: alternativa e possibilidade de amparo e de dignidade diante do morrer	Planos individualizados de cuidado para os pacientes em fase terminal, visando confortar o paciente e familiares/cuidador, e tornar a passagem mais branda.	Estudo quantitativo
Fernanda Schaefer	2020	A importância da implantação dos cuidados paliativos no Sistema Único de Saúde	A efetivação dos cuidados paliativos em todos os níveis da atenção à saúde, de modo a proporcionar autonomia e dignidade aos pacientes.	Estudo quantitativo

Carlos Costa Gomes, Antônio Jácomo	2020	Porquê o cuidado paliativo	Redes de cuidados que disponham de meios adequados para oferecer suporte e propiciar uma morte digna	Estudo quantitativo
Maria do Bom Parto de Oliveira, Nauã Rodrigues de Souza, Magaly Bushatsky, Bruno Felipe Remígio Dâmaso, Dayse Medeiros Bezerra, José Anchieta de Brito.	2017	Atendimento domiciliar oncológico: percepção de familiares/cuidadores sobre cuidados paliativos	Resgatar a importância dos cuidados paliativos no domicílio como possibilidade de minimizar o impacto do sofrimento com a doença e assegurar a dignidade no processo de morrer.	Estudo qualitativo
Mary Rute Gomes Esperandio, Tiago Silva Rosa.	2020	Avaliação da espiritualidade/ religiosidade de pacientes em cuidados paliativos	Urgência na promoção de políticas públicas voltadas ao estabelecimento dos cuidados paliativos.	Estudo quantitativo
Amanda Valério Espíndola, Alberto Manuel Quintana, Camila Peixoto Farias, Mikaela Aline Bade München.	2018	Relações familiares no contexto dos cuidados paliativos	Inclusão da família na assistência prestada pelas equipes de cuidados paliativos.	Estudo quantitativo
Jenifer Barbara Fernandes Costa, Tamilles Alves de Oliveira de Assunção, Helida Silva Araújo Salles.	2017	Cuidados paliativos, o cuidar de uma forma humanizada	Cuidar como um todo, maior sensibilização e qualificação aos cuidados paliativos.	Estudo qualitativo

Fonte: Autores, 2021.

No que tange sobre os cuidados paliativos, os familiares ou cuidadores passam a exercer funções que a maioria deles normalmente desconhece. Algumas dessas atividades estão relacionadas a fazer um curativo, a higiene, a medicamentos, ao manuseio de tubos e drenos, além de lidar com a deterioração da saúde de seus entes queridos e a possibilidade de morte. Portanto, essas atividades podem, em maior ou menor amplitude, produzir desgastes

emocionais, físicos, sociais e econômicos. Logo, tais sintomas podem resultar em transtornos psicológicos e, conseqüentemente, comprometer a qualidade de vida (OLIVEIRA *et al.*, 2017).

Assim, ressalta-se que a vivência de profissionais e usuários de cuidados paliativos é uma oportunidade para entender o processo de morte juntamente com a espiritualidade, em que se refere automaticamente ao processo da vida. Obviamente, é natural que os pacientes enfrentem a morte. No entanto, precisa-se passar por tudo isso permeado pela harmonia, em que a espiritualidade torna-se um elemento essencial (ARRIEIRA *et al.*, 2016).

De modo adicional, os cuidados paliativos se baseiam no fornecimento de comunicação eficaz e o diálogo sobre o prognóstico é uma característica básica. Entender esse contexto é essencial para determinar as decisões de tratamento que promovem o consentimento preferencial dos pacientes e familiares e esperam melhorar a qualidade de vida, de maneira que o paciente possa viver tão ativamente quanto possível até a morte (OLIVEIRA *et al.*, 2017).

Em contrapartida, os cuidados paliativos transcendem os níveis físicos e emocionais, e apresentam a espiritualidade também como uma prioridade na estratégia de tratamento, pois é considerada fonte de felicidade e qualidade de vida para as pessoas que vivenciam o processo de morte. Nesse sentido, o poder espiritual pode ser visto como uma ferramenta para promover a saúde, porque envolve dimensões de consciência sobre a vida, sendo baseada em valores, em profunda motivação e apresentando significados na existência individual e coletiva (ARRIEIRA *et al.*, 2016).

Além disso, existe uma ligação muito importante entre profissionais, pacientes e familiares. No entanto, a literatura reconhece a comunicação em cuidados paliativos como sinônimo de informação, e usa a linguagem para expressar mensagens de preocupação e cuidado. Outras pesquisas sustentam a afirmação de que a comunicação é a espinha dorsal dos cuidados paliativos, uma vez que pode ser utilizada minimizar os sintomas resultantes. Por fim, a comunicação se reflete na relação entre o paciente e a equipe de saúde (COSTA; ASSUNÇÃO & SALLES, 2017).

Diferentes formas podem ser expressas em palavras ou não. Por isso, os profissionais de saúde podem utilizar diversas técnicas para estabelecer relações interpessoais positivas com pacientes terminais. A exemplo disso, tem-se promover a empatia e um ambiente interativo; repetir as informações quando necessário; saber ouvir; usar o tom apropriado, ser honesto e transparente (COSTA; ASSUNÇÃO & SALLES, 2017).

Considerando que os profissionais de saúde expressam suas opiniões, para melhor compreender os cuidados paliativos e aumentar o conceito de cuidado, isso quando a recuperação não é mais possível, então certos comportamentos são priorizados. Assim, enfatiza-se que vários deles podem estar intimamente relacionados como conhecimento dos profissionais de saúde, bem como: massagem de conforto e higiene, hidratação e nutrição; tratamento de lesões e doenças; excelente tecnologia farmacêutica (AMARAL & SILVA, 2019).

4 CONCLUSÃO

Este estudo teve como proposta analisar por meio de uma Revisão Integrativa da Literatura a forma como os cuidados paliativos interferem na recuperação da essência do processo de morrer. O objetivo foi alcançado por meio dos estudos encontrados a partir da metodologia adotada. Nesse sentido, essa investigação permitiu uma oportunidade singular de aprofundar conhecimentos sobre cuidados paliativos no paciente em fase terminal e qualquer sofrimento antes da morte.

Ao estudar a importância de um cuidado holístico no paciente paliativo, destaca-se a espiritualidade como ferramenta essencial para que esse cuidado aconteça de forma humanizada e sensível por parte do profissional. Dessa forma, percebe-se que a qualificação profissional na área paliativa é de grande importância e deve ser o foco para uma assistência integral. Conclui-se, então, que é fundamental realizar ações e estudos voltados a essa área visto que muitos profissionais não possuem total domínio dessa forma de cuidado tão importante e necessária.

REFERÊNCIAS

AMARAL, Tiago Henrique Souza; SILVA, Betânia Eneida de Moraes. Os cuidados paliativos: alternativa e possibilidade de amparo e de dignidade diante do morrer. **Psicologia e Saúde em Debate**, [S.L.], v. 5, n. 1, p. 121-131, 15 jul. 2019.

ARRIEIRA, Isabel Cristina de Oliveria; THOFERN, Maira Buss; PORTO, Adrize Rutz; AMESTOY, Simone Coelho; CARDOSO, Daniela Habekost. Espiritualidade e o processo de morrer: reflexões de uma equipe interdisciplinar de cuidados paliativos. **Avances En Enfermería**, [S.L.], v. 34, n. 2, p. 137-147, 1 maio 2016.

CLOS, Michelle Bertóglia; GROSSI, Patricia Krieger. Desafios para o cuidado digno em instituições de longa permanência. **Revista Bioética**, [S.L.], v. 24, n. 2, p. 395-411, ago. 2016

COSTA, Jenifer Barbara Fernandes; ASSUNÇÃO, Tâmilles Alves de Oliveira de; SALLES., Helida Silva Araújo. Cuidados paliativos, o cuidar de uma forma humanizada. **Enfermagem Brasil**, Amapá, v. 16, n. 1, p. 62-65, 2017.

GOMES, Ana Luisa Zaniboni; OTHERO, Marília Bense. Cuidados paliativos. **Estudos Avançados**, [S.L.], v. 30, n. 88, p. 155-166, dez. 2016.

MAINGUÉ, Paula Christina Pires Muller; SGANZERLA, Anor; GUIRRO, Úrsula Bueno do Prado; PERINI, Carla Corradi. Discussão bioética sobre o paciente em cuidados de fim de vida. **Revista Bioética**, [S.L.], v. 28, n. 1, p. 135-146, mar. 2020.

MONTEIRO, Fabiana Franco; OLIVEIRA, Miriam de; VALL, Janaina. A importância dos cuidados paliativos na enfermagem. **Revista Dor**, São Paulo, v. 3, n. 11, p. 242-248, set. 2010

OLIVEIRA, Livia Costa de. Cuidados Paliativos: por que precisamos falar sobre isso?. **Revista Brasileira de Cancerologia**, [S.L.], v. 65, n. 4, p. 59-61, 16 dez. 2019.

OLIVEIRA, Maria do Bom Parto de; SOUZA, Nauã Rodrigues de; BUSHATSKY, Magaly; DÂMASO, Bruno Felipe Remígio; BEZERRA, Dayse Medeiros; BRITO, José Anchieta de. Atendimento domiciliar oncológico: percepção de familiares/cuidadores sobre cuidados paliativos. **Escola Anna Nery - Revista de Enfermagem**, [S.L.], v. 21, n. 2, p. 1-6, 2017.

PAIVA, Fabianne Christine Lopes de; ALMEIDA JÚNIOR, José Jailson de; DAMÁSIO, Anne Christine. Ética em cuidados paliativos: concepções sobre o fim da vida. **Revista bioética**, v. 22, p. 550-560, 2014.

CAPÍTULO 37

CUIDADOS PRESTADOS AOS PACIENTES COM NECESSIDADE DE REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c37](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c37)

Antonia Mylene Sousa Almeida¹, Maria Dhescyca Ingrid Silva Arruda², Victor Guilherme Pereira da Silva Marques³, Victor Almeida Brito⁴, Juliana da Silva Sousa⁵, Iani Clara Oliveira do Nascimento⁶, Laisa Garcia Matos⁷, Mérssia Maria do Nascimento Leite⁸, Karolayne Carvalho Silva⁹, Geísa de Moraes Santana¹⁰

¹Faculdade de Educação São Francisco, (mylenesousa123@hotmail.com)

² Faculdade São Francisco da Paraíba, (dhescycaingrid20@gmail.com)

³ Centro Universitário do Piauí, (guilhermevictor521@gmail.com)

⁴ Centro Universitário do Piauí, (victor.almeida190601@gmail.com)

⁵ Christus Faculdade do Piauí (enfjuh22@gmail.com)

⁶ Christus Faculdade do Piauí (ianioliveira46@gmail.com)

⁷ Christus Faculdade do Piauí (laisagarciamatos45@gmail.com)

⁸ Christus Faculdade do Piauí (mer123ssia@gmail.com)

⁹ Centro Universitário Maurício de Nassau (karol166carvalho@gmail.com)

¹⁰ Universidade Estadual do Piauí, (geisasantana97@gmail.com)

Resumo

O objetivo desse estudo é apresentar a atuação do enfermeiro no cuidado aos pacientes com revascularização do miocárdio. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, que se deu início no período julho e finalizou em agosto de 2021. A pergunta norteadora para essa pesquisa foi a seguinte: De que forma o enfermeiro pode atuar no cuidado ao paciente com revascularização do miocárdio? O levantamento dos artigos se deu através das bases de dados MEDLINE via BVS, LILACS via BVS e BDENF via BVS. Para esse trabalho, foram considerados como critérios de inclusão os artigos originais disponíveis por meio eletrônico em português e/ou em inglês. Como critério de exclusão, foi adotado artigos que não tratam da temática proposta, artigos duplicados, teses, monografias, dissertações, artigos de revisão, livros e que não apresenta o texto completo. O método de busca foi através dos DeCS: “Cuidados de Enfermagem” “Revascularização Miocárdica” e “Cuidados Pós-Operatórios, com recorte temporal nos últimos 10 anos (2011 a 2021). Dentre os principais resultados,

apontam que os enfermeiros atuam no período pré-operatório, intraoperatório e pós operatório no cuidado aos pacientes com necessidade de revascularização do miocárdio. Várias situações que ocorrem no período pré e intra-operatório, como os efeitos da sedação, o deslocamento de pequenos êmbolos que causam obstrução das artérias e capilares, dificultam a identificação precoce de mudanças neurológicas, o que resulta em déficits para o paciente. Os profissionais de enfermagem, atuam nos sinais clínicos de sonolência, nos distúrbios visuais, e nos sinais que podem aparecer em caso do paciente evoluir com um AVE. Infere-se que os cuidados de enfermagem, principalmente no pós operatório aos pacientes com cirurgia de revascularização do miocárdio é de grande importância, no entanto é necessário mais estudos sobre essa temática, a fim de abordar mais a atuação do enfermagem nesse aspecto.

Palavras-chave: Cuidados de enfermagem; Revascularização miocárdica; Cuidados pós-operatórios.

Área Temática: Ciências da saúde

E-mail do autor principal: mylenesousa123@hotmail.com

1 INTRODUÇÃO

A doença arterial coronariana (DAC) resulta na diminuição do suprimento sanguíneo para o miocárdio e é uma das principais causas de morte. Uma das principais doenças coronarianas é a aterosclerose, na qual, se caracteriza pelo acúmulo anormal de gordura e tecido fibroso no revestimentos das paredes vasculares arteriais. Essas substâncias bloqueiam e estreitam os vasos fazendo com que reduza o fluxo sanguíneo do miocárdio (SMELTZER *et al*, 2008).

De acordo com Smeltzer *et al*. (2008) essa patologia começa quando estrias gordurosas de lipídeos são depositados na túnica íntima da artéria conorária. Essas lesões têm início na infância e tendem a aumentar devido as hábitos alimentares.

Os principais sinais e sintomas da aterosclerose é a angina, falta de ar, fadiga ao realizar esforço físico, dores nas pernas ao caminhar, queda de pelos nas pernas, pele fria, palidez, infarto do miocárdio, acidente vascular encefálico, assim como trombose e embolia das extremidades (PORTO, 2007).

Mediante isso, a cirurgia de revascularização do miocárdio (CRVM) é um procedimento recomendado a pacientes com estreitamento ou bloqueios importantes das artérias que nutrem o coração. Através dessa cirurgia, criam-se alterantivas para desobstruir as artérias coronarianas. O procedimento é indicado a pacientes com múltiplos estreitamentos, pacientes com obstrução no tronco da artéria coronária esquerda, pacientes com áreas importantes do coração funcionando mal devido a isquemia persistente e dentre outros (RBC, 2016).

Segundo a Revista Brasileira de Cardiologia (2016), para a realização dessa cirurgia, utiliza-se dois tipo de ponte: a ponte de safena ou a de mamária. A ponte de safena é a mais

utilizada e envolve a retirada de segmentos da veia safena da perna e costura-se uma das pontas à parede da aorta e a outra ponta depois do local da obstrução, realizando então, um desvio. Após a saída do paciente para a unidade de terapia intensiva, é inserido dreno provisórios no tórax com a finalidade de remover resíduos de sangue no espaço em volta do coração.

Cruz e Lopes (2010), afirma que a CRVM é indicada quando a aterosclerose envolve 50 a 70% da artéria coronária, fazendo com que o fluxo de sangue se torne insuficiente para nutrir o coração, ou quando as lesões coronarianas não podem ser corrigidas através da angioplastia.

Os exames laboratoriais passados para esse paciente estão relacionados a nível de lipídeos no sangue, são eles: Colesterol total sérico, LDL, HDL, triglicerídeos, proteína C reativa, gordura total, carboidratos, proteínas, sódio e álcool (PORTO, 2007).

A partir disso, os cuidados da equipe de enfermagem são fundamentais na recuperação do paciente cirúrgico, com isso, os enfermeiros tem aprimorado seus conhecimentos e desenvolvido metodologias de trabalho diante de novas alternativas da assistência de enfermagem, fundamentada no processo de enfermagem (GALDEANO; ROSSI; PEZZUTO, 2004).

O profissional de enfermagem é essencial no cuidado perioperatório da revascularização do miocárdio, no qual é o período em que consiste na indicação do paciente ao procedimento cirúrgico até o momento que ele recebe alta hospitalar. A pergunta norteadora para essa pesquisa se formulou em de que forma o enfermeiro pode atuar no cuidado ao paciente com revascularização do miocárdio. Através disso, o objetivo desse estudo é apresentar a atuação do enfermeiro no cuidado aos pacientes com revascularização do miocárdio.

2 MÉTODO

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, que se deu início no período julho e finalizou em agosto de 2021. Esse método tem como propósito produzir resultados alcançados em pesquisas sobre uma temática/questão de forma organizada, sistemática e integral. Além disso, permite a inclusão de pesquisas experimentais e não experimentais, bem como dados da literatura teórica e empírica, possibilitando uma compreensão mais completa do tema (ERCOLE; MELO; ALCOFORADO, 2014).

De acordo com Souza, Silva e Carvalho (2010), a revisão integrativa é um instrumento da prática baseada em evidências, bem como um tipo de método que auxilia na produção de informações e na aplicação dos resultados obtidos. Esse método consiste em seis fases para a preparação da revisão, são elas: criação da pergunta que irá nortear o trabalho; busca de dados; coleta de dados; análise dos conteúdos selecionados; discussão dos resultados; apresentação da

revisão

A pergunta norteadora para essa pesquisa foi a seguinte: De que forma o enfermeiro pode atuar no cuidado ao paciente com revascularização do miocárdio?

O levantamento dos artigos se deu através das bases de dados *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (MEDLINE via BVS), Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS via BVS) e Base de Dados de Enfermagem (BDENF via BVS). Para esse trabalho, foram considerados como critérios de inclusão os artigos originais disponíveis por meio eletrônico em português e/ou em inglês. Como critério de exclusão, foi adotado artigos que não tratam da temática proposta, artigos duplicados, teses, monografias, dissertações, artigos de revisão, livros e que não apresenta o texto completo.

O método de busca foi realizado através dos descritores em ciências da saúde (DeCS): “Cuidados de Enfermagem” “Revascularização Miocárdica” e “Cuidados Pós-Operatórios”, também através do *Medical Subject Headings* (MeSH): “Nursing Care”, “Myocardial Revascularization” and “Postoperative Care”, com recorte temporal nos últimos 10 anos (2011 a 2021), anos correspondentes ao maior número de pesquisas. Foram cruzados através do operador booleano “AND” para busca simultânea dos assuntos (Tabela 1).

Tabela 1. Distribuição dos artigos obtidos na biblioteca BVS e nas bases de dados MEDLINE, LILACS e BDENF, segundo os descritores selecionados.

Base de dados	Descritores	Artigos obtidos
MEDLINE	Cuidados de enfermagem AND Revascularização do miocárdio AND Cuidados pós-operatórios	18
LILACS	Cuidados de enfermagem AND Revascularização do miocárdio AND Cuidados pós-operatórios	12
BDENF	Cuidados de enfermagem AND Revascularização do miocárdio AND Cuidados pós-operatórios	11

Fonte: Autores, 2021.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Através do levantamento nas bases de dados, foram encontrados um total de 41 artigos. Aplicando a filtragem, foram eliminados 25 artigos por não corresponderem aos anos

selecionados e 3 por estarem com o texto incompleto. Com isso, 13 estudos foram selecionados para a leitura e análise crítica dos artigos. Após a leitura e análise, 1 foi eliminado por ser revisão, 1 por ser livro e 5 por estarem duplicados, sobrando 6 artigos para o presente estudo (Figura 1).

Figura 1. Levantamento dos artigos nas bases de dados, Pedreiras, Brasil, 2021.

Fonte: Autores, 2021.

Dentre os principais resultados, apontam que os enfermeiros atuam no período pré-operatório, intraoperatório e pós operatório no cuidado aos pacientes com necessidade de revascularização do miocárdio. Esses pacientes necessitam de cuidado contínuo, principalmente no período pós operatório (DUARTE *et al.*, 2020).

Várias situações que ocorrem no período pré e intra-operatório, como os efeitos da sedação, o deslocamento de pequenos êmbolos que causam obstrução das artérias e capilares, dificultam a identificação precoce de mudanças neurológicas, o que resulta em déficits para o paciente. Os profissionais de enfermagem, atuam nos sinais clínicos de sonolência, nos distúrbios visuais, e nos sinais que podem aparecer em caso do paciente evoluir com um AVE (ALMEIDA *et al.*, 2017).

Além disso, quando o paciente sai do pré operatório e vai para a unidade de terapia intensiva (UTI) o enfermeiro deve analisar e observar a permeabilidade das vias aéreas, a

expansabilidade do tórax, a frequência respiratória e todos os sinais relacionados a assistência ventilatória. Isso se da, devido a situação do indivíduo por estar intubado e com necessidades de observações contínuas (COSTA *et al.*, 2014).

Almeida *et al.* (2017), afirma que o ideal para a extubação é que ocorra após a sexta hora após a entrada do paciente na UTI. Durante esse período, o enfermeiro deverá coletar a gasometria do indivíduo para avaliar a possibilidade de iniciar o desmame. Além disso, o enfermeiro deve solicitar a realização da tomografia do tórax para verificar a posição do tubo.

As complicações cardíacas nesses pacientes, podem estar presentes devido ao uso de anestésicos, do desequilíbrio de eletrólitos, como também da diminuição do débito cardíaco. A atuação do enfermeiro no paciente com essa cirurgia relacionado aos cuidados cardiovasculares está direcionado a monitorização dos sinais vitais, além de avaliar oximetria e mensurar pressão venosa central (KOERICH *et al.*, 2017).

Além desses cuidados, a equipe de enfermagem tem o papel no cuidado aos drenos, evitando possíveis complicações. Durante a troca do selo d'água, o enfermeiro deve se atentar no clampeamento do dreno e a realização da higienização das mãos antes e após manipulação do dreno, sempre utilizando as técnicas para evitar a contaminação (KOERICH *et al.*, 2017).

No pós operatório, a hipotermia está relacionada relacionada a diminuição do metabolismo, a exposição do paciente na sala de cirurgia, ao efeito dos anestésicos e o uso da circulação extracorpórea. Em vista disso, a equipe de enfermagem deve monitorar a temperatura do paciente, utilizar cobertor e manta térmica (BRANCO; PEREIRA, 2016).

Ademais Branco e Pereira (2016), confirma também que no pós operatório, a dor é um sinal clínico bem característico e intenso. A incisão cirúrgica, o tubo, a presença de sonda e o tempo prolongado no leito são fatores que elevam o nível da dor. Os cuidados de enfermagem estão voltados para a troca do curativo, no qual deve ser realizado de forma delicada, promovendo conforto e reduzindo a dor do paciente. O enfermeiro deve aplicar a escala visual analógica, afim de identificar a intensidade da dor do indivíduo.

Além desses cuidados relacionados a dor, a enfermagem pode utilizar medidas não farmacológicas para o alívio dela, podendo citar a promoção de sono e repouso, ambiente adequado e silencioso e o posicionamento adequado no leito que pode evitar complicações futuras como lesão por pressão. Se a intervenção não farmacológica não resolver, o paciente deverá receber medidas farmacológicas (COSTA *et al.*, 2014).

Outro cuidado de enfermagem essencial para uma boa assistência ao paciente é o banho no leito. Para esse procedimento é necessário analisar a situação crítica do indivíduo e evitar o banho precoce e com o tempo do procedimento prolongado, podendo esses fatores reduzir a

saturação venosa mista (SvO₂) (OLIVEIRA; SOUZA; PELLANDA, 2016).

4 CONCLUSÃO

Infer-se que os cuidados de enfermagem, principalmente no pós operatório aos pacientes com cirurgia de revascularização do miocárdio é de grande importância, no entanto é necessário mais estudos sobre essa temática, a fim de abordar mais a atuação do enfermagem nesse aspecto.

Os profissionais de enfermagem são responsáveis pelo cuidado contínuo do paciente e além de promover uma estabilidade hemodinâmica, são responsáveis também pela educação permanente a esses indivíduos. O cuidado do enfermeiro vai desde a resolução de todas as dúvidas dos pacientes e familiares com relação ao procedimento, até a recomendação de uma vida saudável sendo orientado na alta hospitalar.

A assistência de enfermagem vai muito além do olhar clínico, esse profissional passa a ver seu paciente de forma holística, ou seja, ver o paciente como um todo. Por isso, o cuidado da equipe de enfermagem é prestada de forma humanizada e integral em todo âmbito de saúde, principalmente no cuidado pós operatório.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, P. S. *et al.* Implementação de orientações de enfermagem aos pacientes pré-operatórios de cirurgia cardíaca em meio digital. **Rev. SOBECC**, São Paulo. ABRI./JUN., v. 22, n. 2, p. 68-75, 2017.

BRANCO, C. S. P. C.; PEREIRA, H. O. Cuidados de enfermagem ao paciente em pós operatório imediato de cirurgia de revascularização do miocárdio. **Enfermagem revista**, v. 19, n. 1, 2016.

COSTA, M. A. C. *et al.* Efeito do controle da pressão venosa central na ocorrência de fibrilação atrial após revascularização do miocárdio: estudo caso-controle. **Relampa**, v. 27, n. 3, p. 129-135, 2014.

CRUZ, A. P. O.; LOPES, R. Diagnóstico de enfermagem no pós-operatório de cirurgias cardíacas. **Salusvita**. v. 29, n. 3, p. 293-312, 2010.

GALDEANO, L. E.; ROSSI, L. A.; PEZZUTO, T. M. Diagnósticos de enfermagem de pacientes no período pré-operatório de cirurgia cardíaca. **Rev Esc Enferm USP**, v. 38, n. 3, p. 307-16, 2004.

KOERICH, C. *et al.* Myocardial revascularization surgery: hospitalization characteristics and changes related to hospitalization time. **Rev. Eletr. Enf.**, v. 19, 2017.

OLIVEIRA, A. P. A.; SOUZA, E. N.; PELLANDA, L. C. Effectiveness of video resources in nursing orientation before cardiac heart surgery. **Rev Assoc Med Bras.**, v. 62, n. 8, p. 762-767, 2016

PORTO, Celmo C. Vademecum de Clínica Médica. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2007. Volume 1.

Revista Brasileira de Cardiologia. Rio de Janeiro: SOCERJ. 2016. Disponível em: <http://sociedades.cardiol.br/socerj/publico/dica-safena.asp>. Acesso em: 11/08/2021.

SMELTZER, Suzanne *et al.* Brunner e Suddarth Tratado de Enfermagem Médico- Cirúrgica. 11 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2008. Volume 1.

CAPÍTULO 38

DESAFIOS A IMPLANTAÇÃO DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c38](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c38)

Jaíres Emanuele Nunes de Sousa¹, Antonia Mylene Sousa Almeida², Rayssa do Nascimento Sousa³, Antonia Aline Rocha de Sousa⁴, Maria Helena de Lima Sousa⁵, Thiemmy de Souza Almeida Guedes⁶, Vitoria Vilas Boas da Silva Bomfim⁷, Terezinha da Costa Santos⁸, Tâmara Karine da Silva⁹, Brenda Tayrine Tavares Souza¹⁰.

¹Centro Universitário Unifacid Wyden, (emanuelejaíres@gmail.com)

²Faculdade de Educação São Francisco, (mylenesousa123@hotmail.com)

³Universidade Estadual do Piauí, (rayssasousa@aluno.uespi.br)

⁴Cristo Faculdade do Piauí, (alinerochaenfer@gmail.com)

⁵Faculdade de tecnologia e ciência, (helenamaria164@gmail.com)

⁶Faculdade Venda Nova do Imigrante, (thiemmyalmeida@gmail.com)

⁷Centro Universitário Jorge Amado, (pesquisaclinica9@gmail.com)

⁸Universidade Estadual do Piauí, (teryscosta@hotmail.com)

⁹Sociedade de Ensino universitário do Nordeste, (tamarakarine1@gmail.com)

¹⁰Centro Universitário do Distrito Federal, (brenndatayrine@gmail.com)

Resumo

Objetivo: Analisar na literatura científica acerca dos desafios e limitações da implantação da Sistematização da Assistência de Enfermagem no âmbito da atenção primária à saúde. **Método:** Revisão integrativa realizada no mês de agosto de 2021, nas bases de dados SciELO, LILACS, BDENF e MEDLINE, através dos DeSC: “Enfermagem”, “Cuidados de Enfermagem”, “Atenção Primária à saúde”, “Administração de serviços de saúde”. Combinados aos operadores *booleanos* "AND e OR". Encontrou-se 3.136 pesquisas e após aplicar os critérios de inclusão e exclusão 9 estudos foram usados para compor a revisão. **Resultados:** Pesquisas mostraram resultados desafiadores quanto a aplicação da Sistematização da Assistência de Enfermagem na Atenção Primária à Saúde, percebeu-se deficiências na execução dos registros em relação, dificuldade quanto a implantação, tornando-a incompleta e inoperante. Alguns pontos como política, normas, objetivos do serviço e limitações profissionais que refletem nas

atitudes, crenças, valores e habilidades técnicas e intelectuais impactam negativamente na aplicabilidade da SAE. **Considerações Finais:** Diante do exposto, há necessidade da implantação da Sistematização da Assistência de Enfermagem no âmbito da atenção básica de saúde intensificando ações de promoção da saúde; reforçando que a SAE é um método objetivo que trabalha o indivíduo como um todo proporcionando uma assistência de qualidade e cuidados, e que a falta de um planejamento, irá sobrecarregar outros profissionais o que pode implicar em baixa qualidade na assistência.

Palavras-chave: Cuidados de enfermagem; Atenção primária à saúde; Administração de serviços de saúde.

Área Temática: Ciências da Saúde

E-mail do autor principal: emanuelejaire@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

Regulamentada pela Resolução nº 358/2009 do Conselho Federal de Enfermagem, a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) tem objetivo de organizar as práticas de enfermagem diante do cuidado aos indivíduos, família e coletividade de maneira integral, holístico e individualizado. Ademais, caracteriza a prática profissional por intermédio de seus conhecimentos técnico-científicos e intervenções desenvolvidas conforme as necessidades assistenciais do paciente (MORAIS *et al*, 2015; BARRETO *et al*, 2020).

Para Sousa *et al*. (2020) a SAE enfatiza que há necessidades que envolvem o paciente, e estão ligadas à todos os aspectos da sua vida, ao mesmo tempo que as ações para os cuidados e registros resultantes do Processo de enfermagem (PE) devem destacar a atuação do enfermeiro e sua equipe de modo a colaborar para efetuar uma assistência de qualidade.

Com isso, faz-se necessário a observação pelo profissional de enfermagem frente aos desafios encontrados na construção e união de saberes sobre as práticas gerenciais e assistenciais (MAROSO *et al*, 2015).

De encontro a Sistematização da assistência de enfermagem, as ações realizadas na atenção primária à saúde (APS), devem ser construídas por políticas públicas de saúde e baseadas em evidências científicas, pois assim possibilitam a assistência à saúde de qualidade (OPAS, 2018).

Diante dessas considerações, o presente estudo tem como objetivo analisar na literatura científica acerca dos desafios e limitações da implantação da Sistematização da Assistência de Enfermagem no âmbito da atenção primária à saúde.

2 MÉTODO

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura descritiva e segundo Mendes, Silveira

& Galvão (2008) permite a construção de conhecimento científico possibilitando a prática da enfermagem com qualidade. Realizada no mês de agosto de 2021, norteada pela questão "Quais os desafios e limitações da implantação da Sistematização da Assistência de Enfermagem no âmbito da atenção primária?".

A busca se deu nas bases de dados *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Banco de Dados em Enfermagem (BDENF) e *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (MEDLINE), através dos seguintes Descritores em Ciências da Saúde (DeSC): “Enfermagem”, “Cuidados de Enfermagem”, “Atenção Primária à saúde”, “Administração de serviços de saúde”. Combinados aos operadores *booleanos* "AND e OR".

Como critérios de inclusão: artigos disponíveis na íntegra, nos idiomas português, espanhol e inglês dos últimos cinco anos. Como critérios de exclusão: artigos que não contemplavam o tema e estudos repetidos nas bases de dados.

A partir da busca inicial com os descritores e operadores *booleanos* definidos, foram encontrados 3.136 estudos nas bases selecionadas e após aplicar os critérios de inclusão e exclusão restaram 1.273, sendo selecionados 09 estudos para compor a revisão.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Quadro 1. Síntese dos principais desafios encontrados na implementação da SAE na Atenção Primária

AUTOR/ANO	TÍTULO	OBJETIVO	RESULTADOS
COSTA <i>et al</i> (2021)	A sistematização da assistência de enfermagem em uma estratégia de saúde da família e suas dificuldades: um relato de experiência	Identificar o conhecimento dos enfermeiros sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) em traumato or	Apesar de tentar implantar a SAE, não é individualizada às necessidades do paciente, questões culturais, postura no ambiente de trabalho, entendimento do que seja a SAE, a desvalorização por parte do cliente quanto a assistência pública também são desafios que interferem na realização da SAE na Atenção Básica .
SOMARIVA <i>et al</i> (2019)	Percepções das equipes de enfermagem na Atenção Básica frente a Sistematização da Assistência de Enfermagem	Avaliar a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) na Atenção Básica de um município do extremo sul catarinense, frente às percepções das equipes de enfermagem	Para que haja reconhecimento e fortalecimento das equipes de enfermagem, é necessário desenvolvimento profissional de modo que a implantação da SAE irá dar relevância a essas ações nos mais variados ambientes laborais que a enfermagem esteja inserida.

OLIVEIRA <i>et al</i> (2019)	Sistematização da assistência de enfermagem: percepção e conhecimento da enfermagem Brasileira	Apresentar a percepção e o conhecimento de enfermeiros e acadêmicos de enfermagem brasileiros quanto à Sistematização da Assistência de Enfermagem.	Os fatores que contribuem para a não aplicação da SAE: são falhas na comunicação entre os profissionais, conhecimento insuficiente acerca do funcionamento do processo e a escassez dos recursos humanos.
ASSIS (2019)	Protocolo de sae do acolhimento da demanda espontânea na aps	Elaborar protocolo para a sistematização da assistência de enfermagem no acolhimento da demanda espontânea na Atenção Primária à Saúde.	Protocolo avaliou o paciente e verificou queixas do paciente e informações intrínsecas percebidas pelo profissional durante o atendimento;
MORAIS <i>et al.</i> (2020)	Implicações para o processo de enfermagem na unidade de terapia intensiva. Implicações para o processo de enfermagem na unidade de terapia intensiva	Descrever SAE pela ótica da atuação da enfermagem em uma Unidade de Terapia Intensiva de um hospital de referência e grande porte	Há a necessidade da implantação SAE e o PE de maneira conjunta, possibilitando assim, benefícios para o profissional e o paciente.
MARTINS, COSTA, SANTOS (2020)	Sistematização da Assistência de Enfermagem nas Unidades de Saúde: Uma revisão integrativa	Analisar artigos brasileiros sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE).	Foram apontadas dificuldades e possíveis soluções para a aplicação da SAE nas Unidades de Saúde. Apesar dos obstáculos a sua implantação, as contribuições significativas devem ser levadas em conta, com compromisso e humanização do cuidado, sendo de grande valia o esforço para implementá-la nas unidades básicas.
CHÁVEZ S <i>et al</i> (2020)	Acesso, acessibilidade e demanda na estratégia saúde da família	Compreender demanda em saúde, acesso e acessibilidade perante as necessidades de saúde, sob a ótica de profissionais e usuários da ESF.	O acesso aos serviços de saúde trata-se de um tema amplo e que abrange diversas dimensões, como disponibilidade, acessibilidade, adequação funcional, capacidade financeira e aceitabilidade.
ANDRADE (2020)	Acolhimento: ferramenta para a sistematização da assistência de enfermagem na atenção primária	Analisar o acolhimento realizado por enfermeiros da Atenção Primária fundamentado na Sistematização da Assistência da Enfermagem na Atenção Primária em Saúde.	O acolhimento foi utilizado com ferramenta na implementação da SAE, sendo aplicada na qualificação da escuta, construção de vínculos, produção de saúde, organização do trabalho em equipe

SILVA <i>et al.</i> 2021	O que facilita e dificulta a Sistematização da Assistência de Enfermagem na percepção dos enfermeiros das Unidades de Saúde da Família?	Analisar os elementos facilitadores e dificultadores na realização da Sistematização da Assistência de Enfermagem e Processo de Enfermagem a partir da percepção dos enfermeiros das Unidades de Estratégia Saúde da Família.	A capacitação através da educação continuada e permanente é importante para possibilitar a utilização da SAE/PE e que, caso isso não ocorra, a equipe de enfermagem preencherá de forma incorreta os formulários específicos, dificultando a implementação das ações de recuperação do paciente
-----------------------------	---	---	---

Fonte: Autores, 2021.

De acordo com Oliveira (2019), a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é a base teórica para a organização do trabalho do enfermeiro, fazendo com que seja possível a execução do Processo de Enfermagem (PE). Morais *et al* (2020) reafirma a SAE como um processo assistencial que quando implantado na atenção básica que vai colocar em prática a educação e promoção em saúde para execução das ações e cuidados, apontando a necessidade da implantação conjunta da SAE e do PE, possibilitando assim, benefícios para o profissional e o paciente.

Para Martins, Costa & Santos (2020), o Processo de Enfermagem (PE) exige na sua implantação compromisso e humanização do cuidado, sendo de grande valia o esforço para implementá-la nas unidades básicas, pois operacionaliza o cuidado, e possibilita a documentação de suas condutas, o que garante a proteção jurídica do enfermeiro, além de ser importante para a autonomia, assistência diferenciada, e promoção da humanização do cuidado através de metodologias integrativas, resultando, assim, na economia de recursos e na assistência de qualidade.

Segundo Somariva *et al.* (2010) a SAE proporciona ao enfermeiro o papel de idealizar e efetivar decisões com a equipe, distinguindo as deficiências de diversas ordens, por parte dos serviços, da equipe propriamente e dos usuários, colaborando para melhoria na efetivação da resolução das problemáticas encontradas diariamente na prática e dará relevância a essas ações nos mais variados ambientes laborais que a enfermagem esteja inserida.

Costa *et al.* (2021) afirma que apesar de sua implantação a SAE muitas vezes não é individualizada às necessidades do paciente, sofrendo interferência de questões culturais, postura no ambiente de trabalho, entendimento do que seja a sistematização por parte dos profissionais e desvalorização por parte do cliente quanto a assistência de saúde pública, impossibilitando a realização da SAE na Atenção Básica à Saúde.

A enfermagem como integrante da equipe da unidade de saúde, utilizará a Sistematização da Assistência como uma metodologia para direcionar o cuidado oferecido aos

seus pacientes, auxiliará para a qualidade e segurança dos serviços oferecidos. No entanto, pode ocorrer a deficiência nos registros da aplicação da SAE, tornando o processo informal, incompleto e inoperante (ANDRADE, 2020).

Diante do exposto, para Assis (2019) entre os desafios a implementação da SAE na APS encontra-se o *déficit* na qualidade do acolhimento que pode interferir na continuidade da procura do usuário pelo serviço. Sendo, a Sistematização da assistência de enfermagem ferramenta eficaz no acolhimento da demanda espontânea nas unidades básicas de saúde, o que pode favorecer o aumento do vínculo, pois possibilita maior resolutividade, fazendo com que o usuário reconheça valor do serviço de saúde. Para Andrade (2020) o acolhimento é uma ferramenta eficaz para a implementação da SAE, aplicada na qualificação da escuta, construção de vínculos, produção de saúde e organização do trabalho em equipe.

Assim, Silva *et al.* (2021) afirma que a desorganização da prática assistencial de enfermagem pode dificultar a implementação das ações de recuperação do paciente, necessária a capacitação dos profissionais através da educação continuada e permanente, possibilitando utilização da SAE/PE.

Desta forma, Oliveira *et al.* (2019) indicam ainda que há deficiência no conhecimento sobre a aplicabilidade da SAE e do PE, estando este apontado como um desafio atrelado a falta de capacitação desses profissionais durante o período acadêmico e depois de formados, tornando essencial a educação continuada, proporcionando a constante qualificação dos enfermeiros.

Todos esses fatores são corroborados por Chávez *et al.* (2020) que apontam que podem estar ligados à ineficiência do serviço de saúde, baixa resolutividade e escassez de profissionais capacitados, evidenciados por sobrecarga de trabalho com funções que não incluem a execução da prática assistencial e de gerência que a SAE possibilita à enfermagem.

4 CONCLUSÃO

Diante disso, há necessidade da implantação da Sistematização da Assistência de Enfermagem no âmbito da atenção Primária à saúde, intensificando ações de promoção da saúde, reforçando a SAE como um método objetivo que trabalha o indivíduo como um todo, proporcionando uma assistência de qualidade e cuidados, e que a falta de um planejamento, irá sobrecarregar outros profissionais o que pode implicar em baixa qualidade na assistência.

É essencial, a capacitação dos profissionais da enfermagem através da educação permanente e continuada, maior interação entre a equipe para articular, de forma sistemática, o cuidado ao paciente, gerando um maior vínculo entre profissional paciente e maior

resolutividade da assistência. Assim, a SAE funciona como um auxílio assistencial para execução de ações de cuidados de forma integral ao paciente na Atenção Básica.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Fátima Aparecida Carvalho de. Acolhimento: ferramenta para a sistematização da assistência de enfermagem na atenção primária. **Tese de Doutorado**. Universidade de São Paulo, 2020.

ASSIS, Gustavo Henrique Piza. Programa, De Pós Gm. Protocolo De Sae Do Acolhimento Da Demanda Espontânea Na Aps. 2019. **Tese de Doutorado**. UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2019.

BARRETO, Mayckel da Silva *et al.* Sistematização da assistência de enfermagem: a prática do enfermeiro de hospital de pequeno porte. **Escola Anna Nery**. 2020, v. 24, n. 4, e20200005.

CHÁVEZ, Giannina Marcela *et al.* Acesso, acessibilidade e demanda na estratégia saúde da família. **Escola Anna Nery**, v. 24, 2020.

COSTA, Elem Cristina Silva da *et al.* A Sistematização Da Assistência De Enfermagem Em Uma Estratégia De Saúde Da Família E Suas Dificuldades: Um Relato De Experiência. 2020. **Ed. Atena**, p. 17, 2020.

MAROSO, Krauzer Ivete; ADAMY, Edlamar Kátia; AMORA, Ascari Rosana; FERRAZ, Lucimare; LIMA Trindade Leticia; NEISS, Mariluci. Sistematização da Assistência de Enfermagem na atenção básica: o que dizem os enfermeiros? **Cienc. Enferm**; 21(2): 31-38, ago. 2015.

MARTINS, Gabriela; COSTA, Arlete Eli Kunz da; SANTOS, Fernanda dos. Sistematização da Assistência de Enfermagem nas Unidades de Saúde: Uma revisão integrativa. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 4, p. e8610413814-e8610413814, 2021.

MORAIS, Lorraine Barreto *et al.* Implicações para o processo de enfermagem na unidade de terapia intensiva. **Biológicas & Saúde**, v. 5, n. 19, 2015.

MENDES, Karina Dal Sasso; SILVEIRA, Renata Cristina de Campos Pereira; GALVÃO, Cristina Maria. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. **Texto & contexto-enfermagem**, v. 17, p. 758-764, 2008.

OLIVEIRA, Marcos Renato de *et al.* Sistematização da assistência de enfermagem: percepção e conhecimento da enfermagem Brasileira. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 72, p. 1547-1553, 2019.

Organização Pan-americana da Saúde. Relatório 30 anos de SUS. Que SUS para 2030?. ISSN: 978-92-75-72044-8; p. 222. 2018.

SILVA, Edyra Damasceno da Costa *et al.* O que facilita e dificulta a Sistematização da Assistência de Enfermagem na percepção dos enfermeiros das Unidades de Saúde da Família?. **Revista de Divulgação Científica Sena Aires**, v. 10, n. 2, p. 336-346, 2021.

SOMARIVA, Vanessa Cristina Alves *et al.* Percepções das equipes de enfermagem na

Atenção Básica frente a Sistematização da Assistência de Enfermagem. **Enfermagem em Foco**, v. 10, n. 4, 2019.

SOUSA, Brendo Vitor Nogueira et al. Benefícios e limitações da sistematização da assistência de enfermagem na gestão em saúde/Benefits and restrictions of systematization of nursing assistance in health management. **Journal of Nursing and Health**, v. 10, n. 2, 2020.

CAPÍTULO 39

DISFUNÇÃO DO EIXO MICROBIOTA-INTESTINO-CÉREBRO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c39](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c39)

**Elany Maria Ferreira Portela¹, Amanda Inocência Rosa², Henrique Caixeta Rocha³,
Ingrid Yumi Ribeiro Yamanaka⁴, Isadora Andrade Fonseca Moreira⁵, Maria Isabel
Fortunato Cavalcante⁶, Mariana Xavier Mendes⁷, Renato Philipe de Sousa⁸.**

¹Discente do Centro Universitário Atenas (Uniatenas), elanyportela@gmail.com

²Discente do Centro Universitário Atenas (Uniatenas), amaanda.rosa_@hotmail.com

³Discente do Centro Universitário Atenas (Uniatenas), henriquecaixeta99@hotmail.com

⁴Discente do Centro Universitário Atenas (Uniatenas), ingridyumi@hotmail.com

⁵Discente do Centro Universitário Atenas (Uniatenas), isadoraandrdefm@gmail.com

⁶Discente do Centro Universitário Atenas (Uniatenas), mfortunatocavalcante@gmail.com

⁷Discente do Centro Universitário Atenas (Uniatenas), marianaxm6@gmail.com

⁸Docente do Centro Universitário Atenas (Uniatenas), r_marcciano@hotmail.com

Resumo

Introdução: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) causa alterações de linguagem, socialização e de comportamento. A etiologia do TEA ainda é uma incógnita, mas, visto que, entre 40% e 60% dos indivíduos com TEA apresentam alterações gastrointestinais, surgiu a hipótese de haver uma relação entre o eixo microbiota-intestino-cérebro e o TEA. **Objetivo:** Analisar a relação entre o eixo microbiota-intestino-cérebro e o TEA. **Método:** Revisão integrativa da literatura, com busca nas bases de dados MEDLINE e LILACS, utilizando os descritores “Gastrointestinal Microbiome” e “Autism Spectrum Disorder”, incluiu-se artigos originais e revisionais publicados entre 2015 e 2021, sem restrição de idioma. Foram excluídos estudos com modelos experimentais. A busca resultou em 130 artigos e após a leitura completa 12 foram selecionados, os quais apresentaram maior relevância ao objetivo proposto. **Resultados:** Os indivíduos com TEA apresentam alterações em sua composição microbiana e na microbiota intestinal, possuindo também alterações metabólicas. A microbiota alterada pode agir modulando as diferentes alterações dos linfócitos T ou produzindo substâncias que induzem alterações comportamentais. Essas alterações são possíveis devido à comunicação bidirecional do eixo intestino-cérebro, através do sistema nervoso autônomo, nervo vago e

sistema entérico. **Conclusões:** Os indivíduos com TEA apresentam microbiota diferente dos indivíduos saudáveis, por isso possuem maior nível de inflamação intestinal o que promove os sintomas do TEA, desse modo os profissionais da saúde já recomendam uma alimentação específica para os indivíduos com TEA. Contudo, ainda são necessários mais estudos sobre a relação da disbiose intestinal com o TEA, pois os trabalhos existentes não possuem dados suficientes para explicar essa relação de forma completa.

Palavras-chave: Microbioma Gastrointestinal; Transtorno do Espectro Autista; Seletividade Alimentar.

Área Temática: Ciências da Saúde

E-mail do autor principal: elanyportela@gmail.com

1. INTRODUÇÃO

O autismo, cientificamente conhecido como Transtorno do Espectro Autista (TEA), é uma disfunção neurobiológica global do desenvolvimento que tem como consequências alterações qualitativas na linguagem, na socialização e no comportamento do indivíduo. A etiologia do autismo é variada e, majoritariamente, o mecanismo patológico subjacente é uma incógnita. O diagnóstico do autismo é clínico e fundamenta-se na análise comportamental e na entrevista clínica (REGO, 2012). De acordo com a etimologia da palavra, “autos” significa “próprio” e “ismo” diz respeito à uma orientação ou estado, sendo assim, a própria denominação “autismo” corresponde a um achado clínico importante do espectro, uma vez que o indivíduo desenvolve hábitos reclusos e antissociais (ONZI, 2015).

Tendo em vista que o TEA não possui cura, tratamentos alternativos buscam amenizar o déficit de cada indivíduo acometido, objetivando maior inserção dos mesmos em tarefas cotidianas junto a familiares e amigos. Quando se estuda a população que apresenta TEA, o eixo microbiota-intestino-cérebro é importante de ser analisado, uma vez que de 40 a 60% dos autistas apresentam distúrbios gastrointestinais, que se enquadram em perturbações do espectro do Autismo (ALBUQUERQUE, 2021). O Trato Gastrointestinal (TGI) é um órgão estéril, colonizado por microrganismos logo após o parto, conhecidos como microbiota. A microbiota é um ecossistema formado principalmente por bactérias anaeróbias, que se consolidam no TGI até os primeiros dois anos de vida, garantindo ações antibacterianas e imunomodulatórias no organismo do hospedeiro. As probióticas (bifidobactérias e lactobacilos), por exemplo, quando presentes em quantidades recomendadas, proporcionam aumento da permeabilidade intestinal, recuperação da mucosa após antibioticoterapia e proteção contra a invasão de agentes patogênicos. Portanto, essa relevante colonização é alvo de estudos direcionados ao tratamento e

à prevenção de certas patologias, como o TEA (PAIXÃO, 2016).

Pesquisas científicas mostram que modificações na microbiota (disbiose) podem gerar déficits no desenvolvimento (ALBUQUERQUE, 2021). O eixo microbiota-intestino-cérebro faz referência às interações presentes entre o sistema gastrointestinal, o sistema nervoso e os microorganismos que habitam o trato gastrointestinal. Um estudo realizado em roedores, chamado de “Germ-free” mostrou que a ausência de microrganismos intestinais faz com que o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HPA) se desenvolva anormalmente. Diante desse cenário, pesquisas avaliam que distúrbios no eixo microbiota-intestino-cérebro são uma causa direta para os transtornos presentes no espectro autista (SOARES, 2017).

Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo analisar a relação entre o eixo microbiota-intestino-cérebro e o transtorno do espectro autista, diante da literatura disponível, buscando compreender o impacto dessa relação na etiologia, sintomas, diagnóstico e tratamento do TEA.

2. MÉTODO

O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizado através de busca nas bases de dados MEDLINE e LILACS, utilizando os descritores “Gastrointestinal Microbiome” e “Autism Spectrum Disorder”, correspondentes à classificação dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). Definiu-se como critérios de inclusão artigos do tipo ensaio clínico, metanálise e revisão de literatura, publicados nos entre 2015 e 2021 sem restrições de idioma, foram excluídos artigos com modelos experimentais. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão foram encontrados 130 artigos, sendo 127 no MEDLINE e 3 no LILACS, através da leitura completa destes, selecionou-se 12 artigos, os quais demonstraram conteúdo com relevância ao objetivo do trabalho.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os artigos previamente selecionados neste trabalho, conforme critérios de inclusão, estão apresentados na tabela 1, bem como os distúrbios gastrointestinais analisados.

Tabela 1. Trabalhos Selecionados e Alterações Gastrointestinais Analisadas

Autor(es)	Ano	Título	Tipo de Estudo	Distúrbios Analisados
-----------	-----	--------	----------------	-----------------------

AZHARI, A; AZIZAN, F; ESPOSITO, G.	2018	A systematic review of gut-immune-brain mechanisms in Autism Spectrum Disorder	Revisão Sistemática	Alteração da microbiota intestinal e aumento da inflamação intestinal.
DING, X. <i>et al.</i>	2020	Gut microbiota changes in patients with autism spectrum disorders.	Ensaio Clínico	Alterações da diversidade microbiana e da composição da microbiota, alterações no metabolismo da galactose, atividade da glicosiltransferase, metabolismo da glutatona e resistência ao antifolato.
FATTORUSSO <i>et al.</i>	2019	Autism Spectrum Disorders and the Gut Microbiota	Revisão de Literatura	Diarreia, constipação, vômitos, problemas de alimentação, refluxo e dor abdominal.
GROCHOWSKA, WOJNAR, RADWOSKI	2018	The gut microbiota in neuropsychiatric disorders	Revisão de Literatura	Inflamação intestinal e alteração da barreira intestinal.
KEIGHTLEY, KOLOSKI, TALLEY	2015	Pathways in gut-brain communication: evidence for distinct gut-to-brain and brain-to-gut syndromes	Revisão de Literatura	Alteração gastrointestinal associada ao sofrimento psicológico (ansiedade, depressão e estresse).
KONG <i>et al.</i>	2021	Altered Autonomic Functions and Gut Microbiome in Individuals with Autism Spectrum Disorder (ASD): implications for assisting asd screening and diagnosis.	Coorte	Relação entre disbiose intestinal e alterações psiquiátricas.
LASHERAS	2020	Microbiota and gut-brain axis dysfunction in autism spectrum disorder: evidence for functional gastrointestinal disorders	Revisão de Literatura	Mudanças na diversidade do microbioma intestinal.
LEFTER <i>et al.</i>	2019	A Descriptive Review on the Prevalence of Gastrointestinal Disturbances and Their Multiple Associations in Autism Spectrum Disorder	Revisão de Literatura	Dor abdominal, constipação e diarreia.
PETRELLI, PUCCI, BEZZI	2016	Astrocytes and Microglia and Their Potential Link with Autism Spectrum Disorders.	Revisão de Literatura	Déficits nas funções das células gliais.
SAURMAN, MARGOLIS, LUNA	2020	Autism Spectrum Disorder as a Brain-Gut-Microbiome Axis Disorder	Revisão de Literatura	Alterações de microbiota e microbioma intestinal, problemas de motilidade intestinal e inflamação gastrointestinal.
YANG <i>et al.</i>	2020	Effects of gut microbial-based treatments on gut microbiota, behavioral symptoms, and gastrointestinal symptoms in children with autism spectrum disorder: a systematic review	Revisão Sistemática	Diarreia, constipação e dor abdominal.
ZOU <i>et al.</i>	2020	Dysbiosis of Gut Fungal Microbiota in Children with Autism Spectrum Disorders	Ensaio Clínico	Absorção de carboidratos e de minerais reduzida e disbiose imunológica.

O transtorno do espectro do autismo (TEA) é um grupo de transtornos do

desenvolvimento nervoso com comportamentos de padrão repetitivo, estereotipados e com características sociais e comunicativas afetadas. A patogênese para o TEA ainda não é clara, mas parece estar associada a complicações nas interações gene-ambiente sendo os homens os mais acometidos. Entre as várias patologias apresentadas pelo paciente com espectro autista, destacam-se as disfunções gastrointestinais (GI), sendo elas bastante comuns, além de apresentarem alta prevalência e direta relação com a gravidade dos sintomas. Muitos pacientes com TEA apresentam sintomas GI como diarreia, constipação e dor intestinal, reafirmando a estreita relação entre a doença e o microbioma intestinal (YANG *et al.*, 2020; ZOU *et al.*, 2020).

O questionamento da relação entre os TEA e o microbioma intestinal foi feito pela primeira vez com o surgimento de casos clínicos de crianças que desenvolveram TEA regressivo após exposição repetida a antibióticos para otite média crônica. Além disso, esse subgrupo também desenvolveu diarreia crônica após a administração de antibióticos, que foi rapidamente seguida de perda de habilidades sociais e perda de linguagem. A primeira hipótese foi feita por Ellen Bolte, mãe de uma criança com TEA regressivo, e sugeria que bactérias anaeróbias, como Clostridiales, possuíam capacidade de produzir neurotoxinas. A mãe também relatou melhora nos sintomas de TEA quando seu filho recebeu antibióticos adicionais destinados à erradicação de Clostridiales. A noção de que esta bactéria poderia ser um fator associado ao TEA estabeleceu a base para o primeiro ensaio clínico aberto de vancomicina – medicamento usado para tratar Clostridia em crianças com TEA regressivo (SAURMAN, MARGOLIS, LUNA, 2020).

A microbiota intestinal apresenta potencial para influenciar a função e o comportamento cerebrais através do “eixo microbiota-intestino-cérebro”, apresentando comunicação bidirecional, incluindo o sistema nervoso central (SNC), o sistema nervoso autônomo (SNA), o sistema nervoso entérico (SNE) e o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HPA). Além disso, a microbiota expõe relações importantes com o sistema imunológico, sendo que, a alteração da resposta imune pode modificar sua composição, resultando, possivelmente, na disfunção comportamental e intestinal no TEA (YANG *et al.*, 2020; ZOU *et al.*, 2020).

Os sintomas autistas podem ser, em partes, afetados por metabólitos microbianos e suas interações com as vias neuroendócrinas do paciente através do nervo vago, que faz interface com o sistema nervoso parassimpático (SNP). Há evidências científicas suficientes que provam que a microbiota intestinal difere entre indivíduos com TEA e indivíduos controles saudáveis. Crianças com autismo apresentaram maior riqueza em *Roseburia* e *Candida sp.* e menor abundância de *Dialister*, *Bilophila*, *Veillonella*, *Streptococcus*, *Coprococcus* e *Prevotella sp.* A exemplo da abundância de certos fungos no intestino de pacientes com TEA, foram detectados

sintomas relacionados à presença de *Candida* sp., sendo que em excesso, essa libera amônia e toxinas, diminuindo a absorção de carboidratos e de minerais, o que pode levar ao comportamento autista (ZOU *et al.*, 2020; KONG *et al.*, 2021).

Pesquisadores observaram a presença de desregulações imunológicas no TEA, verificando alterações nas citocinas circulantes e cerebrais, nas quimiocinas e em outros fatores de inflamação, além de verificar a distribuição anormal de outros tipos de leucócitos. Citocinas inflamatórias como interferon ($\text{INF } \gamma$), $\text{IL-1}\beta$, IL-6 , IL-12 , fator de necrose tumoral ($\text{TNF}\alpha$) podem estar associadas à gravidade dos sintomas nos pacientes, além do que níveis aumentados de algumas quimiocinas (CCL-2 e CCL-5) estiveram associados a comportamentos aberrantes e desenvolvimento mais prejudicado (PETRELLI, PUCCI, BEZZI, 2016).

Várias são as respostas imunes que podem ser observadas nos pacientes com TEA, sendo que algumas delas estão diretamente relacionadas com a microbiota intestinal como a supressão ou ativação da resposta imune no hospedeiro e a degradação da barreira intestinal, resultando em aumento no trânsito bacteriano. A microbiota pode agir modulando a diferenciação dos diferentes tipos de linfócito T, promover a produção de IL-17 pró-inflamatória no intestino e restringir a resposta das células T auxiliares e aumentar o nível das células T reguladoras produtoras de IL-10 . Em aspectos gerais, a simbiose entre microbiota intestinal e sistema imune promove a homeostase normal na vida do hospedeiro, enquanto a perturbação do equilíbrio pode ocasionar disfunção imunológica (AZHARI, AZIZAN, ESPOSITO, 2018; YANG *et al.*, 2020).

Há duas rotas neuroanatômicas conhecidas por enviar sinais do intestino para o cérebro, uma delas é o sistema nervoso autônomo e o nervo vago, a outra rota é o sistema nervoso entérico. Em relação a estas vias, algumas alterações anatômicas foram encontradas nos cérebros de indivíduos autistas, como o funcionamento gabaérgico prejudicado e um aumento da ativação de células microgliais, além de menor quantidade de células de purkinje no cerebelo (LASHERAS, 2020).

A composição da microbiota afeta o desenvolvimento celular nervoso desde o embrião até a idade adulta. Os efeitos são percebidos através da diferenciação das células tronco neurais, da migração e projeção de neurônios imaturos, do crescimento de axônios e de dendritos e na formação de sinapses. Quando há irritação ou lesão do tecido cerebral, micróglia e astrócitos são ativados, respectivamente, liberando citocinas inflamatórias, podendo interferir diretamente na resposta neuroimune. Além disso, as bactérias da flora intestinal podem, direta ou indiretamente produzir neurotransmissores (NT), sendo que, alterações nessa microbiota podem ocasionar em desregulação de NT no sistema periférico e em distúrbios do

neurodesenvolvimento (YANG *et al.*, 2020).

Bactérias benéficas como *Lactobacillus*, *Bifidobacterium* e *Bacilo* foram encontradas produzindo NT como dopamina, norepinefrina, serotonina, ácido-4-aminobutírico (GABA), acetilcolina e histamina, havendo evidências entre *Lactobacillus* e a modulação dos níveis serotoninérgicos e dopaminérgicos no cérebro, influenciando o desenvolver inicial do cérebro. Após tais indícios, é possível afirmar que desordens microbianas no intestino afetam o neurocomportamento e o funcionamento intestinal no TEA. Metabólitos microbianos intestinais resultantes de desordens foram encontrados no microbioma de pacientes com TEA (ácidos graxos de cadeia curta, para-cresol, dimetilamina, hipúrico e fenilacetilglutamina), sendo esses, indutores do comportamento característico da patologia, além de afetar o sistema imune e neural dos portadores (KEIGHTLEY, KOLOSKI, TALLEY, 2015).

O estudo de DING *et al.*, coletou amostras fecais de 127 crianças entre 2 e 7 anos de idade, dessas 77 possuem TEA e 50 são saudáveis. O resultado foi que as crianças com TEA possuem alterações da diversidade microbiana e da composição da microbiota, houve um aumento expressivo de *Lachnospiraceae*, *Clostridiales*, *Erysipelotrichaceae*, *Dorea*, *Collinsella*, e *Lachnoclostridium*, enquanto que *Bacteroides*, *Faecalibacterium*, *Parasutterella*, e *Paraprevotella* foram significativamente menores no grupo com TEA. Ademais, identificou-se que o microbioma intestinal está associado à gravidade dos sintomas da doença, houve maior abundância de *Lachnospiraceae* em crianças com TEA grave e menor abundância em crianças saudáveis. Também foram identificados, no grupo com TEA, alterações no metabolismo da galactose, atividade da glicosiltransferase, metabolismo da glutatona e resistência ao antifolato (DING *et al.*, 2020).

A disbiose pode acarretar em inflamação, o que altera a barreira do intestino, caso a pessoa tenha o TEA, será mais suscetível a essa lesão. Esse processo pode proporcionar e a invasão do organismo por microorganismos, metabólitos intestinais, toxinas, como por exemplo o lipopolissacarídeo. Através disso, marcadores pró-inflamatórios podem aumentar na corrente sanguínea e agir no sistema nervoso central, influenciando no TEA (GROCHOWSKA, WOJNAR, RADWOSKI, 2018; FATTORUSSO *et al.*, 2019). A alteração no trato gastrointestinal pode atuar como fator de risco para quem já é predisposto ao TEA, também pode acarretar em sinais e sintomas clínicos, ou a ampliação destes, como irritabilidade, agressividade, ansiedade, distúrbios no sono, estereotípias, isolamento social, hiperatividade (GROCHOWSKA, WOJNAR, RADKOWSKI, 2018; FATTORUSSO *et al.*, 2019; LEFTER *et al.*, 2019).

É notável que há vínculo entre alterações do sistema imune, exacerbação de marcadores

inflamatórios e os sintomas do TEA, esse processo é demonstrando em alterações na microbiota intestinal, a qual é influenciada pelo sexo, idade, genética, fatores ambientais, inclusive pela dieta, que se for a base de carboidrato pode aumentar a taxa de inflamação do trato gastrointestinal (GROCHOWSKA, WOJNAR, RADKOWSKI, 2018). Diante disso, produtos como ácido propiônico, ácido acético e ácido butírico, os quais se resultam de carboidratos não digeridos totalmente, podem se demonstrar em níveis elevados em pessoas com TEA (AZHARI, AZIZAN, ESPOSITO, 2018; FATTORUSSO *et al.*, 2019).

4. CONCLUSÃO

Entende-se, a partir do presente estudo, que pessoas portadoras do espectro autista possuem microbiota diferente dos demais indivíduos. Isso se deve ao fato de que entre as várias patologias que esse paciente apresenta, destaca-se justamente as disfunções gastrointestinais, o que eleva a probabilidade de haver uma correlação superior a das pessoas que não possuem o transtorno do espectro autista entre os eixos nervoso, gastrointestinal e endócrino. Assim, acredita-se que alterações fisiológicas no funcionamento da pessoa com TEA podem aumentar o nível de inflamação intestinal, o que pode ser transmitido ao sistema nervoso e agravar o quadro clínico do paciente. Desse modo, vários profissionais de saúde já recomendam uma alimentação mais equilibrada para quem possui TEA, evitando que citocinas pró-inflamatórias sejam sintetizadas no organismo do paciente. No entanto, ainda faltam mais estudos que comprovem essa hipótese, pois os que já existem ainda possuem deficiência de dados para detalhar completamente o mecanismo dessa relação.

5. REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, JB; MARTINS, DR; MARTINS, OC; GOMES, VMO; BORGES, FM. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ALTERAÇÃO DA MICROBIOTA INTESTINAL. **Anais do I Congresso Nacional de Microbiologia Clínica On-Line**, [S.L.], v. 2, n. 2, p. 13-13, 14 jun. 2021. Revista Multidisciplinar em Saúde. <http://dx.doi.org/10.51161/rem/1170>.

AZHARI, A; AZIZAN, F; ESPOSITO, G. A systematic review of gut-immune-brain mechanisms in Autism Spectrum Disorder. **Developmental Psychobiology**, [S.L.], v. 61, n. 5, p. 752-771, 6 dez. 2018. Wiley. <http://dx.doi.org/10.1002/dev.21803>.

DING, X; XU, Y; ZHANG, X; ZHANG, L; DUAN, G; SONG, C; LI, Z; YANG, Y; WANG, Y; WANG, X. Gut microbiota changes in patients with autism spectrum disorders. **Journal Of Psychiatric Research**, [S.L.], v. 129, p. 149-159, out. 2020. Elsevier BV.

<http://dx.doi.org/10.1016/j.jpsychires.2020.06.032>.

FATTORUSSO, A; GENOVA, L; DELL'ISOLA, G; MENCARONI, E; ESPOSITO, S. Autism Spectrum Disorders and the Gut Microbiota. **Nutrients**, [S.L.], v. 11, n. 3, p. 521, 28 fev. 2019. MDPI AG. <http://dx.doi.org/10.3390/nu11030521>.

GROCHOWSKA, M; WOJNAR, M; RADKOWSKI, M. The gut microbiota in neuropsychiatric disorders. **Acta Neurobiologiae Experimentalis**, [S.L.], v. 78, n. 2, p. 69-81, 2018. Exeley, Inc.. <http://dx.doi.org/10.21307/ane-2018-008>.

KEIGHTLEY, PC; KOLOSKI, NA; TALLEY, NJ. Pathways in gut-brain communication: evidence for distinct gut-to-brain and brain-to-gut syndromes. **Australian & New Zealand Journal Of Psychiatry**, [S.L.], v. 49, n. 3, p. 207-214, 20 fev. 2015. SAGE Publications. <http://dx.doi.org/10.1177/0004867415569801>.

KONG, X; LIU, J; LIU, K; KOH, M; TIAN, R; HOBBIE, C; FONG, M; CHEN, Q; ZHAO, M; BUDJAN, C. Altered Autonomic Functions and Gut Microbiome in Individuals with Autism Spectrum Disorder (ASD): implications for assisting asd screening and diagnosis. **Journal Of Autism And Developmental Disorders**, [S.L.], v. 51, n. 1, p. 144-157, 14 maio 2020. Springer Science and Business Media LLC. <http://dx.doi.org/10.1007/s10803-020-04524-1>.

LASHERAS, I.; SERAL, P.; LATORRE, E.; BARROSO, E.; GRACIA-GARCÍA, P.; SANTABÁRBARA, J.. Microbiota and gut-brain axis dysfunction in autism spectrum disorder: evidence for functional gastrointestinal disorders. **Asian Journal Of Psychiatry**, [S.L.], v. 47, p. 101874, jan. 2020. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ajp.2019.101874>.

LEFTER, R; CIOBICA, A; TIMOFTE, D; STANCIU, C; TRIFAN, A. A Descriptive Review on the Prevalence of Gastrointestinal Disturbances and Their Multiple Associations in Autism Spectrum Disorder. **Medicina**, [S.L.], v. 56, n. 1, p. 11, 27 dez. 2019. MDPI AG. <http://dx.doi.org/10.3390/medicina56010011>.

ONZI, FZ; GOMES, RF. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO E REABILITAÇÃO. **Revista Caderno Pedagógico**, [S.L.], v. 12, n. 3, dez. 2015. ISSN 1983-0882.

PAIXÃO, LA; CASTRO, FFS. Colonização da microbiota intestinal e sua influência na saúde do hospedeiro. **Universitas: Ciências da Saúde**, v. 14, n. 1, p. 85-96, 2016.

PETRELLI, F; PUCCI, L; BEZZI, P. Astrocytes and Microglia and Their Potential Link with Autism Spectrum Disorders. **Frontiers In Cellular Neuroscience**, [S.L.], v. 10, n. 21, p. 1-1, 12 fev. 2016. Frontiers Media SA. <http://dx.doi.org/10.3389/fncel.2016.00021>.

REGO, SWSE. **Autismo: fisiopatologia e biomarcadores**. 2012. Tese de Doutorado. Universidade da Beira Interior.

SAURMAN, V; MARGOLIS, KG.; LUNA, RA. Autism Spectrum Disorder as a Brain-Gut-Microbiome Axis Disorder. **Digestive Diseases And Sciences**, [S.L.], v. 65, n. 3, p. 818-828, 13 fev. 2020. Springer Science and Business Media LLC. <http://dx.doi.org/10.1007/s10620-020-06133-5>.

SOARES, RA. **Influência da Microbiota Intestinal nas Perturbações do Espectro do Autismo**. 2017. Tese de Doutorado. Universidade de Coimbra.

YANG, J; FU, X; LIAO, X; LI, Y. Effects of gut microbial-based treatments on gut microbiota, behavioral symptoms, and gastrointestinal symptoms in children with autism spectrum disorder: a systematic review. **Psychiatry Research**, [S.L.], v. 293, p. 113471, nov. 2020. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113471>.

ZOU, R; WANG, Y; DUAN, M; GUO, M; ZHANG, Q; ZHENG, H. Dysbiosis of Gut Fungal Microbiota in Children with Autism Spectrum Disorders. **Journal Of Autism And Developmental Disorders**, [S.L.], v. 51, n. 1, p. 267-275, 23 maio 2020. Springer Science and Business Media LLC. <http://dx.doi.org/10.1007/s10803-020-04543-y>.

CAPÍTULO 40

DISTÚRBIOS OSTEOMUSCULARES RELACIONADOS AO TRABALHO ADQUIRIDOS POR PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c40](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c40)

Ana Luisa Mendes Ribeiro¹, Ana Luiza Vieira Dias², Vanessa Sousa Bastos³, Livia Karen Barbosa de Brito⁴, Ana Alice Alves dos Santos⁵, Amilton Diniz dos Santos⁶, Emilly da Silva Pereira⁷, Mariana Silva Souza⁸, Karinn de Araújo Soares Bastos⁹.

¹ Universidade Federal do Piauí - UFPI, (analuuhm28@gmail.com)

² Universidade Federal do Piauí - UFPI, (analvd55@gmail.com)

³ Centro Universitário UniFacid, (vanessabastos46@gmail.com)

⁴ Universidade Federal do Piauí - UFPI, (liviakarenbb@gmail.com)

⁵ Centro Universitário Santo Agostinho - UNIFSA, (alvesalice38@gmail.com)

⁶ Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, (dinizamilton02@gmail.com)

⁷ Christus Faculdade do Piauí - CHRISFAPI, (emillypereira63@gmail.com)

⁸ Christus Faculdade do Piauí - CHRISFAPI, (marianasouza_s@hotmail.com)

⁹ Universidade Federal do Piauí - UFPI (karinnsoares@yahoo.com.br)

Resumo

Objetivo: Identificar na literatura os principais distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT) adquiridos por profissionais da Enfermagem, assim como suas respectivas causas, consequências e medidas de prevenção. **Método:** É uma revisão integrativa da literatura, que teve como questão norteadora: “Quais os principais DORT adquiridos por profissionais da Enfermagem, suas causas, consequências e medidas de prevenção?”. A busca

foi realizada na base de dados LILACS. Utilizaram-se os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), a partir da combinação: Enfermagem AND "Transtornos Traumáticos Cumulativos" OR "Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho". Os critérios de inclusão foram: estudos disponíveis *online*, gratuitos, disponibilizados na íntegra, nos idiomas português, inglês e espanhol, publicados desde 2011 a 2021. Os critérios de exclusão foram: estudos duplicados e os que tratavam de outras classes profissionais ou que não fossem pertinentes ao objetivo da presente investigação. No total, foram encontradas 478 produções e, a partir da leitura dos títulos e dos resumos, utilizando os critérios de seleção estabelecidos, restaram 14 para a amostra final. **Resultados:** Os principais DORT adquiridos por profissionais da Enfermagem são doenças que acometem tendões, músculos, fáscias e ligamentos, que podem ocorrer de forma isolada ou combinada, são problemas que acometem principalmente os membros superiores e a coluna, como as tendinites, lombalgias, cervicalgias e dorsalgias. Vários fatores de riscos estão associados às DORT, em razão de sua etiologia ser multifatorial, podendo ser de natureza ergonômica e/ou psicossocial. **Considerações Finais:** Observou-se que os principais DORT adquiridos por profissionais da Enfermagem são os que afetam principalmente os membros superiores e a coluna, a exemplo de tendinites, dorsalgia, lombalgia e cervicalgia, sendo as duas últimas as mais prevalentes.

Palavras-chave: DORT; Profissionais; Enfermagem.

Área Temática: Ciências da Saúde.

E-mail do autor principal: analuuhm28@gmail.com.

1 INTRODUÇÃO

O aumento, ao longo dos anos, de pessoas com agravos incapacitantes constitui um desafio para as instituições de saúde. Fatores como as condições de saúde, o ambiente e o alargamento do topo da pirâmide etária contribuem para o crescente número de adultos com incapacidades funcionais ao redor do mundo, o que faz com que muitos não consigam realizar suas atividades de vida diária (AVD) ou consigam trabalhar por um tempo prolongado, resultando em altos índices de aposentadorias e licenças para tratamento (MOTA *et al.*, 2020).

Mediante a isso, os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT), correspondem a um dos problemas que mais atingem os profissionais da saúde e afetam cerca de 30% da população com mais de 25 anos, a nível mundial. Ainda, consiste em uma das principais causas de afastamento do trabalho e para requisição de auxílio-doença nesta classe trabalhadora (SILVA *et al.*, 2017).

Segundo Ribeiro *et al.* (2012), nota-se uma elevada incidência de DORT entre profissionais de Enfermagem, uma profissão que expressa um elevado risco de estresse e adoecimento devido a demanda de esforço físico e longas jornadas de trabalho. Leliset *al.* (2012) afirma que “os profissionais realizam atividades multivariadas, fragmentadas, apresentando sobrecarga e ritmo de trabalho acelerado, submetidos à alta exigência no ambiente laboral”.

Nessa perspectiva, os DORT são um conjunto de complicações que acometem músculos, ossos, fáscias, tendões e outras estruturas do sistema ósseo e muscular, desenvolvidas a partir de atividades e condições de trabalho inadequadas (VALENÇA; ALENCAR, 2015). Em geral, os trabalhadores acometidos por esses distúrbios apresentam como sinais e sintomas: dor, formigamento, fadiga precoce e dormência, contribuindo significativamente para o aumento de faltas no trabalho. Além de influenciar na taxa de absenteísmo entre os profissionais, o desenvolvimento de DORT pode gerar um risco funcional, dificultando o desenvolvimento das atividades do profissional, comprometendo a produtividade da empresa. Ademais, geram despesas expressivas em tratamentos dos acometidos e processos indenizatórios de responsabilidade social (LELIS *et al.*, 2012).

Consoante os estudos de Baptista, Merigh e Silva (2011), alguns dos fatores biomecânicos que podem dar origem a esses distúrbios são: posturas inadequadas por tempo prolongado, movimentos repetitivos, pressão mecânica sobre determinada região do corpo, impactos e vibrações, ou seja, o uso excessivo do sistema musculoesquelético durante a jornada de trabalho.

Nesse sentido, os profissionais acometidos com esse agravo podem desenvolver esgotamento físico e mental, capaz de prejudicar suas vidas em âmbito profissional e social, à vista de que afeta a funcionalidade, diminuindo o rendimento no trabalho, assim como pode ter sua mobilidade e convívio com outras pessoas limitados, em decorrência das dores (SILVA *et al.*, 2020).

O estudo da temática é de grande relevância para a promoção de ações de prevenção desses distúrbios, bem como para a abordagem aos profissionais da saúde com problemas no sistema osteomuscular, principalmente àqueles que perfazem longas jornadas de trabalho, como é o exemplo da enfermagem. Além disso, esta temática contribui também para o fomento de pesquisas sobre o assunto, assim como para o desenvolvimento de medidas que visam melhorias na prática laboral, além de favorecer discussões acerca desses problemas dentro das instituições de ensino na área da saúde.

Portanto, o objetivo deste estudo é identificar na literatura os principais DORT adquiridos por profissionais da Enfermagem, assim como suas respectivas causas, consequências e medidas de prevenção.

2 MÉTODO

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura que, para sua execução, seguiram-se as seguintes etapas: definição do tema e da questão de pesquisa, amostragem ou busca na literatura, definição das informações a serem extraídas, análise crítica dos estudos incluídos, discussão dos resultados e apresentação da revisão.

A pesquisa foi norteada pela seguinte pergunta: “Quais os principais DORT adquiridos por profissionais da Enfermagem, suas causas, consequências e medidas de prevenção?”. A partir disso, a busca foi realizada na base de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), em julho de 2021. Foram utilizados os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), cruzando-os com operadores booleanos AND e OR, formando a seguinte combinação: Enfermagem AND "Transtornos Traumáticos Cumulativos" OR "Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho".

Os critérios de inclusão foram: estudos disponíveis *online*, gratuitos, disponibilizados na íntegra, nos idiomas português, inglês e espanhol, publicados nos últimos 10 anos (de 2011 a 2021). Já os critérios de exclusão foram: estudos duplicados e os que tratavam de outras classes profissionais ou que não fossem pertinentes ao objetivo da presente investigação.

No total, foram encontradas 478 produções e a partir da leitura dos títulos e dos resumos, utilizando os critérios de seleção estabelecidos, restaram 13 na amostra final, sendo 12 artigos e 1 dissertação.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir da análise dos estudos selecionados, observaram-se os seguintes aspectos:

3.1 Principais DORT adquiridos por profissionais da Enfermagem

Os profissionais de enfermagem estão sujeitos aos riscos ocupacionais que podem comprometer a saúde física e mental e interferir na qualidade de vida do trabalhador, na qualidade da assistência prestada ao paciente, além de causar adoecimento, absenteísmo, presenteísmo e custos para as instituições (SANTOS; MARZIALE; FELLI, 2018).

Os principais DORT adquiridos por profissionais da Enfermagem são doenças que acometem tendões, músculos, fáscias e ligamentos, que podem ocorrer de forma isolada ou combinada, são problemas que acometem principalmente os membros superiores e a coluna, como as tendinites, lombalgias, cervicalgias e dorsalgias (DOSEA; OLIVEIRA; LIMA, 2016).

De acordo com Souza (2020), dentre os sintomas musculoesqueléticos mais prevalentes, a dor lombar foi a mais referida entre os trabalhadores de enfermagem, seguida da dor no pescoço.

3.2 Causas dos DORT em profissionais da Enfermagem

No ambiente de trabalho, os profissionais de saúde são constantemente expostos aos riscos ocupacionais com agentes físicos (frio, calor, umidade, radiação ionizantes e ruídos), químicos (gases, vapor e poeira) e biológicos (vírus, bactéria, fungos e protozoários), resultando em acidentes e consequentemente causando enfermidades a estes profissionais quando não são utilizadas medidas de segurança (VIDOR *et al.*, 2014).

Deste modo, ressalta-se que os DORT é causada principalmente por fatores de risco ocupacionais provenientes do ambiente de trabalho. No entanto, os fatores de risco externos ao ambiente de trabalho também podem contribuir para o aumento de DORT. Os riscos ocupacionais e não ocupacionais acabam gerando transtornos físicos, emocionais e sociais aos trabalhadores prejudicando diretamente a sua qualidade de vida (COSTA, 2015).

Vários fatores de riscos estão associados a DORT, em razão de sua etiologia ser multifatorial. Podendo ser de natureza ergonômica (postura inadequada, movimentos repetitivos, esforços excessivos, etc.), de natureza organizacional (jornadas de trabalho prolongadas, atividades monótonas, sobrecarga no trabalho e ausência de pausas, etc.) e os de natureza psicossocial (ambiente de trabalho sobrecarregado, pressão excessiva, conflitos de relacionamento interpessoal, acúmulo de tarefas, etc.) (VALENÇA; ALENCAR, 2015).

De acordo com Silva *et al.*, (2020), os danos osteomusculares nos profissionais de enfermagem acontecem principalmente durante o exercício profissional, pois requer esforços

físicos para caminhadas intermitentes, sustentação de cargas mecânicas, como a manipulação de paciente e transporte de materiais e os longos períodos que estão submetidos a posição ortostática. Além disso, estes profissionais são expostos a ambientes de trabalho inadequados ergonomicamente, como as alturas de bancadas e pias inadequadas, cadeiras e monitores sem ajustes ou encostos e a necessidade frequente de levantar e abaixar para alcançar os insumos.

O estilo de vida sedentário também é outro fator de risco que contribui para o desenvolvimento de distúrbios osteomusculares. Um estudo realizado por Monteiro e Faro (2015) evidenciou que houve uma alta taxa de desordens osteomusculares em trabalhadores que não realizavam nenhuma atividade física, indicando que o sedentarismo pode ser um fator de risco associado a DORT.

3.3 Consequências dos DORT em profissionais da Enfermagem

As manifestações clínicas decorrentes dos DORT acometem a vida do profissional de enfermagem em dimensões que vão além do ambiente de trabalho, impactando também a vida pessoal dos trabalhadores. Para mensurar as consequências dos DORT nos profissionais de enfermagem é preciso ter em mente a subjetividade da dor, que vai além de sintomas físicos, abrangendo o âmbito emocional, psicológico, econômico e social (DOSEA; OLIVEIRA; LIMA, 2016).

Um estudo realizado por Dosea, Oliveira e Lima (2016) destacou a presença do sentimento de inutilidade por parte dos trabalhadores, tendo em vista que a dor, por ser um fator de extrema limitação, interfere diretamente no desempenho durante o trabalho, deixando a desejar nas exigências de produtividade impostas e ficando sob pena de desemprego. Além disso, nos relatos do referido estudo fica evidente que a maioria dos profissionais com DORT tem uma percepção negativa da própria saúde, ressaltando os sentimentos de esgotamento, cansaço, desânimo, nervosismo e depressão, que interferem na relação com o trabalho e comprometem a funcionalidade em atividades comuns da vida diária.

O agravamento e a cronificação da condição clínica dos profissionais de enfermagem com DORT são resultado de inúmeros fatores como a automedicação, naturalização da dor, a auto cobrança e o medo do desemprego, que os levam a permanecer em campo, podendo resultar na incapacidade física pela limitação dos movimentos e a necessidade de um afastamento permanente das atividades laborais (SILVA *et al.*, 2020).

3.4 Medidas de prevenção aos DORT em profissionais da Enfermagem

Silva *et al.* (2020) trazem em seu estudo algumas formas de reduzir a ocorrência dos DORT e divide essas formas para dimensão individual, da equipe e da instituição. Como formas de prevenção na dimensão individual são propostas ações desde o uso adequado da mobília, postura adequada, até atenção e participação nos treinamentos. Na dimensão da equipe propõe-se uma boa convivência da equipe, para assim manterem o ambiente sempre limpo e organizado e se ajudarem em tarefas que requerem esforço físico. Na dimensão da instituição, o autor divide as competências em três frentes: mobília/estrutura, recursos humanos e capacitação, uma forma de garantir que os cuidados das outras dimensões sejam eficientes quando usados em conjunto.

Segundo Lelis *et al.* (2012), a prevenção desses distúrbios envolve o entendimento dos fatores psicossociais e do estresse no trabalho, para ajudar na prevenção de agravos, como o maior aproveitamento de tecnologias para a realização de trabalhos que exijam maior força física, pausas durante a jornada, boa convivência com a equipe de trabalho. Outrossim, o serviço de enfermagem ocupacional é essencial para auxiliar na prevenção e diminuição da ocorrência de DORT e absenteísmo, além de proporcionar melhorias para a qualidade de vida do profissional e minimizar custos para a empresa.

4 CONCLUSÃO

Por conseguinte, observou-se que os principais DORT adquiridos por profissionais da Enfermagem são os que afetam principalmente os membros superiores e a coluna, a exemplo de tendinites, dorsalgia, lombalgia (dor lombar) e cervicalgia (dor no pescoço), sendo as duas últimas as mais prevalentes.

Esses distúrbios são causados principalmente pelas condições trabalhistas desses profissionais, tendo em vista a demanda física para caminhar de forma intermitente, sustentar cargas mecânicas e permanecer em posição ortostática por longos períodos. Ademais, a ergonomia inadequada e o sedentarismo também contribuem para o desenvolvimento de DORT nesses trabalhadores.

Portanto, essas lesões geram consequências negativas em todos os aspectos da qualidade de vida dos profissionais da Enfermagem. Poisa dor limita o desempenho e a produtividade no trabalho, ficando sujeito ao desemprego, além de interferir na realização de tarefas comuns do cotidiano. Dessa maneira, devido à auto cobrança e o medo de perder o emprego, o profissional passa a se automedicar e naturalizar esse sintoma, continuando a realizar suas atividades laborais, o que pode agravar seu quadro clínico e afastá-lo de forma permanente de seu trabalho.

Nesse viés, algumas medidas podem ser adotadas para prevenir a ocorrência de DORT em profissionais da Enfermagem, como estratégias multidimensionais que envolvam o indivíduo, a equipe e a instituição, além do uso de tecnologias que auxiliem na realização das atividades desses trabalhadores e o serviço de enfermagem ocupacional para auxiliar a prevenir e diminuir a ocorrência desses distúrbios.

REFERÊNCIAS

- BAPTISTA, P. C. P.; MERIGH, M. A. B.; SILVA, A. Angústia de mulheres trabalhadoras de enfermagem que adoecem por distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 64, n. 3, pp. 438-444, jun. 2011.
- COSTA, G. T. V. **Fatores de risco dos distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho em trabalhadores de Enfermagem**: revisão integrativa. 2015. 151 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015.
- DOSEA, G. S.; OLIVEIRA, C. DA C. DA C.; LIMA, S. O. Percepção da qualidade de vida em portadores de distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. **Ciência, Cuidado e Saúde**, v. 15, n. 3, p. 482 - 488, 1 jul. 2016.
- LELIS, C. M. *et al.* Distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho em profissionais de enfermagem: revisão integrativa da literatura. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 25, n. 3, pp. 477-482, 2012.
- MONTEIRO, C. R.; FARO, A. C. M. Musculoskeletal symptoms among nursing staff in a neonatal unit, neonatal ICU and human milk bank. **Rev Bras Med Trab**, São Paulo, v. 13, n. 2, p. 83-90, 2015.
- MOTA, P. H. S. *et al.* Impacto da dor musculoesquelética na incapacidade funcional. **Fisioterapia e Pesquisa**. v. 27, n. 1, pp. 85-92, 2020.
- RIBEIRO, N. F. *et al.* Prevalência de distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho em profissionais de enfermagem. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 15, n. 2, pp. 429-438, jun., 2012.
- SANTOS, H. E. C.; MARZIALE, M. H. P.; FELLI, V. E. A. Presenteeism and musculoskeletal symptoms among nursing professionals. **Rev. Latino-Am. Enfermagem**, v. 26, 2018.
- SILVA, R. F. *et al.* Presença de distúrbios osteomusculares em enfermeiros de unidades de pronto atendimento. **Revista de Enfermagem e Atenção à Saúde**, v. 6, n. 2, dez., 2017.
- SILVA, S. M. *et al.* Distúrbios osteomusculares e ações para reduzir a ocorrência em trabalhadores de enfermagem. **Revista Enfermagem Uerj**, Rio de Janeiro, v. 28, p. 1-8, 1 jun. 2020.

SOUZA, Y. M. *et al.* Caracterização dos trabalhadores da enfermagem afastados por distúrbios osteomusculares em hospital universitário. **Revista de Enfermagem da UFSM**. Santa Maria - RS, v. 10, p. 1-17, 2020.

VALENÇA, J. B. M.; ALENCAR, M. C. B. Distúrbios osteomusculares e o trabalho de técnicos e auxiliares de enfermagem em instituições de idosos. **O Mundo da Saúde**, Santos, v. 39, n. 3, p. 316-324, 30 set. 2015.

VIDOR, C. R. *et al.* Prevalence of musculoskeletal pain among nursing surgery teams. **Acta Fisiátrica**, São Paulo, v. 21, n. 1, p. 6-10, fev. 2014.

CAPÍTULO 41

EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO FERRAMENTA PARA PROMOÇÃO DOS CUIDADOS AO RN: RELATO DE EXPERIÊNCIA

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c41](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c41)

Amanda Ferreira de Magalhães Santos- Universidade Regional do Cariri- Iguatu, Ceará, Brasil.

Amanda Maria Chaves Barros- Universidade Regional do Cariri- Iguatu, Ceará, Brasil.

Cinthia da Silva Nascimento Vieira- Universidade Regional do Cariri- Iguatu, Ceará, Brasil.

John Herbert da Silva Brito- Universidade Regional do Cariri- Iguatu, Ceará, Brasil.

Samuel Carlos Tomaz- Universidade Regional do Cariri- Iguatu, Ceará, Brasil.

Virna Souza- Universidade Regional do Cariri- Iguatu, Ceará, Brasil.

Samyra Paula Lustoza Xavier- Universidade Regional do Cariri- Iguatu, Ceará, Brasil.

RESUMO

A enfermagem objetiva juntar-se à mãe para garantir um melhor cuidado ao Recém-Nascido através da educação em saúde. Justificou-se apresentar a necessidade de informar às mães sobre os cuidados necessários para o Recém-Nascido. Objetivou-se relatar uma ação de educação em saúde às gestantes sobre os principais cuidados com seus recém-nascidos. A ação foi realizada na Estratégia Saúde da Família no ano de 2019, em Iguatu - CE, por acadêmicos do curso de bacharel em enfermagem. A ação teve abordagem qualitativa, onde cada discente discutiu com os ouvintes. O tema abordado foi: Os Principais Cuidados ao RN. A ação teve por finalidade instigar a curiosidade, participação e busca pelo conhecimento do público. Participaram do momento 4 gestantes e um homem. Foi realizado um círculo de conversa buscando a dinamização, o contato e entrosamento entre participantes. Concluiu-se que a visita trouxe enriquecimento técnico e potencializou o papel educativo da enfermagem.

Palavras-chaves: Educação em Saúde; Saúde da Criança; Estratégia Saúde da Família; Enfermagem Familiar; Saúde do Lactente.

Área Temática: Ciências da Saúde

E-mail do autor para correspondência: amanda.magalhaes@urca.br

1. INTRODUÇÃO

A educação em saúde é um campo que une a área da educação e da saúde com o intuito de trazer conhecimento sobre diferentes assuntos, permite que a população tenha acesso à ciência, o que, por conseguinte, dá maior autonomia e emancipação aos indivíduos que terão como responsabilidade o seu autocuidado, o da sua família e da sua comunidade (ARAÚJO; RODRIGUES; PACHECO, 2015).

Nas ações para promoção da saúde da criança, a educação em saúde é uma estratégia que deve ser oferecida nas maternidades e demais unidades de saúde para garantir um melhor cuidado e ajudar a diminuir a taxa de mortalidade neonatal. Sabe-se que o período neonatal é o momento mais sensível devido à imaturidade dos sistemas em geral, o que requer cuidados específicos com o Recém-Nascido (RN) (GOMES *et al.*, 2015).

Nesse cenário, destaca-se a equipe de enfermagem que tem como objetivo juntar-se à mãe e incentivar para garantir um melhor cuidado ao RN, o que favorece e promove o seu crescimento e desenvolvimento de forma saudável. A equipe profissional deve orientar a mãe levando em consideração os cuidados mais simples, como também os mais específicos, os quais contemplam temas diversos, como aqueles ligados à higiene tanto da mãe como do bebê, a sua alimentação, vacinações, dentre outros (ARAÚJO; RODRIGUES; PACHECO, 2015).

Ressalta-se também a inclusão do pai nas ações regulares de educação em saúde que acontecem dentro das Unidades Básicas de Saúde, visto que a gravidez sempre foi tratada como experiência unicamente feminina, mas que as divisões antes pré-estabelecidas como sendo unicamente de um sexo ou de outro estão em constante mudança, sendo hoje importantíssima a participação do pai em todo o decorrer da gestação (FERREIRA *et al.*, 2014).

É de extrema importância que os alunos desenvolvam, durante a formação em saúde, a criatividade necessária para executar ações de saúde com públicos vulneráveis, visto que a falta de informação pode ocasionar uma internação hospitalar ou até morte, quando se trata do RN. É necessário repassar que a utilização de métodos e práticas empíricas no tratamento de doenças ou em situações de urgência e emergência não surtem resultados que contribuem para a evolução do paciente, devendo o profissional promover promoção, prevenção e cuidados baseados em evidências científicas (ARAÚJO; RODRIGUES; PACHECO, 2015).

Mediante o exposto, vislumbra-se a necessidade de reafirmar ao profissional de saúde a importância do seu trabalho enquanto educador em saúde, bem como destacar que essas ações são fundamentais para a promoção do cuidado materno, adequadas às demandas do RN. Nesse sentido, objetivou-se relatar a experiência vivida em uma ação de educação em saúde às gestantes sobre os principais cuidados com seus recém-nascidos.

2. MÉTODO

Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência realizado por discentes do sexto semestre do curso de graduação em enfermagem da Universidade Regional do Cariri – Unidade Descentralizada de Iguatu, durante a disciplina de Educação em Saúde. A ação foi monitorada por uma aluna do nono semestre, estagiária da respectiva Unidade Básica de Saúde

durante a disciplina do Supervisionado I, e pela professora docente de ambas as disciplinas. A atividade teve como tema geral Os Principais Cuidados ao Recém-Nascido.

A ação foi realizada em outubro de 2019, em uma unidade da Estratégia Saúde da Família (ESF), localizada em um município da região Centro-Sul do Estado do Ceará. A escolha dessa unidade justificou-se pelo acesso facilitado dos discentes em decorrência do vínculo institucional universidade-ESF, bem como por esse ser um território com muitas vulnerabilidades em saúde.

Essa ação foi facilitada pelos Agentes Comunitários de Saúde, que a pedido da aluna do nono semestre realizaram a busca ativa das gestantes. Foi realizada uma reunião onde foram decididos os temas abordados (imunização, amamentação, engasgo, higienização, vestimenta e agasalhamento e posicionamento correto durante o sono) e a metodologia de ensino, a qual se deu a partir de uma exposição dialogada com apresentação de cartazes/imagens ilustrativas e uso de bonecas para simular as dinâmicas de cuidados de acordo com o tema em questão.

Todo o desenvolvimento da ação foi monitorado pela aluna do nono semestre e pela professora orientadora que contribuíram com a adição de saberes.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante a ação, foi realizado um círculo de conversa em um espaço reservado na unidade de saúde com intuito de dinamizar, instigar e facilitar o vínculo entre discentes-participantes da ação, para que o momento fosse de partilha e aprendizado para ambas as partes.

Na ocasião, estiveram presentes quatro gestantes e um pai que aceitou participar do momento enquanto sua esposa, gestante, estava em atendimento médico na unidade. A presença paterna durante a ação surpreendeu a toda a equipe, principalmente quando o pai relatou ser presente durante as consultas de pré-natal e dar suporte a sua companheira durante todas as mudanças físicas e emocionais pelas quais ela passou. Tal fato merece destaque, pois contrapõe as experiências vivenciadas pelos outros discentes que atuam na unidade, bem como pelo relato da professora que afirmava ver pouca presença dos homens no pré-natal e na puericultura.

O papel do pai durante o desenvolvimento da criança tem sua importância destacada, visto que tal envolvimento no processo de criação resultará em um futuro adulto que apresentará maior felicidade. O acompanhamento paterno em consultas ou grupos educativos durante a gestação reflete na relação conjugal, que poderá apresentar maior compreensão entre o casal quanto ao período gravídico, bem como na relação pai-filho, pelo fato de que as lembranças durante a vida pré-natal são retidas e ajudam no vínculo que será construído entre pai e bebê (FERREIRA *et al.*, 2014).

O primeiro tema abordado foi a imunização do RN, com destaque às vacinas BCG e Hepatite B, pois são as primeiras a serem aplicadas. Foi explanada que a principal maneira de evitar a tuberculose em crianças é por meio da BCG, vacina esta responsável por deixar a cicatriz na região do músculo deltoide do braço direito, no nível da inserção inferior deste músculo, o que facilita a identificação da cicatriz. As dúvidas envolvendo a formação da pápula foram sanadas, assim como os cuidados para com ela. Já acerca da vacina contra Hepatite B, foi ressaltada a aplicação de compressas frias para o alívio da dor.

A ESF apresenta uma grande relevância no que se refere às ações humanizadas de saúde, o próprio Ministério da Saúde a considera um avanço do Sistema Único de Saúde. A ela competem as ações de imunização e isso a torna algo acessível à população, o que acarreta em grandes contribuições positivas, principalmente para as crianças. Para as estratégias de imunização infantil, é imprescindível a oferta de informações aos pais, eles devem ficar cientes da sua importância, dos seus efeitos, das futuras aplicações e das suas demais contribuições para a diminuição da mortalidade infantil (HOFFMANN, 2009).

O próximo assunto debatido na ação foi a amamentação e os seus benefícios. Observou-se que os participantes entendiam como um ato de benefício somente para o bebê e sem acréscimo algum para a mãe. Através de uma boneca, foi demonstrada a forma correta da pega durante a amamentação, bem como as melhores posições para o bebê. Houve a resolução das dúvidas e de possíveis erros que normalmente ocorrem durante o processo de amamentação, de forma a evitar que o momento se transforme em uma situação de dor, ansiedade e espera pelo fim.

Antunes *et al.* (2008) trazem que os benefícios da amamentação não atingem a criança apenas quando bebê, tendo vantagens também para a saúde futura do indivíduo. Mães que amamentam seus filhos até os seis meses percebem diante de exames uma boa visão do filho, menores taxas de infecções parasitárias se comparado a uma criança que não foi amamentada e na vida adulta menos riscos de doenças cardiovasculares, redução do surgimento de diabetes e metade do risco de desenvolvimento de quaisquer disfunções neurológicas.

Em seguida, abordou-se sobre o engasgo. Para aquele público, o engasgo era caracterizado como a presença de um corpo estranho nas vias aéreas que tomou um “caminho errado” durante o ato de engolir; consequentemente isso interfere a passagem de ar para os pulmões, causando a asfixia. Após ouvir o conceito do público e reorientá-los sobre sua correta definição, a equipe seguiu apresentando a Manobra de Heimlich de forma prática em uma boneca. Ao final da explicação da manobra, uma das gestantes relatou um episódio de engasgo com seu filho, a qual durante um momento de desespero o reflexo a fez lançar a criança para o

alto, com o objetivo de desobstruir as vias aéreas. Depois de toda a explicação, resolução de dúvidas e escuta dos relatos sobre o assunto, todos praticaram a técnica utilizando a boneca.

Para que a mãe possa atuar com calma e segurança diante de situações como essas, é necessário não apenas o conhecimento teórico, é imprescindível o treinamento (com um profissional atuante da área) para domínio efetivo da prática. Esse treinamento pode estar sendo realizado pela mãe com uma boneca que tenha o tamanho aproximado de um bebê recém-nascido, e possibilita a identificação da localização anatômica para a manobra. Quanto mais vezes a mãe treina a prática simulada, mais ela sentirá segurança para enfrentar a situação quando for real (FARINHA; RIVAS; SOCCOL, 2020).

Ao abordar sobre a higienização, foi demonstrada a melhor forma de realizar a limpeza do RN, incluindo o coto umbilical e a região íntima com o auxílio da boneca novamente. O público não apresentou dúvidas quanto à limpeza do coto umbilical. Uma das mães relatou achar a higienização íntima feminina mais fácil, porém observou-se que ela possuía somente filhas e não tinha experiência com a higienização masculina; o contrário também foi observado em outra gestante que possuía somente filhos do sexo masculino. A mesma gestante reafirmou a importância de puxar o prepúcio para a remoção e prevenção do acúmulo de esmegma no pênis.

Orientar quanto à higienização corporal adequada para o RN é de extrema relevância, pois a pele do bebê é extremamente sensível e fina, o que necessita de uma atenção redobrada quanto ao seu cuidado. Sendo assim, é aconselhável que a higienização do RN seja feita com líquidos, sem sabão, suaves, sem cheiro, com pH neutro de uma forma que não modifique o tecido subcutâneo, nem irrite a pele ou seus olhos. O cordão umbilical merece também uma atenção redobrada, uma vez que pode ser uma importante entrada de micro-organismos. Sua limpeza deve ser diária, com água e sabão, com enxague e secagem adequada, aplicado ainda o álcool a 70% entre as trocas de fralda. É importante não cobrir a região umbilical com nenhum tipo de objeto nem colocar nada além do recomendado (AMADOR, 2014).

Na sequência o grupo explanou sobre a melhor forma de higienização da vestimenta do RN. Recomendou-se o uso de sabão de coco ou neutro devido à baixa quantidade de ácidos e perfumes na sua composição, o que diminui os riscos de alergias. Também foi aconselhado evitar o uso de amaciantes, alvejantes, sabão em pó comum ou removedor de manchas. Foi aconselhado não lavar junto com as roupas de adulto para evitar o contato com secreções indesejáveis, deixar a roupa secar e logo em seguida passar o ferro quente para evitar a proliferação de micro-organismos.

Vestir as roupas adequadas de acordo com o clima foi outra questão também debatida durante o momento. Foi ressaltada a utilização de roupas de cores mais claras e leves para os dias mais quentes e nos períodos de frio realizar um bom agasalhamento no RN para evitar a hipotermia. As mães comentaram que possuíam tal conhecimento, porém discordaram quanto ao agasalhamento, devido o clima quente na maior parte do ano. Percebeu-se que as mães obtiveram esse conhecimento de forma empírica, adquirido na comunidade e que passava de geração em geração.

Foi explanado que a termorregulação do recém-nascido é diferente em relação ao adulto, pois a quantidade de calor ou frio que o mesmo suporta é relativamente menor, uma vez que sua composição física ainda não apresenta o tônus muscular necessário para produção de calor. Os alunos apresentaram às mães que uma das principais medidas para prevenção desse desequilíbrio hemodinâmico do RN é manter a criança sempre envolta por mantas e vestimentas que possam minimizar os efeitos da flutuação de calor para o ambiente. Os cuidados com a vestimenta ainda são de extrema relevância, necessitando de acessórios como gorros, meias, luvas e uma manta.

Através da boneca, foi demonstrada a melhor posição para o RN dormir, sendo esta a posição supina. De forma geral as mães discordaram quanto à posição supina, devido ao falecimento súbito de um bebê na comunidade que estava nessa posição; uma delas afirmou que continuaria a utilizar a posição lateralizada por acreditar ser mais segura e que garantiria que o bebê não tombaria. Ressaltou-se também a necessidade de retirar objetos do berço devido ao risco de a criança puxar para a face e se sufocar, além de dormir no berço e não junto com os pais, com o objetivo de evitar que os mesmos sufocuem a criança. Uma das mães discordou, afirmando que o hábito de dormir todos juntos fortalece a união familiar.

A posição supina previne que ocorra com o RN a síndrome da morte súbita do lactente (SMSL), tida como a ocorrência inesperada de óbito entre menores de um ano, sem causa aparente e que não pode ser explicada pelas informações coletadas e nem pela realização de exame pós-morte. Acredita-se, embora sem dados conclusivos, que a incidência seja maior em países de baixa renda devido à pouca familiaridade das mães com assuntos voltados à gestação e ao puerpério. Visto isso, há a necessidade dos profissionais de saúde repassarem, insistirem e incentivarem as mães a colocarem os recém-nascidos para dormir nessa posição. Isto porque se trata de uma medida simples, de baixo custo, de fácil aplicação e com resultado comprovadamente eficaz (CESAR *et al.*, 2018).

Ao final da ação, foi realizado um momento de reflexão sobre a singularidade de cada indivíduo na sua infância e como educar seus filhos em relação ao preconceito e julgamento

com quem possui características diferentes daquelas do meio em que estão acostumados. Como por exemplo: a cor, religião, transtornos mentais, classe social e outras inúmeras formas de preconceito, na qual muitas crianças apenas reproduzem nas escolas aquilo que veem no comportamento daqueles que a cercam. Duas mães relataram que seus filhos já sofreram preconceito na escola; um devido à cor e o outro por apresentar transtorno do espectro autista.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, a ação facilitou o processo dinâmico com o público, instigando a obter conhecimento adequado sobre a temática, além de levar ensinamentos sobre intervenções corretas que poderão ser necessárias. A ação serviu para destacar o papel educativo da enfermagem como formadora da autonomia de seus clientes, levando-os a reconhecerem o problema e realizarem domesticamente a prática ideal, de modo a prevenir situações adversas.

Os acadêmicos puderam conhecer os aspectos que podem contribuir negativa ou positivamente a saúde das crianças. Tais aspectos são indicadores a serem trabalhados pelo enfermeiro para orientar suas ações de cuidado, com o objetivo de conscientizar sobre a relevância da prática do cuidar da criança. Ao fazê-lo, são necessárias políticas que foquem na formação profissional, na orientação familiar e nos estímulos de mudanças primordiais que venham beneficiar a criança e a família que está inserida.

REFERÊNCIAS

AMADOR, B. M. **Guia de cuidados básicos com recém-nascido na Estratégia Saúde da Família**. Monografia (Especialização em Linhas de Cuidado em Enfermagem – em Saúde Materna, Neonatal e do Lactente) Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, p.41. 2014.

ANTUNES, L. S.; *et al.* Amamentação natural como fonte de prevenção em saúde. **Rev. Ciência e Saúde Coletiva**, n.1, vol.13, p. 103-109, 2008.

ARAÚJO, B. B. M.; RODRIGUES, B. M. R. D.; PACHECO, S. T. A. A promoção do cuidado materno ao neonato prematuro: a perspectiva da educação problematizadora em saúde. **Rev. Enferm. UERJ, Rio de Janeiro**, n.1, v.23, p.121-131, 2015.

CESAR, J. A.; *et al.* Intenção das mães em colocar o bebê para dormir em decúbito dorsal: um estudo de base populacional. **Rev. Ciência & Saúde Coletiva**, n.2, v.23, p.501-508, 2018.

FARINHA, A. L.; RIVAS, C. M. F.; SOCCOL, K. L. S. Estratégia de ensino-aprendizagem da manobra de heimlich para gestantes: relato de experiência. **Rev. Disciplinarum Scientia**, n.1, v.22, p.59-66, 2021.

FERREIRA, T. N.; *et al.* A importância da participação paterna durante o pré-natal: percepção da gestante e do pai no município de Cáceres–MT. **Rev. Eletr. Gestão & Saúde**, n. 2, v.5, p.337-345, 2014.

GOMES, A. L. M. *et al.* Conhecimentos de familiares sobre os cuidados com recém-nascidos. **Revista da Rede de Enfermagem do Nordeste**, n.15, v.16, p.258-265, 2015.

HOFFMANN, M. V. Conhecimento da família acerca da saúde das crianças de 1 a 5 anos em uma comunidade ribeirinha: subsídios para a enfermagem pediátrica. **Rev. Esc Anna Nery**, n.4, v13, p.750-756, 2009.

CAPÍTULO 42

EDUCAÇÃO POPULAR COM UM GRUPO DE IDOSOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c42](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c42)

Geísa de Moraes Santana¹, Célio Pereira de Sousa Júnior², Nágila Silva Alves³, Jônatas Lucas Marcelino da Silva⁴, Sara Silva Soares⁵, Felipe Xavier Soares⁶, Antonia Claudiana Batista da Silva Melo⁷, Elzenira da Silva Rodrigues⁸, Lorena Stephany Lopes Fernandes⁹, Antônio Lucas Farias da Silva¹⁰

¹ Universidade Estadual do Piauí, (geisasantana97@gmail.com)

² Universidade Federal do Pará, (academicocelio@gmail.com)

³ Universidade Estadual do Piauí, (nglarraial@gmail.com)

⁴ Universidade Federal de Pernambuco, (jonatas.lucas@ufpe.br)

⁵ Universidade Estadual do Piauí, (nutrisarasoares@gmail.com)

⁶ Universidade Estadual Do Piauí, (felipesaores@aluno.uespi.br)

⁷ Instituto de Ciências Jurídicas e Sociais Prof. Camilo Filho, (wilner_claudiana@hotmail.com)

⁸ Universidade Federal do Piauí, (elzenira36@gmail.com)

⁹ Centro Universitário Uninvafapi, (lorenastephanny_12@hotmail.com)

Centro Universitário UniFacid (lucas1992farias@gmail.com)

Resumo

Objetivo: Relatar a experiência de acadêmicos da saúde em um projeto de extensão de educação popular com idosos. **Método:** Trata-se de um estudo descritivo do tipo Relato de Experiência obtido a partir de um projeto de extensão realizado em uma cidade do interior do Piauí, realizado no ano de 2019. A iniciativa teve apoio do Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (PRÓ-SAÚDE) pela Universidade Estadual do Piauí. O projeto era composto por 10 acadêmicos da área da saúde, dos cursos de Fisioterapia, Enfermagem,

Nutrição, Educação Física e Terapia Ocupacional, os encontros ocorriam com periodicidade quinzenal com duração de 1 hora, no salão paroquial da cidade. Os idosos eram convidados pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) durante as visitas domiciliares e pela paróquia durante as missas. Em média participavam 10 usuários em cada encontro. **Resultados:** No total aconteceram 07 encontros, assim as atividades foram previamente planejadas pelos acadêmicos e coordenadores. Cada encontro era dividido em três momentos: o acolhimento, a problematização da realidade com propostas de ações transformadoras mediadas por momentos de reflexão crítica, dialógica e compartilhada e a finalização. Optou-se por utilizar metodologias ativas, como rodas de diálogos, teatros, paródias e etc, o objetivo era proporcionar momentos de fala e de escuta. **Considerações Finais:** A partir das falas dos idosos que participaram das atividades propostas e da vivência dos acadêmicos conclui-se que além de experiências enriquecedoras de trocas de saberes com o grupo de idosos, também foi possível aprender mais sobre as metodologias ativas e de acolhimento que a educação popular preconiza.

Palavras-chave: Saúde do Idoso; Relações Comunidade-Instituição; Qualidade de Vida.

Área Temática: Ciências da Saúde.

E-mail do autor principal: geisasantana97@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial iniciado nos países de alta renda e que vem crescendo nos países de média e baixa renda, dentre eles o Brasil. Embora desejável e represente uma conquista da humanidade, esse crescimento traz implicações sociais, econômicas, políticas e de saúde (VERAS, 2018).

Esse envelhecimento traz consigo problemas de saúde que desafiam os sistemas de saúde e de previdência social. Envelhecer não significa necessariamente adoecer. A menos que exista doença associada, o envelhecimento está associado a um bom nível de saúde. Com isso, é fundamental investir em ações de prevenção ao longo de todo o curso de vida, em virtude do seu potencial para “resolver os desafios de hoje e, de forma crescente, os de amanhã” (KALACHE, 2008; MIRANDA *et al*, 2016).

Segundo o Relatório Mundial de Envelhecimento e Saúde (2015), a maioria dos problemas enfrentados pelas pessoas idosas são associados às condições crônicas, principalmente doenças não transmissíveis. E a maioria delas pode ser prevenida e retardada

adotando-se comportamentos saudáveis, trabalhar coletivamente aspectos educativos sobre as temáticas se mostraram efetivas. No desenvolvimento das atividades de educação em saúde, em grupos, é importante que os profissionais enfatizem, também, o empoderamento e a autonomia do sujeito para reforçar o desenvolvimento de habilidades e motivar para um cuidado mais integral (BRASIL, 2013).

Nas práticas de saúde, a simples transferência de informações nem sempre surte o efeito desejado. Nesse sentido, é importante que a educação da pessoa com diabetes seja priorizada em espaços que permitam o diálogo, onde serão debatidos problemas específicos conectados às condições de vida e à dinâmica comunitária, de tal forma que os cidadãos envolvidos sejam valorizados na sua explicitação de saberes, incorporações e reflexões. Só então a incorporação de conhecimentos e práticas será possível entre os cidadãos, suas famílias e os grupos (JAHN, 2012).

Assim, a Educação Popular em Saúde (EPS), em sua dimensão libertadora, remete indivíduos e grupos à troca de saberes e experiências, permitindo-lhes associar a saúde ao resultado das suas condições de vida levando a uma emancipação do sujeito (CARLESSO, 2017).

Segundo Lira (2014), a EPS contrapõe a visão de educação em saúde, entendida como um modo de fazer a população reorganizar e adquirir novos hábitos que assimilem práticas higiênicas e recomendações dos profissionais de saúde, para evitarem o aparecimento de doenças, pois a Educação Popular em Saúde preocupa-se em educar para a saúde no sentido de ajudar a população a compreender as causas das doenças e a se organizar para superá-las.

As ações educativas possibilitam vivenciar a formação universitária, de maneira interdisciplinar, dialógica, processual, tendo uma visão holística do ser humano. Elas contribuem significativamente para a formação de profissionais comprometidos com as transformações sociais, e com o seu próprio fazer, no contato com o outro (LIRA, 2014).

Assim, o presente estudo tem como objetivo relatar a experiência de acadêmicos da saúde em um projeto de extensão de educação popular com idosos.

2 MÉTODO

Trata-se de um estudo descritivo do tipo Relato de Experiência obtido a partir de um projeto de extensão realizado em uma cidade do interior do Piauí, realizado no ano de 2019.

A iniciativa teve apoio do Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em

Saúde (PRÓ-SAÚDE) pela Universidade Estadual do Piauí.

A pesquisa descritiva é construída a partir da descrição cuidadosa dos fatos e efeitos de uma dada situação, com o objetivo de obter informações sobre questões que foram definidas como em investigação (AUGUSTO, 2013). O relato de experiência, segundo o Instituto de Ciências da Vida, da Universidade Federal de Juiz de Fora [2017] é um texto que descreve precisamente uma dada experiência que possa contribuir de forma relevante para sua área de atuação. Segundo este instrutivo de elaboração de relatos de experiência, ele apresenta as motivações ou metodologias para as ações tomadas na situação e as considerações/impressões que a vivência trouxe àquele (a) que a viveu.

O projeto era composto por 10 acadêmicos da área da saúde, dos cursos de Fisioterapia, Enfermagem, Nutrição, Educação Física e Terapia Ocupacional, os encontros ocorriam com periodicidade quinzenal com duração de 1 hora, no salão paroquial da cidade. Os idosos eram convidados pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) durante as visitas domiciliares e pela paróquia durante as missas. Em média participavam 10 usuários em cada encontro.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para Gadotti (2017), as atividades de extensão universitária buscam aproximar diversos setores da sociedade da comunidade acadêmica, mediante ações inter-relacionadas realizadas em determinados territórios por meio de elaborações de estratégias de abordagem e de soluções de problemáticas sociais

No total aconteceram 07 encontros, assim as atividades foram previamente planejadas pelos acadêmicos e coordenadores. O processo de planejamento das ações de saúde é fundamental para a sistematização do processo de trabalho das organizações e serviços deste setor que reflete na qualidade da assistência aos usuários. Assim, o planejamento pode ser definido como um método de se pensar ações, de organizar, de alcançar resultados e de efetivar metas estabelecidas (LANZONI *et al.*, 2009). Cada encontro era dividido em três momentos: o acolhimento, a problematização da realidade com propostas de ações transformadoras mediadas por momentos de reflexão crítica, dialógica e compartilhada e a finalização.

Optou-se por utilizar metodologias ativas, como rodas de diálogos, teatros, paródias e etc, o objetivo era proporcionar momentos de fala e de escuta. Essa abordagem seguiu uma corrente mais participativa e com intervenções multidisciplinares. Na primeira etapa era

realizado o acolhimento, geralmente através de alongamentos corporais, música, poesia ou exercícios respiratórios.

Na segunda etapa, as atividades desenvolvidas buscavam estimular a construção da autonomia dos sujeitos por meio da problematização, da troca de informações e da reflexão para a ação. Uma das ferramentas era a roda de conversa, que é uma forma de buscar construir espaços de partilha, confronto de ideias e entendimento baseado na liberdade de diálogo entre os participantes na intenção de se afirmar como uma alternativa importante para ampliar o grau de corresponsabilidade das ações na produção de saúde (FARIAS *et al*, 2008).

Imagem 1: Encontro 2 do projeto de extensão

Fonte: Autores (2021)

O projeto contou com as seguintes temáticas: Envelhecimento ativo, Memórias, Hipertensão e Diabetes. Prevenção de quedas, Alimentação saudável, Saúde Mental e Prevenção do câncer de mama e próstata.

Para Assis (2005), na perspectiva de aprendizagem da Educação Popular em Saúde, dois elementos são fundamentais para o trabalho educativo e referem-se às experiências dos sujeitos e os conhecimentos advindos da vida prática das pessoas. Neste sentido, a abordagem educativa deve priorizar como eixo metodológico, a criação de contextos de intercomunicação que favoreçam a expressão e reflexão sobre as percepções das pessoas relacionadas ao modo como estas lidam com as noções de saúde/doença, as dificuldades enfrentadas por elas na busca de

aquisição e ampliação de sua saúde e os meios de que se utilizam para alcançar este objetivo, diante das adversidades em seus contextos sociais.

Além disso, a proposta interdisciplinar do projeto permitiu que a interação entre diversas áreas, em um relacionamento recíproco, substituísse a visão fragmentada por uma concepção unitária do ser humano. Permitindo crescimento de habilidades pessoais, como capacidade de adaptação, confiança, sensibilidade e aceitar novos papéis.

Essas ações são importantes, pois, o desenvolvimento de ações voltadas à promoção da saúde aliando o saber popular com o saber científico auxiliam na diminuição do consumo dos serviços de saúde. A educação popular em saúde compreende e reconhece a importância dos saberes e práticas populares e sugere a mediação entre os saberes técnico científicos e populares, promovendo visibilidade e autonomia aos sujeitos junto à sociedade e aos serviços de saúde (BRASIL, 2013).

4. CONCLUSÃO

A partir das falas dos idosos que participaram das atividades propostas e da vivência dos acadêmicos conclui-se que além de experiências enriquecedoras de trocas de saberes com o grupo de idosos, também foi possível aprender mais sobre as metodologias ativas e de acolhimento que a educação popular preconizada. Para além do cuidado, a educação se faz de extrema importância na prevenção de agravos do processo saúde-doença. Como também a experiência possibilitou aos extensionistas a interação com a comunidade e a troca de experiências com os idosos, pois o que alicerça a extensão universitária é a troca de saberes acadêmicos e populares.

REFERÊNCIAS

AUGUSTO. Pesquisa Qualitativa: rigor metodológico no tratamento da teoria dos custos de transação em artigos apresentados nos congressos da Sober (2007-2011). **Rev. Econ. Sociol. Rural**, v. 51, n. 4, 2013.

ASSIS. Envelhecimento ativo e promoção da saúde: reflexão para as ações educativas com idosos. **Rev APS**, v. 8, n. 1, p. 15-24, 2005.

FARIAS, A. M.; ROCHA, A. A. A.S.; NEVES, N. A. Roda de conversa: contribuição da educação popular em saúde à gestão participativa do sus no município de Paudalho. Tese (Doutorado em Gerontologia Biomédica), Recife, 2008.

GADOTTI, M. Extensão universitária: para quê. São Paulo: Instituto Paulo Freire, 2017.

JAHN. Educação popular em saúde: metodologia potencializadora das ações do enfermeiro. **REUFSM**, v. 2, n.3, p. 547-552. 2012.

KALANCHE. O mundo envelhece: é imperativo criar um pacto de solidariedade social. *Ciênc. saúde coletiva*, v. 13, n. 4, 2008.

LANZONI, G.M.M.; LINO, M.M.; LUZARDO, A.R.; MEIRELLES, B.H.S. planejamento em enfermagem e saúde: uma revisão integrativa da literatura. *Revista Enfermagem UERJ*, Riode Janeiro, v. 17, n. 3, p. 430 – 435, 2009.

LIRA, G. A. Educação popular na promoção da saúde do idoso no contexto comunitário. 2014. 135 f. Tese (Doutorado em Gerontologia Biomédica) – Instituto de Geriatria e Gerontologia, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2014

MIRANDA *et al.* O envelhecimento populacional brasileiro: desafios e consequências sociais atuais e futuras. **Rev. bras. geriatr. Gerontol**, v. 19, n. 3, 2016.

Ministério da Saúde. Brasil. Gabinete do Ministro. Portaria nº 2.761, de 19 de novembro de 2013. Institui a Política Nacional de Educação Popular em Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (PNEPS-SUS).

VERAS. Envelhecer no Brasil: a construção de um modelo de cuidado. **Cien Saude Colet**, v. 23, n. 6, p. 1929 – 1936, 2018.

CAPÍTULO 43

EFICÁCIA DOS EXERCÍCIOS NA DOR EM PACIENTES COM OSTEOARTRITE DE JOELHO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA COM METANÁLISE

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c43](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c43)

**Lílian Maria Magalhães Costa de Oliveira¹, Maria Yasmim da Conceição Chagas²,
Monaliza de Sousa Moura³, Verônica Letícia Magalhães da Silva⁴, Bruna Steffany
Aquino de Oliveira⁵, Mayara Monteiro Andrade⁶, Mariana Antonia de Carvalho
Ferreira⁷, Ravena Mayra Sousa Braga⁸, Jorgyanne Gonzalez Costa⁹, Laiana Sepúlveda
de Andrade Mesquita¹⁰**

¹ Universidade Estadual do Piauí, (liliancostaa_@hotmail.com)

² Universidade Estadual do Piauí, (yasmimchagaslp@gmail.com)

³ Universidade Estadual do Piauí, (monalizasmoura@outlook.com)

⁴ Universidade Estadual do Piauí, (magalhaesveronicals@gmail.com)

⁵ Universidade Estadual do Piauí, (brunasteffany2980@gmail.com)

⁶ Universidade Estadual do Piauí, (myalamonteiro@hotmail.com)

⁷ Universidade Estadual do Piauí, (marianacarvalho0173@gmail.com)

⁸ Universidade Estadual do Piauí, (ravenamayra@gmail.com)

⁹ Universidade Estadual do Piauí, (jorgyannegonzalez1402@gmail.com)

¹⁰ Universidade Estadual do Piauí, (laianasepulveda@hotmail.com)

Resumo

OBJETIVO: Portanto, o objetivo desse estudo é verificar a eficácia dos exercícios na dor em indivíduos com osteoartrite de joelho. **MÉTODO:** Trata-se de uma revisão sistemática com metanálise, onde foram analisados os estudos publicados entre 2015 a 2021, consultadas nas bases de dados Pubmed, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Physiotherapy Evidence Database (PEDro). Apenas ensaios clínicos randomizados (ECR) que tivessem recrutado pacientes com diagnóstico de osteoartrite de joelho e estimassem os efeitos de qualquer tipo de exercícios

comparando com grupo controle e outras intervenções para o desfecho de dor. Oito estudos foram incluídos na análise qualitativa e 7 na metanálise. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Mazloum et al (2017) e outros três estudos observaram uma diferença estatística a favor dos exercícios, quando comparados ao grupo controle. E ao ser associado a outras intervenções, seus efeitos foram potencializados, como mostrado por BOKAEIAN et al., (2015) e outros dois estudos. **CONCLUSÃO:** Pode-se concluir que os exercícios foram eficazes para paciente com dor no joelho devido a osteoartrite e seu efeito foi potencializado quando associado com outras intervenções.

Palavras-chave: Dor; Osteoartrite; Joelho.

Área Temática: Ciências da Saúde

E-mail do autor principal: liliancostaa_@hotmail.com

1 INTRODUÇÃO

A osteoartrite, também conhecida como osteoartrose, artrose ou doença articular degenerativa, é uma doença reumática caracterizada pelo desgaste da cartilagem articular e por alterações ósseas e tem como principais sinais e sintomas dor, rigidez matinal, crepitação óssea, atrofia muscular, estreitamento de espaço intra-articular, que resulta em formações osteofíticas, dentre outras manifestações que levam a um declínio funcional. (SOCIEDADE BRASILEIRA DE REUMATOLOGIA, 2019); (YAMADA et al., 2018).

Sua etiologia é multifatorial, mas existem fatores que podem aumentar sua chance de incidência, como a obesidade, o envelhecimento, lesões articulares prévias ou fatores genéticos, por exemplo. Estudos também apontam que a doença tem preferência pela articulação do joelho, devido à sua funcionalidade e características de sustentação e descarga de peso. Além disso, a doença atinge principalmente o sexo feminino (ROCHA, et al., 2020).

As intervenções para a osteoartrite são diversas e aplicadas de acordo com o quadro clínico do paciente e evolução da doença. Entre esses tratamentos, tem ganhado destaque os exercícios, sejam eles em solo ou aquáticos, pois têm demonstrado sucesso quanto à diminuição da dor e melhora da qualidade de vida, uma vez que auxiliam no fortalecimento muscular, propriocepção, nutrição da articulação, dentre outros benefícios que influenciam na manutenção da funcionalidade dos pacientes. (COSTA, 2021); (FACCI; MARQUETTI; COELHO, 2017).

Portanto, o objetivo desse estudo é verificar a eficácia dos exercícios na dor em indivíduos com osteoartrite de joelho.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de uma revisão de literatura do tipo sistemática com metanálise.

2.1 Identificação e seleção de estudos

Três bases/bancos de dados foram consultadas para elegibilidade dos estudos incluídos, sem restrição de linguagem, com data de publicação entre janeiro de 2016 a março de 2021: Pubmed, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Physiotherapy Evidence Database (PEDro). Utilizando-se a estratégia de busca a seguir: (*movement techniques exercise OR Strength training OR Proprioception training*) AND (*Knee Osteoarthritis*) AND (*Pain*).

Dois avaliadores independentes analisaram os artigos para elegibilidade (MY e MM) pelo software Rayann QCRI e, em caso de desacordo, um terceiro revisor arbitrava (LC).

2.1.1 Delineamento de estudo

Foram incluídos apenas ensaios clínicos randomizados (ECR).

2.1.2 Tipos de participantes

O critério de inclusão dos participantes para inclusão dos estudos foram indivíduos maiores de 18 anos com diagnóstico de osteoartrite de joelho.

2.1.3 Tipos de intervenções

Os ensaios foram incluídos apenas se estimassem os efeitos de qualquer tipo de exercícios:

- Exercícios + outra intervenção *versus* a mesma intervenção;
- Exercícios + outra intervenção *versus* exercícios;
- Exercícios *versus* eletroterapia;
- Exercícios *versus* terapia manual;
- Exercícios *versus* controle (intervenção mínima, placebo ou nenhuma intervenção).

2.1.4 Desfecho de interesse

Dor

2.2 Avaliação das características dos estudos

Os revisores extraíram os seguintes dados dos ensaios incluídos: dados bibliométricos, tamanho da amostra, características dos participantes e detalhes das intervenções, medida de desfecho e resultados.

2.2.1 Risco de viés

O risco de viés nos ensaios incluídos foi classificado usando a escala PEDro, que também avalia a integridade dos relatórios estatísticos. A pontuação total da PEDro varia de 0 a 10, calculada pela soma do número de critérios alcançados, com exceção do critério 1, que não é considerado na pontuação final. Os revisores avaliaram qualquer ensaio incluído com a escala PEDro, a menos que uma pontuação fosse já fornecido na página do PEDro (então esta pontuação foi selecionada) (SHIWA et al., 2013). Os ensaios seriam considerados como de “baixo risco” de viés se tivessem uma pontuação maior ou igual a 6 pontos. Ensaios com pontuação menor que 6 foram considerados como tendo “alto risco” de viés (MAHER et al., 2003).

2.3 Análise dos dados

Os dados dos resultados foram agrupados e analisados com o Review Manager (RevMan) versão 5.4 (The Nordic Cochrane Center, the Cochrane Collaboration, Copenhagen, Denmark). Com dados contínuos, os resultados foram apresentados como standardized mean difference (diferença das médias padronizadas) com intervalo de confiança de 95% e modelo de efeito aleatório.

3 RESULTADOS

3.1 Fluxo de estudos através da revisão

A pesquisa inicial nos bancos de dados eletrônicos identificou um total de 115 registros, após a remoção de duplicadas, foram obtidos 91 estudos e 24 pareciam potencialmente elegíveis após a triagem por título e resumo. A avaliação do texto completo identificou 8 estudos elegíveis, destes 7 foram incluídos na metanálise. O fluxograma do processo da seleção completa e a inclusão de ensaios são apresentados na Figura 01.

3.2 Características dos estudos incluídos

3.2.1 Risco de viés

Os resultados da avaliação de risco de viés são apresentados na Tabela 01. A pontuação PEDro dos ensaios incluídos variou de 4 a 7 pontos. Três estudos foram considerados como tendo alto risco de viés e seis com baixo risco de viés.

FIGURA 01: FLUXO DE SELEÇÃO DE ARTIGOS

Fonte: Autores, 2021.

TABELA 01: PONTUAÇÃO PEDRO DOS ENSAIOS INCLUÍDOS

Estudo	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	Total
BOKAEIAN et al., 2015	Y	Y	Y	Y	X	X	Y	Y	X	Y	Y	7
WANG et al., 2015	Y	Y	Y	Y	X	X	Y	Y	X	Y	Y	7
MAZLOUM et al., 2017	X	Y	X	Y	X	X	Y	X	X	Y	Y	5
HALL et al., 2018	Y	Y	X	Y	X	X	X	X	X	Y	Y	4
HAPER et al., 2019	Y	Y	X	Y	X	X	Y	X	Y	Y	Y	6
ASSAR ET AL., 2020	Y	Y	Y	Y	X	X	Y	X	X	Y	Y	7
YE ET AL., 2020	Y	Y	X	Y	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	7

VINCENT, K.R.; Y Y Y Y X X Y X Y Y Y 7
 VINCENT, H.K. (2020)

Legenda: 1º Elegibilidade e fonte/2º Randomização Aleatória/3º Sigilo de alocação/4º Grupos semelhante na linha de base/5º Cegamento dos participantes/6º Cegamento terapeuta/7º Cegamento avaliador/8º 15% de abandonos/9º Análise por intenção de tratar/10º Diferença relatada entre grupos/11º Estimativa de ponto e variabilidade relatada/ Y- Sim/ X- Não.

3.3 Intervenções

A descrição detalhada das características dos ensaios pode ser encontrada na Tabela 02.

TABELA 02: CARACTERÍSTICAS DOS ENSAIOS

Estudo	Participantes	Intervenção	Medidas de desfecho
Bokaeian et al., 2015	N: 28	G1: treino de força G2: treino de força + vibração de corpo inteiro	<ul style="list-style-type: none"> Desempenho muscular: isocinético. Desempenho funcional: teste de caminhada de 2 minutos, teste <i>timed up and go</i> (TUG), teste <i>timed 50 foot walk</i>. Dor: escala visual analógica (EVA). Qualidade de vida: Escala WOMAC.
Wang et al., 2015	N: 99	G1: treino de resistência G2: treino de resistência + vibração de corpo inteiro	<ul style="list-style-type: none"> Função física e desempenho funcional: TUG, teste de caminhada de 6 minutos, escala WOMAC. Dor: EVA. Força muscular: dinamômetro <i>hand-held</i>. Atividade da vida diária: índice de Lasegue. Qualidade de vida: questionário SF-36.
Mazloun et al., 2017	N: 31	G1: exercícios de Pilates G2: exercícios terapêuticos G3: nenhuma intervenção	<ul style="list-style-type: none"> Incapacidade e dor: índice de Lequesne. Desempenho funcional: tempo necessário para realizar atividades de caminhar, sentar e levantar. Senso de posição articular: Biodex.
Hall et al., 2018	N: 97	G1: exercícios de fortalecimento para extensores de joelho	<ul style="list-style-type: none"> Função física e dor: escala WOMAC. Força muscular: dinamômetro isocinético.

		G2: nenhuma intervenção	
Haper et al., 2019	N: 35	G1: exercícios de resistência G2: exercícios de resistência + compressão isquêmica	<ul style="list-style-type: none"> • Força muscular: dinamômetro Biodex. • Velocidade de caminhada: andar 10 voltas em um percurso de 40 metros. • Dor: EVA e Escala WOMAC. • Função física: <i>Short Physical Performance Battery</i> e <i>Late Life Function and Disability Instrument</i>.
Assar et al., 2020	N: 36	G1: programa de exercícios baseado em TRX G2: programa de exercícios aquáticos G3: nenhuma intervenção	<ul style="list-style-type: none"> • Dor: VAS. • Rigidez da articulação: WOMAC. • Equilíbrio: Escala de equilíbrio de Berg. • Instabilidade do joelho: questionário de Felson, escala numérica (0-5). • Amplitude de movimento de flexão de joelho: inclinômetro de bolha. • Força isométrica máxima dos extensores do joelho: Baseline Pull Push Dynamometer.
Ye et al., 2020	N: 50	G1: Baduanjin Qigong G2: nenhuma intervenção	<ul style="list-style-type: none"> • Estabilidade postural: sistema Prokin. • Posição do centro de pressão: deslocamento anterior posterior (AP) e médio-lateral (ML) medidos em milímetros. • Estabilidade postural e propriocepção no joelho: Sistema Proki. • Nível de dor, rigidez articular e função física: WOMAC.
Vincent, K.R.; Vincent, H.K. (2020)	N: 53	G1: treinamento de resistência concêntrica G2: treinamento de resistência excêntrica G3: nenhuma intervenção	<ul style="list-style-type: none"> • Dor: escala Numérica de Dor de 11 pontos • Função física: teste de elevação da cadeira, teste de subida de escada, teste de caminhada e teste de caminhada de 6 minutos • Força: método de 1RM

Fonte: Autores, 2021.

3.4 Efeitos dos tratamentos

3.4.1 Comparação entre exercício X controle

Quatro estudos (MAZLOUM et al., 2017; HALL et al., 2018; ASSAR et al., 2020; YE et al., 2020) compararam exercícios com grupo controle (intervenção mínima, placebo ou nenhuma intervenção) e verifica-se que há diferença estatística entre os grupos a favor dos exercícios (SMD= -0,70; IC 95% -1,25 a -0,31; p= 002) (Figura 02).

FIGURA 02: METANÁLISE EXERCÍCIO X CONTROLE

Legenda: Forest plot para comparação: 1 Exercício X controle, desfecho: 1.1 Dor.

3.5 Comparação entre exercício X exercício + outra intervenção

Três estudos (BOKAEIAN et al., 2015; WANG et al., 2015; HAPER et al., 2019) compararam exercícios com exercícios + outra intervenção e verificou-se que há diferença estatística entre os grupos a favor dos exercícios + outra intervenção (SMD= 0,73; IC 95% 0.16 a 1.30; p= 0.08) (Figura 03).

FIGURA 03: METANÁLISE EXERCÍCIO X EXERCÍCIO + OUTRA INTERVENÇÃO

Legenda: Forest plot para comparação: 2 Exercício X exercício + outra intervenção, desfecho: 2.1 Dor.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os exercícios foram mais eficazes dos que grupos controles e seu efeito foi potencializado quando associado com outras intervenções. Assim, recomenda-se o seu uso para paciente com dor no joelho devido à osteoartrite.

REFERÊNCIAS

ASSAR, S. et al. The effect of Total resistance exercise vs. aquatic training on self-reported knee instability, pain, and stiffness in women with knee osteoarthritis: a randomized controlled trial. **BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation**, v. 12, n. 1, p. 1-13, 2020.

BOKAEIAN, H.R. et al. The effect of adding whole body vibration training to strengthening training in the treatment of knee osteoarthritis: A randomized clinical trial. **Journal of bodywork and movement therapies**, v. 20, n. 2, p. 334-340, 2016.

CHEN, H. et al. The effects of a home-based exercise intervention on elderly patients with knee osteoarthritis: a quasi-experimental study. **BMC musculoskeletal disorders**, v. 20, n. 1, p. 1-11, 2019.

COSTA, M.S. **Recursos fisioterapêuticos utilizados na osteoartrite de joelho**, 2021.

FACCI, L.M.; MARQUETTI, R.; COELHO, K. C. Fisioterapia aquática no tratamento da osteoartrite de joelho: série de casos. **Fisioterapia em movimento**, v. 20, n. 1, 2017.

HALL, M. et al. Knee extensor strength gains mediate symptom improvement in knee osteoarthritis: secondary analysis of a randomised controlled trial. **Osteoarthritis and cartilage**, v. 26, n. 4, p. 495-500, 2018.

HARPER, S.A. et al. Blood-flow restriction resistance exercise for older adults with knee osteoarthritis: a pilot randomized clinical trial. **Journal of clinical medicine**, v. 8, n. 2, p. 265, 2019.

MAHER, C.G. et al. Reliability of the PEDro scale for rating quality of randomized controlled trials. **Phys Ther**, v. 83, n.8, p.713-21, 2003.

MAZLOUM, V. et al. The comparison of the effectiveness of conventional therapeutic exercises and Pilates on pain and function in patients with knee osteoarthritis. **Complementary therapies in clinical practice**, v. 31, p. 343-348, 2018.

OUYANG, X. et al. The curative efficacy of arthroscopic therapy in treating anterior cruciate ligament rupture with secondary osteoarthritis. **Eur Rev Med Pharmacol Sci**, v. 20, n. 2, p. 214-219, 2016.

ROCHA, T.C. et al. Os efeitos do exercício físico sobre o manejo da dor em pacientes com osteoartrose de joelho: Uma revisão sistemática com meta-análise. **Revista Brasileira de Ortopedia**, v. 55, n. 5, p. 509-517, 2020.

SARDIM, A.C.; PRADO, R.P.; PINFILDI, C.E. Efeito da fotobiomodulação associada a exercícios na dor e na funcionalidade de pacientes com osteoartrite de joelho: estudo-piloto. **Fisioterapia e Pesquisa**, v. 27, p. 119-125, 2020.

SHIWA, S.R. et al. Language of publication has a small influence on the quality of reports of controlled trials of physiotherapy interventions. **J Clin Epidemiol**, v.66, n.1, p.78-84, 2013. SOCIEDADE BRASILEIRA DE REUMATOLOGIA – SBR. **Osteoartrite (Artrose)**, 2019. Disponível em: <<https://www.reumatologia.org.br/doencas-reumaticas/osteoartrite-artrose/>>. Acesso em: 13 set 2021.

VINCENT, K.R.; VINCENT, H.K. Concentric and Eccentric Resistance Training Comparison on Physical Function and Functional Pain Outcomes in Knee Osteoarthritis: A Randomized Controlled Trial. **American journal of physical medicine & rehabilitation**, v. 99, n. 10, p. 932-940, 2020.

WANG, P. et al. Effects of whole body vibration exercise associated with quadriceps resistance exercise on functioning and quality of life in patients with knee osteoarthritis: a randomized controlled trial. **Clinical rehabilitation**, v. 30, n. 11, p. 1074-1087, 2016.

YAMADA, E.F. et al. Efeito dos exercícios de fortalecimento, de marcha e de equilíbrio no tratamento de osteoartrite de joelho. **Revista Brasileira de Ciência e Movimento**, v. 26, n. 3, p. 5-13, 2018.

YE, J. et al. The effects of baduanjin qigong on postural stability, proprioception, and symptoms of patients with knee osteoarthritis: a randomized controlled trial. **Frontiers in medicine**, v. 6, p. 307, 2020.

CAPÍTULO 44

CONHECIMENTO DE LIBRAS NA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DAS TÉCNICAS RADIOLÓGICAS: importância para a proteção radiológica e inclusão social dos surdos.

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c44](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c44)

Beatriz Duarte Araújo Rocha¹, Idna de Carvalho Barros Taumaturgo²

¹ Instituto Federal do Piauí (biaduarte0302@gmail.com)

² Instituto Federal do Piauí, (idnabarros@gmail.com)

Resumo

Introdução: A busca por atendimento de saúde pelas pessoas surdas é bem menor quando comparada as pessoas ouvintes. Tal fato deve-se a incompatibilidade comunicativa entre profissionais da saúde e paciente surdo, demonstrando a importância do ensino de Libras na formação acadêmica dos profissionais da saúde, e dentre eles os profissionais das técnicas radiológicas. **Objetivo:** Identificar o conhecimento em Libras de profissionais das técnicas radiológicas e/ou a presença de funcionários no estabelecimento de saúde que sejam capacitados em Libras. **Método:** Trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem quantitativa, realizada com 82 profissionais das técnicas radiológicas no período de 18/05/2021 à 28/05/2021, de acordo com os preceitos da resolução 466/12. Os critérios de inclusão foram: ter idade superior a 18 anos e já ter realizado atendimento de cunho radiológico a pacientes surdos. A coleta de dados se deu através de um questionário desenvolvido na plataforma Google Forms, o qual foi enviado aos participantes da pesquisa através do aplicativo WhatsApp. **Resultados:** A maioria dos participantes eram do sexo masculino (61%); na faixa etária de 20 a 29 anos (52%). Predominou profissionais que trabalham em instituição de saúde privada (67,5%) com tempo de atuação profissional entre 1 a 5 anos (39,1%). Quanto a realização de curso de Libras pelos profissionais entrevistados, 69,5% afirmaram nunca ter feito, porém demonstram interesse. Já 96,4% dos participantes relatam não haver a oferta de capacitação pelo local de trabalho, como também não há a disponibilidade de intérpretes, apontado por 98,8% dos participantes. **Conclusão:** A partir dos resultados obtidos, demonstra-se a importância da realização e da oferta do ensino de Libras na formação acadêmica dos profissionais das técnicas radiológicas, visto que tal conhecimento viria por auxiliar a comunicação entre profissional da saúde e paciente surdo, e aumentaria as chances de sucesso no atendimento de saúde da pessoa surda.

Palavras-chave: Ensino de Libras; Formação Acadêmica; Profissionais das técnicas radiológicas; Inclusão social.

Área Temática: Ciências da Saúde.

E-mail do autor principal: biaduarte0302@gmail.com.

1 INTRODUÇÃO

As deficiências, de maneira geral, são definidas como perda ou anomalia de uma determinada estrutura ou função, podendo ser anatômica, física ou psicológica. É de conhecimento geral que as pessoas com deficiência apresentam características peculiares devido as suas limitações, no entanto, devido a tal unicidade, essa população acaba por sofrer preconceitos e ser deixada à margem da sociedade, mesmo carecendo de atenção e cuidados especiais (PAGLIUCA, FIÚZA, REBOUÇAS, 2007).

A deficiência auditiva se configura como um dos mais graves distúrbios da comunicação, considerada como o tipo de deficiência mais difícil de gerar relações com o restante da sociedade, devido a audição ser o sentido pelo qual o ser humano percebe os sons, sendo essencial para o uso da linguagem como forma de comunicação (PAGLIUCA, FIÚZA, REBOUÇAS, 2007). Os graus de surdez são classificados mediante o grau de perda auditiva, baseados nos decibéis (unidade de medida da intensidade sonora), podendo ser: perda auditiva leve, de 20 a 40 dB; perda moderada, de 40 a 70 dB; perda severa, de 70 a 90 dB e perda profunda acima de 90dB (SILVA, 2008).

Segundo Gatto e Tochetto (2007, p. 110) “*A linguagem desempenha um papel essencial na organização perceptual, na recepção e estruturação das informações, na aprendizagem e nas interações sociais do ser humano*”. As pessoas com surdez têm uma perda enorme em todos os aspectos citados acima, devido a sua incompatibilidade de comunicação com o restante da sociedade. Em razão da sua cultura e forma de comunicação serem minoritárias, os surdos acabam por encontrar barreiras e falta de acessibilidade em diversos serviços essenciais à vida, sendo o principal deles, o atendimento de saúde (SOUZA et al., 2017).

Para os surdos, buscar um serviço de saúde é sinônimo de medo, desconfiança e frustração, devido a inconciliável comunicação entre o profissional de saúde e o paciente surdo. Devido a isso, essas pessoas buscam os serviços de saúde com uma frequência bem menor que o restante da sociedade. Esse comportamento é na verdade bastante compreensivo, visto que a grande maioria dos profissionais não estão aptos a se comunicarem com a comunidade surda, além de não terem preparo e conhecimento para lidar com uma cultura e linguagem tão

diferentes da habitualmente conhecida e utilizada, o que pode gerar ainda mais prejuízos e distanciamento dos ambientes de saúde pelos surdos (REIS, SANTOS, 2019).

Diante do impasse comunicativo entre profissionais da saúde e surdos, o debate acerca do uso e implementação da Língua Brasileira de Sinais (Libras) por esses profissionais nos ambientes de saúde se faz cada vez mais atual e necessário, devido ser por meio dela que a maioria da população surda se comunica (REIS, SANTOS, 2019). A Língua de Sinais foi reconhecida em 2002, através da Lei Federal nº 10.436, como meio legal de comunicação e expressão da população surda (BRASIL, 2002). A mesma se configura como capaz de expressar qualquer conceito e emoção, sendo altamente estruturada e complexa como qualquer outra língua falada (CHAVEIRO, BARBOSA, 2005).

Diante do exposto, a pesquisa tem como objetivos: identificar o conhecimento em Libras de profissionais das técnicas radiológicas e/ou a presença de funcionários no estabelecimento de saúde que sejam capacitados em Libras.

2 MÉTODO

Estudo de natureza descritiva com abordagem quantitativa. Este trabalho é um recorte de um estudo maior intitulado ‘Estratégias e desafios enfrentados por profissionais das técnicas radiológicas no atendimento ao paciente surdo’ desenvolvido no ano de 2021, no período de 18/05/2021 à 28/05/2021, com profissionais das técnicas radiológicas que já tivessem prestado algum tipo de procedimento radiológico de cunho diagnóstico ou terapêutico a pessoas surdas.

Para fundamentação teórica deste estudo, foram feitas buscas nas bases de dados em saúde Scientific Electronic Library Online (SciELO), Centro Latino-Americano de Informação em Saúde (LILACS) e Bases de Dados da Enfermagem (BDENF), entre os anos de 2005 a 2021, por meio dos seguintes descritores: *ensino de Libras, atendimento de saúde, pacientes surdos*.

A amostra utilizada para a realização do trabalho foi composta por profissionais das técnicas radiológicas, dentre eles técnicos, tecnólogos e estagiários. Os critérios de inclusão foram: ter idade superior a 18 anos e ter tido experiência no exercício da profissão em atendimento ao cliente surdo.

A coleta de dados se deu através de um questionário desenvolvido na plataforma Google Forms, que foi posteriormente enviado aos participantes da pesquisa (mediante contato prévio) pelo aplicativo WhatsApp.

O presente trabalho seguiu os preceitos estabelecidos pela Resolução Nº 466/12, que se fundamenta nos principais documentos internacionais sobre pesquisas que envolvem seres

humanos, no que concerne os princípios de não-maleficência, sigilo e privacidade. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que possibilita o mais amplo esclarecimento sobre a investigação a ser realizada.

A coleta de dados foi iniciada após a aprovação da pesquisa na submissão à Plataforma Brasil. Com a aprovação, o número de Certificado de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE) desta pesquisa é: 45141721.9.0000.9207.

3 RESULTADOS

No total, este estudo contou com a participação de 82 profissionais das técnicas radiológicas em que a maioria eram do sexo masculino (61%) e na faixa etária de 20 a 29 anos (52%). Predominou profissionais que trabalham em instituição de saúde privada (67,5%) com tempo de atuação profissional entre 1 a 5 anos (39,1%).

Na Tabela 1 constam as informações a respeito da oferta de capacitação em Libras pelo local de trabalho, como também sobre a realização de cursos pelos profissionais das técnicas radiológicas.

Tabela 1. Capacitação e conhecimento em Libras pelos profissionais das técnicas radiológicas, N=82, Teresina-PI, 2021.

Variáveis		N	%	Total	
				N	%
Em relação a realização de curso de Libras	Já fez, mas esqueceu tudo	4	4,9	82	100
	Já fez e está sendo útil	8	9,8		
	Nunca fez, mas tem interesse	57	69,5		
	Nunca fez e não tem interesse	13	15,9		
Quanto a oferta de cursos de capacitação em Libras no local de trabalho	Sim, obrigatórios	1	1,2	82	100
	Sim, mas não obrigatórios	2	2,4		
	Não	79	96,4		
Em relação a disponibilidade de intérpretes no local de trabalho	Sim, em turnos específicos	1	1,2	82	100
	Não	81	98,8		

Fonte: Elaborada pelas autoras, 2021.

Dos entrevistados, 69,5% afirmaram nunca ter feito curso de Libras, mas demonstram

interesse em fazer. Já 96,4% dos participantes relatam não haver a oferta de capacitação pelo local de trabalho, como também não há a disponibilidade de intérpretes, apontado pela maioria dos entrevistados (98,8%).

4 DISCUSSÃO

4.1 RELAÇÃO PROFISSIONAL-PACIENTE E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA

É evidente o aumento da requisição de exames de imagem, devido ao grande auxílio das imagens para o diagnóstico médico. Tomando como base os exames de Tomografia Computadorizada realizadas nos Estados Unidos, houve um aumento significativo da realização dos mesmos, sendo de 2 milhões/ano em 1980 e crescendo para 65 milhões/ano em 2003 (IARED, SHIGUEOKA, 2010). Já no Brasil, segundo o IBGE, a solicitação de exames tomográficos cresceu 32,5% no curto período de 2000 a 2005 (JUNG, ATALLAH, 2017).

O aumento da solicitação desses exames vai de encontro ao aspecto mais importante da radiologia, a Proteção Radiológica. A mesma consiste em expor o paciente a menor dose de radiação necessária para se obter um diagnóstico preciso e fidedigno. A Radioproteção é baseada nos seguintes princípios: justificação, limitação de dose e otimização. O primeiro consiste na solicitação de um exame de imagem somente se os benefícios forem superiores aos riscos envolvidos. A limitação das doses é estabelecida por legislação e o último deles afirma que devem ser utilizadas doses tão baixas quanto razoavelmente exequíveis, baseando-se no princípio ALARA - *as low as reasonably achievable* (IARED, SHIGUEOKA, 2010).

Os princípios da Radioproteção foram estabelecidos para reduzir a exposição à radiação tanto dos profissionais ocupacionalmente expostos (profissionais das técnicas radiológicas) como dos pacientes. A radiação ionizante causa a ionização de átomos do corpo humano, sendo possível acarretar efeitos biológicos decorrentes da exposição. Os efeitos biológicos da radiação são dependentes de vários fatores, como: quantidade de radiação, energia da radiação, tempo e tipo de exposição, como também da região do corpo que foi irradiada, devido a sensibilidade à radiação das células encontradas na região exposta (DOROW, MEDEIROS, 2019).

O fornecimento de informações imprescindíveis ao funcionamento dos exames de imagem e terapias radiológicas atuam como uma das vertentes da proteção radiológica, visto que os mesmos só são feitos de maneira correta caso haja uma boa orientação ao paciente quanto ao procedimento. O profissional das técnicas radiológicas deve buscar a confiança do paciente, a fim de oferecer um atendimento humanizado e de qualidade. Além disso, o mesmo deve explicar para

o paciente todas as etapas dos exames ou terapia de cunho radiológico, como também tudo o que acontecerá durante a realização do mesmo, evitando assim que o paciente se movimente ou fique no posicionamento errado e consequentemente o exame de imagem seja refeito, aumentando a exposição do paciente à radiação, o que não é desejável (SOUZA et al., 2017; DINIZ, COSTA, SILVA, 2016).

Outro ponto a ser destacado é sobre o uso de meios de contraste em exames de imagem, que é cada vez mais utilizado devido a sua capacidade de possibilitar a diferenciação da densidade de estruturas anatômicas. O uso do contraste requer um cuidado e atenção maior do profissional das técnicas radiológicas, isto se dá por que o meio de contraste é uma substância passível de causar reações alérgicas importantes, sendo de extrema necessidade uma anamnese detalhada antes da sua utilização. Uma boa orientação e comunicação com o paciente podem indicar se o uso do meio de contraste é arriscado ou não, podendo prever a ocorrência de reações alérgicas leves, moderadas, graves, ou até mesmo a morte (MARTINEZ, 2004).

Devido a todos esses fatores, é necessário que o profissional das técnicas radiológicas e os outros profissionais atuantes do setor de diagnóstico por imagem sejam atenciosos e capacitados para promoverem um atendimento seguro e de qualidade. Tal profissional tem como missão realizar os exames de imagem minimizando a quantidade de radiação ao paciente, informar e orientar o paciente sobre todas as etapas do procedimento. Além disso, tem a obrigação de prevenir, detectar e tratar os possíveis efeitos adversos que podem surgir devido ao uso do meio de contraste, maximizando as chances do paciente de obter um diagnóstico seguro e preciso (DINIZ, COSTA, SILVA, 2016).

4.2 IMPORTÂNCIA DO ENSINO DE LIBRAS NOS CURSOS DE SAÚDE

A necessidade e a importância da obrigatoriedade da disciplina de Língua Brasileira de Sinais na formação acadêmica de todos os profissionais da saúde, dentre eles os profissionais das técnicas radiológicas, estão amparados nos benefícios que uma boa comunicação entre profissional e paciente surdo vão promover no atendimento integral do último. É necessário oferecer as bases de conhecimento para que o profissional da saúde tenha acesso e possa aprender a linguagem dos surdos, visando uma efetiva comunicação com eles, o que aumentará a inclusão social dos surdos nos ambientes de saúde como também a melhoria do serviço prestado a essas pessoas que necessitam de atendimento especializado (RAMOS; ALMEIDA, 2017).

Mesmo que métodos de comunicação não verbais sejam utilizados no atendimento

desses

pacientes, a Libras ainda continua sendo o mais efetivo, por ser uma língua com estrutura gramatical própria e majoritariamente conhecida e utilizada pela comunidade surda. Devido a isso, destaca-se a importância de as pessoas terem conhecimento mínimo em língua de sinais, principalmente os profissionais da saúde, visto que ela é indispensável para o estabelecimento de uma comunicação eficiente e posterior relação de confiança do paciente para com o profissional, vindo a aumentar as chances das pessoas surdas buscarem os serviços de saúde com mais segurança e frequência (RAMOS; ALMEIDA, 2017).

A existência de pessoas com deficiência na nossa sociedade não deve ser vista com olhares preconceituosos, pois as deficiências nos mostram que todos somos diferentes e que o ser humano deve ser tolerante, respeitoso e buscar formas de incluir essas pessoas, que no caso da comunidade surda é através do estabelecimento de uma forma de comunicação eficiente. Quando relacionado aos ambientes hospitalares, faz-se imprescindível que esses espaços busquem formas e estratégias para se adequar as necessidades dessas pessoas, provendo um serviço digno em todos os níveis de assistência de saúde. A adequação a comunidade surda se faz através da capacitação e conhecimento em Libras pelos profissionais da saúde, que são os veículos do atendimento de saúde (SOUZA, PORROZZI, 2009).

A inclusão dos surdos na sociedade e a oferta de Libras como disciplina nos currículos escolares estão interligados. O ensino da Língua Brasileira de Sinais deve-se dar não apenas em categorias profissionais específicas, mas sim, desde os níveis básicos de ensino. O ensino de Libras nas escolas ainda é algo recente e que merece mais atenção, visto que o ensino dessa língua desde cedo proveria maiores chances de uma sociedade que saiba se comunicar com as pessoas surdas, facilitando a comunicação entre todos os cidadãos. As escolas inclusivas atuam no sentido de adaptar o sistema educacional de acordo com as necessidades de cada estudante, ou seja, o aluno surdo não é incluído apenas no ambiente de sala de aula e sim em todo o espaço educacional, viabilizando a inclusão social da comunidade surda nesses ambientes (SILVA, DAXENBERGER, 2015).

As potencialidades e habilidades do ser humano são desenvolvidas mediante a convivência social, conhecimento da cultura em que se vive e relações com outras pessoas que podem ou não ter deficiências. Porém, o surgimento dessas potencialidades é dependente do acesso que esses seres tem a diversos fatores e vivências. No contexto da surdez, a aprendizagem da língua de sinais pelos ouvintes se constitui como um elemento agregador do seu processo de formação quanto ser humano, construindo as bases de uma convivência social

com grupos diferentes dele mesmo (MARQUES, BARROCO, SILVA, 2013).

A Lei Federal nº 10.436 foi a responsável por reconhecer a Libras como meio legal de comunicação e expressão dos surdos e também apontar diretrizes, dentre elas: apoio ao uso e difusão da língua de sinais nos espaços públicos, garantia de atendimento adequado aos surdos pelas instituições de saúde e por fim, a obrigatoriedade do ensino de Libras em cursos de Educação Especial, Licenciaturas e Fonoaudiologia. A importância da obrigatoriedade citada anteriormente é indiscutível, entretanto a lei não expõe as bases para a oferta do curso de Libras nos cursos superiores, bem como a sua carga horária, deixando a cargo da instituição de educação a definição dos mesmos, o que não garante uma padronização do ensino da língua de sinais no Brasil (BRASIL, 2002. BENASSI, DUARTE, PADILHA, 2012).

Em uma pesquisa de campo realizada por Benassi, Duarte e Padilha (2012) foi questionado aos participantes se a carga horária de 60h do estudo da Língua Brasileira de Sinais era suficiente para o licenciado se comunicar efetivamente com o surdo. A maioria dos participantes relatou ser insuficiente, com a justificativa de ser impossível aprender e dominar uma segunda língua com um curso de pouca duração. Alguns afirmam a necessidade de mais um módulo do curso voltado a prática e conversação, o que viria por garantir mais domínio e segurança do licenciado ao se comunicar em Libras com as pessoas surdas (BENASSI, DUARTE, PADILHA, 2012).

5 CONCLUSÃO

Mesmo com a Lei Federal nº 10.436 em vigor, que determina que as instituições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos de assistência à saúde devam prestar assistência e atendimento adequado aos pacientes surdos, isso não ocorre, pois os profissionais da saúde não conhecem a língua de sinais (pois geralmente não faz parte da sua formação acadêmica) e também não há a oferta de cursos de capacitação e a disponibilização de intérpretes de Libras pelo local de trabalho. Tais condições dificultam o estabelecimento de uma comunicação eficiente com o paciente surdo, resultando na sua não inclusão social nos ambientes de saúde. Além disso, aumenta-se os riscos da exposição à radiação desnecessária pelo paciente, devido ao não seguimento das orientações dadas pelos profissionais das técnicas radiológicas, já que na maioria das vezes não há sucesso na comunicação entre os mesmos.

REFERÊNCIAS

BENASSI, C.A.; DUARTE, A. S.; PADILHA, S.J. Libras no ensino superior: sessenta horas

para aprender a língua ou para saber que ela existe e/ou como se estrutura. **Revista de Letras Norte@mentos**, v. 5, n. 10, p. 45-59, 2013.

BRASIL. Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras e dá outras providências. **Diário Oficial da República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 25 de abril. 2002.

CHAVEIRO, N.; BARBOSA, M. A. Assistência ao surdo na área de saúde como fator de inclusão social. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, São Paulo, v. 39, n. 4, p. 417-422, 2005.

DINIZ, K.D.; COSTA, I.K.F.; SILVA, R.A.R. Segurança do paciente em serviços de tomografia computadorizada: uma revisão integrativa. **Rev. Eletr. Enf.**, Goiás, v.18, p. 1-15, 2016.

DOROW, P.F. MEDEIROS, C. **Proteção radiológica no diagnóstico e terapia**. Santa Catarina: Publicação do IFSC, 2019.

GATTO, C.I.; TOCHETTO, T.M. Deficiência auditiva infantil: implicações e soluções. **Rev. CEFAC**, São Paulo, v. 9, n. 1, p. 110-115, 2007.

IARED, W. SHIGUEOKA, D.C. Exposição à radiação durante exames de imagem: dúvidas frequentes. **Diagn Tratamento**, São Paulo, v. 15, n.3, p. 143-145, 2010.

JUNG, R. ATALLAH, A.N. Tomografia computadorizada e risco de neoplasias. **Diagn Tratamento**, São Paulo, v. 22, n.2, p. 57-62, 2017.

MARQUES, H.C.R.; BARROCO, S.M.S.; SILVA, T.S.A. O ensino da Língua Brasileira de Sinais na educação infantil para crianças ouvintes e surdas: considerações com base na psicologia histórico-cultural. **Rev. Bras. Ed. Esp**, v. 19, n. 4, p. 503-518, 2013.

MARTINEZ, G.D.R. **Orientação para a equipe de enfermagem sobre exames radiológicos contrastados**. Orientadora: Ana Maria Magalhães. 2004. 45 f. TCC (Graduação em Enfermagem) - Escola de Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2004.

PAGLIUCA, L.M.F.; FIUZA, N.L.G.; REBOUCAS, C.B.A. Aspectos da comunicação da enfermeira com o deficiente auditivo. **Rev. esc. enferm. USP**, São Paulo, v. 41, n. 3, p. 411-418, 2007.

RAMOS, T.S.; ALMEIDA, M.A.P.T. A importância do ensino de Libras: relevância para profissionais da saúde. **Id on Line**, v. 10, n. 33, p. 116-126, 2017.

REIS, V. S. L.; SANTOS, A. M. Knowledge and experience of Family Health Team professionals in providing healthcare for deaf people. **Rev. CEFAC**, São Paulo, v. 21, n. 1, e5418, 2019.

SILVA, L.P. Manual de orientação de práticas interventivas no contexto educacional para professores do ensino fundamental. **Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE**. Mandirituba, 2008.

SILVA, M.L.; DAXENBERGER, A.C.S. Ensino de Libras para alunos da educação básica por meio de uma ação extensionista. **II Congresso Nacional de Educação**. 2015, p. 1-10.

SOUZA, M. F. N. S. *et al.* Principais dificuldades e obstáculos enfrentados pela comunidade surda no acesso à saúde: uma revisão integrativa de literatura. **Rev. CEFAC**, São Paulo, v. 19, n. 3, p. 395-405, 2017.

SOUZA, M.T.; PORROZZI, R. Ensino de Libras para os profissionais da saúde: uma necessidade premente. **Revista Práxis**, Rio de Janeiro, v.1, n. 2, p. 43-46, 2009.

SOUZA, N.R. *et al.* Atuação de enfermeiros em serviços de radioterapia. **Rev enferm UERJ**, Rio de Janeiro, v. 25, e. 26130, p. 1-7, 2017.

CAPÍTULO 45

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR FRENTE AS COMPLICAÇÕES OBSTÉTRICAS DECORRENTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c45](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c45)

Jônatas Lucas Marcelino da Silva¹, Tatiana indiana da Silva², Karolayne Carvalho Silva³, Ana Luiza Evangelista da Silva⁴, Rosa Raquel Pinto Guedes Marques⁵, Tiago Pedrosa Ferreira⁶, Joel Azevedo de Menezes Neto⁷.

¹Graduando em Saúde Coletiva, Universidade Federal de Pernambuco, (jonatas.lucas@ufpe.br).

²Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Maurício de Nassau Caruaru/PE, (Tatianaindiana10@gmail.com).

³Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Maurício de Nassau Caruaru/PE, (karoll66carvalho@gmail.com).

⁴Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Maurício de Nassau Caruaru/PE, (luizaana10@hotmail.com).

⁵Graduanda em Odontologia da Universidade Federal Fluminense Campus de Nova Friburgo, (rosa.raquel.marques@gmail.com).

⁶Graduando em Medicina da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Escola de Medicina, Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil. (tiago.pedrosa@aluno.ufop.Edu.br).

⁷Enfermeiro FBJ/AEB, PE. Pós graduação em Enfermagem em Estomatologia-Albert Einstein Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa -SP. (prof.joelnetto@gmail.com)

Resumo

Para a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), a violência adquiriu um caráter endêmico e com o passar do tempo converteu-se em um problema de saúde pública. Diversos danos à saúde podem resultar da violência doméstica, variando desde queixas ginecológicas e da esfera sexual até consequências obstétricas diversas, retardo em iniciar o pré-natal, abortamento e natimortalidade, baixo peso ao nascer, trabalho de parto prematuro e perdas fetais. Problemas psicológicos e problemas físicos como depressão, anemia, dor pélvica crônica, cefaleia, tentativa de suicídio e síndrome de estresse pós-traumático, aborto, ansiedade e uso de drogas. **Objetivo:** analisar a literatura científica acerca das complicações obstétricas provocadas pela violência doméstica e o papel da equipe multiprofissional nesse contexto. **Metodologia:** O estudo elaborado trata-se de uma revisão bibliográfica no qual foi realizada uma pesquisa exploratória. O estudo terá caráter qualitativo, baseado em artigos indexados na base Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), as fontes de dados MEDLINE, e SciELO. Foi utilizado o acrônimo PICO e os descritores Decs para a formulação da questão norteadora: Quais as evidências da literatura científica contextualizam sobre a atuação da equipe multidisciplinar frente a ocorrência de violência doméstica?. Foram coletados artigos do período entre os anos de 2015 a 2021. **Discussão:** As complicações graves no desenvolvimento da gestação de uma

mulher violentada, repercute em fatores como anemia, pré-eclâmpsia, eclampsia (aumento da pressão arterial durante a gravidez), diabetes gestacional, parto prematuro.. Não raramente, esses quadros podem levar à morte da gestante e do bebê. Além disso, existem razões psicológicas, que afetam o desenvolvimento da gravidez saudável. Como depressão, estresse, síndrome de estresse pós-traumático, uso de drogas, alcoolismo e ansiedade. A equipe multidisciplinar tem papel singular no cuidado e identificação da vítima.

Palavras-chave: Complicações obstétricas ; Violência doméstica; Equipe interdisciplinar de saúde.

Área temática: Saúde Pública

E-mail do autor principal: jonatas.lucas@ufpe.br

1 INTRODUÇÃO

Para a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), a violência adquiriu um caráter endêmico e com o passar do tempo converteu-se em um problema de saúde pública, devido ao crescente número de vítimas e à magnitude de sequelas orgânicas e emocionais que a mesma produz, além do amplo impacto na morbimortalidade da população e das implicações sociais e econômicas; situando-se entre as principais causas de morte na faixa etária de 15 a 44 anos. Podendo estar presente em todos os estágios da vida e manifestando-se sob diferentes formas e inúmeras circunstâncias.

Dentre as diversas situações em que as mulheres são vítimas, destacam-se, mais frequentemente, aquelas ocorridas no espaço socialmente estabelecido para o sexo feminino: o espaço privado, a família e o domicílio; estudos estatísticos apontam o domicílio como um dos principais ambientes de ocorrência das agressões, fato que se justifica, haja vista que na grande maioria das vezes o próprio parceiro é o responsável pelo crime; Fato que contribui para a subnotificação das ocorrências, resultando em muitos casos omissos, que não são notificados e nem mesmo identificados (ACOSTA, DF et al. 2018).

Tratando-se dessa questão no período gravídico, reforça ainda mais a atenção dos casos, já que pode ocorrer diversos danos à saúde da mãe do bebê. As complicações obstétricas são diversas, como retardo em iniciar o pré-natal, abortamento e natimortalidade, baixo peso ao nascer, trabalho de parto prematuro e perdas fetais. Também podem estar presentes dor pélvica crônica, cefaleia, doença espástica dos cólons, depressão, tentativa de suicídio e síndrome de estresse pós-traumático, ansiedade e uso de drogas.

Torna-se evidente que os serviços de saúde são essenciais nas ações de enfrentamento da violência, já que são nesses ambientes que, na maioria das vezes, as vítimas recebem o primeiro atendimento e/ou cuidados. Entretanto, percebe-se que muitos profissionais de saúde não identificam os agravos decorrentes dessa causa, o que evidencia a incapacidade de identificar e registrar os casos de violência doméstica (GARBIN LP, et al., 2015).

De acordo com Freitas RJM, et al. (2017), a identificação dos casos de violência ocorre na primeira etapa do processo de enfermagem, ou seja, no histórico e/ou coleta de dados. Portanto, o cuidado necessita ser planejado a fim de proporcionar segurança, respeito, acolhimento e satisfação das necessidades individuais da pessoa assistida. O acolhimento é primordial para a humanização do atendimento, e pode facilitar a coleta de todos os dados essenciais para a identificação das vítimas. Salientando-se com isso, a importância das unidades de serviços básicos de saúde na detecção precoce do problema, podendo reconhecer e acolher a vítima antes da ocorrência de sequelas ou incidentes.

Diante do exposto, o presente estudo objetiva analisar a literatura científica acerca do papel da equipe multiprofissional frente as complicações obstétricas provocadas pela violência

doméstica.

2 MÉTODO

Trata-se de uma revisão bibliográfica, onde o levantamento bibliográfico foi realizado nas bases de dados da LILACS e PUBMED, e na Biblioteca virtual de saúde-BVS, onde foi coletado artigos entre os anos de 2015 à 2020. Utilizado os Descritores (DeSC) e o acrônimo PICO para a formulação da questão norteadora: Quais as evidências da literatura científica contextualizam sobre a atuação da equipe multidisciplinar frente a ocorrência de violência doméstica?. Foram adotados como critérios de inclusão os artigos disponíveis e na íntegra nas bases de dados, que tivessem aderência ao título, objetivo e que respondessem a pergunta norteadora, e que estivessem dentro dos anos estabelecidos, no idioma português. Foram excluídos os artigos duplicados, anais de congressos, estudos sem aderência, fora dos anos estabelecidos e idioma. Foram selecionados 10 artigos completos, feito a análise criteriosa e após esta 6 artigos compuseram a amostra final.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A violência doméstica repercute em vários problemas de saúde, a exemplo disso, as queixas ginecológicas são muito comuns, podendo haver a presença de problemas como vírus e outros microrganismos. Entre as principais doenças contraídas por abuso, pode-se incluir a candidíase, AIDS, herpes, sífilis e gonorreia. Além disso, podem apresentar-se com dor pélvica crônica, infecções do trato urinário, infecções vaginais e cervicais, cefaleia e ganho de peso insuficiente. Não raro, as agressões sofridas traduz-se em inúmeras repercussões para a saúde das mulheres e impactam diretamente na sua qualidade de vida.

A mulher vítima de pelo menos um ato de violência física durante a gestação, está mais propensa ao acompanhamento pré-natal inadequado (OLIVEIRA et al.,2015). Em muitos casos, verifica-se que o acesso inadequado ou tardio desta à assistência pré-natal pode originar-se da proibição pelo companheiro para essa procura ou pelo intenso estresse psicológico vivenciado por ela durante a gravidez, muitas vezes, como resultado de eventos violentos. Assim, ela vai afastando-se da assistência e tornando-se mais exposta à violência pelo agressor (COSTA, et al.,2015).

As complicações graves no desenvolvimento da gestação de uma mulher violentada, reproduz em fatores como anemia, pré-eclâmpsia, eclampsia (aumento da pressão arterial durante a gravidez), diabetes gestacional, parto prematuro e parto distópico. Não raramente, esses quadros podem levar à morte da gestante e do bebê. Além disso, existem razões psicológicas, que afetam o desenvolvimento da gravidez saudável. Como depressão, estresse, síndrome de estresse pós-traumático, uso de drogas, alcoolismo e ansiedade. Não é considerável o descarte da hipótese de posteriormente essa mulher realizar um possível aborto, devido à sensação de impotência, desprezo, e angústia profunda, o que limita a mãe de cuidar de si e do seu bebê.

Destaca-se, a atenção para a continuidade das agressões, não só no período gravídico mas também no puerpério, onde há maiores expectativas de acolhimento, proteção e cuidado. Outras complicações, é o aumento das brigas de casal, ocasionadas pela mudança de vida e alterações do humor. Segundo os estudos, dificilmente os profissionais questionam sobre queixas de violência, e acabam não identificado no processo de exame, pois estão atuando no enfoque da gestação.

A violência doméstica, sexual e/ou outras foram incluídas como parte da lista de notificação compulsória, e o Ministério da Saúde (2018) afirmou que a notificação é fundamental para a organização dos serviços, para haver a garantia de acesso às medidas de prevenção dos agravos resultantes da violência em tempo oportuno. No entanto, os dados epidemiológicos no Brasil não são confiáveis, devido às subnotificações. O que implica na abordagem prioritária e atrapalhando a elaboração de políticas públicas, que objetivam destinar os recursos para a vigilância e assistência.

Tabela 1: Distribuição percentual da violência doméstica

Fonte: SILVA & OLIVEIRA, 2016.

Mesmo com a lei Maria da Penha considerada como uma das melhores do mundo, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), e trazendo punições mais severas para esse tipo de crime, o número de feminicídio continua crescente, e não intimida o ato machista de superioridade. A lei aumenta o rigor das punições em relação a crimes domésticos, pois foi pensada, discutida e criada com o intuito de punir os autores da violência, física, psicológica, patrimonial, sexual ou moral, contra a mulher praticada no ambiente familiar. Por isso, a atenção deve ser não somente das autoridades, mas também da família, sociedade e profissionais da saúde.

A equipe multidisciplinar é significativa na identificação desse contexto, mas infelizmente, muitos não apresentam segurança para conduzir essa questão, principalmente por não ter obtido durante sua formação os conhecimentos necessários. Cada profissional desempenha seu papel de acordo com as suas competências técnicas e legais, de forma integrada, focando no cuidado integral à saúde, e a vítima agredida, respeitando as leis vigentes no âmbito nacional e internacional. Estudos abordam fatores como maus tratos, abusos, violência obstétrica algo relacionado com aumento de ansiedade e transtorno do estresse-pós-traumático e depressão pós-parto.

O que enfatiza ainda mais, a importância de cada profissão nesse combate, tendo em vista as inúmeras questões a serem trabalhadas. Eles precisam conhecer a rede de apoio à vítima no município onde trabalha, para que possa encaminhá-la e orientá-la em relação aos serviços prestados e aos respaldos oferecidos pela lei, ajudando-as no enfrentamento e recuperação dos traumas sofridos, tanto psicológicos como físicos. Portanto, o profissional necessita prestar uma

assistência de forma holística e humanizada (ACOSTA DF, et al., 2017).

Vale complementar, que nesse cenário, o cirurgião dentista pode auxiliar na identificação de sinais de violência na gestação, e podem fazer a notificação de acordo com o grau de classificações da lesão física, a exemplo das lesões graves e gravíssimas, como perdas dentárias; avulsão dentária; fraturas dentárias onde há perda da coroa; comprometimento definitivo da estética dentária quando a paciente sorri ou conversa; lesões de tecidos moles da face que comprometam significativamente a estética facial (cicatrizes, paralisia permanente dos músculos da expressão facial).

A equipe multiprofissional que é composta por psicólogos, assistentes sociais, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, devem agir de forma interdisciplinar e perante a lei, sabendo que é uma obrigatoriedade que assegura não só a integridade do trabalho profissional, mas também a qualidade de vida a vítima e da criança.

4 CONCLUSÃO

Após a análise das literaturas, observou-se que as complicações obstétricas ocasionadas pela violência doméstica, pode interferir direta/indiretamente na vida da gestante e do bebê, e é capaz de causar traumas psicológicos, físicos e emocionais, durante o período gravídico, podendo estender-se ao puerpério, salientando a necessidade de interferência, atenção e cuidados de todos os profissionais da saúde que podem ter quaisquer tipo de contato com a vítima, durante seu exercício profissional.

Além disso, percebeu-se que a preparação desses profissionais durante a graduação, para esse tipo de enfrentamento também é uma aliada para melhor identificação de casos, além do treinamento de notificação. Existe todo o contexto descrito acima, importante e capaz de poupar/minimizar os danos e sequelas à vida da mulher grávida e do seu bebê, e melhorar a assistência prestada aos mesmos quando se inserirem nesse contexto difícil e precário.

REFERÊNCIAS

- 1-ACOSTA DF, et al. Representações sociais de enfermeiras acerca da violência doméstica contra a mulher: estudo com abordagem estrutural. Revista Gaúcha Enferm, 2018, 39 (e. 61308).
- 2- OLIVEIRA, , Lisiane Camargo Quialheiro de, et al, Violência por parceiro íntimo na gestação: identificação de mulheres vítimas de seus parceiros. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/1983-1447.2015.esp.57320>
- 3- COSTA, ,Marta Cocco da; SILVA, Ethel Bastos da; SIQUEIRA, Elisa Torentino. Gestantes em situação de violência sobre o olhar da saúde: revisão integrativa.Rev enferm UFPE on line., Recife, 9(supl. 2):965-73, fev., 2015 DOI: 10.5205/reuol.6391-62431-2-ED.0902supl201524
- 4- SILVA, L. E. L.; OLIVEIRA, M. L. C. Características epidemiológicas da violência contra a mulher no Distrito Federal, 2009 a 2012. Epidemiologia e Serviços de Saúde, v. 25, p. 331-342, 2016
- 5- GARBIN CAS, et al. Desafios do profissional de saúde na notificação da violência:

obrigatoriedade, efetivação e encaminhamento. *Ciência & Saúde Coletiva*, 2015, 20 (6), 1879-1890.

6-ACOSTA DF, et al. Aspectos éticos e legais no cuidado de enfermagem às vítimas de violência doméstica. *Texto Contexto Enferm*, 2017, 26 (3 e. 6770015)

7-FREITAS RJM, et al. Atuação dos enfermeiros na identificação e notificação dos casos de violência contra a mulher. *HU Revista*, 2017, 43 (2), 91-97.

8-BRASIL. Resolução no 510, de 7 de abril de 2016, do Conselho Nacional de Saúde. Dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. *Diário Oficial da União*, Abr. 7. Brasília (DF); 2016

CAPÍTULO 46

ESTIGMA RELACIONADO AS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E A IMPORTÂNCIA DO TESTE RÁPIDO NA ATENÇÃO BÁSICA: PERCEPÇÃO DE USUÁRIOS E PROFISSIONAIS

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c46](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c46)

Raquel da Silva¹, Silmara Nayra Silva Almeida², Karolyne Carvalho Baia³, Yasmin Maria Sarmiento Viana⁴, Anna Vitória Lima Pereira⁵, Karen Silva de Castro⁶, Sivaldo Oliveira da Silva Júnior⁷.

¹ Graduando (a) em Enfermagem pela Faculdade de Teologia, Filosofia e Ciências Humanas Gamaliel (FATEFIG), Tucuruí, Pará, Brasil, (raquel.silva6284@gmail.com)

² Graduando (a) em Enfermagem pela Faculdade de Teologia, Filosofia e Ciências Humanas Gamaliel (FATEFIG), Tucuruí, Pará, Brasil, (silmarasoarees@gmail.com)

³ Graduando (a) em Enfermagem pela Faculdade de Teologia, Filosofia e Ciências Humanas Gamaliel (FATEFIG), Tucuruí, Pará, Brasil, (Karol.baia@yahoo.com.br)

⁴ Graduando (a) em Odontologia pela Faculdade de Teologia, Filosofia e Ciências Humanas Gamaliel (FATEFIG), Tucuruí, Pará, Brasil, (minviana10@hotmail.com)

⁵ Graduando (a) em Odontologia pela Faculdade de Teologia, Filosofia e Ciências Humanas Gamaliel (FATEFIG), Tucuruí, Pará, Brasil, (vitoriatuc@hotmail.com)

⁶ Graduando (a) em Enfermagem pela Universidade do Estado do Pará (UEPA), Tucuruí, Pará, Brasil, (silvakaren2021@gmail.com)

⁷ Graduado em Enfermagem pela Faculdade de Teologia, Filosofia e Ciências Humanas Gamaliel (FATEFIG), Tucuruí, Pará, Brasil, (sivaldojunyoor13@gmail.com)

Resumo: As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) se mantem como problema de saúde pública mundial, visto que as taxas de contaminação dessas patologias seguem sendo uma preocupação global. **Objetivo:** Por tanto, o presente trabalho tem como objetivo analisar de forma não sistemática os estigmas que envolvem a testagem rápida dentro das unidades básicas

de saúde. **Método:** O presente trabalho trata-se de um artigo de revisão bibliográfica não sistemática, que visa explorar através da fundamentação teórica em livros, manuais, revistas e artigos científicos sobre a Estigmatização da testagem rápida de Sífilis, HIV e hepatites na Unidade Básica. Para realizar a busca dos artigos, foi necessário a utilização de plataformas como Scielo, Medline, Lilacs, e periódicos da Capes. **Resultados:** Os testes rápidos são fundamentais para a detecção precoce de IST's, então fazer o mesmo se tornar uma rotina na nossa população é essencial, assim o prognóstico de casos positivos se fará muito mais eficiente. Muitos casos de HIV, Sífilis, Hepatite B e C poderiam ter sido evitadas se todos tivessem o costume de realizar TR quando necessário. Precisamos trazer isso para a população, através de educação continuada, educação permanente, serviços voltados para a comunidade, palestras, folders. **Considerações Finais:** Conclui-se, portanto, a importância da testagem de Infecções Sexualmente Transmissíveis na Atenção Básica de Saúde, uma vez que, os testes rápidos são uma estratégia de prevenção no que tange a transmissão das doenças, com um diagnóstico precoce e um tratamento certo poderá haver uma diminuição da morbidade e mortalidade causada por doenças como HIV, hepatites virais e sífilis.

Palavras-chave: Estigma; Desigualdade; Prevenção.

Área Temática: Ciências da saúde

E-mail do autor principal: raquel.silva6284@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) se mantem como problema de saúde pública mundial, visto que as taxas de contaminação dessas patologias seguem sendo uma preocupação global. De acordo com os dados do UNAIDS (2018), o Brasil apresentou um aumento de 21% em novos casos de infecções por HIV de 2010 a 2018, no mesmo ano foram notificados 158 mil novos casos de sífilis no país. Não parando por aí, de 2008 até 2018 o foi registrado quase 633 mil casos de hepatites virais, o que causa uma preocupação com essas taxas que continuam alarmantes.

De acordo com o Ministério de Saúde (BRASIL,2011), recomenda que as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde adotem medidas que facilitem no acesso ao diagnóstico das IST, visando a prevenção e a promoção da saúde, pois compreende-se que somente através dessas estratégias possasse diminuir os riscos e agravos à saúde.

Com base nisso, o Ministério da Saúde investiu em uma estratégia de implantações de

testes rápidos dentro da atenção básica, em vista que o panorama das Infecções Sexualmente Transmissíveis na população tem uma incidência alta e os testes rápidos tem como finalidade ampliar o acesso aos diagnósticos de infecção pelo HIV, detecção de sífilis e hepatites virais, tal qual como apoio ao diagnóstico precoce, tratamento dos agravos e aconselhamento pré e pós teste. (BRASIL, 2011).

Concomitante a isso sabe-se que o objetivo dos testes rápidos consiste na detecção dos anticorpos ou de antígenos no corpo. A testagem rápida é uma estratégia para prevenção da transmissão das doenças e diminuição da mortalidade e morbidade, dessa forma possibilitando um diagnóstico precoce e um tratamento oportuno, a testagem acontece de modo simples e agil, sendo de fácil execução e não necessitam de uma estrutura laboratorial, o mesmo é preconizado pelo Ministério da Saúde e acontece do mesmo modo em todo o país. A implantação dos testes também é de suma importância para o meio gestacional, pois reduz a possível transmissão vertical, dentro da atenção básica a realização dos testes rápidos no pré-natal é necessária, dessa forma reduzindo as taxas de transmissões verticais do HIV e a eliminação da sífilis congênita, ofertando dessa forma um cuidado materno-infantil.

Porém o estigma continua neste cenário, a discriminação e a intolerância ainda é muito presente no cotidiano dos portadores das IST, como o vírus HIV, causador da AIDS, hepatites virais ou sífilis. O preconceito social está presente em julgamentos morais relacionados a sexo e sexualidade dos indivíduos. Essa discriminação decorre de diversos preconceitos enraizados dentro da população, a ideia de discriminar está ligada a noções de igualdade ou isonomia, a discriminação aparece desde o acesso ao diagnóstico e ao tratamento, tal qual em outros diversos âmbitos sociais, reforçando a exclusão social, sujeitando-as em menor qualidade e condições de saúde. Por tanto, o presente trabalho tem como objetivo analisar de forma não sistemática os estigmas que envolvem a testagem rápida dentro das unidades básicas de saúde. Ademais, como objetivo secundário discutir a importância da testagem rápida, e o aconselhamento a população.

2 MÉTODO

O presente trabalho trata-se de um artigo de revisão bibliográfica não sistemática, que visa explorar através da fundamentação teórica em livros, manuais, revistas e artigos científicos sobre a Estigmatização da testagem rápida de Sífilis, HIV e hepatites na Unidade Básica. Para realizar a busca dos artigos, foram usadas os seguintes descritores: atenção básica, saúde pública, Infecções Sexualmente Transmissíveis, HIV, Sífilis e hepatites virais. As

plataformas usadas para a busca de dados foram a Scielo, Medline, Lilacs, e periódicos da Capes.

Após as primeiras pesquisas realizadas sobre a temática, foi necessário selecionar 7 artigos que foram utilizados como base para a pesquisa. Foi necessário filtrar quais artigos se configuravam com a temática abordada na produção. Como primeiro critério de seleção, foram excluídos artigos com a data de publicação inferior ao ano de 2016, e o segundo critério foi a exclusão de artigos sem o registro no International Standard Serial Number (ISSN), ou Digital Object Identifier (DOI). Diante disso foi determinado o tempo de leitura previsto para dez dias.

Com relação a abordagem metodológica, preferiu-se utilizar a abordagem qualitativa, pois, sabe-se que a abordagem quantitativa visa a generalização dos resultados encontrados, e em contraste a abordagem qualitativa visa compreender, interpretar e refletir para a criação da construção do conhecimento. (PATIAS, 2019).

Ademais, a fim de expor a forma da construção da pesquisa, foi criado um fluxograma para a melhor compreensão do processo metodológico de busca, enfatizando quais foram os critérios de busca e seleção de artigos.

1- Fluxograma – Processo de busca e seleção

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O ministério da saúde implantou na Atenção Básica (AB) um conjunto de estratégias no que tange a realização de teste rápidos de HIV, Sífilis e Hepatites virais, com o objetivo principal de garantir a população o direito de diagnóstico e tratamento precoce. Entretanto foi possível observar que existem estigmas relacionados com o pré e pós-teste dos TR, seja do olhar do profissional de enfermagem responsável pela realização do teste ao olhar do usuário do Sistema Único de Saúde (SUS). Inicialmente precisa ser observado as fragilidades existentes no que diz respeito a todo o processo de testagem dos clientes da AB.

Os profissionais tendem a ter como principais problemas na execução dos TR, questões relacionadas com a demora de entrega dos pedidos de materiais e insumos, além de dificuldades de acesso aos equipamentos de proteção individual, como máscara, avental, óculos, entre outros. Além de observa-se um despreparo nos profissionais da saúde para o acolhimento dos casos positivos, que muitas vezes se encontram perdidos e não possuem o apoio do enfermeiro que deveria ser holístico e lhe ajudar no processo de encaminhamento ao Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) para garantir um bom prognóstico.

Muita coisa mudou com o passar do tempo, inicialmente tínhamos a ideia de que existia um grupo mais vulnerável para contrair alguma IST, pensávamos na população mais jovem com uma vida sexual ativa, existia e existe um preconceito enraizado para com os homossexuais, principalmente nos casos de HIV, mas hoje sabe-se que o simples fato de se ter uma relação sexual já é um indicativo para exposição a determinados vírus. Uma das grandes problemáticas quando olhamos para os usuários do sistema de saúde é justamente a falta de conhecimento sobre essas patologias, ainda hoje muitas pessoas acham que as infecções sexualmente transmissíveis só ocorrem através de relação sexual, sendo que isso é um total engano.

Existe uma forte intersecção entre estigma e pobreza e o número de casos de IST's. Quando olhamos para fatores como a desigualdade social é possível notar a influência disso para a população em todas as esferas da sua vida, entre elas a sexual. Isso é notório principalmente quando olhamos para as periferias, onde crianças começam a sua vida sexualmente ativa muito cedo, sem conhecimento sobre os métodos contraceptivos e através disso contraem e propagam doenças que trazem risco para si e outras pessoas.

Pode-se observar que tanto os adolescentes quanto os idosos tendem a não fazer o uso de preservativos, sabemos que as infecções sexualmente transmissíveis, como HIV, Sífilis, Hepatite B e C, possuem outras formas de contaminação, entretanto o melhor meio de proteção

de tais doenças ainda é o preservativo. O déficit de informações associadas a tais patologias e a precária orientação preventiva acarreta em um número crescente de casos nos adolescentes.

Observando os idosos temos alguns pontos que devem ser observados. Essa parcela da população tende a ter preconceitos enraizados, acreditam que por fazer sexo somente com uma pessoa não se faça necessário o uso de preservativos, mas, todavia, temos casos em que um dos parceiros tem relações com outras pessoas e acaba trazendo a doença para seu conjugue. E devido ao fator apresentado do preconceito, o idoso acredita que tais patologias só ocorrem devido ao sexo e não fazem a prevenção para os outros tipos de transmissão existentes no que tange o contágio das IST's. E poucas são as políticas voltadas para a sexualidade do idoso, existe uma certa invisibilidade da vida sexual dessa parcela da população, e os profissionais da área da saúde partilham dessas crenças.

É possível observar que a sexualidade feminina é perpassada pela percepção de risco que envolve as diversas manifestações e momentos de vida. Assim, todos os processos da vida sexual das mulheres sempre foram observados e controlados. Em grande parte dos momentos de forma negativa, culpabilizando as mesmas pela infecção, tanto pelo restante da população quanto pelos profissionais da saúde, o que acaba acarretando em um comprometimento da assistência e dificulta a criação do vínculo entre profissional e usuária. Existindo ainda um cofator fundamental nos casos de transmissão de IST's, o fato dos serviços de saúde na grande maioria dos casos não viabilizarem meios das mulheres realizarem suas atividades sexuais com poucos riscos.

O vínculo estabelecido entre usuários e profissionais pode atuar como um elemento interessante no que diz respeito a luta contra a discriminação. Na atenção básica o fato da maioria da população conhecer os trabalhadores daquela unidade se trona reconfortante visto que os mesmos sentem em quem podem confiar. Por outro lado, outros usuários sentem receio em relação ao sigilo da equipe, discriminação, medo de ser identificado na comunidade. Então, temos dois lados os usuários que preferem o atendimento pela equipe por se sentirem acolhidos, priorizando assim o atendimento na unidade do seu próprio território, já em outros casos existem aqueles que não confiam na equipe e preferem ser atendidos onde possam manter o anonimato, devido ao medo de sofrer discriminação. Para que exista esse acolhimento na AB é fundamentação a implantação do acolhimento nos serviços. Discorrendo ainda sobre esse vínculo, ele pode se tornar facilitador para a testagem nas unidades básicas, visto que o usuário se sente mais à vontade em realizar os TR com pessoas em que ele confia.

Dessa maneira, a promoção de empatia se torna um elemento fundamental no processo de redução de estigma no que tange as principais IST's principalmente quando olhamos para os

casos de HIV, sendo esse um fator primordial para aproximação e estabelecimento de confiança entre profissionais e usuários, o que propicia um cenário favorável para a promoção da saúde, tentar identificar culpados para casos positivos só reforça com a manutenção desses estigmas existentes na nossa população.

O conhecimento a respeito das infecções sexualmente transmissíveis se faz fundamental em todos os âmbitos sociais, de forma aberta e livre de quaisquer julgamentos morais. Dessa forma, a educação continuada é essencial no aprimoramento e o aconselhamento no teste rápido na atenção básica. Os gestores, profissionais, precisam ter um olhar mais holístico e fazer o usuário se sentir acolhido em todos os processos de saúde, sendo assim é necessário se quebrar paradigmas no que diz respeito aos TR, tanto dos profissionais quanto dos usuários do sistema de saúde. Precisamos remover as pedras do caminho para só assim trazermos uma população que busque saber da sua saúde em todas as esferas, inclusive na sexual.

Os testes rápidos são fundamentais para a detecção precoce de IST's, então fazer o mesmo se tornar uma rotina na nossa população é essencial, assim o prognóstico de casos positivos se fará muito mais eficiente. Muitos casos de HIV, Sífilis, Hepatite B e C poderiam ter sido evitadas se todos tivessem o costume de realizar TR quando necessário. Precisamos trazer isso para a população, através de educação continuada, educação permanente, serviços voltados para a comunidade, palestras, folders. Tudo o que possa facilitar nesse processo de tornar os testes rápidos comum na nossa sociedade.

4 CONCLUSÃO

Conclui-se, portanto, a importância da testagem de Infecções Sexualmente Transmissíveis na Atenção Básica de Saúde, uma vez que, os testes rápidos são uma estratégia de prevenção no que tange a transmissão das doenças, com um diagnóstico precoce e um tratamento certo poderá haver uma diminuição da morbidade e mortalidade causada por doenças como HIV, hepatites virais e sífilis. Além do mais, esses testes são de muita importância para o meio gestacional, pois irá diminuir a transmissão vertical que pode ocorrer entre mãe e filho. Vale ressaltar que na sociedade como um todo a população geral tende a ter muito preconceito com os portadores de IST, problema que deve ser solucionado através de educação em saúde.

Portanto, fica evidente a importância dos testes rápidos e como eles deveriam ser rotineiros nos exames da Atenção Básica. Para isso, se faz necessário campanhas de promoção de saúde sobre as testagens e educação sexual para a população, para que então haja uma

diminuição das transmissões de IST e a quebra de paradigmas relacionados com essas doenças.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. ORIENTAÇÕES PARA A IMPLANTAÇÃO DOS TESTES RÁPIDOS DE HIV E SÍFILIS NA ATENÇÃO BÁSICA. Rede Cegonha.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Testes rápidos de HIV e Sífilis na Atenção Básica**. Rede Cegonha. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. Disponível em: <https://aps.saude.gov.br/ape/cegonha/testerapido>

Carvalho, Rui Lara de et al. Teste rápido para diagnóstico da infecção pelo HIV em parturientes. Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia [online]. 2004, v. 26, n. 4 [Acessado 1 Setembro 2021] , pp. 325-328. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0100-72032004000400010>>. Epub 22 Jul 2004. ISSN 1806-9339. <https://doi.org/10.1590/S0100-72032004000400010>.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM. COREN. Resolução n. 09/2017. Dispõe sobre a realização de testes rápidos de HIV, hepatites virais e sífilis pela equipe de enfermagem. Pré e pós aconselhamento. Disponível em: https://www.corenpr.gov.br/portal/images/pareceres/PARTEC_17_009-Realizacao_testes_rapidos_HIV_hepatites_virais_sifilis_equipe_enfermagem_pre_pos_aconselhamento.pdf

Ew, R.D., Ferreira, G.S., Moro, L.I., & Rocha, K.B. Estigma e teste rápido na atenção básica: percepção de usuários e profissionais. 2018. Revista Brasileira em Promocao da Saude; Fortaleza Vol. 31, Ed. 3, (2018). DOI:10.5020/18061230.2018.7463.

Patias, N. D., & Von Hohendorff, J. (2019). CRITÉRIOS DE QUALIDADE PARA ARTIGOS DE PESQUISA QUALITATIVA. *Psicologia Em Estudo*, 24.

Telles-Dias, PR et al. Impressões sobre o teste rápido para o HIV entre usuários de drogas injetáveis no Brasil. Revista de Saúde Pública [online]. 2007, v. 41, suppl 2 [Acessado 1 Setembro 2021] , pp. 94-100. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0034->

89102007000900015>. Epub 12 Dez 2007. ISSN 1518-8787. <https://doi.org/10.1590/S0034-89102007000900015>.

CAPÍTULO 47

ESTRATÉGIAS PARA O TRATAMENTO NÃO FARMACOLÓGICO NA SAÚDE DO IDOSO COM DIABETES MELLITUS

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c47](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c47)

Isabella Cristina Galvão da Silva¹, Elian Klyscia Miranda Rocha ², Antonia Mylene Sousa Almeida³, Maria Letícia Gabrielle Feitosa Barbosa⁴, Maria Tailany Sousa Silva⁵, Francisco Lucas Leandro de Sousa⁶, Getúlio Rosa dos Santos Junior⁷, Erika Daniely Vaz de Aquino⁸, Michele Mirley Rodrigues Inácio da Silva⁹, Brenda Kelly da Silva Monte¹⁰

¹Faculdade de Educação São Francisco, (icgds1234@gmail.com)

²Faculdade de Educação São Francisco, (klysciamirandaenfer@gmail.com)

³Faculdade de Educação São Francisco, (mylenesousa123@hotmail.com)

⁴Faculdade Cesmac do Sertão (leticiagabriellefb@gmail.com)

⁵Faculdade de Integração-FIS (mariatailanyss@gmail.com)

⁶Centro Universitário Maurício de Nassau (lucasleandro2912@gmail.com)

⁷Universidade Federal do Maranhão (getulio.rosa@discente.ufma.br)

⁸Centro Universitário Metropolitano da Amazônia (erikavaz2000@gmail.com)

⁹Centro Universitário Cesmac (michelemirley31@gmail.com)

¹⁰Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal do Piauí UFPI (bksm@faesf.com.br)

Resumo

O objetivo desse estudo é realizar uma revisão da literatura, com a finalidade de identificar quais estratégias podem ser adotadas para a realização do tratamento não farmacológico em pacientes da terceira idade que apresentam diabetes mellitus. O presente estudo trata-se de uma revisão literária integrativa, onde o levantamento de artigos se deu pelas bases de dados: *Medical Literature Analysis and Retrieval System on-line* (MEDLINE via BVS), *Literatura Latino-americana de Ciências da Saúde* (LILACS via BVS) e a Base de dados em Enfermagem (BDENF via BVS), a partir dos descritores em ciências da saúde (DeCS): “Saúde do Idoso”, “Diabetes Mellitus” e “Cooperação e Adesão ao Tratamento”, e os MeSH (*Medical Subject Headings*): “*Health of the Elderly*”, “*Diabetes Mellitus*” and “*Treatment Adherence and Compliance*”. Os descritores foram cruzados através do operador booleano “AND” para busca simultânea dos assuntos. Os critérios de inclusão considerados foram os artigos originais disponíveis por meio eletrônico em português ou em inglês, que

estejam disponíveis no período de 2015 a 2021 por se tratarem de pesquisas atuais. Além disso, os critérios de exclusão foram definidos os artigos duplicados, livros, teses, monografias, revisão, artigos que não tratam da temática proposta e os que apresentam o texto incompleto. Os principais resultados, mostram que alguns idosos tem um conhecimento geral sobre os alimentos que devem evitar/restringir, como por exemplo os produtos ricos em carboidratos e gorduras por serem alimentos que prejudicam a saúde e não fazerem bem ao organismo, principalmente aos pacientes diabéticos. Contudo, esse estudo revela a importância de os idosos adquirirem conhecimentos através da educação em saúde promovida por profissionais capacitados. Através dessa promoção de saúde, essa população passa a conhecer sobre suas comorbidades e as práticas de autocuidado que eles podem realizar.

Palavras-chave: Saúde do Idoso; Diabetes Mellitus; Cooperação e Adesão ao Tratamento.

Área Temática: Ciências da saúde

E-mail do autor principal: icgds1234@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

A diabetes mellitus (DM) se destaca dentre as doenças crônicas não transmissíveis e se caracteriza como um agregado de distúrbios metabólicos definidos por alterações ou defeitos na ação/secreção da insulina, que ocasiona a hiperglicemia, podendo estar relacionada à obesidade e hábitos de vida não saudáveis (BERTONHI; DIAS, 2018).

Existem quatro classificações da DM: tipo 01 ou insulino-dependente (DM1); tipo 02 ou insulino não dependente (DM2); gestacional; e secundário a outras patologias (REIS, 2014). Dentre os tipos citados, a DM tipo 01 corresponde a cerca de 10% do total dos casos, enquanto a DM tipo 02 está relacionada a 90% dos casos, sendo essa mais prevalente (BARBOSA; CAMBOIN, 2016).

A DM se estabelece como uma doença que evolui gradualmente, na qual quando acometido, em especial na população idosa, tende a lesar seu estado de saúde com o passar do tempo, principalmente após os 10 anos convivendo com a doença, período que começam a aparecer as complicações provenientes do controle glicêmico inadequado, o que pode refletir na qualidade de vida de forma desfavorável e negativa (LIMA *et al.*, 2018).

Atualmente, o envelhecimento populacional vem crescendo de forma acelerada e devido a isso, há o aparecimento de doenças crônicas incapacitantes que passaram a adquirir uma maior relevância no cenário da saúde pública (SILVA *et al.*, 2016).

Segundo RAMOS *et al.*, (2017), o crescimento da expectativa de vida em idosos, consequentemente reflete em uma maior incidência de doenças crônicas nessa população, especialmente, a DM, isso quando está associado a hábitos de vida inadequados. Ademais, o

idoso diabético, quando comparado ao não diabético, está mais suscetível a ser medicado abundantemente, exibir carências funcionais devendo ser tratado de forma individualizada e planejada.

A diabetes mellitus na população idosa pode ocasionar diversas complicações, como doenças cardiovasculares, retinopatia, nefropatia e neuropatia. Essas complicações podem afetar na qualidade de vida dessa população, em vista disso, há a necessidade de cuidados intensos e atenção dobrada para melhorar a expectativa de vida dos idosos (SILVA *et al.*, 2016).

O tratamento da DM tem a finalidade do controle glicêmico e metabólico, bem como diminuir as complicações associadas a essa doença. Tal tratamento inclui tanto o farmacológico como não farmacológico, podendo citar como exemplos do segundo a prática de exercícios físicos e a dieta específica e individualizada (BERTONHI; DIAS, 2018).

Com isso, essa temática é de suma importância, pois através dela, pode-se avaliar sobre o método de tratamento não farmacológico para melhorar a qualidade de vida dos idosos. Diante disso, tem-se a seguinte pergunta de pesquisa: de que forma o tratamento não farmacológico pode ser adotado no cotidiano dos idosos com DM? A partir disso, o objetivo desse trabalho é realizar uma revisão da literatura, com a finalidade de identificar quais estratégias podem ser adotadas para a realização do tratamento não farmacológico em pacientes da terceira idade que apresentam diabetes mellitus.

2 MÉTODO

O presente estudo trata-se de uma revisão literária integrativa, no qual dentre as revisões é o método mais amplo que inclui estudos experimentais ou não para um melhor conhecimento dos estudos considerados. Esse tipo de metodologia pactua também a literatura no âmbito teórico e empírico e tem a finalidade de definir os conceitos, revisar teorias e evidências e analisar problemas metodológicos (SOUZA; DIAS; CARVALHO, 2010).

Ainda de acordo com Souza, Dias e Cervalho (2010), a revisão integrativa é dividida em 06 etapas, sendo elas: a elaboração da pergunta, no qual é a fase mais importante do método; busca da literatura através das bases eletrônicas; coleta de dados; análise dos estudos; argumentação dos resultados; apresentação do método de revisão.

A pergunta norteadora para a pesquisa foi a seguinte: de que forma o tratamento não farmacológico pode ser adotado no cotidiano dos idosos com DM?

O levantamento de artigos se deu pelas bases de dados: *Medical Literature Analysis and Retrieval System on-line* (MEDLINE via BVS), *Literatura Latino-americana de Ciências da Saúde* (LILACS via BVS) e a Base de dados em Enfermagem (BDENF via BVS), a partir dos

descritores em ciências da saúde (DeCS): “Saúde do Idoso”, “Diabetes Mellitus” e “Cooperação e Adesão ao Tratamento”, e os MeSH (*Medical Subject Headings*): “*Health of the Elderly*”, “*Diabetes Mellitus*” and “*Treatment Adherence and Compliance*”. Os descritores foram cruzados através do operador booleano “AND” para busca simultânea dos assuntos.

Os critérios de inclusão considerados foram os artigos originais disponíveis por meio eletrônico em português ou em inglês, que estejam disponíveis no período de 2015 a 2021 por se tratarem de pesquisas atuais. Além disso, os critérios de exclusão foram definidos os artigos duplicados, livros, teses, monografias, revisão, artigos que não tratam da temática proposta e os que apresentam o texto incompleto.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Através do levantamento nas bases de dados, foram encontrados um total de 514 artigos. Dentre eles, 218 foram excluídos por estarem com o texto incompleto, 206 por não corresponder ao período de ano escolhido e 06 por não estarem na linguagem escolhida. Desses, sobraram 84 que foram selecionados para a leitura. Após a análise, 01 foi eliminado pelo método e 62 por não tratar da temática. Diante disso, 21 artigos foram selecionados para o estudo (Figura 1).

Figura 1. Fluxograma de resultados das buscas nas bases de dados, Pedreiras, 2021.

Fonte: Autores, 2021

Dentre os anos selecionados para a pesquisa, os que se destacaram foram 2017 e 2018, considerando uma temática ainda atual, onde os principais objetivos foram associar a educação em saúde com o autocuidado, como também encontrar novas estratégias para melhorar a adesão dos pacientes às recomendações nutricionais.

Os principais resultados, mostram que alguns idosos tem um conhecimento geral sobre os alimentos que devem evitar/restringir, como por exemplo os produtos ricos em carboidratos e gorduras por serem alimentos que prejudicam a saúde e não fazerem bem ao organismo, principalmente aos pacientes diabéticos.

Além disso, estudos apontam também que os pacientes da terceira idade não aderem aos bons hábitos e que os idosos com atitudes negativas tiveram maiores taxas de não adesão às mudanças no estilo de vida. Relatam ainda que a não mudança de padrões alimentares se dá por parte dos demais membros da família que não aderem aos bons hábitos de vida. Alguns pacientes citam o cuidado com os pés e com os ferimentos.

O papel da equipe multiprofissional é importante para identificar os problemas e potencialidades de pessoas idosas com diabetes e seus parentes / cuidadores para garantir adesão às atividades de autocuidado. A formação continuada desses profissionais é extremamente necessária para que eles entendam a importância de aderir a tais atividades e serem capazes de fornecer orientação e conscientização sobre a adoção de hábitos saudáveis (DYONISIO, *et al.*, 2020).

As práticas educativas em grupo são vistas como uma estratégia essencial para a adesão ao tratamento não farmacológico, pois através dessa prática, os usuários adquirem conhecimentos sobre sua comorbidade e aprendem a melhor forma de tratamento, além do farmacológico. Além disso, aumenta a autonomia e capacidade dos idosos para o autocuidado, além de promover sua qualidade de vida (MACEDO *et al.*, 2017).

Ainda de acordo com Macedo, *et al.* (2017), os profissionais da saúde devem utilizar ferramentas, como as práticas em grupo, para possibilitar aos idosos com DM a aquisição de informações, habilidades e ensinamentos sobre as práticas do autocuidado. A realização de tais atividades é relevante, pois traz benefícios aos indivíduos, podendo citar a melhora nos hábitos alimentares e a prática de exercícios físicos.

A educação em saúde promovida nas unidades básicas de saúde, é uma forma de disseminar a importância do tratamento não farmacológico aos idosos. Essas informações prestadas a eles, podem ser realizadas de forma oral, através de uma roda de conversa durante a espera para consulta. Outra maneira de passar essas informações é através da escuta ativa, na qual o

profissional pergunta quais hábitos eles costumam praticar e a partir disso, ensinar sobre os bons hábitos de vida (JARVIE *et al.*, 2019).

O tratamento não farmacológico inclui a prática de atividades físicas, em vista disso, os profissionais da saúde podem realizar um momento de educação associada a prática de exercícios. Essa ação é de suma importância, pois através dela, pode-se conhecer sobre as formas de tratamento não farmacológico e ainda praticar exercícios adequados para os idosos, como por exemplo a dança (JARL *et al.*, 2019).

Os indivíduos na terceira idade tendem a ter dificuldades emocionais e comportamentais, uma vez que perdem ou diminuem o convívio com a sociedade, interferindo assim na sua maneira de se comunicar, pensar e agir, desta forma resulta na resistência ao diálogo com o profissional e principalmente, a seguir o tratamento estabelecido. Cabe a equipe especializada conhecê-lo, se adequar e buscar atendê-lo e trata-lo de acordo com suas necessidades e particularidades (RAMOS, 2017).

O acompanhamento e assistência profissional contínua tornam-se de extrema importância, visto que aumentarão a interação e o vínculo entre o cliente, a família, o profissional e sua equipe multidisciplinar, e desta forma facilitarão a adesão ao tratamento e realização do autocuidado, além de prevenir possíveis complicações mais severas que poderão prejudicar de forma mais acentuada a saúde do idoso (ALENCAR, *et al.*, 2017).

Em concordância com Ramos (2017), o desenvolvimento de estratégias educativas de intervenção adaptadas às necessidades e que promovam ao idoso diabético o incentivo ao autocuidado serão possíveis, auxiliando, desta maneira, na promoção da autonomia, prevenção dos agravos e benefícios na qualidade de vida.

4 CONCLUSÃO

Contudo, esse estudo revela a importância de os idosos adquirirem conhecimentos através da educação em saúde promovida por profissionais capacitados. Através dessa promoção de saúde, essa população passa a conhecer sobre suas comorbidades e as práticas de autocuidado que eles podem realizar. As informações em saúde são uma estratégia benéfica para o tratamento não farmacológico, pois através dela os idosos podem melhorar sua qualidade de vida por meio de exercícios físicos, boa alimentação e não se limitar apenas ao tratamento farmacológico, prevenindo também o uso exacerbado de medicamentos.

Torna-se imprescindível a atuação do grupo familiar na adesão ao tratamento através do apoio emocional, auxiliando as mudanças de estilo de vida e provendo os cuidados básicos com a saúde. Contribuindo com o trabalho dos profissionais em analisar e compreender o usuário

não somente como portador de DM, mas sim como indivíduo em todos os seus aspectos e particularidades.

REFERÊNCIAS

ALENCAR, D. C, et al. Consulta de enfermagem na perspectiva de usuários com diabetes mellitus na estratégia de saúde da família. **Revista de Enfermagem UFPE on line**. v. 11, n. 10, p. 3749-3756, 2017.

BARBOSA, S. A; CAMBOIN, F. E. F. Diabetes mellitus: cuidados de enfermagem para controle e prevenção de complicações. **Temas em saúde**. v.16, n.3, 2016.

BERTONHI, L. G; DIAS, J. C. R. Diabetes mellitus tipo 2: aspectos clínicos, tratamento e conduta dioterápica. **Revista ciências nutricionais online**, v. 2, n. 2, p. 1-10, 2018.

DYONISIO G, *et al*. Fatores relacionados à adesão às atividades de autocuidado de idosos com diabetes. **Bioscience Jornal**, v. 36, n. 2, p. 636-651, 2020.

JARL, G. *et al*. Gender differences in attitudes and attributes of people using therapeutic shoes for diabetic foot complications. **Journal of Foot and Ankle Research**, v. 12, n. 21, 2019.

JARVIE, J. L. *et al*. Aerobic Fitness and Adherence to Guideline-Recommended Minimum Physical Activity Among Ambulatory Patients With Type 2 Diabetes Mellitus. **Diabetes Care**, v. 42, July 2019

LIMA, L. R., *et al*. Qualidade de vida e o tempo do diagnóstico do diabetes mellitus em idosos. **Rev. Bras. Geriatr. Gerontol.** v.21, n.2, p.180-190, 2018.

MACEDO M. M. L, *et al*. Adesão e empoderamento de usuários com diabetes mellitus para práticas de autocuidado: ensaio clínico randomizado. **Rev Esc Enferm USP**, v.51: e03278, 2017

RAMOS, R. S. P. S., *et al*. Fatores associados ao diabetes em idosos assistidos em serviço ambulatorial especializado geronto-geriátrico. **Rev. Bras. Geriatr. Gerontol.**, v.20, n.3,

p.364-374, 2017.

REIS, T. B. Tratamento não – farmacológico do diabetes mellitus. 2014.

SILVA, A. B, *et al.* Prevalência de diabetes mellitus e adesão medicamentosa em idosos da Estratégia Saúde da Família de Porto Alegre/RS. **Cad. Saúde Colet.**, Rio de Janeiro, v. 24, n. 3, p. 308-316, 2016.

SOUZA, M. T; SILVA, M. D; CARVALHO, R. Revisão integrativa: o que é e como fazer. **Einstein.**, v. 8, n. 1, p. 102-6, 2010.

CAPÍTULO 48

EVIDÊNCIAS ATUAIS EM CRIOTERAPIA E SUAS APLICAÇÕES CLÍNICAS: REVISÃO DE LITERATURA

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c48](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c48)

Leticia Emilly Mesquita de Sousa¹, Beatriz Viana Sousa², Fernanda Mesquita Ferreira³,
Sancler Viana Lobo Paiva⁴, Francisco Valmor Macedo Cunha⁵, Fuad Ahmad Hazime⁶,
Lorena Almeida De Melo⁷

¹Universidade Federal do Delta do Parnaíba, (leemilly3535@gmail.com)

²Universidade Federal do Delta do Parnaíba, (beatrizvsousa@ufpi.edu.br)

³Universidade Federal do Delta do Parnaíba, (fernanda.mesquita.9@gmail.com)

⁴Centro Universitario INTA – UNINTA, (sanclerlobo88@gmail.com)

⁵Universidade Federal do Delta do Parnaíba, (orfeuyeuridice@gmail.com)

⁶Universidade Federal do Delta do Parnaíba, (fuad@ufpi.edu.br)

⁷Universidade Federal do Delta do Parnaíba, (lorenaamelo1@gmail.com)

Resumo

Objetivo: Analisar as evidências atuais em crioterapia e suas aplicações clínicas. **Método:** Foi executado um levantamento bibliográfico por meio de bancos de dados foi realizada uma pesquisa na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), em suas bases de dados, utilizando os termos descritores “Termoterapia” OR “Crioterapia” OR “Gelo”. Onde foram usados como critérios de inclusão: artigos disponíveis na íntegra e na delimitação temporal dos últimos cinco anos (2017 a 2021), texto completo, idioma português. Foram excluídos artigos duplicados (publicados em mais de uma base), e que não respondessem aos objetivos do estudo e aqueles do tipo revisão. Do total 58 artigos foram encontrados, sendo excluídos 51 por se enquadrar nos critérios de exclusão. Portanto, das 58 publicações iniciais 7 foram utilizadas como amostra para esse estudo. **Resultados:** As pesquisas realizadas constataram que a crioterapia além de reduzir a temperatura corporal, diminui a taxa metabólica dos tecidos, as reações enzimáticas, a liberação de histamina, leva à vasoconstrição com consequente diminuição do fluxo sanguíneo, permeabilidade da membrana e edema. Logo, vários são os recursos eletroterapêuticos e termoterapêuticos utilizados na reabilitação de distúrbios do sistema

musculoesquelético para a diminuição do metabolismo, efeitos anti-inflamatórios e analgésicos. **Conclusões:** Neste trabalho foi abordado como a crioterapia pode atuar em diversas situações, destacando os efeitos fisiológicos e terapêuticos do gelo. Portanto, foi observado que a crioterapia é eficaz na redução da velocidade de condução nervosa, tem efeitos anti-inflamatórios, reduz o espasmo vascular e desaceleração do fluxo sanguíneo que ajudam no aumento da flexibilidade e propriocepção dos pacientes. Apesar de que já existem muitos protocolos descobertos para algumas doenças, muito se tem para descobrir acerca dos benefícios gerados pela técnica e quais as melhores alternativas para a elaboração de novos protocolos para doenças específicas que corriqueiramente aparecem na epidemiologia. Dessa forma, é imprescindível que haja interesse e investimentos em pesquisas que comprovem a potencialização desse recurso termoterápico em relação as novas descobertas no mundo das patologias.

Palavras-chave: Crioterapia; Gelo; Termoterapia.

Área Temática: Ciências da Saúde

1 INTRODUÇÃO

A crioterapia é uma técnica em que se utiliza o frio, com a finalidade de absorver calor do tecido corporal em que está sendo aplicado, tendo como consequências a diminuição do metabolismo, efeitos anti-inflamatórios e analgésicos (SILVA, 2018). A crioterapia também demonstrou reduzir eficazmente a dor no período pós-operatório após cirurgia reconstrutiva das articulações. As mudanças de temperatura superficiais e profundas dependem do método de aplicação, da temperatura inicial e do tempo de aplicação. Os efeitos fisiológicos e biológicos são decorrentes da redução da temperatura nos diversos tecidos, aliada à ação neuromuscular e ao relaxamento dos músculos produzidos pela aplicação do frio. A aplicação de frio também foi encontrada para diminuir a reação inflamatória em uma situação experimental (SWENSON, 2020).

Com isso, depois do desenvolvimento de algumas pesquisas, algumas delas realizadas pelo Centro de Estudos em Fisioterapia Esportiva Ademir Rodrigues - CEFESPAR ficou-se claro que a aplicação do frio promove somente vasoconstrição. A crioterapia vem sendo um recurso fisioterápico eficaz como método anti-inflamatório, é bastante aplicada para o tratamento de lesões musculares (SANTOS, 2020).

Surgindo o seguinte questionamento: quais as aplicações clínicas da crioterapia mais evidentes na atualidade?

Diante do exposto, a pesquisa justifica-se no interesse despertado pela temática durante às vivências na disciplina de recursos fisioterapêuticos na qual foi discutido às aplicações e efeitos terapêuticos da crioterapia. Esse estudo tem grande relevância, quando aplicada corretamente a crioterapia traz resultados eficazes. Neste sentido, espera-se que esse trabalho possa contribuir para o conhecimento dos profissionais na área da saúde, sobre as maneiras de aplicações e nas utilizações na prática clínica.

2 OBJETIVO

Analisar as evidências atuais em crioterapia e suas aplicações clínicas.

3 MÉTODO

Trata-se de um estudo do tipo revisão de literatura com abordagem descritiva. Para a busca ou levantamento dos artigos na literatura, foi realizada uma pesquisa na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), em suas bases de dados, utilizando os termos descritores “Termoterapia” OR “Crioterapia” OR “Gelo”. Onde foram usados como critérios de inclusão: artigos disponíveis na íntegra e na delimitação temporal dos últimos cinco anos (2017 a 2021), texto completo, idioma português. Foram excluídos artigos duplicados (publicados em mais de uma base), e que não respondessem aos objetivos do estudo e aqueles do tipo revisão. Do total 58 artigos foram encontrado, sendo excluídos 51 por se enquadrar nos critérios de exclusão. Portanto, das 58 publicações iniciais 7 foram utilizadas como amostra para esse estudo.

Após a conclusão da coleta de dados, foi realizada a leitura da amostra selecionada, buscando identificar as informações que viabilizam alcançar o objetivo proposto do presente estudo.

Todas as produções utilizadas neste estudo estão rigorosamente referenciadas de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

O estudo respeitou os autores das publicações analisadas, baseando-se na Lei de Direitos Autorais, nº 9.610 de 19 de fevereiro de 1998. A Lei defende os autores, especialmente suas propriedades intelectuais de caráter literário, científico ou artístico, podendo ser explorados por pesquisadores ou afins, visto que, uma vez encontradas em banco de dados on-line podem ser apreciadas, portanto não configura afronta aos direitos autorais (BRASIL, 1998).

4 RESULTADOS

No decorrer da coleta nas bases de dados dessa pesquisa, foram selecionados sete

artigos, os quais se adequam nos critérios preestabelecidos.

Conforme amostra encontrada, totalizando sete artigos, surgiram a partir de então, duas categorias que esta abordada em tópicos que envolvem a caracterização dos estudos e as evidências atuais em crioterapia e suas aplicações clínicas.

4.1 Caracterização dos estudo

Após seleção dos artigos que contribuíram para a realização deste estudo, foi realizada a catalogação, onde cada um foi explorado e descrito em forma de quadro, contendo o autor principal, título, programa ou periódico, ano de publicação e a metodologia utilizada.

Também foi utilizado um código para cada estudo, sendo de E01 ao E07, com o “E” representando o nome estudo e o “numero” a sequência dos estudos e a quantidade dos mesmos, para facilitar a compreensão dos leitores e organização.

Para elaboração e organização do quadro 1 abaixo, foram apresentadas as informações dos artigos selecionados para análise deste estudo, e apresentados os mesmos conforme publicações analisadas.

QUADRO 1 – Características dos estudos.

Cód.	Autor principal	Título	Programa/Periódico	Ano	Método
E01	Hugo Joel Fernandes de Sá Pereira	A Crioterapia na Artroplastia Total do Joelho	Escola Superior de Saúde	2020	Estudo quantitativo com recurso a uma técnica amostral não probabilística acidental e sequencial
E02	Andrea Bezerra Rodrigues	Efeito da crioterapia na prevenção de mucosite associada ao uso de 5-fluorouracil	Revista Latino-americana de Enfermagem	2020	Trata-se de um ensaio clínico controlado, randomizado

					o, duplo- cego, multicêntric o
E03	Karina Luiza Virgilio Margini	O efeito do crioalongamento e da massoterapia no trismo pós-neoplasia bucal	Revista de Ondontologia da UNESP	2020	Estudo de Campo
E04	Ariela Torres Cruz	Efeitos da crioterapia associada à cinesioterapia e da estimulação elétrica em pacientes hemiparéticos espásticos	Centro Universitário de Barra Mansa (UBM)	2019	Estudo de Campo
E05	Hudson Azevedo Pinheiro	Efeitos agudo da crioterapia na transferência de peso em sujeitos com hemiparesia espástica crônica	Fisioterapia Brasil	2019	Estudo Transversal
E06	Paulo Roberto Gonçalves Silva	Efeito da imersão em água fria sobre a recuperação pós-esforço em atletas de jiu-jitsu	Rev Bras Med Esporte	2018	Estudo de Campo
E07	Fábio Gonçalves Guedes	Função neuromuscular do bíceps braquial em contração isométrica após termoterapia	Acta Fisiatr	2018	Estudo de Campo

Fonte: Elaboração dos autores, 2021.

Ao realizar uma análise mais apurada sobre os anos de publicação dos estudos avaliados, pode-se perceber os estudos foram publicados nos anos de 2020, 2019 e 2018.

Com isso, observa-se a significância e importância do assunto que tem sido dada nos últimos anos, principalmente para o enriquecimento da literatura.

4.3 Evidências atuais em crioterapia e suas aplicações clínicas

Com base no objetivo do estudo, após ser feita toda catalogação e exploração dos artigos que foram incluídos no mesmo, foi feita a descrição em forma de quadro, onde serão apresentados os objetivos e todas as evidências atuais em crioterapia e suas aplicações clínicas.

Para elaboração e organização do quadro 2 abaixo, foram apresentadas as informações dos artigos selecionados para análise deste estudo, contendo o código de cada estudo, os objetivos e as evidências atuais em crioterapia e suas aplicações clínicas que todos apresentavam.

QUADRO 2 – Evidências atuais em crioterapia e suas aplicações clínicas

Cod.	Objetivos	Evidências atuais em crioterápica e suas aplicações clínica
E01	Analisar os efeitos terapêuticos da crioterápica no contexto da autoplastia total do joelho.	<ul style="list-style-type: none"> • Crioterápica na abordagem ao pós-operatório da autoplastia do joelho
E02	Avaliar o efeito da crioterápica oral em comparação ao soro fisiológico no desenvolvimento de mucosite oral em pacientes oncológicos ambulatoriais em uso de antineoplásico 5-fluorouracil.	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicava gelo na cavidade oral, iniciando 5 minutos antes da infusão do 5-FU e perdurando por 30 minutos de administração continuada, conforme recomendado
E03	Investigar o comportamento dos músculos masseter e supra-hioideos durante a deglutição antes e após o crioalongamento associado à massoterapia, em pacientes pós-neoplasia bucal com trismo devido à radioterapia	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicação de cubos de gelo com 3 cm de largura por 3 cm de comprimento envoltos em gaze foram posicionados na região do ventre dos músculos masseter e do grupo dos supra-hioideos. • Massagens intermitentes com gelo, repetidas com intervalo de um a cinco segundos, de forma gradativa, sem causar desconforto ao paciente
E04	Verificar o efeito da associada à cinesioterapia e da estimulação elétrica na capacidade de preensão palmar do membro espástico de pacientes com AVE na fase crônica.	<ul style="list-style-type: none"> • A crioterápica foi realizada durante 25 minutos no ventre dos músculos flexores de punho do membro superior espástico através de uma bolsa de plástico com gelo, envolvida por uma faixa elástica e uma toalha úmida sobre a pele.
E05	Avaliar os efeitos agudos da crioterápica na transferência de peso de pacientes hemiparéticos	<ul style="list-style-type: none"> • Foi realizada de forma passiva e com a ajuda do fisioterapeuta a imersão do membro inferior parético em um balde com capacidade de 60 litros, com gelo e água a uma temperatura de 0°C a 5°C, no

		<p>qual o segmento era submerso até a linha interarticular do joelho no intuito de inibir a atividade muscular tanto dos músculos plantiflexores como dorsiflexores do tornozelo. Durante a realização da intervenção, o examinado permanecia em posição ortostática e, após o comando, introduzia o membro inferior em teste no recipiente, mantendo-o imerso por 30 segundos, medidos por meio de um cronometro.</p>
E06	<p>O objetivo deste estudo foi investigar os efeitos da imersão em água fria depois de uma sessão de treinamento de atletas de jiu-jitsu, sobre creatina quinase (CQ), testes funcionais de força e parâmetros isocinéticos</p>	<ul style="list-style-type: none">• Para o protocolo de IAF, os atletas foram alocados em uma caixa plástica contendo água fria em torno de $\sim 12^{\circ}\text{C}$ e altura suficiente para atingir o processo xifóide. Essa temperatura está dentro dos parâmetros (10°C a 15°C) sugeridos como adequados para promover a recuperação pós-exercício. A duração dessa imersão foi de seis minutos, uma vez que a partir desse tempo já se observa alterações autonômicas. O atleta permaneceu sentado com as mãos apoiadas na região femoral e a temperatura da água foi monitorada com o uso de um termômetro digital infra-vermelho. Caso houvesse necessidade, cubos de gelos eram adicionados a caixa plástica para o resfriamento da água e manutenção da temperatura em torno do desejável.
E07	<p>Avaliar, através de uma avaliação neuromuscular não invasiva, como a termoterapia influencia na força muscular e nos sinais mioelétricos do bíceps braquial em contração isométrica.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Aplicação do gelo triturado (1000g), envolvido em tecido fino de algodão, tipo fralda (60x60cm), fixada no membro através de atadura não elástica de algodão, de 20cm de largura. O resfriamento foi mantido por 15 minutos, com o indivíduo sentado com o braço estendido, paralelo ao troco, em repouso.

Fonte: Elaboração dos autores, 2021.

5 DISCUSSÃO

Em relação a análise dos artigos, foi possível verificar e pontear todas as evidências atuais em crioterapia e suas aplicações clínicas, o qual mostrou resultados significativos a partir dos objetivos do estudo, que buscou analisar as aplicações clínicas da crioterapia, a partir de publicações científicas.

Deste modo, apesar da crioterapia não ter obtido significância estatística, quando comparada ao protocolo de higiene oral com solução salina, mostrou-se efetiva intragrupo. A inclusão da crioterapia a nível ambulatorial para pacientes em tratamento com quimioterápico 5-FU pode ser uma alternativa para redução da ocorrência e severidade de mucosite (RODRIGUES, 2020).

De acordo com os resultados e referente aos títulos dos estudos analisados, todos tiveram uma boa associação à temática do estudo, facilitando a escolha do mesmo para análise, e inclusão na pesquisa. Como também, apresentaram termos que contribuíram significativamente para a temática abordada no estudo.

Sobre as pesquisas analisadas, observou-se que elas foram publicadas em programas e periódicos de ampla disseminação no âmbito nacional. Acredita-se que a partir da variedade de revistas no qual o assunto foi exposto, as informações referentes as evidências atuais em crioterapia e suas aplicações clínicas possam ser disseminadas, não somente para aqueles que procuram especificamente esta temática, mas também para todos os leitores que buscam o conhecimento sobre a temática.

Diante disso, as informações pesquisadas proporcionam um enriquecimento para o estudo, tornando-o uma ferramenta potencializadora para as questões que abordam o mesmo objetivo, e contribuem de maneira significativa para a aplicação da crioterapia.

6 CONCLUSÃO

Neste trabalho foi abordado como a crioterapia pode atuar em diversas situações, destacando os efeitos fisiológicos e terapêuticos do gelo. Portanto, foi observado que a crioterapia é eficaz na redução da velocidade de condução nervosa, tem efeitos anti-inflamatórios, reduz o espasmo vascular e desaceleração do fluxo sanguíneo que ajudam no aumento da flexibilidade e propriocepção dos pacientes. Dessa forma, é imprescindível que haja interesse e investimentos em pesquisas que comprovem a potencialização desse recurso termoterápico em relação as novas descobertas no mundo das patologias.

A pesquisa teve como principal limitação a escassez de estudos primários na literatura,

que abordassem de forma direta e aprofundada a temática. Desta forma, a pouca quantidade de artigos disponíveis inviabilizou que fossem apontados resultados mais amplos que pudessem ser generalizados. No entanto, as lacunas identificadas, fornecem direcionamento para futuros trabalhos que contemple melhor a temática.

No entanto, acredita-se que a revisão tem o potencial de provocar reflexão acerca da temática abordada, e os resultados apresentados, favorecem a prática profissional.

REFERÊNCIAS

BOUZIGON, Romain; GRAPPE, Frederic; RAVIER, Gilles; DUGUE, Benoit. Whole- and partial-body cryostimulation/cryotherapy: current technologies and practical applications.

Journal Of Thermal Biology, [S.L.], v. 61, p. 67-81, out. 2016. Elsevier BV. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jtherbio.2016.08.009>. Acesso em: 26 de junho de 2021.

CRUZ, Ariela Torres. Efeitos da crioterapia associada à cinesioterapia e da estimulação elétrica em pacientes hemiparéticos espásticos. **Fisioter pesqui**, Rio de Janeiro, v. 26, n. 2, p. 185-189, 2019. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/fp/a/tYzXWHwSVbhZmQBJPCVcBYC/?lang=pt>. Acesso em: 30 de Agosto de 2021.

DOS SANTOS, Lucielma Moreira; MIRANDA, João Vitor Tavares. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA NA APLICAÇÃO DA CRIOTERAPIA PARA O TRATAMENTO DE LESÕES MUSCULARES. **Gep News**, v. 2, n. 2, p. 191-197, 2020.

GUEDES, Fabio Gonçalves. Função neuromuscular do bíceps braquial em contração isométrica após termoterapia. **Acta Fisiatr**, Juiz de Fora, v. 24, n. 4, p. 186-192, Abr. 2018. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/actafisiatr/article/view/154212/150433>. Acesso em: 30 de Agosto de 2021.

KARVAT, Jhenifer. Crioterapia em modelo de compressão do nervo isquiático: análise funcional e morfológica. **Rev Bras Med Esporte**, Parana, v. 24, n. 1, jan/fev. 2018.

Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1517-869220182401171719>. Acesso em: 30 de Agosto de 2021.

MARGINI, Karina Luiza Virgilio. O efeito do crialongamento e da massoterapia no trismo

pós-neoplasia bucal. **Revista de odontologia da UNESP**, São Paulo, v. 40, 2020.

Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1807-2577.02620>. Acesso em: 30 de Agosto de 2021.

PEREIRA, Hugo Joel Fernandes de Sá. A crioterapia na artroplastia total do joelho. **Instituto politecnico de viana do castelo**, Viana do Castelo, set. 2018. Disponível em:

http://repositorio.ipv.pt/bitstream/20.500.11960/2512/1/Hugo_Pereira.pdf. Acesso em: 30 de Agosto de 2021.

PINHEIRO, Hudson Azevedo. Efeitos agudo da crioterapia na transferencia de peso em sujeitos com hemiparesia espástica crônica. **Fisioterapia Brasil**, Brasília, v. 20, n. 1, p. 36-42, 2019. Disponível em:

<https://portalatlanticaeditora.com.br/index.php/fisioterapiabrasil/article/view/2330>. Acesso em: 30 de Agosto de 2021.

RODRIGUES, Andrea Bezerra. Efeitos da crioterapia na prevenção de mucosite associada ao uso de 5-fluorouracil. **Rev. Latino-americana de Enfermagem**, Fortaleza, v. 28, 2020.

Disponível em: <http://www.eerp.usp.br/rlae>. Acesso em: 30 de Agosto de 2021.

Silva, Dalvania Alves da et al. Analgesic efficacy of the association of cryotherapy and transcutaneous electrical nerve stimulation. *BrJP [online]*. 2018, v. 1, n. 3 [Acessado 28 Junho 2021], pp. 274-278. Disponível em: <<https://doi.org/10.5935/2595-0118.20180052>>. ISSN 2595-3192. <https://doi.org/10.5935/2595-0118.20180052>.

SILVA, Paulo Roberto Gonçalves. Efeito da imersão em água fria sobre a recuperação pós-esforço em atletas de jiu-jitsu. **Rev Bras Med Esporte**, Muzambinho, v. 24, n. 1, jan/fev. 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1517-869220182401177165>. Acesso em: 30 de Agosto de 2021.

Swenson C, Swärd L, Karlsson J. Cryotherapy in sports medicine. *Scand J Med Sci Sports*. 2014 Aug;6(4):193-200. doi: 10.1111/j.1600-0838.1996.tb00090.x. PMID: 8896090.

CAPÍTULO 49

EXERCÍCIO FÍSICO NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA SAÚDE MENTAL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c49](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c49)

Josué Tadeu Lima de Barros Dias¹, Luzia Cleia da Silva², Maria Alice dos Santos³,
Maria Luci Esteves Santiago⁴, Renata Batista dos Santos Pinheiro⁵, Renata Louise
Ferreira Lemos⁶

¹Universidade Estadual do Piauí- UESPI, (thadeu_dias_@hotmail.com)

²Universidade Estadual do Piauí- UESPI, (luziaboaventura@gmail.com)

³Universidade Estadual do Piauí- UESPI, (mariaasantos1@aluno.uespi.br)

⁴Universidade Estadual do Piauí- UESPI, (mles_@hotmail.com)

⁵Universidade Estadual do Piauí- UESPI, (renatapersonal1@hotmail.com)

⁶Universidade Estadual do Piauí- UESPI (renatalouise@pcs.uespi.br)

Resumo

O Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking dos países com mais casos de transtorno de ansiedade e o segundo em episódios de depressão. A relação entre a prática de exercício físico e a saúde mental tem sido evidenciada em muitas pesquisas recentes, destacando a importância desta prática na prevenção e tratamentos de questões relacionadas à saúde mental. **-Objetivo:** identificar e descrever as evidências científicas a respeito do efeito da prática regular de exercício físico na prevenção e tratamento da ansiedade e depressão. **Método:** Trata-se de uma revisão integrativa de literatura em que inclui artigos publicados entre os anos de 2016-2021, disponíveis nas bases de dados Lilacs, Medline e Scielo, com os seguintes termos de busca: “exercício físico”, “saúde mental”, “ansiedade e depressão”. **Resultados:** Foram encontrados 225 estudos, após a utilização dos critérios de inclusão e exclusão apenas oito foram considerados elegíveis. A análise dos estudos mostrou que as intervenções, em sua maioria, trouxeram efeitos positivos e melhores respostas nos escores de ansiedade e depressão em públicos variados. **Conclusão:** Os resultados apontam que a prática de exercício físico pode

estar associado à menor ocorrência de sintomas de depressão e ansiedade, destacando assim a importância deste na prevenção e no tratamento de tais problemas.

Palavras-chave: Exercício Físico; Saúde Mental; Ansiedade; Depressão.

Área Temática: Ciências da Saúde

E-mail do autor principal: thadeu_dias_@hotmail.com

1 INTRODUÇÃO

A saúde é considerada um completo bem-estar físico, mental e social e não somente a ausência de doenças (OMS, 2017). Neste contexto, entende-se que, para se ter saúde todos esses aspectos devem ser levados em consideração. Com a pandemia da Covid-19 e as orientações de distanciamento social, somado ao medo de adoecer, morrer ou perder um ente querido, a saúde mental da população mundial foi afetada negativamente. Brooks *et al.*, (2020) destacam que, quanto à saúde mental é importante dizer que as seqüelas de uma pandemia são maiores do que o número de mortes, os transtornos mentais mais citados na literatura são a ansiedade e a depressão.

A ansiedade se caracteriza por um medo excessivo de algo novo, desconhecido, que causa desconforto e antecipação do perigo. Esse medo pode influenciar nas questões psíquicas do sujeito e na forma como elas manifestam seus sentimentos e emoções, dependendo do grau de influência na qualidade de vida, pode ser considerado uma patologia (ZUNTINI, 2018).

A depressão, por sua vez, é uma doença multifatorial no aspecto psicológico, ou seja, causada por uma série de complicações psicológicas e ambientais que podem causar comorbidades e mortalidade, devido a sua alteração de humor. O indivíduo deprimido apresenta desânimo, tristeza, sentimentos de irritabilidade, inutilidade, apatia, baixa autoestima, baixo apetite, perda do interesse em atividades que antes eram prazerosas, cansaço ou falta de energia, agonia, acarretando em prejuízos sociais, afetivos e laborais (SANTOS, 2020).

Em 2017, a Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou um relatório global que apontou o aumento de 18% nos casos de depressão em 10 anos, entre os anos de 2005 até 2015, confirmando que esta patologia afeta 322 milhões de pessoas, sendo a maioria do sexo feminino. No Brasil, 5,8% da população, que representa 11,5 milhões de pessoas, têm depressão, sendo o quinto país com mais casos de depressão no mundo, enquanto 9,3% da população (18,6 milhões de brasileiros) apresentam ansiedade, tornando o Brasil o país com a

maior taxa de transtornos de ansiedade do mundo (CHADE; PALHARES, 2017).

A prática de exercício físico tem sido citada pela literatura como uma importante ferramenta no tratamento e na prevenção da depressão e da ansiedade. Nesse contexto, o exercício físico é considerado uma alternativa benéfica na esfera biopsicossocial, proporcionando uma melhor qualidade de vida, visto que influencia nos ritmos biológicos, como por exemplo, nas alterações hormonais e funções fisiológicas, proporcionando um efeito ansiolítico diminuindo os sintomas dos transtornos, melhorando a qualidade de vida dos indivíduos (BARBANTI, 2021).

Portanto, diante da relevância da prática de exercício físico para o bem-estar, saúde mental e necessidade de manter uma boa qualidade de vida, esta pesquisa teve o objetivo de investigar a produção científica dos últimos 5 anos, referente ao efeito da prática de exercício físico (EF) em pessoas com transtornos de ansiedade ou depressão.

2 MÉTODO

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. O método de revisão integrativa (RI) da literatura científica, é uma investigação que torna possível a busca, análise crítica e síntese das evidências disponíveis sobre determinado tema, neste caso a relação entre a prática de Exercício Físico em pacientes com ansiedade ou depressão, seguindo algumas etapas deste tipo de revisão (SOARES, 2014).

Inicialmente, estabeleceu-se uma pergunta de revisão com a seguinte proposta: Qual a relação existente entre a prática de exercício físico e saúde mental em pacientes com transtornos de ansiedade e depressão? Em seguida, estabeleceram-se os critérios de inclusão e exclusão dos artigos, teses e dissertações para direcionar a seleção dos mesmos.

Foram incluídos neste estudo artigos originais publicados no período de 2016 a março de 2021, em língua portuguesa e inglesa, texto completo disponível, metodologia contendo os dados fundamentais para a obtenção dos níveis de evidência, tratando de procedimentos, intervenções ou diretrizes sobre a prática de EF e seu uso como forma de intervenção e prevenção nos quadros de ansiedade e depressão. Foram excluídos os estudos de revisão, tese, dissertação e anais de congresso assim como aqueles que não estavam diretamente relacionados aos objetivos deste estudo.

As bases de dados eletrônicas consultadas foram Medical Literature Analysis and Retrieval System online (MEDLINE), Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SCIELO). Para busca dos artigos utilizou-se a consulta dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), onde foi

estabelecido os seguintes termos de busca: Exercício Físico, Saúde Mental, Ansiedade e Depressão, com seus correspondentes descritores em português e inglês.

As buscas nas bases de dados foram realizadas utilizando-se a combinação dos termos com os operadores booleanos AND e OR: "Exercício Físico" AND (Saúde Mental OR Ansiedade OR Depressão). Na base de dados LILACS foram encontrados 17 estudos; na MEDLINE 204 estudos e na SCIELO 4 estudos, resultando em um total de 225 artigos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao todo foram encontrados 225 artigos, após a busca iniciou-se a etapa de seleção dos mesmos através da leitura do título e do resumo, restando 8 artigos que se encaixaram nos critérios de inclusão e exclusão desta pesquisa, sendo estes lidos na íntegra. Dos 8 artigos selecionados, 7 foram da base de dados Scielo 1 da Lilacs. A descrição qualitativa dos estudos está expressa nos Quadro 1.

Quadro 1: Características dos Artigos selecionados

Autor/Ano	Objetivos	Resultados	Conclusão
MARTINS, L. L. (2017)	Identificar a prevalência de ansiedade e de depressão em trabalhadores do sexo masculino e a prática regular de exercício físico.	O estudo mostrou que dos 53 trabalhadores respondentes do questionário e da Escala HADS, 36 deles se exercitam regularmente e 17 são considerados sedentários. Os sujeitos praticantes de exercício físico tiveram escores menores de ansiedade e de depressão, ao contrário dos trabalhadores não praticantes, que tiveram maiores escores.	Os não praticantes de nenhuma modalidade de exercícios obtiveram uma média de ansiedade e de depressão bem maior.
ARAÚJO, et al. (2017)	Comparar os níveis de ansiedade e depressão de mulheres treinadas em exercício resistido e de sedentárias.	Os resultados mostraram que existe uma diferença significativa nos níveis de ansiedade e depressão entre o Grupo de treinamento T e o GC, sendo os maiores valores atribuídos ao GC.	Mulheres de meia-idade que participam de programas de exercícios resistidos, três vezes por semana, apresentaram melhor estado de saúde mental, demonstrando níveis mais baixos de depressão e ansiedade

			quando comparadas a mulheres sedentárias.
LAUX, <i>et al.</i> (2018)	Verificar o efeito de um Programa de Exercício Físico no Ambiente de Trabalho sobre a ansiedade dos funcionários técnicos administrativos	Destaca-se entre os achados do presente estudo, a melhora do grupo experimental comparado com o grupo controle após a intervenção, destacando a eficácia do programa e que o mesmo conseguiu diminuir para menos da metade os sintomas de ansiedade (Grupo experimental= De 8,5 pontos, para 4,0 pontos), enquanto no grupo controle esses índices aumentaram (De 9,00 pontos para 9,5 pontos)	Houve uma melhora na ansiedade dos sujeitos que participaram do programa de exercício físico de curta duração no ambiente de trabalho.
LEITE, <i>et al.</i> (2019)	Identificar a influência do treinamento resistido (TR) nos níveis de ansiedade e depressão.	O grupo controle obteve níveis baixos e parecidos de depressão e ansiedade (6,4 e 6,2 respectivamente). O grupo clínico apresentou um nível considerado acima da normalidade para depressão, e um nível bem alto para ansiedade (9,8 e 13,8 respectivamente). Já o grupo de participantes de Treinamento Resistido (ACM) apontou um nível mais baixo para depressão e um nível pouco alterado de ansiedade (4,8 e 8,1 respectivamente).	Os resultados mostram que os praticantes de treinamento resistido obtiveram menores níveis de ansiedade e depressão comparados aos praticantes de outras modalidades.
HERNANDEZ, <i>et al.</i> (2019)	Investigar a relação entre o exercício físico regular e a depressão em indivíduos idosos.	O resultado do presente estudo demonstrou que o exercício físico parece estar associado à significativa redução nos índices de depressão em idosos.	A atividade física é um fator que pode interferir ativa e positivamente na promoção da saúde mental das pessoas e, nesse caso, da população idosa.
ARAÚJO, <i>et al.</i> (2019)	Avaliar o efeito de um programa de exercício físico aeróbio de leve intensidade na	No geral, os escores de depressão e de ansiedade foram significativamente reduzidos no final do programa de treinamento.	A prática de exercício físico aeróbio de leve intensidade durante um curto período de tempo

	modalidade de dança sobre os sintomas de ansiedade e depressão em mulheres.		promoveu melhoria nos sintomas de depressão e ansiedade em mulheres de meia idade e idosas.
OLIVEIRA, <i>et al.</i> (2019)	Analisar os efeitos da atividade física sobre a qualidade de vida, ansiedade e depressão na população idosa.	O grupo ativo apresentou maiores escores de atividade física e qualidade de vida. Por outro lado, o grupo sedentário revelou maiores escores de ansiedade e depressão.	Os achados sugerem uma correlação entre baixos níveis de atividade física e sintomas de ansiedade e depressão em idosos que vivem na comunidade.
MORÉ, <i>et al.</i> (2020)	Analisar a influência de uma intervenção de oito semanas de HIIT na aptidão cardiorrespiratória e nos níveis de ansiedade, depressão e insônia de sujeitos sedentários saudáveis.	A variável depressão apresentou diferença significativa quando comparada ao pré e pós, tanto no GHIIT como no GCON, resultando na melhora de sintomas depressivos.	Na resposta sobre os sintomas depressivos, o GHIIT e o GCON apresentaram melhoras significativas em função do tempo; mas isso não ocorreu em relação à ansiedade cujos sintomas permaneceram.

Fonte: Santos, 2021.

Os estudos elegíveis para esta RI buscam estabelecer e validar o provável impacto positivo da prática de EF na saúde mental, sobretudo nos quadros de ansiedade e depressão de populações variadas, por meio de diferentes metodologias. O debate entre estes artigos é intermediado a seguir, com o objetivo de transpor as evidências coincidentes encontradas na revisão, apontar possíveis disparidades e principalmente, possibilitar um olhar mais abrangente e sucinto sobre os benefícios da prática de exercício físico na saúde mental.

Para isso, os estudos foram classificados de acordo com a compatibilidade de suas amostras, ficando subdivididas em quatro categorias: Saúde mental e EF em trabalhadores; saúde mental e EF em mulheres; saúde mental e EF em idosos; saúde mental e EF em adultos.

No tocante ao efeito do EF para a saúde mental, há evidências cada vez mais significativas de que o mesmo traz benefícios para o tratamento de doenças mentais, porém ainda não é considerada uma prática utilizada pelos psicólogos frequentemente, como parte do tratamento (AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION, 2017).

No que tange a primeira categoria, o estudo realizado por Martins (2017), teve como

objetivo verificar a prevalência de ansiedade e depressão em trabalhadores do sexo masculino, buscando relacionar esses transtornos com a prática regular de exercícios físicos nessa população. Laux *et al.*, (2018), propuseram fazer uma avaliação do efeito de um programa de exercícios físicos no ambiente de trabalho sobre a ansiedade de funcionários técnicos administrativos, prezando pela resposta dos valores pré e pós-intervenção.

Os achados dos estudos supracitados apresentaram resultados semelhantes, indicando maior prevalência de ansiedade e depressão em indivíduos sedentários e melhora significativa nos quadros de ansiedade após a intervenção por meio de programa de exercícios físicos. Em consonância a estes achados Martins (2017), encontrou uma melhora nos escores para os que praticam exercícios físicos sendo de 4,5 para ansiedade e 3,0 para depressão, já os escores dos que não praticam nenhuma modalidade ficaram em 6,5 para ansiedade e 4,8 para depressão, comprovando assim que o público sedentário obteve uma média de ansiedade e de depressão bem maior. O estudo de Laux *et al.*, (2018), mostrou uma diminuição nos níveis de ansiedade e depressão ao comparar o pré e pós-teste no grupo experimental ($p < 0,010$), sendo que não ocorreu o mesmo no grupo controle ($p = 0,348$).

A respeito da saúde mental e EF em mulheres, o estudo de Araújo *et al.*, (2017), comparou os escores de ansiedade e depressão em 40 mulheres de meia-idade usando a escala HAD (Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão) com o objetivo de identificar se a prática de exercícios resistidos modifica os escores desses transtornos. O autor apontou uma diferença significativa nos níveis de ansiedade e depressão entre o grupo controle e o grupo de mulheres treinadas, além da melhora nos escores dos transtornos, evidencia que mulheres que praticantes de EF com peso, desenvolvem benefícios terapêuticos e preventivos no que diz respeito à saúde mental, o que não foi evidenciado no grupo de mulheres sedentárias.

Ainda sob essa perspectiva, a pesquisa elaborada por Araújo (2019), em análises de prontuários de 8 mulheres de meia idade e idosas com 50 anos ou mais, diagnosticadas previamente com ansiedade e depressão, que foram submetidas a um programa de EF aeróbio, a fim de avaliar os possíveis sintomas pós-intervenção. Com isso, seu estudo confirmou o efeito positivo do EF aeróbico em curto espaço de tempo após a notória redução dos escores, corroborando assim com os resultados dos estudos anteriores. Ao final, todas as participantes pediram para continuar no programa, mostrando a importância e eficácia desse tipo de intervenção percebida pelas participantes desse estudo, as quais foram diagnosticadas inicialmente com ansiedade ou depressão (ARAÚJO, 2019).

Focando a saúde mental e EF em idosos, Oliveira *et al.*, (2019), realizaram um estudo transversal contando com 200 idosos, sendo 100 não sedentários e 100 sedentários, objetivando

avaliar os níveis de atividade física e a sua relação com a qualidade de vida, ansiedade e depressão nesses idosos. Os autores constataram que os idosos fisicamente ativos apresentaram escores gerais de qualidade de vida significativamente mais elevados do que os sedentários, que apresentaram os piores resultados em uma relação estatisticamente significativa com ansiedade e depressão.

Hernandez *et al.*, (2019), investigaram a relação entre o EF regular e a depressão em idosos, com uma amostragem de 84 fisicamente ativos e 76 sedentários. As amostragens envolvendo idosos, não constaram disparidades em questão quantitativa, sendo apenas diferenciadas pela temática. Por outro lado, seu estudo constatou que a média de indicativos de depressão no grupo de idosos ativos foi significativamente menor do que no grupo de idosos sedentários. Corroborando com o contexto citado, Gomes *et al.*, (2016) destaca que a terceira idade, a ansiedade pode estar ligada também à insuficiência de suporte físico social e dificuldades nas relações interpessoais, levando a sofrimento psíquico.

Em relação a saúde mental e EF em adultos, Leite *et al.*, (2019) realizaram estudo qualitativo com 16 adultos objetivando analisar a eficácia do treinamento resistido (TR) nos sintomas de ansiedade e depressão, sendo aplicados dois questionários, um para avaliação do nível de ansiedade e depressão e outro para os níveis de atividade física. Moré *et al.*, (2020), executaram uma intervenção com 38 indivíduos adultos, com duração de oito semanas de treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT), afim de contribuir para literatura atual que é considerada escassa em estudos voltados para a temática de HIIT sobre a aptidão cardiorrespiratória e nos sintomas de ansiedade, depressão e insônia. Os autores do estudo concluíram que o TR pode ser um grande aliado no tratamento de ansiedade e depressão em indivíduos adultos.

Por fim, no estudo de Moré *et al.*, (2020), após a intervenção, foi constatada a variável VO₂ máx., com acréscimo de 12% em comparação aos momentos pré e pós testes. Na resposta sobre os sintomas depressivos, o grupo submetido ao HIIT e o grupo controle, apresentaram melhoras significativas em função do tempo; mas isso não ocorreu em relação à ansiedade, cujos sintomas permaneceram. Os sintomas de insônia, por sua vez, apresentaram melhoras significativas. Nesse aspecto, faz-se necessária a busca mais aprofundada a respeito da relação de altas intensidades de exercício físico, na melhora dos quadros de ansiedade e depressão em adultos.

4 CONCLUSÃO

De acordo com os estudos em análise nesta revisão foi possível encontrar resultados

similares quanto à relação entre o exercício físico, a ansiedade e a depressão. Indivíduos submetidos a programas de exercícios orientados e acompanhados demonstram melhoria em relação ao estado saúde-doença-cuidado, maximizando a melhoria no bem-estar, na manutenção de um estilo de vida saudável, no aumento da capacidade funcional e na melhora da qualidade de vida, endossando valor do exercício físico como alternativa terapêutica na prevenção e tratamento da ansiedade e depressão.

REFERÊNCIAS

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. **Anxiety Disorders**. 2017. Disponível em: <https://www.psychiatry.org/patients-families/anxiety-disorders/what-are-anxiety-disorders>. Acesso em: 19 mai. 2021.

ARAÚJO, S. G. B. **Efeito do exercício físico sobre sintomas de ansiedade e depressão em mulheres**, Caicó, ano 2019, p. 1-9, 2019.

ARAUJO, K. C. M. et al. Exercício resistido melhora a ansiedade e depressão de mulheres de meia-idade. **Journal of physical education**, v. 28, p. 1-1, 2017.

BARBANTI, E. J. A importância do exercício físico no tratamento da dependência química. **Educação Física em Revista**. São Paulo-SP, v. 6, n. 1, 2012. Disponível em: <https://portalrevistas.ucb.br/index.php/efr/article/view/3005>. Acesso em: 27 mar. 2021.

BROOKS, S. K. et al. The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. **The Lancet**, v. 395, n. 10227, p. 912–920, mar. 2020.

CHADE, J; PALHARES I. Taxa de transtorno de ansiedade: **Jornal o Estadão**, seção Saúde, 2017. Disponível em: <https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-tem-maior-taxa-detranstorno-de-ansiedade-do-mundo-diz-oms,70001677247>. Acesso em: 19 jun. 2021.

GOMES, J.B.; REIS, L.A.; Descrição dos sintomas de Ansiedade e Depressão em idosos institucionalizados no interior da Bahia, Brasil. **Kairós Gerontologia** 2016;19(1):175-91.

HERNANDEZ, J. A. E.; VOSER, R. C. Exercício físico regular e depressão em idosos. **Estud. pesqui. psicol.** [online]. 2019, v.19, n.3, p. 718-734. ISSN 1808-4281.

LAUX, R.; HOFF, K.; LEDUR, D.; CVIATKOVSK, A.; CORAZZA, S., 2018. Efeito de um Programa de Exercícios Físicos no Ambiente de Trabalho Sobre a Ansiedade. **Cienc Trab.** Maio-agosto; 20 [62]: 80-83).

LEITE, A. D.; MACHADO, S. A.O. **A influência do treinamento resistido no nível de ansiedade e depressão em indivíduos adultos**. 2019. 18 f. Monografia (Especialização) - Curso de Educação Física, Faculdade de Educação Física da Associação Cristã de Moços, Sorocaba, 2019.

MARTINS L. L. **Prevalência de ansiedade e depressão em trabalhadores do sexo**

masculino e a prática regular de exercício físico, Santa Catarina, ano 2017, p. 1-24, 2017.

MORÉ, S.; TIGGEMANN, C. L.; GIOVANELLA, J. Efeito de um treinamento intervalado de alta intensidade na aptidão cardiorrespiratória e nos sintomas de ansiedade, depressão e insônia de sujeitos sedentários. **Revista Destaques Acadêmicos**, [S.l.], v. 12, n. 3, nov. 2020. ISSN 2176-3070. Disponível em: <http://univates.br/revistas/index.php/destaques/article/view/2603>. Acesso em: 15 mar. 2021.

OLIVEIRA, LSSCB.; SOUZA, C. E.; RODRIGUES, R. A. S.; FETT, C. A.; PIVA, A. B. Os efeitos da atividade física na ansiedade, depressão e qualidade de vida em idosos que vivem na comunidade. **Trends Psychiatry Psychother**. 2019; 41 (1): 36-42.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). **Depressão: recomendações baseadas em evidências para o manejo da depressão em ambientes de saúde não especializados** [Internet]. 2015 [citado em 12 de março de 2021]. www.who.int/mental_health/mhgap/evidence/depression/en/ Chang YC, Yao G

SANTOS, M. O exercício físico como auxiliar no tratamento da depressão. Jundiaí SP: **Revista Brasileira de Fisiologia do Exercício**, v. 1, p. 8, 2020. <https://doi.org/10.33233/rbfe.v18i2.3106>.

SOARES, C.B.; HOGA, LAK.; PEDUZZI, M.; SANGALETI, C.; YONEKURA, TS.; SILVA, DRAD.; Revisão integrativa: conceitos e métodos utilizados na enfermagem. **Revista Escola de Enfermagem USP** [internet]. 2014; [cited 2016 Nov 03]; 48(2):335-45. <http://dx.doi.org/10.1590/S0080-6234201400002000020>.

ZUNTINI, Ana Carolina Siqueira; et.al. Atividades e Exercícios físicos nos Transtornos Psicológicos. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**. Ano 03, Ed. 01, v. 03, p. 97-115, Janeiro 2018. ISSN: 2448-0959.

CAPÍTULO 50

EXPRESSÃO DOS RECEPTORES DE SARS-CoV-2 EM GLÂNDULAS SALIVARES E SUA REPERCUSSÃO NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c50](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c50)

Karla Arrigoni Gomes¹, Paula Mylena Paiva de Souza², Maria Luíza da Costa Gomes³, Robert Wilson da Silva Tostes⁴, Nyali Rosa de Castro⁵, Wesley da Silva de Paiva⁶, Bruno Romano de Oliveira⁷, Laryssa Costa Huguenin França⁸, Ana Paula Silva Carvalho⁹, Eduardo Stehling Urbano¹⁰

1 Faculdade de Odontologia, Universidade Federal de Juiz de Fora,
karla.arrigoni@gmail.com

2 Faculdade de Odontologia, Universidade Federal de Juiz de Fora,
paula.mylena@odontologia.ufjf.br

3 Faculdade de Odontologia, Universidade Federal de Juiz de Fora,
marialuiza.gomes@estudante.ufjf.br

4 Faculdade de Odontologia, Universidade Federal de Juiz de Fora,
robert.tostes@odontologia.ufjf.br

5 Faculdade de Odontologia, Universidade Federal de Juiz de Fora,
nyali.castro@odontologia.ufjf.br

6 Faculdade de Odontologia, Universidade Federal de Juiz de Fora,
wesley.paiva@odontologia.ufjf.br

7 Faculdade de Odontologia, Universidade Federal de Juiz de Fora,
bruno.romano@odontologia.ufjf

8 Faculdade de Odontologia, Universidade Federal de Juiz de Fora,
laryssa.huguenin@odontologia.ufjf.br

9 Faculdade de Odontologia, Universidade Federal de Juiz de Fora,
anapaula.carvalho@estudante.ufjf.br

10 Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Juiz de Fora,
esurss@yahoo.com.br

Introdução: A pandemia do novo coronavírus (COVID-19) tem acarretado elevados riscos de contaminação aos profissionais de saúde, principalmente aos cirurgiões-dentistas. O achado de elevadas cargas virais na saliva demonstra que ela desempenha um papel crucial na transmissão do vírus, especialmente através de indivíduos assintomáticos. **Objetivo:** Como o cirurgião-dentista lida diretamente com a cavidade bucal e possui extremo contato com fluidos corporais carreadores do vírus, o presente estudo busca, por meio de uma revisão de literatura atual, analisar o impacto da COVID-19 na prática odontológica. **Metodologia:** Utilizou-se as bases de dados Pubmed, Medline, LILACS e BBO, empregando como unitermos: coronavírus, covid-19, odontologia e cirurgião-dentista. **Resultados:** Estudos publicados recentemente evidenciaram que as glândulas salivares maiores, apresentam receptores da enzima conversora de angiotensina (ACE2), que são essenciais para a entrada do vírus no hospedeiro. Desse modo, torna-se necessária a adoção de medidas de prevenção de infecção durante os procedimentos clínicos e cirúrgicos, como evitar o uso de instrumentais e equipamentos que gerem aerossóis, realizar uma triagem específica, aplicar os protocolos de biossegurança adequados, e em casos maiores como cirurgias bucomaxilofaciais eletivas, poderão ser solicitados RT-PCR, teste considerado padrão-ouro para a COVID-19. **Conclusão:** Dado o fato de que as glândulas salivares se mostram como reservatórios do SARS-CoV-2 por apresentarem receptores de ACE2 em suas células, é possível considerar que a saliva é um potencial meio de transmissão da COVID-19, sendo o cirurgião-dentista um profissional extremamente exposto e sujeito à infecção cruzada. A aceleração das estratégias de vacinação em massa é o caminho mais eficaz para superar a pandemia de COVID-19, porém não é motivo para negligenciar a biossegurança durante os procedimentos odontológicos.

Palavras-chave: Coronavírus; Covid-19; Odontologia; Cirurgião-dentista

Área temática: ciências da saúde

E-mail do autor principal: karla.arrigoni@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

A ocorrência de pneumopatias idiopáticas na China, ocorrida no ano de 2019, desencadeou uma busca ativa com a finalidade de detecção do agente etiológico. Após isolado e identificado, constatou-se tratar de um novo coronavírus (CHEN et al., 2020; ROSA et al., 2020; SONG et al., 2020). Em fevereiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) nomeou a nova pneumonia viral como COVID-19 e em março do mesmo ano a doença foi considerada uma pandemia, atingindo mais de 100 países (ROSA et al., 2020; SONG et al., 2020). Desde então, a COVID-19 passou a ser considerada uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional pela OMS (SONG et al., 2020). Logo, por serem observadas semelhanças filogenéticas entre o novo vírus e o SARS-CoV e o MERS-CoV, o Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus nomeou o novo coronavírus como SARS-Cov-2 (ROSA, 2020; SONG et al., 2020).

Estudos demonstram que a entrada do SARS-CoV-2 na célula se dá pela ligação da proteína viral *spike* (S) a receptores celulares da enzima conversora de angiotensina 2 (ACE2) da célula hospedeira e é desencadeado por proteases de serinas transmembranares específicas (TMPRSS), dentre elas, a TMPRSS2 e a TMPRSS11D. A partir da demonstração das vias de entrada do vírus, estudos identificaram potenciais rotas para infecção por SARS-CoV-2 nos sistemas respiratório, cardiovascular, digestório e urinário, além das glândulas salivares e cavidade bucal, especialmente a língua (SONG et al., 2020).

Antes mesmo das manifestações clínicas pulmonares aparecerem, o RNA do SARS-CoV-2 pode ser encontrado na saliva. Recentemente foi evidenciado que as células epiteliais das glândulas salivares, que apresentam elevada expressão de ACE2 são um reservatório para o SARS-CoV-2, o que revela o papel deste fluido na disseminação e na detecção da doença. Por meio de exames histopatológicos das glândulas parótida e submandibular em pacientes que foram à óbito pela COVID-19, foi constatada a presença de partículas virais nas células acinares, incluindo degeneração de suas organelas e núcleos aumentados nas células infectadas, além da presença de agrupamentos de nucleocapsídeos, o que sugere replicação viral (MATUCK et al., 2021).

Estudos apontaram que a coleta de saliva para diagnóstico da COVID-19 apresentou os mesmos resultados do swab nasal e orofaringe. As cargas virais do SARS-CoV-2 podem ser detectadas na saliva até 29 dias após o término da infecção, o que indica que essa secreção é uma boa opção para se diagnosticar a doença, principalmente em casos assintomáticos. Os benefícios do teste salivar incluem o fato de serem menos invasivos, econômicos, o diagnóstico ser em tempo real, além das amostras serem simples de obter e poderem ser coletadas em ambiente domiciliar. Quando comparada ao sangue, a saliva não coagula, é de mais fácil transporte e armazenamento, e pode ser tratada com mais eficiência (XU et al., 2020).

A evolução clínica da COVID-19 é bastante variável e os principais sintomas relatados são: dor de cabeça, febre, dispneia, mialgia, fadiga e dor de garganta podendo evoluir para pneumonia, falência renal e óbito (BANAKAR et al., 2020; CHEN et al., 2020; SILVA et al., 2020; SONG et al., 2020). Outros sintomas são relatados com menos frequência tais como, manifestações cutâneas, disgeusia, afecções de glândulas salivares e úlceras intrabuciais (ANSARI et al., 2020; XU et al., 2020; CARRERAS-PRESAS et al., 2020). Alguns autores relatam que alterações de olfato e paladar representam os únicos ou os primeiros sintomas de COVID-19, o que os torna importantes para detecção precoce da doença (PASSARELLI et al., 2020). Tais sintomas são, portanto, fundamentais para que o cirurgião-dentista suspeite da

presença da doença e propicie ao paciente o diagnóstico precoce. Muitos estudos também têm investigado o papel do SARS-Cov2 no sistema nervoso, pois sabe-se que a infecção pode culminar em alguns sintomas neurológicos, tais como cefaléia e anosmia. O vírus possui a capacidade de penetrar o sistema nervoso central através da periferia, a partir de estruturas como o bulbo olfatório e ramos do nervo trigêmeo, e alcançar o encéfalo e o líquido cefalorraquidiano. A expressão ACE2 nas células epiteliais da língua e das glândulas salivares poderia explicar o desenvolvimento de disgeusia nos pacientes com COVID-19 (BRANDÃO et al., 2020). Quanto às vias de transmissão, as mais comuns são as tosse e os espirros, levando à liberação de gotículas que contém o SARS-CoV-2. Procedimentos odontológicos podem produzir aerossóis capazes de infectar o profissional, devido à extrema proximidade com o paciente. Estes aerossóis apresentam a capacidade de infectar o hospedeiro por aproximadamente 3 horas após sua liberação no ar, estando sujeitos ao transporte à distância e podendo seguir as trajetórias do fluxo de ar, que muitas vezes são alteradas por objetos em movimento, abertura e fechamento de portas e janelas e variações de temperatura e umidade (ANDERSON, 2020; JAYAWEERA et al., 2020).

Tendo em vista que a taxa de SARS-CoV-2 na saliva dos pacientes pode ser em torno de 92% e que o vírus vivo também pode ser cultivado em amostras de saliva, evidencia-se a grande potencialidade de transmissão (HJELMESAETH et al., 2020; XU et al., 2020) expondo o cirurgião-dentista à infecção (CHEN et al., 2020; HAMID et al., 2021; ELISETTI, 2020; SAPKOTA et al., 2020; SILVA et al., 2020). Dessa forma, são fundamentais os cuidados relativos à biossegurança durante os atendimentos odontológicos.

2 MÉTODO

Foram selecionados estudos observacionais, estudos piloto, revisões sistemáticas e de literatura a fim de analisar o impacto da COVID-19 na prática odontológica, após estudos demonstrarem sua presença nas glândulas salivares.

Foram incluídos estudos que apresentassem resultados como: possibilidade de infecção cruzada através de aerossóis com partículas de COVID-19, capacidade de multiplicação do vírus nas glândulas salivares, fluido salivar como diagnóstico, e a adequação dos cirurgiões-dentistas frente à pandemia.

A estratégia de busca adotada foi a de localização de artigos publicados em inglês entre 2019 a 2021. Utilizou-se as bases de dados Pubmed, Medline, LILACS e BBO, empregando como

unitermos: coronavírus, covid-19, odontologia e cirurgião-dentista. Foram selecionados 34 textos para compor esta revisão de literatura.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A presença do SARS-CoV-2 na saliva expõe o profissional a partículas virais na prática clínica, sendo um fator de risco para infecção, o que torna necessária a adoção de medidas de biossegurança adequadas. Quanto ao cenário de evolução da doença, dois pontos são de extrema importância: a susceptibilidade e a transmissibilidade. A transmissibilidade está relacionada à capacidade de transmissão do SARS-CoV-2, que é determinada pela taxa de contágio entre a população, e a susceptibilidade é determinada pela imunidade dos indivíduos frente ao vírus (GHERLONE et al., 2021; SILVA et al., 2020).

Segundo o jornal “The New York Times” o cirurgião dentista é um dos profissionais da saúde mais expostos à COVID-19, pois está exposto à saliva, sangue, aerossóis, e outros fluidos corporais gerados durante os procedimentos, sendo um importante veículo de contaminação, o que aumenta o risco biológico (GHERLONE et al., 2021; SILVA et al., 2020). A transmissão de SARS-CoV-2 durante procedimentos odontológicos pode ocorrer pela inalação de aerossóis/gotículas de indivíduos infectados ou pelo contato direto com membranas mucosas, fluidos orais ou instrumentos e superfícies contaminados (IZZETTI et al., 2020; SILVA et al., 2020). Assim, é essencial que se adote protocolos de biossegurança que visem minimizar o contágio, e esses protocolos devem ser específicos para as 3 fases do atendimento: antes, durante e após a consulta odontológica (BANAKAR et al., 2020).

Ao avaliar um paciente, o profissional precisa estar apto a identificar casos de suspeita da COVID-19. Aos que serão submetidos a procedimentos como colocação de implantes, extrações que envolvem muitos dentes, ou cirurgias à nível hospitalar, como cirurgias bucomaxilofaciais, poderão realizar além de exames de risco cirúrgico, o teste de RT-PCR para detecção da COVID-19 (BAGHIZADEH, 2021). É importante, portanto, que algumas questões sejam abordadas durante a anamnese, tais como se o paciente apresentou febre e sintomas respiratórios nas últimas duas semanas ou se manteve contato com algum indivíduo contaminado. Além das perguntas da anamnese, é fundamental que o profissional faça a aferição da temperatura corporal. Se houver risco de contágio, o cirurgião-dentista poderá suspender o atendimento por 14 dias e encaminhá-lo para avaliação médica. Caso a análise clínica não demonstre risco de contágio, o tratamento pode ser realizado normalmente, porém, com proteções extras e evitar, sempre que possível, a realização de procedimentos que gerem

aerossóis (ROSA, 2020; PENG et al., 2020). Dessa forma, observa-se que o custo financeiro de um atendimento odontológico aumentou muito devido a necessidade de novos equipamentos de proteção individual (EPI's) e da utilização de mais produtos para desinfecção do ambiente (MARCENES, 2020).

Evidências mostram que partículas do SARS-CoV-2 eliminadas através de aerossóis permanecem estáveis por três horas no ar e setenta e duas horas em superfícies de aço inoxidável ou plástico (SAMANARAYAKE et al., 2021). Por meio de uma revisão sistemática, foram analisados 83 estudos para se verificar a capacidade dos instrumentos odontológicos de contaminar as superfícies ao redor do campo de trabalho. Grande parte dos experimentos usaram corantes para detectar a contaminação após os procedimentos. Foi-se constatado significativa contaminação nas áreas da cabeça do cirurgião-dentista e do corpo do paciente, principalmente quando utilizados dispositivos de ar e água. O *face-shield*, o óculos de proteção e a máscara mostraram-se fortemente contaminados, assim como o braço e o membro superior do operador (INNES et al., 2021).

A quantidade de aerossóis produzida durante os atendimentos depende de diversos fatores na prática clínica como o tipo de procedimento a ser realizado, os equipamentos utilizados e a ventilação do ambiente (REXHEPI et al., 2021). Existe uma equação denominada “Equação de Wells-Riley” que foi desenvolvida especialmente para calcular a taxa de infectividade em ambientes fechados. Porém, esta pode apresentar algumas limitações, pois não é considerado as variações na distribuição das partículas de aerossóis no ambiente. O cálculo é expresso pelo número de novos casos (Nc) ao longo do tempo (t), com base nos indivíduos infectados(I) e suscetíveis (S) presentes em um espaço com ventilação (Q) (MARCENES, 2020).

Para limitar a quantidade de aerossóis e reduzir o risco de infecção cruzada, recomenda-se o uso de motores com válvulas de antirretração e antirrefluxo (ROSA, 2020; TUÑAS et al., 2020). O vírus também pode se aderir aos instrumentais e persistir por dias se os mesmos não forem esterilizados corretamente. Além disso, recomenda-se o uso de isolamento absoluto em procedimentos mais simples e uso de sugador incessantemente (BANAKAR et al., 2020; SAMANARAYAKE et al., 2021) É importante que antes de qualquer atendimento seja realizada a antisepsia bucal, visando reduzir a carga viral na cavidade oral. Para tal, deve-se realizar o enxágue bucal com peróxido de hidrogênio a 1% ou iodopovidona a 0,2%. A clorexidina não demonstra ser eficaz para inativar o SARS-CoV-2, pois o vírus é vulnerável à oxidação, sendo necessário, portanto, o uso de antioxidantes (PENG et al.; ROSA, 2020).

Salienta-se também a importância de janelas abertas para a circulação de ar e caso houver porta na sala clínica, ela deve estar fechada, a fim de que não se espalhe ar contaminado para outros locais do consultório (REXHEPI et al., 2021).

Tendo em vista o potencial risco de contaminação em ambiente odontológico, é de suma importância o cuidado na desinfecção do ambiente, destacando-se: ao higienizar o consultório, usar óculos, gorro, máscara e luvas de borracha; realizar a limpeza dos equipamentos ao final dos atendimentos com água e sabão, sob fricção e, em seguida, usando álcool líquido a 70% passar sobre o refletor, os braços da cadeira odontológica, o mocho e superfícies auxiliares, incluindo os equipamentos de mão. A cuspeira deve ser descontaminada com hipoclorito de sódio a 1%; proteger os teclados dos computadores com filme PVC e higienizá-los com álcool a 70%, assim como as maçanetas de portas e as superfícies da sala de espera. Para a limpeza do piso recomenda-se hipoclorito de sódio a 1%. As áreas externas (portão, corrimão e cadeiras da recepção) podem ser higienizadas com pulverizador contendo solução a 0,3% de ácido peracético (diluição 3 mL de ácido peracético 15% em 1 litro de água) (MORAES et al., 2020).

Quanto aos testes sorológicos para diagnosticar a COVID-19, tem-se que o padrão ouro é o RT-PCR. Dentre os outros estão os testes rápidos que utilizam a metodologia imunocromatográfica e testes sorológicos realizados por técnicas convencionais de ensaios imunoenzimáticos (ELISA) por detecção em plataformas de quimioluminescência ou eletroquimioluminescência (DIAS et al., 2020). Estudos que avaliaram pacientes internados em enfermarias e em unidades de terapia intensiva, evidenciaram a proporção de positividade da RT-PCR na saliva (78%) quando comparado com o swab nasal (100%) (PASOMSUB et al., 2021). Apesar de ainda ser desconhecido o tempo que os anticorpos permanecem no organismo, os testes rápidos podem ajudar na epidemiologia da doença (GOULAR et al., 2020).

O uso da saliva para diagnóstico complementar da COVID-19 tem sido considerado, uma vez que contém o SARS-CoV-2 vivo. Além disso, o diagnóstico salivar é uma forma prática e economicamente mais acessível que os demais métodos disponíveis (SILVA et al., 2020). Diferente de outros coronavírus, uma alta carga viral de SARS-CoV-2 tem sido detectada na primeira semana após o início dos sintomas, o que aponta a saliva como importante fonte de transmissão (CHEN et al., 2020; DIAS et al., 2020; HAMID et al., 2020). Desse modo, a saliva mostra-se como potencial fluido de infecção para diagnóstico da COVID-19.

4 CONCLUSÃO

Dado o fato de que as glândulas salivares mostram-se como reservatórios do SARS-Cov-2 por apresentar receptores de ACE2 em suas células, é possível considerar que a saliva é um potencial meio de transmissão da COVID-19, sendo o cirurgião-dentista um profissional extremamente exposto e sujeito à infecção cruzada. É impreterível que o profissional tenha conhecimentos sobre a doença, para que possa realizar os procedimentos com segurança. É válido salientar que a aceleração das estratégias de vacinação em massa é o caminho mais eficaz para superar a pandemia da COVID-19, porém não é motivo para negligenciar os cuidados.

REFERÊNCIAS

- ADEOYE, J. et al. 'The Double-Edged Sword' – An hypothesis for Covid-19-induced salivary biomarkers. **Medical Hypotheses**, v. 143, p. 110124, out. 2020.
- ANSARI, R. et al.. Oral cavity lesions as a manifestation of the novel virus (COVID-19): a letter-to-editor. **Oral Diseases**, v. 27, n. 3, p. 771-772, abr. 2020.
- BANAKAR, M. et al. COVID-19 transmission risk and protective protocols in dentistry: a systematic review. **Bmc Oral Health Volume**, p. 1-12, 2020
- CARRERAS-PRESAS, M. C. et al. Oral vesiculobullous lesions associated with SARS-CoV-2 infection. **Oral Diseases**, v. 27, n. 3, abr. 2020.
- CHEN, L. et al. Detection of SARS-CoV-2 in saliva and characterization of oral symptoms in COVID-19 patients. **Cell proliferation**, p. 1-7, jul. 2020.
- CHEN, N. Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. **The Lancet**, v. 395, n. 10223, p.507-513, fev. 2020.
- DIAS, V. M. C. H. et al. Testes sorológicos para COVID-19: interpretação e aplicações práticas. **American Journal of Infection Control**, v. 9, n.2, abr-jun. 2020.
- ELISETTI, Nirupa. Periodontal pocket and COVID-19: could there be a possible link? **Medical Hypotheses**, v. 146, p. 110355, jan. 2021.
- FINI, B.M. et al. Oral saliva and COVID-19. **Oral Oncology**, v. 108, p. 1-4, maio 2020.
- GAMIO, L. The workers who face the greatest coronavirus risk. **New York Times**; 2020. Disponível em: <https://www.nytimes.com/interactive/2020/03/15/business/economy/coronavirus-worker-risk.html>. Acesso em: 31 ago. 2021.
- GHERLONE, E. et al. Dentistry and Covid-19 pandemic: operative indications post-lockdown. **New Microbiologica**, Milan, v. 44, p. 1-11, jul. 2020
- GOULAR, T. O. S. et al. Manifestações clínicas, fatores de risco e diagnóstico na COVID-19. **Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial**, 2020.

HAMID, et al. Covid-19 Pandemic And Role Of Human Saliva As A Testing Biofluid In Point-Of-Care Technology Hiba. COVID-19 Pandemic and Role of Human Saliva as a Testing Biofluid in Point-of-Care Technology. **European Journal Of Dentistry**, Saudi Arabia, v. 14, n. 10, p. 123-129, 2020.

HJELMESAETH, J; SKAARE, D. Loss of smell or taste as the only symptom of COVID-19. **Tidsskrift for Den norske legeforening**, v. 140, n. 7, abr. 2020.

INNES, N. et al. A systematic review of droplet and aerosol generation in dentistry. **Journal Of Dentistry**, Londres, v. 105, n. 10, p. 1-13, ago. 2020.

IZZETTI, R. et al. COVID-19 Transmission in Dental Practice: Brief Review of Preventive Measures in Italy. **Journal of Dental Research**, v. 99, n.9, abr. 2020.

MARCENES, W. The impact of the COVID-19 pandemic on dentistry. **Community Dent Health**, p. 239-241, 2020.

MATUCK, B.F. et al. Salivary glands are a target for SARS-CoV-2: a source for saliva contamination. **The journal Of Pathology**, São Paulo, v. 4, n. 10, p. 239-243, maio 2021.

MORAES, D. C. Atendimento odontológico em tempos de COVID-19: compartilhando boas práticas protetivas e de biossegurança. **Journal of Dental Public Health**, v. 11, n. 1, p.73-82, jun. 2020

PASOMSUB, E. et al. Saliva sample as non-invasive specimen for diagnosis of coronavirus disease 2019: a cross-sectional study. **Elsevier**, v. 27, n.2, p. 285, fev. 2021.

PASSARELLI, P. C. et al. Taste and smell as chemosensory dysfunctions in COVID-19 infection. **American Journal of Dentistry**, v. 33, n. 3, p. 135-137, jun. 2020.

PENG, X. Transmission routes of 2019-nCoV and controls in dental practice. **International Journal of Oral Science**, v. 12, n. 1, p. 9, mar. 2020.

REXHEPI, I. et al. Effects of Natural Ventilation and Saliva Standard Ejectors during the COVID-19 Pandemic: A Quantitative Analysis of Aerosol Produced during Dental Procedures. **International Journal Environmental Research Public Health**, Chieti, v. 3, n. 10, p. 1-9, jul. 2021.

ROSA, A. C. G. COVID-19: considerações atuais sobre a transmissão salivar em humanos e recomendações para cirurgiões-dentistas. **Revista de Patologia do Tocantins**, v. 7 n. 2, jun. 2020.

SABINO, R.S. et al. Coronavirus COVID-19 impacts to dentistry and potentialsalivary diagnosis. **Clinical Oral Investigations Volume**, p. 1619-1621, abr. 2020.

SAMARANAYAKE, L.P. et al. The efficacy of bio-aerosol reducing procedures used in dentistry: a systematic review. **Acta Odontologica Scandinavica**, v. 79, n. 1, p. 69-80, 14 dez. 2020.

SANTOSH, T. S. et al. A review of salivary diagnostics and its potential implication in detection of Covid-19. **Cureus**, v. 12, n. 4, 2020.

SAPKOTA, D. et al. COVID-19 salivary signature: diagnostic and research opportunities. **Journal of Clinical Pathology**, p. 344-349, 2021.

SONG, J. et al. Systematic analysis of ACE2 and TMPRSS2 expression in salivary glands reveals underlying transmission mechanism caused by SARS-CoV-2. **Journal of Medical Virology**, v. 92, n. 11, p. 2556-2566, nov. 2020

TUÑAS, I. T. C. et al. Doença pelo corona vírus 2019 (COVID-19): uma abordagem preventiva para a odontologia. **Revista Brasileira de Odontologia**, v. 77, p. 1766, 2020.

VILLANI, F. A. et al. COVID-19 and Dentistry: Prevention in Dental Practice, a Literature Review. **Int J Environ Res Public Health**, p. 1-12, 2020.

XU, H. et al. High expression of ACE2 receptor of 2019-nCoV on the epithelial cells of oral mucosa. **International Journal of Oral Science**, v. 12, n. 8, fev. 2020.

XU, J. et al. Salivary glands: potential reservoirs for COVID-19 asymptomatic infection, **Journal of Dental Research**, v. 99, n. 8, jul. 2020; 9.

CAPÍTULO 51

FARMACOCINÉTICA: ABSORÇÃO E VIAS DE ADMINISTRAÇÃO

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c51](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c51)

Carolina Dourado de Faria¹, Fernando Antônio Ramos Schramm Neto², Yuri de Jesus Machado³, Lucas Furlan Cirqueira de Souza⁴, Isabelly Raiane Silva dos Santos⁵, Carolina Woinarovicz Meneghetti⁶, Liara de Oliveira Teixeira⁷, Demerval de Pinho Borges Netto⁸, Antônio Lucas Farias da Silva⁹, Geísa de Moraes Santana¹⁰.

¹ Universidade Salvador, carolinain11@gmail.com;

² Universidade Salvador, fernando78541@hotmail.com;

³ Universidade Salvador, mjjyuri1999@gmail.com;

⁴ Universidade de Uberaba, lucasfurlan7@hotmail.com;

⁵ Universidade Federal do Pará, isabelly.santos@ifpa.edu.br;

⁶ Universidade Estadual de Ponta Grossa, carolinawmeneghetti@gmail.com;

⁷ Universidade Federal de Santa Maria, liarateixeira6@gmail.com;

⁸ Centro Universitário Unifacid, demervalpinho15@outlook.com;

⁹ Centro Universitário Unifacid, lucas1992farias@gmail.com;

¹⁰ Universidade Estadual do Piauí, geisasantana97@gmail.com.

RESUMO

Objetivo: Discutir sobre as principais evidências científicas acerca do processo de absorção e vias de administração envolvendo a farmacocinética. **Método:** Foi realizada uma revisão narrativa de literatura. As bases de dados bibliográficas utilizadas foram PubMed, SciELO e LILACS. Os seguintes descritores foram usados na pesquisa: “*Pharmacokinetics*”, “*Absorption*”, “*Drug administration routes*”. **Resultados:** A absorção constitui-se como o primeiro processo da farmacocinética, isto é, do caminho que o medicamento percorre após a administração no corpo humano. É nesta etapa que irá ocorrer a passagem das substâncias medicamentosas para a corrente sanguínea para, posteriormente, ser distribuída ao meio intracelular. Os princípios farmacocinéticos dependem da permeabilidade do fármaco, que, por sua vez, dependem de uma série de características, tais como: lipossolubilidade, gradiente de concentração, via de administração, ionização, dentre outras. **Considerações Finais:** O entendimento acerca da etapa de absorção de fármacos, a biodisponibilidade e vias de

administração é de fundamental importância para minimizar os riscos de efeitos indesejados no paciente.

Palavras-chave: Farmacologia; Compostos Orgânicos; Atenção à Saúde.

Área Temática: Ciências da Saúde.

E-mail do autor principal: carolinain11@gmail.com

1. INTRODUÇÃO

Para que exista um melhor entendimento a respeito da ação terapêutica dos fármacos, se faz necessário compreender a farmacocinética (Brunton, 2012), isto é, a forma com que o organismo processa os medicamentos (Pereira, D. G; 2007): a absorção, a distribuição, o metabolismo e a excreção dos fármacos (ADME) (Davis, C. & Harris, S. R, 2017). Em outras palavras, é importante compreender o aproveitamento de determinada substância pelo organismo (biodisponibilidade) e o tempo gasto no seu local de ação, de maneira a assegurar um bom desfecho terapêutico ao paciente, e minimizando a ocorrência de efeitos indesejados (Brunton, 2012; Pereira, D. G, 2007).

Os princípios farmacocinéticos (ADME) dependem da permeabilidade do fármaco através das membranas celulares, e, portanto, das características físico-químicas das suas moléculas. Alguns fatores decisivos no transporte e consequente biodisponibilidade do fármaco são: lipossolubilidade, gradiente de concentração, maior área de contato e vascularização, e ionização (Brunton, 2012; Davis, C. & Harris, S. R, 2017).

A permeabilidade do fármaco depende, na maioria das vezes, das seguintes características: Lipossolubilidade, gradiente de concentração, área de superfície e vascularização, além da ionização. Lipossolubilidade se trata da capacidade do fármaco de se difundir através das bicamadas fosfolipídicas que compõem as membranas das células. Pode ser medida por meio do coeficiente de partição óleo-água. Quanto maior for o coeficiente de partição, maior a lipossolubilidade. Quanto ao gradiente de concentração, fármacos livres, não ionizados, podem se difundir de um local mais concentrado, para outro, menos concentrado. Área de superfície e vascularização também possui importante relação com a permeabilidade, visto que, quanto maior a área de contato do órgão com as moléculas do fármaco e quanto maior a vascularização de determinado local, melhor será a absorção do fármaco para a circulação sanguínea. Por fim, a grande maioria dos fármacos são ácidos fracos ou bases fracas, podendo existir na forma não ionizada ou molecular (capaz de atravessar as membranas celulares, e, portanto, mais bem absorvido) ou na forma ionizada (mais bem excretado por ser

hidrossolúvel). Para saber quanto de cada forma irá existir, dependerá do gradiente de pH através da membrana e do pKa processo absorptivo (Davis, C. & Harris, S. R, 2017).

Fundamentando-se nisso, o objetivo deste trabalho é discutir sobre as principais evidências científicas acerca do processo de absorção e vias de administração envolvendo a farmacocinética.

2. MÉTODO

O presente estudo constitui uma revisão narrativa da literatura sobre a etapa de absorção na farmacocinética e vias de administração. Os dados foram obtidos por meio de levantamento bibliográfico entre abril e maio de 2021 e a revisão foi conduzida entre maio e junho de 2021. Como critério de inclusão, fez-se seleção de publicações dos últimos 15 anos, nos idiomas inglês e português. Os descritores em inglês utilizados para o cruzamento foram: “*Pharmacokinetics*”, “*Absorption*”, “*Drug Administration routes*”. O operador booleano “AND” foi usado para auxiliar nas pesquisas. As bases de dados eletrônicas utilizadas para a pesquisa foram PubMed, SciELO e LILACS, bem como livros publicados sobre o tema. É importante destacar que o estudo se pautou nas características de uma revisão narrativa. Dessa forma, não foi desenvolvido com base em um questionamento específico, de forma sistematizada, mas sim em tema amplo com seleção de informações em publicações gerais sobre o assunto para atualizar o conhecimento do leitor acerca desta temática.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O pKa se refere ao pH no qual a metade do fármaco, seja ele ácido ou básico, está dissociado. Quando ácidos se dissociam, normalmente, ocorre formação de íons ($HA \rightarrow H^+ + A^-$), e quando bases se dissociam, normalmente, não ocorre formação de partícula ionizada ($BH^+ \rightarrow H^+ + B$). Quando o fármaco, seja ele ácido ou básico, estiver em um meio no qual o pH for menor que seu pKa, irá predominar sua forma protonada, já que o ambiente está repleto de H^+ . A forma protonada do fármaco ácido condiz com sua forma não ionizada (HA), enquanto a forma protonada da base (BH^+) condiz com sua forma ionizada.

Já quando o fármaco estiver em um meio com pH maior que seu, irá ocorrer o inverso, havendo predomínio da forma não protonada. A forma não protonada do ácido condiz com sua forma ionizada ($H^+ + A^-$), enquanto a base não protonada condiz com sua forma não ionizada ($B + H^+$) (Brunton, 2012; Davis, C. & Harris, S. R, 2017).

Uma correlação clínica que pode ser feita para facilitar o entendimento é quanto à metabolização da lactulose, açúcar utilizado no tratamento da encefalopatia hepática, patologia

que, dentre outras consequências, causa hiperamonemia. A microbiota intestinal é capaz de transformar a lactulose em ácido lático, acidificando, dessa forma, as massas fecais. A redução de pH faz com que a amônia (NH_3) se transforme em amônio (NH_4^+), sua forma ionizada, e, portanto, passível de excreção renal (Davis, C. & Harris, S. R, 2017).

Algumas observações importantes a se ter em mente para dar continuidade ao tema são:

- A) Somente moléculas desconectadas de proteínas plasmáticas, sejam elas ionizadas ou não ionizadas, podem ser filtradas (Davis, C. & Harris, S. R, 2017);
- B) As moléculas não ionizadas são aquelas passíveis de serem reabsorvidas ou secretadas, tendo em vista que, estes processos requerem a passagem através de membranas celulares, enquanto os fármacos ionizados não conseguem realizar esta passagem, e ficam, portanto, retidos no filtrado para posterior excreção (Davis, C. & Harris, S. R, 2017).

Este último ponto é de extrema relevância para a clínica, uma vez que a manipulação do pH da urina pode influenciar na eliminação de um agente tóxico, por exemplo. A acidificação da urina irá aumentar o processo de ionização das bases fracas e a alcalinização da urina irá aumentar a ionização de ácidos fracos, impedindo a reabsorção, possibilitando a excreção forçada destes compostos (Davis, C. & Harris, S. R, 2017; Zucoloto, A.D et al, 2017).

Com tudo isso, dá para chegarmos em uma regra prática: se a intenção for de que o fármaco permaneça no organismo de um indivíduo, ela deve ser colocada em um ambiente semelhante, visto que irá predominar sua forma não ionizada. Em outras palavras, um fármaco de caráter ácido é melhor absorvido em meio ácido e um fármaco básico é melhor absorvido em meio básico. Se a intenção for de eliminar o fármaco, no entanto, deve-se colocá-lo em um ambiente de caráter oposto, já que irá predominar sua forma ionizada. Um fármaco de caráter ácido é mais bem excretado em meio básico e um fármaco básico é mais bem excretado em meio ácido (Brunton, 2012; Davis, C. & Harris, S. R, 2017).

3.1. ABSORÇÃO E ASPECTOS CLÍNICOS

A absorção corresponde ao processo de passagem do fármaco do seu sítio de administração para a circulação sanguínea (Brunton, 2012; Davis, C. & Harris, S. R, 2017; Souza et al, 2007; Katzung, 2017). A permeabilidade tem papel intrínseco na transferência de determinada substância de um compartimento (local de administração) a outro (sangue) à medida que possibilita o transporte por meio de membranas biológicas (Brunton, 2012; Davis, C. & Harris, S. R, 2017; Souza et al, 2007).

A absorção está intimamente relacionada com a biodisponibilidade. Este termo se refere

à porcentagem inalterada da dose, administrada por qualquer via, que consegue efetivamente chegar na circulação sistêmica e, por conseguinte, no seu local de ação (Brunton, 2012; Davis, C. & Harris, S. R, 2017; Katzung, 2017). Diversos fatores podem afetar a absorção de substâncias, como elementos fisiológicos relacionados ao trato gastrointestinal, características físico-químicas da droga, a forma farmacêutica administrada, entre outros.

A biodisponibilidade de um fármaco pode ser influenciada durante o período pós-prandial pelos elementos fisiológicos do TGI, com destaque para a redução da velocidade de esvaziamento gástrico, aumento do trânsito intestinal e competição pelos sítios de absorção. A presença do alimento também pode modificar o pH do conteúdo gastrointestinal, de modo a facilitar ou dificultar a desintegração de determinada cápsula, ou interferir na ionização de certo fármaco, promovendo alterações na velocidade e extensão de absorção (Souza et al, 2007; Rossato, J.P.M, 2015).

Outro fator que pode contribuir para a redução da biodisponibilidade é o metabolismo de primeira passagem, que, em resumo, é um fenômeno no qual a concentração do fármaco é significativamente reduzida pelo fígado antes de atingir a circulação sistêmica (Brunton, 2012), mas isso será discutido em outro capítulo, quando formos falar de metabolismo dos fármacos.

A administração medicamentosa, de uma forma branda, pode ser dividida em intravascular e extravascular. A aplicação que ocorre diretamente no interior dos vasos permite que haja uma biodisponibilidade total do fármaco, visto que não envolve o processo de absorção. Por outro lado, a dose de um fármaco administrada por via extravascular (oral, subcutânea, intramuscular, inalatória) provavelmente não chegará intacta à circulação sistêmica por intercorrências diversas no processo absorptivo (Brunton, 2012; Davis, C. & Harris, S. R, 2017; Katzung, 2017).

3.2.VIAS DE ADMINISTRAÇÃO

Existem diversas vias pelas quais a terapêutica medicamentosa de um paciente pode ser realizada. É preciso, no entanto, saber qual a opção mais qualificada para cada caso. Para isso, é necessário haver entendimento quanto às vantagens e desvantagens das diferentes formas de aplicação medicamentosa.

3.2.1. VIAS ENTERAIS

Via oral

A administração de medicamentos por via oral é a mais comum, segura e econômica, além de cômoda para a maior parte dos indivíduos, tendo em vista a ausência de dor e

possibilidade de automedicação. Estes medicamentos podem ter formulações sólidas (comprimidos, cápsulas, drágeas) ou líquidas (elixires, xaropes) (Brunton, 2012; TRIPATHI, KD, 2006; Le, J, 2019).

Existem alguns fatores que podem limitar a absorção destes fármacos, como:
o tempo de dissolução do medicamento nas secreções gastrointestinais;

I- o tempo de esvaziamento gástrico;

II- o pH do meio: como a maior parte da absorção do fármaco pelo trato gastrointestinal ocorre por difusão simples, ela será facilitada quando o fármaco estiver em sua forma mais permeável, não ionizada;

III- efeito de primeira passagem: os fármacos presentes no trato gastrointestinal podem ser metabolizados por enzimas da flora ou mucosa intestinais, ou do fígado, antes de alcançarem a circulação sistêmica.

Como a absorção da maioria destes fármacos ocorrem no estômago e intestino, podem ocorrer irritações nestes órgãos. Anti-inflamatórios, por exemplo, podem gerar úlceras gástricas. Outra desvantagem é relacionada à perda de uma porcentagem do fármaco pelo metabolismo de primeira passagem (Brunton, 2012).

A via sublingual propicia uma rápida absorção, diretamente para a circulação sanguínea, devido à vasta vascularização e à baixa espessura da mucosa sublingual. A ação do fármaco pode ocorrer em poucos minutos. Apenas medicamentos lipossolúveis e não irritantes podem ser administrados por essa via. A principal vantagem é evitar a passagem pelo fígado, visto que a drenagem da boca vai em direção à veia cava superior, desviando da circulação porta, poupando alterações na biodisponibilidade (Brunton, 2012; TRIPATHI, KD, 2006).

Às vezes, o princípio ativo do fármaco é colocado dentro de micelas de lipossoma, e este complexo, ao chegar no estômago ou intestino, começa a liberar o princípio ativo de forma lenta. Podemos, dessa forma, colocar uma dosagem bem alta dentro do lipossoma, que terá duração prolongada, sem necessidade de ingestão de outra dose. A dose farmacológica será muito grande porque a liberação é lenta. Essas são as chamadas preparações de liberação controlada (Brunton, 2012).

Via retal

A via retal pode ser utilizada como alternativa da via oral para crianças, para pacientes inconscientes, indivíduos com transtornos psicológicos e para pacientes que apresentam vômitos e náuseas. Esta forma de administração também pode ser útil para substituir certas medicações que provocam muita irritação gastrointestinal ou elevada perda por metabolismo

hepático de primeira passagem (LIMA, M. F, 2008). Apenas cerca da metade do composto absorvido pelo reto passará pelo fígado, sendo reduzida a perda farmacológica por metabolismo de primeira passagem, quando comparada à via oral (Brunton, 2012). Existem, no entanto, algumas desvantagens que precisam ser consideradas, como a absorção irregular e incompleta do fármaco, além de possibilidade de irritação da mucosa retal (Brunton, 2012).

3.2.2. VIAS PARENTERAIS

As vias parenterais estão relacionadas à aplicação do fármaco por injeção, liberando-a diretamente no líquido tecidual ou no sangue, sem precisar atravessar a mucosa intestinal. Ocorre a liberação da forma ativa do fármaco, promovendo uma ação quase que imediata. Por esse motivo, a dose eficaz pode ser administrada com maior precisão. Esta via faz-se de grande importância quando o paciente está inconsciente e incapaz de colaborar com a deglutição de um medicamento por via oral, por exemplo (Brunton, 2012; TRIPATHI, KD, 2006; Le, J, 2019). É preciso ficar atento, todavia, a algumas desvantagens: a assepsia deve ser mantida e a técnica utilizada deve ser a correta para evitar acidentes, como sepse, infecção, hematoma, transfixação, entre outros. Além disso, as injeções podem ser doloridas e dificultosas para autoaplicações (Brunton, 2012; TRIPATHI, KD, 2006).

Intravenosa (IV)

A via intravenosa permite um efeito rápido, biodisponibilidade de 100% e controle máximo sobre a quantidade de fármaco administrada. Além disso, a liberação farmacológica pode ser mais bem controlada e precisa. A indução de anestesia operatória e administração de soluções irritantes são alguns exemplos de quando esta via precisa ser utilizada. Os fármacos são administrados lentamente para que a dose seja distribuída amplamente na corrente sanguínea e para que seja ajustada de acordo com a resposta do paciente (Brunton, 2012).

Após a administração intravenosa dos fármacos, é preciso que o paciente seja monitorado atentamente, pois os medicamentos podem atingir altas concentrações plasmáticas em pouco tempo, gerando reações indesejáveis. Além do mais, após a injeção da substância, geralmente, não é possível retirá-la da circulação (Brunton, 2012). O tipo de medicamento administrado por essa via não pode ser dissolvido em veículos oleosos, conter compostos que se precipitam no sangue ou que lisem eritrócitos. Ademais, o paciente geralmente precisa da ajuda profissional para a realização desse procedimento, por ser doloroso e requerer certa cautela (Brunton, 2012).

Intramuscular (IM)

A via de administração intramuscular deposita a medicação profundamente em músculos estriados esqueléticos, como o deltoide, tríceps, glúteo máximo etc., possibilitando, na maioria das vezes, a rápida e completa absorção do fármaco, tendo em vista que os músculos costumam ser bastante vascularizados (TRIPATHI, KD, 2006). A absorção do fármaco pode ser limitada. No entanto, em alguns casos, devido às suas propriedades físico-químicas, ou por fatores fisiológicos, como a perfusão sanguínea no local de aplicação (LIMA, M. F, 2008).

Os fármacos administrados por esta via podem estar em soluções aquosas ou em preparações de depósito, sendo absorvidas, respectivamente, de forma rápida ou lenta (LIMA, M. F, 2008).

Subcutânea (SC)

A administração medicamentosa por via subcutânea possui, em geral, uma absorção mais lenta e efeito prolongado, já que o tecido subcutâneo é pouco vascularizado. Todavia, o tempo de absorção pode ser alterado de forma proposital. Por exemplo, o acréscimo de um agente vasoconstritor na solução a ser injetada pode retardar esse processo (Brunton, 2012). É preciso ter cautela quanto ao fármaco que será administrado por essa via, pois fármacos que irritam os tecidos, além de provocarem dor intensa no paciente, em função do suprimento de nervos no tecido subcutâneo, podem gerar necrose e descamação tecidual (TRIPATHI, KD, 2006; LIMA, M. F, 2008).

3.3. OUTRAS VIAS: TRANSDÉRMICA, TÓPICA E RESPIRATÓRIA

A pele intacta não é permeável a fármacos, no entanto, a exposição da derme, em situações de queimadura ou inflamação, por exemplo, com consequente aumento do fluxo sanguíneo local, possibilita que solutos se tornem permeáveis e que ocorra absorção sistêmica. A absorção pela pele pode ser aumentada pela suspensão da substância em um veículo oleoso (lipossolúvel) e pela fricção deste produto no local da aplicação (Brunton, 2012).

As aplicações tópicas visam a obtenção de uma ação localizada sobre a região afetada. Os princípios ativos passam, em quantidade mínima, para a circulação sanguínea para evitar os efeitos no resto do organismo. Nesta via, estão inclusas as seguintes administrações: cutânea (pomada, gel, cremes, solução em pó), ocular (colírios), nasal (*sprays*, gotas nasais) e vaginal (Brunton, 2012; Lourenço, A.R.N, 2013).

A administração de fármacos por via respiratória representa a forma de absorção medicamentosa mais rápida, quase que instantânea, comparada a todas as outras vias. Isto se

deve ao grande enovelamento capilar em torno dos alvéolos pulmonares e à grande área de superfície pulmonar. A via inalatória é comumente utilizada para tratar doenças broncopulmonares e para administração de anestésicos gerais gasosos (Brunton, 2012; LIMA, M. F, 2008).

4. CONCLUSÃO

A farmacocinética constitui uma parte extremamente relevante da farmacologia na qual se estuda a forma com que o corpo processa os medicamentos, auxiliando na determinação de dose ideal e entendimento acerca das barreiras e velocidade que as substâncias precisam percorrer. É importante compreender a biodisponibilidade, isto é, aproveitamento de determinada substância pelo organismo, as vias de administração e o tempo gasto no seu local de ação, de maneira a assegurar um bom prognóstico para paciente, tratando-o sem que haja a ocorrência de efeitos indesejados.

REFERÊNCIAS

BRUNTON, L.L. **As Bases Farmacológicas da Terapêutica de Goodman & Gilman**. 12 ed. Porto Alegre: Artmed, 2012. 2112 p.

DAVIS, C; HARRIS, S. R. USMLE Step 1 Lecture Notes 2017: Pharmacology. **Kaplan Medical**, 2017.

HERNANDEZ, E. M. M.; RODRIGUES, R. M. R.; TORRES, T. M.; ZUCOLOTO, A. D.;

OLIVEIRA, C. D. R.; EGITO, E. S. T. et al. Manual de toxicologia clínica: orientações para assistência e vigilância das intoxicações agudas. **In Manual de toxicologia clínica: orientações para assistência e vigilância das intoxicações agudas**, p. 475-475, 2017.

KATZUNG, B. G.; TREVOR, A. J. Farmacologia Básica e Clínica-13. 13 ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. 1216 p.

LE, J. Administração de medicamentos. Skaggs School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, University of California San Diego. 2019.

LIMA, M. F. Formação em preparação e administração de medicamentos. Disponível em: http://www.farmaciamarques.com/Imgs/content/page_87/formacao%20em%20administracao%20de%20medicamentos.pdf>. Acesso em 05 de Maio de 2021.

LOURENÇO, A.R.N. Administração Tópica De Fármacos - Das Restrições Aos Desafios. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/48580661.pdf>. Acesso em 05 de julho de 2021.

PEREIRA, D. G. Importância do metabolismo no planejamento de fármacos. **Química nova**, n. 30, p. 171-177, 2007.

ROSSATO, J.P.M. Avaliação da permeabilidade intestinal da furosemida e da furosemida complexada com hidroxipropil- β -ciclodextrina por meio do modelo de perfusão in situ de passagem tripla em ratos. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

SOUZA, J. D.; FREITAS, Z. M. F.; STORPIRTIS, S. Modelos in vitro para determinação da absorção de fármacos e previsão da relação dissolução/absorção. **Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas**, n. 43, p. 515-527, 2007.

TRIPATHI, KD. Farmacologia Médica. 5 ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 2006. 196 p.

CAPÍTULO 52

FARMACOCINÉTICA: DISTRIBUIÇÃO, EXCREÇÃO E ASPECTOS CLÍNICOS

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c52](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c52)

Carolina Dourado de Faria¹, Fernando Antônio Ramos Schramm Neto², Yuri de Jesus Machado³, Lucas Furlan Cirqueira de Souza⁴, Isabelly Raiane Silva dos Santos⁵, Carolina Woinarovicz Meneghetti⁶, Liara de Oliveira Teixeira⁷, Rafaella Ugrin de Oliveira Silva⁸, Matheus Costa Cabral⁹, Antônio Lucas Farias da Silva¹⁰.

¹ Universidade Salvador, carolinain11@gmail.com;

² Universidade Salvador, fernando78541@hotmail.com;

³ Universidade Salvador, mjjuri1999@gmail.com;

⁴ Universidade de Uberaba, lucasfurlan7@hotmail.com;

⁵ Universidade Federal do Pará, isabelly.santos@ifpa.edu.br;

⁶ Universidade Estadual de Ponta Grossa, carolinawmeneghetti@gmail.com;

⁷ Universidade Federal de Santa Maria, liarateixeira6@gmail.com;

⁸ Universidade Federal de Alfenas-MG, rafaella.oliveira@sou.unifal-mg.edu.br;

⁹ Fundação Cristiano Varela, matheus_c.cabral@outlook.com

¹⁰ Centro Universitário Unifacid, lucas1992farias@gmail.com.

RESUMO

Objetivo: Discutir sobre o funcionamento dos processos de distribuição e excreção dos fármacos, além de abordar os principais aspectos clínicos necessários para aplicação desses conceitos. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão narrativa da literatura. As seguintes bases de dados bibliográficos foram consultadas: PubMed/Medline, SciELO e Google Acadêmico,

utilizando como palavras-chave “*Pharmacokinetics*”, “*Excretion*”, “*Distribution*”, “*Clinical Aspects*”. **Resultados:** A distribuição é o segundo processo farmacocinético, isto é, a etapa em que o fármaco irá passar da corrente sanguínea até o seu tecido alvo, depois de ter entrado na circulação através do processo de absorção. Uma característica clínica importante é a correlação entre a chegada e saída dos fármacos, e a irrigação sanguínea de um tecido. Os tecidos que possuem uma melhor perfusão recebem e eliminam rapidamente o composto, e os que possuem uma perfusão menor, essa ação ocorre lentamente. Já o processo de excreção é a etapa final da interação entre o fármaco e o organismo humano. Constitui-se como a remoção do composto, da corrente sanguínea para o meio externo. A excreção pode ocorrer por meio de alguns órgãos e sistemas como: pulmões, trato gastro intestinal, pele e rins. Esse último, por exemplo, pode ter a sua efetividade clinicamente alterada através da alteração do pH urinário. **Considerações finais:** Compreender o processo de distribuição e de excreção no organismo humano, além da sua aplicação clínica, é necessário para fundamentar o conhecimento farmacológico. Essas informações são essenciais para todo meio acadêmico e científico, que pode corroborar com o desenvolvimento de novos fármacos e condutas terapêuticas.

Palavras-chave: Farmacologia; Compostos Orgânicos; Atenção à Saúde.

Área Temática: Ciências da Saúde.

E-mail do autor principal: carolinain11@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

A partir do momento em que um fármaco é administrado, independentemente da via utilizada, começa a ocorrer uma interação entre o organismo humano e o composto farmacológico. Essa interação é o alvo de estudo da farmacocinética. Esse estudo é subdividido em 4 etapas principais: absorção, distribuição, metabolização e excreção (Brunton, 2012). Neste capítulo, o enfoque será dado às etapas de distribuição e excreção, abordando também os aspectos clínicos que as envolvem.

A distribuição é a etapa da farmacocinética em que o fármaco irá passar da corrente sanguínea para o seu tecido alvo. Esse processo sofre influência do débito cardíaco, fluxo sanguíneo, permeabilidade capilar, características de membrana do tecido alvo, lipossolubilidade, gradiente de pH transmembrana e sua ligação a proteínas plasmáticas e teciduais (Brunton, 2012; Di Giulio, Gorio, Carelli et al, 2018).

É importante destacar que o fármaco precisa estar na sua forma livre, não ligado a

proteínas plasmáticas, para estar ativo e exercer a ação no tecido alvo. Contudo, é necessário que uma proteína faça o transporte do local de entrada até o sítio de ligação, e a mais relevante nesse processo é a albumina (Brunton, 2012; Winter, 1994; Dos Santos, Torriani, Barros, 2013). Então, quando existe alguma enfermidade, por exemplo, uma doença hepática crônica, agindo na redução da produção de proteínas, principalmente a albumina, o processo de distribuição é comprometido. Assim, faz-se necessário a compreensão do funcionamento do fármaco e da condição clínica de quem irá recebê-lo.

O processo de excreção trata-se da parte da farmacocinética na qual os produtos residuais do metabolismo dos fármacos são eliminados do organismo (Brunton, 2012; Di Giulio, Gorio, Carelli et al, 2018). Essa etapa acontece, principalmente, através do metabolismo do fígado e da excreção renal. No entanto, a eliminação também pode ocorrer por meio do ducto biliar, pulmões, e, até mesmo, da pele, por meio do suor (Brunton, 2012; Pascuzzo-Lima, 2008). A excreção retira do organismo compostos farmacológicos que, se permanecessem, seriam tóxicos e deletérios. Assim, quando uma via não pode ser utilizada, é necessário buscar outra via ou terapêutica alternativa. Por exemplo, um paciente nefropata não consegue excretar plenamente certos fármacos, sendo assim, algumas estratégias terapêuticas podem ser lançadas, como: diminuir a dose ou aumentar o intervalo entre elas.

O objetivo desse capítulo discutir sobre as etapas de distribuição e excreção da farmacocinética, demonstrando a sua relevância e aplicação clínica. Consolidando conhecimentos extremamente relevantes da prática clínica, de forma a contribuir na capacitação dos profissionais da área de saúde.

2 MÉTODO

O presente estudo constitui uma revisão narrativa da literatura sobre as etapas de distribuição e excreção na farmacocinética e seus aspectos clínicos. Os dados foram obtidos por meio de levantamento bibliográfico entre abril e maio de 2021. Como critério de inclusão dos artigos, foram selecionadas as publicações entre 2005 e 2021, no idioma inglês. Esse recorte temporal foi utilizado para analisar os trabalhos mais recentes e os da década passada, com o intuito de permitir a observação das discussões, e as atualizações que foram feitas a respeito da temática. Os descritores em inglês utilizados para o cruzamento foram: “*Pharmacokinetics*”, “*Excretion*”, “*Distribution*”, “*Clinical Aspects*”. As bases de dados eletrônicas utilizadas para a pesquisa foram a PubMed/Medline, SciELO (Scientific Electronic Library Online) e Google Acadêmico, bem como sites e livros publicados sobre o tema. É importante destacar que o

estudo se pautou nas características de uma revisão narrativa. Dessa forma, não foi desenvolvido com base em um questionamento específico, de forma sistematizada, mas sim em tema amplo com seleção de informações em publicações gerais sobre o assunto para atualizar o conhecimento do leitor acerca desta temática. Assim, não incluindo uma descrição quantitativa dos trabalhos avaliados.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.3 DISTRIBUIÇÃO E ASPECTOS CLÍNICOS

A distribuição vai promover a passagem do fármaco da corrente sanguínea para o tecido alvo. Assim, a irrigação do tecido é um fator importante, pois determina a velocidade em que o fármaco irá chegar ao seu sítio de ação e a sua quantidade inicial. Desse modo, os órgãos com melhor perfusão mimetizam o efeito rapidamente, assim como conseguem eliminar a substância com maior velocidade (rins, fígado, coração, pulmões). De maneira antagônica, os ossos e o tecido adiposo podem ser considerados reservatórios, pois neles a irrigação é mais escassa, existe maior ligação tecidual, e fármacos muito lipossolúveis ficam por mais tempo armazenados no organismo (Brunton, 2012).

O tecido cerebral, que apesar de ser muito bem perfundido, não é acessado com tanta facilidade por todos os fármacos. A barreira hematoencefálica possui características de permeabilidade distintas em relação aos outros órgãos, pois é mais seletiva e exige que haja o transporte transcelular (Di Giulio, Gorio, Carelli et al, 2018). As características físico-químicas dos fármacos que buscam esse sítio de ligação precisam ser bem calculadas, principalmente com relação à lipossolubilidade. Um exemplo de fármaco lipossolúvel que consegue atravessar esse compartimento, mesmo não sendo originalmente projetado para isso, é a prometazina (antialérgico de 1º geração), que tem como efeito adverso sono e fadiga, pois ao atravessar a barreira, inibe a histamina, que, no cérebro, atua no processo de despertar (Brunton, 2012; Di Giulio, Gorio, Carelli et al, 2018).

Ao chegar à corrente sanguínea, o fármaco pode se apresentar de duas formas - ligado a proteínas plasmáticas ou livre. Ele se encontra farmacologicamente ativo na forma livre, pois estando ligado às proteínas, não consegue atravessar o endotélio e chegar ao líquido intersticial e intracelular devido a fatores como seu tamanho e peso molecular estarem aumentados (Brunton, 2012). As duas principais proteínas envolvidas são a albumina, que se liga aos fármacos de característica ácida, e a glicoproteína alfa-1, que se liga aos básicos (Di Giulio,

Gorio, Carelli et al, 2018).

A ligação com as proteínas depende da concentração do fármaco, da afinidade e do número de locais de ligação. Quanto maior o tempo de ligação da proteína ao fármaco, maior a permanência desse no organismo (Brunton, 2012; Winter, 1994; Di Giulio, Gorio, Carelli et al, 2018). Ela é reversível, então, na medida em que a fração livre reduz no sangue, o fármaco que estava ligado a proteína é liberado para repor a quantidade de fração livre (Winter, 1994). Quando um fármaco chega à corrente sanguínea, cerca de 80% dela está na forma ligada, e 20%, na forma livre (Dos Santos, Torriani, Barros, 2013; Dorce, DeLucia, 2006).

Figura 1 - Compartimento de distribuição dos fármacos.

Fonte: DI GIULIO, Anna Maria et al. Farmacologia generale e speciale: per le lauree sanitarie. Piccin, 2018.

Existem alguns parâmetros que servem de ferramenta para entender como o fármaco se distribuiu pelo organismo. Um dos principais deles é o volume de distribuição que informa qual volume do fármaco é necessário para ser diluído e produzir a concentração no plasma (Winter, 1994). Um maior volume de distribuição significa que a substância foi bem distribuída no organismo e possui baixa concentração plasmática. Ele é calculado através da divisão da quantidade de fármaco no corpo pela concentração no sangue ou plasma (Brunton, 2012; DiGiulio, Gorio, Carelli et al, 2018). Para entender melhor, podemos analisar o seguinte exemplo: foi administrado 100 mg do fármaco X e 100 mg do fármaco Y. A concentração plasmática do fármaco X é de 1mg/L e do fármaco Y é 2 mg/L. O volume de distribuição do fármaco X será de 100 L, já o do fármaco Y será de 50 L. Logo, o fármaco X foi mais bem distribuído pelo organismo.

Figura 2 - Fórmula do volume de distribuição

$$\text{Volume de Distribuição} = \frac{\text{Quantidade de fármaco no corpo}}{\text{Concentração no sangue ou plasma}}$$

Fonte: Autores, 2021

3.2 EXCREÇÃO E ASPECTOS CLÍNICOS

A excreção é a parte final da interação entre o fármaco e o organismo humano. Os resíduos farmacológicos serão eliminados do organismo através dos pulmões, do trato gastro intestinal, da pele ou dos rins. O clearance (Cl), isto é, a taxa de sangue depurado de uma fármaco por unidade de tempo, ocorre de acordo com dois modelos cinéticos principais, sendo eles: cinética de primeira ordem e cinética de ordem zero (Brunton, 2012).

- a) Depuração de primeira ordem: Trata-se de uma taxa de eliminação constante, e é o que acontece com a maioria dos fármacos. Ocorre quando a velocidade do metabolismo de determinado fármaco é diretamente proporcional à sua concentração livre. Dessa forma, uma fração constante do composto é metabolizada por unidade de tempo, correspondente à meia-vida do fármaco. Por exemplo: 100mg de um composto caiu para a metade depois de 4 horas, ficando 50mg no organismo. Após mais 4 horas, esta quantia caiu para 25mg, e assim sucessivamente (Pascuzzo-Lima, 2008; Schinoni, 2008).
- b) Depuração de ordem zero: Trata-se de uma taxa de eliminação variável. Ocorre quando os mecanismos de eliminação estão saturados pela alta concentração de alguns fármacos, como etanol e aspirina. Uma quantidade constante do fármaco é metabolizada por determinada unidade de tempo (que não corresponde à meia-vida). Por exemplo: 100mg de um composto caiu para 90mg depois de 4 horas. Após mais 4 horas, esta quantia caiu para 80mg, e assim sucessivamente (Pascuzzo-Lima, 2008; Schinoni, 2008).

É de fundamental importância entender como se dá o processo de excreção, visto que a partir dele é possível determinar o esquema medicamentoso (dose e frequência de administração) para atingir a concentração sanguínea desejada no estado de equilíbrio (*steady*

state). A concentração em equilíbrio desejada do fármaco precisa estar entre a concentração mínima eficaz e a concentração tóxica mínima, ou seja, dentro da janela terapêutica para não trazer riscos ao paciente. Dessa forma, a dosagem de manutenção (mg/h) pode ser obtida através do produto entre a concentração desejada (mg/L) e a depuração (L/h) (Brunton, 2012; Pascuzzo-Lima, 2008).

3.2.1 Excreção Hepática

Os hepatócitos, principais células componentes do fígado, são formados por transportadores contidos em sua membrana canalicular, que possuem como principal objetivo a liberação de fármacos e metabólitos para a bile, de onde serão excretados: a P-gp (glicoproteína-P) e a PRCM (proteína de resistência ao câncer de mama) são responsáveis pelo transporte de fármacos lipossolúveis anfipáticos, enquanto que a MRP2 (proteína 2 associada à multirresistência dos fármacos) se dedica à liberação dos metabólitos conjugados com os fármacos (Brunton, 2012).

Após a liberação dos fármacos e metabólitos para a bile, tais componentes serão direcionados para o trato gastrointestinal (TGI), de onde deixarão o organismo por meio das fezes. Vale ressaltar o fato de que os enterócitos também possuem transportadores contidos em sua membrana apical, o que possibilita a secreção direta de fármacos e metabólitos da circulação sistêmica para tal localização (Brunton, 2012; Wagner, 1983).

Por fim, vale ressaltar o mecanismo de reciclagem entero-hepática, que envolve a capacidade que o organismo humano possui de reabsorver os fármacos excretados para o TGI, reinserindo-os na circulação sistêmica. Tal procedimento possui extrema importância, pois possibilita o aumento da meia-vida e, conseqüentemente, dos efeitos induzidos pelo medicamento no corpo (Brunton, 2012).

3.2.2 Excreção Renal

Na excreção renal, os mecanismos que irão influenciar na eliminação dos resíduos farmacológicos são os próprios da estrutura renal, mas comportando-se segundo as características do fármaco e as condições que o ambiente renal irá apresentar. O início ocorre com a passagem do sangue pelo glomérulo, onde os resíduos são filtrados. A partir daí, ocorrerá a reabsorção e/ou secreção para posterior eliminação através da urina (Pascuzzo-Lima, 2008; Wagner, 1983). Além disso, outro fator importante é a idade do paciente, já que a capacidade renal é diferente. Com o passar dos anos, os rins perdem características morfológicas que levam à redução da sua funcionalidade. Assim, a fim de evitar danos iatrogênicos, pacientes mais

idosos podem ter uma prescrição farmacológica diferente (Wagner, 1983).

A parcela que passa pelo glomérulo pode voltar à corrente sanguínea através da reabsorção, que será influenciada pelo gradiente de concentração, pH e pela permeabilidade da membrana renal (Wagner, 1983). Todavia, grande parte dos fármacos não passa pelo glomérulo, pois está ligada à albumina. Dessa forma, a secreção do fármaco presente nos capilares peritubulares para a luz tubular é uma alternativa a fim de realizar a eliminação farmacológica. Isso se dará de maneira ativa através de transportadores de ácidos e bases (Winter, 1994).

Certos compostos tornam-se tóxicos ao corpo conforme a quantidade e o tempo que permanecem no organismo. Por isso, os rins possuem uma alta capacidade de filtração, chegando a filtrar cerca de 180 litros por dia em um ser humano saudável. Entretanto, no caso de pacientes com insuficiência renal, a depender do grau de lesão, é feita uma adequação terapêutica para não lesionar mais ainda o parênquima renal e não provocar a acumulação de componentes tóxicos (Winter, 1994; Pascuzzo-Lima, 2008; Schinoni, 2008). Um exemplo disso se dá com o ajuste de uso do tramadal para esse tipo de paciente. Nesses casos, ocorre uma redução da dose em comparação ao padrão. Além disso, há um aumento do intervalo entre as doses, permitindo que os rins tenham mais tempo para realizar a filtração e a consequente eliminação antes de um novo aumento do composto na corrente sanguínea (Brunton, 2012).

A excreção renal irá depender de fatores como: a estrutura preservada dos néfrons (que está comprometida em pacientes portadores de doenças renais crônicas) e o pH urinário. Ácidos fracos, ao entrar em contato com o pH ácido da urina, terminam sendo reabsorvidos, pois não conseguem se dissociar para serem eliminados, como exemplo, o ácido acetilsalicílico (AAS). Do ponto de vista clínico, podemos acelerar a excreção desse fármaco por meio da alcalinização da urina, utilizando bicarbonato de sódio (Brunton, 2012).

3.2.3 Excreção Pulmonar

A via de excreção pulmonar não demonstra grande relevância para a eliminação dos fármacos, mas anestésicos e fármacos administrados sistematicamente são eliminados pelos pulmões, principalmente compostos gasosos e voláteis. Alguns exemplos de substâncias excretadas por essa via são o benzeno e o etanol.

Os fatores que influenciam nessa via de excreção são a intensidade de ventilação, solubilidade no plasma e a tensão de vapor (Dorce, DeLucia, 2006; Lisboa, 2016). A ventilação permite que haja a saída do meio interno para o externo. Quanto maior a ventilação, mais fácil se torna a liberação. Esse processo ocorre devido à diferença de pressão parcial. Quando o gás está em maior pressão no plasma que no alvéolo, ele consegue sair dos capilares para os alvéolos

e ser excretado pela via aérea (Dorce, DeLucia, 2006).

3.2.4 Excreção Dérmica

Através do suor, a pele pode ser porta de saída para a excreção de xenobióticos, mas, quantitativamente, possui uma pequena porcentagem de participação nesse processo (Brunton, 2012; Dorce, DeLucia, 2006). Entretanto, pelo ponto de vista forense, há certa relevância devido à possibilidade de análise toxicológica (Federico, Sakata, Pinto et al, 2017). Fármacos de características lipossolúvel e na forma não-ionizada conseguem ter maior facilidade de atravessar a derme. Além disso, o pH é outro fator relevante nesse processo (Brunton, 2012).

4 CONCLUSÃO

A farmacocinética é uma das bases da farmacologia clínica. Por isso, compreender as suas etapas é essencial, principalmente, para os profissionais de saúde que precisaram desses conceitos para uma boa prática profissional, levando eficiência e eficácia no tratamento farmacológico dos enfermos.

Como visto, a distribuição e a excreção são etapas em que a interação entre o fármaco e o organismo irá variar de acordo com o fármaco e o paciente. Cada caso terá uma determinada conduta. Dessa forma, esses conceitos, ao serem bem difundidos, irão promover o melhor preparo para a assistência adequada à demanda. Além disso, ressalta-se a importância contínua da discussão da temática, pois cada vez mais novos fármacos são introduzidos na prática clínica.

REFERÊNCIAS

Brunton, L.L.; **As Bases Farmacológicas da Terapêutica de Goodman & Gilman**, Ed. Artmed: Porto Alegre, 2012, cap. 2.

Di Giulio, A. M., Gorio, A., Carelli, S., Cella, S. G., Scaglione, F. *Farmacologia generale e speciale: per le lauree sanitarie*. **Piccin**. 2018.

Dorce, V. A., DeLucia, R. Capítulo 8 Excreção de Fármacos. **Farmacologia Integrada**. 2006; 119.

Dos Santos, L., Torriani, M. S., Barros, E. **Medicamentos na prática da farmácia clínica**. Artmed Editora. 2013.

Federico, M. P., Sakata, R. A. P., Pinto, P. F. C., Furtado, G. H. C. Noções sobre parâmetros farmacocinéticos/farmacodinâmicos e sua utilização na prática médica. **Revista da Sociedade Brasileira de Clínica Médica**. 2017; 15(3): 201-205.

Lisboa, M. P. **Matrizes biológicas de interesse forense**. 2016.

Pascuzzo-Lima, C. Farmacocinética VI: Farmacocinética Clínica. **FARMACOLOGÍA BÁSICA**. 2008, 61.

Schinoni, M.I. **Fisiologia hepática**. Gazeta Médica da Bahia. 2008; 76(2).

Wagner, J. G. **Farmacocinética clínica**. Reverté. 1983.

Winter, M. E. **Farmacocinética clínica básica**. Ediciones Díaz de Santos. 1994.

CAPÍTULO 53

FARMACOCINÉTICA: METABOLIZAÇÃO E ASPECTOS CLÍNICOS

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c53](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c53)

Carolina Dourado de Faria¹, Fernando Antônio Ramos Schramm Neto², Yuri de Jesus Machado³, Lucas Furlan Cirqueira de Souza⁴, Isabelly Raiane Silva dos Santos⁵, Carolina Woinarovicz Meneghetti⁶, Liara de Oliveira Teixeira⁷, Felipe Augusto Pereira dos Santos⁸, Fabiana Souza Oliveira⁹, Geísa de Moraes Santana¹⁰

¹ Universidade Salvador, carolinain11@gmail.com;

² Universidade Salvador, fernando78541@hotmail.com;

³ Universidade Salvador, mjjyuri1999@gmail.com;

⁴ Universidade de Uberaba, lucasfurlan7@hotmail.com;

⁵ Universidade Federal do Pará, isabelly.santos@ifpa.edu.br;

⁶ Universidade Estadual de Ponta Grossa, carolinawmeneghetti@gmail.com;

⁷ Universidade Federal de Santa Maria, liarateixeira6@gmail.com;

⁸ Universidade de Uberaba, felipebase016@gmail.com;

⁹ Centro Universitário Governador Ozanam Coelho, fabi.sou.oli.14@gmail.com;

¹⁰ Universidade Estadual do Piauí, geisasantana97@gmail.com.

RESUMO

Objetivo: Discutir sobre as principais evidências científicas acerca do processo de metabolização e aspectos clínicos envolvendo a farmacocinética; **Método:** Foi realizado uma revisão narrativa de literatura. As bases de dados bibliográficos utilizadas foram PubMed, SciELO e LILACS. Os seguintes descritores foram usados na pesquisa: “*Pharmacokinetics*”, “*Metabolization*”, “*Clinical Aspects*”. Foi utilizado o operador booleano “AND” para auxiliar nas buscas. **Resultados:** A metabolização constitui-se como um dos principais processos de passagem de fármacos pelo corpo humano. É nesta etapa que irá ocorrer interação direta entre o sistema orgânico e o produto exógeno, com este segundo exercendo sua ação de forma a interferir direta ou indiretamente em atividades biológicas inatas. Dois exemplos mais comuns de interação corpo-fármaco podem ser exemplificados: as metabolizações do paracetamol e do etanol. **Considerações Finais:** O entendimento acerca da etapa de metabolização de produtos pelo corpo humano é de fundamental importância para a compreensão da ação dos mais diversos fármacos, bem como para o desenvolvimento de novas drogas pela ciência.

Palavras-chave: Farmacologia; Compostos Orgânicos; Atenção à Saúde.

Área Temática: Ciências da Saúde.

E-mail do autor principal: carolinain11@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

A metabolização também pode ser reconhecida como o “M” da sigla mnemônica ADME (Absorção, Distribuição, Metabolização e Excreção). Mas o que, de fato, se constitui a metabolização? O autor Eliezer J. Barreto, juntamente com sua equipe, em seu livro *Química Medicinal*, afirma que a metabolização de fármacos compreende um conjunto de reações enzimáticas que são responsáveis por biotransformar não tais produtos, como também corpos estranhos – os quais ele denominou de xenobióticos – em compostos metabólicos, com aumento de sua polaridade, visando serem excretados através de meios orgânicos, como a urina (Barreiro, Fraga, 2001; Low, 1998).

Retomando o ciclo farmacocinético do fármaco, vê-se que esse é primeiro absorvido na mucosa gástrica – esse ciclo não é válido para todos – passando por sua membrana plasmática para alcançar a corrente sanguínea, com este processo dependendo de uma série de condições específicas para que possa ocorrer, a exemplo do coeficiente de partição óleo/água e da característica intrínseca de acidez ou basicidade de um xenobiótico (Barreiro, Fraga, 2001). Após isso, o fármaco será distribuído através da vascularização, podendo este se encontrar em sua forma livre ou ligada a uma proteína sérica. Por fim, ao chegar a um órgão funcionalmente capaz, a exemplo do fígado, o fármaco será metabolizado por um conjunto de reações enzimáticas, visando ter sua atividade biológica cessada e ser excretado do nosso corpo através da urina, sobretudo, ou outras formas específicas, a exemplo da pulmonar, dérmica, dentre outras, como será mais aprofundado ao longo deste capítulo (Barreiro, Fraga, 2001).

Apesar do metabolismo gerar, em sua maioria, produtos com uma alta polaridade, visando facilitar o processo de excreção do organismo, podem ser produzidos metabólitos com uma atividade biológica mais potente, ou até com uma atividade mais tóxica. Isso acontece, por exemplo, na biossíntese dos esteroides, na qual o conjunto de enzimas que deveria gerar produtos inativos, a partir dos fármacos, também origina metabólitos biologicamente ativos oriundos de substâncias endógenas, neste caso, os esteroides (Brunton, 2012).

O maior entendimento, auxiliado pelo aumento do número de pesquisas voltadas para esta área da farmacocinética, permitiu a criação de uma nova subespecialidade: a farmacogenética. Essa se dedica a estudar sobre como a diferença genética entre as pessoas pode influenciar na resposta que cada um oferece perante os medicamentos, pois polimorfismos genéticos estão diretamente relacionados a enzimas metabolizadoras, transportadoras, e ainda receptoras, o que também interfere no procedimento de resposta própria do organismo contra

os fármacos (Metzger, Souza-Costa, Tanus-Santos, 2006). Acredita-se, ainda, no potencial desta área para se buscar novas oportunidades no tratamento do câncer, visto que com ela pode-se individualizar o tratamento quimioterápico a cada um dos pacientes, objetivando minimizar os riscos e a toxicidade, e maximizar a resposta sua terapêutica (Brunton, 2012; Reis, 2006).

Fundamentando-se nisso, o objetivo deste trabalho é discutir sobre as principais evidências científicas acerca do processo de metabolização e aspectos clínicos envolvendo a farmacocinética.

2 MÉTODO

O presente estudo constitui uma revisão narrativa da literatura sobre a etapa de metabolização na farmacocinética e os aspectos clínicos relacionados. Os dados foram obtidos por meio de levantamento bibliográfico entre abril e maio de 2021 e a revisão foi conduzida entre maio e junho de 2021. Como critério de inclusão, fez-se seleção de publicações dos últimos 15 anos, nos idiomas inglês e português. Os descritores em inglês utilizados para o cruzamento foram: “*Pharmacokinetics*”, “*Metabolization*”, “*Clinical Aspects*”. O operador booleano “AND” foi usado para auxiliar nas pesquisas. As bases de dados eletrônicas utilizadas para a pesquisa foram PubMed, SciELO e LILACS, bem como livros publicados sobre o tema. É importante destacar que o estudo se pautou nas características de uma revisão narrativa. Dessa forma, não foi desenvolvido com base em um questionamento específico, de forma sistematizada, mas sim em tema amplo com seleção de informações em publicações gerais sobre o assunto para atualizar o conhecimento do leitor acerca desta temática.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O processo de metabolização pode ser dividido em fase I, que compreende reações de oxidação, redução e hidrólise, e fase II, que engloba uma conjugação. Por sua vez, os produtos resultantes, denominados metabólitos, podem se apresentar na forma de ativos ou inativos. Por fim, levando-se em consideração o fármaco de origem, os metabólitos ativos podem atuar de modo semelhante, distinto, ou até por antagonismo total (Pereira, 2007; Streck, Costa, 1999; Moro, Invernizzi, 2017).

A cadeia reacionária que compõe a fase I inicia-se expondo ou acrescentando um grupo funcional hidrossolúvel ao composto original, a exemplo do ocorrente em reações de hidrólise. Com isso, o fármaco ativo original se torna inativo na maioria dos casos, muito embora existam exceções nas quais o composto tem sua atividade farmacológica conservada e, muitas vezes,

ampliada. Um caso que foge à regra é quando um pró-fármaco – composto biologicamente inativo utilizado para aumentar a quantidade da substância na forma ativa que chega ao local de ação – sofre o processo de bioativação, com o acréscimo de um grupo funcional hidrossolúvel, em geral, éster ou amida, resultando na formação de um metabólito ativo, sendo que este ainda pode sofrer a ação de uma segunda enzima e ser convertido em metabólito inativo novamente (Brunton, 2012; Pereira, 2007). Um exemplo que evidencia esta segunda condição citada é o do enalapril, um inibidor da ECA (Enzima Conversora de Angiotensina), sendo importante para tratar hipertensão arterial e insuficiência cardíaca, e que constitui-se como um composto biologicamente inativo, até ser convertido pela ação da enzima esterase em enalaprilato diácido, sua forma ativa (Brunton, 2012).

A fase II da metabolização engloba uma reação de conjugação na qual a substância inativa formada durante a fase I, ou até o composto original, tem o seu grupo funcional hidrossolúvel realizando uma ligação covalente com o ácido glucurônico ($C_6H_{10}O_7$), acetato, sulfato, glutatona ou outros metabólitos formados por processos químicos endógenos. Como resultado final, formam-se compostos conjugados extremamente polarizados e inativos, que, por conta disso, são rapidamente excretados do organismo através da urina ou de outras formas específicas já citadas (Brunton, 2012). Um exemplo de composto conjugado é o 6-glicuronídico, oriundo da morfina, sendo essa uma droga narcótica com alto poder analgésico indicada para tratamento de dores extremas.

Existe também o metabolismo de primeira passagem, que nada mais é do que uma porcentagem do fármaco administrado por via oral – é a que mais possui perda por este tipo de metabolismo, muito embora seja comum a todas as vias nas quais se tem absorção - que é inativada primariamente através do epitélio intestinal ou do fígado antes deste cair na corrente sanguínea e ser enviado para a circulação sistêmica, resultando em uma menor biodisponibilidade da droga (Brunton, 2012; Pereira, 2007). Afeta mais os fármacos administrados oralmente pois esta via é onde irá existir maior porcentagem de absorção. Este processo é, portanto, ausente na via endovenosa, onde o grau de biodisponibilidade é de 100%.

Por fim, muitos dos tecidos do corpo possuem um grau de metabolização, a exemplo do trato gastrointestinal e dos pulmões, muito embora isso seja mais comum de se estudar e discutir no fígado. As principais enzimas participantes das reações que englobam a fase I da metabolização são mais comumente encontradas no retículo endoplasmático celular, enquanto as da fase II são localizadas no citosol das células (Brunton, 2012). Por conseguinte, tais reações de biotransformação podem ser de dois tipos: microssomiais, quando ocorrem no retículo endoplasmático liso, e não microssomiais, quando ocorrem no citosol ou na mitocôndria.

Portanto, fica claro a importância do metabolismo para o funcionamento adequado do organismo humano, com a cinética dos produtos obtidos a partir da ingestão de fármacos sendo determinante para caracterizar suas diversas medidas terapêuticas (Barreiro, Fraga, 2001; Nassar, Kamel, Clarimont, 2004). Com o objetivo básico de biotransformar um composto farmacológico lipossolúvel em hidrossolúvel, visando facilitar seu processo de excreção, a metabolização se caracteriza como um dos passos mais importantes do ADME (Absorção, Distribuição, Metabolização e Excreção), sendo fundamental para o organismo se livrar de xenobióticos das mais variadas características.

3.1 SISTEMA CITOCROMO P450 E INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Existem enzimas específicas que atuam nas duas fases deste processo pertencente ao ADME - as chamadas oxidases da fase I, que englobam o conjunto enzimático do sistema citocromo P450, ou simplesmente CYP, as monoxigenases contendo flavina (FMO), e as epóxido hidrolases. Já no grupamento de enzimas pertencentes à fase II, existem algumas principais, como as sulfotransferases, a glutathione-S-transferase e as metiltransferases (Brunton, 2012).

Citocromo, ou citocromas, são proteínas de membrana que atuam como subunidades de um complexo enzimático maior e responsável por gerar reações de redução, bem como outras em específico. As enzimas constituintes do citocromo P450 – ou simplesmente CYP – contêm uma molécula de heme ligada não covalentemente a uma cadeia polipeptídica. A função desse grupamento tem a ver com sua estrutura, que é constituída por um átomo de ferro em uma base de carboidrato, sendo que este átomo se liga ao oxigênio, que por sua vez tem a função de ativar locais específicos do CYP, visando assegurar seu papel na cadeia reacional (Brunton, 2012). Constituem o principal complexo de enzimas responsáveis por biotransformar os fármacos, estando relacionados a efeitos tóxicos de determinados fármacos (quando transformam não tóxicos em tóxicos), assim como no mecanismo de interação entre medicamentos (fármacos podem induzir ou inibir essas enzimas).

Existem mais de 50 enzimas conhecidas que fazem parte do CYP, contudo as mais conhecidas são a CYP3A4, responsável pela metabolização de aproximadamente 60% de todos os fármacos, a CYP2D6, que metaboliza 30% de todos os fármacos, e a CYP2E1, responsável pela reação do paracetamol e do etanol (Costa, de Oliveira, Pimenta, 2004; Santiago, 2003).

Figura 1. Localização do CYP na célula

Fonte: As Bases Farmacológicas da Terapêutica de Goodman & Gilman, p.126

O paracetamol é metabolizado, sobretudo no fígado, por meio de três vias principais de reações químicas: glicuronização (conjugação junto ao ácido glicurônico), sulfatação e oxidação. A via oxidativa é mediada por meio da enzima CYP2E1, e tem como produto final o n-acetil-p-benzoquinonaimina – ou simplesmente NAPQI – um metabólito altamente hepatotóxico que em condições normais se une à glutatona, uma molécula composta por três aminoácidos de cisteína, glicina e ácido glutâmico. Essa união anula a hepatotoxicidade do NAPQI, convertendo-o em ácido glicurônico e facilitando sua excreção (Lopes, Matheus, 2012).

Figura 2– Metabolização do Paracetamol

Fonte: Autores, 2021

Já o etanol possui sua via de metabolização, ocorrente no fígado, dividida em duas vias: através do sistema mediado pela enzima álcool desidrogenase (ADH) e por meio da via microsossomial de oxidação do etanol. Ambas as vias se complementam ao longo do processo de metabolização (Netto, 2008).

Durante a primeira via, a enzima álcool desidrogenase (ADH) converte o etanol em acetaldeído ainda no citoplasma dos hepatócitos. Na segunda via, a enzima aldeído desidrogenase (ALDH), já no interior da mitocôndria, irá metabolizar o aldeído, presente na molécula do acetaldeído, de modo que só reste o acetato. Esse, por sua vez, é convertido em dióxido de carbono e água, o que termina por gerar uma carga energética (Netto, 2008; ed Melo, Barrias, da Silva Breda, 2001; Mincis, Chebli, Khouri et al, 1995).

É importante ressaltar que o etanol, quando ingerido através da via oral, é absorvido em diferentes localidades do corpo, com aproximadamente 30% sendo retirado através da mucosa gástrica, 65% sendo absorvido diretamente a partir do duodeno, e cerca de 5% ao passar através do cólon. Além disso, o próprio etanol atua como um depressor do Sistema Nervoso Central a partir de suas interações com o neurotransmissor ácido gama-aminobutírico, ou simplesmente GABA (Brunton, 2012).

Figura 3 – Metabolização do Etanol

Fonte: Autores, 2021

Em virtude de serem uma superfamília de enzimas, o CYP está envolvido no metabolismo de uma série de fatores, como componentes oriundos de dietas xenobióticos, na produção de substâncias endógenas, como esteroides, e na síntese de ácidos graxos a partir de colesterol (Brunton, 2012). Contudo, existem alguns xenobióticos que possuem propriedades de inibir e estimular a ação dessas enzimas, independentemente de serem substratos para tais.

Um exemplo é o antifúngico cetoconazol, que inibe a ação da CYP3A4 e de outras enzimas pertencentes ao CYP (Brunton, 2012).

As substâncias que possuem a propriedade de inibir a ação deste complexo enzimático são denominadas de xenobióticos antagonistas. Estes fármacos, além de serem substratos, apresentam antagonistas – moléculas que se ligam as enzimas e impedem se ligarem aos seus substratos, impedindo que sejam degradados (Brunton, 2012). Consequentemente, haverá uma diminuição da excreção do xenobiótico, gerando aumento de sua concentração no sangue (disponibilidade), podendo, inclusive, exibir níveis tóxicos na janela terapêutica. Portanto, se um fármaco for administrado na forma de um inibidor, esse apresentará uma maior dose quando presente no sangue (Brunton, 2012; Mtzger, Souza-Costa, Tanus-Santos, 2006).

Já os xenobióticos indutores são aqueles que estimulam a atividade do CYP. Como consequência, esses aumentam a velocidade de excreção destes corpos estranhos, diminuindo sua biodisponibilidade e, consequentemente, seus efeitos no organismo (Brunton, 2012; Cardoso, Figueiredo, Domingos et al, 2000; Follmer, Netto, 2013).

4 CONCLUSÃO

A metabolização, ou biotransformação, constitui-se como sendo uma das etapas mais importantes da passagem de fármacos pelo organismo humano. A partir do seu entendimento, cientistas podem usar os mecanismos básicos envolvidos na ação e reação do sistema orgânico para a elaboração de novos produtos usados no avanço da ciência. Cabe aos órgãos educadores da área da saúde garantir o seu pleno entendimento para com graduandos das áreas de Medicina, Farmácia e Enfermagem, sobretudo, para que possam ter um pleno arcabouço teórico acerca do conhecimento que rege tal temática. Trata-se de uma temática abrangida numa vasta literatura, presente em diferentes bases bibliográficas, o que pode servir como base para tal ação.

REFERÊNCIAS

- BARREIRO, E. J.; FRAGA, C. A. M.; **Química Medicinal: As Bases Moleculares da Ação dos Fármacos**. 3 ed. Porto Alegre: Artmed: Porto Alegre, 2001. 608 p.
- BRUNTON, L.L.; **As Bases Farmacológicas da Terapêutica de Goodman & Gilman**. 12 ed. Porto Alegre: Artmed, 2012. 2112 p.
- CARDOSO, L. C.; FIGUEIREDO, M. D.; DOMINGOS, M. G.; VAISMAN, M.; CARVALHO, D. P. Sistema enzimático gerador de peróxido de hidrogênio: NADPH oxidase na tireóide humana. **Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia**, n. 44, p. 352-357, 2000.
- COSTA, E. M. D. M. B.; DE OLIVEIRA, V.; PIMENTA, F. C. Citocromos P450 e biotransformação microbiana. **Revista de Patologia Tropical/Journal of Tropical Pathology**, n. 33, . 21-32, 2004.
- DE MELO, M. L. M.; BARRIAS, J.; DA SILVA BREDAS, J. J. R. Álcool e problemas ligados ao álcool em Portugal, 2001.
- FOLLMER, C.; NETTO, H. J. B. Fármacos multifuncionais: monoamina oxidase e α -sinucleína como alvos terapêuticos na doença de Parkinson. **Quim. Nova**, n. 36, p. 306-313, 2013.
- LOPES, J.; MATHEUS, M.E. Risco de hepatotoxicidade do Paracetamol (Acetaminofem). **Rev. Bras. Farm**, n. 93, p. 411-414, 2012.
- LOW, L. K. Em Wilson and Gisvold's Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry; Lippincott Williams & Wilkins: Philadelphia, 1998, cap. 3.
- MARTÍNEZ-CAYUELA, M. Toxicidad de xenobióticos mediada por radicales libres de oxígeno. **Ars Pharmaceutica**, n. 39, p. 5-18, 1998.
- METZGER, I. F.; SOUZA-COSTA, D. C.; TANUS-SANTOS, J. E. Farmacogenética: princípios, aplicações e perspectivas. **Medicina (Ribeirão Preto)**, n. 39, p. 515-521, 2006.
- MINCIS, M.; CHEBLI, J. M. F.; KHOURI, S. T.; MINCIS, R.. Etanol e o trato gastrointestinal. **Arq. Gastroenterol**, p. 131-139, 1995.
- MORO, A.; INVERNIZZI, N. A tragédia da talidomida: a luta pelos direitos das vítimas e por melhor regulação de medicamentos. **História, Ciências, Saúde**, n. 3, p. 603-622, 2017.
- NASSAR, A. E. F.; KAMEL, A. M.; CLARIMONT, C. Improving the decision-making process in structural modification of drug candidates: reducing toxicity. **Drug Discovery Today**, n. 9, p. 1055-1064, 2004.
- NETTO, A. U. Considerações bioquímicas sobre o etanol. **Bioquímica II**, 2008.

PEREIRA, D. G. Importância do metabolismo no planejamento de fármacos. **Química nova**, n. 30, p. 171-177, 2007.

Reis, M. Farmacogenética aplicada ao câncer. Quimioterapia individualizada e especificidade molecular. **Medicina**, n. 39, p. 577-586, 2006.

SANTIAGO, L. M. A metabolização no sistema do citocromo P450 e a sua importância em Clínica Geral. **Revista Portuguesa de Medicina Geral e Familiar**, n. 19, p. 121-129, 2003.

STRECK, E. L.; COSTA, T. D. Isoformas do citocromo P450 e outros fatores que alteram a biotransformação de fármacos. **Infarma-Ciências Farmacêuticas**, n. 11, p. 36-41, 1999.

CAPÍTULO 54

HARMONIZAÇÃO DO SORRISO EM DENTES ANTERIORES PELO MEIO DE TÉCNICAS DA INTEGRAÇÃO PERIO-DENTÍSTICA: RELATO DE CASO CLÍNICO

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c54](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c54)

**Hana Yasmim Marques Silva de Souza¹, Nathália Rayanne Torres², Graziella Regina
Roque da Silva Valentim³, Pedro Adolfo de Andrade Lima Cabral⁴**

¹ Centro Universitário Tiradentes de Pernambuco, (hanayasmim@hotmail.com)

² Centro Universitário Tiradentes de Pernambuco, (nathaliasud@hotmail.com)

³ Centro Universitário Tiradentes de Pernambuco, (graziellaroque@hotmail.com)

⁴ Professor Mestre disciplina de dentística do centro universitário tiradentes de Pernambuco,
(Pedro.adolfo@souunit.com)

Resumo

A busca pela estética nas clínicas odontológicas tornou-se algo rotineiro, e o sonho do paciente em alcançar o sorriso perfeito, aumentam as necessidades e expectativas que se tornam cada vez maiores nos procedimentos. A odontologia estética enfatiza o equilíbrio entre a estética branca e a estética rosa, importante para a obtenção de excelentes resultados no tratamento reabilitador e harmonico. **Objetivo:** Demonstrar através de um caso clínico o resultado da associação de gengivoplastia, clareamento dentário e utilização de resina composta direta para restabelecer a harmonia gengival e dental do paciente. **Método:** Trata-se de mostrar opções de tratamento para o paciente que compareceu a clínica escola da UNIT visando a importância da execução, planejamento e com isso resultando na satisfação do paciente. J.A.C, 25 anos, gênero masculino, feoderma, não fumante e sem alterações sistêmicas compareceu a clínica odontológica da UNIT com queixa principal de coroas clínicas de tamanho reduzido e insatisfação estética quanto a coloração dentária. A resolução estética desse caso envolveu cirurgia periodontal, associada ao clareamento dentário e a utilização de material restaurador adesivo. **Resultado e Conclusão:** Enfatiza-se assim a importância da execução e do planejamento de um tratamento odontológico proposto que possibilitou a harmonização estética do sorriso, resultando de grande impacto no aspecto psicológico, pessoal e social do paciente e na sociedade em qual este se insere.

Palavras-chave: Gengivoplastia; Clareamento dental; Restauração.

Área Temática: Ciências da saúde

E-mail do autor principal: hanayasmim@hotmail.com

1 INTRODUÇÃO

O conceito de estética é multifatorial e possui variantes de pessoa para pessoa, dessa forma, harmonizar os dentes anteriores requer uma atenção cuidadosa por parte do cirurgião-dentista, principalmente quando nos referimos aos incisivos centrais superiores. Os mesmos devem ser corrigidos com proporções atraentes e dominantes, uma vez que são os principais determinantes em avaliando da estética anterior, assim sendo, a abordagem do tratamento de forma multidisciplinar é interessante para melhorar a estética do sorriso, podendo ser combinado com diferentes áreas da odontologia, como por exemplo: a associação da periodontia com a dentística restauradora, cirurgia com a prótese, dentre outras, pois, é difícil solucionar todos os casos clínicos com a atuação de uma área isoladamente, fazendo-se necessária a integração de algumas delas para solucionar a queixa do paciente (PEDREIRA *et al.*, 2018; BAPTISTA *et al.*, 2020).

De acordo com Silva *et al.*, (2021); Goyatá *et al.*, (2020) e Cruz *et al.*, (2021), o sorriso harmônico é algo atrativo e o mesmo é composto por vários fatores: a posição e tamanho de dentes, gengiva e lábios. Desse modo, para alguns padrões sociais dentes cada vez mais brancos, bem posicionados e, gengiva com altura proporcional são considerados indícios de saúde, higiene, status social e definição de beleza. Portanto, os parâmetros estéticos ditados pela sociedade têm levado os pacientes a buscar uma harmonia odonto-facial “perfeita”.

Normalmente, os dentes anteriores são afetados por malformação, alteração anatômica e de cor, defeitos hipoplásicos, traumas e doença cárie, que por sua vez comprometem a beleza do sorriso e interferem na autoestima e na interação social do paciente, dessa forma, a estética dos dentes anteriores é uma das maiores reclamações de pacientes que procuram o cirurgião-dentista (PEDREIRA *et al.*, 2018). Por outro lado, temos a gengiva como estrutura importante na harmonização do sorriso, que por sua vez, também está susceptível a alterações. O sorriso gengival é definido pela exposição excessiva de gengiva maxilar durante o sorriso e apresenta etiologia variada, que deve ser corretamente identificada para confecção de um plano de tratamento eficaz (MONTEIRO *et al.*, 2020).

O sorriso gengival tem etiologias diferentes, sendo elas: o aumento do volume de gengiva devido ao acúmulo de placa, o uso de medicamentos e excesso vertical de maxila são uma delas. Contudo, a erupção passiva alterada (EPA) é considerada a etiologia mais comum na formação do sorriso gengival (MONTEIRO *et al.*, 2020). Segundo Barbosa (2017) a erupção

dentária se classifica em ativa e passiva, sendo na erupção ativa o dente que emerge na cavidade oral propriamente dita e na passiva o deslocamento apical da junção dentogengival, ou seja, erupção passiva alterada (EPA) é uma condição quando não há uma correta migração apical da margem gengival e parte da coroa anatômica do dente permanece coberta, tornando a coroa ou as coroas dos elementos dentários aparentemente curtas (PEREIRA, 2015 apud Macedo *et al.*, 2012).

A gengivectomia é a intervenção cirúrgica que se efetua ao nível das gengivas e, que visa corrigir essa quantidade de exposição gengival, favorece a alteração da forma e do contorno dos dentes anteriores, pois, um sorriso com contorno, coloração e texturas gengivais desiguais, associado a coroas curtas e desproporcionais depreciam o sorriso agradável, isto posto, pode-se dizer que, a aparência do sorriso não depende exclusivamente da harmonia entre os dentes e os lábios, mas também da interação destes com o tecido gengival (BAPTISTA *et al.*, 2020; MONTEIRO *et al.*, 2020).

As associações dessas duas especialidades odontológicas: dentística e periodontia, devolvem a função, permitem adequada estética, elevam a autoestima, promovem aceitação social e bem-estar ao paciente (BAPTISTA *et al.*, 2020. Assim sendo, o presente relatório de Estágio Supervisionado em Clínica Integrada II do curso de Odontologia no Centro Universitário Tiradentes de Pernambuco (UNIT PE) tem como objetivo relatar um caso clínico no qual o aumento de coroa clínica estética com finalidade de correção do sorriso gengival por meio de gengivectomia nos dentes superiores e anteriores 11, 12, 21, 22, foi escolhida juntamente com acabamento de resina preexistente para restabelecer a harmonia gengival e dental do paciente.

2 MÉTODO

J.C.H, 25 anos, gênero masculino, feoderma, apresentou-se no Centro Universitário Tiradentes de Pernambuco (UNIT/PE) Clínica-escola de odontologia. Na anamnese, o mesmo relatou não ter doença degenerativa ou qualquer alteração sistêmica, bem como, não possuir doença infectocontagiosa. Paciente relatou não possuir sangramento gengival, não ser fumante, consumir bebida alcoólica moderadamente, nunca ter feito tratamento periodontal ou endodôntico, porém já havia tomada anestesia, para procedimento odontológico de exodontia. Paciente não usava prótese ou aparelho ortodôntico. No exame clínico extraoral não foram observadas alterações. A queixa principal era de sorriso amarelo e dentes curtos. Após avaliação clínica e periodontal, observou-se a presença e acúmulo de biofilme nas superfícies dentárias e

sem presença de cálculo dentário nos elementos, posição labial normal, ausência de perda de inserção e fenótipo periodontal espesso. Observou-se também uma descontinuidade da margem gengival, bordas incisais com irregularidades e coroas curtas nos dentes 11, 12, 13, 21, 22 e 23, pigmentação em todos os elementos, porém, mais evidente no 12 e 21, o que os deixava com cor amarelada em tons mais escuros, quando comparados com todo o arco superior e inferior.

Figura 1. Aspecto inicial das irregularidades no tecido gengival e dentes ântero-superiores pigmentados com coroa clínica curta.

Fonte: Autoria própria, 2021.

PLANEJAMENTO E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO

O plano de tratamento consistiu na regularização das margens gengivais dos elementos anterossuperiores 11, 12, 21 e 22 através da técnica de gengivectomia sem osteotomia. Por conseguinte, a realização de acabamento de material restaurador preexistente nos elementos 11 e 21. O procedimento iniciou-se com a secagem do sulco vestibular e gengiva feita com a seringa tríplice, aplicação de anestésico tópico auxiliado pela gaze estéril, após dois minutos, a anestesia infiltrativa entre os incisivos laterais e caninos e nas papilas com Lidocaína 2% 1:100.000 e demarcação dos futuros zênites com a sonda de Williams.

Figura 2. Sonda de Williams marcando os zênites na gengiva do elemento

Fonte: Autoria própria, 2021.

A incisão inicial aconteceu por meio de bisel interno e foi realizada com cabo de bisturi redondo e lamina 15 C. Após, um corte externo único e preciso foi realizado de mesial para a distal, sem envolver a papila, com o objetivo de retirar e regularizar o tecido gengival, expondo a coroa dos elementos. O acabamento com ponta diamantada tronco cônica foi realizado na face dentaria vestibular em resina preexistente nos elementos 11 e 21, com intuito de trazer melhor lisura a superfície. Por fim, o cimento cirúrgico foi manipulado e aplicado para melhor conforto psicológico do paciente e para se evitar atritos na região.

Figura 3. Incisão da gengiva no elemento 11.

Fonte: Autoria própria, 2021.

Figura 4.Aspecto final da gengivectomia e acabamento com ponta diamantada troco cônica

Fonte: Autoria própria.

Figura 5. Aspecto final após a aplicação do cimento cirúrgico.

Fonte: Autoria própria, 2021.

3 DISCUSSÃO

O presente relato de caso ilustra como o correto diagnóstico do sorriso gengival pode implicar no tipo de tratamento e técnicas cirúrgicas indicadas para resolução do caso. De acordo com Pires *et al.* (2010) e Brilhante *et al.* (2014) as corretas opções terapêuticas estão diretamente dependentes da etiologia, e a decisão clínica de tratamento deve ser individualizada caso a caso, levando em consideração fatores sistêmicos e socioeconômicos do paciente. Dentre as etiologias os autores supracitados destacam: erupção passiva alterada, hiperatividade do lábio superior, lábio curto, e crescimento vertical maxilar. Embora todas as etiologias apresentadas possam ter a gengivectomia e gengivoplastia como tratamento complementar, a real indicação da técnica de plástica gengival deve ser em casos que o principal fator etiológico fora erupção passiva alterada.

De acordo com a literatura o diagnóstico preciso é a base para estabelecer o plano de tratamento a ser realizado. Neste caso clínico, o diagnóstico foi de coroas clínicas curtas, justificando a realização do procedimento. A altura da coroa clínica deve ser medida pela distância mais apical da concavidade gengival marginal até à borda incisal ou superfície oclusal do elemento dentário, e através da sondagem periodontal ou também do uso de guias cirúrgicos. Na prática diária da clínica, as mudanças de cor de dentes são o resultado de

processos químicos, físicos e ambientais, como tabagismo, uso de agentes antibacterianos, traumas e dietas ricas em corantes. Dependendo do grau de escurecimento e vitalidade pulpar, diversas técnicas de tratamento podem alcançar resultados estéticos satisfatórios quando executadas corretamente.

Há vários estudos que relatam insatisfação de grande parte dos pacientes não apenas com a forma e alinhamento dos seus dentes, mas também com relação à cor dos mesmos, o que faz desta uma característica bastante associada à busca por tratamentos estéticos. Esse descontentamento também foi relatado pelo paciente, o que levou à realização do clareamento assistido em consultório, após gengivectomia. Um dos fatores mais desejados pelos profissionais e pacientes é o sucesso clínico associado à longevidade.

4 CONCLUSÃO

Ao lidarmos com casos em situações que requerem equilíbrio estético dentário, devemos considerar os conceitos básicos da estética dentária tanto da estética rosa como a da estética branca, como o contorno das gengivas e a cor dos dentes, que trarão um senso de naturalidade ao sorriso. No caso apresentado neste artigo, a associação de diversos procedimentos estéticos possibilitou a execução do plano de tratamento, feito de comum acordo entre profissional e paciente. Através de um planejamento prévio do passo a passo do caso, respeitando-se o tempo de recuperação do periodonto pós-cirurgia, o acompanhamento contínuo e o trabalho com os procedimentos clareador possibilitaram de forma eficaz a reconstrução e a cosmética da área reabilitada. Portanto, as ações multidisciplinares utilizadas permitiram garantir com sucesso a reabilitação funcional e estética, elevando a autoestima e bem estar do paciente.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, R. L. S. *et al.* ERUPÇÃO PASSIVA ALTERADA E SUAS IMPLICAÇÕES NO TRATAMENTO ORTODÔNTICO – REVISÃO DE LITERATURA **Universidade Estadual da Paraíba**. Araruna. p. 1-388-416, 2017.

BAPTISTA, I. A. *et al.* Associação de diferentes cirurgias periodontais como alternativa de restabelecimento de harmonia gengival. **Periodontia**, p. 59-68, 2020.

GOYATÁ, F. R. *et al.* Anterior rehabilitation involving dental bleaching, frenectomy and composite resin: a case report. **RGO-Revista Gaúcha de Odontologia**, v. 68, 2020.

MONTEIRO, M. M. G. *et al.* Impacto da correção do sorriso gengival na qualidade de vida: relato de um caso clínico com gengivectomia suficientemente invasiva e guiada.

Periodontia, p. 76-86, 2020.

NASCIMENTO, L. S. B. *et al.* Avaliação do impacto do clareamento dental na qualidade de vida de pacientes adultos. **J. Health NPEPS**, p. 392-401, 2018

SILVA, M. A. F. *et al.* Benefits and harms during the dental bleaching procedure: integrative review. **Revista Odontológica de Araçatuba**, v.42, n.1, p. 38-43, 2021.

CAPÍTULO 55

IDOSAS PRATICANTES DE DANÇA: UM EXERCÍCIO DE SAÚDE E CIDADANIA

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c55](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c55)

Kássia Ravana Alves Carvalho¹, Maria Bianca de Sousa Oliveira², Letícia Almeida Reis³, Maria Gabriela Lira da Costa⁴, Layanne Lima de Araújo⁵, Sara Beatriz Santos Rodrigues⁶, Francisca Carolyn dos Santos Luz⁷, Mônica Oliveira Mazuad Cronemberger⁸, Narhara Nágylla Souza da Silva⁹, Vinicius Guimarães Pereira¹⁰

¹ Universidade Estadual do Piauí, (kassiaravanna@hotmail.com)

² Universidade Estadual do Piauí, (mbianca007@gmail.com)

³ Universidade Estadual do Piauí, (leticiareis018@hotmail.com)

⁴ Universidade Estadual do Piauí, (mgabi2020@gmail.com)

⁵ Universidade Estadual do Piauí, (layannelima27@gmail.com)

⁶ Universidade Estadual do Piauí, (sarabsrodriguess@gmail.com)

⁷ Universidade Estadual do Piauí, (caroliny63@hotmail.com)

⁸ Universidade Estadual do Piauí, (monicamazuad@gmail.com)

⁹ Universidade Estadual do Piauí, (abf.spatos.narhara@gmail.com)

¹⁰ Universidade Estadual do Piauí, (vini.tdr33@gmail.com)

Resumo

A dança é considerada como uma atividade física prazerosa, alegre e estimula motivação, autoestima aos praticantes. Pode-se afirmar que ela está nos pequenos gestos como uma forma de caminhar, nos movimentos do cotidiano e na realização das atividades diárias. **Objetivo:** investigar a percepção das idosas praticantes de aula de dança da associação de moradores do bairro manguinha da cidade de Floriano – PI sobre a influência da dança e seus possíveis benefícios na promoção de saúde. **Métodos:** Trata-se de uma pesquisa de campo, realizado nas associação de moradores do Bairro Manguinha, na cidade de Floriano – PI. **Resultados e discussão:** A partir dos resultados obtidos, pôde-se perceber que a dança está relacionada à melhoria na qualidade de vida, bem-estar social e físico dos idosos auxiliando nas atividades do cotidiano, causando motivação e autoestima consequentemente gerando uma maior participação desse grupo na sociedade. **Considerações finais:** Os estudos demonstram que as idosas estão conscientes dos benefícios adquiridos através da dança, demonstrando anseios pela melhoria da qualidade de vida e autonomia em optarem por essa modalidade.

Palavras-chave: Dança; Terceira idade; Promoção de saúde.

Área Temática: Ciências da Saúde.

E-mail do autor principal: kassiaravanna@hotmail.com

1 INTRODUÇÃO

A dança existe desde os primórdios, representada de forma simples através de uma caminhada, movimentos do cotidiano e atividades diárias. Dessa maneira, o movimento e o gesto são considerados formas essenciais e primitivas da dança e representam a primeira forma de manifestação de emoções do homem e, conseqüentemente, da sua exteriorização (TADRA, 2009).

Com a chegada da melhor idade, o corpo e a mente passam por várias modificações, dando origem a algumas limitações físicas. Esse processo de adaptação não é fácil, por isso algumas práticas podem auxiliar nesse processo, tornando a vida do idoso mais independente.

A dança tem assumido um papel importante na vida dos idosos, ganhando muitos adeptos e melhorando sensivelmente a sua qualidade de vida, pois a mesma é uma atividade prazerosa e capaz de proporcionar condicionamento físico, aumentar a circulação periférica, auxiliar na perda de peso, diminuir e/ou manter a pressão arterial, ou seja, promover a melhora na qualidade de vida (SILVA *et al.*, 2011). Desse modo, pode-se afirmar que a dança é uma atividade física recreativa identificada como uma das intervenções de saúde mais significativas na vida das pessoas de idade mais avançada (SALVADOR, 2004).

Com a relevância da dança como meio de promoção de saúde e sendo muito praticada por grupos de idade avançada, esta é considerada uma das mais completas formas de atividade, pois a mesma apresenta satisfação significativa no que diz respeito ao bem-estar físico, mental e social e a partir desse questionamento surgiu a questão norteadora: Qual a relevância da dança em relação à percepção dos idosos, e como essa modalidade vem possibilitando a promoção de saúde cada vez mais dessa população e os seus reais benefícios para os seus praticantes?

Partindo dos benefícios obtidos pelos idosos através da dança, podendo ser um fator positivo na melhoria da qualidade de vida e promoção de saúde dessa população a dança pode proporcionar um bem-estar físico, mental e social a seus praticantes. Diante do exposto este trabalho tem como objetivo investigar a percepção dos idosos sobre a influência da dança e os seus possíveis benefícios na promoção de saúde.

2 MÉTODO

Essa pesquisa trata-se de um estudo de campo, de caráter explicativo e pesquisa

quantitativa. Quanto ao tempo de duração, a pesquisa caracteriza-se como tipo transversal, pois o pesquisador coleta os dados num único período de tempo (GIL, 2002). A amostra constituiu-se com um total de ($n = 7$) definida após os critérios de inclusão e exclusão realizada com universo populacional de idosas que frequentam ativamente as aulas de dança da associação de moradores do Bairro Manguinha, na cidade de Floriano – PI. O total dos participantes que compôs a amostra representou a margem de erro de 5% e um nível de confiança de 95%.

Os critérios de inclusão foram as idosas que praticavam dança na Associação de Moradores do Bairro Manguinha há pelo menos 6 meses e que se propuseram a responder o instrumento de pesquisa e assinar o Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). Já os critérios de exclusão foram as idosas que não estavam presentes na data marcada para coleta de dados e as que estavam ausentes da associação por duas semanas consecutivas.

A presente pesquisa foi submetida à plataforma Brasil para apreciação Ética, tendo como comprovante de envio do projeto registrado sob o CAAE (certificado de apresentação para apreciação ética) número: 10832019.7.0000.5209, como forma de garantir e respeitar todos os preceitos estabelecidos nas resoluções 466/12 e 510/16 dos Conselhos Nacionais de Saúde e Educação respectivamente. As informações coletadas através do instrumento de pesquisa foram analisadas por meio do programa Microsoft Excel (2010) com o intuito de submeter os dados coletados a uma análise simples de dados e também gerar representações gráficas.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os achados da investigação estão apresentados em gráficos com uma análise estatística descritiva simples, para a interpretação das informações obtidas. A pesquisa buscou investigar a prática da dança de mulheres idosas e os motivos que levam a essa modalidade, dentre os resultados encontrados podemos destacar que as idosas revelaram como prioridade a manutenção da saúde. Houve destaque também para a categoria de vontade própria, que pode ser destacada como automotivação das próprias idosas, com 71% de indicação. Por outro lado, mesmo revelando aspectos positivos, outros critérios não apareceram como prioridade na intenção de respostas, como a indicação de amigos (29%) e um valor menor ainda para a indicação pela família (14%). Outro aspecto que teve destaque, com 57% foi a indicação médica, revelando que outros profissionais de saúde também tem se preocupado com a importância da atividade física.

Gráfico 1- Motivos que levaram a prática da dança

Fonte: Elaborado pela autora (2019)

Em relação às respostas obtidas na pesquisa sobre os motivos que levaram as idosas à prática da dança, pôde-se observar que o motivo mais relevante para essa procura, é a melhoria da saúde. Um estudo realizado com 199 idosos na cidade de Florianópolis apontou de forma clara que a busca por saúde é o principal motivo pela adesão a um programa de atividade física, seja por interesse próprio ou por indicação médica (RIBEIRO *et al.*, 2012). Esses resultados mostram a importância dos exercícios físicos para melhorar os níveis de saúde dos idosos, reafirmando mais ainda os resultados obtidos na presente pesquisa.

Em um estudo de Silva *et al.*, (2011) a dança aparece como uma forma de auxiliar na promoção de saúde, podendo assim diminuir ou manter os níveis de pressão arterial, proteger as articulações, a autoestima e a convivência em sociedade, melhorar a capacidade de respiração, aumentar a circulação periférica, ajudar na perda de peso, melhorar a musculatura, melhorar o humor, e uma consequente melhoria da qualidade de vida, demonstrando assim forte relação com as respostas obtidas na primeira questão desta pesquisa.

A dança como modalidade de exercício físico é considerada importante por acarretar uma série de benefícios psicossociais, lógicos, motores e afetivos (PIZANO; NEVES; SARTORI, 2010). Dessa forma, a atividade física se torna bem oportuna na manutenção da saúde, desde que a mesma seja praticada de forma regular promove ao organismo uma desaceleração do ritmo no processo de envelhecimento, facilitando assim a melhoria das condições físicas e limitações do idoso (LOPES, 2012).

Ainda relacionado com o aspecto saúde, a pesquisa em questão revelou que a população idosa que respondeu ao questionário proposto apresentou outro motivo bem relevante para prática

da dança, sendo ele, a vontade própria. Essa vontade própria pode estar revelando certa motivação e autonomia dessas idosas. Para Samulski (2002), a motivação pode ser definida como um processo intencional e direcionado a um objetivo. Já a autonomia é a capacidade que o indivíduo tem de tomar decisões e fazer suas próprias escolhas (QUEIRÓS, 2001).

No entanto, os resultados obtidos na pesquisa mostram que a instituição familiar está um pouco ausente nesse incentivo. Tendo em vista que as idosas ao serem questionadas sobre a indicação da família para a prática da dança demonstraram com respostas um número bastante inferior em relação a outras categorias, apresentando apenas 14%. Um estudo realizado por Assis e Amaral (2010) aponta que os indivíduos que não possuem um suporte social familiar ou de amizade, apresentam maior dificuldade para lidar com o estresse e outras dificuldades encontradas, quando comparados àqueles que têm o suporte social.

Sabe-se que muito idosos passam por situação de abandono e/ou negligência familiar, que nem sempre é caracterizado pela ausência de membros da família, mas muitas vezes pela falta de participação direta na vida desses idosos. Isso se torna contraditório levando em consideração o estudo de Freitas (2002 p.8) que afirma que a família seria um ambiente para cuidado, proteção e socialização, onde os membros se unem por laços afetivos e/ou de sangue.

Níveis de contribuição da dança na promoção de saúde

A pesquisa buscou investigar os níveis de contribuição da dança na promoção de saúde, revelando que todas as categorias apresentaram estatísticas positivas no que diz respeito aos níveis de contribuição da dança na promoção de saúde. Em relação aos resultados percebeu-se que os níveis mais altos de satisfação se deram para os itens relacionados à melhoria da autoestima, melhoria da disposição e fazer novas amizades, sendo assim considerados como satisfação total pelas idosas. No entanto, apenas dois itens foram caracterizados como bom, sendo eles: diminuição do estresse e a melhoria das relações familiares.

Por outro lado, alguns itens também foram considerados como níveis regulares, seguindo empatados com o mesmo número de intenção de resposta, sendo eles: melhoria da memória e melhoria nas relações familiares, totalizando 29% e auxílio na execução de atividades diárias e diminuição do estresse obtendo 14% das respostas. De acordo com os dados obtidos, nenhum item citado acima obteve grau de insatisfação.

Gráfico 2- Níveis de contribuição da dança na promoção de saúde

Fonte: Elaborado pela autora (2019)

Em relação aos achados da pesquisa no que diz respeito aos níveis de contribuição da dança na promoção de saúde, observou-se que alguns itens citados obtiveram um nível de satisfação total, como: melhoria da autoestima, melhoria da disposição e o auxílio a atividades diárias. De acordo com os estudiosos Vitorelli, Pessini e Silva (2005) a autoestima positiva na velhice é muito importante, pois propicia que o indivíduo se sinta seguro, independente, respeitado, reconhecido e feliz. De acordo com o estudo de Neri Al(2001) a autoestima na terceira idade está associada com diversos fatores, tais como: a família, a competência física, o trabalho entre outros. É uma autovalorização feita com base no que é avaliado como positivo ou negativo, podendo ser elevada ou diminuída através da comparação social.

Levando em consideração que autoestima pode apresentar efeitos positivos ou negativos na vida dos idosos, supõe-se que se essa autoestima estiver em um nível alto os idosos tendem a ter mais vontade de viver, comemorar e se sentirem bem, caso contrário pode acontecer o isolamento, facilitando assim a solidão que é bastante comum na velhice. A solidão acaba interferindo na qualidade de vida das pessoas, fazendo com que se privem do convívio social, empobrecendo o conhecimento obtido e afetando as atividades da vida diária (LITVOC; BRITO, 2004; PAPALÉO NETTO, 2002).

Em relação à melhoria da disposição e auxílio nas atividades diárias, a dança se mostrou bem eficaz de acordo os dados obtidos na pesquisa. Esses dois aspectos se interligam, sendo que um depende do outro. Portanto, os impactos relacionados com o envelhecimento pode ser retardados através de um estilo de vida ativo, mantendo assim os idosos independentes para a realização das atividades da vida diárias por mais tempo (BORGES; MOREIRA, 2009).

Motivações para continuar praticando aulas de dança

Os dados coletados na investigação apresentaram estatísticas positivas no que diz

respeito a motivação na continuidade da prática de dança. De acordo com os dados, notou-se que a maior motivação apresentada são que o local das aulas é um lugar para fazer novas amizades, totalizando assim 100% das respostas. Outros dois fatores dessa motivação se mostraram relevantes, como: a professora ser atenciosa e os ritmos serem empolgantes, tendo então 71%. O local das aulas ser considerado um ambiente acolhedor também é um motivo relevante para que essas idosas continuem frequentando.

Gráfico 3- Motivações para continuar praticando aulas de dança

Fonte:Elaborado pela autora (2019)

Vale ressaltar que as principais motivações apontadas pelas participantes para continuarem nas aulas de dança foram fazer novas amizades e os resultados obtidos através dessa modalidade. Sendo assim muito idosos procuram a dança com o intuito de suprir a carência vivenciada nos meios familiares ou em círculos de amizade. Reafirmando essa ideia Leal e Haas (2006) mostram que a dança apresenta características importantes de sociabilização e motivação, sendo considerada uma atividade para a vida inteira, que proporciona sentimentos e desenvolve capacidades anteriormente inimagináveis.

Alguns idosos sentem-se sozinhos mesmo convivendo com familiares, então acabam procurando a dança como forma de conhecer novas pessoas e fazer amizade. Portanto, quando a pessoa idosa entra em contato com o ambiente da dança sente-se mais livre de medos e incertezas que adquirem nessa fase da vida, então o mundo da dança favorece relacionamentos interpessoais e formação de grupos, nesse caso os idosos conseguem ver a importância da dança no aspecto social e o valor de um simples abraço (GOBBO, 2005).

A prática da dança ou qualquer outro programa de atividade física muitas vezes é procurado pelo público idoso como uma alternativa recreativa para se adaptar ao envelhecimento, pois a participação coletiva acaba estimulando a solidariedade. Dessa maneira,

as atividades que são realizadas em grupo favorecem socialização e manutenção do aspecto social do idoso, afastando-o do isolamento. Os autores Jannuzzi & Cintra (2006) afirmam em um dos seus estudos que a ocupação do tempo livre e dos períodos de solidão por parte dos idosos com atividades que propiciem prazer mostra-se uma estratégia favorável para minimizar os efeitos do envelhecimento.

Em relação aos resultados obtidos devido à prática da dança, as participantes da pesquisa relataram uma série de benefícios alcançados desde que começaram realizar essa modalidade. No que diz respeito aos aspectos físicos, Silva (2011) demonstra que a dança propicia melhora da coordenação motora, fatores necessários para atividades do dia a dia como subir escada ou se levantar de um assento, auxilia na ativação mais rápida dos sistemas motores perante as situações de desequilíbrio, prevenindo um dos acidentes mais comuns nessa faixa etária que são as quedas associadas à fraqueza das pernas. Vários estudiosos afirmam que a dança praticada com regularidade proporciona uma série de resultados, auxiliando assim na melhoria dos aspectos físicos, psíquicos e sociais (NANNI, 1995; MARQUES, 1999; CARLI, 2000).

4 CONCLUSÃO

Diante dos achados, observou-se que as idosas estão conscientes dos benefícios adquiridos através da dança, demonstrando anseios pela melhoria da qualidade de vida e autonomia em optarem por essa modalidade e isso ocorre mesmo com a ausência da família nesse incentivo. Sendo assim as idosas estão percebendo os benefícios e a contribuição que a dança tem apresentado na promoção da saúde, apontando satisfação total no que diz respeito à melhoria da autoestima, disposição e realização das atividades. A dança tem se mostrado necessária na vida dessas pessoas, contribuindo nos aspectos físicos, sociais, intelectuais entre outros. Deste modo, espera-se que as contribuições da dança para os idosos apontados neste estudo, seja um fator de reflexão e motivação para que os profissionais possam investir em práticas voltadas para esse público.

REFERÊNCIAS

ASSIS, L. P. P.; AMARAL, M. L. N. do. **Envelhecimento e suporte social**. In: COSTA, Geni de Araújo (Org.). Atividade física, envelhecimento e a manutenção da saúde. Uberlândia: DUFU, 2010, p. 207-217. Disponível em:<<https://psicologado.com.br/psicologiageral/desenvolvimento-humano/envelhecimento-e-apoio-familiar-importancia-no-bem-estarda-pessoa-idosa>>

BORGES, M. R. D; MOREIRA, A. K. Influências da prática de atividades físicas na terceira idade: estudo comparativo dos níveis de autonomia para o desempenho nas AVDs e AIVDs entre idosos ativos fisicamente e idosos sedentários. Motriz: **Revista de Educação Física**. Rio Claro, v. 15, n. 3, p. 562-573, jul./set. 2009. Disponível em:<http://cacphp.unioeste.br/extensao/unati/arqs/UNATI_14.pdf>

CARLI, S. C. **O idoso e a dança: aptidão física, auto-imagem e auto-estima**. Monografia de especialização. UFSC, Florianópolis. 2000. Disponível em: <<http://seer.upf.br/index.php/rbceh/article/view/56/49>>

FREITAS, R. C. S. “Em nome dos filhos, a formação de redes de solidariedade – algumas reflexões a partir do caso de Acari”. In: **Revista Serviço Social e Sociedade**, nº 71; São Paulo: Cortez, 2002. Disponível em: <http://www.servicosocial.ufes.br/sites/servicosocial.ufes.br/files/field/anexo/sso__familia_grupo_e_redes_sociais_2008_01.pdf>

GIL, A. C. **Como elaborar projeto de pesquisa**. 4ª edição. Ed. Atlas. São Paulo, 2002.

GOBBO, D. E. A dança de salão como qualidade de vida para a terceira idade. **Revista Eletrônica de Educação Física**, UniAndrade, Curitiba, v.2, n.1, 2005. Disponível em<<http://www.unifafibe.com.br/revistasonline/arquivos/revistafafibeonline/sumario/28/11122013185614.pdf>>

JANNUZZI, F. F; CINTRA, F. A. Atividades de lazer em idosos durante a hospitalização. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**. Campinas, SP, p. 179-187, 2006. Disponível em:<<http://www.unifafibe.com.br/revistasonline/arquivos/revistafafibeonline/sumario/28/11122013185614.pdf>>

LEAL, I. J; HAAS, A. N. O Significado da dança na terceira idade. **Revista Brasileira de Ciências do Envelhecimento Humano**. Jan/Jun. Passo Fundo, RS, p.64-71, 2006. Disponível em:<<http://www.unifafibe.com.br/revistasonline/arquivos/revistafafibeonline/sumario/28/11122013185614.pdf>>

LITVOC, J; BRITO, F. C. **Envelhecimento: prevenção e promoção da saúde**. São Paulo: Atheneu, 2004. Disponível em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2006000900034>

LOPES, M. A. **Pessoas Longevas e atividade física: fatores que influenciam a pratica**. 2012. 253 f. Tese (Doutorado em Educação Física) – Universidade Federal de Santa Catarina, 2012. Disponível Em:<<https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/961.pdf?>>

MARQUES, I. **Ensino da dança hoje: textos e contextos**. São Paulo: Cortez, 1999.

NANNI, D. **A dança educação: princípios, métodos e técnicas**. Rio de Janeiro: Sprint, 1995.

NERI AL. **Maturidade e velhice. Trajetórias individuais e socioculturais**. Campinas: Papirus editora; 2001. Disponível em:<seer.ufrgs.br/RevEnvelhecer/article/download/45346/35454>

PAPALÉO NETTO, M. **Gerontologia: a velhice e o envelhecimento em visão globalizada**. São Paulo: Atheneu, 2002. Disponível em:<
<https://www.seer.ufrgs.br/RevEnvelhecer/article/viewFile/11437/10919>>

PIZANO, R; NEVES, G. A; SARTORI, T. A. P. Qualidade de Vida na Terceira Idade: um olhar sobre a dança. EFSesportes.com, **Revista Digital**. Buenos Aires, Ano 15, n. 151, Dezembro. 2010. Disponível em:< <https://www.efdeportes.com/efd151/qualidade-de-vida-naterceira-idade-danca.htm>>

QUEIRÓS, A. A. Ética e Enfermagem. Coimbra: **Quarteto Editora**, Novembro de 2001.

RIBEIRO, J. A. B. et al. Adesão de idosos a programas de atividade física: motivação e significância. **Revista Brasileira de Ciências do Esporte**. Florianópolis, v. 34, n. 4, p. 969-984, MESES 2012. Disponível em:<
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-32892012000400012>

SALVADOR, M. A. A Importância da Atividade Física na Terceira Idade: Uma Análise da Dança Enquanto Atividade Física. **Revista Primeiros Passos**. Universidade do Contestado, Concórdia, 2004. Disponível em:<
http://www.gestaouniversitaria.com.br/system/scientific_articles/files/000/000/396/original/99999999tccc.pdf?1528390426>.

SAMULSKI, D. **Psicologia do esporte**. Barueri: Manole. 2002.

SILVA, A. *et al.* **Benefícios da dança na terceira idade. 2011. Tese (Graduação em Educação Física) – Unidade Universitária de Caldas Novas**, Universidade Estadual do Goiás, Caldas Novas, 2011. Disponível em:<
<http://revista.fametro.com.br/index.php/RDA/article/download/151/159>>.

TADRA, D. S. A. *et al.* **Metodologia do ensino de artes: linguagem da dança**. Curitiba: ibepex, 2009. Disponível em:<
<https://portalseer.ufba.br/index.php/revteatro/article/viewFile/17476/11416>>

VITORELI, E; PESSINI, S; SILVA, M. J. P. A autoestima de idosos e as doenças crônicas degenerativas. **Revista Brasileira de Ciências do Envelhecimento Humano**, Passo Fundo, v. 2, n. 1, p. 102-114, 2005. Disponível em:
<<http://seer.upf.br/index.php/rbceh/article/view/20>>

CAPÍTULO 56

IMPACTO DA COVID-19 NA SAÚDE MENTAL DE CRIANÇAS: REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c56](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c56)

Marília Vasconcelos Costa - Universidade Federal do Ceará (mariliavc111@gmail.com),

Darlene Pinho Fernandes de Moura - Universidade Federal do Ceará

(darlene.fernandes@ufc.br),

Ana Cecília Carvalho Soeiro - Universidade Federal do Ceará (anaceciliasoeiro@gmail.com)

Dágila Vasconcelos Rodrigues - Universidade Federal do Ceará

(dagilavasconcellos@gmail.com)

Antonio Renan Santana - Universidade Federal do Ceará (antoniorenan@outlook.com)

André Sousa Rocha - Universidade São Francisco (andresousarocha9@gmail.com)

Hellyne Maria Teles Aguiar - Universidade Federal do Ceará (hellyne.aguiar@gmail.com)

Esthela Sá Cunha - Universidade Federal do Ceará (esthelas7@gmail.com)

Venícus Bernardo do Nascimento - Universidade Federal do Ceará

(veniciusbernardopsi@gmail.com)

Victória Maria Freitas Pedrosa - Universidade Federal do Ceará

(vicmaripedrosa16@gmail.com)

Resumo: A pandemia da COVID-19 trouxe modificações nos hábitos da população mundial. Dentre as recomendações mais difundidas pelas autoridades em saúde, uma das mais comuns, é a de que as pessoas permaneçam em isolamento, o que trouxe impactos diversos para a saúde mental das crianças. **Objetivo:** O presente trabalho tem como objetivo discutir, com base nas evidências científicas, de que forma as medidas de contenção e isolamento adotadas na pandemia da COVID-19 impactam na saúde mental das crianças. **Método:** Trata-se de uma pesquisa bibliográfica realizada por meio das bases de dados Scielo, Pubmed e LILACS para artigos publicados entre 17 de março de 2020 a 29 de julho de 2021, usando os seguintes descritores, *Infância AND Pandemia* e *Children AND Pandemic*. Inicialmente foram captados 16 artigos relevantes a essa temática. Após seleção de título e resumos, bem como da aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram excluídos 3 artigos por não cumprirem os critérios propostos, de modo que 13 artigos foram lidos na íntegra, dos quais 9 foram considerados para

análise. **Resultados:** Os 9 incluídos estudos relataram o impacto da pandemia na saúde mental de crianças previamente saudáveis. De acordo com a literatura, o isolamento social aumentou o risco de depressão e, conjuntamente, o de ansiedade. Entre os sintomas e alterações comportamentais mais comentados estão: hiper convivência no ambiente intrafamiliar; distanciamento social, alterações na rotina escolar com redução da socialização, desajuste nos horários de sono e de alimentação, aumento do uso de eletrônicos, depressão, ansiedade, entre outros transtornos. **Considerações Finais:** Observou-se uma maior incidência de mudanças de humor, assim como de desordens comportamentais que podem afetar o desenvolvimento infantil. Diante disso, serviços de atenção psicossocial precisam oferecer suporte preventivo, além de estarem preparados para uma maior assistência ao público infantil.

Palavras-chave: COVID-19; Crianças; Saúde Mental.

Área Temática: Ciências da Saúde

E-mail do autor principal: mariliavc111@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

A pandemia da Covid-19 causou mudanças significativas na história mundial recente. Dentre as principais transformações estão o uso de máscaras de proteção, novas formas de interação por meio de veículos digitais e a adoção de métodos de educação e de trabalho remotos (LINHARES e ENUMO, 2020). Nesse sentido, diante do atual cenário, as famílias foram expostas a fatores diretos ou indiretos potencializadores de estresse e problemas emocionais. Dessa forma, as crianças, por encontrarem-se em um período de desenvolvimento, merecem cuidados especiais para preservar e promover sua saúde mental durante as atuais circunstâncias (LINHARES e ENUMO, 2020).

À vista disso, as crianças podem vivenciar neste período situações impactantes no processo de sofrimento, por exemplo: medos; incertezas; mudanças nos hábitos e na rotina familiar; isolamento físico e social; alto nível de estresse parental; e falta de contato com o ambiente escolar (LINHARES e ENUMO, 2020). Em que o público mencionado, pode ter reais dificuldades em adaptações necessárias para o cotidiano, posto que muitas crianças ficam preocupadas perante esse cenário de incertezas, aflitas em relação a seus parentes, às questões inerentes de saúde e à garantia de suprimentos para suas necessidades básicas (DUTRA et al., 2020).

Nesse contexto, parte do público infantil tenta retornar às atividades cotidianas enquanto outra fica desconfortável por conta de uma série de fatores, como o confinamento, a restrição das atividades ao ar livre, bem como a diminuição das interações sociais. Por consequência dessas restrições, as crianças ficam suscetíveis a desenvolver, sobretudo, transtornos emocionais relacionados à depressão, bem como à ansiedade (DUTRA et al., 2020). Além disso, cabe salientar que entre os múltiplos aspectos da cognição de fundamental importância

para a intervenção nos comportamentos e nas crenças dessa faixa etária durante a quarentena estão: a percepção de risco, o conhecimento geral, os estilos cognitivos e a tomada de decisões (VILELAS, 2020).

De acordo com Safadi (2020), muitas das percepções de risco irão se formar com base na confluência entre o acesso à informação e estilos pessoais, que muitas vezes, não são racionais, como crenças e estilos cognitivos que influenciam as escolhas. Portanto, em um contexto no qual as informações podem manipular as noções de risco, crenças e estilos decisórios, o cuidado com o que é transmitido às crianças é extremamente importante. Nesse viés, é necessário que os responsáveis filtrem as informações que chegam aos filhos por meio da televisão, das redes sociais e dos diversos canais de comunicação, dado que a “hiperinformação”, de acordo com Souza et al. (2020), aumenta a frequência de emoções e interpretações negativas, além de interferir negativamente nas relações de obediência e de respeito com os pais.

Ademais, cabe ressaltar as crianças que apresentam pais com transtornos mentais ou usuários de substâncias, posto que evidenciam um risco ainda maior de desenvolver distúrbios de comportamento. Portanto, faz-se necessário, nesse período, uma maior atenção às reações dessas crianças, porque, frequentemente, elas não são expressas verbalmente. Tendo isso em vista, é fundamental abrir um canal de comunicação para que possam tirar suas principais dúvidas e verbalizar quais os sentimentos que possuem em relação a pandemia (GOLBERSTEIN et al., 2020).

A tecnologia, desde que gerenciada pelos pais, também pode ser uma ótima ferramenta, visto que é um meio de interação da criança com seus amigos, professores e familiares mais distantes, além de uma forma de distração para os problemas proporcionados nessas condições atuais (FERNANDES et al., 2020). Desse modo, o presente trabalho tem como objetivo discutir, com base nas evidências científicas, de que forma as medidas de contenção e isolamento adotadas na pandemia da covid-19 impactam na saúde mental das crianças e quais os eventos que proporcionam mudanças de humor e alterações comportamentais.

Então, investigar os fatores que repercutem sobre a saúde mental das crianças em tempos de pandemia é imprescindível, uma vez que, reconhecida as especificidades da infância e os impactos advindos do atual contexto sobre esse grupo também devem ser analisados de forma diferencial. Assim, o presente estudo, ao levantar dados sobre como as crianças estão vivenciando o período pandêmico, bem como o impacto deste sobre a saúde mental desse público pode favorecer o desenvolvimentos de estratégias de enfrentamento ao adoecimento, bem como ações de promoção à saúde e cuidado.

2 MÉTODO

O presente trabalho se trata de uma revisão integrativa da literatura de caráter qualitativo. Estudos dessa natureza têm como principal foco pesquisar e reunir os principais conhecimentos sobre uma determinada área, de modo a fundamentar um estudo significativo (SOUZA et al., 2010). Esta pesquisa ocorreu em julho de 2021. Para a realização da revisão, consultou-se a biblioteca da *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), além das bases de dados *PubMed* e *LILACS*. Para tanto, incluíram-se estudos publicados nos idiomas inglês e português, disponíveis na íntegra para leitura. Logo, excluíram-se trabalhos não revisados por pares e fora do período determinado além daqueles que tratavam de revisões e outros públicos, como por exemplo idosos e profissionais de saúde. Os descritores utilizados foram extraídos dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e do *Medical Subject Headings* (MeSH) e formaram duas combinações, sendo *Infância AND Pandemia* e *Children AND Pandemic*. O operador booleano AND foi utilizado na estratégia de busca para unir os termos na tentativa de recuperar o maior número de investigações sobre o tema proposto.

Quadro 1 - Aplicação da estratégia de busca.

Data	Base de Dados/ Biblioteca Virtual	Termos de Busca	Resultados	Excluídos	Incluídos
13/06/2021	SciELO	Infância and pandemia	6	2	4
17/07/2021	PubMed	Children and Pandemic	3	0	3
29/07/2021	LILACS	Children and Pandemic	3	1	2

Fonte: Elaborado pelos autores (2021)

Inicialmente, recuperaram-se 16 artigos. Após a triagem inicial, com a leitura do título e resumo, excluíram-se 3 trabalhos. Por conseguinte, depois da aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, restaram 9 artigos que foram lidos na íntegra, conforme apresentado no quadro 1. O método de leitura utilizado nos artigos foram interpretação, exploração, bem como a análise minuciosa de cada um. Sendo assim, foram analisados os períodos de publicações dos trabalhos, entre janeiro e julho de 2021, com textos completos e gratuitos disponíveis na internet em português, inglês ou espanhol. Artigos sobre crianças com histórico de doenças mentais não foram incluídos no estudo. Por conseguinte, realizou-se uma revisão dos artigos mais relevantes que foram lidos na íntegra. Desse modo, 9 artigos foram considerados para análise das produções. Anteriormente, houve o processo de tabulação dos estudos que foi separado por

título, ano de publicação, país, metodologia e os principais resultados que podem ser visualizados no Quadro 2.

3 RESULTADOS

Foram encontrados um total de 16 artigos. Após a leitura de títulos e resumos foram excluídos três artigos por não serem compatíveis com a temática da pesquisa. Os treze artigos restantes foram analisados na íntegra e nove deles foram selecionados, já que respondiam à pergunta de partida. A compilação sintética dos nove artigos selecionados para a construção da pesquisa com referências, títulos, objetivos, resultados, tipos de estudo e participantes consta no Quadro 2.

Quadro 2 - Síntese das principais informações dos estudos reportados

Título	Ano	País	Metodologia	Principais Resultados
Repercussions of the COVID-19 pandemic from the childrens' perspective	2020	Colômbia	Estudo Qualitativo	As crianças identificaram pontos positivos e negativos vivenciados durante a pandemia. Além disso, apresentou os desafios de transformar momentos de isolamento social em espaços de proximidade familiar.
Os efeitos da pandemia de COVID-19 na saúde mental das crianças	2020	Brasil	Estudo Qualitativo	Observou-se a necessidade das crianças terem contato com os colegas, os professores e o ambiente escolar. As crianças apresentaram sentir falta da rotina anterior à pandemia.
Desafios cotidianos e possibilidades de cuidado com crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) frente à COVID-19	2021	Brasil	Ensaio Reflexivo	Apresentaram diferentes estratégias de cuidado diante das consequências da pandemia para as crianças e adolescentes com TEA, como por exemplo: organização da rotina, intervenções informacionais e apoio à família.
Reflexões baseadas na Psicologia sobre efeitos da pandemia COVID-19 no desenvolvimento infantil	2020	Brasil	Estudo Reflexivo	O isolamento causa perda de referências externas, como por exemplo a escola, e isso requer uma organização interna tanto no sentido de estruturação do ambiente doméstico, quanto do fortalecimento dos recursos pessoais e da rede familiar. Por fim, o texto apresenta algumas medidas para manter a estabilidade, estruturação e

				organização do ambiente doméstico.
Distanciamento social COVID-19 no Brasil: Efeitos sobre a rotina de atividade física de famílias com crianças	2020	Brasil	Estudo Qualitativo	Os pais consideram que houve redução no tempo em que as crianças passam praticando alguma atividade física e aumento do tempo lúdico de tela e das atividades em família. Tendência de diminuição do tempo de atividade física na infância
The intriguing features of COVID-19 in children and its impact on the pandemic	2020	Brasil	Editorial	As crianças raramente experienciam a forma mais grave da doença. As manifestações da COVID-19 são mais leves nas crianças.
O novo coronavírus e o risco para a saúde das crianças	2020	Portugal	Editorial	A infecção das crianças causada pela COVID-19 são inferiores quando comparadas com as taxas nos adultos.
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) and Mental Health for Children and Adolescents	2020	Estados Unidos	Artigo de opinião	O fechamento das escolas pode ocasionar impactos na saúde mental das crianças. A pandemia de COVID-19 traz grandes repercussões para a saúde e bem-estar das crianças e adolescentes
Impact of COVID-19 on children: special focus on the psychosocial aspect	2020	Estados Unidos	Estudo Reflexivo	As crianças apresentam desânimo com a paralisação das atividades do seu cotidiano, com o confinamento em casa e o medo da incerteza sobre a pandemia. Propostas de intervenções direcionadas para as crianças durante o período pandêmico.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Entre os artigos selecionados, todos correspondem a publicações em nove periódicos diferentes: Brazilian Journal of Occupational Therapy, Minerva Pediátrica, Jama Pediatrics, Pedagogia em Ação, Estudos em Psicologia. (Campinas), Revista Paulista de Pediatria, J. Pediatr. (Rio de Janeiro), Aquichan, Revista Latino-Americana de Enfermagem. No que se refere à metodologia, foram utilizados três estudos qualitativos, dois estudos reflexivos, um ensaio reflexivo, dois editoriais e um artigo de opinião.

4 DISCUSSÃO

O perigo relacionado à possibilidade de contaminação, intensificado pela ameaça de morte proporcionada pelo vírus e somado às cenas exibidas na mídia de hospitais lotados,

podem impactar seriamente a saúde mental das crianças, causando percepções constantes de medo e ansiedade (SAFADI, 2020). Além disso, as alterações comportamentais proporcionadas pelo isolamento social, o excesso de informações, aliada às alterações de rotina, poderão ser processadas de tal forma que podem gerar estresse (SAFADI, 2020).

Nesse sentido, quando os estímulos que chegam ao cérebro da criança são intensos, ou quando a criança tem percepções disfuncionais por conta das dificuldades de processar as informações sobre o atual cenário pandêmico. Tendo em vista que elas ainda não possuem recursos cognitivos para compreenderem algo tão abstrato como o contexto da pandemia, poderão ser percebidos altos níveis de estresse que podem propiciar o surgimento de transtornos mentais (SAFADI, 2020).

No que concerne à rotina das crianças durante a pandemia, Sa et al. (2021) comparou os efeitos do isolamento decorrente da covid-19, aos observados em férias e temporadas em casa, como o aumento de peso corporal, tempo de uso prolongado de *tablets* e celulares, além de sono irregular. Desse modo, os autores apontam como alternativas para amenizar esses efeitos, a prática de atividades físicas em lugares abertos, bem como estimular as crianças a participarem das tarefas de casa e das atividades em família. Aliado a essa orientação, a participação dos pais e o envolvimento da criança nessas atividades também auxiliam no cotidiano e no aprimoramento da sua autonomia tanto para a realização do autocuidado quanto para a colaboração no cotidiano com toda a família (SA et al., 2021).

Ademais, há ainda os grupos que estão mais vulneráveis nesse período, que são os que possuem algum tipo de deficiência ou problemas de saúde; aqueles que vivem em situação socioeconômica baixa ou os que já costumam ser isolados socialmente. Além disso, crianças cujos pais são profissionais de saúde que estão afastados por conta da ameaça do risco de infecção ou que os pais foram infectados e ficaram profundamente doentes ou morreram (GHOSH, 2020). Como consequência dessas variáveis e fatores de vulnerabilidade, as crianças podem apresentar diversos sintomas e transtornos como ansiedade, depressão, estresse, irritabilidade, apatia, hipersensibilidade emocional, dificuldade de concentração, assim como atraso no desenvolvimento cognitivo (GHOSH, 2020).

Desse modo, é fundamental que os responsáveis procurem identificar essas mudanças, atentando-se às alterações emocionais da criança e como ela se comporta no dia a dia (FERNANDES et al., 2020). A melhor alternativa é trabalhar na prevenção, na identificação precoce, no intuito de aumentar as possibilidades de intervenção sobre esses problemas, acionando dispositivos psicológicos e sociais de suporte, bem como oferecendo cuidados

voltados à amenização e à prevenção dos impactos que o atual período pode proporcionar ao desenvolvimento dos infantes a curto e longo prazo (GHOSH, 2020).

Além disso, no que diz respeito ao uso dos dispositivos eletrônicos por causa do isolamento, esse consumo pode ser mais flexibilizado (SAFADI, 2020). Contudo, é fundamental a supervisão dos pais para as filhas não ficarem vulneráveis a assediadores por meio dos jogos virtuais e dos bate-papos em aplicativos, bem como a tentativas de golpes ou uso indevido de dados. Nessas circunstâncias, Souza et al. (2020) sugerem algumas medidas de cuidados para os responsáveis que envolvem sustentar uma comunicação aberta e sincera sobre as experiências presenciadas na *internet* durante o período, além de ensinar os filhos a diferenciar as fontes confiáveis das não confiáveis e de terem cautela com o uso de dados e o envio de fotos. Outrossim, é fundamental presenciar e compreender a forma como as crianças navegam na *internet*, além do tipo de conteúdo que acessam (VILELAS, 2020).

Destarte, não é possível prever como a pandemia de covid-19 poderá afetar as populações. Todavia, infere-se que poderão ser percebidas alterações de comportamento e diferentes perspectivas sobre esse cenário por parte das crianças (SOUZA; POTRICH; BRUM; HEIDEMANN; ZUGE; LAGO, 2020). Diante disso, é preciso trabalhar para atenuar esses impactos, utilizando o momento para desviar a atenção das crianças em relação ao medo e ansiedade, buscando focar em atividades criativas e divertidas para que esse seja um momento de desenvolvimento, de boas experiências e então, garantir que uma "segunda onda" da pandemia relacionada aos transtornos mentais seja prevenida (SOUZA; POTRICH; BRUM; HEIDEMANN; ZUGE; LAGO, 2020).

5 CONCLUSÃO

Diante do supracitado, é notório que os impactos ocasionados pelo vírus da covid-19 permanecerão e afetarão diversas esferas do país, na saúde, no desenvolvimento das crianças, em especial, na parte da população mais vulnerável no quesito psicossocial. Entre essas alterações, consta o isolamento, que apesar de ser a principal medida de proteção contra a covid-19, é também um fator que pode propiciar impactos significativos na saúde mental de todas as faixas etárias (GOLBERSTEIN et al., 2020).

Neste artigo, foram esclarecidos fatores que podem afetar as mudanças comportamentais e de humor das crianças durante a pandemia. Entre esses, há o fato de estarem lidando com modificações estruturais no cotidiano, aliado às alterações na rotina escolar sem possibilidade de socialização, o que pode ocasionar mudanças de humor, sintomas de estresse elevado e até depressão (VILELAS, 2020). Tendo isso em vista, é importante os pais estarem

atentos às mudanças comportamentais de seus filhos, posto que as crianças estão em desenvolvimento e, promover saúde mental nesta faixa etária, possibilitará melhor saúde nas outras fases da vida (GOLBERSTEIN et al., 2020).

Portanto, é imprescindível acionar os dispositivos psicossociais, os pediatras e a equipe de saúde mental para atender as demandas e, a partir disso, propiciar um suporte para as crianças lidarem com a situação (GOLBERSTEIN et al., 2020). Os achados deste estudo podem contribuir para avanços no campo científico e da saúde na medida em que sumariza os impactos do contexto pandêmico sobre a saúde mental infantil. Assim, coloca-se como horizonte de investigação pesquisas que aprofundem a relação entre as variáveis citadas neste estudo e o surgimento/acentuamento de transtornos mentais nessa faixa etária. Além disso, os resultados mencionados podem proporcionar aos profissionais de saúde subsídios importantes de atenção à saúde da criança para que se possa pensar em futuros planos de intervenções junto para essa população.

REFERÊNCIAS

DUTRA, J. L. C.; CARVALHO, N. C. C.; SARAIVA, T. A. R. Os efeitos da pandemia de COVID-19 na saúde mental das crianças. *Pedagogia em Ação*, Minas Gerais, v. 8, n. 3, p. 293-301, set. 2020.

FERNANDES, A. D. S. A.; SPERANZA, M.; MAZAK, M. S. R.; GASPARINI, D. A.; CID, M. F. B. Desafios cotidianos e possibilidades de cuidado às crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) frente à COVID-19. *Brazilian Journal of Occupational Therapy*, [S.L.], v. 1, n. 1, p. 1-19, 13 jul. 2020. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/scielopreprints.955>.

GHOSH, R.; DUBEY, M. J.; CHATTERJEE, S.; DUBEY, S. Impact of COVID -19 on children: special focus on the psychosocial aspect. *Minerva Pediatrica*, [S.L.], v. 72, n. 3, p. 226-236, 02 jun. 2020. Edizioni Minerva Medica. <http://dx.doi.org/10.23736/s0026-4946.20.05887-9>.

GOLBERSTEIN, E.; WEN, H.; MILLER, B. F.. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) and Mental Health for Children and Adolescents. *Jama Pediatrics*, [S.L.], v. 174, n. 9, p. 819-831, 1 set. 2020. American Medical Association (AMA). <http://dx.doi.org/10.1001/jamapediatrics.2020.1456>.

LINHARES, M. B. M.; ENUMO, S. R. F.. Reflexões baseadas na Psicologia sobre efeitos da pandemia COVID-19 no desenvolvimento infantil. *Estud. psicol. (Campinas)*, Campinas, v. 37, e200089, 2020. <https://doi.org/10.1590/1982-0275202037e200089>.

SA, C. S. C.; POMBO, A.; LUZ, C.; RODRIGUES, L. P.; CORDOVIL, R. Distanciamento Social COVID-19 no Brasil: Efeitos sobre a rotina de atividade física de famílias com

crianças. **Rev. paul. pediatr.**, São Paulo, v. 39, e2020159, 2021.
<https://doi.org/10.1590/1984-0462/2021/39/2020159>.

SAFADI, M. A. P. As características intrigantes da COVID-19 em crianças e seu impacto na pandemia. **J. Pediatr. (Rio J.)**, Porto Alegre, v. 96, n. 3, p. 265-268, June 2020.
<https://doi.org/10.1016/j.jped.2020.04.001>.

SOUZA, J. B. E; POTRICH, T.; BRUM, C. N.; HEIDEMANN, I. T. S. B.; ZUGE, S. S.; LAGO, A. L.. Repercussions of the COVID-19 pandemic from the childrens' perspective. **Aquichan**, [S.L.], v. 20, n. 4, p. 1-11, 4 dez. 2020. Universidad de la Sabana.
<http://dx.doi.org/10.5294/aqui.2020.20.4.2>.

SOUZA, M. T.; SILVA, M. D.; CARVALHO, R. Revisão Integrativa: o que é e como fazer. **Einstein (São Paulo)** [online]. 2010, v. 8, n. 1, pp. 102-106. <https://doi.org/10.1590/S1679-45082010RW1134>.

VILELAS, J. M. S.. O novo coronavírus e o risco para a saúde das crianças. **Rev. Latino-Am. Enfermagem**, Ribeirão Preto, v. 28, e3320, 2020. <https://doi.org/10.1590/1518-8345.0000.3320>.

CAPÍTULO 57

IMPACTO DO PRÉ-ATENDIMENTO REMOTO ODONTOLÓGICO EM TEMPOS DE PANDEMIA DO COVID-19: REVISÃO INTEGRATIVA

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c57](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c57)

Geovana Bezerra Brum Lima¹, Isis Samara de Melo Queiroga², Renata Araújo Gomes de Sá³, Marleny Elizabeth Márquez de Martínez Gerbi⁴, Fernanda Campos de Almeida Carrer⁵, Mary Caroline Skelton Macedo⁶, Maria Regina Almeida de Menezes⁷

¹Faculdade de Odontologia de Pernambuco, (geovana.brum@upe.br)

²Faculdade de Odontologia de Pernambuco, (dulceisis@gmail.com)

³Faculdade de Odontologia de Pernambuco, (renata.sa@upe.br)

⁴Faculdade de Odontologia de Pernambuco, (marleny.gerbi@upe.br)

⁵Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (mary@usp.br)

⁶Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (fernandacsa@usp.br)

⁷Faculdade de Odontologia de Pernambuco, (regina.menezes@upe.br)

Resumo

Objetivo: O objetivo desse estudo foi realizar uma revisão integrativa da literatura atual sobre o uso do pré-atendimento odontológico remoto durante a pandemia do COVID-19. **Método:** Foi feita uma pesquisa dos artigos nas bases de dados eletrônicas CAPES, PubMed e Medline, utilizando os descritores: “Teleodontologia”, “Atenção Primária à Saúde” e “COVID-19”, indexados no período de 2016 a maio de 2021, que se tratavam de revisões de literatura, relatos de experiência, relatos de caso, estudos retrospectivos, estudos prospectivos e cartas ao leitor. Após os critérios de elegibilidade, foram analisados 11 artigos publicados integralmente na língua inglesa e portuguesa. **Resultados:** A pandemia do COVID-19 causou grande turbulência não só na vida das pessoas, como também em todo o sistema de saúde, e devido à forma de transmissão dessa doença, uma das áreas mais afetadas pela pandemia foi para a odontologia. Existem, assim, diversos estudos mostrando o impacto positivo do teleatendimento para a odontologia e para os pacientes odontológicos, principalmente no contexto da pandemia, se tornando relevante devido ao seu grande potencial de uso como tecnologia alternativa auxiliar e renovadora do sistema nacional de saúde mesmo após fim da pandemia. **Conclusão:** Portanto, essa tecnologia apresenta benefícios como o alcance territorial ampliado, melhora na comunicação entre os envolvidos, controle no fluxo de atendimento emergencial e redução dos custos com EPIs, além do suporte na continuidade de tratamentos e monitoramentos de doenças crônicas, mesmo que ainda existam algumas limitações como a necessidade de um grande investimento inicial, o treinamento e a segurança de dados.

Palavras-chave: Teleodontologia; Atenção Primária à Saúde; COVID-19.

Área Temática: Ciências da Saúde.

E-mail do autor principal: dulceisis@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

A disseminação do novo coronavírus levou a Organização Mundial da Saúde em janeiro de 2020 a decretar como estado de emergência internacional, após alcançar todos os continentes devido à transmissão exponencial de humano a humano e à alta letalidade. (Maspero, C. et. al., 2020). Esse vírus tem como alvo primário o aparelho respiratório, espalhado por gotículas de secreção bucais e nasais com efeitos locais e sistêmicos em decorrência da sobrecarga imunológica de citocinas pro-inflamatórias podendo levar a intubação e morte, a depender do grau (Dauma, R.P. et. al., 2020). No contexto brasileiro, em abril de 2020, segundo o IBGE a doença já havia alcançado todas as Regiões urbanas ou rurais do país. (Floss, M. et. al. 2020). Paralelamente a isso, o atendimento odontológico presencial não emergencial foi suspenso, em virtude do elevado risco de contaminação e infecção cruzada exigindo medidas de biossegurança e controle epidemiológico como o uso de máscara e outros EPIs (Equipamentos de Proteção Individual); isolamento social, por vezes obrigatório; e higienização das mãos, ambientes e equipamentos pelos profissionais atuantes. (Sarti, T.D. et al., 2020).

Diante disso, a logística de atuação do SUS, apresenta-se como instrumento essencial de promoção da saúde no país como afirma o Art. 196 da Constituição Federal: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação” a partir da Atenção Primária à Saúde (APS) em plena execução em conjunto para evitar o colapso do sistema. (Medina, M.G. et. al. 2020). Para tanto, o pré-atendimento remoto odontológico emerge como opção alternativa como: teleorientação, teleconsulta, telemonitoramento e telerrastreamento, os quais foram aceitos pelo Conselho Federal de Odontologia com a Resolução 228- CFO em 16 de julho de 2020 no atendimento odontológico e-SUS, constando no Guia de Orientações para Atenção Odontológica no Contexto da COVID-19 do Ministério da Saúde. (Carrer, F. et. al., 2020).

Diante do contexto, esse método se torna relevante por poder rastrear, monitorar, prevenir e promover a saúde em todo território brasileiro, equilibrar o fluxo emergencial,

reduzir o contato físico, promover atendimento continuado, além de contribuir com os protocolos de biossegurança exigidos no transcorrer da pandemia COVID-19. Gerando, pois, impactos na sociedade atual e futuramente apesar de limitações como a necessidade de treinamento, adequar os espaços físicos e rotina, além da resistência de muitos profissionais e gestores de serviços. (Harzheim, E. et. al., 2020). Essa revisão integrativa, portanto, objetiva explorar o impacto do pré-atendimento on-line como modalidade promissora para o Atendimento Primário à Saúde no cenário da pandemia COVID-19, além de destacar seus benefícios, limitações, relevância e impacto social e no campo da odontologia.

2 MÉTODO

O presente estudo se trata de uma revisão integrativa da literatura, executada por meio da busca de artigos científicos nas bases de dados eletrônicas PubMed, Medline e Capes, fazendo uso dos descritores “Teleodontologia AND Atenção Primária à Saúde AND COVID-19” e seus equivalentes na língua inglesa “Teledentistry AND Primary Health Care AND COVID-19”, com as associações e combinações de interesse dos autores sendo uma metodologia qualitativa, com método de coleta por amostragem. (Pereira A.S. et. al., 2018).

A partir da busca de artigos científicos nas plataformas acima mencionadas, no período de 2016 a maio de 2021, utilizando o descritor “Teleodontologia”, foi obtido um total de 425 artigos. Após a junção desse descritor com “Atenção Primária à Saúde”, obteve-se 114 resultados, seguido de “COVID-19”, chegando a 49, dos quais após análise criteriosa 11 artigos foram incluídos. O processo de seleção dos artigos foi realizado por duas pesquisadoras, de forma independente, com uma subsequente comparação dos resultados para haver selecionados em comum acordo. Assim os listados repetidamente foram considerados uma única vez e conduzida em duas etapas: (1) leitura dos resumos dos artigos, e (2) análise qualitativa dos artigos na íntegra. Essa busca inicial é ilustrada abaixo na figura 1.

Figura 1. Fluxograma de estratégia de busca nas bases de dados

Fonte: Autores, 2021.

Para a escolha das fontes, foram consideradas como critérios de inserção dos artigos originais, publicados na língua inglesa e portuguesa e indexados no período de 2016 a maio de 2021, os quais tratavam de revisões de literatura, relatos de experiência, carta ao editor, relatos de caso, estudos retrospectivos e estudos prospectivos como ilustra a figura 2.

Figura 2. Fluxograma de estratégia de busca e seleção dos artigos

Fonte: Autores, 2021

Esta metodologia seguiu as recomendações PRISMA adaptada para a revisão integrativa. Os artigos incompatíveis com os critérios de inclusão foram excluídos. Em seguida, dos artigos restantes, foi realizada a leitura de forma integral, chegando à quantidade final de artigos incluídos nesta revisão.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Seguindo os critérios de exclusão, não foram utilizados estudos de teses, dissertações, monografias, estudos com animais, nem estudos-piloto em razão da busca desses estudos ser inexecutável logisticamente, as bases de dados utilizadas na pesquisa não possuem esse tipo de publicação Assim, resultado de material incluso segue abaixo no Quadro 1.

Quadro 1. Seleção dos artigos de acordo com o autor, objetivos, metodologia, resultados e conclusão.

Autor e Ano	Objetivo	Metodologia	Resultados	Conclusão
Carrer, Fernanda et. al. (2020)	Analisar estratégias da Teleodontologia, como ferramenta para a oferta do cuidado em saúde bucal em pandemia de COVID-19 e pós-pandemia nas diretrizes do SUS.	Feitas pesquisas eletrônica e manual de 43 fontes bibliográficas de artigos completos, protocolos e diretrizes aplicados ao contexto do Sistema Único de Saúde.	Mostrou-se eficaz no custo e na disseminação do acesso, sendo um meio de democratização e equidade, com vantagens: Maior resolatividade, menor tempo de espera e dos custos de tratamento, além de eficiente na triagem de lesões orais.	Grande potencial para o enfrentamento do contexto global e do Brasil da crise sanitária, de acúmulo e atraso diagnóstico e necessidades ao permitir a retomada parcial do cuidado em saúde bucal da APS no SUS, sendo preciso revisar a portaria para incluir e aumentar os possíveis procedimentos.
Maspero, Cinzia et. al. (2020)	Analisar o serviço de teleodontologia ortodôntica, tipo de intervenção, resultados clínicos, benefícios, eficácia e eficiência dos métodos avaliados comparados ao método tradicional.	Realizar uma Revisão de literatura de 12 artigos seguindo à diretriz do tipo PRISMA e Avaliação de Métodos Mistos (MMAT). (Medline, Pubmed, Ovid, Embase, Cochrane Library, EBM Reviews, Web of Science e Google Scholar).	Benefícios na ortodontia, odontopediatria e periodontia: o manejo à distância, confiar e proximidade, acompanhar, diagnóstico facilitado por registros digitais texto e imagem Whatsapp (eficiência e impacto social, econômico, tecnológico mantendo a qualidade e aprovação).	Apesar das limitações na falta de artigos de metodologias mais concretas e a ida ao consultório como essencial no tratamento, na ortodontia é promissor. Relevância, pandemia COVID-19 na redução do tempo de atendimento, espera, triagem dos casos de emergência reduzindo riscos e custos.
Fiehn, Rebekah et. al. (2020)	Exibir tendências das ocorrências e procedimentos emergenciais entendendo melhor a frequência de atendimentos na assistência pública Medicaid nos EUA aprimorar o atendimento na pandemia ou não.	Reinvindicações: dentistas e farmacêuticos pela IBM Watson MarketScan Research base de dados Multi-State Medicaid Database de 01/01/2013 até 31/12/2017 de 13 Estados dos EUA anônimos, analisados pelo CDT Codes (código de identificação de emergência odontológica).	Com 12 milhões de Medicaid inscritos em 2016 dos quais 3,9 milhões visitaram um dentista e 649.442 tiveram consulta odontológica de emergência, mais paciente de etnia negra, procedimentos adicionais como radiografias, extra e intraorais em 61% das crianças e 68% em adultos com retorno em 78% no prazo de 365 dias e 16% em 15 dias.	Devido à baixa recorrência emergência, telodontologia, que apesar das barreiras financeiras, é promissora, para a conexão rápida, direta e eficaz com o paciente, e reduz os riscos de exposição e as demandas nos serviços de emergência tanto em pandemia COVID-19 (controle da infecção), quanto no pós-pandemia melhorando, manejo e triagem nas emergências.
Gaffar, Balgis et. al. (2020)	Realizar análise SWOT situacional mediante os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças nas instalações odontológicas na pandemia COVID-19 (avaliação interna e externa).	Revisão de literatura de cartas aos editores e comentário governamental, diretrizes internacionais e 76 artigos em inglês de dezembro de 2019 e abril de 2020 (Pubmed, Google Scholar e Site do Ministério da Saúde e da Associação Odontológica Internacional).	Pontos fortes: cumprimento de protocolos de biossegurança e equipes multiprofissionais no monitoramento. Pontos fracos: natureza do atendimento e preparações de higiene. Ameaças: abalo financeiro, escassez de profissionais, custos com EPIs, insegurança cibernética. Oportunidade: atendimento remoto e móvel.	Promissora e aplicável, apesar de exigir aporte financeiro, treinamento adequado e cuidado à segurança virtual. Evitando o agravamento do colapso no contexto de pandemia COVID-19 na maiorias sistemas de saúde o uso desse recurso permite reduzir as ameaças e pontos fracos identificados na análise SOWT.
Al-Khalifa	Identificar, explorar as percepções e experiência com a	Estudo transversal prospectivo, questionário eletrônico (26 perguntas)	Preferiu-se mídia social, e-mail e telefone, preocupados em 80% com a confidencialidade	Apesar das preocupações a tecnologia é considerada valiosa na melhoria nos atendimentos

, K. S. (2020)	teteodontologia pelos profissionais da Arábia Saudita; observar benefícios, limitações aplicadas (pandemia COVID-19).	enviado por e-mail a 1000 profissionais randômicos da Arábia Saudita, (28,6% gerou feedback) de março a abril de 2020, 5 pontos de análise às percepções de utilidade da teledontologia e seu impacto.	no uso dos dados, consentimento dos pacientes, incompatibilidade de hardware e software. Reduz listas de espera e custo, melhora relação, triagem alcance rural e biossegurança.	práticos odontológicos. Para seu aprimoramento 60% concordam com a criação de planos de saúde e seguros odontológicos que incluam treinamento e capacitação, protocolos e diretrizes.
Muñoz, Miguel -Angel (2020)	O objetivo deste estudo foi refletir a respeito das adaptações do atendimento primário e dos profissionais pandemia COVID-19 Barcelona.	Realizou-se uma Carta para o Editor com o uso de um artigo publicado por Sutter et. al. e duas outras bibliografias respondendo questionamentos a respeito das influências da pandemia COVID-19 na atenção primária e sua importância.	Identificou-se medo dos pacientes e profissionais ao contato presencial, restrição dos exames clínicos, aplicação dos protocolos de segurança, falta de EPIs, aumento de 68% atendimentos, desconfortos emocionais e físicos. Atendimento remoto e residencial.	Os profissionais da APS se adaptaram. O teleatendimento permitiu ensinar sobre sintomas e cuidados de higiene, manter os protocolos de segurança, dar apoio emocional, fazer triagem para o atendimento presencial, cuidados paliativos e realizar de procedimentos clínicos básicos na APS.
Sarti, Thiago Dias et. al. (2020)	Discutir alguns aspectos relativos à organização da APS e seu papel diante dos desafios impostos pela Covid-19 no Brasil.	Foi feita uma pesquisa bibliográfica que incluiu 18 artigos indexados entre 2017 e 2020.	Telessaúde mais ampla no Sistema Único de Saúde (SUS) e na APS. Pode melhorar o acesso, capacidade resolutiva, integralidade e abrangência do atendimento, comodidade para os usuários, melhorar acompanhamento de doentes crônicos.	A APS precisou ajustar o fluxo de pacientes e adotar estratégias de telessaúde. Mas precisou investimentos do Ministério da Saúde, na garantia do acesso à internet nos centros de saúde, aquisição de computadores e telefones e criação de prontuário eletrônico interligado ao e-SUS solicitando receitas e exames.
Dauma, Regina Paiva et. al. (2020)	Evidenciar o papel da atenção básica no sistema de saúde brasileiro no enfrentamento ao COVID-19, destacando suas possibilidades e limites.	O artigo analisou 25 artigos indexados entre 2016 e 2020, em bases de dados eletrônicas, sites oficiais do governo e revistas.	Identificar casos suspeitos e monitorar evolução clínica dos pacientes, indivíduos com outras doenças em condição estável, conduzir teleconsultas de casos complexos, encaminhar a hospitais quando necessário, atender demandas medicamentosas e algumas avaliações clínicas.	A adoção da telessaúde evita restrição completa no acesso aos serviços, mais econômica e segura. Para sua execução é imprescindível investimentos em veículos de atendimento domiciliar, estruturas de atendimento externo, celular e acesso gratuito à internet aos usuários da APS.
Medina, Maria Guadalupe et. al. (2020)	Analisar possíveis ações dos serviços de APS da rede do Sistema Único de Saúde (SUS). Contribuir no controle epidêmico garantir a atenção diária e capilar.	O trabalho analisou 13 artigos indexados no período de 2018 e 2020 obtidos da base de dados eletrônica do portal Fiocruz e trechos de debate.	Proporcionam segurança, tratamento contínuo de pacientes com COVID-19 e outras doenças evitando seu agravamento. APS precisam ser integradas às emergências gerenciando leitos e transporte de pacientes em intervenções para populações vulneráveis,	A atual crise planetária de saúde, política, econômica e social exige inovação no funcionamento e radicalização da lógica de intervenção comunitária no exercício de novas formas de sociabilidade e solidariedade.
Floss, Mayara et. al. (2020)	Descrever desafios enfrentados pelos médicos de família identificar propostas tendo a APS como espinha dorsal das práticas em localidades rurais e remotas durante a pandemia COVID-19.	Discute a visão de médicos de família e comunidade de diferentes regiões do Brasil, com experiências no cuidado ao PCFA no Sistema Único de Saúde (SUS), e analisa 19 artigos indexados entre 2014 e 2020.	A existência do COVID-19 evidencia a necessidade da continuidade do cuidado remoto nas APSs. E isso já é aplicado pelas equipes de saúde rurais com sucesso. Comunidades remotas apresentam dificuldades maiores, como a instabilidade dos sinais de telefone, internet e visitas domiciliares.	Para a assistência integral, a educação permanente estratégias de gestão garante a qualificação dos profissionais junto ao Centro de Apoio à Saúde da Família, parcerias com universidades, a teleconsulta, a adaptação de protocolos, além da capacitação para atuação em territórios rurais ou remotos,
Harzheim, Erno	Propor um conjunto de ações federais	Foram analisados 10 artigos no núcleo temático	Priorizar subgrupos de maior risco nos locais com maior	Essa estratégia proporcionará o isolamento de casos leves,

et. al. (2020)	para fortalecer a resposta da APS no combate à pandemia do COVID-19.	da atenção primária à saúde e do enfrentamento do COVID-19, indexados entre 2019 e 2020.	incidência de COVID-19, investigar casos suspeitos, acompanhar, , encaminhar ao hospital, nivelar a curva epidemiológica, reduzir ocupações de UTI, isolar casos confirmados e ajudar nos testes em massa.	reduzirá a disseminação da doença, manterá trabalho em saúde, transformará e expandirá registro e cuidados em APS, aumentando o alcance e consolidando as tecnologias em informação, vigilância, cuidados e prestação de saúde.
-------------------	--	--	--	---

É possível destacar como benefícios atribuídos à aplicação dessa tecnologia o maior alcance interventivo no fluxo de pessoas nas UTIs, essencial na redução da sobrecarga nos hospitais e da exposição desnecessária dos pacientes e profissionais ao risco de infecção como elenca Fiehn, R. et. al. (2020), impactando no achatamento da curva epidemiológica segundo Dauma, R.P. et. al. (2020), o que corrobora com Maspero, C. et. al. (2020), sobre a gestão emergencial, instrução das medidas de biossegurança e realização de exames iniciais por imagem e suporte quando há alto grau de ansiedade como destaca Sarti, T.D. et. al. (2020).

Destaca-se, também, pontos de relevância confirmados por Carrer, F. et. al. (2020), como o rompimento de barreiras geográficas, melhora no atendimento de pacientes acamados ou com necessidades especiais ao promover o autocuidado e orientação familiar, além de planejamento inicial terapêutico e monitoramento remoto periódico de doenças crônicas promovendo saúde de forma continuada pela APS e centros adjacentes do SUS mencionados por Harzheim, E. et. al. (2020).

Em consonância com tais afirmações Al-Khalifa, K.S. (2020) aponta cerca de 70% dos profissionais da odontologia em seu estudo reconhecem os benefícios do pré-atendimento remoto para residentes rurais ou remotos e ressalta sua alta relevância para a odontologia comunitária de instrução e higiene dental orientada, bem aceito pela maioria dos pacientes. Entretanto, apresenta como limitação segundo 80% dos profissionais de saúde entrevistados a falta de segurança e confiabilidade dos softwares concordando com Maspero, C. et. al. (2020), que recomenda o uso de firewall e antivírus, bem como ressalta o aumento no tempo de tratamento devido à necessidade de encontros periódicos e detalhados.

Ademais, Gaffar, B. et. al. (2020), elenca comodidade e capacidade de armazenamento de informações; reduzindo o tempo gasto de espera e atendimento, listas de espera e custos com EPI; além da promoção do alívio de sintomas e melhora na interação entre os envolvidos, apesar do distanciamento social, corroborando com o identificado por Floss, M. et. al. (2020).

Quanto às limitações de seu uso Sarti, T.D. et. al. (2020), destaca a necessidade de investimentos maciços do Ministério da Saúde para equipar profissionais e moradores de áreas rurais ou remotas com computadores, telefones e rede de internet móvel e wi-fi estáveis como assegura Floss, M. et. al. (2020), para uma comunicação satisfatória. Ademais, o treinamento para seu uso adequado e o estabelecimento de um modelo eletrônico de prontuário e protocolo com assinatura eletrônica são essenciais para a correlação do histórico de saúde completo do paciente para emissão de receita e pedido de exames.

Somado a isso, segundo Muñoz, Miguel-Angel (2020), as alterações na rotina devido ao isolamento social e o medo da infecção gerou aumento expressivo de 68,3% na demanda do Teleatendimento no início da pandemia exigindo a atuação diária e intensa dos profissionais. Como consequência disso, Gaffar, B. et. al. (2020), ressalta o estresse gerador de crises de Bornout e afastamento precoce dos profissionais por sobrecarga emocional. Para tanto, Medina, M.G. et. al. (2020), destaca a importância da capilaridade no atendimento entre os diversos setores da APS para o apoio mútuo entre pacientes e profissionais no enfrentamento da crise sanitária, social, política e econômica atendendo às heterogêneas demandas e reduzindo desigualdades no atendimento odontológico público atual e futuro.

4 CONCLUSÃO

A partir do quadro exposto nessa revisão integrativa de literatura é possível identificar a importância sanitária, econômica e política do pré-atendimento remoto para a odontologia aplicada ao Atendimento Primário à Saúde no cenário da Pandemia COVID-19. Isso, pois, apresenta alcance territorial ampliado, melhora na comunicação entre os envolvidos, controle no fluxo de atendimento emergencial e redução dos custos com EPIs, além do suporte na continuidade de tratamentos e monitoramentos de doenças crônicas. Portanto, o uso desse mecanismo em conjunto com os demais setores do SUS, centros educacionais e a própria população impactam o modo de enfrentamento da pandemia e o posterior modelo de promoção da saúde, que apesar das limitações de investimento, treinamento e segurança de dados é tida como relevante no controle epidemiológico e promissora no aporte assistencial à saúde promovendo longevidade com qualidade de vida a todos no território nacional.

Portanto, aos futuros trabalho referentes à temática é sugerida a análise técnica detalhada da confiabilidade dos meios tecnológicos, a construção de protocolos de atuação e a realização de estudos comparativos quanto à prática presencial, a favor do embasamento prático a respeito da

sua aplicação do pré-atendimento remoto na Atenção Primária à Saúde tanto durante a pandemia COVID-19, quanto posteriormente.

REFERÊNCIAS

AL-KHALIFA, K. S.; ALSHEIKH, R. Teledentistry awareness among dental professionals in Saudi Arabia. **PloS one**, v. 15, n. 10, p. e0240825, 2020.

CARRER, F. C. A. et al. Teledentistry and the Unified Health System: An Important Tool for the Resumption of Primary Health Care in the Context of the COVID-19 Pandemic. **Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clínica Integrada**, v. 20, 2020.

DAUMAS, R. P. et al. The role of primary care in the Brazilian healthcare system: limits and possibilities for fighting COVID-19. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 36, p. e00104120, 2020.

FIEHN, R. et al. Emergency and urgent dental visits among Medicaid enrollees from 2013 to 2017. **BMC oral health**, v. 20, n. 1, p. 1-7, 2020.

FLOSS, M. et al. The COVID-19 pandemic in rural and remote areas: the view of family and community physicians on primary healthcare. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 36, p. e00108920, 2020.

GAFFAR, B. et al. Dental Facilities During the New Corona Outbreak: A SWOT Analysis. **Risk Management and Healthcare Policy**, v. 13, p. 1343, 2020.

HARZHEIM, E. et al. Federal actions to support and strengthen local efforts to combat COVID-19: Primary Health Care (PHC) in the driver's seat. **Ciencia & saude coletiva**, v. 25, p. 2493-2497, 2020.

MASPERO, C. et al. Available technologies, applications and benefits of teleorthodontics. A literature review and possible applications during the COVID-19 Pandemic. **Journal of clinical medicine**, v. 9, n. 6, p. 1891, 2020.

MEDINA, M. G. et al. Primary healthcare in times of COVID-19: what to do?. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 36, p. e00149720, 2020.

MUÑOZ, M.; LÓPEZ-GRAU, M. Lessons learned from the approach to the COVID-19 pandemic in urban primary health care centres in Barcelona, Spain. **The European journal of general practice**, v. 26, n. 1, p. 106, 2020.

PEREIRA, A. S. et al. Metodologia da pesquisa científica. 2018.

SARTI, T. D. et al. What is the role of primary health care in the COVID-19 pandemic?. 2020. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**.

CAPÍTULO 58

INOVAÇÃO EM CIRURGIAS CRANIOFACIAIS, VANTAGENS E INDICAÇÕES DO PLANEJAMENTO CIRÚRGICO TRIDIMENSIONAL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c58](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c58)

**Bruno Romano de Oliveira¹, Laryssa Costa Huguenin França², Ana Paula Silva
Carvalho³, Robert Wilson da Silva Tostes⁴, Paula Mylena Paiva de Souza⁵, Wesley da
Silva de Paiva⁶, Nyali Rosa de Castro⁷, Karla Arrigoni Gomes⁸, Maria Luíza da Costa
Gomes⁹, Eduardo Stehling Urbano¹⁰**

1 Faculdade de Odontologia/ Universidade Federal de Juiz de Fora,
(bruno.romano12@gmail.com)

2 Faculdade de Odontologia/ Universidade Federal de Juiz de Fora,
(laryssa.huguenin@odontologia.ufjf.br)

3 Faculdade de Odontologia/ Universidade Federal de Juiz de Fora,
(anapaula.carvalho@estudante.ufjf.br)

4 Faculdade de Odontologia/ Universidade Federal de Juiz de Fora,
(robert.tostes@odontologia.ufjf.br)

5 Faculdade de Odontologia/ Universidade Federal de Juiz de Fora,
(paula.mylena@odontologia.ufjf.br)

6 Faculdade de Odontologia/ Universidade Federal de Juiz de Fora,
(wesley.paiva@odontologia.ufjf.br)

7 Faculdade de Odontologia/ Universidade Federal de Juiz de Fora,
(nyali.castro@odontologia.ufjf.br)

8 Faculdade de Odontologia/ Universidade Federal de Juiz de Fora,
(karla.arrigoni@gmail.com)

9 Faculdade de Odontologia/ Universidade Federal de Juiz de Fora,
(marialuiza.gomes@estudante.ufjf.br)

10 Instituto de Ciências Biológicas/Universidade Federal de Juiz de Fora,
(esurss@yahoo.com.br)

Resumo

Objetivo: Analisar as vantagens e indicações do planejamento cirúrgico virtual, destacando as inovações geradas por esse advento para a prática cirúrgica. **Método:** Foram incluídos estudos observacionais, revisões sistemáticas e revisões integrativas publicadas em inglês e/ou português entre janeiro de 2015 a dezembro de 2021. Foram excluídos duplicatas, cartas, editoriais, resumos de conferências, estudos em animais, e relato de casos com ≥ 5 pacientes. As bases de dados utilizadas foram Medline (via Pubmed) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). A base de dados Pubmed gerou 31 artigos, e a BVS 33 dos quais foram excluídos na primeira etapa respectivamente 8 e 32 artigos. Na segunda etapa, dos 24 artigos selecionados, mais 6 foram excluídos, e, após toda a análise, restaram 18 artigos incluídos no estudo. **Resultados:** O planejamento tridimensional apresenta inúmeras vantagens, como simulação

virtual de osteotomias, confecção de guias cirúrgicos, melhor visualização das estruturas ósseas, o que garante um resultado mais satisfatório. **Conclusão:** O planejamento tridimensional representa uma inovação em cirurgia bucomaxilofacial. Este apresenta vantagens sobre o planejamento bidimensional, pois permite ao cirurgião realizar a avaliação do paciente com informações e imagens de estruturas craniofaciais livres de distorção de perspectiva, o que garante um melhor tratamento de deformidades, principalmente nas assimetrias unilaterais. No planejamento do tratamento há reduções de etapas e a utilização da técnica CAD / CAM permite uma maior precisão e previsibilidade, obtendo assim, resultados mais satisfatórios.

Descritores: Cirurgia Ortognática; Planejamento Cirúrgico; Planejamento Cirúrgico Virtual

Área Temática: Ciências da Saúde

E-mail do autor principal: bruno.romano@odontologia.ufjf.br

1 INTRODUÇÃO

Reconstruções cirúrgicas na região bucomaxilofacial são extremamente desafiadoras pois a face é a área do corpo humano na qual uma assimetria por menor que seja já compromete a estética, além de gerar também distúrbios mastigatórios, desordens articulares e traumas psicossociais. Em casos complexos de anomalias craniofaciais, o bom planejamento cirúrgico é primordial para gerar resultados que corrijam as consequências dessas anomalias e evitem possíveis reincidências.

O modelo de planejamento cirúrgico tradicionalmente utilizado é constituído por muitas etapas laboratoriais, como análise de radiografias bidimensionais e simulação cirúrgica manual em modelo de gesso, as quais demandam muito tempo e por vezes podem levar a erros na cirurgia, dependendo amplamente da experiência clínica do cirurgião. O principal problema encontrado nesse tipo de planejamento é a falta de informações sobre a configuração tridimensional das estruturas relevantes envolvidas, como a linha média facial esquelética ou a articulação temporomandibular (HEUFELDER *et al.*, 2017).

Recentemente com o desenvolvimento de softwares aplicados a cirurgias e o surgimento da impressão tridimensional, as novas técnicas de planejamento cirúrgico baseiam-se em modelos computadorizados do crânio do paciente, representando com precisão o crânio, a dentição, e o tecido mole facial (JI *et al.*, 2019). Esses modelos de orientação após impressos facilitaram a transferência precisa do planejamento cirúrgico virtual para cirurgias reais realizadas em pacientes (LI *et al.*, 2016; SEMBRONIO *et al.*, 2020).

Nesse novo tipo de planejamento inicialmente os pacientes são submetidos a Tomografia computadorizada de Feixe Cônico (TCFC) para obtenção de imagens do crânio. Posteriormente, é realizado um escaneamento intra-oral desses pacientes para digitalização das arcadas dentárias, confeccionando ao final o modelo crânio-composto. Após isso, as análises

cefalométricas e simulações tridimensionais são feitas. Os guias cirúrgicos e placas de fixação são confeccionadas baseadas nos movimentos realizados através do planejamento virtual. Então a cirurgia é realizada a partir desse planejamento prévio (MAZZONI *et al.*, 2015; SEMBRONIO *et al.*, 2020).

Desse modo, o planejamento virtual auxilia na previsão dos resultados de uma intervenção cirúrgica antes da cirurgia real, permitindo aos cirurgiões que experimentem vários procedimentos de forma virtual. No entanto, mesmo com a previsibilidade ofertada pelo planejamento virtual, a qualidade do resultado cirúrgico depende diretamente da habilidade do cirurgião (MAZZONI *et al.*, 2015).

Tendo em vista as mudanças geradas no planejamento cirúrgico com as novas tecnologias, o objetivo desta revisão é analisar as vantagens e indicações do planejamento cirúrgico virtual, destacando as inovações geradas por esse advento na prática cirúrgica.

2 MÉTODO

Esta é uma revisão integrativa que agrupa estudos que descrevem o uso do planejamento cirúrgico virtual para casos cirúrgicos de anomalias craniofaciais. O objetivo desta revisão é analisar nos estudos selecionados as vantagens e indicações do planejamento cirúrgico virtual, destacando as inovações geradas por esse advento para a prática cirúrgica.

Foram incluídos estudos observacionais (transversais, coorte, caso-controle e série de casos ≥ 5 pacientes ou ensaios clínicos randomizados), revisões sistemáticas ou revisões integrativas. Além disso, foram priorizados estudos publicados entre 01 de janeiro de 2015 e 30 de dezembro de 2021, e redigidos em inglês ou português.

A busca foi realizada em duas bases de dados eletrônicas: Medline (via PubMed) e BVS, usando as estratégias descritas na Tabela 1. Foi usado filtro contemplando o período de publicação e os idiomas priorizados como critério de inclusão.

Tabela 1. Estratégia de busca nas bases de dados

Base de dados eletrônica	Estratégia de Busca
MEDLINE via pesquisa PubMed estratégia:	(Orthognathic Surgery) And (Facial Asymmetry) And (Virtual Surgical Planning) And (Surgical Planning)
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS)	(Orthognathic Surgery) AND (Facial Asymmetry) AND (Virtual Surgical Planning) AND (Surgical Planning.)

Na primeira etapa da análise de dados a busca realizada na base de dados PubMed gerou 31 resultados, dos quais 8 foram excluídos a partir da análise dos títulos e resumos. Já na base de dados BVS foram gerados 33 resultados, dos quais 27 resultados eram duplicatas e foram excluídos e em seguida 5 foram excluídos a partir da análise dos títulos e resumos. Na segunda etapa, os 24 artigos selecionados foram lidos e analisados por completo, e desses, 5 foram excluídos por tratar de relatos de casos com ≤ 5 pacientes e 1 foi excluído por fugir ao objetivo do presente estudo. Por fim, foram incluídos no estudo um total de 18 artigos.

Tabela 2. Resumo da Análise de Dados

		PUBMED 31 RESULTADOS	BVS 33 RESULTADOS
1ª ETAPA	EXCLUÍDOS POR TÍTULO E RESUMO	8	5
	DUPLICATAS EXCLUÍDAS	0	27
	ARTIGOS INCLUÍDOS	23	1
2ª ETAPA	EXCLUÍDOS: RELATO DE CASO ≤ 5 PACIENTES	5	0
	EXCLUÍDO POR FUGIR AO TEMA	0	1
	ARTIGOS INCLUÍDOS	18	0
ARTIGOS INCLUÍDOS NO ESTUDO: 18			

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir da análise dos artigos selecionados, pode-se observar como resultado que o planejamento tridimensional apresenta inúmeras vantagens, como simulação de osteotomias virtualmente, confecção de guias cirúrgicos, melhor visualização das estruturas ósseas, o que garante um resultado mais satisfatório (BENGTSSON *et al.*, 2017; HAN *et al.*, 2018; HSU *et al.*, 2020; MAZZONI *et al.*, 2015; SCOLOZZI, 2015; SEMBRONIO *et al.*, 2020; QIN *et al.*, 2019;).

A estética facial é um assunto complexo, pois além de toda funcionalidade da face como a mastigação, os sentidos, as ações musculares, é principalmente através dela e que ocorre a comunicação e a expressão das emoções. Dessa maneira, a deformidade craniofacial pode gerar um enorme impacto na vida do paciente, pois o comprometimento estético e funcional reflete diretamente na vida psicossocial do paciente e, por isso, a procura por tratamento é urgente e necessária. Dentre essas deformidades pode-se destacar a má-oclusão classe II ou III,

hiperplasia ou hipoplasia condilar, dentre outras assimetrias faciais. (BELUSIC GOBIC, M. *et al.*, 2021; HEINZMANN, G. *et al.*; 2021; PERKOVIC, V. *et al.*, 2021)

O equilíbrio da simetria facial é determinado pela posição, volume e formato dos tecidos moles e duros (QIN *et al.*, 2019). Nesse aspecto, a cirurgia bucomaxilofacial busca restituir a forma e função, estabelecendo um perfil estético, corrigindo a oclusão e consequentemente melhorando a qualidade de vida desses pacientes. Uma compreensão abrangente do problema é o primeiro passo antes de realizar a reconstrução definitiva. Portanto o planejamento pré-operatório pode incluir fatores geométricos e quantitativos, como avanço de maxila, desprojeção da mandíbula ou combinação de ambos, com simulação virtual, otimizando o resultado. A análise e o planejamento tridimensionais são ferramentas poderosas em cirurgia craniofacial e reconstrutiva. Os procedimentos incluem 1) análise, 2) planejamento, 3) cirurgia virtual, 4) impressões 3D de guias ou implantes e 5) verificação dos resultados reais em relação aos planejados. O planejamento tridimensional e a cirurgia virtual aumentam a eficiência, precisão, criatividade e reprodutibilidade em cirurgia bucomaxilofacial (PARK *et al.*, 2020; STEINBACHER *et al.*, 2015).

Diferentemente, o planejamento convencional da cirurgia ortognática, anterior ao advento do planejamento virtual, é realizado com base em exames radiográficos, análise cefalométrica e simulação de cirurgia em modelos odontológicos fundidos em gesso, montados em articulador semiajustável. Infelizmente, o planejamento do modelo é complexo, e erros podem ser introduzidos durante a transferência do arco facial e uso de articuladores semiajustáveis, e as medidas de movimento do gesso pode ser impreciso. Também, placas intermediárias e finais manuais não são precisas. Além disso, a inclinação oclusal e uma deformidade assimétrica do esqueleto ósseo são difíceis de diagnosticar corretamente, mesmo com a recriação precisa do plano oclusal (DE RIU *et al.*, 2017; JI *et al.*, 2019). Portanto, em casos acentuados complexos de assimetria a técnica tridimensional apresenta uma vantagem maior, já que podem antecipar os movimentos cirúrgicos baseados na necessidade, como a mobilização translacional e rotacional do complexo maxilomandibular em seis direções diferentes. (BENGTSSON *et al.* 2017; HSU *et al.*, 2020).

De acordo com Liao *et al.* (2020), o planejamento cirúrgico virtual tridimensional é superior na melhora da assimetria da linha média facial em comparação a abordagem convencional, porém os resultados de satisfação são igualmente elevados com os dois métodos de planejamento cirúrgico. Neste estudo, pacientes com deformidade classe III esquelética foram submetidos a cirurgia ortognática para correção da assimetria, podendo esta ser de várias formas: assimetria esquelética, assimetria de tecidos moles, assimetria funcional ou uma

combinação. Sendo, de suma importância que um diagnóstico preciso da assimetria seja realizado no pré-operatório para um planejamento e execução cirúrgica assertivos. A assimetria mais prevalente envolve desvios da mandíbula e da face. Destarte, o planejamento virtual tridimensional da cirurgia ortognática foi proposto para encurtar o tempo de planejamento, melhorar o planejamento cirúrgico, e aumentar a precisão cirúrgica em comparação com o planejamento convencional bidimensional. Embora a precisão cirúrgica seja um componente crítico do planejamento cirúrgico virtual, a avaliação das variáveis de resultado objetivas e subjetivas, bem como o tempo de avaliação, também é importante.

Atualmente os cirurgiões vêm adotando a abordagem CAD / CAM, que representa a união de duas tecnologias, CAD – desenho assistido por computador e CAM – manufatura assistida por computador. A abordagem CAD / CAM oferece diversas vantagens, incluindo: a visualização do local ideal para a osteotomia da maxila para restaurar uma relação ântero-posterior adequada, evitando lesões nos botões dos dentes permanentes, bem como potenciais interferências ósseas; manipulação de distratores virtuais, que permitem escolhas sobre o tamanho do distrator ideal e o posicionamento espacial tridimensional perfeito; transferência precisa do planejamento cirúrgico tridimensional para o paciente na sala de cirurgia por meio da fabricação de guias de corte cirúrgico específico e placas oclusais que mantêm o vetor do distrator; flexão das placas dos pés do distrator específico do paciente em um modelo craniano impresso em 3D feito por um processo de prototipagem rápida; eliminação da necessidade de manipulações intraoperatórias, sempre necessárias para o ajuste adequado dos distratores dobrados não customizados, reduzindo o tempo operatório para aproximadamente 45 a 60 minutos, que representa o tempo gasto para o planejamento da sessão virtualmente (SCOLOZZI, 2015).

A aplicação de placas cirúrgicas CAD/CAM específicas do paciente, guias de corte e implantes permitem um resultado satisfatório em cirurgia ortognática (SCOLOZZI, 2015), pois é possível maior controle vertical da maxila, o que implica numa melhor oclusão e posicionamento da mandíbula, entre outros segmentos ósseos (MAZZONI *et al.*, 2015).

O fluxo de trabalho digital é essencial para que as limitações na precisão dos movimentos sejam superadas, visto que a simulação cirúrgica auxiliada por computador frequentemente combinada com uma etapa cirúrgica tradicional resulta em uma abordagem híbrida que expõe o resultado cirúrgico a uma possível margem de erro devido a imprecisões que ocorrem quando o plano digital é transferido na sala de cirurgia. O fluxo de trabalho digital conta com três fases sólidas: 1) simulação auxiliada por computador de cada procedimento cirúrgico; 2) projeto auxiliado por computador de ferramentas que permitem a transferência da

cirurgia digital para o cenário real, como guias de corte cirúrgico e placas de osteossíntese ajustadas personalizadas; e 3) cirurgia sob a orientação de guias de corte impressos em 3D e placas personalizadas (MAZZONI *et al.*, 2015; SEMBRONIO *et al.*, 2020). Nesse âmbito, o planejamento virtual torna-se uma ótima escolha na resolução da maioria dos casos de deformidade craniofacial, não somente no planejamento cirúrgico, mas também em outras etapas essenciais do tratamento dentário.

De acordo com os estudos analisados, o planejamento virtual torna-se uma ótima escolha na resolução da maioria dos casos de deformidade craniofacial, não somente no planejamento cirúrgico, mas também em outras etapas essenciais do tratamento dentário.

Conforme Cintra *et al.* (2018), o planejamento virtual é utilizado também para o diagnóstico da assimetria facial e posterior tratamento ortodôntico, garantindo uma maior precisão ao longo de todo tratamento e maior previsibilidade. A partir do planejamento virtual tridimensional é feita uma análise das possibilidades mais indicadas para o preparo ortodôntico adequado em cada caso, e além disso, auxilia na escolha do melhor protocolo cirúrgico.

Bem como, segundo Ji *et al.* (2019), bons resultados são obtidos a partir do planejamento virtual com guias de osteotomia e placas de titânio pré-dobradas, visto que após a sobreposição da simulação cirúrgica e das imagens pós-operatórias, o posicionamento da maxila e mandíbula se mostraram satisfatórios, com maior acurácia para a maxila, com uma diferença linear média inferior a 0,60 mm.

Além disso, técnicas que antes eram realizadas separadas, a partir do planejamento virtual podem ser realizadas no mesmo dia. Um exemplo é a cirurgia ortognática com condilectomia simultânea para o tratamento da hiperplasia hemimandibular/condilar. Os resultados cirúrgicos podem ser validados durante a cirurgia por navegação virtual. No entanto, o movimento de cada segmento ósseo não pode ser controlado com precisão conforme planejado antes da cirurgia (HAN *et al.*, 2018; SEMBRONIO *et al.*, 2020). Contudo, é importante salientar que na hiperplasia condilar, deve haver uma avaliação para se constatar se a doença está ativa ou inativa, em caso de inatividade a assimetria pode ser corrigida conforme os princípios ortognáticos (HIGGINSON *et al.*, 2018).

Em relação a pacientes com microsomia craniofacial, estes apresentam uma ampla faixa de gravidade fenotípica. Existem vários sistemas de classificação clínica para características faciais de microsomias. As avaliações e intervenções devem ser sincronizadas com o crescimento craniofacial e adaptadas ao indivíduo com base nas características clínicas e nas preferências do paciente. As necessidades complexas dos pacientes são mais bem atendidas por uma equipe craniofacial multidisciplinar (BIRGFELD e HEIKE, 2019). Nesses

casos, o planejamento virtual é abrangente e fundamental. A oclusão final pode ser definida virtualmente ou com um registro de mordida. Além disso, os guias de corte necessários no lado afetado e uma orientação mesial permitirá um acesso mais fácil (POLLEY *et al.*, 2019).

Contudo, a principal deficiência relacionada ao planejamento cirúrgico virtual, é o alto custo associado à técnica CAD / CAM. Outro potencial fator limitante poderia ser os erros cumulativos relacionados ao processo de aquisição de imagem e ao procedimento de software de aquisição de segmentação tridimensional que é transmitido ao fabricante o qual, de acordo com a literatura, foi estimado em 1 mm (SCOLOZZI, 2015). Outrossim, a simulação 3D dos tecidos moles também apresenta falhas pois ela ainda não permite o manejo preciso da altura facial e da posição do queixo. Diante esses fatos, faz-se necessário o monitoramento constante dos movimentos maxilares no transcirúrgico e também alguma margem para possível correção de imprecisões (DE RIU *et al.*, 2017). Bem como, o aumento da exposição à radiação, uma vez que as Tomografias Computadorizadas de Feixe Cônico possuem uma exposição à radiação maior em comparação com a radiologia de projeção (LI *et al.*, 2016).

4 CONCLUSÃO

O planejamento tridimensional representa uma inovação em cirurgia bucomaxilofacial. Este apresenta vantagens sobre o planejamento bidimensional, pois permite ao cirurgião realizar a avaliação do paciente com informações e imagens de estruturas craniofaciais livres de distorção de perspectiva, o que garante um melhor tratamento de deformidades, principalmente nas assimetrias unilaterais. No planejamento do tratamento há reduções de etapas e a utilização da técnica CAD / CAM permite uma maior precisão e previsibilidade, obtendo assim, resultados mais satisfatórios, visto que é possível realizar a simulação virtual das osteotomias virtualmente e confeccionar guias que auxiliarão durante a cirurgia.

REFERÊNCIAS

- BELUSIC GOBIC, M. *et al.* Dentofacial deformity and orthognathic surgery: Influence on self-esteem and aspects of quality of life. **J Craniomaxillofac Surg.** v. 49, n. 4, p. 277-281 abr. 2021. DOI:10.1016/j.jcms.2021.01.024. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33579617/>. Acesso em: 13 set. 2021.
- BENGTSSON, M. *et al.* Treatment outcome in orthognathic surgery—A prospective randomized blinded case-controlled comparison of planning accuracy in computer-assisted two- and three-dimensional planning techniques (part II). **Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery**, [S. l.], v. 45, n. 9, p. 1419-1424, jul. 2017. DOI: 10.1016/j.jcms.2017.07.001. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28800842/>. Acesso em: 13 set. 2021.

BIRGFELD, C. e HEIKE, C. Craniofacial Microsomia. **Clinics in Plastic Surgery**, [S. l.], v. 46, n. 2, p. 207–221, abr. 2019. DOI: 10.1016/j.cps.2018.12.001. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30851752/>. Acesso em: 13 set. 2021.

CINTRA, O. *et al.* Digital platform for planning facial asymmetry orthodontic-surgical treatment preparation. **Dental Press Journal of Orthodontics**, [S. l.], v. 23, n. 3, p. 80–93, maio/jun. 2018. DOI: 10.1590/2177-6709.23.3.080-093.sar. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30088569/>. Acesso em: 13 set. 2021.

DE RIU, Giacomo *et al.* Accuracy of computer-assisted orthognathic surgery. **Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery**, [S. l.], v. 46, n. 2, p. 293–298, fev. 2018. DOI: 10.1016/j.jcms.2017.11.023. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29275075/>. Acesso em: 13 set. 2021.

HAN, B. *et al.* Hemimandibular Hyperplasia Correction by Simultaneous Orthognathic Surgery and Condylectomy Under Digital Guidance. **Journal of Oral and Maxillofacial Surgery**, [S. l.], v. 76, n. 7, p. 1563.e1–1563.e18, jul. 2018. DOI: 10.1016/j.joms.2018.03.006. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29626447/>. Acesso em: 13 set. 2021.

HEINZMANN, G. *et al.* Quality of life of patients following orthognathic surgery. **Gen Dent**. v. 69, n. 4, p. 64–69, jul.-ago. 2021. PMID: 34185671. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34185671/>. Acesso em: 13 set. 2021.

HEUFELDER, M. *et al.* Clinical accuracy of waferless maxillary positioning using customized surgical guides and patient specific osteosynthesis in bimaxillary orthognathic surgery. **Journal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery: Official Publication of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery**, [S. l.], v. 45, n. 9, p. 1578–1585, set. 2017. DOI: 10.1016/j.jcms.2017.06.027. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28793965/>. Acesso em: 13 set. 2021.

HIGGINSON, J.A. *et al.* Condylar hyperplasia: current thinking. **British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery**, [S. l.], v. 56, n. 8, p. 655–662, out. 2018. DOI: 10.1016/j.bjoms.2018.07.017. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30115459/>. Acesso em: 13 set. 2021.

HSU, P. *et al.* Outcome of facial contour asymmetry after conventional two-dimensional versus computer-assisted three-dimensional planning in cleft orthognathic surgery. **Scientific Reports**, [S. l.], v. 10, n. 1, fev. 2020. DOI: 10.1038/s41598-020-58682-4. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32047228/>. Acesso em: 13 set. 2021.

JL, H. *et al.* Computer-assisted osteotomy guides and pre-bent titanium plates improve the planning for correction of facial asymmetry. **International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery**, [S. l.], v. 48, n. 8, p. 1043–1050, ago. 2019. DOI: 10.1016/j.ijom.2019.01.026. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30773336/>. Acesso em: 13 set. 2021.

LI, Y. *et al.* Treatment of Dentofacial Deformities Secondary to Osteochondroma of the Mandibular Condyle Using Virtual Surgical Planning and 3-Dimensional Printed Surgical Templates. **Journal of Oral and Maxillofacial Surgery**, [S. l.], v. 74, n. 2, p. 349–368, fev.

2016. DOI: 10.1016/j.joms.2015.06.169. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26183010/>. Acesso em: 13 set. 2021.

LIAO, Y. *et al.* Outcomes of conventional versus virtual surgical planning of orthognathic surgery using surgery-first approach for class III asymmetry. **Clinical Oral Investigations**, [S. l.], v. 24, n. 4, p. 1509–1516, fev. 2020. DOI: 10.1007/s00784-020-03241-4. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32100114/>. Acesso em: 13 set. 2021.

MAZZONI, S. *et al.* Computer-Aided Design and Computer-Aided Manufacturing Cutting Guides and Customized Titanium Plates Are Useful in Upper Maxilla Waferless Repositioning. **Journal of Oral and Maxillofacial Surgery**, [S. l.], v. 73, n. 4, p. 701–707, abr. 2015. DOI: 10.1016/j.joms.2014.10.028. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25622881/>. Acesso em: 13 set. 2021.

PARK, K. E. *et al.* Orthognathic Surgery to Improve Facial Profile: Assessment, 3-Dimensional Planning, and Technique. **Aesthetic Surgery Journal Open Forum**, [S. l.], v. 3, n. 1, nov. 2020. DOI: 10.1093/asjof/ojaa051. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33791672/>. Acesso em: 13 set. 2021.

PERKOVIC, V. *et al.* Facial aesthetic concern is a powerful predictor of patients' decision to accept orthognathic surgery. **Orthod Craniofac.** [publicado online antes da impressão: 3 jun. 2021]. DOI:10.1111/ocr.12505. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34080282/>. Acesso em 13 set. 2021.

POLLEY, J. W. *et al.* Salvage or Solution: Alloplastic Reconstruction in Hemifacial Microsomia. **The Cleft Palate-Craniofacial Journal**, [S. l.], v. 56, n. 7, p. 896–901, dez. 2018. DOI: 10.1177/1055665618817669. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30543122/>. Acesso em: 13 set. 2021.

QIN, Z. *et al.* One-Stage treatment for maxillofacial asymmetry with orthognathic and contouring surgery using virtual surgical planning and 3D-printed surgical templates. **Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery**, [S. l.], v. 72, n. 1, p. 97–106, jan. 2019. DOI: 10.1016/j.bjps.2018.08.015. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30228074/>. Acesso em: 13 set. 2021.

SCOLOZZI, P. Computer-aided design and computer-aided modeling (CAD/CAM) generated surgical splints, cutting guides and custom-made implants: Which indications in orthognathic surgery? **Revue de Stomatologie, de Chirurgie Maxillo-faciale et de Chirurgie Orale**, [S. l.], v. 116, n. 6, p. 343–349, dez. 2015. DOI: 10.1016/j.revsto.2015.09.005. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26598243/>. Acesso em: 13 set. 2021.

SEMBRONIO, S. *et al.* One-Stage Computer-Guided Customized Management of Skeletal Asymmetry by Concomitant Proportional Condylectomy and Orthognathic Surgery in Patients With Unilateral Condylar Hyperplasia. **Journal of Oral and Maxillofacial Surgery**, [S. l.], v. 78, n. 11, p. 2072.e1–2072.e12, nov. 2020. DOI: 10.1016/j.joms.2020.05.039. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32621806/>. Acesso em: 13 set. 2021.

STEINBACHER, D. M. Three-Dimensional Analysis and Surgical Planning in Craniomaxillofacial Surgery. **Journal of Oral and Maxillofacial Surgery**, [S. l.], v. 73, n. 12, p. S40–S56, dez. 2015. DOI: 10.1016/j.joms.2015.04.038. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26608154/>. Acesso em: 13 set. 2021.

CAPÍTULO 59

“JÁ LAVOU AS MÃOS HOJE?": COMO A SOBRECARGA DE TRABALHO E INFRAESTRUTURA DEFICIENTE INFLUENCIAM NOS CUIDADOS EM BIOSSEGURANÇA

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c59](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c59)

Maria Gislene Santos Silva¹, Alice Silva Mendes ², Samaritana Barros do Nascimento ³,
Thayaná Ribeiro Silva Fernandes ⁴, Vanessa Galeno de Sousa ⁵

¹Universidade Federal do Delta do Parnaíba, (gislene-bj@hotmail.com)

²Universidade Federal do Delta do Parnaíba, (alicemendes167@gmail.com)

³Universidade Federal do Piauí (samaritanabarro@hotmail.com)

⁴Universidade Federal do Delta do Parnaíba(thayana.fernandes@hotmail.com)

⁵Universidade Federal do Delta do Parnaíba(vanessa-galeno@hotmail.com)

Resumo

Objetivo: Realizar uma revisão de literatura sobre os riscos da falta de cuidados em biossegurança e a ocorrência de infecções hospitalares. **Método:** Foram realizadas buscas nas bases de dados Scielo, Lilacs, PubMed e Medline e Google Acadêmico, no período entre 2016 e 2019. As palavras-chave utilizadas foram “infecção hospitalar”, “biossegurança e infecção hospitalar”, “contaminação cruzada e biossegurança”, “seps e infecção hospitalar” e seus equivalentes em inglês. **Resultados:** Após a busca avançada aos periódicos, foram selecionados 10 artigos científicos que entrariam a partir dos critérios de inclusão. Após a leitura minuciosa dos trabalhos, constatou-se que vários profissionais de saúde não se atentam de sua proteção, além de se observar resultados discordantes quanto ao conhecimento sobre as normas de higiene a conduta na prática clínica. **Conclusão:** Dessa forma é fundamental a orientação e capacitação continuada dos profissionais através de medidas simples, efetivas e de baixo custo.

Palavras-chave: Infecção hospitalar; Biossegurança e Infecção Hospitalar; Contaminação Cruzada e Biossegurança.

Área Temática: Ciências da Saúde.

E-mail do autor principal: gislene-bj@hotmail.com

1. INTRODUÇÃO

O Ministério da Saúde define infecção hospitalar como uma infecção adquirida após a admissão do paciente na unidade hospitalar e que se manifesta durante a internação ou após a alta, esta última quando estiver relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares realizados (BRASIL, 1998). Diante disso, para redução dos índices de infecção hospitalar tem-se a higienização das mãos como pilar da prevenção destas infecções (OLIVEIRA *et al.*, 2016).

A microbiota da pele tem duas populações de microrganismos: a residente e a transitória. A residente é de baixa virulência, sendo composta por microrganismos que se multiplicam na pele, ficando estáveis e viáveis por longos períodos, não sendo fácil a sua remoção, mas são inativadas pelo uso de produtos antissépticos. No entanto, devido à descamação natural da pele e a produção de suor, alguns destes microrganismos são movidos para camadas mais superficiais e eliminados no ambiente. Já a transitória é composta por microrganismos que são considerados os principais causadores da maioria das infecções hospitalares, caracterizados pela inabilidade de multiplicar-se na pele, viáveis por curto período e encontrados na superfície da pele, junto a gorduras e sujidades. Por serem removidos facilmente da pele por meio de ação mecânica, estes microrganismos também se espalham facilmente pelo contato (CORDEIRO e LIMA, 2016).

A nível mundial, a infecção hospitalar representa um importante problema de saúde pública, constituindo risco à saúde dos usuários dos hospitais que se submetem aos procedimentos terapêuticos ou de diagnóstico. Sua prevenção e controle dependem, em grande parte, da adesão dos profissionais da área de saúde as medidas preventivas (GIAROLA *et al.*, 2012; BELELA-ANACLETO *et al.*, 2013). Dentre essas medidas, está a higienização das mãos, que deve ocorrer antes e após o contato com o paciente, mesmo com o uso de luvas, abrangendo toda a superfície das mãos e punhos, utilizando-se de sabão/detergente e/ou antisséptico, dependendo da sujidade. Destaca-se que a higienização correta das mãos contribui para a prevenção e controle de infecções hospitalares (BRASIL, 2009; MOTA *et al.*, 2014; CORDEIRO e LIMA, 2016).

Diante disso, a sensibilização dos profissionais de saúde a respeito da importância da higienização das mãos é imprescindível no contexto hospitalar quando se aborda o controle de infecção, pois a transmissão de infecção pode ocorrer, principalmente, pelas mãos da equipe que assiste ao paciente internado ou por artigos contaminados pelo contato com sangue, secreção ou excretas. A contaminação também pode se dar por meio de gotículas de secreções

respiratórias, pelo ar e/ou ainda pelo manuseio incorreto de equipamentos invasivos, como ventiladores mecânicos, cateteres venosos periféricos e centrais, sondas naso e orogástricas ou vesicais (CORDEIRO e LIMA, 2016).

2. MÉTODO

O presente trabalho constituiu-se de uma revisão de literatura, de natureza descritivo-qualitativa. A pesquisa bibliográfica foi realizada por meio de pesquisa nos bancos de dados PubMed, PsycInfo, CINAHL, Cochrane Library e EMBASE, utilizando os termos descritores (*"COVID-19" OR "SARS CoV 2 Infection" OR "COVID-19 Pandemic"*) AND (*"time perception" OR "temporal perception" OR "temporal processing" OR "time processing"*). Como critérios de inclusão: Estudo como temática central a percepção temporal ao confinamento decorrente da pandemia, estudos experimentais, relatos de caso, revisões e metanálise, escritos em língua inglesa e publicados de 2019 a 2021. Os critérios de exclusão foram teses, dissertações, resenha de livros, anais de congressos e trabalhos com inadequação a questão norteadora.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na pesquisa sistemática da literatura, foram selecionados 10 artigos em periódicos nacionais e internacionais, mas todos estes foram publicados a partir do ano de 2016. As informações encontradas nos artigos selecionados para esta pesquisa subsidiaram a discussão e a conclusão e estão contidas no quadro abaixo de forma resumida.

Tabela 1: Distribuição dos estudos sobre biossegurança e infecção hospitalar segundo título, autores, ano de publicação, país, temática do estudo, principais resultados (N=10).

País	Título/Autor/Ano	Temática	Conclusão
Brasil	Condições de desinfecção de superfície inanimada em unidades de terapia intensiva. (SOUZA <i>et al.</i> , 2019)	Estudo prospectivo, experimental que busca descrever as condições de limpeza de superfícies comuns ao toque dos pacientes e da equipe de saúde após limpeza em unidade de terapia intensiva.	Há necessidade de mudanças no comportamento da equipe de saúde, assim como a revisão dos protocolos de desinfecção como formas de reduzir às Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde.
Nigéria	Higiene durante o parto: um estudo observacional para entender o risco de infecção em unidades de saúde nos estados de Kogi e Ebonyi, Nigéria. (BUXTON <i>et al.</i> , 2019)	Este estudo observacional foi realizado em seis unidades de saúde na Nigéria. Em cada uma, cinco mulheres foram observadas desde o início do trabalho de parto até o parto da placenta.	Este estudo destaca que a higiene das mãos continua sendo uma barreira para a prestação de cuidados seguros e de alta qualidade nas unidades de saúde. Melhorar as práticas de higiene durante o trabalho de parto e entrega exigirá estratégias que vão além da provisão de infraestrutura.
Nicarágua	Conhecimento, atitudes e práticas relacionadas a infecções intrahospitalares na Nicarágua. (HERNÁNDEZ <i>et al.</i> , 2019).	Identificar o nível de conhecimento, atitudes e práticas para controlar as infecções intrahospitalares do pessoal de saúde.	Há falta de conhecimento sobre as infecções associadas aos cuidados de saúde, bem como o exercício de atitudes e práticas corretas visando a sua prevenção, para este fim, um programa de treinamento deve ser desenhado neste nível de atenção para tentar reduzir as IAAS.
Brasil	Avaliação das Práticas de Higienização por Estudantes de Medicina da Universidade Federal da Bahia (Brasil) durante Atendimento Clínico. (SANTANA-CAIRES, 2018).	O estudo avaliou a conduta de 160 estudantes de Medicina do Internato da Faculdade de Medicina da Bahia, da Universidade Federal da Bahia, por meio de um questionário com 22 questões objetivas.	Observaram resultados divergentes quanto ao conhecimento dos estudantes sobre as normas de higiene e à sua conduta na prática médica. Um dos fatores para a não adesão à técnica asséptica pelos estudantes é a abordagem teórica sobre a higienização e biossegurança em período diferente do da prática, falta de fiscalização e carência de insumos e materiais.
Brasil	Avaliação da infraestrutura hospitalar para a higienização das mãos. (MOURA, TRISTÃO, ECHEVARRÍA-GUANILO & PORTO, 2018).	Estudo quantitativo, descritivo, exploratório, transversal, realizado em um hospital público brasileiro. Foram avaliadas sete unidades de internação. Além disso, 43 enfermeiros foram entrevistados por meio de questionários, sendo 37 assistenciais e seis gestores.	Em três das unidades não havia lavatórios dentro das enfermarias e nas sete não havia dispensadores de antisséptico. Em relação aos enfermeiros assistenciais, 15 (40,5%) referiram a presença de lavatórios nas enfermarias e 5 (13,5%) a presença de dispensadores de antisséptico no local. Quanto aos enfermeiros gestores, dois referiram que havia lavatórios nas enfermarias de todas as unidades e quatro que havia dispensadores de antissépticos nesses locais.

Nigéria	<p>Conhecimento, conscientização e prática do controle de infecção por profissionais de saúde nas unidades de terapia intensiva de um hospital terciário na Nigéria.</p> <p>(ADEGBOYE, MAJEED ZAKARI, AHMED, OLUFEMI, 2018).</p>	<p>Este é um estudo transversal e descritivo. Informações sobre conhecimento, conscientização e prática do controle de infecção na UTI foram obtidas junto aos profissionais de saúde com auxílio de um questionário estruturado.</p>	<p>O conhecimento e a conscientização do controle de infecções entre os profissionais de saúde em nossa UTI são bons, mas a prática é ruim. Um seminário de treinamento sobre controle de infecções deve ser organizado para todos os profissionais de saúde da UTI para reduzir infecções nosocomiais.</p>
Brasil	<p>Adesão à higienização das mãos por profissionais da saúde em uma unidade de terapia intensiva.</p> <p>(LUCIANO <i>et al.</i>, 2017)</p>	<p>Estudo quantitativo, descritivo, observacional, com 27 profissionais da saúde, em uma Unidade de Terapia Intensiva. A coleta de dados ocorreu mediante observação com a finalidade de anotar em um instrumento previamente elaborado e adaptado sobre higienização das mãos por profissionais da saúde.</p>	<p>Em relação aos profissionais que tiveram intenção de lavar as mãos houve maior adesão dos fisioterapeutas, no entanto, dentre as observações de ocorrência de lavagem das mãos, nenhum profissional utilizou a técnica adequada sugerida pela ANVISA.</p>
Vietnã	<p>Práticas perigosas em uma unidade de hemodiálise no Vietnã identificam-se a partir de métodos mistos.</p> <p>(DOUNG & MACLAWS, 2017).</p>	<p>A abordagem incluiu observações e discussões de não conformidade com todos os 12 enfermeiros da Unidade de Hemodiálise do Hospital Distrital 6 da Cidade de Ho Chi Minh. Foram realizadas observações da enfermagem entre setembro de 2013 e janeiro de 2014.</p>	<p>A taxa de conformidade com a higiene das mãos foi baixa, independentemente da classificação da gravidade do risco decorrente dessa violação. Embora o uso de luvas e o uso de outros equipamentos de proteção individual foram observadas reutilizações de luvas altas com vários pacientes durante uma única atividade de assistência de enfermagem prestada a pacientes consecutivos.</p>
Brasil	<p>Adesão à higienização das mãos entre técnicos de enfermagem em um hospital universitário.</p> <p>(OLIVEIRA <i>et al.</i>, 2016).</p>	<p>Monitorar a adesão dos técnicos de enfermagem à higienização das mãos e identificar os fatores determinantes para sua execução por meio de um estudo transversal.</p>	<p>A prática de higienização das mãos está distante das diretrizes nacionais e internacionais, principalmente frente ao cenário atual de aumento de infecções por microrganismos multirresistentes.</p>
Brasil	<p>Impacto de programa educacional em práticas interdisciplinares na higienização das mãos (HM) por profissionais de UTI.</p> <p>(ALVES, SILVEIRA, SILVA & SADOYAMA, 2019).</p>	<p>Participaram da pesquisa equipe multiprofissional da (UTI) na qual incluem 05 médicos plantonistas, 04 enfermeiros, 20 técnicos de enfermagem, 04 fisioterapeutas.</p>	<p>Verificou-se uma maior adesão dos profissionais de saúde, a prática de higienização das mãos, após a intervenção, através de um programa educacional interdisciplinar. Verifica-se a necessidade de se repensar a prática profissional, enquanto facilitadores no controle de IRAS, evidenciando os programas de educação em saúde visando a profilaxia através da adesão à HM dos profissionais de saúde.</p>

Fonte: própria do autor (2021).

A partir do levantamento bibliográfico foi possível observar que a maioria dos profissionais de saúde apresentam respostas discordantes quanto ao conhecimento sobre as normas de higiene e à sua conduta. Vários estudos têm enfatizado a importância da limpeza e desinfecção de alta qualidade de superfícies ambientais como parte de um programa abrangente para reduzir as infecções relacionadas à assistência à saúde, sendo dessa maneira uma forma barata e bastante significativa em relação aos benefícios obtidos (FROTA *et al*, 2017). Além de que, para assegurar a eficiência e segurança nos processos de trabalho, é necessário a constante atualização e a existência de uma postura comprometida dos profissionais que exercem suas atividades laborais. Observa-se que os profissionais não se afetam com a própria segurança, além de se preocupar somente com pacientes diagnosticados com patologias mais graves (ALMEIDA, 2015).

Entretanto, adotar medidas de biossegurança é prioritário para todos os setores e profissionais da saúde expostos aos riscos ocupacionais, sendo a educação e o treinamento contínuo fundamental (BORGUETI, 2016). Várias superfícies que rodeiam o paciente no ambiente hospitalar acomodam microrganismos patogênicos, apresentando relação com as infecções hospitalares, podendo proporcionar focos de contato e transmissão destes microrganismos. Essas superfícies, são consideradas de risco para transmissão de microrganismos, de modo que os padrões de higiene e desinfecção no ambiente hospitalar são fatores ímpar na prevenção de infecções. Portanto, a limpeza e a desinfecção hospitalar consistem na remoção de sujeira ou contaminantes encontrados em superfícies, constituindo-se como as medidas mais eficazes de prevenção e controle de microrganismos presentes nas superfícies de bancadas, aparelhos, leitos e vários outros materiais (SOUZA *et al*, 2019).

Dentre os estudos analisados, observa-se que os profissionais apresentam uma relevante dificuldade na prática clínica em relação a biossegurança. Dessa forma, a prevenção e o controle das infecções hospitalares associadas a educação dos profissionais de saúde em seu ambiente de trabalho é fundamental. Assim, há necessidade do processo educativo para disseminar, entre os profissionais, ações de prevenção e controle das infecções hospitalares. Pois através de medidas baratas e eficientes, pode-se prevenir as infecções e reduzir o número de gastos hospitalares. Uma dessas medidas é a higienização das mãos, que é simples, efetiva e de baixo custo na prevenção da transmissão cruzada de microrganismos no ambiente hospitalar e na redução das infecções.

4. CONCLUSÃO

A higienização das mãos (HM) no ambiente hospitalar é imprescindível para evitar danos relacionados à assistência à saúde. É uma ação básica, que ainda carece de maior comprometimento por parte de todos os envolvidos. Para que ela se efetive, é deveras importante uma infraestrutura adequada, a avaliação dos gestores sobre as condições da estrutura (pias, torneiras, dispensadores e insumos), o conhecimento e as atitudes dos profissionais na prática de HM. A inclusão de pacientes e acompanhantes nessa prática também é importante.

Concluindo a presente revisão integrativa, em busca da melhor evidência disponível no mundo em relação à biossegurança na atenção primária à saúde e às recomendações para um trabalho seguro, entende-se que as produções científicas são escassas, apesar de nos últimos anos, ter havido aumento no número de publicações. Contudo, observa-se que tanto em um contexto nacional quanto internacional, que a principal causa de infecções é a não lavagem correta das mãos tanto pela precária infraestrutura dos serviços de saúde, quanto por falta de políticas educacionais em biossegurança para os profissionais da saúde quanto para acompanhantes e pacientes.

REFERÊNCIAS

ADEGBOYE, M.B.; ZAKARI, S.; AHMED, B.A; OLUFEMI, G.H. Knowledge, awareness and practice of infection control by health care workers in the intensive care units of a tertiary hospital in Nigeria. **African Health Sciences**, [S.L.], v. 18, n. 1, p. 72-73, 4 abr. 2018. African Journals Online (AJOL). <http://dx.doi.org/10.4314/ahs.v18i1.11>.

ALMEIDA, M.W.M.; IEMBO, T. Microbiota residente em equipamentos de radiodiagnóstico e a importância em reduzir a disseminação de microrganismos nas instituições de saúde. **J Health Sci Inst**, São José do Rio Preto, v. 4, n. 33, p.309-313, 2015.

ALVES, M.M; SILVEIRA, A.S.; SILVA, J.S.; SADOYAMA, G. Impacto de programa educacional em práticas interdisciplinares na higienização das mãos (HM) por profissionais de UTI. **Revista Edapeci**, [S.L.], v. 18, n. 3, p. 61-70, 9 dez. 2018. Revista EDAPECI. <http://dx.doi.org/10.29276/redapeci.2018.18.310107.61-70>.

BELELA-ANACLETO A.S.C. Higienização das mãos e a segurança do paciente: perspectiva de docentes e universitários. **Texto e Contexto Enfermagem**, v. 22, n. 4, p. 901-908, 2013. <https://doi.org/10.1590/S0104-07072013000400005>.

BORGHETI, S.P.; VIEGAS, K.; CAREGNATO, R.C.A. Biossegurança no centro de materiais e esterilização: dúvidas dos profissionais. **Revista Sobecc**, [s.l.], v. 21, n. 1, p.3-12, 8 jun. 2016. Zeppelini Editorial e Comunicacao. <http://dx.doi.org/10.5327/z1414-4425201600010002>.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria Nº 2.616, de 12 de maio de 1998. Expede na forma de anexos diretrizes e normas para a prevenção e controle das infecções hospitalares**. Diário Oficial da União, 1998.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Manual Segurança do paciente: higienização das mãos**. Brasília: Anvisa, 2009.

BUXTON, H., et al. Hygiene During Childbirth: an observational study to understand infection risk in healthcare facilities in kogi and ebonyi states, nigeria. **International Journal Of Environmental Research And Public Health**, [S.L.], v. 16, n. 7, p. 1301, 11 abr. 2019. MDPI AG. <http://dx.doi.org/10.3390/ijerph16071301>.

CORDEIRO V.B.; LIMA C.B. Higienização das mãos como ferramenta de prevenção e controle de infecção hospitalar. **Temas em Saúde**, v. 16, n. 2, p. 425-444, 2016.

DUONG, M.C.; MCLAWS, M-L. Dangerous practices in a hemodialysis unit in Vietnam identify from mixed methods. **Bmc Infectious Diseases**, [S.L.], v. 17, n. 1, p. 181, 1 mar. 2017. Springer Science and Business Media LLC. <http://dx.doi.org/10.1186/s12879-017-2290-3>.

FROTA, O.P. et al. Efficiency of cleaning and disinfection of surfaces: correlation between assessment methods, **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 70, n. 6, p. 1176–1183, 2017.

GIAROLA L.B et al. Infecção hospitalar na perspectiva dos profissionais de enfermagem: um estudo bibliográfico. **Cogitare Enfermagem**, v. 17, n.1, p. 151-157, 2012. ISSN: 1414-8536. Disponível em: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=483648962022>.

HERNANDEZ FAURE, C. et al. Conocimientos, actitudes y prácticas relacionadas con las infecciones intrahospitalarias en Nicaragua. **Rev. inf. cient.**, Guantánamo, v. 98, n. 1, p. 17-28, feb. 2019.

LUCIANO, M.N.F. et al. Adesão à higienização das mãos por profissionais da saúde em uma unidade de terapia intensiva. **Rev. enferm. UFPE online** [Internet]. 2017 Jun [citado 2013 Jul]; 11(10):3764-3770. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5205/reuol.12834-30982-1-SM.1110201709>.

MOTA E.C. et al. Higienização das mãos: uma avaliação da adesão e da prática dos profissionais de saúde no controle das infecções hospitalares. **Revista de Epidemiologia e Controle de Infecção**, v. 4, n. 1, p. 12-17, 2014. ISSN 2238-3360.

MOURA, P.M.M. et al. Avaliação da infraestrutura hospitalar para a higienização das mãos. **Revista de Enfermagem Ufpe On Line**, [S.L.], v. 11, n. 12, p. 5289, 17 dez. 2017. Revista de Enfermagem, UFPE Online. <http://dx.doi.org/10.5205/1981-8963-v11i12a22884p5289-5296-2017>.

OLIVEIRA, A.C. Adesão à higienização das mãos entre técnicos de enfermagem em um hospital universitário [Hand hygiene compliance among nursing technicians at a university hospital]. **Revista Enfermagem UERJ**, [S.L.], v. 24, n. 2, p. 1-6, 30 abr. 2016. Universidade de Estado do Rio de Janeiro. <http://dx.doi.org/10.12957/reuerj.2016.9945>.

SANTANA-CAIRES, M. et al. Avaliação das Práticas de Higienização por Estudantes de Medicina da Universidade Federal da Bahia (Brasil) durante Atendimento Clínico. **Revista Brasileira de Educação Médica**, [S.L.], v. 40, n. 3, p. 411-422, set. 2016. FapUNIFESP

(SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/1981-52712015v40n3e00572015>.

SOUZA, M.E. et al. Disinfection conditions of inanimate surfaces in intensive therapy units / Condições de desinfecção de superfícies inanimadas em unidades de terapia intensiva. **Revista de Pesquisa: Cuidado é Fundamental Online**, [s.l.], v. 11, n. 4, p.951-956, 1 jul. 2019. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro UNIRIO. <http://dx.doi.org/10.9789/2175-5361.2019.v11i4.951-956>.

CAPÍTULO 60

MANIFESTAÇÕES BUCAIS DO HPV NA INFÂNCIA: REVISÃO DE LITERATURA

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c60](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c60)

Milena Kaory Kazume¹

Discente do curso de Odontologia na Universidade Brasil - Fernandópolis/SP
(milenakazume07@gmail.com)

Mônica Ribeiro de Oliveira Santana²

Discente do curso de Odontologia na Universidade Brasil - Fernandópolis/SP
(monicaribeirode@gmail.com)

Pamela Zulin da Silva³

Discente do curso de Odontologia na Universidade Brasil - Fernandópolis/SP
(pamelazulin@outlook.com)

Raika Larissa Freitas Rodrigues⁴

Discente do curso de Odontologia na Universidade Brasil - Fernandópolis/SP
(raikalfr@gmail.com)

Monica Moreno de Carvalho⁵

Discente do curso de Odontologia na Universidade Brasil - Fernandópolis/SP
(monicamorenocrv@gmail.com)

Vitória Pigari Prata⁶

Discente do curso de Odontologia na Universidade Brasil - Fernandópolis/SP
(vitoriaprata@outlook.com.br)

Alice Freire dos Santos⁷

Discente do curso de Odontologia na Universidade de Fortaleza – UNIFOR, Fortaleza, Ceará.
(alicefreireds@edu.unifor.br)

José Antonio Santos Souza⁸

Docente dos cursos na área da saúde da Universidade Brasil - Fernandópolis/SP
(jose.ssouza@universidadebrasil.edu.br)

Valéria Cristina Lopes de Barros Rolim⁹

Docente dos cursos de Odontologia da Universidade Brasil - Fernandópolis/SP

(valeriarolim@terra.com.br)

Luciana Estevam Simonato¹⁰

Docente dos cursos na área da saúde da Universidade Brasil - Fernandópolis/SP

(lucianasimonato@gmail.com)

Resumo

Objetivo: Este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão narrativa sobre as principais manifestações orais do papilomavirus humano (HPV) em pacientes infantis, a fim de familiarizar os cirurgiões-dentistas e estudantes da área. **Método:** Foi realizado um levantamento bibliográfico por meio de pesquisa nos bancos de dados da SciELO, Lilacs e PubMed, utilizando os termos descritores “Criança”, “Papillomaviridae” e “Manifestações bucais”. **Resultados:** Foram selecionados 14 artigos científicos que mostraram que a população infantil pode ser infectada pelo HPV, apresentando altos números de contaminação, seja pela transmissão materno-fetal ou heteroinoculação. As principais manifestações bucais encontradas foram: verruga vulgar, papilomatose laríngea, papiloma escamoso, hiperplasia epitelial focal e condiloma acumulado. Como forma de conter a propagação do vírus e prevenir contra as doenças que o mesmo causa, houve a criação de duas vacinas, a quadrivalente e a bivalente. **Conclusões:** Diante da literatura revisada concluiu-se que as manifestações bucais do HPV ocorrem na infância, sendo importante que os responsáveis fiquem atentos aos sinais e sintomas. Cabe ressaltar, que as consultas de rotina ao cirurgião-dentista podem ser cruciais no diagnóstico precoce das lesões.

Palavras-chave: Criança; Papillomaviridae; Manifestações bucais.

Área Temática: Ciências da Saúde

E-mail do autor principal: milenakazume07@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

O papilomavirus humano (HPV) é um vírus de ácido desoxirribonucleico (DNA), que pertence à família *Papillomaviridae*. É mais frequente na região anogenital, porém, também é encontrado na mucosa oral. Dentre as manifestações bucais associadas ao HPV estão: papiloma, condiloma acuminado, hiperplasia epitelial focal, verruga vulgar, carcinoma de células escamosas e verrucoso (ASSIS, 2017).

Até o presente momento mais de 150 tipos do HPV foram identificados, sendo 25 tipos associados às lesões em boca. Sua principal via de transmissão é a sexual, mas existe a possibilidade de transmissão por outras vias como a sanguínea e canal do parto (DA SILVA et al., 2016; GAMA et al., 2021).

Segundo Brandt (2009) os principais locais acometidos pelo HPV em crianças são as extremidades e a face. Na cavidade oral, a língua é o local mais frequente de lesões pelo HPV, mas também podem aparecer no palato, mucosa bucal, gengiva, lábios, tonsilas, úvula e assoalho da boca. O diagnóstico do HPV na mucosa oral é dado pelo exame clínico, citologia, biópsia, imuno-histoquímica, hibridização do DNA, captura híbrida e *polimerase chain reaction* (PCR) (CASTRO et al., 2004).

Foi observado que a papilomatose laríngea, verruga vulgar, papiloma escamoso e condiloma acumulado possuem incidência em crianças (CASTRO et al., 2004; NEVILLE et al., 2016; EL ACHKAR et al., 2019).

No primeiro ano de vida são reconhecidas lesões anogenitais que, geralmente, são adquiridas no período perinatal. Entretanto, entre o primeiro e o terceiro ano de vida existem incertezas sobre a origem de novas lesões. O tratamento das lesões condilomatosas extensas na infância é um desafio terapêutico (BRANDT et al., 2009).

Dessa forma, como forma de conter a propagação do vírus e prevenir contra as doenças que o mesmo causa, houve a criação de duas vacinas, a quadrivalente (HPV4) e a vacina contra o HPV oncogênico, que é bivalente (HPV2). Para prevenção de lesões genitais pré-cancerosas de colo do útero, de vulva e de vagina em mulheres, de pênis em homens e anal em ambos os sexos, relacionadas aos HPV 16 e 18, e verrugas genitais em mulheres e homens, relacionadas aos HPV 6 e 11, a vacina HPV4 é a indicada. Já para a prevenção de lesões genitais pré-cancerosas do colo do útero em mulheres, relacionadas aos HPV 16 e 18, a vacina HPV2 é a validada (MELLO, 2013).

Este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão narrativa sobre as principais manifestações orais do HPV em pacientes infantis, a fim de familiarizar os cirurgiões-dentistas e estudantes da área.

2 MÉTODO

Foi realizada uma revisão narrativa com levantamento bibliográfico por meio de pesquisa nos bancos de dados da SciELO, Biblioteca Virtual em Saúde e PubMed, utilizando os termos descritores “Criança”, “Papillomaviridae” e “Manifestações bucais”.

Todos os artigos, independente dos métodos, que apresentavam informações sobre as manifestações bucais do HPV em crianças foram selecionados, analisados e discutidos criticamente.

A partir de um levantamento na Biblioteca Virtual em Saúde, ao utilizar os descritores citados anteriormente e submeter ao filtro, 4 artigos foram escolhidos para compor esta

revisão. Já na plataforma da SciELO, utilizando os mesmos descritores, que passaram pelo filtro, 7 artigos foram selecionados. Na PubMed, utilizando os mesmos descritores e o filtro, para a confecção deste estudo, apenas 2 foram selecionados, considerando a relevância do tema. Portanto, a partir dos critérios de inclusão e exclusão norteados pelo filtro, foram encontrados 7.355 artigos nas bases de dados, foi utilizado também o livro do NEVILLE *et al* (2016) para a confecção deste estudo. Após passar por uma análise e leitura na íntegra foram selecionados 14 artigos científicos publicados na literatura portuguesa, inglesa e espanhola, dos anos de 2004 a 2021 e utilizando o boleanador “or”, artigos que mostravam as principais manifestações do HPV na infância, a fim de familiarizar os profissionais da saúde. Os artigos selecionados para análise encontram-se na Tabela 1.

Tabela 1: Estudos prospectivos de manifestações bucais do HPV na infância.

AUTOR/ANO /PAÍS	TIPO DE ESTUDO	OBJETIVO	ACHADOS
ARTEAGA, F. <i>et al.</i> 2008, Venezuela.	Relato de Caso	Relatar um caso de múltiplas verrugas vulgares orais em uma menina de 12 anos sem lesões semelhantes em qualquer outra área do corpo.	As verrugas vulgares são lesões benignas. No entanto, existe a possibilidade de malignidade, principalmente na presença de cofatores como tabaco, álcool e outras infecções virais.
ASSIS, <i>et al.</i> 2017, Brasil.	Revisão Sistemática e Metanálise	Identificar se a prevalência de HPV na cavidade oral é maior em indivíduos infectados pelo HIV (HIV+) do que em não infectados pelo HIV (HIV-).	Há evidência científica que suporte a afirmação de que indivíduos HIV+ apresentam maior prevalência de infecção de HPV na cavidade oral quando comparados a indivíduos HIV-.
BRANDT, <i>et al.</i> 2009, Brasil.	Caso Clínico	Descrever quatro casos tratados com sucesso utilizando creme de imiquimode a 5% aplicado topicamente.	Sugere que o creme de imiquimode a 5% como alternativa terapêutica segura e eficaz, devendo ser considerada como alternativa a tratamentos agressivos e dolorosos, assim como a tratamentos cirúrgicos.
CASTRO, <i>et al.</i> 2004, Brasil.	Revisão Bibliográfica	Realizar uma revisão bibliográfica a respeito das manifestações orais associadas ao papilomavírus humano (HPV), seu diagnóstico, tratamento e profilaxia.	A profilaxia do HPV visa o controle da transmissão do vírus e diagnóstico precoce da doença, o que torna necessária a realização de programas educativos para doenças sexualmente transmissíveis e o uso de medidas preventivas para a população. A vacinação, ainda em estudo, será futuramente a solução no controle desta doença.

<i>DA SILVA, et al. 2016, Brasil.</i>	Revisão de Literatura	Rever os aspectos de lesões orais associadas ao Papilomavírus humano, com ênfase nas características mais comumente encontradas e as possibilidades de diagnóstico e tratamento.	É de fundamental importância a coleta de sintomas e sinais durante o exame clínico do paciente para estabelecer a etiologia, diagnosticar as lesões orais pelo HPV, e assim garantir a eficácia na indicação das diferentes técnicas para a detecção do HPV.
<i>EL ACHKAR, et al. 2019, Brasil.</i>	Estudo Multicêntrico	Correlacionar as características da papilomatose com o escore de Derkay.	A média do escore de Derkay, no grupo de jovens apresentou resultado mais agressivo do que o grupo adulto. A dificuldade respiratória e traqueostomia foram correlacionadas a um escore Derkay mais alto ($P < 0,05$).
<i>FERRARO, et al. 2011, Brasil.</i>	Artigo de atualização	Rever os aspectos relevantes da biologia do HPV, com ênfase na relação HPV-ceratinócitos.	A detecção do HPV torna-se cada vez mais acessível, permitindo assegurar a associação do vírus ao desenvolvimento de algumas lesões orais epiteliais benignas.
<i>GAMA, et al. 2021, Brasil.</i>	Ensaio Clínico	Avaliar a sensibilidade da reação em cadeia da polimerase (PCR) para detecção de HPV em diferentes amostras.	O uso da PCR convencional e da qPCR para a detecção de HPV em amostras de pacientes pediátricos assintomáticos, com papilomatose laríngea avaliada clinicamente, teve baixa sensibilidade.
<i>GIRALDO, et al. 2009, Brasil.</i>	Revisão Bibliográfica	Revisar o tema que sugere a vacina profilática contra o HPV.	As vacinas são altamente eficazes para os tipos de HPV contidos na mesma, logo a proteção não é total para todos os casos de câncer e verrugas genitais, permanecendo a necessidade de manutenção do exame preventivo do colo uterino (Papanicolaou) e o uso consistente de preservativos nas relações sexuais nas mulheres vacinadas.
<i>MELO, et al. 2013, Brasil.</i>	Revisão Bibliográfica	Relatar sobre duas vacinas para prevenção da infecção pelo papilomavírus humano e,	As duas vacinas para o HPV apresentam boa tolerabilidade, com baixa ocorrência de eventos adversos, sendo os mais comuns dor e

consequentemente, de doenças a ele associadas.

edema no local da aplicação

<i>MONTES, et al. 2016, México.</i>	Estudo Clínico e Histopatológico	Apresentar os achados clínico-patológicos após revisão de 52 pacientes acometidos por hiperplasia epitelial multifocal (HEM).	Células semelhantes à mitose e coilócitos são células degeneradas incapazes de sintetizar citoqueratinas e que células com citoplasma fortemente imunocorado representam células epiteliais com perfil metabólico de citoqueratina alterado.
<i>NEVILLE, et al. 2016, Brasil.</i>	Livro	Descrever as características clínicas, tratamento e prognóstico da Verruga Vulgar.	As verrugas de pele são tratadas eficientemente pela aplicação tópica de ácido salicílico, aplicação tópica de ácido láctico ou pela crioterapia por nitrogênio líquido.
<i>PINHEIRO, et al. 2009, Brasil.</i>	Relato de Caso	Relatar um caso clínico de lesão hiperplásica papilomatosa manifestada no palato dias após o nascimento.	A contaminação do bebê pelo vírus acontece principalmente no momento do nascimento e no período perinatal, através do contato com o vírus HPV genital da mãe.
<i>PONTES, et al. 2009, Brasil.</i>	Estudo Prospectivo	Avaliar a eficácia da aplicação local de cidofovir em associação com o tratamento cirúrgico na papilomatose laríngea recorrente (PLR) em crianças.	O cidofovir é um adjuvante eficaz no tratamento da PLR em crianças, quando utilizado sob a forma de aplicações locais em associação com a ressecção cirúrgica das lesões. O HPV-11 pode ser mais susceptível aos efeitos benéficos do cidofovir.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Um estudo realizado por Pinheiro e colaboradores (2009) relatou que a incidência de aparecimento de lesões orais do HPV é maior em crianças com idade acima de cinco anos quando comparada com a incidência nas menores de três anos pelo fato de a criança mais velha ter ficado mais tempo exposta ao vírus, aumentando as chances de manifestações orais da doença.

A infecção por HPV é através do contato com o vírus, cuja contaminação é sexualmente transmissível. Em pacientes infantis esta contaminação pode ocorrer tanto via sexual quanto em transmissão vertical pela mãe infectada. Sendo assim, as crianças expostas ao vírus podem ou não manifestar lesões orais associadas ao HPV (GIRALDO et al., 2009), mostrando a necessidade de atenção por parte dos responsáveis e o acompanhamento periódico pelo cirurgião-dentista.

A papilomatose laríngea é uma manifestação da infecção por HPV, que pode manifestar-se tanto em adultos quanto na infância, e apresenta-se de forma agressiva e não agressiva. Os estudos demonstram que na infância apresentou resultados mais agressivos quando comparados ao adulto (EL ACHKAR et al., 2019). A maioria das crianças apresenta a primeira manifestação da doença entre dois e quatro anos de idade, sendo o sintoma mais comum a disfonia (PONTES et al., 2009).

O papiloma escamoso é uma lesão proliferativa benigna que pode ocorrer tanto em pacientes pediátricos quanto em adultos, e geralmente acometem o palato mole e a língua. A característica clínica apresenta-se como lesão exofítica e de superfície rugosa, e na maioria dos casos são causadas pelos subtipos 6 e 11 (CASTRO et al., 2004).

A verruga vulgar é frequentemente encontrada em crianças, sendo esta lesão uma hiperplasia focal, benigna, contagiosa e os subtipos do HPV 2, 4, 6 e 40 são os mais observados em verruga vulgar. Manifesta-se preferencialmente na pele, mas pode desenvolver na mucosa geralmente, encontrada em vermelhão do lábio e região anterior de língua. Clinicamente apresenta-se como pápula ou nódulo indolor, com projeções papilares e o tratamento consiste pela remoção cirúrgica (ARTEAGA et al., 2008; NEVILLE et al., 2016).

A hiperplasia epitelial focal é uma lesão comumente encontrada no sexo feminino, em crianças e adolescentes de baixa condição socioeconômica e em índios. Clinicamente apresentam-se em nódulos ou pápulas, únicas ou múltiplas (MONTES et al., 2007).

O condiloma acuminado é uma proliferação induzida geralmente, pelo vírus HPV dos subtipos 2, 6, 11, 53 e 54, que pode ocorrer por autoinoculação, sexualmente ou do trauma (NEVILLE et al., 2016). Os condilomas são geralmente diagnosticados em crianças, adolescentes e adultos jovens. Clinicamente, se apresenta como lesão exofítica, de superfície rugosa, coloração rosada ou esbranquiçada e pode ser pediculada ou séssil (CASTRO et al., 2004).

Castro et al. (2004) relataram que as lesões bucais como condiloma, papiloma e verruga são as manifestações bucais mais frequentes do HPV. Sendo o condiloma uma lesão que afeta geralmente as crianças, e adolescentes. Já Ferraro et al. (2011) destacaram as lesões verrugosas e papilomatosas sendo as mais comuns em mucosa oral.

Considerando a relevância do tema para a melhor compreensão da infecção oral pelo HPV, a maior parte da população sexualmente ativa entra em contato com o HPV em alguma fase da vida (GIRALDO et al., 2009). Desta forma, a literatura revisada demonstrou que algumas crianças podem adquirir o vírus através de contato ao nascer ou por abusos Infantil (BRANDT et al., 2009).

Geralmente, um ou mais tipos específicos de HPV se associam a uma determinada manifestação clínica, sendo que muitas dessas lesões se apresentam em pacientes pediátricos (FERRARO et al., 2011).

4 CONCLUSÃO

Diante da literatura revisada concluiu-se que as manifestações bucais do HPV ocorrem na infância, sendo importante que os responsáveis fiquem atentos aos sinais e sintomas. Cabe ressaltar, que as consultas de rotina ao cirurgião-dentista podem ser cruciais no diagnóstico precoce das lesões, evitando assim futuras complicações.

Os cirurgiões-dentistas podem aplicar métodos de prevenção e informação à população, visto que a vacina e uso de preservativos é o método de prevenir o desenvolvimento da doença quando exposta ao vírus.

REFERÊNCIAS

ARTEAGA, F. *et al.* **Verrugas vulgares bucales múltiples. Reporte de un caso.** Acta Odontol Venez, v. 46, n. 1, p. 92-93, 2008. ISSN 0001-6365

ASSIS, A. V. D. A. **Prevalência de HPV na cavidade oral de indivíduos HIV+ e HIV.** Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2017.

BRANDT, H. R. C. *et al.* **Tratamento do papiloma vírus humano na infância com creme de imiquimode a 5%.** An Bras Dermatol., v. 84, n. 5, p. 549-53, 2009.

CASTRO, T. M. P. G. *et al.* **Manifestações orais associadas ao papilomavírus humano (HPV) conceitos atuais: Revisão bibliográfica.** Rev Bras Otorrinolaringol, v. 70, n. 4, p. 546-450, ago, 2004. DOI org/10.1590/S0034-72992004000400017

DA SILVA, E. J. *et al.* **Considerações relacionadas ao diagnóstico e tratamento do papilomavírus humano (HPV) em cavidade oral.** Rev Odontol Univ Cid São Paulo , v. 28, n. 2, p. 117-125, maio/ago, 2016.

EL ACHKAR, V. N. R. *et al.* **Histopathological features of juvenile-onset laryngeal papillomatosis related to severity.** American J Otolaryngol, v. 41, n. 5, p. 1412-1417, 2019. DOI.org/10.1002/hed.25602

FERRARO, C. T. L. *et al.* **Infecção oral pelo HPV e lesões epiteliais proliferativas associadas.** J Bras de Patol Med Lab, v. 47, n. 4, p. 451-459, 2011.

GAMA, A. R. *et al.* **Deteção de HPV em amostras de mucosa oral em pacientes pediátricos.** J Bras Patol Med Lab, v. 57, p. 1-5, 2021.

GIRALDO, P. C. *et al.* **Prevenção da infecção por HPV e lesões associadas com o uso de vacinas.** J Bras Doenças Sex Transm, v. 20, n. 2, p. 132-140, 2009. ISSN:0103-4065

MELLO, C. F. **Vacinação contra papilomavírus humano.** Einstein São Paulo , v. 11, n. 4, p. 547-549, dezembro, 2013. DOI org/10.1590/S1679-45082013000400027

MONTES, C. L., ORTÍZ, M. G., GUERRERO, J. C. H. **Estudo clínico-patológico e imunocitoquímico da hiperplasia epitelial multifocal.** J Oral Maxillofac Surg, v. 65, n. 11, p. 2211-2217, nov, 2007. DOI: 10.1016 / j.joms.2006.11.035

NEVILLE, *et al.* **Patologia Oral e Maxilofacial.** 4ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.
PINHEIRO, S. L. *et al.* **Hiperplasia epitelial papilomatosa em crianças.** Rev Ciênc Médicas. v. 18. n. 5, p. 281-286, 2009. ISSN 1415-5796

PONTES, P *et al.* **Aplicação local de cidofovir como tratamento adjuvante na papilomatose laríngea recorrente em crianças.** Rev Assoc Med Bras, v. 55, n. 5, p. 581-586, 2009. DOI org/10.1590/S0104-42302009000500023

CAPÍTULO 61

MEGAESÔFAGO EM FELINO: RELATO DE CASO

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c61](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c61)

Yuri Gonçalves MATOS¹, Iandra Rebouças da SILVA², Yara Stephanie Ramos RIBEIRO³; Maria Dayana Cordeiro BARRETO⁴, Rodolfo Gurgel VALE⁵

¹ Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), (yurigmatos@gmail.com)

² Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), (iandravet93@gmail.com)

³ Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), (yara.stephanne15@gmail.com)

⁴ Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), (dayanacordeirobarreto@gmail.com)

⁵ Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), (petvallecenter@gmail.com)

Resumo

O megaesôfago é uma afecção com maior incidência em caninos, e raramente encontrada em pacientes felinos. Caracteriza-se por um distúrbio esofágico, levando a um quadro de hipomotilidade ou perda total do peristaltismo desse órgão. Este trabalho tem como objetivo relatar o caso de megaesôfago em um felino de 6 meses de idade, que apresentava o sinal clínico de regurgitação persistente. Foi atendido na clínica Pet Valle Center e submetido a exames hematológicos e radiográficos, por onde foi confirmada a patologia. Como terapia, foi orientado aos tutores o manejo alimentar adequado para o caso. Porém, devido a gravidade do caso, apesar da melhora clínica inicial, o animal veio a óbito. Portanto, para o controle do quadro é necessário diagnóstico precoce e cuidados intensivos dos responsáveis no tratamento em domicílio, o que proporcionará maior qualidade de vida ao animal.

Palavras-chave: Gato; Esôfago; Regurgitação; Esofagograma.

Área Temática: Ciências Agrárias

E-mail do autor principal: yurigmatos@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

O esôfago é um canal muscular, tendo função de conduzir o alimento ingerido da cavidade oral ao estômago (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2013). Para isso, conta com quatro camadas: mucosa, submucosa, muscular e adventícia (LITTLE, 2015). Nesse órgão temos ainda

a presença de dois esfíncteres que impedem o refluxo do conteúdo deglutido: um superior, na transição da faringe para o esôfago; e um inferior, na passagem do esôfago para o estômago (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2013; LITTLE, 2015).

Na presença de conteúdo alimentar na faringe, o esfíncter superior esofágico relaxa para receber o material. Já no esôfago, a musculatura atua em movimentos coordenados, formando um anel de constrição que empurra o conteúdo em sentido aboral, sendo propulso até o estômago (KLEIN, 2014). Esse mecanismo é conhecido como peristaltismo, e causas que comprometam a peristalse esofágica podem levar a quadros patológicos graves.

O megaesôfago é descrito como um distúrbio generalizado e difuso do órgão, causando hipomobilidade ou perda total do peristaltismo dessa região (LITTLE, 2015; TILLEY e SMITH JR., 2015). Pode ter diferentes causas: congênita, secundária a afecções que comprometam o funcionamento muscular, alterações anatômicas, ou idiopática (BORIN-CRIVELLENTI e CRIVELLENTI, 2015). Nos felinos é raramente diagnosticada, e os casos relatados apontam uma maior incidência na raça Siamês (REGO et al., 2009; VALANDRO et al., 2012; LITTLE, 2015; JERICÓ, KOGIKA e ANDRADE NETO, 2015).

Os sinais clínicos observados refletem em condições de disfunção do esôfago, sendo o mais clássico a regurgitação pós-prandial ou horas depois da alimentação (BORIN-CRIVELLENTI e CRIVELLENTI, 2015; LITTLE, 2015; JERICÓ, KOGIKA e ANDRADE NETO, 2015). Progressivamente, pode ser notado perda de peso, desidratação e debilidade do animal (REGO et al., 2009; TILLEY e SMITH JR., 2015). Ainda a pneumonia por aspiração secundária deve ser investigada em casos que apresentem sinais respiratórios como dispneia e tosse, acompanhada de hipertermia (REGO et al., 2009; LITTLE, 2015).

O diagnóstico é sugestivo com histórico e anamnese, e pode ser confirmado através de exames de imagem. A radiografia torácica simples possibilita visualizar o esôfago preenchido com fluido, alimento ou gás, certo grau de deslocamento traqueal, e pode indicar pneumonia por aspiração (TILLEY e SMITH JR., 2015). Para firmar o diagnóstico de megaesôfago, utiliza-se a radiografia contrastada (VALANDRO et al., 2012), que permite visualizar a dilatação esofágica (REGO et al., 2009; BORIN-CRIVELLENTI e CRIVELLENTI, 2015). A endoscopia pode ainda ser somada para melhor avaliação do lúmen e mucosa esofágica (GONZALEZ e IWASAKI, 2001).

A terapêutica indicada consiste em, além de tratamento sintomático do paciente, cuidados com o manejo alimentar, restringindo a pequenas refeições fracionadas, com alimentos líquidos ou pastosos, e mantendo o animal em posição vertical por 10-20 minutos (REGO et al., 2009; LITTLE, 2015; CRIVELLENTI e BORIN-CRIVELLENTI, 2015). A

administração de pró-cinéticos pode auxiliar no tratamento por estimular a peristalse do órgão, mas a farmacodinâmica do medicamento de escolha deve ser estudada. Quando viável, a intervenção cirúrgica pode corrigir a possível causa de base, como anomalias anatômicas e obstruções (TILLEY e SMITH JR., 2015).

Diante disso, o presente relato tem como objetivo expor um caso clínico de megaesôfago em um felino, ressaltando o método diagnóstico, manejo terapêutico do paciente e prognóstico.

2 MÉTODO

Na clínica Pet Valle Center, na cidade de Russas, Ceará, foi atendido um felino, macho, de 6 meses de idade, da raça Persa, pesando 1,9kg. A tutora relatou como queixa principal os episódios de vômito que o gato apresentava há 2 meses. Entretanto, durante anamnese, chegou-se a conclusão de que o conteúdo expelido não era vômito, mas sim alimento regurgitado.

O animal tinha histórico de atendimentos anteriores com outros profissionais. O prontuário médico indicava que já tinha sido realizado internação, fluidoterapia (solução de ringer com lactato), tramadol, dipirona, bromoprida, alimentação por sonda nasogástrica, amoxicilina associada a ácido clavulânico, ceftriaxona, metronidazol, omeprazol, ranitidina, dexametasona, ondansetrona, maropitant e SAMe (S-Adenosil-L-Metionina). Apesar disso, o quadro não era conclusivo ou responsivo efetivamente às condutas instituídas.

No exame físico, o felino apresentava temperamento dócil, comportamento ativo, com temperatura mensurada em 37,3 °C, incursões respiratórias em valores ideais, mas ausculta pulmonar com estertor considerável, mucosas levemente hipocoradas, 2 segundos para tempo de preenchimento capilar, emagrecimento progressivo, com escore corporal em nível 2, somado a desidratação em 6%.

A partir da sintomatologia clínica, a principal suspeita é de patologias relacionadas ao trato digestivo superior. Para avaliação do caso, foi solicitado a realização de hemograma e radiografia de região cervical e torácica. A tutora aceitou a solicitação e realizou os exames.

Na radiografia simples notou-se alteração em topografia de esôfago, sendo indicado radiografia contrastada para elucidação. Nesta ficou claro a alteração denominada de megaesôgafo.

Após conclusão diagnóstica foi prescrito antibióticoterapia e proposto adequação postural e temporal, alimentar e hídrica, na tentativa de estabilizar o quadro clínico que já perdurava 2 meses.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com Jericó et al. (2015), o principal sinal clínico de megaesôfago é a regurgitação, mas é necessário distinguir quando o alimento é regurgitado ou vomitado. Nelson e Couto (2016) diferenciam os dois termos sendo o primeiro a expulsão do material alimentar da cavidade oral, faringe ou esôfago, sem náusea prodrômica e material pouco digerido; enquanto o vômito pode indicar expulsão do conteúdo estomacal ou intestinal, com líquido biliar presente, e normalmente o animal apresenta sinais prodrômicos.

Com as informações relatadas pela proprietária, a suspeita é de que o animal apresentava regurgitação, pois o conteúdo apresentado caracterizava alimento não digerido, em formato tubular, sem contração abdominal para a expulsão, indicando um processo passivo, característico do regurgitado. Portanto, a principal suspeita é de disfunção esofágica, e a avaliação do quadro se torna mais completa com os resultados das análises radiográficas e hematológicas solicitadas.

O paciente foi encaminhado para o setor de diagnóstico por imagem para realização de radiografia torácica. Corroborando com os achados descritos por Tilley e Smith Jr., 2015, é possível visualizar na imagem radiográfica do paciente (Figuras 1) o canal traqueal deslocado e o tubo esofágico preenchido. Indicativos de pneumonia também são visualizados nos lobos pulmonares craniais. A partir disso, foi solicitada radiografia contrastada com sulfato de bário.

Figura 1. Radiografia simples, em projeção látero-lateral esquerda.

Fonte: Arquivo pessoal, 2021.

O procedimento, descrito por Nelson e Couto (2016), foi realizado pela administração de bário líquido, classificado como melhor agente de contraste no estudo esofágico, por fornecer riqueza em detalhes e ser pouco nocivo, caso seja aspirado. Segundo Little, 2015, o contraste

deve ser, em condições fisiológicas, eliminado rapidamente pela peristalse esofágica. Entretanto, em quadros patológicos, o contraste pode ficar retido difusamente pelo órgão, sugerindo disfunção muscular.

Nas imagens radiográficas do paciente após ingestão do contraste (Figuras 2 e 3), o acúmulo da solução na porção torácica do esôfago comprova a dilatação e sugere hipomotilidade peristáltica. Portanto, a hipótese diagnóstica de distúrbio esofágico foi confirmada, apontando para um caso de megaesôfago.

Figura 2. Radiografia contrastada, em projeção látero-lateral esquerda.

Fonte: Arquivo pessoal, 2021.

Figura 3. Radiografia contrastada, em projeção ventro-dorsal.

Fonte: Arquivo pessoal, 2021.

Nos felinos, essa patologia é incomum, e a raça Siamesa parece ter maior predisposição (REGO et al., 2009; VALANDRO et al., 2012; LITTLE, 2015; JERICÓ, KOGIKA e ANDRADE NETO, 2015). Pela idade do animal e sinais clínicos sugestivos recorrentes, podemos sugerir que o caso é de caráter congênito. Segundo Jericó et al. (2015), a causa adquirida frequentemente acomete animais adultos e idosos, enquanto a origem congênita é a mais comum, sendo normalmente vista em filhotes.

A indicação de solicitar análise hematológica segue a descrição de Jericó et al. (2015),

e os achados laboratoriais do caso concordam com as possíveis alterações descritas. Na contagem eritrocitária, foram encontrados valores de $4.690.000/\text{mm}^3$ (quando deveria estar acima de $5.500.000/\text{mm}^3$). Assim como hemoglobina (7.0 g/dl) e hematócrito (21 %), também em contagem abaixo do nível esperado. Enquanto, na análise leucocitária, nota-se neutrofilia ($12.672/\text{mm}^3$), monocitose ($1.152/\text{mm}^3$) com hematoscopia indicando 25% de monócitos ativados, e linfopenia preocupante ($432/\text{mm}^3$). A contagem de plaquetas mostra-se dentro dos valores esperados, porém com presença de agregados plaquetários. Também foi relatada hipoproteinemia (5.4g/dl), associada a hiporexia e emagrecimento progressivo do paciente.

Relacionando essas alterações com os estudos radiográficos e a literatura consultada, sugere-se que o animal apresenta pneumonia por aspiração como complicação do megaesôfago. Rêgo et al. (2009) cita que a complicação pulmonar pela aspiração do refluxo esofágico torna o prognóstico do paciente reservado.

No caso em estudo, o tratamento conservador foi instituído. Consiste, essencialmente, em correção do manejo alimentar, com objetivo de evitar a progressão da dilatação esofágica e complicações por aspiração. Por isso, a conduta médica do paciente segue a literatura de Jericó, Kogika e Andrade Neto (2015), sugerindo o fornecimento de ração triturada e uso de alimentação semi-úmida e úmida. Deve ser oferecida em comedouro elevado, com o animal em postura que favoreça a deglutição.

Corroborando com Rêgo et al (2009), foi instruído ao tutor que o animal fosse mantido em angulação de $45-90^\circ\text{C}$, por até 15 minutos após alimentação. Além disso, Nelson e Couto (2015) sugerem que as refeições sejam oferecidas em pequenas porções, várias vezes ao dia, assim evitando que o alimento fique retido no esôfago.

A terapêutica medicamentosa também pode ser aplicada. É descrito por Klein (2014), que, nos felinos, a porção distal do esôfago é composta por musculatura lisa. Por esse motivo, o uso de pró-cinéticos como metoclopramida (1 mg/kg) e cisaprida (0,25 mg/kg) pode ser indicado, estimulando o movimento peristáltico (Jericó, Kogika e Andrade Neto, 2015). No entanto, outras espécies animais apresentam a camada muscular esofágica composta, completamente, por musculatura estriada, e nesses casos o uso de estimulantes pode não trazer benefício para o quadro.

Com o tratamento conservador indicado, o animal apresentou melhora clínica, porém a rotina, com as necessidades e cuidados intensivos, se tornou inviável para os tutores, resultando no óbito do paciente nas semanas seguintes.

Segundo Jericó, Kogika e Andrade Neto (2015), o prognóstico para megaesôfago congênito é tido como reservado. Isso porque a qualidade de vida e sobrevida do paciente

depende também da disposição do tutor em domicílio. É importante que o momento de refeição do animal seja assistido, seguindo as orientações do Médico Veterinário. Quando essa rotina não é seguida, o paciente pode voltar a apresentar regurgitações persistentes, com riscos de complicações que podem agravar o quadro.

4 CONCLUSÃO

O caso relatado e literatura levantadas demonstram que distúrbios esofágicos sempre devem ser considerados no diagnóstico diferencial em casos de regurgitação persistente. Podemos ressaltar a importância da avaliação radiográfica nesses casos, como ferramenta essencial para um diagnóstico definitivo, possibilitando uma conduta médica efetiva. Além disso, a cooperação do tutor é indispensável para o sucesso da terapia, oferecendo maior qualidade de vida e prolongando a sobrevida do paciente.

REFERÊNCIAS

- CRIVELLENTI, Leandro Zuccolotto; BORIN-CRIVELLENTI, Sofia. Casos de Rotina em Medicina Veterinária de Pequenos Animais. 2. ed. São Paulo: Medvet, 2015.
- GONZALEZ, Janis Regina Messias; IWASAKI, Masao. Estudo radiográfico de afecções esofágicas em cães. Clínica Veterinária, v.33, p.44-46, 2001.
- JERICÓ, Márcia Marques; KOGIKA, Márcia Mery; ANDRADE NETO, João Pedro de. Tratado de Medicina Interna de Cães e Gatos. 1. ed. Rio de Janeiro: Roca. 2015.
- JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, José. Histologia Básica. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
- KLEIN, Bradley G.. Cunningham tratado de fisiologia veterinária. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.
- LITTLE, Susan E.. O Gato: Medicina Interna. 1. ed. Rio de Janeiro: Roca. 2015.
- NELSON, Richard W.; COUTO, C. Guilherme. Medicina Interna de Pequenos Animais. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier. 2015.
- RÊGO, M. S. A.; LIMA, E. R.; LEITE, J. E. B.; SILVA, V. C. L.; FERREIRA, M. A. S.; CAMARGO, N. I.; RODRIGUES, T. L.; OLIVEIRA, W. N. K.; SILVA, B. N.; LIMA, M. V. F. B. Megaesôfago em gato atendido no hospital veterinário do DMV da UFRPE. 2009. Acesso em 29 de agosto de 2020. Disponível em: <http://www.eventosufrpe.com.br/jeplex2009/cd/resumos/R0519-1.pdf>.
- TILLEY, Larry P.; SMITH JR., Francis W. K.. Consulta veterinária em 5 minutos: espécies canina e felina. 5. ed. Barueri: Manole, 2015.

VALANDRO, Marília A.; MARTINS, D. B.; PIETRO, A.; SACCARO, R. O.; SPEROTTO, V. R. Megaesôfago em felino – relato de caso. In: XVII Seminário Intersintitucional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 17, 2012, Cruz Alta. Anais... Cruz Alta: UNICRUZ, 2012.

CAPÍTULO 62

MODIFICAÇÃO DOS HÁBITOS ALIMENTARES E DA SAÚDE MENTAL EM ADULTOS NA PANDEMIA DA COVID-19

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c62](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c62)

Lucas Araújo Ferreira¹, Amanda Vitória do Nascimento da Silva², Ana Jhennyfer da Silva Moreira³, Ariel Christine dos Anjos Solano⁴, Bruna Raciele de Sousa Nascimento⁵, Carliane Cardoso dos Reis⁶, Juliana Oliveira Ferreira⁷, Laisy da Cruz Corrêa⁸, Laisy Nazaré Araújo da Cunha⁹, Yasmin Carvalho Barata Pereira¹⁰

¹ Universidade Federal do Pará (UFPA), (lucas.parasitologist@gmail.com);

² Universidade Federal do Pará (UFPA), (amandavitoria.nascem@gmail.com);

³ Universidade Federal do Pará (UFPA), (jhenny20ana@gmail.com);

⁴ Universidade Federal do Pará (UFPA), (ari.solano97@gmail.com);

⁵ Universidade Federal do Pará (UFPA), (b.raciele.sousa@gmail.com);

⁶ Universidade Federal do Pará (UFPA), (reiscarli1@gmail.com);

⁷ Universidade Federal do Pará (UFPA), (julianaoliveiraferreira27@gmail.com);

⁸ Universidade Federal do Pará (UFPA), (laisy_correa@hotmail.com);

⁹ Universidade Federal do Pará (UFPA), (laisy.cunha33@gmail.com);

¹⁰ Universidade Estácio de Sá, (yasmincbarata@gmail.com)

Resumo

Objetivo: Analisar, através de revisão literária, as alterações comportamentais e modificações nos hábitos alimentares desencadeadas pelo isolamento social durante a pandemia do covid-19. **Método:** Realizada pesquisa bibliográfica na base de dados *SciELO (Scientific Electronic Library Online)* e *Google Scholar* com as palavras-chaves hábitos alimentares, comportamento alimentar, pandemia, COVID-19 e seus correlatos em inglês. Mediante a pesquisa, foram selecionados 4 artigos, com o período de publicação delimitado de 2020 a 2021 e nos idiomas português e inglês. **Resultados:** Os estudos apresentados evidenciaram o agravamento do estado da saúde mental de pessoas que já apresentavam algum transtorno psicossomático. Além disso, a ingestão alimentar de produtos industrializados aumentaram durante o isolamento social, alterando gravemente os hábitos alimentares, que, relacionado às alterações da saúde mental durante o isolamento social, pode contribuir para o desencadeamento de modificações perigosas no estado nutricional e mental do indivíduo. **Conclusão:** Destarte, vê-se a necessidade de novos estudos que avaliem e relacionem o comportamento alimentar e mental durante a pandemia de Covid-19.

Palavras-chave: Hábitos alimentares; Comportamento Alimentar; Pandemia; Covid-19

Área Temática: Ciências da Saúde

E-mail do autor principal: lucas.parasitologist@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

Neste novo cenário epidemiológico, em dezembro de 2019, um novo vírus, o SARS-CoV-2 (*Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2*) classificado na família de coronavírus,

responsável por causar a COVID-19 foi identificado no leste asiático, mais precisamente na cidade de Wuhan, na China (SANTOS; AYRES, 2021). Por sua grande facilidade de contágio, causou grande preocupação para a saúde da população mundial, e, devido isso, em março de 2020 a Organização Mundial da Saúde declarou o surto do novo coronavírus como “Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional”. As recomendações de segurança das autoridades de saúde foram baseadas em medidas restritivas de circulação de pessoas, como a implementação de distanciamento social com objetivo de frear a disseminação do vírus (MAYNARD *et al.*, 2021).

Desde o início, a pandemia do COVID-19 mudou consideravelmente as vidas de cada indivíduo, alterando e afetando o cotidiano, o trabalho e o bem estar social ocasionando disfunções e impactos na saúde mental (ALONZI; TORRE; SILVERSTEIN, 2020). Diversos grupos sentem o impacto que a pandemia causou, principalmente na saúde mental, e é difícil delimitar e montar intervenções para um grupo específico (ALONZI; TORRE; SILVERSTEIN, 2020). Em vista disso, indivíduos com dificuldades na saúde mental são grupos susceptíveis, pois apresentam mudanças no lazer e nos cuidados da saúde mental (ALONZI; TORRE; SILVERSTEIN, 2020).

De acordo com o boletim epidemiológico fornecido pelo Ministério da Saúde, até o mês de fevereiro de 2021 foram confirmados mais de 113 milhões de casos de COVID-19 no mundo, sendo os Estados Unidos o país com maior número de casos, mais de 28 milhões, seguido pelo Brasil com mais de 10 milhões de casos confirmados (BRASIL, 2021).

A pandemia da COVID-19 causou e ainda causa incertezas e inseguranças na população, e por conseguinte pode desencadear sinais e sintomas de problemas psicológicos e, consequentemente doenças mentais no qual estão inseridas a depressão, ansiedade e estresse traumático (BANNA, *et al.*, 2020).

Os transtornos mentais albergam certo sofrimento psiquiátrico ocasionando problemas de sono e vigília, e tudo isso altera o cotidiano, a saúde mental e qualidade de vida dos indivíduos (BARROS, *et al.*, 2020). Ainda segundo Barros *et al.* (2020) tais transtornos mentais podem agravar ou ser um fator de risco para o surgimento de doenças crônicas não transmissíveis e, por conseguinte doenças de cunho viral, no qual no caso de epidemias e o isolamento total, podem ampliar o problema e aumentar os quadros de doenças mentais na população (BARROS, *et al.*, 2020).

Os pacientes que se encontram com suspeita ou já estão infectados pelo coronavírus, podem sentir medo do que possa vir a acontecer, e aos que estão em quarentena, os sentimentos de tédio, solidão e raiva podem surgir e afetar o fator emocional (DUARTE, *et al.*, 2020).

O surgimento de incertezas sobre como conter o número de casos, e sobre o impacto que a doença poderia causar, afetou a saúde mental de cada pessoa mundialmente (SCHIMIDT, *et al.*, 2020). Além disso, as notícias falsas, também chamadas de *fake news*, sobre o processo infeccioso,

medidas de prevenção ou até as orientações sobre os cuidados sanitários, circulam rapidamente e esse equívoco afeta ainda mais o estado psicológico (SCHIMIDT, *et al.*, 2020).

A pandemia apresentou fatores positivos que podem ser levados em consideração, como ter mais contato com a família, além de ter proporcionado a oportunidade de trabalhar remotamente, ou seja, utilizando meios digitais como usar o computador em vídeo chamadas ou conferências *online*, mas os fatores psicológicos negativos predominam (LEUCHT, *et al.*, 2021). E como relata Barros *et al.* (2020) pessoas diagnosticadas com transtornos mentais têm mais chance de ter agravos elevados de estresse e sofrimento psíquico no decorrer da pandemia da COVID-19, ao contrário do que um indivíduo sem transtornos diagnosticados (BARROS, *et al.*, 2020).

A taxa de infecção do SARS-CoV-2 resultou num aumento expressivo, visto pelo número de casos confirmados, e nesse novo cenário pandêmico cuidados e modificações no estilo de vida foram necessários para manter a integridade na saúde da população (DURÃES, *et al.*, 2020). Logo, algumas medidas foram estabelecidas pelo poder governamental, sob a cautela na diminuição da curva de crescimento do número de casos, tais como distanciamento social com restrição de circulação de pessoas em escolas, universidades, teatros, bares, restaurantes e empresas ou serviços de caráter não essencial (DURÃES, *et al.*, 2020).

E com isso houveram mudanças psicológicas como transtornos de ansiedade, sentimentos de medo e tristeza e alteração de humor; pesquisas afirmam que essas modificações causadas pelo vírus podem estar relacionadas com o sistema imunológico e com neurotransmissores, no qual ocasiona mudanças também no comportamento alimentar da população, tanto no aumento da sensação de fome como também no aumento de apetite, causando quadros de excesso de peso e obesidade (OLIVEIRA, *et al.*, 2021; SILVA, *et al.*, 2020).

Além disso, no que pode-se referir ao consumo alimentar com relação ao mapa da fome, o Brasil obteve grande avanço, pois algumas políticas públicas foram criadas justamente para que indivíduos em condições de vulnerabilidade socioeconômica não perecessem (SILVA, *et al.*, 2020). Logo, dentre os programas criados estão o Bolsa Família, e com esse programa houve a redução de 25% da pobreza extrema, ou seja, muitas famílias conseguiram sair de uma condição exacerbada de fome (SILVA, *et al.*, 2020).

Apesar do Brasil ter tido avanço positivo no mapa da fome a décadas atrás, isso mudou durante a pandemia da COVID-19, em que famílias de baixa renda estavam em condições de insegurança e vulnerabilidade alimentar, e por conta disso houveram modificações nos hábitos alimentares (SILVA, *et al.*, 2020). De acordo com Durães *et al.* (2020) o consumo de alimentos e sua comercialização foram afetados, gerando mudanças no aspecto econômico e social, no qual muitas famílias tiveram que optar pelo consumo de alimentos ultraprocessados devido seu baixo custo, maior durabilidade e

dentro do orçamento familiar, e o baixo consumo de alimentos *in natura* como frutas, legumes e verduras foi percebido (DURÃES, *et al.*, 2020).

A obesidade é considerada uma questão multifatorial, e durante a pandemia foi observado crescimento no número de casos de obesidade, e esse fato se intensificou no decorrer da pandemia. Durante a *Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico de 2019* (VIGITEL), foi observado certo aumento, muito significativo da obesidade entre os brasileiros nos últimos anos, partindo de 11,4% em 2006 para 20,3% em 2019 (BRASIL, 2019).

Em detrimento disso, algumas mudanças nas escolhas alimentares durante a pandemia estão relacionadas com esse crescimento ainda mais acelerado da obesidade, no qual está relacionado com os aspectos emocionais, refletindo em um comer transtornado, ou seja, escolhas alimentares não saudáveis, comer sem controle, substituições de refeições por lanches rápidos, serviços de entrega e alto consumo de alimentos ultraprocessados (SMAIRA, *et al.*, 2021).

Desde o começo das restrições causadas pela pandemia da COVID-19, aumentou-se o consumo de alimentos caracterizados como *junk food*, e isso resultou num hábito alimentar desregulado com pouco consumo de alimentos *in natura*, em que o público afetado é variado, desde crianças, adolescentes até aos adultos, que tiveram seu estado nutricional alterado comprometendo sua condição de saúde (POELMAN, *et al.*, 2021).

2 MÉTODO

O presente estudo trata-se de uma revisão sistemática da literatura, realizada durante o mês de agosto de 2021. Para sua construção, foram selecionados 04 artigos científicos, consultados nas bases de dados SciELO (Scientific Electronic Library Online) e PubMed, e para a busca, utilizou-se os respectivos descritores "hábitos alimentares (*Eating Habits*), comportamento alimentar (*Feeding behavior*), pandemia, (*Pandemic*) e COVID-19". Foram considerados como critérios de inclusão: Artigos científicos publicados em periódicos durante o período de 2020 a agosto de 2021, nos idiomas português e inglês, pertinentes e correspondentes ao objetivo do trabalho. Quanto aos critérios de exclusão, foram descartados todos os artigos que não obedeciam aos critérios acima citados, além de livros e diretrizes. Os artigos selecionados foram lidos integralmente e organizados em planilhas para melhor análise e construção de ideias de caráter científico, crítico e reflexivo baseadas em diferentes fontes textuais produzidas por diferentes autores que permitem subsidiar as questões aqui argumentadas. Em relação aos aspectos éticos, o presente estudo poderia apresentar como risco, a não citação dos autores dos artigos selecionados, não apresentando a correta referência dos mesmos. Para evitar a ocorrência deste risco, foi adotado o uso de planilhas que catalogaram

todos os estudos selecionados, com todas as informações de autores, ano, título e *link* de acesso direto à revista ao qual o artigo está disponível. Como benefício desta pesquisa, observa-se a grande contribuição que a mesma oferece à comunidade científica, visto que é um tema atual, relevante e ainda pouco estudado devido a conjuntura pandêmica atual.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tabela 1- Resultados bibliográficos encontrados na literatura.

Título do artigo	Tipo de estudo	Metodologia	Resultados	Conclusão
Impacto da pandemia de coronavírus (COVID-19) no comportamento alimentar. (2021)	Estudo transversal (Nível de evidência 1B)	Os dados derivam de um projeto aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Para a coleta foram incluídos adultos com idade igual ou superior a 20 anos e menor que 59 anos, residentes no Brasil de ambos os sexos. Estes foram participaram por meio de um formulário eletrônico disponibilizado em meios de comunicação e redes midiáticas com o Instagram, Facebook e Whatsapp. O questionário era constituído em duas partes, a qual uma se referia acerca do consumo e hábitos alimentares e a outra era voltada sobre a COVID-19. Com o preenchimento dos dados foi realizada uma análise descritiva à obtenção dos resultados das variáveis qualitativas e de mediana às quantitativas.	Das 186 pessoas que tiveram sua participação validada, observou-se a prevalência do público feminino, da faixa etária de 20 a 29 anos, dos residentes do estado do Rio de Janeiro, com o isolamento social parcial e não considerado do grupo de risco. Ainda, apontou-se que houve uma piora acerca dos hábitos alimentares durante a pandemia, assim como na saúde mental, além de um ganho de peso. Ao comparar o antes e o depois da pandemia, os hábitos alimentares sofreram um impacto significativo, fazendo com que ocorresse uma mudança no padrão e no comportamento alimentar sob a possível influência da restrição social e da saúde mental.	Como conclusão, o estudo indica que o confinamento domiciliar tem um efeito adverso no comportamento alimentar, e que mesmo apresentando uma amostra de baixa representatividade infere que os achados possam auxiliar no desenvolvimento de recomendações nutricionais com o intuito de manter a saúde em época de isolamento social e compreender as perspectivas associados à alimentação e os fatores que a interferem.
Food consumption and anxiety among the adult population during the COVID-19 pandemic in Brazil (2020)	Estudo descritivo (nível de evidência 6) e Estudo transversal (nível de evidência 1B).	No estudo foram incluídos adultos brasileiros de 18 a 59 anos de ambos os sexos com sintomas ou não da COVID-19. Para a coleta de dados utilizou-se um formulário online divulgado em mídias sociais. O questionário constou com elementos de investigação acerca dos aspectos sociodemográficos e antropométricos; sintomas, histórico de contato com o vírus, modificações de hábitos alimentares e atividade física no período de isolamento social, consumo de alimentos durante o confinamento e sintomas de ansiedade.	1000 questionários foram sancionados, obtendo uma prevalência de participantes da região nordeste, entre a faixa etária média de 31 anos e do sexo feminino. No artigo é evidenciado que 84% da amostra demonstrou ansiedade, sendo majoritariamente a ansiedade grave. A partir da análise do Questionário de Frequência Alimentar (QFA), notou-se que pessoas sem ansiedade consumiram com maior regularidade os alimentos pertencentes ao grupo saudáveis em comparação	Em suma, o artigo mostra os danos causados pela pandemia na saúde, em especial a mental. Concluiu também que houve alterações no tocante à dieta, tendo um aumento das preparações das refeições em casa em razão do isolamento social e o aumento de alimentos saudáveis nos voluntários que não tiveram ansiedade.

			àqueles que tiveram algum nível de ansiedade. Ainda, destacou que no grupo dos alimentos não saudáveis houve uma predominância da ingestão de doces, embutidos e refrigerantes, a qual foram associados estatisticamente a indivíduos com ansiedade, observando a interferência do transtorno psicológico no comportamento alimentar.	
The COVID-19 Pandemic and changes in adult Brazilian lifestyles: a cross-sectional study, 2020. (2020)	Estudo transversal (Nível de evidência 1B)	Por intermédio de um inquérito de saúde virtual “ConVid, Pesquisa de Comportamento” a coleta de dados utilizou pessoas na idade de 18 anos ou mais, residentes no território brasileiro durante a pandemia de COVID-19. Nesse questionário os achados referem-se a respeito das questões sociodemográficas, o consumo de cigarro e bebidas alcoólicas, hábitos alimentares, atividade física, sedentarismo e uso de meios televisivos e de computadores.	Na amostra final de 45.16, percebe-se o aumento da ingestão de bebidas alcoólicas em decorrência da ansiedade e tristeza, do medo, insegurança, bem como do risco de morte e ainda há a redução do consumo dos alimentos saudáveis durante a restrição social acometida pela pandemia da COVID-19. Foi atentado que o consumo de alimentos não saudáveis durante a semana com dois dias ou mais, aumentou significativamente. Arelado a isso, destacou-se a diminuição considerável de atividades físicas e um sedentarismo expressivo associado ao tempo de uso de televisão, computador e tablet.	O estudo aponta o aumento de comportamentos de risco à saúde em consequência do estilo de vida dos adultos provocados por fatores estressores no período pandêmico.
Eating behavior in times by Covid-19 (2021)	Estudo longitudinal prospectivo (Nível de evidência 2B)	A pesquisa teve início após a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa, sendo efetuada em dois momentos. No estudo foram incluídos indivíduos maiores de 18 anos do feminino e do masculino que consentiram responder os questionários.	Depois do levantamento e da análise dos dados obtidos, notou-se um aumento na ingestão de alimentos ultraprocessados mesmo que o aumento do consumo de verduras, frutas e legumes tenha sido significativo, visto que as emoções podem interferir no comportamento alimentar e, por consequência, dar preferência a alimentos que contenham bastante carboidrato as quais causam sensações de relaxamento e conforto.	Teve-se comportamentos compensatórios positivos e negativos entre a população estudada. No positivo destacam-se o crescimento da ingestão de alimentos preparados em casa e o aumento do exercício físico, já no negativo apontou-se uma crescente no consumo de bebidas alcoólicas e um comer atrelado a emoções.

Fonte: Autores (2021).

Dos artigos selecionados, todos foram do tipo transversal, dois foram uma pesquisa por meio de redes sociais e um por intermédio de um inquérito de saúde virtual. Diante dos resultados, de

acordo com a pesquisa de Santos; Ayres, (2021) realizada com 186 pessoas, sendo a maioria composta pelo público feminino, na faixa etária de 20 a 29 anos de idade. Verificou-se que houve uma piora acerca dos hábitos alimentares durante a pandemia, pois o consumo de refeições prontas industrializadas (17,74%), biscoitos e lanches prontos (38,17%) aumentou em comparação ao consumo durante a pandemia (refeições prontas industrializadas, biscoitos e lanches prontos, respectivamente 25,81% e 45,16%) (SANTOS; AYRES, 2021).

As incertezas da COVID-19 ameaçam não só a saúde física das pessoas, como também a saúde mental, estudos apontam que respostas psicológicas e emocionais desencadeadas pela pandemia podem aumentar o risco de desenvolver uma alimentação disfuncional (LI *et al.*, 2020; MONTEMURRO 2020; WANG *et al.*, 2020 Apud OLIVEIRA *et al.*, 2021). Os autores Santos; Ayres, (2021) observaram ainda, agravos na saúde mental, além de ganho de peso. Ademais, segundo o estudo de Maynard *et al.*, (2021) o qual analisou o padrão alimentar e a ansiedade da população adulta durante o surto do Coronavírus no Brasil, o público apresentou faixa etária média de $31 \pm 15,37$, sendo a maior parte do sexo feminino, foi evidenciado que 84% da amostra demonstrou ansiedade, sendo caracterizada como ansiedade grave, além disso, destacou-se que, no grupo dos alimentos não saudáveis houve uma predominância da ingestão de doces, embutidos e refrigerantes, os quais foram associados estatisticamente a indivíduos com ansiedade, observando a interferência do transtorno psicológico no comportamento alimentar. De acordo com esses artigos é possível notar que no momento da quarentena, ocorreram graves mudanças tanto na saúde mental quanto em relação aos hábitos alimentares, fatores que influenciam também no aumento do ganho de peso (MAYNARD *et al.*, 2021).

Na pesquisa de Maynard *et al.*, (2021) foi encontrado um dado relevante, cerca de 29,5% da população estudada foi classificada em sobrepeso, um valor elevado e preocupante, visto que aumenta o risco de desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. Por esse motivo, vale ressaltar que a obesidade está diretamente relacionada com uma dieta baseada em alimentos ultraprocessados, como bebidas açucaradas e *fast foods*, contendo uma alta concentração de substâncias críticas (MARTINS, 2018). Ademais, nas últimas décadas, a população aumentou o consumo desse tipo alimentos e sabe-se que neles contém alta densidade calórica, alta palatabilidade, baixo poder sacietógeno e de fácil absorção e digestão, fatores os quais contribuem e favorecem o aumento da ingestão alimentar, acarretando um desequilíbrio energético (ABESO, 2016). Isto corresponde com o estudo de Aro; Pereira; Bernardo, (2021) no qual foi avaliado a mudança dos hábitos alimentares durante a pandemia, foram notáveis algumas mudanças como um aumento do consumo de alimentos em quantidade exagerada, o comer relacionado com as emoções, consumo de alimentos fora dos horários das refeições e o hábito de “beliscar”, com preferência para os doces. Os autores apontam

que todos estes fatores estão relacionados com o aumento de peso da maioria dos participantes durante a pandemia.

Pacientes com sobrepeso ou obesidade podem apresentar sintomas de estresse, como ansiedade, depressão, nervosismo, além de ter o hábito de se alimentar em resposta a problemas emocionais, logo, a partir disso, pode-se sugerir que há relação entre estresse, compulsão por comida palatável, transtorno de compulsão alimentar e obesidade (ABESO, 2016). Isso pode ser observado na pesquisa de Malta *et al.*, (2020) no qual percebeu-se o aumento da ingestão de bebidas alcoólicas em decorrência da ansiedade e tristeza, do medo, insegurança, bem como do risco de morte, aumento no consumo de alimentos não saudáveis durante a semana e ainda houve a redução do consumo dos alimentos saudáveis durante a restrição social acometida pela pandemia da COVID-19 (MALTA *et al.*, 2020). De acordo com Sominsky; Spencer, (2014) o estresse sendo agudo moderado ou crônico moderado pode influenciar o apetite, incluindo impulsos para comer e na escolha do tipo de alimentos.

O estudo de Andrade *et al.*, (2019) mostrou que, no Brasil, há maior consumo de alimentos ultraprocessados quando as refeições são realizadas fora de casa em comparação quando são realizadas apenas em domicílio. Sendo assim, pode-se concluir que com a pandemia e o fechamento de estabelecimentos como restaurantes entre outros pontos comerciais, os cidadãos ao ficarem mais tempo em casa deveriam aproveitar para desenvolver o hábito de realizar preparações de forma mais saudável, contudo, há alguns fatores que poderiam interferir na mudança de comportamentos alimentares menos saudáveis, como a maior dificuldade em obter alimentos frescos, pois demandaria saídas mais frequentes de casa (STEELE *et al.*, 2020).

4 CONCLUSÃO

Nesse contexto, os estudos analisados evidenciaram uma relação direta entre impactos na saúde mental e no consumo alimentar durante o período de isolamento social, tendo em vista que pessoas sem alterações na saúde mental, melhoraram a ingestão alimentar, com variedade dos grupos alimentares, menor ingestão de produtos alimentícios industrializados, além do aumento da prática de cozinhar. Entretanto, notou-se também mudanças relacionadas ao ganho de peso, a piora dos hábitos alimentares em pessoas que já apresentavam algum transtorno de ordem mental, com aumento da ansiedade e tristeza.

Os indivíduos diagnosticadas com algum tipo de transtorno de ansiedade, consomem mais alimentos de origem industrializada - seja através de doces, embutidos ou bebidas alcoólicas, a ingestão destes alimentos é uma forma compensatória de lidar com eventos adversos, como o isolamento social, e estados negativos de humor, como o aumento da tristeza e do medo causados pela incerteza da pandemia, além de alterações do estado nutricional que podem agravar a saúde

mental de indivíduos já afetados.

Desse modo, é necessário mais pesquisas sobre o impacto do isolamento social em decorrência da pandemia da COVID-19, no aspecto mental e alimentar do indivíduo, tendo em vista que os efeitos desencadeados podem permanecer latentes se não houver intervenção adequada e eficaz. Ademais, o estado pandêmico permanece vigente, logo, as consequências geradas por esta situação necessitam de mais estudos para determinar se as conclusões iniciais permanecerão ou serão alteradas por outras consequências associadas à pandemia.

REFERÊNCIAS

ABESO - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA O ESTUDO DA OBESIDADE E DA SÍNDROME METABÓLICA. Diretrizes brasileiras de obesidade. São Paulo, 2016.

ALONZI, S; TORRE, A. L; SILVERSTEIN, M. W. The Psychological Impact of Preexisting Mental and Physical Health Conditions During the COVID-19 Pandemic. **Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy**, 2020, Vol. 12, No. S1, S236–S238.

ANDRADE, G; GOMBI-VACA, M; LOUZADA, M; AZEREDO, C; LEVY, R. B. The consumption of ultra-processed foods according to eating out occasions. **Public Health Nutrition**, v. 23, n. 6, p, 1041-1048, 2020. DOI:10.1017/S1368980019002623.

ARO, F; PEREIRA, B. V; BERNADO, D. N. A. Comportamento alimentar em tempos de pandemia por Covid-19. **Brazilian Journal of Development**. Curitiba, v.7, n.6, p.59736-59748, 2021.

BANNA, M. H. A. SAYEED, A; KUNDU, S; CHRISTOPHER, E; HASAN, M. T; BEGUM, M. R; KORMOKER, T. DOLA, S. T. I; HASSAN, M. M; CHOWDHURY, S. KHAN, M. S. I. The impact of the COVID-19 pandemic on the mental health of the adult population in Bangladesh: a nationwide cross-sectional study. **International Journal of Environmental Health Research**.

BARROS, M. B. A. LIMA, M. G; MALTA, D. C; SZWARCOWALD, C. L; AZEVEDO, R. C. S; ROMERO, D; JÚNIOR, P. R. B. S; AZEVEDO, L. O; MACHADO, I. E; DAMACENA, G. N; GOMES, C. S; WERNECK, A. O; SILVA, D. R. P; PINA, M. F; GRACIE, R. Relato de tristeza/depressão, nervosismo/ansiedade e problemas de sono na população adulta brasileira durante a pandemia de COVID-19. **Epidemiol. Serv. Saúde**, Brasília, v. 29, n. 4, 2020.

BRASIL. Boletim epidemiológico especial: doença pelo Coronavírus COVID-19. Semana Epidemiológica 8 (21 a 27/2/2021).

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico (2006)**. Brasília, 2007.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico (2019)**. Brasília, 2020.

MAYNARD, D. C; ANJOS, H. A; MAGALHÃES, A. C. V; GRIMES, L. N; COSTA, M. G. O; SANTOS, R. B. Food consumption and anxiety among the adult population during the COVID-19 pandemic in Brazil. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 11, p. e4279119905-e4279119905, 2020.

SANTOS, R. S. M; AYRES, E. M. Impacto da pandemia de coronavírus (covid-19) no comportamento alimentar. **SEMEAR: Revista de Alimentação, Nutrição e Saúde**, v. 2, n. 3, p. 24-27, 2021.

DURÃES, S. A. SOUZA, T. S; GOMES, Y. A. R; PINHO, L. Implicações da pandemia da covid-19 nos hábitos alimentares. **Unimontes Científica**, Montes Claro (MG), v. 22, n. 2, p. 1-20, 2020.

LEUCHT, S. A; CIPRIAN, A; FURUKAWA, T. A; PETER, N; PAPAKONSTANTINOU, T; HOLLOWAY, A; SALANTI, G. Living meta-ecological study of the consequences of the COVID-19 pandemic on mental health. **European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience**, v. 271, p. 219-221, 2021.

MALTA, D. C; SZWARCOWALD, C. L; BARROS, M. B. A; GOMES, C. S; MACHADO, I. E; JÚNIOR, P. R. B. S; ROMERO, D. E; LIMA, M. G; DAMACENA, G. N; PINA, M. F; FREITAS, M. I. F; WERNECK, A. O; SILVA, D. R. P. S; AZEVEDO, L. O; GRACIE, R. The COVID-19 Pandemic and changes in adult Brazilian lifestyles: a cross-sectional study, 2020. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 29, 2020.

MARTINS, ANA PAULA BORTOLETTO. É preciso tratar a obesidade como um problema de saúde pública. **Revista de Administração de Empresas**. 2018, v. 58, n. 3, p. 337-341.

OLIVEIRA, L. V; ROLIN, A. C. P; SILVA, G. F; SANTOS, N. R; ARAÚJO, L. C; BRAGA, V. A. L; COURA, A. G. L. Changes in Eating Habits Related to the Covid-19 Pandemic: A Literature Review. **Brazilian Journal of Health Review**, Curitiba, v.4, n.2, p. 8464-8477, 2021.

POELMAN, M. P; GILLEBAART, M; SCHLINKERT, C; DIJKSTRA, S. C; DERKSEN, E; MENSINK, F; HERMANS, R. C. J; AARDENING, P; RIDDER, D; VET, E. Eating behavior and food purchases during the COVID-19 lockdown: A cross-sectional study among adults in the Netherlands. **Appetite**, v. 157, 2021.

SCHMIDT, B; CREPALDI, M. A; BOLZE, S. D. A; NEIVA-SILVA, L; DEMENEC, L. M. Saúde mental e intervenções psicológicas diante da pandemia do novo coronavírus (COVID-19). **Estud. Psicol.**, Campinas, v. 37, 2020.

SILVA, R. C. R; PEREIRA, M; CAMPELLO, T; ARAGÃO, E; GUIMARÃES, J. M. M; FERREIRA, A. JF; BARRETO, M. L; SANTOS, S. M. C. Implicações da pandemia COVID-19 para a segurança alimentar e nutricional no Brasil. **Ciência e Saúde Coletiva**, v. 25, n. 9, p. 3421-3130, 2020.

SMAIRA, F. I; MAZZOLANI, B. C; ESTEVES, G. B; ANDRÉ, H. C. S; AMARANTE, M. C; CASTANHO, D. F; CAMPOS, K. J; BENATTI, F. B; PINTO, A. J; ROSCHEL, H; GUALANO, B; NOCOLETTI, C. F. Poor eating habits and selected determinants of food choice were associated with ultraprocessed food consumption in brazilian woman during the COVID-19 pandemic. **Brief research report**, v. 8, 2021.

SOMINSKY, E.; SPENCER, S. J. Eating behavior and stress: a pathway to obesity. **Frontiers in psychology**, vol, 5, n. 434. p. 8. 2014. DOI: 10.3389/fpsyg.2014.00434.

STEELE, E. M.; RAUBER, F.; COSTA, C. dos S.; LEITE, M. A.; GABE, K. T; LOUZADA, M. L. da C.; LEVY, R. B.; MONTEIRO, C. A. Mudanças alimentares na coorte NutriNet Brasil durante a pandemia de covid-19. **Revista de Saúde Pública** , [S. I.] , v. 54, p. 91, 2020.

CAPÍTULO 63

MOTIVAÇÃO E ROTATIVIDADE EM ACADEMIAS DE GINÁSTICA

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c63](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c63)

Artur Zanini Rosa Gaudereto. arturzanini2000@gmail.com. Centro Universitário Una Contagem.
Franco Noce. fnoce@hotmail.com. Universidade Federal de Minas Gerais.
Jonatan Lima de Oliveira. jl.00oliveira@hotmail.com. Centro Universitário Una Contagem.
Izabel Cristina Passos de Souza. zabelcristinapsouza@gmail.com. Centro Universitário Una Contagem.
Jhuly Pimenta de Sousa. jhuly.sousa.pimenta@gmail.com. Centro Universitário Una Barreiro.
Vítor Hugo Palma de Lima. vitopalma.lima25@yahoo.com. Centro Universitário Una Contagem.
Marcos Antonio Campelo Lopes. marcoslopes.1773@aluno.una.br. Centro Universitário Una Linha Verde.
Cristina Carvalho de Melo. Carvalho.cristina@gmail.com. Centro Universitário Una. Universidade Federal de Minas Gerais.

RESUMO

Buscar e desfrutar de uma melhor qualidade de vida é o objetivo de muitas pessoas que buscam a realização de exercícios físicos em locais especializados, as academias de ginástica. No entanto a frequência dos praticantes vem apresentando irregularidade contribuindo para o aumento da rotatividade em academias. **Objetivo:** identificar os principais motivos que levam um indivíduo a iniciar, permanecer e abandonar a prática de exercícios físicos em academias de ginástica, e ainda, identificar os fatores responsáveis pela rotatividade. **Método:** A amostra foi composta por duzentos alunos de uma academia de ginástica localizada em Minas Geraí, de ambos os sexos, na faixa etária de 06 a 67 anos. Os dados foram coletados através de questionários, aplicados na academia. **Resultados:** Após a análise estatística dos dados, observa-se que o principal motivo para o indivíduo selecionar uma academia para a prática é a “proximidade” da mesma de suas residências ou trabalho. Que para se iniciar a prática em academia o motivo “melhora na saúde” foi o mais importante. Para permanecer na academia o motivo “qualidade dos profissionais” foi considerado o mais importante. E para o abandono o “acompanhamento imprudente” foi o motivo apontado como mais importante. **Considerações finais:** pode-se concluir que o principal motivo para se iniciar a prática de exercícios em uma academia está relacionado à busca da saúde e ainda, que a rotatividade pode ser associada aos motivos apontados como importantes, tanto para a permanência, quanto para o abandono da academia de ginástica.

Palavras-chave: Motivação; Exercício físico; Aderência.

1 INTRODUÇÃO

A atividade física e/ou exercício físico são indispensáveis para se obter uma boa qualidade de vida (WHO, 2020; RODEL et al., 2020; BURNS e MURRAY, 2014). No mundo moderno, ou seja, na era da tecnologia e da mecanização, o esporte e/ou prática de exercícios físicos vem ganhando espaço fundamental, na prevenção na conservação e na melhoria dos padrões fisiológicos do ser humano (DOMINSKI et al., 2020). As experiências e as evidências científicas confirmam o velho princípio: o exercício físico constitui uma parte integral da vida humana e o homem necessita de um mínimo dessa atividade para manter-se orgânica e emocionalmente sadio (RODEL et al., 2020; HOWLEY e FRANKS, 2000; MOLINARI, 2000).

O aspecto psicológico em muito é afetado pela prática de exercícios físicos e melhoras significativas são observadas. O exercício físico promove uma vida mais saudável, produtiva e agradável, e ainda promove vários ganhos ao corpo e mente como, por exemplo, aumento na capacidade de resistência psicofísica (aumentando a performance física e mental), maior habilidade do sistema nervoso, melhora a sensação de bem-estar, aumento da autoestima, aumento da consciência corporal, além de outros já mencionados (RODEL et al., 2020).

Um dos problemas identificados para a prática regular de exercícios físicos é manter a frequência, a rotatividade de alunos é um problema crescente na grande maioria das academias de ginástica (DOMINSKI et al., 2020). Pode-se considerar que os fatores motivacionais podem afetar diretamente a continuidade da prática de exercícios físicos em academias, já que conscientemente, ela apresenta somente benefícios, não só nos aspectos físicos, como mentais, afetivos e sociais (CASTRO et al., 2021; DOMINSKI et al., 2020).

Segundo SAMULSKI (1995, p.55), “*Motivação é um processo ativo, intencional e dirigido a uma meta, o qual depende da interação de fatores pessoais (intrínsecos) e ambientais (extrínsecos)*”. Neste sentido, fatores externos podem estar relacionados à estrutura física oferecida pela academia, ao difícil acesso da mesma pelo aluno, as condições econômicas, a incompetência dos profissionais atuantes na área, ao pouco tempo disponível, ou seja, pode relacionar-se a diversos fatores ambientais. Já os fatores internos podem estar relacionados a não identificação com o grupo freqüentador da academia, a falta de autoestima, a saída de amigos da academia, entre outros (CASTRO et al. 2021; DOMINSKI et al., 2020).

Partindo desse pressuposto, torna-se instigante a busca de respostas para se justificar de alguma forma a rotatividade, problema comum nas academias de ginástica, analisando-se os níveis motivacionais presentes para a prática de exercícios físicos (CASTRO et al., 2021). Cabe ao profissional, conscientizar seu aluno direcionando-o melhor à atividade, esclarecendo

possíveis dúvidas. Em um treinamento personalizado deve-se considerar a individualidade, respeitando os limites em busca de um determinado objetivo (CASTRO et al., 2021; DELIBERADOR, 1998). Sendo assim, o objetivo do estudo foi identificar os principais motivos que levam uma pessoa a iniciar, permanecer e abandonar a prática de exercícios físicos em academias de ginástica.

2 METODOLOGIA

Participaram do estudo 200 alunos de uma academia de ginástica de MG, sendo estes de ambos os sexos, na faixa etária entre 06 e 67 anos. Para coleta dos dados aplicou-se um questionário baseado em ALVIM e NOCE (1999), sendo este composto por quatro partes distintas: a primeira parte, composta pelos dados demográficos; a segunda, pelos motivos básicos para a prática do exercício em academia; a terceira pelos motivos de permanência na academia e a quarta parte, pelos motivos que levariam o indivíduo abandonar a prática de exercícios físicos em academia.

Pediu-se autorização prévia para aplicação dos questionários, informando sobre todas as etapas e procedimentos adotados na realização da pesquisa. A autorização foi oficializada em documento assinado pelo proprietário, dando-se então, início à coleta de dados, que aconteceu em todos os horários de funcionamento da academia. A abordagem aos alunos foi de forma direta, com apresentação prévia do pesquisador, que forneceu informações sobre o objetivo do questionário a ser aplicado. A participação foi voluntária, sendo garantida ao entrevistado total discrição quanto à sua identidade. A seleção da amostra foi realizada de forma aleatória, garantindo a representatividade do estudo. A abordagem foi realizada preferencialmente, no momento em que os alunos estivessem realizando atividade na esteira ou bicicleta, evitando-se ao máximo causar prejuízo a sua prática.

Realizou-se uma análise estatística e descritiva dos dados e ainda de uma análise de variância (ANOVA One Way), para comparação dos grupos em relação à idade, sexo e outros. Todos os procedimentos foram realizados através do pacote estatístico SPSS for Windows.

Toda pesquisa se realizou dentro das normas éticas sugeridas pelo Comitê de Ética da UFMG, sendo aprovada sob o número 30783914.3.0000.5149.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Pode-se verificar que, dentre os duzentos alunos que compõem a amostra, encontra-se uma idade mínima de seis anos e idade máxima de 67 anos, assim como afirma RUFINO (2000), quando diz que a faixa etária dos frequentadores varia muito. A média de idade do grupo é de 29,67 anos ($\pm 11,55$). Tal resultado confirma afirmativas de NOVAES (2001), quando menciona que as idades dos praticantes de academia encontram-se inferior a 30 anos.

3.1 MOTIVOS PARA SELEÇÃO DA ACADEMIA

Gráfico1. Motivo principal para seleção de uma academia (geral)

Pode-se perceber no Gráfico 1, que dentre os doze motivos relacionados, a proximidade foi o mais mencionado (80 alunos). Estar próxima da residência ou do trabalho, ter acesso facilitado é considerado ponto primordial para maioria os indivíduos que procuram uma academia. LEITE NETO (1994) já afirmava a importância da localização da academia. O segundo motivo mais indicado como seletivo são as recomendações, de amigos, parentes, até mesmo de pessoas que já frequentam a academia. Tornando-se importante, considerar as recomendações de CONTURSI (1996), quando afirma que clientes insatisfeitos geram transtornos, pois podem muitas vezes ser referencial para novos alunos. O terceiro motivo mais mencionado foi a qualidade, que é de fundamental importância para o sucesso da academia. Os demais motivos como: profissionais, patrocínio, estrutura da academia, tradição da mesma, falta de opção no mercado entre outros, tiveram menos ocorrência, mas não deixam de ter grande importância.

3.2 MOTIVOS PARA INICIAR A PRÁTICA DE EXERCÍCIOS

Quadro 1. Motivos para se iniciar exercícios físicos em academia (geral)

	Média	Desvio Padrão	
01- Recomendação de amigos	1,34	1,11	
02- Recomendação médica	1,27	1,36	
03- Melhorar esteticamente	2,45	0,71	
04- Melhorar o condicionamento físico	2,76	0,47	
05- Ampliar o ciclo de amizades	1,46	0,92	
06- Busca de um acompanhamento personalizado	1,79	1,01	
07- Obtenção de maior segurança	1,65	1,12	
08- Lazer	1,70	0,97	
09- Aumentar a auto-estima	2,18	0,93	
10- Aumentar a motivação para a atividade	2,29	0,85	
11- Bom espaço físico para realizar atividade	2,02	0,89	
12- Contar com profissionais habilitados	2,77	0,51	
13- Contar com equipamentos adequados	2,81	0,47	
14- Desfrutar de atividades diversificadas	2,36	0,80	
15- Flexibilidade dos horários para prática	2,51	0,74	
16- Maior privacidade durante a prática	1,73	0,99	
17- Melhorar a saúde	2,91	0,34	

Ao se analisar o Quadro 1, deve-se ressaltar que os diversos motivos nela relacionados são classificados em 4 níveis de importância, seguindo a seguinte relação: 0 – nenhuma importância; 1 – pouco importante; 2 – relativa importância e 3 – muita importância. Levando-se em consideração essa relação, pode-se observar que o motivo “melhorar a saúde” apresenta média de 2,91 ($\pm$ 0,34), ou seja, foi o motivo que mais recebeu classificação de muito importante, sendo considerado o mais importante para se iniciar a prática de exercícios físicos em academia. Nota-se por este resultado que os alunos estão associando saúde à prática de atividade física, o que vem a confirmar a maior conscientização dos indivíduos quanto aos benefícios da prática, afirmado diversos autores como HOWLEY e FRANK (2000), MOLINARI (2000) entre outros. O motivo “contar com equipamentos adequados” apresentou a segunda maior média, 2,81 ($\pm$ 0,47), seguido pelo motivo “contar com profissionais habilitados” e “melhorar o condicionamento físico”. Dentre os motivos relacionados o que apresenta menor média é “recomendação médica”, com 1,27 ($\pm$ 1,36), contradizendo afirmações de RUFINO (2000), que menciona que aumenta consideravelmente o número de pessoas que procuram academias por recomendações médicas.

3.3 MOTIVOS PARA PERMANÊNCIA NA ACADEMIA

Quadro 2. Motivos para permanência na academia (geral)

	Média	D. Padrão	
01- Conforto	2,30	0,84	
02- Acesso facilitado	2,40	0,86	
03- Preço acessível	1,80	1,05	
04- Ambiente agradável e favorável	2,61	0,57	
05- Qualidade dos profissionais	2,87	0,35	
06- Acompanhamento de um profissional	2,77	0,51	
07- Obtenção de resultados satisfatórios	2,63	0,58	
08- Amizades	1,80	0,90	
09- Infraestrutura da academia	2,43	0,61	
10- Conforto	2,34	0,69	
11- Flexibilidade no tempo de prática	2,58	0,62	
12- Variabilidade de horários	2,59	0,62	
13- Atenção da direção e coordenadores da academia	2,28	0,82	
14- Propiciar a participação em evento	1,18	1,03	

Observando-se o Quadro 2 e considerando-se que os motivos são classificações em níveis de importância, de 0 a 3, onde 0 representa nenhuma importância, 1 representa pouca importância, 2 representa relativa importância e 3 muita importância, nota-se que, o motivo “qualidade dos profissionais” é classificado como o mais importante para a permanência dos indivíduos na academia, apresentando uma média de 2,87 ($\pm 0,35$), a maior entre os demais motivos. O segundo motivo mais importante para os alunos para a permanência é “acompanhamento de um profissional” que apresenta uma média de 2,77 ($\pm 0,51$). A terceira maior média foi para o motivo “obtenção de resultados”, fato compreensível, pois segundo SAMULSKI e LUSTOSA (1996), as academias reúnem pessoas que buscam além de prática de exercícios físicos supervisionados os diversos benefícios que o mesmo proporciona. Dentre os motivos, “propiciar a participação em eventos” apresenta uma média de 1,18 ($\pm 1,03$), a menor entre os demais motivos. Ornelas et al. (2019), apontam uma tendência das mulheres a considerar uma quantidade maior de barreiras para a prática de exercício físico quando comparadas aos homens. Os homens tendem a apontar a falta de tempo como motivo principal do afastamento das academias (CASTRO et al.; 2021).

3.4 MOTIVOS PARA O ABANDONO DA PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS EM ACADEMIA

Quadro 3. Motivos para o abandono da prática exercícios físicos (geral)

Motivos	Média	D. Padrão	
01- Não obtenção de resultados	1,81	1,08	
02- Problemas de relacionamento com outros praticantes	0,59	0,88	
03- Problemas de relacionamento com professores	1,52	1,13	
04- Problemas de relacionamento com funcionários	1,08	1,02	
05- Acompanhamento insuficiente	2,34	0,74	
06- Acompanhamento imprudente	2,73	0,55	
07- Falta de flexibilidade nos horários da academia	2,40	0,86	
08- Falta de tempo	1,96	1,05	
09- Queda na qualidade das aulas	2,57	0,68	
10- Falta de motivação	2,14	0,84	
11- Surgimento de trabalho	1,16	1,16	
12- Estudos	1,08	1,19	
13- Aumento no valor da mensalidade	1,74	0,98	
14- Machucar-se na academia (acidentes)	1,16	1,12	
15- Burocracia (regras abusivas)	2,19	0,95	
16- Equipamentos insuficiente e/ou ultrapassados	2,66	0,58	
17- Saída de amigos	0,38	0,68	
18- Insatisfação com a limpeza da academia	2,03	0,86	
19- Mal atendimento	2,45	0,74	
20- Mudança do professor	0,75	0,83	
21- Mudança de endereço da academia	1,75	1,04	
22- Mudança de residência ou trabalho	1,82	1,05	
23- Turmas vazias e pequenas	0,69	0,87	
24- Lotação da academia	2,07	1,04	
25- Falta de entretenimento (TV, vídeo, música)	1,72	1,07	

Analisando-se o Quadro 3, e considerando que os motivos nela relacionados podem ser classificados em níveis de importância de 0 a 3, sendo 0 = nenhuma importância, 1 = pouca importância; 2 = relativa importância e 3 = muita importância. Pode-se perceber que para os alunos, o “acompanhamento imprudente” é o motivo mais importante para o abandono da academia, pois apresenta uma média de 2,73 ($\pm 0,55$). Esta classificação é aceitável, pois os indivíduos procuram centros especializados que oferecem acompanhamento qualificado e competente (CASTRO et al.; 2021; PELLEGRINOTTI, 1998). O segundo motivo mais importante para o abandono da academia é “equipamentos insuficientes e/ou ultrapassados” que apresenta uma média de 2,66 ($\pm 0,58$). CONTURSI (1985) menciona a importância de se ter equipamentos de qualidade e em número suficientes. O terceiro motivo mais importante é “queda na qualidade das aulas” que apresenta média 2,57 ($\pm 0,68$). O motivo considerado menos importante para os alunos para o abandono da academia é “saída de amigos”, que apresenta uma média de 0,38 ($\pm 0,68$). Estudos realizados por Castro et al., (2021) e Ferraro e Cândido (2017) revelam que, para homens praticantes de exercício, os principais motivos para não procurarem uma academia para se exercitar são as questões financeiras e a falta de tempo e para as mulheres, os principais motivos são não gostar do ambiente de academia e a indisposição.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a realização do estudo pode-se perceber que a proximidade é principal motivo apontado pelos indivíduos para a seleção de uma academia para se praticar, podendo-se verificar que muitas vezes a comodidade supera a valorização da qualidade, que representou o segundo motivo mais mencionado.

O motivo “melhorar a saúde” ser classificado como o mais importante para se iniciar a prática de exercícios em uma academia, vem somente a confirmar que a conscientização das pessoas a cerca dos benefícios proporcionados pela atividade física vem crescendo. Os indivíduos associam a prática de exercício físico à obtenção da saúde. Outro motivo também classificado como importante para se iniciar a prática em uma academia é “contar com equipamentos adequados” e “contar com profissionais habilitados”, o que vem a confirmar que os indivíduos se encontram mais conscientes a respeito da prática supervisionada de exercícios físicos.

Analisando-se os motivos “qualidade dos profissionais” e “acompanhamento de um profissional” que foram apontados pelos praticantes, como mais importantes para sua permanência na academia, percebe-se que a valorização dos profissionais de Educação Física em academias, vem crescendo, ocupando posição de destaque na prática. As pessoas estão mais exigentes e críticas, buscam o melhor e querem se sentir seguras quanto à realização das atividades propostas. Tal fato justifica a insatisfação dos praticantes quanto ao “acompanhamento imprudente”, motivo determinado como muito importante para o abandono da academia, assim como “equipamentos insuficiente e/ou ultrapassados” e “queda na qualidade das aulas”.

Após a análise dos resultados pode-se concluir que diversos fatores interferem de alguma forma na prática de exercícios físicos (frequência semanal, regularidade, horário escolhido para a prática, equipamentos, etc.), influenciando na classificação dos motivos para se iniciar, manter e abandonar a prática em academias. Percebe-se ainda, que os motivos classificados para o abandono da academia podem estar direta ou indiretamente associados à rotatividade nas academias.

REFERÊNCIAS

ALVIM, K.; NOCE, F. **Análise dos motivos para a prática de atividade física em academias e suas implicações na Educação Física escolar.** Projeto de monografia. Belo Horizonte: Escola de Educação Física da UFMG, 1999.

BERGAMINI, C. W. **Motivação**. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 1993.

BURNS, S. H.; MURRAY, A. D. Creating health through physical activity. **British Journal of Sports Medicine**, v. 48, n. 3, p. 167-169, 2014.

CASTRO, A. P. **Automotivação: como despertar essa energia e transmiti-la**. 4ª ed. Rio de Janeiro: Campus, 1999.

CASTRO, H. O.; CAIXETA, D. R.; GONÇALVES, L. M. M.; RODRIGUES, L. E. A.; SILVA, S. A.; OLIVEIRA, V. Motivos que levam praticantes e não praticantes de exercício físico do Distrito Federal a não se exercitarem em academias. **Conexões**, v. 19, n.1, 2021

CONTURSI, T. L. Estética/ Ginástica/ Academia. **Revista Sprint Magazine**. Rio de Janeiro, Ano XII, nº 66, 1993.

DELIBERADOR, A. P. **Metodologia do Desenvolvimento - Personal Training**. Londrina: Midiograf, 1998.

DOMINSKI, F. H.; LIZ, C. M.; MATIAS, T. S.; CORREIA, C. K.; VBIANA, M. S.; ARAB, C.; ANDRADE, A. **Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício**, v. 13, n.85, p. 954-962, 2020.

ELBAS, M.; SIMÃO, R. **Em Busca do Corpo – Exercícios, alimentação e lesões**. 1ªed. Rio de Janeiro: Shape, 1997.

FERRARO, N. S.; CÂNDIDO, A. S. C. Percepção dos Idosos Acerca da Atividade Física na Terceira Idade. **Revista Multidisciplinar e de Psicologia**, v. 11, n. 38, 2017.

HOWLEY, E. T.; FRANKS, B. D. **Instrutor de Condicionamento Físico – Para a saúde**. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000.

LEITE NETO, J. A. **Marketing de Academia**. Rio de Janeiro: Sprint, 1994.

MOLINARI, B. **Avaliação Médica e Física – Para atletas e praticantes de atividade física**. São Paulo: Roca, 2000.

NIEMAN, D. C. **Exercício e Saúde – Como se prevenir de doenças usando o exercício como seu medicamento**. 1ªed. São Paulo: Manole, 1999.

NOVAES, J. S. **O corpo na Academia**. Rio de Janeiro: Sprint, 2001.

ORNELAS, J. R. B.; VALENZUELA, C. S.; HERNÁNDEZ, Z. P. B.; FERNÁNDEZ, F. M.; GARCÍA, P. J. J. Barreras para la práctica de ejercicio físico en universitarios mexicanos comparaciones por género. **Retos**, n. 36, p. 80-82, 2019.

PELLEGRINOTTI, I. L. Atividade Física e Esporte: a importância no contexto saúde do ser humano. **Revista Brasileira Atividade Física e Saúde**. Londrina, v.3, p.22-31, Jan –Abr, 1998.

RAMOS, A. T. **Atividade Física- diabéticos- gestantes- 3ª idade –crianças - obesos**. Rio de Janeiro: Sprint, 1997.

RIBEIRO, L. C. S.; FILHO, M. G. B., DACOSTA, L. P. **Simpósio Mineiro de Psicologia do Esporte III**, Influência da atividade física na redução e controle do estresse psicofisiológico. Juíz de Fora: UFJF, 1998.

RODEL, R. G. B.; DANIELEVICZ, A.; SIRYDAKIS, M. E. M.; DELEVATTI, R. S. Quality of life associated with training frequency: a cross-sectional comparative study. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 9, n. 9, p. e663997549, 2020.

SAMULSKI, Dietmar. **Psicologia do Esporte – Teoria e Aplicação Prática**. Belo Horizonte: UFMG, 1995.

SAMULSKI, D.; LUSTOSA, L. A importância da atividade física para a saúde e a qualidade de vida. **Revista Educação Física Desportiva**. v.17,p.60-70, 1996.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour: at a glance. World Health Organization, 2020.

CAPÍTULO 64

MUCORMICOSE EM PACIENTES COM COVID-19

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c64](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c64)

Letícia Rafaella Marinho Honorato¹, Thalita Oliveira da Silva Borba¹, Alícia Lima de Lira¹, Anne Caroline da Silva Freire de Sá¹, Erick Lúcio Souza Santos¹, Fernanda Maria Matos Aragão de Souza², Jadson da Silva Santana³, André Almeida Antunes⁴, Arthur Mendes Lima⁵, Rafael de Sousa Carvalho Sabóia⁶

¹ Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA, (leticiamarinho@hotmail.com)

¹ Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA, (thalita.borba00@gmail.com)

¹ Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA, (alicialira2000@gmail.com)

¹ Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA, (annecarolinefreiree@gmail.com)

¹ Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA, (ErickLucioEL@Gmail.com)

² Graduada em Odontologia / Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA, (aragaofernanda22@gmail.com)

³ Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, (jadsonufpe@gmail.com)

⁴ Centro Universitário de Belo Horizonte - UniBH, (andredemu@yahoo.com.br)

⁵ Universidade Federal de Juiz de Fora, (arthurmlima@hotmail.com)

⁶ Docente / Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA, (rafaelsaboia@asc.es.edu.br)

Resumo

Objetivo: Revisar a literatura acerca da relação da mucormicose com a COVID-19, bem como avaliar a importância do diagnóstico precoce de mucormicose pelo cirurgião-dentista. **Método:** Revisão de Literatura de artigos científicos nos idiomas português e inglês, publicados entre os anos de 2020 e 2021, com exceção dos conceitos históricos. Os critérios de inclusão, foram artigos científicos de relatos de caso, série de casos e estudos retrospectivos que tratam da infecção mucormicose e sua relação com a COVID-19. Foram excluídos trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses, bem como resumos de anais de congressos. **Resultados:** Os artigos mostram a relação da mucormicose com a COVID-19, principalmente em pacientes que possuem comorbidades e/ou fizeram tratamento com corticosteróides intravenosos para a COVID-19. Além disso, é comprovada a alta mortalidade da mucormicose mesmo sob

tratamento, fazendo-se necessário, portanto, o diagnóstico precoce da infecção. **Conclusões:** A incidência de mucormicose aumentou dramaticamente com taxas de mortalidade mais altas em pacientes com COVID-19 grave. Devido à agressividade da mucormicose, principalmente em pacientes com histórico de COVID-19 associado a comorbidades, faz-se necessário uma maior preparação dos profissionais e uma atenção multiprofissional a fim de realizar o diagnóstico precoce da infecção. Destaca-se também a atuação do Cirurgião-Dentista no diagnóstico precoce, devido à proximidade profissional com as áreas de manifestação clínica da mucormicose.

Palavras-chave: Mucormicose; SARS-COV-2; COVID-19; Odontologia; Diagnóstico Precoce.

Área Temática: Estudo de Revisão

E-mail do autor principal: leticiamarinhoh@hotmail.com

1 INTRODUÇÃO

A mucormicose, popularmente conhecida como fungo negro, é o nome dado à infecção fúngica pelos mucormicetos, que pertencem à ordem Mucorales e ao subfilo Mucoromycotina. Os agentes mais comuns de mucormicose são *Rhizopus spp.*, *Mucor spp.*, e *Lichtheimia spp.*, gêneros de outros Mucorales, como *Rhizomucor*, *Saksenaea*, *Cunninghamella*, e *Apophysomyces*, são menos comuns (SKIADA et al., 2018). A mucormicose é uma infecção fúngica relativamente incomum, mas implacavelmente destrutiva, de alta mortalidade e é encontrada predominantemente em pacientes imunocomprometidos, especialmente em pacientes com malignidades hematológicas (HMs) ou receptores de transplante alogênico de células-tronco hematopoiéticas (alo-TCTH) (LEWIS e KONTOYIANNIS, 2013).

Em pacientes suscetíveis, é caracterizada por invasão direta com necrose tecidual marcada de estruturas adjacentes seguida por rápida progressão e angioinvasão da mucosa nasal e sinusal para a órbita e o cérebro. O envolvimento rino-orbital é uma condição sensível ao tempo que deve ser reconhecida e tratada prontamente para evitar mortalidade e morbidade (BAYRAM et al., 2021). A mucormicose também pode acometer o meio oral a partir de duas origens: disseminada, causada pela extensão transpalatal de uma infecção rinocerebral prévia; ou ser originada do contato direto com uma ferida preexistente na cavidade oral (CHEONG et al., 2017; AFROZE et al., 2017). Os sinais da infecção podem se apresentar como ulcerações necróticas locais, acompanhadas de destruição óssea, podendo resultar em disseminação hematogênica, levando à infecção fulminante e morte (EPSTEIN et al., 2016).

O diagnóstico definitivo de mucormicose requer amostragem direta do tecido infectado para pesquisar hifas fúngicas angioinvasivas em forma de fita características no tecido necrótico. No entanto, com exceção da doença cutânea e sinusal, a biópsia muitas vezes não é

viável em trombocitopênicos, especialmente se uma lesão suspeita estiver localizada em um local de tecido profundo, como o pulmão. Portanto, a suspeita precoce da infecção é essencial para o tratamento oportuno, visto que os ensaios de antígenos atualmente disponíveis são usados para rastrear infecções fúngicas (ou seja, galactomanana, 1,3-b-dglucana) não ajudam no diagnóstico de mucormicose (LEWIS e KONTOYIANNIS, 2013).

O diagnóstico precoce é crucial para iniciar prontamente as intervenções terapêuticas necessárias para prevenir a invasão progressiva do tecido e suas sequelas devastadoras, minimizando o efeito de desfigurar a cirurgia corretiva e melhorando o resultado e a sobrevida. Da mesma forma, as terapias antifúngicas com atividade contra a mucormicose (anfotericina B lipossomal e posaconazol) são menos eficazes se não forem iniciadas nos estágios iniciais da infecção. A cirurgia, quando necessária e possível, deve ser muito agressiva. Não apenas os tecidos necróticos, mas também os tecidos infectados ao redor com aparência saudável devem ser removidos, pois a velocidade de extensão da infecção pelas hifas de *Mucorales* é alta (SKIADA et al., 2018).

A COVID-19, doença causada pelo SARS-COV-2 (coronarívus), é uma crise de saúde pública global associada a mortalidade e morbidade substanciais em todo o mundo. Embora a COVID-19 afete principalmente os pulmões, diferentes complicações da doença, como lesão miocárdica, arritmia, eventos tromboembólicos e desregulação imunológica, são relatadas. A doença afeta as respostas das células T auxiliares, incluindo a síndrome de liberação de citocinas, que pode abrir a porta para coinfeções. O risco de coinfeções em pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA), recebendo antibióticos de amplo espectro, corticosteroides e com suporte de ventilação invasiva ou não invasiva é ainda maior. (BAYRAM et al., 2021).

Em 11 de junho de 2021 a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e a Organização Mundial da Saúde (OMS) relatam que, há o crescente número nas notificações de casos de Mucormicose (CAM) associada a COVID-19, principalmente em pessoas com doenças subjacentes, como diabetes mellitus (DM), cetoacidose diabética ou em uso de esteróides. Nesses pacientes, a manifestação clínica mais frequente é a mucormicose rino-orbitária, seguida de mucormicose rino-orbitária-cerebral e de manifestações em meio oral, que se apresentam como infecções secundárias e ocorrem após a infecção por SARS-COV-2. Com isso, dado o potencial aumento de casos de mucormicose associada a COVID-19 na região das Américas, a OPAS e a OMS recomendam que os Estados Membros preparem os serviços de saúde a fim de minimizar a morbidade e mortalidade devido para a CAM.

O tema foi escolhido devido ao seu caráter inovador e de grande relevância para a comunidade científica no período estudado, pois, a partir de estudos e divulgação deste conhecimento os profissionais podem priorizar o monitoramento dos pacientes com COVID-19 grave e/ou que apresentam comorbidades, a fim de realizar o diagnóstico precoce de coinfeções como a mucormicose, que apresentam altos índices de agressividade e mortalidade nos pacientes afetados.

O objetivo deste trabalho foi discutir, com base nas evidências científicas, a relação da mucormicose com a COVID-19, bem como avaliar a importância do diagnóstico precoce de mucormicose pelo cirurgião-dentista.

2 MÉTODO

Esta revisão de literatura narrativa é classificada como um estudo exploratório e observacional. Foram utilizados artigos científicos nos idiomas português e inglês, publicados entre os anos de 2020 e 2021, com exceção dos conceitos históricos. A busca foi realizada nas bases de dados PubMed e Scielo, os Descritores em Saúde (DeCS): mucormicose, COVID-19, SARS-COV-2 e assistência odontológica, e Medical Subject Headings (MeSH): mucormycosis, COVID-19, SARS-COV-2 e dental care. Os critérios de inclusão, foram artigos científicos de relatos de caso, série de casos e estudos retrospectivos que tratam da infecção mucormicose e sua relação com a COVID-19. Foram excluídos trabalhos de conclusão de Curso, dissertações e teses, bem como resumos de anais de congressos. Após selecionados, foram eliminados os artigos em duplicidade, depois foram escolhidos pelos títulos e pela leitura dos resumos, sendo selecionados os mais adequados para o desenvolvimento do trabalho.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir da busca realizada no período de junho e julho de 2021, foram encontrados 150 artigos científicos relacionados ao tema estudado, publicados entre os anos 2020 e 2021, sendo sua maioria artigos internacionais, qualitativos e de relatos de casos. Foram incluídos artigos publicados apenas no ano de 2021, com exceção de artigos que possuíam contextos históricos acerca da mucormicose, bem como seu diagnóstico, apresentação clínica, tratamento e prognóstico. Dos artigos utilizados, 8 foram de relatos de casos, 3 notas técnicas de organizações nacionais e internacionais de saúde e 1 estudo retrospectivo.

A mucormicose, causada por um grupo de fungos chamados mucormicetos, é uma infecção rara, mas potencialmente fatal, se tratada de forma inadequada. Frequentemente,

referido como o chamado fungo negro, a incidência de mucormicose aumentou mais rapidamente durante a segunda onda em comparação com a primeira onda de COVID-19 na Índia, com pelo menos 14.872 casos em 28 de maio de 2021. O estado de Gujarat sozinho contribuiu para o maior número de casos, com pelo menos 3.726 casos de mucormicose em pacientes com COVID-19 ativo e recuperado, seguido pelo estado de Maharashtra (RAUT e HUY, 2021).

Devido a isso, o Conselho Indiano de Pesquisa Médica (2021) divulgou diretrizes para a triagem, diagnóstico e tratamento da mucormicose em pacientes com COVID-19, a fim de proporcionar um maior conhecimento acerca da infecção e, consequentemente, um diagnóstico precoce e uma maior sobrevida dos pacientes. O Conselho destaca sinais e sintomas de alerta como dor e vermelhidão ao redor dos olhos e/ou nariz, febre, dor de cabeça, tosse, falta de ar, vômitos sangrentos e estado mental alterado. Além disso, evidencia a importância de uma equipe multiprofissional, composta por microbiologista, intensivista especialista em medicina interna, neurologista, especialista em otorrinolaringologia, oftalmologista, dentista, cirurgião bucomaxilofacial/plástico e bioquímico.

Tabela 1. Manifestações clínicas da mucormicose de acordo com o histórico médico e local dos pacientes encontrados nos principais trabalhos utilizados e seus respectivos autores.

AUTORES	LOCAL E ANO	GÊNERO E IDADE	COMORBIDADE / FATOR DE RISCO	MANIFESTAÇÃO CLÍNICA
Saldanha, Reddy e Vicent	Índia - 2021	Mulher - 32 anos	COVID-19 e Diabetes descompensada	Paranasal e Rino-orbital
Maini et al	Índia - 2021	Homem - 38 anos	COVID-19 grave	Rino-orbital
Pauli et al	América - 2021	Mulher - 50 anos	COVID-19 e Diabetes tipo 2	Lesão em palato
Buil et al	Países Baixos - 2021	Homem - 50 anos; Homem - 50 anos; Homem - 60 anos; Homem - 70 anos; (4 pacientes)	COVID-19 grave; COVID-19 grave; COVID-19 grave, leucemia linfocítica, diabetes e obesidade; COVID-19 grave, diabetes e AVE*;	Orofaringe; Pulmonar; Pulmonar e disseminada; Rino-orbital;
Ravani et al	Índia - 2021	20 Homens 11 mulheres Idade média 56,3 anos (31 pacientes)	30 com diabetes descompensado; 19 com COVID-19; 19 com hipertensão; 2 com doença renal; 1 com isquemia cardíaca;	31 pacientes com mucormicose rino-orbital
OPAS/OMS	América - 2021	9 Homens 7 Mulheres Idade média 51,9 anos (16 pacientes)	16 com COVID-19; 11 com diabetes; 8 com hipertensão; 3 com obesidade; 2 com doença cardíaca; 1 com insuficiência renal;	9 Rino-orbital; 4 Rino-orbital-cerebral; 3 Pulmonar;

* AVE = Acidente Vascular Encefálico.

Fonte: Autoria própria, 2021.

Em estudos, os autores Ravani (2021), Saldanha (2021) e Paul (2021) destacam que a COVID-19 associada a um histórico médico de diabetes descompensada, hipertensão e insuficiência renal crônica são fatores fundamentais para o desenvolvimento de infecções secundárias como a mucormicose. O autor Bayram (2021) complementa ao realizar um estudo com 32814 pacientes hospitalizados com COVID-19 e, dentre esses, 11 pacientes apresentaram mucormicose, sendo 9 homens e 2 mulheres, 8 com diabetes tipo 2, 3 com insuficiência renal crônica, 2 com insuficiência renal aguda e todos apresentaram síndrome respiratória aguda grave.

Contudo, o estudo de Buil et al (2021) acompanhou 4 casos pacientes hospitalizados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido à COVID-19 e que apresentaram mucormicose pulmonar, rino-orbitária, cerebral e disseminada e, desses, apenas 1 paciente apresentava histórico médico de condições debilitantes, leucemia linfocítica, diabetes e obesidade. Na conclusão do trabalho, o autor destaca, portanto, a necessidade de maior atenção aos pacientes que realizam o uso de corticosteróides no tratamento da COVID-19, principalmente na presença de fatores de risco, devido ao mau prognóstico da mucormicose e à necessidade de uma abordagem cirúrgica agressiva quando a mucormicose invasiva é diagnosticada.

Acerca da apresentação clínica da mucormicose, a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) juntamente com a Organização Mundial da Saúde (OMS) (2021) apresentam o dado que, de 187 pessoas com mucormicose, 62,6% apresentaram mucormicose rino-orbital e 23,5% mucormicose rino-orbital-cerebral. Ravani et al (2021) também destaca as alterações possíveis de serem observadas em exames de imagem de pacientes com mucormicose rino-orbital e rino-orbital-cerebral, são elas: celulose orbital (inflamação dos tecidos moles), envolvimento do músculo extraocular, neurite óptica, erosão da parede orbital óssea, pansinusite etmóide, esfenóide e maxilar, trombose do seio cavernoso, envolvimento cerebral e trombose da artéria carótida interna.

Pakdel et al (2021) complementa ao realizar um estudo transversal no Irã com 58 pacientes com COVID-19 positivo de transcriptase reversa em tempo real reação em cadeia da polimerase (RT-PCR) para amostras de swab nasofaríngeo ou orofaríngeo, aspirado traqueal e / ou lavado broncoalveolar (LBA) e que apresentaram mucormicose em um intervalo menor que 3 meses. Desse total, as manifestações clínicas foram: congestão ou bloqueio nasal 2 (13%), febre 4 (26%), cefaleia 5 (33%), necrose do palato 5 (33%), edema facial unilateral 9 (60%), dor facial periorbital unilateral 11 (73%), ptose palpebral 11 (73%), perda aguda de visão 11 (73%), paralisia dos nervos cranianos 9 (60%) e sintomas otológicos 1 (7%).

Contudo, Paul et al (2021) apresentaram relato de caso de mucormicose também associada à COVID-19, mas pela primeira vez no na América do Sul com apresentação clínica em mucosa de palato duro. A paciente de 50 anos com diabetes tipo 2 e com diagnóstico de COVID-19, confirmado pela detecção de RNA viral da síndrome respiratória aguda grave coronavírus 2 (SARS-CoV-2) via reação em cadeia da polimerase. O diagnóstico foi feito cerca de 8 dias antes da consulta e a paciente não relatava história de tratamento odontológico recente ou qualquer tipo de trauma e referia uso de prótese parcial removível. A paciente apresentava lesão única, ulcerada e profunda, de cerca de 2 cm, localizada no centro do palato duro. Com

isso, para realizar o diagnóstico diferencial, foi realizada a biópsia incisional e, a partir do exame histopatológico, o diagnóstico morfológico de mucormicose foi confirmado.

4 CONCLUSÃO

Em conclusão, os resultados dos artigos estudados mostram que a incidência de mucormicose aumentou dramaticamente com taxas de mortalidade mais altas em pacientes com COVID-19 grave. Estes resultados demonstram que o prognóstico de mucormicose pode ser pior após infecção grave pelo SARS-CoV-2. A desregulação imunológica relacionada à SARS-CoV-2, o uso disseminado de esteroides/antibióticos de amplo espectro e o suporte ventilatório parecem ser os principais fatores que tornam os pacientes suscetíveis. Outros artigos também ressaltam a suscetibilidade à mucormicose por pacientes que possuem comorbidades ou condições debilitantes, sendo esses, juntamente com a COVID-19, fatores de risco para a mucormicose. Devido a gravidade e a variedade de manifestações clínicas da mucormicose, fica clara, portanto, a importância da assistência multiprofissional no diagnóstico precoce da infecção. Por fim, destaca-se a relevância do cirurgião-dentista no diagnóstico precoce de mucormicose, devido à proximidade profissional com as áreas de manifestações clínicas da infecção, bem como o exame físico das estruturas da face associado à interpretação do histórico médico do paciente ser parte da rotina do profissional.

REFERÊNCIAS

AFROZE, S. N.; KORLEPARA, R.; RAO, G. V.; MADALA, J.. Mucormycosis in a diabetic patient: a case report with an insight into its pathophysiology. **Contemporary clinical dentistry**, v. 8, n. 4, p. 662-666, 2017. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29326525/>. Acesso em: 19 jul. 2021.

BAYRAM, N.; OZSAYGILI, C.; SAV, H.; *et al.* Susceptibility of severe COVID-19 patients to rhino-orbital mucormycosis fungal infection in different clinical manifestations. **Japanese Journal of Ophthalmology**, Turquia, v. 65, p. 515–525, 2021. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10384-021-00845-5#citeas>. Acesso em: 19 jul. 2021.

BUIL, J. B. *et al.* Case series of four secondary mucormycosis infections in COVID-19 patients, the Netherlands, December 2020 to May 2021. **Euro Surveill**, Países Baixos, v. 26, n. 23, p. 2100510, 2021. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8165350/pdf/10384_2021_Article_845.pdf. Acesso em: 20 jul. 2021.

CHEONG, H. S.; KIM, S. Y.; KI, H. K.; *et al.* Oral mucormycosis in patients with haematologic malignancies in a bone marrow transplant unit. **Mycoses**, v. 60, n. 12, p. 836-

841, 2017. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28877386/>. Acesso em: 19 jul. 2021.

EPSTEIN, J. B.; KUPFERMAN, S. B.; ZABNER, R.; *et al.* Early diagnosis and successful management of oral mucormycosis in a hematopoietic stem cell transplant recipient: case report and literature review. **Supportive Care in Cancer**, v. 24, n. 8, p. 3343-3346, 2016. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26971955/>. Acesso em: 19 jul. 2021.

INDIAN COUNCIL OF MEDICAL RESEARCH. Evidence based advisory in the time of COVID-19 (screening, diagnosis & management of mucormycosis). **Department of Health Research Ministry of Health and Family Welfare**, Government of India, Índia, 2021.

Disponível em:

https://www.icmr.gov.in/pdf/covid/techdoc/Mucormycosis_ADVISORY_FROM_ICMR_In_COVID19_time.pdf. Acesso em: 20 jul. 2021.

LEWIS, R. E.; KONTOYIANNIS, D. P. Epidemiology and treatment of mucormycosis. **Future Microbiology**, Itália, v. 8, n. 9, p. 1163-1175, 2013. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24020743/>. Acesso em: 19 jul. 2021.

PAKDEL, F. *et al.* How COVID-19 Impacted on Rhino-Orbital-Cerebral Mucormycosis. **Indian Journal of Clinical and Experimental Ophthalmology**, Índia, v. 7, n. 2, p. 257-258, 2021. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/myc.13334>. Acesso em: 21 jul. 2021.

PAULI, M. A.; PEREIRA, L. M.; MONTEIRO, M. L.; *et al.* Painful palatal lesion in a patient with COVID-19. **Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology**, Santa Catarina, v. 131, n. 6, p. 620-625, 2021. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8005255/pdf/main.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2021.

SALDANHA, M.; REDDY, R.; VINCENT, M. J. Title of the Article: Paranasal Mucormycosis in COVID-19 Patient. **Indian Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery**, Índia, 2021. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12070-021-02574-0>. Acesso em: 20 jul. 2021.

RAUT, A.; HUY, N. T. Rising incidence of mucormycosis in patients with COVID-19: another challenge for India amidst the second wave?. **The Lancet Respiratory Medicine**, v. S2213-2600, n. 21, p. 00265-4., 3 jun. 2021. Disponível em: [https://doi.org/10.1016/S2213-2600\(21\)00265-4](https://doi.org/10.1016/S2213-2600(21)00265-4). Acesso em: 21 jul. 2021.

RAVINI, S. A.; AGRAWAL, G. A.; LEUVA, P. A.; *et al.* Rise of the phoenix: Mucormycosis in COVID-19 times. **Indian Journal of Ophthalmology**, Índia, v. 69, n. 6, p. 1563-1568, 2021. Disponível em: <https://journals.lww.com/ijo/pages/default.aspx>. Acesso em: 20 jul. 2021.

SKIADA, A.; LASS-FLOERL, C.; KLIMBO, N.; *et al.* Challenges in the diagnosis and treatment of mucormycosis. **Medical Mycology**, v. 56, n. S1, p. S93-S101, 2018. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6251532/pdf/myx101.pdf>. Acesso em: 19 jul. 2021.

CAPÍTULO 65

NEOPLASIAS DO TRATO RESPIRATÓRIO E SUAS RESPECTIVAS CAUSAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c65](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c65)

Ana Priscila Franca Correia¹, Bárbara Dandara Mendes Vale², Barbara de Araújo Fernandes³, Gleyciane Lins Pereira³, Hugo Diniz Martins Cavalcanti³, Isadora Gonçalves de Ataíde⁴, Joilton Aureliano de Lima Filho³, Letícia Figueiredo Rolim³, Thales Vitor Brasil Araújo³, José Guilherme Ferreira Marques Galvão⁵.

¹ Acadêmico em Medicina pela Faculdade Santa Maria – FSM (francaanaprisila@gmail.com), ² Acadêmico em Medicina pela Universidade Nove de Julho - UNINOVE, ³ Acadêmico em Medicina pela Faculdade Santa Maria – FSM, ⁴ Acadêmico em Medicina pelo Centro Universitário de João Pessoa -UNIPÊ, ⁵ Docente da Faculdade Santa Maria – FSM (guilhermefirst@gmail.com).

Resumo

As neoplasias que acometem o trato respiratório inferior, como traqueia, brônquios e pulmões, têm ganhado destaque ao passo que se tornaram um dos cânceres de maior incidência e uma das principais causas de morte referidas a essa patologia no Brasil, sendo necessária a realização do rastreamento em indivíduos considerados como parte dos grupos de risco. **Objetivo:** Sintetizar e revisar dados já existentes na literatura sobre as neoplasias do trato respiratório e as suas principais causas. **Método:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, em que foram levantados dados de incidência e prevalência nas diferentes regiões do país, como também os dados sobre mortalidade e perspectivas de cura, a partir da literatura clínica coletada em bases de dados, como os registros do PUBMED (National Library of Medicine National Institutes of Health).

Health dos EUA) e BVS (Biblioteca Nacional em Saúde), utilizando os Descritores em Ciências e Saúde (DECS): "Lungneoplasms/epidemiology", "Lungneoplasms/therapy" e "lungneoplasms/diagnosis", através do operador booleano AND. Como critérios de inclusão, utilizaram-se artigos publicados em inglês e português publicados entre os anos de 2012 a 2021; e excluídos estudos de revisão e incompletos. Após a estratégia de busca, 21 artigos foram selecionados. **Resultados e Discussão:** Foram analisados os principais fatores de risco relacionados e observou-se que alguns deles ainda não estão totalmente esclarecidos, carecendo de novos e aprofundados estudos elucidativos para que, no futuro, possamos assumir estratégias de enfrentamento mais eficazes e garantir melhor sobrevida aos pacientes acometidos. **Conclusão:** Depreendeu-se do presente estudo que as incidências principais de neoplasias do trato respiratório estão correlacionadas com o tabagismo, bem como faz-se necessário de medidas que ajudem no tratamento destas.

Palavras-chave: Lungneoplasms/epidemiology; Lungneoplasms/therapy; lungneoplasms/diagnosis.

Área Temática: Ciências da Saúde .

E-mail do autor principal: francaanaprisila@gmail.com

INTRODUÇÃO

O câncer de traqueia, brônquio e pulmão configura-se atualmente como a neoplasia mais letal em todo o mundo. No passado, até cerca de 1965, essa disfunção era vista como uma doença rara, hoje desponta como uma verdadeira epidemia mundial. No Brasil, excetuando o câncer de pele não melanoma, é o terceiro câncer mais prevalente em homens, e o quarto em mulheres. No entanto, quanto à mortalidade, é a neoplasia mais letal em homens e a segunda mais letal em mulheres, atrás apenas do câncer de mama (ARAÚJO, 2018).

O Instituto Nacional do Câncer estimou em 30.220 o número de novos casos de câncer de traqueia, brônquio e pulmão no Brasil em 2020. Esses números sofrem grandes variações de acordo com a região geográfica, sendo a incidência mais elevada nos estados de maior desenvolvimento, como São Paulo e Rio Grande do Sul. Esse dado pode estar diretamente relacionado ao maior número de fumantes e melhor diagnóstico precoce nas regiões citadas, enquanto que, em regiões como norte e nordeste, ainda se têm um alto número de casos subnotificados (INCA, 2020).

O câncer de pulmão, especificamente, é relativamente raro antes da quinta década de vida e o risco aumenta com a idade daí em diante. Os homens são mais afetados do que as mulheres. Embora a exposição ao fumo esteja intimamente ligada ao câncer de pulmão (80% a 90% dos casos são causados por isso), apenas 15% dos fumantes desenvolvem câncer de pulmão, sugerindo uma suscetibilidade genética (NASIM *et al.*, 2019).

A quantidade de cigarros fumados por dia (intensidade do tabagismo) e a duração de vida influenciam o risco proporcionalmente. Mesmo pacientes que não conseguem largar totalmente o tabagismo, a redução do número de cigarros fumados diariamente já demonstram um benefício. Entretanto, qualquer forma de exposição ao fumo aumenta o risco de câncer de traqueia, brônquio e pulmão incluindo o fumo passivo e o fumo de charutos e cachimbos. Algumas formas de doença pulmonar intersticial e a exposição ao radônio são outros fatores de risco. Além disso, a presença de doença pulmonar obstrutiva crônica e história familiar também estão associadas ao câncer de pulmão (NASIM *et al.*, 2019).

Entretanto, as alterações epigenéticas na metilação do DNA, na expressão de RNA não codificante, modelagem da cromatina e reguladores pós transcricionais tem se mostrado como eventos chave nas etapas da patogênese do câncer de pulmão. E como o câncer de pulmão é a principal causa de morte relacionada ao câncer em todo o mundo é necessário avançar cada vez mais no entendimento do genoma do câncer de pulmão, garantindo um progresso no tratamento de subconjuntos moleculares específicos (DURUISSEAU; ESTELLER, 2017).

Portanto esse trabalho buscará analisar os dados disponíveis na literatura sobre as principais causas de neoplasias do trato respiratório.

OBJETIVO

Sumarizar e revisar no que compete à pesquisa, à saúde e ao ensino, os dados da literatura acerca das neoplasias do trato respiratório e seus respectivos fatores.

MÉTODO

O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura, efetuada por meio da coleta de dados a partir de fontes secundárias.

A revisão integrativa é a mais ampla abordagem metodológica referente às revisões, permitindo a incorporação de estudos experimentais e não-experimentais para uma assimilação completa do fenômeno analisado. Une também dados da literatura teórica e empírica, além de incorporar um vasto leque de propósitos: definição de conceitos, revisão de teorias e evidências e análise de problemas metodológicos de um tópico particular (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010).

Para desenvolver a construção do corpus desta pesquisa, foram realizadas buscas em banco de dados online. Por essa razão, foram utilizados estudos indexados nas bases de dados: PUBMED (National Library of Medicine National Institutes of Health dos EUA) e BVS

(Biblioteca Nacional em Saúde), no período de julho de 2021. Sendo então utilizados trabalhos escritos em inglês e em português, os quais foram selecionados utilizando as combinações de descritores indexados no Descritores em Ciência e Saúde (DECS/MeSH): “lungneoplasms/epidemiology AND lungneoplasms/therapy AND lungneoplasms/diagnosis”.

Na produção do trabalho, a partir dos descritores referidos, foram encontrados 2684 resultados no PUBMED. Com a utilização do filtro temporal (2012-2021), essa amostra caiu para 1394 artigos. Somando o filtro de linguagem (inglês e português) e artigos completos, a amostra foi de 1302.

Após, então, a utilização dos filtros de inclusão restantes - estudos originais, artigos disponíveis e revisões integrativas - e os de exclusão - monografias e teses, publicações repetidas em bases de dados diferentes, artigos que fogem do tema após a leitura de seus resumos – a amostra final selecionada foi de 9 artigos, os que melhor se encaixaram na proposta do trabalho.

Além dessas, foram também aproveitados dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) da Secretaria de Vigilância em Saúde e as estatísticas do Instituto Nacional de Câncer (INCA) do Ministério da Saúde. Tais dados foram relativos às causas de morte por traqueia, brônquios e pulmão, tendo como base o CID (Classificação Internacional de Doença). Feito isso, será iniciado o desenvolvimento textual.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dos resultados obtidos para análise e desenvolvimento desta revisão sobre as neoplasias do trato respiratório inferior e suas causas, houve predomínio de estudos qualitativos, sendo sete estudos qualitativos e dois quantitativos.

Em relação à nacionalidade das produções analisadas, cerca de 44,4% eram de produção nacional e publicados na língua portuguesa, já porcentagem restante foram artigos internacionais que se encontravam disponíveis na língua inglesa. O país que prevaleceu com o maior número de resultados foi o Brasil, seguido pelos Estados Unidos da América apresentando um total aproximado de 33,3% dos estudos, seguido pela Espanha e Reino Unido, ambas com 11,1% do total.

No que se refere aos anos de publicação, prevaleceu o ano de 2017 como o ano de maior quantidade de publicações, correspondendo a um total de aproximadamente 33,3% das produções, seguido pelos anos de 2018, 2019 e 2020, apresentando o mesmo número de publicações em cada, dessa forma, cada um apresentou cerca de 22,2% dos resultados. A Tabela

1 apresenta informações mais detalhadas em relação aos resultados.

Tabela 1 - Principais informações sobre os resultados obtidos

Título	Ano	País	Principais resultados
Câncer de pulmão no Brasil	2018	Brasil	Combustão do cigarro libera substâncias que irritam a mucosa respiratória levando ao processo de carcinogênese. Presença de genes específicos, demora e ineficiência do tratamento podem se relacionar com piores prognósticos.
Lung Cancer and Tabacco: Wha tis New?	2017	Estados Unidos da América	Uso do tabaco danifica o gene p53, favorecendo assim, o surgimento de câncer. Presença de substâncias cancerígenas no cigarro eletrônico.
Progress and prospects of Early detection in lung cancer	2017	Reino Unido	Necessidade de direcionar o rastreio do câncer de pulmão para os indivíduos de maior risco.
Estimativa 2020: Incidência de Câncer no Brasil	2020	Brasil	O número de novos casos de câncer de traqueia, brônquio e pulmão no Brasil para 2020 foi estimado em 30.220 casos pelo INCA.
Estatísticas do Câncer: Mortalidade	2020	Brasil	Câncer de traqueia, brônquios e pulmão são as neoplasias mais letais em homens e as segundas mais letais em mulheres.
Tendência de mortalidade do câncer de pulmão,	2007	Brasil	Maior fator de impacto na diminuição dessa enfermidade é a eliminação do tabagismo.

traquéia e brônquios

no Brasil

Lung Cancer

epigenetics: From
knowledge to
applications

2017

Espanha

Patogênese do câncer de pulmão
também sofre influência
epigenética por meio da metilação
do DNA.

Essas neoplasias são mais
prevalentes a partir da quinta
década de vida.

Lung Cancer

2019

Estados Unidos
da América

Intensidade do tabagismo e
duração de vida também são
fatores que aumentam o risco.

Tabagismo é o principal fator de
risco para o desenvolvimento de

Cancer
Epidemiology and
Prevention
Biomarkers

2019

Estados Unidos
da América

neoplasias pulmonares. A
exposição ocupacional também
contribui para tal enfermidade se
desenvolva.

Fontes: ARAUJO *et al.*, 2018; BIALOUS; SARNA, 2017; BLANDIN KNIGHT *et al.*, 2017; INCA, 2020; DURUISSEAU; ESTELLER, 2017; MALTA, 2007; NASIM *et al.*, 2019; SCHABATH; COTE, 2019

As neoplasias de pulmão, brônquio e traqueia são consideradas por muitos pesquisadores como uma patologia adquirida devido à grande ligação causa-efeito existente entre o desenvolvimento desse câncer e sua relação com o tabagismo. A partir de 1950, estudos sobre casos controle mostraram que cerca de 90% desses tipos de câncer tinham ligação com o tabagismo, e fumantes ativos teriam cerca de 20 vezes mais chance de desenvolver a patologia quando em comparação com não fumantes (INCA, 2020).

Hodiernamente, sabemos que o tabagismo é o principal fator de risco em relação ao desenvolvimento dessa enfermidade. Nesse contexto, a magnitude do risco está relacionada também à intensidade do tabagismo, ou seja, a quantidade de cigarros fumados ao longo do dia e o número de anos dos quais fez uso dessa substância. Além disso, fumantes passivos também são suscetíveis ao desenvolvimento dessa doença como resultado da exposição aos produtos cancerígenos da queima do tabaco, dentre eles hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, aminas aromáticas e nitrosaminas (SCHABATH; COTE, 2019)

A combustão do cigarro libera gases e partículas com substâncias carcinogênicas, entre os gases têm-se hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, aldeídos voláteis e nitrosaminas tabaco-específicas (TSNA); no material particulado pode haver alcatrão, metais pesados, cromo e cádmio. Essas substâncias irão se depositar na mucosa respiratória causando irritabilidade e podendo iniciar o processo de oncogênese (ARAÚJO, 2018).

Cerca de 10% dessas neoplasias do trato respiratório inferior não estão diretamente relacionadas ao tabagismo (INCA, 2020). Entretanto, fatores como exposição ocupacional a materiais como hidrocarbonetos aromáticos, sílica e metais pesados, principalmente o radônio, visto ser um elemento rico em solo brasileiro, precisam ser levados em consideração na fisiopatogenia. Além disso, a presença de genes específicos das famílias: RAS, XRCC1, XPD e MGMT parecem estar diretamente relacionados ao desenvolvimento de piores prognósticos (ARAÚJO, 2018).

A eliminação do tabagismo é o fator de maior impacto na redução da incidência desse tipo de câncer (MALTA, 2007). No entanto, é necessário esclarecer melhor sobre os fatores causais que resultam na oncogênese do câncer de pulmão, como os fatores genéticos do hospedeiro e o desenvolvimento de variedades graves de carcinoma de pequenas células que cursam em pior prognóstico e em mortalidade em menos de 5 anos.

Ainda em relação à questão genética envolvendo essa doença, vale ressaltar que o uso do tabaco é capaz de danificar o gene p53, sendo assim responsável pela manifestação de mutações nesse gene que, fisiologicamente, age como supressor tumoral, facilitando, em contrapartida, o surgimento do câncer de pulmão (BIALOUS; SARNA, 2017).

Alguns fatores agravantes também devem ser levados em consideração quando se trata de um pior prognóstico e evolução em relação ao câncer de pulmão. Dentre eles é possível citar a demora e ineficiência no diagnóstico dessa doença, além do número considerável de pessoas acometidas que não recebem um tratamento adequado. Isso ocorre sobretudo por causa do limitado acesso a exames de diagnóstico por imagem em muitas regiões do país devido à desproporção geográfica da tecnologia no país, se concentrando majoritariamente nas regiões sudeste e sul. Ademais, o acesso a procedimentos diagnósticos invasivos (como broncoscopia e biópsia transtorácica) e de testes moleculares são bastante limitados no Brasil, tendo como principais causas desse fenômeno a infraestrutura laboratorial restrita a grandes centros, a falta de informação por parte do paciente e do médico e por questão logística (ARAÚJO *et al.*, 2018).

Em relação ao rastreamento do câncer de pulmão, é importante que ele seja direcionado principalmente para os indivíduos de maior risco, sendo os principais alvos as pessoas que

fazem o uso de tabaco, aqueles que apresentam idade avançada e possuem menor nível socioeconômico (BLANDIN KNIGHT *et al.*, 2017)

A carcinogênese desse tipo de câncer geralmente é um processo demorado que requer o acúmulo de sucessivas mutações genéticas até o surgimento do clone neoplásico. Contudo, excetuando os diagnósticos acidentais de quando um paciente faz um raio-x e se observa o nódulo pulmonar, geralmente a maioria dos diagnósticos são dados tardiamente. Sendo essa demora um dos maiores desafios no Brasil (ARAÚJO, 2018). Muitas vezes, o paciente só vai apresentar sintomas quando o tumor já cresceu e obstruiu alguma estrutura, chegou a acometer pleura parietal ou causou uma cavitação que infeccionou. Os principais sintomas são: tosse, dispneia, sibilos, hemoptise, dor pleurítica e febre; e estão relacionados a fases avançadas da doença.

Ademais, com o avanço da tecnologia houveram inovações em relação ao uso do tabaco, ocorrendo a introdução de dispositivos eletrônicos de liberação de nicotina, os chamados cigarros eletrônicos (e-cigarros), que embora não sejam usados por muitas pessoas atualmente, apresentaram um crescimento exponencial nos últimos anos. Essas novas formas de tecnologias também contêm substâncias cancerígenas que devem ser levadas em consideração, como por exemplo o formaldeído (BIALOUS; SARNA, 2017).

Além da questão do tabaco, é válido destacar a exposição ocupacional a cancerígenos que podem desencadear no surgimento dessas neoplasias. O amianto, exemplo mais comum, ainda é observado em certas situações, como em material têxtil, cimento e isolamentos. Essa substância química provoca efeitos celulares diretos e indiretos que podem se relacionar com a etiologia desse câncer, dentre eles estão alterações genéticas e epigenéticas, fibrose, estresse oxidativo e inflamação crônica (SCHABATH; COTE, 2019)

CONCLUSÃO

Essa revisão integrativa revela o contexto atual de alta incidência e morbimortalidade do câncer de traqueia, brônquio e pulmão dentro do cenário brasileiro mais recente. Em virtude do que foi mencionado, destacou-se a forte ligação dessa patologia com a variável epigenética desencadeada pelo tabagismo em sua forma ativa e passiva. Conseguiu-se ressaltar, também, a influência da idade e da susceptibilidade genética na ascensão das neoplasias discutidas. Dentro do grupo de não tabagistas, é válido considerar que dados mais específicos sobre o desenvolvimento desse tipo de câncer precisam ser melhor elucidados para que estratégias cada vez mais efetivas no plano terapêutico e profilático sejam traçadas.

Dentro do contexto de enfrentamento e do que foi exposto, conclui-se que é imperativo ampliar ações e campanhas educativas em saúde sobre a cessação do tabagismo e para prevenção de suas repercussões clínicas a longo prazo. Nesse sentido, um fornecimento mais abrangente de informações acerca do rastreio dos nódulos e sintomas suspeitos mostra-se imprescindível. Ademais, esse estudo possibilitou concluir que esses cânceres apesar de serem neoplasias silenciosas, apresentam mortalidade minimizada através de abordagem preventiva eficaz e diagnóstico precoce dentro da janela de tratamento efetivo. Sendo assim, infere-se que o combate a essas doenças está no reconhecimento da importância de sua prevenção e, portanto, em um maior investimento nesse cenário dentro da atenção primária principalmente na assistência a fumantes que têm dificuldade de se livrar da dependência sozinhos.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Luiz Henrique et al. Câncer de pulmão no Brasil. **J. bras. pneumol.**, São Paulo, v. 44, n. 1, p. 55-64, Feb. 2018. Access on 24 Apr. 2021.

BIALOUS, Stella Aguinaga; SARNA, Linda. Lung câncer and tobacco: What is new?. **NursingClinics**, v. 52, n. 1, p. 53-63, 2017.

BLANDIN KNIGHT, Sean et al. Progress and prospects of Early detection in lung cancer. **Open biology**, v. 7, n. 9, p. 170070, 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA)** [homepage on the Internet]. Rio de Janeiro: INCA; [cited 2021 Abril 20]. Estimativa 2020: Incidência de Câncer no Brasil; 2019.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA)**. Rio de Janeiro: INCA; [cited 2021 Abril 24]. Estatísticas do Câncer: Mortalidade.

DURUISSEAU, M.; ESTELLER, M. (2018). Lung cancer epigenetics: From knowledge to applications. **Seminars in Cancer Biology**, 51, 116–128. doi:10.1016/j.semcancer.2017.09.005

MALTA, Deborah Carvalho et al. Tendência de mortalidade do câncer de pulmão, traquéia e brônquios no Brasil, 1980-2003. **J. bras. pneumol.**, São Paulo, v. 33, n. 5, p. 536-543, Oct. 2007. Access on 24 Apr. 2021

NASIM, F., SABATH, B. F., &Eapen, G. A. (2019). LungCancer. **Medical Clinics of North America**, 103(3), 463–473. doi:10.1016/j.mcna.2018.12.006

SCHABATH, Matthew B.; COTE, Michele L. Cancer progress and priorities: lung cancer. **Cancer Epidemiology and Prevention Biomarkers**, v. 28, n. 10, p. 1563-1579, 2019.

CAPÍTULO 66

O COMPARTILHAMENTO DE NOTÍCIAS FALSAS EM MEIO À PANDEMIA E O IMPACTO NA PROMOÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE

DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c66

Amanda Cristina da Silva¹, Sabrina Francisca Felix²,

Yasmin Yuri Okamoto Beltrão³, Natália Augusto Benedetti⁴.

Faculdade Marechal Rondon- FMR (Mahdesilva0@gmail.com)¹

Faculdade Marechal Rondon- FMR (Sabrinafelix105@gmail.com)²

Faculdade Marechal Rondon-FMR (minbeltrao@gmail.com)³

Mestre em enfermagem pela Universidade Estadual Paulista- UNESP/ Docente do curso de Enfermagem da Faculdade Marechal Rondon-FMR(natalia.benedetti@fmr.pro.br)⁴.

RESUMO

OBJETIVO: Promover por meio de uma revisão bibliográfica uma reflexão acerca de como o compartilhamento de notícias sem veracidade científica durante a pandemia Covid-19 atrapalha os avanços dos profissionais de saúde que buscam promover estratégias de saúde e garantir um atendimento de qualidade. **MÉTODO:** Para a fundamentação desse estudo foram realizadas pesquisas nas bases de dados MEDLINE e SciELO utilizando como descritores as palavras “Covid-19”, “Compartilhamento de informação” e “Educação em saúde” de acordo com a classificação dos Descritores em Ciências de Saúde (DESC). Para a organização do processo de identificação das evidências encontradas e maior qualidade dessa publicação, aderiu-se ao modelo de fluxograma de seleção de estudos PRISMA. **RESULTADO:** Foram identificados 32 estudos com potencial para elegibilidade (MedLine/PubMed=17; Scielo=12; Outras fontes=1. Dos 32 estudos identificados, 6 foram excluídos por duplicidade detectados pelo Endnote Basic, permanecendo 26 artigos para a etapa de leitura. Após a etapa de leitura foram excluídos 22 artigos por não estabelecerem uma relação concisa entre o fenômeno de notícias falsas e as consequências para o indivíduo e a saúde pública durante a pandemia do coronavírus, sendo incluídos para compor o trabalho 5 artigos onde; 4 foram identificados por meio de bancos de dados e registros e 1 identificados por meio de outras fontes. **CONCLUSÃO:** Considera-se uma opção para o combate ao compartilhamento de informações falsas, a alfabetização digital e em saúde. Incentivada pelas próprias plataformas digitais que são os principais propagadores de informações errôneas sobre o coronavírus e por meio delas, compartilhar conteúdo verificado com viés científico, dando voz aos verdadeiros conhecedores, os profissionais de saúde.

Palavras-chave: Covid-19; Compartilhamento de informação; Educação em saúde.

Área Temática: Ciências da Saúde;

E-mail do autor principal: Mahdesilva0@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

A nova doença coronavírus (COVID-19) foi declarada uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11 de março de 2020 (OMS, 2020). Esta pandemia e as medidas de saúde pública implementada para reduzi-la mudaram profundamente o estilo de vida das pessoas e é considerada uma ameaça para o bem-estar físico e mental. A natureza imprevisível da doença, a perda de liberdades pessoais, mensagens conflitantes das autoridades, mudanças repentinas nos planos para o futuro imediato ou a preocupação com a própria saúde e bem-estar e de parentes são exemplos de fontes de estresse associado a esses surtos e pandemias (Huremović,2019).

Durante a pandemia, a mídia digital surgiu como a primeira opção de informação, seguida por telejornais, redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas (Masip et al.,2020). Para que uma notícia falsa tenha sucesso, basta que o assunto chame a atenção. A crise da saúde é uma questão de interesse máximo, pelo que era previsível que se tornasse um terreno fértil para mentiras e trotes, um ambiente propício ao desenvolvimento de notícias falsas. Além disso, é uma questão altamente carregada emocionalmente, portanto, nos momentos em que a comunicação política coloca o emocional antes do racional, o sucesso das notícias falsas é garantido(Del rey,2007).

Na era da informação atual, com abundância de conteúdo disponível gratuitamente, há um problema crescente com as pessoas formando crenças errôneas e muitas vezes prejudiciais após encontrarem “notícias falsas” online (Ali e Levine, 2008). Nesse ambiente, com alto índice de informação disponível no meio digital, encontra-se o problema causado pela alta produção de notícias falsas, mais conhecidas pelo termo ‘Fake News’, e, conseqüentemente, o aumento das desinformações nos meios digitais (CARVALHO e MATEUS,2018).

Hoje, praticamente qualquer pessoa é capaz de criar uma notícia no meio digital. Os cidadãos deixaram de ser meros consumidores de conteúdo para se tornarem “prosumer” (termo originalmente criado por Alvin Toffler em seu livro de 1980 “The Third Wav”(A quinta onda) que significa um consumidor que atua também como produtor (Berrocal; Dominguez; Redondo,2014). A desinformação sobre o COVID-19 proliferou amplamente nas redes sociais, desde a venda de falsas "curas", como gargarejo com limão ou água salgada, beber álcool para proteção contra COVID-19, injetar alvejante em você mesmo, as falsas teorias da conspiração de que o vírus foi criado em um laboratório em Wuhan ou que a rede celular 5G está causando ou agravando os sintomas de COVID-19 (OMS,2020).

Na luta contra o coronavírus, é preciso ter como guia as evidências. Informações errôneas sobre a COVID-19 já foi motivo de ataques a profissionais de enfermagem no Brasil, essas notícias inverídicas podem além de incentivar o comportamento que facilita a transmissão do coronavírus, sobrecarrega ainda mais os hospitais e quem trabalha neles(Conselho Federal de Enfermagem- COFEN,2020).

À medida que a pandemia cresce em todo o mundo, não estamos apenas lidando com o vírus e sua capacidade de sobrecarregar as instituições de saúde, mas também com uma onda de desinformação que está custando vidas humanas e impactando negativamente aqueles que trabalham pela saúde e bem-estar da população. Essa situação também esclareceu a necessidade de educar a população e a mídia e expôs preconceitos contra a comunidade médica(Merchant e Asch,2018).

Essa crise é também uma oportunidade para pensar como os profissionais de saúde, podem contribuir para o enfrentamento da infodemia com ações cotidianas, como compartilhar conteúdo verificado em nossas redes sociais pessoais e profissionais, ouvir e esclarecer dúvidas de pacientes e educar amigos e familiares (Alvarez e Tijerina,2020)

Nessa perspectiva, o objetivo deste trabalho é promover por meio de uma revisão bibliográfica uma reflexão acerca de como o compartilhamento de notícias sem veracidade científica durante a pandemia COVID-19 atrapalha os avanços dos profissionais de saúde que buscam promover estratégias de saúde e garantir um atendimento de qualidade em meio aos desafios de uma pandemia.

2 MÉTODO

A fim de atender o objetivo proposto, utilizou-se como método a revisão integrativa da literatura, visto que o propósito desse método de pesquisa é obter um profundo entendimento de um determinado fenômeno baseando-se em estudos anteriores (Broome,2000 citado por; Mendes; Silveira; Galvão,2008).

Para fundamentar a reflexão proposta no objetivo deste estudo foram realizadas pesquisas nas bases de dados; Medical Literature Analysis and Retrieval System Online- MEDLINE(acesso via PubMed) e Scientific Electronic Library Online (SciELO). Os descritores utilizados para direcionar a pesquisa foram “Covid-19”, “Compartilhamento de informação” e “Educação em saúde” de acordo com a classificação dos Descritores em Ciências de Saúde (DESC). Buscas também foram feitas nas referências bibliográficas nos artigos encontrados. O ano delimitado para a inclusão no estudo foi a partir do ano de 2020.

A consulta à base de dados foi realizada nos meses de junho e julho de 2021 e os idiomas de redação dos artigos aceitos foram em português e inglês.

Como critérios de inclusão, foram utilizados somente aqueles artigos que relacionassem o fenômeno social das notícias falsas com a pandemia causada pelo coronavírus e que dessa relação ocasionasse o comprometimento das intervenções baseadas em evidências com consequências a curto e longo prazo ao indivíduo e a saúde pública.

Para a organização do processo de identificação das evidências encontradas e maior qualidade dessa publicação, aderiu-se ao modelo de fluxograma de seleção de estudos PRISMA.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Conforme a figura 1, foram identificados 32 estudos com potencial para elegibilidade (MedLine/PubMed=17; Scielo=12; Outras fontes=1). Os estudos categorizados como ‘‘Outras fontes’’ são provenientes de buscas realizadas nas referências bibliográficas dos artigos elegíveis para compor este estudo. Dos 32 estudos identificados, 6 foram excluídos por duplicidade detectados pelo Endnote Basic, permanecendo 26 artigos para a etapa de leitura.

Após a etapa de leitura foram excluídos 22 artigos por não estabelecerem uma relação concisa entre o fenômeno de notícias falsas e as consequências para o indivíduo e a saúde pública durante a pandemia do coronavírus, sendo incluídos para compor o trabalho 5 artigos onde; 4 foram identificados por meio de bancos de dados e registros e 1 identificados por meio de outras fontes.

Todos os estudos foram publicados a partir do ano de 2020, em português, inglês e espanhol, não se limitando apenas aqueles específicos à área da saúde. Em seguida conforme mostra a figura 2 os registros foram organizados em uma tabela de acordo com o título, autor(s), idioma, base de dados e endereço eletrônico.

Figura 1 Diagrama de fluxo PRISMA 2020, para novas revisões sistemáticas que incluíram pesquisas em bancos de dados, registros e outras fontes.

Fonte: <http://www.prisma-statement.org/>

Figura 2 Registros incluídos na revisão segundo título, autor(s), idioma, base de dados e endereço eletrônico.

TÍTULO	AUTOR(S)	IDIOMA	BASE DE DADOS	ENDEREÇO ELETRÔNICO
Fato ou Fake? Uma análise da desinformação frente à pandemia da Covid-19 no Brasil.	Cláudia Pereira Galhardi, Neyson Pinheiro Freire, Maria Cecília de Souza Minayo, Maria Clara e Marques Fagundes	Português	SciELO	https://www.scielo.br/j/csc/a/XnfpYRR45Z4nXskC3PTnp8z/?lang=pt

Análise de <i>fake news</i> veiculadas durante a pandemia de COVID-19 no Brasil.	Thainá do Nascimento de Barcelos, Luíza Nepomuceno Muniz, Deborah Marinho Dantas, Dorival Fagundes Cotrim Junior, João Roberto Cavalcante e Eduardo Faerstein	Português	SciElo	https://www.scielo.org/article/rpsp/2021.v45/e65/
Fighting fake news in the COVID-19 era: policy insights from an equilibrium model.	Kris Hartley e Minh Khuong Vu	Inglês	MEDLINE/PubMed	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7479406/
Fake news in COVID-19: A perspective.	Diego Carrion-Alvarez e Perla X. Tijerina-Salina	Inglês	MEDLINE/PubMed	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7722992/
Impact of Rumors and Misinformation on COVID-19 in Social Media.	Samia Tasnim, Md Mahbub Hossain e Hoimonty Mazumder	Inglês	MEDLINE/PubMed	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7280809/

Fonte: Amanda Cristina da Silva, Sabrina Francisca Felix, Yasmin Yuri Okamoto Beltrão, Natalia Augusto Benedetti, 2021.

Dos artigos analisados o de Galhardi CM, et al., 2020 destaca as principais fake News compartilhadas em aplicativos de mensagens e redes sociais e aponta que o fenômeno do compartilhamento de notícias falsas contribuiu para o descrédito da ciência e das instituições de saúde pública enfraquecendo a adesão da população aos cuidados necessários para evitar a contaminação pelo coronavírus. O artigo ainda considera que o cidadão confira a veracidade do conteúdo a ser compartilhado e que o debate público é uma forma de aumentar a consciência social.

Barcelos TN, et al., 2021, também reconhece que as fake News comprometem os cuidados comprovados pela ciência, manipulando os valores individuais levando as pessoas a acreditarem no que melhor convém, tudo devido ao estado de medo e incertezas decorrentes de uma pandemia. Essas informações falsas que estão carregadas de potencial para influenciar comportamentos que concordem com interesses políticos, sociais e econômicos são extremamente prejudiciais à instalação de medidas de controle e cura da infecção causada pelo vírus SARs-Cov-2.

Sobre os efeitos negativos das notícias falsas Kris Hartley e Minh Khuong Vu, 2020, reconhecem que no contexto de uma pandemia até um parcela mínima da população poderia comprometer os esforços para a recuperação de uma crise. Que até mesmo líderes políticos são vulneráveis às notícias falsas. O artigo coloca como exemplo a promoção do ex-presidente dos Estados Unidos da América_Donald Trump no uso de medicamento antimalárico hidroxicloroquina ao qual a comunidade científica, na época, não possuía evidências sobre eficácia. Segundo o artigo isso “ Ilustra os riscos existenciais apresentados por forças políticas construídas na redefinição ou rejeição de fatos científicos”. De modo geral, o estudo alicerça uma base para explorar as narrativas falsas produzidas em um contexto de crise global, como a da infecção pelo coronavírus.

O artigo de Alvarez D.C e Tijerina-Salina P.X também fala sobre a influência das figuras públicas que são modelos de comportamento e que durante a pandemia contradisseram os conselhos médicos impactando negativamente a população. Os autores levantaram como medida de intervenção não só a educação em saúde, como também a educação sobre o uso de mídias sociais. E que os profissionais de saúde podem contribuir com o compartilhamento consciente de informação, ou seja, conteúdo cientificamente confiável utilizando suas redes sociais para o compartilhamento de conteúdo verificado e, ouvindo e esclarecendo as dúvidas dos pacientes, assim como, educar familiares e amigos.

O artigo de Tasnim S, et al., 2020 fala em como a desinformação sobre o Covid compromete práticas saudáveis e promove comportamentos errôneos levando a resultados ruins para a saúde física e mental do indivíduo. O artigo cita alguns resultados dessa desinformação, como, os vários casos de overdose de cloroquina na Nigéria e o suicídio de um pai de três filhos na Índia que se suicidou após a contaminação pelo coronavírus. A desinformação generalizada segundo Tasnim S, et al., 2020 reduz a legitimidade de novas descobertas científicas o que pode ter impacto prolongado na nutrição da saúde pública e na saúde psicossocial. Como medida para conter a disseminação da desinformação é levantado à responsabilidade das mídias sociais em eliminar fraudes e promover a divulgação de conteúdo cientificamente confiável, e que os profissionais devem estar equipados com os resultados das pesquisas recentes para que se tenha facilidade na comunicação entre o paciente e o provedor de saúde. O artigo ainda levanta a telemedicina como potencial fornecedor de cuidados baseados em evidências e serviço informativo.

4 CONCLUSÃO

A partir dos dados analisados e do objetivo proposto neste trabalho, evidencia-se que o compartilhamento de notícias falsas se mostrou extremamente prejudicial para estabelecer medidas de saúde para impedir a disseminação do vírus e o estabelecimento de hábitos de vida saudáveis, buscando a promoção e a qualidade de vida em meio à pandemia de Covid-19. Considera-se uma opção para o combate ao compartilhamento de informações falsas, a alfabetização digital e em saúde. Incentivada pelas próprias plataformas digitais que são os principais propagadores de informações errôneas sobre o coronavírus e por meio delas, compartilhar conteúdo verificado com viés científico, dando voz aos verdadeiros conhecedores, os profissionais de saúde.

REFERÊNCIAS

Ali, M., & Levine, T. The language of truthful and deceptive denials and confessions. *Communication Reports*, 2008, 21(2), 82–91.

Alvarez D, C and Tijerina-Salina , P. Fake news in COVID-19: A perspective. *Health Promot Perspect.* 2020; 10(4): 290–291.

Barcelos, Thainá do Nascimento et al. Análise de fake news veiculadas durante a pandemia de COVID-19 no Brasil. *Revista Panamericana de Salud Pública* [online]. v. 45, e65. Disponível em: <<https://doi.org/10.26633/RPSP.2021.65>>. ISSN 1680-5348. <https://doi.org/10.26633/RPSP.2021.65>.

Berrocal Gonzalo, S .; Campos Domínguez, E .; Redondo García, M. Prosumidores mediáticos en la comunicación política: El «politainment» en YouTube. *Comun. Rev. Científica Iberoam. Comun. Educ.* 2014 , 43 , 65–72.

Carrion-Alvarez D, Tijerina-Salina PX. Fake news in COVID-19: A perspective. *Health Promot Perspect.* 2020;10(4):290-291. Published 2020 Nov 7. doi:10.34172/hpp.2020.44

Carvalho, M. F .C; Mateus, C. A. fake news e desinformação no meio digital: análise da produção científica sobre o tema na área de ciência da informação. Encontro regional de

estudantes de biblioteconomia, documentação, gestão e ciência da informação das regiões, sudeste, centro-oeste e sul. Belo horizonte- MG 2018.

Conselho federal de enfermagem COFEN adere a carta dos profissionais de saúde contra Fake News,2020.

Del Rey Morató, J. Comunicación Política, Internet y Campañas Electorales: De la Teledemocracia a la Ciberdemocr @ cia ; Tecnos: Barcelona, Espanha, 2007; ISBN 978-84-309-4506-1.

Galhardi, Cláudia Pereira et al. Fato ou Fake? Uma análise da desinformação frente à pandemia da Covid-19 no Brasil. Ciência & Saúde Coletiva [online]. 2020, v. 25, suppl 2, pp. 4201-4210. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1413-812320202510.2.28922020>>. Epub 30 Set 2020. ISSN 1678-4561. <https://doi.org/10.1590/1413-812320202510.2.28922020>.

Hartley K, Vu MK. Fighting fake news in the COVID-19 era: policy insights from an equilibrium model [published online ahead of print, 2020 Sep 9]. Policy Sci. 2020;1-24. doi:10.1007/s11077-020-09405-z

Huremović;Distanciamento social, quarentena e isolamento. Psychiatry of Pandemics,2019 pp. 85-94.

Masip, p.; Aran-Ramspott, S; Ruiz Caballero, C.; Suau, j.; Almenar, E.; Puertas-Graell, D. Consumo Informativo y cobertura mediática durante el confinamiento por el Covid-19; Sobreinformacion, sesgo ideológico y sensacionalismo. Inf Prof.2020.

Merchant RM, Asch DA. Protecting the value of medical science in the age of social media and “fake news” JAMA. 2018;320(23):2415–6. doi: 10.1001/jama.2018.18416.

Organização Mundial da Saúde. Conselhos sobre doença coronavírus (COVID-19)para público:CaçadoresdeMitos, 2020. Disponívelonlineem: <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters>

Tasnim S, Hossain MM, Mazumder H. Impact of Rumors and Misinformation on COVID-19 in Social Media. J Prev Med Public Health. 2020;53(3):171-174. doi:10.3961/jpmph.20.094

CAPÍTULO 67

O CUIDADO MULTIPROFISSIONAL AO PACIENTE ONCOLÓGICO SOB TRATAMENTO

DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c67

Ana Luiza Evangelista da Silva¹, Tatiana Indiana da Silva², Carlos Eduardo da Silva-Barbosa³, Karolayne Carvalho Silva⁴, Zildenilson da Silva Sousa⁵, Laís Carvalho Silva de Araújo⁶, Lais Mesquita de Sousa⁷, Cremilson de Paula Silva⁸, Roberta Luciana do Nascimento Godone⁹

¹ Centro Universitário Maurício de Nassau CARUARU-PE/BRASIL,
(luizaana10@hotmail.com)

² Centro Universitário Maurício de Nassau CARUARU-PE/BRASIL,
(tatianaindiana10@gmail.com)

³ Universidade do Grande Rio RIO DE JANEIRO-RJ/BRASIL,
(cedsbzs@gmail.com)

⁴ Centro Universitário Maurício de Nassau CARUARU-PE/BRASIL,
(karol166carvalho@gmail.com)

⁵ Centro Universitário Maurício de Nassau-CE/BRASIL,
(zildenilsonsilva@gmail.com)

⁶ Centro Universitário Brasileiro- PE/BRASIL
(laiscarvalho188@gmail.com)

⁷ Centro Universitário Christus- unichristus- CE/BRASIL
(laismesquita00@gmail.com)

⁸ Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL)-MG/BRASIL
(cremilsonsilvaa@gmail.com)

⁹ Centro Universitário Maurício de Nassau CARUARU-PE/BRASIL,
(robertagodone@hotmail.com)

Resumo

Objetivo: O presente trabalho visa promover a abordagem coletiva multiprofissional ao paciente oncológico, com promoção para a melhor maneira de enfrentamento da doença, contribuindo assim para o bem-estar do paciente e da família. **Método:** O estudo trata-se de uma revisão integrativa de literatura. Realizou-se o levantamento bibliográfico nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), sendo coletados e analisados artigos entre os anos de 2012 e

2021. Foram utilizados os descritores (DECS): Oncologia; Acolhimento; Equipe multiprofissional, o acrônimo PICO foi utilizado, onde a questão norteadora foi formulada: Quais as evidências da literatura científica contextualizam sobre a ênfase multiprofissional ao paciente sob tratamento oncológico? Foi analisado como critério de inclusão 25 artigos que contemplavam o tema principal do estudo, sendo selecionados 17 dentre eles para a realização do mesmo. **Resultados:** Para que o tratamento seja eficiente, muitos detalhes devem ser observados, o que torna a equipe multidisciplinar no tratamento contra o câncer tão importante. Seja no tratamento radioterápico, tratamento quimioterápico, cirurgia ou qualquer outra forma de tratamento, desta forma, um planejamento completo é necessário. A eficácia do tratamento vai depender das condições do paciente e do tumor, além do planejamento e análise de toda a equipe. Cada profissional é essencial para que o tratamento seja eficiente e seu papel não pode ser substituído. **Conclusão:** Dessa maneira, a pesquisa concede a ideia de como a equipe multidisciplinar lida com a oncologia de modo geral, destacando a importância do papel de cada profissional (enfermeiro, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo etc.), assim, desenvolve o seu papel com prudência e empatia, ficando preparados para lidar com algo tão delicado, que é o câncer.

Palavras-chave: Oncologia; Cuidados paliativos; Equipe multiprofissional

Área Temática: Ciências da Saúde

E-mail do autor principal: luizaana10@hotmail.com

1 INTRODUÇÃO

O câncer é o nome dado a um conjunto de mais de cem doenças que tem em comum o crescimento desordenado (maligno) de células que invadem os tecidos e órgãos podendo espalhar-se (metástase) para outras regiões do corpo. Dividindo-se rapidamente, estas células tendem a ser muito agressivas e incontroláveis, determinando a formação de tumores (acúmulo de células cancerosas) ou neoplasias malignas. Por outro lado, um tumor benigno significa simplesmente uma massa localizada de células que se multiplicam vagarosamente e se assemelham ao seu tecido original, raramente constituindo um risco de vida (INCA, 2014).

A OMS (Organização Mundial da Saúde) estimou em sua última atualização de dados no ano de 2018, 18 milhões de novos casos em todo o mundo, prevendo um possível aumento de 60% nos casos de câncer nas próximas duas décadas, configurando uma questão emergente na saúde pública mundial. Desta forma, o câncer se apresenta como uma doença de alta complexidade, que requer um atendimento especializado, ofertando alta qualidade, segurança, eficácia, oportunidade e uma abordagem centrada no paciente coordenada por uma equipe multiprofissional. A união de profissionais com diferentes perspectivas do processo de cuidar, se complementam para ofertar o todo ao paciente, entendendo que este deve ser tratado de forma humanizada e individualizada. O plano de cuidados deve considerar, além dos aspectos da

doença propriamente dita, todo o contexto biopsicossocial do indivíduo, para que suas ações sejam efetivas (ARTIOLI; SCARPELLI, 2021).

Uma das modalidades de tratamento é a quimioterapia antineoplásica que pode resultar em efeitos colaterais, pois utiliza agentes químicos, isolados e em combinação, que atuam de forma sistêmica, com a finalidade de destruir os tumores malignos a partir da ação sobre seu ciclo celular. No entanto, como essas drogas não possuem especificidade, sua ação também recai sobre células saudáveis, causando efeitos adversos, a chamada toxicidade (BONASSA, E.M.A et al, 2012).

O paciente oncológico não tem apenas um problema físico, quando ele adoece as emoções e a mente também são alteradas. O emocional precisa estar bem para que o paciente possa se recuperar mais rápido ou tenha um final de vida menos doloroso. A mente, o corpo e o coração são um só, ou seja, quando um altera os outros são afetados e, por isso, a equipe de saúde deve tratar os três como um só. Deve-se observar quais são as crenças do paciente, suas emoções e de que forma ele resolve seus problemas emocionais. Para ter o diagnóstico completo da vida do paciente a equipe composta para ele é dividida em três aspectos: do corpo (médico, enfermeiro, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional); da mente (psicólogo, psicoterapeuta, psicanalista, psiquiatria); e sociais (assistente social, voluntários) (POUSA; ALBUQUERQUE; SOUZA, 2017).

Os profissionais da equipe multidisciplinar enfrentam algumas dificuldades como diferenças de personalidades, de opiniões e de formação. São inúmeros os benefícios promovidos por uma abordagem multiprofissional, seja para o paciente que conta com um atendimento especializado multiprofissional, como para os profissionais, que são capazes de exercer suas atividades com maior segurança (SILVA; HAHN, 2012).

A equipe de enfermagem é também de extrema importância no tratamento do paciente com diagnóstico de câncer. Eles são responsáveis pela administração do medicamento e acompanhamento dos procedimentos com o paciente. Além disso, é sua função colher informações acerca das queixas e efeitos colaterais para orientar o paciente e repassar ao médico oncologista. Atendem a protocolos estabelecidos e validados. Já o psicólogo é o profissional que pode auxiliar o paciente a entender a doença e lidar com ela. (THIAGO, 2020).

A participação do profissional da área de nutrição na equipe multidisciplinar é importante pois os pacientes oncológicos estão susceptíveis à anorexia decorrente de alteração da função hipotalâmica e dos tratamentos antitumorais (Figura 1). Portanto os pacientes oncológicos são susceptíveis à desnutrição, aumentando assim os riscos de morbimortalidade, que poderão ser minimizados pelo cuidado prestado pelo nutricionista (BORGES, 2016).

O atendimento fisioterapêutico, frente ao paciente oncológico, é um trabalho que desafia o conhecimento, pois são necessários recursos tecnológicos de alta complexidade, tanto para o diagnóstico quanto para o manejo clínico. Além disso, os fisioterapeutas devem possuir raciocínio ágil e embasamento teórico, sólido e atualizado, para então assim contribuir com diferentes estágios da doença (MACAGNAM *et al.*, 2017).

A comunicação é capaz de amparar os pacientes oncológicos na compreensão das mudanças psicológicas e físicas decorrentes da doença. A boa comunicação gera além de apoio emocional, esclarecimento sobre o que está acontecendo e o processo da doença, possibilitando um cuidado humanizado (ANDRADE *et al.*, 2019). A falta de confiança entre as categorias profissionais devido às relações de poder, e tipo de linguagem utilizada são algumas das dificuldades na estruturação de uma equipe multidisciplinar. Contudo, é por meio da comunicação que os profissionais reconhecem e superam seus problemas. Juntos, em uma troca de saberes revelam-se capazes de superar as adversidades impostas ao longo do cuidado ao paciente oncológico (SILVA; HAHN, 2012).

Figura 1. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR.

Fonte: ARTIOLI; SCARPELII T, 2021.

2 MÉTODO

O estudo trata-se de uma revisão integrativa de literatura, de caráter exploratório, com metodologia qualitativa, com base em estudos teóricos de resultados obtidos por outros autores especialistas no assunto, buscando conhecimento científico sobre a atuação da equipe multiprofissional ao paciente oncológico.

A revisão integrativa de literatura é um método que tem como finalidade sintetizar resultados obtidos em pesquisas sobre um tema ou questão, de maneira sistemática, ordenada e abrangente. É denominada integrativa porque fornece informações mais amplas sobre um

assunto/problema, constituindo, assim, um corpo de conhecimento. Deste modo, o revisor/pesquisador pode elaborar uma revisão integrativa com diferentes finalidades, podendo ser direcionada para a definição de conceitos, revisão de teorias ou análise metodológica dos estudos incluídos de um tópico particular (ERCOLE; MELO; ALCOFORADO, 2014).

Para tanto, utilizou-se levantamento bibliográfico onde foi realizado nas bases de dados, como nas bases da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde). Sendo coletados artigos entre os anos de 2012 e 2021. Foram utilizados os descritores em saúde (DECS) e o acrônimo PICO, onde foi formulada a questão norteadora: Quais as evidências da literatura científica contextualizam sobre a contribuição da da equipe multiprofissional ao paciente sob tratamento oncológico?. Foram adotados como critérios de inclusão: ser redigido em português, estar dentro do período analisado, ter aderência ao tema estudado e a questão norteadora. Todos os estudos que não cumpriram os critérios supracitados foram automaticamente descartados. Os estudos incluídos na revisão foram analisados de forma organizada em relação aos objetivos, materiais e métodos propostos, facilitando a análise e o conhecimento pré-existente sobre o tema procurado.

Foi analisado como critério de inclusão 25 artigos que contemplavam o tema principal do estudo, sendo selecionados 17, para a realização do mesmo.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

No Brasil, tem se identificado que a maioria dos casos de câncer são diagnosticados em estágios avançados, sendo necessário ser levado em conta as condições de vida da população, as dificuldades de acesso às ações de prevenção e promoção, além do contexto contemporâneo da política de saúde do país (INCA, 2012).

Muitas vezes, o tratamento do câncer passa por diversas etapas. Em cada uma delas, podem ser envolvidos outros profissionais de áreas afins à oncologia e ao tratamento multidisciplinar dos pacientes. Atuando de forma associada e especializada, os profissionais unem conhecimento para melhor condução de cada caso, visando proporcionar saúde e bem-estar (THIAGO, 2020).

Para que o tratamento seja eficiente, muitos detalhes devem ser observados, o que torna a equipe multidisciplinar no tratamento contra o câncer tão importante. Seja no tratamento radioterápico, tratamento quimioterápico, cirurgia ou qualquer outra forma de tratamento, diante disto um planejamento completo é necessário (WECARE. 2018). A eficácia do tratamento vai depender das condições do paciente e do tumor, além do planejamento e análise

de toda a equipe. Cada profissional é essencial para que o tratamento seja eficiente e seu papel não pode ser substituído (WECARE. 2018).

Equipe multiprofissional representa uma modalidade de trabalho coletivo, pautada na relação recíproca entre as diversas intervenções técnicas, somada à integração de diferentes áreas profissionais. Adicionalmente, autores ratificam que a equipe multiprofissional é imprescindível ao processo de trabalho em oncologia (SCANAVINNO *et al.*, 2013).

Contudo, esses autores evidenciam que as diferenças de personalidade são um dos maiores problemas no trabalho em equipe (SILVA; HAHN, 2012). Alguns autores concordam que a comunicação é a chave na relação profissional-paciente, sendo necessárias posturas profissionais mais acolhedoras (ANDRADE *et al.*, 2019).

A designação da palavra câncer assusta a grande maioria das pessoas. Por isso, contar com o suporte psicológico é importante. Afinal, a saúde emocional tem grande influência no processo de cura. A contribuição de profissionais da psicologia e da saúde mental também é importante no cuidado prestado ao portador de lesão maligna. As intervenções psicoterapêuticas oferecidas aos pacientes oncológicos são capazes de fornecer estratégias capazes de permitir que busquem forças internas para lidar com diversas situações que o processo adoecimento impõe. Assim, o apoio desses profissionais pode contribuir para tomada de decisões sobre, por exemplo, a realização de procedimentos dolorosos e invasivos, a aceitação de mudanças impostas pela doença, minimizando as sequelas da doença e otimizando a qualidade de vida que resta ao doente (SCANAVINNO *et al.*, 2013).

O papel da enfermagem diante do paciente oncológico visa prestar assistência integral, desde a avaliação diagnóstica do tratamento até a reabilitação. Sendo o paciente oncológico muitas vezes portador de dor crônica, então, cabe ao enfermeiro avaliar a dor do paciente, considerando-a como um sinal vital que pode ser mensurado por meio de escalas, e não somente relacionada aos aspectos subjetivos, para que somente assim, seja capaz de criar estratégias eficazes para o controle da mesma (ROLIM *et al.*, 2019).

Além disso, é necessário que o enfermeiro compreenda sua importância na comunicação com o paciente e seus familiares, principalmente por ser um dos profissionais que mais tempo fica com o paciente (ANDRADE *et al.*, 2019).

O paciente oncológico, na maior parte das vezes, é portador de dor crônica, diante disso, certos autores concordam que a fisioterapia é fundamental para o cuidado em saúde (ROLIM; *et al.*, 2019). Reforçam ainda que o uso de técnicas como cinesioterapia, termoterapia, crioterapia são relevantes coadjuvantes no tratamento (NASCIMENTO; MARINHO; COSTA, 2017).

Propõem-se o uso da avaliação da dor, considerando-a um sinal vital, mensurando-a através de escalas na tentativa de afastar as suas causas (ROLIM *et al.*, 2019).

Ainda sobre o papel da fisioterapia, é sugerido um modelo de Avaliação Física Funcional em Oncologia (AFFO) a qual é mensuradora de funções e estruturas corporais, capaz de facilitar a comunicação entre teoria e prática (MACAGNAM *et al.*, 2017).

Estudos indicam que a desnutrição está presente em aproximadamente 75% dos pacientes oncológicos. Pacientes desnutridos têm risco aumentado para sepse, formação de abscesso e dificuldades de cicatrização no período pós-operatório. Esses fatores contribuem para a redução da capacidade funcional, e menores taxas de sobrevida. Visto isso, é notável a importância da equipe de nutrição no cuidado ao paciente oncológico, sendo capazes os nutricionistas de firmar o diagnóstico nutricional, através de diferentes métodos, IMC, prega cutânea, dinamometria, os quais devem ser avaliados conjuntamente, a fim de aumentarem a especificidade e a sensibilidade da avaliação de risco nutricional (SOUZA *et al.*, 2017).

De acordo com a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, um atendimento humanizado é aquele que prioriza a integralidade da “unidade de cuidado”. Ou seja, pressupõe a união entre a qualidade do tratamento técnico e a qualidade do relacionamento que se desenvolve entre paciente, familiares e equipe (THIAGO, 2020).

4 CONCLUSÃO

De acordo com as pesquisas, é notório perceber que a equipe multiprofissional de saúde pode auxiliar o paciente e sua família num processo difícil, que é o tratamento oncológico. Permitindo assim, uma visão ampla da importância de cada profissional dentro do processo de tratamento oncológico. De modo geral, o resultado deste trabalho mostrou que para haver o bem-estar tanto do paciente quanto da família, é necessário um equilíbrio entre a equipe multidisciplinar, onde, o papel de cada profissional terá a sua porcentagem de melhora durante o tratamento, visando assim um atendimento melhor e personalizado para o paciente.

De modo geral, a oncologia é uma área complexa que requer entrega total de todos que compõem a equipe multiprofissional para contribuir de maneira positiva com o melhoramento do paciente, dando uma “dose” de esperança ao enfermo que está em estado oncológico.

Dessa maneira, a pesquisa concede a ideia de como a equipe multidisciplinar tem que lidar com a oncologia de modo geral, destacando a importância do papel de cada profissional (enfermeiro, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta), assim, desenvolve o seu papel com

prudência e empatia, ficando preparados (teoricamente a princípio) para lidar com algo tão delicado, que é o câncer.

O presente estudo poderá contribuir como subsídio para que os profissionais de saúde procurem trabalhar em conjunto, deixando de lado as relações de poder, possibilitando ao paciente oncológico um tratamento integral humanizado, contribuindo para uma melhoria na qualidade de vida dele.

REFERÊNCIAS:

ANDRADE, Gustavo Baade de. *et al.* Os cuidados paliativos são a importância da comunicação entre o enfermeiro e o paciente, familiar e cuidador. **Revista de Pesquisa: Cuidado e Fundamentos**, p. 713-717, 2019. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-988180>. Acesso em: 14 ago. 2021.

ARTIOLI, Michelle; SCARPELLI, Thais. **Importância da Equipe Multidisciplinar em Oncologia**. Cuidados nestlé na Oncologia, 2021. Disponível em: <https://www.nestleoncologia.com.br/vou-comecar-o-tratamento/importancia-da-equipe-multidisciplinar-em-oncologia>. Acesso em: 22 ago. 2021.

BONASSA, E.M.A et al. Conceitos gerais em quimioterapia antineoplásica. São Paulo: Atheneu, 2012.

BORGES, Camila. Feijó. **O uso de diferentes indicadores de estado nutricional e sua relação com o desfecho clínico de pacientes oncológicos**. Dissertação (Mestrado), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 2016. Disponível em: <https://repositorio.ufcspa.edu.br/jspui/handle/123456789/400>. Acesso em: 13 ago. 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer. **O que é câncer?** Rio de Janeiro, 2014. Disponível em: http://www1.inca.gov.br/conteudo_view.asp?id=322. Acesso em: 24 ago. 2021.

ERCOLE, Flávia Falci; MELO, Laís Samara de; ALCOFORADO, Carla Lúcia Goulart Constant. Revisão integrativa versus revisão sistemática. **Revista Mineira de Enfermagem**,

v. 18, n. 1, p. 9-12, 2014. Disponível em: <http://reme.org.br/artigo/detalhes/904#>. Acesso em: 24 ago. 2022.

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA (INCA). **ABC do câncer**: abordagens básicas para o controle do câncer. Rio de Janeiro: Inca. 2012; 2. ed. rev. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/inca/abc_do_cancer_2ed.pdf. Acesso em: 14 ago. 2021.

MACAGNAN, Fabrício Edler et al. Avaliação fisioterapêutica do paciente oncológico hospitalizado. **Fisioterapia Brasil**, v. 18, n. 4, p. 533-538, 2017. Disponível em: <https://portalatlanticaeditora.com.br/index.php/fisioterapiabrasil/article/view/1216/0>. Acesso em: 18 ago. 2021.

NASCIMENTO, Ícaro Matheus Bezerra Do; MARINHO, Cleidilaine Lima Ferrera; COSTA, Roniery de Oliveira. A contribuição da fisioterapia nos cuidados em pacientes com dor oncológica. **Revista UninGÁ**, v. 54, n. 1, 2017. Disponível em: <http://revista.uninga.br/index.php/uninga/article/view/21>. Acesso em: 16 ago. 2021.

POUSA, Célia Regina Lisboa; ALBUQUERQUE, Iza Jeane Araújo; SOUZA, Shyrley Gleice Mathias de. **O papel da enfermagem na abordagem ao paciente oncológico em estado terminal**. BRASIL ESCOLA, 2017. Disponível em: <https://monografias.brasilescola.uol.com.br/enfermagem/papel-da-enfermagem-na-abordagem-ao-paciente-oncologico-em-estado-terminal.htm>. Acesso em: 13 ago. 2021.

ROLIM, Dulcemar Siqueira et al. Produção científica de enfermeiros brasileiros sobre enfermagem e oncologia: revisão narrativa da literatura. **Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR**, v. 23, n. 1, 2019. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/riipsa/resource/pt/biblio-979973>. Acesso em: 15 ago. 2021.

SANTOS, Marceli de Oliveira. Estimativa 2018: incidência de câncer no Brasil. **Revista Brasileira de Cancerologia**, v. 64, n. 1, p. 119-120, 2018. Disponível em: <https://rbc.inca.gov.br/revista/index.php/revista/article/view/115>. Acesso em: 20 ago. 2021.

SCANNAVINO, Camila Saliba Soubhia et al. Psico-Oncologia: atuação do psicólogo no Hospital de Câncer de Barretos. **Psicologia USP**, v. 24, p. 35-53, 2013. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/psicousp/article/view/55989>. Acesso em: 13 ago. 2021.

SILVA, Daniel Silveira Da; HAHN, Giselda Veronice. PROCESSO DE TRABALHO EM ONCOLOGIA E A EQUIPE MULDISCIPLINAR. **Revista Caderno Pedagógico**, v. 9, n. 2, 2012. Disponível em: <http://www.univates.br/revistas/index.php/cadped/article/view/861/0>. Acesso em: 16 ago. 2021.

SOUZA, Rita Gonçalves de et al. Avaliação do estado nutricional, consumo alimentar e capacidade funcional em pacientes oncológicos. **Braz J Oncol**, v. 13, n. 44, p. 1-11, 2017. Disponível em: <https://www.brazilianjournalofoncology.com.br/details/13/pt-BR/assessment-of-nutritional-status--food-consumption-and-fuctional-capacity-in-oncologic-patients>. Acesso em: 15 ago. 2021.

THIAGO, Ernane Lange de São. **Tratamento Multidisciplinar do Paciente com Câncer**. Imperial hospital de caridade, 2020. Disponível em: <https://www.hospitaldecaridade.com.br/blog/cancer/>. Acesso em: 13 ago. 2021.

WECARE. **Qual a importância da equipe multidisciplinar no tratamento contra o câncer?** São Paulo, 2018. Disponível em: <https://www.wecareskin.com/blog/qual-a-importancia-da-equipe-multidisciplinar-no-tratamento-contra-o-cancer>. Acesso em: 13 ago. 2021.

CAPÍTULO 68

O DELIRIUM COMO UMA COMPLICAÇÃO EM IDOSOS INTERNADOS NA UTI COM COVID-19

DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c68

Laís Celi Mendes Rezende¹; Amanda Barbosa Ribeiro²; Ana Clara Nogueira Cezar³;
Breno Frota Sabbadini⁴; Danielle Blaszak Mosquetta⁵; Higor Quixabeira Bonifacio⁶;
Laura Vilela Buiatte Silva⁷; Moreno Coelho Cyríaco⁸; Yanina Jesus Sobolow de Souza⁹;

Ana Paula Fontana¹⁰

¹Universidade de Rio Verde, laiscelimr@gmail.com

²Universidade de Rio Verde, mandinhamtribeiro@gmail.com

³Universidade de Rio Verde, anacnogueirac@gmail.com

⁴Universidade de Rio Verde, breno_frota@hotmail.com

⁵Universidade de Rio Verde, daniellemosquetta@gmail.com

⁶Universidade de Rio Verde, higorquixabeira33@gmail.com

⁷Universidade de Rio Verde, medlaura30@gmail.com

⁸Universidade de Rio Verde, morenocoelhocyriaco@gmail.com

⁹Universidade de Rio Verde, ninasobolow@gmail.com

¹⁰Universidade de Rio Verde, fontana@unirv.edu.br

RESUMO

A ocorrência de delirium é algo recorrente dentro das unidades de terapia intensiva (UTI). Causada geralmente por um desequilíbrio homeostático no organismo, essa síndrome tende a afetar mais os idosos. Com a chegada da Covid-19 a ocorrência de delirium em idosos na UTI aumentou significativamente devido ao maior número de internações. **Objetivo:** Analisar a ocorrência de delirium em pacientes idosos internados na UTI devido a Covid-19. **Método:** Trata-se de uma revisão sistemática da literatura, através da coleta de dados na PubMed, SciELO, LILACS, Cochrane Brasil e Science, utilizando os descritores "delirium" AND "covid" AND "icu" AND "elderly", que datam dos últimos 2 anos. Foram identificados 97 artigos que se relacionavam com a temática do trabalho, os quais, apenas, 36 foram incluídos na amostra final desse estudo. **Resultados:** O Delirium é uma manifestação neuropsiquiátrica de doença orgânica, essa patologia atinge principalmente pacientes idosos, e sua incidência é mais evidente em idosos hospitalizados. O que é mais recorrente em idosos são as complicações respiratórias causadas pela doença coronavírus 19 (COVID-19) porém, existem cada vez mais

relatos de envolvimento de causas neurológicas e psiquiátrico associadas a óbitos e complicações da Covid, principalmente em idosos, uma dessas é o delirium. Os estudos analisados mostram que houve uma incidência de 43% de pacientes idosos com covid que desenvolveram o delirium enquanto estavam internados para tratar a doença. **Conclusões:** Podemos considerar que o delirium é um dos indicadores da gravidade e das complicações biológica em pacientes idosos internados na UTI com COVID-19 e podem estar associados à morbidade na população geriátrica.

Palavras-chave: Delirium; UTI; Idosos.

Área Temática: Ciências da Saúde

E-mail do autor principal: laiscelimr@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

Delirium é uma alteração cognitiva caracterizada por início súbito, de curso flutuante, distúrbios de consciência, atenção, memória e comportamento. O delirium pode ter diversas etiologias, como alcoólica, medicamentosa, trauma no sistema nervoso central (SNC), distúrbios metabólicos, desidratação/ desnutrição, neoplasias, entre outras (UNICOVSKY MAR; SANTAREM, 2020). Pode se apresentar na forma hipoativa, hiperativa ou mista e é bastante recorrente em pacientes idosos institucionalizados, sendo considerado uma emergência geriátrica mesmo em pacientes sem covid-19.

Com o início da pandemia em Março de 2020, a prevalência de delirium em pacientes idosos teve uma acentuação, pois somados aos fatores de alta incidência como da idade, déficit cognitivo, fragilidade e comorbidades, há ainda as complicações geradas pelo quadro moderados e graves de COVID-19 as quais envolvem lesões miocárdicas, doenças renais e hepáticas, derrames isquêmicos agudos, Síndrome de Guillain-Barré, aumento de citocinas inflamatórias com repercussões neurológicas que podem ocasionar o delirium (MATTACE *et al.*, 2020).

Outro ponto a ser observado em pacientes idosos em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e com Covid-19, é a hipóxia a qual tem correlação com a baixa oxigenação cerebral causando falhas no metabolismo oxidativo, na diminuição de da síntese de acetilcolina repercutindo assim no aumento da liberação de neurotransmissores de dopamina podendo levar a forma hiperativa do delirium (MATTACE *et al.*, 2020).

Nesse sentido, essa alteração cognitiva tem vários fatores adversos que incluindo desde a mortalidade até um prolongado tempo de internação, e consequentemente maiores limitações funcionais. Assim, em pacientes hospitalizados com COVID-19, o delirium é considerado

prevalente, pois o coronavírus não se limita apenas a febre, tosse e dispneia, atualmente, vem apresentando manifestações clínicas múltiplas, desde hipoxia e desidratação, até neuroinflamação e lesão celular (MCLOUGHLIN *et al.*, 2020).

Sabe-se, que o envelhecimento envolve dois caminhos, a senescência e a senilidade, em que uma é complemento da outra, sendo que estão são alterações que ocorrem no organismo humano ao longo do tempo sem que afirme ser uma doença, já a senilidade envolve processos patológicos (CIOSAK *et al.*, 2011).

Nesse viés, a população geriátrica apresenta maior vulnerabilidade, e por conta do declínio na função imunitária apresenta altos riscos de desenvolver agravamentos causados pelo coronavírus, como o delirium (AL-ZAHRANI, 2021). Portanto, o presente estudo tem como objetivo analisar a ocorrência de delirium em pacientes idosos internados na UTI devido a Covid-19.

2 MÉTODO

Trata-se de uma revisão sistemática da literatura, através da coleta de dados na PubMed (*United States National Library of Medicine*), SciELO (*Scientific Electronic Library Online*), LILACS (*Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde*), Cochrane Brasil e Science. Para a busca foi construída, por meio da estratégia PICO, a pergunta de pesquisa: “Pacientes com COVID-19 internados na unidade de terapia intensiva apresentam delirium?”, onde *P*: pacientes com Covid-19, *I*: não se aplica, *C*: Unidade de terapia intensiva, *O*: delirium. O recorte foi os últimos 2 anos, nos idiomas português, inglês, espanhol e francês, utilizando os descritores: "delirium" AND "covid" AND "icu" AND "elderly".

Foram identificados um total de 97 artigos, os quais tiveram seus títulos e resumos lidos para a seleção da amostra final. Ao final da leitura, foram incluídos para a leitura na íntegra 36 artigos, dos quais se relacionavam a temática proposta (Figura 1). Foram excluídos artigos de reflexões, assim como carta ao editor.

Figura 1. Bases de dados e quantidade de artigos

Fonte: Elaborado pela autora Laís Celi Mendes Rezende, 2021.

Dos textos lidos na integra, apenas 7 estudos representaram a amostragem final e os dados coletados serão apresentados a seguir.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O delirium é caracterizado pela por perturbações da consciência e da atenção, Incapacidade de obedecer a comandos; da percepção, do pensamento, da memória, do comportamento psicomotor; não reconhecer familiares ou pessoas conhecidas; das emoções e do ritmo sono-vigília. Os pacientes podem obter um pior prognóstico tanto na vigência da internação como após a alta hospitalar (FREITAS, 2017).

A ocorrência de delirium é algo recorrente dentro das UTI's hospitalares ao redor do mundo. Causada geralmente por um desequilíbrio homeostático no organismo, essa síndrome tende a afetar mais os idosos. Com a chegada da Covid-19 a ocorrência de delirium em idosos na UTI aumentou significativamente devido ao maior número de internações. A incidência de delirium em pacientes que foram diagnosticados com COVID-19 foi retradada como 30% a 50% em vários estudos (FOROUGH *et al.*, 2021).

Um estudo feito na França revelou que de 58 pacientes com COVID-19 que adentraram na UTI, cerca de 26 obtiveram pontuação positiva na escala Método de Avaliação de Confusão para Unidade de Terapia Intensiva (FOROUGH *et al.*, 2021).

Outro estudo demonstraram que há uma probabilidade de 5,8% de ser diagnosticado com alguma doença psiquiátrica cerca de 90 dias após o diagnóstico de COVID-19, a ansiedade foi a mais recorrente, cerca de 4,7% (FOROUGH *et al.*, 2021). Nos pacientes hospitalizados, o maior tempo de internação, associado ao alto custo aos serviços de saúde, a incidência de delirium pode servir como um medidor para se rever a qualidade de atendimento hospitalar, uma vez que em grande parte dos casos a síndrome ocorre devido uma complicação iatrogênica (INOUE, 2007).

As complicações neuropsiquiátricas também podem ocorrer devido a efeitos dos remédios de tratamento COVID-19. Um estudo demonstrou que houve três casos de pacientes que fizeram a autolesão intencional e 12 pacientes com COVID-19 tiveram casos de transtorno psicótico com alucinações (FOROUGH *et al.*, 2021). Alguns grupos de fármacos que são bastante utilizados nos idosos na UTI, como diuréticos, hipotensores, analgésicos narcóticos, anti-inflamatórios não hormonais, anti-histamínicos, bloqueadores H2, entre outros, podem contribuir para o delirium (FREITAS, 2017).

A utilização desses medicamentos em pacientes internados com a Covid-19 pode intensificar a ocorrência do delirium em idosos. Os fármacos tem uma participação importante de delirium, podendo chegar a corresponder como fator etiológico isolado em 12 a 39% dos casos (BRITTON, 2011).

Figura 2. Delirium causado por fármacos

Fonte: Adaptado de BRITTON, 2011.

Um estudo realizado na enfermaria de pacientes internados com a COVID-19 em um Hospital de Cuidados Agudos localizado em Brescia, na Itália, que foi um dos países mais afetados pela infecção por SARS-CoV-2. Na análise de dados, o Delirium hipocinético com

letargia e confusão foi observado em 43% dos casos (ROZZIN IR *et al.*, 2020).

Figura 3. Idosos na UTI de covid

Fonte: Adaptado de ROZZIN IR *et al.*, 2020.

Há também relacionado o aumento da taxa de mortalidade no leito hospitalar, as causas estão relacionadas com a gravidade da doença, déficit cognitivo prévio e idade avançada. Mesmo após a alta hospitalar, alguns estudos de seguimento mostram maior taxa de hospitalização, e piora da função cognitiva, além de maior taxa de mortalidade (WITLOX *et al.*, 2012; GROSS *et al.*, 2012). O estudo realizado na Itália revelou que a taxa de mortalidade geral foi de 71% (ROZZINI R *et al.*, 2020).

Figura 4. Óbitos de pacientes idosos com Covid

Fonte: Adaptado de ROZZIN IR *et al.*, 2020

4 CONCLUSÃO

Dentre os pacientes afetados pelo vírus SARS-CoV-2, um vírus multifacetado, sistêmico, de natureza complexa e causador do COVID-19, os pacientes geriátricos possuem prognóstico sensivelmente pior, devido a diversos fatores, sendo um deles a maior propensão a Delirium, que ainda está sendo objeto de diversos estudos sobre as variadas fisiopatologias envolvidas a esse novo vírus.

Desse modo, através da análise de diversos estudos produzidos, constata-se que os fármacos são o maior fator para ocorrência de Delirium, sendo o hipocinético o mais prevalente e grave, estando ligado há piora cognitiva e maior morbimortalidade.

Em vista disso se demonstra ser de suma importância estar atento a fatores específicos na população idosa, como fragilidade, imunossenescência, comorbidades e a grande incidência de polifarmácia, sendo necessário cada vez mais o acompanhamento de profissionais da saúde familiarizados com os distúrbios clínicos neurológicos apresentados e a farmacologia das medicações prescritas para se evitar que o paciente evolua com Delirium, que aumenta em muito a probabilidade de que ocorra uma maior deterioração do seu quadro neuropsiquiátrico e que pode levar a graves sequelas neurológicas e a uma maior tendência de evolução a óbito.

REFERÊNCIAS

AL-ZAHRANI, Jamaan. SARS-CoV-2 associated COVID-19 in geriatric population: A brief narrative review. **Saudi Journal of Biological Sciences**, v. 28, n. 1, p. 738-743, 2021.

BRITTANY, Woolley. The COVID-19 conundrum: Where both the virus and treatment contribute to delirium. **Geriatric Nursing**, v. 42, n. 4, p. 955-958, 2021.

CIOSEK SI, BRAZ E, COSTA MFBNA, NAKANO NGR, RODRIGUES J, ALENCAR RA, ROCHA ACAL. Senescência e senilidade: novo paradigma na Atenção Básica de Saúde. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 45, n. 2, p. 1763-1768, 2011.
Contents. **Critical Care Clinics**, v. 37, n. 1, p. 7-11, 2021.

FOROUGH, Moein; GUPTA, Rishab; GANGULY, Amvrine; MIRZA, Junaid; FOTROS,

Aryandokht. Neuropsychiatric Manifestations of COVID-19: A Review. **Advances in Psychiatry and Behavioral Health**, v. 1, n. 1, p. 161-172, 2021.

FREITAS, Elizabete Viana de Tratado de geriatria e gerontologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.

Gross AL, Jones RN, Habtemariam DA, Fong TG, Tommet D, Quach L et al. Delirium and long-term cognitive trajectory among persons with dementia. *Arch Intern Med*. 2012; 172:1-8.

Inouye SK, Zhang Y, Jones RN, Kiely DK, Yang F, Marcantonio ER. Risk factors for delirium at discharge. *Arch Intern Med*. 2007

KASTORA, Stavroula; KOUNIDAS, Georgios; PERROTT, Sarah; CARTER, Ben; HEWITT, Jonathan; MYINT, Phyo Kyaw. Clinical frailty scale as a point of care prognostic indicator of mortality in COVID-19: a systematic review and meta-analysis. **EClinicalMedicine**, v. 36, 2021.

Mattace-Raso F, Polinder-Bos H, Oosterwijk B, et al. Delirium: A Frequent Manifestation in COVID-19 Older Patients. *Clin Interv Aging*. 2020;15:2245-2247. Published 2020 Dec 1. doi:10.2147/CIA.S280189

MCLOUGHLIN, B.C., MILES, A., Webb, T.E. *et al*. Functional and cognitive outcomes after COVID-19 delirium. **Eur Geriatr Med**, v 11, p. 857–862, 2020.

ROZZINI, Renzo; BIANCHETTI, Angelo; MAZZEO, Francesca; CESARONI, Giulia; BIANCHETTI, Luca; TRABUCCHI, Marco. Delirium: Clinical Presentation and Outcomes in Older COVID-19 Patients. **Front Psychiatry**, 12 nov. 2021.

UNICOVSKY, Margarita Ana Rubin; SANTAREM, Michelle Santarem. Desafios para enfermagem no atendimento a os pacientes idosos com delirium e covid-19 em unidades de cuidados críticos. **Série Enfermagem e Pandemias: Enfermagem gerontologica no cuidado do idoso em tempos da COVID 19**, v.1 , n. 2, p. 61-65, 2020.

Witlox J, Eurelings LS, JongheJ FM, Kalisvaart KJ, Eikelenboom P, van Gool WA. Delirium

in elderly patients and risk of postdischarge mortality, institutionalization, and dementia. JAMA. 2010; 304(4):443-51.

CAPÍTULO 69

O ENFERMEIRO NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE

DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c69

**Nathalia Emmanuele Pereira Fernandes¹, Everton Bruno Motta Tenório Santiago²,
Nayara Zidia Santos Alvarinhas Lopes³, Sabrina Santos Freitas⁴, Samara Dantas de
Medeiros Diniz⁵, Heloiza Talita Adriano da Silva⁶**

¹ Graduanda em Enfermagem pela Faculdade Estacio do Rio Grande do Norte, Natal,
Rio Grande do Norte, Brasil, (nathalia18epf@gmail.com)

² Graduando em Enfermagem pela Faculdade Estacio do Rio Grande do Norte, Natal,
Rio Grande do Norte, Brasil, (everton.bruno2014@hotmail.com)

³ Graduanda em Enfermagem pela Faculdade Estacio do Rio Grande do Norte, Natal,
Rio Grande do Norte, Brasil, (nayarazidia@live.com)

⁴ Graduanda em Enfermagem pela Faculdade Estacio do Rio Grande do Norte, Natal,
Rio Grande do Norte, Brasil, (sabrina_freitassfs@hotmail.com)

⁵ Graduanda em Enfermagem pela Faculdade Estacio do Rio Grande do Norte, Natal,
Rio Grande do Norte, Brasil, (samaradantas1998@hotmail.com)

⁶ Enfermeira. Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande do
Norte – UFRN, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, (htalitaadriano@gmail.com)

Resumo

Objetivo: Esse estudo tem como objetivo descrever os achados da literatura científica acerca do papel do enfermeiro nas ações de prevenção do câncer de colo de útero na atenção primária a saúde. **Método:** O desenvolvimento do trabalho foi feito mediante uma revisão bibliográfica nas bases de dados: Biblioteca virtual em saúde (BVS), Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e PubMed, por meio do cruzamento dos descritores em Ciências da Saúde a qual tem a finalidade de reunir os resultados de pesquisas de maneira sistemática e ordenada, contribuindo para o conhecimento do tema. **Resultados:** Após os critérios de seleção restaram 10 artigos na amostra, evidenciando que o câncer de colo de útero é um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo, ademais, foram determinadas algumas categorizações: câncer do colo de útero; o papel do enfermeiro frente ao câncer do colo de útero; exame Papanicolau, fatores laboriosos que dificultam a realização da coleta e estratégias que o enfermeiro dispõe para a melhoria nas ações de prevenção ao câncer do colo de útero. **Conclusão:** conclui-se a equipe de saúde deve encontrar meios para ensinar a importância desse exame e suas principais causas para a população através de palestras, campanhas, parcerias e

elaborar o planejamento das ações de saúde para fortalecer as estratégias de promoção e prevenção no âmbito da atenção primária à saúde.

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde; Neoplasias do Colo do Útero; Papel do Profissional de Enfermagem.

Área Temática: Ciências da Saúde

E-mail do autor principal: nathalia18epf@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

Em meados do século XX, as mulheres ganharam espaço nas políticas públicas, no entanto foram limitadas apenas as demandas relacionadas à gravidez e ao parto. Entre as décadas de 1930 à 1970, os programas materno-infantis, trouxeram restrições sobre a representação da mulher, reduzindo seu papel social apenas como mãe e doméstica. Diante a situação, no ano de 1994, o Ministério da Saúde (MS) elaborou o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PNAISM), promovendo assim a assistência de forma integrada, abordando muitas fases da sua vida, desde a adolescência, pré-natal, parto, puerpério, planejamento familiar (ciclo reprodutivo), assistência clínico-ginecológica (prevenção e controle do câncer ginecológico e de mama e prevenção das doenças sexualmente transmissíveis) até a menopausa. O programa tem como objetivo melhorar as condições da mulher e reduzir as taxas de mortalidade. (SANTOS e LIMA, 2016).

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de colo de útero é a terceira causa de morte em mulheres no Brasil, fica atrás apenas do câncer de pele. Seu principal fator de risco é a infecção pelo Papiloma Vírus Humano (HPV) (INCA 2019).

O exame citopatológico conhecido também como papanicolau ou colposcopia é um método realizado por profissionais enfermeiros e médicos que permite a identificação de células escamosas e glandulares sugestivas até lesões malignas do colo uterino. É um exame acessível, de fácil execução e alta eficácia para a detecção de alterações dessas células. (SILVA et al; 2021).

O câncer de colo de útero é causado por um dos 13 tipos oncogênicos do HPV, sendo adquirido através de relações sexuais, existindo duas principais categorias mais comuns sendo elas: carcinoma epidermoide e adenocarcinoma. (RIBEIRO et al, 2021).

Em decorrência ao pouco investimento em atividades de educação em saúde e à baixa cobertura dos exames preventivos leva à preocupação em respeito a prevenção do câncer cérvico-uterino. O índice se torna evidente na faixa etária de 20 a 29 anos e o risco aumenta

atingindo seu pico na faixa etária de 45 a 49 anos. Segundo os dados do Ministério da Saúde, a incidência em mulheres nessas faixas etárias é alta pelo simples fato da não adesão para realização do exame citopatológico. (SANTOS e LIMA, 2016).

O profissional de Enfermagem desempenha um papel ativo no incentivo à realização de exames ginecológicos, deve estar preparado para realizar o exame e atividades educativas, implementar estratégias que aproximem as pacientes do serviço, promovendo um ambiente acolhedor e criando um vínculo entre profissional e usuária a fim de buscar formas de prevenção do câncer do colo de útero e de outros tipos de câncer (Maciel et al; 2021). A alta cobertura de vacinação contra o HPV, e o rastreamento de todas as mulheres na faixa etária preconizada é essencial para a diminuição da mortalidade (CANFELL et al., 2020; OPAS, 2016).

O controle e prevenção do câncer de colo uterino permanecem um desafio para os órgãos mundiais de saúde, tendo em vista que, apesar de estratégias e políticas já implantadas, o índice continua alto relacionado ao números de mulheres acometidas por essa neoplasia (RIBEIRO et al., 2021). Diante disso, esse estudo tem como objetivo Esse estudo tem como objetivo descrever os achados da literatura científica acerca do papel do enfermeiro nas ações de prevenção do câncer de colo de útero na atenção primaria a saúde.

2 MÉTODO

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, que é um método de pesquisa que possibilita, através do caráter sistemático e amplo, a análise de artigos científicos, favorecendo a compreensão aprofundada do tema e a disseminação do conhecimento produzido por outros escritores (SOUZA, et al., 2017). Realizada no período de setembro de 2021, norteadas por protocolo de busca previamente elaborado. As buscas ocorreram por meio das bases de dados: Biblioteca virtual em saúde (BVS), Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e PubMed. Foram utilizados os descritores em ciências da (DeCS): “Atenção Primária à Saúde”; “Neoplasias do Colo do Útero” e “Papel do Profissional de Enfermagem”, o cruzamento foi realizado utilizando-se o operador Booleano AND. Desta busca foram encontrados 61 artigos, que posteriormente foram submetidos aos critérios de seleção. Os critérios de inclusão foram: artigos nos idiomas português, espanhol e inglês; publicados no período de 2011 a 2021 e que abordavam as temáticas propostas para esta pesquisa. Os critérios de exclusão foram: artigos duplicados, disponibilizados na forma de resumo, que não abordavam diretamente a proposta estudada, matérias que não tivessem conexão com a temática do estudo e que não pertencesse a uma base de dados confiável.

Após os critérios de seleção restaram 10 artigos na amostra final, que foram submetidos à leitura minuciosa para a coleta de dados, desta forma para análise e síntese do material selecionado, seguiram-se os seguintes passos: Escolha do tema, determinação dos objetivos, elaboração do protocolo de busca, levantamento e análise da ideia principal, onde demonstram que os fatores de risco estão relacionados aos cuidados com a saúde e ao estilo de vida; a contribuição do enfermeiro na promoção da saúde e ainda na realização de medidas preventivas, a exemplo o exame de Papanicolau

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Posterior à filtragem dos artigos, obtiveram-se 10 amostras as quais atenderam aos critérios de inclusão e exclusão estabelecidos anteriormente. Sendo assim, evidenciou-se que o câncer de colo de útero é um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Ademais, foram determinadas algumas categorizações: Câncer do colo de útero, o papel do enfermeiro frente ao câncer do colo de útero, exame Papanicolau e fatores laboriosos que dificultam a realização da coleta e estratégias que o enfermeiro dispõe para a melhoria na assistência do câncer do colo de útero.

O câncer do colo de útero (CCU) apresenta-se como um problema de saúde pública mundial. Esta neoplasia maligna origina-se devido às alterações celulares na cérvix uterina, podendo progredir lentamente ou rapidamente (DEUS, 2016). Segundo Matos (2016), conseqüente ao câncer de mama, o CCU é a segunda neoplasia que mais acomete a população feminina.

Existem inúmeros fatores de riscos os quais são catalisadores capazes de desenvolver a oncogênese cervical, dentre eles encontram-se: resposta imune (imunologia local e humoral), fatores genéticos (como o polimorfismo da proteína 53), Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), multiplicidade de parceiros, multiparidade, histórico de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), uso prolongado de contraceptivos orais, tabagistas, entre outros fatores relativos. Além disso, ressalta-se que o HPV faz-se fundamental na evolução de células neoplásicas (DA COSTA et al., 2017).

Aproximadamente 10% dos cânceres em mulheres correspondem ao câncer cervical, causando anualmente em média 500 mil novos casos, traduzidos por 2 mortes por minuto (SILVEIRA, 2016). Neste contexto, torna-se indispensável o cuidar humanizado e sistematizado que o profissional de enfermagem aplicará e desempenhará.

O Exame Papanicolau também denominado de Exame Citopatológico (EC) e

popularmente conhecido por preventivo, refere-se a um procedimento de prevenção e rastreamento para o câncer do colo de útero. De acordo com estatísticas do Ministério da Saúde, o EC é o principal e eficaz método para detectar precocemente lesões precursoras as quais possam desenvolver o câncer. Uma vez identificadas precocemente, são curadas em 100% dos casos (DA COSTA et al., 2017).

O papanicolau é realizado na Atenção Primária à Saúde pelo enfermeiro capacitado. Conforme supracitado, o mesmo proporciona averiguar o estágio inicial do CCU, prevenir doenças e promover saúde feminina. Para Silveira (2016, p. 21-22), “todas as mulheres que já iniciaram sua vida sexual, devem submeter-se ao exame citopatológico, principalmente as mulheres na faixa etária de 25 aos 59 anos de idade, como é designado pelo MS”. Outrossim, expõe-se como um método simples, de baixo custo e confiável, sendo de fácil acesso na Unidade Básica de Saúde.

O exame Papanicolau é realizado com a mulher em posição ginecológica e concomitantemente são seguidas as etapas: executa-se a introdução do espécúlo iniciando pela porção posterior do introito avançando até o ápice da vagina, realizando um giro fazendo com que o espécúlo fique em posição transversal e aberto cuidadosamente; ao manter-se aberto, o colo do útero fica de fácil visualização, facilitando a identificação de possíveis lesões, corrimentos e sinais sugestivos de ISTs; com a espátula de Ayre, efetua uma raspagem do material ectocervical em giro de 360°, por aproximadamente 3 vezes (Figura 1); de imediato, é executada a raspagem endocervical com a escova cervical, também em giro de 360° (Figura 2). Logo, o tecido adquirido na coleta é espalhado e fixado em uma lâmina, a qual será encaminhada ao laboratório para ser analisada (Figura 3).

Figura 1. Coleta ectocervical.

Fonte: Caderno de Controle dos cânceres do colo do útero e da mama, Ministério da Saúde, 2013.

Figura 2. Coleta endocervical.

Fonte: Caderno de Controle dos cânceres do colo do útero e da mama, Ministério da Saúde, 2013.

Figura 3. Colocação do material na lâmina.

Fonte: Caderno de Controle dos cânceres do colo do útero e da mama, Ministério da Saúde, 2013.

O preventivo é considerado um procedimento invasivo por incontáveis mulheres, por isso, ocorre a expressão de medo, timidez, aflição, insegurança, dentre outras resistências das quais geram dificuldades na realização do exame. Em conformidade com Luz (2021), a vergonha é o principal fator laborioso, sendo explicado pela exposição de partes íntimas. E em concordância com o autor anterior, Silveira (2016) retifica que essas objeções prolongam a busca do serviço de saúde. Assim, constitui-se imprescindível que o enfermeiro tenha um comportamento ético e técnico, garantindo segurança à paciente.

O enfermeiro possui um espaço primordial no âmbito Atenção Primária à Saúde, dispondo de uma assistência sistematizada, humanizada e empírica de qualidade. O mesmo realizará intervenções importantes desde o nível primário, no qual são detectados os casos de câncer do colo do útero precocemente. Desta forma, contribuirá não somente no reconhecimento precoce, instruindo promoção, prevenção, tratamento e reabilitação do indivíduo, familiares e toda comunidade.

A consulta de enfermagem é de suma importância, pois é um direcionamento de ações onde o profissional possibilita assistência a mulher de forma integral atuando na prevenção primária informando sobre o uso de preservativos feminino ou masculino, como na prevenção secundária através do exame Papanicolal, como também é orientada sobre a importância da realização. Com isso cabe a equipe de enfermagem prestar informações adequadas as usuarias sobre a técnica da coleta do material, mostrar os ensumos utilizados durante o exame, como também acolher e acalmar para que as mulheres não apresentem medo na hora do procedimento.

O enfermeiro dentro da equipe de saúde atua junto a população de forma ativa como orientador e educador na prevenção do câncer do colo uterino desenvolvendo ações qualificadas para assistência integral e continua, ações de promoção a saúde estimulando as mulheres a adotarem cuidados com a saúde e estilo de vida saudáveis.

4 CONCLUSÃO

Ao término dessa pesquisa, foi possível conhecer os desafios para as transformações na assistência integral a saúde da mulher, desde antes da criação do PAISM.

Foi notável observar de forma minuciosa como é preocupante o cenário que envolve essa doença, mesmo tendo uma acessível prevenção. Apesar disso grande parte das mulheres desconhecem o real objetivo do exame, fatores de risco e causas do câncer, o que estabelece um grave obstáculo a saúde pública, não apenas no Brasil mais a nível mundial, considerando nesse contexto, a produção de aprendizagem e discussões em torno da temática, de maneira a contribuir para mudança de tal situação.

A equipe de enfermagem por possuir uma maior relação com a comunidade com foco na educação em saúde pode ter um papel essencial na valorização e resgate dessas condutas com intuito de estabelecer vínculo e conhecer a vivência dessas mulheres, deste modo proporcionando comportamentos saudáveis para viver com autonomia diante sua saúde.

Em virtude dos fatos mencionados a equipe de saúde deve encontrar meios para ensinar a importância desse exame e suas principais causas, realizando palestras, campanhas, parcerias e elaborar planejamento das ações em saúde, assim com a finalidade de fortalecer a promoção e prevenção.

REFERÊNCIAS

DA COSTA, F.K.M et al. Os desafios do enfermeiro perante a prevenção do câncer do colo do útero. **Revista Gestão & Saúde**, p. 55-62, 2017. Disponível em: <
<https://www.herrero.com.br/files/revista/filef125a619c4b18a99efe6fdf22874fdd6.pdf>>
Acesso em:07 set. 2021.

DEUS, C.A. O papel do enfermeiro na prevenção do câncer do colo do útero em unidade básica de saúde com equipe de saúde da família. Universidade Federal de Minas Gerais. Faculdade de Medicina. Núcleo de Educação em Saúde Coletiva. Uberaba, 2011. 30f. Monografia (Especialização em Atenção Básica em Saúde da Família).

LUZ, C.M. Exame de colpocitologia oncótica e o autoexame das mamas: conhecimento de mulheres na oportunidade da coleta do preventivo. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem) - Universidade do Extremo Sul Catarinens, Criciúma, SC, 2021.

MACIEL, N.S et al. Busca ativa para aumento da adesão ao exame Papanicolau. **Revista de Enfermagem Ufpe On Line**. v. 15, n. 1, p. 1-11, mar. 2021. Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/245678/37926#>. Acesso em: 07 set. 2021.

MATOS, D.O. O papel da enfermagem na busca pela adesão das mulheres ao exame de Papanicolau. Universidade Federal de Minas Gerais. Faculdade de Medicina. Núcleo de Educação em Saúde Coletiva. Araçuaí, 2011. 39f. Monografia (Especialização em Atenção Básica em Saúde da Família). Disponível em: <https://ares.unasus.gov.br/acervo/html/ARES/4601/1/2913.pdf>. Acesso em: 07 set. 2021.

RIBEIRO FILHO, M.A; et al. Estratégias utilizadas para a prevenção do câncer de colo uterino na atenção primária em saúde: revisão da literatura. **Pesquisa e Ensino em Ciências Exatas e da Natureza**, v. 5, n. 1, p. 01, fev. 2021. Pesquisa e Ensino em Ciências Exatas e da Natureza. Disponível em: < <http://dx.doi.org/10.29215/pecen.v5i0.1643>>. Acesso em 7 set. 2021.

SANTOS, L.M; LIMA, A.K.B.S. Câncer de colo do útero: papel do enfermeiro na prevenção e detecção precoce dessa neoplasia na atenção básica. **Temas em Saúde**. João Pessoa, v. 16, n. 3, p. 463-475, 2016.

SILVA, L.A; et al. Conhecimento e prática de mulheres atendidas na atenção primária a saúde sobre o exame Papanicolau. **Revista de Pesquisa Cuidado É Fundamental Online**. v. 13, p. 1013-1019, maio 2021. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro UNIRIO. <http://dx.doi.org/10.9789/2175-5361.rpcfo.v13.9845>. Disponível em: <http://seer.unirio.br/cuidadofundamental/article/view/9845/10048>. Acesso em: 07 set. 2021.

SILVEIRA, B.L. Câncer do colo do útero: Papel do enfermeiro na Estratégia e Saúde da Família. 2016. 41 f. TCC (Graduação) - Curso de Enfermagem, Faculdade de Educação e Meio Ambiente, Rondônia, 2016. Disponível em: <http://repositorio.faema.edu.br/bitstream/123456789/895/3/SILVEIRA%20%2c%20B.%20L.-%20C%2c%82NCER%20DO%20COLO%20DO%20%2c%209aTERO.pdf>. Acesso em: 07 set. 2021.

SOUZA, L.M.M; et al. A Metodologia de Revisão Integrativa da literatura em Enfermagem. **Revista investigação em enfermagem [on-line]**. V.1, n.1, p. 17-26, nov, 2017. Disponível em: https://repositorio-cientifico.essatla.pt/bitstream/20.500.12253/1311/1/Metodologia%20de%20Revis%c3%a3o%20Integrativa_RIE21_17-26.pdf> Acesso em: 14 set. 2021.

CAPÍTULO 70

ODONTOLOGIA BIOLÓGICA COMO PROPOSTA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE BUCAL: UMA REVISÃO NARRATIVA

DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c70

Franciele Celestino Bruno Pereira¹, Serena de Oliveira Guimarães², Jaqueline de Souza da Cruz Coelho³, Tatiane Regina Costa Cezar⁴, Adrielly Carvalho do Amaral⁵, Lais Karuline Silva Costa⁶, Michelle Miranda Lopes Falcão⁷

¹ Universidade Estadual de Feira de Santana, (francielecelestino10@gmail.com)

² Universidade Estadual de Feira de Santana, (serenadeog@gmail.com)

³ Universidade Estadual de Feira de Santana, (jaquesccoelho@gmail.com)

⁴ Universidade Estadual de Feira de Santana, (tatianeregina10@gmail.com)

⁵ Universidade Estadual de Feira de Santana, (adrielly.carvalho.07@gmail.com)

⁶ Universidade Estadual de Feira de Santana, (laiskaruline@hotmail.com)

⁷ Universidade Estadual de Feira de Santana, (mmlfalcao@uefs.br)

Resumo

Objetivo Revisar a literatura sobre a proposta da odontologia biológica como estratégia de superação às limitações relacionadas ao serviço odontológico convencional no controle das doenças bucais. **Método** Foi realizada uma revisão da literatura nas bases PUBMED, Scielo e Google Scholar sem restrição de idioma, tipo de estudo ou período através dos termos de busca odontologia, odontologia integrativa, odontologia biológica e Padrões de Prática Odontológica. **Resultados** A odontologia biológica surge no cenário da saúde bucal como uma proposta de atendimento odontológico que contempla o ajuste dos fatores internos e externos associados aos problemas bucais no plano de tratamento, correlacionando-os com possíveis desordens sistêmicas. Além disso, propõe o uso de insumos com menor nível de toxicidade orgânica atrelado à aplicação de técnicas menos invasivas e individualizadas. Associa elementos da medicina ocidental e oriental com vistas ao retorno do equilíbrio entre a mente, o corpo e o espírito. **Considerações Finais** A odontologia biológica revela-se como uma prática de saúde bucal que alinha prevenção e tratamento na busca da homeostase do indivíduo.

Palavras-chave: Odontologia; Padrões de prática odontológica; Terapias complementares.

Área Temática: Ciências da Saúde

E-mail do autor principal: francielecelestino10@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

Os registros históricos revelam a evolução dos modelos de atenção à saúde de acordo com o padrão epidemiológico, científico e cultural da época. O modelo biomédico vigente apresenta entre tantas características o mecanicismo, a fragmentação e a especialização. Esse modelo tem apresentado resultados satisfatórios em diversos processos de saúde-doença, entretanto, com a mudança no perfil epidemiológico a partir da década de 1960, em que as doenças infectocontagiosas estão sendo superadas pelas doenças crônico-degenerativas, a busca por práticas integrativas, pautadas em uma dimensão terapêutica associada ao estilo de vida, perfil genético e socioeconômico, tem sido uma realidade (VERAS, 2007), visto que o modelo de prática em saúde atual não tem obtido o êxito esperado no controle dessas doenças (OTANI e DE BARROS, 2011).

Apesar do crescente avanço em técnicas preventivas e restauradoras na odontologia, a doença cárie, doença periodontal e câncer bucal continuam a ser os principais problemas de saúde bucal (AL-NASSER e LAMSTER, 2020). Essa realidade demonstra a fragilidade do modelo biomédico em superar os desafios impostos pela multifatorialidade relacionada a etiologia dessas doenças. Além disso, algumas técnicas odontológicas têm se revelado prejudicial à saúde, no caso específico da cárie, por exemplo, a liga de amálgama utilizada em procedimentos restauradores para reestabelecer a função do órgão dental tem se revelado potencialmente tóxica, uma vez que o mercúrio presente nessa liga é capaz de adentrar a corrente sanguínea e atingir tecidos corporais como cérebro, rins, pulmões e intestino, impactando negativamente na saúde do paciente e do operador (SAHANI et al., 2016; GALLUSI et al., 2021).

A associação da periodontite com diversas doenças sistêmicas como doenças cardiovasculares, diabetes mellitus, distúrbios respiratórios, prematuridade e baixo peso ao nascer tem demonstrado que a cascata inflamatória desencadeada na presença conjunta desses agravos exacerba tais condições e interfere no sucesso do tratamento, sugerindo a necessidade do tratamento do indivíduo e não da doença isoladamente (MEI et al., 2020). Ademais, sabe-se que a causa da doença periodontal é multifatorial e pesquisas recentes têm trazido a correlação entre estresse e a doença, demonstrando a influência da desordem psicossocial na progressão e severidade da inflamação periodontal (ALVES e GOMES, 2020). Para a prevenção e controle dessa condição e dos seus efeitos na saúde em geral, a adoção da terapia integrativa, fundamentada numa abordagem holística que compreende o homem como um ser indivisível, que considera o relacionamento interpessoal e o contexto de vida como agentes ativos no

processo saúde-doença pode ser uma alternativa viável à superação das limitações do modelo biomédico centrado.

Diante desse contexto, a odontologia biológica surge com o propósito de promover procedimentos minimamente invasivos e o mais biocompatíveis possíveis, integrados ao contexto sistêmico em que mente, corpo e espírito são indissociáveis e os fatores genéticos, ambientais, nutricionais, psicossociais, estressantes, culturais, crenças e valores são considerados no plano de tratamento preventivo e curativo do indivíduo (OTANI e DE BARROS, 2011; MILLS, 2017). Entretanto, algumas barreiras dificultam a concretização e ampliação da odontologia biológica como um modelo de cuidado à saúde. Esses desafios relacionam-se à falta de compreensão sobre a prática integrativa como estratégia de saúde, ao número reduzido de profissionais atuantes nesse modelo, às disputas mercadológicas e, principalmente, às poucas evidências científicas sobre alguns procedimentos que requerem maior tempo para observação dos resultados e maior investimento em pesquisas nesse campo (OTANI e DE BARROS, 2011).

Portanto, o objetivo desse trabalho é revisar a literatura sobre a proposta da odontologia biológica como estratégia de superação às limitações relacionadas ao serviço odontológico convencional no controle das doenças bucais, de modo a contribuir para o conhecimento da comunidade científica e dos profissionais da odontologia sobre o perfil de cuidado que vai além do modelo biomédico, ao defender a abordagem integrativa que envolve corpo-mente-espírito na busca pela qualidade de vida, sem negar as técnicas odontológicas existentes, mas propondo formas de torná-las mais adequadas ao equilíbrio do terreno biológico.

2 MÉTODO

Trata-se de uma revisão narrativa da literatura sobre a odontologia biológica. Para essa revisão foram acessadas as bases de dados PUBMED, Scielo e Google Scholar sem restrição de período, tipo de estudo ou idioma na busca dos trabalhos. Os descritores de busca utilizados foram odontologia, odontologia integrativa, odontologia biológica e Padrões de Prática Odontológica combinados com o operador booleano OR.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A odontologia biológica, também conhecida como odontologia integrativa, é uma proposta de atendimento em saúde bucal que prioriza a redução de impacto nas respostas sistêmicas do indivíduo. Para isso, recorre ao uso de técnicas e materiais biocompatíveis que

promovam segurança do tratamento e ao mesmo tempo gerem o menor nível de toxicidade dentro da necessidade e realidade individual.

Caracteriza-se por uma abordagem centrada na pessoa e não na doença. Defende que o processo de adoecimento está intimamente relacionado ao desequilíbrio orgânico associado ao desalinhamento entre mente-corpo-espírito. Além disso, acredita que a condição bucal é o reflexo do que está ocorrendo no restante do organismo, em uma relação bidirecional e interdependente (AGUIAR, KANAN e MASIERO, 2019; SILVEIRA e ROCHA, 2020). Dessa forma, a integralidade do cuidado bucal na concepção da odontologia biológica inclui todos os aspectos da saúde física, mental, nutricional, emocional e espiritual (LEE et al., 2018).

Distingue-se da odontologia convencional ao superar o modelo biomédico hegemônico caracterizado pelo biologicismo, mecanicismo, tecnicismo, fragmentação e curativismo associados a sua prática centrada na doença. Apesar dessa distinção, a odontologia biológica não nega a odontologia convencional e ressalta a importância de todas as conquistas tecnológicas alcançadas por ela. Ao contrário, propõe a complementaridade de suas práticas como forma de alcançar os melhores resultados para o indivíduo, através da adoção de métodos preventivos, minimamente invasivos e que reduzam a exposição a produtos químicos, otimizando, assim, a conexão boca-corpo, estimulando a saúde e a harmonia (EL KHAYATI e EL YAMANI, 2018; SILVEIRA e ROCHA, 2020).

No contexto da odontologia biológica, os procedimentos odontológicos devem utilizar materiais condizentes com preceito da menor toxicidade e técnicas minimamente invasivas (SIMOES, 2020). Nesse contexto tem-se o uso de implantes de zircônia em substituição ao de titânio (HOCHSCHEIDT et al., 2011); o uso de restaurações foto-polimerizáveis ou de porcelana ao invés da restauração de amálgama; o uso da ozonioterapia para reduzir o uso de antibióticos, corticosteroides e anti-inflamatórios em procedimentos cirúrgicos bucais (SILVA et al., 2021); o uso da acupuntura no tratamento da disfunção-temporo-mandibular (DTM) para reduzir o uso de analgésicos (BORIN et al., 2011); o uso de técnicas de redução do risco de cárie, envolvendo modificação de hábitos de vida cariogênicos e uso de nutracêuticos para reduzir cada vez mais o uso de flúor (ALLAKER e STEPHEN, 2017); o uso da bioressonância para auxiliar a escolha do tratamento (FROES e RONZIO, 2010); a aplicação da terapia neural para através do estímulo do sistema nervoso central reorganizar as funções orgânicas em desequilíbrio, associadas a dores crônicas, entre outros (KLINGHARDT, 1993; HALLER et al., 2018).

Especialistas integrativos em saúde bucal podem se concentrar em determinada especialidade odontológica, entretanto, por acreditarem que a cavidade oral é indissociável do

restante do corpo, não fragmentam o contexto do diagnóstico, tampouco, da terapia a ser empregada. A periodontite, por exemplo, é uma doença cuja relação direta ou indireta com a etiologia ou exacerbação de condições sistêmicas como diabetes, adventos cardiovasculares, asma e reações hansênicas já está consolidada na literatura (CARDOSO, REIS e MANZANARES-CÉSPEDES, 2018), o que ressalta a importância do olhar integrativo do periodontista sobre a saúde bucal. A necessidade de prótese também é outra realidade na odontologia que está relacionada com a qualidade de vida, assim, ao reabilitar o indivíduo com o uso de próteses biocompatíveis e de práticas integrativas, quando necessárias, o protesista contribui para o melhor desempenho das atividades rotineiras dos seus pacientes (IKEBE et al., 2012).

As terapias propostas pelo modelo odontológico hegemônico em saúde seguem o princípio da lei dos contrários: anti-inflamatórios, antitérmicos, antialérgicos, analgésicos e antibióticos. O modelo proposto pela odontologia biológica sugere a terapia integrativa como forma de cuidar do indivíduo, em que o foco não é o sintoma, mas os fatores associados ao seu desencadeamento. O foco da odontologia biológica, que pressupõe a cura do indivíduo e não da doença, é reflexo do entendimento de que a doença é a manifestação de um desequilíbrio do corpo, mente e espírito; de que os indivíduos são regidos por sentimentos e emoções que podem interferir nos resultados dos procedimentos clínicos. Assim, tratar o indivíduo como um todo é um aspecto importante a ser considerado na melhoria do desempenho das técnicas odontológicas tradicionais (AGUIAR, KANAN e MASIERO, 2019). A abordagem voltada para a integralidade do indivíduo demonstrou melhorias nos cuidados de condições crônicas e aumentou o vínculo dos pacientes em relação aos profissionais e aos serviços prestados, reduzindo possíveis falhas no tratamento (LEE et al., 2018).

Ao considerar a correlação entre desordens sistêmicas e afecções bucais, a odontologia biológica compreende que os transtornos psiquiátricos e emocionais, como ansiedade, depressão e estresse podem provocar direta ou indiretamente alterações bucais. Os indivíduos que apresentam a condição crônica de estresse, por exemplo, encontram-se em um estado prolongado de “luta ou fuga” com desequilíbrio no eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA), desencadeando um quadro de fadiga adrenal. Na tentativa de poupar o gasto energético para a manutenção de atividades vitais, algumas funções orgânicas são reduzidas, como a produção de saliva, por exemplo. A redução do fluxo salivar torna a cavidade bucal mais susceptível ao desenvolvimento de patologias, diante da relação direta entre a quantidade desse fluido e o seu papel protetor aos tecidos bucais (GHOLAMI et al., 2017).

Além disso, pessoas emocionalmente desequilibradas tendem a apresentar mudanças comportamentais, que podem incluir o aumento de hábitos tabagistas e etilistas, redução ou ineficiência da prática de higiene bucal, adoção de comportamento alimentar não nutritivo, bem como, o possível aumento do consumo de medicamentos antidepressivos ou estabilizadores de humor. Todas essas mudanças podem refletir no desequilíbrio da saúde bucal e do sistema imunológico (PEUKER, 2010).

Nesse sentido, a proposta da odontologia biológica para curar o indivíduo considera o uso das práticas integrativas complementares (PICS) no plano de tratamento do indivíduo de acordo com as suas necessidades. As PICS são caracterizadas por ações em saúde que buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde através de técnicas tradicionais e naturais baseadas em evidências científicas. As PICS preconizam a harmonização do homem com toda a historicidade do meio em que ele vive, valorizando a escuta e a criação do vínculo terapêutico aliado à proposta do autocuidado (TELESI-JUNIOR, 2016).

Assim, dentre as diversas possibilidades propostas pela prática integrativa, tem-se, por exemplo, a homeopatia que defende o princípio da similaridade (*similia similibus curantur*), em que se utiliza a diluição e dinamização dos fatores associados ao sintoma para curar o indivíduo através do fortalecimento do seu sistema imunológico (BEER, 2018). Tem-se, ainda a ozonioterapia, terapia floral, medicina tradicional chinesa/acupuntura, medicina antroposófica, homeopatia, plantas medicinais e fitoterapia, termalismo social/crenoterapia, arteterapia, ayurveda, biodança, dança circular, meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia, quiropraxia, reflexoterapia, reiki, shantala, terapia comunitária integrativa, yoga, apiterapia, aromaterapia, bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, geoterapia, hipnoterapia e imposição de mãos (TESSER, MARIA e SOUSA, 2018).

Se a odontologia biológica preconiza a integralidade das ações, a experiência do indivíduo dentro dos serviços odontológicos é um aspecto importante para medir a qualidade da odontologia, influencia na relação profissional-paciente, consequentemente, no resultado da abordagem em saúde. Dessa forma, o modelo de atendimento centrado na pessoa e não na doença ressalta que a comunicação durante as consultas é importante para criação de um ambiente mais acolhedor; que é necessário entender as perspectivas, expectativas e necessidades dos indivíduos, assim como, compartilhar com eles o poder de escolha/decisão. O envolvimento do indivíduo na assistência odontológica requer conversas mais empáticas, claras e livres de termos técnicos, para que o vínculo entre profissional e paciente seja construído através da confiança mútua (MILLS et al., 2015) e o sucesso do tratamento seja alcançado em

seu sentido mais amplo. É necessário criar um espaço seguro de escuta, baseado na empatia e sensibilidade para atender as necessidades de cada indivíduo. A confiança mútua, o cuidado holístico com evidência científica, a empatia, o fornecimento de informações e a comunicação possibilitando uma tomada de decisão compartilhada são aspectos essenciais para subsidiar uma experiência odontológica mais positiva e essencial à adesão ao tratamento escolhido (NOUSHI e CHRISTOPHE, 2020).

O holismo em sua essência afirma que o homem não deve ser compreendido através de uma análise restrita de suas diferentes partes, pelo contrário, acentua a importância de considerar a saúde geral do paciente, considerando seu bem-estar físico, psicológico, social e espiritual. A existência de conexões vitais entre a saúde bucal e geral fortalece a união boca-corpo como o cenário de um sistema completo e indissociável (MILLS, 2017).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A odontologia biológica não se trata de uma especialidade odontológica, mas de uma abordagem integrativa em saúde bucal que preconiza a cura do indivíduo e não da doença através da correlação das afecções bucais com as desordens sistêmicas, do uso de técnicas odontológicas menos invasivas com insumos biocompatíveis e da associação de terapias convencionais com terapias integrativas complementares à saúde na busca do equilíbrio entre mente, corpo e espírito. A odontologia biológica não nega a odontologia convencional, apenas propõe que o cuidado em saúde considere a geração do menor dano possível em relação à toxicidade e invasão dos tecidos para o reestabelecimento e manutenção do terreno biológico sadio do indivíduo.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, J.; KANAN, L. A.; MASIERO, A. V. Práticas integrativas e complementares na atenção básica em saúde: um estudo bibliométrico da produção brasileira. **Saúde em Debate**, v. 43, n. 123, p. 1205–1218, 2019.

ALLAKER, R. P.; STEPHEN, A. S. Use of Probiotics and Oral Health. **Current Oral Health Reports**, v. 4, n. 4, p. 309–318, 2017.

AL-NASSER, L.; LAMSTER, I. B. Prevention and management of periodontal diseases and dental caries in the older adults. **Periodontology** 2000, v. 84, n. 1, p. 69–83, 2020.

ALVES, S. DOS S.; GOMES, C. S. B. Influência do estresse na progressão e severidade da doença periodontal: revisão de literatura. **Revista Cathedral**, v. 2, n. 1, p. 3–8, 2020.

BEER, A. M. Homöopathika als Alternative zu Synthetika? [Homeopathic remedies as an

alternative to synthetic medicines?]. **Fortschritte der Medizin**, v. 160, n. 6, p. 60-62, 2018.

BORIN, G.S. et al. Acupuncture as therapeutic resource in the pain and in the severity of the temporomandibular disorder. **Fisioterapia e Pesquisa**, v. 18, n. 3, p. 217-222, 2011.

CARDOSO, E. M.; REIS, C.; MANZANARES-CÉSPEDES, M. C. Chronic periodontitis, inflammatory cytokines, and interrelationship with other chronic diseases. **Postgraduate medicine**, v. 130, n. 1, p. 98-104, 2018.

EL KHAYATI, S.; EL YAMANI, A. Holistic dentistry enhancing overall health TT - La dentisterie holistique au service de la santé globale. **The Pan African Medical Journal**, v. 30, p. 102, 2018.

FROES, P. M.; RONZIO, O. Efeitos in vivo das ondas sônicas de baixa frequência no processo cicatricial. **Fisioterapia Brasil**, v. 11, n. 4, p. 283-286, 2010.

GALLUSI, G. et al. Is dental amalgam a higher risk factor rather than resin-based restorations for systemic conditions? A systematic review. **Materials**, v. 14, n. 8, p. 1-17, 2021.

GHOLAMI, N. et al. Effect of stress, anxiety and depression on unstimulated salivary flow rate and xerostomia. **Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects**, v. 11, n. 4, p. 247-252, 2017.

HALLER, H. et al. Emotional release and physical symptom improvement: a qualitative analysis of self-reported outcomes and mechanisms in patients treated with neural therapy. **BMC Complementary and Alternative Medicine**, v. 18, n. 1, p. 311, 2018.

HOCHSCHEIDT, C. J. et al. Zirconia dental implants: an alternative for today or for the future? (Part I). **Dental Press Implantology**, v. 5, n. 4, p. 100-110, 2011.

IKEBE, K. et al. Comparison of GOHAI and OHIP-14 measures in relation to objective values of oral function in elderly Japanese. **Community Dentistry and Oral Epidemiology**, v. 40, p. 406-414, 2012.

KLINGHARDT, D. Neural Therapy. **Journal of Neurological and Orthopedic Medicine and Surgery**, v. 14, n.2, p. 109-113, 1993.

LEE, H. et al. Person-centered care model in dentistry. **BMC Oral Health**, v. 18, n.1, p. 1-7, 2018.

MEI, F. et al. Porphyromonas gingivalis and Its Systemic Impact: Current Status. **Pathogens (Basel, Switzerland)**, v. 9, n. 11, p. 3-14, 2020.

MILLS, I. J. A Person-Centred Approach to Holistic Assessment. **Primary Dental Journal**, v. 6, n. 3, p. 18-23, 2017.

MILLS, I. et al. Person-Centred Care in Dentistry - the Patients' Perspective. **British Dental Journal**, v. 218, n. 7, p. 407-13, 2015.

NOUSHI, N.; CHRISTOPHE, B. Developing person-centred dental care: the perspectives of people living in poverty. **Dentistry Journal**, v. 8, n. 3, p. 82, 2020.

OTANI, M. A. P.; DE BARROS, N. F. A medicina integrativa e a construção de um novo modelo na saúde. **Ciência e Saúde Coletiva**, v. 16, n. 3, p. 1801–1811, 2011.

PEUKER, A. C. Factors Associated with Drug Abuse in a Clinical Sample. **Paidéia**, v. 20, n. 46, p. 165–173, 2010.

SAHANI, M. et al. Mercury in dental amalgam: are our health care workers at risk? **Journal of the Air & Waste Management Association**, v. 66, n. 11, p. 1077–1083, 2016.

SILVA, H. M et al. Aplicação da ozonioterapia na odontologia: revisão integrativa. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 13, n. 8, p. 1-9, 2021.

SILVEIRA, R. P.; ROCHA, C. M. F. (De)construction of truths: An analysis about integrative and complementary practices in health. **Saúde e Sociedade**, v. 29, n.1, p. 1–11, 2020.

SIMOES, S. C. R. Odontologia integrativa: abordagem sistêmica na Odontologia. **Revista Fitos**, v. 14, n. 3, p. 407–409, 2020.

TELESI-JUNIOR, Emílio. Práticas integrativas e complementares em saúde, uma nova eficácia para o SUS. **Estudos Avançados**, v. 30, n. 86, p. 99-112, 2016. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142016000100099&lng=en&nrm=iso>. Acessado em 05 dez. 2020.

TESSER, C. D.; MARIA, I.; SOUSA, C. DE. Práticas Integrativas e Complementares na Atenção Primária à Saúde brasileira. **Saúde Debate**, v. 42, n. 1, p. 174–188, 2018.

VERAS, R. P. O envelhecimento no Brasil : aspectos da transição demográfica e epidemiológica. **Saúde Coletiva**, v. 4, n. 17, p. 135–140, 2007.

CAPÍTULO 71

OS DESAFIOS DO MÉTODO CANGURU E A ATENÇÃO HUMANIZADA AO RECÉM-NASCIDO DE BAIXO PESO: PAPEL DO ENFERMEIRO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c71

Gabryelle Ribeiro da Costa¹, Laiane da Silva Lima Oliveira², Marcela Rosa da Silva³,
Gabrielly Albuquerque Pinho⁴, Flávia Michele Vilela Gomes⁵, Sirlene Aparecida de
Oliveira⁶, Samara Dantas de Medeiros Diniz⁷, Thais Moura de Ataides⁸, João Carlos Dias
Filho⁹, Taciany Alves Batista Lemos¹⁰

¹Unifacid Wyden, (gabryellecostar@hotmail.com)

² Centro Universitário Jorge Amado, (laianeolima11@gmail.com)

³ Hospital de Clínicas de Porto Alegre, (marcelasilva@hcpa.edu.br)

⁴ Universidade de Brasília, (gabriellya056@gmail.com)

⁵ Hospital de clínicas de porto alegre(fmgomes@hcpa.edu.br)

⁶ Faculdade de Ensino Superior de Cacoal(sirleneaparecidadeoliveira1988@gmail.com)

⁷ Faculdade Estacio do Rio Grande do Norte(samaradantas1998@hotmail.com)

⁸ Faculdade Integradas IESGO(thaismouradeataides@gmail.com)

⁹ Escola Multicampi de Ciências Médicas EMCM (jfilho522@gmail.com)

¹⁰MSC em Biotecnologia aplicada à saúde(tacianyablemos@hotmail.com)

RESUMO

Objetivo: Identificar os fatores relacionados à dificuldade de Implantação da assistência hospitalar junto às dificuldades de implantação de um novo modelo de assistência ao recém-nascido de baixo peso na estrutura hospitalar. **Método:** Trata-se de uma revisão integrativa, qualitativa, realizada através da análise reflexiva, para a construção utilizou-se publicações baseadas em dados científicos válidos, publicações científicas e a vivência dos autores a respeito do tema abordado, realizados através da busca online de publicados na íntegra, em português e inglês, entre 2016 a 2020 a partir das bases de dados SCIELO, LILACS E MEDLINE, através dos DECS: "Método Canguru", "Humanização", "Parto" e como critério de exclusão, artigos repetidos nas bases de dados sendo selecionados 10 artigos científicos para compor a revisão. **Resultados:** Na análise do processo de implantação da assistência hospitalar do método canguru e da Atenção Humanizada ao Recém-Nascido de Baixo Peso, foi constatado que apesar das modificações feitas nas redes de saúde, ainda existem barreiras a serem

rompidas como a resistência da equipe que presta assistência aos RN, que ocorre devido à falta de capacitação dos profissionais e sensibilização envolvendo tal prática, a insegurança e a falta de conhecimento prejudicam a adesão do profissional. **Considerações Finais:** Após finalizar a análise do estudo, pode-se, portanto, observar que o Método Canguru se torna eficaz na recuperação do recém-nascido prematuro e de baixo peso, proporcionando vínculos e inúmeros benefícios. Assim, fazem-se necessários às intervenções que possibilitam a diminuição da taxa de mortalidade neonatal além de estimular o contato e o acolhimento tanto do recém-nascido quanto da sua família buscando assim facilitar o vínculo mãe-bebê previamente.

Palavras-chave: Metodo canguru; Humanizacao; Parto.

Área Temática: Ciências da saúde

E-mail do autor principal: gabryellecostar@hotmail.com

1 INTRODUÇÃO

O método canguru é definido como um tipo de assistência neonatal que implica no contato pele a pele precoce entre mãe e recém-nascido, de forma crescente e pelo tempo que ambos entenderem ser prazeroso e suficiente. Ele tem como objetivo promover um maior vínculo afetivo e a estabilidade térmica, contribuindo para a uma redução dos índices de infecção hospitalar, além de reduzir a dor e o estresse do recém-nascido (OMS,2004).

A maioria dos recém-nascidos (RNs) de alto risco pode apresentar deficiências fisiológicas como: a incapacidade de sugar, engolir e respirar de maneira coordenada, que correspondem às habilidades alcançadas durante a 34^a a 36^a semanas de idade gestacional. Também podem apresentar refluxo gastroesofágico aumentando o risco de aspiração de alimentos e a incapacidade de manter a temperatura corporal. Tais complicações podem gerar várias dificuldades para adaptação à vida extrauterina devido à imaturidade dos diversos sistemas orgânicos (CLOHERTY; SONDHEIMER, 1993; apud MILTERSTEINER, 2003).

No Brasil, o método canguru foi integrado como parte das diretrizes políticas relacionadas à Atenção à Saúde dos recém-nascidos prematuro (RNPTs) e de baixo peso, incluídos no Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento, instituído pelo Ministério da Saúde, sob Portaria/GM nº 693, de 5 de julho de 2000 que adotava o método como estratégia essencial na promoção de mudanças centradas na humanização da assistência e no princípio de cidadania da família, atualizada por meio da Portaria GM/MS nº 1.683, de 12 de julho de 2007 (BRASIL, 2007).

Os recém-nascidos Xribuem significativamente com a mortalidade infantil e neonatal, representando mais de 50% dos óbitos de crianças menores de um ano (ARIAS *et.al.*,2003 *apud* FERRARI *et.al.*, 2006). A melhoria do peso ao nascer poderia levar a uma redução de 8% na mortalidade infantil no país, mas a eficácia das intervenções disponíveis é muito baixa

(FERRARI *et.al.*, 2006). Para Filho (2008) os bebês submetidos ao método mãe canguru, diminuem seu tempo de internação, mantêm oxigenação adequada, têm a estabilização da temperatura corporal favorecida, proporcionam sono mais calmo e prolongado e as mães se sentem seguras para manterem contato e monitorar a saúde de seus bebês.

O cuidado neonatal e a atenção humanizada estão relacionados com o respeito e a qualidade de garantia que promova a segurança do recém-nascido e o acolhimento tanto do recém-nascido quanto da sua família buscando assim facilitar o vínculo mãe-bebê previamente. Desde que o recém-nascido permaneça internado em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, ele estará exposto a estímulos nociceptivos como estresse, dor, conversas de funcionários, ruídos de equipamentos, procedimentos invasivos dolorosos e manuseio excessivo.

Todos os anos nascem no mundo 20 milhões de recém-nascidos de baixo peso, muitos em consequência de um parto prematuro. Isso contribui de maneira substancial para a elevada taxa de mortalidade neonatal ainda existente em várias regiões, principalmente nos países pobres (OMS, 2004). No Brasil, desde o início da década de 1990, a Mortalidade Neonatal passou a ser o principal componente da Mortalidade Infantil, em função, principalmente, da redução proporcional de óbitos pós-neonatais e da manutenção do componente neonatal precoce (LANSKY *et al.*, 2002).

Essa maior visibilidade dos óbitos neonatais em nosso meio, decorrente até mesmo da melhoria dos sistemas de informação, condicionou a inclusão da assistência obstétrica e neonatal, em seus diferentes níveis de complexidade, na agenda de prioridades das políticas de saúde nos três âmbitos de gestão do nosso sistema de saúde (GOMES, 2004). A necessidade de ampliação de leitos para atendimento de recém-nascidos de risco torna indispensável uma maior compreensão do ambiente de internação neonatal. Nesse contexto, tem-se observado a crescente produção de estudos sobre as especificidades desse período e do impacto do ambiente da terapia intensiva sobre o desenvolvimento infantil nas múltiplas dimensões da vida futura do bebê e sua família (LAMY, 2000; SANTORO; SANTORO, 2002).

Os trabalhos pioneiros de Klaus e Kennell (2000), destacando a importância dos cuidados maternos para o melhor desenvolvimento do bebê, chamam a atenção para os efeitos que a separação precoce e prolongada entre mãe e bebê podem trazer como fator de risco para atraso no desenvolvimento e sequelas neurológicas.

Nesse contexto surge a problemática desse estudo: Como a humanização vem sendo realizada junto ao método canguru e ao recém-nascido de baixo peso? O objetivo deste artigo é refletir sobre a implantação da assistência hospitalar junto às dificuldades de implantação de

um novo modelo de assistência ao recém-nascido de baixo peso na estrutura hospitalar e demonstrar a eficácia e os benefícios do método canguru bem como refletir acerca dos desafios enfrentados para essa implementação.

2 METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa, que possibilitou reunir informações necessárias para elucidar o fenômeno de interesse, que se baseou em publicações baseadas em dados científicos válidos, publicações científicas e a vivência dos autores a respeito do tema abordado.

A busca foi realizada no mês de junho de 2021. Através das bases Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) e, na biblioteca Scientific Electronic Library Online (SciELO). Construção da pergunta de pesquisa através do acrônimo PICO (paciente, interesse, contexto), utilizando os descritores em ciências da saúde (DECS) "Método Canguru", "Humanização", "Parto". Os critérios de inclusão estabelecidos, foram: Textos completos e gratuitos, publicações dos anos de 2016 a 2020 nos idiomas português e inglês. E, os critérios de exclusão foram: teses, outras revisões, estudos repetidos, ou não finalizados.

Inicialmente, adotou-se a estratégia PICO (população, intervenção e contexto) para definição da questão norteadora, onde a população fora as enfermeiras que apresentaram dificuldades na atencao humanizada ao recém-nascido de baixo peso no contexto da atencao primaria . Desta forma, questionou-se: “Qual a relação entre a dificuldade da implantacao da atencao humanizada ao recém-nascido de baixo peso na atencao primaria ?”.

Para a seleção dos artigos, houve a leitura do título e do resumo dos estudos, observando os critérios de seleção. Posteriormente, realizou-se uma leitura criteriosa desses artigos e iniciou-se a coleta dos dados. Para essa coleta, foi elaborado um quadro contendo os autores, ano de publicação, local, título do artigo e principais achados assim possibilitou reunir informações necessárias para elucidar o fenômeno de interesse, através de literatura já existente. Possui abordagem qualitativa de natureza exploratória e descritiva. Foi realizada através da busca online de artigos científicos nacionais e internacionais, no período de junho de 2021. (SOUSA; SILVA e CARVALHO, 2010).

Como este estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura, não houve a necessidade de submissão ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), respeitados assim os aspectos éticos referenciando todas as fontes citadas.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Obteve-se na busca inicial Através da estratégia de busca nas bases de dados obteve-se

21 publicações, 10 LILACS, 7 na MEDLINE, 4 na SciELO. Após leitura dos títulos e resumos, excluiu-se 5 artigos que não responderam a questão norteadora, 3 artigos que se repetiram nas bases de dados, 1 artigo de revisão, 1 documento que não era artigo. Resultando em 11 artigos para análise integral do conteúdo.

Quadro 1. Características dos artigos sobre o método canguru e a atenção primária ao recém-nascido de baixo peso para compor a revisão.

AUTOR E ANO	TÍTULO DO ARTIGO	PRINCIPAIS ACHADOS
CONDE-AGUDELO, Agustin; José L DÍAZ-ROSSELLO. 2016	Kangaroo mother care to reduce morbidity and mortality in low birthweight infants	O contato pele a pele garantido através do Método Canguru proporciona que a mãe mantenha a temperatura corporal do bebê, além de desencadear estímulos hormonais e neuropsicobiológicos que favorecem a lacto gênese. O uso do Método Canguru em recém-nascidos de baixo peso estabilizados traz benefícios: na redução da mortalidade, de infecções e hipotermia; aumento do ganho de peso e no estímulo à amamentação exclusiva; aumento do vínculo entre mãe, bebê e cuidadores. Até o momento do estudo, não havia evidências sobre a permissão do uso do Método Canguru em recém-nascidos de baixo peso não estabilizados.
MOORE, E. R., BERGMAN, N., ANDERSON, G. C., MEDLEY, N. 2016.	Early skin-to-skin contact for mothers and their healthy newborn infants.	No cuidado humanizado, o contato pele a pele o bebê é colocado nu sobre o peito da mãe ao nascer e permanece até, no mínimo, o final da primeira amamentação bem-sucedida ou por uma hora após o nascimento. Após o nascimento, existe um período que prepara a mãe e bebê para desenvolverem uma interação recíproca quando estiverem juntos. Os recém-nascidos possuem uma sensibilidade olfatória forte pelo colostro, portanto, os RN's que têm esse momento nas primeiras horas de vida podem mamar com mais facilidade e eficácia e aumentar o ganho de peso.
MEKONNEN, A. G., YEHUALASHET, S. S., BAYLEYEGN, A. D. (2019)	The effects of kangaroo mother care on the time to breastfeeding initiation among preterm and LBW infants: a meta-analysis of published studies	O método canguru diminui a mortalidade e a morbidade de recém-nascidos, é baseada em três processos: a posição canguru (ou contato pele a pele), a amamentação e a alta no momento oportuno com acompanhamento rigoroso. Esse método pode ser realizado a qualquer hora e estabelece um ambiente ideal para o RN se adaptar à vida extrauterina. Esse procedimento possui seus benefícios e é de baixo custo, e permite um cuidado de boa qualidade, e complementar os instrumentos tecnológicos, podendo raciocinar o uso de incubadoras e aquecedores. Os recém-nascidos de baixo peso que recebem MC passam menos tempo hospitalizados. Os bebês expostos ao MC iniciaram a amamentação precoce.
SOUSA S. C. et al (2019)	Fortalecimento do vínculo entre a família e o neonato prematuro	O vínculo neonato-família é de extrema importância para o prognóstico positivo do bebê, ou seja, o vínculo favorece a melhora da estabilidade hemodinâmica, desenvolvimento biopsicossocial, crescimento físico (ganho de peso e comprimento), diminuindo, assim, o tempo de internação. No entanto, há controvérsias quanto à "passagem livre" dos pais na UTIN, uma vez que há aumento dos casos de infecções nosocomiais, e por se tratar de RN 'o risco é ainda maior pela fragilidade. O Método Canguru também é responsável por promover e fortalecer esse vínculo, principalmente nos recém-nascidos de extremo baixo peso.

Johnston, C. et al. 2017	Skin-to-skin care for procedural pain in neonate	O contato pele a pele pode ser benéfico durante procedimentos dolorosos e não causa danos aos neonatos. Porém, esse estudo não conseguiu quantificar o benefício.
Karimi, F. Z., Sadeghi, R., Maleki-Saghooni, N., & Khadivzadeh, T., 2019	The effect of mother-infant skin to skin contact on success and duration of first breastfeeding: A systematic review and meta-analysis	O contato pele a pele imediatamente após o nascimento pode aumentar os benefícios e o sucesso da primeira lactação. As primeiras horas de vida são classificadas como um período crítico ou sensível para o neonato, pois ele está sujeito a várias mudanças fisiológicas de adaptação. O método canguru auxilia nessa adaptação e em uma duração maior da amamentação. A separação da mãe e do bebê nesse momento pode interromper comportamentos inatos do RN como a resposta ao toque, calor e estimulação do olfato.
Kurt FY, Kucukoglu S, Ozdemir AA, Ozcan Z. 2020	The effect of kangaroo care on maternal attachment in preterm infants Kurt FY, Kucukoglu S, Ozdemir AA, Ozcan Z - Niger J Clin Prac	A interação entre mãe e bebê deve ocorrer o mais cedo possível. Como estratégia que possibilita esse contato inicial existe o Método Canguru que acalma e facilita o vínculo materno. Isso gera uma melhor e maior interação física e emocional com o bebê.
DANTAS, J. M. et al., 2018	Percepção das mães sobre a aplicabilidade do Método Canguru	As 11 mães entrevistadas relataram conhecer o Método Canguru desde o pré-natal, ou no momento de transferência do neonato à Unidade Canguru. As genitoras referiram muitas vantagens com relação ao método, uma vez que este proporciona a aproximação do RN, incentiva o aleitamento materno, propicia o aumento de peso e estatura, reduz o estresse do bebê, além de diminuir o tempo de internação. A equipe de Enfermagem participa do Método Canguru desde o pré-natal, quando reconhece a necessidade da mãe em utilizá-lo, e na UTIN, na enfermaria ou no alojamento conjunto. O método canguru deve ser abordado por toda a equipe multiprofissional, contudo, como a Enfermagem passa mais tempo prestando a assistência, seu papel é imprescindível, ou seja, promovendo acolhimento aos pais e ao bebê, facilitando a comunicação, intensificando o uso do MC para obter as melhorias esperadas. Dessa forma, é necessário que estes profissionais sejam capacitados e valorizados.
Stelmak, A. P. e Freire, M. H. S.: 2017	Aplicabilidade das ações preconizadas pelo método canguru	As técnicas e auxiliares em Enfermagem entrevistadas refletiram sobre ações preconizadas pelo MEC, mas realizadas como rotina de trabalho. O estudo apontou que o Acolhimento e a Adequação Ambiental foram os aspectos preconizados pelo MC mais utilizados por essa equipe de Enfermagem. A atenção humanizada ao RNPT através da comunicação efetiva, fortalecimento do vínculo afetivo, incentivo ao aleitamento materno, redução dos efeitos estressores (ruídos, luminosidade) são ações preconizadas pelo MC e que foram utilizadas pela equipe de enfermagem.

MANTELLI, G. V. et al., 2017	Método canguru: percepções da equipe de enfermagem em terapia intensiva neonatal	A equipe de Enfermagem enxerga o Método Canguru como uma prática humanizada no cuidado ao recém-nascido. O contato pele a pele favorece o vínculo do binômio mãe-filho, além de dar espaço para que outros familiares também se aproximem do bebê, principalmente o pai. Contudo, a falta de capacitação, a resistência dos profissionais, a ausência do Protocolo Operacional Padrão (POP), falta de comunicação entre as equipes de enfermagem e médica, são fatores que repercutem na dificuldade de implementar o MC. No entanto, os benefícios são vários, dentre eles: a aproximação da mãe com bebê, proporciona autonomia e confiança dos cuidados da genitora para o filho, auxilia no desenvolvimento neuropsicomotor e no ganho de peso.
GESTEIRA, E. C. R., et al., 2016	Método canguru: benefícios e desafios experienciados por profissionais de saúde	Os profissionais de Enfermagem que foram entrevistados relataram que a implementação do MC na unidade melhorou a tranquilidade do RN, a melhora e recuperação do RN, interação do neonato com a família, e o aleitamento materno. Este método foi considerado não farmacológico para alívio da dor e estresse. No entanto, a falta de educação permanente, a insegurança dos familiares, a falta de conhecimento da equipe e a falta de normas para utilizar o Método Canguru são fatores que interferem diretamente na assistência à esses RN 's.

Fonte: Elaborada pelos autores, 2021.

A mortalidade infantil mundial, de crianças até cinco anos de idade, tem como principal causa a prematuridade. Como o neonato não permaneceu o tempo suficiente no meio intrauterino pode sofrer problemas na transição para a vida extrauterina, o que o torna suscetível a complicações, risco de vida agravada muitas vezes pelo excesso de manipulações e maior número de dias em unidade de tratamento neonatal. O método canguru é uma estratégia de proteção à vida do recém-nascido que inclui toda a família no cuidado mesmo após a alta hospitalar (GOMES et al, 2021).

3.1 Benefícios para adoção do método canguru

O estudo de Gomes et al, 2021 reforça alguns resultados encontrados na presente pesquisa como os benefícios do método canguru, sendo alguns deles: o fortalecimento do vínculo mãe-filho, a amamentação, controle da temperatura, da diminuição de infecção neonatal e do período de internação hospitalar, favorece o desenvolvimento cognitivo e motor, promove a estimulação sensorial e propicia a manutenção dos sinais vitais, além de promover o empoderamento materno e o sentimento de segurança para a prestação de cuidados à criança após a alta hospitalar.

No estudo de Conde, 2016 não havia evidências sobre a permissão do uso do Método Canguru em recém-nascidos de baixo peso não estabilizados, porém já no estudo de Gomes et al, 2021 percebe-se que o método canguru é eficaz mesmo em prematuros em ventilação

mecânica, ou seja, havendo uma estabilidade clínica o método canguru é benéfico em bebês que inspiram cuidados intensivos.

O Ministério da Saúde reforça, através do seu manual prático de atenção humanizada ao recém-nascido: método canguru, os achados no estudo de Mekonnen, 2019. Ressaltando que a prática desse método é de baixo custo, racionando o uso de incubadoras e berços aquecidos, diminuindo o tempo das internações hospitalares e, portanto, de fácil acesso e aplicabilidade nos serviços que não provém de grandes tecnologias e sendo complementar nas instituições modernas já que os benefícios dessa prática não podem ser substituídos por nenhum instrumento tecnológico.

A família incluída no método canguru é estimulada a ficar com o recém-nascido em contato pele a pele, somente de fraldas em posição vertical junto ao peito dos pais pelo maior tempo possível para que ambos se sintam confortáveis. Quando é realizado com a mãe, isso favorece a amamentação sob livre demanda. também cabe aqui reforçar que essas famílias serão acompanhadas, após a alta hospitalar, de forma compartilhada entre equipe hospitalar e da atenção básica do método canguru, ações essas que protegem os bebês de mortalidade (BRASIL, 2017).

O estudo de Souza, 2019 reforça todos os benefícios já citados nos outros estudos porém questiona a livre circulação dos pais dentro de unidades de terapia intensivas devido ao risco de infecções nosocomiais em contrapartida uma revisão da Cochrane de 2016 que avaliou 21 estudos clínicos randomizados com um total de 3042 recém nascidos mostrou que o método canguru diminui o risco de infecções graves/sepsis, dessa forma cabe aos profissionais estimular a interação dos pais mesmo em unidades de terapias intensivas (CONDE-AGUDELO, 2016).

3.2 Relação entre o método canguru e o papel do enfermeiro na atenção primária

Entre os benefícios desse método está a redução da dor durante procedimentos invasivos no neonato. Segundo Santana, 2017 uma das possíveis explicações para a redução dos níveis algícos dos RNs em posição canguru seria a organização comportamental do bebê estimulando o sono profundo e a termorregulação, uma vez que a resposta à dor ao RN em sono profundo é minimizada. Outro fator relacionado é o bloqueio da transmissão do estímulo nociceptivo pelas fibras aferentes ou pela inibição das fibras descendentes. O contato pele a pele fornecido pela posição canguru parece estar relacionado à ativação do sistema inibitório da dor através da modulação do sistema endógeno. A permanência na posição por 20 minutos altera o nível de cortisol no sangue e saliva do bebê e permite a liberação de beta-endorfinas reduzindo seu estresse, acalmando o bebê e diminuindo o choro em resposta à dor.

Já no que se refere a amamentação os resultados apresentados neste estudo vão ao encontro com as recomendações da sociedade brasileira de pediatria na qual afirma que o método canguru é um dos pilares para o sucesso do aleitamento materno pois incentiva o contato precoce e a presença constante da mãe junto ao neonato. E ainda relatam que mães que praticam o método canguru produzem um maior volume diário de leite, bem como amamentam seus filhos por mais tempo (SBP, 2021).

Dessa forma é possível perceber que os presentes resultados da pesquisa corroboram com a literatura científica, que o método canguru é um poderoso aliado no desenvolvimento do recém-nascido de baixo peso e que a equipe de saúde atualizada é uma estratégia para o sucesso desse método.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Método Canguru torna-se eficaz na recuperação do recém-nascido prematuro e de baixo peso, proporcionando vínculos e inúmeros benefícios. Fica explícito que este modelo assistencial oferta estratégias humanizadas no tratamento do neonato, contribuindo para uma boa evolução do recurso terapêutico. Neste âmbito, o enfermeiro intervenciona recorrentemente nos cuidados do recém-natal, tornando-se responsável por grande parte da efetivação deste procedimento.

Excepcionalmente, a cooperação do enfermeiro será primordial à implementação e execução desse método na Atenção Primária, pois este profissional é responsável por orientar, ensinar e educar as puérperas sobre a qualidade de vida do recém-nascido. Sendo assim, a enfermagem estará comprometida em oferecer cuidados humanizados e de qualidade ao recém-nascido e a mãe, pais e familiares. Portanto, transfigura-se indispensáveis educação em saúde nas Unidades de Atenção Primária em Saúde, objetivando informar as gestantes e puérperas sobre este modelo assistencial humanizado, o qual oferece incontáveis benefícios à mãe e ao conceito. Outrossim, as estratégias de humanização, juntamente com a assistência qualificada do enfermeiro, originarão uma evolução significativa ao bebê de baixo peso, promovendo bem-estar à saúde materna e neonatal.

REFERÊNCIAS

AIRES, L. C. P. et al. Percepções dos profissionais de saúde da atenção básica sobre o seguimento do bebê pré-termo e/ou baixo peso e à sua família: interfaces com a terceira etapa do método Canguru. Rev. bras. saúde matern. infant, v. 4, n. 3, p. 253-261, 2015

BOTELHO, Louise Lira Roedel; DE ALMEIDA CUNHA, Cristiano Castro; MACEDO, Marcelo. O método da revisão integrativa nos estudos organizacionais. *Gestão e sociedade*, v. 5, n. 11, p. 121-136, 2011. Disponível em: <https://www.gestaoesociedade.org/gestaoesociedade/article/download/1220/906>.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Atenção humanizada ao recém-nascido: Método Canguru: manual técnico / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. – 3. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2017. 340 p. : il

DANTAS, J. M. et al. Percepção das mães sobre a aplicabilidade do Método Canguru. **Revista de Enfermagem UFPE Online**; 2018. v. 12 (11), p. 2944-2951. DOI: <https://doi.org/10.5205/1981-8963-v12i11a235196p2944-2951-2018>. Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/235196/30471>.

FERRARI, L.S.F; BRITO, A.S.J; CARVALHO, A.B.R; GONZALES,M.R.C. Mortalidade neonatal no município de Londrina, Paraná, Brasil,nos anos 1994 e 2002. *Caderno de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v.22, n.5; p. 1063-1071, 2006.

GESTEIRA, E. C. R. et al. Método canguru: benefícios e desafios experienciados por profissionais de saúde. **Revista de Enfermagem da UFSM**; 2016. v. 6 (4), p. 518-528. DOI: <https://doi.org/10.5902/2179769220524>. Disponível em <https://periodicos.ufsm.br/reufsm/article/view/20524/pdf>.

.MANTELLI, G. V. et al. Método canguru: percepções da equipe de enfermagem em terapia intensiva neonatal. **Revista de Enfermagem da UFSM**; 2017. v. 7 (1), p. 51-60. DOI: <https://doi.org/10.5902/2179769221182>.Disponívelem:<https://periodicos.ufsm.br/reufsm/article/view/21182/pdf>.

SANTORO JÚNIOR, W.; SANTORO, A. Reações psicológicas e processo adaptativo de pais de recém-nascidos prétermo e de muito baixo peso em unidades de terapia intensiva neonatal (UTIN). *Revista Paulista de Pediatria*, v. 20, n.2, p. 95-101. 2002.

SBP, Sociedade Brasileira de Pediatria. Método Canguru: atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso: Departamento Científico de Aleitamento Materno. 2021. Disponível em <https://www.sbp.com.br/especiais/pediatria-para-familias/cuidados-com-o-bebe/metodo-canguru-atencao-humanizada-ao-recem-nascido-de-baixo-peso/#:~:text=Um%20dos%20pilares%20do%20M%C3%A9todo,com%20a%20ajuda%20da%20equipe>.

STELMAK, A. P. e FREIRE, M. H. S. Aplicabilidade das ações preconizadas pelo método canguru. **J. res.: fundam. care. online**; 2017. v. 9 (3), p. 795-802. DOI: <https://doi.org/10.9789/2175-5361.2017.v9i3.795-802>. Disponível em: http://www.seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental/article/view/4429/pdf_1.

SOUZA, Marcela Tavares de; SILVA, Michelly Dias da; CARVALHO, Rachel de. Revisão integrativa: o que é e como fazer. São Paulo. **Einstein**, v. 8, p. 102-106, 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/eins/a/ZQTBkVJZqcWrTT34cXLjtBx/?lang=pt&format=html>.

WENDLAND, J. Prevenção, intervenções e cuidados integrais na gravidez e no pós-parto. In: _____. (Org.). Primeira infância: ideias e intervenções oportunas. Brasília: Senado Federal, 2012. p. 23-58

CAPÍTULO 72

OSTEONECROSE DOS MAXILARES INDUZIDA POR MEDICAMENTOS: UMA REVISÃO DE LITERATURA

DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c72

Thalita Oliveira da Silva Borba¹, Anne Caroline Silva Freire de Sá², Letícia Rafaella Marinho Honorato³, Jadson da Silva Santana⁴, Erick Lúcio Souza Santos⁵, Alícia Lima de Lira⁶, Fernanda Maria Matos Aragão de Souza⁷, Arthur Mendes Lima⁸, André Almeida Antunes⁹, Cláudia Cristina Brainer de Oliveira Mota¹⁰

¹Centro Universitário Tabosa de Almeida – ASCES-UNITA, (thalita.borba00@gmail.com)

²Centro Universitário Tabosa de Almeida – ASCES-UNITA,
(annecarolinefreiree@gmail.com)

³Centro Universitário Tabosa de Almeida – ASCES-UNITA, (leticiamarinoh@hotmail.com)

⁴Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, (jadsonufpe@gmail.com)

⁵Centro Universitário Tabosa de Almeida – ASCES-UNITA, (ErickLucioEL@gmail.com)

⁶Centro Universitário Tabosa de Almeida – ASCES-UNITA, (alicialimadl@gmail.com)

⁷Graduada em Odontologia, pelo Centro Universitário Tabosa de Almeida - ASCES- UNITA,
(aragaofernanda22@gmail.com)

⁸Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF (arthurmlima_@hotmail.com)

⁹Centro Universitário de Belo Horizonte – UniBH (andredemu@yahoo.com.br)

¹⁰Professora orientadora do Centro Universitário Tabosa de Almeida – ASCES-UNITA
(claudiamota@asc.es.edu.br)

RESUMO

Objetivo: O presente estudo tem por objeto revisar a literatura acerca dos medicamentos causadores da osteonecrose dos maxilares, bem como relatar os principais riscos para desencadear a condição necrótica. **Método:** Realizou-se uma revisão de literatura, a partir de estudos publicados no PubMed e no SciELO nos últimos cinco anos. Os artigos foram filtrados através dos descritores ‘Bisphosphonate-Associated Osteonecrosis of the Jaw’, ‘Osteonecrosis’, ‘Antineoplastic Agents’, ‘Bone Density Conservation Agents’, ‘Angiogenesis Inhibitors’ e seus correspondentes em português, seguido pela leitura dos títulos, dos resumos e dos conteúdos na íntegra. **Resultados:** Os bisfosfonatos, os antirreabsortivos e os antiangiogênicos são usados para reduzir a perda de tecido ósseo em várias condições malignas

e metástases de carcinoma, além de serem indicados no tratamento de alguns tumores, pois impedem o crescimento de novos vasos sanguíneos, controlando o crescimento do tumor. No entanto, há diversos registros na literatura de casos de osteonecrose dos maxilares desencadeados após o uso dessas classes farmacológicas, combinado com procedimentos cirúrgicos odontológicos ou por causas aparentemente espontâneas. **Conclusões:** Os cirurgiões-dentistas têm um papel importante na prevenção e descobrimento dessa condição, tornando-se imprescindível o conhecimento sobre os fatores que poderão levar ao estágio de necrose, bem como a minimização das chances de desenvolvimento da osteonecrose.

Palavras-chave: Osteonecrose Associada a Bifosfonatos; Inibidores da angiogênese; Conservadores da densidade óssea.

Área Temática: Ciências da Saúde

E-mail do autor principal: thalita.borba00@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

O termo “osteonecrose dos maxilares relacionada a medicamentos” designa uma condição patológica relativamente conhecida, definida como uma necrose avascular dos ossos gnáticos em pacientes que não tenham sido submetidos a doses de radioterapia e que fizeram uso de algum fármaco com potencial para seu desenvolvimento (JARDIM, 2019). Manifesta-se como uma ou mais lesões ósseas necróticas, geralmente expostas na cavidade oral e que persistem por pelo menos oito semanas, podendo ser acompanhada de dor, inflamação, perda de dentes, eritema e supuração (EGUIA; BAGAN; CARDONA, 2020).

Inicialmente, esses medicamentos eram chamados de bisfosfonatos (BP) e tornaram-se eficazes na prevenção e tratamento de doenças metabólicas ósseas como osteoporose, neoplasias metastáticas ósseas, doença de Paget e mieloma múltiplo (MARLIÉRE et al., 2019). No entanto, tais fármacos são derivados de pirofosfato inorgânico, uma substância conhecida por sua natureza biológica em interferir na atividade, dissolução e precipitação de fosfato de cálcio, o principal componente do osso mineralizado (LOMMEN et al., 2018).

O termo osteonecrose dos maxilares induzido por bisfosfonatos foi estabelecido para denominar esse efeito adverso potencial. No entanto, outros estudos mostraram a descoberta que outros medicamentos não bisfosfonatos, como os antirreabsortivos (denosumabe) ou os agentes antiangiogênicos (bevacizumabe), também podem estar relacionados a osteonecrose dos maxilares (BETH-DOSDOGAN et al., 2017; MARLIÉRE et al., 2019; CAMINHA et al., 2019; KUROSHIMA; SASAK; SAWASE, 2019). Assim, o termo osteonecrose dos maxilares induzida por bisfosfonatos foi progressivamente substituído por osteonecrose dos maxilares induzido por medicamentos (OMAM), recomendado pela American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (EGUIA; BAGAN; CORDONA, 2020).

Há três classes principais de medicamentos capazes de induzir a OMAM, independente de bisfosfonatos: anticorpos monoclonais (bevacizumabe e denosumabe); tirosina inibidores da quinase (sunitinib, sorafenib e cabozantinib); e inibidores de mTOR (temsirolimus e everolimus) (JOHNSTON, 2016). O denosumabe reduz a formação e a atividade dos osteoclastos e as células do corpo que estão envolvidos na quebra do tecido ósseo (BETH-TASDOGAN et al., 2017). Em relação aos antiangiogênicos, eles podem comprometer a integridade de microvasos por dificultar a ação do VEGF (fator de crescimento do endotélio vascular), gerando efeitos potenciais sobre a diferenciação celular e a função óssea e, dessa forma, induzir a OMAM (Paiva et al., 2021).

A epidemiologia e patogênese da OMAM ainda não são claras. No entanto, nos últimos anos, um progressivo número de estudos foi feito em relação às principais causas desencadeantes de OMAM (DI FEDE et al., 2018). Kuroshima; Sasaki; Sawase (2019) relataram situações potencialmente causadoras, incluindo extração dentária (61,7%), ocorrência espontânea (14,8%), cirurgia oral (7,2%), trauma protético (7,4%), periodontite (5,0%) e terapia com implantes dentários (3,9%). Em reconhecimento a isso, alguns estudos demonstraram como, antes de iniciar o tratamento com medicamentos relacionados à osteonecrose, a triagem odontológica e os tratamentos de doenças bucais podem reduzir significativamente a ocorrência deste evento adverso (DI FEDE et al., 2018).

O presente estudo tem por objeto revisar a literatura sobre os medicamentos causadores da osteonecrose, bem como relatar os principais riscos para desencadear tal condição. Com base nesses conhecimentos, o cirurgião-dentista poderá melhorar a qualidade de vida de seus pacientes.

2 MÉTODO

Foi realizada uma busca na literatura nas bases de dados SciELO e PubMed entre 2016 e 2021, através do cruzamento dos descritores ‘Bisphosphonate-Associated Osteonecrosis of the Jaw’, ‘Osteonecrosis’, ‘Antineoplastic Agents’, ‘Bone Density Conservation Agents’, ‘Angiogenesis Inhibitors’ e os seus correspondentes em português, combinados entre si, através dos operadores booleanos ‘AND’ ou ‘OR’. Obteve 262 estudos relacionados ao tema nas bases de dados utilizadas, sendo incluídos 23. Os estudos foram selecionados, seguido pela leitura dos títulos, dos resumos e, por fim, dos artigos na íntegra. Foram incluídos ensaios clínicos, relatos de casos, revisões de literatura e meta-análises, nas quais os pacientes foram tratados com bisfosfonatos, antiangiogênicos e antirreabsortivos. Foram excluídos os estudos realizados com animais, estudos que envolviam radiação em região de cabeça e pescoço e

resumos publicados em anais de congresso. A maioria dos estudos selecionados para compor o estudo foi na língua inglesa, de ordem qualitativa.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Uma síntese dos resultados é apresentada no Quadro 1.

Quadro 1. Descrição dos dados encontrados em relação aos fármacos relacionados à osteonecrose dos maxilares e os fatores desencadeantes.

AUTOR / ANO	TIPO DE ESTUDO	MEDICAMENTO/ VIA DE ADMINISTRAÇÃO	DOSE/ TEMPO DE USO	FATOR DESENCADEANTE
KIM et al., 2019	Relato de caso e revisão de literatura	Risedronato - Via oral	35mg, durante 4 anos	Implante dentário
YAMAMOTO et al., 2016	Relato de caso	Everolimus - Via oral	10 mg/dia, durante 2 meses	Causa espontânea
AKKACH; SHUKLA; MORGAN, 2019	Relato de caso	Everolimus - Via oral	10 mg 2x ao dia, durante 18 meses	Causa espontânea
MAUCERI et al., 2019	Relato de caso	Lenvatinib - Via oral	24 mg por via oral, uma vez por dia durante 12 meses	Exodontia
MANZIE; VUJICICH; CHAN, 2019	Relato de caso	Trastuzumabe em combinação com Pertuzumabe - via oral	Durante 1 ano. Dosagem não identificada	Causa espontânea
OZ et al., 2020	Relato de caso	Ranibizumabe - Injeção intravítrea	23 injeções consecutivas, durante 3 anos	Exodontia

Fonte: (Elaborada pelos próprios autores, 2021)

Embora a osteonecrose dos maxilares seja uma condição rara, é comprovado que existe

a associação de alguns medicamentos que costumam ser usados para tratar pacientes com neoplasias avançadas (YAMAMOTO et al., 2016). Para ser diagnosticado com OMAM, o paciente deve apresentar características como tratamento prévio/atual com bisfosfonatos, antirreabsortivos ou agentes antiangiogênicos (CAMINHA et al., 2019). Os bisfosfonatos se ligam à hidroxiapatita óssea e inibe especificamente a atividade dos osteoclastos, as células de reabsorção óssea. A renovação óssea é, portanto, reduzida, o que resulta em um aumento na densidade mineral do osso e redução no cálcio sérico (BETH-TASDOGAN et al., 2017).

O principal representante dos antirreabsortivos não-bisfosfonatos é o denosumabe, um anticorpo monoclonal que foi projetado para se ligar a um antígeno chamado ligante, RANK. Ao ligar e bloquear o RANKL, a osteoclastogênese é consequentemente afetada, alterando então o processo de reabsorção óssea (BETH-TASDOGAN et al., 2017; FERNANDES DA SILVA, 2018). Em relação aos antiangiogênicos, eles desencadeiam atividade mitogênica específica para células endoteliais, e é desprovido desta para outros tipos de células como células tumorais, macrófagos, plaquetas e queratinócitos. A sua atividade não é limitada apenas ao sistema vascular, mas também tem um papel funcional importante na hematopoiese, remodelação óssea, cicatrização e desenvolvimento (FERNANDES DA SILVA, 2018).

O everolimus é um inibidor de mTOR que intervém em vias de sinalização celular de fatores de crescimento e transcrição de proteínas, e é indicado para o tratamento de vários tipos de tumores malignos e para prevenção da rejeição de órgãos sólidos (LANE et al., 2009). Yamamoto et al., (2016) relataram o caso de uma paciente que usou 10 mg de everolimus por dia para tratar um câncer de mama e, após 2 meses, o lado esquerdo de seu rosto tornou-se edematoso, com lesões localizadas, havendo calor e sensibilidade na região mandibular esquerda, com 3 mm de exposição óssea. Na anamnese, a paciente negou o uso de bisfosfonato em todos os momentos de sua vida e não relatou ter histórico dentário relevante. O exame microscópico revelou inflamação crônica inespecífica, sem evidência de malignidade, apontando a causa para o uso do everolimus.

De maneira semelhante, Akkach, Shukla e Morgan (2019) analisaram um paciente para avaliação de uma possível osteonecrose na maxila em região palatal. O paciente tinha histórico de transplante renal, por isso precisava fazer o uso de 10 mg de everolimus 2x ao dia e nunca usou bisfosfonatos. Ele foi internado no hospital, e o everolimus foi interrompido (após 18 meses de tratamento). Duas semanas depois, ele teve desbridamento radical do palato e houve uma melhora considerável em sua dor. A associação do everolimus com a osteonecrose pode ser explicada aos fatores de crescimento endotelial vascular, que desempenham um papel essencial na cicatrização óssea e, consequentemente, qualquer atividade anti-crescimento

endotelial poderia teoricamente causar OMAM (FUSCO et al., 2016).

O papel dos medicamentos antiangiogênicos que causam a osteonecrose dos maxilares já foi bem descrito (MANZIE; VUJCICH; CHAN, 2019). No entanto, para Oz et al., (2020), a complicação da OMAM associada à injeção intravítrea de agentes antiangiogênicos raramente foi relatada na literatura, ocasionando uma frequência real imprecisa ou desconhecida, que pode ser maior do que o número refletido de casos relatados.

Em relação aos antirreabsortivos, são medicamentos altamente eficazes usados com sucesso no tratamento da osteoporose e eventos esqueléticos de metástases de câncer. No entanto, a osteonecrose dos maxilares é uma das principais complicações dessa classe (AKINTOYE; HERSH, 2016). Ao contrário dos bifosfonatos, o denosumabe não se liga permanentemente à matriz óssea e, portanto, o efeito residual no osso remodelado pode ser um pouco menor, quando comparado de 12-24 meses após a interrupção do tratamento (EGUIA; BAGA; CARDONA, 2019). Além disso, alguns estudos mostram que os dentistas frequentemente solicitam aos médicos que suspendam a terapia antirreabsortiva antes de grandes procedimentos odontológicos (SAMIEIRAD et al., 2021; AKINTOYE; HERSH, 2016).

Mauceri et al., (2019) relataram o caso de um paciente que fazia uso de um antirreabsortivo de 24 mg (Lenvatinib) por via oral, uma vez ao dia, há 12 meses para tratar o desenvolvimento de artralgia severa e câibras musculares com dificuldades de locomoção. A sintomatologia local começou quatro semanas após o início deste tratamento, quando um elemento dentário foi removido da cavidade oral e o alvéolo não cicatrizou. Os resultados foram consistentes com um diagnóstico de OMAM: osso exposto ou osso que poderia ser sondado através de uma fístula intraoral ou extraoral na região maxilofacial que persistiu por mais de oito semanas, sem histórico de terapia com radiação da mandíbula ou doença metastática nos maxilares.

Procedimentos cirúrgicos orais, incluindo extrações dentárias, posicionamento de implantes e cirurgia periodontal, quando associados a medicamentos potenciais, favorecem o desenvolvimento de OMAM. Segundo Paiva et al., (2021) os pacientes que receberam cuidados odontológicos preventivos antes de iniciar a terapia com drogas antiangiogênicas e antirreabsortivas tiveram uma diminuição de 50% no risco de desenvolver a OMAM. No entanto, alguns estudos observaram que mesmo os pacientes não apresentando fatores odontológicos predisponentes, apenas o uso de fármacos potenciais poderia desencadear a osteonecrose dos maxilares na ausência de estímulos cirúrgicos (YAMAMOTO et al., 2016; AKKACH; SHUKLA; MORGAN, 2019; MANZIE; VUJCICH; CHAN, 2019).

Dessa forma, a osteonecrose ainda permanece como uma entidade de difícil prevenção e manejo, não tendo ainda nenhum protocolo terapêutico consensualmente aceito. As estratégias de tratamento no âmbito odontológico devem ser voltadas para a prevenção e o controle local (JARDIM, 2019). A literatura apresenta muitos relatos sobre osteonecroses tratadas com cirurgias agressivas, pois esta terapia já provou resultar em alta taxa de sucesso, particularmente para lesões em estágios mais avançados. Porém, toda cirurgia agressiva é acompanhada de uma série de consequências e estas podem não ser bem toleradas pelos pacientes (ALMEIDA et al., 2021).

4 CONCLUSÃO

Apesar da osteonecrose ser uma condição rara, diante das medicações que a literatura relata como fontes potenciais, como é o caso dos bisfosfonatos, antirreabsortivos e antiangiogênicos, os procedimentos cirúrgicos orais são de grande relevância para o desencadeamento das lesões. Os cirurgiões-dentistas possuem papel importante na prevenção, devendo realizar uma anamnese detalhada sobre as medicações antecedentes e atuais dos pacientes, previamente à realização de procedimentos invasivos. No entanto, existem na literatura relatos nos quais não houve intervenção odontológica anteriormente ao surgimento da lesão. É necessária a realização de mais estudos sobre esta temática, com o intuito de melhor elucidar a etiologia das lesões necróticas que surgem sem estímulo prévio.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, A et al. Tratamento da osteonecrose dos maxilares associada ao uso de medicamentos - revisão de literatura. **Research, Society and Development**, v. 10, ed. 2, p. 1-14, 3 fev. 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i2.12168>. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/12168>. Acesso em: 9 ago. 2021.
- AKKACH, S; SHUKLA, L; MORGAN, D. Everolimus-induced osteonecrosis of the jaw in the absence of bisphosphonates: a case report. **British Journal of Oral Maxillofacial Surgery**, v. 57, p. 688-690, 12 jun. 2019. DOI <https://doi.org/10.1016/j.bjoms.2019.05.017>. Disponível em: [https://www.bjoms.com/article/S0266-4356\(19\)30213-X/pdf](https://www.bjoms.com/article/S0266-4356(19)30213-X/pdf). Acesso em: 5 ago. 2021.
- BETH-TASDOGAN, M et al. Interventions for managing medication-related osteonecrosis of the jaw (MRONJ) (Protocol). **Cochrane Database of Systematic Reviews**, v. 6, p. 1-12, 11 nov. 2016. DOI 10.1002/14651858.CD012432.pub2. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28983908/>. Acesso em: 29 ago. 2021.

CAMINHA, R et al. Perfil de risco para osteonecrose dos maxilares associada a agentes antiangiogênicos. **Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein**, v. 17, n. 3, 12 mar. 2019. DOI doi.org/10.31744/einstein_journal/2019RW4628. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/eins/a/xMzRHDB3K9CtwH3K3QhWck/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 2 ago. 2021.

DI FEDE, O et al. The Dental Management of Patients at Risk of Medication-Related Osteonecrosis of the Jaw: New Paradigm of Primary Prevention. **BioMed Research International**, v. 16, 2 set. 2018. DOI 10.1155/2018/2684924. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30306086/>. Acesso em: 2 ago. 2021

EGUIA, A; BAGAN, L; CARDONA, F. Review and update on drugs related to the development of osteonecrosis of the jaw. **Oral Medicine and Pathology**, v. 25, n. 1, p. 71-83, 24 dez. 2020. DOI 10.4317/medoral.23191. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6982985/>. Acesso em: 2 ago. 2021.

FERNANDES DA SILVA, J. Osteonecrose dos maxilares associada a medicamentos : além dos bifosfonatos. **Instituto Universitário Egas Moniz**, p. 1-75, 8 ago. 2018. DOI hdl.handle.net/10400.26/25602. Disponível em: <https://1library.org/document/q5e105wq-osteonecrose-dos-maxilares-associada-medicamentos-alem-dos-bifosfonatos.html>. Acesso em: 2 ago. 2021.

FUSCO, V et al. Osteonecrosis of the Jaw After Zoledronic Acid and Denosumab Treatment. **Journal of Clinical Oncology**, v. 29, p. 521–522, 5 abr. 2016. DOI 10.1200/JCO.2011.35.1551. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21537047/>. Acesso em: 2 ago. 2021.

JOHNSTON, R. Enhancing Endocrine Therapy for Hormone Receptor-Positive Advanced Breast Cancer: Cotargeting Signaling Pathways. **Journal National of Cancer**, v. 10, ed. 07, 6 ago. 2016. DOI 10.1093/jnci/djv212. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26251289/>. Acesso em: 2 ago. 2021.

JARDIM, J F. Osteonecrose dos Maxilares Relacionada a Medicamentos. **Revista Expressão Católica de Saúde**, v. 4, ed. 1, p. 1-3, 5 maio 2019. DOI: [org/10.25191/recs.v4i1.3270](https://doi.org/10.25191/recs.v4i1.3270). Disponível em: <http://publicacoesacademicas.unicatolicaquixada.edu.br/index.php/recsaude/article/view/3270>. Acesso em: 2 ago. 2021.

KIM, Y et al. Treatment of Medication-Related Osteonecrosis of the Jaw Around the Dental Implant With a Once-Weekly Teriparatide: A Case Report and Literature Review. **Journal of Oral Implantology**, v. 45, ed. 5, 23 set. 2019. DOI 10.1563/aaid-joi-D-19-00040. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31429640/>. Acesso em: 2 ago. 2021.

KUROSHIMA, S; SASAKI, M; SAWASE, T. Medication-related osteonecrosis of the jaw: A literature review. **Journal Of Oral Biosciences**, v. 61, ed. 2, p. 99-104, 9 jun. 2019. DOI

10.1016/j.job.2019.03.005. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31109863/>. Acesso em: 2 mar. 2021.

KHAN , A et al. Case-Based Review of Osteonecrosis of the Jaw (ONJ) and Application of the

International Recommendations for Management From the International Task Force on ONJ. **Journal Clinical Densitom**, p. 8-24, 4 abr. 2017. DOI 10.1016/j.jocd.2016.09.005. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27956123/>. Acesso em: 3 ago. 2021.

LANE, A et al. MTOR inhibitor RAD001 (everolimus) has antiangiogenic/vascular properties distinct from a VEGFR tyrosine kinase inhibitor. **Clinical Cancer**, p. 1612-1622, 12 mar. 2009. DOI 10.1158/1078-0432.CCR-08-2057. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19223496/> Acesso em: 2 set. 2021.

MANZIE, T; VUJCICH, N; CHAN, A. Osteonecrosis of the jaw in an anti-resorptive naïve patient taking trastuzumab and pertuzumab: case report. **Australian Dental Journal**, v. 65, ed. 4, p. 305-307, 2 fev. 2020. DOI 10.1111/adj.12723. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31580483/>. Acesso em: 2 ago. 2021.

MAUCERI, R et al. Medication-related osteonecrosis of the jaw in a cancer patient receiving lenvatinib. **International Journal of Oral Maxillofacial Surgery**, v. 48, ed. 12, p. 1530-1532, 1 dez. 2019. DOI 10.1016/j.ijom.2019.07.010. Disponível em: [https://www.ijoms.com/article/S0901-5027\(19\)31239-1/fulltext](https://www.ijoms.com/article/S0901-5027(19)31239-1/fulltext). Acesso em: 3 ago. 2021

MARLIÉRE, D et al. Knowledge and clinical behavior on antiresorptive medications and osteonecrosis of the jaws: a cross-sectional study. **Revista Gaúcha de Odontologia**, v. 67, 2 fev. 2019. DOI: 10.1590/1981-863720190005820190018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rgo/a/jDL6xm78XxLsJHBDBKRCbQk/abstract/?lang=en>. Acesso em: 4 ago. 2021.

NICOLATOU-GALITIS , O. Medication-related osteonecrosis of the jaw: definition and best practice for prevention, diagnosis, and treatment. **Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology And Oral Radiology**, v. 127, p. 117-135, 3 set. 2019. DOI 10.1016/j.oooo.2018.09.008. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30393090/>. Acesso em: 4 ago. 2021.

OZ, L et al. Medication-related osteonecrosis of the jaws associated with intravitreal administration of ranibizumab. **International Journal of Oral & Maxillofacial Surgery**, v. 49, ed. 12, p. 117-135, 2 jul. 2020. DOI 10.1016/j.oooo.2018.09.008. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30393090/> Acesso em: 5 ago. 2021.

PAIVA, C et al. Osteonecrosis of the jaws related to medicinal use: Systematic review. **Research, Society and Development**, v. 10, ed. 5, 3 mar. 2021. DOI 10.33448/rsd-

v10i5.14740. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/14740>. Acesso em: 4 ago. 2021.

NISI, M. Surgical Management of Medication-Related Osteonecrosis of the Jaw Patients Related to Dental Implants. **Craniofacial Surgery**, v. 31, n. 4, p. 1037-1041, 8 maio 2020. DOI 10.1097/SCS.00000000000006283. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32102027/>. Acesso em: 5 ago. 2021.

RIBEIRO, B et al. Antirreabsortivos ósseos em pacientes odontológicos: noções de conduta para o cirurgião-dentista: uma revisão integrativa. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 4, ed. 2, 24 maio 2021. DOI 10.34119/bjhrv4n2- 387. Disponível em: <https://www.brazilianjournals.com/index.php/BJHR/article/view/28457>. Acesso em: 4 ago. 2021.

YAMAMOTO, D. et al. Osteonecrosis of the jaw associated with everolimus: A case report. **Molecular and Clinical Oncology**, v. 6, n. 2, p. 255–257, 5 dez. 2016. DOI 10.3892/mco.2016.1100. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5351763/>. Acesso em: 3 ago. 2021.

CAPÍTULO 73

PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DA SÍFILIS CONGÊNITA EM UMA REGIÃO DE SAÚDE DO CEARÁ

DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c73

Tamires Barbosa Bezerra¹, Thiáskara Ramile Caldas Leite², Josiliane Pâmela da Silva³, José Nairton Coelho da Silva⁴, Ewerton Pereira Lima⁵, Wellhington da Silva Mota⁶, Maria Nazaré Negreiros Uchôa⁷, Aline de Oliveira Caldeira⁸, Antonia Francielia de Aguiar Lima⁹, Aliciane Sobreira Lima¹⁰

¹ Universidade Regional do Cariri, (tbbtami@gmail.com)

² Faculdade de Juazeiro do Norte, (thiaskara@gmail.com)

³ Universidade Regional do Cariri, (josi-liane@hotmail.com)

⁴ Centro Universitário Dr Leão Sampaio, (nairton201515@yahoo.com.br)

⁵ Universidade Regional do Cariri, (ewrtonplima@gmail.com)

⁶ Universidade Regional do Cariri, (weliguatu@hotmail.com)

⁷ Universidade Regional do Cariri, (naza.uchoa@hotmail.com)

⁸ Universidade Regional do Cariri, (licaldeira89@gmail.com)

⁹ Faculdade Vale do Jaguaribe (francieli5@gmail.com)

¹⁰ Universidade Regional do Cariri, (aliciane.sobreira@hotmail.com)

RESUMO

Objetivo: Descrever o perfil epidemiológico da sífilis congênita na 18ª Região de Saúde do Ceará, de 2012 a 2016. **Método:** Pesquisa retrospectiva e descritiva com abordagem quantitativa e delineamento documental, realizada na 18ª Coordenadoria Regional de Saúde do Ceará. A população do estudo foi composta por todos os casos de sífilis congênita notificados de janeiro de 2012 a dezembro de 2016 nos dez municípios que compõem essa região de saúde. Os dados foram coletados de março a abril de 2017, através de um formulário baseado na ficha de notificação da doença. O tratamento e análise dos dados foram feitos com o *Software* SPSS 20.0 e expressos em tabelas de frequências absolutas e relativas. Foram atendidos os princípios éticos e legais da pesquisa com seres humanos. **Resultados:** Foram incluídos no estudo, 24 casos notificados. As condições clínicas dos recém-nascidos apontaram que 75% nasceram assintomáticos; 83,3% tiveram VDRL reagente; 50% não realizaram teste confirmatório; 66,7% foram tratados com penicilina G procaína e 100% evoluíram vivos. **Conclusões:** É necessário que a assistência pré-natal seja realizada de maneira qualificada, a fim de concretizar as iniciativas e recomendações ministeriais voltadas ao comprometimento com a saúde materna e infantil.

Palavras-chave: Sífilis congênita; Epidemiologia; Cuidado pré-natal.

Área Temática: Ciências da Saúde.

E-mail do autor principal: tbbtami@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

A sífilis é uma doença infecciosa, causada pela bactéria *Treponema pallidum*. É transmitida principalmente por meio do contato sexual, configurando a sífilis adquirida, que pode possuir uma classificação, dependendo dos sintomas e de seu estágio clínico (MELO; SANTOS, 2015).

A sua transmissão também pode ocorrer de forma vertical durante o período gravídico. Assim, aproximadamente 50% das gestantes infectadas que não recebem tratamento ou são inadequadamente tratadas podem transpassar a doença ao concepto (NONATO; MELO; GUIMARÃES, 2015).

A sífilis em gestantes pode causar graves consequências para o feto quando ocorre a transmissão vertical do *Treponema pallidum* através da placenta em qualquer fase da gestação, ocasionando a sífilis congênita, que é considerada o maior impacto para a saúde pública em virtude dos graves desfechos adversos que gera para a interface materna e infantil, tais como parto prematuro, óbito fetal e neonatal e infecções graves na criança acometida (ALMEIDA et al., 2015).

Para a diminuição desse agravo é determinante uma assistência pré-natal de qualidade, pois é o momento oportuno para a captação precoce e acompanhamento da gravidez, realização do diagnóstico e tratamento das gestantes infectadas e parcerias sexuais. O medicamento utilizado para o tratamento é a penicilina benzatina, que é custo-efetiva e fornecida às unidades de Atenção Primária à Saúde, para prevenção da transmissão da sífilis aos recém-nascidos (RN) (CARVALHO; BRITO, 2014).

Dessa forma, apesar da simplicidade diagnóstica e terapêutica, a sífilis congênita persiste como problema de saúde pública, revelando-se como um evento sentinela em que sua ocorrência indica fragilidade nos serviços de saúde, e por conta de sua gravidade, foi incluída na lista de doenças de notificação compulsória do Brasil desde 1986 (ARAÚJO et al., 2012).

Frente ao número elevado de sífilis congênita no Ceará, questionou-se: qual o perfil epidemiológico dos casos de sífilis congênita na 18ª Região de Saúde do Ceará, notificados no período de 2012 a 2016?

Embora a sífilis congênita venha assumindo um desafio de saúde pública, que gera graves sequelas para a saúde da criança, a mesma é uma doença evitável, com tratamento acessível, eficiente e de baixo custo e uma assistência pré-natal qualificada é capaz de identificar e controlar o seu surgimento.

Acredita-se que esta pesquisa aponta contribuições para a divulgação dos dados referentes ao cenário epidemiológico da sífilis congênita na 18ª Região de Saúde do Ceará e os desfechos dos casos nesse local, possibilitando conhecer se a sua incidência enquadra-se no padrão esperado para sua eliminação, informações estas de relevância científica e social, para a adoção de estratégias e ações voltadas para o controle desta adversidade.

2 MÉTODO

Foi realizada uma pesquisa de natureza retrospectiva e descritiva, com abordagem quantitativa e delineamento documental.

A pesquisa foi desenvolvida no departamento de vigilância epidemiológica da 18ª Região de Saúde do Ceará, órgão competente de representação da Secretaria Estadual de Saúde que está inserida na cidade de Iguatu/CE. A coleta dos dados ocorreu nos meses de março a abril de 2017.

A população do estudo foi composta por todos os casos de sífilis congênita notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). As informações que foram coletadas representam os casos ocorridos nos dez municípios que compõem a 18ª Região de Saúde do Ceará e são disponibilizadas pelo núcleo de vigilância epidemiológica dessa região.

Foram incluídos para compor o estudo somente os casos notificados de sífilis congênita no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2016 e cujas fichas do SINAN estavam devidamente preenchidas de forma legível. Foram excluídas as fichas com informações incompletas.

Para a coleta dos dados, o instrumento utilizado foi um formulário, construído de acordo com as informações contidas nas fichas de notificação da sífilis congênita. As variáveis analisadas foram: número de casos notificados de sífilis congênita, diagnóstico clínico do recém-nascido, presença de sinais e sintomas, realização de testes não-treponêmicos e treponêmicos, esquema de tratamento e evolução do caso.

Os dados coletados foram organizados no *Software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)* versão 20.0 e expressos por meio de tabelas de distribuição de frequências absolutas e relativas, e, em seguida confrontadas com os achados na literatura. Este estudo foi realizado cumprindo os preceitos éticos e legais durante todo o seu desenvolvimento, de

acordo com a Resolução Nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, no qual foi necessária a assinatura do termo de anuência para a coleta de dados, e, obteve a aprovação do Comitê de Ética da Universidade Regional do Cariri, sob o número do parecer 2.218.480.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A **TABELA 1** apresenta a distribuição dos casos de acordo com o município de ocorrência e o ano de notificação.

TABELA 1– Distribuição dos casos de sífilis congênita na 18ª Região de Saúde do Ceará, de acordo com o município de ocorrência e o ano de notificação, de 2012 a 2016. Iguatu, 2017.

Municípios	2012	2013	2014	2015	2016	Frequência	%
Acopiara	0	0	0	1	3	4	16,7
Cariús	1	0	1	0	0	2	8,3
Catarina	0	0	0	0	0	0	0
Iguatu	0	0	0	5	6	11	45,8
Irapuan Pinheiro	2	1	0	0	0	3	12,5
Jucás	0	1	0	0	0	1	4,2
Mombaça	0	0	0	0	0	0	0
Piquet Carneio	1	0	0	0	0	1	4,2
Quixelô	0	0	0	2	0	2	8,3
Saboeiro	0	0	0	0	0	0	0
Total	4	2	1	8	9	24	100

Fonte: SINAN. Iguatu/CE, 2017.

Foram notificados, nesse período, 24 casos de sífilis congênita. Quanto à distribuição, observa-se que entre os anos 2012 a 2014 ocorreu uma regressão dos casos; a partir do ano de 2015 houve um aumento expressivo; e em 2016, aconteceu o maior número de notificações. O ano com número de casos menor foi 2014, no entanto, vale destacar que em todos os anos selecionados, a doença sobreveio. A maior concentração de casos em Iguatu, possivelmente ocorreu por este ser o município mais populoso e ser o local de referência de atendimento aos demais municípios dessa região de saúde, o que favorece o maior número de partos e nascimentos, e, consequentemente mais detecções de casos.

O aumento dos casos nos anos 2015 e 2016, também pode ter sido um reflexo da ampliação de acesso das gestantes à assistência pré-natal, devido à expansão das equipes de atenção primária, que impulsionou a identificação da doença, já que a atenção primária é o principal cenário onde ocorre o diagnóstico da sífilis gestacional, a notificação dos casos e a prevenção da sífilis congênita (SARACENI; MIRANDA, 2012). Contudo, também pode estar relacionado a um descontrole da frequência de casos por falha das medidas preventivas e assistenciais, ou denota avanços no processo de notificação.

Por outro lado, nos anos que registraram poucos casos, pode estar refletindo uma subnotificação da doença, visto que a subnotificação da sífilis congênita é uma situação frequente no Brasil, pois apesar de ser uma doença de notificação compulsória desde 1986, foi constatado que apenas 17,4% dos casos são devidamente notificados no país (CAMPOS et al., 2010).

Em relação aos aspectos clínicos e laboratoriais dos recém-nascidos diagnosticados com sífilis congênita no período analisado, as informações estão descritas na **TABELA 2**.

TABELA 2 – Distribuição dos casos de sífilis congênita na 18ª Região de Saúde do Ceará, de 2012 a 2016, de acordo com os aspectos clínicos e laboratoriais dos recém-nascidos. Iguatu, 2017.

Diagnóstico clínico	Frequência	%
Assintomático	18	75
Sintomático	3	12,5
Ignorado	3	12,5
Total	24	100
Teste não-treponêmico em sangue periférico	Frequência	%
Reagente	20	83,3
Não realizado	3	12,5
Ignorado	1	4,2
Total	24	100
Teste treponêmico após os 18 meses	Frequência	%
Reagente	1	4,2
Não realizado	12	50
Não se aplica	5	20,8
Ignorado	6	25
Total	24	100
Sinais e sintomas	Frequência	%
Icterícia	2	8,3
Lesões cutâneas	1	4,2

Sem sintomas	18	75
Ignorado	3	12,5
Total	24	100
Esquema de tratamento	Frequência	%
Penicilina G cristalina 100.000 a 150.000 UI/Kg/dia por 10 dias	4	16,7
Penicilina G procaína 50.000 UI/Kg/dia por 10 dias	16	66,7
Penicilina G benzatina 50.000 UI/Kg/dia	1	4,2
Ignorado	1	4,2
Outro esquema	2	8,3
Total	24	100
Evolução dos casos	Frequência	%
Vivo	24	100

Fonte: SINAN. Iguatu/CE, 2017.

Nesta pesquisa, foi predominante o nascimento de crianças assintomáticas. Este achado está em conformidade com o Ministério da Saúde (MS), que afirma que o nascimento de crianças assintomáticas ocorre em mais da metade dos casos de sífilis congênita, e mesmo naquelas com expressão clínica da doença, os sintomas são inconclusivos ou pouco específicos, tornando o diagnóstico no RN um processo complexo (BRASIL, 2016).

Por outro lado, no que diz respeito aos casos sintomáticos, observa-se neste estudo, que 4,2% tiveram lesões cutâneas e 8,3% apresentaram icterícia, manifestando precocemente os efeitos da infecção adquirida pela mãe.

Manifestações clínicas graves em RN com sífilis foram encontradas por Boni e Pagliari (2016), que ao avaliarem cinco casos notificados em um município do Paraná, entre 2013 e 2014, verificaram que um destes RN teve diagnóstico de pneumotórax e derrame pleural e outro apresentou sinais de hidropsia fetal, indicando que as repercussões da sífilis congênita variam desde casos assintomáticos a complicações severas.

Em relação ao teste não-treponêmico, foi identificado que em apenas três RN o exame não foi realizado, sugerindo que as intervenções dos profissionais quanto à investigação laboratorial com VDRL foram adequadas na maioria das crianças expostas à infecção.

No entanto, metade dos RN notificados não realizou o teste confirmatório treponêmico após os 18 meses, tendo-se a informação de apenas um resultado reagente, já que os demais foram registrados como ignorado ou como um caso que não se aplica, o que denota negligência profissional tanto no acompanhamento clínico, como no esclarecimento das condutas realizadas na ficha de notificação.

O estudo de Mesquita et al., (2012), em que foi realizado uma análise do perfil dos casos de sífilis congênita em Sobral, Ceará, diagnosticados entre os anos de 2007 a 2010, demonstra uma situação semelhante em relação à desconsideração do teste confirmatório treponêmico pelos profissionais, pois, foi verificado que todos os RN identificados, foram submetidos ao VDRL, enquanto que o teste treponêmico aos 18 meses não foi realizado em nenhuma criança.

Como a maior parcela de crianças com sífilis são assintomáticas ao nascimento, é imprescindível que os testes sorológicos sejam realizados em todos os RN de forma precisa para nortear a conduta clínica e assistencial subsequente. Inclusive, o acompanhamento da criança por pelo menos dois anos é indispensável, e, aos 18 meses deve-se verificar se há anticorpos treponêmicos no sangue, para confirmação diagnóstica da sífilis congênita, pois nesta idade não se pode mais associar a positividade do teste à transmissão passiva dos anticorpos maternos pela placenta (FEITOSA; ROCHA; COSTA, 2016).

Com relação ao tratamento, percebe-se que a maior parte dos RN notificados foi submetida à terapia medicamentosa de acordo com as recomendações do MS. Porém, a presença de informações ignoradas também foi encontrada nesse item, dificultando o conhecimento acerca do seguimento terapêutico de 4,2% dos neonatos.

Os casos de sífilis congênita identificados neste estudo evoluíram com RN vivos. Borba e Traebert (2014), ao investigarem os casos de sífilis congênita no Estado de Santa Catarina no ano de 2009, também não identificaram nenhum óbito por sífilis congênita.

Embora haja a perspectiva de restabelecer a saúde dos RN afetados por esta infecção, o tratamento da sífilis congênita é mais complexo em comparação ao da sífilis materna, e envolve o prolongamento da internação hospitalar e exames mais dispendiosos ao RN, culminando em danos individuais, familiares e custos adicionais para os serviços de saúde (MAGALHÃES et al., 2013).

Porém, ressalta-se que todas essas consequências advindas da sífilis congênita podem ser evitadas, se as intervenções necessárias para o impedimento da transmissão vertical da sífilis forem executadas com êxito através de uma assistência pré-natal de alta qualidade (COOPER et al., 2016).

4 CONCLUSÃO

Os resultados expostos viabilizaram a compreensão dos pontos fortes e fragilidades da assistência direcionada à saúde materna e infantil no contexto da prevenção, controle e tratamento do agravo na região investigada e a apresentação dos aspectos clínicos e

laboratoriais de crianças com sífilis foi substancial para determinar as características de vulnerabilidade intrínsecas à população de risco.

A maioria dos RN infectados nasceu assintomáticos, e quanto aos casos sintomáticos, a icterícia foi a manifestação clínica mais presente. Teve destaque o resultado do teste não treponêmico em sangue periférico reagente e a não realização do teste confirmatório aos 18 meses. O principal tratamento utilizado foi com penicilina G procaína 50.000 UI/Kg/dia por 10 dias, e todas as crianças evoluíram vivas.

Sugere-se que no âmbito da atenção primária, sejam realizadas ações de educação em saúde voltadas a comunidade atendida, principalmente às mulheres em idade reprodutiva, tanto durante as consultas de planejamento reprodutivo, como no atendimento pré-natal com as gestantes, de modo a informar acerca dos fatores causais da transmissão da sífilis e das demais Infecções Sexualmente Transmissíveis, bem como os métodos de diagnóstico, prevenção e tratamento existentes, atentando para a inclusão das parcerias sexuais nesse processo.

As informações apresentadas neste estudo não devem ser negligenciadas e precisam ser divulgadas para gestores, acadêmicos e profissionais da saúde, bem como para a população em geral, haja vista que o conhecimento dos percalços que circundam a permanência desse dilema, dos grupos mais suscetíveis, e os comportamentos de risco são indispensáveis para impulsionar as políticas públicas voltadas para a eliminação da sífilis congênita, assim como poderá incitar a adoção das estratégias de enfrentamento da doença referidas ao longo desse estudo.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, P.D et al. Análise epidemiológica da sífilis congênita no Piauí. **Revista Interdisciplinar**, v. 8, n. 1, p. 62-70, 2015.

ARAÚJO, C.L et al. Incidência da sífilis congênita no Brasil e sua relação com a Estratégia Saúde da Família. **Revista de Saúde Pública**, v. 46, n. 3, p. 479-86, 2012.

BONI, S.M.; PAGLIARI, P.B. Incidência de sífilis congênita e sua prevalência em gestantes em um município do noroeste do Paraná. **Revista Saúde e Pesquisa**, v. 9, n. 3, p. 517-524, 2016.

BORBA, K.B.; TRAEBERT, J. Carga de doença por sífilis congênita em Santa Catarina, 2009. **Revista Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 23, n. 4, p. 761-766, 2014.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis**. Brasília: Ministério da Saúde, 2016.

CAMPOS, A.L.A et al. Epidemiologia da sífilis gestacional em Fortaleza, Ceará, Brasil: um agravamento sem controle. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 26, n. 9, p. 1747-1755, 2010.

CARVALHO, I.S.; BRITO, R.S. Sífilis congênita no Rio Grande do Norte: estudo descritivo do período 2007-2010. **Revista Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 23, n. 2, p. 287-294, 2014.

COOPER, J.M et al. A persistência da sífilis congênita no Brasil: mais avanços são necessários! **Revista Paulista de Pediatria**, v.34, n. 3, p. 251-253, 2016.

FEITOSA, J.A.S.; ROCHA, C.H.R.; COSTA, F.S. Sífilis congênita. **Revista de Medicina e Saúde de Brasília**, v. 5, n. 2, p. 286-97, 2016.

MAGALHÃES, D.M.S et al. Sífilis materna e congênita: ainda um desafio. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 29, n. 6, p. 1109-1120, 2013.

MESQUITA, K.O et al. Análise dos casos de sífilis congênita em Sobral, Ceará: contribuições para a assistência pré-natal. **Jornal Brasileiro de Doenças Sexualmente Transmissíveis**, v. 24, n. 1, p. 20-27, 2012.

NONATO, S.M.; MELO, A.P.S.; GUIMARÃES, M.D.C. Sífilis na gestação e fatores associados à sífilis em Belo Horizonte – MG, 2010-2013. **Revista Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 24, n. 4, p. 681-694, 2015.

SARACENI, V.; MIRANDA, A.E. Relação entre a cobertura da Estratégia Saúde da Família e o diagnóstico de sífilis na gestação e sífilis congênita. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 28, n. 3, p. 490-496, 2012.

CAPÍTULO 74

PERCEPÇÃO DE MÃES ADOLESCENTES SOBRE O ALEITAMENTO MATERNO NO ÂMBITO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c74

Tamires Barbosa Bezerra¹, Josiliane Pâmela da Silva², Carla Virgínia Souza Gonçalves Lima³, José Nairton Coelho da Silva⁴, Ewerton Pereira Lima⁵, Paulo Ivany de Souza⁶, Maria Nazaré Negreiros Uchôa⁷, Aline de Oliveira Caldeira⁸, Antonia Francielia de Aguiar Lima⁹, Solange de Freitas Lavor¹⁰

¹ Universidade Regional do Cariri, (tbbtami@gmail.com)

² Universidade Regional do Cariri, (josi-liane@hotmail.com)

³ Universidade Regional do Cariri, (carla.2vivi@hotmail.com)

⁴ Centro Universitário Dr Leão Sampaio, (nairton201515@yahoo.com.br)

⁵ Universidade Regional do Cariri, (ewrtonplima@gmail.com)

⁶ Universidade Regional do Cariri, (pauloivany@hotmail.com)

⁷ Universidade Regional do Cariri, (naza.uchoa@hotmail.com)

⁸ Universidade Regional do Cariri, (licaldeira89@gmail.com)

⁹ Faculdade Vale do Jaguaribe (francieliass5@gmail.com)

¹⁰ Universidade Regional do Cariri, (sollavor2015@gmail.com)

Resumo

Introdução: O aleitamento materno é considerado a principal fonte para atender aos aspectos nutricionais, psicológicos e imunológicos do lactente no seu primeiro ano de vida. A amamentação apresenta inquestionáveis vantagens, configurando-se como a mais saudável das estratégias de saúde tanto para a mãe quanto para a criança, e o conhecimento acerca deste ato permite um impacto positivo na promoção integral à saúde do binômio mãe-filho. **Objetivo:** Conhecer a percepção de mães adolescentes acerca do aleitamento materno. **Método:** Pesquisa com abordagem qualitativa, sendo um estudo de campo, do tipo descritivo, onde a coleta de dados deu-se nos meses de fevereiro a março de 2017 a partir de uma entrevista semiestruturada. Participaram da pesquisa 10 adolescentes, de uma UBS localizada no interior do Estado do Ceará, com faixa etária entre 12 a 18 anos. As respostas obtidas foram agrupadas em categorias temáticas a partir da leitura e análise dos dados. **Resultados:** Verificou-se que as adolescentes ainda possuem dificuldades acerca do

reconhecimento do processo da lactação/amamentação implicando em resultados negativos para realização da amamentação. **Considerações Finais:** Identificamos com este estudo que as adolescentes necessitam ter mais incentivo e informações sobre o aleitamento materno, quanto aos seus benefícios para a saúde materna e infantil, e, que a educação em saúde como ferramenta desse processo necessita ser incorporada com mais ênfase.

Palavras-chave: Aleitamento materno; Estratégia Saúde da Família; Gravidez na adolescência.

Área Temática: Ciências da Saúde.

E-mail do autor principal: tbbtami@gmail.com.

1 INTRODUÇÃO

O aleitamento materno é uma das maneiras mais eficazes de atender aos aspectos nutricionais, psicológicos e imunológicos do lactente no seu primeiro ano de vida, sendo assim, é considerado um sinônimo de boa sobrevivência para a criança. Dessa forma, recomenda-se que todas as crianças devam receber exclusivamente o leite materno até os seis meses de idade, e que a amamentação deve ser mantida pelo menos até os dois anos (BRASIL, 2015).

A amamentação apresenta inquestionáveis vantagens tanto para criança quanto para a mãe. Pode-se dizer que se configura como a mais sábia das estratégias de vínculo, afeto, proteção e nutrição da criança. Constitui uma intervenção sensível, econômica e eficaz para a redução da morbimortalidade infantil por doenças infecciosas em geral, especialmente por diarreias, pneumonias e sepse neonatal, além de reduzir a frequência de doenças alérgicas agudas e crônicas e aumentar sua capacidade cognitiva e intelectual, se sobressaindo em permitir um impacto positivo na promoção de saúde integral (TAMASIA, 2013).

O aleitamento é um ato de amor que envolve carinho, atenção e paciência, que exige um comprometimento da mãe para com o filho, proporcionando afeto e saúde, tornando o vínculo mais intenso, ofertando estímulos saudáveis sensoriais, auditivos, táteis, visuais e emocionais. Contudo, a amamentação pode ser uma fase muito complicada, principalmente para as mães que estão amamentando pela primeira vez, e, com isso surgem os inúmeros problemas que podem ser evitados com orientações dadas desde o início da gravidez (OLIVEIRA; NUNES, 2021).

No entanto, percebe-se que as mulheres mesmo cientes da importância do leite materno, não aderem a esta prática devido às dificuldades enfrentadas principalmente nos primeiros dias após o parto, ou não o mantém devido aos traumas mamários que podem

ocorrer, tais como: fissuras mamilares, ingurgitamento mamário e mastite devido a má pega, causando dor e desconforto, entre outros. Além disso, pode haver crenças culturais que interferem nessa adesão, principalmente as relacionadas ao entendimento do leite ser fraco e não suprir as necessidades nutricionais da criança, quando ofertado de forma exclusiva. Por isso, o ato de amamentar exclusivamente por seis meses torna-se uma dificuldade para muitas mães (SILVA et al., 2019).

Diante disso com o intuito de ampliar o conhecimento a respeito da saúde de mães adolescentes, têm-se como ferramenta essencial a educação em saúde, ou seja, no que concerne a amamentação, podemos observar que através de intervenções educativas bem estruturadas e elaboradas pode-se conseguir o sucesso da prática do aleitamento materno pelo menos até o 6º mês de vida. A intervenção educativa tende a se tornar um aliado em potencial para o estímulo ao aleitamento materno, para isso os profissionais de saúde necessitam não somente ter conhecimentos e habilidades, mas estarem bastante sensibilizados para incorporá-los em sua prática (FILHO; NETO; MARTINS, 2011).

Entre os profissionais envolvidos no processo da amamentação, destaca-se o profissional enfermeiro, pela sua estreita relação com as mães, a qual se inicia durante as consultas de pré-natal e têm-se a chance de abordar temas indispensáveis para a eficácia do mesmo, como aspectos relacionados ao incentivo do aleitamento materno. Além disso, o profissional tem a possibilidade de continuar ofertando orientações sobre o aleitamento no período puerperal e durante o acompanhamento e avaliação do bebê nas consultas de puericultura (AZEVEDO et al., 2009).

A realização deste estudo justifica-se pelo fato de a adesão ao aleitamento materno ser um ato de suma importância para a saúde materna e infantil, necessitando de intervenções contínuas que favoreçam e fortaleçam essa prática. Para tanto, a educação em saúde configura-se como uma ferramenta poderosa diante dessa implementação.

Sabe-se que mesmo com todos os benefícios nutricionais e imunológicos que o leite materno tem a ofertar para a promoção de saúde da criança e da mãe, o desmame precoce ou a falta de adesão ao aleitamento materno ainda vem sendo uma grande problemática, devido à falta de informações ou falha das mesmas, por processos culturais ou por percepções errôneas acerca da lactação.

2 MÉTODO

A pesquisa se constituiu em um estudo de caráter descritivo, exploratório com

abordagem qualitativa. Teve como cenário uma Unidade Básica de Saúde (UBS) localizada no município de Iguatu, no interior do Estado do Ceará (CE).

A pesquisa foi realizada com mães adolescentes na faixa etária dos 12 aos 18 anos, que estavam cadastradas na área de abrangência da unidade de saúde selecionada para o estudo, que aceitaram participar da pesquisa e tiveram a devida autorização, mediante assinatura do termo de consentimento assinado pelos pais ou responsável maior. Os critérios de inclusão foram: as que estavam na faixa etária da adolescência, que tivessem parido há menos de um ano que antecedeu a coleta de dados, e que estavam cadastradas na referida UBS. Entretanto, foram excluídas aquelas que não estavam na UBS no momento da coleta de dados.

A coleta de dados se fez através de uma entrevista semiestruturada. Os dados foram analisados através da técnica de Análise de Conteúdo, mediante transcrição das falas sem qualquer alteração do pesquisador, garantindo a fidedignidade dos dados coletados.

A análise de conteúdo aconteceu em três etapas definidas como pré-análise, que consistiu na leitura e organização do material; exploração do material, em que se realizou a codificação, com os devidos recortes do texto e construção de unidades temáticas, classificação e agregação dos dados; e, por fim, o tratamento dos resultados alcançados e sua exploração (BARDIN, 2009). Para que fosse garantido o anonimato das participantes da pesquisa foram utilizados pseudônimos na categorização dos dados, assim, as adolescentes foram referidas por AD1, AD2, AD3, e assim sucessivamente.

A pesquisa foi realizada após assinatura do termo de anuência, com a devida autorização pelo município. Assim, a pesquisa atendeu aos preceitos éticos e legais da Resolução N° 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde (CNS), e obteve aprovação do Comitê de Ética da Universidade Regional do Cariri, com o número do Parecer 2.182.278.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Participaram da pesquisa, 10 mães adolescentes, sendo predominante a faixa etária entre 16 a 18 anos. Em relação ao nível de escolaridade, a maioria possuía ensino médio incompleto (44,4%). Além disso, prevaleceu o estado civil solteira (88,8%) e todas as participantes relataram que não trabalhavam formalmente, se dedicando apenas às atividades diárias do lar.

Além dos dados sociodemográficos, também foram contextualizadas as respostas dadas pelas participantes da pesquisa durante as entrevistas, que foram abordadas de modo a

apresentar os resultados obtidos e a discussão com os achados na literatura.

O aleitamento exclusivo até seis meses de idade tem grande relevância para o crescimento e desenvolvimento da criança. Sem exceções, outro nenhum alimento ou leite industrializado modificado se mostra eficaz em ofertar ao bebê todos os componentes do leite materno (FILAMINGO et al., 2012).

Para que as adolescentes amamentem de forma eficaz e que entendam a importância desta ação no intuito de melhorar na sua prática diária para com o seu filho, é essencial que estas conheçam todas as informações necessárias sobre o leite materno bem como os seus benefícios. Diante disso a pesquisa buscou conhecer o que as adolescentes entendem por aleitamento materno.

Através das respostas obtidas pode-se perceber que ainda existe uma falta de reconhecimento do que se trata esta ação, mesmo que consigam reconhecer a importância da prática e que as realizaram até pelo menos os seis meses de vida da criança. Algumas entendem o ato do aleitamento materno apenas superficialmente, e outras apresentaram maiores explicações, conforme evidenciado pelas falas dispostas no Quadro 1.

Quadro 1 – Falas das participantes da pesquisa retratando o entendimento que possuem acerca do aleitamento materno.

AD6	<i>“É uma ação importante e essencial para o crescimento saudável da criança e da mãe, além de garantir benefícios infinitos para ambos.”</i>
AD2	<i>“É quando a mãe se dedica totalmente amamentação exclusiva para o seu bebe.”</i>

Fonte: Autores, 2021.

Araújo (2013) ressalta que o grau de instrução materna tem influenciado na motivação para amamentar. Pois em muitos países desenvolvidos, mães com maior grau de instrução tendem a amamentar por mais tempo, pelo fato de um maior acesso a informações sobre as vantagens do leite materno. Logo, as mães com menor escolaridade e menos instruídas, por vezes não casadas, iniciam o pré-natal mais tardiamente, e, por consequência se preocupam em definir sobre a alimentação do bebê também mais tarde.

Com base nos inúmeros benefícios que o leite materno tem a ofertar a saúde materna-infantil, atuando diretamente no desenvolvimento cognitivo do bebê, ao prevenir o surgimento de alergias, anemias e infecções respiratórias e a importância do conhecimento das mães acerca dessa temática, o estudo buscou identificar a visão das adolescentes acerca dos benefícios do aleitamento materno.

Através das respostas dadas pelas participantes, pode-se observar que estas possuem pouco ou nenhum conhecimento sobre as reais vantagens ofertadas pelo aleitamento para o binômio mãe-filho, reconhecendo-o na maioria das vezes como um ato que beneficia apenas a criança, conforme apresentado no Quadro 2.

Quadro 2 – Falas das participantes da pesquisa retratando sobre a percepção que possuem acerca dos benefícios do aleitamento materno.

AD7	<i>“Para mim nada, mas para minha filha para ajudar na alimentação e nos dentinhos.”</i>
AD3	<i>“É bom para nascimento de dente porque não dá febre e nem sintomas”</i>
AD9	<i>“Não sei.”</i>

Fonte: Autores, 2021.

Martins e Silva (2013) encontraram inexatidões semelhantes aos relatos das adolescentes, e afirmam perceber uma falha dos profissionais de saúde em não informar e oferecer de forma direta ações que as disponibilizam as vantagens que o corpo da mulher sofre quando escolhe o aleitamento exclusivo.

Dessa forma, existem diversos aspectos que não podem ser desconsiderados, quanto ao desconhecimento das vantagens ofertadas pelo leite materno tanto para mãe quanto para o filho, que seriam a possibilidade de a adolescente ter sido orientada e não se lembrar as recomendações (TAKEMOTO et al., 2011).

Compreendendo a lactação como um método complexo, que requer dedicação, paciência e muito afeto, dependente de inúmeros mecanismos controlados por hormônios cuja sintonia entre mãe e filho é indispensável, e que frente a isso a adolescente pode enfrentar algumas dificuldades para realizar a amamentação, buscou-se identificar se há essas dificuldades, na percepção das adolescentes.

De acordo com as falas, pode-se perceber que as adolescentes possuem algumas dificuldades para conseguir realmente amamentar seu filho, conforme apresentado no Quadro 3.

Quadro 3 – Falas das participantes da pesquisa retratando sobre a existência de dificuldades para realizar a amamentação.

AD8	<i>“Amamentei! A minha filha não queria pegar o peito.”</i>
AD3	<i>“Não amamento. Dói quando tá sugando o leite.”</i>

AD4	<i>“Dei de mamar mais o leite era fraco e o meu filho não engordava.”</i>
-----	---

Fonte: Autores, 2021.

Shimodai e Silva (2010) encontraram dados que corroboram com os achados do presente estudo, pois trazem que apesar do conhecimento materno sobre os benefícios do leite materno e da importância de amamentá-los exclusivamente durante os seis meses, elas vivenciam dificuldades onde se percebe contradições favoráveis e desfavoráveis, dúvidas e dificuldades à prática do aleitamento materno.

Amamentar é um processo complexo e, quando se fala em adolescentes lactantes, torna-se ainda mais problemático e, embora, existam campanhas de incentivo a amamentação, o processo ainda não é uma prática frequente, principalmente em casos de mães adolescentes. Sendo adolescente ou não, as mães requerem orientação e suporte objetivando o desenvolvimento de habilidades para amamentar (TAKEMOTO et al., 2011).

De acordo com o exposto, compreende-se que é fundamental que se ofereçam informações e ações para o enfrentamento das dificuldades que possam vir ser relatadas pelas mulheres, principalmente as primíparas, pois estas necessitam compreender os fatores que podem estar estreitamente relacionados a estes problemas enfrentados durante o período de lactação.

Dessa forma, entende-se que através das falas das adolescentes, que é necessário as ações de educação em saúde, com informações sobre as possíveis problemáticas associadas à amamentação, para que as lactantes estejam orientadas e conscientes sobre como proceder, contribuindo para um processo de eficácia da amamentação, haja vista que a informação é uma das ferramentas mais eficazes para se obter bom desempenho das ações esperadas.

Diante disso, a pesquisa procurou verificar se as adolescentes recebem ou receberam orientações e incentivo sobre amamentação e quem as forneceu, bem como se essas usuárias participaram de alguma ação de educação em saúde e o que podiam opinar sobre tais ações.

Assim, a partir das falas, notou-se que as adolescentes relatam terem sido orientadas quanto à prática da lactação, porém a maioria expressou não havia participado de momentos específicos, ou até mesmo que desconhecia o que significava as ações de educação em saúde, deixando nítida a curiosidade em conhecer e vivenciar ações de saúde voltadas para amamentação, como pode ser verificado no Quadro 4.

Quadro 4 – Falas das participantes da pesquisa retratando sobre a participação de ações de educação em saúde.

AD1	<i>“Sim, a enfermeira que acompanhou minha gestação. Acho legal, mas não tive incentivo de ninguém para participar. Gostaria muito de ter</i>
-----	---

	<i>participado.”</i>
AD3	<i>“A doutora, mas não teve nenhuma ação dessa.”</i>
AD9	<i>“Sim. As médica de Fortaleza e as daqui. Participei. Foi importante porque aprendi muitas coisas com as explicações(...).”</i>

Fonte: Autores, 2021.

A intervenção educativa é uma estratégia potencial para o estímulo à lactação. Para isso, os profissionais de saúde, especialmente os de enfermagem, precisam não só ter conhecimento e habilidades, mas serem humanizados o suficiente para incluí-la em sua prática.

Estudos mostram que muitas informações oferecidas às mães referente à prática de aleitamento materno pelos profissionais de saúde, são insuficientes, principalmente quando promovidas apenas no puerpério imediato. Diante disso, é relevante destacar a importância do acompanhamento dos profissionais da Estratégia de Saúde da Família (ESF) no apoio e acompanhamento da prática do aleitamento materno, devendo possuir capacidade para atuar frente a esta tarefa, para dessa forma, auxiliar a superar as dificuldades precoces encontradas na lactação apresentadas pelas nutrizes adolescentes, buscando ampliar as estratégias de educação em saúde (TAKEMOTO et al., 2011).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebeu-se que a complexa determinação da amamentação é condicionada por fortes e diferentes fatores socioculturais, psicológicos e fisiológicos, sendo ampla a rede de questionamentos que interferem nessa prática. As adolescentes ainda possuem um conhecimento deficiente, percebendo que o leite materno tem relevância para a saúde delas e do filho, mas não sabem ao certo os seus benefícios ofertados.

Na prática da amamentação, as adolescentes, revelaram-se comprometidas com esta função, e que buscam dentro do seu contexto de vida desempenha-las adequadamente. Porém, pode-se evidenciar que ainda há uma necessidade de uma oferta maior de informações que desmitifiquem os rótulos ainda existentes, para que estes não sejam enquadrados como barreiras encontradas para se ofertar amamentação.

Evidenciou-se a necessidade da implementação e criação de estratégias que possibilitem conhecer as mães de maneira integrada com seus familiares e comunidade. Desta forma o processo de gerenciamento tem que ultrapassar algumas singularidades,

rompendo os modelos administrativos, abrindo espaço para novas ferramentas que possam possibilitar o profissional enfermeiro a elaborar atividades de ações educativas que sirvam de incentivo à amamentação.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, J. P. Desmame precoce e suas causas: experiência na atenção básica de Campina Grande- PB. **Revista da Universidade Vale do Rio Verde**, v. 11, n. 2, p. 146-155, 2013.

AZEVEDO, D. S et al. Conhecimento de primíparas sobre os benefícios do aleitamento materno. **Rev. Rene**, v. 11, n. 2, p. 53-62, 2010.

BARDIN, L. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança: aleitamento materno e alimentação complementar. Brasília, 2015.

OLIVEIRA, C. P. A; NUNES, J. S. S. Aleitamento materno e o papel do enfermeiro. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 7, p. 1-10, 2021.

FILAMINGO, B. O. et al. A prática de aleitamento materno entre mães adolescentes na cidade de Dois Córregos. **Rev. Scientia Medica**, v. 22, n.2, p. 81-85, 2012.

FILHO, M. D. S; NETO, P. N. T. G; MARTINS, M. C. C. Avaliação dos problemas relacionados ao aleitamento materno a partir do olhar da enfermagem. **Cogitare Enferm**, v. 16, n. 1, p. 70-75, 2011.

MARTINS, M. Z.O; SILVA, L. S. Benefícios da amamentação para a saúde materna. **Interfaces e Ambiente**, v.1, n.3, p. 87- 97, 2013.

SHIMODAI, G. T; SILVA, I. A. Necessidades de saúde de mulheres em processo de amamentação. **Rev Bras Enferm**, v. 63, n. 1, p. 58-65, 2010.

SILVA, Y. J. A et al. Dificuldades no aleitamento materno na maternidade da fundação santa casa de misericórdia do Pará e o apoio do banco de leite. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**,

v. 11, n. 5, p. 1-14, 2019.

TAKEMOTO, A. Y et al. Preparo e apoio à mãe adolescente para a prática da amamentação. **Rev Cien Cuid Saúde**, v.10, n.3, p. 444- 451, 2011.

TAMASIA, G. A. **Perfil da amamentação e alimentação complementar no Município de Registro-SP**. Dissertação (Mestrado em Ciências). Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo. São Paulo, p. 140, 2013.

CAPÍTULO 75

PERIODONTITE RELACIONADA ÀS DOENÇAS CARDIOVASCULARES: REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA

DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c75

Tanise de Lima Tadielo¹, João Victor de Lara Brum Pedroso², Julia Wolfart Hindi³,
Pedro Afonso Alves de Oliveira⁴, Natália Boessio Tex de Vasconcellos⁵

¹Universidade Federal de Santa Maria, (tanise.tadielo@acad.ufsm.br)

²Universidade Federal de Santa Maria, (joao-victor.brum@acad.ufsm.br)

³Universidade Federal de Santa Maria, (julia.hindi@acad.ufsm.br)

⁴Universidade Federal de Santa Maria, (pedro.oliveira@acad.ufsm.br)

⁵Universidade Federal de Santa Maria, (natisom_vasconcellos@hotmail.com)

RESUMO

Objetivo: Investigar e analisar a literatura disponível acerca dos aspectos que relacionam doenças periodontais às doenças cardiovasculares (DCV). **Método:** Desenvolveu-se revisão integrativa de literatura, realizada nas bases de dados Lilacs, SciELO e PubMed por meio da associação entre os Descritores em Ciências da Saúde “Doenças Cardiovasculares” [AND] “Periodontite”, bem como seus equivalentes nos idiomas inglês e espanhol. Após aplicação dos critérios de inclusão, exclusão e leitura dos textos na íntegra, foram selecionados seis artigos. **Resultados:** Os seis estudos inferem relação entre periodontite e DCV. Um dos estudos inferiu que a periodicidade das consultas odontológicas é fator inversamente proporcional ao impacto da doença. Evidenciou-se ainda a influência da gravidade da periodontite - moderada e grave - a maiores riscos de infarto agudo do miocárdio, doenças valvulares e isquêmicas, bem como seus vínculos a fatores sociais, comportamentais e familiares. Além disso, observou-se que DCV e periodontite agravam suas condições mutuamente. **Conclusão:** A síntese dos resultados sugere associação entre doença periodontal e DCV. Verificou-se que fatores como estilo de vida, escolaridade, tabagismo, etilismo, IMC, elementos sociais, comportamentais e familiares aumentam o risco de acometimento. Ademais, a gravidade da doença periodontal possui relação diretamente proporcional aos maiores riscos de DCV. Entretanto, eventos que justifiquem relação de causa e consequência ainda são pouco definidos.

Palavras-chave: Periodontite; Doenças Cardiovasculares; Saúde.

Área Temática: Ciências da Saúde.

E-mail do autor principal: tanise.tadielo@acad.ufsm.br

1 INTRODUÇÃO

As doenças cardiovasculares (DCV) são as principais causas de morte no Brasil, responsáveis por quase um terço dos óbitos no país, quando não contabilizadas causas externas (MASSA et al., 2019). Entre os fatores de risco predisponentes ao desenvolvimento de DCV, destacam-se: alto colesterol sérico total, tabagismo, hipertensão arterial sistêmica (HAS), obesidade avaliada pelo Índice de Massa Corporal (IMC) e inflamação crônica de qualquer fonte (MA et al., 2019; YUSUF et al., 2020).

A microbiota bucal é constituída por mais de 500 espécies microbianas diferentes: o desequilíbrio entre sistema imune e virulência gera infecções oportunistas (NOGUERA-JULIAN et al., 2017). Conceitua-se periodontite como doença inflamatória crônica, de extensão localizada e induzida por bactérias, que danifica o tecido conjuntivo e osso que suportam os dentes (CZESNIKIEWICZ-GUZIK et al., 2019). Uma característica importante da periodontite é a presença de leucocitose: marcadores pró-inflamatórios – proteína C reativa (PCR) e citocinas leucocitárias, como as interleucinas (IL-1 e IL-6), prostaglandinas (PGE2) e o fator de necrose tumoral (TNF) – são úteis para a predição do risco cardiovascular elevado nos indivíduos de meia-idade. (RAMOS et al., 2009; ROCHA et al., 2020).

Nesse sentido, observa-se que a periodontite apresenta fatores de risco em comum às DCV, principalmente relacionados a doenças crônicas e fatores psicossociais (KOO; HONG, 2018).

A fim de diagnosticar a periodontite, avalia-se, durante o exame clínico periodontal, os parâmetros clínicos de profundidade de sondagem, sangramento à sondagem, perda de inserção, sendo que há a avaliação destas características nos sítios méso-vestibular, méso-lingual, disto-vestibular, disto-lingual, vestibular e lingual de cada dente (MAKINO-OI et al., 2017). Avaliam-se os índices gengival e de placa, que estabelece o estado de higiene bucal: examinam-se depósitos de biofilme nas superfícies vestibular, mesial, distal e lingual de cada dente (YAGNIK; MAHENDRA; KURIAN, 2019).

Estudos demonstram que a periodontite crônica ocorre de maneira mais corriqueira em homens, o que pode estar mais relacionado a menos visitas aos dentistas e piores hábitos de higiene bucal quando comparados às mulheres. Idade maior de 55 anos, presença de doença sistêmica, baixa escolaridade e presença de placa visível também estão associados a uma maior prevalência da condição crônica (EKE et al., 2018; TEIXEIRA et al., 2019). Ademais, a

periodontite acarreta importantes distúrbios estéticos, funcionais, psicológicos e sociais ao paciente (FULLER et al., 2020; RAWLINSON et al., 2021).

A periodontite, portanto, não deve ser negligenciada como fator de risco ao desenvolvimento de afecções sistêmicas. Sua associação com DCV é de grande valia para a prática médica e atenção integral à saúde. Sendo assim, objetiva-se investigar e analisar a literatura disponível acerca dos aspectos que relacionam ambos os distúrbios.

2 MÉTODO

Desenvolveu-se uma revisão integrativa de literatura. Dessa forma, elaborou-se uma questão de pesquisa, seguida de amostragem da literatura e coleta de dados. Após a obtenção do material, foram analisados os dados da revisão e discutidos criticamente seus resultados (SOUSA et al., 2017).

Em prosseguimento às etapas deste desenho metodológico, a amostragem e coleta de dados foi realizada nas bases de dados Lilacs, SciELO e PubMed por meio da associação entre os Descritores em Ciências da Saúde “Doenças Cardiovasculares” [AND] “Periodontite”, bem como seus equivalentes nos idiomas inglês e espanhol. Foram incluídos estudos primários (observacionais ou de intervenção) disponíveis na íntegra que apresentassem evidências da relação entre DCV e periodontite. Além disso, os estudos deveriam ter sido publicados nos últimos dois anos, ou seja, de janeiro de 2020 até julho de 2021. Foram excluídos estudos de revisão, cartas ao editor, estudos duplicados, cujo tema divergisse do proposto e aqueles que não apresentaram consenso entre os avaliadores.

A partir dos critérios de inclusão e exclusão, os estudos selecionados foram avaliados em pares. Pautou-se a relevância e qualidade do estudo, bem como sua importância para a ciência. As condições de dúvidas ou falta de descrição dos critérios foram discutidas em consenso pelos avaliadores. Todos os dados encontrados foram analisados e posteriormente documentados no decorrer desta escrita.

A amostra inicial foi composta por 1233 estudos. Após a aplicação do filtro para selecionar artigos de 2020 até 2021, restaram 153. Seguindo a seleção a partir da leitura de título e resumo, restaram 13 estudos. Após leitura dos textos na íntegra, foram selecionados seis estudos para comporem a revisão. A síntese dessas etapas pode ser visualizada na Figura 1.

Figura 1. Esquema de seleção dos estudos.

Fonte: Autores, 2021.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

As publicações acerca da temática Periodontite – Doenças Cardiovasculares são significativamente numerosas nas bases de dados científicas. No entanto, há necessidade de pesquisas técnicas que investiguem os fatores pré-existent, de risco e desfechos clínicos dos pacientes assistidos, suplementando estudos anteriores. Os trabalhos selecionados delineiam ensaios de coorte, caso controle e transversal, publicados no idioma inglês, externados na França (1), Paquistão (1), Brasil (1), Coréia do Sul (1), República da Coréia (1) e Tailândia (1).

Carra, et al. (2021) visavam averiguar a associação entre periodontite e hipertensão arterial. Neste estudo, a saúde intraoral influenciou na alteração maléfica da hipertensão, com registro de 21 óbitos. Fatima, et al (2020), objetivaram efetuar a ligação entre periodontite e doenças cardiovasculares; os resultados apontam relação com infarto agudo do miocárdio, cardiomiopatias, doenças valvulares e isquêmicas. As análises de Gomes-Filho, et al. (2020) relacionaram os níveis de gravidade da afecção periodontal e Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), considerando situações de edentulismo e sangramento.

Byon, et al (2020), buscaram resultados para doença periodontal e Doença Cardiovascular Aterosclerótica (ACVD), em que a patologia periodontal aumenta as chances de ACVD em 1,05-1,13. O trabalho de Byun, et al. (2020) interrelacionou periodontite e Doença

Cardiovascular (DCV) a partir do microbioma oral; os efeitos resultantes foram de prevalência de Acidente Vascular Cerebral (AVC) em 1,16-1,57, elevando o risco conforme a idade, assim como nos casos de isquemia do coração. Tiensripojarn et al. (2021), avaliaram periodontite e incidência de Doenças Cardiovasculares (DCV) em adultos, obtendo resultados em manifestações leves, moderadas e graves de doença periodontal.

A partir da leitura completa dos artigos, os dados gerais e principais resultados relacionados à relação Periodontite-Doença Cardiovascular foram sintetizados através da formulação dos Quadro 1 e Quadro 2.

Quadro 1 – Descrição dos estudos a partir dos autores e ano de publicação, local, título e objetivos.

Autor	Local	Título	Objetivos
Carra, et al. (2021)	França	Self-reported periodontal health and incident hypertension: longitudinal evidence from the NutriNet-Santé e-cohort	Investigar a hipótese de associação entre periodontite e hipertensão arterial.
Fatima, et al. (2020)	Paquistão	Periodontitis is a risk factor for developing cardiovascular diseases	Desvendar a ligação entre periodontite e doenças cardiovasculares.
Gomes-Filho, et al. (2020)	Brasil	Severe and moderate periodontitis are associated with acute myocardial infarction	Analisar a relação dos níveis de gravidade de periodontite e Infarto Agudo do Miocárdio (IAM).
Byon, et al. (2020)	Coréia do Sul	Association of Periodontitis with Atherosclerotic Cardiovascular Diseases: A Nationwide Population-based Retrospective Matched Cohort Study	Averiguar a ligação de periodontite e o desenvolvimento de doença cardiovascular aterosclerótica (ACVD).
Byun, et al. (2020)	República da Coréia	Cross-Sectional Analysis of the Association between Periodontitis and Cardiovascular Disease Using the Korean Genome and Epidemiology Study Data	Interrelacionar periodontite e doença cardiovascular (DCV), com estudos de microbioma oral na periodontite e DCV.
Tiensripojarn, et al. (2021)	Tailândia	Periodontitis is associated with cardiovascular diseases: A 13-year study	Avaliar a associação entre periodontite e incidência de doenças cardiovasculares (DCVs) em adultos tailandeses.

Fonte: Autores, 2021.

Quadro 2 – Descrição dos estudos a partir das amostras estudadas e principais resultados.

Estudo	Amostra	Principais Resultados
Carra et al. (2021)	O estudo foi composto por 32.285 participantes. Destes, 78,5% eram do sexo feminino e 21,5% representavam os homens. Média de 45,79 de idade (DP 13,87)	Durante os 91,5 meses da pesquisa, houve 2116 casos de hipertensão arterial (6,6%). A relação entre saúde periodontal, a qual inclui número de dentes, perda óssea alveolar e presença de afecção gengival mostrou relação com hipertensão de frequência mPESS de 5. No decorrer da análise 21 (0,1%) dos indivíduos vieram a óbito. Além disso, os resultados de mPESS iguais a 5 foram parâmetros para risco elevado de periodontite e hipertensão arterial, assim como as condições sociodemográficas, estilo de vida e edentulismo foram apontados como fatores negativos. A periodicidade das consultas odontológicas reduziu o impacto na hipertensão em 12%.
Fatima et al. (2020)	A pesquisa foi realizada a partir do acompanhamento de 146 pacientes aleatórios.	Da amostra estudada, 73 (50%) dos casos eram controle. Destes 48 (65,75%) apresentaram periodontite; nesses pacientes a prevalência de doença periodontal e doença das válvulas cardíacas foi de $p=0.028$. Em periodontite relacionada ao ataque cardíaco $p=0.007$. Afecções no periodonto e cardiomiopatia $p=0.045$.
Gomes-Filho et al. (2020)	O estudo contou com 621 integrantes. 207 destes participantes com diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM). 300 componentes eram mulheres e 321 homens. A média de idade para o grupo controle foi de 59 anos e para o estudo de caso, 58 anos.	Os achados científicos indicaram associação entre níveis de gravidade de periodontite moderada e grave com Infarto Agudo do Miocárdio (IAM). Os níveis de gravidade da periodontite e IAM variou de OR= 1,96 a 3,92 para esta análise, considerando sangramento na sondagem, comprometimento de 4 dentes ou mais, nível de fixação e profundidade de sondagem. Os riscos exponenciaram-se ao levar em conta fatores de escolaridade, tabagismo, Índice de Massa Corporal (IMC) e hipercolesterolemia.
Byon et al. (2020)	Uso do banco de dados do NHIS-NSC2 (2002-2015). Os participantes com periodontite eram 52.425. 50,3% homens e 49,7% mulheres.	Os fatores de risco para Doença Cardiovascular Aterosclerótica (ACVD) foram aumentados para os participantes com presença de afecção periodontal (aHR:1,09, IC 95%: 1,05-1,13). A incidência de ACVD em participantes com periodontite foi maior do que participantes sem periodontite. ($p<0,001$). A influência de riscos para ACVD combinado a periodontite aumenta conforme a renda familiar diminui, além de ser ampliada na presença de hipertensão e diabetes.
Byun et al. (2020)	Foram incluídos no estudo 9.973 pacientes com periodontite e 125.304 indivíduos para o grupo controle, sem afecção periodontal.	Os resultados apontaram a relação de pacientes com periodontite e prevalência de Acidente Vascular Cerebral (AVC) em = 1,16-1,57 ($p<0,001$). Houve análise consistente em subgrupos de idade, a aOR foi de 1,20 no grupo de 40-49 anos, 1,39 para 50-59 anos e 1,34 para 60-69 anos. Para os homens 1,26 e para as mulheres 1,47 (todos $p<0,05$). A aOR da periodontite e doença isquêmica do coração foi de 1,34 ($p<0,001$). O consumo de álcool, tabagismo recente e histórico familiar de diabetes são fatores significativos para exponenciar a correlação periodontite-AVC e periodontite-isquemia cardíaca.

Tiensripojarn et al. (2021)	Questionários médicos e exames físicos de 1850 pacientes foram analisados. A faixa etária ficou entre 47 a 73 anos.	Evidenciou-se a prevalência de periodontite leve em 11,7% dos indivíduos, moderada em 52,7% e grave em 35,6%. As Doenças Cardiovasculares (DCV) ocorreram em 110 participantes (5,9%), sendo 28 (1,5%) casos de Acidente Vascular Cerebral (AVC) e 82 (4,4%) os eventos de Doença Cardíaca Coronariana (CHD). A incidência de Doença Arterial Coronariana (DAC) com periodontite leve teve associação significativa, com HR de 4,53 (Intervalo de confiança: 1,08-19,02). A preexistência de DCV é influência negativa ao agravamento da periodontite e doença cardiovascular.
-----------------------------	---	--

Fonte: Autores, 2021.

Os seis estudos mostram relação positiva entre periodontite e doenças cardiovasculares. Um dos estudos inferiu que a periodicidade das consultas odontológicas se manteve como fator inversamente proporcional ao impacto da doença (CARRA et al., 2021). Evidenciou-se ainda a influência da gravidade da periodontite - moderada e grave - a maiores riscos de infarto agudo do miocárdio, doenças valvulares e isquêmicas, bem como seus vínculos a fatores sociais, comportamentais e familiares (FATIMA et al., 2020; GOMES-FILHO et al., 2020; BYON et al., 2020; BYUN et al., 2020). Ademais, observou-se que DCV e periodontite agravam suas condições mutuamente (TIENSRIPOJAMARN et al., 2021).

Esta revisão integrativa investigou a relação entre Periodontite e DCV a partir da avaliação qualitativa e visão estruturada dos artigos incluídos. Entretanto, informações sobre essa ocorrência são fragmentadas no que se refere à fatores de risco, gravidade das desordens e classificação da DCV. Embora as metodologias paralelas facilitem a análise estatística dos resultados, a utilização de diferentes critérios para avaliar a relação das afecções dificulta o estabelecimento de achados mais conclusivos.

Nesse sentido, estudos indicam que os eventos de periodontite desencadeiam inflamação sistêmica, evidenciada por elevação dos biomarcadores inflamatórios associados ao maior risco de DCV - PCR e IL-6 (FURUTAMA et al., 2020; MONTERO et al., 2020); além disso, observa-se reação cruzada de anticorpos com patógenos periodontais e componentes da túnica íntima dos vasos (PLACHOKOVA et al., 2021): a concomitância de tais condições acarreta o desenvolvimento e progressão de placas de ateroma, principal responsável por doenças isquêmicas (WINNING et al., 2021). De forma análoga, outra linha de estudos indica que toxinas bacterianas resultantes da periodontite interferem na atividade trombogênica devido ao aumento da viscosidade sanguínea e produção de fatores de agregação plaquetária, desestabilizando o sistema circulatório (SILVA et al., 2020; USTAOGU; ERDAL; INANIR, 2020).

Diante dos resultados obtidos, observa-se associação positiva entre periodontite e doenças cardiovasculares, destacando-se hipertensão arterial, infarto agudo do miocárdio, cardiomiopatias, doenças valvulares e isquêmicas; além disso, fatores comportamentais e sociodemográficos se apresentam como fatores de risco ao seu desenvolvimento. Nas circunstâncias e limitações definidas nesta revisão, os achados indicam que periodontite e DCV devem ser investigadas em conjunto com o fito de minimizar sua incidência e determinar ações estratégicas de terapêutica e prevenção. No entanto, são necessários mais estudos que abordem ambas as afecções, buscando mecanismos compartilhados por esses eventos que justifiquem relação de causa e consequência.

4 CONCLUSÃO

A síntese dos resultados sugere associação entre doença periodontal e DCV: destacam-se hipertensão arterial, infarto do miocárdio, cardiomiopatias, doenças valvulares e isquêmicas, doença cardiovascular aterosclerótica e acidente vascular cerebral. Além disso, verificou-se que fatores como estilo de vida, escolaridade, tabagismo, etilismo, IMC, fatores sociais, comportamentais e familiares influenciam o desenvolvimento de tal relação. Ademais, a periodicidade das consultas odontológicas é fator inversamente proporcional ao impacto da doença

Por fim, verificou-se que a associação entre periodontite e doenças cardiovasculares ainda é pouco definida e apresenta lacunas no que cerne a relação de causa e consequência. Cabe aludir que a utilização de diferentes critérios para avaliar a relação das afecções foi fator limitante para a definição da correlação supracitada.

REFERÊNCIAS

BYON, M. J. et al. Association of Periodontitis with Atherosclerotic Cardiovascular Diseases: A Nationwide Population-based Retrospective Matched Cohort Study. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 17, n. 19, p. 7261-7270, 2020.

BYUN, S. H. et al. Cross-Sectional Analysis of the Association between Periodontitis and Cardiovascular Disease Using the Korean Genome and Epidemiology Study Data. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 17, n. 14, p. 5237-5248, 2020.

CARRA, M. C. et al. Self-reported periodontal health and incident hypertension: longitudinal evidence from the NutriNet-Santé e-cohort. **Journal of Hypertension**, v. 39, n. 1, p. 1-9, 2021.

CZESNIKIEWICZ-GUZIK M. et al. Causal association between periodontitis and hypertension: evidence from Mendelian randomization and a randomized controlled trial of non-surgical periodontal therapy. **European Heart Journal**, v. 40, n. 42, p. 3459-3470, 2019.

EKE, P. I. et al. Periodontitis in US Adults: National Health and Nutrition Examination Survey 2009-2014. **Journal of the American Dental Association**, v. 149, n. 7, p. 576-588.e6, 2018.

FATIMA, Z. et al. Periodontitis is a risk factor for developing cardiovascular diseases. **Journal Of Pakistan Medical Association**, v. 70, n. 11, p. 1941-1943, 2020.

FULLER, J. et al. Association of oral health-related quality of life measures with aggressive and chronic periodontitis. **Journal of Periodontal Research**, v. 55, n. 4, p. 574-580, 2020.

FURUTAMA, D. et al. IL-6 Induced by Periodontal Inflammation Causes Neuroinflammation and Disrupts the Blood-Brain Barrier. **Brain Sciences**, v. 10, n. 10, p. 679-691, 2020.

GOMES-FILHO, I. S. et al. Severe and moderate periodontitis are associated with acute myocardial infarction. **Journal of Periodontology**, v. 91, n. 11, p. 1444-1452, 2020.

KOO, H. S.; HONG, S. M. Prevalence and Risk Factors for Periodontitis Among Patients with Metabolic Syndrome. **Metabolic Syndrome and Related Disorders**, v. 16, n. 7, p. 375-381, 2018.

MA, Y. et al. Relationship between carbohydrate intake and risk factors for cardiovascular disease in Chinese adults: data from the China Health and Nutrition Survey (CHNS). **Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition**, n. 28, n. 3, p. 520-532, 2019.

MAKINO-OI, A. et al. Treatment of Severe Chronic Periodontitis with Surgical and Prosthetic Intervention: A 9-year Follow-up Case Report. **The Bulletin of Tokyo Dental College**, v. 58, n. 4, p. 237-246, 2017.

MASSA, K., Duarte, Y. A. O., Chiavegatto Filho, A. Análise da prevalência de doenças cardiovasculares e fatores associados em idosos, 2000-2010. **Cien Saude Colet** [periódico na internet], Jan/2019.

MONTERO, E. et al. Impact of periodontal therapy on systemic markers of inflammation in patients with metabolic syndrome: A randomized clinical trial. **Diabetes, Obesity and Metabolism**, v. 22, n. 11, p. 2120-2132, 2020.

NOGUERA-JULIAN, M. et al. Oral microbiome in HIV-associated periodontitis. **Medicine (Baltimore)**, v. 96, n. 12, p. e5821, 2017.

PLACHOKOVA, A. S. et al. Oral Microbiome in Relation to Periodontitis Severity and Systemic Inflammation. **International Journal of Molecular Sciences**, v. 22, n. 1, p. 5876-5892, 2021.

RAMOS, A. M. et al. Marcadores inflamatórios da doença cardiovascular em idosos. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, v. 92, n. 3, p. 233-240, 2009.

RAWLINSON, A. et al. Periodontal treatment, psychological factors and oral health-related quality of life. **Journal of Clinical Periodontology**, v. 48, n. 2, p. 226-236, 2021.

ROCHA, L. O. et al. Association between Periodontitis, Genetic Polymorphisms and Presence of Coronary Artery Disease in Southern Brazil. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, v. 114, n. 2, p. 268-272, 2020.

SILVA, N. L. C. et al. Periodontal status, vascular reactivity, and platelet aggregation changes in rats submitted to hypercholesterolemic diet and periodontitis. **Journal of Periodontal Research**, v. 55, n. 3, p. 453-463, 2020.

SOUSA, L. M. M. et al. A Metodologia de Revisão Integrativa de Literatura em Enfermagem. **Revista Investigação em Enfermagem**, v. 21, n. 2, p. 17-26, 2017.

TEIXEIRA, F. C. F. et al. Perda de inserção periodontal e associações com indicadores de risco sociodemográficos e comportamentais. **Revista de Odontologia da UNESP**, v. 48, n. e20190095, p. 1-11, 2019.

TIENSRIPOJAMARN, N. et al. Periodontitis is associated with cardiovascular diseases: A 13-year study. **Journal of Clinical Periodontology**, v. 48, n. 3, p. 348-356, 2021.

USTAOGU, G.; ERDAL, E.; İNANIR, M. Does periodontitis affect mean platelet volume (MPV) and plateletcrit (PCT) levels in healthy adults? **Revista da Associação Médica Brasileira**, v. 66, n. 2, p. 133-138, 2020.

WINNING, L. et al. Systemic inflammation and the relationship between periodontitis, edentulism, and all-cause mortality: A 17-year prospective cohort study. **Journal of Clinical Periodontology**, v. 48, n. 9, p. 1260-1269, 2021.

YAGNIK, K.; MAHENDRA, J.; KURIAN, V. M. The Periodontal-Cardiovascular alliance: Evaluation of miRNA-146a in subgingival plaque samples of chronic periodontitis patients with and without coronary heart disease. **Journal of Investigative and Clinical Dentistry**, v. 10, n. 4, p. e12442, 2019.

YUSUF, S. et al. Modifiable risk factors, cardiovascular disease, and mortality in 155 722 individuals from 21 high-income, middle-income, and low-income countries (PURE): a prospective cohort study. **Lancet**, v. 395, n. 10226, p. 795-808, 2020.

CAPÍTULO 76

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA IDOSOS E ILPI's EM BELÉM/PA: Análise sobre o processo de envelhecimento a partir do Estatuto do Idoso

DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c76

**Luana Lisboa Lopes¹, Sthefani Barroso Ferreira², Cibelly Theilon Ferreira Pereira³,
Paula Samara Rodrigues do Nascimento⁴, Alessandro Bararuá Maia⁵, Marinara Melo da
Silva⁶, Douglas Pessoa dos Santos⁷, Flávio Maia do Amaral⁸, Eliany Cristina dos Santos
Fonseca⁹, Karla Jamilly de Sousa e Silva¹⁰.**

¹Universidade Federal do Pará, (llopes.1170@gmail.com)

²Universidade Federal do Pará, (sthefanibarroso@yahoo.com.br)

³Universidade Federal do Pará, (cibellytheylon@gmail.com)

⁴Universidade Federal do Pará, (paula.samara.rn@gmail.com)

⁵Universidade Federal do Pará, (alexmbararua@gmail.com)

⁶Universidade Federal do Pará, (marinaramelossocial@gmail.com)

⁷Universidade Federal do Pará, (santosdouglasdps@gmail.com)

⁸Universidade Federal do Pará, (mrl.flavio@gmail.com)

⁹Universidade Federal do Pará, (elianny11santos@gmail.com)

¹⁰Centro de Referência de Assistência Social de Baião/Universidade Federal do Pará,
(karlajamillyss26@hotmail.com)

RESUMO

Objetivo: O presente trabalho objetivou identificar Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI's) em Belém/PA, assim como, buscou-se realizar um breve contexto histórico da construção da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), e em especial a correlação das/os Assistentes Sociais na aplicabilidade das políticas sociais vinculadas à referida Lei, frente aos seus limites e possibilidades. **Método:** A pesquisa apresenta uma abordagem metodológica de caráter qualitativa, com coleta de dados bibliográficos e documentais. **Resultados e Considerações Finais:** Em síntese, percebe-se a carência de ILPI's no município de Belém do Pará o que torna ainda mais complicado o processo de envelhecimento, pois as políticas existentes não são suficientes para atender as necessidades da população idosa, em especial dos que vivenciam situações de vulnerabilidade socioeconômica, espaço em que o profissional de

Serviço Social pode atuar como um educador social, na orientação social e articulação com as demais políticas sociais.

Palavras-chave: Estatuto do Idoso; ILPI's; Envelhecimento; Serviço Social; Política Pública.

Área Temática: Ciências Sociais Aplicadas

E-mail do autor principal: llopes.1170@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

Para chegar à construção efetiva do Estatuto do Idoso, percorreu-se uma longa trajetória que teve como ponto de partida a percepção do ato de envelhecer, caracterizada pelos seus fatores biopsicossociais. O envelhecimento da população é uma temática que gera muitas discussões principalmente no que diz respeito a compreensão sobre o que é velhice, visto que é uma fase de inovações e de inúmeros desafios enfrentados no seu cotidiano.

Ao analisar as mudanças que ocorrem durante o processo do envelhecimento, é possível observar diversas mudanças nos seus hábitos, crenças e de outras características presentes nesse período da vida, que passam a ser conhecidas como a terceira idade. A noção de velhice emergiu no período de transição do século XIX para o XX, a partir da construção de novos saberes médicos que passaram a aprofundar seus estudos e pesquisas sobre o processo de envelhecimento, o que mais tarde passou a ser denominada como gerontologia (SILVA, 2008). Com destaque, a temática do envelhecimento só ganhou espaço na esfera científica social devido ao fenômeno do crescimento populacional de pessoas de 60 anos ou mais, tornando a velhice um “problema social”, motivado por consequências econômicas que abalaram tanto a estrutura financeira empresarial – e posteriormente do Estado, com o advento das aposentadorias – quanto as estruturas das famílias, que até então tinham como responsabilidade exclusiva o custeio e manutenção de vida desse segmento populacional (SILVA, 2008; PEIXOTO, 1998).

O termo velhice remonta à França, século XIX, caracterizado pelas pessoas que não podiam assegurar seu futuro financeiramente, isto é, os indigentes, despossuídos de bens, pessoas de faixa etária de 60 anos que não tinham status social e que, por isso, denominavam-se velhos. Por outro lado, os que desfrutavam desse status, detendo bens e patrimônio, eram reconhecidos facilmente como símbolo de respeito e assim, designados como idosos (PEIXOTO, 1998). No Brasil, assim como na França, os termos “velho” e “idoso” possuíam um grau de definições sociais distintas. Esse cenário pode ser certificado pelas casas de acolhimento ou de longa permanência existentes no período. Usualmente utiliza-se “Casa de

apartamentos para idosos” para designar um conjunto residencial, onde se era possível viver confortavelmente, tendo em vista que esse local dispunha de amplos serviços (médico, social, e de lazer) para o bem estar de quem ali vivesse. Por outro lado, o “Lar da velhice”, tinha uma estrutura menor, que contavam com serviços escassos, de pouco investimento. Embora ambos tivessem definições semelhantes, o tratamento dado a um certo grupo dentro dessa faixa etária, por sua vez, era diferente do outro: o “Lar” para os velhos e pobres, e a “Casa de apartamentos” para os idosos pertencentes às camadas mais favorecidas (PEIXOTO, 1998).

Entende-se que as concepções correspondentes a velhice, historicamente se constituíram em contextos delimitados pelo processo de exclusão social, uma vez que a população pobre na medida em que envelhecia, se reforçava ainda mais a lógica de marginalização. Embora tenha ocorrido o eufemismo na utilização dos termos de velho para idoso, ou com a inserção de serviços e atividades que configuram a terceira idade, considera-se importante analisar e discutir como se apresenta esse segmento populacional na atualidade, com o protagonismo que o Estatuto do Idoso – mote deste trabalho – possui enquanto legislação vigente de proteção e direitos sociais à população idosa no Brasil.

Tendo em conta o Pará, um Estado que concentra uma grande parte da população idosa do Brasil, e mais especialmente o município de Belém, é interessante identificar as ILPI's na região, com a finalidade de auxiliar e aperfeiçoar o funcionamento dessas instituições para a pessoa idosa. Isto posto, este trabalho foi construído a partir de análise e estudos referente ao Estatuto do Idoso - Lei nº 10.741/2003, no qual buscou-se identificar as Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI's) existentes no município de Belém do Pará, tal como a importância da sua execução para este segmento populacional. Ademais procurou-se abordar a relação da temática com o Serviço Social, no que tange às suas políticas, suas necessidades presentes e futuras para a população que mais têm crescido nas últimas décadas: idosos e idosas.

2 MÉTODO

Para a contextualização e análise do problema, realizou-se análise documental, como as legislações referente a temática, pesquisa de revisão bibliográfica de caráter qualitativa por meio de fontes científicas resultante de livros e artigos, e ainda uma pesquisa na web, através

do Google, com o termo “Instituições de Longa Permanência para Idosos no Pará Q-8711-5/02¹”, a fim de identificar as ILPI’s existentes na região.

3 BREVE CONTEXTO HISTÓRICO DA CONSTRUÇÃO DO ESTATUTO DO IDOSO

Foram cerca de 20 anos até que houvesse a aprovação do Estatuto do Idoso pelo Congresso Nacional, levando um longo tempo de luta para a formulação e fundamentação dessa política em prol das pessoas idosas. Por volta do início dos anos 80 várias entidades discutiam sobre os direitos sociais dos idosos, que foi consequentemente se consolidando a partir da metade da década de 1990. Essa luta alcançou em janeiro de 1994, a aprovação da Lei nº 8.842, referente a Política Nacional do Idoso, que cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências. A Política Nacional do Idoso tem por objetivo assegurar os direitos sociais da pessoa idosa, pessoas maiores de 60 anos de idade, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade, a lei dispõe sobre os princípios, diretrizes, organização, ações governamentais e disposições gerais que deverão orientá-la. Contudo, várias medidas de proteção e ações previstas nesta lei não estavam sendo ao menos aplicadas, e por se tratar de uma lei abrangente, seria necessário uma política que viabilizasse, orientasse e pudesse conduzir todas as ações e direitos referentes aos idosos.

Nesse sentido, dois projetos de lei do Estatuto do Idoso foram postos em proposta no Congresso Nacional. O primeiro em 1997, de autoria de Paulo Paim, Deputado Federal do Rio Grande do Sul na época, e o segundo em 1999, de autoria do Deputado Federal de Santa Catarina nesse período, Fernando Coruja – o segundo projeto demonstrava equívocos e dificuldades na sua execução. Em julho de 2001, a Câmara dos Deputados resolveu criar uma Comissão Especial para analisar os projetos de leis referente aos idosos, logo em seguida, essa mesma Comissão teve a ideia de realizar um seminário sobre o Estatuto do Idoso, com o objetivo de discutir os referidos projetos com a intenção de uni-los em um único projeto. Com isso, o projeto do Estatuto tramitou por cerca de dois anos no Congresso, vindo a ser aprovado em outubro de 2003, mas que foi vigorado apenas dia 1º de outubro de 2004.

O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.74/2003) é uma lei orgânica do Estado brasileiro que tem como propósito regulamentar os direitos destinados às pessoas com idade igual ou maior que 60 anos que vivem no país. De maneira elucidativa, o Estatuto do Idoso nada mais é que uma conclusão final de um grande esforço entre várias entidades voltadas para o asseguramento dos

¹ Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), Q-8711-5/02 é uma subclasse que envolve atividades de assistência social a idosos sem condições financeiras para se manterem, executadas em estabelecimentos públicos, filantrópicos ou privados.

direitos do idoso no Brasil. Dentre essas entidades estão a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, assim também, aquelas que reúnem entre outros representantes, como os parlamentares do Congresso Nacional. Em síntese, é evidente que o Estatuto do Idoso reflete um grande avanço na proteção jurídica dos sujeitos considerados idosos na sociedade brasileira, segundo o próprio Estatuto. Todavia, é de fundamental importância que todos eles e seus familiares, tomem consciência dos seus direitos, de maneira que se tornem sujeitos empoderados.

Dentro desse contexto de aumento da população brasileira, aumento da expectativa de vida da população, assegurar direitos, inúmeras mudanças socioculturais e econômicas, é necessário o respaldo da legislação, principalmente do Estatuto do Idoso, e o fortalecimento de políticas públicas que visem o bem estar destes idosos. Inserido neste processo, está o de acolhimento das Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI's) que faz parte de um serviço de Proteção Social de Alta Complexidade dos Serviços Socioassistenciais o qual é considerado a utilização do mesmo, geralmente em casos excepcionais como o de violência, situação de rua, aplicação de medida de proteção ou em outras situações que provoquem dano à vida do idoso.

As ILPI's, segundo a Lei nº 10.741/2003, governamentais e não-governamentais estão sujeitas a inscrição junto ao órgão competente da Vigilância Sanitária e do Conselho Municipal da Pessoa Idosa ou, na sua ausência, ao Conselho Estadual ou Nacional da Pessoa Idosa, ou seja, mesmo que algumas destas instituições sejam de cunho filantrópico, é preciso que as organizações fiscalizadoras governamentais verifiquem o trabalho realizado, ratificando se as necessidades dos idosos estão sendo atendidas, se está sendo promovido a inclusão social desse público, se a equipe profissional está conseguindo dar o suporte necessário e outros.

4 INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI's) EM BELÉM/PA

No Brasil ainda não há um consenso sobre o que seja as ILPI's, por mais que sua origem esteja relacionada aos asilos, – uma das modalidades mais antigas que existem, destinadas às pessoas que careciam de abrigo mediante a ausência de políticas públicas – geralmente estão correlacionadas a imagens negativas e de preconceitos, por ser considerado um local em que o idoso espera o tempo de sua morte (CAMARANO; KANSO, 2010; NOVAES, 2003; BORN, 2001). Em vista disso, o envelhecimento da população tem gerado preocupação no que se refere aos cuidados que irão exigir devido ao seu crescimento populacional, visto que eles necessitam

de atenção e cuidado integral, por ser uma fase em que há redução da capacidade física, cognitiva e mental. De acordo com o Art. 3º da Lei nº 10.741/2003 “é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação [...]”, dentre outros, todavia percebe-se que muitos idosos não possuem familiares que possam dispor de tempo integral para o seu cuidado, resta então ao Estado e ao mercado privado elaborar alternativas para o cuidado à pessoa idosa, com a criação de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI's). Isto posto, Camarano (2016), parte da afirmação que,

Assume-se que os residentes das Ilpis são pessoas que nunca tiveram ou perderam familiares próximos, que experimentam conflitos familiares e/ou que não têm condições físicas ou mentais de administrar o seu cotidiano nem de garantir o seu sustento. Homens e mulheres vivendo sós apresentam uma probabilidade maior de viver em uma instituição, especialmente mulheres. As razões para isto não são muito claras, mas a maior probabilidade de uma mulher residir em uma instituição pode ser devido ao fato de elas serem mais velhas, terem piores condições de saúde e de capacidade funcional além de uma posição desfavorecida nos arranjos familiares (CAMARANO, 2016, p. 495).

Em conformidade com o Título II, dos Direitos Fundamentais do Estatuto do Idoso, especialmente em seu capítulo IX, que trata sobre habitação, é exposto no Art. 37 que a pessoa idosa possui o direito à moradia digna, seja com a sua família ou em instituição pública ou privada, e ainda a assistência integral na categoria de longa permanência em casos de inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou ausência de recursos financeiros. No que diz respeito ao funcionamento dos ILPI's, pode-se localizar na Lei nº 10.741/2003, de modo mais direcionado e específico, no Título IV (Da Política de Atendimento ao Idoso), dos capítulos II ao VI, uma série de critérios, normas, mecanismos de fiscalização e penalidades para o descumprimento das orientações, visando garantir funcionamento adequado de espaços que se proponham a oferecer serviço de atendimento e acolhimento aos idosos.

À vista disso, conforme o Relatório da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) de 2020, não existe um quantitativo de ILPI's cadastradas no Brasil, o que dificulta a coleta de dados, tal como a realização de ações, por não se conhecer a realidade desses estabelecimentos. Entretanto, neste relatório a ANVISA destaca apenas duas instituições existentes no Pará que se autodeclararam como ILPI's e que possuem cadastrado no Governo Federal. Embora no relatório declare que foram encontradas duas ILPI's na região norte, por meio de uma pesquisa realizada na web, foi possível encontrar no site da Econodata² 155 instituições no Estado do Pará, e 22 em Belém, consideradas casas de repouso, de caráter

² É uma empresa de tecnologia com informações detalhadas de empresas do Brasil, normalmente difíceis de obter por estarem espalhadas em inúmeras fontes de forma desestruturada.

filantrópico, público e privado. Essas instituições realizam atividades de assistência social, de cuidado à saúde, atividades recreativas, entre outras.

Foi perceptível uma carência quanto às informações sobre as instituições, muitas delas não possuem sites na internet ou não se declaram como instituição de longa permanência, o que dificulta o acesso à informação para a população. Além disso, é essencial que haja um trabalho de conscientização social principalmente com as famílias, afinal, muitas destas ainda não conseguem lidar com esse processo de envelhecimento, que não seja de uma forma excludente. Em relação à atuação dos órgãos governamentais, é preciso que se faça valer as legislações e políticas públicas vigentes, a fim de proporcionar qualidade nos serviços prestados, promovendo e assegurando de fato os direitos da população idosa.

Nesse cenário, o Serviço Social está inserido na promoção e garantia de direitos, pois no que tange a Lei de Regulamentação da Profissão (Lei nº 8.662/1993) é competência profissional trabalhar na elaboração, implementação, execução e avaliação das políticas sociais, assim como defender os direitos sociais, principalmente daqueles usuários que estão em condições de vulnerabilidade social, como por exemplo, os idosos que se encontram em situação de violência, exploração e abandono. Dessa forma, o Serviço Social também está posto nesse processo de envelhecimento saudável e na proteção social da população idosa, com a finalidade de que seus direitos enquanto cidadãos não sejam violados e que estes não sejam marginalizadas socialmente.

6 ENVELHECIMENTO E O SERVIÇO SOCIAL

O Serviço Social atua nas mais diversas expressões da questão social, que se manifestam e rebatem sobre a vida da população, tendo como exemplo, a população idosa – enfoque desta análise. O(a) Assistente Social está inserido nas políticas sociais que prestam serviços aos idosos, sendo importante que este profissional tenha clareza sobre as questões do envelhecimento, pois em seu cotidiano profissional, receberá demandas de idosos em busca do acesso aos direitos sociais, tendo em vista que é um grupo que vivencia constantes formas de violações de direitos no âmbito da saúde, assistência, previdência, habitação e lazer. Para realizar a análise da envelhescência, é necessário considerar a totalidade do processo de envelhecimento, tendo em conta que são “[...] determinados por: condição de classe das pessoas idosas; contextos social e histórico vivenciados ao longo de sua história de vida [...]” (TORRES, 2020, p. 47), entende-se que para compreender de maneira crítica a realidade

desses sujeitos, é imprescindível dar importância às suas particularidades, o meio em que está inserido, suas vivências e as suas condições de acesso às políticas sociais.

O trabalho do(a) Assistente Social com a população idosa é fundamentado na perspectiva da defesa da proteção social e dos direitos humanos, em razão disso é essencial que esse profissional tenha um olhar crítico da realidade, para reconhecer os idosos a partir de sua condição de classe social, raça/etnia e de gênero, tal qual analisar a realidade que está inserido, identificando as suas necessidades sociais, formas de estratégias de resistência e de sobrevivência (FRANÇA; FERREIRA, 2020; TORRES, 2020). O Serviço Social depara-se constantemente com desafios impostos pelo capitalismo, interferindo diretamente no trabalho desenvolvido pelo(a) Assistente Social, como a “[...] precarização dos vínculos trabalhistas, o aumento do desemprego e os cortes orçamentários no âmbito das políticas públicas, com a retração da ação do Estado na proteção social [...]” (FRANÇA; FERREIRA, 2020. p. 268), a regressão dos direitos sociais faz com que os diferentes processos de envelhecimento ocorram em uma sociedade de consumo e individualista, que gera insegurança e maior desigualdade social.

O comprometimento do(a) Assistente Social na defesa intransigente dos direitos humanos dentro dessa temática, requer aproximação do debate por meio da formação continuada, fomentando discussões entre os sujeitos de diferentes faixas etárias, visando conscientizar sobre os direitos dos idosos e no enfrentamento ao preconceito sofrido por esse grupo social, o que contribui na inserção dos idosos em um processo saudável e ativo de envelhecimento, fortalecendo então a participação popular em debates e decisões das ações do Estado para a realização de ações que atendam os interesses do idoso (FRANÇA; FERREIRA, 2020; TORRES, 2020). Desse modo, o(a) profissional de Serviço Social deve realizar a sua intervenção de forma crítica e reflexiva, em conjunto com as dimensões teórica-metodológica, técnico-operativa e ético-política, corroborando o compromisso com o Código de Ética da Profissão (1993), a fim de articular estratégias dentro da categoria com as suas entidades representativas, juntos a outras categorias profissionais, conselhos, associações, e outras organizações que tenham o interesse em somar a luta sobre os direitos da população idosa no país, para a criação e execução de políticas públicas efetivas, e contribuir com a superação do tema como problema social e fortalecendo a perspectiva do envelhecimento como conquista para a sociedade.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pôde-se identificar, durante a construção desta pesquisa, os avanços no que diz respeito ao envelhecimento e o processo de luta e conquistas obtidas para os idosos no Brasil, mas principalmente desafios decorrentes da insuficiência de políticas públicas. Logo, podendo a princípio concluir que existem instituições em Belém do Pará, que trabalham com acolhimento, com incentivo e até mesmo empoderamento dos idosos, mas que infelizmente estas políticas sociais já existentes, por si só, não são suficientes para combater as diversas problemáticas que envolvem a existência de pessoas idosas na sociedade. No Brasil, esse processo já não é algo muito novo, há décadas é registrado o aumento populacional de pessoas acima de 60 anos de idade – e com isso a pirâmide etária brasileira vai passando por transformações e novas configurações. As mudanças ocorridas na demografia e posteriormente na pirâmide etária requer uma maior atenção do Estado, mas também o fortalecimento das lutas por direitos da pessoa idosa frente a um estado neoliberal, que muitas vezes deixa de lado a garantia de direitos fundamentais a este público, decorrente do financiamento precário de políticas públicas voltadas para a população idosa.

Diante do contexto político brasileiro no qual os idosos estão inseridos e no que diz respeito às ILPI's identificadas em Belém, e percebendo que estas são instituições de grande importância para a garantia do processo de envelhecimento digno da população, dando ênfase à pessoa idosa em vulnerabilidade social, instituições como estas consistem em importantes espaços que devem ser financiadas pelo Estado, em vista de garantir direitos a este segmento populacional conforme prevê o Estatuto do Idoso.

Portanto, o Serviço Social não está aquém destas demandas, no entanto, infelizmente esta profissão não atua individualmente, descolada de outros sujeitos da sociedade, mas é capacitado ao fortalecimento de movimentos sociais, ou seja, nesse processo cabe aos profissionais realizarem o trabalho de incentivo e emancipação em conjunto aos idosos de forma em que eles, protagonistas no que tange o envelhecimento e suas derivações, estejam na linha de frente desta luta. Mas, para além disso, sejam profissionais capazes de empenhar-se na viabilização dos direitos sociais, através dos programas e políticas sociais conforme prevê o código de ética do/a Assistente Social.

REFERÊNCIAS

ANVISA. **Resultados a partir da autodeclaração das Instituições de Longa Permanência para Idosos no enfrentamento da COVID-19**. 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/publicacoes/relatorio-autoavaliacao-da->

estrutura-e-condicoes-sanitarias-para-a-prevencao-e-controle-da-covid-19-em-ilpi-2-002.pdf. Acesso em: 10 set. 2021.

BORN, Tomiko. Quem vai cuidar de mim quando eu ficar velha? Considerações sobre a família, asilo, (im)previdência social e outras coisas mais. **Revista Kairós – gerontologia**, v. 4, n. 2, p. 135-148, 2001.

BRASIL. **Lei nº 8.662, de junho de 1993 de Regulamentação da Profissão. Código de Ética do/a Assistente Social** – 10ª. ed. rev. e atual. - [Brasília]: Conselho Federal de Serviço Social, 2012. Disponível em: http://cfess.org.br/arquivos/CEP_CFESS-SITE.pdf. Acesso em: 01 set. 2021.

_____. **Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994**. Dispõe sobre a política nacional do idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências. Brasília, 1994. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8842.htm. Acesso em: 28 ago. 2021.

_____. **Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003**. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Brasília, 2003. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.741.htm. Acesso em: 30 ago. 2021.

CAMARANO, Ana Amélia; KANSO, Solange. As instituições de longa permanência para idosos no Brasil. **Revista Brasileira de Estudos de População**. Rio de Janeiro, v. 27, n. 1, p. 233-235 jan./jun. 2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbepop/v27n1/14.pdf>. Acesso em 01 set. 2021.

_____, Ana Amélia, BARBOSA, Pamela. Instituições de longa permanência para idosos no Brasil: do que se está falando? In: ALCÂNTARA et al (Orgs.). **Política Nacional do Idoso: velhas e novas questões**. IPEA, 2016. Disponível em: <http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/9146>. Acesso em: 05 set. 2021.

Empresas de Instituições de Longa Permanência Para Idosos (Q-8711-5/02) em Belém, PA. Disponível em: <https://www.econodata.com.br/consulta-cnae/Q8711502-INSTITUICOES-DE-LONGA-PERMANENCIA-PARA-IDOSOS/PARA/BELEM>. Acesso em: 14 set. 2021.

FRANÇA, Rosilene Marques Sobrinho de; FERREIRA, Maria D'Alva Macedo. Envelhecimento, serviços socioassistenciais e serviço social em tempos de regressão dos direitos. In: TEIXEIRA, Solange Maria (org.). **Serviço Social e envelhecimento**. Teresina: EDUFPI, 2020, p. 249-275. Disponível em: https://www.ufpi.br/arquivos_download/arquivos/Livro_SERVI%C3%87O_SOCIAL_E_ENVELHECIMENTO_E-BOOK-120201020195516.pdf. Acesso em: 01 set. 2021.

NOVAES, R. H. L. **Os asilos de idosos no Estado do Rio de Janeiro – repercussões da (não) integralidade no cuidado e na atenção à saúde dos idosos**. 2003. Dissertação (Mestrado) – Instituto de Medicina Social, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2003.

PEIXOTO, Clarice. Entre o estigma e a compaixão e os termos classificatórios: velho, velhote, idosos, terceira idade. In: BARROS, Myriam Moraes Lins de (Org.). **Velhice ou terceira idade?** Rio de Janeiro: FGV, 1998.

SILVA, Luna Rodrigues Freitas. Da velhice à terceira idade: o percurso histórico das identidades atreladas ao processo de envelhecimento. **História, Ciências, Saúde-Manguinhos** [online]. v. 15, n. 1, p.155-168, jan.-mar. 2008. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/hcsm/a/kM6LLdqGLtgqpggJT5hQRCy/?lang=pt#>. Acesso em: 01 set 2021.

TORRES, Mabel Mascarenhas. O trabalho do Assistente Social com pessoas idosas: competências e demandas em debate. In: TEIXEIRA, Solange Maria (org.). **Serviço Social e envelhecimento**. Teresina: EDUFPI, 2020, p. 46-73. Disponível em: https://www.ufpi.br/arquivos_download/arquivos/Livro_SERVI%C3%87O_SOCIAL_E_ENVELHECIMENTO_E-BOOK-120201020195516.pdf. Acesso em: 01 set. 2021.

CAPÍTULO 77

PREVALÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DO DIQUE DE BORRACHA EM PROCEDIMENTO ENDODÔNTICO: REVISÃO INTEGRATIVA

DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c77

Zildenilson da Silva Sousa¹, Gilmara Régia da Rocha Lessa Rodrigues², Jamerson Rodrigues de Sousa³, José Auberlanio Lima Rodrigues⁴, Luiza Alana Lopes de Sousa Sampaio⁵, Ana Clara Araújo Fernandes⁶, Claudia Santos de Araújo⁷, Isabela Leal de Moura⁸, Maria da Conceição Freitas da Costa⁹, Maria Galba das Neves¹⁰

¹Centro Universitário Maurício de Nassau Fortaleza, (zildenilsonsilva@gmail.com)

²Centro Universitário Maurício de Nassau Fortaleza, (gilmararegia.gl@gmail.com)

³Faculdade de Ensino e Cultura do Ceará, (jamersonr13@gmail.com)

⁴Faculdade de Ensino e Cultura do Ceará, (auberlanio@hotmail.com)

⁵Centro Universitário Maurício de Nassau Fortaleza, (luiza.alana1906@gmail.com)

⁶Centro Universitário Maurício de Nassau Fortaleza, (clara.a.fernandes@hotmail.com)

⁷Centro Universitário Maurício de Nassau Fortaleza, (claudiasaraujo77@hotmail.com)

⁸Centro Universitário Maurício de Nassau Fortaleza, (isabelaleal1312@gmail.com)

⁹Centro Universitário Maurício de Nassau Fortaleza, (mariafreitas851@gmail.com)

¹⁰Centro Universitário Maurício de Nassau Fortaleza, (palomagalba395@gmail.com)

RESUMO

Objetivo: Descrever, por meio de uma revisão integrativa de literatura, a prevalência do uso da barragem de borracha por cirurgiões-dentistas em procedimentos endodônticos. **Método:** Os descritores “*dentistry*”, “*rubber dams*”, “*root canal therapy*” e “*endodontic treatment*” foram aplicados no Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica (MEDLINE) através da PubMed, além da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Science Direct e posteriormente interligados entre si através dos operadores booleanos “AND/OR” em um período de 10 anos (2011 a 2021). Encontrou-se um total de 522 estudos que após leitura apenas 10 foram incluídos nesta revisão através dos critérios de elegibilidade adotados. **Resultados:** Observou-se que essa etapa de preparo no tratamento endodôntico é ignorada em alguns países devido ao ambiente de trabalho, preferência dos pacientes, além da redução do tempo clínico, principalmente por cirurgiões-dentistas clínicos gerais. **Considerações Finais:** É fundamental mais estudos neste campo visto a escassez de dados na literatura, para que assim seja possível fornecer mais informações que promovam o uso deste material por profissionais da odontologia, principalmente na endodontia.

Palavras-chave: Endodontia; Diques de Borracha; Assistência Odontológica.

Área Temática: Ciências da Saúde.

E-mail do autor principal: zildenilsonsilva@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

O dique de borracha ou barragem de borracha é um material que tem sido utilizado no atendimento odontológico durante muitos anos. Seu uso é bem descrito em muitos livros didáticos neste campo da ciências da saúde. (ANABTAWI *et al.*, 2013). Esse tipo de material possui diversas vantagens para diversos tipos de especialidades odontológicas visto seu contexto de biossegurança na saúde (CHIANG *et al.*, 2012).

Sua aplicabilidade consiste basicamente em isolar um determinado campo operatório de trabalho do restante da boca através de uma camada bem fina de borracha, com a finalidade de proteger pacientes de uma forma eficaz contra possíveis problemas secundários, como a deglutição de instrumentais. Além disso, facilita a lavagem do campo de trabalho, evitando assim a contaminação salivar daquela área, permitindo ainda a preparação de um campo de trabalho asséptico e de fácil visualização (MADARATI *et al.*, 2016)

Nos últimos anos, essa técnica vem ganhando cada vez mais reconhecimento por parte de dentistas, sendo considerada pelas autoridades em saúde como um procedimento importante para o controle de infecções na odontologia, principalmente durante o tratamento endodôntico (ZOU *et al.*, 2016). Diante disso, o cirurgião-dentista deve conhecer os tratamentos endodônticos mais adequados e como conduzi-los de maneira correta com base na utilização desta peça (FAYE *et al.*, 2017; MASLAMANI e MITRA, 2018).

Todavia, observa-se na literatura que alguns estudos realizados por meio de questionário que há uma frequência alternada do uso desse dique de borracha, o que sugere por pesquisadores que a realização de estudos em diferentes países pode demonstrar diferenças nas práticas e preferências entre os profissionais (MADARATI *et al.*, 2016).

Com base nisso, o conhecimento sobre as atitudes que os dentistas de modo geral possui sobre o uso de barragens de borracha e outros métodos de isolamento ainda precisam ser avaliadas visando entender melhor as causas e a prevalência de fatores que podem influenciar na utilização ou não deste material (GILBERT *et al.*, 2015).

Diante disso, o objetivo do presente estudo foi relatar, por meio de uma revisão integrativa da literatura, a prevalência do uso da barragem de borracha por cirurgiões-dentistas na prática clínica visando identificar os fatores que podem influenciar na adesão ou não do

material.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 BARRAGEM DE BORRACHA E SUA APLICABILIDADE CLÍNICA

A técnica de isolamento com dique de borracha é um metodologia utilizada na odontologia visando proteger o campo operatório do restante da boca, agindo como uma barreira protetora. De acordo com dados presentes na literatura científica, esse material pode proteger pacientes e dentistas de uma forma eficaz (ZOU *et al.*, 2016). Portanto, deve ser vigorosamente promovido e aplicado na prática clínica (JINGXIAN *et al.*, 2020).

É considerado o padrão ouro no que se refere ao controle de microorganismos na cavidade oral, uma vez que um grupo de pacientes avaliados em tratamento sem o uso de barragens de borracha seria uma prática antiética (AHMAD *et al.*, 2014). Além disso, o uso de rotina da barragem de borracha não deve exigir uma investigação científica para persuadir as atitudes de dentistas de modo geral sobre a necessidade fundamental desta ferramenta durante procedimentos odontológicos (GILBERT *et al.*, 2015; AHMAD *et al.*, 2014).

Estudos sugerem ainda que a prevalência do uso de barragens de borracha por dentistas em diferentes países tende a reduzir consideravelmente após a graduação, uma vez que a utilização do material nas faculdades de odontologia é uma prática obrigatória (ZOU *et al.*, 2016; AHMAD *et al.*, 2014). A causa mais comum pode ser descrita pelo fato de dentistas recém formados podem não estar familiarizados com a gestão lucrativa de um consultório particular, além de fato de estarem fora das regras estabelecidas no ambiente educacional (JINGXIAN *et al.*, 2020; AHMAD *et al.*, 2014).

2.2 ISOLAMENTO NA ENDODONTIA: EFICÁCIA NO CONTROLE DE MICROORGANISMOS

A utilização da barragem de borracha pode reduzir o potencial de deglutição de materiais ou objetos usados durante o tratamento de canal, bem como pedaços da estrutura do dentária ou tecido necrótico desalojado durante a preparação do acesso de canal (ANABTAWI *et al.*, 2013; CHIANG *et al.*, 2012).

Diversas técnicas de isolamento podem ser aplicadas na odontologia visando obter um campo operatório estéril. Uma das possíveis explicações possíveis para a baixa utilização de dique de borracha é que os dentistas podem utilizar de uma endodontia rotativa ao fazer o tratamento de canal radicular (ANABTAWI *et al.*, 2013). Esse método funciona com os arquivos fixados na própria peça de mão do profissional, apesar dessa circunstância diminuir a

probabilidade de um paciente aspirar ou ingerir uma lima, as outras razões para usar uma barragem de borracha não são evitadas (ANABTAWI *et al.*, 2013; AHMAD *et al.*, 2014).

Além da comunicação e do treinamento técnico para profissionais atuantes nesta área da odontologia, os benefícios do uso de barragens de borracha devem ser enfatizados e o uso rotineiro deve ser incentivado (JINGXIAN *et al.*, 2020), uma vez que a turbina de ar resulta na formação de aerossóis e gotículas que geralmente estão contaminadas com o sangue (AHMAD *et al.*, 2009).

3 MÉTODO

3.1 ESTRATÉGIA DE BUSCA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada entre os meses de julho e agosto de 2021. Para a sua idealização, seguiu-se os 6 passos descritores por Souza, Silva e Carvalho (2010): Elaboração da pergunta norte da pesquisa, busca na literatura de dados relacionados a temática, coleta de informações, análise minuciosa dos estudos selecionados após os critérios de elegibilidade adotados, discussão dos resultados obtidos através da busca literária e apresentação final da revisão.

Nesse sentido, para que fosse possível guiar a busca, realizou o seguinte questionamento: o isolamento absoluto em procedimentos endodônticos é comumente utilizado na prática clínica de cirurgões-dentistas?” Para a elaboração da pergunta norteadora da pesquisa, seguiu-se o acrônimo PICO: População = cirurgões-dentistas, “*dentistry*”; Intervenção = utilização do isolamento absoluto na endodontia, “*rubber dams*”, “*root canal therapy*”; Comparação/Controle = não utilizado; Desfecho do estudo= eficácia no sucesso do tratamento endodôntico, “*endodontic treatment*”.

Após definição, tais descritores cadastrados nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e *Medical Subject Headings* (MeSH) foram interligados através dos operadores booleanos AND/OR e aplicados na base de dados do Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica (MEDLINE) através da PubMed, além da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Science Direct, sendo encontrados posteriormente um total de 522 estudos publicados em um período de 10 anos (2011 a 2021) que após análise dos critérios de elegibilidade adotados foram selecionados apenas 10 artigos, conforme evidenciado na Figura 1.

3.2 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

Foram incluídos nesta revisão estudos com desenho de pesquisas transversais descritivos, estudos originais, estudos pilotos e revisões sistemática publicadas entre 2011 a

2021, sem distinção de idiomas e que avaliavam a prevalência e os fatores que poderiam estar ligados a utilização ou não do dique de borracha em procedimentos endodônticos por cirurgiões-dentistas.

Foram removidos documentos editoriais, livros e capítulos de livro, estudos incompletos, estudos sem resumo na íntegra, duplicados, estudos indisponíveis, inferiores a 2011, anais de evento, teses e dissertações de mestrado e/ou doutorado, relatos de caso e experiência, trabalhos de conclusão de curso (TCC), estudos que tinham o objetivo de relatar a preferência dos pacientes pelo tratamento com ou sem o dique de borracha e estudos que não relacionavam diretamente a análise e prevalência do uso da barragem de borracha na endodontia por cirurgiões-dentistas na prática clínica, mas sim o seu uso na taxa de sobrevivência de dentes com canais radiculares tratados.

Figura 1. Fluxograma do processo metodológico da seleção dos estudos

Fonte: Autores, 2021.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dentre os achados na literatura, observa-se uma escassez de estudos a longo prazo e com amostras significativas relacionadas à temática em questão. Além disso, observou-se que outros métodos alternativos de isolamento são comumente utilizados por esses profissionais, como a utilização de rolos de algodão e compressas de gazes.

Em 09 estudos, a coleta de dados quantitativos e qualitativos foram através de

formulários eletrônicos. Assim, nota-se que o isolamento absoluto em procedimentos clínicos na odontologia é uma etapa fundamental visando proteger o paciente de diversos riscos químicos, biológicos e de deglutição de pequenos objetos comumente utilizados por cirurgiões-dentistas.

Contudo, 03 estudos relataram que há uma discrepância do uso desse material na prática clínica entre dentistas clínicos gerais e endodontistas. Dos artigos selecionados, 07 eram estudos transversais descritivos, 02 estudos piloto e 01 estudo de revisão. Visando obter um melhor entendimento dos principais achados na literatura, os dados dos 10 estudos selecionados foram destacados na Tabela 2.

Tabela 2. Principais achados na literatura dos estudos incluídos.

Autor/ano.	Desenho do estudo/País da pesquisa.	Amostragem (N)	Resultados obtidos.
THIESSEN <i>et al.</i> , 2020.	Estudo transversal descritivo. País: Suíça.	N=141.	86,5% dos dentistas relataram fazer uso rotineiro de barragem de borracha em tratamentos odontológicos.
FAYE <i>et al.</i> , 2017.	Estudo transversal descritivo. País: Burkina.	N=33.	9% dos dentistas não realizavam o uso de barragem de borracha em tratamentos endodônticos.
MADARATI <i>et al.</i> , 2016.	Estudo piloto. País: Arábia Saudita.	N=237.	O uso de dique de borracha não é comumente utilizado por dentistas na prática odontológica saudita.
GILBERT <i>et al.</i> , 2015.	Estudo piloto. País: Não especificado.	N=1490.	Os dentistas gerais apresentam variações substanciais nas atitudes sobre o uso de barragens de borracha.
AHMAD <i>et al.</i> , 2014.	Estudo de revisão. País: Não especificado.	18 estudos.	Há uma diferença significativa entre atitudes de dentistas gerais durante a graduação e o que praticam após ela.
ANABTAWI <i>et al.</i> , 2013.	Estudo transversal descritivo. País: Estados Unidos.	N=729.	Nem todos os dentistas usaram um dique de borracha durante o tratamento de canais radiculares.
GUPTA e RAI 2013.	Estudo transversal descritivo. País: Índia.	N=700.	Barragens de borracha eram utilizadas apenas por 27% dos dentistas da pesquisa.
KAPTAN <i>et al.</i> , 2012.	Estudo transversal descritivo. País: Turquia.	N=1400.	Quase 92% dos profissionais relataram que nunca usaram a barragem de borracha.

KAPITÁN e SUSTOVÁ, 2011.	Estudo transversal descritivo. País: República Tcheca.	N=449.	Frequência reduzida na utilização da barragem de borracha por dentistas atuantes na República Tcheca.
LIN <i>et al.</i> , 2011.	Estudo transversal descritivo. País: Taiwan.	N=1332.	A prevalência do uso de barragens de borracha para tratamento de canal por dentistas é relativamente baixa.

Fonte: Autores, 2021.

O uso do dique de borracha durante o tratamento do canal radicular é considerado o padrão de cuidado visto que aumenta a segurança do paciente e otimiza as chances de um tratamento bem-sucedido (GILBERT *et al.*, 2015; GUPTA e RAI, 2013). No entanto, nem todos os dentistas usam, o que gera uma desconexão entre o padrão de atendimento presumido e o que é realmente feito na prática clínica. Além disso, pouco se sabe sobre as atitudes dos dentistas em relação ao uso da barragem de borracha em seus consultórios (GILBERT *et al.*, 2015). Essa condição envolve muitos fatores e deve ser dada a devida atenção (ZOU *et al.*, 2016).

Os resultados mostram que embora a barragem de borracha seja o padrão de atendimento na prática endodôntica, há uma grande diferença entre o que os dentistas são ensinados nas faculdades de odontologia e o que eles praticam ao término dela (AHMAD *et al.*, 2014; KAPITAN e SUSTOVÁ, 2011). Existem poucas evidências científicas para apoiar a aplicação da barragem de borracha; contudo, as diretrizes de prática clínica indicam que é antiético considerar um estudo de coorte para provar o que já é universalmente aceito na prática odontológica (AHMAD *et al.*, 2014; KAPTAN *et al.*, 2012).

Sobre isso, no estudo de Madarati *et al.* (2016) a taxa de endodontistas que usaram barragem de borracha foi de 84,8%, o que foi significativamente maior que a de dentistas gerais sem especialidade na área (21,6%). Observou-se ainda através de seu estudo piloto que a maior proporção não utilizava a barragem de borracha por indisponibilidade do material no local de trabalho (40,5%), o que fez com que esses profissionais utilizassem meios de isolamento como rolos de algodão no local de tratamento para finalização do procedimento.

Similar aos resultados de Madarati *et al.* (2016), Lin *et al.* (2011) observaram que a prevalência do uso de barragens de borracha para tratamento de canal radicular por dentistas do sistema de Seguro Saúde Nacional em Taiwan também demonstrou-se reduzida, em termos estatísticos representou apenas 16,5% da amostra total coletada pelos autores. Com base nisso, para os autores, o isolamento com dique de borracha em um dente tratado endodonticamente pode fornecer melhor controle de infecção, além de aumentar a proteção do paciente e melhorar

a eficiência do tratamento. Apesar disso, ainda há uma necessidade de promover seu uso para cada caso de tratamento de canal radicular.

O estudo de Thiessen *et al.* (2020) difere de Madarati. (2016) e Lin *et al.* (2011) em termos de aplicabilidade clínica do material. Os autores observaram que a maioria dos dados coletados através de formulários demonstrou que os profissionais realizam cotidianamente o uso da barragem de borracha em procedimentos odontológicos. Apesar dos efeitos positivos, o estudo demonstra escassez de informações em áreas específicas da odontologia visto que não avaliou a aplicabilidade da ferramenta no tratamento endodôntico.

Além do uso de barragem de borracha, outras formas de isolamento também foram relatadas na literatura. Nessa perspectiva, no estudo de Anabtawi *et al.* (2013), dos 524 dentistas que realizaram tratamento de canal radicular e relataram a porcentagem de tempo em que usam uma barragem de borracha, 204 relataram pelo menos um outro tipo de isolamento, como a utilização de rolos de algodão. Neste estudo, observou-se ainda que o uso de dique de borracha foi universal entre os endodontistas quando levado em comparação a dentistas gerais.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com dados presentes na literatura avaliada, a prevalência no uso do isolamento com dique de borracha em procedimentos endodônticos por dentistas é variável, uma vez que o ambiente de trabalho pode ser modificado dependendo de fatores culturais e econômicos de cada país. Dentre as limitações desta revisão, observa-se nos estudos coletados amostras reduzidas, o que sugere novas abordagens na coleta de dados visando um número maior de profissionais participantes. Este estudo pode contribuir para fins informativos a cirurgiões-dentistas sobre a prevalência do uso deste material na endodontia para possíveis estudos na área, visando obter melhores medidas que promovam o seu uso na odontologia, para que assim possa reduzir riscos e promover um tratamento odontológico adequado ao paciente.

REFERÊNCIAS

AHMAD, I. A. Rubber dam usage for endodontic treatment: a review. **International Endodontic Journal**, [S.L.], v. 42, n. 11, p. 963-972, 2009.

AHMED, H. et al. Rubber dam application in endodontic practice: an update on critical educational and ethical dilemmas. **Australian Dental Journal**, [S.L.], v. 59, n. 4, p. 457-463, 2014.

ANABTAWI, M. F. et al. Rubber dam use during root canal treatment. **The Journal Of The**

American Dental Association, [S.L.], v. 144, n. 2, p. 179-186, 2013.

CHIANG, C.P et al. Low prevalence of rubber dam usage for root canal treatment in Taiwan. **Journal Of The Formosan Medical Association**, [S.L.], v. 111, n. 11, p. 660, 2012.

FAYE, B. et al. A Survey of Endodontic Practices among Dentists in Burkina Faso. **The Journal Of Contemporary Dental Practice**, [S.L.], v. 18, n. 8, p. 641-646, 2017.

GILBERT, G. H et al. Discordance between presumed standard of care and actual clinical practice: the example of rubber dam use during root canal treatment in the national dental practice-based research network. **Bmj Open**, [S.L.], v. 5, n. 12, p. 79-97, 2015.

GUPTA, R; RAI, R. The Adoption of New Endodontic Technology by Indian Dental Practitioners: a questionnaire survey. **Journal Of Clinical And Diagnostic Research**, [S.L.], v. 7, n. 11, p. 2610-2614, 2013.

JINGXIAN, F. et al. Application of Quality Control Circle in Promoting the Use of Rubber Dams in the Root Canal Treatment of Primary Teeth. **Biomed Research International**, [S.L.], v. 2020, p. 1-5, 2020.

KAPTAN, R. F. et al.. An Investigation of Current Endodontic Practice in Turkey. **The Scientific World Journal**, [S.L.], v. 2012, n.2, p. 1- 6, 2012.

KAPITÁN, M; SUSTOVÁ, Z. The use of rubber dam among Czech dental practitioners. **Acta Medica (Hradec Kralove)**, v.54, n. 4, p.144-148, 2011.

LIN, P. Y. et al. The Effect of Rubber Dam Usage on the Survival Rate of Teeth Receiving Initial Root Canal Treatment: a nationwide population-based study. **Journal Of Endodontics**, [S.L.], v. 40, n. 11, p. 1733-1737, 2014.

LIN, H.C. et al. Use of Rubber Dams During Root Canal Treatment in Taiwan. **Journal Of The Formosan Medical Association**, [S.L.], v. 110, n. 6, p. 397-400, 2011.

MASLAMANI, M; MITRA, A. Factors associated with patients' satisfaction of rubber dam use during root canal treatment. **Indian Journal Of Dental Research**, [S.L.], v. 29, n. 2, p. 144-149, 2018.

MADARATI, A. A. Why dentists don't use rubber dam during endodontics and how to promote its usage? **Bmc Oral Health**, [S.L.], v. 16, n. 1, p. 16-24, 2016.

MADARATI, A. et al. Dental-Dam for Infection Control and Patient Safety during Clinical Endodontic Treatment: preferences of dental patients. **International Journal Of Environmental Research And Public Health**, [S.L.], v. 15, n. 9, 2012.

SOUZA, M. T; SILVA, M. D; CARVALHO, R. Revisão integrativa: o que é e como fazer. **Einstein (São Paulo)**, São Paulo, v. 8, n. 1, p. 102-106, 2010.

THIESSEN, M. et al. What happened to our former students five to six years after graduation? An endodontic teacher's perspective. **Swiss Dental Journal**, v. 7, n.8, p. 584-591, 2020.

ZOU, H. et al. An overview on rubber dam application in dental treatments. **Yiigle**, [S.L.], v. 51, n. 2, p. 119-123, 2016.

CAPÍTULO 78

PRINCIPAIS TRAÇOS CLÍNICOS DA SÍNDROME DE STURGE-WEBER: UMA REVISÃO DE LITERATURA

DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c78

Samara Dantas de Medeiros Diniz¹, Maria Eduarda Lopes de Macedo Bezerra², Nayara Costa da Silva³, Andrezza Eduarda Borba Gomes⁴, Ludmilla Rafaela Marinho da Silva⁵, Rafaela de Jesus Portugal⁶, Francisco Lucas Leandro de Souza⁷, Victor Gutemberg Mendez Ferraz⁸, Lais Nicolly Ribeiro da Silva⁹, Heloiza Talita Adriano da Silva¹⁰

¹ Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte, samaradantas1998@hotmail.com

² Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte, eduardalopes022@gmail.com

³ Centro Universitário São Miguel, c.nayara1@gmail.com

⁴ Centro Universitário São Miguel, andrezaeborba@gmail.com

⁵ Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, ludmillarafaela30@gmail.com

⁶ Universidade Salvador, rafaelaenfermagem2@gmail.com

⁷ Centro Universitário Maurício de Nassau, lucasleandro2912@gmail.com

⁸ Universidade Estadual de Montes Claros, gutemvictor@gmail.com

⁹ Universidade Federal de Alagoas, laisnicollyribeiro@gmail.com

¹⁰ Universidade Federal do Rio Grande do Norte, htalitaadriano@gmail.com

RESUMO

Objetivo: O presente estudo objetiva identificar na literatura científica as principais características clínicas da Síndrome de Sturge-Weber (SSW). **Método:** Trata-se de um estudo descritivo expandido, executado a partir de revisões bibliográficas. A coleta de dados foi realizada na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Para a busca foram empregues os descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Condições Patológicas” AND “Sinais e Sintomas” AND “Síndrome de Sturge-Weber”. A seleção foi executada a partir do recorte temporal de 2006 a 2021, mediante o protocolo de busca elaborado previamente e a leitura minuciosa dos artigos gratuitos em português, espanhol e inglês. Obteve-se 25 artigos dos quais 17 atenderam aos critérios de inclusão. **Resultados:** Consequente às análises, evidenciou-se que a síndrome em pauta possui características peculiares e específicas, das quais são fundamentais no diagnóstico precoce da patologia, a

qual atinge ambos os sexos e qualquer grupo étnico. Retifica-se que síndrome é causada por uma malformação capilar e venosa, resultando em multações somáticos e em tecidos ectodérmicos fetais. Essas falhas provocam modificações anômálicas no cérebro, ocasionando alterações neurológicas em geral, transformações na motricidade orofacial, entre outros inúmeros aspectos únicos. Não existe tratamento para os achados médico-biológicos, entretanto, enfoca-se no tratamento aliviador dos sinais e sintomas. **Conclusões:** Logo, faz-se preciso estudos inéditos, objetivando descobrir novas questões sobre os traços da SSW. Igualmente, é imprescindível a implantação de capacitações nas unidades de saúde, intruindo os trabalhadores a aprofundar-se nos conceitos fisiopatológicos e promover uma assistência segura e de qualidade aos pacientes com Síndrome de Sturge-Weber.

Palavras-chave: Condições Patológicas; Sinais e Sintomas; Síndrome de Sturge-Weber.

Área Temática: Ciências da Saúde.

E-mail do autor principal: samaradantas1998@hotmail.com

1 INTRODUÇÃO

A Síndrome de Sturge-Weber (SSW) ou Angiomatose Encéfalo-Trigeminal, refere-se a uma doença congênita rara causada por uma desordem neurocutânea, caracterizada por angiomias leptomeníngeo, glaucoma e várias complicações, especificamente nos ramos oftálmico (V1) e maxilar (V2) do nervo trigêmio. Estando na proporção de 1/50.000 nascimentos, as manifestações clínicas são peculiares, tendo como principal a marca facial em “vinho do porto”, encontrada em variados tamanhos.

Além das características supracitadas, também encontram-se alterações no sistema nervoso central, acarretando evidências neurológicas como as convulsões – as quais se manifestam geralmente, nos primeiros meses de vida – e retardo mental. Quanto ao glaucoma, surge no nascimento ou eclodir posteriormente. O diagnóstico é dado pelo exame físico e estabelecido pelo nevo característico da síndrome. Ademais, apesar de raramente acontecer sem a presença da mancha vinho do porto, é imprescindível a realização de exames complementares, como a Tomografia Computadorizada (TC) e Ressonância Magnética (RM).

Torna-se notório que contemporaneamente, esta etiopatogenia é estritamente conhecida. Por isso, almejando elucidar os principais traços médico-biológico e proporcionar conhecimento sobre a enfermidade, esta pesquisa planeia identificar na literatura científica as principais características clínicas da Síndrome de Sturge-Weber e ressaltar a importância do reconhecimento precoce. Para tanto, é enleçada na pergunta de pesquisa: Quais os principais

aspectos clínicos da Síndrome de Sturge-Weber?

2 MÉTODO

Trata-se de um estudo descritivo expandido, executado a partir de revisões bibliográficas. A coleta de dados foi realizada nas consecutivas bases: Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Para a busca foram empregues os descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Condições Patológicas”, “Sinais e Sintomas”, “Síndrome de Sturge-Weber”, utilizando-se para o cruzamento o operador Booleano "AND".

A seleção foi executada a partir do recorte temporal de 2006 a 2021, mediante o protocolo de busca elaborado previamente e a leitura minuciosa dos artigos, gratuitos em português, espanhol e inglês. Obteve-se 25 artigos dos quais 17 atenderam aos critérios estabelecidos de inclusão (idiomas conhecidos, estudos voltados à área em pauta, artigos completos) e exclusão (artigos duplicados, idiomas desconhecidos aos autores, ausência de temas coerentes ao tema escolhido).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Consequente às análises, explicitou-se que a Síndrome de Sturge-Weber possui características peculiares e específicas, das quais são fundamentais no reconhecimento e diagnóstico precoce da patologia. É considerada uma doença rara e esporádica, afetando ambos os sexos e todos os grupos étnicos, além de interligar-se diretamente a uma trajetória clínica indispensável.

Ao saber científico, a SSW significa uma malformação capilar e venosa, resultada de multiplicações somáticas em tecidos ectodérmicos fetais. Estas inexistências acometem o cérebro, face, olhos, cavidade oral e sistema respiratório. Como supramencionado, a cardinal marca sintomatológica é a Mancha em Vinho do Porto (Port-wine Stain – PWS), também titulada de nevus flammeus, associa-se à dilatação venosa cutânea facial, a qual pode ser encontrada em qualquer região corporal (Figura 1). O diagnóstico dar-se-á no nascimento, podendo correlacionar com manifestações neurológicas ao decorrer do seu amadurecimento fisiológico.

Figura 1. Recém-nascido com Síndrome de Sturge-Weber, apresentando a Mancha Vinho do Porto.

Fonte: Google Imagens, 2021.

Os achados sintomáticos neurológicos são comumente encontrados em pacientes com a síndrome de Weber. Dentre as principais evidências, estão as convulsões, cefaleia, glaucoma, hipertrofia de tecidos moles e acidentes vasculares encefálicos (AVE). Entretanto, os principais achados referem-se às convulsões e AVE (isquêmicos ou hemorrágicos). Regularmente, as convulsões ocorrem apenas de um lado do corpo, o qual usualmente é do lado oposto da marca de vinho do porto. Análises de tomografia computadorizada de crânio e de ressonância magnética nuclear ajudam na avaliação médica. Além disso, tranfigura-se inescusável o controle de crises epiléticas para uma evolução promissora. Todavia, apesar de existir o tratamento, alguns casos de pacientes jovens necessitam de intervenção cirúrgica, como em quadros clínicos unilaterais exclusivos com indagações epiléticas refratárias.

Na avaliação da motricidade orofacial, os pacientes apresentam deformações ósseas faciais, alterando movimentos, morfologia, entre outros fatores. Evidencia-se recorrentemente a síndrome de hiperplasia gengival, acarretando prejuízos nos lábios, palato, assoalho da boca e língua – notável no mesmo lado da marca de vinho do porto –, morfologia gengival e região maxilar. Alguns traços negativos foram visualizados na compreensão oral, atos comunicáveis verbais e não verbais.

O tratamento de tal patologia é feito a partir dos sinais e sintomas. Não existe medicamento específico para tratar esta doença. Corriqueiramente, são prescritos

medicamentos anticonvulsivantes e em casos de alteração na visão, indica-se medicamentos para tratamento do glaucoma. Em casos gravídicos, existe a possibilidade de intervenção cirúrgica, como a cirurgia para solucionar o glaucoma ou convulsões frequentes. Neste contexto, menciona-se o tratamento de clareando da marca de porto do vinho, o qual é executado a partir de terapias com laser, apesar de ainda está sendo estudado pelos cientistas.

Quanto à incidência da participação e conhecimento dos profissionais acerca da SSW, transfigura-se explícita a baixa sabedoria sobre os traços clínicos e o manejo assistencial dos pacientes. Este fator pode ser explicado pelo curto índice de casos diagnosticados patologicamente. Ademais, é perceptível a falta de interesse dos gestores públicos no investimento de capacitações aos trabalhadores de saúde, salientando sobre todos os aspectos clínicos e médico-biológicos desta síndrome.

4 CONCLUSÕES

Torna-se imprescindível, portanto, a implementação de novas estratégias de assistência aos pacientes acometidos pela Síndrome de Sturge-Weber. Como destacado anteriormente, os profissionais de saúde apresentam uma baixa sapiência sobre a fisiopatologia da SSW. Deste modo, faz-se necessária elaboração de licitações elencadas na oferta de capacitações aos indivíduos trabalhadores, instruindo-os sobre os achados sintomatológicos primordiais no diagnóstico, além de informá-los sobre a assistência adequada e direcionada ao cuidar do usuário com SSW.

Igualmente, ressalta-se a grande importância da Educação em Saúde nas Unidades primárias de Saúde, fomentando sobre esta síndrome. Outrossim, calcula-se essencial a construção de novas pesquisas científicas, visto que a pauta discutida é pouco explorada nas íntegras, assim, promovendo maior conhecimento aos profissionais de saúde e, amigos e familiares de pacientes acometidos pela Síndrome de Sturge-Weber, preparando-os para um manejo adequado e proporcionando bem-estar físico, mental e social.

REFERÊNCIAS

DE AZEVEDO, Simone Fátima et al. Síndrome de Sturge-Weber: A importância do cuidado integral na assistência ao adolescente portador. **Saúde Coletiva (Barueri)**, v. 10, n. 52, p. 2326-2337, 2020.

DE LYRA VASCONCELOS, Mariana et al. Síndrome de sturge-weber: relato de um caso raro. **Jornada Odontológica da Liga de Diagnóstico Oral e Maxilofacial**, v. 2, 2018.

DOS SANTOS SOUZA, Felipe et al. Achados radiológicos em síndrome de Sturge-Weber: relato de caso. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 2, p. 16015-16022, 2021.

DUARTE, Guichande Luis Liladar. **Síndrome de Sturge-Weber: caso clínico e revisão bibliográfica**. 2019. Tese de Doutorado (Doutorado em medicina) – Faculdade de Medicina, Universidade de Lisboa, 2019.

FARIAS, Luis Arthur Brasil Gadelha et al. Tromboembolismo pulmonar em paciente com síndrome de klippel-trenaunay-weber: relato de caso. **Revista de Patologia do Tocantins**, v. 5, n. 2, p. 55-57, 2018.

FORTUNA, Tila et al. Desafios do tratamento odontológico na síndrome de Surge-Weber: relato de caso. **Revista de Ciências Médicas e Biológicas**, v. 19, n. 4, p. 642-646, 2020.

HIGUEROS, E. et al. Síndrome de Sturge-Weber: revisión. **Actas Dermo-Sifiliográficas**, v. 108, n. 5, p. 407-417, 2017.

LAMAS-ÁVILA, Mireya; DÍAZ-ESTÉVEZ, Harasay; CREMÉ-LAMBERT, Limnet. Síndrome Sturge-Weber. Revisión de la literatura a propósito de un caso. **Revista Información Científica**, v. 99, n. 1, p. 89-101, 2020.

LONDOÑO, Grace Wilson; PIERRE, Joanny Jean; CALDERÓN, Marukyelys. Síndrome de sturge-weber: reporte de un caso. **Revista Médico Científica**, v. 31, p. 26-31, 2018.

MARINHO, Sandra Aparecida; CHERUBINI, Karen. Síndrome de Sturge-Weber. **Rev. odontol. Univ. Cid. Sao Paulo**, p. 167-173, 2006.

MOURA, Ludimila Lemes. **Odontomas múltiplos associados a Síndrome de Sturge-Weber: relato de caso e revisão sistemática da literatura**. 2018. 29 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Odontologia) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2018.

NETO, Francisco Xavier Palheta et al. Aspectos clínicos da síndrome de Sturge-Weber. **Arq. Int. Otorrinolaringol**, v. 12, n. 4, p. 565-570, 2008.

NORONHA, Victor Fernando Costa Macedo et al. Relação da mancha vinho-do-porto com a síndrome de Sturge-Weber: revisão integrativa. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, n. 42, p. e1859-e1859, 2020.

ROQUE QUEZADA, Juan Carlos Ezequiel et al. Síndrome de Sturge Weber, triada clásica desde un enfoque genético, molecular y fisiopatológico. **Revista de la Facultad de Medicina Humana**, v. 20, n. 3, p. 20, 2020.

SANTOS, Sara Virgínia Paiva; CAVALHEIRO, Laura Giotto. Síndrome de Sturge-Weber: relato de caso dos achados da avaliação fonoaudiológica. **Revista CEFAC**, v. 12, n. 1, p. 161-170, 2010.

SARTI, Marcela et al. Síndrome de Sturge-Weber (SSW) Experiencia en cuatro pacientes con episodios de déficit motor transitorio (DM). **Ludovica pediátr**, p. 8-13, 2019.

TOLEDO, D. O.; VAZ, G. R.; DEMARCHI, M.; MENDES, P. M.; CERIBELI, L. E. B. Síndrome de Sturge-Weber: relato de caso. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, n. 56, p. e3855, 13 ago. 2020.

CAPÍTULO 79

PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE FRENTE AO IMPACTO DAS QUEIMADURAS EM CRIANÇAS

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c79](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c79)

Tatiana Indiana da Silva¹, Ana Luiza Evangelista da Silva², Ellyan Victor Ferreira dos Santos³, Rosa Raquel Pinto Guedes Marques⁴, Ísis Passos Ferreira⁵, Emanuely Ferreira da Silva⁶, Matheus Emanuel Souza Araújo Vieira⁷, Maria Fernanda da Silva⁸, karolayne Carvalho da Silva⁹, Roberta Luciana do Nascimento Godone¹⁰

¹Acadêmica em Enfermagem do Centro Universitário Mauricio de Nassau/Caruaru-PE,
(tatianaindiana10@gmail.com)

²Acadêmica em Enfermagem do Centro Universitário Mauricio de Nassau/Caruaru-PE,
(luizaana10@hotmail.com)

³Acadêmico em Enfermagem do Centro Universitário Mauricio de Nassau/Caruaru-PE,
(ellyansantos12@gmail.com)

⁴Acadêmico em Odontologia da Universidade Federal Fluminense Campus de Nova Friburgo,
(rosa.raquel.marques@gmail.com)

⁵Acadêmica em Odontologia do Centro Universitário Fametro, Manaus-AM,
(isisfpassos@gmail.com)

⁶Acadêmica em Enfermagem do Centro Universitário Maurício de Nassau/Caruaru-PE,
(emanuely.f.ef@gmail.com)

⁷Acadêmico em Enfermagem do Centro Universitário Maurício de Nassau/Caruaru-PE,
(matheusvieira.7@outlook.com)

⁸Acadêmica em Fisioterapia do Centro Universitário Mauricio de Nassau/Caruaru-PE,
(fernanda16062001@gmail.com)

⁹Acadêmica em Enfermagem do Centro Universitário Maurício de Nassau/Caruaru-PE,
(Karol66carvalho@gmail.com)

¹⁰Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, PE. Phd em biologia Aplicada a saúde -
UFPE

(robertagodone@hotmail.com)

Resumo

Introdução: A queimadura na infância é um problema de saúde pública grave, que incide principalmente nos países em desenvolvimento, como o Brasil. A ocorrência de acidentes com crianças é um fator preocupante, por sua imaturidade física e cognitiva, portanto, elas possuem altas chances de cair e se machucarem, reforçando a supervisão dos responsáveis, para a sua proteção. **Objetivo:** Revisar a Literatura acerca da promoção e prevenção de saúde frente às queimaduras infantis. **Método:** Trata-se uma revisão bibliográfica, onde o levantamento foi realizado nas bases de dados da LILACS, Scielo e PubMed, por meio do operador booleano AND, sendo coletados artigos entre 2016 e 2020, utilizando os Descritores (DeSC): Educação em Saúde; prevenção de queimaduras; equipe multidisciplinar. **Resultados:** A educação em saúde no combate a acidentes por queimaduras é feita pelos enfermeiros durante as suas consultas e visitas domiciliares. As estratégias educacionais alcançam pais e cuidadores, resultando na conscientização dos mesmos e mudanças no ambiente a fim de torná-lo mais seguro. A equipe multidisciplinar também atua, trabalhando de forma conjunta, dividindo a atenção e cuidado ao paciente. Pode-se citar a exemplo, o trabalho da odontologia e fisioterapia no cenário de queimados, já que esses pacientes apresentam risco de desenvolvimento de problemas físicos, locomotores e dificuldade de se realizar a higiene bucal. O que mostra o tamanho da importância de orientação aos responsáveis e aos enfermeiros da saúde da criança, durante o período de internação. **Conclusão:** A prevenção das queimaduras em crianças é de responsabilidade dos adultos, sejam seus pais ou aqueles responsáveis pelos cuidados delas. Todos devem receber formação sobre prevenção de acidentes e, acima de tudo, das queimaduras. Essa formação deve ser destinada a evitar fatores de risco de queimaduras em crianças, levando em conta os diferentes ambientes em que estes ocorrem.

Palavras-chave: Educação em saúde; Equipe multidisciplinar; Prevenção de queimaduras.

Área Temática: Temas livres.

E-mail do autor principal: tatianaindiana10@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

A prática da educação em saúde é uma das atividades que requer grande atenção, por sua magnitude, por isso ela deve ser entendida como uma importante vertente à prevenção. Os acidentes na infância são diversos, elevando a necessidade de preveni-los, principalmente o que ocorrem por queimaduras. A Organização Mundial de Saúde (OMS) define como acidente “um acontecimento independente da vontade humana”, contudo, o padrão usual que o compreende como inevitável e imprevisível vem sendo transformado e uma nova concepção conceitua o acidente como um episódio previsível, capaz de gerar lesões ou até o óbito. (BATALHA *et al.*,

2016) Os acidentes domésticos na infância (ADI), embora subestimados, caracterizam-se como um relevante problema de saúde no mundo, devido à sua potencial gravidade (SILVA *et al.*, 2017).

Nesse sentido, ocorrência de ADI possui relação direta com o comportamento familiar e sociedade, estando relacionada aos hábitos de vida, condições educacionais, econômicas, sociais e culturais, associada à idade específica das crianças, somada à curiosidade e desejo de aprender (MOITA *et al.*, 2018). A queimadura na infância é um problema de saúde pública grave que incide principalmente nos países em desenvolvimento como o Brasil. A decorrência de acidentes com crianças é um fator preocupante, por sua imaturidade física e cognitiva elas possuem altas chances de cair e se machucarem, reforçando a supervisão dos responsáveis, para sua proteção.

2 MÉTODO

Este trabalho se trata de uma revisão bibliográfica, onde o levantamento foi realizado nas bases de dados da LILACS, Scielo e PubMed, através do operador booleano AND, sendo coletados artigos entre 2016 e 2021. Foi utilizado os Descritores (DeSC) e estratégia PPC (população, problema e controle), no qual corresponde: P:Crianças, P: Queimaduras, C: Promoção e educação. Com isso, foi formulada a pergunta norteadora: “Quais as evidências da literatura científica contextualizam a respeito da promoção em saúde frente ao impacto das queimaduras em crianças?”. Foram incluídos artigos completos, com aderência ao estudo, nos idiomas português e inglês. Foram excluídos artigos duplicados, anais de congressos, estudos sem aderência e fora dos anos estabelecidos e dos idiomas supracitados. Foram analisados 15 artigos completos e após análise criteriosa, foram selecionados 11 artigos que compuseram a amostra final.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A educação de saúde no combate a acidentes por queimaduras é feita na Atenção Primária pelos enfermeiros durante as consultas e visitas domiciliares. Isso é feito através de medidas educativas, como banners, simulações criativas, palestras, e diálogos com os pais, onde

através disso, eles poderão desenvolver papel muito importante na promoção de saúde. Uma das estratégias possíveis é modificar o ambiente de acordo com a idade da criança, sempre levantar hipóteses do que pode acontecer e assim, afastá-la dos locais mais perigosos, pois, quanto mais baixa a faixa etária da criança, mais chances de acidentes. As crianças menores de três anos são mais suscetíveis às queimaduras, e isso é explicado pela sua curiosidade natural, elas são impulsivas e não possuem discernimento para avaliar os perigos. O cuidado com a exposição ao sol também é imprescindível, pois as crianças ficam em áreas abertas de 16 a 60 minutos, um tempo suficiente para causar queimaduras solares (STANGANELLI *et al.*, 2020).

É necessário ter atenção aos objetos fora dos domicílios, que podem com o aquecimento do sol causar essas lesões, como o metal quente. Devido a isso, a área mais afetada são os pés, por frequentemente estarem descalças ou com sapatos inadequados. Além disso, é importante que a temperatura de brinquedos seja verificada antes de expor a criança e, assim, será possível ser evitada lesões. Como também, limitar a exposição ao sol entre o horário de dez da manhã a dezesseis horas da tarde, reduzindo o risco de ocorrências solares. Podendo ocasionar lesões de grau 1, menos avançado, até o grau 3, onde compromete boa parte do tecido (CHOI *et al.*, 2019). (Tabela 1).

Tabela 1. Características acerca dos graus, a superfície e os agentes etiológicos de queimaduras em crianças internadas no Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, Ananindeua, Pará.

Características	n	%
Grau da queimadura		
1º Grau	34	9,69
2º Grau	285	81,20
3º Grau	32	9,12
Superfície Corporal Queimada		
Pequeno queimado	141	46,38
Médio queimado	106	34,87
Grande queimado	57	18,75
Agente etiológico		
Escaldadura	152	50
Substância inflamável	44	14,50
Contato	89	3,30
Radiação solar	10	1,62
Eletricidade	5	29,3

Fonte: Tabela adaptada da Revista Brasileira de Queimaduras, 2015.

<http://www.rbqueimaduras.com.br/details/265/pt-BR/caracterizacao-das-criancas-vitimas-de-queimaduras-em-hospital-de-referencia-na-regiao-amazonica>

Portanto, há necessidade de novas campanhas para se evitar queimaduras na infância, como também se faz necessário que os pediatras, nos postos de saúde e consultórios, façam um pequeno alerta aos pais das maneiras habituais de prevenção aos acidentes domésticos, visto que, estatisticamente, a maior incidência de acidentes ocorre em ambiente domiciliar. Estudos relatam que boa parte das vítimas, é a população infantil.

Figura 1. Faixa etária de pacientes queimados atendidos no período de 2013 a 2018 no hospital infantil da Serra Catarinense, 2019.

Fonte: Figura adaptada da Revista Brasileira de Queimaduras
< <http://www.rbqueimaduras.com.br/details/467/pt-BR/perfil-epidemiologico-das-criancas-vitimas-de-queimaduras-em-um-hospital-infantil-da-serra-catarinense> <

O grupo infantil é o mais atingido por queimaduras, e o profissional da enfermagem é o mais capacitado como mediador na Atenção Básica, por possuir grande aproximação e confiança da população. Assim, fica sob sua incumbência a orientação e educação aos pais sobre os acidentes domésticos na infância e formas de prevenção (PASSOS & SANTOS, 2016).

Fortalecer os conhecimentos junto aos pais e familiares, sobre a magnitude da prevenção dos Acidentes doméstico na infância (ADI) é de fundamental importância. Sobretudo, expor apenas as formas de prevenções de determinados agentes causadores de acidentes não são o suficiente, é necessário compreender a família como um todo; condições socioeconômicas, demográficas e culturais, condições de moradia e familiares impactam direta ou indiretamente na prevenção dos ADI. Diante do conhecimento desses fatores, é possível desenvolver estratégias direcionadas, evidenciando os fatores de riscos, as medidas de segurança e finalmente, reduzir a incidência de ADI (LIMA *et al.*, 2019). Na Atenção Primária, desenvolver estratégias educacionais para o alcance de pais e cuidadores, pode resultar na conscientização dos mesmos e mudanças no ambiente a fim de torná-lo mais seguro (BRITO *et al.*, 2017). Esses profissionais devem estar em constante atualização dos conhecimentos, uma vez que dúvidas possam surgir (MARGOTTI *et al.*, 2018).

Ressalta-se que a presença de adultos na hora dos acidentes nem sempre é fator protetivo para a ocorrência deles. Por isso, é necessário que além das orientações de prevenção, a educação sobre como agir diante de determinadas situações façam parte do planejamento. O eficiente conhecimento de pais e cuidadores sobre primeiros socorros e a correta maneira de agir, podem resultar na redução de danos (SANCHES *et al.*, 2016).

A equipe multidisciplinar também faz parte da educação em saúde, trabalhando de forma conjunta, dividindo a atenção e cuidado ao paciente. Pode-se citar a exemplo, o trabalho da odontologia no cenário de queimados, já que esses pacientes apresentam risco de desenvolvimento de problemas dentários, como a cárie e a doença periodontal, devido à dificuldade de uma adequada higiene bucal. A fisioterapia, por sua vez, atua no tratamento dos pacientes queimados com objetivo de fazê-lo retornar as suas atividades cotidianas, melhorando sua qualidade de vida. Para isso, a reabilitação do paciente tem como foco: manutenção da força muscular e da Amplitude de Movimento (ADM), diminuição do risco de infecções, obtenção de deambulação independente, mínima formação de cicatrizes, prevenção de contraturas e deformidades, aumento da capacidade aeróbia e restauração da resistência cardiovascular. Por outro lado, por atender o público infantil, esses pacientes sentem-se expostos a pessoas fora de seu vínculo afetivo, em um espaço diferente do que é costumeiro. Precisando-se ter enquanto profissional, paciência, motivação e construção afetiva a fim de passar o máximo de segurança à criança. Porque, infelizmente, o tratamento fisioterapêutico é doloroso, e mostrar o quanto se importa com o pequeno(a), traz conforto também a família neste momento de preocupação,

além de considerar que esse trauma psicológico (queimaduras graves) é capaz de afetar o progresso do tratamento.

Diante do exposto, mostra-se o tamanho da importância de orientação aos responsáveis e aos enfermeiros da criança, durante o período de internação. Além disso, alternativas de tratamento e métodos de promoção de saúde bucal, devem ser estudados especificamente pela comunidade odontológica. Se torna indispensável a presença da equipe multiprofissional, para verificar as características da queimadura, bem como para decidir a melhor conduta terapêutica, objetivando o alívio do sofrimento do paciente durante os procedimentos indicados no tratamento. Tendo em vista a dimensão da queimadura, para o controle e alívio da dor são utilizados tratamentos farmacológicos e não farmacológicos (SCAPIN S *et al.*, 2017). A exemplo do recurso não farmacológico utiliza-se a realidade virtual (RV), classificada como analgesia distrativa, que faz uma simulação de um cenário real, por meio de uma interface indivíduo-máquina o paciente corresponde ao que é simulado por meio da potencial capacidade de interação e imersão produzidas, de forma que a atenção seja desviada do ambiente real para o ambiente virtual com a exposição de animações tridimensionais, em tempo real, promovendo assim, a interação e, conseqüentemente, distração durante o atendimento, sendo aplicada principalmente nas condutas que geram um estímulo maior à dor (CARICCHIO MBM, 2017; SCAPIN S *et al.*, 2017). Estudos relatam resultados favoráveis desse tratamento em pacientes queimados, resultando na diminuição da percepção de intensidade dolorosa e ansiedade (FARIAS MB *et al.*, 2019). Com enfoque da neurociência moderna, para compreender as respostas cerebrais de crianças às situações por elas vivenciadas. Nesse âmbito, a RV é considerada um meio facilitador promissor de tratamento de várias afecções (CARICCHIO MBM, 2017).

4 CONCLUSÃO

A prevenção das queimaduras em crianças é responsabilidade dos adultos, sejam seus pais ou aqueles responsáveis pelos cuidados delas. Todos devem receber formação sobre prevenção de acidentes, como o das queimaduras. Percebeu-se durante o estudo, que o Enfermeiro está cotidianamente ligado ao papel educativo de promoção a saúde, mas que sem o apoio da equipe multiprofissional, essa missão torna-se algo não muito efetivo. Ressaltando a importância do trabalho conjunto, pois os pais precisam ser alertados quanto aos riscos, bem

como intervir de maneira adequada. A elaboração de cartilhas, manuais e palestras também conseguem atingir esse público-alvo. Portanto, o preparo desses profissionais durante a graduação e a contínua atualização de conhecimentos, quanto às medidas de educação e saúde, são capazes de aprimorar a sua atuação nesse contexto.

REFERÊNCIAS

Batalha, Sara *et al.* Acidentes em Crianças e Jovens, Que Contexto e Que Abordagem? Experiência de Nove Meses no Serviço de Urgência num Hospital de Nível II. **Acta Pediátrica Portuguesa**, 47, p. 7-30, 2016.

Brito, Mychelangela de Assis *et al.* Fatores de risco no ambiente doméstico para quedas em crianças menores de cinco anos. **Rev. Gaúcha Enferm**, v. 38, n. 3, 2017.

Caricchio, Milena Braga Maia. Tratar brincando: o lúdico como recurso da fisioterapia pediátrica no Brasil. **Revista Eletrônica Atualiza Saúde**, v. 6, n. 6, p. 43-57, 2017.

Farias, Marcela Barbosa de *et al.* A experiência da criança hospitalizada com a realidade virtual em procedimentos dolorosos. **Revista de Saúde Digital e Tecnologias Educacionais**, v. 4, n. 2, 2019.

Lima, E. P. M. *et al.* Identificação dos conhecimentos de mãos na prevenção de acidentes domésticos com crianças da primeira infância. **Enferm. Foco**, v. 9, n. 4, p. 77-80, 2018.

Margotti, Edficher; Costa, Pedro Paulo Silva da; Corrêa, Allyson Maycon Chaves. A importância da prevenção de acidentes na infância: Um relato de experiência. **Rev Enferm Atenção Saúde**, v. 7, n. 1, p. 200-208, 2018.

Moita, Carina Estrela; Andrade, Alícia Maria Silva; Campos, Rita Cristina Gonçalves. Educação em saúde para prevenção de acidentes domésticos na infância. **Revista de Trabalhos Acadêmicos**, v. 1, n. 5, 2017.

Passos, Daniele de Almeida; Santos, Walquiria Lene dos. O enfermeiro como educador para a prevenção dos principais acidentes ocorridos na primeira infância. **Revista de Divulgação Científica Sena Aires**, v. 5, n. 2, p. 124-35, 2016.

Sanches, Pedro Henrique Soubhia *et al.* Perfil epidemiológico de crianças atendidas em uma Unidade de Tratamento de Queimados no interior de São Paulo. **Rev Bras Queimaduras**, v. 15, n. 4, p. 246-250, 2016.

Scapin, Soliane *et al.* Realidade virtual no tratamento da dor em criança queimada: Relato de caso. **Rev Bras de Queimaduras**, v. 16, n. 1, p. 45-8, 2017.

Silva, Manalde Ferreira da *et al.* Determining factors of domestic accidents in early childhood. **J Hum Growth Dev**, v. 27, n. 1, p. 10-18, 2017.

CAPÍTULO 80

PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE NA ESCOLA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c80](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c80)

Antônio Lucas Farias da Silva¹, José de Ribamar Gomes da Silva Júnior², Bianca Gisele Lira Gonzaga Sobrinho³, Leonardo César Soares Maia⁴, Matheus Rodrigues Santos⁵, Diva Nina Melo Machado⁶, Lucília da Costa Silva⁷, Janiele Soares de Oliveira⁸, Emanuel Osvaldo de Sousa⁹, Geísa de Moraes Santana¹⁰.

¹Centro Universitário Unifacid, (lucas1992farias@gmail.com)

²Centro Universitário Unifacid, (ribamar.jr19@outlook.com)

³Centro Universitário Unifacid, (biancagonzagapi@gmail.com)

⁴Centro Universitário Unifacid, (Leo.583@hotmail.com)

⁵Centro Universitário Unifacid, (matheus.rodrigues.97.mr@gmail.com)

⁶Centro Universitário Unifacid, (fisioninamelo@gmail.com)

⁷Centro Universitário Santo Agostinho, (luciliafisio@outlook.com)

⁸Associação de Ensino Superior do Piauí-AESPI, (janysoares276@gmail.com)

⁹Pós: Fisioterapia Traumatológica UESPI, (emanfisio@hotmail.com)

¹⁰Universidade Estadual do Piauí, (geisasantana97@gmail.com)

Palavras-chave: Promoção da Saúde; Saúde Escolar; Saúde do Adolescente.

Área Temática: Ciências da Saúde.

E-mail do autor principal: lucas1992farias@gmail.com

RESUMO

Objetivo: Relatar a experiência de um projeto de extensão universitária na realização de oficinas de educação em saúde em uma escola municipal do interior de José de Freitas PI. **Metodologia:** Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência, realizado no período de Março a Agosto de 2018 na Escola Municipal Joaquim Euclides da Rocha,

localizada na comunidade Graciosa, interior da cidade de José de Freitas PI. O projeto foi composto por acadêmicos da área da saúde, os encontros ocorriam com periodicidade quinzenal com duração de 2 horas por encontro. Os encontros tinham a participação de crianças e adolescentes do ensino fundamental e médio. **Resultados:** A escola é espaço de grande relevância para promoção da saúde, principalmente quando exerce papel fundamental na formação do cidadão crítico, estimulando a autonomia, o exercício de direitos e deveres, o controle das condições de saúde e qualidade de vida, com opção por atitudes mais saudáveis. Os encontros eram feitos através de rodas de conversa, voltadas para um tema específico em cada dia, sempre tentando fazer de forma lúdica, no intuito de fazer com que as crianças tivessem interesse em participar das atividades propostas. **Conclusão:** Ações de educação em saúde permitem um espaço de troca entre o saber popular e o saber científico, além de permitir a construção de vínculo entre os profissionais de saúde e os usuários.

INTRODUÇÃO

O programa saúde na escola (PSE), foi instituído pelo Decreto Presidencial nº 6.286/2007 e caracteriza-se por ser uma política intersetorial que atende aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). O programa se propõe a ser um modelo de atenção à saúde com finalidade de contribuir para a formação integral dos escolares da rede básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde. As ações são planejadas pelas secretarias de saúde e de educação, como também, podem ser planejadas por demanda solicitada pelos diretores das escolas (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2011)

A escola, que tem como missão primordial desenvolver processos de ensino-aprendizagem, desempenha papel fundamental na formação e atuação das pessoas em todas as arenas da vida social. Juntamente com outros espaços sociais, ela cumpre papel decisivo na formação dos estudantes, na percepção e construção da cidadania e no acesso às políticas públicas. Desse modo, pode tornar-se locus para ações de promoção da saúde para crianças, adolescentes e jovens adultos (DEMARZO; AQUILANTE, 2008).

A adolescência é considerada um rito de passagem da fase infantil para a fase adulta. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Organização Pan Americana de Saúde (OPAS), a adolescência consiste entre o período de vida de 10 a 19 anos, etapa em que ocorre um complexo processo de aceleração do crescimento e desenvolvimento biopsicossocial e da personalidade (CONCEIÇÃO; MACEDO, 2013).

É notório que na fase da adolescência, muitos hábitos e atitudes comportamentais, sofrerão variações na idade adulta, tornando-se mais difíceis de serem contornados. Dessa

forma, é fundamental despertar no adolescente o desejo de se tornar agente ativo do seu autocuidado, valendo-se para isso de métodos de educação em saúde que direcionem à promoção da saúde, a prevenção de doenças e o autocuidado (VIERO *et al.*, 2015).

Segundo Martins *et al.* (2019), existe uma elevada resistência dos jovens a se aproximarem dos serviços de saúde, podendo estar atrelada ao despreparo dos profissionais desde o acolhimento, através de uma escuta desqualificada, descontinuidade da assistência e a não vinculação. No intuito de enfrentar e transformar essa realidade, faz-se necessários implementar estratégias educativas que alcancem os sujeitos. Sob essa ótica, a Promoção da saúde é compreendida como um instrumento eficaz no desenvolvimento da autonomia, contribuindo para melhoria das condições de vida. (BRASIL, 2006; TEIXEIRA *et al.*, 2014).

A promoção de saúde deve ocorrer de maneira eficaz e não impositiva, priorizando-se práticas que respeitem as diferenças dos envolvidos, fazendo da educação em saúde uma verdadeira ferramenta de empoderamento do indivíduo (SPERÂNDIO, A. M. *et al.*). Para crianças e adolescentes, a escola é o melhor local para a prática da educação em saúde, porque este espaço é adequado para promover ações educativas com o envolvimento de diferentes grupos sociais, onde se destaca a coparticipação dos escolares, dos pais, educadores e profissionais da saúde, que juntos têm uma maior chance de encontrar soluções para os mais diversos problemas (FERREIRA, I. R. *et al.*).

Portanto, os processos de educação em saúde na escola ajudam crianças e adolescentes a adquirirem um comportamento social voltado aos melhores métodos de prevenção aos problemas de saúde, como também, esclarecer a população no sentido de adotar um estilo de vida saudável (EBERHARDT, T. D. *et al.*). Neste contexto, os acadêmicos da área da saúde podem contribuir de forma positiva, exercendo além de suas obrigações dentro da Universidade, atuando no papel de educador, trabalhando com a realização de atividades que estimulem a saúde e a qualidade de vida por meio da educação.

Para que a atenção à saúde atinja seu objetivo, além do esforço dos profissionais de saúde, é de fundamental importância o interesse e participação dos educadores e diretores da escola em fazer chegar até o escolar as informações mínimas necessárias ao esclarecimento de atividades que garantem a promoção à saúde, assim como, as orientações para cuidados diários que o escolar pode fazer em casa, na escola e em sua vida cotidiana (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009).

O adolescente tem a característica de conviver em grupo para a busca da sua identidade e resposta a seus anseios. Geralmente se agrupa com jovens que possuem as mesmas qualidades, gostos e interesses (QUINTANA; ROSSI; VELHO, 2014). Partindo desse princípio, a maioria das atividades eram feitas em grupo, visando com que os adolescentes se sentissem mais a vontade para participar.

A partir da conjuntura anteriormente apresentada, o objetivo deste trabalho é relatar a experiência de um projeto de extensão universitária na realização de oficinas de educação em saúde em uma escola municipal do interior de José de Freitas PI.

METODOLOGIA

O relato de experiência, segundo o Instituto de Ciências da Vida, da Universidade Federal de Juiz de Fora [2017] é um texto que descreve precisamente uma dada experiência que possa contribuir de forma relevante para sua área de atuação. Segundo este instrutivo de elaboração de relatos de experiência [2017], ele apresenta as motivações ou metodologias para as ações tomadas na situação e as considerações/impressões que a vivência trouxe àquele (a) que a viveu.

Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência, realizado no período de Março a Agosto de 2018 na Escolar Municipal Joaquim Euclides da Rocha, localizada na comunidade Graciosa, interior da cidade de José de Freitas PI. O projeto teve apoio da Universidade Estadual do Piauí (UESPI). O projeto foi composto por acadêmicos da área da saúde, os encontros ocorriam com periodicidade quinzenal com duração de 2 horas por encontro, a escolha dessa escola justificou-se pela precariedade de acesso as informações sobre saúde e qualidade de vida.

Os encontros tinham a participação de crianças e adolescentes do ensino fundamental e médio. Enquanto ocorriam os encontros com as crianças, uma parte dos acadêmicos ficavam responsáveis por trazer temas sobre saúde para os funcionários, professores e os pais dos alunos que aguardavam no local. Ao término de todos os encontros foi disponibilizado pelo diretor da escola, lanche para todos os participantes do projeto.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No contexto situacional do espaço escolar, encontram-se diferentes sujeitos, com histórias e papéis sociais distintos – professores, alunos, merendeiras, porteiros, pais, mães,

avós, avôs, voluntários, entre outros –, que produzem modos de refletir e agir sobre si e sobre o mundo e que devem ser compreendidos pelas equipes de Saúde da Família em suas estratégias de cuidado.

A escola é espaço de grande relevância para promoção da saúde, principalmente quando exerce papel fundamental na formação do cidadão crítico, estimulando a autonomia, o exercício de direitos e deveres, o controle das condições de saúde e qualidade de vida, com opção por atitudes mais saudáveis. As iniciativas de promoção da saúde escolar constituem ações efetivas para a consecução dos objetivos citados, o que pode ser potencializado no Brasil pela participação ativa das equipes de Saúde da Família (DEMARZO; AQUILANTE, 2008), sempre em associação com as equipes de educação.

Os encontros eram feitos através de rodas de conversa, voltadas para um tema específico em cada dia, sempre tentando fazer de forma lúdica, no intuito de fazer com que as crianças tivessem interesse em participar das atividades propostas. Os adolescentes mostraram-se muito participativos, questionadores e interativos. Durante a roda de conversa percebeu-se muitas curiosidades e perguntas a respeito da sexualidade, das doenças sexualmente transmissíveis e relatos de alto índice de gravidez na adolescência na comunidade.

Percebeu-se também a falta de informação sobre os métodos contraceptivos e sobre as principais informações sobre o HIV, então foi proposto uma competição entre 04 grupos, onde era dito uma frase e os adolescentes julgavam se era verdade ou mito, depois discutia-se sobre o assunto.

A imagem 01 representa o primeiro encontro que teve como tema o que é saúde? As crianças foram divididas em grupos para que houvesse uma discussão sobre o tema e cada grupo fazia suas considerações sobre o tema, logo em seguida os acadêmicos complementavam com outras informações relevantes sobre saúde.

Imagem 01: Discussão em grupo sobre o que é saúde.

Fonte: Própria

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), entende-se como Educação em Saúde a combinação de ações e experiências de aprendizado planejado com o intuito de habilitar as pessoas a obterem conhecimento sobre fatores determinantes e comportamentos de saúde. São várias as modalidades de Educação em Saúde e todas evidenciam a mudança de hábitos, atitudes e comportamentos individuais e coletivos. Essas mudanças de comportamentos estão atreladas à aquisição de novos conhecimentos e à adoção de atitudes favoráveis à saúde.

Imagem 02: Importância da boa postura.

Fonte: Própria

Na imagem 02, os acadêmicos falaram sobre os benefícios da boa postura e sua importância para a saúde. Foi criado um mural com as posturas CORRETAS X ERRADAS, o mesmo ficou exposto na escola para que todos pudessem ter acesso às informações sobre uma boa postura. Ao todo ocorreram 12 encontros e todos eram voltados para atividades em grupo, sempre iniciando com discussões sobre o tema específico de cada dia. Os momentos de troca, sejam através de perguntas e repostas ou através de falas voluntárias, engrandeceram a roda, faziam com que cada participante se envolvesse com a atividade, estando e sentindo-se livre para expor suas ideias, conceitos e dúvidas.

Quadro 01: Temas abordados nos encontros.

SEXUALIDADE	Inicialmente, foi feita uma roda de conversa para para discussão sobre o tema, logo após, os acadêmicos sanaram todas as dúvidas das crianças e repassaram informações importantes sobre o tema.
DOENÇA SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (DST)	Os acadêmicos falaram sobre a importância da prevenção das DST's, como também, sobre suas causas e possíveis complicações da doença. Ao término do encontro foi feito um jogo de MITOS X VERDADES sobre o tema.
DROGAS	Ocorreu uma discussão em grupo sobre o tema, em seguida os acadêmicos fizeram um jogo de perguntas e respostas. Logo após, abordamos questões relacionadas aos tipos de drogas e trocamos experiências de falas e contatos com amigos usuários. Discutimos os conceitos de uso, abuso e dependência, bem como os efeitos das substâncias no organismo humano.

GRAVIDEZ	Inicialmente, os adolescentes foram divididos em grupos por sexo, para deixar as meninas mais à vontade para falarem sobre o tema, logo após, foram abordadas questões sobre formas de prevenção e a importância do pré-natal.
FAMÍLIA	Durante a roda de conversa, cada criança e adolescente puderam falar sobre sua família e foi percebido uma grande diversidade das mesmas. No final do encontro os acadêmicos falaram sobre a importância da família para o desenvolvimento e crescimento das pessoas.

Visando lograr a integralidade do enfoque da área da saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) propõe a utilização de técnicas e métodos participativos que ultrapassem a delimitação física da escola e envolvam pais, professores e comunidades. Metodologias dessa natureza devem permear todas as atividades desenvolvidas, tais como diagnóstico das necessidades de saúde da população escolar; desenvolvimento curricular de forma integrada; preparação de material didático; formação permanente de professores e funcionários; investigação, seguimento e avaliação das atividades desenvolvidas; e difusão de informações sobre os avanços e desafios encontrados (BRASIL, 2006a).

A roda de conversa é, portanto, muito importante no dia a dia da educação infantil, pois é um momento de partilha, aprendizagens, em que a criança aprende a conversar, pois a roda é para conversar e não apenas para ocupar tempo como afirmou a autora Bombassaro (2010). Desta forma os acadêmicos devem explorar esse momento, buscando trazer temáticas em que envolvam o grupo todo, para que haja uma participação ativa na roda.

CONCLUSÃO

Ações de educação em saúde permitem um espaço de troca entre o saber popular e o saber científico, além de permitir a construção de vínculo entre os profissionais de saúde e os usuários. Promovemos discussões e compartilhamos conhecimentos e experiências durante

toda a condução do projeto. A partir das rodas de conversas com os adolescentes aprendemos conhecimentos que se somaram e se multiplicaram a cada etapa concluída.

Dessa forma, foi possível observar que o projeto foi de grande valia para as crianças e adolescentes, assim como, para os acadêmicos envolvidos, que obtiveram um grande crescimento pessoal e profissional.

REFERÊNCIAS

BOMBASSARO, Maria Cláudia. A Roda na Educação Infantil: Aprendendo a Roda aprendendo a conversar. 2010. 96f. Dissertação (Mestrado) –Faculdade de Educação.

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

766

BRASIL. Ministério da Saúde; ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Escolas Promotoras de Saúde: experiências do Brasil. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2006a.

BRASIL, Ministério da Saúde. Portaria nº 687, de 30 de março de 2006. **Política Nacional de Promoção da Saúde**. Brasília, DF. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_promocao_saude.pdf. Acesso em: 04 maio 2019.

CONCEICAO, M. I. G.; MACEDO, E. O. S. Ações em grupo voltadas à promoção da saúde de adolescentes. **Rev. bras. Crescimento Desenvolv. Hum.**, São Paulo, v. 23, n. 2, p. 222-230, 2013. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-12822013000200016&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 02 maio 2019.

DEMARZO, M. M. P.; AQUILANTE, A. G. Saúde Escolar e Escolas Promotoras de Saúde. In: Programa de Atualização em Medicina de Família e Comunidade. Porto Alegre, RS: Artmed: Pan-Americana, 2008. v. 3, p. 49-76.

EBERHARDT, T. D, Reis LF. Programa Saúde na Escola – PSE: estruturado de acordo com os princípios do SUS?. Anais do 5º Seminário Nacional Estado e Políticas Sociais. As políticas sociais nas transições latinoamericanas no século XXI: tendências e desafios. Cascavel, Paraná; 9-12 out 2011. Cascavel (PR): Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE); 2011. p. 1-14.

FERREIRA IR, Vosgerau DS, Moysés SJ, Moysés ST. Normative measures of the Health in the School Program: content analysis associated with ATLAS TI software. *Ciênc Saúde Coletiva*. 2012 Dez;17(12):3385-98. DOI: <https://doi.org/10.1590/s1413-81232012001200023>

MARTINS, M. M. F. *et al.* Acesso aos serviços de atenção primária à saúde por adolescentes e jovens em um município do Estado da Bahia, Brasil. **Cad. Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 35, n. 1, 2019. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2019000105007&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 02 maio 2019.

Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde na escola. Cadernos de Atenção Básica, n. 24. Série B. Textos Básicos de Saúde. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2009.

Ministério da Educação (BR). Secretaria da Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. Manual da educação integral em jornada ampliada para obtenção de apoio financeiro por meio do programa dinheiro direto na escola–PDE/educação integral: no exercício de 2011. Brasília (DF): Ministério da Educação; 2011.

QUINTANA, A. M.; ROSSI, A. G.; VELHO, M. T. A. C. Adolescência, autonomia e pesquisa em seres humanos. *Rev. Bioét.*, Brasília, v. 22, n. 1, p.76-84, abr., 2014. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S198380422014000100009&lng=en&nrm=i so. Acesso em: 03 maio 2019.

SPERÂNDIO AM, Carvalho FFB, Nogueira J, Zancan L, Akerman M. 10 years of the National Health Promotion Policy: progress and challenges. *Ciênc Saúde Coletiva*. 2016 Jun;21(6):1681-2. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232015216.10862016>

VIERO, V. S. F. *et al.* Educação em saúde com adolescentes: Análise da aquisição de conhecimentos sobre temas de saúde. **Esc. Anna Nery**, v.19, n. 3, p. 484- 490, 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/ean/ v19n3/1414-8145-ean-19-03-0484.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2019.

CAPÍTULO 81

PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE NA SALA DE ESPERA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c81](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c81)

Antônio Lucas Farias da Silva¹, Maria Gabriela Moreira Alves², Leonardo César Soares Maia³, Matheus Rodrigues Santos⁴, Laércio Bruno Ferreira Martins⁵, Bárbara Leite da Silva⁶, Keylane kelle Pereira Mendes⁷, Diva Nina Melo Machado⁸, Zildenilson da Silva Sousa⁹, Emanuel Osvaldo de Sousa¹⁰, Geísa de Moraes Santana¹¹

¹ Centro Universitário Unifacid, (lucas1992farias@gmail.com)

² Cristo Faculdade do Piauí – CHRISFAPI (gabimorenf@gmail.com)

³ Centro Universitário Unifacid, (Leo.583@hotmail.com)

⁴ Centro Universitário Unifacid, (matheus.rodrigues.97.mr@gmail.com)

⁵ Universidade Estadual do Piauí, (laerciom42@gmail.com)

⁶ Universidade Estadual do Piauí, (babiileiteslv@gmail.com)

⁷ Centro Universitário Unifacid, (Keylanekelle@hotmail.com)

⁸ Centro Universitário Unifacid, (fisioninamelo@gmail.com)

⁹ Centro Universitário Maurício de Nassau, (zildenilsonsilva@gmail.com)

¹⁰ Centro Universitário Unifacid, (emanfisio@hotmail.com)

¹¹ Universidade Estadual do Piauí, (geisasantana97@gmail.com)

Resumo

Objetivo: O objetivo deste trabalho é relatar a experiência de um projeto de extensão universitária na realização de oficinas de educação em saúde na sala de espera de uma UBS do interior do Piauí. **Método:** Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência, realizado no período de janeiro a dezembro de 2017 na Unidade Básica de Saúde Hilda Veras, localizada na cidade de José de Freitas PI. O projeto teve apoio da Universidade Estadual do Piauí (UESPI) e do Conselho Regional de Fisioterapia. O projeto foi composto por acadêmicos da área da saúde e os encontros ocorriam com periodicidade quinzenal com duração de 1 hora por encontro, a escolha dessa unidade justificou-se pelo acesso facilitado para os acadêmicos. **Resultados:** Foram realizados 22 encontros na UBS. um ponto importante a se destacar foram às possibilidades produzidas pelas estratégias de acolhimento que propiciaram uma relação bem próxima entre usuários, seus familiares e as equipes durante as práticas. Verificamos que o acolhimento, com o tempo estava se tornando algo espontâneo

e não engessado ou tímido, como foram nos primeiros instantes. Isso foi possível evidenciar pelo fato de que algumas pessoas da comunidade já passavam a reconhecer os estudantes do projeto, e assim, procurá-los para informações, ajuda e até mesmo uma conversa, afim de saber o papel deles no local, o que foi bastante interessante. **Conclusão:** A partir das experiências no projeto de extensão foi possível promover reflexões sobre a importância do acolhimento nas Unidades Básicas de Saúde, como também sobre a importância da Educação em Saúde. Além de experiências enriquecedoras de trocas de saberes com os grupos, também foi possível aprender mais sobre as metodologias ativas e de acolhimento que as políticas públicas preconizam.

Palavras-chave: Promoção da Saúde; Sistema Único de Saúde; Unidade Básica de Saúde.

Área Temática: Ciências da Saúde

E-mail do autor principal: lucas1992farias@gmail.com

INTRODUÇÃO

A Atenção Básica (AB) configura o primeiro nível de atenção à saúde, englobando um conjunto de ações de saúde, nos âmbitos individual e coletivo, visando à promoção de saúde, prevenção de agravos, tratamento, reabilitação e recursos de manutenção à saúde. A proposta da AB é ser a porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde, por meio de Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Estratégia de Saúde da Família (ESF) (BRASIL, 2017).

As UBS surgiram na década de 1980 no contexto de sistematização dos serviços de saúde, com a finalidade de alcançar resolutividade nas questões referentes à saúde e melhor eficácia nos tratamentos. Por isso podem ser consideradas como uma das geradoras do Sistema Único de Saúde (SUS). O SUS, por sua vez, ampliou concepções sobre processos de saúde e de adoecimento, por considerar seus fatores condicionantes e determinantes, como alimentação, saneamento básico, moradia, meio ambiente, trabalho, renda e transporte (BRASIL, 2017).

A busca de um novo modelo assistencial centrado na Atenção Primária à Saúde (APS) decorre de um momento histórico social, em que o modelo tecnicista, hospitalocêntrico não atende mais à emergência das mudanças do mundo moderno e, conseqüentemente, às necessidades de saúde dos usuários. Nesse sentido, a Estratégia de Saúde da Família (ESF) se apresenta como um modelo de atenção dos serviços de saúde, tendo a família no centro de atenção, incorporando um novo olhar no processo de intervenção e buscando a implementação de ações preventivas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014).

A APS é o primeiro nível de assistência no sistema e tem como seus atributos essenciais o acesso de primeiro contato do indivíduo com o sistema de saúde, a continuidade e a integralidade da atenção e coordenação da atenção dentro do sistema. Além de outros três atributos derivados: a orientação familiar e comunitária e a competência cultural. A partir disso, tem-se uma perspectiva de APS acolhedora, resolutiva que avança na gestão e coordenação do cuidado do usuário na rede de atenção à saúde (RAS) (STARFIELD, 2002).

A Estratégia Saúde da Família (ESF) configura um modelo assistencial em que as práticas devem estar orientadas pelos determinantes do processo saúde-doença, considerando o indivíduo e o seu contexto familiar, social, econômico e cultural, bem como a realização das ações de vigilância em saúde e promoção da saúde. A ESF deve ser operacionalizada por equipes multiprofissionais, em Unidades Básicas de Saúde (UBS), em um território definido (FERTONANI *et al.*, 2015).

As UBS, por serem peças fundamentais da AB, integram a ESF como prioridade para sua organização, e é nessa articulação entre UBS e ESF que se obedece e trabalha em favor dos princípios do SUS. As UBS focam a atenção de uma população específica que está em um território definido. Assumem, portanto, a responsabilidade sanitária e o cuidado a essas pessoas, e trabalham considerando as particularidades existentes no território em que elas vivem (BRASIL, 2017).

A partir da conjuntura anteriormente apresentada, o objetivo deste trabalho é relatar a experiência de um projeto de extensão universitária na realização de oficinas de educação em saúde na sala de espera de uma UBS do interior do Piauí.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência, realizado no período de janeiro a dezembro de 2017 na Unidade Básica de Saúde Hilda Veras, localizada na cidade de José de Freitas PI. O projeto teve apoio da Universidade Estadual do Piauí (UESPI) e do Conselho Regional de Fisioterapia. O projeto foi composto por acadêmicos da área da saúde e os encontros ocorriam com periodicidade quinzenal com duração de 1 hora por encontro, a escolha dessa unidade justificou-se pelo acesso facilitado para os acadêmicos

O relato de experiência, segundo o Instituto de Ciências da Vida, da Universidade Federal de Juiz de Fora [2017] é um texto que descreve precisamente uma dada experiência

que possa contribuir de forma relevante para sua área de atuação. Segundo este instrutivo de elaboração de relatos de experiência [2017], ele apresenta as motivações ou metodologias para as ações tomadas na situação e as considerações/impressões que a vivência trouxe àquele (a) que a viveu.

Inicialmente, os acadêmicos explicavam o objetivo do projeto e os procedimentos a serem seguidos, logo após, o convite era feito aos usuários para participação das atividades. O público alvo era a população em geral, o tema de cada encontro era escolhido de acordo com o público específico de cada dia na UBS, pois cada dia da semana eram atendidas pessoas de diferentes faixa etária, além disso, existiam dias exclusivos para pacientes com comorbidades como, hipertensão e diabétes. Posteriormente, foi feito um levantamento de temas que os usuários gostariam que fossem abordados nos encontros.

Os encontros ocorriam durante a espera dos atendimentos das consultas médicas e odontológicas, as mesmas aconteciam de forma simultânea, fazendo com que tivesse uma grande aglomeração de pacientes, facilitando a participação de mais pessoas no projeto. Durante a ação, foram realizadas rodas de conversa em uma sala de espera reservada na unidade de saúde com intuito de dinamizar, instigar e facilitar o vínculo entre os acadêmicos da ação e participantes do projeto, para que o momento fosse de partilha e aprendizado para ambas as partes.

As Rodas de Conversa foram utilizadas como uma metodologia participativa com a população em geral atendidas na referida unidade, para tanto foram utilizadas metodologias ativas e participativas que estimulavam e valorizavam o contato e o saber dos atores envolvidos.

A roda de conversa era organizada em momentos, desde acolhimento, exposição dialogada, e interação com as participantes, com espaço para sugestões, dúvidas, relato de experiências e discussão coletiva.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Humanizar na atenção à saúde é levar em consideração as vivências e valores das pessoas de forma individualizada (RECH, 2003). A ação desenvolvida em sala de espera foi ao encontro da Política Nacional de Humanização do SUS, proporcionando ao usuário a troca e construção de saberes e uma escuta qualificada sobre questões da saúde. Além disso,

permitiu aos acadêmicos o contato com outros profissionais da rede e levou o aluno, juntamente com a equipe do centro de saúde, a refletir sobre as necessidades locais, viabilizando a elaboração e organização de ações de promoção de saúde voltadas para as necessidades e interesses da população em geral.

Para Gadotti (2017), as atividades de extensão universitária buscam aproximar diversos setores da sociedade da comunidade acadêmica, mediante ações inter-relacionadas realizadas em determinados territórios por meio de elaborações de estratégias de abordagem e de soluções de problemáticas sociais.

Foi possível aprender muitas coisas a respeito das realidades e como as equipes lidam com as prioridades, tendo como base o entendimento das distintas realidades e particularidades da vida cotidiana que envolve os indivíduos e suas famílias.

Um ponto importante a se destacar foram às possibilidades produzidas pelas estratégias de acolhimento que propiciaram uma relação bem próxima entre usuários, seus familiares e as equipes durante as práticas. Verificamos que o acolhimento, com o tempo estava se tornando algo espontâneo e não engessado ou tímido, como foram nos primeiros instantes. Isso foi possível evidenciar pelo fato de que algumas pessoas da comunidade já passavam a reconhecer os estudantes do projeto, e assim, procurá-los para informações, ajuda e até mesmo uma conversa, afim de saber o papel deles no local, o que foi bastante interessante.

A metodologia da problematização tenciona o modelo tecnocientífico, com seus processos de análise da realidade e de construção do conhecimento. Pode mesmo vir a reorientar o entendimento sobre adoecimento, pois garante maior visibilidade às questões sociais, culturais e psicológicas do indivíduo/paciente. Ademais facilita a ruptura de paradigmas em educação, possibilitando formar profissionais em Saúde com novos pensamentos (DARIUS, 2017)

O primeiro encontro foi apenas com os funcionários e profissionais da UBS, com intuito de fazer o reconhecimento do local, saber os horários dos atendimentos e a forma que ocorriam. A partir do segundo encontro foram elaboradas estratégias e temas específicos para o público alvo do dia.

Quadro 01: Temas e práticas desenvolvidas

O QUE É SAÚDE?	Foi feita a construção de cartazes sobre como ter uma boa saúde, assim como, ocorreu o compartilhamento de conhecimentos, sempre buscando trabalhar em grupo.
ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO (AVE)	Ocorreu uma roda de conversa para debater sobre o tema, como também, foi feito um jogo sobre Mitos e Verdades. Ao final do encontro foi entregue um panfleto com informações sobre AVE.
DIABETES	Houve discussão em grupo sobre o tema, realização de atividades físicas e sua importância para a saúde.
SAÚDE DO TRABALHADOR	Foi feita uma roda de conversa para discussão sobre o tema, logo após, também foi feito um jogo de perguntas e respostas para esclarecer as principais dúvidas.
HIPERTENSÃO	Iniciou-se com uma roda de conversa para discutir sobre o tema, foi feito um jogo de perguntas e respostas, ao final do encontro foi repassado as principais informações sobre o tema.

SÁUDE DA CRIANÇA	As crianças foram divididas em grupos e desafiadas a criar um cartaz com as principais informações sobre saúde, ao término do cartaz, todos os grupos fizeram a apresentação. Ao final do encontro os acadêmicos observaram pontos positivos de cada grupo e acrescentaram outras informações importantes sobre a saúde da criança.
SAÚDE DO IDOSO	Primeiramente, foi feita uma roda de conversa para discussão sobre o tema, ao final do encontro os acadêmicos abordaram sobre algumas temáticas que influenciam na qualidade de vida do idoso, como, alimentação, atividade física e a importância do sono.
BOA POSTURA	Inicialmente, os acadêmicos falaram sobre os benefícios da boa postura e sua importância para a saúde. Foi criado um mural com as posturas CORRETAS X ERRADAS, o mesmo ficou exposto na UBS para que todos pudessem ter acesso às informações sobre uma boa postura.

Fonte: (Autores, 2021)

O objetivo da Roda de Conversa é estimular a construção da autonomia dos sujeitos por meio da problematização, da troca de informações e da reflexão para a ação (MELO, CRUZ, 2014). A roda de conversa na gestão em saúde é uma forma de buscar construir espaços de partilha, confronto de ideias e entendimento baseado na liberdade de diálogo entre os participantes na intenção de se afirmar com uma alternativa importante para ampliar

o grau de corresponsabilidade das ações na produção de saúde (FARIAS, ROCHA, NEVES, 2008).

Após o término de todos os encontros foram distribuídos panfletos educativos, com intuito de fortalecer e concretizar os conhecimentos repassados pelos acadêmicos. Vale ressaltar que o formato de rodas de conversa, através da dialética, permite ao pesquisador se inserir como sujeito da pesquisa pela participação na conversa. O uso das metodologias ativas de ensino e aprendizagem promove a socialização dos atores envolvidos na aprendizagem, o compartilhamento de conhecimentos, a reflexão sobre os conteúdos teóricos e práticos, e acima de tudo, torna o processo educativo mais dinâmico e participativo (CARRARO et. al, 2011)

Projetos de extensão como esse, são uma excelente alternativa para melhorar a qualidade de vida das pessoas, além de permitir uma troca de conhecimentos entre a população e os acadêmicos, assim como, permitir que os acadêmicos tivessem o contato prévio com as principais necessidades da população de forma geral.

CONCLUSÃO

A partir das experiências no projeto de extensão foi possível promover reflexões sobre a importância do acolhimento nas Unidades Básicas de Saúde, como também sobre a importância da Educação em Saúde. Além de experiências enriquecedoras de trocas de saberes com os grupos, também foi possível aprender mais sobre as metodologias ativas e de acolhimento que as políticas públicas preconizam. Assim, a roda de conversa mostrou-se como uma ótima ferramenta que possibilita a troca de conhecimentos, de saberes populares, estimula a autonomia dos usuários em relação a sua saúde.

REFERÊNCIAS

BRASIL. (2017). *Ministério da Saúde: Portaria no 2.436, de 21 de setembro de 2017*. Brasília: Autor. 2017. Recuperado em 22 jun. 2018, de http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html [[Link](#) s]

CARRARO, T.E. et al. Socialização como processo dinâmico de aprendizagem na enfermagem. Uma proposta na metodologia ativa. **Investigación y Educación en Enfermería**, v. 29, n. 2, p.248-254, 2011.

DARIUS,R.P.P. et al. O uso da metodologia da problematização para o desenvolvimento de projeto integrador no curso de pedagogia. Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação, [S.l.], p. 983-1004, mar. 2017.

FARIAS, A. M.; ROCHA, A. A. A.S.; NEVES, N. A. Roda de conversa: contribuição da educação popular em saúde à gestão participativa do sus no município de Paudalho. Recife, 2008.

FERTONANI et al. Modelo assistencial em saúde: conceitos e desafios para a atenção básica brasileira. Ciênc. saúde coletiva, v. 20, n.6, 2015.

GADOTTI, M. Extensão universitária: para quê. São Paulo: Instituto Paulo Freire, 2017.

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA VIDA. Departamento de Nutrição. Instrutivo para Elaboração de Relato de Experiência. Estágio em Nutrição em Saúde Coletiva. Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF - Campus Governador Valadares, 2017.

MELO, M. C. H.; CRUZ, G. C. Roda de conversa: uma proposta metodológica para a construção de um espaço de diálogo no ensino médio. **Imagens da Educação**, v. 4, n. 2, p. 31-39, 2014.

Ministério da Saúde (BR), Secretaria de Assistência à Saúde, Coordenação de Saúde da Comunidade. Saúde da Família: uma estratégia para reorientação do modelo assistencial [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 1997 [acesso em 2014 Fev 19]. Disponível em: http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd09_16.pdf

Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Atenção à Saúde, Implantação das Redes de Atenção à Saúde e outras estratégias da SAS/Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Brasília: Ministério da Saúde; 2014.

RECH CMF. Humanização hospitalar: o que pensam os tomadores de decisão a respeito? [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo; 2003.

STARFIELD. Atenção primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e tecnologia. Brasília: Unesco; 2002.

CAPÍTULO 82

QUALIDADE DE VIDA DE MULHERES MASTECTOMIZADAS SUBMETIDAS À RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA IMEDIATA

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c82](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c82)

Nágila Silva Alves¹, **Geísa de Moraes Santana**², **Maria Bianca de Sousa Oliveira**³,
Rayane Oliveira Almeida⁴, **Bárbara Leite da Silva**⁵, **Rafaela Larissa Santos de Jesus**⁶,
Rosana Maria Nogueira Gonçalves Soares⁷, **Francisco Wagner dos Santos Sousa**⁸,
Evandro Raimundo Madeira Portela⁹, **Kaliny Vieira dos Santos Alves Pereira**¹⁰

¹ Centro Universitário Santo Agostinho (UNIFSA), nglarraial@gmail.com

² Universidade Estadual do Piauí (UESPI), geisasantana97@gmail.com

³ Universidade Estadual do Piauí (UESPI), mbianca007@gmail.com

⁴ Centro Universitário Santo Agostinho (UNIFSA), rayane18almeida@gmail.com

⁵ Universidade Estadual do Piauí (UESPI), babiileiteslv@gmail.com

⁶ Centro Universitário Jorge Amado (UNIJORGE), rafaelalarissafisio@outlook.com

⁷ Centro Universitário Santo Agostinho (UNIFSA), rosanameireles25@gmail.com

⁸ Universidade Estadual do Piauí (UESPI), wagnersantosreal@gmail.com

⁹ Centro Universitário Santo Agostinho (UNIFSA), portela.15@hotmail.com

¹⁰ Universidade Estadual do Piauí (UESPI), kalinyalves29@hotmail.com

RESUMO

OBJETIVO: Identificar na literatura científica a qualidade de vida de mulheres mastectomizadas submetidas à reconstrução mamária imediata. **MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada através da base de dados SciELO, utilizando-se os descritores do MeSh “câncer de mama”, “qualidade de vida”, “mastectomia”, “reconstrução mamária”, juntamente com o operador booleano AND. Os filtros aplicados foram: “texto completo”, artigos de 2016 a 2021, “línguas Português, Inglês e Espanhol”. Posteriormente à leitura detalhada dos resumos e textos completos, excluíram-se os artigos que não correspondiam à temática, as revisões de literatura. Obtiveram-se 18 artigos para a amostra final. **RESULTADOS:** Os 18 artigos selecionados são de natureza quantitativa. Com base nos resultados, a reconstrução mamária é um indicador para que a paciente tenha melhor qualidade de vida. Os resultados também destacam a obrigação de os profissionais de saúde considerarem o bem-estar psicossocial dos pacientes no pré e pós-operatório. **CONCLUSÕES:** Foi possível perceber que a qualidade de vida de mulheres mastectomizadas são melhores quando submetidas a reconstrução mamária, por aumentar a autoestima e diminuir fatores que vão melhorar a saúde mental.

Palavras-chave: Câncer de mama; Mastectomia; Reconstrução mamária; Qualidade de vida.

Área Temática: Ciências da Saúde.

E-mail do autor principal: nglarraial@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

O câncer de mama é o câncer maligno mais comum em mulheres do mundo todo. Seu tratamento pode trazer várias mudanças na qualidade de vida das pacientes, seja deixando cicatrizes muito visíveis, retirando uma mama, deixando os seios assimétricos, etc. todos esses aspectos repercutem na saúde mental das mulheres afetadas, proporcionando estresse psicológico em todo o decorrer do tratamento (JUHL, 2017).

Surgiram aproximadamente 2,3 milhões de casos estimados em 2020, o que representa 24,5% dos casos novos por câncer em mulheres. É também a causa mais frequente de morte por câncer nesse grupo, com 684.996 óbitos estimados para esse ano, ou seja 15,5% dos óbitos por câncer em mulheres (BRASIL, 2021).

Além da cirurgia de conservação mamária, a reconstrução mamária imediata após uma mastectomia permite a conservação da imagem corporal dessas mulheres (DAUPLAT, 2017). Para a paciente tomar uma boa decisão é fundamental que preveja como irá se sentir no futuro depois da escolha, é importante que suponha como seria a vivência com ou sem o procedimento cirúrgico. Um desses desafios está principalmente em volta de procedimentos mais complexos e desconhecidos (LEE, 2018).

Alguns estudos indicam que nos Estados Unidos, as taxas de mastectomia unilateral e bilateral estão crescendo. A razão para o aumento do uso de mastectomia é indeterminada, embora pareça ser impulsionada por escolha do paciente, e alguns sugeriram que o resultado cosmético melhorado com técnicas de reconstrução mamária pode contribuir para essa ação (JAGSI, 2015).

Além disso, estudos estimam que mulheres sem fatores de risco para câncer de mama, tem aproximadamente 12% de desenvolver a doença ao longo da vida. Porém, mulheres com forte histórico familiar de carcinoma de mama têm um risco estimado ao longo da vida de 45% a 67%, e nestes casos uma das principais estratégias para reduzir o risco de ter câncer de mama é a remoção cirúrgica de ambas as mamas (MCCARTHY, 2017).

Essa patologia merece atenção especial, principalmente no que se refere ao diagnóstico e tratamento, além de ser necessário se observar o desgaste emocional na vida de pacientes e familiares. É uma doença que carrega um significado muito forte, o da morte, transformando-se em um estigma para quem é acometido por ela. O portador de neoplasia maligna passa por um processo de várias perdas, que começa desde o diagnóstico, perdurando durante o

tratamento e prognóstico. No caso da mulher, as alterações da imagem corporal também representam perda ligada ao grande sofrimento psíquico (OLIVEIRA; MORAIS; SARIAN, 2010).

O câncer de mama é o fantasma que assusta toda mulher e seu tratamento como no caso da mastectomia que envolve a mutilação do corpo, naquilo que é mais simbólico na sua feminilidade que são as mamas, coloca também em risco a sua saúde mental que pode impactar na qualidade de vida da mulher.

Apesar de alguns estudos evidenciarem os efeitos da reconstrução mamária na vida mulheres mastectomizadas, ainda se faz necessário evidenciar cada vez mais a questão sobre a qualidade de vida de mulheres mastectomizadas após submissão a reconstrução mamária. A partir desses pressupostos, o presente trabalho teve como objetivo identificar na literatura científica a qualidade de vida de mulheres mastectomizadas submetidas à reconstrução mamária imediata.

1 MÉTODO

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura que objetiva sintetizar resultados de pesquisas sobre o tema em questão de maneira ordenada, amparando no aprofundamento de informação e conhecimento do assunto averiguado (HOHENDORFF, 2014). A revisão integrativa inclui uma análise extensa da literatura, facilita a discussão de métodos e resultados de pesquisa e reflexões sobre realizações de pesquisas futuras. O objetivo deste tipo de pesquisa é organizar a coleta e implementação de resultados de pesquisa para um determinado tipo de tópico, a fim de melhorar de forma colaborativa o tópico a ser estudado (MENDES, SILVEIRA, & GALVÃO, 2008).

A busca dos dados se deu no banco de dados da SciELO pela Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) através dos seguintes Medical Subject Headings (MeSH): “breast neoplasms”, “quality of life”, “mastectomy”, “mammoplasty”, combinados entre si através do operador booleano AND.

Isto posto, os critérios de inclusão foram baseados na busca de artigos originais, que abordassem a temática, disponíveis *online*, na íntegra, nos idiomas português, espanhol e inglês, entre 2016 e 2021. Como critérios de exclusão foram retirados estudos repetidos nas bases de dados e que não tivesse o protocolo de submissão do comitê de ética e pesquisa.

Na busca bibliográfica nas bases de dados foram elencados 193 artigos que contemplavam o tema principal do estudo e ao filtrar pelos critérios de inclusão e exclusão, selecionaram-se 19 artigos dentre eles para a realização, análise e discussão deste estudo. Os estudos incluídos na revisão foram analisados de forma organizada em relação aos objetivos, materiais e métodos propostos, facilitando a análise e o conhecimento pré-existente sobre o tema procurado.

2 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Inicialmente, foram encontrados cento e noventa e três artigos, quatro deles eram revisões de literatura ou não respondiam às questões norteadoras, restando apenas dezenove artigos que atendiam aos critérios da pesquisa.

Através da análise da bibliografia encontrada foi perceptível que em todos os estudos foi apontado que o tratamento do câncer de mama engloba várias modalidades, logo sendo a mastectomia considerada a mais agressiva e traumática para a mulher, uma vez que as mamas desempenham importante papel em sua vida. Pois como afirmado por Duarte & Andrade (2003) as mamas desde a puberdade até a idade adulta, elas representam feminilidade, erotismo, sensualidade e sexualidade, constituindo-se assim como o símbolo da identidade da mulher.

Fanakidou *et al.* (2018) destaca que a reconstrução mamária é um indicador para que a paciente tenha melhor qualidade de vida, evidenciado por uma melhora na saúde mental, menos graus de estresse e ansiedade, em compensação as mulheres sem a reconstrução da mama apresentaram maior nível de solidão, redução da qualidade de vida e aumento da ansiedade.

Outrossim, Matthews *et al.* (2017) demonstra através de um questionário a diferença entre a satisfação com a aparência das mamas e a satisfação com o resultado, além disso, fatores psicossociais foram motivadores por 75% da variância na satisfação com os seios, 68% para a satisfação com o resultado e 46% com a qualidade de vida. O bem-estar psicossocial emergiu como um prognosticador significativo de satisfação com a aparência do peito.

Os resultados também destacam a obrigação de os profissionais de saúde considerarem o bem-estar psicossocial dos pacientes no pré e pós-operatório e fornecer evidências preliminares para o uso de reconstruções perforantes epigástricas inferiores profundas em relação a outros tipos de procedimentos reconstrutivos.

Segundo Hamann *et al.* (2019), resultados cirúrgicos ou estéticos foram melhores na cirurgia sem tratamento prévio do que no corte com radioterapia pós-mastectomia, mas a satisfação com o resultado e o bem-estar psicossocial foram melhores com radioterapia pós-mastectomia. Para mais, o corte simples com a radioterapia anterior apresentou resultados consideráveis mais altos em satisfação com a mama, além de, satisfação com o implante e bem-estar sexual.

Paralelo a isso, Siqueira *et al.* (2020) analisaram a qualidade de vida de mulheres mastectomizadas insatisfeitas com as mamas não reconstruídas, e foi observado que a não reconstrução impactou negativamente na qualidade de vida. A satisfação com os seios e o bem-estar psicossocial foram superiores em 1 e 2 anos; no entanto, a ansiedade foi inferior em 1 ou 2 anos e o bem-estar físico do tórax e parte superior do corpo foi significativamente pior em 1 ano (MCCARTHY, C. *et al.*, 2017).

Logo, fica evidente o quanto a qualidade de vida deve ser considerada durante todas as fases do tratamento de um paciente com câncer. De fato, todos os sintomas e problemas próprios, do câncer e ao seu tratamento podem afetar em algum aspecto da vida da mulher, tais como em relação as limitações nas suas atividades diárias, toxicidade advinda da quimioterapia e perda da autoestima. Fica evidente também mudanças sociais pois muitas pacientes ainda experimentam mudança no emprego, nas relações pessoais, na capacidade física e no seu papel dentro da família. Portanto várias pesquisas confirmam que são comuns o declínio da qualidade de vida, na imagem corporal, humor e relações familiares em mulheres submetidas à reconstrução mamária imediata.

3 CONCLUSÃO

Diante da análise da literatura, é constatado que mulheres que fizeram mastectomia e não foram submetidas à reconstrução mamária imediata, tem a maior probabilidade de desenvolver fatores psicossociais, como ansiedade, além de uma baixa qualidade de vida. Outrossim, a utilização de técnicas para aperfeiçoar o pós-operatório, faz com que as pacientes tenham um bem-estar maior e se sintam bem com o próprio corpo.

Foi possível perceber também que a qualidade de vida de mulheres mastectomizadas são melhores quando submetidas a reconstrução mamária, por aumentar a autoestima e diminuir fatores que vão melhorar a saúde mental. Além de demonstrar que a qualidade de vida desses pacientes está relacionada muitas vezes pela sua aparência e como aquilo afeta tanto a vida social, amorosa e a profissional. Diante disso, é de fundamental importância que profissionais

da saúde, principalmente os que lidam diretamente com esse processo proporcione um melhor bem-estar psicossocial para as mulheres.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer. **Conceito e Magnitude**. INCA: Rio de Janeiro, 2021.

CASELLA, D., *et al.* Nipple-sparing bilateral prophylactic mastectomy and immediate reconstruction with TiLoop® Bra mesh in BRCA1/2 mutation carriers: A prospective study of long-term and patient reported outcomes using the BREAST-Q. **Breast**, v. 39, p. 8-13, 2018.

DAUPLAT, J., *et al.* Quality of life after mastectomy with or without immediate breast reconstruction. **Br J Surg**, v. 104, n. 9, p. 1197-1206, 2017.

DUARTE, T. P.; ANDRADE, A. N. de. Enfrentando a mastectomia: análise dos relatos de mulheres mastectomizadas sobre questões ligadas á sexualidade. *Estud psicol.*, v. 8, n. 1, p. 155-163, 2003.

FANAKIDOU, I., *et al.* Mental health, loneliness, and illness perception outcomes in quality of life among young breast cancer patients after mastectomy: the role of breast reconstruction. **Qual Life Res**, v. 27, n. 2, p. 539-543, 2018.

HAMANN, M., *et al.* Quality of life in breast cancer patients and surgical results of immediate tissue expander/implant-based breast reconstruction after mastectomy. **Arch Gynecol Obstet**, v. 300, n. 2, p. 409-420, 2019.

HOHENDORFF, Jean Von. Como escrever um artigo de revisão de literatura. **Manual de produção científica**, p. 39-54, 2014.

JAGSI, R., *et al.* Patient-reported Quality of Life and Satisfaction With Cosmetic Outcomes After Breast Conservation and Mastectomy With and Without Reconstruction: Results of a Survey of Breast Cancer Survivors. **Ann Surg**, v. 261, n. 6, p. 1198-206, 2015.

JUHL, A. A., *et al.* Unilateral breast reconstruction after mastectomy - patient satisfaction, aesthetic outcome and quality of life. **Acta Oncol**, v. 56, n. 2, p. 225-231, 2017.

LEE, C. N., *et al.* Precisão das previsões de pacientes com câncer de mama quanto ao bem-estar futuro após a reconstrução mamária imediata. **JAMA Surg**, v. 153, n. 4, 2018.

MANOROV, M., *et al.* Potencialidades e fragilidades no acesso ao tratamento oncológico: perspectiva de mulheres mastectomizadas. **Rev. Enferm. UFSM**, vol. 10 e: 1-20, 2020.

MATTHEWS, H., *et al.* Predictors of satisfaction and quality of life following post-mastectomy breast reconstruction. **Psychooncology**, v. 26, n. 11, p. 1860-1865, 2017.

MENDES, Karina Dal Sasso; SILVEIRA, Renata Cristina de Campos Pereira; GALVÃO, Cristina Maria. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. **Texto & contexto-enfermagem**, v. 17, n. 4, p. 758-764, 2008.

MCCARTHY, C. M., *et al.* Impact of Bilateral Prophylactic Mastectomy and Immediate Reconstruction on Health-Related Quality of Life in Women at High Risk for Breast Carcinoma: Results of the Mastectomy Reconstruction Outcomes Consortium Study. **Annals of surgical oncology**, vol. 24, n. 9, p. 2502-2508, 2017.

OLIVEIRA, R. R.; MORAIS, S. S.; SARIAN, L. O. Efeitos da reconstrução mamária imediata sobre a qualidade de vida de mulheres mastectomizadas. **Rev Bras Ginecol Obstetr.**, v. 32, n. 12, p. 602-608, 2010.

PUSIC, A. L., *et al.* Patient-Reported Outcomes 1 Year After Immediate Breast Reconstruction: Results of the Mastectomy Reconstruction Outcomes Consortium Study. **J Clin Oncol**, v. 35, n. 22, p. 2499-2506, 2017.

SINAEI, F., *et al.* Association Between Breast Reconstruction Surgery and Quality of Life in Iranian Breast Cancer Patients. **Acta Med Iran**, v. 55, n. 1, p. 35-41, 2017.

SIQUEIRA, H. F. F., *et al.* Patient satisfaction and quality of life in breast reconstruction: assessment of outcomes of immediate, delayed, and nonreconstruction. **BMC Res Note**, v. 13, n. 1, 2020.

STEIN, M. J., *et al.* Quality-of-Life and Surgical Outcomes for Breast Cancer Patients Treated with Therapeutic Reduction Mammoplasty Versus Mastectomy with Immediate Reconstruction. **Ann Surg Oncol**, v. 27, n. 11, p. 4502-4512, 2020.

CAPÍTULO 83

RELAÇÃO ENTRE SOFRER VIOLÊNCIA POR PARCEIROS ÍNTIMOS E A IDEAÇÃO SUICIDA ENTRE MULHERES

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c83](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c83)

Rayssa do Nascimento Sousa¹, Brenda Tayrine Tavares Souza², Maria Helena de Lima Sousa³, Leticia Velozo Domingos Pinto⁴, Ana Luisa Mendes Ribeiro⁵, Angelica Ribeiro do Nascimento Oliveira⁶, Maria Dhescyca Ingrid Silva Arruda⁷, Gabryelle Ribeiro da Costa⁸, Tâmara karine da Silva⁹, Caroline Taiane Santos da Silva¹⁰

¹Universidade Estadual do Piauí, (rayssasousa@aluno.uespi.br)

²Centro Universitário do Distrito Federal, (brenndatayrine@gmail.com)

³UniFTC de Juazeiro, (helenamaria164@gmail.com)

⁴Universidade Tuiuti do Paraná, (leticiavelozo99@gmail.com)

⁵Universidade Federal do Piauí, (analuuhm28@gmail.com)

⁶Centro Universitário Maurício de Nassau, Piauí, (angelicalribeiro.ar19@gmail.com)

⁷Faculdade São Francisco da Paraíba, (dhescycaingrid20@gmail.com)

⁸Facid Wyden, (gabryellecostar@hotmail.com)

⁹SEUNE, (tamarakarine1@gmail.com)

¹⁰Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, (carolinetiaiane.enfa@gmail.com)

Resumo

Objetivo: Identificar os fatores relacionados à ocorrência de violência por parceiro íntimo e sua relação com a ideação suicida entre mulheres **Método:** Trata-se de uma revisão integrativa, qualitativa, realizada através de busca *online* de estudos primários, publicados na íntegra, em português, inglês e espanhol, entre 2011 a 2021, a partir das bases de dados SciELO, LILACS e MEDLINE, através dos DECS: “Mulheres”, “Violência por Parceiro Íntimo”, “Ideação Suicida” e como critérios de exclusão, artigos repetidos nas bases de dados, sendo selecionados 11 artigos científicos para compor esta revisão. **Resultados:** Evidenciou-se que as diversas formas de violências tiveram relação direta com desenvolvimento de ideação suicida entre mulheres. Todas as formas de violência por parceiro íntimo foram identificadas, sendo a violência psicológica a mais frequente e a física a que mais repercutiu negativamente nas vidas das mulheres. **Considerações Finais:** Ao finalizar a análise do estudo, pode-se, portanto, concluir que mulheres que sofrem com violência estão mais suscetíveis a desenvolver depressão e ter pensamentos suicidas. Assim, fazem-se necessárias intervenções que possibilitem a redução nos casos de violência contra a mulher, de modo que seja realizada uma assistência humanizada que possibilite que todas recebam um acompanhamento psicológico, que tenham amparo dos profissionais envolvidos no cuidar, para se sentirem encorajadas a realizar a denúncia.

Palavras-chave: Mulheres; Violência por Parceiro Íntimo; Ideação Suicida.

Área Temática: Ciências da saúde.

E-mail do autor principal: rayssasousa@aluno.uespi.br

1 INTRODUÇÃO

Violência é caracterizada pela Organização Mundial de saúde, como uso de força física ou poder, infligida em forma de ameaça ou prática, contra si, ou contra outros que cause sofrimento, danos psicológicos ou leve a morte (OMS, 2002). A violência por parceiro íntimo (VPI), pode incluir abuso físico, sexual, emocional e comportamentos controladores, repercutindo negativamente na saúde mental de toda a família (OMS, 2012).

Segundo dados do Ministério da Saúde no ano de 2018 foram notificados 78.393 casos de VPI, destes 91,5% foram notificados por mulheres, em sua maioria negras, residentes da zona urbana e que moravam com seus parceiros, e essas agressões foram repetidas (BRASIL, 2020). Entre os fatores relacionados à ocorrência da violência por parceiro íntimo, estão segundo Wong e Mellor (2014) a cultura, vivência de relações abusivas e abuso sexual na infância. O que pode fazer com que muitas mulheres estejam em um ciclo de violência, e sofrimento, durante boa parte da vida, o que pode refletir sobre sua saúde mental.

Macisaac (2017) apontou em seu estudo que 3,5–62,5% das mulheres que cometeram suicídio, sofreram violência por parceiro íntimo em algum momento da vida. Assim, a ideação suicida pode estar inserida na rotina dessas mulheres, em forma de pensamentos e comportamentos que levem ao suicídio (SANTOS *et al.*, 2018).

Diante do exposto, buscou-se através dessa pesquisa identificar os fatores relacionados à ocorrência de violência por parceiro íntimo e sua relação com a ideação suicida entre mulheres.

2 METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa descritiva de abordagem qualitativa, que possibilitou reunir informações necessárias para elucidar o fenômeno de interesse, através de literatura já existente. Possui abordagem qualitativa de natureza exploratória e descritiva. Foi realizada através da busca online de artigos científicos nacionais e internacionais, no período de junho de 2021. (SOUSA; SILVA e CARVALHO, 2010)

Esta revisão foi construída através das seguintes etapas: escolha do tema, construção da pergunta de pesquisa através do acrônimo PICO (paciente, interesse, contexto), escolha dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), definição dos critérios de inclusão/exclusão dos artigos científicos; coleta, análise e discussão dos dados dos estudos selecionados, exposição da síntese das evidências encontradas. (BOTELHO; CUNHA e MACEDO, 2011).

Inicialmente, adotou-se a estratégia PICO (população, intervenção e contexto) para

definição da questão norteadora, onde a população fora as mulheres que apresentaram pensamento suicida no contexto da violência por parceiro íntimo. Desta forma, questionou-se: “Qual a relação entre sofrer violência por parceiros íntimos e ideação suicida entre mulheres?”.

A pesquisa foi realizada a partir das bases de dados da Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) e na biblioteca Scientific Electronic Library Online (SciELO) através dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): "Mulheres", "Violência por Parceiro Íntimo", "Violência contra a Mulher", "Violência Doméstica" e "Ideação Suicida", em busca booleana utilizando as ferramentas "AND" e "OR".

Como critérios de inclusão estudos originais que contemplassem a temática, disponíveis online, na íntegra, em português, inglês e espanhol, publicados entre 2011 e 2021 de exclusão foram: estudos repetidos nas bases e os artigos que não respondessem à pergunta norteadora.

Para a seleção dos artigos, houve a leitura do título e do resumo dos estudos, observando os critérios de seleção. Posteriormente, realizou-se uma leitura criteriosa desses artigos e iniciou-se a coleta dos dados. Para essa coleta, foi elaborado um quadro contendo os autores, ano de publicação, local, título do artigo e principais achados.

Como este estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura, não houve a necessidade de submissão ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), respeitados assim os aspectos éticos referenciando todas as fontes citadas.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Confirme os critérios metodológicos da pesquisa, na busca inicial foram encontradas 200 publicações onde foram: 10 na LILACS, 182 na MEDLINE, 8 na SciELO. Após os critérios de inclusão, foram obtidos 74 artigos, 9 na LILACS, 58 na MEDLINE, e 7 na SciELO. Após leitura dos títulos e resumos, excluiu-se 63 artigos. Totalizando 11 artigos para compor esta revisão.

Quadro 1. Características dos artigos sobre VPI e idealização suicida entre mulheres selecionados para compor a revisão.

AUTOR E ANO	LOCAL	TÍTULO DO ARTIGO	PRINCIPAIS ACHADOS
Miller e Contreras-Urbina, 2021.	Guiana	Exploring the determinants and outcomes of intimate partner violence during pregnancy for Guyanese women: Results from a nationally representative cross-sectional household survey	A violência física durante a gravidez e a violência física ao longo da vida associadas ao aumento da probabilidade de ideação suicida.

Llosa e Canetti 2019.	Uruguai	Depressão e ideação do suicídio em mulheres vítimas de violência do parceiro íntimo.	A violência por parceiro íntimo esteve relacionada diretamente ao aparecimento de ideação suicida em mulheres.
Gibbs, Dunkle e Jewkes. (2018)	África do Sul	Emotional and economic intimate partner violence as key drivers of depression and suicidal ideation: A cross-sectional study among young women in informal settlements in South Africa	Das mulheres que sofreram violência por parceiros íntimos relataram sintomas clinicamente relevantes de depressão e ideação suicida.
Maru <i>et al.</i> , 2018	Estados Unidos	The Relationship Between Intimate Partner Violence and Suicidal Ideation among Young Chinese, Korean, and Vietnamese American Women	Os resultados indicaram que 7 em cada 10 mulheres na amostra experimentou na vida ideação/intenção suicida. A agressão psicológica foi mais relatada foi a VPI
Rurangirwa <i>et al.</i> 2018	Ruanda	Intimate partner violence during pregnancy in relation to non-psychotic mental health disorders in Rwanda: a cross-sectional population-based study.	A exposição às formas de VPI durante a gravidez foi altamente associada à probabilidade de diagnóstico para ideação suicida
Lacey <i>et al.</i> 2015	Estados Unidos	The mental health of US Black women: the roles of social context and severe intimate partner violence	VPI física severa foram associados à ideação suicida entre todas as mulheres negras investigadas.
Karakoc <i>et al.</i> 2015	Turquia	Prevalence of Intimate Partner Violence and Associated Factors	64% das mulheres com diagnóstico de depressão e ideação suicida sofriam de violência física por parceiro íntimo.
Fonseca-Machado, <i>et al.</i> 2015	Brasil	Sob a sombra da maternidade: gravidez, ideação suicida e violência por parceiro íntimo.	Das mulheres que apresentaram ideação suicida quase sua 17,6% estavam em situação de violência por parceiro íntimo durante a atual gestação.
Zunner <i>et al.</i> 2015	Quênia	HIV, violence and women: unmet mental health care needs	Ampla previdência de violência física, sexual e emocional e sexual contra mulheres HIV+ incluíram sintomas como: depressão, ansiedade, sintomas de estresse traumático e pensamentos suicidas
Noori <i>et al.</i> 2013	Iran	Risk factors of suicidal ideation and attempt in women with drug user spouses	A associação entre uso de drogas, ansiedade, depressão e exposição a abuso físico pelo cônjuge, podem contribuir como determinante para tentativa de suicídio ou ideação suicida em mulheres.
Do; Weiss e Pollack, 2013.	Vietnã	Cultural Beliefs, Intimate Partner Violence and Mental Health Functioning among Vietnamese Women	30% das entrevistadas foram significativas para depressão e ideação suicida. Quanto mais fortes eram as crenças da esposa de que os homens têm o direito de ser abusivos, menor era a relação entre VPI sexual e ansiedade, depressão e

			comportamento suicida.
--	--	--	------------------------

Fonte: Elaborada pelos autores, 2021.

A amostra foi sumarizada no quadro 1, e classificada segundo o autor, ano, título e principais achados. Através da análise dos artigos, relacionando-os com a questão de pesquisa, emergiram as categorias analíticas: fatores de risco para a violência por parceiro íntimo, e relação entre violência por parceiro íntimo e ideação suicida.

3.1 Fatores de risco para a violência por parceiro íntimo

Observou-se, a partir dos estudos, que os fatores de risco para a VPI estão relacionados a questões socioeconômicas e ao estado de saúde das mulheres. De acordo com Llosa e Canetti (2019); Rurangirwa *et al.* (2018) entre as mulheres que referiram ter sofrido VPI, sua maioria, se encontravam em condições socioeconômicas desfavoráveis, e com pouco ou nenhum apoio familiar, ou social. Além disso, possuíam histórico de abuso físico, sexual ou mental na infância (MARU *et al.*, 2018; MILLER e CONTRERAS-URBINA, 2021).

Segundo Zunner *et al.* (2015), muitas mulheres portadoras do vírus da imunodeficiência humana adquirida (HIV) referiram violência sexual, agressão física e moral por parte dos companheiros, estes desconheciam seu *status* sorológico e atribuíam a mulher infidelidade conjugal, descartaram seus medicamentos anti-retrovirais e exigiam relações sexuais para fins de procriação.

Karakoc *et al.* (2015) afirma que mulheres com diagnóstico de depressão foram expostas principalmente à violência física e econômica durante o período em que estavam grávidas. Em conformidade, Fonseca-Machado *et al.* (2015) aponta que durante a gestação as mulheres de sua pesquisa foram vítimas de violência psicológica em grande proporção, seguida de violência física e sexual mais de uma vez.

3.2 Relação entre violência por parceiro íntimo e ideação suicida

A exposição a violência gera repercussões negativas, aumentando as possibilidades de desenvolvimento de transtornos mentais, de acordo com Lacey *et al.* (2015), as altas taxas de transtorno de ansiedade, comportamento suicida e qualquer transtorno mental entre mulheres após sofrer violência de seus parceiros. Sendo a violência física pelo parceiro íntimo, está entre os preditores da saúde das mulheres principalmente negras. Segundo Karakoc *et al.* (2015) entre

as mulheres vítimas de violência, houve agravamento dos sintomas de depressão, ansiedade e comportamento suicida.

De acordo com Gibbs, Dunkle e Jewkes (2018) quase a metade das mulheres de sua pesquisa que sofreram violência por parceiros íntimos relataram sintomas de depressão e de ideação suicida. Maru *et al.* (2018) também confirmam isso em seu estudo, onde 7 em cada 10 mulheres que sofrem VPI física ou sexual pensaram em tirar a própria vida em algum momento. Com base em Llosa e Canetti (2016) a depressão e os transtornos de ansiedade são os dois problemas de saúde mental mais comuns entre mulheres que sofreram VPI.

Sobre a VPI no período gestacional, Miller e Contreras-Urbina (2021) aponta que as vítimas de violência por parceiro íntimo durante a gravidez tiveram 4,07 vezes mais de *chances* de apresentar ideação suicida. Corroborando com este achado, Fonseca-Machado *et al.* (2015) identificou que entre 63 mulheres que sofreram VPI durante a gravidez, 22,2% apresentaram indicativo de ideação suicida. Demonstrando a fragilidade que as mulheres estão expostas durante uma fase decisiva e importante de suas vidas.

Outro ponto importante é a violência por parceiro íntimo relacionada ao abuso de drogas pelo parceiro, que segundo Noori *et al.* (2013) esteve associada a ansiedade e ideação suicida entre mulheres. Tendo isso, relação com problemas sociais como pobreza e desassistência a saúde relacionada ao vício. Por fim, Do, Weiss e Pollack (2013) sugerem que, ao tentar prevenir ou tratar os efeitos da violência, é importante considerar que certas crenças sobre a violência pelo parceiro geralmente vistas como mal-adaptativas podem ter efeitos adaptativos, pelo menos a curto prazo.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo apresentou a relação entre sofrer violência por parceiros íntimos e a ideação suicida entre mulheres, através da elaboração de uma revisão integrativa. De modo a minimizar os vieses de publicação, houve uma busca abrangente, sem definição prévia de idioma. Após avaliação da qualidade científica dos artigos, foram utilizados estudos originais, que delinearam resultados científicos confiáveis.

As pesquisas selecionadas demonstraram que mulheres que sofrem com violência estão mais suscetíveis a desenvolver depressão e ter comportamento suicida. Assim, fazem-se necessárias intervenções que possibilitem a redução nos casos de violência contra a mulher, de modo que seja realizada uma assistência humanizada que possibilite que todas recebam um acompanhamento psicológico, que tenham amparo dos profissionais envolvidos no cuidar, para se sentirem encorajadas a realizar a denúncia.

REFERÊNCIAS

BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Boletim Epidemiológico Violência por parceiro íntimo contra homens e mulheres no Brasil: dados da Vigilância de Violências e Acidentes. Brasília. Volume 51. Nº 49. Dez. 2020.

BOTELHO, Louise Lira Roedel; DE ALMEIDA CUNHA, Cristiano Castro; MACEDO, Marcelo. O método da revisão integrativa nos estudos organizacionais. *Gestão e sociedade*, v. 5, n. 11, p. 121-136, 2011. Disponível em:
<https://www.gestaoesociedade.org/gestaoesociedade/article/download/1220/906>.

DO, Khanh Ngoc; WEISS, Bahr; POLLACK, Amie. Cultural beliefs, intimate partner violence, and mental health functioning among Vietnamese women. **International perspectives in psychology**, v. 2, n. 3, p. 149-163, 2013. Disponível em:
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24358448/>.

KARAKOC, Berna *et al.* Prevalence of intimate partner violence and associated factors. **Nöro Psikiyatri Arşivi**, v. 52, n. 4, p. 324, 2015. Disponível em:
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28360734/>.

FONSECA-MACHADO, Mariana de Oliveira *et al.* Sob a sombra da maternidade: gravidez, ideação suicida e violência por parceiro íntimo. **Revista Panamericana de Salud Pública**, v. 37, p. 258-264, 2015. Disponível em: <https://www.scielo.org/article/rpsp/2015.v37n4-5/258-264/>.

LACEY, Krim K. *et al.* The mental health of US Black women: the roles of social context and severe intimate partner violence. **BMJ open**, v. 5, n. 10, p. e008415, 2015. Disponível em:
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26482770/>.

GIBBS, Andrew; DUNKLE, Kristin; JEWKES, Rachel. Emotional and economic intimate partner violence as key drivers of depression and suicidal ideation: A cross-sectional study among young women in informal settlements in South Africa. **PloS one**, v. 13, n. 4, p. e0194885, 2018. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29659595/>.

GRACIA-LEIVA, Marcela *et al.* Off-and online heterosexual dating violence, perceived attachment to parents and peers and suicide risk in young women. **International journal of environmental research and public health**, v. 17, n. 9, p. 3174, 2020. Disponível em:
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32370200/>.

LLOSA, Martinez, Sebastián; CANETTI Wasser, Alicia. Depressão e ideação suicida em mulheres vítimas de violência de pareja. Montevideo. **Psicol. Conoc. Soc.** v. 9, n. 1, p. 138-160, jun. 2019. Disponível em:

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-70262019000100138&lng=es&nrm=iso.

MARU, Mihoko *et al.* The relationship between intimate partner violence and suicidal ideation among young Chinese, Korean, and Vietnamese American women. **Women & therapy**, v. 41, n. 3-4, p. 339-355, 2018. Disponível em:

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30467448/>.

MACISAAC, Michael B; BUGEJA, Lyndal C; JELINEK, George A. A associação entre exposição à violência interpessoal e suicídio entre mulheres: uma revisão sistemática. **Jornal australiano e neozelandês de saúde pública**, v. 41, n. 1, pág. 61-69, 2017. Disponível em:

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/1753-6405.12594>.

MILLER, Lior; CONTRERAS-URBINA, Manuel. Exploring the determinants and outcomes of intimate partner violence during pregnancy for Guyanese women: results from a nationally representative cross-sectional household survey. **Revista Panamericana de Salud Pública**, [S.L.], v. 45, p. 1, 24 mar. 2021. Pan American Health Organization.

<http://dx.doi.org/10.26633/rpsp.2021.6>.

NOORI, Roya *et al.* Risk factors of suicidal ideation and attempt in women with drug user spouses. **Journal of the Chinese Medical Association**, v. 76, n. 11, p. 648-652, 2013.

Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23938148/>.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE; KRUG, Etienne G. Relatório mundial sobre violência e saúde. Genebra: Organização Mundial da Saúde, 2002.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Prevenção da violência sexual e da violência pelo parceiro íntimo contra a mulher: ação e produção de evidência. 2012.

RURANGIRWA, Akashi Andrew *et al.* Intimate partner violence during pregnancy in relation to non-psychotic mental health disorders in Rwanda: a cross-sectional population-based study. **BMJ open**, v. 8, n. 7, p. e021807, 2018. Disponível em:

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29997142/>.

SANTOS, Ariane Gomes dos *et al.* Tipos de transtornos mentais não psicóticos em mulheres adultas violentadas por parceiro íntimo: uma revisão integrativa. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 52, 2018. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/reeusp/a/jv5tRXN38mZkgPC5gRw47df/?lang=pt&format=html>.

SOUZA, Marcela Tavares de; SILVA, Michelly Dias da; CARVALHO, Rachel de. Revisão integrativa: o que é e como fazer. São Paulo. **Einstein**, v. 8, p. 102-106, 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/eins/a/ZQTBkVJZqcWrTT34cXLjtBx/?lang=pt&format=html>.

WONG, Jessica; MELLOR, David. Violência por parceiro íntimo e saúde e bem-estar da mulher: impactos, fatores de risco e respostas. **Enfermeira contemporânea**, v. 46, n. 2, pág. 170-179, 2014. Disponível em:

<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.5172/conu.2014.46.2.170>.

ZUNNER, Brian *et al.* HIV, violence and women: unmet mental health care needs. *Journal of affective disorders*, v. 174, p. 619-626, 2015. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25574781/>.

CAPÍTULO 84

RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PROJETO DE EXTENSÃO ANATO ACADEMY: JOVENS DO ENSINO MÉDIO APRENDENDO SOBRE O CORPO HUMANO

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c84](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c84)

Ana Priscila Franca Correia¹, Carlos Kaylan Souza Batista², Diego Bitu de Melo², Francisca Ana Livia Rodolfo da Silva², Gleyciane Lins Pereira², Karen Maria Ferreira Tavares², Larissa Thaís de Melo Filizola², Letícia Bezerra Barroso², Ranielly Lara Corpe Teixeira², Jalles Dantas de Lucena³.

¹ Acadêmico em Medicina pela Faculdade Santa Maria – FSM (francaanapris-cila@gmail.com), ² Acadêmico em Medicina pela Faculdade Santa Maria - FSM, ³ Docente da Faculdade Santa Maria – FSM (jallesdantas@gmail.com).

RESUMO

O anato academy é um projeto de extensão que foi idealizado pelo professor da disciplina de Correlações Anatomoclínicas, juntamente com alguns alunos do curso de Medicina da FSM. Com a finalidade de difusão do conhecimento anatômico para os jovens do ensino médio, principalmente, para aqueles que a posteriori realizarão o ENEM. O objetivo desse trabalho é relatar a dinâmica do projeto, bem como, suas modificações ocasionadas pela deflagração da pandemia do Sars-CoV-2 e experiências vivenciadas pelos extensionistas. O método utilizado trata-se de um relato de experiência sobre o ensino anatômico para o ENEM e de educação em saúde, vivenciada pelos participantes do projeto de extensão “Anato Academy”, vinculado ao curso de Medicina da FSM, Cajazeiras (PB), durante os anos de 2020 e 2021, tendo como público-alvo estudantes do primeiro ao terceiro ano do ensino médio de escolas públicas e particulares. Para isso, os alunos extensionistas do Anato Academy produziram cartilhas educativas, sobre doenças comuns nos sistemas orgânicos, e uma coleção de apostilas com conhecimento anatômico direcionado para o ENEM. Nesse sentido, o projeto obteve o êxito esperado ao conseguir ampliar o acesso à informação dos estudantes beneficiados com os materiais produzidos, ao mesmo tempo que expandia as vivências dos extensionistas. Dessa

forma, o projeto foi incisivo nas estratégias de melhorias do ensino anatômico e de educação em saúde.

Palavras-chave: Anatomia, Educação em Saúde e COVID-19.

Área Temática: Ciências da Saúde.

E-mail do autor principal: francaanaprisila@gmail.com

INTRODUÇÃO

A Constituição Brasileira de 1988 tem como cláusula pétrea no Art. 205 “a educação como um direito de todos e dever do Estado” (BRASIL, 1988). Tendo este, a responsabilidade de incentivar e buscar melhorias no que concerne ao pressuposto.

Contudo, a pandemia do SARS-CoV-2 evidenciou grandes problemas relacionados ao processo educativo brasileiro. Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 4,3 milhões de estudantes no país entraram na pandemia sem acesso à internet, pelos mais variados fatores, como: inacessibilidade a computadores ou celulares, baixas condições financeiras para o custeio dos gastos de rede e indisponibilidade de serviço na região em que vivem (PAMPLONA, 2021).

Adjunto a estes fatores de exclusão digital, observou-se ainda, uma dificuldade no estabelecimento e organização da rotina dos estudos, problemas de relacionamentos interpessoais nas aulas, e o não funcionamento de muitas escolas de forma remota, principalmente as de âmbito público. Resultando assim, em uma defasagem no sistema de ensino do país (PROGEPE, 2020).

Quadro este que evidenciou ainda mais a importância de um projeto de extensão como meio de propagação do conhecimento e de tentativa de acesso mais igualitário ao ensino (ABRANCHES, 2020). Então, baseando-se no pressuposto, o Projeto de extensão Anato Academy foi idealizado pelo professor da disciplina de Correlações Anatomoclínicas, juntamente com alguns alunos do curso de Medicina da Faculdade Santa Maria (FSM), com o objetivo de disseminação de conteúdo anatômico para estudantes do ensino médio de escolas públicas e particulares da cidade de Cajazeiras, que vão realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

A priori, o projeto foi pensado para acontecer de forma presencial, com a observação e o estudo em laboratório da Anatomia Humana através de peças cadavéricas. Contudo, com a deflagração da pandemia, e a suspensão das aulas presenciais, o projeto se reinventou, sendo realizadas muitas atividades de cunho informativo, como a criação de redes informativas onde

aconteceram posts semanais, produção de cartilhas educativas para a distribuição em escolas públicas e particulares, e produção de apostilas com material didático de Anatomia Humana voltado para o ENEM (UFCA, 2020).

Evidenciando então, a importância deste, tanto para os extensionistas pela experiência na divulgação do conhecimento, bem como para muitos estudantes do ensino médio da cidade de Cajazeiras, que estavam sem participar de aulas remotas e com déficit nos conteúdos de ciências (UFES, 2021).

OBJETIVO

O objetivo deste artigo é relatar a experiência vivenciada por um grupo de 9 discentes do curso de Medicina da Faculdade Santa Maria (FSM), participantes do projeto de extensão “Anato Academy”, durante as atividades de educação em saúde e de ensino anatômico para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), para alunos do ensino médio de escolas públicas e particulares da cidade de Cajazeiras, Paraíba.

METODOLOGIA

Almeida (2007) destaca que “um relato de experiência propõe tornar visível e compartilhar com outros profissionais e estudantes uma vivência prática”. Nesse contexto, este relato de experiência descreve às experiências do ensino anatômico para o ENEM e de educação em saúde, vivenciada pelos participantes do projeto de extensão “Anato Academy”, vinculado ao curso de Medicina da Faculdade Santa Maria (FSM), Cajazeiras, Paraíba.

O conhecimento da realidade possibilita definir o que é necessário conhecer naquele momento, o que pode ser trabalhado pelo aluno durante o período e o que necessita ser aprofundado no período subsequente (ALVES, 2020).

Assim, as atividades de extensão foram desenvolvidas com os estudantes do ensino médio, do primeiro ao terceiro ano, de escolas públicas e particulares da cidade de Cajazeiras (PB), durante os semestres de 2020.2 e 2021.1. As atividades foram executadas por um grupo de 9 discentes do curso de Medicina da Faculdade Santa Maria (FSM) e pelo professor da disciplina de Correlações Anatomoclínicas, como coordenador do Projeto. Os membros do Anato Academy participavam semanalmente de reuniões pela plataforma virtual de

videochamadas Google Meet®, em que ocorriam atividades de capacitação e planejamento das atividades desenvolvidas pelo Projeto.

Inicialmente, os membros do Projeto foram divididos em 3 grupos, com 3 extensionistas cada, que ficaram responsáveis por determinados sistemas orgânicos abordados no Anato Academy (Tabela 1).

O projeto de extensão Anato Academy teve como principal objetivo no seu primeiro ano de atuação, nesse contexto de isolamento social e de aulas remotas devido a pandemia da Covid-19, a criação de uma conta na rede social Instagram®, para divulgação do projeto e fácil acesso às informações pelo público interessado. Esta rede social foi escolhida pelo fato da sua plataforma apresentar uma variedade de ferramentas, permitindo a publicação de conteúdos de formas variadas. Foi instituído, portanto, que as informações seriam publicadas em formato de *posts*, facilitando o fácil acesso aos conteúdos. Os assuntos mais robustos foram divulgados em forma de texto e publicados no *feed*, enquanto que outros conteúdos menores, foram publicados em formato de tópicos através dos *stories*.

Dessa forma, utilizando de variadas formas de apresentação de conteúdo do Instagram®, conseguiu-se proporcionar de forma prática, interativa e bem aceita no cenário atual, a transmissão de informações e conteúdos propostos pelo projeto. Além disso, as ferramentas utilizadas como os *stories* - os quais, de maneira rápida e precisa, levaram conteúdo rapidamente absorvível -, e o *feed* - o qual foi uma fonte de interação com os internautas, por meio dos comentários; permitiram um *feedback* sobre as informações divulgadas na rede social do Anato Academy, possibilitando uma análise do conteúdo produzido, permitindo que melhorias acontecessem durante seu primeiro ano de atuação.

Concomitante a isso, houve a produção de cartilhas educativas, com temas voltados para educação em saúde de algumas doenças comuns nos sistemas orgânicos (Tabela 2), e de uma coleção de apostilas com material didático sobre Anatomia Humana, voltada, principalmente, para o ENEM, com o intuito de serem compartilhadas com os alunos de escolas públicas e particulares do ensino médio da cidade de Cajazeiras, beneficiadas pelo projeto. Em especial, aquelas na qual os alunos tiveram menor interação na rede social devido a dificuldades de acesso à internet e aparelhos digitais.

Assim, devido ao uso desses recursos, os alunos participantes tiveram acesso a recursos didáticos com conteúdo sobre Anatomia e questões de vestibulares sobre importantes temas, ampliando as possibilidades de acesso à informação, como também, a expansão e exercício de seus conhecimentos.

Tabela 1. Formação dos grupos com seus membros e sistemas orgânicos abordados no Anato Academy.

Grupos	Membros	Sistemas
1	A. P. F. C.	Respiratório
	G. L. P.	Locomotor
	R. L. C. T.	
2	F. A. L. R. S.	Digestório
	L. B. B.	Circulatório
	D. B. M. S.	
3	L. T. M. F.	Reprodutor
	K. M. F. T.	Urinário
	C. K. S. B.	Endócrino

Fonte: Autores, 2021.

Tabela 2. Temas abordados nas cartilhas educativas.

Grupos	Sistemas	Temas abordados
1	Respiratório	COVID-19, Asma, DPOC, Pneumonia, Tuberculose
	Locomotor	Osteoporose, Fibromialgia, Artrite Reumatóide
2	Digestório	Apendicite, Gastrite, Colelitíase, Úlcera péptica
	Circulatório	Insuficiência Venosa, TVP, Aterosclerose, IAM
3	Reprodutor	Dismenorreia, HPV, câncer de mama, HPB, Adenocarcinoma de próstata
	Endócrino	Diabetes Mellitus, Hipotireoidismo, Hipertireoidismo
	Urinário	ITU, Litíase, Glomerulonefrite

Fonte: Autores, 2021.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Neste tópico apresentamos alguns resultados alcançados a partir da proposta do projeto de extensão “Anatomia para alunos do ensino médio” em desenvolvimento.

Até o momento, os alunos extensionistas executaram parte das atividades planejadas para o projeto de extensão. Eles, desde o início do projeto, participaram semanalmente de reuniões pelo Google Meet® para planejamento das atividades desenvolvidas pelo Projeto.

Desde o início da execução do Projeto os extensionistas produziram o material didático distribuído aos estudantes das escolas parceiras desse projeto. Foram selecionados, em discussão entre os extensionistas e o coordenador do Anato Academy, alguns assuntos já apresentados na tabela 2. Estes temas foram selecionados baseados nos conteúdos de Anatomia Humana presentes nas últimas provas do ENEM.

Após a produção dos primeiros materiais, foi iniciada a etapa de divulgação do Projeto nas redes sociais, para isso os alunos criaram uma conta no Instagram®, que possibilitou maior divulgação dos materiais produzidos. Na página eram divulgados semanalmente conteúdos de Anatomia voltados ao ensino médio e algumas doenças comuns nos sistemas orgânicos.

A partir disso, iniciamos os contatos com os diretores escolares e professores de Ciências do ensino médio das escolas públicas e privadas da cidade de Cajazeiras, afim de apresentar o referido Projeto, o material didático produzido e fecharmos parcerias com as escolas.

Além da produção de material para divulgação nas redes sociais, produzimos cartilhas educativas com temas voltados para educação em saúde de algumas doenças mais comuns nos sistemas orgânicos, que foram distribuídas não apenas aos estudantes do ensino médio, mas também aos demais estudantes nas escolas. Os alunos do ensino médio vão fazer provas do ENEM, pensando nisso, também produzimos apostilas com material didático de Ciências, focado em Anatomia Humana, que foram compartilhadas inicialmente com os professores da disciplina para análise, e a seguir com os alunos. Por meio destas ferramentas, os alunos tiveram acesso a recursos didáticos com conteúdo sobre Anatomia e questões de vestibulares trabalhando os temas, além da possibilidade de poderem expandir e exercitar seus conhecimentos.

Percebemos muitas transformações nos alunos extensionistas mesmo antes de iniciarem efetivamente os encontros presenciais. Todas as etapas já mencionadas resultaram e vêm resultando positivamente na mudança de atitude e de percepção em relação à pesquisa, extensão e ensino. Os alunos extensionistas relatam constante aprendizado sobre a Anatomia Humana e

estratégias de educação em saúde, tão importante para a formação médica. Neste sentido, podemos perceber que alguns dos resultados esperados já estão sendo alcançados, entre eles:

- Divulgação do projeto de extensão nas redes sociais Instagram®;
- Fechamento de parcerias com as escolas;
- Produção e início da distribuição de material educativo e para o ENEM, nas escolas;
- Os alunos extensionistas vêm gradativamente ampliando e aprimorando suas habilidades de comunicação;
- Os extensionistas relatam maior aprendizagem de Anatomia, por terem que estudar e produzir os materiais;
- Os extensionistas estão aprendendo a produzir conhecimento científico ao perceberem as práticas da pesquisa e da extensão. São incentivados a terem autonomia e iniciativa para a realização das atividades, o que se mostra um processo em desenvolvimento;
- Por fim, ainda que precoce, acreditamos que os estudantes das escolas públicas e privadas assistidos pelo Anato Academy, tiveram acesso a conhecimento anatômico que alguns não teriam em suas escolas, e que agora pode contribuir para um melhor desempenho no ENEM.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os extensionistas do projeto vivenciaram estratégias de educação em saúde diante do cenário de pandemia, desenvolvendo maturidade ao utilizarem diversas ferramentas para alcançar o público do referido projeto. A maior parte do público-alvo beneficiado pelo projeto aconteceu através de conteúdo publicado nas redes sociais e do recebimento de material didático digital, outra parte com maiores dificuldades de acesso à internet pode participar ao receber material didático na forma de cartilhas e apostilas focadas nos sistemas orgânicos, conteúdo do ENEM. Durante o desenvolvimento dos primeiros passos do Anato Academy, aprendemos muito sobre a capacidade de reinventar, de adaptar e de ter empatia para conseguir que o projeto realmente fosse efetivo em contribuir com o acesso à informação.

Os extensionistas modificaram suas posturas diante do atual período, lembraram de momentos nos quais ainda estudavam para prestar o vestibular, diante disso, discutiram e aplicaram estratégias que acreditaram serem efetivas para ajudar de fato esses estudantes no

competitivo ENEM.

Nesse sentido, a principal limitação desse estudo foi a falta de coleta de dados acerca da efetividade da transferência de conhecimentos aos participantes do projeto, pois não foram realizados testes de aprendizagem devido à dificuldade de acesso e de horário em comum entre todos os estudantes participantes. Todavia, acreditamos que o referido projeto conseguiu oferecer conhecimento anatômico, minimizando os efeitos da pandemia no ensino de Ciências dos estudantes.

REFERÊNCIAS

ABRANCHES, Monica. Extensão Universitária remota? Os desafios em tempos de pandemia.

Jornal Pensar a Educação, 10 de julho de 2020. Disponível em:

<<https://pensaraeducacao.com.br/pensaraeducacaoempauta/extensao-universitaria-remota-os-desafios-em-tempos-de-pandemia/>>. Acesso em: 17 de maio de 2021

ALMEIDA, L. H. R. B. et al. Ensinando e aprendendo com portadores de Esclerose Múltipla: relato de experiência. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 60, n. 4, p. 460-463, Aug. 2007.

ALVES, M. S. Relato de experiência no PRONATEC/MEDIOTEC. **Revista Psicologia & Saberes**, v. 9, n. 15, p. 98-105, 2020.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF:Senado Federal: Centro Gráfico, 1988.

PAMPLONA, Nicola. Segundo IBGE, 4,3 milhões de estudantes brasileiros entraram na pandemia sem acesso à internet. **Folha de São Paulo**, Rio de Janeiro, 14 de abril de 2021. Disponível em: <<https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2021/04/segundo-ibge-43-milhoes-de-estudantes-brasileiros-entraram-na-pandemia-sem-acesso-a-internet.shtml>>. Acesso em: 13 de maio de 2021.

PROGEPE. Relacionamentos interpessoais em tempos de confinamento: dicas para lidar com conflitos. Disponível em: <http://www.uff.br/?q=relacionamentos-interpessoais-em-tempos-de-confinamento-dicas-para-lidar-com-conflitos>. Acesso em: 15 de maio de 2021.

UFCA. A Extensão em tempo de pandemia: atuação das ações durante o isolamento social. Universidade Federal do Cariri. 2020. Disponível em: <https://www.ufca.edu.br/noticias/a-extensao-em-tempo-de-pandemia-atuacao-das-acoes-durante-o-isolamento-social/>. Acesso em: 17 de maio de 2021.

UFES. Ações de Extensão da Ufes no enfrentamento à pandemia de Covid-19. Pró-reitoria de extensão da UFES. 2021. Disponível em: <https://proex.ufes.br/conteudo/acoes-de-extensao-da-ufes-no-enfrentamento-pandemia-de-covid-19>. Acesso em: 17 de maio de 2021.

CAPÍTULO 85

RELATO DE EXPERIÊNCIA NA ABLAÇÃO POR REENTRADA NODAL EM LACTANTE COM SÍNDROME DE WOLFF PARKINSON WHITE

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c85](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c85)

Lourenço VP ¹, Moreira AC ²

¹ Universidade de Santa Cruz do Sul

² Hospital Santa Cruz

Resumo: O mecanismo arritmogênico mais comum encontrado na prática clínica é a reentrada, podendo ocorrer em indivíduos previamente hígidos, como também em certas patologias. A síndrome de Wolff Parkinson White envolve os mecanismos de via acessória que provocam uma pré-excitação ventricular associado as taquiarritmias recorrentes. **Objetivos:** Relatar a experiência do estudante de graduação em enfermagem durante o estágio extracurricular no setor de hemodinâmica no procedimento de ablação em uma lactante de 34 anos com síndrome de Wolff Parkinson White. **Público alvo:** Estudantes da graduação em enfermagem. **Descrição das ações desenvolvidas:** M.J, lactante, 34 anos, diagnosticada com taquicardia por reentrada nodal. Compareceu para procedimento eletivo de ablação. Procedimento ocorrido no serviço de hemodinâmica do Hospital Santa Cruz na cidade de Santa Cruz do Sul no Estado do Rio Grande do Sul, no mês de junho de 2021. A entrevista para coleta de dados de enfermagem foi realizada segundo parecer normativo nº001/2015/cofen sendo atividade privativa do enfermeiro, em seguida a equipe de enfermagem conduziu a paciente para sala de procedimento, onde foi realizada ablação de circuito arritmogênico por cateter de radiofrequência através de artéria radial direita em via acessória póstero-septal direita, realizado com sucesso. Procedimento sem intercorrências, com tempo total de 25 minutos. **Considerações finais.** O estágio extracurricular contribui para o pensamento crítico e na construção do conhecimento do estudante de graduação. A síndrome de Wolff- Parkinson White é a mais frequente das síndromes de pré-excitação cardíaca, podendo apresentar as formas sintomáticas e assintomáticas, sendo o diagnóstico precoce importante ferramenta para prevenir seu pior desfecho, a morte súbita.

Palavras-chave: Ablação, circuito arritmogênico, taquicardia por reentrada nodal, wolff parkinson white

Área Temática: Ciências da vida

E-mail do autor principal: vinipl15369@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

O mecanismo arritmogênico mais comum encontrado na prática clínica é a reentrada, podendo ocorrer em indivíduos previamente hígidos, como também em certas patologias. A síndrome de Wolff Parkinson White envolve os mecanismos de via acessória que provocam uma pré-excitação ventricular associado as taquiarritmias recorrentes.

As células cardíacas ou miócitos são altamente especializadas, responsável tanto pelos impulsos elétricos, quanto pela contração mecânica. Alguns miócitos apresentam automaticidade, que é a capacidade das células receberem despolarização diastólica espontânea e iniciar impulso elétrico na ausência de estímulos externos. Em humanos, as arritmias cardíacas são altamente prevalentes em todas as faixas etárias e podem ocorrer tanto no contexto da doença cardíaca subjacente quanto em corações estruturalmente normais.

Embora as apresentações clínicas das arritmias sejam diversas, nas células elas compartilham propriedades eletrofisiológicas comuns. Os três principais mecanismos de arritmias cardíacas são alterações no automatismo, atividade desencadeada e reentrada (SANDERS, 2005).

Durante a atividade elétrica normal o ciclo cardíaco começa no nó sinoatrial e continua a se propagar até que todo o coração seja ativado, quando todas as fibras foram despolarizadas e estão em fase completamente refratária, o impulso é extinto. Se um grupo isolado de fibras não for despolarizado na fase inicial, essas fibras permanecem excitadas até que o impulso seja extinto. Nesse contexto essas fibras podem atuar como elo de excitação de áreas previamente despolarizadas, mas que se recuperaram da despolarização inicial. (SOMOTO, 2008). Esse tipo de mecanismo é conhecido por vários nomes como reentrada, movimento circular, ou taquicardia recíproca.

A reentrada foi dividida em dois grupos, reentrada anatômica ou clássica, em que o circuito é determinado por estruturas anatômicas, e, reentrada funcional caracterizadas por falta de limites anatômicos. Ambas as formas podem coexistir e compartilhar mecanismos biofísicos comuns. (MILLER, 2009).

O relato a seguir é um relato de experiência vivenciado por um acadêmico do curso de graduação em enfermagem de um município do interior do Estado do Rio Grande do Sul, em um hospital universitário no serviço de hemodinâmica, onde uma mulher por codinome M.J, lactante, 34 anos, diagnosticada com taquicardia por reentrada nodal submeteu-se a um procedimento de ablação realizado no mês de junho do ano de 2021.

2 METODOLOGIA

Procedimento ocorrido no serviço de hemodinâmica do Hospital Santa Cruz na cidade de Santa Cruz do Sul no Estado do Rio Grande do Sul, no mês de junho de 2021. A entrevista para coleta de dados de enfermagem foi realizada segundo parecer normativo nº001/2015/cofen como atividade privativa do enfermeiro. A equipe de enfermagem conduziu a paciente para sala de procedimento para realização ablação de circuito arritmogênico por cateter de radiofrequência através de artéria radial direita em via acessória póstero-septal direita.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

M.J, lactante, 34 anos, diagnosticada com taquicardia por reentrada nodal. Compareceu para procedimento eletivo de ablação. Procedimento ocorrido no serviço de hemodinâmica do Hospital Santa Cruz na cidade de Santa Cruz do Sul no Estado do Rio Grande do Sul, no mês de junho de 2021.

A entrevista para coleta de dados de enfermagem foi realizada segundo parecer normativo nº001/2015/cofen sendo atividade privativa do enfermeiro, em seguida a equipe de enfermagem conduziu a paciente para sala de procedimento, onde foi realizada ablação de circuito arritmogênico por cateter de radiofrequência através de artéria radial direita em via acessória póstero-septal direita, realizado com sucesso. Procedimento sem intercorrências, com tempo total de 25 minutos.

A ablação é o tratamento definitivo para tratar as arritmias cardíacas, trata-se de uma microcoagulação feita com energia de radiofrequência, aplicada com cateteres especiais nos focos das arritmias, que são mapeadas pelo estudo eletrofisiológico. Um computador faz os ajustes da quantidade de energia aplicada no coração para que a temperatura sentida na ponta do cateter seja constante e não ultrapasse os limites da segurança.

A maior parte das arritmias são curadas através da ablação. Como a ablação compreende um estudo eletrofisiológico, alguns medicamentos devem ser suspensos antes do procedimento, e recomenda-se jejum de 6 horas. O preparo é feito através de tricotomia nas regiões inguinais e torácica, exame pré-operatório básico de sangue e eletrocardiograma, além de instalação de

terapia endovenosa pré e pós procedimento. Destaca-se o alto índice de sucesso no procedimento, pós operatório confortável, indolor com apenas um curativo e com menores possibilidades de complicações. Segundo dados atuais de acordo com o tipo de arritmia e o local tratado, apenas de 2% a 5% a arritmia poderá voltar após a ablação.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

. O estágio extracurricular contribui para o pensamento crítico e na construção do conhecimento do estudante de graduação. A síndrome de Wolff- Parkinson White é a mais frequente das síndromes de pré-excitação cardíaca, que pode apresentar formas sintomáticas e assintomáticas. O diagnóstico precoce é importante ferramenta para prevenir seu pior desfecho, a morte súbita. A maioria dos pacientes sente cominação de taquicardia até o segundo e o terceiro mês após o procedimento conhecida como síndrome pós-ablação não devendo causar preocupação e costuma desaparecer naturalmente.

REFERÊNCIAS

Sanders P, Berenfeld O, Hocini M, Jaïs P, Vaidyanathan R, Hsu LF, et-al. A análise espectral identifica locais de atividade de alta frequência mantendo a fibrilação atrial em humanos. *Circulação*. 112 (2005), pp. 789-797.

Centurio OA, Shimizu A, Somoto S, Konoe A. Mecanismos para a gênese da fibrilação atrial paroxística na síndrome de Wolff-Parkinson-White: vulnerabilidade do músculo atrial intrínseco vs. propriedades eletrofisiológicas da via acessória. *Europace*, 10 (2008), pp. 294-302.

Peters NS, Coromilas J, Severs NJ, Wit AL. A distribuição da junção de lacuna da conexina 43 perturbada se correlaciona com a localização dos circuitos de reentrada na zona de fronteira epicárdica da cicatrização de infartos caninos que causam taquicardia ventricular. *Circulação*, 95 (1997), pp. 988-996.

Arq Bras Cardiol. Junho de 2020; 114 (6): 1015-1026.

Calkins H, Hindricks G, Cappato R, Kim YH, Saad EB, Aguinaga L, et al. 2017. Declaração de consenso de especialistas HRS / EHRA / ECAS / APHRS / SOLAECE sobre cateter e ablação cirúrgica de fibrilação atrial. *Ritmo do coração*. 2017; 14 (10): e275-e444.

Heidbuchel H, Wittkamp FH, Vano E, Ernst S, Schilling R, Picano E, et al. Maneiras práticas de reduzir a dose de radiação para pacientes e funcionários durante implantações de dispositivos e procedimentos eletrofisiológicos. *Europace*. 2014; 16 (7): 946-64.

Lickfett L, Mahesh M, Vasamreddy C, Bradley D, Jayam V, Eldadah Z, et al. Exposição à radiação durante a ablação por cateter de fibrilação atrial. *Circulação*. 2004; 110 (19): 3003-10.

Perisinakis K, Damilakis J, Theocharopoulos N, Manios E, Vardas P, Gourtsoyiannis N. Avaliação precisa da dose de radiação efetiva do paciente e risco de detrimento associado de procedimentos de ablação por cateter de radiofrequência. *Circulação*. 2001; 104 (1): 58-62.

Quesada A, Cózar R, Anguera I; em representação dos colaboradores do Registro Español de Ablación con Catéter. *Rev Esp Cardiol*. Dezembro de 2020; 73 (12): 1049-1060.

Kwak J. Anesthesia for electrophysiology studies and catheter ablations. *Semin Cardiothorac Vasc Anesth*. 2013 Sep;17(3):195-202.

CAPÍTULO 86

REPERCUSSÃO ÓSSEA NOS PACIENTES COM DOENÇA RENAL CRÔNICA

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c86](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c86)

Luana Maria de Moura Santos¹, Bruna Thaís Santos da Rocha², Marcela Côrte Real Fernandes³, Ricardo Eugenio Varela Ayres de Melo⁴

¹ Graduanda em Odontologia pelo Centro Universitário FACOL- UNIFACOL, luanasantos.99412@gmail.com

² Graduanda em Odontologia pelo Centro Universitário FACOL- UNIFACOL, bruna.th.rocha@hotmail.com

³ Professora do Centro Universitário FACOL- UNIFACOL, marcela.cortereal@gmail.com

⁴ Professor do Centro Universitário FACOL- UNIFACOL, revamelo@yahoo.com

RESUMO

Em todo o mundo a doença renal crônica (DRC) é considerada um problema de saúde pública com predomínio crescente e resultados adversos. A DRC é uma síndrome clínica secundária à alteração permanente da função e/ou estruturação do rim definida por sua irreversibilidade e evolução lenta e progressiva. **Objetivo:** Mostrar a repercussão óssea associada a pacientes com doença renal crônica, demonstrando os processos fisiopatológico do distúrbio mineral ósseo ocasionado pela doença renal crônica. **Método:** A metodologia aplicada foi a revisão de literatura de artigos científicos nos idiomas português e inglês com um levantamento bibliográfico nas seguintes plataformas: periódicos capes, PubMed e SciELO, dos últimos 5 anos e, em livros com os temas correlacionados. Por meio de uma pesquisa de natureza exploratória foi possível analisar e discutir sobre o tema apresentado. **Resultados:** As alterações no metabolismo mineral e ósseo são observadas nos estágios iniciais da DRC progredindo de acordo com o declínio da função renal. A osteodistrofia renal é dividida em doenças de alta e baixa remodelação óssea, sendo a osteíte fibrosa uma doença de alta remodelação óssea que se manifesta pelo o hiperparatireoidismo secundário (HPS). **Conclusão:** É observado que as alterações do metabolismo mineral ósseo em pacientes com doença renal crônica são frequentes e progressivas à medida que a disfunção renal progride, tendo maior chance de fraturas ósseas, sendo fundamental o conhecimento do cirurgião-dentista frente a estas alterações, principalmente em procedimentos cirúrgicos.

Palavras-chave: Doença renal crônica; Distúrbios minerais; Repercussão óssea.

Área Temática: Ciências da Saúde.

E-mail do autor principal: luanasantos.99412@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

Em todo o mundo a doença renal crônica (DRC) é considerada um problema de saúde pública com predomínio crescente e resultados adversos (CARBONARA *et al*, 2020).

A DRC é uma síndrome clínica secundária à alteração permanente da função e/ou estruturação do rim definida por sua irreversibilidade e evolução lenta e progressiva (ANIMARIT, 2020; WEBSTER *et al*, 2017).

As doenças renais estão relacionadas a uma taxa de mortalidade bastante elevada, associada a produção de doenças cardiovasculares, relacionados a síndrome do distúrbio mineral ósseo. O risco de doença esclerótica é de 87% para doença renal leve e moderada (HRUSKA *et al*, 2015). Os distúrbios minerais ósseos são considerados complicações da doença renal crônica, gerando várias consequências clínicas como fraturas, deformidades esqueléticas, dores ósseas, calcificação vascular, doença cardiovascular e óbito (CARBONARA *et al*, 2020). Esses distúrbios não afetam apenas saúde óssea, mas também associados a uma maior deterioração da função renal (RAMOS *et al*, 2019).

As principais causas ou fatores de riscos para DRC são diabetes, hipertensão, glomerulonefrite crônica, pielonefrite crônica, uso crônico de antiinflamatórios, doença renal policística, doenças autoimunes, doença renal prolongada e malformações congênitas (ANIMARIT, 2020; WEBSTER *et al*, 2017). Alguns indicadores incluem albuminúria, alterações, mas imagens renais, desarranjos hidroeletrolíticos, sedimentos de urina anormais, taxa de filtração glomerular (TFG) (ANIMARIT, 2020; WEBSTER *et al*, 2017; GAITONDE *et al*, 2017).

O objetivo deste artigo é mostrar a repercussão óssea associada a pacientes com doença renal crônica, demonstrando os processos fisiopatológico do distúrbio mineral ósseo ocasionado pela doença renal crônica.

1 MÉTODO

A metodologia aplicada foi a revisão de literatura de artigos científicos nos idiomas português e inglês com um levantamento bibliográfico nas seguintes plataformas: periódicos capes, PubMed e SciElo e, em livros com os temas correlacionados. Por meio de uma pesquisa de natureza exploratória foi possível analisar e discutir sobre o tema apresentado.

2 RESULTADOS E DISCUSSÃO

ANATOMIA E FISIOLOGIA RENAL

Através das atividades orgânicas ocorre a decomposição de proteínas, lipídeos, carboidratos e outros produtos que necessitam serem eliminados para o exterior. A excreção ocorre através da urina, logo o sistema urinário compreende órgãos responsáveis pela produção de urina que são os rins e pela excreção que são ureteres, bexiga e uretra (DANGELO, FATTINI, 2007).

Os rins estão localizados à direita e à esquerda da coluna vertebral, circundado por tecido adiposo, delimitados superiormente pela décima segunda vertebra torácica e inferiormente com a terceira vertebra lombar. O rim direito normalmente é mais baixo que o esquerdo devido a sua relação com o fígado o rim esquerdo se encontra mais próximo do plano mediano. Cada rim tem aproximadamente 1.250.000 néfrons que são unidades funcionais do rim (STANDRING, 2010; DANGELO, FATTINI, 2007).

Figura 1- componentes do sistema urinário.

Fonte: DANGELO, FATTINI, 2007.

Os rins são responsáveis pela purificação do sangue eliminando através da excreção produtos finais como ureia, creatinina, ácido úrico, produtos de nitrogênio, do glucagon, da insulina, e de grande parte dos fármacos, desempenha função de regulação do equilíbrio eletrolítico e hidrolítico, também tem função endócrina sintetizando e liberando eritropoiena que está relacionada com a produção de células vermelhas do sangue; renina, que influencia

na regulação da pressão arterial, atua na síntese de 1,25vitamina D que é a forma metabolicamente ativa da vitamina D que está relacionada a absorção do cálcio e controle do metabolismo mineral (CASTRO *et al*, 2017; STANDRING, 2010).

DOENÇA RENAL CRÔNICA

A doença renal é definida quando há uma anormalidade na estrutura ou função renal com duração maior que três meses, sendo considera função renal diminuída quando a taxa de filtração glomerular é menor que 60 ml por min por 1,73 m² (GAITONDE *et al*, 2017).

A Kidney Disease Outcome Quality Initiative, 2002, classifica a DRC em estágios por meio de diretrizes de acordo com grau de diminuição da taxa de filtração glomerular demonstrado na tabela 1 abaixo:

Tabela 1- Grau de insuficiência renal.

Estágios	FG (ml/min/1.73 m ²)	Grau de insuficiência renal
1	≥ 90	Dano renal / FG normal
2	60-80	Dano renal / FG Leve
3	30-59	Dano renal moderado
4	15-29	Dano renal severo
5	<15	Falha renal

Fonte: Kidney Disease Outcome Quality Initiative, 2002.

Além do débito urinário diário a DRC pode ser descoberta através de sinais e sintomas clínicos e avaliação laboratorial (CASTRO *et al*, 2017).

AValiação Laboratorial

A avaliação laboratorial ocorre pela determinação dos valores de nitrogênio ureico e da creatinina no sangue, sendo os principais indicadores que demonstram alterações séricas aumentadas e excreção diminuída, como pode ser observado na tabela 2. Além disso, o hemograma é realizado para avaliar anemia (normocítica e normocrômica) que acomete esses pacientes devido a produção de eritropoietina. No coagulograma ocorre tempo de sangria aumentado devido as toxinas urêmica que inibe a adesão plaquetária. Também é observado cálcio sérico diminuído, hipercalcemia e fósforo sérico aumentado (CASTRO *et al*, 2017; QUADRELLI, SOUSA, 2019).

Tabela 2- Valores laboratoriais para avaliar função renal

	Teste Laboratorial	Valores de Referência	Indicadores de insuficiência Renal	Indicadores de Falência Renal
URINA	Clearance de creatinina	85-125 mL/min (mulheres) 97-140 mL/min (homens)	50-90 mL/min	10-50 mL/min (moderado) <10 mL/min (grave)
	Taxa de filtração glomerular	100-150 mL/min	50-90 mL/min	10-50 mL/min (moderado) <10 mL/min (grave)
SORO	Nitrogênio ureico sanguíneo	8 a 18 mg/dL (3 a 6,5 mmol/L)	20-30 mg/Dl	30-50 mg/dL (moderado) >50 mg/dL (grave)
	Creatinina	0,6 a 1,20 mg/dL	2-3 mg/Dl	3-6 mg/dL (moderado) >6 mg/dL (grave)

Fonte: De Rosse e Glick, 1996.

ALTERAÇÕES MINERAIS

A doença mineral óssea (DMO) relacionada a DRC integra anormalidades bioquímicas, esqueléticas e as calcificações extraesqueléticas, ocorrendo devido alterações no metabolismo mineral ocasionada pela perda progressiva da função renal, sendo manifestada através do desequilíbrio de fosforo (P), cálcio (Ca^{2+}), hormônio da paratireoide (PTH), klotho, vitamina D, e fator de fibroblastos 23 -FGF-23 (VILLANUEVA et al, 2016).

HORMÔNIO DA PARATIREOIDE

A liberação de PTH é controlado pelo cálcio e fosforo plasmático: Quando há elevação de Ca^{2+} , ocorre a diminuição da secreção de PTH. Quando se têm um aumento de fosforo ocorre a diminuição de Ca^{2+} , e a diminuição do cálcio estimula a secreção do PTH. O FGF-23 tem ação inibitória direta sobre o PTH, porém na DRC ocorre resistência do PTH ao efeito do FGF-23, isso porque, há uma diminuição do receptor FGF-23 na glândula paratireoide e da expressão do Klotho. O calcitrol também age na glândula paratireoide inibindo a produção do PTH através do seu receptor (VILLANUEVA et al, 2016; RODRÍGUEZ-ORTIZ, RODRÍGUEZ, 2020).

O PTH aumenta os valores de Ca^{2+} devido a estimulação indireta de reabsorção óssea que ocorre por meio da ativação de osteoblastos que liberam fatores de diferenciação osteoclásticos, que se liga aos osteoclastos. Além disso, reduz a expressão de receptores de

vitamina D e de proteínas sintetizadas pelos osteoblastos que diminuem a ação dos osteoclastos (VILLANUEVA *et al*, 2016).

FATOR DE FIBROBLASTOS 23 (FGF-23)

A progressão da DRC compromete progressivamente a excreção e filtração da carga de fósforo, exigindo maior excreção fracionada de fósforo para manter o equilíbrio, sendo essa função controlada pelo o fator de crescimento de fibroblastos 23 e o hormônio da paratireoide, estes reduzem a expressão dos co-transportadores de fosfato de sódio no túbulo proximal do rim (LUNYERA, SCIALLA, 2018). O FGF 23 necessita do klotho de comprimento total para converter o FGFR canônico em um receptor específico para que se tenha ação em tecidos alvos. O efeito do FGF 23 na excreção do fosfato é limitado pela deficiência do klotho tubular proximal. Na DRC o aumento do FGF 23 e PTH resulta em efeitos adversos no metabolismo de vitamina D. O FGF 23 aumentado cria um estado de deficiência de 1-25-D que ocasiona a baixa absorção de cálcio gastrointestinal reduzindo os níveis de cálcio sérico. Tanto o FGF23 quanto o PTH parecem aumentar a reabsorção de cálcio no túbulo distal do rim, o que pode compensar a baixa absorção gastrointestinal (ZOU *et al*, 2018).

KLOTHO

O klotho solúvel é a principal forma funcional na circulação, sendo detectado no sangue, urina e líquido cefalorraquidiano, atuando como hormônio. Há outra forma funcional do klotho que é sinalização do receptor FGF. O klotho é considerado um co-receptor essencial na ligação do FGF 23 aos seus receptores (LUNYERA, SCIALLA, 2018).

O klotho solúvel tem ação de regular diretamente a excreção de fósforo no rim e também participa da homeostase mineral sistêmica regulando a secreção de FGF 23, 1 alfa atividade de hidroxilase que é uma enzima responsável na produção 1-25 vitamina D e do PTH (ZOU *et al*, 2018).

VITAMINA D

O papel fisiológico principal da vitamina D é a homeostase de cálcio e fósforo. A diminuição da concentração dos níveis de 25- dihidroxivitamina- D pode estar relacionada a diminuição da exposição ao sol, diminuição da ingestão nutricional ou uma perda de ligação

da proteína de ligação à vitamina D. Os níveis baixo de 25- dihidroxivitamina D está associado a um maior risco de progressão da doença renal (ZAND, KUMAR, 2017).

Na DRC inicial ações fisiológicas da secreção de FGF 23 incluem diminuição da produção do calcitriol e produzindo deficiência de 25- hidroxivitamina D, através da inibição do 1-alfa- hidroxilase e estimulação da 24-hidroxilase nos túbulos renais proximais. A deficiência em calcitriol gera a diminuição da absorção do cálcio pelo o intestino causando a hipocalcemia e diminuindo os níveis teciduais de receptores de vitamina D, gerando na glândula paratireoide uma resistência à regulação do calcitriol estimulando a secreção de PTH, levando ao hiperparatireoidismo secundário (HRUSKA *et al*, 2015).

OSTEODISTROFIA RENAL

Alterações ósseas como desmineralização, perda de osso alveolar e lâmina dura, diminuição gradual do trabeculado ósseo, remodelação óssea anormal após exodontias, fraturas espontâneas dos maxilares, perda das bordas do canal mandibular e entre outros são observadas com frequências em osteodistrofia renal (CASTRO *et al*, 2017). As alterações no metabolismo mineral e ósseo são observadas nos estágios iniciais da DRC progredindo de acordo com o declínio da função renal. A osteodistrofia renal é dividida em doenças de alta e baixa remodelação óssea, sendo a osteíte fibrosa uma doença de alta remodelação óssea que se manifesta pelo o hiperparatireoidismo secundário (HPS). Nos estágios iniciais da DRC ocorre a retenção de fosforo (P), este possui papel importante para desenvolvimento do HPS, acredita-se também que o aumento nos níveis de fibroblastos (FGF-23) reduza os níveis de 1,25 vitamina D (calcitriol) podendo ser fator inicial que desencadeia o HPS (VILLANUEVA *et al*, 2016; RODRÍGUEZ-ORTIZ, RODRÍGUEZ, 2020).

O risco de fraturas em pacientes com DRC é quatro vezes maior comparado a população em geral, sendo uma possível explicação para isso é que na DRC ocorre uma diminuição de massa óssea. Em pacientes que realizam dialise níveis de PTH <100 e >450 pg/mL foram associados respectivamente ao baixo e alto remodelamento ósseo (BARRETO *et al*, 2017).

A perda progressiva da função renal causa o aumento de osso esponjoso e diminuição do osso cortical, isso ocorre porque há deposição de fibrilas colágenas imaturas ao invés de fibrilas lameras maduras que, aparentemente há aumento de massa óssea, porém não há resistência. Pacientes com DRC podem ter ganho ou perda de volume ósseo que vai

depende do equilíbrio ósseo geral. No equilíbrio ósseo positivo é observado quando os osteoblastos depositam novo osso que possui composição principal tecido colágeno imaturo levando a osteosclerose. Quando ocorre equilíbrio negativo há perda de osso cortical e esponjoso que resulta em osteopenia ou osteoporose, ou seja, na osteodistrofia renal de alta e de baixa remodelação pode ser observado a osteoporose (HRUSKA *et al*, 2015).

3 CONCLUSÃO

É observado que as alterações do metabolismo mineral ósseo em pacientes com doença renal crônica são frequentes e progressivas à medida que a disfunção renal progride, tendo maior chance de fraturas ósseas, sendo fundamental o conhecimento do cirurgião-dentista frente a estas alterações, principalmente em procedimentos cirúrgicos.

REFERÊNCIAS

- AMMIRATI, A. L. Chronic Kidney Disease. **Rev assoc med bras**. São Paulo, 2020.
- BARRETO, F. C.; COSTA, C. R. V.; REIS, L. M.; CUSTÓDIO, M. R. Biópsia óssea na prática nefrológica. **Braz. J. Nephrol.** 40(4):366-374. 2018.
- CARBONARA, C. E. M.; REIS, L. M.; QUADROS, K. R. S.; ROZA, N. A.V.; SANO R.;
- CARVALHO, A. B. Osteodistrofia renal e desfechos clínicos: dados do Registro Brasileiro de Biópsias Ósseas – REBRABO. **Braz. J. Nephrol.** 42(2):138-146. 2020.
- CASTRO, D. S.; HERCULANO, A. B. S.; GAETTI JARDIM, E. C.; COSTA, D. C. Alterações bucais e o manejo odontológico dos pacientes com doença renal crônica. **Arch Health Invest** 6(7):308-315. 2017.
- DANGELO, J. G.; FATTINI, C. A. Anatomia humana sistêmica e tegumentar. 3 ed. **Editora Atheneu**, São Paulo, 2007.
- DE ROSSI, S. S.; GLICK M. Dental considerations for the patient with renal disease receiving hemodialysis. **J Am Dent Assoc.** 127(2):211- 1996.
- GAITONDE, D. Y.; COOK, D. L.; RIVERA, I. M. Chronic Kidney Disease: Detection and Evaluation. **American Family Physician.** Volume 96, Number 12, December 15, 2017.
- STANDRING, S. (Ed.). **Gray's anatomia: a base anatômica da prática clínica**. 40. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
- HRUSKA, K. A.; SEIFERT, M.; SUGATANI, T. Pathophysiology of the Chronic Kidney Disease – Mineral Bone Disorder (CKD-MBD). **Curr Opin Nephrol Hypertens.** 24(4): 303–309. 2015.
- LUNYERA, J.; SCIALLA, J. J. Update on chronic kidney disease mineral and bone disorder in cardiovascular disease. In: **Seminars in nephrology**. WB Saunders, p. 542-558. 2018.

National Kidney Foundation. K-DOQI clinical practice guidelines for chronic kidney disease: evaluation, classification and stratification. **Am J Kidney Dis.** 39(2 Suppl 1):S1-266. 2002.

ORTIZ RODRÍGUES, M. E.; Rodríguez M. Recent advances in understanding and managing secondary hyperparathyroidism in chronic kidney disease. **Faculty Rev:**1077 Last updated: 01 SEP 2020.

QUADRELLI, J. B. S.; SOUSA, C. O. Manifestações bucais e o manejo odontológico em pacientes com doença renal crônica. **Rev. JOPIC.** Vol. 02. Teresópolis- RJ, 2019.

RAMOS, M. A. L.; ARCE, J. A. R.; ROMERO, J. M. A.; JIMÉNEZ, S. G.; OSORIO, J. M. C.; BOHORQUEZ, D. S. et al. Prevalencia de las alteraciones del metabolismo óseo-mineral asociadas a enfermedad renal crónica no en diálisis. **Rev. Colomb. Nefrol.** 6(1): 17 - 27, enero – junio 2019.

VILLANUEVA, L. S.; AGUILERA, A.; GONZÁLEZ, C. S.; TOMERO, J. A. S. Enfermedad óseo-mineral en la enfermedad renal crónica Implicaciones en el riesgo cardiovascular. **Insuf Card.**11 (1): 39-49. 2016.

WEBSTER, A. C.; NAGLER, E.; MORTON, R. L.; MASSON, P. Chronic Kidney Disease. **The Lancet**, v.389, n.10075, p. 1238-1252, march, 2017.

ZAND, L.; KUMAR, R. The use of vitamin D metabolites and analogues in the treatment of chronic kidney disease. **Endocrinology and Metabolism Clinics**, v. 46, n. 4, p. 983-1007, 2017.

ZOU, D.; WU, W.; HE, Y.; MA, S.; GAO, J. The role of klotho in chronic kidney disease. **BMC nephrology**, v. 19, n. 1, p. 1-12, 2018.

CAPÍTULO 87

RESPOSTA IMUNOLÓGICA: O POTENCIAL ELO ENTRE SISTEMA ABO E SUSCETIBILIDADE À COVID-19

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c87](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c87)

Vitória Freire Lima¹, **Tainah Guerra Pereira**², **Lucas Cruz Torres**³, **Diana Ísis Ribeiro Macêdo**⁴, **Veruscka Pedrosa Barreto**⁵

¹Universidade Federal de Campina Grande, (vitoriaflima4@gmail.com)

² Universidade Federal de Campina Grande, (tai.guerrap@gmail.com)

³ Universidade Federal de Campina Grande, (lucascruztorres@hotmail.com)

⁴ Universidade Federal de Campina Grande, (dianamed1221@gmail.com)

⁵ Universidade Federal de Campina Grande, (barretovk@hotmail.com)

Resumo

Objetivo: investigar a resposta imunológica em relação à hipótese de que o grupo sanguíneo influencia na suscetibilidade à infecção pela COVID-19. **Método:** trata-se de uma revisão narrativa da literatura nas bases Medline e Lilacs e na biblioteca da Scielo. Como critérios de inclusão têm-se: ser artigo completo que versasse sobre o tema proposto e ser publicado em inglês, espanhol ou português. Como critérios de exclusão têm-se artigos de opinião e aqueles que não se encaixavam na temática foram descartados. **Resultados:** 34 resultados foram encontrados, dos quais apenas 08 foram utilizados após a aplicação dos fatores de inclusão e exclusão. A produção científica existente aponta que há relação entre o Sistema ABO e desenvolvimento de doença. A depender do fator alvo da análise aforma-se maior predominância de complicações nos tipos sanguíneos A ou B. Sendo o fenotipo O o que possui menor ocorrência de detecção de Covid-19. **Considerações Finais:** O mecanismo dessa relação ainda não é conhecido e os autores sugerem diferentes hipóteses, mas todas são especulativas, de modo que é necessário incentivar novos estudos de análise genômica, diminuindo as limitações das pesquisas para que resultados mais conclusivos sejam observados

Palavras-chave: Sistema ABO de Grupos Sanguíneos; COVID-19; Suscetibilidade a Doenças.

Área Temática: Ciências da Saúde;

E-mail do autor principal: vitoriaflima4@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

No final do ano de 2019, foi descoberto em Wuhan, na China, o coronavírus 2 da síndrome respiratória aguda grave, com sigla no inglês (SARS-CoV-2), causou surtos da doença

do coronavírus 2019 com sigla do inglês (COVID-19), que rapidamente evoluíram para uma pandemia global. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), a pandemia já atinge cerca de 196 países em todos os continentes e registra até o dia 25 de setembro de 2020 a marca de 32,2 milhões de pessoas infectadas no mundo, e o número de mortos ultrapassa 983 mil (GROOT *et al.*, 2020).

Dada a morbidade significativa associada à COVID-19 e a superlotação do sistema de saúde, é necessária a identificação e a priorização de indivíduos de maior risco. No entanto, isto constitui-se um desafio crítico, visto que a infecção por SARS-CoV-2 apresenta grande heterogeneidade clínica. Cerca de 30% das pessoas infectadas são assintomáticas e 55% apresentam sintomas gripais e outros, constituindo uma categoria de sintomas leves representada por 85% dos doentes (ELLINGHAUS *et al.*, 2020). Os 15% restantes desenvolvem insuficiência respiratória secundária à pneumonia intersticial bilateral e à síndrome do desconforto respiratório agudo, característica da COVID-19 em sua forma severa e fator crítico de mortalidade: em países de primeiro mundo, foi observado que as taxas de mortalidade aumentam cerca de 50% em pacientes que necessitam de admissão em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) com ventilação mecânica invasiva (ELLINGHAUS *et al.*, 2020; GROOT *et al.*, 2020).

Nesse contexto, é notório o interesse científico em obter dados que determinem quais fatores de risco podem estar relacionados à progressão e à gravidade da doença. Observações clínicas sugerem maior mortalidade constantemente associada à idade avançada, ao sexo masculino e à presença de comorbidades, como hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares e pulmonares, entre outras (ZHAO *et al.*, 2020; GALLIAN *et al.*, 2020).

Outrossim, existem inúmeras hipóteses à nível molecular que buscam determinar um marcador biológico para a suscetibilidade à doença, visto que a análise da associação genômica pode permitir a identificação de potenciais fatores genéticos envolvidos no desenvolvimento da COVID-19 (ZHAO *et al.*, 2020; ZALBA MARCOS *et al.*, 2020). Seis estudos de associação genômica realizados no início de 2020 em três continentes dedicaram-se a investigar a genética dos hospedeiros do SARS-CoV-2 com insuficiência respiratória.

Observações sobre complicações tromboembólicas frequentes podem sugerir que a COVID-19 é uma doença que fere principalmente o endotélio vascular (ZHAO *et al.*, 2020). Alguns autores apontam o tipo sanguíneo do Sistema ABO como um possível marcador biológico, visto que os determinantes antigênicos desse sistema são expressos nas células de certos tecidos epiteliais e endoteliais, como no epitélio das vias aéreas no sistema respiratório. Os relatórios sugerem uma correlação em que o tipo sanguíneo A é mais propenso a desenvolver

a infecção severa, enquanto o tipo sanguíneo O é menos propenso (ZHAO *et al.*, 2020). Ademais, foi observada uma variabilidade no teste sorológico positivo para COVID-19 entre os tipos sanguíneos: o sangue do tipo A correlacionou-se com maiores chances de testar positivo em pacientes com a infecção viral (ZIETZ; ZUCKER; TATONETTI, 2020). Nesse sentido, o objetivo da pesquisa é investigar a reposta imunológica em relação à hipótese de que o grupo sanguíneo influencia na suscetibilidade à infecção pela COVID-19.

2 MÉTODO

Trata-se de uma revisão narrativa da literatura de caráter descritivo e de abordagem qualitativa. Tendo em vista a escolha da questão norteadora como “qual a relação entre o tipo sanguíneo e suscetibilidade à infecção pela COVID-19?”, foi realizada uma busca de dados, entre os dias 20/07 e 29/07, a fim de produzir uma revisão integrativa da literatura. No tocante aos procedimentos de pesquisa, a revisão procedeu seguindo 7 fases: escolha meticulosa da questão norteadora, procura de referências por meio da literatura disponível, avaliação para descarte daquilo que não atendia à questão norteadora, análise criteriosa dos dados, extração de dados e organização dos mesmos no texto e, por último, apresentação da revisão. Em termos de recursos de procura de informações, foram utilizadas as bases de dados para área da saúde: Medline (via PubMed) e Lilacs (via BVS). Ademais, foi utilizada como fonte complementar a literatura disponível na biblioteca Scielo.

A fim de otimizar a busca, a estratégia de combinação de Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) foi utilizada da seguinte forma: (“ABO Blood-Group System” OR “Sistema del Grupo Sanguíneo ABO” OR “Sistema ABO de Grupos Sanguíneos”) AND (“Disease Susceptibility” OR “Susceptibilidad a Enfermedades” OR “Suscetibilidade a Doenças”) AND (“Coronavirus Infections” OR “Infecciones por Coronavirus” OR “Infecções por Coronavirus”).

Os critérios de inclusão seguidos para esta revisão literária foram: ser artigo completo que versasse sobre o tema proposto e ser publicado em inglês, espanhol ou português. Em relação à data de publicação, um intervalo de tempo maior que 5 anos foi estabelecido, pois, como não existe um número elevado de estudos sobre a COVID-19, alguns dados importantes para fundamentação teórica foram encontrados em artigos e livros mais antigos. Ademais, artigos de opinião e aqueles que não se encaixavam na temática foram descartados.

Por fim, de acordo com a Resolução CNS 510/2016, afirma-se que esse trabalho não necessitou passagem e aprovação do Comitê de Ética, devido ao fato de ser uma revisão de literatura.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram identificados 34 resultados, já excluídas, desse total, as publicações repetidas. Depois da aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 22 foram selecionados para a leitura de resumos e 18 artigos foram lidos na íntegra. Finalmente, 08 artigos compuseram a amostra analisada. A tabela 1 mostra os títulos destas obras, tipos de estudos, período de realização e o delineamento destes.

Tabela 1 – Descrição dos estudos mais relevantes para a revisão integrativa.

Título do artigo	Autores	Ano	Delineamento de estudo
Infección y trombosis asociada a la COVID-19: posible papel del grupo sanguíneo ABO	ZALBA MARCOS <i>et al.</i>	2020	Pesquisa original; Relato de caso
The ABO blood group locus and a chromosome 3 gene cluster associate with SARS-CoV-2 respiratory failure in an Italian-Spanish genome-wide association analysis.	ELLINGHAUS <i>et al.</i>	2020	Pesquisa original; Estudo de caso-controle
Genetically determined ABO blood group and its associations with health and disease.	GROOT <i>et al.</i>	2020	Pesquisa original; Estudo transversal
Relationship between the ABO blood group and the COVID-19 susceptibility.	ZHAO <i>et al.</i>	2020	Pesquisa original; Estudo transversal
Lower prevalence of antibodies neutralizing SARS-CoV-2 in group O french blood donors.	GALLIAN <i>et al.</i>	2020	Pesquisa original; Estudo de etiologia
Testing the association between blood type and COVID-19 infection, intubation, and death	ZIETZ; ZUCKER; TATONETTI.	2020	Pesquisa original; Estudo transversal

Clinical and genetic characteristics of Covid-19 patients from UK Biobank.	KOLIN; KULM; ELEMENTO.	2020	Pesquisa original; Estudo transversal
Blood type and outcomes in patients with COVID-19	LATZ <i>et al.</i>	2020	Pesquisa original; Estudo clínico controlado/ estudo observacional

Fonte: autoria própria, 2020.

Em relação aos resultados, já é evidente que a comunidade acadêmica tenta, através de pesquisas, confirmar ou negar as hipóteses de que haja relação entre o Sistema ABO e desenvolvimento de doenças. Nesse contexto, com base na análise de estudos recentes sobre a existência ou não de uma ligação realmente significativa entre a forma grave da COVID-19 e tipo sanguíneo do paciente, o presente tópico apontará os resultados e suposições que se têm até então.

Pontua-se, de início, que os resultados de estudos de Ellinghaus *et al.* (2020), realizados em cinco cidades dos epicentros da pandemia na Itália e na Espanha, apontam para uma predominância de casos graves da COVID-19 em pacientes pertencentes ao grupo sanguíneo A, enquanto se observou uma menor incidência de complicações em pacientes do grupo O (ZIETZ; ZUCKER; TATONETTI, 2020). Tal estudo concorda, em partes, com os resultados daquele feito por Zhao *et al.* (2020) em três hospitais de Wuhan e Shenzhen, na China, o qual foi a primeira observação entre uma possível associação do Sistema ABO com o COVID-19. Na pesquisa realizada no país de descoberta do SARS-CoV-2, fora observada uma maior suscetibilidade do grupo A à COVID-19 em comparação a grupos não-A, em especial o tipo O. Ou seja, essas pesquisas diferem no ponto de que Ellinghaus *et al.* (2020) relacionou somente com a forma grave, enquanto Zhao *et al.* (2020) considerou todas as formas clínicas.

Ademais, uma pesquisa francesa de Gallian *et al.* (2020), seguindo a mesma abrangência do estudo chinês, sugere que o tipo sanguíneo O não está relacionado apenas com um menor risco de desenvolvimento da forma grave da COVID-19, mas também com a suscetibilidade à doença seja qual for a sua apresentação clínica.

Entretanto, conforme descreveu ZIETZ; ZUCKER; TATONETTI (2020) em seu estudo realizado na Comunidade Foral de Navarra, Espanha, ao relacionar complicações

tromboembólicas associadas ao SARS-CoV-2 e ao Sistema ABO, notou-se que o grupo sanguíneo com maior incidência fora o B, ao passo que o grupo O possuía menor risco. Essa pesquisa, ao adicionar a variável trombose, obteve resultados distintos, exceto em relação ao grupo O, dos estudos já mencionados. Embora existam esses estudos que tentam provar a ligação entre Sistema ABO e COVID-19, ainda não se sabe como e por que isso ocorre, o que não impede, entretanto, que se façam teorias a fim de encontrar respostas. Nesse sentido, cada autor, com base nos seus resultados, sugere explicações para essa questão.

O locus 3p21.31 abrange seis genes que são SLC6A20, LZTFL1, CCR9, FYCO1, CXCR6 E XRC1. Nesse contexto, o alelo de risco, GA de rs11385942, interfere na expressão de três dos seis genes mencionados: diminui a expressão de CXCR6 e aumenta a expressão de SLC6A20 e LZTFL1, que é intensamente expresso no pulmão. No estudo, fora descoberto que o alelo GA tem alta frequência em pacientes que necessitaram de ventilação mecânica. Além disso, percebeu-se uma replicação cruzada entre rs11385942 do locus 3p21.31 com rs657152 do locus 9q34.2, este último coincidindo com o locus do grupo sanguíneo (ZIETZ; ZUCKER; TATONETTI, 2020).

Os autores, nesse caso, contaram com uma bibliografia limitada acerca do assunto, devido ao assunto recente e até então pouco explorado. Sendo assim, esses pesquisadores se basearam em Guillon *et al.* (2008), que estudou a relação entre o Sistema ABO e o vírus SARS-CoV-1, no qual se observou que os anticorpos anti-A podem se ligar à proteína S viral e, assim, bloquear a interação entre o vírus e o seu receptor, ECA2, na célula do hospedeiro.

Conforme descrito anteriormente, o coronavírus apresenta uma grande diversidade de apresentação clínica, variando com algumas condições físicas, clínicas, entre outras. Nesse âmbito, foi observado que soropositivos para a COVID-19 podem apresentar eventos trombóticos. Sob essa óptica, a pesquisa de Zalba Marcos *et al.* (2020) destaca o Fator de Von Willebrand (VWF), glicoproteína plasmática complexa relacionada à fisiologia do sangue.

O VWF é sintetizado pelos megacariócitos e células endoteliais; e apresenta sítios de ligação ao colágeno, às glicoproteínas plaquetárias (GPIb e GPIIb-IIIa) e ao fator VIII da coagulação (FVIII), justificando seu importante papel no sistema hemostático. As principais funções do VWF são: adesão plaquetária ao colágeno exposto do subendotélio após lesão vascular, levando a ativação plaquetária com exposição da GPIIb-IIIa e subsequente agregação plaquetária; e ligação com o FVIII, evitando sua proteólise e promovendo sua estabilização no plasma. Ou seja, quando o Fator de Von Willebrand está faltando ou é defeituoso, as plaquetas não conseguem aderir às paredes dos vasos sanguíneos no local em que ocorreu uma lesão. Consequentemente, a hemorragia não para tão rapidamente como deveria (ZALBA MARCOS

et al., 2020)

Além disso, segundo Xavier, Cavalheiro e Silva (2010), o VWF tem seus níveis no plasma influenciados pelo locus ABO, até 30%, entre outros motivos. Pacientes pertencentes ao grupo O demonstram um menor nível de VWF; e o autor sugere, então, que este fato pode ter relação com um menor número de complicações tromboembólicas em soropositivos de grupo sanguíneo O. Ademais, observou-se maiores níveis de dímero D no grupo A do que no grupo O. Esse dímero D é obtido através da degradação do coágulo de fibrina polimerizada. Segundo Páramo (2007), quando seus níveis estão elevados, pode significar trombose venosa profunda, cirurgia, traumatismo, gravidez ou câncer. Por último, fora descrito um aumento de fibrinogênio nos grupos AB e B em relação ao grupo O. De acordo com Brandão *et al.* (2004), p. 202:

O fibrinogênio, uma glicoproteína plasmática com ação no final da cascata de coagulação sanguínea, é também reconhecido como fator de risco para a doença arterial coronariana (DAC), acidente vascular cerebral (AVC). [1]

Dados preliminares de um estudo realizado com 1.559 indivíduos por Zietz, Zucker e Tatonetti (2020) no Hospital Presbiteriano de New York, nos EUA, apontam para uma associação entre o tipo sanguíneo A e maiores chances de testar positivo para COVID-19, enquanto os tipos sanguíneos O e AB foram relacionados a chances reduzidas. Ademais, foi observado resultados positivos significativos nos tipos Rh +, produzindo uma forte correlação entre esse rhesus e testagem positiva para a doença, embora os tipos sanguíneos Rh- sejam raros. Sob essa óptica, um estudo realizado por Kolin, Kulm e Elemento (2020) no Reino Unido, teve resultados semelhantes: participantes com sangue tipo A tiveram chances aumentadas de pelo menos um teste positivo para COVID-19 em relação aos participantes do tipo O.

Em contrapartida, o estudo de Latz *et al.* (2020) nos cinco principais hospitais do estado de Massachusetts, EUA, com 7.648 pacientes sintomáticos trouxe alguns resultados diferentes da pesquisa de Zietz, Zucker e Tatonetti (2020) e Kolin, Kulm e Elemento (2020). Nessa análise, o tipo O teve menor frequência de positividade da doença, mas o tipo A apresentou menor frequência de testes positivos do que os tipos AB ou B.

Um último estudo realizado pela empresa privada de genômica pessoal e biotecnologia 23andMe em 2020, foi construído por meio de um questionário enviado a milhares de pessoas que já haviam mandado seu DNA anteriormente para análise. Os resultados demonstram que pessoas do grupo sanguíneo O teriam de 9 a 18% menos chances de testar positivo para COVID-19 e que não foram encontradas diferenças entre os demais grupos.

Possíveis explicações para os resultados gerais desses estudos que apontam variabilidade entre os tipos sanguíneos na possibilidade de se testar positivo para COVID-19 são advindas da hipótese de que há diferenças na resposta à inflamação entre esses grupos. Pessoas do grupo A teriam uma menor formação de anticorpos quando submetidas a uma transfusão sanguínea, visto que não formam anticorpos se receberem sangue do grupo A ou O. Por outro lado, pessoas do grupo O formam anticorpos ao receberem transfusão de qualquer grupo sanguíneo, com exceção do próprio O. Se isso for verdade, pessoas do grupo sanguíneo AB, receptores universais, seriam mais suscetíveis a testar positivo para COVID-19, visto que não produziram anticorpos.

4 CONCLUSÃO

Relatórios de explorações genéticas de indivíduos positivos para COVID-19 sugerem uma correlação entre sangue e susceptibilidade à SARS-CoV-2, ou seja, o tipo sanguíneo seria um biomarcador capaz de influenciar na severidade da doença. Sob essa perspectiva, a maioria das pesquisas indica que o tipo sanguíneo A teria 50% mais risco do que o tipo O de desenvolver formas mais graves, isto é, de ser intubado, ou menos graves, ou seja, de requererem apenas ventilação assistida. O mecanismo dessa relação ainda não é conhecido e os autores sugerem diferentes hipóteses, mas todas são especulativas.

É válido ressaltar que todas essas pesquisas contaram com limitações, a maioria relacionada a quantidade pequena da amostra. Ademais, como a maioria dos autores estudaram pacientes que testaram positivo para a doença, principalmente àqueles internados com a forma mais ou menos grave, essas amostras não levaram em consideração as pessoas resistentes, ou seja, àquelas que mesmo em contato próximo com uma pessoa infectada, não desenvolve sintomas e são testadas negativamente para viremia e sorologia da COVID-19. Nessa linha de raciocínio, não sabemos a frequência dessas pessoas resistentes na população, então os dados são subnotificados.

Dada essas limitações, seria prematuro usar esses estudos para orientar a prática clínica neste momento. Independentemente do tipo sanguíneo, as pessoas devem continuar a realizar as práticas cuidadosas de prevenção para evitar a infecção por SARS-CoV-2. Por fim, é necessário incentivar novos estudos de análise genômica, diminuindo as limitações das pesquisas para que resultados mais conclusivos sejam observados.

REFERÊNCIAS

BRANDÃO, A. C. *et al.* Polimorfismo genético do fibrinogênio na doença arterial periférica.

Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, vol. 26, n. 3, 2004a.

ELLINGHAUS, D. *et al.* Genomewide Association Study of Severe Covid-19 with Respiratory Failure. **The New England Journal of Medicine**, 17 jun. 2020.

ELLINGHAUS, D. *et al.* **The ABO blood group locus and a chromosome 3 gene cluster associate with SARS-CoV-2 respiratory failure in an Italian-Spanish genome-wide association analysis.** [s.l.] *Infectious Diseases (except HIV/AIDS)*, 2 jun. 2020.

GALLIAN, P. *et al.* Lower prevalence of antibodies neutralizing SARS-CoV-2 in group O French blood donors. **Antiviral Research**, v. 181, n. 1, p. 1-3, set. 2020.

GROOT, H. E. *et al.* Genetically Determined ABO Blood Group and its Associations With Health and Disease. **Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology**, v. 40, n. 3, p. 830–837, mar. 2020.

KOLIN, D. A.; KULM, S.; ELEMENTO, O. **Clinical and Genetic Characteristics of Covid-19 Patients from UK Biobank.** [s.l.] *Infectious Diseases (except HIV/AIDS)*, 5 maio 2020.

LATZ, C. A. *et al.* Blood type and outcomes in patients with COVID-19. **Annals of Hematology**. v. 99, n. 9, p. 2113–2118, set. 2020.

PÁRAMO, J. A. *et al.* Diagnóstico y tratamiento de la trombosis venosa profunda. **Revista de Medicina de la Universidad de Navarra**. v. 51, n. 1, p. 13-17, dez./2007.

XAVIER, N. L.; CAVALHEIRO, J. A. C.; SILVA, A. A. DA. Dosagem plasmática do fator de Von Willebrand e variáveis clínicas como fatores prognósticos no Câncer de Mama. **Revista HCPA**. v. 30, n. 2, p. 105-110, mai. 2010.

ZALBA MARCOS, S. *et al.* Infección y trombosis asociada a la COVID-19: posible papel del grupo sanguíneo ABO. **Medicina Clínica**, v. 155, n. 1, p. 1-13, jul. 2020.

ZHAO, J. *et al.* **Relationship between the ABO Blood Group and the COVID-19 Susceptibility.** [s.l.] *Epidemiology*, 16 mar. 2020.

ZIETZ, M.; ZUCKER, J. E.; TATONETTI, N. P. **Testing the association between blood type and COVID-19 infection, intubation, and death.** [s.l.] *Infectious Diseases (except HIV/AIDS)*, 11 abr. 2020.

CAPÍTULO 88

RISCO DE LESÃO POR PRESSÃO PRECOCE EM PACIENTES COM INCONTINÊNCIA URINÁRIA E FECAL NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA: REVISÃO INTEGRATIVA

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c88](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c88)

Antonia Mylene Sousa Almeida¹, Isabella Cristina Galvão da Silva², Maria Samila Silva Carvalho Andrade³, Danilo da Silva Soares⁴, Ludmilla Rafaela Marinho da Silva⁵, Pamella Souza Macedo⁶, Victor Emmanuel Costa Ribeiro⁷, Francisco Lucas Leandro de Sousa⁸, Daniele Teixeira dos Santos⁹, Brenda Kelly da Silva Monte¹⁰

¹Faculdade de Educação São Francisco (mylenesousa123@hotmail.com)

²Faculdade de Educação São Francisco, (icgds1234@gmail.com)

³Centro Universitário do Piauí, (samilacarvalhoccb@gmail.com)

⁴Centro Universitário Maurício de Nassau, (enferdanilo.alves@gmail.com)

⁵Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, (ludmillarafacla30@gmail.com)

⁶Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória,
(pamellamacedo20@gmail.com)

⁷Associação de Ensino Superior do Piauí, (emmanuelribeiro36@gmail.com)

⁸Centro Universitário Maurício de Nassau, (lucasleandro2912@gmail.com)

⁹Uninassau Unidade Dorotéias, (danieleteixeira02@hotmail.com)

¹⁰Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal do Piauí, (bksm@faesf.com.br)

Resumo

O objetivo desse estudo é analisar o risco do desenvolvimento precoce de lesão por pressão em pacientes com incontinência urinária e fecal em unidade de terapia intensiva. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, no qual O levantamento dos artigos se deu através das bases de dados *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (MEDLINE via BVS), Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS via BVS) e Base de Dados de Enfermagem (BDENF via BVS). Para esse trabalho, foram considerados como critérios de inclusão os artigos originais disponíveis por meio eletrônico em português e/ou em inglês. Como critério de exclusão, foi adotado artigos que não tratam da temática proposta, artigos duplicados, teses, monografias, dissertações, artigos de revisão, livros e que não apresenta o texto completo. O método de busca foi realizado através dos descritores em ciências da saúde (DeCS): “Lesão por pressão”, “Incontinência urinária” ; “Incontinência fecal” e “Unidade de terapia intensiva”. A pergunta norteadora para essa pesquisa foi a seguinte: Qual risco de desenvolver precocemente lesão por pressão em pacientes que sofrem de incontinência

urinária e fecal em uma unidade de terapia intensiva? Dentre os principais resultados, a higiene do paciente é o cuidado mais básico em que os profissionais de enfermagem devem realizar e priorizar. A incontinência urinária e fecal é vista como fatores para o desenvolvimento de lesão por pressão precocemente, pois a umidade e mobilidade são categorias que influenciam e limitam o paciente por não conseguir deambular sem auxílio ou não deambular totalmente. Contudo, implementar medidas para evitar danos sérios à pele merece atenção no âmbito da saúde e segurança do paciente. Conclui-se então, que o risco de desenvolver a LP precocemente devido a incontinência urinária e fecal na unidade de terapia intensiva é evidente na literatura.

Palavras-chave: Lesão por pressão; Incontinência urinária; Incontinência fecal; Unidade de terapia intensiva

Área Temática: Ciências da Saúde

E-mail do autor principal: mylenesousa123@hotmail.com

INTRODUÇÃO

A lesão por pressão (LP) é definida por um prejuízo situado na pele e/ou tecidos moles subjacentes sobre uma proeminência óssea ou relacionada ao uso de dispositivo médico ou artefato (MENDONÇA *et al.*, 2018). A LP é um sério problema de saúde pública e tem sido fonte de preocupação, pois leva ao desenvolvimento de transtornos físicos, emocionais e influencia na morbimortalidade (SOARES; HEIDEMANN, 2018).

Estudos apontam que o risco para o desenvolvimento da lesão por pressão no Brasil é entre 41,2% e 59% e há uma prevalência entre 8% e 23%. Essas estimativas são um fator preocupante, tendo em vista que é um evento que pode ser prevenido em até 95% dos casos de acordo com a declaração do Rio de Janeiro sobre a prevenção de lesão por pressão (SOARES; HEIDEMANN, 2018).

A lesão por pressão é dividida em quatro estágios. O estágio 1, a pele encontra-se íntegra com eritema e pode aparecer diferente em pele com pigmentação escura. O estágio 2, ocorre a perda de espessura parcial da pele com exposição da derme. Já a lesão por pressão estágio 3, ocorre a perda total da espessura da pele na qual o tecido adiposo é visível. E o último, estágio 4 que ocorre a perda total da espessura da pele com exposição ou palpação direta de tecidos como fáscia, músculo, tendão, ligamento, cartilagem ou osso, podendo ser visíveis (SANTOS *et al.*, 2019).

Os locais mais frequentes para desenvolver a LP é na região sacra, trocânteres, calcâneos e proeminências ósseas. Há vários fatores para o desenvolvimento dessa lesão, no qual o principal é a compressão exercida sobre um capilar, entre uma estrutura óssea e uma superfície. Os aspectos que predispõem sua ocorrência são a pressão, o atrito, desequilíbrio nutricional, idade

avançada, diabetes, medicamentos e a umidade, que compreende a incontinência fecal e urinária (SILVA *et al.*, 2020).

Segundo Silva *et al.* (2020), a incontinência urinária e fecal é definida como uma condição que ocorre perda involuntária de urina e fezes, aumenta o risco de desenvolver a lesão por pressão devido a umidade, o contato com a pele, dentre outros fatores. Em vista disso, na unidade de terapia intensiva (UTI) é o lugar na qual os pacientes se encontram vulneráveis e existem fatores que prejudicam sua estrutura psicológica, além do surgimento de complicações como a lesão por pressão.

Contudo, essa pesquisa se torna relevante devido a importância de se entender os principais fatores que levam ao desenvolvimento da lesão por pressão em pacientes com incontinência urinária e fecal, além de estudar e verificar o risco associado a esse problema. A pergunta que norteou essa pesquisa foi qual risco de desenvolver precocemente lesão por pressão em pacientes que sofrem de incontinência urinária e fecal em uma unidade de terapia intensiva? O presente trabalho tem como objetivo analisar o risco do desenvolvimento precoce de lesão por pressão em pacientes com incontinência urinária e fecal em unidade de terapia intensiva.

MÉTODO

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, na qual tem como propósito produzir resultados alcançados em pesquisas sobre uma temática/questão de forma organizada, sistemática e integral. Esse método permite a inclusão de pesquisas experimentais e não experimentais, bem como dados da literatura teórica e empírica, possibilitando uma compreensão mais completa do tema (ERCOLE; MELO; ALCOFORADO, 2014).

De acordo com Souza, Silva e Carvalho (2010), a revisão integrativa é um instrumento da prática baseada em evidências, bem como um tipo de método que auxilia na produção de informações e na aplicação dos resultados obtidos. Para construir essa revisão, é necessário de seis etapas, sendo elas: a criação da pergunta norteadora; busca de dados; coleta de dados; análise dos conteúdos selecionados; discussão dos resultados; apresentação da revisão (ERCOLE; MELO; ALCOFORADO, 2014).

A pergunta norteadora para essa pesquisa foi a seguinte: Qual risco de desenvolver precocemente lesão por pressão em pacientes que sofrem de incontinência urinária e fecal em uma unidade de terapia intensiva?

O levantamento dos artigos se deu através das bases de dados *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (MEDLINE via BVS), Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS via BVS) e Base de Dados de Enfermagem (BDENF via BVS). Para esse trabalho, foram considerados como critérios de inclusão os artigos originais

disponíveis por meio eletrônico em português e/ou em inglês. Como critério de exclusão, foi adotado artigos que não tratam da temática proposta, artigos duplicados, teses, monografias, dissertações, artigos de revisão, livros e que não apresenta o texto completo.

O método de busca foi realizado através dos descritores em ciências da saúde (DeCS): “Lesão por pressão”, “Incontinência urinária” ; “Incontinência fecal” e “Unidade de terapia intensiva”, como também através do *Medical Subject Headings* (MeSH): “*Pressure Ulcer*”, “*Urinary Incontinence*”, “*Fecal Incontinence*” and “*Intensive Care Units*”, com recorte temporal nos últimos 10 anos (2011 a 2021), anos correspondentes ao maior número de pesquisas. Foram cruzados através do operador booleano “AND” para busca simultânea dos assuntos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Através do levantamento nas bases de dados, foram encontrado um total de 159 artigos nas bases de dados. Após a filtragem dos artigos, 98 foram eliminados por não disponibilizarem do texto completo, 03 por não estar em português e/ou inglês e 08 por não corresponder aos anos selecionados para o estudo. A partir disso, 50 artigos foram selecionados para a leitura e análise crítica. Após a leitura e análise dos artigos, 02 foram eliminados por serem jornais, 01 por ser livro, 01 por ser relatório de estágio, 23 por não estar de acordo com a temática proposta, 03 foram eliminados por estarem duplicados e 03 por serem artigos de revisão. Diante disso, 17 artigos foram incluídos na pesquisa (Figura 1).

Figura 1. Levantamento dos artigos nas bases de dados, Pedreiras, Maranhão, 2021.

Fonte: Autores, 2021.

Dentre os principais resultados, a higiene do paciente é o cuidado mais básico em que os profissionais de enfermagem devem realizar e priorizar. Dentro da unidade de terapia intensiva, esses cuidados devem se redobrar, pois há o risco de ruptura da pele em pacientes que apresentam incontinência urinária e fecal. Além disso, o líquido ou semi-líquido pode contaminar o ambiente no qual o paciente se encontra e aumentar o risco de infecção e contaminação cruzada (JOHANSEN *et al.*, 2020).

A incontinência urinária e fecal é vista como fatores para o desenvolvimento de lesão por pressão precocemente, pois a umidade e mobilidade são categorias que influenciam e limitam o paciente por não conseguir deambular sem auxílio ou não deambular totalmente. Esses tipos de incontinência são avaliados como fatores de risco com maior impacto sobre lesões graves de pressão (KAYSER *et al.*, 2018).

A umidade e danos superficiais à pele aumentam o coeficiente de fricção e diminui a tolerância a cargas mecânicas. Com isso, um paciente com LP que apresenta incontinência

urinária tem a probabilidade de aumentar do estágio I para o estágio IV em relação a pacientes sem incontinência (LACHENBRUCH *et al.*, 2016).

O risco de desenvolver LP em pacientes com incontinência é maior em comparação a pacientes sem incontinência. Em vista disso, os enfermeiros devem fornecer medidas de proteção para esses pacientes que possuem esse problema urinário e fecal e produtos devem ser usados, quando necessários (ZHOU *et al.*, 2018).

Aos pacientes com incontinência, o uso de dispositivos como foley cateteres, ostomias e sistemas de manejo fecal, são essenciais para prevenir a lesão por pressão precoce nas unidades de terapia intensiva. Ademais, esses pacientes que tem esse problema são propensos a desenvolverem a LP devido a umidade do ambiente, fator esse que leva a evolução dos estágios da lesão por pressão (KAYSER, *et al.*, 2018).

Novas diretrizes clínicas para a prevenção de LP incluem manter a pele limpa e seca, como também o desenvolvimento de um plano de gestão para pacientes com incontinência e sua limpeza imediata após a incontinência (GREY; GIULIANO, 2017).

Estudos apontam a relevância do cuidado com a pele através de um pano pré-umedecido, hidratante à base de emoliente e a pele à base de dimeticona para diminuir a prevalência de lesão por pressão associado a incontinência urinária e fecal (GREY; GIULIANO, 2017).

Um dos papéis da enfermagem na UTI é atuar no leito na parte de higienização e mobilização do paciente. Esses cuidados, quando centrados no paciente promovem a segurança do indivíduo diminuindo as prevalências de lesões. Além desses cuidados, outras atividades são necessárias para a prevenção da LP como mudar o paciente de posição, utilizar travesseiro entre as pernas para evitar fricção entre os joelhos e tornozelos, dentre outros (AVSAR; KARADAG, 2017).

Profissionais de enfermagem especializados em feridas, ostomia e incontinência são importantes em um mundo no qual a necessidade é crescente para os cuidados com os pacientes que sofrem com esses problemas. Esses enfermeiros especialistas atuam na gestão de incontinências, além do cuidado com a pele relacionado as incontinências e os dados a pele referente a umidade (BERKE *et al.*, 2019).

CONCLUSÃO

Conclui-se então, que o risco de desenvolver a LP precocemente devido a incontinência urinária e fecal na unidade de terapia intensiva é evidente na literatura. Ademais, a lesão por pressão, apesar de ser prevenível, é uma situação recorrente e que variados fatores podem auxiliar para o seu desenvolvimento.

Além disso, pessoas com incontinência urinária e fecal encontram-se em constante risco de pele, ferida e complicações relacionadas, e a partir disso, é necessário profissionais especializados com conhecimentos e habilidades para a avaliação do risco, prevenção e tratamento.

Contudo, implementar medidas para evitar danos sérios à pele merece atenção no âmbito da saúde e segurança do paciente. Além de prevenir LP baseado em evidências através de intervenções para redistribuir a pressão como giro regular e reposicionamento do indivíduo, como também cuidados relacionados a pele para promover limpeza, proteção e melhora da pele através de barreiras de umidade.

REFERÊNCIAS

AVSAR, P; KARADAG, A. Efficacy and Cost-Effectiveness Analysis of Evidence-Based Nursing Interventions to Maintain Tissue Integrity to Prevent Pressure Ulcers and Incontinence-Associated Dermatitis. **Worldviews on Evidence-Based Nursing**, v. 00, n. 0, p. 1–8, 2017.

BERKE, C. *et al.* Papel da Enfermeira de Feridas, Ostomia e Continência em Continence Care: atualização de 2018. **J Wound Ostomy Continence Nurs.**, v. 46, n. 3, p. 221-225, 2019.

ERCOLE, F. F; MELO, L. S; ALCOFORADO, C. L. G. C. **Revisão Integrativa versus Revisão Sistemática. Rev Min Enferm.** v. 18. n. 1, p. 1-260, 2014.

GREY, M; GIULIANO, K. K. Dermatite e imobilidade associadas à incontinência como fatores de risco de lesão por pressão. **J Wound Ostomy Continence Nurs.**, v. 00, n. 0, p. 1-5, 2017.

JOHANSEN, E. *et al.* Moisture associated skin damage (MASD) in intensive care patients: A Norwegian point-prevalence study. **Intensive & Critical Care Nursing**, v. 60, e:102889, 2020.

KAYSER, S. A. *et al.* Predictors of Superficial and Severe Hospital-acquired Pressure Injuries: A Cross-Sectional Study. **Revista Internacional de Estudos de Enfermagem**, v. 89, p. 46-52, 2019.

LACHENBRUCH, C. *et al.* Analysis of Incontinence and Hospital-Acquired Pressure Ulcers From the International Pressure Ulcer PrevalenceTM Survey. **J Wound Ostomy Continence Nurs.** v. 43, n. 3, p. 235-241, 2016.

MENDONÇA, P. K. *et al.* Prevenção de lesão por pressão: ações prescritas por enfermeiros de centros de terapia intensiva. **Texto Contexto Enferm**, v. 27, n. 4:e4610017, 2018.

SANTOS, M. L. *et al.* Cicatrização de lesão por pressão: abordagem multiprofissional. **Rev enferm UFPE on line.**, v. 13:e239634, 2019.

SOUZA, M. T.; SILVA, M. D.; CARVALHO, R. Revisão integrativa: o que fazer. **Einstein**, v.8, n. 1, p. 102-6, 2010.

SOARES, C. F; HEIDEMANN, I. T. S. B. Promoção da saúde e prevenção da lesão por pressão: expectativas do enfermeiro da atenção primária. **Texto Contexto Enferm**, v. 27, n. 2:e1630016, 2018.

SILVA, J. F. *et al.* Lesões precoces por pressão em pacientes com incontinência miccional e fecal em unidade de terapia intensiva. **REAEnf/EJNC**, v. 2:e2591, 2020.

ZHOU, Q. *et al.* The prevalence and specific characteristics of hospitalised pressure ulcer patients: A multicentre cross-sectional study. 2018.

CAPÍTULO 89

SAÚDE MENTAL E SERVIÇO SOCIAL: BREVES REFLEXÕES DA PROFISSÃO NO ESPAÇO SÓCIO-OCUPACIONAL

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c89](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c89)

Clarice Bezerra ¹,

Antônio Lucas Farias da Silva²

¹ Universidade Federal do Rio Grande do Norte/ UFRN, claricebezerraa@outlook.com

² Centro Universitário UniFacid, lucas1992farias@gmail.com

Resumo

O presente artigo tem como objetivo descrever a relação teórico-prático do Serviço Social, no âmbito do processo de trabalho do atendimento realizado aos usuários com transtornos mentais, no Centro de Atenção Psicossocial- CAPS III LESTE, do município de NATAL - RN. O trabalho refere-se à experiência vivenciada no estágio supervisionado, realizado no período de julho de 2021 a setembro de 2021, levando em consideração pressupostos éticos políticos, formalizados no cerne da profissão de Serviço Social.

Palavras-chave: Saúde Mental; Serviço Social; Reforma Psiquiátrica.

Área Temática: Ciências Sociais Aplicada.

E-mail do autor principal: claricebezerraa@outlook.com

1 INTRODUÇÃO

Ao discurtir acerca da Saúde Mental, é de suma importância destacar uma linha traçada durante décadas, dando ênfase à Reforma Sanitária, processo este que representa um avanço de extrema importância no âmbito da saúde, ao qual torna acessível e democrática, evidenciando o papel do Estado frente à sociedade.

O participação do profissional de Serviço Social, neste processo foi de extrema importância, ao qual de forma prática desmotra os avanços profissionais que junto com a sociedade foram ocasionados ao longo do processo evolucionário. Vale apontar que a Reforma Sanitária Brasileira se configura-se em um divisor entre ações e pensamentos acerca da saúde mental, ao qual reflete diretamente no fazer dos profissionais em questão.

O termo saúde mental e a participação do profissional de serviço exige um vasto acúmulo de conhecimento teórico direcionado as transformações societárias, pois é o processo socio histórico que possibilita ao profissional a compreensão sobre a realidade contemporânea vivenciadas e possíveis alinhamentos. A partir da compreensão da totalidade, o desvelamento do cerne da temática em questão é proporcionado, destacando-se:

A história da doença é contada como o acúmulo de situações fragilizadoras em que vários fatores, que algumas vezes podem envolver outras pessoas, como a família/ ascendente e descendente – e o hábitat, se inter-relacionam, ocasionando uma desorganização mental. Os sintomas físicos aparecem a eles como expressão de infortúnio e inadaptação frente a essas situações. (QUIRINO; LEITE, 2003, p. 9)

Ao falarmos sobre saúde mental, é imprescindível mencionar que a reforma psiquiátrica surge com caráter de uma proposta inovadora, requisitando uma maior compreensão ao cuidado do usuário com transtorno mental ou psicossocial. Bravo e Matos (2004) destaca a consolidação da reforma psiquiátrica que ocorre na metade dos anos 90, e a descentralização das ações como fatores recorrentes ao processo.

A reflexão do serviço social na saúde mental, proporciona direcionamentos para as leituras de cunho críticas científicas, que intensificam o processo de formação profissional, tendo em vista que o estudo formativo do profissional deve ser contínuo e constante, assim proporcionando ao profissional a consolidação fundamentadas nos fatos postos em seus campos sócio-ocupacionais.

A partir dessa linha de interpretação o presente artigo tem como objetivo descrever a relação teórico-prático do Serviço Social inserido na Saúde Mental, no âmbito do processo de trabalho do atendimento aos usuários com transtornos mentais, no Centro de Atenção Psicossocial- CAPS III LESTE, do município de NATAL – RN. O trabalho refere-se à experiência vivenciada no estágio supervisionado, realizado no período de julho de 2021 a setembro de 2021, levando em consideração pressupostos éticos políticos, formalizados no cerne da profissão de Serviço Social.

2 MÉTODO

O presente estudo trata-se de um estudo de cunho qualitativo, ao qual foi centrado na reflexão da atuação do Serviço Social inserido na área da saúde mental. O relato de experiência teve respaldo no estudo bibliográfico, ao qual foi focalizado na vivência do Estágio

Supervisionado no CAPS III – LESTE, tendo em vista a seriedade dos estudos que realizados sob a perspectiva crítico científica.

Com a finalidade de maiores compreensão e dispor de uma maior aproximação acerca do objetivo do artigo, serão utilizados os documentos/materiais produzidos no campo de estágio, análise institucional, diário de campo, assim como o pré-projeto de intervenção.

Portanto, a discussão acerca de saúde mental no Brasil relembrará a relação teórico-prático, que for construída no bojo da profissão, a qual as ações técnicas e o embasamento em fatos teóricos contudentes, são prezadas.

O processo de supervisão de estágio, de acordo com Lewgoy (2010) é um processo ao qual necessita de discussões constantes acerca do fazer profissional com o objetivo de compreender os fatores que envolvem o campo de atuação. Assim pode-se proporcionar a ligações dos pontos aqui discutidos e dando ênfase e valorizando o processo de supervisão de estágio, e seu exercício prático-teórico, proporcionado pelo estágio supervisionado, relatado nesse trabalho.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O fazer profissional do serviço social no âmbito da saúde mental apresenta complexo e essencial, tendo em vista as transformações societárias vivenciadas, onde a interlocução do trabalho realizado por este profissional com a sociedade traz ganhos para os usuários e para a profissão em si.

Diante do contexto de Reforma Psiquiatria instaurado no Brasil, Bezerra (2013, p. 43-44) aponta que a “criação dos CAPS promoveu a diminuição das internações, estas devendo ser realizadas na menor duração de tempo possível, privilegiando-se o tratamento no CAPS.” Consequentemente a interação dos profissionais com os usuários tem aumentado, possibilitando uma maior conexão com a sociedade.

Bezerra (2013) nos seus estudos ressalta o usuários da rede que engloba os serviços de saúde mental como “protagonista do seu tratamento”, que a partir da reforma psiquiátrica os pacientes começam a agregar foco na sua atuação no processo de tratamento.

Logo a necessidade de um serviço em conjunto que englobe os órgãos integrante da rede surge, e a partir da compreensão expressa no Sistema Único de Saúde (SUS), instituído pelas Leis Federais 8.080/1990 e 8.142/1990, que traz em seu texto “saúde como direito de todos e dever do Estado”, previsto na Constituição 1988. (BRASIL, 1990 a, BRASIL, 1990b, BRASIL, 2004).

Para ocorrer o devido funcionamento do sistema, faz-se necessário um conjunto de

profissionais para a integração da rede voltada para o atendimento da comunidade, de acordo com Brasil (2012, p.12) “os Agentes Comunitários de Saúde e Equipe de Saúde da Família no cuidado domiciliar, então quando se fala em saúde mental”. Não se tratando inclusivamente do CAPS III, mas de toda a rede de atendimento.

A regulamentação do “CAPS- assim como os NAPS (Núcleos de Atenção Psicossocial), os CERSAMs (Centros de Referência em Saúde Mental) e outros tipos de serviços substitutivos que têm surgido no país, atualmente regulamentados pela Portaria nº 336/GM de 19 de fevereiro de 2002 que integram a rede do Sistema Único de Saúde, o SUS”, Brasil (2004, p.12), é a partir desses instrumentos que é traçado as estratégias para as ações para o tratamento. Evidenciar e tratar o indivíduo em sua totalidade, é necessário envolver o núcleo familiar, econômico e social do indivíduo, de modo que reitera o fazer profissional conciente, baseado nas dimensões teórico-prático, resultando em uma intervenção eficiente e eficaz.

3.1 RELAÇÃO ENTRE SAÚDE MENTAL E SERVIÇO SOCIAL

Consoante com Vasconcelos (2008, p. 242) faz-se necessário intensificar revisões os estudos acerca do fazer profissional do assistente social ao qual os preceitos são fundamentos no código de ética da profissão de 1993, como também no controle social e na saúde como direito de todos.

“Aos assistentes sociais que objetivam romper com práticas conservadoras, não cabe reproduzir o processo de trabalho capitalista, alienante”, CFESS apud Vasconcelos (2008, p. 242). Logo, o rompimento com o conservadorismo e da alienação tem sua gênese ainda na profissão, assim, a profissão passa a não ser mais vista como uma reprodução do retrocesso das lutas pelo empoderamento profissional.

Os princípios éticos impulsionam a profissão, e em consonância com o Conselho Federal de Serviço Social (2010), o código de ética apresenta como “ferramentas imprescindíveis para o trabalho dos assistentes sociais na saúde em todas as suas dimensões: na prestação de serviços diretos à população, no planejamento, na assessoria, na gestão e na mobilização e participação”.

As relações internas x externas, são importantes dentro das instituições de atuação do profissional, Amarante (2007) destaca que essas relações permitem a situação dos usuários dentro da realidade do convívio diário. Existindo inúmeros fatores culminantes nesses processos nas instituições, assim sendo ao Serviço Social a discernimentos estabelecer ações efetivadas.

Cada vez mais o Serviço Social, o posicionamento do serviço social no âmbito da saúde mental tem se tornado de grande relevância, resultantes das compreensões acerca do exposto por Brasil (2004), os Centro de Atenção Psicossocial estão sendo instituído a partir de uma perspectiva de valorização de direitos e acessos dos usuários nos mais diversos ambientes possíveis.

3.2 CAPS: ESPAÇO OCUPACIONAL DO SERVIÇO SOCIAL

O processo de estágio possibilita um aprofundamento acadêmico, possibilitando uma maior visualização entra a teoria e prática. Nesse processo é identificado alguns desafios pelo caminho, Bisneto (2011) enfatiza que é necessário a realização de um levantamento da instituição na sua estrutura, as atribuição e competências do serviço social nesse espaço assim como seu posicionamento, e principalmente as demandas apresentadas pelos usuários do serviço.

No CAPS III Leste, ficou evidente que o trabalho se dá de forma interdisciplinar, ofertas de grupos e de oficinas, que no momento de pandemia foram suspensas mais que já estão voltando aos poucos, tal ação modifica e acrescenta no tratamento dos usuários.

Ao tratamos sobre a atuação do assistente social no CAPS III Leste, é imprescindível damos destaque ao Código de Ética da profissão, que aponta no capítulo V, acerca do sigilo profissional “parágrafo 8 único em trabalho multidisciplinar só poderão ser prestadas informações dentro dos limites do estritamente necessário.”. E sobre as competências contidas no inciso III art. 4 “encaminhar providências, e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população”. (CFESS, 1993). Logo, a atuação do serviço social é pautada na dimensão crítica e nas fundamentas nos documentos que durante a evolução da profissão foi sendo consolidados e de grande valia para a atuação do assistente social.

Conforme exposto nos Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na política de saúde, é necessário que os profissionais do serviço social possuam uma percepção crítica da realidade, analisando a história brasileira, e as características regionais que suscitaram o desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Devem também compreender o significado do serviço social na sociedade e seu desenvolvimento como profissão e identificar as demandas sociais, visando formular respostas profissionais para o enfrentamento da questão social, considerando as novas articulações entre o público e o privado (ABEPSS, 1996).

Tais competências tornam-se imprescindíveis para compreender o contexto social e histórico da sua intervenção. Elas permitem ao profissional fazer uma análise crítica da

realidade, para que só então possam construir seu trabalho e determinar as competências e atribuições específicas para o enfrentamento das demandas sociais presentes em seu cotidiano. (CFESS, 2008)

De acordo com Lewgoy (2010, p.43) ao se inserir no processo de estágio necessita da compreensão que e “nessa perspectiva, o sujeito constitui-se pelos processos de maturação orgânica e pelas suas interações sociais, com base nas trocas estabelecidas”, realizadas no estágio obrigatório e proporciona uma aproximação com a realidade consequentemente uma maior absorção das atividades e articulação da teórica com a prática.

Nesse contexto, vale ressaltar o que é exposto por Bisneto (2011, p. 127) o “o melhor tratamento psiquiátrico também é o melhor 9 tratamento social, assim são os objetivos da reabilitação psicossocial”, assim, o profissional realiza suas práticas no fortalecimento da ligação do usuário ao qual se vê uma determinada ruptura.

Amarante (2007), em seus estudos traz destaque nas discussões dos conceitos pré-estabelecidos no âmbito da saúde mental, faz-se imprescindível realizar a reflexão do fazer profissional como sendo mediador na valorização das relações sociais, tornando-se de relevância uma atuação crítica e concisa do profissional.

As oficinas, grupos, e as outras atividades realizadas com os usuários, são promotoras de inclusão e um exercício de relação com os profissionais, sendo proposto pela necessidade de uma análise de cunho critica em volta do perfil e realidade individualizada dos usuários. (BISNETO,2011).

Para Lewgoy (2010, p. 60) “as habilidades de investigação, de proposição e de intervenção precisam ser trabalhadas desde o início do curso de Serviço Social, por meio de leitura crítica e propositiva das exigências sociais postas no mundo contemporâneo”. Dessa forma, o autor expõe em seus estudos que a materialização das práticas/ações do assistente social são momentos extremamente ricos de reflexões, no que concerne o processo sócio histórico dos espaço socio-ocupacionais de atuação dos profissionais de serviço social, sendo fundamentadas no fazer e no porquê das ações, consequente dessas reflexões a atuação passa a ser uma atuação com comprometimentos, e sem preceitos particulares, e rompe com o conservadorismo, pois só o conhecimento critico é capaz de levar para a profissão e a sociedade uma realidade com uma roupagem justa e igualitária.

3 CONCLUSÃO

A experiência da vivencia com o estágio proporciona ao acadêmico de aproximação

com a realidade profissional, e a articulação da teoria e prática. A contextualização a atuação do assistente social inserida no âmbito da saúde mental, necessita de um aprofundamento teórico e a compreensão do processo evolutivo e estruturação da psiquiatria, o contexto social e os posicionamentos dos profissionais de linha de frente desse setor da saúde.

O serviço social desde sua consolidação vem incorporando como frente a defesa e garantia de direitos da classe trabalhadora, atrelado a um projeto societário. A necessidade científica, a consolidação e sistematização de documentos e estudos, proporciona subsídios para o fazer profissional, sendo de necessidade dos usuários e da sociedade uma atuação crítica. Tais apontamentos ficaram evidentes no processo de estágio, quando o estágio começa suas intervenções e análise do fazer profissional, e identifica como mediador analítico e o compromisso ético-político, emancipatório e promoção de direitos.

A proposição de intervenção, objetiva a materialização da teoria do cuidado à saúde, compreendendo-se a necessidade de articulação entre o usuário e a equipe, inclusive no envolvimento deles como um todo, tencionando o tratamento decorre pelo meio social em conformidade com a Reforma Psiquiátrica. Assim, surgindo a proposta de intervenção o trato continuado, ao qual ser executado pelas vias das ações terapêuticas/interativas, como os grupos, oficinas entre outras ações, com o envolvimento dos usuários e equipe de serviço social, sendo a equipe de serviço fundamentado no ensino continuado, concretizado na profissão e por meio das trocas das relações entre os profissionais e setores da saúde mental.

REFERÊNCIAS

ABEPSS. **Diretrizes Gerais para o Curso de Serviço Social de 8 de novembro de 1996.** Rio de Janeiro. 1996.

AMARANTE, Paulo. **Saúde Mental e Atenção Psicossocial.** Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2007

BISNETO, José Augusto. **Serviço Social e saúde mental: uma análise institucional da prática.** 3ed. São Paulo: Cortez, 2011.

BRAVO, Maria Inês Souza; MATOS, Maurílio Castro de. **Projeto Ético-Político do Serviço Social e sua Relação com a Reforma Sanitária: elementos para o debate.** 2004. Disponível em: Acesso em: 21/05/2021.

CFESS. **Código de Ética do Assistente Social**. 10 Ed. rev. e atual. Brasília: 1993.

CARDOSO, Maria de Fátima Matos. **Reflexões sobre Instrumentais em Serviço Social: Observação Sensível, Entrevista, Relatório, Visitas e teorias de Base no Processo de Intervenção Social**. São Paulo: LCTE Editora, 2008.

LEWGOY, Alzira Maria Baptista. **Supervisão de Estágio Em Serviço Social: desafios para a formação e o exercício profissional**. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2010.

MS. **SAÚDE MENTAL, NO SUS: OS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL**. Brasília 2012 Acesso em: 26/05/2021.

CAPÍTULO 90

SEXUALIDADE E INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS NA TERCEIRA IDADE

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c90](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c90)

Drieli Ferreira Costa¹, **Bruna Stephanie Sousa**², **Àlvaro da Silva Santos**³

¹Curso de Graduação em Enfermagem/ Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM),
(enfdrieli@gmail.com)

² Programa de Pós Graduação em Atenção à Saúde (PPGAS)/ UFTM,
(b.malaquias@outlook.com)

³ Curso de Graduação em Enfermagem e PPGAS/Programa de Pós Graduação Stricto Sensu
em Psicologia/ UFTM, (alvaroenf@hotmail.com)

Resumo

Objetivo: Desenvolver atividades de educação em saúde em uma roda de conversa com idosos para transmitir conhecimentos sobre sexualidade e infecções sexualmente transmissíveis. **Método:** O trabalho foi desenvolvido por meio de um projeto de extensão da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Trata-se de um grupo de educação em saúde realizado com idosos frequentadores da Unidade de Atenção ao Idoso em Uberaba - Minas Gerais. A atividade contou com 20 encontros que aconteciam semanalmente, durante cinco meses. Foram realizadas dinâmicas e jogos como forma de atração para ser realizado o objetivo de discutir temas importantes acerca de sexualidade e ISTs na terceira idade. **Resultados:** O projeto difundiu informações sobre sexualidade pertinentes na terceira idade, criou espaço de acolhimento e participação social, promoveu saúde e trocas de experiências ricas entre os graduandos e os idosos. A partir do conhecimento adquirido, os idosos atingiram autonomia em diversas áreas da vida, melhorando sua qualidade de vida. **Considerações Finais:** O projeto atingiu o objetivo, mostrando eficácia nas ações de educação em saúde. Foi identificada carência de conhecimento de grande parte dos idosos acerca dos temas estudados, indicando a necessidade de mais ações como estas. Os graduandos que coordenaram as ações aprenderam a mediar discussões em grupo, a elaborar material didático e aprimoraram sua prática com pessoas mais velhas.

Palavras-chave: Sexualidade; Idosos; Infecções Sexualmente Transmissíveis.

Área Temática: Ciências da Saúde.

E-mail do autor principal: enfdrieli@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

A expectativa de vida mundial está aumentando e os países em desenvolvimento, como o Brasil, tem um grande destaque (BRASIL, 2013). Atualmente, o Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística (2021) aponta que os idosos com 65 anos ou mais representam 10,15% da população brasileira, projetando que será 17,41% em 2040, e em 2060 um expressivo número de 25,49%.

O envelhecimento da população acarreta impactos importantes, gerando mudanças sociais, na previdência e nas áreas da saúde. E apesar do estigma de pessoas envelhecidas serem frágeis, a maioria dos idosos são ativos, possuem papel importante na família, sonham e possuem grande perspectiva de vida (BRASIL, 2013).

Nesse contexto, os idosos necessitam de um olhar especial para que sejam amparados nessa fase da vida. O cuidado deve ser empregado em todas as esferas da vida, e o Estatuto do Idoso garante proteção, acesso à saúde e políticas públicas que permeiam um envelhecimento saudável (GUEDES et al, 2017; BRASIL, 2013).

A sexualidade é um processo natural da vida que envolve aspectos físicos e emocionais promovendo bem estar, e colaborando para uma melhor qualidade de vida (GATTI e PINTO, 2019). Mas, muitas vezes, a sexualidade na velhice é vista como inexistente, e apesar das limitações fisiológicas, as pessoas envelhecidas têm desejos e são capazes de amar e trocar carícias até o fim da vida (OLIVEIRA et al, 2021; VIEIRA, COUTINHO e SARAIVA, 2016).

Quando a velhice é vista como mais uma fase normal da vida, os estereótipos e preconceitos podem dar lugar ao enaltecimento da vasta experiência que essas pessoas possuem e o rico conhecimento sobre o mundo já adquiridos (VIEIRA, COUTINHO e SARAIVA, 2016).

Uma grande parcela da sociedade não considera que os idosos podem ter uma vida sexual ativa e não possuem IST's (KIM et al, 2019). O fato das pessoas mais velhas sofrerem alterações hormonais e físicas pode diminuir a frequência da atividade sexual, mas não findar (OLIVEIRA et al, 2021). Esse tabu faz com que as pessoas da terceira idade não sejam alvo de campanhas de preservativos e prevenção de IST's, deixando-as em situação de risco (EZHOVA et al, 2020; KIM et al, 2019; LYONS, 2017).

O estudo de Kim et al (2019) mostra uma taxa baixa de uso de preservativos e número elevado de parceiros sexuais na população idosa. Em outro estudo, RITTER e UENO (2018), foi identificado que os adultos mais velhos que viveram em um meio onde não era discutida a sexualidade hoje possuem maior envolvimento em práticas sexuais sem preservativos.

É evidente que grande parte dos idosos possui carência de conhecimentos sobre a importância do uso de preservativos e a incidência de IST's nessa fase da vida (GATTI e PINTO, 2019; LIMA et al, 2020). Assim como possuem medo de serem julgados socialmente e pelo próprio parceiro ao falar sobre sexualidade (LIMA et al, 2020).

Frente a essa realidade, o projeto de extensão Abordando a Sexualidade e Infecções Sexualmente Transmissíveis em um Grupo de Educação em Educação em Saúde para Idosos visou desenvolver uma roda de conversa com idosos para transmitir conhecimentos sobre sexualidade e IST's.

2 MÉTODO

O trabalho é um relato de experiência sobre as atividades desenvolvida por graduandas de enfermagem da UFTM, por meio de um projeto de extensão financiada pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Extensão Universitária (PIBEX), em Uberaba – Minas

Gerais. O projeto foi realizado na UAI, semanalmente, durante cinco meses, entre agosto e dezembro de 2018, totalizando 20 encontros.

A UAI é uma unidade da prefeitura de Uberaba que visa promover saúde às pessoas da terceira idade de forma gratuita. São oferecidas atividades recreativas (canto coral, jogos de mesa, baile, bateria), artísticas (pintura em tela, trabalhos manuais), físicas (dança de salão, natação, ginástica, hidroginástica, musculação), área da educação (alfabetização, informática), área de saúde (cabeleireiro, serviço social, psicologia, fisioterapia, enfermagem, terapia ocupacional). Além de ser um dos pontos de telecentro da cidade, onde são desenvolvidas atividades em computadores conectados à internet usando a Tecnologia de Comunicação e Informação (TIC) (PMU).

A Unidade foi escolhida por já desenvolver atividades que visam melhorar a qualidade de vida das pessoas idosas, grande público cadastrado e ampla estrutura física. Para iniciar o trabalho, foi realizado contato com o coordenador da Unidade e solicitado uma sala grande, arejada e bem iluminada, para facilitar as práticas de atividades lúdicas com idosos.

Após a autorização da coordenação, foi realizada divulgação do planejamento do projeto na unidade por cerca de uma semana em diferentes horários do dia. Essa divulgação contou com a distribuição de panfletos (Figura 1), ação de promoção de saúde com aferição de pressão no salão da UAI e distribuição de lanches saudáveis (adequados para pessoas diabéticas e hipertensas), os últimos foram utilizados para aproximação daqueles que ainda não haviam sido abordados. Dessa forma, foi realizado contato com muitos frequentadores da Unidade por onde foi feito o convite para as atividades que seriam desenvolvidas durante o projeto.

Figura 1. Panfleto.

Fonte: Autores, 2018.

Os encontros aconteceram às quintas feiras, com duração de 60 minutos. Para iniciar, todos os participantes se apresentavam, realizavam alongamento como técnica de relaxamento e concentração, desenvolviam uma dinâmica em relação ao tema da aula para integração, discutiam o tema central e por último, era realizado um bingo.

Acerca dos temas, eram escolhidos de forma a contemplar as necessidades da realidade vivenciada pelos idosos. Para isso, a cada encontro os graduandos questionavam sobre os assuntos que eram de interesse para cada idoso, objetivando sanar as dúvidas de todos.

Para a prática metodológica, foi usado como referência o trabalho de Paulo Freire (1968), que mostra a eficácia de trabalhar por meio da investigação, tematização e problematização. Aplicado nessa realidade, investigar consistiu em conversas abertas com os idosos com a finalidade de conhecer as vivências e experiências de todos, identificando os déficits de informações sobre saúde sexual. Logo, era realizada a conscientização das temáticas em questão e, após, a transmissão de informações acerca dos temas levantados pelos idosos.

Como forma de atração para os idosos frequentar os encontros, foi usado a estratégia do jogo de bingo ao final de todos os encontros. Ao término das atividades, era reservado de dez a quinze minutos para realização do bingo, onde o ganhador recebia presentes simbólicos,

como bijuterias e doces, alguns levados pelos graduandos e outros pelos idosos, o que proporcionava sentimento de participação ativa a eles.

A avaliação da atividade foi realizada semanalmente e em dois momentos distintos. Primeiro, os participantes comentavam sobre os pontos positivos e negativos sobre o tema abordado, a condução das discussões e a forma de transmitir o conhecimento, além disso, dissertavam sobre a absorção das informações discutidas; após, os graduandos responsáveis pela coordenação do grupo avaliavam seu próprio desempenho e o do grupo, a fim de aprimorar a prática com os idosos e melhorar a didática.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O projeto mostrou resultados positivos desde o início. Diante do contato com a coordenação da unidade, foi possível estreitar a relação com os funcionários promovendo abertura para conversar sobre todas as ações desenvolvidas. Como por exemplo, as dificuldades de cognição que os idosos apresentavam durante a realização de outras atividades. Essa aproximação facilitou a adesão dos participantes, bem como a confiança dos participantes nos condutores da atividade. E os trabalhos desenvolvidos buscavam suprir a carência das participantes através da transmissão de conhecimentos (discussão sobre temas importantes) e práticas de desenvolvimento motor (dinâmicas e alongamentos).

Lima et al (2020), aborda no seu trabalho o receio que os idosos possuem em falar sobre sua sexualidade com medo de julgamentos. As dinâmicas foram importantes estratégias para o grupo de educação em saúde, pois permitiam que os participantes pudessem se sentir mais à vontade na presença dos outros participantes, estreitando os laços entre eles. Essas dinâmicas também fortaleceram o vínculo entre os graduandos e os participantes, possibilitando mais abertura nas falas e questionamentos deles durante as discussões.

Um exemplo de dinâmica foi organizar os participantes em dois círculos com o mesmo número de pessoas, um interno e outro externo, colocar uma música e pedir para girar os círculos enquanto a música estiver tocando; quando a música parar uma pessoa do círculo interior deve ficar de frente para outra do círculo exterior e fazer perguntas um para outro como: O que mais te deixa feliz? O que você mais admira nas pessoas; O que você mais gosta de fazer?.

Participar de grupos é importante para o desenvolvimento afetivo das pessoas, a socialização e troca de experiências permite maiores perspectivas de vida e melhora da qualidade de vida (SES-SP, 2001). Em consonância, os idosos do projeto demonstraram mais participação ao decorrer das semanas, aumento de alegria e motivação no enfrentamento de

problemas diários frente aos momentos de relaxamento e promoção de autocuidado vivenciados.

Muitas vezes, a prática de educação em saúde é feita de forma fragmentada, segmentando o conhecimento em diferentes atendimentos médicos (SES-SP, 2001). O projeto visou perpassar o máximo de informações possível acerca da temática sexualidade em idosos. Proporcionando espaço em que os idosos podiam discutir sobre conhecimentos novos e esclarecer dúvidas.

É muito importante para um educador conhecer a realidade do receptor de informações, desenvolver empatia e problematizar sua vivência (SES-SP, 2001). Nesse sentido, os graduandos conseguiram aproximar dos idosos, compartilhando experiências, sem julgamentos, e desenvolvendo escuta ativa. O resultado foi positivo, aumentando a participação durante as atividades e dividindo experiências pessoais com o grupo.

No estudo de Limas et al (2020) foi evidenciado que no atendimento médico, momento propício para discutir assuntos relacionados a saúde, os profissionais de saúde possuem receio de trabalhar sexualidade e prevenção de ISTs com a população idosa. Mas, durante as atividades desenvolvidas houve grande participação dos idosos e interesse pela maioria dos temas estudados. Demonstrando que esse pré conceito de abordar o tema deve ser findado.

Foram abordados diversos temas, como ISTs, sexualidade e hábitos saudáveis, lubrificação, gênero, Papilomavirus Humano (HPV), métodos contraceptivos, exame ginecológico e urológico, infecções que causam feridas, corrimentos e verrugas, apresentação do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), sexualidade na adolescência, vida adulta e sexualidade na velhice, entre outros. Sendo os temas mais discutidos pelos idosos: menopausa e andropausa, casamentos, infecções urinárias e preservativos.

Concordando com a literatura, foi identificado que a população envelhecida possui muitas dúvidas sobre as mudanças da sexualidade nessa fase da vida (GATTI e PINTO, 2019; LIMA et al, 2020). As orientações corretas desse tema pode diminuir estigmas e preparar a pessoa idosa a lidar com sua expressão sexual, beneficiando sua saúde sexual (SRINIVASAN et al, 2020).

Durante a semana do idoso comemorada entre os dias 2 e 6 de outubro, foi desenvolvido uma atividade que buscou conhecer os sonhos dos idosos. Assunto de grande importância quando voltado aos idosos e cercado de crenças que muitas vezes levam a exclusão dos mesmos, uma vez que para nossa sociedade e cultura o idoso deixa de ter sonhos e perspectiva de vida, por envolver planejamentos futuros.

O tema abordado indicou grande relevância para desmistificar a ideia genérica de que a

terceira idade não possui desejos, planejamentos e sonhos. Assim, a maioria dos idosos abordados mostraram grandes expectativas para o futuro, relatando que o exercício de sonhar é prazeroso na terceira idade. Essa atividade contribuiu para o bem estar e promoção de saúde dos participantes, de acordo com as funções que um profissional de saúde precisa exercer com a população idosa (TAVARES et al, 2016).

Todos os idosos que participaram da atividade assinaram o Termo de Autorização de Uso da Imagem. E, algumas falas, foi percebida a importância do sonhar na vida dessas pessoas, impulsionando-as a ter um objetivo e uma conquista a ser realizada. A ação buscou homenagear os idosos por meio de uma atividade lúdica e dinâmica, proporcionando diversão aos participantes, que apresentaram um pouco da sua história de vida, sua vivência da terceira idade e os seus sonhos ainda não alcançados, como demonstrado em algumas das imagens a seguir:

Imagem 1. Sonhando na Terceira Idade.

Fonte: Autores, 2018.

Imagem 2. Sonhando na Terceira Idade.

Fonte: Autores, 2018.

Imagem 3. Sonhando na Terceira Idade.

Fonte: Autores, 2018.

Imagem 4. Sonhando na Terceira Idade.

Fonte: Autores, 2018.

4 CONCLUSÃO

O envelhecimento populacional esta acontecendo de forma mundial, e os cuidados com os idosos precisam ser discutidos cada vez mais. É necessário atenção nas reais necessidades que essa fase da vida necessita para promover bem estar e promoção de saúde na velhice.

Dentro desse contexto, a sexualidade é um importante fator a ser estudado. O estigma de idosos serem assexuais pode fazer a velhice ser vivida com medo e receio ou muitas das vezes, ser anulada. de coerções sociais e até mesmo do parceiro, o que deixa a sexualidade inativa.

Contudo, intervenção que mescla troca de experiências e momentos de descontração se mostrou eficaz. Trabalhar educação em saúde pode trazer vários benefícios, como promoção de bem estar, melhora da qualidade de vida e incentivo ao autocuidado. Sendo assim, o presente estudo demonstra resultados positivos na transmissão de conhecimentos por meio de uma roda de conversas com idosos.

REFERÊNCIAS

ANACLETO, G. M. C.; AQUINO, R. C.; REBUSTINI, F. Quality of life in the elderly in a stretching program. **Revista Kairós – Gerontologia**, v. 1, n. 20, São Paulo, 2017.

Brasil. Ministério da Saúde. Estatuto do Idoso / Ministério da Saúde - 3. ed., 2. reimpr. - Brasília : Ministério da Saúde, 2013. 70 p.

ECHOVA, L. et al. Barriers to older adults seeking sexual health advice and treatment: A scoping review. **International Journal of Nursing Studies**, v. 107, 2020.

GATTI, M. C.; PINTO, M. J. C. Velhice ativa: a vivência afetivo-sexual da pessoa idosa. **Períodicos Eletrônicos em Psicologia**, v. 16, n. 2, 2019. <http://dx.doi.org/10.32467/issn.19982-1492v16n2p133-159>

GUEDES, M. B. O. G. et al. Apoio social e o cuidado integral à saúde do idoso. **Pshysis**, v. 27, n. 4, p. 1185-1204, 2017.

IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeção da população do Brasil e das Unidades da Federação, 2021. Disponível em: <
<https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/>>. Acesso em 30 de agosto de 2021.

KIM, H. Y. et al. Comportamento sexual e infecções sexualmente transmissíveis na população idosa da Coreia do Sul. **Investigative and Clinical Urology**, v. 60, n. 3, p. 202-209, 2019.

LIMA, I. C. C. et al. Sexualidade na terceira idade e educação em saúde: um relato de experiência. **Revista de Saúde Pública do Paraná**, v. 1, n.3, p. 137-143, 2020.

LYONS, A. et al. Sexually active older Australian's knowledge of sexually transmitted infections and safer sexual practices. **Australian and New Zealand of Public Health**, v. 41, n. 3, p. 259-261, 2017.

OLIVEIRA, P. R. S. P. et al. Sexualidade de idosos participantes de um centro de convivência. **Revista Online de Pesquisa**, v. 13, n. 13, p. 1075-1081, 2021.

PMU - Prefeitura Municipal de Uberaba. Unidades Municipais. Disponível em:
<<http://uberaba.mg.gov.br/portal/conteudo,10248>>

RITTER, L. J.; UENO, K. Same- N. ex Contact and Lifetime Sexually Transmitted Disease Diagnoses Among Older Adults. **Journal of Aging and Health**, v. 34, n. 6, 2019.

SERINIVASAN, S. et al. Sexuality and the Older Adult. **Current Psychiatry Reports**, v. 21, n. 97, 2019. <https://doi.org/10.1007/s11920-019-1090-4>

SES-SP - Secretária do Estado de Saúde de São Paulo. Manual Para Operacionalização das Ações Educativas no SUS. Educação em Saúde Planejando as Ações Educativas: Teoria e Prática. São Paulo (SP): Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo; 2001.

TAVARES, M. F. L et al. A promoção de saúde no ensino profissional: desafios na Saúde e a necessidade de alcançar outros setores. **Ciência e Saúde Coletiva**, v. 6, n. 21, p. 1799-1800, 2016.

VIEIRA, K. F. L.; COUTINHO, M. P. L.; SARAIVA, E. R. A. A Sexualidade Na Velhice: Representações Sociais de Convivência. **Revista Psicologia, Ciência e Profissão**, n. 36, v. 1, 2016. <https://doi.org/10.1590/1982-3703002392013>

CAPÍTULO 91

TECNOLOGIA EDUCATIVA EM SAÚDE COMO UMA FERRAMENTA DE PROMOVER O BEM ESTAR EM TEMPOS DE PANDEMIA DA COVID-19: REVISÃO INTEGRATIVA

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c91](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c91)

Antonia Mylene Sousa Almeida¹, Jhonnata Bezerra Araújo Melo², Lorena Stephany Lopes Fernandes³, Victória de Souza Nery⁴, Isis Passos Ferreira⁵, Isabelly Raiane Silva dos Santos⁶, Jônatas Lucas Marcelino da Silva⁷, Mylena Sousa Almeida⁸, Regisson Cauann Teixeira Barbosa⁹, Geísa de Moraes Santana¹⁰

¹Faculdade de Educação São Francisco, (mylenesousa123@hotmail.com)

² Faculdade de Educação São Francisco, (jhonnatamelol3@gmail.com)

³Centro Universitário Uninovafapi, (lorenastephanny_12@hotmail.com)

⁴Faculdade São Francisco da Paraíba (victorianery2001@hotmail.com)

⁵ Centro Universitário Fametro (isispassosferreira@gmail.com)

⁶ Universidade Federal do Pará (isabelly.santos@ifpa.edu.br)

⁷ Universidade Federal de Pernambuco (jônatas.lucas@ufpe.br)

⁸Faculdade de Educação São Francisco, (smylena191@gmail.com)

⁹ Centro Universitário Santo Agostinho (cauannt@gmail.com)

¹⁰ Universidade Estadual do Piauí, (geisasantana97@gmail.com)

Resumo

O presente estudo têm-se como objetivo identificar os diferentes tipos de educação em saúde através das tecnologias em tempos de pandemia, como também discutir sobre a importância das tecnologias para disseminar informações em meio a pandemia da COVID-19. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, no qual o levantamento se deu através das bases de dados: Base de Dados de Enfermagem (BDENF via BVS), *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (MEDLINE via PUBMED) e *Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde* (LILACS via BVS). Para esse trabalho, foram considerados como critérios de inclusão os artigos originais disponíveis por meio eletrônico em português e/ou em inglês e os que estão disponíveis entre o ano de 2020 e 2021, onde correspondem ao tempo de pandemia. Os critérios de exclusão, são artigos que não tratam da temática proposta, artigos duplicados, teses, monografias, dissertações, revisão, livros e que apresenta texto incompleto. A partir disso, o método de busca foi desenvolvido por meio da PICO no qual *Population*: coronavírus; *Intervention*: tecnologias da informação;

Comparison: não há e *Outcomes*: educação em saúde. A seleção dos descritores controlados e não controlados foram através dos DeCS, e do MeSH. Foram cruzados através do operador booleano “AND” para busca simultânea dos assuntos. Dentre os principais resultados, as tecnologias de informação contribuem para o repasse dos conhecimentos e da conversação beneficiando a população, além disso o uso das tecnologias é a forma mais eficaz nesse período, pois proporciona um maior alcance das orientações, podendo chegar à maioria da população. Devido ao fato da COVID-19 ser uma doença de alta transmissão, torna-se irrealizável as ações comunitárias em saúde. Diante do exposto, o uso das tecnologias em tempos de pandemia da COVID-19 é urgente e essencial, visto que é uma estratégia inovadora e eficaz para as ações educativas.

Palavras-chave: Coronavírus; Tecnologia da Informação; Educação em saúde.

Área Temática: Ciências da Saúde

E-mail do autor principal: mylenesousa123@hotmail.com

INTRODUÇÃO

Segundo Pimentel *et al.* (2020), os coronavírus constituem uma grande família de vírus e sua nomeação se dá devido às espículas na superfície, que lembram uma coroa. Existem seis espécies desse vírus que são capazes de adoecer a espécie humana, o SARS-COV-2 corresponde ao sétimo coronavírus que causa a doença COVID-19.

A COVID-19 foi identificada na cidade da China em Wuhan no dia 31 de dezembro de 2019 e desde então vem trazendo desafios em todo o mundo (GRANJEIRO *et al.* 2020). As pessoas com essa doença podem apresentar sintomas como tosse, dores na garganta, dificuldade de respirar, febre e outras manifestações clínicas, como também podem ser assintomáticos (CAVALCANTE *et al.* 2020). O vírus da COVID-19 é de fácil transmissão através de gotículas pelas vias respiratórias, como também pelo contato físico (SOARES *et al.* 2020).

De acordo com Granjeiro *et al.* (2020), o Ministério da Saúde divulgou recomendações para interromper a disseminação do vírus, no qual uma das principais delas foi o isolamento social afim de separar pessoas sintomáticas ou assintomáticas de maneira a conter a transmissão da doença. Diante desse cenário, onde a maior porcentagem da população se encontra em suas residências, vê-se a importância da tecnologia para realizar as ações na produção da saúde. Dentre as tecnologias, pode-se relatar sobre as tecnologias educacionais que tem a finalidade de facilitar o processo de educação em saúde da população com a transmissão de conhecimentos sobre a doença, tratamento e o autocuidado (MANIVA *et al.* 2017).

Portanto, essa pesquisa torna-se relevante devido a importância de abordar de forma específica sobre a educação em saúde em tempos de pandemia da COVID-19, tendo em vista o cenário atual onde a população encontra-se em isolamento e necessitada de informações para a promoção,

prevenção e recuperação da doença. A pergunta norteadora para essa pesquisa, foi a seguinte: de que forma as tecnologias da informação podem promover educação em saúde na pandemia da coronavírus?

OBJETIVOS

Identificar os diferentes tipos de educação em saúde através das tecnologias em tempos de pandemia, como também discutir sobre a importância das tecnologias para disseminar informações em meio a pandemia da COVID-19.

MÉTODO

Esse estudo é baseado na revisão integrativa da literatura, na qual a coleta de dados deu início no período de abril e finalizou em maio de 2021. De acordo com Souza, Silva e Carvalho (2010), a revisão integrativa é um instrumento da prática baseada em evidências, bem como um tipo de método que auxilia na produção de informações e na aplicação dos resultados obtidos.

O método de estudo abordado nesse trabalho apresenta informações sobre um tema específico, visto que tem a finalidade de reconhecer, avaliar e produzir resultados de estudos. Esse método consiste em seis fases para a preparação da revisão, são elas: criação da pergunta que irá nortear o trabalho; busca de dados; coleta de dados; análise dos conteúdos selecionados; discussão dos resultados; apresentação da revisão (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010).

Santos, Pimenta e Nobre (2007) afirmam que a estratégia PICO é fundamental para a construção da pergunta norteadora e para a busca nas bases de dados. PICO retrata um acrônimo para P: paciente; I: intervenção; C: comparação; O: *outcomes* (desfecho). Para a realização da construção da pergunta norteadora, considerou-se: P: coronavírus; Intervenção: tecnologias da informação; Comparação: não existe; *Outcomes*: educação em saúde. A pergunta deu-se a seguinte: de que forma as tecnologias da informação podem promover educação em saúde na pandemia da coronavírus?

O levantamento se deu através das bases de dados: Base de Dados de Enfermagem (BDENF via BVS), *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (MEDLINE via PUBMED) e *Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde* (LILACS via BVS). Para esse trabalho, foram considerados como critérios de inclusão os artigos originais disponíveis por meio eletrônico em português e/ou em inglês e os que estão disponíveis entre o ano de 2020 e 2021, onde correspondem ao tempo de pandemia por covid-19. Como critério de exclusão, foi adotado artigos que não tratam da temática proposta, artigos duplicados, teses, monografias, dissertações, revisão, livros e que não apresenta o texto completo.

A partir disso, o método de busca foi desenvolvido por meio da PICO (*Population, intervention,*

comparison, outcomes), no qual *Population*: coronavírus; *Intervention*: tecnologias da informação; *Comparison*: não há e *Outcomes*: educação em saúde. A seleção dos descritores controlados e não controlados foram através dos descritores em ciências da saúde (DeCS), e no Medical Subject Headings (MeSH) (Tabela 01). Foram cruzados através do operador booleano “AND” para busca simultânea dos assuntos.

Tabela 1. Descritores controlados e não controlados utilizados para busca de dados, Pedreiras, Brasil, 2021.

DECS		
Descritor controlado		Descritor não controlado
P	Coronavírus	Coronavirus do Coelho
I	Tecnologias da informação	ICT; Tecnologia da Informação e Comunicação; Tecnologia de Informação; Tecnologias da Informação; Tecnologias da Informação e Comunicação; Tecnologias da Informação e Comunicações; Tecnologias de Informação; TIC em Saúde; TIC na Saúde
C	-	-
O	Educação em saúde	Educar para a Saúde; Educação para a Saúde; Educação para a Saúde Comunitária; Educação Sanitária
MESH		
Descritor controlado		Descritor não controlado
P	Coronavirus	Coronaviruses; Coronavirus, Rabbit; Rabbit Coronavirus; Coronaviruses, Rabbit; Rabbit Coronaviruses
I	Information Technology	Information Technologies; Technology, Information
C	-	-
O	Health Education	Education, Health; Community Health Education; Education, Community Health; Health Education, Community

Fonte: Autores, 2021.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Através do levantamento nas bases de dados, foi quantificado no total 224 artigos. Dentre esses, 08 foram eliminados por não estar em português e/ou inglês, 01 foi eliminado pelo método, 01 por estar disponível na modalidade livro, 01 por estar duplicado e 05 por ausência de texto completo. Restaram então, 208 artigos que foram selecionados para a leitura. Após a leitura, 01 foi eliminado por estar duplicado, 152 por não tratar especificamente da temática, 05 por texto incompleto e 15 pelo método. Mediar

Quadro 1.1

2021.

Fonte: Autores, 2021.

Dentre os principais resultados, nota-se de acordo com Soares *et al.* (2020), que as tecnologias de informação e comunicação contribuem para o repasse das informações e da conversação beneficiando a população, visto que com a atual pandemia a maioria das pessoas estão em suas casas e precisam de conhecimentos que promovam a saúde e auxilie na diminuição da disseminação do vírus.

Acredita-se também, que o uso das tecnologias para distribuir informações é a forma mais eficaz nesse período, pois proporciona um maior alcance das orientações, podendo chegar à maioria da população. A educação em saúde pode ser realizada de variadas formas, podendo ressaltar a utilização de aplicativos para distribuir conhecimentos sobre ações protetivas, contribuindo para o aumento da segurança no ambiente de trabalho, como por exemplo (SOARES *et al.*, 2020).

Além disso, baseado no estudo de Marasca *et al.* (2020), as tecnologias contribuíram também para as atividades psicológicas *online*, no qual foi primordial nesse contexto precário onde muitas pessoas tiveram a saúde mental abalada, possibilitando assim o acesso da população ao cuidado com a mente, visto que com os noticiários sobre a doença, as múltiplas mortes de amigos e familiares e o isolamento social há uma necessidade de ações psicológicas desenvolvida para a sociedade, principalmente para as pessoas mais afetadas psicologicamente pela doença.

Outra atividade tecnológica utilizada atualmente frente a pandemia é o telemonitoramento em saúde, onde é possível acompanhar o paciente e suas condições de saúde sem precisar se locomover e sair de casa, tendo em vista que para a redução da transmissão do coronavírus é primordial o isolamento social. Essa forma de tecnologia é utilizada principalmente com gestantes e idosos que fazem parte do grupo de risco.

Na China, o modo de educação em saúde para distribuir informações importantes sobre a pandemia foi realizado por meio de mensagens de texto, um tipo de tecnologia bastante usada pelas pessoas, onde proporciona a chegada dos conhecimentos sobre prevenção a todo indivíduo, bem como mensagens de motivações para o enfrentamento desse momento difícil (LUO *et al.*, 2020). Ademais, as *lives* realizadas pelas redes sociais estão sendo bem vistas na promoção de saúde e prevenção da doença COVID-19 por abranger grande parte da população.

Xie *et al* (2020), afirma que para o alcance das informações por meio da informática, é fundamental que os educadores e profissionais disseminem esses conhecimentos de maneira criativa para que desperte a atenção da população e assim praticar ações preventivas de forma correta em suas residências. A criatividade é um dos fatores que leva a pessoa a olhar tais informações com outros olhares, visto que é uma forma diferente de disseminar a promoção de saúde, o que faz a sociedade praticar essas ações de promoção.

Para combater a atual pandemia, é preciso que informações corretas sejam disseminadas diariamente, tendo em vista que é um momento onde surge diversas *fake News*. Com isso, o uso de

cartilha educativa foi uma maneira acessível para combater essas notícias falsas que podem alterar a qualidade da promoção em saúde, pois através da cartilha ampliou-se as informações seguras, com fontes confiáveis e com embasamento científico (SILVA *et al.*, 2020).

De acordo com Valizadeh-Haghi, Khazaal e Rahmatizadeh (2021), as informações em educação em saúde através das tecnologias devem ser divulgadas por meio de conteúdos em linguagem simples que seja de fácil entendimento a toda população para que possa atender suas necessidades, especialmente em tempos de pandemia, pois a população leiga poderá praticar as ações de prevenção e se autocuidar através da divulgação com linguagem simplificada.

As tecnologias de informação podem ser utilizadas também para reduzir estresse e ansiedade no período de pandemia da COVID-19 sendo disseminado estratégias essenciais como a prática de exercício físico, atividades de relaxamento e alimentação saudável para auxiliar na saúde mental dos profissionais da saúde e da população (PINHO *et al.*, 2021).

CONCLUSÃO

Conclui-se então, que as tecnologias informativas em saúde podem ser utilizadas de diferentes formas para propagar educação em saúde no meio da pandemia da COVID-19. Além disso, é importante ressaltar também que esse meio de transmitir informações em meio as adversidades na atualidade é essencial para que todos tenham acesso a prevenção e cuidados relacionados a doença.

Devido ao fato da COVID-19 ser uma doença de alta transmissão, torna-se irrealizável as ações comunitárias em saúde. Diante do exposto, o uso das tecnologias em tempos de pandemia da COVID-19 é urgente e essencial, visto que é uma estratégia inovadora e eficaz para as ações educativas, bem como para a prevenção da doença e para a promoção e recuperação da saúde. Dentre os estudos, vê-se a necessidade dessas informações serem de forma criativa para que a população possa se atentar e se prevenir de forma eficaz.

REFERÊNCIAS

CAVALCANTE, J. *et al.* COVID-19 no Brasil: evolução da epidemia até a semana epidemiológica 20 de 2020. **Epidemiol. Serv. Saúde**. v.29, n.4, 2020.

GRANJEIRO, E. *et al.* Estratégias de ensino à distância para a educação interprofissional em Saúde frente à pandemia COVID-19. **REVISA**. v.9, p.591-602, 2020.

LUO, Y. *et al.* Factors influencing health behaviours during the coronavirus disease 2019 outbreak

in China: an extended information-motivation behaviour skills model. **Public Health**, v. 185, p. 298-305, 2020.

MANIVA, S. *et al.* Tecnologias educativas para educação em saúde no acidente vascular cerebral: revisão integrativa. **Rev Bras Enferm.** v.71(suppl 4):1824-32., 2018

MARASCA, A. R. *et al.* Avaliação psicológica online: considerações a partir da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) para a prática e o ensino no contexto a distância. **Estud. psicol. Campinas**, v. 37, e200085, 2020.

PIMENTEL, R. M. M. *et al.* A disseminação da covid-19: um papel expectante e preventivo na saúde global. **J Hum Growth Dev.** v. 30, n. 1, p. 135-140, 2020.

PINHO, L. *et al.* O uso de estratégias de promoção da saúde mental por enfermeiros para reduzir a ansiedade, estresse e depressão durante o surto de COVID-19: uma perspectiva. **Pesquisa Ambiental**, v. 195, e:110828, 2021.

SANTOS, C. M. C.; PIMENTA, C. A. M.; NOBRE, M. R. C. A estratégia pico para a construção da pergunta de pesquisa e busca de evidências. **Rev Latino-am Enfermagem**, v. 15, n. 3, maio-junho, 2007.

SILVA, R. C. R. *et al.* Construção de cartilha educativa sobre cuidados com crianças frente à pandemia covid-19: relato de experiência. **Rev baiana enferm**, v. 34:e37173, 2020.

SOARES, D. C. *et al.* Tecnologias da informação e comunicação na educação em saúde acerca do Coronavírus: relato de experiência. **J. nurs. health.**, v. 10:e20104027, 2020.

SOUZA, M. T.; SILVA, M. D.; CARVALHO, R. Revisão integrativa: o que fazer. **Einstein**, v.8, n. 1, p. 102-6, 2010.

VALIZADEH-HAGHI, S; KHAZAAL, Y; RAHMATIZADEH, S. Health websites on COVID-19: are they readable and credible enough to help public self-care? **Journal of the Medical Library Association**, v. 109, n. 1, January, 2021.

XIE, B. *et al.* When Going Digital Becomes a Necessity: Ensuring Older Adults' Needs for Information, Services, and Social Inclusion During COVID-19. **JOURNAL OF AGING & SOCIAL POLICY**, v. 00, N 00, p. 1–11, 2020.

CAPÍTULO 92

UMA ÓTICA EMPÁTICA E CRÍTICA PARA A QUESTÃO DAS DROGAS: VISLUMBRANDO UMA ALTERNATIVA AO MODELO PROIBICIONISTA

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c92](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c92)

Natália Lopes Lima¹, Elias Emanuel Oliveira da Silva², Yasmin de Sousa Vieira³, Ivelise Pereira dos Santos de Freitas⁴

^{1,2} Graduanda (o) em Direito pela Universidade Federal do Piauí- UFPI, Teresina, Piauí, Brasil. Email: natlialopes713@gmail.com. eliasoliver841@gmail.com.

³ Graduanda em Direito pela Faculdade Maurício de Nassau- UNINASSAU, Teresina, Piauí, Brasil. Email: minsousa18@gmail.com.

⁴ Graduada em Serviço Social pela Universidade Salvador- UNIFACS, Salvador, Bahia, Brasil. Email: ivelisepereirafreitas@gmail.com.

RESUMO

O presente estudo tem como eixo central o modelo proibicionista sobre as drogas. Metodologicamente, adotou-se a revisão bibliográfica, de abordagem qualitativa e utilizando a pesquisa bibliográfica, com o fito, em um primeiro momento, de pontuar que o proibicionismo não consegue reintroduzir as pessoas viciadas na sociedade, a partir de uma abordagem focada em estudos sobre o vício em drogas, correlacionando-os a um exemplo de flexibilização do proibicionismo. Ademais, em segundo plano, o objetivo voltou-se para demonstrar a íntima ligação do sistema proibicionista com a penalização da população pobre e do ser negro. A partir disso, inferiu-se que a arquitetura penal dada à problemática não só dificulta a ressocialização dos viciados como também pune sobremaneira a negritude e a pobreza.

Palavras-chave: Proibicionismo; Sistema Penal; Portugal.

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas.

Email da autora principal: natlilopes713@gmail.com.

1 INTRODUÇÃO

As drogas estão presentes na sociedade humana desde os primórdios de sua existência. As finalidades são as mais diversas: práticas ritualísticas, tratamentos medicinais, atividades recreativas, etc. Ao longo da história os entorpecentes não foram proibidos, tampouco regulamentados, entretanto, a partir do século XX, há uma virada nessa conjuntura na medida em que a maioria dos países, incluindo o Brasil, encabeçados pelo modelo antidrogas

estadunidense, adotou políticas severas focadas no proibicionismo das drogas (BORGES, 2016).

Nesse sentido, o objeto de estudo deste trabalho é o modelo proibicionista sobre as drogas, objetivando demonstrar que este não promove a reintegração dos dependentes na sociedade, sobretudo no contexto brasileiro, onde há a problemática do encarceramento em larga escala dos grupos subalternos e vulneráveis do tecido social, com participação ativa da polícia e da jurisdição estatal. Posto isso, a pertinência da temática está na capilaridade que alcança no meio social e com isso a importância de sua abordagem. Contudo, os debates relacionados ao tema são feitos de forma deturpada, com maior utilização do senso comum em detrimento do embasamento científico. Enxerga-se a droga como uma substância corruptível e que necessariamente levará a quadros de dependência, portanto, deve ser combatida com rigor, além do olhar de repulsa para com o viciado, tratando-o sob uma ótica criminal e não como um ser humano fragilizado que precisa de assistência e amparo.

Essas perspectivas enviesadas motivaram a construção do presente artigo, na tentativa de desconstruir alguns pré-conceitos formados em detrimento das pessoas que se tornam dependentes e reforçar que o proibicionismo não é eficaz para diminuir o consumo e a circulação dos entorpecentes, conforme se propõe. Além disso, priorizou-se contextualizar o caso brasileiro, em que o encarceramento por crimes relacionados às drogas assume um viés racista e classista.

2 METODOLOGIA

Do ponto de vista metodológico, optou-se por uma revisão bibliográfica, com abordagem qualitativa de todos os trabalhos acadêmicos coletados, utilizando a pesquisa bibliográfica. Com isso, não foi delimitado um período temporal, mas, primeiramente, foram selecionadas aquelas pesquisas pertinentes em relação à temática de toxicodependência e que seguissem a linha de raciocínio de que uma pessoa se torna viciada não exclusivamente pelo consumo regular do entorpecente nem por ter uma suposta postura criminal, mas, devido, especialmente, aos contextos nos quais esse ser humano está inserido, para tanto, foram utilizados os trabalhos de Alexander, Merhy e Silveira (2018) e Hari (2015). Ademais, ambicionando delinear um panorama geral da descriminalização das drogas feita em Portugal, a fim de demonstrar que uma alternativa ao paradigma repressivo surte reais efeitos no consumo de entorpecentes e nas problemáticas a eles relacionadas, foram empregadas as contribuições de Martins (2013) e Rodrigues Neto (2016).

Na segunda parte, preferiu-se trabalhos que comungassem da linha crítica do Direito Penal, compreendendo-o não apenas como um ramo do Direito que tão só define infrações penais e pune quem as transgride, mas também, como um instrumento de dominação social e que age de forma seletiva, conforme aponta Flauzina (2006). Desse modo, partindo dos pressupostos teóricos de Borges (2016), expõe-se que o intuito de proteger a saúde pública e afastar as pessoas das drogas, que sancionam sua criminalização, não são alcançados. Outrossim, com o mesmo pesquisador, analisou-se o modo de atuação seletivo da Instituição Policial, somado a isso, com as teses de Carvalho (2015), externou-se o agir dos atores judiciais e o quanto isso contribui para o aprisionamento de negros e pobres. Por fim, importante pontuar que foi estipulado um período temporal (referências dos últimos 5 anos) somente nos dados utilizados na pesquisa, a fim de melhor representar a realidade atual.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A questão das drogas ainda é percebida na sociedade com bastante preconceito e imbuída de julgamentos morais e culturais que enraizaram-se no debate público. A grande maioria da população associa o vício em narcóticos ao simples consumo reiterado da substância ilícita. Tal concepção encontrou terreno fértil entre o fim da década de 1960 e o início da década de 1980, em um contexto marcado tanto pelo endurecimento da política antidrogas iniciada pelo presidente estadunidense Richard Nixon e mantida pelos seus sucessores, quanto pela ebulição cultural e política do período, em que as drogas estavam ligadas às minorias racializadas e aos setores mais progressistas da sociedade americana, vistos como opostos aos valores cristãos anglo-saxônicos do branco estadunidense médio, o que tornava ainda mais justificável a ideologia proibicionista (BORGES, 2016).

Nessa seara, estudos realizados em laboratório nas décadas de 70 e 80 vieram a corroborar com a visão de que basta o uso regular de entorpecentes para sobreviver o vício. Os experimentos consistiam em disponibilizar a um rato engaiolado dois bebedouros, um com água pura e o outro com uma solução de morfina diluída em água. Os ratos submetidos a essa situação tiveram predileção pela solução aquosa de morfina. Estes desenvolveram vício na substância e alguns morreram em decorrência da overdose (ALEXANDER; MERHY; SILVEIRA, 2018). Para os cientistas, essa pesquisa foi considerada uma prova cabal de que o vício decorre apenas da ingestão constante de psicoativos, o que, por sua vez, mais que justificaria a política de repressão adotada pelo ocidente capitaneada pelos Estados Unidos. No entanto, o psicólogo Alexander e sua equipe notaram certas incongruências no experimento e decidiram replicá-lo

com algumas alterações: ao invés dos ratos permanecerem em gaiolas pequenas e sem companhia, optaram por introduzi-los em uma gaiola muito mais espaçosa e colorida, com túneis e bolas para que os ratos pudessem se entreter. Além disso, foi inserido o fator convivência, no qual os ratos não mais estavam sozinhos, mas em grupos de 18 a 20 indivíduos, com metade destes sendo pertencente ao sexo masculino e a outra metade ao sexo feminino. Essa gaiola foi nomeada de *Rat Park* (ALEXANDER; MERHY; SILVEIRA, 2018). Como resultado desse experimento, os ratos consumiram uma quantidade relativamente menor da água com droga quando comparados aos isolados (menos de um quarto em quantidades absolutas). Além disso, nenhum deles morreu de overdose ou apresentou sintomas de abstinência após a interrupção do uso, enquanto no isolamento, todos os ratos apresentavam sintomas de abstinência antes que fossem reintroduzidos na gaiola e morressem de overdose (ALEXANDER; MERHY; SILVEIRA, 2018).

Nesse seguimento, o pesquisador Hari (2015), em seu livro “Chasing the Scream: the first and the last days of the war on drugs”, abordou o famoso experimento de Bruce Alexander e buscou traçar paralelos com acontecimentos semelhantes na história humana. Segundo Hari (2015), o caso mais próximo de *Rat Park* ocorreu durante e após a Guerra do Vietnã, em que 20% das tropas americanas em solo vietnamita desenvolveram vício em heroína, droga da família dos opioides, a qual também compreende a morfina do experimento de Alexander com os ratos. Com o fim da guerra, as autoridades sanitárias dos Estados Unidos e a Drug Enforcement Administration (DEA)-Administração de Fiscalização de Drogas- ficaram receosos de que houvesse um aumento considerável no número de viciados em heroína nos EUA, no entanto, 95% dos toxicodependentes que voltaram para casa conseguiram se curar do vício em menos de um ano e de forma natural (HARI, 2015).

Nessa perspectiva, os experimentos do doutor Alexander e o estudo apresentado na obra de Hari (2015) trazem indícios de que a dependência transcende o aspecto químico e alcança outros determinantes, como o fator emocional e social. Ratos engaiolados e que são submetidos a poucos estímulos que sejam capazes de ativar os neurotransmissores do cérebro e descarregar hormônios de prazer e euforia em seus corpos são mais suscetíveis aos efeitos negativos das drogas, visto que estas também possuem ativos capazes de ligarem-se com os receptores de endorfina, dopamina, adrenalina, serotonina, dentre outros. Tanto os roedores presos em gaiolas pequenas quanto as tropas americanas no Vietnã enfrentavam situações de bastante estresse emocional e, portanto, buscaram a forma mais simples a sua disposição para prover a seus cérebros a quantidade demandada de neurotransmissores. O retorno dos soldados a suas casas e ao aconchego de suas famílias fez com que a imensa maioria deles debandasse do uso de

heroína, o que, de maneira análoga, aconteceu com os ratos de *Rat Park*.

Destarte, o paradigma proibicionista age de maneira oposta, pois conferir um caráter penal à questão das drogas não ataca o real motivo pelo qual toxicodependentes tentam fugir de suas realidades. Por esse ângulo, o exemplo de Portugal ilustra que uma intervenção não proibicionista pode gerar consequências positivas no controle das drogas. O país ibérico presenciou um surto no consumo de psicoativos durante os anos que sucederam o fim da ditadura de Antônio Salazar, dado que, durante seu regime, foi promulgado o Decreto-Lei nº 420/70, o qual regulava a produção, o tráfico e o uso de tóxicos, contribuindo para a repressão ao consumo de drogas (RODRIGUES NETO, 2016). Devido ao fracasso do paradigma punitivo em Portugal, os mandatos governistas subsequentes ao de Salazar tentaram adotar políticas descriminalizantes. Após debates do governo, ao longo da década de 80 e 90, com os diversos setores da sociedade portuguesa, resolveu-se modificar a política em relação aos psicoativos, culminando na Lei nº 30/2000 (RODRIGUES NETO, 2016).

Com a referida lei, o país descriminalizou o consumo de todas as drogas (GREENWALD, 2009). Nesse ínterim, faz-se mister distinguir o significado de descriminalizar, legalizar ou despenalizar no que tange às drogas. Nas linhas de Greenwald (2009), descriminalizar quer dizer que as infrações saíram do âmbito penal e da justiça criminal, passando a ser tratadas na esfera administrativa. Quanto à despenalização, significa que o consumo de entorpecentes ainda existe como crime, porém, a pena privativa de liberdade é suprimida dentre as reprimendas penais cabíveis, aplica-se multa, liberdade condicionada, dentre outras. Na legalização, a venda, produção, posse ou consumo de drogas não sofre qualquer tipo de proibição.

Em Portugal, o uso, a compra e a posse para consumo próprio, embora ainda sejam condutas proibidas legalmente, deixaram de ser crime, desde que a quantidade não seja superior ao consumo médio individual durante 10 dias (RODRIGUES NETO, 2016). Com isso, a “virada de chave” no modelo português deu-se com o tipo de abordagem da problemática, priorizando alocar investimentos para políticas de desestímulo ao consumo, por meio da informação, redução de danos, como a troca de seringas para as drogas injetáveis, e a construção de mais centros de tratamentos, ao invés de punições (RODRIGUES NETO, 2016). O usuário não mais sofreria processos penais, passou a integrar a esfera da saúde pública, com vistas ao seu acolhimento e a um uso controlado e seguro das substâncias. Quando alguém portando/consumindo drogas fosse flagrado, não seria mais conduzido a uma delegacia, mas guiado a Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência- integrada por dois profissionais que possuem experiência na temática de drogadição, além de um jurista- e após identificar a

pessoa, suas condições socioeconômicas, o modo de uso e o nível de dependência, essa comissão aplica as medidas cabíveis, que podem ser sanções administrativas, tratamento ou terapia (MARTINS, 2013), mas em nenhuma hipótese será aplicada a abordagem coercitiva (RODRIGUES NETO, 2016).

Conforme os resultados angariados por Portugal desde a implementação do referido diploma legal, percebe-se que o usuário deixou de ser um inimigo da lei e passou a ser inserido no sistema de saúde português e na sociedade. A cobertura do programa chegou a atingir quase 95% dos toxicodependentes de Portugal e como resultado o país conseguiu que o uso de heroína e cocaína despencasse, reduzindo de 1% para 0,3% da população portuguesa. As contaminações por HIV entre os consumidores, um dos principais problemas em razão do uso da heroína injetável, caíram pela metade (eram assustadores 104 novos casos por milhão ao ano em 1999 e em 2015 passou a ser 4,2 casos a cada milhão de habitantes) e o encarceramento de pessoas por motivos associados às drogas diminuiu de 75% para 45%, segundo dados extraídos da matéria de 6 de maio de 2019 no jornal El País e disponibilizados pela Agência Piaget para o Desenvolvimento (Apdes).

Ante o exposto, pode-se colocar que a associação entre entorpecentes e o necessário vício é algo equivocado, deve-se somar ao uso reiterado, o contexto socioeconômico e emocional que a pessoa está vivenciando. Por outro lado, há uma relação entre a flexibilização do modelo proibicionista e a eficácia em reduzir o número de dependentes, resultando em uma diminuição das consequências maléficas desse problema na sociedade. Desse modo, o proibicionismo falha, tanto em conceder uma rede de apoio às pessoas viciadas, integrando-as de fato na sociedade, quanto em conseguir conter a comercialização e difusão dos entorpecentes. No Brasil, a problemática das drogas ganha outros contornos, em vista da criminalização afetar seletivamente pessoas racializadas e periféricas.

Dando continuidade, as instituições criminais que executam a política repressiva sobre as drogas tomam como certo que empreender esse modelo proibicionista é válido porque o uso de drogas inevitavelmente leva a quadros de dependência, além de que, drogas desnaturam a mente humana podendo levar a pessoa a ter comportamentos criminosos (BORGES, 2016). Com isso, o porte e o comércio ilícito de entorpecentes devem ser duramente combatidos, em virtude de constituírem um perigo para a saúde do corpo social. No entanto, pode-se inferir que a proteção social a qual se propõe essa medida criminalizadora não ocorre na realidade. O que se observa é o uso do aparato repressivo do Estado em direção aos grupos mais vulneráveis da sociedade. Com contribuição da Instituição Policial e dos atores judiciais, o sistema que, em tese, deveria garantir a tão almejada segurança pública legitimadora da política de guerra às

drogas, acaba por produzir vítimas.

O paradigma proibicionista está fundado na salvaguarda dos interesses sociais, ao ter como objetividade jurídica a saúde pública, uma vez que esta configura-se como o polo passivo da dispersão do consumo de drogas (BORGES, 2016). Com isso, criminalizar o uso e o tráfico de psicoativos seria uma forma de protegê-la, dado que o consumo ou a disseminação de substâncias ilícitas (tráfico) caracterizam crime de perigo abstrato pela lesão presumida à saúde pública, visto que o seu uso pode desencadear quadros de dependência, ameaçando o bem-estar físico e psíquico dos seres humanos. Considerar a droga um esfacelador da vida social também é um discurso que respalda o paradigma proibicionista, por consequência, a sociedade demoniza as drogas, assim como aqueles que as consomem. Desse modo, a criminalização é a solução mais apropriada porque é vital agir contra essas substâncias “demoníacas” (BORGES, p. 36, 2016), seguindo a linha de apenas culpabilizar as pessoas por sua eventual dependência (MARTINS, 2013), desumanizando o usuário. Entretanto, como pontua Borges (2016), o modelo proibicionista não alcança os seus objetivos instituídos (como a desarticulação das estruturas das organizações criminosas que estão à frente do comércio ilícito de drogas e diminuir o consumo entre a população brasileira), o que se observa, na verdade, é uma atuação seletiva da máquina estatal no combate às drogas.

Segundo a ótica de Flauzina (2006), a seletividade é a marca estrutural do sistema penal, afirmando que este funciona de modo quantitativa e qualitativamente seletivo. Sob esse ângulo, o sistema penal é dirigido de acordo com uma perspectiva de não penalização de certos delitos e imunidade a determinadas pessoas, o que Flauzina denomina de seletividade quantitativa. Desse modo, o sistema penal é inepto a realizar o objetivo primordial para o qual foi criado: corrigir de maneira isonômica as perturbações mais graves que ocorrem no ordenamento jurídico e quem o perturba.

A seletividade qualitativa, a seu turno, está conectada à criminalização primária (quando o Poder Executivo ou Legislativo seleciona determinadas condutas, positivas ou negativas, que deverão merecer as reprimendas penais cabíveis) e a criminalização secundária, coordenada pela Polícia, promotores e os atores judiciais os quais direcionam o controle penal a um dado grupo social, o que reforça estereótipos criminais (FLAUZINA, 2006). Nessa linha, a atuação policial na repressão ao consumo e tráfico de drogas é um ótimo exemplo dessa seletividade penal. É certo que milhares de brasileiros praticam ambos os delitos; de todas as etnias, estratos sociais, faixas etárias e gêneros. Todavia, Borges (2016) nos alerta que a suspeita policial se volta esmagadoramente para pessoas negras e pobres. Nesse sentido, porque “as estatísticas criminais são indicativos [...] não dos grupos mais criminosos, mas daqueles mais

criminalizados” (BORGES, p. 51, 2016) não se pode afirmar de modo algum que essa parcela do corpo social seja a que mais cometa esses ilícitos penais, mas tão somente que negritude e pobreza são fatores de vulnerabilidade para o encarceramento. Isso correlaciona-se ao fato de que pessoas negras e pobres são erroneamente associadas ao estereótipo de “bandido” e “marginal”, criando a mácula sobre negros e periféricos de serem presumivelmente criminosos e, portanto, merecedores de todo o aparato repressivo estatal.

Coerentemente com essa visão, Carvalho (2015) evidencia que os dados referentes à taxa de aprisionamento permitem inferir a parcela importante de participação do Poder Judiciário no encarceramento em massa de pessoas negras. Em acordo com esse pensamento, os dados mais recentes compilados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2021 ilustram bem essa maior incidência da taxa de prisionalização sobre pessoas negras. Quanto à quantidade de pessoas encarceradas que tiveram suas informações de raça registradas (599.932 em 2020) referente ao período de janeiro e junho, 397.816 eram pessoas identificadas como negras, o que corresponde a 66,3% do total e apenas 32,5% dos encarcerados foram classificados como brancos ou 195.085 presos. Isso demonstra uma normalização do racismo nos órgãos de aplicação da pena e consequentemente na orientação do punitivismo estatal. Um dos pontos levantados pelo professor, a fim de analisar mais profundamente a contribuição dos magistrados para o encarceramento de negros, é a Lei de Drogas brasileira, porquanto seja um dos crimes que mais gera prisões, atrás apenas dos delitos patrimoniais (CARVALHO, 2015). Dado que a norma, não obstante despenalize o uso de substâncias ilícitas, não traz patamares mínimos objetivos de psicoativos portados pela pessoa que permita distingui-la como usuário ou como traficante (CARVALHO, 2015).

Esse trabalho de diferenciação fica a cargo, inicialmente, de policiais e muitos dos quais, em suas abordagens, costumam utilizar critérios raciais e socioeconômicos, colocando pessoas brancas de classe média ou mais abastadas na benesse de destinatárias finais das drogas, ainda que com elas sejam encontradas uma quantidade considerável de substâncias ilícitas que permita deduzir que seja para o comércio ilícito, por não terem o estereótipo de criminoso, e imputando aos negros periféricos a figura de traficante, mesmo que esses venham a ser apreendidos com uma pequena quantidade de drogas, por serem presumivelmente marginais (BORGES, 2016). Subsequentemente, a valoração judicial tende a corroborar com a imputação feita pelos policiais, em decorrência dos privilégios e posições de vantagens vivenciados pelos primeiros e da vulnerabilidade social sofrida pelos segundos.

Sob essa perspectiva, traficantes brancos de boa posição social conseguem suportar os honorários advocatícios de excelentes criminalistas para fazerem suas defesas técnicas e, com

isso, dificilmente são condenados pelo crime de tráfico de psicoativos. O que ocorre, nas raras vezes em que são punidos, é a desclassificação para usuários de drogas. Em contraponto a isso, jovens não brancos e desprovidos de recursos financeiros não podem arcar com os altos custos de um bom advogado criminal, além da carência de defensores públicos no Brasil (BORGES, 2016), dificultando o acesso dessas pessoas a um processo penal justo. Assim, o judiciário brasileiro segue a linha de castigar mais a negritude e a pobreza e dar imunidade às pessoas brancas e de maior poder aquisitivo. Logo, usuários negros presos em flagrante em um contexto de marginalização e fragilidade social são mais facilmente interpretados e posteriormente condenados por tráfico de entorpecentes.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, é evidente que o modelo proibicionista falha em reinserir o dependente na sociedade, grande parte, devido aos estigmas produzidos em desfavor desse grupo e contra as drogas. Destarte, a ingerência penal da questão tolhe a capacidade do Estado em canalizar investimento público consciente para a construção de perspectivas reais e uma rede de apoio no âmbito da saúde, a fim de integrar de fato os viciados e assim tirá-los de suas “gaiolas solitárias” em que o único estímulo possível é a droga.

Outro aspecto a ser destacado é que a estrutura legal brasileira de combate às drogas justifica-se, de forma velada, pelo domínio sobre corpos negros e espaços povoados pelo contingente mais pobre dos centros urbanos do país, tendo em vista que mais facilmente são pessoas racializadas e despojadas de vantagens socioeconômicas que lotam os presídios brasileiros por essas práticas incriminadoras. Nessa linha, não olvidemos da contribuição da Instituição Policial e dos operadores do Direito para essa filtragem racial e social na consecução e posterior aplicação da Lei de Drogas, pois os critérios de distinção entre o usuário e o traficante são marcadamente étnico-raciais e classistas, o que deixa transparecer a seletividade do sistema penal.

Dessa forma, esse escrito buscou traçar alguns elementos que amparam uma política de drogas antiproibicionista, com especial olhar para os viciados e o desenvolvimento de um aparato social para estes em vez de repressão, além de pontuar o fator encarceramento em massa empreendido contra o segmento negro e pauperizado da sociedade brasileira. Nesse âmbito, quanto às limitações desse trabalho, pode-se destacar a não abordagem das dificuldades para a implantação de políticas públicas, sobretudo no Brasil, de abrandamento ao proibicionismo e consequentemente os aspectos que levam a manutenção dessa política criminal, o que pode ser desenvolvido e aprofundado em futuras pesquisas.

REFERÊNCIAS

ALEXANDER, B. K; MERHY, E. E; SILVEIRA, P. Criminalização ou acolhimento?. *In*: ALEXANDER, B. K. **Dependência dos opiláceos: Rat-Park revisitado**. Porto Alegre: Rede Unida, 2018. p. 19-57.

BORGES, S. S. da F. **A eficácia invertida da guerra às drogas: gestão diferencial das ilegalidades e dominações sociais**. 2016. 101 f. Monografia (Bacharel em Ciência Política) – Instituto de Ciência Política. Universidade de Brasília, Brasília, 2016. Disponível em: <https://bdm.unb.br/handle/10483/16858>. Acesso em: 26 jun. 2021.

CARVALHO, S de. O encarceramento seletivo da juventude negra brasileira: a decisiva contribuição do Poder Judiciário. **Revista da Faculdade de Direito da UFMG**, n. 67, p. 623-652, 2015. DOI: 10.12818/P.0304-2340.2015v67p623. Acesso em: 26 jun. 2021.

FBSP - Fórum Brasileiro de Segurança Pública. **Anuário Brasileiro de Segurança Pública**, São Paulo, 2021. Disponível em: <https://forumseguranca.org.br/anuario-brasileiro-seguranca-publica/>. Acesso em: 15 jul. 2021.

FLAUZINA, A. L. P. **Corpo negro caído no chão: o sistema penal e o projeto genocida do Estado brasileiro**. 2006. 145 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade de Brasília, Brasília, 2006. Disponível em: <https://repositorio.unb.br/handle/10482/5117>. Acesso em: 26 jun 2021.

GREENWALD, G. **Dependências**— Só para Profissionais, 2009. Disponível em: <http://www.dependencias.pt>. Acesso em: 18 jul. 2021.

HARI, J. **Chasing the Scream: The First and Last Days of the War on Drugs**. Nova York: Bloomsbury Publishing, 2015.

LINDE, P. Como Portugal se tornou referência mundial na regulação das drogas. **El País**, Porto, 06 maio 2019. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/05/02/internacional/1556794358_113193.html. Acesso em: 26 jun. 2021.

MARTINS, V. L. A política de descriminalização de drogas em Portugal. **Serv. Soc. Soc.**, São Paulo, n. 114, p. 332-346, jun. 2013. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010166282013000200007&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 15 jul. 2020.

RODRIGUES NETO, M. **A descriminalização do consumo de droga em Portugal- quinze anos depois**. 2016. 115 f. Dissertação (Mestrado em Comunicação, Media e Justiça). Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 2016. Disponível em: <https://run.unl.pt/handle/10362/20345>. Acesso em: 15 jul. 2021.

CAPÍTULO 93

USO DA VISCOSSUPLEMENTAÇÃO NO TRATAMENTO DA ARTROCENTESE: REVISÃO DE LITERATURA

[DOI 10.4322/978-65-995353-2-1.c93](https://doi.org/10.4322/978-65-995353-2-1.c93)

Arthur Mendes Lima¹, Thalita Oliveira da Silva Borba², Anne Caroline Silva Freire de Sá³, André Almeida Antunes⁴, Erick Lúcio Souza Santos⁵, Fernanda Maria Matos Aragão de Souza⁶, Jadson da Silva Santana⁷, Letícia Rafaella Marinho Honorato⁸, Alícia Lima de Lira⁹, Eduardo Stehling Urbano¹⁰

¹ arthurmlima@hotmail.com - Universidade Federal de Juiz de Fora/UFJF

² thalita.borba00@gmail.com - Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES/UNITA

³ annecarolinefreiree@gmail.com - Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES/UNITA

⁴ andredemu@yahoo.com.br - Centro Universitário de Belo Horizonte/Unibh

⁵ ericklucioel@gmail.com - Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES/UNITA

⁶ aragaofernanda22@gmail.com - Graduada em Odontologia, pelo Centro Universitário Tabosa de Almeida Ascens/UNITA

⁷ jadsonufpe@gmail.com - Universidade Federal de Pernambuco/UFPE

⁸ leticiamarinhh@hotmail.com - Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES/UNITA

⁹ alicialimadl@gmail.com - Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES/UNITA

¹⁰ esurss@yahoo.com.br - Universidade Federal de Juiz de Fora /UFJF

RESUMO

Objetivo: Analisar a eficácia da artrocentese associada à viscoossuplementação, ressaltando os seus benefícios, através de uma revisão de literatura. **Método:** Trata-se de uma revisão de literatura realizada a partir da inserção de descritores específicos nas bases de dados PubMed, SciELO e MedLine, onde foram incluídos estudos publicados na íntegra, entre 2010 a 2021, na língua portuguesa e inglesa, sendo excluídos resumos publicados em anais, textos incompletos, periódicos pagos, revisões e trabalhos sem fundamentação científica. A partir disso, foram selecionados 16 artigos que se relacionavam com o tema em questão. **Resultados:** A partir da inserção de descritores encontrou-se 128 estudos, os quais, após a filtragem por ano, idioma, gratuidade e texto

completo disponível findaram-se em apenas 54. A partir da leitura dos títulos e resumos foram selecionados os artigos considerados de interesse para o objetivo do presente estudo que totalizaram 16 artigos. **Conclusão:** Pode-se concluir que a disfunção temporomandibular implica na qualidade de vida do paciente devido aos sintomas frequentemente divulgados. Diante disso, pode-se elaborar o tratamento cirúrgico ou conservador.

Palavras-chave: Artrocentese da Articulação Temporomandibular; Articulação Temporomandibular; Viscosuplementação;

Área Temática: Ciências da Saúde

E-mail do autor principal: arthurmlima@hotmail.com

1 INTRODUÇÃO

A disfunção temporomandibular (DTM) abrange problemas clínicos que interferem na articulação temporomandibular (ATM), músculos mastigatórios e estruturas anatômicas associadas à região. Os motivos relacionados à DTM são traumas diretos ou indiretos, estresse cumulativo e repetitivo, alterações na coluna, postura inadequada e o porte ergonômico da cabeça, além de fatores psicológicos. Pode-se incluir também, hábitos parafuncionais como apertamento dentário e bruxismo que implicam nas condições anatômicas e funcionais do sistema estomatognático (MACIEL, LANDIM e VASCONCELOS, 2018). Dentre os sintomas causados, são relatados dor facial, disfunção da mandíbula, sensibilidade e rigidez nos músculos da mastigação. Esses sintomas estão atrelados à disfunção da ATM (STEPAN, SHAW e OUE, 2017).

De acordo com a literatura, a prevalência da disfunção temporomandibular é oscilante, atingindo cerca de 5-70 % da população, sendo a dor o sintoma dominante em 40 por cento dos pacientes. Foi relatado que 40-75 % da população apresenta um sinal de DTM e 33 por cento exibem um sintoma dessa disfunção (MACIEL, LANDIM e VASCONCELOS, 2018; SILVA e SOARES, 2018; STEPAN, SHAW e OUE, 2017). O acometimento, em especial, engloba indivíduos jovens e de meia-idade, com uma tendência maior ao gênero feminino. Em uma proporção que pode alterar, segundo a literatura, de 3:1 a 9:1 quando comparada aos homens (URBANO, et al., 2020; STEPAN, SHAW e OUE, 2017). A etiologia é regularmente multifatorial e, por isso, encontram-se diferentes intervenções. Nesse tocante, o objetivo do tratamento é uma melhora ou eliminação da dor e um aumento da função (BOULOUX et al., 2017).

O diagnóstico de disfunção temporomandibular pode ser difícil, uma vez que a DTM exibe uma variedade de sintomas, no qual não são exclusivos da disfunção temporomandibular

(STEPAN, SHAW e OUE, 2017). Diante disso, os métodos diagnósticos para a identificação da DTM consiste em Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD), que se baseia num questionário publicado em 2014, a partir da adaptação do Research Diagnostic Criteria for TMD (RDC/TMD). O DC/TMD é distinguido em dois eixos, sendo o Eixo I utilizado com a finalidade de classificação em presença ou não de DTM, além da classificação do tipo de desordem; ao mesmo tempo que no Eixo II analisa aspectos psicossociais e comportamentais do paciente relacionado à DTM (SCHIFFMAN et al., 2014). Além disso, o reconhecimento da disfunção normalmente é clínico, sendo imprescindível os exames imaginológicos, essencialmente nos casos em que o tratamento cirúrgico é uma opção (DANTAS et al., 2019).

Para o tratamento das disfunções internas da ATM são sustentadas pela literatura as intervenções conservadoras, como o repouso funcional, anti-inflamatórios não esteroides (AINES), dispositivos interoclusais, exercícios fisioterápicos de suporte, injeções intra-articulares de corticosteróide; e terapias cirúrgicas, sendo estas variando desde cirurgias abertas até cirurgias consideradas minimamente invasivas, como a artrocentese e artroscopia da ATM (BONOTTO et al., 2011). A artrocentese não é indicada em casos de fibroanquilose, doenças intra-articulares como alterações ósseas e perfuração do disco articular. Usualmente, o protocolo primário de controle das DTM preconiza as medidas mais simples, reversíveis e menos invasivas. Entretanto, o tratamento conservador em determinados casos pode ser ineficaz, especialmente nos casos de distúrbios intra-articulares, sendo indicado as terapias cirúrgicas (DE RIU et al., 2013; URBANO et al., 2020).

Desse modo, a artrocentese relacionada a viscosuplementação é uma alternativa para casos em que a terapia conservadora não é bem vista. A viscosuplementação, corresponde na aplicação intra-articular de ácido hialurônico (AH), no intuito de diminuir o estresse da cartilagem articular através da lubrificação, e por obter mecanismos analgésicos e anti-inflamatórios, bloqueiam receptores e substâncias algícas nos tecidos sinoviais, acarretando na recuperação da função fisiológica do líquido sinovial (BONOTTO et al., 2011). Com isso, a viscosuplementação pode ser vinculada a artrocentese que é um procedimento fácil, minimamente invasivo e altamente eficiente, tendo como objetivo de limpar a articulação de restos de tecidos, sangue e mediadores inflamatórios, além de aumentar a amplitude de abertura da boca em pacientes com restrição de movimentos mandibulares (LEE et al., 2013).

Diante disso, o objetivo do trabalho é analisar a eficácia da artrocentese associada à viscosuplementação, através de uma revisão de literatura.

2 MÉTODO

Trata-se de uma revisão de literatura feita nas bases de dados PubMed, SciELO e MedLine realizada a partir do cruzamento dos descritores “Artrocentese da Articulação Temporomandibular; Articulação Temporomandibular; Viscosuplementação”; e seus correspondentes em inglês, entre os anos de 2010 a 2021, utilizando o operador booleano “AND”. Foram incluídas revisões de literatura, relatos de caso, meta análises e ensaios clínicos. Além disso, foram excluídos resumos publicados em ANAIS, artigos incompletos, periódicos pagos ou trabalhos sem fundamentação científica. Frente a isso, foram encontrados 54 artigos, e selecionados 16 que se relacionavam com o tema em questão.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Silva e Soares (2018) e Azato et al. (2013) relataram que o aparecimento e perpetuação da DTM estão relacionados à interação de fatores, como estresse, lassidão ligamentar, trauma, hábitos parafuncionais, alterações sistêmicas e mudanças internas e externas na estrutura da articulação temporomandibular, sendo a DTM responsável pela causa de dor crônica da região orofacial, onde, dentre os indivíduos afetados, somente 12% possuem sintomas graves o suficiente para procurar tratamento. Não obstante, Silva e Soares (2018) apontam que para a realização do diagnóstico da disfunção temporomandibular, diversos questionários, índices e critérios diagnósticos devem ser utilizados adjunto com o exame clínico, onde, o critério diagnóstico em pesquisa para DTM (RDC/TMD) é apontado como uma das melhores ferramentas estruturadas para o diagnóstico da DTM. Além disso, o uso de exames de imagem que auxiliem a complementar o diagnóstico podem ser usados, como radiografia panorâmica, tomografia convencional da ATM, tomografia computadorizada da ATM, artrografia da ATM e a ressonância magnética nuclear, onde as imagens geradas, proporcionam a realização de vários cortes na imagem captada, permitindo a visão por

ângulos

diversos.

Stepan, Shaw e Oue (2017), afirmam que o tratamento é determinado pela sintomatologia. No entanto, pode ser difícil determinar se a dor do músculo facial é primária ou resultado de disfunção da articulação intra-articular. Em geral, a mialgia e a disfunção articular ocorrem em conjunto. A orientação do paciente é um primeiro passo essencial na conduta. O tratamento se baseia numa alimentação leve, realização de compressas térmicas no local da dor e técnicas de relaxamento. Nesse contexto, Lee et al. (2013), condizem da mesma linha de raciocínio, destacando que o tratamento da DTM pode ser fragmentado em duas categorias sendo, o método conservador e o método cirúrgico. A conduta conservadora inclui medicamentos, fisioterapia, terapia com talas e diretrizes quanto aos hábitos parafuncionais. Os tratamentos cirúrgicos têm por sua vez, artrocentese, artroplastia, discectomia e reconstrução da ATM.

A artrocentese possibilita técnicas diferentes conforme a literatura, como a cânula única de Shepard, unidade concêntrica de agulhas, cânula dupla de agulhas, agulha única e a técnica de duas agulhas (GROSSMAN, 2012). Nesse contexto, o objetivo da artrocentese é remover mediadores inflamatórios, como interleucinas, radicais livres e restos celulares além de eximir aderências entre o disco e a fossa articular através da limpeza do compartimento superior da ATM com manipulação simultânea da mandíbula (ROSSINI et al., 2021). Esse procedimento pode ser realizado isoladamente ou associado a injeções intra-articulares de medicamentos (URBANO, et al., 2020; BOULOUX et al., 2017).

Os medicamentos com possibilidade de uso nas injeções intra-articulares são os corticoesteroides e o hialuronato de sódio (HS), sendo este último estipulado como viscosuplementação. No caso da viscosuplementação, o AH tem por característica potencial de lubrificação da ATM, além de desempenhar propriedades analgésica, anti-inflamatória e condroprotetora (URBANO, et al., 2020; ROSSINI et al., 2021). Num estudo comparativo de Giraddi et al., 2012) com relação ao uso da AH e corticosteróides após a intervenção com artrocentese, conclui-se que não existe distinção significativa entre esses medicamentos em relação à redução da dor e aumento da abertura bucal, e que ambos mostram excelentes resultados no tratamento. Entretanto, existe uma observação em relação ao uso de corticosteróides intra-articulares, visto que na literatura há relatos de que este fármaco pode causar efeitos colaterais a longo prazo, como destruição da cartilagem articular, reabsorção óssea e infecções (ABDULRAZZAK et al., 2021; GIRADDI et al., 2012).

O maior componente do líquido sinovial é o AH, sendo relevante em função da lubrificação dos tecidos articulares, por causa do seu alto peso molecular. Nos processos inflamatórios e degenerativos das articulações a concentração e o peso molecular do AH estão reduzidos. A injeção do HS aumenta a quantidade e o peso molecular de AH no líquido sinovial, o que reflete no alívio da dor. Ou seja, a desobstrução das zonas de aderências entre o disco articular e a fossa mandibular amplificam a mobilidade articular, permitindo melhor circulação do líquido sinovial. Portanto, esses mecanismos de ação favorecem o avanço do quadro obtido pela paciente, após o tratamento com ambas as técnicas. A melhora na abertura bucal da paciente está relacionada com a eliminação de adesões, alívio da pressão negativa sobre o disco articular e recuperação do disco para a posição original durante a lavagem, o que também gera uma melhora dos ruídos articulares (BONOTTO et al., 2011). Em resumo, o AH proporciona aumento da lubrificação articular por ampliar a viscosidade do líquido sinovial, na qual exerce função protetora de choque, conservação da homeostase, proporcionando a ativação de processos de reparo e regulação das ações que interferem na síntese do líquido sinovial de células endógenas, provocando assim, uma maior mobilidade articular, diminuindo o atrito e ruído favorecendo a perfusão de nutrientes e metabólitos do líquido sinovial para os tecidos vasculares (ROSSINI et al., 2021).

Diante dessas técnicas, existe a chance de complicações como paralisia do ramo zigomático e temporal do nervo facial provocada pelo bloqueio anestésico local ou pelo próprio edema; paralisia zigomática ou de ramo bucal devido a trauma de agulha; edema pós-operatório causado por vazamento de solução intra-articular; hematoma periauricular; sangramento perioperatório por lesão vascular; bradicardia, fratura de instrumentos dentro da articulação e perfuração intracranial (GROSSMANN, 2012; MATSA et al., 2010; TAN e KRISHNASWAMY, 2012). Outrossim, Grossman (2012) aponta que outras complicações são possíveis como a formação de micro-hemorragias extra e intra-articulares, que podem avançar para anquilose fibrótica da ATM e até mesmo dores de difícil manuseio, como síndrome dolorosa regional complexa tipo I. No caso da viscosuplementação as principais intercorrências são reações no local da injeção da medicação, que se mostra como dor e edema (URBANO, et al., 2020).

Bouloux et al. (2017) evidenciaram que a artrocentese isolada é eficaz na redução da dor em pacientes com artralgia ou distúrbio interno, uma vez que diminui o nível de citocinas inflamatórias e proteínas degradadas na ATM, resultando em uma diminuição paralela da dor. Todavia, Lee et al. (2013) apontam que a artrocentese associada à viscosuplementação é um

método eficiente no tratamento de DTM, devido aos seus mecanismos fisiológicos condroprotetor, anti-inflamatório e analgésicos; além de serem consideradas técnicas seguras. Outrossim, a associação dessas técnicas com placas neuromioelaxantes potencializam ainda mais o tratamento, ou seja, a combinação da terapia conservadora com a injeção de AH mais a artrocentese tem resultados significativos. Dessa maneira, pode-se dizer que a DTM apresenta diferentes caminhos a serem seguidos no quesito plano de tratamento e à associação da artrocentese com a viscosuplementação oferece benefícios mais expressivos quando comparada a artrocentese isolada. Perante a isso, o operador junto com sua equipe decidirá qual o melhor caminho a ser traçado para o sucesso no tratamento.

4 CONCLUSÃO

Pode-se concluir que a disfunção temporomandibular pode causar limitações e diminuição da qualidade de vida das pessoas por conta do quadro álgico doloroso comumente referido como sintoma. Sendo assim, pode-se traçar o plano de tratamento conservador ou cirúrgico, visto que este último engloba a artrocentese isolada ou associada a corticosteroides ou a injeção de ácido hialurônico, sendo que a injeção de AH oferece um método eficaz para o tratamento das desordens temporomandibulares por proporcionar aumento da lubrificação articular ampliando a viscosidade do líquido sinovial.

REFERÊNCIAS

ABDULRAZZAK, N. J. et al. Arthrocentesis versus glucocorticosteroid injection for internal derangement of temporomandibular joint. *Oral And Maxillofacial Surgery*, v. 25, n. 2, p. 191-197, 2021.: 191-197.

AZATO, F. K. et al. Influência do tratamento das desordens temporomandibulares na dor e na postura global. *Revista Dor*, v. 14, n. 4, p. 280-283, dez. 2013.

BONOTTO, et al. Viscosuplementação como tratamento das alterações internas da articulação temporomandibular: relato de casos. *Revista Dor*, v. 12, n. 3, p. 274-278, set. 2011.

BOULOUX, G. F. et al. Is hyaluronic acid or corticosteroid superior to lactated ringer solution in the short-term reduction of temporomandibular joint pain after arthrocentesis? Part 1. *Journal of Oral and Maxillofacial Surgery*, v. 75, n. 1, p. 52-62, 2017.

DANTAS, L. S. et al. A evolução do tratamento das desordens temporomandibulares. *Braz J Surg Clin Res*, v. 27, n. 3, p. 108-113, 2019.

DE RIU, G. at al. Arthrocentesis and temporomandibular joint disorders: clinical and radiological results of a prospective study. *Int J Dent*, doi: 10.1155/2013/790648. Epub 2013 Nov 11.

GIRADDI, G. B. et al. Internal derangement of temporomandibular joint: an evaluation of effect of corticosteroid injection compared with injection of sodium hyaluronate after arthrocentesis. *Journal of maxillofacial and oral surgery*, v. 11, n. 3, p. 258-263, 2012.

GROSSMANN, E. Arthrocentesis techniques applied to arthrogenic temporomandibular joint disorders. *Rev Dor. São Paulo, Porto Alegre, RS*, p. 374-381, dez. 2012.

LEE, H. S. et al. Effect of simultaneous therapy of arthrocentesis and occlusal splints on temporomandibular disorders: anterior disc displacement without reduction. *Journal of the Korean Association of Oral and Maxillofacial Surgeons*, v. 39, n. 1, p. 14-20, 2013.

MACIEL, L. F. O.; LANDIM, F. S.; VASCONCELOS, B. C. Otological findings and other symptoms related to temporomandibular disorders in young people. *British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery*, v. 56, n. 8, p. 739-743, 2018.

MATSA, S. et al. Temporomandibular joint arthrocentesis for closed lock - A prospective analysis of 10 consecutive cases. *Univer J of Dent Scienc*, v. 1, n. 3, p. 225-229, 2010.

ROSSINI, R. et al. Double-Needle Arthrocentesis with Viscosupplementation in Patients with Temporomandibular Joint Disc Displacement without Reduction. *Clinics (São Paulo, Brazil)*, v. 76, e2840, 2021.

SCHIFFMAN, E. et al. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) for Clinical and Research Applications: recommendations of the International RDC/TMD Consortium Network and Orofacial Pain Special Interest Group. J Oral Facial Pain Headache, v. 28, n. 1, p. 6-27, 2014.

SILVA, H. B.; SOARES, J. L. Análise da abordagem fisioterapêutica no tratamento da disfunção temporomandibular: revisão integrativa. Revista Eletrônica Acervo Saúde, n. 19, p. 210, dez 2018.

STEPAN, L.; SHAW, C.L.; OUE, S. Temporomandibular disorder in otolaryngology: systematic review. J Laryngol Otol, v. 131, n. 1, p. 50-56, 2017.

TAN, D. B. P.; KRISHNASWAMY, G. A Retrospective Study of Temporomandibular Joint Internal Derangement Treated with Arthrocentesis and Arthroscopy. Proceedings of Singapore Healthcare, v. 21, n. 1, p. 73-78, 2012.

URBANO, E. S. et al. Avaliação da eficácia da artrocentese associada à viscosuplementação no tratamento das desordens temporomandibulares: relato de caso. HU Revista, v. 46, p. 1-8, 2020.