REFERENCES

1. Sheikhi, M., Shahab, S., Filippovich, L., Khaleghian M., Dikuser E., Mashayekhi, M. (2017) Interaction between new synthesized derivative of (E,E)-azomethines and BN(6,6-7) nanotube for medical applications: Geometry optimization, molecular structure, spectroscopic (NMR, UV/Vis, excited state), FMO, MEP and HOMO-LUMO investigations. *J Mol Struct* 1146:881–888.
2. Sheikhi, M., Shahab, S., Khaleghian, M., Kumar, R. (2018) Interaction Between New Anti-cancer Drug Syn-dros and CNT (6, 6-6) Nanotube for Medical Applications: Geometry Optimization, Molecular Structure, Spectroscopic (NMR, UV/Vis, Excited state), FMO, MEP and HOMO-LUMO Investigation. *Appl Surf Sci* 434:504–513.
3. Sheikhi, M., Shahab, S., Khaleghian, M., Hajikolaee, FH., Balakhanava, I., Alnajjar, R. (2018) Adsorption Properties of the Molecule Resveratrol on CNT (8, 0-10) Nanotube: Geometry Optimization, Molecular Structure, Spectroscopic (NMR, UV/Vis, Excited State), FMO, MEP and HOMO-LUMO Investigations. *J Mol Struct* 1160:479–478.
4. Sheikhi, M., Shahab, S., Alnajjar, R., Ahmadianarog, M. (2019) Adsorption Properties of the New Anti-cancer Drug Alectinib on CNT(6,6-6) Nanotube: Geometry Optimization, Molecular Structure, Spectroscopic (NMR, UV/Vis, Excited State), FMO, MEP and HOMO-LUMO Investigations. *J clust sci* 30:83–96.
5. Sheiki, M., Shahab, S., Khaleghian, M., Ahmadianarog, M., Kumar, R. (2019) Investigation of the Adsorption Rubraca Anticancer Drug on the CNT(4,4-8) Nanotube as a Factor of Drug Delivery: A Theoretical Study Based on DFT Method. *Current Mol Med* 19:473–486.

ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭКСКРЕЦИИ ГОРМОНОВ В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У ПАЦИЕНТОК, СТРАДАЮЩИХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

ASSESSMENT OF THE LEVEL OF HORMONE EXCRETION IN PERIPHERAL BLOOD AMONG PATIENTS WITH BREAST CANCER

К. В. Юрченкова¹, Р. М. Смолякова¹, Е. М. Шпадарук¹, И. Н. Андреева²
K. Yurchenkova¹, R. Smolyakova¹, K. Shpadaruk¹, I. Andreeva²

¹Белорусский государственный университет, МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ,
г. Минск, Республика Беларусь

²Институт генетики и цитологии НАН Беларуси,
г. Минск, Республика Беларусь
karinayurchenkova@gmail.com

¹Belarusian State University, ISEI BSU, Minsk, Republic of Belarus

²Institute of Genetics and Cytology, National Academy of Sciences of Belarus,
Minsk, Republic of Belarus

Результаты радиоиммунного исследования позволили обнаружить у пациенток активного репродуктивного периода снижение содержания в крови эстрадиола и прогестерона. У пациенток климактерического и постменопаузального периодов выявлен гормональный дисбаланс, характеризующийся более выраженным нарастанием уровня эстрадиола и прогестерона в крови на фоне снижения концентрации фолликуло-стимулирующего и лютеинизирующего гормонов.

The results of the radioimmune study revealed a decrease in the content of blood of estradiol and progesterone among patients of the active reproductive period. A hormonal imbalance, characterized by more clear increase in the level of estradiol and progesterone in the blood against the background decrease of follicle stimulating and luteinizing hormones was detected among patients with menopausal and postmenopausal periods.

Ключевые слова: рак молочной железы, гормоны, радиоиммунный анализ.

Key words: breast cancer, hormones, radioimmune study.

<https://doi.org/10.46646/SAKH-2020-2-274-277>

Рак молочной железы является одним из самых распространенных злокачественных новообразований среди женщин не только на постсоветском пространстве, но и во всем мире. Заболеваемость раком молочной железы зависит от ряда факторов: возраста пациенток и их овариально-менструальной функции, наступления менархе, первых родов. Изменение гормонального фона также является немаловажным фактором малигнизации клеток, на который стоит обратить внимание.

Регуляция состояния и функционирования молочных желез у женщин различного репродуктивного возраста осуществляется с помощью различных гормонов, продуцируемых железами внутренней секреции (яичники,

надпочечники, гипофиз и гипоталамус). Большинство этих гормонов являются стероидными с общим предшественником – холестерином. Гормональная регуляция – это сложный механизм различных эндокринных взаимодействий, который реализуется по принципу «обратной связи». Повышение концентрации эстрогенов обусловлено наступлением половой зрелости женского организма, что в свою очередь вызывает рост и функциональное созревание молочных желез. В период менопаузы прекращается функционирование яичников, которые вырабатывают эстрогены у женщин с активной репродуктивной функцией, и происходит частичная инволюция этих гормонов. Однако яичники не являются единственным источником эстрогенов, так у женщин в менопаузальном периоде некоторое количество эстрогенов синтезируется в жировой ткани, мышцах и внутренних органах. Еще одним регулятором функционирования молочной железы является прогестерон. Прогестерон и его аналоги участвуют в регуляции пролиферации и дифференцировке паренхиматозных клеток органа [1].

С каждым годом риск развития рака молочной железы возрастает у женщин как на фоне высокого уровня эстрогенов до менопаузы, так и на фоне эстрогенной недостаточности после неё. Менопауза – это прекращение менструаций на фоне угасания функциональной активности яичников сопровождающееся стойкой гипоестрогемией, которая приводит к ряду определенных проблем. Высокий риск развития рака молочной железы в постменопаузе обусловлен продолжительной стимуляцией клеток молочных желез эстрогенами, которые циркулируют в крови и усилением локального образования эстрогенов в молочных железах. Однако, с увеличением возраста, несмотря на снижение функциональной активности яичников, риск развития рака молочной железы прогрессивно возрастает без применения экзогенных гормонов, что является подтверждением наличия локальных механизмов, не зависящих от уровня циркулирующих гормонов.

Пролактин оказывает прямое влияние на развитие альвеолярного аппарата молочных желез, активирует синтез специфических молочных белков и действует вместе с эстрогенами, стимулируя размножение клеток молочной железы. Секреция пролактина тесно связана с секрецией фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормонов, которые регулируют активность репродуктивной активности женщин и стимулируют секрецию эстрогенов и прогестерона в яичниках. Рост опухолей молочной железы зависит от взаимодействий эстрогенов, прогестерона, пролактина, фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормонов. В связи с этим огромное значение в лечении рака молочной железы имеет гормональная терапия [2].

Цель исследования: определение уровня стероидных и гонадотропных гормонов в периферической крови для выявления нарушений эндокринной регуляции в организме у пациенток, страдающих раком молочной железы.

Материалом исследования послужили клинические данные и периферическая кровь пациенток, страдающих раком молочной железы, получавшие специальное лечение в ГУ «РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» с обязательным морфологическим подтверждением диагноза.

Всего в исследование было включено 32 пациентки в возрасте от 42 до 73 лет, средний возраст пациенток, страдающих раком молочной железы, составил $57,6 \pm 8,9$ года. Исходя из данных возрастных категорий установлено, что в группе пациенток, возраст которых 37–46 лет соответствует 16% случаев. У пациенток, возраст которых составил 47–56 лет – 19% случаев, в возрасте от 57–65 лет – 52%, и в группе пациенток с возрастом от 66 до 75 лет выявлено 13% случаев развития РМЖ.

Анализ клинических данных показал, что преобладающей морфологической формой рака является инвазивно-протоковая карцинома молочной железы, что соответствует 88% случаев. Инвазивная дольковая карцинома молочной железы обнаружена у 9% пациенток. Количество пациенток со смешанным раком (протоково-дольковым) установлен в 3% случаях. Другие морфологические типы РМЖ не выявлены в данной исследуемой группе пациенток. На диаграмме представлено распределение пациенток с РМЖ в зависимости от морфологического типа опухоли (рисунок 1).

Рисунок 1 – Распределение пациенток с РМЖ в зависимости от морфологического типа опухоли

При сравнении степени дифференцировки опухоли большинство пациенток имели умеренно (G2) дифференцированную опухоль, что составило 63% случаев. В то же время установлено присутствие высокой (G1) степени гистологической дифференцировки в 6% случаев, а низкая степень (G3) диагностирована у 28% пациенток.

Анализ локализации злокачественного образования показал, что у большинства пациенток (56%) опухоль локализована в правой молочной железе, а у 41% пациенток злокачественное образование локализовалось в левой молочной железе. Только в 3% случаев опухоль была локализована в обеих молочных железах.

При анализе распространённости опухолевого процесса (рисунок 2) выявлено, что преобладает II стадия – 47%. Количество пациенток с раком молочной железы I ст. составило 25%, III ст. – 22%. Наименее встречающейся является IV ст. – 6% случаев.

В связи с тем, что пациентки в климактерическом и постменопаузальном периодах наиболее подвержены заболеванию раком молочной железы следует принять во внимание, что важным является проведение сравнительной характеристики гормонального статуса пациенток с раком молочной железы. Для этого весь контингент пациенток был разделен на две подгруппы в соответствии с репродуктивным статусом женщин.

Первую подгруппу наблюдения составили 8 пациенток в возрасте до 50 лет с сохраненной овариально-менструальной функцией. В данной подгруппе у всех пациенток по результатам гистологического исследования выявлен инвазивный протоковый рак с преобладанием III ст. опухолевого процесса.

Рисунок 2 – Распределение пациенток, страдающих РМЖ, по степени распространённости опухолевого процесса

Во вторую подгруппу вошли 24 пациентки с РМЖ от 50 до 73 лет в климактерическом и постменопаузальном периодах. У данной категории пациенток диагностирован инвазивный протоковый рак в 83% случаев, преобладающей является II ст. опухолевого процесса.

В исследуемой группе пациенток с РМЖ подавляющее большинство составляют пациентки в возрасте от 50 до 73 лет в период климакса (75%), у 25% исследуемых пациенток сохранена репродуктивная функция.

У данных пациенток проводилось количественное определение в крови концентраций гормонов (эстрадиола, прогестерона, лютеинизирующего гормона, фолликулостимулирующего гормона и пролактина) радиоиммунным методом на гамма-счетчике «470 – 0050 WIZARD», PerkinElmer, США с использованием стандартных наборов РИА-ЭСТРАДИОЛ-СТ, РИА-ПРОГЕСТЕРОН-СТ, ИРМА-ФСГ-СТ, ИРМА-ЛГ-СТ и ИРМА-ПРОЛАКТИН-СТ согласно протоколу [3,4] (Республика Беларусь).

Предиктивным фактором развития рака молочной железы является гормональный статус пациенток. Таким образом, в ходе данного исследования было проведено определение концентраций в периферической крови основных половых и гонадотропных гормонов у групп пациенток с различной репродуктивной активностью (таблица).

В ходе исследования определялась концентрация эстрадиола в периферической крови пациенток, страдающих раком молочной железы. Отклонение от нормального уровня приводит к ряду изменений в молочных железах. В условиях повышенного синтеза эстрогенов молочные железы наиболее чувствительны к мутагенному и аберративному воздействию. В случае гипоестрогенемии у пациенток в большинстве случаев наблюдается неэффективность гормональной терапии, в то же время, гиперэстрогения является одним из ведущих патогенетических факторов развития РМЖ. Установлено, что в первой анализируемой подгруппе пациенток с сохраненной овариально-менструальной функцией содержание эстрадиола находилось в пределах нормы (0,2–0,8 нмоль/л) в 50% случаев. У 12,5% пациенток с раком молочной железы детектировано превышение нормального значения (>0,8 нмоль/л), в 37,5% случаев выявлено снижение (0–0,2 нмоль/л). Во второй подгруппе пациенток в климактерическом и постменопаузальном периодах все 100% случаев превысили значение нормы (>0 нмоль/л) исследуемого параметра.

При определении уровня прогестерона в первой подгруппе у 50% пациенток с раком молочной железы выявлено нормальное значение данного показателя (6–45 нмоль/л), снижение (0–6 нмоль/л) и превышение (>45 нмоль/л) данного стероидного гормона наблюдалось в равном соотношении по 25% случаев. Во второй подгруппе менопаузальных пациенток детектировано превышение нормального значения (>0 нмоль/л) в 100% случаев.

У пациенток с нормальной репродуктивной функцией уровень лютеинизирующего гормона находился ниже нормы (0–1 МЕ/л) в 12,5% случаев, у 37,5% пациенток – выше (10 > МЕ/л), в 50% случаев данный показатель соответствовал нормальному установленному значению (1–10 МЕ/л). Во второй подгруппе норме (12 >, МЕ/л) соответствовало 50% пациенток, ровно столько же случаев пришлось на пациенток, у которых уровень лютеинизирующего гормона был снижен (0–12, МЕ/л).

Нормальный уровень фолликулостимулирующего гормона (1,5–6 МЕ/л) пациенток первой подгруппы установлен в 75% случаев, снижение уровня (0–1,5 МЕ/л) выявлено у 12,5% пациенток, превышение (6 > МЕ/л) выявлено у 12,5%. В подгруппе климактерического и постменопаузального периодов детектировано снижение нормального значения (0–30 МЕ/л) в 75% случаев, у 25% пациенток выявлен нормальный уровень (30 > МЕ/л) данного гонадотропного гормона.

В первой подгруппе пациенток повышенная концентрация пролактина (27,7 > нг/мл) установлена в 25% случаев. В 75% случаев уровень данного показателя не выходил за пределы общепринятой норма (3,9–27,7, нг/мл). При исследовании уровня пролактина во второй подгруппе большинство случаев (64%) составили пациентки с повышенным содержанием (12,3 > нг/мл) исследуемого показателя и 36% случаев находились в пределах нормы (2,8–12,3 нг/мл).

Таблица – Уровни содержания гормонов в периферической крови пациенток с РМЖ

Гормоны	Подгруппа 1; количество пациенток, %			Подгруппа 2; количество пациенток, %		
	Повышение	Понижение	Норма	Повышение	Понижение	Норма
Эстрадиол	12,5%	37,5%	50%	100%	–	–
Прогестерон	25%	25%	50%	100%	–	–
ЛГ	37,5%	12,5%	50%	–	50%	50%
ФСГ	12,5%	12,5%	75%	–	75%	25%
Пролактин	25%	–	75%	64%	–	36%

Таким образом, пониженное значение фолликулостимулирующего гормона наблюдается у женщин во время менопаузы и связано с нарушением функции молочных желез. Наряду с фолликулостимулирующим гормоном у постменопаузальных пациенток наблюдается понижение лютеинизирующего гормона. Вследствие этого наблюдается резкое возрастание уровня эстрадиола в крови у женщин климактерического и постменопаузального периодов подтверждает факт того, что это является патологическим фактором развития рака молочной железы и женщины данной группы наиболее подвержены данной патологии, так как с возрастом у женщин в норме в менопаузе уровень эстрадиола снижается. Повышенное содержание пролактина приводит к супрессии выработки фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормонов, что наблюдается у второй подгруппы пациенток.

Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований молодых ученых (грант №М19М-015).

ЛИТЕРАТУРА

1. Чеснокова, Н. П., Барсуков, В. Ю., Злобнова, О. А. /О роли нарушений функциональной активности гипоталамо-гипофизарно-гонадной системы в патогенезе опухолевой прогрессии при раке молочной железы // Саратовский научно-медицинский журнал, – 2012. – Т.8. – № 4. – С. 915–919.
2. Уровень половых гормонов и пролактина в ткани злокачественных опухолей молочной железы у больных разного возраста /Кит О.И., Франциянц Е.М., Бандовкина В.А., Шатова Ю.С., Комарова Е.Ф., Верескунова М.И., Кучкина Л.П. // Фундаментальные исследования. – 2013. – №73. – С. 560–564.
3. Инструкция по применению набора реагентов для определения эстрадиола в сыворотке крови человека методом радиоиммунологического анализа № ИМ – 7.2617/1204 Министерство здравоохранения Республики Беларусь. – Минск, 2012. – 2 с.
4. Инструкция по применению набора реагентов для определения прогестерона в сыворотке крови человека методом радиоиммунологического анализа № ИМ – 7.2616/1204 Министерство здравоохранения Республики Беларусь. – Минск, 2012. – 2 с.