Рисунок 2 – Объем производства табачных изделий, млн. шт. сигарет

ЛИТЕРАТУРА

1. «Гродненская табачная фабрика «Неман». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.tabak.by/> – Дата доступа: 13.02.2020.
2. Корректировка акта инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух / ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман». – 2017.
3. Экологический паспорт предприятия ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» Концерн «Белгоспищепром».

ФИЗИЧЕСКАЯ СОРБЦИЯ МЕЖДУ CO, CO₂ И ФУРАНОКУМАРИНАМИ PHYSICAL SORPTION BETWEEN CO, CO₂ AND FURANOCUMARINES

В. С. Чепля, Е. С. Лукша, С. Н. Шахаб
V. Cheplya, E. Luksha, S. Shahab

*Белорусский государственный университет, МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ,
г. Минск, Республика Беларусь
vlad1997.cheplya@gmail.com
Belarusian State University, ISEI BSU,
Minsk, Republic of Belarus*

В настоящей работе исследованы адсорбционные свойства производных фуранокумаринов при не связанном взаимодействии с CO и CO₂ с помощью теории функционала плотности (уровни теории DFT: B3LYP/6-31+G* и M06-2X/6-31+G*) в воде растворителе. Определено несвязанное взаимодействие названных соединений с CO и CO₂ по электронным свойствам, таким как E_{HOMO}, E_{LUMO}, энергетический зазор между LUMO и HOMO, глобальная твердость.

In the present work, the adsorption properties of furanocoumarin derivatives at the nonbonded interaction with CO and CO₂ are investigated using the density functional theory (DFT: B3LYP/6-31+G* and M06-2X/6-31+G* levels of theory) in the solvent water. The nonbonded interaction of the named compounds with CO and CO₂ by electronic properties such as E_{HOMO}, E_{LUMO}, the energy gap between LUMO and HOMO, global hardness was determined.

Ключевые слова: фуранокумарины, теория функционала плотности, несвязанное взаимодействие.

Keywords: furanocoumarins, theory of density functional, unbound interaction.

<https://doi.org/10.46646/SAKH-2020-2-442-444>

Биологические свойства фуранокумаринов являются целью исследований в фармацевтической промышленности, поэтому значительный интерес был проявлен к их доступности и источникам. Многие фуранокумарины токсичны и вырабатываются растениями как защитный механизм против различных видов хищников, начиная от насекомых и заканчивая млекопитающими. Данные соединения уже давно известны своей биологической активностью, воздействуя на несколько систем организма, в частности на ферменты P450. Известно также, что фуранокумарины вызывают фоточувствительность кожи, свойство, которое может быть использовано для усиления ультрафиолетового лечения кожных заболеваний, таких как псориаз и витилиго [3].

Молекулярное моделирование включает в себя теоретические методы, которые могут быть использованы в качестве эффективных инструментов, позволяющих лучше понять электронные, спектральные, а также структурные модели поведения, позволяющие прогнозировать и интерпретировать характеристики возбужденного состояния различных видов молекул. В частности, теория функционала плотности (DFT) – это квантово-механический метод, позволяющий точно объяснить структуру, энергетические и молекулярные характеристики соединений [1,4,5]. Целью настоящей работы является изучение фуранокумариновых веществ для дальнейшего пользования в поисках решения экологических проблем CO и CO₂ в мире.

В настоящем исследовании квантово-химические расчеты были проведены для оптимизации двух производных фуранокумаринов (соединения I и II) и таких комплексов, как изомер I / CO, изомер I / CO₂, изомер II / CO, изомер II / CO₂ с использованием метода DFT (B3LYP и M06-2X) в базисе 6-311+G*, установленным программным обеспечением Gaussian 09W [2]. Энергию адсорбции (E_{ad}) исследуемых систем рассчитывали по следующим уравнениям:

$$E_{ad} = E_{\text{isomer I/CO}} - [E_{\text{isomer I}} + E_{\text{CO}}] \quad (1)$$

$$E_{ad} = E_{\text{isomer I/CO}_2} - [E_{\text{isomer I}} + E_{\text{CO}_2}] \quad (2)$$

$$E_{ad} = E_{\text{isomer II/CO}} - [E_{\text{isomer II}} + E_{\text{CO}}] \quad (3)$$

$$E_{ad} = E_{\text{isomer II/CO}_2} - [E_{\text{isomer II}} + E_{\text{CO}_2}] \quad (4)$$

Были рассчитаны электронные свойства названных соединений, энергия разрыва между НОМО и LUMO, потенциал ионизации, сродство к электрону, электроотрицательность, электронный химический потенциал, электрофильность, природные заряды и дипольный момент. Оптимизированные молекулярные структуры, поверхности НОМО и LUMO визуализировались с помощью программного обеспечения GaussView 06.

Несвязанное взаимодействие CO и CO₂ с соединениями I и II исследовали с помощью расчетов DFT в воде-растворителе. Оптимизированные структуры соединений: изомер I, изомер II, комплексный изомер (I) / CO, комплексный изомер (I) / CO₂, комплексный изомер(II) / CO и комплексный изомер (II) / CO₂ показаны на рисунке.

Были рассмотрены различные состояния взаимодействия соединений I и II с CO и CO₂. На первом этапе все состояния были рассчитаны методом PM6. По рассчитанным энергиям мы выбрали наиболее стабильное состояние для соединений I и II с CO и CO₂ с наименьшей энергетической ценностью.

Рисунок 1 – Оптимизированные структуры соединений I, II и комплексов I/CO, I/CO₂, II/CO, II/CO₂ с использованием B3LYP/6-311+G* уровня теории

Таблица – Термохимические параметры взаимодействия соединений I и II с CO и CO₂ оптимизированы методом B3LYP/6-311+G*.

Compound	E+G(kcal/mol)	E+H (kcal/mol)	E+T (kcal/mol)	S (cal/mol.K)
I	-406947.428	-406918.809	-406919.401	95.980
I/CO	-478080.495	-478041.354	-478041.946	131.280
I/CO ₂	-525328.950	-525288.038	-525288.631	137.218
II	-406948.046	-406919.474	-406902.066	95.830
II/CO	-478083.046	-478041.440	-478042.032	141.351
II/CO ₂	-525329.828	-525288.678	-525289.270	138.019

Далее произведен анализ взаимодействия между CO и CO₂ и соединениями I и II и оптимизация с использованием уровня теории B3LYP/6-311G*. Оптимизированные структуры комплексов I / CO, I / CO₂, II / CO и II / CO₂ показаны на рисунке. В таблице приведены термохимические параметры, такие как сумма электронной и тепловой энергий (E+T), сумма электронной и тепловой энтальпий (E+H), сумма электронной и тепловой свободных энергий (E+G) и Энтропия оптимизированных соединений и комплексов с использованием уровня теории B3LYP/6-311+G*. Когда соединения I и II находятся в несвязанном взаимодействии с CO и CO₂, значения энергии Гиббса и энтальпии уменьшаются. Энергетические значения отражают снижение реакционной способности и повышение стабильности молекул I и II в присутствующих CO и CO₂.

В результате вычислений выявлено, что энергия адсорбции (E_{ad}) CO над соединением I имеет положительное значение около 0,0000187 эВ; следовательно, взаимодействие является эндотермическим, тогда как энергия адсорбции CO₂ над соединением I имеет отрицательное значение около -0,0001689 эВ, что свидетельствует о экзотермичности взаимодействия. Кроме того, энергии адсорбции CO и CO₂ над соединением II имеют отрицательное значение около -0.000017 эВ и -0.000137 эВ соответственно; следовательно, взаимодействие является экзотермическим.

Анализ теорией молекулярных орбиталей демонстрирует, что орбитали НОМО и LUMO соединения I и комплексов I / CO, I / CO₂ в основном сосредоточены на двойных связях (-C=C-) бензола, альфа-пирона, фурановых колец и атомов кислорода. НОМО орбитали комплекса II и комплексов II/CO, II/CO₂ в основном локализируются на двойных связях (-C=C-) в бензоле, альфа-пироне, фурановых кольцах и атомах кислорода, в то время как LUMO орбитали фокусируются на двойных связях (-C=C-) бензола, альфа-пиринового кольца и атомах кислорода в альфа-пириновом кольце. Таким образом, перенос заряда от НОМО к LUMO в соединениях I, II и комплексах I / CO, I / CO₂, II / CO, II / CO₂ обусловлен вкладом связей π и одиночных пар атомов кислорода.

Энергетические зазоры между LUMO и НОМО (E_g) соединений I, II составляют соответственно 4,26 эВ и 4,40 эВ, и после взаимодействия с CO и CO₂ эти значения не изменились.

В настоящей работе изучено несвязывающее взаимодействие производных фуранокумаринов (I и II) и CO и CO₂ на уровне теории B3LYP/6-311+G*. Установлено, что электронные свойства соединений I и II чувствительны к адсорбции CO и CO₂. Замечено изменение атомных зарядов несвязывающим взаимодействием CO и CO₂ у названных соединений. Было установлено, что λ_{max} соединения I и II при несвязанном взаимодействии с CO и CO₂ не изменяется. По результатам работы тензоров химического сдвига было описано несвязанное взаимодействие рассматриваемых соединений с CO и CO₂, которое приводит к анизотропному и изотропному химическому сдвигу. Расчетные результаты показали несвязанное взаимодействие между производными фуранокумаринов и CO и CO₂. Таким образом, фуранокумарины могут быть использованы для решения экологических проблем, связанных с выбросами CO и CO₂ во всем мире.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бутырская, Е. В. Компьютерная химия: Основы теории и работа с программами GAUSSIAN и GAUSSVIEW // Солон-пресс. – 2011. – 224 с.
2. Соловьев, М. Е. Компьютерная химия / М. Е. Соловьев// СОЛОН-Пресс. – 2005. – 536 с.
3. Jurecka, P. Density Functional Theory Augmented with an Empirical Dispersion Term: Interaction Energies and Geometries of 80 Noncovalent Complexes Compared with ab initio Quantum Mechanics Calculations// J. Comput. Chem. – 2007. – P. 555–569.
4. Litwinienko, G. Abnormal Solvent Effects on Hydrogen Atom ion // The Journal of Organic Chemistry-2005.
5. Shahab, S. Polarization, excited states, trans-cis properties and anisotropy of thermal and electrical conductivity of the 4-(phenyldiazanyl)aniline in PVA matrix //S. Shahab, L. Filippovich, M. Sheikhi, R. Kumar, E. Dikumar, H. Yahyaee, A. Muravsky, J. Mol. Struct. 1141 (2017). – P. 703–709.

АНАЛИЗ РАБОТЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРУДОВ ДООЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНОГО ЦЕХА АО «СЫРДАРЬИНСКАЯ ТЭЦ»

ANALYSIS OF WORK OF WASTE WATER AFTER-PURIFICATION BIOLOGICAL PONDS OF “SYRDARYA TPP” JSC FUEL AND TRANSPORTATION DEPARTMENT.

Л. М. Шаповалова¹, В. Б. Нурматова¹, Е. Ю. Куршина¹, О. А. Смолькова²
L. Shapovalova¹, V. Nurmatova¹, E. Kirshina¹, O. Smolkova²

¹Ташкентский научно-исследовательский институт окружающей среды
и природоохранных технологий Госкомэкологии РУз, г. Ташкент, Республика Узбекистан
dagon49@mail.ru

²«LAR PROCESS ANALYSERS AG», Берлин, Германия

¹Research Institute of Environment and Environment Protection technologies under the State Committee for
Ecology and Environmental Protection of Republic of Uzbekistan, Tashkent, Republic of Uzbekistan

²«LAR PROCESS ANALYSERS AG», Berlin, Germany

В статье представлена технология доочистки нефтесодержащих сточных вод в прудах с высшей водной растительностью. Использование данной технологии позволяет получить качество очищенного стока соответствующее нормам сброса в открытые водоемы.

The technology of oil-containing waste waters after-purification in biological ponds with higher aquatic vegetation. Use of this technology allows to obtain quality of treated wastewater in accordance with regulations for open water.

Ключевые слова: биопруды, высшая водная растительность, производственные сточные воды, нефтепродукты.

Keywords: biological ponds, higher aquatic vegetation, industrial waste water, oil products.

<https://doi.org/10.46646/SAKH-2020-2-445-448>

Одним из источников загрязнения окружающей среды нефтепродуктами являются производственные сточные воды. Обычно для их очистки используются механические и физико-химические методы [1]. Однако, очищенные сточные воды могут содержать растворенные и тонкодиспергированные нефтепродукты в концентрациях, превышающих нормы сброса в открытые водоемы. Для доочистки нефтесодержащих сточных вод наиболее перспективным является биологический метод, основанный на разложении нефти микроорганизмами, способными использовать углеводороды нефти в качестве единственного источника углерода [2].

Биохимическое окисление проводят как в промышленных сооружениях (биофильтры, аэротенки), так и в естественных условиях - в биологических прудах. В прудах доочистки достаточно часто высаживается различная высшая водная растительность, такая как рогоз, тростник, камыш и т.д. Это способствует стабильности и увеличению эффективности работы системы. Высшая водная растительность в прудах выполняет следующие основные функции:

- фильтрационную – способствует задержанию взвешенных веществ;
- поглотительную – поглощение биогенных элементов и некоторых органических веществ;
- накопительную – способность накапливать некоторые трудноразлагаемые органические вещества, которые затем постепенно разлагаются;
- окислительную – в процессе фотосинтеза вода обогащается кислородом;
- детоксикационную – способность накапливать токсичные вещества и преобразовывать их в нетоксичные [3].

В присутствии высшей водной растительности значительно возрастает окислительная мощность сооружений благодаря формированию биопленки гидробионтов (перифитона) на поверхности стеблей и корневищ высшей водной растительности, которые находятся в состоянии симбиотического взаимодействия. Следует отметить, что немаловажную роль в процессах доочистки выполняют сапрофитные бактерии, которые вместе с высшей водной растительностью успешно выполняют роль дезинфектантов за счет своих продуктов обмена и антагонизма с бактериями гетеротрофами. Качество вод, прошедших обработку в сооружениях в присутствии высшей водной растительности, не отличается от качества вод природных водоемов. Все это привело к тому, что в настоящий момент сооружения с высшей водной растительностью, отличающиеся своей простотой эксплуатации, не высокой стоимостью и высокой эффективностью широко используются в различных странах мира [4].

Узбекистан относится к странам с аридным климатом и достаточно ограниченными водными ресурсами. В связи с этим была разработана система прудов доочистки с высшей водной растительностью, наиболее полно соответствующей климатическим условиям Узбекистана (Патент № 326 РУз).

Для доочистки сточных вод топливно-транспортного цеха Сырдарьинской ТЭЦ были разработаны рекомендации, выполнен проект и осуществлено строительство биологических прудов с высшей водной растительностью. Статья посвящена анализу работы этих прудов за период 1989-2020 гг.