Fundamentos e Atualidades em Tecnologia e Inspeção de Alimentos

FUNDAMENTOS E ATUALIDADES EM TECNOLOGIA E INSPEÇÃO DE ALIMENTOS

**Lina Raquel Santos Araújo
(Organizadora)**

2020

2020 by Editora In Vivo
Copyright © Editora In Vivo
Copyright do Texto © 2020 O autor
Copyright da Edição © 2020 Editora In Vivo

Esta obra está licenciada com uma Licença [Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) (CC BY 4.0).

O conteúdo desta obra e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade exclusiva do autor. Permitido o download da obra e o compartilhamento desde que sejam atribuídos créditos ao autor, mas sem a possibilidade de alterá-la de nenhuma forma ou utilizá-la para fins comerciais.

Editor Chefe

Dr. Everton Nogueira Silva

Conselho Editorial

1 Colégio de Ciências da Vida

1.1 Ciências Agrárias

Dr. Aderson Martins Viana Neto
Dra. Ana Paula Bezerra de Araújo
MSc. Edson Rômulo de Sousa Santos
Dr. Fágner Cavalcante P. dos Santos
MSc. Filomena Nádia Rodrigues Bezerra
Dra. Lina Raquel Santos Araújo
Dr. Luis de França Camboim Neto
MSc. Maria Emília Bezerra de Araújo
MSc. Yuri Lopes Silva

1.2 Ciências Biológicas

Dra. Antonia Moemia Lúcia Rodrigues Portela

1.3 Ciências da Saúde

Dr. Isaac Neto Goes Silva
Dra. Maria Verônyca Coelho Melo
Dr. Victor Hugo Vieira Rodrigues

2 Colégio de Humanidades

2.1 Ciências Humanas

Dra. Alessandra Maria Sousa Silva
MSc. Francisco Brandão Aguiar
MSc. Julyana Alves Sales

2.2 Ciências Sociais Aplicadas

MSc. Cícero Francisco de Lima
MSc. Erivelton de Souza Nunes
Dra. Maria de Jesus Gomes de Lima
MSc. Maria Rosa Dionísio Almeida
MSc. Marisa Guilherme da Frota

3 Colégio de Ciências Exatas, Tecnológica e Multidisciplinar

3.1 Ciências Exatas e da Terra

Dra. Irvila Ricarte de Oliveira Maia

3.2 Engenharias

MSc. Henrique Nogueira Silva

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação - CIP

A658f Araújo, Lina Raquel Santos.
Fundamentos e atualidades em tecnologia e inspeção de alimentos [livro eletrônico]. /
Organizadora: Lina Raquel Santos Araújo. Fortaleza: Editora In Vivo, 2020.
131p.

Bibliografia.
ISBN: 978-65-991243-3-4
DOI: [10.47242/978-65-991243-3-4](https://doi.org/10.47242/978-65-991243-3-4)

1. Alimentos. 2. Inspeção de alimentos. 3. Alimentos – atualidades em tecnologia. I. Título.

CDD 353.9

Denise Marques Rodrigues – Bibliotecária – CRB-3/CE-001564/O

APRESENTAÇÃO

O Brasil tem ocupado lugar de destaque no cenário mundial em relação à produção de matérias-primas, como alimentos de origem vegetal e proteína animal. O desenvolvimento de novas tecnologias no processamento de alimentos tem favorecido à reestruturação da cadeia produtiva do agronegócio agregando valor aos alimentos industrializados. Assim, diversas pesquisas têm surgido das demandas da indústria de alimentos, seja na solução de problemas, otimização de processos, detecção de fraudes, redução de custos de produção dentre outros.

Esta obra reúne resultados de estudos voltados para a grande área de Ciência e Tecnologia de Alimentos e áreas afins, incluindo desde os fundamentos às novas tecnologias aplicadas na elaboração e na inspeção de alimentos, como uma forma de dinamizar o acesso à informação científica e de divulgação do conhecimento.

Façam uma boa leitura!

Lina R.S. Araújo

Capítulo 1 - A IMPORTÂNCIA DA <i>Listeria monocytogenes</i> NA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA.....	5
Capítulo 2 - A IMPORTÂNCIA DA QUALIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL	15
Capítulo 3 - PRINCIPAIS IMPACTOS AMBIENTAIS NA INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS	27
Capítulo 4 - AVALIAÇÃO DE MATERIAL ESTRANHO EM POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS E COMERCIALIZADAS EM MERCADO PÚBLICO NA CIDADE DE FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL	46
Capítulo 5 - FERMENTAÇÃO NATURAL X FERMENTAÇÃO TRADICIONAL: QUAL A PREFERÊNCIA BRASILEIRA?	60
Capítulo 6 - MONITORAMENTO DO RECEBIMENTO DE CARNE BOVINA EM UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DE FORTALEZA-CE.....	70
Capítulo 7 - IMPACTO DA APLICAÇÃO DE ULTRASSOM NOS PARÂMETROS DE QUALIDADE DE SUCOS	76
Capítulo 8 - AVALIAÇÃO MACROSCÓPICA E MICROSCÓPICA DE RINS BOVINOS DE MATADOUROS NO ESTADO DE ALAGOAS	89
Capítulo 9 - AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DE ESTOQUE DE UMA UAN HOSPITALAR E PROPOSTA DE INTERVENÇÃO PARA RESOLUÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES	96
Capítulo 10 - PRODUÇÃO DE ENZIMAS POR FUNGOS FILAMENTOSOS	106
Capítulo 11 - AVALIAÇÃO DO TEOR DE ZINCO EM <i>Pereskia grandfolia</i> Haw	118
Capítulo 12 - PESQUISA DE PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS DE QUALIDADE EM LEITE OVINO DE CONJUNTO.....	125

A IMPORTÂNCIA DA *Listeria monocytogenes* NA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA

Isabela Cristina Braga Lima

Pós-Graduação da Universidade Cândido Mendes, Rio de Janeiro, RJ

<https://orcid.org/0000-0002-4124-2917>

Lina Raquel Santos Araújo

Pós-Graduação da Universidade Cândido Mendes, Rio de Janeiro, RJ

<https://orcid.org/0000-0003-3325-4130>

Informações sobre o

artigo:

Recebido em:

05/07/2020

Aceite em:

14/07/2020

Data de publicação:

21/09/2020

Palavras-chave:

DTA

Contaminação

Alimentos

Listeriose

RESUMO

A *Listeria monocytogenes* é uma bactéria encontrada na natureza, que possui grande importância do ponto de vista sanitário, devido à sua patogenicidade. Ela ocorre geralmente em alimentos de origem animal, como produtos cárneos e lácteos. O consumo de alimentos contaminados por essa bactéria pode causar uma infecção chamada Listeriose, que se manifesta na forma invasiva ou não invasiva, sendo a primeira a mais grave, podendo causar doenças como encefalite e meningite. Por ser de difícil erradicação, as indústrias alimentícias devem prevenir a entrada deste patógeno através de um eficiente controle de qualidade, começando na obtenção da matéria prima, até chegar ao produto final. Esta revisão tem como objetivo ressaltar a importância da *Listeria monocytogenes* como contaminante de produtos de origem animal.

IMPORTANCE OF *Listeria monocytogenes* IN THE FOOD INDUSTRY

ABSTRACT

Listeria monocytogenes is a bacterium found in nature, which has great importance from the health point of view, due to its pathogenicity. It generally occurs in foods of animal origin, such as meat and dairy products. The consumption of food contaminated by this bacterium can cause an infection called Listeriosis, which manifests in an invasive or non-invasive form, the first being the most severe and can cause diseases such as encephalitis and meningitis. Because it is difficult to eradicate, the food industries must prevent the entry of this pathogen through efficient quality control, starting with obtaining the raw material, until it reaches the final product. This review aims to highlight the importance of *Listeria monocytogenes* as a contaminant of animal products.

Keywords:

FBD

Contamination

Food

Listeriosis

1 INTRODUÇÃO

O gênero *Listeria* compreende seis espécies: *L. monocytogenes*, *L. innocua*, *L. ivanovii*, *L. seeligeri*, *L. welshimeri* e *L. grayi* (LIU, 2006). Podem ser encontradas no solo, na água, nas fezes de animais e do homem, no leite das vacas, e em restos provenientes de abatedouros (PALMA, 2016).

Os membros do gênero *Listeria* são definidos como pequenos bastonetes Gram positivos não esporogênicos, catalase positivos e não produtores de ácido sulfídrico (H₂S). São classificados como psicotolerantes e crescem numa ampla faixa de temperatura (1 a 45°C) com intervalo ótimo entre 30-37°C. São imóveis quando crescem a 35°C mas apresentam motilidade característica a 25°C. São oxidase negativos, anaeróbios facultativos, fermentam a glicose (e outros carboidratos) com produção de ácido, mas sem produção de gás (SILVA *et al.*, 2010).

Dentre as seis espécies do gênero *Listeria*, a *L. monocytogenes* merece especial atenção, devido a sua patogenicidade para o homem e outros animais (LIU, 2006). Silva *et al.* (2010) demonstraram que ela é uma importante bactéria para o controle sanitário, pois, além de apresentar alta taxa de disseminação, ela pode causar doenças graves em humanos e em bovinos, ovinos e caprinos. Embora existam medidas para o controle da proliferação bacteriana em ambientes de produção e processamento de alimentos, ainda são encontradas dificuldades para erradicação total das colônias, uma vez que elas conseguem sobreviver por longos períodos em temperaturas de refrigeração (GANDHI; CHIKINDAS, 2007). Dessa forma, *L. monocytogenes* ocorre principalmente em alimentos crus, processados e em produtos refrigerados prontos para comer sem aquecimento prévio, *ready-to-eat* (GONÇALVES, 2017).

Um dos impasses em eliminar a contaminação do ambiente de trabalho pela espécie é a dificuldade de controlar o foco de origem bacteriana. Castro (2002) demonstrou que bactérias presentes em calçados e vestimentas dos trabalhadores podem contaminar plantas processadoras de alimentos, matéria-prima crua de origem vegetal ou animal, equipamentos, utensílios provenientes de outro ambiente, superfícies de trabalho e até mesmo esteiras de transporte de alimentos já processados.

Um fator preocupante para as indústrias alimentícias é a capacidade da *L. monocytogenes* de formar biofilmes em superfícies, devido ao acúmulo de materiais orgânicos e inorgânicos, que favorecem seu desenvolvimento. Os biofilmes ficam fortemente aderidos à superfície, sendo que parte deles podem ser desprendidos, contaminando outras superfícies e alimentos (OLIVEIRA *et al.*, 2010).

Por ser o agente causador da listeriose humana e animal, a *Listeria monocytogenes* se tornou um dos microrganismos patogênicos mais estudados das últimas décadas (PITA, 2012).

Após a ocorrência de surtos de listeriose na América do Norte e na Europa na década de 1980 terem sido epidemiologicamente considerados de origem alimentar, as indústrias processadoras de alimentos foram alertadas para a importância da ocorrência deste microrganismo em seus produtos (CHIARINI, 2007). Atualmente, o sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) tem sido utilizado em toda cadeia produtiva de alimentos por ter como filosofia a prevenção, racionalidade e especificidade para o controle dos riscos que um alimento possa oferecer (FURTINI; ABREU, 2006).

Dessa forma, esta revisão tem como objetivo avaliar a presença de *Listeria monocytogenes* na indústria de produtos de origem animal.

2 LISTERIOSE

Listeriose é a denominação de um grupo geral de desordens causadas por *L. monocytogenes*, tendo como principais grupos suscetíveis as mulheres grávidas e fetos (infecção neonatal e perinatal), indivíduos imunossuprimidos devido à utilização de medicamentos, pacientes com leucemia e outros tipos de câncer, portadores de HIV, diabéticos, cirróticos, asmáticos e idosos (SILVA *et al.*, 2010).

A patogênese inicia-se após a *Listeria* entrar por via oral no organismo hospedeiro, aderindo e invadindo a mucosa intestinal. Após atingir a corrente sanguínea, a célula bacteriana é fagocitada por macrófagos e após a lise do fagossomo, ela é liberada no citoplasma da célula do hospedeiro, multiplicando-se rapidamente (MANTILLA *et al.*, 2007). A dose de infectividade é desconhecida, mas, acredita-se variar conforme a cepa e a susceptibilidade do indivíduo atingido. O período de incubação ocorre entre 20 a 30 dias após a ingestão de alimentos contaminados. A listeriose pode se manifestar na forma não invasiva e invasiva. A forma não invasiva resulta em uma gastroenterite com sintomas típicos de febre, diarreia e vômito, sendo o período de incubação em aproximadamente 20 h após a ingestão de alimentos contaminados. A doença na forma invasiva possui sintomas graves, como meningite e encefalite, possuindo taxa de mortalidade de 20 a 30% (GARRIDO *et al.*, 2010).

Comparando com outras doenças alimentares, a listeriose é uma doença rara, com poucos casos reportados e de maior incidência em países industrializados (GONÇALVES, 2017).

2.1 *Listeria monocytogenes* em produtos cárneos

A presença de *Listeria* em produtos cárneos ocorre devido às deficientes condições sanitárias durante o abate dos animais, cozimento e armazenamento inadequado e falta de higiene durante o preparo dos produtos (SILVEIRA, 2010).

Os produtos cárneos associados à transmissão de *L. monocytogenes*, geralmente são processados, com longa vida de prateleira, capazes de suportar o seu crescimento e são consumidos sem nenhum tratamento térmico (BERZINS *et al.*, 2007). Devido a ampla distribuição e sobrevivência da *L. monocytogenes* no ambiente, o controle e monitoramento dos produtos cárneos são necessários em todas as etapas da elaboração, iniciando pelo abate dos animais (FERRONATTO *et al.*, 2012).

A presença de *L. monocytogenes* em produtos cárneos cozidos é provavelmente resultado de contaminação cruzada no processamento, que pode ocorrer durante o manuseio adicional, como descascar, fatiar e reembalar (LIANOU; SOFOS, 2007). De acordo com Bersot (2000), das 30 amostras de mortadelas analisadas no município de São Paulo, 11 apresentaram *Listeria spp*, sendo que 8 foram positivas para *L. monocytogenes*. Além disso, Araújo *et al.* (2002), encontraram *L. monocytogenes* em amostras de blanquet de peru fatiado e de presunto de peru fatiado, que foram coletadas em estabelecimentos comerciais varejistas da cidade de Niterói. Demonstrando, portanto, um maior índice de contaminação em alimentos fatiados, possivelmente devido à manipulação inadequada dos produtos durante o fatiamento (Tabela 1).

Em produtos acabados e *in natura* a contaminação por *L. monocytogenes* também é bastante prevalente. No estado do Paraná, em 2009, as amostras de linguiças resfriadas analisadas apresentaram resultado positivo (BENETTI, 2009). Além disso, no estudo realizado por Silvério *et al.* (2014), 2309 amostras foram analisadas, sendo 1,65% positivas para *L. monocytogenes*. A maior ocorrência se deu em amostras de cortes suínos. Também testaram positivos amostras de carcaças e cortes de frango, peixes e embutidos.

Tabela 1. Percentual de contaminação de produtos cárneos por *Listeria monocytogenes*

Produto	Positivas para <i>Listeria sp</i>	Positivas para <i>L.monocytogenes</i>	Referência
Mortadela	36.7%	26.7%	Bersot (2000)
Blanquet de peru	-	50.0%	Araújo <i>et al.</i> (2002)
Presunto de peru fatiado	-	60.0%	Araújo <i>et al.</i> (2002)
Linguiça	-	13.7%	Benetti (2009)
Cortes suínos	-	3.6%	Silvério <i>et al.</i> (2014)
Carcaças e cortes de frango	-	2.8%	Silvério <i>et al.</i> (2014)
Peixe	-	2.7%	Silvério <i>et al.</i> (2014)
Embutidos	-	3.3%	Silvério <i>et al.</i> (2014)

Fonte: Elaborado pelos autores.

2.2 *Listeria monocytogenes* em produtos lácteos

O leite pode ser contaminado por microrganismos patógenos em qualquer etapa de produção, beneficiamento, distribuição e consumo. Essa susceptibilidade se deve estar relacionada a práticas inadequadas de manejo, higienização deficiente em sala de ordenha e equipamentos de beneficiamento, armazenamento e conservação inadequados, dentre outros fatores. Pasteurização ineficiente, conservação e transporte inadequado do produto final são responsáveis pela sobrevivência desses patógenos (NERO, 2005).

Em leite cru, a presença de *L. monocytogenes* é preocupante devido ao seu consumo direto ou na produção de derivados sem nenhum tratamento térmico prévio (BARANCELLI, 2010). Segundo Moura *et al.* (1993), das 220 amostras de leite cru analisadas em São Paulo, 21 apresentaram *L. monocytogenes*.

Os produtos lácteos mais comumente contaminados por *L. monocytogenes* são os queijos de alta e média umidade, como a ricota, minas frescal, muçarela e minas padrão. A presença dessa bactéria nesses queijos é alarmante devido ao armazenamento por longos períodos sob refrigeração, permitindo seu crescimento, e posteriormente são consumidos sem nenhum aquecimento prévio (BARANCELLI, 2010). Durante a análise de 106 amostras de queijos minas frescal e ricotas do estado do Paraná, em 12 foram detectadas a presença do gênero *Listeria*, sendo 9 queijos e 3 ricotas. Em 5 amostras foi isolada *L. monocytogenes*, sendo 3 de queijos e 2 de ricotas, de acordo com Bernardi (2014).

Os produtos lácteos que costumam passar por aquecimento prévio antes do consumo também apresentaram contaminação por *L. monocytogenes*. No nordeste do Brasil, a

bactéria foi encontrada em 19,0% das amostras de queijo de coalho no estado do Ceará e em 5,5% das amostras de queijo de coalho no estado de Pernambuco (BRANCO *et al.*, 2003; DUARTE *et al.*, 2005).

Através dos estudos analisados, é possível comparar a prevalência da *Listeria monocytogenes* em variados produtos de origem animal, mostrando assim, sua ampla taxa de contaminação (Tabela 2).

Tabela 2. Percentual de contaminação de produtos lácteos por *Listeria monocytogenes*

Produto	Positivas para <i>Listeria sp</i>	Positivas para <i>L.monocytogenes</i>	Referência
Leite cru	-	9.54%	Moura <i>et al.</i> (1993)
Minas frescal	8.47%	2.82%	Bernardi (2014)
Ricota	2.82%	1.88%	Bernardi (2014)
Queijo de coalho	-	19.0%	BRANCO <i>et al.</i> (2003)
	-	5.5%	DUARTE <i>et al.</i> (2005)

Fonte: Elaborado pelos autores.

3 NECESSIDADES E PERSPECTIVAS

Por ser uma bactéria de origem ambiental, sem correlação entre a presença de bactérias e microrganismos indicadores higiênicos-sanitários, o controle de *L. monocytogenes* na indústria é dificultado (BARANCELLI, 2010).

O método ideal para prevenir a entrada desse patógeno nas indústrias de alimentos, é através do controle do microrganismo nos pontos de origem da matéria-prima, da sanitização correta dos equipamentos, do cuidado da saúde, higiene e educação sanitária dos manipuladores e funcionários da indústria, além de manter programas de controle de pontos críticos. Esse conjunto de medidas visa a diminuição e até erradicação de contaminação (CATÃO; CEBALLOS, 2001).

Além desses métodos de prevenção, uma boa alternativa para prevenir a multiplicação da *L. monocytogenes* é o uso de bacteriocinas, principalmente aquelas produzidas por bactérias ácido lácticas. Essas proteínas possuem atividade antimicrobiana e, portanto, podem ser utilizadas como conservantes naturais nos alimentos (GÁLVEZ *et al.*, 2008).

Condições favoráveis para o crescimento da *Listeria monocytogenes* são facilmente encontradas dentro de embalagens, portanto, é necessário a implementação de medidas preventivas contra esse patógeno (ESTRADA, 2019). Segundo Cui *et al.* (2017), a utilização de embalagens de nanofibras contendo nanopartículas carregadas com nisina, mostrou

eficiência contra a *Listeria monocytogenes*, diminuindo a sua taxa de crescimento, sem alterar as características sensoriais do produto.

A contaminação de produtos por *Listeria monocytogenes* pode acontecer também durante os procedimentos pós-processamento, como por exemplo, em queijos e presuntos fatiados. Quando ocorre a contaminação cruzada, é necessário a aplicação de medidas eficientes para impedir a multiplicação do patógeno no produto durante sua *shelf-life*. Uma medida empregada é a utilização de antimicrobianos como lactatos, diacetatos, nitritos e nitratos durante a formulação dos produtos (FARIA, 2016).

A implementação do plano APPCC, atualmente, é o que mais gera confiança dentro das indústrias, devido à segurança do produto e minimização de perdas, além da certeza de estar cumprindo as exigências da fiscalização nacional e internacional (FURTINI; ABREU, 2006).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

L. monocytogenes é um patógeno de grande interesse na área de alimentos, devido a sua capacidade de fácil contaminação, multiplicação e formação de biofilmes, dificultando a sua eliminação na indústria de alimentos. Dessa forma, é de suma importância que as indústrias de alimentos se conscientizem e desenvolvam métodos para controlar a contaminação de seus produtos por essa bactéria. A adesão de técnicas higiênico-sanitárias desde o manuseio da matéria-prima até o produto final garante ao consumidor um alimento de boa qualidade.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, P. C. C.; FRANCO, R. M.; OLIVEIRA, L. A. T. de. *et al.* Ocorrência de *Listeria monocytogenes* em produtos de carne de peru comercializados na cidade de Niterói-RJ-Brasil. **Acta Scientiae Veterinariae**. v.30, p. 19-25, 2002.

BARANCELLI, G. V. **Ocorrência e caracterização sorológica e genotípica de *Listeria monocytogenes* em indústrias de queijo do estado de São Paulo**. 2010. 115f. Dissertação (Doutorado em Zootecnia) – Universidade de São Paulo, Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Pirassununga.

BENETTI, T. M. **Métodos de detecção e incidência de *Listeria sp* e *Salmonella sp* em linguças resfriadas comercializadas no estado do Paraná**. 2009. 134f. Dissertação (Mestrado em Microbiologia, Parasitologia e Patologia) – Universidade Federal do Paraná, Departamento de Patologia Básica, Curitiba.

BERSOT, L. dos S. **Frequência de *Listeria monocytogenes* em mortadelas e comportamento durante o processo industrial e estocagem.** 2000. 66f. Dissertação (Mestrado em Ciências dos Alimentos) – Universidade de São Paulo, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, São Paulo.

BERZINS, A.; HORMAN, A.; LUNDÉN, J. *et al.* Factors associated with *Listeria monocytogenes* contamination of cold-smoked pork products produced in Latvia and Lithuania. **International Journal of Food Microbiology.** v.115, p.173-179, 2007.

BERNARDI, G. **Avaliação de métodos de detecção e ocorrência de *Listeria monocytogenes* em ricotas e queijos frescos produzidos no estado do Paraná.** 2014. 87f. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas) – Universidade Federal do Paraná, Área de Concentração de Insumos, Medicamentos e Correlatos, Curitiba.

BRANCO, M. A. de A. C.; FIGUEIREDO, E. A. T. de.; BORGES, M. de F. *et al.* Incidência de *Listeria monocytogenes* em queijo de coalho refrigerado produzido industrialmente. **Boletim do Centro de Pesquisa de Processamento de Alimentos.** v.21, p.393-408, 2003.

CASTRO, A. P. **Sobrevivência de bactérias aeróbias mesófilas, psicotróficas, bactérias lácticas e *Listeria monocytogenes* em salsichas submetidas a tratamento com nisina.** 2002. 91f. Dissertação (Mestrado em Ciências dos Alimentos) – Universidade de São Paulo, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, São Paulo.

CATÃO, R. M. R.; CEBALLOS, B. S. O. de. *Listeria spp.*, Coliformes totais e fecais e *E. coli* no leite cru e pasteurizado de uma indústria de laticínios, no estado da Paraíba (Brasil). **Ciência e Tecnologia de Alimentos.** v. 21, p.281-287, 2001.

CHIARINI, E. ***Listeria monocytogenes* em matadouros de aves: marcadores sorológicos e genéticos no monitoramento de sua disseminação.** 2007. 145f. Dissertação (Doutorado em Ciências dos Alimentos) – Universidade de São Paulo, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, São Paulo.

CUI, H.; WU, J.; LI, C. *et al.* Improving anti-listeria activity of cheese packaging via nanofiber containing nisin-loaded nanoparticles. **Food Science and Technology.** v.81, p.233-242, 2017.

DUARTE, D. A. M.; SCHUCH, D. M. T.; SANTOS, S. B. *et al.* Pesquisa de *Listeria monocytogenes* e microrganismos indicadores higiênico-sanitários em queijo de coalho produzido e comercializado no estado de Pernambuco. **Instituto Biológico.** v.72, p.297-302, 2005.

ESTRADA, E. M. Investigating the prevalence, persistence, and diversity of *Listeria monocytogenes* and *Listeria* species in produce packinghouses. 2019. Dissertação (Master of Sciences Life Science in Food Science and Technology) – Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University, Painter.

FARIA, D. B. **Contaminação cruzada durante o fatiamento de produto cárneo pronto para consumo: foco em *Listeria monocytogenes*.** 2016. 60f. Dissertação (Mestrado em Ciências dos Alimentos) – Universidade de São Paulo, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, São Paulo.

FERRONATTO, I. A.; PELLEGRINI, D. da C. P.; GUERRA, P. *et al.* Distribuição de grupos clonais de *Listeria monocytogenes* em carcaças e no ambiente de matadouros frigoríficos de suínos. **Archives of Veterinary Science**. v.17, p.42-49, 2012.

FURTINI, L. L. R.; ABREU, L. R. de. Utilização de APPCC nas indústrias de alimentos. **Ciência e Agrotecnologia**. v.30, p.358-363, 2006.

GÁLVEZ, A.; LÓPEZ, R. L.; ABRIOUEL, H. *et al.* Application of bacteriocins in the control of foodborne pathogenic and spoilage bacteria. **Critical Reviews in Biotechnology**. v.28, p.125-152, 2008.

GANDHI, M.; CHIKINDAS, M. L. *Listeria*: a foodborne pathogen that knows how to survive. **International Journal of Food Microbiology**. v.113, p.1-15, 2007.

GARRIDO, V.; VITAS, A. I.; GARCÍA-JALÓN, I. The problem of Listeriosis and ready-to-eat products: prevalence and persistence. **Current Research**, p.1182,1189, 2010.

GONÇALVES, A. I. D. **Caracterização de biofilmes de estirpes persistentes de *Listeria monocytogenes***. 2017. 57f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Alimentar) – Universidade de Lisboa, Instituto Superior de Agronomia, Lisboa.

LIANOU, A.; SOFOS, J. N. A review of the incidence and transmission of *Listeria monocytogenes* in ready-to-eat products in retail and food service environments. **Journal of Food Protection**. v.70, p.2172-2198, 2007.

LIU, D. Identification, subtyping and virulence determination of *Listeria monocytogenes*, an important foodborne pathogen. **Journal of Medical Microbiology**, v.55, p.645-659, 2006.

MANTILLA, S. P. S.; FRANCO, R. M.; OLIVEIRA, L. A. T. *et al.* Importância da *Listeria monocytogenes* em alimentos de origem animal. **Revista da FZVA**, v.14, p.180-192, 2007.

MOURA, S. M.; DESTRO, M. T.; FRANCO, B. D. G. M. Incidence of *Listeria* species in raw and pasteurized milk produced in São Paulo, Brasil. **International Journal of Food Microbiology**. v.19, p.229-237, 1993.

NERO, L. A. ***Listeria monocytogenes* e *Salmonella* spp. em leite cru produzido em quatro regiões leiteiras no Brasil: ocorrência e fatores que interferem na sua detecção**. 2005. 141f. Dissertação (Doutorado em Ciências dos Alimentos) – Universidade de São Paulo, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, São Paulo.

OLIVEIRA, M. M. M. de.; BRUGNERA, D. F.; PICCOLI, R. H. Biofilmes microbianos na indústria de alimentos: uma revisão. **Revista Instituto Adolfo Lutz**, v.3, p.277-284, 2010.

PALMA, J. M. **Caracterização molecular de cepas de *Listeria monocytogenes* oriundas de corte bovino e abatedouros frigoríficos de bovinos localizado no Distrito Federal**. 2016. 46f. Dissertação (Mestrado em Saúde Animal) – Universidade de Brasília, Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, Brasília.

PITA, J. S. M. **Surto de listeriose entre 2009 e 2011 em Lisboa e Vale do Tejo – Investigação e medidas implementadas pela ASAE**. 2012. 91f. Dissertação (Mestrado

em Medicina Veterinária) – Universidade Técnica de Lisboa, Faculdade de Medicina Veterinária, Lisboa.

SILVA, N. da.; JUNQUEIRA, V. C. A.; SILVEIRA, N. F. A. *et al.* **Manual de métodos de análise microbiológica de alimentos e água**. 4. ed. São Paulo: Livraria Varela, 2010.

SILVEIRA, J. G. **Investigação de *Listeria sp.* e microrganismos mesófilos totais em carcaças bovinas e em ambiente industrial de abatedouro frigorífico**. 2010. 54f. Dissertação (Mestrado em Microbiologia Agrícola e do Ambiente) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Ciências Básicas da Saúde, Porto Alegre.

SILVÉRIO, K. I.; PIERETTI, G. G.; ANTIGO, J. L. *et al.* Incidência de *Listeria monocytogenes* em alimentos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA QUÍMICA, 20, 2014, Maringá. **Anais...** Florianópolis: Engenharia e Tecnologia de Alimentos, 2014. 7p.

A IMPORTÂNCIA DA QUALIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

Pollyana Santos de Sousa

Pós-Graduação IFOPE, Universidade Cândido Mendes, Rio de Janeiro, RJ

<http://lattes.cnpq.br/7165507103678464>

Lorrayne Starwth de Oliveira Soares

Comércio e Indústria Matsuda Importadora e Exportadora Ltda, Imperatriz, MA

<http://lattes.cnpq.br/2066302857013395>

Lina Raquel Santos Araújo

Pós-Graduação IFOPE, Universidade Cândido Mendes, Rio de Janeiro, RJ

<http://lattes.cnpq.br/7591378438576586>

Informações sobre o

artigo:

Recebido em:

26/06/2020

Aceite em:

04/07/2020

Data de publicação:

21/09/2020

Palavras-chave:

Qualidade

Capacitação

Manipuladores de

Alimentos

Segurança dos

Alimentos

RESUMO

Diante de um mercado consumidor cada vez mais exigente, as empresas têm dado maior atenção a garantia da qualidade de seus produtos ao cliente. A implantação das Boas Práticas de Fabricação tem mostrado bons resultados, assegurando os padrões de qualidade apropriados e mostrando que as empresas que utilizam desses programas estão comprometidas em atender seus clientes. Os gestores perceberam que os manipuladores de alimentos estão diretamente envolvidos no resultado final do processo, sendo necessário realizar capacitações, fator que diminui o risco de falhas, aumenta a produtividade, possibilita a oportunidade de estes colaboradores adquirirem novos conhecimentos e conceitos, além de manter a empresa mais competitiva no mundo. O treinamento da equipe não é um processo fácil e requer responsabilidade e comprometimento por parte dos líderes e demais colaboradores, a fim de prevenir ou minimizar a contaminação dos alimentos. Portanto, o objetivo desse estudo é mostrar a importância da capacitação profissional para conscientização sobre as Boas Práticas de Fabricação.

IMPORTANCE OF EMPLOYEE QUALIFICATION AT ANIMAL PRODUCTS INDUSTRY

ABSTRACT

Faced with an increasingly demanding consumer market, companies have given greater attention to quality assurance to the customer. The implementation of Good Manufacturing Practices has presented good results, assuring the appropriate quality standards and shows that the companies that use these programs are committed to serving their customers. The managers realized that food handlers are directly involved in the final result of the process, being necessary to perform trainings, factor that decrease the risk of failures, increasing the productivity and possibility the

Keywords:

Quality

Training

Food Handlers

Food Safety

workers to acquire new knowledge and concepts. Beside of keeping the industry more competitive in the market. The team training is not an easy process and requires accountability and commitment on the part of leaders and the other employees to prevent or minimize food contamination. Therefore, the objective of this study is to show the importance of professional training to raise awareness of Good Manufacturing Practices.

1 INTRODUÇÃO

A indústria alimentícia passou por constantes transformações ao longo do tempo. Os estabelecimentos que manipulam ou comercializam produtos alimentícios têm se preocupado cada vez mais em aperfeiçoar técnicas que promovam a qualidade e segurança dos alimentos para se destacar no mercado (DEVIDES *et al.*, 2014). Todo estabelecimento que manipula e produz alimentos deve seguir os padrões exigidos pelos órgãos reguladores do país, que se baseiam nas boas práticas de fabricação e segurança dos alimentos, no sentido de diminuir as contaminações nos alimentos (ALMEIDA; NONATO, 2013).

Muitos problemas de saúde que acometem os consumidores são de origem alimentar, são as chamadas Doenças Transmitidas por Alimentos (DTAs). Além de afetar a saúde das pessoas, elas geram prejuízos para a empresa responsável pelo fornecimento do alimento, comprometendo a qualidade e a confiabilidade do serviço por ela prestado. Segundo a Organização Mundial de Saúde todos os anos, mais de 30% da população dos países industrializados contrai algum tipo de DTA. O Brasil sofre com a subnotificação, ou seja, a maioria das ocorrências não é notificada, com isso, a quantidade de casos registrados fica muito abaixo da ocorrência real, o que acaba agravando a situação (SACCOL *et al.*, 2006).

Neste sentido, as Boas Práticas de Fabricação (BPF's) se constituem como exigências legais utilizadas em todo o processo de produção, desde a aquisição da matéria prima até a expedição do produto pronto para o consumo a fim de garantir a qualidade dos alimentos (MACHADO *et al.*, 2015). Dentro dessas exigências encontra-se a capacitação da mão de obra da indústria de alimentos, como um item indispensável para implementação das BPF's. Assim, a capacitação em higiene pessoal, em práticas higiênicas de manipulação do produto e dos equipamentos são essenciais para qualquer programa que visa a segurança dos alimentos (GONÇALVES, 2013). Portanto esta revisão tem como objetivo explicar sobre a necessidade de capacitar o profissional que está diretamente envolvido com o processo de produção de alimentos para conscientização das BPF, além de enfatizar a higienização do

ambiente e equipamentos e o controle dos processos, contribuindo assim para a diminuição da veiculação de doenças causadas por contaminação de alimentos.

2 NORMATIVAS SANITÁRIAS NA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS

A produção e comercialização de alimentos com qualidade passou a ser item de fundamental importância na busca por um lugar no mercado (CARDOSO *et al.*, 2011). Diante de consumidores cada vez mais exigentes, a qualidade que antes fazia a diferença no mercado competitivo, passou a ser uma necessidade e um compromisso por parte de todos dentro da empresa, para assim conseguirem manter um elo de confiança com o consumidor (VERONEZI; CAVEIÃO, 2015). Assim, empresas do ramo alimentício passaram a se preocupar mais com a segurança dos alimentos, adotando técnicas, como a avaliação de etapas do processo de fabricação, no intuito de eliminar riscos e consequentemente melhorar a qualidade de seus produtos (PAULA *et al.*, 2013).

A avaliação da qualidade e a padronização de alimentos é fato do século XX, dada pela Portaria n. 1428 de 26 de novembro de 1993 do Ministério da Saúde (BRASIL, 1993), a qual aprova o “Regulamento Técnico para Inspeção Sanitária de Alimentos”, as “Diretrizes para o Estabelecimento de Boas Práticas de Produção e de Prestação de Serviços na Área de Alimentos” e o “Regulamento Técnico para o Estabelecimento de Padrão de Identidade e Qualidade (PIQ's) para Serviços e Produtos na Área de Alimentos”. Tal Portaria ainda considera o estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, com vistas à proteção da saúde do consumidor.

O Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078 – BRASIL, 1990), é claro quando o assunto é alimentos e demandas consonantes a qualidade, ele é um grande aliado no que diz respeito à segurança de alimentos e aos direitos dos consumidores como cidadãos (GERMANO, 2003). Assim, pensando na proteção à saúde e à vida do consumidor, ele estabelece que o fornecedor e/ou fabricante não pode oferecer nenhum produto ou serviço que ofereça risco a sua saúde ou segurança e determina ainda a necessidade de higienização de utensílios e equipamentos de forma que seus produtos não tenham risco de contaminação (BRASIL, 2012).

O “Regulamento Técnico para Inspeção Sanitária de Alimentos” (BRASIL, 1993) se aplica a todos os Órgãos de Vigilância Sanitária nos níveis federal, estadual e municipal, nas atividades primárias, secundárias e terciárias em toda a cadeia alimentar. Desse modo, tem-se alguns órgãos e instituições que fortalecem a segurança de alimentos, dentre eles, a

nível nacional, estão o Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (RIBEIRO *et al.*, 2010) e os serviços de vigilância sanitária das secretarias estaduais e municipais de saúde. Além desses órgãos que atuam em território nacional, atuam a nível internacional, a Organização para Alimentos e Agricultura (FAO - *Food Agriculture Organization*) e a Organização Mundial de Saúde.

Já as “Diretrizes para o Estabelecimento de Boas Práticas de Produção e de Prestação de Serviços na Área de Alimentos” são destinadas a todos os estabelecimentos produtores e/ou prestadores de serviços na área de alimentos, com a finalidade de alcançar o padrão de identidade de qualidade de produtos e/ou serviços na área de alimentos, representando um importante marco legal para a indústria de alimentos (BRASIL, 1993). Para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, autarquia vinculada ao Ministério da Saúde, as legislações nos serviços de alimentação têm o intuito de melhorar as condições higiênico-sanitárias dos alimentos, com destaque para as Resoluções da Diretoria Colegiada nº 275/2002 e a nº 216/2004 (BRASIL, 2002; BRASIL, 2004). As quais dispõem sobre os Regulamentos Técnicos dos Procedimentos Operacionais Padronizados e do Controle Contínuo das Boas Práticas de Fabricação e sobre a regulamentação das Boas Práticas de Fabricação para serviços de alimentação no Brasil, respectivamente. Ambas as portarias auxiliam as empresas a definirem os procedimentos a serem seguidos no processamento do alimento garantindo suas condições higiênico-sanitárias.

E por último, não menos importante, a Portaria n.1428/1993 traz o “Regulamento Técnico para o Estabelecimento de Padrão de Identidade e Qualidade (PIQ's) para Serviços e Produtos na Área de Alimentos”. Os PIQ's são definidos como o conjunto de atributos que identifica e qualifica um produto na área de alimentos. Este regulamento tem o objetivo de avaliar as normas de boas práticas de produção e o PIQ dos produtos visando à proteção da saúde do consumidor, além de classificar os estabelecimentos da área de alimentos em relação aos perigos à saúde tanto do trabalhador, quanto do consumidor, usuário e/ou possibilidade de contaminação dos alimentos (BRASIL, 1993).

A qualidade de alimentos, é um assunto que tem se tornado cada vez mais relevante, gerando várias técnicas de gestão de qualidade e segurança para atender às exigências necessárias ao mercado consumidor e ao mesmo tempo as exigências para exportação com normas mais rígidas (SILVA; PIERRE, 2017). Dessa forma, com a intenção de garantir a qualidade na industrialização e manipulação do alimento e a necessidade de realizar medidas preventivas junto aos manipuladores de alimentos, surgem vários programas de qualidade,

como: Boas Práticas de Fabricação (BPF), Procedimento Padrão de Higiene Operacional (PPHO), Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC), Programas de Qualificação de Fornecedores (PGQ) e outros (RIBEIRO *et al.*, 2010).

Dentre os programas de qualidade, as boas práticas de fabricação são de fundamental importância, devendo preceder qualquer outro programa de qualidade, trazendo benefícios no processo de administração da indústria alimentícia, permitindo a correção de falhas, melhorando assim a qualidade do produto final, a segurança e a saúde dos manipuladores e do consumidor. Através das BPF's cada segmento fabril propicia meios para manter a segurança e qualidade do alimento enquanto estiver sob sua responsabilidade (VERONEZI; CAVEIÃO, 2015; SILVA; PIERRE, 2017).

3 BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO

Segundo a Portaria 1428/1993, as boas práticas são definidas como normas de procedimentos adotados para atingir um determinado padrão de identidade e qualidade de um produto e/ou de um serviço na área de alimentos, cuja eficácia e efetividade deve ser avaliada através da inspeção e/ou da investigação (BRASIL, 1993). Posteriormente, com a IN 04/2007, dentro desse mesmo conceito de boas práticas de fabricação, definiu-se a natureza dos procedimentos como higiênicos, sanitários e operacionais, bem como sua abrangência, devendo ser aplicado em todo o fluxo de produção, desde a obtenção dos ingredientes e matérias-primas até a distribuição do produto final (BRASIL, 2007). Nesse contexto as BPF's configuram-se como a base para implementação de outros programas de controle e monitoramento para garantir a qualidade de produtos.

A legislação geral sobre BPF's traz a preocupação com a capacitação dos recursos humanos em técnicas de limpeza e em higiene, além de torná-los aptos a execução dos procedimentos operacionais padrão (BRASIL, 1997; 2002). Essa preocupação vem do fato de que o manipulador pode desempenhar importante papel nos casos de contaminação devido a doenças, falta de higiene e condutas inadequadas durante a produção. E este problema, segundo Pagotto *et al.* (2018), está diretamente relacionado com a falta de preparo dos manipuladores de alimentos. Dessa forma, é necessário dar maior atenção a capacitação dos colaboradores, a fim de garantir a inocuidade dos alimentos.

Neste sentido, a aplicação das BPF's é fundamental para a garantia da qualidade dos produtos (MACHADO *et al.*, 2015) e uma exigência legal, sua implementação é uma

ferramenta necessária para que o produto atenda as especificações e com menores riscos de contaminação (DEVIDES *et al.*, 2014).

4 MANIPULAÇÃO E CONTAMINAÇÃO DE ALIMENTOS

O início do processo de contaminação dos alimentos ocorre no processo de produção da matéria-prima e segue no transporte, recepção e armazenamento. Todavia, também pode ocorrer contaminação durante a manipulação, por falta de higiene dos manipuladores, equipamentos, utensílios, ambiente e armazenamento inadequado de produtos prontos para o consumo. Mesmo após a fase de industrialização a exposição a contaminantes continua nos pontos de distribuição, supermercados, mercearias e nas residências (RIBEIRO *et al.*, 2010).

A maioria das toxinfecções alimentares está ligada a contaminação do alimento através de seu manipulador. Portanto, é necessário treinamento e conscientização dos trabalhadores, visto que eles podem espalhar microrganismos para equipamentos, utensílios e alimentos processados. A primeira e principal via de contaminação dos alimentos são as mãos sujas e mal lavadas. A contaminação pode ocorrer por contato do manipulador com alimentos contaminados ou por manipuladores portadores (sintomáticos ou não) de microrganismos de importância sanitária (GONÇALVES, 2013). Além disso, a realização de procedimentos de higienização e desinfecção dos equipamentos e utensílios de forma inadequada contribuem para a ocorrência de contaminações (PILECCO *et al.*, 2012).

A limpeza e desinfecção dos equipamentos e utensílios deve ser sempre verificada por meio de inspeções. Pode-se, inclusive, fazer uso dos nossos sentidos como visão, olfato e tato, o que denominamos de inspeção sensorial. Tem-se também, a inspeção física, que se dá através da medição da temperatura da água de limpeza e por meio da inspeção química medindo o pH e a concentração dos sanitizantes (GONÇALVES, 2013). As inspeções são ações importantes para a garantia da qualidade microbiológica dos alimentos, como grande parte das contaminações que ocorrem na indústria de alimentos são oriundas de erro humano, a capacitação da mão de obra trona-se item fundamental para reduzir riscos de contaminação.

De acordo com Germano (2003), quando se fala em diminuir os riscos de contaminação dos alimentos, é de grande valia a realização de treinamentos com os operadores. Dessa forma, os manipuladores de alimentos devem ser supervisionados e capacitados periodicamente em higiene pessoal, em manipulação higiênica dos alimentos e

em doenças transmitidas pelos mesmos (BRASIL, 2004), caso contrário aumenta-se o risco de contaminações comprometendo a segurança dos alimentos (TRASEL, 2014).

5 CAPACITAÇÃO E SEGURANÇA DE ALIMENTOS

Uma pesquisa realizada na cidade de Araraquara-SP avaliou o impacto do curso de capacitação em BPF's e obteve resultados satisfatórios com base no aumento nível de conhecimento dos participantes pós-treinamento (DEVIDES *et al.*, 2014). Segundo Leite *et al.* (2013) a capacitação de manipuladores de alimentos influenciou positivamente na melhoria das condições higiênico-sanitárias em fábrica de doces no município de Pombal-PB. Por outro lado, Boaventura *et al.* (2017) não observou diferenças quanto a avaliação de conhecimento geral antes e depois de treinamento sobre higiene e BPF's na produção de alimentos, no entanto, evidenciou queda do número de acertos relacionados à higiene pessoal após treinamento. Isso mostra que os manipuladores embora possam ter algum conhecimento do assunto, este ainda não é suficiente (RIBEIRO *et al.*; 2010). Reforçando-se assim a necessidade de levar conhecimentos teórico-práticos aos manipuladores.

O conceito de que não só o funcionário deve buscar capacitação, mas de que também a empresa deve oferecê-la para seus funcionários ganhou força e mostra que a capacitação de pessoas é uma forma de gerar ganhos para a empresa. Foi observado que investir nos colaboradores não é benéfico somente para eles, mas também para as empresas que buscam melhorar sua eficiência ao ofertar um produto ou serviço de melhor qualidade sendo competitivas em um mercado consumidor que se mostra cada dia mais exigente (BUDIN e LOPES, 2019). Nesse sentido, treinar e capacitar pessoas é o mesmo que dar a elas a oportunidade de aprenderem novas maneiras de agir, novos pensamentos e conceitos, a reciclar conhecimentos e a se tornarem mais produtivos e motivados (LEANDRO; BRANCO, 2011).

Segundo Maia e Tolentino (2011), um treinamento sobre BPF's não é tão fácil de ser ministrado, devido à baixa escolaridade de muitos manipuladores, a qual, segundo Byrdbredbrenner (2007), mantém estreita relação com a velocidade de aprendizagem em treinamentos, principalmente quando se trata de atividades correlatas a escrita, concentração e interpretação (MAIA; TOLENTINO, 2011). Já nas capacitações práticas, forma-se uma imagem na memória dos funcionários, o que pode facilitar o aprendizado (HANSSON, 2007). Por isso é tão importante se conhecer o perfil socioeconômico dos manipuladores de alimentos e o seu nível de escolaridade para implementação de programas de capacitação

visando a segurança e a qualidade dos alimentos (DEVIDES *et al.*, 2014). Segundo o estudo de Devides *et al.* (2014), a maioria dos manipuladores de alimentos que participaram da capacitação eram do sexo feminino (63%), solteiros (42%) e jovens com idade entre 21 e 30 anos (33%). Observou-se que a inserção de jovens nesta área é relativamente comum, e como na maioria das vezes esta é sua primeira experiência profissional, capacitá-lo representa uma excelente oportunidade para implantar conceitos de higiene e boas práticas na manipulação dos alimentos. Neste mesmo estudo, cerca de 55% dos participantes do curso declararam possuir 2º grau completo e 13% ainda frequentavam a escola para concluir os estudos.

Segundo Maia e Tolentino (2011), o tempo de profissão também influenciou na quantidade de acertos em questionário aplicado sobre BPF's, dessa forma quanto maior o tempo de experiência (acima de 12 anos), menor o nível de conhecimento (menos de 50% de acertos). Pagotto *et al.* (2018) observou que o baixo grau de conhecimento por parte dos manipuladores acarretou a inadequada manipulação de alimentos. Foi constatado maior percentual de erro nas questões básicas, como por exemplo a higiene das mãos com 93,3%. Reforçando assim que o mais importante do treinamento é a busca por mudança de hábitos e comportamentos das pessoas treinadas, e não focar somente em passar conhecimentos (GERMANO, 2003).

Nota-se, que é necessário o uso de tecnologias que garantam o pleno entendimento por todos (FORMIGONI *et al.*, 2017). Segundo Gonçalves (2013) somente 22% da mão de obra é qualificada e que ainda há muita falta de informação sobre segurança dos alimentos por parte dos manipuladores, e dentre os que tem algum conhecimento, ainda existem muitas dúvidas. Por isso é tão importante a avaliação das atitudes, da prática e do conhecimento da equipe (PAGOTTO *et al.*, 2018). O processo educativo deve ser visto com responsabilidade e competência, e deve ser utilizado visando a prevenção ou pelo menos, a mitigação dos problemas causados pela má conduta dos manipuladores (GONÇALVES, 2013). Para isso, o curso de treinamento em BPF's deve ser focado na realidade da empresa e de seus manipuladores, para que seus objetivos sejam alcançados (ARAÚJO *et al.*, 2014; BERTOLO *et al.*, 2016).

Todavia, não existe um padrão de treinamento a ser seguido, com conteúdo programático e frequência. No entanto, é necessário manter registrados os treinamentos, o conteúdo utilizado, bem como a carga horária. A verificação do resultado dos treinamentos pode ser realizada por auditoria de pessoal responsável da própria empresa ou fiscalizações dos órgãos responsáveis (PILECCO *et al.*, 2012). É importante frisar que, a periodicidade desses treinamentos serve para manter a higiene e a qualidade em todo o processo de

produção (MACHADO *et al.*, 2015). No entanto, Pilecco *et al.* (2012), ao adotar diferentes frequências de treinamento em BPF's em fábrica de ração animal, consideraram a frequência de treinamentos quinzenais a mais eficaz, reduzindo o maior número de não conformidades por hora de treinamento efetuado.

Vasques e Madrona (2016) após a implementação das BPF's e dos procedimentos operacionais padrão observaram mudanças significativas principalmente após a capacitação dos manipuladores de alimentos, com destaque para a melhora no cuidado com a higiene dos equipamentos, utensílios e instalações internas, sobretudo na manipulação dos alimentos e higiene pessoal. Mesmo com resultados satisfatórios, esses autores relatam que muitos itens relacionados às BPF's ainda precisam ser melhorados, o que faz da capacitação um processo gradativo e constante até que todas as normas e regras estabelecidas no manual tornem-se procedimentos. Para isso ressalta-se a importância das auditorias internas, para que os funcionários se sintam na responsabilidade de cumprir as normas, e da manutenção dos registros de atividades, como uma forma de auxiliar as monitorias e permitir a realização da rastreabilidade, caso seja necessário (MACHADO *et al.*, 2015).

Atualmente tem-se exigido mais agilidade e inovação das empresas. Isso é conseguido através da valorização de seus funcionários e do conhecimento que eles têm (BUDIN e LOPES, 2019). Para Costa *et al.* (2012), as capacitações, é uma das formas de fácil aplicação e de baixo custo para atender as exigências de mercado e estar em conformidade com a lei. Desse modo, para se manter em um mercado consumidor cada vez mais exigente, competitivo e sempre bem informado, deve-se fornecer sempre um produto de melhor qualidade. Com isso, a capacitação de pessoal se torna um diferencial, contribuindo para a vida profissional dos funcionários e para a sobrevivência da empresa no mercado em que está inserida (BUDIN e LOPES, 2019).

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A implantação das Boas Práticas de Fabricação é a base para se obter um processo de fabricação de produtos com qualidade. Sua aplicação é um grande passo dado pelas indústrias que querem atender o consumidor, que está cada vez mais exigente. Independentemente do nível de escolaridade dos nossos trabalhadores, a capacitação ainda é a ferramenta mais simples e de custo mais acessível, sendo importante para se obter um resultado satisfatório dentro dos padrões exigidos e utilizado por aqueles que buscam melhoria contínua dentro do processo.

Sendo assim, é recomendável a adoção de treinamentos em caráter admissional e periódico, com o uso de várias metodologias, não só a teoria, como também atividades práticas para promover o aprendizado do colaborador, e com isso oportunizar a mudança de suas atitudes, desenvolvendo melhor e de forma mais consciente suas atividades, satisfazendo assim as exigências legais e o consumidor.

Além disso, também é necessário, que a diretoria da empresa esteja comprometida com a capacitação dos manipuladores de alimentos de forma a contribuir para o aperfeiçoamento pessoal e profissional e para a busca de melhorias no processo cotidiano de trabalho, sendo primordial para um processo de produção com qualidade.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, F.Q.A.; NONATO, I.L. Práticas de Fabricação (BPF) para Manipuladores de Alimentos, em Cozinha Piloto com Serviço de Pizzaria, na Cidade de Uberaba, MG. **Revista Higiene Alimentar**, v.27, n.226/227, p.46-49, 2013.

ARAÚJO, A.L. *et al.* Modelo para capacitação em GMP visando a transferência de conhecimento para funcionários do setor de produção na indústria de sorvete. **Revista Científica On-line Tecnologia, Gestão, Humanismo**, v.3, n.1, p.36-46, 2014.

BERTOLO, A. *et al.* Experiência do uso das boas práticas de fabricação para melhoria das condições higiênico-sanitárias da feira do agricultor de Laranjeiras do Sul – PR. **Revista Brasileira de Extensão Universitária**, v.7, n.1, p.51-57, 2016.

BOAVENTURA, L.T.A. *et al.* Conhecimento de manipuladores de alimentos sobre higiene pessoal e boas práticas na produção de alimentos. **Revista Univap**, v.23, n.43, p.53-62, 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.428, de 26 de novembro de 1993. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 02 dez. 1993, n.229, seção 1, p.71-75.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 326, de 30 de julho de 1997. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 1º ago. 1997, n.146, seção 1, p.40-46.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento. Instrução normativa nº4 de 23 de fevereiro de 2007. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 1 mar. 2007, seção 1, p.5-9.

BRASIL. Código de Proteção e Defesa do Consumidor (1990). **Código de proteção e defesa do consumidor e legislação correlata**. – 5. ed. – Brasília : senado Federal, subsecretaria de Edições técnicas, 2012. 106 p.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resoluções da Diretoria Colegiada nº 216 de 15 de setembro de 2004. **Diário oficial da União**, Brasília, DF, 16 set. 2004, seção 1, p.15-28.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resoluções da Diretoria Colegiada, 275 de 21 de outubro de 2002. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 23 out. 2002, seção 1, p.126-130.

BUDIN, D.D.; LOPES, A.M.Z. Indústria 4.0 e os desafios para a capacitação profissional. **Revista Tecnológica da Fatec Americana**, v.7, n.2, p.88-97, 2019.

BYRD-BREDBENNER, C. *et al.* Development and implementation of a food safety knowledge instrument. **Journal of Food Safety Education**, v.6, p.46-55; 2007.

CARDOSO, M.F.; MIGUEL, V.; PEREIRA, C.A.M. Avaliação das condições higiênico-sanitárias e de boas práticas de fabricação em panificadoras. **Alimentos e Nutrição**, v.22, n.2, p.211-217, 2011.

COSTA, T.S. *et al.* Oficinas de boas práticas de fabricação: construindo estratégias para garantir a segurança alimentar. **Brazilian Journal of Food Technology IV SSA**, v.15, p.64-68, 2012.

DEVIDES, G.G.G.; MAFFEI, D.F.; CATANOZI M.P.L.M. Perfil Socioeconômico e Profissional de Manipuladores de Alimentos e o Impacto Positivo de um Curso de Capacitação em Boas Práticas de Fabricação. **Brazilian Journal of Food Technology**, v. 17, n. 2, p. 166-176, abr./jun. 2014.

FORMIGONI, A.S.; MARCELO, G.C.; NUNES, A.N. Importância do programa de qualidade “boas práticas de fabricação” (BPF) na produção de ração. **Revista eletrônica Nutri Time**, v. 14, n.6, p.8016-8025, 2017.

GERMANO, M.I.S. **Treinamento de Manipuladores de Alimentos: Fator de Segurança Alimentar e Promoção da Saúde**. 1 ed. São Paulo: Varela, 2003.

GONÇALVES, J.C.G. **Elaboração de material didático para treinamento de manipuladores de alimentos**. 2013, 85f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia de Alimentos) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, PR, 2013.

HANSSON, B. Company-based Determinants of Training and the Impact of Training on Company Performance: Results from an International HRM Survey. **Personnel Review**, v.36, n.2; p.311-331, 2007.

LEANDRO, A.I.P.; BRANCO, E.S. Importância do treinamento e desenvolvimento nos serviços de saúde. **RAHIS – Revista de Administração Hospitalar e Inovação em Saúde**, v.6, p. 64-69, 2011.

LEITE, C.A. *et al.* Capacitação tecnológica e avaliação das condições higiênico-sanitárias de três fábricas de doces da cidade de Pombal – PB. **Revista Verde**, v.8, n.1, p.72-79, 2013.

MACHADO, R.L.P.; DUTRA, A.S.; PINTO, M.S.V. **Boas Práticas de Fabricação (BPF)**. Embrapa Agroindústria de Alimentos, 1ª ed., Rio de Janeiro, RJ, 2015. 20f.

MAIA, M.F.M.; TOLENTINO, F.M. Boas práticas de manipulação, higiene e conservação: uma análise sobre os conhecimentos dos manipuladores de alimentos de empresas da cidade de Montes Claros – MG. **FIEP Bulletin**, v.81, p.1-6, 2011.

PAGOTTO, H.Z. *et al.* Nível de conhecimento, atitudes e práticas dos manipuladores de alimentos em serviços de alimentação. **Demetra: Alimentação, Nutrição & saúde**, v.13, n.1, p.293-305, 2018.

PAULA, A.V.S.; CHABOLI, F.C.; RAGONHA, S. A importância das boas práticas relacionadas ao treinamento de manipuladores evitando a contaminação de alimentos. **Revista Científica UNILAGO**, v.1, n.1, p.59-62, 2013.

PILECCO, M. *et al.* Treinamentos de boas práticas de fabricação de rações: Qual a frequência ideal? **Revista Agrarian**, v.5, n.17, p.295-302, 2012.

RIBEIRO, L.F. *et al.* Importância da capacitação profissional dos manipuladores dos estabelecimentos alimentícios: Um estudo no município de Ivaiporã/PR. In: ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 30, 2010. **Anais...** São Carlos, SP, Brasil, 2010. 13p.

SACCOL, A.L.F. *et al.* Importância de Treinamento de Manipuladores em Boas Práticas. **Disciplinarum Scientia Série: Ciências da Saúde**, v.7, n.1, p.91-99, 2006.

SILVA, V.F.; PIERRE, F.C. Análise das Boas Práticas de Fabricação da Indústria Leiteira do Interior do Estado São Paulo. **Tekhne e Logos**, v.8, n.1, p.8, 2017.

TRASEL, K. **Implantação de Boas Práticas de Fabricação em Empresas de Chocolates Artesanais em Arroio do Meio – RS**. 2014, 21f. Trabalho de Conclusão de Curso (Técnico em química) - Centro Universitário Univates, Lajeado, RS, 2014.

VASQUES, C.T.; MADRONA, G.S. Aplicação de checklist para avaliação da implantação das boas práticas em uma unidade de alimentação e nutrição. **Higiene Alimentar**, v.30, n.252/253, p.53-58, 2016.

VERONEZI, C.; CAVEIÃO, C. A importância da implantação das boas práticas de fabricação na indústria de alimentos. **Revista saúde e desenvolvimento**, v. 8, n.4, p.14, 2015.

PRINCIPAIS IMPACTOS AMBIENTAIS NA INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS

Patrícia Batista de Oliveira

Pós-Graduação IFOPE, Universidade Cândido Mendes, Rio de Janeiro, RJ

<http://lattes.cnpq.br/8924429412389751>

Alicielle Souza Aguiar

Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Fortaleza, CE

<http://lattes.cnpq.br/3454772011398015>

Lina Raquel Santos Araújo

Pós-Graduação IFOPE, Universidade Cândido Mendes, Rio de Janeiro, RJ

<http://lattes.cnpq.br/7591378438576586>

Informações sobre o

artigo:

Recebido em:

26/06/2020

Aceite em:

04/07/2020

Data de publicação:

21/09/2020

Palavras-chave:

Sustentabilidade

Meio Ambiente

Produtos Lácteos

Resíduos

Efluentes

RESUMO

Os laticínios no Brasil se destacam positivamente pela sua importância na economia (empregos e agregação de valor aos produtos), e negativamente contribuindo para os impactos ambientais. Dentre estes, tem-se a geração de efluentes, resíduos sólidos, emissões atmosféricas, ruídos e vibrações. É sabido que, o controle da geração dos impactos, tais como, tratamento de efluentes e disposição de resíduos sólidos, são críticos nos processos industriais, sendo negligenciados em alguns casos, ocasionando danos ambientais relevantes. As indústrias que buscam tecnologias para uma produção mais eficiente e ambientalmente adequada a fim de reduzir os impactos ambientais tendem a se destacar no mercado, pois atendem as novas exigências dos consumidores, de produtos sustentáveis. Neste sentido, o objetivo deste trabalho é realizar um levantamento teórico das atividades desenvolvidas nos laticínios, identificando os fatores que ocasionam perdas na produção de modo a minimizar os impactos ao meio ambiente.

MAIN ENVIRONMENTAL IMPACTS ON THE DAIRY INDUSTRY ABSTRACT

Keywords:

Sustainability

Environment

Dairy Products

Waste

Effluents

Dairy products in Brazil stand out positively for their importance in the economy (jobs and adding value to products), and negatively contributing to environmental impacts. Among these, there is the generation of effluents, solid waste, atmospheric emissions, noise and vibrations. It is known that the control of the generation of impacts, such as the treatment of effluents and disposal of solid waste, are critical in industrial processes, being neglected in some cases, causing significant environmental damage. Industries that seek technologies for more efficient and environmentally friendly production in order to reduce environmental impacts tend to stand out in the market, as they meet the new demands of consumers,

for sustainable products. In this sense, the objective of this work is to carry out a theoretical survey of the activities developed in the dairy, identifying the factors that cause losses in production in order to minimize the impacts on the environment.

1 INTRODUÇÃO

A indústria de laticínios possui a importante missão de processar e beneficiar o leite, bem como de produzir seus derivados. Para Carvalho (2010a) laticínio é um produto comestível cujo elemento principal de sua constituição é o leite ou ainda qualquer produto oriundo desta atividade industrial. Assim, como produtos de laticínios têm-se o leite pasteurizado, leite desnatado, leite condensado, cremes de leite, queijos, manteiga, doce de leite, iogurte, as bebidas fermentadas, os sorvetes, dentre outros.

Por ser uma atividade de destaque no cenário econômico do Brasil, a indústria de laticínios necessita cada vez mais de profissionalização da produção, de modo a aprimorar os métodos para melhor elaboração de produtos, tornando-os diferenciados e competitivos (SLACK *et al.*, 2009).

Segundo Carvalho (2010b), devido a diversos fatores, em especial a competitividade oriunda de empresas de laticínios de grande porte, a exigência em relação à melhoria na qualidade da matéria-prima vem transformando o setor leiteiro brasileiro. Assim, deverão surgir novos produtos/serviços visando o atendimento das necessidades dos consumidores.

Neste contexto de qualidade, a indústria afirma que a segurança do leite é apurada em todas as etapas do processo produtivo, considerando que em todas elas existe a possibilidade de contaminação com agentes que possam comprometer a saúde do consumidor (MENSEN, 2015).

Para garantir a higiene e a segurança dos produtos na indústria realiza-se o controle logo na recepção do leite, ou seja, antes mesmo de seu processamento. Além disso, é importante ressaltar que é necessário cuidado na obtenção o leite, uma adequada classificação e refrigeração e o transporte deve ser realizado em ambiente limpo e refrigerado (MENSEN, 2015).

Ao chegar à indústria o leite deve passar por análises importantes, tais como a verificação da temperatura de chegada do leite, acidez, teste do alizarol e crioscopia, a fim de garantir sua qualidade para processamento (SLACK *et al.*, 2008).

Além disso, é importante adequar o arranjo produtivo aos processos, organizar o *layout* e pessoas dentro da produção e suas inter-relações. Pois, manter o equilíbrio das

atividades evita que haja movimentação excessiva de pessoas, materiais e informações, promovendo de forma organizada o sequenciamento das etapas produtivas. Para tanto, busca-se a redução de todas as formas de perdas eliminando as atividades que não agregam valor (SLACK *et al.*, 2008).

O objetivo deste artigo é realizar um estudo das atividades desenvolvidas pela indústria de laticínios (produção, gestão, redução de custos de produção) identificando os fatores que possam ocasionar perdas e/ou que provocam impactos ambientais a fim de minimizá-los.

2 INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS

As indústrias de laticínios se originaram na metade do século XIX, quando iniciaram as etapas de refrigeração e concentração de leite com intuito de armazenarem em recipientes esterilizados. Essa nova condição de higiene, foi um marco inicial da profissionalização da produção de leite para expansão das vendas nas grandes cidades. Posteriormente, foi adotada a tecnologia da pasteurização, fundamental para ampliar mercados e garantir a segurança alimentar do leite (FARIA, 2015).

É sabido que, os produtos lácteos há milhares de anos são utilizados na alimentação humana. Historicamente o leite de vaca foi introduzido na alimentação humana através do povo romano. O leite consumido anteriormente era o de cabras, ovelhas e burros e foram eles também que aperfeiçoaram a técnica para trabalhar seus derivados (PARMALAT, 2016).

A indústria de alimentos é uma das estruturas produtivas mais tradicionais existentes no país. Entre os anos de 2000 e 2010, o setor alimentício apresentou o maior superávit da indústria brasileira, com US\$ 201,2 bilhões. Em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) do país a indústria da alimentação tem garantido presença média de 9% em sua composição (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS, 2014).

Considerando os variados setores de alimentos no Brasil, o setor de produtos lácteos encontrava-se entre os quatro principais, ocupando o segundo lugar no ano 2001, perdendo apenas para o setor de derivados de carne. Em alguns anos observou-se no país um grande aumento na importação dos produtos derivados do leite, fato esse observado devido a sobrevalorização do câmbio, tabelamento de preços para combate à inflação e mudanças nas políticas de apoio à produção de leite. Como consequência dessas mudanças houve um aumento de investimentos no setor, ocasionando ganhos diretos e indiretos na cadeia produtiva (CARVALHO, 2010b).

O Brasil foi o quarto maior produtor do mundo de leite *in natura* no ano de 2013, atingindo a marca de 34,3 milhões de toneladas (FAO, 2016). Já em 2015, a produção brasileira ultrapassou 35 bilhões de litros de leite, valor que determina investimento no aperfeiçoamento das atividades visando atender a demanda do mercado nacional (MILKPOINT, 2016a).

O leite *in natura* se destaca como uma das seis atividades agropecuárias mais importantes do Brasil (EMBRAPA, 2016). A importância do setor também pode ser observada pelo expressivo número de empregos gerados, pela agregação de valor aos produtos e, por conseguinte, a geração de renda (FAO, 2016).

As agroindústrias com o passar dos anos além de suprir demandas nutricionais também apresentaram uma preocupação em relação ao meio ambiente, de modo, a envolver-se em uma nova missão, colaborando para o desenvolvimento sustentável (MAGANHA, 2006). Isso porque em todo o princípio de produção industrial há exigência de recursos para desenvolvimento dos produtos. Esses recursos normalmente se apresentam na forma de matéria prima, energia na forma de água, ar, combustível para o seu processamento. Sabendo que esses recursos são finitos, sua utilização deve ser de maneira controlada evitando assim à escassez e desequilíbrio (MAGANHA, 2006).

O setor de laticínios exige uma grande demanda por recursos hídricos, nas diferentes etapas do processo produtivo, resultando na geração de efluentes industriais, principalmente para limpeza, que representa aproximadamente 80% da água consumida neste setor (BRIÃO, 2007).

Observando a questão supracitada, percebe-se que o setor agroindustrial de leite no Brasil tem um grande potencial para a poluição ambiental. Deste modo, necessita-se de rigor no controle ambiental e desenvolvimento de ações de gerenciamento que permitam um controle efetivo dos aspectos e impactos ambientais associados. Assim, a indústria tem buscado incrementar com uso de novas tecnologias de controle nos últimos anos, como, por exemplo, o uso da tecnologia de membrana filtrante para obtenção das frações proteicas do soro (ROHLFES *et al.*, 2011).

3 LEITE E PRODUTOS LÁCTEOS

Quando se fala em setor de produção de alimentos fica clara a diferença entre este setor e os demais segmentos do mercado, considerando a duração da vida útil do produto. É sabido que, trabalhar com tais produtos exige aplicação de tecnologias específicas, sem citar que estão sujeitos a ocorrência de imprevistos climáticos. Deste modo, para processar tais produtos há uma alta exigência quanto ao controle de qualidade (SANTANA, 2004).

Devido à vulnerabilidade dos alimentos, a atividade apresenta como peculiaridade a susceptibilidade a alterações químicas, nutricionais, sensoriais e microbiológicas, exigindo que a manipulação e o armazenamento sejam realizados de maneira adequada e cuidadosa. O intervalo de tempo entre a coleta e o processamento, é um fator muito importante para produção, pois, este é limitado e pouco flexível, necessitando ser rigorosamente cumprido (SANTANA, 2004). Para melhor entendimento do setor lácteo e considerando a grande diversidade de produtos, se faz necessário, deixar claro conceitos básicos como: leite e produtos lácteos.

Segundo o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) “entende-se por leite, sem outra especificação, o produto oriundo da ordenha completa, ininterrupta, em condições de higiene, de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas”. Desse modo, o leite, de outras espécies de animais, deve denominar-se segundo sua espécie procedente (BRASIL, 2017). Enquanto, “os produtos lácteos são obtidos mediante processamento tecnológico do leite, podendo conter ingredientes, aditivos e coadjuvantes de tecnologia, apenas quando funcionalmente necessários para o processamento” (BRASIL, 2017).

O leite em termos nutricionais é considerado um produto completo, uma vez que composto por uma parte úmida, representada pela água, e uma parte sólida, denominada extrato seco total, constituído por gordura, carboidratos (lactose), proteínas e sais minerais cujos percentuais estão expostos na Figura 1 (SILVA *et al.*, 2012).

Figura 1. Distribuição percentual da composição do leite bovino.

Fonte: SILVA *et al.*, 2012

Ressalta-se que a composição centesimal do leite pode sofrer variações a depender de alguns fatores, tais como: espécie lactante (bovina, bubalina, caprina, ovina etc.), raça (holandesa, jersey etc.), período de lactação, alimentação, saúde do animal, individualidade, diferença entre os quartos do úbere, idade, clima, intervalo entre as ordenhas, estação do ano. Além disso, o rendimento do leite está diretamente relacionado à fração de extrato seco, ou seja, quanto maior a matéria seca, melhor o rendimento e elaboração dos produtos lácteos (MAGANHA, 2006).

4 QUALIDADE DO LEITE E FLUXO DO LEITE NA INDÚSTRIA

Para atestar a qualidade do leite *in natura* que será processado pela indústria é importante observar suas características físico-químicas, devendo ser compatíveis com padrões de qualidade estabelecidos pela Instrução Normativa (IN) de nº 62 (BRASIL, 2011a).

Os parâmetros estabelecidos pela legislação têm o objetivo de conferir as reais condições em que o leite foi obtido, processado ou até mesmo indicar a ocorrência de algum tipo de fraude. Deste modo, no Quadro 1 está descrito alguns parâmetros físicos e químicos do leite recomendados pela IN 62 (BRASIL, 2011a).

Quando o leite chega ao laticínio, considerando que foi realizada uma obtenção higiênica (ordenha), que a coleta na fazenda e o transporte seguiram os requisitos estabelecidos, o leite ainda na plataforma de recepção, imediatamente ao ser recebido, é

submetido às análises preliminares supracitadas, antes de seguir no fluxo da linha de produção dentro do laticínio (SILVA *et al.*, 2012).

Quadro 1. Principais parâmetros (e suas mensurações) recomendados para o leite também utilizados para indicar a presença de fraudes.

Parâmetro	Descrição
Temperatura de conservação	A temperatura de armazenamento indicada, ainda na fazenda, deve ser igual ou inferior a 4 °C dentro de três horas após o término da ordenha, podendo alcançar no máximo até 7 °C, no momento de recebimento no estabelecimento industrial. Esta temperatura inibe o crescimento de microrganismos presentes no leite, pois diminui sua velocidade de multiplicação.
Acidez titulável	Expressa em % em ácido láctico, diz respeito tanto ao ácido láctico quanto a outros componentes que também podem interferir nesta característica, tais como citratos, fosfatos e proteínas. A acidez do leite é mensurada, através do acidímetro Dornic. Este equipamento tem a finalidade de verificar o grau de metabolização da lactose a ácido láctico, que é baseado na titulação com solução básica do ácido láctico da amostra na presença do indicador. O teste do alizarol baseia-se na ocorrência de coagulação por efeito da elevada acidez ou do desequilíbrio salino, quando se promove desestabilização das micelas pelo álcool e na mudança de colocação da mistura pela alizarina, como indicador de pH auxiliando. A acidez do leite varia de 14 a 18° D (graus Dornic). Outra maneira de aferir a presença de ácidos no leite é por meio da medição do pH. Em condições normais, o pH apresenta-se em 6,7 (SILVA <i>et al.</i> , 2012).
Densidade	Utilizada no controle de qualidade do leite, relaciona seu peso e volume, sendo normalmente mensurada a 15 °C, ou corrigida para esta temperatura. Seu valor deve estar compreendido entre 1,028 e 1,034 g/ml (BRASIL, 2017). Leites de composições diferentes podem apresentar o mesmo grau de densidade. Para determinar a densidade, utiliza-se um instrumento denominado termolactodensímetro (SILVA <i>et al.</i> , 2012).
Determinação da gordura no leite	A gordura está dentre os componentes do leite que mais sofre variação e normalmente é o primeiro a sofrer alterações diante de qualquer fator de origem genética, ambiental e fisiológica que esteja afetando o metabolismo normal da vaca. Para determinar a gordura do leite utiliza-se o método de Gerber que consiste na destruição do estado globular da gordura e a dissolução da caseína. O álcool isoamílico usado para diminuir a tensão na interfase entre a gordura e a mistura ácido-leite, facilitando a separação da gordura. Essa diminuição na interfase facilita a ascensão dos glóbulos de gordura menores durante a centrifugação (MENSEN, 2015). De acordo com a Instrução Normativa nº 62 (BRASIL, 2011a), o leite deve apresentar o teor mínimo de 3,0 g/100g de gordura para leite cru refrigerado e leite pasteurizado.
Índice crioscópico ou crioscopia	Refere-se à medida do ponto de congelamento do leite ou da depressão do ponto de congelamento do leite em relação ao da água. O ponto de congelamento do leite aceito pela legislação brasileira é de - 0,530°H a -0,550°H (equivalentes a -0,512°C e a -0,531°C). A temperatura de congelamento do leite é mais baixa do que a da água devido ao efeito das substâncias dissolvidas no leite, principalmente a lactose e os sais minerais. Sabendo que a água é o componente mais constante do leite, e aguçagem é falsificação mais comum, esse índice é usado para detectar adulteração do leite com água.
Extrato seco desengordurado	Compreendem-se todos os elementos do leite, exceto a água e a gordura. Quanto maior esse componente no leite, maior será o rendimento dos produtos (MILKPOINT, 2016 b). Valor de referência mín. 8,4 g/100 g
Proteínas	A proteína do leite é constituída por 80% caseína e 20% proteína do soro do leite. A caseína apresenta-se como uma proteína "lenta", pois, sua taxa de digestão é mais lenta que ocasiona uma distribuição mais prolongada de aminoácidos na circulação. Por outro lado, a proteína do soro do leite é uma proteína "rápida", pois é rapidamente digerida, proporcionando um rápido aumento dos níveis sanguíneos de aminoácidos, e estimula a síntese proteica e a oxidação (MILKPOINT, 2016 b). Valor de referência: mín. 2,9 g /100g

Fonte: BRASIL, 2011a.

Na Figura 2 está descrito de maneira esquemática os diferentes caminhos pelo qual o leite pode percorrer desde sua obtenção até sua expedição. Ressalta-se que há diferença entre os fluxogramas de distintas indústrias, variando de acordo com suas estruturas e setores de processamento aos quais o leite será destinado (SILVA *et al*, 2012).

Figura 2. Fluxo do leite na indústria de laticínios.

Fonte: SILVA *et al*, 2012.

5 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS RELACIONADOS A INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS

Em todo processo produtivo existe os pilares que resultam no produto, dentre eles pode-se citar insumos, processos e saídas, todavia, em alguns casos pode surgir intemperes que pode ocasionar desperdícios, fazendo com que o custo de produção seja elevado. Além

disso, pode originar resíduos sólidos, efluentes e emissões atmosféricas podendo assim impactar diretamente o meio ambiente (SILVA, 2011).

Por muito tempo o meio ambiente era considerado uma fonte de recursos fartos, na qual não havia necessidade de muito esforço para sua obtenção e, por isso, eram classificados como de categoria de bens livres. Esse pensamento, de certa forma, acarretou dificuldade de se criar critérios normativos para sua utilização, resultando em graves problemas de poluição ambiental que afetaram diretamente toda a população, pois ocorreu de maneira indevida a apropriação do ar, da água e do solo (MAGANHA, 2006). Ciente de tal fato, a legislação ambiental exige que, independente do seu porte e seu potencial poluidor, as empresas armazenem e tratem seus resíduos adequadamente (SILVA, 2011).

Segundo a NBR ISO 14001, aspecto ambiental “é o elemento das atividades, produtos e/ou serviços de uma organização que pode interagir com o meio ambiente de forma adversa ou benéfica”. Os aspectos ambientais são constituídos pelos agentes geradores das interações, como, emissão atmosférica, odor, resíduos, consumo de matérias-primas, energia, água, entre outros (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, 2015). Por outro lado, conforme definição da NBR ISO 14001, “impacto ambiental é qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou em parte, das atividades, produtos ou serviços de uma organização” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, 2015). Em contrapartida, o Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) “considera impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais” (BRASIL, 1986).

Sabendo que o meio ambiente é diretamente afetado pela geração de resíduos, efluentes e emissões, se faz necessário, conhecer o processamento industrial de modo a identificar os aspectos e impactos ambientais inerentes à atividade de maneira a propor melhorias para o setor. A melhor maneira de realizar o controle ambiental é reduzir a geração de resíduos, controlando o processo de forma a reduzir desperdício, adotando práticas de reciclagem e reuso, diminuindo assim o custo com tratamento e destinação final (SILVA, 2011). Para obter êxito no processo de gerenciamento dos resíduos é essencial que a organização conheça os tipos de resíduos que são gerados, suas características e fontes de

geração (SILVA, 2011). Abaixo é apresentado o fluxograma (Figura 3) que representa o processo global de obtenção de produtos lácteos, nele é descrito de forma genérica as etapas do processamento do leite, indicados os insumos utilizados como entradas e os impactos ambientais que podem ser gerados na saída do produto.

Para Machado *et al.* (2001), uma maneira eficaz para controle dos impactos ambientais ocasionados pelas indústrias de laticínios seria a otimização e controle dos processos dentro da indústria. Também poderia ser realizada uma adequação do consumo de alguns insumos tais como água, combustíveis, detergentes, desinfetantes, entre outros e, principalmente, o uso de inovação tecnológica para melhor utilização dos subprodutos gerados na produção como o soro de leite. Este autor acredita ainda que há uma carência na análise de alguns aspectos ligados à industrialização, tais como água, energia, tratamento e lançamento de efluentes e disposição de resíduos sólidos, que são determinantes em processos industriais, para ele estes aspectos frequentemente são negligenciados.

Figura 3. Etapas genéricas da indústria de produtos lácteos

Fonte: MAGANHA, 2006.

Para Machado *et al.* (2001) na indústria de laticínios os impactos ambientais mais relevantes identificados na atividade são a produção de efluentes, a geração de resíduos sólidos e as emissões atmosféricas. Tais impactos são agravados principalmente quando são emitidos sem nenhum tipo de controle ou tratamento.

a) Efluentes

Os efluentes industriais normalmente são aqueles originários de operações e procedimentos que utilizam água, tais como, lavagem de equipamentos e piso, os esgotos sanitários gerados e as águas pluviais captadas na indústria (MACHADO *et al.*, 2001). Exclui-se apenas a parcela que é incorporada no produto final, no entanto, a parte líquida da matéria prima é removida nos processos industriais (CAVALCANTI, 2012).

Há uma grande variação, tanto em composição quanto em quantidade das águas residuais da indústria. Esta variação depende da diversidade dos produtos que são fabricados, da capacidade produtiva da indústria, da modernidade dos processos empregados, da natureza da atividade, de quais matérias-primas são utilizadas, além das práticas de reciclagem e de reuso que são empregadas (CAVALCANTI, 2012).

No setor de laticínios o consumo médio de água está entre 1,0 e 6,0 litros de água/kg de leite recebido (MAGANHA, 2006). Quando se cita o processamento do leite e iogurtes, esse consumo apresenta uma variação entre 0,6 a 4,1 litros de água/litro de leite processado. Parte desta água é utilizada no processamento (resfriamento, geração de vapor etc.), enquanto a maior parte é utilizada na limpeza de superfícies que entram em contato com o produto, bem como tanques de fermentação, máquinas de envasamento etc. Estes efluentes exibem um elevado teor de matéria orgânica, nitrogênio e fósforo (sobretudo em função do uso de produtos para limpeza e desinfecção), observa-se grandes variações no pH e variações na temperatura provocadas por etapas específicas do processamento (MAGANHA, 2006).

Segundo Brasil (2011b) os efluentes de qualquer fonte poluidora só podem ser devolvidos ao meio ambiente após passarem tratamento adequado que permita que tais efluentes se encaixarem nos padrões estabelecidos pela legislação ambiental vigente. Assim as principais condições para lançamento de efluentes no corpo receptor previstas são:

- a) pH entre 5 a 9;
- b) Temperatura inferior a 40°C, sendo que a variação de temperatura do corpo receptor não deverá exceder a 3°C no limite da zona de mistura;
- c) Materiais sedimentáveis até 1 ml/L em teste de 1 hora em cone Imhoff. Para o lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja praticamente nula, os materiais sedimentáveis deverão estar virtualmente ausentes;

d) Regime de lançamento com vazão máxima de até 1,5 vez a vazão média do período de atividade diária do agente poluidor, exceto nos casos permitidos pela autoridade competente;

e) Óleos e graxas: até 20 mg/L para óleos minerais e até 50 mg/L para óleos vegetais e gorduras animais

f) Ausência de materiais flutuantes;

g) DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) 5 dias a 20°C para remoção mínima de 60% de DBO (BRASIL, 2011b).

No entanto, essa resolução não especifica o Demanda Química de Oxigênio (DQO), de modo que Bado *et al.* (2013) relata que estes limites são estabelecidos em algumas legislações ambientais estaduais. No caso do estado de Minas Gerais, o teor de DQO é regulado pela Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG N° 1/2008 (MINAS GERAIS, 2008). Nesta normativa o teor de DQO permitido é de até 180 mg/L ou:

a) Tratamento com eficiência de redução de DQO em no mínimo 55% e média anual igual ou superior a 65% para sistemas de esgotos sanitários e de percolados de aterros sanitários municipais;

b) Tratamento com eficiência de redução de DQO em no mínimo 70% e média anual igual ou superior a 75% para os demais sistemas.

Considerando a preocupação com a ocorrência do aumento da concentração de matéria orgânica é representada pela elevação dos valores de DBO e DQO, que são parâmetros importantes na quantificação do potencial poluidor dos efluentes industriais. Quanto maior a quantidade de matéria orgânica, maior será o consumo de oxigênio para oxidação da matéria orgânica e menor será a disponibilidade de oxigênio dissolvido na água, o que pode causar impactos ambientais que comprometem a vida (BADO *et al.*, 2013).

b) Resíduos sólidos

A geração de resíduos sólidos também é citada como impacto inerente às atividades exercidas no laticínio corresponde a todo tipo de material na forma sólida resultante da sobra de um processo. São citados restos de matéria-prima, produto acabado, embalagens, os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água e efluentes, resíduos gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição atmosférica, entre outros (SILVA, 2011).

Os resíduos sólidos gerados no laticínio podem ser subdivididos de acordo com sua origem em dois grupos principais. Sendo o primeiro grupo dos resíduos originados nos escritórios, nas instalações sanitárias e nos refeitórios da indústria, composto por papéis,

plásticos e embalagens diversas gerados nos escritórios, resíduos provenientes dos sanitários como papel toalha, papel higiênico, além dos resíduos de refeitório/cantina, restos de alimentos, produtos deteriorados, embalagens diversas, papel filtro etc. O segundo grupo é composto pelos resíduos sólidos industriais provenientes das diversas operações e atividades relacionadas diretamente à produção industrial e demais unidades de apoio. São basicamente sobras de embalagens, embalagens defeituosas, papelão, plásticos, produtos devolvidos, embalagens de óleos lubrificantes, resíduos da estação de tratamento de efluentes (sólidos grosseiros, areia, gordura, lodo biológico etc.) e cinzas de caldeiras, caso de caldeiras a lenha (SILVA, 2011).

No laticínio de modo geral os resíduos de ocorrência comum são o plástico (polietileno de baixa densidade e de alta densidade) usado para a embalagem de leite pasteurizado, iogurte e bebidas lácteas, bem como de filmes plásticos diversos usados na embalagem de queijos. No caso da produção de manteiga, pode haver filmes de papel, usados na embalagem de tabletes. E ainda nas indústrias onde se produz doce de leite e requeijão também há resíduos de lata, vidro ou de embalagens de plástico semiflexível (SILVA, 2011).

Todos os resíduos gerados na indústria devem ser identificados e classificados para definir a forma mais adequada para sua disposição final (KOROIVA, 2018). De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, (2004) os resíduos sólidos industriais são divididos da seguinte forma:

- Resíduo Classe I: resíduos que apresentam periculosidade em função de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade ou patogenicidade, apresentando diversos riscos à saúde e ao meio ambiente.
- Resíduos Classe II-A (não inertes): resíduos com propriedades de biodegradabilidade, solubilidade em água ou combustibilidade.
- Resíduo Classe II-B (inertes): após ensaiados não tem concentrações superiores aos padrões estabelecidos e permanecem inertes ao longo do tempo não apresentando variações nem solubilidade.

Há também outras normas técnicas que especificam as condições necessárias para o adequado acondicionamento, transporte e destinação final. O tempo em que os resíduos ficam estocados na indústria é chamado “armazenagem temporária” (SILVA, 2011).

Para minimizar a geração dos resíduos sólidos há algumas diretrizes que podem ser seguidas com intuito de controlar os resíduos gerados nos processos produtivos e unidades de apoio de modo a garantir um gerenciamento adequado, tais como: redução dos resíduos

nas fontes de geração; reuso; reciclagem (interna ou externa); tratamento e destinação final. Ainda para aperfeiçoar as ações de controle a empresa pode implementar alguns programas de manutenção preventiva de equipamentos e ferramentas de padronização e garantia da qualidade dos processos produtivos e produtos acabados, tais ações são importantes na redução das perdas de matéria-prima e insumos necessários ao processo produtivo, bem como reduzem o consumo de água e de produtos químicos usados nas operações de higienização. Promover a segregação dos resíduos e reduzir o consumo de energia, de maneira a diminuir o custo com tratamento e disposição final além de reduzir os impactos ambientais (SILVA, 2011).

c) Emissão atmosférica

De acordo com Pires (2005) os poluentes atmosféricos podem ser classificados como sólidos, líquidos e/ou gasosos, de acordo com seu estado de agregação. Em atenção a Resolução nº 003 de 28 de junho de 1990 do CONAMA (BRASIL, 1990), “entende-se como poluente atmosférico qualquer forma de matéria ou energia com intensidade e em quantidade, concentração, tempo ou características em desacordo com os níveis estabelecidos, e que tornem ou possam tornar o ar”:

I - Impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde;

II - Inconveniente ao bem-estar público;

III - Danoso aos materiais, à fauna e flora.

IV - Prejudicial à segurança ao uso e gozo da propriedade e às atividades normais da comunidade.

As emissões atmosféricas geradas na indústria de laticínios são provenientes da queima dos combustíveis nas caldeiras, podendo ser a óleo ou à lenha, cujo vapor é usado no aquecimento da água para a limpeza e desinfecção de pisos e equipamentos e em etapas do processo produtivo, como a pasteurização do leite e a fabricação de queijos. A combustão do óleo resulta na emissão de poluentes atmosféricos, tais como material particulado, monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrogênio (NO_x), óxidos de enxofre (SO_x) e hidrocarbonetos. A queima da lenha também libera esses mesmos poluentes, além de compostos voláteis como o ácido acético (CH₃COOH), metanol (CH₃OH), acetona (CH₃(CO)CH₃) e acetaldeído (CH₃CHO) (FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS, 1982).

Além desse, existe ainda gases refrigerantes, oriundos de eventuais vazamentos nos tubos de refrigeração, de vapor das tubulações, exaustão de ar quente do evaporador de leite,

esterilização das folhas de alumínio com peróxido de hidrogênio, em máquinas Tetra Park[®], odores, vapores da(s) torre(s) de resfriamento (MAGANHA, 2006).

Dentre as estratégias de controle de emissões de material particulado e óxidos de enxofre das caldeiras, é descrito a utilização de equipamentos de controle de poluentes, sem esquecer-se das medidas de controle indiretas tais como a otimização dos processos de combustão, manutenção adequada dos equipamentos, controle operacional apropriado, bem como do treinamento de operadores (MACHADO *et al.*, 2001).

d) Poluição sonora

Convém lembrar que, ainda como impacto ambiental é descrito o ruído e/ou vibração, que pode trazer incômodo quando a indústria está localizada próxima a centros urbanos. Isto se deve aos ruídos emitidos pelo desenvolvimento das atividades industriais, incluindo equipamentos de refrigeração e tráfego de caminhões, as partes móveis de motores elétricos de bombas, o funcionamento de diversos equipamentos e os mecanismos de transporte de materiais. Tais ruídos e/ou vibrações são passíveis de causar incômodos à população de entorno (MAGANHA, 2006).

Para Tostes (2003), a mitigação de ruídos pode-se intervir na fonte, no meio e no homem, nesta ordem prioritária, quando viável tecnicamente. Assim:

- a) No controle da fonte: medidas técnicas devem ser utilizadas para minimizar a emissão de ruídos dos maquinários e medidas administrativas devem ser empregadas na produção. Dentre as providências tomadas, tem-se como exemplo a redistribuição das operações, a substituição de peças de materiais rígidos por absorventes, a instalação de sistemas amortecedores e a manutenção adequada dos equipamentos;
- b) Para controle do meio: as medidas objetivam impedir a propagação dos ruídos, para isso é necessário, promover isolamento entre a fonte e do receptor. No enclausuramento da fonte, faz-se uso de barreiras, adequação no ambiente e nos materiais utilizados na construção, permitindo assim isolamento acústico destas;
- c) No controle do homem: o último na ordem das prioridades, as principais medidas resumem-se à redução do tempo de exposição e o uso de EPI's (Equipamentos de Proteção Individual), como por exemplo, protetores auditivos, pelos indivíduos.

Para garantir que as atividades e operações das indústrias mantenham os limites de tolerância a Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho, determina os limites para ruído contínuo e intermitente (BRASIL, 2012). Considerando que na indústria de

laticínios estes ruídos são contínuos, o nível máximo permitido é de 85 dB (decibéis) para jornadas de trabalho de 8 horas diárias (BRASIL, 2012).

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sabe-se que o leite em termos nutricionais é considerado um produto completo, no entanto, possui como característica peculiar sua susceptibilidade a alterações químicas, nutricionais, sensoriais e microbiológicas. Fato que o classifica como um produto muito exigente em termos de manipulação e armazenamento, desta maneira, é importante destacar que o controle de qualidade dentro da indústria seja bem eficiente, evitando perdas no processo de produção.

Considerando que o mercado de lácteos a cada dia se mostra mais competitivo, é fundamental que haja um investimento em profissionalização das ações ligadas aos processos produtivos, em busca de sobrevivência. Diante desse cenário, as empresas que buscam uma produção mais eficiente e que se preocupam com as questões ambientais, apresentam uma tendência maior em sobressair no mercado, pois, essas empresas se encaixam nas novas exigências do consumidor.

A indústria deve colocar em prática algumas estratégias de gestão de recursos com intuito de reduzir a geração de efluentes e resíduos e outras perdas do processo. Dentre as estratégias, podem citar algum tipo de mudança dentro da planta industrial como melhorias dos procedimentos operacionais e otimização das operações de limpeza, realização de manutenção preventiva para máquinas, equipamentos e instalações.

De maneira geral, deve-se considerar o uso de soluções tecnológicas como parte de um sistema de gestão e controle ambiental, de modo, aperfeiçoar o processo industrial e promover o treinamento e conscientização dos funcionários.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS - ABIA. **O desenvolvimento do Brasil começa na Indústria da Alimentação**, 2014. Disponível em: https://www.abia.org.br/vsn/tmp_2.aspx?id=23. Acesso em: 21 de set. 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 10.004**. Rio de Janeiro: ABNT, 2004.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 14001**. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.

BADO, C.; PERCIO, J. E; LINDINO, C. A. A Demanda química de oxigênio: questionamentos. **Revista Analytica**, v.62, p.44-51, 2013.

BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA. Resolução nº 001 de 23 de janeiro de 1986. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 17 fev. 1986. Seção 1.

BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA. Resolução nº 003 de 28 de junho de 1990. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 22 ago. 1990. Seção 1 p. 15.937 a 15.939.

BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA. Resolução nº 430, de 13 de maio 2011. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 16 mai. 2011b, Seção 1, p.89.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Decreto nº 9013 de 29 de março de 2017. **Diário Oficial da União**, Brasília, 30 mar. 2017, Seção 1, p.3.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de Defesa Agropecuária. Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Instrução Normativa nº 62 de 29 de dezembro de 2011. **Diário Oficial da União**, Brasília, 30 dez. 2011a, Seção 1. 24f.

BRASIL. Ministério do Trabalho. **Normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho. NR 15** - Atividades e operações Insalubres. São Paulo: Atlas, 69ª edição, 2012.

BRIÃO, V. B. **Processos de separação por membranas para reuso de efluentes de laticínios**. 2007, 94 p. Tese (Doutorado)- Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2007.

CARVALHO, G. R. O retrato do mercado nacional. **Revista Leite & Derivados**, v. 19, n. 118, p. 22-28, 2010a.

CARVALHO, G. R. **A Indústria de laticínios no Brasil: passado, presente e futuro**, 2010b. Disponível em: <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/24349/1/CT-102.pdf>. Acesso em: 10 de out. 2019.

CAVALCANTI, J. E. W. A. **Manual de Tratamento de Efluentes Industriais**. 2 ed. São Paulo: Engenho Editora Técnica Ltda. 2012.

EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – **Gado de Leite - Importância Econômica**, 2016 Página corporativa. Disponível em <http://www.cnpgl.embrapa.br/>. Acesso em: 30 de out. 2019.

FAO. Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. **Produção da Agropecuária**, 2016. Disponível em: <http://faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/home/E>. Acesso em: 22 jan. 2019.

FARIA, V. P. D. **Pensando o Leite**. Rio de Janeiro: FAERJ – Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do Estado do Rio de Janeiro: SEBRAE - RJ, v. I, 2015.

FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS, CETEC-MG. **Produção e Utilização de Carvão Vegetal**. Minas Gerais, Publicação Técnica n.8 – CETEC, 1982.

KOROIVA, T. **Gestão de Resíduos Sólidos**, 2018. Disponível em: <http://simespi.com.br/gestao-de-residuos-solidos/> Acesso em: 31 de janeiro de 2020.

MACHADO, R. M. G.; SILVA, P.C.; FREIRE, V.H. Controle ambiental em indústrias de laticínios. **Brasil Alimentos**, v.7, p.34-36, 2001.

MAGANHA, M. F. B. **Guia técnico ambiental da indústria de produtos lácteos série P+L**. CETESB; São Paulo, 2006.

MENSEN, J. F. R. **Controle Da Qualidade: Análises Físico-Químicas Do Leite E Derivados Em Uma Indústria De Beneficiamento De Leite**. 2015. 81f. Trabalho de Conclusão do Curso (Graduação em Zootecnia) - Universidade Federal do Paraná, 2015.

MILKPOINT. **Conhecimento: uma preciosa ferramenta**, 2016a. Disponível em <https://www.milkpoint.com.br/colunas/cooperideal/conhecimento-uma-preciosa-ferramenta-206012n.aspx>. Acesso: 19 de out. 2019.

MILKPOINT. **Entendendo as análises de composição do leite**, 2016b. Disponível em: <https://www.milkpoint.com.br/artigos/industria/entendendo-as-analises-de-composicao-do-leite-102896n.aspx>. Acesso: 31 de mai. 2020.

MINAS GERAIS. Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM e Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais – CERH-MG. Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG nº 01, de 05 de maio de 2008. **Diário do Executivo Minas Gerais**, Belo Horizonte, 13 mai. 2008.

PARMALAT. **História do leite**, 2016. Disponível em: http://parmalat.pt/index.php?include=content&page=Despre%20noi&module_name=istoria%20laptelui. Acesso em: 06 de nov. 2019.

PIRES, D. O. **Inventário de emissões atmosféricas de fontes estacionárias e sua contribuição para a poluição do ar na região metropolitana do Rio de Janeiro**. 2005. 188 f. Tese (Mestrado) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005.

ROHLFES, A. L. B. *et al.* Indústrias Lácteas: Alternativas de Aproveitamento do Soro de Leite Como Forma de Gestão Ambiental. **Tecno-Lógica**, v.15, n.2, p.79-83, 2011.

SANTANA, N. B. *et al.* Avaliação das condições dos ambientes de trabalho em indústrias de laticínios a partir da investigação das noções de segurança e identificação de riscos ocupacionais. In: ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 24. **Anais...** Florianópolis, SC: ABEPRO, 2004. p. 2547-2553.

SILVA, D. J. P. **Resíduos na Indústria de Laticínios**, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2011. 21p. Disponível em: <https://www2.cead.ufv.br/sgal/files/apoio/saibaMais/saibaMais2.pdf>. Acesso em: 15 de out. 2019.

SILVA, G.; DIAS, A. M. A.; FERREIRA, M. P. B. Processamento de leite. e-Tec Brasil (Curso Técnico em alimentos). Recife: EDUFRPE, 2012. 168 p.

SLACK, N. *et al.* **Gerenciamento de Operações e de Processos**. Porto Alegre: Bookman, 2008.

SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. **Administração da Produção**. 3ª. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 703 p.

TOSTES, M. G. V. **Segurança no Trabalho em Unidades de Alimentação e Nutrição – Treinamentos e Dinâmicas**. 2003, 93f. Monografia (Especialização em Qualidade de Alimentos). Universidade de Brasília, Brasília, 2003.

AVALIAÇÃO DE MATERIAL ESTRANHO EM POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS E COMERCIALIZADAS EM MERCADO PÚBLICO NA CIDADE DE FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL

Maria Verônyca Coelho Melo

Centro Universitário Christus (Unichristus), Fortaleza, CE

<http://lattes.cnpq.br/3825083818114123>

Fernanda de Sá Santos

Centro Universitário Christus (Unichristus), Fortaleza, CE

Vitória Rebouças Cordeiro

Centro Universitário Christus (Unichristus), Fortaleza, CE

Fágner Cavalcante Patrocínio dos Santos

Faculdade de Veterinária, Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, CE

<http://lattes.cnpq.br/1663854190165663>

Isaac Neto Góes da Silva

Faculdade de Veterinária, Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, CE

<http://lattes.cnpq.br/1191488997675957>

Informações sobre o

artigo:

Recebido em:

26/06/2020

Aceite em:

31/07/2020

Data de publicação:

21/09/2020

Palavras-chave:

Insetos

Parasitas

Segurança Alimentar

RESUMO

A comercialização de polpas de frutas congeladas tem apresentado alto índice de crescimento nos últimos anos, principalmente no Nordeste brasileiro, com grande potencial mercadológico devido à variedade de frutas. O objetivo do estudo foi avaliar material estranho presentes em diferentes amostras de polpa de frutas comercializadas em mercado público da cidade de Fortaleza - CE, nos períodos de novembro de 2019 a fevereiro de 2020. Foram avaliadas 120 amostras de polpa de frutas congeladas de diferentes frutas (manga, acerola, goiaba, caju, cajá) sendo 24 de cada sabor. O produto encontrava-se em embalagens fechadas em pacotes semipermeáveis, acondicionadas em ambiente refrigerado. Estabeleceu-se como unidade amostral 100 g de polpa de fruta adquirida de cada estabelecimento dentro do mercado público. As amostras foram coletadas de forma aleatória conforme a disposição do consumidor sendo colhida 30 amostras durante 4 meses. As amostras foram identificadas, codificadas e posteriormente acondicionadas individualmente em recipientes de plástico próprio, e em seguida, armazenadas em bolsa térmica e encaminhadas, para Laboratório Vettings situado dentro da Universidade Estadual do Ceará, para processamento posterior. As amostras foram processadas utilizando-se dois métodos: o de Hoffmann (sedimentação espontânea) para identificação dos parasitos e o de flutuação (Isolamento de sujidades) de quaisquer naturezas. Das 120 amostras foi observado a maior prevalência de Toxocara (55%), Ancylostoma (26%), Ascaris (5%) e Trichuris (5%). As 120 amostras de polpa de frutas também foram avaliadas quanto à presença de sujidades. Dentre as sujidades de maior

ocorrência destaca-se a presença de insetos inteiros identificados em 57,5% das polpas avaliadas, seguido da presença de plásticos e pedras em 23,3% das amostras. Ácaros (8,33%), partes de insetos (10%) e pelos (12,5%). Conclui-se que a presença de estruturas parasitárias e sujidades nas polpas de fruta artesanal comercializadas no mercado central de Fortaleza estão impróprias para o consumo.

EVALUATION OF STRANGE MATERIAL IN FROZEN FRUIT PULPS AND COMMERCIALIZED IN THE PUBLIC MARKET IN THE CITY OF FORTALEZA, CEARÁ, BRAZIL

ABSTRACT

The sale of frozen fruit pulps has shown a high growth rate in recent years, mainly in Northeast of Brazil, with great market potential due to the variety of fruits. The objective of the study was to evaluate foreign material present in different samples of fruit pulp sold in a public market in the city of Fortaleza-CE, in the periods from November 2019 to February 2020. 120 samples of frozen fruit pulp of different fruits were evaluated (mango, acerola, guava, cashew, cajá) with 24 of each flavor. The product was in packaging closed in semipermeable packages, packed in a refrigerated environment. 100 g of fruit pulp acquired from each establishment within the public market was established as a sample unit. The samples were collected at random according to the consumer's disposition and 30 samples were collected during 4 months. The samples were identified, coded and subsequently individually packed in their own plastic containers, and then stored in a thermal bag and sent to Vettings Laboratory located within the State University of Ceará, for further processing. The samples were processed using two methods: Hoffmann's (spontaneous sedimentation) to identify parasites and fluctuation (dirt isolation) of any nature. Of the 120 samples the highest prevalence of *Toxocara* (55%), *Ancylostoma* (26%), *Ascaris* (5%) and *Trichuris* (5%) was observed. The 120 samples of fruit pulp were also evaluated for the presence of dirt. Among the most frequently occurring soils the presence of whole insects identified in 57.5% of the evaluated pulps stands out, followed by the presence of plastics and stones in 23.3% of the samples. Mites (8.33%), insect parts (10%) and hair (12.5%). It is concluded that the presence of parasitic structures and dirt in the pulp of artisanal fruit sold in the central market of Fortaleza are unfit for consumption.

Keywords:

Insects

Parasites

Food Security

1 INTRODUÇÃO

O Brasil tem a maior produção de frutas in natura no mundo, mas, por serem perecíveis, a maioria dessas frutas sofrem deterioração em poucos dias, tendo uma grande dificuldade na sua distribuição, principalmente em grandes distâncias. (MORAIS, 2010, CALDA *et al.*, 2010).

A comercialização de polpas de frutas congeladas tem apresentado alto índice de crescimento nos últimos anos, principalmente no Nordeste brasileiro, com grande potencial mercadológico devido à variedade de frutas e sabores agradáveis. Porém, a sua imensa variedade de sabores não contemplados na legislação, aliado ao desenvolvimento do mercado informal, podem levar à comercialização de produtos sem a legalização e sem controle sanitário devido, pois as unidades fabris se compõem, em sua maioria, de micros produtores, onde suas maiores partes utilizam processos artesanais, sem a devida adequação das técnicas de processamento. (MACHADO, 2009).

Atualmente, as polpas de frutas vêm crescendo consideravelmente no mercado. Sua popularidade no empreendimento está ligada entre outros fatores, pois, através do perfil dos consumidores, os mesmos vêm buscando uma vida mais saudável e de forma que seja mais fácil para preparar e que requeira menor tempo possível, tendo assim, produtos de excelente qualidade e práticos na hora do preparo. (SOUZA *et al.*, 2011).

As polpas de frutas têm grande importância como matéria prima em indústrias de conservas de frutas, que podem produzir as polpas nas épocas de safra, armazená-las e reprocessá-las nos períodos mais propícios, ou de acordo com a demanda do mercado consumidor, como doces, geleias e néctares. Simultaneamente, também são vendidos para outras indústrias que utilizam a polpa de fruta como parte da formulação de iogurtes, biscoitos, bolos, sorvetes, refrescos e alimentos infantis (CALDA *et al.*, 2010; PARIZ, 2011).

Segundo a legislação brasileira do Ministério da Agricultura, polpa é o produto não fermentado, não concentrado ou diluído, obtido pelo esmagamento de frutos polposos, através de um processo tecnológico apropriado, com um teor mínimo de sólidos totais proveniente da parte comestível do fruto (BRASIL, 2000). Além disso, devem ser preparadas com frutas sãs, limpas, isentas de matérias terrosas, de parasitas e detritos de animais ou vegetais, não devendo conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas à sua composição normal, assim como observar as características microscópicas, como ausência de sujeiras, parasitas e larvas.

Uma grande parte da microbiota presente nas frutas reside em sua parte externa, sendo o seu interior praticamente estéril, a menos que haja uma ruptura em alguma parte da

casca. Devido as frutas e seus derivados serem em geral alimentos ácidos, restringe a microbiota deterioradora, especialmente os microrganismos patogênicos. A microbiota normalmente presente constitui-se em bolores, leveduras, bactérias lácticas, parasitos e outros microrganismos ácido tolerantes como bactérias acéticas, *Zymomonas* e algumas espécies de *Bacillus* (SANTOS *et al.*, 2008).

A conservação de polpa de frutas é basicamente determinada por condições que preservem suas qualidades organolépticas (aroma, cor, sabor, consistência etc.), que visa prevenir o desenvolvimento de microrganismos deteriorantes e a ocorrência de reações químicas e enzimáticas indesejáveis (SOUZA *et al.*, 2011).

A microbiota que contamina os produtos de frutas é normalmente proveniente das condições da matéria-prima e da lavagem às quais estas são submetidas, além das condições higiênico-sanitárias dos manipuladores, equipamentos e ambiente industriais em geral.

No nosso país, a carência de dados sobre toxinfecções relacionadas a produtos frescos ainda é enorme e pode ser justificada pela vida curta de prateleira, pela dificuldade de contraprova, pelo grande número de fornecedores diferentes e pela distribuição bastante grande de produtos frescos em um curto espaço de tempo, atrapalhando a rastreabilidade de agentes patogênicos. Apesar de não registradas, essas doenças não devem ser esquecidas (BRUGALLI *et al.*, 2000). No entanto, esta qualidade deve ser criteriosamente avaliada, pois os produtos prontos para consumo podem conter microrganismos patogênicos ou elementos parasitários patogênicos ao homem, podendo transmitir doenças bacterianas ou parasitárias.

A contaminação de alimentos geralmente ocorre através de conteúdo de fezes contendo protozoários e helmintos que são os parasitos mais preocupantes para a saúde pública (SHAHNAZI; JAFARI-SABET, 2010). Nesse contexto, o objetivo do presente trabalho foi avaliar material estranhos presentes em diferentes amostras de polpa de frutas congeladas e comercializadas em mercado público da cidade de Fortaleza, Ceará.

2 METODOLOGIA

Foram avaliadas 120 amostras de polpa de frutas congeladas de diferentes frutas (manga, acerola, goiaba, caju, cajá) sendo 24 de cada sabor. O produto foi adquirido no supermercado público na cidade de Fortaleza Ceará, no período de novembro de 2019 a fevereiro 2020. O produto encontrava-se em embalagens fechadas em pacotes semipermeáveis, acondicionadas em ambiente refrigerado. Estabeleceu-se como unidade

amostral 100g de polpa de fruta adquirida de cada estabelecimento diferentes dentro do mercado público. As amostras foram coletadas de forma aleatória conforme a disposição do consumidor sendo colhida 30 amostras durante 4 mês. As amostras foram identificadas, codificadas e posteriormente acondicionadas individualmente em recipientes de plástico próprio, e em seguida, armazenadas em bolsa térmica e encaminhadas, para Laboratório Vettingns situado dentro da Universidade Estadual do Ceará, para processamento posterior.

A análise e determinação de matérias estranhas presentes nos alimentos pode ser realizada pelo método de observação macroscópica ou por meio de métodos de isolamento para a detecção microscópica. Neste trabalho utilizou-se os métodos de sedimentação espontânea para identificação dos parasitos e o de flutuação, para identificação de sujidades leves (isolamento de sujidades), de acordo com as recomendações de KRAMER e TWIGG (1970, apud FEITOSA *et al.*, 1997) e pelo método de sedimentação espontânea para a identificação das formas parasitarias.

2.1 Descrição do método para identificação de parasitos

Segundo Hoffmann *et al.* (1934) o método de sedimentação espontânea tem como princípio básico a identificação tanto os helmintos como os protozoário. Foram pesadas das 50g de polpas de frutas congeladas. As amostras depois de pesadas foram descongeladas normalmente em recipiente de vidro (baques). A solução foi tamisada, após lavagem com água destilada e transferida para um cálice de Hoffman com capacidade para 250 ml, onde foi deixado em repouso por aproximadamente 2 horas. Findado o período de 2 horas, decantou-se o sobrenadante ficando somente o precipitado. O precipitado foi examinado em triplicata fazendo o uso de microscópio óptico, utilizando objetivas de 10X e 40 X.

2.2 Isolamento das sujidades

Foram pesado 500 g da amostra e transferido para um frasco de Wildman acrescentado água destilada e óleo de rícino. A solução foi agitada durante 2 minutos e adicionou-se água a temperatura de 55-75°C. O frasco foi deixado em repouso por alguns minutos, agitando-o ocasionalmente. As bolhas de óleo da parede do frasco foram retiradas com o auxílio do bastão de agitação. Quando o óleo parou de subir e a fase aquosa ficou bem definida, adicionou-se água quente bem devagar, trazendo o óleo até o gargalo. O agitador foi removido vagarosamente até a camada superior do óleo, depois o frasco foi fechado com tampa própria. A fase oleosa foi transferida para Becker, e a decantação do óleo no becker foi repetida várias vezes para total remoção do mesmo. Descartou-se o conteúdo

do frasco e completou-se cerca de $\frac{3}{4}$ da capacidade do frasco com água quente. Transferiu-se o óleo coletado mais as águas de lavagem para um frasco e separou-se o óleo, como anteriormente indicado num becker. Filtrou-se sob vácuo a amostra coletada no becker, removeu-se o papel de filtro e observou-se através de estereoscópio. Contou-se e identificou-se o material observado (FEITOSA *et al.*, 1997).

As matérias estranhas foram quantificadas e agrupadas nas categorias com: Pedras, insetos inteiros, insetos quebrados (fragmentos) parte do inseto patas, antenas) e ácaros.

2.3 Análise dos dados

Para o presente estudo utilizou-se a estatística descritiva, onde os dados foram armazenados em planilhas Excel, sumarizados e organizados de forma a gerar gráficos que mostram os percentuais de parasitos e sujidades nas 120 amostras.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Das 120 amostras de polpas de frutas comercializadas em Fortaleza - CE foram identificados parasitas conforme a figura 1. Foi observado a maior prevalência de *Toxocara* (55%), *Ancylostoma sp* (26%), *Ascaris sp* (5%) e *Trichuris sp* (5%).

Figura 1. Percentual de parasitas identificados em polpas de frutas comercializadas no município de Fortaleza - CE.

Fonte: Dados da pesquisa

Azevedo *et al.* (2014) relataram um índice de contaminação parasitárias em 72,7% das amostras em trabalho sobre análise parasitológica do caldo de cana e das condições higiênico-sanitárias do seu comércio no centro da cidade de Fortaleza, Ceará, onde se obteve a prevalência 36,4% de *Ascaris* sp., 18,2% de *Trichuris* sp., 18,2% de *Ancylostoma* sp., 9,2% de *Entamoeba* sp., 9,2% de *Enterobius* sp. e 9,2% de *Taenia* sp. O índice de contaminação das amostras do presente estudo - Figura 2 - mostraram um elevado percentual de *Ancylostoma* sp e *Toxocara*, que são parasitos de grande importância para a saúde pública, uma vez que são responsáveis por ancilostomose humana, Larva migrans ocular e Larva migrans visceral. Portanto essa grande prevalência se deve a facilidade de dissipação dos ovos desse parasita e da resistência às condições adversas do ambiente. Esses ovos podem ser carregados pela poeira, aves e insetos (moscas e baratas), chuvas e ventos. Outro parasito que chama muito atenção nos dias atuais é o *Ascaris*, que é um geohelminto muito resistente no meio ambiente e que até hoje traz grande consequência para o homem.

Figura 2. Parasitas identificados em polpas de frutas comercializadas no município de Fortaleza – CE:
1.Cisto de protozoário; 2. Ovo tipo *Ancylostoma* sp; 3. Ovos de *Enterobius vermiculares*; 4. Larva de vida livre e 5. Ovo de *Ascaris* sp

Fonte: Dados da pesquisa

Neves et al (2005) comentam que o *Ascaris* consome grande quantidade de proteínas, carboidratos, lipídios e vitaminas A e C, levando o paciente, principalmente crianças, a subnutrição, eles podem também causar irritação na parede intestinal e podem enovelar-se, levando à obstrução da luz intestinal. Conforme Torres *et al.* (2009) aponta o *Ascaris* como um dos causadores de transtorno para a saúde pública em países em desenvolvimento podendo prejudicar diversos tecidos e Órgãos.

Barbosa *et al.* (2011) realizaram um trabalho sobre detecção de sujidades leves e parasitos em polpas de acerola pasteurizadas e comercializadas em Fortaleza, CE. Os autores investigaram três marcas onde receberam a denominação de polpa “A, B e C”. Segundo os achados a polpa "A" apresentou contaminação por *Tênia sp*, *Entamoeba coli*, *Ascaris sp* e *Oxiúros sp*, todos nos níveis de frequência de 25% de contaminação. A polpa "B" foi evidenciado *Ascaris sp*, ácaros, presença de fibra de algodão que é um indicador de contaminação alimentar e presença de algas proveniente do processamento, ou seja, qualidade da água, com um nível de frequência de 25% também. Já na polpa “C” foi constatado ovo tipo *Strongyloides sp*, Larvas de vida livre e presença de fibra de algodão, nos níveis de frequência de 33% de contaminação por parasitos.

Melo *et al.*, (2016), relatam que as sujidades de ordem alimentar estão incluídas nos grupos de materiais estranhos. Elas são encontradas em todos os produtos alimentícios e variam de acordo com o resíduo disposto e as formas de conservação. Entretanto, é o residual físico, químico ou biológico considerado estranho ao produto original que pode ser capaz de provocar efeitos deterioráveis.

As 120 amostras de polpa de frutas também foram avaliadas quanto à presença de sujidades (Gráfico 1). Dentre as sujidades de maior ocorrência destaca-se a presença de insetos inteiros identificados em 57,5% das polpas avaliadas, seguido da presença de plásticos e pedras em 23,3% das amostras. Ácaros (8,33%), parte de insetos (10%) e pelos (12,5%) foram as sujidades identificadas de menor frequência.

Gráfico 1: Principais sujidades e sua frequência (positivo ou negativo) identificadas em popas de frutas comercializadas em Fortaleza - CE.

Fonte: Dados da pesquisa

A incidência tão significativa dos parasitos patogênicos presentes no gráfico acima se deve a alguns fatores tais como: a grande facilidade com que os parasitos se disseminam e a simplicidade de seu ciclo de vida. Para Norberg *et al.*, (2008) os indicadores de doenças transmitidos pela ingestão de alimentos são resultantes predominantemente do ciclo de contaminação fecal-oral e seu controle tem recebido atenção cada vez maior em todo mundo.

Na presente pesquisa foram visualizados protozoários em 3% das amostras e o método utilizados foi Hoffman (Sedimentação espontânea), mas devido as condições de congelamentos não foi possível diferenciar as formas oocísticas. Os oocistos de protozoários, podem causar problemas como má absorção dos nutrientes, quadros de diarreia e perda de peso nos indivíduos acometidos. No caso de oocisto de *Giardia lamblia* a infecção ocorre pela ingestão de água ou alimentos contaminados. A formação de cisto ocorre quando o parasito transita o cólon, e neste estágio os cistos são encontrados nas fezes (formas infectantes). Já no ambiente as formas podem sobreviver meses na água fria, através de sua espessa camada, ou no solo na forma vegetativa. Os cistos de *Entamoeba histolytica* causa infecção parasitária que acomete o homem, podendo ficar restrita ao intestino, tendo como principal sintoma a diarreia, ou não, causando febre e sintomas diferentes dependendo do órgão “invadido”. Segundo Torres et al (2009) o índice de cistos, mesmo sendo um parasita não patogênico, funciona como uma alerta das condições higiênico-sanitário da população.

Villela (2004) relata que existem várias metodologias para separação e isolamento de materiais estranhos tais como: pedras, galhos, pelos vidros, pedaço de plástico, parasitos, insetos e fragmentos de insetos, e que essas metodologias foram adaptadas, desenvolvidos, combinados e também testados por vários autores o que veio surgir a origem de métodos específicos para análises de variáveis tipos de sujidades. Hoje os métodos mais utilizados e aceitos internacionalmente são aqueles validados e publicados através da Association of Analytical Chemists International (AOAC).

A RDC nº 14, de 28 de março de 2014, aponte matérias estranhas macroscópicas e microscópicas em alimentos e bebidas, seus limites de tolerância. Entretanto os presentes achados estão em desacordo com o artigo 04 da RDC nº 14 (BRASIL, 2014).

Segundo Aragão et al (2018) a citada RDC define que matérias estranhas indicativa de riscos à saúde humana são todos os achados macroscopicamente e/ ou microscopicamente, apropriados ao veículo de agentes patogênicos para os alimentos e/ou de causar danos ao consumidor, envolvendo os insetos pelo hábito de manter contato com fezes contaminadas e lixões, em qualquer fase de seu ciclo evolutivo, vivo ou morto, inteiros ou fragmentos.

Melo et al (2016) em seu trabalho sujidades em queijo coalho artesanal comercializado em Fortaleza, Ceará, observaram a presença de insetos (formigas) em duas amostras de queijo coalho. Aragão et al (2018) relatam a contaminação do doce de leite produzido no setor de laticínios de instituição pública de ensino superior no estado do Ceará, onde obtiveram resultados positivos em 29% das amostras estavam contaminadas com ácaros, 23% tinham fibras, 18% com pelos, 12% apresentavam fragmentos de insetos e 12% continham larva de inseto. No presente estudo observou-se uma quantidade elevada de sujidades nas polpas de frutas congeladas. Acredita-se que a taxa de contaminação do presente trabalho se deva as condições de higienização das polpas e ao prepara, pois se trata de polpas artesanais (Figura 3).

Figura 3. Insetos identificados nas polpas de frutas.

Fonte: Dados da pesquisa

Silva *et al.* (2006) observaram a presença de sujidades como fragmentos de insetos e ácaros jovens e resto de animais em trabalhos realizados. Entretanto os riscos de contaminações dos alimentos dependem do grau de contato com este produto, e uma maneira empregada para se garantir a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos é a realização de programas de educação continuada para os manipuladores de alimentos.

Para Sousa e Carneiro (2008) os padrões de identidade e qualidade de contaminante em alimentos exigem, quanto aos aspectos macroscópicos e microscópicos, que o produto esteja isento de substâncias estranhas de qualquer natureza, tais como: insetos, larvas, semente, talos de vegetais, grãos de areia e outros. Em trabalho realizado por Barbosa *et al.* (2011) averiguaram a presença de sujidade em polpas de acerola e concluíram que há a necessidade de fiscalização mais efetiva nos que diz respeito as Boas Práticas de Fabricação

(BPF) e /ou Análise dos pontos Críticos de Controle (APPCC), para que ocorra o controle de enfermidades e que constituem um problema de saúde pública em nosso Estado. Os autores ainda relatam que as características das frutas estabelecem fatores eficazes no processamento das polpas, as quais devem ser sãs, limpas, isentas de matérias terrosas, de parasitos e de restos de animais ou vegetais. Para Loshie (2007) a ingestão de insetos pode trazer sérios problemas, pois são indicadores de que os estabelecimentos industriais não estão realizando a higienização corretamente. Aragão et al (2018) relatam que alimentos contaminados por ácaros são um problema emergente de segurança dos alimentos, pois a alergia é uma condição que pode resultar em asma, rinite e, em casos mais graves, anafilaxia, que é potencialmente fatal. Nas amostras analisadas observou-se um percentual de 8,33% de ácaros e 10,00% de parte de insetos (Figura 4).

Figura 4. Imagens 1, 2 e 3 Ácaros sp; 4. Pedras; (5-7) parte de insetos e (8-9) fragmentos de insetos.

Fonte: Dados da pesquisa

Nunes (2012) comprovar que as alergias alimentares são respostas fisiológicas do corpo, sendo o sistema imunológico responsável pela identificação de antígenos inofensivos como se estes ocasionassem situações agravantes. Outros achados também foram relevantes para o presente estudo tais como: Pedras, plásticos e pelos.

4 CONCLUSÃO

Conclui-se que a presença de estruturas parasitárias e sujidades nas polpas de fruta artesanal comercializadas no mercado central na cidade de Fortaleza – CE, torna-se necessária a aplicação mais efetiva dos princípios de higiene e segurança alimentar frente aos manipuladores, com a finalidade de prevenir a contaminação por estes agentes evitando danos à saúde do consumidor.

REFERÊNCIAS

ARAGÃO, F.D. de; MELO, M.V.C.; AGUIAR, I. W. de. O.; PERREIRA, T.M.M. **Pesquisa de contaminantes no doce de leite produzido no setor de laticínios de Instituição Pública de Ensino Superior no estado do Ceará**, 2018.

AZEVEDO, A.M.F.; LIMA, L.S.; MELO, M.V.C, RODRIGUES, R.L.; FILHO, N. M.G. Análise parasitológica do caldo de cana e das condições higiênico-sanitárias do seu comércio no centro da cidade de Fortaleza, Ceará. **Nutrivisa – Revista de Nutrição e Vigilância em Saúde**, v.1, n.2, 2014.

BARBOSA, M.M; SILVA, A.P.V; MELO, M.V.C. Detecção de sujidades leves e parasitas em polpas de acerola pasteurizadas comercializadas em Fortaleza, CE. **Revista de Higiene Alimentar**, v.25, n.196/197, p.69- 74, 2011.

BRASIL. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA DO ABASTECIMENTO. Instrução Normativa nº 01/00, de 07/01/00. Regulamento técnico geral para fixação dos padrões de identidade e qualidade para polpa de fruta. **Diário Oficial da República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 10 jan. 2000, Seção I, p.54-58.

Brasil. (2014). **RDC Nº 14, de 28 de março de 2014** - Dispõe sobre matérias estranhas macroscópicas e microscópicas em alimentos e bebidas, seus limites de tolerância e dá outras providências.

BRUGALLI, A.; PINTO, J. M.; TONDO, E. C. **Análises de perigos e pontos críticos de controle para garantir a segurança alimentar em restaurante da Universidade Federal do Rio Grande do Sul**. *Higiene Alimentar*, São Paulo, v.11, n. 72, p. 53-59, 2000.

CALDAS, Z. T C.; ARAÚJO, F.M.C.; MACHADO, A.V.; ALMEIDA, A.K.L.; ALVES, F.M.S.; Investigação de qualidade das polpas de frutas congeladas comercializadas nos estados da Paraíba e Rio Grande do Norte. **Revista Verde** (Mossoró – RN – Brasil) v.5, n.4, p. 156 -163 Outubro /dezembro de 2010.

HOFFMANN, WA; PONS, JA; JANER, JL. The sedimentation concentration method in schistosomiasis mansoni. **Puerto Rico Journal of Public Health Tropical Medicine**, v.9, p.283-291, 1934.

IOSHIE, IT; VIGGIANI, AMFS. Bactérias veiculadas por formigas em ambiente hospitalar. **Arq Med. ABC**. 2007, v.32,n.2, p. 60-63.

MACHADO, A.V. **Estudo da secagem do pedúnculo do caju em sistemas convencional e solar: modelagem e simulação do processo**. Natal 2009. p.126, Tese Doutorado em Engenharia Química, Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

MORAIS, F.A.; ARAÚJO, F. M. M. C.; MACHADO, A.V. Influência da atmosfera modificada sob a vida útil pós-colheita do mamão ‘formosa’. **Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável**, Mossoró - RN, v.5, n°4, p.01-09, (2010).

MELO, MVC; CAVALCANTE, JFM; DO VALE SILVA, GV. **Sujidades em queijo coalho artesanal comercializado em Fortaleza, Ceará**. Julho. 2016.

NEVES, D. P.; MELO, A. L.; LINARDI, P. M. **Parasitologia Humana**. 11. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2005.

NORBERG, A. N.; RIBEIRO, P. C.; GONÇALVES, J.; S. SANCHES, F. G.; SILVEIRA, V. F. C.; OLIVEIRA, M. F.; FERREIRA, G. G. Prevalência de ovos, larvas, cistos e oocistos de elementos parasitários em hortaliças comercializadas no município de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brasil, **Revista Ciência & Tecnologia UNIG**, v. 8, n. 1, p.12-21, 2008.

NUNES, M *et al.* **Alergia Alimentar**. Ministério da Educação e Ciência - Direção-Geral da Educação, Ministério da Saúde - Direção-Geral da Saúde (Ed.), pp. 1-22, 2012

PARIZ, K.L. **Avaliação da qualidade microbiológica de polpas de frutas**. Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso Superior de Tecnologia em Alimentos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – Campus Bento Gonçalves como parte dos requisitos para a conclusão do curso, 40f, 2011.

SANTOS, C.A.A.;1, COELHO, A.F.S.; CARREIRO, S.C. Avaliação Microbiológica de polpa de frutas congeladas. **Ciência e Tecnologia de Alimentos**. Campinas, 2008.

SILVA, S.R.P.; VERDIN, S.E.F.; PEREIRA, D.C.; SCHATKOSKI, A.M.; ROTT M.B.; CORÇÃO, G. Microbiological Quality of Minimally Processed Vegetables Sold in Porto Alegre, Brazil. **Braz J Microbiol** 38: 594-598.2006

SOUSA, R.S.; MELLO, J.G.; CARNEIRO: Pesquisa de sujidades e matérias estranhas em mel de abelhas (*Apis mellifera* L.). **Ciência Tecnologia de Alimentos**, Campinas, 28(1): 32-33, jan.-mar. 2008.

SOUZA, G.C.; G.C.; CARNEIRO, J.G.; OLIVEIRA, H.R.; Qualidade microbiológica de polpas de frutas congeladas produzidas no município de Russas – CE. **Agropecuária científica no semiárido**, v. 7, n. 3 julho/setembro 2011 p. 01 – 05.

SHAHNAZI, M & JAFARI-SABET, M. Prevalence of Parasitic Contamination of Raw Vegetables in Villages of Qazvin Province, Iran. **Foodborne Pathog Dis** v.7, p.1025-1030.2010.

TORRES, C. A.; MELO M. V.C.; SILVA, A. de P.V. Avaliação parasitológica de leite pasteurizado tipo “C” padronizado e leite In Natura, comercializados no Município de Eusébio, CE. **Revista Higiene Alimentar**, v 23, no 118, 2009.

VILLELA, MLR. **Pesquisa de sujidades em farinha de trigo e seus derivados entre 1987 e 2002:** a importância do controle de qualidade na higiene e segurança alimentar, sua influência na Legislação sanitária e promoção da saúde. 2004.

FERMENTAÇÃO NATURAL X FERMENTAÇÃO TRADICIONAL: QUAL A PREFERÊNCIA BRASILEIRA?

Natalia Portes Thiago Pereira

Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), São Paulo, SP

<http://lattes.cnpq.br/2079642334944304>

Andrea Carneiro Guerra Matias

Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), São Paulo, SP

<http://lattes.cnpq.br/9123737158149253>

Paola Biselli Ferreira Scheliga

Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), São Paulo, SP

<http://lattes.cnpq.br/3749202972571219>

Juliana Masami Morimoto

Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), São Paulo, SP

<http://lattes.cnpq.br/5921911630589621>

Desiree Rita Denelle Bernardo

Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), São Paulo, SP

<http://lattes.cnpq.br/7678999533224332>

Informações sobre o

artigo:

Recebido em:

14/08/2020

Aceite em:

17/08/2020

Data de publicação:

21/09/2020

Palavras-chave:

Fermentação natural

Panificação

Análise sensorial

RESUMO

O pão faz parte da alimentação diária em vários países. Entre os métodos de fermentação utilizados para a panificação está o *levain*, técnica de fermentação natural que resulta em pão com intensificação do sabor, aroma e textura da crosta. O objetivo deste estudo foi avaliar a aceitação e a preferência sensorial de pães preparados com *levains* obtidos a partir de uva passa preta e cana-de-açúcar, respectivamente, bem como preparados com fermento comercial. Para tanto, os pães foram submetidos a testes de avaliação sensorial, aceitabilidade e preferência. O pão preparado com fermento comercial apresentou melhor aceitação sensorial estatisticamente significativa quando comparado aos pães fermentados a partir do *levain*. No entanto, os pães preparados com *levain* também foram aceitos sensorialmente com moda 8 para a maioria dos atributos sensoriais. Sugere-se que este resultado esteja relacionado ao fato de o brasileiro ainda não estar familiarizado com pães de fermentação natural.

NATURAL FERMENTATION X COMMERCIAL
FERMENTATION: WHICH IS THE BRAZILIAN PREFERENCE?

ABSTRACT

Bread is part of the everyday diet in several countries worldwide. Among the methods of fermentation used for baking, there is *levain*, a starter developed from the proliferation of free microorganisms which result in bread is intensified flavor, aroma and texture of the crust. The purpose of this study was to assess the acceptance and sensorial preference of breads prepared with black raisin and sugarcane *levains*, respectively, as well as breads

Keywords:**Natural fermentation****Baking****Sensorial analysis**

made with commercial baker's yeast. To do so, the breads were submitted to sensorial assessment, acceptability and preference tests by non-trained tasters. The bread made with commercial baker's yeast presented statistically significant better acceptance. However, the breads made with *levain* were accepted by the panel of tasters with mode 8 for most attributes. This result suggests the Brazilian habit, because Brazilian consumers have not been widely introduced to products made by natural fermentation.

1 INTRODUCTION

Bread is a highly valued food item and is part of the everyday diet in several countries worldwide (SHEASBY, 2009). It basically consists of a mix of flour, yeast and water (ABREU; SPINELLI, 2014).

In the baking process, fermentation, where the dough characteristics are changed, is a crucial part for the quality of the product. In addition to industrial or commercial yeast, the preferment, also known as natural fermentation, is used. An example of preferment is the *levain* (SUAS, 2012). In this preparation, there is natural proliferation of microorganisms that leads to fermentation, giving unique flavor, aroma and texture to the preparation (CANELLA-RAWLS, 2012).

Egypt was considered the largest producer of cereals around 4,000 B.C., having wheat and barley as the foundation of its diet, since they were used to prepare cakes and beer. It was there that this preparation achieved a considerable meaning. It is supposed that fermentation was incorporated to cooking in this region, as well as the invention of the closed oven (CANELLA-RAWLS, 2012).

In the baking process, fermentation, where the dough characteristics are changed, is a crucial part for the quality of the product. In addition to industrial or commercial yeast, a fermentation method highly used in baking is the preferment (SUAS, 2012). Preferment is a general way to address several terms used for identifying a two-step fermentation. One of these terms is *levain*, which in France is made only with wheat flour and water, being more liquid or more consistent depending on the amount of water used. In this preparation, more dough is added as time passes, thus starting the proliferation of microorganisms that cause fermentation and multiply. Yeast and bacteria grow naturally and can grant unique flavor, aroma and texture to the preparation. This type of fermentation gives the dough a more consistent structure, a slightly sour aroma, and great texture resulting from the dough acidity,

which collaborates for the preservation and quality of the product and also reduces the time for preparing the bread (CANELLA-RAWLS, 2012).

According to the 2008-2009 Consumer Expenditure Survey (POF), conducted by IBGE, the total consumption per capita in Brazil, adding bread rolls and whole-wheat bread, is 53.9g/day. Natural fermentation is relatively recent in Brazil, and many sensorial aspects related to its acceptability and production need to be explored. Natural fermentation was first used, by influence from Italians, in the late 19th century, with their breads in round or rolled shapes, thick crust, and slightly acid flavor. However, the technique is not compatible with modern life, because it requires long fermentation periods (ANQUIER, 1996).

Industrialization has brought more practical ways to prepare bread, with the use of baker's yeast, which consists of a concentrate of yeasts (*Saccharomyces cerevisiae*). This yeast is widely used by bakers because it guarantees quick fermentation. However, this baker's yeast cannot emulate the same flavor that breads made by natural fermentation offer, which is easily perceived by the consumers' palate (SHIMURA, 2011).

This study has the purpose of assessing and comparing the acceptance and sensorial preference of breads prepared with different preferments (*levains*) and with commercial baker's yeast (*Saccharomyces cerevisiae*).

2 METHODS

It is a cross-section study, where data was collected at the Experimental Kitchen of the Biological and Health Science Center from the Mackenzie Presbyterian University.

Two *levains* from a total of ten experiments conducted during the baking classes of the Gastronomy Technology course were selected: the black raisin *levain* and the sugarcane *levain*. Breads made with these *levains* presented better sensorial, growth and texture characteristics.

Three yeasts were used in this experiment: baker's (commercial) yeast, black raisin *levain* and sugarcane *levain*.

Concerning the food inputs, lyophilized instant dry baker's yeast (Fleischmann®); refined wheat flour for bread making (Bunge®); processed sugarcane juice purchased at the farmer's market the same day it was used, and black raisins in bulk were used.

The formulation and procedures for preparing the black raising and sugarcane *levains* are displayed on Figure 1.

Figure 1. Detailing of the process for producing black raisin and sugarcane *levains*.

After three days at room temperature, the *levain* went through a “feeding” process until achieving a mature yeast for making bread. In this process, 100g of *levain* were added with 110 g of white wheat flour and 100g of water and maintained at room or cooled temperature. Every day for four weeks, the process was repeated, starting from 100g of the previous day’s mix. For weighing the inputs, a semi-analytical balance was used (brand Toledo, model 9094c/5). Three breads with the following yeasts were prepared, respectively: dry baker’s yeast, black raisin *levain*, and sugarcane *levain*. The formulation of breads is displayed on Table 1.

Table 1. Formulation of breads. Sao Paulo, 2016

Ingredients	Bread with baker' yeast	Bread with black raisin <i>levain</i>	Bread with sugarcane <i>levain</i>	Flour base percentage
Wheat flour	500g	500g	500g	100%
Water	300g	300g	300g	60%
Salt	10g	10g	10g	2%
Baker's yeast	5g	-	-	1%
<i>Levain</i> dough	-	100g	100g	20%

Breads made with the two *levains* and baker’s yeast were submitted to acceptance and ordination sensorial analysis tests, respectively. The panel of tasters was comprised of at least fifty individuals over 18 years of age, not trained, including students and employees of the University. Volunteers who smoked one hour before the test, who had the flu or cold, with aversion to any ingredient in the formulation, as well as people with hypertension, did not participate on the study (DUTCOSKY, 2007). The volunteers were asked to be part of the research through internal call at the campus.

The sample tasting was conducted in an environment that had a tasting area with individual partition. The samples were served in clean, odorless white containers and identified by a code with three random digits so that there was no psychological interference in the assessment. A glass of water was served, and the taster received instructions to drink it between samples. The portions served had approximately 20g.

The acceptance test by 9-point hedonic scale was applied, anchored in scores ranging from “extremely disliked” to “extremely liked” for assessing the attributes of appearance, smell, texture and acidity. For this test, breads made with the *levains* and with baker’s yeast were presented in the monadic method on different days. An ordination test was applied with random presentation of breads made with baker’s yeast, black raisin *levain* and sugarcane *levain* (DUTCOSKY, 2007).

The sensorial analysis files also included collecting data on social-demography, gender, age, level of education, as well as frequency of consuming bread.

The results were tabbed using the Microsoft Office Excel 2013® software and presented through measures of position (average and mode) and measures of dispersion (standard deviation), as well as frequency distribution charts. The statistical analysis was conducted on the software SPSS for Windows 15.0. After the non-normal distribution of samples was verified by the Kolmogorov Smirnov test, the samples were compared by Kruskal-Wallis testing, followed by a two-sided Mann-Whitney test. For assessing the test of preference per ordination, data was analyzed by the Minimum Significant Difference (MSD) of the Sum of Orders for comparison, based on the non-parametric Friedman test, followed by a two-sided analysis by the Wilcoxon test. For all statistic tests, a level of 5% of probability ($p \leq 5\%$) was considered.

The study complied with guidelines from the Resolution 466/12 concerning ethics on research with human beings with CAAE 48483015.7.0000.0084.

3 RESULTS

In total, 232 tasters participated on the study, with average of 22.6 years and standard deviation of 6.7 years of age. Most of them, 75.9%, were females (n=176). Concerning the level of education, 72.4% had college degree (n=168); 25.5% were pursuing a college degree (n=59), and 2.1% did not mention the education level (n=5).

Among the tasters, 77% declared to eat a type of bread on a daily basis or at least three times per week.

The Table 2 presents data from the sensorial acceptance test, where significantly statistic differences were noticed among breads for the attributes of smell ($p=0.000$), flavor ($p=0.000$), acidity ($p=0.000$), texture ($p=0.00$), and global score ($p=0.000$), except for the attribute of appearance ($p=0.119$). However, no statistic difference was noticed between the black raisin (FN- UVA) and sugarcane (FN-Cana) levains.

Table 2. Average and Standard Deviation from hedonic values of samples of bread according to type of fermentation and sensorial attributes for the sensorial acceptance test. São Paulo. 2016.

Sensorial attributes	Samples of bread			Value of p^1
	FB n=67	FN-UVA n=71	FN-Cana n=65	
Appearance	7.8 (1.3)a	7.5 (1.5)a	7.9 (1.9)a	0.119
Smell	8.0 (1.1)a	6.8 (1.7)b	7.2 (1.3)b	0.000
Flavor	8.2 (0.9)a	6.8 (2.1)b	6.6 (1.6)b	0.000
Acidity	7.5 (1.5)a	5.3 (1.3)b	5.4 (2.0)b	0.000
Texture	8.2 (0.8)a	7.5 (1.4)b	8.0 (0.9)b	0.001
Global Score	8.1 (0.8)a	7.1 (1.8)b	7.2 (1.5)b	0.000

¹Kruskal-Wallis test with statistic significance at $p<0.05$. Averages followed by the same letter, on the same line, do not differ among themselves according to Mann-Whitney test at $p<0.05$.

Table 3 presents data from the sensorial ordination analysis test, where it is observed that bread made with baker's yeast was preferred against breads made from natural fermentation.

Table 3. Average of ordination values from the preference test among breads according to type of fermentation and sensorial attributes. São Paulo. 2016.

Sensorial attribute:	Samples of bread			Value of p^1
	FBiol	FN-UVA	FN-Cana	
Appearance	1.61a	2.15b	2.24b	0.000
Smell	1.36a	2.49b	2.15b	0.000
Flavor	1.36a	2.49b	2.15c	0.001
Acidity	2.31a	1.81b	1.81b	0.015
Texture	1.66a	2.44c	1.90b	0.000
Global Score	1.42a	2.42b	2.16b	0.000

¹Friedman test with statistic significance at $p<0.05$. Averages followed by the same letter do not differ among themselves according to Wilcoxon test at $p<0.05$

Appearance is one of the first characteristics to be observed, greatly influencing the product acceptance (APPLEVICZ, 2014). Therefore, this would not be a factor for non-acceptance of naturally fermented breads, since, for these volunteers, they are apparently similar to conventional bread ($p=0.119$).

For the attribute smell, a statistically significant difference was observed between natural fermentation breads and bread made with baker's yeast ($p=0.000$). Despite the bread

made with baker's yeast having presented better acceptance for the attribute smell, it is noticed that the breads made with levain were accepted by the panel of tasters, since the scores concentrated around 7, 8 and 9 ("liked"; "liked very much" and "extremely liked"). Both for the raisin levain bread and for the sugarcane levain bread, the mode (more frequent value) of hedonic values of the attribute smell was 8 ("liked very much"). According to Shimura (2011), a characteristic smell with "a vinegar-like aroma" is attributed to breads made by natural fermentation.

For the sensorial attribute flavor, the scores concentrated around the hedonic values 6 to 9 ("slightly liked"; "liked"; "liked very much" and "extremely liked"), with average of 6.8 and 6.6 for the raisin levain and the sugarcane levain, respectively. However, the mode was 7 (liked) and 8 (liked very much) for the raisin levain and the sugarcane levain, respectively. With this data, it is affirmed that the flavor of natural fermentation breads was accepted. An "acid tang" flavor is attributed to breads with natural fermentation (SHIMURA, 2011).

Acidity is highly related to flavor. However, for the attribute acidity, natural fermentation breads were not accepted by the panel of tasters, with scores 5.4 and 5.6 for the raisin levain bread and the sugarcane levain bread, respectively. The opposite was seen with the bread with baker's yeast, which achieved a score 7.5.

Acidity comes from the type of natural yeast, therefore, the firmer its consistency, more acetic acid is produced, which translates into a more acid flavor (CALVO, 2016).

On the other hand, the tasters were pleased with the texture of breads. Despite the higher acceptance ($p=0.001$) and preference ($p=0.000$) of bread made with baker's yeast, natural fermentation breads achieved scores concentrated on hedonic values 7, 8 and 9, with mode 8 for both breads.

Breads with natural fermentation are characterized by crunchy crust and light, airy inner crumb. Holes are formed while the dough grows, when carbon dioxide is produced through fermentation, generating bubbles. While baking, when the bread grows considerably, these bubbles pop, forming porosity in the bread crumb (ANQUIER, 1996). This porosity is called by some bakers of "airy core" (SHMAEDEL, 2017).

For the attribute general score, the acceptance and preference of bread made with baker's yeast against natural fermentation breads are evident ($p=0.000$ and $p=0.000$, respectively, for acceptability and preference). However, natural fermentation breads were well accepted, with concentration of scores on 7.8 and 9, and mode 8 (liked very much).

Natural fermentation, after being discovered, was used until the 19th century, being replaced by commercial yeast, which started being used with the purpose of accelerating the fermentation process (ANQUIER, 1996). Since then, the habit of consuming natural fermentation breads was lost, making the following generation accustomed with bread made from commercial (baker's) yeast. It is suggested that this context contributes to understand the higher acceptance and preference seen for baker's yeast bread in this study.

However, considering that two different products were used to start the levain dough – black raisins and sugarcane –, it is observed that these sourdough breads do not differ statistically between each other in different circumstances. No difference was observed in the acceptance of the attributes smell, texture, flavor, acidity and general score, nor in the ordination (preference) test for the attributes appearance, odor, acidity and general score for the sourdough produced from black raisin and sugarcane, respectively, regardless of the particular composition of each product (grape, sugarcane), and, consequently, possible different micro biota produced in the maturation of this sourdough. However, no differences were observed from the sensorial standpoint for notable bread characteristics, such as acidity, texture and flavor, when raisins and sugarcane were used.

Within the gastronomy universe, there is a movement for valuing breads made from natural fermentation in Brazil, especially in major cities like Sao Paulo. Bakers in Sao Paulo are adhering to natural fermentation as one of their products offers to consumers. A fact that corroborates this trend is that even a manufacturer of baker's yeast, with a prominent and tradition brand in the baking segment, is offering chilled dough made from natural fermentation. Area professionals notice that this new habit in the Brazilian taste results from trips made to European and North American countries, from where travelers return wanting to eat the breads they tasted abroad, disseminating some cultures.

4 CONCLUSIONS

Breads made from baker's yeast presented higher acceptability and were preferred in relation to breads made by natural fermentation. However, these were sensorially accepted by the panel of tasters. This result suggests the Brazilian habit, because Brazilian consumers have not been widely introduced to products made by natural fermentation. Despite consuming bread being a popular habit, the product that is present and available at the market, as well as the one prepared by families, is the quick fermentation bread, made with commercial baker's yeast. For this reason, the flavor and, consequently, the acidity that are characteristic to breads made from

natural fermentation are unusual to the taste of the people who participated on the study.

REFERENCES

ABREU, E.S; Spinelli, M.G.N. **Seleção e Preparo dos Alimentos: Gastronomia e Nutrição**. 1.ed. São Paulo: Metha Ltda, 2014. 414p.

ANQUIER, O. **Pães de França**. 1.ed. São Paulo: DBA Artes Gráficas e Companhia Melhoramentos de São Paulo, 1996. 142p.

APELVICZ, K. S. **Fermentação Natural em Pães**. 1.ed. Santa Catarina: Instituto Federal de Santa Catarina, 2014. Disponível em: <https://issuu.com/eduardosantos11/docs/livro_fermentacao_baixa> Acesso em: 02 abr. 2017.

BACCAN, N., ALEIXO, L. M., STEIN, E., & GODINHO, O. E. S. (1995). **Introdução à semimicroanálise qualitativa** (6. ed.). Campinas: EduCamp. Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP. (2006).

BRASIL, Ministério da Educação e Cultura. (2010). **Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências (Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010)**. Diário Oficial da República Federativa do Brasil.

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). **Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF)**. Ano 2008-2009. Disponível em: <https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/pesquisas/pesquisa_resultados.php?id_pesquisa=25> Acesso em: 02 abr. 2017

CALVO, P. O Fermento Natural. **Massa Madre**, 27 abr. 2016. Disponível em: <<http://massamadreblogger.com.br/postagem/o-fermento-natural>> Acesso em: 02 abr. 2017.

CANELLA-RAWLS, S. **Pão: Arte e Ciência**. 5.ed. São Paulo: Senac São Paulo, 2012. 348p.

DUTCOSKY, S.D. **Análise sensorial de alimentos**. 2ºed. Champagnat, São Paulo. 2007, 239.

FAZIO, M. L. S. (2006). **Qualidade microbiológica e ocorrência de leveduras em polpas congeladas de frutas** (Dissertação de mestrado). Universidade Estadual Paulista, São José do Rio Preto.

FLANDRIN, J.L; MONTANARI, M. **História da Alimentação**. 7.ed. Estação Liberdade, 1998. 885p.

SHEASBY, N. **Pães: 365 pães deliciosos para todas as ocasiões**. 1.ed. São Paulo: Publifolha, 2009. 240p.

SHIMURA, R. **Fermentos e Fermentação**. *Levain Escola*, 2011. Disponível em <<https://rogerioshimura.wordpress.com/category/fermento-natural-levain/>> Acesso em: 02 abr. 2017.

SCHMAEDEL, M.V. Padarias descoladas que usam fermentação natural: Padarias descoladas investem na maneira tradicional de fazer pão: respeitando o tempo que a massa precisa crescer. **ELLE Brasil**, 04 jan. 2017. Disponível em: <<http://elle.abril.com.br/gastronomia/padarias-descoladas-que-usam-a-fermentacao-natural/>> Acesso em: 02 abr. 2017.

SUAS, M. **Advanced Bread and Pastry**. 1.ed. Cengage Learning. 2012. 442p

SGARBIERI, V. C. (1987). Composição e valor nutritivo do feijão *Phaseolus vulgaris* L. In E. A. Bulisani (Ed.), **Feijão: fatores de produção e qualidade** (cap. 5; p. 257-326). Campinas: Fundação Cargill.

SILLICK, T. J., & SCHUTTE, N. S. (2006). Emotional intelligence and self-esteem mediate between perceived early parental love and adult happiness. **E-Journal of Applied Psychology**, 2(2), 38-48.

SUTOPO, W., NUR BAHAGIA, S., CAKRAVASTIA, A., & ARISAMADHI, T. M. A. (2008). A Buffer stock Model to Stabilizing Price of Commodity under Limited Time of Supply and Continuous Consumption. **In Proceedings of The 9th Asia Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference** (APIEMS), Bali, Indonesia.

TABELA BRASILEIRA DE COMPOSIÇÃO DE ALIMENTOS - TACO (versão 2, 2. ed.). Campinas: UNICAMP/NEPA.

VERSANTVOORT, C. H., OOMEN, A. G., VAN DE KAMP, E., ROMPELBERG, C. J., & SIPS, A. J. (2005). Applicability of an *in vitro* digestion model in assessing the bioaccessibility of mycotoxins from food. **Food and Chemical Toxicology**, 43(1), 31-4

MONITORAMENTO DO RECEBIMENTO DE CARNE BOVINA EM UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DE FORTALEZA-CE

Valdenor Vieira da Silva

Universidade Estadual do Ceará, Centro de Ciências da Saúde, Fortaleza, CE

<http://lattes.cnpq.br/6122221258547489>

<https://orcid.org/0000-0002-9331-7175>

Victor Nobre Vidal

Universidade Estadual do Ceará, Centro de Ciências da Saúde, Fortaleza, CE

<http://lattes.cnpq.br/1108457784854622>

Antônio Lucas Fernandes Leal

Universidade Estadual do Ceará, Centro de Ciências da Saúde, Fortaleza, CE

<http://lattes.cnpq.br/0761713873349568>

Beatriz Paiva Rocha

Universidade Estadual do Ceará, Centro de Ciências da Saúde, Fortaleza, CE

<http://lattes.cnpq.br/6789725031101183>

Denise Losi Rodrigues

Universidade Estadual do Ceará, Centro de Ciências da Saúde, Fortaleza, CE

<http://lattes.cnpq.br/9180252677114902>

Clarice Maria Araújo Chagas Vergara

Universidade Estadual do Ceará, Centro de Ciências da Saúde, Fortaleza, CE

<http://lattes.cnpq.br/4575182715509072>

Informações sobre o

artigo:

Recebido em:

25/08/2020

Aceite em:

26/08/2020

Data de publicação:

21/09/2020

Palavras-chave:

Unidades de
alimentação e nutrição

Legislação sobre
alimentos

Carne Bovina

RESUMO

As Unidades de Alimentação e Nutrição (UANs) se caracterizam como um conjunto de espaços cujo principal objetivo é oferecer uma alimentação segura e adequada, diante disso, o presente trabalho teve como objetivo monitorar o recebimento de carne bovina em uma UAN de Fortaleza - CE, para assim se observar se a mesma atende ou não os critérios e recomendações sanitárias estabelecidas pela legislação. Logo, para tal avaliação contou-se com o auxílio de planilha previamente elaborada contendo as seguintes informações: data, tipo de produto, quantidade, temperaturas do veículo e do alimento (°C), conformidade da análise sensorial do produto, condições higiênico-sanitárias do veículo e do entregador. Como resultado, foi observado que a unidade atende tais critérios e as recomendações da legislação brasileira vigente.

MONITORING OF BEEF RECEIPT IN A FOOD NUTRITION UNIT IN FORTALEZA-CE

ABSTRACT

Keywords:

Food and nutrition
foods units
Legislation food
Meat

The Food and Nutrition Units (UANs) are characterized as a set of spaces whose main objective is to offer safe and adequate food. In view of this, the present study aimed to monitor the receipt of beef in a UAN in Fortaleza-Ce, so that it can be observed whether or not it meets the health criteria and recommendations established by law. Therefore, for this evaluation, a spreadsheet was prepared previously containing the following information: date, type of product, quantity, vehicle and food temperatures (°C), conformity of the sensory analysis of the product, hygienic-sanitary conditions of the product, vehicle and the delivery person. As a result, it was observed that the unit meets these criteria and the recommendations of the current Brazilian legislation.

1 INTRODUÇÃO

As Unidades de Alimentação e Nutrição (UANs) podem ser definidas como um conjunto de espaços, desde unidades de trabalho à órgãos de uma empresa, cujo principal objetivo é oferecer uma alimentação segura e adequada, que garanta ao cliente os nutrientes essenciais para a preservação e recuperação do estado nutricional, proporcionando uma manutenção e melhora na saúde dos indivíduos que recebem este serviço (ABREU; SPINELLI, 2011; POHREN *et al.*, 2015; FONSECA; SANTANA, 2012).

Logo, como forma de garantir tal alimentação segura e adequada, nas UANs são implementados uma série de procedimentos para avaliar os fornecedores de matérias primas e os meios de transportes desses produtos que precisam ser realizados em condições adequadas de higiene e preservação, e tais procedimentos são de fundamental importância a segurança, prevenção, controle e eliminação dos riscos de contaminação alimentar para evitar ocorrências de doenças de origem alimentar (BRASIL, 2004; SILVA JR, 2016).

Dentre os produtos de maior necessidade de controle higiênico por conta de sua perecibilidade, tem-se as carnes, que representam todo o tecido comestível de diferentes animais, sendo elas uma das principais matérias primas que compõem, a elaboração e preparação dos cardápios na UAN (GÓIS, 2012; FEIJÓ, 1999; ABERC, 2015).

Diante de sua importância, a presente pesquisa teve como objetivo descrever e analisar o monitoramento do recebimento de carne bovina em Unidade de Alimentação e

Nutrição (UAN) de Fortaleza–Ceará, para se observar, assim, se a mesma atende ou não os critérios sanitários estabelecidos pela legislação vigente.

2 METODOLOGIA

O estudo foi do tipo descritivo e quantitativo e realizado em uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) de Fortaleza-Ceará durante os meses de agosto e setembro de 2017, totalizando 9 semanas de avaliação. Foram avaliados 11 tipos de cortes de carne bovina e a coleta de dados foi realizada por meio de uma planilha previamente elaborada, que possibilita a visualização de um panorama abrangente sobre as informações gerais dos produtos recebidos e suas condições higiênico-sanitárias. Além disso, a medição e análise das temperaturas da carne bovina e do veículo responsável pelo transporte dos produtos foi realizada no ato do recebimento com o auxílio de termômetros capazes de aferir a temperatura interna dos produtos e a do veículo responsável pela entrega das carnes.

Durante o recebimento, foram avaliadas as condições higiênicas-sanitárias do veículo e entregador responsável, durante todo o período da coleta de dados, os quais contêm as informações obrigatórias das legislações vigentes. Além disso, foi realizada análise sensorial de cada produto entregue na unidade, a partir da verificação da aparência, textura, odor e sabor de cada mercadoria, segundo os padrões descritos no Manual da Associação Brasileira de Empresas de refeições Coletivas (ABERC, 2015) e os requisitos previstos para análise sensorial de carnes descritos por SILVA JR (2016) e pelo Instituto Adolf Lutz (2008).

Após a obtenção dos resultados, foi realizada a análise e tabulação dos mesmos e foram calculados valores médios e desvio padrão e apresentados no formato de tabelas para uma melhor visualização.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O volume de carnes vermelhas recebido na unidade no período do estudo totalizou 6.877 Kg de carnes conforme descrito no Gráfico 1. Após analisar as entregas correspondentes a todos os 11 tipos de cortes de carne bovina observou-se que 100% de todos os itens analisados atenderam aos critérios e as recomendações previstas pelas normas e legislação vigente, para o transporte, entrega e recebimento de produtos perecíveis.

Gráfico 1. Volume recebido de carnes recebidas no período. Fortaleza, 2017

Fonte: Dados da pesquisa

Todos os veículos analisados apresentaram 100% de conformidades, de acordo com os critérios e as recomendações que determina as normas vigentes, para o transporte, entrega e recebimento de produtos perecíveis. Eram confeccionados de material resistente, e de fácil limpeza e que não permite a contaminação das matérias primas transportadas e não causar danos às vias públicas e ao meio ambiente (SÃO PAULO, 2011). Além disso, as condições higiênico-sanitárias do entregador apresentaram 100% de conformidade, durante todo o período. Durante as entregas foram observadas que o entregador estava com o uniforme adequado e limpo, com o uso de avental, sapato fechado, proteção para o cabelo e as mãos (SILVA JR.,2016).

Durante o recebimento em todos os veículos de entrega foi realizada análise sensorial de todas as carnes bovinas que chegavam na UAN, foram observadas as características sensoriais dos produtos que estavam sendo entregues pelos fornecedores como a cor, odor, textura, sabor e aspecto higiênicos-sanitários, que dificilmente pode ser detectado por instrumentos, tanto do ponto de vista microbiológico, como químico. As características sensoriais de todos os produtos analisados apresentaram 100% de conformidade segundo os critérios propostos por SILVA JR (2016) e pelo Instituto Adolfo Lutz (2008).

Todas as carnes do tipo bovina são refrigeradas e a temperatura média dos produtos foi de 1,2°C com desvio padrão de 1,0°C e a temperatura média dos veículos foi de 2,4°C com desvio padrão de 1,1°C e todas apresentaram 100% de conformidade segundo os critérios e as recomendações, que determina as normas vigente para o recebimento de

produtos refrigerados (SÃO PAULO, 2013). Durante a compra e recebimento de quaisquer produtos resfriados em especial as carnes bovinas devemos verificar se as temperaturas e se as embalagens estão íntegras, e se as mesmas têm registros nos serviços de inspeção (Federal, Estadual e Municipal), e se estão todos conformes as recomendações para transporte e recebimento de matérias-primas perecíveis (SILVA JR, 2016).

Diante do alto grau de conformidade, destaca-se a qualidade do trabalho realizado por toda equipe que trabalha na UAN: por ter implantado os procedimentos e padrões de qualidades, que são exigidos pelas as normas e legislação vigente, para o serviço de refeições coletivas.

4 CONCLUSÃO

Diante dos dados apresentados, foi verificado que o estabelecimento atendeu aos critérios e as recomendações da legislação brasileira vigente, para o transporte, entrega e recebimento de produtos perecíveis, todos os itens obtiveram um índice de conformidade de 100% superando as expectativas e atendendo todos os parâmetros exigidos pelas legislações e normas específicas.

Dessa forma, para garantir a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos perecíveis para venda e consumo humano é necessário que esses produtos sejam produzidos, transportados, manipulados e comercializados de acordo com as normas e legislação sanitárias vigentes e acompanhamento contínuo dos profissionais da área de alimentos.

REFERÊNCIAS

ABERC - Associação Brasileira das Empresas de Refeições Coletivas. **Manual ABERC de práticas de elaboração e serviço de refeições para coletividades**. 11. Ed. São Paulo: ABERC, 2015

FEIJÓ, G. L. D. C. **Curso conhecendo a carne que você consome**, 1, 1999. Campo Grande. Qualidade da carne bovina. Campo Grande: Embrapa; 1999.

GÓIS, L. Carnes. *In*: JAPUR, C. C.; VIEIRA, M. N. C. M. **Dietética aplicada na produção de refeições**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.

Instituto Adolf Lutz (São Paulo). **Métodos físico-químicos para análise de alimentos/coordenadores**. Odair Zenebon, Neus Sadocco Pascuet e Paulo Tigleia- São Paulo: Instituto Adolf Lutz, 2008.

POHREN, Noeli Fatima *et al.* Avaliação da estrutura física de uma unidade de alimentação e nutrição. **Revista Univap**, v. 20, n. 36, p. 17-23, 2015.

SÃO PAULO, Secretaria de Saúde. Coordenação dos Institutos de Pesquisa. Centro de Vigilância Sanitária. **Portaria CVS n.5 de 9 de abril de 2013**. Diário Oficial do Estado de São Paulo. 19 abr. 2013.

_____, Secretaria de Saúde. Coordenação dos Institutos de Pesquisa. Centro de Vigilância Sanitária. **Portaria CVS n.4 de 31 de março de 2011**. Diário Oficial do Estado de São Paulo. 31 mar 2011.

SILVA JR, E. A. **Manual de controle higiênico-sanitário em serviços de alimentação**. 7. ed. São Paulo: Varela, 2016.

IMPACTO DA APLICAÇÃO DE ULTRASSOM NOS PARÂMETROS DE QUALIDADE DE SUCOS

Bárbara Morandi Lepaus

Universidade Federal do Espírito Santo, Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde, Vitória, ES

<http://lattes.cnpq.br/4001105223244303>

<https://orcid.org/0000-0002-0074-7943>

Jackline Freitas Brilhante de São José

Universidade Federal do Espírito Santo, Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde, Vitória, ES

<http://lattes.cnpq.br/9686717495086118>

<https://orcid.org/0000-0002-6592-5560>

Informações sobre o

artigo:

Recebido em:

28/08/2020

Aceite em:

31/08/2020

Data de publicação:

21/09/2020

Palavras-chave:

Tecnologia de

alimentos

Qualidade

Conservação

RESUMO

O ultrassom é uma tecnologia emergente estudada como alternativa à pasteurização na conservação de sucos de frutas e hortaliças. A eficiência do ultrassom está associada principalmente à cavitação, que é a formação, crescimento e colapso de bolhas. Este capítulo discute o impacto do tratamento com ultrassom em diversos parâmetros de qualidade de sucos de frutas e hortaliças. O Ultrassom possui potencial para ser aplicado na indústria de processamento de sucos. Contudo, é necessário estudar e ajustar as diferentes condições de operação a fim de obter um produto que atenda às expectativas dos consumidores.

IMPACT OF ULTRASOUND APPLICATION ON QUALITY PARAMETERS OF JUICES

ABSTRACT

Ultrasound is an emerging technology studied as an alternative to pasteurization in the conservation of fruit and vegetable juices. The efficiency of ultrasound is mainly associated with cavitation, which is the formation, growth, and collapse of bubbles. This chapter discusses the impact of ultrasound treatment on various quality parameters of fruit and vegetable juices. Ultrasound has the potential to be applied in the juice processing industry. However, it is necessary to study and adjust the different operating conditions to obtain a product that meets consumer expectations.

Keywords:

Food technology

Quality

Conservation

1 INTRODUÇÃO

A pasteurização é comumente utilizada para garantir a segurança microbiológica dos sucos processados. Entretanto, o calor aplicado pode afetar aspectos sensoriais, conteúdo de compostos bioativos e de nutrientes do alimento (ORDÓÑEZ-SANTOS; MARTÍNEZ-GIRÓN; ARIAS-JARAMILLO, 2017). Por esse motivo, algumas tecnologias, tais como alta pressão, campo elétrico pulsado, irradiação ultravioleta e ultrassom têm sido estudadas como alternativas aos tratamentos térmicos convencionais para a conservação de alimentos. O ultrassom ganhou destaque na indústria de processamento de alimentos e sua eficiência está relacionada principalmente ao fenômeno de cavitação, que consiste na formação, crescimento e colapso de bolhas que geram intenso calor e pressão, além de energia mecânica e química localizada (SUSLICK, 1989; SÃO JOSÉ *et al.*, 2014; OJHA; TIWARI; O'DONNELL, 2018).

O ultrassom é uma tecnologia que se mostrou eficaz na inativação de microrganismos, inclusive patógenos alimentares. A aplicação associada com temperatura (termossonicação) permite maior eficiência na ação antimicrobiana e manutenção da qualidade físico-química e sensorial de sucos tratados (GUERROUJ *et al.*, 2016; POKHREL *et al.*, 2017). Além disso, a aplicação desta tecnologia pode incrementar a homogeneidade, viscosidade e turbidez do produto (AADIL *et al.*, 2013; ERTUGAY; BAŞLAR, 2014; ROJAS *et al.*, 2016; CAMPOLI *et al.*, 2018; OJHA; TIWARI; O'DONNELL, 2018; CHEN *et al.*, 2019).

Com base em todo o exposto, este capítulo irá discutir o impacto do tratamento com ultrassom nos parâmetros de qualidade de sucos de frutas e hortaliças.

2 TECNOLOGIA DO ULTRASSOM

O ultrassom é uma tecnologia emergente que visa contribuir na indústria e processamento de alimentos. Trata-se de um equipamento baseado na geração e emissão de ondas ultrassônicas de alta intensidade, em frequência maior que 16 kHz, que são imperceptíveis pela audição humana (SUSLICK, 1989). O ultrassom pode ser classificado em baixa potência, que equivale a 100 kHz ou mais e alta potência, que varia de 20 a 100 kHz (SANGO *et al.*, 2014).

Esta tecnologia despertou o interesse da indústria de alimentos (VALDRAMIDIS; KOUTSOUMANIS, 2016) e sua eficiência está associada principalmente ao processo de

cavitação, que consiste na formação, crescimento e colapso de bolhas (SUSLICK, 1989). As ondas ultrassônicas emitidas pelo equipamento induzem a formação de zonas de compressão e expansão. O ciclo de compressão afasta as moléculas umas das outras devido à pressão positiva que é exercida no meio. Entretanto, elas são novamente atraídas para perto quando o ciclo de expansão exerce uma pressão negativa.

A alternância entre os ciclos no meio líquido favorece a formação de bolhas, devido à constante mudança de pressão exercida no sistema (KENTISH, 2017). Durante o ciclo de expansão a área superficial da bolha aumenta e o gás é difundido para o seu interior. O constante processo causa o crescimento e colapso da bolha, pois em determinado momento a pressão no interior será maior que a exercida pelo meio externo (KENTISH, 2017). De forma geral, os fenômenos ocasionados pelo ultrassom incluem, além da cavitação, agitação, pressão, ondas de choque, forças de cisalhamento, micro jatos, compressão, refração, transmissão acústica e formação de radicais livres (H^+ e OH^-) (OJHA; TIWARI; O'DONNELL, 2018), que são difundidos para o interior das bolhas e liberados no momento em que ocorre o colapso (ŠIMUNEK *et al.*, 2013; JAMBRAK *et al.*, 2017).

2.1 Tipos de ultrassom e a combinação com outras tecnologias

Existem diversos tipos de sistemas de ultrassom que podem ser empregados em alimentos (OJHA; TIWARI; O'DONNELL, 2018). Os estudos que avaliam a eficácia do tratamento na conservação de sucos utilizam basicamente dois tipos de equipamento, o de sonda ou de banho. O princípio da operação é o mesmo, o que difere é o modo como as ondas ultrassônicas são emitidas (Figura 1).

O ultrassom pode ser combinado com outras tecnologias como agentes antimicrobianos, ozônio, radiação ultravioleta (SANGO *et al.*, 2014), pressão (manossonicação), calor (termossonicação) e a associação entre pressão e calor (manotermossonicação) (SANGO *et al.*, 2014; OJHA; TIWARI; O'DONNELL, 2018). Algumas vantagens ao utilizar o ultrassom em produtos líquidos incluem as perdas mínimas de sabor e odor, aumento da homogeneidade, além da redução do consumo de energia (VALDRAMIDIS; KOUTSOUMANIS, 2016).

Figura 1. Esquema representando os tipos de equipamentos utilizados no processamento de sucos: A) Ultrassom de Banho e B) Ultrassom de Sonda.

Fonte: Próprio autor.

2.2 Inativação microbiológica em sucos pelo tratamento com ultrassom

Não está totalmente esclarecido na literatura o mecanismo de dano pelo qual o ultrassom afeta os microrganismos, porém sabe-se que a combinação entre os fenômenos físicos e químicos contribuem para o enfraquecimento ou destruição da parede celular (SWAMY; MUTHUKUMARAPPAN; ASOKAPANDIAN, 2018).

Na Figura 2 é apresentada de forma resumida a combinação entre os fenômenos que ocorrem durante a cavitação. Estes processos proporcionam a liberação de energia mecânica e química (SÃO JOSÉ *et al.*, 2014). Esses fenômenos afetam os microrganismos e provocam morte a partir da ruptura da membrana celular, calor localizado e liberação de radicais livres.

Figura 2. Resumo entre fenômenos físicos e químicos durante a aplicação do ultrassom, que resultam na inativação dos microrganismos.

Fonte: Próprio autor.

Alguns estudos verificaram que o ultrassom sozinho não foi capaz de reduzir significativamente a carga microbiológica de suco de maçã (ABID *et al.*, 2014; TREMARIN; BRANDÃO; SILVA, 2017) e morango (BHAT; GOH, 2017), mesmo após 30 minutos de tratamento. Por outro lado, a termossonicação demonstrou incrementar a ação antimicrobiana em sucos, conforme Tabela 1.

Os resultados após o tratamento com o ultrassom dependem, além do tipo de microrganismos, de diversos fatores. As condições de operação (tempo, temperatura e amplitude das ondas ultrassônicas) poderão interferir nos resultados. Fatores como o volume e composição do alimento tratado também podem interferir na eficiência da operação (JAMBRAK *et al.*, 2018).

A exposição do suco a temperaturas maiores que 50 °C provoca o enfraquecimento da membrana celular e consequentemente a morte dos microrganismos (POKHREL *et al.*, 2017). Contudo diferentes microrganismos podem ser mais ou menos resistentes a essas condições. Características como tipo, forma, diâmetro e estruturas celulares também poderão afetar no desempenho do processo.

De forma geral, células bacterianas em forma vegetativa parecem ser menos resistentes ao processo de cavitação quando comparadas com esporos bacterianos e fungos (BHAT; GOH, 2017; JAMBRAK *et al.*, 2018).

Tabela 1. Efeito de diferentes tratamentos com ultrassom sob microrganismos em sucos de frutas e hortaliças.

Matéria prima	Tipo de US	Condições de operação	Microrganismos	Referência
Laranja	Banho	24 kHz < 46°C 1, 10, 20, 30 min	Bactérias aeróbicas totais Fungos e leveduras <i>Aspergillus ochraceus</i> 318 <i>Penicillium expansum</i> 565 <i>Rhodotorula</i> sp. 74 <i>Saccharomyces cerevisiae</i> 5 <i>Alicyclobacillus acidoterrestris</i> DSM 3922	Guerrouj <i>et al.</i> (2016)
Maçã, <i>blueberry</i> e <i>cranberry</i>	Sonda	20 kHz 20, 40, 60°C 3, 6, 9 min		Jambrak <i>et al.</i> (2017)
Cenoura	Sonda	24 kHz 50, 54, 58°C 0 a 10 min	<i>Escherichia coli</i> (ATCC 11755)	Pokhrel <i>et al.</i> (2017)
Maçã	Banho	35 kHz 70, 80, 85, 90, 95 C 0 a 90 min	<i>Alicyclobacillus acidoterrestris</i>	Tremarin <i>et al.</i> (2019)

US: Ultrassom. kHz: frequência.

2.3 Impacto do ultrassom nas propriedades físico-químicas, nutricionais e compostos bioativos de sucos

A tecnologia do ultrassom também é estudada com intuito de minimizar os prejuízos causados pela pasteurização nas propriedades físico-químicas, nutricionais e nos compostos bioativos de sucos (OJHA; TIWARI; O'DONNELL, 2018). Alguns autores avaliaram o impacto do ultrassom nessas propriedades (Tabela 2).

O aumento na disponibilidade dos compostos bioativos observado em alguns estudos é atribuído principalmente à liberação do conteúdo intracelular após ruptura pelo processo de cavitação (GUERROUJ *et al.*, 2016; CAMPOLI *et al.*, 2018). A adição de grupos hidroxila, formados pelo processo, ao anel aromático dos compostos fenólicos também contribuem para o incremento (AADIL *et al.*, 2013).

Tabela 2. Impacto do tratamento com ultrassom sob as propriedades físico-químicas, nutricionais e compostos bioativos de sucos.

Matéria prima	Tipo de US	Condições de operação	Principais resultados	Referência
Maçã	Banho	25 kHz 20, 40, 60°C 30 min	Manutenção do pH, ATT e SST; Em geral, redução do ácido ascórbico, fenólicos e flavonóis.	Abid <i>et al.</i> (2014)
	Sonda	20 kHz 20, 40, 60°C 5, 10 min		
Tomate de capucho	Banho	42 kHz 30°C 10, 20, 40 min	Manutenção do pH, ATT e SST; ↓ ácido ascórbico; ↑ compostos fenólicos e outros compostos bioativos.	Ordóñez-Santos, Martínez-Girón, Arias-Jaramillo (2017)
Cenoura	Sonda	24 kHz 50, 54, 58°C 0 a 10 min	Manutenção pH, SST, ATT, compostos fenólicos, ácido ascórbico e carotenoides.	Pokhrel <i>et al.</i> (2017)
Cenoura	Sonda	20 kHz TNI 2, 4, 6, 8, 10 min	Manutenção do pH e SST; ↓ dos carotenoides.	Chen <i>et al.</i> (2019)

US: Ultrassom. kHz: frequência. TNI: Temperatura Não Informada. ATT: Acidez Total Titulável. SST: Sólidos Solúveis Totais.

Além disso, tratamentos térmicos causam a decomposição da celulose presente na parede vegetal, que pode favorecer a liberação de compostos (SHARMA *et al.*, 2012). Entretanto, a exposição por longos períodos e a ruptura da parede celular vegetal pode favorecer diversas reações de oxidação, reduzindo alguns nutrientes, compostos e comprometer parâmetros como a coloração da amostra. A associação entre a atividade antioxidante em função do decréscimo ou incremento de compostos fenólicos foi observada

(WANG *et al.*, 2019). Os compostos fenólicos e as vitaminas são os principais responsáveis pela capacidade antioxidante em sucos de frutas e hortaliças (AADIL *et al.*, 2013). Portanto, é esperado que a redução ou incremento nesses compostos alterem a atividade antioxidante da amostra.

2.4 Impacto do ultrassom na cor instrumental de sucos

A cor do produto é um importante parâmetro de qualidade no momento da escolha de sucos. Tratamentos de conservação devem manter ou incrementar as coordenadas cromáticas (L^* , a^* , b^* , c^* , h°). Alguns estudos observaram bons resultados em sucos tratados com ultrassom (Tabela 3).

Tabela 3. Impacto do tratamento com ultrassom nas coordenadas cromáticas de sucos.

Matéria prima	Tipo de US	Condições de operação	Principais resultados	Referência
Pêssego	Banho	20 kHz 22 ± 3°C 3, 6, 10 e 15 min	Incremento de L^* Manutenção de a^* e b^*	Rojas <i>et al.</i> (2016)
Tomate-capucho	Banho	42 kHz 30°C 10, 20, 40 min	Manutenção L^* Redução c^*	Ordóñez-santos, Martínez-girón e Arias-jaramillo (2017)
Cenoura	Sonda	24 kHz 50, 54, 58°C 0 a 10 min	Manutenção de L^* , a^* e b^*	Pokhrel <i>et al.</i> (2017)
Goiaba	Banho	20 kHz 25°C 3, 6, 9 min	Redução do L^*	Campoli <i>et al.</i> (2018)
Morango	Sonda	20 kHz TNI 4, 8, 12, 16 min	Manutenção do L^* Redução do h° , c^*	Wang <i>et al.</i> (2019)

US: Ultrassom. kHz: frequência. TNI: Temperatura Não Informada. L^* : luminosidade; a^* : *redness*; b^* : *yellowness*; c^* : cromaticidade; h° : ângulo de tonalidade

A redução nos valores da tonalidade (h°) após o tratamento com ultrassom gera aumento na intensidade da cor dos sucos e representa aumento do rubor da amostra (coloração avermelhada). Segundo Ordóñez-Santos, Martínez-Girón e Arias-Jaramillo (2017), esse comportamento ocorre devido a formação de hidroxilas que favorecem a intensidade da coloração que varia desde o amarelo ao vermelho, a partir da hidroxilação do anel aromático de fenóis.

2.5 Impacto do ultrassom na microscopia e características reológicas de sucos

Alguns estudos avaliaram o impacto do tratamento com ultrassom em diferentes tempos e temperaturas nas estruturas microscópicas e reológicas de sucos de frutas (Tabela 4).

Tabela 4. Impacto do tratamento com ultrassom na microscopia e características reológicas de sucos.

Amostra	Tipo de US	Condições de operação	Principais resultados	Referência
Toranja	Banho	28 kHz 20°C 30, 60, 90 min	Incremento da turbidez	Aadil <i>et al.</i> (2013)
Maçã	Sonda	24 kHz 40, 50 e 60°C 5, 10 min	US 50 e 60 °C demonstraram partículas menores em relação à amostra não tratada. US retardou o processo de sedimentação. Incremento da turbidez.	Ertugay e Başlar (2014)
Pêssego	Banho	20 kHz 22 ± 3°C 3, 6, 10, 15 min	Aumento do tempo de exposição promoveu maior o dano e ruptura na estrutura celular, além de redução no tamanho das partículas. Incremento na turbidez na amostra tratada por 6 minutos. A sedimentação também foi retardada.	Rojas <i>et al.</i> (2016)
Morango	Sonda	20 kHz TNI 4, 8, 12, 16 min	Aumento do tempo de exposição promoveu maior o dano e ruptura na estrutura celular.	Wang <i>et al.</i> (2019)
Goiaba	Banho	20 kHz 25°C 3, 6, 9 min	Ruptura celular e extravasamento do conteúdo de compostos para o soro após 6 e 9 minutos de tratamento. US retardou o processo de sedimentação e incrementou a turbidez.	Campoli <i>et al.</i> (2018)
Cenoura	Sonda	20 kHz TNI 2, 4, 6, 8, 10 min	Aumento da turbidez e viscosidade.	Chen <i>et al.</i> (2019)

US: Ultrassom. kHz: frequência. TNI: Temperatura Não Informada.

Sucos de frutas e hortaliças são compostos pela polpa e pelo soro. A polpa contém fragmentos de células e tecidos vegetais, que ficam dispersas no soro. O soro é constituído por água e componentes solúveis intracelulares tais como açúcares, ácidos e minerais (CAMPOLI *et al.*, 2018).

De forma geral, o aumento do tempo e da temperatura de tratamento promove alterações nas estruturas celulares, tais como redução dos aglomerados de partículas, tornando-as menos densas e mais dispersas no soro, e alteração na integridade da parede

celular, com consequente extravasamento do conteúdo intracelular, aumentando a disponibilidade e acesso dos nutrientes (Figura 3).

Figura 3. Imagens da Microscopia óptica de suco de goiaba tratado com diferentes condições de tempo. As setas indicam os cloroplastos dentro das células na amostra controle (sem tratamento). US: Ultrassom.

Fonte: Adaptado de Campoli *et al.* (2018).

Os resultados dos estudos sugerem que o ultrassom é capaz de promover mudanças na estrutura celular, tamanho das partículas e extravasamento do conteúdo intracelular. Os fenômenos que ocorrem durante o tratamento do ultrassom causam a laceração e perda de tecido celular, causando mudanças estruturais nas moléculas. Essa capacidade pode favorecer a saída dos compostos intracelulares para o exterior das células (CAMPOLI *et al.*, 2018), além de estarem diretamente relacionados com os parâmetros reológicos dos sucos de frutas, tais como o processo de sedimentação, a turbidez e a homogeneidade e viscosidade de sucos.

De fato, a redução do tamanho e peso molecular das partículas em suspensão, devido à pressão exercida pela cavitação, demonstrou ser capaz de retardar o processo de sedimentação e aumentar a homogeneidade de produtos, tais como sucos e purês (Tabela 4).

A Lei de Stokes sugere que a velocidade de sedimentação se relaciona com o diâmetro e densidade das partículas. Conforme Figura 4, partículas maiores depositam-se mais rapidamente, ao passo que as menores tendem a retardar a sedimentação (KUBO; AUGUSTO; CRISTIANINI, 2013).

Figura 4. Imagem representando a Lei de Stokes, no qual observa-se A) amostra com partículas grandes e densas e B) amostras com partículas menores e menos densas.

Fonte: Próprio autor.

A velocidade e o tempo de sedimentação de amostras tratadas com ultrassom variam de acordo com a natureza da matéria prima, pois a parede celular vegetal pode ser mais ou menos resistente ao rompimento das estruturas (KUBO; AUGUSTO; CRISTIANINI, 2013; CAMPOLI *et al.*, 2018). Por esse motivo, diferentes tendências na sedimentação de sucos são observadas, pois se relacionam com as amostras que são utilizadas no preparo.

Quanto à turbidez dos sucos tratados com ultrassom, ela é um parâmetro de qualidade desejável em sucos de frutas e hortaliças, pois está diretamente ligada com a homogeneidade e consistência do produto, além de melhorar a cor e aroma do produto devido à presença de partículas de celulose, hemicelulose e pectina (AADIL *et al.*, 2013). A associação entre os efeitos químicos e físicos do ultrassom, além do calor aplicado durante o tratamento, pode favorecer o aumento da turbidez. Esse aumento é atribuído à cavitação, pois a pressão exercida durante o colapso promove a quebra de partículas em estruturas menores, aumentando, conseqüentemente, o número de partículas em suspensão no meio (AADIL *et al.*, 2013; CAMPOLI *et al.*, 2018).

2.5 Ultrassom e aceitação sensorial

É importante conhecer os possíveis efeitos de novos tratamentos nas características sensoriais de sucos (odor, sabor, textura e aparência), para que sejam compatíveis com o desejado pelo consumidor. Sucos tratados com o ultrassom apresentaram boa aceitação em análises sensoriais com preservação dos atributos analisados (Tabela 5).

Tabela 5. Impacto do tratamento com ultrassom em aspectos sensoriais de sucos.

Amostra	Tipo de US	Condições de operação	Principais resultados	Referência
Amora	Sonda	20 kHz 25 ± 2°C 0 a 20 min	Amostras tratadas por mais de 8 min foram avaliadas de forma negativa quanto ao sabor, descrito como “sabor cozido”.	Wong, Vaillant e Pérez (2010)
Maçã	Sonda	20 kHz 20, 40, 60°C 3, 6, 9 min	Avaliação similar entre amostras tratadas com US e a pasteurizada para os atributos sabor, aroma, odor e cor, mesmo após 9 minutos de tratamento.	Šimuněk <i>et al.</i> (2013)
Maçã	Sonda	24 kHz 40, 50 e 60°C 5 e 10 min	Amostras tratadas com US foram avaliadas de forma positiva quanto aos parâmetros cor e aparência, odor, sabor e turbidez.	Ertugay e Başlar (2014)
Morango	Banho	40 kHz 20 ± 1°C 10 e 30 min	Boa aceitação sensorial mesmo após 30 minutos de tratamento.	Tomadoni <i>et al.</i> (2017)

US: Ultrassom. kHz: frequência.

Entretanto, o contato com ultrassom por longos períodos pode proporcionar a formação ou intensificação de compostos aromáticos, devido à pressão causada pela cavitação no meio, e favorecer a formação de sabores indesejáveis (WONG; VAILLANT; PÉREZ, 2010; ŠIMUNEK *et al.*, 2013). Há evidências na literatura que demonstram a alteração do perfil aromático em sucos e néctares de maçã (ŠIMUNEK *et al.*, 2013) e de *cranberries* (JAMBRAK *et al.*, 2017) após o tratamento com ultrassom devido à formação de novos compostos ou ao desaparecimento dos que estavam presentes nas amostras. A degradação de compostos aromáticos é possivelmente ocasionada pelas condições físicas extremas dentro das bolhas durante a cavitação, além de diversas reações que ocorrem ao mesmo tempo ou isoladamente. Reações tais como a formação de radicais livres e aumento de reações de polimerização ou despolimerização podem ser responsáveis pelas mudanças nos aromas observados (JAMBRAK *et al.*, 2017).

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ultrassom é uma tecnologia que possui potencial para ser aplicado no processamento de sucos de frutas. Diferentes tendências são observadas nos estudos, pois estão relacionadas com as condições de operação, tais como frequência, intensidade, tempo, temperatura, volume e amostra tratados. Cada alimento possui suas características e essas podem ser afetadas de forma positiva ou negativa após o tratamento com ultrassom, por isso é necessário avaliar diferentes condições de tempo, temperatura e amplitude para obter produtos bem aceitos pelos consumidores.

REFERÊNCIAS

- AADIL, R. M. *et al.* Effects of ultrasound treatments on quality of grapefruit juice. **Food Chemistry**, v. 141, n. 3, p. 3201-3206, 2013.
- ABID, M. *et al.* Thermosonication as a potential quality enhancement technique of apple juice. **Ultrasonics Sonochemistry**, v. 21, n. 3, p. 984-990, 2014.
- BHAT, R.; GOH, K. M. Sonication treatment convalesce the overall quality of hand-pressed strawberry juice. **Food Chemistry**, v. 215, p. 470-476, 2017.
- CAMPOLI, S. S. *et al.* Ultrasound processing of guava juice: Effect on structure, physical properties and lycopene in vitro accessibility. **Food Chemistry**, v. 268, p. 594-601, 2018.
- CHEN, L. *et al.* The effect of high-power ultrasound on the quality of carrot juice. **Food Science and Technology International**, p. 1082013219825736, 2019.

ERTUGAY, M. F.; BAŞLAR, M. The effect of ultrasonic treatments on cloudy quality-related quality parameters in apple juice. **Innovative Food Science & Emerging Technologies**, v. 26, p. 226-231, 2014.

GUERROUJ, K. *et al.* Sonication at mild temperatures enhances bioactive compounds and microbiological quality of orange juice. **Food and Bioproducts Processing**, v. 99, p. 20-28, 2016.

JAMBRAK, A. R. *et al.* Aromatic profile and sensory characterization of ultrasound treated cranberry juice and nectar. **Ultrasonics Sonochemistry**, v. 38, p. 783-793, 2017.

JAMBRAK, A. R. *et al.* Influence of high power ultrasound on selected moulds, yeasts and *Alicyclobacillus acidoterrestris* in apple, cranberry and blueberry juice and nectar. **Ultrasonics**, v. 83, p. 3-17, 2018.

KENTISH, S. E. Engineering Principles of Ultrasound Technology. **Ultrasound: Advances for Food Processing and Preservation**, 1–13. 2017.

KUBO, M. T. K.; AUGUSTO, P. E. D; CRISTIANINI, M. Effect of high pressure homogenization (HPH) on the physical stability of tomato juice. **Food Research International**, v. 51, n. 1, p. 170-179, 2013.

OJHA, K. S.; TIWARI, B. K.; O'DONNELL, C. P. Effect of Ultrasound Technology on Food and Nutritional Quality. In: **Advances in Food and Nutrition Research**. Academic Press, 2018. p. 207-240.

ORDÓÑEZ-SANTOS, L. E.; MARTÍNEZ-GIRÓN, J.; ARIAS-JARAMILLO, M. E. Effect of ultrasound treatment on visual color, vitamin C, total phenols, and carotenoids content in Cape gooseberry juice. **Food Chemistry**, v. 233, p. 96-100, 2017.

POKHREL, P. R. *et al.* Combined Effect of Ultrasound and Mild Temperatures on the Inactivation of *E. coli* in Fresh Carrot Juice and Changes on its Physicochemical Characteristics. **Journal of Food Science**, v. 82, n. 10, p. 2343-2350, 2017.

ROJAS, M. L. *et al.* Peach juice processed by the ultrasound technology: Changes in its microstructure improve its physical properties and stability. **Food Research International**, v.82, n.1, p.22-33, 2016.

SANGO, M. D. *et al.* Assisted ultrasound applications for the production of safe foods. **Journal of Applied Microbiology**, v. 116, n. 5, p. 1067-1083, 2014.

SÃO JOSÉ, J. F. B. *et al.* Decontamination by ultrasound application in fresh fruits and vegetables. **Food Control**, v. 45, p. 36-50, 2014.

SHARMA, K. D. *et al.* Chemical composition, functional properties and processing of carrot—a review. **Journal of Food Science and Technology**, v. 49, n. 1, p. 22-32, 2012.

ŠIMUNEK, M. *et al.* Aroma profile and sensory properties of ultrasound-treated apple juice and nectar. **Food Technology and Biotechnology**, v. 51, n. 1, p. 101-111, 2013.

SUSLICK, K. S. The chemical effects of ultrasound. **Scientific American**, v. 260, n. 2, p. 80-87, 1989.

SWAMY, G. J., MUTHUKUMARAPPAN, K., ASOKAPANDIAN, S. Ultrasound for Fruit Juice Preservation. **Fruit Juices**, 451–462. 2018.

TOMADONI, B. *et al.* Effect of ultrasound and storage time on quality attributes of strawberry juice. **Journal of Food Process Engineering**, v. 40, n. 5, p. e12533, 2017.

TREMARIN, A. *et al.* Modelling *Alicyclobacillus acidoterrestris* inactivation in apple juice using thermosonication treatments. **LWT-Food Science and Technology**, v. 102, p. 159-163, 2019.

TREMARIN, A.; BRANDÃO, T. R. S.; SILVA, C. L. M. Application of ultraviolet radiation and ultrasound treatments for *Alicyclobacillus acidoterrestris* spores inactivation in apple juice. **LWT-Food Science and Technology**, v. 78, p. 138-142, 2017.

VALDRAMIDIS, V. P.; KOUTSOUMANIS, K. P. Challenges and perspectives of advanced technologies in processing, distribution and storage for improving food safety. **Current Opinion in Food Science**, v. 12, p. 63-69, 2016.

WANG, J. *et al.* Influence of high-intensity ultrasound on bioactive compounds of strawberry juice: Profiles of ascorbic acid, phenolics, antioxidant activity and microstructure. **Food Control**, v. 96, p. 128-136, 2019.

WONG, E.; VAILLANT, F.; PÉREZ, A. Osmosonication of blackberry juice: impact on selected pathogens, spoilage microorganisms, and main quality parameters. **Journal of Food Science**, v. 75, n. 7, p. M468-M474, 201

AVALIAÇÃO MACROSCÓPICA E MICROSCÓPICA DE RINS BOVINOS DE MATADOUROS NO ESTADO DE ALAGOAS

Annelise Castanha Barreto Tenório Nunes

Universidade Federal de Alagoas, Medicina Veterinária, Maceió, AL

<http://lattes.cnpq.br/6073472579856933>

ORCID: 0000-0002-3166-1667

Hayanne Ferreira Parlamento

Médica Veterinária Autônoma

<http://lattes.cnpq.br/5730786831330699>

Jefferson Gonçalves Luna dos Santos

Médico Veterinário Autônomo

<http://lattes.cnpq.br/5035493979653284>

Informações sobre o

artigo:

Recebido em:

07/09/2020

Aceite em:

10/09/2020

Data de publicação:

21/09/2020

Palavras-chave:

Avaliação renal

Histopatológico

Abate

RESUMO

O rim bovino é um dos órgãos direcionados ao consumo humano e está sujeito a apresentar diversas lesões por suas funções metabólicas e hemostáticas. É um dos órgãos com maior porcentual de condenação na linha de inspeção. Este trabalho objetivou identificar lesões que acometem os rins de bovinos e as principais causas de condenação nos matadouros em diferentes municípios do estado de Alagoas, através da identificação de lesões macroscópicas e microscópicas. Os rins bovinos coletados foram divididos em condenados e não condenados na linha de inspeção. A taxa de condenação foi 1,34% (17/1268), onde 50% por cisto urinário, 12,5% tuberculose, 12,5% congestão, 6,25% hipoplasia, 6,25% cálculo renal, 6,25% palidez do órgão e 6,25% uronefrose. No estudo histológico dos rins condenados, todos os apresentaram infiltrado mononuclear, sendo 60% em zona cortical, 20% zona medular e 20% zona cortical e medular, com intensidade 40% leve, 30% moderada e 30% intensa. Nos rins não condenados, 31/48 amostras apresentaram infiltração mononuclear onde 51,61% foram classificados como leve, 45,16% moderada e 3,23% intensa; distribuída em 50% córtex, 25% medula e 25% em córtex e medula. Análises complementares podem contribuir para um diagnóstico mais seguro visando reduzir enfermidades e desperdícios.

MACROSCOPIC AND MICROSCOPIC ASSESSMENT OF BOVINE KIDNEYS IN SLAUGHTERHOUSES IN THE STATE OF ALAGOAS ABSTRACT

Keywords:

Renal evaluation

Histopathological

Slaughter

The bovine kidney is one of the organs aimed at human consumption and is subject to present several lesions due to its metabolic and hemostatic functions. It is one of the organ with the highest percentage of condemnation in the inspection line. This study aimed to identify the lesions that affect the kidneys of cattle and the main causes of condemnation in slaughterhouses in

different municipalities in the state of Alagoas, through the identification of macroscopic and microscopic species. The collected bovine kidneys were divided into condemned and non-condemned in the inspection line. The condemnation rate was 1.34% (17/1268), where 50% for urinary cyst, 12.5% tuberculosis, 12.5% congestion, 6.25% hypoplasia, 6.25% renal calculus, 6.25% organ pallor and 6.25% uronephrosis. No histological study of condemned kidneys, all infiltrated mononuclear dissipated, 60% in the cortical zone, 20% in the medullary zone and 20% in the cortical and medullary zone, with intensity 40% mild, 30% moderate and 30% intense. In non-condemned kidneys, 31/48 moderate mononuclear infiltration where 51.61% were classified as mild, 45.16% moderate and 3.23% intense; distributed in 50% cortex, 25% medulla and 25% in cortex and medulla. Complementary analyzes can contribute to a safer diagnosis to reduce illness and waste.

1 INTRODUÇÃO

O Brasil possui posição privilegiada na produção de bovinos, concentrando um dos maiores rebanhos comerciais do mundo. Devido à grande perecibilidade dos produtos de origem animal, a inspeção sanitária é de caráter obrigatório e fundamental na qualidade do produto, assegurando por diferentes meios e processos (BARRETO *et al.*, 2013). A inspeção *post mortem* de bovinos destinados para o consumo humano, favorece a obtenção de diagnósticos de patologias que podem ser desenvolvidas durante o manejo da propriedade de origem, no transporte ou no momento do atordoamento. Tais patologias podem estar relacionadas com alterações que impliquem na condenação, seja parcial ou total, durante o momento da inspeção das carcaças. Desta forma, a inspeção *post mortem* realizada pelo médico veterinário é economicamente importante, pois o conhecimento de patologias possui um efeito sanitário em selecionar as carcaças e diagnosticar patologias que podem afetar a espécie humana durante o consumo (LIMA *et al.*, 2007). Os rins bovinos são subprodutos do abate bovino utilizados tanto diretamente na alimentação humana quanto animal na forma de rações, sendo possível encontrar diversos tipos de anormalidades as quais podem levar a condenação do órgão para o consumo humano (CASTRO; MOREIRA, 2010). Os trabalhos vêm demonstrando uma grande frequência de patologias encontradas neste órgão (SILVA *et al.*, 2013).

Os critérios para condenação e liberação de órgãos submetidos ao serviço oficial de inspeção de carnes têm sido controversos. Argumenta-se que órgãos que não apresentam lesões macroscópicas visíveis podem ainda assim apresentar alterações microscópicas; por

outro lado, órgãos rejeitados durante exame macroscópico podem revelar-se normais ao exame histológico. A identificação, caracterização e registro de processos patológicos dos animais abatidos em matadouro constitui uma fonte de dados importante para a avaliação da condição sanitária das explorações, uma vez que permite identificar a ocorrência de doenças subclínicas e quantificar a gravidade de lesões que representem manifestações de doenças. Este trabalho teve por objetivo identificar lesões em rins bovinos provenientes de matadouros – Alagoas.

2 METODOLOGIA

A pesquisa foi realizada durante o período de agosto de 2017 e julho de 2018, em dois matadouros de diferentes municípios do estado de Alagoas. Foram realizadas visitas autorizadas para a realização da coleta das amostras de rins bovinos condenados e não condenados na linha de abate. Cada rim examinado foi observado tamanho, peso, volume, bordas, consistência e coloração. Após a inspeção, fragmentos dos órgãos medindo 1 a 2 cm de tamanho e 0,5cm de espessura, foram coletados em frascos contendo formol a 10% e devidamente identificados. Dos órgãos condenados, foram retirados mais de um fragmento de acordo com a quantidade de lesões que cada órgão apresentava. As amostras dos dois grupos foram reservadas para posterior processamento e análise histopatológica comparativa.

As amostras de tecidos coletadas foram encaminhadas para a realização do estudo histopatológico, onde foram processadas utilizando as técnicas de rotina do Laboratório de Histologia e Patologia Veterinária. As amostras passaram pelas etapas de desidratação em álcoois de diferentes concentrações, diafanização em xilol, impregnação e inclusão em parafina. De cada bloco, foram cortadas em secções de 3 a 5µm de espessura, fixadas em lâmina de vidro, desparafinadas, reidratadas, coradas com hematoxilina-eosina, montadas com Bálsamo do Canadá e examinadas a microscopia de luz, para identificar a intensidade e a extensão das possíveis alterações patológicas. Os dados obtidos foram analisados utilizando análise estatística descritiva.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram inspecionados 1.268 rins. Dentre esses, 17 rins foram condenados na linha de inspeção, perfazendo uma taxa de condenação geral de 1,34%. As causas de condenações desses órgãos baseadas nas observações macroscópicas pelos inspetores foram: cisto urinário variando entre cisto solitário e cistos múltiplos (50%) (figura 1), tuberculose (12,5%), congestão (12,5%), hipoplasia (6,25%), uronefrose (6,25%), rim pálido (6,25%) e cálculo renal (6,25%).

Durante os acompanhamentos dos abates, na linha de inspeção, foi realizada a avaliação morfométrica em 108 rins. A média obtida no tamanho foi de 19,82cm de comprimento para os não condenados, variando de 17 a 23 cm, e 16,90cm para os condenados, variando de 12,5 a 20 cm. Quanto ao peso, os órgãos não condenados tinham em média 436,26 g, variando de 210 a 744 g, e 482,25 g para os condenados, variando de 89 a 705 g. Em relação à coloração, apenas os rins condenados por congestão, apresentaram-se levemente avermelhados. Quanto à consistência, apenas os rins com cisto urinário, apresentaram alteração na consistência no local do cisto, devido à dilatação do parênquima, com perda do mesmo por compressão do líquido, apresentando a parede flácida. Estes rins com presença de cisto apresentaram alteração do volume, devido à dilatação.

Figura 1: A: cisto solitário; B: cistos múltiplos

Fonte: Dados da pesquisa.

Segundo Tigre, Leite e Dias (2012), das patologias encontradas durante avaliação dos rins em um matadouro municipal em Itabuna na Bahia, a mais frequente correspondeu aos cistos urinários (45,9%), seguido pela presença de lesões características de nefrite (38,7%). Outras condenações ocorreram devido a alterações circulatórias como congestão

(10,2%) e infarto (5,2%). A presença de cisto urinário como principal causa de condenação encontrada coincide com a principal causa observada neste trabalho.

Dentre os rins condenados, apenas um apresentou uronefrose que pode ser causada pelo bloqueio do fluxo de saída da urina que dilata o ureter e a pressão da obstrução no tecido pode formar grandes cistos contendo urina (CARVALHO; WEBER, 2018). O estudo realizado por Palma, Poty e Santana (2013), também evidenciaram a uronefrose como a causa menos encontrada em carcaças e órgãos de bovinos oriundos de frigoríficos no Distrito Federal e Goiás, porém não foram relatados casos de cálculo renal. Já Lima *et al.* (2007), identificaram cálculo renal como sendo uma das principais patologias diagnosticadas durante a inspeção post mortem em bovinos no abatedouro frigorífico industrial de Mossoró, Rio Grande do Norte.

Para a avaliação microscópica foram analisadas 65 amostras, sendo 17 de rins condenados e 48 de não condenados. Na microscopia dos rins condenados, foi possível identificar alterações como: infiltrado mononuclear em todas as lâminas analisadas nos rins condenados, variando em sua localização: infiltrado mononuclear em córtex renal (60%), em medula renal (20%) e em córtex e medula (20%). Variam também em intensidade, sendo 30% de infiltrado leve, 30% de infiltrado moderado e 60% de infiltrado intenso. Foi observada necrose de coagulação (12,5%) nos túbulos contorcidos, além áreas de calcificações nos túbulos (10%) e infiltrados pericapsulares (3,44%). Também foram observadas áreas de congestão (31,25%) variando de intensidade: leve (40%), moderada (30%), intensa (10%). Nos órgãos não condenados, foi observado na microscopia: infiltrado mononuclear em 31 das 48 amostras analisadas perfazendo 64,58%, variando de intensidade, onde 16 apresentaram infiltrado leve (51,61%), 14 com infiltrado moderado (45,16%) e 1 infiltrado intenso (3,23%); distribuídos em córtex renal (50%), medula renal (25%) e córtex e medula (25%). Em 15 amostras (31,25%) foi possível observar diferentes graus de congestão: congestão leve (66,66%), moderada (20%) e intensa (13,34%). Ainda na análise histológica, observou-se que 13 rins não apresentaram nenhuma alteração (27,08%).

A necrose de coagulação também foi encontrada por Yener e Erer (2000) em apenas uma das amostras avaliadas de rins bovinos abatidos em Konya na Turquia. Segundo Mendes *et al.* (2009), os achados microscópicos mais encontrados em rins bovinos abatidos em frigoríficos industriais sob inspeção estadual no Oeste e Planalto Catarinense foram: fibrose associada a infiltrado inflamatório (26,51%), nefrite intersticial (20,51%), cisto (17,09%), cisto acompanhado de infiltrado pericapsular (12,82%), cisto com nefrite intersticial (8,55%),

calcificações (3,42%), cisto associado à fibrose e infiltrado inflamatório (2,56%), hiperplasmabilidade glomerular (0,85%), causas diversas (4,27%) e sem alterações (3,42%).

No estudo realizado por Monsalve (2013), sobre achados histopatológicos em rins bovinos abatidos na região de Los Rios no Chile, foram encontrados macroscopicamente as seguintes lesões: nefrite (11,4%) seguida de outras causas de condenação (6,0%) e cistos renais (5,8%). Já as lesões histopatológicas foram classificadas em sete grupos: transtornos inflamatórios (60,9%), transtornos variados (24,6%), transtornos de desenvolvimento (19,6%), transtornos pigmentários (16,7%), transtornos circulatórios (10,1%), transtornos necróticos (6,5%) e transtornos do metabolismo celular (5,1%).

Algumas amostras apresentaram mais de um achado histopatológico. A maioria dos estudos sobre lesões renais em matadouros apresentam o infiltrado inflamatório como principal achado microscópico, corroborando assim com os achados desta pesquisa. Já os achados macroscópicos mais encontrados na literatura em sua maioria aparecem como nefrites, cistos urinários, congestão e infarto. Os rins condenados por nefrite no estudo de Barreto *et al.* (2013) representaram 59,3% dos rins analisados na linha de inspeção do matadouro municipal de Pilão Arcado-BA, esses dados diferem deste trabalho, onde a principal causa de condenação observada foi a presença de cistos urinários. Dentre as alterações microscópicas encontradas por Giron (2012), o infiltrado inflamatório também foi o mais observado e representou 70% dos achados incluindo glomerulonefrites supurativas, nefrite intersticial e nefrite granulomatosa.

4 CONCLUSÃO

A presença de cisto urinário foi a causa de condenação mais observada em rins bovinos abatidos nos municípios de Alagoas na linha de inspeção baseadas nas análises macroscópicas pelos inspetores. Na avaliação microscópica o infiltrado mononuclear foi a alteração mais encontrada tanto nos órgãos condenados, quanto nos não condenados. Atualmente, condenação ou liberação para consumo das vísceras nos abatedouros depende apenas do diagnóstico macroscópico realizado pelos inspetores, porém é possível que algumas lesões possam passar despercebidas durante a inspeção, assim como alterações não significativas podem levar a condenação dos órgãos. Com isso, análises complementares, como o histopatológico, podem contribuir para um diagnóstico mais seguro visando reduzir prejuízos à saúde humana e desperdícios para os estabelecimentos, além de contribuir com informações para responsáveis pela saúde animal.

REFERÊNCIAS

BARRETO, S. B. *et al.* Principais causas de condenação de órgãos bovinos abatidos no matadouro municipal de Pilão Arcado-BA. In: JORNADA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - JEPEX, 13, 2013 Recife – PE. **Anais** (online). Recife: JEPEX, 2013 Disponível em: <<http://www.eventosufrpe.com.br/2013/cd/resumos/R1433-2.pdf>> Acesso em 12 fev. 2018

CARVALHO, L. P.; WEBER, L.D. Principais causas de condenações viscerais ocorridas em um abatedouro de bovinos em um município do sudoeste do Paraná. In: CONGRESSO NACIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA FAG, 2, 2018, Cascavel. **Anais...** Cascavel: Fundação Assis Gurgacz, v. 2, n.1, 2018.

CASTRO, R.V.; MOREIRA, M.D. **Ocorrências patológicas encontradas de rins e fígados bovinos em matadouro frigorífico do Triângulo Mineiro.** 2010. Disponível em: Acesso em: 20 abr. 2017.

GIRON, L. A,S. **Principales de comisos renales em bovinos, em el rastro municipal de Torreón.** 2012. 53f. Monografía (Médico Veterinario Zootecnista)- Universidad Autónoma Agrária Antonio Narro, Torreón. 2012

LIMA M.F.C *et al.* Análise das alterações anatomopatológicas durante a inspeção post mortem em bovinos no abatedouro frigorífico industrial de Mossoró, Rio Grande do Norte. **Ciência Animal**, v.17, n.2, p.113-116, 2007.

MENDES, R.E. *et al.* Estudo morfológico de rins de bovinos abatidos em frigoríficos industriais sob inspeção estadual no Oeste e Planalto Catarinense, Brasil. **Ciência Animal Brasileira**, v. 10, n. 1, p. 281-287, jan./mar. 2009

MONSALVE, K. V. V. **Hallazgos Histopatológicos em Riñones Decomisados de Bovinos en una Planta Faenadora de la Región de Los Ríos, Chile.** 2013. 53 f. Monografía (Médico Veterinario)-Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Austral de Chile, Valdivia, 2013.

PALMA, J. M; POTY, I.O; SANTANA, A. P. Principais lesões em carcaças e órgãos de bovinos oriundos de frigoríficos localizados em Goiás e no Distrito Federal. **Higiene Alimentar**, v. 29, n. 246/247, p. 113-117, 2015.

SILVA, M.C.A.*et al.* Alterações anatomopatológicas identificadas na inspeção post mortem em bovinos no abatedouro frigorífico no município de Uberlândia – MG. **Enciclopédia Biosfera**, v.9, n.17; p. 82-89, 2013.

TIGRE, J. S.; LEITE, P.A.G.; DIAS, R.C. Principais causas de condenação de rins de bovinos que foram abatidos no Matadouro Municipal de Itabuna, Bahia. **PUBVET**, v. 6, p. Art. 1405-1410, 2012

YENER, Z.; ERER, H. The pathology of kidney abnormalities in cattles laughtered at Konya Slaughter houses. **Veteriner Bilimleri Dergisi**, v. 16, n. 2, p. 63-74, 2000

AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DE ESTOQUE DE UMA UAN HOSPITALAR E PROPOSTA DE INTERVENÇÃO PARA RESOLUÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES

Paula Teixeira

Nutricionista, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Macaé, RJ
<http://lattes.cnpq.br/5480453332431436>

Gilson Irineu de Oliveira Junior

Docente do Curso de Nutrição, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Macaé, RJ
<http://lattes.cnpq.br/1399236984114152>

Informações sobre o
artigo:

Recebido em:

08/09/2020

Aceite em:

11/09/2020

Data de publicação:

21/09/2020

Palavras-chave:

Unidade de
alimentação e nutrição

Estoque

Lista de checagem

Qualidade sanitária

RESUMO

Introdução: Para assegurar um serviço de excelência, uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) precisa acompanhar todas as etapas do processo. Sendo assim, o local de armazenamento (estoque), que é a origem de todo o processo de produção, deve estar adequado às legislações vigentes e, quando necessário, implementar ações corretivas baseadas nas Boas Práticas de Fabricação, a fim de garantir a qualidade sanitária dos alimentos. **Objetivo:** Avaliar e organizar o funcionamento do estoque de uma UAN hospitalar. **Método:** Foi elaborada uma lista de checagem adaptada, baseada nas RDC 275/2002, 216/2004, Portaria n 78/2009, NR 08 e NR 11 para identificar as não conformidades do estoque da UAN, contemplando as especificidades do estoque e da unidade. A partir de gráficos foi feita a avaliação das não conformidades e identificadas as mais significativas cuja intervenção fosse factível, sendo implementadas soluções. Após esta etapa, a mesma lista de checagem foi utilizada para avaliação dos resultados das intervenções executadas. **Resultados:** Do total de 34 itens da lista de checagem foram encontrados 20 itens não conformes (60%) e 14 itens conformes (40%). Dentre os itens avaliados, controle integrado de vetores e pragas urbanas, móveis, e documentação foram os que apresentaram piores resultados, tendo 0% de conformidade dentro dos itens avaliados. Também apresentaram resultado insatisfatório: janelas, rotulagem e armazenamento e funcionários, com 33,3%, 20% e 33,3% de conformidade respectivamente. Após a realização das intervenções, 22 itens (65%) passaram a estar dentro da conformidade e 12 (35%) itens não conforme. **Considerações finais:** Conclui-se que a ferramenta lista de checagem adaptada alcançou o objetivo proposto de facilitar a identificação dos problemas, bem como de verificar a eficácia das ações de correção implementadas neste setor que elevaram o número de itens em conformidade. Dessa forma, ressalta-se a importância de adaptar instrumentos à realidade a ser avaliada.

EVALUATION OF THE STOCK OPERATING CONDITIONS OF A HOSPITAL FOOD SERVICE AND PROPOSED INTERVENTION TO RESOLVE NON-CONFORMITIES

ABSTRACT

Introduction: To ensure an excellent service, a Food Service needs to monitor all stages of the process. Therefore, the storage location (stock), which is the source of the whole production process, must be in accordance with current legislation and, when necessary, implement corrective actions based on Good Manufacturing Practices, in order to guarantee sanitary quality of food. **Objective:** To evaluate and organize the functioning of the stock of a hospital Food Service. **Methods:** An adapted checklist was prepared, based on RDC 275/2002, 216/2004, Ordinance No. 78/2009, NR 08 and NR 11 to identify non-conformities of the Food Service stock, considering the specificities of the Unit. Graphs were used to assess non-conformities and identify the most significant ones whose intervention was feasible, and solutions were implemented. After this stage, the same checklist was used to evaluate the results of the performed interventions. **Results:** Of the total of 34 items on the checklist, 20 non-compliant items (60%) and 14 compliant items (40%) were found. Among the items evaluated, integrated vector and urban pest control, furniture, and documentation were the ones that showed the worst results, with 0% compliance within the evaluated items. They also showed an unsatisfactory result: windows, labeling and storage and employees, with 33.3%, 20% and 33.3% of compliance respectively. After performing the interventions, 22 items (65%) became compliant and 12 (35%) non-compliant items. **Final considerations:** It is concluded that the adapted checklist tool achieved the proposed objective of facilitating the identification of problems, as well as of verifying the effectiveness of the corrective actions implemented in this sector that increased the number of items accordingly. Thus, the importance of adapting instruments to the reality to be evaluated is emphasized.

Keywords:

Food service

Stock

Checklist

Sanitary quality

1 INTRODUÇÃO

De acordo com a Resolução do CFN 600/2018, uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) pode ser definida como a unidade gerencial onde são desenvolvidas todas as atividades técnico-administrativas necessárias desde a produção de refeições até a sua distribuição para coletividades sadias e enfermas, tendo como objetivo contribuir para manter, melhorar ou recuperar a saúde da clientela atendida.

Portanto, para assegurar um serviço de excelência, a UAN precisa se preocupar com todas as etapas do processo, não somente com a qualidade do alimento acabado, mas com

todos os fatores que podem interferir na qualidade da preparação durante o fornecimento da matéria-prima, armazenamento e produção (SANT'ANA, AZEREDO, 2012). Além disso, a produção de refeições de qualidade também está atrelada ao leiaute das instalações físicas, aos equipamentos, à qualidade dos gêneros alimentícios, ou seja, à toda cadeia de processamento das preparações bem como à saúde ocupacional dos manipuladores (SANTOS, 2014).

Por isso é necessário identificar os problemas existentes e aplicar ações corretivas, que são um conjunto de medidas que a UAN deve adotar, baseando-se nas Boas Práticas de Fabricação, a fim de garantir a qualidade sanitária e manter a conformidade dos produtos alimentícios começando com o armazenamento (BRASIL, 2006). E para essa avaliação pode ser utilizada a ferramenta lista de checagem, que é um método de bom custo benefício, de fácil aplicação e que gera bons resultados (GERMANO, 2003).

O local de armazenamento (estoque), que é a origem de todo processo de produção, deve estar adequado às legislações para garantir a qualidade da matéria-prima (SANT'ANA, 2012). Os estoques são definidos como os materiais, produtos e mercadorias que percorrem a cadeia de suprimentos até que sejam requeridas para transformação ou venda a clientes, e por fim, ao consumidor final (GRANT, 2013).

Este trabalho tem como objetivo organizar o funcionamento do estoque de uma UAN hospitalar utilizando uma lista de checagem adaptada para identificação de não conformidades em estoque de UAN e implementar intervenções para solução destas não conformidades e possíveis melhorias.

2 METODOLOGIA

Foi empregada a metodologia 5w2h para a elaboração de um plano de ação a ser executado no estoque de uma empresa terceirizada prestadora de serviço a um hospital na região norte fluminense.

Foi elaborada uma lista de checagem adaptada, baseada nas RDC 275/2002, 216/2004, NR 08 e NR 11 para identificar as não conformidades do estoque da UAN, contemplando as especificidades do estoque da unidade. Essa ferramenta era composta por 34 itens dos quais 3 eram referentes ao piso, 2 ao teto, 3 às portas, 3 a janelas e outras aberturas, 1 à ventilação e climatização, 7 à higienização do estoque, 2 à controle de vetores e pragas urbanas, 5 à rotulagem e armazenamento, 2 a móveis, 3 à documentação e 3 a funcionários. As opções de resposta para o preenchimento da lista de verificação eram: “Sim”

para os itens de avaliação que atendiam aos requisitos, “Não” para os que não atendiam, e “NA” para o item de avaliação que não se aplicava ao estabelecimento.

Foi avaliado o percentual de não conformidades no estoque a partir de gráficos realizados no programa Excel. Foi realizada a avaliação das não conformidades e identificadas as mais factíveis para intervenção, sendo estas realizadas para a solução das inadequações.

Realizadas as intervenções, a mesma lista de checagem foi utilizada para avaliação da melhoria no funcionamento do estoque e para análise da eficácia da intervenção realizada.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir da lista de checagem realizada, foram observadas as não conformidades do estoque e tendo em vista a necessidade da adequação de procedimentos à legislação vigente foram feitas algumas propostas de intervenção explicitadas no Quadro 1.

Quadro 1 Não conformidades, propostas e custo de intervenção.

Não conformidade	Proposta de intervenção	Custo da intervenção
1.Portas		
1.1 Sem superfície lisa, de difícil higienização, com falhas de revestimento.	Realizar a troca da porta.	Alto.
1.2 Portas externas sem fechamento automático (mola, sistema eletrônico ou outro) e sem barreiras adequadas para impedir entrada de vetores e outros animais (telas milimétricas ou outro sistema).	Realizar a troca da porta.	Alto.
1.3 Em estado de conservação inadequado (com falhas, rachaduras, descascamento e outros).	Realizar a troca da porta.	Alto.
2. Ventilação e climatização:		
2.1 Ventilação e circulação de ar não garantem o conforto térmico e o ambiente livre de fungos.	Implementar sistema de climatização e/ou outra janela para circulação do ar.	Alto.
3. Higienização do estoque:		
3.1 Inexistência de um responsável pela operação de higienização comprovadamente capacitado.	Contratação de um funcionário comprovadamente capacitado para a operação.	Alto.
3.2 Ausência de higienização frequente e adequada das instalações.	Realizar higienização adequada e frequente.	Baixo.
3.3 Inexistência de registro da higienização.	Organizar o registro de higienização através de uma planilha.	Sem custo.
4. Controle integrado de vetores e pragas urbanas:		
4.1 Existência de vetores e pragas urbanas.	Organizar os registros das operações de desinsetização e adotar medidas preventivas Adoção de medidas básicas, como manter a porta fechada.	Sem custo.
4.2 Não adoção de medidas preventivas e corretivas para impedir a atração, o abrigo, o acesso e ou proliferação de vetores e pragas urbanas.		
5.Rotulagem e armazenamento:		
5.1 Sem dizeres de rotulagem com identificação visível e de acordo com a legislação vigente	Identificar todos os produtos já abertos com as etiquetas do estabelecimento.	Sem custo.

Não conformidade	Proposta de intervenção	Custo da intervenção
5.2 Alimentos não armazenados separados por tipo ou grupo, sobre estrados distantes do piso, ou sobre pallets, bem conservados e limpos ou sobre outro sistema aprovado, afastados das paredes de forma a impedir apropriada higienização, iluminação e circulação de ar.	Organizar as prateleiras por tipo ou grupo. Adquirir novos pallets para serem colocados no local de recebimento. Afastar as prateleiras da parede (mínimo 10 cm).	Médio.
5.3 Existência de material estranho, estragado ou tóxico.	Proibir o depósito de material estranho em meio ao estoque.	Sem custo.
5.4 Não armazenamento em local limpo e conservado.	Realizar a limpeza adequada e frequente do local de armazenamento.	Sem custo.
6. Móveis:		
6.1 Os móveis que entram em contato com o alimento não estão em adequado estado de conservação e não são resistentes à corrosão e a repetidas operações de limpeza e desinfecção.	Realizar a substituição dos móveis.	Alto.
6.2 As superfícies dos móveis utilizados no armazenamento não são lisas, e não estão isentas de rugosidades, frestas e outras imperfeições que possam comprometer a higienização dos mesmos e serem fontes de contaminação dos alimentos.	Realizar a substituição dos móveis.	Alto.
7. Documentação: Seleção das matérias-primas, ingredientes e embalagens.		
7.1 Ausência de POP estabelecido para este item.	Elaboração do Pop.	Sem custo.
7.2 POP descrito não está sendo cumprido.	Treinamento dos funcionários para seguirem o POP.	Sem custo.
7.3 Ausência de POP para nova rotulagem de produtos abertos.	Elaboração do POP e capacitação	Sem custo.
8. Funcionários:		
8.1 Ausência de Treinamento para os estoquistas.	Realização de capacitação para os estoquistas.	Sem custo.
8.2 Atividades exigidas não estão sendo cumpridas.	Realização de capacitação para os estoquistas.	Sem custo.

Fonte: Elaborado pelos autores

Após a observação de todas as não conformidades encontradas, foram eleitas as sem custo pois eram as mais factíveis. Mesmo assim a tabela foi disponibilizada para a empresa e nutricionistas para que outras irregularidades pudessem ser melhoradas em outro momento.

No total de 34 itens da lista de checagem foram encontrados 21 itens não conformes (62%) e 13 itens conformes (38%), revelando um alto índice de não conformidades no estoque, evidenciando a necessidade de intervenções para assegurar a qualidade das matérias-primas e, consequentemente, do produto final.

Para melhor identificar as mudanças mais necessárias e urgentes, foi calculado o percentual de não conformidades de cada item avaliado na lista de checagem (Tabela 1).

Tabela 1. Categorização de itens em conformidade no estoque.

Item	Nº de subitens analisados	Itens conforme	Itens não conforme	Percentual de conformidade
Portas	3	3	0	100

Teto	2	2	0	100
Portas	3	2	1	66,6
Janelas	3	1	2	33,3
Ventilação e climatização	1	1	1	100
Higienização do estoque	7	4	3	57
Controle integrado de vetores e pragas urbanas	2	0	2	0
Rotulagem e armazenamento	5	1	4	20
Móveis	2	0	2	0
Documentação	3	0	3	0
Funcionários	3	1	2	33,3

Fonte: Dados da pesquisa

Os itens de controle integrado de vetores e pragas urbanas, móveis e documentação foram os que apresentaram piores resultados, tendo 0% de conformidade dos itens avaliados. Outros itens que apresentaram resultado insatisfatório foram: janelas, rotulagem e armazenamento, e funcionários, com 33,3%, 20% e 33,3% respectivamente.

Apesar de existirem resultados inferiores ao do item de higienização do estoque, deve-se considerar a relevância deste item, pois o estoque não contava com limpeza adequada e frequente, além da falta de organização. Além disso, a condição higiênico-sanitária em geral da empresa era bastante insatisfatória, sendo frequentemente e rigorosamente contestada pelas nutricionistas fiscais do hospital.

Com esses resultados, nota-se que o serviço do estoque não estava sendo realizado de forma a garantir a segurança de alimentos. De acordo com LIMA (2013), a segurança de alimentos é o termo usado para se referir à prática de medidas que permitam o controle da entrada de qualquer agente que promova risco à saúde ou integridade física do consumidor. Portanto, ela é consequência do controle de todas as etapas da cadeia produtiva, desde o campo até o consumo.

Quadro 2. Não conformidades eleitas e intervenções específicas.

1. HIGIENIZAÇÃO	
1. Inexistência de registro da higienização.	Organizar o registro de higienização por meio de uma planilha.
2. CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS:	
2.1 Existência de vetores e pragas urbanas.	Organizar os registros das operações de desinsetização e adotar medidas preventivas básicas, como manter a porta fechada.
2.2 Não adoção de medidas preventivas e corretivas com o objetivo de impedir a atração, o abrigo, o acesso e ou proliferação de vetores e pragas urbanas.	
3. ROTULAGEM E ARMAZENAMENTO:	
3.1 Sem dizeres de rotulagem com identificação visível e de acordo com a legislação vigente.	Identificar todos os produtos já abertos com as etiquetas do estabelecimento. Alertar os estoquistas para tal atividade para que seja executada rigorosamente.
3.2 Alimentos não armazenados separados por tipo ou grupo, afastados das paredes de forma a impedir apropriada higienização, iluminação e circulação de ar.	Organizar as prateleiras por tipo ou grupo. Afastar as prateleiras da parede (mínimo 10 cm).
3.3 Existência de material estranho, estragado ou tóxico.	Proibir o depósito de material estranho em meio ao estoque através de placas de alerta e treinamento dos estoquistas.
3.4 Não armazenamento em local limpo e conservado.	Realizar a limpeza adequada e frequente do local de armazenamento.
4.DOCUMENTAÇÃO: Seleção das matérias-primas, ingredientes e embalagens.	
4.1 Ausência de POP estabelecido para este item.	Elaboração dos Procedimentos Operacionais Padronizados (POP).
4.2 POP descrito não está sendo cumprido.	Capacitação dos funcionários para seguirem o POP.
4.3 Ausência de instruções para nova rotulagem de embalagens de produtos abertos.	Elaboração de POP e capacitação.
5. FUNCIONÁRIOS	
5.1 Ausência de Treinamento para os estoquistas.	Realização de capacitação para os estoquistas.
5.2 Atividades exigidas não estão sendo cumpridas.	Realização de capacitação para os estoquistas.

Fonte: elaborado pelos autores.

Para intervir na não conformidade de higienização foi feita uma planilha de limpeza semanal. De acordo com a RDC 275 de 2002, deve existir o registro da higienização das instalações e equipamentos, portanto foi elaborada uma tabela específica para o estoque. Durante esse trabalho, a empresa validou um POP para higienização de instalações que englobava o estoque, o que melhorou as condições higiênico-sanitárias e foi possível a utilização da planilha de registro de higienização elaborada. Além disso, a intervenção do item 3.4 do Quadro 2 também levou a esse resultado.

Nos itens 3.1 e 3.3 do Quadro 2 foram feitas intervenções diretamente com o estoquista. Foram observados todos os produtos que estavam abertos sem a nova rotulagem e feita a identificação correta. Durante essa ação, foram feitos aconselhamentos aos estoquistas quanto a maneira correta exigida. Para o item 3.4 do Quadro 2 foi necessário o auxílio do nutricionista da empresa para que a intervenção pudesse ser concretizada, sendo definida a função de limpeza diária e frequente do estoque a um dos agentes de serviços

gerais. A princípio, o item 3.2 foi julgado como factível, porém com os contratempos existentes no local, não foi possível a realização da intervenção prevista.

A empresa não possuía POP para seleção das matérias-primas, ingredientes e embalagens e o item 4.1.1 da RDC 275 (2002) retrata a necessidade de os estabelecimentos produtores/industrializadores de alimentos desenvolverem, implementarem e manterem os Procedimentos Operacionais Padronizados (POP). Assim, foi criado um POP para esse requisito e enviado para a empresa, pois era necessária a aprovação do responsável técnico, responsável pela operação e do proprietário do estabelecimento, a fim de firmar o compromisso de implementação, monitoramento, avaliação e registro do mesmo.

A RDC 216 (2004) deixa claro que quando as matérias-primas e ingredientes não forem utilizados em sua totalidade, devem ser adequadamente acondicionados e identificados com, no mínimo, as seguintes informações: designação do produto, data de fracionamento e prazo de validade após a abertura ou retirada da embalagem original. A maneira que um produto é armazenado após sua abertura influencia na qualidade do alimento, sendo que alguns produtos alimentícios possuem data de validade secundária registrada na embalagem pelo seu fabricante. Os estoquistas foram orientados a confeccionarem nova rotulagem dos alimentos que fossem abertos e não utilizados totalmente, e em caso de dúvidas consultassem os nutricionistas.

Portanto, para melhoria desse serviço, foram criadas instruções que facilitassem essa ação e colocadas no estoque, de modo que os estoquistas pudessem compreender e realizar a nova rotulagem. De forma positiva, resultados foram observados após a orientação básica sobre a necessidade de etiquetar com nova validade todos os produtos abertos.

A capacitação para os estoquistas que contemplaria os subitens 4.2, 5.1 e 5.2 do Quadro 2 foi considerada executável inicialmente, porém não foi possível sua realização já que a empresa conta com funcionários externos que executam o treinamento padronizado para os colaboradores da UAN, tendo sido esse serviço já solicitado. Apesar de existir esse empecilho, foram realizadas orientações aos estoquistas quanto às exigências das legislações que auxiliaram na melhoria da não conformidade apresentada no item 5.2 do Quadro 2.

Cabe ressaltar que algumas das atividades planejadas no plano de ação não foram completadas com excelência devido à rotina conturbada no momento em que a empresa se encontrava. Os resultados poderiam ser melhores caso houvesse mais liderança na UAN onde foi realizado o presente trabalho. Outra dificuldade para realizar as intervenções foram as regras que a empresa dispõe sobre o treinamento de funcionários. Contudo, foi realizada

a aplicação da lista de checagem novamente para comparar os itens conformes após as intervenções que puderam ser realizadas nesse período.

Apesar da dificuldade encontrada ao longo das atividades de intervenção, pôde ser observada uma melhoria nos itens conformes a partir das intervenções realizadas e por atividades que a empresa realizou em conjunto. Dentre os 34 itens, 22 itens (65%) se encontraram dentro da conformidade e 12 (35%) itens não conforme. Além disso, itens que estavam dentre os mais prejudiciais a toda a cadeia de produção, como higiene e rotulagem de alimentos, tiveram melhorias satisfatórias.

4 CONCLUSÃO

Com esses resultados, foi possível concluir que a ferramenta lista de checagem adaptada alcançou o objetivo proposto de facilitar a visualização e o entendimento dos problemas e direcionar a execução de melhorias para o estoque.

Além disso, a partir da avaliação dos percentuais de não conformidades antes e depois das intervenções realizadas, foi possível observar que a execução das intervenções na Unidade propiciou uma melhora perceptível, passando o número de itens conformes a ser maior que de não conformes. Deste modo, houve melhorias no bom funcionamento do estoque e uma possível melhora na qualidade higiênico-sanitária das refeições dos pacientes e servidores do hospital, ao se reduzir situações não conformes que ofereciam riscos. A qualidade higiênico-sanitária não pode ser assegurada com a ferramenta aplicada, uma vez que esse aspecto só pode ser afirmado por análises microbiológicas. De qualquer forma, ressalta-se a importância de se adaptarem instrumentos às realidades a serem avaliadas.

REFERÊNCIAS

ABREU, E. S.; SPINELLI, M. G. N.; SOUZA PINTO, A. M. P. **Gestão de Unidades de Alimentação e Nutrição: um modo de fazer**. 4. ed. São Paulo: Metha, 2011.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Resolução RDC nº 275 de 21 de outubro de 2002**. Regulamento técnico de procedimentos operacionais padronizados aplicados aos estabelecimentos produtores/ industrializadores de alimentos e a lista de verificação das boas práticas de fabricação nesses estabelecimentos.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância Sanitária. **Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004**. Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação.

BRASIL. **Resolução CFN nº 600 de 25 de fevereiro de 2018**. Dispõe sobre a definição das áreas de atuação do nutricionista e suas atribuições, estabelecer parâmetros numéricos de

referência, por área de atuação e dá outras providências. Conselho Federal dos Nutricionistas 2018; 25 fev.

BRASIL. Ministério do Trabalho. **Portaria Mtb nº 3.214 de 08 de junho de 1978 NR 08 – Edificações**. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 1978.

BRASIL. Ministério do Trabalho. **Portaria Mtb nº 3.214 de 08 de junho de 1978 NR 11 – transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de matérias**. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 1978.

GRANT, David B. **Gestão de logística e cadeia de suprimentos**. São Paulo: Saraiva, 2013.

GERMANO, M. I. S. **Treinamento de Manipuladores de Alimentos: fator de segurança alimentar e promoção da saúde**. São Paulo. Ed. Varela, 2003.

LIMA, M. A. C. **Segurança de Alimentos**. Disponível em: http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Agencia22/AG01/arvore/AG01_179_24112005115229.html Acesso em: 25/09/2018.

SANT'ANA, H. M. P.; AZEREDO, E. M. C. **Planejamento dos Setores de Distribuição, Consumo, Higienização e Pessoal**. In: SANT'ANA, H. M. P. Planejamento físico funcional de Unidades de Alimentação e Nutrição. Rio de Janeiro: Rubio, 2012.

SANTOS, EA. **Implantação de ferramentas de gestão da qualidade dos alimentos em uma unidade de alimentação e nutrição institucional: um estudo de caso**. 2014. 162 f. Dissertação (Mestrado em ciência e Tecnologia de Alimentos)-Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro , Uberaba - MG, 2014.

SILVA Junior, Eneo Alves da - **Manual de controle higiênico-sanitário em Serviço de Alimentação**. 6ª ed. São Paulo: Livraria Varela, 2012.

PRODUÇÃO DE ENZIMAS POR FUNGOS FILAMENTOSOS

Mariana Ferreira Alves

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência de Alimentos, Itapetinga, BA

<http://lattes.cnpq.br/6587765010055841>

<https://orcid.org/0000-0001-5976-1937>

Mirelly Pereira Vieira

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência de Alimentos, Itapetinga, BA

<http://lattes.cnpq.br/7808495523215919>

<https://orcid.org/0000-0003-1814-0397>

Jabson Meneses Teixeira

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Curso de Biologia, Itapetinga, BA

<http://lattes.cnpq.br/9302919168749301>

<https://orcid.org/0000-0002-4139-1699>

Katia Iro Altidis Mota

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Departamento de Ciências Exatas e Naturais, Laboratório de Aproveitamento de Resíduos Agroindustriais (LABRA), Itapetinga, BA

<http://lattes.cnpq.br/9720067554267389>

<https://orcid.org/0000-0002-9458-1584>

Silmara Almeida Carvalho

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Departamento de Ciências Exatas e Naturais, Laboratório de Produtos Naturais e Biotecnologia (LPNbio), Itapetinga, BA

<http://lattes.cnpq.br/7119837516036225>

<https://orcid.org/0000-0003-4132-431>

Informações sobre o

artigo:

Recebido em:

14/09/2020

Aceite em:

16/09/2020

Data de publicação:

21/09/2020

RESUMO

Quase cinquenta por cento das enzimas utilizadas em escala comercial são de origem fúngica. Proteases, amilases, celulasas e lipases podem ser produzidas por diferentes gêneros de fungos incluindo *Aspergillus*, *Rhizopus* e *Penicillium*. A origem destes fungos é diversa. Dentre as variedades de origem têm-se os fungos endofíticos que convivem em simbiose com as plantas hospedeiras, promovendo proteção as mesmas de diversas formas. Assim os fungos endofíticos apresentam potencial na produção de metabólitos secundários de interesse biotecnológico, sendo as enzimas umas das classes exploradas destes metabólitos. Para este estudo, o fungo endofítico do gênero *Trichoderma* (isolado 50 – I50) foi avaliado para produção de enzimas, pertencente a coleção de fungos endofíticos de videira do Laboratório de Produtos Naturais e Biotecnologia (UESB). A produção das enzimas amilase, celulase, invertase, lipase e poligalacturonase foi testada para o índice enzimático como resultado preliminar em placa de Petri com BDA e, a atividade enzimática em fermentação submersa foi avaliada quanto ao tempo de maior produtividade. O isolado 50 apresentou índice enzimático para todas as enzimas testadas, exceto para invertase. Enzima com maior atividade enzimática foi a

Palavras-chave:	poligalacturonase com 96h, também mostrando bons resultados com 72h quando comparado com as outras enzimas. A atividade enzimática para a lipase foi a segunda melhor produção. Estes resultados demonstraram que o fungo endofítico do gênero <i>Trichoderma</i> isolado de videira tem potencial para ser explorado para produção das enzimas poligalacturonase e lipase.
Atividade enzimática	
Biotecnologia	
Fermentação submersa	

PRODUCTION OF ENZYMES BY FILAMENTAL FUNGI

ABSTRACT

Almost half of enzymes used on commercial scale are fungal origin. Protease, amylase, cellulase and lipase can be produced by different genera of fungi including *Aspergillus*, *Rhizopus* and *Penicillium*. The fungi origin is diverse, such as endophytic. Among the varieties of origin, there are the endophytic fungi that live in symbiosis with the host plants, were promoting their protection in different way. Thus, endophytic fungi presented a potential production in secondary metabolites of biotechnological interest, enzymes being one of the explored classes these metabolites. For this study, the endophytic fungus of genera *Trichoderma* (isolated 50 – I50) was evaluated to enzymes production, belonging to the collection of endophytic fungi from grapevine of the Natural Products and Biotechnology Laboratory (UESB). The productions of amylase, cellulose, invertase, lipase and polygalacturonase enzymes were tested for enzymatic index for preliminary results in Petri place with PDA broth and, enzymatic activity in submerged fermentation evaluated time to major production. The I50 showed enzymatic index for all enzymes tested, except for invertase. Enzyme of major enzymatic activity was polygalacturonase with 96h of fermentation, already showing good results with 72h when compared with others enzymes. The enzymatic activity for lipase was the second better production. These results showed the endophytic fungi genera *Trichoderma* isolated from grapevine have been potential to be exploring for enzymes polygalacturonase and lipase production.

Keywords:
Enzymatic activity
Biotechnology
Submerge fermentation

1 INTRODUÇÃO

Microrganismos são muito promissores na produção de enzimas de interesse biotecnológico e industrial, devido à grande variedade de atividades catalíticas, fácil adaptação e à possibilidade de produção de enzimas através de processos fermentativos em grande escala, principalmente com a aplicação de leveduras e fungos (BON *et al.*, 2008).

Os fungos filamentosos compõem um grupo de microrganismos que biossintetizam uma variedade de metabólitos secundários, que podem ser utilizados nas indústrias médico-farmacêutica, alimentícia e agricultura. Fungos endofíticos são fungos

filamentosos que habitam o interior de plantas sem causar injúrias a planta, vivem em simbiose e constituem-se em uma fonte valiosa de produção de compostos bioativos (HIGGINBOTHAM *et al.*, 2013). A relação entre microrganismos endófitos e planta hospedeira pode promover a produção de enzimas extracelulares, dentre elas celulasas e amilases, e até mesmo proteases e lipases (ESPOSITO; AZEVEDO, 2004).

Enzimas microbianas são utilizadas comercialmente com sucesso por serem menos dispendiosas, menos prejudiciais ao meio ambiente. Estas enzimas apresentam grande importância para indústrias no processamento de alimentos, bebidas, amaciamento de carnes, dentre muitas outras possibilidades (FOUKIS *et al.*, 2012, KAN *et al.*, 2019; PELLEGRINI *et al.*, 2020).

Dois tipos básicos de fermentação são utilizados para a produção de enzimas: a fermentação submersa (FS) e a fermentação em estado sólido (FSE) (FERNANDES, 2007). A diferenciação deve-se a maneira como o microrganismo se desenvolve no meio de cultura, submerso ou não em meio líquido (FS) ou, sobre a superfície e fragmentos de substratos sólidos (FSE) (OLIVEIRA *et al.*, 2014). A FS é frequentemente utilizada na produção de enzimas por controlar melhor as condições de crescimento dos microrganismos, como temperatura e pH, o cultivo também apresenta uma recuperação das enzimas extracelulares facilitada em relação a FSE (FEITOSA, 2009).

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a produção das enzimas amilase, celulase, invertase, lipase e poligalacturonase por fungo filamentoso endofítico em processo fermentativo submerso.

2 METODOLOGIA

2.1 Cultura de fungos endofíticos e preparo de inoculo

O fungo utilizado neste trabalho foi, primeiramente, denominado como isolado 50 (I50) e pertencente à Coleção de Cultura de Fungos Filamentosos Endofíticos isolados de videira para produção de vinho, especificamente uva da espécie Syrah. Esta coleção consta com 49 diferentes isolados de fungos endofíticos e encontra-se no Laboratório de Produtos Naturais e Biotecnologia (LPNBio) da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), campus de Itapetinga-BA. Posteriormente alguns fungos foram avaliados quanto às formas e características microscópicas e realizada a identificação molecular, sendo o I50 identificado como pertencente ao gênero *Trichoderma*.

Os fungos da coleção são mantidos em meio BDA (Batata-Dextrose-Agar) com óleo mineral, a 4 °C e renovados a cada 6 meses.

Para fermentação submersa líquida foi preparado suspensão de esporos contendo 10^7 células.mL⁻¹. Tubos de ensaio com o fungo I50 cultivado em meio BDA inclinado por sete dias foram lavados com 100 mL de água estéril, com a superfície do meio de cultura devidamente friccionada com palitos de madeira estéreis promovendo a soltura dos esporos na solução. A câmara de Neubauer foi utilizada para a contagem dos esporos.

2.2 Cultura de fungos endofíticos e preparo de inoculo

Foi avaliado o potencial enzimático do I50 aplicando método qualitativo de análise em placas de Petri avaliando diâmetro de halo produzido. O isolado foi previamente cultivado em BDA, por sete dias, sendo observado o crescimento de hifas e a presença de esporos característicos (aparência de aveludado verde).

Na determinação da produção da amilase, celulase, invertase e poligalacturonase foi utilizada a metodologia proposta por Dingle, Teid e Solomons (1953). Para cada enzima testada foi adicionado ao meio BDA, 1% de diferentes substratos para avaliar se houve produção de enzima pelo isolado fúngico estudado. Assim, para análise da amilase foi adicionado 1% de amido ao meio BDA, para análise da celulase foi adicionado 1% de carboximetilcelulose, para a análise da invertase foi adicionado sacarose e para a análise da poligalacturonase foi adicionado ácido poligalacturônico. Para a análise de lipase foi utilizado o método proposto por Sierra (1957) utilizando óleo de milho a 1% ao meio BDA.

BDA, substratos e água foram devidamente esterilizados e vertidos em placas de Petri de 10 cm de diâmetro (100 x 20 mm), em triplicata. Após solidificação dos meios, foi realizado um corte circular de diâmetro 2 cm, não muito profundo de forma que ainda tivesse meio sólido para realizar a repicagem do I50 neste poço. Assim, o fungo foi incubado a 30°C, por um período de cinco dias. Em seguida foi realizada a revelação de acordo com a metodologia descrita para cada enzima.

O Índice Enzimático (I.E.) foi expresso a partir da relação entre o diâmetro médio do halo de hidrólise (Dh) e diâmetro médio da colônia (Dc), conforme descrição na Equação (1) (FLORENCIO *et al.*, 2012).

$$I.E. = Dh/Dc \quad \text{Equação (1)}$$

2.3 Atividade enzimática

Para avaliação da atividade enzimática foi inoculado 10 mL da solução de esporos do I50 no meio de cultura líquido composto por óleo vegetal de milho como fonte de carbono, ureia ($\text{CH}_4\text{N}_2\text{O}$) como fonte de nitrogênio e os sais cloreto de sódio, fosfato monopotássico e sulfato de magnésio pentahidratado. O volume de 50 mL deste meio líquido foi utilizado para FS em erlenmeyers de 150mL e os frascos incubados a 30 °C em shaker com agitação a 180 rpm. Esquema ilustrativo encontra-se apresentado na Figura 1.

Figura 1. Resumo gráfico do preparo do meio líquido e das condições de cultivo

Fonte: Elaborado pelos autores

Para a dosagem da atividade enzimática foram preparados frascos para cada tempo de fermentação, avaliando-se o período entre 24 – 120 horas, em intervalos de 24 em 24 h. Ao final de cada período da fermentação, a biomassa celular foi separada por filtração e o caldo fermentado foi usado como extrato enzimático bruto (EEnzB) a ser analisado.

Para avaliação da atividade das enzimas amilase, celulase e poligalacturonase foi aplicada a metodologia descrita por Miller (1959) e Ghose (1987), com modificações no tipo de substrato (SB). Para a enzima celulase utilizou-se carboximetilcelulose como SB, para a amilase – amido (SB), para a enzima poligalacturonase – ácido poligalacturônico (SB). Preparou-se soluções de cada substrato (SB) a 1% em tampão acetato 100 mM, pH 5.

Adicionou-se o extrato enzimático bruto (EEnzB) em tubos de ensaio contendo solução SB a 1%. Esta mistura foi mantida em banho-maria a 50°C por 15 min. Para interromper a reação foi adicionado solução padrão de DNS para quantificação de açúcar redutor (SANTOS et al, 2017), e mantido em banho-maria a 100°C por 5 min. Em seguida, foi adicionado água destilada e realizou-se a leitura em espectrofotômetro modelo SP 2000 UV, marca BEL Engineering (Monza, Itália) em comprimento de onda a 540 nm, conforme esquema da Figura 2.

Figura 2. Resumo gráfico da metodologia para medição da atividade enzimática para as enzimas amilase, celulase e poligalacturonase.

Fonte: Elaborado pelos autores

Para a mesma sequência de análise foi submetido o ensaio considerado branco, mantida as proporções de caldo fermentado, solução tampão sem substrato e solução de DNS, e realizada a leitura ao λ 540 nm. Todos os ensaios foram realizados em triplicata. A unidade de atividade enzimática (U) foi definida como a quantidade de enzima capaz de hidrolisar 1 $\mu\text{mol/g/min}$ de produto. A atividade espectrofotométrica foi expressa em U.mL^{-1} . A atividade lipásica foi realizada aplicando método titulométrico de acordo com Watanabe *et al.* (1977). A reação enzimática foi desenvolvida em frascos de erlenmeyers de 150 mL de capacidade contendo caldo EEnzB com emulsão de óleo de oliva (25 %, v/v) em solução de álcool polivinílico a 2 % p/V e, solução-tampão TRIS-HCl 0,02M pH 8,0, para liberação de ácidos graxos a partir da ação da enzima presente no caldo fermentado. A reação de hidrólise foi mantida por 10 minutos, a temperatura ambiente. Após este período, foi adicionado solução de acetona/álcool etílico (1:1) para finalizar a reação, seguida da etapa de titulação. Para esta etapa, foram adicionadas 5 gotas de solução indicadora de timolftaleína a 0,2%, homogeneizado a mistura, titulou-se com solução padronizada de hidróxido de sódio 0,05 M, conforme resumo gráfico apresentado na Figura 3.

Figura 3. Resumo gráfico da metodologia para medição da atividade enzimática para a enzima lipase.

Fonte: Elaborado pelos autores

Como ensaio considerado controle (branco), realizou-se a inativação da enzima presente no caldo fermentado (EEnzB), mantendo o mesmo em banho-maria a 100 °C/10 minutos, dando-se sequência a reação de hidrólise conforme descrito anteriormente. Todos os ensaios foram realizados em triplicata. Para o cálculo da atividade lipásica foi utilizada a equação (2).

$$\text{Atividade lipásica U/ml} = \frac{(V_{\text{enzimático}} - V_{\text{controle}}) \times f_c \times D \times 50}{t} \quad \text{Equação (2)}$$

Em que:

V_{enzimático}: volume de solução de NaOH 0,05M gasto para titular os ácidos graxos da reação enzimática.

V_{controle}: volume de solução de NaOH 0,05M gasto para titular os ácidos graxos presentes no branco da amostra.

f_c: fator de correção da solução titulante de NaOH 0,05M padronizada.

D: fator diluição.

t: tempo de reação, em minutos.

50: fator aplicado para expressar o resultado em micromoles de ácido graxo por mL de amostra (Representa o número de micromoles de NaOH por mL em solução 0,05M).

Uma unidade de atividade lipásica foi definida como a quantidade de enzima que liberou 1 micromol (μmol) de ácidos graxos por minuto, nas condições padronizadas do teste.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A formação do halo indicador foi observada para amilase, celulase, poligalacturonase e lipase, o que sinaliza produção de enzima pelo fungo isolado I50 devido à hidrólise do substrato testado, amido, carboximetilcelulose, ácido poligalacturônico e óleo vegetal (triglicerídeo), respectivamente. Já não foi possível observar a formação de halo na placa com sacarose, indicando não haver produção de invertase. O isolado 50 (I50) apresentou halo de degradação maior para as enzimas poligalacturonase e lipase.

Com a avaliação qualitativa de formação de halo a partir da presença de substratos e fungo do gênero *Trichoderma* foi possível selecionar 4 enzimas para avaliação da atividade enzimática. Imagens das placas de Petri após cinco dias de incubação encontram-se agrupadas na Figura 4, com três tipos de resultados, grande formação de halo (lipase) o que representa maior produção de enzima, formação média de halo (amilase) e não formação de halo (invertase), o que indica não haver produção desta enzima pelo isolado selecionado.

Figura 4. Imagens de placas de Petri com meio BDA, células do fungo endofítico I50 e substratos para teste de Lipase, Amilase e Invertase.

Fonte: Dados da pesquisa

A partir da medição do halo formado (Dh) e o halo de crescimento do fungo (Dc) foi calculado o índice enzimático para todas as enzimas testadas, apresentado maior valor para as enzimas poligalacturonase e lipase (Tabela 1). Alguns estudos citam que microrganismos que apresentem índice enzimático (relação Dh/Dc) maior do que 1,2 são promissores (COLEN *et al.*, 2005). Assim o I50 apresentou-se promissor para a produção de todas as enzimas testadas, por apresentarem índice acima de 1,2, exceto para a invertase.

Tabela 1. Índice enzimático (IE) do isolado fúngico endofítico do gênero *Trichoderma* (I50).

Enzima	Índice enzimático
Amilase	2,53
Celulase	1,60
Invertase	---
Lipase	5,71
Poligalacturonase	5,83

Fonte: Dados da pesquisa

Quando se avalia o índice para a amilase observa-se que o valor foi maior que para celulase, isto pode estar relacionado com a complexidade que a celulose apresenta frente ao amido, pois a sua natureza insolúvel e estrutura cristalina dificultam a degradação da enzima (IRFAN *et al.*, 2012; CRAGG *et al.*, 2015).

Após o teste inicial do índice enzimático, foi determinada a atividade enzimática do I50 e observado o tempo de fermentação de maior produtividade para as enzimas amilase, celulase, poligalacturonase e lipase (Figura 5). Nota-se que o I50 produziu em maior escala as enzimas poligalacturonase ($5,056 \text{ U.mL}^{-1}$) e a lipase ($4,088 \text{ U.mL}^{-1}$), no período de 96 horas de fermentação. Em seguida, há uma estabilização na produtividade destas enzimas. Porém, com 48h de fermentação a enzima poligalacturase apresentou atividade de $4,845 \text{ U.mL}^{-1}$, valor este maior que a maior resultado de atividade da lipase (96h fermentação).

Figura 5. Atividade enzimática do I50 em função do tempo de fermentação

Fonte: Dados da pesquisa

A poligalacturonase é uma enzima pectinolítica que tem por ação hidrolisar ligações α -1,4 glicosídicas da cadeia polimérica da pectina. Esta enzima apresenta grande interesse

comercial por apresentar utilização nas mais diversas indústrias, como no branqueamento de papel ou no processamento de vegetais, na fermentação de chá e café, na fabricação de cerveja e na clarificação de sucos de frutas. Este último processo relaciona-se a diminuição na quantidade de pectina naturalmente presente em frutas, principalmente cítricas, que causa turbidez ao produto (KOZIOL *et al.*, 2017).

Considerando que foi utilizado óleo vegetal como fonte de carbono do meio de cultura para a fermentação submersa, o fungo do gênero *Trichoderma* apresentou-se bom produtor de poligalacturonase, pois manitol ou glicose seriam fontes de carbono com maior potencial de produção para a enzima em questão (AMIN *et al.*, 2020). Devido à presença desta fonte de carbono, acredita-se que a produção de lipase tenha sido estimulada, pois os ácidos graxos livres, principalmente o ácido oleico, são indutores de lipase, o que pode ter contribuído para um valor elevado da atividade enzimática (ATTAR & AMINIFAR, 2014). Microrganismos produtores de lipases são interessantes para o setor industrial, pelo fato de que a lipase possui vasta aplicação em diferentes áreas, por exemplo: alimentos, medicamentos, detergentes, biodiesel, efluentes, dentre outros (COLLA *et al.*, 2016; ROCHA *et al.*, 2020).

Já para a enzima amilase o tempo de fermentação de 48 horas foi suficiente para atingir o valor máximo da sua atividade, ocorrendo depois um decréscimo na produtividade. Em menor escala, a enzima celulase apresentou maior atividade quando alcançou o tempo de 96 horas de cultivo submerso.

A produção máxima das enzimas amilase e celulase poderiam ser melhoradas também se avaliada a fonte de carbono de maior impacto na produção destas enzimas, como glicose, amido e carboximetilcelulose. Outros fatores também poderiam ser avaliados, tais como concentração do inóculo, agitação, temperatura e tempo de cultivo (LI *et al.*, 2009).

A partir dos bons resultados encontrados na produção de enzimas pelo isolado fúngico endofítico de videira I50, identificado como do gênero *Trichoderma*, sugere-se a continuidade do presente estudo, avaliando mais fatores que interferiram no processo fermentativo, para posteriormente ampliação de produção. Já que o emprego de enzimas em processos industriais é fundamental para a obtenção de produtos de alta qualidade e de elevado valor agregado por tecnologias limpas.

4 CONCLUSÃO

O fungo filamentoso endofítico do gênero *Trichoderma* (I50) apresentou atividade enzimática, com predominância na produção da poligalacturonase, seguida da lipase. Esses resultados contribuem para o aprofundamento dos estudos da coleção de cultura de fungos do LPNBio e comprova o potencial desse fungo para diferentes finalidades.

REFERÊNCIAS

AMIN, FAIZA *et al.* Production, thermodynamic characterization, and fruit juice quality improvement characteristics of an Exo-polygalacturonase from *Penicillium janczewskii*. **BBA – Proteins and Proteomics**, 1868, 140379, 2020

ATTAR, F.; AMINIFAR, M. Spectroscopic techniques used for enzyme evaluation in food industry. **International conference on nutrition and food sciences**, v. 71, p. 23-27, 2014.

BON, E.P.S. *et al.* **Enzimas em Biotecnologia: Produção, Aplicação e Mercado: Bioprocessos para produção de enzimas**. Edição 1, Cap. 6. Editora: Interciência, Rio de Janeiro - RJ, p.95-122, 2008.

COLEN, G.; JUNQUEIRA, R.G.; MORAES-SANTOS, T. Isolation and screening of alkaline lipase-production fungi from Brazil savanna soil. **World Journal of Microbiology & Biotechnology**, v. 22, p. 881-885, 2005.

COLLA, LUCIENE MARIA *et al.* Surface response methodology for the optimization of lipase production under submerged fermentation by filamentous fungi. **Brazilian Journal of microbiology**, v. 47, p. 461-467, 2016.

CRAGG, S.M. *et al.* Lignocellulose degradation mechanisms across the Tree of Life. **Current Opinion in Chemical Biology**, v.29, p.108–119, 2015.

DINGLE, J.; TEID, W. W.; SOLOMONS, G. L. The enzymic degradation of pectin and other polysaccharides. **Journal of the Science of Food and Agriculture**, London, v. 4, n. 8, p. 149-155, 1953.

ESPOSITO, E.; AZEVEDO, J. L. **Fungos: uma introdução à biologia, bioquímica e biotecnologia**. Editora da Universidade de Caxias do Sul - EDUSC, p.510, 2004.

FEITOSA, I. C. **Produção de enzimas lipolíticas utilizando bactéria isolada de solo com histórico de contato com petróleo em fermentação submersa**. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Processos) – Universidade Tiradentes, Aracaju, p. 104, 2009.

FERNANDES, M. L. M. **Produção de lipases por fermentação no estado sólido e sua utilização em biocatálise**. Tese (Doutorado em Química) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, p. 131, 2007.

FLORENCIO, C., COURI, S., FARINAS, C. S. Correlation between agar plate screening and solid-state fermentation for the prediction of cellulase production by *Trichoderma* strains. **Enzyme Research**, p.1-7, 2012.

FOUKIS, A. *et al.* Purification, kinetic characterization and properties of a novel thermo-tolerant extracellular protease from *Kluyveromyces marxianus* IFO 0288 with potential biotechnological interest. **Bioresource Technology**, v. 123, p. 214–220, 2012.

GHOSE T. K. Measurement of cellulase activities. *Pure Andamp; Applied Chemistry*, v. 59, p. 257-268, 1987.

HIGGINBOTHAM, S.J. *et al.* Bioactivity of fungal endophytes as a function of endophyte taxonomy and the taxonomy and distribution of their host plants. **Plos One**, San Francisco, v.8, n.9, 2013.

IRFAN, M. *et al.* Isolation and screening of cellulolytic bacteria from soil and optimization of celulase production and activity. **Turkish Journal of Biochemistry**, v.37, n.3, p.287-293, 2012.

KAN, R. S. *et al.* Developments and opportunities in fungal strain engineering for the production of novel enzymes and enzyme cocktails for plant biomass degradation. **Biotechnology Advances**, v.37, 107361, 2019.

KOZIOL, A. *et al.* Changes of pectin nanostructure and cell wall stiffness induced in vitro by pectinase. **Carbohydrate Polymers**, 161, p. 197-207, 2017.

LI, J.; YUAN, H.; YANG, J. Bacteria and lignin degradation. **Frontiers of Biology in China**, v.4, n.1, p.29-38, 2009.

MILLER, G, L. Use of dinitrosalicylic acid reagent for determination of reducing sugar. **Analytical Chemistry**, v. 31, p.426-428, 1959.

OLIVEIRA, A.C.D. *et al.* Production and characterization of an extracellular lipase from *Candida guilliermondii*. **Brazilian Journal of Microbiology**, v. 45, p. 1503-1511, 2014.

ROCHA, K.S.C. *et al.* Two novel Lipases of Endophytic Fungi *Stemphylium lycopersici* and *Soldaria* sp: application in the synthesis of Monoacylglycerols. **Enzyme and Microbial Technology**, 109664, 2020.

PELLEGRINI, V.O.A. *et al.* Enzymes for lignocellulosic biomass polysaccharides valorization and production of nanomaterials. **Sustainable Chemistry**, 8 september, 100397, 2020.

SANTOS, A.A. *et al.* Dosagem de açúcares redutores com o reativo DNS em microplaca. **Brazilian Journal of Food Technology**, v.20, e2015113, 2017.

SIERRA, G. Simple method for detection of lipolytic activity of microorganisms and some observations on the influence of the contact between cells and fatty substrates. Antonie van Leeuwenhoek, **Journal of Microbiology**, v. 23, n.1, p.15-22, 1957.

WATANABE, N. *et al.* Isolation and identification of alkaline lipase producing microorganisms, cultural conditions and some properties. **Agricultural and Biological Chemistry**, v. 41, p. 1353-1358, 1977.

AVALIAÇÃO DO TEOR DE ZINCO EM *Pereskia grandfolia* Haw

Nelma Ferreira de Paula Vicente

Universidade Federal de Lavras, Departamento de Agricultura, Lavras, MG

<http://lattes.cnpq.br/4057985752747853>

ORCID: 0000-0001-5874-7076

Érica Alves Marques Marafeli

Universidade Federal de Lavras, Departamento de Agricultura, Lavras, MG

<https://orcid.org/0000-0003-1382-5012>

ORCID: 0000-0003-1382-5012

Michelle Carlota Gonçalves

Universidade Federal de Lavras, Departamento de Biologia, Lavras, MG

<https://orcid.org/0000-0002-9567-6905>

ORCID: 0000-0002-9567-6905

Abraão José Silva Viana

Universidade Federal de Lavras, Departamento de Agricultura, Lavras, MG

<https://orcid.org/0000-0002-3140-859X>

ORCID: 0000-0002-3140-859X

Roberta Hilsdorf Piccoli

Universidade Federal de Lavras, Departamento de Ciências dos Alimentos, Lavras, MG

<https://orcid.org/0000-0003-2334-9400>

ORCID: 0000-0003-2334-9400

Adjaci Uchoa Fernandes

Universidade de São Paulo, Instituto de Química, São Paulo, SP

<https://orcid.org/0000-0002-6915-9971>

ORCID: 0000-0002-6915-9971

Informações sobre o

artigo:

Recebido em:

14/09/2020

Aceite em:

16/09/2020

Data de publicação:

21/09/2020

Palavras-chave:

Ora-pro-nóbis

Hortaliça não

convencional

Minerais

RESUMO

Pereskia grandfolia Haw, popularmente conhecida no Brasil como ora-pro-nóbis, é considerada planta medicinal, classificada como uma hortaliça folhosa não convencional. É de fácil cultivo e propagação, de sabor agradável, rica em proteína. Pesquisas experimentais e clínicas têm reforçado a importância do zinco na saúde humana. O trabalho teve como objetivo avaliar a presença do micronutriente zinco nas folhas, no caule e nas flores da *Pereskia grandfolia* Haw. A análise do mineral foi realizada utilizando espectrofotometria de absorção atômica acoplado a UV visível. Foi observado maior quantidade de zinco nas flores da hortaliça (24,8 mg/kg). Nas folhas o resultado foi 23,8 mg/Kg e no caule 17,8 mg/Kg. Portanto, ora-pro-nóbis pode complementar as necessidades diárias de zinco.

EVALUATION OF THE ZINC CONTENT IN *Pereskia grandifolia* Haw

ABSTRACT

Keywords:

Ora-pro-nobis

Non-conventional

vegetables

Minerals

Pereskia grandifolia Haw, popularly known in Brazil as ora-pro-nobis, it is considered a medicinal plant, classified as an unconventional leafy vegetable. It is easy to cultivate and propagate, with a pleasant taste, rich in protein. Experimental and clinical research has reinforced the importance of zinc in human health. The work aimed to evaluate the presence of the micronutrient zinc in the leaves, stem and flowers of *Pereskia grandifolia* Haw. The mineral analysis was performed using atomic absorption spectrophotometry coupled with visible UV. A greater amount of zinc was observed in the flowers of the vegetable (24,8 mg / kg). In the leaves the result was 23,8 mg / Kg and in the stem 17,8 mg / Kg. Therefore, ora-pro-nóbis can supplement daily zinc requirements.

1 INTRODUÇÃO

Popularmente conhecida como ora-pro-nóbis a *Pereskia grandifolia* Haword apresenta alto potencial de utilização no conjunto das hortaliças não-convencionais do latim seu nome popular significa “rogai por nós” a espécie pertence ao reino *Plantae*, classe *Magnoliopsida*, ordem *Caryophyllales*, família *Cactaceae* e gênero *Pereskia* (SOUZA, 2016).

Originária de regiões temperadas e tropicais das Américas, particularmente de clima quente e seco, compreendendo plantas arbóreas, perenes de hábito variado e geralmente espinhosas, possuem caules lenhosos bem desenvolvidos, folhas suculentas e flores terminais dispostas em cimeiras consumida pelas populações rurais e urbanas (CARVALHO *et al.*, 2019).

Por apresentar flores de grande beleza *P. grandifolia* Haw. tem sido cultivada como planta ornamental. Dados etnobotânicos revelam que as folhas são empregadas topicamente como emoliente na medicina popular, em razão do seu conteúdo mucilaginoso. Na Malásia as folhas desta espécie são usadas no tratamento de câncer, hipertensão, diabetes mellitus e doenças associadas ao reumatismo. No Brasil são muito consumidas na culinária do estado de Minas Gerais, sendo comumente encontrada nessa região, levando indústrias alimentícias a incluí-las em complementos alimentares, devido ao alto teor do biopolímero arabinogalactana (SIMÃO, 2015).

Além do alto teor de biopolímeros, segundo a RDC nº 54/2012 (BRASIL, 2012), a espécie pode ser considerada um alimento funcional devido ao seu alto teor de proteína (aproximadamente 25%), com alta digestibilidade (80%), 3,35g / 100g de cálcio, 2,42g / 100g

de potássio, 1,13g / 100g de fósforo, 0,45g / 100g de magnésio e 0,98g / 100g de enxofre, folha (140,36 ppm) e caule (88,75 ppm) ferro. Esses dados também atendem às características antioxidantes da planta. Essa composição faz desta planta uma importante aliada contra deficiência nutricional humana em proteínas, macronutrientes e micronutrientes (SILVEIRA *et al.*, 2020). As folhas de ora-pro-nóbis não apresentam toxicidade e devido ao seu elevado valor proteico, muitas vezes é chamada de forma popular como “carne de pobre” (SOBRINHO *et al.*, 2015).

Recentes pesquisas experimentais e clínicas têm reforçado a importância do zinco na saúde humana. O zinco é um mineral que se encontra amplamente distribuído em todo o corpo humano, porém em concentrações traço (1,5g a 2,5g). Apesar da quantidade, a sua deficiência está relacionada a quadros patológicos graves que surgem em sua grande maioria em função da deficiência alimentar, presença de compostos quelantes nos alimentos, distúrbios no processo de absorção gastrointestinal ou aumento na excreção urinária (SILVEIRA *et al.*, 2020).

As recomendações diárias de ingestão (RDI) do zinco são de 11mg/dia para homens e 8 mg/dia para mulheres adultas. Em algumas fases da vida, as necessidades deste mineral estão aumentadas, como na gestação, infância, puberdade e senilidade (HAMBIDGE *et al.*, 2008). A deficiência leve de zinco é um problema nutricional comum, especialmente entre crianças de países em desenvolvimento, nos quais a dieta apresenta menor disponibilidade, por ser rica em cereais e pouco uso do leite materno (Salgueiro *et al.* 2002). Esta deficiência pode ter graves consequências para a saúde nessa fase da vida, como retardo no crescimento, aumento na incidência de doenças infecciosas e prejuízo na função cognitiva, sendo indispensável medidas implementadas com ações visando a prevenção e o combate à deficiência desse nutriente (CHEOW *et al.*, 2019).

O zinco possibilita várias funções bioquímicas, pois é componente de inúmeras enzimas, dentre estas, álcool desidrogenase, superóxido dismutase, anidrase carbônica, fosfatase alcalina e enzimas do sistema nervoso central. Participa na divisão celular, expressão genética, processos fisiológicos como crescimento e desenvolvimento, na transcrição genética, na morte celular, age como estabilizador de estruturas de membranas e componentes celulares, além de participar da função imune e desenvolvimento cognitivo. Sua deficiência pode causar alterações fisiológicas como, hipogonadismo, danos oxidativos, alterações do sistema imune, hipogeusia, danos neuropsicológicos e dermatites. (MAFRA; COZZOLINO, 2004).

Considerando o alto valor nutricional da espécie e a grande atuação no corpo humano o trabalho teve como objetivo avaliar a presença do micronutriente zinco nas folhas, no caule e nas flores da *Pereskia grandifolia* Haw.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Exsicatas da espécie foram registradas no herbário PAMG da EPAMIG (Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais) sob o número de registo PAMG 58224. A hortaliza foi coletada no Horto de Plantas Medicinais da UFLA, em outubro de 2016; um galho de cada planta foi sorteado, e neste foi retirado todas as folhas, caules e flores. As folhas foram imersas em água destilada durante 10 min para lavagem, e posteriormente, junto com os caules e flores, foram submetidas a desidratação em estufa ventilada, a 55°C, durante 24 horas. Após o período de secagem, as amostras foram trituradas em moinho elétrico para se obter amostras homogêneas, colocadas em frascos e mantidas à temperatura ambiente. A análise do mineral foi realizada seguindo metodologia sugerida por Malavolta et al (1997), utilizando espectrofotometria de absorção atômica acoplado a UV visível, no Departamento de Química da UFLA.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados de zinco nas flores, folhas e caule de *Pereskia grandifolia* Haw (ora-pro-nóbis) estão descritos na Tabela 1.

Tabela 1. Quantidade de zinco nas flores, folhas e caule de *Pereskia grandifolia* Haw (ora-pro-nóbis).

Quantidade de zinco (mg/Kg)		
Flores	Folhas	Caule
24,8	23,8	17,8

Fonte: Dados da pesquisa

Como resultado foi observado maior quantidade de zinco nas flores da hortaliza (24,8 mg/Kg). Nas folhas o resultado foi 23,8 mg/Kg e no caule 17,8 mg/Kg. TAKEITI et al (2009) realizou análises nutricionais de *Pereskia aculeata* Miller e encontrou 267mg/kg de zinco nas folhas desta espécie, caule e flores não foram avaliados. DE ALMEIDA et al (2014) quantificou o zinco na farinha de folhas de *P. grandifolia* e *P. aculeata* Miller. Em *P. grandifolia* foi encontrada uma média de 49,3 mg/kg e na *P. aculeata* Miller 73 mg/kg

Outra hortaliça muito consumida no Brasil e sempre recomendada por seus valores nutricionais é o espinafre (*Spinacia oleracea* L), o estudo de KORNDÖRFER et al (2015) comparou os valores de minerais em espinafres de cultura convencional e orgânica, no Rio Grande do Sul. Na cultura orgânica a quantidade de zinco encontrada foi de 4,5 mg/kg enquanto na convencional 3,8 mg/kg. Esse mesmo estudo também analisou repolho (*Brassica oleracea* L. var capitata) nos dois tipos de cultura, na orgânica o valor encontrado de zinco foi de 3 mg/kg e na convencional 3,3 mg/kg.

As diferenças na composição nutricional de *P. grandifolia* nos estudos realizados podem estar relacionadas, principalmente, ao tipo de solo cultivado e os nutrientes disponíveis nele, ao clima do local de cultivo e a diferentes temperaturas e altitudes que também influenciam na composição química das plantas, ocasionando a expressão de diferentes fenótipos.

Conforme regulamento técnico sobre a ingestão diária recomendada (IDR) a quantidade de zinco ideal para um adulto é de 7 mg/d (FAO/OMS). Uma folha de *P. grandifolia* possui aproximadamente 25 g, portanto, para atingir a necessidade diária de zinco é necessário consumir 12 folhas da hortaliça. As flores de *P. grandifolia* apresentam uma maior quantidade de Zn, porém elas não são habitualmente consumidas no Brasil. Já as folhas fazem parte da culinária tradicional de diversas cidades mineiras e em várias regiões do país.

4 CONCLUSÃO

Considerando o importante papel do zinco como um nutriente mineral no corpo humano, os países em desenvolvimento necessitam de programas com maior relevância em educação alimentar e nutricional sobre a *Pereskia grandifolia*.

Os resultados mostram que a ora-pro-nóbis pode complementar as necessidades diárias de zinco, especialmente para populações carentes pelo fácil acesso. Além disso, os dados corroboram para o incentivo do uso de alimentos regionais com potencial nutritivo e para a utilização das flores de ora-pro-nóbis na alimentação, já que estas apresentaram valor considerável de zinco e baixo custo de produção e cultivo.

REFERÊNCIAS

- CARVALHO, M. F. F.; LEONARDO, M. M.; MENDES, M. P.; GESSER, V.; MONTEIRO, C. C. F.; PERALTA, R. M.; MONTEIRO, A. R. G. Centesimal evaluation of two species of ora-pro-nóbis (*pereskia aculeata* miller and *pereskia grandifolia* haw) and application in extruded product. **Chemical Engineering Transactions**, v. 75, n. p. 325-330, 2019.
- CHEOW, P. S.; SHAFEE, N.; LIEW, S. Y.; HAMID, M. Effects of methanolic plant extracts on cell proliferation and HIF activity under hypoxic condition in vitro. **Asia-Pacific Journal of Molecular Biology and Biotechnology**, v. 27, n. 1, p. 1-9, 2019.
- DE ALMEIDA, Martha Elisa Ferreira *et al.* Caracterização química das hortaliças não-convencionais conhecidas como ora-pro-nóbis. **Bioscience Journal**, v. 30, n. 3, 2014.
- DUARTE, M.R.; HAYASHI, S.S. Estudo anatômico de folha e caule de *Pereskia aculeata* Mill. (Cactaceae). **Revista Brasileira de Farmacognosia**, v.15, n.2, p.103-109, 2005.
- FAO/OMS. Human and Mineral Requirements. **In: Report 7th Joint FAO/OMS Expert Consultation**. Bangkof, Thailand, 286p., 2001.
- FARAGO, P.V. *et al.* Atividade antibacteriana de óleos essenciais de *Ocimum selloi* Benth. (*Lamiaceae*). Publicatio UEPG: **Ciências Biológicas e da Saúde**, v.10, n.4, p.59-63, 2004.
- HAMBIDGE, Michael K.; MILLER Leland V.; WESTCOTT, Jamie E. *et al.* Dietary Reference Intakes for Zinc May Require Adjustment for Phytate IntakeBased upon Model Predictions. **Journal of Nutrition**, v.138, p.2363–2366, 2008.
- KAZAMA, C. C.*et al.* Involvement of arginine-vasopressin in the diuretic and hypotensive effects of *Pereskia grandifolia* Haw.(Cactaceae). **Journal of Ethnopharmacology**, v.144, p.86-93, 2012.
- KORNDÖRFER, Katiana; MACIEL, Mônica Jachetti; DE SOUZA, Claucia Fernanda Volken. Determinação de minerais em hortaliças orgânicas e convencionais cultivadas no vale do Taquari, RS. **Revista Brasileira de Tecnologia Agroindustrial**, v. 9, n. 1, 2015.
- MAFRA, D.; COZZOLINO, S.M.F. The importance of zinc in human nutrition. **Revista de Nutrição**, v.17, n.1, p.79-87.
- MALAVOLTA, E.; VITTI, G. C.; OLIVEIRA, S. A. **Avaliação do estado nutricional das plantas**. Piracicaba: Potafós, 1997. 319p.
- ROCHA, D.R.C. *et al.* Macarrão adicionado de ora-pro-nóbis (*Pereskia aculeata* Miller) desidratado. **Alimentos e Nutrição**, v.19, n.4, p.459-465, 2008.
- ROSA, S.M.; SOUZA, L.A. Morfo-anatomia do fruto (hipanto, pericarpo e semente) em desenvolvimento de *Pereskia aculeata* Miller (Cactaceae). **Acta Scientarium Biological Sciences**, v.25, n.2, p.415-428, 2003.

SALGUEIRO M. J. ; ZUBILLAGA M. B. ; LYSIONEK A. E. ; CARO R. A.; WEILL R. ; BOCCIO J. R. The role of zinc in the growth and development of children. **Nutrition** 2002; 18:510-519.

SOBRINHO, S. S. *et al.* Emulsified cooked sausages enriched with flour from ora-pro-nobis leaves (*Pereskia aculeata* Miller). **International Food Research Journal** (IFRJ), v.22, p.318-323, 2015.

TAKEITI, Cristina Y. *et al.* Nutritive evaluation of a non-conventional leafy vegetable (*Pereskia aculeata* Miller). **International journal of food sciences and nutrition**, v. 60, n. sup1, p. 148-160, 2009.

SOUZA, L. F. *et al.* Temperature requirements for seed germination of *Pereskia aculeata* and *Pereskia grandifolia*. **Journal of Thermal Biology**, v. 57, p. 6-10, 2016.

SIMÃO, A. A.; Correa, A. D.; Carvalho, T. C. L; Cesar P. H. S.; Oliveira, C. H. M; Marcussi, S. Pharmaco-toxic characterization of the aqueous extract from *Pereskia grandifolia* leaves. **Journal of Medicinal Plants Research**, [S. l.], v. 9, n. 7, p. 216-222, Feb. 2015.

SILVEIRA, M. G.; PICININ, C. T. R.; CIRILLO, M. Â; FREIRE, J. M.; BARCELOS, M. F. P. Nutritional assay *pereskia* spp.: Unconventional vegetable. **Anais da Academia Brasileira de Ciências**, v. 92, n. p. 1-16, 2020.

PESQUISA DE PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS DE QUALIDADE EM LEITE OVINO DE CONJUNTO

Tatiana Regina Vieira

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias, Porto Alegre, RS

<http://lattes.cnpq.br/0524141331306616>

<https://orcid.org/0000-0002-4531-8974>

Andrea Troller Pinto

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Veterinária, Porto Alegre, RS

<http://lattes.cnpq.br/5128560186039381>

<https://orcid.org/0000-0003-467639-3025>

Verônica Schmidt

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Veterinária, Porto Alegre, RS

<http://lattes.cnpq.br/1443941093004699>

<https://orcid.org/0000-0003-1666-8577>

Informações sobre o

artigo:

Recebido em:

15/09/2020

Aceite em:

16/09/2020

Data de publicação:

21/09/2020

Palavras-chave:

Indicadores

Ovelha

Bactérias

RESUMO

Com o objetivo avaliar a qualidade microbiológica do leite de ovelha *in natura*, coletaram-se mensalmente amostras de leite do tanque de expansão ou tarros, em quatro unidades produtivas (UP). Não foi evidenciada a presença de *Salmonella* contudo, isolaram-se *Escherichia coli* (3 UP), *Staphylococcus aureus* e *Listeria murrayi* (1 UP). Observaram-se coágulos homogêneos (38,7%) (sugestivo de bactérias lácticas) e sem líquido (38,7%) (indicativo da presença de inibidores bacterianos). O teste de redutase indicou a maioria (54,8%) das amostras com qualidade muito boa e a contagem média de mesófilos foi 2×10^7 UFC.mL⁻¹ e de coliformes termotolerantes de 2×10^6 UFC.mL⁻¹. Os microrganismos isolados, assim como os resultados das provas de lactofermentação e redutase, foram indicativos da adoção de práticas de higiene ineficientes das instalações ou do sistema de ordenha, passíveis de correção por meio de manejo adequado.

RESEARCH OF QUALITY MICROBIAL PARAMETERS IN EWE MILK

ABSTRACT

In order to evaluate the microbiological quality of fresh sheep's milk, milk samples were collected monthly from the bulk tank, in four production units (UP). The presence of *Salmonella* was not evidenced, however, *Escherichia coli* (3 UP), *Staphylococcus aureus* and *Listeria murrayi* (1 UP) were isolated. Homogeneous clots (38.7%) (suggestive of lactic bacteria) and without liquid (38.7%) (indicative of the presence of bacterial inhibitors) were observed. The reductase test indicated the majority (54.8%) of the samples with very good quality and the average mesophilic count was 2×10^7 CFU.mL⁻¹ and thermotolerant coliforms of 2×10^6 CFU.mL⁻¹. The

Keywords:

Indicators

Dairy sheep

Microorganisms

isolated microorganisms, as well as the results of the lactofermentation and reductase tests, were indicative of the adoption of inefficient hygiene practices in the facilities or the milking system, which can be corrected through proper management

1 INTRODUÇÃO

Microrganismos indicadores podem ser utilizados para avaliar aspectos gerais da qualidade de alimentos, assim como mensurar aspectos relativos à vida de prateleira ou segurança alimentar (JAY, 2005).

De acordo com Castanheira (2010), os microrganismos atuam nos alimentos de três formas: coadjuvantes de fabricação, deterioradores e patogênicos; sendo que as análises microbiológicas têm como objetivo avaliar as operações de higiene, da qualidade dos produtos e do atendimento à legislação.

A presença de microrganismos no leite é indicativo de problema sanitário no rebanho ou emprego de práticas de higiene não adequadas e tem repercussão direta na qualidade do leite, gerando perdas econômicas e comprometendo a segurança alimentar.

As bactérias do grupo coliforme habitam o intestino, solo, água contaminada e plantas. A presença de microrganismos deste grupo em leite cru pode ser indicativa de contaminação por patógenos (CASTANHEIRA, 2010), assim como a presença de *Staphylococcus*, da sanidade da glândula mamária. Desta forma, a qualidade microbiológica do leite de rebanho reflete a adoção de boas práticas agropecuárias (BPA).

O presente estudo teve como objetivo avaliar a qualidade microbiológica do leite de ovelha *in natura*.

2 METODOLOGIA

O estudo foi realizado na região da Serra Gaúcha. A seleção dos rebanhos se deu por conveniência (THRUSFIELD, 2004), atendendo ao total de unidades produtivas (UP) na região de estudo.

Realizou-se avaliação microbiológica de 31 amostras de leite de conjunto/rebanho ovino, ao longo de sete meses de produção leiteira, em quatro rebanhos no Rio Grande do Sul. Para tanto, foram avaliadas a contagem padrão de microrganismos mesófilos (contagem global), contagem de *Staphylococcus aureus*, quantificação de Coliformes Totais e Coliformes Termotolerantes, pesquisa de *Listeria* sp. e pesquisa de *Salmonella* sp. Em 24 amostras

realizou-se, também, a contagem de microrganismos psicotróficos. Os testes foram realizados segundo a descrição de Castanheira (2010).

Realizaram-se os testes de lactofermentação e redutase, segundo Fagundes (1997). O teste de lactofermentação está baseado na formação de coágulos e, a partir deste, pode-se inferir sobre os microrganismos presentes no leite; o teste da redutase tem como objetivo avaliar, indiretamente, a carga microbiana do leite. A prova está fundamentada na presença da enzima redutase, produzida pela maioria dos microrganismos, que modifica o potencial de oxirredução do leite, descolorindo o azul de metileno. O tempo de redução é dependente da carga microbiana, ou seja, quanto maior a carga microbiana, mais rápida será a descoloração do indicador.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Não foi evidenciada a presença de *Salmonella* sp. Em uma amostra, proveniente da UP3, identificou-se a presença de *Listeria murrayi*. Identificou-se a presença de *Staphylococcus aureus* em 8 (25,8%) amostras, provenientes de três UP, exceto a UP4, com contagens variando de $1,8 \times 10^2$ a $5,1 \times 10^6$ ufc.mL⁻¹.

Na pesquisa de coliformes verificou-se presença de Coliformes Totais em 23 (74,2%) amostras provenientes da quatro Unidades Produtivas (UP), com contagens médias variando de $6,7 \times 10^2$ a $5,9 \times 10^3$ ufc.mL⁻¹, com média de $2,9 \times 10^3$ ufc.mL⁻¹. A contaminação do leite por coliformes pode provocar o desenvolvimento de odores indesejáveis e, até mesmo, a coagulação deste em decorrência da produção de ácido láctico (CASTANHEIRA, 2010).

Quanto aos Termotolerantes, verificou-se presença deste grupo de microrganismos em 5 (16,13%) amostras, provenientes da quatro UP com contagem média de $1,1 \times 10^2$ e presença de *E. coli* em 80% destas (Tabela 1).

Tabela 1. Contagens de Coliformes Termotolerantes (CT) em 5 amostras de leite de rebanho ovino, de acordo com a Unidade Produtiva (UP) de origem e a presença de *E. coli*.

UP	CT Ufc.mL ⁻¹	<i>E. coli</i>
1	$5,6 \times 10^1$	positivo
2	$2,5 \times 10^3$	positivo
2	$1,0 \times 10^1$	negativo
3	$3,0 \times 10^2$	positivo
4	$2,4 \times 10^2$	positivo

Fonte: Dados da pesquisa

Os coliformes termotolerantes constituem um subgrupo dos coliformes totais, sendo o principal representante *E. coli*. A presença destes microrganismos determina contaminação de origem fecal, indicando risco de da presença de patógenos (CASTANHEIRA, 2010). A origem da contaminação pode ser a água (MATEUS *et al.*, 2015) utilizada na higienização de úbere e equipamentos.

Na contagem de mesófilos, 93,5% das amostras apresentaram resultados acima do limite estabelecido pela IN76/2018 ($3,0 \times 10^5$) (BRASIL, 2018). Apenas as UP 3 e 4, em geral, apresentaram menores contagens de microrganismos mesófilos (Figura 1). Cabe frisar que a legislação para leite bovino é usada como parâmetro, já que não existe regra específica para leite ovino.

Figura 1. Contagem (Log10) de microrganismos mesófilos totais em amostras de leite ovino de quatro unidades produtivas (UP), segundo o mês de amostragem

Fonte: Dados da pesquisa

A presença de microrganismos mesófilos, em grande número em alimentos, pode ser indicativa de deficiência higiênica na obtenção da matéria-prima, aplicação de processo tecnológico inadequado, manipulação higiênica incorreta do produto ou manutenção em condições inadequadas (CASTANHEIRA, 2010).

Pereira *et al.* (2012) verificaram que o tipo de estocagem do leite (tanque de expansão ou imersão) na UP tem influência nas contagens de mesófilos, sendo que o tanque de expansão apresentou menores contagens (7%) do que amostras provenientes de tanques de imersão (43%). Este fato torna-se importante à medida que nas UP de ovinos leiteiros, existe uma tendência à utilização de tanques de imersão (FAVA, 2012).

Nos microrganismos psicrotróficos, a contagem máxima foi de $2,5 \times 10^6$ ufc.mL⁻¹, sendo que em quatro (16,7%) não houve crescimento destes microrganismos. Estes

microrganismos têm seu crescimento favorecido em leite armazenado resfriado por períodos superiores a 48 horas (PEREIRA *et al.*, 2012).

Também em estudo realizado em UP no Paraná e Rio Grande do Sul, foram observadas elevadas médias para CBT ($7,3 \times 10^6$ UFC.mL⁻¹) e psicrotróficos ($5,8 \times 10^6$ UFC.mL⁻¹); contudo, os autores encontraram maior percentual (100%) de amostras com crescimento de *S. aureus* ($2,2 \times 10^5$ UFC.mL⁻¹) e coliformes totais ($2,3 \times 10^5$ UFC.mL⁻¹); porém, menor proporção (45%) de amostras com crescimento de *E. coli*. Os resultados microbiológicos indicaram elevada incidência de mastite nos rebanhos, deficiência na aplicação de boas práticas de ordenha e falhas na higienização (MERLIN JUNIOR, 2013).

Na prova de lactofermentação se observaram quatro tipos de coágulos (Tabela 2). Também Pinto *et al.* (2006) observaram coágulos homogêneos ou gelatinosos em grande parte (32,3%) das amostras coletadas em tanques individuais, indicando a predominância de bactérias lácticas, que correspondem aos tipos de coágulos desejáveis à indústria de laticínios, por indicar a boa qualidade bacteriológica de amostras de leite cru.

Segundo Fagundes (1997), a partir do tipo de coágulo presente no teste de lactofermentação, tem-se uma ideia das bactérias presentes nas amostras de leite podendo, indiretamente, indicar as condições de higiene na obtenção do leite. A presença de coágulos floculosos pode ser indicativa de lavagem e enxague ineficientes de equipamentos e de coágulos sulcados, contaminação com fezes ou forragens, sendo que a presença de microrganismos contaminantes no leite pode interferir na qualidade do produto final.

Já, a inexistência de coágulo, observado em 38,7% das amostras analisadas, pode estar relacionada à presença de resíduos de substâncias antimicrobianas (PINTO *et al.*, 2006).

Tabela 2. Tipos de coágulos observados em teste de lactofermentação, em amostras de leite de rebanho ovino.

Tipo de coágulo	Nº amostras (%)	Bactérias predominantes ¹
Homogêneo	12 (38,71)	Bactérias da flora mesofílica e flora láctica abundante
Ausência de coágulo	12 (38,71)	Pouca presença de flora láctica, leite mastítico, presença de inibidores
Sulcado	5 (16,13)	Predominância de bactérias da flora láctica e coliformes
Floculoso	2 (6,45)	Bactérias psicrófilas

Fonte: Dados da pesquisa

Os testes de redutase têm sido amplamente utilizados na indústria de lácteos uma vez que são provas simples, baratas, rápidas (TRONCO, 1997) O teste de redutase, pela

descoloração do azul de metileno – TRAM (FAGUNDES, 1997; TRONCO, 1997), apresentou tempos que variaram de 6 a 1 horas e a qualidade, de Muito Boa à Péssima. Verificou-se que a maioria (54,7%) das amostras foram classificadas como muito boas (Tabela 3).

Tabela 3. Classificação de qualidade de amostras de leite pela prova de redutase, em rebanhos ovinos provenientes de quatro unidades produtivas no RS.

Classificação de qualidade	Unidade Produtiva				Total (%)
	1	2	3	4	
Muito boa	3	5	5	4	17 (54,84)
Boa	1	0	0	2	3 (9,68)
Satisfatória	2	1	1	1	5 (16,13)
Ligeiramente contaminada	1	1	2	1	5 (16,13)
Péssima	0	1	0	0	1 (3,23)
Total	8	10	11	12	31 (100, 00)

Fonte: Dados da pesquisa

A redução rápida (<1h30min) é indicativa de alta carga bacteriana e de piores condições de manejo na UP (FAGUNDES, 1997). Isto porque, o teste fundamenta-se em que as bactérias presentes no leite, ao se multiplicarem, utilizam os elementos nutricionais e, quanto mais contaminado, ou seja, maior o número de microrganismos, mais rápida será a descoloração. Embora presente, amostras nesta condição foram em número reduzido (3,23%) e em apenas uma UP.

Embora largamente utilizados pela indústria de laticínios para avaliar de forma indireta a qualidade microbiológica do leite, os testes de redutase podem apresentar resultados falso-negativos ou falso-positivos em leite refrigerado mascarando, portanto, a qualidade real do produto e devem ser usados com muita cautela para o leite refrigerado, independentemente da estocagem na propriedade (PEREIRA *et al.*, 2012).

4 CONCLUSÃO

Neste estudo foi possível observar a presença de microrganismos no leite que podem interferir na qualidade deste e de seus derivados. O isolamento de *Staphylococcus* coagulase positiva pode estar relacionado a problemas de sanidade no rebanho. Entretanto, os demais microrganismos isolados, em especial a presença de *E. coli*, indica práticas inadequadas de higiene geral, com a presença de contaminação de origem fecal. Os resultados encontrados na lactofermentação e TRAM indicam que é possível e recomendado melhorar as práticas de higiene e conservação, do leite, corroborando os achados microbiológicos.

REFERÊNCIAS

BRASIL – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 76, de 26 de novembro de 2018**. Estabelece os Regulamentos Técnicos que fixam a identidade e as características de qualidade que devem apresentar o leite cru refrigerado, o leite pasteurizado e o leite pasteurizado tipo A. Disponível em: <<http://sistemasweb.agricultura.gov.br/sislegis/action/detalhaAto.do?method=consultarLegislacaoFederal>>.

CASTANHEIRA, Ana Carolina Guimarães. **Controle de Qualidade de Leite e Derivados**. São Paulo: Cap-Lab, 2010.

FAGUNDES, C. M. **Inibidores e controle de qualidade do leite**. Pelotas: UFPel, 1997.

FAVA, Luisa Wolker. **Caracterização físico-química do leite de ovelhas da raça Lacaune e análise do rendimento de coalhada com caracterização física do soro obtido**. 2010. 73f. Dissertação (Mestrado em Ciências veterinárias) Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2012.

JAY, James M. **Microbiologia de Alimentos**. 6ed. São Paulo: Artmed, 2005.

MATEUS, T. A. P. *et al.* Quantificação de coliformes totais e termotolerantes em amostras de leite caprino e água utilizada na ordenha em propriedades de assentamentos rurais no município de Mossoró/RN. **Ciências Veterinárias nos Trópicos**, Recife-PE, v. 18, n. 2, p. 224-227, mai/ago. 2015.

MERLIN JUNIOR, I. A. **Caracterização físico-química e microbiológica do leite de ovelha Lacaune produzido em duas propriedades no Sul do Brasil**. 2013. 58f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia do Leite) Universidade Norte do Paraná - UNOPAR, Londrina, 2013.

PEREIRA, J. G. *et al.* Testes de Redutase para a Avaliação da Qualidade de Leite Cru Refrigerado, **UNOPAR Científica. Ciências Biológicas e Saúde**, v. 14, n. 2, p. 77-80, 2012.

PINTO, C. L. O. *et al.* Qualidade microbiológica de leite cru refrigerado e isolamento de bactérias psicotróficas proteolíticas, **Ciência e Tecnologia de Alimentos**, v. 26, n. 3, p. 645-651, 2006.

THRUSFIELD, Michael. **Epidemiologia veterinária**. 2.ed. São Paulo: Roca, 2004.

TRONCO, Vania Maria. **Manual de inspeção da qualidade do leite**. Santa Maria: UFSM, 1997.

www.editorainvivo.com

Avance na ciência! Venha ser In Vivo!