MULTIPLICIDADE DAS CIÊNCIAS AGRÁRIAS

VOL. 1

ORGANIZADORES:

LUIS DE FRANÇA CAMBOIM NETO

EVERTON NOGUEIRA SILVA

MULTIPLICIDADE DAS CIÊNCIAS AGRÁRIAS
VOLUME 1

LUIS DE FRANÇA CAMBOIM NETO

EVERTON NOGUEIRA SILVA

(Organizadores)

2021

2021 by Editora In Vivo
Copyright © Editora In Vivo
Copyright do Texto © 2021 O autor
Copyright da Edição © 2021 Editora In Vivo

Esta obra está licenciada com uma Licença [Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) (CC BY 4.0).

O conteúdo desta obra e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade exclusiva dos autores. Permitido o download da obra e o compartilhamento desde que sejam atribuídos créditos aos autores, mas sem a possibilidade de alterá-la de nenhuma forma ou utilizá-la para fins comerciais.

Editor Chefe

Dr. Everton Nogueira Silva

Conselho Editorial

1 Colégio de Ciências da Vida

1.1 Ciências Agrárias

Dr. Aderson Martins Viana Neto
Dra. Ana Paula Bezerra de Araújo
MSc. Edson Rômulo de Sousa Santos
Dr. Fágner Cavalcante P. dos Santos
MSc. Filomena Nádia Rodrigues Bezerra
Dra. Lina Raquel Santos Araújo
Dr. Luis de França Camboim Neto
MSc. Maria Emília Bezerra de Araújo
MSc. Yuri Lopes Silva

1.2 Ciências Biológicas

Dra. Antonia Moemía Lúcia Rodrigues Portela

1.3 Ciências da Saúde

Dr. Isaac Neto Goes Silva
Dra. Maria Verônica Coelho Melo
MSc. Paulo Abílio Varella Lisboa
Dra. Vanessa Porto Machado
Dr. Victor Hugo Vieira Rodrigues

2 Colégio de Humanidades

2.1 Ciências Humanas

Dra. Alessandra Maria Sousa Silva
MSc. Francisco Brandão Aguiar
MSc. Julyana Alves Sales

2.2 Ciências Sociais Aplicadas

MSc. Cícero Francisco de Lima
MSc. Erivelton de Souza Nunes
Dra. Maria de Jesus Gomes de Lima
MSc. Maria Rosa Dionísio Almeida
MSc. Marisa Guilherme da Frota

3 Colégio de Ciências Exatas, Tecnológica e Multidisciplinar

3.1 Ciências Exatas e da Terra

MSc. Francisco Odécio Sales
Dra. Irvila Ricarte de Oliveira Maia

3.2 Engenharias

MSc. Amâncio da Cruz Filgueira Filho
MSc. Gilberto Alves da Silva Neto
MSc. Henrique Nogueira Silva
Dr. João Marcus Pereira Lima e Silva
MSc. Ricardo Leandro Santos Araújo

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação - CIP

C176m	Camboim Neto, Luís de França. Multiplicidade das ciências agrárias [livro eletrônico]. / Organizadores: Luís de França Camboim Neto e Everton Nogueira Silva. Fortaleza: Editora In Vivo, 2021. 82 p. Bibliografia. ISBN: 978-65-993899-2-4 DOI: 10.47242/978-65-993899-2-4 1.Ciências Agrárias. 2. Ciências Agrárias – Multiplicidade. I. Título.
-------	--

CDD 630

Denise Marques Rodrigues – Bibliotecária – CRB-3/CE-001564/O

APRESENTAÇÃO

A agricultura e a pecuária passaram na atual contemporaneidade por fases de evolução e adequação, saindo de um modelo de agricultura baseado no modo de produção agroecológico para um modelo mais tecnificado e dependente de insumos agroquímicos, implementos e maquinários agrícolas, tendo por base os pacotes tecnológicos da chamada Revolução Verde que foi tão amplamente difundida a partir da segunda metade do século XX, no Brasil e no mundo. Criou-se modelos técnicos de produções agropecuárias baseados na monocultura e pecuária tanto intensiva como extensiva produtoras de royalties. Surge a partir de então uma pergunta, tais modelos foram ou são realmente sustentáveis a partir do tripé econômico, social e ambiental?

No sentido de avançarmos nas atualizações das pesquisas científicas tão necessárias para o universo das ciências agrárias - Agronomia, Zootecnia e Medicina Veterinária - tem-se neste livro uma série de trabalhos acadêmicos que buscam apresentar avanços significativos que possam ampliar e vir a contribuir com o desenvolvimento do universo agrário, servindo de base para trabalhos correlatos, tornando a grande área das ciências agrárias um universo mais equilibrado e ambientalmente sustentável. Tenham uma boa leitura!

Everton Nogueira Silva

Luís de França Camboim Neto

SUMÁRIO

Capítulo 1 - DOI: [10.47242/978-65-993899-2-4-1](https://doi.org/10.47242/978-65-993899-2-4-1)

COMPOSIÇÃO QUÍMICA E ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DE EXTRATOS
PROVENIENTES DE SUBPRODUTOS DA INDÚSTRIA
CAFEIRA..... 06

Capítulo 2 - DOI: [10.47242/978-65-993899-2-4-2](https://doi.org/10.47242/978-65-993899-2-4-2)

OCORRÊNCIA DE CROSTA-NEGRA NA CULTURA DA SERINGUEIRA NO
ESTADO DE SÃO PAULO..... 21

Capítulo 3 - DOI: [10.47242/978-65-993899-2-4-3](https://doi.org/10.47242/978-65-993899-2-4-3)

FORMULAÇÃO FUNGICIDA NATURAL À BASE DE EXTRATO DE
Azadirachta indica PARA USO COMO DEFENSIVO AGRÍCOLA..... 27

Capítulo 4 - DOI: [10.47242/978-65-993899-2-4-4](https://doi.org/10.47242/978-65-993899-2-4-4)

AVALIAÇÃO DE TRÊS TÉCNICAS DE ENRIQUECIMENTO AMBIENTAL
PARA CACHORROS-DO-MATO (*Cerdocyon thous*, Linnaeus, 1766) EM
CATIVEIRO..... 40

Capítulo 5 - DOI: [10.47242/978-65-993899-2-4-5](https://doi.org/10.47242/978-65-993899-2-4-5)

Gyropus ovalis BURMEISTER, 1838 (PHTHIRAPTERA: GYROPIDAE) EM
PORQUINHOS-DA-ÍNDIA (*Cavia porcellus* LINNAEUS, 1758) (RODENTIA:
CAVIIDAE), JOÃO PESSOA, PARAÍBA, BRASIL.....48

Capítulo 6 - DOI: [10.47242/978-65-993899-2-4-6](https://doi.org/10.47242/978-65-993899-2-4-6)

DIFERENTES MÉTODOS PARA AVALIAR O TEOR DE ÁGUA EM
SEMENTES DE *Ormosia grossa* Rud..... 55

Capítulo 7 - DOI: [10.47242/978-65-993899-2-4-7](https://doi.org/10.47242/978-65-993899-2-4-7)

DESEMPENHO DE PNEU AGRÍCOLA EM ENSAIO DE SUPERFÍCIE RÍGIDA
EM FUNÇÃO DE DIFERENTES CARGAS E PRESSÕES DE
INFLAÇÃO..... 62

Capítulo 8 - DOI: 10.47242/10.47242/978-65-993899-2-4-8

RURALIDADE DO SEMIÁRIDO: CONCEITOS NORTEADOS SOBRE
SOCIEDADE, TERRITÓRIO E ÁGUA NA CONTEMPORANEIDADE..... 69

Capítulo 9 - DOI: 10.47242/10.47242/978-65-993899-2-4-9

HORTA COMUNITÁRIA COMO PROMOÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA
PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL..... 80

SOBRE OS ORGANIZADORES.....85

ÍNDICE REMISSIVO.....87

COMPOSIÇÃO QUÍMICA E ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DE EXTRATOS PROVENIENTES DE SUBPRODUTOS DA INDÚSTRIA CAFEEIRA

Ingridy Simone Ribeiro

Instituto Federal do Sul de Minas Gerais – Campus Muzambinho, MG

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5091628420765230>

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4286-0952>

Adriene Ribeiro Lima

Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, RJ

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6516064880031804>

Amanda Tristão Santini

Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2539281202461641>

Rafaela Franco Dias Bruzadelli

Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, Campus Muzambinho, MG

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3783163754266881>

Mário Lúcio Vilela de Resende

Universidade Federal de Lavras, Lavras, MG

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8921922898103482>

**Informações sobre o
artigo:**

Recebido em:

10/02/2021

Aceito em:

13/02/2021

Data de publicação:

27/04/2021

Palavras-chave:

Compostos bioativos

Cafeína

Compostos fenólicos

Ácido clorogênico

Café

RESUMO

Os subprodutos da indústria cafeeira podem ser fontes de moléculas bioativas que poderão ser utilizadas na indústria, tornando-se uma opção sustentável para a obtenção das mesmas. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi caracterizar e avaliar a atividade antioxidante de extratos aquosos de subprodutos da indústria cafeeira. Foram utilizados subprodutos produzidos na Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé, Cooxupé (Guaxupé-MG), codificados como PVA e RA44. Foram analisados os seguintes parâmetros: composição centesimal e mineral, ácidos graxos, compostos fenólicos, pH, índice de acidez e peróxido, estabilidade oxidativa e atividade antioxidante. O teor de proteína bruta ficou entre 8,0% e o extrato etéreo foi em torno de 2,0%. Para os açúcares totais, o teor do extrato RA44 foi 8,18% e do extrato PVA foi de 4,03%. RA44 apresentou maior variedade em ácidos graxos, 14 no total, enquanto PVA apresentou 9 tipos de ácidos graxos diferentes. Detectaram-se 9 minerais, sendo os maiores teores para ferro, zinco, manganês, cobre e potássio. O pH encontrado de 5,78 para o PVA e 5,63 para o RA44. O índice de acidez foi de 4,73 e 4,93 mg NaOH/g para PVA e RA44, respectivamente. O índice de peróxido foi nulo. Os extratos apresentaram estabilidade oxidativa em torno de 496 dias. O extrato RA44 apresentou teor de compostos fenólicos totais maior (6,62 g AG/100g) que o extrato PVA (6,05 g AG/100g). Para o

ácido clorogênico, o maior teor foi para o extrato PVA, já para a cafeína, o maior teor para o extrato RA44. Verificou-se que o teor de vitamina C para o PVA foi o dobro do que o teor encontrado para o RA44. Para atividade antioxidante, a amostra PVA apresentou menor IC₅₀ (76,70 µg/mL) que RA44 (129,02 µg/mL). Esses resultados abrem perspectivas para o uso do PVA e RA44 como ingredientes de novos produtos.

CHEMICAL COMPOSITION AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF EXTRACTS FROM COFFEE INDUSTRY BY-PRODUCTS

ABSTRACT

By-products of the coffee industry can be sources of bioactive molecules that can be used in industry, making it a sustainable option for obtaining them. Thus, the objective of this work was to characterize and evaluate the antioxidant activity of aqueous extracts from by-products of the coffee industry. By-products produced at the Regional Cooperative of Coffee Growers in Guaxupé, MG, coded as PVA and RA44 were used. The following parameters were analyzed: chemical and mineral composition, fatty acids, phenolic compounds, pH, acidity and peroxide index, oxidative stability and antioxidant activity. The crude protein content was between 8.0% and the ether extract was around 2.0%. For total sugars, the content of the RA44 extract was 8.18% and the PVA extract was 4.03%. RA44 presented a greater variety in fatty acids, 14 in total, while PVA presented 9 different types of fatty acids. Nine minerals were detected, with the highest levels for iron, zinc, manganese, copper and potassium. The pH found was 5.78 for PVA and 5.63 for RA44. The acidity index was 4.73 and 4.93 mg NaOH / g for PVA and RA44, respectively. The RA44 extract had a higher content of total phenolic compounds (6.62 g AG / 100g) than the PVA extract (6.05 g AG / 100g). For chlorogenic acid, the highest content was for PVA extract, while for caffeine, the highest content was for RA44 extract. It was found that the vitamin C content for PVA was twice as high as the content found for RA44. For antioxidant activity, the PVA sample showed a lower IC₅₀ (76.70 µg / mL) than RA44 (129.02 µg / mL). These results open perspectives for the use of PVA and RA44 as ingredients of new products.

Keywords:

Bioactive compounds

Caffeine

Phenolic compounds

Chlorogenic acid

Coffee

1 INTRODUÇÃO

O café é uma das plantas mais consumidas e estudadas ao redor do mundo pelos seus compostos bioativos. Os países que mais consomem café no mundo são os Estados Unidos e o Brasil, com um consumo de aproximadamente 25 a 20 milhões de sacas, respectivamente. O café é uma das 5 mercadorias mais exportadas pelos países em

desenvolvimento no mundo, sendo um produto base da economia brasileira, cuja produção em 2020 totalizou uma área cultivada de 2,16 milhões de hectares. (SAMOGGLA; RIEDEL, 2018). A grande produção e consumo de café no Brasil levam a geração de uma enorme quantidade de subprodutos, que representam perda de matéria-prima e energia e, se dispostos inadequadamente, podem gerar um problema ambiental devido ao grande acúmulo de matéria orgânica no meio ambiente. Apesar da grande quantidade de resíduos gerados, apenas uma pequena porcentagem é aproveitada em razão do desconhecimento do potencial de sua reutilização.

O grão de café possui uma grande variedade de minerais, aminoácidos, lipídios, açúcares, vitaminas, cafeína e em maior quantidade que todos os demais componentes, os ácidos clorogênicos, que são os principais compostos bioativos presentes no café (MELO et al., 2011). Estes compostos são relacionados às atividades antioxidante, anti-inflamatória, hipoglicêmica, hipolipidêmica e prebiótica. Portanto, o subproduto gerado após a extração do óleo em grãos de café, denominado de “torta”, é uma potencial fonte de muitos desses compostos benéficos à saúde humana (BAE et al., 2014; IRIONDO-DEHOND et al., 2020).

A reutilização dos subprodutos provenientes da cadeia produtiva do café pode ser fundamentada na existência de compostos fenólicos, tais como o ácido clorogênico e cafeico, com propriedades antioxidantes (BALASUNDRAM et al., 2006). Tais compostos apresentam valor agregado potencial, podendo ser utilizados como ingredientes funcionais na indústria alimentícia, farmacêutica e cosmética.

O primeiro passo para determinar o valor nutritivo de produtos alternativos é a análise da composição química, pois por meio da mesma, determina-se se há condições deste produto ser potencialmente utilizado (PIMENTA et al., 2011).

Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi caracterizar os extratos aquosos de subprodutos da indústria cafeeira por meio da sua composição centesimal e teor de compostos bioativos, bem como avaliar o seu potencial antioxidante *in vitro*.

2 MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Material

Foram utilizados subprodutos produzidos em grande escala na Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé, Cooxupé (Guaxupé-MG), sendo estes codificados como PVA

e RA44. Tais subprodutos, tanto conhecidos como “torta”, foram provenientes da extração do óleo de grãos não utilizados no processamento do café.

2.2 Preparo dos extratos aquosos

Foram pesados 20 kg de resíduos e adicionados 100 L de água. A extração foi feita padronizando-se o tempo até atingir o ponto de ebulição e pressão de 100 KPa. Em seguida, o extrato foi centrifugado e concentrado até 50° Brix.

2.3 Composição centesimal e minerais

O teor de umidade, proteínas, lipídeos e açúcares totais foram determinados em triplicata seguindo IAL (2008). Os minerais foram determinados por espectrofotometria de absorção atômica (IAL, 2008).

2.4 Perfil e teor de ácidos graxos

Após a extração dos lipídeos, seguiu-se com o preparo dos ésteres metílicos de ácidos graxos. Foram pesados cerca de 100 mg da amostra em tubo de centrífuga de 20 mL com tampa. Foram adicionados 2 mL de n-hexano e em seguida 0,2 mL de solução metanólica de KOH 2 M. O tubo foi fechado e agitado em vortex por 30 seg. Foram adicionados 3 mL de solução saturada de cloreto de sódio. A mistura foi deixada em repouso até a separação das fases. A fase superior foi utilizada para a análise por cromatografia em fase gasosa. Foi utilizado cromatógrafo gasoso com as seguintes condições operacionais: coluna Supelco 2560 com dimensões de 10m x 0,25mm x 0,2 µm; programação da temperatura da coluna para 45 °C por 4 min, primeira rampa de 13 °C/min até 175 °C (27 min), segunda rampa de 4 °C/min até 215 °C (35 min), temperatura do injetor 220 °C, temperatura do detector 220 °C e razão de divisão da amostra 1:50. Foi injetado 1 µL da amostra no cromatógrafo utilizando microseringa de 10 µL. Os picos foram identificados por comparação com os tempos de retenção dos padrões de ésteres metílicos com os componentes separados da amostra, utilizando-se o *software* YL-Clarity (IAL, 2008).

2.5 Teor de compostos fenólicos

Uma alíquota de cada um dos extratos (25 µL) a 0,1 mg/mL foi misturada com 125 µL do reagente Folin-Ciocalteu (diluído em água destilada 1:10) e 100 µL de Na₂CO₃ (4% m/v em água destilada). Após 2 h de incubação ao abrigo da luz e à temperatura ambiente, a absorbância foi medida em espectrofotômetro a 740 nm. Os resultados do teor de compostos fenólicos totais foram expressos como equivalentes de ácido gálico (mg AG/g), calculados por meio de uma curva construída com concentrações que variaram de 5 a 100 µg/mL (SINGLETON; ORTHOFER; LAMUELA-RAVENTOS, 1999).

2.6 Teor de ácido clorogênico, cafeína e vitamina C por cromatografia líquida

As análises por Cromatografia Líquida de Ultra Eficiência foram feitas injetando-se dois microlitros de cada extrato em um cromatógrafo líquido, marca Waters, acoplado a um detector de arranjo de fotodiodos a 240 nm e uma coluna Waters Acquity UPLC BHE C18 (2,1 x 100 mm), com tamanho da partícula 1,7µm. A fase móvel utilizada foi água/ácido acético (99,5 : 0,5 v/v) (solvente A) e água/ácido acético/n-butanol (92,5:0,5:7 v/v) (solvente B). O fluxo foi de 0,45mL/min. O gradiente utilizado foi o seguinte: 10% solvente A (24 s); 5% de A (até 2 min e 24 s); 5% de A (3 min e 24 s); 1% de A (até 3 min e 30 s); 1% de A (4 min e 30 s); 5% de A (até 4 min e 48 s); 5% de A (4 min e 54 s); 10% de A (até 8 min). A coluna foi mantida a uma temperatura constante de 40 °C e os cromatogramas foram processados utilizando o *software Empower PRO*. Os compostos foram identificados pelo espectro de absorção na região ultravioleta, utilizando os recursos do detector de arranjo de fotodiodos, pela comparação do tempo de retenção e co-cromatografia de padrões. Foram utilizados os padrões autênticos de ácido clorogênico, cafeína e ácido ascórbico.

2.7 Medida do pH

A medida do pH foi realizada por meio de potenciômetro digital Digimed, sendo utilizados 10 g de amostra e 100 mL de água destilada (IAL, 2008).

2.8 Índice de Acidez

Foram pesados 2 g da amostra e adicionados 25 mL de solução de éter-álcool (2:1). Em seguida, adicionaram-se duas gotas do indicador fenolftaleína. A titulação foi feita com solução de hidróxido de sódio 0,1 M até o aparecimento da coloração rósea, persistente por 30 segundos (IAL, 2008).

2.9 Índice de Peróxido

Foram pesados 5 g da amostra e adicionados 30 mL da solução ácido acético-clorofórmio (3:2). Em seguida, 0,5 mL de solução saturada de KI foram adicionados e deixado em repouso ao abrigo da luz por um minuto. Acrescentou-se 30 mL de água e titulou-se com solução de tiosulfato de sódio 0,1 N, com constante agitação, até que a coloração amarela tenha quase desaparecido. Por fim, foram adicionados 0,5 mL de solução de amido indicadora e continuou-se com a titulação até o completo desaparecimento da coloração azul (IAL, 2008).

2.10 Estimativa de vida útil por estabilidade oxidativa

Amostras de 50 mL dos extratos aquosos PVA e RA44 foram inseridas no equipamento Oxipres, Mikrolab Asrhus, à temperatura de 100 °C e pressão de oxigênio de 0,5 MPa (DANISCO, 2007). As leituras do decaimento da pressão de oxigênio, causada pela reação deste elemento com radicais livres produzidos pela oxidação da amostra, compuseram a curva que, traçada em função do tempo, permitiu a determinação do período de indução e a extensão de vida útil, calculados pelo software do próprio equipamento.

2.11 Atividade antioxidante pelo sequestro de radical livre DPPH

Diferentes concentrações das amostras (entre 400 e 1,56 µg/mL, em diluição seriada de razão 2) em uma solução etanólica (200 µL) foram misturados com 50 µL de DPPH (0,5 mM, diluído em etanol). Depois da incubação por 30 min, ao abrigo da luz, em temperatura ambiente, a absorbância foi medida em 517 nm. O branco foi composto por todos os reagentes, exceto os extratos. Ácido ascórbico e BHT foram utilizados como

controle positivo. A propriedade de sequestro foi calculada em porcentagem de radicais DPPH sequestrados, usando a seguinte equação: Sequestro de radical DPPH (%) = [(absorbância do branco – absorbância da amostra) / (absorbância branco)] x 100. Os valores foram apresentados como média das análises em triplicata. O valor EC₅₀ é a concentração efetiva que pode sequestrar 50% dos radicais DPPH da solução (YEN et al., 2005).

2.12 Análise Estatística

Como o objetivo do trabalho foi caracterizar os extratos aquosos, a análise estatística foi realizada somente para a análise do potencial antioxidante pelo sequestro de radical livre DPPH, para a comparação da atividade dos extratos frente aos padrões. A avaliação estatística dos resultados foi realizada por meio do *software* SISVAR 5,3, pela análise de variância (ANAVA) e aplicado o Teste de Scott-Knott para observar as diferenças significativas entre os valores médios ($p < 0,05$) (SCOTT; KNOTT, 1974).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foi possível observar para a composição centesimal que para umidade, proteína e lipídeos, os teores apresentaram-se semelhantes entre as amostras (Tabela 1). O teor de proteína bruta ficou entre 8,0% e o extrato etéreo foi em torno de 2,0%. Já para os açúcares totais, observou-se que o teor do extrato aquoso RA44 foi aproximadamente o dobro (8,18%) com relação ao extrato aquoso PVA (4,03%).

Tabela 1 - Composição centesimal dos extratos aquosos PVA e RA44.

Análises	*PVA	*RA44
Umidade e voláteis (%)	53,67 ± 0,4	51,84 ± 0,2
Proteína bruta (%)	8,67 ± 0,3	8,71 ± 0,1
Extrato etéreo (%)	2,08 ± 0,0	2,10 ± 0,0
Açúcares totais (%)	4,03 ± 0,6	8,18 ± 0,1

Fonte: dados da pesquisa

***Valores expressos como média (n=3) ± desvio padrão.**

De acordo com Vasconcelos et al. (2005), o grão identificado como PVA apresentou 14,72% de proteína e 8,30% de lipídeos. Os resultados encontrados na

composição centesimal dos extratos aquosos dos subprodutos PVA e RA44 são inferiores aos encontrados para o grão de café *in natura*. Esse fato era esperado, já que o material foi submetido à outros processamentos, como a extração de óleo.

O grão de café verde possui alto teor de carboidratos (em torno de 60% do peso seco) incluindo polissacarídeos solúveis e insolúveis. O teor de lipídeos é entre 8-18% (peso seco), com Arábicas sendo significativamente maior que Robustas. Proteínas, peptídeos e aminoácidos livres somam entre 9-16% (peso seco), sendo os principais aminoácidos a asparagina, ácido glutâmico, alanina, ácido aspártico e lisina (LUDWIG et al., 2014).

A Tabela 2 descreve o perfil de ácidos graxos dos extratos aquosos PVA e RA44. Foi possível observar que o RA44 apresentou maior variedade em ácidos graxos, 14 no total, sendo 7 saturados e 7 insaturados. Já o PVA apresentou 9 tipos de ácidos graxos diferentes, sendo 5 saturados e 4 insaturados.

Com relação aos ácidos graxos saturados, o RA44 apresentou maior teor, sendo o ácido esteárico (C18:0), o majoritário. Para o PVA, o ácido graxo detectado em maior teor foi o ácido palmítico (C16:0).

Para os insaturados, o maior teor encontrado foi para o PVA (1,79%). Dentre os ácidos graxos monoinsaturados, o ácido oleico foi o encontrado em maior teor, em ambas amostras. Nos poli-insaturados, o ácido linoleico foi o majoritário, sendo seu teor no PVA 3 vezes maior que no RA44.

Tabela 2 - Perfil de ácidos graxos dos extratos aquosos PVA e RA44.

Análises	PVA	RA44
Gorduras Saturadas (%)	0,76	1,05
Ác. Mirístico (C14:0)	0,01	0,09
Ác. Pentadecanóico (C15:0)	0,00	0,02
Ác. Palmítico (C16:0)	0,57	0,02
Ác. Margárico (C17:0)	0,00	0,01
Ác. Esteárico (C18:0)	0,12	0,74
Ác. Araquídico (C20:0)	0,05	0,01
Ác. Behênico (C22:0)	0,01	0,16
Gorduras Insaturadas (%)	1,79	1,13
Gorduras Monoinsaturadas (%)	0,42	0,51
Ác. Palmitoléico (C16:1)	0,00	0,10
Ác. Oléico (C18:1n9c)	0,41	0,37
Ác cis-Eicosenóico (C20:1)	0,01	0,04
Gorduras Poli-insaturadas (%)	1,37	0,62
Ác. Linoleico (C18:2n6c)	1,17	0,37
Ác. Linolênico (C18:3n3)	0,00	0,03
Ác. Araquidônico (C20:4n6)	0,00	0,02
Ác. Cis-Docosahexaenóico DHA (C22:6n3)	0,20	0,20
Gorduras Trans	0,00	0,00

Fonte: dados da pesquisa

Apesar da matéria prima utilizada na elaboração dos extratos aquosos ter passado previamente pelo processo de extração de óleo, pode-se observar que os sub-produtos resultantes ainda possuem ácidos graxos considerados importantes, como o palmítico, oleico, linoleico e linolênico. Os lipídeos constituem cerca de 7-17% do peso seco do café, dos quais 75% são triglicerídeos e os outros lipídeos são esteróis (estigmasterol, sitosterol) e ácidos graxos, como o linoleico, linolênico, oleico, palmítico, araquídico e behênico (CORNELIO-SANTIAGO et al., 2017).

Com relação à composição mineral dos extratos, detectaram-se 9 minerais, sendo os maiores teores quantificados para ferro, zinco, manganês, cobre e potássio. Os teores de cobre e zinco encontrados no extrato RA44 foram o dobro dos teores encontrados para o extrato PVA (Tabela 3).

Tabela 3 - Composição mineral dos extratos aquosos PVA e RA44.

Análises	PVA	RA44
Cálcio (%)	0,08	0,08
Fósforo (%)	0,53	0,09
Potássio (%)	5,32	4,70
Magnésio (%)	0,22	0,23
Cobre (mg/kg)	8,96	16,40
Cobalto (mg/kg)	<5,00	<5,00
Manganês (mg/kg)	6,93	14,50
Ferro (mg/kg)	36,22	28,16
Zinco (mg/kg)	10,18	24,44

Fonte: dados da pesquisa

A composição mineral do grão pode variar com o estado nutricional do cafeeiro (MALTA et al., 2003). De acordo com Barcelos et al. (2001), a polpa do café apresentou teor de minerais totais de 8,5%. Foram encontrados valores de 1240 mg/kg para o ferro, 21,30 mg/kg para o zinco, 71,54 mg/kg para o manganês, 0,37% para cálcio, 0,17% para fósforo e 0,18% para manganês. Não foram encontrados na literatura pesquisada trabalhos que abordem a composição mineral do grão de café.

Os extratos aquosos PVA e RA44 tiveram o pH, índice de acidez e índice de peróxido analisados (Tabela 4). O pH encontrado em ambas amostras foi levemente ácido, de 5,78 para o PVA e 5,63 para o RA44. O índice de acidez foi de 4,73 e 4,93 mg NaOH/g para PVA e RA44, respectivamente. O índice de peróxido foi nulo, não sendo detectados peróxidos ou outras substâncias resultantes da oxidação de gorduras. Os extratos aquosos apresentaram estabilidade oxidativa pelo método Oxipres semelhantes, em torno de 496 dias.

Tabela 4 - Caracterização físico-química e estabilidade oxidativa dos extratos aquosos PVA e RA44.

Análises	*PVA	*RA44
pH	5,78 ± 0,0	5,63 ± 0,0
Índice de Acidez (mg NaOH/g)	4,73 ± 0,4	4,93 ± 0,3
Índice de Peróxido (meq/ kg gordura)	0,00	0,00
Estabilidade oxidativa – oxipres (dias)	497	496

Fonte: dados da pesquisa

***Valores expressos como média (n=3) ± desvio padrão.**

Os estudos sobre pH em grão de café estão ligados à bebida e aceitação do produto pelo consumidor. Sivetz e Desrosier (1979) indicam que o pH ideal deve estar entre 4,95 a 5,20 tornando o café palatável, sem excesso de amargor ou acidez. Siqueira et al., 2006 encontraram o valor de pH de 5,88 para o grão de café cru. Não foram encontrados na literatura dados sobre pH em resíduos da indústria cafeeira.

A determinação da acidez pode fornecer um dado importante na avaliação do estado de conservação do óleo (IAL, 2008). Siqueira et al. (2006) encontraram o valor de 2,5 mg NaOH/g em grão de café cru.

O método do Oxipres também é considerado um método acelerado e o processo de oxidação é monitorado pelo consumo de oxigênio, o qual é registrado através das mudanças na pressão, em um recipiente hermeticamente fechado contendo este gás (RIBEIRO et al., 2014). Os testes acelerados permitem estimar, de forma rápida, a estabilidade oxidativa de uma matéria graxa ou a eficácia “teórica” de um antioxidante isolado ou em associação. (Frankel et al., 1993). Deste modo, os testes de estabilidade acelerados assumem particular importância na rotina analítica. Não foram encontrados na literatura dados sobre estimativa de vida útil em produtos e resíduos da indústria cafeeira.

De acordo com os resultados obtidos (Tabela 5), pode-se verificar que o extrato aquoso RA44 apresentou teor de compostos fenólicos totais maior (6,62 g AG/100g) que o extrato aquoso PVA (6,05 g AG/100g). Estudos mostram que a concentração de polifenóis é baixa quando seus teores se encontram abaixo de 1g EAG/100 g; média, quando estão entre 1 e 5g EAG/100 g e alta, quando estão acima de 5g EAG/100 g (VASCO; RUALES; KAMAL-ELDIN, 2008). Diante disso, os resultados indicam que ambos extratos apresentam alto teor de polifenóis, sendo, portanto, interessantes fontes de compostos fenólicos.

Para o ácido clorogênico, o maior teor foi para o extrato PVA, já para a cafeína, o maior teor para o extrato RA44. Para Iriondo-DeHond et al. (2020), a quantidade de cafeína em subprodutos da indústria cafeeira varia de 0,1% a 1,4%, corroborando com o resultado do presente trabalho. Além disso, verificou-se que o teor de vitamina C para o PVA foi o dobro do que o teor encontrado para o RA44. A vitamina C é um potente antioxidante, o que também possibilita o seu uso como conservante em alimentos em substituição a antioxidantes sintéticos.

Tabela 5 - Teor de compostos bioativos dos extratos aquosos PVA e RA44

Compostos bioativos	*PVA	*RA44
Fenólicos Totais (g AG/100 g)	6,05	6,62
Ácido clorogênico (%)	1,64	1,49
Cafeína (%)	0,90	1,54
Vitamina C (mg/Kg)	62,75	30,51

Fonte: dados da pesquisa

***Valores expressos como média (n=3) $\pm$ desvio padrão.**

De acordo com Ludwig et al. (2014), o café verde contém uma variedade de (poli) fenóis em torno de 6-10% do peso seco, mais alto em Robustas do que em Arábicas. Os principais componentes são os ácidos cafeoilquínicos, especialmente o ácido clorogênico, seguido por teores mais baixos de ácidos feruloilquínicos e dicafeoilquínicos.

A capacidade antioxidante é definida pela habilidade que alguns compostos redutores possuem para sequestrar os radicais livres, reduzindo o estresse oxidativo e o desenvolvimento de algumas doenças (HALLIWELL, 2012). Atualmente, não existe um método oficial para determinar essa capacidade antioxidante em alimentos de origem vegetal e seus subprodutos, tendo em vista os vários mecanismos antioxidantes que podem ocorrer. Sendo assim, com relação ao potencial antioxidante, observou-se pela Tabela 7 que, para reduzir em 50% os radicais livres DPPH da solução, a amostra PVA necessitou de um menor teor quando comparada a RA44. O IC₅₀ para o PVA foi de 76,70 µg/mL, pouco maior ao padrão BHT, que foi de 70,11 µg/mL.

Tabela 7 - Potencial antioxidante (IC₅₀ µg/mL) pelo método do sequestro de radical livre DPPH dos extratos aquosos PVA e RA44 e dos padrões hidroxibutiltolueno (BHT) e ácido ascórbico.

Tratamentos	IC ₅₀ µg/mL
PVA	76,70 $\pm$ 0,3 ^c
RA44	129,02 $\pm$ 0,5 ^d
BHT	70,11 $\pm$ 0,2 ^b
Ácido Ascórbico	6,49 $\pm$ 0,1 ^a

Valores expressos como média (n=3) $\pm$ desvio padrão. Médias seguidas por letras diferentes são estatisticamente diferentes a 5% (Scott-Knott p<0,05).

Ambos extratos apresentaram em sua composição química alto teor de compostos fenólicos. Muitos fatores influenciam na atividade antioxidante dos compostos de natureza fenólica, em especial a posição de substituição e o número de grupos hidroxila (OH), as propriedades de outros grupos substituintes e a possibilidade de formação de ligações de hidrogênio (CHENG et al., 2003). Conforme detectado por CLAE (Tabela 5), os extratos contém em sua composição química o ácido clorogênico, que possui duas hidroxilas no anel benzênico. Isso pode explicar a expressiva atividade antioxidante apresentada no método DPPH (Tabela 7).

Tanto o ácido clorogênico como a cafeína vêm sendo indicados como compostos com potencial atividade antioxidante. O ácido clorogênico tem uma contribuição majoritária na expressão de enzimas responsáveis pelas defesas antioxidantes endógenas e atividade anticarcinogênica através da inibição da DNA metiltransferase. Já a cafeína aumenta a proteção contra os radicais livres, além de outras atividades biológicas como termogênica e lipolítica (BARCELOS et al., 2020; PEREIRA et al., 2020).

4 CONCLUSÃO

Os resultados preliminares mostraram que os resíduos apresentam quantidades significativas de compostos bioativos, bem como atividade antioxidante *in vitro*, com destaque para o PVA. Esses resultados abrem perspectivas para o uso do PVA e RA44 como ingredientes de novos produtos, tanto para a indústria farmacêutica como de cosméticos, sendo fontes naturais de compostos bioativos com atividade antioxidante. Outra forma de aproveitamento possível é seu uso na agricultura, como fonte de defensivos agrícolas naturais.

REFERÊNCIAS

- BAE, J. H.; PARK, J. H.; IM, S. S.; SONG, D; K; Coffee and health. **Integrative Medicine Research**, v. 3, n. 4, 2014.
- BALASUNDRAM, N.; SUNDRAM, K.; SAMMAN, S. Phenolic compounds in plants and agrindustrial by-products: Antioxidant activity, occurrence and potential uses. **Food Chemistry**, Barking, v. 99, n. 1, p. 191–203, 2006.
- BARCELOS, R. P.; LIMA, F. D.; CARVALHO, N. R.; BRESCIANI, G.; ROYES, L. F. F. Caffeine effects on systemic metabolismo, oxidative-inflammatory pathways, and exercise performance. **Nutrition Research**, ed. 80, 2020.

BARCELOS, A.F.; PAIVA, P.C.A.; PÉREZ, J.R.O.; SANTOS, V.B.; CARDOSO, R.M. Composição química da casca e polpa desidratada de café (*Coffea arabica* L.) armazenadas em diferentes períodos. **Anais do II Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil**. Vitória – ES, 2001.

CHENG, Z.; REN, J.; YAN, G.; LI, Y.; CHANG, W.; CHEN, Z. Quantitative elucidation of the molecular mechanisms of hydroxyl radical quenching reactivity of phenolic compounds. **Bioorganic Chemistry**, v.31, n.2, p.149-162, 2003.

CORNELIO-SANTIAGO, H. P.; GONÇALVES, C. B.; OLIVEIRA, N. A.; OLIVEIRA, A. L. Supercritical CO₂ extraction of oil from green coffee beans: solubility, triacylglycerol composition, thermophysical properties and thermodynamic modelling. **The Journal of Supercritical Fluids**, v. 137, 2020.

DANISCO A/S. **Manual de Operacional e Analítico: Oxipres ML**. Copenhagen, Denamark, 2007.

INSTITUTO ADOLFO LUTZ (IAL). **Métodos físico-químicos para análise de alimentos**. 4. ed. São Paulo, 2008.

IRIONDO-DEHOND, A.; IRIONDO-DEHOND, M.; CASTILLO, M. D. Applications of compounds from coffee processing by-products. **Biomolecules**, v. 10, n. 1219, 2020.

FRANKEL, E.N. In search of better methods to evaluate natural antioxidants and oxidative stability in food lipids. **Trends in Food Science & Technology**, v. 4, n. 7, p. 220-225, 1993.

HALLIWELL, B. Free radicals and antioxidants: Updating a personal view. **Nutrition Reviews**, 2012.

LUDWIG, I. A.; CLIFFORD, M. N.; LEAN, M. E. J.; ASHIHARA, H.; CROZIER, A. Coffee: biochemistry and potential impact on health. **Food & Function**, v. 5, n. 8, 2014.

MALTA, M.R.; NOGUEIRA, F.D.; GUIMARAES, P.T.G. Composição química, produção e qualidade do café fertilizado com diferentes fontes e doses de nitrogênio. **Ciência e Agrotecnologia**, v. 27, n. 6, p. 1246-1252, 2003.

MELO, P. S. et al. Composição fenólica e atividade antioxidante de resíduos agroindustriais. **Ciência Rural**, v. 41, n. 6, p. 1088-1093, 2011.

PEREIRA, G. V. M.; NETO, D. P. C.; JÚNIOR, A. I. M.; PRADO, F. G.; PAGNONCELLI, M. G. B.; KARP, S. G.; SOCCOL, C. R. Chemical composition and health properties of coffee and coffee by-products. **Advances in Food and Nutrition Research**, v. 91, 2020.

PIMENTA, C.J.; OLIVEIRA, M.M.; FERREIRA, L.O.; PIMENTA, M.E.S.G.; LOGATO, P.V.R.; LEAL, R.S.; MURGAS, L.D.S. Aproveitamento do resíduo do café na alimentação de Tilápia do Nilo. **Archivos de Zootecnia**, v. 60, n. 231, p. 583-593, 2011.

RIBEIRO, I. S.; SHIRAHIGUE, L. D.; SUCASAS, L. F. A.; CARPES, S. T.; OETTERER, M. Evaluation of antioxidant activity of seaweed through accelerated oxidation methods. **International Food Research Journal**, ed. 21, n. 5, 2014.

SAMOGGLA, A.; RIEDEL, B. Coffee consumption and purchasing behavior review: insights for further research. **Appetite**, n. 129, p. 70-81, 2018.

SCOTT A, KNOTT, M. Cluster-analysis method for grouping means in analysis of variance. **Biometrics**, v. 30, p. 507-512, 1974.

SINGLETON, V. L.; ORTHOFER, R.; LAMUELA-RAVENTOS, R. M. Analysis of total phenols and other oxidation substrates and antioxidants by means of Folin-Ciocalteu Reagent. **Methods in Enzymology**, v. 299, p. 152-178, 1999.

SIQUEIRA, H. H.; ABREU, C. M. P. Composição físico-química e qualidade do café submetido a dois tipos de torração e com diferentes formas de processamento. **Ciência e Agrotecnologia**, v.30, n.1. p. 112-117, 2006.

SIVETZ, M.; DESROSIER, N. W. Physical and chemical aspects of coffee. **Coffee Technology**, Westpor, p. 527- 575, 1979.

VASCO, C.; RUALES, J.; KAMAL-ELDIN, A. Total phenolic compounds and antioxidant capacities of major fruits from Ecuador. **Food Chemistry**, v. 111, p. 816-823, 2008.

VASCONCELOS, A.L.; FRANÇA, A.S.; OLIVEIRA, L.S.; GLÓRIA, M.B. **Avaliação comparativa da composição química centesimal de grãos defeituosos e sadios de café**. 2005. Disponível em <http://www.sbicafe.ufv.br/handle/10820/1343>. Acesso em 20 de dez. 2020.

YEN, W. J.; CHANG L.W.; DUH, P. D. Antioxidant activity of peanut seed testa and its antioxidative component, ethyl protocatechuate. **Food Science and Technology**. v. 38, n.1, p. 193-200, 2005.

OCORRÊNCIA DE CROSTA-NEGRA NA CULTURA DA SERINGUEIRA NO ESTADO DE SÃO PAULO

Elaine Cristine Piffer Gonçalves

APTA Polo Regional Alta Mogiana, Colina, SP

ORCID: 0000-0001-5797-6264

Antonio de Goes

Universidade Estadual Paulista – UNESP, Jaboticabal, SP

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0786750280869349>

Antonio Lúcio Mello Martins

APTA Polo Regional Centro Norte, Pindorama, SP

Lattes: <http://Lattes.Cnpq.Br/1092498137289104>

Mariana Ayres Rodrigues

USP – Universidade de São Paulo, Piracicaba, SP

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3287476344709233>

Monica Helena Martins

APTA Polo Regional Centro Norte, Pindorama, SP

ORCID: 0000-0001-8858-0609

Informações sobre o

artigo:

Recebido em:

18/02/2021

Aceito em:

27/02/2021

Data de publicação:

27/04/2021

Palavras-chave:

Hevea brasiliensis

Phyllachora sp.

RESUMO

A seringueira, *Hevea brasiliensis*, é uma espécie arbórea nativa da Amazônia brasileira, mas que ultimamente tem seu cultivo amplamente expandido no sudeste do Brasil, especialmente no estado de São Paulo. A partir de 2012/13, uma doença caracterizada pela presença de lesões de 5-10 mm de diâmetro, com estromas escuros na face abaxial de folíolos maduros, e mancha clorótica na face adaxial, regularmente acompanhadas da presença de peritécios escuros, submersos, com ascósporos de $14-18 \times 8-10 \mu\text{m}$, ou conídios de $10 - 15 \times 3-5 \mu\text{m}$, denominada de crosta negra foi regularmente observada em plantas localizadas em diversos municípios do estado de São Paulo. Os sintomas foram observados em plantas adultas, em diferentes regiões. Ataques severos provocaram a queda precoce das folhas doentes em algumas regiões. Análises foliares, assim como dos tecidos estromáticos, revelaram a presença de *Phyllachora* sp., um patógeno originalmente restrito à região amazônica.

OCCURRENCE OF BLACK CRUST OF RUBBER TREE IN SÃO PAULO STATE

ABSTRACT

The rubber tree (*Hevea brasiliensis*) is a species native to the Brazilian Amazon, but lately it is widely cultivated in southeastern Brazil, especially in the state of São Paulo. However, from 2012/13, a disease characterized by the presence of lesions of 5-10 mm in diameter, with dark stroma on the abaxial face of mature leaflets, and chlorotic spot on the adaxial face, regularly accompanied by the presence of dark, submerged perithecia, with ascospores of $14-18 \times 8-10 \mu\text{m}$, or conidia of $10 - 15 \times 3-5 \mu\text{m}$, is regularly observed on plants located in several municipalities in the São Paulo state. The symptoms were observed in adult plants, in different regions. Symptoms are often seen in adult plants, although they are also seen in nurseries, but to a lesser extent. Severe attacks caused the early fall of diseased leaves in some regions. Analysis of leaves and stromal tissues revealed the presence of *Phyllachora* sp., a pathogen originally restricted to the Amazon region.

Keywords:

Hevea brasiliensis

Phyllachora sp

1 INTRODUÇÃO

A seringueira é uma espécie arbórea originária da região amazônica, pertence ao gênero *Hevea* e família Euphorbiaceae. Dentre as 11 espécies do gênero, *H. brasiliensis* é a mais importante, por ser a maior fonte de borracha natural para o Brasil e o mundo (WILCKEN, et al., 2015). Contribui para conservação do solo e melhoria do ambiente; além disso, a seringueira durante seu ciclo de vida contribui para o sequestro de carbono da atmosfera (LAKSHMAN; MUNASINGHE, 2017) e as árvores adultas podem ser fonte de madeira constituindo um sistema de duplo propósito (CORLEY, 1983).

No Brasil, a heveicultura é uma atividade de importância no agronegócio, pelo fato de o país possuir uma moderna indústria de pneumáticos e artefatos, ser um importante consumidor de elastômeros e apresentar condições favoráveis para ampliar a oferta de borracha natural (VIRGENS FILHO, 2013).

O Estado de São Paulo é o maior produtor nacional e possui, 49,1% de toda área brasileira destinada à colheita (75.179 hectares) e 68,2% do volume produzido (227.163 toneladas) de látex coagulado. Apresenta 6.886 Unidades de Produção Agropecuária (UPAs) com seringais, ocupando área de 132.659,12 hectares, sendo que a heveicultura está presente em 305 municípios paulistas (OLIVEIRA & GONÇALVES, 2020). Vários fatores afetam e

até limitam o desenvolvimento da heveicultura brasileira, entre estes, destacam-se as doenças fúngicas, principalmente a doença conhecida como Mal das Folhas (*Pseudocercospora ulei*) (DA HORA JUNIOR et al. 2014, GUYOT & LE GUEN, 2018).

Dentre outras doenças consideradas de menor importância econômica, mas que nas últimas décadas em razão da expansão da heveicultura tornou-se frequente, é a doença conhecida como crosta-negra da seringueira (GASPAROTTO et al., 2012). No Brasil, a doença já foi relatada nos estados do Amazonas, Acre, Amapá, Mato Grosso, Rondônia, Pará e São Paulo (FERREIRA, 1989, GASPAROTTO et al., 2012, FURTADO; GASPAROTTO; PEREIRA, 2016, GONÇALVES; GOES, 2017).

As folhas afetadas, com o avanço da doença tornam-se total ou parcialmente amarelas, induzindo queda prematura, (GASPAROTTO et al., 2012, GONÇALVES; GOES, 2017) principalmente quando ocorre infecção por outros fungos como *Colletotrichum* spp. e *Fusarium* spp. (FURTADO; GASPAROTTO; PEREIRA, 2016).

2 MATERIAL E MÉTODOS

À partir da safra 2012/2013, a doença conhecida como crosta negra, foi observada em plantações de seringueira localizadas em diversos municípios do estado de São Paulo (Figura 1). Para tanto, várias consultas foram solicitadas e materiais foram encaminhados para a APTA Polo Alta Mogiana, localizada em Colina - SP e na UNESP (Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita”) na cidade de Jaboticabal - SP.

Além do material encaminhado, visitas presenciais em diversos seringais em regiões distintas do estado de São Paulo foram realizadas, visando observar e coletar materiais para análise e identificação do patógeno e determinação dos danos que estavam sendo ocasionados.

Figura 1: Sintomas característicos de crosta negra na face abaxial de folhas maduras

Foto: Elaine C.P. Gonçalves

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A ocorrência da doença, bem como os sintomas foram frequentemente observados em seringais à partir de 2 anos de idade, mas, principalmente em seringais adultos. Desde de 2012/13 a doença foi identificada no estado de São Paulo, na região de Votuporanga e este ano, muitas áreas, em diferentes regiões foram atacadas pela doença, que na maioria dos casos em associação ao *Colletotrichum gloeosporioides*. Foram relatados casos em: Palestina, Olímpia, Barretos, Colômbia, Colina, Guaraci, Guaira, São José do Rio Preto, Paulo de Faria, Tanabi, Bálsamo. A doença causa desfolha progressiva e lenta das plantas 3 a 4 meses após o período de reenfolhamento normal.

Desta maneira o seringal passa por duas desfolhas, uma desfolha natural e outra devido à doença, levando a um outro reenfolhamento no final do período chuvoso, sendo que esta segunda reposição de folhas ocorre numa época favorável a outras doenças ocasionadas por *M. ulei*, *T. cucumeris*, *C. gloeosporioides*. Esta desfolha precoce, faz com que as plantas produzam menos durante a safra, em alguns seringais foram relatadas quedas de 15 a 20% da produção. Devido à expansão da cultura e dos patógenos, associados à mesma, em áreas com presença de crosta-negra, com desfolha precoce, tem havido necessidade de controle da doença.

4 CONCLUSÕES

A doença crosta negra se espalhou para diversos municípios do estado de São Paulo rapidamente, e vários casos de desfolha precoce das folhas foram observados e relatados. Pesquisas que estudem e quantifiquem os impactos da doença na cultura da seringueira, precisam ser realizadas.

REFERÊNCIAS

CORLEY, R.V.H. Potential productivity of tropical perennial crops. *Experimental Agriculture* 19:217-237. 1983.

DA HORA JÚNIOR, Braz Tavares, et al. Erasing the past: a new identity for the Damoclean pathogen causing South American leaf blight of rubber. **PloS one**, 2014, 9.8: e104750.

FERREIRA, Francisco A. Patologia florestal. *Princípios Doenças Florestais no Brasil*. Viçosa, Brasil. **Sociedade de Investigações Florestais**, 1989.

FURTADO, E.L.; GASPAROTTO, L.; PEREIRA, J.C.R. Doenças da Seringueira. In: Amorim, L.; Rezende, J.A.M.; Bergamin Filho, A.; Camargo, L.E.A. **Manual de Fitopatologia**. 5.ed., Editora Agronômica Ceres Ltda, v. 2, p. 359-372, 2016.

GASPAROTTO, L. et al. Capítulo 3: **Doenças das folhas. Doenças da seringueira no Brasil**. EMBRAPA Amazônia Occidental. Brasília, DF, p. 39-176, 2012

GONÇALVES, E.C.P.; GOES, A. . **Ocorrência de crosta negra na cultura da seringueira no estado de São Paulo**. In: 50 Congresso Brasileiro de Fitopatologia, 2017, Uberlândia

GUYOT, J., LE GUEN, V. A review of a century of studies on South American Leaf Blight of the rubber tree. **Plant disease**, 2018, 102.6: 1052-1065.

LAKSHMAN, R.; MUNASINGHE, E. Disponível em <http://www.heveabrasil.com/noticias/not0032-Sequestro-de-carbono-na-seringueira-virarealidade.pdf> . Acesso em: 10 out. .2017.

OLIVEIRA, M.D.M; GONÇALVES, E.C.P. Impactos do SarS-CoV-2 na Produção de Borracha Natural no Estado de São Paulo. **Análises e Indicadores do Agronegócio**, v.5, n.8, p. 1-9, 2020.

VIRGENS FILHO, A. C. 2013. **Sistemas agroflorestais com a seringueira como alternativa de renda**. In: Congresso Brasileiro de Heveicultura, 3º, Guarapari. A busca da autossuficiência na produção da borracha natural no Brasil. Vitória, ES, CEDAGRO. xp

WILCKEN, S. R. S.; GABIA, A. A.; BRITO, P. F.; FURTADO, E. L. Nematóides fitoparasitas em seringais do Estado de São Paulo. **Summa Phytopathologica**, Botucatu-SP, v. 41, n.1, p. 54-57, 2015.

FORMULAÇÃO FUNGICIDA NATURAL À BASE DE EXTRATO DE *Azadirachta indica* PARA USO COMO DEFENSIVO AGRÍCOLA

Ana Lúcia Eufrázio Romão

Universidade Estadual do Ceará, Departamento de Ciência e Tecnologia, Fortaleza, CE
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5262784392862851>

Katiany do Vale Abreu

Universidade Estadual do Ceará, Departamento de Ciência e Tecnologia, Fortaleza, CE
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0813972202761743>

Elini Alves Oliveira de Sousa

Universidade Estadual do Ceará, Departamento de Ciência e Tecnologia, Fortaleza, CE
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3428772305277830>

Aristides Pavani Filho

Universidade Federal da Bahia, Instituto de Geociências, Salvador, BA
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1570337112488817>

Carlucio Roberto Alves

Universidade Estadual do Ceará, Departamento de Ciência e Tecnologia, Fortaleza, CE
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0937331784886630>

Informações sobre o

artigo:

Recebido em:

05/03/2021

Aceito em:

08/03/2021

Data de publicação:

27/04/2021

Palavras-chave:

Óleo essencial

Cravo

Eucalipto

Azadirachta indica

L. theobromae

RESUMO

Crescem as pesquisas voltadas para aplicação de metabólitos secundários de plantas no manejo integrado de pragas, já que o uso destas substâncias pode reduzir os custos de produção da lavoura, bem como diminuir os riscos ambientais e a dependência dos inseticidas sintéticos. Contudo, os métodos mais utilizados no controle dos insetos-pragas ainda se encontram baseados na utilização de inseticidas sintéticos, que apresentam altos riscos de toxicidade e contaminação ambiental, além de custo elevado. Um fitopatógeno importante para agricultura é o fungo *Lasiodyplodia theobromae*, que é um microrganismo bastante agressivo capaz de infectar várias espécies de plantas e seus diferentes órgãos. O objetivo do presente trabalho foi desenvolver formulações fungicidas capazes de inibir o crescimento do fungo *L. theobromae*. Foram desenvolvidas formulações a base de extrato de neem (*Azadirachta indica*) com a adição de óleo essencial de eucalipto (*Eucalyptus staigeriana*), cravo (*Syzygium aromaticum* [L]) e citronela (*Cymbopogon nardus*). As formulações desenvolvidas foram utilizadas em testes de controle do crescimento do fungo *in vitro*. Na avaliação da atividade antifúngica empregou-se a determinação do percentual de crescimento micelial (PIC), realizada conforme metodologia descrita por Menten, (1976). Também foi avaliada a toxicidade aguda das formulações a partir da determinação da DL₅₀ (Dose Letal 50%). A partir deste estudo foi possível inferir que as formulações obtidas a partir do extrato etanólico em associação com os óleos de cravo e eucalipto apresentam forte atividade

fungicida. Os produtos elaborados foram eficientes na inibição do crescimento do fungo em até 100%, indicando que os óleos essenciais atuam em sinergia com o extrato.

NATURAL FUNGICIDE FORMULATION FROM *Azadirachta indica* EXTRACT FOR USE AS AGRICULTURAL DEFENSIVE

ABSTRACT

Research on the application of plant secondary metabolites in integrated pest management is increasing, as the use of these substances can reduce crop production costs, as well as reduce environmental risks and dependence on synthetic insecticides. However, the most widely used methods for insect pest control are still based on the use of synthetic insecticides, which present high risks of toxicity and environmental contamination, as well as high cost. An important phytopathogen for agriculture is the fungus *L. theobromae*, which is a very aggressive microorganism capable of infecting various plant species and their different organs. The objective of the present work was to develop fungicidal formulations capable of inhibiting the growth of the fungus *L. theobromae*. Neem extract (*Azadirachta indica*) formulation was developed with the addition of eucalyptus (*Eucalyptus staigeriana*), clove (*Syzygium aromaticum* [L]) and citronella (*Cymbopogon nardus*) essential oil. *In vitro* evaluation of antifungal activity was used to determine the percentage of mycelial growth (PIC), carried out according to the methodology described by Menten, 1976. The acute toxicity of the formulations was also assessed by determining the LD₅₀ (Lethal Dose 50%) From this study it was possible to infer that the formulations obtained from the ethanolic extract in association with clove and eucalyptus oils have strong fungicidal activities. %, indicating that the essential oils act synergistically with the extract to combat the fungus *L. theobromae*. Therefore, it was possible to verify that, as well as pure essential oils and crude extract, the formulations have low toxicity.

Keywords:

Essential oil

Clove, eucalyptus,

Azadirachta indica

L. theobromae

1 INTRODUÇÃO

Crescem as pesquisas voltadas para aplicação de metabólitos secundários de plantas no manejo integrado de pragas, já que o uso destas substâncias pode reduzir os custos de produção da lavoura, bem como diminuir os riscos ambientais e a dependência dos inseticidas sintéticos. Além disso, o interesse crescente por fitotoxinas deve-se a ampla gama de novos sítios de ação nos organismos alvo. Muito embora o uso desses fitoquímicos não seja viável economicamente, é possível usá-los como modelos moleculares para realização de

síntese de moléculas semelhantes e que tenham a mesma atividade. Atualmente, são várias as pesquisas envolvendo plantas inseticidas no controle de pragas. Contudo, os métodos mais utilizados no controle dos insetos-pragas ainda se encontram baseados na utilização de inseticidas sintéticos, que apresentam altos riscos de toxicidade e contaminação ambiental, além de custo elevado (RUFINO; ARAÚJO; NOGUEIRA, 2018; TAGLIARI; KNAACK; FIUZA, 2010)

Azadiracta indica é uma espécie que ficou conhecida mundialmente como planta medicinal e por apresentar elevado potencial pesticida. Em inglês, é conhecida como “Lilac indiano”, “neem tree” ou “margosa”; é conhecida também por *Melia azadirachta* e *Melia indica* (A. Juss). Os nomes vernaculares são “neem” ou “nim” (Hindi, Urdu), “neeb” (árabe), “azad dirakht” (persa) e “Nimba” (sânscrito). Esta espécie é indígena da Ásia, mais precisamente do subcontinente indo-paquistão, e pertence à família *Meliaceae*. No Brasil é uma espécie exótica (MORO; WESTERKAMP, 2011).

O fungo *Lasiodiplodia theobromae* é um microrganismo bastante agressivo, capaz de infectar várias espécies de plantas e seus diferentes órgãos. A infestação da planta com o fungo pode provocar o cancro em raízes, caules e ramos, causar lesões em folhas, sementes, estacas e frutos e, em muitos casos, pode provocar a morte de mudas e enxerto ou a morte descendente, doença popularmente conhecida como a podridão seca ou “dry-back” em inglês. Essa espécie de patógeno está bem adaptada ao clima do semiárido brasileiro, principalmente, às áreas irrigadas e atua infestando culturas como a mangueira, videira, goiabeira, laranjeira, coqueiro, tamareira, abacateiro, dentre outros. Contudo, o fungo *L. theobromae* é uma espécie cosmopolita, encontram-se catalogados mais de 500 hospedeiros em regiões tropicais e temperadas (MORO; WESTERKAMP, 2011; FREIRE, 2004; PEIXINHO; RIBEIRO; AMORIM, 2017)

O objetivo do presente trabalho consistiu na elaboração de um composto com atividade pesticida frente ao fitopatógeno *L. theobromae*.

2 METODOLOGIA

Para realização da presente pesquisa a Comissão de Ética para o Uso de Animais da Universidade Estadual do Ceará (UECE), aprovou as experimentações utilizando o zebrafish como modelo animal, tendo sido registrada sob o nº 3915755/2018. Os modelos animais utilizados foram mantidos e acondicionados de acordo com a Diretriz Brasileira

para o Cuidado e a Utilização de Animais para Fins Científicos e Didáticos, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA).

As amostras para produção do extrato etanólico de neem foram coletadas de plantas adultas com idade aproximada de 5 anos, no Campus da Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, Brasil (03° 43' 02" S and 38° 32' 35" W). O espécime vegetal foi identificado por Luiz Wilson Lima-Verde, no Herbário Prisco Bezerra da Universidade Federal do Ceará em 13/03/2018, sendo o depósito de exsicata registrado com o número 61196.

2.1 Obtenção dos óleos essenciais e produção do extrato

O extrato etanólico foi obtido a partir de 200 g de raízes previamente lavadas em água corrente e seca em estufa à temperatura de 40°C. O material vegetal triturado permaneceu imerso em 1 L de EtOH-H₂O (75:25, v/v) durante sete dias, à temperatura ambiente, com agitação ocasional e abrigado da luz. O extrato foi filtrado em papel de filtro e solvente, evaporado até a secura em rotaevaporador, resultando em 1,2 g de extrato bruto.

Os óleos essenciais utilizados nas formulações utilizadas no presente estudo, *Eucalyptus staigeriana*, *Syzygium aromaticum* [L] e *Cymbopogon nardus* foram adquiridos em comércios especializados e produzidos pela BioEssência® (Anvisa MS 2.048.81.6).

2.2 Avaliação da atividade antifúngica

Para a avaliação da atividade antifúngica, as formulações foram obtidas a partir da solubilização de 1,4 mg de extrato para 1 mL de água. Em seguida, foram preparadas emulsões a partir da solubilização dos óleos essenciais nas concentrações de 5%, 10% e 15% (m/v em relação ao extrato). O emulscionamento foi facilitado pela adição de dimetilsulfóxido (DMSO) ao óleo na proporção de 5%. Obtendo-se dessa forma, formulações nas concentrações de 1400 mg/L de extrato emulsionado em 5%, 10% e 15% de óleos essenciais em relação ao extrato.

A determinação do percentual de crescimento micelial (PIC) foi realizada conforme metodologia descrita por Menten, 1976. O extrato foi adicionado ao meio Agar Potato Dextrose fundente e vertido em placa de Petri. Os experimentos foram realizados em triplicata para cada concentração de constituintes/fungo. No centro de cada placa teste foi depositado um disco de micélio medindo 7 mm de diâmetro. Os discos inoculados nas placas

de teste foram retirados das bordas da colônia de fungos cultivados em etapa anterior. Em seguida os organismos foram incubados por até 72 horas à temperatura constante de 25 °C. Para efeito comparativo da atividade fungicida dos extratos utiliza-se como testemunha uma placa de Petri inoculada com o fungo sem a adição dos produtos teste. Determinou-se o diâmetro médio das colônias (em milímetros) nos intervalos de 24, 48 e 72 horas de incubação.

2.3 Avaliação das toxicidades

Para a avaliação das toxicidades, as formulações foram obtidas a partir da solubilização de 2,0 mg, 1,0 mg e 0,5 mg de extrato para 1 mL de água. Em seguida, foram preparadas emulsões a partir da solubilização dos óleos essenciais nas concentrações de 15% (m/v em relação ao extrato). O emulscionamento foi facilitado pela adição de dimetilsulfóxido (DMSO) ao óleo na proporção de 5%. Obtendo-se dessa forma, formulações nas concentrações de 500, 1000 e 2000 mg/L de extrato emulsionado em 15% de óleos essenciais.

Para cada concentração avaliada foram utilizados grupos de seis espécimes selvagens e adultos de *Danio rerio* (zebrafish), idade entre 60 a 90 dias ($4,0 \pm 0,1$ g). A avaliação da toxicidade seguiu o método de imersão, no qual os animais são colocados submersos nas soluções avaliadas. Como controle negativo um grupo de animais foi monitorado em aquário contendo somente água potável (EKAMBARAM; PERUMAL; PAVADAI, 2017). Após 24, 48 e 72 h, foram contabilizados os números de animais mortos e realizada a análise estatística pelo método *Trimmed Spearman-Kärber* com intervalos de confiança de 95%, estimando-se a dose letal que promove a morte de 50% (DL₅₀) dos modelos utilizados.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Conforme é possível observar, a partir dos resultados apresentados na Tabela 1 e através das fotografias correlacionadas, os ensaios revelam formulações com elevadas atividades fungicidas, principalmente se comparado ao extrato etanólico bruto.

Tabela 1: Determinação do percentual de inibição promovido pelas formulações e pelo extrato bruto frente ao fungo *L. thebromae*.

Percentual de inibição do fungo (%)				
Formulação	C5	C10	C15	Test
Extrato + citronela	17,2	20,5	22,3	NI
Extrato + cravo	100	100	100	NI
Extrato etanólico	31,45	34,23	39,82	NI

* C5 = 5%, C10 = 10% e C15 = 15% para as 3 primeiras linhas

C5 = 800 ppm, C10 = 1100 ppm e C15 = 1400 ppm para a última linha

3.1 Atividade antifúngica com o extrato etanólico da raiz do neem

Diversos autores relataram o potencial antifúngico do neem. Wang, Cao e Jiang (2010), descreveram que o neem foi expressivamente efetivo na inibição do crescimento dos fungos *Monilinia fructicola*, *Penicillium expansum*, *Alternaria alternata*. Estes fungos são responsáveis por doenças de frutas no pós-colheita. Dias-Ariera e colaboradores (2010) avaliaram a atividade antifúngica do óleo de neem frente ao *Colletotrichum acutatum*, trabalhando com o óleo diluído em água nas concentrações 0,1; 0,5 e 1,0%, (v/v) obtendo inibições de crescimento micelial superiores a 75%. Já El-Kholie, Abdelreheem e Khader, (2012) observaram em seus estudos que a ação fungicida dos extratos de neem propiciam significativos níveis inibição no crescimento micelial deste. Contudo, na literatura não foi encontrado avaliação das atividades do extrato etanólico da raiz de neem em associação com os óleos essenciais descritos no presente trabalho.

Na Figura 1 é possível verificar que o extrato etanólico do neem tem atividade frente ao *L. teobromae*. É possível observar que o extrato atua inibindo o crescimento do fungo ao longo da placa.

Figura 1: Teste de atividade antifúngica com o extrato etanólico da raiz do neem após 72 horas de ensaio

* Da esquerda para a direita: testemunha, 1400 ppm, 1100 ppm, e 800 ppm

3.2 Atividade antifúngica com extrato etanólico e óleo de cravo

Conforme é possível observar a partir da Figura 2 a associação do óleo de cravo ao extrato etanólico promoveu um forte incremento no controle do crescimento do fungo. Todas as concentrações avaliadas foram capazes de inibir a evolução do fungo em 100%, indicando uma potente atividade fungicida. A atividade do óleo de cravo sobre o *L. teobromae* foi avaliada por Ranasinghe, Jayawardena e Abeywickrama, (2002). Os autores determinaram que a Concentração Inibitória Mínima (CMC) para o óleo essencial frente ao fungo gira em torno de 0.045 % (v/v). A concentração determinada pelo autor se encontra bem superior à utilizada no presente estudo. Logo, o indicativo é que o efeito fungicida observado no presente trabalho está associado ao efeito sinérgico entre o extrato de neem e os componentes do óleo de cravo e não somente o potencial fungicida do óleo de cravo.

Figura 2: Resultados da atividade antifúngica da formulação extrato etanólico + óleo de cravo após 72 h de ensaio.

* Da esquerda para a direita, 5%, 10%, 15% de óleo e testemunha

3.3 Atividade antifúngica com extrato etanólico e óleo de eucalipto

Na avaliação da atividade fungicida do produto obtido a partir da associação entre o extrato e o óleo essencial de eucalipto, Figura 3, é possível também observar forte incremento na inibição ao crescimento do fungo. Contudo, esse incremento começa a ocorrer somente a partir da utilização da solução na qual o óleo está presente proporção de 10% em relação ao extrato, tendo sido essa formulação capaz de inibir o crescimento do fungo em 78,4%. A inibição máxima obtida na avaliação coincide com a inibição de 100% no crescimento do fungo. A partir dos dados avaliados é possível inferir que a formulação tem forte atividade fungicida. A ausência de dados na literatura referentes a teste com óleo essencial de eucalipto inviabiliza a comparação dos resultados obtidos com dados da literatura.

Figura 3: Resultado do processo de inibição do extrato etanólico + eucalipto após 72 horas de ensaio frente ao *L. theobromae*

* Da esquerda para a direita, 5%, 10%, 15% de óleo e testemunha

3.4 Atividade antifúngica com extrato etanólico e óleo de citronela

A partir da Figura 4 é possível observar que a associação entre o extrato e óleo essencial de citronela não produziu incremento no controle do crescimento do fungo. Anthony e colaboradores, (2004), avaliaram a atividade fungicida do óleo essencial da citronela contra *L. theobromae*, determinando que a CIM girou em torno de 3% (v/v). A CIM identificada pelos autores é substancialmente superior à concentração utilizada no presente estudo. De toda forma, os resultados parecem estar em concordância entre si, já que a concentração mínima com atividade frente ao fungo descritas pelos autores é significativamente elevada. O óleo de citronela não foi eficaz no melhoramento da atividade fungicida do extrato, indicando que não houve sinergia entre o extrato e óleo ou que a proporção utilizada estava abaixo da mínima capaz de alterar o potencial bioativo.

Figura 4: Potencial de inibição do extrato etanólico + citronela frente ao fitopatógeno *L. theobromae* após 72 horas de ensaio

*Da esquerda para a direita 5%, 10%, 15% e testemunha

3.5 Toxicidade aguda utilizando o modelo animal zebrafish

Os resultados obtidos para o teste de toxicidade aguda com as formulações, utilizando o zebrafish permitiram inferir que nenhuma das concentrações avaliadas apresenta toxicidade aguda frente aos organismos teste, ver Figura 5. Durante as experimentações não ocorreu nenhuma morte dentre os indivíduos utilizados. Dados da literatura indicam que as preparações com neem não apresentam toxicidade (MOSSINI; KEMMELMEIER, 2005; ASHAFA, OREKOYA e YAKUBU 2012). Relatos da literatura indicam que óleo essencial de eucalipto apresenta baixa toxicidade (MACEDO et al., 2011; MACEDO et al., 2010). Alonso, (1998), descreveu que a DL_{50} do óleo essencial de cravo-da-índia em ratos, por via oral, foi estabelecida em 2.650 mg/kg, para humanos, a estimativa de dose diária máxima permitida de eugenol é de 2,5 mg/kg. Testes de toxicidade aguda com óleo de citronela

indicaram baixa toxicidade em ensaios com roedores tratados por diferentes vias de administração (UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 1997).

Figura 5: Teste de toxicidade aguda realizado com o extrato e as formulações utilizando como modelo animal zebrafish

Fonte: próprio autor

Apesar dos dados indicando baixa toxicidade para os compostos avaliados, é preciso ressaltar que toda substância pode ser considerada um agente tóxico. O seu potencial tóxico é dependente das condições de exposição, ou seja, da dose administrada ou absorvida, do tempo e da frequência de exposição e até das vias de administração (AFFONSO et al., 2012).

4 CONCLUSÃO

A partir deste estudo foi possível inferir que as formulações obtidas a partir do extrato etanólico em associação com os óleos de cravo e eucalipto apresentam fortes

atividades fungicidas. Os produtos elaborados foram eficientes na inibição do crescimento do fungo em até 100%, indicando que os óleos essenciais atuam em sinergia com o extrato no combate ao fungo *L. theobromae*. Além disso, foi possível verificar que, assim como os óleos essenciais puros e o extrato bruto, as formulações apresentam baixa toxicidade.

REFERÊNCIAS

AFFONSO, R. S. et al. Aspectos Químicos e Biológicos do Óleo Essencial de Cravo da Índia. **Revista Virtual de Química**, v. 4, n. 2, p. 146–161, 2012.

ALONSO, J. R. **Tratado de Fitomedicina. 1. ed. Buenos Aires.** 1a ed. ed. Buenos Aires: [s.n.].

ANTHONY, S. et al. Fungal pathogens associated with banana fruit in Sri Lanka, and their treatment with essential oils. **Mycopathologia**, v. 157, p. 9197, 2004.

ASHAFA, A. O. T.; OREKOYA, L. O.; YAKUBU, M. T. Toxicity profile of ethanolic extract of *Azadirachta indica* stem bark in male Wistar rats. **Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine**, p. 811–817, 2012.

EKAMBARAM, S. P.; PERUMAL, S. S.; PAVADAI, S. Anti-inflammatory effect of *Naravelia zeylanica* DC via suppression of inflammatory mediators in carrageenan-induced abdominal oedema in zebrafish model. **Inflammopharmacology**, 2017.

EL-KHOLIE, E. M.; ABDELREHEEM, M. A. T.; KHADER, S. . *Azadirachta indica* extracts influenced some pathogenic fungi. **African Journal of Microbiology Research**, v. 6, n. 27, p. 5645–5649, 2012.

FREIRE, F. DAS C. O. Novos Hospedeiros do Fungo *Lasiodiplodia theobromae*. Embrapa Agroindústria Tropical, 2004.

MACEDO, I. T. F. et al. Anthelmintic effect of *Eucalyptus staigeriana* essential oil against goat gastrointestinal nematodes. **Veterinary Parasitology**, v. 173, p. 93–98, 2010.

MACEDO, I. T. F. et al. Evaluation of *Eucalyptus citriodora* essential oil on goat gastrointestinal nematodes. **Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária**, v. 20, n. 3, p. 223–227, 2011.

MORO, M. F.; WESTERKAMP, C. A arborização alienígena de fortaleza (Nordeste do Brasil): Observações qualitativas e um levantamento em dois bairros. **Ciencia Florestal**, v. 21, n. 4, p. 789–798, 2011.

MOSSINI, S.A.G. ; KEMMELMEIER, C. A árvore Nim (*Azadirachta indica* A . Juss): M ú ltiplos Usos. **Acta Farmaceutica Bonaerense**, v. 24, n. 1, p. 139–148, 2005.

PEIXINHO, G. S.; RIBEIRO, V. G.; AMORIM, E. P. R. Controle da Podridão seca (*Lasiodiplodia theobromae*) em cachos de videira cv. Itália por óleos essenciais e quitosana. **Summa Phytopathologica**, v. 43, n. 1, p. 23–31, 2017.

RANASINGHE, L.; JAYAWARDENA, B.; ABEYWICKRAMA, K. Fungicidal activity of essential oils of *Cinnamomum zeylanicum* (L.) and *Syzygium aromaticum* (L.) Merr et L.M.Perry against crown rot and anthracnose pathogens isolated from banana. **Letters in Applied Microbiology**, v. 35, p. 208–211, 2002.

RUFINO, C. P. B.; ARAÚJO, C. DA S.; NOGUEIRA, S. R. DESAFIOS NA UTILIZAÇÃO DO CONTROLE BIOLÓGICO DE DOENÇAS DE PLANTAS NA AMAZÔNIA. **South American Journal of Basic Education, Technical and Technological**, v. 5, n. 1, p. 248–262, 2018.

TAGLIARI, M. S.; KNAAK, N.; FIUZA, L. U. C. Efeito de extratos de plantas na mortalidade de lagartas de *Spodoptera frugiperda*. (JE Smith) (Lepidoptera: Noctuidae). **Arq. Inst. Biol**, v. 77, n. 2, p. 259–264, 2010.

UNITED, S. E. P. A. **Reregistration eligibility decision. Oil of Citronella. List C Case 3105** Washington, DC United States Environmental Protection Agency, , 1997. Disponível em: <https://www3.epa.gov/pesticides/chem_search/reg_actions/reregistration/red_PC-021901_30-May-97.pdf>

AVALIAÇÃO DE TRÊS TÉCNICAS DE ENRIQUECIMENTO AMBIENTAL PARA CACHORROS-DO-MATO (*Cerdocyon thous*, Linnaeus, 1766) EM CATIVEIRO

Aksa Ingrid Vieira Batista

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Mossoró, RN
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6614624885083003>
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0696-7194>

Gabriel Vinícius Carvalho de Lucena

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Patos, PB
ORCID: <https://orcid.org/00000001-9789-6066>

Audisio Alves da Costa Filho

Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ), João Pessoa, PB
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4125-0359>

Igor Espínola Winkeler

Universidade Federal da Paraíba (UFPB), João Pessoa, PB
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1861-9509>

Roberta da Silva Simas

Universidade Federal da Paraíba (UFPB), João Pessoa, PB
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6668-5108>

João Victor Fernandes da Silva

Universidade Federal da Paraíba (UFPB), João Pessoa, PB
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7628-5151>

Samuel Anthony Fonsêca de Melo

Universidade Federal da Paraíba (UFPB), João Pessoa, PB
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2186-7132>

Cintia Cleub Neves Batista

Parque Zoobotânico Arruda Câmara, João Pessoa, PB
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5363-7863>

Ingrid Louise Lins de Albuquerque Evaristo

Parque Zoobotânico Arruda Câmara, João Pessoa, PB
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0955-0693>

Nathalia Caroline Souza da Silva

Parque Zoobotânico Arruda Câmara, João Pessoa, PB
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1043-5713>

Marília Gabriela Maia

Parque Zoobotânico Arruda Câmara, João Pessoa, PB
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3113-2738>

Thiago Ferreira Lopes Nery

Parque Zoobotânico Arruda Câmara, João Pessoa, PB
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4051-428X>

Informações sobre o**artigo:****Recebido em:****05/03/2021****Aceito em:****08/03/2021****Data de publicação:****27/04/2021****Palavras-chave:****Bem-estar****Canidae****Comportamento****Zoológico****RESUMO**

O cachorro-do-mato (*Cerdocyon thous*, Linnaeus, 1766) é um canídeo de médio porte, que possui distribuição geográfica pela América do Sul, e no Brasil pode ser encontrado praticamente em todos os ambientes, com exceção apenas da Floresta Amazônica. Dentre as principais afecções que acometem os animais mantidos sob cuidados humanos, o estresse pode ocorrer devido ao ambiente de cativeiro, podendo ocasionar as chamadas estereotípias, que são definidas como ações repetitivas, constantes e sem propósito aparente, que derivam de comportamentos normais. Com a finalidade de diminuir esses problemas, o enriquecimento ambiental é muito utilizado, já que consiste numa tentativa de estimular os animais a desempenharem os seus comportamentos naturais. Dessa forma, os estímulos podem ser físicos, cognitivos, sensoriais, alimentares e/ou sociais. Logo, os objetivos desse trabalho foram avaliar o comportamento de dois cachorros-do-mato cativos do Parque Zoobotânico Arruda Câmara, João Pessoa-PB, submetidos a três diferentes técnicas de enriquecimento ambiental, assim como comparar os estímulos de produtos vegetais, animais e artificiais. A partir de análises, percebeu-se que os enriquecimentos utilizando produtos de origem animal se mostraram eficientes na redução de atividades relacionadas a inatividade e ao estresse. Além disso, os enriquecimentos do tipo alimentar foram destacados como os preferidos pelos espécimes.

EVALUATION OF THREE ENVIRONMENTAL ENRICHMENT TECHNIQUES FOR BUSH DOGS (*Cerdocyon thous*, Linnaeus, 1766) IN CAPTIVITY**ABSTRACT**

The bush dog (*Cerdocyon thous*, Linnaeus, 1766) is a medium-sized canid that has a geographic distribution throughout South America, and in Brazil it can be found in practically all environments, with the exception of the Amazon Forest. Among the main conditions that affect animals kept under human care, stress can occur due to the captivity environment, which can cause the so-called stereotypes, which are defined as repetitive, constant actions and with no apparent purpose, which derive from normal behaviors. In order to reduce these problems, environmental enrichment is widely used, as it consists of an attempt to encourage animals to perform their natural behaviors. Thus, stimuli can be physical, cognitive, sensory, dietary and / or social. Therefore, the objectives of this research were to evaluate the behavior of two captive bush dogs of the Zoobotanic Park Arruda Câmara, João Pessoa-PB, submitted to three different techniques of

Keywords:**Welfare****Canidae****Behavior****Zoo**

environmental enrichment, as well as to compare the stimuli of plant, animal and artificial products. From analysis, it was noticed that enrichments using products of animal origin proved to be efficient in reducing activities related to inactivity and stress. In addition, food-type enrichments were highlighted as preferred by specimens.

1 INTRODUÇÃO

O cachorro-do-mato (*Cerdocyon thous*, Linnaeus, 1766) é um canídeo de médio porte que pesa entre 4,5 e 8,5kg. A coloração do dorso do animal é cinza, podendo ter áreas mais escuras na região central do dorso, nos ombros e nas patas. Os lábios, orelhas, patas e ponta da cauda são escuras e a região ventral possui uma coloração cinza mais claro. Sua distribuição geográfica se limita a América do Sul, e no Brasil pode ser encontrado praticamente em todos os biomas brasileiros como o cerrado, a caatinga, mata atlântica e floresta de araucária, com exceção apenas da floresta amazônica. Apesar de ser um animal onívoro, este possui dieta predominantemente de vegetais, se alimentando de frutas, flores, frutos, coquinhos e pequenos animais como roedores, répteis e aves (CUBAS et al., 2014; LUCHERINI, 2015).

Dentre as principais afecções que acometem os animais silvestres mantidos sob cuidados humanos e apesar do esforço das instituições que regem esses locais, o estresse pode ocorrer devido simplificação do espaço em relação ao seu ambiente natural, o que costuma causar tédio e distresse. Destarte, o estresse é definido como um mecanismo de defesa do organismo para os desafios cotidianos ou extraordinários envolvendo primariamente vias neuroendócrinas que sustentam o comportamento adaptativo. Assim sendo, o distresse pode levar a várias consequências, como diminuição da aptidão por imunossupressão e atrofia de tecidos, gerando maior predisposição a doenças e dificuldade em se reproduzir; e alterações comportamentais, também conhecidas como estereotípias. Esses distúrbios compulsivos são descritos como ações repetitivas, constantes e sem propósito aparente, que derivam de comportamentos normais (PIZZUTTO et al., 2009; DE SIQUEIRA; BASTOS, 2020; VERONEZE et al., 2020).

Com a finalidade de diminuir esse problema, o enriquecimento ambiental consiste numa tentativa de provocar estímulos nos animais que são mantidos sob cuidados humanos, fazendo certas alterações no ambiente, de maneira a desempenharem os seus comportamentos naturais. Dessa forma, é possível dividir o enriquecimento ambiental por

categorias, de acordo com o que tenciona estimular no animal: o alimentar, o físico, o sensorial, o social e o cognitivo (SANTOS, 2020).

Logo, os objetivos desse trabalho foram avaliar o comportamento de dois cachorros-do-mato (*Cerdocyon thous*) cativos do Parque Zoobotânico Arruda Câmara, João Pessoa-PB, submetidos a três diferentes técnicas de enriquecimento ambiental, assim como comparar os estímulos de produtos vegetais, animais e artificiais.

2 METODOLOGIA

O Parque Zoobotânico Arruda Câmara (CNPJ: 08.806.721/0001-03), João Pessoa-PB, apresenta-se cadastrado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis sob Registro nº236567. Dessa forma, foram realizados etogramas para a avaliação do comportamento de um casal de cachorros-do-mato (*Cerdocyon thous*, Linnaeus, 1766) cativos deste zoológico do dia 1 ao dia 5 de março, dias esses que precediam as atividades de enriquecimento, durante 1 hora pela manhã. A finalidade desses etogramas era de estimar o período médio de comportamento estereotipado desses animais, nitidamente marcado pelo ato de correr em círculos pelo recinto sem motivo aparente.

No dia 10 de março do mesmo ano, objetivou-se observar o comportamento dos animais perante os estímulos de origem vegetal. Dessa forma, foram feitas esferas de cipó contendo vegetais e frutas em seu interior, além de feno para que elas não saíssem com facilidade (enriquecimento alimentar e cognitivo) (Figura 1 – A). Foi utilizado também camas de feno contendo ervas, como boldo e salsa (enriquecimento sensorial) (Figura 1 – C).

Já no dia 12 de março, o objetivo era avaliar o comportamento de *C. thous* quanto aos produtos de origem animal. Então, foram utilizados bambus enriquecidos com ovos, carne bovina e carne de galinha (enriquecimento alimentar e cognitivo) (Figura 1 – B), assim como camas de feno contendo fezes de ratos, que foram examinadas a partir de dois exames coproparasitológicos por meio do método direto de avaliação (HOFFMAN, 1987) e tratadas a partir da exposição a luz solar por 5 horas (enriquecimento sensorial) (Figura 1 – C).

Por fim, no dia 14 de março, a finalidade era de observar o comportamento dos cachorros-do-mato a partir de objetos artificiais. Assim sendo, foram utilizados brinquedos feitos de plástico, borracha e cordas. Estes foram enriquecidos com sangue bovino e ração para cachorros domésticos (enriquecimento alimentar, cognitivo e sensorial). Todas as atividades foram realizadas no período da manhã e observados durante 1 hora, assim como

também foram feitos etogramas nos dias dos enriquecimentos e entre eles. O método de observação usado foi o direto e a técnica de amostragem foi a *scan*, onde se observa o grupo ao invés de apenas um indivíduo (animal focal) (ALTMANN, 1974).

Figura 1: A: Esferas com frutas, legumes e feno; B: Bambus enriquecidos com ovos e carne bovina e de galinha; C: Cama de feno; D: Recinto com as camas de feno e bambus; E: Esferas no recinto; F: Interação do cachorro-do-mato com os bambus enriquecidos.

Fonte: dados da pesquisa

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Comparando os tipos de enriquecimento de cada dia individualmente, as atividades utilizando-se alimentos foram mais eficientes, assim como mostra o Gráfico 1. O enriquecimento ambiental alimentar já foi demonstrado como uma técnica eficaz para promover comportamentos mais naturais e a redução de comportamentos estereotipados, uma vez que instiga os animais a despenderem mais tempo em atividades associadas à obtenção de comida, assim como ocorre na natureza (VELOSO, 2017).

Gráfico 1: Tempo de interação dos animais a cada tipo de enriquecimento ambiental em minutos.

Fonte: dados da pesquisa

Percebeu-se também, que com as atividades de enriquecimento ambiental foi possível diminuir tanto a quantidade de episódios de estereotípias (Tabela 1), quanto o tempo de cada episódio, já que antes os animais possuíam uma média de $6,5 \pm 1,5$ comportamentos estereotípicos de em média $3,14 \pm 2,11$ minutos. Destarte, menos estereotípias refletem uma melhor aptidão dos animais para enfrentar eventos de estresse ou diminuir os efeitos do ócio, e os enriquecimentos aqui aplicados contribuíram para aumentar a variabilidade e complexidade do ambiente no qual estes animais são mantidos (PEIXOTO et al., 2019).

Por fim, apesar de serem animais onívoros, o *Cerdopion thous* (Linnaeus, 1766) possui a predominância de alimentos de origem vegetal (59%) em sua dieta (CUBAS et al. 2014). Porém, a partir da observação realizada, os estímulos de origem vegetal, assim como os de origem artificial não foram tão eficazes quanto os de origem animal, já que estes últimos provocaram interações mais duradouras e houve ausência de comportamentos estereotipados (Tabela 1).

Tabela 1: Atividades comportamentais observadas durante a aplicação dos procedimentos de enriquecimento com estímulos de origem vegetal, animal e artificial. IO - Interação com o objeto; IA – Ingerindo água; IR - Interação com o recinto; URI - Urinando; ALI - Alimentação; EST - estereotipia.

Tipo de estímulo	IO	IA	IR	URI	ALI	EST
Estímulo de origem vegetal	15 min	SIM	SIM	NÃO	SIM	3 episódios $\bar{X}$: 2 min $\pm$ 0
Estímulo de origem animal	36 min	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO
Estímulo de origem artificial	5 min	SIM	SIM	SIM	SIM	4 episódios $\bar{X}$: 2 min $\pm$ 1

Fonte: dados da pesquisa

4 CONCLUSÃO

O enriquecimento utilizando-se produtos de origem animal realizado se mostrou eficiente na redução de atividades relacionadas a inatividade e ao desinteresse. Além disso, os enriquecimentos do tipo alimentar foram destacados como os preferidos pelos espécimes, sendo que os de outras categorias, quando aplicadas juntamente com itens alimentares, promoveram maior interação do animal com o ambiente, aumentando assim os comportamentos exploratórios e reduzindo os comportamentos estereotipados. Com a finalidade de contribuir para a preservação *ex situ* da espécie, estes resultados mostram a importância de se adotar procedimentos de enriquecimentos para animais sob cuidados humanos, já que práticas como essas colaboram com o bem-estar dos animais e favorecem comportamentos naturais para a vida em cativeiro.

REFERÊNCIAS

- ALTMANN, J. Observational study of behavior: sampling methods. **Behaviour**, v. 49, p. 227-267, 1974.
- CUBAS, Z. S.; SILVA, J. C.R.; CATÃO-DIAS, J. L. **Tratado de animais selvagens: Medicina Veterinária**. 2.ed. São Paulo: Editora GEN/Roca, 2014.
- DE SIQUEIRA, V.C.; BASTOS, P.A.S. Bem-estar animal para clínicos veterinários. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 3, p. 1713-1746, mar/abr. 2020.
- HOFFMANN, R. P. **Diagnóstico de parasitismo veterinário**. Sulina, 1987.

LUCHERINI, M. *Cerdocyon thous*. **The IUCN Red List of Threatened Species, 2015:** e.T4248A81266293. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2015-4.RLTS.T4248A81266293.en>>. Acesso em: 30 abr. 2020.

SANTOS, M.I.M. **Avaliação do enriquecimento ambiental da instalação de um jaguar no Jardim Zoológico de Lisboa**. Dissertação (Mestrado) - Universidade de Lisboa, 2020.

PEIXOTO, F.B.G. et al. Enriquecimento ambiental aplicado a tamanduás-mirins (*Tamandua tetradactyla*) no Aquário de São Paulo: estudo de caso. **Pesquisa e Ensino em Ciências Exatas e da Natureza**, v. 3, p. 119-124, 2019.

PIZZUTO, C.S.; SGAI, M.G.F.G.; GUIMARÃES, M.A.B.F. O enriquecimento ambiental como ferramenta para melhorar a reprodução e o bem-estar de animais cativos. **Revista Brasileira de Reprodução Animal**, v.33, p.129-138, jul./set. 2009.

VELOSO, A.C.G. **Enriquecimento Ambiental em Animais de Cativeiro**. Dissertação (Mestrado) – Universidade do Porto, 2017.

VERONEZE A.S. et al. Enriquecimento ambiental aplicado a tigres (*Panthera tigris*) e onças pintadas (*Panthera onca*) cativos no zoológico Zoo Park da Montanha – Marechal Floriano – ES. **Atas de Saúde Ambiental**, v. 8, p. 110-121, jan./dez. 2020.

***Gyropus ovalis* BURMEISTER, 1838 (PH'THIRAPTERA:
GYROPIDAE) EM PORQUINHOS-DA-ÍNDIA (*Cavia porcellus*
LINNAEUS, 1758) (RODENTIA: CAVIIDAE), JOÃO PESSOA,
PARAÍBA, BRASIL**

Aksa Ingrid Vieira Batista

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Mossoró, RN
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6614624885083003>
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0696-7194>

Gabriel Vinícius Carvalho de Lucena

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Patos, PB
ORCID: <https://orcid.org/00000001-9789-6066>

Mariana Fernandes Lopes

Espaço Pet Clínica Veterinária, João Pessoa, PB
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3572-2332>

Jéssica Azevedo Costeira

Espaço Pet Clínica Veterinária, João Pessoa, PB
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1252-5512>

Roberto Citelli de Farias

Espaço Pet Clínica Veterinária, João Pessoa, PB
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7837-2803>

Caio Michel de Moraes Rolim

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Mossoró, RN
ORCID: <https://orcid.org/0000.0001.9992.506X>

Fernando Lucas Monteiro Medeiros

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Mossoró, RN
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1978-8224>

Juliane Nayra Dantas Silva

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Mossoró, RN
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8226-4285>

Vanessa Maria de Sales Duarte

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Mossoró, RN
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0872-5295>

Lígia Vanessa Leandro Gomes

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Mossoró, RN
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7914-1356>

Iany Leda Moreira Dantas

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Mossoró, RN
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7155-5423>

Josivania Soares Peireira

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Mossoró, RN
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2407-9417>

Informações sobre o artigo:	RESUMO
Recebido em: 12/04/2021	O porquinho-da-índia, também chamado comumente de preá, cobaia ou cuy é um mamífero da ordem Rodentia, subordem Hystricomorpha e família Caviidae. Dentre as afecções que podem acometer esses animais, as ectoparasitoses estão entre os principais agravos, apresentando grande importância na medicina veterinária pois podem atuar como transmissores de microrganismos patogênicos, além de poder causar alopecia, crostas, pelo quebradiço, prurido, erosões, inquietação, falta de apetite e apatia. O objetivo do presente trabalho é relatar a ocorrência de piolhos <i>Gyropus ovalis</i> Burmeister, 1838 em quatro porquinhos-da-índia atendidos em uma Clínica Veterinária na cidade de João Pessoa, Paraíba, Brasil. Após a visualização dos ectoparasitos a olho nu e por dermatoscópio, estes foram coletados manualmente e acondicionados em frascos de vidro contendo álcool a 70°. Os espécimes foram levados ao Laboratório de Parasitologia Animal da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (LPA-UFERSA) onde foram processados e analisados em estereomicroscopia e microscopia óptica de luz utilizando chaves taxonômicas específicas. Apesar de alguns trabalhos relatarem a ocorrência de <i>G. ovalis</i> no Brasil, este relato é o primeiro para o estado da Paraíba no Nordeste do país.
Aceito em: 15/04/2021	
Data de publicação: 27/04/2021	
Palavras-chave:	
Cobaio	
<i>Hystricomorpha</i>	
Parasitologia	
Pediculose	

Gyropus ovalis BURMEISTER, 1838 (PHTHIRAPTERA: GYROPIDAE) IN GUINEA PIGS (*Cavia porcellus* LINNAEUS, 1758) (RODENTIA: CAVIIDAE), JOÃO PESSOA, PARAÍBA, BRAZIL

ABSTRACT

Keywords:
Guinea pigs
Hystricomorpha
Parasitology

The guinea pig, also commonly called preá, guinea pig or cuy is a mammal of the order Rodentia, suborder Hystricomorpha and family Caviidae. Among the diseases that can affect these animals, ectoparasitoses are among the main diseases, presenting great importance in veterinary medicine because they can act as transmitters of pathogenic microorganisms, besides being able to cause alopecia, crusts, by the brittle, itching, erosions, restlessness, lack of appetite and apathy. The aim of the present study is to report the occurrence of *Gyropus ovalis* Burmeister, 1838 in four guinea pigs treated at a Veterinary Clinic in the city of João Pessoa, Paraíba, Brazil. After visualizing the ectoparasites with the naked eye and by dermatoscope, they were collected manually and placed in glass bottles containing alcohol at 70 °. The specimens were taken to the Animal Parasitology Laboratory of the Federal Rural University of the Semi-Arid (LPA-UFERSA) where they were

1 INTRODUÇÃO

O porquinho-da-índia, também chamado comumente de preá, cobaia ou cuy é um mamífero da ordem Rodentia, subordem Hystricomorpha e família Caviidae. Este roedor é muito utilizado como animal de companhia, de laboratório ou como alimento em seu local de origem. Esses animais podem apresentar expectativa de vida entre cinco e oito anos e pesar por volta de 700g a 1,2kg. Por serem muito populares como pets, o número de atendimentos destes têm aumentado muito nos últimos anos (LOPES et al., 2013).

As ectoparasitoses estão entre as principais afecções que acometem os animais silvestres e exóticos, apresentando grande importância na medicina veterinária pois podem atuar como transmissores de microrganismos patogênicos, dentre eles os vírus, riquetsias, bactérias, espiroquetas, protozoários e helmintos. O estudo dos ectoparasitos tem importância sanitária, tanto pela especificidade de alguns para os respectivos hospedeiros, como pela intertransmissibilidade de outros, e ainda pela vertente zoonótica apresentada por alguns deles. O diagnóstico correto das ectoparasitoses é importante para que técnicas de tratamento específico sejam destinadas aos animais (VALIM; AMORIM; SERRA-FREIRE, 2004; PEREIRA et al., 2013^{a, b}; ROBLES et al., 2014; VELOSO, 2015).

Em porquinhos-da-índia e outros roedores, as dermatites por piolhos podem, em infestações graves, levar ao aparecimento de alopecia, crostas, pelo quebradiço, prurido, além de erosões, principalmente na região posterior das orelhas do hospedeiro. Muitas vezes, os animais com pediculose apresentam-se ansiosos, inquietos, com falta de apetite e por vezes apáticos (VALIM; AMORIM; SERRA-FREIRE, 2004; PEREIRA et al., 2013^{a, b}; ROBLES et al., 2014; VELOSO, 2015).

Considerando que no Brasil e em especial para a região Nordeste deste país, os registros de ocorrência de Phthiraptera são escassos e espaçados, o presente trabalho tem como objetivo relatar a primeira ocorrência de *Gyropus ovalis* em porquinhos-da-índia no Município de João Pessoa, no Estado da Paraíba (PB).

2 METODOLOGIA

Deram entrada à Clínica Veterinária Espaço Pet em João Pessoa-PB, quatro porquinhos-da-índia (*Cavia porcellus* Linnaeus, 1758) machos e de quatro tutores diferentes no ano de 2021. O paciente 1 foi atendido no dia 19 de janeiro, possuía idade de 5 meses e pesou 356 gramas; o paciente 2 deu entrada no dia 3 de fevereiro, tinha 9 meses e 656 gramas; o paciente 3 também foi atendido no dia 3 de fevereiro, tinha 7 meses e possuía 553 gramas; e o paciente 4 foi atendido no dia 15 de fevereiro, possuía 1 ano de idade e 672 gramas.

A partir da avaliação clínica, em todos esses animais, observou-se a presença de ectoparasitos a partir de dermatoscópio e visualização a olho nu. Todos os animais apresentavam-se na condição de escore 3 (na escala onde 1 se refere a caquexia e 5, a obesidade), mucosas normocoradas, e apenas o paciente 1 apresentava o sinal clínico de prurido. Os ectoparasitos foram retirados manualmente e acondicionados em frascos contendo álcool 70°. Os quatro porquinhos-da-índia foram devidamente tratados utilizando-se selamectina (15mg/kg) por via tópica no dorso, com repetição após 30 e 60 dias.

Os ectoparasitos foram encaminhados ao Laboratório de Parasitologia Animal (LPA-UFERSA) para análise. Para montagem, realizou-se clareamento em solução de potassa a 30%, seguido de lavagem em água destilada e montagem em meio de Hoyer. A identificação foi realizada a partir do estudo da morfologia, auxiliada por estereomicroscopia e microscopia óptica usando-se as chaves taxonômicas de Werneck (1936; 1948) e Valim (2010).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Da análise realizada nos espécimes, identificou-se 50 piolhos sendo 10 ninfas, 17 fêmeas e 23 machos de *Gyropus ovalis* Burmeister, 1838 (Figura 1). Dentre as características observadas nos piolhos destacam-se: cabeça muito mais larga do que longa, com algumas cerdas mais longas nas regiões temporais (Fig 1-A, B); placa proesternal de formato subcônico com 4 cerdas de mesmo comprimento em cada lado, placa mesoesternal subtriangular com 3 cerdas curtas de cada lado, e placa metaesternal sub-losangonal com 3 pares de cerdas curtas (Fig 1-C); abdome grande e oval, com pequenas reentrâncias nas margens laterais (Fig 1-D); genitália feminina com gonopodos apresentando diversas cerdas

(Fig 1-E) e órgão copulador masculino característico (Figura 1-F) (WERNECK, 1936; VALIM, 2010; JIMÉNEZ, 2017).

Figura 1: *Gyropus ovalis* Burmeister, 1838. A – Piolho macho, face ventral (objetiva de 20x); B – Cabeça muito mais larga que longa, mostrando cerdas maiores em regiões temporais (objetiva de 40x); C – Placas esternais: placa proesternal de formato subcônico com 4 cerdas de mesmo comprimento em cada lado, placa mesoesternal subtriangular com 3 cerdas curtas de cada lado e placa metaesternal, também com 3 cerdas de cada lado. No canto superior direito, a comparação com a representação de Valim (2010) (objetiva de 40x); D – Abdome oval mostrando reentrâncias (objetiva de 40x); E – Genitália masculina (objetiva de 40x); F- Genitália feminina (objetiva de 40x).

Fonte: dados da pesquisa

Dentre as espécies de ectoparasitos que podem acometer esses roedores, destaca-se os Acari *Trixacarus caviae* Fain; Howell; Hyatt, 1972, *Chirodiscoides caviae* Hirst, 1917 *Demodex caviae*, *Myocoptes musculus* Koch, 1836, *Radfordia affinis* Poppe, 1896, *Psoroptes cuniculi* Delafond, 1859, *Sarcoptes scabiei* De Geer, 1778 e *Notoedres muris* Megnin, 1877; assim como os Phtiraptera *Gyropus ovalis* Burmestein, 1838, *Gliricolla porcelli* Schrank, 1781 e o *Trimenopon hispidum* Burmestein, 1838 (VALIM; AMORIM; SERRA-FREIRE, 2004; PEREIRA et al., 2013a,b; ROBLES et al., 2014; VELOSO, 2015).

Em porquinhos-da-índia e outros pequenos roedores, a infestação por *G. ovalis* é geralmente assintomática, pois as populações de piolhos mantêm-se estáveis através do comportamento “grooming” do hospedeiro, sabendo-se que infestações graves podem indicar má nutrição, stress e imunodeficiência do hospedeiro pela falta desse comportamento (MIRCEAN et al., 2012; ROBLES et al., 2014; VELOSO, 2015).

No Brasil, a associação de *G. ovalis* em *C. porcellus* foi relatada, como nos municípios de Silva Jardim e Duque de Caxias no Rio de Janeiro (VALIM et al., 2004) e Mossoró no Rio Grande do Norte (PEREIRA et al., 2013a). Apesar desse Phtiraptera ser comum em porquinhos-da-índia, os relatos são escassos e espaçados no Brasil, e especificamente para a região Nordeste, sendo este o primeiro relato para João Pessoa, Paraíba, Brasil.

4 CONCLUSÃO

Através da presente pesquisa, registra-se a ocorrência de *Gyropus ovalis* em *C. porcellus* pela primeira vez em João Pessoa, Paraíba, o que representa um novo dado referente aos Phtiraptera que ocorrem nessa espécie, no Nordeste e no Brasil. Este trabalho contribui para ampliação dos dados ecológicos e a partir do presente relato, será possível que pesquisas futuras sejam realizadas com o objetivo de compreender o comportamento desses ectoparasitos em porquinhos-da-índia e como esta parasitose interfere no bem-estar da espécie hospedeira.

REFERÊNCIAS

JIMÉNEZ, A. C. **Prevalência de Ectoparasitos en Cuyes (*Cavia Porcellus*) de La Ciudad de Ferreñafe–Departamento de Lambayeque-2017**. 2017. 55f. Trabalho de conclusão de curso (Medicina Veterinária) – Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque, 2017.

LOPES, F. C. et al. Lipoma infiltrativo espontâneo em porquinho da Índia (*Cavia porcellus*). **Revista Brasileira de Ciência Veterinária**, v. 20, n. 3, 2013.

MIRCEAN, V. et al. Research on the etiology of skin diseases in laboratory animals. **Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Veterinary Medicine**, v. 66, n. 2, 2009.

PEREIRA, J. S. et al. Ocorrência de *Gyropus ovalis* em porquinho-da-índia, *Cavia porcellus*, em Mossoró, Rio Grande do Norte, Brasil. **Acta Veterinaria Brasilica**, v. 7, n. 3, p. 237-240, 2013^a.

PEREIRA, J. S. et al. Parasitismo por *Gliricola porcelli* (Schränk, 1781) em *Cavia porcellus*, em Mossoró, Rio Grande do Norte, Brasil. **Revista Brasileira de Higiene e Sanidade Animal**, v. 7, n. 2, p. 250-257, 2013^b.

ROBLES, K. et al. Parasitosis externa en cuyes (*Cavia porcellus*) de crianza familiar-comercial en las épocas de lluvia y seca en Oxapampa, Perú. **Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú**, v. 25, n. 1, p. 51-57, 2014.

VALIM, M. P.; AMORIM, M.; SERRA-FREIRE, N. M. Parasitismo por Acari e Phthiraptera em cobaias [*Cavia Porcellus* (Linnaeus, 1758)] de ambientes rural e urbano nos municípios de Silva Jardim e Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Brasil. **Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science**, v. 41, n. 4, p. 240-246, 2004.

VALIM, M. P. **Sistemática e análise cladística das espécies do gênero *Gyropus* Nitzsch (Phthiraptera, Amblycera, Gyropidae)**, 2010.

VELOSO, I. M. F. **Estudo de ectoparasitas no porquinho-da-Índia e noutros pequenos roedores domésticos**. 2015. 84f. Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária) - Universidade de Lisboa, Lisboa, 2015.

WERNECK, F. L. Contribuição ao conhecimento dos mallophagos encontrados nos mamíferos sulamericanos. **Memórias do Instituto Oswaldo Cruz**, v. 31, p. 391-589, 1936.

WERNECK, F. L. **Os Malófagos de mamíferos**. Parte I: Amblycera e Ischnocera (Phloptoridae e parte de Trichodectidae). Rio de Janeiro: Ed. Revista Brasileira de Biologia, 1948.

DIFERENTES MÉTODOS PARA AVALIAR O TEOR DE ÁGUA EM SEMENTES DE *Ormosia grossa* Rudd

Romário de Mesquita Pinheiro

Universidade Federal de Pelotas - Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes, Pelotas, RS.

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3522836335385738>

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0484-8351>

Gizele Ingrid Gadotti

Universidade Federal de Pelotas - Centro de Engenharias, Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes, Pelotas, RS.

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4110765012494684>

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9545-6577>

Elson Junior Souza da Silva

Universidade Federal de Pelotas - Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes, Pelotas, RS.

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9635820644380732>

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0149-2866>

Isabella Brandão Moreira

Universidade Federal de Pelotas - Centro de Engenharias, Pelotas, RS.

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8752052543298781>

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9681-5866>

Rafael Rico Timm

Universidade Federal de Pelotas - Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Pelotas, RS.

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9475593202792475>

Informações sobre o

artigo:

Recebido em:

10/03/2021

Aceito em:

12/03/2021

Data de publicação:

27/04/2021

Palavras-chave:

Armazenamento

Ortodoxa

Sementes florestais

RESUMO

As interações entre fatores físicos para a determinação do teor de água em sementes são bastante complexa e requer informações específicas para cada espécie, sendo que a retirada de água esta relacionado com a composição do tegumento. Este trabalho teve como objetivo avaliar o procedimento mais eficaz para a determinação do teor de água em sementes de *Ormosia grossa* Rudd, em função de seus aspectos estruturais acondicionadas em papel e cápsula de alumínio. Para a determinação do teor de água das sementes adotou-se os métodos de estufa a 105 ± 3 °C por 24 horas, a 103 ± 2 °C por 17 horas e a 130 °C por 2 horas e 70 ± 3 °C por 48 horas, em arranjo fatorial 4 x 2. Os resultados obtidos através das análises recomendam-se a trituração das sementes e a utilização do método de estufa não interfere na retirada de água, independentemente dos recipientes, pois os mesmos apresentaram a mesma precisão na averiguação do conteúdo de água. Portanto, conclui-se que para esta espécie sementes trituradas evapora maior percentual de água em relação aos demais tratamentos.

DIFFERENT METHODS FOR ASSESSING WATER CONTENT IN SEEDS OF *Ormosia Grossa* Rudd

ABSTRACT

The interactions between physical factors to determine the water content in seeds are quite complex and require specific information for each species, and the withdrawal of water is related to the composition of the tegument. This work aimed to evaluate the most effective procedure for the determination of the water content in *Ormosia grossa* Rudd seeds, due to its structural aspects conditioned in paper and aluminum capsule. For the determination of the water content of the seeds, the greenhouse methods were adopted at $105 \pm 3^\circ\text{C}$ for 24 hours, at $103 \pm 2^\circ\text{C}$ for 17 hours and at $130 \pm 3^\circ\text{C}$ for 2 hours and $70 \pm 3^\circ\text{C}$ for 48 hours, in a 4×2 factorial arrangement. The results obtained through the analyzes are recommended to crush the seeds and the use of the greenhouse method does not interfere in the removal of water, regardless of the containers, since they equal the precision in the average water content. Therefore, it is concluded that for this crushed species, a higher percentage of water evaporates in relation to the other treatments. Therefore, it is concluded that for this species crushed seeds evaporates a higher percentage of water in relation to the other treatments.

Keywords:

Storage

Orthodox

Forest seeds.

1 INTRODUÇÃO

A espécie *Ormosia grossa* é conhecida popularmente como mulungú vermelho e preto, pertence à família Fabaceae, ocorrendo apenas nos estados do Acre, Amazonas e Rondonia. A principal forma de propagação da maioria das espécies florestais nativas é por via assexuada, por esse motivo, é pertinente a identificação dos fatores que influenciam durante a produção e conservação das sementes (DIAS et al., 2012). O conteúdo de água que compõe a semente é um dos elementos mais importante na manutenção de viabilidade e determina as condições de armazenamento, como também a tolerância aos aspectos de dessecação. Isso só é determinado conforme sua classificação quanto a ortodoxa e recalcitrante, cada uma tem suas limitações a perda de água.

O teor de água é um fator imprescindível quanto à manutenção do potencial fisiológico das sementes, influenciando em todas as etapas do processo tecnológico (ARAÚJO et al., 2016), inclusive para todas as espécies de propagação assexuada. Devido a diversidade de espécies florestais, estas são as que mais necessitam de estudos sobre os processos de armazenamento. Por isso métodos para verificar o teor de água em

determinadas espécies devem ser testados. A determinação do teor de água das sementes é de fundamental importância na avaliação de sua própria qualidade e durante várias etapas do seu manuseio (MARCOS FILHO et al., 1987).

Existem regras nacionais (BRASIL, 2009) e internacionais (ISTA, 1998), para padronizar a determinação do teor de água de sementes para fins comerciais. Nas regras do Brasil (2009), recomenda-se utilizar uma temperatura de 105 ± 3 °C, durante 24 horas e os resultados de duas amostras (5 ou 10 g) devem se manter dentro de limites pré-estabelecidos dependendo do grau de umidade e do tamanho das sementes. Porém, a aplicação destas regras se restringe mais as sementes agronômicas de valor comercial apresentando algumas dificuldades em sementes tropicais florestais devido à grande variabilidade que há em cada espécie em relação ao tamanho, espessura de tegumento, dureza de tegumento, óleos essenciais e composição química que podem interferir na determinação do teor de água. Dentre as limitações destaca-se duas: uma ligada ao preparo e outra ao tamanho da amostra.

O tegumento impermeável de algumas espécies pode dificultar a evaporação da água e desta forma dificultar no alcance do resultado em 24 horas (GONÇALVES et al., 2004). Diante do exposto, considera-se que é necessário avaliar o procedimento mais eficaz para a determinação do teor de água em sementes de *Ormosia grossa* Rudd.

2 METODOLOGIA

O experimento foi conduzido no laboratório de Agrotecnologia da Universidade Federal de Pelotas, localizado no campus do Capão do Leão, RS, em fevereiro de 2019. As sementes depois de coletadas foram armazenadas em câmara frias a 16 °C até a condução do experimento. Foram utilizadas 8 sementes para cada repetição, onde uma semente equivale aproximadamente 0,75 g e então foi utilizada quatro repetições por tratamento.

Para a determinação do teor de água das sementes de *Ormosia grossa* adotou-se os métodos de estufa a 105 ± 3 °C por 24 horas (Brasil, 2009), a 103 ± 2 °C por 17 horas e a 130 ± 3 °C por 2 horas e 70 ± 3 °C por 48 horas, conduzidos em delineamento inteiramente casualizado disposto em arranjo fatorial 4 x 2 (quatro temperaturas e dois recipientes). Para cada tratamento foi determinado o teor de água das sementes intactas (sem nenhum dano), sementes trituradas (maceradas com martelo) e sementes escarificadas (na região oposta ao hilo ocasionado uma ruptura no tegumento favorecendo a liberação de água mais rápida). Após esses procedimentos foram realizados a pesagem em balança de precisão 0,0001 g.

Conforme os procedimentos iniciais, os recipientes com as sementes no seu interior foram levados à estufa de acordo com os métodos citados anteriormente, decorridos os períodos de secagem estabelecidos, os conjuntos (recipientes – sementes) foram colocados em dessecador até esfriar e em seguida obteve-se o peso seco das repetições (BRASIL, 2009).

Os dados foram submetidos à análise de variância do delineamento e as médias comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade através do software winStat (MACHADO et al., 2003). A análise de variância dos dados foi realizada a 5% de probabilidade pelo teste F, o efeito das temperaturas foi analisado por meio de estudo de regressão.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao analisar o efeito entre temperaturas, aos quais as sementes foram submetidas e os recipientes utilizados para a determinação do teor de água das sementes de *Ormosia grossa*, observou-se que não houve interação entre os mesmos quando a aferição foi pela desestruturação do tegumento das sementes (intacta, trituradas e escarificadas). Houve, apenas efeito significativo para o fator isolado nas condições de temperatura (Tabela 1).

Tabela 1: Valores de F para o teor de água de sementes de *Ormosia grossa*, em função das temperaturas pelos métodos de estufas (105 °C/ 24 horas, 103 °C/ 17horas, 130 °C/ 02 horas e 70 °C/ 48 horas, recipientes (cápsula de alumínio e papel alumínio) em relação aos aspectos estrutural das sementes (Intactas, trituradas, escarificadas).

Fatores de Variação	Valores de F		
	Intactas	Trituradas	Escarificadas
Temperaturas	14,031*	8,319*	11,659*
Recipientes	0,267 ^{ns}	3,065 ^{ns}	2,519 ^{ns}
Temperaturas x recipientes	2,849 ^{ns}	1,192 ^{ns}	2,662 ^{ns}
CV%	17,14	11,29	18,68

^{NS}: não significativo (P>0,05); *: significativo (P<0,05); C.V.: coeficiente de variação.

Os recipientes sob as diferentes temperaturas não apresentaram diferença estatística para os aspectos estruturais das sementes analisadas, exceto para a temperatura a 70 °C por 48 horas que apresentou diferença estatística para sementes intactas sob cápsula de alumínio e para sementes escarificadas em papel alumínio (Tabela 2). A médias que levaram a letra ‘b’ foram as que apresentaram menor quantidade de água removida. Para tal explicação dos

fatos, as sementes intactas (sem nenhum dano) tendem a eliminar pouca água em relação aos demais tratamentos e quando colocadas na cápsula de alumínio houve variação na liberação do conteúdo de água, que pode ser em função, das sementes apresentarem estruturas diferentes (tegumentos rígidos) ou sementes desiguais em tamanho nos recipientes e no caso, das sementes escarificadas em baixa temperatura, pode ser em função do processo de escarificação que não rompeu totalmente o tegumento diminuindo assim, a saída de água.

Tabela 2. Médias do teor de água de sementes de *Ormosia grossa* com diferentes aspectos estruturais, em função de diferentes temperaturas e recipientes por meio de método em estufa.

Recipientes	Temperatura	Aspectos estruturais das sementes		
		Intactas	Trituradas	Escarificadas
Papel alumínio	105 °C/ 24 h	6,67±0,24a	16,40±0,97a	12,24±0,26a
Capsula de alumínio		7,21±0,19a	14,45±0,01a	13,34±3,24a
Papel alumínio	103 °C/ 17 h	5,91±0,33a	14,52±1,21a	13,56±0,56a
Capsula de alumínio		6,23±2,41a	15,33±4,02a	11,64±3,13a
Papel alumínio	130 °C/ 02 h	4,01±0,12a	11,30±1,10a	7,33±0,33a
Capsula de alumínio		4,46±0,14a	12,10±0,41a	8,98±0,51a
Papel alumínio	70 °C/ 48 h	8,45±1,68a	14,83±0,15a	7,19±3,15b
Capsula de alumínio		6,37±1,17b	14,15±0,28a	10,83±0,70a

*Médias ± erro padrão da média. Médias seguidas pelas mesmas letras (minúsculas nas colunas) não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade

Os resultados obtidos através de análise de regressão para o efeito da temperatura demonstraram que as sementes submetidas a temperatura de 130 °C por 2 horas (Figura 1) não é eficiente para determinar o conteúdo de água total na semente. Isso pode ser reflexo do pouco tempo de exposição a temperatura sendo insuficiente para evaporar o conteúdo de água de impregnação que está entre as células das sementes. Araújo et al. (2015), atribuíram a obtenção do teor de água em sementes de *Enterolobium contortisiliquum* (Vell.) Morong (tamboril) a eficácia do procedimento de moagem, uma vez que, o mesmo promoveu a descompartimentalização dos tecidos de proteção, meristemático e de reserva.

Este método de moagem é semelhante ao de trituração, portanto escolher um método mais eficaz para determinar o teor de água pode ser influenciado de uma espécie

para outra, pois suas estruturas tegumentares são diferentes. Em estudo com *Hymenaea courbaril* L. (jatobá), Andrade et al. (2010), observaram que a escarificação do tegumento não foi um método suficiente para garantir a desidratação satisfatória das sementes, relatando que sua escarificação não diferiu da testemunha.

Por outro lado, saber o percentual de umidade das sementes em tempo rápido pode tornar econômico para a conservação da espécie. E segundo Xu et al. (2019), o teor de água é um indicador significativo para avaliar a qualidade das sementes, o que influencia diretamente o tempo de armazenamento e a taxa de semeadura, bem como na produção de mudas de espécies florestais.

Figura 1. Representação gráfica e equação de regressão da determinação do teor de água de sementes de *Ormosia grossa* em função de diferentes temperaturas (apenas o R^2 para 130 °C/2h, apresentou melhor ajuste, por isso que para os demais não se apresentou a curva de regressão, valores foram inferiores a 50%).

Os teores de água retirados a 103 °C/17h e 105 °C/24h foram mais eficiente na determinação do conteúdo de água, indo de acordo com as regras de análise de sementes (BRASIL, 2009), sendo que o recipiente papel de alumínio foi o que apresentou melhor resultado para sementes trituradas (14,5% e 16,4%).

4 CONCLUSÕES

Para a melhor determinação do teor de água em sementes de *Ormosia grossa* recomenda-se a trituração e a utilização do método de estufa não interfere na retirada de água, independentemente dos recipientes, pois os mesmos apresentaram a mesma precisão na averiguação do conteúdo de água. As sementes em temperatura de 103 e 105 °C/ 24 horas, foram as que tiveram maior tempo de exposição, sendo do ponto de vista percentual dos dados apresentados as mais eficiente para remoção do teor de água.

REFERÊNCIAS

- ANDRADE, L. A.; BRUNO, R. L. A.; OLIVEIRA, L. B.; SILVA, T. F. Aspectos biométricos de frutos e sementes, grau de umidade e superação de dormência de jatobá. **Acta Scientiarum Agronomy**, v. 32, n. 2 p. 293-299, 2010.
- ALVES, M. S.; FERRAZ, R. D. K.; FERREIRA, S. A. N. Tamanho mínimo e preparo da amostra na determinação do teor de água de sementes com impermeabilidade de tegumento. XV Jornada de Iniciação Científica do PIBIC/CNPq/ FAPEAM/INPA, 11 a 14.07.2005, INPA Manaus-AM. **Anais...** p. 353-354. 2006.
- ARAÚJO, A. V.; PINTO, M. A. D. S. C.; FERRAZ, A. P. F.; BRITO, A. C. V. Comparação de métodos para avaliar o teor de água em sementes de paricá (*Schizolobium parahyba*). **Revista Biociências** (Taubaté), v. 22, p. 71-77, 2016.
- ARAÚJO, A. V.; PINTO, M. A. D. S. C.; NUNES, A. F.; OLIVEIRA, A. S. L.; BRITO, A. C. V. Métodos de secagem na determinação do teor de água de sementes de *Enterolobium contortisiliquum* (Vell.) Morong. **Revista SODEBRAS**, v. 10, n. 112, p. 94-97, 2015.
- BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **Regras para análise de sementes**. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de Defesa Agropecuária. Brasília, DF: Mapa/ACS. 2009. 399p.
- DIAS, P. C.; OLIVEIRA, L. S. de; XAVIER, A.; WENDLING, I. Estaquia e miniestaquia de espécies florestais lenhosas do Brasil. **Pesquisa Florestal Brasileira**, v. 32, n. 72, p. 453-462, 2012.
- GONÇALVES, J. F. C.; VIEIRA, G.; BARBOSA, A. P.; FERRAZ, R. D. K. Transferência de Tecnologia no Setor Florestal da Amazônia. Universidade de Brasília. **Comunicações Técnicas Florestais**. 6 (1) 33-45. 2004.
- ISTA. International Seed Technology Association. **Tropical and subtropical tree and shrub seed handbook**. Zurique, Suíça. 204 p. 1998.
- MACHADO, A. de A.; CONCEIÇÃO, A. R.; SILVA, J. G. C. E; CAMPARI, C. A. P.; JÚNIOR, P. S.; PORENSTEIN, D.; KROLOW, R. A. L. A.; GONSALES, A. D.; JUNIOR, J. C. V.; **WinStat. Sistemas de análises estatísticas para Windows**. Versão 2.11. UFPEL – Universidade Federal de Pelotas, NIA – Núcleo de Informática Aplicada, 2003.
- MARCOS FILHO, J.; CÍCERO, S. M.; SILVA, W. R. **Avaliação da qualidade das sementes**. Piracicaba. FEALQ, 230 p. 1987.
- XU, Y.; ZHANG, H.; ZHANG, C.; WU, P.; LI, J.; XIA, Y.; FAN, S. Rapid prediction and visualization of moisture content in single cucumber (*Cucumis sativus* L.) seed using hyperspectral imaging technology. **Infrared Physics and Technology**. v. 102, n. 103034, Nov. 2019. <https://doi.org/10.1016/j.infrared.2019.103034>.

DESEMPENHO DE PNEU AGRÍCOLA EM ENSAIO DE SUPERFÍCIE RÍGIDA EM FUNÇÃO DE DIFERENTES CARGAS E PRESSÕES DE INFLAÇÃO

Aldir Carpes Marques Filho

UNESP - Faculdade Ciências Agronômicas, Botucatu, SP
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5546495390309109>
ORCID: 0000-0002-9105-0040

Michel dos Santos Moura

UNESP - Faculdade Ciências Agronômicas, Botucatu, SP
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6080859196119434>
ORCID: 0000-0002-5325-6048

Daniel Roveri Balestrin

UNESP - Faculdade Ciências Agronômicas, Botucatu, SP
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1290608025058167>
ORCID: 0000-0002-2864-5914

José Tomba Neto

UNESP - Faculdade Ciências Agronômicas, Botucatu, SP
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9327860165510434>
ORCID: 0000-0003-3455-3570

Informações sobre o

artigo:

Recebido em:

26/03/2021

Aceito em:

29/03/2021

Data de publicação:

27/04/2021

Palavras-chave:

Mecanização agrícola

Tração

Compactação do solo

Tráfego controlado

RESUMO

Ensaio com pneus agrícolas são fundamentais para a tomada de decisão na agricultura moderna. Os modelos construtivos de pneus agrícolas seguem basicamente três construções: radial, diagonal e BPAF (Baixa pressão e alta flutuação). Cada tipo de pneu possui uma área de contato específica com o solo, de acordo com seu modelo construtivo. Sabe-se que a determinação da área de contato com o solo é importante durante as operações agrícolas, já que direciona a capacidade total de tração da máquina, bem como o grau de compactação proporcionado pela mesma. O presente trabalho objetivou avaliar a influência da pressão de inflação e de diferentes cargas de trabalho aplicadas em um pneu agrícola de construção radial. Os resultados demonstraram que a pressão de inflação e a carga sobre o rodado, impactam diretamente a área de contato pneu-superfície. As maiores áreas foram obtidas com menor pressão interna de inflação. Altas pressões de inflação geraram menores áreas de contato. O incremento de 3000kgf na carga sobre o rodado, proporcionou aumento de 28% na área de contato total e 20% na área de garras do pneu com a superfície.

PERFORMANCE OF AGRICULTURAL TIRE IN RIGID SURFACE TEST ACCORDING TO DIFFERENT LOADS AND INFLATION PRESSURES

ABSTRACT

Keywords:

Mechanization

Traction

Soil compaction

Controlled traffic

Tests with agricultural tires are essential for decision-making in modern agriculture. The agricultural tire construction models basically follow three constructions: radial, diagonal and BPAF (Low pressure and high fluctuation). Each type of tire has a specific contact area with the ground, according to its constructive model. It is known that the determination of the area of contact with the soil is important during agricultural operations, since it directs the total traction capacity of the machine, as well as the degree of compaction provided by it. The present work aimed to evaluate the influence of inflation pressure and different workloads applied to an agricultural tire with radial construction. The results showed that the inflation pressure and the load on the wheels directly impact the tire-to-surface contact area. The largest areas were obtained with less internal inflation pressure. High inflation pressures generated smaller areas of contact. The increase of 3000kgf in the load on the wheels, provided an increase of 28% in the area of total contact and 20% in the area of claws of the tire with the surface.

1 INTRODUÇÃO

Os pneus agrícolas representam importante componente do trator e das máquinas agrícolas, sendo que o desempenho de tração das máquinas se dá em função da interação rodado-solo. A capacidade de uma máquina fornecer potência para a realização das operações agrícolas depende diretamente do dispositivo de tração, no caso de rodados pneumáticos, o tipo de pneu é determinante para o bom desempenho da máquina.

Segundo Zoz e Grisso (2003), vários fatores interferem no desempenho de rodados pneumáticos tais como: o raio dinâmico do pneu, a pressão interna de inflação e as características construtivas da banda de rodagem (ALAKUKKU et al. 2003). Além de alterar a capacidade de tração das máquinas os pneus também influenciam o crescimento radicular das culturas, já que dissipam cargas no solo, aumentando sua compactação.

O manejo incorreto do solo produz efeitos como compactação superficial e redução da produtividade agrícola (MOLINA JR., 2017). As máquinas e os implementos agrícolas são os principais responsáveis pela compactação do solo nas áreas agrícolas (MARTINS et al. 2018).

Os pneus agrícolas apresentam grande influência na compactação do solo, bem como podem incrementar a intensidade da compactação, de acordo com sua pressão de inflação ou forma construtiva, portanto, torna-se fundamental estudar o comportamento dos pneus na interação rodado-superfície de rolamento, em função das cargas aplicadas e pressão interna.

Com base no exposto acima, o objetivo do presente trabalho foi realizar um ensaio avaliativo de pneu agrícola em Unidade Fixa de Ensaio de Pneus (UFEP), sob superfície rígida em função de diferentes cargas e pressões de inflação.

2 MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi desenvolvido na Fazenda experimental Lageado, pertencente à Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Faculdade de Ciências Agrônômicas no município de Botucatu. Para realização dos ensaios foi utilizada metodologia proposta por Lanças, et al. (1996).

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado (DIC) sendo que os tratamentos consistiram na aplicação de cinco pressões de inflação ($p_1=413,7$ kPa; $p_2=365,4$ kPa; $p_3=324,1$ kPa; $p_4=289,6$ kPa; $p_5=255,1$ kPa) e duas cargas controladas ($c_1=8000$ kgf e $c_2=5000$ kgf) em pneu agrícola modelo 75R26 com largura total de banda de 712mm; diâmetro externo de 1600mm e pressão de inflação recomendada de 331kPa. Foram realizadas 4 repetições para cada tratamento.

Para ensaio em laboratório e aplicação das cargas controladas foi utilizada a Unidade Fixa de Ensaio de Pneus UFEP (Figura 1) constituída por perfis e tubo de aço carbono, apresentando um eixo acionado por pistão hidráulico, onde o pneu é fixado com a finalidade de receber cargas controladas através de uma célula com capacidade de 10.000 kgf, simulando assim, as interações entre rodados pneumáticos com o solo ou superfície rígida.

As variáveis analisadas foram: área de contato total (AT) e área de contato das garras (AG) do pneu, em função de diferentes pressões de inflação e cargas aplicadas. As cargas aplicadas de 5000kgf e 8000kgf, objetiveram representar a situação de trabalho e a carga crítica máxima para o modelo de pneu, respectivamente.

Foi utilizado o método da super elipse para composição da área total de contato. Para a área das garras foi utilizado equipamento planímetro de mesa desenvolvido por Silva, Catâneo e Cardoso (1993).

Para o tratamento estatístico dos dados foi utilizado o software Minitab v. 16, onde os resultados foram submetidos ao teste de normalidade, análise de variância e quando necessário ao teste de comparação de médias Tukey à 5% de probabilidade.

Figura 1: Unidade Fixa de ensaio de pneus em ensaio de interação rodado-superfície rígida (*“Footprint”*).

Fonte: Marques Filho, (2019)

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos nos ensaios foram agrupados na Tabela 1, para as informações de área de contato total (AT) e área das garras (AG) em função das cargas aplicadas c1 (8000kgf) e c2 (5000kgf).

Para a carga aplicada de 5000kgf não se constatou diferença estatística entre as pressões p2; p3; p4 e p5, porém verificou-se diferença entre essas e p1. Em ATc2 e AGc2 a carga aplicada apresentou diferença entre p1 e as demais pressões de inflação, fato que possivelmente ocorreu pela menor imposição de carga no pneu e maior estabilidade do mesmo para suportar tais pressões em função da área de contato. Os resultados obtidos vão de encontro com Fernandes et al. (2018) e Leite et al. (2010).

Tabela 1: Resultados análise de variância e teste de Tukey para variáveis área de contato e área das garras em pneu agrícola sob diferentes pressões de inflação e cargas aplicadas.

Trat.	p1 (cm ²)	Desvio	p2 (cm ²)	Desvio	p3 (cm ²)	Desvio	p4 (cm ²)	Desvio	p5 (cm ²)	Desvio
ATc1*	1403 d	4,8	1514 c	14,8	1535 bc	6,1	1580 ab	4,7	1603 a	3,7
ATc2*	1109 f	25,3	1231 e	56,5	1236 e	9,5	1226 e	16,3	1261 e	1,8
CV(%)	2,28		4,58		1,2		1,32		1,1	
AGc1*	425 d	9,1	472 c	1,3	486 bc	2,08	498 ab	8,4	503 a	1,2
AGc2*	328 f	3,2	365 e	16,2	351 e	1,1	349 e	5,2	357 e	2,8
CV(%)	2,14		4,45		0,42		1,7		0,8	

*médias seguidas de letras iguais entre linhas ou colunas, não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey à 5%.

Pode-se inferir que quanto maior a pressão de inflação do pneu, menor a área de contato com o solo. Em área total, com a aplicação de 8000kgf não houve diferença entre valores para p4 e p5; p3 e p4 respectivamente. Os resultados indicam alta correlação entre pressão de trabalho e área de contato total do pneu com a superfície rígida (Figura 2).

Figura 2: Relação entre as variáveis área de contato total e Pressão de inflação do pneu sob diferentes cargas aplicadas c1(8000kgf) e c2 (5000kgf).

Fonte: dados da pesquisa

Os resultados obtidos concordam com os encontrados por Teimourlou e Taghavifar (2015), onde se observou que o aumento da carga sobre o rodado agrícola,

aumenta a área de contato. Entretanto, os autores verificaram comportamento contrário para o incremento da pressão de inflação do pneu, onde a área de contato foi reduzida linearmente com o aumento da pressão interna do pneu.

Foi possível verificar que o aumento de carga aplicada em 3000kgf, aumentou também a área de contato total (AT) na superfície em média 20%, e área das garras (AG) em 28% para pressões de inflação idênticas. Resultados semelhantes foram obtidos por Feitosa et al. (2014).

A pressão de inflação impactou diretamente a área de contato do pneu com a superfície, sendo que foram necessários 131kPa para obtenção de um aumento de 10% de aumento na área de contato com a superfície rígida.

É importante salientar que as altas pressões de trabalho, associadas ao aumento do índice de carga sobre os rodados, causam problemas de compactação no solo, prejudicando o crescimento radicular e consequentemente da produtividade das culturas agrícolas.

4 CONCLUSÕES

O aumento de carga sobre o rodado apresenta correlação linear positiva com o ganho em área de contato do pneu com a superfície. O incremento da pressão de inflação interna, reduz linearmente a área de contato.

O acréscimo de 3000kgf na carga aplicada proporcionou aumento de 28% na área de contato total e 20% na área de garras do pneu com a superfície.

É preciso equalizar corretamente pressão de trabalho e distribuição de cargas nos rodados, utilizando como fonte de racionalização de recursos na agricultura e manutenção das características do solo.

REFERÊNCIAS

ALAKUKKU, L.; WEISSKOPF, P.; CHAMEN, W.C.T.; TIJINK, F.G.J.; van der LINDEN, J. P.; PIRES, S.; SOMMER, C.; SPOOR, G. Prevention strategies for field traffic-induced subsoil compaction: a review: Part 1. Machine/soil interactions. **Soil and Tillage Research**, v. 73, p. 145160, 2003.

FEITOSA, J. R.; FERNANDES, H. C.; DADALTO, J. P.; FURTADO JÚNIOR, M. R.; SANTOS, L. N. Determinação da área de contato entre os pneus de um trator agrícola e o solo em função de diferentes pressões internas dos pneus. **XLIII Congresso de Engenharia Agrícola**, Campo Grande – MS, Anais, 2014.

FERNANDES, B. B.; MARASCA, I.; MARTINS, M. B.; SANDI, J.; LANÇAS, K. P. Tráfego de máquinas agrícolas e interação dos rodados com dois solos em diferentes teores de água. **Energia na Agricultura**, v.33, n.03, p. 190-195, 2018.

LEITE, F.; FROHILICH, W. F.; DOIMO, L. S.; ALEIXO, E. V.; VOLK, L. B. S. Influência de diferentes teores da água e níveis de pressão no pneu sobre área de solo mobilizada e recalque no arenito Caiuá. **Cultivando o Saber**. Cascavel, v.3, n. 1, p. 82-98, 2010.

MARTINS, P. C. C.; DIAS JUNIOR, M. S.; AJAYI, A. E.; TAKAHASHI, E. N.; TASSINARI, D. Soil compaction during harvest operations in five tropical soils with different textures under eucalyptus forests. **Ciência e Agrotecnologia**, v.42, p.58-68, 2018.

MOLINA JR, W. F. **Comportamento mecânico do solo em operações agrícolas**. Escola superior de agricultura Luiz de Queiroz, ESALQ/USP, ed. autor, Piracicaba, 223p., 2017.

TEIMOURLOU, R. F.; TAGHAVIFAR, H. Determination of the super-elliptic shape of tire-soil contact area using image processing method. **Cercetari Agronomice in Moldova**, v.48, n.2, p.5-14, 2015.

ZOZ, F., GRISSO, R.D. Traction and tractor performance. St Joseph: **ASAE**. 46p. 2003.

RURALIDADE DO SEMIÁRIDO: CONCEITOS NORTEADOES SOBRE SOCIEDADE, TERRITÓRIO E ÁGUA NA CONTEMPORANEIDADE

Everton Nogueira Silva

Universidade Estadual do Ceará - UECE, Fortaleza, CE
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1111762467064798>

Luis de França Camboim Neto

Universidade Federal do Ceará
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8798851810906877>

Lorena Maria Gomes Bastos

Universidade Sete de Setembro - UNI7, Fortaleza, CE
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3631661313340037>

Raimunda Gomes da Silva

Secretaria de Educação do Estado do Ceará, Fortaleza, CE

Aderson Martins Viana Neto

Universidade Estadual do Ceará (UECE), Faculdade de Veterinária, Fortaleza, CE
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4682104695685941>

Fágner Cavalcante Patrocínio dos Santos

Universidade Estadual do Ceará (UECE), Faculdade de Veterinária, Fortaleza, CE
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1663854190165663>

Isaac Neto Goes da Silva

Universidade Estadual do Ceará (UECE), Faculdade de Veterinária, Fortaleza, CE
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1191488997675957>

Lina Raquel Santos Araújo

Universidade Estadual do Ceará (UECE), Faculdade de Veterinária, Fortaleza, CE
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7591378438576586>

Victor Hugo Vieira Rodrigues

Centro Universitário Maurício de Nassau, Centro de Saúde, Fortaleza, CE
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2226604565550002>

Informações sobre o

artigo:

Recebido em:

26/03/2021

Aceito em:

29/03/2021

Data de publicação:

27/04/2021

RESUMO

Entender a dinâmica da sociedade nordestina e suas relações com o seu território tem-se se tornada a cada dia mais evidente nos estudos sociais e agrários. A região nordeste por muito tempo ao longo dos séculos e desde os primórdios de sua ocupação tem sido visto pelas demais regiões do país como um lugar de atraso em que o fenômeno da seca é reinante no semiárido. A seca deve ser entendida em sua complexidade não sendo apenas um fenômeno meteorológico, mas um problema de superação também social e político. Deste modo este estudo de caráter bibliográfico apresenta uma base conceitual de discussões ainda evidentes na

Palavras-chave:

Seca

Complexidade

Socioambientais

contemporaneidade sobre a questão da ruralidade para o nordeste semiárido brasileiro onde os desafios da inserção da sociedade sobre as questões do território e da gestão de águas tornam-se temas que precisam ser melhor trabalhados entre o poder público e a sociedade sobre a proposta de construção de pontes de diálogo horizontais para que haja eficácia nas ações de mitigação dos problemas socioambientais causados principalmente pelos períodos de secas.

RURALITY OF THE SEMI-ARID: GUIDED CONCEPTS ON SOCIETY, TERRITORY AND WATER IN CONTEMPORANEITY

ABSTRACT

Keywords:

Drought

Complexity

Social and

environmental

Understanding the dynamics of Northeastern society and its relations with its territory has become increasingly evident in social and agrarian studies. The northeast region for a long time over the centuries and since the beginning of its occupation has been seen by other regions of the country as a place of backwardness in which the phenomenon of drought reigns in the semiarid region. The drought must be understood in its complexity not only as a meteorological phenomenon, but also as a problem to overcome social and political issues. In this way, this bibliographic study presents a conceptual basis for discussions that are still evident in contemporary times on the issue of rurality for the Brazilian semi-arid northeast where the challenges of society's insertion on issues of territory and water management become themes that need be better worked out between the government and society on the proposal to build horizontal dialogue bridges so that there is effectiveness in actions to mitigate socio-environmental problems caused mainly by periods of drought.

1 INTRODUÇÃO

Ao longo dos séculos o nordeste brasileiro em sua porção semiárida tem sido estigmatizado como uma região de extrema pobreza sendo difícil a aplicação de técnicas mais adequadas para o desenvolvimento de sistemas agrários tido como mais eficientes. O próprio desenvolvimento de ações “modernizantes” da revolução verde no Brasil trouxe exclusão da maioria dos territórios do semiárido por conta da assistência técnica querer implantar “pacotes tecnológicos” sem nenhum entendimento sobre o modo de produção e reprodução da sociedade sertaneja em seu território.

Contribuindo para tal fato, entende-se que as questões edafoclimáticas - solos rasos e escassez hídrica temporal - faz com que o semiárido seja visto como um território em que

os avanços da agricultura sempre terão um aspecto limitante. Soma-se a isso a questão da ocupação do território através do binômio gado-algodão em que as glebas eram ocupadas por pessoas influentes que tinham no latifúndio a forma de se gerar receita para si e para aqueles que estavam à disposição de trabalhar nas grandes fazendas.

Neste interim e voltando-se para questões mais contemporâneas que avançaram ao longo do século XX, tem-se a modernização do campo e a urbanização de grandes centros. O rural passa então por reformas técnicas para atender a demanda por alimentos nas grandes cidades que agora se tornavam grandes centros comerciais e industriais. Neste processo o sertanejo, excluído do sistema de produção agrícola “moderno” - sem acesso à terra e/ou sem capital - passa a servir de mão de obra para a engrenagem do bom funcionamento urbano industrial, havendo um grande número de emigrantes nordestinos principalmente para os estados da região sudeste - principalmente Rio de Janeiro e São Paulo.

Entender esse arcabouço complexo sobre território, sociedade e relações de gestão para as águas torna-se mister nesse estudo em que se realizará um panorama teórico através de uma revisão bibliográfica para que se possa entender a complexidade deste território tão rico e tão vasto em cultura e em potencialidades na sua ruralidade. As melhorias para a sociedade nordestina, perpassam por esse entendimento e se faz necessário que cada vez mais as ações do poder público possam a cada dia dialogar de forma mais horizontal com a sociedade para que as ações públicas possam ter efetividade nas mudanças sociais para o povo nordestino.

2 SEMIÁRIDO BRASILEIRO: RELAÇÕES SOCIEDADE, TERRITÓRIO E ÁGUA

O semiárido brasileiro vai além dos aspectos geográficos de clima e bioma. O novo olhar relaciona-se à capacidade do sertanejo nordestino em adaptar o seu modo de vida de produção e reprodução às condições adversas que inicialmente pensa-se ser somente de acesso à água. A complexidade das adaptações perpassa pelos saberes adquiridos pela sociedade ao longo dos anos na busca de superar, não somente questões relacionadas ao clima, mas também questões político-sociais que durante muito tempo foram negligenciadas para a sociedade que vive no território semiárido.

Neste sentido, através deste estudo teórico-bibliográfico se poderá ampliar o conhecimento de questões sobre território e suas relações sociais e gestão de águas, que cada

vez mais precisam ser entendidas dentro de novas propostas de políticas públicas para avanços no semiárido brasileiro sob o modo de produção e reprodução do meio rural.

2.1 Relações sociais e políticas no território semiárido

Território e espaço são conceitos aparentemente semelhantes, porém apresentam distinções. Segundo Egler (1995) o espaço representa um nível elevado de abstração, enquanto território envolve o ator que se apropria da terra e nela constrói relações de poder em múltiplas dimensões. O conceito de território não se relaciona apenas a uma dimensão material ou concreta, é algo mais amplo, sendo um campo de “teia ou uma rede de relações sociais” que se projetam no espaço sendo objeto de análise em diferentes perspectivas: geográficas, antropológicas, econômica, bioecológica (RAFFESTIN,1993).

O território do semiárido brasileiro tem por classificação sob a dimensão física uma área oficial de 895.254,40 km², constituída por 1.134 municípios presentes nos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e norte de Minas Gerais (BRASIL, 2020). Já Andrade (1988, p.62) em seu trabalho intitulado “Nordeste: Alternativas da Agricultura” observa que há no semiárido brasileiro uma diferenciação ecológica marcante semelhante a uma “colcha de retalhos” em que o espaço ou território não deve ser somente percebido pela simples avaliação das condições climáticas (que acaba induzindo a homogeneidade do semiárido relacionado principalmente a questão da seca). Andrade (1988) afirma que:

Há sim uma heterogeneidade observada através dos “grandes pediplanos drenados pelos principais rios da região: São Francisco, Paraíba, Jaguaribe, Piranhas-Açu e etc., com serras e chapadas que se alteiam sobre o pediplano e que apresentam um clima úmido ou sub-úmido. São as áreas conhecidas como “brejos”, que formam verdadeiros “oásis” onde existe uma grande concentração populacional”.

Para entender o modo de produção e reprodução no semiárido, se faz necessário o esforço para a compreensão de como ocorreu o processo de ocupação desta região diante dos desafios edafoclimáticos. A ocupação do semiárido ocorreu sustentada por um tripé: gado, algodão e lavouras alimentares (FARIAS, 2018). O gado era criado solto na caatinga de forma extensiva não requerendo um grande número de trabalhadores para essa atividade, ou seja, a mão de obra era basicamente constituída pelo núcleo familiar. Já o algodão era cultivado tanto em grandes como em pequenas propriedades.

Nas grandes propriedades, o cultivo de algodão seguia a plataforma baseada no sistema de parceria ou arrendamento estando os riscos e tratos culturais da produção de algodão sob a responsabilidade dos parceiros e arrendatários. Já as lavouras alimentares eram cultivadas pelos produtores arrendatários, parceiros ou por proprietários de pequenas propriedades agrícolas, baseado em um modo de produção de garantia mínima alimentar do núcleo familiar (MOREIRA, 2007). Para Moreira e Targino (1997):

[...] Outro aspecto que merece realce é o predomínio de uma estrutura de propriedade Marcada, desde o início do processo de ocupação regional, pela grande propriedade latifundiária. A pequena produção surge atrelada ao latifúndio e dele dependente. Sua expansão acha-se ali relacionada à expansão dos sistemas de parceria e arrendamento, relações de trabalho características da região.

Sob um olhar social, econômico e político, nas últimas décadas - a partir da década de 1990 - o governo federal aplicou ações de investimentos de forma polarizada através de políticas públicas ativas de investimento em regiões ou setores do país aclamados como “prioritários”, sendo um processo excludente de acumulação intencional e de fortalecimento da “Região Concentrada” (grandes núcleos urbanos, principalmente das regiões sul e sudeste) onde haveria o grande crescimento do “bolo econômico” para a partir daí repartir o “bolo” com as demais regiões e com os seus cidadãos (FAUSTO, 2015).

Para Théry (1995), no Brasil, há um ou mais “territórios arquipélagos” que foram construídos ou desconstruídos a partir de uma dinâmica territorial que fragmentou o país em ilhas de propriedades e excelência em que a qualidade de vida e os indicadores sociais e econômicos são dispares em relação ao resto do país. Há em algumas “ilhas” níveis de produtividade e competitividade alinhados a outras regiões do mundo economicamente mais desenvolvidas. Como resultado da política de investimentos polarizada se gerou no Brasil umas das sociedades mais desiguais do mundo (SACHS, 2003). Já Zaidan Filho (2003) destaca que o desenvolvimento regional e suas políticas e ações públicas nasceram de grandes propostas nacionais imposta em sentido vertical (de cima para baixo) advinda de uma elite dominante e dirigente que se impunha à missão de atenuar as disparidades e de integrar as regiões economicamente buscando fortalecer os vínculos de: nação, povo e identidade regional.

Dentre tantos chamados “arquipélagos”, encontra-se a região semiárida brasileira, que comumente tem sido estereotipada como uma região “pobre” onde a fome é um fator constante dada a escassez de chuvas em anos de seca quase que constantes. Sob esse aspecto, Carvalho (2004) destaca que:

Reconhecer a existência de uma “região pobre” dentro de um país é reconhecer as disparidades econômico-sociais [...] A “problemática regional” do semiárido é um produto sociocultural das disparidades geográficas no processo de desenvolvimento econômico capitalista, vale dizer, empreendidas com maior “rigor” em países periféricos, como no caso do Brasil.

Delgado (1985) destaca que até a primeira metade do século XX, não houve mudanças significativas no modo de produção dos latifúndios e dos minifúndios na região semiárida nordestina. Diferentes literaturas situam que mudanças significativas nos meios e formas de produção agrícola e pecuária no semiárido passam a ocorrer a partir da década de 1960 com um marco temporal importante no processo de modernização da agricultura brasileira a partir da integração da agricultura com a indústria, sendo a primeira a principal fornecedora de matéria-prima e consumidora da nascente indústria de insumos e equipamentos agrícolas.

Carvalho (2004) avalia que até meados da década de 1970 a parte central do semiárido era ocupada por atividades agropecuárias de consórcio gado-algodão-lavouras alimentares e sua forte dependência as condições climáticas da “quadra invernososa” (meses de fevereiro à junho). Silva (2006) destaca que:

Em meados do século XX, escancara-se o problema das desigualdades regionais, fruto da disparidade regional de ritmos de crescimento. De um lado assistia-se ao crescimento econômico do Centro-Sul do país, com base no dinamismo industrial; e, de outro, a lentidão e o atraso na economia regional nordestina, refletindo a estagnação da agroindústria açucareira e do complexo algodoeiro-pecuário[...]

Para Fausto (2015) as relações região Nordeste e Centro-Sul se dão pela dinâmica da integração, como “homogeneização do espaço econômico nacional” em que a região Centro-Sul assume o processo de expansão do capitalismo sendo as demais regiões subordinadas havendo um processo de desenvolvimento capitalista desigual e combinado em que há uma relação do controle dos níveis de produção regionais pela região Centro-Sul que detém o capital industrial, sendo as demais regiões fornecedoras apenas de produtos agropecuários (insumos para as indústrias).

Lima (2010) destaca que o desenvolvimento recente de algumas das chamadas “ilhas de modernidade” no semiárido ocorreu ou ocorre pela crença fundamentada de que o modelo relacionado ao agronegócio deve ser promotor de um maior nível de agregação de valor à produção local para que haja um incremento expressivo nos níveis de emprego e de renda e com isto a região semiárida é vista como um espaço do mercado onde as empresas

podem desenvolver suas operações de ampliação do capital. Araújo (1997 p.112) observa que atualmente a organização geoeconômica do semiárido comporta realidades bem diferentes e diversas, tornando-se uma região de desenvolvimento tecnológico e de novas formas de organização da produção principalmente aquelas relacionadas a produção agrícola irrigada e a indústria.

Essa nova plataforma de desenvolvimento é resultado de elementos de três elementos fundamentais: condições climáticas em seu estado ótimo, ampliação de investimentos tecnológicos para ampliação e desenvolvimento da fruticultura irrigada e a intensa participação do setor público com ações promotoras de desenvolvimento para integração do semiárido à economia das demais regiões do país.

2.2 Semiárido e sua relação com a gestão de águas

Quando se fala ou se pensa em semiárido a característica mais evidente mensurada em diferentes estudos é a ausência de chuvas em períodos longos. Coelho (1985) verifica que o fator seca no semiárido nordestino apresenta-se como uma característica natural, pois ocorrem somente duas estações, o inverno e o verão com variações de precipitações e de períodos dentro do próprio Sertão - início de chuvas no mês de outubro em algumas áreas e/ou regiões e em outras somente a partir de março. Lima (2010) relata que a insuficiência e irregularidade na distribuição de chuvas, com médias entre 260 e 800 mm, forte taxa de evaporação e a temperatura elevada refletem na modelagem da paisagem predominante, influenciando diretamente na vegetação que apresenta espécies xerófilas e caducifólias, formando o bioma caatinga. Com relação à rede de rios existentes no Nordeste, Cirilo (2008, p. 62) destaca:

O Nordeste semiárido é uma região pobre em volume de escoamento de água dos rios. Essa situação pode ser explicada em razão da variabilidade temporal das precipitações e das características geológicas dominantes, onde há predominância de solos rasos baseados sobre rochas cristalinas e consequentemente baixas trocas de água entre o rio e o solo adjacente. O resultado é a existência de densa rede de rios temporários.

Já para Agência Nacional de Águas (ANA) (2003) o longo período seco e a elevada evaporação faz com que os rios, riachos e córregos no semiárido apresentem a característica de serem intermitentes (baixos níveis ou até mesmo ausência hídrica em períodos de estiagem), havendo um conjunto de fatores ecológicos e hidrológicos relacionados ao clima

semiárido regional, “muito quente e sazonalmente seco, que projeta derivadas radicais para o mundo das águas, o mundo orgânico das caatingas e o mundo socioeconômico dos viventes dos sertões”.

Gomes (2001) destaca que “nos três últimos séculos, registros acerca dos eventos climáticos ocorridos na região se tornaram mais confiáveis. Nesse período, por 85 anos as chuvas foram escassas, inexistentes ou mal distribuídas no semiárido nordestino”. Sobre o modo de produção e reprodução da população camponesa nordestina, Castro (2011, p. 8) destaca que: “à escassez ou à má distribuição das chuvas soma-se o fato de que aproximadamente 10 milhões de habitantes do Semiárido obtêm o seu sustento da agricultura e da pecuária tradicionais, atividades muito vulneráveis às secas”.

A principal alternativa pensada desde o final do século XIX para o semiárido nordestino, no sentido de atenuar os efeitos da seca, vem a ser a construção de açudes para armazenamento das águas da quadra “invernosa”.

De acordo com Assunção e Livingstone (1993), desde que a seca é por definição um problema relacionado à falta de água, a solução encontrada é a acumulação de água em grandes quantidades, a chamada “solução hidráulica”. Em oposição a esse ideal chama atenção o fato, de que a grande maioria dos açudes construídos ao longo do século XX são escassamente utilizados, pois há deficiência de políticas e ações eficazes de gestão dos recursos hídricos que garantam que a água chegue de forma regular para todos os viveres de uma região ou localidade.

Porém algumas ações promotoras de gestão dos recursos hídricos merecem destaque como o “Canal da Integração” para o estado do Ceará coordenado pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (COGERH) que conduz a água do reservatório do Castanhão por 225 km até a região metropolitana de Fortaleza. Outro exemplo são os 500 quilômetros de adutoras construídas no estado do Rio Grande do Norte. Estes dois exemplos expressam ações técnicas eficientes de aproveitamento das reservas hídricas (CIRILO, 2008).

Destaca-se no último parágrafo, o termo “ações técnicas eficientes”, mas sob o aspecto social - redução da pobreza - tais ações são realmente eficientes? Ao avaliar o aspecto benefício social das barragens, Coelho (1985 p. 30) levanta a seguinte indagação: “E as barragens que servem para irrigação, não são desenvolvimento social e econômico, de acordo com o que diz o Governo”? Sob a sua indagação, Coelho expõe em a ideia das barragens como promotoras de riquezas dos poderosos, dos donos de fábricas e dos latifundiários através do amplo acesso aos meios técnicos de irrigação, sendo pouco expressivo o seu papel

social e econômico para a grande parcela de camponeses e/ou agricultores familiares. Silva (2003, p. 370) observa que há falhas na funcionalidade social dos grandes açudes em relação ao aspecto da garantia da produção agrícola, pois muitos estão localizados longe de várzeas irrigáveis e os que estão próximos destas áreas atendem a um pequeno número limitado de famílias.

A construção e gestão dos açudes, ao longo do tempo, tem obedecido a lógica da injustiça ambiental defendida por Sen (2008) em que há negação de acesso das classes mais pobres aos recursos que atendam às suas necessidades básicas de sobrevivência, como por exemplo água potável. A lógica da injustiça ambiental segue parâmetros defendidos por políticas de desenvolvimento econômico que buscam promover a equidade social negligenciando os direitos individuais dos cidadãos que não estejam dentro da lógica de evolução do mercado (SEN, 2008).

Como forma de atenuar a injustiça ambiental - para a água - Fracalanza, Jacob e Eça (2013, p.1) defendem a ampliação da participação de novos atores sociais nas políticas públicas relacionadas à gestão dos recursos hídricos, tendo por ponto de partida uma dimensão predominantemente técnica da gestão que seria ampliada para uma panorama e/ou dimensão de uso da água em que entrariam múltiplas formas de apropriação, abrindo um espaço para o debate questionador das considerações meramente mercantis de utilização da água.

Com o debate busca-se criar modelos mais igualitários e sustentáveis de acesso e apropriação dos recursos hídricos por todos, não havendo exclusão de nenhuma classe social. Já Silva (2003) destaca que em ecossistemas frágeis como o semiárido, há cada vez mais a necessidade de se construir um conceito de sustentabilidade orientado no processo participativo e de valorização dos conhecimentos das populações locais.

A gestão das águas para o semiárido brasileiro, deve ser pautada por políticas públicas permanentes e apropriadas para diferentes realidades sociais, ampliando a capacidade humana local e quebrando com as estruturas de concentração da terra, da água, do poder e do acesso a serviços sociais básicos.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entender as questões complexas que envolvem o modo de vida da sociedade do semiárido foi a base deste estudo. As relações histórico-sociais em muitas faixas territoriais

do semiárido ainda são fatores limitantes necessitando que a própria sociedade que ali vive possa compreender as suas potencialidades para superar os mais vastos desafios ainda correntes. Esta superação ocorrerá através do fortalecimento do diálogo do poder público com a sociedade sobre o entendimento das questões a serem efetivamente superadas sejam a níveis micro ou macros dentro da sociedade nordestina.

Para a questão das águas, este trabalho apresenta o viés da construção não somente de obras hidráulicas, mas que haja pontes de diálogos entre sociedade e Estado para que juntos possam efetivar ações eficientes e eficazes para a superação da escassez hídrica, pois entende-se que o fenômeno das secas não é somente um fenômeno climático, mas também um fenômeno político-social que precisa cada vez mais estar alinhado com as demandas corretas das sociedades que vivem no território semiárido.

REFERÊNCIAS

ANA. Agência Nacional de Águas: **O comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco**. Brasília: Instituto Manoel Novaes. MMA: ANA. 99p, 2003.

ANDRADE, M.C. de. Nordeste: Alternativas para a Agricultura. Ed. Papirus, São Paulo, 1988.

ARAÚJO, Tânia Bacelar. **Herança de diferenciação e futuro de fragmentação**. Revista Estudos Avançados, Dossiê Nordeste, São Paulo, v. 11, n. 29, abr. 1997.

ASSUNÇÃO, Luiz Márcio; LIVINGSTONE, Ian. **Desenvolvimento inadequado: construção de açudes e secas no sertão do Nordeste**. R. Bras. Beon., Rio de Janeiro, 47 (3) 425-480 jul/set, 1993.

BORIS, F. História do Brasil. Editora Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.

BRASIL. **Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)**. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br>. Acesso em 02 de maio de 2020.

CARVALHO, L. D. **A Emergência da Lógica da Convivência Com o Semiárido e a Construção de uma Nova Territorialidade**. In: Secretaria Executiva da RESAB. (Org.). Educação Para a Convivência com o Semiárido: Reflexões Teórico-Práticos. 1ªed. Petrolina-Pe: Gráfica Fransciscana, p. 13-26, 2004.

CASTRO, César Nunes de. **Transposição do Rio São Francisco: Análise de Oportunidade do Projeto**. IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, textos para discussão. Rio de Janeiro, fev. de 2011.

CIRILO, J. A. **Políticas públicas de recursos hídricos para o semiárido**. Estudos Avançados, São Paulo, v. 22, p. 63, 2008.

COELHO, Jorge. **As secas do Nordeste e a indústria das secas**. Petrópolis-RJ, Editora Vozes LTDA, p. 30, 1985

DELGADO, Guilherme da Costa. **Capital financeiro e agricultura no Brasil**. São Paulo: Editora Ícone / Editora Unicamp, 1985.

EGLER, C.A.G. **Questão Regional e Gestão do Território no Brasil**. In: CASTRO, Iná E.; GOMES, Paulo C.C.; CORRÊA, Roberto L. (orgs.). Geografia: conceitos e temas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995.

FARIAS, A. de. História do Ceará. Ed. Armazém da Cultura, Fortaleza, 2018.

FRACALANZA, Ana Paula; JACOB, Amanda Martins; EÇA, Rodrigo Furtado. **Justiça ambiental e práticas de governança da água: (re)introduzindo questões de igualdade na agenda**. In.: Ambiente e sociedade, São Paulo, v. XVI, n. 1, jan.-mar./2013. p. 19-38.

GOMES, G. M. **Velhas secas em novos sertões**. Brasília: Ipea, 2001. 326p.

LIMA, Luiz Eduardo Corrêa. **Transposição das águas: um "ensaio teórico" sobre essas situações ambientalmente perigosas**. Ângulo 123, out./dez., 2010.

MOREIRA, Emília. **De território de exploração a território de esperança: organização agrária e resistência camponesa no semiárido paraibano**. Revista NERA Presidente Prudente, Ano 10, n.10 pp. 72-93, Jan-Jun/2007.

MOREIRA, Emília e TARGINO, Ivan. **Capítulos de geografia agrária da Paraíba**. João Pessoa: Editora Universitária, 1997.

RAFFESTIN, C. **Por uma Geografia do Poder**. Rio de Janeiro: Zahar, 1993.

SACHS, Ignacy Sachs (Org.). **Inclusão social pelo trabalho. Desenvolvimento humano, trabalho decente e o futuro dos empreendedores de pequeno porte**. Rio de Janeiro: Garamond, 2003.

SEN, A. **Desenvolvimento como liberdade**. Companhia das Letras, 2008.

SILVA, Roberto Marinho Alves da. **Entre dois paradigmas: combate à seca e convivência com o semiárido**. Sociedade e Estado, Brasília, v. 18, n. 1/2, p. 361-385, jan./dez, 2003.

THÉRY, Hervé. **Pouvoir et territoire au Brésil. De l'archipel au continent**. Paris: Éditions de La Maison des Sciences de l'Homme, 1995.

ZAIDAN FILHO, Michel. **O fim do Nordeste e outros mitos**. São Paulo: Cortez, coleção questões da nossa época; v. 82, 2001.

HORTA COMUNITÁRIA COMO PROMOÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

Lorhana Franco Mesquita

Engenharia Agrônoma - IFTO - Palmas, TO

David Aimar Sousa Silva

Engenharia Agrônoma - IFTO - Palmas, TO

Mayara Pereira da Luz

Engenharia Agrônoma - IFTO - Palmas, TO

Fernando José Sousa Borges

Engenharia Agrônoma - IFTO - Palmas, TO

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6905207182073916>

Edvar de Sousa da Silva

Engenharia Agrônoma - IFTO - Palmas, TO

Informações sobre o

artigo:

Recebido em:

12/03/2021

Aceito em:

15/03/2021

Data de publicação:

27/04/2021

Palavras-chave:

Integração

Hortas comunitárias

Segurança alimentar

Ações extensionistas

RESUMO

A integração de atividades comunitárias em pequenas cidades é engrenagem fundamental para promover a participação social no desenvolvimento local. Para tanto, A implantação de hortas comunitárias acata uma série de vantagens à distribuição de recursos alimentares de forma justa. Os benefícios de tal atividade são: produzir alimentos promovendo o acesso e a disponibilidade dos mesmos de forma solidária; garantir a segurança alimentar para as comunidades carentes; propiciar igualmente oportunidades de trabalho; geração de renda; e aproveitamento de áreas públicas ociosas. Objetiva-se por meio deste trabalho, apresentar observações dos efeitos sociais e econômicos de uma horta comunitária na vida de famílias em situação de vulnerabilidade social, através do relato de uma atividade acadêmica que analisou o funcionamento de tal projeto no município de Araguaatins por meio de ações extensionistas.

COMMUNITY HOUR AS A PROMOTION OF QUALITY OF LIFE FOR FAMILIES IN SOCIAL VULNERABILITY

ABSTRACT

The integration of community activities in small towns is a fundamental gear to promote social participation in local development. To this end, the establishment of community gardens embraces a series of advantages in the distribution of food

Keywords:

Integration

Community gardens

Food security

Extension actions

resources in a fair manner. The benefits of such an activity are: producing food by promoting access and availability of it in solidarity; guarantee food security for needy communities; also provide job opportunities; income generation; and use of idle public areas. The objective of this work is to present observations of the social and economic effects of a community garden on the lives of families in situations of social vulnerability, through the report of an academic activity that analyzed the functioning of such a project in the municipality of Araguatins through extension actions.

1 INTRODUÇÃO

A integração de atividades comunitárias em pequenas cidades é engrenagem fundamental para promover a participação social no desenvolvimento local. Agindo como um estimulador do comércio de alimentos orgânicos e da independência financeira de famílias de baixa renda. A implantação de hortas comunitárias acata uma série de vantagens à distribuição de recursos de forma justa.

De acordo com Silva (2011) a horta comunitária tem sua importância sob o ponto de vista nutricional, como forma de terapia ocupacional, na melhoria do hábito de consumo das pessoas, na economia das famílias até na manutenção e/ou melhoria da saúde e prevenção de doenças. Os benefícios de tal atividade são: produzir alimentos promovendo o acesso e a disponibilidade dos mesmos de forma solidária; garantir a segurança alimentar para as comunidades carentes; propiciar igualmente oportunidades de trabalho; geração de renda; e aproveitamento de áreas públicas ociosas (ALBUQUERQUE, 2016).

A política de funcionamento de projetos de horta comunitária é simples, o que viabiliza ainda mais sua contribuição para o desenvolvimento social. Estes projetos se desenvolvem a partir da utilização de áreas públicas dentro da cidade fazendo o seu aproveitamento para a produção de alimentos, através do trabalho.

Objetiva-se por meio deste trabalho, apresentar observações dos efeitos sociais e econômicos de uma horta comunitária na vida de famílias em situação de vulnerabilidade social, através do relato de uma atividade acadêmica que analisou o funcionamento de tal projeto no município de Araguatins por meio de ações extensionistas.

2 RELATO DE EXPERIÊNCIA

A constituição deste trabalho deu-se a partir de uma experiência vivenciada na Horta Comunitária da cidade de Araguatins – TO, a partir da implementação de um trabalho de extensão. De acordo com Calgaro et al., (2013) a realização de projetos de extensão, como a implementação de hortas, busca principalmente a produção sustentável. Diante disto, desenvolveram-se várias iniciativas, sendo a primeira dedicada a entender o funcionamento da horta, se as pessoas diretamente envolvidas na produção das hortaliças seguiam um padrão de cultivo, se alguma entidade pública fora envolvida nesse projeto e quem cuida diretamente da horta.

A horta está localizada no setor denominado Irial, região noroeste da cidade de Araguatins - TO (Figura 1) e interfere de modo positivo na economia municipal e na renda pessoal dos horticultores envolvidos, sendo estes pertencentes ao sistema de agricultura familiar. O projeto é uma iniciativa da prefeitura municipal e de moradores do bairro Irial que intensifica atividades agrícolas sustentáveis na região.

Em média cinquenta produtores trabalham na horta, cada um tem seu espaço para as plantações e o desenvolvimento de instalações como canteiros e telas de sombreamento é feito através do trabalho braçal individual em conjunto com o auxílio de seus familiares.

Quanto aos aspectos de manejo das culturas, observou-se que a maioria dos produtores utilizava adubo orgânico, fazendo uso de esterco bovino devido facilidade de obtenção na região. Além do esterco de gado, alguns poucos adubos químicos também são utilizados. A maioria das famílias não tem conhecimento sobre adubação e acabam utilizando os métodos convencionais que encontram disponíveis, devido à carência de informação e de orientação técnica. Além disso, foi observado que grande parte dos produtores não tem conhecimento dos métodos alternativos para o controle de pragas.

De acordo com Galvão et al. (2005) um nível de dependência de mão-de-obra externa bastante baixo na composição da renda familiar, pode ser entendido como sinal positivo de sustentabilidade econômica. As principais hortaliças cultivadas são: alface, couve, coentro e cebolinha, devido sua produção ser rápida e de baixo custo. Segundo Silva et al. (2015), tal predominância reflete a grande demanda local relacionada com a culinária regional tradicional. Grande parte do cultivo é destinada à comercialização no município, outra parte ao consumo próprio dos horticultores, o que contribui para a inclusão de alimentos orgânicos na mesa dos mesmos.

Indubitavelmente, é plausível dizer que o projeto traz vantagens e benefícios tanto em questões econômicas, quanto para a saúde humana, conscientização e preservação ambiental, devido ao uso mínimo ou até mesmo a não utilização de produtos químicos, como, defensivos e adubos.

Figura 1 - Atividade Experimental

Fonte: próprios autores

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo de promover autonomia financeira de famílias de menor renda e de fornecer uma alimentação saudável de alto valor nutricional é o que movimenta a realização do projeto. Contudo, observou-se que a mobilidade e coletividade dos produtores responsáveis pela horta promove efetividade na produção, no abastecimento local e nas relações sociais.

Observou-se também que cultivar horta em conjunto com outras pessoas pode unir a comunidade e serve como terapia ocupacional. Isso se deve grande parte, ao aumento da importância do componente social nas atividades e nos processos dos projetos de hortas.

Essa temática é englobada no conceito de agricultura social, pela realização de atividades em explorações agrícolas no âmbito de utilização da natureza para produzir saúde, benefícios sociais e educacionais nos diversos cenários da agricultura urbana.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, J. O. **Horta comunitária: inclusão social e produtiva.** Banco de tecnologia sociais. Maringá, PR, 2016. Disponível em: <http://tecnologiasocial.fbb.org.br/tecnologiasocial/banco-de-tecnologias-sociais/pesquisar-tecnologias/horta-comunitaria-inclusao-social-e-produtiva.htm>. Acesso em: 19 set. 2019.

CALGARO, H. F.; ALFONSO, L. A.; ARAÚJO, C. A. M. Projeto horta viva: um relato de experiência de extensão universitária. **Rev. Ciênc. Ext.** v. 9, p. 150-166. 2013. Disponível em: https://ojs.unesp.br/index.php/revista_proex/article/view/728. Acesso em: 26 set. 2019.

SILVA, T. C. C. MARQUES, A. R. R. S.; PIRES, A. P. A. Horta comunitária: um relato de experiência. In: Congresso Estadual de Iniciação Científica e Tecnológica do IF Goiano, 5., 2016, Iporá. **Anais [...]**. Goiânia: IF Goiano, 2016. Disponível em: <https://even3.azureedge.net/anais/35683.pdf>. Acesso em: 19 set. 2019.

SILVA-FREITAS, S.; *et al.* Análise da produção de hortas no município de Araguatins. In: Jornada de iniciação científica e extensão do IFTO, 2015, Palmas. **Anais [...]**. Palmas: IFTO, 2015. Disponível em: <http://propi.iftto.edu.br/ocs/index.php/jice/6jice/paper/viewFile/7150/3429>. Acesso em: 20 set. 2019.

SILVA, E. C. R; FONSECA, A. B. **Hortas em escolas urbanas, complexidade e transdisciplinaridade:** contribuições para o ensino de ciências e para a educação em saúde, Semantic Scholar, UFRJ-RJ, 2011. Disponível em: <https://www.semanticscholar.org/paper/Hortas-em-escolas-urbanas%2C-Complexidade-e-para-a-e-Silva-Fonseca/f8f0fb62d0e3c6f7a1372153a3f3ca2c0d678d0b>. Acesso em: 18 set. 2019.

SOBRE OS ORGANIZADORES

Luis de França Camboim Neto

Doutor em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Viçosa (2002). Mestre em Agronomia (Irrigação e Drenagem) pela Universidade Federal do Ceará (1995). Especialista em Gestão de Instituições de Ensino Superior (2010). Especialista em Engenharia de Produção pela Universidade Cândido Mendes (2019). Graduado em Agronomia pela Escola Superior de Agricultura de Mossoró (1986). Licenciado em Biologia (Cruzeiro do Sul (2020). Tenho experiência junto as disciplinas: Estatística Básica, Metodologia Científico, Introdução a Engenharia, Gestão de Resíduos Sólidos, Gestão Ambiental, Educação Ambiental, Produtividade e Qualidade Projeto de Pesquisa. Elaboração e Análise de Projetos, Responsabilidade Socioambiental e Fundamentos de Ecologia. Coordenou, 2007-2008, o Curso de Pós-graduação Lato sensu em Gestão Estratégica de Instituições de Ensino Superior ligado à Rede Católica de Ensino Superior do Ceará - RECENS e de 2009 a 2010 na Faculdade Metropolitana de Fortaleza - FAMETRO. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Gestão de Instituições de Ensino Superior (IES), tendo atuado como Professor, Coordenador, Diretor Acadêmico (4 anos), Diretor Geral (1 ano), Diretor Executivo (1 ano). No Grupo Educacional FATENE foi Diretor Executivo (2009), Diretor Acadêmico (2010) Assessor Acadêmico (2011-2014), Ouvidor (2011-2012) e Coordenador da Comissão Própria de Avaliação (CPA) (2011-2013), Membro do Conselho Superior (2009 - 2018), Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (2009 - 2018) e do Núcleo Docente Estruturante, dos cursos de Engenharia Agrícola e Ambiental, Engenharia de Produção e Engenharia Civil da Fatene Caucaia (2009-2018). Atuou ainda como Assessor Técnico (2011-2014), Presidente do Comitê de Ética (2012-2014). Coordenou o Curso de Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental (2009-2018) e da Pós-graduação Lato sensu em Engenharia de Segurança do Trabalho. Coordenou o Curso de Engenharia de Produção (2014-2017) e Engenharia Civil (2017- 2018). No período de outubro de 2018 a dezembro de 2019 passou a responder como Pesquisador Institucional da Faculdade CEPEP e de março de 2019 a fevereiro de 2020 como Diretor Acadêmico, Membro do Núcleo Docente Estruturante (NDE). Membro do Corpo Editora da Editora In Vivo. Revisor da Revista Ciência Agronômica, (ISSN 0045-6888 impresso e 1806-6690 online). Como consultor atua nos seguintes segmentos: Elaboração de Projetos (PDI, Regimento e Projetos de Cursos Técnicos e de Cursos Superiores) e Gestão de IES, Gestão Ambiental, Agricultura Irrigada, Irrigação em Jardinagem Biotecnologia da água do coco, Engenharia Agrícola, Manejo de Irrigação e Hortifrutigranjeiros. **CV Lattes:** <http://lattes.cnpq.br/8798851810906877>

Everton Nogueira Silva

Possui graduação em Agronomia pela Universidade Federal do Ceará (2008), especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Faculdade Ateneu (2012), mestrado em Economia Rural pela Universidade Federal do Ceará (2011) e doutorado em DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE (UFPI/ UFRN/ FUFSE/ UESC-BA) pela Universidade Federal do Ceará (2018). Atualmente é professor no curso técnico de agronegócio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR/CE); Professor do curso de bacharelado em Medicina Veterinária da Universidade Estadual do Ceará (UECE) - responsável pelas disciplinas: sociologia e extensão rural, administração e economia das empresas agropecuárias. Editor Chefe Editora In Vivo. **CV Lattes:** <http://lattes.cnpq.br/1111762467064798>

ÍNDICE REMISSIVO

A

agricultura, 3, 18, 27, 63, 68, 69, 72, 75, 77, 80
antifúngica, 27, 30, 32, 33, 34, 35

C

Compostos, 6, 17

D

diâmetro, 21, 31, 65
doença, 21, 23, 24, 25, 29

E

enriquecimento ambiental, 41, 42, 43, 44, 45, 47
extração, 8, 9, 13, 14

F

formulações, 27, 30, 31, 32, 36, 37, 38

G

gestão de águas, 71, 73, 76

I

Índice, 11, 15

L

lavoura, 27, 28

M

manejo integrado, 27, 28
moléculas, 6, 29

O

óleos essenciais, 28, 30, 31, 32, 38, 39, 57

P

pneus agrícolas, 63, 64, 65
pressão, 9, 11, 16, 63, 64, 65, 67, 68, 69
público, 71, 72, 76, 79

S

sementes, 29, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62
semiárido, 29, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80

T

teor de água, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61
toxicidades, 31

V

Veterinária, 3, 38, 46, 48, 49, 51, 53, 54, 70, 82

EDITORA
IN VIVO

ACESSE:

www.editorainvivo.com

Avance na ciência! Venha ser In Vivo!