ATUALIDADES NA SAÚDE E BEM-ESTAR ANIMAL

VOLUME 3

ORGANIZADORES

Victor Hugo Vieira Rodrigues

Aksa Ingrid Vieira Batista

ATUALIDADES NA SAÚDE E BEM-ESTAR ANIMAL
VOLUME 3

VICTOR HUGO VIEIRA RODRIGUES

AKSA INGRID VIEIRA BATISTA

(Organizadores)

2021

Esta obra está licenciada com uma Licença [Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) (CC BY 4.0).

O conteúdo desta obra e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade exclusiva dos autores. Permitido o download da obra e o compartilhamento desde que sejam atribuídos créditos aos autores, permitindo-se uso para fins comerciais.

Editor Chefe

Dr. Everton Nogueira Silva

Conselho Editorial

1 Colégio de Ciências da Vida

1.1 Ciências Agrárias

Dr. Aderson Martins Viana Neto
Dra. Ana Paula Bezerra de Araújo
MSc. Edson Rômulo de Sousa Santos
Dr. Fágner Cavalcante P. dos Santos
MSc. Filomena Nádia Rodrigues Bezerra
Dra. Lina Raquel Santos Araújo
Dr. Luis de França Camboim Neto
MSc. Maria Emília Bezerra de Araújo
MSc. Yuri Lopes Silva

1.2 Ciências Biológicas

Dra. Antonia Moemia Lúcia Rodrigues Portela

1.3 Ciências da Saúde

Dra. Ana Luiza M. Cazaux de Souza Velho
Dr. Isaac Neto Goes Silva
Dra. Maria Verônica Coelho Melo
MSc. Paulo Abílio Varella Lisboa
Dra. Vanessa Porto Machado
Dr. Victor Hugo Vieira Rodrigues

2 Colégio de Humanidades

2.1 Ciências Humanas

Dra. Alessandra Maria Sousa Silva
MSc. Francisco Brandão Aguiar
MSc. Julyana Alves Sales

2.2 Ciências Sociais Aplicadas

MSc. Cícero Francisco de Lima
MSc. Erivelton de Souza Nunes
Dra. Maria de Jesus Gomes de Lima
MSc. Maria Rosa Dionísio Almeida
MSc. Marisa Guilherme da Frota

3 Colégio de Ciências Exatas, Tecnológica e Multidisciplinar

3.1 Ciências Exatas e da Terra

MSc. Francisco Odécio Sales
Dra. Irvila Ricarte de Oliveira Maia

3.2 Engenharias

MSc. Amâncio da Cruz Filgueira Filho
MSc. Gilberto Alves da Silva Neto
MSc. Henrique Nogueira Silva
Dr. João Marcus Pereira Lima e Silva
MSc. Ricardo Leandro Santos Araújo

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação - CIP

-
- R696a Rodrigues, Victor Hugo Vieira.
Atualidades na saúde e bem-estar animal [livro eletrônico]. / Organizadores: Victor Hugo Vieira Rodrigues e Aksa Ingrid Vieira Batista. Fortaleza: Editora In Vivo, 2021.
v. 3, 112 p.
- Bibliografia.
ISBN: 978-65-993899-7-9
DOI: 10.47242/978-65-993899-7-9
1. Bem-estar animal. 2. Saúde e bem-estar animal –. 3. Saúde e Bem-estar animal – atualidades. I. Título. II. Organizadores.

CDD 590.7

Denise Marques Rodrigues – Bibliotecária – CRB-3/CE-001564/O

APRESENTAÇÃO

O terceiro volume desta obra é dirigido para aqueles que precisam das informações essenciais e atuais sobre a saúde das diversas espécies animais, bem como o seu bem-estar, abrangendo diversas áreas da medicina veterinária, zootecnia. Procuramos fornecer os fatos clínicos mais importantes, sem nos atermos em detalhes acadêmicos que, embora sejam necessários para alguns, só dificultam a compreensão das coisas que realmente importam para a maioria das pessoas que trabalham no cotidiano de sua profissão. Há, certamente, infinitos argumentos sobre o que considerado essencial ou básico, nós oferecemos nesta obra uma apresentação baseada em trabalhos realizados na patologia animal, patologia clínica, clínica médica, anestesiologia, bem-estar, tanto nas espécies domésticas como nas espécies silvestres.

Os diversos trabalhos publicados nesta obra relatam da importância do bem-estar animal, métodos de diagnóstico de risco à saúde na interação entre seres humanos, os animais e o ambiente, manejo animal e relatos de casos de várias doenças que podem auxiliar no emprego de uma terapêutica mais específica e eficiente para promover uma melhor qualidade de vida dos animais ou proporcionar um mais conhecimento sobre a prevenção, no controle e no diagnóstico situacional de doenças transmissíveis ao homem pelos animais, as zoonoses.

Os animais devem ser livres de desconforto, em um ambiente com abrigo, com temperaturas confortáveis para a espécie e superfícies adequadas para proporcionar conforto. A expressão do comportamento natural da espécie deve ser sempre considerada para medir a qualidade de vida e bem-estar do animal. Esperamos que este volume seja útil a todos os que estejam à procura de uma literatura concisa sobre a saúde animal e, conseqüentemente, seu bem-estar como base para estudos médicos veterinários e áreas afins que corroboram com o tema.

Tenham uma boa leitura!

Victor Hugo Vieira Rodrigues

Aksa Ingrid Vieira Batista

SUMÁRIO

Capítulo 1 - DOI: [10.47242/978-65-993899-7-9-1](https://doi.org/10.47242/978-65-993899-7-9-1)

TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO MCMASTER E MINI-FLOTAC NA QUANTIFICAÇÃO DE OOCISTOS E OVOS DE PARASITOS GASTRINTESTINAIS DE OVINOS..... 06

Capítulo 2 - DOI: [10.47242/978-65-993899-7-9-2](https://doi.org/10.47242/978-65-993899-7-9-2)

QUANTIFICAÇÃO DE OOCISTOS E OVOS DE PARASITOS GASTRINTESTINAIS DE CÃES POR MÉTODOS DE SEDIMENTAÇÃO E FLUTUAÇÃO..... 19

Capítulo 3 - DOI: [10.47242/978-65-993899-7-9-3](https://doi.org/10.47242/978-65-993899-7-9-3)

LEISHMANIOSE VISCERAL: O USO DE COLEIRAS ANTIPARASITÁRIAS COMO MEDIDA PROFILÁTICA EM UMA REGIÃO DE TRANSMISSÃO..... 29

Capítulo 4 - DOI: [10.47242/978-65-993899-7-9-4](https://doi.org/10.47242/978-65-993899-7-9-4)

PNEUMOTÓRAX FECHADO SIMPLES TRAUMÁTICO EM GATO-DOMÉSTICO (*Felis catus* LINNAEUS, 1758) – RELATO DE CASO..... 38

Capítulo 5 - DOI: [10.47242/978-65-993899-7-9-5](https://doi.org/10.47242/978-65-993899-7-9-5)

EFICÁCIA DA IVERMECTINA SOBRE NEMATOIDES INTESTINAIS DE ASININOS.....45

Capítulo 6 - DOI: [10.47242/978-65-993899-7-9-6](https://doi.org/10.47242/978-65-993899-7-9-6)

HIDRONEFROSE SECUNDÁRIA À LIGADURA DE URETER APÓS OVARIOSSALPINGO-HISTERECTOMIA (OSH) EM CANINO – RELATO DE CASO..... 56

Capítulo 7 - DOI: [10.47242/978-65-993899-7-9-7](https://doi.org/10.47242/978-65-993899-7-9-7)

INCIDÊNCIA DE OVOS E LARVAS DE ANCILOSTOMATÍDEO EM ÁREA DE ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE..... 65

Capítulo 8 - DOI: 10.47242/978-65-993899-7-9-8

O USO INDISCRIMINADO DE ANTIBIÓTICOS EM ANIMAIS DE
COMPANHIA.....74

Capítulo 9 - DOI: 10.47242/978-65-993899-7-9-9

ASPECTOS CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS DO BOTULISMO EM
BOVINOS.....88

Capítulo 10 - DOI: 10.47242/978-65-993899-7-9-10

DERMOIDE CORISTOMAL EM REGIÃO LIMBOESCLERAL DE CÃO
TRATADO COM CERATECTOMIA SUPERFICIAL ASSOCIADA AO FLAP DE
TERCEIRA PÁLPEBRA – RELATO DE CASO.....99

SOBRE OS ORGANIZADORES.....111

ÍNDICE REMISSIVO.....112

TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO MCMASTER E MINI-FLOTAC NA QUANTIFICAÇÃO DE OOCISTOS E OVOS DE PARASITOS GASTRINTESTINAIS DE OVINOS

Maria de Lara Oliveira Lima

Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Recife, PE

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5861-9277>

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6108177158055138>

Juliane Nayra Dantas Silva

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Mossoró, RN

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8226-4285>

Ruana Rafaela Lira Torquato Paiva

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (SEMAGMA), Lajes, RN

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6992-7598>

Antônia Aniellen Raianne Moisés Aguiar

Universidade Estadual do Ceará (UECE), Fortaleza, CE

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1273-5501>

Eylha Priscila Fernandes Menezes

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Mossoró, RN

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2898-5337>

Caio Michel de Moraes Rolim

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Mossoró, RN

ORCID: <https://orcid.org/0000.0001.9992.506X>

Lígia Vanessa Leandro Gomes

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Mossoró, RN

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7914-1356>

Wesley Adson Costa Coelho

Faculdade de Tecnologia do Nordeste (FATENE), Mossoró, RN

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7039-9481>

Iany Leda Moreira Dantas

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Mossoró, RN

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7155-5423>

Janilene de Oliveira Nascimento

Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Recife, PE

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5210-2656>

Aksa Ingrid Vieira Batista

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Mossoró, RN

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0696-7194>

Josivania Soares Pereira

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Mossoró, RN

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2407-9417>

Informações sobre o**artigo:****Recebido em:****19/04/2021****Aceito em:****27/04/2021****Data de publicação:****04/08/2021****Palavras-chave:****Exames****coproparasitológicos****Pequenos ruminantes****Helmintos****RESUMO**

O Nordeste brasileiro tem destaque para a ovinocultura devido à rusticidade e adaptabilidade dos animais ao clima e vegetação. Porém, a parasitose gastrointestinal nesses animais acarreta grandes perdas econômicas. O diagnóstico clínico das infecções por helmintos nos pequenos ruminantes nem sempre é possível, embora muitos sinais clínicos sejam indicativos de alta carga parasitária. Com o intuito de prevenir problemas graves nesse setor produtivo, se faz necessário a utilização de técnicas de diagnóstico sensíveis e específicas para infecções gastrointestinais nesses animais. Considerando a grande perda produtiva da ovinocultura em detrimento do parasitismo na região de Mossoró/RN, o estudo objetivou verificar técnicas de diagnóstico para quantificação de ovos e oocistos de parasitos gastrointestinais em ovinos provenientes desta região. Utilizou-se amostras de fezes de 45 ovinos naturalmente infectados e sem uso de anti-helmínticos por no mínimo 90 dias. As fezes foram coletadas diretamente da ampola retal, armazenadas individualmente em sacos plásticos, acondicionadas em caixa isotérmica e enviadas ao Laboratório de Parasitologia Animal da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) para análise. Estas foram submetidas a quatro métodos de diagnóstico, dentre eles as técnicas de contagem de ovos por gramas de fezes (OPG) com McMaster, segundo Gordon e Whitlock (1998), com modificação de Chagas, Niciura e Molento (2011), sendo denominados McMaster100 e McMaster25, respectivamente; e a técnica de Mini-FLOTAC modificado de Rinaldi et al. (2014) e de Cringoli et al. (2017), denominados de Mini-FLOTAC10 e Mini-FLOTAC5. Os oocistos e ovos foram identificados através da morfologia e com auxílio de chaves taxonômicas específicas. Os dados obtidos foram submetidos ao programa estatístico SPSS versão 21.0 e as diferenças estatísticas e concordância entre as técnicas, por Friedman ($p < 0,05$) e kappa (p -valor), respectivamente. Valores de $p < 0,05$ foram considerados significativos. Nas amostras fecais coletadas no presente estudo foram identificados ovos do tipo Strongylida, *Strongyloides* spp., *Moniezia* spp., *Trichuris* spp., além de oocistos de *Eimeria* spp. Para *Eimeria* spp., as técnicas de McMaster100 e Mini-FLOTAC10 apresentaram maior potencial de recuperação dos oocistos. Para strongilídeos não houve diferença entre as técnicas quanto ao seu potencial de recuperação dos ovos. O McMaster100 apresentou maior potencial na recuperação dos ovos do tipo *Strongyloides* spp. Ovos de *Moniezia* spp. e *Trichuris* spp. somente foram recuperados por Mini-FLOTAC5. Ao realizar a análise de concordância entre as técnicas estudadas, observou-se que as mesmas apresentam um alto grau de concordância entre elas, sendo estatisticamente semelhantes. O uso de mais de uma técnica para diagnóstico coproparasitológico é indicado, uma vez que o um único método

pode não revelar o verdadeiro parasitismo, especialmente considerando que, em muitos casos, os animais apresentam co-infecções.

MCMASTER AND MINI-FLOTAC DIAGNOSTIC TECHNIQUES FOR THE QUANTIFICATION OF OOCYSTS AND EGGS OF SHEEP GASTROINTESTINAL PARASITES

ABSTRACT

The Brazilian Northeast has a highlight for sheep production due to the rusticity and adaptability of the animals to the climate and vegetation. However, the gastrointestinal parasitosis in these animals causes great economic losses. The clinical diagnosis of helminth infections in small ruminants is not always possible, although many clinical signs are indicative of high parasitic load. In order to prevent serious problems in this productive sector, it is necessary to use sensitive and specific diagnostic techniques for gastrointestinal infections in these animals. Considering the great productive loss of ovine breeding in detriment of parasitism in the region of Mossoró, RN, the study aimed to verify diagnostic techniques for quantification of eggs and oocysts of gastrointestinal parasites in sheep from this region. Stool samples from 45 naturally infected sheep without anthelmintics were used for at least 90 days. The feces were collected directly from the rectal ampulla, stored individually in plastic bags, placed in an isothermal box and sent to the Animal Parasitology Laboratory of the Federal Rural Semi-Arid University (UFERSA) for analysis. They were submitted to four diagnostic methods, among them the techniques of egg count per gram of feces (OPG) with McMaster, according to Gordon and Whitlock (1998), with modification of Chagas, Niciura and Molento (2011), being called McMaster100 and McMaster25, respectively; and the modified Mini-FLOTAC technique of Rinaldi et al. (2014) and Cringoli et al. (2017), called Mini-FLOTAC10 and Mini-FLOTAC5. Oocysts and eggs were identified through morphology and with the aid of specific taxonomic keys. The data obtained were submitted to the statistical program SPSS version 21.0 and the statistical differences and agreement between the techniques, by Friedman ($p < 0.05$) and kappa (p -value), respectively. Values of ($p < 0.05$) were considered significantcy, were identified eggs of the type Strongylida, *Strongyloides* spp., *Moniezia* spp., *Trichuris* spp., besides oocysts of *Eimeria* spp. For *Eimeria* spp., the techniques of McMaster100 and Mini-FLOTAC10 presented greater potential for oocyst recovery. For Strongyles there was no difference between the techniques regarding their potential for egg retrieval. The McMaster100 presented greater potential in the recovery of eggs of the type *Strongyloides* spp. Eggs of *Moniezia* spp. and *Trichuris* spp. were only retrieved by Mini-FLOTAC5. When performing the analysis of agreement between the techniques studied, it was observed that they present a high degree of agreement between them, being statistically similar. The use of more than one technique for coproparasitological diagnosis is indicated, since the only one

Keywords:

Coproparasitological
examinations

Small ruminants

Helminths

method may not reveal the true parasitism, especially considering that, in many cases, the animals present co-infections.

1 INTRODUÇÃO

O diagnóstico clínico das infecções por helmintos nos animais domésticos nem sempre é possível, embora muitos sinais clínicos sejam indicativos de alta carga parasitária, tais como palidez das mucosas, pelos sem brilho, diarreia, fraqueza e perda de peso. Portanto, tão importante quanto esses efeitos e prejuízos provocados pelas parasitoses, é saber o grau em que está ocorrendo. A infecção de animais pelos helmintos que vivem no trato gastrointestinal é usualmente diagnosticada *in vivo*, através de técnicas laboratoriais com o uso da microscopia óptica de luz (FERNANDES et al., 2005; BOSCO et al., 2018; OLIVEIRA, 2018).

Um dos métodos utilizados para contagem de ovos por gramas de fezes (OPG) é o de Gordon e Whitlock (1939), o qual consiste numa técnica de flutuação através do uso da câmara de McMaster. Com esta técnica é possível verificar a sanidade do rebanho relacionando o número de ovos por grama de fezes obtido, com a carga parasitária (AMARANTE, 2016).

Outra técnica a ser usada para diagnóstico parasitário em pequenos ruminantes é o Mini-FLOTAC (CRINGOLI et al., 2012; RINALDI et al., 2014; CRINGOLI et al., 2017). Esta consiste em um método de diagnóstico copromicroscópico quantitativo e qualitativo de infecções gastrointestinais de animais e humanos, que possibilita o aumento da sensibilidade e precisão nos diagnósticos parasitários. Foi desenvolvido a partir da modificação da técnica de FLOTAC e considera a presença de duas câmaras de suspensões de amostras fecais (CRINGOLI et al., 2012; AMARANTE; AMARANTE, 2016; CRINGOLI et al., 2017).

Apesar de existirem diversas técnicas de diagnóstico coproparasitológicos, na rotina laboratorial, deve-se sempre optar pelo uso de uma técnica para recuperação de ovos e oocistos que apresente alta sensibilidade, que seja rápida e de fácil execução, além de ter um baixo custo operacional. Pensando nestes critérios, alguns pesquisadores têm sido motivados a desenvolver ou modificar as técnicas de diagnósticos já existentes, contribuindo, em muitos casos, no estabelecimento mais preciso da carga parasitária dos hospedeiros e assim elaborar medidas de tratamentos e controles estratégicos de parasitos que acometem os animais, o

que contribui para evitar o aparecimento de um dos maiores problemas na produção dos animais: a resistência parasitária (CASTRO et al., 2019; SOUZA JÚNIOR, 2019).

Considerando as grandes perdas produtivas observada na ovinocultura de Mossoró, Rio Grande do Norte (SANTOS; AHID; SUASSUNA, 2006; AHID et al., 2008), desencadeada principalmente pelos endoparasitos gastrintestinais, faz-se necessário um estudo de avaliação de técnicas de diagnóstico para contagem de ovos e oocistos fecais nesta localidade geográfica.

A presente pesquisa objetivou verificar técnicas de flutuação na quantificação de ovos e oocistos de parasitos gastrintestinais de ovinos de Mossoró, Rio Grande do Norte. Objetivou-se ainda identificar a prevalência de ovos e oocistos dos parasitos obtidos nos ovinos estudados; averiguar a existência de diferença na quantificação de ovos e oocistos recuperados; comparar a quantidade de ovos e oocistos encontrados para cada técnica testada e analisar o grau de concordância entre as técnicas estudadas.

2 METODOLOGIA

2.1 Animais experimentais

Foram utilizados 45 ovinos, *Ovis aries* Linnaeus, 1758, naturalmente infectados e sem uso de anti-helmíntico por no mínimo 90 dias, provenientes de propriedades do município de Mossoró, Rio Grande do Norte. Para realização da pesquisa, foram considerados animais adultos, jovens, machos e fêmeas, os quais passaram, após consentimento do proprietário, por procedimentos de coleta de fezes direto da ampola retal.

2.2 Aspectos éticos

Todos os procedimentos de manipulação e coleta de fezes nos animais foram executados conforme as recomendações propostas pela Comissão de Ética no uso de animais em pesquisa da UFERSA (Processo n. 23091.004479/2018-28 aprovado pela CEUA-UFERSA sob N° de parecer 11/2018).

2.3 Coleta das fezes e exames coproparasitológicos

Para realização da coleta das fezes, os animais foram contidos mecanicamente com a ajuda do seu proprietário e em seguida submetidos à coleta de amostras fecais, diretamente

da ampola retal. As fezes foram enviadas ao Laboratório de Parasitologia Animal da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) para análise.

Cada uma das amostras foi analisada através da técnica de Mini-FLOTAC segundo modificação de Rinaldi et al. (2014), realizando homogeneização de 2 g de fezes em 38 ml de solução hipersaturada de NaCl. Cada ovo e oocisto recuperado foi multiplicado por 10 (fator de conversão 1:10), sendo assim denominada de Mini-FLOTAC10.

Cada amostra foi analisada, ainda, segundo Cringoli et al. (2017). Nesta usou-se 5 g de fezes em 45 ml de solução hipersaturada de NaCl, multiplicando cada ovo e oocisto encontrado por 5 (fator de conversão 1:5), sendo denominada de Mini-FLOTAC5.

Ainda do mesmo animal, foi coletado aproximadamente 6 gramas de fezes para realização de duas técnicas de OPG/OOPG com McMaster. Uma delas foi realizada segundo Gordon e Whitlock (1939), na qual foi homogeneizada 2 gramas de fezes em 58 ml de solução hipersaturada de NaCl, e cada ovo e oocisto encontrado foi multiplicado por 100 (fator de conversão 1:100), denominada McMaster100. Na outra, foi utilizado 4 gramas de fezes em 26 ml de solução hipersaturada de NaCl e cada ovo e oocisto encontrado foi multiplicado por 25 (fator de conversão 1:25), denominada McMaster25 (CHAGAS; NICIURA; MOLENTO, 2011).

2.4 Identificação de ovos e oocistos

Os ovos e oocistos foram identificados até gênero, através de microscopia óptica de luz e com o auxílio de literatura específica (HOFFMANN, 1987; FORTES, 1997; UENO; GONÇALVES, 1998; FOREYT, 2005).

2.5 Análise de dados

Os dados foram expressos em valores de média e erro padrão, bem como frequência simples e porcentagem através do programa estatístico SPSS versão 21.0. Após análise dos pressupostos paramétricos, diferenças estatísticas entre as técnicas foram obtidas por Friedman. As concordâncias entre as técnicas foram avaliadas através do valor de kappa. Valores de ($p < 0,05$) foram considerados significativos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nas 45 amostras coletadas no presente estudo foram identificados ovos do tipo Strongylida (estrongilídeos), *Strongyloides* spp., *Moniezia* spp., *Trichuris* spp., além de oocistos de *Eimeria* spp. Estudos realizados nos estados do Rio Grande do Norte (RN), Maranhão (MA) e Ceará (CE), levando em consideração pequenos ruminantes, em destaque os ovinos, demonstraram de forma semelhante ao presente trabalho, a presença desses endoparasitos (COSTA; VIEIRA, 1984; AHID et al., 2008; BRITO et al., 2009).

O clima tropical e subtropical, predominante da região Nordeste, favorece o desenvolvimento e sobrevivência dos nematoides gastrintestinais, que por sua vez, atuam negativamente no desempenho dos animais, em especial, os ovinos (ROBERTO et al., 2018). Lino, Pinheiro e Ortunho (2016) citam ainda que estes nematoides quando não controlados podem causar prejuízos de até 40% no desempenho animal, comprometendo especialmente o desenvolvimento de animais jovens e de matrizes em período reprodutivo, que além de serem as categorias mais sensíveis, estão intimamente ligados ao crescimento do plantel, tornando a atividade economicamente inviável e impraticável aos produtores. Ao analisar as frequências simples (%) das 45 amostras estudadas, observou-se que para os oocistos de *Eimeria* spp., as técnicas de Mini-FLOTAC5 e Mini-FLOTAC10 obtiveram igual positividade de 97,78%, enquanto que nas técnicas de McMaster100 e McMaster25 obtiveram 88,89% e 71,11%, respectivamente. Para ovos do tipo estrongilídeos, Mini-FLOTAC5 demonstrou maior número de amostras positivas, seguido pelas técnicas de McMaster100, McMaster25 e Mini-FLOTAC10 (Tabela 1).

Tabela 1 - Frequência simples (%) das amostras de fezes analisadas nos 45 ovinos estudados

Parasitos	McMaster100		McMaster25		Mini-FLOTAC5		Mini-FLOTAC10	
	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo
<i>Eimeria</i> spp.	40 (88,89)	05 (11,11)	32 (71,11)	13 (28,89)	44 (97,78)	01 (2,22)	44 (97,78)	01 (2,22)
Strongylida (estrongilídeo)	36 (80,0)	09 (20,0)	36 (80,0)	09 (20,0)	38 (84,44)	07 (15,56)	35 (77,78)	10 (22,22)
<i>Moniezia</i> spp.	0 (0,0)	45 (100,0)	0 (0,0)	45 (100,0)	01 (2,22)	44 (97,78)	0 (0,0)	45 (100,0)
<i>Strongyloides</i> spp.	03 (6,67)	42 (93,33)	01 (2,22)	44 (97,78)	06 (13,33)	39 (86,67)	03 (6,67)	42 (93,33)
<i>Trichuris</i> spp.	0 (0,0)	45 (100,0)	0 (0,0)	45 (100,0)	01 (2,22)	44 (97,78)	0 (0,0)	45 (100,0)

Strongyloides spp. foram encontrados em todas as técnicas de diagnóstico utilizadas, sendo sua maior frequência de positividade observada para Mini-FLOTAC5. Por esta técnica de Mini-FLOTAC foi possível observar também positividade para *Moniezia* spp. e *Trichuris* spp, fato este não observado em nenhuma das técnicas testadas (Tabela 1).

Demonstrou-se no presente trabalho que o Mini-FLOTAC5 apresentou positividade para todos os ovos e oocistos de endoparasitos analisados. O Mini-FLOTAC, técnica recentemente criada com o objetivo de combinar sensibilidade e baixo custo de execução, foi demonstrada segundo estudos, como uma alternativa confiável e promissora no diagnóstico de endoparasitos gastrintestinais de pequenos ruminantes (SILVA et al., 2013; RINALDI et al., 2014; CRINGOLI et al., 2012, 2013, 2017). Cringoli et al. (2017) afirmaram que o Mini-FLOTAC tem capacidade de apresentar dados altamente reprodutíveis aliado à sua fácil utilização, bem como sensibilidade, acurácia e precisão elevadas quando comparado as técnicas clássicas de diagnóstico coproparasitológico.

Alguns autores defendem a premissa de que o volume examinado nas técnicas interfere na representação dos ovos presentes na amostra. Para McMaster, o volume sob a grade de contagem é de 0,15 mL, o que dá um total de 0,30 mL examinados. Em comparação, o Mini-FLOTAC possui 1 mL por câmara, para um total de 2 mL examinados, o que garante uma maior representatividade dos ovos da amostra ao analisar pela técnica de Mini-FLOTAC (SILVA et al., 2013; NOEL, 2017). Além disso, o maior volume analisado no equipamento de Mini-FLOTAC garante uma leitura mais limpa devido às sujidades ficarem retidas em outra área, separando-a do local de leitura (SILVA et al., 2013; GODBER et al., 2015).

As diferenças na metodologia de processamento entre as técnicas também são citadas como pontos importantes de interferência na sensibilidade dos métodos coproparasitológicos. No McMaster, Leveck et al. (2012) acreditam que o processamento aberto permite falhas de recuperação dos ovos nas amostras fecais.

Dos 45 animais analisados através da comparação entre as quatro técnicas, observou-se que houve diferença estatística entre elas. Através da técnica de McMaster100, McMaster25 e Mini-FLOTAC10 foi possível recuperar oocistos de *Eimeria* spp., ovos de estrongilídeos e de *Strongyloides* spp. Enquanto que através da técnica de Mini-FLOTAC no fator de conversão 5x foi possível recuperar todos os tipos de ovos e oocistos encontrados na presente pesquisa (Tabela 2)

Tabela 2 - Valores de média $\pm$ erro padrão da contagem de ovos e/ou oocistos por gramas de fezes (OPG/OOPG) em 45 ovinos

Parasitos	McMaster100	McMaster25	Mini-FLOTAC5	Mini-FLOTAC10
<i>Eimeria</i> spp.	2.365,91 $\pm$ 972,19aA	163,64 $\pm$ 37,63cB	487,27 $\pm$ 135,01bB	1.352,5 $\pm$ 598,66aA
Strongylida (estrongilídeo)	1.281,4 $\pm$ 240,55aA	1.084,3 $\pm$ 228,93aA	860,47 $\pm$ 165,13aA	650,23 $\pm$ 130,07aB
<i>Strongyloides</i>	60,0 $\pm$ 33,99aB	2,78 $\pm$ 2,78bC	15,45 $\pm$ 9,33bC	3,75 $\pm$ 1,83bC
<i>Trichuris</i> spp.	-	-	5,0 $\pm$ 0,0C	-

a,b = Letras minúsculas diferentes, nas linhas, significam diferença estatística ($p < 0,05$ – Friedman)

A,B = Letras maiúsculas diferentes, na coluna, significam diferença estatística ($p < 0,05$ – Friedman)

Na técnica de McMaster100, não foi observado diferença estatística entre oocistos de *Eimeria* spp. e ovos do tipo estrongilídeos, porém observou-se diferença para *Strongyloides* spp. Nas técnicas de McMaster25 e Mini-FLOTAC10 foi observado diferença estatística entre todos os ovos e oocistos encontrados, sendo as maiores médias de recuperação para ovos do tipo estrongilídeos e oocistos de *Eimeria* spp. (Tabela 2).

Na técnica de Mini-FLOTAC5 foi identificado todos os parasitos estudados, apresentando maior média de recuperação para ovos do tipo estrongilídeos, seguindo de oocistos de *Eimeria* spp., ovos de *Moniezia* spp., *Strongyloides* spp. e, por fim, *Trichuris* spp. Foi observada diferença estatística para ovos do tipo estrongilídeos, contudo, ao comparar a recuperação de oocistos de *Eimeria* spp. com ovos de *Moniezia* spp., bem como entre *Strongyloides* spp. com *Trichuris* spp., não foi identificado diferença estatística entre as mesmas (Tabela 2).

Demonstrou-se no presente trabalho que a técnica de McMaster100 apresentou, estatisticamente, maiores médias de recuperação de oocistos de *Eimeria* spp., ovos do tipo estrongilídeos, além de ovos de *Strongyloides* spp. Rinaldi et al. (2014) compararam em seu estudo as técnicas de McMaster e Mini-FLOTAC para infecções gastrintestinais por estrongilídeos em ovinos, utilizando tanto amostras individuais, quanto agrupadas (pool). Foi utilizado duas variantes da técnica de McMaster, uma com fator de conversão 1:15 (McM15) e outra 1:50 (McM50), e apenas uma para Mini-FLOTAC, considerando o fator de conversão 1:10. A técnica de Mini-FLOTAC foi mais sensível em relação às duas variantes de McMaster (McM15 e McM50) e ainda resultou em significativa maior contagem de ovos por grama de fezes, em comparação com ambas as variações, McM15 e McM50, divergindo do presente estudo.

Silva et al. (2013) realizaram uma pesquisa com o intuito de investigar se o Mini-FLOTAC poderia ser uma alternativa ao McMaster para o diagnóstico de *Eimeria* spp. em caprinos. Foi utilizado duas variantes da técnica de McMaster, uma com fator de conversão 1:15 e outra 1:50, e apenas uma para Mini-FLOTAC, considerando o fator de conversão 1:10. A média da OOPG detectada pelo Mini-FLOTAC foi superior aos valores observados com as técnicas de McMaster ($p < 0,05$), discordando da presente pesquisa.

Existem várias técnicas de diagnóstico, cada uma com vantagens e limitações. No entanto, nenhuma é capaz de detectar todas as infecções quando empregados separadamente (OLIVEIRA-SEQUEIRA et al., 2002).

Ao realizar a análise de concordância entre as técnicas estudadas, observou-se que as mesmas apresentam um alto grau de concordância entre elas, sendo estatisticamente semelhantes. Contudo, o Mini-FLOTAC5 apresentou maior potencial para recuperação dos ovos e oocistos de endoparasitos gastrintestinais encontrados através da presente pesquisa (Tabela 3).

Tabela 3 - Valores de concordância kappa (p-valor) entre as técnicas de OPG/OOPG para todos os parasitos encontrados

Testes	McMaster100	McMaster25	Mini-FLOTAC5
McMaster25	0,719 (<0,001*)	-	
Mini-FLOTAC5	0,764 (<0,001*)	0,759 (<0,001*)	-
Mini-FLOTAC10	0,797 (<0,001*)	0,811 (<0,001*)	0,831 (<0,001*)

* Significância estatística

Rinaldi et al. (2014) em seu estudo demonstraram que mesmo as técnicas de McMaster e Mini-FLOTAC tenham apresentado uma concordância positiva, o Mini-FLOTAC apresentou uma contagem de ovos fecais significativamente mais elevada.

Ferramentas inovadoras de diagnóstico direto que combinam tecnologia moderna e sensibilidade com acessibilidade e viabilidade com recursos limitados são necessários e desenvolvimento do Mini-FLOTAC é um avanço nessa direção (BARDA et al., 2014).

O uso de mais de uma técnica para diagnóstico coproparasitológico é indicado, uma vez que o um único método pode não revelar o verdadeiro parasitismo, especialmente considerando que, em muitos casos, os animais apresentam co-infecções.

4 CONCLUSÕES

Através das técnicas empregadas, identificou-se ovos do tipo Strongylida (estrongilídeos), *Strongyloides* sp., *Moniezia* sp., *Trichuris* spp., além de oocistos de *Eimeria* spp. Para *Eimeria* spp., as técnicas de McMaster100 e Mini-FLOTAC10 apresentaram maior potencial de recuperação dos oocistos. Para estrongilídeos não houve diferença entre as técnicas quanto ao seu potencial de recuperação dos ovos. O McMaster100 apresentou maior potencial na recuperação dos ovos do tipo *Strongyloides* sp. Ovos de *Moniezia* sp. e *Trichuris* spp. somente foram recuperados por Mini-FLOTAC5. Dentre as concordâncias analisadas, observou-se que existe similaridade entre todas as técnicas testadas.

REFERÊNCIAS

- AHID, S. M. M. et al. Parasitos gastrintestinais em caprinos e ovinos da região oeste do Rio Grande do Norte, Brasil. **Ciência Animal Brasileira**, v. 9, n. 1, p. 212-218, 2008.
- AMARANTE, A. F. T do; AMARANTE, M. R. V. Advances in the diagnosis of the gastrointestinal nematode infections in ruminants. **Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science**, v. 53, n. 2, p. 127-137, 2016.
- BARDA, B. et al. Mini-FLOTAC, Kato-Katz and McMaster: three methods, one goal; highlights from north Argentina. **Parasites & vectors**, v. 7, n. 1, p. 271, 2014.
- BOSCO, A. et al. The recovery of added nematode eggs from horse and sheep faeces by three methods. **BMC veterinary research**, v. 14, n. 1, p. 7, 2018.
- BRITO, D. R. B. et al. Parasitos gastrintestinais em caprinos e ovinos da microrregião do Alto Mearim e Grajaú, estado do Maranhão. **Ciência Animal Brasileira**, v. 10, n. 3, p. 967-974, 2009.
- CASTRO, L. L. D. et al. Efeito in vitro e in vivo de extratos de *Eugenia uniflora* em nematódeos gastrintestinais de ovinos. **Ciência Animal Brasileira**, v. 20, p. 1-12, 2019.
- CRINGOLI, G. et al. Geospatial (s)tools: integration of advanced epidemiological sampling and novel diagnostics. **Geospatial Health**, v. 7, p. 399-404, 2013.
- CRINGOLI, G. et al. The Mini-FLOTAC technique for the diagnosis of helminth and protozoan infections in humans and animals. **Nature protocols**, v. 12, n. 9, p. 1723, 2017.
- CHAGAS, A. C. S.; NICIURA, S. C. M.; MOLENTO, M. B. **Manual Prático: metodologias de diagnóstico da resistência e de detecção de substâncias ativas em parasitas de ruminantes**. Embrapa Informação Tecnológica, Brasília, 2011, 153p.
- COSTA, C. A. F.; VIEIRA, L. S. Controle de nematódeos gastrintestinais de caprinos e ovinos no estado do Ceará. **Embrapa Caprinos e Ovinos**, n. 13, p. 1-6, 1984.

FERNANDES, R. M. et al. Comparação entre as técnicas McMaster e centrífugo-flutuação para contagem de ovos de nematóides gastrintestinais de ovinos. **Ciência Animal Brasileira**, v. 6, n. 2, p. 105-109, 2005.

FOREYT. **Parasitologia Veterinária** – Manual de Referência. 5.ed. São Paulo: Rocca, 2005, 240p.

FORTES, E. **Parasitologia Veterinária**. 4 ed. São Paulo: Ícone, 2004. 607 p.

GODBER, O. F. et al. A comparison of the FECPAK and Mini-FLOTAC faecal egg counting techniques. **Veterinary parasitology**, v. 207, n. 3-4, p. 342-345, 2015.

GORDON, H. M.; WHITLOCK, H. V. A new technique for counting nematode eggs in sheep faeces. **Journal of the Council for Scientific and Industrial Research**, v. 12, n. 1, p. 50-52. 1939.

HOFFMANN, R. P. **Diagnóstico de parasitismo veterinário**. Sulina, Porto Alegre, 1987. 156p.

LEVECKE, B. et al. The bias, accuracy and precision of faecal egg count reduction test results in cattle using McMaster, Cornell-Wisconsin and FLOTAC egg counting methods. **Veterinary Parasitology**, v. 188, n. 1, p. 194-199, 2012.

LINO, D. M.; PINHEIRO, R. S. B.; ORTUNHO, V. V. Benefícios do bem-estar animal na produtividade e na sanidade de ovinos. **Periódico Eletrônico Fórum Ambiental da Alta Paulista**, v. 12, n. 5, p. 124-132, 2016.

NOEL, M. L. et al. Accuracy and precision of Mini-FLOTAC and McMaster techniques for determining equine strongyle egg counts. **Journal of equine veterinary science**, v. 48, p. 182-187, 2017.

OLIVEIRA, R. S. **Status parasitológico de ovinos mestiços Santa Inês em região trópico úmida**. 2018. 34p. Monografia – Faculdade da Amazônia, Amazônia.

OLIVEIRA-SEQUEIRA, T. C. G. et al. Prevalence of intestinal parasites in dogs from São Paulo State, Brazil. **Veterinary parasitology**, v. 103, n. 1-2, p. 19-27, 2002.

RINALDI, L. et al. Comparison of individual and pooled faecal samples in sheep for the assessment of gastrointestinal strongyle infection intensity and anthelmintic drug efficacy using McMaster and Mini-FLOTAC. **Veterinary parasitology**, v. 205, n. 1-2, p. 216-223, 2014.

ROBERTO, F. F. S. et al. Nematóides gastrintestinais na ovinocultura de corte sob regime de pastejo. **PUBVET**, v. 12, n. 4, p. 1-12, 2018.

SANTOS, W. B.; AHID, S. M. M.; SUASSUNA, A. C. D. Aspectos epidemiológicos da caprinocultura e ovinocultura no município de Mossoró (RN). **A Hora Veterinária**, v. 26, n. 152, p. 25-28, 2006.

SILVA, L. M. R. et al. Mini-FLOTAC for the diagnosis of Eimeria infection in goats: an alternative to McMaster. **Small Ruminant Research**, v. 114, n. 2-3, p. 280-283, 2013.

SOUZA JÚNIOR, R. D. **Avaliação do método FAMACHA® para detecção de anemia por Haemonchus contortus em rebanhos caprinos e ovinos**. 2019. 76p. Dissertação – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal.

UENO, H.; GONÇALVES, P. C. Manual para diagnóstico das helmintoses de ruminantes, 4 ed. **Japan International Cooperation Agency**, Tokyo, 1998. 143p.

QUANTIFICAÇÃO DE OOCISTOS E OVOS DE PARASITOS GASTRINTESTINAIS DE CÃES POR MÉTODOS DE SEDIMENTAÇÃO E FLUTUAÇÃO

Eylha Priscila Fernandes Menezes

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Mossoró, RN
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2898-5337>
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/4110733756825774>

Vanessa Maria de Sales Duarte

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Mossoró, RN
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0872-5295>

Jamille Yanca Ferreira Peixoto

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Mossoró, RN
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2367-1627>

Maria de Lara Oliveira Lima

Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Recife, PE
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5861-9277>

Ruana Rafaela Lira Torquato Paiva

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (SEMAGMA), Lajes, RN
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6992-7598>

Juliane Nayra Dantas Silva

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Mossoró, RN
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8226-4285>

Caio Michel de Moraes Rolim

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Mossoró, RN
ORCID: <https://orcid.org/0000.0001.9992.506X>

Antônia Aniellen Raianne Moisés Aguiar

Universidade Estadual do Ceará (UECE), Fortaleza, CE
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1273-5501>

Wesley Adson Costa Coelho

Faculdade de Tecnologia do Nordeste (FATENE), Mossoró, RN
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7039-9481>

Janilene de Oliveira Nascimento

Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Recife, PE
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5210-2656>

Aksa Ingrid Vieira Batista

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Mossoró, RN
<https://orcid.org/0000-0003-0696-7194>

Josivania Soares Pereira

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Mossoró, RN
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2407-9417>

Informações sobre o artigo:	RESUMO
Recebido em: 22/04/2021	A realização de diagnóstico parasitológico em amostras de fezes caninas pode funcionar como bom indicador do nível de infecção gastrointestinal e tem auxiliado na implementação de medidas adequadas de tratamento que visem o controle de parasitos. Considerando que em Mossoró/RN os cães apresentam alta mortalidade em detrimento do parasitismo, o presente trabalho objetivou verificar quatro técnicas para quantificar a eliminação de ovos e oocistos de endoparasitos gastrointestinais em cães naturalmente infectados. Foram obtidas 40 amostras fecais de cães e enviadas ao Laboratório de Parasitologia Animal (LPA) da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA). Cada uma das amostras passou por análise direta, flutuação de Willis-Mollay, Mini-FLOTAC e sedimentação simples. Os dados foram submetidos ao programa estatístico SPSS versão 21.0 e as diferenças estatísticas foram obtidas por Friedman e Kruskal-Wallis. A concordância entre as técnicas foi avaliada através do valor Kappa. Valores de $p < 0,05$ foram considerados significativos. A técnica de Mini-FLOTAC obteve maior potencial de recuperar ovos de <i>Ancylostoma</i> spp. e <i>Dipylidium caninum</i> em relação as demais testadas. Para <i>Cystoisospora canis</i> e <i>Toxocara</i> spp., os métodos não apresentaram diferença estatística. O método direto e de sedimentação simples apresentaram capacidade de recuperação igual para <i>Ancylostoma</i> spp. e <i>D. caninum</i> . O Mini-FLOTAC apresentou maior eficácia de recuperação de ovos e oocistos, seguido por Willis Mollay, que embora menor, apresentou igual potencial de detecção para estes. O uso de mais de uma técnica para diagnóstico parasitológico é recomendado, pois um único método pode não revelar o exato parasitismo.
Aceito em: 27/04/2021	
Data de publicação: 04/08/2021	
Palavras-chave:	
Exames coproparasitológicos	
Caninos	
Zoonose	

QUANTIFICATION OF OOCYSTS AND EGGS OF DOGS GASTROINTESTINAL PARASITES BY SEDIMENTATION AND FLOTATION METHODS

ABSTRACT

The performance of parasitological diagnosis in samples of canine feces can work as a good indicator of the level of gastrointestinal infection and has helped in the implementation of appropriate treatment measures aimed at controlling parasites. Considering that in Mossoró, Rio Grande do Norte, dogs show high mortality to the detriment of parasitism, the present study aimed to verify four techniques to quantify the elimination of eggs and gastrointestinal endoparasite oocysts in naturally infected dogs. For the analysis, 40 fecal samples from dogs were obtained. These were sent to the Animal Parasitology Laboratory of the Universidade Federal Rural do Semi-Árido. Each sample underwent direct analysis, Willis-Mollay fluctuation, Mini-FLOTAC and simple

Keywords:
Coproparasitological
examinations
Canines
Zoonosis

sedimentation. The data were submitted to the statistical program SPSS version 21.0 and the statistical differences were obtained by Friedman and Kruskal-Wallis. The agreement between the techniques was assessed using the Kappa value. Values of $p < 0.05$ were considered significant. The Mini-FLOTAC technique had the greatest potential to recover *Ancylostoma* spp. and *D. caninum* in relation to the others tested. For *Cystoisospora canis* and *Toxocara* spp., The methods showed no statistical difference. The direct and simple sedimentation method showed equal recovery capacity for *Ancylostoma* spp. and *D. caninum*. Mini-FLOTAC showed greater efficiency in the recovery of eggs and oocysts, followed by Willis Mollay, although smaller, had the same detection potential for these. The use of more than one technique for parasitological diagnosis is recommended, as a single method may not reveal the exact parasitism.

1 INTRODUÇÃO

Na sociedade contemporânea, a ampla distribuição geográfica de cães e gatos e a estreita relação com os seres humanos, predispõe a ocorrência de parasitos de caráter zoonótico como helmintos e protozoários, que constitui um importante problema de saúde pública (BRICARELLO et al., 2018; HEILMANN et al., 2018; REGINALDO et al., 2019).

A infecção por endoparasitos gastrintestinais nos animais pode causar um quadro que pode ser assintomático, no qual o animal é portador ou sintomático levando o estabelecimento da doença, o que favorece a contaminação ambiental e o aparecimento de zoonoses. O homem pode adquirir a infecção através do contato direto com as fezes ou pela ingestão de água e alimentos contaminados (SOARES et al., 2018).

Por conseguinte, é importante estabelecer medidas de controle e prevenção, principalmente as que contrapõem o uso indiscriminado de fármacos que contribuem para o surgimento de resistência parasitária nos animais (JESUS et al., 2015; SILVA et al., 2017; MARTINS et al., 2018). As técnicas coproparasitológicas são primordiais no diagnóstico das parasitoses gastrintestinais e no conhecimento da infecção, visto que auxiliam na escolha do melhor protocolo terapêutico para eliminação do agente etiológico.

Para o diagnóstico coproparasitológico em cães, além de exames diretos (HOFFMAN, 1987), técnicas qualitativas e quantitativas de sedimentação e flutuação podem ser usadas. Dentre esses métodos existem os de sedimentação (HOFFMAN et al., 1934), flutuação de Willis Mollay (1921) e Mini-FLOTAC (CRINGOLI et al., 2013). Apesar da

existência de inúmeras técnicas disponíveis de diagnóstico coproparasitológicos em laboratório, deve-se optar por uma que apresente alta sensibilidade, rapidez e fácil execução, além de um baixo custo operacional (SILVA et al., 2018).

Considerando a alta casuística de endoparasitos registrada para os cães de Mossoró, Rio Grande do Norte (RN) (COELHO et al., 2007; AHID et al., 2009), faz-se necessário um estudo de avaliação de técnicas de diagnóstico para contagem de ovos e oocistos fecais nesta localidade. O objetivo do estudo foi comparar técnicas de sedimentação, flutuação e exame direto na quantificação de ovos e oocistos de parasitos gastrintestinais de cães de Mossoró, RN, Brasil.

2 METODOLOGIA

2.1 Animais e aspectos éticos

Foram utilizadas amostras fecais de 40 cães independente da raça, domiciliados de Mossoró, RN, Brasil. Nenhum animal do estudo foi submetido ao uso de antiparasitário num intervalo de três meses. O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética no uso de animais em pesquisa da UFERSA (Processo n. 23091.007409/2018-70).

2.2 Coletas das amostras e exames coproparasitológicos

As amostras de fezes foram obtidas através da eliminação espontânea dos animais e armazenadas em recipientes de polipropileno, refrigeradas e transportadas ao Laboratório de Parasitologia Animal da UFERSA. O processamento e análise ocorreu num intervalo de no máximo de 24 horas através das técnicas de Mini-FLOTAC (CRINGOLI et al., 2013), sedimentação simples (HOFFMAN et al., 1934), exame direto (HOFFMAN, 1987) e flutuação (WILLIS MOLLAY, 1921). Os ovos e oocistos foram identificados através da morfologia, auxiliada pela microscopia óptica de luz e com o uso de literatura específica (FORTES et al., 1997; FOREYT et al., 2005; BOWMAN et al., 2010).

2.3 Avaliação das técnicas coproparasitológicas sobre a categoria dos animais e análise dos dados

Para avaliação de cada umas das técnicas sobre a categoria dos animais (sexo e idade) foi definido para cada um dos cães se o mesmo se apresentava dentro do sexo macho ou fêmea e se classificava como adulto ou jovem.

Os dados obtidos a partir das análises coproparasitológicas foram expressos em valores de média e desvio padrão através do programa estatístico SPSS versão 21.0. Após análise dos pressupostos paramétricos, diferenças estatísticas entre técnicas foram realizadas por Friedman e Kruskal-Wallis. A concordância entre as técnicas foi avaliada através do valor Kappa. Valores de $p < 0,05$ foram considerados significativos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Das amostras analisadas, observou-se ovos de *Ancylostoma* spp., *Toxocara* spp., *Dipylidium caninum*, além de oocistos de *Cystoisospora canis*. JÚNIOR et al. (2015) realizaram um estudo em Natal, RN com animais domiciliados e errantes, onde encontrou dados semelhantes aos do presente trabalho.

Das 40 amostras analisadas através da comparação das técnicas, verificou-se que houve diferença estatística entre algumas delas. A técnica de Mini-FLOTAC apresentou a maior média de recuperação de ovos em relação a todas as técnicas testadas, porém os dados foram concordantes em relação ao método de Willis Mollay (Tabela 1). Fato este pode ser observado no estudo realizado por MENEZES et al. (2013).

Tabela 1 - Valores de média $\pm$ desvio padrão da contagem dos ovos e oocistos recuperados nos animais (N=40) estudados

Willis Mollay	Direto	Sedimentação	Mini-FLOTAC
101,38 $\pm$ 212,66b	1,43 $\pm$ 3,4c	6,15 $\pm$ 21,93c	308,13 $\pm$ 606,51a

N = Número total de animais avaliados.

a,b,c = Letras minúsculas diferentes significa diferença estatística ($p < 0,05$ – Friedman)

Através da técnica de Willis Mollay foram recuperados ovos de *Ancylostoma* spp., *Toxocara* spp., além de oocistos de *C. canis*, com exceção de *D. caninum*. Ao comparar a técnica de Willis Mollay com a técnica direta, bem como o método de sedimentação observou-se que elas são diferentes para ovos de *Ancylostoma* spp. O método de exame direto empregado possibilitou a recuperação de *Ancylostoma* spp., *C. canis*, *D. caninum* e *Toxocara* spp. (Tabela 2).

Tabela 2 - Valores de média $\pm$ desvio padrão dos ovos dos helmintos e oocistos de protozoários recuperados nos animais estudados (N=40)

Parasitas	Técnicas			
	Willis Mollay	Direto	Sedimentação	Mini-FLOTAC
<i>Ancylostoma</i> spp.	101,38 $\pm$ 212,66Ab	1,43 $\pm$ 3,4Ac	6,15 $\pm$ 21,93Ac	258,25 $\pm$ 555,98Aa
<i>Cystoisospora canis</i>	0,63 $\pm$ 2,94Ba	0,1 $\pm$ 0,63Ba	0,08 $\pm$ 0,47Ba	2,13 $\pm$ 10,18Ba
<i>Toxocara</i> spp.	0,03 $\pm$ 0,16Ba	0,23 $\pm$ 1,42Ba	0,45 $\pm$ 2,85Ba	1,63 $\pm$ 10,28Ba
<i>Dipylidium caninum</i>	0	0,08 $\pm$ 0,47Bb	0,05 $\pm$ 0,32Bb	46,13 $\pm$ 291,72Ba

A, B, C = Médias seguidas de letras maiúsculas diferentes na coluna, significa diferença estatística ($p < 0,05$ – Friedman).

a, b, c = Médias seguidas de letras minúsculas diferentes na linha significa diferença estatística ($p < 0,05$ – Friedman).

Através da técnica de sedimentação simples permitiu-se verificar a recuperação de todos os ovos de helmintos e oocistos de protozoários pesquisados. Considerando esta técnica e todos os ovos e oocistos recuperados, houve diferença somente para os ovos do tipo *Ancylostoma* spp. (Tabela 2).

Na técnica de Mini-FLOTAC também foi possível observar todos os parasitos e helmintos analisados, sendo que estes foram observados em maior número em relação a todas as outras técnicas testadas. Dos animais positivos, observou-se um maior número de ovos de *Ancylostoma* spp., seguido de *D. caninum*, *C. canis* e *Toxocara* spp. (Tabela 2). Segundo Lima et al. (2015), de acordo com ponto de vista prático, a técnica de Mini-FLOTAC é uma excelente opção para ser usado na rotina de laboratório porque é facilmente realizado e possui um sistema de conservação de amostras que protege operador e permite uma análise detalhada.

Ovos de *D. caninum* foram recuperados através de todas as técnicas empregadas, exceto Willis Mollay. A ausência de observação dos ovos destes Cestoda através da técnica de flutuação usada pode ser justificada pela alta densidade dos mesmos, o que não permite que estes ovos flutuem e assim possam ser observados. É válido ressaltar ainda que, na presente pesquisa, apesar do Mini-FLOTAC ser uma técnica de flutuação, foi possível recuperar os ovos densos de *D. caninum*.

Estudos anteriores demonstraram que o Mini-FLOTAC apresenta alta sensibilidade em relação aos métodos clássicos e que seus resultados são confiáveis, dado que a quantidade

de amostra fecal utilizada, design do aparelho, variação da técnica empregada e tipos de soluções de flotação, contribui para o maior aumento na detecção e quantificação dos diferentes gêneros de parasitos gastrintestinais (CRINGOLI et al., 2013; MAURELLI et al., 2014).

Ao considerar a categoria dos animais (macho, fêmea, adulto, jovem) observou-se que nenhuma das técnicas diferiu quanto à capacidade de recuperar ovos e oocistos (Tabela 3). Sugere-se que, o fato de não ter observado diferenças entre as categorias analisadas, possa estar relacionado ao número de amostras biológicas estudadas. É possível que, se estudos futuros forem realizados com um maior número de amostras, a diferença de parasitos entre jovens e adultos seja observada. Diferenças entre estas categorias são esperadas, pois normalmente animais jovens apresentam uma maior suscetibilidade ao parasitismo em relação a animais adultos que já possuem imunidade desenvolvida.

Tabela 3 - Valores de média $\pm$ desvio padrão dos ovos dos helmintos e oocistos de protozoários recuperados entre as categorias dos animais estudados (N=40)

Parasitas	Técnicas			
	Willis Molley	Direto	Sedimentação	Mini-FLOTAC
Fêmeas adultas (N=14)	114 $\pm$ 268,74A	1,57 $\pm$ 2,77A	1,71 $\pm$ 3,12A	504,64 $\pm$ 939,37A
Fêmeas jovens (N=6)	27 $\pm$ 64,19A	3,83 $\pm$ 6,15A	19,67 $\pm$ 40,01A	85,83 $\pm$ 172,9A
Machos adultos (N=17)	94,65 $\pm$ 155,1A	0,65 $\pm$ 2,03A	1,41 $\pm$ 2,45A	238,24 $\pm$ 325,19A
Machos jovens (N=3)	238 $\pm$ 401,88A	5,67 $\pm$ 7,37A	34,33 $\pm$ 56,89A	231,67 $\pm$ 218,88A

N= Número total de animais;

A,B, Letras maiúsculas na coluna significa diferença estatística ($p < 0,05$ - Kruskal – Wallis)

Alves et al. (2005) relatam que a frequência de ovos de parasitos intestinais, de acordo com o sexo dos cães de residências e de rua examinados, não foi estatisticamente significativa ($P > 0,05$), sendo que, dos machos, 14,93% (33/221) foram positivos, e das

fêmeas, 15,19% (31/204). Oliveira et al. (1990), observaram maior parasitismo nos animais jovens de até um ano de idade. Fatos estes discordam dos dados da presente pesquisa.

Ao realizar a análise da concordância entre técnicas testadas, observou-se que Mini-FLOTAC e Willis Mollay são iguais independente de ovos e oocistos encontrados, tendo assim um índice de concordância perfeito. Ao comparar as técnicas de exame direto com Willis Mollay e Mini-FLOTAC, a concordância entre eles foi moderada. Ao comparar as técnicas de sedimentação com Willis Mollay, bem como método direto com o de sedimentação, o valor de Kappa é interpretado como forte (Tabela 4).

Tabela 4 - Valores de concordância kappa (p-valor) entre as técnicas estudadas

Testes	Willis Mollay	Direto	Sedimentação
Direto	0,47 (<0,001)*	-	
Sedimentação	0,71 (<0,001)*	0,61 (<0,001)*	-
Mini-FLOTAC	1,0 (<0,001)*	0,47 (<0,001)*	0,71 (<0,001)*

* Significância estatística.

O emprego de diferentes técnicas coproparasitológicas constitui a primeira providência capaz de identificar a presença de parasitos nesses animais. Além disso, existem várias opções de técnicas diagnósticas que podem ser empregadas, cada uma com vantagens e limitações.

No presente trabalho, ao se comparar a eficácia dos métodos de flutuação Willis-Mollay e Mini-FLOTAC para diagnóstico de parasitos de fezes, observou-se que os mesmos se mostraram equivalentes, contudo o Mini-FLOTAC apresentou maior potencial de recuperação de oocistos e ovos em relação às todas as outras técnicas estudadas, além de ter apresentado o potencial de recuperar ovos densos, a exemplo dos de *D. caninum*.

4 CONCLUSÕES

Ao realizar a comparação entre as técnicas coproparasitológicas empregadas, na presente pesquisa, observou-se que de todas elas, a única que conseguiu recuperar todos os ovos e oocistos encontrados foi a de Mini-FLOTAC. Assim, sugere-se que na ocasião em que é possível escolher uma técnica para realizar a coproparasitologia em fezes de cão, o

Mini-Flotac seja o método empregado. Quando não possível realizar o Mini-FLOTAC, que mais de uma técnica seja utilizada, incluindo uma de sedimentação e uma de flutuação.

REFERÊNCIAS

ALVES, O. G. A. S. A. et al. Ocorrência de enteroparasitos em cães do município de Goiânia, Goiás: comparação de técnicas de diagnóstico. **Ciência animal brasileira**, v. 6, n. 2, p. 127-133, 2006.

BELTRÃO, B. A. et al. Projeto cadastro de fontes de abastecimento por água subterrânea, estado do Rio Grande do Norte: relatório diagnóstico do município de Mossoró. **Repositório institucional de geociências**, p. 11, 2005.

BOWMAN, D. D.; GEORGIS. **Parasitologia Veterinária**. 9 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 430p.

BRICARELLO, O. et al. Contaminação por parasitas de importância zoonótica em amostras fecais nas praias de Florianópolis, SC, Brasil. **Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal**, v. 55, n. 1, p. 1-10, 2018.

COELHO, W. A. C. et al. Larvas de ancilostomatídeos em diferentes ambientes do estado do Rio Grande do Norte. **Revista Caatinga (Mossoró, Brasil)**, v. 20, n. 3, p. 207-209, 2007.

CRINGOLI, G. et al. Geospatial (s)tools: integration of advanced epidemiological sampling and novel diagnostics. **Geospatial Health**, v. 7, p. 399-404, 2013.

FOREYT. **Parasitologia Veterinária** – Manual de Referência. 5.ed. São Paulo: Rocca, 2005, 240p.

GODBER, O. F. et al. A comparison of the FECPAK and Mini-FLOTAC faecal egg counting techniques. **Veterinary parasitology**, v. 207, n. 3-4, p. 342-345, 2015.

HEILMANN, R. et al. Effect of selected gastrointestinal parasites and viral agents on fecal S100A12 concentrations in puppies as a potential comparative model. **Parasites & Vectors**. v. 11, p. 252, 2018.

HOFFMANN, W. A.; PONS, J. A.; JANER, J. L. The sedimentation concentration method in *Schistosomiasis mansonii*. **Puerto Rico Journal of Public Health**, v. 9, p. 281-298, 1934.

HOFFMANN, R. P. **Diagnóstico de parasitismo veterinário**. Sulina, Porto Alegre, 1987. 156p.

JESUS, A. P. et al. Efficacy of pyrantel pamoate and ivermectin for the treatment of canine nematodes. **Semina. Ciências Agrárias**, v. 36, n. 6, p. 3731-3740, 2015.

JUNIOR, A. L. F. A. et al. Ocorrência de parasitas com potencial zoonótico em fezes de cães coletadas em vias públicas da cidade de Natal. **Revista Humano Ser**, v. 1, n. 1, p. 52-59, 2015.

LIMA, V.F.S.et al. A comparison of mini-FLOTAC and FLOTAC with classic methods to diagnosing intestinal parasites of dogs from Brazil. **Parasitology research**, v. 114, n. 9, p. 3529-3533, 2015.

MARTINS, L. R. V et al. Contaminação do solo por ovos de *Ancylostoma* sp. e *Toxocara* sp. Em praças públicas no município de Ijuí, RS, Brasil. **Anais do Simpósio Latino-Americano de Estudos de Desenvolvimento Regional**, v. 1, n. 1, 2018. Online.

MAURELL I, M.P.et al. Mini-FLOTAC, a new tool for copromicroscopia diagnosis of commonintestinal nematodes in dog. **Parasits & Vectores**, v. 7, p. 2-5, 2014.

MENEZES, R. A. O. et al. Sensibilidade de métodos parasitológicos para o diagnóstico das enteroparasitoses em Macapá – Amapá, Brasil. **Revista de Biologia e Ciência da Terra**. v. 13, n. 2, 2013.

OLIVEIRA, P.R.et al. Frequência de endoparasitos em cães da região de Uberlândia, Minas Gerais. **Brazilian Journal of Veterinary Research Animal Science**, v. 27, p. 193-197, 1990.

REGINALDO, G. M. S. **Parasitos gastrintestinais em filhotes caninos domiciliados do município de Araçatuba – São Paulo**. 2019. 38f. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal) - Curso de Pós-graduação em Medicina Veterinária Preventiva e Produção Animal, Universidade Estadual Paulista.

SILVA, A. **Contaminação por parasitas de importância zoonótica em amostras fecais na praia da pinheira Palhoça-SC, Brasil**. 2018. 49f. Monografia (Graduação em Zootecnia) - Curso de Zootecnia, Universidade Federal de Santa Catarina.

SILVA, J. C. S. et al. Endoparasitas em cães e gatos diagnosticados em São Luís- Maranhão. **PUBVET**, v. 11, n. 6, p. .587-595, 2017.

SOARES, S. et al. Larva Migrans Cutânea: apresentação típica de dois casos clínicos. **Nascer e Crescer**, v. 27, n. 1, p. 46-49, 2018.

WILLIS, H. H. A simple levitation method for the detection of wookworm ova. **Medicine Journal of Australia**, v. 8, p. 375- 376, 1921.

LEISHMANIOSE VISCERAL: O USO DE COLEIRAS ANTIPARASITÁRIAS COMO MEDIDA PROFILÁTICA EM UMA REGIÃO DE TRANSMISSÃO

Catherine Konrad Nava Calva

Universidade Federal do Pampa, Bagé, RS

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6032983464681125>

Tiago Gallina Corrêa

Universidade Federal do Pampa, Bagé, RS

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2427437551173964>

Informações sobre o

artigo:

Recebido em:

24/05/2021

Aceito em:

26/05/2021

Data de publicação:

04/08/2021

Palavras-chave:

Leishmaniose visceral
canina

Medidas profiláticas

Coleiras antiparasitárias

RESUMO

Nas últimas décadas houve a re-emergência da Leishmaniose Visceral (LV) como um grave problema de saúde pública no Brasil, e o município de Uruguaiana (Rio Grande do Sul) se tornou área de transmissão para LV no ano de 2009. Diante dessa realidade é necessária a adoção de medidas profiláticas ao vetor da doença na região. O presente estudo visou quantificar o uso de coleiras antiparasitárias por tutores nos animais de estimação na cidade de Uruguaiana. Uma pesquisa foi realizada através de aplicação de questionário em 20 estabelecimentos que comercializavam coleiras repelentes, sendo constatado que o número de coleiras vendidas por mês foi de: 0 a 10 coleiras em 70% dos estabelecimentos, 11 a 30 foram 25% e 5% de 31 a 50. Sobre a importância nas vendas, as coleiras repelentes não tiveram considerável relevância. Os motivos que levaram os proprietários a adquirirem a coleira repelente variaram, sendo que 60% buscavam para prevenção da Leishmaniose e 20% dos proprietários buscavam adquirir a coleira repelente contra pulgas e carrapatos e também para a prevenção da Leishmaniose Visceral Canina (LVC). Quanto a marca mais vendida, 55% a marca Scalibor®, 30% a marca Seresto®, e 15% a marca Leevre®. Já a preferência na hora da escolha da coleira repelente observou-se principalmente relação com o preço (50%), seguida da marca com (20%), tempo de proteção (15%) e receita veterinária (15%). A escolha dos proprietários entre coleira e vacina para LVC foi 80% para coleira repelente. Sobre o objetivo dos tutores ao adquirir a coleira 80% buscavam para prevenção. Por conseguinte, 100% dos tutores obtinham a coleira para cães. Conclui-se que os proprietários possuem conhecimento do uso da coleira repelente para prevenir transmissão via vetor, porém a comercialização de coleiras ainda é baixa. Assim, medidas de acesso facilitado para profilaxia da LV devem ser incentivadas pelos órgãos públicos.

VISCERAL LEISHMANIOSIS: THE USE OF ANTIPARASITARY COLLARS AS A PROPHYLATIC MEASURE IN A TRANSMISSION REGION

ABSTRACT

Keywords:

Canine visceral

leishmaniosis

Prophylactic measures

Repellent collars

In recent decades there has been the re-emergence of Visceral Leishmaniosis (VL) as a serious public health problem, and the municipality of Uruguaiana (Rio Grande do Sul) became a transmission area for VL in 2009. In this way, it is necessary to adopt prophylactic measures for the disease vector in the region. The present study aimed to quantify the use of antiparasitic collars by pet tutors in the city of Uruguaiana. A research was carried out through the application of questionnaires in 20 establishments that sold repellent collars, and it was found that the number of collars sold per month was: 0 to 10 collars in 70% of the establishments, 11 to 30 were 25% and 5% from 31 to 50. Regarding the importance in sales, the repellents collars did not have considerable relevance. The reasons that led the owners to purchase the repellent collar varied, and 60% sought to prevent Leishmaniosis and 20% of the owners also sought to purchase the repellent collar for the prevention ticks, fleas and Canine Visceral Leishmaniosis (CVL). As for the best-selling brand, 55% were Scalibor® brand, 30% Seresto® brand, and 15% Leevre® brand. The preference at the time of choosing the repellent collar was mainly related to the price (50%), followed by the brand (20%), protection time (15%) and veterinary prescription (15%). The choice of the tutors between collar and vaccine for CVL was 80% for repellent collar. About the goal when acquiring the collar, 80% sought prevention. Therefore, 100% of the tutors obtained the dog collar. It is concluded that they have knowledge of the use of the repellent collar to prevent vector transmission; however, the commercialization of collars is still low. Thus, access measures facilitated for VL prophylaxis should be encouraged by public agencies.

1 INTRODUÇÃO

As últimas décadas foram caracterizadas pela re-emergência da Leishmaniose Visceral (LV) como um grave problema de saúde pública em vários países tropicais (WERNECK GL, 2002). Em um cenário mais próximo, o Brasil concentra atualmente 96% dos casos de LV em relação aos países das Américas (OPAS/OMS, 2015), ainda o município de Uruguaiana – Rio Grande do Sul foi classificado como área de transmissão para LV no ano de 2009 (SOUZA et al., 2010).

A falta ou interrupção do controle da LV gera um aumento de animais circulantes positivos para o patógeno, atuando como fonte de infecção para outros animais e humanos

(NOGUEIRA et al., 2021). Diante disso, é necessário que medidas profiláticas em relação ao principal vetor relacionado a doença na região de Uruguaiana, *Lutzomyia longipalpis*, sejam estabelecidas e empregadas. Além de aprofundar o conhecimento de fatores socioeconômicos relacionados a ocorrência da leishmaniose para estabelecer ações profiláticas aplicáveis a população.

O presente estudo tem como objetivo quantificar a venda de coleiras antiparasitárias para cães e gatos como medida profilática para a LV e relacioná-la com o perfil socioepidemiológico dos proprietários na hora da escolha profilática.

2 METODOLOGIA

No município de Uruguaiana (RS) foi realizada seleção aleatória de estabelecimentos que tinham à disposição do consumidor coleiras repelentes antiparasitárias. Dentre os estabelecimentos pode-se citar clínicas veterinárias, agropecuárias, pet shop e bazares.

O método de recolhimento de dados foi a partir de questionários que continham oito perguntas: número de coleiras repelente vendidas em um mês pelo estabelecimento, qual a relevância das coleiras no faturamento do estabelecimento em uma escala de 1 a 4, em que 1 possui grande relevância e 4 pouca relevância. Principal motivo de compra da coleira repelente pelos proprietários. Qual a marca mais vendida no estabelecimento e a preferência na hora da escolha: marca ou valor, ou ainda tempo de proteção. Entre vacina e coleira antiparasitária qual a principal escolha dos proprietários, e objetivo dos proprietários ao adquirir o produto: prevenção ou impedir a transmissão em animais positivos para LVC. E por fim espécie que há mais procura: cães ou gatos.

3 RESULTADO E DISCUSSÃO

Dentre os 20 estabelecimentos em que foram aplicados o questionário, os respondentes tinham como atividade, vendedor 40% (8), proprietário do estabelecimento 35% (7) e médico veterinário 25% (5).

Em primeiro plano a relação do número de coleiras vendidas em um mês pelo estabelecimento foi de: 70% (14) vendiam de 0 a 10 coleiras repelentes, 25% (5) de 11 a 30 e 5% (1) de 31 a 50 (gráfico 1). Sobre a importância nas vendas dos estabelecimentos, as

coleiras repelentes não foram de muita relevância. Em uma escala de 1 a 4, 45% (9) dos entrevistados deram importância 4 para a vendas das coleiras, 45% (9) importância 3 na escala e 10% (2) 2 na escala (gráfico 2). Uruguiana é o quarto município do estado do Rio Grande do Sul em questão de extensão contando com aproximadamente 130 mil habitantes (IBGE, 2010), assim vê-se que o número de coleiras vendidas na maioria dos estabelecimentos é pouco para suprir a demanda de cães em um município de porte populacional tão elevado. A baixa relevância das coleiras repelentes para o lucro dos estabelecimentos também causa a diminuição da comercialização, desmotivando os estabelecimentos a oferecerem opções e diferentes marcas para os consumidores.

Outro ponto que causa a diminuição da comercialização das coleiras no município é que a cidade de Uruguiana fica localizada na fronteira oeste do Brasil com a Argentina, fazendo fronteira com a cidade de Paso de los Libres, e muitos brasileiros vão até a Argentina para fazer compras, sendo que a procura das coleiras antiparasitárias é comum pois seu preço é mais baixo e o tempo de proteção das coleiras argentinas são maiores (em bula), mesmo sendo as mesmas marcas vendidas no Brasil.

Gráfico 1 - Número de coleiras vendidas em um mês pelos estabelecimentos entrevistados

Fonte: Dados da pesquisa

Legenda: Observou-se que 70% dos estabelecimentos vendiam de 0-10 coleiras em um mês (em azul no gráfico), 25% vendiam de 11-30 (em laranja no gráfico) e 5% vendiam de 31 – 50 (em cinza no gráfico)

Gráfico 2 - Importância das coleiras antiparasitárias nas vendas dos estabelecimentos entrevistados

Fonte: Dados da pesquisa

Legenda: Observou-se que 70% dos estabelecimentos vendiam de 0-10 coleiras em um mês (em azul no gráfico), 25% vendiam de 11-30 (em laranja no gráfico) e 5% vendiam de 31 – 50 (em cinza no gráfico).

Em relação aos motivos que levaram os proprietários a adquirirem a coleira repelente, 60% (12) procuravam a coleira para prevenção do *L. longipalpis*, conhecido popularmente por mosquito palha, 20% (4) procuravam prevenção para pulgas, carrapatos e para o mosquito palha, 15% (3) para pulgas e carrapatos e 5% (1) procuravam a coleira apenas para prevenção de pulga (gráfico 3). Percebe-se que a preocupação com a Leishmaniose Visceral Canina (LVC) existe por parte dos proprietários já que 80% dos estabelecimentos tinham procura para prevenção da doença. Essa afirmativa vai ao encontro de outro estudo realizado em Uruguaiana, em que 80% dos entrevistados já haviam escutado falar sobre LVC e tinham o conhecimento que se tratava de uma doença (MASSIA L. I. et al, 2016).

Gráfico 3 - Motivação para a compra das coleiras repelente segundo os estabelecimentos entrevistados

Fonte: Dados da pesquisa

Legenda: 20% dos clientes dos estabelecimentos entrevistados buscavam as coleiras para prevenção de pulgas, carrapatos e do mosquito palha. 60% para prevenção do mosquito palha, 15% para pulga e carrapatos e 5% para prevenção apenas de pulgas.

Quanto à marca mais vendida, 55% (11) dos estabelecimentos vendiam em maior quantidade a marca Scalibor®, 30% (6) a marca Seresto® e por último 15% (3) a marca Leevre®. Já a preferência na hora de escolher a coleira repelente teve principalmente relação com o preço 50% (10), seguida da marca com 20% (4), tempo de proteção 15% (3) e receita veterinária 15% (3). Essas duas variáveis se complementam (gráfico 4) uma vez que a coleira repelente da marca Scalibor®, impregnada com 4% de deltametrina, é a marca com menor preço no mercado local, porém com apenas quatro meses de proteção enquanto outras marcas, como a coleira Seresto®, chegam até oito meses de proteção.

Gráfico 4 - Relação preferência dos proprietários na hora da compra e marca mais vendida nos estabelecimentos entrevistados

Legenda: Com as variáveis observa-se que 50% dos proprietários buscavam as coleiras com menor preço no mercado, e a marca mais vendida nos estabelecimentos foi a Scalibor®.

A escolha dos proprietários entre a coleira repelente e a vacina para LVC foi que 80% (16) escolhiam em primeiro lugar a profilaxia por meio da coleira repelente e 20% (4) preferiam a vacinação, deixando a coleira como segunda medida preventiva. Pode-se relacionar esse alto índice de 80% para escolha das coleiras pelo alto custo da vacinação, mesmo que muitos estabelecimentos entrevistados recomendassem que os proprietários optassem pelas duas medidas profiláticas, vacinação e uso das coleiras repelentes.

O Ministério da Saúde indica como medidas protetivas para a LV o uso de telas nas janelas, repelentes, o uso de coleiras em cães, e em cães soropositivos errantes a captura e a eutanásia. Sobre a eutanásia existe um grande debate bioético uma vez que existe outras maneiras mais eficientes para diminuir a transmissão (DOS SANTOS, A. A. et al, 2018). A vacina é considerada por muitos autores um método preventivo promissor (FERNANDES, A. P. et al., 2017), e em conjunto a vacinação e o uso de coleiras aumentaria significativamente a proteção dos humanos e de outros animais, porém estudos nesse âmbito são menos frequentes.

Em relação ao objetivo dos clientes ao comprar a coleira, 80% (16) dos proprietários procuravam às coleiras como medida de prevenção e 20% (4) procuravam por

animais já positivos para LVC. O uso de coleiras em animais positivos chamado popularmente de “encoleiramento inverso ou reverso”, está sendo muito discutido para diminuir a transmissão e evitar que se faça a eutanásia. Porém poucos estudos foram realizados para comprovação.

Por conseguinte, em relação à espécie em que havia mais procura de coleiras repelentes, houve maior procura para cães 100% (20). Ainda há muitas especulações sobre os felinos em relação a LV. Segundo Simões-Mattos, os gatos domésticos agregam todas as condições de um potencial reservatório, porém mais estudos são necessários para avaliar o real papel dos felinos na transmissão da LV.

4 CONCLUSÕES

Com o presente estudo pode-se concluir que a comercialização de coleiras repelentes como medida profilática para LVC não é suficiente para suprir a necessidade de um município considerado área de transmissão, e com uma alta população de cães. Ainda, nota-se que os proprietários que procuram a coleira sabem que a leishmaniose é presente no município, pois a maioria dos motivos para procura é para prevenir o contato dos animais com o vetor da doença.

Uma vez que a principal preferência na hora da compra da coleira repelente é o preço, conclui-se que pelo alto valor comercial das medidas profiláticas a procura pelas mesmas é baixa.

Portanto, medidas de acesso facilitado para profilaxia da Leishmaniose Visceral devem ser incentivadas pelos órgãos públicos. Além da conscientização de medidas protetivas simples como o uso de telas e repelentes tópicos com o objetivo de melhorar o controle da doença e proteger a população tanto de cães quanto de humanos.

REFERÊNCIAS

DOS SANTOS, A. A. et al. **Eutanásia canina como medida profilática para o controle da Leishmaniose Humana: uma abordagem bioética.** Vol. 18, Nº. 1, p. 21-40, 2018.

FERNANDES, A. P. et al. **Leishmaniose visceral canina: Novos antígenos para diagnóstico e vacinas.** Gerais: Revista de Saúde Pública do SUS/MG, v. 1, n. 1, p. 49-50, 2017.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Sinopse do censo demográfico 2010: Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010.**

Disponível em: <http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?uf=43&dados=1>

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Manual de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral**. Brasília; 2014. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_vigilancia_controle_leishmaniose_viscer.pdf

MASSIA, L. I. et al. Leishmaniose visceral canina em três bairros de Uruguaiana - RS. **Vigilância Sanitária em Debate: Sociedade, Ciência & Tecnologia (Health Surveillance under Debate: Society, Science & Technology)** – Visa em Debate, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 113-119, 2016. DOI: 10.3395/2317-269x.00679.

NOGUEIRA, R. A. et al. **Transmissão Intensa da Leishmaniose Visceral em Região do Nordeste do Brasil: uma análise após a descontinuidade do programa de controle de zoonoses**. Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária, v. 30, n. 1, 2021.

OPAS/OMS. **Leishmanioses – Informe Epidemiológico das Americas**. Informe Leishmaniose nº 7, Março 2019. Disponível em: <https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/50505/2019-cde-leish-informe-epi-das-americas.pdf?seq>

PEÇANHA, R. et al. ***Lutzomyia longipalpis* (Diptera: Psychodidae: Phlebotominae) in the region of Saquarema: potential area of visceral leishmaniasis transmission in the state of Rio de Janeiro, Brazil**. Rev. Soc. Bras. Med. Trop., Uberaba, v. 45, n.1, p. 120-121, Feb. 2012.

SIMÕES-MATTOS, L. **O gato doméstico (*Felis catus*) como potencial hospedeiro reservatório de *Leishmania (Viannia) braziliensis***. Diss. Tese (Doutorado) - Universidade Estadual do Ceará, Faculdade de Veterinária, 2005.

WERNECK G. L. et al. **The urban spread of visceral leishmaniasis: clues from spatial analysis**. Epidemiology. 2002;13(3):364-7.

PNEUMOTÓRAX FECHADO SIMPLES TRAUMÁTICO EM GATO-DOMÉSTICO (*Felis catus* LINNAEUS, 1758) – RELATO DE CASO

Aksa Ingrid Vieira Batista

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Mossoró, RN

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0696-7194>

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6614624885083003>

Gabriel Vinícius Carvalho de Lucena

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Patos, PB

ORCID: <https://orcid.org/00000001-9789-6066>

Priscilla Dayanne Chagas Souza

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Mossoró, RN

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4248-5849>

Sandy Beatriz Silva de Araújo

Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Areia, PB

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0871-2809>

Natanael do Nascimento Silva

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Mossoró, RN

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5629-2274>

Emanuel Lucas Bezerra Rocha

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Mossoró, RN

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1265-0698>

João Victor da Silva Oliveira

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Mossoró, RN

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2465-0214>

Leon Denner Moreira Benício

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Mossoró, RN

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6117-1573>

Hugo Maciel de Faria

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Mossoró, RN

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7347-1880>

Ana Lucelha dos Santos Silva

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Mossoró, RN

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6039-5302>

Thays Ribeiro Pacó

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Mossoró, RN

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9327-5366>

Luanda Pâmela César de Oliveira

Clínica Veterinária Vet Center, Mossoró, RN

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8003-6649>

Informações sobre o**artigo:****Recebido em:****25/05/2021****Aceito em:****27/05/2021****Data de publicação:****04/08/2021****Palavras-chave:****Emergência****Felinos****Pneumologia****Trauma****RESUMO**

O pneumotórax pode ser classificado de acordo com sua etiologia em traumático, espontâneo ou iatrogênico e de acordo com a sua patofisiologia em aberto ou fechado. Geralmente, a causa mais comum de pneumotórax em gatos é o trauma e dependendo da situação do paciente, essa patologia pode levar a quadros graves, podendo ser fatal ao animal. Este trabalho tem por objetivo relatar um caso de pneumotórax fechado simples em paciente felino associado a possível trauma, sendo realizada estabilização do quadro de dispneia através da realização de toracocentese e tratamento sintomático coadjuvante. Deu entrada ao Hospital Veterinário da Universidade Federal Rural do Semi-Árido um gato sem raça definida, macho, com escore corporal 2 (na escala de 1 a 5), apresentando grau de desidratação de aproximadamente 8%, mucosas esbranquiçadas, dispneia, respiração abdominal, tosse, hiporexia, hipodipsia e sangue na região bucal. Para a realização da estabilização e tratamento sintomático o animal foi internado, e logo foi instituída a administração metronidazol (15mg/kg), amoxicilina (20mg/kg), dipirona (25mg/kg) e tramadol (3mg/kg) durante os dois dias de internamento. Foi realizada radiografia torácica, mostrando hiperlucência no pulmão, principalmente em lobos caudais, apresentando também um aumento de radiopacidade de lobos pulmonares com retração dos mesmos, caracterizando atelectasia e/ou colapso, sugerindo pneumotórax fechado traumático. O paciente foi submetido ao procedimento de toracocentese e após isso, a alta foi instituída assim como antibioticoterapia. O pneumotórax fechado traumático é uma afecção comum em gatos e a técnica de toracocentese se mostrou eficaz para o tratamento, assim como a avaliação radiográfica se mostrou uma opção decisiva para um diagnóstico diferencial preciso.

TRAUMATIC SIMPLE CLOSED PNEUMOTHORAX IN A DOMESTIC CAT (*Felis catus* LINNAEUS, 1758) – CASE REPORT**ABSTRACT**

Pneumothorax can be classified according to its etiology as traumatic, spontaneous or iatrogenic and according to its pathophysiology as open or closed. Generally, the most common cause of pneumothorax in cats is trauma and depending on the patient's situation, this pathology can lead to severe conditions, which can be fatal to the animal. This work aims to report a case of simple closed pneumothorax in a feline patient associated with possible trauma, with stabilization of dyspnea through thoracentesis and adjunctive symptomatic treatment. A male, mixed breed, with a body score of 2 (on a scale of 1 to 5) was admitted to the Veterinary Hospital of the Federal Rural University

Keywords:
Emergency
Felines
Pneumology
Trauma

of the Semi-Arid, with a degree of dehydration of approximately 8%, pale mucous membranes, dyspnoea, abdominal breathing, cough, hyporexia, hypodipsia and blood in the oral region. The animal was hospitalized for stabilization and symptomatic treatment with metronidazole (15mg/kg), amoxicillin (20mg/kg), dipyrone (25mg/kg) and tramadol (3mg/kg) were instituted during the two days internment. A chest X-ray was performed, showing hyperlucence in the lung, especially in the caudal lobes, also showing an increase in radiopacity of the pulmonary lobes with retraction of them, characterizing atelectasis and/or collapse, suggesting traumatic closed pneumothorax. The patient underwent a thoracentesis procedure and after that, discharge was instituted as well as antibiotic therapy. Traumatic closed pneumothorax is a common condition in cats and the technique of thoracentesis has proved to be effective for treatment, just as radiographic evaluation has proved to be a decisive option for an accurate differential diagnosis.

1 INTRODUÇÃO

O pneumotórax é caracterizado como a condição patológica em que o ar atmosférico consegue ter acesso ao espaço pleural por uma das três vias: pleurocutânea, se o extravasamento ocorrer devido a lesões na pele, pleuropulmonar, se as lesões estiverem no pulmão, ou pleuroesofágica, se estas se localizarem no esôfago. Em decorrência da entrada de ar no espaço pleural, ocorre diminuição da pressão negativa, o pulmão apresenta capacidade elástica permitindo que se recolha, levando a atelectasia, ou seja, o seu colapso (PAWLOSKI; BROADDUS, 2010; PEREIRA et al., 2016; BOMFIM, 2017; FERNANDES, 2017).

Além disso, o pneumotórax pode ser classificado de acordo com sua etiologia em: traumático, se ocorrer devido a algum trauma; espontâneo, quando não decorrer de nenhum motivo prévio; ou iatrogênico, se acontecer devido a erros médicos. Geralmente, a causa mais comum de pneumotórax em gatos é o trauma, não havendo predisposição de raça, sexo ou idade para a ocorrência dessa afecção. Adicionalmente, esse distúrbio pode ser classificado de acordo com a sua patofisiologia em aberto, quando o animal apresenta lesões externas na parede torácica, e fechado, quando não existem lesões externas (JOHNSON, 2010; PAWLOSKI; BROADDUS, 2010; LITTLE, 2015; PEREIRA et al., 2016; ANDRADE; BICALHO, 2017; BOMFIM, 2017; EGUCHI et al., 2017).

O pneumotórax fechado é subdividido em simples e de tensão. No simples ocorre acúmulo de ar não-progressivo na cavidade pleural, decorrente de pequenas lacerações no

parênquima e cápsula pulmonares, enquanto que no de tensão, observa-se acúmulo progressivo de ar devido à lesão extensa no pulmão, aumentando a pressão intrapleurar e levando ao colapso pulmonar. Constitui emergência médica na medida em que a elevação da pressão ocasiona a compressão dos vasos principais, e diminuição do retorno venoso e do débito cardíaco, levando ao desenvolvimento de insuficiência respiratória progressiva, síncope e morte rápida (PIGATTO et al., 2008; VASCONCELLOS, 2009).

O pneumotórax geralmente é bilateral e em algumas vezes são autolimitantes, podendo ser resolvidas sem tratamento, quando o tecido pulmonar é reestabelecido e o ar intrapleurar é reabsorvido. Porém, na maioria dos casos, o pneumotórax debilita o animal podendo causar grave hipoxemia, taquipneia, alcalose respiratória e alterações na pressão cardíaca, podendo ser fatal. Radiografias torácicas usualmente são suficientes para diagnóstico, no entanto tomografia computadorizada ou ressonância magnética podem ser necessárias (JOHNSON, 2010; PAWLOSKI; BROADBENT, 2010; LITTLE, 2015; EGUCHI et al., 2017).

Esse trabalho tem como finalidade relatar o caso clínico de um paciente felino que apresentou o quadro de pneumotórax fechado simples traumático, assim como o tratamento utilizado.

2 METODOLOGIA

No dia 07 de março de 2019, deu entrada ao Hospital Veterinário da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (HOVET-UFERSA) um gato sem raça definida, macho, não castrado, com 05 anos de idade, pesando 3,3 quilogramas, sem histórico de vermifugação e com vacinação apenas para a raiva. O animal se apresentava com escore corporal 2 (na escala onde 1 se refere a caquexia e 5 a obesidade), apresentando grau de desidratação de aproximadamente 8% e mucosas hipocoradas.

Quanto ao sistema respiratório, este apresentava dispneia, com respiração abdominal, ambos os pulmões estavam normofônicos, além de a tutora ter afirmado tosse com frequência observada no animal. Ele se alimentava de comida natural, porém seis dias antes do atendimento clínico o animal apresentou hiporexia e hipodipsia, além de exibir sangue na região bucal, e não aparentar ter mais interesse em sair de casa. Como o animal era semidomiciliado, a tutora afirmou a possibilidade de ter havido trauma nos momentos em que o animal esteve fora de casa, porém este não apresentava lesões aparentes.

Para a realização da estabilização e tratamento sintomático o animal foi internado, e logo foi instituída a administração metronidazol 15mg/kg a cada 12 horas por via intravenosa (IV), amoxicilina 20mg/kg a cada 24 horas por via subcutânea (SC), dipirona 25mg/kg a cada 12 horas por via SC e tramadol 3mg/kg a cada 24 horas por via intramuscular (IM) apenas durante os dois dias de internamento.

Além disso, foi realizado exame radiográfico, que mostrou hiperlucência no pulmão, principalmente em lobos caudais, apresentando também um aumento de radiopacidade de lobos pulmonares com retração dos mesmos, caracterizando atelectasia e/ou colabamento. Devido ao aumento de radiolucência e retração pulmonar, não foi possível a avaliação cardíaca assim como de grandes vasos torácicos. Por fim, o diagnóstico radiográfico sugeriu pneumotórax fechado traumático.

Após isso, o paciente foi submetido ao procedimento de toracocentese para estabilização do quadro dispneico. Para a realização da técnica foi realizada a tranquilização do animal utilizando-se metadona na dose de 0,3mg/kg por via intramuscular e posterior tricotomia ampla da caixa torácica. Logo depois, a toracocentese foi realizada entre o 6º e o 9º espaço intercostal, dorsal à junção costochondral, utilizando-se escalpe, uma seringa de 20 mililitros e uma torneira de três vias. Dessa forma, foi dada a alta do animal e instituído o tratamento com amoxicilina associada ao clavulanato de potássio na dose de 12,5mg/kg a cada 12 horas e durante 14 dias. O gato retornou ao hospital por duas vezes, observando-se uma melhora significativa no quadro clínico.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os animais mais predispostos são os felinos jovens, machos, pois são mais atingidos por carros ou sofrem outros traumas. Na maioria dos casos de pneumotórax, como o aqui relatado, o animal geralmente se encontra em estado de urgência, apresentando grave hipoxemia, taquipneia e apatia. E consequentemente, se o pneumotórax não for tratado, na maioria das vezes o acometimento do animal pode ser fatal. Quando o tórax permanece fechado, o pneumotórax pode ter sido causado pelas extremidades perfurocortantes de ossos fraturadas que podem lacerar a pleura, resultando em vazamento de ar diretamente do parênquima pulmonar (ANDRADE; BICALHO, 2017; BOMFIM, 2017). Porém, no caso relatado, tanto pela palpação quanto pela avaliação radiográfica não foram observados nenhum sinal de fratura óssea, nem de lesões externas aparentes no animal.

Os primeiros sinais clínicos associados são principalmente a dispneia ou o aumento da taxa respiratória, o que é observado imediatamente logo após a injúria. Apesar da

compensação respiratória por taquipneia, os animais geralmente apresentam hipóxia, o que leva a hipoperfusão tecidual, e consequentemente o animal apresenta mucosas cianóticas ou pálidas, o que aconteceu com o felino do presente caso (JOHNSON, 2010; PAWLOSKI; BROADDUS, 2010; ANDRADE; BICALHO, 2017; BOMFIM, 2017).

O aumento na taxa de ventilação reduz o dióxido de carbono arterial, aumenta o pH do sangue e resulta em uma alcalose respiratória. No caso aqui relatado, o animal apresentava dificuldade respiratória, respiração abdominal marcante e taquipneia grave. Além disso, atividades que aumentam o débito cardíaco, como o exercício, aumentam a quantidade de sangue desviada através dos pulmões, piorando o quadro de hipoxemia (PAWLOSKI; BROADDUS, 2010; ANDRADE; BICALHO, 2017).

Outros sintomas incluem tosse, vômito, letargia, ansiedade, e a intolerância ao exercício. No presente caso, o animal apresentava-se com tosse aparente, além de não mostrar interesse em sair de casa e de se movimentar, corroborando com a literatura. Já quanto ao sangramento na região bucal do animal, sabe-se que hemorragias podem ocorrer em casos de pneumotórax devido ao rompimento dos vasos localizados no trato respiratório devido as lesões nesses órgãos (JOHNSON, 2010; PAWLOSKI; BROADDUS, 2010; ANDRADE; BICALHO, 2017).

O diagnóstico do pneumotórax é baseado na anamnese, sinais clínicos, bem como na avaliação radiográfica da cavidade torácica, exames laboratoriais e toracocentese. Essa afecção geralmente tem um bom prognóstico se não houverem miocardite traumática e contusões pulmonares, o que não foi observado neste caso. A literatura recomenda o tratamento do pneumotórax a partir da utilização da técnica de toracocentese entre o 6º e o 9º espaço intercostal, dorsal à junção costondral, utilizando-se um registro de três vias, o que demonstrou um resultado eficaz para a diminuição do ar presente na cavidade torácica no presente relato (PAWLOSKI e BROADDUS, 2010; PEREIRA et al., 2016; BOMFIM, 2017; EGUCHI et al., 2017; FERNANDES, 2017).

4 CONCLUSÕES

Conclui-se que o pneumotórax fechado traumático é uma afecção comum em gatos e que o tratamento clínico utilizando a técnica de toracocentese e terapia sintomática se mostrou eficaz. Embora o pneumotórax seja a causa mais comum de desconforto respiratório em pacientes com trauma, esta afecção pode ser confundida com contusão

pulmonar, fraturas de costela, ruptura diafragmática, bolhas traumáticas, hemotórax, hipoperfusão e hérnia diafragmática. Dessa maneira, a avaliação radiográfica se mostra uma opção decisiva para um diagnóstico diferencial preciso.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, M.; BICALHO, A. Pneumotórax espontâneo secundário a doença pulmonar obstrutiva crônica em felino. *Enciclopédia biosfera*, v. 14, n. 26, 2017.

BOMFIM, L. S. Abordagem terapêutica do pneumotórax em cães: revisão sistemática. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Medicina Veterinária) – Universidade Estadual Paulista (USP), 2017.

EGUCHI, G. U. et al. Pneumomediastino, pneumotórax e enfisema subcutâneo em cão com pneumopatia e infecção pelo vírus da cinomose: relato de caso. *Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia*, v. 70, n. 5, p. 1403-1408, 2018.

FERNANDES, S. S. Síndrome do gato paraquedista: estudo retrospectivo de 78 casos (2013-2016). Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária) - Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, 2017.

JOHNSON, L. R. **Clinical Canine and Feline Respiratory Medicine**. Ames: Wiley-blackwell, 2010. 202 p.

LITTLE, S. E. **O Gato: Medicina Interna**. Rio de Janeiro: Roca, 2015. 1913 p.

PAWLOSKI, D. R; BROADDUS, K. D. Pneumothorax: A Review. *Journal of the American Animal Hospital Association*. Oklahoma, p. 385-397, 2010.

PEREIRA, P. A. et al. Pneumotórax aberto associado a hemotórax em um cão. *Revista Científica de Medicina Veterinária*, v. 12, n. 45, 2016.

PIGATTO, J. et al. Produção de pneumotórax em cães e manejo por toracoscopia paraxifóide transdiafragmática. *Ciência Rural*, v. 38, n. 8, p. 2210-2217, 2008.

VASCONCELLOS, R. R. Pneumotórax traumático em cães. Monografia (Medicina Veterinária) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS), 2009.

EFICÁCIA DA IVERMECTINA SOBRE NEMATOIDES INTESTINAIS DE ASININOS

Ruana Rafaela Lira Torquato Paiva

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (SEMAGMA), Lajes, RN

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6992-7598>

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5498059090310014>

Iany Leda Moreira Dantas

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Mossoró, RN

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7155-5423>

Maria de Lara Oliveira Lima

Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Recife, PE

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5861-9277>

Juliane Nayra Dantas Silva

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Mossoró, RN

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8226-4285>

Aksa Ingrid Vieira Batista

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Mossoró, RN

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0696-7194>

Antônia Aniellen Raianne Moisés Aguiar

Universidade Estadual do Ceará (UECE), Fortaleza, CE

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1273-5501>

Lígia Vanessa Leandro Gomes

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Mossoró, RN

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7914-1356>

Caio Michel de Moraes Rolim

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Mossoró, RN

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9992-506X>

Fernando Lucas Monteiro Medeiros

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Mossoró, RN

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1978-8224>

Wesley Adson Costa Coelho

Faculdade de Tecnologia do Nordeste (FATENE), Mossoró, RN

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7039-9481>

Weibson Paz Pinheiro André

Centro Universitário Doutor Leão Sampaio (Unileão), Juazeiro do Norte, CE

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9079-6791>

Josivania Soares Pereira

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Mossoró, RN

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2407-9417>

Informações sobre o**artigo:****Recebido em:****22/06/2021****Aceito em:****29/06/2021****Data de publicação:****04/08/2021****Palavras-chave:****Jumento****Lactona macrocíclica****Nematódeos****Refugia****RESUMO**

Equus asinus Linnaeus, 1778 caracteriza-se por ter força, rusticidade e resistência. Entretanto é susceptível às parasitoses. É crescente seu emprego em novas funções, para as quais precisa estar livre de uma carga parasitária patogênica. Objetivou-se analisar a eficácia da ivermectina sobre nematoides intestinais de asininos naturalmente infectados. Foi realizado teste de redução da contagem de ovos por gramas de fezes (RCOF). Animais com contagem de ovos por grama de fezes (OPG) de no mínimo 800, foram distribuídos em 2 grupos (n=10): G1, tratado com ivermectina a 1% (0,2mg/kg) e G2, controle negativo. Coletou-se fezes nos dias 0 (D0) e dia 14 (D14) pós-tratamento, para avaliação do OPG e coproculturas. Os resultados do OPG foram aplicados em uma fórmula e avaliados no programa estatístico SPSS versão 23.0. Os asininos apresentaram parasitismo para ovos do tipo Strongylida e *Strongyloides* sp. Através das coproculturas, identificaram-se larvas de *Cyathostomum* morfotipo A, *Strongyloides westeri*, *Posteriostrongylus* sp. e *Strongylus vulgaris*. Os valores médios do OPG do G1 no D0 e D14 foram menores ($p<0,05$) que os do G2 nos mesmos momentos. Apenas para o G1 no D14 houve redução total do potencial de larvas nas coproculturas. Os resultados desse estudo comprovam a eficácia de 100% da ivermectina sobre os nematoides intestinais de *E. asinus*. Portanto, seguindo-se medidas de manejo adequado, a ivermectina poderá ser um fármaco eficiente no tratamento de endoparasitoses desencadeadas pelos nematoides recuperados no presente estudo.

EFFECTIVENESS OF IVERMECTIN ON INTESTINAL NEMATODES OF ASININES**ABSTRACT**

Equus asinus Linnaeus, 1778 is characterized by having strength, rusticity and resistance. However, it is susceptible to parasitic infections. Its use in new functions is growing, for which it needs to be free of a pathogenic parasitic load. The objective was to analyze the efficacy of ivermectin on intestinal nematodes of naturally infected donkeys. A test was performed to reduce the egg count per gram of feces (RCOF). Animals with egg count per gram of feces (OPG) of at least 800, were divided into 2 groups (n=10): G1, treated with 1% ivermectin (0.2mg/kg) and G2, negative control. Feces were collected on days 0 (D0) and day 14 (D14) post-treatment, for the evaluation of OPG and co-cultures. The OPG results were applied to the formula and evaluated in the statistical software SPSS version 23.0. Donkeys showed parasitism for Strongylida and *Strongyloides* sp. Through co-cultures, larvae of *Cyathostomum* morphotype A, *Strongyloides westeri*, *Posteriostrongylus* sp. and *Strongylus vulgaris*. The mean values of the OPG of G1 in D0 and D14 were lower ($p<0.05$) than those of G2 in the same moments. Only for G1 at D14 there was a total reduction in the

Keywords:

Donkey

Macrocyclic lactone

Nematodes

Earth

potential of larvae in co-cultures. The results of this study prove the efficacy of 100% of ivermectin on intestinal nematodes of *E. asinus*. Therefore, following appropriate management measures, ivermectin may be an efficient drug in the treatment of endoparasitosis triggered by the nematodes recovered in the present study.

1 INTRODUÇÃO

O Brasil possui um efetivo de 1 milhão de asininos, sendo a região Nordeste detentora de 90% do total desses animais (IBGE, 2012). *Equus asinus* Linnaeus, 1758 exibe um conjunto de peculiaridades tais como rusticidade, resistência e força que o adapta às intempéries garantindo sua utilidade, principalmente, em zonas semiáridas (YILMAZ *et al.*, 2012).

Historicamente, esse animal era empregado em serviços de transporte, montaria e tração. Contudo, têm sido usados para atividades de lazer, ecoturismo, asinoterapia e como modelo experimental (PIMENTEL *et al.*, 2014; YILMAZ *et al.*, 2012). Em países europeus, africanos e asiáticos, há o crescente interesse na produção dessa espécie devido às características nutricionais de sua carne e leite (GIANFALDONI *et al.*, 2020; MARTINI *et al.*, 2018).

Apesar de sua robustez, *E. asinus* é vulnerável às parasitoses, que levam este hospedeiro ter sua saúde e bem-estar acometidos por problemas como diarreia, cólica, perda de peso, letargia e, em alguns casos, pode ser levado ao óbito (BORJI *et al.*, 2014; OLINDA *et al.*, 2016). Os asininos apresentam uma fauna parasitária constituída por mais de 100 espécies diferentes de helmintos. Dentre estes, destaca-se pela prevalência e potencial patogênico, os grandes estrôngilos e pequenos estrôngilos (ciatostomíneos) (COSTA *et al.*, 2018).

Para sua utilização como modelo experimental, em atividades de entretenimento, ocupacionais e produtivas, bem como para evitar que seja reservatório disseminador de patógenos a outros organismos com os quais coabita, *E. asinus* precisa estar livre de uma carga parasitária considerada patogênica (COSTA *et al.*, 2018; FERREIRA *et al.*, 2014).

Infelizmente, na busca por um estado não parasitado, onde se objetiva realizar tratamento para sustentar a carga parasitária e a contagem de ovos por grama de fezes (OPG)

próximo de zero, cada vez mais se observa o uso indistinto e continuado dos anti-helmínticos, o que auxilia na seleção de parasitos resistentes (FELIPPELLI *et al.*, 2015; PEÑA-ESPINOZA, 2018).

Considerando a importância da espécie para a região Nordeste do Brasil e o seu crescente uso em novas funções, admitindo-se ainda que, na localidade geográfica mencionada, é comum os asininos compartilharem áreas onde vivem animais sensíveis aos parasitos dessa espécie, a exemplo de *Equus caballus*, e que podem levar estes hospedeiros à morte, objetivou-se avaliar a eficácia da ivermectina sobre nematoides intestinais de *E. asinus*.

2 METODOLOGIA

2.1 Localidade das amostragens e animais experimentais

A pesquisa ocorreu durante o período de março a abril de 2019, no município de Felipe Guerra, RN. Este município apresenta um clima Semi-Árido tropical de zona equatorial, com temperatura média anual de 27,5 °C e umidade relativa de 50%. Quanto à pluviosidade, a precipitação anual é de 700-800mm com chuvas ocorridas de fevereiro a maio, seguida por um longo período de seca (DINIZ e PEREIRA, 2015). Todos os procedimentos de manipulação dos animais seguiram as normas da Comissão de Ética no uso de animais em pesquisa da Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFRSA (Processo nº 23091.003873/2017-54, parecer nº 07/2017).

A propriedade na qual se realizou o estudo recebe asininos doados por proprietários ou apreendidos por órgãos competentes, sendo esses animais procedentes de várias localidades (RN, Paraíba e Ceará). O gado asinino adotado para presente pesquisa vivia em um rebanho de aproximadamente 100 animais que eram manejados de forma extensiva e recebia alimentação composta por pastagem nativa. Já a água era oriunda de poço semiartesiano fornecida em tinas. Para o manejo dos asininos, estes eram arrebanhados e direcionados a currais anexos às áreas de pastagem.

Para composição dos grupos experimentais, foram considerados asininos adultos, machos (quatro) e fêmeas (dezesseis), com contagem de ovos por grama de fezes (OPG) de no mínimo 800 (BARBOSA *et al.*, 2018). No dia 0 (D0), realizou-se contenção mecânica (uso de cabresto) dos animais e, em seguida, foi efetuada a coleta de amostra fecal diretamente da ampola retal.

2.2 Teste de redução da contagem de ovos/grama de fezes (RCOF)

Os animais tiveram seu peso corporal mensurado através de fita métrica (perímetro torácico na altura da cernelha) e foram divididos em dois grupos randomizados ($n=10$), marcados através de colares plásticos com cores diferentes estabelecidas para cada grupo: G1, tratados com ivermectina a 1% (0,2mg/kg) e G2, controle negativo. Decorridos 14 dias (D14), nova coleta foi realizada em ambos os grupos.

As amostras biológicas coletadas foram analisadas no Laboratório de Parasitologia Animal (LPA) da UFERSA. Estas foram processadas conforme o método estabelecido por Gordon; Whitlock (1939) e modificado por Chagas; Niciura e Molento (2011). A identificação dos ovos dos parasitos foi realizada após cultivo das fezes para ambos os grupos, no D0 e D14, segundo método de Roberts; O'sullivan (1950). De cada coprocultura foram identificadas 100 larvas, segundo Madeira de carvalho; Afonso-Roque; Fazendeiro (2008) e Santos *et al.* (2016). Utilizando-se dos resultados de Santos, Madeira de Carvalho; Molento (2018), buscou-se ainda identificar qual o morfotipo predominante nos ciatostomíneos recuperados.

Para avaliar a eficácia do fármaco, foi utilizado teste de redução na contagem de ovos por grama de fezes (RCOF). Foram feitas as médias aritméticas do número de ovos nas fezes a partir dos resultados obtidos no OPG do grupo tratado (OPGt) e grupo controle (OPGc). Posteriormente, realizou-se comparações segundo Coles *et al.* (1992).

Os resultados do RCOF foram avaliados pelo OPG e coprocultura no D0 e D14. Para determinar se a população de nematoides intestinais de asininos era resistente à ivermectina, seguiu-se as orientações da Associação Mundial para o Avanço da Parasitologia Veterinária (WAAVP), que preconiza para anti-helmíntico uma eficácia superior a 95% (COLES *et al.*, 1992).

2.3 Análise Estatística

Os dados foram expressos em valores de média, desvio padrão, intervalo de confiança 95%, bem como valores mínimos, máximos e porcentagem através do programa estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 23.0. Após análise dos pressupostos paramétricos, diferenças estatísticas entre grupos tratado e controle, dentro e entre momentos, foram realizadas através do teste de Mann-Whitney. Todos os testes foram realizados no nível de significância de 5% ($p<0,05$).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante o período experimental e nas técnicas empregadas foram recuperados, no OPG, ovos do tipo Strongylida (estrongilídeos) e *Strongyloides* sp., e nas coproculturas o mais prevalente foi o *Cyathostomum* morfotipo A, seguido por *Strongyloides westeri*, *Strongylus vulgaris* e *Posteriosomum* sp. (Fig. 01).

Figura 1 - Ovos e larvas em estágio de L3 de nematoides intestinais recuperados em asininos naturalmente infectados. (objetiva 20x): Ovo (a) Strongylida; (b) *Strongyloides* sp.; Larva L3: (c) *Strongyloides westeri*; (d) *Strongylus vulgaris*; (e) *Cyathostomum* morfotipo A (f) *Posteriosomum* sp

Fonte: Dados da pesquisa

Os helmintos encontrados na presente pesquisa, foram semelhantes aos descritos por Ferreira *et al.* (2014) e Costa; *et al.* (2018). Entretanto, em nenhum desses estudos foram detectadas larvas com estrutura morfológica de *Posteriosomum* sp.

No RCOF realizado, verificou-se 100% de eficácia da ivermectina a 1% sobre nematódeos do grupo tratado (G1). Esse resultado foi observado no D14, no qual não ocorreu a constatação de ovos no OPG. Para o grupo controle (G2), nos diferentes momentos de avaliação, não houve diferença estatística ($p>0,05$), demonstrando que a infecção se manteve inalterada (Tab. 01).

Tabela 1 - Valores de média±desvio padrão de contagem de ovos por grama de fezes (OPG) em asininos naturalmente infectados (n=10 animais por grupo). A, B. Médias seguidas de letras maiúsculas diferentes na linha significa diferença estatística (p<0,05-Mann-Whitney) entre grupos nos diversos momentos. DP (desvio padrão). IC95: Intervalo de confiança 95%.

OPG	Momentos (dias)				
	G1 (Tratado)			G2 (Controle)	
	D0	D14		D0	D14
Média±DP	1435±997 ^A	0±0 ^B		1936±1133 ^A	1477±1021 ^A
Máximo	3975	0		3700	2650
Mínimo	800	0		800	500
IC95 (%)	721,83-2148,16	0-0		1125,56-2746,44	746,67-2207,33
Redução (%)	-	100		-	-

Fonte: Dados da pesquisa

Nas coproculturas do décimo quarto dia (D14), foi observado para o G1, a redução do potencial de larvas em 100%. Para o G2, além das larvas já recuperadas no D0, recuperou-se *Posteriostomum* sp. (Tab. 02).

Tabela 2 - Distribuição (%) dos helmintos encontrados nas coproculturas realizadas no D0 e D14 nos asininos (n=10 animais por grupo)

Helmintos	G1 (Tratado) %			G2 (Controle) %	
	D0	D14		D0	D14
<i>Cyathostomum</i> Tipo A	23	0		44	64
<i>Strongyloides westeri</i>	54	0		34	23
<i>Strongylus vulgaris</i>	23	0		22	10
<i>Posteriostomum</i> sp.	0	0		0	3
Total	100	0		100	100

Fonte: Dados da pesquisa

Apesar da resistência ao grupo das lactonas macrocíclicas ser bem retratada para ovinos (BATISTA *et al.*, 2017) e caprinos (COELHO *et al.*, 2010; BORGES *et al.*, 2015); e uma preocupação crescente em bovinos (BAIAK *et al.*, 2019); suínos (MACRELLI *et al.*, 2019) e equinos (CANEVER *et al.*, 2013; FELIPPELLI *et al.*, 2015) nos dados analisados na

presente pesquisa, observou-se que a ivermectina ainda se apresenta eficaz no controle de nematoides intestinais de *E. asinus*.

Os animais utilizados no presente trabalho, provenientes dos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará, poderiam a vir apresentar nematoides em seleção para a resistência anti-helmíntica em virtude da diversidade genética das populações, sendo esse um dos processos significativos para desencadear a resistência, contudo, esse não foi o resultado observado (PEÑA-ESPINOZA, 2018).

A eficácia obtida, mesmo em uma população tão heterogênea, pode ser justificada pelo fato de os criadores dessa região acreditarem que os asininos são animais muito resistentes, não requerendo cuidados, e, portanto, deixando de se realizar o tratamento antiparasitário desses animais (YILMAZ *et al.*, 2012; PESSOA *et al.*, 2014). Esse fato foi constatado por Costa; Vilela e Feitosa (2018), em seu estudo com equídeos de tração do estado da Paraíba, Nordeste, Brasil no qual detectaram que em torno de 70% dos animais, dos quais 51% eram asininos, nunca haviam recebido antiparasitário e os outros 30% haviam recebido apenas uma vez, embora todos os animais já fossem adultos.

Segundo questionário aplicado por Costa *et al.* (2018), no mesmo estudo, 63,5% dos proprietários responderam que seus animais compartilhavam o ambiente com outros equídeos. Considerando-se essa realidade, se houver um manejo adequado e não havendo fatores que levem ao aparecimento da resistência, a população parasitária na espécie estudada pode contribuir para sustentar o depósito de refúgio no meio ambiente, especialmente para equídeos, como próprio asinino ou mesmo o equino, espécie para a qual já é descrita algum grau de resistência à ivermectina (FELIPPELLI *et al.*, 2015).

Sugere-se ainda que esse potencial de redução esteja ligado ao intenso processo de mecanização, em que cada vez mais asininos voltados às funções de carga, montaria ou tração tem sua mão de obra substituída por máquinas (SALLES *et al.*, 2013). Abandonados, passam a subsistir nas estradas como animais errantes, não adquirindo o manejo sanitário adequado (MADEIRA DE CARVALHO *et al.*, 2007).

Estudos como esse que visam monitorar o perfil de resistência parasitária em espécies domésticas são cotidianamente necessários, uma vez que o diagnóstico atualizado da eficácia de anti-helmínticos é fundamental para projetar um programa de controle parasitário eficaz. Assim como demonstrado no presente estudo, o proprietário pode contar com ação efetiva da ivermectina, que é um medicamento eficaz, relativamente barato e acessível.

4 CONCLUSÕES

Os resultados desse estudo comprovam que a ivermectina 1% apresentou 100% de eficácia sobre nematoides intestinais de asininos naturalmente infectados. Portanto, seguindo-se medidas de manejo adequado, a ivermectina 1% poderá ser elencada como um fármaco eficiente no tratamento de endoparasitos desta espécie.

REFERÊNCIAS

BAIAK, B.H.B.; LEHNEN, C.B.; ROCHA, R.A. Anthelmintic resistance of injectable macrocyclic lactones in cattle: A systematic review and meta-analysis. **Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária**, v.28, n.1, p.59-67, 2019.

BARBOSA, F.C.; OLIVEIRA, W.J.; COSTA, P.C.; MUNDIM, A.V. Eficácia anti-helmíntica da ivermectina em equinos: exames coproparasitológicos e hematológicos. **Ciência Animal Brasileira**, v.19, p.1-12, 2018.

BATISTA, L.F.; RAMOS, L.F.; BRITO, S.N.S.; CASTRO, A.L.C.; ANTUNES, C.R.; OLIVEIRA, L.L.S. Resistência anti-helmíntica em nematoides gastrintestinais de ovinos. **Pubvet**, v.11, n.12, p.1245-1249, 2017.

BORGES, S.L.; OLIVEIRA, A.A.; MENDONÇA, L.R.; LAMBERT, S.M.; VIANA, J.M.; NISHI, S.M.; JULIÃO, F.S.; ALMEIDA, M.A. O. Resistência anti-helmíntica em rebanhos caprinos nos biomas Caatinga e Mata Atlântica. **Pesquisa Veterinária Brasileira**, v.35, n.7, p.643-648, 2015.

BORJI, H.; MOOSAVI, Z.; AHMADI, F. Cranial Mesenteric Arterial Obstruction Due To *Strongylus vulgaris* Larvae in a Donkey (*Equus asinus*). **Iranian Journal of Parasitology**, v.9, n.3, p.441-444, 2014.

CANEVER, R.J.; BRAGA, P.R.; BOECKH, A.; GRYJACUCK, M.; BIER, D.; MOLENTO, M.B. Lack of *Cyathostomun* sp. reduction after anthelmintic treatment in horses in Brazil. **Veterinary Parasitology**, v.194, n.1, p.35-39, 2013.

CHAGAS, A.C.S.; NICIURA, S.C.M.; MOLENTO, M.B. **Manual Prático: metodologias de diagnóstico da resistência e de detecção de substâncias ativas em parasitas ruminantes**. 1ª ed., Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, 2011. 153p.

COELHO, W.A.C.; AHID, S.M.M.; VIEIRA, L.S.; FONSECA, Z.A.A.S.; DA SILVA, I.P. Resistência anti-helmíntica em caprinos no município de Mossoró, RN. **Ciência Animal Brasileira**, v.11, n.3, p.589-598, 2010.

COLES, G.C.; BAUER, C.; BORGSTEEDE, F.H.M.; GEERTS, S.; CLEI, T.R.; TAYLOR, M.A.; WALLER, P.J. World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology (WAAVP) methods for the detection of anthelmintic resistance in nematodes of veterinary importance. **Veterinary Parasitology**, v.44, n.1-2, p.35-44, 1992.

COSTA, P.W.L.; VILELA, V.L.R.; FEITOSA, T.F. Parasitic profile of traction equids in the semi-arid climate of Paraíba State, Northeastern, Brazil. **Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária**, v.27, n.2, p.218-222, 2018.

DINIZ, M.T.M.; PEREIRA, V.H.C. Climatologia do Estado do Rio Grande do Norte, Brasil: sistemas atmosféricos atuantes e mapeamento de tipos de clima. **Boletim Goiano de Geografia**, v.35, n.3, p.488-506, 2015.

FELIPPELLI, G.; CRUZ, B.C.; GOMES, L.V.C.; LOPES, W.D.Z.; TEIXEIRA, W.F.P.; MACIEL, W.G.; BUZZULINI, C.; BICHUETTE, M.A.; CAMPOS, G.P.; SOARES, V.E.; BERGAMASCO, P.L.F.; OLIVEIRA, G.P.; COSTA, A.J. Susceptibility of helminth species from horses against different chemical compounds in Brazil. **Veterinary Parasitology**, v.212, n.3-4, p.232-238, 2015.

FERREIRA, G.M.S.; DUTRA, F.A.F.; AMORIM FILHO, E.F.; SANTOS, A.C.G. Parasitismo gastrointestinal e hematologia em equinos e asininos da mesorregião da aglomeração urbana, São Luiz, Maranhão. **Archives of Veterinary Science**, v.19, n.2, p.22-30, 2014.

GIANFALDONI, C.; BARLOZZARI, G.; MANCINI, S.; DI DOMENICO, E.; MAESTRINI, M.; PERRUCCI, S. Parasitological investigation in an organic dairy donkey farm. **Large Animal Review**, v.1, n.26, p.25-30, 2020.

GORDON, H.M.; WHITLOCK, H.V. A new technique for counting nematode eggs in sheep faeces. **Journal of the Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization**, v.12, n.1, p.50-52, 1939.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Produção da Pecuária Municipal (PPM)**. v.39, Rio de Janeiro, RJ. 2012. 63p.

MACRELLI, M.; WILLIAMSON, S.; MITCHELL, S.; PEARSON, R.; ANDREWS, L.; MORRISON, A.A.; NEVEL, M.; SMITH, R.; BARTLEY, D.J. First detection of ivermectin resistance in *Oesophagostomum dentatum* in pigs. **Veterinary Parasitology**, v.270, p.1-6, 2019.

MADEIRA DE CARVALHO, L.D.; GOMES, L.; CERNEA, M.; CERNEA, C.; SANTOS, C.A.; BERNARDES, M.; ROSARIO, M.A.; SOARES, M.J.; FAZENDEIRO, I. Parasitismo gastrointestinal e seu controlo em asininos e híbridos estabulados. **Revista Portuguesa de Ciências Veterinárias**, Lisboa, v.102, n.563-564, p.225-231, 2007.

MADEIRA DE CARVALHO, L.M.; AFONSO-ROQUE, M.M.; FAZENDEIRO, M.P. Estudo morfológico das larvas infectantes (L3) dos estrongilídeos (Nematoda: Strongylidae) dos equídeos. 3. Conclusões, perspectivas futuras e proposta de chave de identificação de alguns nemátodes gastrointestinais mais comuns dos equídeos em Portugal. **Acta Parasitológica Portuguesa**, v.15, p.57-63, 2008.

MARTINI, M.; ALTOMONTE, I.; LICITRA, R.; SALAFARI, F. Nutritional and Nutraceutical Quality of Donkey Milk. **Journal of Equine Veterinary Science**, v.65, p.33-37, 2018.

OLINDA, R.G.; FERREIRA, J.S.; FIRMINO, M.O.; ALVES, R.C.; DANTAS, A.F.M.; RIET-CORREA, F. Tiflocolite por larvas de ciatostomíneos em um asinino. **Acta Scientiae Veterinariae**, v.44, n.133, p.1-4, 2016.

PEÑA-ESPINOZA, M. Drug resistance in parasitic helminths of veterinary importance in Chile: status review and research needs. **Austral Journal of Veterinary Sciences**, v.50, n.2, p.65-76, 2018.

PESSOA, A.F.A.; PESSOA, C.R.D.M.; MIRANDA NETO, E.G.D.; RIET-CORREA, F. Doenças de asininos e muarees no Semi-Árido brasileiro. **Pesquisa Veterinária Brasileira**, v.34, n.12, p.1231-1235, 2014.

PIMENTEL, M.M.L.; PINHEIRO, M.; MAIA FILHO, H.; SAKAMOTO, S.M.; NOBRE, F.V.; DIAS, R.V.C. Parâmetros biométricos de asininos (*Equus asinus*) utilizados em provas de corrida no estado do Rio Grande do Norte. **Acta Veterinária Brasília**, v.8, n.2, p.136-143, 2014.

ROBERTS, F.H.S.; O'SULLIVAN, P.J. Methodos of egg counts and larval cultures for strongyles infesting the gastrointestinal tract of cattle. **Australian Agriculture Research**, v.1, n.1, p.99-102, 1950.

SALLES, P.A.; SOUZA, L.O.; GOMES, L.P.B.; BARBOSA, V.V.; MEDEIROS, G.R.; SOUSA, C.M.; WELLER, M. Análise populacional dos equídeos no Semi-Árido Paraibano. **Journal of Biotechnology and Biodiversity**, v.4, n.3, p.269-275, 2013.

SANTOS, D.W.; CASTRO, L.L.D.; GIESE, E.G.; MOLENTO, M.B. Morphometric Study of Infective Larvae of Cyathostomins of Horses and Their Distribution. **Journal of Equine Veterinary Science**, v.44, p.49-53, 2016.

SANTOS, D.W.; MADEIRA DE CARVALHO, L.M.; MOLENTO, M.B. Identification of third stage larval types of cyathostomins of equids: An improved perspective. **Veterinary Parasitology**, v.260, p.49-52, 2018.

YILMAZ, O.; ERTUĞRUL, M.; BOZTEPE, S. The Domesticated Donkey: III – Economic Importance, Uncommon Usages, Reproduction Traits, Genetics, Nutrition and Health Care. **Canadian Journal of Applied Sciences**, v.3, n.2, p.320-338, 2012.

HIDRONEFROSE SECUNDÁRIA À LIGADURA DE URETER APÓS OVARIOSSALPINGO-HISTERECTOMIA (OSH) EM CANINO – RELATO DE CASO

Aline Martins Venuto

Centro Universitário UNINTA, Sobral, CE
ORCID: <http://lattes.cnpq.br/914514783261693>
Lattes: <https://orcid.org/0000-0003-2333-3281>

Andressa Nunes Mouta

Centro Universitário UNINTA, Sobral, CE
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3261431960445349>

Geysa Almeida Viana

Centro Universitário UNINTA, Sobral, CE
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0268820596623948>

José Gerardo Vasconcelos Morais

Centro Universitário UNINTA, Sobral, CE
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0731328089993345>

Ramuelly Olinda Cavalcante

Centro Universitário UNINTA, Sobral, CE
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2638642411622481>

Robson dos Anjos Honorato

Centro Universitário UNINTA, Sobral, CE
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4294636372407625>

Maria Janeila Carvalho Soares

Centro Universitário UNINTA, Sobral, CE
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2256499113630210>

Informações sobre o

artigo:

Recebido em:

24/06/2021

Aceito em:

29/06/2021

Data de publicação:

04/08/2021

Palavras-chave:

Nefrectomia

Rim

Erros médicos

RESUMO

A hidronefrose se refere à dilatação da pelve e dos cálices renais decorrentes da obstrução do fluxo urinário, ocasionando o acúmulo de urina associada à progressiva atrofia do parênquima renal. Entre suas principais causas se destacam as ações iatrogênicas, como a ligadura errônea de ureter durante a realização de procedimentos cirúrgicos. Desta forma, objetivou-se relatar um caso de hidronefrose secundária à ligadura iatrogênica de ureter após ovariossalpingo-histerectomia (OSH) em um canino. O animal da espécie canina, fêmea, sem raça definida, 13 anos de idade, castrada aos 5 anos, apresentava apenas secreção sanguinolenta vulvar recorrente. No exame clínico não foram constatadas alterações, assim como nos exames laboratoriais (hemograma e bioquímicos). Na ultrassonografia abdominal observou-se uma estrutura de aproximadamente 10,79 cm de diâmetro que se distribuía por grande parte da cavidade abdominal sem arquitetura interna definida. Entretanto, notou-se que o ureter

esquerdo se encontrava dilatado com conteúdo anecoico em seu interior. O animal foi submetido a uma laparotomia exploratória para diagnóstico definitivo, na qual observou-se que a estrutura se tratava do rim esquerdo em processo de hidronefrose causada por uma ligadura do ureter que ocorreu após ovário salpingo histerectomia eletiva. Desta forma, o mesmo foi submetido a uma nefrectomia unilateral do rim esquerdo. O ato configura-se como erro médico veterinário, sendo definido como um caso de imperícia, ocorrendo por deficiência de conhecimentos técnicos profissionais, ocasionando riscos à saúde do paciente. Logo, é de suma importância a identificação e investigação de tais atos para que haja o desenvolvimento de intervenções que minimizem os erros médicos.

HYDRONEPHROSIS SECONDARY TO URETER LIGATURE AFTER OVARIOS SALPINGO-HYSTERECTOMY (OSH) IN CANINE - CASE REPORT

ABSTRACT

Hydronephrosis refers to the dilation of the pelvis and renal calyces resulting from urinary flow obstruction, causing the accumulation of urine associated with progressive atrophy of the renal parenchyma. Among its main causes, iatrogenic actions stand out, such as the erroneous ligation of the ureter during surgical procedures. Thus, the objective was to report a case of hydronephrosis secondary to iatrogenic ureter ligation after ovariosalpingohysterectomy (OSH) in a canine. The canine animal, female, mixed breed, 13 years old, castrated at 5 years old, presented only recurrent bloody vulvar secretion. In the clinical examination, no alterations were found, as well as in the laboratory tests (blood count and biochemicals). Abdominal ultrasonography showed a structure of approximately 10.79 cm in diameter that was distributed over a large part of the abdominal cavity without a defined internal architecture. However, it was noted that the left ureter was dilated with anechoic content inside. The animal was submitted to an exploratory laparotomy for definitive diagnosis, in which it was observed that the structure was the left kidney undergoing a hydronephrosis process caused by a ligature of the ureter that occurred after an elective hysterectomy salpingo ovary. Thus, he underwent a unilateral left kidney nephrectomy. The act is configured as a veterinary medical error, being defined as a case of malpractice, occurring due to a lack of professional technical knowledge, causing risks to the patient's health. Therefore, it is extremely important to identify and investigate such acts so that interventions can be developed to minimize medical errors.

Keywords:

Nephrectomy

Kidney

Medical errors

1 INTRODUÇÃO

Os rins desempenham um papel fundamental na manutenção da vida, uma vez que são responsáveis por um conjunto de funções que garantem a homeostase do organismo. Entre elas estão a manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico e ácido-base, excreção de substâncias nocivas e regulação hormonal (DUKES; REECE, 2017).

Dentre as afecções que acometem os rins, destaca-se a hidronefrose que se refere à dilatação da pelve e dos cálices renais decorrentes da obstrução do fluxo urinário, ocasionando o acúmulo de urina associada à progressiva atrofia do parênquima renal, fazendo com que o rim adquira um formato mais arredondado (ZACHARY; MCGAVIN, 2013). Alterações congênitas, inflamação crônica, urólitos, neoplasias e ações iatrogênicas que podem afetar diretamente a dinâmica do fluxo urinário, resultando em obstrução parcial ou total de segmentos do trato urinário, principalmente ureteres, podem ser causas de hidronefrose (ZACHARY; MCGAVIN, 2013). Dentre as ações iatrogênicas, destacam-se os procedimentos cirúrgicos realizados erroneamente (KANG et al., 2007).

Neste contexto, a ovariossalpingo-histerectomia (OSH) é considerada um dos procedimentos mais realizados pela clínica cirúrgica de pequenos animais para o controle de natalidade de animais errantes, prevenção de cio e neoplasias, assim como, tratar afecções do trato reprodutivo feminino (NUNES et al., 2019). Entretanto, apesar de ser considerada um procedimento simples, algumas complicações podem ocorrer, como a ligadura accidental do ureter no momento da exposição e ligadura dos pedículos ovarianos ou corpo uterino, ocasionando obstrução do fluxo urinário (SHIPOV; SEGEV, 2013).

No âmbito da medicina veterinária legal, tal evento configura-se como erro médico, entrando em desacordo com o código de ética do médico veterinário (BRASIL, 2016).

Nesta perspectiva, é importante destacar a importância da conduta ética do médico veterinário assim como, esclarecer as implicações de erros médicos na rotina profissional e os riscos inerentes a tais atos para os pacientes envolvidos, para que assim estes erros sejam evitados. Desta forma, objetivou-se relatar um caso de hidronefrose secundária à ligadura iatrogênica de ureter após ovariossalpingo-histerectomia em canino.

2 RELATO DE CASO

Um Cão sem raça definida (SRD), fêmea, castrada, 13 anos de idade, pesando 18,25kg, foi atendido no Hospital Veterinário de Pequenos animais – HOVET PA do centro universitário INTA – UNINTA, na cidade de Sobral-CE. A tutora relatou como queixa principal que o animal apresentava secreção sanguinolenta vaginal.

Durante a anamnese constatou-se que o animal havia sido castrada há 8 anos atrás e sempre apresentava secreção vaginal serosa de coloração transparente que evoluiu, ao longo dos anos, para uma secreção sanguinolenta de maior frequência. Observou-se que o animal apresentava-se alerta e com escore corporal normal, normohidratado e com tempo de preenchimento capilar em torno de 2 segundos. As mucosas estavam normocoradas e os linfonodos submandibulares reativos, além de pulso normocinético e normofonese. A temperatura retal era de 38,9°C, frequência cardíaca de 140 bpm e frequência respiratória de 48 mpm.

Foram solicitados hemograma completo e análises bioquímicas de função renal (uréia e creatinina) e função hepática (ALT e FA), além de ultrassonografia abdominal. No hemograma foi constatado apenas uma leve neutrofilia, enquanto os parâmetros de função renal avaliados estavam dentro da normalidade (Creatinina: 1,1mg/dL e Uréia: 14mg/dL). Todavia, observou-se elevadas taxas de ALT e FA, sugerindo possíveis alterações hepáticas e colestase.

Na ultrassonografia constatou-se que o rim direito possuía dimensões preservadas, contorno regular e relação corticomedular preservada, entretanto apresentava região da pelve com moderado aumento da ecogenicidade e presença de microcalcificações formadoras de sombra acústica. Além de diminuição da ecogenicidade cortical de área circunscrita em polo cranial. O rim esquerdo não foi localizado em topografia habitual, dentro das características sonográficas esperadas durante a avaliação. No entanto, notou-se a presença de uma estrutura tubular contornada em topografia dorsal à vesícula urinária com conteúdo anecoico e celularidade, sugerindo ser o ureter. Além disso, uma estrutura de aproximadamente 10,79 cm de diâmetro se distribuía por grande parte da cavidade abdominal sem arquitetura interna.

Os demais órgãos não apresentaram alterações dignas de nota. No eletrocardiograma, notou-se onda P de duração aumentada e onda T de amplitude aumentada. Além de eixo elétrico médio desviado a direita do plano frontal.

A partir das informações obtidas na anamnese, exame físico e exames complementares, alguns diagnósticos presuntivos foram determinados: piometra de coto uterino e hidronefrose, uma vez que não foi possível identificar a origem da estrutura observada durante a ultrassonografia. Desta forma, uma laparotomia exploratória foi realizada para o diagnóstico definitivo. O primeiro órgão visualizado foi a estrutura não identificada no exame de imagem e após o vasculhamento minucioso da cavidade, concluiu-se que se tratava do rim esquerdo em processo de hidronefrose secundária a uma ligadura de ureter (Figuras 1, 2 e 3).

Figura 1 – A: Estrutura não identificada durante ultrassonografia visualizada durante procedimento cirúrgico de laparotomia exploratória, concluindo-se que se tratava do rim esquerdo (seta) B: Presença de uma ligadura em ureter esquerdo (seta)

Fonte: Autoria própria

Figura 2 – A Rim esquerdo hidronefrótico após sua remoção. B: Líquido interno de aspecto serosanguinolento

Fonte: Autoria própria

Figura 3 - A: Visualização do parênquima renal após ruptura da cápsula renal. B: Nota-se rim esquerdo completamente atrofiado (seta)

Fonte: Autoria própria

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com Alves (2019), a ligadura iatrogênica do ureter durante procedimentos cirúrgicos é uma das principais causas de hidronefrose em pequenos animais. Júlio et al., (2016) descreveu a mesma complicação pós cirúrgica, na ocasião de uma ovariossalpingo-histerectomia, resultando em hidronefrose iatrogênica em uma cadela, corroborando que a hidronefrose unilateral pode afetar diretamente qualquer raça, em qualquer idade.

No caso descrito, o animal apresentou-se assintomático por muitos anos até desenvolver seus primeiros sinais clínicos, caracterizados apenas por uma secreção sanguinolenta em região vulvar. Um sinal inespecífico que gerou dúvidas em relação a sua real origem durante a anamnese e exame físico, podendo ser oriundo do trato urinário (hematúria) e/ou reprodutor (secreção vaginal ou uterina). Na hidronefrose, o animal pode apresentar-se assintomático por um longo período, principalmente, quando unilateral e o rim contralateral saudável, for capaz de compensar essa disfunção, através da hipertrofia de seus néfrons. Enquanto na hidronefrose bilateral, comumente os sinais clínicos se desenvolvem de forma aguda (GUIMARÃES, 2018).

Na avaliação dos exames complementares observou-se apenas uma leve neutrofilia no hemograma solicitado, podendo sugerir o início de uma infecção, uma vez que estas células são consideradas a primeira linha de defesa e de reconhecimento de agentes

infecciosos (SILVA, 2015). Devido a processos obstrutivos no trato urinário, a estase da urina pode resultar em condições propícias para proliferação bacteriana.

Nas análises de função renal constatou-se que os compostos nitrogenados (uréia e creatinina) dosados se encontravam dentro dos parâmetros normais de referência, conforme descrito por Nascimento et al., (2012). Em indivíduos acometidos de forma unilateral, tais alterações podem não ser perceptíveis, uma vez que só há o aumento das concentrações de tais compostos, quando há o comprometimento de pelo menos 75% dos néfrons, considerando os dois rins (BORIN-CRIVELLENTI, 2015).

Entretanto, na ultrassonografia foi possível observar que o rim esquerdo encontrava-se com suas dimensões aumentadas, tomando grande parte da cavidade abdominal e sem arquitetura interna preservada, sendo preenchido por conteúdo de elevada celularidade. Ademais tais alterações, foi observada uma estrutura tubular dorsal à vesícula urinária com conteúdo anecoico e elevada celularidade, sugerindo a presença de hidroureter. Canuto et al., (2018), observou um rim hidronefrótico na espécie canina com a presença de uma fina capsula renal, linhas hiperecogênicas se estendendo até o centro renal e grande quantidade de líquido em seu interior, semelhante as alterações observadas no caso em questão.

Na laparotomia exploratória para diagnóstico definitivo, observou-se o rim esquerdo em processo de hidronefrose secundária a uma ligadura de ureter. Desta forma, considerando o rim contralateral funcional, o rim hidronefrótico foi submetido a uma nefrectomia unilateral, como descrito por Souza et al., (2015), nos casos de hidronefrose avançada, quando o rim se apresenta dilatado e repleto de líquidos, desafiando o reparo cirúrgico, a nefrectomia é indicada.

A nefrectomia é indicada em casos de neoplasias renais, hemorragias incontroláveis, perda de urina persistente, pielonefrite resistente a terapia medicamentosa, anormalidades ureterais e hidronefrose (FOSSUM, 2014). Desta forma, a nefrectomia raramente é realizada quando a arquitetura e suprimento vascular do rim estão normais (BOJHAB, 2014).

A ligadura de ureter configura-se como um ato de imperícia do médico veterinário envolvido, como descrito por Marques et al., (2014). Segundo Silva (2016), a imperícia consiste na ignorância, incompetência, desconhecimento, inexperiência e inabilidade na profissão, ocorrendo por deficiência de conhecimentos técnicos profissionais, ocasionando riscos à saúde do paciente. Qualquer ato errôneo tem potencial para aumentar a morbidade e mortalidade dos animais envolvidos. Investigar todos os incidentes ocorridos, quer eles

resultem ou não em danos ao paciente, é de suma importância para que, assim, haja o desenvolvimento de intervenções que minimizem os erros médicos (PHAM et al., 2012).

4 CONCLUSÕES

Os erros médicos implicam em graves consequências para o paciente envolvido, sendo importante a identificação e investigação de tais atos através de estudos retrospectivos de casos, como o caso descrito sobre hidronefrose secundária à ligadura iatrogênica de ureter após ovariosalpingo-histerectomia (OSH) em um canino, para que haja o desenvolvimento de intervenções que minimizem os mesmos.

É importante destacar que fatores importantes e cruciais devem ser levados em consideração durante a realização procedimentos cirúrgicos, como o conhecimento anatômico das estruturas envolvidas e da técnica cirúrgica, a fim de evitar graves complicações pós-cirúrgicas, como o caso de hidronefrose iatrogênica, que pode ocorrer após um procedimento eletivo como a ovariosalpingo-histerectomia em pequenos animais.

REFERÊNCIAS

- ALVES, Tamila Belchor de Araújo; FILHO, Saulo Humberto de Ávila. **Hidronefrose iatrogênica após ovariosalpingohisterectomia em felino**. Goiás: IFG, 2019. Cap. 2. p.16-23.
- BOJHAB, Joseph. **Current Techniques in Small Animal Surgery**. 5. ed. Teton New Media, 2014. 1183 p.
- BORIN-CRIVELLENTI, Sofia; CRIVELLENTI, Leandro Zuccolotto. **Casos de Rotina em Medicina Veterinária de Pequenos Animais**. 2 ed. São Paulo: MedVet, 2015. 880 p.
- BRASIL. Conselho Federal de Medicina Veterinária. **Código de Ética do Médico Veterinário**. Resolução nº 1.138 de 16 de dezembro de 2016. Brasília, DF, Presidência do Conselho Federal de Medicina Veterinária do Brasil, 2016.
- CANUTO, Jucélio Correia; MAGALHÃES, Francisco Felipe; PINHEIRO, Aglailson Silva; BARBOSA, Roméria Rodrigues; SILVA, Márcio César Vasconcelos. **Aspectos ultrassonográficos de hidronefrose e hidroureter em cadela**. Ciência animal, v. 28, n.2, p. 25-27. 2018.
- DUKES, Henry Hugh; REECE, William. **Fisiologia dos animais domésticos**. 13. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 740 p.

FOSSUM, Theresa Welch. **Cirurgia de pequenos animais**. 4.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 1640 p.

GUIMARÃES, Jady Larissa. **Hidronefrose por obstrução ureteral em felino doméstico (Felis catus): Relato de caso**. Paraná: Centro universitário campo real, 2018. Cap. 3. p. 24-44.

JÚLIO, Anna Carolina Foltran; IZOTTON, Daniele; STAROY, Dhandara Aparecida; WEBER, Ana Paula; MELO, Kelly Christine Pawlik; FRANÇA, Jessea de Fátima. **Hidronefrose latrogênica em paciente canino com agenesia renal unilateral: relato de caso**. Revista Eletrônica de Biociência, Biotecnologia e Saúde, v. 6, n. 15, p. 164-166. Ago. 2016.

KANG, Byeong-Teck; PARK, Chul; JUNG, Dong-In; YOO, Jong-Hyun; KIM, Ju-Won; GU, Su-Hyun; JEON, Hyo-Won; KIM, Jung-Hyun; WOO, Eung-Je; PARK, Hee-Myung. **Iatrogenic hydroureter and hydronephrosis following hysterotomy with ovariohysterectomy in a pregnant dog**. Korean Journal Vet. v.47, n. 2, p. 213-217. Mai. 2007.

MARQUES, Lucas Monteiro; CARLOS, Renata Santiago Alberto; SILVA, Elisângela Barboza; CLARK, Rosana Maria De Oliveira; SAMPAIO, Katia Moema Oliveira Rosa; HARVEY, Tatiani Vitor. **Imperícia e negligência em ovariosalpingo-histerectomia de uma cadela - Relato de caso**. Revista Brasileira de Medicina Veterinária, v. 36, n. 4, p. 425-429. Dez. 2014.

NASCIMENTO, Hugo Barbosa; FILHO, Robério Silveira de Siqueira; ALMEIDA, Edvaldo Lopes. **Complicações em ovariosalpingo-histerectomia em cadela**. Ciência veterinária dos trópicos, v.15, n.1, p. 65-71. Dez. 2012.

NUNES, Vânia Fátima Plaza. **Guia Prático -Políticas de manejo ético populacional de cães e gatos em Minas Gerais**. 1. ed. Belo Horizonte: Superintendência de comunicação integrada do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (SCI-MPMG), 2019. 269 p.

PHAM, Julius Cuong; ASWANI, Monica; ROSEN, Michael; LEE, HeeWon; HUDDLE, Matthew; WEEKS, Kristina; PRONOVOST, Peter. **Reducing medical errors and adverse events**. Annual Reviews Medical, v.63, p. 447-463. Nov. 2012.

SILVA, Ítala Cristine. **Neutrófilos: aspectos clássicos, plasticidade e novas funções imunorregulatórias**. Revista Interdisciplinar de Estudos Experimentais, v. 7, n. único, p. 35-46. Mai. 2015.

SILVA, Placido; **Vocabulário jurídico**. 23 ed. Forense: Rio de Janeiro, 2016. 1518 p.

SHIPOV, Anna; SEGEV, Gilad. **Ureteral Obstruction in Dogs and Cats**. Israel Journal of Veterinary Medicine. v. 68, n. 2. Jun. 2013.

SOUZA, Renata; ZAGGO, Estela; MONTEIRO, Rodrigo. **Hidronefrose por obstrução de ureter em gato: Relato de caso**. Revista Científica Eletrônica, n. 25. Jul. 2015.

ZACHARY, James; MCGAVIN, Donald. **Bases da patologia em veterinária**. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 1344 p.

INCIDÊNCIA DE OVOS E LARVAS DE ANCILOSTOMATÍDEO EM ÁREA DE ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE

Maria Verônyca Coelho Melo

Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, CE
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3825083818114123>

Genehom Nunes de Farias Neto

Centro Universitário Christus - Unichristus, Fortaleza, CE
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1711059155450747>

Karina Gatti de Abreu

Centro Universitário Christus - Unichristus, Fortaleza, CE
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1325633317521567>

José Adriano Soares Lopes

Centro Universitário Christus - Unichristus, Fortaleza, CE
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0416653596470015>

Thaís Alves de Sousa

Centro Universitário Christus - Unichristus, Fortaleza, CE
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8586323462805190>

Isaac Neto Goes da Silva

Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, CE
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1191488997675957>

Informações sobre o

artigo:

Recebido em:

02/07/2021

Aceito em:

06/07/2021

Data de publicação:

04/08/2021

Palavras-chave:

Ancylostoma

Helminto

Larvas

RESUMO

Solo de praças públicas tem sido apontado como indicador de contaminação humana, devido ao grande contingente de cães e gatos errantes que circulam livremente. O objetivo da pesquisa foi verificar a contaminação por ovos e larvas de *Ancylostoma sp.*, em amostras de solo coletadas em uma área de alimentação, na Cidade de Fortaleza-CE, Brasil. Levando em consideração a influência sazonal do Estado do Ceará. Foram coletadas 480 amostras de solo. As amostras foram retiradas, no período seco (agosto a dezembro de 2018), e chuvoso (janeiro a julho de 2019). Uma área de 320m² de onde foram colhidas as amostras, situadas em torno da área de alimentação e circulação de uma instituição pública da cidade de Fortaleza-CE, a qual foi dividida em quatro quadrantes de 80X80, e de cada quadrante foram colhidas 30 amostras de solo. Portanto, foram retiradas 240 amostras de solo no período seco, e 240 amostras no chuvoso, perfazendo um total de 480 amostras. Para a retirada do solo, utilizou-se um retângulo de alumínio de dez centímetros de largura, por três centímetros de altura, a um raio de cinco metros de distância de qualquer contaminação fecal. As coletas foram realizadas às 9:00 horas da manhã, com o auxílio de luva, colher-de-jardineiro e recipientes plásticos devidamente etiquetados. O retângulo de alumínio foi fixado no solo,

aproximadamente, três centímetros de profundidade em relação à superfície. Foram removidas do solo cerca de 300g de solo, os quais foram acondicionados nos recipientes plásticos e conservados sob refrigeração a 4°C. As amostras foram processadas pelos métodos de Willia e Baermann Morais. O helminto investigado neste trabalho foi o *ancylostoma sp*, sendo a positividade para ovos de 53% (258/480) e para larvas de 51% (244/480). Das 480 amostras, 53% apresentaram positividade para ovos e 51% para larvas de *Ancylostoma sp*. Os maiores resultados concentram-se no período chuvoso, 517 larvas encontradas. Conclui-se que os resultados demonstraram que cães e gatos desempenham um importante papel como fonte de contaminação ambiental, disseminadores e veiculadores de parasitos com potencial zoonótico, necessitando maior atenção da população, visando à diminuição do risco de infecções para o homem e para os próprios animais.

INCIDENCE OF HOOKWORM EGGS AND LARVAE IN A FEEDING AREA IN FORTALEZA-CE

ABSTRACT

The soil of public squares has been indicated as an indicator of human contamination due to the large contingent of stray dogs and cats that circulate freely. The objective of this research was to verify the contamination by eggs and larvae of *Ancylostoma sp* in soil samples collected in a feeding area in the city of Fortaleza-CE, Brazil, taking into consideration the seasonal influence of the State of Ceará. A total of 480 soil samples were collected. The samples were taken, in the dry period (August to December 2018) and rainy period (January to July 2019). The 320m² area from which the samples were collected are located around the food and circulation area of a public institution in the city of Fortaleza-CE, which was divided into four quadrants of 80X80, and from each quadrant 30 soil samples were collected. Therefore, 240 soil samples were taken in the dry period and 240 samples in the rainy period, totaling 480 samples. An aluminum rectangle, ten centimeters wide by three centimeters high, was used to collect the soil, within a radius of five meters from any fecal contamination. The samples were collected at 9 am, using gloves, gardening spoons, and labeled plastic containers. The aluminum rectangle was fixed to the soil at a depth of approximately three centimeters from the surface. Approximately 300g of soil were removed from the soil, which were packed in the plastic containers and stored under refrigeration at 4°C. The samples were processed by the methods of Willia and Baermann Morais. The helminth investigated in this study was the hookworm *Ancylostoma sp*, and the positivity for eggs was 53% (258/480) and for larvae 51% (244/480). Of the 480 samples, 53% were positive for *Ancylostoma sp* eggs and 51% for larvae. The highest results were concentrated in the rainy season, with 517 larvae found. We conclude that the results showed that dogs and cats play an important role as sources of environmental

Keywords:
Ancylostoma
Helminth
Larvae

contamination, disseminators and carriers of parasites with zoonotic potential, requiring greater attention from the population, aiming at reducing the risk of infections for humans and for the animals themselves.

1 INTRODUÇÃO

O ambiente contaminado por ovos, larvas de helmintos e oocistos de protozoários que, anteriormente, parasitaram cães e gatos, pode atuar como agente mecânico de importantes infecções para o homem. Isso decorre, devido a muitos dos parasitos encontrados nestes animais serem causadores de zoonoses. De acordo com VISSER, S. *et al.* as particularidades do ambiente exercem grande relevância sobre a saúde. Portanto, a contaminação ambiental por essas formas parasitárias, disseminadas por meio das fezes de animais corroboram como um agravo de saúde pública, principalmente para as crianças que frequentam esses locais públicos como área de lazer.

A Larva Migrans Cutânea (LMC) é uma zoonose, associada à contaminação ambiental. Os seres humanos e, notoriamente, crianças, infectam-se ao ingerir acidentalmente ovos larvados de *Toxocara spp*, presentes no solo ou em fômites e em mãos previamente contaminadas (GUIMARÃES, B.C.D.S *et al.*, 2019). Os principais agentes etiológicos envolvidos são *Ancylostoma braziliense* e *Ancylostoma caninum*, parasitos do intestino delgado de cães e gatos. A infecção também pode ocorrer por atuação de penetração da larva infectante na pele. Assim, migram pelo tecido subcutâneo dos humanos (NEVES, 2000). Cães e gatos que possuem livre acesso a locais públicos são apontados, epidemiologicamente, como os responsáveis pela contaminação do solo, por eliminarem, aproximadamente, até 15.000 ovos por grama de fezes (MIRANDA, P. H. S *et al.*, 2015).

A LMC é conhecida como uma dermatite serpiginosa, geralmente denominada de coceira da praia (SANTARÉM, *et al.*, 2004; COELHO, 2007). Essa via de infecção por vetores, onde os animais contaminam o solo. Isso ocorre por meio de suas fezes que contêm larvas, por isso está relacionada a pacientes que tiveram contato com areia de praias, de depósitos peridomiciliares ou de áreas de recreação (ROCHA, WEBER, COSTA, 2019).

Essa dermatite é causada pela migração de larvas do nematódeo *Ancylostoma braziliense* e *A. canis*, no tecido cutâneo humano, principalmente no Brasil (GUIMARÃES *et al.*, 2005). A contaminação humana com LMC é contraída em áreas públicas de recreação,

em espaços em que o hospedeiro se contamina com larvas de ancilostomídeos (ARAÚJO *et al.*, 1999).

Geralmente, locais públicos em que o terreno é arenoso, que são de preferência para caninos e felinos que fazem desse local um ambiente para realizarem suas necessidades fisiológicas, torna-se um meio potencialmente contaminado (REY, L. 2001). O presente trabalho teve como objetivo investigar a contaminação ambiental por ovos e larvas de *ancylostoma* na área de pública de Fortaleza.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Coletas das amostras

Levando em consideração a influência sazonal do Estado do Ceará, as amostras foram retiradas no período seco (agosto a dezembro de 2018), e chuvoso (janeiro a julho de 2019). As amostras foram colhidas de uma área de 320m², situada em torno da área de alimentação e circulação de uma instituição pública da cidade de Fortaleza, CE, Brasil. Essa área foi dividida em quatro quadrantes de 80X80m², e de cada quadrante foram colhidas 30 amostras de solo.

Portanto, foram retiradas 240 amostras de solo no período seco, e 240 amostras no período chuvoso, perfazendo um total de 480 amostras. Para a retirada do solo, utilizou-se um retângulo de alumínio de dez centímetros de largura, por três centímetros de altura, a um raio de cinco metros de distância de qualquer contaminação fecal. As coletas foram realizadas às 9:00 horas da manhã, com o auxílio de luva, colher-de-jardineiro e recipientes plásticos devidamente etiquetados. O retângulo de alumínio foi fixado no solo ,aproximadamente, três centímetros de profundidade em relação à superfície. Foram removidas do solo cerca de 300g de solo, os quais foram acondicionados nos recipientes plásticos e conservados sob refrigeração a 4°C.

2.2 Métodos utilizados para a recuperação de ovos, cistos e larvas

Os métodos utilizados para detectar ovos leves de helmintos foi o de Willis (1972) com modificações. As amostras de solo escolhidas aleatoriamente (14g) foram dissolvidas em 60mL de solução saturada de açúcar e, em seguida, a solução foi tamisada. Uma alíquota de 5mL foi colocada em tubo de vidro, com uma lamínula na borda do tubo. Após 10 minutos, a lamínula foi cuidadosamente retirada e colocada sobre uma lâmina. A leitura foi realizada em microscópio óptico em objetiva de 10X e 40X. As amostras foram feitas em triplicatas. E, para obtenção das larvas, utilizou-se o método de Baermann Morais (Neves,

2002). As amostras de solo (14g) foram colocadas em pedaços de gaze (30cm X 30cm) e mergulhadas em água a 45°C, utilizando um cálice de sedimentação (125mL). Após uma hora de repouso, a gaze foi retirada e o material, em suspensão, foi deixado por mais uma hora. A leitura e quantificação das larvas foram realizadas em microscópio óptico em objetiva de 10X.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O helminto investigado neste trabalho foi o *Ancylostoma sp.* Das 480 amostras coletadas, 53% (258/480) apresentaram positividade para ovos e 51% (244/480) para larvas de *Ancylostoma*. Os maiores resultados concentram-se no período chuvoso, das quais 517 larvas foram encontradas, como mostram o Gráfico 1 e Figura 1.

Gráfico 1 - Presença de ovos e larvas de *Ancylostoma sp.* no período seco e chuvoso na cidade de Fortaleza, Ceará.

Figura 1 - Larva e ovos de *Ancylostoma sp.*

Fonte: Dados da pesquisa

A presença de larvas de *Ancylostoma* possui uma importância epidemiológica significativa, pois indica a existência de condições ambientais favoráveis ao desenvolvimento deste parasita, na qual apresenta um risco para saúde pública devido à vulnerabilidade da ocorrência da Larva Migrans Cutânea (LMC). O fácil acesso de animais de estimação a áreas públicas, aliado ao descaso dos tutores em relação aos dejetos e ao grande número de animais de rua, tornam-se preocupantes devido ao potencial zoonótico do nematódeo em questão. (STUTZ *et al*, 2014)

O parasita relatado nesse estudo foi do gênero *Ancylostoma*, e é facilmente encontrado, infectando cães e gatos da região, porém, os canídeos domésticos apresentam maior incidência (GUIMARÃES *et al*, 2019), mas, quando atingem a maturidade, desenvolvem imunidade contra os ascarídeos (BOWMAN *et al*, 2003). Na região Nordeste, a incidência da ancylostomose está interligada à distribuição das chuvas e ao desenvolvimento das larvas. Além disso, a transmissão dos parasitos está na dependência direta da temperatura e umidade do solo, ou seja, do índice pluviométrico (MIRANDA *et al*, 2015).

Os ancilóstomos são os helmintos mais comuns, os quais propagam infecções através do solo, podendo causar deficiência protéica em humanos e mamíferos domésticos e selvagens, podendo causar ainda grave anemia por deficiência de ferro. Essa espécie de helminto é considerada como uma das maiores de importância médica e veterinária, em razão da sua distribuição e alta prevalência zoonótica (XIE *et al*, 2017). Classicamente, a presença de ovos de *Ancylostoma sp.* nos diversos ambientes, como solo e pontos lamacentos de locais públicos de recreação, pode favorecer o aparecimento de doenças dermatologicamente como a larva migrans cutânea, afetando seres humanos, jovens e adultos, determinando desde uma lesão eritematosa com intenso prurido, até lesões graves com surgimento de edema do membro afetado (AGHAINDUM; ATUD; NADÈGE, 2019).

4 CONCLUSÕES

Estes resultados demonstram que cães e gatos desempenham um importante papel como fonte de contaminação ambiental de parasitos com potencial zoonótico, necessitando de uma maior atenção da população, visando à diminuição do risco de infecções para o homem e os próprios animais. As análises qualitativas revelaram que as maiores ocorrências de casos se concentram nos meses de maior precipitação pluviométrica. Este estudo demonstrou o risco potencial de transmissão de zoonoses causadas por helmintos de cães e gatos, reforçando a necessidade de implementar medidas efetivas de saúde pública, como o

controle da população canina com acesso às praças públicas, por meio da apreensão de animais vadios e a construção de cerca ao redor das áreas públicas.

REFERÊNCIAS

AGHAINDUM, A. G.; ATUD, A. Q.; NADÈGE, O. A. T. Implicationsofsoilsarounddomesticwater points in the spread of intestinal parasites in thecityofYaounde (Cameroon). **J Water Health**. v. 17, n. 2, p. 318-328, 2019.

ARAÚJO, F. R. DE; CROCCI, A. J; RODRIGUES, R. G. C; AVALHAES, J. DA. S; MIYOSHI, M. I; SALGADO, F. P; SILVA, M. A. DA; PEREIRE, M. L. Contaminação de praças públicas de Campos Grandes, Mato Grosso do Sul, Brasil, por ovos de *Toxocara* e *Ancylostoma* em fezes de cães. **Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical**, v.32, n. 5,p. 581-583, set./out. 1999.

ASSIS, M; BORGES, F. P; SANTOS, R.C. V; LUNARDELLI, A; GASPARETO, P. B; GRAZIOTTIN, C. M; MICHEL, R. V; TASCA, T; CARLI, G. A. Prevalência de endoparasitos em moradores de vilas periféricas de Porto Alegre, RS. **Revista Brasileira de Análises Clínicas**, v. 35, n. 4, p. 215-217, 2003.

BOWMAN, D. D.; LYNN, R.C.; EBERHARD, M.L. **Georgi'sParasitology for Veterinarians**. 8.ed. St.Louis: Saunders, p.422, 2003.

CASTILHO, D.; PAREDES, C.; ZAÑART, C.; CASTILHO, G.; MERCADO, R.; MUNÓZ, V.; SCHENONE, H. Environmental contaminationwith*Toxocara*spp in publicsquaresandparksfron, Santiago, Chile. **Bol. Chile. Parasitology**, v. 55, n. 3-4, p. 86-91, 2000.

CAUMES, E. Treatmenteofcutaneous larva migrans. **Clin. Infect. Dis**. v. 30, n. 5, p. 811-814, 2000.

CIMERMAN, B; CIMERMAN, S. Parasitologia Humana e Seus Fundamentos Gerais.**Atheneu**, São Paulo, 1999.

COELHO, L.M.P.S.; MILMAN, M.H.S.A.; OLIVEIRA, S.M. *Toxocara*spp eggs in publicsquares Sorocaba, São Paulo state, Brazil. **Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical**, v. 43, n. 4, p. 189 -191, 2001.

GUIMARÃES, A. M; ALVES, E. G. L; REZENDE, G. F. DE; RODRIGUES, M. C. Ovos de *Toxocara*sp e larvas de *Ancylostoma*sp em praça pública de Lavras, Minas Gerais. **EditoraVerde**, v. 39, n. 2, p. 293-5, 2005.

GUIMARÃES, B. C. D. S; TEXEIRA, B. T.; TOLEDO, L. V.; DAMASCENO, L. S.; ALMEIDA, M. E. W. C.; MARTINS; M. A.; LEITE; N. S. Infecções por parasitas ancilostomíase.**BrazilianJournalofSurgeryandClinicalResearch**, Paraná, v. 26, n.3, p.84-88, mar./mai. 2019.

HABLUETZEL, A; TRALDI, G; RUGGIERI, S; ATTILI, A.R; SCUPPA,P; MARCHETTI,R; MENGHINI, G; ESPOSITO, F. An estimation of *Toxocara canis* prevalence in dogs, environmental egg contamination and risk of human infection in the Marche region of Italy. **Veterinary Parasitology**, v. 113, p. 243-252, 2003.

MIRANDA, P. H. S; BEZERRA, W. F. L; CASTRO, T. M. B. Q; GONÇALES, L. S. Contaminação do solo de áreas de recreação infantil de creches públicas por *ancylostoma* sp. e *toxocara* sp. em Teresina-PI. **Revista Interdisciplinar Centro Universitário Uninovafapi**, Piauí, v. 8, n. 4, p. 93-98, out./dez. 2015.

NEVES, D. P. Parasitologia Humana. **Editora Atheneu**, São Paulo, 10 ed, v. 245, 2002.

REY, L. Parasitos e Doenças Parasitárias do Homem nas Américas e na África. **Guanabara Koogan S.A**, Rio de Janeiro, 3 ed. 2001.

REY, Luís. Um século de experiência no controle da ancilostomíase. **Rev. Soc. Bras. Med. Trop.**, Uberaba, v. 34, n. 1, p. 61-67, fev. 2001.

ROCHA, M. J.; WEBER, D.; COSTA, J. P. Prevalência de larvas migrans em solos de parques públicos da cidade de Redenção, estado do Pará, Brasil. **RevPan-AmazSaude**, Ananindeua, v. 10, mar. 2019. Disponível em <http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2176-62232019000100011&lng=pt&nrm=iso>. acessado em 15 dez. 2020. Epub 01-Jul-2019. <http://dx.doi.org/10.5123/s2176-6223201901607>.

PESSOA, S. B; MARTINS, A. V. Parasitologia Veterinária. **Guanabara**, Rio de Janeiro, 11. ed, p. 872, 1988.

SANTARÉM, V. A; GLUFFRIDA, R.; ZANIN, G. A. Larvas migrans cutânea: ocorrência de casos humanos e identificação de larvas de *Ancylostoma* spp em parque público do município de Taciba, São Paulo. **Rev. Soc. Bras. Méd. Trop.**, v. 37, p. 1179-181, 2004.

SANTARÉM, V. A; SARTOR, I. F; BERGAMO, F. M. M. Contaminação, por ovos de *Toxocara* spp, de parques e praças públicas de Botucatu, São Paulo, **Rev. Soc. Bras. Méd. Trop.**, v. 31, p. 539-532, 1998.

STUTZ, E. T. G.; SOUZA, A. P.; LIMA, I. S.; GUIMARÃES, P. M. S. Ocorrência de *Ancylostoma* sp. em fezes de animais coletados em praças do município de Volta Redonda. **Revista Episteme Transversalis**, Rio de Janeiro, v.7, n. 2, 2014.

SMOUT, F. A.; SKERRATT, L. F.; BUTLER, J. R. A.; JOHNSON, C. N.; CONGDON, B. C.; THOMPSON, R. C. A. The hookworm *Ancylostomaceylanicum*: An emerging public health risk in Australian tropical rainforests and Indigenous communities. **One Health**. v. 26, n. 3. p.66-69, apr. 2017.

TAN, JS. Human zoonotic infection transmitted by dogs and cats. **Arch Intern Med**, v; 157, p. 1933-43, 1997.

VISSER, Silvia et al . Estudo da associação entre fatores socioambientais e prevalência de parasitose intestinal em área periférica da cidade de Manaus (AM, Brasil). **Ciênc. saúde coletiva**, Rio de Janeiro , v. 16, n. 8, p. 3481-3492, Aug. 2011 . Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141381232011000900016&lng=en&nrm=iso>.accesson15Dec. 2020. <https://doi.org/10.1590/S1413-81232011000900016>.

XIE, Y.; HOBERG, E. P.; YANG, Z.; JR, J. F. U.; YANG, G. *Ancylostoma ailuropodae* n. sp. (Nematoda: Ancylostomatidae), a new hookworm parasite isolated from wild giant pandas in Southwest China. **Parasites & Vectors**. v. 10, n. 277, 2017.

WILLIS, H. H. A simple levitation method for the detection of hookworm ova. **Medical Journal of Australia**, v. 8, p. 375-376, 1927.

O USO INDISCRIMINADO DE ANTIBIÓTICOS EM ANIMAIS DE COMPANHIA

Yamille Marques Pinheiro

Universidade Estadual Do Ceará - UECE, Faculdade De Medicina Veterinária - FAVET, Fortaleza, CE
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6190378423046665>

Laíza Hellen Dantas Batista

Universidade Estadual Do Ceará - UECE, Faculdade De Medicina Veterinária - FAVET, Fortaleza, CE
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4749447606482494>

Léia Jamylle dos Santos Freitas

Universidade Estadual Do Ceará - UECE, Faculdade De Medicina Veterinária - FAVET, Fortaleza, CE
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9484505644790986>

Nicole Souza Willers

Universidade Estadual Do Ceará - UECE, Faculdade De Medicina Veterinária - FAVET, Fortaleza, CE
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4358778511005891>

Victória Paola Nogueira Moreira Silva

Universidade Estadual Do Ceará - UECE, Faculdade De Medicina Veterinária - FAVET, Fortaleza, CE
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8437996011915470>

Marcelo Custódio Lopes

Universidade Estadual Do Ceará - UECE, Faculdade De Medicina Veterinária - FAVET, Fortaleza, CE
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7956031100278616>

Mônica Araújo de Sousa

Universidade Estadual Do Ceará - UECE, Faculdade De Medicina Veterinária - FAVET, Fortaleza, CE
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8650245468739627>

Rafaela Batista Sabino

Universidade Estadual Do Ceará - UECE, Faculdade De Medicina Veterinária - FAVET, Fortaleza, CE
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9331569553837124>

Victor Hugo Vieira Rodrigues

Centro Universitário Maurício de Nassau – UNINASSAU, Centro de Saúde, Fortaleza, CE
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2226604565550002>

Aderson Martins Viana Neto

Universidade Estadual Do Ceará - UECE, Faculdade De Medicina Veterinária - FAVET, Fortaleza, CE
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4682104695685941>

Isaac Neto Goes da Silva

Universidade Estadual Do Ceará - UECE, Faculdade De Medicina Veterinária - FAVET, Fortaleza, CE
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1191488997675957>

Informações sobre o artigo:	RESUMO
Recebido em: 15/07/2021	O uso indiscriminado de antimicrobianos em animais de companhia é um impasse recorrente na sociedade, e pode acarretar consequências problemáticas, visto que a administração errônea dessas drogas gera a ineficácia de antibióticos em função do aumento da resistência bacteriana. O objetivo deste trabalho foi verificar, por meio de um questionário, a hipótese da ocorrência de uso indiscriminado de antimicrobianos em animais de companhia e averiguar as suas principais causas, a fim de direcionar e contribuir de forma efetiva para a promoção de medidas de conscientização do uso racional de antibióticos. Para isso, foi realizada uma pesquisa mediante formulário online para se obter dados a respeito dos conhecimentos dos entrevistados sobre esse tema. Os questionamentos incluíam perguntas sobre o perfil do entrevistado, a procura por atendimento veterinário, a administração do fármaco e questões sobre os conhecimentos básicos relativos à antibióticos e à saúde pública. Os resultados constatarem que a maioria dos entrevistados utiliza esses medicamentos de maneira adequada, a partir da prescrição médica veterinária e da correta administração aos animais, entretanto, a interrupção de tratamentos por observação de melhora dos sinais clínicos e a indicação de antibióticos a amigos foram pontos problemáticos de destaque. Desse modo, concluiu-se que apesar do uso indiscriminado de antimicrobianos ser uma prática corrente no Brasil, a maioria dos tutores de animais de estimação demonstrou realizar os procedimentos envolvidos na obtenção e utilização dessa medicação de maneira apropriada, fazendo-se necessário apenas o estabelecimento de medidas de conscientização sobre o modo efetivo de driblar algumas condutas inadequadas.
Aceito em: 18/07/2021	
Data de publicação: 04/08/2021	
Palavras-chave:	
Antibióticos	
Animais de companhia	
Saúde pública	
Bactérias	
Resistência microbiana	

THE INDISCRIMINATE USE OF ANTIMICROBIALS IN COMPANION ANIMALS

ABSTRACT

The indiscriminate use of antimicrobials in companion animals is a recurrent impasse in society, and can lead to problematic consequences, since the wrong administration of these drugs makes antibiotics ineffective due to the increase in bacterial resistance. The objective of this work was to verify, through a questionnaire, the hypothesis of the occurrence of indiscriminate use of antimicrobials in companion animals and to investigate its main causes, in order to effectively direct and contribute to the promotion of measures to raise awareness of the rational use of antibiotics. For this, a survey was conducted through an online form to obtain data on the knowledge of respondents on this topic.

Keywords:**Antibiotics****Company animals****Public health****Bacterium****Microbial resistance**

Questions included questions about the interviewee's profile, seeking veterinary care, administering the drug and questions about basic knowledge related to antibiotics and public health. The results showed that most respondents use these drugs properly, based on the veterinary prescription and the correct administration to the animals, however, the interruption of treatments due to observation of improvement in clinical signs and the indication of antibiotics to friends were points highlighted problems. Thus, it was concluded that despite the indiscriminate use of antimicrobials being a current practice in Brazil, most pet owners demonstrated to perform the procedures involved in obtaining and using this medication properly, requiring only the establishment of awareness-raising measures on the effective way to circumvent some inappropriate behaviors.

1 INTRODUÇÃO

Os antibióticos são fármacos utilizados na medicina veterinária e humana para tratar infecções causadas por bactérias. Podem atuar como bactericida, eliminando a bactéria, ou como bacteriostático, retardando o seu crescimento e a sua multiplicação. Eles podem ser produzidos a partir de microrganismos como as próprias bactérias ou ter origem sintética (SCALDAFERRI *et al.*, 2020). Além do uso de antibióticos para prevenção e tratamento de microrganismos infecciosos, esses medicamentos podem ser utilizados também em níveis subterapêuticos nas rações animais para promover crescimento e aumentar a eficácia alimentar (CASELANI, 2014).

A utilização inadequada de antibióticos é um dos principais fatores que contribuem para desenvolvimento de resistência bacteriana, uma vez que pode levar a um desequilíbrio da microbiota do paciente, e assim favorecer a multiplicação de microrganismos patogênicos, contribuindo, desse modo, para o surgimento de novas infecções e de superbactérias (SCALDAFERRI *et al.*, 2020). Estas são bactérias que devido à pressão seletiva ocasionada pelo uso dos antibióticos, se tornaram mais fortes em função dos aumentos dos genes de resistência e, atualmente, constituem um grande problema para a saúde única (MARTINS *et al.*, 2015; SCALDAFERRI *et al.*, 2020), visto que as mutações e a formação de biofilmes desenvolvidos por estas bactérias são mecanismo para a sua sobrevivência no hospedeiro (SCALDAFERRI *et al.*, 2020).

Os animais de estimação, como cães e gatos, representam uma fonte de disseminação de bactérias resistentes devido ao amplo uso destes fármacos na rotina

veterinária e ao contato cada vez mais próximo destes animais com os seres humanos. Neste sentido, já foi relatada a transmissão de várias bactérias multirresistentes entre animais de estimação e seres humanos (HOPMAN *et al.*, 2019). Portanto, o objetivo deste trabalho foi verificar a ocorrência de uso indiscriminado de antimicrobianos em animais de companhia, averiguando suas principais causas a fim de direcionar e contribuir de forma efetiva para a promoção de medidas de conscientização do uso racional de antibióticos.

2 METODOLOGIA

Realizou-se uma pesquisa com tutores de animais de estimação, cuja permissão para coleta de dados foi solicitada em primeira instância no formulário. Quando de acordo, iniciou-se a aplicação do questionário online, produzido com o uso da plataforma Google Forms, cuja divulgação foi compartilhada nas redes sociais, como whatsapp e instagram durante 60 dias. Esse questionário foi composto por perguntas objetivas, cujo propósito foi promover um levantamento dos conhecimentos básicos em relação à antimicrobianos, à forma de administração desses medicamentos e à utilização restrita ou não à prescrição de um médico veterinário, a fim de verificar o uso abusivo de antimicrobianos aos pets.

A partir da coleta dessas informações, efetuou-se uma avaliação qualitativa das respostas fornecidas para obtenção de estimativas da assiduidade do uso indiscriminado dos antibióticos, de sua possível associação com o grau de escolaridade e com o conhecimento da função do medicamento. Também buscou-se compreender em qual estágio do tratamento ocorre maior casuística de negligência: na compra do antimicrobiano sem receita, na interrupção do tratamento pelo do tutor ou no uso sem prescrição desses medicamentos em casos desnecessários.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O questionário foi respondido por 150 tutores de pets, que foram integralmente considerados para análise. A faixa etária desses participantes foi segmentada em seis classes, constatando-se que a maioria dos entrevistados eram jovens (21 a 30 anos) e adultos de até 30 anos (Gráfico 1).

Gráfico 1 - Variações de faixa etária dos entrevistados (%) participantes da pesquisa: o uso indiscriminado de antimicrobianos em animais de companhia

Fonte: Dados da pesquisa

Quanto ao nível de escolaridade dos entrevistados, constatou-se que houve prevalência de pessoas com ensino superior incompleto e completo, prevalência essa que se dá em virtude do predomínio de 48,7% dos entrevistados com faixa etária de 21 a 30 anos.

Quanto à renda familiar dos entrevistados, obteve-se que 66% possuem até 3 salários mínimos, sendo classificados, portanto, como classe média baixa. Esse fato, por sua vez, pode interferir negativamente na demanda por atendimento veterinário, bem como atuar como fator atenuante do uso indevido de antimicrobianos por indicação de amigos ou balconistas. Isso porque, segundo Las Casas (1992), a renda é um parâmetro muito importante para o perfil de comportamento social, de modo que, quanto mais alta, maiores são os gastos possíveis de serem realizados e, quanto mais baixa, menores são as condições de ter acesso aos confortos oportunos da vida moderna.

Observou-se uma grande variedade de animais de estimação sendo criados pelos tutores, apesar da grande prevalência estar concentrada em cães (76%) e gatos (52%), também foi relatado, em menor proporção, aves como calopsitas, periquitos e papagaios, além de hamsters, peixes, tartarugas e jabutis, serpentes, porquinho da índia e gerbilo.

A predominância de cães e gatos, seguido de aves como animais de estimação está de acordo com a pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) em 2017, 76% dos brasileiros com acesso

à internet possuem animais de estimação, sendo que os mais comuns são os cachorros (79%), gatos (42%) e aves (17%). Ademais, completam o ranking os peixes (13%), tartarugas (6%) e roedores (5%), como coelhos, camundongos, furões e porquinhos da índia.

A procura por atendimento veterinário em casos de adoecimento dos animais de estimação, foi a escolha de eleição entre os entrevistados, totalizando 73,3% das respostas. Este resultado está diretamente relacionado à posição de destaque e importância ocupada pelos pets na nova estrutura familiar, além da ampliação da tendência de crescimento da aquisição de consciência de respeito e cuidado com os animais (ELIZIERE, 2013).

Gráfico 2 - Primeira atitude tomada pelos tutores em situações cujo animal de estimação apresentou-se doente.

Fonte: Dados da pesquisa

Questionados sobre a frequência com que levam o animal de companhia ao veterinário, 52% revelaram que só buscam atendimento quando o animal está doente. Esse padrão de comportamento demonstra a necessidade de se ampliar o estabelecimento de uma medicina preventiva, cujo foco é a prevenção das doenças em vez do tratamento. Essa prática contribui para a redução do custo da saúde, além de promover uma maior qualidade de vida (FERREIRA et al., 2013).

Gráfico 3 - Frequência (%) em que os entrevistados levam o animal de companhia para avaliação em uma consulta com médico veterinário.

Fonte: Dados da pesquisa

Ao serem questionados sobre a ação dos antibióticos, a maioria dos participantes (70,6%) afirmou saber exatamente sobre a função do antibiótico no organismo. No entanto, é perceptível uma discrepância no número de entrevistados que de fato conhecem a função dessas drogas, já que quando questionados a respeito da eficácia de antimicrobianos contra organismos patogênicos, 37,4% dos entrevistados afirmou acreditar que essas drogas são capazes de matar qualquer tipo de microrganismo, como fungos e vírus. Ademais, houve um número relevante de participantes que não soube se posicionar (19,3%) e 44,6% discordaram dessa afirmação. Com isso, é possível constatar que, ainda que mais da maioria dos entrevistados acredita conhecer a função de um antibiótico, 56,7% não conhece ou tem conhecimentos controversos sobre o assunto.

Gráfico 4 - Resposta dos entrevistados (%) quando questionados sobre a capacidade de eliminação de todos os tipos de bactérias, vírus e fungos por antibióticos

Fonte: Dados da pesquisa

Dos 78,7% dos tutores que afirmaram já ter administrado antibiótico aos seus animais, 14,6% mencionaram não ter sido prescrito por um médico veterinário. Esse dado representa uma problemática pertinente, visto que é comum que balconistas de drogarias desempenhem um papel de prescritores de medicamentos, favorecendo ao uso inadequado de medicamentos e ao subdiagnóstico de zoonoses (HAAK, 1989; FVE, 1999; MELO *et al.*, 2006; SOUSA, 2006; BORTOLON *et al.*, 2007; VITOR *et al.*, 2008). Esse fato contribui com a acentuação do uso inadequado de medicamentos, bem como com o errôneo costume da população de optar pela farmácia como substituto dos serviços de saúde (BARROS, 1997).

É importante destacar que, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), a problemática do uso descontrolado de medicamentos não é exclusiva do Brasil, visto que 2/3 dos antibióticos são usados sem prescrição médica em muitos países (AQUINO, 2008).

No Brasil a venda de antibióticos direcionados para o uso humano é controlada por receita médica (Nascimento Júnior *et al.*, 2016). No entanto, medicamentos similares usados na medicina veterinária são frequentemente vendidos sem receita em agropecuárias, como mostrados no estudo de Leite *et al.* (2006), no qual foi demonstrado que, em 100% dos estabelecimentos visitados para o desenvolvimento da pesquisa, houve a prescrição da medicação pelos atendentes sem receita e avaliação prévia por médico veterinário.

Gráfico 5 - Padrão de aquisição e escolha dos medicamentos antimicrobianos pelos tutores de animais de estimação.

Fonte: Dados da pesquisa

Foi constatado que a maioria (61,3%) dos tutores compram medicamentos sob prescrição de um médico veterinário, retratando, desse modo, uma favorável conjuntura. Isso se justifica pelo fato de que o uso de antibióticos deve fundamentar-se em uma responsável decisão terapêutica sobre a real necessidade de indicação, além da seleção minuciosa dos mesmos, levando-se em conta os malefícios do emprego inadequado desses fármacos, cuja função é de competência médica (Ricardo Ariel, 2010).

Os entrevistados também foram questionados quanto ao uso correto do antibiótico, se foi administrado no mesmo horário conforme a prescrição médica. A maioria (92,7%) afirmou que sim e apenas 7,3% dos entrevistados informaram que não administram no mesmo horário prescrito. Para Guardabassi et al. (2009) é essencial administrar os antimicrobianos em conformidade com a posologia recomendada, tendo em vista que a dose, o intervalo entre doses e a duração do tratamento são de suma importância para atenuar a falha terapêutica e maximizar o potencial de eficácia da droga.

Com relação à interrupção do tratamento antes do período prescrito, 20,6% dos entrevistados relataram que não fizeram o tratamento de acordo com o indicado pela bula. Desses tutores que não administraram a medicação corretamente, 35,5% relataram que observaram melhora nos sinais clínicos e por isso interromperam o uso da medicação, 19,4% afirmaram ter dificuldade de administração do medicamento e 9,7% interromperam porque seus animais apresentaram efeitos adversos.

Além disso, 12,9% declararam problemas financeiros para a compra de medicamentos na quantidade adequada, configurando, por sua vez, uma problemática pertinente de países em desenvolvimento, onde antimicrobianos são adquiridos em dose única e são administrados apenas por uma fração da duração efetiva recomendada, culminando na potencialização de seleção de microrganismos resistentes e do fracasso do tratamento (World Health Organization, 2001).

Segundo Nogueira (2017), quando o tratamento é interrompido, o sistema imune do indivíduo pode não ser eficaz em eliminar todas as bactérias patogênicas. Assim, a população microbiana que sobreviveu se multiplica, retomando o seu crescimento, mas agora o antibiótico anteriormente usado pode se tornar ineficaz, formando bactérias multirresistentes. Para Guardabassi et al. (2009) é comum o abandono do tratamento com antimicrobianos prescritos em medicina veterinária, já que, normalmente, os antimicrobianos são administrados aos animais por um tutor, dificultando ainda mais o uso adequado do medicamento.

No que se refere à interrupção do tratamento com antibióticos antes do prazo estabelecido pelo médico veterinário, 96,6% dos entrevistados concordaram que essa prática resulta em consequências negativas para saúde animal, enquanto apenas 3,4% se mostraram indecisos. Segundo Nogueira (2017), assim que a sintomatologia da patologia desaparece, é frequente que o tratamento seja cessado, não havendo o cumprimento do prescrito pelo médico acerca do uso do antibiótico.

Ademais, a pesquisa constatou que 71,3% dos entrevistados relataram já ter indicado antibiótico a conhecidos que não tinham condições de levar seu animal ao veterinário. Esse padrão de comportamento está de acordo com os dados nacionais e mundiais da saúde, que mostram que é muito grande o número de prescrições desnecessárias ou inadequadas de antibacterianos, além do uso sem prescrição médica (Fiol & Barberato-Filho, 2010).

Gráfico 6 - Resultado em porcentagem da realização ou não de indicação de antibióticos por tutores de pets para amigos que não possuíam condições de levar seus animais a uma consulta veterinária

Fonte: Dados da pesquisa

Quando questionados sobre a indicação de antibióticos, apenas 21,3% dos entrevistados responderam que já compraram um antibiótico indicado por um conhecido. A facilidade na compra de venda de antibióticos veterinários (Leite *et al.*, 2006) frequentemente leva tutores à administração de drogas ao animal com prescrições de medicamentos provenientes de indivíduos leigos, frequentemente representados por conhecidos ou balconistas de farmácias. Isso contribui com a recorrência do uso de forma inadequada, desnecessária e perigosa de fármacos (KOROLKOVAS, 1979).

A pesquisa também demonstrou que 92% dos participantes acreditam que os antibióticos são um fator importante no desenvolvimento de superbactérias e que 95,3% estão cientes de que o uso inapropriado de antibióticos é um risco à saúde pública. Isso configura, desse modo, uma realidade positiva, uma vez que, o uso não moderado de antibióticos é a fonte primária do aumento da resistência bacteriana aos medicamentos, responsáveis por gerar bactérias mais patogênicas ao organismo (GUARDABASSI et al., 2018).

De modo geral, os resultados apurados foram promissores, uma vez que representam, em sua maioria, um uso adequado de antimicrobianos em animais de companhia. Foram levantados dados de prevalência por procura de atendimento veterinário, compra de antibióticos mediante a prescrição, administração correta dos medicamentos durante a terapia e conhecimentos gerais sobre a tríade, saúde pública, antimicrobianos e resistência bacteriana. Sendo esses, portanto, resultados animadores, uma vez que estão correlacionados com a saúde em um aspecto ecossistêmico, dado que os antimicrobianos e os genes de resistência, ao serem liberados no ambiente, levam à contaminação ambiental, humana e animal, incluindo espécies silvestres que não entraram em contato com essas drogas (MARTINEZ, 2009). Contudo, apesar do panorama promissor, deve-se ressaltar a necessidade da aplicação de medidas de conscientização e profilaxia, mediante educação populacional, a fim de sanar algumas condutas inadequadas e de fornecer o suporte informacional para a população leiga com a finalidade de minimizar a resistência bacteriana por meio do uso racional e moderado de fármacos antimicrobianos (SINGER et al., 2003).

4 CONCLUSÕES

A partir dos dados apurados pode-se concluir que, apesar do uso de medicamentos isentos de prescrição médica ser uma prática mundialmente recorrente, a maioria dos tutores compram antibióticos apenas quando prescritos por médicos veterinários, além de realizarem corretamente a administração destes fármacos. Nesse contexto, chama-se atenção apenas para a ocorrência de interrupção do tratamento antes do tempo determinado no receituário, que apesar de representar um pequeno percentual das respostas, demonstrou grande reincidência de motivação, sendo esta a cessação de sinais clínicos no animal. Faz-se necessário, portanto, o estabelecimento de medidas que foquem na conscientização dos tutores através de uma abordagem simples e direta sobre todos os riscos envolvidos e o modo efetivo de driblar estas condutas. Isso se justifica pelos dados obtidos, já que mais de

90% desses participantes relataram já ter ciência das consequências negativas desse ato, do risco de desenvolvimento de superbactérias e do impacto dessa problemática na saúde pública.

REFERÊNCIAS

AQUINO, D. S. Porque o uso racional de medicamentos deve ser prioridade. **Ciência Saúde Coletiva**; v.13, p.733-6, 2008. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232008000700023>

BARROS, J. A. C. Atuação dos balconistas de farmácia: ajudando a promover o uso racional de medicamentos. **J Bras Med**. v.73, n.2, p. 120-127, 1997.

BORTOLON, P. C.; KARNIKOWSKI, M. G. O.; ASSIS, M. Automedicação versus indicação farmacêutica: o profissional de farmácia na atenção primária à saúde do idoso. **Revista de Atenção Primária à Saúde**, v. 10, n. 2, p. 200-209, 2007.

CARLOS LEITE, LUIZ ET AL. PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS POR LEIGOS: UM PROBLEMA ÉTICO. **Revista Acadêmica Ciência Animal**, [S.l.], v. 4, n. 4, p. 43-47, out. 2006. ISSN 2596-2868. Disponível em: <<https://periodicos.pucpr.br/index.php/cienciaanimal/article/view/9498/9129>>.

CASELANI, K. Resíduos de medicamentos veterinários em alimentos de origem animal. **Arquivos de Ciências Veterinárias e Zoologia Da UNIPAR**. v. 17, n. 3, p. 189-197, setembro, 2014. DOI: <https://doi.org/10.25110/arqvet.v17i3.4944>

CNDL. Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas; SPC Brasil. Serviço de Proteção ao crédito. **Mercado de consumo pet**. Setembro de 2017.

ELIZEIRE, M. B. **Expansão do Mercado Pet e a Importância do Marketing na Medicina Veterinária**. Porto. Alegre. 2013.

FERREIRA, J. R. N.; MALUF, J. A.; CONCEIÇÃO, R. D. O. Medicina Preventiva: Lifetime risk, uma nova ferramenta para prevenção cardiovascular. **Educ Contin Saúde Einstein**. 2013;11(1):31-2; Disponível em: <<http://apps.einstein.br/revista/arquivos/PDF/2807-31-32.pdf>>

FIOL, F.S. D.; BARBERADO-FILHO, S. Antibacterianos. In: BRASIL. Ministério da Saúde. **Formulário Terapêutico Nacional 2010**: Rename 2010. 2.ed., Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2010, p.115.

FVE - FEDERATION OF VETERINARIANS OF EUROPE. **Antibiotic Resistance & Prudent use of Antibiotics in Veterinary Medicine**. Brussels, 1999. 12p.

GUARDABASSI, L., APLEY, M., OLSEN, J. E., TOUTAIN, P., & WEESE, S. Optimization of antimicrobial treatment to minimize resistance selection. **American Society of Microbiology**, v.6, n.3, p.637-673, 2018. DOI: <http://dx.doi.org/10.1128/microbiolspec.arba-0018-2017>

GUARDABASSI, L.; JESEN, L.B.; KRUSE, H. Guia de antimicrobianos em veterinária. Porto Alegre: **Artmed Editora**, 2009.

HOPMAN, N. E. M.; VAN DIJK, M. A. M.; BROENS, E. M.; WAGENAAR, J. A.; HEIDERICK, D. J. J. Van GEIJLSWIJK, I. M. Quantifying antimicrobial use in Dutch companion animals. **Frontiers in Veterinary Science**, v.6, a.158, p.1-9, 2019. DOI:10.3389/fvets.2019.00158

HAAK, H. Padrões de consumo de medicamentos em dois povoados da Bahia (Brasil). **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 23, n. 2, p. 143-151, 1989.

KOROLKOVAS, A. Uso e abuso de medicamentos. **Comunicação Científica Faculdade Medicina Veterinária e Zootecnia**, São Paulo, SP: v. 3, n. 3/4, p. 123-136. 1979.

LAS CASAS, Alexandre Luzzi. **Marketing de Varejo**. 1. ed. São Paulo: Atlas, 1992. v. 1. 288p .

MARTINEZ, J. L. Environmental pollution by antibiotics and by antibiotic resistance determinants. **Environmental Pollution**, Amsterdam, v. 157, n. 11, p. 2893-2902, 2009.

MARTINS, G. S.; MANGIAVACCHI, B. M.; BORGES, F. V.; LIMA, N. B. Uso indiscriminado de antibióticos pela população de São José do Calçado (ES) e o perigo das superbactérias. **Acta Biomédica Brasiliensia**, v. 6, n. 2, p. 84-96, Dezembro, 2015. DOI: <https://doi.org/10.18571/acbm.089>

MELO, D. O.; RIBEIRO, E.; STORPIRTIS, S. A importância e a história dos estudos de utilização de medicamentos. **Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas**, v. 42, n. 4, p. 475-485, 2006

NOGUEIRA, T. A crise dos antibióticos. **Revista de Ciência Elementar**, v.5, n.1, p.1-5, março, 2017. DOI: <http://doi.org/10.24927/rce2017.013>

SCALDAFERRI, L. G.; TAMEIRÃO, E. R. FLORES, S. A.; NEVES, R. A. S. C.; CORREIA, T. S.; CARMO, J. R.; TOMA, H. S.; FERRANTE, M. Formas de resistência microbiana e estratégias para minimizar sua ocorrência na terapia antimicrobiana: Revisão. **PUBVET**, v.14, n.8, p.1-10, Agosto, 2020. DOI: <https://doi.org/10.31533/pubvet.v14n8a621.1-10>

SOUSA, F. F. O. **Perfil da automedicação com antimicrobianos em farmácias de Fortaleza**. Fortaleza, UFC, 2006, 137p. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas), Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, Departamento de Farmácia, Universidade Federal do Ceará, 2006.

VITOR, R. S.; LOPES, C. P.; MENEZES, H. S.; et al. Padrão de consumo de medicamentos sem prescrição médica na cidade de Porto Alegre – RS. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 13 (Sup), p. 737-743, 2008.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **WHO global strategy for containment of antimicrobial resistance**. Geneva: World Health Organization; 2001.

ZIMERMAN, Ricardo Ariel. Uso indiscriminado de antimicrobianos e resistência microbiana. Boletim, Brasília, DF, ano 3, p. 3-11, 2010. **Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos / Ministério da Saúde**

ASPECTOS CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS DO BOTULISMO EM BOVINOS

João Marcelo Alves Coelho

Centro Integrado de Saberes do Nordeste (CISNE), Quixadá, CE

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2430531013843540>

Vitória Costa Pinheiro

Centro Integrado de Saberes do Nordeste (CISNE), Quixadá, CE

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1578024785455551>

Adriane Luzia Da Silva Mendes

Centro Integrado de Saberes do Nordeste (CISNE), Quixadá, CE

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5236530175840111>

Victor Hugo Vieira Rodrigues

Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU), Fortaleza, CE

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2226604565550002>

Informações sobre o

artigo:

Recebido em:

15/07/2021

Aceito em:

18/07/2021

Data de publicação:

04/08/2021

Palavras-chave:

Clostridium botulinum

Clínica

Epidemiologia

RESUMO

O presente trabalho aborda sobre o botulismo em bovinos, uma enfermidade causada pela ingestão das toxinas produzidas pelo *Clostridium botulinum*. Os animais acometidos apresentam uma flacidez neuromuscular, levando ao decúbito esternal, também podem manifestar tônus muscular diminuído na cauda e língua, ademais, os animais podem estar taquicárdicos e com temperatura retal diminuída (37,5 – 38,0 °C). Diagnostica-se a doença através dos sinais clínicos e exames laboratoriais. O tratamento consiste em utilizar a antitoxina botulínica que deve ser aplicada no início da doença, caso contrário, não terá eficácia. Como forma de controle é necessário a vacinação do rebanho e a inspeção rigorosa da alimentação fornecida aos animais, desse modo, evitando-se alimentos contaminados com a toxina, também devem ser retiradas do ambiente as carcaças de animais, reduzindo a propagação da bactéria.

CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF BOTULISM IN CATTLE

ABSTRACT

The present study deals with botulism in cattle, a disease caused by the ingestion of the toxins produced by *Clostridium botulinum*. Affected animals present neuromuscular flaccidity, leading to sternal decubitus, and may also manifest decreased muscle tone in the tail and tongue, in addition, the animals may be tachycardiac and with decreased rectal temperature (37.5 - 38.0 °C). The disease

Keywords:***Clostridium botulinum*****Clinic****Epidemiology**

is diagnosed by clinical signs and laboratory tests. The treatment consists in the use of botulinum antitoxin that must be applied at the beginning of the disease, otherwise it will not be effective. As a form of control it is necessary to vaccinate the herd and strictly inspect the food supplied to the animals, thus avoiding food contaminated with the toxin, and the carcasses of animals should also be removed from the environment, reducing the spread of the bacteria.

1 INTRODUÇÃO

O botulismo é uma intoxicação neuromuscular grave causada pelo *Clostridium botulinum* (GRAÇA *et al.*, 2010), uma bactéria gram positiva, capaz de formar esporos que podem sobreviver por até trinta anos no ambiente e sua proliferação ocorre em condições anaeróbias (DESTA *et al.*, 2016). Alguns tipos da toxina são letais (KUMMEL *et al.*, 2012). São descritos oito tipos de toxinas (A, B, C, D, E, F, G e H) do *Clostridium botulinum* (LOBATO *et al.*, 2013), sendo mais comumente encontradas nas intoxicações em bovinos os tipos C e D (DESTA *et al.*, 2016).

A doença pode afetar diversas espécies domésticas, aves silvestres (VALENTINE, MCGAVIN, 2009) e peixes (RADOSTITS *et al.*, 2000), apresentando importância sanitária e econômica quando relacionada a pecuária extensiva (DUTRA *et al.*, 2005), visto que em bovinos o botulismo geralmente está associado a osteofagia, no qual os animais com deficiência de minerais ingerem restos de cadáveres contaminados (DESTA *et al.*, 2016; SILVA *et al.*, 2016).

O botulismo, além da importância na pecuária extensiva, também apresenta na pecuária intensiva, visto que na literatura há descrição de surto no sistema de confinamento de bovinos através da ingestão de milho contaminado (COSTA *et al.*, 2008). Também podem ser fatores de contaminação a cama de frango (CÂMARA *et al.*, 2014), silagens malconservadas ou contaminadas com pequenos animais, aves ou roedores (ANNIBALLI *et al.*, 2013), feno armazenado incorretamente (MABONI *et al.*, 2010) ou água contaminada com *C. botulinum* (GALIZA *et al.*, 2010).

Diante da relevância do botulismo na pecuária e a importância do controle dessa enfermidade, objetivou-se realizar uma revisão bibliográfica sobre o botulismo em bovinos, relatando a epidemiologia da doença, sinais clínicos apresentados, como é realizado o diagnóstico, possível prevenção e como controlar a incidência do botulismo no gado.

2 MATERIAL E MÉTODO

O estudo foi realizado através de levantamento bibliográfico de dados epidemiológicos, diagnóstico, tratamento e os sinais clínico-patológico presentes em bovinos com botulismo. Os materiais utilizados foram artigos e livros atuais, encontrados nos sites Research gate, SciELO, pubvet e google acadêmico, sobre essa doença em bovinos.

2.1 Aspectos epidemiológicos

O botulismo foi descrito pela primeira vez no Brasil por Tokarnia *et al.* (1970), após ter feito um isolamento de cultura com algumas amostras de animais que foram acometidos por uma doença conhecida como “doença da mão-dura” no estado do Piauí. Posteriormente, foi diagnosticado nos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia, São Paulo, Distrito Federal e em outros estados do país (Döbereiner *et al.*, 1992).

Surtos têm sido registrados nos últimos anos em extensas regiões do país acometendo sobretudo fêmeas em gestação ou lactação, com a estimativa de centenas de milhares de mortes (Döbereiner *et al.*, 1992; Dutra & Döbereiner 1995). Outro fator que contribuiu para o agravamento do problema foi a intensificação da contaminação ambiental pelos esporos de *C. botulinum*, principalmente a partir de cadáveres que entram em decomposição no pasto (Souza & Langenegger 1987; Ribas *et al.* 1994). Por outro lado, são ocasionalmente observadas situações em que pelas características e condições epidemiológicas, permite-se associar a ingestão de água contaminada à ocorrência de surtos da doença (Dutra *et al.* 1990).

De acordo com o guia de vigilância em saúde, todo caso de botulismo deve ser notificado à vigilância epidemiológica em até 24 horas. No Brasil, a notificação de surtos e casos isolados passou a ser feita de forma sistemática a partir de 1999 até os dias atuais (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019).

2.2 Sinais clínicos

No exame clínico pode-se evidenciar uma afeção neuromuscular, com o animal em decúbito esternal (Figura 1), com estado mental alerta e consciente ao meio ambiente circundante, efetuando tentativas infrutíferas para se erguerem (Figura 2) (TORRE *et al.*, 2019). A superfície corporal apresenta-se fria ao toque e com temperatura retal diminuída (37,5 – 38,0 °C), amplitude cardíaca diminuída com taquicardia e arritmia, sons ruminiais com

frequência normal, mas de intensidade diminuída, tônus muscular diminuído na cauda e língua (Figura 3), sendo esse último exclusivo do botulismo bovino, sialorreia, midríase, fezes homogêneas de consistência normal e pulso arterial fraco avaliado por palpação retal na aorta abdominal. (TORRE *et al.*, 2019).

Os animais apresentam perversão do apetite, onde os animais passam a ingerir e roer ossos dos cadáveres deixados no pasto, além de comer também restos de tendões e músculos, onde estão presentes as toxinas e esporos, ocorre devido um manejo nutricional deficiente de suplementação mineral, levando a um déficit de fósforo no organismo, situação essa que irá estabelecer a cadeia epidemiológica do botulismo a campo e levar ao diagnóstico do botulismo epizootico (GONZÁLEZ & SILVA, 2019).

O quadro clínico em bovinos sofre uma considerável variação, isso porque os sinais clínicos apresentados irão depender da quantidade de toxina que foi ingerida pelo animal. Músculos da locomoção, mastigação e deglutição estão envolvidos em todas as formas de evolução da patologia, variando na intensidade da manifestação clínica (DÖBEREINER & DUTRA, 2004).

Figura 1: Animais em decúbito esternal

Fonte: The center for food security & public health, 2020

Figura 2 - Animal apresentando dificuldade ao se levantar

Fonte: Blog Rehagro, 2020

Figura 3 - Animal com tônus muscular da língua diminuído

Fonte: The center for food security & public health, 2020

2.3 Diagnóstico

O diagnóstico antecipado do botulismo se baseia na história em uma mescla do histórico individual e do rebanho, obtendo informações através dos sinais clínicos característicos da doença (LOBATO *et al.*, 2013). Normalmente, as alterações *post mortem* não são tão significativos, mas a presença de ossos no rúmen pode indicar botulismo por osteofagia (LOBATO *et al.*, 2013).

Deve ser feito o diagnóstico diferencial para outras doenças que levam o animal ao quadro de decúbito dorsal (raiva, hipocalcemia, encefalites, traumas), técnicas laboratoriais

como a prova de BoNT ou toxicológico da bactéria no trato gastrointestinal (ALEMU & AYELE, 2018).

Ao realizar a observação do ambiente nota-se que as categorias animais mais acometidas pelo botulismo associado à osteofagia são as fêmeas em fase reprodutiva, os machos de engorda e os animais jovens. Quando se trata do botulismo relacionado a ingestão de água contaminada com os esporos, todas as categorias podem estar envolvidas. A presença de carcaças em decomposição na pastagem cria condições favoráveis à ocorrência do botulismo, visto que aumenta a contaminação do ambiente com os esporos da bactéria (DÖBEREINER & DUTRA, 2004).

Para pesquisa de toxinas, os materiais de predileção para envio são: 250 g de conteúdo intestinal, conteúdo ruminal, fragmentos de fígado e 20 mL de soro sanguíneo, em frascos estéreis. Deve-se enviar 250 g das fontes suspeitas como água, silagem, feno, cama de frango, e outras. O material deve ser enviado congelado, o mais rápido possível ao laboratório acompanhado do histórico da doença (MOREIRA, 2011).

No laboratório, é feita a identificação e detecção da toxina botulínica por meio de testes de soroneutralização em ratos (Figura 4) (LOBATO *et al.*, 2013). O diagnóstico laboratorial também é realizado através da cultura da bactéria, onde são coletadas as amostras da parte mais inferior do intestino e as larvas encontradas nas carcaças, essas são levadas para o laboratório no qual será realizado o crescimento da cultura, uma vez que esses microrganismos passam a crescer em meios de cultura é possível identificar que se trata da *C. botulinum* e identificar o tipo da toxina (ALEMU & AYELE, 2018).

Figura 4 - Inoculação de neurotoxina em camundongos

Fonte: Animal friends Croatia, 2008

2.4 Tratamento

Inexistem opções terapêuticas para a cura do botulismo, é disponível apenas a antitoxina polivalente ou específica, porém só há eficácia no início da doença, quando a toxina está circulante, antes de se fixar na sinapse neuromuscular (ANNIBALLI *et al.*, 2013; PANDIAN *et al.*, 2015). Não é indicado a administração de antibióticos clostridiocidas, visto que pode causar a quebra das formas vegetativas, desse modo, aumentando o número de toxinas no intestino animal. (PANDIAN *et al.*, 2015).

É recomendado o tratamento de sinais inespecíficos, como a desidratação, através da fluidoterapia intravenosa ou oral. Sendo contraindicado fármacos aminoglicosídeos, pois desfazem a junção neuromuscular de acetilcolina, levando ao aumento da fraqueza muscular (MOREIRA, 2011). Após a confirmação do diagnóstico é indicada a eutanásia para reduzir o sofrimento do animal enfermo (ANNIBALLI *et al.*, 2013; SILVA *et al.*, 2016).

2.5 Prevenção e controle

As medidas consideradas necessárias para prevenir ou diminuir riscos para o desenvolvimento do botulismo em bovinos são diversas, como descrito por Lobato *et al.* (2013) e Câmara *et al.* (2014), a vacinação é a principal forma de prevenção. Ademais, é de extrema importância minimizar a contaminação ambiental por *C. botulinum*, isso deve ocorrer através da remoção de carcaças que estão se decompondo nos pastos, podendo causar contaminação de animais, solos ou fonte de águas (NASSAR *et al.*, 2009; SKARIN *et al.*, 2013). Na eliminação desses cadáveres os métodos a serem utilizados devem ser a incineração ou a compostagem (Figura 5 e 6) (DÖBEREINER & DUTRA, 2004).

Também é necessário a correção de deficiências nutricionais e fornecimento dos minerais adequados (LOBATO *et al.*, 2007; CÂMARA *et al.*, 2014). Do mesmo modo se deve disponibilizar ao animal alimentação de qualidade e tomar todas as precauções no momento de produção da ensilagem ou fabricação da ração, assim como no seu estágio de armazenamento (ANNIBALLI *et al.*, 2013).

Figura 5 - Incineração de cadáveres de bovinos

Fonte: DÖBEREINER & DUTRA, 2004

Figura 6 - Compostagem. Cadáveres de bovinos cobertos são com uma maravalha (fonte de carbono), entrando em decomposição e após 50 a 60 dias o tecido mole está decomposto, encontrando-se somente os ossos, que serão incinerados

Fonte: DÖBEREINER & DUTRA, 2004

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O botulismo é uma enfermidade que ataca o sistema nervoso central causando uma flacidez neuromuscular generalizada, seus sinais clínicos apresentam um quadro de variação dependendo da quantidade de toxina ingerida pelo animal, não há cura para o botulismo, sendo mais indicada a vacinação dos animais.

É uma doença que apresenta muita importância para as criações de bovinos, visto que pode atingir os animais por diversas formas de transmissão, assim, levando a prejuízos nos tipos extensivos e intensivos de pecuária, por isso é extremamente necessário o controle de disseminação da doença.

REFERÊNCIAS

ALEMU, B.; AYELE, M. (2018). **Review on Botulism in Cattle**. 17-25. 10.5829/idosi.ajh.2018.17.25.

Animal friends Croatia. Botox - Animal Cruelty for a Questionable Beauty. Animal friends Croatia. 2008. Disponível em: <https://www.prijatelj-zivotinja.hr/index.en.php?id=1192>. Acesso em: 1 jul. 2021.

ANNIBALLI, F. *et al.* Manejo de surtos de botulismo animal: da suspeita clínica a contramedidas práticas para prevenir ou minimizar surtos. **Biosecurity and Bioterrorism**, v.11, S1, S191-S199, 2013. Disponível em: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23971806> >. Acesso em: 20. Maio. 2021.

Bovino. Parálisis flácida característica de botulismo.. The center for food security & public health. 2020. Disponível em: <https://www.cfsph.iastate.edu/es/enfermedades/disease-images/?disease=botulism&lang=es>. Acesso em: 1 jul. 2021.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços. Guia de Vigilância em Saúde: volume único [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços. – 3ª. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2019.

BRUGGEMANN, H. Genomics of clostridial pathogens: implication of extrachromosomal elements in pathogenicity. **Curr. Opin. Microbiol.**, v. 8, p. 601 – 605, 2005.

CÂMARA, A.C.L. *et al.* Epidemiology, Clinical Signs, Laboratorial and Pathological Findings in Eight Outbreaks of Botulism in Cattle in Rio Grande do Norte State, Northeastern Brazil. **Acta Scientiae Veterinariae**, v.42, p.1-8, 2014. Accessed: May. 20, 2021.

COSTA, G.M.; Salvador S.C.; Pereira M.N. 2008. Botulismo em bovinos leiteiros no Sul de Minas Gerais, Brasil. **Ciência Rural**. 38(7): 2068-2071.

DESTA, S.; MELAKU M.; ABDELA, N. (2016). Botulinum toxin and its biological significance: A review. **Austin Journal of Veterinary Science & Animal Husbandry**, 3(1), 1021.

DÖBEREINER, J. *et al* 1992. Epizootic botulism of cattle in Brazil. **Dtsch. Tierärztl. Wschr.** 99:188-190.

DUTRA, I.S. 2001. Epidemiologia, quadro clínico e diagnóstico pela soroneutralização em camundongo do botulismo em bovinos no Brasil, 1989- 2000. **Tese de Livre-Docência**, Faculdade de Odontologia de Araçatuba, Universidade Estadual Paulista. 133p.

DÖBEREINER, J.; DUTRA, I. O botulismo dos bovinos e o seu controle. **Seropédica: Embrapa Agrobiologia**, 2004. 6 p. (Embrapa Agrobiologia. Comunicado Técnico, 72).

DUTRA I.S.; DÖBEREINER J. 1995. Fatos e teorias sobre a doença da vaca caída: botulismo. *Hora Vet.*, Porto Alegre, 84:7-10.

DUTRA I.S. *et al* (1990). Botulismo de origem hídrica em bovinos no Brasil. **16th World Buiatrics Congress**, Salvador, Bahia, p.547-550.

DUTRA, I. S.; DÖBEREINER, J. Eficácia da Vaxall vacina botulínica bivalente – na prevenção do botulismo em bovinos. *Hora Veterinária*, v.16, n. 93. p. 22-26, 1996.

GALIZA, G.J.N. *et al*. Doenças do sistema nervoso de bovinos no Semi-Árido nordestino. **Pesq. Vet. Bras.**, Rio de Janeiro, v. 30, n. 3, p. 267-276, Mar. 2010. Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-736X2010000300014&lng=en&nrm=iso>. access on 21, may 2021.

GONZÁLEZ, Félix H. D.; SILVA, Sérgio C. **Minerais e vitaminas no metabolismo animal** - Porto Alegre: Laboratório de Análises Clínicas, Faculdade de Veterinária, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2019. viii. 135 p.

GRAÇA, D.L. *et al*. 2010. Patologia do sistema nervoso, p.580-582. In: Santos R.L. & Alessi A.C (Eds), **Patologia Veterinária**. Roca, São Paulo. 892p.

KUMMEL, J. *et al*. (2012). **Descriptive study of botulism in an Austrian dairy herd: a case report**. *Veterinari Medicina*, 57(2), 143-149.

LOBATO, F. C. F.; ALMEIDA, A.C.; ABREU, V. L. V.; SILVA, N.; NASCIMENTO, R. A.; MARTINS, N. E. Anticorpos neutralizantes em bovinos vacinados com toxóides botulínicos monovalentes e bivalentes tipos C e D. *Revista Brasileira de Medicina Veterinária*, v. 21, n. 1, p. 25-27, 1999.

LOBATO, F. C. F.; ASSIS, R. A.; SALVARANI, F. M. Principais Clostridioses dos ruminantes domésticos. **Rev. Vet. e Zootec.** p. 36-40, 2007.

LOBATO, F.C.F. *et al*. Clostridiosis of small ruminants. **Revista Portuguesa de Ciência Veterinária**, v.102, p.23-34, 2007. Available from: http://www.fmv.utl.pt/spcv/PDF/pdf6_2007/23-34.pdf >. Accessed: Jun. 2021.

LOBATO, F.C.F. *et al.* Clostridial infection in farm animals. **Veterinária e Zootecnia**, v.20, p.29-48, 2013.

MABONI, F. *et al.* Ocorrência de botulismo em bovinos confinados no Rio Grande do Sul. **Ci. Anim. Bras.**, Goiânia, v. 11, n. 4, p. 962-965, out./dez. 2010.

MASSON, J. H.; STEYN, H. P.; BISSCHOP, J. H. R. The immunization of bovines against lamsiekte. J. S. **Afr. Vet. Med. Assoc.**, v. 180, p. 163-164, 1938.

MOREIRA, Gustavo. **Botulismo bovino: Relato de Casos**. BELO HORIZONTE, f. 23, 2011. 23 p. Monografia (Medicina veterinária) - Universidade Federal de Minas Gerais. Disponível em: https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/SMOC-9FVM6Y/1/monografia_entregue_final_fev_2011.pdf. Acesso em: 19 jun. 2021.

PANDIAN, S.J. *et al* (2015). **Therapeutic management of botulism in dairy cattle**, **Veterinary World**, 8(11), 1305-1309

RADOSTITS, O.M. *et al* (2000). Diseases caused by bacteria – II. In: **Veterinary Medicine: A Textbook of Diseases of Cattle, Sheep, Pigs, Goats and Horses**. 9th Edition. Ed. W.B. SAUNDERS (Philadelphia), 757-760.

Rehagro. O que é e como prevenir o botulismo bovino?. Blog Rehagro. 2018. Disponível em: <https://rehagro.com.br/blog/o-que-e-e-como-prevenir-o-botulismo-bovino/>. Acesso em: 1 jul. 2021.

RIBAS A.I. *et al* (1994). **Deteção de esporos e toxinas de Clostridium botulinum em costelas de cadáveres decompostos de bovinos**. Anais XXIII Congr. Bras. Med. Veterinária, Olinda, Pernambuco, p. 142. (Resumo)

SILVA, R.O.S. *et al.* Botulism in ruminants in Brazil. **Cienc. Rural**, Santa Maria, v. 46, n. 8, pág. 1411-1417, ago, 2016. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010384782016000801411&lng=en&nrm=iso>. acesso em 21 de maio de 2021. Epub 10 de maio de 2016.

SKARIN, H. *et al.* 2013. The workshop on animal botulism in Europe. **Biosecurity and Bioterrorism: Biodefense Strategy, Practice, and Science**, 11(1), S183-S190

SOUZA A.M.; LANGENEGGER J. 1987. Esporos de Clostridium botulinum em torno de cadáveres decompostos de bovinos em pastagem no sul de Goiás. **Pesq. Vet. Bras.** 7(1):17-22.

TOKARNIA, C. H.; LANGENEGGER J.; LANGENEGGER C. H.; CARVALHO, E. V. Botulismo em bovinos no Piauí, **Pesq. Agropec. Bras.** v. 5, p. 465-472, 1970.

VALENTINE, B.A.; MCGAVIN, M.D. 2009. Músculo esquelético, p.1006-1010. In: McGavin M.D. & Donald J.F. (Eds), **Bases da Patologia em Veterinária**. Elsevier, Rio de Janeiro. 1476 p.

VANDERLUG, J. J., et al. Two outbreaks of type C and D botulism in sheep and goats in South Africa. J. of **South Africa Vet Assoc.** v. 66, p. 77-82, 1995.

DERMOIDE CORISTOMAL EM REGIÃO LIMBOESCLERAL DE CÃO TRATADO COM CERATECTOMIA SUPERFICIAL ASSOCIADA AO FLAP DE TERCEIRA PÁLPEBRA – RELATO DE CASO

Luciana Campos da Silva

Centro Universitário Luterano de Palmas (CEULP-ULBRA), Palmas, TO
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3233525522259417>

Dayverson de Souza dos Santos

Centro Universitário Luterano de Palmas (CEULP-ULBRA), Palmas, TO
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9098038452376471>

Paulo César Gontijo Zanatta

Centro Universitário Luterano de Palmas (CEULP-ULBRA), Palmas, TO
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6783086873027021>

Mayara Ferreira de Sousa

Médica Veterinária Clínica na Clínica Santa Helena Cany D'or, Palmas, TO
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4900204479104422>

Thaylane Santana Alves do Nascimento

Centro Universitário Luterano de Palmas (CEULP-ULBRA), Palmas, TO
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7696918061822779>

Thuanny Lopes Nazaret

Centro Universitário Luterano de Palmas (CEULP-ULBRA), Palmas, TO
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9543242416017460>

Informações sobre o

artigo:

Recebido em:

15/07/2021

Aceito em:

18/07/2021

Data de publicação:

04/08/2021

Palavras-chave:

Cisto dermoide

Limbo

Terceira pálpebra

Oftalmologia

RESUMO

Os dermóides são lesões congênitas benignas coristomais que acomete geralmente o limbo e pode envolver a pálpebra, córnea, conjuntiva ou uma combinação dessas estruturas. É caracterizado pela produção de tecido epitelial em uma posição anatômica anormal durante a fase embrionária. A terapêutica convencional é a exérese cirúrgica pela técnica de ceratectomia superficial. O objetivo desse trabalho é relatar o caso de um cão com dermoide coristomal de limbo cujo tratamento designado foi a ceratectomia superficial associada ao flap de terceira pálpebra. Foi atendido um cão, da raça rottweiler, com 6 meses de idade e histórico de aparecimento de uma nodulação no olho esquerdo. No exame físico foi observado uma massa elevada e circunscrita, na região do limbo medial, recobrindo parcialmente a córnea do olho esquerdo, com características semelhantes a um dermoide. Optou-se pelo tratamento cirúrgico de ceratectomia superficial associado ao recobrimento corneano com a terceira pálpebra com o objetivo de favorecer o processo de cicatrização. No pós-operatório, foi instituído uso de colírios antibiótico e inibidor tecidual de metaloproteinases, além de analgésico sistêmico e utilização do

colar elizabetano de forma contínua. Quinze dias depois do procedimento cirúrgico, o paciente foi anestesiado, o flap de terceira pálpebra desfeito e realizado o teste de fluoresceína com resultado negativo, evidenciando a cicatrização completa da córnea. Na análise histopatológica foi observado uma amostra livre de malignidade com presença de tecido epitelial irregular, processo inflamatório granulomatoso nodular e focos de fibrose, alterações compatíveis com cisto dermoide. Dois meses após o procedimento o paciente foi reavaliado e não apresentou qualquer sinal de recidiva local, lesão corneana ou comprometimento visual. Conclui-se que apesar do caráter benigno do coristoma a exérese em associação com o recobrimento da terceira pálpebra é indicada, pois não houve recidiva, proporcionou boa cicatrização, adequada funcionalidade do olho e melhor qualidade de vida ao paciente.

CORISTOMAL DERMOID IN THE LIMBOESCLERAL REGION OF A DOG TREATED WITH SUPERFICIAL KERATECTOMY ASSOCIATED WITH THE THIRD EYELID FLAP - CASE REPORT

ABSTRACT

Dermoids are congenital benign choristomal lesions that usually affect the limbus and may involve the eyelid, cornea, conjunctiva, or a combination of these structures. It is characterized by the production of epithelial tissue in an abnormal anatomical position during the embryonic stage. Conventional therapy is surgical excision using the superficial keratectomy technique. The aim of this paper is to report the case of a dog with limbal choristomal dermoid whose designated treatment was superficial keratectomy associated with a third eyelid flap. A 6-month-old dog, Rottweiler breed, with a history of appearance of a nodule in the left eye was treated. On physical examination, an elevated and circumscribed mass was observed in the medial limbus region, partially covering the cornea of the left eye, with characteristics similar to a dermoid. We opted for surgical treatment of superficial keratectomy associated with corneal covering with the third eyelid in order to favor the healing process. Postoperatively, antibiotic eye drops and tissue inhibitor of metalloproteinases were used, in addition to systemic analgesics and use of Elizabethan paste continuously. Fifteen days after the surgical procedure, the patient was anesthetized, the third eyelid flap was removed and the fluorescein test was performed with a negative result, showing complete healing of the cornea. Histopathological analysis showed a malignancy-free sample with the presence of irregular epithelial tissue, nodular granulomatous inflammatory process and fibrosis foci, alterations compatible with a dermoid cyst. Two months after the procedure, the patient was re-evaluated and did not show any signs of local recurrence, corneal injury or visual impairment. It is concluded that despite the benign character of the choristoma, excision in association with third eyelid coverage is indicated, as

Keywords:

Dermoid cyst

Limbus

Third eyelid

Ophthalmology

there was no recurrence, it provided good healing, adequate eye functionality and better quality of life for the patient.

1 INTRODUÇÃO

O cisto dermoide, chamado também de coristoma ocular ou dermoide ocular, apresenta casuística rara em cães e pode ser de caráter congênito onde no desenvolvimento embrionário, é possível que algumas células cutâneas se desprendam e migrem para a córnea ou conjuntiva, causando assim o surgimento do cisto dermoide na superfície ocular (ALBULQUERQUE et al., 2012), ou de caráter hereditário, onde se recomenda que os cães com essa anomalia sejam retirados da reprodução (GELLAT; GILGER; KERN, 2013). Esta patologia pode estar presente em conjuntiva palpebral ou bulbar, em córnea, em pálpebras ou eventualmente em terceira pálpebra e pode acometer uni ou bilateralmente (WILCOCK e NJAA, 2016; MANSILLA et al., 2000).

Algumas raças têm predisposição genética, sendo elas: Pastor Alemão, Dálmata, São Bernardo (GELLAT; GILGER; KERN, 2013) Rottweiler, Golden Retriever e Pinscher (STELMANN et al., 2012). A sua patogênese não está completamente esclarecida (BRUDENALL, 2007).

Geralmente apresenta crescimento lento e os sinais clínicos vão depender da sua localização e da severidade de desenvolvimento, sendo que na maioria das vezes há presença de pelos voltados à córnea e podem levar a irritação e lesões oculares graves (SLATTER, 2005; BRUDENALL, 2007).

O diagnóstico é fundamentado no histórico clínico do paciente e exame oftalmológico detalhado e complementado por exames como citologia e histopatológico (KILIÇ et al., 2012). Como diagnósticos diferenciais devem ser incluídos o cisto epidermoide, tecido granulomatoso, papiloma e neoplasia (STELMANN et al., 2012).

O tratamento de escolha é a remoção cirúrgica associada ou não ao recobrimento palpebral, para auxiliar na reepitelização da falha no epitélio (LEE et. al., 2005, ERDIKMEN). Recomenda-se uso de antibióticos e anti-inflamatórios tópicos, associados à utilização do colar Elizabetano para impedir qualquer contato com a região operada.

O objetivo do presente trabalho é relatar o caso de um cão com 6 meses de idade, apresentando dermoide coristomal de limbo cujo tratamento instituído foi a ceratectomia superficial associada ao flap de terceira pálpebra.

2 METODOLOGIA

Foi atendido na clínica veterinária Bichinho Chick em Palmas/TO, um cão, da raça rottweiler, com 6 meses de idade e histórico de aparecimento de um nódulo no olho esquerdo, percebido pelo tutor, a cerca de 4 meses atrás e de crescimento lento, porém a 1 mês notou-se crescimento relativamente rápido, mas sem causar dor e desconforto ao paciente. Na avaliação oftalmológica foi observado uma massa elevada e circunscrita, de coloração rósea, na região do limbo medial, recobrindo parcialmente a córnea do olho esquerdo, com características semelhantes a um dermoide (Figura 1). Foi realizado teste de Schirmer para avaliar quantitativamente o líquido lacrimal e teste de fluoresceína para avaliar a presença ou ausência de úlcera de córnea, ambos apresentaram resultados normais.

Figura 1 - Cisto dermoide em região limboescleral aos 2 meses (esquerda) e aos 6 meses de idade (direita)

Fonte: autores

Optou-se pelo tratamento cirúrgico de exérese da nodulação pela técnica de ceratectomia superficial devido ao crescimento rápido apresentado, necessidade de avaliação histopatológica da massa, bem como pelo incômodo manifestado pelo tutor com o crescimento da lesão. A técnica foi associada ao recobrimento corneano com a terceira pálpebra afim de favorecer o processo de cicatrização da córnea e por se tratar de uma técnica relativamente simples, de baixo custo e de fácil execução.

Para a realização do procedimento cirúrgico o paciente foi devidamente preparado e mantido sob anestesia geral associada com bloqueio local retrobulbar, visando melhor analgesia e manutenção do globo ocular centralizado. A antisepsia da superfície ocular foi realizada com solução de iodopovidona a 0,5% diluída em solução salina estéril, as pálpebras afastadas com auxílio de um blefarostato e o globo ocular mantido tracionado pela fixação de pontos de arrimo na conjuntiva bulbar (Figura 2).

Figura 2 - Posicionamento cirúrgico usando blefarostato e pontos de arrimo para realização de ceratectomia superficial

Fonte: autores

A cirurgia foi iniciada com uma incisão corneana circular envolvendo toda a lesão, passando pela região limbo corneoescleral. Na sequência, a borda lamelar anterior da córnea foi sustentada por uma pinça, o instrumental dissecador introduzido paralelo a ela, permitindo a ressecção do dermoide pela separação das camadas superficial e profunda da córnea. Após a exérese, a superfície ocular foi lavada com solução salina estéril aquecida e, como um suporte cirúrgico à lesão corneana, foi realizado o recobrimento do olho com a terceira pálpebra, sendo essa fixada à conjuntiva bulbar do canto lateral do olho com fio monofilamentar inabsorvível, com o objetivo de favorecer o processo de cicatrização (Figura 3, 4 e 5).

Figura 3 - Delimitação do cisto em região limboescleral

Fonte: autores

Figura 4 - Incisão na córnea para retirada do cisto

Fonte: autores

Figura 5 - Pós operatório imediato, cisto limboescleral completamente removido

Fonte: autores

Como suporte clínico pós-operatório, foi instituído uso de colírios antibiótico e inibidor tecidual de metaloproteinases, além de analgésico sistêmico e utilização do colar elizabetano de forma contínua. Quinze dias depois do procedimento cirúrgico, após o tutor negar manifestação de desconforto pelo paciente, este foi anestesiado, o flap de terceira pálpebra desfeito e realizado o teste de fluoresceína com resultado negativo, evidenciando a cicatrização completa da córnea, porém com discreto edema e hiperemia conjuntival, que foram associados ao flap (Figura 6).

Figura 6 - Aspecto do olho após a retirada do flap de terceira pálpebra aos 15 dias de pós operatório, sem fluoresceína (esquerda) e com fluoresceína (direita)

Fonte: autores

Após completa cicatrização da úlcera causada pela ceratectomia e com o objetivo de melhorar a transparência corneana foi prescrito colírio de acetato de prednisolona 1,0% a cada 8 horas durante 15 dias.

Aos 45 dias de pós operatório o paciente retornou para reavaliação oftalmológica sendo observado redução do tecido cicatricial que recobria a córnea e ausência do edema e hiperemia conjuntival apresentada anteriormente (Figura 7).

Figura 7 - Córnea e esclera cicatrizadas aos 45 dias de pós operatório

Fonte: autores

O paciente foi reavaliado após 60 dias do procedimento e não apresentou qualquer sinal de recidiva local, desconforto, lesão corneana ou comprometimento visual (Figura 8).

Figura 8 - Paciente sem sinais de recidivas, dor ou desconforto

Fonte: autores

O tecido excisado foi encaminhado para análise histopatológica que revelou uma amostra livre de malignidade com presença de tecido epitelial irregular, processo inflamatório granulomatoso nodular e focos de fibrose, alterações compatíveis com cisto dermoide.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com Maggs et al. (2013) o cisto dermoide ocular pode circundar conjuntiva, terceira pálpebra, margem palpebral, limbo, córnea ou uma combinação dessas estruturas. Weber; Van Hoven, (1990) e Slatter, (2005) o coristoma congênito benigno é raro nas pálpebras e na terceira pálpebra, em contrapartida Gellat; Gilger; Kern, (2013) relatam que esta afecção ocorre mais comumente na região do limbo o que está de acordo com o caso apresentado, por se tratar de um coristoma limboescleral. Quanto a localização do coristoma no limbo, Gellat; Gilger; Kern, (2013) descreve que o posicionamento mais comum é na região temporal, porém, no relato em questão, foi notado o coristoma na região medial do limbo.

Maggs et al., 2013; Stelmann et al., (2012) e Gross; Ihrke; Walder (1992) descrevem que o dermoide ocular é diagnosticado em animais jovens e que geralmente apresenta crescimento lento, fato que condiz com o presente relato, onde o paciente apresentou histórico de crescimento lento de uma massa elevada e circunscrita, na região do limbo medial, recobrando parcialmente a córnea do olho esquerdo sendo observado inicialmente, pelo tutor, aos 60 dias de vida, porém o mesmo apresentou crescimento rápido nos últimos 30 dias.

Na avaliação oftalmológica do caso relatado foi realizado teste de Schirmer e de fluoresceína, a literatura descreve que para o diagnóstico inicial do cisto dermoide é primordial a realização destes exames oftalmológicos (MANSILLA et al., 2000; DIAS et al., 2014). De acordo com Gellat; Gilger; Kern, (2013) outros exames oftalmológicos complementares como biomicroscopia, ultrassom de alta frequência, microscopia confocal ou tomografia determinam o grau da lesão e auxiliam no planejamento cirúrgico.

O tratamento de eleição do coristoma benigno é a excisão cirúrgica, com o objetivo de remover o tecido anômalo e melhorar a estética do paciente, sendo este um método de baixo custo, e relativamente seguro (MUDASIR et al. 2012; PARRAH et al. 2013). Gellat; Gilger; Kern, (2013) descreve que a ceratectomia superficial é a cirurgia mais convencional e necessita da utilização de instrumentais microcirúrgicos específicos que auxiliam na realização de um procedimento com mais precisão para a extração do tecido corneano podendo refletir em um melhor resultado clínico. O mesmo autor menciona, ainda, a utilização de dióxido de carbono ou ablação por laser de excímero na intervenção cirúrgica de ceratectomia.

A principal complicação cirúrgica após a ceratectomia superficial é a perfuração da córnea, o que pode levar à infecção local, dificuldade de cicatrização, opacidade de córnea e interferência na visão (OBER et al. 2009; KALPRAVIDH et al. 2009). O procedimento cirúrgico deve ser realizado somente após os 3 meses de vida do paciente, visando maior maturidade do sistema imune e hepatobiliar do mesmo (MANSILLA et al., 2000; OBER et al., 2009), o que corrobora com esse relato visto que o paciente tinha 6 meses de idade quando foi realizada a ceratectomia.

O recobrimento da ferida cirúrgica com a terceira pálpebra atrapalha a visualização da recuperação cicatricial do olho segundo LEDBETTER; e GILGER (2013), porém (KALPRAVIDH et al., 2009; GELLAT; GILGER; KERN, 2013) afirmaram que o recobrimento com a terceira pálpebra ou enxerto de membrana amniótica após a ceratectomia facilita a epitelização corneal, pode prevenir a perfuração e pode promover a cura dentro de uma semana. Autores descrevem também que a utilização de membrana

amniótica após a remoção do cisto dermoide em sete cães não provocou rejeição do enxerto em nenhum dos animais e que ocorreu uma maior translucidez da córnea com uma ótima cicatrização pela diminuição da inflamação e vascularização (KALPRAVIDH et al., 2009). Nesse caso, a técnica de recobrimento com a terceira pálpebra proporcionou uma cicatrização completa da córnea após 15 dias do procedimento cirúrgico, sendo uma alternativa eficaz, simples e menos onerosa que o uso de membrana amniótica.

Segundo Fossum as úlceras de córnea não devem ser tratadas com corticosteroides sistêmicos ou tópicos, já que estes fármacos suprimem o sistema imune local e potencializam a infecção. No caso descrito optou-se pela não utilização de colírio antiinflamatório no pós-operatório imediato sendo instituído uso de colírio antibiótico e inibidor tecidual de metaloproteinases, além de analgésico sistêmico e utilização do colar elizabetano de forma contínua conforme Ober et al, (2009). Autores preconizam que reavaliações contínuas após a ceratectomia para o acompanhamento da cicatrização com aplicações de corante de fluoresceína na ferida cirúrgica pode prevenir complicações (GELLAT; GILGER; KERN, 2013). O uso de corticóides tópicos diminui a vascularização, a cicatriz e a pigmentação, contribuindo para melhora da transparência da córnea (LEE et al, 2005; SLATTER, 2005). Contudo, só devem ser administrados em pacientes negativos para úlcera de córnea após o teste de fluoresceína (SLATTER, 2005; DIETRICH, 2007). No relato em questão optou-se pela utilização de corticóide tópico após teste de fluoresceína negativo para úlcera de córnea após 15 dias de pós operatório, em acordo com as recomendações dos autores.

No exame histopatológico geralmente são observadas glândulas sebáceas, sudoríparas e tecido adiposo (HORIKIRI et al., 1994; BALLAND et al., 2015). No caso descrito houve presença de tecido epitelial irregular, processo inflamatório granulomatoso nodular e focos de fibrose.

4 CONCLUSÕES

Conclui-se que apesar do caráter benigno do coristoma a cirurgia é indicada pois, quando bem executada, não cursa com recidiva, além disso o recobrimento com a terceira pálpebra associada à técnica, foi eficiente por proporcionar boa cicatrização, adequada funcionalidade do olho e melhor qualidade de vida ao paciente.

REFERÊNCIAS

- ALBUQUERQUE, L. V. R. P.; HUNNING, P. S.; BERCHT, B. S.; PIGATTO, J. A. T. **Dermoide ocular- revisão de literatura.** Medvep - Revista Científica de Medicina Veterinária - Pequenos Animais e Animais de Estimação; 2012; 10(32); 44-47
- BALLAND O.; RAYMOND, I.; MATHIESON, I.; ISARD, P. F.; VIDÉMONT-DREVON, E.; DULAURENT, T. **Canine Bilateral Conjunctivo-Palpebral Dermoid: Description of Two Clinical Cases and Discussion of the Relevance of the Terminology.** Case Reports in Veterinary Medicine, 2015. 2: p. 1-6.
- BRUDENALL, K. D.; BERNAYS, M. E.; PEIFFER JUNIOR, R. L. **Central corneal dermoid in a Labrador Retriever puppy.** Journal of Small Animal Practice, 2007. v. 48, n. 1, p. 588-590.
- DIAS FGG, HONSHO CS, PEREIRA LF, BRUNELLI ATJ, DIAS LGGG. **Considerações clínicas e cirúrgicas do dermoide em superfície ocular de cães: revisão de literatura.** Enciclopédia Biosfera, 2014. 10(18): p.1133-1143.
- ERDIKMEN, D. O.; AYDIN, D.; SAROGLU, M.; GUZEL, O.; HASIMBEGOVIC, H.; EKICI, A.; GUREL, A.; OZTURK, G. Y. **Surgical correction of ocular dermoids in dogs: 22 cases.** Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, v. 19, n. 1, 2013. p. 41- 47.
- GELLAT, K. N.; GILGER, B. C.; KERN, T. J. **Veterinary Ophthalmology.** Fifth Edition - Two Volume Set, 2013. p. 840, 993-994.
- HORIKIRI, K.; OZAKI, K.; MAEDA, H.; NAMARA, I. **Corneal dermoid in two laboratory beagle dogs.** Jikken Doutsu, 1994. 43 (3). p. 417-420.
- KILIÇ, N.; TOPLU, N.; EPIKMEN, E. T. **Surgical treatment of corneal large dermoid in a simmental calf.** Acta Scientiae Veterinariae, v. 40, n. 2, 2012.p. 1-5.
- LEE, J.; KIM, M.; KIM, I.; KIM, Y.; KIM, M. **Surgical correction of corneal dermoid in a dog.** Journal of Veterinary Science, v. 6, n. 4, p. 369-370, 2005.
- MANSILLA, M.; VEUTHEY, C.; VASCONCELLOS, A.; PENA, P. **Teratoma dermoide quístico córneo-conjuntivo em um perro ovejero alemán (Canis familiaris). Caso clínico.** Revista Chilena de Anatomía, v. 18, n. 2, p. 273-277, 2000
- SLATTER, D. S. **Córnea e Esclera.** In: Fundamentos de Oftalmologia Veterinária. 3ª ed. São Paulo: Roca, 2005. p.283- 338
- STELMANN, U. J. P.; SILVA, A. A.; SOUZA, B. G.; OLIVEIRA, G. F.; MELLO, E. B. F. R. B.; SOUZA, G. C. J.; HESS, T. M. **Dermoid cyst in sheep – a case report.** Revista Brasileira de Medicina Veterinária, v. 34, n. 2, p. 127-130, 2012.
- WILCOCK, B. P.; NJAA, B. L. **Special Senses.** In: MAXIE, M. G. (Ed.) Jubb, Kennedy, and Palmer's Pathology of domestic animals. 6. ed., vol. 1. Missouri: Elsevier, 2016. p. 407-508

SOBRE OS ORGANIZADORES

VICTOR HUGO VIEIRA RODRIGUES

Possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Rural do Semiárido (2005), mestrado em Programa de Pós-graduação em Ciências Veterinárias pela Universidade Estadual do Ceará (2010) e doutorado em Biotecnologia pela Rede Nordeste de Biotecnologia (2016). Atualmente é professor do Centro Universitário Maurício de Nassau Fortaleza, responsável pelas disciplinas de anatomia descritiva e topográfica dos animais domésticos e da disciplina de patologia geral e técnicas de necropsia. É orientador no programa de especialização do Ifope Educacional em Minas Gerais. Além disso, é membro do corpo editorial da editora in vivo e organizador dos e-books Atualidades na Saúde e Bem-Estar Animal e Atualidades e Fundamentos na Reprodução e no Desenvolvimento. Tem experiência na área de Medicina Veterinária, com ênfase em embriologia, biotécnicas da reprodução, patologia clínica e anatomia veterinária.

CV lattes: <http://lattes.cnpq.br/2226604565550002>

AKSA INGRID VIEIRA BATISTA

Discente de Medicina Veterinária da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) e vice-presidente do Grupo de Estudos de Animais Selvagens da mesma universidade (GEAS-UFERSA). Pesquisadora (Iniciação Científica - PIVIC) do Laboratório de Parasitologia Animal da UFERSA (LPA-UFERSA) com o projeto intitulado "Ecto e endoparasitos em animais silvestres e exóticos cativos no Parque Zoobotânico Arruda Câmara, João Pessoa-PB". Monitora da disciplina de Parasitologia Animal, orientada pela Profª Drª Josivania Soares Pereira. Possui e possui linhas de pesquisa relacionadas a Animais Silvestres e Exóticos, com ênfase em Parasitologia e Histopatologia.

CV lattes: <http://lattes.cnpq.br/6614624885083003>

ÍNDICE REMISSIVO

A

Ancylostoma, 20, 21, 23, 24, 28, 66, 67, 68, 69,
70, 71, 72, 74
Antibióticos, 76

B

Bactérias, 76

C

Caninos, 20
Cisto dermoide, 101, 104
Clostridium botulinum, 89, 90, 99, 100
Compostos, 7, 20, 30, 40, 47, 57, 66, 76, 89, 101
coproparasitológicos, 7, 9, 10, 13, 20, 22, 54

E

Exames, 7, 20

F

Felinos, 40

H

Helminto, 66

Helmintos, 52

J

Jumento, 47

L

Lactona macrocíclica, 47
Leishmaniose visceral, 30, 37, 38

N

Nefrectomia, 57

P

Pequenos ruminantes, 7
Pneumologia, 40

R

Rim, 57, 61

S

Saúde pública, 76

EDITORA
IN VIVO

ACESSE:

www.editorainvivo.com

Avance na ciência! Venha ser In Vivo!