Multiplicidade das Ciências da Saúde

Volume 2

Organizadores

Lidia Rocha de Oliveira

José Erivelton de Souza

Maciel Ferreira

Editora In Vivo.

Avance na ciência a
cada dia!

**MULTIPLICIDADE DAS CIÊNCIAS DA SAÚDE
VOLUME 2**

LIDIA ROCHA DE OLIVEIRA

JOSÉ ERIVELTON DE SOUZA MACIEL FERREIRA

(Organizadores)

2022

Esta obra está licenciada com uma Licença [Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) (CC BY 4.0).

O conteúdo desta obra e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade exclusiva dos autores. Permitido o download da obra e o compartilhamento desde que sejam atribuídos créditos aos autores, permitindo-se uso para fins comerciais.

Editor Chefe

Dr. Everton Nogueira Silva

Conselho Editorial

1 Colégio de Ciências da Vida

1.1 Ciências Agrárias

Dr. Aderson Martins Viana Neto
Dra. Ana Paula Bezerra de Araújo
MSc. Edson Rômulo de Sousa Santos
Dr. Fágner Cavalcante P. dos Santos
MSc. Fernanda Beatriz Pereira Cavalcanti
MSc. Filomena Nádia Rodrigues Bezerra
Dra. Lina Raquel Santos Araújo
Dr. Luis de França Camboim Neto
MSc. Maria Emília Bezerra de Araújo
MSc. Yuri Lopes Silva
1.2 Ciências Biológicas
Dra. Antonia Moemia Lúcia Rodrigues Portela
1.3 Ciências da Saúde
Dra. Ana Luiza M. Cazaux de Souza Velho
Dr. Isaac Neto Goes Silva
Dra. Maria Verônica Coelho Melo
Dra. Paula Bittencourt Vago
MSc. Paulo Abílio Varella Lisboa
Dra. Vanessa Porto Machado
Dr. Victor Hugo Vieira Rodrigues

2 Colégio de Humanidades

2.1 Ciências Humanas

Dra. Alessandra Maria Sousa Silva
MSc. Francisco Brandão Aguiar
MSc. Julyana Alves Sales

2.2 Ciências Sociais Aplicadas

MSc. Cícero Francisco de Lima
MSc. Erivelton de Souza Nunes
MSc. Janaildo Soares de Sousa
MSc. Karine Moreira Gomes Sales
Dra. Maria de Jesus Gomes de Lima
MSc. Maria Rosa Dionísio Almeida
MSc. Marisa Guilherme da Frota

3 Colégio de Ciências Exatas, Tecnológica e Multidisciplinar

3.1 Ciências Exatas e da Terra

MSc. Francisco Odécio Sales
Dra. Irvila Ricarte de Oliveira Maia

3.2 Engenharias

MSc. Amâncio da Cruz Filgueira Filho
MSc. Gilberto Alves da Silva Neto
MSc. Henrique Nogueira Silva
Dr. João Marcus Pereira Lima e Silva
MSc. Ricardo Leandro Santos Araújo

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação - CIP

O48m	Oliveira, Lidia Rocha de. Multiplicidade das ciências da saúde [livro eletrônico]. / Organizadores: Lidia Rocha de Oliveira e José Erivelton de Souza Maciel Ferreira. Fortaleza: Editora In Vivo, 2022. v. 2, 128 p. Bibliografia. ISBN: 978-65-995500-7-2 DOI: 10.47242/978-65-995500-7-2 1. Ciências da saúde. 2. Ciências da saúde - multiplicidade. I. Título. II. Organizadores.
------	--

CDD 610

Denise Marques Rodrigues – Bibliotecária – CRB-3/CE-001564/O

APRESENTAÇÃO

A Saúde é uma área muito ampla, envolvendo diferentes profissionais, âmbitos de trabalho e pontos de vista. Adota-se com frequência o termo saúde única, que relaciona a saúde do paciente ou ser humano à saúde animal e ao meio ambiente.

Esta obra reúne diversos estudos na grande área da saúde, ressaltando sua inter e multidisciplinaridade. Estudos em saúde pública, em saúde do idoso, em ética e atuação profissional do enfermeiro e do médico foram abordados neste segundo volume.

No entanto, ainda há muito a se descobrir sobre o ser humano e suas interações interpessoais e com o meio ambiente. Portanto este E-book se traduz em uma amostra de estudos em saúde em suas múltiplas faces.

Tenham uma boa leitura!

Lidia Rocha de Oliveira

José Erivelton de Souza Maciel Ferreira

SUMÁRIO

Capítulo 1 - DOI: 10.47242/978-65-995500-7-2-1

Autores: Aline Silva Ramos, Luciana Aparecida de Souza Nascimento, Maucilene Portal de Ataíde e Artemize Kelly Pereira da Costa.

FISIOTERAPIA NA DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE (DMD): EFEITOS, PERFIL DE ATENDIMENTO E PERFIL DE PACIENTES..... 06

Capítulo 2 - DOI: 10.47242/978-65-995500-7-2-2

Autores: Lorena Delgado Rodrigues, Diego Rios Queiróz, Nádia Rahmeh de Paula e Leonardo Zornoff.

PAPEL DA GEOMETRIA VENTRICULAR COMO PREDITOR DE SÍNDROME CARDIORRENAL TIPO I NA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA AGUDA..... 19

Capítulo 3 - DOI: 10.47242/978-65-995500-7-2-3

Autores: Juliana Silva Siqueira, Erika Tiemi Nakandakare-Maia, Artur Junio Togneri Ferron, Fabiane Valentini Francisqueti-Ferron e Camila Renata Corrêa.

FARELO DE ARROZ MODULA MARCADORES DO DESEQUILÍBRIO REDOX NO HIPOTÁLAMO DE RATOS OBESOS..... 23

Capítulo 4 - DOI: 10.47242/978-65-995500-7-2-4

Autora: Silvia Helena Ferraz Planard.

MORTALIDADE EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS..... 34

Capítulo 5 - DOI: 10.47242/978-65-995500-7-2-5

Autores: Leonardo Valente Sanchez, Tatiane Cristina de Carvalho, Adriana Polachini do Valle e Paulo Jose Fortes Villas Boas.

OCORRÊNCIA DE QUEDAS EM IDOSOS DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA: ESTUDO DE COORTE..... 44

Capítulo 6 - DOI: 10.47242/978-65-995500-7-2-6

Autores: Dara Cesario Oliveira, Vivian Saraiva Veras, Jamilly de Aquino Mendonça, Francisca Sousa Lima, Antonia Maynara Lourenço Aires, Aida Teixeira Sancho e Ana Carolinna Correia Sales

APLICATIVOS MÓVEIS PARA EDUCAÇÃO EM SAÚDE EM PESSOAS COM DIABETES MELLITUS TIPO 2: UMA REVISÃO INTEGRATIVA..... 56

Capítulo 7 - DOI: 10.47242/978-65-995500-7-2-7

Autores: Jamilly de Aquino Mendonça, Dara Cesario Oliveira, Vivian Saraiva Veras, Francisca Sousa Lima, Antonia Maynara Lourenço Aires, Aida Teixeira Sancho e Ana Carolinna Correia Sales

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM PARA UM PACIENTE COM DIABETES MELLITUS TIPO 2 E HIPOTIREOIDISMO: RELATO DE EXPERIÊNCIA..... 66

Capítulo 8 - DOI: 10.47242/978-65-995500-7-2-8

Autores: José Erivelton de Souza Maciel Ferreira, Raphaella Castro Jansen, Lídia Rocha de Oliveira, Daniel Freitas Oliveira Damasceno, Francisco Breno Barbosa de Oliveira, Maria Jocelane Nascimento da Silva, Alanna Elcher Elias Pereira, Glauciano de Oliveira Ferreira, Lucas de Sousa Silva, Hudson Pimentel Costa e Mohamed Said Balde, Janiel Ferreira Felício.

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A UMA PUÉRPERA GEMELAR INTERNADA EM ALOJAMENTO CONJUNTO: RELATO DE EXPERIÊNCIA..... 74

Capítulo 9 - DOI: 10.47242/978-65-995500-7-2-9

Autores: Raiane Martins da Silva, Rafaella Martins Mota, Lídia Rocha de Oliveira, José Erivelton de Souza Maciel Ferreira, Natália Klauck de Souza, Jocilene da Silva Paiva, Joelita de Alencar Fonseca Santos, Giliana Martins da Costa, Geovanna Renaisa Ferreira Caldas, Ana Caroline Moraes Paiva, Maria Charlianne de Lima Pereira Silva e Alana Rocha Tomaz de Souza.

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A UM PACIENTE COM PNEUMONIA NECROSANTE..... 85

Capítulo 10 - DOI: 10.47242/978-65-995500-7-2-10

Autores: André Ribeiro de Castro Júnior, Ticiane Freire Gomes, Marcos Augusto de Paula Santos, Maria Iara Socorro Martins, Daniel Germano Alcântara, Iohanna Aragão de Paiva, Tayná Albuquerque Tabosa, Ana Naiara Alves Teixeira, Leticia Kelly Costa Silva e Francisco Jadson Franco Moreira

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A UM PACIENTE COM PNEUMONIA NECROSANTE..... 93

Capítulo 11 - DOI: 10.47242/978-65-995500-7-2-11

Autores: Ticiane Freire Gomes, André Ribeiro de Castro Júnior, Tayná Albuquerque Tabosa, Iohanna Aragão de Paiva, Marcos Augusto de Paula Santos, Ana Naiara Alves Teixeira, Daniel Germano Alcântara, Maria Iara Socorro Martins, Thalyta Gleyane Silva de Carvalho e Francisco Jadson Franco Moreira.

PACIENTES HOSPITALIZADOS POR SARS-COV-2 EM VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA E ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO: CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS..... 104

Capítulo 12 - DOI: 10.47242/978-65-995500-7-2-12

Autores: Maria Josivânia da Silva, Jocilene da Silva Paiva, Samara dos Reis Nepomuceno, Alanna Elcher Elias Pereira, Joana Darc Martins Torres, Ana Caroline Moraes Paiva, Dulce Helena de Sousa, Terezinha Almeida Queiroz, Edmara Chaves Costa, Janyelle Jeronimo de Sousa Silva e Hilderlânia de Freitas Lima

ASSISTÊNCIA DE SAÚDE HUMANIZADA: ANÁLISE DOS FATORES INTERFERENTES..... 116

SOBRE OS ORGANIZADORES..... 126

ÍNDICE REMISSIVO..... 128

FISIOTERAPIA NA DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE (DMD): EFEITOS, PERFIL DE ATENDIMENTO E PERFIL DE PACIENTES

Aline Silva Ramos

Docente de Fisioterapia da Faculdade de Macapá (FAMA), Macapá - AP.

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1355698338777882>

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4837-2239>

Luciana Aparecida de Souza Nascimento

Especializanda em Fisioterapia Intensiva Adulto, Pediátrica e Neonatal, Centro de Estudos em Reabilitação Traumatortopédica, João Pessoa - PB.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7530-5931>

Maucilene Portal de Ataíde

Especializanda em Fisioterapia Respiratória e em Terapia Intensiva, Faculdade Metropolitana do Estado de São Paulo, São Paulo - SP

Artemize Kelly Pereira da Costa

Acadêmica de Fisioterapia da Faculdade Estácio de Macapá, Macapá - AP

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4272-7094>

Informações sobre o

artigo:

Recebido em:

28/09/2021

Aceito em:

30/09/2021

Data de publicação:

07/02/2022

Palavras-chave:

Distrofia Muscular de

Duchenne

Fisioterapia

Neurologia

RESUMO

A Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) é uma doença neuromuscular debilitante, genética recessiva, que se agrava com o tempo, afetando 1 em cada 3.500 meninos nascidos vivos. Objetivo: Verificar as estratégias fisioterapêuticas mais utilizadas no tratamento de DMD, seus efeitos e o perfil dos pacientes atendidos. Metodologia: Revisão Integrativa da Literatura, quantitativa, com busca realizada em Março e Maio de 2020, utilizando-se o DeCS "Distrofia Muscular de Duchenne", nos bancos de dados PubMed, Biblioteca Virtual de Saúde/Bireme, Periódicos CAPES, PEDro e no site de busca acadêmica Google Acadêmico, incluindo artigos científicos e trabalhos de conclusão de curso de graduação e pós-graduação publicados entre 2010 e 2019, em língua portuguesa e inglesa. Foram selecionadas e analisadas 10 publicações do tipo pesquisas de campo originais, com texto completo e acesso gratuito. Resultados: o perfil prevalente dos pacientes incluídos em pesquisas de campo envolvendo os efeitos da fisioterapia na DMD foi sexo masculino, na fase da adolescência, cadeirantes, atendidos em associações multiprofissionais. Sobre a realização da fisioterapia, o tempo de terapia mais utilizado nos estudos foi entre 1 e 5 sessões, com duração de 41 a 50 minutos, usando as modalidades de cinesioterapia isolada, terapia aquática isolada ou terapia combinada de Cinesioterapia + Hidroterapia + Respiratória, priorizando as estratégias de exercícios respiratórios, treino de marcha, exercícios ativos livres ou assistidos e fisioterapia aquática e cinesioterapia geral. E, finalmente, os efeitos da fisioterapia mais

investigados foram locomoção, funções respiratórias e a força muscular, com resultado de manutenção ou melhora de locomoção e função respiratória, e melhora da força muscular, na maioria das pesquisas. Apenas 1 artigo mencionou piora da função locomotora após a fisioterapia e 1 artigo, piora da função respiratória. Conclusão: a fisioterapia se mostrou benéfica, seja para manter ou para melhorar as diferentes funções destes pacientes.

PHYSIOTHERAPY IN DUCHENNE MUSCULAR DYSTROPHY (DMD): EFFECTS, CARE PROFILE AND PATIENT PROFILE

ABSTRACT

Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) is a debilitating, genetic recessive neuromuscular disease that worsens over time, affecting 1 in 3,500 live-born boys. Objective: To verify the physiotherapeutic strategies most used in the treatment of DMD, their effects and the profile of the patients seen. Methodology: Integrative literature review, quanti-qualitative, using the DeCS “Muscular Dystrophy of Duchenne” in PubMed, Bireme, CAPES, PEDro and Google Scholar databases, with selection of articles and academic papers published between 2010 and 2019, in Portuguese and English, totaling 10 selected publications. Results: the prevalent profile was male patients, adolescents, wheelchair users and seen in multiprofessional associations. Physiotherapy was performed with 1 to 5 sessions, lasting 41 to 50 minutes, using isolated kinesiotherapy, isolated hydrotherapy or combination of Kinesiotherapy, Hydrotherapy and Respiratory, prioritizing the strategies of breathing exercises, gait training and free or assisted active exercises. The most investigated effects were locomotion, respiratory functions and muscle strength, with the result of maintaining or improving locomotion and respiratory function, and improving muscle strength, in most studies. Conclusion: physical therapy proved to be beneficial, either to maintain or to improve the different functions of these patients.

Keywords:

Duchenne Muscular

Dystrophy

Physiotherapy

Neurology

1 INTRODUÇÃO

A Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) é uma doença neuromuscular debilitante e progressiva, de caráter genético recessivo, causada por produção deficiente da proteína distrofina, encontrada na membrana de células musculares. Afeta 01 para cada 3.500 meninos nascidos vivos (FERREIRA et. al., 2015).

Caracterizada pela perda progressiva da força muscular, especialmente a partir da região proximal do membro inferior e tronco, resulta em perda do equilíbrio, quedas frequentes, alterações do ortostatismo e da marcha, redução das amplitudes de movimento, afetando a postura e a realização das atividades funcionais (NUNES et. al., 2008).

As manifestações relacionam-se ao enfraquecimento paulatino das fibras musculares de ambos os hemisférios, iniciando no quadril e membros inferiores, avançando para tronco, cintura escapular, membros superiores, pescoço e músculo do sistema respiratório (SANTOS et. al., 2006). Em média, aos 10 anos de idade, o paciente para de andar, passa a usar cadeiras de rodas, a capacidade respiratória vai reduzindo (RAMOS et. al., 2008), surgem problemas cardíacos e neurológico-cognitivos, podendo prejudicar fala, memória e atenção (SANTOS; SEVILHA; SOUTO, 2015).

A fisioterapia objetiva ganhos na capacidade funcional, adiando a deterioração da doença com atividades cinesioterápicas, respiratórias, posturais, em solo e água, prevenindo encurtamentos musculares e deformidades com atividades de baixo impacto (FERREIRA et. al., 2015).

Assim, este artigo objetivou investigar as estratégias fisioterapêuticas mais usadas no tratamento da Distrofia Muscular de Duchenne conforme dados da literatura, o perfil dos pacientes com Distrofia Muscular de Duchenne em atendimento fisioterapêutico e os efeitos da fisioterapia nestes pacientes.

2 METODOLOGIA

A pesquisa realizada do tipo revisão integrativa da literatura, com abordagem quanti-qualitativa e busca realizada foi nos meses de março e maio de 2020, utilizando-se o DeCS “Distrofia Muscular de Duchenne”. O universo de busca foram os bancos de dados PubMed, Biblioteca Virtual de Saúde/Bireme, Periódicos CAPES, PEDro e o site de busca acadêmica Google Acadêmico. Os critérios para inclusão das publicações foram: artigos, teses, monografias ou similares publicados por revistas científicas ou páginas de Instituições de Ensino Superior nos anos de 2010 a 2019, em idioma português ou inglês, que fossem pesquisas de campo originais, com texto completo disponível e acesso gratuito.

Os critérios de exclusão foram produções repetidas ou duplicadas, estudos incompletos ou comprometidos, não realizados com seres humanos e que não responderam pelo menos 50% dos objetivos específicos. Foram selecionadas 10 publicações. A análise dos dados foi feita de maneira quantitativa, com base no total absoluto e percentual para os

resultados achados para cada objetivo traçado; e qualitativa, por meio de análise descritiva dos textos das obras publicadas.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A coleta de dados ocorreu em 03 etapas: 1) busca com o Descritor de Ciências da Saúde (DeCS) “Distrofia Muscular de Duchenne” em cada base de dados, na qual foram encontrados 10.193 resultados na Bireme, 34 resultados no CAPES, 32 resultados na PEDro, 19 resultados na PubMed e 2.400 resultados no GA; 2) aplicação dos filtros de cada base de dados conforme critérios de inclusão e exclusão, somando 317 resultados para a Bireme, 04 para o CAPES, 15 para a PEDro, 4 para a PubMed e 16 no GA; e 3) análise de títulos e resumos individuais para seleção final dos artigos, totalizando 4 trabalhos selecionados na Bireme, nenhum trabalho selecionado na CAPES, nenhum trabalho selecionado na PEDro, 1 selecionado na PubMed e 5 selecionados no GA, compondo a amostra de 10 publicações analisadas neste estudo. As publicações selecionadas apresentam-se listada na Tabela 1, a seguir:

Tabela 1 - Autores, anos e títulos das pesquisas selecionadas para análise

	Autores	Título
A1	Gomes et. al. 2011	Desempenho Motor Funcional na Distrofia Muscular de Duchenne: estudo de um caso.
A2	Ramacciotti; Nascimento. 2010	Efeito do Exercício Resistido na Função Motora do Paciente com Distrofia Muscular de Duchenne
A3	Silva et. al. 2012	Interferência da Fisioterapia Aquática na Agilidade de Paciente com Distrofia Muscular de Duchenne não Deambulador
A4	Almeida et. al. 2012	Efeitos da Imersão nos Parâmetros Ventilatórios de Pacientes com Distrofia Muscular de Duchenne
A5	Gevaerd et. al. 2010	Alterações fisiológicas e metabólicas em indivíduos com Distrofia Muscular de Duchenne durante tratamento fisioterapêutico: um estudo de caso
A6	Silva et. al. 2015	Análise do gasto energético na Distrofia Muscular de Duchenne nos ambientes aquático e terrestre
A7	Quadrado. 2014	Aprendizagem Motora em Tarefa Virtual na Distrofia Muscular
A8	Jansen et. al. 2013	Assisted Bicycle Training Delays Functional Deterioration in Boys With Duchenne Muscular Dystrophy: The Randomized Controlled Trial “No Use Is Disuse”

A9	Albuquerque et. al. 2012	Desconforto respiratório em pacientes com distrofia muscular e restrição ventilatória grave durante uma sessão de hidroterapia
A10	Ferreira et. al. 2015	Comparação da função motora em solo e imersão de pacientes com Distrofia Muscular de Duchenne em acompanhamento fisioterapêutico-follow-up de 2 anos

Fonte: Dados da Pesquisa, 2020.

Os resultados achados foram estruturados de acordo com os objetivos planejados, em 03 tópicos gerais: Perfil dos pacientes avaliados nas publicações, estratégias fisioterapêuticas mais utilizadas no tratamento de DMD e por fim os efeitos da fisioterapia nos pacientes. Todas as informações obtidas através de análise das pesquisas selecionadas estão expostas nas tabelas 2, 3 e 4.

Tabela 2 - Perfil dos pacientes incluídos nas amostras dos estudos selecionados

Sexo	Masculino		Feminino		Masc. +Fem.		Não Menciona	
	N	%	N	%	N	%	N	%
	09	90%	00	0%	01	10%	00	00
Idade	Crianças		Adolescentes		Crianças e Adolescentes		Crianças, Adolesc. e Adultos	
	N	%	N	%	N	%	N	%
	01	10%	06	60%	01	10%	02	20%
Local de atendimento	Clínicas		Associações		Casa e escola		Não Menciona	
	N	%	N	%	N	%	N	%
	03	30%	06	60%	01	10%	00	00
Tempo de tratamento	1-5 sessões		6-10 sessões		> 11 sessões		Não Menciona	
	N	%	N	%	N	%	N	%
	04	50%	03	30%	02	10%	01	10%

Fonte: Dados da Pesquisa, 2020.

Sobre o perfil dos pacientes incluídos nos estudos analisados, a tabela 2 indica que o sexo predominante foi o masculino, com 9 das 10 pesquisas (90%) tendo incluído apenas meninos na amostra, enquanto 1 estudo (10%) incluiu meninas e meninos porque abordava outras distrofias musculares além de Duchenne.

Quadrado (2014) já mencionava que a mãe do paciente é a principal responsável por carregar a mutação, apresentando um grande risco de ter filhos do sexo masculino afetados. Já a mãe que é portadora da mutação não apresenta nenhum tipo de manifestação clínica, sendo apresentada apenas por indivíduos do sexo masculino.

Para análise da idade, tomou-se como referência a divisão criada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que define infância como a faixa etária de 0 a 09 anos, adolescência como a fase de 10 a 19 anos, e vida adulta acima dos 20 anos. Em relação à idade, a maioria dos estudos abordou a fase da adolescência (06 artigos, 60%), seguido dos que investigaram crianças, adolescentes e adultos (02 artigos, 20%).

Este estudo indicou que a maioria das pesquisas envolveu apenas adolescentes, o que pode indicar que crianças com DMD são tardiamente encaminhadas para serviços que prestam assistência multidisciplinar, mas que também tem relação com o fato de pacientes com DMD possuírem sobrevida em torno dos 18 aos 25 anos, indo a óbito por comprometimento cardíaco ou insuficiência respiratória.

Em 6 dos 10 estudos, os pacientes incluídos eram cadeirantes (A3, A4, A5, A7, A8, A9), com ou sem doenças associadas, incluindo a necessidade de uso de Ventilação Mecânica Não Invasiva durante o sono; 3 estudos incluíam somente pacientes que ainda deambulavam (A1, A2, A6), com ou sem déficits associados, em melhor ou pior condição; e 1 incluiu tanto cadeirantes quanto deambulantes (A10).

Conforme Albuquerque et. al. (2012), na adolescência, a fraqueza muscular impossibilita a criança de andar. A função motora de tronco e membros superiores (MMSS) encontra-se comprometida e acaba se agravando ainda mais após o confinamento na cadeira de rodas⁹.

Os locais de atendimentos que mais foram citados foram as associações (06 artigos, 60%), que incluíram a Associação de Apoio à Criança Deficiente Central – AACD (A3, A4, A6), a Associação Brasileira de Distrofia Muscular – ABDIM (A7, A9, A10); as clínicas (n=03, 30%), que incluíram 2 clínicas de fisioterapia (A1 e A2) e a clínica de prevenção e reabilitação física da Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC (A5); e, por último, casa e escola (n=01,10%).

E quanto ao tempo de tratamento fisioterapêutico, a maioria dos estudos envolveu um número de 1 a 5 sessões (n=05,50%) (A4, A6, A7, A9), seguido dos que realizaram 6 a 10 sessões (n=03,30%) (A2, A3, A5) e, em último lugar, o tratamento com mais de 11 sessões (n=01, 10%) (A8, A10).

Tabela 3 - Estratégias Fisioterapêuticas utilizadas nas pesquisas analisadas

MODALIDADES	N	%	ESTRATÉGIAS	N	%	DURAÇÃO DA SESSÃO	N	%
Cinesioterapia	02	20%	Exercícios respiratórios	06	60%	15 - 30 Minutos	02	20%
Terapia Aquática	02	20%	Treino de marcha	05	50%	31 - 40 Minutos	01	10%
Cinesioterapia +Hidroterapia +Respiratória	02	20%	Exercícios ativos livres ou assistidos	05	50%	41 -50 Minutos	03	30%
Cinesioterapia +Respiratória	01	10%	Aquática geral	05	50%	51– 60 Minutos	02	20%
Hidroterapia+ Respiratória	01	10%	Cinesioterapia geral	04	40%	Não menciona	02	20%
Ambientes de realidade virtual	01	10%	Alongamento de MMSS e MMII	04	40%			
Treinamento assistido de bicicleta	01	10%	Exercício para coordenação e equilíbrio	04	40%			
			Mobilização articula/ADMP	03	30%			
			Exercícios resistidos	03	30%			
			Exercício aeróbico	02	20%			
			Método Halliwick	02	20%			
			Natação/Nado	01	10%			

Fonte: Dados da Pesquisa, 2020.

Sobre o perfil de tratamento, era também esperado que o maior índice dos locais de atendimentos fosse as associações, em especial a AACD, já que esses pacientes necessitam de tratamento multidisciplinar, o que costuma ser disponibilizado por essas instituições. Contudo, era esperado que o tempo de duração do tratamento fosse maior, já que a doença é incurável, precisando de atendimento sem prazo de término. Identificou-se um tempo de tratamento fisioterapêutico curto (1 a 5 sessões), contudo, isso não necessariamente reflete todo o tratamento fisioterapêutico dos pacientes, podendo ter sido um recorte temporal apenas para coleta de dados. Porém, ainda assim, para pacientes de um quadro progressivo crônico, um tempo curto de coleta pode não permitir que se verifique o resultado ou eficácia real das técnicas aplicadas.

Gevaerd et. al. (2010) já falavam que, apesar de ser uma doença incurável, o tratamento da DMD tem que ser multidisciplinar, envolvendo médico, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional e fisioterapeuta, visando sempre o seu bem-estar. Dentre os tratamentos utilizados, a fisioterapia apresenta importância fundamental para a prevenção de complicações.

Na tabela 3, verificamos que as modalidades de tratamento fisioterapêutico mais utilizadas foram a Cinesioterapia isolada (A2, A8), a Terapia Aquática isolada (A3, A4) e a terapia combinada de Cinesioterapia + Hidroterapia + Respiratória (A10, A1), todos com os mesmos resultados (n=02, 20%).

Sobre as estratégias mais utilizadas dentro dessas modalidades, o mesmo artigo foi enquadrado em mais de uma opção de resposta, visto que todos utilizaram mais de uma estratégia fisioterapêutica. As estratégias mais utilizadas pelas pesquisas foram exercício respiratório com e sem incentivadores (n=6, 60%) (A1, A3, A4, A5, A9, A10); seguido do treino de marcha (n=5, 50%) (A1, A2, A6, A9, A10); dos exercícios ativos livres ou assistidos (n=5, 50%) (A3, A5, A8, A9, A10); e da aquática geral (n=5, 50%) (A1, A3, A4, A6, A10).

Quanto à duração de cada sessão de fisioterapia, o tempo mais utilizado pelas pesquisas foi de 41 a 50 minutos (n=3, 30%) (A5, A9, A10); 2 pesquisas (20%) utilizaram tempo de 15 a 30 minutos (A6 e A8); e 2 pesquisas (20%) utilizaram o tempo de 51 a 60 minutos (A2 e A3).

Todos os achados a respeito da forma de realização da fisioterapia já eram esperados, visto que cinesioterapia, terapia aquática e fisioterapia respiratória costumam ser a modalidades de tratamento sugeridas pela literatura para a DMD, objetivando manter a função respiratória e cardíaca e o máximo possível de funcionalidade motora, necessitando dos exercícios respiratórios e ativos, seja em solo ou em água, especialmente no caso de adolescentes em que o quadro motor e respiratório já está se agravando.

Albuquerque et. al. (2012) explicam que na adolescência o comprometimento da musculatura cardíaca e ventilatória já se apresentam. Em função disso, problemas respiratórios são frequentes nas distrofias musculares e estão associados à fraqueza dos músculos respiratórios.

Com a evolução da doença, acontece perda da força muscular e os portadores de DMD podem evoluir com alteração da mecânica ventilatória, tais como diminuição da ventilação e da complacência pulmonar, tosse ineficiente e padrão incomum de respiração, tornando-os mais expostos a contrair infecções pulmonares. Assim, o tratamento precoce

das manifestações respiratórias, através do fortalecimento muscular, melhora a ventilação pulmonar e previne atelectasias e pneumonias, podendo impedir hospitalizações e atuar atrasando o óbito destes pacientes (MELO; CARVALHO, 2011).

Ramos et. al. (2008) relatam que as causas mais comuns de morbidade e mortalidade em pacientes com distrofia muscular são os distúrbios respiratórios. Na DMD, os distúrbios respiratórios são a causa da mortalidade em mais de 70% dos pacientes e estima-se que 55% a 90% dos pacientes morrem de insuficiência respiratória entre 16 e 19 anos de idade.

Segundo Almeida et. al. (2012), a fisioterapia aquática busca otimizar a função muscular global, inclusive dos músculos associados à respiração, e facilitar a movimentação ativa através das propriedades do meio líquido.

A hidroterapia pode promover alívio de dor e espasmos musculares, manutenção da amplitude de movimento das articulações, reeducação dos músculos paralisados, melhora a circulação sanguínea e encoraja atividades funcionais melhorando assim a coordenação, equilíbrio e postura (NAVARRO; LOPES, 2006).

Segundo Ramacciotti e Nascimento (2010), a cinesioterapia motora ativa livre e/ou resistida, objetiva retardar a evolução da perda da função motora dos pacientes de DMD, ainda que o tratamento deva ser o mais cauteloso possível, para não fadigar a criança.

Fonseca et. al. (2007) ressaltam que alguns estudos chegam a advertir sobre um possível efeito danoso dos exercícios físicos aos pacientes com DMD, especialmente nas atividades que demandam muita força contra a ação da gravidade, de forma constante. De outro modo, a falta de exercício físico ocasiona uma rápida perda funcional de órgãos e sistema.

Campos e Santana (2018) mencionam que os exercícios resistidos com intervalo do programa de exercícios, e o respeito do princípio da particularidade, podem agregar ganhos maiores de força quando realizados por crianças de menor idade, lembrando assim, que a idade pode ser fator definitivo no tratamento motor de portadores de DMD.

Tabela 4 - Efeitos da Fisioterapia identificados nas pesquisas analisadas

	Melhorou		Piorou		Manteve		Não menciona	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Locomoção	03	30%	01	10%	02	20%	04	40%
Função respiratória	03	30%	01	10%	02	20%	04	40%
Força muscular	04	40%	00	00	00	00	06	60%
Função cardiovascular	00	00	00	00	02	20%	08	80%
Quadro algico	01	10%	00	00	00	00	09	90%
Outros	02	20%	02	20%	02	20%	04	40%

Fonte: Dados da Pesquisa, 2020.

A tabela 4 evidencia que os efeitos da fisioterapia mais analisados foram locomoção (A1, A3, A6, A7, A8, A10) e função respiratória (A1, A3, A4, A5, A7, A9), cada um analisado por 6 estudos (60%), enquanto a força muscular foi analisada por apenas 4 artigos (40%). As funções menos avaliadas foram quadro algico, avaliado por apenas 1 estudo (10% - A1) e função cardiovascular (n=2, 20% - A5, A4). Outros efeitos foram analisados em 6 estudos, incluindo o metabolismo e a percepção subjetiva de esforço (A5), gasto energético (A6), estadiamento da doença e Atividades de Vida Diária (A1, A2, A3, A10).

Pode-se perceber que, nos estudos que avaliaram locomoção, houve uma igualdade de resultados entre os estudos em que ela melhorou e aqueles em que ela se manteve ou piorou; nos que analisaram a função respiratória, igualmente; na análise de força muscular, todos os artigos que a fizeram identificaram melhora da função; no quesito função cardiovascular, houve manutenção desta nos 2 estudos que a avaliaram; e no único artigo que analisou quadro algico, houve indicação de melhora. Nos outros parâmetros analisados, houve igualdade entre resultados de melhora, piora e manutenção da função.

A análise da locomoção e da função respiratória nos estudos de DMD são, de fato, as mais esperadas, já que a locomoção é que nos dá possibilidade de autonomia e independência, e os primeiros sinais evidentes da doença envolvem o comprometimento da marcha, com evolução para a dependência da cadeira de rodas, acarretando problemas tanto musculoesqueléticos quanto respiratórios, por causa da fraqueza muscular, deformação na caixa torácica e escoliose, o que compromete a ventilação pulmonar.

Tanaka et. al. (2007) explicam que a DMD apresenta rápido avanço, com início dos sintomas por volta dos 2-3 anos de idade. A criança mostra diversas modificações motoras, tais como dificuldade em levantar-se e ficar em pé, dificuldade na marcha e quedas

frequentes. As alterações da marcha, quando não tratadas, ocorrem entre 8 e 12 anos de idade e podem acentuar alterações posturais, como as escolioses, e deformidades em tornozelos. As escolioses podem causar mudanças da dinâmica da caixa torácica, atuando na capacidade respiratória, deixando a pessoa exposta a infecções pulmonares que podem levar a óbito.

Segundo Nascimento et. al. (2015), os objetivos das intervenções respiratórias consistem em melhorar ou redistribuir a ventilação, melhorar a força, a resistência à fadiga e a coordenação dos músculos respiratórios, evitar complicações pulmonares pós-cirúrgicas, aumentar a efetividade da tosse e promover limpeza das vias aéreas, corrigir padrões respiratórios ineficientes e diminuir o trabalho respiratório, e melhorar a capacidade funcional geral do paciente para atividades de vida diária.

A cinesioterapia motora sob a forma de exercícios ativos e passivos moderados, voltados principalmente para os membros inferiores, quando aplicados na fase inicial da DMD, prolongam o desenvolvimento de contraturas, a deambulação independente e maximizam as capacidades funcionais, proporcionando uma melhor qualidade de vida (MOURA; CUNHA; MONTEIRO, 2002).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo evidenciou que o perfil prevalente dos pacientes incluídos em pesquisas de campo envolvendo os efeitos da fisioterapia na DMD foi sexo masculino, adolescentes, cadeirantes, atendidos em associações multiprofissionais. Quanto à realização da fisioterapia, o perfil foi de tempo de terapia entre 1 e 5 sessões, com duração de 41 a 50 minutos, fazendo uso das modalidades de cinesioterapia isolada, terapia aquática isolada ou terapia combinada de Cinesioterapia, Hidroterapia e Respiratória, priorizando as estratégias de exercícios respiratórios, treino de marcha, exercícios ativos livres ou assistidos e fisioterapia aquática e cinesioterapia geral. Os efeitos da fisioterapia mais investigados foram locomoção, funções respiratórias e a força muscular, com resultado de manutenção ou melhora de locomoção e função respiratória, e melhora da força muscular, na maioria das pesquisas. Apenas 1 artigo mencionou piora da função locomotora após a fisioterapia e 1 artigo, piora da função respiratória.

Tais resultados ressaltam os benefícios que a fisioterapia pode trazer, seja para manter ou para melhorar as diferentes funções destes pacientes, porém também a importância de se realizar mais estudos envolvendo as crianças e o potencial de retardo da progressão da doença que a fisioterapia pode trazer, algo difícil de avaliar quando só se avalia essas pessoas ao chegar na adolescência, com complicações já instaladas. Ressalta-se também

o importante papel que instituições como a AACD desenvolvem no cuidado e no desenvolvimento de pesquisas para esse público.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, P.S. et. al. Desconforto Respiratório em Pacientes com Distrofia Muscular e Restrição Ventilatória grave durante uma sessão de hidroterapia. **Cadernos de Pós-Graduação em Distúrbios do desenvolvimento**, v.12, n.2, 2012.

ALMEIDA, C. et. al. Efeitos da Imersão nos Parâmetros Ventilatórios de Pacientes com Distrofia Muscular de Duchenne. **Revista Acta Fisiátrica**, v.19, n.1, pp. 21-25, 2012.

CAMPOS, A.B.R.; SANTANA, D.B. Intervenção fisioterapêutica motora em crianças com Distrofia Muscular de Duchenne e Becker. **Revista Eletron. Atualiza Saúde**, Salvador, v.7, n.7, pp. 84-94, jan/jun, 2018.

FERREIRA, A.V.S. et. al. Comparação da Função Motora em Solo e Imersão de Pacientes com Distrofia Muscular de Duchenne em acompanhamento fisioterapêutico-follow-up de 2 anos. **Acta Fisiátrica**, v. 22, n.2, pp. 51-54, 2015.

FONSECA, J.G. et. al. Distrofia muscular de Duchenne: complicações respiratórias e seu tratamento. **Revista de Ciências Médicas**, v.16, n.2, pp. 109-120, mar/abril. 2007.

FREZZA, R.M.; SILVA, S.R.N.; FAGUNDES, S.L. Atualização do Tratamento Fisioterapêutico das Distrofias Musculares de Duchenne e de Becker. **Rev-Bras-Promoção Saúde – RBPS**, Fortaleza, v.18, n.1, pp. 41-49, jan. 2005.

GEVAERD, M.D et. al. Alterações Fisiológicas e Metabólicas em indivíduos com Distrofia Muscular de Duchenne durante tratamento Fisioterapêutico: um estudo de caso. **Fisioter. Mov.**, Curitiba, v.23, n.1, pp. 93-103, 2010.

MELO, A.P.F.; CARVALHO, F.A. Efeitos da fisioterapia respiratória na Distrofia Muscular de Duchene. **Revista Neurociências**, v.19, n.4, pp. 686-693, 2011.

MOURA, R.C.F.; CUNHA, M.C.B; MONTEIRO, A.P. Orientações fisioterapêuticas motoras para pacientes portadores de Distrofia Muscular de Duchenne na fase I. **Fisioterapia Brasil**, v.3, n.1, pp. 46-52, jan/fev. 2002.

NASCIMENTO, L.P. et. al. Treinamento muscular respiratório em Distrofia Muscular de Duchenne. **Revista Neurociências**, v.23, n.1, pp. 9-15, 2015.

NAVARRO, F.M.; LOPES, M.F. Implicações da fisioterapia aquática na assistência motora e familiar do paciente com Distrofia Muscular de Duchenne. **Revista Uningá**, v.8, n.1, 2006.

NUNES, G.A. et. al. Influência da Fisioterapia Aquática no Quadro de Estresse Infantil, em Paciente com Distrofia Muscular de Duchenne (estudo de caso). **Revista Brasileira de Ciências da Saúde**, v.6, n.16, abr/jun. 2008.

QUADRADO, V.H. **Aprendizagem Motora em Tarefa Virtual na Distrofia Muscular.** Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo: 2014.

RAMACCIOTTI, E.C.; NASCIMENTO, C.F. Efeito do Exercício Resistido na Função Motora do Paciente com Distrofia Muscular de Duchenne. **Revista Neurociências**, v.18, n.3, pp. 341-346, 2010.

RAMOS, F.A.B. et. al. Avaliação da força muscular respiratória e do peakflow em pacientes com distrofia muscular do tipo Duchenne submetidos à ventilação não invasiva e à hidroterapia. **Pulmao RJ**, v.17, n.2-4, pp. 81-86, 2008.

SANTOS, N.M. et. al. Perfil clínico e funcional dos pacientes com Distrofia Muscular de Duchenne assistidos na Associação Brasileira de Distrofia Muscular (ABDIM). **Revista Neurociências**, v.14, n.1, pp. 015-022, jan/mar. 2006.

SANTOS, W.M.; SEVILHA, R.C.C.; SOUTO, A. Aspectos Genéticos, Fisiológicos e Clínicos de um Paciente com Distrofia Muscular de Duchenne. **Ensaio e Ciência: Ciências Biológicas, Agrárias e da Saúde**, v.13, n.1, pp. 107-123, 2015.

SILVA, K.M. et. al. Interferência da Fisioterapia Aquática na agilidade de Pacientes com Distrofia Muscular de Duchenne não Deambulador. **Acta Fisiátr.**, v.19, n.1, pp. 42-5, 2012.

TANAKA, M.S. et. al. Principais instrumentos para a análise da marcha de pacientes com distrofia muscular de Duchenne. **Revista Neurociências**, v.15, n.2, pp. 153-159, 2007.

PAPEL DA GEOMETRIA VENTRICULAR COMO PREDITOR DE SÍNDROME CARDIORRENAL TIPO I NA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA AGUDA

Lorena Delgado Rodrigues

Faculdade de Medicina de Botucatu, Botucatu – SP
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5230142868080429>

Diego Rios Queiróz

Faculdade de Medicina de Botucatu, Botucatu – SP
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9199393816019554>

Nádia Rahmeh de Paula

Faculdade de Medicina de Botucatu, Botucatu – SP
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5194405993440759>

Leonardo Zornoff

Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Botucatu, Botucatu – SP
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5016839015394547>

Informações sobre o

artigo:

Recebido em:

28/10/2021

Aceito em:

10/11/2021

Data de publicação:

07/02/2022

Palavras-chave:

Insuficiência Cardíaca

Síndrome Cardiorenal

Prognóstico

RESUMO

O padrão de geometria ventricular tem implicações conhecidas no prognóstico de pacientes com insuficiência cardíaca crônica de diferentes etiologias, mas é desconhecido o seu papel nos quadros de insuficiência cardíaca aguda. Adicionalmente, apesar da importância do tema, não há estudos que abordem a relação da geometria com o aparecimento e gravidade da síndrome cardiorenal tipo I nos pacientes com IC aguda. Neste estudo prospectivo e observacional com pacientes hospitalizados com insuficiência cardíaca aguda, admitidos no Hospital das Clínicas de Botucatu, avaliamos a associação entre os sete padrões de geometria ventricular esquerda com o desenvolvimento da síndrome cardiorenal tipo I. Dados clínicos, laboratoriais e ecocardiograma foram avaliados para 55 pacientes. Não se encontrou associação entre os padrões de geometria do ventrículo esquerdo e o aparecimento de SC tipo I, em pacientes hospitalizados com insuficiência cardíaca aguda.

VENTRICULAR GEOMETRY'S ROLE AS A PREDICTOR OF TYPE I CARDIORENAL SYNDROME IN ACUTE HEART FAILURE

ABSTRACT

The ventricular geometry pattern has known implications for the prognosis of patients with chronic heart failure of different etiologies, but its role in acute heart failure is unknown. Additionally, despite the importance of the topic, there

Keywords:**Heart Failure****Cardiorrenal syndrome****Prognosis**

are no studies addressing the relationship between geometry and the onset and severity of type I cardiorenal syndrome in patients with acute heart failure. In this prospective and observational study with patients hospitalized with acute heart failures admitted to Hospital das Clínicas de Botucatu, we evaluated the association between the seven patterns of left ventricular geometry with the development of type I cardiorenal syndrome. Clinical, laboratory and echocardiographic data were evaluated for 55 patients.

There was no association found between left ventricular geometry patterns and the appearance of type I cardiorenal syndrome in patients hospitalized with acute heart failure.

1 INTRODUÇÃO

No surgimento da síndrome de insuficiência cardíaca, frente a diversos fatores agressores, ocorrerão alterações moleculares, celulares e intersticiais, caracterizando o fenômeno de remodelação cardíaca. Mais recentemente, vem ganhando destaque no estudo da remodelação cardíaca o papel desempenhado por diferentes padrões de geometria ventricular esquerda. Outro fator relevante na disfunção cardíaca é a Síndrome cardiorrenal (SC) tipo I, caracterizada por piora aguda da função renal em consequência da piora da insuficiência cardíaca. No entanto, a relação entre os padrões de geometria e a SC não é conhecida.

Desta maneira, o estudo objetiva avaliar a associação entre os sete padrões de geometria ventricular esquerda com o desenvolvimento de síndrome cardiorrenal tipo I, em pacientes hospitalizados com insuficiência cardíaca aguda.

2 METODOLOGIA

Estudo prospectivo e observacional que incluiu pacientes admitidos no Hospital das Clínicas de Botucatu com diagnóstico de insuficiência cardíaca aguda, durante o período de outubro de 2019 a junho de 2020. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da FMB (número de aprovação: 25770819.0.0000.5411) e os pacientes foram incluídos após assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido.

Os dados foram coletados durante a admissão hospitalar, em que se avaliou os dados clínicos e laboratoriais. Os pacientes foram submetidos também à realização de ecocardiograma. Todos foram acompanhados durante a internação, sendo registradas as

medicações prescritas, o diagnóstico de síndrome cardiorenal do tipo I e a mortalidade intra-hospitalar. A SC foi caracterizada por elevações acima de 0,3mg/dl nos valores de creatinina e melhora com tratamento da insuficiência cardíaca.

As variáveis categóricas foram analisadas pelo teste de Quiquadrado. Para comparação entre dois grupos, utilizamos o teste t de Student e o teste de Mann-Whitney. Para comparação das variáveis contínuas utilizamos o teste de correlação de Spearman. A associação do padrão de geometria com os desfechos (SC e mortalidade) intra-hospitalares foi feita por regressão logística univariada. O nível de significância adotado foi de 5%.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram incluídos no estudo 55 pacientes, sendo que os padrões de geometria ventricular encontrados foram: hipertrofia excêntrica (49%), normal (20%), hipertrofia concêntrica (20%) e remodelamento concêntrico (11%). Vinte e um pacientes apresentaram síndrome cardiorenal tipo I. Não foram encontradas associações entre o aparecimento da SC e os padrões de geometria ($P=0,801$), com a fração de ejeção ($P=0,980$) ou com a mortalidade ($P=1,000$).

Das limitações do estudo destacam-se o tamanho amostral reduzido e sua realização em um único centro.

4 CONCLUSÃO

O estudo não encontrou associação entre os padrões de geometria do ventrículo esquerdo e o aparecimento de SC tipo I, em pacientes hospitalizados com insuficiência cardíaca aguda.

REFERÊNCIAS

ESC guidelines. **2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure.** Eur Heart J 2016; 37:2129-2200

FARAH E, FUSCO DR, OKUMOTO PR, et al. **Impact of ventricular geometric pattern on cardiac remodeling after myocardial infarction.** Arq Bras Cardiol 2013;100:518-23.

GAASCH W, ZILE M, **Left Ventricular structural remodeling in health and disease with emphasis on volume, mass and geometry,** J Am Coll Cardiol 2011;58:1733-40.

KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury. Kidney International 2012; 2 (suppl 1): 1-138.

KOREN MJ, DEVEREUX RB, CASALE PN, et al. **Relation of left ventricular mass and geometry to morbidity and mortality in uncomplicated essential hypertension.** Ann Intern Med 1991;114:345-5

MAGGIONI AP, DAHLSTROM U, FILIPPATOS G, et al. **EURObservational Research Programme: regional differences and 1-year follow-up results of the Heart Failure Pilot Survey (ESC-HF Pilot).** Eur J Heart Fail 2013; 15:808-17.

RANGASWANI J, BHALLA V, BLAIR J, et al. **AHA Scientific Statement. Cardiorenal syndrome: classification, pathophysiology, diagnosis, and treatment.** Circulation 2019; 139:840-78.

STAPCZYNSKI JS & TINTINALLI JE (2016). **Tintinalli's emergency medicine: A comprehensive study guide** (8th ed.). New York, N.Y.: McGraw-Hill Education LLC.

FARELO DE ARROZ MODULA MARCADORES DO DESEQUILÍBRIO REDOX NO HIPOTÁLAMO DE RATOS OBESOS

Juliana Silva Siqueira

Universidade Estadual Paulista (UNESP), Faculdade de Medicina de Botucatu, Botucatu – SP
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3172-2199>
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1794868129841404>

Erika Tiemi Nakandakare-Maia

Universidade Estadual Paulista (UNESP), Faculdade de Medicina de Botucatu, Botucatu – SP
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1253-001X>
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6567215985816672>

Artur Junio Togneri Ferron

Universidade Estadual Paulista (UNESP), Faculdade de Medicina de Botucatu, Botucatu – SP
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7089-3033>
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8456051687173106>

Fabiane Valentini Francisqueti-Ferron

Universidade Estadual Paulista (UNESP), Faculdade de Medicina de Botucatu, Botucatu – SP
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2910-4308>
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8974836677143731>

Camila Renata Corrêa

Universidade Estadual Paulista (UNESP), Faculdade de Medicina de Botucatu, Botucatu – SP
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8493-5329>
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8515265257310064>

Informações sobre o

artigo:

Recebido em:

28/10/2021

Aceito em:

10/11/2021

Data de publicação:

07/02/2022

Palavras-chave:

Obesidade

Farelo de arroz

Cérebro

RESUMO

A obesidade é definida como o excesso de gordura corporal que pode trazer prejuízos à saúde. O balanço energético positivo, resultado do elevado consumo calórico, favorece a hiperadiposidade, que é lipotóxica com propagação de sinais pró-oxidantes que podem afetar o funcionamento de órgãos como o cérebro, levando a doenças neurodegenerativas. No intuito de prevenir comorbidades associadas ao estresse oxidativo, a adição de compostos bioativos com ação antioxidante como o gama-oryzanol, presente no farelo de arroz, tem sido alvo de pesquisas. O objetivo foi avaliar o efeito preventivo do consumo de farelo de arroz sobre marcadores do estresse oxidativo no hipotálamo de animais submetidos à dieta rica em açúcar e gordura. Foram utilizados ratos Wistar machos (n=16) do Biotério Central da Faculdade de Medicina de Botucatu-UNESP. O protocolo experimental seguiu o projeto já aprovado (CEUA-1311) pela Comissão de Ética em Experimentação Animal da Faculdade de Medicina de Botucatu-UNESP. Os animais foram casualmente distribuídos em 2 grupos para receberem: dieta rica em açúcar e gordura (HSF, n=8) e dieta rica em açúcar e gordura+farelo de arroz (HSF+FA, n=8) ao longo de 20 semanas. O farelo de arroz

foi adicionado às rações HSF na concentração de 11%. Foram avaliados: índice de adiposidade, pressão arterial sistólica, perfil glicêmico e o estresse oxidativo no hipotálamo. Os dados estão expressos em média e desvio padrão. Comparação por Teste T de *student* e nível de significância de 5%. Os valores de ingestão calórica, peso corporal final, índice de adiposidade e pressão arterial sistólica não apresentaram diferença significativa entre os grupos, ao passo que os níveis de glicose em jejum, malondialdeído (MDA) e carbonilação de proteínas reduziu no grupo HSF+FA quando comparado ao grupo HSF. O consumo de farelo de arroz mostrou-se uma estratégia eficiente para prevenção do desequilíbrio RedOx no hipotálamo decorrente de obesidade.

RICE BRAN MODULATES REDOX IMBALANCE MARKERS IN THE HYPOTHALAMUS OF OBESE RATS

ABSTRACT

Obesity is defined as excess body fat that can harm health. The positive energy balance, resulting from high caloric intake, favors hyperadiposity which is lipotoxic with propagation of pro-oxidant signals that can affect organs functions such as the brain, leading to neurodegenerative diseases. In order to prevent comorbidities associated with oxidative stress, the addition of bioactive compounds such as gamma-oryzanol, present in rice bran, has been the subject of research. The aim was to evaluate the preventive effect of rice bran consumption on oxidative stress markers in the hypothalamus of animals fed with high sugar-fat diet. Male Wistar rats (n=16) from the Central Animal Facility of the Faculdade de Medicina de Botucatu-UNESP were used. The experimental protocol followed the already approved project (1311) and was approved by the Animal Experimentation Ethics Committee of the Faculty of Medicine of Botucatu-UNESP. The animals were randomly divided into 2 groups to receive: a high sugar-fat diet (HSF, n=8) and a high sugar-fat diet+rice bran (HSF+FA, n=8) over 20 weeks. Rice bran was added to control and HSF diets at a concentration of 11%. It was evaluated: adiposity index, systolic blood pressure, glycemic profile and oxidative stress in the hypothalamus. Data are expressed as mean and standard deviation. Comparison by Student's T Test with 5% significance level. The values of caloric intake, final body weight, adiposity index and systolic blood pressure showed no significant difference between groups, whereas fasting glucose, malondialdehyde (MDA) and protein carbonyl levels decreased in the HSF+FA group when compared to the group HSF. Rice bran consumption was shown to be a strategy to prevent the RedOx imbalance in the hypothalamus resulting from obesity.

Keywords:

Obesity

Rice bran

Brain

1 INTRODUÇÃO

A obesidade é definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS), como excesso de gordura corporal que pode trazer prejuízos à saúde do indivíduo (AWADA; PARIMISSETTY; D'HELLEN COURT, 2013). Em balanço energético positivo, o tecido adiposo sofre hipertrofia e hiperplasia, aumentando exacerbadamente a produção de fatores inflamatórios que se propagam sistemicamente, afetando assim, a função normal de outros órgãos, dentre eles o cérebro (BHAT, Z. F. *et al.*, 2017; FRANCISQUETI, F. V. *et al.*, 2017; MONTEIRO; AZEVEDO, 2010). O aumento do metabolismo do adipócito, excesso de nutrientes e liberação de macrófagos residentes a partir do processo inflamatório e necrose durante a expansão do tecido adiposo contribuem com uma maior produção de espécies reativas de oxigênio (ROS), favorecendo o desenvolvimento de complicações sistêmicas pelo desequilíbrio redox. O fator NFκ-B é estimulado a produzir mais citocinas pró-inflamatórias quando há um aumento das ROS, criando um ciclo de retroalimentação entre estresse oxidativo e inflamação. Esse ciclo pode acarretar a decomposição de biomoléculas, comprometendo a função de sistemas e órgãos, dentre eles o hipotálamo que, quando afetado, desencadeia prejuízos nos processos metabólicos e atividades autônomas (FRANCISQUETI, F. V. *et al.*, 2017; VISTOLI *et al.*, 2013). Níveis elevados de ROS no hipotálamo também podem prejudicar a captação de glicose e lipídios, comprometendo a capacidade de detecção metabólica dos neurônios hipotalâmicos (CARMO-SILVA; CAVADAS, 2017; COLOMBANI *et al.*, 2009; LELOUP *et al.*, 2006).

Com a finalidade de reduzir e prevenir os efeitos negativos decorrentes da obesidade e do estresse oxidativo, estudos envolvendo compostos bioativos vem se destacando. O arroz (*Oryza sativa* L.) é fonte de micronutrientes bioativos rico em γ-orizanol, constituído por ésteres de ácido ferúlico que conferem efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios atribuindo ação benéfica no tratamento de disfunções associadas à obesidade (JUSTO *et al.*, 2013). O objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito preventivo do consumo de farelo de arroz sobre marcadores do estresse oxidativo no hipotálamo de animais submetidos ao consumo de dieta rica em açúcar e gordura.

2 METODOLOGIA

2.1 Animais e Modelo Experimental

No presente estudo foram utilizados ratos Wistar machos (n=40), com 30 dias de idade, provenientes do Biotério Central da Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade Estadual Paulista - UNESP, São Paulo, Brasil. Os animais foram casualmente alocados em 2 grupos para receberem dieta rica em açúcar e gordura (HSF, n=8 animais) e dieta rica em açúcar e gordura + farelo de arroz (HSF+FA, n=8 animais). Os dois grupos também receberam sacarose na água de beber numa concentração de 25%. O modelo dietético e as complicações associadas à obesidade já foram estabelecidas e publicadas por nosso grupo de pesquisa (FRANCISQUETTI FV. *et al.*, 2017).

As ofertas de ração e água foram *ad libitum*. O consumo das dietas e da ingestão calórica foram controlados semanalmente; a ingestão calórica foi determinada pelo produto do consumo e teor energético das dietas. Para acompanhar o desenvolvimento do animal, o peso corporal foi aferido semanalmente, sendo os ratos mantidos em gaiolas individuais, em meios enriquecidos com toalhas de papel amassadas em formato de bolas, ambiente com temperatura ($24\pm 2^{\circ}\text{C}$) e umidade controladas ($55\pm 5\%$) e ciclo claro-escuro (12-12hs). O protocolo de estudo foi aprovado pela Comissão de Ética em Experimentação Animal da Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade Estadual Paulista - UNESP, São Paulo, Brasil, (CEUA 1311) e seguiu recomendações do *Guide for the Care and Use of Experimental Animals*. No fim do período experimental de 20 semanas, os animais foram anestesiados com tiopental (120mg/kg/IP) e após verificação dos reflexos palpebral, podal, interdigital e caudal, foram eutanasiados por decapitação.

2.2 Farelo de Arroz

O farelo de arroz foi adicionado às rações controle e HSF na concentração de 11% (KAHLON *et al.*, 1992).

2.3 Caracterização da Obesidade

2.3.1 Índice de Adiposidade

O índice de adiposidade foi utilizado como indicador de obesidade, permitindo avaliação precisa da quantidade de gordura corporal dos animais. Após o sacrifício foram

dissecados os depósitos de gordura epididimal, visceral e retroperitoneal dos animais. A soma dos depósitos normalizada pelo peso corporal $[(\text{epididimal} + \text{retroperitoneal} + \text{visceral}) / \text{peso corporal} \times 100]$ foi considerada o índice de adiposidade (LUVIZOTTO *et al.*, 2013).

2.4 Comorbidades

2.4.1 Pressão Arterial Sistólica

A análise da pressão arterial sistólica foi realizada por meio da técnica de plestimografia segundo Pfeffer *et al.*, (1971, utilizando-se eletroesfigmomanômetro Narco Bio-System® PE 300, modelo 709-0610 (International Biomedical, Inc, Houston, TX, USA) (GONC *et al.*, 2014). Este método não permite avaliar a pressão arterial diastólica. Os animais foram aquecidos (40°C) durante 5 minutos, em uma caixa de madeira (50 x 40 cm) forrada com maravalha de Pinus autoclavada, com a finalidade de produzir vasodilatação da artéria caudal. Em seguida, manguito conectado a transdutor de pulso foi acoplado à cauda do animal, sendo posteriormente insuflado (200 mmHg) e desinsuflado, respectivamente, para registro das pulsações arteriais. Os registros foram coletados em polígrafo Gould RS 3200 (Gould Instrumenta Valley View, Ohio, USA).

2.5 PERFIS GLICÊMICO

Os animais foram expostos a jejum de 12 horas para aferição dos níveis de glicose através de um glicosímetro portátil (Accucheck Advantage; Roche Diagnostics Co., Indianapolis, IN).

2.6 PARÂMETROS DO SISTEMA REDOX

2.6.1 Malondialdeído (MDA)

100mg de tecido hipotalâmico foram homogeneizadas com solução gelada de PBS (1mL, pH 7.4) usando o ULTRA-TURRAX® T25 basic IKA ® Werke Staufen/Germany, e centrifugadas a 800g a 4°C por 10 min. Ácido tiobarbitúrico (TBA) 0,67% na proporção (1: 1) foi adicionado ao sobrenadante e a posteriormente as amostras foram aquecidas por

45 min em banho-maria a 100 °C. O MDA reagiu com o TBA na proporção 1: 2 MDA-TBA e após o resfriamento, a leitura foi realizada a 535 nm em um leitor de microplacas Spectra Max 190 (Molecular Devices®, Sunnyvale, CA, EUA). A concentração de MDA foi obtida através do coeficiente de extinção molar ($1,56 \times 10^5 \text{ M}^{-1} \text{ cm}^{-1}$) e as absorbâncias das amostras e o resultado final expresso em nmol / g de proteína (UCHIYAMA; MIHARA, 1978).

2.6.2. Carbonilação de Proteínas

100 mg de tecido hipotalâmico foram homogeneizados em solução gelada de PBS (1mL, pH 7.4) usando o ULTRA-TURRAX® T25 basic IKA ® Werke Staufen/Germany, e centrifugadas a 800g a 4°C por 10 min. Proteínas carboniladas foram medidas por um método inespecífico que usa DNPH (agente derivatizante de 2,4-dinitrofenilhidrazina) e detecção fotométrica de qualquer proteína modificada por carbonilação (MESQUITA *et al.*, 2014). Os níveis de proteína carbonilada são expressos em nmol de DNPH / mg de proteína.

2.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os grupos foram comparados por Teste T de student, em nível de significância de 5% e utilizando o software SigmaStat 3.5. Os dados estão apresentados em média e desvio padrão.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A figura 1 demonstra resultados referentes às análises nutricionais e metabólicas ao final de 20 semanas. Não houve diferença entre os grupos quanto à ingestão calórica (Figura 1A), peso corporal final (Figura 1B), índice de adiposidade (Figura 1C) e pressão arterial sistólica (Figura 1D). O grupo HSF+FA demonstrou valores reduzidos de glicose em jejum quando comparados ao grupo HSF (Figura 1E).

Figura 1 - Análises nutricionais e metabólicas ao final de 20 semanas. (A) Ingestão calórica (kcal); (B) Peso Corporal Final (g); (C) Índice de Adiposidade (%); (D) Pressão Arterial Sistólica (mmHg); (E) Glicose em jejum (mg/dL). Dados expressos em média e desvio padrão. Comparação por Teste T de student * $p < 0,05$. HSF- high sugar-fat diet. HSF+FA- high sugar-fat diet + farelo de arroz. PAS- Pressão Arterial Sistólica

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

A figura 2 apresenta os valores referentes aos níveis dos marcadores de estresse oxidativo no hipotálamo dos animais ao final de 20 semanas. Os valores de Malondialdeído e Carbonilação de proteínas apresentaram-se reduzidos em relação ao grupo HSF.

Figura 2 - Marcadores do estresse oxidativo ao final de 20 semanas. (A) MDA (nmol/mg de proteína); (B) Carbonilação de proteínas (nmol/mg de proteína). Dados expressos em média e desvio padrão. Comparação por Teste T de student * $p < 0,05$. HSF- high sugar-fat diet. HSF+FA- high sugar-fat diet + farelo de arroz

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

Ratos Wistar machos foram submetidos a uma dieta HSF para avaliação do efeito preventivo do farelo de arroz sobre do estresse oxidativo no hipotálamo. Nossos resultados mostraram que os animais que consumiram a dieta HSF + FA apresentaram menor glicose de jejum, MDA e proteínas carboniladas em relação aos animais HSF.

O consumo crônico de dietas HSF se associa à hiperglicemia por mecanismos inflamatórios através da secreção de adipocinas que atuam direta e indiretamente no metabolismo da glicose, aumentando sua produção (KERSHAW; FLIER, 2004; SHI *et al.*, 2019). Nossos dados mostraram que o farelo de arroz se mostrou eficiente em reduzir os níveis glicêmicos dos animais do grupo HSF + FA. Tal efeito benéfico pode ser explicado pelos compostos bioativos presentes no farelo, que apresentam ação antiinflamatória e antioxidante (JUSTO *et al.*, 2013). Dentre eles, destaca-se o γ -orizanol, composto por ésteres de ácido ferúlico, que conferem seu efeito anti-inflamatório e antioxidante, que contribui beneficemente no tratamento de disfunções associadas à obesidade (PAUCAR-MENACHO *et al.*, 2007).

Dentre os diversos órgãos acometidos pelos efeitos negativos da obesidade está o cérebro, especialmente o hipotálamo, a principal área cerebral que controla o balanço energético (KJAERGAARD *et al.*, 2018). Evidências mostram que essa região é a primeira a apresentar sinais de comprometimento após consumo de dietas ricas em gordura, resultando em prejuízo do controle do balanço energético (LUMENG; SALTIEL, 2011). Dentre os

mecanismos sugeridos como causa do comprometimento hipotalâmico estão: disfunção mitocondrial, espécies reativas de oxigênio (ROS) e estresse do retículo endoplasmático, resultando em estresse oxidativo (KJAERGAARD *et al.*, 2018). O efeito do farelo contra o estresse oxidativo foi observado no grupo HSF + FA, que apresentou valores menores de MDA e carbonilação em relação ao grupo HSF. Tais resultados estão de acordo com a literatura, uma vez que Schraiber et al. (2019) encontraram níveis elevados de MDA e proteínas carboniladas em camundongos alimentados com dieta rica em gordura após 10 semanas (BONA SCHRAIBER, DE *et al.*, 2019).

O efeito antioxidante do FA pôde ser verificado pela prevenção da peroxidação lipídica que consequentemente impede a lipotoxicidade que se associa à disfunção mitocondrial, principal organela responsável pela produção de ROS celulares, reduzindo, dessa forma, o estresse oxidativo gerado pela dieta (SON et al., 2010).

4 CONCLUSÃO

O consumo de farelo de arroz mostrou-se uma estratégia na prevenção do desequilíbrio do sistema RedOx no hipotálamo decorrente de obesidade.

REFERÊNCIAS

AWADA, R.; PARIMISSETTY, A.; D'HELLENCOURT, C. L. Influence of Obesity on Neudegenerative Diseases. 2013.

BHAT, Z. F. *et al.* Obesity and neurological disorders: Dietary perspective of a global menace. 2017. v. 8398.

BONA SCHRAIBER, R. DE *et al.* Diet-induced obesity causes hypothalamic neurochemistry alterations in Swiss mice. **Metabolic Brain Disease**, 2019. v. 34, n. 2, p. 565–573.

CARMO-SILVA, S.; CAVADAS, C. **Hypothalamic dysfunction in obesity and metabolic disorders**. [S.l.]: [s.n.], 2017. V. 19.

COLOMBANI, A. L. *et al.* Enhanced hypothalamic glucose sensing in obesity: Alteration of redox signaling. **Diabetes**, 2009. v. 58, n. 10, p. 2189–2197.

FRANCISQUETI, F. V. *et al.* The role of oxidative stress on the pathophysiology of metabolic syndrome. **Revista da Associacao Medica Brasileira**, 2017. v. 63, n. 1, p. 85–91.

GONC, D. F. *et al.* Vitamin D Induces Increased Systolic Arterial Pressure via Vascular Reactivity and Mechanical Properties. **PLoS One**, 2014. v. 9, n. 6, p. 1–9.

JUSTO, M. L. *et al.* Water-soluble rice bran enzymatic extract attenuates dyslipidemia, hypertension and insulin resistance in obese Zucker rats. **European Journal of Nutrition**, 2013. v. 52, n. 2, p. 789–797.

KAHLON, T. S. *et al.* Cholesterol-lowering in hamsters fed rice bran at various levels, defatted rice bran and rice bran oil. **The Journal of nutrition**, 1992. v. 122, n. October 1991, p. 513–519.

KERSHAW, E. E.; FLIER, J. S. Adipose Tissue as an Endocrine Organ. **The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism**, jun. 2004. v. 89, n. 6, p. 2548–2556. Disponível em: <<https://academic.oup.com/jcem/article-lookup/doi/10.1210/jc.2004-0395>>.

KJAERGAARD, M. *et al.* Hypothalamic oxidative stress and inflammation, and peripheral glucose homeostasis in Sprague-Dawley rat offspring exposed to maternal and postnatal chocolate and soft drink. **Nutrition and Diabetes**, 2018. v. 8, n. 1. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1038/s41387-018-0051-z>>.

LELOUP, C. *et al.* Mitochondrial reactive oxygen species are required for hypothalamic glucose sensing. **Diabetes**, 2006. v. 55, n. 7, p. 2084–2090.

LUMENG, C. N.; SALTIEL, A. R. Inflammatory links between obesity and metabolic disease. **Journal of Clinical Investigation**, 2011. v. 121, n. 6, p. 2111–2117.

LUVIZOTTO, R. D. A. M. *et al.* Lycopene supplementation modulates plasma concentrations and epididymal adipose tissue mRNA of leptin, resistin and IL-6 in diet-induced obese rats. **The British journal of nutrition**, 2013. v. 110, n. 10, p. 1803–9.

MESQUITA, C. S. *et al.* Simplified 2,4-dinitrophenylhydrazine spectrophotometric assay for quantification of carbonyls in oxidized proteins. **Analytical Biochemistry**, ago. 2014. v. 458, p. 69–71. Disponível em: <<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0003269714001936>>.

MONTEIRO, R.; AZEVEDO, I. Chronic Inflammation in Obesity and the Metabolic Syndrome. **Mediators of Inflammation**, 2010. v. 2010, n. Atp Iii, p. 1–10.

PAUCAR-MENACHO, L. M. *et al.* Refino de óleo de farelo de arroz (*Oryza sativa* L.) em condições brandas para preservação do gama-orizanol. **Ciênc. Tecnol. Aliment.**, 2007. v. 27, p. 45–53.

SHI, J. *et al.* Cytokines and Abnormal Glucose and Lipid Metabolism. **Frontiers in Endocrinology**, 30 out. 2019. v. 10. Disponível em: <<https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fendo.2019.00703/full>>.

SON, M. J. *et al.* Influence of oryzanol and ferulic acid on the lipid metabolism and antioxidative status in high fat-fed mice. **Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition**, 2010. v. 46, n. 2, p. 150–156.

UCHIYAMA, M.; MIHARA, M. Determination of malonaldehyde precursor in tissues by thiobarbituric acid test. **Analytical Biochemistry**, maio. 1978. v. 86, n. 1, p. 271–278. Disponível em: <<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/0003269778903421>>.

VISTOLI, G. *et al.* Advanced glycoxidation and lipoxidation end products (AGEs and ALEs): An overview of their mechanisms of formation. **Free Radical Research**, 2013. v. 47, n. S1, p. 3–27.

MORTALIDADE EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS

Silvia Helena Ferraz Planard

Universidade Estadual Paulista (UNESP), Faculdade de Medicina de Botucatu, Botucatu – SP

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8061810380733170>

Informações sobre o

artigo:

Recebido em:

28/10/2021

Aceito em:

10/11/2021

Data de publicação:

07/02/2022

Palavras-chave:

Idosos

Longa permanência

Doenças do aparelho

respiratório

Doenças do aparelho

circulatório

RESUMO

O processo de envelhecimento é inerente a todos os seres humanos, mas a forma como cada pessoa o experimenta é diferente de acordo com múltiplos fatores orgânicos, sociais, psíquicos e ambientais. Os idosos residentes das chamadas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) vivem em um contexto que os diferencia daqueles que habitam com familiares ou em suas próprias residências até o final da vida. Todavia, a literatura atual carece de estudos sobre as principais causas de mortalidade nesse grupo específico de pessoas, motivo que levou ao desenvolvimento desse trabalho, que consistiu na avaliação de causas básicas de morte de 94 habitantes do Lar Padre Euclides, em Botucatu, nos últimos dez anos (2010-2019), através de suas Declarações de Óbito. Em seguida, essas causas básicas foram agrupadas de acordo com capítulos da Classificação Internacional de Doenças (CID-10) para definir as causas de mortalidades mais prevalentes. Foi feita também uma análise dos óbitos de acordo com idade, sexo, raça, local de óbito, período de institucionalização e ano do óbito, e, através do teste qui-quadrado de Pearson, buscada a associação entre: causa básica e sexo; sazonalidade e número de óbitos. Como resultado, concluiu-se que a principal causa de mortalidade foram Doenças do Aparelho Respiratório (30,9% do total de óbitos, principalmente representada pela broncopneumonia), seguida de Doenças do Aparelho Circulatório (29,8%). Não foram observadas associações estatisticamente significantes entre causas básicas e o sexo; assim como entre número de óbitos e sazonalidade.

MORTALITY IN LONG-TERM INSTITUTIONS FOR THE ELDERLY

ABSTRACT

The aging process is inherent to all human, but the way each person experiences it is different according to multiple organic, social, psychic and environmental factors. The elderly residents of the so-called Long Term Care Institutions for the Elderly live in a context that differentiates them from those who live with family members or in their own homes until the end of their lives. However, the current literature lacks studies on the main causes of mortality in this specific group of people, which led to the development of this

Keywords:**Seniors****Long stay****Respiratory System****Diseases****Circulatory System****Diseases**

work, which consisted of the assessment of the basic causes of death of 94 inhabitants of Lar Padre Euclides, in Botucatu, in the last few years. ten years (2010-2019), through his Death Certificates. These basic causes were then grouped according to chapters of the International Classification of Diseases (CID-10) to define the most prevalent causes of mortality. An analysis of deaths was also carried out according to age, sex, race, place of death, institutionalization period and year of death, and, using Pearson's chi-square test, the association between: basic cause and sex; seasonality and number of deaths. As a result, it was concluded that the main cause of mortality was Diseases of the Respiratory System (30.9% of the total deaths, mainly represented by bronchopneumonia), followed by Diseases of the Circulatory System (29.8%). There were no statistically significant associations between basic causes and sex; as well as between number of deaths and seasonality.

1 INTRODUÇÃO

Envelhecimento é um termo amplo e com múltiplas definições. Pode ser visto como um conjunto de modificações que acontecem em um organismo ao longo dos anos, tanto em nível celulares e teciduais (1). Também é descrito como um processo complexo e desigual de comprometimento e posterior decadência das funções de um organismo de vida ou, ainda, em uma visão mais voltada à espécie humana especificamente, como fenômeno que, quando associado a fatores sociais, pode causar problemas em condições de saúde e bem estar da pessoa considerada idosa (2). Idoso, por sua vez, é considerado aquele com mais de 65 anos em países desenvolvidos e com mais de 60 anos em países em desenvolvimento, como o Brasil (3). Nos últimos anos, tem-se observado um aumento exponencial desse grupo populacional, tanto dentro como fora de nosso país. A taxa de crescimento da população idosa mundial é atualmente de 3,26% ao ano, sendo que em 2015, já existiam 901 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, o que equivale a 12% da população mundial (4).

O Brasil é um dos países envolvidos mais profundamente nessa mudança. Seu número de idosos passou de 3 milhões em 1960 para 7 milhões em 1975 e então para 14 milhões em 2002, o que representa aumento de 500% em quarenta anos (5). A população idosa hoje representa 9,52% da total e estimativas mostram que, em 2050, esse número passe a 21,87% (6). Tal alteração de perfil demográfico já acarreta profundas transformações em

nosso país à medida em que se expande um grupo social com maior tendência a apresentar limitações ligadas a doenças crônico-degenerativas.

Nesse contexto, mesmo que a Política Nacional do Idoso preconize a manutenção do idoso em ambiente familiar (7), muitos idosos, em especial aqueles com vínculo familiar pouco desenvolvido, se tornam residentes das instituições de longa permanência para idosos (ILPI), também chamadas popularmente asilos. Dentre os fatores que determinam a procura de ILPS, destaca-se elevado grau de dependência, aparecimento de doenças crônicas e estágios terminais de doenças contribuintes, assim como a falta de políticas públicas e assistência social para a população geriátrica (8).

As ILPIs são instituições de caráter residencial e coletivo, destinadas a pessoas com 60 anos ou mais, com ou sem suporte familiar. Elas podem ser públicas ou privadas, mas precisam ter registro legal, com objetivo de satisfazer às necessidades do idoso e garantir seu envelhecimento saudável (9). Em 2011, artigo científico baseado em estudo feito em 118 pacientes que faleceram no ano de 2006 no Hospital Geriátrico e de Convalescentes Dom Pedro II apontou como causas para óbitos em instituição hospitalar a somatória de imobilidade e infecção que evoluem para quadros sépticos (10). Outro estudo feito em 2017 propôs-se a fazer uma reavaliação sistemática da literatura sobre as formas metodológicas de avaliação de idosos institucionalizados, concluindo a importância de múltiplos testes para conhecimento das afecções que podem acometer idosos institucionalizados e direcionamento do tratamento (11).

Porém, mesmo com o aumento do número de idosos e de ILPIs no Brasil, ainda são poucos os estudos que dizem respeito a proposição de políticas de melhora de condições de vida e redução da mortalidade em idosos institucionalizados. Pesquisa feita em busca de literatura em bases de dados MEDLINE/PubMed, LILACs, Scielo, Cochrane e Ebescos mostra que idosos institucionalizados atualmente têm pior qualidade de vida quando comparados aos não institucionalizados (12).

Dessa forma, é necessária a realização de pesquisas para avaliação da mortalidade e morbidade de idosos em ILPIs, bem como estudos epidemiológicos visando averiguar o perfil desses pacientes, com o objetivo de proporcionar maior qualidade de vida e identificação de fatores de risco e medidas preventivas para diminuir a mortalidade dessa população. Esta pesquisa justifica-se por ser um estudo relacionada com a epidemiologia sobre mortalidade em idosos institucionalizados possam contribuir para implantação de ações preventivas e controle das doenças que levam a estes desfechos, tendo por objetivo avaliar o perfil de mortalidade dos residentes de instituição de longa permanência para idosos.

2 METODOLOGIA

A metodologia aplicada neste estudo é de base observacional retrospectivo com análise de Declarações de Óbito dos idosos residentes no Lar Padre Euclides, em Botucatu-SP, no período de 2010 a 2019. Foram verificados os seguintes dados:

- a. Sexo;
- b. Idade;
- c. Raça;
- d. Local de óbito;
- e. Período de institucionalização;
- f. Ano de óbito;
- g. Sazonalidade -Trimestre do ano;
- h. Causa básica;
- i. Causa básica agrupada de acordo com capítulos da Classificação Internacional de Doenças CID-10.

Foram aplicados testes qui-quadrado para avaliação da associação entre:

- 1) Sazonalidade e óbito (trimestre do ano)
- 2) Causa básica de acordo com CID-10 e sexo.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram analisadas as Declarações de Óbito de um total de 94 idosos, sendo 57 homens (60,6%) e 37 mulheres (39,4%) com mediana de idade de 79,5 anos (74-87). Quanto a raça, 81 (86,2%) eram brancos, 9 (9,6%) negros e 4 (4,3%) pardos. O local de óbito mais prevalente foi o próprio asilo (47,9%), seguido do hospital (40,4%) e do pronto-socorro (11,7%) (Tabela 1).

Tabela 1 - Local de óbito dos idosos institucionalizados no Asilo Padre Euclides-SP no período de 2010 a 2019

Local	Frequência	Porcentagem
Hospital	38	40,4%
Pronto-Socorro	11	11,7%
Asilo Padre Euclides	45	47,9%

Fonte: Dados da Pesquisa, 2021.

Quanto ao período de institucionalização observou-se grande variabilidade (de 6 a 412 meses (cerca de 34 anos); sendo a mediana de 39,183 meses (8,2 -99,1).

A tabela 2 apresenta a distribuição dos óbitos no período estudo. Observou-se que o ano com maior número de óbitos foi 2017, com um total de 14 dos 94 óbitos. Aquele com menor número foi 2016, com um total de 4 óbitos.

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos dos residentes do Asilo Padre Euclides- SP no período de 2010 a 2019

Ano	Frequência	Porcentagem
2010	11	11,7
2011	10	10,6
2012	10	10,6
2013	7	7,4
2014	10	10,6
2015	7	7,4
2016	4	4,3
2017	14	14,9
2018	13	13,8
2019	8	8,5

Fonte: Dados da Pesquisa, 2021.

Quanto a associação entre a frequência dos óbitos e sazonalidade verificada por trimestre do ano, não foi observado significância estatística.

As causas básicas de óbito descritas nas DO foram selecionadas (Tabela 3) e, em seguida agrupadas em Capítulos de acordo com a Classificação Internacional de Doenças CID-10 (Tabela 4). Observa-se que a principal causa de mortalidade foram as Doenças do Aparelho Respiratório (30,9% do total de óbitos), especialmente a Broncopneumonia; seguida de Doenças do Aparelho Circulatório (29,8%) e Doenças do Sistema Nervoso

(10,6%) representada exclusivamente pela demência. Também foram frequentes os óbitos por Neoplasias (8,5%) e Doenças do Aparelho Gênito-Urinário (7,4%).

Tabela 3 - Principais causas básicas de óbito dos residentes no Asilo Padre Euclides- SP no período de 2010 a 2019

Causa básica	Frequência	Porcentagem
Broncopneumonia	23	24,5
Cardiopatía hipertensiva	13	13,8
Doença arterial coronariana	11	11,7
Demência	10	10,6
Infecção do trato urinário	6	6,4
Doença pulmonar obstrutiva crônica	3	3,2
Sepse	3	3,2
Acidente vascular cerebral	2	2,1
Diabetes	2	2,1
Carcinoma de cólon	2	2,1
Outras	9	9,5

Fonte: Dados da Pesquisa, 2021.

Tabela 4 - Causas básicas de óbito por capítulo do CID 10 dos residentes no Asilo Padre Euclides- SP no período de 2010 a 2019

Capítulo CID 10	Frequência	Porcentagem
<i>I- Algumas doenças infecciosas e parasitárias</i>	3	3,2
<i>II- Neoplasias</i>	8	8,5
<i>III- Doenças do sangue e dos órgãos hematopoiéticos e alguns transtornos imunitários</i>	1	1,1
<i>IV- Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas</i>	2	2,1
<i>VI- Doenças do Sistema nervoso</i>	10	10,6
<i>IX- Doenças do Aparelho Circulatório</i>	28	29,8
<i>X- Doenças do Aparelho Respiratório</i>	29	30,9
<i>XI- Doenças do Aparelho Digestivo</i>	2	2,1
<i>XIV- Doenças do Aparelho Gênito-Urinário</i>	7	4,4
<i>XVIII: sintomas, sinais e achados anormais, não classificados em outra parte</i>	1	1,1
<i>XX: Causas externas de morbidade e mortalidade.</i>	3	3,2

Fonte: Dados da Pesquisa, 2021.

Não houve significância estatística entre a associação de sexo e causas básicas de óbito.

4 CONCLUSÕES

O presente estudo teve como objetivo avaliar o perfil da mortalidade em idosos institucionalizados. Observou-se predomínio de óbitos por broncopneumonia na casuística estudada. No agrupamento das causas básicas verificou-se predomínio de doenças do aparelho respiratório (representado principalmente pela broncopneumonia) e do aparelho circulatório.

Não foi observado associação estatisticamente significantes entre sazonalidade o óbitos ou entre sexo e causas de morte.

Os resultados encontrados no presente estudo estão de acordo com dados da literatura nacional.

Em estudo de Gorzoni e Pires, foram avaliados óbitos de idosos em ILPI no ano de 2006 e encontraram como principal causa de óbitos as doenças infecciosas, sendo a broncopneumonia a causa básica mais prevalente. Neste estudo também não houve associação estatisticamente significantes entre óbitos e sazonalidade (13).

Quando comparado com o jovem, o idoso, em particular, o institucionalizado está mais suscetível à infecção em razão de alterações fisiológicas do envelhecimento, declínio da resposta imunológica e a presença de doenças concomitantes com consequente aumento de morbidade e mortalidade.

São várias as alterações anatômicas e funcionais que colaboram para o entendimento dos mecanismos que predispõem essa população à infecção. O declínio na função do linfócito T e na imunidade celular e a diminuição da produção de anticorpos na imunização extrínseca são alterações imunológicas que podem aumentar a vulnerabilidade à infecção. O adelgaçamento da pele e o menor reflexo da tosse são alterações fisiológicas do envelhecimento que facilitam a infecção de pele e partes moles e à aspiração e pneumonia, respectivamente (14).

A infecção adquirida na própria instituição é uma das causas mais frequentes de hospitalização e de mortes nesses pacientes. Um dos motivos é o retardo no diagnóstico e tratamento. A investigação dessa condição nos residentes de ILPI é frequentemente prejudicada pela limitação estrutural e econômica das unidades. Além da dificuldade de realização de exames laboratoriais e radiológicos, as manifestações clínicas do processo infeccioso são comumente atípicas nessa faixa etária. A febre ausente ou baixa é exemplo clássico dessa atipia no paciente idoso (15). As doenças do aparelho circulatório são a principal causa de morte entre idosos em todo o mundo (16).

No presente estudo, encontramos cardiopatia hipertensiva (que comumente está associada a insuficiência cardíaca) e doença coronariana como causas básicas mais frequentes no grupo das doenças cardiovasculares.

Este achado está de acordo com outros estudos. Cabrera e Wajngarten realizaram acompanhamento ambulatorial por nove anos 840 idosos e a principal causa de morte foi doença cardiovascular, representada principalmente por doença coronariana e insuficiência cardíaca (17). Aronow investigou a causa de morte de idosos institucionalizados no período de 15 anos, sendo a morte súbita cardíaca, infarto agudo do miocárdio e insuficiência cardíaca as principais causas do total de mortalidade no período estudado (18).

Os fatores de risco para doença cardiovascular são os mesmos para adultos ou idosos, incluindo hipertensão arterial, dislipidemia, tabagismo, sedentarismo, diabetes, obesidade, abuso de álcool, nível social e nutrição. Todavia, com o envelhecimento observa-se aumento do estresse oxidativo, o que leva a uma suscetibilidade aumentada para anormalidades funcionais e elétricas que podem culminar com doença cardiovascular. Essas anormalidades incluem fibrilação atrial e insuficiência cardíaca, que são resultado do aumento das espécies reativas de oxigênio devido ao estresse oxidativo e aumento da produção de moléculas de sinal inflamatório.

Ademais, a idade também está associada a um risco aumentado de fragilidade, obesidade e diabetes. Essas condições também são fatores de risco independentes para doença cardiovascular. Assim sendo, vários fatores de risco resultam em uma alta incidência destas doenças em idosos (19).

Assim, torna-se evidente que medidas preventivas simples e efetivas são de alto valor em pacientes idosos, tais como monitoramento da pressão arterial, controle do diabetes e dislipidemia, cessar tabagismo, atividade física e dieta saudável; além de diagnóstico e tratamento precoce de intercorrências infecciosas.

REFERÊNCIAS

1. World economic and social survey 2007: development in an ageing world. New York: United Nations [Publicação online]; 2007 [acesso em 27 de abril de 2019]. Disponível em: http://www.un.org/en/development/desa/policy/wess/wess_archive/2007wess.pdf
2. Timo-Iaria C. O Envelhecimento. *Acta Fisiátrica*, 2003, 10(3):114-120.
3. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Síntese de indicadores sociais uma análise das condições de vida da população brasileira, 2010. Censo Demográfico, 2010. Brasil: IBGE, 2010.

4. United Nations Department of Economic and Social Affairs/ Population Division 59 World Population Prospects: The 2015 Revision, Key Findings and Advance Tables. New York: UN; 2015.
5. Lima-Costa MF, Veras R. Saúde pública e envelhecimento. Cad. Saúde Pública. 2003.
6. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [homepage na internet]. Projeção populacional [acesso em 28 de abril de 2019]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/>
7. Brasil. Decreto n. 8.842/94, de 4 de janeiro de 1994. Dispõe sobre a política nacional do idoso, ^[1]cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências. Política Nacional do Idoso. [acesso em 28 de abril de 2019]. Disponível em: <http://saserj.br.tripod.com/textos/idoso.htm>.
8. Veras R. Envelhecimento populacional contemporâneo: demandas, desafios e inovações. Rev Saúde Pública [revista em internet]. Junho 2006. [acesso em 29 de abril de 2019]. Disponível em: <http://www.scielo.org/pdf/rsp/2009nahead/224.pdf>.
9. Brasil. Resolução da Diretoria Colegiada, 283, de 26 de setembro de 2005.
10. Gorzolini ML, Pires SL. Óbitos em instituição asilar. Rev Associação Med Bras 2011; 57(3):333-337.
11. Lima AAC et al. Forma metodológica de avaliação em idosos institucionalizados: uma revisão sistemática. Revista do Departamento de Educação Física e Saúde e do Mestrado em formação de saúde da Universidade de Santa Cruz do Sul. Ano 18, vol 18, número 3. Julho/setembro 2018.
12. Martins ABT et al. Qualidade de vida em idosos institucionalizados: revisão sistemática. Convibra Saúde- Congresso Virtual Brasileiro de Educação, gestão e promoção de saúde.
13. Gorzoni, ML; Pires SL. Óbitos em instituição asilar. Rev Assoc Med Bras 2011; 57(3):333-337
14. Nicolle LE, Strausbaugh LJ, Garibaldi LJ. Infections and antibiotic resistance in nursing homes. Clin Microb Rev. 1996;9:1-17
15. Villas Boas, PJF; Reis, A. Infecção em idosos internados em instituição de longa permanência. Rev. Assoc. Med. Bras. vol.53 no.2 São Paulo Mar./Apr. 2007
16. Cheng, X; Yang, y; Schwebel, DC; Liu, Z et al. Population ageing and mortality during 1990–2017: A global decomposition analysis. PLOS Medicine | <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003138> June 8, 2020
17. Cabrera MAS, Andrade SM, Wajngarten M. Causes of mortality in elderly people: a 9-year follow-up study. Geriatr Gerontol Aging. 2007;1(1):12-18

18. Aronow WS. Clinical causes of death of 2372 older persons in a nursing home during 15-year follow-up. *J Am Med Dir Assoc.* 2009 Feb;10(2):147. doi: 10.1016/j.jamda.2008.10.016. Epub 2008 Dec 16. PMID: 19187888.
19. Rodgers JL, Jones J, Bolleddu SI, Vanthenapalli S, Rodgers LE, Shah K, Karia K, Panguluri SK. Cardiovascular Risks Associated with Gender and Aging. *J Cardiovasc Dev Dis.* 2019 Apr 27;6(2):19. doi: 10.3390/jcdd6020019. PMID: 31035613; PMCID: PMC6616540.

OCORRÊNCIA DE QUEDAS EM IDOSOS DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA: ESTUDO DE COORTE

Leonardo Valente Sanchez

Universidade Estadual Paulista (UNESP), Faculdade de Medicina de Botucatu, Botucatu – SP

ORCID: 0000-0003-2682-764X

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1343845708415553>

Tatiane Cristina de Carvalho

Universidade Estadual Paulista (UNESP), Faculdade de Medicina de Botucatu, Botucatu – SP

ORCID: 0000-0002-6593-810X

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6399492455831828>

Adriana Polachini do Valle

Universidade Estadual Paulista (UNESP), Faculdade de Medicina de Botucatu, Botucatu – SP

ORCID: 0000-0002-0090-8524

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8003931926137460>

Paulo Jose Fortes Villas Boas

Universidade Estadual Paulista (UNESP), Faculdade de Medicina de Botucatu, Botucatu – SP

ORCID: 000-0001-9876-3222

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5470736132142683>

Informações sobre o

artigo:

Recebido em:

01/11/2021

Aceito em:

10/11/2021

Data de publicação:

07/02/2022

Palavras-chave:

Idosos

Quedas

Risco de queda

Fragilidade

Instituições de longa permanência

RESUMO

Objetivo - Avaliar incidência de quedas e fatores associados em idosos de Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPI).

Metodologia - Estudo longitudinal, observacional, descritivo realizado em seis ILPI cadastradas no Município de Botucatu. Na avaliação inicial (M1) foi realizada Avaliação Geriátrica Ampla (AGA), com observação de dados sócio-demográficos, condições clínicas, fragilidade (Fenótipo de Fragilidade de Fried e Frail – Nursing Home), dependência para atividades básicas de vida diária (ABVD - Índice de Katz) e do risco de queda com aplicação do Time Up and Go Test (TUGT). Doze meses depois foi realizada reavaliação quanto à ocorrência de queda nos 6 meses anteriores. Foi testada a associação do desfecho de queda com os fatores avaliados em M1.

Resultados – Em M1 foram avaliados 113 idosos de 6 ILPI com média da idade de 81,1 anos ($DP \pm 9,09$), sendo 66,4% do sexo feminino. 61,1% apresentavam pelo menos uma dependência para ABVD, eram frágeis pelo fenótipo de Fragilidade de Fried 31,9% e pelo FRAIL – NH 51,3% e 35,4% cadeirantes. Em M2 se observou que 32 (28,3%) idosos foram à óbito e 4 transferidos de ILPI, sendo reavaliados 76 residentes. Destes, 20 idosos (26,3%) sofreram pelo menos um episódio de queda no período de acompanhamento. Na análise estatística não foram observadas associações com queda.

Discussão - A prevalência de quedas nos idosos institucionalizados observada neste estudo foi menor do que a obtida em outros

estudos brasileiros em ILPI. Nossos achados podem ser devido às características da população avaliada com alta prevalência de residentes frágeis e dependentes, do viés de memória dos pacientes e cuidadores (os eventos foram referidos retrospectivamente) ou aos cuidados ofertados pelas instituições.

Conclusões – Observamos alta prevalência de quedas, porém não forma obtidas associações com as condições avaliadas

OCCURRENCE OF FALLS IN OLDER PEOPLE OF LONG-TERM CARE FACILITIES: COHORT STUDY

ABSTRACT

Objective - Assess the incidence of falls and associated factors in the elderly in Long-stay Institutions for the Elderly (LSIE).

Methodology - Longitudinal, observational, descriptive study carried out in six LSIEs registered in the city of Botucatu. In the initial evaluation (M1), a Comprehensive Geriatric Assessment was performed, with observation of socio-demographic data, clinical conditions, frailty (Fried and Frail Frailty Phenotype – Nursing Home), dependence for activities of daily living (ADL- Katz Index) and the risk of falling with the application of the Time Up and Go Test (TUGT). After twelve months, a reassessment was performed regarding the occurrence of falls in the previous 6 months. The association of the fall outcome with the factors evaluated in M1 was tested.

Results – In M1, 113 elderly people from 6 LSIEs were evaluated, with a mean age of 81.1 years (SD $\pm$ 9.09), being 66.4% female. 61.1% had at least one dependence for ADL, were frail by Fried Frailty phenotype 31.9% and by FRAIL – NH 51.3% and 35.4% wheelchair users. In M2 it was observed that 32 (28.3%) elderly people died and 4 were transferred from the ILPI, with 76 residents being reevaluated. Of these, 20 elderly (26.3%) suffered at least one episode of fall in the follow-up period. In the statistical analysis, no associations with falls were observed.

Discussion - The prevalence of falls in institutionalized elderly observed in this study was lower than that obtained in other Brazilian studies on LSIE. Our findings may be due to the characteristics of the population assessed, with a high prevalence of frail and dependent residents, the memory bias of patients and caregivers (events were referred to retrospectively) or the care provided by the institutions.

Conclusions - We observed a high prevalence of falls, but no associations were obtained with the conditions evaluated

Keywords:

Elderly

Falls

Fall risk

Frailty

Long-Term care facilities

1 INTRODUÇÃO

No Brasil o processo de envelhecimento populacional ocorre de forma acentuada, assim as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) se tornam cada vez mais prevalentes, transformando-se nas principais causas de morbidade, incapacidade e mortalidade em idosos (VERAS, 2009). Essas condições têm influência significativa no grau de dependência e capacidade funcional do idoso. O declínio funcional é caracterizado, entre outras coisas, por dependência nas atividades básicas e instrumentais da vida diária, podendo impedir o autocuidado, tornando-o, muitas vezes, completamente dependente. Tais fatos tem impulsionado a busca por Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) (CAMARANO; KANSO, 2010). No Brasil se observa um incremento da demanda por assistências de longa duração para idosos (DEL DUCA et al., 2012).

Nas ILPI são desenvolvidas ações para a assistência social e de saúde dessa população. O perfil dos residentes de ILPI é constituído por mulheres, idade superior a 75 anos, múltiplas DCNT, risco aumentado de perda de independência e recuperação mais longa e difícil na vigência de intercorrências clínicas (CHAMI et al., 2011). Em média o residente sobrevive até um ano após a admissão na instituição (SMITH; RUSNAK, 1997). No Brasil, a taxa de institucionalização situa-se na faixa de 0,6 a 1,3% de idosos segundo dados governamentais (VILLAS BÓAS; FERREIRA, 2007).

Evento frequentemente observado em ILPI é a ocorrência de quedas. Estudo observou que 41% dos idosos institucionalizados apresentaram queda no período de 6 meses no Brasil (DOS REIS; DE JESUS, 2015). Outro estudo realizado em ILP na Espanha mostrou que 30% dos idosos apresentaram quedas, e os fatores associados foram sintomas neuropsiquiátricos, depressão e baixa capacidade funcional (SEIJO-MARTINEZ et al., 2016). A queda é considerada evento prevalente, prevenível e com altos índices de morbimortalidade

O objetivo deste trabalho é avaliar a incidência de quedas e seus fatores associados em idosos de ILPI.

2 METODOLOGIA

Trata-se de um estudo observacional e longitudinal, realizado em 6 ILPI do Município de Botucatu.

Entre novembro de 2017 e julho de 2018 foi realizada avaliação inicial (M1) de idosos institucionalizados baseada na Avaliação Geriátrica Ampla (AGA). Foram obtidos

dados quanto: identificação; diagnósticos relatados e descritos no prontuário, internações e atendimentos em unidades de emergências nos seis meses anteriores; capacidade funcional segundo atividades básicas de vida diária pelo Índice de Katz (DUARTE; DE ANDRADE; LEBRÃO, 2007); risco de queda (AMERICAN GERIATRICS SOCIETY AND BRITISH GERIATRICS SOCIETY, 2011; DE URBANETTO et al., 2013); cognição; humor; medicações utilizadas; estado nutricional; audição e visão; síndrome da fragilidade pelo Fenótipo de fragilidade de Fried e FRAIL – Nursing Home (FRAIL-NH) (FRIED et al., 2001; VASCONCELLOS ROMANINI et al., 2020); dentição; continência urinária; lesão por pressão; suporte social e financeiro; condições ambientais; e risco de internação.

Para avaliação das ABVD foi utilizado Índice de Katz, (DUARTE; DE ANDRADE; LEBRÃO, 2007; KATZ et al., 1963; LINO et al., 2008), com adaptação transcultural e validação para o Brasil, que avalia seis funções: transferência, continência urinária e/ou fecal; realização de higiene pessoal; capacidade de tomar banho sozinho; trocar de roupa sem ajuda; alimentar-se sem ajuda. A pontuação varia de 0 a 6 conforme a independência para funções, sendo a maior pontuação referente ao estado mais independente. Classifica-se em independente (5 e 6 pontos), semi-dependente (3 e 4) e dependente (0,1 e 2). Os residentes foram classificados como dependentes para pelo menos uma das ABVD.

O risco de queda foi avaliado pelo teste Time up and go test (TUGT), sendo considerado com risco de queda nos próximos doze meses se o tempo foi maior que 13,5 segundos. Quando o residente não conseguiu realizar o teste por qualquer motivo, foi considerado como risco para queda (AMERICAN GERIATRICS SOCIETY AND BRITISH GERIATRICS SOCIETY, 2011).

Foi caracterizada polifarmácia o uso de cinco ou mais medicamentos (AMERICAN GERIATRICS SOCIETY 2015 BEERS CRITERIA UPDATE EXPERT PANEL, 2015).

Na avaliação visual foi questionado ao idoso se tinha dificuldade em assistir televisão. A audição foi o próprio relato subjetivo do paciente sobre perda de audição.

A fragilidade foi identificada por dois instrumentos:

- Fenótipo de Fragilidade de Fried (Cardiovascular Health Study – CHS) (FRIED et al., 2001) que é composto por perda de peso (4,5 quilos nos últimos 12 meses); redução da força muscular mensurada pela força de preensão palmar; auto relato exaustão, mensuração da velocidade de marcha de 4,6 metros e nível de atividade física atividade na

última semana. Se não pontuou em nenhum critério foi considerado robusto, se 1 ou 2 – pré-frágil e 3 ou mais – frágil.

- Escala FRAIL-NH (KAEHR et al., 2015), que inclui fadiga (baseado no questionário PHQ-9), resistência (habilidade de se transferir), deambulação (uso ou não de dispositivos de marcha como bengala, andador ou cadeira de rodas), incontinências, perda de peso (definido por mais que 5% em 90 dias ou maior que 10% em 180 dias), abordagem nutricional (dieta regular, dieta alterada ou através de sonda) e vestuário. A escala totaliza 0 a 14 pontos e são categorizados como: robusto (não frágil) de 0 a 5 pontos; pré-frágeis de 6 a 7 e frágeis com pontuação ≥ 8 .

Foi considerado incontinência urinária a resposta afirmativa para pelo menos uma pergunta: no ano passado você já perdeu a sua urina e sentiu-se molhado (a)? ou; você utiliza fraldas?

Foi avaliada a presença de lesão por pressão (LPP) nos idosos e classificadas conforme documento da National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) com adaptação cultural para o português pela Associação Brasileira de Estomaterapia - SOBEST e da Associação Brasileira de Enfermagem em Dermatologia- SOBENDE(CALIRI et al., 2016)

Doze meses após M1 foram analisados a ocorrência de queda nos seis meses prévios. Queda foi definida como evento não intencional que tem como resultado a mudança de posição do indivíduo para um nível mais abaixo em relação à sua posição inicial (DOS REIS; DE JESUS, 2015).

2.1 Análise Estatística

Os dados obtidos foram descritos em termos de variáveis quantitativas discretas e contínuas e foi realizada análise descritiva construindo, para as variáveis quantitativas, tabelas com médias e desvio-padrão, se distribuição normal, ou mediana e percentil 25 e 75, se distribuição não normal. Para as variáveis qualitativas foram confeccionadas tabelas com as distribuições de frequências e percentagens.

Para realização de análise exploratória preliminar quanto aos fatores associados com queda, as variáveis foram transformadas em binárias e foi testada a associação com os desfechos pelo teste do qui-quadrado e do cálculo do odds ratio (OR), aplicados a cada variável separadamente. Preservaram-se apenas as variáveis cujos efeitos tiverem $p < 0,25$ para a ocorrência do evento. A análise multivariada com regressão logística foi realizada com a introdução, no modelo, uma a uma, de cada variável, partindo-se daquela com maior OR na

análise bivariada para menor. No modelo final, foram preservadas apenas as variáveis estatisticamente associadas ao evento.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em M1 foram avaliados 113 idosos de seis diferentes ILPI, instituição A (55,8%), B (13,3%), C (13,3%), D (7,1%), E (5,3%) e F (5,3%).

A média da idade foi de 81,1 anos (DP $\pm$ 9,09) e a mediana do tempo de institucionalização de 36 meses (Percentil 25 – 75: 15 – 73). 66,4% eram do sexo feminino e a raça prevalente referida foi a branca (76,1%). (Tabela 1).

Tabela 1 - Características sociodemográficas de idosos residentes de Instituições de Longa permanência para idosos, Botucatu, 2021

Instituição	N	%
A	63	55,8
B	15	13,3
C	15	13,3
D	8	7,1
E	6	5,3
F	6	5,3
Total	113	100
Sexo		
Feminino	75	66,4
Masculino	38	33,6
Total	113	100
Raça		
Branco	86	76,1
Negro	16	14,2
Pardo	10	8,8
Amarelo	1	0,9
Total	113	100
	Média	DP
Idade (anos)	81,1	9,09
Número de doenças diagnosticadas	3,72	1,95
Número de medicamentos	5,54	2,61
	Mediana	Percentil 25 -75
Tempo de institucionalização (meses)	60,14	15 – 73,5

Fonte: Dados da Pesquisa, 2021.

Quanto à capacidade funcional, 61,1% apresentavam pelo menos uma dependência para ABVD, eram frágeis pelo fenótipo de Fragilidade de Fried 31,9% e pelo FRAIL – NH 51,3% e 35,4% cadeirantes. As doenças mais prevalentes foram Hipertensão Arterial Sistêmica (52,6%), Depressão (32,9%) e Demência (26,3%) (Tabela 2).

Tabela 2 – Doenças referidas, eventos prévios, fragilidade e capacidade funcional de idosos residentes de Instituições de Longa permanência para idosos, Botucatu, 2021

	N	%
Doenças		
Hipertensão arterial	56	49,6
Depressão	36	31,9
Demência	32	28,3
Diabetes Mellitus	29	25,7
Sequela de AVC	14	12,4
Cadeirante	40	35,4
Eventos prévios (últimos 6 meses)		
Internação	31	27,4
Quedas	38	33,6
Índice massa corporal (kg/m²)		
< 22	42	37,2
22 – 27	49	43,4
>27	22	19,5
Fragilidade – Fenótipo de Fragilidade de Fried		
Robusto	8	7,1
Pré-frágil	31	27,4
Frágil	74	5,5
Fragilidade – Frail Nursing Home		
Robusto	41	36,3
Pré-frágil	17	15
Frágil	55	48,7
Capacidade funcional – Índice de Katz		
Independente	44	38,9
Parcialmente dependente	11	9,7
Totalmente dependente	58	51,3
Dependente para 2 ou mais ABVD*	69	61,1

ABVD* – Atividades Básicas de Vida Diária

Fonte: Dados da Pesquisa, 2021.

Na avaliação do risco de queda foram avaliados 73 idosos pelo TUGT, pois 40 eram cadeirantes, sendo que 83,6% apresentaram risco. Quando considerados os cadeirantes como de risco para queda temos 89,4% (101) com alto risco para queda (Tabela 3).

Tabela 3 - Análise do risco de queda segundo Teste Time Up and Go de idosos residentes de Instituições de Longa permanência para idosos, Botucatu, 2021

	N	%
TUGT* adequado	12	10,6
TUGT* alterado	61	54
Cadeirante	40	35,4
Risco de queda**	101	89,4

***TUGT** – Time up and Go Test

**** Risco de queda** – TUGT alterado + cadeirante

Fonte: Dados da Pesquisa, 2021.

Um ano depois da avaliação inicial, os idosos institucionalizados foram reavaliados quanto ao histórico de queda nos últimos 6 meses e possíveis correlações. No entanto, dos 113 pacientes iniciais, 76 permaneceram no estudo, devido a 37 perdas de seguimento, sendo 33 óbitos de pacientes e 4 transferências de ILPI nesse período de 12 meses (Tabela 4).

Tabela 4 – Evolução após 12 meses (M2) de idosos residentes de Instituições de Longa permanência para idosos, Botucatu, 2021

	N	%
Óbitos	33	28,3
Sobreviventes	81	71,7
Idosos sobreviventes que tiveram queda últimos 6 meses antes de M2		
Sim	20	26,3

Fonte: Dados da Pesquisa, 2021.

A tabela 5 demonstra as associações pelo teste de Qui Quadrado entre a ocorrência de queda nos últimos 6 meses e as variáveis clínicas, demográficas e epidemiológicas estudadas.

Tabela 5 - Associação da ocorrência de queda nos últimos 6 meses e das variáveis clínicas, demográficas e epidemiológica dos 76 idosos residentes em Instituição de Longa Permanência. Botucatu – SP, 2020

	N	Bivariada		Multivariada	
		OR (IC 95%)	p	OR 95%	p
Idade				1,01 (0,95 – 1,08)	0,671
Sexo feminino	75	1,50 (0,72 – 3,23)	0,229	0,55 (0,15 – 1,97)	0,304
Hipertensão arterial	56	1,40 (0,87 – 2,23)	0,145	1,94 (0,66 – 5,74)	0,181
Depressão	36	1,03 (0,73 – 1,44)	0,548		
Demência	32	0,62 (0,18 – 2,15)	0,333		
Diabetes Mellitus	29	1,06 (0,81 – 1,39)	0,453		
Sequela de AVC	14	1,02 (0,86 – 1,22)	0,562		
Cadeirante	40	1,22 (0,94 – 1,57)	0,148		
Internação	31	1,10 (0,87 – 1,39)	0,335		
Quedas	38	2,33 (0,79 – 6,81)	0,355		
IMC (kg/m ²)					
< 22	42		0,277		
22 – 27	49				
>27	22				
Frágil Fried	74	1,27 (0,71 – 2,08)	0,333		
Frágil FRAIL – NH	55	1,31 (0,93 – 1,84)	0,126	1,29 (0,23 – 7,24)	0,158
Dependente ABVD*	69	1,42 (0,79 – 2,21)	0,266		

***dependente ABVD** – dependente para duas ou mais atividades de vida diária

Fonte: Dados da Pesquisa, 2021.

A incidência média de quedas em residentes de ILPI é cerca de três vezes a taxa de idosos da comunidade (média de 1,5 quedas / cama / ano). A maior taxa relatada seria resultante da natureza mais frágil das pessoas nas instituições e talvez relatório e monitoramento mais preciso nesses ambientes (RUBENSTEIN; JOSEPHSON; OSTERWEIL, 1996).

As quedas são uma das principais causas de mortalidade e morbidade em idosos. Todos os anos, estima-se que 30 a 40% dos pacientes com mais de 65 anos cairão pelo menos uma vez. Quedas levam a lesões moderadas a graves, medo, perda de independência e morte em um terço desses pacientes. Estudos tentaram definir os fatores de risco para quedas em idosos. Uma revisão sistemática, com adaptação transcultural e validação para o Brasil, mostrou que os principais fatores de risco identificados foram equilíbrio e marcha prejudicados, polifarmácia, história de quedas anteriores, idade avançada, sexo feminino, deficiência visual, declínio cognitivo e fatores ambientais (AMBROSE; PAUL; HAUSDORFF, 2013).

Na análise dos dados notamos prevalência das doenças crônicas não transmissíveis, como a hipertensão e depressão, frequentes em toda população idosa, e demência, condição importante nas ILPI. É importante observar a alta prevalência de doenças da saúde mental, em especial depressão e demência, semelhante ao relatado em estudos prévios em ILPI (AUER et al., 2018).

Com relação aos episódios de queda, nosso estudo identificou que, de 76 pacientes avaliados, 20 apresentaram pelo menos uma queda nos últimos 6 meses (26,3%), número menor do que o indicado por Reis e Jesus, que em 2015 observaram que 41% dos idosos institucionalizados no Brasil apresentaram queda (DOS REIS; DE JESUS, 2015). Essa diferença pode ter existido por fatores como as características dos residentes e das instituições estudadas e também pelo tamanho amostral e período de acompanhamento.

Outro aspecto a ser considerado é o viés de memória dos pacientes e cuidadores, visto que os episódios de queda foram referidos retrospectivamente.

Como limitações do estudo, podemos citar a coleta dos dados retrospectivamente e não termos avaliado a totalidade de residentes de ILPI de Botucatu. Portanto, não é possível extrapolar os resultados obtidos para a população idosa geral de Botucatu, dado que a população de idosos institucionalizados deve apresentar predisposição a algumas características marcantes que os tenham levado à institucionalização.

4 CONCLUSÕES

As quedas são evento adverso prevalente dentro das ILPI e de caráter prevenível, uma vez que possuem instrumentos aclamados que podem ser utilizados na estratificação de risco dos pacientes a fim de evitar que esse episódio e suas graves consequências venham a ocorrer. Assim, é essencial que sejam criadas estratégias dentro das instituições para identificação precoce dos idosos com maior risco e implementação de ações para prevenção desses eventos. Em nosso estudo não encontramos condições associadas à este evento.

Devido à ocorrência de quedas em ILPI, um programa de prevenção de quedas multidimensional deve incluir avaliação e modificação dos fatores de risco, educação da equipe, avaliação e intervenção da marcha, avaliação e otimização de dispositivos auxiliares, bem como avaliação e modificação ambiental. Embora não haja associação entre o uso de protetores de quadril e as taxas de queda, seu uso deve ser incentivado, pois o objetivo final dos programas de prevenção de quedas é prevenir a morbidade relacionada ao evento (VU; WEINTRAUB; RUBENSTEIN, 2004).

REFERÊNCIAS

AMBROSE, A. F.; PAUL, G.; HAUSDORFF, J. M. Risk factors for falls among older adults: a review of the literature. **Maturitas**, v. 75, n. 1, p. 51–61, maio 2013.

AMERICAN GERIATRICS SOCIETY 2015 BEERS CRITERIA UPDATE EXPERT PANEL. American Geriatrics Society 2015 Updated Beers Criteria for Potentially Inappropriate Medication Use in Older Adults. **Journal of the American Geriatrics Society**, v. 63, n. 11, p. 2227–2246, nov. 2015.

AMERICAN GERIATRICS SOCIETY AND BRITISH GERIATRICS SOCIETY. Summary of the Updated American Geriatrics Society/British Geriatrics Society clinical practice guideline for prevention of falls in older persons. **Journal of the American Geriatrics Society**, v. 59, n. 1, p. 148–157, jan. 2011.

AUER, S. R. et al. Cross-sectional study of prevalence of dementia, behavioural symptoms, mobility, pain and other health parameters in nursing homes in Austria and the Czech Republic: results from the DEMDATA project. **BMC geriatrics**, v. 18, n. 1, p. 178, 13 2018.

CALIRI, M. H. L. et al. **Classificação das lesões por pressão - Consenso da da National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) adaptada transculturalmente para o Brasil** Associação Brasileira de Estomaterapia e da Associação Brasileira de Enfermagem em Dermatologia, 2016.

- CAMARANO, A. A.; KANSO, S. As instituições de longa permanência para idosos no Brasil. **Revista brasileira de estudos de população**, v. 27, n. 1, p. 232–235, 2010.
- CHAMI, K. et al. Guidelines for infection control in nursing homes: a Delphi consensus web-based survey. **The Journal of Hospital Infection**, v. 79, n. 1, p. 75–89, set. 2011.
- DE URBANETTO, J. S. et al. [Morse Fall Scale: translation and transcultural adaptation for the Portuguese language]. **Revista Da Escola De Enfermagem Da U S P**, v. 47, n. 3, p. 569–575, jun. 2013.
- DEL DUCA, G. F. et al. Indicadores da institucionalização de idosos: estudo de casos e controles. **Revista de Saúde Pública**, v. 46, n. 1, p. 147–153, 2012.
- DOS REIS, K. M. C.; DE JESUS, C. A. C. Cohort study of institutionalized elderly people: fall risk factors from the nursing diagnosis. **Revista Latino-Americana De Enfermagem**, v. 23, n. 6, p. 1130–1138, dez. 2015.
- DUARTE, Y. A. DE O.; DE ANDRADE, C. L.; LEBRÃO, M. L. [Katz Index on elderly functionality evaluation]. **Revista Da Escola De Enfermagem Da U S P**, v. 41, n. 2, p. 317–325, jun. 2007.
- FRIED, L. P. et al. Frailty in older adults: evidence for a phenotype. **The Journals of Gerontology. Series A, Biological Sciences and Medical Sciences**, v. 56, n. 3, p. M146–156, mar. 2001.
- KAEHR, E. et al. Frailty in nursing homes: the FRAIL-NH Scale. **Journal of the American Medical Directors Association**, v. 16, n. 2, p. 87–89, fev. 2015.
- KATZ, S. et al. Studies of illness in the aged. The index of ADL: A standardized measure of biological and psychosocial function. **JAMA: The Journal of the American Medical Association**, v. 185, p. 914–919, 21 set. 1963.
- LINO, V. T. S. et al. [Cross-cultural adaptation of the Independence in Activities of Daily Living Index (Katz Index)]. **Cadernos De Saude Publica**, v. 24, n. 1, p. 103–112, jan. 2008.
- RUBENSTEIN, L. Z.; JOSEPHSON, K. R.; OSTERWEIL, D. Falls and fall prevention in the nursing home. **Clinics in Geriatric Medicine**, v. 12, n. 4, p. 881–902, nov. 1996.
- SEIJO-MARTINEZ, M. et al. Influence of cognitive impairment on fall risk among elderly nursing home residents. **International Psychogeriatrics**, v. 28, n. 12, p. 1975–1987, 2016.
- SMITH, P. W.; RUSNAK, P. G. Infection prevention and control in the long-term-care facility. SHEA Long-Term-Care Committee and APIC Guidelines Committee. **Infection Control and Hospital Epidemiology**, v. 18, n. 12, p. 831–849, dez. 1997.
- VASCONCELLOS ROMANINI, C. et al. Prediction of Death with the FRAIL-NH in Institutionalized Older Adults: A Longitudinal Study from a Middle-Income Country. **The Journal of Nutrition, Health & Aging**, v. 24, n. 8, p. 817–820, 2020.
- VERAS, R. Envelhecimento populacional contemporâneo: demandas, desafios e inovações. **Revista de Saúde Pública**, v. 43, n. 3, p. 548–554, 2009.

VILLAS BÔAS, P. J. F.; FERREIRA, A. L. DOS A. [Infection in elderly interned in long-term care facilities]. **Revista Da Associacao Medica Brasileira (1992)**, v. 53, n. 2, p. 126–129, abr. 2007.

VU, M. Q.; WEINTRAUB, N.; RUBENSTEIN, L. Z. Falls in the nursing home: are they preventable? **Journal of the American Medical Directors Association**, v. 5, n. 6, p. 401–406, dez. 2004.

APLICATIVOS MÓVEIS PARA EDUCAÇÃO EM SAÚDE EM PESSOAS COM DIABETES MELLITUS TIPO 2: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Dara Cesario Oliveira

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), Instituto de Ciências da Saúde (ICS), Redenção - CE
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1708-1260>

Vivian Saraiva Veras

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), Instituto de Ciências da Saúde (ICS), Redenção - CE
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3267-3712>

Jamilly de Aquino Mendonça

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), Instituto de Ciências da Saúde (ICS), Redenção - CE
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9143-8272>

Francisca Sousa Lima

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), Instituto de Ciências da Saúde (ICS), Redenção - CE
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1699-3927>

Antonia Maynara Lourenço Aires

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), Instituto de Ciências da Saúde (ICS), Redenção - CE
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8994-6481>

Aida Teixeira Sancho

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), Instituto de Ciências da Saúde (ICS), Redenção - CE
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7596-9372>

Ana Carolinna Correia Sales

Enfermeira do Programa em Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade. Escola de Saúde Pública do Ceará/ ESP-CE
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9140-098X>

Informações sobre o

artigo:

Recebido em:

20/12/2021

Aceito em:

28/12/2021

Data de publicação:

07/02/2022

RESUMO

Objetivo: Identificar aplicativos móveis utilizados para educação em saúde em pessoas com diabetes mellitus do tipo 2. Método: Revisão integrativa realizada de março a abril de 2021 por meio das bases de dados PUBMED, LILACS, COCHRANE e SCOPUS. E definiu-se a seguinte pergunta norteadora: “Quais aplicativos móveis descritos na literatura para educação em saúde em pessoas com diabetes mellitus tipo 2?”. Os descritores controlados foram delimitados no DESC (Descritores em Ciências da Saúde) e MESH (Medical Subject Headings) e definidas as palavras-chaves: Aplicativos móveis (Mobile Application), Educação em saúde (Health education), e Diabetes Mellitus tipo 2 (Diabetes Mellitus type 2). Foram selecionados estudos primários sobre a temática,

Palavras-chave:

Aplicativos móveis

Educação em saúde

Diabetes Mellitus tipo 2

disponíveis gratuitamente na íntegra e publicados em inglês, no período de janeiro de 2017 a março de 2021. Foram excluídas as produções que não atenderam a questão norteadora do estudo, estudos repetidos ou indisponíveis nas bases de dados. Resultados: Foram incluídos 04 artigos primários na revisão, que houve identificação de 04 aplicativos utilizados como estratégia da prevenção, automonitorização e promoção à saúde de pessoas com Diabetes Mellitus tipo 2. Além disso, podem ser utilizados juntamente com outras estratégias educativas para uma educação de saúde mais potencializada. Conclusão: Os achados do estudo apontam que diferentes aplicativos podem ser utilizados como estratégias educativas na prevenção e promoção da saúde de pessoas DM2, e que os profissionais da saúde necessitam se empoderar e conhecer a sua clientela para identificar melhor as dificuldades e necessidades dos seus pacientes a fim, de utilizar os aplicativos de maneira mais apropriada para cada realidade.

MOBILE APPS FOR HEALTH EDUCATION IN PEOPLE WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS: AN INTEGRATIVE REVIEW

ABSTRACT

Objective: To identify mobile apps used for health education in people with type 2 diabetes mellitus. Method: Integrative review conducted from March to April 2021 using the PUBMED, LILACS, COCHRANE and SCOPUS databases. And the following guiding question was defined: "What mobile apps described in the literature for health education in people with type 2 diabetes mellitus? ". The controlled descriptors were delimited in DESC (Descriptors in Health Sciences) and MESH (Medical Subject Headings) and the keywords were defined: Mobile applications, Health education, and Type 2 Diabetes Mellitus. We selected primary studies on the topic, freely available in full and published in English, from January 2017 to March 2021. The productions that did not meet the guiding question of the study, repeated studies or unavailable in the databases were excluded. Results: Four primary articles were included in the review, which identified four apps used as a strategy for prevention, self-monitoring, and health promotion for people with Type 2 Diabetes Mellitus. Moreover, they can be used together with other educational strategies for a more potentiated health education. Conclusion: The findings of the study indicate that different applications can be used as educational strategies in the prevention and health promotion of people with DM2, and that health professionals need to empower themselves and know their clientele to better identify the difficulties and needs of their patients in order to use the applications in a more appropriate way for each reality.

Keywords:

Mobile Applications

Health Education

Type 2 Diabetes

Mellitus

1 INTRODUÇÃO

As tecnologias de informação e comunicação, incluindo tecnologia de saúde móvel, têm grande potencial para promover a autogestão e não apenas melhorar os resultados clínicos e as habilidades de autogerenciamento, mas também reduzir os custos relacionados à saúde e diminuir a frequência de consultas dos pacientes. Assim, utilização de telefones móveis e tecnologias sem fio relacionadas à saúde, são ferramentas que podem facilitar e melhorar a comunicação entre pacientes e profissionais (RANGRAZ JEDDI et al., 2020; VÊSCOVİ et al., 2017).

Essas tecnologias utilizadas com o intuito educativo, são importantes ferramentas que ajudam no processo de ensino-aprendizagem durante as atividades de educação em saúde. E o uso dessas tecnologias móveis podem ser uma forte aliada no processo de educação em saúde para pessoas com Diabetes Mellitus, e dessa forma, sendo implementadas a favor da saúde (VÊSCOVİ et al., 2017).

Diante disso, os aplicativos móveis, utilizados como novas ferramentas na gestão do cuidado das pessoas com diabetes mellitus tipo 2 (DM2), contribuem para a melhoria da qualidade de vida, da eficiência e da eficácia da educação em saúde. Então, os aplicativos móveis educativos devem fazer parte do tratamento de pessoas com DM2, por ser evidenciado como o veículo de capacitação das pessoas para realizar o gerenciamento da sua doença, auto responsabilização, autocontrole e controle glicêmico (HAAS et al., 2014; NGUYEN et al., 2019; GALDINO et al., 2019).

Destarte, os profissionais de saúde devem se atualizar sobre as tecnologias móveis educativas que possam estar sendo utilizadas no plano de cuidado. E assim, motivar pessoas com DM2 a assumir a sua responsabilidade no plano terapêutico (SANTANA, 2012; GARNWEIDONER-HOLME et al., 2015).

Dessa forma, a seguinte pergunta norteadora foi formulada: “Quais aplicativos móveis descritos na literatura para educação em saúde em pessoas com diabetes mellitus tipo 2?”.

O estudo torna-se relevante por buscar conhecer aplicativos móveis que podem ser utilizados na educação em saúde de pessoas com DM2 e contribuir com atualização da prática clínica dos enfermeiros, e assim melhorar a qualidade do cuidado em Enfermagem e auxiliar na tomada de decisões no plano de cuidado. Dessa maneira, o objetivo do presente estudo é identificar aplicativos móveis utilizados para educação em saúde em pessoas com diabetes mellitus do tipo 2.

2 METODOLOGIA

Este estudo é uma revisão integrativa da literatura que para sua execução obedece a seis etapas: 1. Identificação do tema e seleção da questão de pesquisa; 2. Estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos; 3. Categorização dos estudos; 4. Avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa; 5. Interpretação dos resultados; 6. Síntese do conhecimento dos principais resultados evidenciados na análise dos artigos incluídos (SILVA et al., 2017).

A questão de pesquisa foi elaborada de acordo com a estratégia PICO, acrônimo no idioma inglês que significa “paciente, intervenção, comparação e resultados”. Essa estratégia representa um importante método de preparação de questões norteadoras e posterior busca de evidências na literatura. Com base nessa estratégia, a presente revisão considerou “P” os pacientes com diabetes mellitus tipo 2, “I” se referiu à identificação de aplicativos móveis, “C” não houve palavras correspondentes, e “O” se associou a educação em saúde.

O levantamento bibliográfico ocorreu em março a abril de 2021 nas seguintes bases de dados: National Library of Medicine and National Institutes of Health (PUBMED/MEDLINE); Cochrane library (COCHRANE); Literatura Latino-Americana de Ciências da Saúde (LILACS) e SciVerse Scopus (SCOPUS). E a busca dos estudos primários por meio da Comunidade Acadêmica Federada (CAFe) do Portal de Periódicos da Coordenação de Pessoal de Nível Superior (CAPES), por conseguir ampliar as buscas e mais artigos disponíveis na íntegra.

Os descritores controlados foram delimitados no DESC (Descritores em Ciências da Saúde) e MESH (Medical Subject Headings) e definidas as palavras-chaves: Aplicativos móveis (Mobile Application), Educação em saúde (Health education), e Diabetes Mellitus tipo 2 (Diabetes Mellitus type 2).

Elegeram-se como critérios de inclusão dos estudos: artigos disponíveis na íntegra, nos idiomas português, inglês e espanhol, que respondessem à questão norteadora do estudo, publicados no período entre 2017 a 2021. Houve delimitação do período, pois assegura um quantitativo adequado de estudos primários, assim, evita-se que ocorra a inclusão de volume extenso de artigos que inviabilize a condução de uma revisão integrativa metodologicamente rigorosa e introduza vieses nas etapas seguintes deste método de pesquisa (TOSTES, GALVÃO, 2019).

Os critérios de exclusão foram publicações repetidas, editoriais, manuais, livros, teses, dissertações, monografias e estudos de revisão. Foi utilizado o instrumento adaptado de Ursi (2005), que permite a obtenção de informações sobre a identificação, características metodológicas, intervenções realizadas nos estudos e o nível de evidência (POLIT, BECK, 2011).

Ao realizar a busca dos artigos, foram encontrados 33 artigos na PubMed, 51 na Scopus, 26 na Cochrane e 0 na LILACS, totalizando 110 artigos. Em seguida, foi realizada uma pré-seleção dos artigos localizados nas buscas efetuadas por meio da leitura do título e do resumo, dos quais foram excluídos 76 artigos, por não contemplarem o tema da revisão ou por se tratar de revisão integrativa e 12 por não estarem disponíveis gratuitamente na íntegra.

Mediante leitura na íntegra de 22 artigos, foram excluídos 10, por estarem repetidos e 08 artigos por não contemplar o tema da revisão. Destarte, 04 estudos primários compuseram a amostra do presente RI. A seleção dos estudos primários foi realizada conforme o fluxograma descrito na Figura 1. É importante destacar que todas as produções científicas utilizadas na RI foram citadas e referenciadas, em respeito aos direitos autorais de pesquisa.

FIGURA 1 - Fluxograma da seleção dos estudos segundo o Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Acarape (CE), Brasil, 2021

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os 04 artigos incluídos na revisão estão apresentados no Quadro 1, contendo título, autores, delineamento, nível de evidência e principais resultados. Na verificação da qualidade das evidências científicas, denota-se que 100% dos artigos tratam-se de ensaio clínico randomizado ou quase experimental e com classificação nível II de evidência (POLIT; BECK 2011).

Em relação ao ano de publicação, dois artigos são datados de 2017, um artigo de 2019 e um artigo de 2021. Quanto ao idioma, todas as pesquisas foram publicadas em inglês. Os estudos selecionados foram desenvolvidos nos seguintes países: Índia (n=1), Dinamarca (n=1), Ásia (n=1) e Estados Unidos (n=2). Verificou-se que a maioria dos artigos foram encontrados na base de dados PUBMED (40%) e, nas bases de dados SCOPUS (40%), LILACS (0%) e COCHRANE (20%) das publicações.

Os artigos apontaram quatro aplicativos móveis como estratégia da prevenção, automonitorização e promoção à saúde de pessoas com Diabetes Mellitus tipo 2. Além disso, podem ser utilizados juntamente com outras estratégias educativas para uma educação de saúde mais potencializada.

QUADRO 1 - Artigos selecionados para a revisão integrativa. Redenção (CE), 2019

Titulo	Autores e Ano	Delineamento Experimental	Nível de evidências	Nome do aplicativo	Resultados
Baseline Characteristics and Technology Training of Underserved Adults With Type 2 Diabetes in the Mobile Diabetes Detective (MoDD) Randomized Controlled Trial	Heitkemper M.E et al., 2017	Ensaio Clínico	Nível II	MoDD	Obtiveram boas melhorias no controle glicêmico e nas práticas dos exercícios. Porém, é necessário mais apoio aos usuários e que os profissionais se capacitem mais para utilizarem esse tipo de tecnologia.
Development and testing of a mobile application to support diabetes self-management for people with newly diagnosed type 2 diabetes: a design thinking case study	Petersen M., Hempler N.F., 2017	Ensaio quase-Experimental	Nível II	NEED- Next education	Os usuários encontraram o aplicativo para ser uma ferramenta valiosa de apoio, especialmente para aumentar a conscientização sobre sua saúde psicológica e para informando e orientando pelo sistema de saúde após o diagnóstico.
DM-calendar app as a diabetes self-management education on adult type 2 diabetes mellitus: a randomized controlled trial	Kusnato W.K.A.J., Suprajitno A.H., 2019	Ensaio Clínico	Nível II	DM-Calendar	A educação com esses meios eletrônicos aumentou a percepção de auto eficácia e melhorou o comportamento de bons autocuidado que pode ser observado a partir de mudanças no nível controlado de HbA1c, perfil lipídico e insulina.
General Behavioral Engagement and Changes in Clinical and Cognitive Outcomes of Patients with Type 2 Diabetes Using the Time2Focus Mobile App for Diabetes Education: Pilot Evaluation	Batch B.C. et al., 2021	Ensaio Clínico	Nível II	Time2Focus	Apresentaram melhoria na autogestão e na auto eficácia, e um bom controle glicêmico, porém, não houve uma diferença significativa na HbA1c dos pacientes.

Nessa revisão, em resposta à questão norteadora do estudo, observou-se a identificação de 04 aplicativos para uso exclusivo por pessoas com DM2, são eles o MoDD, NEED, DM-calendar e Time2focus. Percebe-se, portanto, que os aplicativos móveis podem agrupar mais de uma função e que destina-se ao público na busca de trazer informações acessíveis, com o intuito de melhorar a qualidade de vida, favorecer mudanças de fatores de risco, a promoção do autocuidado e autogerenciamento da doença.

Mediante leitura na íntegra dos artigos selecionados, foi possível categorizar os aplicativos em 4 modalidades: Alimentação saudável; exercício físico; controle glicêmico; educação em diabetes. Os aplicativos apresentam funções que podem fornecer informações de maneiras fáceis de monitorar o índice glicêmico, metas de atividade física, controle de peso, dicas de alimentação saudável, alarmes em formato de lembretes dos horários dos medicamentos e/ou aplicações de insulina, e dicas para o autocuidado.

O MoDD, é um aplicativo que orienta o usuário por meio do processo de resolução de problemas diários do diabetes e autogestão por meio do acesso de um computador, celular ou tablet com internet. O MoDD faz a educação em saúde a partir das experiências pessoais e resolução de problemas usando princípios de aprendizagem por descoberta. As orientações vão de acordo com o preenchimento dos dados fornecidos pelo participante, e podem ser desde administração correta dos medicamentos, alimentação saudável a exercícios físicos.

Já o NEED (next education), é um aplicativo focado para as pessoas com DM recém diagnosticados. Orienta sobre as principais necessidades dos usuários como a visão geral das atividades do diabetes após o diagnóstico, registro de dados de saúde, jogos de autorreflexão e estabelecimento de metas, jogos de conhecimento e registro de dados psicossociais e bem-estar.

O NEDD, auxilia no controle glicêmico, orientações sobre alimentação saudável, exercícios físicos. Os usuários viram que o aplicativo é uma ferramenta viável para apoio para enfrentar as dificuldades no dia a dia e por ser uma realidade nova o aplicativo auxilia na correta tomada de decisões. Então, o profissional pode estar sendo guiado pelo app para abordar na educação em saúde as principais dificuldades ou dúvidas relatadas pelos pacientes no aplicativo.

O DM-Calendar é um aplicativo com o foco na educação em saúde e melhorias no autocuidado de pacientes com DM que vivem sozinhos. Contém três dos quatro "pilares" do DM: controle da glicemia, programa de educação, nutrição e atividade física. Ele funciona ao lembrar o usuário com notificações em seus celulares, com o intuito de ajudar o paciente não esquecer os horários certa do uso das medicações/insulina, e orientações para o controle

do índice glicêmico por meio de um programa de autogestão e traz dicas sobre o autocuidado e formas de prevenção de complicações do DM2.

O Time2focus, é um aplicativo que tem como finalidade auxiliar na melhoria da auto eficácia e autogestão dos usuários. A utilização desse aplicativo obteve elevada satisfação pelo os usuários que pela utilização do aplicativo teve relevância para as suas vidas diárias e que ajudou nas tomadas de decisões ou dúvidas do dia a dia, consequentemente, influenciando nas mudanças de hábitos saudáveis e melhorias no autocuidado. Os usuários obtiveram bons resultados no controle glicêmico, porém, na hemoglobina glicada não houve diferença significativa.

Assim, foi perceptível que os aplicativos móveis têm como objetivo a mudança de comportamento dos usuários. Sabe-se que, engajar os usuários no cuidado do DM2 e aumentar a motivação intrínseca para o autocuidado e a competência dos usuários para alcançarem suas metas estabelecidas é um dos principais desafios para os profissionais de saúde.

Dessa forma, os profissionais de saúde podem utilizar os aplicativos móveis como veículo de educação em saúde para capacitar e incentivar as pessoas com DM ao autocuidado e criar sentimentos de corresponsabilidade sobre sua saúde (CARVALHO et al., 2018).

4 CONCLUSÃO

Os achados do estudo apontam que diferentes aplicativos podem ser utilizados como estratégias educativas na prevenção e promoção da saúde de pessoas DM2. Nota-se que os profissionais da saúde necessitam se empoderar e conhecer a sua clientela para identificar melhor as dificuldades e necessidades dos seus pacientes a fim de utilizar os aplicativos de maneira mais apropriada para cada realidade, e replicá-los de forma correta e eficaz na educação em saúde de seus clientes.

Apesar do artigo apresentar limitações, como a exclusão de artigos indisponíveis gratuitamente nas bases, o mesmo apresenta dados relevantes para profissionais de saúde, principalmente da Atenção Primária, onde se concentra o ápice das práticas educativas com os usuários que possuem diabetes. Salienta-se a necessidade de novos estudos sobre a temática que possam apresentar aplicativos cada vez mais promissores e acessíveis à realidade dos profissionais e usuários.

REFERÊNCIAS

BATCH BC, Spratt SE, Blalock DV, Benditz C, Weiss A, Dolor RJ, Cho AH. General Behavioral Engagement and Changes in Clinical and Cognitive Outcomes of Patients with Type 2 Diabetes Using the Time2Focus Mobile App for Diabetes Education: Pilot Evaluation. **J Med Internet Res.** 2021 Jan 20;23(1):e17537. doi: 10.2196/17537. PMID: 33470947; PMCID: PMC7857941.

CHAWLA A, Chawla R, Jaggi S. Microvascular and macrovascular complications in diabetes mellitus: Distinct or continuum?. **Indian J Endocr Metab** 2016;20:546-53. 2019;32(2):210-9.

SBD – **Sociedade Brasileira de Diabetes. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes.** Clannad,2020. 419p.

GALDINO, Y.L.S., MOREIRA, T.M.M., MARQUES, A.D.B., SILVA, F.A.A. Validation of a booklet on self-care with the diabetic foot. **Rev Bras Enferm** [Internet], v.72, n.2, p. 780-787,2019. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2017-0900>

GARNWEIDNER-HOLME LM, Borgen I, Garitano I, Noll J, Lukasse M. Designing and Developing a Mobile Smartphone Application for Women with Gestational Diabetes Mellitus Followed-Up at Diabetes Outpatient Clinics in Norway. **Healthcare (Basel).** 2015 May 21;3(2):310-23. doi: 10.3390/healthcare3020310. PMID: 27417764; PMCID: PMC4939538.

HAAS, L., et al. National standards for diabetes self-management education and support. **Diabetes Care.** Standards Revision Task Force v.37, p.144-153, 2014. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.2337/dc14-S144>

HEITKEMPER EM, Mamykina L, Tobin JN, Cassells A, Smaldone A. Baseline Characteristics and Technology Training of Underserved Adults With Type 2 Diabetes in the Mobile Diabetes Detective (MoDD) Randomized Controlled Trial. **Diabetes Educ.** 2017 Dec;43(6):576-588. doi: 10.1177/0145721717737367. Epub 2017 Oct 23. PMID: 29059017; PMCID: PMC5759770.

HOVADICK, Ana Carolina de Andrade; REIS, Ilka Afonso; TORRES, Heloísa Carvalho. Short Message Service (SMS) e promoção do autocuidado em DM2: revisão integrativa. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 32, p. 210-219, 2019.

International Diabetes Federation. IDF Atlas. 8. ed. Bruxelas: **International Diabetes Federation**; 2017.

KUSNANTO, WIDYANATA KAJ, SUPRAJITNO, ARIFIN H. DM-calendar app as a diabetes self-management education on adult type 2 diabetes mellitus: a randomized controlled trial. **J Diabetes Metab Disord.** 2019 Nov 19;18(2):557-563. doi: 10.1007/s40200-019-00468-1. PMID: 31890682; PMCID: PMC6915201.

MENDES, K.D.S., et al. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. **Enferm. Florianópolis**, v. 17, n.4, p.758-764, 2008.Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0104-07072008000400018>

NGUYEN, T.P.L., et al. Effectiveness of a theory-based foot care education program (3STEPFUN) in improving foot self-care behaviours and foot risk factors for ulceration in people with type 2 diabetes. **Diabetes Research and clinical practice**. 1 v.5, n. 2, p. 29 – 38, 2019.

PETERSEN M, Hempler NF. Development and testing of a mobile application to support diabetes self-management for people with newly diagnosed type 2 diabetes: a design thinking case study. **BMC Med Inform Decis Mak**. 2017 Jun 26;17(1):91. doi: 10.1186/s12911-017-0493-6. Erratum in: BMC Med Inform Decis Mak. 2017 Sep 12;17 (1):133. PMID: 28651639; PMCID: PMC5485734.

POLIT, D.F., et al. Fundamentos de pesquisa em enfermagem: avaliação de evidências para a prática da enfermagem. **Artmed**, 7.ed., 669 p., 2011

RANGRAZ JEDDI, F., Nabovati, E., Hamidi, R. et al. Mobile phone usage in patients with type II diabetes and their intention to use it for self-management: a cross-sectional study in Iran. **BMC Med Inform Decis Mak** 20, 24 (2020). <https://doi.org/10.1186/s12911-020-1038-y>

SANTANA, N.A.O. Abordagem da equipe de saúde na prevenção do pé diabético. **Universidade Federal da Bahia. Faculdade de Medicina da Bahia**, 2012. <https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/7981/1/Am%C3%A1lia%20Ol%C3%ADmpia%20de%20Santana%20Neta%20%282012.1%29.pdf>

TOSTES, M.F.P., GALVÃO, C.M. Implementation process of the Surgical Safety Checklist: integrative review. **Rev. Latino-Am. Enfermagem** v. 27, p.3104, 2019. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/1518-8345.2921.3104>

VÊSCOVİ SJ, Primo CC, Sant' Anna HC, Bringuete ME, Rohr RV, Prado TN, Bicudo SD. Aplicativo móvel para avaliação dos pés de pessoas com diabetes mellitus. **Acta Paul Enferm**. 2017; 30(6):607-13.

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM PARA UM PACIENTE COM DIABETES MELLITUS TIPO 2 E HIPOTIREOIDISMO: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Jamilly de Aquino Mendonça

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), Instituto de Ciências da Saúde (ICS), Redenção - CE

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9143-8272>

Dara Cesario Oliveira

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), Instituto de Ciências da Saúde (ICS), Redenção - CE

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1708-1260>

Vivian Saraiva Veras

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), Instituto de Ciências da Saúde (ICS), Redenção - CE

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3267-3712>

Francisca Sousa Lima

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), Instituto de Ciências da Saúde (ICS), Redenção - CE

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1699-3927>

Antonia Maynara Lourenço Aires

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), Instituto de Ciências da Saúde (ICS), Redenção - CE

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8994-6481>

Aida Teixeira Sancho

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), Instituto de Ciências da Saúde (ICS), Redenção - CE

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7596-9372>

Ana Carolinna Correia Sales

Enfermeira do Programa em Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade. Escola de Saúde Pública do Ceará/ ESP-CE

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9140-098X>

Informações sobre o

artigo:

Recebido em:

20/12/2021

Aceito em:

28/12/2021

Data de publicação:

07/02/2022

RESUMO

O objetivo do estudo foi relatar sobre a experiência de acadêmicos de enfermagem acerca do desenvolvimento da sistematização da assistência de enfermagem a um paciente com DM2 e hipotireoidismo. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, realizado durante o período de estágio hospitalar da disciplina de Internato de Enfermagem Hospitalar, do curso de graduação em Bacharelado em Enfermagem, de uma universidade federal, no período de janeiro a abril de 2021, em um Hospital do Estado do Ceará. Verificou-se a importância da utilização da SAE, na identificação dos principais problemas, tornando-se essencial no planejamento das ações de Enfermagem. Com isso conclui-se que

Palavras-chave:

Processo de
Enfermagem
Diabetes Mellitus
Hipotireoidismo
Enfermagem

a utilização do Processo de Enfermagem (PE), é de suma importância para uma assistência de qualidade e eficaz para a sua condição clínica.

**SYSTEMATIZATION OF NURSING CARE FOR A PATIENT WITH
TYPE 2 DIABETES MELLITUS AND HYPOTHYROIDISM:
EXPERIENCE REPORT**

ABSTRACT

Keywords:

Nursing Process
Diabetes Mellitus
Hypothyroidism
Nursing

The objective of this study was to report on the experience of nursing students about the development of nursing care systematization to a patient with DM2 and hypothyroidism. This is a descriptive study, of the type experience report, carried out during the period of hospital internship of the discipline of Hospital Nursing Internship, of the undergraduate course in Bachelor's Nursing, a federal university, from January to April 2021, in a hospital in the state of Ceará. The importance of using the SAE was verified, in the identification of the main problems, becoming essential in the planning of nursing actions. Thus, it was concluded that the use of the Nursing Process (NP) is of paramount importance for a quality and effective assistance to their clinical condition.

1 INTRODUÇÃO

A associação entre Diabetes mellitus (DM) e o hipotireoidismo vem se tornando cada vez mais debatida. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes (2020), o DM é um distúrbio metabólico caracterizado por hiperglicemia persistente, decorrente da produção ou ação insuficiente de insulina, ou a ausência de ambos os mecanismos, levando ao prazo para complicações em longo prazo .

Pode ser classificada como DM tipo 1, DM tipo 2, tipos específicos (genéticos) e DM gestacional. O DM tipo 2 (DM2) é o mais predominante e correspondente a 90 a 95% dos casos e trata-se de um distúrbio de etiologia complexa resultante de diversos fatores (SBD, 2020).

Dentre esses fatores está o hipotireoidismo, mais prevalente em idades avançadas maiores de 60 anos e do sexo feminino, atua na diminuição dos hormônios tireoidianos onde há um aumento no metabolismo dos carboidratos e na deposição de lipídios, o que dificulta a captação de glicose e a produção de insulina, estes possuem efeitos sistêmicos no organismo criando um estado de resistência e aumenta os riscos para o desenvolvimento do DM2 (GRONICH et al., 2015).

Assim como o DM, o hipotireoidismo, pode ser diagnosticado por meio de exames laboratoriais e avaliação médica, a fim de considerar o tratamento adequado e evitar possíveis complicações (VIEIRA et al., 2020).

Pessoas com DM2, podem estar mais propensas a uma maior incidência de complicações associadas a doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, cegueira, insuficiência renal e amputações não traumáticas de membros inferiores devido às altas taxa dos valores glicêmicos (SBD, 2019-2020)

Assim, o estudo tem como objetivo relatar a experiência de acadêmicos de enfermagem acerca do desenvolvimento da sistematização da assistência de enfermagem a um paciente com DM2 e hipotireoidismo.

2 METODOLOGIA

Trata-se de estudo descritivo, do tipo Relato de Experiência, realizado através da aplicação do processo de enfermagem a um paciente com DM2, em regime de internação hospitalar, durante o estágio da disciplina de Internato de Enfermagem Hospitalar do curso de graduação em Bacharelado em Enfermagem de uma Universidade Federal, em um Hospital localizado no estado do Ceará.

Para a obtenção dos dados referentes ao estado de saúde do paciente, seguimos as etapas da Sistematização da Assistência de Enfermagem que acordo com a Resolução COFEN 358/2009 por meio da consulta de enfermagem, composta de: coleta de dados de Enfermagem (ou Histórico de Enfermagem); diagnóstico de Enfermagem; Planejamento de Enfermagem; Implementação e Avaliação de Enfermagem. São etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes, baseadas em teorias que lhes dêem orientação (Conselho Federal de Enfermagem. Resolução COFEN nº 358, de 15 de outubro de 2009).

Foi destacado durante a coleta, pontos necessários para nos guiar no melhor plano de cuidados, tais como: perfil de autocuidado, idade, fatores socioeconômicos, história

anterior de tabagismo e etilismo; antecedentes familiares; hipertensão e Diabetes Mellitus; alimentação e uso de medicações.

Após análise dos dados coletados, plano de cuidados foi elaborado segundo a classificação de North American Nursing Diagnosis Association da (NANDA), Classificação dos Resultados de Enfermagem (NOC) e classificação das intervenções de enfermagem (NIC) (HERDMAN; KAMITSURU, 2018); BULECHEK; BUTVHEK; DOCHTERMAN, 2010).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A coleta de dados foi composta de uma anamnese e exame físico, guiada por meio da aplicação de um roteiro seguido de uma busca no prontuário da paciente. Construído e disponibilizado pelas preceptoras da disciplina, a aplicação desse instrumento, possibilitou uma coleta de dados referentes às necessidades da paciente, e aos seus aspectos sociodemográficos, o que contribui para a construção de um plano de cuidados com foco nas definições dos problemas, diagnósticos prioritários, resultados esperados e intervenções necessárias a serem realizadas.

Logo em seguida, obtivemos conhecimento que a paciente de 64 anos, portava DM2 e hipotireoidismo. No momento estava em uso de insulina NPH e levotiroxina. Pesando (44,5 kg), Altura (1,46 cm), agricultora, casada, ensino fundamental incompleto, nascida em 08/08/1956, natural de Poranga/Ce e residente de Fortaleza,

No prontuário da paciente, foi observado que ela compareceu ao hospital com queixa principal de aumento do volume do pescoço de forma indolor que iniciou em dezembro de 2020 com piora progressiva desde então, apresentou disfagia progressiva inicialmente para sólidos e depois para líquidos, apresentando perda ponderal significativa. Devido ao quadro, a cliente referiu dificuldade para respirar em repouso, pigarros frequentes, tosse que piorava no período da noite, foi verificado também que a paciente é ex tabagista.

A paciente se encontrava no 6º dia de Pós-Operatório (P.O.) de traqueostomia mais gastrostomia (GTT) e Herniorrafia umbilical. Durante a anamnese, notou-se que a paciente se encontrava orientada e cooperativa, conciliando sono e vigília, traqueostomizada, higienizada, aceitando dieta por GTT tolerada deambulando com auxílio, em uso de cateter tipo óculos (baixo fluxo); reflexos pupilares presentes e simétricos, conjuntivas hipocoradas, sem alteração na esclerótica, acuidade auricular preservada, narinas sem alterações

anatômicas e lesões, ausência de secreções, lábios com coloração rósea, sem massas ou lesões, mucosa oral preservada, em uso de prótese dentária, não apresentava halitose, tireoide indolor a palpação, porém com aumento de volume, linfonodos palpáveis em face medial do braço e antebraço.

Cateter central na Jugular esquerda íntegro, sem presença de sinais flogísticos, pele íntegra para LPP, normocorada, enchimento capilar (<2.S). SSVV: PA:114X80mmHg. T: 35.6 C°, FC: 70. FR: 20 ipm, SatO2: 98%, AC: ruído cardíaco regular (RCR) em 2t, bulhas normofonéticas e sem sopro (BNF s/s). AP: murmúrios vesiculares, sem RA. ABD: globoso, flácido, indolor e ausência de visceromegalias, com FO limpa e seca e GTT sem sinais flogísticos, MMSS e MMII com baixa amplitude de movimentos sem presença de edemas. Eliminações vesicais e intestinais presentes e espontâneas (SIC).

A partir da análise dados coletados traçaram-se os principais diagnósticos de Enfermagem que melhor condiz ao paciente conforme a tabela 1.

TABELA 1 - Diagnósticos de Enfermagem conforme a NANDA -I 2018-2019

Domínios da NANDA	Diagnósticos de Enfermagem Prioritários
Domínio 11: segurança/proteção Classe 1: infecção	DIAGNÓSTICO I: Risco de infecção relacionado a alterações na integridade da pele, diabetes mellitus, processo cirúrgico e tabagismo.
Domínio 4: Atividade/repouso Classe 4: Respostas cardiovasculares/pulmonares	DIAGNÓSTICO II: Padrão respiratório ineficaz relacionado a dispneia evidenciada pela posição do corpo que inibe a expansão pulmonar.
Domínio 2: Nutrição Classe 1: Ingestão	DIAGNÓSTICO III: Nutrição desequilibrada: menor que as necessidades corporais relacionada a ingestão de alimentos menor que a ingestão diária recomendada evidenciada por incapacidade de ingerir os alimentos.

Fonte: NANDA I: 2018-2020.

Em seguida, após elencar os principais diagnósticos de Enfermagem, foram direcionados os resultados e/ou metas esperados definidos a partir da taxonomia de Resultados de enfermagem-NOC (tabela 2).

TABELA 2 - Resultados esperados NOC, 2016

METAS (NOC)
Controle dos riscos de infecção. -O paciente e/ou familiar reconhecerá os sinais de infecção e alertará a equipe se necessário. -O paciente apresentará satisfação pessoal e participará da tomada de decisões terapêuticas. - Enfrentamento do estado atual de saúde. -Apoio da família durante o tratamento. - Estado Respiratório: Permeabilidade das Vias Aéreas - Controle dos Sinais Vitais - Ingestão de líquidos coerente com a dieta prescrita - Comportamento de ganho de peso

Fonte: NOC, 2016.

Em sequência, após análise dos diagnósticos e metas a serem alcançadas, foram traçadas as intervenções a partir da Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC), conforme a Tabela 3.

TABELA 3 - Intervenções de Enfermagem NIC, 2010

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM (NIC)
-Monitorar a vulnerabilidade à infecções. -Monitorar sinais e sintomas sistêmicos e locais de infecção. -Examinar as condições das feridas cirúrgicas. -Promover ingestão nutricional adequada. -Ensinar o paciente e à família sobre os sinais e sintomas de infecção e sobre o momento de informá-los aos profissionais de saúde. -Orientar o paciente e a família maneiras de evitar infecções. -Manter o controle glicêmico dentro dos parâmetros recomendados

- Monitorar frequência, ritmo, profundidade e esforço nas respirações.
 - Posicionar o paciente com o segmento pulmonar a ser drenado na posição mais elevada possível.
 - Monitorar a ocorrência de aumento da inquietação, ansiedade e falta de ar
 - Monitorar a capacidade do paciente para tossir de forma eficaz.
 - Monitorar a ocorrência de dispneia e eventos que a melhorem ou piores.
 - Registrar mudanças no SaO₂, SvO₂, CO₂ corrente terminal e mudanças nos valores gasometria arterial, conforme apropriado.
-
- Identificar a dieta prescrita
 - Manter a cabeceira da cama elevada de 30 a 45 minutos após a refeição.
 - Verificar o posicionamento da sonda nasogástrica e da gastrostomia antes de alimentar o paciente.
 - Verificar o resíduo da sonda nasogástrica ou da gastrostomia antes de alimentar o paciente.

Fonte: NIC, 2010.

O desenvolvimento da SAE é importante pois, é traçado o planejamento de Enfermagem e realizado a prescrição dos cuidados de acordo com a necessidade do paciente. A sua implementação possibilita avaliar o paciente de forma individualizada, uma maior autonomia aos profissionais da enfermagem, clínica assistencial baseada em evidências científicas e ajuda a minimizar as chances de erros no cuidado (MARTIN; DA COSTA; DOS SANTOS, 2021).

Assim, após a implementação do plano de cuidados, realizou-se a última etapa de avaliação de Enfermagem. Na qual, observou-se boa aceitação do cliente e repassado para os familiares as medidas que pudessem auxiliar na melhoria da paciente frente à doença.

Destarte, salienta-se a importância deste relato de experiência, pois poderá subsidiar profissionais de saúde e acadêmicos na elaboração de um plano de cuidados para pacientes com DM2 e Hipotireoidismo. Destaca-se também a importância do Processo de Enfermagem (PE) como instrumento a ser utilizado durante as consultas de Enfermagem.

4 CONCLUSÕES

A aplicação do processo de enfermagem é de fundamental importância para que o processo de cuidar ocorra de forma coesa e seus objetivos possam ser alcançados. De modo que o paciente e a família sejam integradas nesse processo, facilitando o cumprimento das metas terapêuticas.

Nesse sentido é compreensível o papel da enfermagem na assistência a essas pessoas, principalmente, para desenvolver educação em saúde com o objetivo de aumentar

o nível de conhecimento dos pacientes e das famílias/ cuidadores sobre a doença em questão, estimular o autocuidado, facilitar a cooperação e adesão do paciente ao tratamento.

Em suma, a enfermagem tem um papel extremamente importante no que diz respeito ao processo de cuidar, uma vez que sua atuação profissional está intrínseca à realização de procedimentos técnicos/científicos e a utilização de protocolos específicos de sua atuação.

REFERÊNCIAS

BULECHEK, G. M.; BUTCHER, H. K.; DOCHTERMAN, J. M. Classificação das intervenções de enfermagem (**NIC**). Organização Alba Lucia Bottura Leite de Barros. 5. ed. Tradução de Jacqueline Cesar Thompson, Regina Garcez, Soraia Imon de Oliveira e Tatiana Ferreira Robaina. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COFEN). Resolução COFEN nº 358/2009, de 15 de outubro de 2009. Dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, e dá outras providências. In: **Conselho Federal de Enfermagem [legislação na internet]**. Brasília; 2009. Disponível em: < [http:// www.portalcofen.gov.br](http://www.portalcofen.gov.br) >. Acesso em: 10 de dezembro de 2010.

FERNANDES, G. Q.; FREITAS, G. G. Prevalência de hipotireoidismo em pacientes com diabetes mellitus tipo 2. **Rev Med** (São Paulo). v. 97, n. 3, p. 273-277. 2018. DOI: <http://dx.doi.org/10.11606/issn.1679-9836.v97i3p273-277>

GRONICH, N. Et al. Hypothyroidism is a risk factor for new-onset diabetes: **a cohort study**. **Diabetes Care**. v. 38, n. 9, p. 1657-1664. doi: 10.2337/dc14-2515

HERDMAN, T. H.; KAMITSURU, S. Diagnósticos de Enfermagem da NANDA-I: **definições e classificação 2018-2020** . Organização Alba Lucia Bottura Leite de Barros. 11. ed. Tradução de Regina Machado Garcez. Porto alegre: Artmed, 2018.

VIEIRA, D. S. C. Et al. Prevalência de diabetes tipo 2, hipotireoidismo, a associação entre essas patologias e seus fatores de risco cardiovascular na ubaldina rezende carvalho em mineiros-go nos anos de 2016 a 2018. **Rev Saúde Multidisciplinar (Mineiros)**. v. 8, n. 2, p. 24-29, 2020.

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A UMA PUÉRPERA GEMELAR INTERNADA EM ALOJAMENTO CONJUNTO: RELATO DE EXPERIÊNCIA

José Erivelton de Souza Maciel Ferreira

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (UNILAB), Redenção – Ceará
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2668-7587>
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6769744803078115>

Raphaella Castro Jansen

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (UNILAB), Redenção – Ceará
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4032-5825>
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8692988722129463>

Lídia Rocha de Oliveira

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (UNILAB), Redenção – Ceará
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7716-1388>
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9684328247340215>

Daniel Freitas Oliveira Damasceno

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (UNILAB), Redenção – Ceará
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9664-6660>
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1407111040420799>

Francisco Breno Barbosa de Oliveira

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (UNILAB), Redenção – Ceará
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2488-937X>
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6390610476457752>

Maria Jocelane Nascimento da Silva

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (UNILAB), Redenção – Ceará
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1764-7460>
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4427273172679409>

Alanna Elcher Elias Pereira

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (UNILAB), Redenção – Ceará
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9516-1883>
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1867078283078942>

Glauciano de Oliveira Ferreira

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (UNILAB), Redenção – Ceará
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5142-671X>
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4456885211846332>

Lucas de Sousa Silva

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (UNILAB), Redenção – Ceará
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5801-1875>
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9088055405234568>

Hudson Pimentel Costa

Centro universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU), Fortaleza – Ceará
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9973-6100>
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1075491623486578>

Mohamed Saido Balde

Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza – Ceará

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3946-1600>

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7259691697748592>

Janiel Ferreira Felício

Universidade Estadual do Ceará (UECE), Fortaleza – Ceará

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5601-0086>

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0487309332588107>

Informações sobre o artigo:	RESUMO
Recebido em: 23/12/2021	<p>Objetivo: descrever a sistematização da assistência de enfermagem prestada a uma puérpera gemelar internada no alojamento conjunto, adotando as distintas classificações taxonômicas NANDA-I, NOC, NIC. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, acerca da assistência de enfermagem prestada a uma paciente no período pós-parto imediato de cirurgia cesárea, internada no alojamento conjunto de um hospital municipal de uma cidade metropolitana do estado do Ceará. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista e exame físico e de forma secundária, através da consulta ao prontuário da paciente em busca de informações adicionais sobre ela e sobre a sua gestação. Elencaram-se diagnósticos de enfermagem prioritários: Dor aguda; Risco de infecção de sítio cirúrgico; Disposição para conhecimento melhorado. Como resultados esperados têm-se: mostrar-se capaz de amamentar adequada e exclusivamente, apresentar mais conhecimento no processo de cuidar de si mesmo e dos recém-nascidos, disposição para cuidar da própria saúde psicológica, com padrão de sono regular, disposição para realizar as atividades de vida diárias, realização de exercícios físicos e hábitos alimentares saudáveis, livre de dores e atenta quanto aos melhores métodos contraceptivos enquanto estiver amamentando. Para alcance desses resultados algumas intervenções foram elencadas, entre elas: administrações de medicamentos; exame da ferida operatória de 12/12, ensino de técnicas para promover o cuidado com os recém-nascidos. Conclusão: A elaboração e implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem foi essencial para o alcance dos resultados esperados, principalmente no que se refere ao conhecimento sobre o autocuidado, aos cuidados com o bebê e sobre o planejamento familiar e reprodutivo.</p>
Aceito em: 31/12/2021	
Data de publicação: 07/02/2022	
Palavras-chave: Período Pós-Parto Gravidez de Gêmeos Sistematização da Assistência de Enfermagem Saúde da Mulher Enfermagem Obstétrica	

NURSING CARE FOR A TWIN POSTPARTUM WOMAN ADMITTED TO A JOINT ACCOMMODATION: EXPERIENCE REPORT

ABSTRACT

Objective: to describe the systematization of nursing care provided to a twin postpartum woman hospitalized in the joint housing, adopting the different taxonomic classifications NANDA-I, NOC, NIC. Methodology: This is a descriptive study about nursing care provided to a patient in the immediate postpartum period of cesarean surgery, admitted to the joint accommodation of a municipal hospital in a metropolitan city of the state of Ceará. Data collection was performed through interviews and physical examination and in a secondary way, through the consultation of the patient's medical record in search of additional information about her and her pregnancy. Priority nursing diagnoses were listed: Acute pain; Risk of surgical site infection; Disposition for improved knowledge. As expected results have been shown to be able to breastfeed properly and exclusively, to show more knowledge in the process of caring for oneself and newborns, willingness to take care of one's own psychological health, with regular sleep pattern, willingness to perform daily life activities, exercise and healthy eating habits, free of pain and attentive to the best contraceptive methods while breastfeeding. To achieve these results, some interventions were listed, among them: drug administration; examination of the 12/12 operative wound, teaching techniques to promote the care of newborns. Conclusion: The elaboration and implementation of Nursing Care Systematization was essential to achieve the expected results, especially regarding knowledge about self-care, care with the baby and about family and reproductive planning.

Keywords:

Postpartum Period

Pregnancy, Twin

Nursing Care

Women's Health

Obstetric Nursing

1 INTRODUÇÃO

O puerpério é a fase em que ocorrem manifestações involutivas das modificações locais e sistêmicas provocadas pela gravidez e parto, onde a mulher retorna ao estado pré-gravídico (LOPES *et al.*, 2005). Nesta etapa, a mulher experimenta profundas modificações. Assim, este evento pode ser concebido como um fenômeno de âmbito biológico, psicológico e sociocultural. Nesse sentido, o parto é uma experiência excepcional e um processo cheio de significados que pode deixar marcas positivas ou negativas dependendo da experiência vivenciada pela mulher (ZVEITER; PROGIANTI; VARGENS, 2005).

A gestação gemelar é caracterizada pela presença de dois conceitos presentes simultaneamente no útero ou fora dele. Na espécie humana é mais frequente em mulheres

com idade acima de 27 anos, raça negra, múltiparas, história familiar materna e com maior assiduidade de atividades sexuais. A incidência de gravidez múltipla tem aumentado significativamente nas últimas décadas, em consequência das técnicas de reprodução assistida. Existem dois tipos de gravidez gemelar, a monozigótica que descreve a fecundação de um óvulo por um único espermatozoide, e a dizigótica que decorre da fecundação de dois óvulos por dois espermatozoides (SANTOS *et al.*, 2010).

No âmbito da enfermagem obstétrica, percebe-se que estudos que foquem nos diagnósticos de enfermagem identificados durante a parturição e puerpério são escassos, pouco contribuindo para o esclarecimento de fenômenos que interessem a prática profissional nesta área de interesse (VIEIRA *et al.*, 2010). A assistência planejada, com a obtenção de dados e a identificação das respostas a problemas ou à etapa do ciclo de vida, de forma individualizada, considerando o contexto em que a puérpera está inserida, é fundamental para uma assistência de qualidade (PEREIRA; BACHION, 2005).

Nesse contexto, a enfermagem pode contribuir significativamente quando elabora intervenções focadas nas reais necessidades da puérpera. Com isso, o objetivo desse estudo de caso é descrever a sistematização da assistência de enfermagem prestada a uma puérpera gemelar internada no alojamento conjunto, adotando as distintas classificações taxonômicas NANDA-I, NOC, NIC.

2 METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo, acerca da assistência de enfermagem prestada a uma paciente no período pós-parto imediato de cirurgia cesárea, internada no alojamento conjunto de um hospital de uma cidade do estado do Ceará.

Esse estudo foi realizado por acadêmicos e profissionais de enfermagem de uma universidade federal brasileira como atividade de um estágio supervisionado em uma disciplina do curso, sob orientação de enfermeiros doutores professores e especialistas na área de Enfermagem Obstétrica. Ressalta-se que os aspectos relacionados à Bioética e Ética foram devidamente respeitados.

Para a realização primeira etapa do Processo de Enfermagem – coleta de dados – realizou uma entrevista flutuante e exame físico obstétrico. Após a coleta de dados inicial e exame físico, consultou-se o prontuário da paciente em busca de informações adicionais

sobre ela e sobre a sua gestação. As anotações próprias de percepção acerca do cliente foram utilizadas como fonte complementar para formular a descrição do caso clínico da paciente.

Os dados coletados auxiliaram, por sua vez, na elaboração das últimas quatro etapas do Processo de Enfermagem, que são o levantamento de diagnósticos apurados, planejamento do cuidado, intervenções eficazes e avaliação.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A paciente, para a qual foi prescrita a assistência de enfermagem era do sexo feminino, 25 anos, G3P1A1e com IG gemelar de bivitelinos de 37s6d foi admitida na instituição no dia 13 de março de 2019 às 09h35 sem acompanhante e sem documentação. Quanto a ultrassonografia obstétrica, observou-se que ambos os fetos se apresentavam em posição longitudinal, apresentação cefálica com dorso a direita, movimentos fetais presentes, BCF presentes em torno de 145bpm (Feto 1) e 144pbm (Feto 2). À biometria fetal apresentam-se com os parâmetros dentro do esperado e visibilizada 1 placenta de localização anterior outra de localização posterior. A conclusão da US foi gestação tópica compatível com a IG atual. Foi admitida na sala de operação as 11h45 e ao exame obstétrico apresentava-se com amniorrexe com líquido claro e com risco de complicação, sendo necessário realizar parto cesariano imediato sob raquianestesia.

Na ficha de acompanhamento social foi documentado que a paciente residia com mais três pessoas em casa própria com infraestrutura básica e não trabalha, não recebe benefícios social ou previdenciário e com renda familiar de 01 salário mínimo. Foram preenchidos corretamente os instrumentos relatório cirúrgico e de materiais gastos na sala, não havendo alguma intercorrência registrada. Realizado o registro das Declarações de Nascido Vivo DNVs. Por fim, foi prescrito para a paciente no pós-operatório: dieta zero, soro glicosado a 5% e 1000ml de ringer, Dipirona, Profenid, Plamet, Oxitocina 2 ampolas e Hidrocortizona (Tabela 1).

Tabela 01 – Medicamentos prescritos para uma puérpera gemelar cesariana. Maracanaú-CE, 2019

MEDICAÇÕES	PARA QUE SERVE? *
Dipirona	A dipirona é um medicamento utilizado no tratamento de febre e dor. Os efeitos antitérmico e analgésico podem ser esperados em 30 a 60 minutos após a administração e geralmente persistem por aproximadamente 4 horas. A amamentação deve ser evitada durante e por até 48 horas após a administração de dipirona.
Profenid (cetoprofeno)	Este medicamento é destinado ao tratamento de inflamações e dores decorrentes de processos reumáticos e traumatismos, e de dores em geral. Desta forma, PROFENID IV pode ser utilizado no tratamento da dor no pré e pós-operatório e outras patologias dolorosas. Não existem dados disponíveis sobre a excreção de cetoprofeno no leite materno. O uso de cetoprofeno não é recomendado durante a amamentação.
Plamet	Está indicado para: -distúrbios da motilidade gastrointestinal (alteração na movimentação do estômago e intestino); - refluxo gastroesofágico (presença de conteúdo ácido dentro do esôfago proveniente do estômago); - náuseas e vômitos de origem central e periférica (cirurgias, metabólicas, infecciosas e problemas secundários ao uso de medicamentos). Não existem estudos adequados e bem controlados com bromoprida em mulheres grávidas. A bromoprida é excretada pelo leite materno. Por isso, não deve ser administrada a mulheres grávidas ou que amamentam.
Ocitocina	Antes do parto (anteparto): Provocar (induzir) ou aumentar as contrações do útero (trabalho de parto); corrigir contrações lentas (inércia uterina) durante o trabalho de parto; tratar o abortamento espontâneo incompleto, inevitável ou retido. Após o parto (pós-parto): Ajudar nas contrações do útero durante a cesariana, depois da retirada da criança; prevenir e tratar sangramento caso não haja contração forte o suficiente do útero depois da retirada da criança.
Hidrocortizona	O acetato de hidrocortisona é indicado para o tratamento de doenças inflamatórias e alérgicas da pele que respondem ao tratamento com corticosteroides aplicados diretamente na pele como, por exemplo, dermatites, eczemas, vermelhidão provocada por sol, queimadura de primeiro grau e picadas de inseto. Não deve se utilizar acetato de hidrocortisona nas mamas durante o período de amamentação.

*Segundo a ANVISA.

Fonte: Autores, 2019.

Observou-se que a paciente teve uma evolução do quadro satisfatória, sem nenhuma intercorrência e complicação. Quanto as medicações prescritas pelo médico, observou-se que mesmo com as precauções e advertências dessas medicações quando prescritas para uma puérpera torna-se ainda uma escolha do profissional mantê-las. Cabe o profissional enfermeiro, em situações semelhantes, conversar com o profissional médico para entender os motivos que o levaram a prescrever medicações que podem oferecer risco

para o bebê. Daí a importância do profissional enfermeiro generalista e obstétrico ter conhecimento de farmacologia aplicada a Enfermagem.

3.1 Plano de cuidados

Segue adiante (Tabela 2) os principais Diagnósticos de Enfermagem prioritários encontrados nesta puérpera de acordo com a classificação taxonômica internacional NANDA-I que estavam presentes para que posteriormente fosse traçado um plano de cuidados à paciente.

Tabela 02 - Diagnósticos de Enfermagem de uma puérpera gemelar cesariana. Maracanaú-CE, 2019

DIAGNÓSTICO	FATORES RELACIONADOS	CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS/FATORES DE RISCO OU CONDIÇÕES ASSOCIADAS
Dor aguda	Agente físico lesivo	Autorrelato e a palpação do abdômen
Risco de Infecção no sítio cirúrgico	-	Procedimento cirúrgico e aumento da exposição ambiental a patógenos
Disposição para conhecimento melhorado	-	Expressa desejo de melhorar a aprendizagem

Fonte: Autores, 2019.

Após análise e conclusão dos diagnósticos de enfermagem da paciente, estabeleceu-se as metas que a paciente alcançaria partir da Classificação dos Resultados de Enfermagem (NOC), e da implementação das intervenções prescritas, quer seja a curto ou longo prazo. São elas: mostrar-se capaz de amamentar adequada e exclusivamente, apresentar mais conhecimento no processo de cuidar de si mesmo e dos recém-nascidos, disposta para cuidar da própria saúde psicológica, com padrão de sono regular, disposta para realizar as atividades de vida diárias e exercícios físicos e disposição para hábitos alimentares saudáveis, livre de dores e atenta quanto aos melhores métodos contraceptivos enquanto estiver amamentando. A partir de então, foi traçado um plano de cuidados de enfermagem de acordo com a Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC), conforme a tabela 3.

Tabela 03 – Plano de Cuidados de Enfermagem voltado para uma paciente uma puérpera gemelar cesariana. Maracanaú-CE, 2019

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM
Administrar medicamentos prescritos e avaliar seus efeitos.
Monitorar SSVV.
Examinar, de 12 em 12 horas, a ferida operatória.
Explicar o processo de amamentação esclarecendo suas dúvidas e estimular ao aleitamento materno exclusivo aos dois recém-nascidos.
Ensinar técnicas para promover o cuidado com os recém-nascidos (amamentação adequada e posição ideal, aquecimento do bebê, manobra do desengasgo, cuidados com a limpeza das partes íntimas, com o coto e no banho).
Orientar sobre os cuidados para promoção da saúde dos recém-nascidos (banho de sol e passeios).
Realizar exame físico das mamas diariamente e ensinar a paciente o exame de auto palpação das mamas.
Orientar sobre planejamento familiar e reprodutivo (métodos de anticoncepções adequados: LAM ou minipílula de progestágeno).
Avaliar o retorno às condições pré-gravídicas.
Avaliar diariamente a involução do Globo de Segurança de Pinnard se há dor à palpação.
Avaliar interação da mãe com o recém-nascido.
Orientar sobre higiene, alimentação, atividades físicas.
Encorajar a paciente ir, após uma semana de alta, à Unidade de Atenção Primária à Saúde a qual está adscrita.

Fonte: Autores, 2019.

As intervenções de enfermagem selecionadas para este caso estão em harmonia com a Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC), estando algumas voltadas apenas para a paciente e outras para o cuidado com o recém-nascido. Devido a gama de informações repassadas sobre os principais cuidados com os recém-nascidos, considerou-se importante entregar para a puérpera um folder abordando esses principais cuidados (Figuras 1 e 2).

Ao que se refere a evolução, a paciente apresentava-se consciente, orientada, higienizada, couro cabeludo íntegro, face sem cloasma e corada. Ausculta pulmonar e cardíaca sem ruídos adventícios. Mamas flácidas e sem alterações, mamilos protusos. Abdômen com presença de linha nigra, dor a palpação, útero contraído cm globo de segurança de Pinnard acima da cicatriz umbilical. Fenda operatória sem sinais flogísticos. Lóquios rubros sem odor fétido com pouca quantidade. MMII: sinais de Homans negativo e cacifo positivo. SSVV: PA: 118X74mmHg; P: 91bpm; T: 36,6°C; FR: 16 mrpm.

Figura 1 - Folder Educativo sobre os principais cuidados com o bebê – Frente. Redenção, 2019

Fonte: Autores, 2019

Figura 2 - Folder Educativo sobre os principais cuidados com o bebê – Verso. Redenção, 2019

Fonte: Autores, 2019.

4 CONCLUSÕES

A Sistematização da Assistência de Enfermagem construída e implementada com a paciente foi de grande valia, visto que a paciente conseguiu alcançar alguns resultados esperados, principalmente o que se refere ao conhecimento sobre os principais cuidados consigo, com o bebê e sobre o planejamento família e reprodutivo.

O apelo é que os enfermeiros e demais profissionais atuantes na área obstétrica e afins utilizem os sistemas de classificação NANDA-I, NIC, NOC e outros instrumentos de coleta de dados validados como os principais recursos importantes para a construção de uma Sistematização da Assistência de Enfermagem à puérpera.

REFERÊNCIAS

Alves, Hosana Nolasco dos Santos *et al.* Assistência de enfermagem durante o processo gravídico gemelar. **Ciência & Consciência**. 2010. Disponível em: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:162516486> . Acesso em: 21 dez 2021.

Lopes, Rita de Cássia Sobreira *et al.* O antes e o depois: expectativas e experiências de mães sobre o parto. **Psicologia: Reflexão e Crítica [online]**. v. 18, n. 2, pp. 247-254, 2005. doi:10.1590/S0102-79722005000200013

Pereira, Sandra Valéria Martins; Bachion, Maria Márcia. Diagnósticos de Enfermagem identificados em gestantes durante o pré-natal. **Revista Brasileira de Enfermagem [online]**. v. 58, n. 6, pp. 659-664, 2005. doi: 10.1590/S0034-71672005000600006

Vieira, Flaviana *et al.* Diagnósticos de enfermagem da NANDA no período pós-parto imediato e tardio. **Escola Anna Nery [online]**. v. 14, n. 1, pp. 83-89, 2010. doi: 10.1590/S1414-81452010000100013

Zveiter, Marcel; Progiati, Jane Márcia; Vargens, Octavio Muniz da Costa. O trauma no parto e nascimento sob a lente da enfermagem obstétrica. **Pulsional Rev Psicanál.** v. 18, n. 182, pp. 86-92, 2005. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/290998289_O_trauma_no_parto_e_nascimento_sob_a_lente_da_enfermagem_obstetrica. Acesso em: 21 dez 2021.

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A UM PACIENTE COM PNEUMONIA NECROSANTE

Raiane Martins da Silva

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Instituto de Ciências da Saúde,
Redenção – CE

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7440-5279>

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9063164429067111>

Rafaella Martins Mota

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Instituto de Ciências da Saúde,
Redenção – CE

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4916-081X>

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1410259028982892>

Lídia Rocha de Oliveira

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Instituto de Ciências da Saúde,
Redenção – CE

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7716-1388>

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9684328247340215>

José Erivelton de Souza Maciel Ferreira

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (UNILAB), Redenção – CE

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2668-7587>

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6769744803078115>

Natália Klauck de Souza

Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul, Porto Alegre - RS

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2006-9393>

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3645007453426836>

Jocilene da Silva Paiva

Faculdade de ensino e cultura do Ceará, Fortaleza - CE

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8340-8954>

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6760519048495312>

Joelita de Alencar Fonseca Santos

Universidade Federal do Piauí, Teresina - PI

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0126-465X>

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6461231491143139>

Giliana Martins da Costa

Universidade de Fortaleza, Fortaleza -CE

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7975-159X>

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6674951890147607>

Geovanna Renaisa Ferreira Caldas

Centro Universitário de Juazeiro do Norte, Juazeiro do Norte - CE

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9820-309X>

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9527841510122388>

Ana Caroline Moraes Paiva

Faculdade de Ensino e Cultura do Ceará, Fortaleza - CE

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6949-8842>

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6032372097014354>

Maria Charlianne de Lima Pereira Silva

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção - CE

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3258-6793>

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3777957717185116>

Alana Rocha Tomaz de Souza

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção - CE

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6882-0046>

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8299157841500218>

Informações sobre o**artigo:****Recebido em:**

24/12/2021

Aceito em:

31/12/2021

Data de publicação:

07/02/2022

Palavras-chave:

Processo de

Enfermagem

Enfermagem

Pneumonia

RESUMO

A pneumonia necrosante (PN) é uma rara complicação da infecção pulmonar em crianças. O objetivo desse estudo é apresentar o relato de experiência vivenciado por acadêmicos e profissionais de enfermagem durante a prestação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), por meio do Processo de Enfermagem para uma paciente pediátrica com o diagnóstico de pneumonia necrosante. Estudo caracterizado como descritivo, do tipo relato de experiência, obtido no período de estágio hospitalar de uma disciplina do curso de Bacharelado em Enfermagem, de uma universidade do Ceará. Os dados clínicos e observações foram obtidos através da entrevista e exame físico da paciente. A partir dos achados, foi traçado o processo de enfermagem e o plano de cuidados para a paciente. Conclui-se que a utilização da SAE contribui de forma assertiva para a formação profissional dos discentes, bem como pode ofertar o cuidado mais direcionado e eficaz no contexto clínico da pneumonia necrosante, sendo capaz de promover melhorias efetivas no quadro clínico da paciente.

SYSTEMATIZATION OF NURSING CARE FOR A PATIENT WITH NECROSIZING PNEUMONIA**ABSTRACT**

Necrotizing pneumonia (NP) is a rare complication of pulmonary infection in children. The aim of this study is to present the experience report experienced by academics and nursing professionals during the provision of Systematization of Nursing Care (SAE), through the Nursing Process for a pediatric patient with a diagnosis of necrotizing pneumonia. Study characterized as descriptive, of the experience report type, obtained during the hospital internship period of a discipline in the Bachelor of Nursing course, at a university in Ceará. Clinical data and observations were obtained through the interview and physical examination of the patient. Based on the findings, the nursing

Keywords:
Nursing Process
Nursing
Pneumonia

process and the care plan for the patient were traced. It is concluded that the use of SAE assertively contributes to the professional training of students, as well as offering more targeted and effective care in the clinical context of necrotizing pneumonia, being able to promote effective improvements in the patient's clinical condition.

1 INTRODUÇÃO

A Pneumonia Necrosante (PN) é uma rara complicação da infecção pulmonar Adquirida na Comunidade (PAC) na pediatria. Observa-se o aumento da sua prevalência nos últimos anos, apesar dos avanços tecnológicos na terapia antibiótica (WESTPHAL *et al.*, 2010; DALPONTE *et al.*, 2020).

Na infância, a PN apresenta-se com bom prognóstico e, na maioria dos casos, apresenta resolução completa apenas com o tratamento clínico. No entanto, alguns pacientes podem necessitar de procedimentos invasivos e até mesmo de tratamento cirúrgico, com ressecção de parte do parênquima pulmonar (CHATA; FORTIN; BOSMA, 2014).

Neste cenário, considerando a complexidade do quadro clínico, destaca-se que o enfermeiro é um profissional de suma importância no processo de cuidar em pediatria ao paciente com PN, levando em consideração que este é o ator que se encontra mais próximo ao paciente, sendo responsável pela prestação de práticas do cuidado essenciais para a manutenção e melhoria da sua saúde, bem como pelo registro de suas respostas humanas. Assim, pode-se utilizar o Processo de Enfermagem (PE) para promover o cuidado mais direcionado e eficaz para o paciente.

O Processo de Enfermagem é formado por cinco etapas, inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes, a saber: histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação de enfermagem e avaliação de enfermagem. Dessa maneira, ele se insere como método para a implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), que é o cuidado direcionado e sistemático ao paciente (COFEN, 2009).

Dessa forma, considerando o contexto clínico apresentado, o objetivo deste trabalho é apresentar o relato de experiência da implementação do processo de enfermagem, através da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) para uma paciente pediátrica diagnosticada com Pneumonia Necrosante.

2 METODOLOGIA

Este estudo possui delineamento metodológico descritivo, do tipo relato de experiência, obtido através da vivência de discentes e profissionais de enfermagem no contexto clínico do atendimento hospitalar para uma paciente pediátrica. A paciente encontrava-se internada em um hospital de referência no estado do Ceará, em decorrência de quadro clínico de Pneumonia Necrosante.

A coleta de dados para a elaboração da SAE foi realizada por meio da consulta de enfermagem, contemplando as etapas de entrevista e exame físico, executada durante o período de estágio hospitalar de uma disciplina do curso de Bacharelado em Enfermagem, de uma universidade do Ceará, em outubro de 2019. Para obter as informações necessárias a condução do estudo, foi obtida a permissão da responsável familiar pela paciente pediátrica.

Destaca-se que os acadêmicos foram supervisionados por profissionais de enfermagem em todo o período da coleta. Ademais, os pesquisadores que não participaram ativamente da coleta de dados ou supervisão dos discentes, contribuíram neste trabalho através da escrita e revisão final da escrita do trabalho para a publicação.

É relevante ressaltar que foram seguidos todos os aspectos éticos e legais em relação ao cuidado prestado, preservando-se o anonimato do paciente e tratando-se apenas dos aspectos clínicos importantes para o desenvolvimento do processo de cuidado de enfermagem implementado. No mais, por se tratar de um relato de experiência, este estudo dispensa a apreciação por Comitê de Ética em Pesquisa.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para consecução do estudo, procedeu-se a realização da primeira etapa do processo de enfermagem, que é a coleta de dados (COFEN, 2009). Os achados clínicos foram obtidos através da entrevista e exame físico. A partir do histórico da paciente elencado foi possível dar seguimento as demais etapas do processo de enfermagem e a realização da SAE propriamente dita.

Os dados obtidos indicaram: idade de 3 anos e diagnóstico médico de Pneumonia Necrosante. A paciente apresentava história de febre, tosse e dispneia a 5 dias. Ao raio-x foi indicado derrame pleural à direita. Realizada toracocentese à direita, obtendo-se drenagem de 350 ml de secreção purulenta. Após o procedimento, a paciente foi intubada e internada em Unidade de Terapia Intensiva, sendo aberto protocolo de sepse e permaneceu em

intubação por 9 dias. Os sinais e sintomas clínicos evidenciados nesse estudo convergem com as queixas apresentadas na literatura (BARREIRA *et al.*, 2002; SAWICKI *et al.*, 2008).

O tratamento medicamentoso que estava sendo realizado era composto de: cefepime e linezolida. Após quadro de choque foi utilizado também noradrenalina, adrenalina e concentrado de plaquetas. Chamou a atenção dos discentes o fato da paciente apresentar apenas 99.340 mil plaquetas mesmo após o recebimento do concentrado, o que é considerado um valor baixo mesmo para uma criança. A média de antibióticos utilizados no caso dessa paciente apresenta-se em quantidade semelhante a outros estudos (BARREIRA *et al.*, 2002; DALPONTE *et al.*, 2020).

Além disso, após a ocorrência do choque a paciente também apresentou quadro de acidose metabólica, que foi normalizado pelo uso de bicarbonato de sódio. Os discentes notaram sinais clínicos de edema e anúria, os quais foram comunicados a equipe médica e realizada a prescrição de furosemida e reduzida a dose de noradrenalina e adrenalina, que foram suspensas logo após. A paciente continuava apresentando picos febris.

Chama-se atenção para o dado clínico obtido de Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada em 180s. Após isso, foi iniciada a administração de vitamina K.

Apesar das medicações utilizadas, a paciente não obteve melhora pulmonar, apresentando quadro de pneumotórax. Foi orientada cirurgia torácica para colocar um dreno devido o aumento do pneumotórax à direita. O dreno foi mantido em aspiração e retirado após 1 semana.

Um mês após a internação, a paciente passou por uma toracotomia exploradora, com decorticação pulmonar à direita + correção de fístulas bronco- pleurais + toracostomia com drenagem pleural fechada. A cultura do empiema foi negativa, parcial de necrose pulmonar negativa e aspirado traqueal: *Stenotrophomas maltophilia*.

A abordagem cirúrgica nos casos onde há agravamento do quadro clínico, tem sido relatada em outros estudos. Dessa forma, é proposto que a cirurgia seja realizada de forma precoce, enquanto a doença e os focos necróticos ainda estão localizados, pois atrasar a intervenção pode significar progressão na lesão ao parênquima pulmonar e maiores índices de complicações (WESTPHAL *et al.*, 2010; TSAI *et al.*, 2012).

Durante o período de internação, a paciente apresentou episódios de crise convulsiva, com olhar fixo, movimentos mastigatórios e tônicos em MSD, tendo sido realizado tratamento com fenitoína 20mg/kg e manutenção com fenobarbital. Observa-se a

partir dos achados, que esta paciente era instável clinicamente, necessitando de elevada atenção da equipe de saúde.

No dia 09 de janeiro de 2020, a paciente já apresentava melhora. Evoluindo orientada e restrita ao leito, devido a acidente vascular encefálico sofrido e lado esquerdo do corpo comprometido. Aceitava dieta branda via oral, conciliava período de alerta e repouso. Possuía curativo de óstio de dreno de tórax, no lado lateral direito.

Ao exame físico, os discentes perceberam: pupilas isocóricas; pele e mucosas íntegras; lesão por pressão em fase de cicatrização na região occipital em uso de ácidos graxos essenciais; linfonodos normais à palpação; reflexos prejudicados; ausculta pulmonar apresentando roncos e sibilos; ruídos hidroaéreos presentes; abdômen simétrico. Membros superiores e inferiores simétricos e eliminações fisiológicas presentes.

Ao exame sanguíneo, a paciente apresentou: proteínas totais, albumina, ureia, bilirrubina total dentro dos valores de referência.

A partir dos achados clínicos, foram traçados os diagnósticos de enfermagem que se adequavam as respostas humanas apresentadas, bem como as intervenções de enfermagem mais pertinentes. Observe no Quadro 1, o diagnóstico de enfermagem e a intervenção de enfermagem realizada.

Quadro 1 - Diagnóstico de enfermagem e Intervenção de enfermagem definidos de acordo com o quadro clínico da paciente

Diagnóstico de enfermagem	Intervenção de Enfermagem
Integridade da pele prejudicada relacionada à cirurgia, evidenciada pela alteração na integridade da pele.	Cuidados com lesões/pele; Realizar/trocar curativo.
Padrão respiratório ineficaz relacionado à dor, evidenciado pelo padrão respiratório anormal.	Verificar SSVV; Manter cabeceira elevada; Controle da dor.
Mobilidade física prejudicada relacionada a atraso no desenvolvimento e força muscular diminuída, evidenciada por redução na amplitude dos movimentos.	Supervisão: segurança; Controle da dor.
Dor aguda relacionada a agente lesivo biológico, evidenciado por expressão facial de dor, choro e agitação.	Administração de analgésicos (conforme prescrição médica); Controle do ambiente: conforto.
Risco de lesão por pressão relacionado a imobilização física e pressão sobre proeminências ósseas.	Reposicionamento de 2/2 horas; Massagem com óleo; Supervisão da pele.

Risco de queda relacionado à mobilidade prejudicada.	Manter as laterais do leito erguidas;
Risco de infecção relacionado a procedimento invasivo.	Lavar as mãos com álcool gel 70% nos 5 momentos de higiene das mãos.

Fonte: Autores, 2021.

De acordo com os dados ilustrados no Quadro 1, nota-se que foram elencados os principais diagnósticos e intervenções de enfermagem pertinentes ao caso clínico da paciente. Dessa forma, esses resultados contribuíram de forma eficiente para a construção do plano de cuidados de enfermagem direcionado e adequado para a promoção de melhorias no estado de saúde da paciente.

Assim, ressalta-se a relevância deste relato, pois este poderá auxiliar a profissionais de enfermagem em contextos clínicos semelhantes, na elaboração de planos de cuidados para pacientes pediátricos com quadro de pneumonia necrosante.

Após o planejamento das intervenções, estas foram implementadas de acordo com a rotina do serviço. Acredita-se que houve melhoria no quadro da paciente após a implementação.

Em suma, é importante destacar que a realização da SAE, por meio do Processo de Enfermagem é de grande valia para a melhoria do estado de saúde do paciente, pois possibilita o cuidado assertivo e diretivo, de forma a contribuir eficientemente para a manutenção da saúde do paciente.

4 CONCLUSÕES

As experiências discentes foram de grande relevância, no que se refere ao crescimento profissional, pessoal e acadêmico. O contato com pacientes com patologias tão delicadas e por vezes tão raras, como no estudo apresentado, se torna uma grande contribuição para a formação profissional. O olhar de agradecimento, a gentileza da paciente e mãe, para com os acadêmicos, foi perceptível e marcante, levando a crença de que o caminho certo no que concerne à ciência do cuidado, está sendo trilhado.

REFERÊNCIAS

- BARREIRA, J. S. *et al.* Pneumonias necrosantes em crianças previamente saudáveis. **Rev. port. pneumol.**, v. 8, n. 1, p. 7-19, 2002.
- CHATHA, N.; FORTIN, D.; BOSMA, K. J. Management of necrotizing pneumonia and pulmonary gangrene: a case series and review of the literature. **Can respir j.**, v. 21, n. 4, p. 239-245, 2014. Disponível em: <https://www.hindawi.com/journals/crj/2014/864159/>. Acesso em: 20 dez. 2021.
- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. **Resolução COFEN nº 358, de 15 de outubro de 2009.** Dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem e dá outras providências. Rio de Janeiro: Conselho Federal de Enfermagem; 2009. Disponível em: http://www.cofen.gov.br/resoluco-cofen3582009_4384.html. Acesso em: 1 dez. 2020.
- DALPONTE, R. S. *et al.* Tratamento cirúrgico de pneumonia necrosante em crianças em um período de 10 anos. **Rev. Col. Bras. Cir.**, v. 47, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rcbc/a/9hwZGBj5PFXZtPTn6Z8Wryg/?lang=pt&format=html>. Acesso em: 1 dez. 2019.
- SAWICKI, G. S. *et al.* Necrotising pneumonia is an increasingly detected complication of pneumonia in children. **Eur. respir. j.**, v. 31, n. 6, p. 1285-1291, 2008.
- WESTPHAL, F. L. *et al.* Surgical treatment of children with necrotizing pneumonia. **J. bras. pneumol.**, v. 36, p. 716-723, 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/jbpneu/a/rbC358zPtq7FCLztnF9JhRn/abstract/?lang=en&format=html>. Acesso em: 20 dez. 2019.
- TSAI, Y. F.; KU, Y. H. Necrotizing pneumonia: a rare complication of pneumonia requiring special consideration. **Curr. opin. pulm. med.**, v. 18, n. 3, p. 246-252, 2012.

INCIDÊNCIA DE SEPSE EM PACIENTES HOSPITALIZADOS POR SARS-COV-2 EM USO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA

André Ribeiro de Castro Júnior

Centro de Investigação Científica, Escola de Saúde Pública do Ceará – ESP, Fortaleza -CE

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3681-3607>

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9127094235885272> ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3681-3607>

Ticiane Freire Gomes

Centro de Investigação Científica, Escola de Saúde Pública do Ceará – ESP, Fortaleza -CE

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8469-1472>

Marcos Augusto de Paula Santos

Centro de Investigação Científica, Escola de Saúde Pública do Ceará – ESP, Fortaleza -CE

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3632-3904>

Maria Iara Socorro Martins

Centro de Investigação Científica, Escola de Saúde Pública do Ceará – ESP, Fortaleza -CE

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9366-8621>

Daniel Germano Alcântara

Centro de Investigação Científica, Escola de Saúde Pública do Ceará – ESP, Fortaleza -CE

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0798-6293>

Iohanna Aragão de Paiva

Centro de Investigação Científica, Escola de Saúde Pública do Ceará – ESP, Fortaleza -CE

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7268-6505>

Tayná Albuquerque Tabosa

Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia e Funcionalidade, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza CE

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3964-081X>

Ana Naiara Alves Teixeira

Escola de Ensino Fundamental e Médio Professora Abigail Sampaio, Paracuru - CE

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4069-0515>

Leticia Kelly Costa Silva

Centro de Investigação Científica, Escola de Saúde Pública do Ceará – ESP, Fortaleza - CE

<https://orcid.org/0000-0002-6508-7819>

Francisco Jadson Franco Moreira

Programa de Pós-Graduação em Educação - Universidade Estadual do Ceará – UECE. Fortaleza - CE

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3141-4700>

Informações sobre o

artigo:

Recebido em:

10/01/2022

Aceito em:

RESUMO

Objetivou-se apresentar caracterização de pacientes com COVID-19 em uso de Ventilação Mecânica Invasiva que evoluíram para a complicação sepse. Estudo descritivo, retrospectivo, de análise documental com abordagem quantitativa, realizado em 5 hospitais de referência para tratamento da COVID-19 no Ceará. Incluídos 779 pacientes divididos entre primeira e segunda onda, conforme

13/01/2022

Data de publicação:

07/02/2022

Palavras-chave:

Infecções por

coronavírus

Pandemias

Organização Mundial

da Saúde

Epidemiologia

data de internação. Os dados foram obtidos através da plataforma “ResCOVID”. Resultados: O perfil descreve de forma respectiva 1ª e 2ª onda, apresentando idade >60 anos 151 (58%) e 350 (67,4%), sexo masculino 151 (58%) e 262 (50,5%). Quanto à escolaridade predominaram pessoas com ensino fundamental incompleto contando 56 921,5%) e 106 (20,4%) respectivamente. A complicação sepse se apresentou em 53 (20,4%) e 142 (27,4%), conforme as ondas. Do grupo geral de pacientes houve ainda uma alta incidência de óbitos tendo 212 (81,5%) na primeira onda e 458 (88,2%) na segunda onda. Foi possível realizar a caracterização da população, evidenciando variações discretas no perfil de pacientes acometidos pela COVID-19 em uso de ventilação mecânica invasiva, evidenciando aumento no número de complicações por sepse e óbito de pacientes em ventilação mecânica invasiva na segunda onda.

INCIDENCE OF SEPSIS IN PATIENTS HOSPITALIZED FOR SARS-COV-2 IN USE OF INVASIVE MECHANICAL VENTILATION

ABSTRACT

The objective was to present the characterization of patients with COVID-19 under Invasive Mechanical Ventilation that evolved to sepsis complication. Descriptive, retrospective study of document analysis with a quantitative approach, carried out in 5 reference hospitals for the treatment of COVID-19 in Ceará. 779 patients were included, divided between the first and second wave, according to the date of admission. Data were obtained through the “ResCOVID” platform. Results: The profile describes the 1st and 2nd wave respectively, aged >60 years, 151 (58%) and 350 (67.4%), males 151 (58%) and 262 (50.5%). As for education, people with incomplete primary education predominated, accounting for 56,921.5% and 106 (20.4%), respectively. Sepsis complication was present in 53 (20.4%) and 142 (27.4%), depending on the waves. From the general group of patients, there was also a high incidence of deaths, with 212 (81.5%) in the first wave and 458 (88.2%) in the second wave. It was possible to characterize the population, showing slight variations in the profile of patients affected by COVID-19 using invasive mechanical ventilation, showing an increase in the number of complications from sepsis and death of patients on invasive mechanical ventilation in the second wave.

Keywords:

Coronavirus Infections

Pandemics

World Health

Organization

Epidemiology

1 INTRODUÇÃO

Desde o surgimento dos primeiros relatos em Wuhan, na China, em dezembro de 2019, o SARS-CoV-2, conhecido como novo coronavírus, preocupa especialistas por suas características infecciosas e capacidade de transmissão. Não demorou para a doença tornar-se um desafio para a saúde global. A doença conhecida como COVID-19 apresenta em seu desenvolvimento desde pacientes assintomáticos até aqueles que desenvolvem a síndrome de desconforto respiratório agudo (SDRA), sendo presente em cerca de 5% dos pacientes (BASTOS *et al.*, 2020).

Antes da COVID-19 ser deflagrada como pandemia suscitou importante impacto na saúde das populações e na economia mundial. Sinais e sintomas frequentes nesta doença englobam à síndrome clínica consistem em febre, mialgia ou fadiga, tosse seca e dispneia, que podem ser acompanhadas de opacidades pulmonares bilaterais em vidro fosco na tomografia computadorizada de tórax, relacionado a uma piora que significa maior demanda no número de hospitalizações em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) (RAMALHO NETO *et al.*, 2020).

Em casos graves da doença, a demanda de leitos de UTI pode estar relacionada com a necessidade de suporte respiratório por meio da Ventilação Mecânica invasiva - VMI. A VMI consiste em um suporte voltado para normalizar as trocas gasosas do indivíduo sem lesar os pulmões ou comprometer a fisiologia cardiovascular. Contudo, existem riscos para a utilização dessa tecnologia, podendo causar graves iatrogenias e risco de morte (HOLANDA; PINHEIRO, 2020).

Uma complicação intimamente relacionada ao uso da VMI é a ocorrência de sepse. Esse agravo caracteriza-se pela presença de mecanismos inflamatórios, que ocasionam alterações celulares e circulatórias como a vasodilatação e o aumento da permeabilidade capilar, podendo ocasionar a hipovolemia e a hipotensão. Agravos como a SEPSE podem determinar aumento no período de internação, sendo responsável pela média de ocupação de 25% dos leitos de UTI no Brasil (ZONTA *et al.*, 2018; De ANDRADE *et al.*, 2020). Nesse sentido, o presente estudo teve por objetivo apresentar caracterização de pacientes com COVID-19 em uso de Ventilação Mecânica Invasiva que evoluíram para a complicação sepse.

2 METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo, de análise documental com abordagem quantitativa, realizado em 5 hospitais referência no tratamento da COVID-19 da rede pública da secretaria de saúde do estado do Ceará. A pesquisa se insere em um projeto piloto intitulado “Projeto ResCOVID: Desenvolvimento de um sistema de registro clínico eletrônico para pacientes hospitalizados com COVID-19 no Ceará/Brasil”. O projeto é desenvolvido pela Escola de Saúde Pública do Estado do Ceará – ESP, junto à Secretaria de Saúde do Estado do Ceará – SESA.

A coleta de informações ocorreu de novembro de 2020 a setembro de 2021 sobre pacientes em prontuários eletrônicos disponíveis na sede das instituições. O universo de pacientes abrange a divisão da coleta em dois momentos, constando de pacientes com data internação da primeira onda (março a maio de 2020), e segunda onda (janeiro a abril de 2021).

Para esse estudo, que trata de um recorte de um projeto maior, foram elegíveis para a amostra pacientes com internação por COVID-19, que possuíam teste diagnóstico RT-PCR detectável e com entrada no hospital de referência sem uso de VMI. Foram excluídos da amostra pacientes com processo de intubação inferior a 24 horas após a internação hospitalar, assim como pacientes com desfecho de transferência.

O universo de pacientes coletados neste hospital compreende 2655. Respeitando os critérios de inclusão e exclusão, a amostra contou com 779 representantes que fizeram a utilização da VMI durante a internação.

Toda informação foi consultada via prontuário, sendo coletada e armazenada em uma plataforma exclusiva intitulada “ResCOVID”, desenvolvida pelo projeto supracitado a fim de viabilizar maior agilidade na coleta e armazenamento de informações. Esta ferramenta facilitou o trabalho dos pesquisadores, deixando mais ágil o modelo de coleta e mais segura a forma de armazenamento, assim como o acesso às informações para consulta. A plataforma web permite ainda o armazenamento dos dados em nuvem possibilitando o fácil acesso aos dados coletados.

Considerando o desenvolvimento de um estudo descritivo, os dados foram apresentados conforme estatística descritiva utilizando-se de frequência absoluta e percentual para cada variável categórica. Foram descritas as variáveis referentes aos pacientes: idade (representada por faixa etária), cor, escolaridade, ocupação, hábitos

pessoais (tabagismo, consumo de bebida alcoólica), considerando ainda pacientes com a complicação sepse e desfecho.

Esta pesquisa cumpre a todos os princípios éticos em pesquisa ao tratar com dados de pacientes, respeitando o anonimato e segurança de dados. O trabalho segue as determinações da Resolução 466 de 12 de dezembro de 2012, estando aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Saúde Pública do Ceará – ESP, sob o parecer número 3.948/100.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

As características sociodemográficas dos 779 pacientes sintetizadas conforme tabela 1 apontam para a divisão entre 1ª e 2ª onda de contaminação pela COVID-19 no Ceará, sendo dispostos dados dos pacientes com uso de Ventilação Mecânica Invasiva. Na tabela é possível identificar o predomínio dos pacientes com faixa de idade >60 anos, 151 (58%) e 350 (67%), respectivamente conforme as ondas, seguido por pacientes entre 50 e 59 anos, 49 (18,9%) e 70 (13,5%). Quanto ao sexo, temos um predomínio de indivíduos do sexo masculino em ambos os momentos, apresentando 151 (58%) e 262 (50,5%), conforme onda.

Tabela 1- Caracterização de pacientes acometidos pela COVID-19 em uso de Ventilação Mecânica Invasiva no Ceará, Brasil. 2021

Características sociodemográficas da população estudada (N=779)				
Período	1ª Onda (260)		2ª Onda (519)	
Variáveis	N	%	N	%
Idade (anos)				
<20	3	1,1	7	1,3
20-29	5	1,9	9	1,7
30-39	17	6,5	38	7,3
40-49	35	13,5	45	8,7
50-59	49	18,9	70	13,5
≥60	151	58	350	67,4
Sexo				
M	151	58	262	50,5
F	109	41,9	257	49,5
Cor				
Pardo	68	26,1	194	37,4
Branco	24	9,2	87	16,8
Preto	5	1,9	15	2,9
Não referido	163	62,7	223	43

Escolaridade				
Sem Escolaridade	46	17,7	105	20,2
Ensino Fundamental Incompleto	56	21,5	106	20,4
Ensino Fundamental Completo	21	8	37	7,1
Ensino Médio Incompleto	5	1,9	11	2,1
Ensino Médio Completo	42	16	58	11,2
Ensino Superior Incompleto	2	0,8	9	1,7
Ensino Superior Completo	6	2,9	28	5,4
Não Informado	82	31,5	165	31,8
Hábitos Pessoais				
Tabagista	14	5,4	31	6
Ex-Tabagista	22	8,5	101	19,5
Etilista	14	5,4	18	3,5
Ex-Etilista	4	1,5	10	1,9
Sepse	53	20,4	142	27,4
Desfecho				
Alta	48	18,5	61	11,8
Óbito	212	81,5	458	88,2

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021.

Em relação à cor dos pacientes internados, os pardos foram maioria em ambas as ondas, contando com 68 (26,1%) e 194 (37,4%). Quanto à escolaridade, a maioria dos pacientes declarantes relatou ensino fundamental incompleto, 56 (21,5%) e 106 (20,4%). Considerando os hábitos pessoais, 14 (5,4%) e 31 (6%) eram tabagistas; 22 (8,5%) e 101 (19,5%) pacientes eram ex-tabagistas, respectivamente; enquanto 14 (5,4%) e 18 (3,5%) eram etilistas, na primeira onda não houve relato sobre práticas de ex-etilismo em 4 (1,5%), enquanto na segunda 10 (1,0%) se declararam ex-etilistas.

Relacionando a complicação sepse tem-se que na primeira onda foram apresentados 53 (20,4%) de casos enquanto na segunda um considerável aumento para 142 (27,4%). Quanto aos desfechos na primeira onda 48 (18,5%) de alta e 212 (81,5%) de óbito, enquanto na segunda onda 61 (11,8%) de alta enquanto 458 (88,2%) de óbito.

No que diz respeito à variável idade tanto na primeira quanto na segunda onda, os idosos foram os mais suscetíveis a forma mais agressiva e com maior letalidade do COVID-19 (CUNHA *et al.*, 2020). Estudos apontam a vulnerabilidade dos idosos no cenário do COVID-19 representando um maior número de pacientes internados (MORAES *et al.*, 2020; MOHSIN *et al.*, 2021). Essa observação foi registrada em todos os países afetados pela pandemia. A resposta imune observada entre os idosos poderia ser uma possível explicação para a maior letalidade da COVID-19 observada nessa população (CUNHA *et al.*, 2020). Outro fator agravante no manejo da COVID-19 em idosos seria a susceptibilidade a um maior número de comorbidades, principalmente

diabetes, hipertensão e fatores cardiovasculares que acarretam maiores manifestações clínicas do SARS-CoV-2 (DRUCKER *et al.*, 2021).

Conforme os achados apresentados na Tabela 1, e em concordância com outros autores, além do grande número de pacientes idosos houve um predomínio de pacientes do sexo masculino internados pela COVID-19 durante a primeira onda (CHEN *et al.*, 2020; GRASSELLI *et al.*, 2020). Um estudo realizado no Hospital Jinyintan em Wuhan, China, com pacientes internados entre 1 ° de janeiro a 20 de janeiro de 2020 foi observado um número maior de homens (n=67) quando comparado às mulheres (n=32) dos 99 casos de infecção de 2019-nCoV. Em um outro estudo de coorte retrospectiva realizado com 88 pacientes hospitalizados entre 17 de março e 3 de maio de 2020, que tiveram o diagnóstico de infecção pelo SARS-CoV-2 mostrou que 59 (67%) pacientes eram do sexo masculino (BASTOS *et al.*, 2020).

O maior acometimento de idosos do sexo masculino está relacionado a maior resposta inflamatória neste público em que há o aumento dos marcadores inflamatórios, quando comparado à mulheres com a mesma idade, o que pode estar associada às alterações hormonais deste grupo. Além disso, estudos evidenciaram que o sexo e a idade são fatores que atuam ainda na quantidade de receptores da enzima conversora da angiotensina 2, o que facilita a multiplicação do coronavírus no organismo humano (VALENZUELLA *et al.*, 2021). Embora para a segunda onda tenha-se observado um pequeno aumento no número de mulheres internadas, os números de óbitos para o sexo masculino continuam a ser maiores.

Para os dados de raça observamos números desproporcionalmente altos de casos, hospitalizações e desfecho em ventilação mecânica invasiva em populações pardas. Os determinantes sociais que circundam os grupos raciais/étnicos como barreiras enfrentadas por esta parte da população incluem baixas taxas de alfabetização (XU *et al.*, 2021), onde podemos observar um grande número de pacientes analfabetos e com ensino fundamental incompleto. Menores níveis educacionais estão relacionados a piores desfechos de saúde principalmente no manejo da COVID-19 cenário da VMI ((MASCARELLO *et al.*, 2021).

As más condições de habitação, que estão inextricavelmente associadas à superlotação e à falta de saneamento, que têm sido associadas ao aumento das taxas de mortalidade por COVID-19 onde negros e pardos são mais propensos a residir em

habitações abaixo do padrão moderado a grave do que brancos. Existem disparidades substanciais de renda, além de esta população representar um maior número de profissionais essenciais que não possuíam condições de realizar o isolamento social ou trabalhar remotamente. (XU *et al.*, 2021)

As características da amostra estudada revelam um grupo com maior vulnerabilidade às complicações decorrentes da infecção pela COVID-19. Neste conjunto de especificidades o tabagismo atua tornando o pulmão mais vulnerável à complicações devido às modificações estruturais, vasculares e químicas (SILVA; MOREIRA; MARTINS, 2020; CUNHA *et al.*, 2020).

O tabagismo prévio aumenta a gravidade dos casos de COVID-19 em que há a necessidade de internação hospitalar, administração de oxigenoterapia suplementar, necessidade de VMI e maior suscetibilidade de outras infecções respiratórias como pneumonias, síndrome do desconforto respiratório agudo e sepse (SANTANA *et al.*, 2020; SILVA; MOREIRA; MARTINS, 2020).

Ao se analisar as complicações relacionadas ao COVID-19, a sepse foi a principal complicação, seguida da insuficiência respiratória, insuficiência cardíaca e choque séptico, respectivamente (BAPTISTA; FERNANDES, 2020). Sendo o risco de evoluir com sepse maior à medida que aumenta o número de dias internado na unidade de terapia intensiva, assim como é elevada também a taxa de mortalidade associada devido às disfunções múltiplas de órgãos (SMITH; COSTA, 2021).

A COVID-19, enquanto uma doença multissistêmica, apresenta além da disfunção pulmonar, o comprometimento também de outros órgãos, em um processo imunológico de cascata inflamatória só que de forma desregulada, que acaba ativando o sistema de coagulação, com eventos trombóticos comuns em quadros de sepse e à infecção pelo coronavírus, quadro este observado com maior prevalência na presente pesquisa sobretudo nos pacientes do período classificado como segunda onda (BESEN, 2021).

Assim como nos resultados encontrados nesta pesquisa, os resultados observados no estudo de Cesar *et al.* (2021) em Tocantins revelaram que a segunda onda foi mais agravante que a primeira onda em termos de letalidade, mortalidade e incidência, decorrente da maior transmissibilidade, infectividade e agressividade da variante P.1, acometendo inclusive jovens (VALENZUELLA *et al.*, 2021).

4 CONCLUSÕES

Através deste estudo pode-se observar que a sepse foi uma das complicações mais frequente entre os indivíduos acometidos pela COVID-19, sobretudo relacionado à sua fisiopatologia de abrangência sistêmica e comprometimento vascular. Além disso, a segunda onda do vírus, em 2021, foi caracterizada por maior gravidade dos casos em sua incidência e em algumas regiões no prognóstico, principalmente entre a população não vacinada ou mais vulnerável biologicamente, com associação de comorbidades.

A alta incidência de sepse entre os indivíduos com COVID-19 submetidos à VMI revela a necessidade de conhecimento acerca da doença desde a identificação, ao monitoramento e possibilidade de intervenção precoce, assim como expõe as complicações a que o paciente com SARS-Cov-2 estão submetidos e necessidade de maior atenção e cuidado no manejo destes pacientes.

REFERÊNCIAS

BAPTISTA, Anderson Barbosa; FERNANDES, Leonardo Vieira. COVID-19, análise das estratégias de prevenção, cuidados e complicações sintomáticas. DESAFIOS-Revista Interdisciplinar da Universidade Federal do Tocantins, v. 7, n. Especial-3, p. 38-47, 2020.

BASTOS, Gisele Alsina Nader et al. Características clínicas e preditores de ventilação mecânica em pacientes com COVID-19 hospitalizados no sul do país. Revista Brasileira de Terapia Intensiva, v. 32, n 4, p. 487-492, 2020.

BESEN, Bruno Adler Maccagnan Pinheiro. Abordagem clínica do paciente com SRAG por COVID-19. **Acesso e cuidados especializados**, p. 60, 2021.

CESAR, Andre Evaristo Marcondes et al. Análise da mortalidade e letalidade por COVID-19 em uma região de baixa renda: um estudo ecológico de série temporal no Tocantins, Amazônia Brasileira. **J Hum Growth Dev**, v. 31, n. 3, p. 496-506, 2021.

CUNHA, Thaynara Gabriella Silva et al. Atuação da equipe multiprofissional em saúde, no cenário da pandemia por Covid 19. **Health Residencies Journal-HRJ**, v. 1, n. 2, p. 1-22, 2020.

CUNHA, Lucas Leite, et al., Remodeling of the Immune Response With Aging: Immunosenescence and Its Potential Impact on COVID-19 Immune Response. **Front Immunol**. v. 7, n.11, p. 1-11, 2020.

CHEN, Nanshan et al. Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. **Lancet**. v. 395, n. 10223, pág. 507-513, 2020.

DRUCKER, Daniel J. Diabetes, obesity, metabolism, and SARS-CoV-2 infection: the end of the beginning. **Cell Metab**. v. 33, n. 3, p. 479-498. 2021.

DE ANDRADE, DIÊGO Correia. Prevalência de sepse na unidade de tratamento intensivo e os fatores associados. *Revista Brasileira de Inovação Tecnológica em Saúde*-ISSN: 2236-1103, p. 11-11, 2018.

GRASSELLI, Giacomo et al. COVID-19 Lombardy ICU Network. Baseline Characteristics and Outcomes of 1591 Patients Infected With SARS-CoV-2 Admitted to ICUs of the Lombardy Region, Italy. **Jama**. v. 323, n. 16, pág. 1574-1581, 2020.

HOLANDA, Marcelo Alcantara; PINHEIRO, Bruno Valle. Pandemia por COVID-19 e ventilação mecânica: enfrentando o presente, desenhando o futuro. **Jornal Brasileiro de Pneumologia**, v. 46, n 4 2020.

Moraes CL, Marques ES, Ribeiro AP, Souza ER. Contributions to address violence against older adults during the Covid-19 pandemic in Brazil. **Cien Saude Colet**. 2020 (2):4177-4184.

MORAES, Claudia Leite de et al . Lifestyle and Comorbidity-Related Risk Factors of Severe and Critical COVID-19 Infection: A Comparative Study Among Survived COVID-19 Patients in Bangladesh. **Infect Drug Resist**. v. 25, p. 4177-4184, 2020.

RAMALHO, José Melquiades et al. Diagnósticos / resultados e intervenções de enfermagem para pacientes graves acometidos por Covid-19 e Seps. **Texto & Contexto-Enfermagem**, v. 29, n(esp), 2020.

SANTANA, Viviane Vanessa Rodrigues da Silva et al. Fatores de Risco Para o Agravamento da COVID-19 em Indivíduos Jovens. **Enfermagem em Foco**. v. 11, n. 2. ESP, 2020.

SILVA, Andre Luiz Oliveira da; MOREIRA, Josino Costa; MARTINS, Stella Regina. COVID-19 and smoking: a high-risk association. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 36, p. e00072020, 2020.

SMITH, Maressa Samai Pinheiro Silva; COSTA, Averlândio Wallysson Soares. Atuação da enfermagem mediante a prevenção e detecção precoce de sepse na unidade de terapia intensiva: uma revisão. **Journal of Education Science and Health**, v. 1, n. 4, p. 1-14, 2021.

VALENZUELA, Edwin Vivanco et al. Evolução da mortalidade e letalidade da COVID-19 no Estado de Roraima no período de março de 2020 a julho de 2021. **J Hum Growth Dev**. v. 31, n. 3, p. 447-457, 2021.

XU, Jay J. et al. Racial and Ethnic Disparities in Years of Potential Life Lost Attributable to COVID-19 in the United States: An Analysis of 45 States and the District of Columbia. **Int J Environ Res Public Health**. v. 18, n. 6, pág. 2921, 2021.

ZONTA, Franciele Nascimento Santos et al. Características epidemiológicas e clínicas da sepse em um hospital público do Paraná. **Revista de Epidemiologia e Controle de Infecção**, v. 8, n. 3, p. 224-231, 2018.

PACIENTES HOSPITALIZADOS POR SARS-COV-2 EM VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA E ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO: CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS

Ticiane Freire Gomes

Centro de Investigação Científica, Escola de Saúde Pública do Ceará – ESP, Fortaleza -CE
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8469-1472>

André Ribeiro de Castro Júnior

Centro de Investigação Científica, Escola de Saúde Pública do Ceará – ESP, Fortaleza -CE
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3681-3607>
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9127094235885272> ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3681-3607>

Tayná Albuquerque Tabosa

Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia e Funcionalidade, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza CE
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3964-081X>

Iohanna Aragão de Paiva

Centro de Investigação Científica, Escola de Saúde Pública do Ceará – ESP, Fortaleza -CE
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7268-6505>

Marcos Augusto de Paula Santos

Centro de Investigação Científica, Escola de Saúde Pública do Ceará – ESP, Fortaleza -CE
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3632-3904>

Ana Naiara Alves Teixeira

Escola de Ensino Fundamental e Médio Professora Abigail Sampaio, Paracuru - CE
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4069-0515>

Daniel Germano Alcântara

Centro de Investigação Científica, Escola de Saúde Pública do Ceará – ESP, Fortaleza -CE
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0798-6293>

Maria Iara Socorro Martins

Centro de Investigação Científica, Escola de Saúde Pública do Ceará – ESP, Fortaleza -CE
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9366-8621>

Thalyta Gleyane Silva de Carvalho

Universidade Federal do Ceará – UFC, Fortaleza - CE
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1728-4719>

Francisco Jadson Franco Moreira

Programa de Pós-Graduação em Educação - Universidade Estadual do Ceará – UECE. Fortaleza - CE
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3141-4700>

Informações sobre o artigo:	RESUMO
Recebido em: 10/01/2022	<p>Objetivou-se apresentar características do índice de desenvolvimento humano de pacientes COVID-19 que evoluíram para ventilação mecânica invasiva. Estudo descritivo, retrospectivo, de análise documental com abordagem quantitativa, realizado em Fortaleza-Ceará. Incluídos 812 pacientes que utilizaram ventilação mecânica invasiva durante a internação. Os dados foram armazenados através da plataforma “ResCOVID”. O perfil apresenta predomínio de idade igual ou superior a 60 anos 534 (76,3%), sexo masculino 437 (53,8), cor pardo 275 (33,8%). Do total, 128 (15,7%) pacientes eram ex-tabagistas e 34 (4,1%) estilistas. Para a escolaridade 168 (20,6%) possuíam ensino fundamental incompleto e 155 (19%) analfabetos. A atividade profissional houve uma notória predominância de pacientes aposentados 213 (26,2%), seguido de pacientes com atividades autônomas 107 (13,1%). Segundo o índice de desenvolvimento humano foi observado um maior número de pacientes com alto índice 501 (61,6%), seguido por pacientes que possuíam índice muito baixo 170 (20,9%). Ao analisarmos o índice de desenvolvimento humano encontrou-se que os indivíduos com maiores níveis foram mais acometidos pela COVID-19, essa prevalência foi mudando atingindo indivíduos com menores níveis.</p>
Aceito em: 13/01/2022	
Data de publicação: 07/02/2022	
Palavras-chave: COVID-19 Epidemiologia Saúde Pública Ventilação mecânica invasiva Índice de Desenvolvimento Humano	

PATIENTS HOSPITALIZED FOR SARS-COV-2 IN INVASIVE MECHANICAL VENTILATION AND HUMAN DEVELOPMENT INDEX: EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS

ABSTRACT

The objective was to present characteristics of the human development index of COVID-19 patients who evolved to invasive mechanical ventilation. Descriptive, retrospective study of document analysis with a quantitative approach, carried out in Fortaleza-Ceará. 812 patients who used invasive mechanical ventilation during hospitalization were included. Data were stored using the “ResCOVID” platform. The profile is predominantly aged 60 years or over 534 (76.3%), male 437 (53.8), brown 275 (33.8%). Of the total, 128 (15.7%) patients were former smokers and 34 (4.1%) were stylists. . For education, 168 (20.6%) had incomplete primary education and 155 (19%) were illiterate. Professional activity had a notable predominance of retired patients 213 (26.2%), followed by patients with autonomous activities 107 (13.1%). According to the human development index, a greater number of patients with a high rate of 501 (61.6%) was observed, followed by patients with a very low rate of 170 (20.9%). When analyzing the human development index, it was

Keywords:
COVID-19
Epidemiology
Public health

1 INTRODUÇÃO

O SARS-CoV-2, causador da doença do novo coronavírus (COVID-19), foi anunciado em dezembro de 2019, após registros de infecção na China (BRASIL 2020). As manifestações pulmonares do COVID-19 são amplas, variando de pneumonia sem necessidade de oxigênio suplementar à insuficiência respiratória aguda (IRA) (YEATES *et al.*, 2021). Destes pacientes afetados pela COVID-19, até 30% pode desenvolver SDRA (ROBERTO *et al.*, 2020) e em média, entre 15 e 20% necessitam de internação em unidades de terapia intensiva (UTI), com necessidade de intubação orotraqueal (IOT) e ventilação mecânica invasiva (VMI) (LUO *et al.*, 2020).

Uma meta análise descrevendo 57.420 pacientes adultos com COVID-19 que receberam VMI evidenciou que quase metade dos pacientes com COVID-19 morreram (LIM *et al.*, 2021). Nesse cenário, o manejo da infecção relacionada à assistência à saúde (IRAS) decorrente da COVID-19 é bastante desafiador, principalmente em países que já possuem seus sistemas de saúde fragilizados (JABER *et al.*, 2020). Com suas repercussões mais graves em países em desenvolvimento caracterizados por uma base populacional relativamente grande, grande pressão sobre os recursos disponíveis (energia, alimentos, água, terra), inadequada infraestrutura de saúde pública, sistemas econômicos frágeis e programas de segurança social fracos (AHMED *et al.*, 2020).

A literatura enfatiza a necessidade de complementar os relatos de casos COVID-19 com medidas de fatores de posição socioeconômica de indivíduos infectados (KHALATBARI-SOLTANI *et al.*, 2020). Uma vez que o relatório clínico da OMS se concentra na idade, sexo, locais de diagnóstico e residência, enquanto fatores adicionais do ambiente social, como ocupação, renda ou educação, podem revelar preventivamente indivíduos e populações desfavorecidos de posição socioeconômica com alto risco de vulnerabilidade social (SINGU *et al.*, 2020).

Considerando o índice de desenvolvimento humano como preditor de saúde pública nacional e de comparativo entre países a nível mundial, o conhecimento das vulnerabilidades demográficas e socioeconômicas de pacientes COVID-19 que evoluíram

para VMI pode permitir uma compreensão abrangente dos fatores de risco que aumentam o risco para o desfecho de morte. Nesse sentido, o estudo teve por objetivo apresentar características do índice de desenvolvimento humano de pacientes COVID-19 que evoluíram para ventilação mecânica invasiva.

2 METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo, de análise documental com abordagem quantitativa, realizado em 5 hospitais referência no tratamento da COVID-19 da rede pública da secretaria de saúde do estado do Ceará. A pesquisa se insere em um projeto piloto intitulado “Projeto ResCOVID: Desenvolvimento de um sistema de registro clínico eletrônico para pacientes hospitalizados com COVID-19 no Ceará/Brasil”. O projeto é desenvolvido pela Escola de Saúde Pública do Estado do Ceará – ESP, junto à Secretaria de Saúde do Estado do Ceará – SESA.

A coleta de informações ocorreu de novembro de 2020 a setembro de 2021 sobre pacientes em prontuários eletrônicos disponíveis na sede das instituições.

Para esse estudo, que se trata de um recorte do projeto maior, foram elegíveis para a amostra pacientes com internação por COVID-19, que possuíam teste diagnóstico RT-PCR detectável e com entrada no hospital de referência sem uso ventilação mecânica invasiva. Foram excluídos da amostra pacientes com processo de intubação inferior a 24 horas após a internação hospitalar, assim como pacientes com desfecho de transferência.

O universo de pacientes coletados neste hospital compreende 2.655. Respeitando os critérios de inclusão e exclusão, a amostra contou com 812 representantes que fizeram a utilização da ventilação mecânica invasiva durante a internação.

Toda informação foi consultada via prontuário, sendo coletada e armazenada em uma plataforma exclusiva intitulada “ResCOVID”, desenvolvida pelo projeto supracitado a fim de viabilizar maior agilidade na coleta e armazenamento de informações. Esta ferramenta facilitou o trabalho dos pesquisadores, deixando mais ágil o modelo de coleta e mais segura a forma de armazenamento, assim como o acesso às informações para consulta. A plataforma web permite ainda o armazenamento dos dados em nuvem possibilitando o fácil acesso aos dados coletados.

Considerando o desenvolvimento de um estudo descritivo, os dados foram apresentados conforme estatística descritiva utilizando-se de frequência absoluta e percentual para cada variável categórica. Foram descritas as variáveis referentes aos pacientes: idade (representada por faixa etária), cor, escolaridade, ocupação, hábitos pessoais (tabagismo, consumo de bebida alcoólica), índice de desenvolvimento humano e desfecho. Caracterizando assim os pacientes que fizeram uso de ventilação mecânica invasiva além de descrever seu desfecho.

Esta pesquisa cumpre a todos os princípios éticos em pesquisa ao tratar com dados de pacientes, respeitando o anonimato e segurança de dados. O trabalho segue as determinações da Resolução 466 de 12 de dezembro de 2012, estando aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Saúde Pública do Ceará – ESP, sob o parecer número 3.948/100.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

As características epidemiológicas dos 812 pacientes estão sintetizadas na tabela 1. A maioria dos pacientes eram do sexo masculino, 437 (53,8%) e possuíam idade igual ou superior a 60 anos, 534 (76,3 %), seguido por pacientes entre 50 e 59 anos, 96 (11,8%).

Tabela 1 - Características epidemiológicas de pacientes acometidos pela COVID-19 em uso de Ventilação mecânica invasiva, Fortaleza-CE, Brasil. 2021

Características Epidemiológicas da população estudada (N=812)		
Variáveis	N	%
Idade (anos)		
<20	3	0,3
20-29	7	0,8
30-39	33	4
40-49	56	6,8
50-59	96	11,8
≥60	534	76,3
Não referido	83	10,2
Sexo		
M	437	53,8
F	375	46,1
Cor		
Pardo	275	33,8
Branco	111	13,6
Preto	20	2,4

Não referido	406	50
Hábitos Pessoais		
Tabagista	47	5,7
Ex-Tabagista	128	15,7
Etilista	34	4,1
Ex-Etilista	16	1,9
Não referido	557	68,5
Escolaridade		
Analfabeto	155	19
Ensino Fundamental Incompleto	168	20,6
Ensino Fundamental Completo	59	7,2
Ensino Médio Incompleto	18	2,2
Ensino Médio Completo	105	12,9
Ensino Superior Incompleto	11	1,3
Ensino Superior Completo	32	3,9
Pós-Graduação	3	0,3
Não informado	261	32,1
Atividade Profissional		
Agricultor	57	7
Aposentado	213	26,2
Dona de Casa	77	9,4
Autônomo	107	13,1
Desempregado	33	4
Estudante	3	0,3
Trabalhador com Carteira Assinada	14	1,7
Funcionário Público	16	1,9
Profissional da Saúde	6	0,7
Não referido	286	35,2
Índice de Desenvolvimento Humano		
Muito Alto	69	8,4
Alto	501	61,6
Médio	8	0,9
Baixo	23	2,8
Muito Baixo	170	20,9
Não Informado	41	5

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021.

Em relação à cor dos pacientes internados, 406 (50%) não possuíam cor referida, seguido dos pacientes de cor parda, 275 (33,8%). Considerando os hábitos pessoais, 128 (15,7%) pacientes eram ex-tabagistas e 16 (1,9%) pacientes ex-etilistas. Apenas 47 (5,7%) pacientes eram tabagistas. Para a escolaridade em 261 (32,1%) pacientes não houveram registros, no entanto 168 (20,6%) informaram possuir o ensino fundamental incompleto e 155 (19%) serem analfabetos. A atividade profissional em 286 (35,2%) pacientes não foi informada, porém houve uma notória predominância de pacientes aposentados 213 (26,2%), seguido de pacientes com atividades autônomas 107 (13,1%). Segundo o índice de desenvolvimento humano foi observado um maior número de

pacientes com alto índice 501 (61,6%), seguido por pacientes que possuíam índice muito baixo 170 (20,9%).

Tabela 2: Desfecho de pacientes acometidos pela COVID-19 em uso de Ventilação mecânica invasiva e índice de desenvolvimento humano, Fortaleza-CE, Brasil. 2021

Desfecho da população estudada e IDH (n= 687).		
Índice de desenvolvimento humano	Óbito	%
Muito Alto	58	8,4
Alto	425	61,8
Médio	6	0,8
Baixo	21	3
Muito Baixo	136	19,7
Não Informado	41	5,9

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021.

Seguindo a mesma tendência da tabela 02, para o desfecho do óbito houve um maior predomínio entre os pacientes em uso de ventilação mecânica invasiva que possui alto índice de desenvolvimento humano com 425 (61,8%) óbitos. Embora podemos observar que independente do IDH dos pacientes houve um grande número de óbitos entre os pacientes que utilizaram a ventilação mecânica invasiva, representados por 687 (84,6%) pacientes.

O estudo atual explorou as características do índice de desenvolvimento humano de pacientes COVID-19 que evoluíram para VMI e sua possível relação com o desfecho clínico de óbito.

A amostra revela que a maioria dos indivíduos avaliados eram do sexo masculino, em concordância aos estudos internacionais e nacionais, e com idade superior a 60 anos, sendo considerada a idade avançada em muitos estudos como fator de risco importante para o agravamento do caso clínico e evolução com óbito (BASTOS *et al.*, 2020; MASCARELLO *et al.*, 2021).

A idade avançada converge a maior incidência de casos entre os indivíduos aposentados, os quais além de idade, geralmente superior à 60 anos, também possuem mais comorbidades, o que favorece as complicações relacionadas ao COVID-19. Assim como os indivíduos autônomos tiveram casos mais graves pelos trabalhos, em sua maioria, informais que podem representar maior exposição ao vírus (SAN MARTIN, 2020). Minorias com níveis educacionais mais baixos têm maior probabilidade de ser trabalhadores essenciais, incapazes de se envolver totalmente no isolamento social e trabalhar remotamente (CHUN-HAN *et al.*, 2021).

Ao se observar que os pacientes com maior gravidade, que necessitaram de VMI, eram da cor parda e com baixa escolaridade, sendo em sua maioria analfabetos ou com ensino fundamental incompleto, reforça-se a relevância dos determinantes sociais na instauração de agravos da saúde e seus prognósticos. A escolaridade assume uma posição de variável inversamente proporcional à um desfecho negativo, em que torna-se maior a proporção dos indivíduos com necessidade de VMI e a mortalidade na medida em que o nível de escolaridade diminui (MASCARELLO *et al.*, 2021).

Outro fator que interage negativamente para o aumento da gravidade dos casos com COVID-19 é o tabagismo, que pela maior incidência de agravos pulmonares (bronquiolite, pneumonia, enfisema, outros), oferece um ambiente com condições estruturais e neuroquímicas (radicais livres, alteração endotelial, maior exposição da enzima conversora da angiotensina 2) favoráveis às complicações da COVID-19 e piora da função pulmonar (SILVA; MOREIRA; MARTINS, 2020).

Quando analisado pelo IDH tem-se uma discrepância, que em parte não representa a realidade observada na maioria das regiões brasileiras, e estado do Ceará, em que foi encontrado maior acometimento entre os indivíduos com IDH alto (61,6%) e, em menor proporção, com IDH muito baixo (20,9%), que no último caso é justificado pelas menores condições sociais que elevam a vulnerabilidade e as chances de contato com o vírus (ARAÚJO *et al.*, 2020).

Uma hipótese para esse achado seria que populações com maior IDH apresentaram maiores números de contaminados no início da pandemia. O que poderia ser justificado através de que apesar da ampla disseminação do vírus, a taxa de mortalidade permaneceu altamente concentrada em países de alta renda. Os países em desenvolvimento representam 85% da população global, mas apenas 21% do número de mortos da pandemia para os primeiros meses de disseminação (SCHELLEKENS; SOURROUILLE, 2020).

Um estudo realizado no Centro Europeu para Controle de Doenças entre 31 de dezembro de 2019 a 31 de outubro de 2020 buscou calcular o total de mortes esperadas por milhão para 162 países incluídos na lista de IDH que classifica de forma decrescente 189 estados membros da ONU. O resultado mostrou que muitos países do grupo de alto IDH, especialmente na Europa e na América do Norte, foram aqueles com o pior desempenho para lidar com COVID-19. A hipótese poderia ser que os fatores socioeconômicos não são "tão" determinantes quanto se pensava. Várias hipóteses alternativas podem ser anunciadas, por exemplo, que as características biológicas do vírus SARS-CoV-2 conferem infecciosidade

e transmissividade particulares, superando as desigualdades socioeconômicas dentro do país, ou as políticas de saúde pública envolvendo restrições sociais em estados e economias liberais foram tratadas com suspeita e atrasos por tomadores de decisão para os cidadãos (TROUMBIS 2020).

Ao contrário desses achados, conforme evidenciado na literatura a COVID-19 levou a uma morbidade e mortalidade desproporcional entre as populações desfavorecidas e com menores IDH, no entanto as disparidades relacionadas a fatores socioeconômicos versus fatores biológicos ainda é amplamente desconhecida (PATEL *et al.*, 2020). Foi observada na amostra do estudo que pacientes que requerem VMI apresentaram alta mortalidade. Embora essa taxa possa estar relacionada a outros fatores, é considerável que seja avaliada a relação VMI e IDH nesses pacientes.

Variáveis socioeconômicas são fortes preditores de saúde em todo o mundo (KABISCH *et al.*, 2017). Um estudo realizado na Inglaterra apresentou uma forte correlação entre piores condições socioeconômicas com maior mortalidade por COVID-19 (MARMOT *et al.*, 2020), associações entre pobreza e maiores casos de COVID-19 em toda a Europa também foram identificados, embora com graus diferentes dependendo do país (SANNIGRAHI *et al.*, 2020). Além disso, foi encontrada uma correlação entre piores condições de vida e maiores transmissões de COVID-19 em Calcutá, Índia (DAS *et al.*, 2021); e encontraram associações entre qualidade de moradia, condições de vida e raça com as taxas de mortalidade de COVID-19 em Washington DC, EUA (HU *et al.*, 2021).

A desigualdade social exerce influência direta sobre a transmissibilidade do vírus, em um contexto de disparidade e insegurança social e alimentar, com condições de moradia e saneamento precários, maior aglomeração populacional em um mesmo domicílio, dificuldade de acesso aos serviços de saúde, contribuindo para uma fragilidade, inclusive, imunológica (NASCIMENTO ARAÚJO; MARTINS, 2021).

Destaca-se ainda como limitação deste estudo o tamanho amostral que pode não ser representativo da realidade da população do estado.

4 CONCLUSÕES

Ao analisarmos o IDH, como um índice relacionado à renda, educação e saúde, encontrou-se que os indivíduos classificados no estrato alto foram mais acometidos pela COVID-19, o que ao mesmo tempo que revela a abrangência do vírus, pode, indiretamente revelar uma situação presenciada na primeira onda em que indivíduos com maior poder aquisitivo e escolaridade foram os primeiros a ter contato com o vírus.

Considerando inicialmente os casos exportados, mas que por consequência da aglomeração, dificuldade na realização das medidas sanitárias protetivas e na restrição pela escolaridade, essa prevalência foi mudando rapidamente e atingindo indivíduos com IDH menor, que na presente pesquisa, os com IDH baixo assumiram a segunda posição de incidência.

Por meio desta pesquisa é possível observar que os determinantes sociais são fatores de que interagem e podem modificar, minimizando ou maximizando, a relação do meio com a predisposição aos agravos de saúde, em que no contexto da COVID-19 .

Com isso, expõe-se a necessidade de incluir tais determinantes como objetos de pesquisa, considerando sua influência na saúde pública como causa, consequência, intervenção e avaliação da situação de saúde de uma determinada região. Enfatizando-se que seu estudo relacionado ao escopo da COVID-19 poderá direcionar intervenções mais específicas à realidade e vulnerabilidades a que determinada população está exposta, garantindo maior eficácia das propostas de intervenção, sobretudo àquelas relacionadas à quebra do ciclo de transmissão do vírus.

REFERÊNCIAS

AHMED, Faheem et al. Why inequality could spread COVID-19. **The Lancet Public Health**, v. 5, n. 5, p. e240, 2020.

ARAUJO, Igor Gomes et al. COVID-19 no Estado do Ceará: Impacto do índice de desenvolvimento humano (IDH) na casuística. **Brazilian Journal of Health and Pharmacy**, v. 2, n. 3, p. 21-30, 2020.

BASTOS, Gisele Alsina Nader et al. Características clínicas e preditores de ventilação mecânica em pacientes com COVID-19 hospitalizados no sul do país. **Revista Brasileira de Terapia Intensiva**, v. 32, p. 487-492, 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolo de manejo clínico para o novo coronavírus (2019-nCoV). 2020.

DAS, Arijit et al. Living environment matters: Unravelling the spatial clustering of COVID-19 hotspots in Kolkata megacity, India. **Sustainable Cities and Society**, v. 65, p. 102577, 2021.

HU, Ming et al. The role of built and social environmental factors in Covid-19 transmission: A look at America's capital city. **Sustainable Cities and Society**, v. 65, p. 102580, 2021.

JABER, Samir; CITERIO, Giuseppe; SLUTSKY, Arthur S. Acute respiratory failure and mechanical ventilation in the context of the COVID-19 pandemic: why a special issue in ICM?. **Intensive Care Medicine**, p. 1-2, 2020.

KABISCH, Nadja; VAN DEN BOSCH, Matilda; LAFORTEZZA, Raffaele. The health benefits of nature-based solutions to urbanization challenges for children and the elderly—A systematic review. **Environmental research**, v. 159, p. 362-373, 2017.

KHALATBARI-SOLTANI, Saman et al. Importance of collecting data on socioeconomic determinants from the early stage of the COVID-19 outbreak onwards. **J Epidemiol Community Health**, v. 74, n. 8, p. 620-623, 2020.

LIM, Zheng Jie et al. Case fatality rates for patients with COVID-19 requiring invasive mechanical ventilation. A meta-analysis. **American journal of respiratory and critical care medicine**, v. 203, n. 1, p. 54-66, 2021.

LUO, Mengqiang et al. Intubation, mortality, and risk factors in critically ill Covid-19 patients: A pilot study. **Journal of clinical anesthesia**, v. 67, p. 110039, 2020.

MARMOT, Michael. Health equity in England: the Marmot review 10 years on. **Bmj**, v. 368, 2020.

MASCARELLO, Keila Cristina et al. Hospitalização e morte por COVID-19 e sua relação com determinantes sociais da saúde e morbidades no Espírito Santo: um estudo transversal. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 30, 2021.

NASCIMENTO ARAÚJO, Diomar Maria do; MARTINS, Islane Cristina. A obesidade como fator preditivo de hospitalização em UTI no paciente adulto infectado com COVID-19: uma revisão integrativa. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 7, n. 9, p. 230-245, 2021.

PATEL, Aniruddh P. et al. Race, socioeconomic deprivation, and hospitalization for COVID-19 in English participants of a national biobank. **International journal for equity in health**, v. 19, n. 1, p. 1-4, 2020.

ROBERTO, Gabriel Antonio et al. Ventilação mecânica em pacientes portadores de COVID-19. **ULAKES JOURNAL OF MEDICINE**, v. 1, 2020.

SAN MARTIN, Maristel Coelho. A espacialização e os reflexos sociais e econômicos da COVID-19 no município do Rio Grande-RS. **Boletim Gaúcho de Geografia**, v. 47, n. 2, 2020.

SANNIGRAHI, Srikanta et al. Examining the association between socio-demographic composition and COVID-19 fatalities in the European region using spatial regression approach. **Sustainable cities and society**, v. 62, p. 102418, 2020.

SHELLEKENS, Philip; SOURROUILLE, Diego M. COVID-19 mortality in rich and poor countries: a tale of two pandemics?. **World Bank Policy Research Working Paper**, n. 9260, 2020.

SILVA, Andre Luiz Oliveira da; MOREIRA, Josino Costa; MARTINS, Stella Regina. COVID-19 and smoking: a high-risk association. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 36, p. e00072020, 2020.

SINGU, Sravani et al. Impact of social determinants of health on the emerging COVID-19 pandemic in the United States. **Frontiers in public health**, v. 8, p. 406, 2020.

TROUMBIS, Andreas Y. Testing the socioeconomic determinants of COVID-19 pandemic hypothesis with aggregated Human Development Index. **J Epidemiol Community Health**, v. 75, n. 4, p. 414-415, 2021.

YEATES, Eric O. et al. Improved outcomes over time for adult COVID-19 patients with acute respiratory distress syndrome or acute respiratory failure. **PloS one**, v. 16, n. 6, p. e0253767, 2021.

ASSISTÊNCIA DE SAÚDE HUMANIZADA: ANÁLISE DOS FATORES INTERFERENTES

Maria Josivânia da Silva

Centro Universitário Estácio- FIC, Fortaleza – CE

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3994-356X>

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4138866316716307>

Jocilene da Silva Paiva

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), Redenção – CE

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8340-8954>

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6760519048495312>

Samara dos Reis Nepomuceno

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), Redenção – CE

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9549244667253240>

Alanna Elcher Elias Pereira

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), Redenção – CE

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9516-1883>

Joana Darc Martins Torres

Universidade Estadual do Ceará (UECE), Redenção – CE

ORCID: <https://orcid.org/0000.0002.6161.5768>

Ana Caroline Morais Paiva

Faculdade de Ensino e Cultura do Ceará (FAECE), Fortaleza – CE

ORCID: <https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-6949-8842>

Dulce Helena de Sousa

Faculdade de Ensino e Cultura do Ceará (FAECE), Fortaleza – CE

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8001-0959>

Terezinha Almeida Queiroz

Universidade Estadual do Ceará (UECE), Fortaleza – CE

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1848-8564>

Edmara Chaves Costa

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), Redenção – CE

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7211109843852937>

Janyelle Jeronimo de Sousa Silva

Centro Universitário Fametro (Unifametro), Fortaleza – CE

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9012590389804392>

Hilderlânia de Freitas Lima

Centro Universitário Católica de Quixadá (UniCatólica), Quixadá – CE

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1115472596768240>

Informações sobre o artigo:	RESUMO
Recebido em: 31/01/2022	A prestação da assistência humanizada visa proporcionar um cuidado mais eficaz e individualizado ao paciente, sendo influenciada por diversos fatores. Dessa forma, este estudo objetiva verificar na literatura nacional fatores que impedem a prestação da assistência humanizada nos diversos contextos de saúde (primário, secundário e terciário). Para isso, optou-se por realizar um estudo de revisão integrativa da literatura. Assim, efetuou-se uma consulta na base de dados LILACS; na biblioteca digital SciELO; e no buscador <i>Google Acadêmico</i> . Após a análise dos artigos encontrados na busca, foram incluídos 8 para a análise final. Os resultados evidenciaram que os principais fatores que interferem na prestação da assistência humanizada são: problemas de rotina, de relacionamento interpessoal entre a equipe e com os familiares dos pacientes; carga horária exaustiva; problemas estruturais; e ainda a baixa remuneração, que foi citada como causa de desmotivação e fator comprometedor do atendimento humanizado. Conclui-se que os fatores elencados nos estudos prejudicam a prestação do atendimento humanizado, portanto é necessário corrigir esses problemas para que o atendimento ao paciente não seja dificultado e também para que os profissionais possam ter um ambiente de trabalho mais digno.
Aceito em: 02/02/2022	
Data de publicação: 07/02/2022	
Palavras-chave: Humanização Prática Profissional	

HUMANIZED HEALTH CARE: ANALYSIS OF INTERFERING FACTORS

ABSTRACT

The provision of humanized care aims to provide more effective and individualized care to the patient, being influenced by several factors. Thus, this study aims to verify in the national literature factors that prevent the provision of humanized care in different health contexts (primary, secondary and tertiary). For this, it was decided to carry out an integrative literature review study. Thus, a query was made in the LILACS database; in the SciELO digital library; and the Google Scholar search engine. After analyzing the articles found in the search, 8 were included for the final analysis. The results showed that the main factors that interfere in the provision of humanized care are: routine problems, interpersonal relationship problems between the team and with the patients' relatives; exhaustive workload; structural problems; and also the low remuneration, which was cited as a cause of demotivation and a compromising factor of humanized care. It is concluded that the factors listed in the studies impair the provision of humanized care, so it is necessary to correct these problems so that patient care is not hampered and also so that professionals can have a more dignified work environment.

Keywords:
Humanization
Professional Practice

1 INTRODUÇÃO

O conceito de humanização das práticas e da atenção à saúde tem sido amplamente discutido e nos últimos anos ganhou destaque na literatura científica internacional e nacional, principalmente nas publicações ligadas à saúde coletiva devido a necessidade cotidiana de sua aplicação no ambiente dos cuidados primários, secundários e terciários em saúde (GOULART; CHIARI, 2010).

A humanização no Sistema Único de Saúde (SUS) tem sido implantada diariamente na rotina dos profissionais devido sua necessidade nas relações interpessoais, seja entre os próprios profissionais ou entre profissional e paciente. Nesse contexto, a Política Nacional de humanização trouxe à tona os direitos e também os deveres dos usuários do SUS, algo que consequentemente promoveu melhorias para todo o processo desde a admissão até a alta do cliente. Os usuários passaram a ter conhecimento sobre seus direitos e deveres devido ao acesso a essas informações que agora estão disponíveis para todos. E os profissionais de saúde, vêm sendo cada vez mais cobrados para a prestação do cuidado humanizado (BRASIL, 2013).

Nesta feita, a humanização da saúde é um movimento integrador das relações da saúde, buscando uma melhoria do atendimento e um ambiente propício para o desenvolvimento do cuidado de forma eficaz. Apesar da extensa produção científica sobre o tema e o desenvolvimento de políticas públicas visando o resgate de tal perspectiva, o conceito relativo à humanização da saúde e a determinação de sua aplicabilidade dentro da área ainda permanece confuso, em vista dos fatores que interferem na sua aplicação durante a prática profissional. Assim, são evidenciados rotineiramente casos de realização de práticas de cuidados desumanizadas, sendo necessário, portanto entender os fatores que têm interferido nessas práticas (MONGIOVI *et al.*, 2014).

Diante disso, essa pesquisa justifica-se levando em consideração a necessidade de entender os fatores que têm interferido na execução das práticas de cuidados em saúde de maneira humanizada. Pois, é preciso entender a causa para que se possa evitar a ocorrência das práticas assistenciais desumanas nos diferentes níveis do Sistema Único de Saúde.

Destaca-se sua relevância em incentivar outros pesquisadores da área da saúde a se aprofundarem no tema e trazerem uma reflexão aos gestores para que possam avaliar

e elaborar um planejamento para as unidades de saúde do SUS, no intuito de incorporar a humanização desde a seleção dos profissionais. Somado a isso, também poderá contribuir para que os profissionais possam identificar os problemas que interferem na sua prática profissional, levando a sua correção. Desta forma o objetivo desta pesquisa é verificar na literatura nacional fatores que impedem a assistência humanizada nas unidades de saúde.

2 METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão integrativa da literatura no intuito de identificar os fatores que interferem na realização do atendimento humanizado no âmbito das unidades de saúde brasileiras, sejam primárias, secundárias ou terciárias.

Destaca-se que o estudo do tipo revisão integrativa é uma modalidade de trabalho investigativo que realiza a análise de forma organizada dos estudos realizados e já publicados, realizando a síntese do seu conteúdo, no intuito de identificar respostas específicas. Assim, é possível atribuir novos conhecimentos ou incorporar ao conhecimento já existente novas considerações resultantes dessa investigação (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).

Nesse estudo a busca dos artigos foi efetuada na base de dados: LILACS; biblioteca digital: SciELO; e buscador: *Google Acadêmico*.

Destaca-se que foram realizadas duas buscas. Inicialmente foram coletados dados dos artigos publicados até o ano de 2014, utilizando os seguintes termos de busca: “Humanização, atendimento humanizado, fatores intervenientes”, combinados com o operador booleano: AND. No ano de 2022, a busca foi atualizada utilizando a bases de dados LILACS e a biblioteca digital SciELO, no intuito de elencar artigos publicados após o ano de 2014 até 2022, sendo utilizado os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Humanização da Assistência e Prática Profissional, combinados com o mesmo operador booleano. Para a nova busca foram considerados artigos publicados após o ano de 2014.

Para alcançar o objetivo do estudo, foi elaborada a seguinte questão norteadora: quais fatores intervêm na realização da assistência humanizada nas unidades de saúde brasileiras (primárias, secundárias ou terciárias).

Assim, foram utilizados como critérios de inclusão: artigos na íntegra que respondessem à questão norteadora. A análise dos estudos incluídos na revisão se fundamentou na descrição dos fatores que interferem na realização das práticas assistenciais humanizadas. Foram excluídos estudos com o mesmo delineamento metodológico de revisão e outros que não se configuram como artigo original.

Os dados dos artigos foram analisados de forma qualitativa e descritiva e seus resultados foram dispostos em quadros que serão apresentados adiante.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na busca primária em 2014 foram incluídos 2 artigos neste estudo. Ao realizar a busca secundária em janeiro de 2022, foram evidenciados 39 novos estudos. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão foram analisados 16 estudos, destes, 6 foram incluídos na amostra desta revisão.

Dessa forma, no Quadro 1 são apresentados os 8 artigos incluídos, no que se refere ao título, ano de publicação e periódico.

Quadro 1 - Identificação dos artigos incluídos na revisão

TÍTULO	ANO DE PUBLICAÇÃO	PERIÓDICO
(A1) - Reflexões conceituais sobre a humanização da saúde: concepção de enfermeiros de Unidades de Terapia Intensiva (MONGIOVI <i>et al.</i> , 2014).	2014	Revista Brasileira de Enfermagem
(A2) - Fatores intervenientes do cuidado humanizado de enfermagem pediátrica (ROCHA <i>et al.</i> , 2014).	2014	Faculdade Pequeno Príncipe
(A3) - Atendimento móvel às urgências e emergências psiquiátricas: percepção de trabalhadores de enfermagem (OLIVEIRA <i>et al.</i> , 2020).	2020	Revista Brasileira de Enfermagem
(A4) - Percepções do paciente oncológico sobre o cuidado (THEOBALD <i>et al.</i> , 2016).	2016	Physis Revista de Saúde Coletiva
(A5) - Humanização da assistência à saúde na percepção de enfermeiros e médicos de um hospital privado (CALEGARI; MASSAROLLO; SANTOS, 2015).	2015	Revista da Escola de Enfermagem da USP
(A6) - Método canguru: percepções sobre o conhecimento, potencialidades e barreiras entre enfermeiras (FERREIRA <i>et al.</i> , 2019).	2019	Revista Escola Anna Nery
(A7) - Ser enfermeiro no cotidiano da atenção primária à saúde: o fazer, o aprender e o conviver (SILVA; VIEGAS; MENEZES, 2019).	2019	Online brazilian journal of nursing
(A8) - Análise de partos acompanhados por enfermeiras obstétricas na perspectiva da humanização do parto e nascimento (REIS <i>et al.</i> , 2016).	2016	Revista de Pesquisa (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Online)

Fonte: Elaborado pelos autores, 2022.

No Quadro 2 os artigos incluídos na revisão são apresentados de acordo com o seu objetivo e resultados que respondem à questão norteadora deste estudo.

Quadro 2 - Distribuição dos artigos incluídos de acordo com o seu objetivo e resposta a questão norteadora deste estudo

ARTIGO	OBJETIVO	RESPOSTA DA QUESTÃO NORTEADORA
A1	Reflexões conceituais sobre humanização da saúde: concepção de enfermeiros de Unidades de Terapia Intensiva (MONGIOVI <i>et al.</i> , 2014).	No intuito de favorecer o entendimento do conteúdo, agrupamos as respostas em três subcategorias sendo elas: Humanização como empatia pelo paciente; Humanização como cuidado holístico; e Humanização na formação do profissional.
A2	Fatores intervenientes do cuidado humanizado de enfermagem pediátrica (ROCHA <i>et al.</i> , 2014).	Foram relatados problemas de rotinas e procedimentos hospitalares, de relacionamento pessoal entre a equipe e com familiares, também a baixa remuneração foi citada como causa de desmotivação, que implica no comprometimento do atendimento humanizado.
A3	Compreender como os trabalhadores de enfermagem percebem o cuidado às pessoas em situações de urgências e emergências psiquiátricas no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) (OLIVEIRA <i>et al.</i> , 2020).	A análise das entrevistas dos profissionais permitiu a identificação de três categorias: prática mecanicista, necessidade de qualificação e des (humanização) da assistência.
A4	Identificar as percepções do paciente oncológico sobre o cuidado profissional recebido (THEOBALD <i>et al.</i> , 2016).	Foi evidenciado que o usuário possui uma percepção positiva sobre o cuidado recebido. Porém, a prática profissional ainda incorpora as recomendações da Política Nacional de Humanização de forma parcial.
A5	Verificar o significado do termo “humanização” para enfermeiros e médicos de um hospital privado e identificar os fatores que dificultam e facilitam a humanização da assistência (CALEGARI; MASSAROLLO; SANTOS, 2015).	Verificou-se que o termo humanização está vinculado a respeito, acolhimento e empatia. Na prática profissional as ações que visam à humanização podem ser facilitadas pela cultura organizacional e dificultadas pela sobrecarga de trabalho.
A6	Analisar o conhecimento, as potencialidades e as barreiras relacionadas à implantação do Método Canguru, na percepção de enfermeiras que atuam nas unidades materno-infantil de um hospital-escola (FERREIRA <i>et al.</i> , 2019).	Foram identificados como fatores relacionados a implantação do Método Canguru: barreira para o desenvolvimento do Método Canguru; Conhecimento sobre o Método Canguru; e Potências do Método Canguru. As falas das profissionais identificaram conhecimento parcial, ausência de experiência prática e resistência da equipe e falta de apoio institucional para a realização da prática.
A7	Compreender o cotidiano do enfermeiro na Atenção Primária à Saúde (APS) e suas vivências como ser, no fazer, aprender e conviver (SILVA; VIEGAS; MENEZES, 2019).	Os enfermeiros convivem com desafios em sua rotina, como o elevado número de pacientes cadastrados, a carência de recursos humanos, a alta demanda espontânea reprimida, o foco centrado na doença e a necessidade da realização da educação permanente.
A8	Analisar partos acompanhados pelas enfermeiras obstétricas relacionando sua prática com a política de	Foi evidenciado que é de extrema relevância o acompanhamento do trabalho de parto pela enfermeira obstétrica, profissional que valoriza e

	humanização do parto e nascimento (REIS <i>et al.</i> , 2016).	pratica as recomendações preconizadas pelo Ministério da Saúde no que se refere à humanização do parto e nascimento.
--	--	--

Fonte: Elaborado pelos autores, 2022.

Quando se fala de humanização no contexto atual os autores falam em uma de suas pesquisas que a humanização da saúde é vista como um movimento integrador das relações da saúde, buscando uma melhoria do atendimento e um ambiente propício para o desenvolvimento do cuidado. (MONGIOVI *et al.*, 2014).

Baseado neste contexto, os autores em uma de suas pesquisas usaram três subcategorias para conceituar a humanização sendo elas: Humanização como empatia pelo paciente; Humanização como cuidado holístico; e Humanização na formação do profissional e em uma delas afirmam que a humanização é tudo que você pode usar como artifício para o atendimento do paciente de forma holística. Dessa forma, o tratamento deve ser executado com base nas necessidades fisiológicas, emocionais, espirituais, dentre outras (MONGIOVI *et al.*, 2014).

No que se refere aos fatores que intervêm no atendimento humanizado, é citado a incapacidade de sistematizar ações de humanização devidamente aplicáveis aos diversos cenários assistenciais, o desrespeito pelo próximo, a falta da educação permanente, a falta de uma postura dialógica, dentre outros (MONGIOVI *et al.*, 2014).

Concorda-se com os autores quando falam que existe um despreparo dos profissionais por falta de conhecimento sobre o assunto e que a humanização deveria fazer parte da vida dos profissionais desde a graduação para que eles desde cedo possam ter afinidade, conhecimento sobre o tema para que esta falta de conhecimento não venha refletir no cuidado aos pacientes que procuram atendimento nas unidades de saúde.

Para Rocha *et al.*, (2014) a humanização não deve ser direcionada unicamente ao paciente, mas a todos que estão inseridos no processo do cuidar, incluindo a equipe e familiares. Esse conceito vem sendo amplamente trabalhado, entretanto, observa-se a ênfase voltada aos usuários dos serviços de saúde, à assistência humanizada ao paciente, pesquisas voltadas unicamente ao cliente. Porém, nota-se ainda são poucos os estudos que trazem a perspectiva da humanização voltada para o profissional de enfermagem.

De acordo com a Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão no Sistema Único de Saúde (PNH), também chamada de Humaniza SUS as práticas assistenciais em saúde no Brasil precisam ser reformuladas sob o olhar da humanização, assim entende-se que é necessário modificações no setor da saúde, principalmente no modelo de atenção

empregado que ainda é muito centralizador e biomédico, no qual percebe-se relações frágeis entre usuários e equipe de saúde e a precarização do acesso aos serviços (BRASIL, 2013).

A PNH conceitua humanização como a valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde: usuários, trabalhadores e gestores, fomento da autonomia e do protagonismo desses sujeitos; aumento do grau de corresponsabilidade na produção de saúde e de sujeitos; estabelecimento de vínculos solidários e de participação coletiva no processo de gestão; identificação das dimensões de necessidades sociais, coletivas e subjetivas de saúde; mudança nos modelos de atenção e gestão, tendo como foco as necessidades dos cidadãos, a produção de saúde e o próprio processo de trabalho em saúde, valorizando os trabalhadores e as relações sociais no trabalho; compromisso com a ambiência, melhoria das condições de trabalho e de atendimento (BRASIL, 2013).

Também foi evidenciado que entre os fatores intervenientes da prática do cuidado humanizado estão a: prática mecanicista, necessidade de qualificação e des (humanização) da assistência (OLIVEIRA *et al.*, 2020); parcialidade da incorporação das recomendações da Política Nacional de Humanização (THEOBALD *et al.*, 2016); prática humanizada dificultada pela sobrecarga de trabalho (CALEGARI; MASSAROLLO; SANTOS, 2015).

Ferreira *et al.*, (2019) destacaram que a dificuldade para a implementação do Método Canguru, que é uma prática de cuidado humanizada desenvolvida para neonatos pré-termo, está atrelada dentre outros fatores a ausência de experiência prática e a resistência da equipe e falta de apoio institucional para a realização da prática.

No estudo de Silva; Viegas & Menezes (2019) foi evidenciado que os enfermeiros convivem com desafios em sua rotina, como o elevado número de pacientes cadastrados, a carência de recursos humanos, a alta demanda espontânea reprimida, o foco centrado na doença e a necessidade da realização da educação permanente.

Reis *et al.*, (2016) observaram que é de extrema relevância o acompanhamento do trabalho de parto pela enfermeira obstétrica, profissional que valoriza e pratica as recomendações preconizadas pelo Ministério da Saúde no que se refere à humanização do parto e nascimento.

Dessa forma, através dos achados na literatura nota-se que para que a humanização aconteça é necessário realizar diversas mudanças nos serviços de saúde, incluindo o dimensionamento adequado de pessoal e dos recursos, preservação dos recursos materiais, controle dos insumos, melhoria salarial, bom relacionamento interpessoal entre a equipe e com os familiares, acolhimento nas ações desenvolvidas, educação continuada para a equipe

multiprofissional, melhora no clima organizacional, onde haja o respeito entre todos independente da hierarquia e todos os profissionais sejam devidamente valorizados.

4 CONCLUSÕES

A partir deste estudo, pode-se concluir que os casos de desumanização no atendimento estão ligados a diversos fatores tanto pessoais (como a falta de conhecimento sobre o atendimento humanizado, sobrecarga de trabalho) como também fatores institucionais (ligados a problemas estruturais, baixa remuneração, falta de gerenciamento dos recursos humanos e materiais).

Assim, cabe aos gestores elaborar um planejamento estratégico para minimizar essas dificuldades. Destaca-se também que é necessário a atuação conjunta da gestão e da equipe profissional para que se possa trazer melhorias efetivas nas instituições e promover o atendimento humanizado para os pacientes nos diferentes níveis de saúde.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Política Nacional de Humanização**. 2013. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_humanizacao_pnh_folhet_o.pdf. Acesso em: 25 jan. 2022.

CALEGARI, R. C.; MASSAROLLO, M. C. K. B.; SANTOS, M. J. Humanização da assistência à saúde na percepção de enfermeiros e médicos de um hospital privado. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 49, p. 42-47, 2015.

FERREIRA, D. O. *et al.* Método canguru: percepções sobre o conhecimento, potencialidades e barreiras entre enfermeiras. **Escola Anna Nery**, v. 23, 2019.

GOULART, B. N. G.; CHIARI, B. M. Humanização das práticas do profissional de saúde: contribuições para reflexão. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 15, p. 255-268, 2010.

MENDES, K. D. S.; SILVEIRA, Renata Cristina de Campos Pereira; GALVÃO, Cristina Maria. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. **Texto & contexto-enfermagem**, v. 17, p. 758-764, 2008.

MONGIOVI, V. G. *et al.* Reflexões conceituais sobre humanização da saúde: concepção de enfermeiros de Unidades de Terapia Intensiva. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 67, p. 306-311, 2014.

OLIVEIRA, L. C. *et al.* Atendimento móvel às urgências e emergências psiquiátricas: percepção de trabalhadores de enfermagem. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 73, 2020.

REIS, C. S. C. *et al.* Análise de partos acompanhados por enfermeiras obstétricas na perspectiva da humanização do parto e nascimento. **Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental Online**, v. 8, n. 4, p. 4972-4979, 2016.

ROCHA, P. D. *et al.* Fatores Intervenientes do cuidado humanizado de enfermagem pediátrica. **Faculdade Pequeno Príncipe**, 2014.

SILVA, L. S.; VIEGAS, S. M. F.; MENEZES, C. Ser enfermeiro no cotidiano da atenção primária à saúde: o fazer, o aprender e o conviver. **Online Brazilian Journal Nursing (Online)**, 2019.

THEOBALD, M. R. *et al.* Percepções do paciente oncológico sobre o cuidado. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, v. 26, p. 1249-1269, 2016.

SOBRE OS ORGANIZADORES

LIDIA ROCHA DE OLIVEIRA

Enfermeira pela Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) -2020. Especialista em Enfermagem do Trabalho pela Faculdade Venda Nova do Imigrante (FAVENI) - 2021. Especialista em Gestão e auditoria em serviços de saúde pela FAVENI 2021. Membro do Grupo de Pesquisa e Extensão Sistemas de Classificação da Prática de Enfermagem. Foi bolsista de Iniciação científica pela Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (PIBIC/UNILAB) e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Atualmente é Mestranda em Enfermagem pelo Programa de Pós-graduação em Enfermagem (PPGENF) da UNILAB. Possui conhecimento na área de Enfermagem e atua nas seguintes áreas: Doenças crônicas degenerativas, Hipertensão, Diabetes Mellitus, Sistemas de Classificação da Prática de Enfermagem (Diagnóstico de Enfermagem e Resultado de Enfermagem), Enfermagem do trabalho e Gestão e Auditoria.

CV Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9684328247340215>

JOSÉ ERIVELTON DE SOUZA MACIEL FERREIRA

Enfermeiro. Mestrando em Enfermagem na UNILAB, atualmente como bolsista FUNCAP. Especialista em Instrumentação Cirúrgica, Centro Cirúrgico e Central de Material e Esterilização; e em Enfermagem do Trabalho. Integrante do Grupo de Pesquisa e Extensão Sistemas de Classificação da Prática de Enfermagem da UNILAB, cadastrado no Diretório dos Grupos de Pesquisa-CNPq. Foi bolsista pela Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP) no ano de 2017 e pelo Programa de Bolsas e Extensão, Arte e Cultura (PIBEAC) da UNILAB nos anos de 2018 a 2020. Possui conhecimentos na área de Enfermagem e atua principalmente nos seguintes temas: Acidente Vascular Cerebral, Doenças Crônicas Não Transmissíveis (Hipertensão, Diabetes e Doença Renal Crônica), COVID-19, Taxonomias de Enfermagem, Tecnologias Educacionais, Educação em Saúde e Promoção da Saúde.

CV Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6769744803078115>

ÍNDICE REMISSIVO

C

Cardíaca, 19
Compostos, 6, 19, 23, 34, 44, 56, 67, 77, 89, 96, 108, 120

D

Diabetes Mellitus, 50, 51, 56, 57, 58, 59, 61, 64, 67, 68, 70, 129
Distrofia, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18

E

Educação em saúde, 56, 59
Enfermagem, 48, 54, 58, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 82, 83, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 105, 123, 127, 128, 129, 130

F

Fisioterapia, 6, 9, 15, 17, 18, 96, 107
Fragilidade, 44, 47, 49, 50

G

Gravidez de Gêmeos, 77

H

Hipotireoidismo, 67, 73
Humanização, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127

I

Idosos, 34, 44, 46, 51
Infecções por coronavírus, 96

O

Obesidade, 23, 26

P

Pandemias, 96
Período Pós-Parto, 77
Pneumonia, 89, 90, 91, 92
Proteínas, 28

R

Risco de queda, 44, 50, 51, 94

EDITORA

IN VIVO

JUNTOS SOMOS +

WWW.EDITORAINVIVO.COM