E-BOOK

AMPLAMENTE

DESAFIOS EM SAÚDE

Organizadores

Dayana Lúcia Rodrigues de Freitas

Luciano Luan Gomes Paiva

Caroline Rodrigues de Freitas Fernandes

EDITORA DE LIVROS
FORMAÇÃO CONTINUADA

E-BOOK

AMPLAMENTE: DESAFIOS EM SAÚDE

1ª EDIÇÃO. VOLUME 01.

EDITORA DE LIVROS
FORMAÇÃO CONTINUADA

ORGANIZADORES

Dayana Lúcia Rodrigues de Freitas
Luciano Luan Gomes Paiva
Caroline Rodrigues de Freitas Fernandes

DOI: 10.47538/AC-2021.02

Ano 2021

E-BOOK

AMPLAMENTE: DESAFIOS EM SAÚDE

1ª EDIÇÃO. VOLUME 01.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Amplamente [livro eletrônico] : desafios em saúde :
volume 1 / organizadores Dayana Lúcia Rodrigues
de Freitas, Luciano Luan Gomes Paiva,
Caroline Rodrigues de Freitas Fernandes. --
1. ed. -- Natal, RN : Amplamente Cursos e
Formação Continuada, 2021.
PDF

Bibliografia
ISBN 978-65-992789-8-3

1. Artigos - Coletâneas 2. Bem-estar 3. Ciências
médicas - Pesquisa 4. Inovações médicas 5. Saúde -
Pesquisa I. Freitas, Dayana Lúcia Rodrigues de.
II. Paiva, Luciano Luan Gomes. III. Fernandes,
Caroline Rodrigues de Freitas.

21-59597

CDD-610

Índices para catálogo sistemático:

1. Artigos científicos : Saúde : Ciências médicas
610

Maria Alice Ferreira - Bibliotecária - CRB-8/7964

Amplamente Cursos e Formação Continuada

CNPJ: 35.719.570/0001-10

E-mail: publicacoes@editoraamplamente.com.br

www.amplamentecursos.com

Telefone: (84) 999707-2900

Caixa Postal: 3402

CEP: 59082-971

Natal- Rio Grande do Norte – Brasil

Ano 2021

Editora Chefe:

Dayana Lúcia Rodrigues de Freitas

Assistentes Editoriais:

Caroline Rodrigues de F. Fernandes

Maria Pollyana Sales Vicente

Margarete Freitas Baptista

Bibliotecária:

Maria Alice Ferreira

Projeto Gráfico e Diagramação:

Luciano Luan Gomes Paiva

Caroline Rodrigues de F. Fernandes

Imagem da Capa:

Shutterstock

2021 by Amplamente Cursos e Formação Continuada

Copyright © Amplamente Cursos e Formação Continuada

Edição de Arte:

Luciano Luan Gomes Paiva

Copyright do Texto © 2021 Os autores

Copyright da Edição © 2021 Amplamente Cursos e
Formação Continuada

Revisão:

Os autores

Direitos para esta edição cedidos pelos autores à
Amplamente Cursos e Formação Continuada.

Todo o conteúdo deste livro está licenciado sob uma Licença de atribuição [Creative Commons. Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional \(CC-BY-NC-ND\).](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

Este e-book contém textos escritos por autores de diversos lugares do Brasil e, possivelmente, de fora do país. Todo o conteúdo escrito nos capítulos, assim como correção e confiabilidade são de inteira responsabilidade dos autores, inclusive podem não representar a posição oficial da Editora Amplamente Cursos.

A Editora Amplamente Cursos é comprometida em garantir a integridade editorial em todas as etapas do processo de publicação. Todos os artigos foram previamente submetidos à avaliação cega pelos pares, membros do Conselho Editorial desta Editora, tendo sido aprovados para a publicação.

É permitido o download desta obra e o compartilhamento desde que sejam atribuídos créditos aos autores, mas sem a possibilidade de alterá-la de nenhuma forma ou utilizá-la para fins comerciais.

Situações de má conduta ética e acadêmica ou quaisquer outros problemas que possam vir a surgir serão encaminhados ao Conselho Editorial para avaliação sob o rigor científico e ético.

CONSELHO EDITORIAL

Dr. Damião Carlos Freires de Azevedo - Universidade Federal de Campina Grande
Dra. Danyelle Andrade Mota - Universidade Federal de Sergipe
Dra. Débora Cristina Modesto Barbosa - Universidade de Ribeirão Preto
Dra. Elane da Silva Barbosa - Universidade Estadual do Ceará
Dra. Eliana Campêlo Lago - Universidade Estadual do Maranhão
Dr. Everaldo Nery de Andrade - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
Dra. Fernanda Miguel de Andrade - Universidade Federal de Pernambuco
Dr. Izael Oliveira Silva - Universidade Federal de Alagoas
Dr. Jakson dos Santos Ribeiro - Universidade Estadual do Maranhão
Dra. Josefa Gomes Neta - Faculdade Sucesso
Dr. Maykon dos Santos Marinho - Faculdade Maurício de Nassau
Dr. Rafael Leal da Silva - Secretaria de Educação e da Ciência e Tecnologia da Paraíba
Dra. Ralydiana Joyce Formiga Moura - Universidade Federal da Paraíba
Dra. Roberta Lopes Augustin - Faculdade Murialdo
Dra. Viviane Cristhyne Bini Conte - Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Dr. Wanderley Azevedo de Brito - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás

CONSELHO TÉCNICO CIENTÍFICO

Ma. Ana Claudia Silva Lima - Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves
Ma. Andreia Rodrigues de Andrade - Universidade Federal do Piauí
Esp. Bruna Coutinho Silva - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
Ma. Camila de Freitas Moraes - Universidade Católica de Pelotas
Me. Carlos Eduardo Krüger - Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões
Esp. Caroline Rodrigues de Freitas Fernandes - Fanex Rede de Ensino
Me. Clécio Danilo Dias da Silva - Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Me. Fabiano Eloy Atílio Batista - Universidade Federal de Viçosa
Me. Francisco Odécio Sales - Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Ceará

Ano 2021

Me. Fydel Souza Santiago - Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo
Me. Giovane Silva Balbino - Universidade Estadual de Campinas
Ma. Heidy Cristina Boaventura Siqueira - Universidade Estadual de Montes Claros
Me. Jaiurte Gomes Martins da Silva - Universidade Federal Rural de Pernambuco
Me. João Antônio de Sousa Lira - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Me. João Paulo Falavinha Marcon - Faculdade Campo Real
Me. José Henrique de Lacerda Furtado - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro
Me. José Flôr de Medeiros Júnior - Universidade de Uberaba
Ma. Josicleide de Oliveira Freire - Universidade Federal de Alagoas
Me. Lucas Peres Guimarães - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro
Ma. Luma Mirely de Souza Brandão - Universidade Tiradentes
Me. Marcel Alcleante Alexandre de Sousa - Universidade Federal da Paraíba
Me. Márcio Bonini Notari - Universidade Federal de Pelotas
Ma. Maria Antônia Ramos Costa - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia
Ma. Maria Inês Branquinho da Costa Neves - Universidade Católica Portuguesa
Me. Milson dos Santos Barbosa - Universidade Tiradentes
Ma. Náyra de Oliveira Frederico Pinto - Universidade Federal do Ceará
Me. Paulo Roberto Meloni Monteiro Bressan - Faculdade de Educação e Meio Ambiente
Ma. Rosiane Correa Guimarães - Universidade Federal de Jataí
Ma. Sirlei de Melo Milani - Universidade do Estado de Mato Grosso
Ma. Viviane Cordeiro de Queiroz - Universidade Federal da Paraíba
Me. Weberson Ferreira Dias - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins

DECLARAÇÃO DOS AUTORES

Todos os autores desta obra declaram que trabalharam ativamente na produção dos seus trabalhos, desde o planejamento, organização, criação de plano de pesquisa, revisão de literatura, caracterização metodológica, até mesmo na construção dos dados, interpretações, análises, reflexões e conclusões. Assim como, atestam que seus artigos não possuem plágio acadêmico, nem tampouco dados e resultados fraudulentos. Os autores também declaram que não possuem interesse comercial com a publicação do artigo, objetivando apenas a divulgação científica por meio de coletâneas em temáticas específicas.

APRESENTAÇÃO

O E-book Amplamente: desafios em Saúde, consiste em uma coletânea de artigos científicos, oriundos de fundamentos e experiências médicas, com diversos objetivos, e de várias localidades do Brasil. O livro é estruturado por textos de profissionais da área de Saúde que também são pesquisadores, nas modalidades de Pesquisa Concluída, Pesquisa em Andamento, Ensaio Acadêmico, Revisão Bibliográfica, Relato de Experiência e Relatórios específicos.

A temática direcionada aos desafios em Saúde, de forma factual, aponta para uma multiplicidade de fatores emergentes no cotidiano dos profissionais dessa área, imbricadas às questões comumente abordadas no âmbito da pesquisa. Fatores que, em muitas discussões, acabam ficando de fora dos debates, sobretudo por trazer à tona, de forma interseccional, aspectos não centralizados às temáticas mais corriqueiras.

No âmbito da Saúde, os desafios cotidianos vêm, cada vez mais, ficando complexos e delicados, envolvendo questões sociais de saúde pública, condições adequadas de trabalho, demandas das especialidades médicas, entre outros aspectos importantes nesse contexto. Dessa forma, este livro está estruturado na articulação da diversidade de situações que desafiam os profissionais da Saúde diariamente, com o compartilhamento de experiências em forma de relatos, interpretações, análises, avaliações e reflexões.

Assim sendo, em nome da Amplamente Cursos e Formação Continuada, convido todas as pessoas para leitura do E-book Amplamente: desafios em Saúde, sobretudo para conhecer diversas temáticas e desafios das Ciências Médicas, a partir do compartilhamento de diversos profissionais da Saúde.

Luciano Luan Gomes Paiva

Ano 2021

SUMÁRIO

CAPÍTULO I	13
A INFLUÊNCIA DO USO DE ESTEROIDES ANDROGÊNICOS ANABOLIZANTES NO COMPORTAMENTO DA CARGA DE TREINAMENTO, COMPOSIÇÃO CORPORAL E MARCADORES BIOQUÍMICOS: RELATO DE CASO	
Rafael Bizarelo Ribeiro dos Santos; Raphael da Silva Lau; Omara Machado Araujo de Oliveira; Juliana dos Santos Vilar. DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2021.02-01	
CAPÍTULO II	30
BREVE REVISÃO BIBLIOGRÁFICA DAS ALGIAS LOMBARES E SUAS CORRELAÇÕES COM AS ATIVIDADES TRABALHISTAS	
Alexandre Jardim da Rosa DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2021.02-02	
CAPÍTULO III	64
CIRURGIA METABÓLICA COMO ALTERNATIVA AO TRATAMENTO DO DIABETES MELLITUS TIPO II NO PACIENTE PORTADOR DE OBESIDADE	
Eduarda Heringer Bernis; Ingridy Maria Diniz Melo Azevedo; João Arthur Rodrigues Barbosa; Elisa de Castro Correia; Mariana Didier Reis. DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2021.02-03	
CAPÍTULO IV	81
COLECISTITE ASSOCIADA A ÍLEO BILIAR: UM RELATO DE CASO	
Marina Gomes Silva Martins; Luiza Pires Miranda; Romullo V. Dutra Menezes; Lays Viana Freitas; Tassiana Soares Silva; Lucianno Viana Ribeiro; Vitor Hugo Neves Santos. DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2021.02-04	
CAPÍTULO V	88
COMPORTAMENTO BIOLÓGICO DE <i>Aedes albopictus</i> EM LABORATÓRIO	
John Layonn de Sousa Silva DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2021.02-05	

CAPÍTULO VI _____ **106**

DOENÇA FALCIFORME NA INFÂNCIA: CONHECIMENTO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Viviane Pereira Alves; Evelyne de Lourdes Neves de Oliveira;
Carla Lidiane Jácome dos Santos; Jael Rúbia Figueiredo de Sá França;
Eliane Cristina da Silva Buck.

DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2021.02-06

CAPÍTULO VII _____ **122**

FATORES DE RISCO ASSOCIADOS AO ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO EM USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Ana Karolyna da Silva Sena; Viviane Cordeiro de Queiroz;
Viviane Michele da Silva; Jackson Soares Ferreira;
Maria de Lourdes Vieira Lins.

DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2021.02-07

CAPÍTULO VIII _____ **139**

GÊNERO *LEISHMANIA*, VETORES NATURAIS E ASPECTOS CLÍNICOS INERENTES: UMA BREVE REVISÃO

José Ednésio da Cruz Freire; Lara Lys Santos Rocha;
José Gerardo Carneiro; Antônio Juscelino Sudário Sousa.

DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2021.02-08

CAPÍTULO IX _____ **155**

IDENTIFICAÇÃO *IN SILICO* DE FITOTERÁPICOS INIBIDORES DA MDR₁ NO CÂNCER DE PULMÃO DE CÉLULAS NÃO PEQUENAS

Fátima Morgana Pio Fonseca; Mayara Queiroz de Santiago;
Vanir Reis Pinto Júnior; José Gerardo Carneiro;
José Ednésio da Cruz Freire.

DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2021.02-09

CAPÍTULO X _____ **171**

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL COMO ESTRATÉGIA PARA O SUCESSO DE ESTUDANTES DE ALTA PERFORMANCE

Renato dos Santos Lisboa

DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2021.02-10

CAPÍTULO XI _____ **192**

MAPEAMENTO DOS NÚCLEOS DE TELESSAÚDE: UMA ANÁLISE DE SUA DISTRIBUIÇÃO NO CONTEXTO NACIONAL

Ana Cristina Carneiro Menezes Guedes; Carla Cardi Nepomuceno de Paiva;
Rosângela Caetano; Daniela Lacerda Santos;
Gizele da Rocha Ribeiro; Angélica Baptista Silva ;
Rondineli Mendes da Silva; Ione Ayala Gualandi de Oliveira;
Vanessa de Lima e Souza.

DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2021.02-11

CAPÍTULO XII _____ **207**

O TRIPÉ DO EMAGRECIMENTO: INTELIGÊNCIA EMOCIONAL, PRÁTICA ESPORTIVA E NUTRIÇÃO ALIMENTAR

Renato dos Santos Lisboa

DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2021.02-12

CAPÍTULO XIII _____ **225**

PERCEPÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E CAPACIDADE FUNCIONAL EM PACIENTES COM DOENÇA RENAL CRÔNICA SUBMETIDOS À HEMODIÁLISE

Ywia Danieli Valadares; Wander Valadares de Oliveira Júnior;
Thays Santos Mendonça; Hiago Antônio de Paula Coutinho;
Luana Aparecida Astéria de Oliveira; Maria Santa Azevêdo;
Stella Marina Silva Azevedo Araújo.

DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2021.02-13

CAPÍTULO XIV _____ **242**

POLIFARMÁCIA E SUAS IMPLICAÇÕES EM SEUS USUÁRIOS

Jairo de Freitas de Sousa; Anny Gabriele Pereira de Oliveira;
Fabrício Bezerra Eleres; Laisla Bonfati Rafael;
Lucas Duarte Silva; Maria Elane de Oliveira Dias Aires;
Romário Martins Romeiro Eugênio.

DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2021.02-14

CAPÍTULO XV **255**
POLÍTICAS PÚBLICAS NO ENFRENTAMENTO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS: UM OLHAR SOBRE A PRODUÇÃO DO CUIDADO A PARTIR DO PROGRAMA HIPERDIA

Juliana Latini Azevedo; Laura Nunes Oliveira Soares;
Maria Eduarda Bianchi Reis Guimarães; Jade de Paula Brum;
Paula Altoé Carvalho; Daniela Lacerda Santos;
Júlia Barcelos Poubel.
DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2021.02-15

CAPÍTULO XVI **266**
PROPEDEÚTICA DIAGNÓSTICA REFERENTE À ESCLEROSE MÚLTIPLA DESCRITAS NA LITERATURA

Matheus Alves de Souza; Miguel Pereira Goulart Neto;
Isadora Medrado Goulart; Natália Inácio Beltramini;
Ana Júlia Ferreira da Silva; Luana Martins Camilo;
Guilherme Henrique Pagliarani; Vinícius Lopes Imamura;
Matheus Scabini Fernandez; Lara Oliveira Soares;
Miriam Pardini Gomes.
DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2021.02-16

CAPÍTULO XVII **275**
RASTREAMENTO DO CÂNCER DE COLO DO ÚTERO: UMA ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E OUTRAS LOCALIDADES

Beatriz Henrique Correa Ferreira; Altever de Sá Vianna Filho;
Izabella Souza Garbelini; Calebe Lima de Brito;
Giovanna de Castro do Amaral Monteiro Prado; Daniela Lacerda Santos.
DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2021.02-17

CAPÍTULO XVIII **291**
SOROLOGIA PARA SÍFILIS: VDRL E FTA-ABS

Breno Pimentel Moraes Oliveira; Andre Luiz de Souza Silva;
Thiago Michael Ferreira Ibiapino; Gean Costa Nascimento;
Yan Alves Gramacho.
DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2021.02-18

CAPÍTULO XIX	298
VULNERABILIDADE E TRANSMISSIBILIDADE DE RECÉM-NASCIDOS E CRIANÇAS À INFECÇÃO POR SARS-COV-2	
Vitória Régia da Silva; Luanna Júlia Silva de Melo; Marcelo Sebastião Gomes; Bereneuza Tavares Ramos Valente Brasileiro. DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2021.02-19	
SOBRE OS ORGANIZADORES	309
SOBRE OS AUTORES	311
ÍNDICE REMISSIVO	324

CAPÍTULO I

A INFLUÊNCIA DO USO DE ESTEROIDES ANDROGÊNICOS ANABOLIZANTES NO COMPORTAMENTO DA CARGA DE TREINAMENTO, COMPOSIÇÃO CORPORAL E MARCADORES BIOQUÍMICOS: RELATO DE CASO

Rafael Bizarelo Ribeiro dos Santos¹; Raphael da Silva Lau²;
Omara Machado Araujo de Oliveira³; Juliana dos Santos Vilar⁴.
DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2021.02-01

RESUMO:

Os esteroides anabólicos androgênicos (EA), são substâncias sintetizadas a partir da testosterona e de substâncias quimicamente derivadas, possuindo diversas ações terapêuticas importantes. Entretanto, o efeito anabólico dos esteroides anabolizantes sobre o organismo despertou o interesse de muitos praticantes de atividade física, que começaram a utilizá-los para outros fins, principalmente, como recurso ergogênico. Porém, o uso indiscriminado desse tipo de substância pode acarretar diversas alterações endócrinas, bioquímicas e comportamentais. A carga interna consiste no conjunto de reações fisiológicas dos sistemas orgânicos, e pode ser refletida mediante parâmetros fisiológicos e bioquímicos e a baixa variabilidade de cargas. O objetivo deste trabalho foi avaliar o comportamento das cargas de treinamento, alterações antropométricas e bioquímicas após 9 semanas. Foi realizado um relato de caso, com amostra composta por um homem de 42 anos, treinado, sem uso de esteroides anabolizantes por 12 meses, que decidiu utilizar EA com acompanhamento médico. Para acompanhar o treinamento foram registradas as cargas internas e a carga total levantada. A composição corporal foi descrita pelo modelo de 2 componentes, e as medidas antropométricas através das referências da Sociedade Internacional para o Avanço da Cineantropometria (ISAK). Para acompanhamento do consumo alimentar foi realizado o recordatório de 24h e foram analisados exames bioquímicos antes e depois da intervenção no treinamento. Conclui-se que houve uma redução considerável da massa gorda e aumento da massa magra. No entanto, ao ser analisado o perfil bioquímico foi possível identificar um aumento considerável de marcadores de risco cardiovascular e inflamatório. Em relação a carga interna, foi verificado uma menor monotonia e carga de treino no microciclo recuperativo.

PALAVRAS-CHAVE: Treinamento de força. Esteroides anabolizantes. Carga de treinamento. Efeitos adversos.

¹ Centro Universitário IBMR. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3960357560142560>. E-mail: rafaelbizarelo@hotmail.com

² Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5498807572595356>. E-mail: raphael.lau@bol.com.br

³ Centro Universitário IBMR. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3130197710165363>. E-mail: omararj@gmail.com

⁴ Universidade Federal Fluminense. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7725981827500403>. E-mail: dravilar@yahoo.com.br

THE INFLUENCE OF THE USE OF ANABOLIZING ANDROGENIC STEROIDS ON THE BEHAVIOR OF THE TRAINING LOAD, BODY COMPOSITION AND BIOCHEMICAL MARKERS: CASE REPORT

ABSTRACT:

Anabolic androgenic steroids (EA), are substances synthesized from testosterone and chemically derived substances, having several important therapeutic actions. However, the anabolic effect of anabolic steroids on the body has aroused the interest of many practitioners of physical activity, who have started using them for other purposes, mainly as an ergogenic resource. However, the indiscriminate use of this type of substance can cause several endocrine, biochemical and behavioral changes. The internal charge consists of the set of physiological reactions of the organic systems, and can be reflected by physiological and biochemical parameters and the low charge variability. The objective of this work was to evaluate the behavior of training loads, anthropometric and biochemical changes after 9 weeks. A case report was carried out, with a sample composed by a 42-year-old man, trained, without using anabolic steroids for 12 months, who decided to use AE with medical monitoring. To monitor the training, internal loads and the total load lifted were recorded. The body composition was described by the 2-component model, and the anthropometric measurements through the references of the International Society for the Advancement of Cineanthropometry (ISAK). To monitor food consumption, the 24-hour recall was performed and biochemical tests were analyzed before and after the training intervention. It was concluded that there was a considerable reduction in fat mass and an increase in lean mass. However, when analyzing the biochemical profile, it was possible to identify a considerable increase in markers of cardiovascular and inflammatory risk. Regarding the internal load, less monotony and training load were observed in the recuperative microcycle.

KEYWORDS: Strength training. Anabolic steroids. Training load. Adverse effects.

INTRODUÇÃO

Os esteroides anabólicos androgênicos (EA), são substâncias sintetizadas a partir da testosterona e de substâncias quimicamente derivadas (NUNES et al, 2020). Os EA podem ser classificados da seguinte forma: esterificação do grupo 17β hidroxil, que compreendem o propionato e o cipionato de testosterona; ésteres de testosterona que podem ser convertidos em testosterona ou estrógeno, tais como a nandrolona; compostos alquilados, tais como o stanazolol (OBERLANDER; HENDERSON, 2012). Os EA podem ser utilizados para fins terapêuticos tais como: hipogonadismo, anemia falciforme, osteoporose, necessidade clínica de anabolismo proteico, sarcopenia em idosos, tratamento de distrofias musculares, problema na produção celular de medula óssea, entre outros (PIACENTINO et al, 2015).

Entretanto, o efeito anabólico dos esteroides anabolizantes sobre o organismo despertou o interesse de muitos praticantes de atividade física, que começaram a utilizá-los para outros fins, principalmente, como recurso ergogênico. A principal justificativa no uso de EA por esses usuários, justifica-se por fins estéticos, seguido por performance e, por último vinculado à saúde (SANZON; ALMEIDA; TORIANI, 2020).

Praticantes de treinamento resistido, normalmente, tem como objetivo a melhora na estética corporal, porém o uso se dá de forma indevida, visto que em geral é realizado sem acompanhamento médico, e com produtos de qualidade duvidosa (PEREIRA et al, 2020). Em um estudo realizado em Santa Catarina mostrou-se que o uso de EA em praticantes de treinamento resistido em academia nessa população teve uma representatividade bem elevada, visto dos participantes que responderam à pesquisa 77,8% dos homens e 53,9% das mulheres alegaram ter usado ou fazer uso dessas substâncias (SANZON; ALMEIDA; TORIANI, 2020).

O uso indiscriminado dessas substâncias pode contribuir para aumentar o risco de morte em seus usuários, que pode estar associado, principalmente, pelas alterações estruturais e funcionais (diretamente ou indiretamente) na musculatura cardíaca (NUNES et al, 2020). Em um estudo de pesquisadores suecos, verificou-se que os homens que utilizavam EA de forma não terapêutica, tinham o dobro de taxa de mortalidade e morbidade cardiovascular do que aqueles que não utilizavam (THIBLIN et al, 2015). O uso indiscriminado dessas substâncias pode levar também a alterações no eixo hipotálamo-hipófise-gonadal, influenciando diretamente na produção e secreção de gonadotrofinas e no perfil bioquímico geral. Em estudo realizado por Venâncio et al (2010) foi realizada a análise de algumas variáveis bioquímicas em pessoas que fizeram uso de EA e que praticavam treinamento resistido, com a apresentação de dois grupos: um grupo sedentário e outro treinado. Os usuários de EA tiveram uma redução significativa nos níveis dos hormônios luteinizante (LH) e folículo-estimulante (FSH) e elevação do estradiol quando comparado aos outros dois grupos, foi observado também uma redução significativa da lipoproteína de alta densidade (HDL) (VENÂNCIO et al, 2010).

Muitos trabalhos foram realizados e elucidam bem a influência do uso de anabolizantes esteroides na composição corporal e na capacidade física de humanos.

Porém poucos trabalhos investigaram o comportamento da carga interna do treinamento naqueles que faziam uso de esteroides anabolizantes em doses supra fisiológicas.

A carga interna consiste no conjunto de reações fisiológicas dos sistemas orgânicos, e pode ser refletida mediante parâmetros fisiológicos e bioquímicos (MONTEIRO; LOPES, 2015). Para avaliação da carga interna diversos parâmetros podem ser utilizados, como: perfil hormonal; concentração de metabólitos; frequência cardíaca e percepção subjetiva de esforço (PSE) (NAKAMURA; MOREIRA; AOKI, 2010). Nesse último, Foster (1998) validou e adaptou a PSE proposta inicialmente por Borg, propondo a quantificação da carga interna de treinamento, monotonia de treinamento e *strain*.

A baixa variabilidade de cargas, logo a maior monotonia, podem acabar reduzindo os efeitos do treinamento sobre o indivíduo, assim como causar efeitos negativos sobre ele, como, por exemplo, o *overtraining*, que por consequência poderá comprometer a saúde do indivíduo (FOSTER, 1998; DANTAS, 2016).

Uma vez que o padrão hormonal certamente influencia diretamente no treinamento resistido e capacidade física, a proposta deste trabalho foi observar o comportamento da carga interna frente a tarefa realizada, identificar alterações bioquímicas e na composição corporal.

MATERIAIS E MÉTODOS

ESTUDO DE CASO

A amostra é composta por um indivíduo do sexo masculino, 42 anos de idade, praticante de musculação há 20 anos, residente na cidade do Rio de Janeiro (RJ). O indivíduo teve como objetivo, a partir da utilização de EA, reduzir a massa gorda total e aumentar a massa muscular. O indivíduo relatou que tinha como alvo uma data comemorativa e, portanto, optou por iniciar um planejamento multidisciplinar para melhorar sua forma física. Esse planejamento, por sua vez, teve uma participação conjunta entre um professor de educação física e um médico endocrinologista, que ficaram responsáveis pelo treinamento e modulação hormonal, respectivamente.

O indivíduo fez administração intramuscular duas vezes por semana de 1 ml de acetato de trembolona, 1ml de masteron, e 1ml propionato de testosterona, uma vez por semana. O uso da substância foi iniciado uma semana antes da intervenção do treinamento. Antes disso, o indivíduo estava sem fazer uso de nenhuma substância ergogênica ou similar por pelo menos 12 meses.

No presente trabalho, o perfil bioquímico e nutricional foi realizado apenas de modo observacional descritivo, não tendo qualquer influência dos pesquisadores sobre as variáveis extra do treinamento.

PLANEJAMENTO E PERIODIZAÇÃO DO TREINAMENTO

Na variável do treinamento, foi utilizado uma periodização linear semelhante ao período básico de treinamento descrito por Dantas (2016), no qual consistiu em um microciclo introdutório, 4 microciclos ordinais, 2 microciclos de choque e 2 recuperativos. Na primeira semana foi realizado um microciclo introdutório, seguido por dois microciclos ordinais, um microciclo de choque, e um regenerativo. Após a semana regenerativa foi iniciado mais dois ordinais, seguido novamente por um microciclo de choque, finalizando com um microciclo regenerativo. Ao longo de nove semanas foram registradas 51 unidades de treino, na qual o sujeito treinava em média 6 vezes por semana.

Para o microciclo ordinal e introdutório, usamos na rotina de peito e costas, aliado ao método agonista-antagonista, com carga constante, com uma faixa de 12 repetições. Para a rotina de ombros, foi utilizado o método tradicional de cargas constante, em uma zona de 15 repetições. A rotina de membros inferiores seguiu o mesmo modelo da rotina de ombros.

Foram preferencialmente utilizados os exercícios multiarticulares, em comparação aos monoarticulares, por favorecerem o aumento da carga total levantada e maiores impactos metabólicos (BRIGATTO, 2019).

No microciclo de choque, foi realizado o modelo tradicional de cargas constantes, porém adicionou-se o método de Drop-set ao final da última série de cada exercício em todas as rotinas. O objetivo foi a intensificação do treinamento para promover

possivelmente maior sobrecarga biológica, o sujeito é submetido a realizar nova série se possível com o mesmo número de repetições até atingir a falha concêntrica (PRESTES et al, 2016).

No microciclo regenerativo, por sua vez, foi incluído o descanso ativo cardiopulmonar, introduzido no sistema de treinamento de super-circuito de cargas constantes e descanso ativo.

No quadro abaixo (quadro1), está descrito como foi a organização do treinamento. Os exercícios foram os mesmos em todos os microciclos.

Quadro 1. Rotina de treinamento de acordo com método estabelecido para cada caracterização do microciclo.

Rotina	Método		
	Ordinal	Choque	Recuperativo
Peito e Costas	Agonista-Antagonista	Drop-set	Super-Circuito
Ombro	Carga estável	Drop-set	Super-Circuito
Membros Inferiores	Carga estável	Drop-set	Super-Circuito

MONITORAMENTO DA CARGA DE TREINAMENTO

Após 30 minutos do término da sessão de treinamento, o avaliado foi perguntado sobre a sua percepção de esforço com a seguinte pergunta: "Olhando para este quadro, qual foi a sua percepção de esforço percebida durante o treino?" O avaliado, por sua vez, respondeu indicando no quadro supracitado. Após a coleta do valor indicado, foi coletado também o volume de treinamento em minutos.

Posteriormente os dados foram agrupados em uma planilha onde também foram tratados. O valor do PSE e o volume de treinamento foram multiplicados, e a partir do produto dessa multiplicação temos a carga interna de treinamento em unidades arbitrárias (UA). Para o cálculo da monotonia do treinamento, utilizou-se a média das UA verificadas durante as semanas dividido pelo seu desvio padrão, assim como proposto por Foster (1998).

Para o monitoramento da carga externa, foi admitido o cálculo básico de carga total levantada, que consiste em multiplicar as séries, repetições e carga erguida (série x repetições x carga).

COMPOSIÇÃO CORPORAL

Para avaliação da composição corporal, foi adotado o modelo de dois compartimentos de massa corporal (massa magra e massa gorda). A partir do protocolo de Guedes (1985), consideram-se as dobras cutâneas subescapular, tricipital, abdômen vertical, supra ilíaca e axilar média para cálculo do percentual de gordura. No que diz respeito a perimetria, assim como proposto pela Sociedade Internacional para o Avanço da Cineantropometria (ISAK) (2011), admitiu-se o perímetro de cintura como o ponto mais estreito entre a margem costal inferior e parte superior da crista ilíaca, perpendicular ao tronco (eixo longitudinal).

Para comparação, esses dados foram coletados um dia antes do início do programa de treinamento, e um dia após o término do estudo.

AValiação DO CONSUMO ALIMENTAR E EXAME BIOQUÍMICO

Para avaliação do consumo alimentar foi utilizado o recordatório de 24 horas. Foram coletados dados referentes a dois dias da semana não consecutivos e um dia no final de semana. Foi admitido o valor médio de consumo desses três dias. O recordatório consiste em uma descrição bem detalhada do consumo alimentar (descrita pelo avaliado) do dia anterior (MCARDLE; KATCH, F.I.; KATCH, V.L., 2016).

A avaliação bioquímica utilizada foi a mesma requerida pelo responsável médico. Neste, utilizamos as referências do momento pré e pós utilização de esteroides anabolizantes, a fim de comparação. As variáveis incluídas foram: testosterona total, lipoproteína de baixa densidade (LDL), HDL, colesterol total, creatinofosfoquinase (CPK), FSH e LH.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As médias das cargas de treinamento tanto interna quanto externa são apresentadas na tabela 1. A média mais alta da carga interna foi observada no treino de peito e costas no microciclo de choque, e a mais baixa foi no microciclo recuperativo na rotina de ombros. Em relação a carga externa (carga total levantada), a média mais alta registrada na rotina de membros inferiores na semana de choque, e a mais baixa foi observada no microciclo recuperativo de ombros.

Em relação as cargas totais tanto a interna quanto a carga total levantada foram superiores na semana de choque, o que caracteriza de fato a sobrecarga. A carga total mais baixa foi observada no microciclo recuperativo, o que corresponde ao objetivo da implementação desse microciclo.

Tabela 1. Média das Cargas externa e Cargas interna para cada classificação do microciclo.

Rotina	Ordinal		Choque		Recuperativo	
	Média	DP	Média	DP	Média	DP
Carga Total Levantada (t)						
Peito e costas	8,59	3,10	14,27	0,67	6,91	1,46
Ombro	3,93	1,45	6,340	1,12	2,99	0,20
Membros inferiores	9,10	3,33	16,63	0,11	6,02	3,46
Total	7,21	2,85	12,43	5,36	5,31	2,05
Carga Interna (UA)						
Peito e costas	288,18	119,22	379	207,52	172	134,22
Ombro	231,09	91,31	341,67	161,58	111,4	74,92
Membros inferiores	231,73	91,47	325	219,32	121,25	25,29
Total	250,33	32,78	348,56	27,65	134,88	32,52

*DP = desvio padrão; t = toneladas de força; UA = carga arbitrária.

Em relação a carga total levantada, a média encontrada no microciclo de choque se assemelha com os indivíduos que realizam o treinamento personalizado. Em estudo de Lopes et al (2020), eles encontraram um valor médio 12535kgf e no presente trabalho foi encontrado 12432kgf. Nesse mesmo estudo, foi verificado uma carga total levantada média de 9618kgf para os indivíduos sem supervisão, a carga que mais se aproxima é a média do microciclo ordinal que é de 7210kgf (diferença de 2408kg). Porém, vale ressaltar que a média de idade do estudo de Lopes et al é muito inferior ao do sujeito estudado, com uma diferença de 23 anos.

A carga interna na semana ordinal total média foi semelhante ao encontrado na carga interna média do treinamento de musculação apresentado por jogadores de vôlei (FARIA et al, 2020), porém com uma diferença de 8,27 UA entre os estudos. Já a carga interna média apresentada no microciclo de choque foi similar ao encontrado em atletas semiprofissionais de rugby em uma semana de treinamento de carga normal (COUTTS et al, 2007) com uma diferença de 16.5 UA entre os estudos.

Cabe ressaltar, que o treinamento de característica ordinal contou com uma carga semanal média de 9,16km de corrida leve. O treinamento de característica de choque apresentou uma média semanal de 6,08km e o treinamento recuperativo de 14,2km de trote leve. O aumento do volume de treinamento na semana recuperativa pode ser justificado pela característica do método de super-circuito (circuito de ação cardiovascular), que consiste em realizar o descanso de modo ativo, o que contribuiria para o aumento da quilometragem percorrida (PRESTES et al, 2016).

Na tabela 2, foram apresentadas as cargas de treinamento semanal, tanto interna quanto carga total levantada. É possível identificar o comportamento nas duas primeiras semanas de treinamento, onde a carga externa é aumentada e a carga interna também. No entanto, pode-se observar que na terceira semana, a carga interna diminuiu mesmo com o aumento da carga externa. Em estudo recente realizado por Barbosa et al (2021), foi demonstrado que indivíduos treinados podem aumentar a carga total levantada por volta de 9% na segunda semana após o início de uma intervenção planejada. No presente trabalho encontramos um aumento de 6,5%, o que demonstra que o indivíduo evoluiu no progresso das cargas conforme o esperado.

Na quarta semana houve a sobrecarga através do microciclo de choque, onde observamos a maior carga interna semanal registrada e a segunda maior carga total levantada. O primeiro microciclo regenerativo foi realizado na quinta semana, onde foi reduzido 50,5% da carga total levantada comparado a carga de choque da quarta semana. Consequentemente observou-se também uma queda considerável na carga interna (queda de 53,8%). Essa carga foi similar a primeira carga interna regenerativa apresentada por um dos indivíduos (sujeito A) praticante de crossfit apresentado no trabalho de Tibana, Sousa e Prestes (2017).

Na sexta semana foi realizado uma carga ordinal, onde mesmo com o aumento da carga externa se comparado a semana 1 e 2 apresentou valores menores de carga interna. Isso pode ser justificado pelo descanso ativo da semana recuperativa.

Na sétima semana foi planejado uma nova carga ordinal, porém o sujeito investigado por motivos profissionais teve que se ausentar 3 dias do treinamento, o que culminou em uma carga geral semanal baixa.

Tabela 2. Carga de treinamento semanal avaliada pelo método PSE e Volume total.

	Carga interna I(UA)	Carga total levantada (t)
Semana 1 (Introdutório)	1887	43,96
Semana 2	1970	46,82
Semana 3	1621	50,3
Semana 4 (sobrecarga)	2294	62,56
Semana 5 (regenerativo)	1061	31
Semana 6	1301	47,8
Semana 7*	753	19,81
Semana 8 (sobrecarga)	2062	73,4
Semana 9 (regenerativo)	841	38,74
Carga Média	1532,22	46,04
Carga total	13790	414,39

*Semana 7 o indivíduo ausentou-se por 3 dias do treinamento por motivos profissionais.

A maior carga externa registrada foi na oitava semana, onde foi registrado uma carga de 73,4 toneladas. No entanto, a carga interna foi inferior à quinta semana (choque). É possível justificar esse resultado pela diminuição da carga de treinamento da 7ª semana, o que proporcionou ao indivíduo uma recuperação prolongada dos sistemas fisiológicos, impactando diretamente sobre a sua percepção de esforço. Na última semana (9ª) foram registradas cargas internas e externas similares a semana 5, compatível ao microciclo regenerativo.

A carga de treinamento interna semanal média apresentada nesse trabalho varia apenas 279,7 cargas arbitrárias da média da carga interna dos dois sujeitos apresentados no estudo de Tibana, Sousa e Prestes (2017). Todavia, o valor semanal total da carga interna do microciclo recuperativo assimilou-se aos encontrados nas aulas pré-formatadas de Les Mills pelo estudo de Fonseca et al (2014).

Em relação a carga interna de treinamento, conforme verificado no gráfico 1, foi possível verificar uma baixa monotonia de treinamento nas semanas regenerativa (5ª e 9ª) e na semana ‘ordinal’ em que o sujeito se ausentou por 3 dias (7ª semana). É interessante ressaltar que as semanas com a menor monotonia (média 1,27) também foi a menor para carga interna.

Gráfico 1. Média da carga interna de treinamento a partir do PSE, e monotonia para cada semana.

Nas semanas de característica ordinal (exceto a 7ª semana) foram registradas cargas intermediárias e um alto nível de monotonia (média de 2,07). As semanas de choque (4ª e 8ª) apresentaram as maiores cargas internas, e níveis intermediários de monotonia (média de 1,86).

No estudo de Tibana, Sousa e Prestes (2017), um dos sujeitos (sujeito B) apresentou a menor monotonia na semana regenerativa. Desconsiderando a semana 7, esse fato também foi apresentado pelo sujeito avaliado em nosso trabalho. Curiosamente, na semana sete do estudo supracitado, um dos indivíduos (sujeito A) apresentou doença respiratória do trato superior e consequentemente tanto a carga interna quanto a

monotonia foram bem baixas. No presente estudo o volume de treinamento teve que ser reduzido por motivos profissionais, assimilando-se as respostas visualizadas no sujeito A.

Em relação ao consumo alimentar, foi verificado uma dieta hipocalórica e hiper proteica, conforme tabela 3.

Tabela 3. Distribuição de macronutrientes e energia consumida.

Distribuição de Energia		
	g	%
Carboidratos	226,68	43,93%
Proteína	148,06	28,69%
Lipídeos	53,92	23,50%
	2064,5	
Energia (kcal)	2	-

Ao considerar o gasto calórico basal de acordo com a superfície corporal e nível metabólico pelo modelo de McArdle, Katch F.I. e Katch V.L. (2016), este seria equivalente ao valor de 1953kcal. Para o gasto energético aproximado para as atividades diárias e exercício físico, de acordo com a tabela proposta por Willians (2002), temos mais 947kcal. Totalizando 2900kcal de gasto total médio diário.

Seguindo esse raciocínio, ele apresentava um déficit diário de 836kcal. De acordo com McArdle, Katch F.I. e Katch V.L. (2016), 3500kcal de déficit calórico representam menos 0,45kg de gordura corporal armazenada (teoricamente). Pensando em uma constante de metabolismo (o que geralmente não ocorre) e desconsiderando as flutuações da carga de treinamento e do uso de hormônios esteroides, ao longo dessas 9 semanas haveria um déficit total de 52,67kcal que representaria um valor de 6,77kg a menos de gordura apresentada.

A estimativa de perda de gordura a partir do método de antropometria foi similar ao suposto no início da pesquisa em que o valor teórico encontrado foi de 6,33kg.

Na tabela 4 é possível verificar a influência dessas 9 semanas na composição corporal e nas variáveis bioquímicas. Foi possível observar, uma redução de 29,7% da

massa gorda total, e um aumento de 2,87% na massa corporal magra. Houve também uma redução considerável no somatório de 8 dobras cutâneas e no perímetro de abdômen.

Como é possível observar, houve uma queda considerável nos hormônios gonadotróficos (LH e FSH), possivelmente devido ao efeito de feedback negativo no eixo hipotálamo-hipófise, causado pelos altos níveis de testosterona. A administração exógena de EA suprime o eixo Hipotálamo-hipófise-gonadal, tornando a recuperação mais longa quando a administração é supra fisiológica. A situação, porém, é reversível com a interrupção do consumo (ROCHA; AGUIAR; RAMOS, 2014).

Tabela 4. Comparação das variáveis antropométricas e bioquímicas no momento antes e depois da periodização e concomitante utilização de anabolizantes esteroides androgênicos.

Variáveis	Pré	Pós	Diferença
Bioquímicas			
Testosterona total	599ng/dL	1849ng/dL	+1250ng/dL
FSH	2, 4mIU	0,3mIU	-2,1mIU
LH	2,7mUI	0,1mUI	-2,6mUI
CPK	273U/L	709U/L	+436U/L
LDL	124mg/dL	308mg/dL	+184mg/dL
HDL	40mg/dL	29mg/dL	-11mg/dL
Colesterol total	182mg/dL	359mg/dL	+177mg/dL
Antropométricas			
Massa total	94,3kg	90,1kg	-4,2kg
Massa magra	73,1kg	75,2kg	+2,1kg
Massa gorda	19kg	13,6kg	-6,3kg
IMC	29,1	27,8	-1,3
Somatório de DC	147,2mm	89,8mm	-57,4mm
Perímetro de Abdômen	96,5cm	88,5cm	-8cm

Os resultados encontrados no estudo de Souza Junior (2017) para o LH e FSH, é similar ao verificado no presente relato de caso. No estudo citado, foi observado que indivíduos que utilizavam EA (com diferentes combinações) tinham o valor reduzido próximo a zero para hormônios LH e FSH após 45 dias da administração dessas substâncias.

De acordo com Achar, Rostamian e Narayan (2010), anormalidades no HDL e LDL podem surgir dentro de 9 semanas da administração de anabolizantes.

No presente estudo, verificou-se que no HDL foi observado uma alteração abaixo do nível recomendado, o que pode comprometer a proteção cardiovascular que essa lipoproteína oferece ao coração (MCARDLE; KATCH, F.I.; KATCH, V.L., 2016). Um estudo comparou parâmetros bioquímicos entre um grupo usuário de EA e outro sem uso, verificou que a média do HDL sérico do grupo usuário era estatisticamente menor quando comparada ao grupo não usuário (SEVERO et al, 2013). A média do grupo não usuário se aproxima aos valores encontrados no sujeito estudado antes da administração dos EA (diferença de 2mg/dL com a média). Após o uso dos EA o sujeito avaliado nesse estudo apresentou valores de HDL próximos aos dos sujeitos usuários dessa substância encontrado no estudo de Severo et al (diferença de 8mg/dL com a média). Os valores achados no presente estudo para HDL se assemelham também com o estudo clássico de Lenders et al (1988) que investigou o efeito deletério dos esteroides anabolizantes nas lipoproteínas séricas.

Em relação ao LDL, foi verificado um aumento na concentração sanguínea de 184mg/dL se comparado ao valor apresentado no momento pré administração. Um estudo de revisão analisou 49 artigos relacionando o efeito sobre o sistema cardiovascular ao uso abusivo de EA, e concluiu que em média o uso dessas substâncias eleva em 20% as concentrações séricas de LDL (ACHAR; ROSTAMIAN; NARAYAN, 2010). Em contraste, o presente relato de caso reportou um aumento bem superior a 20%, o que pode ser posteriormente prejudicial ao indivíduo. Em relação ao colesterol total, foi verificado também um aumento considerável e perigoso para saúde cardiovascular.

CONCLUSÃO

Foi verificado nesse estudo um comportamento similar entre a carga interna e a carga total levantada, porém ao longo das semanas essa similaridade foi sendo cada vez menor. A menor monotonia registrada foi nos microciclos regenerativos, a maior monotonia foi nas semanas de característica ordinal de cargas intermediárias, e no

microciclo de choque obtivemos as maiores cargas e uma monotonia de treinamento intermediário.

O sujeito apresentou uma dieta hipocalórica com alto consumo de proteínas. De acordo com a ingestão alimentar e gasto energético total, foi estipulado o valor teórico de perda de massa gorda ao longo das 9 semanas, que foi similar ao que de fato o sujeito perdeu.

Em relação ao exame bioquímico pode-se dizer que houve um aumento dos marcadores de risco cardiovascular, o que pode comprometer a saúde do sujeito a longo prazo. Houve também um aumento do perfil inflamatório. Foi observada uma redução considerável da massa gorda total e perímetro de abdômen concomitante ao aumento da massa muscular.

REFERÊNCIAS

ACHAR, S.; ROSTAMIAN, A.; NARAYAN, S.M. Cardiac and metabolic effects of anabolic-androgenic steroid abuse on lipids, blood pressure, left ventricular dimensions, and rhythm. **The American journal of cardiology**, v. 106, n. 6, p. 893-901, 2010.

BARBOSA, P.H. et al. Volume de séries em 2 microciclos altera padrão de carga, percepção de fadiga, recuperação, bem-estar e prazer em sujeitos treinados? **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 2, p. 17501-17517, 2021.

BRIGATTO, F.A. et al. Comparação entre a carga total levantada e o lactato sanguíneo em resposta as sessões de exercício de força executadas com exercício multiarticular e monoarticular em homens treinados. **RBPFE-Revista Brasileira De Prescrição E Fisiologia Do Exercício**, v. 13, n. 88, p. 1354-1360, 2019.

COUTTS, A.J. et al. Monitoring for overreaching in rugby league players. **European journal of applied physiology**, v. 99, n. 3, p. 313-324, 2007.

DANTAS, E.H.M. A prática da preparação física. SP, Roca, 6.ed. 2016.

FARIA, B.S.H. et al. Comparação da carga de treinamento de atletas profissionais entre modos de treinos específicos do voleibol e de força. **Journal of Physical Education**, v. 31, 2020.

FONSECA, A.C. et al. Carga interna de treinamento em diferentes aulas pré-formatadas do sistema Les Mills. **Revista Brasileira de Ciência e Movimento**, v. 22, n. 3, p. 82-88, 2014.

FOSTER, C.A.R.L. Monitoring training in athletes with reference to overtraining syndrome. **Medicine and science in sports and exercise**, v. 30, n. 7, p. 1164-1168, 1998.

GUEDES, D.P. Estudo da gordura corporal através da mensuração dos valores de densidade corporal e da espessura de dobras cutâneas em universitários. **Kinesis**, v. 1, n. 2, 1985

LENDERS, J.W.M. et al. Deleterious effects of anabolic steroids on serum lipoproteins, blood pressure, and liver function in amateur body builders. **International journal of sports medicine**, v. 9, n. 01, p. 19-23, 1988.

LOPES, C.R. et al. Sessão de treinamento de força supervisionada aumenta a carga total levantada e as respostas subjetivas em sujeitos treinados. **Journal of Physical Education**, v. 31, 2020.

MCARDLE, W.D.; KATCH, F.I.; KATCH, V.L. **Nutrição para o esporte e exercício**. Grupo Gen-Guanabara Koogan, 2016.

MONTEIRO, A.; LOPES, C. **Periodização esportiva** – Estruturação do treinamento. São Paulo- SP, AG Editora, 2015.

NAKAMURA, F.Y.; MOREIRA, A.; AOKI, M.S. Monitoramento da carga de treinamento: a percepção subjetiva do esforço da sessão é um método confiável. **Journal of physical education**, v. 21, n. 1, p. 1-11, 2010.

NUNES, A.C.C.A. et al. Efeitos indiscriminado do uso de esteroides anabólicos androgênico no sistema cardiovascular. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 12, p. 101229-101240, 2020.

OBERLANDER, J.G.; HENDERSON, L.P. Corticotropin-releasing factor modulation of forebrain GABAergic transmission has a pivotal role in the expression of anabolic steroid-induced anxiety in the female mouse. **Neuropsychopharmacology**, v. 37, n. 6, p. 1483-1499, 2012.

PEREIRA, M.C.A. et al. Análise do perfil de praticantes de musculação usuários de esteroides anabolizantes do município de Campinas-SP e baixa mogiana. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 5, p. 32668-32676, 2020.

PIACENTINO, D. et al. Anabolic-androgenic steroid use and psychopathology in athletes. A systematic review. **Current neuropharmacology**, v. 13, n. 1, p. 101-121, 2015.

PRESTES, Jonato et al. **Prescrição e periodização do treinamento de força em academias** (2a edição revisada e atualizada). Editora Manole, 2016.

ROCHA, M.; AGUIAR, F.; RAMOS, H. O uso de esteroides androgênicos anabolizantes e outros suplementos ergogênicos—uma epidemia silenciosa. **Revista Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo**, v. 9, n. 2, p. 98-105, 2014

SANZON, G.F.; ALMEIDA, P.H.F.; TORIANI, S.S. Efeitos decorrentes do uso de anabolizantes em praticantes de musculação. **Redes-Revista Interdisciplinar do IELUSC**, n. 2, p. 119-128, 2020.

SEVERO, C.B. et al. Increased atherothrombotic markers and endothelial dysfunction in steroid users. **European journal of preventive cardiology**, v. 20, n. 2, p. 195-201, 2013.

SOUZA JUNIOR, E.L. **Avaliação de parâmetros bioquímicos, hormonais e variabilidade da frequência cardíaca em indivíduos que fizeram uso de esteróides anabólicos de maneira recreativa.** 2017.

THIBLIN, I. et al. Anabolic steroids and cardiovascular risk: a national population-based cohort study. **Drug and Alcohol Dependence**, v. 152, p. 87-92, 2015.

TIBANA, R.A.; SOUSA, N.M.; PRESTES, J. Quantificação da carga da sessão de treino no Crossfit® por meio da percepção subjetiva do esforço: um estudo de caso e revisão da literatura. **Rev bras ciênc mov**, v. 25, n. 3, p. 5-13, 2017.

VENÂNCIO, D.P. et al. Avaliação descritiva sobre o uso de esteroides anabolizantes e seu efeito sobre as variáveis bioquímicas e neuroendócrinas em indivíduos que praticam exercício resistido. **Revista Brasileira de Medicina do Esporte**, v. 16, n. 3, p. 191-195, 2010.

WILLIAMS, M.H. **Nutrição para saúde, condicionamento físico e desempenho esportivo.** Manole, 2002.

CAPÍTULO II

BREVE REVISÃO BIBLIOGRÁFICA DAS ALGIAS LOMBARES E SUAS CORRELAÇÕES COM AS ATIVIDADES TRABALHISTAS

Alexandre Jardim da Rosa⁵

DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2021.02-02

RESUMO:

O trabalho é uma das atividades mais antigas desempenhadas pelo ser humano, permitindo o desenvolvimento da prosperidade e das relações sociais entre os povos. Contudo, apesar de tais benefícios, especialmente desde a consolidação do sistema capitalista e seus processos de trabalho repetitivo, uma série de doenças físicas e psicossociais relacionadas à atividade laboral vem sendo observadas. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (O.I.T), cerca de 160 milhões de indivíduos são acometidos por algum tipo de agravo de saúde cuja origem é ocupacional, destacando-se as Lesões por Esforço Repetitivo (LER) e os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT). Esta pesquisa, do tipo revisão integrativa da literatura, visa ilustrar um dos principais fatores no Brasil e no mundo de absenteísmo entre os trabalhadores braçais, o conceito de doenças Ocupacionais Relacionadas ao trabalho é novo, porém merece atenção especial, pois influencia cronicamente o trabalhador, uma vez que a lombalgia está neste contexto, a relevância com os mecanismos de lesão deve ser estudado, pois existe grande variedade de técnicas e tratamentos referentes a esta patologia.

PALAVRAS-CHAVE: LER. DORT. Lombalgia ocupacional. Saúde do trabalhador.

BRIEF BIBLIOGRAPHIC REVIEW OF LUMBAR ALGIAS AND THEIR CORRELATIONS WITH LABOR ACTIVITIES

ABSTRACT:

The work is one of the oldest activities performed by humans, enabling the development of prosperity and social relations between people. However, despite these benefits, especially since the consolidation of the capitalist system and its repetitive work processes, a series of physical and psychosocial illnesses related to labor activity has been observed. According to the International Labour Organization (ILO), about 160 million people are affected by some kind of health problem whose origin is occupational, especially the injuries Repetitive Strain (RSI) and Work-Related Musculoskeletal Disorders (MSDs). This research, the type integrative literature review, aims to illustrate one of the main factors in Brazil and in the world of absenteeism among laborers, the concept of Occupational related to occupational diseases is new, but deserves special

⁵ Pós-graduado em Fisioterapia nas Disfunções Biomecânicas e Posturais pela Faculdade Einstein – Facei. E-MAIL: alexandre.fisio1973@gmail.com

attention because chronically influences the worker, since the LBP is in this context, the relevance to the mechanisms of injury should be investigated because there is a great variety of techniques and treatments related to this pathology.

KEYWORDS: RSI. MSDs. Occupational low back pain. Worker's health.

INTRODUÇÃO

Uma das atividades mais antigas e fundamentais exercidas pelo ser humano, o trabalho permitiu o desenvolvimento das sociedades, estreitando laços sociais e facilitando o estabelecimento de melhores e mais prósperas condições de vida. Por outro lado, as atividades laborais também incrementaram a exposição do homem a riscos relacionados ao ambiente de trabalho e suas possíveis consequências sobre a saúde física e mental do trabalhador (RODRIGUES et al., 2013; GONTIJO et al., 2012; FREITAS, LUNARDI FILHO, LUNARDI, FREITAS, 2009).

Especialmente com o advento do sistema capitalista e seus processos de trabalho repetitivo, houve incremento na incidência de acidentes e de enfermidades relacionadas à atividade profissional. Tal fenômeno, contudo, corresponde a um fenômeno recente na História, sendo constatado pela primeira vez em 1717 por Ramazini. E é apenas em meados do século XX que doenças ocupacionais começam a ser objeto de investigação de diferentes países. No Brasil, tais questões começam a ser levantadas apenas nos anos 1970, uma vez que em 1972 o Brasil foi o campeão mundial de acidentes de trabalho (RODRIGUES et al., 2013, MARTINS, FELLI, 2013, CÉLIA, 2003).

De acordo com a OIT, aproximadamente 160 milhões de pessoas sofrem algum tipo de agravo de saúde relacionado ao trabalho, destacando-se os distúrbios osteomusculares, como as Lesões por Esforço Repetitivo (LER) e os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT), os quais são um conjunto heterogêneo de problemas funcionais e/ou orgânicos, podendo ocorrer de modo simultâneo ou não e apresentando um amplo e variado quadro clínico (FREITAS, LUNARDI FILHO, LUNARDI, FREITAS, 2009).

Além das LER e DORT, outro agravo de saúde relacionado ao trabalho é a lombalgia ocupacional, a doença ocupacional mais antiga conhecida pela literatura.

Basicamente, a lombalgia corresponde a uma dor aguda ou crônica nas regiões lombar ou sacral, relacionando-se ou não a entorses e distensões musculares, deslocamento do disco intervertebral e outras condições (BORGES et al., 2012).

Os fatores de risco relacionados à lombalgia incluem falta de atividade física, obesidade, manutenção de postura estática, falta de desenvolvimento muscular e até mesmo questões psicológicas e sociais (DIAS, GODOI, ALMEIDA, 2003).

A lombalgia ocupacional, sua definição, causas e métodos de tratamento e prevenção, é objeto de estudo desta pesquisa, de tipo descritivo-exploratória e elaborada por meio de uma revisão integrativa da literatura, objetivando discutir diferentes conceitos, aspectos relevantes e formas de tratamento da lombalgia ocupacional.

AGRAVOS OCUPACIONAIS: BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO

O advento e desenvolvimento do sistema capitalista favoreceram a intensificação dos processos produtivos, ampliando jornadas de trabalho e agravando a carga trabalhista, permitindo o aumento da incidência de enfermidades relacionadas à atividade laboral, simultaneamente favorecendo a ocorrência de acidentes capazes de impedir temporária ou permanentemente o trabalho do indivíduo em questão. Esse fato corresponde, por outro lado, a uma evidência relevante da relação causal entre saúde e trabalho (RODRIGUES et al., 2013; MARTINS, FELLI, 2013).

O trabalho repetitivo remonta há aproximadamente duzentos anos, conforme ocorreu em 1717, com Ramazini, o qual constatou que movimentos bruscos e violentos, assim como posturas inadequadas e práticas incorretas de trabalho caracterizavam-se como fatores especialmente relevantes para a incidência de problemas à então denominada “máquina vital”. Atualmente, tal conceito do organismo humano é considerado ultrapassado. Contudo, essa perspectiva mecanicista do homem ainda é bastante forte no que tange ao trabalho repetitivo (FREITAS, LUNARDI FILHO, LUNARDI, FREITAS, 2009). Em 1891, Fritz de Quervain, ao observar lavadeiras que se queixavam de dores frequentes, constatou que a tenossinovite do polegar manifestada nas lavadeiras poderia estar associada à prática de lavar roupas, levando-o a denominar

tal enfermidade de “entorse das lavadeiras” (RODRIGUES et al., 2013; FREITAS, LUNARDI FILHO, LUNARDI, FREITAS, 2009).

O Japão foi um dos países pioneiros a dar a devida relevância às enfermidades laborais, reconhecendo-as desde a década de 1960 e estabelecendo o Comitê da Associação Japonesa de Saúde Ocupacional. No Brasil, essa tipologia de problema de saúde foi observada inicialmente nos anos 1960, com destaque na década seguinte, quando, no ano de 1972 o Brasil foi considerado o campeão mundial de acidentes de trabalho (CÉLIA, 2003). Na década de 1980 profissionais que utilizavam computadores também foram observados, levando ao seu reconhecimento como problema ocupacional pela Norma Técnica para Perícia Médica do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que passou a considerar tal enfermidade como questão de saúde pública (RODRIGUES et al., 2013).

Em âmbito nacional, os primeiros passos para a criação de uma política de saúde do trabalhador foram o estabelecimento da primeira Lei do Trabalho em 1919, a Consolidação das Leis do trabalho (CLT) em 1944, a Constituição Federal de 1988, a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) em 1990 e as três Conferências Nacionais de Saúde do Trabalhador (SCUSSIATO et al., 2010). Em 1997 houve um aumento significativo na quantidade de enfermidades relacionadas a fatores ocupacionais (CÉLIA, 2003).

Outros fatos marcantes para a proteção da saúde do trabalhador são, em 2002, a promulgação da Portaria nº 1.679, que trata da estruturação da rede nacional e atenção integral à saúde do trabalhador (RENAST) e, em 2005, pela Portaria nº 2.437, que aprofundou a RENAST, marcando o estabelecimento de uma política de estado mais adequada e ampliada, favorecendo os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CERESTS), além de incluir iniciativas de saúde do trabalhador na atenção básica e implementando iniciativas de vigilância e promoção em saúde do trabalhador (SCUSSIATO et al., 2010).

A saúde do trabalhador pode ser tratada como o conjunto de medidas, entre as quais ações de vigilância epidemiológica e sanitária, voltado para a promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como à reabilitação de profissionais submetidos aos

agravos provindos pelo ambiente e processos laborais, assistindo o profissional que foi vítima de acidente de trabalho ou que se tornou portador de uma enfermidade de origem laboral (SCUSSIATO et al., 2010).

Neste sentido, a Vigilância em Saúde do Trabalhador (VST) funciona como paradigma para o estabelecimento de ações em saúde do trabalhador no SUS, uma vez que ela permite que problemas de saúde advindos do meio profissional sejam prevenidos, detectados, reconhecidos, pesquisados, a fim de que medidas de controle, prevenção e avaliação dos serviços sejam implementados continuamente (SCUSSIATO et al., 2010).

Para que a VST alcance efetividade, foram adicionados 11 problemas de saúde relacionados à atividade profissional ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN-NET), coletando, transmitindo e publicando informações geradas continuamente no Sistema de Vigilância Epidemiológica nos três âmbitos governamentais, utilizando amplo sistema informatizado, auxiliando o processo de investigação das informações relacionadas à vigilância epidemiológica de enfermidades de notificação compulsória. O SINAN foi estabelecido em 1993 e regulamentada em 1998 por meio da Portaria Funasa/ MS nº 073 de 9/3/1998, passando a ser alimentado por todas as esferas governamentais e também pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) (SCUSSIATO et al., 2010).

O SINAN-NET auxilia a análise de problemas ocupacionais, a Portaria GM/MS nº 777, são agravos de notificação compulsória: acidente de trabalho fatal ou com mutilações, acidente com material biológico, acidentes que envolvam crianças e/ou adolescentes, dermatoses ocupacionais, intoxicações exógenas (decorrentes de substâncias químicas, tais como agrotóxicos, gases tóxicos e metais pesados), lesões por esforços repetitivos (LER), distúrbios osteomoleculares relacionados ao trabalho (DORT), pneumoconioses, perda auditiva induzida por ruído (PAIR), transtornos mentais relacionados à atividade laboral e câncer relacionado à atividade profissional (SCUSSIATO et al., 2010).

DISTÚRBIOS OSTEOMUSCULARES RELACIONADOS AO TRABALHO: LER E DORT

Quanto aos distúrbios osteomusculares, atualmente estes correspondem aos problemas relacionados ao trabalho com maior incidência, em países com diferentes perfis de desenvolvimento econômico

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) estima que anualmente aproximadamente 160 milhões de pessoas são acometidas por doenças de ordem laboral não transmissíveis, das quais cerca de 2 milhões de trabalhadores morrem. Neste sentido, nota-se que enfermidades de ordem ocupacional constituem um problema importante de saúde pública no mundo atual. Entre tais agravos à saúde, destacam-se as ocasionadas por esforços repetitivos, sendo conhecidos no Brasil como Lesões por Esforços Repetitivos (LER) e, posteriormente, como Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) (FREITAS, LUNARDI FILHO, LUNARDI, FREITAS, 2009).

As Lesões por Esforços Repetitivos – LER e as Doenças Osteomoleculares Relacionadas ao Trabalho – DORT correspondem a uma categorização de enfermidades laborais que afetam músculos, fáscias musculares, tendões, articulações, nervos, vasos sanguíneos e tegumento, e frequentemente acarretam dor e invalidez, sendo a maior causa de compensações por absenteísmo no trabalho em diversos países. Essas afecções representam o grupo mais significativo de agravos à saúde quanto às doenças ocupacionais. No Brasil, sua incidência cresceu de modo significativo a partir da década de 1980, tornando-se um grave problema de saúde pública, ocasionando consequências no âmbito econômico brasileiro (GONTIJO et al., 2010; MARTINS, FELLI, 2013).

LER/DORT podem ser definidas como afecções músculo-esqueléticas relacionadas ao ambiente e condições de trabalho, os quais podem inclusive piorar tais afecções. A etiologia das LER/DORT é multifatorial, sendo caracterizada pela exposição do trabalhador aos fatores de risco relacionados ao ambiente profissional e à atividade em questão (SCUSSIATO et al., 2010). Algumas dessas condições de trabalho são: movimentos repetitivos, aplicação de forças com as mãos, levantamento e movimentação de objetos pesados, postura inadequada e estresse relacionado ao meio profissional. A manifestação de tais afecções relaciona-se à exposição dos trabalhadores a esses riscos e a sua intensidade depende da frequência e duração da exposição e da possibilidade particular do indivíduo em lidar com as condições de trabalho (MARTINS, FELLI, 2013; Rodrigues et al., 2010).

LER/DORT correspondem a um conjunto heterogêneo de problemas funcionais e/ou orgânicos, que podem ocorrer de modo simultâneo ou não, cujas características sintomáticas comuns são: cansaço neuromuscular ocasionado por trabalho efetuado em posição fixa (estática) ou por meio de movimentação repetitiva, principalmente pelos membros superiores, falta de tempo de recuperação pós-contração e fadiga provocada pela falta de tempo e pelo ritmo acelerado de trabalho (MARTINS, FELLI, 2013; RODRIGUES et al., 2010; GONTIJO et al., 2010; FREITAS, LUNARDI FILHO, LUNARDI, FREITAS, 2009).

Quanto ao quadro clínico, este é diversificado, com a manifestação de dor, formigamento, dormência, choque, peso e fadiga precoces; aparecimento de entidades ortopédicas tais como tendinite, tenossinovite, sinovite, dedo em gatilho, síndrome do túnel do carpo, mialgia, síndrome da tensão do pescoço, distrofia simpático- reflexa e síndrome complexa de dor regional (MARTINS, FELLI, 2013; RODRIGUES et al., 2010; GONTIJO et al., 2010; FREITAS, LUNARDI FILHO, LUNARDI, FREITAS, 2009; SCUSSIATO et al., 2010). Barbosa, Santos e Trezza (2007) destacam que a nomenclatura da patologia em questão não é homogênea no Brasil nem em âmbito mundial, porém asseveram que as suas causas são homogêneas, com destaque para fatores de organização do trabalho. Célia (2003) considera, contudo, que o principal sintoma de problemas osteomusculares é a dor, a qual pode ser relacionada de diversas maneiras à atividade em questão. Mas é essencial que sejam avaliados todos os aspectos individuais e ocupacionais capazes de provocar esse sintoma.

Para que o trabalho seja identificado como causa de LER/DORT, são necessárias avaliações ocupacionais que envolvem a análise das atividades de trabalho, relacionando-se posteriormente os sinais e sintomas observados às condições laborais constatadas. (MARTINS, FELLI, 2013).

Quanto ao diagnóstico de doenças osteomusculares, é relevante observar se o músculo encontra-se encurtado e cronicamente fatigado, e se, na prática costumeira ou sustentada de certas posições utilizadas no trabalho, os músculos mantêm-se em contração estática, ocasionando um processo de isquemia e comprometimento da remoção de substâncias resultantes do metabolismo celular. Tais fatores provocam fadiga muscular e estresse mecânico sobre a cartilagem. A movimentação repetitiva e as

contrações dinâmicas musculares contínuas podem se manifestar com dor difusa, fadiga e desconforto (CÉLIA, 2003).

LER/DORT acometem tanto homens quanto mulheres, inclusive adolescentes (BARBOSA, SANTOS, TREZZA, 2007), mas Martins e Felli (2013) e Scussiato et al. (2010) destacam que há incidência maior de LER/DORT no sexo feminino, o que é justificado devido a fatores hormonais, por dupla jornada de trabalho, falta de preparo e desenvolvimento muscular, uma vez que mulheres possuem menor quantidade de fibras musculares e menor capacidade de converter glicogênio em energia útil, ocasionando uma estrutura óssea mais leve e com ossos mais curtos, com menores áreas de junção, assim como pelo crescimento na quantidade de mulheres no mercado de trabalho.

Para o Ministério da Saúde, em seu Protocolo de Investigação, Diagnóstico, Tratamento e Prevenção de Lesões por Esforço Repetitivo, é necessário que o diagnóstico clínico-ocupacional seja elaborado por profissionais de saúde, com a presença de um ergonomista e seguindo uma sequência (BRASIL, 2000):

- História da doença atual detalhada;
- Investigação dos equipamentos com os quais a pessoa trabalha (avaliação ergonômica);
- Comportamentos e costumes do profissional que apresentam relação importante com a lesão osteomuscular;
- Histórico pessoal;
- Antecedentes ocupacionais, tempo de atividade na função, jornada, condições e ambiente de trabalho;
- Exame físico detalhado, a fim de avaliar outras condições que podem ter auxiliado para o desenvolvimento da moléstia;
- Exames complementares se necessário.

Reitera-se o fato de que moléstias osteomusculares são ocasionadas por fatores inter-relacionados, com ênfase para levantamento de objetos pesados, má postura, movimentos repetitivos, além dos problemas anatômicos do próprio trabalhador. Do

mesmo modo, elementos psicossociais e ocupacionais são relevantes para o desenvolvimento de doenças osteomusculares (CÉLIA, 2003).

Entre os fatores físicos, estão as condições de saúde do profissional para a prática da atividade em questão, como peso, altura, idade, sexo etc. Com relação aos elementos psicossociais, é importante considerar a quantidade de tarefas que o profissional deve executar, suas condições familiares, psicológicas e afetivas, necessidades financeiras, as quais podem ocasionar acúmulo de jornadas de trabalho, ou ainda se há ocorrência de exploração no trabalho. Por fim, quanto às questões ocupacionais, estão as condições de trabalho, tais como: equipamentos inadequados para a prática de tarefas, colaboradores em quantidade menor que a necessária etc. Há ainda elementos de ordem puramente psicológica que se relacionam com problemas osteomusculares, com destaque para a satisfação profissional e qualidade de vida no trabalho. Ou seja, para a avaliação de fatores de risco profissional, deve-se ter uma visão mais ampla, observando não apenas fatores físicos, mas também questões psicológicas e psicossociais (CÉLIA, 2003).

Quanto às atividades com maior incidência de lesões musculoesqueléticas, destacam-se as relacionadas com construção civil, coletores de lixo, profissionais de enfermagem e trabalhadores industriais, trata-se de uma verdadeira epidemia industrial contemporânea (CÉLIA, 2003).

A literatura apresenta que profissionais de enfermagem apresentam moléstias osteomusculares e podem ser classificados como fatores de risco individuais e ocupacionais, com destaque para defeitos de postura ou congênitos, a força muscular, a manutenção de determinada posição por longo período de tempo e constantes flexões e torções da coluna vertebral (CÉLIA, 2003).

LOMBALGIA OCUPACIONAL

Questões de trabalho e saúde não podem ser desvinculadas, conforme apresentado anteriormente, uma vez que moléstias afetam a qualidade de vida do profissional e o seu desempenho no trabalho. Além das LER e DORT apresentadas anteriormente, outro problema que merece atenção são as lombalgias. De acordo com os descritores de saúde, a lombalgia corresponde à dor aguda ou crônica nas regiões lombar ou sacral, podendo

relacionar-se a entorses e distensões musculares, deslocamento do disco intervertebral e outras condições (BORGES et al., 2012).

METODOLOGIA

Esta pesquisa é de tipo descritivo-exploratória, elaborada por meio de uma revisão integrativa da literatura. Tal escolha deveu-se ao fato de que a revisão integrativa é considerada a abordagem metodológica de maior amplitude no que tange à elaboração revisões, uma vez que permite a inclusão de estudos experimentais e não experimentais, a fim de permitir uma percepção completa e multifacetada acerca do tema pesquisado (SOUZA, SILVA, CARVALHO, 2010).

Ou seja, este método combina informações teóricas e empíricas da literatura, incorporando uma gama ampla de propósitos: apresentação de conceitos, revisão de teorias e evidências e análise de problemas metodológicos sobre um assunto específico. A amostragem deve proporcionar um panorama consistente e compreensível de conceitos complexos, abordagens teóricas ou problemas de saúde importantes para a enfermagem (SOUZA, SILVA, CARVALHO, 2010). Objetiva discutir diferentes conceitos, aspectos relevantes e formas de tratamento da lombalgia ocupacional.

Para o levantamento dos artigos na literatura, efetuou-se uma busca nas seguintes bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e BDENF. Para a busca do material, foram utilizados os seguintes descritores: lombalgia ocupacional, lombalgia comum e distúrbios osteomusculares.

Quanto aos critérios para a busca dos artigos, estes foram: trabalhos publicados em português, inglês e espanhol; artigos na íntegra que tratassem acerca da lombalgia ocupacional, seus aspectos e métodos de diagnóstico e artigos publicados entre os anos 2000 e 2015.

Os descritores foram pesquisados individualmente, encontrando obras, conforme o quadro abaixo:

Descritores	Bases de dados			
	LILACS	SciELO	BDENF	Total
Lombalgia ocupacional	47	12	11	70
Lombalgia comum	31	13	1	45
Distúrbios osteomusculares	354	74	44	472
Total				587

Na terceira etapa, realizou-se uma leitura seletiva dos textos, excluindo aqueles que não atendiam aos objetivos desta pesquisa e os que se repetiam nas bases de dados consultados. Neste sentido, chegou-se a sete artigos que constituíram a fundamentação teórica da discussão abaixo.

DISCUSSÃO

A lombalgia é a enfermidade ocupacional mais antiga que se tem notícia. Conforme apresentado no início deste trabalho, em 1713, Bernardino Ramazzini, considerado o fundador da medicina do trabalho, constatou que determinados movimentos bruscos assim como posturas incorretas poderiam prejudicar a estrutura interna do corpo. Do mesmo modo, a lombalgia é a enfermidade ocupacional mais comum, uma vez que aproximadamente 80% dos trabalhadores relataram pelo menos uma vez na vida algum tipo de dor lombar (DIAS, GODOI, ALMEIDA, 2003).

A lombalgia é uma enfermidade corriqueira entre trabalhadores braçais, acarretando problemas econômicos para a empresa onde trabalham e para a sociedade em sua completude, uma vez que tais profissionais correspondem à grande massa trabalhadora de um país e sua correspondente parcela produtiva da economia. Destacando-se a lombalgia ocupacional, esta pode promover incapacidade temporária ou permanente no trabalho, o que representa custos de tratamento e fisioterapia. Dias, Godoi e Almeida (2003) destacam estudo epidemiológico de Mendes, Reis et al. (2000), do perfil de morbimortalidade de trabalhadores de uma indústria de alumínio, onde constatou que o custo direto total relacionado a atestados médicos de até 15 dias representou cifras de US\$ 905.807,90, com destaque para doenças osteomusculares, as quais corresponderam a US\$ 203.925,00, seguidas de doenças respiratórias (US\$ 150.865,00)

e outros contatos de saúde (US\$ 139.615,70). Trata-se de uma prevalência alta de dor na coluna entre os colaboradores.

Com relação às profissões mais acometidas por lombalgias ocupacionais, destacam-se as atividades de carpinteiro, mecânico automotivo, empregada doméstica, zelador e cabeleireiro, assim como operários do setor civil e enfermeiros, sendo que estes dois últimos apresentam uma prevalência de 22,6% e 18,8% de prevalência, respectivamente. Há prevalência maior entre o sexo masculino. Quanto às mulheres, estas são especialmente acometidas de lombalgias quando profissionais da área de saúde, uma vez que essa atividade exige a execução de atividades especialmente lesivas à coluna, tais como constantes flexões do tronco, manutenção de postura parada, levantamento e manuseio de objetos pesados, entre outras. Ademais, constatou-se que hospitais com quadro de funcionários menos qualificados também apresentam maior incidência de lombalgia (DIAS, GODOI, ALMEIDA, 2003).

Dores na região lombar/sacral podem ser ocasionadas por inflamação, processo degenerativo, neoplasia, modificações ginecológicas, traumatismo, alterações metabólicas ou decorrentes de outras disfunções. Contudo, uma diversidade de lombalgias é acarretada por origem inespecífica e de causa idiopática (DIAS, GODOI, ALMEIDA, 2003).

Os fatores de risco relacionados à lombalgia incluem falta de atividade física, obesidade, manutenção de postura estática, falta de desenvolvimento muscular e até mesmo questões psicológicas e sociais. Há relação entre a falta de satisfação profissional e o acometimento de lombalgias, conforme apresenta estudo de avaliação ergonômica em 3020 colaboradores de uma fabricante de aviões. Jornadas longas de trabalho, relacionadas com outras atividades do cotidiano, favorecem a manifestação de dores lombares e de outros males, como fadiga crônica e problemas de ordem mental e emocional, tais como depressão, ansiedade e síndrome do pânico (DIAS, GODOI, ALMEIDA, 2003).

Esses problemas de saúde favorecem o absenteísmo e o aumento da utilização do atestado médico. Do mesmo modo, tais problemas estimulam os conflitos interpessoais entre colegas de trabalho, acarretando diminuição da qualidade de vida dos trabalhadores,

aumentando custos operacionais da organização, o que pode ser revertido em problemas até mesmo para os clientes da empresa. Neste sentido, a lombalgia é considerada a moléstia que mais ocasiona custos relacionados à atividade profissional (DIAS, GODOI, ALMEIDA, 2003).

Nos EUA, a lombalgia ocupacional é a doença que acarreta os maiores custos, onde são gastos cerca de 16 bilhões de dólares com prevenção, tratamento e custos relacionados ao afastamento. Quanto aos gastos indiretos, estes correspondem a cifras entre 50 e 80 bilhões de dólares anuais. Dias, Godoi e Almeida (2003) destacam que essa doença é a que provoca maior quantidade de horas de trabalho perdidas nos EUA. No Brasil, a situação não é diferente, uma vez que o custo direto proporcionado por um colaborador faltoso deve ser assumido pela empresa nos primeiros 15 dias de afastamento por motivo de doença.

Fatores ergonômicos e traumáticos relacionam-se fortemente com a lombalgia. Quanto aos fatores ergonômicos, destacam-se as exigências das atividades, ao ambiente e ao funcionamento das condições profissionais, tais como a manutenção dos equipamentos e o modelo de execução do processo da atividade em questão. Os fatores traumáticos relacionam-se ao trabalho físico e pesado ocasionado pelo levantamento e manuseio de objetos pesados. A OMS classifica os fatores traumáticos em (DIAS, GODOI, ALMEIDA, 2003):

- Risco individual: idade, sexo, relação peso e altura, desequilíbrio muscular, força muscular;
- Risco profissional: intensidade das forças compressivas na coluna vertebral devido à utilização de objetos pesados no decorrer da atividade profissional, assim como a manutenção de posturas erradas por um longo período temporal.

Com relação aos riscos individuais, a lombalgia ocupacional apresenta predominância entre homens, com destaque para a faixa etária de 20 a 24 anos, devido à sobrecarga acarretada por tarefas mais voltadas ao sexo masculino, como o levantamento e manuseio de objetos pesados. Quanto às mulheres, são mais acometidas as de idade entre 30 e 34 anos. Destaca-se também a relação entre lombalgia ocupacional e a posição socioeconômica do paciente em questão: pessoas localizadas nas camadas inferiores

costumam apresentar maior prevalência de lombalgia, uma vez que esta camada populacional está mais sujeita a executar tarefas pesadas (DIAS, GODOI, ALMEIDA, 2003).

Para que os diagnósticos estrutural e sindrômico da lombalgia ocupacional sejam estabelecidos, deve-se considerar as peculiaridades do trabalho desenvolvido pelo paciente, tais como o local da atividade, posturas e movimentos exercidos pelo profissional, ritmo, duração, carga de trabalho, e até mesmo os já comentados aspectos psicossociais, uma vez que estes podem estar relacionados com estresse, agravando possíveis cargas osteomusculares (DIAS, GODOI, ALMEIDA, 2003).

Os profissionais de saúde também devem considerar medidas preventivas, tais como conscientizar, educar e orientar os trabalhadores de modo a diminuir os riscos musculoesqueléticos (DIAS, GODOI, ALMEIDA, 2003).

LOMBALGIA OCUPACIONAL: DEFINIÇÃO

Não é fácil obter o equilíbrio nas estruturas componentes da coluna vertebral, modificações constantes na postura agravam a estrutura morfofuncional da coluna e o seu consequente desequilíbrio mecânico funciona como um fator nocivo para ela. Todas as unidades estruturais que compõem a unidade anátomo-funcional do segmento lombar apresentam inervação nociceptiva, exceto o núcleo pulposo e certas fibras do anel fibroso. Os elementos estruturais músculo-articulares respondem pelo antagonismo das ações mecânicas da coluna, respondendo simultaneamente pela sustentação e pela movimentação corporais. O esforço físico em falta ou em demasia danificará a coluna e suas estruturas osteomioarticulares (TOSCANO, EGYPTO, 2001).

A lombalgia corresponde à dor situada na região entre as últimas costelas (margem costal) e as linhas glúteas inferiores, acompanhada ou não de dor nos membros inferiores. Ela pode originar-se no disco intervertebral, articulação facetaria, articulação sacroilíaca, músculos, fáscias, ossos, nervos e meninges, e entre suas causas estão: hérnia de disco, osteoartrose, síndrome miofascial, espondilolistese, espondilite anquilosante, artrite reumatoide, fibrose, aracnoidite, tumor e infecções (LIZIER, PEREZ, SAKATA, 2012). De Vitta (1996) destaca que sua etiologia é complexa, relacionada com uma

diversidade de fatores de risco, tais como traumas mecânicos, obesidade, ocupação, sexo, idade etc., os quais influenciam as estruturas componentes da unidade anatomofuncional do seguimento lombar, podendo ocasionar degeneração, cuja sintomatologia é variada.

De Vitta (1996) destaca que a lombalgia é determinada por aspectos internos e externos ao paciente: apresentando levantamento bibliográfico efetuado entre 1988 a 1992, destaca que certas situações do cotidiano são especialmente agressoras das estruturas músculo-esqueléticas da coluna lombar, sendo, pois, consideradas como determinantes da lombalgia. Entre tais situações, estão: manutenção de postura errada, sentada ou em pé, movimentos repetitivos, diferentes tipos de atividade física mal executada, levantamento de pesos, entre outras.

A dor lombar é o segundo distúrbio doloroso que mais acomete o ser humano, abaixo apenas para a cefaleia, e é causa relevante de morbidade e incapacidade, relacionando-se, portanto, a problemas sociais e econômicos. Estudos apontam que as lombalgias prevalecem entre 50% e 80% da população, com destaque para homens acima dos 40 anos e mulheres entre 50 e 60 anos de idade, talvez em relação com a osteoporose. A lombalgia ocupacional é a maior causa de transtorno de saúde e absenteísmo, além de ser uma das causas mais importantes para consultas médicas, hospitalizações e intervenções cirúrgicas, sendo a causa mais comum de incapacidade em profissionais de faixa etária abaixo de 45 anos. Trata-se de uma enfermidade que acomete $\frac{1}{4}$ dos casos de invalidez prematura e que, mais do que um problema de saúde, corresponde a uma questão de âmbito social e econômico (JÚNIOR, GOLDENFUM, SIENA, 2010).

A Classificação internacional de Comprometimentos, Incapacidades e Deficiências da Organização Mundial da Saúde considera a lombalgia como um acometimento relacionado à perda ou anormalidade da estrutura da coluna lombar cuja causa relaciona-se a fatores psicológicos, fisiológicos, anatômicos ou até mesmo a deficiências capazes de impedir ou limitar a execução de atividades físicas variadas. Conforme assevera essa classificação, a lombalgia pode revelar uso excessivo da coluna, compressivas ou posturais, fraqueza muscular, diminuição na amplitude ou na coordenação de movimentos, ampliando a fadiga e a instabilidade do tronco (JÚNIOR, GOLDENFUM, SIENA, 2010).

Quanto à sua duração, a lombalgia pode ser categorizada em aguda, de início súbito, prolongando-se por até seis semanas, subaguda, cuja duração é de seis a 12 semanas, crônica, cuja duração é maior que 12 semanas, ou ainda como recorrente, quando reaparece depois de períodos de acalmia. A lombalgia também pode ser classificada em mecânica, não mecânica e psicogênica. A lombalgia mecânica pode ser específica ou inespecífica. Também pode ser classificada como viscerogênica (ex: dores abdominais), vascular (ex: aneurisma de aorta abdominal), psicogênica (induzida problemas de ordem psicológica que ocasionam a dor), neurogênica (lesão no sistema nervoso) e espondilogênica (exemplificada pela hérnia de disco e osteoartrose) (LIZIER, PEREZ, SAKATA, 2011).

Muito relacionadas com o meio de trabalho, a lombalgia inespecífica ou mecânica comum é ocasionada pelo desequilíbrio entre a carga funcional, ou seja, o esforço necessário para a realização de atividades da vida cotidiana, e a capacidade de execução de tais atividades. Esse tipo de lombalgia não apresenta alteração estrutural do disco, compressão de raízes nervosas, lesão óssea ou articular, escoliose ou lordose acentuada capazes de ocasionar dor na coluna (LIZIER, PEREZ, SAKATA, 2011).

Apenas 10% das lombalgias são acarretadas por doenças determinadas, contudo, apesar da não modificação estrutural na lombalgia comum, ela é capaz de limitar as ações cotidianas, incapacitando o indivíduo. Trata-se de uma enfermidade comum em trabalhadores que praticam esforço físico pesado e movimentos repetitivos ou necessitam ficar em postura estática por períodos prolongados. Trata-se de uma enfermidade que acomete mais mulheres do que homens, provavelmente devido a especificidades anatomo-funcionais como menor estatura, massa muscular e massa óssea, apresentando, portanto, articulações mais frágeis e menor adaptação ao esforço físico (LIZIER, PEREZ, SAKATA, 2011).

Júnior, Goldenfum e Siena (2010) destacam que há o conjunto das lombalgias orgânicas, muito relevantes para a análise das lombalgias ocupacionais. Entre elas, há as secundárias à síndrome de Munchausen (com pouca frequência), as lombalgias simuladas com o interesse direto e consciente acerca de ganhos secundários, costumeiramente financeiros, e as lombalgias de ordem psicossomática, secundárias a conflitos

psicológicos comumente inconscientes, sendo ou não acompanhadas de queixas somáticas.

As lombalgias também podem ser classificadas em cinéticas, quando relacionadas a sobrecargas de movimento; ou estáticas, quando relacionam-se à má postura de acordo com o grau de comprometimento dos tecidos: lombalgia por desgaste da musculatura para-vertebral e lombalgia por distensão muscular e ligamentar; pode originar-se no sistema de locomoção e estabilização da coluna: lombalgia por torção da coluna lombar ou ritmo lombo pélvico inadequado ou lombalgia por instabilidade articular; pode originar-se no disco intervertebral: lombalgia por protusão intradiscal do núcleo pulposo e lombalgia por hérnia de disco intervertebral; de origem psíquica: lombalgia como conversão psicossomática ou objetivando ganhos secundários (Júnior, Goldenfum e Siena, 2010).

Quanto às enfermidades laborais, Schilling (1984) as classificou em três categorias:

- I. Doenças que têm o trabalho como causa necessária, tais como os acidentes de trabalho e as doenças profissionais reconhecidas juridicamente;
- II. Doenças cujo trabalho é um dos fatores contribuintes;
- III. Doenças cujo trabalho é um fenômeno agravante ou estimulante de problemas latentes ou pré-existentes.

Referenciando-se nessa categorização, tem-se que a lombalgia ocupacional é uma enfermidade Schilling II nos casos em que o trabalho for um aspecto que contribuiu para o seu surgimento, ou Schilling III, quando a lombalgia for agravada pelo trabalho em questão (JÚNIOR, GOLDENFUM, SIENA, 2010).

A CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADE (CIF) E A LOMBALGIA OCUPACIONAL

Desenvolvida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2001, a Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF) tem como objetivo delimitar um mecanismo de comunicação entre profissionais de saúde, por meio de uma linguagem uniforme e padronizada, a fim de identificar o modo como enfermidades e mudanças

estruturais físicas e psíquicas são capazes de influenciar na vida dos indivíduos (QUINTANA et al., 2014, RIBERTO, CHIAPETTA, LOPES, BATTISTELLA, 2011).

Pertencente à família de classificações, a CIF foi criada devido à necessidade de cobrir questões não alcançadas pela Classificação Internacional de Doenças (CID). Enquanto esta última oferece informações sobre mortalidade e morbidade, a CIF trata das repercussões da doença e dos componentes de saúde que interferem sobre a sua funcionalidade. A CIF foi estabelecida, pois, devido ao fato de que apenas uma classificação de doenças não seria o bastante para todas as questões relacionadas à saúde (QUINTANA et al., 2014, RIBERTO, CHIAPETTA, LOPES, BATTISTELLA, 2011).

A CIF subdivide-se em duas categorias, cada uma com dois componentes. A primeira parte trata da Funcionalidade e Incapacidade, sendo subdividida em Funções e Estruturas do Corpo e Atividades e Participação. A segunda parte trata dos Fatores Contextuais, os quais são subdivididos em Fatores Ambientais e Fatores Pessoais. Cada um desses componentes pode ser classificado em termos positivos ou negativos (QUINTANA et al., 2014, RIBERTO, CHIAPETTA, LOPES, BATTISTELLA, 2011).

Cada componente da CIF é organizado em capítulos e subcategorias cada vez mais detalhadas, de modo a oferecer uma descrição completa da experiência humana relacionada aos diferentes estados de saúde. Contudo, devido à grande variedade de agrupamentos humanos, com suas respectivas variabilidades transculturais, os Fatores Pessoais, que tratam de aspectos genéticos, antropométricos, de hábitos e crenças, ainda não foram descritos e organizados na CIF, não apresentando classificação (RIBERTO, CHIAPETTA, LOPES, BATTISTELLA, 2011).

A CIF foi estabelecida para ações em saúde pública, permitindo a comparação de especificidades entre as funcionalidades de diferentes países, regiões e populações no decorrer do tempo. Mas seu uso é de grande utilidade clínica, uma vez que permite a obtenção de informações acerca da funcionalidade dos pacientes com uma terminologia padronizada e consistente. Do mesmo modo, a CIF favorece o planejamento e gerenciamento de intervenções administrativas e acompanhamento dos pacientes com maior eficácia (RIBERTO, CHIAPETTA, LOPES, BATTISTELLA, 2011).

Quanto à lombalgia, o *core set* da CIF pode ser aplicado em qualquer paciente com lombalgia, não importando a etiologia. Ele é constituído por 19 código de Funções do Corpo, 5 Códigos para Estruturas do Corpo, 29 Códigos de Atividades e 25 Códigos de Fatores Ambientais. De acordo com Riberto, Chiapetta, Lopes, Battistella, 2011, autores de estudo pioneiro sobre a aplicação do *core set* da CIF para lombalgia no Brasil, ele mostrou-se útil para a descrição de toda a gama de dificuldades encontradas por portadores de lombalgia mecânica crônica inespecífica, com exceção de algumas poucas categorias, as quais se mostraram pouco representativas. Tal razão se deu não devido a falhas na CIF, mas sim a limitações da pesquisa em questão.

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTOS PARA A LOMBALGIA

O diagnóstico da lombalgia é norteado pelos elementos de anamnese e sua fisiopatologia no tocante à intensidade, horário de aparecimento e outros aspectos relacionados à dor. Quanto à lombalgia mecânica comum, em geral a dor é limitada à região lombar e nádegas, não costumando alcançar as coxas. Costuma surgir de modo súbito pela manhã, podendo vir acompanhada de escoliose antálgica. A duração dessa dor é de 3 a 4 dias, após os quais o paciente retorna à normalidade (BRAZIL et al., 2004).

Na ocorrência de hérnia de disco, no momento de esforço de flexão, o material nuclear é empurrado para trás, em sentido ântero-posterior por meio das fibras do anel fibroso, porém sendo por ele contido, podendo não aparecer a dor. Tal fenômeno costuma ocorrer no período diurno. À noite, devido à maior embebição aquosa do núcleo e consequente aumento da pressão interdiscal, as fibras do anel são rompidas, ocasionando dor nas primeiras horas do dia, manifestando-se dor aguda e intensa, a qual se irradia para os membros inferiores e se intensifica com os esforços cotidianos (BRAZIL et al., 2004).

No estreitamento do canal raquidiano artrósico, a dor lombar eventualmente ocorre durante o período noturno, podendo ser acompanhada de cialgia uni ou bilateral intensa, a qual diminui ao sentar-se. Ela pode ocorrer em conjunto com dor na panturrilha e de claudicação neurogênica intermitente. A dor piora com a caminhada do paciente, especialmente nos casos de decida de rampas e/ou ladeiras, melhorando nas subidas. Tal situação é diferente da que ocorre na claudicação vascular, que piora quando em subidas.

O sinal de Lasegue é negativo, enquanto na hérnia discal pode ser positivo. A manobra de Romberg é positiva. A extensão da coluna lombar, durante 30 segundos, desencadeia a dor (BRAZIL et al., 2004).

Nas espondiloartropatias soronegativas, as quais são enfermidades reumáticas inflamatórias, ocorre a intensificação dos sintomas no período da manhã, devido ao ritmo circadiano da secreção do cortisol e pelo sistema nervoso autônomo. A sacro-ilite bilateral, ou eventualmente unilateral, finaliza o diagnóstico.

Na espondilite anquilosante, a dor pode apresentar certa peculiaridade: uma pseudociatalgia alternante. Neste caso, uma série de cinco elementos, apresentados pelo indivíduo, são essenciais para o diagnóstico: lombalgia de caráter insidiosa, antes dos quarenta anos de idade, cuja duração é maior que três meses, juntamente à rigidez matinal e melhora com atividade física, apresenta sensibilidade de 95% e especificidade de 85% para a sua identificação (BRAZIL et al., 2004).

Brazil et al. (2004) destaca algumas relações que podem ser observadas entre a dor e certos fenômenos:

- Relação entre a dor e a prática (ou não) de atividades físicas: a dor decorrente de movimentação corporal diário ou devido a longos períodos de permanência em pé pode estar relacionada à modificações mecânicas ou degenerativas;
- Relação da dor com queixas sistêmicas: havendo comprometimento sistêmico, a dor lombar costuma iniciar-se de modo gradual e progressivo, distribuindo-se de modo simétrico ou alternante, não se relacionando com o movimento e não melhorando com o repouso, havendo a possibilidade de estar acompanhada de rigidez matinal cuja duração é superior à trinta minutos;
- Irradiação da dor: quando a dor é irradiada para a face anterior da coxa, não ultrapassando o joelho, pode estar ocorrendo neuralgia crural;
- Dor de origem raquidiana ou extrarraquidiana: a dor extrarraquidiana não se relaciona com movimentos da coluna, surgindo mesmo em períodos de repouso. Neste caso, o profissional deve considerar a possibilidade de

calculose renal, endometriose, aneurisma de aorta abdominal, processos expansivos abdominais e retroperitoniais;

- Dor psicossomática: relaciona-se com pacientes que apresentam sensibilidade dolorosa superficial ou de distribuição não anatômica, havendo dor vaga, imprecisa e que varia de localização de um dia para outro, podendo até mesmo irradiar-se para o peito, coluna e abdômen;

Para o exame físico e sua fisiopatologia, é essencial observar a flexão e extensão da coluna lombar, uma vez que o aumento da pressão intradiscal na flexão da coluna lombar impele o disco para trás, no sentido ântero- posterior, piorando a dor na hérnia de disco. Do mesmo modo, deve-se notar (BRAZIL et al., 2004):

- Quanto à manobra de Valsalva, na compressão radicular tal manobra ocasiona aumento da dor ou irradiação dela até o pé.
- Quanto à manobra de Lasegue, pode ser considerada positiva quando a dor aumenta ou se irradia no trajeto do dermatomo de L4-L5 ou L5-S1 quando a elevação do membro inferior ocorrer em um ângulo de 35° a 70° com o plano horizontal. A compressão radicular é comprovada em caso de positividade a 60°.
- Quanto à manobra de Romberg, é anormal quando o movimento de compensação do corpo for necessário para manter os pés fixos no mesmo lugar, sendo um sinal positivo na estenose do canal;
- Sinal das pontas: o paciente não consegue andar com um dos calcanhares, uma vez que a raiz L5 é comprimida. Por sua vez, se o indivíduo não consegue andar com uma das pontas dos pés, há a compressão da raiz S1;
- Sinal do arco de corda: deve-se levantar a perna do indivíduo, como ocorre na manobra de Lasegue, até a manifestação da dor. neste momento, deve-se flexionar o joelho. Ocorrendo diminuição e/ou desaparecimento da dor, o sinal é positivo para o diagnóstico da hérnia discal;
- Sinais não orgânicos de lombalgias psicossomáticas: há simulação de dor lombar quando da compressão axial no topo do crânio ou na rotação da pelve e ombros, sem movimentação da coluna;
- Sinais de alerta: há a possibilidade dos sintomas apresentados pelo paciente

estarem relacionados a outras enfermidades, tais como tumores, infecções, dependência química, de fraturas cujos traumas podem ser maiores ou menores em idosos ou osteoporóticos, ou ainda da síndrome da cauda equina.

Por fim, quanto ao diagnóstico complementar, a tomografia computadorizada e a ressonância magnética são indicadas para as lombalgias e cialgias agudas que apresentem evolução atípica ou insatisfatória, cuja causa não foi estabelecida após seis semanas de tratamento clínico. A tomografia computadorizada corresponde a uma metodologia planar, segmentar, capaz de permitir uma boa avaliação dos desarranjos discais, das modificações degenerativas das faces intervertebrais (platôs vertebrais) e articulações zigapofisiárias. Do mesmo modo, permite a análise do canal vertebral, recessos laterais e forames intervertebrais, apresentando boa definição dos contornos dos ossos (BRAZIL et al., 2004).

Quanto à ressonância magnética, trata-se de um método multiplanar que não usa radiação ionizante e cujo espectro de visão é amplo. Deste modo, favorece a observação dos desarranjos discais e de modificações degenerativas, sendo útil para a avaliação do conteúdo do canal vertebral, inclusive do cone medular, raízes da cauda equina e medula óssea (BRAZIL et al., 2004).

A eletroneuromiografia não é adequada em casos de lombalgias agudas e crônicas, assim como nas lombociatalogias agudas. É o único método que informa acerca da fisiologia da raiz nervosa envolvida, auxiliando a compor a relevância clínica. Por fim, quanto à densitometria óssea, esta não é indicada em lombalgias mecânicas ou não, agudas ou não, como método de diagnóstico inicial, sendo mais adequada nas situações em que o RX simples apresenta de deformidade vertebral, de tipo colapso, ou osteopatia radiológica. Neste caso, a mera observação de perda de massa óssea, revelada por este exame, não significa que a osteoporose justifique a lombalgia em questão. Cabe ao profissional alertar-se acerca das possibilidades clínicas em que há osteoporose secundária, como no caso da utilização de corticosteróides (BRAZIL et al., 2004).

TRATAMENTOS

Conforme discorrido neste trabalho, Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) e Lesões por Esforço Repetitivo (LER) costumam relacionar-se à prática de movimentos repetitivos, manutenção de posturas anômalas e levantamento de objetos pesados, além de fatores psicossociais, tais como ritmo acelerado de trabalho, ansiedade e ambiente profissional conflituoso e estressante.

Quanto aos tratamentos para o combate à lombalgia, há uma diversidade de métodos empregados, entre os quais: uso de medicamentos (antiinflamatórios, corticosteroides, paracetamol, dipirona, tramadol, opióides, relaxantes musculares, antidepressivos, anticonvulsionantes), medidas físicas (ondas ultrassom, estimulação elétrica transcutânea, laser), infiltração, bloqueios e acupuntura. Lizier, Perez e Sakata (2012) destacam, contudo, que a eficácia dos métodos terapêuticos ainda não está totalmente comprovada.

PRÁTICA DE EXERCÍCIOS

Trata-se de uma categorização heterogênea de intervenções, as quais podem ser realizadas individualmente, por grupo de pacientes, os quais podem ser assistidos pessoalmente por um terapeuta ou ainda podem ser executados em casa. Ainda podem ser efetuados com o auxílio de aparelhos, em piscinas, aeróbicos, flexão ou extensão, alongamento, estabilização, balanço e coordenação (LIZIER, PEREZ, SAKATA, 2012).

Lizier, Perez e Sakata (2012), em revisão de pesquisas acerca da eficácia dos exercícios para o tratamento da lombalgia, destacam que, de fato, eles podem diminuir a intensidade da dor lombar, melhorando a capacidade de recuperação do indivíduo, por sua vez, eles consideraram que a terapia comportamental cognitiva é mais adequada para enfraquecer a dor em períodos mais curtos de tempo.

Pode-se considerar exercícios terapêuticos como a série de movimentos específicos que objetivam desenvolver e treinar determinados músculos e articulações, por meio da execução de certas práticas ou treinamentos físicos, os quais promovem melhorias na saúde de um dado indivíduo (LIZIER, PERES, SAKATA, 2012). Tais exercícios podem ser classificados em:

1. Passivos: efetuados externamente em pacientes que apresentam certas restrições de movimentos;
2. Ativos: efetuados de modo ativo pelo indivíduo;
3. Ativos assistidos: realizados ativamente pelo próprio indivíduo, mas com o auxílio de forças externas a fim de que o movimento seja completado. Tais auxílios costumam ocorrer nas angulações finais do movimento; Ativos resistidos: realizados ativamente, mas também com o uso de pesos ou algum outro objeto capaz de provocar resistência contra o movimento em questão, dificultando sua execução. Como exemplos, há a força manual do fisioterapeuta ou a utilização de thera-band;
4. Isométricos: efetuados ativamente, provocando contração muscular e produção de força, mas sem a modificação da angulação articular;
5. Isocinéticos: também executados de modo ativo pelo paciente, sendo dinâmicos, porém com a redução da velocidade de encurtamento ou de alongamento articular.

Exercícios terapêuticos são especialmente úteis para o transverso do abdômen, em relação a prática de exercícios gerais e a terapia de manipulação espinal em pacientes com lombalgia. Constata-se que exercícios terapêuticos correlacionam-se com o recrutamento moderado do transversos abdominal e a diminuição da incapacidade, demonstrando a importância dessa musculatura para a estabilidade da coluna vertebral (LIZIER, PEREZ, SAKATA, 2012).

Lizier, Perez e Sakata (2012) também destacam outro estudo, que analisou um programa de exercícios de estabilização segmentar no período de seis semanas em indivíduos com lombalgia crônica, onde observou-se diminuição relevante da dor e da incapacidade funcional nos pacientes que praticaram tais exercícios, em comparação com o grupo de controle.

Com relação a pacientes portadores de lombalgia crônica, os autores acima destacam que os exercícios que promovem a contração independente dos músculos profundos do tronco, com contração do transversos do abdômen e multífido, são benéficos para a diminuição da dor e da recorrência dos sintomas. Também merece destaque o fato de que exercícios ativos são mais eficazes para a diminuição da dor do que a prática de

exercícios passivos. A eficácia da movimentação ativa para a diminuição da dor é ainda maior com a prática contínua desses exercícios em um período mais prolongado de tempo (LIZIER, PEREZ, SAKATA, 2012).

Os autores também destacam como medida de combate à lombalgia crônica a execução de uma escola da coluna, a qual pode ser definida como um programa educacional que abrange o ensino de exercícios por um fisioterapeuta ou médico especialista.

Por fim, a terapia comportamental cognitiva corresponde a um conjunto de técnicas de relaxamento, de desenvolvimento social e de melhor execução de tarefas e posturas a fim de diminuir a dor e melhorar a capacidade funcional do indivíduo. Porém, Lizier, Perez e Sakata (2012) não chegaram a uma conclusão quanto à sua eficácia, pois defendem que a abordagem multidisciplinar e interdisciplinar, capaz de abranger não apenas exercícios físicos, mas também outras modalidades de tratamento da lombalgia inespecífica, seria o método mais adequado para o combate aos seus sintomas.

QUIROPRAXIA

A Quiropraxia é uma prática originária nos Estados Unidos na década de 1890 com o objetivo de tratar condições musculoesqueléticas, com destaque para as algias vertebrais. Trata-se de um método terapêutico cada vez mais estudado por pesquisadores e que apresenta grande satisfação dos pacientes, com custos baixos (BRACHER, BENEDICTO, FACCHINATO, 2013).

O pioneiro da atividade é o canadense Daniel David Palmer, que em 1895 estabeleceu o termo “Quiropraxia”, a qual é provinda das palavras gregas “keirós”, mãos, e “práxis”, prática. Palmer também é o fundador da primeira escola de Quiropraxia, em Davenport, Iowa, em 1897, iniciando os estudos sistemáticos das técnicas de manipulação articular.

A Quiropraxia é procurada principalmente por pacientes de dores musculoesqueléticas, com destaque às algias vertebrais, valoriza a relação entre a estrutura (coluna vertebral) e a função (coordenada pelo sistema nervoso) e o modo como essa relação atua na manutenção e melhora da saúde, valorizando as terapias manuais por

meio de manipulação ou ajuste quiroprático nas articulações do corpo (CHAPMAN-SMITH, 2001). A atividade quiroprática também permite a detecção de interferências no sistema nervoso antes que o paciente manifeste sintomas.

A palpação articular identifica a restrição ou disfunção das articulações, músculos, fáscias, ligamentos e outros tecidos da marcha. Técnicas específicas de avaliação com a palpação estática e dinâmica são úteis para a localização de mudanças de posição e mobilidade articular tais como disfunções articulares (DA) ou o complexo de subluxação vertebral (CSV), os quais correspondem à disfunção em um segmento articular em que o alinhamento, integridade de movimento e função da articulação encontram-se alterados, mesmo com a manutenção da congruência entre as superfícies articulares (BERGMAN, PETERSON, 2000).

A ocorrência de dor durante a palpação é um sintoma relevante para o diagnóstico de DA ou CSV (BERGMAN, PETERSON, 2000). Contudo, a presença de dor não caracteriza contraindicação para o ajuste quiroprático. Este é contraindicado nos casos de instabilidade ou movimento normal. O ajuste objetiva restabelecer a mobilidade restrita, e são reduzidos com a melhora do paciente.

Há variedade de técnicas pode ser utilizada para o seu tratamento, as quais devem ser escolhidas e utilizadas pelo profissional de acordo com o caso e as particularidades de cada paciente:

1. Técnica Gonstead: desenvolvida por Clearence S. Gonstead, utiliza cinco critérios para o diagnóstico quiroprático, sendo os quais a visualização, instrumentação (neurocalorímetro), a palpação estática, palpação dinâmica e análise radiográfica por meio de linhas. Muitos fundamentos da técnica Gonstead fundamentam-se na biomecânica do disco intervertebral, sendo indispensável a análise radiográfica.
2. Técnica Thompson: útil nas situações de desvantagem biomecânica entre o quiropraxista e o paciente, ocorrendo a impossibilidade de ajuste, assim como em idosos, os quais costumam manifestar problemas degenerativos avançados e dificuldades de locomoção, ou ainda para pacientes com problemas de adaptação às cavitações articulares. Suas contraindicações são: fraturas, má

consolidação óssea, próteses e degeneração acetabular ou ainda em outras enfermidades dos membros inferiores, capazes de influenciar no comprimento das pernas;

3. Técnica Diversificada: utiliza a biomecânica normal da coluna vertebral e extremidades para proporcionar a fim de proporcionar o ajustamento, mas não é fundamentada em um sistema de análise específico, como os métodos Gontead e Thompson.

Chapman-Smith (2001) defende que a Quiropraxia objetiva atender necessidades imediatas do paciente, como o alívio da dor, recuperação da função e amplitude de movimentos normais das articulações, músculos e outras estruturas do aparelho musculoesquelético ou locomotor, permitindo o funcionamento normal do sistema nervoso (CHAPMAN-SIMITH, 2001).

A manipulação é a movimentação passiva, rápida e de baixa amplitude de uma vértebra, além da amplitude de movimento fisiológico e dentro da integridade anatômica, levando a articulação para o espaço parafisiológico. Tal manipulação costuma ser acompanhada de um sinal auditivo, como um estalo, o qual é decorrente do mecanismo de cavitação articular, tal como acontece com uma articulação sinovial. Quando a cavitação articular sofre uma força de tração, a separação das superfícies articulares acarreta a diminuição da pressão intraarticular do líquido sinovial. Como o conteúdo do espaço articular não é expansível, ocorre a invaginação da cápsula articular e a diminuição da pressão intra articular, a qual, ficando abaixo da pressão parcial de dissolução do gás carbônico, provoca a constituição de bolhas de gás carbônico nesse espaço. A consequência desse fato é a ruptura da força de coaptação quanto às superfícies articulares opostas, separando-as por um curto período de tempo. Esse fenômeno provoca a vibração dos tecidos periarticulares e sua consequente emissão de som (BRACHER, BENEDICTO, FACCHINATO, 2013).

A manipulação ocasiona efeitos fisiológicos locais e sistêmicos, tais como a redução da dor, melhoria na amplitude de movimento, aumento do limiar de dor à pressão, diminuição da tensão na musculatura e de sua atividade elétrica, assim como da pressão sanguínea, estímulo ao fluxo sanguíneo periférico, dos níveis plasmáticos de beta-endorfina e da atividade metabólica dos neutrófilos. Contudo, há a possibilidade de

efeitos adversos ocorrerem, mas trata-se de efeitos de baixa intensidade e curta duração, entre esses efeitos adversos, estão desconforto local, dor irradiada, tontura, dor de cabeça e náuseas (BRACHER, BENEDICTO, FACCHINATO, 2013).

A lombalgia é uma das condições de saúde mais estudadas pelos quiropraxistas, seguindo-se das cervicalgias e cefaleias (BRACHER, BENEDICTO, FACCHINATO, 2013).

BANDAGENS FUNCIONAIS

De acordo com Perrin (2015), a utilização de bandagens funcionais é eficaz para a prevenção de lesões, uma vez que ela limita o movimento excessivo ou anormal de uma articulação que tenha sofrido entorse, simultaneamente ao fato de que fornece suporte ao músculo afetado pela lesão. Ademais, tais bandagens aumentam a resposta proprioceptiva do paciente.

Segundo Thompson (2010), apesar de utilizada há muito tempo, a bandagem funcional é relativamente recente como prática da Fisioterapia. Sua aplicabilidade clínica é bastante ampla, contudo, Bates (2008) assevera que certas bandagens, justamente por restringir certos movimentos e articulações, podendo obstruir fluidos.

A *kinesio taping* foi criada por Kenzo Kase em 1986 e ela ocasiona efeitos por meio de mecanismos biomecânicos e neurofisiológicos, mas deve-se destacar que o tratamento da dor e de patologias do sistema nervoso central depende principalmente dos efeitos neurológicos manifestados pelo paciente (THOMPSON, 2010).

Quanto à dor lombar há duas técnicas de bandagem funcional elástica que podem ser utilizadas:

1. Facilitadoras: apoia o movimento normal, mantendo a amplitude do movimento;
2. Inibidoras, diminui a inflamação local por meio de estímulos sensoriais, limitando a contração muscular hiperativa.

Para Moura (2010), a bandagem permite que estímulos neuromusculares sejam proporcionados devido ao aumento do *feedback* pela via aferente decorrente dos

receptores cutâneos. As bandagens dão assistência e suporte à musculatura, favorecendo sua movimentação e o retorno venoso e linfático. De acordo com Lemos (2011), as bandagens podem ser utilizadas em conjunto com outras técnicas terapêuticas, como crioterapia, hidroterapia, massoterapia e estimulação elétrica. Deve-se ressaltar que a *kinesio taping* estimula os aparelhos neurológico, circulatório e linfático.

Por fim, Cassiolato (2011) destaca que a bandagem funcional reduz edemas e a dor de lesões musculares, uma vez que a dor ocasionada pela pressão sobre os receptores sensoriais e neurológicos é diminuída pelas ondulações que a bandagem proporciona, elevando a pele e favorecendo a circulação sanguínea, assim como o sistema linfático.

Quanto às técnicas, devem obedecer certos princípios que devem ser respeitados, tais como:

- Ancoragem: princípio necessário em todas as aplicações, sendo distal e proximal e em tamanho proporcional à tensão aplicada;
- Tensão: a variação irá reger o efeito terapêutico da aplicação da bandagem.

A *kinesio taping* pode ser cortada em X, Y, I, teia de aranha ou espacial, conforme o objetivo visado. Quanto às suas propriedades terapêuticas, ela apresenta quatro efeitos fisiológicos, tais como analgésico, expansão, drenagem e articular (MATOS, 2002).

O efeito analgésico ocorre porque a fita favorece o estímulo dos receptores localizados nos planos cutâneo e subcutâneo, modelando os impulsos aferentes e regulando a dor. Ademais, considerando que lesões musculares provocam inflamações que iniciam o processo de reparação e influenciam o processamento da dor. A bandagem pode influenciar esse processo, uma vez que ela pode diminuir o edema e, conseqüentemente, a inflamação mediada pela irritação dos nociceptores periféricos (MATOS, 2002).

TRATAMENTOS CONSERVADORES

O repouso, trata-se de uma medida eficaz para o tratamento de lombalgias, especialmente as lombociatalgias e ciáticas. Contudo, não deve ser prolongado, uma vez

que a falta de atividade também afeta de modo negativo sobre o aparelho locomotor. (BRAZIL et al., 2004).

O repouso costuma ser executado em decúbito supino, com joelhos fletidos e pés apoiados sobre o leito, havendo ou não a flexão das pernas em um ângulo de 90° e uma mesma angulação das coxas em relação à bacia, de modo a retificar a coluna lombar. Esta posição permite que o indivíduo diminua a pressão sobre os discos intravertebrais e a musculatura paravertebral lombar. Quanto à sua duração, esta varia de acordo com a enfermidade e a intensidade da dor, sendo, em média, de três a seis dias no máximo. Uma exceção se dá quando a intensidade da dor não diminui neste período, havendo a possibilidade de o paciente repousar por um período maior (BRAZIL et al., 2004).

A terapia medicamentosa, tem foco no controle sintomático da dor, a fim de permitir a recuperação funcional o mais rapidamente possível. Paracetamol 500mg, 4 a 6 vezes ao dia é eficaz para o tratamento da dor de intensidade baixa ou moderada, observando os casos de hepatopatias e de usuários de antiinflamatórios. A Dipirona é bastante utilizado, assim como: ácido acetilsalicílico, clonixinato de lisina, viminol e flupirtina (BRAZIL et al., 2004).

REABILITAÇÃO

De acordo com Brazil et al. (2004), meios físicos de tratamento, ou seja, frio e calor, em suas são coadjuvantes na reabilitação, não agindo de modo eficaz para o combate às causas do agravo em questão. Quanto à eletroestimulação transcutânea, não há consenso acerca de sua eficácia, não sendo indicada no tratamento inicial da lombalgia mecânica aguda.

Do mesmo modo, há controvérsias sobre a eficácia da acupuntura em indivíduos portadores de lombalgia. Brazil et al. (2004), em conformidade com o que já foi apresentado, concorda com o fato de que a prática de atividades físicas é um meio eficaz de combate às lombalgias. Os autores destacam que a educação é um dos meios mais relevantes para uma reabilitação bem sucedida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A satisfação de necessidades por meio do trabalho permitiu a evolução da técnica e da colaboração entre os trabalhadores, mas também aumentou a exposição do homem a fatores de risco relacionados à prática e ao ambiente de trabalho, o que pode ocasionar problemas em sua saúde física e psicológica (RODRIGUES et al., 2013; GONTIJO et al., 2012; FREITAS, LUNARDI FILHO, LUNARDI, FREITAS, 2009).

O sistema capitalista favoreceu de modo particularmente relevante para a intensificação dos processos produtivos, aumentando a incidência de acidentes e enfermidades relacionadas ao trabalho. De acordo com Rodrigues et al., (2013) e Martins e Felli (2013), tal fato constitui-se em uma evidência clara do nexos causal entre trabalho e saúde.

O trabalho repetitivo é um fenômeno relativamente recente na história da humanidade, sendo constatado pela primeira vez em 1717, com Ramazini. É apenas na década de 1960 que um país começa a dar a devida importância a doenças laborais, quando o Japão estabeleceu o Comitê da Associação Japonesa de Saúde Ocupacional. No Brasil, apenas na década seguinte tais questões de saúde começaram a receber a devida importância, uma vez que este país foi o campeão mundial em acidentes de trabalho em 1972 (CÉLIA, 2003).

De acordo com a OIT cerca de 160 milhões de pessoas são acometidas por problemas de saúde de ordem laboral, com destaque para os distúrbios osteomusculares, entre os quais há as Lesões por Esforço Repetitivo (LER) e os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT), os quais correspondem a um conjunto heterogêneo de problemas funcionais e/ou orgânicos (FREITAS, LUNARDI FILHO, LUNARDI, FREITAS, 2009).

Além das LER e DORT, outro agravo de saúde relacionado ao trabalho é a lombalgia ocupacional, a doença ocupacional mais antiga de que se tem notícia, a qual corresponde a uma dor aguda ou crônica nas regiões lombar ou sacral, podendo relacionar-se a entorses e distensões musculares, deslocamento do disco intervertebral e outras condições (BORGES et al., 2012).

Trata-se de uma enfermidade comum entre trabalhadores braçais e é capaz de acarretar incapacidade temporária ou permanente no trabalho, sendo, portanto, um problema não apenas de saúde, mas econômico também. Os fatores de risco relacionados à lombalgia incluem falta de atividade física, obesidade, manutenção de postura estática, falta de desenvolvimento muscular e até mesmo questões psicológicas e sociais.

Quanto aos diagnósticos estrutural e sindrômico da lombalgia ocupacional, para que estes sejam estabelecidos, deve-se considerar as especificidades do trabalho executado pelo paciente, entre as quais: o local da atividade, posturas e movimentos exercidos pelo profissional, ritmo, duração, carga de trabalho, e até mesmo os já comentados aspectos psicossociais, uma vez que estes podem estar relacionados com estresse, agravando possíveis cargas osteomusculares (DIAS, GODOI, ALMEIDA, 2003).

Quanto ao tratamento, há diferentes modalidades possíveis, com diferentes graus de eficácia. Porém, há consenso quanto ao fato de que o repouso não deve ser muito duradouro, não ultrapassando o período de seis dias, exceto em casos específicos. E também há concordância quanto ao fato de que a prática de exercícios físicos constitui importante meio de prevenção e combate à lombalgia (BRAZIL et al., 2004).

REFERÊNCIAS

BARBOSA MSA, SANTOS RM, TREZZA MCSF. A vida do trabalhador antes e após a Lesão por Esforço Repetitivo (LER) e Doença Osteomuscular Relacionada ao Trabalho (DORT). *Rev Bras Enferm*, Brasília 2007 set-out; 60(5): 491-6.

BORGES TP et al. Aplicação da massagem para lombalgia ocupacional em funcionários de Enfermagem. *Rev. Latino-Am. Enfermagem*, 20(3): [9 telas] maio-jun. 2012.

BRACHER ESB, BENEDICTO CC, FACCHINATO APA. Quiropraxia. *Rev Med (São Paulo)*. 2013 jul.-set.,92(3):173-82.

BRAZIL. Ministério da Saúde. **Protocolo de investigação, diagnóstico, tratamento e prevenção de lesões por esforços repetitivos/ distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho**. Brasília, 2000.

BRAZIL AV et al. Diagnóstico e tratamento das lombalgias e lombociatalgias. *Rev Bras Reumatol*. v. 44. n. 6. p. 41 9-2 5. nov,dez. 2004.

CASSIOLATO, F. **Bandagens elásticas**, 2011.

CÉLIA RCRS. **Sintomas musculoesqueléticos e qualidade de vida em trabalhadores envolvidos em transportes de pacientes**. Dissertação de mestrado apresentada à Pós-Graduação da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, 2003.

CHAPMAN-SMITH, D. A. *Quiropraxia uma profissão na área da saúde*. São Paulo: Anhembi Morumbi, 2001.

DE VITTA A. A lombalgia e suas relações com o tipo de ocupação, com a idade e o sexo. *Rev. Bras. Fisiot.* Vol. I, No. 2, 67-72. 1996.

DIAS EC, GODOY SCB, ALMEIDA V. Desafio da abordagem multidisciplinar da lombalgia ocupacional. *Reme Rev. Min. Enf.*, 7(1):67-72, jan./jul., 2003.

FREITAS JRS, FILHO WDL, LUNARDI VL, FREITAS KSS. Distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho em profissionais de enfermagem de um hospital universitário. *Rev. Eletr. Enf.* [Internet]. 2009;11(4):904-11. Disponível em: <http://www.fen.ufg.br/revista/v11/n4/v11n4a16.htm>. Acesso em 05 jan 2016.

GONTIJO RS et al. Análise dos distúrbios osteomusculares relacionados à ergonomia em aciaria de uma empresa siderúrgica. *R. Enferm. Cent. O. Min.* 2012, mai/ago; 2(2):203-210.

JÚNIOR, M. H. GOLDENFUM, M. A. SIENA, C. Lombalgia ocupacional. *Rev Assoc Med Bras*; 56(5): 583-9. 2010. Lemos VT. *Apostila International kinesio ping*. 2011.

LIZIER, D. T. PEREZ, M. V. SAKATA, R. K. Exercícios para o tratamento de lombalgia inespecífica. *Revista Brasileira de Anestesiologia* Vol. 62, No 6, Novembro-Dezembro. 2012.

MARTINS AC, FELLI, VEA. Sintomas músculo-esqueléticos em graduandos de enfermagem. *Enfermagem em Foco*, 2013; 4(1): 58-62.

MATOS, N. Kinesio taping: conceitos e aplicações no mundo do desporto. *Revista Training*, Lisboa, n. p. 10-12, 2002

MENDES R, REIS P et al. *Estudo epidemiológico do perfil de morbi-mortalidade dos trabalhadores empregados na Alcan Alumínio do Brasil S.A. Fábrica de Ouro Preto-MG*. Belo Horizonte, 2000.

MOURA, ML. Efeito neuromuscular das técnicas fisioterapeúticas bandagem funcional e corrente interferencial na síndrome tensional cervical. *Dissertação de Mestrado apresentada à PósGraduação da Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas para obtenção do título de Mestre em Educação Física*, 2010.

PERRIN DH. *Bandagens funcionais e órteses*. Porto Alegre: Artmed, 2015.

RIBERTO M, CHIAPETTA LM, LOPES KAT, BATTISTELA LM. **A experiência brasileira com o core set da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde para lombalgia.** *Coluna/Columna*. 2011; 10(2): 121-6

RODRIGUES BC. Limitações e consequências na vida do trabalhador ocasionadas por doenças relacionadas ao trabalho. *Rev Rene*. 2013; 14(2):448-57.

SCUSSIATO LA et al. Análise dos agravos relacionados ao trabalho notificados pela unidade saúde do trabalhador. *REVE – Rev. Min. Enferm*. 2010, 14(1): 88-95, jan./mar.

SCHILLING RSF. *More effective prevention in occupational health practice. Journal of the Society of Occupational Medicine*, 1984:39;71-9.

SOUZA MT, SILVA MD, CARVALHO R. **Revisão integrativa: o que é e como fazer?** *Einstein*. 2010; 8(1 Pt 1):102-6

QUINTANA JM et al. A utilização da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde no cuidado de idosos. *Revista de Enfermagem Referência Série IV* - n.º 1 - Fev./Mar. 2014

THOMPSON D. *Bandagem Funcional, aspectos teóricos*. Oklahoma City 2010.

TOSCANO, J. J. O. EGYPTO, E. P. A influência do sedentarismo na prevalência de lombalgia. *Rev Bras Med Esporte*, Vol. 7, Nº 4 – Jul/Ago, 2001.

CAPÍTULO III

CIRURGIA METABÓLICA COMO ALTERNATIVA AO TRATAMENTO DO DIABETES MELLITUS TIPO II NO PACIENTE PORTADOR DE OBESIDADE

Eduarda Heringer Bernis⁶; Ingridy Maria Diniz Melo Azevedo⁷;

João Arthur Rodrigues Barbosa⁸; Elisa de Castro Correia⁹;

Mariana Didier Reis¹⁰.

DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2021.02-03

RESUMO:

INTRODUÇÃO: A prevalência de Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2 OU DMT 2) e obesidade têm se elevado vertiginosamente e afeta cada vez mais pessoas ao redor do mundo, adquirindo características epidêmicas em vários países, e o cenário atual apresenta projeções negativas para o futuro. O conceito de cirurgia metabólica foi desenvolvido a partir da necessidade em inovação terapêutica para os pacientes acometidos por essa patologia endócrina. **MÉTODO:** Realizou-se análise e revisão do conhecimento disponível, na literatura científica, de artigos publicados entre os anos de 2000 e 2020, nas bases de dados SciELO, PubMed e Medline. **RESULTADOS:** Nas últimas décadas, a partir de uma visão multissistêmica da obesidade, diversos mecanismos do sistema gastrointestinal foram descobertos, tornando possível a compreensão, com uma nova visão científica, o porquê de o procedimento cirúrgico em questão ser capaz de tratar tanto a obesidade quanto o DMT2. **CONCLUSÃO:** O desenvolvimento da cirurgia metabólica como uma nova alternativa de tratamento para pacientes com DMT2, doença desafiadora para o médico, foi uma imensurável conquista multidisciplinar para a medicina.

PALAVRAS-CHAVE: Cirurgia metabólica. Cirurgia bariátrica. Diabetes Mellitus.

METABOLIC SURGERY AS AN ALTERNATIVE TO THE TREATMENT OF DIABETES MELLITUS TYPE II IN THE PATIENT WITH OBESITY

ABSTRACT:

INTRODUCTION: The prevalence of Type 2 Diabetes Mellitus (DM2 OR DMT 2) and obesity has skyrocketed and affects more and more people around the world, acquiring epidemic characteristics in several countries, and the current scenario presents negative projections for the future. The concept of metabolic surgery was developed from the need for therapeutic innovation for patients affected by this endocrine pathology. **METHOD:**

⁶ Acadêmica do 9º período da Faculdade da Saúde e Ecologia Humana (FASEH). E-mail: eduardabernis@hotmail.com

⁷ Acadêmica do 8º período da Faculdade da Saúde e Ecologia Humana (FASEH). E-mail: ingridymdiniz@gmail.com

⁸ Acadêmico do 9º período da Faculdade da Saúde e Ecologia Humana (FASEH). E-mail: jjarthur97@gmail.com

⁹ Acadêmico do 8º período da Faculdade da Saúde e Ecologia Humana (FASEH). E-mail: elisacastro368@gmail.com

¹⁰ Acadêmica do 9º período da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais. E-mail: marianadidier@gmail.com

An analysis and review of the knowledge available in the scientific literature of articles published between the years 2000 and 2020 in the SciELO, PubMed and Medline databases was carried out. **RESULTS:** In the last decades, from a multisystemic view of obesity, several mechanisms of the gastrointestinal system were discovered, making it possible to understand, with a new scientific view, why the surgical procedure in question is capable of treating both obesity and DMT2. **CONCLUSION:** The development of metabolic surgery as a new treatment alternative for patients with T2DM, a challenging disease for the physician, was an immeasurable multidisciplinary achievement for medicine.

KEYWORDS: Metabolic surgery. Bariatric surgery. Diabetes mellitus.

INTRODUÇÃO

O Diabetes Mellitus (DM) é uma patologia compreendida em um grupo de doenças metabólicas que possui como característica principal o aumento dos níveis de glicose sanguínea devido a um distúrbio na secreção ou na ação da insulina. Essa é uma síndrome do metabolismo defeituoso de carboidratos, lipídios e proteínas.

O DM tipo I é caracterizado pela falta de produção da insulina por um processo autoimune onde o organismo não reconhece as células beta do pâncreas. A destruição dessas células beta leva o organismo a uma incapacidade total ou quase total de produzir o hormônio, sendo o paciente obrigado a fazer uso de insulina sintética, recebendo o nome, de paciente insulino-dependente. Já o diabetes tipo II (DMT2) é ocasionado por um defeito que pode acometer a produção e a secreção da insulina pelo pâncreas, tornando o paciente um produtor de quantidade insuficiente ou um portador de problema nos receptores (resistência insulínica). Geralmente ocorre em pessoas que possuem entre 50 e 60 anos, porém sua prevalência tem aumentado nos adultos jovens, tendência relacionada à maior prevalência da obesidade.

A obesidade é uma doença crônica que pode ser definida, sumariamente, como uma patologia onde há o acúmulo excessivo de gordura corporal, sendo consequência direta de um balanço energético positivo. Essa doença acarreta repercussões à saúde, como complicações cardiovasculares, com perda importante na qualidade e na expectativa de vida, fato conhecido desde a época de Hipócrates (460 a.C. a 377 a.C.). O aumento de peso possui associação direta com a maior incidência do DMT2, pois leva o organismo a um aumento da resistência dos tecidos à ação da insulina. Entretanto, a

distribuição de gordura no corpo de um indivíduo é o fator de maior importância para a ocorrência dessa patologia: o acúmulo abdominal, independente do índice de massa corpórea (IMC), juntamente com uma predisposição genética, gera a maior incidência de DMT2 e de outros componentes de síndromes metabólicas. Percebemos então o DMT2 como um grande desafio para a medicina.

O tratamento clínico do diabetes vem melhorando e se modernizando com a incorporação de novos medicamentos para seu controle, porém, por ser uma enfermidade progressiva, os números de pacientes que estão sob controle ainda são modestos. Vários fatores associam-se à dificuldade de manejo clínico desses pacientes, incluindo a própria característica da doença e a aderência ao tratamento, que, por vezes, é de difícil assimilação, pelo uso de fármacos injetáveis e o alto custo das insulinas e drogas de últimas gerações.

Nesse contexto desafiador, as cirurgias bariátricas surgiram como uma opção bastante eficaz para a perda e manutenção do peso por tempo prolongado, além de proporcionarem importante redução da morbimortalidade dos pacientes. Nas últimas décadas, foi comprovada a intrínseca relação entre a realização dessas cirurgias e o controle do DM e, nesse cenário, surgiu o termo "cirurgia metabólica". Estudos feitos em pacientes submetidos a cirurgia bariátrica que possuíam DMT2 constataram que o controle glicêmico foi obtido muito antes da perda de peso, dessa forma, os chamados "efeitos antidiabéticos" provenientes das operações independeriam da perda ponderal.

A complexidade do quadro clínico dos indivíduos com obesidade e DM e as alterações fisiológicas e psíquicas ligadas às operações bariátricas e metabólicas tornam imprescindível uma abordagem multidisciplinar. A multidisciplinaridade se traduz em equipes multiprofissionais que devem ter capacidade técnica para indicar adequadamente a cirurgia individualmente a cada paciente, além do necessário acompanhamento dos indivíduos candidatos ao procedimento, cuidando de suas morbidades clínico-psíquico-nutricionais no pré e pós-operatório. Mediante esta perspectiva, conclui-se que o desenvolvimento da técnica cirúrgica voltada para pacientes diabéticos e obesos foi uma grande conquista na medicina.

MÉTODOS

Para a estruturação deste trabalho, realizou-se uma análise e revisão do conhecimento disponível na literatura científica de artigos publicados entre os anos de 2000 e 2020, nas bases de dados SciELO (*Scientific Electronic Library Online*), PubMed e Medline (*Medical Literature Analysis and Retrieval System Online*). Foram adotados, para consulta às bases de dados os seguintes descritores: *cirurgia metabólica*, *cirurgia bariátrica* e *diabetes mellitus*.

RESULTADOS

Foram analisados dados em diferentes referenciais para chegar aos resultados do presente trabalho.

Tabela 1 - Dados observados nos principais estudos incluídos no presente trabalho (elaborado pelos autores)

AUTOR/ANO	RESULTADOS
Maria 2001	PC, A cirurgia bariátrica pode reduzir ou erradicar as comorbidades inerentes à obesidade, assim como promover uma redução satisfatória no índice de massa corporal, porém tende a provocar déficits nutricionais importantes se os pacientes não forem bem monitorados, com uso de suplementos nutricionais adequados. Houve redução de gordura corporal e aumento de massa magra e água. Constatou-se que a qualidade de vida dos pacientes operados melhorou após a cirurgia, apresentando insucesso no quadrante saúde nos indivíduos que não praticam atividade física três vezes por semana.
Philip, Bartolome,	O Bypass gástrico em Y de Roux laparoscópico (RYGB) resultou em perda de peso significativa (60% por cento do excesso de perda de peso corporal) e resolução (83%) de DM2. Os pacientes com a menor

Sayeed et al, 2003 duração e a forma mais leve de DM2 apresentaram maior taxa de resolução de DM2 após a cirurgia, sugerindo que a intervenção cirúrgica precoce é garantida para aumentar a probabilidade de tornar pacientes com problemas de ácido euglicêmico.

Magda, Maria A, Selma et al, 2008 O trabalho analisou a importância da intervenção multidisciplinar no tratamento cirúrgico da gastropastia em pacientes obesos mórbidos. A análise dos dados foi aferida e foi feita uma tabela de frequência, onde se verificou que os pacientes partiram de um peso médio de 126,01kg apresentando uma perda ponderal média de 35 kg, equivalente a aproximadamente 40% de perda ponderal em doze meses de acompanhamento, o que sugere que a atuação multidisciplinar adequada e evidencia a importância da intervenção dos profissionais da equipe.

Rubino F et al, 2009 No fim de março de 2007, um grupo de aproximadamente 53 profissionais envolvidos com DM2 reuniu-se em Roma para uma conferência de consenso sobre os próximos passos a serem seguidos para alcançar o sucesso no campo da Cirurgia Metabólica. O evento foi chamado de *Diabetes Surgery Summit*.

Roland et al, 2013 A cirurgia bariátrica mais comum, o bypass gástrico de Roux-en-Y, leva à normalização da glicemia na maioria dos pacientes muito antes de qualquer perda de peso apreciável. Este efeito é muito grande para ser atribuído puramente à restrição calórica, de modo que vários outros mecanismos foram propostos. A hipótese mais popular é a produção melhorada de um incretina, um peptídeo-1 semelhante a um glucagon ativo (GLP-1), no intestino inferior.

Jana et al, 2014 O Projeto Obeso Saudável BioSHaRE-EU tem como objetivo obter informações sobre as consequências da obesidade (saudável) usando dados sobre fatores de risco e fenótipos em vários estudos de coortes em larga escala. O objetivo deste estudo foi descrever a prevalência de obesidade, síndrome metabólica (MetS) e obesidade metabolicamente saudável (MHO) em dez estudos participantes, já que nem todos os obesos têm um perfil metabólico adverso predispondo-os a desenvolver DMT2 ou DCV.

Carolina, 2015 Estudo transversal realizado com pacientes submetidos à cirurgia bariátrica mostrou que a auto-eficácia e a resiliência são fatores importantes frente ao estilo comportamental necessário para o sucesso do tratamento e da adequação alimentar.

Cássio et al, 2017 O estudo revelou que a busca pela cirurgia bariátrica acontece por indivíduos em idade produtiva de ambos os sexos, e está relacionada à presença de patologias associadas, confirmando a condição multissistêmica da obesidade.

DISCUSSÃO

PREVALÊNCIA E GRAVIDADE DA OBESIDADE

A obesidade é uma doença grave associada a elevada morbimortalidade. Referências revelam que a taxa de mortalidade relacionada à obesidade é 12 vezes maior nas idades entre 25 a 34 anos e 6 vezes nas idades 35 a 44 anos, indicando que os maiores riscos dessa condição clínica patológica se concentram em indivíduos adultos em idade produtiva. De acordo com dados de 2010 do IBGE, a obesidade é uma epidemia no Brasil e, em 10 anos, o país se igualaria aos números dos Estados Unidos (EUA).

Estima-se que a obesidade seja responsável por mais de 2,8 milhões de mortes no mundo por ano devido ao aumento da prevalência de comorbidades relacionadas, incluindo DMT2, dislipidemia, hipertensão arterial (HAS), apneia obstrutiva do sono,

doença cardíaca, acidente vascular cerebral, asma, problemas degenerativos, neoplasias e depressão.

As inúmeras comorbidades associadas à obesidade, especialmente, em pacientes portadores das formas mais graves da doença se traduzem em alta morbimortalidade, custos à saúde e alteração da qualidade de vida dos indivíduos acometidos. O Brasil, nas últimas décadas, experimenta prevalência crescente dessa patologia e essa situação, há um tempo, vem gerando grande preocupação aos gestores da saúde pública e privada, com necessidade da criação de políticas específicas. O tratamento da obesidade é um enorme desafio, uma vez que os recursos terapêuticos clínicos são pouco eficazes em médio e longo prazos e, na maioria das vezes, os doentes são portadores de múltiplos distúrbios, envolvendo, além de alterações fisiológicas em seu sistema endócrino, muito comumente, alterações psíquicas.

ASSOCIAÇÃO ENTRE OBESIDADE E DMT2

Embora haja um componente hereditário importante, o ganho de peso e o sedentarismo guardam estreita relação com o aparecimento do DMT2. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), estima-se que 60% a 90% dos portadores do DMT2 sejam obesos e a incidência é maior após os 40 anos.

A obesidade é um grave fator de risco cardiovascular e de distúrbio na homeostase glicose insulina. Resultando-se em várias alterações fisiopatológicas como a menor extração de insulina pelo fígado, com aumento da produção hepática de glicose e diminuição da captação de glicose pelo tecido muscular. Esses eventos podem resultar em diferentes graus de intolerância à glicose e, nos indivíduos com DMT2, irão influenciar o controle glicêmico, refletido por maiores níveis de hemoglobina glicosilada (HbA1c)

Portanto, juntamente com a diminuição da resistência à insulina, a perda de peso melhora a resposta das células beta pancreáticas à glicose, além de estar associada a um aumento na liberação de insulina e a uma redução na imunorreatividade da pró insulina.

GRAVIDADE DA DM2

O DMT2 é considerado uma doença crônica e complexa, que exige um seguimento clínico contínuo com o intuito de reduzir, além da glicemia, outros fatores de risco cardiovasculares. A atual abordagem clínica de DMT2 e de obesos segue várias etapas, começando com mudança de estilo de vida, seguindo para terapia farmacológica oral até atingir o controle por insulina. Caso essa linha de tratamento não seja eficaz e o paciente não consiga atingir um controle glicêmico adequado, complicações microvasculares começam a surgir e, ao longo do tempo, o quadro vai se tornando irreversível, como demonstrado no esquema abaixo (Figura 3). Portanto, é possível afirmar que em pacientes portadores de DMT2 e obesidade grave, existe um grande benefício em tentar não permitir que o quadro de complicações da doença avance através da indicação da cirurgia bariátrica. Ademais, é substancial ressaltar que um grupo seletivo de pacientes diabéticos portadores de obesidade leve também se beneficiam dessa terapêutica.

Figura 1: Linha do tempo mostrando o curso clínico do DMT2 com as principais alterações ao longo dos anos e a sequência usual de intervenções propostas ao paciente. (elaborado pelos autores).

APARECIMENTO DA CIRURGIA BARIÁTRICA

A cirurgia bariátrica (“baros” do grego - peso e “iatren” - tratamento) é um procedimento cirúrgico no trato gastrointestinal que visa o controle da doença obesidade através da redução da ingestão de alimentos e/ou a absorção de nutrientes.

Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), nosso país é o segundo com mais cirurgias realizadas, atrás apenas dos EUA. O número de procedimentos cresceu 90% nos últimos cinco anos e 300% em dez anos. No SUS, o número de cirurgias bariátricas cresceu 215% entre os 2008 e 2016. Ressalta-se, ainda, que os números são crescentes devido ao gradual aumento do acometimento da população pela obesidade.

CIRURGIA BARIÁTRICA LEVANDO À REMISSÃO DO DMT2

Na década de 1980, Prioires e colegas publicaram um artigo que mostra que 99% dos pacientes portadores de DMT2 ou com intolerância à glicose, obtiveram melhora precoce do controle glicêmico alguns dias após a cirurgia de RYGB para tratamento de obesidade, antes mesmo da perda de peso se mostrar significativa. Em uma meta-análise realizada em 2004, Buchwald encontrou como resultado que houve uma remissão em 78,1% do DMT2, incluindo várias modalidades cirúrgicas, mas esse estudo teve como limitação a falta de critérios mais rígidos que indicassem a remissão da doença. O estudo SOS (Swedish Obesity Subjects) comparou pacientes submetidos a técnicas diferentes de cirurgia metabólica com pacientes que se sujeitaram, apenas, a tratamento clínico (grupo controle). Percebeu-se que, após dois anos de seguimento, a prevalência de DMT2 nos pacientes do grupo controle foi de 8% e, no grupo cirúrgico, foi de 1%. Quando passados 10 anos, a prevalência aumentou para 24% no grupo controle e 7% no grupo operado. Esse estudo concluiu, ainda, que a cirurgia reduziu em 40% a mortalidade por todas as causas, em 56% a mortalidade por doenças coronarianas, em 60% por câncer e em impressionantes 92% por diabetes. Outros estudos mostraram que aproximadamente 80% dos pacientes obesos que se submeteram a uma RYGB obtiveram remissão total do DMT2. Sendo assim, a cura da DMT2 para alguns pacientes pode ser uma realidade no contexto atual da medicina.

CONCEITO DE CIRURGIA METABÓLICA

Enquanto o objetivo da cirurgia bariátrica é o controle do peso, a cirurgia metabólica tem como objetivo o controle do DMT2 e de outras comorbidades associadas

à obesidade, como hipertensão, dislipidemia e esteatose hepática. Define-se então a cirurgia metabólica como qualquer intervenção do tubo digestivo que tenha como finalidade o controle do diabetes mellitus tipo 2, com ou sem medicação, através de mecanismos independentes da perda de peso, e secundariamente pela perda de peso (Centro de Obesidade e Diabetes).

ALTERAÇÕES METABÓLICAS DECORRENTES DA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA

Diversos mecanismos do sistema gastrointestinal foram descobertos junto com a ascensão do termo "cirurgia metabólica", facilitando a compreensão, com uma nova visão científica, do porquê de o procedimento cirúrgico ser capaz de tratar o DMT2 e outras disfunções metabólicas. Dentre esses hormônios, os principais são a Grelina, o GLP-1 e o peptídeo YY (PYY), descobertos apenas nos anos 2000, décadas após a realização da primeira bariátrica pelo método Bypass.

A grelina é um peptídeo secretado por glândulas oxínticas do fundo gástrico, onde está em maior concentração, sendo um potente orexígeno intimamente conectado com o centro hipotalâmico. Em pacientes obesos, a resposta a este orexígeno é inibida. Compreende-se então que a cirurgia visa o fundo gástrico, e por consequência, controla-se a resposta hormonal, causando saciedade ao paciente. No gráfico abaixo, é possível analisar os níveis de grelina e a consequente saciedade induzida por esse hormônio em pacientes normais e pacientes submetidos a cirurgia metabólica por Bypass.

Gráfico 1: Níveis de grelina, ao longo do dia, em pacientes com peso normal x pacientes submetidos a cirurgia (elaborado pelos autores)

O peptídeo semelhante a glucagon (GLP-1) é uma incretina, ou seja, uma substância produzida pelo pâncreas e pelos intestinos que regula o metabolismo da glicose, sendo a insulina e o glucagon os exemplos mais clássicos dessa classe de substâncias. O GLP-1 é um hormônio produzido pelas células enteroendócrinas, principalmente do íleo terminal, que aumenta a secreção, a expressão gênica e a proliferação das células beta pancreáticas produtoras de insulina, inibindo também a ação do glucagon. O aumento de sua concentração no corpo é dependente da presença de nutrientes, principalmente carboidratos, proteínas e lipídios no lúmen do íleo. Sendo assim, a gastroplastia de derivação intestinal em Y Roux, desvi o trajeto do bolo alimentar de parte do jejuno e faz com que os nutrientes cheguem no principal local de sensibilização das células enteroendócrinas, levando a secreção de GLP-1.

É importante ressaltar que GLP-1 e PYY apresentam níveis normais em jejum em pacientes com IMC abaixo de 25. Entretanto, os níveis pós prandiais estão baixos em portadores de obesidade, fato que ainda não é justificado certamente. Acredita-se que pode estar associado a fatores genéticos ainda incompreendidos e à própria reação hormonal induzida pelo excesso de tecido adiposo. Observa-se, portanto, que, de forma contrária, ao realizar a cirurgia metabólica, deve-se visar a redução de grelina e, em contrapartida, o estímulo de GLP-1 e PYY.

Logo após a cirurgia metabólica, o organismo do paciente passa por restrição calórica aguda devido à privação alimentar e, depois de 3 a 7 dias, quando o paciente retorna à alimentação com maior oferta de calorias, o organismo passa por uma sensibilização à insulina. Isso ocorre devido à redução repentina da concentração plasmática de glicose e insulina, o que sensibiliza as células beta pancreáticas a produzir esse hormônio.

Após um tempo considerável da realização do procedimento, alguns aspectos favorecem o controle da glicemia de maneira mais adequada. A perda de peso afeta diretamente a concentração de adiponectina na corrente sanguínea. Essa substância é um hormônio produzido pelo tecido adiposo e sua concentração é inversamente proporcional à quantidade de gordura corporal em adultos. A adiponectina está diretamente relacionada à supressão de eventos metabólicos, como o DM2, por estimular o aumento da

concentração de receptores de insulina nas células, reduzindo a resistência periférica à insulina.

CRITÉRIOS DE INDICAÇÃO

No ano de 2009, a Associação Americana de Diabetes (ADA) incluiu a cirurgia bariátrica como tratamento alternativo para o diabetes, e em 2010, a Diabetes Surgery Summit Consensus Conference reconheceu a legitimidade do procedimento cirúrgico em questão como uma opção para tratar pacientes com DMT2, criteriosamente selecionados, com IMC > 30, sendo eles obesos não-graves e sem controle glicêmico. Em 2011, a International Federation of Diabetes (IFD) introduziu a cirurgia metabólica nos algoritmos de tratamento de DMT2 como alternativa para pacientes com IMC entre 30 e 35 kg/m², desde que a doença não tenha sido controlada com tratamento medicamentoso otimizado e esteja associada a fatores de risco para doença cardiovascular. Já em 2016, 49 associações médicas de diferentes países passaram a adotar essa mesma premissa.

Em 2017, o Conselho Federal de Medicina (CFM) publicou a resolução número 2.172/2017, onde ampliou a indicação da cirurgia metabólica para o tratamento de pacientes com diabetes. Sumariamente, as normas da resolução consideram paciente portador de DMT2 há menos de 10 anos e IMC entre 30 e 34,9 kg/m², e com, obrigatoriamente, mais de 30 anos de idade e, no máximo, 70. A indicação cirúrgica deve ser feita por dois médicos endocrinologistas, havendo a necessidade de um parecer que mostre que o paciente apresentou resistência ao tratamento clínico com antidiabéticos orais e/ou injetáveis, mudanças no estilo de vida e que compareceu ao endocrinologista por, no mínimo, dois anos, somado a ausência de contraindicações.

No SUS os critérios e indicações são os mesmos utilizados na rede privada, ditadas pelo CFM. Entretanto, o acesso a cirurgia bariátrica pelo Sistema Único de Saúde é de difícil acesso, sendo a fila de espera de pacientes uma das maiores queixas dos candidatos.

Segundo o CFM, em uma resolução de 2017, a técnica de primeira escolha para o tratamento de pacientes com DMT2 não controlado clinicamente, com IMC 30 kg/m² é a gastroplastia com derivação intestinal em Y Roux (RYGB), também denominada Bypass.

CONTRAINDICAÇÕES

As contraindicações e limitações para cirurgia bariátrica em obesos com DM 2 são: IMC < 30 kg/m², peptídeo C < 1 ng/mL, doença coronariana aguda, pacientes portadores de nefropatia, pneumonia, cardiopatia ou hepatopatia avançada, alcoolismo e uso de drogas, distúrbios psiquiátricos graves, neoplasias, gestantes e pacientes com baixa motivação e suporte social inadequado.

CONDUTA E NECESSIDADE DE SEGUIMENTO

A escolha da conduta deve ser sempre centrada no paciente, com metas individualizadas, respeitando dificuldades assim como a vontade e as preferências do paciente, e evitando efeitos adversos. Em 2016, a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) e a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica (ABESO) emitiram um comunicado no website da Sociedade Brasileira de Diabetes em que reconhecem o DMT2 como doença crônica e complexa, que exige tratamento contínuo e com abordagens multidisciplinares, a fim de evitar a progressão da doença e seus efeitos negativos a longo prazo. Nesse comunicado, reconhecem também a importância da cirurgia metabólica como opção de tratamento, considerando que essa abordagem tem mostrado relevantes efeitos positivos no controle glicêmico e outros benefícios, apesar de reconhecer a metformina como primeira opção de tratamento. No fluxograma abaixo, há uma espécie de algoritmo atualizado para o tratamento do DMT2.

Figura 2: Algoritmo para o tratamento da DM 2, de acordo com as recomendações dos delegados votantes da DSS-II. (elaborado pelos autores).

TFA = terapêutica farmacológica anti-hiperglicemiante.

O aparecimento da videocirurgia e o seu rápido desenvolvimento chegaram à cirurgia bariátrica no ano de 1998. Os resultados são semelhantes à via laparotômica, com menor índice de complicações. Na cirurgia laparoscópica, são necessárias técnicas e equipamentos especiais, tornando a cirurgia mais complexa e aumentando o tempo cirúrgico e, conseqüentemente, o custo do procedimento também aumenta. Em função dessa oneração, o SUS, mesmo reconhecendo os excelentes resultados da cirurgia laparoscópica, faz apenas a cirurgia via laparotômica.

Os resultados esperados com a cirurgia bariátrica incluem a perda de peso, melhora das comorbidades relacionadas e da qualidade de vida. É vista a melhora da qualidade de vida, dos parâmetros cardiorrespiratórios (dor torácica, dispneia, apneia do sono e hipertensão) e metabólicos (DM e distúrbios lipídicos) associados a uma perda substancial de peso induzida pela cirurgia. A mortalidade perioperatória está em torno de 0.3 a 1.6 %. A principal complicação dessa cirurgia, também relacionada a mortalidade,

é a embolia pulmonar advinda de uma trombose venosa profunda. As principais vantagens observadas são: perda de peso corporal (cerca de 40% em 12 a 18 meses), melhora do perfil lipídico, melhora da esteatose fibrosa, glicemia de jejum e albumina sérica dentro dos valores da normalidade, redução da insulina e redução dos riscos cardiovasculares. É considerado normal um reganho de 2 a 5% de peso em até 24 meses. Quanto às principais desvantagens, destacam-se o aparecimento de: deficiência de cálcio e ácido fólico, anemia ferropriva, deficiência de vitamina B, colelitíase, hérnias incisionais, fístulas digestivas, embolia pulmonar maciça, alopecia, depressão, compulsão alimentar e anorexia nervosa. A taxa de falha de cirurgia é de aproximadamente 3%, quando ocorre perda menor do que 15% do peso corporal após cinco anos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A cirurgia metabólica surgiu como uma nova perspectiva para tratamento de pacientes diabéticos e seu desenvolvimento e aperfeiçoamento ocorreu em função de uma demanda clínica da endocrinologia. Atualmente, as diferentes técnicas cirúrgicas visam, além da redução ponderal, a melhora do quadro de DMT2 nos pacientes portadores desse distúrbio metabólico. Com a alta incidência epidemiológica dessa patologia e sabendo que é de difícil controle, a conduta terapêutica através da cirurgia é uma maneira segura com resultados positivos a curto, médio e longo prazo, diminuindo também a mortalidade de origem desses pacientes.

Pesquisas mostraram que aproximadamente 80% dos diabéticos chegam à completa remissão da patologia após a realização da cirurgia metabólica do tipo derivação intestinal em Y de Roux. Para explicar esses dados, surgiu a hipótese da restrição calórica e do aumento do GLP-1. Tendo em vista tamanhos benefícios trazidos pela cirurgia aos pacientes portadores de DMT2, a realização desse procedimento se tornou legalmente possível, no Brasil, através do SUS e, também, por meio de convênios de saúde privados. Entretanto, vale ressaltar que é imprescindível que o paciente se encaixe em todos os critérios pré-determinados para que seja possível a indicação segura da cirurgia bariátrica.

Mesmo com toda a evidência disponível, não é possível explicar a expressividade dos efeitos dessa técnica, em sua totalidade, no metabolismo da glicose, mas é possível constatar que os mecanismos que envolvem essa intervenção são complexos e ainda incompreendidos, mostrando a necessidade de constante busca ao conhecimento. É inegável que o desenvolvimento da cirurgia metabólica e os incansáveis estudos voltados para a concreta indicação desse procedimento para tratamento de pacientes diabéticos foi uma imensurável conquista no enfrentamento do desafio que é a DMT2.

REFERÊNCIAS

1. Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia [internet]. **Cirurgia metabólica para diabetes**: saiba o que a SBEM tem a dizer sobre o assunto.
2. Sociedade Brasileira de Diabetes. **Diabetes na prática clínica**. [livro online].
3. Arthur CG, John EH. **Tratado de Fisiologia Médica**. 11. ed.. Rio de Janeiro: Elsevier; 2006
4. Consultation on Obesity. World Health Organization. **Obesity**: Preventing And Managing The Global Epidemic. Geneva: 2000
5. Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica [Internet]. **Número de cirurgias bariátricas no Brasil cresce 7,5% em 2016**. São Paulo; 24 Jan 2017.
6. Roland EA, Tyler DH, Jia LN, Roberto DO, Michel AG, Othmane B, Philippe F and Abdelilah A. **Mechanisms behind the immediate effects of Roux-en-Y gastric bypass surgery on type 2 diabetes**. T Biol and Med M; 2013; 10/45.
7. Cássio DAS, Madria AF, Maria Clara SPGM, Roberta L G, Fernanda FS. Perfil Clínico de Pacientes Candidatos à Cirurgia Bariátrica. **Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento**. Jul./Ago. 2017; v.11. n.64: p.211-216.
8. Jana VVO, Marja LN, Sandra NS, Dany D. **The prevalence of metabolic syndrome and metabolically healthy obesity in Europe**: a collaborative analysis of ten large cohort studies. Dez 2014: 14/ 9
9. Luciana B, Denizar V. **Cirurgia Bariátrica. Instituto de Estudos de Saúde Suplementar** [Pareceres Técnico-Científicos]. Rio de Janeiro: Departamento de Clínica Médica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
10. Maria PC. **Avaliação Nutricional e de Qualidade de Vida de Pacientes Submetidos à Cirurgia Bariátrica** [dissertação]. Florianópolis: Universidade Federal De Santa Catarina; 2001

11. Magda GS , Maria Aparecida MFNB, Selma MS et al. A Importância da Intervenção Multidisciplinar no Tratamento da Obesidade Mórbida Considerando o Acompanhamento Nutricional Pré e Pós Cirúrgico. **Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento**. Nov/Dez. 2008; 2 (12) .588-596
12. Bruno Z, Manoel GN, Almino CR. **O papel da cirurgia no tratamento da obesidade**. Moreira Jr. Editora. Out/Nov 2001; 258-264
13. Dora MDL, Jocemar NE. Vantagens e desvantagens da cirurgia bariátrica para o tratamento da obesidade mórbida. **Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento**. Julho-agosto.Ago 2008; 2 (10): 376-383
14. Philip RS, Bartolome B, Sayeed I et al. **Effect of Laparoscopic Roux-En Y Gastric Bypass on Type 2 Diabetes Mellitus**. Annals of Surger. October 2003; 238 (4): 467-485.
15. Francesco R, David EC. **Recommendations for the Evaluation and Use of Gastrointestinal Surgery to Treat Type 2 Diabetes Melitus**. The Diabetes Surgery Summit Consensus Conference. 2009. 1-7

CAPÍTULO IV

COLECISTITE ASSOCIADA A ÍLEO BILIAR: UM RELATO DE CASO

Marina Gomes Silva Martins¹¹; Luiza Pires Miranda¹²;

Romullo V. Dutra Menezes¹³; Lays Viana Freitas¹⁴;

Tassiana Soares Silva¹⁵; Lucianno Viana Ribeiro¹⁶;

Vitor Hugo Neves Santos¹⁷.

DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2021.02-04

RESUMO:

Dentre as várias etiologias de dores abdominais, destaca-se a colecistite aguda que é uma afecção comumente diagnosticada nos serviços de urgência e emergência. É mais comum em mulheres e secundária a colelitíase, podendo evoluir para abdome agudo se não tratada corretamente. Além disso, após a cirurgia de colecistectomia, há chances de se fistulizar causando um grande problema para o paciente e até mesmo íleo biliar. A revisão bibliográfica foi realizada por meio de artigos e livros disponibilizados na íntegra, encontrados de forma completa em plataformas de pesquisas como: BVS, SCIELO, LILACS e PUBMED. O objetivo deste trabalho é discutir, por meio de uma revisão literária, o diagnóstico e o tratamento do íleo biliar. No presente artigo, relatamos o caso clínico de colelitíase em uma paciente do sexo feminino, 44 anos, obesa, hipertensa e diabética que relatou dor intensa e constante em região do hipocôndrio direito, acompanhada de náuseas e vômitos. A paciente foi diagnosticada com colecistite, feito tratamento com antibioticoterapia para regressão de processo infeccioso e inflamatório. Porém, houve persistência da dor e optou-se por colecistectomia aberta. Durante a cirurgia, foi constatada a presença de fístula biliodigestiva. No pós-operatório, doente evoluiu com quadro de íleo biliar, sendo submetida à laparotomia e tratamento definitivo do quadro.

PALAVRAS-CHAVE: Colecistectomia. Colecistite. Colelitíase. Fístula Biliodigestiva. Íleo Biliar.

¹¹Graduação em Medicina pela UNEC, residência de cirurgia geral pelo hospital Deraldo Guimarães, e socorrista pelo SAMU, atuante em ultrassonografia abdominal. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0385514553163313>. E-mail: marina_martins00@hotmail.com

¹²Graduada em Medicina pela Universidade de Itaúna. E-mail: luizapiresmiranda@gmail.com

¹³Graduando em Medicina pela Universidade de Itaúna. E-mail: romullodutra@hotmail.com

¹⁴Graduada em Medicina pelas Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros (FIP-Moc). E-mail: laysvf@hotmail.com

¹⁵Graduada em Medicina pela Universidade Vila Velha (UVV). E-mail: tassianas2@hotmail.com

¹⁶ Residência médica em cirurgia geral, pós graduação em endoscopia digestiva e motilidade digestiva. Idealizador do Gastrocentro em Almenara MG, vale do Jequitinhonha. Título de especialista em endoscopia pela SOBED/AMB. Coordenador da COREME do Hospital Deraldo Guimarães em Almenara. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0115745789367234>. E-mail: luciannovianaribeiro@hotmail.com

¹⁷Graduado em Medicina pela Universidade de Itauna-MG (2014) Cirurgião geral Hospital Deraldo Guimarães (2018), residente Endoscopia Gastrocenter. E-mail: victorsantos89@hotmail.com

CHOLECYSTITIS ASSOCIATED WITH BILIARY ILE: A CASE REPORT

ABSTRACT:

Among the various etiologies of abdominal pain, acute cholecystitis stands out, which is a condition commonly diagnosed in urgent and emergency services. It is more common in women and secondary to cholelithiasis, and may progress to acute abdomen if not treated correctly. In addition, after cholecystectomy surgery, there are chances of fistulizing causing a major problem for the patient and even bile ileus. The bibliographic review was carried out through articles and books made available in full, found in a complete way in research platforms such as: VHL, SCIELO, LILACS and PUBMED. The aim of this paper is to discuss, through a literary review, the diagnosis and treatment of bile ileus. In the present article, we report the clinical case of cholelithiasis in a 44-year-old female patient, obese, hypertensive and diabetic who reported intense and constant pain in the region of the right hypochondrium, accompanied by nausea and vomiting. The patient was diagnosed with cholecystitis, treated with antibiotic therapy for regression of the infectious and inflammatory process. However, pain persisted and open cholecystectomy was chosen. During surgery, the presence of biliodigestive fistula was found. Postoperatively, the patient developed biliary ileus and underwent laparotomy and definitive treatment of the condition.

KEYWORDS: Cholecystectomy. Cholecystitis. Cholelithiasis. Biliodigestive fistula. Biliary ileum.

INTRODUÇÃO

A colelitíase é a denominação científica para a presença de cálculos biliares, independentemente de sua localização. É a doença mais comum do trato biliar, apresentando maior incidência em mulheres. Os principais fatores de risco para colelitíase são a genética, a obesidade, o gênero, o uso de medicamentos, a perda ponderal acentuada, a alimentação rica em lipídeos, a idade, infecções biliares prévias e diversas outras variáveis. Nesse sentido, a afecção ocorre quando o colesterol, os sais biliares ou os bilirrubinatos são produzidos em excesso pelo fígado, levando à precipitação e formação dos cálculos biliares (SABISTON JR; TOWNSEND, 2003; COTRAN et al., 2005).

O principal método para visualização dos cálculos biliares é a ultrassonografia, em que a especificidade e a sensibilidade superam os 95% (LASSANDRO et al., 2004). Após o diagnóstico, a colecistectomia é o único tratamento definitivo para a colelitíase e é indicada para a maioria dos pacientes sintomáticos. Já em pacientes assintomáticos, há

divergência quanto à realização ou não da colecistectomia como operação profilática (NUNES et al., 2007).

Já a colecistite, é a inflamação da parede da vesícula biliar, podendo ser aguda ou crônica, ligada principalmente à obstrução da saída de bile pelo cálculo. Desse modo, sucessivos quadros de colecistite podem ocasionar na formação de uma fistula biliodigestiva e, posteriormente, culminar em um quadro de Íleo Biliar (IB) (SABISTON, 2014).

OBJETIVO

O objetivo deste trabalho é discutir por meio de uma revisão literária o diagnóstico e o tratamento do íleo biliar.

METODOLOGIA

A revisão bibliográfica foi realizada por meio de artigos e livros disponibilizados na íntegra, encontrados de forma completa em plataformas de pesquisas como: BVS, SCIELO, LILACS e PUBMED. Foram utilizados os seguintes descritores: colecistite calculosa, íleo biliar e abdome agudo obstrutivo. Selecionou-se cinco artigos e dois livros metodologicamente adequados para embasar a discussão.

RELATO DE CASO

Paciente AAD, do sexo feminino, 44 anos, branca, casada, dona de casa, procedente de Almenara, Minas Gerais, relatou dor intensa e constante em região do hipocôndrio direito acompanhada de náuseas e vômitos há 15 dias. A paciente é hipertensa, diabética e nega outras comorbidades. Nega alergias. Ao exame físico, apresentou pressão arterial (PA) de 140/90 mmHg, frequência cardíaca (FC) de 69 batimentos por minuto e frequência respiratória (FR) de 12 incursões respiratórias por minuto. Durante o exame físico, apresentava bom estado geral, LOTE (lúcida, orientada em tempo e espaço) perfusão capilar normal, mucosa ocular corada e hidratada, anictérica, acianótica, afebril. A ausculta cardiovascular revelou bulhas normo-rítmicas e normofonéticas em dois tempos sem sopro, pulso cheio, regular e simétrico. À ausculta

pulmonar, verificou-se murmúrio vesicular fisiológico sem ruídos adventícios. Observou-se abdome globoso, ausência de hematomas e aranhas vasculares, presença de ruídos hidroaéreos, abdome timpânico, flácido, livre, sem massas ou visceromegalias. Apresentou dor à palpação superficial e profunda em hipocôndrio direito (Sinal de Murphy Positivo). Deu entrada na emergência no dia 02/04/2019 e ficou internada até o dia 07/04/2019, realizando tratamento com antibioticoterapia e analgésico. Fez uso de ceftaxima, dipirona e tramadol.

Apresentava exames laboratoriais com discreta leucocitose e enzimas canaliculares aumentadas. Ultrassonografia de abdome indicativa de colecistite calculosa. Paciente evoluiu com vômitos durante toda a internação, melhorando apenas na véspera de sua alta hospitalar. Foram receitados ciprofloxacino e metronidazol por sete dias e foi orientada a procurar serviço de cirurgia geral para realização de colecistectomia eletiva.

Porém, retornou ao hospital no dia 08/04/2019 apresentando o mesmo quadro anterior. Assim, optou-se pela administração de antibioticoterapia venosa e realização de colecistectomia programada para o dia 09/04/2019. Durante procedimento cirúrgico, foi constatada grande aderência de vesícula biliar, estômago e ângulo hepático, com liberação subsequente. Após, constatou-se a existência de uma fistula colecisticogástrica, procedida por rafia da fístula, ligadura da artéria hepática e do ducto cístico e descolamento da vesícula do leito hepático. Retirado a vesícula biliar, revisou-se a hemostasia e ocorreu o fechamento da cavidade por planos.

No entanto, no pós-operatório, a paciente evoluiu com quadro de vômito persistente mesmo em uso de antieméticos, acompanhado por parada da eliminação de gases e fezes, que perdurou por 11 dias. Durante a evolução, foram realizados exames laboratoriais diários, radiografia de tórax e abdome em ortostatismo, passagem de sonda nasogástrica aberta, toque retal e clister glicerinado. Aqui, salienta-se que todos os procedimentos realizados causaram melhoras passageiras, porém, ocorria piora progressiva da doente tão logo à reinserção da dieta.

O diagnóstico de IB foi sugerido durante todo o pós-operatório, porém, por falta de exame complementar para elucidar o quadro, não foi possível resolução no Hospital Deraldo Guimarães. Sendo assim, a paciente foi transferida para Teófilo Otoni, onde

realizou tomografia computadorizada de abdome e constatou-se achado a esclarecer em íleo terminal. Portanto, foi submetida à laparotomia exploratória e resolutiva em que foi retirado um cálculo de aproximadamente 7 cm. Por fim, o paciente evoluiu com melhora progressiva do quadro até o momento da alta hospitalar.

DISCUSSÃO

O anatomista inglês Francis Glisson disse em 1678 a marcante frase: “O único remédio para o cálculo biliar é a morte” (NUNES et al., 2007). Nesse cenário, com um acometimento de aproximadamente 10% de certas populações, a colecistite calculosa é uma afecção de significativa importância e não dever ser (HEATON et al., 1991). Sobre a epidemiologia, a afecção possui maior incidência nas mulheres com múltiplas gestações e apresenta-se ligeiramente aumentada em pacientes idosos. Quanto à idade, tem grande incidência entre os 35 e 55 anos e eleva-se, gradativamente, após os 55 anos (COTRAN et al., 2005; SABISTON, 2014).

No que tange às complicações decorrentes à litíase biliar, cita-se como as mais frequentes a colecistite, a colangite, a coledocolitíase e a pancreatite aguda. Ademais, podem ocorrer evoluções não tão comuns como as fístulas de vesícula biliar, a síndrome de Mirizzi e o íleo biliar. Essa última, ocorrendo em apenas 0,5% dos casos de colecistite e, apesar de rara, devido à elevada prevalência das doenças biliares e à gravidade que essa enfermidade pode resultar, seu adequado reconhecimento e rápido tratamento é de extrema importância (HEATON et al., 1991; DOKO, 2003).

Na atualidade, o exame de imagem com maior acurácia diagnóstica para o IB é a Tomografia Computadorizada (TC), considerando-se sua melhor resolução e seu tempo de realização relativamente curto quando comparada a outros exames. Desse modo, em casos de IB, a TC possibilita a identificação dos elementos da Tríade de Rigler em quase 80% dos casos em oposição aos 15% da radiografia de abdome (LASSANDRO et al., 2004). Vale ressaltar que o Brasil é um país de tamanho continental e, por isso, ainda há vários serviços de saúde que não contemplam a TC.

Sendo assim, no caso relatado, optou-se por realizar apenas a enterolitotomia, visto que a principal meta era promover a desobstrução intestinal e melhorar

imediatamente o quadro, objetivando-se minimizar e até mesmo evitar um estresse cirúrgico prolongado que pudesse agravar as condições clínicas da paciente. Nesse cenário, ressaltamos que o foco do tratamento do íleo biliar é a exérese do cálculo a fim de restabelecer o fluxo intestinal. Porém, em razão da baixa incidência dessa enfermidade, não existe até o presente estudo um consenso quanto ao procedimento cirúrgico preterível para tal resolutiva, sendo descrita a cirurgia aberta, a laparoscópica, a remoção endoscópica e a litotripsia (SABISTON JR; TOWNSEND, 2003; MASANNAT; WEI, 2006). Por fim, a ressecção somente está indicada se houver perfuração ou isquemia de alças intestinais (DOKO, 2003; SABISTON, 2014).

CONCLUSÃO

O IB é uma rara complicação da colelitíase. No entanto, deve ser aventada a possibilidade de tal afecção como causa de abdome agudo obstrutivo pois, quando não tratado adequadamente, é causa de alta morbimortalidade. Frente a isso, durante o atendimento inicial do doente, devem ser solicitados exames laboratoriais básicos e radiografia simples de tórax e abdômen, objetivando-se a correção de possíveis distúrbios hidroeletrólíticos, o manejo da desidratação e a resolução da estase gástrica.

A associação das modalidades propedêuticas possibilita o diagnóstico em 77% dos casos, porém, frequentemente, ele só é feito durante a cirurgia. Dentre as possíveis causas que postergam o diagnóstico, cita-se o baixo índice de suspeição dos cirurgiões somados à inespecificidade da sintomatologia e dos achados nos exames complementares. Portanto, apesar de raro, não podemos deixar de investigar o íleo-biliar em pacientes que não melhoram com o tratamento medicamentoso no pré-cirúrgico ou nos pacientes que apresentem fístula biliar no intraoperatório.

REFERÊNCIAS

COTRAN, R.S; KUMAR, Vinay; COLLINS, T. Robbins. **Bases patológicas das doenças. Patologia**. 7ª edição. Editora Guanabara Koogan, 2005.

DOKO, M.; et al. **Comparison of surgical treatments of gallstone ileus: Preliminary report**. World Journal of Surgery, Portland, v. 27, p. 400-404, 2003.

HEATON, K. W.; BRADDON, F. E.; MOUNTFORD, R. A.; HUGHES, A. O.; EMMETT, P. M. **Symptomatic and silent gall stones in the community.** Gut, London, v. 32, n. 3, p. 316- 320,1991.

LASSANDRO, F.; GAGLIARDI, N.; SCUDERI, M.; PINTO, A.; GATTA, G.; MAZZEO, R. Gallstone ileus analysis of radiological findings in 27 patients. **European journal of radiology**, Stuttgart, v. 50, p. 23-29, 2004.

MASANNAT, Y.; WEI, A. S. Gallstone Ileus: A Review. **Mount Sinai journal of medicine**, New York, v. 73, n. 8, p. 1132- 1134, 2006.

NUNES, S. I., et al. Colelitíase assintomática: quando operar? **HU revista**, Juiz de Fora, v.33, n.3, p.69-73, jul./set. 2007.

SABISTON JR., D. C., TOWNSEND, M. C. **Tratado de Cirurgia.** 16.^a ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.

SABISTON. **Tratado de cirurgia: A base biológica da prática cirúrgica moderna.** 19.ed. Saunders. Elsevier, 2014.

CAPÍTULO V

COMPORTAMENTO BIOLÓGICO DE *Aedes albopictus* EM LABORATÓRIO

John Layonn de Sousa Silva¹⁸

DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2021.02-05

RESUMO:

O *Aedes albopictus* e o *Aedes aegypti* são responsáveis pela transmissão de diversos arbovírus, causando grande impacto na saúde pública no Brasil e no mundo. Atualmente, ambas espécies têm dividido o mesmo ambiente urbano, juntamente com os humanos. O objetivo deste trabalho foi avaliar o comportamento biológico de *Aedes albopictus*, em condições de laboratório. Para tal foi comparado o período do ciclo biológico de *A. albopictus* e *A. aegypti*, em condições de criação em insetário, o qual foi observado que o *A. albopictus* necessitou de mais tempo para evoluir da fase de larva de primeiro estágio até a fase adulta. Também foi avaliada a produção de ovos de ambas as espécies mediante a oferta de alimentação sanguínea às fêmeas, a qual apresentou elevado número de ovos quando as fêmeas *A. albopictus* foram alimentadas com camundongos acordados, presos numa tela. Outro ponto avaliado foi a possibilidade de cruzamento e reprodução entre as espécies, onde verificou-se que pode haver a cópula, porém os ovos gerados eram inférteis. Por fim, foi avaliado o comportamento reprodutivo de *A. albopictus* quando coabitam o mesmo espaço com *A. aegypti*. Neste caso, parece que a convivência não alterou a performance das espécies, em condições de laboratório, não verificando o poder competitivo de *A. albopictus* observado em análises no campo. Assim, concluiu-se que *A. albopictus* apresenta peculiaridades em seu comportamento biológico, sugerindo a necessidade de aprofundar o conhecimento sobre esta espécie que vem se expandindo por todo o território brasileiro.

PALAVRAS-CHAVE: Comportamento biológico. Competitividade. *Aedes albopictus*

BIOLOGICAL BEHAVIOR OF *Aedes albopictus* IN LABORATORY

ABSTRACT:

Aedes albopictus and *Aedes aegypti* are responsible for the transmission of several arboviruses, causing great impact on public health in Brazil and in the world. Currently, both species have shared the same urban environment, along with humans. The objective of this work was to evaluate the biological behavior of *Aedes albopictus*, under laboratory conditions. For this, the period of the biological cycle of *A. albopictus* and *A. aegypti* was compared, under conditions of rearing in an insectarium, which was observed that *A. albopictus* needed more time to evolve from the first stage larva to the phase adult. The

¹⁸ Graduação em andamento em Ciências da Natureza pela Universidade Federal do Piauí. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8678398506628103>. Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-5297-5625>. E-mail: johnteresina@gmail.com

production of eggs of both species was also evaluated by offering blood to the females, which showed a high number of eggs when the females *A. albopictus* were fed with awake mice, trapped in a screen. Another point assessed was the possibility of crossbreeding and reproduction between species, where it was found that there may be copulation, however the eggs generated were infertile. Finally, the reproductive behavior of *A. albopictus* was evaluated when they cohabit in the same space with *A. aegypti*. In this case, it seems that the coexistence did not change the performance of the species, under laboratory conditions, failing to verify the competitive power of *A. albopictus* observed in field analyzes. Thus, it was concluded that *A. albopictus* has peculiarities in its biological behavior, suggesting the need to deepen the knowledge about this species that has been expanding throughout the Brazilian territory.

KEYWORDS: Biological behavior. Competitiveness. *Aedes albopictus*

INTRODUÇÃO

O *Aedes albopictus* (SKUSE, 1894) é um inseto pertencente à família Culicidae, estando alocado na subfamília Culicinae. Apresenta grande importância na saúde pública, pela possibilidade de ser, juntamente com o *Aedes aegypti*, transmissor de diversos arbovírus no mundo, tais como, Dengue, Chikungunya, Zika, entre outros.

O *A. albopictus* também conhecido como “tigre-asiático”, é uma espécie exótica, de origem asiática, especificamente do sudeste da Ásia. De lá, dispersou-se para as regiões tropicais, subtropicais e temperadas (FORATTINI, 2002). No Brasil, o *A. albopictus* foi retratado pela primeira vez, em 1986, no Rio de Janeiro, de onde foi se expandindo por todo o território brasileiro. Atualmente, ele é encontrado praticamente em todos os estados brasileiros, exceto no Acre. Esta espécie é conhecida por habitar áreas mais verdes, mais afastadas de cidades, em zonas rurais, onde há uma variedade de hospedeiros como fonte de alimento sanguíneo. Entretanto, observa-se com certa frequência a sua presença em áreas urbanas, convivendo com o homem (BARROS, 2019).

Esta espécie apresenta um ciclo biológico semelhante ao do *A. aegypti*, são holometábolos, desenvolvendo-se em ovo, 4 estádios larvais, pupa e adultos, macho e fêmea (FORATTINI, 2002). Ambas as espécies são ecologicamente homólogas e simpátricas, podendo utilizar os mesmos tipos de criadouros. No entanto, o *Aedes albopictus* apresenta maior grau de exofilia e hábitos silvestres e possui caráter de

domiciliação inferior ao apresentado por *Aedes aegypti* (SILVA et al., 2001). Muito pouco se sabe sobre como se dá esta convivência/interação, nem qual o papel efetivo do *A. albopictus* na transmissão de arbovírus no Brasil

O objetivo geral deste trabalho é avaliar o comportamento biológico de *Aedes albopictus*, em condições de laboratório.

Desde a introdução do *A. albopictus* no Brasil, seu papel vetorial tem sido controverso. A justificativa deste trabalho se faz pelo fato de que, em análises de infecção experimental de *A. albopictus* indicam que esta espécie apresenta competência na transmissão de diversos arbovírus, tornando necessário uma vigilância intensiva e estudos aprofundados sobre sua biologia e comportamento, com intuito de aprimorar os programas de estratégias de controle vetorial.

REFERENCIAL TEÓRICO

AEDES ALBOPICTUS

O *A. albopictus*, também conhecido como “tigre asiático”, tem sua origem no oeste do Pacífico e no sudeste da Ásia, de onde vem se espalhando pela Europa, África, Oriente Médio e pelas Américas. A expansão desta espécie vem sendo observada com bastante preocupação pela comunidade científica e autoridades da saúde pública pela sua capacidade e competência de transmitir diversos arbovírus e outros patógenos como *Dirofilaria immitis*, conhecido como verme do coração (GRATZ, 2004).

Na década de 1940, ocorreram grandes surtos e epidemias de Dengue, em países asiáticos, como no Japão, onde o principal vetor era o *A. albopictus*, tendo o *A. aegypti*, vetor secundário. Na maioria destes países de clima temperado, onde o *A. albopictus* é considerado 14 espécie autóctone, a transmissão de arbovírus tem como principal vetor esta espécie (GRATZ, 2004).

A grande problemática deste quadro é o fato de que o *A. albopictus* circula naturalmente em áreas urbanas, periurbanas, rurais e silvestres, facilitando o trânsito de certos arbovírus entre primatas não-humanos, mosquitos e humanos (BARROS, 2019).

Em 1985, o *A. albopictus* foi identificado pela primeira vez nas Américas, nos EUA, onde foi encontrado espécimes infectados naturalmente com o vírus da Febre do Nilo Ocidental, vírus La Crosse, encefalite equina oriental, entre outros, aumento o risco humano de infecção (TURUELL et al., 2001; GRATZ, 2003).

No Brasil, este mosquito foi identificado pela primeira vez, no Rio de Janeiro, em 1986 (FORATTINI, 1986). Atualmente, o *A. albopictus* está presente em quase todo o território brasileiro, exceto no Acre (BARROS, 2019). A partir de análises genéticas das linhagens deste mosquito foi identificado que *A. albopictus* dos EUA e do Brasil são originados no Japão (KAMBHAMPATI et al., 1991).

Existe uma grande analogia entre o desenvolvimento biológico do *A. albopictus* e *A. aegypti*. São holometábolos, desenvolvem nas formas evolutivas ovo, quatro estádios larvais, pupa e adultos, macho e fêmea (FORATTINI, 2002). A figura (2) mostra o ciclo dos mosquitos de gênero *Aedes*.

Entretanto, há diferenças comportamentais entre as duas espécies. Marques e Gomes (1997) observaram que o *Aedes albopictus* apresenta uma particularidade diurna durante a sua picada, e em seu processo de alimentação tem preferência por aquele que se encontra em movimento. Tal necessidade locomotiva da presa como é o caso do homem, torna ainda mais viável a vinda do *Aedes albopictus* para a cidade, pois nela se encontra um aglomerado de pessoas durante o dia e que estão em constante movimento. O *Aedes albopictus* vem mostrando uma forma muito diversificada quanto aos seus criadouros nas cidades, enquanto o *Aedes aegypti* seu concorrente é encontrado em grande parte dentro das casas, o *Aedes albopictus* fica nas redondezas domiciliares, porém ambos possuem uma alta capacidade de adaptação (MARTINS et al., 2010). Essa diversificação permite que o inseto possua uma maior abrangência nos arredores até chegar diretamente aos domicílios, e com a água parada muitas vezes proveniente das chuvas, fica propício à formação de locais para sua reprodução.

O *A. albopictus* apresenta algumas resistências em seu desenvolvimento, ocasionando por vezes atrasos quando colocado em criadouros artificiais, por outro lado, demonstra capacidade de sobrevivência e, que mesmo em frente a diferentes temperaturas, consegue terminar o seu ciclo (CALADO; NAVARRO-SILVA, 2002). Sua

preferência é por temperaturas entre os 25° à 30°, todavia, as temperaturas mais baixas não o impedem de se procriar ou de se desenvolver até a fase adulta.

ARBOVIROSES

DENGUE

A dengue é uma doença viral que possui uma figuração de meio urbano, onde tem como seu principal vetor o *Aedes aegypti*. Esta doença possui sintomatologia variável em relação ao grau que se apresenta, podendo sair de um quadro assintomático até um altamente severo e mortal (FORATTINI, 2002). No entanto, o *A. albopictus* é um vetor em potencial deste patógeno arboviral, e cuidar de forma preventiva contra este inseto, é mais uma forma de eliminar riscos futuros que possam acometer a saúde humana.

Não existe uma vacina contra a Dengue no mercado e o tratamento se restringe em diminuir e/ou eliminar os sintomas. Desta forma, o controle da Dengue e de outras arboviroses está baseado atualmente no combate ao mosquito vetor (DIAS, 2010).

O Ministério da Saúde (2019) notificou, já no mês de janeiro, número de casos de dengue duas vezes superior ao mesmo período do ano passado, em torno de 54.777 casos distribuídos por todo o país. A mínima possibilidade existente de que o *A. albopictus* poderia ser um contribuinte neste quadro, gera um quadro de preocupação da sociedade.

De acordo com Alencar et al. (2008) o *A. albopictus* tem um grande valor ecológico e epidemiológico, pois tem uma capacidade vetorial bastante elevada, chegando a 32 arbovírus e 7 alfavírus como vetor experimental. O primeiro relato de *A. albopictus* infectados naturalmente com DENV-1, foi no interior de Minas Gerais, a partir de larvas recolhidas de pneus velhos (SERUFO et al., 1993).

ZIKA

O vírus Zika é um arbovirus no qual teve a sua descoberta em 1947, por meio do macaco Rhesus infectado, na floresta de Zika, em Uganda (DICK; KITCHEN; HADDOW, 1952).

Duchemin (2017), a partir de uma análise de competência e capacidade de infecção em possíveis vetores na Austrália, observou que dentre as espécies de mosquitos, *A. albopictus* era um forte candidato a ser o principal vetor do vírus Zika no país. Em Gabão, na África Central, o *A. albopictus* também aparece como principal vetor do vírus Zika (GRARD et al., 2014). Entretanto, em estudos semelhantes na Ásia (OSLON et al., 1981) e Polinésia francesa (OEHLER et al., 2016) foi observado que o *A. aegypti* poderia ser o principal vetor desse arbovírus.

Embora o papel do *A. albopictus* na transmissão do vírus Zika no Brasil ainda não esteja determinado, a sua ampla disseminação e a falta de restrição deste arbovírus a uma espécie vetora específica, indica que essa espécie poderia servir como vetor no Brasil (PLOURDE, BLOCH, 2016).

Assim como na Dengue, a prevenção da infecção pelo vírus Zika se dá no combate de seus vetores, o *A. aegypti* e o *A. albopictus*. As mulheres necessitam de cuidados especiais quando em período de gestação, pois bebês podem apresentar graus diversos de microcefalia, quando suas mães se infectaram pelo vírus Zika no período da gravidez. Entre 2000 e 2014, foram registrados 164 casos de crianças com microcefalia, já no ano de 2015 os resultados chegaram a alarmantes 1.608 casos. Esse levantamento apenas acentua a ineficiência dos programas de controle vetorial, e que se deve aprimorar as condições de atendimento e combate contra os vetores deste vírus (MARINHO et al., 2016).

CHIKUNGUNYA

A Febre Chikungunya é uma doença febril aguda, cujos vetores principais são o *A. aegypti* e o *A. albopictus*, que está em plena expansão no Brasil. Dentre as arboviroses presentes no Brasil, observa-se que indivíduos com chikungunya apresentam menor tempo de incubação, ou seja, tempo entre a infecção e o aparecimento dos sintomas, e quando presentes, os sintomas são mais intensos (HONÓRIO, 2015). O quadro sintomático da chikungunya se apresenta de forma intensa, chegando a deixar o indivíduo bastante debilitado por conta das dores intensificadas nas áreas das articulações, seguindo de fraquezas e dores musculares. A febre chikungunya apresenta-se como um grande

perigo para pessoas de idades mais avançadas, as quais não possuem condições imunológicas e físicas para enfrentarem os sintomas provenientes da infecção viral, tendo assim a extrema necessidade de busca de uma forma eficiente para o tratamento da doença (DE FREITAS QUEIROS et al., 2019).

Segundo Silva et al. (2018), entre os anos de 2014 e 2016, foram obtidos mais de 100 mil casos suspeitos de Chikungunya, tendo a região nordestina do Brasil apresentando os números mais elevados. Esta situação pode indicar a alta capacidade em que o vírus tem de se difundir, a elevada densidade da população de mosquitos que está diretamente ligada a péssima infraestrutura do município/comunidade e as medidas de controle vetorial ainda são ineficazes.

FEBRE AMARELA

A febre amarela é uma doença que apresenta dois ciclos epidemiológicos, um no meio silvestre, onde estão envolvidos primatas não-humanos e vetores silvestres; e outro no meio urbano, onde o principal vetor é o *A. aegypti* (FORATTINI, 2002).

Atualmente, vivemos em alerta para evitar o retorno da Febre Amarela em áreas urbanas. Existem alguns fatores que potencializam esta preocupação: a urbanização de vetores que outrora eram tidos silvestres; a baixa cobertura vacinal, uma vez que houve um relaxamento nas campanhas vacinais contra a Febre Amarela, juntamente, ao crescente número de pessoas que acreditam na sua ineficiência; aumento do número e diversidade de criadouros artificiais produzido pelos humanos (LIMA, 1985; FORATTINI, 2002; BARROS, 2009).

A presença e expansão do *A. albopictus* por todo o território brasileiro pode vir a ser um agravante, devido a sua característica ecológica comportamental de transitar entre os ambientes silvestres, rurais, periurbanos e urbanos, podendo vir a ser também um transportador do vírus das áreas silvestres para as urbanas (FORATTINI, 2002).

Embora não se saiba o verdadeiro papel do *A. albopictus* na transmissão da Febre Amarela, sabe-se que esta espécie apresenta capacidade e competência vetorial, em condições laboratoriais (DE ALENCAR et al., 2008).

METODOLOGIA

As espécies *A. albopictus* e *A. aegypti* são provenientes do Campus da UFPI de Teresina- PI, mantidas em uma colônia semifechada no Laboratório de Parasitologia e Entomologia Sanitária – LAPES/DPM/UFPI. No insetário, as formas imaturas, larvas e pupas, eram criadas em potes plásticos, contendo água desclorada e ração de peixe triturada, cobertos por uma tela de náilon. Os adultos eram mantidos em gaiolas de náilon, alimentados com solução de sacarose saturada ad libitum, em condições controladas de temperatura e umidade ($28\pm1^{\circ}\text{C}$; $80\pm5\%$). Após 3 dias de eclosão, as fêmeas eram alimentadas com camundongos anestesiados, em ambiente escuro, aprovado pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal – UFPI, nº 500/18. Após o repasto sanguíneo, as fêmeas tinham a sua disposição, pote contendo água desclorada e papel filtro cobrindo sua parede interna para a oviposição. Após a postura, o filtro com os ovos era posto para secar e, em seguida, inserido em novo pote contendo água desclorada e ração de peixe triturada para a eclosão das larvas.

Figura 4: Criação de mosquitos Aedes em laboratório

Fonte: Autor, 2019

Os adultos são criados e mantidos em gaiola de nylon erguida por hastes de metal (1) e as formas imaturas são mantidas em potes de plástico cobertos por tecido com abertura central coberto por algodão (2); os adultos recém eclodidos são transferidos para as gaiolas com auxílio do aspirador individual (5), onde são alimentados com solução açucarada (3) e as fêmeas são alimentadas com sangue de camundongos anestesiados (6). O Insetário é mantido em temperatura constante de 28°C e a umidade semi-controlada com umidificador (4).

DELINEAMENTO DO ENSAIO EXPERIMENTAL

COMPARAÇÃO DO CICLO BIOLÓGICO DE *A. ALBOPICTUS* E *A. AEGYPTI*, EM CONDIÇÕES DE CRIAÇÃO EM INSETÁRIO

Foram selecionadas 10 larvas de cada espécie e adicionadas em pote individual, contendo água desclorada e ração de peixe triturada. Diariamente era feita avaliação da fase evolutiva para calcular o tempo que cada indivíduo gastou em cada fase. Todos os potes foram mantidos nas condições de criação.

Ao verificar diferenças no tempo médio do ciclo biológico entre *A. albopictus* e *A. aegypti*, foram realizados ensaios onde o resultado foi expresso a partir de análise empírica.

AVALIAÇÃO DA FORMA DE OFERTA DE ALIMENTO SANGUÍNEO PARA MELHOR PRODUÇÃO DE OVOS

Foram oferecidos para ambas as espécies três formas diferentes de alimento sanguíneo: A) camundongo anestesiado por 30 minutos; B) camundongo anestesiado por 60 minutos; e C) camundongo acordado preso em tela.

AVALIAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE CRUZAMENTO E REPRODUÇÃO ENTRE AS ESPÉCIES *A. ALBOPICTUS* E *A. AEGYPTI*

Foram preparados dois grupos, um contendo 10 fêmeas de *A. albopictus* e machos de *A. aegypti* e, outro, 10 fêmeas de *A. aegypti* e machos de *A. albopictus*.

Para garantir que as fêmeas não copulassem com machos da mesma espécie, foram utilizados recipientes de plástico onde as larvas eram mantidas individualmente até o surgimento dos adultos. Até momentos antes do ensaio, os adultos “virgens” do mesmo sexo eram mantidos em gaiolas separadamente, com acesso a solução açucarada *ad libitum*. Após formarem os grupos, as fêmeas receberam alimentação sanguínea, com camundongos anestesiados, semanalmente; e o recipiente contendo papel filtro para a possível postura.

Após uma semana, os potes contendo ovos, ou não, eram trocados por novos, nas mesmas condições citadas acima. Os filtros do pote retirado eram colocados para secar e,

em seguida, era feita a contagem dos ovos. Posteriormente, os ovos eram acondicionados em novos potes contendo água desclorada e ração de peixe triturada para se desenvolver até a fase de adultos, os quais eram utilizados para identificação da espécie (seguindo Forattini, 1962). Esta etapa foi repetida três vezes, caracterizando um ciclo gonotrófico por semana.

AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO REPRODUTIVO DE *A. ALBOPICTUS* COABITANDO O MESMO ESPAÇO COM *A. AEGYPTI*

Para avaliar o comportamento reprodutivo de *A. albopictus* quando em convívio do *A. aegypti* foram inseridas numa mesma gaiola 10 fêmeas de cada espécie provenientes das respectivas colônias.

Os adultos recebiam solução açucarada *ad libitum* e as fêmeas de ambas as espécies eram alimentadas com camundongos anestesiados por 30 minutos. A cada semana o pote de postura era trocado por novos e os ovos contados. Posteriormente, os ovos eram acondicionados em novos potes contendo água desclorada e ração de peixe triturada para se desenvolver até a fase de adultos, os quais eram submetidos a identificação da espécie (seguindo Forattini, 1962).

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Foi feito análise estatística somente no item 4.1

RESULTADOS E DISCUSSÃO

COMPARAÇÃO DO CICLO BIOLÓGICO DE *A. ALBOPICTUS* E *A. AEGYPTI*, EM CONDIÇÕES DE CRIAÇÃO EM INSETÁRIO

O tempo médio do ciclo biológico de *A. albopictus* foi superior ao tempo observado para *A. aegypti*, em condições controladas em laboratório, sendo 19 dias para este e 26,4 para aquele (Tabela 1). O período médio larval de *A. albopictus* foi de 20,5 dias (12-34) e de *A. aegypti* 12,9 (10-30).

Avaliando o tempo médio total de larvas à adultos, a partir do tempo médio de cada fase, observa-se que o tempo médio total de *A. albopictus* é significativamente maior que o observado para *A. aegypti* ($5,2 \pm 1,49$; $3,94 \pm 1,92$, respectivamente). Isto pode indicar que o ciclo biológico das duas espécies apresenta comportamento diferentes, e que a fase do segundo estágio de *A. albopictus* necessitou mais tempo para se desenvolver plenamente (Tabela 1).

Em estudos de populações de *A. aegypti*, Beserra et al. (2006) observaram que as larvas levaram o tempo médio entre 6,6 a 10,2 dias; e as pupas, de 2,1 a 2,7 dias para mudar de fase evolutiva, a 26°C. Calado e Silva (2002) observaram que a temperatura influencia no ciclo biológico de *A. albopictus*, tendo que a fase larvária ocorreu 7,67 dias a 25°C e 5,86 dias a 30°C.

O período médio das fases evolutivas observado nas duas espécies deste estudo foi superior ao encontrado na literatura e isso pode ser explicado devido ao fato de que as populações estudadas por estes autores foram coletadas no campo, enquanto no estudo, as espécies foram obtidas a partir de colônia pré-estabelecida por mais de 30 gerações. Outro aspecto importante que interfere no tempo médio do ciclo biológico dos insetos é a temperatura em que estas espécies foram mantidas para observação. Em nosso estudo, os espécimes eram mantidos em ambiente a 28°C, ou seja, temperatura superior àquelas utilizadas nos trabalhos supracitados. Entretanto, esperava-se que o tempo médio do ciclo biológico fosse menor, uma vez que o aumento da temperatura tende a acelerar o processo biológico dos insetos (Calado et al., 2002; Bezerra et al., 2006; Walton e Reisen 2013; Williams et al., 2014). A hipótese mais provável está relacionada à oferta do alimento (ração de peixe triturado) às larvas, pois grande parte da ração ficava depositada no fundo do pote, fazendo com que elas gastassem mais tempo em busca do alimento.

O curto período do ciclo biológico dos mosquitos nem sempre quer dizer melhor qualidade de vida, pois existem outras variáveis que devem ser avaliadas. Tais como, tempo de vida dos alados, processo de alimentação sanguínea das fêmeas, número de ovos viáveis, número de ovos que finalizam seu ciclo biológico até a fase adulta, entre outros aspectos. Desta forma, é importante aprofundar os estudos nesta direção.

O elevado período médio do ciclo biológico de *A. albopictus* nos traz questionamentos sobre as condições de criação em laboratório, sugerindo que deve ser estudado fatores na alimentação das formas evolutivas, na temperatura e na umidade relativa do ar no ambiente.

Além do tempo médio maior das fases larvais a adulto de *A. albopictus* em relação à mesma fase de *A. aegypti*, foi observado que o tempo médio da fase L2 de *A. albopictus* foi significativamente maior que L2 de *A. aegypti*. Até o momento não há nenhum fator fisiológico para explicar o porquê do maior gasto de tempo na fase L2 entre as espécies.

Tabela 01: Comparação do ciclo biológico de *A. albopictus* e *A. aegypti*, em condições de criação em insetário: os valores representam a Média de dias (Mínimo de dias - Máximo de dias)

Espécie	L1/L2	L2/L3	L3/L4	L4/Pupa	Pupa/Adult.	Total
<i>A. albopictus</i>	2,6 (1-7)a	5,5 (4-7)b	6,4 (5-9)d	6,0 (2-11)e	5,9 (3-10)f	26,4 (15-44)g
<i>A. aegypti</i>	1,8 (1-5)a	2,2 (3-9)c	4,8 (4-7)d	4,1 (2-9)e	6,1 (2-9)f	19 (12-39)h

Fonte: Autor, 2019.

Foi feito análise estatística entre as duas espécies: letras diferentes mostram que o tempo médio da fase do ciclo são diferentes.

O volume de água de 250mL para cada larva pode ter interferido no tempo de vida de cada estágio larval. Serpa et al. (2008) avaliando a influência da água de criadouro na postura das fêmeas de *A. aegypti* utilizaram a concentração de 1 larva / 3,5ml de água com ração de peixe triturado. Eles observaram uma produção de quase 3 vezes mais de ovos férteis em relação ao dado apresentado neste estudo.

Além do volume da água, a densidade da água do criadouro experimental pode ter sido um fator dificultante para o desenvolvimento das larvas. Sabe-se que a fase larvária é a fase em que o mosquito utiliza o alimento para armazenar nutrientes que serão utilizados no desenvolvimento das fases evolutivas seguintes. Considerando a temperatura no insetário (28°C), a densidade da água (0,9962) (tabela 02) e com a adição

da ração de peixe triturado (0,2mg/ml) por criadouro experimental, adicionado ao fato de que grande parte da ração ficou concentrado no fundo dos potes, aventa-se que as larvas foram forçadas a descender ao fundo do pote para se alimentar e subir para respirar. Isso poderia implicar no maior gasto de energia das larvas em obter mais alimento, o que aumentaria no tempo necessário para armazenar os nutrientes necessários para a seguir seu desenvolvimento.

AVALIAÇÃO DA FORMA DE OFERTA DE ALIMENTO SANGUÍNEO PARA MELHOR PRODUÇÃO DE OVOS

Para as fêmeas de *A. aegypti*, a forma de oferta de alimento sanguíneo, ou seja, camundongo anestesiado ou não, não interfere na performance de produção de ovos, mostrando que é uma espécie eclética sem muita exigência alimentar. Entretanto, quando o tempo de oferta foi maior, observou-se que a produção de ovos também aumentou.

As fêmeas de *A. albopictus* apresentaram dificuldade de se alimentar em camundongos anestesiados, mesmo com o tempo de oferta ampliado para 60 minutos. Quando foi ofertado camundongo preso em tela, as fêmeas ficaram mais ativas e se aproximavam rapidamente do animal, mesmo ele se mexendo dentro da tela. O tempo de oferta de 30 minutos foi suficiente para que todas as fêmeas presentes na gaiola se alimentassem suficientemente bem e, conseqüentemente, produzem mais ovos. Já as fêmeas de *A. aegypti* se alimentavam suficientemente bem em qualquer forma de oferta da alimentação testada.

AVALIAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE CRUZAMENTO E REPRODUÇÃO ENTRE AS ESPÉCIES *A. ALBOPICTUS* E *A. AEGYPTI*

Nos ensaios para verificar a possibilidade de reprodução cruzada entre as duas espécies, foram observadas em três e quatro ciclos gonotróficos, nos quais as fêmeas eram alimentadas com camundongos anestesiados e os potes para postura eram trocados a cada semana. Na gaiola onde estavam fêmeas de *A. albopictus* e machos de *A. aegypti*, foram encontrados 397, 268 e 324 ovos por semana, totalizando 989 ovos. Após 15 dias de avaliação foi observado que os ovos se encontravam rachados e nenhuma larva eclodiu.

Já na gaiola onde havia fêmeas de *A. aegypti* e machos de *A. albopictus*, foram contabilizados 0, 76, 197 e 292 ovos, totalizando 565 ovos inférteis, com a mesma característica rachada vista no outro grupo.

Aedes aegypti e *Aedes albopictus* são duas espécies ecologicamente homólogas e simpátricas, que evoluíram independentemente, uma na África e a outra, na Ásia. Entretanto, pode-se afirmar que esta barreira geográfica já não existe em sua amplitude, devido à expansão dessas espécies por todo o mundo. Atualmente é possível observar o compartilhamento de habitats e alimento com frequência, o que traz questionamentos sobre como elas interagem.

Segundo Marcela et al. (2015), *A. aegypti* e *A. albopictus* apresentam duas horas de picos para o acasalamento, pela manhã das 7:30 às 9:00 e pela noite das 18:00 às 19:30h.

Corroborando Marcela et al. (2015), foi observado que o maior número de acasalamento ocorreu na gaiola onde tinha fêmeas de *A. albopictus* e machos de *A. aegypti*. Em contrapartida, na gaiola onde havia machos de *A. albopictus* e fêmeas de *A. aegypti*, havia mais movimentação, onde os machos pululavam muito, porém as fêmeas conseguem se esquivar das capturas dos machos, evidenciando menor número de acasalamento e, conseqüentemente, menor número de ovos.

AValiação DO COMPORTAMENTO DE ADULTOS DE *A. ALBOPICTUS* COABITANDO O MESMO ESPAÇO COM *A. AEGYPTI*

Quando populações das duas espécies estavam presentes em um mesmo ambiente, ou seja, na mesma gaiola, foi observado o total de 434 ovos de *A. albopictus*, 736 ovos de *A. aegypti* e 105 ovos inférteis, totalizando 1275 ovos, no período de cinco ciclos gonotróficos.

Tanto a fêmeas de *A. albopictus* quanto a de *A. aegypti* produziram ovos viáveis que deram origem a adultos, demonstrando que em situações de convivência e competição, seja por alimento ou pelo meio em que estavam (gaiola), ambos podem coexistir aparentemente de forma harmônica na natureza (MARTINS et al., 2010).

Entretanto, há relatos na literatura de que *A. albopictus* apresenta vantagem competitiva sobre *A. aegypti*. Nos EUA, foi verificado que o *A. albopictus* foi responsável pelo deslocamento daquela espécie, em condições locais de campo (KESAVARAJU et al., 2014). Braks et al. (2004) analisaram o desempenho das larvas de ambas as espécies competindo em condições de campo no Rio de Janeiro e verificaram que larvas de *A. albopictus* eram competidores superiores às larvas de *A. aegypti*.

O fato de o resultado não ter apresentado indícios de superioridade competitiva de fêmeas de *A. albopictus*, não quer dizer que não haja. É necessário que novos ensaios sejam realizados, com o intuito de verificar a dinâmica populacional de ambas as espécies.

No estudo, menos de 10% dos ovos não geraram larvas, corroborando o que ocorre na natureza. As razões pelas quais isto ocorre pode ser devido ao comportamento autogênico das fêmeas, as quais produzem ovos mesmo antes da cópula; outro fator poderia ser a cópula de fêmeas com machos de outras espécies, o que geraria ovos inférteis (FORATTINI, 2002).

CONCLUSÕES

Concluiu-se que o *Aedes albopictus* apresenta comportamento biológico peculiar, em condições de laboratório. Fatores como a oferta de alimento, seja na fase larvária, seja na fase alada, influencia diretamente na população da espécie; a densidade da água dos criadouros influencia no desenvolvimento das larvas; as fêmeas de ambas as espécies são capazes de copular com machos da outra espécie, porém, ovipõem ovos inférteis; e, em condições de competitividade com o *A. aegypti*, não foi capaz de demonstrar a superioridade de *A. albopictus* observada em condições de campo.

REFERÊNCIAS

BARROS, Veruska Cavalcanti; FEITOSA, Chistiane Mendes (organ.). **Produtos naturais no combate ao mosquito *Aedes aegypti***. Campinas: Átomo, 2019.

BORGES, Sonia Marta dos Anjos Alves. **Importância epidemiológica do *Aedes albopictus* nas Américas**. 2001. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

BRAKS, M. A. H.; HONÓRIO, N. A.; LOUNIBOS, L. P.; LOURENÇO-DE-OLIVEIRA, R.; JULIANO, S. A. Interspecific Competition Between Two Invasive Species of Container Mosquitoes, *Aedes aegypti* and *Aedes albopictus* (Diptera: Culicidae), in Brazil. *Annals of the Entomological Society of America*, v. 97, n. 1, p. 130–139, 2004.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Saúde Brasil 2014:** uma análise da situação de saúde e das causas externas. Brasília: Ministério da Saúde, 2015.

CALADO, D. C.; NAVARRO-SILVA, M. A. Exigências térmicas de *Aedes (Stegomyia) albopictus* Skuse, 1894 (Diptera, Culicidae) em condições de laboratório. **Revista Brasileira de Entomologia**, v. 46, n. 4, p. 547-551, 2002.

CONSOLI, R. A. G. B.; OLIVIERA, R. L. Principais mosquitos de importância no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz; 1994.

DA COSTA VASCONCELOS, Pedro Fernando. Febre amarela. **Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical**, v. 36, n. 2, p. 275-293, 2003.

DE ALENCAR, C. H. M. et al. POTENCIALIDADES DO AEDES ALBOPICTUS COMO VETOR DE ARBOVIROSES NO BRASIL: UM DESAFIO PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA. **Revista de Atenção Primária à Saúde**, v. 11, n. 4, 2008.

DE FREITAS QUEIROZ, A. L. et al. ELABORAÇÃO DE UMA TECNOLOGIA EDUCATIVA SOBRE FEBRE DE CHIKUNGUNYA EM IDOSOS. **Mostra Interdisciplinar do curso de Enfermagem**, v. 4, n. 2, 2019.

DICK, G. W. A, KITCHEN, S. F.; HADDOW, A. J. Zika vírus (II). **Patogenicidade e propriedades físicas**. *Transações da sociedade real de medicina e higiene tropical*, 46 (5), 1952.

DUCHEMIN, Jean-Bernard et al. Risco de transmissão do vetor de zika na Austrália temperada: um estudo de competência vetorial. **Revista de Virologia**, v. 14, n. 1, p. 108, 2017.

FORATTINI, O. P. Identificação de *Aedes (stegomyia) Albopictus* (skuse) no Brasil. **Revista de Saúde Pública**, v. 20, p. 244-245, 1986.

FORATTINI, O. P. **Culicidologia Médica: Identificação, Biologia, Epidemiologia Vol. 2**. Edusp, 2002.

GRARD, G.; CARON, M.; MOMBO, I. M.; NKOGHE, D.; MBOUI, O. N. D. O. S.; JIOLLE, D, et al. **Zika virus in Gabon (Central Africa) - 2007:** a new threat from *Aedes albopictus*? PLoS Negl Trop Dis. 2014;8:e2681.

GRATZ, N. G. **Critical review of the vector status of *Aedes albopictus***. Medical and Veterinary Entomology (2004) 18, 215–227.

GUEDES, D. R. D. et al. **Epidemiologia Molecular do *Aedes albopictus* (Díptera: Culicidae)**. 2006. Tese de Doutorado.

HONÓRIO, N. A. et al. Chikungunya: uma arbovirose em estabelecimento e expansão no Brasil. **Cadernos de saúde pública**, v. 31, p. 906-908, 2015.

KAMBHAMPATI, S.; BLACK, W. C; RAI, K. S. **Origem geográfica do *Aedes albopictus* dos EUA e do Brasil inferida a partir da análise de aloenzimas. *Hereditarietà*, 67 , 85 – 93, 1991 .**

KESAVARAJU, B.; LEISNHAM, P. T.; KEANE, S.; DELISI, N.; POZATTI, R. **Interspecific Competition between *Aedes albopictus* and *A. sierrensis*: Potential for Competitive Displacement in the Western United States. *PlosOne*: e0089698, 2014.**

LEANDRO, R. S. et al. **Competição e dispersão de *Aedes (Stegomyia) aegypti* (Linnaeus, 1762) e *Aedes (Stegomyia) albopictus* (Skuse, 1894) (Diptera: Culicidae) em áreas de ocorrência no município de João Pessoa-PB. 2012.**

LESSER, J.; KITRON, U. A geografia social do zika no Brasil. **Estudos Avançados**, v. 30, n. 88, p. 167-175, 2016.

LUZ, K. G.; SANTOS, G. I. V.; VIEIRA, R. M. Febre pelo vírus Zika. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 24, p. 785-788, 2015.

MARINHO, F. et al. Microcefalia no Brasil: prevalência e caracterização dos casos a partir do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc), 2000-2015. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 25, p. 701-712, 2016.

MARQUES, C. A.; MIRANDA, C. Influência de extratos de formas evolutivas sobre atividades de oviposição de fêmeas de *Aedes (S) albopictus* (Skuse). **Revista de saúde pública**, v. 26, p. 269-271, 1992.

MARQUES, G. R. A. M.; GOMES, A. C. Comportamento antropofílico de *Aedes albopictus* (Skuse)(Diptera: Culicidae) na região do Vale do Paraíba, sudeste do Brasil. **Revista de Saúde Pública**, v. 31, p. 125-130, 1997.

MARTINS, V. E. P. et al. Distribuição espacial e características dos criadouros de *Aedes albopictus* e *Aedes aegypti* em Fortaleza, Estado do Ceará. **Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical**, v. 43, n. 1, p. 73-77, 2010.

MOHRDIECK, R. Vacina contra febre amarela: Vigilância de efeitos adversos pós-vacina. **Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul/Centro de Vigilância Estadual em Saúde/Divisão de Vigilância Epidemiológica/Programa Estadual de Imunizações**. Disponível em: <http://www.saude.rs.gov.br/>

OEHLER, E.; WATRIN, L.; LARRE, P.; LEPARC-GOFFART, I.; LASTERE, S.; VALOUR, F. et al. **Zika virus infection complicated by Guillain-Barre syndrome—case report, French Polynesia, December 2013. *Euro Surveill*. 2014;19:20720.**

OLSON, J. G.; KSIAZEK, T. G.; SUHANDIMAN, T. **Zika virus, a cause of fever in Central Java, Indonesia.** *Trans R Soc Trop Med Hyg.* 1981;75:389–93.

PESSÔA, S. B.; MARTINS, A. V. 1978. **Parasitologia Médica.** 10a Ed., 1a reimpressão. Rio de Janeiro: Editora Guanabara-Koogan.

PLOURDE, A. R.; BLOCH, E. M. **A Literature Review of Zika Virus Emerg Infect Dis.** Jul; 22(7): 1185–1192, 2016.

RANGEL-S, M. L. Dengue: educação, comunicação e mobilização na perspectiva do controle-propostas inovadoras. **Interface-Comunicação, Saúde, Educação**, v. 12, p. 433-441, 2008.

RIBEIRO, Mirtes. **Febre amarela:** estudo de um surto. 2008.

ROSSI, J. C. N. et al. Efeito larvicida de extratos etanólicos de folhas secas e frutos maduros de *Melia azedarach* (Meliaceae) sobre *Aedes albopictus*. **Latin American Journal of Pharmacy**, v. 26, n. 5, p. 737, 2007.

SERUFO, J. C.; OCA, H. M.; DE TAVARES, V. A.; SOUZA, A. M.; ROSA, R. V.; JAMAL, M. C.; LEMOS, J. R.; OLIVEIRA, M. A.; NOGUEIRA, R. M. R.; SCHATZMAYR, H. G. **Isolamento do vírus da dengue tipo 1 de larvas de *Aedes albopictus* na cidade de Campos Altos, Minas Gerais, Brasil.** *Memorias do Instituto Oswaldo Cruz*, 88, 503 – 504, 1993.

SILVA, I. G. da et al. **Estudo do comportamento de oviposição no campo e o ciclo de vida de *Aedes albopictus* (Skuse, 1894) (Diptera: Culicidae) em laboratório.** 2009.

SILVA, N. M. da et al. Vigilância de chikungunya no Brasil: desafios no contexto da Saúde Pública. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 27, p. e2017127, 2018.

TURELL, M. J.; O'GUINN, M. L.; DOHM, D. J.; JONES, J. W. **Competência vetorial de mosquitos norte-americanos (Diptera: Culicidae) para o vírus do Nilo Ocidental.** *Jornal de Entomologia Médica*, 38, 130 – 134, 2001.

CAPÍTULO VI

DOENÇA FALCIFORME NA INFÂNCIA: CONHECIMENTO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Viviane Pereira Alves¹⁹; Evelynne de Lourdes Neves de Oliveira²⁰;
Carla Lidiane Jácome dos Santos²¹; Jael Rúbia Figueiredo de Sá França²²;
Eliane Cristina da Silva Buck²³.

DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2021.02-06

RESUMO:

A doença Falciforme é uma condição crônica hereditária que faz parte do grupo de doenças e agravos mais relevantes que afetam a população afrodescendente do Brasil. Na infância, a doença causa uma série de restrições à criança, podendo comprometer seu desenvolvimento físico, mental, emocional e social. Logo, faz-se importante que os profissionais de enfermagem que atuam na Atenção Primária à Saúde, possuem conhecimento adequado sobre a doença que permita o rastreamento eficaz, medidas de prevenção e identificação de crises e o manejo correto da doença na infância, de modo a diminuir hospitalizações, prevenir agravos e melhorar a qualidade de vida dessas crianças. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar o conhecimento de profissionais de enfermagem sobre Doença Falciforme na infância. Estudo quantitativo realizado com oito equipes de enfermagem de Unidades Básicas de Saúde da Família do Estado da Paraíba. A coleta de dados foi realizada mediante aplicação de questionários e analisados por meio de estatística descritiva. Os resultados evidenciaram prevalência de acertos em todas as dimensões dos instrumentos, contudo os enfermeiros apresentaram um melhor desempenho no domínio manejo clínico e, os técnicos de enfermagem no domínio epidemiologia. De modo geral, os técnicos de enfermagem obtiveram um maior percentual de acertos do que os enfermeiros. Entretanto, todos os profissionais apresentaram dúvidas acerca da doença, indicando uma fragilidade sobre o manejo da doença pelos participantes e expondo a necessidade de uma atuação mais presente da educação continuada a nível de atenção primária.

PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem. Atenção Primária. Doença Falciforme. Criança.

¹⁹ Enfermeira do Hospital Dom Pedro I; Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8032236812085644>; ORCID 0000-0002-7414-3026. E-mail: viviane.timpb@gmail.com

²⁰ Enfermeira; Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9003358878263813>; ORCID: 0000-0001-7332-2500. E-mail: evelyneoliveira@hotmail.com

²¹ Enfermeira, Doutoranda pela Universidade Federal da Paraíba; Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5142857905726050>; ORCID 0000-0002-5101-4408. E-mail: carlalima2006@yahoo.com.br

²² Enfermeira, Doutora em Enfermagem, Docente do Departamento de Enfermagem em Saúde Pública e do Programa de Pós-graduação em Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba; Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4954436220551945>; ORCID 0000-0001-8880-6786. E-mail: jaelrubia@gmail.com

²³ Enfermeira, Doutoranda pela Universidade Federal da Paraíba, Docente das Faculdades Nova Esperança; Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9855395433239611>; ORCID 0000-0002-9230-8760. E-mail: elianecristina@facene.com.br

FALCIFORM DISEASE IN CHILDHOOD: KNOWLEDGE OF NURSING PROFESSIONALS IN PRIMARY HEALTH CARE

ABSTRACT:

Sickle cell disease is a chronic hereditary condition that is part of the group of most relevant diseases and conditions that affect the Afro-descendant population in Brazil. In childhood, the disease causes a series of restrictions to the child, which can compromise their physical, mental, emotional and social development. Therefore, it is important that nursing professionals who work in Primary Health Care, have adequate knowledge about the disease that allows for effective screening, prevention and identification of crises and the correct management of the disease in childhood, in order to decrease hospitalizations, prevent injuries and improve the quality of life of these children. Thus, the aim of this study was to assess the knowledge of nursing professionals about sickle cell disease in childhood. Quantitative study carried out with eight nursing teams from Basic Family Health Units in the State of Paraíba. Data collection was performed through the application of questionnaires and analyzed using descriptive statistics. The results showed a prevalence of correct answers in all dimensions of the instruments, however, nurses performed better in the clinical management domain and nursing technicians in the epidemiology domain. In general, nursing technicians obtained a higher percentage of correct answers than nurses. However, all professionals had doubts about the disease, indicating a weakness in the management of the disease by the participants and exposing the need for a more present role in continuing education at the level of primary care.

KEYWORDS: Nursing. Primary attention. Sickle cell disease. Kid.

INTRODUÇÃO

A Doença Falciforme- DF, também conhecida como anemia falciforme, é uma hemoglobinopatia genética autossômica recessiva e hereditária com alta prevalência no Brasil. De curso crônico, a DF se caracteriza pela oxigenação inadequada dos tecidos decorrentes do grande número de hemácias circulantes que passam pelo processo de falcização, ou seja, assumem o formato de foice quando expostas a baixa pressão de oxigênio (RODRIGUES *et al.*, 2016).

A mutação da hemácia é consequência de um conjunto de eventos intrínsecos, como a presença de um ou mais genes HbS responsáveis por produzir Hemoglobina S em quantidade elevada no interior do eritrócito, e extrínsecos como a desoxigenação sanguínea tecidual ou sistêmica. Durante o processo de falcização, a hemácia passa a se apresentar enrijecida e com isso ocorre a sua adesão o endotélio desencadeando processo

inflamatório, ativação da coagulação, hipóxia, isquemia e infarto local, além de redução da sobrevivência da hemácia (MARTINS; SOUZA; SILVEIRA, 2010; BRASIL, 2018).

No Brasil, a Doença faz parte do grupo de doenças e agravos relevantes que afetam a população afrodescendente. Estima-se que 7.200.000 pessoas sejam portadoras do traço falcêmico (heterozigoto) e entre 25.000 a 30.000 expressem a DF (homozigotos recessivos). Por esta razão, ela foi incluída nas ações da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da População Negra - PNAISPN e na Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doença Falciforme e outras Hemoglobinopatias – PNAIPDF (FELIX; SOUZA; RIBEIRO, 2010; BRASIL, 2010; BRASIL, 2018).

Apesar disso, a visibilidade da DF se relaciona com a implantação de duas estratégias do Ministério da Saúde anteriores ao PNAISPN e PNAIPDF: o Programa Nacional de Triagem Neonatal – PNTN e a Rede Cegonha. O PNTN visa a detecção precoce da doença, enquanto que a rede cegonha visa o planejamento reprodutivo para assegurar o pré-natal de alto risco, contribuindo para a redução da morbimortalidade materna (RAMOS et al, 2020).

Segundo o PNTN, nascem 3.500 crianças por ano com DF e 200.000 com traço falciforme. Isso indica que a cada mil crianças nascidas no Brasil, uma possui a doença e a cada 35 crianças recém-nascidas uma possui o traço falciforme (SILVA, 2016).

Neste contexto, o rastreamento eficaz, assim como medidas de prevenção de crises e o manejo correto da doença falciforme, possibilita que a criança tenha uma vida com mais qualidade, diminuindo as hospitalizações e prevenindo agravos. Para isso, faz-se importante que os profissionais da atenção primária à saúde, em especial os de enfermagem, possuam conhecimentos sobre os meios de detecção precoce, grupos de risco, fatores desencadeantes das crises, as manifestações clínicas e manejo terapêutico.

O diagnóstico e tratamento precoce e contínuo da doença aumentam a sobrevivência e melhoram a qualidade de vida das crianças afetadas, mas não possibilita a cura clínica. Sendo assim, é fundamental o acompanhamento ao longo da vida por meio de uma equipe multiprofissional especializada, bem como a compreensão dos pais em relação aos planos de tratamento a fim de evitar complicações e agravos à saúde de seus filhos (SILVA, 2016).

Após o diagnóstico que geralmente se ocorre na fase neonatal, a equipe de enfermagem deve adotar medidas de promoção e prevenção à saúde, com destaque para as orientações dadas aos familiares no tocante ao reconhecimento precoce das complicações mais frequentes. Tais medidas reduzem a taxa de mortalidade para menos de 5% nos primeiros cinco anos de vida da criança, aumentando a sobrevida média, que passou de 20 anos na década de 1970, para 45 anos no homem e 55 anos na mulher na década de 1990 (LOBO *et al.*, 2003).

Deste modo, o avanço no tratamento da doença e a consequente melhoria da sobrevida dos pacientes estão intrinsecamente ligados à forma como a família é acolhida e orientada pela equipe de enfermagem a partir do seu diagnóstico. Para isso, se faz importante que o enfermeiro e o técnico de enfermagem tenham conhecimento técnico-científico sobre a patologia, bem como sobre o seu manejo (GESTEIRA *et al.*, 2020).

Assim, o conhecimento de enfermeiros e técnicos de enfermagem que atuam na Atenção Primária sobre doença falciforme na infância tem relevância científica, sendo por isso importante ser investigado. Neste contexto, este estudo objetivou avaliar o conhecimento dos profissionais de enfermagem sobre Doença Falciforme na infância.

METODOLOGIA

Pesquisa do tipo exploratório-descritiva com delineamento quantitativo realizada em oito Unidades Básicas de Saúde da Família -UBSF de um município da Paraíba/PB. A população foi constituída por enfermeiros e técnicos de enfermagem que atuam nas UBSF. Para definição da amostra adotou-se como critérios de elegibilidade: profissionais concursados, contratados e efetivados que desempenhassem atividades assistenciais durante o período de coleta de dados; e como critérios de exclusão: profissionais que não estivessem na UBSF no momento da coleta de dados por férias, licença e/ou atestado médico. Assim, o número de participantes da amostra foi igual ao da população, ou seja, oito enfermeiros e oito técnicos de enfermagem, totalizando 16 participantes.

Os dados foram coletados durante o mês de outubro de 2018, através de dois questionários validados, sendo um destinado a enfermeiros e outro a técnicos de enfermagem. Cada instrumento apresentava-se dividido em duas partes: uma que

contemplava as características sociodemográficas dos participantes e outra com as questões pertinentes à temática, de acordo com o conhecimento técnico-científico de cada classe profissional (GOMES, 2010).

Cada questionário estruturava-se em três domínios (Epidemiologia, Manifestações Clínicas e Manejo da criança com doença falciforme) com questões de dupla escolha entre verdadeiro ou falso. Assim, o questionário voltado para os enfermeiros possuía 47 perguntas, enquanto o voltado para os técnicos de enfermagem possui 37. Cada questão respondida corretamente soma um ponto no score dos instrumentos, o qual indicará o desempenho do conhecimento dos profissionais sobre a temática.

Tabela 1 - Escore dos instrumentos de coleta de dados (GOMES, 2010).

Desempenho abaixo da média	Menor que 31 acertos
Desempenho acima da média	Maior que 31 acertos

Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva com ênfase no percentual e nas medidas de tendência central (média aritmética e mediana), utilizando, para tanto, uma planilha eletrônica do programa *Microsoft Office Excel®*, versão 2010 do Windows 8.

Salienta-se que a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa, sob protocolo n.º 190/2018, sendo assim, norteadas pelas diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos, estabelecidas na Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e na Resolução 564/2017 do Conselho Federal de Enfermagem (BRASIL, 2012; COFEN, 2017).

RESULTADOS

A análise estatística dos dados permitiu realizar a caracterização sociodemográfica dos participantes da pesquisa que encontra-se ilustrada na tabela 2. Percebe-se prevalência das mulheres jovens em ambas classes profissionais. Sobre pacientes, principalmente crianças, com doença falciforme, a maioria das enfermeiras referiu desconhecer algum caso na área de abrangência da UBSF em que trabalham.

Tabela 2 – Caracterização sociodemográfica dos enfermeiros (n = 8) e técnicos de enfermagem (n = 8). 2018. (n = 16).

Variáveis	Enfermeiros		Técnicos de Enfermagem	
	<i>f</i>	%	<i>F</i>	%
Faixa etária				
≥ 40anos	1	12.5	2	25.0
< 40 anos	7	87.5	6	75.0
Número de filhos				
Nenhum	3	37.2	3	37.5
Um	2	25	1	12.5
Dois	1	12.5	3	37.5
Três	2	25	1	12.5
Sexo				
Feminino	8	100	7	87.5
Masculino	0	0	1	12.5
Estado civil				
Casada	7	87.5	3	37.2
Solteira	1	12.5	5	62.5
Qualificação profissional				
Saúde da família	5	62.5		
Saúde pública	2	25		
Urgência e Emergência	1	12.5		
Enfermagem do trabalho	1	12.5		
Não possui	2	7,5		
Tempo de formação				
< 10 anos	2	25		
10 - 20 anos	5	62.5		
> 20 anos	1	12.5		
Tempo de serviço				
> 5 anos	2	25		
≤ 5 anos	6	75		
< 10 anos			5	62.5
≥ 10 anos			3	37.5
Há pacientes com Doença Falciforme na UBS				
Sim	2	25		
Não	6	75		
Já ouviu falar na Doença Falciforme?				
Sim			8	100
Não			0	0
Conhece alguém com Doença Falciforme?				

Sim	5	62.5
Não	3	37.5
Quem?		
Paciente	3	37.5
Parente	2	25.0
Amigos	1	12.5

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

As figuras 1 e 2 apresentam o percentual das respostas dos enfermeiros e técnicos de enfermagem para os quesitos contidos nos domínios epidemiologia, manifestações clínicas e manejo clínico. Entre os enfermeiros, observou-se que a prevalência de acertos foi sempre superior em todas as dimensões do inquérito, com destaque para o manejo clínico (Figura 1). No caso dos técnicos de enfermagem, as respostas foram mais satisfatórias para o domínio da Epidemiologia (Figura 2).

Figura 1 – Distribuição das respostas dos enfermeiros participantes segundo os domínios da Escala de Conhecimento sobre Doença Falciforme na infância. Ingá-PB, 2018. (n=8).

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

Figura 2 – Distribuição das respostas dos técnicos de enfermagem participantes segundo os domínios da Escala de Conhecimento sobre Doença Falciforme na infância. Ingá-PB, 2018. (n=8).

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

A figura 3 representa o desempenho dos participantes da pesquisa na resolução dos questionamentos contidos no instrumento aplicado. Nesta, é possível observar que todos os enfermeiros pontuaram acima de 20 acertos, obtendo, assim média = 27; mediana = 26, desvio padrão = 4,5. Considerando-se os escores apresentados na tabela 1, é possível avaliar que os enfermeiros deste estudo apresentaram um desempenho abaixo da média (31 acertos).

Figura 3 – Desempenho dos profissionais de Enfermagem segundo a Escala de Conhecimento sobre Doença Falciforme na infância. Ingá-PB, 2018. (n=16).

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

Entretanto, quando se observa o traçado da pontuação dos questionários respondidos pelos técnicos de enfermagem, evidencia-se que a maioria pontuou acima da média do escore apresentado na tabela 1 (19 acertos). Assim os valores de média, mediana e desvio padrão corresponderam, respectivamente, a 17,7; 22,0; 11,4. O curioso nestes dados é que, apesar da maioria dos participantes terem acertados mais de 19 quesitos, dois participantes responderam “não sei” em todas as questões, não pontuando, assim, e baixando a média de acertos desse grupo. Este fato foi preponderante para que este grupo ficasse abaixo do escore recomendado e, portanto, caracterizado com baixo desempenho. A tabela 3 apresenta as questões que obtiveram os maiores e menores índices de acertos e erros segundo a categoria profissional.

Tabela 3 – Questões que obtiveram os maiores e menores índices de acertos e erros segundo a categoria profissional.
Ingá-PB. 2018. (n=16).

Enfermeiros			Técnicos de Enfermagem		
	<i>Q</i>	%		<i>Q</i>	%
Menor índice de acerto	B27		Menor índice de acerto	B3	
	B31	12,5%		B25	12,5%
Total	2		Total	3	
Maior índice de acerto	B16		Maior índice de acerto	B1	
	B21			B7	
	B22			B8	
	B33	100%		B10	75,0%
	B36			B18	
	B37			B19	
	B38			B20	
	B40			B22	
	B46			B31	
				B37	
Total	9		Total	10	
Menor índice de erro	B16		Menor índice de erro	B1	
	B21			B7	
	B22			B8	
	B33			B10	
	B36	0%		B12	0%
	B37			B14	
	B38			B15	
	B40			B18	
	B44			B19	
	B46			B20	
				B22

				B31	
				B37	
Total	10			13	
Maior índice de erro Total	B25	100%	Maior índice de erro Total	B23	75,0%
	1			1	

Q = questão do instrumento de coleta de dados; % = percentual.

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

Dentre as enfermeiras pesquisadas verificou-se que as questões 25, 27, 31 e foram as que tiveram os piores desempenhos, quando visto o percentual de erros e acertos. Tais questões são contempladas dentro do domínio “manejo clínico” e relacionam-se a imunização, dieta e uso profilático de ácido fólico pelas crianças.

Enquanto que as questões B16, B21, B22, B33, B36, B37, B38, B40, B44 e B46 foram as que as enfermeiras obtiveram os melhores desempenhos, estando inseridas nos domínios “manifestações clínicas” e “manejo clínico”, tendo este último uma expressividade maior. Tais questões referem-se aos sinais de alerta, monitoramento laboratorial e do quadro clínico, além de cuidados relacionados à educação em saúde para os pais sobre a doença.

Entre os técnicos de enfermagem pesquisados, constatou-se que as questões B3, B25 e B26 foram as que os profissionais tiveram os piores desempenhos, quando visto o percentual de erros e acertos. Tais questões são contempladas dentro dos domínios “epidemiologia” e “manejo clínico”.

Das 37 questões do instrumento aplicado aos técnicos de enfermagem, estas obtiveram um alto desempenho em 13 questões que estão inseridas nos três domínios (epidemiologia, manifestações clínicas e manejo clínico). Logo, observa-se que os técnicos de enfermagem obtiveram um melhor desempenho (maiores números de questões com maior percentual de acertos) se comparado aos enfermeiros pesquisados.

DISCUSSÃO

Pela própria singularidade de seu processo teórico-técnico, a enfermagem funda o trabalho em equipe como um dos pilares de sua existência, sendo caracterizado por um componente essencialmente feminino, uma profissão de mulheres, que no mundo público, representava uma extensão do lar, das representações de um feminino dócil, que cuida, nutre e educa. Percebemos que o valor atribuído ao feminino é tão forte, que o masculino na profissão sofre com os olhares indagadores (TELLES, 2015).

O perfil sociodemográfico das participantes encontrado neste estudo foi semelhante ao encontrado em uma pesquisa (GOMES et al, 2014) realizada em um município do sudeste brasileiro, o qual evidenciou que a maioria das enfermeiras que atuavam em UBSF eram jovens de até 30 anos, do sexo feminino e com titulação acadêmica de especialistas na área em que atuavam. Esse dado não foge à caracterização peculiar da enfermagem, composta, quase exclusivamente, por mulheres.

A Doença Falciforme pode ser detectada nos primeiros dias de vida quando realizada a triagem neonatal em tempo hábil. Isto é possível mediante a solicitação do teste do pezinho por médicos e enfermeiros nas UBSF. Sabendo que crianças menores de cinco anos possuem um maior risco de adquirir infecções e que estas podem desencadear crises álgicas relacionadas à falcização das hemácias, é importante que os profissionais de enfermagem tenham conhecimento adequado sobre o manejo da doença. Para isso, se faz necessário a reorganização, estruturação e qualificação da rede assistencial para a correta identificação da doença e de suas complicações (LOIOLA et al, 2017).

Os profissionais de enfermagem devem dar o primeiro passo para a descoberta do diagnóstico precoce da doença falciforme, antecipando os riscos e evitando complicações. O conhecimento e a sua transmissão deste pelos profissionais às crianças e seus familiares é essencial para a compreensão e enfrentamento da doença, bem como prevenção de agravos e múltiplas hospitalizações.

Evidenciou-se neste estudo que enfermeiros e técnicos apresentaram um desempenho abaixo da média proposta pelo instrumento, indicando um déficit no conhecimento acerca da doença falciforme. Este dado vai ao encontro dos resultados encontrados em uma pesquisa realizada em serviços da Atenção Primária à Saúde de Minas Gerais (MG) apontou a fragilidade no conhecimento de profissionais da saúde

sobre a doença e correlacionou este fato com as taxas elevadas de óbitos (GOMES et al, 2014).

Em Monte Carlos-MG pesquisa revelou que o conhecimento e a assistência prestada pelos profissionais da Atenção Básica sobre a epidemiologia e manejo clínico da Doença Falciforme, não atingiu os 75% que seria necessário para o não comprometimento dos cuidados para com esses pacientes (SOUZA; SILVA, 2017) Evidenciou-se que as fragilidades no conhecimento das enfermeiras estão relacionada a imunização, dieta e uso profilático de ácido fólico pelas crianças com DF.

As crianças com DF apresentam risco de contrair infecções 400 vezes maiores em relação à população infantil em geral. Destarte, devem receber todas as vacinas recomendadas no calendário de vacinação, em especial a vacina contra o pneumococo, meningococo e influenza, responsáveis por grande parte das infecções graves em crianças menores de cinco anos (BRASIL, 2015; BRAGA, 2007).

Existem dois tipos de vacinas contra pneumococo disponíveis no Brasil a Vacina 7-valente conjugada (Pnc7) e Vacina 23-valente (Pn23), ambas disponibilizadas gratuitamente nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais – CRIEs (FRAUCHES et al, 2010).

Deve-se ressaltar a importância de uma dieta equilibrada, baseada em todos os grupos de alimentos da pirâmide alimentar: alimentos energéticos, ricos em carboidratos (de preferência integrais); alimentos reguladores, que possuem vitaminas e minerais; e alimentos construtores, como os ricos em proteínas, sendo importante ingerir bastante quantidade de líquidos. Uma vez que as necessidades aumentam, o ácido fólico deverá ser prescrito, pois o mesmo age na construção das células do sangue. A criança com a DF tem uma destruição celular aumentada, apresentando uma demanda de ácido fólico maior, sobretudo no período de crescimento (BRAGA, 2007).

Os sinais de alerta, monitoramento laboratorial e do quadro clínico, além de cuidados relacionados à educação em saúde para os pais sobre a doença foram destacados como um desafio enfrentado pelos profissionais, uma vez que a DF pode se manifestar de diferentes formas em cada crianças. Contudo, são sinais de alerta que a equipe de enfermagem deve perceber e orientar aos pais: Crises álgicas, Icterícia, Síndrome mão-

pé, Infecções, Úlcera de Perna e Sequestro do Sangue no Baço. As crises de dor são os sintomas mais frequentes e geralmente está relacionada com obstrução vascular e hipóxia tecidual (BRASIL, 2015).

O monitoramento laboratorial é realizado antes de iniciar o tratamento com: Hemograma com contagem de plaquetas, Contagem de reticulócito, Eletroforese de Hb com dosagem de Hb fetal, Sorologias: hepatite B e C e HIV, Determinação do tempo de protrombina (TP), dosagem de transaminases (AST, ALT), fosfatase alcalina, gama-GT, Determinação do clearance de creatinina, Dosagem de ureia, creatinina, sódio, potássio e ácido úrico, Dosagem de bilirrubina, Dosagem de desidrogenase láctica, Dosagem de ferritina. Teste de gravidez em mulheres (β -HCG sérico), sendo necessário ser repetido se houver riscos em caso de gravidez são constantes as orientações para o uso de métodos contraceptivos durante todo o tratamento (CANÇADO et al, 2009).

Visto que os enfermeiros apresentam um melhor conhecimento autorreferido nas questões relacionadas ao manejo clínico das crianças com doença falciforme, quando comparados aos outros domínios do instrumento. Contudo, ainda existem dúvidas acerca dos cuidados, que precisam ser esclarecidos para garantir a qualidade da assistência prestada.

A criança que apresenta uma doença falciforme necessita de uma assistência prestada por uma equipe multiprofissional qualificada, para que se consiga atingir uma melhora na qualidade de vida e também influenciar positivamente o curso da doença, sendo de fundamental importância o acompanhamento e tratamento clínico (SILVEIRA, 2014). Contudo, um dos desafios que foi percebido neste estudo é a carência de uma educação permanente sobre a doença de forma contínua, de modo que os profissionais sempre estejam atentos aos sinais e sintomas, bem como de orientar o manejo adequado das crises álgicas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesse estudo, no quesito dos técnicos de enfermagem, foi apresentado um questionário sobre o conhecimento da doença falciforme, demonstrando três domínios: Epidemiológico, Manifestações Clínicas e Manejo da Doença, havendo 37 perguntas,

sendo importante ressaltar que, no total foram oito técnicos de enfermagem, que ficaram abaixo da média, pelo fato de duas técnicas responderem uma das questões como “não sei”, isso somado a média levou ao fato do baixo conhecimento do mesmo sobre a doença.

Nas perguntas realizadas aos enfermeiros, encontraram-se três que obtiveram um número de acertos igual ou maior que média, e cinco se mostraram abaixo da média de conhecimento.

Os resultados apresentados interferem nas práticas de saúde e na assistência de enfermagem pelo fato de muitos profissionais terem dúvida, ou não saberem responder sobre a doença falciforme. Sendo assim, o surgimento das dúvidas é um gatilho para começarem a ter um conhecimento aprofundado do assunto e assim saber como ajudar em uma qualidade de vida adequada à criança e à família.

Nesse estudo, foram vistas algumas limitações, tais como: A dificuldade de encontrar as enfermeiras na atenção básica, pois as mesmas se encontravam de férias, como também os técnicos de enfermagem estavam resistentes em responder os questionários.

REFERÊNCIAS

BRAGA, J.A.P. Medidas gerais no tratamento das doenças falciformes. **Rev Bras Hematol Hemoter.** v.29, n.3, p.233-8, 2007. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-84842007000300009&lng=en&nrm=iso Acesso em: 07 dec 2018.

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. **Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012.** Dispõe sobre pesquisas com seres humanos. Disponível em: <http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf>

BRASIL. **Diretrizes Básicas da Linha de Cuidado.** Doença Falciforme. Brasília; 2015.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Política Nacional de Saúde Integral da População Negra: uma política do SUS.** Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2010.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas Doença Falciforme.** Relatório De recomendação. CONITEC, 2018.

CANÇADO, R. D. et al. Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para uso de hidroxiureia na doença falciforme. **Rev. Bras. Hematol. Hemoter.** v.31, n.5, p.361-6,

2009. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbhh/2009nahead/aop7709.pdf> Acesso em 7 dez 2018.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN. **Resolução COFEN 564/2017**: Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Rio de Janeiro; 2017.

FELIX, A.A.; SOUZA, H.M.; RIBEIRO, S.B.F. Aspectos epidemiológicos e sociais da doença falciforme. **Rev. Bras. Hematol. Hemoter.** v.32, n. 3, p.203-8, 2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbhh/2010nahead/aop72010.pdf>. Acesso em 07 dez 2018.

FRAUCHES, D.O. et al. Vacinação contra pneumococo em crianças com doença falciforme no Espírito Santo, entre 2004 e 2007. **Epidemiol. Serv. Saúde.** v.19, n. 2, p.65-72, 2010. Disponível em http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-49742010000200009&lng=pt&nrm=iso. Acesso em 07 dez 2018

GESTEIRA, E. C. R. et al . Manejo familiar de crianças que vivenciam a doença falciforme: um estudo qualitativo. **Rev. Bras. Enferm.** v. 73, supl. 4, e20190521, 2020 . Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71672020001600180&lng=en&nrm=iso. Acesso em 11 dez 2020.

GOMES, L.M.X. **Avaliação da qualidade da assistência à criança com doença falciforme na atenção primária no Norte de Minas Gerais**. Dissertação - Programa de pós-graduação em Ciências da Saúde UNIMONTES, 2010.

GOMES, L.M.X. et al. Acesso e assistência à pessoa com anemia falciforme na Atenção Primária. **Acta Paul Enferm.** v. 27, n. 4, p.348-55, 2014. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-21002014000400010&lng=en&nrm=iso Acesso em 8 dez 2018.

LOBO, C.L.C. et al. Triagem neonatal para hemoglobinopatias no Rio de Janeiro. **Rev. Panam. Salud.** v.13, n. 2/3, 2003. Disponível em: <http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/8397/15732.pdf?sequence=1> Acesso em 20 mai 2018.

LOIOLA, K.J. et al. Anemia falciforme: conhecimento do enfermeiro sobre o desenvolvimento da doença. **Cadernos ESP.** v.11,n.1, p.18-28, 2017.

MARTINS, P.R.J.; SOUZA, H.M.; SILVEIRA, T.B. Morbimortalidade em Doença Falciforme. **Rev. Bras. Hemat. Hemot.** v.32, n.5, p.378-83, 2010. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/262518908_Morbiditymortality_in_sickle_cell_disease Acesso em 5 jun 2018

RAMOS, E. et al. Portadores da doença falciforme: reflexos da história da população negra no acesso à saúde. **Rev. Eletr. Comun. Infor. Inov. Saúde.** v.14, n. 3, 2020.

RODRIGUES, D.O.W. et al. **Genetic determinants and stroke in children with sickle cell disease.** J. Pediatr. v.92, n.6, p.602-8, 2016. Disponível em: <http://www.redalyc.org/html/3997/399748352010/> Acesso em 18 mai 2018.

SILVA, A.C.R. Políticas Ontológicas e Realidades Múltiplas: a doença falciforme performada na prática. **Rev. Antropológicas**. v. 27, n.2, p.169-95, 2016. Disponível em: <http://www.revista.ufpe.br/revistaanthropologicas/index.php/revista/article/view/679/416> Acesso em 18 mai 2018.

SILVEIRA, M.H. Percepção da equipe multiprofissional sobre cuidados paliativos. **Rev. Bras. Geriatr. Gerontol.** v.17, n. 1, p.7-16, 2014. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbgg/v17n1/1809-9823-rbgg-17-01-00007.pdf> Acesso em 7 dez 2018.

SOUSA, A.M.; SILVA, F.R.A. Traço falciforme no Brasil: revisão da literatura e proposta de atenção primária. **Rev. Med. UFC**.v.57, n.2, 2017. Disponível em: <http://periodicos.ufc.br/revistademedicinadaufc/article/view/19993/30665> Acesso em 7 dez 2018.

TELLES V. **História da educação brasileira: a mulher como protagonista da educação no ideário Positivista 1880-1930**. Dissertação [Mestrado em Educação] - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel; 2015.

CAPÍTULO VII

FATORES DE RISCO ASSOCIADOS AO ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO EM USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Ana Karolyna da Silva Sena²⁴; Viviane Cordeiro de Queiroz²⁵;

Viviane Michele da Silva²⁶; Jackson Soares Ferreira²⁷;

Maria de Lourdes Vieira Lins²⁸.

DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2021.02-07

RESUMO:

O acidente vascular encefálico é uma síndrome neurológica grave prevalente em adultos e idosos, que pode causar sequelas irreversíveis se não tratada em tempo hábil é uma das principais causas de mortalidade no mundo. Objetivou-se analisar a produção científica acerca dos fatores de risco associados ao AVE em usuários da atenção básica. Trata-se de revisão integrativa com seis etapas subsequentes, norteadas pela questão Quais os fatores de risco relacionados ao AVE em usuários da atenção básica?. Os critérios de inclusão utilizados para seleção das publicações foram: estudos publicados no período de 2017 a 2019, descritores Acidente Vascular Encefálico; Fatores de Risco; Enfermagem; Unidade Básica de Saúde no idioma português e artigos disponibilizados na íntegra. Após a seleção e leitura criteriosa de cada um dos artigos, apenas seis corresponderam à questão norteadora e atenderam aos critérios da pesquisa. Os resultados foram apresentados em quadros e a análise e síntese dos dados extraídos das publicações foram realizadas de forma descritiva e discutidas de acordo com as publicações pertinentes. Após análise das publicações surgiram duas categorias, dentre elas: 1) Fatores de Riscos Relacionados ao AVE e 2) A Enfermagem na Reabilitação dos Usuários com AVE. Neste estudo espera-se contribuir para a melhoria dos cuidados de enfermagem no atendimento das pessoas acometidas com Acidente Vascular Encefálico, desde o acometimento, sequelas, recuperação e reabilitação, até aos cuidados domiciliares.

PALAVRAS-CHAVE: Acidente Vascular Encefálico. Fatores de Risco. Enfermagem. Unidade Básica de Saúde.

²⁴Enfermeira graduada em Enfermagem pela Faculdade de Enfermagem Nova Esperança. E-mail: gcarolsena@hotmail.com

²⁵ Enfermeira. Mestranda em Enfermagem pela Universidade Federal da Paraíba. João Pessoa – PB – Brasil. E-mail: vivicordeiroqueiroz35@gmail.com

²⁶ Enfermeira graduada em Enfermagem pela Faculdade de Enfermagem Nova Esperança. João Pessoa – PB – Brasil. E-mail: vivi.michele015@gmail.com

²⁷ Enfermeiro. Pós-graduando Urgência e Emergência e UTI pela Faculdade de Enfermagem Nova Esperança. João Pessoa – PB – Brasil. E-mail: soaresjf21@gmail.com

²⁸ Enfermeira. Pós-graduada em Cuidados Paliativos pela Faculdade Futura São Paulo/SP. João Pessoa – PB – Brasil. E-mail: maluvlins@gmail.com

RISK FACTORS ASSOCIATED WITH BRAIN VASCULAR ACCIDENT IN BASIC CARE USERS: AN INTEGRATIVE REVIEW

ABSTRACT:

Stroke is a severe neurological syndrome prevalent in adults and the elderly, which can cause irreversible sequelae if not treated in a timely manner is a major cause of mortality worldwide. The objective was to analyze the scientific production about the risk factors associated with CVA in primary care users. It is an integrative review with six subsequent steps, guided by the question What are the risk factors related to stroke in primary care users?. The inclusion criteria used for the selection of publications were: studies published from 2017 to 2019, descriptors Stroke; Risk factors; Nursing; Basic Health Unit in Portuguese and articles made available in full. After the selection and careful reading of each of the articles, only six corresponded to the guiding question and met the research criteria. The results were presented in tables and the analysis and synthesis of the data extracted from the publications were carried out in a descriptive manner and discussed according to the relevant publications. After analyzing the publications, two categories emerged, among them: 1) Risk Factors Related to the Stroke and 2) Nursing in the Rehabilitation of Users with Stroke. In this study, it is expected to contribute to the improvement of nursing care in the care of people affected with stroke, from involvement, sequelae, recovery and rehabilitation, to home care.

KEYWORDS: Stroke. Risk factors. Nursing. Basic health Unit.

INTRODUÇÃO

Nos países emergentes a incidência das doenças crônicas não transmissíveis vem apresentando um elevado crescimento quando comparado com os países desenvolvidos, onde na atualidade, cerca de dois terços dos Acidentes Vascular Encefálico (AVE) ocorrem nesses países. A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é a principal causa para o risco do desenvolvimento dessa patologia (SOUSA *et al.*, 2019).

O AVE é definido como uma mudança dos níveis neurológicos, ocasionando uma interrupção súbita do fluxo sanguíneo. Pode ser isquêmico quando há uma obstrução da artéria e hemorrágico quando há uma ruptura dos vasos. Esta doença acomete mais os idosos, na qual 90% dos acometidos desenvolvem algumas sequelas sendo ela motora ou psicológica, impossibilitando assim o paciente de continuar suas atividades diárias (SILVA *et al.*, 2019).

Assim, provoca danos e comprometimentos que dependem do local e da extensão da lesão, a complicação do AVE pode provocar sequelas em partes sensitivas, motoras e

cognitivas, resultando em déficits na capacidade funcional, na independência e também na qualidade de vida dos indivíduos afetados (ALVES; NASCIMENTO; FRANCISCO, 2019).

Dados epidemiológicos mostram que o AVE é o principal causador de incapacidade física e mental no mundo. Os indivíduos mais acometidos são idosos na faixa etária de 70 a 80 anos, porém, muitas pessoas estão com predisposição precoce a este evento pelo fato de não estarem atentos aos fatores de risco, como sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, obesidade, dentre outros. Apesar disso, sujeitos que possuem distúrbios de coagulação, doenças inflamatórias, imunológicas e hipertensão estão também propícios a adquirirem essa doença independente da faixa etária (SILVA *et al.*, 2019).

As doenças cerebrovasculares estão no segundo lugar no topo de doenças que mais afetam vítimas com óbitos no mundo, perdendo a posição somente para as doenças cardiovasculares. As pesquisas indicam que esta posição tende a se manter até o ano de 2030 (BRASIL, 2013).

No Brasil são registradas cerca de 70 mil mortes anualmente por consequência do AVE ocasionando um impacto econômico e social, visto que muitos indivíduos permanecem dependentes de algum tipo de ajuda por pequeno tempo ou mesmo por toda a vida após a lesão (ALVES; NASCIMENTO; FRANCISCO, 2019).

A Linha do Cuidado do AVE, instituída pela Portaria MS/GM nº 665, de 12 de abril de 2012, e parte integrante da Rede de Atenção às Urgências e Emergências, sugere uma redefinição de estratégias que deem conta das necessidades específicas do cuidado ao AVE diante do cenário epidemiológico exposto, bem como de um contexto sociodemográfico considerável, a exemplo do aumento da expectativa de vida e assim sendo o envelhecimento da população, aumentando os fatores de risco e dimensionando mais ainda o seu desafio no SUS (BRASIL, 2013).

Os cuidados primários dos pacientes são dados pela Estratégia Saúde da Família (ESF), esta, que tem por função acompanhar as pessoas que foram acometidas por alguma doença, como também atuar na prevenção e controle de outros problemas. No caso de pacientes acometidos por AVE o principal papel dessas Unidades é o acompanhamento

especializado com a atenção devida, prevenindo crises epiléticas posteriores, bem como, promover uma melhor qualidade de vida. Tendo em vista que após serem acometidos por essa doença os pacientes adquirem algumas sequelas, como a perda do movimento de algum membro, espasticidade, perda da audição, ptose palpebral, dificuldade na fala, dentre outros (SILVA *et al.*, 2019).

Esta pesquisa justifica-se devido uma crescente evolução na população em relação às doenças cerebrovasculares, sendo uma das mais propensas o AVE e que, devido à idade e aos fatores de risco para lesões cardiovasculares e cerebrovasculares, elevam um risco para a morbimortalidade. Por este motivo é importante a elaboração da pesquisa para mostrar qual o perfil social desses usuários com objetivo de contribuir com a diminuição da incidência do desenvolvimento da doença, evitando agravos. Nesse contexto, este estudo busca responder a seguinte questão de pesquisa: Quais os fatores de risco relacionados ao AVE em usuários da atenção básica? Para tanto, objetivou-se analisar a produção científica acerca dos fatores de risco associados ao AVE em usuários da atenção básica.

METODOLOGIA

Para conseguir realizar a análise e discussões acerca da temática, o estudo se propôs a desenvolver uma pesquisa através do método de revisão integrativa. A revisão integrativa da literatura é um método que objetiva sintetizar resultados obtidos acerca de uma determinada temática ou questão de forma sistemática e abrangente (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2010).

Para composição deste estudo foram utilizadas as seis etapas da revisão integrativa que são descritas abaixo, segundo Souza; Silva e Carvalho (2010).

1ª Fase: Elaboração da pergunta norteadora, considerada a fase mais importante do processo, devendo ser elaborada de forma clara e específica, pois ela que irá determinar como os estudos e as pesquisas deverão ser realizados;

2ª Fase: Pesquisa e amostragem na literatura, em que se deve realizar uma pesquisa ampla e diversificada em base de dados;

3ª Fase: Coleta de dados, extração de artigos selecionados e seguros, com mínimo de erros na transcrição e garantia na checagem das informações, que irão como registro;

4ª Fase: Avaliação crítica dos estudos incluídos, está por sua vez procura atribuir uma abordagem organizada para avaliar o rigor e as características de cada estudo;

5ª Fase: Discussão dos resultados, fase na qual se compara os dados identificados na análise dos artigos ao referencial teórico, possibilitando a identificação de algumas lacunas do conhecimento influenciando assim para estudos futuros;

6ª Fase: Apresentação da revisão integrativa, na qual se deve ter uma apresentação objetiva e completa a fim de permitir ao leitor examinar criticamente os resultados.

A busca e a seleção foram realizadas por meio da utilização do descritor oficial, em português, disponibilizados pela interface da plataforma Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Acidente Vascular Encefálico; Fatores de Risco; Enfermagem; Unidade Básica de Saúde.

O levantamento dos artigos científicos ocorreu por meio da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) devido à integração das bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), BDEMF, bem como pela biblioteca *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), durante o primeiro semestre de 2020.

Os critérios de inclusão utilizados para seleção das publicações foram: estudos publicados no período de 2017 a 2019, que estivessem no idioma português e artigos disponibilizados na íntegra.

Para possibilitar a análise das publicações que integraram a análise, foi utilizado um instrumento elaborado pela autora contendo: título, ano, autores, delineamento, tipos de estudo e principais resultados (QUADRO 1).

Após a seleção das publicações iniciou-se um processo de leitura fluente e organização. Depois da seleção e leitura criteriosa foram identificadas 448 publicações. Ficando assim 41 artigos. De cada um dos artigos, apenas 06 corresponderam à questão norteadora e atenderam aos critérios da pesquisa.

Através do fichamento houve a facilitação da identificação dos núcleos abordados em cada publicação e assim deu-se início a fase de exploração do material, e sua análise.

Os resultados foram apresentados em quadros, a análise e síntese dos dados extraídos das publicações foram realizadas de forma descritiva e discutidas de acordo com as publicações pertinentes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na presente revisão integrativa da literatura analisou-se seis artigos que atenderam aos critérios de inclusão previamente estabelecidos. A seguir será apresentado um panorama geral dos artigos avaliados, antes de proceder à apresentação das categorias temáticas.

Quadro 1 – Características dos estudos incluídos na amostra da revisão integrativa, publicado entre 2017-2019. João Pessoa, Paraíba, 2020. (N= 6).

N	Título	Ano	Autores	Revista	Tipo de estudo	Principais Resultados
01	Acidente Vascular Cerebral e diferentes limitações: Uma análise interdisciplinar	2019	Schmidt, M.H <i>et al</i>	Arq. Ciência saúde UNIPAR	Observacional transversal	Verificou-se que o AVC acontece de modo igual em ambos os sexos, em prevalência de 39,8% dos casos na faixa etária de adultos jovens (30 a 59 anos), 69,8% das pessoas afetadas possuem baixo grau de escolaridade, e há proporção elevada na cor branca (48,2%) e parda (41,1%). O acesso ao processo de reabilitação demonstra-se insatisfatório, apenas 0,27% das pessoas realizaram fisioterapia para o AVC e 0,12% realizaram algum tipo de tratamento para reabilitação, prejudicando o quadro funcional do usuário. Destaca-se que os dados afirmaram com estudos realizados, mas, contrapõem no quesito de raça.

02	Perfil Social e Funcional dos Usuários da Estratégia Saúde da Família com Acidente Vascular Encefálico	2017	Medeiros, C.S.P <i>et al</i>	Rev. Bras. Cienc. Saúde	Transversal	Mostra que a idade média dos indivíduos foi $68,94 \pm 14,01$ anos, onde 56,41% eram mulheres, 58,97% casados, 58,97% pardos, 46,15% analfabetos, 41,03% agricultores, 71,79% aposentados e 84,62% residentes em casa própria. O hemisfério cerebral esquerdo (56,41%) e o tipo isquêmico (61,54%) mostraram ser mais predominantes nesta população. O tempo de lesão após o AVE foi de $6,7 \pm 6,9$ anos, onde 66,67% apresentaram um único evento. 97,40% dos avaliados são fatores de risco relativos. A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) (74,35%) foi o de maior destaque. No MEEM observou-se 82,05% da amostra com grave comprometimento cognitivo, 48,72% com pontuação da MIF indicando maior independência funcional, grave comprometimento motora FM (46,88%) e equilíbrio pobre com significativo risco para quedas na pontuação da EEB (43,59%) e TUG (36%).
03	Efeito do atendimento em grupo na qualidade de vida e capacidade funcional de pacientes após AVC	2018	Nascimento, H.S; Ribeiro, N. M. S	Rev. Pesqui. Fisioter	Análise retrospectiva de prontuário	Durante a análise, 27 prontuários corresponderam aos critérios estabelecidos. No que diz aos resultados referentes à capacidade funcional dos indivíduos, foi possível notar diferenças importantes nos itens de: Alimentação; higiene pessoal; banho; vestir-se, além do score total do Índice de Barthel Modificado. Observou-se também melhora significativa em aspectos relacionados à

						qualidade de vida nos seguintes itens: Energia; linguagem; mobilidade; memória/concentração, além do score total da escala de avaliação EQVE-AVE.
04	Adesão terapêutica e qualidade de vida de hipertensos assistidos na atenção primária de saúde	2019	Gouveia N. J.R <i>et al</i>	Nursing	Descritivo, transversal, quantitativo	Abordaram-se 140 hipertensos, grande parte da amostra apresentou sobrepeso e escore de qualidade de vida 12,18. A principal queixa foi cefaleia, com 27,7, no qual a maioria está com baixo score de adesão (17,8). Com relação aos fatores de risco modificáveis, a maior parte da amostra é sedentária, com score de adesão baixo de 45,5. Quanto às doenças, o diabetes mellitus é mais comum, com score baixo de 22,3.
05	Risco cardiovascular em usuários hipertensos da atenção primária de saúde	2018	Santos, L.B <i>et al</i>	Revi. Enferm. UFPE online	Quantitativo e transversal	Houve predomínio do sexo feminino (67,8%), idosos (> 60 anos) (66,1%), em uso contínuo de diuréticos (65,2%). Ao estratificar os usuários da APS de acordo com o risco para doenças cardiovasculares, observou-se que a maioria apresentou risco elevado (59,1%), risco médio (26,1%) e baixo risco (14,8%). São relativos ao maior risco de eventos cardiovasculares os hipertensos com diabetes mellitus (DM) ($p = 0,000$), infarto agudo do miocárdio (IAM) ($p = 0,000$), insuficiência cardíaca congestiva (ICC) ($p = 0,000$) e aqueles em uso de diuréticos ($p = 0,001$).
06	Intervenção de enfermagem ao paciente com acidente cerebrovascular em reabilitação	2018	Cavalcante, T. F <i>et al</i>	Revi. Enferm. UFPE online	Revisão integrativa com abordagem qualitativa	Foram selecionadas 29 publicações e dentre as intervenções de Enfermagem assistenciais, destacou-se a reabilitação motora e funcional. Nas intervenções educacionais, observou-se a

						educação do paciente sobre a doença. Dentre as intervenções gerenciais, sobressaíram as relacionadas à coordenação do cuidado. Foram encontradas intervenções de Enfermagem direcionadas aos cuidadores.
--	--	--	--	--	--	--

Fontes: Scielo, Lilacs, Ibecs, Medline e PubMed, 2020.

CATEGORIAS TEMÁTICAS

Nesta seção, será sintetizada e discutida a produção científica sobre os fatores de risco relacionados ao acidente vascular encefálico. Para facilitar essa apresentação os estudos da amostra foram dispostos em duas categorias temáticas: (1) Fatores de riscos relacionados ao AVE; (2) A enfermagem na reabilitação dos usuários com AVE.

FATORES DE RISCOS RELACIONADO AO AVE

Após análise das publicações foi possível notar que no Brasil, o AVE ainda é uma das principais causas de morte, onde a mudança no estilo e expectativa de vida associadas com o aumento dos fatores de riscos podem servir como justificativa para a grande incidência dessa patologia (Medeiros *et al.*, 2017).

Para Santos *et al* (2018) as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) se apresentam como o maior problema global de saúde e estão associadas principalmente aos maus hábitos, como o tabagismo, a alimentação desequilibrada, o sedentarismo e o sobrepeso.

Existem diversos fatores potenciais para a ocorrência do AVE. Os fatores de riscos não modificáveis como a idade avançada, o sexo, o histórico familiar, e os fatores de riscos modificáveis que incluem a hipertensão arterial sistêmica, sendo uma das principais causas, o sedentarismo, tabagismo, diabetes *mellitus* e dentre outras comorbidades (SCHIMIDT *et al.*,2019).

Nascimento e Ribeiro (2018) dizem que, precisam ser analisados com atenção, a qualidade de vida, onde a capacidade funcional é definida como a habilidade mental e

física do indivíduo em realizar seu autocuidado preservando sua independência e autonomia para a realização das atividades do cotidiano.

Corroborando com tais fatos, Lima *et al* (2016) relata em seus estudos que os estilo de vida adotado pelos indivíduos pode trazer sim benefícios ou riscos para sua saúde, onde optar pela adoção de práticas saudáveis parece estar relacionado a diversos fatores como a percepção do indivíduo em relação a sua posição na vida, contexto cultural e sistemas de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações.

Uma pesquisa feita por Gouveia *et al* (2019), com usuários hipertensos de uma Unidade Básica de Saúde, observou-se que o índice de sobrepeso é alto, ou seja, com relação aos fatores de risco modificáveis, a maioria possui uma vida sedentária.

O conhecimento e percepção dos fatores de risco são medidas essenciais para se obter um maior controle da doença e melhor adesão a medidas preventivas (Medeiros *et al.*, 2017).

Segundo o autor supracitado, o Programa Saúde da Família foi implantado no Brasil, como uma importante estratégia de reorientação do modelo assistencial a partir da atenção básica, em conformidade com os princípios do Sistema Único de Saúde e assistência voltada para a comunidade. Portanto, a Estratégia Saúde da Família visa à reorganização da atenção básica favorecendo a reorientação do processo de trabalho, ampliando a resolutividade e impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades, no qual devem ser priorizadas estratégias de prevenção, promoção e proteção da saúde, identificação precoce e o tratamento das doenças, onde o AVE deve ser pauta das ações haja vista as suas limitações e impacto social além do crescente número de fatores de risco para doença adscritos na população nas atividades de vida diárias, no que para Medeiros *et al* (2017) não foi diferente em seus relatos, pois a funcionalidade e motricidade ficam completamente afetadas e as incapacidades e sequelas geradas causam limitações funcionais e grande dependência.

Com os resultados da pesquisa de Silva *et al* (2016) apontou a necessidade de sensibilizar a população para uma adequada compreensão dos sinais e sintomas associados ao AVE de uma forma que possa cumprir a prevenção desse agravo. Além

disso, observou-se a necessidade da educação popular para o reconhecimento precoce dos sinais e sintomas dessa patologia e a busca imediata de cuidados à saúde, pois, o conhecimento inadequado tem prejudicado o prévio acesso aos cuidados disponíveis

Segundo Cavalcante *et al* (2018) as ações das equipes de enfermagem diante de um paciente em reabilitação, estão direcionadas para o favorecimento da melhoria e a adaptação às limitações impostas pela deficiência e para o atendimento às necessidades de cada paciente e família, dentre as quais se destacam as funcionais, motoras, psicossociais e espirituais. A todo o momento, a equipe de saúde busca a independência do paciente em relação aos limites físicos, cognitivos e comportamentais impostos pelas incapacidades decorrentes do AVE.

A importância de serem concedidos estímulos adequados e realizar atividades funcionais faz do processo de reabilitação essencial para aperfeiçoar o potencial plástico do Sistema Nervoso, ofertando um melhor prognóstico para o desenvolvimento físico e cognitivo (SILVA *et al.*, 2016).

A reabilitação motora e funcional envolve ações diversas como a orientação sobre a realização de atividades e treinamento de fala para melhorar a comunicação, ensinamentos de exercícios de equilíbrio, marcha e força que, além de melhorarem a mobilidade do paciente, ainda diminui a incidência de quedas. Portanto, a reabilitação motora é realizada no sentido de conseguir o nível máximo de mobilidade e alinhamento articular normalizado do paciente e, conseqüentemente, sua independência (CAVALCANTE *et al* 2018).

Com base nos estudos de Schmidt *et al* (2019) alguns pacientes, a reabilitação constituirá um processo constante de aquisição, manutenção e aperfeiçoamento de capacidades e poderá envolver a participação de diferentes profissionais

A ENFERMAGEM NA REABILITAÇÃO DOS USUÁRIOS COM AVE

O AVE ocorre quando o fluxo sanguíneo dos vasos locais é interrompido por um coágulo ou trombo, pela pressão de perfusão cerebral insuficiente ou pela ruptura da

parede de um vaso sanguíneo, podendo ser Isquêmico ou Hemorrágico (ALVES; SANTANA; AOYAMA, 2020).

É uma das principais causas de internações e mortalidade, tornando um grande problema de saúde pública (SCHIMIDIT *et al.*, 2019). Diante da quantidade elevada de condições crônicas de saúde, é considerada uma doença incapacitante, podendo causar alterações na função motora, linguagem, marcha, humor, percepção, cognição e realização de atividades de vida diária (NASCIMENTO; RIBEIRO, 2018).

As sequelas do AVE provoca algumas alterações pessoais e sociais na vida dos indivíduos na qual geram restrições e alterações associadas a limitações (médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, nutricionistas e assistente social) atuando de forma interdisciplinar, com intervenção na comunidade durante meses ou anos após o AVE.

Dessa forma, segundo o autor supracitado, a atenção primária em saúde tem um papel fundamental como referência a estes usuários, fornecendo os encaminhamentos necessários para promover a reabilitação eficiente e no menor tempo possível.

Com isso, para Cavalcante *et al* (2018) o enfermeiro desempenha um papel muito importante na educação dos usuários sobre a doença e suas implicações, orientando sobre aspectos da patologia, o tratamento e a sintomatologia de um AVE, como forma de prevenção de complicações severas.

CONCLUSÃO

O objetivo deste estudo foi sintetizar a contribuição de estudos científicos sobre o perfil social dos usuários com AVE. As publicações desta revisão integrativa estão direcionadas a duas grandes temáticas: fatores de riscos relacionados ao AVE e a enfermidade na reabilitação dos usuários com AVE.

A alimentação do estudo recai sobre o quantitativo de trabalhos indexados na rede de base de dados nacional. Acredita-se que os descritores não estejam condizentes com as publicações, causando redução do total de manuscritos que porventura estiveram nas bases, mas não foram captados pela rede.

É importante conhecer o perfil dos usuários que são acometidos pelo AVE, para melhor compreensão sobre suas causas e para guiar as políticas públicas de prevenção. Conhecer as principais sequelas é fundamental para auxiliar na orientação sobre os tratamentos, permitindo aos indivíduos afetados uma melhor qualidade de vida e uma rápida recuperação.

Considerando-se a importância da hipertensão arterial e o diabetes como causa principal para essa patologia, o acompanhamento realizado pelas equipes de saúde da família a esses usuários, torna-se essencial o trabalho com a promoção da saúde, na tentativa de reduzir as incidências de doenças crônicas e incapacitantes e melhorar a qualidade de vida das pessoas acometidas destes agravos, assim como a situação socioeconômica, que também desempenha um papel determinante na saúde dos indivíduos e populações, sendo a renda familiar baixa associada às condições de vida inadequadas e pouco acesso às informações e, conseqüentemente, as elevadas taxas de mortalidade por problemas cardiovasculares.

O AVE é um grande problema de saúde pública, por isso é de extrema importância que exista campanhas que promovam um estilo de vida saudável, com eficácia na prevenção, prestando uma assistência organizada para minimizar as complicações dessa patologia.

Por isso, é preciso estabelecer melhorias ou modificações nas estratégias de política de saúde em relação ao AVE, como a realização de campanhas educativas nas escolas, unidades básicas de saúde, hospitais, visando a conscientização e melhoria da qualidade de vida, com foco principalmente nas populações de baixa renda, aumentando assim a prevenção dessa patologia e conseqüentemente do AVE.

Espera-se que este estudo possa contribuir para a melhoria dos cuidados de enfermagem no atendimento das pessoas acometidas com Acidente Vascular Encefálico, desde o acometimento, sequelas, recuperação e reabilitação, até aos cuidados domiciliares.

REFERÊNCIAS

ALVES, C.L; SANTANA, D.S; AOYAMA, E.A. Acidente Vascular Encefálico em Adulto Jovem com Ênfase nos Fatores de Risco. **Revista Brasileira Interdisciplinar de Saúde**, v. 2, n. 1, p. 1-6, 2020.

ALVES, M. G *et al.* Conhecimento dos enfermeiros da atenção primária à saúde sobre a escala de Cincinnati. **Revista Atenas Higéia**, v. 1, n. 1, p. 35-40, 2019.

ALVES, N.S; Nascimento, P; Francisco, A. Análise das principais sequelas observadas em pacientes vítimas de acidente vascular cerebral-AVC. **Revista da FAESF**, v. 2, n. 4, 2019.

ANDERLE, P; ROCKENBACH, S.P; GOULART, B.N.G. **Reabilitação pós-AVC**: identificação de sinais e sintomas fonoaudiológicos por enfermeiros e médicos da atenção primária à saúde. **CoDAS [online]**, São Paulo, v. 31, n. 2, p. 20180015, 2019.

ARAÚJO, F.N.; FERREIRA, *et al.* Afetividade das ações de controle da hipertensão arterial na atenção primária a saúde. /The effectiveness of hypertension control blood in shares attention health. **Revista de Pesquisa em Saúde**, v. 17, n. 2, 2017.

ARAÚJO, J.P.; *et al.* Tendência da Mortalidade por Acidente Vascular Cerebral no Município de Maringá, Paraná entre os Anos de 2005 a 2015. **Int J CardiovascSci**, v. 31, n. 1, p. 56-62, 2018.

BARREIRA, I.; *et al.* Resultados da implementação do protocolo da via verde do acidente vascular cerebral num hospital português. **Revista de Enfermagem Referência**, v. 22, n. 4, p. 117-126, 2019.

BASSI, A.K.Z. Estilo de vida e histórico de saúde de pessoas com e sem Acidente Vascular Encefálico (AVE): contribuições para a fonoaudiologia e ciências da saúde. 2017. **Tese (Doutorado)** - Universidade de São Paulo, 2017.

BOTELHO, T.S.; *et al.* **Epidemiologia do acidente vascular cerebral no Brasil**. v. 16, n. 2, p. 361 a 377. João Pessoa, 2016.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Especializada. **Manual de rotinas para atenção ao AVC**. Brasília, 2013.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. **Saúde da família**. Brasília, DF, 2018. Disponível em: <https://pensesus.fiocruz.br/saude-da-familia>. Acesso em: 08 maio. 2019.

_____. Portaria nº 483. Brasília, 2014.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. **AVC-o que é, causas, sintomas, diagnostico, tratamento e prevenção**. Brasília, DF, 2017. Disponível em: <http://www.portalms.saude.gov.br/saude-de-az/acidente-vascular-cerebral-avc>. Acesso em: 08 maio. 2019.

CAIRES, E.S.; REMPEL, C.; MEDEIROS, C.R.G. Ações desenvolvidas para promover a qualidade de vida de pessoas com hipertensão arterial sistêmica: Uma revisão de literatura. **Revista de Atenção à Saúde**, v. 16, n. 58, 2019.

CAVALCANTE, T.F.; *et al.* Intervenções de enfermagem ao paciente com acidente Cerebrovascular em reabilitação. **Revi. Enferm. UFPE online**, v. 12, n. 5. p. 1430- 1436, 2018.

COFEN. Conselho Federal de Enfermagem. **Resolução COFEN nº 564/2017**: Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Rio de Janeiro, 2017.

GARCEZ, R.M. **Diagnóstico de enfermagem da NANDA-I: definições e classificações 2018 – 2020**. 11 ed. Porto Alegre: Artmed, 2018.

GOMES, G.L.S.; *et al.* Cuidados de enfermagem na unidade de terapia intensiva as vítimas de acidente vascular encefálico. **ReBIS-Revista Brasileira Interdisciplinar de Saúde**, v. 1, n. 4, 2019.

GONDIN, G.M.M.; MONKEN, M. Territorialização em Saúde. Escola Nacional de Saúde Pública. **Fundação Osvaldo Cruz**, p.32, 2012. Disponível em: <http://www.epsjv.fiocruz.br/upload/ArtCient/25.pdf>. Acesso em: 09 out. 2019

GOUVEIA, N.J.R.; *et al.* Adesão terapêutica e qualidade de vida de hipertensos assistidos na atenção primária de saúde. **Nursing**, São Paulo, v.22, n. 249, p. 2600-2603, fev.2019.

LIMA, M.J.M.R.; MOREIRA, T.M.M.; FLORÊNCIO, R.S.; NETO, P.B. Fatores associados ao conhecimento dos adultos jovens sobre histórico familiar de Acidente Vascular Cerebral. **Rev. Latino-Am. Enfermagem**, Ribeirão Preto, v. 24, nov. 2016.

MALTA, D.C; SILVA JUNIOR, J.B. O Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil e a definição das metas globais para o enfrentamento dessas doenças até 2025: uma revisão. **Epidemiol. Serv. Saúde**, Brasília, v. 22, n. 1, mar. 2013.

Disponível em: http://scielo.iec.pa.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-49742013000100016&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 26 de fev. 2017

MEDEIROS, C.S.P.; *et al.* Perfil social e funcional dos usuários da Estratégia Saúde da Família com Acidente Vascular Encefálico. **Rev Bras Cienc Saud**, v. 21, n. 3, p. 211-220, 2017.

MENDES; SILVEIRA; GALVÃO; *et al.* Revisão integrativa: método de pesquisa para incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. **Texto & Contexto Enfermagem**, Florianópolis, v.17, n.4, p.758-64, out. 2008. Disponível em: file:///C:/Users/barla/Documents/Nova%20pasta/29%2008%2019/Musicoterapia%20TRABALHO_EV076_MD4_SA1_ID946_03082017190612.pdf. Acesso em: 15 set. 2019.

NASCIMENTO, H.S.; Ribeiro, N.M.S. Efeito do atendimento em grupo na qualidade de vida e capacidade funcional de pacientes após AVC. **Revista Pesquisa em Fisioterapia**, v. 8, n. 2, p.183-190, 2018.

OLIVEIRA, S.N.; *et al.* Percepções de cuidadores paraibanos de pessoas que sofreram um acidente vascular. **Revista Sustinere**, v. 6, n. 2, p. 268-280, 2018.

PEREIRA, M.S. O Sistema de Triagem de Manchester e a pessoa com Acidente Vascular Cerebral. 2014. **Tese (Doutorado) - Escola Superior de Enfermagem de Coimbra**. Disponível no RCAAP.

REIS, M.L. **A dimensão social do trabalho do enfermeiro na estratégia de saúde da família**, 2014. Disponível em: <https://repositorio.bc.ufg.br/tede/bitstream/tede/4453/5/Tese%20Mary%20Lopes%20Reis%20-%202014.pdf>. Acesso em: 09 de out. 2019.

RIBEIRO, K.S.Q.S.; *et al.* Perfil de Usuários Acometidos por Acidente Vascular Cerebral Adscritos à Estratégia Saúde da Família em uma Capital do Nordeste do Brasil. **Revista brasileira de Saúde**. v.16, n.2, p.25-44, 2012. Disponível em: <http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/rbcs/article/view/16433/9522>. Acesso em: 09 de out. 2019.

SANTOS, L.B.; *et al.* Risco cardiovascular em usuários hipertensos na atenção primária à saúde. **Revi. Enferm. UFPE online**, v. 12, n. 5, p. 1303-1309, 2018.

SCHMIDT, M.H.; *et al.* Acidente vascular cerebral e diferentes limitações: uma análise interdisciplinar. **Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR**, Umuarama, v. 23, n. 2, p. 139-144, maio/ago. 2019.

SILVA, B.N.; *et al.* Avaliação da qualidade de vida de acometidos por acidente vascular encefálico acompanhados por uma unidade básica de saúde. **Revista Expressão Católica Saúde**, v. 4, n. 1, p. 44-52, 2019.

SILVA, J.K.; *et al.* A vida após o acidente vascular cerebral na perspectiva dos sobreviventes. **Revista Eletrônica de Enfermagem**, v. 18, 2016.

SOARES, L.L.; AMARAL, R.R. Assistência de enfermagem centrada no cuidador de pacientes com acidente vascular encefálico. **Dissertação de Graduação em Enfermagem**. Centro Universitário de Goiás. 2019.

SOUSA, C.M.R.; *et al.* Cuidados de Enfermagem ao Paciente acometido por Acidente Vascular Cerebral: Revisão Integrativa/Nursing Care for Patients caused by Cerebral Vascular Accidents: Integration Review. **Revista Multidisciplinar e de Psicologia**, v. 13, n. 44, p. 198-207, 2019.

SWARTZ, M.H. **Tratado de semiologia: história e exame clínico**. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

VIANA, R.A.P.P; MARIANA, T. **Enfermagem em terapia intensiva: Práticas integrativas.** São Paulo: Manole, 2017.

CAPÍTULO VIII

GÊNERO *LEISHMANIA*, VETORES NATURAIS E ASPECTOS CLÍNICOS INERENTES: UMA BREVE REVISÃO

José Ednézio da Cruz Freire²⁹; Lara Lys Santos Rocha³⁰;
José Gerardo Carneiro³¹; Antônio Juscelino Sudário Sousa³².
DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2021.02-08

RESUMO:

As leishmanioses consistem em um grupo de doenças negligenciadas, sendo uma das doenças parasitárias mais importantes no mundo, com prevalência de 12 milhões de infectados, distribuídos em 98 países. A doença é causada por um parasita intracelular obrigatório, denominado *Leishmania spp.*, cuja transmissão ocorre através de insetos hematófagos dos gêneros *Phlebotomus* e *Lutzomyia*. O processo de infecção de *leishmania* envolve mecanismos de escape do parasita para sobreviver no intestino do inseto dando continuidade ao seu ciclo. No processo de alimentação do vetor, os parasitas são ingeridos juntamente com o sangue, formando o bolo alimentar, no qual se encontram envolvidos por uma barreira físicoquímica composta majoritariamente por quitina e glicoproteínas. Durante o processo de digestão do inseto, as *leishmânias* precisam escapar do bolo alimentar, quebrando a barreira peritrófica para não serem excretados, utilizando para isso uma proteína denominada quitinase cuja sua função primordial é clivar quitinas. Existem poucos estudos relacionados às quitinases de *leishmânia* e o processo de purificação e caracterização requer métodos sofisticados e tempo. Desse modo, o principal objetivo deste trabalho é harmonizar informações de maneira fácil e rápida sobre a biologia de *Leishmania spp.*, de seus vetores naturais, bem como aspectos clínicos inerentes as *Leishmania spp.*

PALAVRAS-CHAVE: *Leishmania*. Flebotomíneo. Doenças negligenciadas.

LEISHMANIA GENDER, NATURAL VECTORS AND INHERENT CLINICAL ASPECTS: A BRIEF REVIEW

ABSTRACT:

Leishmaniasis consists of a group of neglected diseases, being one of the most important parasitic diseases in the world, with a prevalence of 12 million infected, distributed in 98 countries. The disease is caused by a mandatory intracellular parasite, called *Leishmania spp.* whose transmission occurs through hematophagous insects of the genera *Phlebotomus* and *Lutzomyia*. The leishmania infection process involves escape

²⁹ Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2872960672942349>. E-mail: jednesio@gmail.com

³⁰ Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2821590201221643>. E-mail: laralysrocha@hotmail.com

³¹ Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5964767469589227>. E-mail: gerardo@ifce.edu.br

³² Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8611868441945375>. E-mail: ajuscelinoss@gmail.com

mechanisms from the parasite to survive in the insect's intestine and continue its cycle. In the process of feeding the vector, the parasites are ingested together with the blood, forming the food bolus, in which it is surrounded by a physical-chemical barrier composed mainly of chitin and glycoproteins. During the process of digestion of the insect, *Leishmanias* need to escape from the bolus, breaking the peritrophic barrier so as not to be excreted, using a protein called chitinase, whose primary function is to cleave chitins. There are few studies related to *Leishmania* chitinases and the purification and characterization process requires sophisticated methods and time. Thus, the main objective of this work is to harmonize information in an easy and fast way about the biology of *Leishmania* spp., Its natural vectors, as well as clinical aspects inherent to *Leishmania* spp.

KEYWORDS: *Leishmania*. Phlebotomine. Neglected diseases.

INTRODUÇÃO

As leishmanioses consistem em um grupo de doenças negligenciadas, sendo uma das doenças parasitárias mais importantes no mundo, com prevalência de 12 milhões de infectados, distribuídos em 98 países (WHO, 2010). A doença é causada por um parasita intracelular obrigatório, pertencente ao gênero *Leishmania*, a qual é dividida em dois grupos: leishmaniose visceral (LV) e leishmaniose tegumentar americana (LTA), sendo esta última, um grave problema de saúde pública difundido em quatro continentes: América, África, Ásia e Europa (REY, et al., 2010).

De acordo com um estudo da Organização Mundial da Saúde, em 2010, estimou-se que 90% dos casos de leishmaniose visceral ocorreram em seis países: Bangladesh, Brasil, Etiópia, Índia, Sudão do Sul e Sudão. Para a LTA, a incidência de 70% dos casos concentrou-se em países subdesenvolvidos como Afeganistão, Argélia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Etiópia, Irã, Peru e Sudão (WHO, 2010).

Na história natural da doença, os insetos vetores dos gêneros *Phlebotomus* (Velho Mundo) e *Lutzomyia* (Novo mundo) são responsáveis por transmitir o protozoário no momento da alimentação (DESJEUX, 1996). No ciclo da doença, a fêmea se alimenta de sangue para nutrir os ovos e nesse momento ingere macrófagos contendo *Leishmania* sp., na forma amastigotas (HANDMAN, BULLEN, 2002). O sangue ingerido é armazenado no interior do intestino médio abdominal do inseto, onde há a matriz peritrófica (MP) composta majoritariamente por quitina e glicoproteínas cuja função é revestir o bolo alimentar (HEGEDUS et al. 2009).

Juntamente com o sangue, os parasitas são armazenados dentro da MP, se multiplicando e diferenciando nas primeiras 48 horas do processo de digestão, no entanto, para não ser excretado posteriormente ao final do processo, o parasita precisa escapar do bolo alimentar, possibilitando a continuidade do seu ciclo (PIMENTA et al., 1997). Esse processo de digestão no intestino do inseto é complexo e estudos na literatura abordam que este processo não foi totalmente compreendido, em especial as interações entre a quitinase oriunda do parasita com a quitina presente na MP do inseto vetor, necessitando de mais estudos, visto que este pode ser um ponto crucial na continuidade do ciclo de infecção da *Leishmania*.

REVISÃO TEÓRICA

ASPECTOS GERAIS DAS LEISHMANIOSES

As leishmanioses são causadas pelo protozoário do gênero *Leishmania*, que possui mais de 30 espécies catalogadas (20 de importância clínica), sendo considerada uma zoonose por causar doenças no homem e em outros animais (ASHFORD, 2000; SHAW, 2002; DESJEUX, 2004). A Organização Mundial de Saúde estima que as leishmanioses ocupam o segundo lugar em mortalidade e o quarto em morbidade dentre as doenças tropicais.

LEISHMANIA, CICLOS E SEUS VETORES

As *Leishmania spp.*, pertencem à ordem *Kinetoplastida*, família *Trypanosomatidae*. Duas morfologias principais se destacam: promastigota, forma flagelada encontrada no tubo digestivo do vetor, e amastigota, forma aflagelada, intracelular obrigatória e encontrada nos hospedeiros definitivos (BRASIL, 2010). Esses microrganismos possuem características bioquímicas, genéticas, evolutivas e imunológicas diferenciadas (THOMAZ-SOCCOL et al., 1993; CUPOLILLO, GRIMALDI; MOMEN, 1994; FERNANDES et al., 1994;). O DNA extranuclear do cinetoplasto (kDNA) constitui uma característica marcante da ordem *Kinetoplastida*, na qual essa organela possui dois tipos de moléculas circulantes denominados maxicírculos

e minicírculos que repetem-se de cinco a dez mil vezes por célula, sendo encontrados em regiões conservadas entre as espécies (ROGERS et al., 1990; BRUIJN, BARKER, 1992).

O gênero *Leishmania* possui 3 subgêneros: *Leishmania sensu stricto*, *Viannia* e *Sauroleishmania*, este último causa doença apenas em répteis (FERNANDES et al. 1994). Os subgêneros *Leishmania* e *Viannia* incluem juntos cerca de 20 espécies que divergem em sua distribuição geográfica, sendo os dois presentes no território brasileiro (LAINSON, 2003). Eles diferem-se um do outro pelo fato das espécies pertencentes ao subgênero *Viannia* terem seu desenvolvimento limitado ao intestino médio e anterior no inseto vetor, enquanto as espécies do subgênero *Leishmania* têm seu desenvolvimento nas regiões posterior, média e anterior do intestino (MOMEN, CUPOLLILO, 2000).

Nos continentes Africano, Asiático e Europeu as espécies *L. (L.) major*, *L. (L.) tropica* e *L. (L.) aethiopica* são causadoras de leishmaniose tegumentar (ASHFORD, BETTINI, 1987; GOTO, LINDOSO, 2010). Nas Américas, a principal espécie causadora de LT é majoritariamente a *L. (V.) braziliensis*, seguida de *L. (L.) amazonensis* e *L. (V.) guyanensis* (ASHFORD, BETTINI, 1987; GOTO, LINDOSO, 2010). A leishmaniose visceral tem como agentes etiológicos as leishmânias pertencentes ao subgênero *Leishmania* incluindo a *L. donovani*, responsável por causar a doença na Ásia e África e as espécies *L. infantum/chagasi* na Ásia, África, Américas e Europa (LAINSON, 2003; SHAW, 2006).

Os insetos vetores (hospedeiro invertebrado), responsáveis pela transmissão de *Leishmania spp.* pertencem à família *Psychodidae*, subfamília *Phlebotominae*, e são distribuídos em dois gêneros de acordo com a localização geográfica. Os insetos pertencentes ao gênero *Lutzomyia* (Novo Mundo) são responsáveis por transmitir os parasitas nas Américas, da Argentina até o México, enquanto o gênero *Phlebotomus* (Velho Mundo) é responsável pela transmissão nos demais continentes (WILLIAMS, 1999). Os vetores apresentam pequeno porte e corpo coberto de cerdas (LEITE, WILLIAMS, 1997).

Ambos os gêneros, machos e fêmeas (vetores) alimentam-se de substâncias açucaradas como plantas e nectas de flores (CHANIOTES 1974, ALEXANDER; USMA, 1994). No entanto, as fêmeas alimentam-se também de sangue devido à necessidade de

maturação dos ovócitos e produção de ovos (READY, 1979; SOARES, TURCO, 2003). Em sua alimentação, as fêmeas picam a pele do hospedeiro, formando um pequeno poço subcutâneo, no qual contém sangue e restos de tecidos ingeridos pelo inseto, cujo processo é denominado telmatofagia; isso ocorre devido a impossibilidade de se alimentar diretamente dos vasos sanguíneos devido a morfologia das curtas peças bucais. Desse modo, as leishmânias podem ser transmitidas para a pele e infectar macrófagos subcutâneos (BATES, 2007).

O habitat natural dos vetores é disperso, presente em quase todo o mundo, no entanto, seu predomínio consiste em áreas neotropicais, com regiões que variam de 16°C à 44°C, com vasta altitude, variando entre o nível do mar e 1500 metros acima, sendo encontrados em áreas isoladas como grutas, florestas ou em áreas urbanas em decorrência da extensão de áreas ocupadas pelo homem na natureza (COLACICCO-MAYHUGH et al., 2010; QUARESMA et al., 2012; KASSEM et al., 2012).

No ciclo de vida dos flebotomíneos, os ovos são depositados em solo de florestas ou ambientes modificados pelo homem nos quais após eclodirem dão origem às larvas, pupas até se tornarem adultos. Os ovos são pequenos, de difícil visualização macroscópica e após eclodirem surgem as larvas que se alimentam da matéria orgânica presente no solo úmido posteriormente aumentando de tamanho e metabolismo até se tornarem pupas, que se fixam no substrato e param de se alimentar para iniciar o processo de metamorfose. O inseto atinge a forma adulta após o processo de metamorfose. Os insetos vivem em abrigos escuros de alta umidade e normalmente se alimentam em períodos noturnos (PAIVA et al., 2007). Quanto à escolha do hospedeiro, o processo ainda não está totalmente esclarecido, no entanto, acredita-se que esse comportamento pode variar de acordo com a espécie, uma vez que algumas espécies apresentam comportamento oportunista, enquanto outras se limitam de poucos hospedeiros vertebrados (TESH et al., 1971; QUINNELL; DYE; SHAW, 1992; MISSAWA; LOROSA; DIAS, 2008).

No processo de telmatofagia são ingeridas leishmânias na forma amastigota que possuem baixa motilidade e passam a se replicar no intestino do vetor, mais especificamente em uma bolsa denominada matriz/barreira peritrófica (MP) que se forma de 12 à 24 horas após o repasto sanguíneo (WALTERS et al., 1995). Essa matriz consiste

em uma barreira física, química e mecânica responsável por revestir o bolo alimentar, fornecendo proteção para o inseto, uma vez que este se alimenta de substâncias que podem conter bactérias, parasitas e toxinas (MILLER, LEHANE, 1993). A MP é composta majoritariamente de quitina e glicoproteínas, sendo possível encontrar também as peritrofinas que se ligam ao arcabouço de quitina através dos seus múltiplos domínios, podendo mediar interações de glicoproteínas a MP, possibilitando a elasticidade estrutural (WALTERS et al, 1993). A quitina consiste no segundo carboidrato mais abundante na natureza, depois da celulose, sendo este um polissacarídeo com características estruturais semelhantes à celulose, no entanto, possuindo no carbono de posição 2 de cada unidade glicosídica da celulose uma substituição de hidroxila (OH) por um grupo acetilado (NHCOCH_3), sendo está, composta por uma cadeia longa não ramificada por duas unidades de *N*-acetil-2-desoxi-*D*-glicopiranosose interligadas e por ligações β -1,4 arranjadas em α -hélice.

A matriz peritrófica apresenta classificação 1 e 2, variando de acordo com a sua forma de secreção. Os insetos ao longo de sua vida podem secretar os dois tipos, entretanto não simultaneamente. A MP_1 é mais encontrada em insetos hematófagos adultos, principalmente algumas horas após a ingestão de sangue, sendo secretada pelas células do epitélio intestinal, na porção média, enquanto a matriz peritrófica do tipo 2 (MP_2) recobre todo o epitélio do tubo digestivo da larva, podendo ser continuamente secretada. A MP_2 é mais organizada e secretada sem a necessidade de estímulo alimentar, sendo produzida por células especializadas da região cárdia, localizadas entre o esôfago e o intestino médio.

Apesar da MP atuar como uma barreira contra os microrganismos, um estudo realizado por Pimenta e seus colaboradores (1997) demonstrou que a mesma é essencial para a continuidade do ciclo da *Leishmania*. Tal pesquisa realizou testes com adição de quitinases exógenas, esperando que a infecção pelo parasita aumentasse, no entanto, ao contrário do que se esperava, houve a perda de infecção, em decorrência da liberação precoce dos parasitas para o meio externo a MP, não havendo estabilização dos parasitas e consequente perda da infecção, logo nas primeiras 4 horas após a alimentação (PIMENTA et al., 1997).

Para o escape de *Leishmania spp.*, no intestino do inseto, o parasita se diferencia em promastigota procíclica (forma menos suscetível ao ataque das enzimas digestivas), capaz de se multiplicar intensamente através de divisão binária e posteriormente se diferenciar em promastigota nectomônadas, forma mais alongada e de flagelo maior, com capacidade de digerir a membrana peritrófica através da secreção de quitinase e escapar do bolo alimentar para não ser excretada (SHAKARIAN; DWYER, 2000; BATES 2007).

O mecanismo de digestão da MP está relacionado a produção de quitinases pelo parasita (PIMENTA, 1997). As mesmas constituem o grupo de enzimas que clivam as ligações glicosídicas β -1,4 presentes nas cadeias de quitina, podendo ser encontradas em diversos organismos (UBHAYASEKERA, 2011). As quitinases são divididas em duas famílias, sem conservação de aminoácidos entre elas, denominadas GH₁₈ (Glicosil Hidrolases 18) e GH₁₉ (Glicosil Hidrolases 19). Em geral, as quitinases dessas famílias se diferem em estruturas tridimensionais e função. A família GH₁₈ apresenta um domínio catalítico na forma de 12 barris (α/β)₈, enquanto a família GH₁₉ apresenta estrutura classicamente bilobada (BANNER et al., 1975). As funções entre essas quitinases também são diferentes, uma vez que os membros da GH₁₈ possuem mecanismo de retenção, resultando em quito-oligossacarídeos com configuração β -anômérica, já as quitinases GH₁₉ possuem mecanismo de inversão e seus produtos são α -anômeros. As quitinases GH₁₈ podem ser encontradas em microrganismos como fungos, bactérias e animais, em contrapartida, as GH₁₉ são majoritariamente encontradas em plantas.

Nos insetos, essas enzimas pertencentes à família 18 das Glicosil Hidrolases, e apresentam em geral: um peptídeo sinal, uma região transmembranar, um domínio catalítico e regiões ricas em serina/treonina, além de um domínio de ligação a quitina (CBD - *Chitin Biding Domain*) conservados, capazes de se ligar a quitina polimérica (ZHU et al., 2008). O domínio catalítico das quitinases GH₁₈ apresenta características estruturais em barril com 8 fitas alfa e 8 fitas beta (FUKAMIZO, 2000). A região rica em serina e treonina possui diferentes sítios de *O*-glicosilação, contribuindo para a estabilidade enzimática, mesmo quando expostas a proteases no tubo digestivo (ARAKANE, MUTHUKRISHNAN, 2009).

No flebotomíneo, após a fuga do bolo alimentar através da ação de quitinases, as promastigotas nectomônas se fixam ao epitélio intestinal do vetor, através das moléculas

de lipofosfoglicano (LPG) (PIMENTA, et al., 1992). Especula-se que as moléculas de LPG, ligadas a *Leishmania*, se ligam às lectinas presentes nas microvilosidades do tecido epitelial do intestino do vetor (MCCONVILLE et al. 1992, PIMENTA et al. 1994). Posteriormente, as promastigotas nectomônas se diferenciam em promastigotas leptomônadas (forma mais curta) e iniciam o segundo processo de multiplicação no interior do vetor no limite entre o intestino anterior e o intestino, denominado válvula do estomodeu (GOSSAGE et al., 2003; BATES 2007). No processo final do ciclo, são encontradas duas diferentes formas, as promastigotas haptomônas e as promastigotas metacíclicas, forma infectante para o homem (BATES 2007).

A origem das promastigotas haptomônadas ainda não está esclarecida, não se sabe ao certo se a morfologia precursora é de promastigotas nectomônas ou leptomônas, no entanto, sabe-se que as haptomônas apresentam-se um pequeno flagelo que adere a parede da válvula do estomodeu, bloqueando o local, enquanto as promastigotas metacíclicas (originadas a partir das leptomônas) possuem corpo pequeno e longo flagelo, facilitando a motilidade (BOULANGER et al., 2004; BATES, 2007). A válvula estomodeu consiste em uma estrutura rica em quitina que normalmente encontra-se fechada, sendo aberta apenas para a passagem de sangue e demais alimentos (TANG, et al, 2006). A produção de *Promastigote Secretery Gel* pelos parasitas, juntamente as formas lectomônas, levam a abertura forçada da válvula estomodeu, possibilitando a saída das *Leishmania spp.*, e transmissão para novos hospedeiros (ROGERS et al. 2002).

LEISHMANIOSE VISCERAL

A forma mais grave da leishmaniose é causada por parasitas da espécie *L. infantum*, *L. donovani* e *L. chagasi*. A doença caracteriza-se por febres irregulares e anemia, leucopenia e trombocitopenia, em longo prazo, pode ainda causar megalia em órgãos vitais decorrente do parasitismo e replicação no interior do órgão. As alterações no organismo do indivíduo infectado são diversas, incluindo as pulmonares, hepatoesplenomegalia, pancitopênicas, sendo os principais órgãos acometidos o baço, linfonodos, medula óssea e fígado (REY, 2010). Apesar de todas as manifestações citadas, na fase aguda, o indivíduo mostra-se com sintomas inespecíficos, como sudoreses

e febres, ou mesmo assintomático, podendo prevalecer assim por anos, até o aparecimento dos sintomas descritos acima. Estudos demonstram que a *L. infantum/chagasi* é a espécie predominantemente associada à leishmaniose visceral nas Américas, incluindo o Brasil. Na África e Índia, essa manifestação está associada com a infecção pela espécie *L. donovani* (KUHL et al., 2011).

LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA

A LTA pode apresentar diversos agentes etiológicos, padrões de transmissão e evolução da doença, o que justifica estudos escassos relacionados ao seu controle e dados epidemiológicos, sendo considerada pela OMS como uma das seis mais importantes doenças infecciosas no mundo, em decorrência da alta taxa de incidência e morbidade. No Brasil, a leishmaniose tegumentar é considerada uma das infecções dermatológicas de maior importância clínica devido a sua incidência e aos riscos de agravamento, além de apresentar ampla distribuição com registro de casos em todas as regiões.

A LTA é causada principalmente pela espécie *L. (Viannia) braziliensis*, uma vez que esta espécie se encontra distribuída por todos os estados brasileiros (Figura 1). A infecção por *L. (V.) braziliensis* pode causar agravamentos, levando a forma mucocutânea da doença. Outras espécies importantes na LTA são *L. (V.) guyanensis* causadora de lesões cutâneas localizadas e *L. (L.) amazonensis* podendo causar lesões localizadas ou difusas no Brasil, esta última, a única espécie pertencente ao subgênero *Leishmania* capaz de causar a forma cutânea no país (SAÚDE, 2007). Na América Central e México, a *L. (L.) mexicana* ocasiona lesões localizadas ou em alguns casos lesões difusas (BIAGI, 1953).

Figura 1: Mapeamento das espécies de *Leishmania* causadoras de LTA presentes no Brasil

Fonte: Vigilância Sanitária/ Ministério da Saúde, 2010 (adaptado).

Estudos apontam que milhares de pessoas são diagnosticadas com leishmaniose tegumentar todos os anos (WHO, 2016). Em regiões do México e América Central, a LCM costuma acometer principalmente a orelha (predominantemente causada por *L. mexicana*), enquanto no Brasil, a doença acomete com maior frequência as mucosas oral e nasal (BOGITSH, et al., 2005). Os pacientes com a forma clínica mucocutânea frequentemente são tratados com quimioterápicos de classe antimoniais pentavalentes como a silamaquina, paromicina, meglumina e anfotericina B, sendo este último de alta toxicidade e efeitos colaterais graves ao organismo, como lesões renais e hepáticas, bem como leucopenia, podendo levar a sequelas irreversíveis.

ESPÉCIES DE *LEISHMANIA*

LEISHMANIA BRAZILIENSIS

A *L. (V.) braziliensis* é a principal espécie causadora da LTA no Brasil. Este agente etiológico está presente em todos os estados brasileiros (SAÚDE, 2007). A *L. braziliensis* está frequentemente associada a lesões cutâneas localizadas e em alguns casos às lesões mucocutâneas, acometendo principalmente mucosas oral e nasal (BOGITSH, et al., 2005). Em animais como *Canis familiaris* (cães domésticos), a LTA pode manifestar-se de forma com lesões que podem evoluir em número e extensão.

LEISHMANIA DONOVANI

A espécie *Leishmania (L.) donovani* foi descoberta por Leishman e Donovan em 1903, no baço de pacientes com leishmaniose. Esta espécie tem ampla distribuição entre os continentes, sendo endêmica na África, América do Sul, China, Sul da Europa, Índia, Mediterrâneo e Rússia. Os maiores focos endêmicos em termos de prevalência, morbidade e mortalidade estão em regiões pertencentes à Índia, Sudão e Brasil. No entanto, manifestações clínicas relacionadas à espécie *L. donovani* são majoritariamente documentadas em Africanos e Indianas (KUHLIS et al., 2011).

LEISHMANIA INFANTUM

A *Leishmania (L.) infantum* pertence ao subgênero *Leishmania*, sendo responsável por uma importante parcela dos casos de leishmaniose visceral em cães e em homens na América e região do Mediterrâneo. Não se sabe ao certo qual das espécies *L. infantum* ou *L. chagasi*) deu origem a leishmaniose visceral, pois os dados presentes na literatura são contraditórios. No entanto há indícios de que a leishmaniose visceral tinha sido introduzida na época da colonização europeia sendo causada pela espécie *L. infantum*; outros indícios apontam que a leishmaniose visceral tenha surgido há milhões de anos atrás, concomitantemente a introdução de canídeos com *L. chagasi*. Em um estudo publicado em 2000 foi sugerido que as espécies *L. infantum* e *L. chagasi*, na verdade são uma única espécie, visto a alta similaridade compartilhada por ambas, sendo

possível encontrar a nomenclatura *Leishmania (Leishmania) infantum/chagasi* em muitos manuscritos científicos atualmente.

LEISHMANIA MAJOR

A *Leishmania major* está frequentemente associada à infecção de leishmaniose tegumentar nas regiões da África e Ásia, (ASHFORD, BETTINI, 1987; GOTO; LINDOSO, 2010). A infecção por esta espécie pertencente ao subgênero *Leishmania* (Velho mundo) causa lesões únicas, que podem se curar naturalmente após meses, em média de 2 a 4 meses.

LEISHMANIA MEXICANA

A *Leishmania mexicana* pertence ao subgênero *Leishmania*. Esta espécie não é encontrada normalmente no Brasil, no entanto apresenta importante papel em lesões na região do México e América Central acometendo vítimas com a forma tegumentar, contudo, há registro no Brasil de casos mistos entre *L. mexicana* e *L. amazonensis* em diferentes isolados cutâneos. Apesar de esporádico, é importante ressaltar que a *L. mexicana* é responsável pela alta incidência da forma difusa da doença.

CONCLUSÃO

O gênero *Leishmania* agrupa diferentes parasitas (protozoários) unicelulares, digenéticos (ou seja, heteroxenos), geralmente identificados na forma promastigota no trato digestório de hospedeiros invertebrados e, na forma amastigota parasitando fagócitos mononucleares em hospedeiros vertebrados. Quando parasitam invertebrados, *Leishmania* spp., parecem estar limitadas a insetos hematófagos (dípteros: *Phlebotomidae*). Por outro lado, quando parasitam vertebrados, os mamíferos são os principais alvos. Geralmente, interações danosas são observadas quando *Leishmania* spp., parasitam roedores e canídeos, edentados, marsupiais, procionídeos, ungulados primitivos e primatas incluindo o homem.

REFERÊNCIAS

- ALEXANDER, B.; USMA, M. C. Potential sources of sugar for the phlebotomine sand fly *Lutzomyia youngi* (Diptera: *Psychodidae*) in a Colombian coffee plantation. **Annals of Tropical Medicine & Parasitology**. v. 88, n. 5, p. 543-549, 1994.
- ARAKANE, Y.; MUTHUKRISHNAN, S. Insect chitinase-like proteins. **Cellular and molecular life sciences**. Basel, 2009.
- ASHFORD, R. W., BETTINI, S. **Ecology and epidemiology: Old World. In: The Leishmaniasis in Biology and Medicine**. v. 1, Peters, W., Killick-Kendrick, R. (editors). London: Academic Press, pp. 365-424, 1987.
- BANNER, D.W.; et al. Structure of chicken muscle triose phosphate isomerase determined crystallographically at 2.5 angstrom resolution using amino acid sequence data. **Nature**. v. 255, p. 609-614, 1975.
- BATES, P. A. Transmission of leishmania metacyclic promastigotes by phlebotomine sandflies. **International journal for parasitology**. **Liverpool**, 2007.
- BIAGI, F. F. Algunos comentarios sobre las leishmaniasis y sus agentes etiológicos, *Leishmania tropica mexicana*, nueva subespecie. **Medicina**. v. 33, p. 385-396, 1953.
- BOGITSH, B. J. et al. **Human parasitology**. 3rd ed. New York: Elsevier, 2005.
- BOULANGER, N. et al. Characterization of a defensin from the sand fly phlebotomus duboscqi induced by challenge with bacteria or the protozoan parasite *Leishmania major*. **American society for microbiology**. v. 72, n. 12, p. 7140-6, 2004.
- BRASIL. SVS - **Secretaria de Vigilância em Saúde. Manual de Vigilância da Leishmaniose Tegumentar Americana**. 2.ª edição atualizada 1.ª reimpressão. Série A. Normas e Manuais Técnicos. Brasília – DF 2010.
- BRUIJIN, M. H. L.; BARKER, D. C. Diagnosis of new world leishmaniasis: specific detection of species of the *Leishmania braziliensis* complex by amplification of kinetoplast DNA. **Acta Tropica**. v. 52, n. 1, p. 45-58, 1992.
- CHANIOTES, B.N. et al. Horizontal and vertical movements of phlebotomine sandflies in a Panamanian rain forest. **Journal of Medical Entomology**. v. 11. n. 3, p. 369-75, 1974.
- COLAICCO-MAYHUGH, M; et al. Ecological niche model of *Phlebotomus alexandri* and *P. papatasi* (diptera: *Psychodidae*) in the middle east. **International journal of health geographics**. v. 21, n. 9, p. 1-9, 2010.
- CUPOLILLO, E.; GRIMALDI G. Jr; MOMEN, H. A general classification of New World *Leishmania* using numerical zymotaxonomy. **The American journal of tropical medicine and hygiene**, v. 50, n. 3, p. 296-311, 1994.

DESJEUX, P. Leishmaniasis: current situation and new perspectives. **Comparative Immunology, Microbiology & Infectious Diseases**. v. 27, n. 5, p. 305-18 27, 2004.

FERNANDES, O. et al. Mini-exon gene variation in human pathogenic *Leishmania* species. **Molecular and Biochemical Parasitology**. v. 66, n. 2, p. 261-71, 1994.

FUKAMIZO, T. Chitinolytic enzymes: catalysis, substrate binding, and their application. **Current Protein & Peptide Science**, v. 1, n. 1, p. 105-24, 2000.

GOSSAGE, S. M.; ROGERS, M. E.; BATES, P. A. Two separate growth phases during the development of *Leishmania* in sand flies: implications for understanding the life cycle. **International Journal for Parasitology**. v. 33, n.10, p. 1027-34, 2003.

GOTO, H.; LINDOSO, J. A. L. Current diagnosis and treatment of cutaneous and mucocutaneous leishmaniasis. **Expert Review of Anti-infective Therapy**. v. 8, n. 4, p. 419-433, 2010.

HANDMAN, E.; BULLEN, D. V. R. Interaction of *Leishmania* with the host macrophage. **Trends in parasitology**. v. 18, n. 8, p. 332-334, 2002.

HEGEDUS, D. et al. New insights into peritrophic matrix synthesis, architecture, and function. **Annual Review of Entomology**. v. 54, p. 285-302. 2009.

KASSEM, H. A. et al. Environmental factors underlying spatial patterns of sandflies (Diptera: *Psychodidae*) associated with leishmaniasis in southern Sinai, Egypt. **Acta tropica**. v. 123, n. 1, p. 8-15, 2012.

KUHLS, K. et al. Comparative microsatellite typing of new world *Leishmania infantum* reveals low heterogeneity among populations and its recent old world origin. Public library of science. **PLOS Neglected Tropical Diseases**. v. 5, n. 6, p.e1155, 2011.

LAINSON R. **Flebotomíneos do Brasil**. Editora Fiocruz. Rio de Janeiro. 2003.

LEITE, A. C. R.; WILLIAMS, P. The first instar larva of *Lutzomyia longipalpis* (Diptera: *Phlebotomidae*). **Memórias do Instituto Oswaldo Cruz**. v. 92, p. 197-203, 1997.

MILLER, N.; LEHANE, M. J. Peritrophic membranes, cell surface molecules and arthropod tropisms within arthropod vectors. **Parasitology Today**. v. 9, n. 2, p. 45-50, 1993.

MCCONVILLE, M. J. et al. Development modification of lipophosphoglycan during the differentiation of *Leishmania major* promastigotes to an infectious stage. **The EMBO Journal**. Dundee, v. 11, n. 10, p. 3593-600, 1992.

MISSAWA, N.; LOROSA, E. S.; DIAS, E. S. Feeding preference of *Lutzomyia longipalpis* (Lutz & Neiva, 1912) in transmission area of visceral leishmaniasis in Mato Grosso. **Journal of the Brazilian Society of Tropical Medicine**. v. 41, n. 4, p. 365-8, 2008.

MOMEN, H.; CUPOLILLO, E. Speculations on the origin and evolution of the genus *Leishmania*. **Memórias do Instituto Oswaldo Cruz**. v. 95, n. 4, p. 583-588, 2000.

PAIVA, B. R. et al. Padronização de condições para detecção de DNA de *Leishmania* spp., em flebotomíneos (díptera, *Psychodidae*) pela reação em cadeia de polimerase. **Cadernos de saúde pública**. v.23, n.1, p. 87-94, 2007.

PIMENTA, P. F. P. et al. Evidence that the vectorial competence of phlebotomine sand flies for different species of *Leishmania* is controlled by structural polymorphisms in the surface lipophosphoglycan. **Proceeding sof the National Academy of Sciences**. v. 91, n. 19, p. 9155-9159, 1994.

PIMENTA, P. F. P. et al. A novel role for the peritrophic matrix in protecting *Leishmania* from the hydrolytic activities of the sandfly midgut. **Parasitology**. 115, (Pt 4), p. 359-369, 1997.

PIMENTA, P.F.P. et al. Stage-specific adhesion of *Leishmania* promastigotes to sand fly midgut. **Science**. 256, 1812-1815., 1992.

QUARESMA, P. F. et al. Natural leishmania sp. reservoirs and phlebotomine sandfly food source identification in ibitipocasate park, minas gerais, Brazil. **Instituto Oswaldo Cruz**. v. 107, n. 4, p. 480-5, 2012.

QUINNELL, R. J.; DYE, C.; SHAW, J. J. Host preferences of the phlebotomine sandfly *Lutzomyia longipalpis* in Amazonian Brazil. **Medical and veterinary entomology**. v. 6, n. 3, p. 195-200, 1992.

READY, P. D. Factor affecting egg production flaboratory-bred *Lutzomyia longipalpis* (Diptera: *Psychodidae*). **Journal of medical entomology**. v. 16, n. 5, p. 413-423, 1979.

REY, L. **Bases da Parasitologia Médica**. 3. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 391p, 2010.

ROGERS, D S. Genic evolution, historical biogeography, and systematic relationships among spiny pocket mice (subfamily *Heteromyinae*). **Journal of Mammalogy**. v. 71, n. 4, p. 668–685,1990.

ROGERS, B. T.; PETERSON, M. D.; KAUFMAN, T. C. The development and evolution of insect mouthparts as revealed y the expression atterns of gnathocephalic genes. Blackwell science. **Evolution & Development**. v. 4, n. 2, p. 96-110, 2002.

SAÚDE, Ministério da. **Manual de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral**. 2. ed. Brasília: Editora MS.2007. 179p.

SHAKARIAN, A. M.; DWYER, D. M. Pathogenic *Leishmania* secrete ant if genetically related chitinases which are encoded by a highly conserved gene locus. **Experimental Parasitology**. v. 94, n. 4, p. 238-42, 2000.

SHAW, J. J. Further thoughts on the use of the name *Leishmania (Leishmania) infantum chagasi* for the etiological agent of american visceral leishmaniasis. **Memórias do Instituto Oswaldo Cruz**. v. 101, n. 5, p. 577-579, 2006.

SOARES, R. P. P.; TURCO, S. J. *Lutzomyia longipalpis* (Diptera: *Psychodidae*: *Phlebotominae*): a review. **Anais da Academia Brasileira de Ciências**. v. 75, n. 3, p. 301-330, 2003.

TANG, W. et al. Development of insect-resistant transgenic indica rice with a synthetic cr1C* gene. **Molecular Breeding**. v. 18, n. 1, p. 1-10, 2006.

TESH, R. B. et al. Natural host preferences of panamian phlebotomine sandflies as determined by precipitin test. **The American society of tropical medicine and hygiene**. v. 20, n. 1, p. 150-6, 1971.

THOMAZ-SOCCOL V, et al. Phylogenetic taxonomy of new world *Leishmania*. **Annales de Parasitologie Humaine et Comparee**. v. 68, n. 2, p. 104-6, 1993.

UBHAYASEKERA, W. Structure and function of chitinases from glycoside hydrolase Family 19. **Polymer International**. v. 60, n. 6, p. 890-896, 2011.

WALTERS, L. L. et al. Life cycle of *Leishmania major* (*Kinetoplastida*: *Trypanosomatidae*) in the neotropical sand fly *Lutzomyia longipalpis* (Diptera: *Psychodidae*). **Journal of Medical Entomology**. v. 30, n. 4, p. 699-718, 1993.

WALTERS, L. L. et al. Peritrophic envelopes of *Lutzomyia spinicrassa* (Diptera: *Psychodidae*). **Journal of medical entomology**. v. 32, n. 5, p. 711-25, 1995.

WILLIAMS, J. C. et al. Structural and mutagenesis studies of *Leishmania* tricosphosphate isomerase: a point mutation can convert a mesophilic enzyme into a superstable enzyme without losing catalytic power. **Protein Engineering, Design and Selection**. v. 12, n. 3, p. 243-250, 1999.

WORLD HEALTH ORGANIZATION et al. **Control of the leishmaniasis: report of a meeting of the WHO Expert Committee on the Control of Leishmaniasis, Geneva, 22-26 March 2010**. 2010.

WORLD HEALTH ORGANIZATION et al. **Leishmaniasis in high-burden countries: an epidemiological update based on data reported in 2014**. v. 91, n. 22, p. 287-96, 2016.

ZHU, Q., et al. Characterization of recombinant chitinase-like proteins of *Drosophila melanogaster* and *Tribolium castaneum*. **Insect Biochemistry and Molecular Biology**. v. 38, n. 4, p. 467-77, 2008.

CAPÍTULO IX

IDENTIFICAÇÃO *IN SILICO* DE FITOTERÁPICOS INIBIDORES DA MDR₁ NO CÂNCER DE PULMÃO DE CÉLULAS NÃO PEQUENAS

Fátima Morgana Pio Fonseca³³; Mayara Queiroz de Santiago³⁴;

Vanir Reis Pinto Júnior³⁵; José Gerardo Carneiro³⁶;

José Ednézio da Cruz Freire³⁷.

DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2021.02-09

RESUMO:

O câncer de pulmão caracteriza-se como o mais comum dos tumores malignos. Pode ser dividido em dois tipos principais: pequenas células (CPPC) e células não pequenas (CPCNP). O fenômeno de resistência a multidrogas tem sido um grande problema enfrentado no tratamento de pacientes com câncer, inclusive nos pacientes com câncer de pulmão. A MDR₁ é uma proteína transmembrana pertencente à família ABC (*ATP-binding cassette*), que ocasiona grande parte da resistência medicamentosa devido ao seu metabolismo que expulsa os fármacos para fora das células. O presente estudo foi desenvolvido com o objetivo de explorar e avaliar as interações entre fitoterápicos e a MDR₁, empregando ferramentas computacionais.

PALAVRAS-CHAVE: Câncer de pulmão de células não pequenas. MDR₁. Análise *in silico*.

IN SILICO IDENTIFICATION OF MDR₁ PHYTOTHERAPY INHIBITORS IN NON-SMALL CELL LUNG CANCER

ABSTRACT:

Lung cancer is characterized as the most common of malignant tumors. It can be divided into two main types: small cells (CPPC) and non-small cells (CPCNP). The phenomenon of multidrug resistance has been a major problem faced in the treatment of cancer patients, including in patients with cancer of the lung. MDR₁ is a transmembrane protein belonging to the ABC family (*ATP-binding cassette*), which causes a large part of drug resistance due to its metabolism that expels drugs out of cells. The present study was developed with the objective of exploring and evaluating the interactions between herbal medicines and MDR₁, using computational tools.

KEYWORDS: Non-small cell lung cancer. MDR₁. In silico analysis.

INTRODUÇÃO

³³ Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7187343849404965>. E-mail: fatimamorganapf@gmail.com

³⁴ Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6946710332110975>. E-mail: santiago_mq@outlook.com

³⁵ Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4181697997790568>. E-mail: juniorreis4@hotmail.com

³⁶ Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5964767469589227>. E-mail: gerardo@ifce.edu.br

³⁷ Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2872960672942349>. E-mail: jednesio@gmail.com

O câncer é classificado como o maior problema de saúde do mundo (SIEGEL; MILLER; JEMAL, 2016) e a segunda maior causa de morte em todas as Américas (VICK; BURRIS, 2017). Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o câncer de pulmão caracteriza-se como o mais comum dos tumores malignos, com um crescimento anual de 2% em escala mundial. Anatomopatologicamente o câncer de pulmão pode ser dividido em dois tipos principais: pequenas células (CPPC) e células não pequenas (CPCNP). O tumor de células não pequenas possui três tipos histológicos distintos, denominados: carcinoma epidermóide, adenocarcinoma e carcinoma de grandes células (NOVAES et al., 2008). De todos os casos de câncer de pulmão na população mundial, 80% a 85% são caracterizados como células não pequenas, que possuem como peculiaridade o seu grau metastático (CAPELOZZI, 2001; DUARTE; PASCHOAL, 2005; ARAUJO et al., 2014; ZHAO et al., 2017).

O fenômeno de resistência a multidrogas tem sido um grande problema enfrentado nos tratamentos de pacientes com câncer (RAMAEN et al., 2006). Resistência essa que é ocasionada devido a uma massiva expressão dos transportadores da família ABC (*ATP-binding cassette*), caracterizados como proteínas transmembranas, que direcionam os fármacos para fora das células (RAMAEN et al., 2006; SUBHANI; JAYARAMAN; JAMIL, 2015; SZCZYREK et al., 2017). Uma proteína pertencente à família ABC, codificada pelo gene *MDR1* (resistência a multidrogas), é a P-gp – Glicoproteína-P (AZEREDO; COSTA; UCHOA, 2009), também chamada de *MDR1* – Proteína 1 resistente a multidrogas (RAMAEN et al., 2006).

Não só presente nas células tumorais, a P-gp também se encontra presente nas células do fígado, rins, cérebro, trato gastrointestinal e em células das barreiras hematotéciduais (AZEREDO; COSTA; UCHOA, 2009). A P-gp está entre uma das três principais subfamílias responsáveis pela resistência a multidrogas em células cancerígenas (RAMAEN et al., 2006). Como mecanismo metabólico ela age como uma bomba de efluxo ATP-dependente, permitindo a absorção, o transporte, o metabolismo e excreção de fármacos e xenobióticos (AZEREDO; COSTA; UCHOA, 2009). As proteínas da família ABC como um todo, são fisiologicamente capazes de transportar uma variedade de moléculas através da membrana celular, como lipídios, drogas e produtos naturais (RAMAEN et al., 2006; SUBHANI; JAYARAMAN; JAMIL, 2015).

A presença da MDR₁ nas células tumorais, diminui a eficácia das intervenções clínicas a base de quimioterápicos, visto que sua superexpressão minimiza a resposta do organismo frente às medicações (BURGER et al., 2003); (WISE, 2012). Inicialmente, o nível de MDR₁ é baixo quando localizado em pacientes com CPCNP, mas após aquelas células cancerígenas pulmonares locais serem expostas aos quimioterápicos, elas acabam por adquirir resistência medicamentosa (CAMPA et al., 2012).

Nos últimos anos, além dos fármacos obtidos sinteticamente em laboratório, os compostos farmacologicamente ativos presentes em plantas medicinais, tem sido descritos em trabalhos anteriores como promissores para o tratamento de doenças que acometem os seres humanos, como exemplo o câncer (RAZIS; IBRAHIM; KNTAYYA, 2014). Vários compostos presentes em plantas têm sido avaliados e vistos como potenciais terapêuticos (NADEEM; IMRAN, 2016; RAZIS; IBRAHIM; KNTAYYA, 2014).

Segundo estudos, de 2006 a 2013 foram gastos 34 bilhões de reais em compras de medicamentos pelo Governo Federal Brasileiro, dos quais os agentes antineoplásicos, antivirais de uso sistêmico, e imunossupressores foram responsáveis por cerca de 50% desses gastos (LUZ et al., 2017).

Em 2015 foram descritas interações moleculares entre a proteína MDR1 humana modelada por homologia, com cinco quimioterápicos para câncer de pulmão de células não pequenas (SUBHANI; JAYARAMAN; JAMIL, 2015). Entretanto, o modelo (proteína) usado para o trabalho citado anteriormente, uma estrutura obtida por *in silico*, pode não apresentar os padrões físicoquímicos favoráveis como estruturas cristalográficas, já que sua conformação é deduzida. Geralmente, as proteínas obtidas por cristalografia de Raios-X possuem uma geometria favorável, diferentemente das modeladas que podem apresentar uma geometria ruim.

Com base nesta pesquisa, o presente estudo teve como objetivo validar e comparar as interações moleculares da proteína MDR₁ de *Mus musculus* (PDB ID: 4KSB), com fitoterápicos específicos por ferramentas de bioinformática, frente ao CPCNP. Servindo assim como um estudo prévio para trabalhos experimentais posteriores, para essa classe de proteínas transportadoras.

MÉTODOS

ALINHAMENTO DAS SEQUÊNCIAS

A sequência de aminoácidos da proteína MDR₁ humana (ID: P08183) foi retirada da base de dados *online* UniProt (BATEMAN, 2019). A estrutura cristalográfica tridimensional da MDR₁ de *Mus musculus* (PDB ID: 4KSB) obtida por difração de raios-X, foi retirada da base de dados *online* Protein Data Bank (BURLEY et al., 2021). O alinhamento das sequências foi obtido pelo software Mega X v.1.2.4 (KUMAR et al., 2018), e a identidade entre as sequências pela ferramenta BLAST® (<https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi>).

OBTENÇÃO DOS LIGANTES

Foram escolhidos cinco ligantes, sendo a gencitabina (ID: 60750) e a carboplatina (ID: 498142), drogas já descritas como quimioterápicos para câncer de pulmão de células não pequenas, e os ligantes fitol (ID: 5280435), esqualeno (ID: 638072), e resveratrol (ID: 445154), como compostos bioativos presentes em plantas com efeito antineoplásico descritos na literatura. Todos os ligantes foram obtidos a partir da base de dados NCBI PubChem (KIM et al., 2021).

DOCKING MOLECULAR

Quimioterápicos (carboplatina e gencitabina) e fitoterápicos (fitol, esqualeno e resveratrol) foram utilizados para a ancoragem molecular com a estrutura cristalográfica da MDR₁ de *M. musculus* (PDB ID 4KSB), usando o programa CLC Drug Discovery Workbench (Version 4.0, CLC Bio®, Boston, MA, USA). Os resíduos do sítio de ligação foram escolhidos com base no estudo realizado em 2015 da MDR₁ humana (SUBHANI; JAYARAMAN; JAMIL, 2015), aos quais representam os sítios funcionais da proteína, como podem ser vistos na tabela 1.

O número de iterações para cada ligante foi estabelecido em 10.000, gerando 10 poses para cada. Para a localização do sítio de ligação na MDR₁, utilizou-se um raio de

12 Å para as drogas, e de 15 Å para os compostos vegetais. Os raios determinados para as simulações de Docking molecular neste trabalho, estão de acordo com os usados no trabalho de Subhani e colaboradores (2015), com base na topologia de resíduos, determinados previamente.

As melhores poses dos ligantes foram selecionadas com base no docking *score*, ligações de hidrogênio e interações hidrofóbicas. Para obtenção das interações mais favoráveis foram selecionadas as melhores poses de cada ligante. Para representar as interações entre a proteína MDR₁ e os ligantes (carboplatina, gencitabina, fitol, esqualeno, resveratrol), foram usados os *softwares* LigPlot⁺ v.4.5.3 para gerar representações em segunda dimensão (2D) e o PyMOL v 2.0 para gerar as figuras.

PROTEÍNA	RESÍDUOS UTILIZADOS COMO SÍTOS DE LIGAÇÃO
MDR ₁	His ⁶⁰ , Leu ⁶⁴ , Val ¹²⁹ , Trp ¹³² , Asp ¹⁸⁴ , Lys ¹⁸⁵ , Met ¹⁸⁸ , Thr ¹⁹⁵ , Ala ¹⁹² , Ile ³³⁶ , Phe ³³⁹ , Ser ³⁴⁰ , Gln ³⁴³ , Pro ³⁴⁶ , Asn ³⁴⁷ , Ile ⁸⁶⁴ , Gly ⁸⁶⁸ , Glu ⁸⁷¹ , Met ⁸⁷² , Leu ⁸⁷⁵ , Ser ⁸⁷⁶ , Phe ⁹³⁴ , Phe ⁹³⁸ , Thr ⁹⁴¹ , Gln ⁹⁴² , Met ⁹⁴⁵ , Tyr ⁹⁴⁹ , Ile ⁹⁷⁷

Tabela 1: Resíduos do sítio funcional da proteína MDR₁ de *M. musculus*, usados como sítos de ligação para a ancoragem molecular.

RESULTADOS

O presente trabalho manteve como foco a comparação entre quimioterápicos já descritos em trabalhos anteriores contra câncer de pulmão células não pequenas, com fitoterápicos. A escolha desse tipo de câncer é devido a sua alta taxa de mortalidade e sua agressividade frente ao organismo humano. Segundo estudos, a proteína MDR₁ está diretamente associada ao câncer de pulmão de células não pequenas (SUBHANI; JAYARAMAN; JAMIL, 2015), sendo necessário assim estudos mais aprofundados frente ao seu mecanismo inibitório relacionado às drogas.

ALINHAMENTO DAS SEQUÊNCIAS

Os resultados obtidos pelo BLAST® mostraram 87% de identidade entre as sequências, demonstrando assim uma porcentagem favorável para a realização do trabalho. A maioria dos resíduos permaneceram conservados na proteína MDR₁ de *M. musculus*, porém, embora sejam proteínas de origem mamífera, são de espécies diferentes, devido a isso existem três substituições nos resíduos dos sítios de interação que podem ser vistos na figura 1 identificados pela cor vermelha.

Figura 1: Alinhamento múltiplo da sequência de aminoácidos (aa) da proteína MDR₁ humana (ID:P08183) com a MDR₁ de *M. musculus* (PDB:4KSB), empregando o software Mega X, implementado pelo ferramenta *online* Clustal Ω (<https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/>): * Identidade de todos os resíduos de aa na coluna indicada; : Similaridade dos aa alinhados na coluna indicada; . Baixa similaridade dos aa na coluna indicada; - Espaço, não há similaridade alguma. Em vermelho os aa substituídos na *M. musculus*. Setas verdes indicam os resíduos utilizados como cavidades para o docking molecular.

CLUSTAL O (1.2.4) multiple sequence alignment

```
MDR1 (P08183) MDLEGDRNGGAKKKNFKLNKSEKDKKEKKPTVSFVSFRYSNWLDKLYMVVGTLAATII
MDR1 (4KSB) MLEFELDK--RADKNFSKMGKSKKEKKEKKPAVSVLTMEFYAGWLDRLYMLVGTLAATII
          * * * * *
          ↓ ↓
MDR1 (P08183) HGAGLPLMLLVFGEMTDIFANAGNLEDLMSNITNRSNDINDTGFFMNLEEDMTRYAYYYSG
MDR1 (4KSB) HGVALPLMLLVFGDMTDSFASVGNVSKN---STNMSADKRAMHAKLEEFMTTRYAYYYTG
          * * * * *
          ↓ ↓
MDR1 (P08183) IGAGVLVAAYIQVSFWCLAAGRQIHKIRKQFFHAIMRQETIGWFDVHDVDELNTRLTDDVS
MDR1 (4KSB) IGAGVLIVAYIQVSFWCLAAGRQIHKIRKQFFHAIMRQETIGWFDVHDVDELNTRLTDDVS
          * * * * *
          ↓ ↓ ↓ ↓
MDR1 (P08183) KINEGIGDKIGMFFQSMATFFTGFIIVGFTRGWKLTLVILAI SPVLGLSAAVWAKILSSFT
MDR1 (4KSB) KINEGIGDKIGMFFQSMATFFSGFIIVGFTRGWKLTLVILAI SPVLGLSAGI WAKILSSFT
          * * * * *
          ↓ ↓ ↓ ↓
MDR1 (P08183) DKELLAYAKAGAAEEVLAAIRTVIAFGGQKKELERYNKNLEEAKRIGIKKAITANISIG
MDR1 (4KSB) DKELLAYAKAGAAEEVLAAIRTVIAFGGQKKELERYNKNLEEAKRIGIKKAITANISIG
          * * * * *
          ↓ ↓ ↓ ↓
MDR1 (P08183) AAFLLIYASYALAFWYGTTLVLSGEYSIGQVLT VFFSVLIGAFSVGQASPIEAFANARG
MDR1 (4KSB) AAFLLIYASYALAFWYGTSLVISKEYSIGQVLT VFFSVLIGAFSVGQASPIEAFANARG
          * * * * *
          ↓ ↓ ↓ ↓
MDR1 (P08183) AAYEIFKIIDNKPSIDSYSKSGHKPDNIKGNLEFRNVHFSYPSRKEVKILKGLNLKVQSG
MDR1 (4KSB) AAYEIFKIIDNKPSIDSYSKSGHKPDNIKGNLEFRNVHFSYPSRKEVKILKGLNLKVQSG
          * * * * *
          ↓ ↓ ↓ ↓
MDR1 (P08183) QTVALVGNSGCGKSTTVQLMQRLYDPTGEMVSDGQDIRTINVRLREIIGVVSQEPVLF
MDR1 (4KSB) QTVALVGNSGCGKSTTVQLMQRLYDPTGEMVSDGQDIRTINVRLREIIGVVSQEPVLF
          * * * * *
          ↓ ↓ ↓ ↓
MDR1 (P08183) ATTIAENIRYGRENVMTDEIEKAVKEANAYDFIMKLPHKFDTLVGERGAQLSGGQKQRIA
MDR1 (4KSB) ATTIAENIRYGRENVMTDEIEKAVKEANAYDFIMKLPHKFDTLVGERGAQLSGGQKQRIA
          * * * * *
          ↓ ↓ ↓ ↓
MDR1 (P08183) IARALVRNPKILLDEATSALDTESEAVVQALDKARKGRTTIVIAHRLSTVRNADVIAG
MDR1 (4KSB) IARALVRNPKILLDEATSALDTESEAVVQALDKARKGRTTIVIAHRLSTVRNADVIAG
          * * * * *
          ↓ ↓ ↓ ↓
MDR1 (P08183) FDDGVIVEKGNHDELMKEKGIYFKLVMTQTAGNELEENACKSKDEIDNLDSSKDSKSS
MDR1 (4KSB) FDDGVIVEKGNHDELMKEKGIYFKLVMTQTAGNELEENACKSKDEIDNLDSSKDSKSS
          * * * * *
          ↓ ↓ ↓ ↓
MDR1 (P08183) SLIRKRSTRRSVRGSQAQDRKLTKEALDESIPPVSFWRMKLNLTWPYFVVGVCATII
MDR1 (4KSB) SLIRKRSTRRSVRGSQAQDRKLTKEALDESIPPVSFWRMKLNLTWPYFVVGVCATII
          * * * * *
          ↓ ↓ ↓ ↓
MDR1 (P08183) NGGLQPAFAIIFSKIIGVFTRIDDPETKQNSNLFSLFLALGIISFIFFLQGFTFGKA
MDR1 (4KSB) NGGLQPAFAIIFSKIIGVFTRIDDPETKQNSNLFSLFLALGIISFIFFLQGFTFGKA
          * * * * *
          ↓ ↓ ↓ ↓
MDR1 (P08183) GEILTKRLRYMVFMSMLRQDVSWFDDPKNTTGALTTRLANDAAQVKGATSSRLAVITQNI
MDR1 (4KSB) GEILTKRLRYMVFMSMLRQDVSWFDDPKNTTGALTTRLANDAAQVKGATSSRLAVITQNI
          * * * * *
          ↓ ↓ ↓ ↓
MDR1 (P08183) ANLGTGIIISFIYQWLTLLLLAIVPIIATAGVVMKMLSGQALKDKKELEGSGKIATEA
MDR1 (4KSB) ANLGTGIIISFIYQWLTLLLLAIVPIIATAGVVMKMLSGQALKDKKELEGSGKIATEA
          * * * * *
          ↓ ↓ ↓ ↓
MDR1 (P08183) IENFRTVVSILTQEQKFEHMYAQSLOQPYRNSLRKAHIFGITFSFTQAMMYFSYAGCFRFG
MDR1 (4KSB) IENFRTVVSILTQEQKFEHMYAQSLOQPYRNSLRKAHIFGITFSFTQAMMYFSYAGCFRFG
          * * * * *
          ↓ ↓ ↓ ↓
MDR1 (P08183) AYLVAHKLMSFEDVLLVFSAVVFGAMAVGQVSSFAPDYAKAKISAHHIIMIEKTPIDS
MDR1 (4KSB) AYLVAHKLMSFEDVLLVFSAVVFGAMAVGQVSSFAPDYAKAKISAHHIIMIEKTPIDS
          * * * * *
          ↓ ↓ ↓ ↓
MDR1 (P08183) YSTGLMPNTLEGNVTFGEVVFNYPTRPDIPVLQGLSLEVKKGQTLALVGSSGCGKSTVV
MDR1 (4KSB) YSTGLMPNTLEGNVTFGEVVFNYPTRPDIPVLQGLSLEVKKGQTLALVGSSGCGKSTVV
          * * * * *
          ↓ ↓ ↓ ↓
MDR1 (P08183) QLLERFYDPLAGKVLDDGKEIKRLNVQWLRRAHLGIVSQEPILFDCSIAENIAYGDNRSVV
MDR1 (4KSB) QLLERFYDPLAGKVLDDGKEIKRLNVQWLRRAHLGIVSQEPILFDCSIAENIAYGDNRSVV
          * * * * *
          ↓ ↓ ↓ ↓
MDR1 (P08183) SQEEIVRAAKEANIHAFIESLPNKYSTKVGDGKTQLSGGQKQRIAIARALVRQPHILLD
MDR1 (4KSB) SQEEIVRAAKEANIHAFIESLPNKYSTKVGDGKTQLSGGQKQRIAIARALVRQPHILLD
          * * * * *
          ↓ ↓ ↓ ↓
MDR1 (P08183) EATSALDTESEKVVQEAALDKAREGRTCIVIAHRLSTIQNADLIVVFQNGRVKHEHGTHQOL
MDR1 (4KSB) EATSALDTESEKVVQEAALDKAREGRTCIVIAHRLSTIQNADLIVVFQNGRVKHEHGTHQOL
          * * * * *
          ↓ ↓ ↓ ↓
MDR1 (P08183) LAQKGIYFSMVSVQAGTKRQ-----
MDR1 (4KSB) LAQKGIYFSMVSVQAGTKRSLHHHHHHH
          * * * * *
```

Fonte: Autores.

OBTENÇÃO DOS LIGANTES

A escolha dos ligantes teve como base trabalhos publicados anteriormente, que demonstraram o efeito farmacológico ou o efeito fitoterápico *in vivo*.

DOCKING MOLECULAR

Os resultados das melhores poses dos ligantes estão representados na tabela abaixo:

Ligante	Docking Score	Contr. Interações de Hidrogênio	Contr. Interações Estéricas	Geometria do ligante
<i>Carboplatina</i>	-21.35	-10.96	-13.43	3.05
<i>Gencitabina</i>	-38.04	-3.84	-35.17	0.97
<i>Fitol</i>	-53.82	-4	-58.10	8.28
<i>Esqualeno</i>	-66.18	0	-74.96	8.78
<i>Resveratrol</i>	-44.17	-9.58	-35.15	0.56

Tabela 4: Dados obtidos nas ancoragens dos ligantes com a MDR₁ de *M. musculus* pelo programa *CLC Drug Discovery Workbench*. *Score = Contr. Pontes de hidrogênio + Contr. Interações Estéricas + Geometria do ligante.

CARBOPLATINA

As análises de docking molecular demonstraram que os resíduos His⁶⁰, Gln¹⁹¹ e Gln⁹⁴² da MDR₁ (PDB ID: 4KSB), estão envolvidos em interações de hidrogênio com a droga. Leu⁶⁴, Gln¹⁹¹ e Thr¹⁹⁵ estão envolvidos em interações hidrofóbicas (Figura 2A e 2B).

Figura 2: A) Ancoragem molecular da carboplatina com a MDR₁ (4KSB). O ligante em representação *stick* com carbonos em amarelo, e os contatos polares representados em azul tracejado. B) Diagrama do LigPlot⁺ do complexo entre o ligante carboplatina e MDR₁ (4KSB). Ligações covalentes do ligante em roxo, ligações covalentes dos aminoácidos em marrom, pontes de hidrogênio em linhas verdes tracejadas. Os resíduos proteicos em interações hidrofóbicas são representados por semicírculos vermelhos com raios.

Fonte: Autores.

GENCITABINA

Os complexos de ancoragem mostraram que os resíduos Asp¹⁸⁴ e Glu⁸⁷¹ estão envolvidos em interações de hidrogênio com a gencitabina. Trp¹³², Asp¹⁸⁴, Met¹⁸⁸, Phe⁹³⁴ e Phe⁹³⁸ encontram-se em interações hidrofóbicas (Figura 3A e 3B).

Figura 3: A) Ancoragem molecular da gencitabina com a MDR₁ (4KSB). O ligante em representação *stick* com carbonos em amarelo, e os contatos polares representados em azul tracejado. B) Diagrama do LigPlot⁺ do complexo entre o ligante gencitabina e MDR₁ (4KSB). Ligações covalentes do ligante em roxo, ligações covalentes dos aminoácidos em marrom, pontes de hidrogênio em linhas verdes tracejadas. Os resíduos proteicos em interações hidrofóbicas são representados por semicírculos vermelhos com raios.

Fonte: Autores.

FITOL

As análises de ancoragem mostram que os resíduos Gln³⁴³ e Asn³⁴⁷ formam interações de hidrogênio com o composto, e que Gln¹²⁸, Val¹²⁹, Trp¹³², Asp¹⁸⁴, Lys¹⁸⁵, Met¹⁸⁸, Leu⁸⁷⁵, Phe⁹³⁴ e Phe⁹³⁸ formam interações hidrofóbicas (Figura 4B).

Figura 4: A) Ancoragem molecular do fitol com a MDR₁ (4KSB). O ligante em representação *stick* com carbonos em amarelo, e os contatos polares representados em azul tracejado. B) Diagrama do LigPlot⁺ do complexo entre o ligante fitol e MDR₁ (4KSB). Ligações covalentes do ligante em roxo, ligações covalentes dos aminoácidos em marrom, pontes de hidrogênio em linhas verdes tracejadas. Os resíduos proteicos em interações hidrofóbicas são representados por semicírculos vermelhos com raios.

Fonte: Autores.

ESQUALENO

Diferentemente dos outros, a ancoragem do esqualeno não demonstrou nenhuma ligação de hidrogênio, e sim apenas interações hidrofóbicas com os resíduos: Val¹²⁹, Trp¹³², Asp¹⁸⁴, Lys¹⁸⁵, Met¹⁸⁸, Gln¹⁹¹, Ala¹⁹², Gln³⁴³, Asn³⁴⁷, Glu⁸⁷¹, Gln⁹⁴², Phe⁹³⁴ e Phe⁹³⁸ (Figura 5A e 5B).

Figura 5: A) Ancoragem molecular do esqualeno com a MDR₁ (4KSB). O ligante em representação *stick* com carbonos em amarelo, e os contatos polares representados em azul tracejado. B) Diagrama do LigPlot⁺ do complexo entre o ligante esqualeno e MDR₁ (4KSB). Ligações covalentes do ligante em roxo, ligações covalentes dos aminoácidos em marrom, pontes de hidrogênio em linhas verdes tracejadas. Os resíduos proteicos em interações hidrofóbicas são representados por semicírculos vermelhos com raios.

Fonte: Autores

RESVERATROL

Nas análises, o resveratrol demonstrou ligações de hidrogênio com os resíduos Asp¹⁸⁴, Gln³⁴³, Glu⁸⁷¹ e Thr⁹³⁷ da MDR₁ (ID: 4KSB), e interações hidrofóbicas com os resíduos: Val¹²⁹, Trp¹³², Asp¹⁸⁴, Met¹⁸⁸, Gln³⁴³, Asn³⁴⁷, Glu⁸⁷¹, Phe⁹³⁴ e Phe⁹³⁸ (Figura 6A e 6B).

Figura 6: A) Ancoragem molecular do resveratrol com a MDR₁ (4KSB). O ligante em representação *stick* com carbonos em amarelo, e os contatos polares representados em azul tracejado. B) Diagrama do LigPlot⁺ do complexo entre o ligante resveratrol e MDR₁ (4KSB). Ligações covalentes do ligante em roxo, ligações covalentes dos aminoácidos em marrom, pontes de hidrogênio em linhas verdes tracejadas. Os resíduos proteicos em interações hidrofóbicas são representados por semicírculos vermelhos com raios.

Fonte: Autores

As distâncias em Å (ångström) das interações de hidrogênios entre os resíduos estão melhores exemplificadas na tabela 3.

Ligantes	Resíduos	PyMol	LigPlot
<i>Carboplatina</i>	His ⁶⁰	3.1 (Å)	3.12 (Å)
	Gln ¹⁹¹	2.9 e 3.1 (Å)	-
	Gln ⁹⁴²	2.6 (Å)	2.62 (Å)
<i>Gencitabina</i>	Asp ¹⁸⁴	3.3 e 3.5 (Å)	-
	Glu ⁸⁷¹	3.1 (Å)	3.06 (Å)
<i>Fitol</i>	Gln ³⁴³	3.1 (Å)	3.09 (Å)
	Asn ³⁴⁷	3.0 (Å)	2.96 (Å)
<i>Esqualeno</i>	-	-	-
<i>Resveratrol</i>	Asp ¹⁸⁴	2.7 (Å)	-
	Gln ³⁴³	3.1 (Å)	-
	Glu ⁸⁷¹	2.8 (Å)	-
	Thr ⁹³⁷	2.6 (Å)	2.62 (Å)

Tabela 3: Resultados obtidos pelo PyMol e pelo LigPlot⁺, demonstrando as interações de hidrogênio entre os resíduos de aminoácidos da MDR₁ com os ligantes.

DISCUSSÃO

Os resultados do docking molecular foram semelhantes à simulação do trabalho de (SUBHANI; JAYARAMAN; JAMIL, 2015). Porém, algumas diferenças foram observadas provenientes do posicionamento dos resíduos na estrutura, fato este que pode ser inferido devido a utilização de uma estrutura cristalográfica no estudo. No trabalho de Subhani e colaboradores (2015), foi utilizado uma estrutura modelada de MDR₁, a qual pode apresentar geometria ruim e choque atômicos, diferente da estrutura cristalográfica que possui geometria mais confiável. Na simulação da gencitabina uma interação adicional foi observada, um Trp¹³² atuando em interações hidrofóbicas.

As análises das interações por docking molecular dos ligantes carboplatina, gencitabina, fitol, esqualeno e resveratrol exibiram os valores de docking *score* -21.35, -38.04, -53.82, -66.18, e -44.17 respectivamente. Destas moléculas testadas, a proteína MDR₁ de *M. musculus* sugere interações mais favoráveis para os ligantes esqualeno e fitol, visto que os dois compostos possuem *scores* com valores mais negativos, como pôde ser visto na tabela 2.

Os fitoterápicos testados apresentaram resultados consideráveis (os três melhores valores obtidos), visto que os resíduos de interação permaneceram os mesmos que interagem com os quimioterápicos. Os compostos utilizados no presente trabalho possuem características que favoreceram para o modo de interação resultante. O Fitol está presente em diversas plantas consideradas medicinais, e tanto ele como seus produtos de

degradação têm sido utilizados como biomarcadores (COSTA et al., 2012). Possui afinidade por ambiente hidrofóbico, encontra-se presente nos óleos essenciais, além de ter atividade anticâncer reportada em trabalhos anteriores (LEE; LEE; PARK, 1999); (BARRETO et al., 2009).

O esqualeno é um composto isoprenóide, ou seja, possui uma grande cadeia hidrocarbonada, atuando assim como um composto apolar. Possui atividade anticâncer, e encontra-se amplamente distribuído na natureza, principalmente nos óleos de determinados alimentos. O Resveratrol caracteriza-se como uma fitoalexina polifenólica encontrado principalmente em uvas frescas. Possui um leque de atividades biológicas, incluindo a anticancerígena e atua no metabolismo lipídico de ratos (SADRUDDIN; ARORA, 2009; ALBERTONI; SCHOR, 2015).

A natureza dos ligantes de origem vegetal são semelhantes, logo, todos os três possuem afinidade por ambiente hidrofóbico. Os resíduos de interação do fitol, do esqualeno e do resveratrol demonstrados na Figura 2, mostram que as ligações se mantiveram dentro da cavidade testada, com apenas um resíduo em interação adicional fora da cavidade para cada um: Gln¹²⁸, Phe⁸³⁴ e Thr⁹³⁷, respectivamente.

As ligações dos fitoterápicos com a MDR₁ de *M. musculus*, puderam mostrar que as interações permaneceram nos mesmos resíduos dos quimioterápicos testados tanto no presente trabalho como na simulação feita por (SUBHANI; JAYARAMAN; JAMIL, 2015). O que corrobora para a análise comparativa dos resultados, visto que não existe trabalho na literatura atual que possa servir como base teórica e experimental dos compostos naturais. Desta forma, o método de docking molecular orientado neste estudo pode ser validado e usado como base para o estudo das ligações dos fitoterápicos com a MDR₁.

Em consideração às substituições ocorridas na sequência da MDR₁ de *M. Musculus* (4KSB), vale salientar que um dos resíduos que manteve ligação com a molécula esqualeno foi a Ala¹⁹². Resíduo este que na sequência da MDR₁ humana caracteriza-se como uma Ser¹⁹⁶. O esqualeno foi a única molécula testada que não obteve nenhuma ligação de hidrogênio, apenas interações hidrofóbicas. A alanina é um aminoácido mais apolar do que a serina, fato este que pode ter contribuído para a

formação de uma cavidade mais hidrofóbica. O que favorece a interação com o esqualeno, já que sua afinidade é por um ambiente altamente hidrofóbico.

CONCLUSÃO

A partir dos dados obtidos, os achados sugerem que os compostos naturais obtidos de plantas medicinais, podem desempenhar um papel farmacológico favorável, assim como os fármacos sintéticos contra a proteína MDR₁. As análises *in silico* para essa classe proteínas transportadoras voltadas para o câncer de pulmão de células não pequenas, podem ser utilizadas como estudos prévios para testes experimentais farmacológicos posteriores.

REFERÊNCIAS

- ALBERTONI, G.; SCHOR, N. Resveratrol plays important role in protective mechanisms in renal disease - mini-review. **Jornal brasileiro de nefrologia**. v. 37, n. 1, p. 106–114, 2015.
- ARAUJO, L. H. L., et al. Survival and prognostic factors in patients with non-small cell lung cancer treated in private health care. **Revista Brasileira de Epidemiologia**. v. 17, n. 4, p. 1001–1014, 2014.
- AZEREDO, F. J.; COSTA, T. D.; UCHOA, F. T. Papel da glicoproteína-P na farmacocinética P-glycoprotein role on drug pharmacokinetics and interactions. **Brazilian journal of Pharmaceutical sciences**. v. 90, n. 4, p. 321–326, 2009.
- BARRETO, M. B. et al. Constituintes químicos voláteis e não-voláteis de *Moringa oleifera* Lam., *Moringaceae*. **Revista Brasileira de Farmacognosia**. v. 19, n. 4, p. 893–897, 2009.
- BATEMAN, A. UniProt: A worldwide hub of protein knowledge. **Nucleic Acids Research**. v. 47, n. D1, p. D506–D515, 2019.
- BURGER, H. et al. RNA expression of breast cancer resistance protein, lung resistance-related protein, multidrug resistance-associated proteins 1 and 2, and multidrug resistance gene 1 in breast cancer: Correlation with chemotherapeutic response. **Clinical Cancer Research**. v. 9, n. 2, p. 827–836, 2003.
- BURLEY, S. K. et al. RCSB Protein Data Bank: Powerful new tools for exploring 3D structures of biological macromolecules for basic and applied research and education in fundamental biology, biomedicine, biotechnology, bioengineering and energy sciences. **Nucleic Acids Research**. v. 49, n. 1, p. D437–D451, 2021.

CAMPA, D. et al. A comprehensive study of polymorphisms in ABCB1, ABCC2 and ABCG2 and lung cancer chemotherapy response and prognosis. **International Journal of Cancer**. v. 131, n. 12, p. 2920–2928, 2012.

CAPELOZZI, V. L. Entendendo o papel de marcadores biológicos no câncer de pulmão. **Jornal de Pneumologia**. v. 27, n. 6, p. 321–328, 2001.

COSTA, J. P. et al. Avaliação da toxicidade aguda e das alterações histopatológicas em camundongos tratados com fitol. **Revista de Ciencias Farmaceuticas Basica e Aplicada**. v. 33, n. 3, p. 421–428, 2012.

DUARTE, R. L. M.; PASCHOAL, M. E. M. Molecular markers in lung cancer: prognostic role and relationship to smoking. **Lung Cancer**. v. 32, n. 1, p. 56–65, 2005.

KIM, S. et al. PubChem in 2021: new data content and improved web interfaces. **Nucleic acids research**. v. 49, n. D1, p. D1388–D1395, 2021.

KUMAR, S. et al. MEGA X: Molecular evolutionary genetics analysis across computing platforms. **Molecular Biology and Evolution**. v. 35, n. 6, p. 1547–1549, 2018.

LEE, K. L.; LEE, S. H.; PARK, K. Anticancer activity of phytol and eicosatrienoic acid identified from *Perilla* leaves. **Journal of the Korean Society of Food Science and Nutrition**. v. 28, n. 5, p. 1107–1112, 1999.

LUZ, T. C. B. et al. Trends in medicines procurement by the Brazilian federal government from 2006 to 2013. **PLoS ONE**. v. 12, n. 4, p. 1–13, 2017.

NADEEM, M.; IMRAN, M. Promising features of *Moringa oleifera* oil: Recent updates and perspectives. *Lipids in Health and Disease*. v. 15, n. 1, p. 1–8, 2016.

NOVAES, F. T. et al. Lung cancer: histology, staging, treatment and survival. **Jornal Brasileiro de Pneumologia**. v. 34, p. 595–600, 2008.

RAMAEN, O. et al. Structure of the human multidrug resistance protein 1 nucleotide binding domain 1 bound to Mg^{2+} /ATP reveals a non-productive catalytic site. **Journal of Molecular Biology**. v. 359, n. 4, p. 940–949, 2006.

RAZIS, A. F. A.; IBRAHIM, M. D.; KNTAYYA, S. B. Brain health benefits of *Moringa oleifera*. **Asian Pacific Journal of Cancer Prevention**. v. 2, p. 113–118, 2014.

SADRUDDIN, S.; ARORA, R. Resveratrol: Biologic and therapeutic implications. **Journal of the CardioMetabolic Syndrome**. v. 4, n. 2, p. 102–106, 2009.

SIEGEL, R. L.; MILLER, K. D.; JEMAL, A. Cancer statistics, 2016. CA: A Cancer **Journal for Clinicians**. v. 66, n. 1, p. 7–30, 2016.

SUBHANI, S.; JAYARAMAN, A.; JAMIL, K. Homology modelling and molecular docking of MDR₁ with chemotherapeutic agents in non-small cell lung cancer. **Biomedicine and Pharmacotherapy**. v. 71, p. 37–45, 2015.

SZCZYREK, M. et al. Polymorphisms of genes encoding multidrug resistance proteins as a predictive factor for second-line docetaxel therapy in advanced non-small cell lung cancer. **Pathology and Oncology Research**. v. 23, n. 3, p. 607–614, 2017.

VICK, A. D.; BURRIS, H. H. Epigenetics and health disparities. **Current Epidemiology Reports**. v. 4, n. 1, p. 31–37, 2017.

WISE, J. G. Catalytic transitions in the human MDR₁ P-glycoprotein drug binding sites. **Biochemistry**. v. 51, n. 25, p. 5125–5141, 2012.

ZHAO, X. M. et al. Prognostic and predictive value of serum carcinoembryonic antigen levels in advanced non-small cell lung cancer patients with epidermal growth factor receptor sensitive mutations and receiving tyrosine kinase inhibitors. **Oncotarget**. v. 8, n. 41, p. 70865–70873, 2017.

CAPÍTULO X

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL COMO ESTRATÉGIA PARA O SUCESSO DE ESTUDANTES DE ALTA PERFORMANCE

Renato dos Santos Lisboa³⁸

DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2021.02-10

RESUMO:

O presente estudo discorre acerca do conceito de inteligência emocional, pelo viés da psicanálise, aplicado às práticas de estudos de alunos de alta performance, no processo preparatório para ENEM ou concursos públicos com altos níveis de concorrência. A inteligência emocional é um conceito relativamente novo em meio acadêmico, contudo, consubstanciado por elementos há muito tempo estudados, sobretudo, no campo da psicologia. Dentre eles, as emoções, a inteligência, e a capacidade de autoconsciência acerca do modo como essas habilidades cognitivas podem ser determinantes para saúde mental, resolução de problemas, tomada de decisão e qualidade de vida no geral. De modo que, a análise aqui apresentada, se referenciou em uma revisão da literatura recente, a respeito da compreensão sobre a inteligência emocional, funcionamento da rotina de alunos de alto desempenho e a forma como a psicanálise atualmente interpreta e prevê essa relação. Portanto, considera-se a importância de articulação nesse tema, por se tratar de discussão recente, requerendo mais aprofundamento na área, sobretudo na perspectiva psicanalítica, uma vez que são escassas as articulações nessa linha epistemológica e científica.

PALAVRAS-CHAVE: Inteligência Emocional. Psicanálise. Alta performance.

EMOTIONAL INTELLIGENCE AS A STRATEGY FOR THE SUCCESS OF HIGH PERFORMANCE STUDENTS

ABSTRACT:

The present study discusses the concept of emotional intelligence, from the perspective of psychoanalysis, applied to the study practices of high performance students, in the preparatory process for ENEM or public tenders with high levels of competition. Emotional intelligence is a relatively new concept in academia, however, embodied by elements long studied, especially in the field of psychology. Among them, emotions,

³⁸ Psicanalista Clínico, Jornalista, Coach e Advogado, foi responsável pela maior negociação Trabalhista do Brasil, é mestre em Psicanálise. Pós-Graduado em Direito Material e Processual do Trabalho, em Administração de Conflito e Gestão Empresarial, em inteligência múltiplas e mind fullness e em Big Data (Ciência dos Dados), Master Coach Executivo e de Negócios, com formação Profissional em Wellness & Health, Global Coach Certification®, Leader Coach, Trainer de Analistas Comportamentais, e membro do Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica e da ABRAPCoaching. É Especialista em Inteligência Emocional. Atua também como palestrante, facilitador de programas de desenvolvimento de líderes, programas de inteligência emocional, tomada de decisão, consultor empresarial de reestruturação organizacional, implementação de políticas, procedimento de pessoas, transição de carreira e implantação de sistemas de *compliance* e jurimetria.

intelligence, and the capacity for self-awareness about how these cognitive skills can be determinant for mental health, problem solving, decision making and quality of life in general. So, the analysis presented here, was referenced in a recent literature review, regarding the understanding of emotional intelligence, the functioning of high performance students' routine and the way psychoanalysis currently interprets and predicts this relationship. Therefore, it is considered the importance of articulation on this theme, as it is a recent discussion, requiring more depth in the area, especially in the psychoanalytic perspective, since the articulations in this epistemological and scientific line are scarce.

KEYWORDS: Emotional intelligence. Psychoanalysis. High performance.

INTRODUÇÃO

O conceito de inteligência emocional tem se delineado na literatura, de forma bastante recente. De modo que, diversos autores, sobretudo, nas áreas da psicologia positiva e da neurociências têm se debruçado sobre este tema, a fim de, apresentar explicações acerca da inteligência emocional, ou a respeito de modos para seu melhor funcionamento.

De modo que, um tema que entra em convergência, quando se discute a inteligência emocional, são os relevantes contextos de estresse, associados a situações que envolvem conjunturas, tais como, a aprovação no ENEM e concursos públicos, sobretudo, pelos consideráveis níveis de competitividade e exigências qualificatórias que demandam em cada um desses cenários.

Desde 1999 o Exame Nacional do Ensino Médio ENEM, é utilizado por algumas Instituições de Ensino Superior IES brasileiras, como requisito para ingresso ao ensino superior (INEP, 2018). Se tornando, portanto, gradativamente nestes últimos 20 anos, o modelo de avaliação mais concorrido, para ingresso na qualificação acadêmica.

O ENEM atualmente é considerado o maior vestibular no Brasil, sobretudo, para as instituições públicas, o sistema de ingresso pode ser realizado através de três modelos sistêmicos, sendo eles: Sistema de seleção unificada (SISU), destinado ao ingresso nas universidades e institutos federal e estadual; o Programa Universidade para todos (PROUNI) que seleciona alunos com bolsas integrais ou parciais para faculdades, centros universitários e universidades privadas; e o Fundo de financiamento estudantil (FIES)

que disponibiliza financiamento parcial ou integral para ingresso em faculdades, centros universitários e universidades privadas.

Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP (2019) apontam que em 2018 foram 5. 513,747 milhões de pessoas inscritas no Exame Nacional do Ensino médio ENEM. Desses, apenas 3.893, 743 milhões compareceram aos dois dias de provas. Portanto, se tornando um grupo de ampla concorrência para uma vaga em cursos de ensino superior.

Dentre os cursos com maior procura no SISU, por exemplo, estão: administração; direito; pedagogia; medicina; educação física; engenharia civil; ciências biológicas; enfermagem; psicologia e ciências contábeis. Contudo, entre os de maior concorrência destacam-se: medicina (47,6); educação física (35,67); direito (35,2); administração (29,7) e pedagogia (26,41), sendo estes números de candidatos por vaga (SISU, 2018).

O censo do INEP em 2017 apontou que, no Brasil, há um registro de 296 Instituições de ensino superior (IES) em nível público, e 2.152 na esfera privada (INEP, 2018). Dessas, cerca de 1.434 IES utilizam o ENEM, como porta de ingresso. Vale ressaltar, que algumas instituições utilizam o modelo misto, onde além da nota do ENEM, é requerida também outra etapa de avaliação realizada pela própria instituição (MATIAS, TOLEDO, 2016).

Em outra vertente, para além da graduação, está a corrida pela tão concorrida efetivação no mercado de trabalho. Assim, os concursos públicos se configuram como uma das alternativas mais cobiçadas entre os brasileiros. A carreira pública se torna atrativa pela conjuntura salarial, que geralmente é melhor empregada do que na esfera privada e, sobretudo, pelo seu teor de estabilidade e possibilidade de estabelecimento de plano de cargos e carreira.

Os últimos concursos para analista do INSS; operacional e administrativo dos correios, e bancários da caixa econômica federal, juntos mobilizaram mais de 4 milhões de candidatos inscritos (JCCONCURSOS, 2019). Todavia, Granato (2019) salienta que os concursos que exigem maior nível de desempenho, considerando alto grau de exigências, e a concorrência maciça são: concursos da Receita Federal; Instituto Nacional de Seguro Social-INSS; Departamento de Trânsito-DETRAN; Departamento

Penitenciário Nacional-DEPEN; POLÍCIA CIVIL; Magistratura no Tribunal de Justiça-TJ; Defensoria Pública; Secretaria da Fazenda; Tribunal de Contas da União TCU; e Tribunal de Contas dos Estados TCE.

Embora haja uma frenética preocupação em torno de uma aprovação em um concurso público, Aragão (2017) chama atenção para outros fatores que são de grande relevância na busca deste propósito. E um dos fatores destacados, se refere à concorrência real que diz respeito à possibilidade de fato de uma convocação. Nesse aspecto, o autor salienta que apenas uma pequena parcela dos candidatos estão realmente aptos na competição sendo, portanto, necessário uma estratégia que permita o máximo de nivelamento com esses candidatos, para que haja uma efetiva chance de convocação.

Diante do exposto, este estudo visa compreender de que modo a estratégia de inteligência emocional pode contribuir para processo de aprovação dos estudantes, nos concursos nacionais mais concorridos. Considerando, por exemplo, o ENEM voltado para os cursos de maior concorrência, tais como, medicina e direito; e os concursos públicos com altos níveis de concorrência real, a título de exemplo, magistratura, ministério público e auditores fiscais.

Para tanto, esta pesquisa se debruçou no conceito de emoções para discorrer sobre como é possível gerir as suas próprias emoções, enfrentar as emoções dos outros e lidar com a concorrência; discutindo sobre de que maneira a psicanálise explica a inteligência emocional como fundamental no processo de preparação, não apenas abdicando dos relacionamentos sociais, mas também em administrar e suportar um ritmo de estudo de longas jornadas diárias, ter disciplina, manter o foco, absorver as pressões familiares e dos amigos; e ainda apresentar reflexões acerca da importância da inteligência emocional para prática esportiva diária e uma alimentação equilibrada neste processo, apontando tratamento psicanalítico, nutrição emocional, reestruturação comportamental, reprogramação cerebral, reprogramação dos hábitos e hipnoterapia como estratégia para a manutenção do foco.

Portanto, este estudo se justifica, primeiramente, porque permite a compreensão de conceitos em relação a temas de relevância para a sociedade. Visto, o seu caráter significativo de contribuição não só para a comunidade acadêmica, mas para a sociedade

em geral e, sobretudo, ao público alvo, estudantes e concurseiros que se permitirão na reflexão sobre a importância de trabalhar sua saúde mental, como parte essencial do processo de estudos e alto desempenho.

METODOLOGIA

Esta pesquisa caracteriza-se como um estudo descritivo exploratório de caráter qualitativo, utilizando como método a Revisão Bibliográfica Sistemática (RBS) em artigos publicados entre os anos de 2015 a 2019. Esse método científico possibilita buscar e analisar artigos de uma determinada área da ciência, visto que esse tipo de pesquisa nos permite ter uma visão mais ampliada do tema, confrontar ideias ou concordância existentes entre os autores (GIL, 2008).

Para Gil (2008), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos, no qual é elaborada através de matérias documentais que se fundamenta nas contribuições de diversos autores sobre determinado assunto.

Para a construção deste trabalho, foi delimitado o objeto de estudo, e posteriormente feito uma pesquisa exploratória, cuja finalidade foi obter uma maior aproximação do tema por meio da leitura de textos, artigos e livros. Na análise dos textos foram avaliados os contextos referentes aos conceitos de emoção e inteligência emocional, e de que forma estes interagem no processo de estudos voltados para concursos públicos em alto grau de concorrência. Utilizamos como palavras-chave: inteligência emocional, emoções, desempenho e psicanálise.

Assim, estabeleceram-se critérios de inclusão e exclusão para as buscas dos dados desta revisão bibliográfica. Características para inclusão: trabalhos científicos publicados no intervalo dos últimos 05 anos; artigos publicados em revistas científicas, disponíveis na íntegra e para acesso público com *download* gratuito em língua portuguesa; e qualidade da descrição do desfecho a ser estudado. E para exclusão foram escolhidos os seguintes critérios: publicações em línguas estrangeiras; trabalhos que não estavam no período de publicação estabelecido; artigos duplicados.

Dentro dos critérios, buscaram-se material de interesse na base de dados dos Periódicos Eletrônicos de Psicologia (PEPSIC), Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). A coleta de dados foi iniciada e finalizada no decorrer do mês de janeiro de 2020. Nesse processo foram selecionados 7 artigos que contribuíram na produção deste trabalho, a primeira leitura foi seguida de fichamento dos textos a fim de compor as ideias da estrutura do trabalho. Os dados estão no quadro abaixo especificando: título; autor do texto; ano de publicação e fonte.

Tabela 1 – Base de dados

Título	Autores	Ano	Fonte
Instrumentos de autorregulação emocional: uma revisão de literatura.	BATISTA, Helder H. V. e NORONHA, Ana Paula P	2018	SCIELO
Avaliação do nível de inteligência emocional em estudantes de medicina de diferentes períodos da graduação. Estudo transversal Belo Horizonte 2017-2018.	COURY, Marayara I. F.	2019	BVS
Desenvolvimento da compreensão emocional.	FRANCO, Maria G. S. E. C; SANTOS, Natalie N	2015	PEPSIC
Psicoterapia psicanalítica focada nas emoções.	PIRES, Antônio P.	2016	BVS
Entre a entrega e a renúncia: excelência acadêmica em escolas públicas chilenas de alta performance.	QUARESMA, Maria L.	2015	SCIELO
Inteligência emocional: uma revisão de literatura internacional.			
Manual de treinamento em inteligência emocional.	SANTOS, J. V. et al	2018	SCIELO

	TAVELA JUNIOR, J. S.	2018	BVS
Total		7	

Fonte: Autora (2020)

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL NO VIÉS PSICANALÍTICO COMO ESTRATÉGIA PARA ALTA PERFORMANCE

EMOÇÕES

Emoções segundo Dorneles (2014) vem do latim *movere*, e está relacionado ao estado de pôr em movimento. Ainda de acordo com a autora, podemos compreender emoção como sendo “um movimento subjetivo do ser humano, de dentro para fora, que acontece a partir de experiências e/ou estímulos que o sujeito vivencia, acontecendo por manifestar reações fisiológicas, seja através de suas reações, ações ou expressões” (DORNELES, 2014, p. 15).

Na perspectiva da psicologia, emoções e sentimentos se relacionam, mas são diferentes. De modo que, segundo a Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional (2017), as emoções são respostas químicas a partir de memórias emocionais, que ocorrem nas regiões subcorticais do cérebro, as emoções são capazes de criar diversas reações no corpo, através da liberação de hormônios, alterando o estado no qual o indivíduo se encontra. Basicamente, são reações instantâneas que se tem perante os acontecimentos da vida.

Em contrapartida, os sentimentos são uma espécie de resposta às emoções e neurologicamente, os sentimentos são encontrados nas regiões neocorticais do cérebro. Os autores supracitados salientam que, os sentimentos são influenciados, principalmente, pelo histórico de cada indivíduo, o que inclui suas experiências vividas. Por isso, cada pessoa tem uma reação diferente perante emoções e, enquanto alguns perdem a calma facilmente, outros conseguem manter a tranquilidade, mesmo perante situações consideradas graves (SOCIEDADE BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL, 2017).

A neurociência explica as emoções como sendo aparentemente, uma espécie de sentimentos conscientes, mas estruturalmente elas são desencadeadas por eventos internos ou externos que enviam sinais para o cérebro. De modo que, se configuram como respostas psicológicas aos estímulos, destinados a nos afastar do perigo e nos aproximar da recompensa. As emoções são geradas constantemente, mas, em geral, não temos consciência disso. Essa reação inicial transparece em milésimos de segundos, sem que a pessoa perceba o que está acontecendo (DOUX, 1998).

Anatomicamente, Oliveira e Jesus (2014) explicam que as emoções são geradas no sistema límbico: um conglomerado de estruturas situado abaixo do córtex. Esse processo se deu muito cedo na história dos mamíferos. Nos humanos, está conectado às áreas corticais desenvolvidas recentemente. O tráfego de duas vias entre o sistema límbico e o córtex permite que as emoções sejam vivenciadas de forma consciente e que os pensamentos as afetem. Cada emoção é produzida por uma rede diferente de módulos cerebrais, incluindo o hipotálamo e a hipófise; estes controlam os hormônios que provocam reações físicas, como aumento da frequência cardíaca e contração muscular.

De acordo com Moraes (2009), cinco elementos se caracterizam como as principais estruturas do sistema límbico, que são elas: o giro cingulado que se relaciona com o controle visual, auditivo e as alterações das emoções; o Tálamo que são as células nervosas que enviam sinais dos sentidos para o córtex. Nesse campo, estão ativas também as sensações de pressão e dor. Portanto, sua função é de integração do sistema sensorial com o motor.

Ainda segundo o autor supracitado, também compõe o sistema límbico, o Hipotálamo que regula funções essenciais, dentre elas: o sono, a libido, o apetite e a temperatura corporal; a amígdala que está relacionada com a memória emocional que temos, padronizando comportamentos adequados para cada ocasião. E finalmente o hipocampo que tem a funcionalidade de arquivar as memórias.

Originalmente, na perspectiva psicanalítica, as emoções, mais precisamente o que compete a afeto e suas representações eram reflexões indispensáveis no processo analítico. Embora, a própria psicanálise nunca tenha se desprendido na elaboração teórica acerca das emoções e sua significância. Ainda assim, atualmente e, sobretudo, com o

advento da neuropsicanálise, as questões relacionadas às emoções estão ganhando dimensão na atuação interventiva da psicanálise (PIRES, 2016).

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

No escopo da inteligência emocional, diversos autores se debruçaram na tentativa de conceituar o termo e aproximar seu sentido no máximo da compreensão entre a complexidade das emoções e sua relação com práticas, tomadas de atitude e comportamento em geral.

Atualmente estudos com foco na inteligência emocional, tem se destacado consideravelmente no meio científico. Todavia, segundo Coury (2019) esse interesse científico, só começou por volta de 1960 e se concentrava exclusivamente no âmbito da psicoterapia, sendo o estopim para maior discussão acerca do conceito, datado a partir da década de 1990 principalmente, através dos estudos de Daniel Goleman.

De modo que, na perspectiva psicológica, o entendimento de Leahy, Tirch e Napolitano (2013, p. 26) acerca da inteligência emocional “engloba a natureza geral da consciência e adaptação emocional, sugerindo uma característica geral que possui implicações abrangentes no comportamento adaptativo. A inteligência emocional compreende quatro fatores: percepção, uso, compreensão e manejo das emoções”.

Assim, a inteligência emocional está relacionada por sua capacidade de perceber o autocontrole e suas emoções, bem como motivar a si mesmo, controlar impulsos e motivar pessoas, ajudando-as a buscar o seu melhor.

Santos et al (2018) pontuam que a inteligência emocional está conceituada na capacidade de processar informações, usando a inteligência como modo para raciocinar sobre as emoções e se valendo dessa informação para tomadas de decisão mais assertivas.

Na compreensão de Goleman (2001, p. 337) a “inteligência emocional é a capacidade de identificar nossos próprios sentimentos e dos outros, de motivar a nós mesmos e de gerenciar bem as emoções dentro de nós e em nossos relacionamentos”.

O autor supracitado, ainda afirmar que a inteligência emocional corresponde à capacidade de criar motivações para si próprio e de persistir num objetivo, apesar dos

percalços; de controlar impulsos e saber aguardar pela satisfação de seus desejos; de se manter em bom estado de espírito e de impedir que a ansiedade interfira na capacidade de raciocinar; de ser empático e autoconfiante (GOLEMAN, 2012).

Goleman (2011) ainda propõe que estruturalmente a inteligência emocional se baseia fundamentalmente no princípio da autoconsciência, autocontrole, consciência social e a habilidade de gerenciar relacionamentos.

De modo que, na esfera da autoconsciência Franco e Santos (2015, p. 346) salientam que a compreensão emocional está associada a “uma série de habilidades e mecanismos de processamento da informação emocional como: a compreensão da relação entre emoções e outros estados mentais; o conhecimento de estratégias de regulação das emoções e a compreensão de respostas emocionais ambivalentes”.

Nesse aspecto, Coury (2019) argumenta que a possibilidade de aferir elementos que fundamentam a Inteligência emocional, se permeia através de instrumentos avaliativos. Dentre alguns, a autora supracitada menciona os instrumentos de desempenho, que tem como foco avaliar a performance; e os instrumentos de autorrelato, que se constitui de questionário auto avaliativos acerca do nível de percepção sobre suas próprias habilidades.

Contudo, Batista e Noronha (2018) ressaltam que pesquisas recentes divergem acerca da efetividade da avaliação da autorregulação emocional. Em pesquisa realizada pelos autores, foi possível identificar que regular as próprias emoções é um recurso precioso de preservação da saúde mental. Contudo, a pluralidade de contextos em que o sujeito avaliado pode estar inserido, e a multiplicidade cultural implicam necessariamente em ampliar outras perspectivas avaliativas.

De modo que, por meio desses instrumentos, ao longo de anos de pesquisas nas mais variadas áreas, tais como: trabalho, estudo, dinâmica social, foi possível identificar que fatores, como Otimismo, autorrealização, felicidade, independência e responsabilidade social se relacionam de maneira positiva com o contexto de inteligência emocional (COURY, 2019).

Desta forma, a inteligência emocional compreende e se apropria de suas próprias emoções e a dos outros, reagindo naturalmente quando se depara com os problemas na dinâmica da rotina, buscando resolver de modo eficaz as situações emocionais.

Conforme Weisinger (2001), a inteligência emocional é simplesmente o uso inteligente das emoções, isto é, fazer intencionalmente com que as emoções trabalhem a seu favor, usando-as como uma ferramenta a fim de, ditar seu comportamento e raciocínio de maneira a aperfeiçoar os resultados.

Portanto, nos leva ao entendimento de que os autores corroboram sobre ser a inteligência emocional, uma espécie de capacidade em identificar as emoções, gerando sentimentos e facilitando o pensamento, fomentando a aptidão em avaliar as expressões das emoções em si e nos outros, controlando e administrando bem essas emoções para que haja o crescimento de todos.

ESTUDANTES DE ALTA PERFORMANCE

Basicamente, todos os modelos de ensino atualmente se propõem no desafio de lançar no mercado acadêmico e profissional, sujeitos com altos níveis de excelência, aptos para desenvolver suas performances da melhor maneira, seja qual for à área na qual se submeteram (QUARESMA, 2015).

Recentemente o Ministério da Educação alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96), por meio da Lei nº. 13.145/2017 que estabelece reforma na estrutura do Ensino Médio, tornando a carga horária maior e redimensionando o currículo no intuito de trabalhar com foco na formação técnica e qualificação profissional. A justificativa do MEC, afirma que a proposta é garantir a oferta de educação de qualidade a todos os jovens brasileiros e de aproximar as escolas à realidade dos estudantes de hoje, considerando as novas demandas e complexidades do mundo do trabalho e da vida em sociedade (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2018).

Na contrapartida, a PL nº 60/2007 que prevê a atuação de psicólogos e assistentes sociais na educação básica em escolas públicas, passou por um verdadeiro calvário, inclusive tendo que derrubar veto do poder executivo, que alegava inconstitucionalidade

e contrariedade ao interesse público, até ser aprovada por meio da lei nº. 13.935/2019 (SENADO FEDERAL, 2019).

Esses apontamentos se fazem pertinentes, para a reflexão acerca do modo paradoxal como a educação e saúde mental são colocados de forma dispersa no contexto de ensino, aprendizagem e desenvolvimento pessoal e social. Ora, se a proposta é aumentar carga de ensino e atuar com foco em personalizar esses alunos trabalhando-os para a excelência diante do mercado de trabalho que os espera, então nada mais constitucional que permitir e, sobretudo, promover qualidade psíquica a estes sujeitos.

Uma das áreas mais visadas e concorridas em meio acadêmico, é a formação em medicina. A implicação de anos de estudo e práticas exaustivas, como meio para atingir o status de uma formação em uma área com considerável *know how*, conduz estudantes a um processo de preparação, com características de devoção.

Assim, Coury (2019) salienta que é comum aos aspirantes em processo de preparação, e os efetivos estudantes de medicina, conduzirem sua rotina de estudos de maneira intensa, focada nos conteúdos, se abstendo de vida social e qualquer outro interesse de lazer, que eventualmente, possam desvirtuá-los de seus propósitos.

Nesse aspecto, Olivieri (2018) traz uma reflexão onde aborda questões acerca dos princípios e valores que são tomados diante da escravização de uma paixão, em detrimento de si mesmo. O autor salienta que, indubitavelmente as emoções são o alicerce das melhores e das piores tomadas de decisão. Então de que maneira cuidar dessas emoções, para que as decisões tomadas sejam as mais assertivas? Assim, citando Daniel Goleman o autor discorre o seguinte pensamento.

O que parecia separar aqueles que estão no topo da alta performance de outros com capacidade aproximadamente igual é o grau em que, começando cedo na vida, eles conseguem seguir uma árdua rotina de prática por anos e anos. E essa obstinação depende de traços emocionais entusiasmo e persistência diante de dificuldades acima de tudo (OLIVIERI, 2018, p. 11).

Nesse sentido, Quaresma (2015) enfatiza que a capacidade de excelência surge, sobretudo, associada a uma competição consigo mesmo e que em última instância os custos dessa competência, pela tão almejada excelência, não se associam diretamente a contextos de renúncia, resignação social ou frustração.

Assim, em pesquisa realizada com alunos de alto rendimento, Quaresma (2015) ao inquirir vestibulandos acerca de suas percepções sobre o que caracteriza a excelência, concluiu que os alunos percebem a excelência pelo viés da expressão efetiva da aprendizagem, ou seja, a capacidade crítica e reflexiva aliada a um ambiente de equidade, condizem de forma mais efetiva para o entendimento acerca da excelência.

NEUROPSICANÁLISE E A INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

Toda a premissa psicanalítica, em sua origem, foi fundamentada por um neurocientista. Callegaro (2011) assume a afirmativa de que Sigmund Freud autor de grande parte do postulado da psicanálise tentou fazer a interação entre a psicologia e a neurologia. Contudo, os recursos científicos na época não permitiram que seus conceitos se estendessem de forma mais embasada no viés neurocientífico.

Um pouco mais tarde, no começo do ano 2000 foi realizado, o primeiro movimento nessa ordem de interação entre neurociências e psicanálise. E este, se deu através da I Conferência Internacional de Neuropsicanálise, em Londres, onde na ocasião, foi fundada a Sociedade Internacional de Neuropsicanálise (CALLEGARO, 2011). De maneira que, ao longo do último século, com todo avanço na área da investigação científica, foi possível promover a compreensão mais holística acerca do funcionamento cerebral e suas relações com o inconsciente, nos permitindo elucubrar acerca de conceitos neuropsicológicos.

Fajardo (2016) destaca que, Freud em seu ensaio “projeto para uma psicologia científica”, aborda a compreensão acerca do aparelho psíquico a partir da ideia de uma cadeia neuronal, onde se destaca o “Q”, que em última instância, se refere a uma espécie de energia ou descarga elétrica. De modo que, os neurônios dessa cadeia se distinguem entre os permeáveis, responsáveis pelas memórias; os impermeáveis que impedem a passagem de neurônios e os perceptuais sendo estes os que percebem elementos, mas não retém informações.

Essas proposições Freudianas são relevantes para a compreensão, por exemplo, de que são essas interações neuronais que conduzem o entendimento psicanalítico acerca dos princípios de prazer e satisfação. E essa reflexão é essencial, uma vez que, de acordo

com Fajardo (2016) A esperança forma-se no princípio do aparelho psíquico como fonte de resolução de problemas.

Para o aproveitamento e aplicabilidade da habilidade de inteligência emocional, sobretudo, no que cerne ao contexto de desenvolver a alta performance, Oliveiri (2018) salienta que o cerne ideia não está na abdicação do lazer ou no empreendimento obsessivo em horas e horas de estudo, mas principalmente na capacidade do sujeito em discernir sobre suas a qualidade de suas decisões e ações.

Assim, na perspectiva de Goleman (2012) essa competência de discernimento se faz possível através da inteligência emocional, que em sua essência amplifica as aptidões do sujeito de perceberem seu autocontrole, sua capacidade de zelo e persistência, e a automotivação. Sendo estas capacidades possíveis de serem ensinadas e plenamente aprendidas.

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL APLICADA AO CONTEXTO DE ALTO DESEMPENHO

No ensaio intitulado “alguns tipos de caráter, encontrados na prática psicanalítica” (1916/2010) Freud argumenta que, a frustração é um dos fatores que têm maior relação condicionante ao surgimento de neuroses. De modo que, a frustração aqui pode ser entendida como o processo no qual os desejos libidinais tentam se lançar por meio de metas, que não são superadas ou condenadas pelo eu (FREUD, 2010).

Pensando principalmente sobre as emoções, Olivieri (2018) aponta oito passos que podem ser utilizados para fundamentar um processo de estudos que almeja alta performance. Dessa forma, o autor indica que o foco inicial deve ser dado às emoções, de modo que, compreendê-las e utilizá-las a seu favor, tendo o discernimento para aproveitar inclusive os efeitos das emoções ditas negativas, como a tristeza e a raiva, são salutares para o processo de aprendizagem. E que basicamente, esse princípio consiste na prática de inteligência emocional.

Em seguida Olivieri (2018) salienta a importância de manter uma vida saudável, através da combinação de hábitos alimentares equilibrados, que propiciam melhor

condicionamento físico e mantém a energia rítmica do corpo; e rotinas de sono principalmente, pela sua condição de permitir ao cérebro melhores condições de consolidação de aprendizagens e memórias; e exercícios físicos, como fonte de consciência corporal.

O terceiro passo consiste em potencializar a aprendizagem, ou seja, tornar-se consciente sobre as particularidades de seu aprendizado. Assim, Olivieri (2018) apresenta uma espécie de equação para alcançar os resultados tão almejados, que consiste em: tempo em sala de aula x qualidade do aprendizado + tempo de estudo x qualidade do estudo. De modo que, se valendo dessa estratégia é possível aplicar técnicas de aprendizado que serão melhor explicadas na tabela.

Tabela 2 – Técnicas para o processo de aprendizagem focado na alta performance.

Técnica	Descrição	Contribuição
Leitura ativa	Após terminar de ler um parágrafo, página, ou capítulo, feche-o e busque o lembrar com o máximo de detalhes e se explicar tudo o que você aprendeu! Você pode fazer isso em voz alta, na sua mente ou esquematizando tudo em uma folha branca.	Fortalece a memória de longo prazo; identifica falhas no processo de aprendizado; e protege contra frustrações consigo mesmo.
Técnica Feynman de estudo	Escolhe a fonte pela qual quer aprender; descreve com suas próprias palavras o conteúdo em questão; dê uma aula para si mesmo em voz alta; identifique as falhas de forma momentânea e as corrija; e progressivamente vá simplificando a explicação.	Fortalece a compreensão, assimilação e acomodação do conteúdo.
Prática de exercícios	Faça leitura dinâmica e compreensiva, sobretudo, de conteúdos dos quais têm mais dificuldade ou resistência, para posteriormente aplicar nas respostas de exercícios.	Permite maior domínio do conteúdo e percepção acerca dos níveis de assertividade.
Sair da zona de conforto	Se imponha desafios constantes. Encontre prazer na atividade que não lhe agrada tanto	para potencializar as habilidades cognitivas.
Maximizar aprendizado das aulas	Estar plenamente presente às aulas, descansado e focado em tirar todas as dúvidas.	Amplia e fortalece a aprendizagem.

Repetição espaçada	Rever (reler) o conteúdo de preferência em dias alternados ao invés de várias vezes no mesmo dia.	Auxilia no reforço da memória, sem sobrecarregar o cérebro.
Alterar técnica de resolução de exercícios.	Se proponha em exercícios diferentes para o mesmo conteúdo (alterne leitura, fichamento, reprodução de aula, etc).	Possibilita a neuroplasticidade, ou seja, várias possibilidades de resolução para um mesmo problema.
Realize intervalos regulares de qualidade.	Faça um ciclo de tempo para estudos e estabeleça uma pausa, ou pausa para descansos maiores no decorrer do dia, ou pausa no fim do dia (mais longa até o dia seguinte), contudo, não durma em seguida, se proponha em outra atividade.	Permite dinamizar a rotina de estudos, propiciando inclusive relaxamento mental e corporal.
Estudos em grupo.	Faça de forma estruturada (conteúdo e tempo definidos) estabeleça regras de funcionamento, se permita na troca ensine a aprender.	Permite trabalhar a flexibilidade de ideias reflexivas e interação social.

Fonte: Olivieri (2018) adaptado pelo autor (2020).

O quarto passo é de fundamental importância para qualquer processo que exija desenvolvimento de habilidades, como o foco. E este, diz respeito a otimização do ambiente, que deve ser um lugar adequado, com o mínimo de distrações e o máximo de praticidade, ou seja, tendo o essencial ao alcance da mão (OLIVIERI, 2018).

Ainda segundo o autor aludido, o quinto passo é estabelecer uma estratégia para cada tipo de avaliação, estar atento ao peso de cada conteúdo, focar no que é mais importante, fazer experimentos anteriores ao dia oficial da avaliação. O sexto passo, realça a importância da produtividade se dar por meio da especificidade e clareza dos objetivos, no intuito de não desperdiçar tempo.

E finalmente o sétimo passo e talvez o mais importante no qual Olivieri (2018) refere-se ao que é feito no tempo livre e como estabelece os relacionamentos. Aprender

a aproveitar o tempo livre é tão complexo quanto aprender e praticar todo o resto, anteriormente mencionado no processo. De modo que, se conectar de forma significativa em atividades prazerosas e divertidas com outras pessoas, buscar atividades que qualifiquem a saúde mental, como processo terapêutico, técnicas de relaxamento, ou seja, atribuído significado e relevância ao tempo no qual não está estudando.

Diante do exposto, Tavela Junior (2018) salienta que cada pessoa desenvolve suas habilidades de forma bastante particular, não sendo, portanto, as propostas de treino da inteligência emocional, uma receita inflexível ou infalível. De modo que, o autor reforça a importância de escolher a técnica mais adequada ao objetivo no qual se propõe. Assim, técnicas de treinamento são mais interessantes para o domínio de conteúdos, por outro lado técnicas de relaxamento são mais viáveis para o contexto de inteligência emocional aplicada, por exemplo, a relações de trabalho.

Todavia, o elemento de maior relevância no treino da inteligência emocional, é saber diferenciar emoções que são, por exemplo, a raiva, tristeza, medo; dos sentimentos que é a manifestação da emoção; e os estados de humor que diz respeito à sensação associada a uma emoção (TAVELA JUNIOR, 2018).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A conjuntura de acesso ao ensino superior no Brasil se configura, em sua grande maioria, por meio da excelência nos resultados do processo seletivo, que se dá através do Exame Nacional do Ensino Médio ENEM. Sendo também, a excepcionalidade nos resultados, o quesito fundamental de apreciação dos concursos públicos, na corrida pela tão almejada carreira estável e consideravelmente bem remunerada.

De maneira que, o grupo de pessoas que se lançam nessa empreitada, buscam em seus processos de preparação, nada menos que a excelência, e que para alcançar a aprovação se propõe em jornadas de estudo, se caracterizando assim, como sujeitos de alta performance.

Contudo, é entendido que alta performance exige muito além de dedicação e disciplina nos estudos. Na discussão apresentada neste artigo, pudemos identificar que

trabalhar a habilidade da inteligência emocional, se apresenta como um diferencial essencial para que a alta performance seja processada de maneira saudável, acarretando em conquistas reais, sendo no contexto aqui discutido, a aprovação.

Existem inúmeras maneiras de se trabalhar a inteligência emocional. Todavia, diante da perspectiva neuropsicanalítica aqui apresentada, compreende-se que não obstante, primeiramente se faz necessário reconhecer as próprias emoções, de modo a diferenciar dos sentimentos e dos estados de humor, uma vez que, é no aparelho psíquico que acontece a interação dos neurônios que em última instância são à base de desenvolvimento das emoções e do prazer.

Destacaram-se ainda, técnicas de aprendizado que devem ser pensadas e aplicadas de forma particularizada a cada sujeito, presumindo assim, que não exista uma única fórmula para fomentar a inteligência emocional em todas as pessoas.

Vale ressaltar, que as limitações deste estudo se apresentaram diante da escassez de conteúdo na literatura, que faça uma interlocução discursiva entre a perspectiva psicanalítica e a inteligência emocional aplicada ao contexto da alta performance. Portanto, caracterizando este estudo como essencial para maior discussão, sobretudo, por se tratar de um tema que reflete a realidade de uma parcela considerável da população brasileira.

REFERÊNCIAS

ARAGÃO, G. **Devo me importar com a concorrência em concurso público?**. In: JUSBrasil artigos [on line], 2017. Disponível em: <https://gersonaragao.jusbrasil.com.br/artigos/466743401/devo-me-importar-com-a-concorrenca-em-concurso-publico>. Acesso em: 05 Fev. 2020.

BATISTA, Helder H. V. e NORONHA, Ana Paula P. **Instrumentos de autorregulação emocional**: uma revisão de literatura. Avaliação Psicológica. V. 17, n. 3, 2018. 389-398.

CALLEGARO, MARCOS M. **O novo inconsciente**: como a terapia cognitiva e as neurociências revolucionaram o modelo de processamento mental. Porto Alegre: Artmed, 2011.

COURY, Marayara I. F. **Avaliação do nível de inteligência emocional em estudantes de medicina de diferentes períodos da graduação**. Estudo transversal, Belo Horizonte

2017-2018. Dissertação de Mestrado. Universidade José do Rosario Vellano, Belo Horizonte, 2019.

DORNELES, T. M. **As bases neuropsicológicas da emoção**: um diálogo acerca da aprendizagem. Revista Acadêmica Licencia & acturas, v.2, n.2, 2014, p. 14-21.

DOUX J. L. **O cérebro emocional – Os misteriosos alicerces da vida emocional**. 8 ed. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 1998.

FARJADO, W. **Considerações sobre o “projeto para uma psicologia científica” de Sigmund Freud**. In: A psicanálise artigos [on line], 2016. Disponível em: <https://www.apsicanalise.com/index.php/blog-psicanalise/48-artigos/360-consideracoes-sobre-o-projeto-para-uma-psicologia-cientifica-de-sigmund-freud>. Acesso em: 05 Fev. 2020.

FRANCO, Maria G. S. E. C; SANTOS, Natalie N. **Desenvolvimento da compreensão emocional**. Psicologia: Teoria e Pesquisa. V. 31, n.3. 2015. 339-348.

FREUD, S. Alguns tipos de caráter encontrados na prática psicanalítica [1916] In: FREUD (1914-1916) Obras completas volume 12: **Introdução ao narcisismo, ensaios de metapsicologia e outros textos**. Companhia das letras, 2010.

GIL, A. C. **Método e técnicas de pesquisa social**. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GOLEMAN, D. **Trabalhando com a Inteligência Emocional**. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.

GOLEMAN, D. **Inteligência Emocional - A teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente**. Rio de Janeiro: Objetiva, 2011.

GOLEMAN, D. **O cérebro e a inteligência emocional**: novas perspectivas. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012.

GRANATO, L. **Os concursos públicos mais procurados e cobicados para 2019**. In: Exame [on line], 2019. Disponível em: <https://exame.abril.com.br/carreira/os-concursos-publicos-mais-procurados-e-cobicados-para-2019/>. Acesso em: 05 Fev. 2020.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA INEP. **Dados do censo da educação superior** As universidades brasileiras representam 8% da rede, mas concentram 53% das matrículas. In: Instituto nacional de estudos e pesquisas educacionais Anísio Teixeira. [on line], 2018. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/dados-do-censo-da-educacao-superior-as-universidades-brasileiras-representam-8-da-rede-mas-concentram-53-das-matriculas/21206. Acesso em: 04 Fev. 2020.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA INEP. **Sinopse estatística do Exame Nacional de Ensino Médio 2018**.

Brasília INEP, 2019. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/sinopses-estatisticas-do-enem>. Acesso em: 04 Fev. 2020.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA INEP. **Press Kit resultados enem 2018 – 20 anos**. Brasília INEP, 2019. Disponível em: http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2018/presskit/presskit_enem-resultados2018.pdf. Acesso em: 04 Fev. 2020.

JCCORCursos. **Sabe quais são os concursos públicos mais disputados da história**. In: JCCONCURSOS [on line], 2019. Disponível em: <https://jcconcursos.uol.com.br/noticia/concursos/maiores-concursos-publicos-da-historia-do-brasil-68398>. Acesso em: 05 Fev. 2020.

LEAHY, R. L; TIRCH, D. e NAPOLITANO, L. A. **Regulação emocional em psicoterapia: um guia para o terapeuta cognitivo comportamental**. Trad. Ivo Haun de Oliveira. Porto Alegre: Artmed, 2013.

MATIAS, L. e TOLEDO, S. **Enem: veja como 1.434 instituições usam a nota do exame**. In: Guia do estudante [on line], 2017. Disponível em: <https://guiadoestudante.abril.com.br/enem/enem-como-1-434-instituicoes-usam-a-nota-do-exame-2/>. Acesso em: 04 Fev. 2020.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. **Novo ensino médio – perguntas e respostas**. In: Ministério da Educação [on line], 2018. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=40361>. Acesso em 06 Fev. 2020.

MORAES A. P. Q. **O livro do cérebro**. vol. 2. São Paulo: Editora Duetto, 2009.

OLIVEIRA, J. L. M; JESUS, A. M. G. **Teologia do prazer**. São Paulo: Editora Paulus, 2014.

OLIVIERI, A. **Os 8 passos para se tornar um estudante de alta performance**, 2018.

PIRES, Antônio P. **Psicoterapia psicanalítica focada nas emoções**. Tempo psicanalítico, v. 48, n.2. Rio de Janeiro, 2016. 114-134.

QUARESMA, Maria L. **Entre a entrega e a renúncia: excelência acadêmica em escolas públicas chilenas de alta performance**. Educ. pesqui. V. 41. São Paulo, 2015. 1487-1501.

SANTOS, J. V. et al. **Inteligência emocional: uma revisão de literatura internacional**. Estudos interdisciplinares em psicologia. V. 9, n. 2. Londrina, 2018. 78-99.

SENADO FEDERAL. **Promulgada lei que garante atendimento de psicólogo a alunos de escolas públicas**. In: Senado Notícias [on line], 2019. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/12/12/promulgada-lei-que-garante-atendimento-de-psicologo-a-alunos-de-escolas-publicas>. Acesso em: 06 Fev. 2020.

SISU. **10 Cursos mais procurados no SISU.** In: Portal SISU, 2018. Disponível em: <https://sisu2018mec.com.br/cursos-mais-procurados-no-sisu/>. Acesso em 04 Fev. 2020.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL SBIE. **Qual a diferença entre emoção e sentimento na psicologia?** In: Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional [on line], 2017. Disponível em: <https://www.sbie.com.br/blog/qual-diferenca-entre-emocao-e-sentimento-na-psicologia-2/>. Acesso em 14 Jan. 2020.

TAVELA JUNIOR, J. S. **Manual de treinamento em inteligência emocional.** Dissertação de mestrado. Universidade José do Rosário Vellano. Belo Horizonte, 2018.

WILLIAMS, M; PENMAN, D. **Atenção Plena.** Trad. Ivo Korytowski, Rio de Janeiro: Sextante, 2015.

WEISINGER, H. **Inteligência emocional no trabalho:** como aplicar os conceitos revolucionários da I. E. nas suas relações profissionais, reduzindo o estresse, aumentando sua satisfação, eficiência e competitividade. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.

CAPÍTULO XI

MAPEAMENTO DOS NÚCLEOS DE TELESSAÚDE: UMA ANÁLISE DE SUA DISTRIBUIÇÃO NO CONTEXTO NACIONAL

Ana Cristina Carneiro Menezes Guedes³⁹; Carla Cardi Nepomuceno de Paiva⁴⁰;

Rosângela Caetano⁴¹; Daniela Lacerda Santos⁴²;

Gizele da Rocha Ribeiro⁴³; Angélica Baptista Silva⁴⁴;

Rondineli Mendes da Silva⁴⁵; Ione Ayala Gualandi de Oliveira⁴⁶;

Vanessa de Lima e Souza⁴⁷.

DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2021.02-11

RESUMO:

A telessaúde utiliza recursos tecnológicos de informação e de comunicação para facilitar o acesso à atenção à saúde, reduzindo barreiras relacionadas a distâncias, sobretudo em áreas rurais, locais de difícil acesso ou com carências assistenciais. No Brasil, teve início na década de 90 e está em franca consolidação, assumindo caráter estratégico de otimização do sistema de saúde no cuidado assistencial, no ensino e na pesquisa. Contudo, não existe uma fonte de informação única, que permita um rápido e pleno conhecimento do quantitativo e características dos Núcleos de Telessaúde (NT) existentes. O estudo objetivou mapear a distribuição dos Núcleos de Telessaúde no Brasil e caracterizar as modalidades de serviços ofertados, utilizando informações disponíveis nos sites governamentais e nas páginas dos núcleos estaduais de telessaúde. Método: O quantitativo e a distribuição geográfica dos Núcleos de Telessaúde foram realizados a partir de levantamento nos sítios governamentais do Cadastro Nacional de

³⁹ Doutoranda no Programa de Pós-Graduação de Enfermagem e Biociências da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro-UNIRIO. Coordenadora do Núcleo de Telessaúde do Hospital Federal dos Servidores do Estado e Membro da Divisão de Ensino e Pesquisa do Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro. E-mail: anamenegue@gmail.com

⁴⁰ Doutoranda em Saúde Coletiva no Instituto de Medicina Social da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E-mail: carlacardiufjf@gmail.com

⁴¹ Doutora em Saúde Coletiva. Professora associada do Departamento de Políticas Públicas, Planejamento e Administração em Saúde do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E-mail: caetano.r@gmail.com

⁴² Doutora em Saúde Coletiva, na área de Política, Planejamento, Administração em Saúde, pelo Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IMS/UERJ). Professora da Faculdade de Medicina de Petrópolis - Fundação Octacílio Gualberto (FMP/FOG). E-mail: enfdanielalacerda@gmail.com

⁴³ Tecnologista em saúde pública no Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, RJ / Biblioteca de Saúde Pública. E-mail: gizalivros@gmail.com

⁴⁴ Doutora em Saúde Pública pela Fundação Oswaldo Cruz. Pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz. E-mail: silva.angelica@gmail.com

⁴⁵ Doutor em Saúde Coletiva pelo Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IMS/UERJ). Professor no Departamento de Política de Medicamentos e Assistência Farmacêutica da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz. E-mail: rondineli.mendes@gmail.com

⁴⁶ Doutora em Saúde Coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ. E-mail: ionegualandi@yahoo.com.br

⁴⁷ Doutora em Informação e Comunicação em Saúde e em Estudos Sociais de Ciência e Tecnologia. E-mail: limasvan@gmail.com

Estabelecimentos de Saúde, da Rede Universitária de Telemedicina e da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde realizado em março/2018. Resultados: Foram identificados 243 núcleos, 83 dos quais integrantes do Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes. As regiões Sudeste e Norte concentram 68,3% dos NT, enquanto os pontos de telessaúde associados predominam no Norte e no Sul (67,5%). Teleconsultoria e segunda opinião formativa eram as principais modalidades ofertadas por, respectivamente, 107 e 61 NT. Conclusão: Espera-se que o estudo fomente a discussão sobre a complexidade dos contextos e seus reflexos no âmbito da gestão, planejamento e avaliação das ações de telessaúde.

PALAVRAS-CHAVE: Telemedicina. Telessaúde. Assistência à saúde. Serviços de Saúde/provisão e distribuição.

MAPPING HEALTHCARE CENTERS: AN ANALYSIS OF ITS DISTRIBUTION IN THE NATIONAL CONTEXT

ABSTRACT:

Telehealth uses technological information and communication resources to facilitate access to health care, reducing barriers related to distances, especially in rural areas, places that are difficult to access or in need of assistance. In Brazil, it started in the 90's and is in full consolidation, assuming a strategic character of optimization of the health system in care, teaching and research. However, there is no single source of information, which allows a quick and full knowledge of the quantity and characteristics of the existing Telehealth Centers (NT). The study aimed to map the distribution of Telehealth Centers in Brazil and to characterize the types of services offered, using information available on government websites and on the pages of state telehealth centers. Method: The quantitative and geographic distribution of the Telehealth Centers were carried out based on a survey carried out on the government websites of the National Registry of Health Establishments, the University Telemedicine Network and the Secretariat of Primary Health Care of the Ministry of Health held in March / 2018. Results: 243 centers were identified, 83 of which were members of the National Telehealth Brazil Networks Program. The Southeast and North regions concentrate 68.3% of the NT, while the associated telehealth points predominate in the North and the South (67.5%). Teleconsulting and second training opinion were the main modalities offered by, respectively, 107 and 61 NT. Conclusion: The study is expected to foster a discussion on the complexity of contexts and their reflexes in the scope of management, planning and evaluation of telehealth actions.

KEYWORDS: Telemedicine. Telehealth. Health care. Health Services/Supply e Distribution.

INTRODUÇÃO

As Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) têm modificado grandemente o cuidado à saúde nos últimos trinta anos. No intento de promover a saúde

de indivíduos e comunidades, as TIC têm se expandido para, progressivamente, incluir o intercâmbio de informações para o diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças, a pesquisa e avaliação, e a educação continuada dos profissionais de saúde e usuários (PAHO, 2016).

O conceito de Telemedicina refere-se ao uso das TIC para prover o cuidado clínico à distância, em uma modalidade de atenção que desafia a condição tradicional da presença física e do contato entre profissionais e pacientes para o atendimento assistencial. Telessaúde deriva de Telemedicina, porém possui um espectro mais abrangente e ampliado sobre a promoção e manutenção da saúde, bem como a inclusão de outras áreas de saúde e profissões essenciais no processo de cuidado, como enfermagem, farmácia e reabilitação (BASHSHUR et al., 2011).

Entre os elementos elencados para a difusão experimentada pela telessaúde nos diversos sistemas de saúde incluem-se: (i) redução de custos e tempo, evitando o transporte dos pacientes; (ii) uso mais eficiente dos recursos de saúde, pela descentralização da assistência e possibilidade de avaliação e triagem por especialistas, ampliando o atendimento a maior número de pessoas,; (iii) acesso mais rápido a especialistas nas emergências; (iv) redução das internações hospitalares; (v) incentivo à cooperação dos pesquisadores e oferta de programas educacionais para médicos e demais profissionais de saúde localizados fora de centros especializados (PAHO, 2016).

Relatório da OMS publicado em 2016 identificou um rápido progresso da telemedicina entre seus Estados membros de 2010 a 2016, referindo que sua expansão é fundamental para alcançar a cobertura universal de saúde (WHO, 2016).

A despeito desse progresso e de suas contribuições potenciais, ainda há dificuldades de incorporá-la no processo de trabalho dos profissionais de saúde, no Brasil e no mundo (COMBI, POZZANI, POZZI, 2016). Parte dessa lentidão na difusão pode ser causada pelo complexo processo de implantação da telessaúde. Diversos fatores têm sido elencados na literatura como interferindo em sua aplicação mais intensiva: as exigências relativas à infraestrutura tecnológica e à integração/interoperabilidade e falta de padronização para tecnologias e dados; diferentes modelos e falta de financiamento mantido e suficiente, que afetam a sustentabilidade e a qualidade dos serviços fornecidos;

exigências regulatórias e legais relativos à oferta e funcionamento dos serviços, bem como desafios referentes aos contextos organizacionais e os profissionais e usuários (AHMED, DANNHAUSER, PHILIP, 2016).

Em um país de dimensões continentais como o Brasil, a telessaúde representa uma perspectiva de assegurar a consecução de políticas públicas concebidas à época da concepção do SUS, as quais não foram plenamente satisfeitas em virtude da existência de áreas desassistidas ou remotas com exiguidade de profissionais de saúde, entre outras razões (CAETANO et al., 2020a).

No Brasil, a telessaúde surgiu de forma descentralizada e fragmentada nos estabelecimentos de saúde e de ensino e pesquisa nos anos 1990, acompanhando tendência mundial de atendimento médico e geração de laudos à distância. Uma década e pouco depois, duas iniciativas na administração pública integraram essas atividades isoladas à Rede Universitária de Telemedicina (RUTE) e o Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes (SANTOS et al., 2009).

A RUTE, criada em 2006 e coordenada pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, tem por objetivo principal aprimorar a infraestrutura de comunicação e colaboração interinstitucional entre os hospitais universitários e as instituições de saúde (SILVA, MORAES, 2012). O Programa Telessaúde Brasil Redes (PNTBR) foi criado pelo Ministério da Saúde em 2007, a partir da convergência de ideias oriundas de projetos ligados à telemedicina propostos por grupos de pesquisadores alocados em universidades e de iniciativas municipais isoladas. Iniciou como um Projeto Piloto, que incluía centros de telessaúde localizados em nove universidades públicas das cinco regiões do país e ligados a 900 unidades básicas de saúde em 728 municípios, localizados principalmente em áreas remotas e isoladas. Foi posteriormente estendido para o âmbito nacional, como ferramenta de gestão e fortalecimento das redes de atenção à saúde. A Atenção Primária à Saúde é seu foco principal de atuação, a partir da oferta de atividades de apoio assistencial e de educação permanente para profissionais de saúde e gestores. Os Núcleos de Telessaúde (NT) do Programa integram a lista de serviços de saúde do Sistema Único de Saúde e, segundo portaria do Ministério da Saúde, todos em princípio deveriam oferecer teleconsultoria, teliagnóstico, tele-educação e elaboração de textos de Segunda Opinião Formativa (SOF) (BRASIL, 2011).

A despeito da expansão verificada na última década, não existe, em função do modo fragmentado como a Telessaúde se desenvolveu historicamente no país, uma fonte de informação única disponível, que permita um rápido e pleno conhecimento do quantitativo e distribuição geográfica dos Núcleos existentes no território nacional, bem como das modalidades de serviços ofertadas. Esse conhecimento é fundamental para um adequado planejamento e avaliação dos serviços e ações desenvolvidas pela telessaúde no Brasil.

O estudo teve por objetivo mapear a quantidade e distribuição dos Núcleos de Telessaúde no Brasil e caracterizar as modalidades de serviços ofertados, utilizando informações disponíveis nos sítios governamentais e nas páginas eletrônicas dos núcleos estaduais de telessaúde.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Trata-se de estudo exploratório, de caráter descritivo e abordagem quantitativa, que utilizou fontes de dados secundárias disponíveis em sítios da internet, dispensando aprovação prévia pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Foi desenvolvido como etapa inicial de um projeto de pesquisa voltado a elaborar proposta de modelo de avaliação que contribua na institucionalização das ações de Telessaúde no SUS, para o qual se verificava importante ter um panorama dos NT existentes e das atividades neles desenvolvidas.

Foram utilizados, como fontes de informação, os sítios eletrônicos do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS) e do antigo Departamento de Atenção Básica (DAB). Adicionalmente, foi realizada consulta à coordenação nacional RUTE e à página eletrônica da RUTE.

A coleta de dados foi norteadada por um formulário eletrônico estruturado construído no software Microsoft Excel®, organizado em cinco módulos, com preenchimento padronizado com auxílio de um instrutivo e validado por teste piloto. A coleta foi realizada em março de 2018 por quatro pesquisadores, de forma independente.

Os dados foram importados para Software SPSS versão 27 para realizar a análise estatística descritiva, que examinou a distribuição geográfica, esfera administrativa, número de pontos de telessaúde associados, modalidades e especialidades ofertadas e presença de redes sociais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O mapeamento identificou 243 núcleos de telessaúde (Tabela 1), presentes em todos os estados da federação. A região Sudeste possuía 89 NT (36,6%), seguida do Nordeste (31,7%). Os estados com maior número de NT eram Rio de Janeiro (35), São Paulo (31), Minas Gerais e Pernambuco (20) e Amazonas (14).

Pontos de telessaúde são os serviços de saúde onde os trabalhadores e profissionais dos SUS demandam as ações de teleconsultoria e/ou telediagnóstico (BRASIL, 2011). Detectou-se 13.516 pontos de telessaúde registrados no CNES, dos quais 4,1% estavam inativos no momento da pesquisa. As regiões Nordeste (37,6%) e Sul (29,9%) congregam a maior parte desses pontos. Enquanto quatro estados (Bahia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Ceará) congregam 55,3% dos pontos de telessaúde identificados (dos quais menos que 0,2% estão inativos), Rio Grande do Norte, Amapá e o Distrito Federal não possuíam nenhum ponto (Tabela 1).

Tabela 1. Distribuição dos Núcleos e dos Pontos de Telessaúde segundo unidade da federação e região, Brasil, 2018

Região/UF	Núcleos de Telessaúde				Pontos de Telessaúde			
	RUTE	Telessaúde Brasil Redes	Total	%	Ativos	Inativ os	Total	%
Norte	15	20	35	14,4	792	117	909	6,7
AC	1	1	2	0,8	20	0	20	0,1
RO	1	1	2	0,8	0	98	98	0,7
AM	5	9	14	5,8	74	0	74	0,5
AP	2	0	2	0,8	0	0	0	0,0
PA	4	7	11	4,5	472	19	491	3,6
RR	1	1	2	0,8	1	0	1	0,0
TO	1	1	2	0,8	225	0	225	1,7
Centro-Oeste	12	5	17	7,0	1.328	158	1.486	11,0
DF	8	0	8	3,3	0	0	0	0,0

GO	1	2	3	1,2	180	158	338	2,5
MS	2	1	3	1,2	455	0	455	3,4
MT	1	2	3	1,2	693	0	693	5,1
Nordeste	42	35	77	31,7	4.908	176	5.084	37,6
AL	2	4	6	2,5	124	0	124	0,9
BA	11	2	13	5,3	2.921	11	2.932	21,7
CE	9	2	11	4,5	1.131	0	1.131	8,4
MA	2	5	7	2,9	31	0	31	0,2
PB	2	1	3	1,2	81	0	81	0,6
PE	9	11	20	8,2	429	165	594	4,4
PI	3	7	10	4,1	20	0	20	0,1
RN	3	2	5	2,1	0	0	0	0,0
SE	1	1	2	0,8	171	0	171	1,3
Sudeste	71	18	89	36,6	1.883	109	1.992	14,7
ES	2	1	3	1,2	1.038	0	1.038	7,7
MG	12	8	20	8,2	20	0	20	0,1
RJ	30	5	35	14,4	287	0	287	2,1
SP	27	4	31	12,8	538	109	647	4,8
Sul	20	5	25	10,3	4.044	1	4.045	29,9
PR	5	1	6	2,5	627	0	627	4,6
RS	9	3	12	4,9	1.771	1	1.772	13,1
SC	6	1	7	2,9	1.646	0	1.646	12,2
Brasil	160	83	243	100,0	12.955	561	13.516	100,0

Fonte: Elaboração própria da pesquisa (2020).

Verificou-se um certo descompasso entre a distribuição dos núcleos e pontos de telessaúde e as regiões e estados brasileiros mais carentes de recursos assistenciais e de especialistas (SCHEFFER; BIANCARELLI; CASSENTE, 2018), para as quais a telessaúde mais poderia contribuir em termos de redução das iniquidades em saúde existentes. Essa realidade configura-se como um desafio para a oferta equitativa dos serviços oferecidos pela telessaúde no país.

A maioria dos NT identificados encontra-se vinculado à Rede Universitária de Telemedicina (65,8%). Embora presentes em todas as unidades da federação, quase 60% deles estavam localizados nas regiões sudeste e sul. A grande maioria desses NT pertenciam às esferas administrativas federal (76, 47,5%) e estadual (58, 36,3%), tendo ainda sido identificados vinculados à esfera municipal (10) e privada (16).

A RUTE é um programa coordenado pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) e integrado ao Programa Telessaúde Brasil Redes, estimulando assistência, ensino,

pesquisa, monitoramento, gestão e avaliação remota e colaborativa na infraestrutura de comunicação avançada da RNP.

Uma atividade importante da RUTE são os Grupos de Interesse Especial (ou Special Interest Group – SIGs, na sigla em inglês), organizados e coordenados pelas instituições integrantes da RUTE, onde profissionais de Saúde debatem temas específicos, a partir de videoconferências e webconferências, voltadas para o ensino, pesquisa ou pedidos de segunda opinião (RIBEIRO FILHO, MESSINA & LOPES, 2014). Atualmente, existem mais de 50 SGI, cobrindo áreas como atenção primária à saúde, audiologia, endocrinologia pediátrica, enfermagem, cardiologia, cirurgia pediátrica, mastologia, psiquiatria, oftalmologia, saúde de crianças e adolescentes, saúde bucal, saúde do trabalhador, medicina desportiva, terapia ocupacional, radiologia pediátrica, neurologia, entre outras. Mais recentemente, em decorrência da pandemia provocada pelo coronavírus, foi criado o SIG-COVID, com o objetivo de congregar os hospitais terciários, universitários, públicos e privados envolvidos no tratamento dos casos de maior gravidade.

Em inquérito realizados com coordenadores dos SIGs entre abril e maio de 2016 e respondido por 45 SIGs ativos, 35% declararam que seus grupos atuavam no eixo ensino, 21% nos eixos de assistência e pesquisa, desenvolvimento e inovação, enquanto 12% atuavam em gestão e 11% em avaliação. Quanto ao tipo de atividade realizada, 37% dos coordenadores informaram que os SIGs praticavam discussão/estudos de casos, seguido de aulas/ensino com 26%, reuniões profissionais e de grupos de pesquisa (21%), cursos/treinamentos (7%); 5% declararam que realizam outros tipos de reuniões e 4% declararam que atuavam com segunda opinião formativa (BRITO et al., 2019).

Oitenta e três núcleos identificados no presente mapeamento estavam vinculados ao Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes, não sendo observados núcleos no Amapá e Distrito Federal. No caso dessa rede, dois terços dos NT estavam localizados nas regiões Nordeste e Norte.

Desses 83 Núcleos, apenas 75 possuíam cadastro ativo no CNES no momento da coleta de dados. Dos 160 NT pertencentes à RUTE, oito estavam também registrados no CNES. O cadastramento no CNES como estabelecimento de saúde, incluindo a descrição

de serviços ofertados, é condição para o NT vinculado ao PNTBR receber o custeio mensal relativo ao financiamento das atividades de Telessaúde, cadastramento esse que não é exigido para os NT vinculados à RUTE. Além disso, é necessário que o NT possua equipes vinculadas a Unidade Básica de Saúde com ponto de telessaúde no CNES (BRASIL, 2014). Essa ausência de cadastro ativo traz questionamentos sobre como esses núcleos não presentes no CNES estão conseguindo obter os recursos para seu funcionamento.

A tipologia dos serviços de telessaúde no SCNES foi estabelecida pela Portaria nº 2.546 de 2011, que redefiniu e ampliou o Programa Telessaúde Brasil, a partir de então denominado Programa Telessaúde Brasil Redes. Um estabelecimento é classificado como Telessaúde se for autônomo e utilizar as tecnologias de informação e comunicação para realizar cuidado e educação em saúde através de distâncias geográficas e temporais. Esses estabelecimentos, por sua vez, podem ser um Núcleo Técnico-Científico, que são instituições formadoras e de gestão e/ou serviços de saúde responsáveis pela formulação e gestão de teleconsultorias, telediagnósticos e segunda opinião formativa, com o objetivo de qualificar, expandir e fortalecer o SUS. O estabelecimento de telessaúde também pode ser uma Unidade de Telessaúde, estabelecimento autônomo que também usa as TIC para realizar teleconsultoria e apoio diagnóstico; nessa segunda modalidade, estão incluídas as unidades da RUTE e as unidades públicas ou da saúde suplementar que optaram pela não adesão ao programa do MS. Existe ainda um terceiro tipo de estabelecimento que são os pontos de telessaúde, obrigatoriamente vinculados a um Núcleo Técnico-Científico e que recebe seus serviços.

Uma das ações dos Núcleos é a oferta de teleconsultoria, que consiste:

[...] na consulta registrada e realizada entre trabalhadores, profissionais e gestores da área de saúde, por meio de instrumentos de telecomunicação bidirecional, com o fim de esclarecer dúvidas sobre procedimentos. Podendo ser síncrona - teleconsultoria realizada em tempo real, geralmente por chat, web ou videoconferência; ou assíncrona - teleconsultoria realizada por meio de mensagens off-line” (BRASIL, 2011, p.1).

Nos núcleos de telessaúde vinculados ao Programa Brasil Redes, a teleconsultoria é uma atividade preconizada, sendo um dos componentes do custeio mensal cujo

regimento é definido pela portaria nº 2.860, de 29 de dezembro de 2014. Para o recebimento desse custeio, é exigido que as equipes apresentem histórico de teleconsultorias nos últimos três meses, além do envio mensal de relatório de produção e de um conjunto de indicadores de monitoramento (BRASIL, 2014).

Segundo as informações disponíveis na web, Teleconsultoria era ofertada por 107 NT. Parte importante deles (84 NT) não informaram a área ou especialidade e muitos ofereciam teleconsultoria relacionada a múltiplas especialidades (Tabela 2). Destaca-se, também, a presença de teleconsultorias relacionadas não apenas às especialidades médicas, mas também a outras áreas do cuidado como enfermagem, odontologia, nutrição e fisioterapia.

Tabela 2. Áreas e especialidades relacionadas às teleconsultorias informadas pelos Núcleos de Telessaúde segundo região, Brasil, 2018.

Áreas de Teleconsultorias	Região					Total
	CO	SU	NO	NE	SE	
Cirurgia	1	0	2	2	1	6
Cardiologia	0	1	2	3	2	8
Clínica Médica	0	1	2	1	1	5
Dermatologia	2	1	5	2	1	11
Endocrinologia	0	1	2	2	0	5
Gastroenterologia	0	0	1	0	0	1
Geriatria	0	0	2	0	0	2
Hematologia	0	1	1	1	0	3
Medicina de Família e Comunidade	0	2	0	1	2	5
Nefrologia	0	0	2	0	0	2
Neurologia	0	2	1	0	0	3
Oftalmologia	0	1	0	1	0	2
Oncologia	0	1	0	0	1	2
Pediatria	0	0	2	3	1	6
Pneumologia	0	1	2	3	0	6
Proctologia	0	1	0	0	0	1
Reumatologia	0	1	1	1	0	3
Saúde Mental	0	1	1	2	1	5
Urologia	0	1	0	0	0	1
Enfermagem	1	2	5	5	6	19
Fisioterapia	1	0	0	0	1	2
Nutrição/nutrologia	1	1	0	0	1	3
Odontologia	3	1	2	4	6	16
Gestão	1	1	1	2	0	5
Outras*	3	4	9	8	7	31

Não Especificado	7	5	18	24	30	84
------------------	---	---	----	----	----	----

Fonte: Elaboração própria da pesquisa (2020)

Nota: Outras se refere a medicina intensiva e terapia intensiva neonatal e infanto-juvenil, urgência e emergência, medicina tropical/ infectologia, mastologia, otorrinolaringologia, ortopedia, traumatologia, radiologia, estomatoterapia, acidentes por animais peçonhentos, psicologia, farmácia e fonoaudiologia.

A oferta de segunda opinião formativa (que corresponde a teleconsultoria assíncrona sobre dúvidas correntes de profissionais de saúde que são respondidas e depois validadas por especialistas, seguidas pela sua difusão posterior na Biblioteca Virtual em Saúde), foi informada por 61 NT. As temáticas objeto de SOF, contudo, não se encontravam especificadas em 46 núcleos. Naqueles que mencionam, destacam-se temas referentes à saúde da mulher (9 NT), saúde da criança e do adolescente (7 NT), odontologia (5 NT), endocrinologia (4 NT), cardiologia (3 NT), clínica médica (3 NT), neurologia (2 NT) e saúde da família e comunidade, saúde do idoso, doenças sexualmente transmissíveis, audiologia e fonoaudiologia, urgências e emergências, doenças crônicas, eventos adversos a medicamentos, abordagem ao usuário de droga na APS, práticas integrativas e complementares, reunião de matriciamento, atendimento Núcleos de Apoio da Saúde da Família, psiquiatria e saúde mental; oftalmologia, oncologia e infectologia (mencionados por 1 NT).

Telediagnóstico significa o uso das TIC para a realização de serviços de apoio ao diagnóstico de condições ou doenças através de distâncias geográficas e/ou temporais, geralmente de forma assíncrona, facilitando o acesso a serviços especializados. Busca reduzir o tempo de diagnóstico, possibilitando tratamento para complicações previsíveis por meio do diagnóstico precoce. Informações sobre as ações de telediagnóstico foram encontradas em 37 NT, predominando as áreas de telecardiologia, teledermatologia, teleradiologia e teleoftalmologia.

O grau de detalhamento da informação disponível sobre as ações de telediagnóstico e SOF disponibilizadas na web pelos NT, todavia, era frequentemente pequeno, impedindo conhecer de forma mais precisa e detalhada as atividades prestadas. A indisponibilidade de dados sugere um desafio em relação à comunicação, dificultando o alcance e acesso da informação, tanto pelos profissionais de saúde quanto para os beneficiários e interessados pelos serviços oferecidos nos NT.

Verificou-se ainda a presença de 112 redes sociais vinculadas aos NT, predominando *Facebook* (42) e *YouTube* (32). Apesar de alguns Núcleos terem plataformas digitais com acesso restrito, foi possível obter informações sobre as modalidades ofertadas e atividades de educação nessas mídias. Mídias sociais possuem um potencial didático e pedagógico no que diz respeito à educação em saúde (MALDONADO et al., 2016), e eram frequentemente utilizadas pelos NT para divulgar as atividades educativas ofertadas.

Atualmente, as redes sociais são um meio de comunicação que vem ganhando espaço importante na área da saúde. No contexto da pandemia da COVID-19, observou-se uma intensa produção dos NT sobre conteúdos com orientações de prevenção e cuidado em saúde no *YouTube*, aplicativos, *Facebook*, *Instagram* (CAETANO et al., 2020b). Dada a necessidade de isolamento social, o processo de consolidação de tais mecanismos de comunicação constituiu-se como uma forma de reduzir a distância e facilitar o acesso à informação.

CONCLUSÕES

O estudo permitiu mapear a distribuição dos Núcleos de Telessaúde no país, cuja importância vem crescendo em termos quantitativos e atingiram ainda maior relevância com o estabelecimento da pandemia da COVID-19. Informações sobre o quantitativo e ações realizadas por esses núcleos é fundamental para o planejamento, gestão e avaliação desses serviços, mas se constitui ainda um desafio, dado a ausência de uma fonte única, continuamente atualizada e de fácil consulta aos interessados.

Nesse sentido, a busca congregando múltiplas fontes de informação (páginas da RUTE e da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde e dados do CNES) ampliou a possibilidade de identificação dos serviços. Realizado com base nas informações disponibilizadas na web e nos *sites* governamentais dos NT, que funcionam como recursos de divulgação de seus serviços, permitiu identificar a potencialidade desses lócus na divulgação das atividades dos serviços de telemedicina.

Ausência de *sites* na web, dados incompletos ou desatualizados, dinamicidade de substituição dos conteúdos presentes nesses espaços virtuais ao longo do tempo, e

dificuldades de recuperação de informações mais detalhadas sobre alguns serviços ofertados foram algumas das limitações identificadas na utilização da web como fonte de informação sobre aplicações da Telessaúde.

Ampliar o uso da web como fonte interativa de informação e de consulta para os usuários é um dos desafios para a gestão dos serviços de telessaúde. Investimento em ferramentas que atendam às demandas crescentes por democratização da informação, transparência, confiabilidade e consistência dos dados são fundamentais para o fortalecimento desses serviços no país.

Os achados do estudo podem contribuir no planejamento das ações dos NT, considerando fatores políticos, sociais e financeiros que impactam diretamente na conformação, consolidação e organização dos serviços de telessaúde e, portanto, devem ser alvo de futuras pesquisas e debates no âmbito do Sistema Único de Saúde.

REFERÊNCIAS

AHMED, Bakhtiyar; DANNHAUSER, Thomas; PHILIP, Nada. **A systematic review of reviews to identify key research opportunities within the field of eHealth implementation.** Journal of Telemedicine And Telecare, v. 25, n. 5, p. 276-285, 27 abr. 2018. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29703127/>. Acesso em: 29 de nov. 2020.

BASHSHUR, Rashid; SHANNON, Gary; KRUPINSKI, Elizabeth; GRIGSBY, Jim. **The Taxonomy of Telemedicine.** Telemedicine And E-Health, [S.L.], v. 17, n. 6, p. 484-494, jul. 2011. Mary Ann Liebert Inc. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1089/tmj.2011.0103>. Acesso em: 25 nov.2020

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.546, de 27 de outubro de 2011. **Redefine e amplia o Programa Telessaúde Brasil, que passa a ser denominado Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes.** DOU, 28 out. 2011.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.859, de 29 de dezembro de 2014. **Institui incentivo financeiro de custeio mensal destinado aos Núcleos Intermunicipais e Estaduais de Telessaúde do Programa Nacional de Telessaúde Brasil Redes na Atenção Básica, e dá outras providências.** DOU, 30 dez. 2014.

BRITO, Thiago Delevidove de Lima Verde et al. Classificação dos Grupos de Interesse Especial (SIGs) da Rede Universitária de Telemedicina (Rute) em Grupos Homogêneos com base em Sua Produção em Comunicação, Cooperação e Coordenação (3C). **Revista Brasileira de Educação Médica**, [S.L.], v. 43, n. 11, p. 36-46, 2019. Disponível em:

<http://dx.doi.org/10.1590/1981-5271v43suplemento1-20190129>. Acesso em: 20 Nov.2020.

CAETANO, Rosângela et al. Desafios e oportunidades para telessaúde em tempos da pandemia pela COVID-19: uma reflexão sobre os espaços e iniciativas no contexto brasileiro. **Cad. Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 36, n. 5, e00088920, 2020a. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2020000503001&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 30 Jan. 2021.

CAETANO, Rosângela et al. Educação e informação em saúde: iniciativas dos núcleos de telessaúde para o enfrentamento da COVID-19. *Revista de Enfermagem do Centro-Oeste Mineiro*, v. 10, n. 2020b. Disponível em: <http://seer.ufsj.edu.br/index.php/recom/article/view/3888>. Acesso em: 28 Jan.2021.

COMBI, Carlo; POZZANI, Gabriele; POZZI, Giuseppe. **Telemedicine for Developing Countries**. *Applied Clinical Informatics*, [S.L.], v. 07, n. 04, p. 1025-1050, out. 2016. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.4338/aci-2016-06-r-0089>. Acesso em: 20 Nov. 2020

MALDONADO, Jose Manuel Santos de Varge; MARQUES, Alexandre Barbosa; CRUZ, Antonio. Telemedicine: challenges to dissemination in brazil. **Cadernos de Saúde Pública**, [S.L.], v. 32, n. 2, p. 1-12, 2016. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/0102-311x00155615>. Acesso em: 20 Nov. 2020.

PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION. **Framework for the Implementation of a Telemedicine Service**. Washington, DC: PAHO, 2016. Disponível em: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/28414>. Acesso em 20 de novembro 2020.

RIBEIRO FILHO, José Lopes.; MESSINA, Luiz Ary.; LOPES, Paulo Roberto de Lima. RUTE 100 - **As 100 primeiras unidades de Telemedicina no Brasil e o impacto da Rede Universitária de Telemedicina (RUTE)**. Rio de Janeiro: E-Papers, 2014. Disponível em: https://rute.rnp.br/c/document_library/get_file?p_l_id=163071&folderId=1463084&name=DLFE-24102.pdf. Acesso em 21 de janeiro de 2020.

SANTOS, Alaneir de Fátima, et al. **Estruturação do Sistema Único de Saúde e o desenvolvimento das ações de Telessaúde no Brasil**. *Latin Am J Telehealth*, v. 1, n. 1, p. 5-38. 2009. Disponível em <http://cetes.medicina.ufmg.br/revista/index.php/rlat/article/view/12>. Acesso em: 20 Nov. 2020.

SCHEFFER, M.; BIANCARELLI, A.; CASSENOTE, A. **Demografia médica no Brasil**. São Paulo: FMUSP/Cremesp/CFM. 2018. Disponível em: <https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/DemografiaMedica2018.pdf>. Acesso em 29 de Jan. 2021.

SILVA, Angélica Baptista; MORAES, Ilara Hammerli Sozzi de. **O caso da Rede Universitária de Telemedicina: análise da entrada da telessaúde na agenda política brasileira**. *Physis: Revista de Saúde Coletiva*, [S.L.], v. 22, n. 3, p. 1211-1235, 2012. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-73312012000300019. Acesso em: 20 Nov. 2020.

SCHMITZ, Carlos André Aita; HARZHEIM, Erno. **Oferta e utilização de teleconsultorias para Atenção Primária à Saúde no Programa Telessaúde Brasil Redes**. Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, [S.L.], v. 12, n. 39, p. 1-11, 2 set. 2017. Disponível em: <https://rbmfc.org.br/rbmfc/article/view/1453>. Acesso em: 29 de Jan. 2021.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Global diffusion of eHealth: Making universal health coverage achievable**. Report of the third global survey on eHealth Global Observatory for eHealth. 2016. Disponível em: http://who.int/goe/publications/global_diffusion/en/. Acesso em 29 de Jan. 2021.

AGRADECIMENTOS

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que financia o projeto de pesquisa “Modelo de avaliação de serviços de Telessaúde (MAST): adaptação e validação para o contexto brasileiro”, processo nº 305439/2017-4, sob coordenação de Rosângela Caetano.

CAPÍTULO XII

O TRIPÉ DO EMAGRECIMENTO: INTELIGÊNCIA EMOCIONAL, PRÁTICA ESPORTIVA E NUTRIÇÃO ALIMENTAR

Renato dos Santos Lisboa⁴⁸

DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2021.02-12

RESUMO:

A obesidade é uma realidade entre as pessoas de todo mundo e está presente em diferentes escalas em todas as nações existentes. As questões sociais e comportamentais como a cultura e o estilo de vida característicos de cada país interferem para que os índices de obesidade sejam mais baixos ou mais altos. Sendo assim, a busca pelo emagrecimento é contínua e muito antiga, a quantidade de informação disponível sobre o assunto causa grande confusão e muitas vezes faz com que as pessoas sigam atitudes erradas e que dificultam o seu processo de perda de peso. Ao longo dos anos diversas metodologias foram desenvolvidas em busca do corpo perfeito, desde dietas restritivas até cirurgias evasivas. Porém, o caminho para o emagrecimento saudável e definitivo está na completa reformulação das ideologias, comportamentos e crenças limitantes do indivíduo em questão. O objetivo geral do artigo em questão é demonstrar como a inteligência emocional pode ser a chave para o emagrecimento saudável aliada aos demais conceitos fundamentais: a prática esportiva e a nutrição alimentar correta. A metodologia escolhida se refere à revisão bibliográfica e foi capaz de direcionar a conclusão de que soluções rasas e imediatistas só levam ao emagrecimento de curto prazo, sendo necessário que a inteligência emocional do indivíduo seja desenvolvida através de técnicas de psicanálise, reprogramação cerebral, de hábitos, dentre outros.

PALAVRAS-CHAVE: Obesidade. Emagrecimento. Inteligência Emocional.

THE TRIPOD OF SLIMMING: EMOTIONAL INTELLIGENCE, SPORTS PRACTICE AND FOOD NUTRITION

ABSTRACT:

Obesity is a reality among people around the world and is present at different scales in all existing nations. Social and behavioral issues such as each country's characteristic culture and lifestyle interfere with lower or higher obesity rates. Therefore, the search for weight

⁴⁸ Psicanalista Clínico, Jornalista, Coach e Advogado, foi responsável pela maior negociação Trabalhista do Brasil, é mestre em Psicanálise. Pós-Graduado em Direito Material e Processual do Trabalho, em Administração de Conflito e Gestão Empresarial, em inteligência múltiplas e mind fullness e em Big Data (Ciência dos Dados), Master Coach Executivo e de Negócios, com formação Profissional em Wellness & Health, Global Coach Certification®, Leader Coach, Trainer de Analistas Comportamentais, e membro do Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica e da ABRAPCoaching. É Especialista em Inteligência Emocional. Atua também como palestrante, facilitador de programas de desenvolvimento de líderes, programas de inteligência emocional, tomada de decisão, consultor empresarial de reestruturação organizacional, implementação de políticas, procedimento de pessoas, transição de carreira e implantação de sistemas de compliance e jurimetria. E-mail: renatodslisboa@gmail.com

loss is still very old, the amount of information available on the subject causes great confusion and often causes people to follow wrong attitudes and make their weight loss process difficult. Over the years several methodologies have been developed in search of the perfect body, from restrictive diets to evasive surgeries. However, the path to healthy and definitive weight loss lies in the complete overhaul of the limiting ideologies, behaviors and beliefs of the individual concerned. The general objective of the article in question is to demonstrate how emotional intelligence can be the key to healthy weight loss combined with the other fundamental concepts: sports practice and correct food nutrition. The chosen methodology refers to the literature review and was able to direct the conclusion that shallow and immediate solutions only lead to short-term weight loss, and it is necessary that the individual's emotional intelligence be developed through psychoanalysis techniques, brain reprogramming, habits. , in others.

KEYWORDS: Obesity. Weight loss. Emotional intelligence.

INTRODUÇÃO

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2018) um em cada oito adultos em todo o planeta é obeso. A projeção é de que, em 2025, cerca de 2,3 bilhões de indivíduos estejam com excesso de peso, sendo mais de 700 milhões com obesidade. Já o número de crianças com sobrepeso e obesidade pode chegar a 75 milhões, caso nada seja feito – incluindo 427 mil crianças com pré-diabetes, 1 milhão com hipertensão arterial e 1,4 milhão com aumento do acúmulo de gordura no fígado.

Apesar de a obesidade ser uma realidade entre os brasileiros, a mesma não é vista com comodismo, na maioria dos casos. A luta em busca da diminuição do peso e o retorno para um corpo dentro dos padrões recomendados é muito recorrente. Porém, é muito comum que as pessoas não saibam a forma correta de buscar esse emagrecimento e acabam escolhendo tomar atitudes e fazer uso de técnicas que não são favoráveis ao seu objetivo

Entretanto, é preciso pontuar o quanto o advento que corresponde a revolução tecnológica causou grandes impactos nesse meio. Isso porque a internet facilita o acesso a informações, bem como também facilita a postagem de informações para qualquer pessoa e em qualquer lugar do mundo. O fim de boa parte das limitações causadas pela distância física entre as pessoas alterou diversos tipos de interação humana.

Hoje, uma pessoa pode ter acesso a diversas formas de emagrecer, inúmeras dietas e muitos tipos diferentes de treinamentos físicos. Porém, em uma maioria esmagadora dos casos, essas informações não derivam de estudos científicos e não tiveram sua aplicabilidade testada em uma quantidade satisfatória de organismos diferentes para que possa de fato ser considerada adequada para ser seguida.

Por isso, é de extrema importância que se realizem estudos com base acadêmica e através de comprovação científica sobre esse tema que é de tanto interesse social e medicinal. É preciso garantir também que essa informação chegue a uma boa parte da população e que se instaure o costume de sempre procurar saber a procedência das informações recebidas antes de iniciar processos que podem ser prejudiciais à saúde de forma até mesmo irreversível.

O emagrecimento se trata de um processo e deve ser visto como tal, bem como exige dos indivíduos um conjunto de habilidades que não estão ligadas apenas a parte física como também a mente e o estado emocional dos mesmos. Logo, para que o processo de emagrecimento ocorra de modo saudável e possa ser duradouro, é preciso que a inteligência emocional dessa pessoa esteja fortalecida para que assim ela possa colocar em prática as atividades físicas e a nutrição alimentar necessárias ao processo.

O objetivo geral do presente trabalho é apresentar a inteligência emocional como o caminho para o tripé do emagrecimento que consiste no fortalecimento da mente, rotina de exercícios físicos e nutrição alimentar. Os objetivos específicos consistem em pontuar a problemática do sobrepeso, a necessidade de atividades físicas e alimentação correta, e o uso de técnicas de psicanálise e reprogramação cerebral com foco no emagrecimento saudável.

A metodologia escolhida para o desenvolvimento deste trabalho é descritiva e qualitativa e faz parte da classe das pesquisas bibliográficas. Bem como se apresentam todos os estudos caracterizados como revisões, este estudo foi elaborado através de uma pesquisa bibliográfica sobre o tema. Realizando a leitura, seleção e compreensão dos materiais acadêmicos encontrados nas plataformas como Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Literatura Latino-americana em Ciências da Saúde (LILACS) e Public Medine or Publisher Medine (PUBMED), nos idiomas português e inglês.

OBESIDADE: BREVE CONTEXTO

A obesidade se tornou um caso de saúde pública nos últimos 30 anos, isso porque pela primeira vez na história da humanidade morrem mais pessoas devido a complicações causadas pela obesidade, do que por desnutrição. O problema se agrava mais ainda quando analisamos os fatos apresentados por Dias (2017), onde se constata que a obesidade vem aumentando seus níveis em todas as faixas etárias e em pessoas do sexo masculino e feminino, sendo ainda mais presente em pessoas com menor poder aquisitivo.

Muitos são os fatores envolvidos nesse aumento nas taxas de obesidade no Brasil, a má alimentação, a constante pressão para executar todas as funções do dia a dia e o ato de colocar a saúde financeira acima da saúde física podem ser descritos como as maiores causas dessa realidade. Para a Organização Mundial de Saúde, a obesidade é uma das maiores doenças do século XXI e os fatores socioculturais seguem fazendo com que essas taxas cresçam ainda mais (OMS, 2018).

Por ser uma doença que deriva também de atos exercidos em sociedade e até mesmo culturais, é obrigação do Estado desenvolver intervenções médicas que visem a disseminação de informações que conscientizem as pessoas sobre os riscos da obesidade em longo prazo. O ato de consumir alimentos orgânicos, menos industrializados, evitar frituras, doces sortidos e bebidas gasosas devem ser incentivados nas escolas, empresas e em todos os centros de grande acesso populacional (DANTAS, 2015).

É importante salientar que apesar de ser uma doença, a obesidade não deve ser tratada através de remédios e sim por meio de uma completa mudança de vida e de pensamentos. Obviamente, as demais anormalidades biológicas causadas pelo sobrepeso como a diabetes, pressão alta, problemas de articulações, dentro outros devem ser tratados através de remédios. Segundo Bertuol e Navarro (2015) a adoção de uma alimentação saudável e balanceada, rica em alimentos naturais e prática diária de exercícios físicos são atitudes que viabilizam o tratamento da obesidade e resultam no emagrecimento.

Sendo assim, no que diz respeito à alimentação, é de suma importância que o indivíduo procure a ajuda profissional especializada de um nutricionista, nutrólogo ou endocrinologista. Para que esse paciente possa ser submetido aos exames necessários que

irão apresentar em que situação está a sua saúde e após isso definir as metodologias de ação para a reabilitação de uma boa qualidade de vida (DANTAS, 2015).

Para Dantas (2015) a frequente prática de exercícios físicos é o que define uma boa parte dos resultados de combate à obesidade e suas consequências, logo é preciso que esse paciente também procure um profissional especializado em séries de exercícios físicos que promovam a perda de gordura corpórea de forma saudável e respeitosa frente as suas limitações individuais.

O emagrecimento é um dos assuntos mais estudado e comentado em todos os meios relacionados à qualidade de vida, por isso existe uma infinidade gigantesca de conteúdos que tratam sobre o assunto. Porém, muitos deles não passam informações corretas e saudáveis sobre o ato de emagrecer e isso ocorre porque os autores de tais indicações não são munidos dos conhecimentos necessários para tratar de assuntos tão sérios (VIANA et. al, 2017).

Segundo Albuquerque (2016) as metodologias de treinamento físico devem ser elaboradas pelo profissional de acordo com as necessidades físicas e as limitações biológicas do paciente. Associações simples podem ser analisadas a partir disso, por exemplo: obviamente uma pessoa obesa precisa executar exercícios aeróbicos para iniciar seu processo de emagrecimento, porém esse paciente não pode ser submetido a longas e intensas corridas. Assim, se faz necessário a observação desses dois pontos para formular o tipo de treinamento físico que será utilizado com o paciente em questão.

Apesar da grande quantidade de informação, é possível separar essas técnicas de treinamento com foco em emagrecimento em dois grandes grupos: treinamentos contínuos e treinamentos intervalados. Ambos podem ser usados como base da construção do treino físico de todas as pessoas, sendo elas obesas ou não. Porém, no caso de indivíduos com excesso de peso corpóreo, há um tipo de treinamento mais indicado por apresentar melhores resultados (ALBUQUERQUE, 2016).

O primeiro passo a ser alcançado através dos exercícios físicos é a resistência física, isso porque pessoas que possuem um estilo de vida sedentário aliada ao sobrepeso corpóreo resulta em uma grande deficiência de resistência física. A definição mais ampla de resistência física é como sendo a tolerância à intensidade e duração de todos os tipos

de exercícios físicos, no início de um plano de melhora física, essa resistência precisa ser trabalhada para que assim os treinos possam fluir da maneira correta (SPAGNOL, 2015).

A autora - Spagnol (2015) - enfatiza ainda que cabe ao profissional qualificado e licenciado, analisar o estilo de vida, o estado de saúde e as preferências de seu paciente, para que assim seja elaborado o melhor treino possível. Através da aplicação de uma metodologia de treinamento físico adequada ao biotipo de cada paciente, traz os resultados desejados em um menor período de tempo e de forma saudável.

Porém, nem todos os indivíduos conseguem emagrecer através de exercícios físicos e alimentação regrada, para Corrêa et. al. (2017) muitas são as causas para que não haja o emagrecimento esperado através das mudanças de hábitos propostas. Alguns pacientes são impossibilitados de realizar atividades físicas ou são portadores de alguma patologia que não permite a perda das calorias mediante o estímulo dado pela dieta e pelos exercícios.

Sendo assim, a cirurgia bariátrica se torna uma opção viável para esses pacientes que não conseguem diminuir o seu peso de outras formas menos evasivas. Entretanto, mesmo que o processo cirúrgico de uma bariátrica consista em reduzir o estômago, não é considerado um método irreversível no que se refere ao peso do paciente, já que o mesmo pode voltar a engordar durante sua vida (FLOR, 2015).

A obesidade pode acarretar uma perda considerável na capacidade física dos pacientes, isso porque o sobrepeso afeta a locomoção e a resistência dos indivíduos. Dessa forma, é extremamente comum que a obesidade esteja diretamente associada ao sedentarismo (SANTOS; RIBEIRO, 2016). Mesmo após a realização da cirurgia bariátrica, o paciente continua com a sua capacidade física limitada e a alteração dessa realidade consiste em um longo e assistido processo.

CAPACIDADE FÍSICA DOS INDIVÍDUOS E A PROBLEMÁTICA DO SEDENTARISMO

Segundo Santos e Ribeiro (2016) a definição correta de capacidade física seria as características pontuais e singulares de cada indivíduo em relação com o seu corpo físico,

ou seja, as habilidades que possui em realizar atividades e exercícios físicos. Essas capacidades físicas são divididas em grupos, sendo eles: velocidade, resistência, equilíbrio, força e flexibilidade.

Determinados esportes ou exercícios físicos dependem dessas capacidades físicas para serem executados da maneira correta, o atletismo, por exemplo, exige que seu praticante esteja munido de capacidades físicas relacionadas a velocidade, força e resistência.

É importante ressaltar também que essas capacidades físicas não podem ser relacionadas a dons que já nascem com os indivíduos, se trata de muito treino e aperfeiçoamento. Ou seja, é preciso que o indivíduo faça exercícios ou pratique esportes de forma regular para que consiga se aprimorar e dominar as capacidades físicas que deseja (SANTOS; RIBEIRO, 2016).

O sedentarismo vem se tornando um caso de saúde pública, tal afirmação se valida pelo fato de que a adoção de um estilo de vida sedentário é extremamente prejudicial à saúde do indivíduo e contribui para o acúmulo de gordura, sobrepeso, obesidade e doenças cardiovasculares (FLOR, 2015).

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), um a cada quatro adultos são considerados sedentários e relatam não realizar nenhum tipo de atividade física durante a sua rotina. Isso inclui também atividades simples como descer e subir escadas, percorrer pequenas distâncias a pé ou até mesmo dançar nos fins de semana. Para Flor (2015) esses dados estão diretamente relacionados ao aumento dos índices de obesidade e sobrepeso já supracitados neste artigo.

No ano de 2018, a OMS publicou outro relatório que apresenta dados alarmantes: a América Latina é a região que concentra a maior quantidade de pessoas sedentárias no mundo, chegando a quase 40% da população total. O critério utilizado para nortear a pesquisa consiste em saber se as pessoas praticam exercícios físicos suficientes para serem consideradas saudáveis e o Brasil é o país da América Latina que menos atende a esse critério, ou seja, que concentra a maior população sedentária da região. O relatório mostra que 47% dos brasileiros não realizam nenhum tipo de atividade física durante o dia e segue ostentando hábitos não saudáveis e ingerindo alimentos sem valor nutricional.

O sedentarismo e hábitos alimentares errados correspondem à combinação mais prejudicial à saúde dos indivíduos e quando mantidos em longo prazo podem resultar na degradação da saúde do indivíduo, obesidade e doenças cardiovasculares graves. Sendo assim, os pacientes chegam a um nível onde a recomendação passa ser a intervenção cirúrgica: a bariátrica. Para que seja possível a prática de exercícios físicos e um período sem a ingestão de alimentos ricos em gorduras e pobres em nutrientes.

O ESTADO EMOCIONAL DEBILITADO E O DESENVOLVIMENTO DE COMPULSÕES ALIMENTARES

A Compulsão alimentar faz parte de um conjunto de transtornos chamados de “Transtornos do Comportamento Alimentar”. Os Transtornos do Comportamento Alimentar (TCA) são doenças mentais graves, marcadas por alterações no comportamento e atitudes relacionadas à ingestão de alimentos e pela intensa preocupação com o peso ou a forma do corpo. De acordo com o DSM-V (APA, 2015) os transtornos alimentares são caracterizados por uma perturbação persistente na alimentação ou no comportamento relacionado à alimentação que resulta no consumo ou na absorção alterada de alimentos e que compromete significativamente a saúde física ou o funcionamento psicossocial.

Destaca-se que, a obesidade não está incluída no DSM-V como um transtorno mental. A obesidade (excesso de gordura corporal) resulta do excesso prolongado de ingestão energética em relação ao gasto energético. Uma gama de fatores genéticos, fisiológicos, comportamentais e ambientais que variam entre os indivíduos contribui para o desenvolvimento da obesidade; dessa forma, não é considerada um transtorno (SOUZA; PESSA, 2016).

Como bem colocam Souza e Pessa (2016), existem associações robustas entre obesidade e uma série de transtornos mentais (p. ex., transtorno de compulsão alimentar, transtornos depressivos e bipolares, esquizofrenia). Os efeitos colaterais de alguns medicamentos psicotrópicos contribuem de maneira importante para o desenvolvimento da obesidade, e esta pode ser um fator de risco para o desenvolvimento de alguns transtornos mentais (p. ex., transtornos depressivos).

Segundo o Instituto Nacional da Saúde Mental, o TCA corresponde a uma doença que causa graves perturbações em sua dieta diária, tais como comer quantidades muito pequenas ou comer em excesso. Uma pessoa que tem um transtorno da alimentação pode ter começado por comer pequenas ou grandes quantidades de comida, mas o impulso de comer mais ou menos em algum momento disparou ficando fora de controle. Angústia severa ou preocupação pela forma ou peso do corpo também se podem caracterizar como um transtorno da alimentação (FORTES, 2015).

Os TA surgem com maior frequência durante a infância e adolescência. Segundo Fortes (2015) podemos dividir as alterações do comportamento alimentar neste período em dois grupos; primeiramente, aqueles transtornos que ocorrem precocemente na infância e que representam alterações da relação da criança com a alimentação.

Estas condições parecem não estar associadas a uma preocupação excessiva com o peso ou a imagem corporal. Aqui geralmente a criança desenvolve: o transtorno da alimentação na primeira infância, que leva ao emagrecimento e a dificuldade em ganhar peso corporal; a pica, ingestão de substâncias não nutritivas, como terra e alimentos crus; ou o transtorno da ruminação, episódios de remastigação da comida que não possui uma causa médica.

O segundo grupo de transtornos tem o seu aparecimento mais tardio e é constituído pelos TA propriamente ditos; a anorexia nervosa (AN), bulimia nervosa (BN), a compulsão alimentar (CA) e o distúrbio de distorção de imagem.

De especial interesse para os profissionais envolvidos com o atendimento de crianças e adolescentes são a anorexia e bulimia nervosa e a categoria diagnóstica denominada transtorno da compulsão alimentar (TCA). Neste contexto, o indivíduo possui muito interesse na temática da alimentação (embora tente evitá-la de alguma maneira) e muita preocupação com o ganho de peso e com sua imagem corporal.

Para Westmoreland et. al. (2016) postulam no seu artigo entre as doenças de etiologia desconhecida que se inter-relacionam estão a anorexia nervosa (AN) e a bulimia nervosa (BN). Ambas caracterizadas por padrões anormais de comportamento alimentar e controle de peso e por percepções alteradas sobre o próprio peso e corpo.

O Transtorno da Compulsão Alimentar (TCA) é uma nova entidade no DSM-V (2015) criada para responder às evidências empíricas que apontavam para sua existência, e que explica o comportamento alimentar das pessoas que não conseguem controlar o consumo de alimentos, que ingerem grande quantidade de alimentos em um período discreto de tempo, mas depois não realizam manobras como provocar vômitos para reduzir os efeitos do excesso de comida.

Segundo os parâmetros divulgados pelo CID (2018) os critérios diagnósticos do DSM-V (DSM-V (2015) para o TCA são:

A - Episódios de compulsão recorrentes. Um episódio de compulsão é caracterizado pelos seguintes dois eventos:

1- Ingestão, em um determinado período (por exemplo, dentro de qualquer período de duas horas), de uma quantidade de alimentos claramente superior ao que a maioria das pessoas ingeriria em um período similar em circunstâncias semelhantes.

2- Sentimentos de falta de controle sobre o que é ingerido durante o episódio (por exemplo, sensação de que você não pode parar de comer ou controlar o que é engolido ou a quantidade do que é engolido).

B - Os episódios de compulsão estão associados a três (ou mais) dos seguintes eventos:

1- Come muito mais rapidamente do que o habitual.

2- Come até se sentir desagradavelmente satisfeito.

3- Come grandes quantidades de comida quando não se sentir fisicamente com fome.

4- Come sozinho devido à vergonha sentida pela quantidade engolida.

5- Sentir-se deprimido ou muito envergonhado consigo mesmo.

C- Desconforto intenso com os episódios de compulsão alimentar.

D- A compulsão alimentar ocorre, em média, pelo menos uma vez por semana durante três meses.

E- A compulsão não está associada à presença recorrente de comportamento compensatório inadequado como na bulimia nervosa e não ocorre exclusivamente no curso da bulimia nervosa ou anorexia nervosa (CID, 2018, p. 25).

Especifique se também que: a) em remissão parcial: depois de ter atendido todos os critérios para a compulsão alimentar de antemão, a compulsão alimentar ocorre com uma frequência média inferior a um episódio semanal durante um período contínuo; b) em remissão total: depois de ter cumprido todos os critérios para compulsão alimentar antes, nenhum dos critérios foram atendidos durante um período contínuo.

O presente manual orienta o profissional a especificar a gravidade atual: suave, moderada, séria ou extrema de acordo com o Índice de Massa Corporal (IMC) para a faixa etária.

A CID-18 (2018) não inclui o TCA no capítulo Transtornos Comportamentais associados a disfunções fisiológicas e fatores somáticos, embora inclua Hiperfagia em outros transtornos psicológicos, que descreve como ingestão excessiva como reação a eventos estressantes (luto, acidentes, intervenções eventos cirúrgicos e emocionalmente estressantes) e que leva à obesidade. Esta descrição está muito longe da descrição feita pelo DSM, mas é a mais semelhante ao TCA.

Os critérios da CID-18 (2018) para hiperfagia em outros transtornos psicológicos:

A - ingestão excessiva como uma reação a eventos estressantes e que leva à obesidade. Duelos, acidentes, intervenções cirúrgicas e eventos emocionalmente estressantes podem levar à "obesidade reativa", especialmente em pacientes predispostos ao ganho de peso.

B - Obesidade como causa de alterações psicológicas não deve ser codificada aqui. A obesidade pode fazer com que o paciente se sinta muito sensibilizado sobre sua aparência e desencadeie uma falta de confiança nas relações interpessoais.

C - A avaliação subjetiva das dimensões corporais pode ser exagerada (CID, 2018, p. 27).

Dessa forma, se torna necessário que os pais, responsáveis legais e todo e qualquer indivíduo que tenha contato direto com esse indivíduo esteja atento a todas as situações, comportamentos e ações executadas pelos mesmos, que levem a crer que estejam desenvolvendo distúrbios alimentares, como a compulsão alimentar, tratada no presente trabalho. Iniciando assim um tratamento psicológico e médico adequado para que esse adolescente volte a ser saudável e ter sua qualidade de vida.

A diversidade humana se aplica a todos os contextos e a todos os indivíduos humanos, isso é cada pessoa pode e costuma reagir de diferentes maneiras frente a determinadas situações. A Compulsão Alimentar deve ser diagnosticada através de uma bateria de exames e análises comportamentais e psicológicas que devem ser realizadas por especialistas na área, quanto mais cedo o diagnóstico for passado, mais rápido e mais eficaz é o tratamento.

A problemática que envolve a relação do indivíduo com distúrbio alimentar com a sua família começa já no recebimento da confirmação da existência do transtorno: o diagnóstico final que classifica o jovem como um compulsivo alimentar. Por ser um transtorno que afeta a parte cognitiva e em casos mais leves não apresenta sintomas físicos tão visíveis, é muito comum que pais e responsáveis legais desacreditem da existência da condição que afeta seus filhos (MELEK; MAIA, 2017).

É preciso que se compreenda que existe uma quebra de planos, ideias e certezas dos pais no momento em que o diagnóstico é confirmado. Isso porque os mesmos, assim como todas as famílias, haviam se planejado para darem a luz e criarem um filho que não apresentasse nenhum problema de saúde ou limitação social.

Segundo Melek e Maia (2017) é como se aquele filho imaginado pelos pais fosse embora após o diagnóstico, e os pais precisam conhecer, aprender a lidar e desenvolver uma relação de afeto com aquele novo indivíduo que se encontra com distúrbios alimentares. Isso faz com que o primeiro desafio desse paciente seja a inclusão dentro de sua própria casa e a aceitação de seus próprios familiares.

Segundo Cobelo (2019) o apoio familiar é fundamental para o desenvolvimento do tratamento do paciente com distúrbios alimentares, isso porque o convívio familiar pode ser o maior contato social na vida daquele indivíduo. Nessa etapa da adolescência, onde o diagnóstico ainda é uma novidade, é o momento onde o paciente toma consciência de que suas práticas não são saudáveis e que se encontra doente, sendo necessário que refaça todas as suas ideias de saúde e beleza.

Caso essa fase de reconhecimento, ainda no seio da família, seja conflituoso ou não consiga apresentar evolução, pode causar grandes atrasos no desenvolvimento social, emocional e físico desse indivíduo com distúrbios alimentares. Fazendo com que a construção de laços e a socialização fora de casa sejam ainda mais complicadas e traumáticas, dificultando a evolução do tratamento e a ressignificação do seu corpo e do ato de comer (COBELO, 2019).

Porém, existem ainda casos onde o desenvolvimento de compulsão alimentar e demais transtornos do gênero, são incentivados e motivados pelas famílias. Existem uma

série de fatores que são nocivos para indivíduos que estão em processo de desenvolvimento ou são mais suscetíveis a distúrbios relacionados à alimentação.

Os fatores familiares estão associados à reprodução dos padrões de beleza, ou seja, a exclusão e a perseguição de um indivíduo da família que não segue, e não se esforça para seguir, os padrões de beleza impostos. Leonidas e Santos (2015) colocam que esses fatores são ainda mais extensos para meninas em idade de desenvolvimento com suas mães ou familiares próximas de sexo feminino.

Logo, é possível dizer que esses fatores estão altamente associados à ideia de posse, construída e empregada sobre as crianças e adolescentes ao longo das gerações, por parte de seus pais, responsáveis e da sociedade de forma geral. Essa ideologia coloca que esses indivíduos são posse de seus progenitores, e é construída de acordo com a forma como a criança e o adolescente eram vistos pela sociedade.

Sendo assim, é preciso que os pais ou responsáveis legais desse indivíduo, bem como todos aqueles sujeitos que fazem parte da família e do círculo social direto, não reproduzam padrões de beleza inalcançáveis e nem pressionem esses adolescentes para utilizarem seus corpos como um objeto a ser moldado. Apenas dessa forma ocorre a prevenção do desenvolvimento da compulsão alimentar e de outros distúrbios, da mesma forma que essa mudança de comportamento também pode ajudar no tratamento de pacientes já diagnosticados.

O DESENVOLVIMENTO DA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL EM BUSCA DO EMAGRECIMENTO SAUDÁVEL

Apesar de os seres humanos serem categorizados como racionais, ainda contam com uma infinidade de emoções que são extremamente complexas e que podem motivar a execução de ações que nem sempre são benéficas para si e para aqueles que convivem com os mesmos.

Em busca de controlar essa situação, a inteligência emocional é um conceito desenvolvido dentro da psicologia que tem por definição o ensinamento da forma correta e saudável de lidar com as emoções. Como bem explica Shim (2018), a inteligência

emocional não consiste no silenciamento de emoções, mas sim no desenvolvimento do controle das mesmas a fim de usá-las com objetivos individuais e coletivos benéficos.

Quando fortalecida, a inteligência emocional traz diversos benefícios para os indivíduos. Não apenas no tratamento de sofrimentos emocionais já consolidados, como também na prevenção do desenvolvimento de transtornos, distúrbios e até doenças psicológicas de natureza emocional. De modo que a convivência e a socialização são facilitadas através do autoconhecimento e da compreensão das sensações e emoções vividas por terceiros (SHIM, 2018).

Apesar das emoções serem completamente naturais à existência humana, muitas vezes não há um direcionamento correto da forma como essas emoções devem ser conduzidas. Para Goleman (2015) a maioria das pessoas que não desenvolvem a inteligência emocional passa a desenvolver uma valorização constante de emoções negativas e tóxicas ao seu desenvolvimento pessoal, profissional e até mesmo de suas relações sociais.

O foco da inteligência emocional é ajudar o indivíduo a controlar suas emoções e fazer com que as mesmas sejam utilizadas para que possa usar essa energia para atividades positivas e que promovam sua evolução em todos os aspectos de sua vida, incluindo o emagrecimento.

Farah e Castanho (2018) colocam que a psicanálise pode ser fundamental para a busca do desenvolvimento da inteligência emocional, inclusive quando o foco for o emagrecimento. Tal realidade se deve ao fato de que as sessões de psicanálise, quando aplicadas da forma correta, são capazes de fazer com que o paciente se conheça melhor, compreenda suas emoções, a origem de seus traumas e a construção dos seus comportamentos alimentares irregulares e incorretos.

Como já supracitado, o emagrecimento é um processo que exige muito esforço e habilidades diversas em todas as áreas de ação do indivíduo. A mente pode ser colocada como o ponto chave para o sucesso desse processo, visto que é através de seus comandos que ocorre a ingestão incorreta de alimentos bem como o desenvolvimento do sedentarismo.

Para Farah (2019) a psicanálise pode auxiliar o paciente na reprogramação das suas atividades cerebrais, na reformulação dos seus hábitos fazendo uso de técnicas como a hipnoterapia. Através da compreensão dos seus traumas e crenças limitantes, sanando-as por meio do desenvolvimento da inteligência emocional. Logo, o emagrecimento saudável passa a ser o resultado da reformulação completa dos hábitos alimentares e do combate ao sedentarismo com a realização de atividades físicas diárias.

METODOLOGIA

O presente artigo faz jus a uma metodologia exploratória, que segundo o autor Severino (2017, pg. 41), “Estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses”. Destaca ainda, o envolvimento do levantamento bibliográfico, traz a relevância que a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos (SEVERINO, 2017).

Diante a essas especificações o presente estudo desenvolvido é de natureza qualitativa e descritiva, e também foi utilizado em pesquisas bibliográficas. A base dos dados utilizados foi encontrada e retirada de plataformas para pesquisas acadêmicas como ScientificElectronic Library Oline (SCIELO), Literatura Latino-americana em Ciências da Saúde (LILACS) e Google Acadêmico, nos idiomas português e inglês.

O período de elaboração deste estudo iniciou-se em dezembro de 2019 com conclusão em janeiro de 2020. Foram utilizados para o desenvolvimento do presente estudo, descritores de pesquisa, sendo eles em português: Compulsão Alimentar, Obesidade, Inteligência Emocional; Comportamento Alimentar, Atividades Físicas, Psicanálise. Foram selecionados e revisados artigos que apresentassem relação com os descritores escolhidos, realizando a seleção e compreensão de informações importantes contidas em cada artigo.

O estudo foi organizado na seguinte sequência: em um primeiro momento se fez necessário a análise de artigos originais obedecendo aos descritores propostos, fazendo combinações com operadores como and, al not utilizando palavras chaves do tema, usando os filtros: base de dados, idiomas, ano de publicação e tipo de documentos. Já em

um segundo momento foi selecionado artigos através de leitura do resumo verificando assim aqueles com maior relevância para o estudo aqui apresentado, sendo excluídos os que fugiam da temática proposta e considerando os critérios de exclusão. Por fim, todos os artigos selecionados passaram por uma leitura e tradução na íntegra para determinar sua legibilidade, assim feito análise dos mesmos de forma criteriosa para a extração dos dados.

Os critérios de inclusão adotados consistem em artigos acadêmicos reconhecidos, que tenham sido escritos entre os anos de 2000 a 2019, nos idiomas inglês e português, e que tratem da inteligência emocional desenvolvida como o caminho para o emagrecimento saudável e concreto.

Foram excluídos dos referenciais bibliográficos aqueles artigos que não sejam academicamente reconhecidos, produzidos e publicados fora do período mencionado ou que estejam em outro idioma além dos supracitados. Os dados recolhidos através das pesquisas bibliográficas realizadas nas plataformas de artigos acadêmicos foram criteriosamente analisados e compreendidos para que fosse viabilizada a produção do presente trabalho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mediante o conhecimento adquirido para que fosse viabilizada a produção textual do presente trabalho é possível concluir que a obesidade é um problema de saúde pública e extremamente silenciado em muitos âmbitos da sociedade. É preciso que o combate à incidência da obesidade seja uma prioridade para o Estado e que campanhas de conscientização e de incentivo ao esporte sejam adotadas.

É de suma importância que haja a plena compreensão de que medidas imediatistas e prejudiciais à saúde como dietas extremamente restritivas, cirurgias evasivas e desnecessárias ou o uso de medicamentos não regulamentados e prescritos, não correspondem ao caminho correto para o emagrecimento saudável e duradouro.

O desenvolvimento da inteligência emocional, através da psicanálise e da reprogramação cerebral, são formas adequadas para se atingir o emagrecimento pleno e saudável por meio da alimentação balanceada e da prática de atividades físicas regulares.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, Lusyanny Parente et al. **Relação da obesidade com o comportamento alimentar e o estilo de vida de escolares brasileiros**. Nutrición clínica y dietética hospitalaria, v. 36, n. 1, p. 17-23, 2016.

BERTUOL, Camila Dias; NAVARRO, Antonio Coppi. Consumo Alimentar e prevalência de obesidade/emagrecimento em pré-escolares de uma escola infantil pública. **RBONE-Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento**, v. 9, n. 52, p. 127-134, 2015.

COBELO, Alicia Weisz. **A importância da inclusão da família no tratamento multidisciplinar dos transtornos alimentares na infância e adolescência**. Transtornos alimentares na infância e na adolescência: Uma visão multidisciplinar, 2019.

CORRÊA, Janaína Domingues et al. **Associação entre dislipidemia, dados sociodemográficos, hábitos sedentários e alimentação inadequada em escolares do sul do Brasil**. Cinergis, v. 18, n. 2, p. 146-150, 2017.

DANTAS, Estélio Henrique Martins. **Obesidade e emagrecimento**. 2015.

DIAS, Patricia Camacho. Obesidade e políticas públicas: concepções e estratégias adotadas pelo governo brasileiro. **Cadernos de Saúde Pública**, Universidade Federal Fluminense. Rio de Janeiro, 2017.

FARAH, Juliana Ferreira Santos. Emagrecer é uma barra (de chocolate): a psicanálise de grupo no tratamento de pacientes com queixas em relação a sobrepeso e obesidade. 2019. **Tese de Doutorado**. Universidade de São Paulo.

FARAH, Juliana Ferreira Santos; CASTANHO, Pablo. Dimensões psíquicas do emagrecimento: por uma compreensão psicanalítica da compulsão alimentar. **Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental**, v. 21, n. 1, p. 41-57, 2018.

FLOR, Luísa Sorio et al. Carga de diabetes no Brasil: fração atribuível ao sobrepeso, obesidade e excesso de peso. *Revista de Saúde Pública*, v. 49, p. 1-10, 2015.

FORTES, Leonardo de Sousa et al. Autoestima, insatisfação corporal e internalização do ideal de magreza influenciam os comportamentos de risco para transtornos alimentares?. **Revista de Nutrição**, v. 28, n. 3, p. 253-264, 2015.

GOLEMAN, Daniel. **Liderança: a inteligência emocional na formação do líder de sucesso**. Objetiva, 2015.

LEONIDAS, Carolina; SANTOS, Manoel Antônio. **Relações familiares nos transtornos alimentares: o Genograma como instrumento de investigação**. Ciência & Saúde Coletiva, v. 20, n. 5, p. 1435-1447, 2015.

MELEK, Kátia; DE ORNELAS MAIA, Ana Claudia C. Os transtornos alimentares: causas e tratamento numa visão multidisciplinar. **Cadernos UniFOA**, v. 3, n. 1 (Esp.), p. 21-38, 2017.

RAMOS, Fábio Pestana. Liderança e inteligência emocional no contexto da gestão de pessoas: um estudo de caso através do filme 'Mestre dos mares'. **Revista de Ciências Gerenciais**, v. 14, n. 20, 2015.

SANTOS, Zilda Aparecida; RIBEIRO, Ronaldo. Efeito do exercício físico na melhora do grau de flexibilidade na articulação dos joelhos em obesos exercitados comparados com obesos sedentários. **RBONE-Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento**, v. 10, n. 55, p. 20-24, 2016.

SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do trabalho científico**. Cortez editora, 2017.

SHIM, Samuel L. **Longevidade saudável demanda inteligência**. Nelpa, 2018.

SOUZA, Ana Paula Leme de; PESSA, Rosane Pilot. **Tratamento dos transtornos alimentares: fatores associados ao abandono**. Jornal Brasileiro de Psiquiatria, v. 65, n. 1, p. 60-67, 2016.

SPAGNOL, Gabriela Ornelas. Efeito do treinamento de caminhada após oito semanas de intervenção com uso do suplemento alimentar ácido alfa lipoico em sedentários obesos. **RBNE-Revista Brasileira de Nutrição Esportiva**, v. 9, n. 49, p. 84-90, 2015.

VIANA, Helena Brandão; SANTOS, Elisa Gomes de Carvalho; MONTEIRO, Olga Bouchard. Imagem corporal, perfil lipídico e nível de atividade física de mulheres em projeto de emagrecimento. **Revista Ciência & Saúde Coletiva**, v. 21, n. 1, p. 51-58, 2017.

WESTMORELAND, Patricia; KRANTZ, Mori J .; MEHLER, Philip S. **Complicações médicas de anorexia nervosa e bulimia**. The American journal of medicine , v. 129, n. 1, p. 30-37, 2016.

CAPÍTULO XIII

PERCEPÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E CAPACIDADE FUNCIONAL EM PACIENTES COM DOENÇA RENAL CRÔNICA SUBMETIDOS À HEMODIÁLISE

Ywia Danieli Valadares⁴⁹; Wander Valadares de Oliveira Júnior⁵⁰;
Thays Santos Mendonça⁵¹; Hiago Antônio de Paula Coutinho⁵²;
Luana Aparecida Astéria de Oliveira⁵³; Maria Santa Azevêdo⁵⁴;
Stella Marina Silva Azevedo Araújo⁵⁵.
DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2021.02-13

RESUMO:

Introdução: A doença renal crônica (DRC) é definida como a presença de lesões que resultam em perda lenta, progressiva e irreversível das funções renais, o que apresenta grande impacto negativo na qualidade de vida dos indivíduos acometidos e gera limitações físicas e psicológicas. O tratamento hemodialítico tem como objetivo atenuar os sintomas provocados pelo mau funcionamento renal e proporcionar uma melhor qualidade de vida. **Métodos:** Trata-se de um estudo observacional do tipo transversal, por meio da aplicação da Escala de Lawton que avaliou a capacidade funcional e do questionário KDQOL-SF 36 que avaliou a percepção da qualidade de vida, em pacientes renais crônicos submetidos à hemodiálise no município de Bom Despacho-MG. **Resultados:** Os 59 pacientes incluídos no estudo, tinham idade entre 22 e 77 anos com média entre $54,93 \pm 13,67$ anos. 35 (59,3%) eram do sexo masculino e 24 (40,7%) do sexo feminino. Houve correlação da capacidade funcional com o funcionamento físico, ($r=0,570$ $p=0,000$), da capacidade funcional com a função sexual, ($r=0,613$ $p=0,012$), do domínio efeitos da doença com energia/fadiga ($r=0,631$ $p=0,002$), da energia/fadiga com funcionamento físico, ($r=0,487$ $p=0,000$) e por fim na saúde geral com tempo de tratamento ($r=0,301$ $p=0,021$). **Conclusão:** Conclui-se que pacientes renais crônicos submetidos à hemodiálise na cidade de Bom Despacho-MG, apresentam modificações significativas da sua capacidade funcional e na sua qualidade de vida. Porém, após a análise dos dados obtidos dos questionários foi possível perceber que a percepção dos

⁴⁹Professora do curso de fisioterapia do Centro Universitário Una Bom Despacho; <http://lattes.cnpq.br/0336861515307402>; Orcid: 0000-0003-4124-6309. E-mail: ywiaval@hotmail.com

⁵⁰Professor do curso de farmácia do Centro Universitário Una Bom Despacho; <http://lattes.cnpq.br/9468657933259765>; Orcid: 0000-0001-9784-918. E-mail: wandervjunior@gmail.com

⁵¹Professora do curso de farmácia do Centro Universitário Una Bom Despacho; <http://lattes.cnpq.br/9113741216688021>; Orcid: 0000-0002-7005-8780. E-mail: thayssmfarmacia@gmail.com

⁵²Graduado em fisioterapia pelo Centro Universitário Una Bom Despacho; <http://lattes.cnpq.br/7716862799516963>. E-mail: hiagocoutinho14@hotmail.com

⁵³Graduada em Fisioterapia pelo Centro Universitário Una Bom Despacho; E-mail: Luana-oliveiraf@hotmail.com

⁵⁴ Maria Santa Azevêdo; Graduada em Fisioterapia pelo Centro Universitário Una Bom Despacho. E-mail: Mariasantaaezevedo@hotmail.com

⁵⁵ Graduada em Fisioterapia pelo Centro Universitário Una Bom Despacho. E-mail: stellamarinasilva@hotmail.com

pacientes da sua qualidade de vida e capacidade funcional é satisfatória de acordo com sua condição de saúde.

PALAVRAS-CHAVE: Qualidade de vida. Capacidade funcional. Doença renal crônica. Hemodiálise.

PERCEPTION OF QUALITY OF LIFE AND FUNCTIONAL CAPACITY IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE SUBMITTED TO HEMODIALYSIS

ABSTRACT:

Introduction: Chronic kidney disease (CKD) is defined as the presence of lesions that result in slow, progressive and irreversible loss of kidney functions, which has a major negative impact on the quality of life of affected individuals and generates physical and psychological limitations. Hemodialysis treatment aims to mitigate the symptoms caused by kidney malfunction and provide a better quality of life. **Methods:** This is an observational, cross-sectional study using the Lawton Scale that assessed functional capacity and the KDQOL-SF 36 questionnaire that assessed the perception of quality of life in chronic renal patients undergoing hemodialysis in the Bom Despacho-MG. **Results:** The 59 patients included in the study were aged between 22 and 77 years old with a mean of 54.93 ± 13.67 years. 35 (59.3%) were male and 24 (40.7%) female. There was a correlation between functional capacity and physical functioning, ($r = 0.570$ $p = 0.000$), functional capacity with sexual function, ($r = 0.613$ $p = 0.012$), in the domain of disease effects with energy / fatigue ($r = 0.631$ $p = 0.002$), energy / fatigue with physical functioning, ($r = 0.487$ $p = 0.000$) and finally in general health with treatment time ($r = 0.301$ $p = 0.021$). **Conclusion:** It was concluded that chronic renal patients submitted to hemodialysis in the city of Bom Despacho-MG, present significant changes in their functional capacity and in their quality of life. However, after analyzing the data obtained from the questionnaires, it was possible to perceive that the patients' perception of their quality of life and functional capacity is satisfactory according to their health condition.

KEYWORDS: Quality of life. Functional capacity. Chronic kidney disease. Hemodialysis.

INTRODUÇÃO

A doença renal crônica (DRC) é definida como a presença de lesões renais que resultam em perda lenta, progressiva e irreversível das funções excretoras, metabólicas e endócrinas, o que leva à perda da capacidade preservadora do equilíbrio metabólico e hidroeletrólítico.¹ As principais causas da DRC são glomerulopatia, Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Diabetes Mellitus (DM).²

As manifestações clínicas da doença são: fraqueza, adinamia e fadiga, relação direta com o grau de anemia, queixas de prurido, edema e pele facilmente escoriável, anorexia, náuseas e vômitos são os sintomas iniciais. Sendo assim, a DRC apresenta grande impacto negativo na qualidade de vida dos indivíduos acometidos.³

De acordo com os dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia (2014), existem 48.834 doentes renais crônicos no país e aproximadamente 112.000 pessoas realizam tratamento de hemodiálise por ano. Segundo Zanescio², o diagnóstico pode ser obtido pela diminuição na Taxa de Filtração Glomerular (TFG). Se os valores apresentados forem inferiores a 15 ml/min/1,73 m², o paciente se encontra na fase terminal ou dialítica, sendo proposta a Terapia Renal Substitutiva (TRS), onde a mais utilizada é a Hemodiálise (HD).²

O tratamento hemodialítico tem como principal objetivo atenuar os sintomas provocados pelo mau funcionamento renal e proporcionar ao paciente uma melhor qualidade de vida, possibilitando bem-estar ao mesmo, sempre considerando o monitoramento dos níveis plasmáticos de uréia, potássio, cloretos e sódio.⁴

A hemodiálise é um processo terapêutico realizado por uma máquina, que proporciona a circulação sanguínea extracorpórea. Tem função de corrigir alterações do meio interno e remover catabólitos que o organismo produz. O sangue passa por tubos com membranas semipermeáveis ou compartimentos que são banhados por uma solução eletrolítica apropriada constantemente. O dialisador realiza a filtragem do excesso de líquido e resíduos presentes no sangue.⁵

O tratamento hemodialítico compromete a qualidade de vida do paciente levando a uma limitação de suas atividades, favorecendo o sedentarismo e deficiência funcional. A monotonia e a dependência relacionadas às restrições dietéticas, hídricas e a presença de acesso intravenoso resultam em alterações na capacidade física, auto estima e imagem corporal do paciente o que compromete aspecto físico e psicológico e repercute em fatores pessoais, sociais e familiares.¹

Diante do exposto, o objetivo do presente trabalho foi avaliar os escores de qualidade de vida e sua associação com a capacidade funcional em pacientes renais

crônicos em tratamento de hemodiálise atendidos em uma clínica de Nefrologia na cidade de Bom Despacho – Minas Gerais.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo observacional do tipo transversal. Foi realizado no centro de hemodiálise de um município do interior de Minas Gerais, com pacientes renais crônicos. A amostra foi composta por 59 indivíduos com doença renal crônica e os dados foram coletados no segundo semestre de 2018.

Os critérios de inclusão foram, pacientes maiores de 18 anos e em diálise por mais de dois meses e ausência de alterações cognitivas identificadas pelo Miniexame do estado mental (MMEM). Foram excluídos pacientes transplantados e com instabilidade hemodinâmica no momento da coleta (avaliada através da medida da FC e da PA).

Os voluntários inicialmente foram convidados a participarem da pesquisa e posteriormente assinaram termo de consentimento livre e esclarecido para responderem aos questionários.

Foram utilizados na coleta dos dados dois instrumentos, a Escala de Lawton e o KDOL. A escala de Lawton foi utilizada para conhecer o grau de dependência em relação às atividades instrumentais da vida diária, relacionadas à participação do indivíduo no contexto social e foi constituída de nove questões. Cada questão possuía três opções: a primeira indicava independência; a segunda dependência parcial e a terceira dependência total. Definidos os graus de independência e dependência, procedeu-se a análise em três níveis, "sem ajuda", "com ajuda parcial" e "não consegue" e para o cálculo do escore atribuiu-se de 3, 2 e 1 pontos respectivamente, com pontuação máxima de 27. Quanto maior o escore maior foi o grau de independência: dependência total - menor ou igual a 5, dependência parcial - maior que 5 e menor que 21 pontos e independência - igual ou acima de 21 pontos.⁶

O KDQOL, por sua vez, foi utilizado para avaliar a percepção da qualidade de vida. Constituiu em um instrumento específico para pacientes renais crônicos que realizam algum programa dialítico. É composto por 80 itens, que incluem o Short Form -

36 Item Health Survey (SF-36) e mais 43 itens sobre a doença renal crônica. O SF-36 é composto de 36 itens divididos em oito dimensões: funcionamento físico (10 itens), função física (quatro itens), função emocional (três itens), função social (dois itens), bem-estar emocional (cinco itens), dor (dois itens), energia /fadiga (quatro itens), saúde geral (cinco itens). O estado da saúde atual comparado há um ano (um item) e avaliação da saúde no geral (um item) são computados à parte. O módulo específico sobre a doença renal inclui itens divididos em 11 dimensões: sintomas / problemas (12 itens), efeito da doença renal (oito itens), sobrecarga da doença renal (quatro itens), papel profissional (dois itens), função cognitiva (três itens), qualidade da interação social (três itens), função sexual (dois itens) e sono (quatro itens). Estão incluídas no KDQOL-SF três escalas adicionais: suporte social (dois itens), estímulo por parte da equipe de diálise (dois itens) e satisfação do paciente (um item).⁷

Para obter uma pontuação final do KDQOL-SF, os dados brutos foram recodificados em uma escala de 0-100, de modo que os escores mais altos refletiam melhor qualidade de vida.⁸ Os itens foram distribuídos entre as 11 dimensões, seguindo orientações dos autores da versão para o português do KDQOL-SF. Após, as pontuações de cada dimensão foram somadas para produzirem o escore de cada uma. O escore final da dimensão representou a média para todos os itens respondidos pertencentes à mesma.⁹

Foi realizada a análise descritiva dos dados, os quais estão apresentados sob média e desvio padrão na forma de gráficos e tabelas.

Logo após, foram realizados os testes estatísticos, onde utilizou-se o Kolmogorov Smirnov para a avaliação a normalidade dos dados. Para correlacionar as variáveis, utilizou-se o teste de correlação de Pearson para dados paramétricos e spearman para dados não paramétricos. Foi utilizado o software mini tab. e $p < 0,05$.

Este projeto foi executado após aprovação do Comitê Interno de Ética do Centro Universitário Una, número do protocolo: 2.830.262.

RESULTADOS

Foram abordados 80 pacientes que realizam hemodiálise numa clínica no interior de Minas Gerais, sendo que 18 pacientes não passaram no MEEM e três desistiram durante a coleta de dados, totalizando uma amostra final de 59 voluntários, cujas características estão demonstradas na tabela 1.

TABELA 1- Caracterização da amostra de pacientes com DRC submetidos à hemodiálise no município de Bom Despacho-MG, 2018 (n=59)

Características	N	Percentual ou média $\pm$ desvio padrão
Gênero		
Feminino	24	40.67%
Masculino	35	59.32%
Tempo de diálise	02 a 240	65,59 $\pm$ 59,91
Diabéticos	20	33%
Hipertensos	44	74%
Tabagistas	09	15.25%
Etilistas	06	10.16%

Quando se comparou a capacidade funcional (Escala de Lawton) com o funcionamento físico (Domínio do questionário KDQOL), observou-se que houve correlação significativa ($r= 0,570$ $p=0,000$) entre as variáveis, conforme apresentado na figura 1. O mesmo ocorreu quando se correlacionou a capacidade funcional (Escala de Lawton) com os valores da função sexual (Domínio do questionário KDQOL). Houve significância estatística, sendo $r=0,613$ $p=0,012$, conforme observado na figura 2.

Figura 1 – Comparação da capacidade funcional (Escala de Lawton) com funcionamento físico (Domínio do questionário KDQOL).

Figura 2 – Comparação da capacidade funcional (Escala de Lawton) com função sexual (Domínio do questionário KDQOL).

Na correlação dos domínios do KDQOL: efeitos da doença e energia/fadiga, observou-se a presença de correlação significativa ($r= 0,631$ $p=0,002$) entre as variáveis, conforme apresentado na figura 3.

Figura 3 - Correlação dos domínios efeitos da doença e energia/fadiga.

Quando se correlacionou a energia/fadiga com funcionamento físico, houve significância estatística, sendo ($r=0,487$ $p=0,000$), conforme observado na figura 4.

Figura 4 - Comparação da energia/fadiga com funcionamento físico

Quando se comparou a saúde geral com tempo de tratamento, foi possível observar a presença de correlação significativa ($r=0,301$ $p=0,021$) entre as variáveis, conforme apresentado na figura 5.

Figura 5 - Comparação da saúde geral com tempo de tratamento

DISCUSSÃO

É de extrema importância avaliar a qualidade de vida (QV) e a capacidade funcional de pacientes portadores de DRC submetidos à HD, uma vez que os resultados obtidos poderão nortear abordagens e intervenções tanto clínicas quanto fisioterapêuticas de forma eficaz. Portanto, torna-se imprescindível traçar o perfil dos pacientes envolvidos, suas necessidades e deficiências para a elaboração de condutas que atendam todos os déficits levantados.

A pesquisa apresentou uma maior predominância de pacientes do gênero masculino, indo de encontro ao constatado pela Sociedade Brasileira de Nefrologia em 2013. Os homens são mais susceptíveis às doenças crônicas devido a uma menor procura pelos serviços de saúde quando comparados com as mulheres.¹⁰ Este dado corrobora com o que foi observado durante a pesquisa, onde a maior parte dos homens acometidos reside em zona rural, relatando dificuldades ao acesso na atenção primária.

A média de idade foi de $54,93 \pm 13,67$ anos, corroborando com os estudos de GONÇALVES et al.¹¹, com média de $54,4 \pm 15,2$ anos, e OLIVEIRA et al.¹², com média de $54,71 \pm 14,12$ anos, ambos estudos brasileiros realizados em 2015 e 2016 respectivamente.

FRAZÃO *et al*¹³, aborda que na terceira idade, os sinais e sintomas são frequentemente inespecíficos, pois é comum apresentarem sintomas de outras patologias que podem disfarçar os sintomas da DRC, adiando o diagnóstico e tratamento da doença.

O aumento da incidência da DRC, ocorre em sua maioria em pessoas acima dos 50 anos, sendo decorrente de hábitos alimentares inadequados e da deficiência de prática de atividades físicas ao longo da vida, além de aspectos genéticos, estresse e outros fatores determinantes.

O tempo de diálise dos pacientes admitidos no estudo variou de 2 a 240 meses, apresentando uma média de $65,59 \pm 60,42$ meses. Pesquisas como a realizada em Portugal por ANES E FERREIRA¹⁴, encontrou uma variação no tempo de diálise entre 15 dias a 24 anos e apresentou média de $55,95 \pm 14,95$ meses. Já em estudo conduzido também foi observada uma semelhança no tempo de diálise a qual foi de $48,5 \pm 45,3$ meses. Desta forma, é possível observar que a presente pesquisa está de acordo com outros estudos realizados.

Segundo FRAZÃO *et al*¹⁰, a duração do tratamento hemodialítico está diretamente relacionada ao agravamento das morbidades associadas (HAS, diabetes), tendo assim relação com o tempo de sobrevida dos pacientes submetidos à hemodiálise. Quanto maior for o tempo de doença renal, bem como de tratamento dialítico, o paciente apresenta uma maior quantidade de sinais e sintomas, os quais interferem nas suas atividades de vida diária.

A longa duração do tempo de diálise provavelmente ocorre devido ao fato de que as pessoas que recebem esse tratamento geralmente estão aguardando transplante renal, o que leva tempo, uma vez que se faz necessário encontrar órgão compatível com o paciente em questão. Portanto, para a manutenção da vida desses pacientes, a hemodiálise é realizada durante longos períodos de tempo, podendo estender por anos.

As principais causas da DRC são glomerulopatia, DM, HAS, além de fatores secundários como o tabagismo e etilismo.²

A DM é a causa mais frequente de falência renal no mundo, desencadeando a DRC, sendo a segunda causa mais comum entre os pacientes em hemodiálise no Brasil.¹⁶ As disfunções renais se manifestam após aproximadamente 15 anos do diabetes. A

proteinúria, o surgimento de hipertensão e posteriormente o aumento da creatinina e ureia no sangue, são as primeiras manifestações envolvidas na doença.¹³ No presente estudo, 20 pacientes (33%) possuem DM, porém não souberam classificar a doença. Sabe-se que pacientes diabéticos apresentam um maior risco para o desenvolvimento de eventos cardiovasculares e que a hiperglicemia está associada à ocorrência de nefroesclerose de maneira independente, além de alterações na concentração plasmática dos produtos finais de glicolização e disfunção endotelial, sendo essencial o controle dos níveis séricos de glicose para esses pacientes.¹⁶

No presente estudo, 44 voluntários (74%) possuíam HAS, tendo relação direta com a função renal, já que em indivíduos hipertensos descompensados, a hipertensão pode acarretar graves lesões renais de natureza microvascular. A DRC é tanto causa quanto consequência de HAS, e se constitui a primeira causa de DRC terminal no Brasil, instalando-se em pouco tempo e de forma frequente caso a hipertensão não seja adequadamente tratada.¹⁷ Sabe-se que o principal mecanismo da HAS na DRC está relacionado com a perda gradativa da capacidade dos rins de excretar sódio, o que resulta em sobrecarga salina e aumento da volemia. Porém, outros mecanismos podem estar implicados, tais como maior produção de angiotensina II, qual promove constrição dos vasos, redução de substâncias vasodilatadoras, como as prostaglandinas, e alterações na função endotelial com reduzida produção de óxido nítrico.¹⁸

Observou-se que nove dos 59 participantes (15,25%) da pesquisa são tabagistas e apesar de ser considerada uma minoria, este achado representa um fator preocupante, uma vez que o tabagismo piora a sobrevida de pacientes em hemodiálise.

A fumaça do tabaco contém várias substâncias químicas que desencadeiam distúrbios e lesões no organismo. Uma dessas substâncias é a nicotina, a qual atua diretamente no cérebro e no sistema circulatório e causa dependência. Sua ação após a liberação de catecolaminas séricas promove uma vasoconstrição e, consequentemente gera um aumento da frequência cardíaca que contribui para o aumento da pressão arterial.¹⁹ Desta forma, a hipertensão arterial gera alterações funcionais no glomérulo renal, podendo desenvolver a DRC.²⁰ Essas alterações resultam em uma queda progressiva da filtração glomerular, levando a uma retenção de substâncias eliminadas pelos rins, como a ureia, comprometendo todo funcionamento do organismo.²¹

Em relação ao uso de bebidas alcoólicas, 6 participantes (10.16%) afirmaram fazer uso frequente, porém optaram por não especificar o tempo de consumo. De acordo com PEREIRA et. al¹⁷, a ingestão de bebidas alcoólicas em quantidade inferior a 20 g diárias, diminuem o risco de evolução para uma disfunção renal em ambos os sexos, enquanto existe diminuição dos efeitos favoráveis nos casos de consumo superior a 20 g por dia. Portanto, o uso excessivo de álcool pode provocar danos irreparáveis aos rins, já que está associado ao desenvolvimento de albuminúria, que é considerada um marcador de lesão renal, predispondo o indivíduo ao surgimento de DRC.¹⁷

O nível da capacidade funcional foi avaliado através da escala de Lawton (atividades instrumentais de vida diárias), pois é um instrumento que apresenta uma boa aplicabilidade devido à sua fácil compreensão, o que facilitou tanto na execução da aplicação do teste, quanto no entendimento por parte do entrevistado, tendo como objetivo a avaliação das condições de tarefas do indivíduo.²² Segundo MORAES, et al²³, pacientes submetidos ao tratamento de hemodiálise apresentam um déficit de 50% da capacidade funcional comparados aos indivíduos saudáveis. Dentre os vários fatores associados a essa redução, pode-se destacar a diminuição da realização de atividades físicas.

A qualidade de vida foi avaliada através do questionário KDQOL-SF 36, o qual é específico para a população renal e possui várias dimensões.²⁴ Durante esse estudo foram selecionadas duas dimensões que obtiveram maior correlação com a escala de Lawton, sendo elas o funcionamento físico e a função sexual.

Entende-se que o funcionamento físico é a capacidade da pessoa em desempenhar suas funções ou atividades utilizando diversas habilidades.²⁵ Para a obtenção destas informações, os participantes foram questionados sobre o grau de dificuldade ao realizar tarefas de autocuidado e grandes esforços.²⁶

De acordo com os resultados obtidos, houve correlação da capacidade funcional com domínio do funcionamento físico ($R = 0,570$ $p = 0,000$). Isto pode ser justificado pelo fato de que o funcionamento físico está associado à diminuição da capacidade funcional, devido ao fato dos pacientes apresentarem alterações bioquímicas e eletrolíticas, sendo algumas delas o cálcio, fósforo, potássio, creatinina e ureia.²⁴

Na DRC o cálcio não é usado de maneira eficiente pelo organismo, devido ao acúmulo de fósforo no sangue, podendo levar à formação de depósito de cálcio nas articulações, órgãos e vasos sanguíneos, denominado calcificação. A lesão nos rins faz com que o potássio não seja eliminado de forma eficiente, causando a hiperpotassemia, gerando um enfraquecimento do coração levando arritmias fatais, sendo necessário a diminuição da ingestão de potássio.²⁷

A ureia é o principal metabólico nitrogenado no organismo, sendo considerada uma substância tóxica em níveis elevados, juntamente com o aumento da creatinina, determinando o grau de gravidade da insuficiência renal crônica.²⁸ O aumento dessa substância apresenta sinais e sintomas como cefaleia, vômito, fadiga, mal-estar, prurido e hemorragias.²⁹ Essas alterações influenciam na contração muscular e sua execução, o que gera um grande impacto na vida do paciente devido à atrofia das fibras musculares do tipo I.²⁴

Houve uma correlação significativa entre a capacidade funcional e a função sexual ($R = 0,613$ $p = 0,012$), visto que os pacientes que realizam hemodiálise apresentam uma série de limitações e modificações no seu próprio corpo. A evolução da patologia leva a um declínio sexual devido às alterações hormonais. A diminuição da libido está relacionada com essas alterações, resultando em um aumento dos níveis de prolactina e diminuição dos níveis de testosterona. Outros efeitos que agravam ainda mais a função sexual é a deterioração do músculo esquelético, sendo de característica da doença, o nível de energia baixo e o uso contínuo de medicamentos.³⁰

No domínio “Efeitos da doença renal” observou-se correlação significativa com a vitalidade dos voluntários ($R = 0,631$ $p = 0,002$) sendo que, quanto menores os efeitos decorrentes da doença renal, maior a energia física e psíquica e menor a fadiga relatada pelos pacientes.

Acredita-se que esses resultados se devem ao fato de que grande parte dos voluntários relataram não se sentirem incomodados com os efeitos da doença em suas vidas, mesmo com as limitações em suas atividades de vida diária. Desde a descoberta da doença renal e da rotina imposta pelo tratamento, ocorrem alterações emocionais e

psíquicas, devido ao isolamento social, além de alterações funcionais do paciente que trazem limitações às atividades de vida diária e o consequente abandono de empregos ².

A fadiga, por sua vez, se dá pela sensação física desagradável, levando ao déficit de energia, ocasionando uma diminuição ao realizar atividades habituais, sendo ela considerada um forte desencadeador de prejuízo físico.³¹

Devido à sobrecarga imposta aos rins, a insuficiência da capacidade renal gera impactos significativos na vida do paciente acometido, sendo a perda de massa muscular a maior causa de morte nos indivíduos em HD. Ocorre atrofia da musculatura e devido a isso, instala-se uma fraqueza generalizada no organismo, causada pela perda de força muscular, que juntamente com a baixa concentração de enzimas aeróbicas, redução da capacidade oxidativa, perda da capilaridade e níveis reduzidos de proteínas contráteis contribuem para fadiga muscular e consequente diminuição da vitalidade desses pacientes. Se essa disfunção muscular for comparada a de indivíduos normais, a perda muscular é de 30 a 40% menor, comprometendo o condicionamento físico do paciente.³²

Dentre as dimensões presentes no questionário KDQOL-SF 36, os domínios energia/fadiga com o funcionamento físico obteve correlação ($R=0,487$ $p=0,000$). Onde quanto maior o nível de energia, menor a fadiga e melhor o funcionamento físico.

Ao analisar os resultados obtidos, pode-se perceber correlação significativa entre os domínios de saúde geral e tempo de tratamento ($R=0,301$, $p=0,021$), podendo-se concluir que quanto maior o tempo de tratamento, melhor a saúde geral do paciente.

De acordo com Grasseli et al³³, o tratamento hemodialítico juntamente com a DRC em si, causa um impacto negativo na vida dos pacientes, uma vez que a alimentação, a vida social, a condição física e mental sofrem alterações, podendo vir a afetar outras áreas de suas vidas. Deste modo, é visível que a saúde desses pacientes, de uma forma geral, pode ser afetada.

Segundo Frazão et al¹⁰, o domínio saúde geral é avaliado através do entendimento do indivíduo em relação à sua própria saúde no momento atual, comparando-a com os demais e o futuro da sua saúde.

Ondei et al³⁴, relata em seu estudo que no início do tratamento os pacientes têm mais dificuldades em aceitar sua condição clínica, o que afetaria diretamente na saúde geral desses indivíduos, pois se recusam a cumprir as orientações médicas e as datas de realização da hemodiálise.

Deste modo podemos correlacionar que quanto maior o tempo de tratamento mais ciente dos benefícios os pacientes se encontram, conseqüentemente há uma melhoria da saúde geral dos mesmos, o que vai de encontro com os dados obtidos na correlação entre saúde geral e tempo de tratamento.

Dentre as limitações deste estudo, pode-se destacar a resistência de alguns pacientes em participar da pesquisa proposta pelo estudo, o horário de entrada dos pacientes ao setor de hemodiálise e o tempo disponível para aplicação dos questionários. Outra limitação encontrada foi referente à escassez na literatura sobre o tempo de diálise e as dimensões energia/fadiga e saúde geral do questionário KDQOL-SF36.

Portanto, é necessário avaliar a qualidade de vida e capacidade funcional do indivíduo, identificando pontos relevantes a serem modificados oferecendo melhorias aos pacientes que realizam HD, auxiliando na efetividade do tratamento, bem como diminuindo gastos com hospitalizações.

CONCLUSÃO

Conclui-se que pacientes renais crônicos submetidos à hemodiálise na cidade de Bom Despacho-MG, apresentam modificações significativas da sua capacidade funcional e na sua qualidade de vida. Porém, após a análise dos dados aplicados dos questionários podemos perceber que a percepção dos pacientes da sua qualidade de vida e capacidade funcional é satisfatória de acordo com sua condição de saúde.

REFERÊNCIAS

1. LARA, CR. Qualidade de vida de pacientes renais crônicos submetidos à fisioterapia na hemodiálise. **Ciência & Saúde**, v. 6, n. 3, p. 163–171, 2013.

2. ZANESCO, C. Qualidade de vida em pacientes hemodialítico: avaliação através do questionário KDQOL-SF™. **Saúde.com**, v. 13, n. 1, p. 818–823, 2017.
3. SANTOS, RR. Qualidade de vida de pacientes com insuficiência renal crônica sob tratamento hemodialítico. **Revista Interdisciplinar**, v. 8, n. 3, p. 83–92, 2015.
4. MACHADO, RG. Tratamento De Diálise Em Pacientes Com Insuficiência Renal Crônica. **Caderno Unifoa**, v. 26, p. 1–12, 2014.
5. SILVA, GD. Qualidade de vida de pacientes com insuficiência renal crônica em tratamento hemodialítico: análise de fatores associados. **Revista Brasileira de Qualidade de Vida**, v. 8, n. 3, p. 229–245, 2016.
6. FAHUR, BS. Avaliação da qualidade de vida com instrumento KDQOL-SF em pacientes que realizam hemodiálise. **Colloquium Vitae**, 2(2): 17-21. DOI: 10.5747/cv2010.v02.n2.v032, jul/dez 2010
7. UESUGUI, H. Escalas validadas como instrumentos de avaliação da capacidade funcional do idoso. Faculdade de Educação e Meio Ambiente. **Ariquemes**, 14 de Julho de 2011.
8. MOREIRA, CA. Avaliação das propriedades psicométricas básicas para a versão em Português do KDQOL-SF™. **Rev Assoc Med Bras.**, 55(1): 22-8, 2009.
9. DUARTE, PS. Tradução e adaptação cultural do instrumento de avaliação de qualidade de vida para pacientes renais crônicos (KDQOL-SF™). **Rev Assoc Med Bras.**, 49(4): 375-81, 2003.
10. FRAZÃO, CMFQ. Modificações corporais vivenciadas por pacientes com doença renal crônica em hemodiálise. **Revista Electrónica Trimestral de Enfermeria**, nº43, p300-310; Julho 2016.
11. GONÇALVES, FA. Qualidade de vida de pacientes renais crônicos em hemodiálise ou diálise peritoneal: estudo comparativo em um serviço de referência de Curitiba –PR. **Jornal Brasileiro de Nefrologia**, 2015;37(4):467-474.
12. OLIVEIRA, APB. Qualidade de vida de pacientes em hemodiálise e sua relação com mortalidade, hospitalizações e má adesão ao tratamento. **Jornal Brasileiro Nefrologia** 2016;38(4):411-420.
13. FRAZÃO, CMFQ. Qualidade de vida de pacientes submetidos a hemodiálise. **Rev. enferm. UERJ**, Rio de Janeiro, 2011 out/dez; 19(4):577-82.
14. ANES, EJ. Qualidade de vida em diálise. **Revista Portuguesa de Saúde Pública**, Volume Temático: 8; p 67-82; 2009.

15. SANTOS, PR. Mudança do nível de qualidade de vida em portadores de insuficiência renal crônica terminal durante seguimento de 12 meses. **Revista Associação Médica Brasileira**, 2007; 53(4): 329-34.
16. BASTOS, MG. Doença renal crônica: frequente e grave, mas também prevenível e tratável. **Rev Assoc Med Bras** 2010; 56(2): 248-53.
17. PEREIRA ERS, PEREIRA AC, ANDRADE GB, NAGHETTINI, AV et al. **Prevalência de doença renal crônica em adultos atendidos na Estratégia de Saúde da Família**. Universidade Federal de Goiás, 2015.
18. BORTOLOTTTO, LA. Hipertensão arterial e insuficiência renal crônica. **Rev Bras Hipertens** vol.15(3):152-155, 2008.
19. SOUZA, AA. Hipertensão Arterial em Adolescentes: Reflexões Acerca dos Fatores de Risco Modificáveis. Mostra Interdisciplinar do Curso de Enfermagem. v 2, nº1, Junho/2016.
20. MORAES, LL. **Identificação de Risco Cardiovascular Pela Razão Triglicérido/HDL-Colesterol em Pacientes com Doença Renal Crônica em Hemodiálise. Artigo Original**. Belém-PA, Brasil. p. 01-07, Agosto/2017.
21. DUARTE, J. Alterações de Volumes e Capacidades Pulmonares Pré e Pós-Hemodiálise em Insuficiência Renal Crônica. **J Health Sci Inst**. São Paulo-SP, Brasil. p. 70-72, 2011.
22. SANTOS, RL, **Confiabilidade da Versão Brasileira da Escala de Atividades Instrumentais da Vida Diária**. Artigo Original. Bahia, Brasil. p. 290-296, Novembro 2008.
23. MORAES, FC. Efeito do Exercício Físico e Sua Influência da Doença Renal Crônica Sobre a Força Muscular, Capacidade Funcional e Qualidade de Vida em Pacientes Submetidos à Hemodiálise. **Revista Científica da FEPI**. Itajubá- MG, Brasil. p. 64-87, Dezembro 2016.
24. BAUMGARTEM MS, DIPP T, SILVA VG, et al Percepção Subjetiva e Desempenho Físico de Pacientes com Doença Renal Crônica em Hemodiálise. Artigo Original- **Rev. Acta Brasileira do Movimento Humano**. v 2, nº 1. p. 5-14, Janeiro/Março 2012.
25. MACIEL, MG. Atividade Física e Funcionalidade do Idoso. Artigo de Revisão. v 16, nº 04, Ibitiré-MG, Brasil. p. 1024-1032, Outubro/ Dezembro 2010.
26. KUSUMOTO, L. Adultos e Idosos em Hemodiálise: Avaliação da Qualidade de Vida Relacionada a Saúde. **Acta Paul Enferm**. Ribeirão Preto-SP, Brasil. p. 153-159, Outubro 2008.

27. TELLES, C. **Importância da Terapia Nutricional com Ênfase no Cálcio Fosforo e Potássio no Tratamento da Doença Renal Crônica.** Perspectiva, Erechim. Brasil. v 39, n145. p. 143-154, Março 2015.
28. SILVANO, AL. **Alterações Bioquímicas em Pacientes Renais Crônicos Hipertensos.** Dourados- MS, Brasil. v 8, n 1. p. 65-71, 2014.
29. GIANNASI, AC. Comparação dos Exames de Rotina de Pacientes em Hemodiálise Diabéticos e não Diabéticos de uma Clínica Particular da Cidade de Maringa- PR. **Arq. Ciên. Saúde Unipar.** Maringa- PR, Brasil. v13, n2. p.119-123, Maio/ Agosto-2009.
30. MACEDO, LOS. Alterações Vivenciadas na Doença Renal Crônica: Impacto na Percepção da Autoimagem e Sexualidade. **Revista Saúde e Desenvolvimento.** v 09, n° 05, Brasil. p. 165-177, Janeiro/junho de 2016.
31. AMADUCCI, CM. Fadiga Entre Estudantes de Graduação em Enfermagem. Artigo Original, **Rev. Esc. Enferm.** USP. São Paulo- SP, Brasil. p. 1052-1058, 2010.
32. NASCIMENTO, LCA. Efetividade do exercício físico na insuficiência renal crônica. **Fisioter. Mov.** Curitiba, v. 25, n. 1, p.232-239, jan./mar. 2012.
33. GRASSELLI, CSM. Avaliação da qualidade de vida dos pacientes submetidos à hemodiálise. **Revista Brasileira Clínica Médica.** São Paulo, 2012 nov-dez;10(6):503-7.
34. ONDEI, LS. **Avaliação da qualidade de vida de pacientes renais crônicos em hemodiálise.** Enciclopédia Biosfera, Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.13 n.24; p. 1412 2016.
35. **Sociedade Brasileira de Nefrologia,** Censo de diálise 2014.

CAPÍTULO XIV

POLIFARMÁCIA E SUAS IMPLICAÇÕES EM SEUS USUÁRIOS

Jairo de Freitas de Sousa⁵⁶; Anny Gabriele Pereira de Oliveira⁵⁷;

Fabício Bezerra Eleres⁵⁸; Laisla Bonfati Rafael⁵⁹;

Lucas Duarte Silva⁶⁰; Maria Elane de Oliveira Dias Aires⁶¹;

Romário Martins Romeiro Eugênio⁶².

DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2021.02-14

RESUMO:

O uso de cinco ou mais tipos de medicamentos é caracterizado com polifarmácia. O objetivo deste trabalho é abordar o conceito de polifarmácia e destacar as complicações ocasionadas no organismo humano. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, nas bases Scientific Eletronic Library online, Literatura Latino-americana do Caribe em Ciência da Saúde e Biblioteca Virtual em Saúde, com uso de artigos publicados entre os anos 2015 a 2020. O advento da população idosa pode ser evidenciado em todo Brasil é atribuída como característica a este fenômeno a queda da fecundidade, da redução da mortalidade e do aumento da expectativa de vida. As interações medicamentosas são definidas como a modulação da atividade farmacológica de um determinado medicamento pela administração prévia ou concomitante de outro medicamento. A reação adversa a medicamentos é uma resposta a um medicamento que seja prejudicial, não intencional e que ocorre em doses normalmente utilizadas no ser humano. Os aspectos que contribuem positivamente para o surgimento da polifarmácia são: o aumento das doenças crônicas e das sequelas que acometem a população idosa; o poder da indústria farmacêutica voltada à lucratividade. O correto uso dos fármacos nas mais formas e dimensões nos quais são apresentados aos seus diversos usuários, ainda é a melhor forma de garantia do sucesso. Um diagnóstico de uma doença crônica, muda toda o estilo de vida de uma pessoa, porém

⁵⁶ Farmacêutico Generalista-Centro Universitário Presidente Antônio Carlos. Especialista em Farmácia Hospitalar Oncológica-PUC-GO. Mestre em Genética e Toxicologia Aplicada-ULBRA-CANOAS-RS. Docente do Curso de Enfermagem e Psicologia-Faculdade Carajás. E-mail: j.bioquimico@hotmail.com. E-mail: j.bioquimico@hotmail.com

⁵⁷ Farmacêutica Generalista-Faculdade Integrada Aparício Carvalho. Especialista em Farmácia Estética-NEPUGA-DF. Mestrando no curso de Cirurgia e Pesquisa Experimental-Universidade do Estado do Pará. E-mail: annygabriele@hotmail.com

⁵⁸ Enfermeiro-Universidade do Estado do Pará. Especialista em Enfermagem Pediátrica e Neonatologia-Escola Superior da Amazônia. Mestre em Tecnologia e Inovação em Enfermagem-Universidade de Fortaleza. Docente do Curso de Enfermagem-Faculdade Carajás. Docente do Curso de Enfermagem-Faculdade FADESA. E-mail: fabricioeleres@hotmail.com

⁵⁹ Graduada em Nutrição pelo Centro Universitário do Triângulo Mineiro. Pós graduada em Nutrição Clínica pela Estácio de Sá. Pós graduada em Nutrição Esportiva pela Universidade Internacional. E-mail: laislalbonfati@hotmail.com

⁶⁰ Enfermeiro-Universidade de Uberaba. Mestre em Ciências- USP-Ribeirão Preto. Docente do Curso de Enfermagem e Psicologia-Faculdade Carajás. E-mail: lucasduarteslv@hotmail.com

⁶¹ Psicóloga- Centro Universitário Luterano de Palmas. Especialista em Gestão de Pessoas-UNINTER. Mestranda do Curso de Promoção da Saúde, Desenvolvimento Humano e Sociedade-ULBRA-CANOAS-RS. E-mail: psicologia@faculadecarajas.edu.br

⁶² Farmacêutico Generalista - Universidade de Gurupi. Especialista em Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica - DALMAS-PA. E-mail: romarioextrafarma@outlook.com

a ajuda multidisciplinar pode modificar essas mudanças, contribuindo para a aderência e garantia da continuidade da terapêutica fora do domicílio hospitalar ou ambulatorial.

PALAVRAS-CHAVE: Polifarmácia. Interações Medicamentosas. Reação Adversa a Medicamento.

POLYPHARMACY AND ITS IMPLICATIONS FOR ITS USERS

ABSTRACT:

The use of five or more types of medication is characterized by polypharmacy. The objective of this work is to approach the concept of polypharmacy and to highlight the complications caused in the human organism. A bibliographic search was carried out on the Scientific Electronic Electronic Library online, Latin American Caribbean Literature on Health Science and Virtual Health Library, using articles published between the years 2015 to 2020. The advent of the elderly population can be seen in all of Brazil is attributable to this phenomenon, the fall in fertility, the reduction in mortality and the increase in life expectancy. Drug interactions are defined as the modulation of the pharmacological activity of a given drug by prior or concomitant administration of another drug. An adverse drug reaction is a response to a drug that is harmful, unintentional, and occurs in doses normally used in humans. The aspects that positively contribute to the emergence of polypharmacy are: the increase in chronic diseases and the sequelae that affect the elderly population; the power of the pharmaceutical industry focused on profitability. The correct use of drugs in the most shapes and dimensions in which they are presented to their various users, is still the best way to guarantee success. A diagnosis of a chronic disease changes a person's whole lifestyle, but multidisciplinary help can modify these changes, contributing to compliance and ensuring continuity of therapy outside the hospital or outpatient home.

KEYWORDS: Polypharmacy. Drug interactions. Adverse Drug Reaction.

INTRODUÇÃO

O uso de cinco ou mais tipos de medicamentos é caracterizado com polifarmácia. No Brasil, o uso irracional de medicamentos, polifarmácia, automedicação e interações medicamentosas, constituem um problema de saúde pública, por ocasionar iatrogenia e reação adversa ao medicamento. A terapêutica farmacológica é um processo de intervenção poderoso para propiciar a melhora do estado de saúde da população, desde que racionalmente utilizada. O uso racional de medicamentos caracteriza-se pela adequação da medicação às necessidades clínicas do paciente, em doses ajustadas individualmente e em regime terapêutico tempo e custo adequados (CONSTANTINO et al., 2020).

A prescrição de fármacos realizada por profissionais habilitados e que apresentam riscos significativos de produzir um evento adversos também fazem parte desta vertente. Apesar da existência de alternativas farmacológicas tão ou mais eficazes, é definida como prescrição inadequada de medicamentos. A polifarmácia aumentou de modo importante (CONFORTIN, et al 2015), é categórico ao afirmar que, nos últimos anos, apesar de não ser uma questão contemporânea (MARQUITO et al., 2020).

A magnitude deste fenômeno evidenciou-se nos Estados Unidos, quando esta prática passou a se configurar como um dos problemas de segurança relacionados ao uso de medicamentos. Sua etiologia é multifatorial. Todavia, as doenças crônicas e as manifestações clínicas decorrentes do envelhecimento, apresentam-se como os principais elementos (PAGNO et al., 2018).

A polifarmácia está associada ao aumento do risco e da gravidade das reações adversas ao medicamento, de precipitar interações medicamentosas, de causar toxicidade cumulativa, de ocasionar erros de medicação, de reduzir a adesão ao tratamento e elevar a morbimortalidade. Assim, essa prática relaciona-se diretamente aos custos assistenciais, que incluem medicamentos e as repercussões advindas desse uso. Neste são incorporados os custos de consulta a especialistas, atendimento de emergência e de internação hospitalar (CONFORTIN, et al., 2015; STUCCHI-PORTOCARRERO et al., 2018).

O papel multiprofissional torna-se um grande divisor de águas na garantia da qualidade de vida e adesão ao tratamento aos pacientes que fazem uso desta forma de terapia, visto que o grupo de pessoas que mais se enquadram nesta condição são os idosos e portadores de doenças crônicas não transmissíveis. Saber respeitar, as diferentes posologias, cumprir fielmente toda terapêutica, é o ponto chave para evitar as complicações de uma terapia imprópria e até mesmo evitar o abandono da farmacoterapia (GERBER et al., 2015).

Dentre os motivos para a não adesão existem aqueles relacionados a erros em virtude da falta de informação por parte dos pacientes, como não saber se devem continuar usando os medicamentos; não usar os medicamentos antes ou depois das refeições, não saber que medicamentos controlam a pressão e acreditarem ser melhor não

usar os medicamentos em dias de consulta, falta de recursos financeiros e reações adversas também evidenciam tais ocorrências (MANSO et al., 2015).

Existe um padrão de comportamento individual em que são refletidas suas crenças, valores e hábitos, os quais devem ser compreendidos e respeitados pelos profissionais de saúde. Entretanto, todas as orientações e explicações sobre as consequências advindas do abandono do tratamento prescrito devem ser amplamente enfatizadas por estes profissionais e garantir que esta prática não seja abandonada é uma das obrigações de tais profissionais, também encarada como um desafio, que pode ser vencido, desde que haja comprometimento, força de vontade e profissionalismo (MOREIRA et al., 2020).

O objetivo deste trabalho é abordar o conceito de polifarmácia e destacar as complicações ocasionadas no organismo humano. Como forma específica descrever interações medicamentosas, complicações e reações adversas.

METODOLOGIA

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, do tipo narrativa com uso das bases como Scientific Eletronic Library online, Literatura Latino-americana do Caribe em Ciência da Saúde e Biblioteca Virtual em Saúde, na busca foram levados em consideração os artigos com a temática, publicados entre os anos 2015 a 2020, publicados em língua portuguesa e internacional. Foram pesquisados 30 artigos, dos quais foram pré-selecionados 20, e selecionados 12 artigos, onde o critério de exclusão foram os anos de publicação e tipo de pesquisa.

REFERÊNCIAS DE LITERATURA

PERFIL DOS USUÁRIOS DA POLIFARMÁCIA

O advento da população idosa pode ser evidenciado em todo Brasil é atribuída como característica a este fenômeno a queda da fecundidade, da redução da mortalidade e do aumento da expectativa de vida. O envelhecimento é acompanhado por um processo

de alterações biológicas, morfológicas, funcionais e psicológicas, elevando a frequência de doenças crônico-degenerativas que acometem os idosos (MANSO et al., 2015).

Ao conviverem mais com doenças crônicas, os idosos estão sujeitos a uma gama de medicamentos. O uso de vários fármacos leva a prática da polifarmácia. A polifarmácia, conceituada como uso concomitante de vários fármacos, a partir de cinco ou mais, favorece a ocorrência de interações medicamentosas (OLIVEIRA et al., 2020)

Uma interação ocorre quando um medicamento influencia a ação de outro, podendo ser benéfica quando a associação de fármacos promovem efeitos semelhantes proporcionando uma boa eficácia terapêutica ou redução dos efeitos adversos, entretanto uma interação maléfica pode diminuir a eficácia terapêutica, aumentar excessivamente os efeitos farmacológicos causando toxicidade, acentuar os efeitos colaterais, desenvolver uma reação adversa ao medicamento e até elevar a morbimortalidade (MANSO et al., 2015) .

Esse aumento colocará o Brasil na condição de portador da sexta maior população de idosos do mundo. Esta situação é vista como um grande desafio para a geriatria/gerontologia, no intuito de prevenir e tratar os problemas típicos das pessoas de idade avançada, como a imobilidade, a instabilidade, a incontinência urinária, a insuficiência cerebral e a iatrogenia medicamentosa. Estima-se que 23% da população brasileira consome 60% da produção nacional de medicamentos, principalmente as pessoas acima de 60 anos (GERBER et al., 2015).

Envelhecer torna as pessoas mais propensas e evidenciam um número maior de patologias, o que pode acarretar um aumento da utilização de medicamentos e, muitas vezes, o uso indevido dos mesmos. Estudos mostram um consumo médio de dois a cinco medicamentos em pessoas acima de 60 anos, conhecido eventualmente como polifarmácia, sendo que o número de medicamentos tende a aumentar com o avanço da idade devido a mudanças no processo fisiológico orgânico (SILVA et al., 2018).

Este processo de envelhecimento é evidenciado por mudanças fisiológicas e bioquímicas, com consequente diminuição da massa muscular, um aumento gradativo no percentual de gordura corpórea e diminuição do metabolismo do sistema orgânico, tais mudanças tornam as pessoas mais vulneráveis a doenças crônicas não transmissíveis e

degenerativas como Alzheimer, Parkinson, problemas cardiovasculares, respiratórios, entre outras e aos efeitos dos medicamentos de uso contínuo (TELES et al., 2020).

As doenças crônicas exigem a utilização de diferentes fármacos como forma de tratamento tornando assim, os pacientes geriátricos vulneráveis a efeitos nocivos da polifarmácia. Outros agravantes também somam como fatores que intervenham na qualidade de vida e aderência à terapêutica de forma correta tais como; interações medicamentosas, iatrogenia medicamentosa, reações adversas ao medicamento (este sendo um dos grandes problemas, visto que pode agravar o quadro do paciente, induzindo a uma internação prolongada, contribuindo para outros riscos à saúde, como infecção hospitalar, e gastos maiores com o tempo de internação, além de promover um ataque a saúde mental (MOREIRA et al., 2020).

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

As interações medicamentosas são definidas como a modulação da atividade farmacológica de um determinado medicamento pela administração prévia ou concomitante de outro medicamento. Podem ser classificadas conforme as suas ações no organismo em duas categorias: sinérgica, quando os efeitos combinados dos dois medicamentos são maiores que a soma dos efeitos individuais; e antagônica, quando o efeito resultante é menor que a combinação dos efeitos dos dois medicamentos isolados ou quando a interação resulta em anulação parcial ou completa das propriedades farmacológicas de cada medicamento (SILVA et al., 2018).

Existem dois tipos didáticos em que as interações medicamentosas são classificadas; interações farmacocinéticas e farmacodinâmicas. As interações farmacocinéticas são as interações que acontecem em uma das fases da cinética medicamentosa, (absorção, distribuição, metabolização e excreção). O início mais peculiar se origina na absorção, pois alguns fármacos necessitam serem administrados com o pH estomacal ácido ou básico, isso a depender do princípio ativo, outros interagem com proteínas carreadoras, outros com enzimas digestivas e por sua vez os que necessitam serem excretados, e que a depender dos fármacos, alguns podem até mesmo liberar os

temidos metabólitos ativos, esses por sua vez causam a maioria das temidas nefrotoxicidade (TELES et al., 2020).

Fármacos esses que no seu último estágio de eliminação ainda conseguem segurar alguns metabólitos que por sua vez conseguem imitar a ação terapêutica. Outra vertente das interações medicamentosas são as interações farmacodinâmicas, estas por sua vez atuam de forma a somar os efeitos terapêuticos a fim de proporcionar um efeito farmacológico mais rápido e seguro (STUCCHI-PORTOCARRERO et al., 2018).

Porém também apresentam uma adversidade, onde a depender do fármaco empregado, eles podem competir por um determinador receptor farmacológico em alguns dos sítios de ação. Essa “briga” gera uma situação de loucura no organismo humano, onde o tempo do fármaco no organismo pode ser maior do que o esperado, e assim gerar reações adversas ao medicamento/toxicidade terapêutica (PAGNO et al., 2018).

As interações farmacodinâmicas são subclassificadas como sinérgicas e antagonicas. Existe outra forma de interação medicamentosa muito observada no cotidiano do paciente, a chamada interação físico-química, estas interações podem ser chamadas de interações farmacêuticas porque se referem às interações em que ocorrem antes das drogas serem administradas, fora ainda do organismo humano, podem resultar na inativação de efeitos biológicos, em uma ou mais drogas e ainda formar um novo composto, cuja atividade possa ser diferente da esperada (MANSO et al., 2015).

Tais reações podem exteriorizar-se por precipitação, turvação, floculação e alteração na cor da mistura, contudo, a ausência destas alterações não garante a inexistência da alteração. Os fenômenos físico-químicos compreendem as reações de oxido-redução, inativação de um medicamento por pela incidência da luz, fenômenos de adsorção e neutralização ácido-base (OLIVEIRA et al., 2020).

O grupo de pacientes mais propícios para o surgimento desta situação são os idosos, onde apresentam riscos mais elevados de serem vítimas de interações medicamentosas, em função de alterações fisiológicas importantes, que ocorrem com o envelhecimento, principalmente nas funções hepática, renal e cardíaca, além da diminuição da massa muscular, do nível de albumina sérica e da quantidade total de água no organismo (MARQUITO et al., 2020).

Atualmente, a incidência das interações medicamentosas clinicamente relevantes, que exigem intervenção terapêutica. Em uma análise sistêmica de eventos adversos a medicamentos, estimaram que as interações medicamento-medimento seriam responsáveis por 5% de todos os erros de medicação. Além disso, os pacientes idosos ainda apresentam frequentes estados de doença crônica e aguda e consomem grande número de medicamentos, apresentando, na maioria das vezes, um complicado regime medicamentoso (CONSTANTINO et al., 2020).

Muitos medicamentos comumente usados por idosos como, por exemplo, antiinflamatórios não esteroidais (AINE), betabloqueadores, inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA), diuréticos, digoxina, antilipidêmicos, depressores do sistema nervoso central são potencialmente interativos. Há, ainda, os indutores (fenitoina, carbamazepina) e inibidores enzimáticos como, por exemplo, cimetidina, omeprazol que, freqüentemente, encontram-se envolvidos no processo das temidas interações medicamentosas, que ameaçam a saúde do usuário (MOREIRA et al., 2020).

Apesar do difícil estabelecimento de relação causal, é possível pressupor algumas interações medicamentosas. Deste modo, é fundamental que os profissionais conheçam possuam conhecimento técnico e que constantemente passe por treinamentos e reciclagem envolvendo o mundo dos medicamentos, principalmente os medicamentos potencialmente interativos, no intuito de prevenir eventos adversos decorrentes da combinação terapêutica (OLIVIERA et al., 2020).

A amiodarona e a digoxina usadas por muitos idosos que apresentam doenças cardiovasculares são implicadas em interações medicamentosas do tipo grave, que podem causar respectivamente cardiotoxicidade e intoxicação digitalica. Muitas das interações medicamentosas apresentam grande magnitude podendo resultar em morte, hospitalização, injúria permanente do paciente ou insucesso terapêutico (MOREIRA et al., 2020).

Todavia, podem surgir interações que não causam danos aparentes no idoso, porém o impacto é silencioso, tardio e, às vezes, irreversível. A terapia combinada dos antiinflamatórios não esteroidais e diuréticos tiazídicos, (IECA e AINE) podem causar

alteração da função renal, desequilíbrio eletrolítico, além de afetar a eficácia da terapia anti-hipertensiva (CONFORTIN, et al 2015).

REAÇÕES ADVERSAS A MEDICAMENTOS

A reação adversa a medicamentos (RAM) é uma resposta a um medicamento que seja prejudicial, não intencional e que ocorre em doses normalmente utilizadas no ser humano. Em idosos as RAM representam um importante problema de saúde pública, cuja relação de risco é bem estabelecida. Estima-se que o risco para RAM e de hospitalização decorrente seja, respectivamente, sete e quatro vezes maior em idosos do que em jovens (MANSO et al., 2015).

Na Europa 20% dos idosos procuraram serviço ambulatorial devido a RAM, e cerca de 10-20% das internações em hospitais geriátricos foram relacionadas a elas. Em idosos que utilizaram agentes impróprios, a prevalência foi de 30%. Embora entre os idosos as RAM apresentem-se com maior gravidade que entre os jovens, não são, muitas vezes, identificadas ou relatadas (GERBER et al., 2015).

A idade por si só não representa um fator de risco, mas um indicador para comorbidade, pois neste grupo a farmacocinética alterada e o advento da polifarmácia são as variáveis mais diretamente associadas às RAM. Idade avançada, sexo feminino, número elevado de fármacos, maiores doses e tratamentos prolongados, reações adversas prévias, enfermidades subjacentes, valoração clínica inadequada, mau cumprimento terapêutico (apego terapêutico), automedicação, estado nutricional alterado, alterações em farmacocinética e, farmacodinâmica são grandes fatores predisponentes para o surgimento das reações adversas a medicamentos um terço deste episódio são dependentes das doses (MARQUITO et al., 2020).

Outros fatores de risco relacionados entre si, como a interação medicamentosa, o perfil do paciente e médico formam um pilar que prepondera o surgimento desta situação. As reações adversas aos medicamentos são classificadas de acordo com a tabela 1.

Tabela 1: Tipos de Reações Adversas aos Medicamentos.

Tipo de Dose	Não Relacionadas com a Dose	Relacionadas ao Tempo	Efeitos Tardios
<ul style="list-style-type: none"> ● representam cerca de 80% do total de reações adversas. ● são previsíveis e geralmente resultam em efeito farmacológico excessivo, por exemplo, a intoxicação por digoxina em pacientes com doença renal 	<ul style="list-style-type: none"> ● Os medicamentos podem chegar a induzir processos indesejados. ● imunológicos farmacogenéticos ● choque anafilático e hemólise; causada por doxorubicina em indivíduos geneticamente suscetíveis 	<ul style="list-style-type: none"> ● Alterações adaptativas. ● efeitos rebote; delirium tremens em decorrência da abstinência ao álcool 	<ul style="list-style-type: none"> ● carcinogênese. comprometimento da fertilidade. Teratogênese. ● O desenvolvimento de hipotireoidismo

Fonte: MANSO et al., 2015.

O erro pode estar relacionado à prática profissional, produtos usados na área de saúde, procedimentos, problemas de comunicação tais como; prescrição, rótulos, embalagens, nomes, preparação, dispensação, distribuição, administração, educação, monitoramento e uso de medicamentos. No tocante aos fármacos mais utilizados, destacam-se os prescritos para as doenças cardiovasculares, onde é a principal causa de morbidade e mortalidade na população idosa e somado com o os distúrbios mentais são tornam-se mais frequentes (TELES et al., 2020).

Os fármacos cardiovasculares e psicotrópicos são os mais comumente prescritos para esta população. É difícil determinar precisamente quais fármacos são mais perigosos, porém, de um modo geral os medicamentos podem destacar-se os fármacos de maior meia vida (tempo necessário para a eliminação de 50% da droga) e aqueles com janela terapêutica estreita (dose terapêutica muito próxima da dose tóxica) são os mais comumente associados a efeitos adversos (MANSO et al., 2015).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O uso excessivo de medicamentos por idosos merece atenção, uma vez que a polifarmácia tem sido foco de vigilância da saúde pública. A polifarmácia é definida como o uso simultâneo (ao mesmo tempo) de cinco ou mais medicamentos. Os aspectos que contribuem positivamente para o surgimento da polifarmácia são: o aumento das doenças crônicas e das sequelas que acometem a população idosa; o poder da indústria farmacêutica voltada à lucratividade (o Brasil é um dos países com maior imposto sobre

medicamentos); o marketing dos medicamentos e a medicalização presente na formação de boa parte dos profissionais da saúde. Todavia, observam-se ações da saúde pública, da área geriátrica e da área gerontológica visando a desmedicalização da pessoa idosa (STUCCHI-PORTOCARRERO et al., 2018).

O objetivo da desmedicalização é retirar medicamentos desnecessários, deixando somente aquilo que é essencial. Observamos dentre o público idoso, em alguns casos, a ingestão de mais de 10 cápsulas diárias por uma única pessoa. Será que realmente essa pessoa necessita dessa quantidade de drogas? Será que um remédio não está interferindo na ação do outro? Neste contexto, o grande desafio dos profissionais da área da saúde é contribuir na promoção do uso racional dos medicamentos (MOREIRA et al., 2020).

A conscientização sobre o uso do medicamento de forma segura. E vamos tentar desmistificar o fato que “o médico bom é aquele que prescreve medicamentos”. Pelo contrário, o bom profissional da saúde é aquele que consegue utilizar diferentes tipos de tratamento, além do tratamento farmacêutico. Ou seja, o tratamento ou controle de determinada doença pode ser realizado em parceria com outras formas, como a prática de exercícios físicos, alimentação adequada, dentre outros. É um comprimido a menos para ingerir, é um medicamento a menos para pagar. Vamos consumir somente o que realmente é necessário (CONSTANTINO et al., 2020).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O correto uso dos fármacos nas mais formas e dimensões nos quais são apresentados aos seus diversos usuários, ainda é a melhor forma de garantia do sucesso. Além de evitar problemas/agravantes que acarretaram graves sequelas pelo resto da vida. Um diagnóstico de uma doença crônica muda todo o estilo de vida de uma pessoa, porém a ajuda multidisciplinar pode modificar essas mudanças, contribuindo para a aderência e garantia da continuidade da terapêutica fora do domicílio hospitalar ou ambulatorial.

O fato de usar mais de cinco tipos de medicamentos ao dia, pode e gera uma complicação na mente de quem acaba de tornar-se usuário desta nova prática, somando com a falta do conhecimento específico sobre esta nova prática, torna-se um fator que prepondera para o abandono da terapêutica. Todos os profissionais têm um papel

importante no desenvolver desta prática, onde cada especialidade precisa viver o momento juntamente com o paciente, enxergando as dificuldades, as vantagens, e acima de tudo a vontade de viver.

Portanto, seja consciente sobre o uso de medicamentos. Converse com os profissionais da área da saúde sobre seus medicamentos: número, dosagens, tempo de utilização, real necessidade da prescrição, utilização simultânea com outros remédios, etc. Dessa forma, estaremos contribuindo para o uso racional de medicamentos e evitando os agravos advindos da polifarmácia.

REFERÊNCIAS

CONFORTIN, Susana Cararo et al. **Autopercepção positiva de saúde em idosos: estudo populacional no Sul do Brasil.** *Cad. Saúde Pública* [online]. 2015, vol.31, n.5, pp.1049-1060. ISSN 0102-311X. [Http://dx.doi.org/10.1590/0102-311X00132014](http://dx.doi.org/10.1590/0102-311X00132014).

CONSTANTINO, Juliana Lima et al. Polypharmacy, inappropriate medication use and associated factors among brazilian older adults. **Cad. saúde colet.**, Rio de Janeiro, v. 28, n. 3, p. 400-408, Sept. 2020.

GERBER, Elizângela et al. **Estudos das interações medicamentosas em idosos residentes em instituição de longa permanência.** INFARMA Ciências Farmacêuticas. V1. Nº 1. 2015

MANSO, Maria Elisa Gonzalez.et al. Prescrição inadequada de medicamentos a idosos portadores de doenças crônicas em um plano de saúde no município de São Paulo, Brasil. **Rev. bras. geriatr. gerontol.** [online]. 2015.

MARQUITO, Alessandra Batista et al. Pharmacotherapy assessment in chronic kidney disease: validation of the PAIR instrument for use in Brazil. **Braz. J. Nephrol.**, São Paulo, v. 42, n. 4, p. 400-412, Dec. 2020.

MOREIRA, Francisca Sueli Monte et al. Uso de medicamentos potencialmente inapropriados em idosos institucionalizados: prevalência e fatores associados. **Ciênc. saúde coletiva**, Rio de Janeiro, v. 25, n. 6, p. 2073-2082, June 2020.

OLIVEIRA, Henrique Souza Barros de et al. Risk factors associated with potential cardiovascular and cerebrovascular adverse events in elderly individuals assisted at secondary level. **Rev. Assoc. Med. Bras.**, São Paulo, v. 66, n. 8, p. 1087-1092, Aug. 2020.

PAGNO, Andressa Rodrigues et al. Drug therapy, potential interactions and iatrogenesis as factors related to frailty in the elderly. **Rev. bras. geriatr. gerontol.**, Rio de Janeiro, v. 21, n. 5, p. 588-596, Oct. 2018.

SANCHEZ-MOYA, Jessica; SANZ-VALERO, Javier; LOPEZ-PINTOR, Elsa. Intervenciones desde la farmacia comunitaria en los pacientes adultos que reciben atención de la salud a domicilio: revisión exploratoria. **Hosp.**

SILVA, Michael Ruberson Ribeiro da et al. Uso de medicamentos e fatores associados à polifarmácia em indivíduos com diabetes mellitus em Minas Gerais, Brasil. **Ciênc. saúde coletiva**, Rio de Janeiro, v. 23, n. 8, p. 2565-2574, Aug. 2018.

STUCCHI-PORTOCARRERO, Santiago; SAAVEDRA, Javier E. Polifarmacia psiquiátrica en personas con esquizofrenia en un establecimiento público de salud mental en Lima. **Rev Neuropsiquiatr**, Lima, v. 81, n. 3, p. 145-153, jul. 2018.

TELES, Miguel Oliva; FONSECA, Margarida R.; PAROLA, Ana Gomes. Improving Elderly Patients Medication Appropriateness in an Internal Medicine Ward: Application of the STOPP/START Criteria. **Medicina Interna**, Lisboa, v. 27, n. 2, p. 37-46, abr. 2020.

CAPÍTULO XV

POLÍTICAS PÚBLICAS NO ENFRENTAMENTO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS: UM OLHAR SOBRE A PRODUÇÃO DO CUIDADO A PARTIR DO PROGRAMA HIPERDIA

Juliana Latini Azevedo⁶³; Laura Nunes Oliveira Soares⁶⁴;
Maria Eduarda Bianchi Reis Guimarães⁶⁵; Jade de Paula Brum⁶⁶;
Paula Altoé Carvalho⁶⁷; Daniela Lacerda Santos⁶⁸;
Júlia Barcelos Poubel⁶⁹.

DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2021.02-15

RESUMO:

O Programa Hiperdia foi criado em 2001, dando continuidade às políticas públicas implementadas anteriormente, desde a institucionalização do Sistema Único de Saúde e da proposta de mudança do modelo hegemônico da saúde à época. Este programa é crucial para o acompanhamento de duas Doenças Crônicas Não Transmissíveis, que apresentam carga significativa para o sistema de saúde, a Hipertensão Arterial Sistêmica e a Diabetes Mellitus. Objetivo: o estudo objetivou mapear uma linha do tempo com as principais políticas de saúde que antecederam a criação do Programa Hiperdia, além de outras posteriores visto a aprimorar o cuidado e assistência no enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis. Método: pesquisa qualitativa, com coleta e análise de documentos governamentais, disponíveis nos sites ministeriais, com foco em construir uma ordem cronológica da implementação das políticas. Resultados: Observa-se a contínua preocupação na implementação de políticas públicas no bojo da promoção e prevenção em saúde, desde discussões anteriores à conformação do SUS, até a reestruturação da Atenção Básica com a Estratégia de Saúde da Família e posteriormente a Política Nacional de Promoção à Saúde, o Pacto pela Vida, o Programa Hiperdia e toda

⁶³ Estudante de Medicina do Centro Universitário Arthur Sá Earp Neto/Faculdade de Medicina de Petrópolis. Ligante da Liga de Saúde da Família e Sociedade do Centro Universitário Arthur Sá Earp Neto/Faculdade de Medicina de Petrópolis. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7112233549221459>. E-mail: jujulatini99@gmail.com

⁶⁴ Estudante do 3 período de Medicina do Centro Universitário Arthur Sá Earp Neto/Faculdade de Medicina de Petrópolis. Diretora de relações públicas da Liga de Medicina do Esporte e Exercício do Centro Universitário Arthur Sá Earp Neto/Faculdade de Medicina de Petrópolis. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2848522366554103>. E-mail: lauranunesssoares15@gmail.com

⁶⁵ Estudante de Medicina do Centro Universitário Arthur de Sá Earp Neto/ Faculdade de Medicina de Petrópolis. Ligante da Liga de Medicina do Esporte e Exercício do Centro Universitário Arthur de Sá Earp Neto/ Faculdade de Medicina de Petrópolis. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7032001817931882>. E-mail: dudaguimaraes1150@gmail.com

⁶⁶ Estudante de Medicina do Centro Universitário Arthur de Sá Earp Neto/ Faculdade de Medicina de Petrópolis. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0536673917278437>. E-mail: jade_brum@yahoo.com.br

⁶⁷ Estudante de Medicina do Centro Universitário Arthur Sá Earp Neto/Faculdade de Medicina de Petrópolis. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7803217620298511>. E-mail: paulaaltoec@hotmail.com

⁶⁸ Doutora em Saúde Coletiva, na área de Política, Planejamento, Administração em Saúde, pelo Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IMS/UERJ). Professora da Faculdade de Medicina de Petrópolis - Fundação Octacílio Gualberto (FMP/FOG). E-mail: enfdanielalacerda@gmail.com

⁶⁹ Estudante de Medicina do Centro Universitário Arthur Sá Earp Neto/Faculdade de Medicina de Petrópolis. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9367706506689750>. E-mail: juliapoubel2609@gmail.com

sua rede de apoio nas ações de vigilância em saúde, o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis e vários outros também significantes. Conclusão: Várias políticas de saúde, implementadas isoladamente em uma sociedade tão desigual, não produzirão resultados positivos na saúde da população; visto a manutenção dos determinantes da saúde no processo de saúde e doença. Urge-se pelo fortalecimento e continuidade de políticas de distribuição de renda, de moradia, de educação para minimizar as lacunas de acesso da maioria da população brasileira.

PALAVRAS-CHAVE: Políticas Públicas. Diabetes Mellitus. Hipertensão Arterial. Sistema Único de Saúde

PUBLIC POLICIES IN COPING WITH NON-TRANSMISSIBLE CHRONIC DISEASES: A VIEW ON THE PRODUCTION OF CARE FROM THE HYPERDIA PROGRAM

ABSTRACT:

The Hiperdia Program was created in 2001, continuing the public policies previously implemented, since the institutionalization of the Unified Health System and the proposal to change the hegemonic model of health at the time. This program is crucial for the monitoring of two Chronic Noncommunicable Diseases, which have a significant burden on the health system, Systemic Arterial Hypertension and Diabetes Mellitus. Objective: the study aimed to map a timeline with the main health policies that preceded the creation of the Hiperdia Program, in addition to subsequent ones aimed at improving care and assistance in coping with Chronic Noncommunicable Diseases. Method: qualitative research, with collection and analysis of government documents, available on ministerial websites, with a focus on building a chronological order for the implementation of policies. Results: There is a continuing concern with the implementation of public policies in the midst of health promotion and prevention, from discussions prior to the formation of SUS, to the restructuring of Primary Care with the Family Health Strategy and later the National Promotion Policy. to Health, the Pact for Life, the Hiperdia Program and all its support network for health surveillance actions, the Strategic Action Plan for Coping with Chronic Noncommunicable Diseases and several other significant ones. Conclusion: Several health policies, implemented in isolation in such an unequal society, will not produce positive results in the health of the population; considering the maintenance of health determinants in the health and disease process. There is an urgent need for the strengthening and continuity of income distribution, housing and education policies to minimize the access gaps of the majority of the Brazilian population.

KEYWORDS: Public Policies. Diabetes Mellitus. Hypertension. Unified Health System.

INTRODUÇÃO

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) englobam um dos principais desafios mundiais de saúde, principalmente, em países de baixa renda, em que os

determinantes sociais da saúde são reflexos do abismo das desigualdades enfrentadas pela população, o que é maximizado pelo confronto frequente com o recrudescimento de doenças transmissíveis antes erradicadas (MS, 2011). Sendo que:

As DCNT são as principais causas de morte no mundo, correspondendo a 63% dos óbitos em 2008. Aproximadamente 80% das mortes por DCNT ocorrem em países de baixa e média renda. Um terço dessas mortes ocorre em pessoas com idade inferior a 60 anos (MS, 2011, p 11).

Além disso, nos últimos anos, houve uma intensificação de práticas pró-sedentarismo modernas, com crescente ingestão de álcool, aumento da incidência de sobrepeso e obesidade, aumento da expectativa de vida, em que as modificações na pirâmide etária da população geraram uma maior vulnerabilidade de desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis (GRZELCZAK, 2015). Tal suscetibilidade se estabelece considerando que sedentarismo, tabagismo e alimentação inadequada são os principais fatores de risco para o surgimento das DCNT, como câncer, hipertensão, diabetes e doenças respiratórias (MS, 2011).

Entre as Doenças Crônicas Não Transmissíveis, a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e a Diabetes Mellitus (DM) representam as síndromes metabólicas, cujo aumento da prevalência está diretamente relacionada com o aumento dos fatores de risco supracitados e tão presentes na sociedade atual.

Tal consequência torna-se evidente na medida em que os índices de morbimortalidade dos brasileiros relacionados à Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e ao Diabetes Mellitus (DM) mostram-se em uma expansão significativa (GRZELCZAK, 2015). A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma condição crônica de origem multifatorial, caracterizada por níveis elevados e mantidos da pressão arterial (PA), vista como o principal fator de risco para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio, derrame cerebral e insuficiência renal, representando o acometimento de cerca de 35% da população de 40 anos e mais, compondo 17 milhões de portadores no país (MS, 2014).

A Diabetes Mellitus é uma doença caracterizada pela exibição de uma hiperglicemia constante decorrente das modificações insulínicas, tais quais a

incapacidade de utilizá-la adequadamente e a falta da insulina em determinado organismo, gerando uma resistência insulínica - quando as células são incapazes de responder normalmente a essa. A DM apresenta duas classificações (insulino-dependente e não-insulinodependente) e ambas podem gerar a longo prazo o aparecimento de complicações decorrentes da doença crônica, fato que se relaciona a alta taxa de mortalidade específica (TME), medida por 100 mil habitantes que, em 2011, constatou o índice de 30,1 no Brasil (SBD, 2019).

Esse quadro alarmante das duas DCNT de ampla prevalência acarreta impactos no setor da saúde, estabelecendo gastos expressivos, principalmente, no que tange às intervenções e às hospitalizações por essas patologias, além de gerar complicações graves que influenciam negativamente a autonomia dos pacientes. Por isso, fez-se necessário o desenvolvimento e a instituição de políticas públicas voltadas à prevenção e à atenção integral tanto aos portadores, quanto aos indivíduos potenciais, a fim de reverter essa problemática, fundamentando-se numa precedência desafiadora a ser enfrentada por múltiplos níveis de gestão do SUS (MS, 2011).

Pensando nessa assistência, desde 2002, o Programa Hiperdia (BRASIL, 2002) oferecido pelo Ministério da Saúde pôde promover um sistema de cadastramento e acompanhamento dos indivíduos hipertensos e diabéticos, estrategicamente implementado a fim de reduzir os custos do Sistema Único de Saúde (SUS) e de criar um melhor atendimento. Nesse sentido, o programa se coloca como um marco importante na gestão de saúde pública brasileira, sendo necessária a análise de seus aperfeiçoamentos com o fito de providenciar a ampliação e o aprimoramento constante do suporte da Atenção Básica às doenças crônicas

Assim, esse trabalho tem como objetivo apresentar uma linha do tempo com as principais políticas de saúde que antecederam a criação do Programa Hiperdia, além de outras tantas que, posteriormente, puderam aprimorar o cuidado e assistência no enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este trabalho consiste em uma pesquisa qualitativa exploratória, desenvolvida através de uma análise documental realizada em janeiro de 2021 por estudantes que cursam o 3º período de Medicina do Centro Universitário Arthur de Sá Earp Neto (UNIFASE). A partir da coleta de dados de documentos governamentais para melhores observações e estudo acerca da assistência ao público-alvo desta pesquisa (hipertensos e diabéticos) foi realizada uma linha do tempo com as informações encontradas, descrevendo como o SUS organizou suas políticas públicas assistenciais. Tendo como base as mudanças epidemiológicas brasileiras e as necessidades de aprimoramento da saúde, recolhemos políticas públicas essenciais que pudessem influenciar o Programa Hiperdia.

Em meio ao contexto de pandemia causada pelo vírus COVID-19, este trabalho foi concebido mediante o levantamento de dados no ambiente virtual (sites ministeriais) e bases bibliográficas, com a percepção da relevância do Programa Hiperdia no cenário nacional. Posteriormente, foram realizadas semanalmente na plataforma Zoom discussões plurais e críticas relacionadas às políticas e suas conjunturas históricas. Assim, esse projeto foi elaborado, expandindo-se ao cerne das limitações e restrições geradas nas circunstâncias atuais, a partir da busca em bases bibliográficas a fim de atingir uma crítica interpretação para a construção deste artigo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O olhar sobre a produção do cuidado a partir do Programa Hiperdia (BRASIL, 2002) consistiu em construir uma linha do tempo da evolução da política pública para as DCNT, considerando os hipertensos e diabéticos, a implementação do programa em 2002 e as políticas subsequentes até os dias atuais. Essa linha do tempo foi costurada epistemologicamente considerando as ações de acompanhamento do perfil epidemiológico da população, com foco na promoção e prevenção da saúde.

Ao pensar nas ações de promoção e prevenção em saúde, permite-se revisitar a declaração de Alma Ata de 1978, que, além de recomendar saúde para todos até os anos 2000, propunha a relevância das ações intersetoriais desse âmbito frente ao adoecimento da população. No Brasil, o movimento da Reforma Sanitária, na década seguinte,

propunha, além das mudanças na conjuntura política, um novo modelo de atenção à saúde, centrado em ações promotoras e profiláticas, ordenado a partir da Atenção Primária (ANDRADE et al, 2015).

Com a Constituição Federal de 1988 e a definição de saúde como um direito a ser assegurado, foi promulgada a maior política em saúde, o Sistema Único de Saúde (SUS) definido com os princípios da universalidade, da equidade e da integralidade, transfigurando-se como um marco importante no panorama histórico de conquistas a favor da justiça social. Da mesma forma, a fim de promover o acesso à saúde de maneira descentralizada, a prioridade no atendimento integral tornou-se voltada prioritariamente às ações preventivas, sem acometer as atividades assistenciais da população e incentivando a maior participação da sociedade (BRASIL, 1988).

Dois anos depois, em 1990, foi aprovada a Lei Orgânica da Saúde (LOAS) que, além de regulamentar o SUS, abordou condições para promover, proteger e recuperar a saúde, assim como para a organização e o funcionamento dos serviços (BRASIL, 1990). A LOAS apresenta os princípios e diretrizes do SUS, define suas ações e a organização dos serviços; assim como a vigilância epidemiológica, com o acompanhamento do perfil de adoecimento da população.

Pensando na atuação do papel da Atenção Básica, em 1993, foi elaborada a primeira proposta do Programa Saúde da Família (PSF) com o objetivo de dar forma para a Atenção Básica, porta de entrada do SUS, de modo a diminuir a intensa demanda sobre os hospitais da época. Tal programa originou-se primeiramente como Programa de Agentes Comunitários a Saúde (PACS), sendo hoje conhecido como Estratégia Saúde da Família (ESF), a qual busca promover uma melhor assistência e qualidade de vida para a população por meio da Atenção Básica, sem a necessidade de intervenção de média e alta complexidade em uma Unidade de Pronto Atendimento (MS, 2010).

Dada uma distância histórica de oito anos sem políticas específicas ao tema, em 2001, a Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS) implementou as diretrizes para a ampliação do acesso e da qualidade da Atenção Básica, definindo o controle da HAS como sua área de atuação de estratégia mínima (BARRETO et al, 2013). Ainda nesse mesmo ano, o Ministério da Saúde implantou o Plano de Reorganização da Atenção

à HAS e ao Diabetes mellitus (DM), com a função de diminuir as taxas de agravamento dessas doenças, além de assegurar o diagnóstico e o vínculo do paciente com às Unidades Básicas de Saúde (UBS). Tal ferramenta contou com a Campanha Nacional de Detecção de DM e com a Campanha Nacional de Detecção da HAS, o que permitiu um rastreamento, ainda que limitado, de portadores dessas patologias, ocasionando uma maior possibilidade de auxílio e, ao mesmo tempo, uma minimização de vulnerabilidades MS, 2014).

Essas campanhas ascenderam com a criação do Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos, o SisHIPERDIA, também chamado de HIPERDIA. O sistema possibilita, através do registro dos portadores e potenciais desenvolvedores dessas doenças, a garantia do recebimento dos medicamentos necessários aos seus tratamentos, além de, a partir do perfil epidemiológico dos habitantes de certo território, outorgar as estratégias específicas de saúde pública no objetivo de mudar o quadro alarmante a favor do bem-estar e da autonomia dessas pessoas. Para isso, o Programa gera dados para o Cartão Nacional de Saúde, cujo papel é assegurar a identificação única do usuário e, ao mesmo tempo, há a disponibilização desses materiais informativos na plataforma digital do Departamento de Informática do SUS (DATASUS), como um conjunto de subsistemas, municipais e federais, que compõem uma base nacional (BRASIL, 2011).

No ano subsequente (2002), o Programa Nacional de Assistência Farmacêutica para HAS e DM foi criado com o intuito de viabilizar aos indivíduos cadastrados medicamentos que são necessários à terapêutica, como a insulina NPH e a glibenclamida. A implementação dessa assistência foi de grande importância, visto que o acesso da população aos fármacos é fundamental, uma vez que eles possibilitam a prevenção, o controle e o tratamento dessas DCNT (BRASIL, 2002).

Dois anos depois, em 2004, o Ministério da Saúde, junto com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), organizou e fundou o Programa Farmácia Popular do Brasil (FPB). Essa medida foi um marco para a saúde pública, pois fornece gratuitamente medicamentos essenciais para o tratamento de doenças crônicas, possibilitando uma maior democratização e expansão do acesso à saúde. Além disso, o alcance social desse programa consolida como é significativo o Estado brasileiro implementar iniciativas e

estratégias de ação para garantir a assistência terapêutica e farmacêutica integral da população (MS, 2005). Dessa forma, os programas vão crescendo e alcançando maiores extensões no território nacional.

Já em 2006, houve a implementação do Pacto da Saúde, através da Portaria MS/GM nº 399 de 22 de fevereiro, que define, inclusive, os eixos prioritários de cuidado com o Pacto pela Vida. Este, por sua vez, apresenta-se como uma ação de cuidado e de autonomia para os indivíduos que desenvolveram quadros de adoecimento, sendo compreendido como uma ação sanitária de atenção integral, que pressupõe a criação de vínculos de corresponsabilidade entre o profissional de saúde e aquele que busca seu saber técnico específico para o alívio do seu sofrimento. Assim, para a efetividade do cuidado aos doentes crônicos, faz-se necessária uma ação proativa dos sujeitos na busca de comportamentos que considerem hábitos de vida saudáveis e acarretem o controle da patologia (BRASIL, 2006).

Em conjunto com o Pacto pela Saúde, foi inaugurado no mesmo ano o Manual Diretrizes e Recomendações para o Cuidado Integral de Doenças Crônicas Não-transmissíveis: Promoção da saúde, Vigilância, Prevenção e Assistência, o qual aborda entre as suas doenças prioritárias a HAS e a DM. Este manual propõe a cooperação das três esferas de gestão do sistema sanitário, para a elaboração de estratégias de prevenção de doenças, da melhoria da promoção da saúde e da coleta de dados adequados para a avaliação da eficácia das ações em saúde (MS, 2008). Nota-se a importância dada às ações de promoção em saúde, com a promulgação neste mesmo ano, de uma política específica (Política Nacional de Promoção da Saúde), através da Portaria nº 687 de 30 de março de 2006, com objetivo de promover a qualidade de vida e diminuir a indefensibilidade e os riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e agentes. Esse plano amplifica o compromisso do MS no desenvolvimento de ações e serviços que respondam às necessidades sociais e garantam bem-estar total da população (BRASIL, 2006).

Nos anos seguintes, o Brasil acompanha o cenário mundial com o aumento da prevalência das DCNT e, em 2011, há o lançamento do Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil (MS, 2011), com foco no enfrentamento dos fatores de risco, com ações de promoção em saúde; como por exemplo para a redução do tabagismo, sedentarismo, entre outros.

Nesse ínterim, o Governo Nacional instituiu o Guia Metodológico de Avaliação e Definição de Indicadores de DCNT e Rede Carmen, com a responsabilidade do desenvolvimento e da efetivação de políticas, no intuito de diminuir amplamente os múltiplos fatores de risco comuns existentes nas DCNT, além de gerar mobilização social, exercitar a vigilância epidemiológica e promover atividades que auxiliem na prevenção para a minimizar o abismo das desigualdades encontradas na saúde. (BARRETO et al, 2013).

O Brasil também investiu em desenvolvimento de pesquisas e estudos referentes às condições de vida e saúde da população e de grupos que apresentam fatores de risco para o desenvolvimento das DCNT, por meio do Departamento de Ciência e Tecnologia (DECIT). Esse realiza a Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que efetua, anualmente, a Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar (PNAD). (BARRETO et al, 2013).

Considerando que “[...] política pública é uma diretriz elaborada para enfrentar um problema público” (SECCHI; COELHO; PIRES, 2019, p 2) e que o aumento das DCNT sobrecarrega o sistema de saúde, com impacto econômico e social sobre o país; observa-se que os atores governamentais construíram metas e planos nacionais, identificaram o problema e implementaram políticas públicas no confronto das DCNT. No entanto, o que chama atenção é a dificuldade de obter os resultados esperados, considerando a existência de políticas e programas e da proposta de mudança do modelo de atenção à saúde há quase 30 anos.

CONCLUSÕES

Evidencia-se que, ao longo dos anos, houve uma preocupação exaustiva com as ações de promoção em saúde, visando reduzir a vulnerabilidade do processo de adoecimento da população e consequentemente melhorar os indicadores em saúde com relação às DCNT. Entretanto, apesar de todas as políticas implementadas, essas não conseguiram reduzir as desigualdades sociais, seja no acesso aos serviços de saúde, seja nas condições de moradia, trabalho, educação e renda.

Enquanto existirmos como sociedade, apresentando graves disparidades, em que 1% da população detém 30% dos recursos financeiros, os determinantes sociais em saúde serão imperativos na desigualdade das condições de saúde e vida da população. As políticas de saúde necessitam estar integradas com políticas educacionais e políticas de distribuição de renda, visando alcançar uma sociedade mais justa e igualitária.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, L, O, M; BARRETO, I, C, H, C; BEZERRA, R, C; SILVA, R, M. Atenção Primária à Saúde e Estratégia Saúde da Família. In: CAMPOS, G, W, S; BONFIM, J, R, A; MINAYO, M, C, S; AKERMAN, M; JUNIOR, M, D; CARVALHO, Y, M (Org). **Tratado de Saúde Coletiva**. São Paulo: HUCITEC EDITORA, 2015, 968 p.

BRASIL. Presidência da República. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**.

BRASIL. Presidência da República. **Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990** [Dispõe sobre as condições de promoção e proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências].

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria GM nº 371 de 04 de março de 2002**.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria GM nº 687 de 30 de março de 2006** [Aprova a Política de Promoção da Saúde].

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria GM nº 940 de 28 de abril de 2011** [Regulamenta o Sistema Cartão Nacional de Saúde (Sistema Cartão)].

BARRETO, M, S; SILVA, R, L, D, T; WAIDMAN, M, A, P; MARCON, S, S. **A trajetória das políticas públicas de saúde para Hipertensão Arterial Sistêmica no Brasil**. Rev. APS, 2013, p 460-468

GRZELCZAK, M, T. **Políticas públicas de saúde: um estudo sobre a qualidade de vida, sedentarismo e o impacto econômico do diabético, no sistema municipal de saúde**. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional) – Universidade do Contestado-UnC, Campos Canoinhas. Canoinhas, p 78, 2015.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Fundação Oswaldo Cruz. **Programa Farmácia Popular do Brasil**. Brasília-DF, 2005, 102p.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Diretrizes e Recomendações para o Cuidado Integral de Doenças Crônicas não Transmissíveis**. Promoção da Saúde, Vigilância, Prevenção e Assistência. Brasília- DF, 2008, 74p.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Memórias da Saúde da Família no Brasil**. Brasília- DF, 2010, 146 p.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) no Brasil**. Série B. Textos Básicos de Saúde. Brasília- DF, 2011, 160p.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Cadernos de Atenção Básica. Estratégias para o Cuidado da Pessoa com Doença Crônica**. Hipertensão Arterial Sistêmica. Brasília-DF, 2014, 130p.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. **Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes 2019-2020**. Clannad Editora Científica, 2019, 491 p.

SECCHI, L; COELHO, F,S; PIRES, W. **Políticas Públicas. Conceitos, Casos Práticos, Questões de Concurso**. CENGAGE, 2020, 250p.

CAPÍTULO XVI

PROPEDÊUTICA DIAGNÓSTICA REFERENTE À ESCLEROSE MÚLTIPLA DESCRITAS NA LITERATURA

Matheus Alves de Souza⁷⁰; Miguel Pereira Goulart Neto⁷¹;
Isadora Medrado Goulart⁷²; Natália Inácio Beltramini⁷³;
Ana Júlia Ferreira da Silva⁷⁴; Luana Martins Camilo⁷⁵;
Guilherme Henrique Pagliarani⁷⁶; Vinícius Lopes Imamura⁷⁷;
Matheus Scabini Fernandez⁷⁸; Lara Oliveira Soares⁷⁹;
Miriam Pardini Gomes⁸⁰.

DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2021.02-16

RESUMO:

A esclerose múltipla (EM) é uma doença crônica autoimune. Esta patologia é considerada crônica e progressiva, que se define por uma disfunção do sistema nervoso causando a perda da bainha de mielina nos diferentes territórios do Sistema Nervoso Central (SNC), seja na medula espinhal ou no encéfalo. Assim, está relacionada a uma inflamação e destruição dos axônios, afetando a condução dos impulsos nervosos, provocando sintomas físicos e cognitivos no sujeito. O objetivo deste trabalho é discutir por meio de uma revisão literária as propedêuticas diagnósticas referentes à Esclerose Múltipla. O estudo realizado do tipo de revisão bibliográfica, e efetuou-se um levantamento bibliográfico nas bases de dados, Capes, Scielo, Google acadêmico, Banco de teses USP. Para a realização do trabalho científico foi necessário a busca em sites por meio da associação dos seguintes descritores: Esclerose Múltipla, Doenças Desmielinizantes, Doenças Autoimunes, Diagnóstico. Os sintomas apresentados pelos portadores dependem do tamanho, como também do local da lesão. Em fase inicial, os sintomas são

⁷⁰Discente do curso de medicina da Universidade Brasil, Fernandópolis, São Paulo. E-mail: alves.math@outlook.com.br

⁷¹Discente do curso de medicina da Universidade Brasil, Fernandópolis, São Paulo. E-mail: netogoulart.estudos@gmail.com

⁷²Discente do curso de medicina da Universidade Brasil, Fernandópolis, São Paulo. E-mail: Isadora08_10@hotmail.com

⁷³Discente do curso de medicina da Universidade Brasil, Fernandópolis, São Paulo. E-mail: natbeltramini@gmail.com

⁷⁴Discente do curso de medicina da universidade Nove de Julho campus Vergueiro. E-mail: anawarteca@uni9.edu.br

⁷⁵Discente do curso de medicina da Universidade Brasil, Fernandópolis, São Paulo. E-mail: luanamartins67@gmail.com

⁷⁶Discente do curso de medicina da Universidade Brasil, Fernandópolis, São Paulo. E-mail: guihpag@gmail.com

⁷⁷Discente do curso de medicina da Universidade Brasil, Fernandópolis, São Paulo. E-mail: viniciusimamura1@gmail.com

⁷⁸Discente do curso de medicina da Universidade Brasil, Fernandópolis, São Paulo. E-mail: matheuscanarinho@hotmail.com

⁷⁹Discente do curso de medicina da Universidade de Marília, São Paulo. E-mail: larasolv@hotmail.com

⁸⁰Discente do curso de medicina da Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, São Paulo. E-mail: miriampardini@hotmail.com

sutis, que gradativamente, com a evolução da doença, tornam-se incapacitantes. O diagnóstico é pungente, tanto para o médico quanto para o paciente, pois estes não sabem o prognóstico da doença. Os critérios hoje utilizados para confirmação do diagnóstico são os de McDonald, elaborado com base no Painel Internacional sobre Diagnóstico de EM, sendo este citado por todos os autores pesquisados. Os exames realizados englobam exames do LCR para pesquisa de bandas oligoclonais, Imagem por Ressonância Magnética e outros complementares, como dosagem de vitamina B12, VDRL, anti-HIV.

PALAVRAS-CHAVE: Esclerose Múltipla. Doenças Desmielinizantes. Doenças Autoimunes. Diagnóstico.

DIAGNOSTIC PROPEDEUTIC REGARDING MULTIPLE SCLEROSIS DESCRIBED IN THE LITERATURE

ABSTRACT:

Multiple sclerosis (MS) is a chronic autoimmune disease. This pathology is considered chronic and progressive, which is defined by a dysfunction of the nervous system causing the loss of the myelin sheath in the different territories of the Central Nervous System (CNS), either in the spinal cord or in the brain. Thus, it is related to inflammation and destruction of axons, affecting the conduction of nerve impulses, causing physical and cognitive symptoms in the subject. The study carried out the type of bibliographic review, and a bibliographic survey was carried out in the databases, Capes, Scielo, Google academic, Banco de theses USP. In order to carry out the scientific work, it was necessary to search websites through the association of the following descriptors: Multiple Sclerosis, Demyelinating Diseases, Autoimmune Diseases, Diagnosis. The symptoms presented by the patients depend on the size, as well as the location of the lesion. In the initial phase, the symptoms are subtle, which gradually, with the evolution of the disease, become disabling. The diagnosis is poignant, both for the doctor and for the patient, as they do not know the prognosis of the disease. The criteria used today to confirm the diagnosis are those of McDonald's, prepared based on the International Panel on Diagnosis of MS, which is cited by all the authors surveyed. The tests performed include CSF tests to search for oligoclonal bands, Magnetic Resonance Imaging and other complementary ones, such as vitamin B12, VDRL, anti-HIV dosage.

KEYWORDS: Multiple sclerosis. Demyelinating Diseases. Autoimmune diseases. Diagnosis.

INTRODUÇÃO

A esclerose múltipla (EM) é uma doença crônica autoimune. Esta patologia é considerada progressiva, que se define por uma disfunção do sistema nervoso causando a perda da bainha de mielina nos diferentes territórios do Sistema Nervoso Central (SNC), seja na medula espinhal ou no encéfalo. Assim, está relacionada a uma inflamação e

destruição dos axônios, afetando a condução dos impulsos nervosos, provocando sintomas físicos e cognitivos no sujeito (BÔA, 2017).

Em uma análise histológica, podem-se notar lesões inflamatórias perivenulares, as quais são evidentes nas fases anteriores da doença, resultando em placas desmielinizantes. A inflamação leva a danos nos oligodendrócitos e desmielinização, interrompendo a retransmissão de sinais neuronais nas regiões afetadas. Conforme a doença progride, surgem deficiências e danos permanentes nos neurônios (KARUSSIS, 2014).

Os dados de prevalência referente à EM apresentam uma grande variação de prevalência no mundo, sendo que esses dados possuem uma relação com o gradiente latitudinal. Em análise observa-se maior prevalência em áreas localizadas acima da linha do Equador. De acordo com os índices do território brasileiro, percebe-se maior prevalência na região Sudeste de 12 a 18 casos por 100.000 habitantes e na região Sul que apresenta uma variação entre 14 a 27 casos, para 100.000 habitantes, fato que comprova a existência do fator latitudinal (DOSHI, 2016).

Segundo o relatório da Federação Internacional de Esclerose Múltipla para a Organização Mundial de Saúde (OMS), realizado em 2008, ocorre maior incidência da doença em países da Europa e América do Norte. A América do Sul é considerada região de baixa prevalência, com índices menores que 5 casos por 100.000 habitantes (CALEGARO; SATO, 2011; RIBEIRO et al., 2011).

A doença ocorre principalmente na fase adulto jovem, com pessoas de idade inferior a 40 anos, sendo exatamente este um momento crucial para o desenvolvimento profissional e/ou acadêmico do indivíduo (VUKUSIC, 2007).

Os fatores ambientais e genéticos são mecanismos de autoagressão que permitem o desenvolvimento da moléstia. Esta fisiopatologia reflete diretamente em fatores ambientais, como por exemplo, no impacto do retrovírus endógeno humano (HERV) e pela *Chlamydia pneumoniae*; a falta de exposição a luz solar com consequente menor produção de vitamina D pelo organismo, e a menor exposição a bactérias e parasitas durante a infância, levando a alteração na maturação do sistema imunológico. Além disso, outro fator atrelado é o tabagismo, o qual pode também estar implicado no maior risco de

desenvolvimento da doença. Os genes que conferem susceptibilidade à doença são os do chamado HLA DRB1 e DQB1, situados no cromossoma 6. Os genes do sistema HLA são responsáveis pela codificação das proteínas da superfície das células que apresentam os antígenos, e de muitos outros genes. O sistema imunológico usa os HLAs para diferenciar as células do próprio organismo de células estranhas ao organismo (MOTA, 2009).

Os principais sintomas são: perda da visão, visão dupla, rigidez, fraqueza, falta de equilíbrio, dormência, dor, problemas da bexiga/intestinos e fadiga. Assim como também pode ocorrer a diminuição da função cognitiva, as mais frequentes são alterações na memória, atenção, execução de tarefas, percepção visual e fluência verbal. Ainda, o sujeito pode apresentar alterações mentais, sendo as mais comuns a depressão e a ansiedade. Normalmente as primeiras manifestações da patologia não são reconhecidas, isso porque os sintomas que iniciam o quadro podem variar. Além disso, o tipo e o número de sintomas dependem do local que ocorreu a lesão na bainha de mielina (OH, 2018).

Em relação ao diagnóstico, ele é clínico, com base no histórico relatado, na avaliação dos sintomas percebidos e relatados pelo paciente, juntamente com exames de Ressonância Magnética, Tomografia Computadorizada, análise do Líquido Cefalorraquidiano (que irá dosar as imunoglobulinas e pesquisar bandas oligoclonais para comparação com valores sanguíneos) e testes complementares. Existe, também, um método de diagnóstico da EM realizado pelo Potencial Evocado Miogênico Vestibular (VEMP), que avalia a via vestibulo-espinal a partir de mácula de sáculo (ZIEGELBOIM, 2010).

OBJETIVO

O objetivo deste trabalho é discutir por meio de uma revisão literária as propedêuticas diagnósticas referentes à Esclerose Múltipla.

METODOLOGIA

O estudo realizado do tipo de revisão bibliográfica, e efetuou-se um levantamento bibliográfico nas bases de dados, Capes, Scielo, Google acadêmico, Banco de teses USP.

Para a realização do trabalho científico foi necessário a busca em sites por meio da associação dos seguintes descritores: Esclerose Múltipla, Doenças Desmielinizantes, Doenças Autoimunes.

DESENVOLVIMENTO

Com o avanço das técnicas neurorradiológicas, a necessidade de evidência clínica de DIT e DIS foi parcialmente substituída pela evidência radiológica de tal disseminação. Com base neste princípio, um comitê liderado por McDonald, definiu os novos critérios propostos, que foram recentemente revisados com a intenção de utilizar a ressonância magnética para melhorar a sensibilidade diagnóstica e a produtividade sem comprometer a especificidade (KATZ SAND, 2015).

Em geral, os critérios McDonald se concentram na integração de dados clínicos, laboratoriais e radiográficos para estabelecer um diagnóstico de EM. O diagnóstico McDonald de 2001 critérios requerem 2 ataques clínicos variando em tempo e espaço para estabelecer de modo definitivo (KARUSSIS, 2014).

A confirmação do diagnóstico surge a partir da anamnese do paciente e de exames físicos. Os critérios de McDonald associados aos exames de ressonância magnética, potencial evocado e do líquido cefalorraquidiano (LCR) confirmarão o diagnóstico (ARRAMBIDE, 2018).

A identificação por meio do exame do líquido analisa a natureza inflamatória e imunológica das lesões do SNC, através de dados qualitativos e quantitativos da resposta imunológica intratecal. Este exame serve também como diagnóstico diferencial de algumas moléstias como: neurosífilis, infecção por HTLV I/II, Lyme. O exame revela, na maioria dos casos, que as proteínas totais estão elevadas no líquido, sendo esta elevação de tamanha importância para o diagnóstico, pois ela demonstra a disfunção da barreira hemato-encefálica (VILAR, 2002).

Em relação à quantificação da resposta imune humoral sabe-se que sua realização ocorre a partir da medida da concentração total de imunoglobulinas no LCR (fração gama da eletroforese), concentração absoluta do IgG, e de forma precisa pelo índice

de IgG ($\text{IgG líquido/IgG soro} \div \text{Albumina líquido/Albumina soro}$). Além disso, há outra análise quantitativa da resposta imune humoral intratecal, a qual baseia-se na síntese diária intratecal de IgG que tem correlação direta com o índice de IgG (WANG., 2002).

A efetivação da análise em correlação as variáveis clínicas e laboratoriais demonstra que a avaliação da resposta imune intratecal é realizada por meio de detecção de bandas oligoclonais. Essas bandas são sintetizadas por um ou poucos clones de plasmócitos, derivados de linfócitos B, este fato ocorre devido a presença contínua de um antígeno único e altamente específico (JARIUS, 2009).

Segundo o estudo denominado Esclerose múltipla: correlação clínico-laboratorial, realizado por *Marzia Puccioni-Sohler* mostra que os pacientes com a forma crônica progressiva apresentam com mais frequência síntese intratecal de IgG quantitativamente detectável (76%) em comparação às formas de surto-remissão (48%). Diferenças são também observadas através de estudos clínicos, patológicos e de neuroimagem. Na forma crônica progressiva ocorre constante piora do quadro clínico. A demonstração de processo auto-imune parece ser menos comum na forma crônica progressiva. Maior número e carga das lesões na ressonância magnética têm sido encontrados nos pacientes com evolução recidivante em comparação às formas de EM progressivas primárias. Tratamento com imunomoduladores tais como interferon beta1b, beta 1a ou copolímero resulta em diferentes respostas de acordo com a forma clínica. A eficácia do uso dos interferons já é bem documentada na literatura em pacientes com surto-remissão.

Atualmente, a ressonância magnética é uma importante ferramenta para o diagnóstico, demonstrando precocemente a presença de disseminação do processo desmielinizante no tempo e no espaço. De acordo com o Projeto Diretrizes, denominado por Esclerose Múltipla: Diagnóstico por imagem, desenvolvido pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e pela Academia Brasileira de Neurologia, os critérios aceitos permitem o diagnóstico da EM na primeira manifestação clínica, ou seja, na forma monossintomática da doença conhecida como síndrome clínica isolada. Além disso, a RM é útil para a monitorização da resposta terapêutica permitindo o acompanhamento in vivo de todas as fases evolutivas da EM. Na maioria dos casos descritos a RM apresenta-se alterada em 87 a 95% dos casos e mostra lesões hipointensas em T1 e hiperdensas em cortes com TR longo (T2, DP, FLAIR) e realce pelo contraste das lesões ativas. As áreas que

são acometidas com mais frequência são os centros semi-ovais, substância branca periventricular, corpo caloso, tronco cerebral, radiações ópticas, pedúnculos cerebelares, cerebelo, nervos ópticos e medula espinal (COLÉGIO BRASILEIRO DE RADIOLOGIA; ACADEMIA BRASILEIRA DE NEUROLOGIA, 2012).

A tomografia computadorizada de crânio mostra-se alterada em 36 a 44% dos casos. De acordo com os resultados as imagens relatam lesões com realce na fase que sofre ação do contraste. Além disso, a EM gera um quadro de áreas hipotensas na substância branca, alargamento ventricular e atrofia cerebral. Após o estabelecimento do diagnóstico, deve-se estadiar a moléstia, estabelecendo seu nível de acometimento e a gravidade do caso por meio da Escala Expandida do Estado de Incapacidade (ROVIRA, 2013).

As dosagens de proteínas básicas da mielina, aparecem antes das bandas oligoclonais, fato que é indicativo de destruição mielínica recente. Além disso, os profissionais de saúde devem solicitar exames laboratoriais, como exames anti-HIV e VDRL e dosagem sérica de vitamina B12, no sentido de excluir outras doenças com características parecidas da EM (FERNANDES, 2009).

CONCLUSÃO

A esclerose múltipla (EM) é uma doença desmielinizante crônica do sistema nervoso central de etiologia autoimune presumida, caracterizada por áreas localizadas de inflamação, desmielinização, perda axonal e gliose no cérebro e medula espinal. Os sintomas apresentados pelos portadores dependem do tamanho, como também do local da lesão. Em fase inicial, os sintomas são sutis, que gradativamente, com a evolução da doença, tornam-se incapacitantes. O diagnóstico é pungente, tanto para o médico quanto para o paciente, pois estes não sabem o prognóstico da doença. Os critérios hoje utilizados para confirmação do diagnóstico são os de McDonald, elaborado com base no Painel Internacional sobre Diagnóstico de EM, sendo este citado por todos os autores pesquisados. Os exames realizados englobam exames do LCR para pesquisa de bandas oligoclonais, Imagem por Ressonância Magnética e outros complementares, como dosagem de vitamina B12, VDRL, anti-HIV.

REFERÊNCIAS

- AKTAS, O et al. “**Diagnose der Multiplen Sklerose: Revision der McDonald-Kriterien 2017**” [Diagnosis of multiple sclerosis: revision of the McDonald criteria 2017]. *Der Nervenarzt* vol. 89,12 (2018): 1344-1354. doi:10.1007/s00115-018-0550-0
- ARRAMBIDE G, TINTORE M, ESPEJO C, AUGER C, CASTILLO M, RÍO J, CASTILLÓ J, VIDAL-JORDANA A, GALÁN I, NOS C, MITJANA R, MULERO P, DE BARROS A, RODRÍGUEZ-ACEVEDO B, MIDAGLIA L, SASTRE-GARRIGA J, ROVIRA A, COMABELLA M, MONTALBAN X. **The value of oligoclonal bands in the multiple sclerosis diagnostic criteria.** *Brain*. 2018 Apr 1;141(4):1075-1084. doi: 10.1093/brain/awy006. PMID: 29462277.
- BÔA, Izadora Nogueira Fonte. Desempenho de uma amostra de pacientes com esclerose múltipla remitente-recorrente em memória episódica verbal: um estudo longitudinal. 2017. **Dissertação** (Mestrado em Neurologia) - Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. doi:10.11606/D.5.2018.tde-15022018-130509.
- CALEGARO, D.; SATO, D. **Esclerose múltipla no Brasil: aspectos epidemiológicos da esclerose múltipla no Brasil:** comparativo com estudos internacionais. São Paulo: Novartis, 14p, 2011.
- DOSHI, Anisha, and Jeremy Chataway. “**Multiple sclerosis, a treatable disease.**” *Clinical medicine (London, England)* vol. 16,Suppl 6 (2016): s53-s59. doi:10.7861/clinmedicine.16-6-s53
- FERNANDES, R. D. Vivências de pessoas com esclerose múltipla. 2009, p. 140. **Dissertação** (Mestrado em Saúde Pública). Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal, 2009. Disponível em: < https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/12965/1/RF_tese%20mestrado.pdf
- JARIUS S, EICHHORN P, JACOBI C, et al. **The intrathecal, polyspecific antiviral immune response:** Specific for MS or a general marker of CNS autoimmunity? *J Neurol Sci* 2009; 280: 98–100.
- KARUSSIS, Dimitrios. “**The diagnosis of multiple sclerosis and the various related demyelinating syndromes:** a critical review.” *Journal of autoimmunity* vol. 48-49 (2014): 134-42. doi:10.1016/j.jaut.2014.01.022
- KATZ SAND, Ilana. “**Classification, diagnosis, and differential diagnosis of multiple sclerosis.**” *Current opinion in neurology* vol. 28,3 (2015): 193-205. doi:10.1097/WCO.0000000000000206
- MOTA, Rute Salomé Guedes da. A interacção de factores ambientais na génese da esclerose múltipla. 2009. 67 f. **Dissertação de mestrado em medicina.** Universidade da Beira Interior - Faculdade de Ciências da Saúde. Covilhã, 2009.
- OH J, VIDAL-JORDANA A, MONTALBAN X. **Multiple sclerosis:** clinical aspects. *Curr Opin Neurol*. 2018 Dec;31(6):752-759. doi: 10.1097/WCO.0000000000000622. PMID: 30300239.

PUCCIONI-SOHLER, Marzia et al. Esclerose múltipla: correlação clínico-laboratorial. **Arq. Neuro-Psiquiatr.** São Paulo , v. 59, n. 1, p. 89-91, Mar. 2001. Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-282X2001000100018&lng=en&nrm=iso>. <https://doi.org/10.1590/S0004-282X2001000100018>.

ROCHA AJ, GAMA HPP, BOLZAN A, MENDONÇA RA, MACHADO SN, ANDRADA NC. Colégio Brasileiro de Radiologia e Academia Brasileira de Neurologia. Projeto Diretrizes. **Esclerose Múltipla: Diagnóstico por imagem.**2012.

ROVIRA. À; AUGER, C.; ALONSO, J. **Magnetic resonance monitoring of lesion evolution in multiple sclerosis.** Therapeutic Advances in Neurological Disorders. v6, n 5, p 298-310, 2013. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3755529>>.

VILAR, L.M.; MASJUAN, J.; GONZALEZ-PORQUE, P.; PLAZA, J.; SADABA, M.C.; ROLDAN, E.; BOOTELLO, A.; ALVAREZ-CERMENO, J.C. – Intrathecal IgG synthesis in neurologia diseases: relationship with disability in multiple sclerosis. *Neurology*. 58(5): 824-826, 2002

VUKUSIC, Sandra, and Christian Confavreux. “**Natural history of multiple sclerosis: risk factors and prognostic indicators.**” *Current opinion in neurology* vol. 20,3 (2007): 269-74. doi:10.1097/WCO.0b013e32812583ad

WANG, H.Y.; MATSUI, M.; SAIDA, T.; - **Immunological disturbances in the central nervous system linked to MRI findings in multiple sclerosis.** *J Neuroimmunol*. 125(1-2): 49-54, 2002.

ZEIGELBOIM, B. S. e Cols. Reabilitação vestibular: utilidade clínica em pacientes com Esclerose Múltipla. **Revista da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia**, v.15, n.1, Curitiba-PR, 2010, p. 125-128.

CAPÍTULO XVII

RASTREAMENTO DO CÂNCER DE COLO DO ÚTERO: UMA ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E OUTRAS LOCALIDADES

**Beatriz Henrique Correa Ferreira⁸¹; Altever de Sá Vianna Filho⁸²;
Izabella Souza Garbelini⁸³; Calebe Lima de Brito⁸⁴;
Giovanna de Castro do Amaral Monteiro Prado⁸⁵; Daniela Lacerda Santos⁸⁶.
DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2021.02-17**

RESUMO:

Estima-se uma incidência de mais de 16.000 casos novos de câncer de colo de útero para os próximos dois anos no país, sendo considerado um grande desafio em saúde pública apesar da efetividade comprovada do programa de rastreio na prevenção secundária e da vacina contra o Papilomavírus Humano na prevenção primária. Objetivo: este estudo objetivou comparar a razão de exames de citopatológicos realizados no município e estado do Rio de Janeiro, assim como a cobertura da Estratégia de Saúde da Família (ESF) com diversas localidades de diferentes regiões do país. Método: foi realizado um estudo quantitativo descritivo, através de dados coletados do Departamento de Informática e da Sala de Gestão Estratégica do Sistema Único de Saúde. Resultados: Evidencia-se a baixa razão de exames realizados assim como da cobertura da ESF no município e estado do Rio de Janeiro em comparação com todas as outras seis localidades de análise; até mesmo em regiões desfavorecidas geograficamente para o alcance das mulheres em idade elegível para o rastreamento, como o estado do Amazonas por exemplo. Conclusão: Urge-se a necessidade de mais estudos, principalmente de acesso aos serviços de saúde, da qualidade da assistência da Atenção Primária e dos exames de citopatológicos realizados; assim como interesses governamentais em vencer os desafios impostos para garantir a efetividade do programa de rastreamento do câncer de colo de útero no Brasil,

⁸¹ Graduanda do 4º período de medicina do Centro Universitário Arthur Sá Earp Neto. Participante da Liga Acadêmica de Anatomia Humana da Faculdade de Medicina de Petrópolis. E-mail: beatrizhcf@gmail.com

⁸² Graduando do 4º período de medicina do Centro Universitário Arthur Sá Earp Neto. Diretor da Liga de Fisiologia e Fisiopatologia Humana da Faculdade de Medicina de Petrópolis/ UNIFASE no ano de 2020. Vice coordenador discente do núcleo de estudos em fisiologia da Faculdade de Medicina de Petrópolis, participante da Liga de Oncologia Clínica e Cirúrgica da Faculdade de Medicina de Petrópolis. E-mail: altevervianna@icloud.com

⁸³ Graduanda do 4º período de medicina do Centro Universitário Arthur Sá Earp Neto. E-mail: iza.sg99@hotmail.com

⁸⁴ Graduando do 4º período de medicina do Centro Universitário Arthur Sá Earp Neto. Diretor da Liga Acadêmica de Fisiologia e Fisiopatologia Humana da Faculdade de Medicina de Petrópolis/ UNIFASE nos anos de 2020 e 2021. Colunista na comunidade SANARMED. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9894388505163012>. E-mail: calebelimamed@gmail.com

⁸⁵ Graduanda do 4º período de medicina do Centro Universitário Arthur Sá Earp Neto. E-mail: gigi.m.prado@gmail.com

⁸⁶ Doutora em Saúde Coletiva, na área de Política, Planejamento, Administração em Saúde, pelo Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IMS/UERJ). Professora da Faculdade de Medicina de Petrópolis - Fundação Octacílio Gualberto (FMP/FOG). E-mail: enfdanielalacerda@gmail.com

onde os dados de incidência e mortalidade são comparados aos de países subdesenvolvidos.

PALAVRAS-CHAVE: Câncer de Colo do Útero. Sistema Único de Saúde. Exame Colpocitopatológico. Cuidado Preventivo.

CERVERAL CANCER TRACKING: A COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN THE STATE OF RIO DE JANEIRO AND OTHER LOCATIONS

ABSTRACT:

An incidence of more than 16,000 new cases of cervical cancer is estimated for the next two years in the country, being considered a major public health challenge despite the proven effectiveness of the screening program in secondary prevention and the vaccine against Papillomavirus Human in primary prevention. Objective: this study aimed to compare the ratio of cytopathological exams performed in the city and state of Rio de Janeiro, as well as the coverage of the Family Health Strategy (FHS) with different locations in different regions of the country. Method: a quantitative descriptive study was carried out, using data collected from the Department of Informatics and the Strategic Management Room of the Unified Health System. Results: The low ratio of tests performed as well as the coverage of the FHS in the city and state is evidenced. Rio de Janeiro compared to all the other six analysis sites; even in geographically disadvantaged regions to reach women of eligible age for screening, such as the state of Amazonas for example. Conclusion: There is an urgent need for further studies, mainly on access to health services, on the quality of primary care assistance and on cytopathological tests performed; as well as governmental interests in overcoming the challenges imposed to ensure the effectiveness of the cervical cancer screening program in Brazil, where incidence and mortality data are compared to those of underdeveloped countries.

KEYWORDS: Cervical Cancer. Unified Health System. Pap smear test. Preventive Care.

INTRODUÇÃO

O câncer do colo do útero é o quarto tipo de câncer mais comum entre as mulheres, e é responsável por aproximadamente 311 mil óbitos por ano, sendo a quarta causa mais frequente de morte por câncer em mulheres. É uma doença rara em mulheres com até 30 anos, e sua incidência aumenta progressivamente até ter seu pico na faixa de 40 a 50 anos, sendo que a mortalidade é maior a partir da quarta e quinta década de vida. Além disso, percebe-se que esse tipo de câncer possui uma incidência 2 vezes maior em países em desenvolvimento quando comparado a países considerados desenvolvidos (MS, 2019). Dessa forma, observa-se que pode haver uma relação da neoplasia do colo do útero com

o baixo nível socioeconômico e de escolaridade da população (LIBERA et al, 2016). Segundo o mais recente documento do Instituto Nacional do Câncer (INCA): “O número de casos novos de câncer do colo do útero esperados para o Brasil, para cada ano do triênio 2020-2022, será de 16.590, com um risco estimado de 15,43 casos a cada 100 mil mulheres” (MS, 2019, p. 38).

Pode-se definir o câncer de colo de útero a partir de uma replicação desordenada do epitélio que reveste o colo do útero, de modo que possa invadir estruturas e órgãos subjacentes ou mesmo distantes (MS, 2013). Dentre as principais categorias de carcinomas invasores do colo do útero e causados pelo Papiloma Vírus Humano (HPV), cabe citar o carcinoma epidermóide, (tipo mais incidente) no epitélio escamoso. Além desse, também há o adenocarcinoma (tipo mais raro) no epitélio glandular. O primeiro chega a representar 90% dos casos, já o segundo somente 10% (MS, 2020).

Atualmente, entende-se que a infecção pelo HPV é causa importante para o desenvolvimento do câncer do colo do útero, e sabe-se que “[...] 80% das mulheres entrarão em contato com algum HPV até os 50 anos de idade” (FEDRIZZI et al, 2008, p 73). Contudo, nem todas as mulheres que contraíram o HPV irão desenvolver o câncer portanto, deduz-se que a infecção pelo HPV é um fator fundamental, mas não suficiente para o desenvolvimento do câncer do colo do útero, outros fatores como imunossupressão, multiparidade e início precoce da atividade sexual têm forte influência sobre o desenvolvimento da doença (MS, 2017).

Cerca de 12 a 18 tipos de HPV são considerados oncogênicos para o colo uterino e como ocorre na maior parte dos casos, a infecção se dá de maneira transitória, e regride de forma espontânea. Porém, a infecção persistente pode levar ao desenvolvimento de lesões precursoras, que uma vez não rastreadas, evoluirão para o câncer no colo do útero (MS, 2013).

Dois tipos de lesões pré-cancerosas podem ocorrer após a infecção por HPV: lesões intraepiteliais escamosas de baixo grau e lesões intraepiteliais escamosas de alto grau. A primeira lesão é somente uma manifestação citológica da infecção pelo HPV e não representa lesões verdadeiramente precursoras do câncer do colo do útero, a segunda apresenta potencial para progressão, tornando sua detecção o objetivo primordial da

prevenção secundária do câncer do colo do útero. A progressão dessa lesão para câncer ocorre lentamente, em uma média de 10 anos (LIBERA et al, 2016).

Os mecanismos de prevenção do câncer de colo de útero estão na prevenção primária, com o uso de preservativos nas relações sexuais, para evitar a infecção pelo HPV, e com a vacinação de meninas e meninos contra HPV (OPAS, 2019). Já a prevenção secundária, que consiste no rastreamento do câncer de colo uterino, através do exame citopatológico, que deve ser realizado de acordo com a periodicidade recomendada pela Organização Mundial da Saúde (WHO, 2007).

É importante ressaltar que o exame citopatológico do colo do útero é essencial para a detecção precoce da neoplasia, e sua realização leva à “redução de até 90% nas taxas de incidência de câncer cervical invasor”; considerando o alcance da cobertura ideal do rastreamento na população elegível, com os padrões de qualidade na realização dos exames (NASCIMENTO et al, 2015, p. 254).

No Brasil o exame citopatológico é recomendado para mulheres entre 25 e 64 anos. Sua realização é anual e após 2 ou 3 exames anuais consecutivos normais pode-se realizar a cada 3 anos. Para mulheres com mais de 64 anos e que nunca realizaram o exame citopatológico, deve-se realizar dois exames com intervalo de um a três anos. Se ambos forem negativos, essas mulheres podem ser dispensadas de exames adicionais (MS, 2013).

É fundamental que a equipe da Estratégia de Saúde da Família, conhecida como coordenadora do cuidado, porta de entrada do sistema e responsável pelas ações de promoção e prevenção em saúde, conheça sua população, com cadastro sistemático de todos os usuários da sua área adscrita. A partir desse cadastro, a equipe deve identificar todas as mulheres da faixa etária prioritária, bem como identificar aquelas que têm risco aumentado para a doença. Ao realizar o cruzamento entre as mulheres que deveriam realizar o exame e as que realizaram, é possível definir a cobertura e, a partir daí, pensar em ações para ampliar o acesso ao exame (MS, 2013).

Dentro da linha de cuidado, após a realização da coleta do citopatológico, cabe à Atenção Básica encaminhar o material para análise, e aguardar o recebimento dos laudos. Caso o resultado do exame determine encaminhamento a outro serviço, é fundamental

realizar uma solicitação de encaminhamento qualificada, com os dados relevantes sobre a usuária, sobre o quadro clínico e sobre o resultado do exame. Além disso, é necessário que a equipe acompanhe essa mulher, verificando a adesão ao tratamento (MS, 2013).

É, ainda, interessante frisar que o rastreamento é um dos grandes fomentadores da redução da incidência e mortalidade em países que introduziram programas com ele. Entretanto, no Brasil, o modelo adotado de rastreamento é o oportunístico apresentando dificuldades de implementação, tendo redução dos indicadores abaixo do esperado, embora tenha-se população-alvo e diretrizes bem definidas.

Nesse âmbito, é necessário destacar que os indicadores de saúde nos auxiliam a entender a dinâmica dentro da Assistência ao Câncer de Colo de Útero e do Exame Colpocitopatológico, uma vez que estes ajudam na construção de estatísticas e na obtenção de dados para avaliar a eficácia das medidas tomadas. Exemplos desses indicadores seriam a taxa de incidência estimada de câncer do colo de útero e a taxa de mortalidade por câncer de colo de útero, as quais deveriam ser reduzidas com medidas como a realização do citopatológico. Desta forma, o aprimoramento dos programas de rastreamento e diagnóstico precoce é fundamental para a estruturação de um sistema de informação que possibilite o diálogo entre os diversos serviços. Atualmente, há o Sistema de Informação do Câncer (Siscan), que é a versão em plataforma web que integra os Sistemas de Informação do Câncer do Colo do Útero (SISCOLO) e do Câncer de Mama (SISMAMA).

OBJETIVOS E MÉTODO

Para discutir o rastreamento do câncer de colo de útero no Rio de Janeiro, foi elaborado um estudo comparativo entre a cidade do Rio de Janeiro e Petrópolis (dentro do mesmo estado) e do estado do Rio de Janeiro e outros estados, como São Paulo, Mato Grosso, Santa Catarina, Pernambuco e Amazonas, sobre o ponto de vista da Cobertura Populacional da Estratégia de Saúde da Família (ESF) e da razão de pessoas da mesma faixa etária (de 25 a 64 anos). Assim, foram coletadas informações através de bancos de dados do próprio Ministério da Saúde (MS).

Foi realizada uma análise quantitativa comparativa através dos dados coletados no Sistema de Informações da Atenção Básica (SIAB), dados da razão de exames citopatológicos. Essa última plataforma gerou arquivos .CSV que foram manipulados através do software Microsoft Excel.

A razão entre exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos e população feminina da mesma faixa etária é a relação entre o número de exames citopatológicos do colo do útero, realizados e pagos pelo SUS, em mulheres de 25 a 64 anos residentes em um município ou estado, no período de três anos; e a população feminina de mesma faixa etária, residente no mesmo município ou estado, no último ano do triênio.

Através do Sala de Apoio à Gestão Estratégica do MS (SAGE) foram obtidos os dados da cobertura populacional de equipes da Saúde da Família em uma série histórica entre 2010 e 2015. Em seguida, foram construídas tabelas com esses dados.

Sendo assim, este estudo buscou discutir o rastreamento do câncer de colo de útero no estado e na cidade do Rio de Janeiro a partir de comparações com outros estados e municípios, visando comparar a cobertura de Equipes de Saúde da Família (ESF) do Rio de Janeiro com outras localidades; comparar a realização de exames citopatológicos e prevenção secundária do câncer de colo de útero do Rio de Janeiro com outras localidades, e também cotejar os dados, estimando possíveis impactos da cobertura da ESF sobre a realização do rastreamento do câncer de colo de útero.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir dos dados fornecidos pelo Sistema de Informações do SUS foram elaborados gráficos comparativos entre a razão de exames citopatológicos realizados entre pessoas da mesma faixa etária (de 25 a 64 anos) em diferentes regiões do país, conforme ilustração abaixo:

Figura 1: Razão de exames citopatológicos e população da mesma faixa etária nas cidades de Petrópolis e Rio de Janeiro

Fonte: Ministério da Saúde. Departamento de Informática do SUS (DATASUS). Disponível em <http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php>. Acesso no dia: 26/10/2020.

Em um primeiro momento, foi realizada uma comparação entre dois municípios do mesmo estado - Rio de Janeiro e Petrópolis. O primeiro sendo uma cidade de quase 7 milhões de habitantes e com um grande território, e o segundo sendo uma localidade com pouco mais de 300 mil habitantes e um território de maior facilidade no monitoramento, justamente por sua área demográfica ser menor. Dessa forma, é perceptível que os dados encontrados em Petrópolis na série histórica de 2010 a 2015 são melhores do que os do Rio de Janeiro, porém ainda pouco satisfatórios.

No intuito de conseguir estabelecer uma relação que melhor justifique essa diferença, foi analisada a cobertura populacional de equipes da saúde da família em ambos os municípios, com dados retirados da Sala de apoio à Gestão Estratégica - Ministério da Saúde (SAGE).

Figura 2: Cobertura populacional - Equipes de Saúde da Família

Cobertura Populacional - Equipes de Saúde da Família

Petrópolis			Rio de Janeiro (cidade)		
Ano	População	Percentual	Ano	População	Percentual
2010	113.850	36,4	2010	917.700	14,9
2011	148.350	50,13	2011	1.745.700	27,62
2012	148.350	50,02	2012	2.532.300	39,84
2013	138.000	46,43	2013	2.518.500	39,41
2014	144.900	48,64	2014	2.866.950	44,59
2015	148.350	49,78	2015	2.949.750	45,71

Fonte: BRASIL, Ministério da Saúde. SAGE - Sala de Apoio à Gestão Estratégica. Disponível em: <https://sage.saude.gov.br/>. Acesso em: 04 nov. 2020.

Ao analisar essas tabelas, percebe-se que apesar de a cobertura populacional de ambos os municípios, a partir de 2014, não serem tão diferentes, ainda sim o Rio de Janeiro não conseguiu realizar uma quantidade semelhante de exames citopatológicos quando comparado à Petrópolis. Isso pode estar relacionado a dificuldade encontrada pelas equipes de saúde da família do Rio de Janeiro em acessar as mulheres que deveriam realizar o exame, pois muitos locais são perigosos e a equipe de saúde não consegue ter acesso, nem para realizar busca ativa. Além disso, o gráfico 1 mostra que de 2012 para 2013 a razão de exames citopatológicos em mulheres da mesma faixa etária caiu significativamente, e continuou baixo nos anos seguintes. Contudo, a cobertura populacional de equipes de saúde da família aumentou nesse período, o que indica algum problema que pode estar relacionado à captura e acompanhamento das mulheres, ou até mesmo à subnotificação.

No entanto, para que fosse possível estimar uma análise comparativa e correlacional entre os dados e o impacto da cobertura da ESF na efetividade do rastreamento do câncer de colo de útero foram realizadas outras análises comparativas entre o Rio de Janeiro e outros municípios de outros estados. Para obter uma abrangência para o território nacional foram comparados estados de cada macrorregião nacional.

Nesse sentido, foram realizadas análises do estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso, Pernambuco e Amazonas.

Assim, tornou-se mais claro demonstrar que o problema da baixa cobertura na realização do exame citopatológico não é um aspecto exclusivo ao Rio de Janeiro, mas sim, um desafio presente em todo território brasileiro, sendo mais evidente em algumas regiões do que em outras.

Para início das comparações em regiões, foi feita uma análise da razão da cobertura do exame citopatológico entre pessoas da mesma faixa etária (25 a 64 anos) entre os estados de Rio de Janeiro e São Paulo. A escolha por esses dois municípios deve-se ao fato de que ambos possuem o maior PIB por estado e maior população de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Dessa forma, ficou claro que, apesar de possuir uma maior área territorial, São Paulo possui uma cobertura bem superior à do Rio de Janeiro, mesmo que essa ainda não seja satisfatória.

Figura 3: Razão de exames citopatológicos e população da mesma faixa etária nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro

Fonte: Ministério da Saúde. Departamento de Informática do SUS (DATASUS). Disponível em <http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php>. Acesso no dia: 26/10/2020

Assim, para que seja possível entender melhor tal situação, foi analisada a cobertura populacional de equipes de saúde da família em ambos os estados.

Figura 4: Cobertura Populacional - Equipes de Saúde da Família

Cobertura Populacional - Equipes de Saúde da Família

Rio de Janeiro (Estado)			São Paulo (Estado)		
Ano	População	Percentual	Ano	População	Percentual
2010	5.468.358	34,45	2010	11.389.542	27,77
2011	6.307.245	39,45	2011	11.848.882	28,72
2012	7.181.060	44,57	2012	12.766.477	30,7
2013	7.284.944	44,88	2013	12.601.254	30,07
2014	7.943.751	48,53	2014	16.055.607	36,77
2015	7.888.872	47,92	2015	16.702.753	37,93

Fonte: BRASIL, Ministério da Saúde. SAGE - Sala de Apoio à Gestão Estratégica. Disponível em: <https://sage.saude.gov.br/>. Acesso em: 04 nov. 2020.

Ao analisar as figuras 3 e 4, percebe-se que, contrariando o que se imagina da relação direta entre cobertura da ESF e alcance do rastreio do câncer de colo de útero, visto ser competência da Atenção Básica as ações de promoção e prevenção em saúde, desde a definição da organização dos serviços pela Lei nº 8080/90 (BRASIL, 1990); os dados de cobertura populacional mostram que o estado de São Paulo possui uma cobertura menor do que a do Rio de Janeiro, mas mesmo assim, a razão de exames citopatológicos em mulheres da mesma faixa etária é bem maior em São Paulo do que no Rio de Janeiro. Tal observação demonstra a falha que a Atenção Básica do estado do Rio de Janeiro apresenta para captar mulheres na idade de realizar o exame, além de não conseguir manter acompanhamento.

Posteriormente, foi realizada a comparação entre um estado da região Sul do Brasil com o Rio de Janeiro. Sendo assim, Santa Catarina foi a região escolhida por apresentar o maior IDH de tal porção do território nacional, com esse índice chegando a 0,774 em 2010, segundo o IBGE (IBGE, 2010). Assim, foi observado que Santa Catarina também possui índices de realização do exame citopatológico superiores que as do Rio de Janeiro e que as de São Paulo, sendo o estado que apresenta os melhores dados nesse quesito, porém esses, mesmo assim, apresentam-se insatisfatórios para garantir o rastreio

das mulheres em idade elegível e consequentemente a efetividade da prevenção secundária do câncer de colo de útero.

Figura 5: Razão de exames citopatológicos e população da mesma faixa etária nos estados de Santa Catarina e Rio de Janeiro

Fonte: Ministério da Saúde. Departamento de Informática do SUS (DATASUS). Disponível em <http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php>. Acesso no dia: 26/10/2020

Para melhor entendimento da alta razão de exames citopatológicos entre mulheres da mesma faixa etária em Santa Catarina em comparação com o Rio de Janeiro foram também coletados os dados da cobertura populacional de equipes de saúde da família em ambos os estados.

Figura 6: Cobertura Populacional - Equipes de Saúde da Família

Cobertura Populacional - Equipes de Saúde da Família

Rio de Janeiro (Estado)			Santa Catarina		
Ano	População	Percentual	Ano	População	Percentual
2010	5.468.358	34,45	2010	4.274.250	70,62
2011	6.307.245	39,45	2011	4.402.711	70,46
2012	7.181.060	44,57	2012	4.421.195	69,99
2013	7.284.944	44,88	2013	4.759.222	74,56
2014	7.943.751	48,53	2014	5.042.395	76,01
2015	7.888.872	47,92	2015	5.114.524	76,03

Fonte: BRASIL, Ministério da Saúde. SAGE - Sala de Apoio à Gestão Estratégica. Disponível em: <https://sage.saude.gov.br/>. Acesso em: 04 nov. 2020.

Os dados dessa tabela demonstram uma alta taxa de cobertura populacional da ESF no estado de Santa Catarina, desta forma, era esperado que a razão de exames citopatológicos nesse estado fosse alta. Contudo, mesmo possuindo essa alta cobertura, ao observar a Figura 5 acima, a partir de 2011 a razão de exames citopatológicos foi diminuindo a cada ano. Tal dado é preocupante visto que essa queda demonstra uma menor realização de exames em mulheres que deveriam estar sendo acompanhadas pela Atenção Básica, impossibilitando a detecção precoce do câncer de colo de útero.

No Centro-Oeste, o estado escolhido para a comparação com o Rio de Janeiro foi o Mato Grosso, aquele que apresenta a maior área dessa região segundo o IBGE (IBGE, 2010). Apesar de ser um estado com maior extensão territorial, o que se imagina maior dificuldade para alcançar essas mulheres, esse estado apresentou índices superiores aos do Rio de Janeiro e próximos aos de São Paulo.

Figura 7: Razão de exames citopatológicos e população da mesma faixa etária nos estados do Mato Grosso e Rio de Janeiro

Fonte: Ministério da Saúde. Departamento de Informática do SUS (DATASUS). Disponível em <http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php>. Acesso no dia: 26/10/2020

Portanto, para melhor compreensão dos resultados, foi realizada uma comparação entre a cobertura populacional entre os dois estados.

Figura 8: Cobertura Populacional - Equipes de Saúde da Família

Cobertura Populacional - Equipes de Saúde da Família

Rio de Janeiro (Estado)			Mato Grosso		
Ano	População	Percentual	Ano	População	Percentual
2010	5.468.358	34,45	2010	1.910.276	64,59
2011	6.307.245	39,45	2011	1.919.878	63,26
2012	7.181.060	44,57	2012	1.867.724	60,72
2013	7.284.944	44,88	2013	1.961.603	62,97
2014	7.943.751	48,53	2014	2.024.332	63,62
2015	7.888.872	47,92	2015	2.083.192	64,61

Fonte: BRASIL, Ministério da Saúde. SAGE - Sala de Apoio à Gestão Estratégica. Disponível em: <https://sage.saude.gov.br/>. Acesso em: 04 nov. 2020.

A tabela acima mostra que o estado do Mato Grosso apresenta cobertura populacional maior que o estado do Rio de Janeiro, mesmo possuindo uma extensão territorial maior, o que dificultaria a chegada da Atenção Básica para a população. Dessa forma, percebe-se mais uma vez que, com a comparação com outros estados, o Rio de Janeiro possui uma baixa cobertura populacional, realizando poucos exames citopatológicos nas mulheres que necessitam ser acompanhadas.

No Nordeste, o estado escolhido para comparação com o Rio de Janeiro em relação aos exames citopatológicos foi Pernambuco, pois possui o 2º maior Produto Interno Bruto (PIB) de tal região e uma área territorial próxima àquele que serve como comparativo. Apesar de ser de uma região com uma economia menos abundante do que a da região Sudeste, Pernambuco apresenta um resultado na realização do citopatológico melhor do que o Rio de Janeiro e próximo ao de Santa Catarina. No entanto, apesar desse positivo resultado aparente, é válido dizer que, ainda assim, os valores não são os ideais para o rastreamento adequado.

Figura 9: Razão de exames citopatológicos e população da mesma faixa etária nos estados de Pernambuco e Rio de Janeiro

Fonte: Ministério da Saúde. Departamento de Informática do SUS (DATASUS). Disponível em <http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php>. Acesso no dia: 26/10/2020

Dessa forma, para melhor compreender o porquê de Pernambuco conseguir realizar mais exames citopatológicos nas mulheres entre faixas etárias de 25 a 64 anos, é necessário olhar para seus dados de cobertura populacional de equipes da Saúde da Família.

Figura 10: Cobertura Populacional - Equipes de Saúde da Família

Cobertura Populacional - Equipes de Saúde da Família

Rio de Janeiro (Estado)			Pernambuco		
Ano	População	Percentual	Ano	População	Percentual
2010	5.468.358	34,45	2010	6.023.396	68,78
2011	6.307.245	39,45	2011	6.001.864	68,23
2012	7.181.060	44,57	2012	6.093.428	68,74
2013	7.284.944	44,88	2013	6.436.953	72,07
2014	7.943.751	48,53	2014	6.729.115	73,07
2015	7.888.872	47,92	2015	6.886.804	74,23

Fonte: BRASIL, Ministério da Saúde. SAGE - Sala de Apoio à Gestão Estratégica. Disponível em: <https://sage.saude.gov.br/>. Acesso em: 04 nov. 2020.

Com esses dados percebe-se que a porcentagem da população que é coberta pela Atenção Básica é grande em Pernambuco, sendo muito próxima, em 2015, da

porcentagem da população coberta pela Atenção Básica em Santa Catarina. Neste ano, a diferença de cobertura populacional foi de somente 1,8%. Somando essa informação com a alta razão de exames citopatológicos também em Pernambuco e Santa Catarina, é possível inferir e ratificar a importância da cobertura adequada da ESF, onde em regiões com maior cobertura populacional por parte das Equipes de Saúde da Família, as quais compõem a Atenção Básica, acarreta uma maior taxa de realização de exames citopatológicos.

Por fim, o último estado a ser comparado com o Rio de Janeiro em relação à razão de exames citopatológicos realizados entre pessoas de uma mesma faixa etária (24 a 65 anos) foi o Amazonas. A escolha justifica-se pelo fato desse estado possuir uma área territorial bastante expressiva e de difícil acesso, com comunidades isoladas e pouco acesso a serviços de saúde. Porém, apesar disso, o Amazonas possui um dado relativo à realização de exame citopatológico melhor do que o do Rio de Janeiro e em crescente desde 2010, mas ainda distante do ideal para a efetividade do programa de prevenção.

Figura 11: Razão de exames citopatológicos e população da mesma faixa etária nos estados do Amazonas e Rio de Janeiro

Fonte: Ministério da Saúde. Departamento de Informática do SUS (DATASUS). Disponível em <http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php>. Acesso no dia: 26/10/2020

Dessa forma, é importante analisar a cobertura de atenção básica em ambos os estados para que ocorra o melhor entendimento sobre a dificuldade territorial no

Amazonas e como o Rio de Janeiro, mesmo não apresentando tal problema, possui um índice inferior ao apresentado por esse estado do Norte do Brasil.

Figura 12: Cobertura Populacional - Equipes de Saúde da Família

Cobertura Populacional - Equipes de Saúde da Família

Rio de Janeiro (Estado)			Amazonas		
Ano	População	Percentual	Ano	População	Percentual
2010	5.468.358	34,45	2010	1.682.314	50,35
2011	6.307.245	39,45	2011	1.677.362	48,14
2012	7.181.060	44,57	2012	1.685.642	47,64
2013	7.284.944	44,88	2013	1.748.294	48,69
2014	7.943.751	48,53	2014	2.049.646	53,83
2015	7.888.872	47,92	2015	2.182.599	56,34

Fonte: BRASIL, Ministério da Saúde. SAGE - Sala de Apoio à Gestão Estratégica. Disponível em: <https://sage.saude.gov.br/>. Acesso em: 04 nov. 2020.

Os dados de cobertura populacional de Equipes da Saúde da Família mostram que o Amazonas também possui um percentual de cobertura maior do que o do Rio de Janeiro, mesmo com as dificuldades já citadas acima. É interessante ressaltar que a cobertura populacional acompanhou, em quedas e aumentos, a razão de exames citopatológicos no Amazonas. Assim como a razão de exames citopatológicos, de 2010 para 2011, a cobertura populacional diminuiu. Contudo, a partir de 2011, a razão de citopatológicos foi aumentando progressivamente no estado, ao passo que a cobertura populacional também voltou a aumentar. Essa observação demonstra a importância da Atenção Básica na realização de exames citopatológicos, que quanto maior sua abrangência, maior também será a de realização do acompanhamento, realização da prevenção secundária através do exame citopatológico e encaminhamento das usuárias na rede de atenção à saúde.

CONCLUSÃO

É sabido o papel da Atenção Primária na rede de assistência do Sistema Único de Saúde, principalmente organizada como Estratégia de Saúde da Família, sendo

responsável pelo acompanhamento da população adscrita no território com uma equipe definida, formada por múltiplos profissionais de saúde que atuam em conjunto nas ações de promoção e prevenção em saúde da população. Assim como também é de conhecimento que um dos desafios do país em saúde pública é garantir o rastreio de mulheres em idade elegível para a detecção precoce e tratamento adequado do câncer de colo de útero e com isso reduzir a alta taxa de mortalidade em mulheres por essa doença.

Estudos exclusivamente quantitativos e descritos possuem limitações, como por exemplo compreender o porquê da baixa cobertura da ESF no município e principalmente no estado do Rio de Janeiro, da razão reduzida de exames de citopatológicos em mulheres elegíveis em comparação com várias outras localidades de diferentes regiões do país; assim como compreender a qualidade da assistência da Atenção Primária e a qualidade dos exames realizados. É importante destacar a necessidade de estudos complementares sobre gestão, financiamento, planejamento e interesse governamental para estimar a situação apresentada para o estado do Rio de Janeiro. Para o município do Rio de Janeiro, mesmo especulando sobre as condições de violência que restringem o acesso das equipes de saúde em muitas comunidades e a gestão da Atenção Primárias sob a égide das Organizações Sociais em Saúde, estudos posteriores também se fazem necessários.

Apesar de ser um tema tão comumente debatido no meio acadêmico, mais estudos para todas as regiões tornam-se necessários para entender a dificuldade da ESF em acompanhar essas mulheres e garantir acesso à prevenção secundária, adesão e efetividade de um programa para uma doença tratável e prevenível.

REFERÊNCIAS

BRASIL, Ministério da Saúde. **SAGE - Sala de Apoio à Gestão Estratégica**. Disponível em: <https://sage.saude.gov.br>. Acesso em: 04 nov. 2020.

FEDRIZZI, E; SCHLUP, C, G; MENEZES, M, E; OCAMPOS, M. **Infecção pelo Papilomavírus Humano (HPV) em mulheres de Florianópolis, Santa Catarina**. DST – J bras Doenças Sex Transm 2008; 20(2): 73-79

LIBERA, L, S, D; ALVES, G, N, S; SOUZA, H, G; CARVALHO. Avaliação da Infecção pelo Papiloma Vírus Humano (HPV) em Exames Citopatológicos. **Revista Brasileira de Análises Clínicas**. 2016. Disponível em: <http://www.rbac.org.br/artigos/avaliacao-da->

infeccao-pelo-papiloma-virus-humano-hpv- em-exames-citopatologicos-48-n2/. Acesso em 18 de outubro de 2020.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Cadernos de Atenção Básica Controle dos Cânceres do Colo do Útero e da Mama**. 2. ed. Brasília: DF, 2013, 124p.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. **Estimativa 2018**: Incidência de Câncer no Brasil. Rio de Janeiro: INCA, 2017, 130p.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. **Estimativa 2020**: Incidência de Câncer no Brasil. Rio de Janeiro: INCA, 2019, 122p.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Instituto Nacional do Câncer. INCA. **Câncer do colo do útero - versão para profissionais de saúde**. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer-do-colo-do-utero/profissional-de-saude>. Acesso em: 28 out. 2020.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Instituto Nacional do Câncer. INCA. **Conceito e magnitude**. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/controle-do-cancer-do-colo-do-utero/conceito-e-magnitude#:~:text=Com%20aproximadamente%20570%20mil%20casos,por%20c%C3%A2ncer%20e%20mulheres1>. Acesso em: 29 out. 2020.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Instituto Nacional do Câncer. INCA. **Estimativa 2016**: Incidência de Câncer no Brasil. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/campanhas/dia-nacional-de-combate-ao-cancer/2015/estimativa-2016-incidencia-de-cancer-no-brasil>. Acesso em: 20 fev. 2021.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Razão entre exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 59 anos e população feminina da mesma faixa etária e local de residência**. Disponível em: <http://idsus.saude.gov.br/detalhadas.html>. Acesso em: 30 out. 2020.

NASCIMENTO, G, W, C; PEREIRA, C, C, A; NASCIMENTO, D, I, C; LOURENÇO, G, C; MACHADO, C, J. Cobertura do exame citopatológico do colo do útero no Estado de Minas Gerais, Brasil, no período entre 2000-2010: um estudo a partir dos dados do Sistema de Informação do Câncer do Colo do Útero (SISCOLO). **Cad. Saúde Colet.**, 2015, Rio de Janeiro, 23 (3): 253-260

Organização Pan Americana de Saúde. OPAS. BRASIL. **Folha informativa - HPV e câncer do colo do útero**. 2019. Disponível em: https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5634:folha-informativa-hpv-e-cancer-do-colo-do-utero&Itemid=839. Acesso em: 28 de outubro de 2020.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Prevention**. Geneva, 2007. (Cancer control: knowledge into action: WHO guide for effective programmes). Disponível em: <

https://www.who.int/cancer/publications/cancer_control_detection/en/. Acesso em 21 de fev. 2021.

CAPÍTULO XVIII

SOROLOGIA PARA SÍFILIS: VDRL E FTA-ABS

Breno Pimentel Moraes Oliveira⁸⁷; Andre Luiz de Souza Silva⁸⁸;
Thiago Michael Ferreira Ibiapino⁸⁹; Gean Costa Nascimento⁹⁰;
Yan Alves Gramacho⁹¹.

DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2021.02-18

RESUMO:

A sífilis é uma doença sistêmica crônica importante causada pelo *Treponema pallidum* e é transmitida principalmente por via sexual e vertical, sendo a probabilidade de transmissão maior nas fases iniciais. Na gestação, a gravidade da infecção aumenta gradativamente até o final da gestação. A infecção não-tratada pelo *T. Pallidum*, além poder cursar com sequelas graves, também aumenta o risco de infecção pelo HIV devido às lesões sífilíticas.¹ No ano de 2013, de acordo com a World Health Organization (WHO), a prevalência mundial de infecção por sífilis em gestantes foi de cerca de 1.9 milhões e, dos casos não-tratados, 66,5% tiveram efeitos adversos fetais. A prevalência de sífilis em gestantes na população brasileira entre 2011 e 2012 foi similar à encontrada no estudo sentinela conduzido em 2006. Torna-se importante ressaltar que desigualdades socioeconômicas assim como a baixa cobertura do rastreio são fatores que contribuem para a persistência da sífilis congênita no Brasil.²

PALAVRAS-CHAVE: Sífilis. FTA-Abs. VDRL. IST.

SYMPHILIS SOROLOGY: VDRL AND FTA-ABS

ABSTRACT:

Syphilis is an important chronic systemic disease caused by *Treponema pallidum* and is transmitted mainly through sexual and vertical routes, with a higher probability of transmission in the early stages. In pregnancy, the severity of the infection gradually increases until the end of the pregnancy. Infection untreated by *T. Pallidum*, in addition to having severe sequelae, also increases the risk of HIV infection due to syphilitic lesions.¹ In 2013, according to the World Health Organization (WHO), the worldwide prevalence of syphilis infection in pregnant women was about 1.9 million and, of the untreated cases, 66.5% had adverse fetal effects. The prevalence of syphilis in pregnant

⁸⁷Graduação em andamento em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, UFV, Brasil. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4258060198060500>. E-mail: brenopmo@gmail.com

⁸⁸ Graduação em andamento. Universidade Federal de Viçosa, UFV, Brasil. E-mail: andre.silva2@ufv.br

⁸⁹Graduação em andamento em Medicina. Universidade Federal de Viçosa, UFV, Brasil. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4239622139166945>. E-mail: thiagomychaell@gmail.com

⁹⁰Graduação em andamento em Medicina. Universidade Federal de Viçosa, UFV, Brasil. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9147208280630341>. E-mail: geancn82@gmail.com

⁹¹ Graduação em andamento. Universidade Federal de Viçosa, UFV, Brasil. E-mail: yangramacho@gmail.com

women in the Brazilian population between 2011 and 2012 was similar to that found in the sentinel study conducted in 2006. It is important to note that socioeconomic inequalities as well as the low coverage of the screening are factors that contribute to the persistence of congenital syphilis in Brazil. Brazil.²

KEYWORDS: Syphilis. FTA-Abs. VDRL. IST.

TESTES SOROLÓGICOS

Existem dois tipos de testes sorológicos para sífilis: os treponêmicos e os não-treponêmicos. Serão abordados a frente os testes Veneral Disease Research Laboratory (VDRL) e Fluorescent Treponemal Antibody Absorption (FTA-Abs). Em suma, os testes treponêmicos são aqueles que detectam especificamente o antígeno do *T. Pallidum* e os não-treponêmicos aqueles que detectam anticorpos anticardioplipina.³

FTA-Abs

Por muito tempo considerado “padrão-ouro”, o FTA-Abs perdeu esse posto devido ao surgimento de testes mais sensíveis e principalmente menos subjetivos. É o primeiro teste a positivar após infecção pelo *T. Pallidum* (3 semanas). O teste possui alta especificidade e nos raros casos em que o FTA-Abs é não-reagente após um teste de VDRL de título maior que 1:4, recomenda-se um outro teste treponêmico diferente. Ao contrário dos testes não-treponêmicos, o teste treponêmico não é usado durante o acompanhamento da resposta terapêutica, uma vez que em cerca de 85% dos casos de sífilis o FTA-Abs mantém-se reagente ao longo de toda a vida mesmo após o tratamento efetivo.⁴

O teste é feito a partir da fixação do antígeno da cepa Nichols do *T. Pallidum* em lâminas onde será adicionado o soro a ser testado. O próximo passo é uma lavagem para remover o excesso de anticorpos não ligados. Por fim, acrescenta-se imunoglobulina anti-humana (antigamaglobulina) marcada com isotiocianato de fluoresceína (FITC, do inglês fluorescein isothiocyanate) conferindo coloração verde-maçã brilhante às espiroquetas. Resumidamente, o teste usa um antígeno (cepa Nichols) que, na presença de anticorpos, forma um complexo antígeno-anticorpo e esse complexo é então fixado por uma

antigamaglobulina marcada com FITC, permitindo a visualização microscópica das espiroquetas.⁵

FALSO-POSITIVO

Geralmente observado na Doença de Lyme, aproximadamente 1% da população apresenta resultado falso-positivo e estes pacientes também costumam apresentar resultado negativo quando submetidos a testes não-treponêmicos. Ademais, populações onde a prevalência de sífilis é baixa possuem uma proporção maior de resultados falso-positivo.

FALSO-NEGATIVO

Tanto falso-negativo quanto falso-positivo podem ocorrer em razão da subjetividade da avaliação microscópica do teste, o que requer profissionais experientes e materiais de qualidade. Nos testes treponêmicos, não há ocorrência do fenômeno prozona.⁶

VDRL

O teste Veneral Disease Research Laboratory (VDRL) atualmente é o mais usado ao redor do mundo para o rastreio da sífilis. Isso deve-se ao fato de apresentar baixo custo de execução e uma sensibilidade alta, detectando cerca de 70-90% dos casos na fase primária e até 100% na fase secundária. O VDRL torna-se reagente logo nas primeiras semanas após infecção, com pico durante o primeiro ano e após esse período há uma redução lenta e progressiva da sensibilidade do teste, o que é capaz de torná-lo não-reagente em torno de 30% dos casos de sífilis tardia ou latente.

O VDRL é um teste qualitativo ou quantitativo, muito utilizado para o rastreio inicial de sífilis e acompanhamento da resposta terapêutica, ao passo que a confirmação do diagnóstico é dada através de um teste mais específico, usualmente o Fluorescent Treponemal Antibody Absorption (FTA-Abs), que detecta diretamente a presença do antígeno treponêmico no soro do paciente.⁷

O princípio do VDRL é que o sistema imunológico produz anticorpos IgG e IgM quando infectado pelo *Treponema pallidum* e, estes anticorpos, quando adicionados a uma solução reagente composta basicamente por cardiolipina, colesterol e lecitina, formam estruturas denominadas micelas. As cardiolipinas presentes nas micelas ligam-se aos anticorpos anticardiolipina gerando uma reação de floculação. Posteriormente, esses flocos resultantes serão visualizados microscopicamente.

A avaliação quantitativa deve ser realizada em todas as amostras reagentes ao teste qualitativo. A amostra é então submetida a diluições seriadas obedecendo um fator 2 de diluição e o resultado da titulação é referente ao valor da última diluição onde houve reação. Dessa forma, o título 1:1 remete a uma amostra pura; 1:2 significa que o volume da amostra na solução é igual ao volume de tampão. Portanto, uma amostra reativa à diluição 1:32 possui mais anticorpos que uma amostra reativa à diluição 1:8.³

Não existe vacina para a sífilis e não há desenvolvimento de imunidade pós-infecção, o que permite a reinfecção.

O acompanhamento da resposta terapêutica é baseado na comparação com o resultado do primeiro teste utilizado no diagnóstico. O sucesso terapêutico é previsto pela diminuição de duas diluições em três meses e três diluições em seis meses. Um aumento de duas diluições ou mais nos períodos subsequentes ao sucesso terapêutico são um indicativo de reinfecção ou reativação da doença e preconiza-se novo tratamento estendido às parcerias sexuais se necessário.⁴

FALSO-POSITIVO

Encontrado em todas as membranas celulares de mamíferos, o antígeno usado no teste pode provocar reações falso-positivo em determinadas condições denominadas biological false-positive (BFP) em cerca de 1-2% dos resultados, tais como: gravidez, idade avançada, drogas injetáveis, hepatopatia, doenças febris (malária, tuberculose, filariose), lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatóide e outras doenças autoimunes relacionadas ao colágeno. Contudo, os títulos atingidos usualmente não ultrapassam a relação 1:8, embora haja relatos de títulos maiores que 1:256. Esta condição é conhecida como Cicatriz Sorológica e pode durar a vida toda. Além disso, erros de técnica ou baixa

qualidade do reagente são possíveis causas de falso-positivo não relacionadas a processos biológicos. Quando existe a suspeita de BFR, recomenda-se a repetição do teste após 10 semanas, intervalo no qual a maioria dos pacientes sucedem com a soroconversão negativa na ausência de infecção.⁸

FALSO-NEGATIVO

Em pacientes com títulos de anticorpos muito altos pode ocorrer uma desproporção nas concentrações antígeno-anticorpo que culmina em resultados falso-negativo, seja devido a não-reação ou reação muito fraca. Este fenômeno, conhecido como prozona, tem uma incidência de 0-0,4% em pacientes imunocompetentes e pode ocorrer em qualquer fase clínica da infecção.⁹

GESTAÇÃO E SÍFILIS CONGÊNITA

Toda gestante deve realizar o VDRL no 1º e 3º trimestre, além um teste treponêmico ou não-treponêmico no momento após internação para o parto ou em caso de abortamento e, nesses casos, os testes rápidos são mais vantajosos visto que diminuem o tempo de ocupação do leito, evitando assim o prolongamento a internação apenas para obter o resultado do teste.

A suspeita e subsequente diagnóstico de sífilis congênita deve estar embasada em um minucioso exame clínico, físico e epidemiológico da díade mãe-criança. Além disso, é recomendado correlacionar a anamnese e exame físico aos achados radiográficos e exames laboratoriais como sorologia para sífilis, hemograma, perfil hepático e eletrólitos. Sugere-se também uma avaliação neurológica, audiológica e oftalmológica.

Em caso de resultados reagentes na amostra de soro da criança menor de 18 meses, é de suma importância comparar com os resultados maternos, dado que há a possibilidade de transferência de anticorpos IgG para o feto. Logo, nessa faixa etária, um resultado reagente no VDRL deve ter relevância clínica apenas se o título encontrado no soro da criança aumentar em 2 diluições quando comparado ao título da mãe. Outrossim, o resultado encontrado na criança deve ser confirmado por meio de uma segunda amostra

de sangue da criança que, em hipótese alguma, deve ser colhido do cordão umbilical, tendo em vista que esse sangue compõe-se de uma mistura do sangue da mãe e da criança.

Em caso de resultado não-reagente, ou de título igual ou menor no sangue da criança, o VDRL deve ser realizado novamente após 1, 2 e 3 meses. Na inviabilidade de cumprir-se o acompanhamento supracitado, o recém-nascido deve ser tratado conforme previsto no “Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)”

A pesquisa direta do T. Pallidum pode ser realizada a partir de lesões cutâneo-mucosas ou secreção nasal e é útil quando há sinais clínicos da doença na criança e a suspeita de neurosífilis na criança prevê um exame do líquido.³

Figura 1 – fluxograma para o manejo da sífilis a partir de um teste não treponêmico.

Figura 1 – autoria própria

CONCLUSÃO

O diagnóstico precoce da sífilis é fundamental para a redução dos níveis de transmissão e gravidade da doença, sobretudo em gestantes, visto que a transmissão vertical pode acarretar consequências negativas para o feto. Embora os testes sorológicos tenham uma boa sensibilidade, o uso exclusivo de um único teste não é indicado devido a inúmeras condições clínicas e técnicas que podem alterar o resultado dos exames. Dessa

maneira, o fluxograma diagnóstico utilizando VDRL e FTA-Abs possibilita que estes testes complementam um ao outro de modo a favorecer um diagnóstico mais preciso ao passo que torna-se economicamente vantajoso. Ademais, os achados sorológicos sempre devem ser correlacionados à clínica do paciente em questão.

REFERÊNCIAS

1. WHO. **WHO guidelines for the treatment of *Treponema pallidum* (syphilis).** *WHO Libr. Cat. Data* 1–51 (2016). doi:10.1136/bmj.2.398.180-b
2. DOMINGUES, R. M. S. M., SZWARCOWALD, C. L., JUNIOR, P. R. B. S. & LEAL, M. DO C. Prevalence of syphilis in pregnancy and prenatal syphilis testing in Brazil: Birth in Brazil study. *Rev. Saude Publica* 48, 766–774 (2014).
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. ***Manual Técnico para Diagnóstico da sífilis.*** Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis, Aids e Hepatites Virais. - Brasília. (2016).
4. CARLIN, E., ZIZA, J., KEAT, A. & JANIER, M. 2014 **European Guideline on the management of sexually acquired reactive arthritis.** *Int. J. STD AIDS* 25, 901–912 (2014).
5. MORSHED, M. G. & SINGHB, A. E. **Recent trends in the serologic diagnosis of syphilis.** *Clin. Vaccine Immunol.* 22, 137–143 (2015).
6. SUMIKAWA, E. S., Inocêncio, L. R. da M. L. A. & Ueda, L. A. P. F. M. L. B. M. F. M. **Sífilis: Estratégias para Diagnóstico no Brasil.** *Ministério da Saúde* 1º, 100 (2010).
7. YIN, Y. P. *et al.* **A dual point-of-care test shows good performance in simultaneously detecting nontreponemal and treponemal antibodies in patients with syphilis: A multisite evaluation study in China.** *Clin. Infect. Dis.* 56, 659–665 (2013).
8. NAYAK, S. & Acharjya, B. **VDRL test and its interpretation.** *Indian J. Dermatol.* 57, 3 (2012).
9. LIU, L. L. *et al.* **Incidence and risk factors for the prozone phenomenon in serologic testing for syphilis in a large cohort.** *Clin. Infect. Dis.* 59, 384–389 (2014).

CAPÍTULO XIX

VULNERABILIDADE E TRANSMISSIBILIDADE DE RECÉM-NASCIDOS E CRIANÇAS À INFECÇÃO POR SARS-COV-2

Vitória Régia da Silva⁹²; Luanna Júlia Silva de Melo⁹³;

Marcelo Sebastião Gomes⁹⁴; Bereneuza Tavares Ramos Valente Brasileiro⁹⁵.

DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2021.02-19

RESUMO:

Há descrição de alguns casos da COVID-19 por transmissão perinatal, mas não está claro se isso ocorreu pela via transplacentária ou transcervical ou pela exposição ambiental. O presente estudo teve natureza investigativa e informativa e, teve como objetivo, compreender melhor a vulnerabilidade e potencial de transmissão intrauterina do SARS-CoV-2 em recém-nascidos e crianças. Foi realizada uma pesquisa de natureza investigativa e informativa. A infecção neonatal positiva com SARS-CoV-2 em 3 recém-nascidos de mães com COVID-19 ocorreu em Wuhan, China. Em bebês, quanto à gravidade da doença por idade, o estudo mostrou que eram vulneráveis à infecção por SARS-CoV-2. As proporções de casos graves e críticos foram de 10,6% a 3,0% para as faixas etárias de <1 a ≥ 16 anos. Crianças após o primeiro mês de idade e antes da puberdade são mais resistentes ao Coronavírus por apresentarem menos receptores ACE2 nas vias respiratórias inferiores para atrair a ligação da proteína S dos Betacoronavírus. O primeiro caso comprovado de transmissão transplacentária de SARS-CoV-2 de uma mulher grávida infectada para o bebê no útero, no último trimestre da gravidez, foi confirmado na França. Como a RT-PCR no tecido placentário foi positiva para os genes “E” e “S” do SARS-CoV-2 e as amostras de sangue materno e neonatal, em secreções da narina e vagina na gestante, do líquido amniótico coletado antes da ruptura das membranas, do líquido retirado do pulmão, do nariz, faringe e reto do recém-nascido também foram positivas, a transmissão ocorreu claramente através da placenta. A carga viral foi muito maior no tecido placentário do que no líquido amniótico e no sangue materno ou neonatal.

PALAVRAS-CHAVE: Covid-19. Coronavírus. Imunopatogênese. ACE-2.

⁹² Graduanda em Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP, Recife – PE. Email: vitoria.2018113980@unicap.br

⁹³ Graduanda em Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP, Recife – PE. Email: luanna.2018113363@unicap.br

⁹⁴ Graduando em Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP, Recife – PE. Email: marcelo.2018130373@unicap.br

⁹⁵ Bióloga Graduada em Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP, Recife – PE e Pós-graduada em doutorado, Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP, Recife – PE. Email: bereneuza.brasileiro@unicap.br

VULNERABILITY AND TRANSMISSIBILITY OF NEWBORNS AND CHILDREN TO SARS-VOC-2 INFECTION

ABSTRACT:

There is a description of some cases of COVID-19 due to perinatal transmission, but it is not clear whether this occurred through the transplacental or transcervical route or through environmental exposure. The present study was investigative and informative in nature and aimed to better understand the vulnerability and potential for intrauterine transmission of SARS-CoV-2 in newborns and children. An investigative and informative research was carried out. Neonatal SARS-CoV-2 positive infection in 3 newborns of mothers with COVID-19 occurred in Wuhan, China. In babies, regarding the severity of the disease by age, the study showed that they were vulnerable to SARS-CoV-2 infection. The proportions of severe and critical cases were 10.6% to 3.0% for the age groups <1 to ≥ 16 years. Children after the first month of age and before puberty are more resistant to Coronavirus because they have fewer ACE2 receptors in the lower respiratory tract to attract the protein S binding of Betacoronaviruses. The first proven case of transplacental transmission of SARS-CoV-2 from an infected pregnant woman to her baby in the womb in the last trimester of pregnancy was confirmed in France. As the RT-PCR in the placental tissue was positive for the SARS-CoV-2 “E” and “S” genes and the maternal and neonatal blood samples, in the nostril and vagina secretions in the pregnant woman, of the amniotic fluid collected before the rupture of membranes, fluid removed from the lung, nose, pharynx and rectum of the newborn were also positive, the transmission clearly occurred through the placenta. The viral load was much higher in the placental tissue than in the amniotic fluid and in maternal or neonatal blood

KEYWORDS: Covid-19. Coronavirus. Immunopathogenesis. ACE-2.

INTRODUÇÃO

A COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), iniciou-se na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China. Detectou-se em um grupo de adultos um rápido desenvolvimento da síndrome do desconforto respiratório agudo, seguida de complicações graves no trato respiratório para uma pneumonia inexplicável (HUANG, 2020).

Com base na estrutura do genoma do *SARS-COV-2*, a estrutura de ligação ao receptor específico, a enzima conversora de angiotensina 2 (ACE-2) leva a fusão das membranas virais com as do hospedeiro (DHAMA et al., 2020; FERREIRA et al., 2020).

Dos trabalhos enfocando mulheres grávidas com *SARS-CoV-2* foi relatado um natimorto (LAM et al., 2020). Um estudo em Hong Kong, em 2004, mostrou que a *SARS-CoV-I* durante a gravidez está associada a altas taxas de abortos espontâneos, partos prematuros e retardo do crescimento intrauterino (LIU et al., 2020). Não há veracidade de infecção intrauterina causada por transmissão vertical através da COVID-19 (CHEN et al., 2020).

Foi realizada a descrição de alguns casos de transmissão perinatal (CHEN et al., 2020; PHAN, 2020; WONG et al., 2019; YU et al., 2020; DU et al., 2020; ROBERTSON et al., 2020; WONG et al., 2020), mas não está claro se isso ocorreu pela via transplacentária compreender melhor a vulnerabilidade e potencial de transmissão intrauterina do SARS-CoV-2 em recém-nascidos e crianças.

METODOLOGIA

Esse trabalho surge de uma pesquisa simples, de natureza investigativa e informativa relacionada ao *SARS-COV-2*, construído a partir de informação científica indexadas na base, como, JAMA, EBSCO/MEDLINE, BMJ, Portal CAPES, NEJM e ScienceDaily Além de angariar o maior volume de evidências possível de publicações de fontes de informação científica indexadas na base, como, JAMA, EBSCO/MEDLINE, BMJ, Portal CAPES, NEJM e The Lancet.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nos estudos de Martínez-Perez et al. (2020), no período de março e abril de 2020, três entre 72 recém-nascidos de mulheres com gestações únicas na Espanha deram positivo no teste RT-PCR para o *SARS-CoV-2* dentro das seis primeiras horas de vida, o mesmo teste foi refeito após 48h e desta vez deu negativo, as crianças não apresentaram sintomas.

No trabalho de Zeng et al. (2020), a infecção neonatal positiva com *SARS-CoV-2* em 3 recém-nascidos de mães com COVID-19 em Wuhan, China, foi nos dias 2 e 4 de

vida e negativa no dia 6. Os pacientes pediátricos apresentaram letargia e febre, com resultados de pneumonia na imagem radiográfica do tórax (Figura 1).

Li et al. (2020) relataram que a combinação dos dados de ACE2 e os achados da pesquisa, confirmam que a transmissão transplacentária é realmente possível nas últimas semanas de gravidez, embora não se pode excluir uma possível transmissão e consequências fetais mais cedo durante a gravidez, pois ainda não existem dados definitivos da literatura disponíveis.

Conforme Patel et al. (2020), entre 305 pacientes com idades entre 4 e 60 anos, pacientes maiores que 10 anos apresentaram maior expressão de ACE2 no epitélio nasal em comparação com crianças menores de 4 a 9 anos (Figura 2). A expressão de ACE2 foi maior em cada faixa etária subsequente após ajuste para sexo e asma.

Figura 1. Achados de imagem de três neonatos infectados com SARS-CoV-2. A) Imagem da radiografia do tórax do paciente 1 e B) Paciente 2; C) Tomografia computadorizada do paciente 3.

Fonte: Patel et al. (2020).

Figura 2. A expressão da enzima de conversão da angiotensina 2 (ECA2) no epitélio nasal de 305 pacientes com idades entre 4 e 60 anos.

Fonte: PATEL et al. (2020).

Os pesquisadores Lanziotti e Marques (2020) corroboraram os resultados de Patel et al. (2020), quando relacionam à imunopatogênese da Covid-19 em crianças com os marcadores inflamatórios, como as proteínas C reativas e D- dímero que são menores em crianças em comparação aos adultos. Outro ponto, a variação da ACE2 em humanos e seu impacto na doença. A menor expressão de ACE2 em crianças pode ser um dos fatores que contribuem para doenças mais leves nessa faixa etária. Entretanto, Xie et al. (2020) em estudos experimentais em animais mostraram que a expressão da ACE2 diminui com a idade e Gu et al. (2020) relataram que a ACE2 pode proteger contra lesão pulmonar grave induzida por infecção por *SARS-CoV-2*, que é inconsistente com a hipótese de que a gravidade da doença esteja correlacionada com níveis aumentados de expressão da ACE2.

Dos 157 pacientes pediátricos com Covid-19 analisados por Huan et al. (2020), 60 deles apontavam caso clínico leve com pneumonia, 88 casos moderados, 6 casos graves e 3 estavam gravemente enfermos (Figura 3). As 148 crianças com doença leve ou moderada tinham idade média de 84 meses.

Figura 3. Casos clínicos leves, moderados, graves e gravemente enfermos de 157 pacientes pediátricos com Covid-19.

Fonte: Huan et al. (2020).

Foi elaborado por DONG et al. (2020) uma pesquisa no dia 8 de fevereiro de 2020, no qual 2135 pacientes pediátricos com Covid-19 foram notificados ao CDC chinês. Dos

pacientes, 728 foram casos confirmados e 1407 foram suspeitos (Figura 3), todos pacientes com a idade média de 7 anos.

Em relação à gravidade dos casos confirmados e suspeitos, 94 eram assintomáticos, 1088 casos leves e 826 diagnosticados como casos moderados (Figura 4) e representou 94,1% de todos os casos. Nos estudos de DONG e seus colaboradores, 981 dos pacientes eram da província de Hubei e 396 eram de Anhui, Henan, Hunan, Jiangxi, Shanxi e Chongqing (DONG et al., 2020).

Figura 4. Notificação de 2135 pacientes pediátricos com Covid-19 da China.

Em bebês, quanto à gravidade da doença por idade, o estudo de Dong et al. (2020) mostrou que eram vulneráveis à infecção por SARS-CoV-2. As proporções de casos graves e críticos foram de 10,6% a 3,0% para as faixas etárias de <1 a ≥ 16 anos (Figura 5).

Os recém-nascidos são mais vulneráveis ao *SARS-CoV-2* devido ao seu sistema imunológico, até o primeiro mês de vida, demonstrando alguns dos sintomas da Covid-19, caso seja portador do vírus. Crianças após o primeiro mês de idade e antes da puberdade são mais resistentes ao Coronavírus por apresentarem dois mecanismos que protegem das infecções por Covid-19. Apresentam menos receptores ACE2 nas vias

respiratórias inferiores para atrair a ligação da proteína S dos *Betacoronavírus* (DIAZ, 2020).

Figura 5. A vulnerabilidade ao SARS-CoV-2 de crianças quanto a gravidade da Covid-19 por idade de <1, 1 a 5, 6 a 10, 11 a 15 e ≥ 16 anos.

Fonte: Dong et al. (2020)

Chen et al. (2020) mostraram um achado de nove outros casos sugerindo que não há evidências de infecção intrauterina causada por transmissão vertical em mulheres que desenvolvem pneumonia por Covid-19 no final da gravidez.

Alguns trabalhos encontraram o Coronavírus nos bebês, mas não conseguiram especificar a via de transmissão perinatal, porque a placenta, o líquido amniótico e o sangue materno ou neonatal não foram sistematicamente testados ou relataram apenas a presença de anticorpos específicos (PHAN, 2020; YU et al., 2020)

O primeiro caso comprovado de transmissão transplacentária de *SARS-CoV-2* de uma mulher grávida infectada para o bebê no útero, no último trimestre da gravidez, foi confirmado pelos franceses Vivanti et al. (2020). Como a RT-PCR no tecido placentário foi positiva para os genes “E” e “S” do *SARS-CoV-2* e as amostras de sangue materno e neonatal, em secreções da narina e vagina na gestante, do líquido amniótico coletado antes da ruptura das membranas, do líquido retirado do pulmão, do nariz, faringe e reto do recém-nascido também foram positivas, a transmissão ocorreu claramente através da

placenta. A carga viral foi muito maior no tecido placentário do que no líquido amniótico e no sangue materno ou neonatal.

Vivanti et al. (2020) sugerem que a viremia materna ocorreu, o vírus atingiu a placenta, pela imuno-histoquímica (Figura 6) o vírus causou uma reação inflamatória e a viremia neonatal ocorreu após infecção placentária. Esses achados são também consistentes com um estudo de caso de Algarroba et al. (2020) que descreve a presença de virions no tecido placentário, embora não tenha relatado inflamação da placenta nem infecção fetal / neonatal.

Figura 6. Exame macroscópico e microscópico da placenta. **A)** As lesões macroscópicas da deposição de fibrina perivillosa com infarto, como fios irregulares de endurecimento amarelo-branco pálido (seta). **B)** Lesões microscópicas de intervillosite caracterizadas por um infiltrado dos espaços intervillares constituídos por neutrófilos e histiócitos (seta) (HES, × 400). **C)** A intervillosite com vários histiócitos CD68 positivos (seta) (imuno-histoquímica, × 400).

Fonte: Vivanti et al. (2020).

CONCLUSÕES

É possível durante as últimas semanas de gravidez a transmissão transplacentária da infecção por *SARS-CoV-2* podendo causar inflamação da placenta e viremia neonatal.

Para contribuir para tomada de decisões terapêuticas e de precaução da infecção, mais estudos precisam ser realizados para o melhor entendimento dos desfechos clínicos maternos, fetais e neonatais de *SARS-CoV-2* durante a gestação.

REFERÊNCIAS

ALGARROBA, G. N. et al. **Visualization of SARS-CoV-2 virus invading the human placenta using electron microscopy.** Am. J. Obstet. Gynecol. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2020.05.023> (2020).

CHEN HJ, GUO JJ, WANG C, LUO F, YU XC, ZHANG W, et al. **Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant women: a retrospective review of medical records.** *Lancet.* (2020) 20:30360–3. doi: 10.1016/S0140-6736(20)3 0360-3. 2020a.

CHEN, Yan; PENG, Hua; WANG, Lin; ZHAO, Yin; ZENG, Lingkong; GAO, Hui; LIU, Yalan. **Infants Born to Mothers With a New Coronavirus (COVID-19).** *Frontiers in Pediatrics, Wuhan, China, 2020, 16 Março 2020.* Disponível em: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fped.2020.00104/full>. Acesso em: 10 jul. 2020b.

DIAZ, James H. **Hipótese: angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin receptor blockers may increase the risk of severe COVID-19.** *Journal of Travel Medicine, [S.I], v.27, 23 Março 2020.* Disponível em: <https://academic.oup.com/jtm/article/27/3/taaa041/5809509>. Acesso em: 9 jul. 2020.

DONG, Yuanyuan; et al. **Epidemiology of COVID-19 Among Children in China.** *Official Journal of the American academy of pediatrics.* 2020, june. Disponível em: <https://pediatrics.aappublications.org/content/145/6/e20200702> Acesso em: 7 jul. 2020

DU, FL; OJCIUS, DM; PAN, C; JIANG, S. **Measures for diagnosing and treating infections by a novel coronavirus responsible for a pneumonia outbreak originating in Wuhan, China.** *Microbes Infect.* (2020) 20:30025–3. doi: 10.1016/j.micinf.2020.01.003

FERREIRA, Eskálath Morganna S; et al. **SARS-COV-2 aspectos relacionados a Biologia, propagação e transmissão da doença emergente covid-19.** *Revista interdisciplinar da Universidade Federal de Tocantins (Palmas-To, Brasil).* Abril,2020, p.4-6. Disponível em: <https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/desafios/article/view/8859>. Acesso em: 12 jul. 2020

GU, H; XIE, Z; LI, T; et al: **Angiotensin-converting enzyme 2 inhibits lung injury induced by respiratory syncytial virus.** *Sci Rep* 2016; 6:19840

HUANG, C; WANG, Y; LI, X; REN, L; ZHAO, J; HU, Y; et al. **Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China.** *Lancet (London, England).* 2020 Feb; 395 (10223): 497–506.

LAM, CM; WONG, SF; LEUNG, TN; CHOW, KM; YU, WC; WONG, TY; et al. **A case-controlled study comparing clinical course and outcomes of pregnant and non-pregnant women with severe acute respiratory syndrome.** *BJOG.* 2004; 111 (8): 771-74. <https://doi.org/10.1111/j.1471-0528.2004.00199.x>

LI, M; CHEN, L; ZHANG, J; XIONG, C. E; LI, X. **A expressão ACE2 do receptor SARS-CoV-2 da interface materno-fetal e dos órgãos fetais pelo estudo do transcriptoma de célula única.** *PLoS ONE* 15, e0230295 (2020)

LIU, Y; CHEN, H; TANG, K; GUO, Y. **Clinical manifestations and outcome of SARS-CoV-2 infection during pregnancy**, *Journal of Infection* (2020), doi: <https://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.02.028>

MARTÍNEZ-PÉREZ, Oscar; VOUGA, Manon; MELGUIZO, Sara Cruz; et al. **Association Between Mode of Delivery Among Pregnant Women With COVID-19 and Maternal and Neonatal Outcomes in Spain**. *Jama Network*, [S.I.], 8 Junho 2020. Disponível em: <https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2767206?resultClick=1>. Acesso em: 10 jul. 2020.

PATEL, Ankit B; VERMA, Ashish. **Níveis Nasais de ACE2 e COVID-19 em Crianças**. *Jama Network*, [S.I.], v. 23, n.323, 2020, p.2386-2387. Disponível em: <https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2766522>. Acesso em: 10 jul. 2020.

PHAN, T. **Novel coronavirus: from discovery to clinical diagnostics**. *Infect Genet Evol.* (2020) 79:104211. doi: 10.1016/j.meegid.2020.1 04211

Robertson CA, Lowther SA, Birch T, Tan C, Sorhage F, Stockman L, et al. SARS and pregnancy: a case report. *Emerg Infect Dis.* (2004) 10:345–8. doi: 10.3201/eid1002.030736

VIVANTI, Alexandre J.; VAULOUPE-FELLOUS, Christelle; PREVOT, Sophie; ZUPAN, Veronique; SUFFEE, Cecile; CAO, Jeremy Do; BENACHI, Alexandra; DE LUCA, Daniele. **Transplacental transmission of SARS-CoV-2 infection**. *Nature Communications*, [S.I.], 2020. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41467-020-17436-6.pdf>. Acesso em: 9 jul. 2020.

WONG, ACP; LI, X; LAU, SKP; WOO, PCY. **Global epidemiology of bat coronaviruses**. *Viruses*. (2019) 11:E174. doi: 10.3390/v11020174

WU, Huan et al. **Clinical and Immune Features of Hospitalized Pediatric Patients With Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Wuhan, China**. *Jama Network* [S /] 2020, june. Disponível em: <https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2766670?resultClick=1>. Acesso em: 08 jul.2020a.

XIE X, CHEN J, WANG X, et al: **Age- and gender-related difference of ACE2 expression in rat lung**. *Life Sci* 2006; 78:2166e71

YU, F; DU, L; OJCIUS, DM; PAN, C; JIANG, S. Measures for diagnosing and treating infections by a novel coronavirus responsible for a pneumonia outbreak originating in Wuhan, China. *Microbes Infect.* (2020) 20:30025–3. doi: 10.1016/j.micinf.2020.01.003

ZENG, Lingkong; XIA, Shiwen; YUAN, Wenhao; et al. Neonatal Early-Onset Infection With SARS-CoV-2 in 33 Neonates Born to Mothers With COVID-19 in Wuhan, China. *Jama Network*, [S.I.], 26 Março 2020. Disponível em:

<https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2763787?resultClick=1>.
Acesso em: 11 jul. 2020.

SOBRE OS ORGANIZADORES

FREITAS, Dayana Lúcia Rodrigues de: Mestre em Ciências da Educação pelo Centro de Educação Continuada e Aperfeiçoamento Profissional (CECAP). Especialista em Mídias na Educação pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN). Especialista em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância pelo Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). Especialista em Metodologia do ensino de Biologia e Química pelo Instituto Pedagógico de Minas Gerais (IPEMIG/MG). Especialista em Educação Ambiental e Geografia do semiárido pelo Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). Especialista em Ensino de Ciências Naturais e Matemática pelo Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). Especialista em Língua Portuguesa, Matemática e Cidadania pelo Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). Graduada em Licenciatura Plena em Biologia pelo Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). Técnica em Meio Ambiente pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC/RS). Palestrante. Pesquisadora. Professora e Orientadora de cursos de Pós-Graduação e Graduação em instituições da rede privada em Macau/RN. Professora; Orientadora de TCC e Orientadora de Estágio Curricular Supervisionado da Escola Técnica Fanex Rede de Ensino – Macau/RN. Professora da Educação Básica do município de Guamaré/RN. Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-5355-3547>. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5122671799874415>. E-mail: dayannaproducoes@gmail.com.

PAIVA, Luciano Luan Gomes: Diretor de Arte na Editora Amplamente Cursos, coordenando toda a produção visual e ações de publicidade nas redes sociais e site da empresa. No campo da Educação, atua como Coach Educacional, Palestrante, Ministrante de Oficinas (presenciais e on-line), Tutor a Distância na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e Professor de Música em múltiplos contextos. Como pesquisador, tem feito estudos sobre Aprendizagem mediada por Tecnologias Digitais sob a ótica da Complexidade; Formação Docente no âmbito das Tecnologias Digitais; e Mediação Pedagógica no Ciberespaço. Também é membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em Música (GRUMUS-UFRN). Tem formação acadêmica, como Mestre em Música (com ênfase em Educação Musical) pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Especialista em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFRN). Licenciado em Música pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-6192-6075>. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0772088747598226>. E-mail: luciano.90@hotmail.com.

FERNANDES, Caroline Rodrigues de Freitas: Especialista em Mídias na Educação pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN). Pós-graduanda

em Educação Inclusiva pelo Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). Graduada em Licenciatura em História pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN). Graduanda em Licenciatura Plena em Pedagogia pela Faculdade UNOPAR. Técnica em Contabilidade pelo Centro de Educação Integrada Monsenhor Honório (CEIMH). Atuou como professora da Rede Pública em Macau/RN. Atuou como professora da Escola Técnica Fanex Rede de Ensino – Macau/RN. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-9198-6746>. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5956672837215695>. E-mail: caroline_brum2005@hotmail.com.

SOBRE OS AUTORES

AIRES, Maria Elane de Oliveira Dias: Psicóloga- Centro Universitário Luterano de Palmas. Especialista em Gestão de Pessoas-UNINTER. Mestranda do Curso de Promoção da Saúde, Desenvolvimento Humano e Sociedade-ULBRA-CANOAS-RS. E-mail: psicologia@faculadecarajas.edu.br

ALVES, Viviane Pereira: Enfermeira do Hospital Dom Pedro I; <http://lattes.cnpq.br/8032236812085644>; ORCID 0000-0002-7414-3026. E-mail: viviane.timpb@gmail.com

ARAÚJO, Stella Marina Silva Azevedo: Graduada em Fisioterapia pelo Centro Universitário Una Bom Despacho. E-mail: stellamarinasilva@hotmail.com

AZEVEDO, Ingridy Maria Diniz Melo: Graduanda do 8º período de Medicina- FASEH. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3821264069953349>. E-mail: ingridymdiniz@gmail.com.

AZEVEDO, Juliana Latini: Estudante de Medicina do Centro Universitário Arthur Sá Earp Neto/Faculdade de Medicina de Petrópolis. Ligante da Liga de Saúde da Família e Sociedade do Centro Universitário Arthur Sá Earp Neto/Faculdade de Medicina de Petrópolis. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7112233549221459>. E-mail: jujulatini99@gmail.com

AZEVÊDO, Maria Santa: Maria Santa Azevêdo; Graduada em Fisioterapia pelo Centro Universitário Una Bom Despacho. E-mail: Mariasantaazevedo@hotmail.com

BARBOSA, João Arthur Rodrigues: Graduando do 9º período de Medicina - FASEH. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0794708662903999>. E-mail: jjarthur.97@gmail.com.

BELTRAMINI, Natália Inácio: Discente do curso de medicina da Universidade Brasil, Fernandópolis, São Paulo. E-mail: natbeltramini@gmail.com

BERNIS, Eduarda Heringer: Graduanda do 9º período de Medicina - FASEH. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1355911630852119>. E-mail: eduardabernis@hotmail.com.

BRASILEIRO, Bereneuza Tavares Ramos Valente: Licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Católica de Pernambuco, especialista em Micologia e

doutora em Biologia de Fungos pela Universidade Federal de Pernambuco (2003). Diretora da Empresa Genetech - Pesquisa, Desenvolvimento e Consultoria em Biotecnologia (2006 a 2012), Assessora da Coordenação Geral de Pesquisa (02/2012 a 01/2014) da Universidade Católica de Pernambuco e Professora da Faculdades Integradas de Patos - FIP (2005 a 2006). É participante do Grupo de Pesquisa Desenvolvimento de Processos e Novos Materiais. Atualmente é Professora dos Cursos de Licenciatura e Bacharelado em Ciências Biológicas, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina e Nutrição da Escola de Saúde e Ciências da Vida - Unicap e Docente Orientadora do Programa de Residência Pedagógica de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Católica de Pernambuco. E-mail: bereneuza.brasileiro@unicap.br

BRITO, Calebe Lima de: Graduando do 4º período de medicina do Centro Universitário Arthur Sá Earp Neto. Diretor da Liga Acadêmica de Fisiologia e Fisiopatologia Humana da Faculdade de Medicina de Petrópolis/ UNIFASE nos anos de 2020 e 2021. Colunista na comunidade SANARMED. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9894388505163012>. E-mail: calebelimamed@gmail.com

BRUM, Jade de Paula: Estudante de Medicina do Centro Universitário Arthur de Sá Earp Neto/ Faculdade de Medicina de Petrópolis. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0536673917278437>. E-mail: jade_brum@yahoo.com.br

BUCK, Eliane Cristina da Silva: Enfermeira, Doutoranda pela Universidade Federal da Paraíba, Docente das Faculdades Nova Esperança; <http://lattes.cnpq.br/9855395433239611>; ORCID 0000-0002-9230-8760. E-mail: elianecristina@facene.com.br

CAETANO, Rosângela: Doutora em Saúde Coletiva. Professora associada do Departamento de Políticas Públicas, Planejamento e Administração em Saúde do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E-mail: caetano.r@gmail.com

CAMILO, Luana Martins: Discente do curso de medicina da Universidade Brasil, Fernandópolis, São Paulo. E-mail: luanamartins67@gmail.com

CARNEIRO, José Gerardo: Possui doutorado em Biotecnologia pelo RENORBIO/UFC e Mestrado em Bioquímica pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente é docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE - Campus Acaraú), Coordenador do Grupo de Estudos em Biotecnologia do IFCE - Campus Acaraú (BIOTIFCE). Membro do Centro de Inovação Biotecnológica (CIB-IFCE, Campus Acaraú) e dos laboratórios: LABIAM - Laboratório de Microbiologia Ambiental e Microbiologia (IFCE - Acaraú) e CARBOLEC - Laboratório de Carboidratos e Lectinas (DBBM-UFC-Fortaleza). Está inserido nos grupos: Biodiversidade (IFCE-Acaraú), Química de Macromoléculas (IFCE-Sobral) e Carboidratos e Lectinas (UFC). Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5964767469589227>. E-mail: gerardo@ifce.edu.br

CARVALHO, Paula Altoé: Estudante de Medicina do Centro Universitário Arthur Sá Earp Neto/Faculdade de Medicina de Petrópolis. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7803217620298511>. E-mail: paulaaltoec@hotmail.com

CORREIA, Elisa de Castro: Graduanda do 8º período de Medicina - FASEH. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9139712262497415>. E-mail: elisacastro368@gmail.com.

COUTINHO, Hiago Antônio de Paula: Graduado em fisioterapia pelo Centro Universitário Una Bom Despacho; <http://lattes.cnpq.br/7716862799516963>. E-mail: hiagocoutinho14@hotmail.com

ELERES, Fabrício Bezerra: Enfermeiro-Universidade do Estado do Pará. Especialista em Enfermagem Pediátrica e Neonatologia-Escola Superior da Amazônia. Mestre em Tecnologia e Inovação em Enfermagem-Universidade de Fortaleza. Docente do Curso de Enfermagem-Faculdade Carajás. Docente do Curso de Enfermagem-Faculdade FADESA. E-mail: fabricaoeleres@hotmail.com

EUGÊNIO, Romário Martins Romeiro: Farmacêutico Generalista - Universidade de Gurupi. Especialista em Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica - DALMAS-PA. E-mail: romarioextrafarma@outlook.com

FERNANDEZ, Matheus Scabini: Discente do curso de medicina da Universidade Brasil, Fernandópolis, São Paulo. E-mail: matheuscanarinho@hotmail.com

FERREIRA, Beatriz Henrique Correa: Graduanda do 4º período de medicina do Centro Universitário Arthur Sá Earp Neto. Participante da Liga Acadêmica de Anatomia Humana da Faculdade de Medicina de Petrópolis. E-mail: beatrizhcf@gmail.com

FERREIRA, Jackson Soares: Enfermeiro. Pós-graduando Urgência e Emergência e UTI pela Faculdade de Enfermagem Nova Esperança. João Pessoa – PB – Brasil. E-mail: soaresjf21@gmail.com

FILHO, Altever de Sá Vianna: Graduando do 4º período de medicina do Centro Universitário Arthur Sá Earp Neto. Diretor da Liga de Fisiologia e Fisiopatologia Humana da Faculdade de Medicina de Petrópolis/ UNIFASE no ano de 2020. Vice coordenador discente do núcleo de estudos em fisiologia da Faculdade de Medicina de Petrópolis, participante da Liga de Oncologia Clínica e Cirúrgica da Faculdade de Medicina de Petrópolis. E-mail: altevervianna@icloud.com

FONSECA, Fátima Morgana Pio: Possui graduação em Bacharelado em Biomedicina com Habilitação em Análises Clínicas (2017) pela Faculdade Maurício de Nassau (UNINASSAU) de Fortaleza. Como fundadora e ex-presidente, possui colaboração na Liga Acadêmica de Estudo e Pesquisa em Imunologia, da faculdade UNINASSAU (Fortaleza/CE). Realiza pesquisas nas áreas de neuroimunologia, virologia (Sars-CoV2 e HIV-1) e estudo da relação parasita-hospedeiro sob a orientação da Prof. Dra. Juliana Terzi Maricato. Atualmente Bolsista de Doutorado Direto pelo Departamento de Pós-graduação em Microbiologia, Imunologia e Parasitologia (DMIP) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), desenvolvendo pesquisas referentes a infecção pelo Sars-CoV-2 em células pulmonares, a fim de averiguar as modificações metabólicas desempenhada pelo vírus frente a estímulos adrenérgicos e farmacológicos. Possui experiência em purificação de proteínas, bioinformática, imunologia e virologia. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7187343849404965>. E-mail: fatimamorgana@live.com

FRANÇA, Jael Rúbia Figueiredo de Sá: Enfermeira, Doutora em Enfermagem, Docente do Departamento de Enfermagem em Saúde Pública e do Programa de Pós-graduação em Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba;

<http://lattes.cnpq.br/4954436220551945>; ORCID 0000-0001-8880-6786. E-mail: jaelrubia@gmail.com

FREIRE, José Ednézio da Cruz: Doutor (2018) e Mestre (2013) em Bioquímica pela Universidade Federal do Ceará. Especialista (2012) em Bioquímica e Biologia Molecular Aplicadas à Saúde pela Universidade Estadual do Ceará. Graduado (2007) em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Ceará. Tem experiência em Bioquímica, Biologia Molecular, Bioinformática, Genética e Citogenética. Os principais interesses de investigação compreendem os peptídeos e proteínas relacionadas aos mecanismos de defesa em plantas e animais; Bioinformática aplicada a genômica e proteômica; Genética e Metabolismo das Lipodistrofias Generalizadas Congênitas; Tecnologia do DNA recombinante; Citogenética de plantas com potencial Farmacológico/Biotecnológico. Atualmente é Pós-doutorando, Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas da Universidade Federal do Ceará. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2872960672942349>. E-mail: jednesio@gmail.com

FREITAS, Lays Viana: Graduada em Medicina pelas Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros (FIP-Moc). E-mail: laysvf@hotmail.com

GARBELINI, Izabella Souza: Graduanda do 4º período de medicina do Centro Universitário Arthur Sá Earp Neto. E-mail: iza.sg99@hotmail.com

GOMES, Marcelo Sebastião: Graduando em Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP, Recife – PE. E-mail: marcelo.2018130373@unicap.br

GOMES, Miriam Pardini: Discente do curso de medicina da Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, São Paulo. E-mail: miriampardini@hotmail.com

GOULART, Isadora Medrado: Discente do curso de medicina da Universidade Brasil, Fernandópolis, São Paulo. E-mail: Isadora08_10@hotmail.com

GRAMACHO, Yan Alves: Graduação em andamento. Universidade Federal de Viçosa, UFV, Brasil. E-mail: yangramacho@gmail.com

GUEDES, Ana Cristina Carneiro Menezes: Doutoranda no Programa de Pós-Graduação de Enfermagem e Biociências da Universidade Federal do Estado do Rio de

Janeiro-UNIRIO. Coordenadora do Núcleo de Telessaúde do Hospital Federal dos Servidores do Estado e Membro da Divisão de Ensino e Pesquisa do Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro. E-mail: anamenegue@gmail.com

GUIMARÃES, Maria Eduarda Bianchi Reis: Estudante de Medicina do Centro Universitário Arthur de Sá Earp Neto/ Faculdade de Medicina de Petrópolis. Ligante da Liga de Medicina do Esporte e Exercício do Centro Universitário Arthur de Sá Earp Neto/ Faculdade de Medicina de Petrópolis. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7032001817931882>. E-mail: dudaguimaraes1150@gmail.com

IBIAPINO, Thiago Michael Ferreira: Graduação em andamento em Medicina. Universidade Federal de Viçosa, UFV, Brasil. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4239622139166945>. E-mail: thiagomychaell@gmail.com

IMAMURA, Vinícius Lopes: Discente do curso de medicina da Universidade Brasil, Fernandópolis, São Paulo. E-mail: viniciusimamura1@gmail.com

JÚNIOR, Vanir Reis Pinto: Possui graduação em Bacharelado em Biotecnologia, mestrado e doutorado em Biotecnologia de Recursos Naturais, ambos na Universidade Federal do Ceará (UFC). Atualmente é Bolsista de Pós-Doutorado no Departamento de Física da Universidade Federal do Ceará. Atua na pesquisa em Bioquímica de Macromoléculas, na área de purificação de proteínas, cristalografia de raios-X e bioinformática. Atualmente atuando em projetos de purificação, caracterização físico-química e estrutural de proteínas, com foco em lectinas. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4181697997790568>. E-mail: juniorreis4@hotmail.com

JÚNIOR, Wander Valadares de Oliveira: Professor do curso de farmácia do Centro Universitário Una Bom Despacho; <http://lattes.cnpq.br/9468657933259765>; Orcid: 0000-0001-9784-918. E-mail: wandervjunior@gmail.com

LAU, Raphael da Silva: Mestrando em Ciências Fisiológicas pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Pós-graduando em Ciências do Esporte. Graduado em Bacharelado em Educação Física pelo Centro Universitário Leonardo Da Vinci. Graduado em Licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5498807572595356>. E-mail: raphael.lau@bol.com.br

LINS, Maria de Lourdes Vieira: Enfermeira. Pós-graduada em Cuidados Paliativos pela Faculdade Futura São Paulo/SP. João Pessoa – PB – Brasil. E-mail: maluvlins@gmail.com

LISBOA, Renato dos Santos: Psicanalista Clínico, Jornalista, Coach e Advogado, foi responsável pela maior negociação Trabalhista do Brasil, é mestre em Psicanálise. Pós-Graduado em Direito Material e Processual do Trabalho, em Administração de Conflito e Gestão Empresarial, em inteligência múltiplas e mind fulness e em Big Data (Ciência dos Dados), Master Coach Executivo e de Negócios, com formação Profissional em Wellness & Health, Global Coach Certification®, Leader Coach, Trainer de Analistas Comportamentais, e membro do Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica e da ABRAPCoaching. É Especialista em Inteligência Emocional. Atua também como palestrante, facilitador de programas de desenvolvimento de líderes, programas de inteligência emocional, tomada de decisão, consultor empresarial de reestruturação organizacional, implementação de políticas, procedimento de pessoas, transição de carreira e implantação de sistemas de *compliance* e jurimetria.

MARTINS, Marina Gomes Silva: Graduação em Medicina pela UNEC, residência de cirurgia geral pelo hospital Deraldo Guimarães, e socorrista pelo SAMU, atuante em ultrassonografia abdominal. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0385514553163313>. E-mail: marina_martins00@hotmail.com

MELO, Luanna Júlia Silva de: Graduanda em Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP, Recife – PE. E-mail: luanna.2018113363@unicap.br

MENDONÇA, Thays Santos: Professora do curso de farmácia do Centro Universitário Una Bom Despacho; <http://lattes.cnpq.br/9113741216688021>; Orcid: 0000-0002-7005-8780. E-mail: thayssmfarmacia@gmail.com

MENEZES, Romullo V. Dutra: Graduando em Medicina pela Universidade de Itaúna. E-mail: romullodutra@hotmail.com

MIRANDA, Luiza Pires: Graduada em Medicina pela Universidade de Itaúna. E-mail: luizapiresmiranda@gmail.com

NASCIMENTO, Gean Costa: Graduação em andamento em Medicina. Universidade Federal de Viçosa, UFV, Brasil. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9147208280630341>. E-mail: geancn82@gmail.com

NETO, Miguel Pereira Goulart: Discente do curso de medicina da Universidade Brasil, Fernandópolis, São Paulo. E-mail: netogoulart.estudos@gmail.com

OLIVEIRA, Anny Gabriele Pereira de: Farmacêutica Generalista-Faculdade Integrada Aparício Carvalho. Especialista em Farmácia Estética-NEPUGA-DF. Mestrando no curso de Cirurgia e Pesquisa Experimental-Universidade do Estado do Pará. E-mail: annygabriele@hotmail.com

OLIVEIRA, Breno Pimentel Moraes: Graduação em andamento em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, UFV, Brasil. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4258060198060500>. E-mail: brenopmo@gmail.com

OLIVEIRA, Evelyne de Lourdes Neves de: Enfermeira; <http://lattes.cnpq.br/9003358878263813>; ORCID 0000-0001-7332-2500. E-mail: evelyneoliveira@hotmail.com

OLIVEIRA, Luana Aparecida Astéria de: Graduada em Fisioterapia pelo Centro Universitário Una Bom Despacho; E-mail: Luana-oliveiraf@hotmail.com

OLIVEIRA, Omara Machado Araujo de: Mestre em Saúde Coletiva pela Universidade Federal Fluminense. Pós-graduada em Nutrição Clínica pela Universidade Federal Fluminense. Graduada em Nutrição pela Universidade Federal Fluminense e em Ciências Biológicas pela Faculdade de Biologia e Psicologia Maria Thereza. Professora do Curso de Nutrição do Centro Universitário IBMR. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3130197710165363>. E-mail: omaraarj@gmail.com

PAGLIARANI, Guilherme Henrique: Discente do curso de medicina da Universidade Brasil, Fernandópolis, São Paulo. E-mail: guihpag@gmail.com

PAIVA, Carla Cardi Nepomuceno de: Doutoranda em Saúde Coletiva no Instituto de Medicina Social da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E-mail: carlacardiufjf@gmail.com

POUBEL, Júlia Barcelos: Estudante de Medicina do Centro Universitário Arthur Sá Earp Neto/Faculdade de Medicina de Petrópolis. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9367706506689750>. E-mail: juliapoubel2609@gmail.com

PRADO, Giovanna de Castro do Amaral Monteiro: Graduanda do 4º período de medicina do Centro Universitário Arthur Sá Earp Neto. E-mail: gigi.m.prado@gmail.com

QUEIROZ, Viviane Cordeiro de: Enfermeira. Mestranda em Enfermagem pela Universidade Federal da Paraíba. João Pessoa – PB – Brasil. E-mail: vivicordeiroqueiroz35@gmail.com

RAFAEL, Laisla Bonfati: Graduada em Nutrição pelo Centro Universitário do Triângulo Mineiro. Pós graduada em Nutrição Clínica pela Estácio de Sá. Pós graduada em Nutrição Esportiva pela Universidade Internacional. E-mail: laislabonfati@hotmail.com

REIS, Mariana Didier: Graduanda do 9º período de Medicina - FCMMG. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4214217239487116>. E-mail: marianadidierr@gmail.com.

RIBEIRO, Gizele da Rocha: Tecnologista em saúde pública no Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, RJ / Biblioteca de Saúde Pública. E-mail: gizalivros@gmail.com

RIBEIRO, Lucianno Viana: Residência médica em cirurgia geral, pós graduação em endoscopia digestiva e motilidade digestiva. Idealizador do Gastrocentro em Almenara MG, vale do Jequitinhonha. Título de especialista em endoscopia pela SOBED/AMB. Coordenador da COREME do Hospital Deraldo Guimarães em Almenara. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0115745789367234>. E-mail: luciannovianaribeiro@hotmail.com

ROCHA, Lara Lys Santos: Graduação em Biomedicina pela Faculdade Maurício de Nassau (2016) e especialização (Lato Sensu) em Genética Molecular e Bioinformática pelo Centro Universitário Christus (UNICHRISTUS) (2019). Atua como Biomédica plantonista no Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2821590201221643>. E-mail: laralysrocha@hotmail.com

ROSA, Alexandre Jardim da: Graduado em Fisioterapia pela Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte (2012), FATERN. Membro da ANAFIQ (Associação Nacional De Fisioterapia Em Quiropraxia), Especialista em fisioterapia nas disfunções biomecânicas e posturais da coluna vertebral pela Faculdade Einstein (FACEI, BA); possui experiência nas áreas de fisioterapia hospitalar geral e ambulatorial, geriátrica, desportiva e educacional. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4569759886366620>. E-mail: alexandre.fisio1973@gmail.com

SANTIAGO, Mayara Queiroz de: Cientista, empreendedora e doutoranda no Programa de Pós-graduação em Biotecnologia de Recursos Naturais da Universidade Federal do Ceará. Na pesquisa atua na área de bioquímica, com ênfase em química de macromoléculas, e biofísica, com ênfase em cristalografia de proteínas, associadas às aplicações biológicas e biotecnológicas. Desenvolve as referidas atividades no Laboratório de Moléculas Biologicamente Ativas (BioMol-Lab) no Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular, Universidade Federal do Ceará. No empreendedorismo atua na área educacional, com foco na popularização e acessibilidade da Ciência e Tecnologia, e em bionegócios, com foco em bioindústria e soluções de base tecnológica voltadas à saúde humana e animal. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6946710332110975>. E-mail: santiago_mq@outlook.com

SANTOS, Carla Lidiane Jácome dos: Enfermeira, Doutoranda pela Universidade Federal da Paraíba; <http://lattes.cnpq.br/5142857905726050>; ORCID 0000-0002-5101-4408. E-mail: carlalima2006@yahoo.com.br

SANTOS, Daniela Lacerda: Doutora em Saúde Coletiva, na área de Política, Planejamento, Administração em Saúde, pelo Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IMS/UERJ). Professora da Faculdade de Medicina de Petrópolis - Fundação Octacílio Gualberto (FMP/FOG). E-mail: enfdanielalacerda@gmail.com

SANTOS, Daniela Lacerda: Fisioterapeuta graduada pela Universidade Gama Filho. Especialização em Reabilitação Cardiovascular e Respiratória pela Universidade Estácio de Sá. Enfermeira graduada pelo Centro Universitário Augusto Motta, com especialização em Enfermagem do Trabalho pela Universidade Gama Filho. Mestre em

Saúde da Família pela Universidade Estácio de Sá. Doutora em Saúde Coletiva pelo Instituto de Medicina Social/UERJ. Professora do Centro Universitário Arthur Sá Earp Neto/ Faculdade de Medicina de Petrópolis. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4803532250229421>. E-mail: enfdanielalacerda@gmail.com

SANTOS, Daniela Lacerda: fisioterapeuta graduada pela Universidade Gama Filho. Especialização em Reabilitação Cardiovascular e Respiratória pela Universidade Estácio de Sá. Enfermeira graduada pelo Centro Universitário Augusto Motta, com especialização em Enfermagem do Trabalho pela Universidade Gama Filho. Mestre em Saúde da Família pela Universidade Estácio de Sá. Doutora em Saúde Coletiva pelo Instituto de Medicina Social/UERJ. Professora do Centro Universitário Arthur Sá Earp Neto/Faculdade de Medicina de Petrópolis. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4803532250229421>. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-6318-0809>. E-mail: enfdanielalacerda@gmail.com

SANTOS, Rafael Bizarelo Ribeiro dos: Pós-graduado em Bases Fisiológicas do Treinamento Personalizado e Nutrição Esportiva pela Faculdade Casa do Estudante. Graduando do Curso de Nutrição pelo Centro Universitário IBMR. Graduado em Educação física pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3960357560142560>. E-mail: rafaelbizarelo@hotmail.com

SANTOS, Vitor Hugo Neves: Graduado em Medicina pela Universidade de Itauna-MG (2014) Cirurgião geral Hospital Deraldo Guimarães (2018), residente Endoscopia Gastrocenter. E-mail: victorsantos89@hotmail.com

SENA, Ana Karolyna da Silva: Enfermeira graduada em Enfermagem pela Faculdade de Enfermagem Nova Esperança. E-mail: gcarolsena@hotmail.com

SILVA, Ana Júlia Ferreira da: Discente do curso de medicina da universidade Nove de Julho campus Vergueiro. E-mail: anawarteca@uni9.edu.br

SILVA, Andre Luiz de Souza: Graduação em andamento. Universidade Federal de Viçosa, UFV, Brasil. E-mail: andre.silva2@ufv.br

SILVA, John Layonn de Sousa: Graduação em andamento em Ciências da Natureza pela Universidade Federal do Piauí. Lattes:

<http://lattes.cnpq.br/8678398506628103>. Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-5297-5625>.

E-mail: johnteresina@gmail.com

SILVA, Lucas Duarte: Enfermeiro-Universidade de Uberaba. Mestre em Ciências- USP-Ribeirão Preto. Docente do Curso de Enfermagem e Psicologia-Faculdade Carajás. E-mail: lucasduarteslv@hotmail.com

SILVA, Tassiana Soares: Graduada em Medicina pela Universidade Vila Velha (UVV). E-mail: tassianas2@hotmail.com

SILVA, Vitória Régia da: Graduanda em Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP, Recife – PE. E-mail: vitoria.2018113980@unicap.br

SILVA, Viviane Michele da: Enfermeira graduada em Enfermagem pela Faculdade de Enfermagem Nova Esperança. João Pessoa – PB – Brasil. E-mail: vivi.michele015@gmail.com

SOARES, Lara Oliveira: Discente do curso de medicina da Universidade de Marília, São Paulo. E-mail: larasolv@hotmail.com

SOARES, Laura Nunes Oliveira: Estudante do 3 período de Medicina do Centro Universitário Arthur Sá Earp Neto/Faculdade de Medicina de Petropolis. Diretora de relações públicas da Liga de Medicina do Esporte e Exercício do Centro Universitário Arthur Sá Earp Neto/Faculdade de Medicina de Petropolis. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2848522366554103>. E-mail: lauranunessoares15@gmail.com

SOUSA, Antônio Juscelino Sudário: Doutor em Bioquímica pela Universidade Federal do Ceará (2018), fez mestrado também em Bioquímica pela Universidade Federal do Ceará (2013) e graduou-se em Ciências Biológicas na modalidade Licenciatura Plena pela Universidade Regional do Cariri (2009). Tem experiência na área de Bioquímica, Fisiologia Vegetal, Genética, Biologia Molecular e Microbiologia. Além disso, participou de 7 bancas de trabalhos de conclusão de curso nos últimos 3 anos, tendo participado da orientação de dois graduandos e foi aprovado em 1º lugar no Concurso da Prefeitura de Juazeiro do Norte - CE, para o cargo Professor de Ciências. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8611868441945375>. E-mail: ajuscelinoss@gmail.com

SOUSA, Jairo de Freitas de: Farmacêutico Generalista-Centro Universitário Presidente Antônio Carlos. Especialista em Farmácia Hospitalar Oncológica-PUC-GO. Mestre em Genética e Toxicologia Aplicada-ULBRA-CANOAS-RS. Docente do Curso de Enfermagem e Psicologia-Faculdade Carajás. E-mail: j.bioquimico@hotmail.com

SOUZA, Matheus Alves de: Discente do curso de medicina da Universidade Brasil, Fernandópolis, São Paulo. E-mail: alves.math@outlook.com.br

VALADARES, Ywia Danieli: Professora do curso de fisioterapia do Centro Universitário Una Bom Despacho; <http://lattes.cnpq.br/0336861515307402>; Orcid: 0000-0003-4124-6309. E-mail: ywiaval@hotmail.com

VILAR, Juliana dos Santos: Doutora em Ciência de Alimentos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Pós-graduada em Segurança Alimentar e Qualidade Nutricional pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Professora da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal Fluminense. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7725981827500403>. E-mail: dravilar@yahoo.com.br

ÍNDICE REMISSIVO

A

ACE-2, [297](#)
Acidente Vascular Encefálico, [122](#)
Aedes albopictus, [88](#)
Alta performance, [170](#)
Assistência à saúde, [192](#)
Atenção Primária, [106](#)

C

Câncer de Colo do Útero, [275](#)
Câncer de pulmão, [154](#)
Capacidade funcional, [225](#)
Carga de treinamento, [13](#)
Cirurgia bariátrica, [64](#)
Cirurgia metabólica, [64](#)
Colecistectomia, [81](#)
Colecistite, [81](#)
Comportamento biológico, [88](#)
Coronavírus, [297](#)
Covid-19, [297](#)
Cuidado Preventivo, [275](#)

D

Diabetes Mellitus, [64](#), [255](#)
Diagnóstico, [266](#)
Doença Falciforme, [106](#)
Doença renal crônica, [225](#)
Doenças Autoimunes, [266](#)
Doenças Desmielinizantes, [266](#)
Doenças negligenciadas, [138](#)
DORT, [30](#)

E

Efeitos adversos, [13](#)
Emagrecimento, [206](#)
Enfermagem, [106](#), [122](#)
Esclerose Múltipla, [266](#)
Esteroides anabolizantes, [13](#)
Exame Colpocitopatológico, [275](#)

F

Fatores de Risco, [122](#)
Fístula Biliodigestiva, [81](#)
Flebotomíneo, [138](#)
FTA-Abs, [290](#)

H

Hemodiálise, [225](#)
Hipertensão Arterial, [255](#)

I

Íleo Biliar, [81](#)
Imunopatogênese, [297](#)
Inteligência Emocional, [170](#), [206](#)
Interações Medicamentosas, [242](#)
IST, [290](#)

L

Leishmania, [138](#)
LER, [30](#)
Lombalgia ocupacional, [30](#)

M

MDR₁, [154](#)

O

Obesidade, [206](#)

P

Polifarmácia, [242](#)
Políticas Públicas, [255](#)
Psicanálise, [170](#)

Q

Qualidade de vida, [225](#)

R

Reação Adversa a Medicamento, [242](#)

S

Saúde do trabalhador, [30](#)

Serviços de Saúde, [192](#)

Sífilis, [290](#)

Sistema Único de Saúde, [255](#), [275](#)

T

Telemedicina, [192](#)

Telessaúde, [192](#)

Treinamento de força, [13](#)

U

Unidade Básica de Saúde, [122](#)

V

VDRL, [290](#)

E-BOOK

AMPLAMENTE: DESAFIOS EM SAÚDE

1ª EDIÇÃO. VOLUME 01.

EDITORA DE LIVROS
FORMAÇÃO CONTINUADA

ORGANIZADORES

Dayana Lúcia Rodrigues de Freitas
Luciano Luan Gomes Paiva
Caroline Rodrigues de Freitas Fernandes

DOI: 10.47538/AC-2021.02
ISBN: 978-65-992789-8-3

(84) 99707 2900

@editoraamplamentecursos

amplamentecursos

publicacoes@editoraamplamente.com.br