Cultivo em Substrato de Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares

Cassiane Ubessi
Jerônimo Luiz Andriolo
Organizadores

ARCO
EDITORES ● ● ●

Cultivo em Substrato de Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares

Cassiane Ubessi
Jerônimo Luiz Andriolo
Organizadores

CONSELHO EDITORIAL

Prof. Dr. Adilson Tadeu Basquerot e
Silva
UNIDAVI/SC
<http://lattes.cnpq.br/8318350738705473>

Profa. Msc. Jesica Wendy Beltrán
UFCE- Colômbia
<http://lattes.cnpq.br/0048679279914457>

Profa. Dra Fabiane dos Santos Ramos
UFSM- Santa Maria/RS
<http://lattes.cnpq.br/0003382878348789>

Dr. João Riél Manuel Nunes Vieira de
Oliveira Brito
UAL - Lisboa- Portugal.
<http://lattes.cnpq.br/1347367542944960>

Profa. Dra. Alessandra Regina Müller
Germani
UFFS- Passo Fundo/RS
<http://lattes.cnpq.br/7956662371295912>

Prof. Dr. Everton Bandeira Martins
UFFS - Chapecó/SC
<http://lattes.cnpq.br/9818548065077031>

Prof. Dr. Erick Kader Callegaro Corrêa
UFN- Santa Maria/RS
<http://lattes.cnpq.br/2363988112549627>

Prof. Dr. Pedro Henrique Witchs
UFES - Vitória/ES
<http://lattes.cnpq.br/3913436849859138>

Prof. Dr. Thiago Ribeiro Rafagnin
UFOB
<http://lattes.cnpq.br/3377502960363268>

Prof. Dr. Mateus Henrique Köhler
UFSM- Santa Maria/RS
<http://lattes.cnpq.br/5754140057757003>

Profa. Dra. Liziany Müller Medeiros
UFSM- Santa Maria/RS
<http://lattes.cnpq.br/1486004582806497>

Prof. Dr. Camilo Darsie de Souza
UNISC- Santa Cruz do Sul/RS
<http://lattes.cnpq.br/4407126331414>

Prof. Dr. Dioni Paulo Pastorio
UFRGS - Porto Alegre/RS
<http://lattes.cnpq.br/7823646075456872>

Prof. Dr. Leonardo Bigolin Jantsch
UFSM- Palmeira das Missões/RS
<http://lattes.cnpq.br/0639803965762459>

Prof. Dr. Leandro Antônio dos Santos
UFU– Uberlândia/MG
<http://lattes.cnpq.br/4649031713685124>

Dr. Rafael Nogueira Furtado
UFJF- Juiz de Fora/MG
<http://lattes.cnpq.br/9761786872182217>

Profa. Dra. Angelita Zimmermann
UFSM- Santa Maria/RS
<http://lattes.cnpq.br/7548796037921237>

Profa. Dra. Francielle Benini Agne
Tybusch
UFN - Santa Maria/RS
<http://lattes.cnpq.br/4400702817251869>

Copyright © Arco Editora, alguns direitos reservados.

Copyright do texto © 2021 os autores e as autoras.

Copyright da edição © 2021 Arco Editora.

Diagramação e Projeto Gráfico: Gabriel Eldereti Machado

Capa: Cassiane Ubessi

Revisão: dos/as autores/as.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Cultivo em substrato de plantas medicinais,
aromáticas e condimentares [livro eletrônico] /
Cassiane Ubessi, Jerônimo Luiz Andriolo
organizadores. -- 1. ed. -- Santa Maria, RS :
Arco Editores, 2021.
PDF

Vários autores.
Bibliografia
ISBN 978-65-89949-25-1

1. Agronomia 2. Ervas - Miscelânea 3. Fitoterapia
4. Medicina alternativa 5. Plantas (Botânica)
6. Plantas medicinais 7. Plantas medicinais - Cultivo
I. Ubessi, Cassiane. II. Andriolo, Jerônimo Luiz.

21-81974

CDD-581.634

Índices para catálogo sistemático:

1. Plantas medicinais : Cultivo : Botânica 581.634

Maria Alice Ferreira - Bibliotecária - CRB-8/7964

10.48209/978-65-89949-25-1

O padrão linguístico-gramatical, bem como o sistema de citações e referências bibliográficas são prerrogativas de cada autor. Da mesma maneira, o conteúdo e teor de cada capítulo é de inteira e exclusiva responsabilidade de seu respectivo autor.

SUMÁRIO

<i>Apresentação</i>	7
<i>Prefácio</i>	8
<i>Capítulo 1. Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares: Importância e Contexto Histórico</i>	9
<i>Capítulo 2. Bases Fisiológicas do Metabolismo Primário e Secundário das Plantas</i> ...	13
<i>Capítulo 3. Propagação das Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares</i>	16
<i>Capítulo 4. Estrutura e Manejo para o Cultivo em Substrato</i>	20
4.1. Embalagens para o substrato.....	23
4.2. Substratos a empregar.....	24
4.3. Etapas da instalação da lavoura em substrato.....	25
4.3.1. Vasos.....	25
4.3.2. Leito de Cultivo.....	26
4.3.3. Sistema misto.....	29
<i>Capítulo 5. Preparo e Manejo da Solução Nutritiva</i>	30
5.1. Preparo da solução nutritiva.....	31
5.2. Manejo da solução nutritiva.....	33
<i>Capítulo 6. Implantação e Manejo dos Cultivos</i>	36
6.1. Alecrim (<i>Rosmarinus officinalis</i>).....	37
6.2. Calêndula (<i>Calendula officinalis</i>).....	40
6.3. Camomila (<i>Chamomilla recutita</i>).....	42
6.4. Hortelã pimenta (<i>Mentha x piperita</i>).....	45
6.5. Lavanda (<i>Lavandula angustifolia</i> ; <i>Lavandula dentata</i>).....	48

6.6. Manjeriç�o (<i>Ocimum basilicum</i>).....	51
6.7. Manjerona (<i>Origanum majorana</i>).....	54
6.8. Pimentas (<i>Capsicum</i> sp.).....	56
6.9. Salsa e cebolinha (<i>Petroselinum sativum</i> ; <i>Allium fistulosum</i>).....	61
6.10. S�lvia (<i>Salvia officinalis</i>).....	65
Cap�tulo 7. Colheita, Secagem e Armazenamento das Plantas Medicinais, Arom�ticas e Condimentares	68
7.1. Colheita das plantas medicinais, arom�ticas e condimentares.....	69
7.2. Secagem das plantas medicinais, arom�ticas e condimentares.....	70
7.2.1. Secagem natural.....	70
7.2.2. Secagem artificial.....	71
7.3. Embalagem e armazenamento das plantas medicinais, arom�ticas e condimentares.....	73
Cap�tulo 8. �leos Essenciais e os M�todos de Extra��o	75
8.1. Arraste de vapor ou destila��o a vapor.....	76
8.2. Hidrodestila��o.....	79
8.3. Enfleurage, enflora��o ou florage.....	80
8.4. Extra��o por Solventes.....	81
8.5. Fl��ido Supercr�tico.....	84
8.6. Armazenamento dos �leos essenciais.....	85
Refer�ncias Bibliogr�ficas	86

Apresentação

As plantas medicinais, aromáticas e condimentares acompanham a humanidade desde tempos primordiais e têm sido empregadas em diversas finalidades como medicamentos, cosméticos, chás, temperos e, inclusive, em rituais religiosos. Na primeira metade do século XX a indústria química - farmacêutica passou a produzir em laboratório substâncias sintéticas, substituindo o uso das plantas por medicamentos alopáticos e, com isso, as plantas passaram a ter uma importância secundária.

No entanto, atualmente o cenário é inverso e as plantas configuram-se como alternativa a substituição de inúmeros produtos sintéticos em diversas áreas, desde a saúde até a agrícola. Esse contraposto é estimulado pela redução da eficácia e os efeitos colaterais nocivos de muitos medicamentos químicos, pela busca de uma alimentação saudável e terapias alternativas, bem como, um estilo de vida com um mínimo impacto ambiental e sustentável. Embora o setor hortícola venha percebendo essa demanda, ainda são escassas as informações técnicas sobre o manejo da produção de plantas medicinais, aromáticas e condimentares.

O cultivo sem solo revolucionou a produção de hortaliças em todos os continentes. Esse sistema de cultivo aplicado às plantas medicinais, aromáticas e condimentares poderá contribuir para uma produção maior e mais regular ao longo do ano, tanto para a comercialização na forma de temperos e uso *in natura*, como também, fonte de matéria-prima para a elaboração de subprodutos oriundos desses vegetais.

O objetivo dessa obra é divulgar aos agricultores, estudantes e técnicos, indicações para o cultivo em substrato de plantas medicinais, aromáticas e condimentares, a partir de resultados de pesquisas realizadas na Universidade Federal de Santa Maria-RS.

Prefácio

A demanda por plantas medicinais, aromáticas e condimentares fomenta a pesquisa por novas técnicas de cultivo e práticas que favoreçam a produção de princípios ativos. Desse modo, esta referência tem o intuito de disponibilizar resultados de pesquisas para elucidar inúmeras dúvidas no cultivo de espécies medicinais, aromáticas e condimentares.

A obra *Cultivo em Substrato de Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares* está organizada em oito capítulos. O *Capítulo 1* contextualiza a importância e o histórico de uso das espécies medicinais, aromáticas e condimentares, uma conceituação introdutória sobre o assunto. No *Capítulo 2* é referenciada a fisiologia do metabolismo vegetal, subdividido em primário e secundário. O *Capítulo 3* aborda os métodos predominantes de propagação das espécies medicinais, aromáticas e condimentares. O *Capítulo 4* enfatiza os princípios de produção em ambiente protegido, demonstrando os fatores primordiais que interferem no êxito do cultivo. Complementando o capítulo anterior tem-se o *Capítulo 5* destacando o preparo e o manejo da solução nutritiva. Já o *Capítulo 6* traz os principais cultivos resultantes da pesquisa acadêmica, bem como, a importância e o manejo de cada espécie em ambiente protegido. De modo geral, o *Capítulo 7* abrange os processos de colheita, secagem e armazenamento das plantas, pontos chaves para garantir a qualidade pós-colheita. E para finalizar essa obra, o *Capítulo 8* discorre sobre os óleos essenciais e os métodos de extração comumente utilizados.

Espera-se que esta obra sane muitas das dúvidas relacionadas ao cultivo de plantas medicinais, aromáticas e condimentares e todas as interfaces dessa temática, incluindo a extração de óleos essenciais, contribuindo também para a disseminação do conhecimento produzido nos âmbitos da Universidade Federal de Santa Maria e que seja uma referência de apoio e informação a todos os interessados no assunto.

*Atenciosamente,
Os Organizadores*

Todas as informações contidas em cada capítulo
são de inteira responsabilidade dos autores.
Os Organizadores

CAPÍTULO 1

Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares: Importância e Contexto Histórico

Fernanda Alice Antonello Londero Backes

A importância das plantas medicinais, aromáticas e condimentares tem origem com a própria existência da humanidade, à medida que foram sendo utilizadas para suprir necessidades na cura de moléstias, no preparo e conservação de alimentos e em rituais religiosos. O conhecimento sobre o uso e as aplicações das plantas foi sintetizado em vários tratados e deixados de herança desde a Antiguidade, na China (2.800 a.C.), Índia (2.500 a.C.), Egito e Grécia (ALMEIDA, 2011). O interesse pelas especiarias fez surgir as Grandes Navegações, tornando os condimentos cada vez mais apreciados na culinária. Desde então, esses conhecimentos têm sido transmitidos através das gerações e, na atualidade, a população mundial tem se apropriado, cada vez mais, dos inúmeros benefícios que as plantas medicinais, aromáticas e condimentares proporcionam à sociedade.

Segundo recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), as pesquisas com espécies vegetais devem avançar a fim de que se comprove a eficácia das plantas medicinais com fins terapêuticos. A OMS revela que 70 a 90% da população de países em desenvolvimento utilizam medicamentos derivados de plantas medicinais. No Brasil, cerca de 82% da população faz uso de algum tipo de produto à base das espécies medicinais em cuidados com a saúde (ROSA et al., 2011; BRASIL, 2012). Embora a medicina tradicional seja amplamente utilizada pela população, em muitos países, os produtos ainda não são oficialmente reconhecidos por lei (ROBINSON; ZHANG, 2011; RODRIGUES et al., 2011). No Brasil, a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos foi aprovada na forma do Decreto Presidencial Nº 5.813, de 22 de junho de 2006, e tem como principal objetivo garantir à população brasileira o acesso seguro e uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos, promovendo o uso sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional (BRASIL, 2006).

As plantas condimentares, também chamadas de especiarias ou temperos, são reconhecidas como ingredientes essenciais no preparo de inúmeras receitas por possuírem características organolépticas como aromas, cores e sabores. Em relação às plantas medicinais, são considerados todos os vegetais que produzem substâncias biologicamente ativas utilizadas no preparo de produtos com fins medicinais, podendo auxiliar no combate a doenças ou alívio de sintomas específicos, no funcionamento do organismo, estimulando as defesas naturais ou suprimindo a carência de alguns elementos nutricionais tanto em seres humanos quanto em animais. Sua importância deve-se pela presença de substâncias ou princípios ativos sintetizados pelas plantas a partir do metabolismo secundário. Os princí-

pios ativos mais importantes presentes nos vegetais são terpenos, compostos fenólicos e compostos nitrogenados e subdividem-se em inúmeras substâncias.

A importância e o consumo das plantas medicinais, aromáticas e condimentares devem-se ao aroma, sabor e propriedades terapêuticas encontradas nas folhas (salsa, cebolinha, orégano, manjeriço, alecrim, manjerona, *Mentha*, melissa), flores (camomila, calêndula, capuchinha, alcachofra), frutos (pimenta, pimentão, fisalis), raízes (açafrão-da-terra ou cúrcuma, gengibre), cascas (limão, laranja, canela), bulbos (alho, cebola) e sementes (erva-doce, coentro, funcho, endro). Estas plantas têm sido amplamente utilizadas, tanto *in natura* ou secas, pelas suas inúmeras aplicações como alimento funcional, corante, chá, adoçante, fonte de vitamina e suplementos alimentares, água aromatizada, óleo essencial, fitocosmético, aromatizante de ambiente, repelente e inseticida natural. Ou seja, uma larga escala de utilização desde o âmbito farmacêutico, cosmético, aromacológico até alimentício, além da sua valorização e importância cultural.

Atualmente são escassas as informações sobre cultivo, colheita, beneficiamento e armazenamento de plantas medicinais, aromáticas e condimentares, bem como, a descrição dos métodos de extração de óleos essenciais. Os conhecimentos técnicos são imprescindíveis para a obtenção de uma produção comercial rentável e satisfatória, principalmente em pequenas propriedades, além de garantir aos consumidores produtos de boa qualidade. Apesar do Brasil possuir condições climáticas favoráveis ao cultivo de diversas espécies vegetais, a importação de matéria-prima de plantas como orégano, alcachofra, coentro, açafrão-da-terra, alecrim, manjerona, camomila, calêndula, erva-doce, entre outras espécies, ainda é elevada.

Os princípios ativos que determinam as propriedades medicinais, aromáticas e condimentares são provenientes de diferentes órgãos das plantas. Por isso, a primeira etapa consiste na produção do vegetal em quantidade e qualidade. Muitas dessas espécies vegetais são nativas de regiões quentes e secas durante a maior parte do ano, como a bacia do Mediterrâneo. O clima dessas regiões difere do Sul do Brasil, onde é predominantemente úmido.

O cultivo sem solo é uma tecnologia de produção que permite maior controle do ambiente do que o cultivo convencional no solo. Por ser conduzido em ambiente protegido, permite amenizar as variações adversas da radiação solar, temperatura do ar, e, principalmente, proteger as plantas dos ventos e da precipitação pluviométrica excessiva

em volume e intensidade. No cultivo sem solo a nutrição e o fornecimento de água podem ser ajustados durante o período de produção através da fertirrigação com solução nutritiva completa. O resultado é o maior crescimento e desenvolvimento em menor período de tempo como observado na Figura 1.1.

Figura 1.1 – Plantas de hortelã pimenta (*Mentha x piperita*) cultivadas nos sistemas convencional no solo (A) e em substrato (B), 25 dias após o plantio realizado em 21/09/2017.

Fonte: Backes (2021).

10.48209/978-65-89949-25-3

CAPÍTULO 2

Bases Fisiológicas do Metabolismo Primário e Secundário das Plantas

Jerônimo Luiz Andriolo

O crescimento das plantas é resultado da fotossíntese, uma reação química entre o carbono atmosférico (CO_2) e a água que ocorre nos cloroplastos empregando a energia solar. Um dos primeiros produtos dessa reação é a glicose, a qual é em seguida convertida em um grande número de compostos intermediários necessários para o funcionamento da máquina vegetal. Exemplos desses compostos são os ácidos nucleicos, proteínas, enzimas, ácidos graxos e carboidratos. O conjunto desses compostos participa das etapas do crescimento e desenvolvimento vegetal até a síntese dos produtos de interesse agrônômico como grãos, frutas, folhas, caules e flores. Esse processo é denominado metabolismo primário. Entretanto, existem em muitas plantas outros compostos que não são essenciais para o crescimento e desenvolvimento das plantas e não participam diretamente na síntese dos produtos agrônômicos. Esses compostos têm outras funções fisiológicas que não fazem parte do metabolismo primário. Por esse motivo, fazem parte do metabolismo secundário das plantas (MAFFEI, 2010; KABERA, 2014; TIWARI; RANA, 2015).

Do estrito ponto de vista da produtividade vegetal, os compostos produzidos pelo metabolismo secundário poderiam ser considerados como um desperdício de energia. Entretanto, todos os processos que ocorrem na natureza estão associados a questões evolutivas. No caso do metabolismo secundário das plantas, constituem um mecanismo de proteção contra fatores agressivos do ambiente (abióticos) ou de outros organismos vivos, animais ou vegetais (bióticos) que possam representar algum risco ao crescimento e desenvolvimento (KABERA, 2014). A humanidade reconhece esses compostos desde os tempos primordiais, os quais foram as principais e talvez as únicas fontes de medicamentos durante milênios (LANGE, 2004; PETROVSKA, 2012).

As substâncias vegetais sintetizadas pelo metabolismo secundário fazem parte de três grupos químicos: terpenos, alcaloides (compostos nitrogenados) e fenóis (compostos fenólicos) (Figura 2.1) (VERPOORTE, 1998; KABERA, 2014). Os terpenos caracterizam-se pela volatilidade e servem como veículos de comunicação das plantas com outras plantas e/ou com os animais. Os óleos essenciais incluem-se nesse grupo. Quando essas substâncias entram em contato com o ar atmosférico, principalmente através de ferimentos causados nos órgãos das plantas, são volatilizados e percebidos pelas outras plantas, as quais podem ativar mecanismos de inteligência vegetal (TREWAVAS, 2009). Nos insetos,

animais herbívoros ou humanos reações diversas de repelência ou atração são provocadas. Muitas dessas substâncias são também fitoterápicas, com efeitos antibacterianos, antivirais e antifúngicos.

Os alcaloides caracterizam-se por serem em grande parte tóxicos, como a atropina, morfina, nicotina, solanina e estricnina, embora alguns tenham também propriedades fitoterápicas (KABERA, 2014). Essas substâncias têm potencial para emprego no controle de pragas. Os compostos fenólicos constituem um vasto grupo presente em diversos órgãos das plantas, principalmente frutos, com propriedades nutraceuticas. Os flavonoides e os taninos incluem-se nessa categoria.

Figura 2.1 – Esquema das rotas metabólicas envolvidas na síntese dos compostos do metabolismo secundário em plantas.

Fonte: Elaborado pelo autor.

CAPÍTULO 3

Propagação das Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares

Jerônimo Luiz Andriolo

Os dois principais métodos de propagação de plantas medicinais, aromáticas e condimentares são por sementes e por miniestaquia.

A propagação por sementes é feita de maneira similar à produção de mudas de hortaliças em bandejas. Quando são empregadas sementes de pequeno porte e sem peletização a semeadura é feita manualmente tornando-se uma operação laboriosa. Podem ser empregadas bandejas de polipropileno ou isopor com substrato comercial indicado para produção de mudas.

O método mais empregado e de baixo custo para a produção de mudas dessas espécies é a miniestaquia (Figura 3.1). Esse método consiste em extrair ápices caulinares juvenis e submetê-los ao enraizamento para formar uma nova muda (Figura 3.1A). O comprimento e o número de folhas dos ápices extraídos variam entre espécies. A aptidão ao enraizamento também varia entre as espécies. Citam-se como exemplo os ápices de hortelã pimenta (*Mentha x piperita*), os quais enraízam com facilidade e aqueles do alecrim, os quais necessitam de estímulo hormonal para obter uma taxa elevada de enraizamento.

Figura 3.1 – Miniestacas de manjerona (A) plantadas em bandeja com substrato (B).

Fonte: Andriolo (2021).

Podem ser empregadas na miniestaquia bandejas similares àquelas utilizadas na produção de mudas de hortaliças, com 40 até 128 células por bandeja (Figura 3.1B).

Quanto maior o número de células por bandeja menor é o volume de substrato por alvéolo. Nesse caso as mudas devem ser repicadas para embalagens maiores ou para uma segunda bancada com subirrigação assim que as raízes ultrapassarem o orifício localizado na parte inferior do alvéolo.

A maior dificuldade da propagação por miniestaquia consiste em evitar a desidratação das miniestacas até a emissão de novas raízes. Por esse motivo o sistema de produção de mudas deve ser constituído em duas etapas (Figura 3.2). A primeira emprega uma bancada com microaspersão controlado por um programador horário (timer) (Figura 3.2A). Devem ser programadas várias irrigações diárias curtas, em torno de 1 minuto cada, de forma a manter sempre úmida a parte aérea das miniestacas. Nas épocas do ano com elevada radiação e temperatura e/ou com baixa umidade do ar pode ser necessária à instalação de uma tela de sombreamento ou filme de polietileno sobre a bancada para manter o ambiente úmido em torno das bandejas, ou apenas, o aumento do número de irrigações diárias.

Figura 3.2 – Bancada com mudas na etapa de microaspersão (A) e subirrigação (B). Detalhe do enraizamento das mudas na subirrigação (C).

Fonte: Andriolo (2021).

Assim que forem emitidas as primeiras raízes, as quais podem ser visualizadas no orifício existente na parte inferior dos alvéolos das bandejas (Figura 3.2C), as bandejas devem sair da microaspersão e passar para uma segunda bancada com subirrigação (Figura 3.2B). Essa operação é necessária principalmente quando são empregadas bandejas com baixo volume de substrato. O baixo volume de substrato contém pequena quantidade de nutrientes, alguns dos quais são perdidos pela lixiviação provocada pela microaspersão. Decorre que o crescimento das mudas fica reduzido ou paralisado se permanecerem nessa condição.

Na subirrigação a bancada deve ter uma base plana, nivelada e revestida com filme de polietileno transparente, com paredes laterais entre 5 cm e 10 cm de altura. As bandejas são colocadas sobre a bancada e uma lâmina fina de água ou de solução nutritiva é mantida na parte inferior. As bandejas permanecem nessa condição até que se complete a colonização de todo o alvéolo pelas raízes. Alguns dias antes da repicagem ou plantio as bandejas devem retornar para a bancada da microaspersão a fim de estimular a adaptação das mudas ao estresse de água. Nesse período as raízes que ultrapassaram o alvéolo pelo orifício inferior morrem.

CAPÍTULO 4

Estrutura e Manejo para o Cultivo em Substrato

Jerônimo Luiz Andriolo

No Brasil predominam dois sistemas de cultivo sem solo de plantas: a hidroponia e o cultivo em substratos. Na hidroponia as plantas são cultivadas diretamente na solução nutritiva, sem nenhum meio sólido de suporte às raízes. O material mais empregado para suporte das plantas e crescimento das raízes são canais ou tubos de polipropileno colocados sobre bancadas a uma altura em torno de 0,80 m do solo. Nesse sistema a solução nutritiva deve ser fornecida às plantas diuturnamente em intervalos curtos de tempo, geralmente de 15 ou 30 minutos. É um sistema que vem sendo empregado em várias regiões brasileiras para o cultivo sem solo de hortaliças folhosas de pequeno porte e período curto de crescimento, como alface, rúcula, almeirão e agrião.

No cultivo em substrato as plantas são cultivadas em um substrato sólido e a solução nutritiva é fornecida em intervalos variáveis de tempo, de acordo com a capacidade de retenção de água do substrato e a demanda transpiratória das plantas. Plantas de pequeno porte podem ser cultivadas sobre bancadas, enquanto aquelas de porte mais elevado são cultivadas na superfície do solo. Neste caso, devem ser feitos camalhões com aproximadamente 0,2 m de altura e todo o solo revestido com filme de polietileno opaco, de forma a evitar o contato das plantas com o solo e reduzir a evaporação superficial. A superfície do solo deve ser rebaixada nas laterais de cada camalhão, formando uma canaleta para escoar a solução nutritiva proveniente da drenagem, a qual deve ser recolhida e reutilizada. Podem ser empregadas calhas para essa finalidade. Porém, a forma mais simples e de baixo custo consiste em canaletas feitas no solo e revestidas com filme de polietileno. A localização das fileiras em terreno com declividade de até 3% facilita o escoamento da solução nutritiva.

Plantas de pequeno porte são cultivadas preferencialmente sobre bancadas com altura em torno de 0,80 m do nível do solo. As bancadas podem ser construídas com ripões de madeira de aproximadamente 0,25 m de largura. A principal desvantagem da madeira é a vida útil curta, que pode ser de apenas de alguns anos quando a madeira é de baixa qualidade. Outra alternativa são as telhas de fibrocimento, revestidas com filme de polietileno de baixa densidade. As telhas adaptam-se também para preparar leitos de cultivo e têm vida útil mais longa do que a madeira.

O cultivo em substrato é mais indicado que a hidroponia para as plantas medicinais, aromáticas e condimentares. As seguintes razões podem ser apontadas:

a) **Controle da disponibilidade de água em torno das raízes.** Grande parte das plantas medicinais, aromáticas e condimentares é oriunda de regiões áridas ou semiáridas, com baixa umidade do solo. Quando essas plantas são cultivadas com elevada umidade em torno das raízes podem ocorrer doenças que provocam a morte das raízes. O cultivo em substrato permite manejar a fertirrigação de forma a controlar a umidade em torno das raízes. Esse manejo dificilmente pode ser realizado na hidroponia, pois nesse sistema as raízes devem estar permanentemente envoltas por solução nutritiva para evitar a desidratação e morte;

b) **Controle da temperatura do meio radicular.** O substrato favorece a inércia térmica do sistema radicular, enquanto na hidroponia a temperatura das raízes é afetada pela temperatura das tubulações e da solução nutritiva. Ao circular no sistema essas temperaturas tendem a entrar em equilíbrio atingindo valores fora da faixa considerada mais favorável ao crescimento. Temperaturas abaixo dessa faixa reduzem o crescimento e a atividade fisiológica das raízes. Aquelas acima podem provocar hipóxia, morte das raízes e ainda favorecer a incidência de doenças radiculares;

c) **Manejo das plantas.** O cultivo em substrato permite empregar diversos recipientes para o cultivo das plantas. Quando são empregados vasos ou sacolas a densidade de plantio pode ser ajustada à espécie e/ou ao estágio de desenvolvimento. O espaçamento entre vasos pode ser menor com plantas de pequeno porte e/ou no início do crescimento e ser aumentado à medida que as plantas se desenvolvem;

d) **Risco de morte das plantas.** No cultivo em substrato o volume de substrato e a frequência das fertirrigações são determinados de forma que as plantas disponham de um volume de água suficiente para sobreviver por períodos de até 24 horas sem fertirrigação. Esses períodos são importantes para prevenir a morte das plantas por problemas no sistema de fertirrigação;

e) **Versatilidade do método de fertirrigação.** No cultivo em substrato a fertirrigação pode ser feita por gotejamento ou por subirrigação, ou ambos os métodos simulta-

neamente. A subirrigação consiste em fornecer a solução nutritiva na camada inferior do substrato, a qual umedece a camada superior por capilaridade. O gotejamento adapta-se bem nos períodos de baixa demanda de água das plantas e favorece o crescimento nas fases iniciais de desenvolvimento após o plantio. Entretanto, nos períodos quentes em que é elevada a evaporação superficial, a fração de molhamento do substrato pode diminuir e o crescimento das raízes ser reduzido. Por outro lado, a subirrigação concentra a umidade na camada inferior do substrato e favorece a distribuição homogênea da água nessa camada. Por isso, nos meses quentes o emprego simultâneo dos dois métodos pode ser favorável ao crescimento das plantas.

4.1. Embalagens para o substrato

Tanto no cultivo sobre bancadas como sobre camalhões o acondicionamento do substrato pode ser feito em sacolas, vasos de polipropileno, calhas, *slabs* (“salsichas” de polietileno) ou distribuído diretamente sobre bancadas formando um leito de cultivo.

O tipo de embalagem a ser empregada para acondicionar o substrato depende da espécie e do manejo do cultivo. Plantas sensíveis à hipóxia e às doenças radiculares associadas ao excesso de água como a salsa, a sálvia e o alecrim devem ser cultivadas em vasos, porque essa embalagem permite um melhor controle da umidade em torno das raízes. Os vasos de polipropileno empregados para o cultivo de flores também se adaptam para o cultivo de plantas medicinais, aromáticas e condimentares. O tamanho do vaso deve ser compatível com a espécie a ser cultivada. Porém, o volume mínimo deve ser de 2 dm³, mesmo para plantas de pequeno porte. Plantas de porte mais elevado como o alecrim e o manjerição podem ser cultivadas em vasos com volumes entre 3 e 4 dm³.

Os *slabs* são confeccionados com polietileno, têm formato de salsicha e são adquiridos prontos no comércio. Têm formato geralmente cilíndrico ou achatado, com 1 m de comprimento, largura entre 0,20 a 0,25 m e altura em torno de 0,2 m. Depois de instalados devem ser perfurados na parte inferior para permitir a drenagem da água ou da solução nutritiva. Antes do plantio devem ser feitos orifícios na parte superior para receber as mudas, no espaçamento adequado para cada espécie. O controle da umidade nos *slabs* é mais

difícil do que nos vasos, devido ao formato achatado e à pequena declividade. Geralmente a umidade é mais elevada na parte mais baixa das fileiras. O polietileno degrada-se com o passar do tempo, rompe-se e os *slabs* tem que ser substituídos, gerando resíduos. Plantas tolerantes à umidade e/ou estoloníferas como o gênero *Mentha* podem ser cultivadas com o substrato distribuído uniformemente em bancadas, na forma de canteiros elevados.

4.2. Substratos a empregar

A escolha do substrato depende principalmente das características químicas e físicas, custo e disponibilidade. Um substrato deve ter inércia química, pois os elementos químicos dissolvidos podem reduzir ou aumentar o pH para valores inadequados e também provocar efeitos tóxicos às plantas. O substrato não deve conter nutrientes, pois a solução nutritiva irá fornecê-los nas concentrações e proporções adequadas. As características físicas referem-se principalmente à porosidade e à capacidade de retenção de água, as quais devem ser adequadas para cada espécie.

Os substratos podem ser minerais ou orgânicos. A areia é um substrato mineral que apresenta boas características para o cultivo de plantas. Seu maior inconveniente é o peso, especialmente na capacidade máxima de retenção de água. Os substratos orgânicos provêm em sua maioria de resíduos vegetais, geralmente submetidos à compostagem. Na região Sul do Brasil os mais comuns são preparados à base de resíduos florestais e/ou casca de arroz, com ou sem a adição de vermiculita e/ou perlita. Sofrem decomposição e adensamento com o passar do tempo com alterações principalmente nas características físicas.

A vida útil de um substrato depende da ocorrência de doenças radiculares, da alteração das características físicas e da salinização. Os substratos inertes podem ser empregados continuamente por vários anos enquanto não ocorrerem doenças. Os orgânicos devem ser parcialmente completados com um volume suplementar pelo menos uma vez ao ano e as características físicas novamente determinadas para adequar o manejo da fertirrigação (ANDRIOLO, 2017). Entretanto, em ambos os tipos de substratos pode ocorrer com o passar do tempo à acumulação de íons que provocam salinização. O acúmulo de sais pode interferir na absorção dos nutrientes, alterar o pH e exercer efeito tóxico ao cresci-

mento das raízes. Alguns sintomas visuais que indicam que o substrato está salinizado são crescimento reduzido, deficiências nutricionais mesmo com emprego de solução nutritiva ajustada e necrose nas bordas das folhas.

A salinização do substrato pode ocorrer pelo acúmulo de nutrientes e/ou de elementos químicos que não são nutrientes. Estes provêm principalmente da água de baixa qualidade empregada no preparo da solução nutritiva. Os principais são o sódio e o cloro, mas podem também ocorrer o ferro e o manganês. A depender do período de tempo e da concentração, os íons podem reagir entre si, formando agregados que precipitam. A des-salinização do substrato é difícil de ser realizada porque a dissolução de sais precipitados é lenta e exige volumes elevados de água. Uma forma de reduzir a salinização oriunda de íons nutrientes é o cultivo temporário de alguma espécie com elevada produção de massa seca como milho, milheto ou sorgo. Durante o período de cultivo somente água deve ser fornecida, de forma que as plantas extraiam do substrato os nutrientes que necessitam para o crescimento. Após esgotar os nutrientes presentes no substrato, mesmo que parcialmente, as plantas morrem, são eliminadas e o substrato pode ser novamente empregado. Esse método não se aplica quando a salinização provém de íons não nutrientes. Nesse caso o substrato deve ser substituído. Retirar o substrato das bancadas e/ou vasos e deixá-lo exposto às chuvas durante alguns meses também pode reduzir a salinização.

4.3. Etapas da instalação da lavoura em substrato

4.3.1. Vasos

Os vasos preenchidos com substrato devem ser dispostos sobre brita, a fim de facilitar a drenagem da solução nutritiva na parte inferior (Figura 4.1). O fornecimento da solução deve ser feito na superfície, empregando fitas gotejadoras ou microtubos do tipo espaguete.

Figura 4.1 – Cultivo em substrato empregando vasos.

Fonte: Andriolo (2021).

4.3.2. Leito de Cultivo

O leito de cultivo assemelha-se a um canteiro. Deve ser feito sobre uma superfície sólida. As telhas de fibrocimento adaptam-se bem para essa finalidade e devem ser revestidas com um filme de polietileno transparente de 80 micras, o mesmo empregado para cobertura de túneis baixos. Sobre o filme coloca-se nas calhas uma camada de brita número 2, empregada na construção civil (Figura 4.2A). Esta camada destina-se a facilitar a drenagem da solução nutritiva.

Figura 4.2 – Preparo do leito de cultivo: revestimento da telha e camada de brita (A). Preparo do leito de cultivo: colocação dos ripões e da tela (B).

Fonte: Andriolo (2021).

No entorno da telha são colocados ripões de eucalipto de 5 cm de largura e sobre a brita e os ripões uma tela mosquiteira ou anti-aídeo (Figura 4.2B). O substrato é distribuído uniformemente sobre a superfície da tela, formado um leito de cultivo. A fertirrigação

é feita através de fitas gotejadoras distribuídas na superfície do substrato (Figura 4.3). O volume de substrato a ser empregado depende das características físicas do material e da espécie que vai ser cultivada. A metodologia para dimensionar uma lavoura em substrato pode ser encontrada na literatura (ANDRIOLO, 2017).

Figura 4.3 – Preparo do leito de cultivo com a colocação das fitas gotejadoras.

Fonte: Andriolo (2021).

4.3.3. Sistema misto

Este sistema combina os dois anteriores. Os vasos são colocados sobre o leito de cultivo (Figura 4.4). É indicado para plantas de porte intermediário, como o alecrim e a malva, e/ou que não toleram excesso de água. A maior parte do sistema radicular cresce no interior do vaso, onde a umidade pode ser facilmente controlada. Outra parte do sistema radicular cresce no leito de cultivo através dos orifícios inferiores do vaso. Esse sistema aumenta a inércia da temperatura em torno das raízes e o volume de água disponível, reduzindo o risco de perda da lavoura por panes no sistema de irrigação.

Figura 4.4 – Preparo do sistema misto formado por vasos sobre o leito de cultivo.

Fonte: Andriolo (2021).

CAPÍTULO 5

Preparo e Manejo da Solução Nutritiva

Jerônimo Luiz Andriolo

A qualidade da água é o primeiro fator a ser considerado antes do preparo de uma solução nutritiva. Mananciais diversos podem ser empregados, como rios, arroios, sangas, açudes ou poços. Resíduos sólidos devem ser eliminados. No caso de haverem resíduos em suspensão, um reservatório de decantação e limpeza pode ser necessário. O emprego de substâncias químicas para purificação da água deve ser evitado porque essas substâncias podem apresentar efeitos tóxicos às plantas.

5.1. Preparo da solução nutritiva

O pH da água deve situar-se próximo da neutralidade. Mananciais de águas alcalinas são frequentes em várias regiões do Rio Grande do Sul (RS). Nesse caso deve ser feita uma análise química para determinar os íons presentes, os quais devem ser levados em consideração no preparo da solução nutritiva. O pH deve ser corrigido a partir de uma curva de titulação, de forma que os valores na solução nutritiva se situem entre 5,5 e 6,5. A redução do pH pode ser feita principalmente com ácido fosfórico (H_3PO_4) ou ácido nítrico (HNO_3). As quantidades de nutrientes acrescentadas à água através desses ácidos também devem ser levadas em conta no cálculo da solução nutritiva.¹

A composição da solução nutritiva deve ser buscada na literatura para a espécie e o local em que vai ser feito o cultivo. Entretanto, são escassas as indicações de soluções nutritivas ajustadas para o cultivo sem solo de plantas condimentares, aromáticas e medicinais. Em não havendo indicações para a espécie de interesse, emprega-se uma solução genérica (Tabela 5.1).

A quantidade de cada um dos fertilizantes que compõem a solução nutritiva pode ser dissolvida em balde e em seguida virada diretamente no reservatório, o qual deve estar cheio. Outra forma, principalmente em lavouras grandes, consiste em preparar soluções estoque concentradas. Nesse caso devem ser utilizados três reservatórios separados para as soluções contendo fosfatos, cálcio e micronutrientes, respectivamente. O volume de cada solução estoque a ser misturado com a água de irrigação deve ser calculado levando em conta a vazão do sistema, a condutividade elétrica (CE) da solução de aporte às plantas

¹ A metodologia para correção do pH da água e cálculo da solução nutritiva pode ser encontrada em Andriolo (2017).

e a concentração de cada solução estoque. A condutividade elétrica é proporcional à quantidade total de íons dissolvidos na água, incluindo também aqueles que não são absorvidos pelas plantas.

Tabela 5.1 – Composição da solução nutritiva genérica indicada para o cultivo em substrato de plantas medicinais, aromáticas e condimentares na região Sul do Brasil.

Concentração Iônica de Macronutrientes (mmol L ⁻¹)						
NO ₃	H ₂ PO ₄	K ⁺	Ca ²⁺	NH ₄ ⁺	Mg ²⁺	SO ₄ ²⁻
12,6	2,0	6,0	3,0	2,6	1,5	1,5
Quantidades de Fertilizantes (mg L ⁻¹)*						
KNO ₃	Calcinit [®]	MgSO ₄	NH ₄ H ₂ PO ₄ (MAP)	Fe	CE de referência	Faixa de pH
606,6	648,3	369,6	230,1	1,0	1,0 - 1,5 dS m ⁻¹	5,5 – 6,5

*Quantidades sugeridas de fertilizantes. Outros fertilizantes podem ser empregados, sempre observando a composição iônica indicada em mmol L⁻¹. Para produção comercial foram desconsiderados no cálculo dos fertilizantes os resíduos de NH₄NO₃ provenientes do Calcinit[®]. A quantidade de micronutrientes a ser adicionada compreende 0,1 mL da solução padrão (Capítulo 5) para cada litro de solução nutritiva. KNO₃: nitrato de potássio; Calcinit[®]: nitrato de cálcio; MgSO₄: sulfato de magnésio; NH₄H₂PO₄ (MAP): monoamônio fosfato. CE: condutividade elétrica. Fonte: Elaborado pelo autor.

Para determinar a quantidade de fertilizante em gramas e de acordo com o volume de solução nutritiva basta multiplicar o valor do nutriente em miligrama por litro pelo volume (quantidade de solução nutritiva a ser preparada) e dividir por 1000. Exemplo: (606,6 mg L⁻¹ de KNO₃ x 500 litros)/1000 = 303,3 gramas de KNO₃ para preparar 500 litros de solução nutritiva.

O nitrato (NO₃) é a forma preferencial de absorção do nitrogênio (N) pelas plantas. Entretanto, o emprego de parte do N da solução nutritiva na forma amoniacal tem, entre outros efeitos, a vantagem de retardar o aumento do pH da solução. Isso ocorre porque a absorção do nitrato pelas plantas aumenta o pH enquanto a absorção do amônio diminui. Por isso, tanto o pH como a CE no reservatório principal devem ser medidos frequente-

mente. Quando o pH atingir valores acima de 6,5 deve ser corrigido, de forma similar aos procedimentos adotados para a correção do pH da água, no entanto, raramente ocorre a diminuição do pH da solução nutritiva durante o período de crescimento das plantas com a solução indicada nas Tabela 5.1 e 5.2.

Os micronutrientes são adicionados após a dissolução dos fertilizantes correspondentes aos macronutrientes e apresentam uma quantidade fixa independente da formulação da solução nutritiva. Dessa forma, é utilizada uma formulação padrão premix, contendo todos os micronutrientes (Tabela 5.2). Então, para cada litro de solução nutritiva emprega-se a proporção de 0,1 mL da solução padrão de micronutrientes. O ferro (Fe) não deve ser misturado à solução premix e sim, fornecido separadamente na forma de quelato, na quantidade de 1 mg de Fe por litro de solução nutritiva.

Tabela 5.2 – Formulação padrão premix de micronutrientes para o preparo das soluções nutritivas.

Sais	% do micronutriente	Quantidade (mg L ⁻¹)
Molibdato de sódio	40	0,07
Ácido bórico	17,5	2,4
Sulfato de cobre	25,0	0,2
Sulfato de manganês	32,0	1,6
Sulfato de zinco	23,0	1,0

Fonte: Elaborado pelo autor.

5.2. Manejo da solução nutritiva

O fornecimento da solução deve ser feito em sistema fechado, isto é, após circular pelo substrato o volume drenado deve retornar ao reservatório de estocagem para ser reutilizado. Em cada fertirrigação deve-se sempre acrescentar um volume adicional de drenagem, denominado coeficiente de drenagem. Esse coeficiente situa-se geralmente entre

20 a 30% do volume transpirado no período desde a última fertirrigação. A drenagem é necessária para reduzir a salinização do substrato. A metodologia para o manejo da fertirrigação pode ser encontrada na literatura especializada sobre o assunto (ANDRIOLO, 2017).

No cultivo em sistema fechado deve-se definir o número de bancadas que podem ser fertirrigadas por um mesmo reservatório e o período de tempo durante o qual a solução pode ser reutilizada. Nesse sistema existe o risco de proliferação rápida de doenças radiculares. Por isso, recomenda-se empregar um mesmo reservatório para grupos separados de bancadas. Normalmente esses grupos são definidos de forma a escalonar o plantio e a colheita segundo um cronograma de produção. Dessa forma um grupo pode ser colhido enquanto o(s) outro(s) está(ão) em crescimento.

O período de tempo de reuso da solução depende da extração de nutrientes e do nível tecnológico empregado. A solução nutritiva pode ser reutilizada indefinidamente quando são disponíveis equipamentos e softwares para medir a concentração dos nutrientes e corrigir automaticamente a composição. Esses equipamentos são indispensáveis quando são empregadas soluções estoque concentradas. Quando a solução nutritiva é preparada dissolvendo os fertilizantes diretamente no reservatório na concentração normal, as correções podem ser feitas diretamente nesse reservatório. Esse reservatório é conectado diretamente na rede hidráulica através de boia, de forma que permaneça sempre cheio. Quando são empregados substratos orgânicos, a correção pode ser feita quando a CE medida no reservatório atingir valores baixos em torno de $0,5 \text{ dS m}^{-1}$ ou quando forem percebidos visualmente sinais de redução de crescimento ou distúrbios nutricionais nas plantas. Uma quantidade de cada um dos fertilizantes é adicionada, de forma a restabelecer a CE original. Como a proporção dos nutrientes na composição da solução nutritiva é diferente da proporção de extração pelas plantas, é possível que com o passar do tempo ocorra acúmulo de alguns nutrientes no substrato. A análise química do substrato pode fornecer uma indicação da situação. Havendo acúmulo, os procedimentos para dessalinização descritos no Capítulo 4 podem ser aplicados.

O fornecimento da solução nutritiva às plantas pode ser feito por fitas gotejadoras ou tubos capilares finos conhecidos como espaguete. As fitas gotejadoras são adquiridas prontas no comércio com distâncias variáveis entre os gotejadores. Quando é empregado o leito de cultivo, distâncias curtas entre 0,10 m e 0,20 m proporcionam uma fração de molhamento mais elevada. Quando são empregados vasos, sacolas ou *slabs*, a distância entre os gotejadores deve ser compatível com o recipiente e deve ser previsto pelo menos um gotejador para cada planta. As fitas gotejadoras são versáteis, de fácil instalação e operam com baixa pressão no sistema de fertirrigação. São, entretanto, passíveis de entupimento por impurezas e/ou deposição de sais e são normalmente substituídas após um ano de uso. Os tubos espaguete são indicados para o cultivo em vasos, sacolas ou *slabs*. Devem ser conectados a um tubo semirrígido de polietileno e necessitam de pressão mais elevada no sistema do que as fitas gotejadoras. Também são passíveis de entupimento.

10.48209/978-65-89949-25-7

CAPÍTULO 6

Implantação e Manejo dos Cultivos

Viviane Dal-Souto Frescura

Cassiane Ubessi

Rogério Antonio Belle

Jerônimo Luiz Andriolo

Suany Maria Gomes Pinheiro

Este capítulo descreve as ações primordiais referentes ao cultivo de algumas espécies medicinais, aromáticas e condimentares em substrato quanto sua finalidade e manejo, visando à otimização da produção de massa fresca e óleo essencial.

6.1. Alecrim (*Rosmarinus officinalis*)

Viviane Dal-Souto Frescura

O alecrim é uma planta perene originária da região Mediterrânea pertencente à família Lamiaceae. Possui porte subarbustivo lenhoso, ereto, de até 1,5 m de altura, folhas lineares, coriáceas e aromáticas, flores azulado-claras e pequenas. As folhas dessa espécie são utilizadas como condimento e no preparo de chá (LORENZI; MATOS, 2008). São ricas em compostos fenólicos como ácido rosmarínico, ácido clorogênico, ácido cafeico e ácido carnósico, canferol, quercetina e rutina (FRESCURA et al., 2013), conferindo ao extrato efeito antioxidante (SILVA et al., 2011). Das folhas e das flores é extraído o óleo essencial, empregado na indústria alimentícia, farmacêutica e de cosméticos constituído principalmente por cânfora, 1.8 cineol, α -pineno, β -myrceno, verbenona, β -pineno, dentre outros compostos químicos (FRESCURA et al., 2018).

A propagação do alecrim pode ser realizada por estacas apicais em bandejas de polipropileno com alvéolos de 3 dm³ e com substrato orgânico. Em períodos quentes as bandejas devem permanecer em bancadas com microaspersão e com períodos de irrigação frequentes para evitar a desidratação e senescência das estacas. O período de tempo na microaspersão é variável e deve terminar quando aparecerem às primeiras raízes nos orifícios inferiores das bandejas, como descrito no Capítulo 3. O excesso de umidade no substrato pode causar a morte das mudas e as mesmas podem ser transplantadas quando estiverem enraizadas e com o surgimento de novas folhas.

A época mais favorável para o plantio das mudas nas bancadas de produção no RS ocorre entre setembro e novembro, pois o crescimento e desenvolvimento são favorecidos em temperaturas entre 20 e 25 °C. O plantio pode ser realizado em vasos com volume em torno de 4 dm³ contendo substrato. É indicada densidade de 12 vasos por metro quadrado,

o que é possível com espaçamento de 30 cm entre vasos e 27 cm entre fileiras (Figura 6.1).

A parte aérea pode ser colhida cerca de 90 dias após o plantio. Porém, para a extração de óleo essencial é indicado maximizar a produção de massa fresca realizando a colheita um ano após o plantio das mudas. Além disso, a produção de óleo essencial é maior em plantas mais velhas. O corte nas plantas deve ser realizado após a terceira gema axilar visível, deixando-se algumas folhas remanescentes para aumentar a capacidade de rebrota das plantas. A produção média de folhas nesse sistema de cultivo é de 245 g planta⁻¹ de massa fresca e 65 g planta⁻¹ de massa seca. O rendimento de óleo essencial é de aproximadamente 4,53 g planta⁻¹, com base na solução nutritiva descrita na Tabela 6.1.

O alecrim não apresenta muitos problemas com pragas, porém, pode ocorrer o aparecimento de pulgões e cochonilhas. Para o controle dessas pragas pode ser pulverizada uma mistura de água e detergente neutro na concentração de 20 mL L⁻¹, em três aplicações com intervalos de 15 dias entre elas.

Tabela 6.1 – Composição da solução nutritiva para o cultivo de alecrim em ambiente protegido.

Concentração Iônica de Macronutrientes (mmol L ⁻¹)						
NO ₃	H ₂ PO ₄	K ⁺	Ca ²⁺	NH ₄ ⁺	Mg ²⁺	SO ₄ ²⁻
8,0	1,0	4,0	2,0	1,0	1,0	1,0
Quantidades de Fertilizantes (mg L ⁻¹)*						
KNO ₃	Calcinit®	MgSO ₄	NH ₄ H ₂ PO ₄ (MAP)	Fe	CE de referência	Faixa de pH
404,4	432,0	246,3	115,0	1,0	1,0 - 1,5 dS m ⁻¹	5,5 – 6,5

* Quantidades sugeridas de fertilizantes. Outros fertilizantes podem ser empregados, sempre observando a composição iônica indicada em mmol L⁻¹. Para produção comercial foram desconsiderados no cálculo dos fertilizantes os resíduos de NH₄NO₃ provenientes do Calcinit®. A quantidade de micronutrientes a ser adicionada compreende 0,1 mL da solução padrão (Capítulo 5) para cada litro de solução nutritiva. KNO₃: nitrato de potássio; Calcinit®: nitrato de cálcio; MgSO₄: sulfato de magnésio; NH₄H₂PO₄ (MAP): monoamônio fosfato. CE: condutividade elétrica. Fonte: Elaborado pela autora.

Figura 6.1 – Plantas de alecrim cultivadas em vasos de 4 dm³ aos 50 dias após o plantio realizado no dia 21 de agosto de 2012 (A) e aos 90 dias após o plantio realizado em 26 de janeiro de 2013 (B).

Fonte: Frescura (2021).

6.2. Calêndula (*Calendula officinalis*)

Cassiane Ubessi

A calêndula é uma espécie medicinal utilizada também para fins ornamentais durante a estação fria no Sul do Brasil, inclusive com variedades desenvolvidas exclusivamente para a ornamentação de jardins. Suas finalidades terapêuticas são encontradas exclusivamente nos capítulos florais, que variam a coloração do amarelo ao laranja. Possui propriedades antiespasmódica, anti-inflamatória e cicatrizante, como também, propriedade antioxidante, capaz de rejuvenescer a pele (GRANDI, 2014). Apresenta uma ínfima concentração de óleo essencial nos capítulos florais, com elevado valor de mercado. Já as flores secas são preparadas para uso por meio da infusão juntamente com óleos vegetais carreadores, como o óleo de amêndoa doce, girassol e até mesmo soja.

O cultivo em ambiente protegido favorece a qualidade dos capítulos florais, o manejo das plantas e a colheita das flores, visto a altura da bancada de cultivo que permite o trabalho em pé, ao contrário da colheita agachada no cultivo a campo. Também é uma espécie que tolera o adensamento entre plantas, podendo ser cultivada com um espaçamento de 30 cm entre vasos nas bancadas de cultivo (Figura 6.2).

Figura 6.2 – Cultivo de calêndula em ambiente protegido.

Fonte: Ubessi (2021).

O substrato de cultivo deve ser bem drenado com o fornecimento equilibrado da solução nutritiva descrita na Tabela 6.2. A calêndula não tolera umidade em excesso, porém não resiste à falta de água. A adição de nitrogênio favorece o crescimento em altura das plantas e maior produção de flores. A propagação pode ser realizada por sementes ou pela aquisição e mudas.

A floração ocorre em plena primavera e a colheita dos capítulos florais é realizada quando os mesmos estiverem completamente abertos e formados, lembrando que as flores abrem com o aumento da luminosidade e fecham ao final da tarde, ou seja, a abertura floral é regulada pela luminosidade. Após a colheita os capítulos florais podem ser consumidos *in natura* ou secos em temperatura ambiente para posterior uso. É uma espécie anual com plantio em meados de julho e com florescimento na primavera até início do verão.

Tabela 6.2 – Composição da solução nutritiva para o cultivo de calêndula em ambiente protegido.

Concentração Iônica de Macronutrientes (mmol L ⁻¹)						
NO ₃	H ₂ PO ₄	K ⁺	Ca ²⁺	NH ₄ ⁺	Mg ²⁺	SO ₄ ²⁻
9,4	1,4	5,0	2,2	1,4	1,0	1,0
Quantidades de Fertilizantes (mg L ⁻¹)*						
KNO ₃	Calcinit [®]	MgSO ₄	NH ₄ H ₂ PO ₄ (MAP)	Fe	CE de referência	Faixa de pH
505,5	475,2	246,3	161,0	1,0	1,0 - 1,5 dS m ⁻¹	5,5 – 6,5

* Quantidades sugeridas de fertilizantes. Outros fertilizantes podem ser empregados, sempre observando a composição iônica indicada em mmol L⁻¹. Para produção comercial foram desconsiderados no cálculo dos fertilizantes os resíduos de NH₄NO₃ provenientes do Calcinit[®]. A quantidade de micronutrientes a ser adicionada compreende 0,1 mL da solução padrão (Capítulo 5) para cada litro de solução nutritiva. KNO₃: nitrato de potássio; Calcinit[®]: nitrato de cálcio; MgSO₄: sulfato de magnésio; NH₄H₂PO₄ (MAP): monoamônio fosfato. CE: condutividade elétrica. Fonte: Elaborado pela autora.

6.3. Camomila (*Chamomilla recutita*)

Cassiane Ubessi

A camomila pertence à família Asteraceae sendo uma espécie medicinal anual com flores reunidas em capítulos florais, as quais são utilizadas com fins medicinais. Apresenta como principais funções terapêuticas a atividade anti-inflamatória, antisséptica, carminativa e sedativa, encontradas no chá e também no óleo essencial que tem como analitos majoritários o α -bisabolol e seus óxidos de α -bisabolol A e B, e camazuleno (GUPTA et al., 2010). O camazuleno é responsável pela coloração azul do óleo essencial e é obtido durante o processo de extração pelo aquecimento e conversão da matricina em camazuleno (Figura 6.3B).

Figura 6.3 – Semeadura (A), óleo essencial (B), fase vegetativa (C) e de floração (D) da camomila cultivada em substrato.

Fonte: Ubessi (2021).

* A Figura (D) retrata o início da terceira colheita, dia 25/10/2016, com semeadura em 08/08/2016 em substrato.

A camomila é uma cultura que apresenta uma ampla adaptabilidade quanto ao período de semeadura em ambiente protegido. É recomendável a semeadura entre maio a junho, porém no cultivo sem solo esse intervalo pode ser prolongado até o início de agosto. As sementes não devem ser enterradas no momento da semeadura, pois são fotoblásticas positivas e necessitam de luz para a germinação. A semeadura deve ser feita diretamente no local de cultivo, pois não tolera transplantio por mudas. Devido ao minúsculo tamanho da semente é impreciso determinar quantas são colocadas no momento da semeadura. Dessa forma, é indicado colocar uma porção pequena de sementes (Figura 6.3A) e, após a emergência, realizar o raleio selecionando no máximo duas plantas por vaso, em lados opostos. O espaçamento indicado é de 30 cm entre vasos na bancada (Figura 6.3C). O leito de cultivo também pode ser empregado mantendo uma densidade de plantas similar àquela em vasos. Pois, elevada densidade de plantas no leito de cultivo favorece o acamamento.

A camomila apresenta um ciclo médio em torno de 180 dias, quanto mais tarde for realizada a semeadura menor é o período vegetativo e logo se inicia a floração, principalmente quando a semeadura é realizada ao final de julho – início de agosto. A colheita é recomendada quando as flores liguladas (“pétalas brancas”) estiverem em uma posição de 180°, momento indicativo da máxima concentração de princípios ativos na flor (Figura 6.3D). As flores da camomila respondem a luminosidade diária, e abrindo as flores liguladas à medida que aumenta a incidência luminosa na parte da manhã e fechando ao final da tarde.

O cultivo em ambiente protegido amplia o período de semeadura e aumenta o número de colheitas, podendo ser realizadas até cinco colheitas, enquanto que no cultivo convencional, a campo, são feitas no máximo três. A produção média de capítulos florais nesse sistema de cultivo é de aproximadamente 60 a 70 g, contudo, o tamanho e a massa dos capítulos florais decrescem com o aumento do número de colheitas. O teor de óleo essencial corresponde a 0,39% por grama de massa fresca e, convertido a hectare, equivale a 2,69 L ha⁻¹. Essa produção foi obtida com a solução nutritiva indicada na Tabela 6.3 e com a cultivar Mandirituba.

Tabela 6.3 – Composição da solução nutritiva para o cultivo de camomila em ambiente protegido.

Concentração Iônica de Macronutrientes (mmol L ⁻¹)						
NO ₃	H ₂ PO ₄	K ⁺	Ca ²⁺	NH ₄ ⁺	Mg ²⁺	SO ₄ ²⁻
9,5	0,8	6,0	1,75	0,8	1,25	1,25
Quantidades de Fertilizantes (mg L ⁻¹)*						
KNO ₃	Calcinit [®]	MgSO ₄	NH ₄ H ₂ PO ₄ (MAP)	Fe	CE de referência	Faixa de pH
606,6	378,0	307,9	92,0	1,0	1,0 - 1,5 dS m ⁻¹	5,5 – 6,5

*Quantidades sugeridas de fertilizantes. Outros fertilizantes podem ser empregados, sempre observando a composição iônica indicada em mmol L⁻¹. Para produção comercial foram desconsiderados no cálculo dos fertilizantes os resíduos de NH₄NO₃ provenientes do Calcinit[®]. A quantidade de micronutrientes a ser adicionada compreende 0,1 mL da solução padrão (Capítulo 5) para cada litro de solução nutritiva. KNO₃: nitrato de potássio; Calcinit[®]: nitrato de cálcio; MgSO₄: sulfato de magnésio; NH₄H₂PO₄ (MAP): monoamônio fosfato. CE: condutividade elétrica. Fonte: Elaborado pela autora.

6.4. Hortelã pimenta (*Mentha x piperita*)

Jerônimo Luiz Andriolo

O gênero *Mentha* (Lamiaceae), também popularmente conhecido no Brasil como hortelã, é utilizado para fins medicinais e alimentícios (GRISI et al., 2006). Uma das principais espécies é a *Mentha x piperita* (peppermint), um híbrido resultante do cruzamento da *Mentha aquatica* e da *Mentha spicata* (SATO et al., 1996). O mentol é o principal componente do óleo essencial de hortelã pimenta (> 50%), armazenado principalmente na parte abaxial das folhas (DESCHAMPS et al., 2006).

O Brasil já foi o maior produtor mundial de óleo essencial de menta. Na primeira metade do século passado a produção brasileira representou aproximadamente 70% da produção mundial, concentrada no estado do Paraná (CLARK, 1998). Nas décadas seguintes a produção declinou, devido à concorrência do óleo sintético, de outras culturas como a soja e da queda de produtividade pela ocorrência de doenças (CZEPAK, 1995).

É uma planta perene com crescimento de estolões. A propagação é vegetativa, tanto por segmentos do estolão como por ápices caulinares (Figura 6.4A/B). As mudas produzidas a partir dos ápices das hastes jovens, cortadas com aproximadamente 5 cm de comprimento e portando apenas duas a três folhas enraízam facilmente. Podem ser produzidas em bandejas da mesma forma como as mudas de hortaliças, em bancadas com microaspersão. As mudas produzidas desta forma são mais homogêneas do que aquelas produzidas por segmentos do estolão. Pode ser produzida durante todo ano, com redução do crescimento no inverno e aumento na primavera-verão.

Embora seja uma planta perene, recomenda-se a substituição das plantas após um ano de cultivo. O plantio pode ser feito em vasos ou em leito de cultivo. Nos vasos os estolões crescem sem enraizar e a emissão de folhas nos estolões é retardada. Uma primeira poda dos estolões pode ser feita aproximadamente 30 dias após o plantio no verão e 45 no inverno, para estimular o crescimento da planta-mãe. A poda estimula a emissão de ramificações secundárias as quais aumentam a fração de folhas em relação às hastes. Podem ser empregados vasos de 3 a 4 dm³, no espaçamento de 30 cm entre fileiras e vasos, fertirrigados por fita gotejadora (Figura 6.4B/C).

O plantio também pode ser feito em leito de cultivo, no mesmo espaçamento e empregando igualmente fitas gotejadoras. Nesse sistema os estolões enraízam e emitem hastes e folhas em cada nó, colonizando toda a superfície do leito. A fração de folhas pode ser mais elevada do que no cultivo em vasos. A desvantagem desse sistema é a maior dificuldade em controlar a umidade do substrato e o menor arejamento da área foliar, que podem favorecer a ocorrência de doenças tanto da parte aérea como das raízes. A solução nutritiva tanto para o cultivo em vasos como em leitos está determinada na Tabela 6.4.

Figura 6.4 – Mudas de hortelã pimenta produzidas em bandejas com substrato por enraizamento de ápices caulinares (A/B) e o rebrote em vasos com volume de 4 dm³ aos 30 dias após a colheita da parte aérea (C).

Fonte: Andriolo (2021).

Tabela 6.4 – Composição da solução nutritiva para o cultivo de hortelã pimenta em ambiente protegido.

Concentração Iônica de Macronutrientes (mmol L ⁻¹)						
NO ₃	H ₂ PO ₄	K ⁺	Ca ²⁺	NH ₄ ⁺	Mg ²⁺	SO ₄ ²⁻
12,6	2,0	6,0	3,0	2,6	1,5	1,5
Quantidades de Fertilizantes (mg L ⁻¹)*						
KNO ₃	Calcinit [®]	MgSO ₄	NH ₄ H ₂ PO ₄ (MAP)	Fe	CE de referência	Faixa de pH
606,6	648,3	369,6	230,1	1,0	1,0 - 1,5 dS m ⁻¹	5,5 – 6,5

*Quantidades sugeridas de fertilizantes. Outros fertilizantes podem ser empregados, sempre observando a composição iônica indicada em mmol L⁻¹. Para produção comercial foram desconsiderados no cálculo dos fertilizantes os resíduos de NH₄NO₃ provenientes do Calcinit[®]. A quantidade de micronutrientes a ser adicionada compreende 0,1 mL da solução padrão (Capítulo 5) para cada litro de solução nutritiva. KNO₃: nitrato de potássio; Calcinit[®]: nitrato de cálcio; MgSO₄: sulfato de magnésio; NH₄H₂PO₄ (MAP): monoamônio fosfato. CE: condutividade elétrica. Fonte: Elaborado pelo autor.

6.5. *Lavanda* (*Lavandula angustifolia*; *Lavandula dentata*)

Cassiane Ubessi

A lavanda ou alfazema é uma espécie medicinal e aromática amplamente conhecida pelo seu poder calmante e cicatrizante encontrado no óleo essencial, oriundo das flores e folhas. Existem diversas espécies de lavandas, com destaque para *Lavandula angustifolia* ou *Lavandula officialis* conhecida mundialmente por suas propriedades terapêuticas e a *Lavandula dentata*, cultivada no Brasil. A lavanda tradicional ou verdadeira é a espécie *Lavandula angustifolia* ou *Lavandula officialis*, a qual apresenta um óleo essencial com elevada quantidade de acetato de linalina e baixos teores de cânfora ($\leq 0,5\%$) (TISSE-RAND; YOUNG, 2014), no entanto, não é cultivada no Brasil e somente na França e demais países europeus. A *Lavandula dentata* é adaptada às condições ambientais brasileiras, sendo cultivada desde o sul do país até São Paulo e Minas Gerais. O óleo essencial dessa espécie contém elevados teores de cânfora e reduzidos percentuais de acetato de linalina. O mesmo comportamento é observado para os óleos essenciais oriundos de Lavandim, que são híbridos derivados do cruzamento das espécies *Lavandula angustifolia* e *Lavandula latifolia*.

A *Lavandula dentata* também pode ser cultivada em ambiente protegido (Figura 6.5). As bancadas de cultivo devem ser altas (0,80 - 1 m de altura) para proporcionar a circulação de ar entre as plantas. O espaçamento atribuído compreende distâncias superiores a 30 cm, para evitar a senescência das folhas e ramos basais. Esse arranjo também proporciona melhor arquitetura de planta, ou seja, aumenta o número de ramificações, assemelhando-se a uma condição de campo. Quanto à irrigação, a lavanda é uma espécie que não tolera excesso de água e dessa forma, a irrigação não deve encharcar o substrato, principalmente se apresentar uma elevada capacidade retenção de água. A solução nutritiva para o cultivo de lavanda está descrita na Tabela 6.5.

Figura 6.5 – Cultivo de *Lavandula dentata* em ambiente protegido. Folhas (A) e inflorescência (B) da espécie.

Fonte: Ubessi (2021).

Tabela 6.5 – Composição da solução nutritiva para o cultivo de lavanda (*Lavandula dentata*) em ambiente protegido.

Concentração Iônica de Macronutrientes (mmol L ⁻¹)						
NO ₃	H ₂ PO ₄	K ⁺	Ca ²⁺	NH ₄ ⁺	Mg ²⁺	SO ₄ ²⁻
8,0	1,0	4,0	2,0	1,0	1,0	1,0
Quantidades de Fertilizantes (mg L ⁻¹)*						
KNO ₃	Calcinit [®]	MgSO ₄	NH ₄ H ₂ PO ₄ (MAP)	Fe	CE de referência	Faixa de pH
404,4	432,0	246,3	115,0	1,0	1,0 - 1,5 dS m ⁻¹	5,5 – 6,5

*Quantidades sugeridas de fertilizantes. Outros fertilizantes podem ser empregados, sempre observando a composição iônica indicada em mmol L⁻¹. Para produção comercial foram desconsiderados no cálculo dos fertilizantes os resíduos de NH₄NO₃ provenientes do Calcinit[®]. A quantidade de micronutrientes a ser adicionada compreende 0,1 mL da solução padrão (Capítulo 5) para cada litro de solução nutritiva. KNO₃: nitrato de potássio; Calcinit[®]: nitrato de cálcio; MgSO₄: sulfato de magnésio; NH₄H₂PO₄ (MAP): monoamônio fosfato. CE: condutividade elétrica. Fonte: Elaborado pela autora.

A propagação da lavanda é realizada por meio de miniestaquia e o plantio pode ser realizado a partir de março até meados de julho. Recomenda-se a colheita entre seis meses (dependendo do desenvolvimento da planta) a um ano após o plantio. Quanto maior o intervalo entre o plantio e a colheita maior é o acúmulo de princípio ativo. Podem ser realizados um ou dois cortes (flores e galhos) por ano, lembrando que, apenas um corte anual promove maior acúmulo de princípios ativos no óleo essencial, garantindo qualidade. O rendimento de massa fresca (flores e folha) pode chegar a 1,2 kg planta⁻¹ em um único corte anual. A escolha do momento ideal para fazer um único corte deve priorizar a floração, pois esse é o momento com a maior concentração de princípios ativos nas flores. Durante a colheita não é indicado a retirada total dos ramos que devem ser podados na terceira ramificação a partir do início da ramificação (MAMBRÍ, 2016). Após a colheita, os ramos devem ser submetidos à pré-secagem na sombra, em temperatura ambiente, por um período de um a quatro dias e, posteriormente, armazenados em temperatura ambiente por um período maior de tempo até o momento da extração do óleo essencial, que representa a principal finalidade do cultivo de lavanda.

6.6. Manjeriço (*Ocimum basilicum*)

Jerônimo Luiz Andriolo

O manjeriço (Lamiaceae) é uma planta perene semi-arbustiva. No Sul do Brasil a cultivar Basilicão é a mais cultivada (KUHN, 2018). As folhas são empregadas como condimento e também para produção de óleo essencial, rico em linalol, utilizado como componente na indústria de cosméticos (FAVORITO et al., 2011). Essa espécie ao ser submetida a podas sucessivas da parte aérea, aumenta a fração da massa seca no caule. Por isso, no cultivo sem solo deve ser cultivada como planta anual, com substituição das plantas por mudas novas. Na região Central do RS o plantio pode ser realizado nos meses de outono e o período de crescimento e produção ocorre durante todo o ano. As plantas devem ser substituídas todos os anos.

A propagação pode ser feita com mudas produzidas a partir de estacas herbáceas. As estacas são retiradas das hastes em brotação de plantas sadias e vigorosas. Emprega-se preferencialmente a parte mediana de hastes com aproximadamente 30 cm de comprimento, descartando-se terço superior e inferior. As folhas desenvolvidas devem ser retiradas, deixando-se apenas as gemas com folhas primordiais para evitar a desidratação da estaca. O comprimento das estacas pode ser de aproximadamente 10 a 15 cm. O plantio pode ser feito em bandejas de polipropileno com alvéolos de entre 150 e 200 cm³, com substrato orgânico. O plantio é feito com dois a três nós inseridos no substrato e um a dois nós na parte aérea. Após o plantio as bandejas devem ser mantidas por alguns dias na microaspersão, para evitar a desidratação da parte aérea. A frequência das microaspersões deve ser ajustada de acordo com a demanda evaporativa da atmosfera e permanecer até que sejam visíveis as primeiras raízes nos orifícios existentes na parte inferior das bandejas. Nessa fase a microaspersão deve ser reduzida para manter apenas a umidade no substrato ou substituída pela subirrigação.

As mudas podem ser plantadas quando o torrão do substrato se mantiver intacto ao ser retirado do alvéolo (célula da bandeja). É mais adequado o plantio em sistema misto, empregando vasos de 3 a 4 dm³ sobre um leito de cultivo de pelo menos 15 cm. O plantio somente em vasos é desaconselhado devido ao risco de tombamento das plantas, as quais

podem ultrapassar 80 cm de altura. Podem ser empregadas distâncias entre 30 cm entre plantas e 50 cm entre fileiras, com irrigação por fitas gotejadoras (Figura 6.6) para o fornecimento da solução nutritiva apresentada na Tabela 6.6.

Figura 6.6 – Manjerição cv. Basilicão cultivado em substrato aos 21 (A) e aos 40 dias (B) após o plantio realizado em 28/03/2018.

Fonte: Andriolo (2021).

Tanto para o uso condimentar ou para extração de óleo podem ser realizados vários cortes sucessivos ao longo do ano. O primeiro corte deve ser efetuado quando as plantas tiverem alcançado a altura de pelo menos 30 cm. Cortes precoces reduzem o crescimento posterior da planta. Cortes tardios aumentam a produção de hastes e caule e reduzem a fração de folhas e flores que são as partes comerciais da planta. Em cada colheita a altura de corte de cada haste deve ser definida de forma que fiquem pelo menos três a quatro meristemas secundários para que a planta reinicie o crescimento. Cortes drásticos retardam a retomada do crescimento, diminuem a produção acumulada ao longo do ano e podem provocar a morte das plantas.

Tabela 6.6 – Composição da solução nutritiva para o cultivo de manjeriço em ambiente protegido.

Concentração Iônica de Macronutrientes (mmol L ⁻¹)						
NO ₃	H ₂ PO ₄	K ⁺	Ca ²⁺	NH ₄ ⁺	Mg ²⁺	SO ₄ ²⁻
8,0	1,0	4,0	2,0	1,0	0,5	0,5
Quantidades de Fertilizantes (mg L ⁻¹)*						
KNO ₃	Calcinit [®]	MgSO ₄	NH ₄ H ₂ PO ₄ (MAP)	Fe	CE de referência	Faixa de pH
404,4	432,0	123,1	115,0	1,0	1,0 - 1,5 dS m ⁻¹	5,5 – 6,5

*Quantidades sugeridas de fertilizantes. Outros fertilizantes podem ser empregados, sempre observando a composição iônica indicada em mmol L⁻¹. Para produção comercial foram desconsiderados no cálculo dos fertilizantes os resíduos de NH₄NO₃ provenientes do Calcinit[®]. A quantidade de micronutrientes a ser adicionada compreende 0,1 mL da solução padrão (Capítulo 5) para cada litro de solução nutritiva. KNO₃: nitrato de potássio; Calcinit[®]: nitrato de cálcio; MgSO₄: sulfato de magnésio; NH₄H₂PO₄ (MAP): monoamônio fosfato. CE: condutividade elétrica. Fonte: Elaborado pelo autor.

6.7. Manjerona (*Origanum majorana*)

Jerônimo Luiz Andriolo

A manjerona (Lamiaceae) é uma planta perene de pequeno porte empregada como condimento ou para fins medicinais (VAZ; JORGE, 2007). O crescimento ocorre pela emissão de novas hastes e rebentos em torno da planta-mãe, formando uma touceira. Com o passar do tempo às hastes e raízes mais velhas morrem e o crescimento da planta diminui. Por isso no cultivo em substrato as plantas devem ser substituídas anualmente.

A propagação pode ser feita com mudas obtidas a partir do enraizamento das hastes de plantas matrizes em bandejas de polipropileno com alvéolos entre 150 e 200 cm³ com substrato orgânico. Emprega-se a parte apical das hastes de plantas vigorosas e sadias, com aproximadamente 10 cm de comprimento. As folhas são retiradas e dois a três nós são inseridos no substrato, deixando-se outros dois ou três na parte aérea. Nos períodos quentes do ano a microaspersão é necessária até que ocorra o enraizamento das miniestacas.

O plantio pode ser feito o ano todo. Porém, a época mais favorável é o início do outono para obter elevada produção de massa verde na primavera e no verão. O emprego de vasos é preferível porque permite um melhor controle da umidade em torno das raízes, no espaçamento de 30 cm entre plantas e entre fileiras (Figura 6.7), como também a distribuição da solução nutritiva indicada na Tabela 6.7.

A colheita é feita quando surgem os primeiros sinais de senescência nas folhas localizadas na base das hastes. As hastes são cortadas a aproximadamente 10 cm de altura, de forma que permaneçam pelo menos quatro a cinco meristemas sem dormência nas axilas de folhas verdes. O rebrote ocorrerá nesses meristemas. O número total de cortes ao longo do ano depende principalmente da temperatura. No verão é possível realizar cortes em plantas jovens a intervalos de aproximadamente 30 dias.

Figura 6.7 – Plantas de manjerona aos 7 (A) e 25 dias após o plantio (B). Detalhe da folha da espécie (C).

Fonte: Andriolo (2021).

Tabela 6.7 – Composição da solução nutritiva para o cultivo de manjerona em ambiente protegido.

Concentração Iônica de Macronutrientes (mmol L ⁻¹)						
NO ₃	H ₂ PO ₄	K ⁺	Ca ²⁺	NH ₄ ⁺	Mg ²⁺	SO ₄ ²⁻
12,6	2,0	6,0	3,0	2,6	1,5	1,5
Quantidades de Fertilizantes (mg L ⁻¹)*						
KNO ₃	Calcinit®	MgSO ₄	NH ₄ H ₂ PO ₄ (MAP)	Fe	CE de referência	Faixa de pH
606,6	648,3	369,6	230,1	1,0	1,0 - 1,5 dS m ⁻¹	5,5 – 6,5

*Quantidades sugeridas de fertilizantes. Outros fertilizantes podem ser empregados, sempre observando a composição iônica indicada em mmol L⁻¹. Para produção comercial foram desconsiderados no cálculo dos fertilizantes os resíduos de NH₄NO₃ provenientes do Calcinit®. A quantidade de micronutrientes a ser adicionada compreende 0,1 mL da solução padrão (Capítulo 5) para cada litro de solução nutritiva. KNO₃: nitrato de potássio; Calcinit®: nitrato de cálcio; MgSO₄: sulfato de magnésio; NH₄H₂PO₄ (MAP): monoamônio fosfato. CE: condutividade elétrica. Fonte: Elaborado pelo autor.

6.8. Pimentas (*Capsicum* sp.)

Rogério Antonio Belle

Pimenta é o nome comum dado a várias plantas cujos frutos são usados como condimentos e geralmente apresentam o sabor picante. As pimentas aqui apresentadas se referem unicamente as espécies pertencentes ao gênero botânico *Capsicum* nativas das Américas. Essas plantas podem ser classificadas em domesticadas semi-domesticadas. Domesticada significa que houve uma seleção para as características de interesse e essas plantas não são capazes de sobreviver naturalmente. Já as semi-domesticadas expressa que a seleção é ainda parcial na eliminação de diferenças importantes entre as espécies selvagens, assim como sobre a dispersão (REIFSCHNEIDER, 2000).

As pimentas são caracterizadas por apresentar sabor picante que é determinado pela presença de níveis variáveis de capsaicina, substância que produz a sensação de queimação ou ardência. Tecnicamente este efeito é chamado de pungência. A capsaicina é encontrada em maior concentração nas nervuras do fruto e nas sementes. Sua ação consiste em provocar a aceleração do metabolismo com a dilatação dos vasos capilares, aumentando assim o fluxo e a oxigenação da área. As terminações nervosas são estimuladas assim como o sistema imunológico. Têm ação anti-inflamatória, bacteriana e cicatrizante. No conhecimento popular têm a reputação de limpar os vasos sanguíneos e aumentar a longevidade.

Dentre as 27 espécies de *Capsicum* conhecidas, somente cinco foram totalmente ou parcialmente domesticadas para cultivo, que são as seguintes (HORTAS.INFO, 2018):

- a) *Capsicum annuum*: Esta espécie de pimenta é a mais cultivada. As flores surgem solitárias nos nós e geralmente são brancas. Pertencem a esta espécie os chamados pimentões, frutos grandes e aromáticos que geralmente não apresentam capsaicina, embora haja cultivares com picância.
- b) *Capsicum baccatum*: O que a distingue são as flores brancas com manchas amarelas ou esverdeadas. Fazem parte desta espécie a pimenta dedo de moça, cumari, cambuci, chapéu de bispo, pitanga e a *Lemon Drop*.
- c) *Capsicum chinense*: Os frutos normalmente têm um aroma característico, há

duas ou mais flores brancas por nó, sendo que as anteras das flores são roxas. São desta espécie as pimentas mais picantes conhecidas.

- d) *Capsicum frutescens* (pimenta): É típico desta espécie os frutos crescerem eretos. Há duas ou mais flores por nó e as flores são branco-esverdeadas ou amarelo-esverdeadas, com anteras roxas ou azuladas. Inclui a malagueta, a tabasco, e algumas ornamentais que também são comestíveis e picantes.
- e) *Capsicum pubescens*: é a espécie mais diferente, as folhas são pubescentes (têm pelos) e suas sementes são escuras. Suas flores são roxas. É considerada a pimenta mais difícil de cultivar.

As pimentas são plantas que crescem em condições de clima tropical e subtropical quente. São sensíveis a geadas mesmo leves e as temperaturas baixas (menores de 15 °C), algumas espécies morrem e outras entram em dormência perdendo folhas e paralisando por completo o crescimento e a floração no período frio, plantas velhas são mais resistentes.

A condição ambiental ótima caracteriza-se por temperaturas entre 16 - 35 °C com radiação solar direta sobre as plantas. Temperaturas acima de 35 °C comprometem a formação dos frutos, sendo a temperatura ideal a de 27 °C (CLOCK, 2009). Há cultivares da espécie *C. pubescens* que crescem melhor em condições de temperaturas abaixo da temperatura ideal, não suportando geadas e longos períodos de baixas temperaturas. Na maioria das espécies de pimenta as plantas são anuais, mas podem sobreviver, quando em boas condições, por dois, três ou mais anos e algumas se tornam verdadeiros arbustos. Já a germinação ocorre sob condições de altas temperaturas (25 a 30 °C) entre uma a duas semanas (EMBRAPA, 2007).

No cultivo protegido deve ser observado que a cobertura de polietileno esteja limpa para evitar sombreamento o qual pode provocar o estiolamento e tombamento das plantas e frutos menos pungentes. Na propagação das pimentas, o método mais indicado é por sementes, em recipientes a meio centímetro de profundidade. O transplante em lugar definitivo pode ser realizado quando as mudas apresentarem em torno de 10 cm (4 a 6 folhas). É importante que as sementes utilizadas tenham qualidade sanitária para evitar que sejam transmitidas viroses e outras doenças que podem estar veiculadas às sementes infectadas.

O espaçamento entre plantas pode variar de 30 a 70 cm e entre linhas de 60 a 120 cm, em função das espécies e/ou cultivares (Figura 6.8). Quanto maior o porte e volume da copa, maiores serão os espaçamentos, assim como o tamanho dos vasos, que podem variar de 3 a 5 dm³. O tutoramento deve ser providenciado logo após o plantio, utilizando estacas ou fios (horizontais ou verticais) para evitar o acamamento e/ou quebra das plantas. A solução nutritiva que pode ser fornecida para o cultivo de pimenta está demonstrada na Tabela 6.8.

Figura 6.8 – Plantas de pimentas cultivadas em substrato fertirrigadas com solução nutritiva completa.

Continuação..

Fonte: Belle (2021).

A colheita pode ter início de 80 até 150 dias após a semeadura, dependendo da espécie, cultivar e das condições de cultivo. Os frutos podem ser colhidos verdes ou maduros, os quais podem apresentar a coloração vermelha, roxa, laranja ou amarela dependendo da espécie. A colheita e o manuseio dos frutos das pimentas com alta pungência devem ser realizados com o uso de luvas e não fazer contato com os olhos, boca e nariz para evitar “queimaduras” causadas pela capsaicina. A utilização de álcool auxilia na higienização. Nestas condições de cultivo a qualidade dos frutos é elevada e a produção se prolonga por um longo período.

Os frutos podem ser comercializados *in natura*, secos inteiros, secos moídos ou em conserva imersos em óleo ou vinagre com outros condimentos.

Tabela 6.8 – Composição da solução nutritiva para o cultivo de pimentas em ambiente protegido.

Concentração Iônica de Macronutrientes (mmol L ⁻¹)						
NO ₃	H ₂ PO ₄	K ⁺	Ca ²⁺	NH ₄ ⁺	Mg ²⁺	SO ₄ ²⁻
12,0	2,0	6,0	3,0	2,0	1,5	1,5
Quantidade de Fertilizantes (mg L ⁻¹)*						
KNO ₃	Calcinit [®]	MgSO ₄	NH ₄ H ₂ PO ₄ (MAP)	Fe	CE de referência	Faixa de pH
606,6	648,0	369,5	230,0	1,0	1,0 - 1,5 dS m ⁻¹	5,5 – 6,5

*Quantidades sugeridas de fertilizantes. Outros fertilizantes podem ser empregados, sempre observando a composição iônica indicada em mmol L⁻¹. Para produção comercial foram desconsiderados no cálculo dos fertilizantes os resíduos de NH₄NO₃ provenientes do Calcinit[®]. A quantidade de micronutrientes a ser adicionada compreende 0,1 mL da solução padrão (Capítulo 5) para cada litro de solução nutritiva. KNO₃: nitrato de potássio; Calcinit[®]: nitrato de cálcio; MgSO₄: sulfato de magnésio; NH₄H₂PO₄ (MAP): monoamônio fosfato. CE: condutividade elétrica. Fonte: Elaborado pelo autor.

6.9. Salsa e cebolinha (*Petroselinum sativum*; *Allium fistulosum*)

Jerônimo Luiz Andriolo

A salsa (Apiaceae) é cultivada principalmente como hortaliça condimentar para consumo verde, embora também produza óleo essencial nas folhas e nas sementes. A comercialização no Brasil é feita em maços mistos com cebolinha (Alliaceae). A salsa crespa (*Petroselinum crispum*) também pode ser empregada como condimento, porém sua importância comercial é pequena no Brasil. O desenvolvimento da salsa ocorre em duas fases, vegetativa e reprodutiva. A fase vegetativa transcorre nos meses de inverno e primavera, com a emissão de folhas. As baixas temperaturas no inverno podem induzir a passagem da fase vegetativa para a reprodutiva, com a emissão de hastes florais e produção de sementes no final da primavera e início do verão. Por esse motivo, indica-se o replantio todos os anos no final do verão, com mudas oriundas da semeadura em bandejas de produção de mudas de hortaliças.

A cebolinha é uma planta perene que cresce durante todo o ano na região Sul do Brasil. Novos rebentos são emitidos a partir da planta-mãe e aqueles mais velhos podem morrer com o passar do tempo. Escamas acumulam-se na base das plantas, formando um ambiente propício para a infestação de pragas e doenças. Por este motivo, recomenda-se também a substituição das plantas no final do verão com mudas produzidas em bandejas.

Os resultados de Schmitt et al. (2016) mostraram que a produção de maços mistos pode ser feita pelo plantio de mudas de ambas as espécies uma ao lado da outra, no mesmo vaso de cultivo (Figura 6.9/Figura 6.11C). Podem ser empregadas mudas provenientes de um alvéolo de salsa e um alvéolo de cebolinha (Figura 6.9), ambas produzidas separadamente em bandejas de produção de mudas comerciais. No momento da colheita, o maço pode ser feito com uma única operação de corte, reduzindo a mão de obra necessária para o preparo do produto comercial. O manejo das plantas e a colheita são facilitados pelo plantio em vasos de aproximadamente 3 dm³. Os vasos permitem também um melhor controle da umidade em torno das raízes, reduzindo o risco de podridões radiculares, as quais podem ocorrer nas plantas de salsa principalmente no período de primavera-verão. Podem ser feitos vários cortes sucessivos ao longo do ano.

Figura 6.9 – Plantio de mudas de salsa e cebolinha no mesmo vaso de cultivo.

Fonte: Andriolo (2021).

No plantio para produção de maços mistos o espaçamento deve ser de pelo menos 40 cm entre fileiras e 30 cm entre vasos na fileira. Após o primeiro corte podem ocorrer diferenças na taxa de crescimento do rebrote entre as duas espécies, com dominância da salsa sobre a cebolinha (Figura 6.10). Essa dominância pode ser reduzida empregando-se um espaçamento maior entre fileiras, de forma a diminuir o sombreamento da salsa sobre a cebolinha.

O plantio de cada uma das espécies pode ser feito também em vasos separados para formação manual do maço comercial após a colheita, da mesma forma como no plantio convencional no solo (Figura 6.11A/B). Nesse método pode ser empregado o espaçamento de 30 cm entre fileiras e entre plantas, bem como, a solução nutritiva apresentada na Tabela 6.9.

Figura 6.10 – Cultivo consorciado de salsa e cebolinha no mesmo vaso para produção de maços mistos.

Fonte: Andriolo (2021).

Figura 6.11 – Cultivo isolado de cebolinha (A) e salsa (B). Cultivo consorciado de salsa e cebolinha no mesmo vaso para produção de maços mistos (C).

Fonte: Andriolo (2021).

Tabela 6.9 – Composição da solução nutritiva para o cultivo de salsa e cebolinha em ambiente protegido.

Concentração Iônica de Macronutrientes (mmol L ⁻¹)						
NO ₃	H ₂ PO ₄	K ⁺	Ca ²⁺	NH ₄ ⁺	Mg ²⁺	SO ₄ ²⁻
5,7	1,2	3,2	1,2	1,2	0,6	0,6
Quantidade de Fertilizantes (mg L ⁻¹)*						
KNO ₃	Calcinit [®]	MgSO ₄	NH ₄ H ₂ PO ₄ (MAP)	Fe	CE de referência	Faixa de pH
323,5	270,0	147,8	138,0	1,0	1,0 - 1,5 dS m ⁻¹	5,5 – 6,5

*Quantidades sugeridas de fertilizantes. Outros fertilizantes podem ser empregados, sempre observando a composição iônica indicada em mmol L⁻¹. Para produção comercial foram desconsiderados no cálculo dos fertilizantes os resíduos de NH₄NO₃ provenientes do Calcinit[®]. A quantidade de micronutrientes a ser adicionada compreende 0,1 mL da solução padrão (Capítulo 5) para cada litro de solução nutritiva. KNO₃: nitrato de potássio; Calcinit[®]: nitrato de cálcio; MgSO₄: sulfato de magnésio; NH₄H₂PO₄ (MAP): monoamônio fosfato. CE: condutividade elétrica. Fonte: Elaborado pelo autor.

6.10. Sálvia (*Salvia officinalis*)

Suany Maria Gomes Pinheiro

A sálvia é uma planta perene pertencente à família Lamiaceae originária da região Mediterrânea. É um subarbusto lenhoso ramificado que alcança, em média, uma altura de 50 a 70 cm. As folhas são utilizadas como condimento e na preparação de chás. Das folhas e das flores é extraído o óleo essencial, empregado na indústria alimentícia, farmacêutica e de cosméticos constituído principalmente por cânfora, α e β tujona, 1,8 cineol, β - cariofileno, viridiflorol e linalol (GARCIA, 2014). Essa espécie tem crescimento e desenvolvimento na faixa de temperaturas entre 20 a 25 °C. Não tolera excesso de umidade, a qual está associada com doenças que ocasionam podridão nas raízes e hastes. Dessa forma, o cultivo em ambiente protegido e em substrato é mais indicado, além de proporcionar melhor planejamento relacionado à produção no decorrer do ano.

O plantio pode ser feito em vasos com substrato orgânico, com volume entre 3 e 4 dm³ por vaso, empregando mudas enraizadas produzidas em bandejas (Figura 6.12C). O espaçamento depende do número de cortes realizados ao longo do ano. Ao menos 20 cm entre fileiras e 30 cm entre plantas, uma vez que em espaçamentos menores ocorre adensamento, prejudicando o crescimento e desenvolvimento das plantas. O plantio deve ser feito preferencialmente no início da primavera e o período de crescimento estende-se até o final do verão. No outono e inverno o crescimento é reduzido e são maiores os riscos de doenças radiculares devido à dificuldade de controle da umidade no substrato. Assim, indica-se o descarte de plantas velhas no final do verão.

Quanto à colheita, o primeiro corte pode ser realizado a partir dos 50 dias após o plantio. A altura do corte é de aproximadamente 10 cm de altura do substrato, deixando pelo menos quatro gemas axilares, permitindo que as plantas rebrotem para uma nova colheita. Entretanto, no segundo corte é interessante que esse seja menos intenso, mantendo-se algumas folhas remanescentes para aumentar a capacidade de rebrota das plantas, o mesmo deve ser feito em plantas mais velhas, as quais não conseguem rebrotarem se o corte for drástico. A produção média de massa fresca e seca de folhas de sálvia, nesse sistema de cultivo, é de aproximadamente 300 g planta⁻¹ e 43 g planta⁻¹, respectivamente.

O óleo essencial apresenta um rendimento de $0,85 \text{ mL planta}^{-1}$. Esses resultados são referentes à aplicação da solução nutritiva abordada na Tabela 6.10.

Quanto ao ataque de pragas a cultura da sálvia não apresenta grandes problemas. No entanto, deve-se se atentar para o aparecimento de pulgões e mosca branca, sendo o primeiro mais recorrente. Para o controle dessas pragas pode ser utilizado um extrato a base de alho e cebola, aplicados diretamente nas plantas com uso de um borrifador a cada sete dias.

Figura 6.12 – Sálvia cultivada em vasos com 3 dm^3 aos 22 (A) e 31 (C) dias após o plantio realizado em 17/09/2016. Sálvia em floração (B).

Fonte: Pinheiro (2021).

Tabela 6.10 – Composição da solução nutritiva para o cultivo de sálvia em ambiente protegido.

Concentração Iônica de Macronutrientes (mmol L ⁻¹)						
NO ₃	H ₂ PO ₄	K ⁺	Ca ²⁺	NH ₄ ⁺	Mg ²⁺	SO ₄ ²⁻
8,0	0,7	5,0	1,5	0,7	1,2	1,2
Quantidade de Fertilizantes (mg L ⁻¹)*						
KNO ₃	Calcinit®	MgSO ₄	NH ₄ H ₂ PO ₄ (MAP)	Fe	CE de referência	Faixa de pH
505,5	324,0	308,0	80,5	1,0	1,0 - 1,5 dS m ⁻¹	5,5 – 6,5

*Quantidades sugeridas de fertilizantes. Outros fertilizantes podem ser empregados, sempre observando a composição iônica indicada em mmol L⁻¹. Para produção comercial foram desconsiderados no cálculo dos fertilizantes os resíduos de NH₄NO₃ provenientes do Calcinit®. A quantidade de micronutrientes a ser adicionada compreende 0,1 mL da solução padrão (Capítulo 5) para cada litro de solução nutritiva. KNO₃: nitrato de potássio; Calcinit®: nitrato de cálcio; MgSO₄: sulfato de magnésio; NH₄H₂PO₄ (MAP): monoamônio fosfato. CE: condutividade elétrica. Fonte: Elaborado pela autora.

CAPÍTULO 7

Colheita, Secagem e Armazenamento das Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares

Cassiane Ubessi

7.1. Colheita das plantas medicinais, aromáticas e condimentares

O momento ideal de colheita é variável para cada espécie, conforme sua utilização e de acordo com o órgão vegetal que armazena os compostos com fins terapêuticos, aromáticos ou condimentares. No entanto, há uma regra geral que o momento de colheita consiste no período de maior concentração de princípios ativos, o qual é variável conforme o órgão de reserva. No Quadro 7.1 está exemplificado o período de colheita conforme a parte vegetal utilizada.

Quadro 7.1 – Período de colheita de cada órgão vegetal.

Órgão Vegetal	Período de Colheita
Flores	No início e durante a floração
Folhas, ramos e caules	Antes do florescimento
Casca	No início da floração
Raízes e rizomas	Quando a planta completar o ciclo (dormência)
Sementes e frutos	Quando maduros

Fonte: adaptado de Azevedo & Moura (2010).

O período de colheita está relacionado com a distribuição de fotoassimilados pela planta, que são transferidos dos órgãos fotossinteticamente ativos (fontes) para o consumo ou armazenamento (drenos) de outros órgãos. Os órgãos fontes são aqueles responsáveis pela fotossíntese, principalmente as folhas. Os órgãos drenos são aqueles consumidores, como caules, raízes e flores, e aqueles de estocagem como frutos, sementes, rizomas, bulbos e tubérculos. Isso explica a colheita de folhas, ramos e caules antes da floração, pois estão armazenando fotoassimilados que serão destinados para a floração e frutificação. Durante a fase reprodutiva, inclusive, em algumas espécies, o crescimento e desenvolvimento da parte vegetativa são suspensos a fim de favorecer o processo reprodutivo. No caso das raízes e rizomas há o acúmulo de fotoassimilados durante todo o ciclo, pois ao final do ciclo ou após o período de dormência esses órgãos serão utilizados como fonte de nutrientes para a geração de uma nova planta. Assim, a colheita desses órgãos deve ser

realizada no final do ciclo, durante o período de dormência e antes do início da emissão de brotos.

Portanto, além do período de colheita é aconselhável conhecer as fases do desenvolvimento do vegetal de interesse, para a compreensão e planejamento do momento ideal da colheita a fim de garantir a qualidade do produto final. Além disso, deve-se evitar a colheita de plantas doentes, com órgãos deformados ou senescentes, com manchas ou avarias nas partes de consumo, como o ataque de pragas e doenças. Também, órgãos sujos com terra, areia ou poeira, lembrando que essa situação é comum no cultivo a campo e é minimizada no cultivo em ambiente protegido. O melhor horário para a colheita é no início da manhã, em que há temperaturas amenas e evita-se, assim, a perda de princípios ativos e após secar o orvalho, para reduzir a ocorrência de fungos que levam a deterioração do material vegetal.

7.2. Secagem das plantas medicinais, aromáticas e condimentares

O processo de secagem tem como finalidades evitar a degradação do vegetal após a colheita, promover a estabilização dos princípios ativos e prolongar o tempo de armazenamento e consumo do vegetal. Com a remoção da água do vegetal ocorre a inibição da atividade enzimática e com isso há a estabilização dos princípios ativos.

Porém, antes de iniciar o processo de secagem as plantas devem ser selecionadas, removendo as partes indesejadas. Além disso, é indicado dividir a planta por segmentos: folhas, caules, raízes e flores. A mistura de espécies diferentes durante a secagem deve ser evitada, pois cada órgão e espécie apresenta uma temperatura adequada de secagem. A separação das espécies também evita interferências no aroma de cada planta.

Há dois tipos de secagem recomendados: natural e artificial.

7.2.1. Secagem natural

A secagem natural é uma técnica simples e comumente utilizada, principalmente para consumo doméstico das espécies. Ademais, garante excelente aroma e qualidade do material vegetal quando feita adequadamente. A desvantagem dessa técnica é o longo

período de tempo até a obtenção do material seco, que não convém para fins industriais e grandes quantidades de material vegetal.

A secagem natural deve ser realizada à sombra, em um ambiente seco e com circulação de ar. O material vegetal não pode ser exposto diretamente ao sol, pois o aquecimento irá promover a volatilização de alguns princípios ativos, atenuando o aroma e promovendo alterações na coloração. Geralmente o material seco a pleno sol acaba escurecendo, apresentando tons de verde escuro com um aspecto de vegetal queimado. Para uma secagem natural eficiente o material deve ser espalhado em uma fina camada ou pendurado por maços em um varal ou suportes de madeiras como exemplificado na Figura 7.1.

Figura 7.1 – Secagem natural de plantas penduradas em varal.

Fonte: Elaborado pela autora.

7.2.2. Secagem artificial

A secagem artificial é realizada por meio de estufas com circulação de ar ou por desidratadoras (Figura 7.2). Em comparação com a secagem natural, a artificial permite secar ou desidratar grande volume de material vegetal em um curto período de tempo.

Atualmente no mercado existem inúmeros modelos de estufas e desidratadoras e dessa forma não há um modelo específico direcionado às plantas medicinais, aromáticas e condimentares. Geralmente as desidratadoras são de tamanho menor e destinadas a produção em pequena escala. O principal fator desse processo de secagem é a temperatura que não deve ser superior a 35 - 40 °C, pois acima desses valores ocorre o rompimento das estruturas de armazenamento dos princípios ativos e, conseqüentemente, há a perda de aroma por volatilização, especialmente nas espécies que são destinadas a extração de óleos essenciais ou que apresentam compostos altamente voláteis. No entanto, estruturas como caules e raízes podem ser secas em temperaturas superiores (50 - 65 °C). O processo de secagem é realizado por espécie e por órgão vegetal, lembrando que raízes, rizomas e caules podem ser fracionados para facilitar a técnica. Dessa forma, a secagem artificial é um processo rápido, que evita a perda do aroma e alterações na coloração devido à remoção imediata da umidade.

Figura 7.2 – Gavetas em estrutura móvel para a secagem artificial de plantas.

Fonte: Ubessi (2021).

7.3. Embalagem e armazenamento das plantas medicinais, aromáticas e condimentares

A embalagem somente será realizada após o processo de secagem e ao atingir um teor de umidade de 10%, que minimiza a deterioração e proliferação de pragas no material vegetal. Para a produção e comercialização de alguns chás e condimentos, definidos como especiarias pela Anvisa, há uma regulamentação que dispõe sobre matérias estranhas macroscópicas e microscópicas em alimentos e bebidas e seus limites de tolerância que devem ser atendidos (ANVISA, 2014).

A embalagem deve evitar a troca de umidade com o ambiente, sendo preferencialmente de vidro ou polipropileno (plástico). A vantagem da embalagem de vidro é que permite o reaproveitamento, o qual muitas vezes não é possível com o plástico, principalmente após o armazenamento de uma espécie com aroma marcante que acaba impregnando a embalagem e interferindo no aroma da outra espécie que for armazenada na mesma embalagem. Porém, o custo com a embalagem de plástico é menor em relação ao vidro. De modo geral, quanto mais eficiente à capacidade de vedação da embalagem, maior o tempo de conservação e qualidade do material vegetal. Na embalagem também deve constar a espécie (nome comum e científico), a data de colheita, a validade, o número do lote e o responsável, como exemplificado na Figura 7.3.

Figura 7.3 – Etiqueta de identificação em embalagem de plástico com camomila.

Fonte: Ubessi (2021).

O armazenamento é realizado geralmente em câmaras com temperatura e umidade controladas em local escuro, arejado e seco, sem acesso de insetos, roedores ou poeira (Figura 7.4). O tempo de armazenamento das plantas medicinais, aromáticas e condimentares é variável conforme a espécie e pode prolongar-se por aproximadamente um ano. Após esse período ocorre um decréscimo na concentração de princípios ativos no material vegetal. Cabe destacar que alguns condimentos, como por exemplo, alho, pimentas, canela, cravo-da-índia, noz moscada e louro apresentam um período maior de armazenamento após o processo de secagem. Outro fator importante é evitar o armazenamento próximo de outras espécies aromáticas, para que não haja interferências entre os diferentes aromas.

Figura 7.4 – Local de armazenamento de plantas medicinais, aromáticas e condimentares.

Fonte: Ubessi (2021).

CAPÍTULO 8

Óleos Essenciais e os Métodos de Extração

Cassiane Ubessi

Os óleos essenciais são misturas complexas de substâncias químicas, podendo conter de 20 a 200 compostos orgânicos, estando a grande maioria presente em concentrações inferiores a 1%. São moderadamente voláteis e lipossolúveis, com um grau muito pequeno de solubilidade em água (TISSERAND; YOUNG 2014). Os óleos essenciais são produzidos pelo metabolismo secundário das plantas e comumente armazenados em tricomas. Apresentam aroma e coloração variável conforme a espécie, mas plantas de uma mesma espécie podem gerar óleos essenciais com perfis distintos, chamados quimiotipos. A constituição do óleo essencial é expressa geneticamente, mas também sofre influência do ambiente e das condições de cultivo, bem como do método de extração. A escolha do método de extração deve levar em consideração a matéria prima, pois alguns métodos são específicos a uma determinada espécie ou órgão vegetal em que se encontra armazenado o óleo essencial. A escolha errônea de um método de extração levará a uma baixa produtividade e perda de componentes do óleo essencial durante o processo. Os seguintes métodos são utilizados para a extração de óleos essenciais: arraste de vapor, hidrodestilação, prensagem a frio, enfleurage, solventes e fluido supercrítico. No entanto, não será explanado sobre a prensagem a frio, pois esse método é específico à extração de óleos essenciais cítricos e óleos vegetais provenientes de sementes oleaginosas, espécies as quais não são passíveis de cultivo em ambiente protegido.

8.1. Arraste de vapor ou destilação a vapor

É o método de extração mais utilizado em pequena, média e larga escala, pois é adequado para várias espécies como, por exemplo, manjerição, lavanda, alecrim, sálvia e camomila. A principal vantagem dessa técnica é a possibilidade de extração de diversas espécies e distintos órgãos vegetais, além da obtenção de óleo essencial com excelente aroma e dentro dos padrões regulamentados pelas ISO (International Organization for Standardization). Sua desvantagem encontra-se na impossibilidade da extração em algumas espécies florais, pois as altas temperaturas acabam degradando o material vegetal antes da liberação do óleo essencial, visto que a flor é um órgão vegetal mais delicado. Também, é inadequado para a extração de óleos cítricos, os quais são obtidos por prensagem a frio, como já mencionado no início do capítulo.

O método de extração por arraste de vapor é realizado colocando o material vegetal em contato apenas com o vapor d'água oriundo do aquecimento da água para extrair o óleo essencial. Esse método é dividido em três etapas, as quais são demonstradas na Figura 8.1.

Figura 8.1 – Esquema do processo de extração de óleo essencial por arraste a vapor.

Fonte: adaptado de Sereno - Cuidados Holísticos (2015).

A primeira etapa é referente à caldeira onde ocorre o aquecimento da água originando o vapor que irá até a dorna, a qual compreende a segunda etapa. O sistema de caldeiras é empregado apenas para dornas com capacidade acima de 100 kg de material vegetal. O aquecimento da água em quantidades menores de material vegetal pode ser feito por equipamentos elétricos ou a gás. A dorna é confeccionada em aço inoxidável, composta por um reservatório de água sobre o qual há uma placa perfurada (fundo da dorna - Figura 8.2B). Também faz parte da dorna um cesto móvel onde é colocado o material vegetal para a extração (Figura 8.2A/C). A capacidade de destilação das dornas é variável, de 2 kg até 1000 kg de material vegetal em dornas fixas ou 2000 kg em dornas móveis.

Figura 8.2 – Dorna com capacidade de destilação de 10 kg de material vegetal. Cesto móvel (A). Fundo da dorna perfurado (B). Dorna com o cesto móvel preenchido com lavanda (*Lavandula dentata*) (C).

Fonte: Ubessi (2021).

No cesto móvel ocorre a percolação do vapor de água pelo material vegetal promovendo o rompimento das estruturas de armazenamento, extraindo o óleo essencial. Esse cesto também facilita a retirada do material após a extração. Quanto mais perfurado o fundo da dorna melhor é a eficiência de extração, pois permite maior entrada de vapor no cesto. Após passar pelo material vegetal o vapor é direcionado ao condensador, o qual compreende a terceira etapa de extração. No condensador há uma entrada constante de água a temperatura ambiente para resfriar e condensar o vapor de água que transporta o óleo essencial e ambos, após o condensador, são coletados concluindo o processo de extração. No coletor ocorre a separação do óleo essencial e do hidrolato, que é uma solução aquosa composta de um ínfimo percentual de óleo essencial e demais componentes da espécie que são solúveis em água. O hidrolato apresenta as mesmas propriedades terapêuticas do óleo essencial com a vantagem do uso tópico, que não é recomendado aos óleos essenciais. O tempo de extração do óleo essencial é variável conforme a espécie e o órgão vegetal, normalmente em torno de duas horas, ocorrendo o pico uma hora após o início da ebulição da água.

8.2. Hidrodestilação

O processo de extração por hidrodestilação é semelhante ao arraste de vapor, porém o material vegetal fica submerso em água durante todo o procedimento, visto que, no arraste a vapor apenas o vapor de água entra em contato com o material vegetal. As vantagens desse método consistem no baixo custo, fácil instalação e manuseio. Porém, é usado apenas em escala laboratorial e doméstica devido ao baixo rendimento resultante da pequena capacidade de extração. Também promove um aroma mais atenuado em comparação ao arraste de vapor, pois alguns componentes do óleo essencial acabam se solubilizando na água durante a extração. A hidrodestilação é realizada em um aparelho chamado Clevenger acoplado a um balão volumétrico e um condensador na parte superior, como demonstrado na Figura 8.3.

Figura 8.3 – Extração de óleo essencial por hidrodestilação em Clevenger.

Fonte: Elaborado pela autora.

O aquecimento da água onde está imerso o material vegetal é feito por meio de manta aquecedora, até que ocorra a evaporação da água. O vapor de água carrega consigo o óleo essencial extraído até o condensador. Igualmente como ocorre no arraste de vapor, o condensador apresenta circulação constante de água à temperatura ambiente para promover a condensação do vapor com o óleo essencial. Por diferença de densidade, o óleo essencial fica sobre a água, onde é acumulado até o término da extração. Posteriormente, a água é retirada e o óleo essencial coletado. O tempo de extração é variável conforme a espécie vegetal, visto que esse método pode ser empregado para inúmeras espécies como camomila, hortelã pimenta, sálvia, citronela, tomilho, entre outras.

8.3. Enfleurage, enfloração ou florage

É um dos métodos de extração mais antigo desenvolvido pelos egípcios e aperfeiçoado ao longo dos séculos por outras civilizações, como os franceses. Consiste na extração de óleo essencial de matérias primas delicadas como as flores, pois devido à sensibilidade ao calor há a degradação das pétalas antes da liberação do óleo essencial. Não é um método comumente utilizado nos dias atuais devido ao baixo rendimento, alto custo e longo período para a obtenção do óleo essencial. Em contrapartida, apresenta um óleo essencial de excelente qualidade e aroma marcante, muito similar ao vegetal. Além disso, os óleos essenciais extraídos por esse método apresentam elevado valor agregado. No Brasil, o Grupo Boticário utiliza dessa técnica para a obtenção do óleo essencial das pétalas de lírio Stargazer, usado para a composição de produtos da linha Lily.

No método de enfleurage as pétalas florais são colocadas em um recipiente de vidro que apresenta uma placa com gordura vegetal (Figura 8.4), a qual absorve o óleo essencial liberado pelas flores. As pétalas não são colocadas em contato direto com a camada de gordura, geralmente esta é aplicada na tampa que recobre os recipientes de vidro. As pétalas florais são substituídas por flores novas em um curto período de tempo (um ou dois dias) e o processo é repetido inúmeras vezes até a gordura saturar, ficando com um aspecto de pomada. Após essa etapa, a gordura é lavada com álcool e posteriormente destilada para a evaporação do álcool e obtenção do óleo essencial.

Figura 8.4 – Processo de enfleurage com flores de lírio.

Fonte: Elaborado pela autora.

8.4. Extração por Solventes

É um método destinado a extração de óleos essenciais de matérias primas delicadas, como as flores, por meio do uso de solventes orgânicos (hexano, benzeno, acetona, etanol). Esse processo não degrada o material vegetal, porém é altamente agressivo durante a extração, pois remove vários compostos além do óleo essencial, como ceras, gorduras, pigmentos e demais componentes solúveis em solvente. Também, é um procedimento que pode contaminar o óleo essencial com resquícios dos solventes utilizados. Dessa forma, o solvente residual pode promover alterações químicas na composição do óleo e resultar em efeitos tóxicos durante o uso. Além das desvantagens citadas, também é uma técnica de

alto custo devido aos processos de purificação e remoção dos solventes da amostra extraída. Em virtude das razões supracitadas esse método é inaplicável atualmente, até mesmo por uma questão de segurança e garantia da qualidade medicinal dos óleos essenciais.

A extração por solventes é realizada por meio do extrator de Soxhlet, o qual é composto por uma fonte de aquecimento, balão volumétrico, dedal e um condensador (Figura 8.5). O solvente é aquecido por uma manta de aquecimento, evapora e condensa, preenchendo o dedal. O dedal é um compartimento localizado no centro do extrator de Soxhlet, onde é depositado o material vegetal e também assegura que não ocorra o carregamento de partículas sólidas para o balão volumétrico durante a passagem do solvente. Quando o espaço central estiver praticamente preenchido de solvente, este é esvaziado por um sifão e o solvente retorna ao balão volumétrico, levando consigo o óleo essencial e demais compostos extraídos do vegetal. Esse processo é repetido inúmeras vezes até completar o tempo total de extração (Figura 8.5).

Figura 8.5 – Extrator Soxhlet para a extração de óleos essenciais por solventes.

Fonte: Elaborado pela autora.

O primeiro produto obtido na extração é chamado de concreto, pois é uma mistura pastosa a qual contém solvente, óleo essencial, ceras, pigmentos, gorduras e vários outros compostos que foram extraídos do vegetal. Dessa forma, essa mistura é submetida novamente a outro solvente, geralmente etanol, para eliminar os compostos indesejáveis e para promover a evaporação do solvente, obtendo o absoluto, que é uma substância purificada de consistência líquida, constituída majoritariamente por óleo essencial (Figura 8.6).

Figura 8.6 – Esquema da extração de óleos essenciais por solventes.

Fonte: Elaborado pela autora.

8.5. Fluido Supercrítico

O método de extração por fluido supercrítico teve início ao final dos anos 70, na Alemanha, e usa gases como solvente. É considerado um processo rápido, não inflamável, atóxico e sem residuais poluentes. Isso é devido ao uso de solventes não tóxicos como o gás carbônico (CO_2), além da obtenção de um óleo essencial de excelente qualidade e com a preservação das propriedades naturais do material vegetal, principalmente do aroma extremamente similar ao vegetal. Quando o gás está em uma condição de pressão e temperatura superior aos valores críticos, afirma-se que o gás está em seu estado supercrítico, o que justifica a nomenclatura dessa técnica. Esse estado é intermediário entre líquido e gasoso e é o momento no qual o gás age como solvente extraíndo o óleo essencial.

O material vegetal é colocado dentro de um cilindro perfurado que permite a percolação do gás ao longo do vegetal extraíndo o óleo essencial. O gás geralmente utilizado é o CO_2 , manipulado a uma determinada pressão e temperatura para que o mesmo encontre-se no estado intermediário entre líquido e gasoso. Após passar pelo material vegetal o gás é destinado a outro compartimento em que há a redução da pressão para a precipitação do óleo essencial e o retorno do gás ao estado gasoso. O gás regressa novamente ao sistema, iniciando um novo ciclo de extração e o óleo essencial é coletado. O fluxo de extração é apresentado na Figura 8.7. É um dos métodos mais modernos e eficientes de extração, pois promove baixa agressividade ao material vegetal, extraíndo unicamente o óleo essencial, sem aquecimento ou reações de hidrólise, quesitos que acabam alterando alguns componentes no óleo essencial. Porém, é um sistema complexo e com alto custo de implantação.

Figura 8.7 – Fluxograma de extração supercrítica.

Fonte: Elaborado pela autora.

8.6. Armazenamento dos óleos essenciais

Após a extração, os óleos essenciais devem ser bem armazenados a fim de evitar a volatilização, oxidação e degradação das características originais do produto. Recomenda-se o armazenamento em frasco de vidro âmbar, que reduz a ação da radiação luminosa sobre o óleo essencial, completamente preenchido e hermeticamente fechado. As embalagens devem ser armazenadas e preferencialmente refrigeradas, pois isso prolonga o período de armazenamento e a vida útil do óleo essencial, bem como suas propriedades químicas, físicas e medicinais. O vidro é uma embalagem que não interage com o óleo essencial, ou seja, não se deteriora e não contamina o óleo. Porém, não é o que ocorre com as embalagens plásticas, as quais podem contaminar o óleo essencial e alterar suas propriedades químicas, medicinais e aromáticas. Além disso, o vidro possibilita fácil esterilização e a reutilização das embalagens. Em contrapartida, o vidro é frágil podendo vir a quebrar durante o manuseio ou transporte. Uma alternativa a isso é a utilização de recipientes de alumínio que apresentam as mesmas vantagens da embalagem de vidro e não são vulneráveis a quebra.

Referências Bibliográficas

ANDRIOLO, J. L. **Olericultura Geral**. Santa Maria: Editora UFSM, 2017. 96 p.

ANVISA. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. **Resolução da diretoria colegiada - RDC nº 14, de 28 de Março de 2014**. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2014/rdc0014_28_03_2014.pdf>

AZEVEDO, C. D.; MOURA, M. A. **Cultivo de plantas medicinais: guia prático**. Niterói: Programa Rio Rural, Manual Técnico, 2010. 19 p.

BRASIL. **Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos**. 1. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 60 p.

BRASIL. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Práticas integrativas e complementares: plantas medicinais e fitoterapia na Atenção Básica**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2012.

CLARK, G. S. Menthol. **Perfumer & Flavorist**, v. 23, n. 5, p. 33-46. 1998.

CLOCK, H. **Re: Temperaturas baixas!** Fórum Pimentas.org. 2009. Disponível em: <<https://www.pimentas.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=9707#p155155>>.

CZEPAK, M. P. **Produção de óleo bruto e mentol cristalizável em oito frequências de colheita da menta (*Mentha arvensis* L.)**. 1995. 81 p. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade de São Paulo, Piracicaba, SP, 1995.

DESCHAMPS, C. et al. Densidade de tricomas glandulares e produção de óleo essencial em *Mentha arvensis* L., *Mentha x piperita* L. e *Mentha* cf. *aquatica* L. **Ciência e Natura**, v. 28, n. 1, p. 23-34, 2006.

EMBRAPA. **Pimenta (*Capsicum* spp.)**. Embrapa Hortaliças, 2007. Disponível em: <https://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Pimenta/Pimenta_capsicum_spp/index.html>.

FAVORITO, P. A. et al. Características produtivas do manjeriço (*Ocimum basilicum* L.) em função do espaçamento entre plantas e entre linhas. **Revista Brasileira de Plantas Medicinais**, v. 13, p. 582-586, 2011.

FRESCURA, V. D. S. et al. Compostos fenólicos em extratos de *Rosmarinus officinalis* L. sob cultivo fora do solo. **Enciclopédia Biosfera**, v. 9, n. 17, p. 755-761, 2013.

FRESCURA, V. D. S. et al. Nutrient solution concentration and collection time in phyto-mass production, content, yield and chemical composition of essential oil of rosemary. **Journal of Plant Nutrition**, v. 41, n. 10, p. 1293-1302, 2018.

GARCIA, C. S. C. ***Salvia officinalis* (Lamiaceae) Lin.: caracterização química, atividade citotóxica e apoptótica em células de mamíferos**. 2014. 98 p. Dissertação (Mestrado em Biotecnologia) - Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul, RS, 2014.

GRANDI, T. S. M. **Tratado das Plantas Medicinais: mineiras, nativas e cultivadas**. Belo Horizonte: Adaequatio Estúdio, 2014. 1204 p.

GRISI, M. C. M. et al. Avaliação de genótipos de Menta (*Mentha* spp) nas condições do Distrito Federal, Brasil. **Revista Brasileira de Plantas Medicinais**, v. 8, n. 4, p. 33-39, 2006.

GUPTA, V. et al. Pharmacological potential of *Matricaria recutita*: A review. **International Journal of Pharmaceutical Sciences and Drug Research**, v. 2, n. 1, p. 12-16, 2010.

HORTAS.INFO. **Como plantar pimenta**. 2018. Disponível em: <<https://hortas.info/como-plantar-pimenta>>.

KABERA, J. N. et al. Plant secondary metabolites: biosynthesis, classification, function and pharmacological properties. **Journal of Pharmacy and Pharmacology**, v. 2, n. 7, p. 377-392, 2014.

KUHN, A. W. **Manjerição (*Ocimum basilicum* L.) sob diferentes períodos de estresse salino: fitomassa, fitoquímica e citogenotoxicidade**. 2018. 81 p. Tese (Doutorado em Agronomia) - Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, 2018.

LANGE, D. Medicinal and aromatic plants: trade, production, and management of botanical resources. **Acta Horticulturae**, n. 629, p. 177-197, 2004.

LORENZI, H.; MATOS, F. J. **Plantas medicinais no Brasil: nativas e exóticas**. 2^a ed. Nova Odessa - SP, Instituto Plantarum, 2008. 544 p.

MAFFEI, M. E. Sites of synthesis, biochemistry and functional role of plant volatiles. **South African Journal of Botany**, v. 76, n. 4, p. 612-631, 2010.

MAMBRÍ, A. P. S. ***Lavandula dentata* L. sob o efeito da radiação solar e de diferentes épocas de colheita**. 2016. 77 p. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, 2016.

PETROVSKA, B. B. Historical review of medicinal plants usage. **Pharmacognosy Reviews**, v. 6, n. 11, p. 1-5, 2012.

REIFSCHNEIDER, F. J. B. et al. **Capsicum: pimentas e pimentões no Brasil**. Brasília, DF: Embrapa Comunicação para Transferência de Tecnologia/Embrapa Hortaliças, 2000. 113 p.

ROBINSON, M. M.; ZHANG, X. The world medicines situation 2011, traditional medicines: Global situation, issues and challenges. **World Health Organization**, 3. ed. 2011. 12 p.

RODRIGUES, A. G.; SANTOS, M. G.; SIMONI, C. Fitoterapia na Saúde da Família. In: Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (Org.). **Programa de Atualização em Medicina de Família e Comunidade (PROMEF)**. Porto Alegre: Artmed/Panamericana, p. 31-65, 2011.

ROSA, C.; CÂMARA, S. G.; BÉRIA, J. U. Representações e intenção de uso da Fitoterapia na atenção básica à saúde. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 16, n. 1, p. 311-318, 2011.

SATO, H. et al. Production of an interspecific somatic hybrid between peppermint and gingermint. **Plant Science**, v. 115, n. 1, p. 101-107. 1996.

SCHMITT, O. J. et al. Consórcio de salsa e cebolinha para produção de maços comerciais mistos de cheiro-verde. **Horticultura Brasileira**, v. 34, n. 1, p. 114-120, 2016.

SERENO - Cuidados Holísticos. **Métodos de extração dos óleos essenciais - Parte I: Destilação a vapor**. 2015. Disponível em: <<http://serenocuidadosholisticos.blogspot.com.br/2015/03/metodos-de-extracao-dos-oleos.html>>.

SILVA, A. M. O. et al. Efeito do extrato aquoso de alecrim (*Rosmarinus officinalis* L.) sobre o estresse oxidativo em ratos diabéticos. **Revista de Nutrição**, v. 24, n. 1, p. 121-130, 2011.

TISSERAND, R.; YOUNG, R. **Essential oil safety: a guide for health care professionals**. 2ª ed., Churchill Livingstone, 2014. 783 p.

TIWARI, R.; RANA C. S. Plant secondary metabolites: a review. **International Journal of Engineering Research and General Science**, v. 3, n. 5, p. 661-670, 2015.

TREWAVAS, A. What is plant behaviour? **Plant, Cell and Environment**, v. 32, n. 6, p. 606-616, 2009.

VAZ, A. P. A.; JORGE, M. H. A. **Manjerona**. Corumbá: Embrapa Pantanal, 2007. 2 p.

VERPOORTE, R. Exploration of nature's chemodiversity: the role of secondary metabolites as leads in drug development. **Drug Discovery Today**, v. 3, n. 5, p. 232-238, 1998.

SOBRE AS AUTORAS E OS AUTORES

Jerônimo Luiz Andriolo (Organizador)

Engenheiro Agrônomo, Doutorado em Physiologie - Bases de La Production Végétale - Université de Montpellier II (Scien. et Tech Du Languedoc), França.

Professor Titular na Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria-RS.

E-mail: jeronimoandriolo@gmail.com

Fernanda Alice Antonello Londero Backes

Engenheira Agrônoma, Doutorado em Ciência (Fitotecnia - Produção Vegetal) pela Universidade Federal de Viçosa, Viçosa-MG.

Professora Associada I na Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria-RS.

E-mail: prof.fernanda.backes@gmail.com

Rogério Antonio Belle

Engenheiro Agrônomo, Doutorado em Biologie et Physiologie Végétales pela Université Pierre et Marie Curie, França.

Professor Associado I na Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria-RS.

E-mail: rogeriobelle@gmail.com

Cassiane Ubessi (Organizador)

Engenheira Agrônoma, Doutorado em Agronomia (Produção Vegetal) pela Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria-RS.

E-mail: cassi.ubessi@yahoo.com.br

Suany Maria Gomes Pinheiro

Engenheira Agrônoma, Doutorado em Agronomia (Produção Vegetal) pela Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria-RS.

E-mail: suanygp@hotmail.com

Viviane Dal-Souto Frescura

Bióloga, Doutorado em Agronomia (Produção Vegetal) pela Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria-RS.

Professora Adjunta na Universidade Federal de Santa Maria, Campus Cachoeira do Sul-RS.

E-mail: viviane.frescura@ufsm.br

www.arcoeditores.com

contato@arcoeditores.com

[@arcoeditores](https://www.facebook.com/arcoeditores)

[/arcoeditores](https://www.instagram.com/arcoeditores)

(55)99723-4952

ISBN: 978-65-89949-25-1

CD

9 786589 949251

ARCO
EDITORES