УДК 633.853.494, 631.811

Особенности использования десикации при разных сроках посева сурепицы яровой в технологии получения маслосемян

Лупова Е.И.

Рязанский государственный агротехнологический университет

Аннотация

В статье предложены исследования по выявлению эффективности химических препаратов для десикации в посевах яровой сурепицы. Исследования проведены в 2017-2020 гг. в условиях Рязанской области.

Выявлено, что в фазу желто-зеленого стручка органы растений сурепицы характеризовались различной влажностью. Максимальную влажность (до 75%) имели стебли, у створок стручков – около 55% и семян – 40%. В среднем по опыту высокая прибавка семян наблюдалась на варианте с посевом в I декаде мая, Дикошанс, ВР, 3 л/га – 20,0 ц/га (+2,1 ц/га, или +11,7%, к контролю). Средняя максимальная урожайность во втором сроке посева отмечена на варианте Глифошанс, ВР, 3 л/га – 18,4 ц/га (+1,5 ц/га, или +8,8%, к контролю) и на варианте Дикошанс, ВР, 3 л/га – 18,3 ц/га (+1,4 ц/га, или +8,2%, к контролю), что доказывает высокую эффективность использования приёма десикации в технологии производства маслосемян яровой сурепицы.

Ключевые слова: СУРЕПИЦА ЯРОВАЯ, ВЛАЖНОСТЬ СЕМЯН, ДЕСИКАЦИЯ, УРОЖАЙНОСТЬ, МАСЛИЧНОСТЬ

Введение

Как показывает мировая практика, в решении проблемы растительного масла и кормового белка исключительно важная роль принадлежит масличным капустным культурам [1-3], в том числе и яровой сурепице [4].

В технологии производства сурепицы необходимо соблюдение равномерности развития и созревания. Это важнейшее условие получения высококачественной продукции. Так, например, сохранить качество семян сурепицы с высокой масличностью и содержанием

протеина значительно сложнее, чем, например, зерна злаков, содержащего, преимущественно, углеводы [5-9].

Очень важно, чтобы перед уборкой семена сурепицы были хорошо выполнены, чистые и сухие, без примеси зеленых и поврежденных [10-13].

Современные сорта яровой сурепицы хорошо пригодны к прямому комбайнированию, как следствие, с точки зрения сохранности, качества урожая и наличия трудовых ресурсов, уборку напрямую следует считать основной. В отдельных случаях уборку напрямую следует вести в посевах, которые прошли десикацию [14-17].

Применение химического подсушивания растений на корню – неотъемлемый прием технологии производства семян сурепицы. В настоящее время популярными препаратами при десикации являются Реглон супер, Баста и другие на основе глифосатов, которые возможно применять наземной и авиационной обработкой. Последнее время широкое применение получил десикант Глифошанс, ВР на основе изопропиламинной соли [18, 19] Десикация позволяет высушить растения основной культуры и сорняков даже при влажной погоде, снизить засоренность посевов, ускорить срок уборки и обеспечить равномерное созревание массива. Учитывая вышеизложенное, было определено направление наших исследований [20-24].

Цель работы – определить эффективность вариантов десикации в технологии производства маслосемян яровой сурепицы в условиях Нечерноземной зоны России.

Условия и методика исследований

Исследования выполнены на агротехнологической опытной станции Рязанской области на серой лесной тяжелосуглинистой почве в 2017–2020 гг. Полевые исследования заложены по методике опытного дела Б.А. Доспехова [25].

Агрохимические свойства почвы: гумус – 3,6-3,7 %, фосфор – 158-162 мг/кг почвы, калий – 123-128 мг/кг почвы, обменная кислотность – 5,6-5,7.

Агротехнические мероприятия по возделыванию яровой сурепицы были выполнены согласно рекомендациям, принятым в южной части Нечерноземной зоны России для яровых масличных капустных культур.

В опыте предшественник – озимая пшеница. Применяли осеннюю зяблевую вспашку на глубину 20-22 см. Ранней весной – боронование, 2-4 см, далее использовали культивацию,

12-14 см; предпосевную культивацию, 2-4 см. Под предпосевную культивацию вносились минеральные удобрения в дозе $N_{90}P_{50}K_{50}$ (фон). Применяли аммиачную селитру, нитрофоску в пересчете на действующее вещество.

Объект исследования – сорт Липчанка, характеризующийся устойчивостью к полеганию и осыпанию семян выше средних значений.

Посев проводили сеялкой ССНТ-16 + МТЗ-1221 на глубину 2-3 см. Посев сурепицы проводили семенами, прошедшими предпосевную обработку Круйзер Рапс, КС в I и II декадах мая. После посева проводили прикатывание почвы. Опрыскивание посевов сурепицы осуществляли при побурении семян в стручках среднего яруса. Расход рабочей жидкости – 150-200 л/га.

Глифошанс, ВР – водный раствор, действующее вещество глифосат, или изопропиламинная соль, 360 г/л. Контактный и системный пестицид. Характеризуется как быстроразлагающийся в растениях и почве, не вызывающий ограничений в севообороте по чередованию сельскохозяйственных культур. Химический класс – фосфорорганические соединения.

Дикошанс, ВР – водный раствор, действующее вещество дикват (дибромид), 150 г/л. Контактный пестицид. Химический класс – производные дипиридилия.

При прямом комбайнировании уборку сурепицы осуществляли при влажности семян 13-15 % комбайном TERRION-SAMPO SR 2010. На вариантах с десикацией к обмолоту приступали в среднем через 8-9 дней после обработки препаратом. Уборку выполняли на высоком срезе. Математическая обработка – с помощью «Statistica 10». Повторность – четырехкратная.

Результаты и обсуждение

В целом в 2017–2020 годах сложились благоприятные условия для роста и развития масличных капустных культур, но годы отмечены различными периодами по теплообеспеченности и количеству осадков.

Большую роль в получении высоких урожаев семян играли сроки и качество уборки. Ранняя или поздняя уборка семян сурепицы снижала урожайность семян и их качество. При ранней косовице семена культуры получались щуплыми, как следствие, снижалась урожайность, а при поздней – наступали потери за счет осыпания сурепицы.

Выявлено, что в фазу желто-зеленого стручка органы растений сурепицы характеризовались различной влажностью. Максимальную влажность имели стебли (до 75%), у створок стручков – около 55% и семян – 40%. Подсушивающее действие Глифошанс, ВР и Дикошанс, ВР проявлялось уже через трое-четверо суток после обработки препаратами. В среднем за годы исследований при естественном созревании влажность стеблей сурепицы понижалась на 4-5 %, створок стручков – на 2-4 % и семян – на 5-7 %, на вариантах же с Дикошансом, ВР – на 9-12, 10-14 и 20-24 %; вариантах с Глифошансом, ВР – на 5-7, 5-6 и 10-14 %, соответственно. При применении Глифошанса, ВР эффект подсушивания растений сурепицы наступал позже на 2-4 дня, чем при действии Дикошанса, ВР.

Химическое подсушивание растений и темпы ускорения наступления фазы полного созревания семян зависели от погодных условий конкретного года в период созревания. В сухую и жаркую погоду растения подсыхали быстрее (2018, 2020 гг.), а в прохладную с увеличенным увлажнением – медленнее (2016, 2017 гг.).

В среднем за годы изучения опыта с вариантами десикации растения на варианте с Дикошансом, ВР сокращали период созревания семян на 6-8 дней, а с Глифошансом, ВР – на 4-6 дней.

Сроки посева влияли на вегетационный период культуры. В среднем более продолжительный период вегетации отмечен при посеве в I декаде мая: на 6-8 дней больше, чем при II сроке посева. При первом сроке посева фенологические периоды развития культуры увеличивались. Такая же закономерность влияния десикантов на созревание сурепицы прослеживалась и при норме применения препаратов в 3 л/га. Наиболее короткий период вегетации сурепицы отмечен на варианте II срока посева с применением препарата Дикошанс, ВР (81-83 дня). Таким образом, сроки уборки сурепицы зависели от продолжительности фаз спелости семян, а также их влажности, на которые влияли сроки посева и обработка десикантами.

В опытах используемые препараты оказали быстросействующий эффект десикации, который проявлялся уже на 3 день после обработки посевов. Глифошанс, ВР и Дикошанс, ВР не смывались дождем после обработок, эффективно работали при высокой температуре воздуха. Интенсивность подсушивания семян яровой сурепицы не является единственным критерием оптимизации доз препарата и сроков посева: основным показателем эффективности является величина собранного урожая (рис. 1).

Рис. 1. Урожайность яровой сурепицы в зависимости от факторов опыта

Примечания: НСР₀₅, ц/га взаимодействия факторов ABC 2017–3,34; 2018–2,45; 2019–2,39; 2020–1,44.

В опыте прибавка урожая отмечена на всех вариантах с десикацией яровой сурепицы. В среднем высокая прибавка наблюдалась на варианте с посевом в I декаде мая и обработкой десикантом Дикошанс, ВР, 3 л/га – 20,0 ц/га (+2,1 ц/га, или +11,7%, к контролю). Максимальная прибавка урожая выявлена в 2019 году первого срока посева: вариант Дикошанс, ВР 3 л/га, где прибавка семян составила 3,1 ц/га (+20,1%). Выявление оптимального срока уборки культуры является важным условием минимизации потерь маслосемян при обмолоте.

Отметим, что контрольные варианты посевов (без обработки десикантами) отличались высокой разнокачественностью, обусловленной, в первую очередь, неравномерностью созревания. В целом по годам исследований варианты посева яровой сурепицы сорта Липчанка в I декаде мая отмечались как более урожайные, чем при посеве во II декаде мая.

Десикация посевов яровой сурепицы агрохимикатами по вариантам увеличивала энергию прорастания семян на 2,0-6,5 % к контролю. Масличность семян на вариантах с использованием Дикошанса была на 1,5-2,3 % выше, чем при прямом комбайнировании сурепицы без десикации. Обработка десикантами снижала развитие возбудителей болезней в предуборочный период, облегчала уборку посевов, в том числе и за счет высушивания

сорняков.

Выводы

В среднем высокая прибавка семян наблюдалась на варианте с посевом в I декаде мая, Дикошанс, ВР, 3 л/га – 20,0 ц/га (+2,1 ц/га, или +11,7%, к контролю). Средняя максимальная урожайность во втором сроке посева отмечена на варианте Глифошанс, ВР, 3 л/га – 18,4 ц/га (+1,5 ц/га, или +8,8%, к контролю) и на варианте Дикошанс, ВР, 3 л/га – 18,3 ц/га (+1,4 ц/га, или + 8,2%, к контролю), что доказывает высокую эффективность использования приёма десикации в технологии производства маслосемян яровой сурепицы.

Список использованных источников

1. Габитов М.А., Виноградов Д.В., Бышов Н.В. Растениеводство // Учебник. ФГБОУ ВО РГАТУ. – Рязань, 2019. – 302 с.
2. Vinogradov, D.V. Influence of technology of growing on yield and oil chemical composition of linseed in non-chernozem zone of Russia / Vinogradov D.V., Polyakov A.V., Kuntsevich A.A. // Journal of Agricultural Sciences. – 2012. – Т. 57. – № 3. – С. 135-142.
3. Vinogradov D.V, Lupova E.I, Khromtsev D.F and Vasileva V. The influence of bio-stimulants on productivity of coriander in the non-chernozem zone of Russia // Bulgarian J. of Agric. Sc. – 2018. – 24 (6). – Р. 1078-1084.
4. Лупова Е.И., Виноградов Д.В., Мастеров А.С. Совершенствование технологии возделывания сурепицы. Монография. – Рязань: ИП Жуков В.Ю., 2020. – 176 с.
5. Виноградов Д.В., Вертелецкий И.А. Рост и развитие масличных культур при разном уровне минерального питания // Международный технико-экономический журнал. – 2011. – № 4. – С. 99-102.
6. Виноградов Д.В. Приемы повышения урожайности яровой сурепицы в условиях южной части Нечерноземной зоны. – Рязань, 2008. – 112 с.
7. Виноградов Д.В., Поляков А.В., Вертелецкий И.А., Артемова Н.А. Возможность расширения ассортимента масличных культур в южном Нечерноземье // Международный технико-экономический журнал. – 2012. – № 1. – С. 118.
8. Соколов А.А., Лупова Е.И., Мазиров М.А., Виноградов Д.В. Мониторинг фитосанитарного состояния агроценозов в условиях Рязанской области // Владимирский земледелец. – 2020. – №4 (94). – С. 46-52.
9. Виноградов Д.В., Бышов Н.В., Лупова Е.И. Возможность использования масличных культур в качестве сырья для производства экологически чистого топлива // В сб.: Молодёжь в поисках дружбы. Матер. Республ. науч.-практич. конф. – ИЭТ. – 2017. – С. 28-33.

10. Виноградов Д.В. Новая масличная культура для Рязанской области // Международный технико-экономический журнал. – 2009. – № 4. – С. 32-34.
11. Виноградов Д.В. Пути повышения ресурсосбережения в интенсивном производстве рапса // Международный технико-экономический журнал. – 2009. – № 2. – С. 62-64.
12. Виноградов Д.В. Особенности и перспективы возделывания масличных культур в условиях юга Нечерноземья // В сб.: Перспективные направления исследований в селекции и технологии возделывания масличных культур. Матер. 5-й межд. конф. – 2009. – С. 51-54.
13. Филатова О.И., Лупова Е.И., Виноградов Д.В. Масличные культуры в Рязанской области // В сб.: Интеграция научных исследований в решении региональных экологических и природоохранных проблем. Матер. конф. – Рязань. – 2018. – С. 104-108.
14. Виноградов Д.В. Использование капустных культур // Пчеловодство. – 2009. – № 5. – С. 23-24.
15. Виноградов Д.В. Научно-практические аспекты интродукции масличных культур в южной части Нечерноземной зоны России // В сб.: Интродукция растений: теоретические, методические и прикладные проблемы. Матер. Межд. конф., посвященной 70-летию ботанического сада-института МарГТУ. – 2009. – С. 16-18.
16. Лупова Е.И., Виноградов Д.В. Технология производства яровых рапса и сурепицы в Нечерноземной зоне России. Учебное пособие. – Рязань, 2018. – 86 с.
17. Лупова Е.И., Виноградов Д.В. Биологическая активность серой лесной почвы и урожайность масличных культур при использовании способов основной обработки // Нива Поволжья. – 2021. – №1.
18. Лупова Е.И. Продуктивность ярового рапса и технологические свойства маслосемян, выращенных в условиях южной части Нечерноземной зоны [Электронный ресурс] // АгроЭкоИнфо: Электронный научно-производственный журнал. – 2021. – №3. – Режим доступа: http://agroecoinfo.ru/STATYI/2021/3/st_326.pdf. DOI: <https://doi.org/10.51419/20213326>.
19. Лупова Е.И., Исригова Т.А., Виноградов Д.В. Использование десикантов в технологии производства семян яровой сурепицы // Проблемы развития АПК региона. – 2020. – №2 (42). – С. 183-187.
20. Бадынский Л.А. и др. Развитие АПК на основе рационального природопользования. – Саарбрюккен, 2015. – 278 с.
21. Бышов Н.В., Виноградов Д.В., Стародубцев В.В., Вертелецкий И.А. Агроэкологическая оценка возделывания масличных культур в зоне техногенного загрязнения агроландшафта // В сб.: Почвы Азербайджана: генезис, мелиорация, рациональное использование и экология. Международная научная конференция. – 2012. – С. 855-859.
22. Мастеров А.С., Виноградов Д.В., Потапенко М.В., Трапков С.И., Балабко П.Н., Лупова Е.И. Практикум по земледелию. – Рязань, 2018. – 256 с.
23. Троц Н.М., Прохорова Н.В., Троц В.Б., и др. Тяжелые металлы в агроландшафтах Самарской области. – Кинель, 2018. – 220 с.

Лупова Е.И. Особенности использования десикации
при разных сроках посева сурепицы яровой в технологии получения маслосемян

.....
Электронный научно-производственный журнал
«АгроЭкоИнфо»
=====

24. Щур А.В., Виноградов Д.В., Валько В.П. Влияние различных уровней агроэкологических нагрузок на биохимические характеристики почвы // Юг России: экология, развитие. – 2016. – Т. 11. – № 4. – С. 139-148.

25. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.

=====

Цитирование:

Лупова Е.И. Особенности использования десикации при разных сроках посева сурепицы яровой в технологии получения маслосемян [Электрон. ресурс] // АгроЭкоИнфо: Электронный научно-производственный журнал. – 2021. – №4. – Режим доступа: http://agroecoinfo.ru/STATYI/2021/4/st_412.pdf.
DOI: <https://doi.org/10.51419/202144121>.