CIÊNCIAS DA SAÚDE: APRENDIZADOS, ENSINO E PESQUISA NO CENÁRIO CONTEMPORÂNEO

VOLUME I

ORGANIZADORES
NEUDSON JOHNSON MARTINHO
CAROLINA CARBONELL DEMORI
JOÃO VITOR ANDRADE

EDITORA
LAMPLLA

CIÊNCIAS DA SAÚDE: APRENDIZADOS, ENSINO E PESQUISA NO CENÁRIO CONTEMPORÂNEO

VOLUME I

ORGANIZADORES
NEUDSON JOHNSON MARTINHO
CAROLINA CARBONELL DEMORI
JOÃO VITOR ANDRADE

EDITORA
LAMPLLA

2021 - Editora Amplla

Copyright © Editora Amplla

Editor Chefe: Leonardo Pereira Tavares

Design da Capa: Editora Amplla

Projeto Gráfico: Editora Amplla

Diagramação: Higor Costa de Brito

Ciências da saúde: aprendizados, ensino e pesquisa no cenário contemporâneo está licenciado sob CC BY 4.0.

Esta licença exige que as reutilizações deem crédito ao criador. Ele permite que os reutilizadores distribuam, remixem, adaptem e construam o material em qualquer meio ou formato, mesmo para fins comerciais.

O conteúdo da obra e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade exclusiva dos autores, não representando a posição oficial da Editora Amplla. É permitido o download da obra e o compartilhamento desde que sejam atribuídos créditos aos autores. Todos os direitos para esta edição foram cedidos à Editora Amplla.

ISBN: 978-65-88332-51-1

DOI: 10.51859/amplla.csa511.1121-0

Editora Amplla

Campina Grande – PB – Brasil

contato@ampllaeditora.com.br

www.ampllaeditora.com.br

CONSELHO EDITORIAL

Andréa Cátia Leal Badaró – Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Andréia Monique Lermen – Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Antonieile Silvana de Melo Souza – Universidade Estadual do Ceará
Bergson Rodrigo Siqueira de Melo – Universidade Estadual do Ceará
Bruna Beatriz da Rocha – Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais
Caio César Costa Santos – Universidade Federal de Sergipe
Carina Alexandra Rondini – Universidade Estadual Paulista
Carla Caroline Alves Carvalho – Universidade Federal de Campina Grande
Carlos Augusto Trojaner – Prefeitura de Venâncio Aires
Carolina Carbonell Demori – Universidade Federal de Pelotas
Cícero Batista do Nascimento Filho – Universidade Federal do Ceará
Clécio Danilo Dias da Silva – Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Daniela de Freitas Lima – Universidade Federal de Campina Grande
Denise Barguil Nepomuceno – Universidade Federal de Minas Gerais
Dylan Ávila Alves – Instituto Federal Goiano
Edson Lourenço da Silva – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
Elane da Silva Barbosa – Universidade Estadual do Ceará
Érica Rios de Carvalho – Universidade Católica do Salvador
Gilberto de Melo Junior – Instituto Federal do Pará
Higor Costa de Brito – Universidade Federal de Campina Grande
Italan Carneiro Bezerra – Instituto Federal da Paraíba
Ivo Batista Conde – Universidade Estadual do Ceará
Jaqueline Rocha Borges dos Santos – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Jessica Wanderley Souza do Nascimento – Instituto de Especialização do Amazonas
João Henriques de Sousa Júnior – Universidade Federal de Santa Catarina
João Manoel Da Silva – Universidade Federal de Alagoas
João Vitor Andrade – Universidade de São Paulo
Joilson Silva de Sousa – Instituto Federal do Rio Grande do Norte
José Cândido Rodrigues Neto – Universidade Estadual da Paraíba
Jose Henrique de Lacerda Furtado – Instituto Federal do Rio de Janeiro
Josenita Luiz da Silva – Faculdade Frassinetti do Recife
Josiney Farias de Araújo – Universidade Federal do Pará
Karina de Araújo Dias – SME/Prefeitura Municipal de Florianópolis
Laíze Lantyer Luz – Universidade Católica do Salvador
Lindon Johnson Pontes Portela – Universidade Federal do Oeste do Pará
Lucas Capita Quarto – Universidade Federal do Oeste do Pará
Lúcia Magnólia Albuquerque Soares de Camargo – Unifacisa Centro Universitário
Luciana de Jesus Botelho Sodré dos Santos – Universidade Estadual do Maranhão
Luís Paulo Souza e Souza – Universidade Federal do Amazonas
Luiza Catarina Sobreira de Souza – Faculdade de Ciências Humanas do Sertão Central
Manoel Mariano Neto da Silva – Universidade Federal de Campina Grande
Marcelo Alves Pereira Eufrazio – Centro Universitário Unifacisa
Marcelo Williams Oliveira de Souza – Universidade Federal do Pará
Marcos Pereira dos Santos – Faculdade Rachel de Queiroz
Marcus Vinicius Peralva Santos – Universidade Federal da Bahia
Marina Magalhães de Moraes – Universidade Federal de Campina Grande
Nadja Maria Mourão – Universidade do Estado de Minas Gerais
Natan Galves Santana – Universidade Paranaense
Nathalia Bezerra da Silva Ferreira – Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
Neide Kazue Sakugawa Shinohara – Universidade Federal Rural de Pernambuco
Neudson Johnson Martinho – Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso
Patrícia Appelt – Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Paulo Henrique Matos de Jesus – Universidade Federal do Maranhão
Rafael Rodrigues Gomides – Faculdade de Quatro Marcos
Reângela Cíntia Rodrigues de Oliveira Lima – Universidade Federal do Ceará
Rebeca Freitas Ivanicska – Universidade Federal de Lavras
Renan Monteiro do Nascimento – Universidade de Brasília
Ricardo Leoni Gonçalves Bastos – Universidade Federal do Ceará
Rodrigo da Rosa Pereira – Universidade Federal do Rio Grande
Sabrynna Brito Oliveira – Universidade Federal de Minas Gerais
Samuel Miranda Mattos – Universidade Estadual do Ceará
Shirley Santos Nascimento – Universidade Estadual Do Sudoeste Da Bahia
Silvana Carloto Andres – Universidade Federal de Santa Maria
Silvio de Almeida Junior – Universidade de Franca
Tatiana Paschoalette Rodrigues Bachur – Universidade Estadual do Ceará
Telma Regina Stroparo – Universidade Estadual do Centro-Oeste
Thayla Amorim Santino – Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Virgínia Maia de Araújo Oliveira – Instituto Federal da Paraíba
Virginia Tomaz Machado – Faculdade Santa Maria de Cajazeiras
Walmir Fernandes Pereira – Miami University of Science and Technology
Wanessa Dunga de Assis – Universidade Federal de Campina Grande
Wellington Alves Silva – Universidade Estadual de Roraima
Yáscara Maia Araújo de Brito – Universidade Federal de Campina Grande
Yasmin da Silva Santos – Fundação Oswaldo Cruz
Yuciara Barbosa Costa Ferreira – Universidade Federal de Campina Grande

2021 - Editora Amplla

Copyright © Editora Amplla

Editor Chefe: Leonardo Pereira Tavares

Design da Capa: Editora Amplla

Projeto Gráfico: Editora Amplla

Diagramação: Higor Costa de Brito

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Sueli Costa CRB-8/5213

Ciências da saúde [livro eletrônico]: aprendizados, ensino e pesquisa no cenário contemporâneo / organização Neudson Johnson Martinho, Carolina Carbonell Demori, João Vitor Andrade. Campina Grande : Editora Amplla, 2021.
2 V.

Formato: PDF

ISBN: 978-65-88332-51-1 (Volume 1)

ISBN: 978-65-88332-52-8 (Volume 2)

1. Medicina 2. Enfermagem 3. Odontologia 4. Farmacologia
5. Psicologia 6. Epidemiologia I. Martinho, Neudson Johnson
II. Demori, Carolina Carbonell III. Andrade, João Vitor
IV. Título

CDD-610.6

Índices para catálogo sistemático:

1. Profissionais de saúde 610.6

Editora Amplla
Campina Grande – PB – Brasil
contato@ampllaeditora.com.br
www.ampllaeditora.com.br

PREFÁCIO

Novos desafios surgem a cada dia na área de saúde, os quais vem demonstrando que somente a partir da confluência de saberes e fazeres das diversas áreas do conhecimento os sistemas de saúde estarão fortalecidos para o enfrentamento deles, tendo em vista a complexidade das ações que se fazem necessárias em todos os níveis de atenção: primário, secundário e terciário.

As rápidas mudanças epidemiológicas e demográficas, concomitante ao surgimento de pandemias e recrudescimento de doenças transmissíveis e não transmissíveis no mundo, evocam novos olhares e fazeres que requerem transformações desde a formação dos profissionais, produção de conhecimentos com vistas à processos de trabalhos colaborativos nos serviços de saúde, nos quais ocorram uma compreensão quanto a complementariedade dos diversos saberes e fazeres que compõem a equipe de saúde, desconstruindo a cultura das ações sobrepostas ou, a falácia que algumas profissões são mais importantes e portanto, hegemônicas frente as outras.

O mundo é complexo e dinâmico, logo, os seres humanos que nele existem também o são em suas dimensões existenciais considerando que estão imbricados no mundo e, por esta característica fenomenológica, o saber / fazer de uma única profissão jamais será capaz de compreender e atender as complexas necessidades factuais destes seres em todo o seu ciclo vital, tendo em vista a imprevisibilidades e incertezas oriundas delas.

Com base nas afirmações supracitadas e partindo do princípio de que o trabalho em saúde não tem um produto concreto final, sendo seu resultado consequência das relações profissionais e interpessoais que subjazem suas ações de cuidado e não apenas resultante do saber/fazer de um único profissional, é importante enfatizar que toda a centralidade do processo de trabalho em saúde deve ser o usuário e suas complexas necessidades, as quais só poderão ser realmente atendidas com um cuidado interprofissional / colaborativo.

Portanto, mudanças no *modus operandi* e *modus faciendi* na formação dos profissionais de saúde e no processo de trabalho suscitam o desenvolvimento de novas competências e habilidades que devem permear a arte de ensinar, pesquisar e

extensionar, reverberando no verdadeiro trabalho em equipe nos serviços de saúde, algo somente alcançável através da implementação de uma educação interprofissional nas universidades e cursos técnicos, assim como, a criação de políticas indutoras para o trabalho colaborativo, no qual os diversos saberes e fazeres profissionais sejam valorizados e reconhecidos quanto sua importante complementariedade, visando decisões terapêuticas compartilhadas no atendimento às necessidades de saúde no contexto mundial vigente frente a pandemia de COVID-19 e outras demandas biopsicossociais de cuidado humano.

Nesta perspectiva, pensar em ciências da saúde é refletir sobre novos aprendizados, novas metodologias de ensino e novas formas de pesquisar em um cenário contemporâneo que desvela um mix de processos antigos que recrudescem e novos que surgem, apontando a urgência de novas tomadas de decisões, as quais sejam rápidas e eficazes em responder às complexas necessidades dos usuários do sistema de saúde, contribuindo para o resgate e manutenção da qualidade de vida.

Desejamos a todos uma profícua leitura desta obra, a qual pela diversidade de temáticas abordadas, permitirá ao leitor não somente uma leitura do mundo sob o prisma dos autores ao socializarem os resultados alcançados em seus estudos, mas, sobretudo, poderá instigá-lo de certa forma à “reescrevê-lo”, no sentido de transformá-lo a partir da apreensão e ressignificação de conhecimentos contidos nas diferentes pesquisas que corporificam este e-book, permitindo um movimento de cruzamento e interdependência entre variadas competências.

Neudson Johnson Martinho

Enfermeiro; Doutor em Educação; Mestre em Enfermagem em Saúde Comunitária; Especialista em Docência na Saúde; Professor Associado da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)

SUMÁRIO

CAPÍTULO I - O PAPEL DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: PERCEPÇÃO DE USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	11
CAPÍTULO II - O COTIDIANO DE TRABALHO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: SENTIMENTOS E LAÇOS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	23
CAPÍTULO III - OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM PRIMEIROS SOCORROS PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA	37
CAPÍTULO IV - A PROMOÇÃO DA SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: REFLEXÕES E APRENDIZADO	46
CAPÍTULO V - SAÚDE MENTAL DOS ALUNOS DE GRADUAÇÃO NA PANDEMIA DE COVID-19	62
CAPÍTULO VI - ATUAÇÃO DISCENTE NA ELABORAÇÃO DE UM WORKSHOP SOBRE SAÚDE MENTAL PARA PRÉ-VESTIBULANDOS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19	77
CAPÍTULO VII - DOCÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR EM SAÚDE EM TEMPOS DE PANDEMIA PELA COVID-19	91
CAPÍTULO VIII - METODOLOGIA DE APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS: SAÚDE E <i>FAKE NEWS</i> SOBRE COVID-19	101
CAPÍTULO IX - FILIAÇÃO DISCENTE A ONG INTERNACIONAL REPRESENTATIVA DE ESTUDANTES DE MEDICINA NO CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19	117
CAPÍTULO X - VIVÊNCIAS NA MONITORIA: A IMPORTÂNCIA DAS METODOLOGIAS ATIVAS NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NO CAMPO DA SAÚDE	126
CAPÍTULO XI - EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL E PRÁTICA COLABORATIVA: VISÃO DE ACADÊMICOS DOS CURSOS DA SAÚDE	135
CAPÍTULO XII - O ENSINO A DISTÂNCIA NA FORMAÇÃO MÉDICA	152
CAPÍTULO XIII - LIGA ACADÊMICA DE ESTOMATOPATOLOGIA: ATUAÇÃO NO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19	162
CAPÍTULO XIV - AVALIAÇÃO DO GRAU DE SATISFAÇÃO DE ALUNOS EM EVENTOS REMOTOS NA ÁREA DA ESTOMATOPATOLOGIA	175
CAPÍTULO XV - A UTILIZAÇÃO DA OZONIOTERAPIA APLICADA PARA FINS ESTÉTICOS SAUDÁVEIS	187
CAPÍTULO XVI - FARMACOVIGILÂNCIA EM TEMPOS DE PANDEMIA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA	200
CAPÍTULO XVII - INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM FRENTE ÀS PRINCIPAIS TAXONOMIAS APLICADAS AO PACIENTE DE COVID-19 NA TERAPIA INTENSIVA	214
CAPÍTULO XVIII - ASSISTÊNCIA DO ENFERMEIRO EMERGENCISTA FRENTE A PANDEMIA DA COVID-19: UMA REVISÃO INTEGRATIVA	226

CAPÍTULO XIX - O IMPACTO DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS: DESAFIOS ECONÔMICOS E MENTAIS.....	243
CAPÍTULO XX - CENÁRIO SOBRE A VIDA DO INDIVÍDUO COM DIABETES MELLITUS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19.....	255
CAPÍTULO XXI - PREDISPOSIÇÃO À INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS (SARS-COV-2) E A DEFICIÊNCIA DE VITAMINA D: EXISTE UMA RELAÇÃO?	267
CAPÍTULO XXII - ANÁLISE ESPACIAL DA VACINAÇÃO DA COVID-19 NO ESTADO DA PARAÍBA	276
CAPÍTULO XXIII - ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA E O RASTREIO DE VACINAÇÃO DE SARAMPO NO BRASIL DURANTE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (SARS-COV-2) NO ANO DE 2020	286
CAPÍTULO XXIV - SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ RELACIONADA À COVID-19	298
CAPÍTULO XXV - SÍNDROME HIPERTENSIVA GESTACIONAL E SUAS IMPLICAÇÕES AO BINÔMIO	313
CAPÍTULO XXVI - USO DE PSICOFÁRMACOS DURANTE A GRAVIDEZ: UMA REVISÃO INTEGRATIVA	324
CAPÍTULO XXVII - O USO DA ASPIRINA E DO CÁLCIO NA PROFILAXIA DA PRÉ-ECLÂMPSIA NO PRÉ-NATAL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA.....	334
CAPÍTULO XXVIII - ANÁLISE DAS TÉCNICAS DE EXPIRAÇÃO LENTA EM RECÉM NASCIDOS INTERNOS EM UTI NEONATAL	351
CAPÍTULO XXIX - FATORES ECONÔMICOS, HABITACIONAIS E EDUCACIONAIS EM CRIANÇAS HOSPITALIZADAS POR DOENÇAS RESPIRATÓRIAS	361
CAPÍTULO XXX - HIPERCALEMIA E A ADMINISTRAÇÃO DE CLORETO DE POTÁSSIO EM CRIANÇAS – REVISÃO SISTEMÁTICA.....	372
CAPÍTULO XXXI - DESENVOLVIMENTO DE LIVRO COM ATIVIDADES LÚDICAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL EM SAÚDE E MEIO AMBIENTE.....	387
CAPÍTULO XXXII - O USO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS LEVE-DURA NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CRIANÇA	400
CAPÍTULO XXXIII - OCORRÊNCIA DE BACTÉRIAS RESISTENTES À ANTIBIÓTICOS: UMA ANÁLISE EM SEUS MECANISMOS	408
CAPÍTULO XXXIV - SOROPOSITIVIDADE: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA DOENÇA APÓS O IMPACTO DO DIAGNÓSTICO	421
CAPÍTULO XXXV - FREQUÊNCIA E CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DA ANEMIA NOS ADULTOS ATENDIDOS EM UM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EM FORTALEZA-CE	435
CAPÍTULO XXXVI - PERFIL DE SENSIBILIDADE DE BACTÉRIAS ISOLADAS DA UROCULTURA DE PACIENTES DE UM LABORATÓRIO PRIVADO DE ANÁLISES CLÍNICAS NO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG.....	447
CAPÍTULO XXXVII - BENEFÍCIOS NUTRICIONAIS DO LEITE DE JUMENTA PARA CRIANÇAS ALÉRGICAS A PROTEÍNA DO LEITE DE VACA.....	463

CAPÍTULO XXXVIII - PREVALÊNCIA DE HIPERTENSÃO E PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS POR UMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM TEIXEIRA DE FREITAS – BA.....	472
--	------------

CAPÍTULO I

O PAPEL DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: PERCEPÇÃO DE USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

DOI: 10.51859/amplla.csa511.1121-1

Beatriz Santana Caçador ¹
Rejany Rodrigues Fontes ²
Gian Batista Carmo ³
Thalyta Cássia de Freitas Martins ⁴
Poliana Miranda ⁵
Ramon Augusto de Souza Ferreira ⁶

¹ Professora Adjunta do Departamento de Medicina e Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa

² Enfermeira da Estratégia Saúde da Família de Paula Cândido - MG

³ Enfermeiro Gerente do Centro Estadual de Atenção Especializada de Viçosa - MG

⁴ Doutoranda do Programa de Saúde Pública na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)

⁵ Residente em Enfermagem em Terapia Intensiva Oncológica no Hospital do Câncer de Barretos - SP

⁶ Mestrando em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Viçosa

RESUMO

Objetivo: Compreender a percepção de usuários do Sistema Único de Saúde sobre o papel do agente comunitário de saúde. **Métodos:** Estudo de natureza qualitativa realizado em uma cidade da zona da mata mineira. Participaram 14 usuários cadastrados em 14 Estratégia Saúde da Família, sendo um de cada comunidade. A coleta de dados ocorreu por meio de entrevista aberta orientada por roteiro semiestruturado. A entrevista foi gravada e transcrita na íntegra, e preservado o anonimato dos participantes. Realizada análise de conteúdo de Bardin (2011). A pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética (Parecer: 1135193). **Resultados:** Emergiu uma categoria temática: “O papel do agente comunitário de saúde: entre ressonâncias e distanciamentos”. Evidencia-se que, embora ainda existam distorções na percepção dos usuários acerca das atribuições que competem aos ACS, é possível perceber avanços no reconhecimento do papel deste profissional bem como de sua importância. **Conclusão:** É fundamental melhorar as condições de trabalho dos agentes comunitários para que seja possível realizar suas atribuições e, assim, fortalecer seu reconhecimento perante os usuários.

Palavras-chave: Agentes Comunitários de Saúde. Papel Profissional. Sistema Único de Saúde.

1. INTRODUÇÃO

A construção do Sistema Único de Saúde (SUS) tem como contexto o processo de redemocratização do Brasil e superação da ditadura militar. Assim, a criação do SUS pertence a uma trama de configuração social que ultrapassa o setor saúde, constituindo-

se como um processo de consolidação da cidadania e da justiça social (BISPO JÚNIOR, 2020).

Das grandes transformações mobilizadas pela criação do SUS, destacam-se as reconfigurações ideológicas, organizativas e jurídicas estabelecidas pelos seus princípios e diretrizes. Deste modo, o SUS traz como prerrogativa, a existência em todo território nacional, de um sistema de saúde público, de qualidade e universal, comprometido com as necessidades de saúde e direitos sociais da população (MENEZES; MORETTI; REIS, 2019).

Como forma de operacionalizar as mudanças advindas do SUS, criou-se a Estratégia Saúde da Família (ESF), compreendida como principal dispositivo para a organização do modelo de atenção proposto pelo SUS. A ESF constitui-se, como uma forma de reestruturar a atenção primária e possui como foco a ação na família, abordando o seu ambiente físico e social. Baseia-se na participação de toda a comunidade juntamente com a equipe, onde buscam juntos, identificar os agravos de saúde, definir prioridades e traçar os planos de cuidados que melhor se adaptem ao usuário, tornando-o capaz de elaborar o seu próprio autocuidado (CAÇADOR et al., 2015).

No âmbito da ESF, há que se destacar a atuação do Agente Comunitário de Saúde (ACS) por tratar-se de um membro da equipe cujas práticas possuem a singularidade de transitar entre o saber popular e o saber técnico da saúde. Isto porque o ACS é morador da comunidade e sua principal função é constituir-se como um elo entre a equipe de saúde e a comunidade (BEZERRA; FEITOSA, 2018).

O trabalho do ACS tem como potência sua inserção integral na comunidade pelo fato de a ela pertencer. Assim, é um trabalhador com competência para identificar as reais necessidades da população bem como conhecer seu contexto de vida social, afetivo, cultural e familiar. Porém, por tratar-se de uma atribuição recente, a literatura evidencia que os usuários não conhecem seu papel (JESUS et al., 2014).

Considerando que o ACS é um trabalhador novo no contexto das práticas em saúde e, que seu papel ainda está sendo construído no conjunto das representações dos gestores, trabalhadores e usuários, surge a inquietação: qual a percepção do usuário sobre o papel do ACS?

Tem-se como pressuposto que a compreensão sobre a percepção dos usuários acerca do papel do ACS pode contribuir para identificar aproximações e distanciamentos em relação ao fazer do ACS na comunidade e, desta forma, sinalizar para necessárias melhorias em seu processo de trabalho.

Nesse sentido, o objetivo do presente estudo foi compreender a percepção de usuários do SUS sobre o papel do ACS.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Estudo de natureza qualitativa que teve como objeto de análise a percepção dos usuários do SUS sobre o papel do ACS. Dada a subjetividade do fenômeno em questão, escolheu-se a abordagem qualitativa uma vez que, segundo Proetti (2017) este caminho metodológico é coerente quando se pretende compreender fenômenos subjetivos e analisar os fatos investigados em seu contexto.

O cenário do estudo são comunidades atendidas pela Estratégia Saúde da Família do município em que a pesquisa foi realizada. Neste município, a ESF foi implantada em 1997 e, na atualidade conta com 18 equipes e a estimativa é de que haja cobertura de 67% da população de 73.863 mil habitantes. A escolha das unidades ocorreu de modo aleatório.

Os participantes do estudo foram 14 usuários cadastrados em equipes de ESF do município. Os usuários também foram escolhidos de modo aleatório na sala de espera da unidade de saúde da família. As entrevistas foram realizadas na ESF e também no domicílio do usuário, conforme sua preferência.

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista aberta orientada por roteiro semiestruturado durante os meses de fevereiro a abril de 2018. As entrevistas foram gravadas e transcritas na íntegra. A coleta de dados foi encerrada pelo critério de saturação dos dados conforme Minayo (2017).

Os dados foram analisados mediante técnica de análise de conteúdo de Bardin (2016). Foram realizados os três pólos cronológicos de modo que se procedeu a pré-análise dos dados, sua exploração e, por fim, o tratamento dos dados, etapa em que foram feitas inferências e interpretações.

Os aspectos éticos que envolvem as pesquisas com seres humanos foram respeitados e a pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética e pesquisa com seres humanos sob o Parecer 1135193, em consonância com a Resolução 466/12 (BRASIL, 2012). Aos participantes foi entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e seu anonimato foi preservado. Os usuários participantes do estudo foram identificados seguindo uma numeração que corresponde à ordem das entrevistas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. "O PAPEL DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: ENTRE RESSONÂNCIAS E DISTANCIAMENTOS"

As percepções dos usuários participantes deste estudo acerca do papel do ACS transitam entre o conhecimento e desconhecimento sobre o fazer deste profissional, ora reforçando as atribuições previstas na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), ora evidenciando distorções em relação à prática do ACS.

O Ministério da Saúde na Política Nacional de Atenção Básica (2017) discorre quais são as atribuições do ACS e, algumas delas, foram citadas pelos usuários deste estudo de forma coerente com o que está previsto na normativa (BRASIL, 2017). Os relatos a seguir ilustram essa compreensão quando o usuário reconhece como sendo o papel do ACS à realização de visita domiciliar (VD), a promoção da saúde e a prevenção de doenças:

[...] elas fazem a visita porque assim elas conseguem ver quem tá precisando de alguma coisa ou não [...] (E4)

[...] Ué, o papel do agente comunitário de saúde é promover a saúde na comunidade, como diz o nome né?! [...] [...]foi... foi muito através disso que conseguiu se erradicar muitas doenças né?! [...] (E 10)

[...] O principal objetivo do Agente Comunitário de Saúde, é a prevenção, 'né' das 'doença'. Enfim, a profissão tem o objetivo de controlar as capacitações epidemiológicas de toda a Saúde Pública[...] E essas funções aí dentro da comunidade, falei, o principal objetivo é a prevenção e o monitoramento nessas áreas mais abrangidas, principalmente as doenças que surgem dentro da comunidade[...] (E 7)

A ressonância entre o papel deliberado pela política de saúde e a percepção dos usuários acerca deste papel confere importantes traços identitários ao

trabalho do ACS, uma vez que há um reconhecimento coletivo da natureza de sua prática. Estes achados encontram similaridade ao estudo de Andrade e Cardoso (2017) os quais reforçam a visita domiciliar, a atuação na prevenção de doenças e na promoção da saúde como lugar central de práticas dos ACS.

Na PNAB (2017) são descritas as atribuições específicas de cada categoria profissional dentro da ESF. Com isso, podem-se citar algumas das atribuições do ACS, com relevância ao estudo como: a realização de registros e/ou cadastros de indivíduos e famílias, realização de VD nos domicílios sob responsabilidade de cada ACS, considerando os critérios de riscos e de vulnerabilidade da família. Assim, há um direcionamento de que os mais necessitados sejam visitados com mais frequência, tendo a média de pelo menos uma visita por mês (BRASIL, 2017).

Durante a VD é que acontece a aproximação do ACS com as famílias, surgindo então à possibilidade de falar sobre a responsabilização destes usuários com a sua saúde, tendo como perspectiva alcançar a independência destas famílias ao cuidado da própria produção de saúde (CARLI et al., 2014)

Cardoso e Andrade (2017) evidenciam, em seu estudo, percepções do papel do ACS na perspectiva de profissionais da equipe, os quais reconhecem que na VD o ACS capta para toda a equipe a percepção mais real da família, por meio da qual a equipe consegue ter uma visão de um todo da família. Enfermeiros dizem que o ACS são os olhos e ouvidos da equipe dentro da comunidade.

Além disso, ACS deve realizar ações de promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos e vigilância à saúde, mantendo sempre a integração da comunidade com a ESF. Por meio do fazer do ACS que as famílias e/ou indivíduos serão acompanhados de modo longitudinal pela equipe da ESF (ANDRADE; CARDOSO, 2017).

Há que se destacar, ainda que os usuários do presente estudo reconhecem como papel do ACS a essência de sua prática: estabelecer elos entre a comunidade e a equipe e construir vínculos. Na ESF é necessário que o cuidado vá além de apenas procedimentos, à medida que o vínculo da equipe e principalmente do ACS com a comunidade e o usuário vai aumentando há ampliação do diálogo do ACS com a comunidade e/ou usuário. Este vínculo é muito percebido pelos usuários quando estes relatam sobre. Segue os relatos:

[...] um agente que tem um vínculo bom com a sua... com a comunidade e com a equipe, logicamente a qualidade de assistência vai estar envolvida nisso[...] (E 3)

[...] o ACS é mais amigo da comunidade... ele conhece, ele está dentro da casa do paciente, conhece toda a vida do paciente[...] (E14)

[...] Ah as facilidades dele é...Ele já ter vínculos na comunidade, dominar o território.[...] (E 13)

[...] Primeiro o ACS deve ter uma relação de confiança com a comunidade[...] (E 13)

[...] A amizade... O 'ACS' é mais amigo da comunidade do que a o resto da equipe aqui. Ele conhece, ele está dentro da casa do paciente, conhece toda a vida do paciente [...] (E 11)

[...]É... pra mim, o papel do Agente Comunitário de Saúde, ele é de suma importância, pois é ele que... é,... "tipo" assim é o mediador entre a comunidade e os serviços de saúde e é... se você tem Agente capacitado na sua equipe, um Agente que tem um vínculo bom com a sua... com a comunidade e com a equipe, logicamente a qualidade de assistência vai estar envolvida nisso, ou seja, se melhora o vínculo agente-comunidade e os serviços de saúde, melhor será a assistência. [...] (E 6)

De acordo com Jesus *et al.* (2014) constitui-se como papel do ACS realizar o elo do usuário, comunidade e a equipe de saúde da família mediante a inserção e contato próximo que o ACS tem com a comunidade por dela fazer parte. Deste modo, o ACS consegue compartilhar informações e criar laços de pertença com a família.

Por adentrarem na intimidade das famílias de modo permanente, os ACS criam vínculos afetivos e captam as reais necessidades de saúde da comunidade. A VD, prática rotineira do ACS, viabiliza este encontro mais próximo com as famílias. VD, que o ACS adquire um conhecimento das famílias do qual ele acompanha, sendo necessário realizar uma escuta qualificada para que seja possível conhecer a realidade daquela família e comunidade. Após esta VD o ACS deve repassar ao enfermeiro da EBS quais são as realidades observadas para que assim, o enfermeiro junto com o ACS possa realizar ações de promoção, prevenção e reabilitação naquele território (ALONSO; BÉGUINLL; DUARTE, 2018).

De modo consoante, o estudo de Carli *et.al* (2014) revela que as informações que o ACS possui da família nenhum outro profissional da equipe teria, e que há uma dificuldade destes usuários em compartilhar. O reconhecimento pela comunidade do real papel do ACS fortalece a prática deste profissional e sua valorização bem como

demarca seu campo de atuação, elemento tão importante para uma profissão ainda recente.

O ACS é um profissional que deve ser da comunidade, morar naquela localidade conforme previsto na Lei nº 11.350/06 (BRASIL, 2006) uma vez que, somente mediante tal inserção, será possível conhecer a realidade daquele local. Por meio da prática do ACS é possível descobrir e perceber quais as fragilidades e as potencialidades existentes naquela comunidade, e não esquecendo as bases culturais daquele local. Este privilégio faz com que a equipe consiga trabalhar da melhor forma para com a comunidade (BORNSTEIN; STOTZ, 2008).

O vínculo constitui-se, dessa forma, como estratégia mais potente no trabalho do ACS, viabilizando a oferta do cuidado de modo integral e efetivo por aproximar-se das necessidades das famílias. Mediante o vínculo, estabelece-se uma relação entre usuário e ACS de responsabilidade e confiança potentes para o cuidado (MARIN, MARCHIOLI, MORACVIK, 2013). Nesta dimensão é importante que o ACS trabalhe com a promoção de vínculo com a comunidade, fazendo com que este seja um facilitador do seu trabalho (JESUS et al., 2014).

De acordo Merhy (2002) e Cecílio (2001), o vínculo é o resultado de uma boa relação de confiança, e esta baseia-se em alguns princípios em que o ACS assume um caráter social dentro daquela comunidade, sustentando-se com a humanização, o acolhimento e o comprometimento partindo assim da sua responsabilização do cuidado que é acionado.

Jesus (2014) demonstra que é através do vínculo que os usuários criam os laços de amizade e confiança com o ACS, facilitando então a comunicação entre o ACS, as famílias e a comunidade.

Por meio do vínculo construído e fortalecido no cotidiano das práticas, o ACS consegue viabilizar a essência de seu trabalho na saúde: ser elo entre a comunidade e a equipe e viabilizar o fluxo de informações para produção do cuidado.

[...] É... é levando informação, 'né', no caso, informação da saúde e também acolhendo, 'né', as pessoas no caso o membro da equipe, o Agente de Saúde, é... faz 'tipo', no caso aí um elo de informação entre a saúde e a comunidade[...] (E 9)

[...] E no caso, o Agente Comunitário de Saúde é um elo, 'né', um elo de informação. Diante disso, acho que a profissão aí do Agente Comunitário é

de extrema importância no caso aí, é... diante da Saúde aí, de todos, da comunidade[...] (E 7)

O ACS explicitando uma de suas funções, que é de ser o elo entre a comunidade e a equipe de saúde, realizando aqui um contato permanente com a comunidade e realizando uma ponte entre o saber científico da equipe e o saber popular da comunidade (SPERONI *et al.*, 2016).

Com relação às percepções dissonantes acerca do papel do ACS, destaca-se o não reconhecimento deste papel pela ausência do ACS na rua do usuário. Essa ausência pode ser devida a realidade do município em que muitas áreas estão descobertas e sem quantitativo de ACS suficiente para acompanhar as famílias. Deste modo, ainda que a comunidade tenha uma equipe de saúde da família de referência, não há quantitativo de ACS suficiente para garantir a cobertura de acesso.

Também pode estar relacionado ao fato de muitos ACS's não conseguirem sair da unidade em decorrência de atribuições administrativas que assumem na dinâmica da ESF para suprir a ausência de auxiliares de administração.

Há, pois, na realidade estudada um desconhecimento acerca do papel do ACS em virtude da ausência deste profissional na rua em que alguns dos participantes residem conforme pode ser evidenciado nas falas abaixo:

[...] aqui em casa não passa ninguém [...]. (E 4)

[...] Não vem Agente de Saúde aqui, não. Na rua aqui, 'tipo' assim, é... Depois, 'tipo' assim, quando a... (nome da ACS) estava aqui, era excelente. Aí vinha a... (nome da ACS). Depois que a... (nome da ACS) foi embora ninguém vem mais aqui [...]. (E 5)

[...] não... Eu, assim, por causa da minha rua que não tem agente, né?! Fica mais difícil de saber de tudo [...]. (E14)

[...] Eu não tenho muito contato assim, com esse posto. Tô tendo agora, né?! Que eu estou gestante. Mas, pelo que eu tô vendo, tem assim uma importância de...de... como é que eu te explico? De levar pra nós, de trazer pra nós a..aah... tudo o que a gente tá precisando, as consultas, minha ultrassom[...] (E 2)

De acordo com a Portaria nº 2.355 de 10 de outubro de 2013 do Ministério da saúde (BRASIL, 2013), cada equipe de ESF deverá cobrir no máximo 4.000 pessoas. Já a Portaria nº 2.488 de 2011 (BRASIL, 2011), discorre que um ACS deve atender no máximo a 750 pessoas. Para isso, é necessário que o ACS mantenha seu cadastrado a apenas uma equipe de ESF e trabalhe 40 horas semanais. Mesmo sabendo dessas deliberações

do MS, de acordo com Alonso *et al.* (2018) há várias ESF's que possuem áreas descobertas, fazendo com que os ACS's destas unidades fiquem sobrecarregados, implicando então o número insuficiente de ACS para tal área de abrangência da ESF.

De acordo com Nogueira (2019) o trabalho do ACS é marcado por precarização, desvalorização e desvios de função as quais são apresentadas em forma de perfil esperado do trabalhador e características reconhecidas como necessárias, tais como polivalência, colaboração e flexibilidade. A pouca autonomia decorrente de vínculos empregatícios frágeis também contribui para que os ACS sejam alocados em atividades que não lhes competem.

Nogueira (2019) argumenta, ainda, que os desvios de função no trabalho dos ACS produzem um processo de estranhamento neles em relação ao próprio fazer o qual, por sua vez, fragiliza seus laços de pertença profissional e fortalece representações dissonantes de seu trabalho para a comunidade.

Diante do exposto, há o reconhecimento por parte dos usuários de quais são atribuições do ACS, aquelas que estão previstas na PNAB do MS, destacando-se os centrais como realizar visitas domiciliares, constituir-se como elo entre a equipe de saúde e comunidade e implementar práticas de promoção da saúde e prevenção de agravos. Ademais, reconhecem que o trabalho do ACS é tecido mediante a produção de vínculos de afeto com as famílias e comunidade.

Contudo, devido às fragilidades relacionadas a organização do processo de trabalho na saúde do município cenário deste estudo, pode influenciar na percepção distorcida acerca do papel do ACS uma vez que não conseguem desempenhar seu papel de modo integral.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo permitiu compreender as percepções dos usuários de um município do interior de Minas Gerais acerca do papel do ACS, revelando que tais percepções transitam entre o reconhecimento de seu fazer bem como não reconhecimento de sua prática.

Em relação ao reconhecimento por parte dos usuários, destaca-se a identificação de atribuições que são centrais na prática do ACS como: visita domiciliar, ser o elo entre a equipe e a comunidade e atuar na promoção da saúde e prevenção de agravos.

No que tange às percepções que se distanciam da prática do ACS, importa ressaltar que a ausência do ACS nas visitas domiciliares prejudica o reconhecimento de seu papel por parte da comunidade. Essa ausência decorre, muitas vezes, de precarização do processo de trabalho deste profissional que, ao ser desviado de função, não executa seu próprio papel.

É fundamental aos gestores e coordenadores de equipe garantirem condições materiais de trabalho aos ACS que lhes permita desempenhar seus papéis e fortalecer seu reconhecimento perante os usuários do serviço de saúde. Ademais, garantir que a prática do ACS aconteça é contribuir para a consolidação do SUS e de seus princípios.

REFERÊNCIAS

- BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. Tradução Luís Antero Reto,. Augusto Pinheiro. -- São Paulo: Edições 70, 2016. 3 reimp. da 1ª edição de 2016.
- BEZERRA, Y.R.N.; FEITOSA, M. Z. S.. A afetividade do agente comunitário de saúde no território: um estudo com os mapas afetivos. **Ciênc. saúde coletiva** [online]. 2018, vol.23, n.3
- BISPO JÚNIOR, J.P.; MORAIS, M.B. Democracia e Saúde: reflexões e desafios frente à 16ª Conferência Nacional de Saúde. **Rev Saude Publica**. 2020;54:16.
- BORNSTEIN, V.J.;STOTZ, E.N. O Trabalho dos agentes comunitários de saúde: entre a mediação convencidora e a transformadora. **Trab. educ. saúde** [online]. 2008, vol.6, n.3
- BRASIL. **Resolução nº466, de 12 de Dezembro de 2012**. Dispõe sobre Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa envolvendo Seres Humanos. Diário Oficial da União. 12 dez 2012
- BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017**. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. 21 set 2017
- BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011**. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família

(ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (Pacs). Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. 21 out 2011

BRASIL. **Lei nº 11.350, de 05 de Outubro de 2006**. Regulamenta o § 5o do art. 198 da Constituição, dispõe sobre o aproveitamento de pessoal amparado pelo parágrafo único do art. 2º da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. 05 out 2006

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria nº2.355, de 10 de Outubro de 2013**. Altera a fórmula de cálculo do teto máximo das Equipes de Saúde da Família. Diário Oficial da União. 10 out 2013.

CACADOR, Beatriz Santana et al. Ser enfermeiro na estratégia de saúde da família: desafios e possibilidades. **Reme : Rev. Min. Enferm.** [online]. 2015, vol.19, n.3

CARLI, R.; COSTA, M.C.; SILVA, E.B.; RESTA, D.G.; COLOMÉ, I.C.S. Acolhimento e vínculo nas concepções e práticas dos agentes comunitários de saúde. **Texto contexto - enferm.** [conectados]. 2014, vol.23, n.3

CECÍLIO, L.C.O. As necessidades de saúde como conceito estruturante na luta pela integralidade e equidade na atenção em saúde. In: PINHEIRO, R.; MATTOS, R.A. **Os sentidos da integralidade na atenção e no cuidado em saúde**. Rio de Janeiro, IMS ABRASCO, 2001. P.113-126.

JESUS, A.S.; SANTOS, F.P.A.; RODRIGUES, V.P.; NERY, A.A.; MACHADO, J.C.; COUTO, T.A. Atuação do agente comunitário de saúde: conhecimento de usuários. **Rev enferm UERJ**, Rio de Janeiro, 2014 mar/abr; 22(2):239-44.

MARIN, M.J.S.; MARCHIOLI, M. e MORACVICK, M.Y.A.D.. Fortalezas e fragilidades do atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Tradicionais e nas unidades da Estratégia Saúde da Família na perspectiva dos usuários. **Texto contexto - enferm.** [conectados]. 2013, vol.22, n.3

MERHY E.E. Saúde: **A cartografia do trabalho vivo**. 3ªEd. São Paulo: Editora Hucitec; 2002.

MENEZES, A.P.R.; MORETTI, B; REIS, A.A.C. O futuro do SUS: impactos das reformas neoliberais na saúde pública – austeridade versus universalidade. **Saúde Debate** | Rio De Janeiro, v. 43, n. Especial 5, p. 58-70, dez 2019

MINAYO, M. C. S. Amostragem e saturação em pesquisa qualitativa: consensos e controvérsias. **Revista Pesquisa Qualitativa. São Paulo (SP)**, v.5, n. 7, p. 01-12, abril. 2017

NOGUEIRA, M.L. Expressões da precarização no trabalho do agente comunitário de saúde: burocratização e estranhamento no trabalho. **Saude soc.** 28 (3) 07 Out 2019Jul-Sep 2019

PROETTI, S. As pesquisas qualitativa e quantitativa como métodos de investigação científica: um estudo comparativo e objetivo. **Revista Lumen.** v.2, n.4. 2017

SPERONI, K.S.; FRUET, I.M. A.; DALMOLIN, G. L.; LIMA, S. B. S. Percepções dos agentes comunitários de saúde: contribuições para a gestão em saúde. **Rev Cuid** 2016; 7(2): 1325-37

CAPÍTULO II

O COTIDIANO DE TRABALHO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: SENTIMENTOS E LAÇOS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL

DOI: 10.51859/ampla.csa511.1121-2

Beatriz Santana Caçador¹
Aline Elizabet Ribas Souza Cruz²
Isabela de Souza Santana³
Alan Ferreira de Freitas⁴
Daniela Peixoto Lorenzoni⁵
Ana Paula Mendes dos Santos⁶

¹ Enfermeira. Professora Adjunta do Departamento de Medicina e Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa – UFV

² Enfermeira da Unidade Básica de Saúde Araponga – Araponga MG

³ Graduanda do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa – UFV.

⁴ Cooperativista. Professor Adjunto do Departamento de Administração e Contabilidade da Universidade Federal de Viçosa – UFV

⁵ Enfermeira. Técnica de Nível Superior da Universidade Federal de Viçosa - UFV

⁶ Enfermeira Coordenadora de Enfermagem da AMA/ UBS integrada Jardim Tietê – São Paulo

RESUMO

Objetivo: compreender as vivências subjetivas do Agente Comunitário de Saúde no cotidiano de trabalho considerando os sentimentos experimentados e os laços de identificação profissional existentes. **Materiais e métodos:** Realizou-se pesquisa qualitativa, cujos participantes foram 14 ACS das ESF de Viçosa-MG. A coleta de dados foi realizada mediante entrevista orientada por roteiro semiestruturado e os dados foram submetidos à Análise de Conteúdo. Os preceitos éticos de pesquisa com seres humanos foram respeitados. **Resultados e discussão:** O estudo evidenciou que os ACS compreendem o vínculo como principal atribuição por meio do qual experimentam sentimentos de prazer e sofrimento. Identificam-se com a comunidade, entretanto, consideram que morar na comunidade contribui para sobrecarga de trabalho. Além disso, observou-se a existência de laços de identificação profissional, afetivos e ideológicos, que fortalecem o vínculo com a comunidade e sua organização. **Conclusão:** A prática do ACS sofre influências dos sentimentos experimentados no cotidiano sendo necessária uma maior atenção dos gestores a essa subjetividade, a qual interfere diretamente na qualidade da assistência oferecida à comunidade bem como afeta a vida do trabalhador.

Palavras-chave: Enfermagem. Vínculo. Agentes Comunitários de Saúde. Trabalho.

1. INTRODUÇÃO

O processo de trabalho é o modo como são realizadas as atividades profissionais para obter um produto final. Na área da saúde, o processo de trabalho tem como singularidade a indissociabilidade entre o produto final (objeto do trabalho) e seu processo de feitura (RIBEIRO; PIRES, 2004).

O processo de trabalho em saúde no Brasil sofreu importantes transformações a partir do Movimento de Reforma Sanitária, em meados de 1970, o qual culminou com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS). O SUS promove, dessa forma, uma reconfiguração organizacional e paradigmática na concepção das políticas de saúde no Brasil e nos processos de trabalho a elas associados (ROCHA; ALMEIDA, 2000).

Assim, a partir do SUS, as práticas em saúde têm como eixo central o cuidado e uma concepção ampliada de saúde de modo que são necessários modos de pensar, fazer e gerir o sistema de saúde coerentes com tais prerrogativas ideológicas (MENEZES; MORETTI; REIS, 2019).

Tendo em vista a necessidade de traduzir as mudanças paradigmáticas impulsionadas pelo SUS em práticas cotidianas que transformem a realidade concreta dos serviços, o governo criou a Estratégia Saúde da Família (ESF) cujo objetivo é reorientar o modelo de atenção à saúde. Para tanto, a ESF sustenta-se em três vertentes: o território, a família e o processo de trabalho organizado por equipes multiprofissionais (CAÇADOR et al., 2015).

A equipe multiprofissional de uma ESF é formada por trabalhadores de diferentes formações profissionais e níveis de escolaridade. Há que se ressaltar a figura dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) por constituírem-se como atores fundamentais no contexto da saúde da família por estabelecerem o elo entre a equipe e a comunidade (BEZERRA; FEITOSA, 2018).

Para sustentar o vínculo com a comunidade, o Ministério da Saúde determina que o ACS deve residir na própria comunidade que trabalham, sendo os únicos trabalhadores da atenção primária à saúde que devem obrigatoriamente residir na área de atuação (BRASIL, 2012). A singularidade de trabalhar e morar na comunidade promove uma ligação de pertencimento uma vez que, as pessoas do seu meio social são as mesmas para quem dirige as suas ações de cuidado. Além disso, o ACS vivencia as

fragilidades da comunidade por dela fazer parte, compartilhando seu cotidiano tanto na dimensão material quanto simbólica e cultural (JARDIM et al., 2009).

O cotidiano é o lugar onde os indivíduos criam suas formas singulares e mais profundas de agir e se relacionar com as políticas deliberadas. Constroem, assim, seus modos subjetivos de traduzir em práticas concretas as deliberações normativas, produzindo as invenções cotidianas. As invenções cotidianas revelam o modo com o qual os sujeitos interpretam as políticas e criam suas maneiras de consumi-las e realizá-las (CERTEAU, 1998). Assim, o cotidiano é marcado por subjetividade, significados e sentimentos os quais, por sua vez, guiam as ações dos indivíduos.

Sentimentos básicos da vida humana como satisfação, saúde, bem-estar e qualidade de vida estão inscritos nos processos de trabalho, tornando o contexto laboral um ambiente propício à realização pessoal, relacionamento interpessoal e não apenas sustento (NUNES; LINS, 2009).

Tem-se como premissa que os sentidos e significações pertencem à vida coletiva e compõem a base das relações sociais, constituindo a dimensão simbólica da vida humana. É por meio do trabalho que ocorre o processo de socialização e o estabelecimento das ligações sociais e afetivas entre os trabalhadores. Sendo assim, é inerente ao homem a reflexão sobre si mesmo, o ato criador, a imaginação e a crítica bem como a potência de participar da transformação do mundo (CHANLAT, 2000).

São necessários estudos organizacionais que superem a abordagem antropológica reducionista a qual concebe o ser humano como entidade abstrata, objeto econômico e indivíduo destituído de afeto, de história e de cultura (CHANLAT, 2000).

Há que se aprofundar em análises que revelem as significações e os aspectos simbólicos de produção da prática profissional do agente comunitário. Sendo o enfermeiro líder da equipe multiprofissional na saúde da família, importa ampliar sua compreensão sobre as vivências subjetivas do ACS a fim de ser possível tecer um processo gerencial mais flexível e que promova o trabalho vivo em ato, isto é, a execução do trabalho o qual irá determinar a produção de cuidado (MARTINS et al., 2009).

Mediante o exposto, surge a inquietação com relação às vivências subjetivas dos agentes comunitários de saúde no contexto da saúde da família de um município do interior de Minas Gerais. Dessa forma, este estudo tem por objetivo conhecer as

vivências subjetivas do ACS em seu cotidiano de trabalho, considerando os sentimentos experimentados e os laços de identificação profissional existentes.

Acredita-se que o presente estudo pode contribuir para os gestores deliberarem processos de trabalho mais coerentes com a complexidade inscrita no cotidiano do agente comunitário de saúde.

2. METODOLOGIA

Estudo de natureza qualitativa haja vista que as vivências subjetivas dos ACS são objeto da pesquisa. O cenário do estudo foi 14 unidades de saúde da família de um município do interior de Minas Gerais. Os participantes foram 14 Agentes Comunitários de Saúde que trabalham no município, sendo um de cada equipe de ESF do município. Os participantes de cada equipe foram escolhidos pelos próprios agentes comunitários que indicavam quem seria o representante da equipe para contribuir com a pesquisa.

A coleta de dados foi realizada durante o mês de julho de 2015, por meio de entrevistas individuais abertas, orientadas por roteiro semiestruturado, as quais foram previamente agendadas mediante contato telefônico. Os dados foram transcritos na íntegra e analisados mediante a técnica de Análise de Conteúdo de Bardin (2011), na qual procura-se conhecer aquilo que está por trás do significado das palavras. A análise de conteúdo organiza-se em 3 fases distintas: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados, incluindo a inferência e interpretação dos dados (BARDIN, 2011).

A pesquisa foi autorizada pela Secretaria Municipal de Saúde do município cenário deste estudo e aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Viçosa, com protocolo de nº 44143615.2.0000.5153, a fim de respeitar os princípios éticos da pesquisa de acordo com a Resolução Conselho Nacional de Saúde 466/12. Os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e foram identificados seguindo a numeração correspondente à ordem das entrevistas, a saber, (ACS1 a ACS14) assegurando seu anonimato.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. O FAZER COTIDIANO DO ACS: SENTIMENTOS DE PERTENÇA E LAÇOS DE IDENTIFICAÇÃO AFETIVOS, IDEOLÓGICOS E INSTITUCIONAIS

Os depoimentos dos participantes do estudo evidenciam que os ACS's experimentam sentimentos de orgulho e satisfação em seu trabalho, os quais configuram-se como sentimentos de pertença ao seu fazer profissional:

“Isso aqui pra mim, eu tenho orgulho de falar que eu sou um agente comunitário de saúde, porque eu gosto do que eu faço. Faço com amor, com garra, com carinho, isso aqui é tudo pra mim” (ACS 2).

“Eu gosto do serviço, apesar de que tem as dificuldades muitas vezes, mas é gostoso, gosto muito do serviço. Então não consigo viver sem, é gratificante” (ACS 14).

Percebe-se pelos depoimentos que gostar do trabalho exalta sentimentos de amor, apreço, gratificação. Por isso, o ACS consegue realização e satisfação pessoal, busca pela felicidade e o preenchimento da vida com atos significativos para si e para os outros. Porém, mesmo a porcentagem de satisfação em relação ao trabalho realizado sendo divergente na literatura é consenso que a satisfação é multidimensional e que ela reflete na qualidade de vida dos ACS (CASTRO et al., 2017). Nessa perspectiva, pode-se superar as práticas mecanizadas e indiferentes, substituindo-as por modos de fazer saúde carregados de afeto e de implicação com as pessoas, famílias e comunidade.

Ademais, as falas dos participantes da pesquisa revelam coerência entre as atribuições que lhe são previstas pela política de saúde e seu fazer cotidiano. Deste modo, experimentam laços ideológicos e se reconhecem no trabalho que desempenham. Declaram sentimentos de alegria, prazer, felicidade, euforia e satisfação por cumprir o que está proposto como atribuição e ajudar as pessoas ou relatam sentirem decepção, raiva e impotência quando não conseguem.

“Olha, eu fico alegre quando eu consigo resolver as coisas, eu me sinto um máximo quando eu consigo. Marcou um exame pra mim, e eu consigo resolver? Nossa eu tenho maior prazer. Quando chega uma consulta então? Eu tenho maior prazer de entregar uma consulta pra uma pessoa. Agora, quando chega uma pessoa do seu lado: Preciso fazer esse exame com urgência; e eu não consigo aí me dá muita raiva e decepção” (ACS 12).

“Quando a gente consegue a gente fica muito feliz. Quando a gente consegue contribuir principalmente com a população mais carente que falta informação tá carente de tudo. É muito gratificante. Entendeu? Mas infelizmente às vezes, muita coisa fica a desejar, falta bastante coisa. Entendeu?” (ACS 5).

O Ministério da Saúde tem como desafio reorientar as práticas e ações de saúde, de forma integral e contínua, levando os serviços para mais perto das famílias com o estabelecimento do vínculo entre a equipe multiprofissional e usuários a fim de potencializar a qualidade da atenção à saúde na ESF (BARBOSA; BOSI, 2017). Para tal, é preciso que se tenha um profissional que conheça os determinantes sociais e participe do processo saúde-doença desses indivíduos. Assim, o ACS é imprescindível na equipe da ESF, pois atua como intermediador uma vez que é morador da comunidade, convive e interage com os aspectos culturais desse ambiente (PINTO et al., 2017).

As transformações no modelo padrão de gerir as organizações tem acarretado novos delineamentos de identificação do trabalhador com o local onde constrói sua prática profissional. Assim, as relações emocionais favorecem o crescimento profissional na presença de laços afetivos, os quais fortalecem a identificação do trabalhador com a organização por meio da manifestação de sentimentos de apreço pelo seu ofício (DUBAR, 2013).

Os ACS acreditam que suas ações geram transformações positivas e significativas, estando em consonância com as atribuições da PNAB por meio da centralidade de suas ações na integralidade da atenção e do cuidado à família (MIRANDA; PEGORARO, 2021).

Neste sentido, o vínculo e a identidade fazem com que esse trabalhador queira fazer o bem, para que se sinta bem, legitimando sua potência de facilitar um cuidado longitudinal e integral por meio da relação terapêutica (SANTOS; ROMANO; ENGSTROM, 2018). Para tanto, o ACS incorpora meios que facilitem o processo de trabalho e o aprendizado da população, como evidenciado abaixo:

“Eu não deixo uma diarreia ir adiante, entendeu? É de conseguir pegar os copinhos, separar o remédio pra uma pessoa que não tem leitura pra tomar o medicamento, desenha o sol pra o dia, a lua pra noite, um pratinho mais ou menos assim, porque eu não sou muito bem desenhista não, uma colherzinha, a pessoa sabe que é pra o horário de almoço. Então é uma satisfação muito grande de tá tendo uma melhoria na sua área, por exemplo: A distribuição de preservativos, de anticoncepcional, que diminuiu, acho que

tem uns três anos já que eu não tenho menores de 20 grávidas. Então isso aí é uma vitória pra gente, né” (ACS 13).

Os laços ideológicos ligam os profissionais à instituição pelos seus princípios, políticas, diretrizes, valores e crenças (ALVES et al., 2007). Ao se identificarem com as atribuições que lhes são previstas pela política de saúde, os ACS's deste estudo experimentam sentimentos de pertença e laços de identificação ideológicos que lhes confere sentido no seu fazer cotidiano.

Segundo a Política Nacional da Atenção Básica (PNAB) são atribuições do ACS: Realizar adscrição e cadastramento atualizados das famílias de sua microárea, fazer orientação quanto á utilização dos serviços disponíveis, realizar visitas domiciliares programadas pelo menos uma vez por mês para cada família e com mais frequência às famílias com risco e vulnerabilidade, integrar a equipe com a população por meio do vínculo, fazer atividades de promoção da saúde e prevenção de agravos por meio de educação em saúde e manter contato permanente com as famílias de sua área (BRASIL, 2012).

Pelo fato de se identificarem com sua prática, quando não é possível realiza-la por constrangimentos institucionais, os ACS's experimentam sentimentos de sofrimento e frustração. Assim, ao serem impelidos a assumirem outras funções para suprir as necessidades do serviço, como recepcionista, digitação do e-SUS, entrega de medicamentos da farmácia, vivenciam sentimentos de angústia e sofrimento por não se reconhecerem nas práticas que realizam, conforme narrativas abaixo:

[...] “A gente tem que acabar de fazer o cadastro, não terminamos, tem que ficar na mesa, na recepção, porque falta sistema administrativo, aí no caso, a gente fica na recepção da zona rural, fica aqui á tarde também, quer dizer, então é meio que confuso, então, eu tenho pessoas esperando assim na minha área aqui na rua para fazer visitas, as pessoas que não podem esperar muito tempo, mas você tem semanas que as vezes eu não consigo, passa a semana e eu não consigo chegar até eles, sem contar que você separa medicamentos para famílias que não conseguem ler, são analfabetos a gente que colar o remédio na folha, separadinho e entregar até a família então, sem agente também a gente tem que fazer isso, além da nossa área, tem os nossos pacientes das outras áreas também para fazer” (ACS 10).

“E quando a gente tá aqui mexendo com o e-SUS a gente não tá mais visitando, e aí isso é trabalho interno, tem muito trabalho. Se for olhar coisa aqui da parte burocrática a gente nem sai né? Mas aí a gente acaba saindo pra entregar consulta, pra entregar fichinha de dentista, essas coisas, emergência assim. E a visita periódica com o tempo afunilando por causa do

É SUS acaba ficando pra lá, e o nosso trabalho tem sido praticamente isso, é farmácia, recepção, as burocracias e o e-SUS. Só isso” (ACS 14).

Neste contexto, o excesso de trabalho burocrático, os desvios de função e a incapacidade de atingir as demandas solicitadas são geradores de sofrimento para o ACS, uma vez que, não se contemplam nessas práticas que só refletem em sobrecarga de trabalho, ocasionando sentimentos de insatisfação e desvalorização, os quais são refletidos nos conflitos com a equipe e os usuários do sistema de saúde e na qualidade de vida destes profissionais (RIQUINHO et al., 2018).

Também experimentam sentimentos de sofrimento por reconhecerem sua impotência perante as necessidades dos pacientes. Há que se destacar nos relatos abaixo os sentimentos de dor na consciência, frustração derivado da transposição dos problemas como falta de estrutura nos serviços e compreensão do risco social e de saúde.

“Por exemplo, um câncer, precisa fazer uma ressonância, um exame de alto custo, às vezes você vê a ansiedade daquela pessoa né! Cara, aí você vê aquela situação, será que você vai conseguir ajudar? Sabe, você vê a ansiedade na cara da pessoa. A pessoa precisando dessa ressonância para amanhã, aí você olha, conversa, você sabe que não dá. Até tenta, mas você sabe que esse exame vai demorar no mínimo uns três meses e olhe lá, te dá essa frustrada” (ACS 11).

“E quando a gente vai, igual eu fui na semana passada, o caso tá gravíssimo. É preciso fazer alguma coisa, aí eu te falo, cai a consciência, dói na consciência, mas não depende da gente” (ACS 10).

O ACS se depara com fragilidades estruturais na ESF que mobilizam sentimento de tristeza, frustração e impotência decorrente do vínculo com as famílias considerando sua incapacidade de ser resolutivo (DIAS, 2020).

Importa destacar ainda que, neste estudo, foi identificado que o vínculo com as famílias faz com que o ACS se sinta parte dela em decorrência da frequência de visitas domiciliares e da proximidade construída, gerando sentimento de confiança entre usuário e trabalhador.

“Ser agente comunitário significa você tá ali com a família, é como se você fosse uma pessoa da família, você entra na família então a pessoa confia em você” (ACS 1).

“Acho que, porque eu cresci aqui. Eu fui colocada numa área que eu conheço todo mundo, tem gente que, de pequena ficava brincando na casa com os filhos, eles da minha idade. É muito íntimo. Uma relação muito engraçada de

ver isso, quando eu era pequena eu brincava na casa deles, hoje eu tô cuidando deles. É muito gostoso” (ACS6).

A palavra vínculo nos remete à união, ligadura, atadura, ligação entre as partes que estão unidas e delimitadas entre si (ZIMERMAN, 2009^{ei}). Sugere-se que o vínculo pode ser construído, se tratando da relação estabelecida entre indivíduos, que por sua vez também é possível de desconstrução (SEIXAS et al., 2019). Essa subjetividade reflete certo grau de responsabilidade, integralidade e humanização da assistência em saúde no que tange a relação usuário-profissional (BARBOSA; BOSI, 2017).

A relação íntima e prolongada entre o ACS e a comunidade estabelece laços que se intensificam e transformam essa união em duradoura, de natureza emocional e com expressão de sentimentos. Partindo desse pressuposto, percebe-se que o vínculo é um grande mobilizador de sentimentos e que estes têm o poder de proporcionar vivências e processos de trabalho de qualidade (PINTO et al., 2017).

Assim, o que diferencia o ACS em relação aos demais trabalhadores de saúde, é a importância do papel que ele exerce ao atuar como mediador da vida social (NOGUEIRA, 2019). Portanto, os laços afetivos citados neste estudo revelam os sentimentos que os ACS experimentam no seu cotidiano que transformam as pessoas e suas necessidades como relevantes para si, dedicando-se e sentindo-se responsável pelo laço que cresceu entre eles.

O ACS assume uma dupla inserção no seu meio relacional, destacando-se o fato de morar e trabalhar na comunidade os levando a terem duplo papel: o de ser agente e sujeito. Assim, além de estabelecer laços de identificação com o trabalho o ACS estabelece esses mesmos laços com comunidade mediante o vínculo, que em conformidade com as atribuições do ACS o vínculo é sua ferramenta de trabalho e se exprime no encontro com o usuário (PINTO et al., 2017).

Em decorrência do forte vínculo criado com a comunidade e, do sentimento de impotência que muitas lhes invadem quando não conseguem ser resolutivos no cuidado com as pessoas, os ACS podem prejudicar sua própria saúde mental, confirme evidenciado abaixo:

“A gente tem que ter muito jogo de cintura, por que você pode adoecer né? Cê pode adoecer mentalmente, adoecer. Então é como realmente tá aí na cama doente mesmo, uma depressão e não ter apoio né?” (ACS 9).

Pedroso (2019) afirma que as relações interpessoais podem se tornar fonte de angústia, pois tem o poder de ligar o trabalho com o trabalhador de forma indissolúvel, ainda mais o ACS que opera como ponte de ligação entre a comunidade e os profissionais da ESF por intermédio do vínculo. Não obstante, os sentimentos negativos podem ser ameaças para a saúde do trabalhador, tornando assim, essencial o apoio emocional e ajuda no enfrentamento dessa situação (PEDROSO, 2019).

Os ACS's do presente estudo evidenciam também as dificuldades inscritas no cotidiano de morar e trabalhar na mesma comunidade:

“Para a gente na rua, pergunta seu telefone, é no telefone, é aqui em casa é na rua, você já vai pra igreja o pessoal te cerca, cê tá na rua, qualquer lugar o pessoal tá te cercando o tempo inteiro” (ACS 5).

“Então a gente não tem, em vez de estar dormindo, o paciente tá batendo na porta, tarde da noite lá, perguntando coisas de posto. O telefone toca a gente acha que é coisa familiar, é paciente querendo saber se tem ficha. Então a gente não tem uma noite tranquila de sono” (ACS 10).

“Eu sou da comunidade, então eu não sou diferente daquelas pessoas que eu tô atendendo. E às vezes isso é outra coisa que atrapalha a qualidade do trabalho aqui, é se distanciar da comunidade. Mas eu acho que é porque, a gente começa a enxergar tanto problema tanto defeito, que a gente não quer fazer parte, mas a gente faz né” (ACS 14).

Miranda e Pegoraro (2021) relatam que os principais geradores de sofrimento para o ACS são a ausência de limite entre o trabalho e o local onde residem e o quando absorvem as aflições e dificuldades dos usuários.

Além disso, a busca da comunidade por respostas imediatas gera pressões sobre o trabalho do ACS (ALONSO; BÉGUIN; DUARTE; 2018). Todavia, essa vinculação não deve gerar dependência do público em relação ao agente, pois, o vínculo deve servir para incentivar o autocuidado e contribuir para a adesão ao tratamento e autonomia (PINTO et al., 2017).

Considerando que não há como separar as emoções do trabalho, os sentimentos declarados pelos ACS são provenientes de como percebem as circunstâncias da população que convive e cuida. Deve-se priorizar as práticas de promoção da saúde e colocar em prática estratégias para responsabilizar os usuários, permitindo que o ACS atue em conjunto com os outros membros da equipe de saúde, principalmente em casos mais complexos, os quais o encaminhamento será realizado conforme necessário (JESUS et al., 2014).

Embora os sentimentos vividos pelos trabalhadores em seu cotidiano nem sempre sejam levados em consideração, a motivação profissional é essencial para o desenvolvimento adequado e satisfatório do trabalho em uma instituição. Assim, promover bem-estar e estrutura adequada da instituição é um desafio para cada líder. Ressalta-se que para atingir a excelência do trabalho deve-se conhecer as potencialidades e fragilidades dos indivíduos mediante os sentimentos expressos diariamente, na tentativa de fortalecer os laços entre a organização e o trabalhador e resgatar a subjetividade no contexto do trabalho (BRUM, 2012).

Os depoimentos revelam que os sentimentos vivenciados pelos ACS no cotidiano de trabalho são de natureza variada e permeiam a construção de sua prática profissional. Emergiram sentimentos de: amor, carinho, apreço, gratificação, confiança, satisfação, alegria, prazer, euforia, preocupação, frustração, decepção, dor, nervosismo e impotência. Foi possível perceber que tais sentimentos se encontram fortemente atrelados ao vínculo estabelecido com a comunidade e sua prática profissional.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ACS é o elo entre a comunidade e a ESF e tem o vínculo como sua principal função por mediar e aproximar a comunidade aos serviços de saúde. Este envolvimento proporciona a construção de laços de identificação, afetivos e ideológicos, expressos neste estudo por meio dos sentimentos vivenciados na prática profissional.

Esse estudo permitiu compreender que as transformações no modelo de gestão modificam a maneira como os ACS se identificam com dada organização, evidenciados na abordagem sobre laços de identificação. Demonstrou que os sentimentos positivos expressos trazem significados e identificação com seus processos de trabalho, repercutindo em melhores resultados. Já os sentimentos negativos causam sofrimento e degradação da identidade, possibilitando refletir na reavaliação e adequação das condições de trabalho desses profissionais. Ademais, no que diz respeito às fragilidades estruturais do sistema de saúde acabam por provocar desvios nas atribuições dos ACS, despertando sentimentos de sofrimento e angústia por não se reconhecerem nas práticas que realizam, além de comprometer o que lhe já é posto como dever.

Diante do exposto, ressalta-se que para atingir a excelência do trabalho devem-se conhecer as fragilidades e potencialidades do ACS sendo importante debruçar nos significados dos sentimentos desse profissional para fortalecer os laços entre o trabalhador e a instituição resgatando a subjetividade neste contexto. Constituindo-se em meta considerável para o gestor da ESF pode-se reconfigurar, assim, o modo de cuidar e refletir diretamente na qualidade da assistência e da vida do ACS.

Logo, espera-se com este estudo, contribuir para novas pesquisas sobre o tema com o intuito de compreender os significados que os Agentes Comunitários atribuem à sua prática e como eles interferem em sua identidade. Este presente estudo proporciona pensar em quais os sentimentos experimentados por outros profissionais de saúde da equipe de Estratégia de Saúde da Família bem como a compreensão do gestor acerca das questões subjetivas no contexto de trabalho com comunidades.

REFERÊNCIAS

- ALONSO, C.M.C.; BÉGUIN, P.D.; DUARTE, F.J.C.M. Trabalho dos agentes comunitários de saúde na Estratégia Saúde da Família: metassíntese. **Revista de Saúde Pública**. 2018, v. 52, 14.
- ALVES, M. et al. Identificação dos Gerentes com o Trabalho em uma Unidade Básica de Saúde de Belo Horizonte: Realidade ou Utopia? **Enfermería Global**, v. 6, n. 2, 2007.
- BARBOSA, Maria Idalice Silva; BOSI, Maria Lúcia Magalhães. Vínculo: um conceito problemático no campo da Saúde Coletiva. **Physis**, Rio de Janeiro, v. 27, n. 4, p. 1003-1022, Dec. 2017.
- BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2011.
- BEZERRA, Y.R.N.; FEITOSA, M. Z. S.. A afetividade do agente comunitário de saúde no território: um estudo com os mapas afetivos. **Ciênc. saúde coletiva** [online]. 2018, vol.23, n.3
- BRASIL. Ministério da Saúde. **Política Nacional de Atenção Básica**. Brasília, 2012 (Série E. Legislação em Saúde).
- BRUM, DE L. B; SCHIMITT, A. C. A. N. Motivação profissional: Fator determinante para qualidade do cuidado de enfermagem. **Anais da 2ª Jornada Internacional de Enfermagem UNIFRA**. Santa Maria-RS. UNIFRA, 2012.

- CACADOR, Beatriz Santana et al. Ser enfermeiro na estratégia de saúde da família: desafios e possibilidades. **Reme : Rev. Min. Enferm.** [online]. 2015, vol.19, n.3
- CASTRO, Thiago Alves de et al. Agentes Comunitários de Saúde: perfil sociodemográfico, emprego e satisfação com o trabalho em um município do semiárido baiano. **Cad. saúde colet.**, Rio de Janeiro, v. 25, n. 3, p. 294-301, July 2017.
- CERTEAU, Michel de. Credibilidades políticas. **A invenção do cotidiano: artes de fazer.** v. 3, 1998.
- CHANLAT, Jean-François. **Ciências sociais e management: reconciliando o econômico e o social.** São Paulo: Atlas, v. 100, 2000.
- DIAS, Monique Nunes Fiuza. O olhar do agente comunitário de saúde para a sua prática profissional: trabalho previsto, trabalho real e a influência dos processos de formação. 2020, 96 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação Profissional em Saúde) - **Fundação Oswaldo Cruz**, Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Rio de Janeiro, 2020.
- DUBAR, Claude. A construção de si pela atividade de trabalho: a socialização profissional. **Cadernos de pesquisa**, v. 42, n. 146, p. 351-367, 2013.
- JARDIM, Tatiana de Andrade et al. Aspectos subjetivos do morar e trabalhar na mesma comunidade: a realidade vivenciada pelo agente comunitário de saúde. **Interface-Comunicação, Saúde, Educação**, v. 13, n. 28, p. 123-135, 2009.
- JESUS, Andreia Souza de et al. Atuação do agente comunitário de saúde: conhecimento de usuários [Community health agent role: users' knowledge]. **Revista Enfermagem UERJ**, [S.l.], v. 22, n. 2, p. 239-244, nov. 2014. ISSN 0104-3552.
- MARTINS, A. A. et al. A Produção do Cuidado no Programa de Atenção Domiciliar de uma Cooperativa Médica. **Physis**, 2009.
- MENEZES, A.P.R.; MORETTI, B; REIS, A.A.C. O futuro do SUS: impactos das reformas neoliberais na saúde pública – austeridade versus universalidade. **Saúde Debate** | Rio De Janeiro, v. 43, n. Especial 5, p. 58-70, dez 2019
- MIRANDA, B.A.B.; PEGORARO, R. F. Qualidade de vida e sofrimento psíquico em agentes comunitárias de saúde. **REFACS (online)** Jan/Mar 2021; 9(Supl. 1): 202-215.
- NOGUEIRA, Mariana Lima. Expressões da precarização no trabalho do agente comunitário de saúde: burocratização e estranhamento do trabalho. **Saude soc.**, São Paulo, v. 28, n. 3, p. 309-323, Sept. 2019.

- NUNES, Aline Vieira de Lima; LINS, Samuel Lincoln Bezerra. Servidores públicos federais: uma análise do prazer e sofrimento no trabalho. **Revista Psicologia Organizações e Trabalho**, v. 9, n. 1, p. 51-67, 2009.
- PINTO, Antonio Germane Alves et al. VÍNCULOS SUBJETIVOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO TERRITÓRIO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA. **Trab. educ. saúde**, Rio de Janeiro, v. 15, n. 3, p. 789-802, Dec. 2017.
- RIBEIRO, Edilza Maria; PIRES, Denise. A teorização sobre processo de trabalho em saúde como instrumental para análise do trabalho no Programa Saúde da Família. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 20, p. 438-446, 2004.
- RIQUINHO, Deise Lisboa et al. O COTIDIANO DE TRABALHO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: ENTRE A DIFICULDADE E A POTÊNCIA. **Trab. educ. saúde**, Rio de Janeiro, v. 16, n. 1, p. 163-182, Apr. 2018.
- ROCHA, Semiramis Melani Melo; ALMEIDA, MCP de. O processo de trabalho da enfermagem em saúde coletiva e a interdisciplinaridade. **Rev Latino-am Enfermagem**, v. 8, n. 6, p. 96-101, 2000.
- SANTOS, Renata Oliveira Maciel dos; ROMANO, Valéria Ferreira; ENGSTROM, Elyne Montenegro. Vínculo longitudinal na Saúde da Família: construção fundamentada no modelo de atenção, práticas interpessoais e organização dos serviços. **Physis**, Rio de Janeiro, v. 28, n. 2, e280206, 2018.
- SEIXAS, Clarissa Terenzi et al. O vínculo como potência para a produção do cuidado em Saúde: o que usuários-guia nos ensinam. **Interface (Botucatu)**, Botucatu, v. 23, e170627, 2019.
- PEDROSO, Bianca Adrielle de Almeida. Considerações acerca do sofrimento psíquico do agente comunitário de saúde. **Repositório UNIJUÍ**. Monografia – Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – Departamento de Humanidades e Educação. 2019.
- ZIMERMANN, David E. Os Quatro Vínculos: Amor, ódio, conhecimento e reconhecimento na psicanálise e em nossas vidas. **Artmed Editora**, 2009.

CAPÍTULO III

OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM PRIMEIROS SOCORROS PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.51859/amplla.csa511.1121-3

Odete Helenice Paiva de Alencar Melo ¹
Emília Suitberta de Oliveira Trigueiro ²

¹ Mestre em Ensino em Saúde- Unileão. Juazeiro do Norte CE.

² Doutora em psicologia escolar e do desenvolvimento humano. Docente do programa de mestrado em Ensino em saúde- Unileão. Juazeiro do Norte-CE.

RESUMO

Para a realização de atendimentos relacionados a primeiros socorros, é indispensável que os profissionais da saúde, de todos os níveis de atenção, tenham habilidades básicas. Os profissionais da Atenção Primária à Saúde, independentemente do nível de escolaridade, necessitam envolver-se com ações nessa temática. Sabendo que os Agentes Comunitários de Saúde são profissionais que estão em contato direto com a comunidade, e atuam enquanto educadores da população, foi desenvolvido um programa de educação permanente em saúde para estes profissionais em 4 ESF do município de Juazeiro do Norte- CE, sobre atendimento em primeiros socorros. Após os procedimentos éticos exigidos, foi implementada capacitação para 17 profissionais sobre Queimaduras, Choque elétrico, Intoxicação/Envenenamento, Acidentes com animais peçonhentos, Convulsão e desmaio, Hemorragias (epistaxe), Engasgo com obstrução das vias aéreas por corpo estranho (OVACE), Parada Cardiorrespiratória e Ressuscitação Cardio pulmonar (RCP). A ação foi realizada utilizando metodologias teóricas e práticas, com treinos em bonecos de diferentes tamanhos e simulações de casos reais. Através da capacitação desenvolvida percebeu-se a necessidade de investimentos para qualificar os ACS em atendimentos imediatos a indivíduos que necessitam de primeiros socorros, bem como desmistificar algumas ações comumente realizadas que podem agravar a situação da vítima.

Palavras chave: Agentes Comunitários de Saúde. Capacitação profissional. Primeiros Socorros.

1. INTRODUÇÃO

O crescente número de acidentes que ocorrem em todos os âmbitos da sociedade chama atenção no cotidiano dos noticiários. Situações de emergência comuns como acidentes, queimaduras, convulsões e parada cardiorrespiratória, ocorrem a todo instante em locais públicos ou em domicílios. Diante dessas situações, percebe-se que o

prognóstico está diretamente associado à eficácia do atendimento inicial que quando realizado de imediato, minimiza o sofrimento, previne sequelas e complicações futuras e pode salvar vidas (FERREIRA et al., 2017; SILVA et al., 2018).

No âmbito da Atenção Primária à Saúde muitos encaminhamentos a outros níveis de atenção podem ser evitados caso o primeiro atendimento às vítimas seja realizado corretamente. A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), aprovada pela Portaria Nº 2436/2017 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017), traz a Atenção Básica como porta de entrada preferencial das Redes de Atenção à Saúde (RAS). Esta é responsável pelo primeiro atendimento de casos de urgência/emergência, pelo acolhimento e pela organização de ações e estratégias conforme as necessidades e demandas da sua população adscrita.

A PNAB destaca ainda as atribuições comuns a todos os membros que atuam na Atenção Básica, dentre elas a de estabelecer ações e medidas para segurança do paciente e promoção da saúde. O processo de trabalho das equipes deve ser organizado de modo que os casos de urgência/emergência tenham prioridade no atendimento, independentemente do número de consultas agendadas no período, provendo atendimento e suporte adequados até que os usuários sejam acolhidos por outros pontos de atenção da RAS.

A Rede Atenção às Urgências e Emergências (RUE) foi implantada visando melhorar a atenção à saúde diante de situações de urgência e emergência (BRASIL, 2011). Dentre os componentes da rede estão: Promoção e Prevenção; Atenção Básica e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A Atenção Básica é o nível de atenção mais próximo do cotidiano dos usuários, tida como ponto importante da RUE. Neste sentido é fundamental o desenvolvimento de ações de cunho educativo nesse âmbito, para a prevenção de agravos em situações de urgência e emergência.

A categoria profissional do Agente Comunitário de Saúde (ACS) é vinculada à Estratégia de Saúde da Família (ESF), e atua nas unidades estabelecendo um elo entre os serviços de saúde e a comunidade (BARROS et. al., 2010). O ACS conhece o perfil ocupacional das famílias e geralmente estabelece, de modo intuitivo, correlação entre as principais queixas, demandas e problemas com o trabalho que desenvolve (DIAS; SILVA, 2013).

Dessa forma, os ACS se configuram como elementos essenciais na APS por possuir como características do seu trabalho a competência cultural, a orientação comunitária e a construção de vínculo, relacionando-se cotidianamente com as famílias do seu território e transitando entre os saberes técnicos e populares (ALONSO et. al., 2018).

É sabido que o desempenho do cuidado à saúde da comunidade requer dos ACS múltiplos saberes e habilidades, o que pressupõe a necessidade de formação sólida e permanente desses trabalhadores. Nesse sentido este artigo objetiva descrever as atividades desenvolvidas durante uma oficina para capacitação em primeiros socorros para ACS no município de Juazeiro do Norte-CE, que teve como intuito capacitar esses profissionais na atuação em situações de urgência e emergência.

2. METODOLOGIA

Este texto apresenta um relato de experiência fruto de dissertação de mestrado intitulada: Educação Permanente em Saúde: capacitação em primeiros socorros para Agentes Comunitários de Saúde. Um dos objetivos deste trabalho foi promover uma oficina para qualificação profissional abordando noções básicas de primeiros socorros, sendo desenvolvido através de uma pesquisa-ação.

Participaram das atividades além da coordenadora do estudo, uma enfermeira que atua no Serviço Móvel de Urgência e Emergência-SAMU e estudantes do curso de enfermagem de uma instituição de ensino superior, membros da Liga Acadêmica do Suporte Básico de Vida em Parada Cardio Respiratória (LASP).

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa para apreciação, obtendo parecer favorável de número: 3.761.106. Após os procedimentos legais e éticos exigidos para o desenvolvimento de pesquisas, 3 reuniões foram realizadas para fins organizacionais com os enfermeiros das unidades, com a gerente e com os ACS que aceitaram participar do estudo. Na oportunidade foram definidos os temas a serem trabalhados durante a oficina, o local onde esta seria desenvolvida, e também foram acordadas as datas para liberação no horário de trabalho dos ACS.

A oficina foi desenvolvida no período de uma semana e envolveu sessões teórico-práticas. A parte teórica contou com apresentação de slides confeccionados pela

coordenadora do projeto, utilizando referências científicas atualizadas, sendo revisada frequentemente. A parte prática contou com a participação de membros da liga acadêmica LASP que auxiliou no desenvolvimento de simulações realísticas e treinamento de técnicas, estimulando sempre a participação ativa dos ACS. Para isso, foram utilizados os seguintes materiais: ataduras, talas, bonecos tipo bebê, manequins em tamanhos diferentes para ressuscitação cardiopulmonar e simulador do desfibrilador externo automático.

No primeiro dia da oficina foi realizada discussão acerca da motivação para participação nesse projeto de educação em saúde, bem como os anseios e dificuldades dos ACS para realizarem orientações e técnicas em primeiros socorros na APS. Logo após falamos sobre o tema primeiros socorros, caracterizações, funções, aspectos fundamentais, o papel da Atenção Primária e dos ACS na Rede de Urgência e Emergência (RUE).

Após estas discussões iniciou-se uma roda de conversa com uma enfermeira plantonista da intervenção do Serviço Móvel de Urgência-SAMU de Juazeiro do Norte que abordou temas relevantes sobre o atendimento em primeiros socorros. Nesta oportunidade aproveitamos para realizar uma breve discussão acerca da RUE de Juazeiro e região citando os hospitais e Unidades de Pronto Atendimento que fazem parte da rede, como são realizados os encaminhamentos para cada caso, além de elucidar as diferenças entre ambulância básica e avançada, e esclarecer dúvidas sobre as diversas ocasiões em que se necessita de socorro e quando se deve ligar para os bombeiros ou SAMU.

Dando prosseguimento à capacitação, nos momentos seguintes foram trabalhados os seguintes temas: queimaduras, choque elétrico, intoxicação/envenenamento, acidentes com animais peçonhentos, convulsão e desmaio, hemorragia (epistaxe), engasgo com obstrução das vias aéreas por corpo estranho (OVACE), parada cardiorrespiratória e ressuscitação cardio pulmonar (RCP). A tabela abaixo apresenta os temas escolhidos para a capacitação e as estratégias metodológicas utilizadas para cada um.

Tabela 1: Temas trabalhados e estratégia metodológica utilizada na oficina.

TEMAS TRABALHADOS	ESTRATÉGIA METODOLÓGICA UTILIZADA
Queimaduras	Apresentação de slides com imagens de queimaduras de modo a facilitar o entendimento acerca de suas classificações gerais, considerando agente causador, local atingido, extensão e profundidade da lesão; Roda conversa abrindo espaço para discussões acerca das práticas de primeiros socorros recomendadas, bem como técnicas de primeiros socorros variadas e produtos que podem ser utilizados no processo cicatricial; Apresentação de slides para demonstração de algumas orientações nas visitas domiciliares, buscando desmitificar ações de primeiros socorros comumente realizadas na comunidade consideradas inadequadas e que podem gerar complicações.
Choque elétrico	Apresentação de vídeos demonstrando casos reais de vítimas de choque elétrico; Discussão em grupo onde as participantes deveriam relatar o que consideravam uma conduta adequada para o atendimento de primeiros socorros nos casos apresentados; Demonstrações de dados estatísticos sobre o aumento do número de mortes no Brasil e no Nordeste causadas por choque elétrico; Estudo de caso onde as participantes deveriam discutir em grupo a percepção acerca do atendimento correto.
Intoxicação/Envenenamento	Apresentação em slides com a definição de intoxicação e envenenamento, demonstração de fotos dos agentes causadores mais comuns, e as formas de prevenção e salvamento para os casos de acidentes domésticos com produtos químicos.
Acidentes com animais peçonhentos	Apresentação de slides com demonstração de fotos dos animais mais comuns com suas estruturas como dentes e agulhões; Demonstração de dados estatísticos do último boletim epidemiológico divulgado pelo MS, no Brasil e Ceará, acerca da incidência dos casos; Roda de conversa sobre as experiências vividas.
Convulsão e desmaio	Estudo de caso sobre um caso de convulsão ocorrido na via pública; Demonstração de vídeo de um caso de desmaio com criança; Roda de conversa para discutir os dois casos e apresentar maneiras corretas de agir.
Hemorragias (epistaxe)	Demonstração de vídeos de casos reais de hemorragia nasal ocorrido com adulto e criança; Demonstração de procedimentos para realização de torniquetes para casos de hemorragias em membros; Exposição de fotos com os tipos de hemorragias, o passo a passo para realização de torniquetes e as manobras para socorro em casos de epistaxe.
Engasgo com obstrução das vias aéreas por corpo estranho (OVACE)	Participação de membros da Liga Acadêmica do Suporte Básico de Vida em Parada Cardio Respiratória (LASP), que realizaram uma breve apresentação teórica; Apresentação de vídeo com um caso real de engasgo com obstrução das vias aéreas por corpo estranho (OVACE), onde foi demonstrada a manobra de Heimlich no salvamento da vítima; Demonstração da manobra de Heimlich recomendada para crianças acima de dois anos, bebês e adultos; Exposição teórica sobre o tema reforçando a responsabilização do profissional de saúde na condução e orientação de procedimentos frente a esses casos;

Parada Cardiorrespiratória e Ressuscitação Cardio pulmonar (RCP).	Participação de membros da LASP que dividiram as participantes em três grupos para trabalhar com a dramatização de um caso de parada cardiorrespiratória, demonstração de manobras de RCP realizadas com bonecos de tamanhos diferentes; Roda de conversa para sanar as dúvidas finais.
---	---

Fonte: Autoria própria.

Após as práticas, foi reservado um momento para uma conversa entre a pesquisadora e os participantes a fim de avaliar a percepção dos mesmos acerca das atividades desenvolvidas durante a semana. Nesta ocasião, percebeu-se uma resposta positiva, onde as profissionais relataram ter aprendido muito sobre o tema, como também manifestaram o desejo de participar de outras capacitações do tipo para aprimorar os assuntos relativos a primeiros socorros e outros temas de relevância na APS.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na roda de conversa inicial observou-se que a maioria das participantes não possuía conhecimento prévio adequado sobre Primeiros Socorros. Não só isso, conforme observado durante as atividades propostas na oficina as participantes relataram ter vivenciado situações no cotidiano envolvendo casos de parada cardiorrespiratória, queimaduras, choque elétrico, engasgo, dentre outros.

A maioria demonstrou não saber como agir nessas situações. Este resultado é semelhante ao encontrado em outros estudos realizados em todo o mundo para avaliar o nível de conhecimento sobre primeiros socorros entre diferentes grupos. Entre esses, alguns mostraram que a maioria dos pesquisados tinham pouca ou nenhuma formação referente ao assunto (KHATATBEH, 2016).

Este fato pode ser decorrente da pouca disseminação de conteúdos sobre o tema para a população em geral. Este é um dado preocupante pois tais informações são consideradas um fator de grande importância no momento de auxiliar uma vítima. Saber os procedimentos adequados em situações de emergência é a ferramenta mais poderosa que pode ser usada por uma pessoa durante um acidente (CAVALCANTE, 2015).

Não obstante, sendo a Atenção Primária a porta de entrada do sistema de saúde, espera-se que casos de urgência/emergência possam vir a ocorrer em uma UBS. Dessa

forma, os profissionais presentes devem estar aptos a lidar com tais situações até que se obtenha ajuda especializada. Assim, treinamentos e aulas devem ser conduzidos periodicamente para as equipes, visando fixar conteúdos e práticas, pois mesmo entre profissionais treinados pode não haver homogeneidade de conhecimentos e técnicas (MARTÍNEZ JAC, et al., 2018).

Neste contexto torna-se indispensável o desenvolvimento de estratégias para capacitação dos ACS em primeiros socorros, tendo em vista a proximidade que essa categoria profissional tem com a comunidade e o seu papel de educador e transformador das práticas cotidianas (MACIAZEKI-GOMES; SOUZA; BAGGIO, 2016).

Os primeiros socorros quando realizados adequadamente e em tempo hábil podem contribuir para salvar uma vida ou evitar sequelas para a vítima. A qualidade e eficiência das ações e intervenções aplicadas nessa primeira abordagem possui influência direta no êxito das etapas seguintes. Este tipo de atendimento pode ser realizado por qualquer pessoa, sendo importante medida para redução das taxas de morbimortalidade (SINGLETERY, 2015).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

É notável a lacuna existente no conhecimento de leigos e dos profissionais da saúde em relação à abordagem de uma urgência ou emergência. Isto precisa ser aperfeiçoado através de capacitações para os diferentes públicos.

Sabe-se que um número significativo de acidentes acontece no cotidiano dos ACS, entretanto, a maioria não possui o embasamento teórico e prático necessário para prestar atendimento de primeiros socorros em algumas situações, apesar de alguns relatos de treinamentos sobre o tema.

A capacitação oferecida aos ACS foi concretizada baseada no conceito de Educação permanente com a aprendizagem no trabalho, em que as ações de aprender e ensinar se incorporam no cotidiano dos serviços. Também se baseou na aprendizagem significativa e na possibilidade de transformar as práticas profissionais, sendo desenvolvida com apoio nos problemas enfrentados na realidade e nos conhecimentos prévios e experiências anteriores dos profissionais participantes. Também pôde contribuir para a formação das acadêmicas do curso de enfermagem membros da Liga

Acadêmica do Suporte Básico de Vida em Parada Cardiorespiratória (LASP), fomentando o trabalho em equipe, o desenvolvimento de estratégias e o respeito aos diferentes saberes.

A atividade desenvolvida, pioneira neste aspecto educativo, resultou claramente em ganhos cognitivos para todos os profissionais participantes. Com isso percebe-se que é evidente a necessidade de manutenção do processo de Educação Permanente aos ACS, sobretudo quando o tema é urgência e emergência.

Espera-se que os resultados dessa pesquisa possam subsidiar os gestores municipais e coordenações no planejamento de um processo de educação permanente para a equipe de saúde, em especial os ACS, visando prevenir acidentes e o agravamento das vítimas. Além disso, visou-se contribuir para aumentar a capacidade de intervenção dos ACS no cotidiano de trabalho de modo a colaborar para o empoderamento da categoria, valorizando-a e reafirmando seu papel na Atenção Primária a Saúde enquanto porta de entrada preferencial do SUS, e a necessidade de compreender a articulação entre a APS e a RUE.

REFERÊNCIAS

- ALONSO, C. M. C.; BÉGUIN, P. D.; DUARTE, F. J. C. M. Trabalho dos agentes comunitários de saúde na Estratégia Saúde da Família: metassíntese. **Revista Saúde Pública** 2018.
- BARROS, D. F.; BARBIERI, A. R.; IVO, M. L.; SILVA, M. G. O contexto da formação dos agentes comunitários de saúde no Brasil. **Texto contexto - enfermagem** 2010.
- CAVALCANTE, J. L. Avaliação do nível de conhecimento em primeiros socorros de acadêmicos do curso de educação física da UFRN. Rio Grande do Norte: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. **Trabalho de Conclusão de Curso em Educação Física**, 2015.
- BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria nº 2.436**, de 21 de setembro de 2017. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 21 set. 2017.
- BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria nº 1.600**, de 7 de julho de 2011. Reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde (SUS). Disponível em:

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt1600_07_07_2011.htm
l. Acesso em: 12 dez. 2020.

DIAS, E. C.; SILVA, T. L. Contribuições da atenção primária em saúde para a implementação da Política Nacional de Saúde e Segurança no Trabalho (PNSST). **Revista Brasileira de Saúde Ocupacional**, São Paulo, v. 38, n. 127, p. 31-43, 2013.

FERREIRA, M. G. N. et al. O leigo em primeiros socorros, uma revisão integrativa. **Revista de Ciências de Saúde Nova Esperança**, Paraíba, v. 15, n. 3, p. 12-20, dez. 2017. Disponível em: <http://www.facene.com.br/wp-content/uploads/2010/11/Artigo-02.pdf>. Acesso em: 15 out. 2020.

KHATATBEH, M. First Aid Knowledge Among. University Students in Jordan. **Int J Prev Med.** 2016;7(24). Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.gov/pmc/articles/PMC4755219>.

MACIAZEKI-GOMES, R. C.; SOUZA, C. D.; BAGGIO, L.; WACHS, F. O trabalho do agente comunitário de saúde na perspectiva da educação popular em saúde: possibilidades e desafios. **Ciências Saúde Coletiva** 2016; 21(5):1637-1646

MARTÍNEZ JAC, et al. Self – Perception of Theoretical Knowledge and Practical Skills by Primary Health Care Physicians In Life – **Threatening Emergencies**. *Prehosp Disaster Med.* 2018; 33(5):508 - 518.

SILVA, D. P. et al. Primeiros socorros: objeto de educação em saúde para professores. **Revista Enfermagem UFPE On Line**, Recife, v. 12, n. 5, p.1444-1453, mai. 2018. Disponível: <https://periodicos.ufpe.br/revistaenfermagem/article/view/234592/28912>. Acesso em 17 out de 2020.

SINGLETARY, E.M., et al. Part 15: First Aid: 2015 **American Heart Association and American Red Cross Guidelines Update for First Aid**. *Circulation*. 2015.

SOUZA, P. S.; LIMA, J.S.; EPAMINONDAS, J.M.; NUNES, E.C.S. Ensino baseado em simulação: experiência no ensino de primeiros socorros em curso técnico. **Revista EIXO**. Brasília DF. Vol 7, nº2 dez 2018.

CAPÍTULO IV

A PROMOÇÃO DA SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: REFLEXÕES E APRENDIZADO

DOI: 10.51859/ampla.csa511.1121-4

Tatiane Aparecida Queiroz ¹
Francisca Patrícia Barreto de Carvalho ²
Francisco Arnaldo Nunes de Miranda ³
Lara Candice Costa de Moraes Leonez ⁴
Ana Luiza de Oliveira Sousa ⁵
Amélia Carolina Lopes Fernandes ⁶

¹ Enfermeira. Mestra em Saúde e Sociedade pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde e Sociedade da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Enfermeira lotada na Secretaria de Saúde Pública do Estado Rio Grande do Norte.

² Enfermeira. Doutora em Enfermagem pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Analista Técnico da Fundação de Apoio à Pesquisa do Rio Grande do Norte. Docente do Programa de Pós-Graduação Saúde e Sociedade da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.

³ Enfermeiro. Pós-Doutor em Enfermagem pela Escola Superior de Enfermagem São João de Deus, Évora/Portugal. Professor Titular do Curso de Graduação em Enfermagem e Permanente do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

⁴ Graduanda do curso de Medicina da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.

⁵ Nutricionista. Especialista na Modalidade de Residência Multiprofissional em Atenção Básica/ Saúde da Família e Comunidade da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Especialista na Modalidade de Residência Multiprofissional em Cardiopneumologia pela Escola de Saúde Pública do Ceará.

⁶ Enfermeira. Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Professora Adjunto II no Departamento de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.

RESUMO

Este estudo tem como objetivo propor a reflexão crítica dos profissionais da atenção primária sobre as ações de promoção da saúde no seu processo de trabalho. Trata-se de um estudo qualitativo, com abordagem de pesquisa-ação. O cenário da pesquisa foi uma Unidade Básica de Saúde (UBS) localizada no município de Mossoró, Rio Grande do Norte, Brasil. A população do estudo foi composta por 22 profissionais. A amostra foi definida mediante a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão e correspondeu a 20 profissionais. A coleta de dados aconteceu através de entrevistas individuais semiestruturadas e de observação participante realizadas no período de maio a novembro de 2017, na própria infraestrutura da UBS. O desenvolvimento do estudo se deu em quatro fases: 1- Pesquisa preliminar e definição do problema; 2- Desenvolvimento de um plano de ação; 3- Implementação do plano de ação e 4- Avaliação do processo. Constatou-se que maioria dos profissionais passou a reconhecer a influência dos determinantes sociais no processo saúde/doença e ampliou sua concepção a respeito do conceito de promoção da saúde, entendendo que ela é permeada por ações que buscam contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e comunidade, não se restringindo, portanto, a prevenção de doenças. Ao dialogar através de encontros educativos os profissionais de saúde sentiram-se valorizados e motivados ao desenvolvimento dos princípios e diretrizes do SUS, com ênfase na resolutividade e na garantia do atendimento das necessidades de saúde da população em seus processos de trabalho.

Palavras-chave: Pedagogia Crítica. Atenção Primária em Saúde. Promoção da saúde.

1. INTRODUÇÃO

A promoção da saúde surge como uma resposta à intensa medicalização da saúde. Embora inicialmente tenha sido compreendida como um nível de atenção da medicina preventiva, tendo como foco a transformação de comportamentos individuais, nos últimos anos passa a ter um enfoque político e técnico voltado ao processo saúde/doença, reconhecendo a influência dos determinantes sociais sobre as condições de saúde e a necessidade de empoderamento dos indivíduos e comunidade (BUSS, 2009).

A Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, realizada em Ottawa em 1986, foi um marco importante para a construção do conceito contemporâneo de promoção da saúde (MAEYAMA et al, 2015), que foi definida como o “processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle deste processo” (BRASIL, 2002, p. 19).

As conferências internacionais que se sucederam à Ottawa aprofundaram o conceito através, principalmente, da ampliação do próprio conceito de saúde e definiram alguns princípios norteadores para o desenvolvimento de estratégias para a promoção da saúde ao longo dos anos.

Mediante as mesmas influências sócio históricas vivenciadas na construção da promoção da saúde no âmbito internacional, ocorreu no Brasil, na década de 80, o movimento de Reforma Sanitária, que através da promulgação da Constituição de 1988 resultou no reconhecimento da saúde como um direito de todos e um dever do Estado. O entendimento da saúde como direito desencadeou, portanto, a compreensão de que a sua garantia só será alcançada mediante o desenvolvimento de ações e serviços voltados à promoção da saúde (GERMANI; AITH, 2013).

A Promoção é sabiamente reconhecida enquanto estratégia de produção da saúde desenvolvida no Sistema Único de Saúde (SUS) (ROCHA et al, 2012). Consiste em um conjunto de estratégias e formas de produzir saúde, voltadas ao âmbito individual e coletivo, que através da articulação intra e intersetorial e da formação da Rede de Atenção à Saúde, busca garantir à equidade e à qualidade de vida, por meio da redução

de vulnerabilidades e riscos à saúde decorrentes dos determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais (BRASIL, 2014).

A promoção da saúde se traduz, portanto, como uma possibilidade concreta de ruptura do paradigma biomédico, centrado na doença, e propõe uma nova forma de intervenção no campo da saúde, devendo permear todos os níveis de complexidade da atenção à saúde. Na Atenção Primária a Saúde (APS) ela se constitui como uma importante ferramenta para o desenvolvimento de práticas comprometidas com a saúde e qualidade de vida (LOPES et al, 2013; PEREIRA, OLIVEIRA, 2013).

Nesse sentido, é fundamental a formação de grupos de discussão que envolvam os profissionais de saúde de diferentes categorias e possibilitem um processo de ensino-aprendizagem que permita dialogar sobre às práticas de promoção da saúde e como esta se insere no seu cotidiano de trabalho (HEIDEMANN, WOSNY, BOEHS, 2014; LOPES et al, 2013).

É preciso promover encontros para que em conjunto, através da inter-relação e da cooperação, as pessoas possam construir seus processos de trabalho, ações de promoção da saúde e projetos que envolvam o seu interesse e o do próximo (MENDES; PEZZATO; SACARDO, 2016). Nesse sentido, o objetivo deste estudo é propor a reflexão crítica dos profissionais da atenção primária sobre as ações de promoção da saúde no seu processo de trabalho.

2. MÉTODOS

Trata-se de um estudo qualitativo, com abordagem de pesquisa-ação, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, sob o Protocolo nº 1.943.235 e CAEE nº 62649616.7.0000.5294.

A pesquisa-ação consiste em um tipo de pesquisa social com base empírica, que é idealizada e desenvolvida em associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e na qual os pesquisadores e os participantes envolvem-se de modo cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 2015).

Considerando a coerência da metodologia proposta com o pensamento Freiriano, este estudo será norteado pelo referencial teórico-metodológico de Paulo Freire, que permite a problematização e desvelamento de temas relativos ao cotidiano

dos sujeitos, preparando-os para intervir na realidade (FREIRE, 2011a; FREIRE, 2011b; FREIRE, 1996).

A Unidade Básica de Saúde (UBS) cenário da pesquisa localiza-se em Mossoró, Rio Grande do Norte, Brasil. Este serviço foi escolhido por ser campo de atuação da pesquisadora enquanto enfermeira residente pelo Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Básica/Saúde da Família e Comunidade, fruto da parceria entre a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e a Prefeitura Municipal de Mossoró-RN.

A pesquisa ação valoriza os processos de apreensão da realidade e permite a integração entre os sujeitos participantes, sem promover uma separação entre quem pesquisa e quem é pesquisado, utilizando estratégias de produção de conhecimento e transformação da realidade (PITANO; ROSA; DAUDT, 2014), o que justifica sua realização no próprio serviço onde se trabalha.

A população do estudo foi composta por 22 profissionais, ou seja, pela totalidade que trabalha na equipe de atenção primária da referida UBS, onde se destaca uma equipe de Estratégia de Saúde da Família (ESF) composta por uma médica, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, um dentista, uma auxiliar em saúde bucal, uma técnica em saúde bucal e oito agentes comunitários de saúde. Além disso, fazem parte do quadro de funcionários uma assistente social, uma gerente, três auxiliares administrativas, uma auxiliar de enfermagem e duas auxiliares de serviços gerais.

Destes, a amostra foi composta por 20 profissionais, selecionados em acordo com os seguintes critérios de elegibilidade: estar em pleno exercício de suas funções no período da pesquisa; atuar no serviço por um período não inferior a três meses. Excluíram-se aqueles afastados do serviço por motivo de férias, licença maternidade ou atestado médico superior a 15 dias.

A coleta de dados aconteceu através de entrevistas individuais semiestruturadas e de observação participante realizadas no período de maio a novembro de 2017, na própria infraestrutura da UBS, onde se realizou quatro encontros educativos como logística metodológica, ou seja, a pesquisa participante. A equipe de pesquisa constou de uma pesquisadora principal, uma nutricionista e uma graduanda em Enfermagem. Antes de iniciar a coleta dos dados, foram realizadas reuniões entre a equipe de pesquisa

para estudo e divisão de tarefas, a fim de desenvolver um trabalho integrado e complementar.

Em atenção aos preceitos éticos dispostos na Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, garantiu-se a preservação da identidade dos participantes, anonimato e sigilo com a utilização de pseudônimos. Optou-se pelo uso de palavras características do trabalho e dos princípios norteadores da atenção primária, atribuídos aleatoriamente na medida em que se desenvolvia a coleta dos dados, a saber: universalidade, acessibilidade, vínculo, longitudinalidade, cuidado, integralidade, responsabilização, humanização, equidade, participação, acolhimento, descentralização, corresponsabilização, escuta, resolutividade, afetividade, confiança, interdisciplinaridade, organização e autonomia.

Todas as entrevistas foram gravadas em áudio com a permissão dos participantes, que assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, após os devidos esclarecimentos sobre o propósito do estudo.

A observação participante foi realizada durante os encontros entre pesquisadores e participantes. Os dados coletados nas observações foram registrados em um diário de campo, sendo considerado o interesse, participação e tempo de permanência, o conteúdo e o aspecto evolutivo das discussões realizadas durante os encontros com os sujeitos participantes.

3. RESULTADOS

O desenvolvimento da pesquisa se deu de acordo processo cíclico definido pela pesquisa-ação: planejamento, ação e avaliação (ADAMS; HOQUE; MCNICHOLAS, 2006), sendo dividida em quatro fases: 1- Pesquisa preliminar e definição do problema, realizada a partir de três passos - levantamento dos temas geradores, seleção/codificação de palavras e frases registradas e ordenamento dos temas geradores; 2- Desenvolvimento de um plano de ação; 3- Implementação do plano de ação e 4- Avaliação do processo.

3.1. PESQUISA PRELIMINAR E DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

A organização do universo temático foi realizada a partir dos seguintes passos:

3.1.1. LEVANTAMENTO DOS TEMAS GERADORES

O levantamento dos temas geradores corresponde a uma investigação, baseada na dialogicidade da educação libertadora, experiência e reflexão crítica dos sujeitos, que busca identificar temas significativos para os participantes do processo (DOMINGUES, 2009; FREIRE, 2011b).

Nesta etapa foi realizada uma entrevista individual e semiestruturada com cada participante do estudo. A entrevista buscou identificar o conceito de saúde trazido por cada profissional, sua compreensão acerca da APS, sua concepção a respeito da promoção da saúde, qual o trabalho por ele realizado e como a promoção da saúde se insere no seu trabalho. Além disso, os participantes foram estimulados a identificar como a promoção da saúde é inserida no trabalho realizado pela equipe da UBS.

Os profissionais demonstram ter conhecimento sobre o conceito ampliado de saúde, associando-o não apenas a ausência de doença, mas ao completo bem-estar do indivíduo. Alguns deles reconhecem que a atenção primária se configura como a porta de entrada para os usuários no SUS, no entanto, a maioria não apresentou uma definição clara sobre o que é atenção primária, destacando que o papel deste nível de atenção é promover o acolhimento aos usuários e a prevenção de doenças. O que pode ser observado nas falas dos participantes apresentadas a seguir:

“É o completo bem-estar físico e social, ou seja, não só a ausência de doença, como também emprego, moradia, lazer e acesso aos serviços.” [Afetividade]

“É justamente a preventiva. Da atenção básica, primária, se for levar em consideração a atenção básica, a atenção primária, é, na saúde, no Sistema Único de Saúde, é o cuidado preventivo, é pra fazer com que aquele usuário ele não adoça e precise do serviço.” [Vínculo]

De modo geral os profissionais apresentaram dificuldades para construir ou elaborar uma definição sobre o conceito de promoção da saúde e grande parte entende que a promoção da saúde corresponde à prevenção de doenças, sendo que apenas quatro entrevistados a associaram a estratégias de melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e comunidade e ao desenvolvimento de ações intersetoriais.

“[...] Promoção da saúde são ações que a gente tem que fazer na comunidade na prevenção doenças, promoção da saúde, assim, no meu entendimento digamos que seja isso: promover ações na prevenção de doenças.” [Cuidado]

Os profissionais apontam que as ações de promoção da saúde realizadas no seu trabalho acontecem por meio de orientações oferecidas aos usuários durante o acolhimento, consultas, visitas domiciliares e palestras, sendo essas orientações voltadas à mudança de estilo de vida, prevenção de doenças ou agravos, sobre o fluxograma de atendimento da UBS ou direcionadas as diferentes fases do ciclo de vida.

Em relação às ações de promoção da saúde realizadas pela equipe, os profissionais destacam estratégias de busca ativa voltadas a doenças crônicas ou agudas, como hanseníase, tuberculose e arboviroses, e atividades educativas realizadas nos grupos desenvolvidos na UBS para determinadas populações expostas a doenças e/ou fatores de riscos, como pessoas obesas ou em sobrepeso, idosos e fumantes.

“Podemos citar uma ação que foi feita agora recentemente, que foi o mutirão de hanseníase, isso aí foi uma ação que a equipe fez na busca ativa de novos casos e no encaminhamento até a UBS, pra detectar algum paciente que possivelmente possa ter hanseníase. No grupo “Vida Saudável” nós estamos promovendo a saúde, quando estamos no grupo de fumantes nós estamos promovendo saúde [...]” [Cuidado]

3.1.2. SELEÇÃO/CODIFICAÇÃO DE PALAVRAS E FRASES REGISTRADAS

Nessa fase foi feita a leitura das respostas obtidas nas entrevistas e em seguida, selecionadas as palavras ou frases de maior significância. A partir disso, foram definidos quatro temas geradores a serem trabalhados: “promoção da saúde – conceitos e reflexões”, “o papel da atenção primária”, “determinação social do processo saúde/doença” e “como materializar a promoção da saúde nas ações desenvolvidas na atenção primária?”.

3.1.3. ORDEM DOS TEMAS GERADORES

Buscando possibilitar o aprofundamento das discussões ao longo de cada encontro educativo e conseqüentemente, uma melhor compreensão dos participantes acerca dos assuntos trabalhados, os temas geradores foram ordenados na seguinte sequência: “determinação social do processo saúde/doença”; “o papel da atenção

primária”; “promoção da saúde – conceitos e reflexões” e “como materializar a promoção da saúde nas ações desenvolvidas na atenção primária? ”.

Posteriormente, realizou-se uma reunião com os participantes do estudo para a apresentação dos temas geradores definidos, sendo aberto um espaço de discussão no qual os profissionais foram instigados a sugerir possíveis ajustes e modificações que se considerassem necessários. Aqui se buscou o “respeito aos saberes dos educandos” (FREIRE, 1996, p. 33).

Após a discussão, os profissionais julgaram que os temas geradores são relevantes e não sugeriram nenhuma modificação, ficando acordada a realização de quatro encontros educativos, de modo que cada um deles foi destinado à discussão de um dos temas geradores.

3.2.DESENVOLVIMENTO DE UM PLANO DE AÇÃO

Durante o planejamento de cada momento educativo realizou-se leituras para identificação de referenciais teóricos consistentes para a abordagem de cada temática. Os encontros foram planejados considerando metodologias que fossem adequadas para a discussão e compreensão dos participantes acerca das temáticas, de modo a proporcionar a participação ativa de todos os envolvidos.

3.3.IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO

Nessa etapa implementou-se as atividades educativas, promovendo a problematização e contextualização das temáticas levantadas, buscando assim a construção de novos conhecimentos e a resolução de problemas. A tabela 1 mostra o tema, o número de participantes, a metodologia utilizada e uma síntese de cada encontro educativo.

Tabela 1 - Tema, número de participantes, metodologia utilizada e síntese de cada encontro educativo.

Encontro educativo	Tema	N	Metodologia	Síntese da atividade
01	Determinação social do processo saúde-doença.	10	Dinâmica, discussão de estudo de caso e abordagem do tema através de roda de conversa e recurso áudio visual.	Os profissionais evidenciaram a necessidade de acolher a paciente, descrita no estudo de caso, mesmo se ela não fizesse parte da população adscrita a UBS, alguns apontaram inicialmente a necessidade de tratar suas queixas físicas, realizando o encaminhamento para consulta médica, e a maioria destacou que é preciso dar resolutividade também aos seus problemas familiares e sociais.
02	O papel da atenção básica	08	Jogo do “Falo sério ou Com certeza”	Os profissionais demostram conhecer os princípios e diretrizes que regem a atenção primária, no entanto, alguns manifestaram dúvidas quando questionados sobre as ações de saúde desenvolvidas nesse nível de atenção e sobre seu papel na rede de atenção à saúde, o que gerou muita discussão entre os participantes. Também foram observadas dúvidas em relação às atribuições comuns a todos os profissionais da equipe, principalmente quando se questionou sobre a responsabilidade pelo acolhimento e escuta qualificada dos pacientes.
03	Promoção da saúde: conceitos e reflexões	13	Abordagem do tema através de recurso áudio visual, roda de conversa e dinâmica.	Os profissionais que se mostraram participativos e atentos à discussão tiveram uma maior facilidade em trazer as respostas solicitadas na dinâmica que buscava possibilitar a diferenciação entre a promoção da saúde e prevenção de doenças, de modo que a maioria dos grupos conseguiu responder em conformidade com a literatura mais atual acerca da temática.
04	“Como materializar a promoção da saúde nas ações desenvolvidas na atenção primária?”	10	Exibição e discussão do filme “Preciosa: uma história de esperança”.	Após a exibição do filme os profissionais apontaram as falhas existentes nas políticas de saúde e assistência social, a importância de realizar uma atenção à saúde livre de julgamentos e que permita a identificação das demandas de saúde para além dos aspectos biológicos. Foram realizadas ainda reflexões sobre as dificuldades que a equipe enfrenta na resolução de casos que envolvem complexos problemas sociais, especialmente por que a articulação com outros setores como assistência social e educação, por exemplo, ainda não é satisfatória.

Fonte: Autoria própria.

No primeiro encontro, relembrou-se os objetivos do estudo e a logística dos encontros educativos, ressaltando a autonomia dos profissionais quanto à decisão de participar ou não das programações pactuadas. Realizou-se uma dinâmica em que os participantes foram convidados a trazerem algumas características de sua vida pessoal, como por exemplo: “sou casado (a)”, “tenho animal de estimação”. Esse mote serviu para subdividir os participantes (n=10) em dois grupos. Reagrupados solicitou-se uma reflexão sobre as semelhanças e diferenças entre seus colegas de trabalho, que os mesmos pudessem destacar as potencialidades presentes no outro, e ainda a diferença conceitual entre grupo de trabalho e equipe de trabalho. Instilou-se o sentimento de equipe e sua importância na rotina do trabalho desenvolvido na UBS.

Em seguida, foi entregue a cada um dos dois grupos um estudo de caso e solicitada a apresentação de estratégias que promovessem a resolutividade dos problemas elencados. Estudo de caso situacional: uma paciente que apresentava sofrimento psíquico, diabetes mellitus, hipertensão arterial e sérios problemas sociais. Durante a síntese realizada por cada grupo, discutiu-se a influência dos determinantes sociais no processo saúde-doença dos indivíduos e comunidade, levando os profissionais a refletirem sobre os determinantes de saúde presentes no seu território de atuação e como eles têm sido considerados em sua prática profissional.

No segundo encontro educativo através do jogo do “Falo sério” ou “Com certeza” introduziu-se a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) de 2012, (BRASIL, 2012) ainda vigente no período de realização dos encontros. Foram lançadas seis afirmações relativas a alguns aspectos apresentados na PNAB e os profissionais (n=8), divididos em dois grupos, deveriam responder se aquela afirmação era falsa ou verdadeira levantando uma plaquinha, respectivamente, a de cor vermelha com a frase “falo sério” e a de cor verde com a frase “com certeza”. Após o escore obtido, iniciou-se a discussão sobre cada afirmativa, sendo esclarecidas as dúvidas que surgiam.

No terceiro encontro educativo enfatizou-se o surgimento do conceito de promoção da saúde e sua evolução ao longo dos anos, a importância das Conferências Internacionais de Promoção da Saúde e foram discutidas as diferenças existentes entre os conceitos de promoção da saúde e prevenção de doenças.

Questionou-se aos participantes (n=13): “promoção da saúde e prevenção de doenças são conceitos semelhantes?” Listou-se em um quadro as seguintes categorias:

conceito de saúde, modelo de intervenção, público-alvo, abordagens, direcionamento de medidas, objetivos dos programas e executores dos programas, sendo solicitado que os participantes, divididos em pequenos grupos de no máximo três pessoas, respondessem a cada uma das categorias propostas, com destaque para a diferenciação entre a promoção da saúde e prevenção de doenças.

No quarto momento educativo exibiu-se o filme “Preciosa: uma história de esperança”, lançado em 2009, dirigido e co-produzido por Lee Daniels, que conta a história de Clairece Preciosa Jones, uma garota de dezesseis anos de idade, abusada pela mãe, violentada por seu pai e que tem a vida marcada pela pobreza, ausência de amor e invisibilidade. O mesmo aborda questões como violência sexual, física e psicológica, negligência, preconceito, pobreza, problemas de saúde e educacionais. Os participantes (n=10) identificaram as semelhanças e diferenças entre o filme e a realidade vivenciada em seu cotidiano de trabalho e foram instigados a refletir sobre a realidade na qual exerciam seu trabalho.

3.4. AVALIAÇÃO DO PROCESSO

Considera-se que o número de profissionais que se fizeram presentes nos encontros foi satisfatório, pois apenas três dos profissionais que participaram da entrevista inicial não compareceram a nenhum dos momentos educativos propostos.

Após a finalização dos momentos educativos, os profissionais que participaram de pelo menos dois encontros (n=12) foram convidados a participar de uma entrevista individual. Destes, apenas onze foram entrevistados, pois uma profissional estava de férias no período no qual as entrevistas foram realizadas. Reaplicou-se a entrevista, com vistas a uma auto avaliação sobre a participação nos encontros e também para avaliar as contribuições do estudo para o trabalho individual e em equipe.

Constatou-se que os profissionais manifestaram satisfação em ter participado do estudo, afirmando que este permitiu identificar e preencher algumas lacunas em relação aos conhecimentos relativos ao SUS e os despertou para a importância dos momentos de educação permanente.

Além disso, a maioria dos profissionais passou a reconhecer a influência dos determinantes sociais no processo saúde/doença e ampliou sua concepção a respeito do conceito de promoção da saúde, entendendo que ela é permeada por ações que

buscam contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e comunidade, não se restringindo, portanto, a prevenção de doenças.

4. DISCUSSÃO

O conceito de saúde sofreu diversas alterações ao longo do tempo, sendo influenciado por características próprias de cada período histórico (SILVA; LINS; CASTRO, 2016). O reconhecimento dos determinantes sociais e a formulação de um discurso sanitário que afirma a saúde em sua positividade é algo recente. No Brasil, surge a partir do Relatório Final da VIII Conferência Nacional de Saúde em 1986 (CZERESNIA, 2009).

Observa-se que os profissionais participantes do estudo, de um lado trazem uma visão ampliada sobre o conceito de saúde, entendendo que esta vai além da ausência de doença, o que é algo bastante positivo, uma vez que os conceitos permitem a viabilidade das intervenções operativas (CZERESNIA, 2009). Do outro, apresentaram dificuldade em descrever o papel da atenção primária, que envolve o desenvolvimento de ações de promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde (BRASIL, 2017).

Nesse sentido, o papel da atenção primária vai muito além de aspectos curativos. Através da ESF, ela se constitui como uma das principais tentativas de superação dos problemas resultantes do modelo biomédico e da consolidação dos princípios e diretrizes do SUS (FERTONANI et al, 2015).

O entendimento de que promoção da saúde corresponde à prevenção de doenças é algo ainda muito frequente entre os profissionais de saúde que atuam na atenção primária. Estudos realizados com equipes multiprofissionais e com enfermeiros da ESF (HEIDEMANN, WOSNY, BOEHS, 2014; ROCHA et al, 2012; TESSER et al, 2010), também evidenciaram que a promoção da saúde é compreendida como prevenção de doenças, não havendo o reconhecimento das diferenças existentes entre esses dois conceitos.

A promoção da saúde busca identificar os determinantes do processo saúde-doença de modo a transformá-los em direção a saúde e a garantir a qualidade de vida. Aponta para a necessidade de estratégias de ação intersetoriais e para a efetiva participação dos indivíduos e comunidades no cuidado de sua saúde. Enquanto a

prevenção objetiva a ausência de doenças, assim baseia-se em ações que buscam evitar o acontecimento de doenças específicas, reduzindo sua incidência e prevalência (BUSS, 2009; CZERESNIA, 2009; HEIDEMANN, WOSNY, BOEHS, 2014).

Concorda-se que há uma imprecisão conceitual sobre promoção da saúde, frente a um campo de tensões próprio da saúde com diversidades e contradições referentes à concepção e operacionalização, nos elementos práticos e estruturais. Os diferentes entendimentos a respeito da promoção da saúde e sua aplicação prática são diretamente influenciados pelo contexto histórico e pelo próprio entendimento sobre saúde (MAEYAMA et al, 2015; NETTO, SILVA, RUA, 2016).

As falas dos entrevistados demonstram que as ações de promoção da saúde desenvolvidas em seus processos de trabalho são resumidas a educação em saúde, e esta, por sua vez, é reduzida a palestras e dicas pautadas no discurso tradicional de repasse de informações, não havendo, portanto, estímulo à autonomia da população, prevalecendo o comportamento “bancário”, no qual há o “depósito” de conhecimentos durante as orientações oferecidas (FREIRE, 2011b).

Entende-se que a educação para a saúde precisa acontecer de maneira contextualizada, valorizando a experiência sociocultural dos sujeitos, reconhecendo-os em sua história, espaço e tempo. A partir dessa matriz, a educação para a saúde contribui para a formação de cidadãos autônomos e com consciência crítica (SOLIA; SILVA, 2017).

A constatação de que houve uma mudança de pensamento em relação à promoção da saúde e sobre a influência dos determinantes sociais do processo saúde-doença após a realização do processo educativo é algo muito positivo. É preciso repensar a promoção da saúde enquanto processo dialético, que permite a produção de conhecimentos e práticas que contribuam para o desenvolvimento da autonomia, para a redução de vulnerabilidades e o exercício dos direitos humanos (PORTO, PIVETTA, 2009).

5. CONCLUSÃO

Ao dialogar através de encontros educativos que partiram das necessidades identificadas nas falas dos profissionais a respeito da temática proposta, levando-os a

problematização e identificação de estratégias que visam à melhoria do cuidado prestado ao usuário, este estudo permitiu aos profissionais da atenção primária refletir criticamente sobre as ações de promoção da saúde realizadas em seu processo de trabalho, sentindo-se valorizados e motivados ao desenvolvimento dos princípios e diretrizes do SUS, com ênfase na resolutividade e na garantia do atendimento das necessidades de saúde da população em seus processos de trabalho.

Observa-se que os investimentos em ações que favoreçam o diálogo sobre promoção da saúde e sua inserção nos processos de trabalho dos profissionais ainda são incipientes, e que muito ainda precisa ser feito para que mudanças no campo conceitual e prático possam ser efetivadas na atenção primária, no que concerne à promoção da saúde.

Reconhece-se as limitações do estudo quanto a generalizações, mas sua relevância na produção do conhecimento sobre a promoção da saúde frente a Rede de Atenção à Saúde e ressalta-se a importância de ampliar para outros cenários estudos que permitam reflexões a respeito da promoção da saúde e sua inserção nos processos de trabalho na atenção primária.

REFERÊNCIAS

- ADAMS, C.; HOQUE, Z; MCNICHOLAS, P. Case studies and action research. *In*: HOQUE, Z (ed.). **Methodologic al issues in accoun-ting research – theories, methods and issues**. London: Spiramus, 2006. p. 361-73.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Política Nacional de Atenção Básica**. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. 110 p.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Projeto Promoção da Saúde. **As Cartas da Promoção da Saúde**. Brasília: Ministério da Saúde, 2002. 56 p.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância à Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. **Política Nacional de Promoção da Saúde**: PNaPS: revisão da Portaria MS/GM nº 687, de 30 de março de 2006. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 36 p.
- BRASIL. **Portaria Nº 2.436, de 21 de setembro de 2017**. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília: 2017.

- BUSS, P. M. Uma introdução ao conceito de promoção da saúde. In: CZERESNIA, D.; FREITAS, C. M. (org.). **Promoção da saúde: conceitos, reflexões e tendências**. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2009. p. 19-42.
- CZERESNIA, D. O conceito de Saúde e a diferença entre prevenção e promoção. In: CZERESNIA, D.; FREITAS, C. M. (org.). **Promoção da saúde: conceitos, reflexões e tendências**. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2009.
- DOMINGUES, M. P. **Pesquisa-ação e práticas educativas do enfermeiro psiquiátrico: incentivo a educação permanente em serviço**. 2009. Tese (Doutorado em Enfermagem Psiquiátrica) - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.
- FERTONANI, H. P. et al. Modelo assistencial em saúde: conceitos e desafios para a atenção básica brasileira. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 20, n. 6, p. 1869-78.
- FREIRE, P. **Educação como prática da liberdade**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011a.
- FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
- FREIRE, P. **Pedagogia do oprimido**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011b.
- GERMANI, A. C. C. G.; AITH, F. Advocacia em promoção da saúde: conceitos, fundamentos e estratégias para a defesa da equidade em saúde. **Revista De Direito Sanitário**, v. 14, n. 1, p. 34-59, 2013.
- HEIDEMANN, I. T. S. B.; WOSNY, A. M.; BOEHS, A. E. Promoção da Saúde na Atenção Básica: estudo baseado no método de Paulo Freire. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 19, n. 8, p. 3553-59, 2014.
- LOPES, M. S. V. et al. Promoção da saúde na percepção de profissionais da estratégia saúde da família. **Rev Rene**, v. 14, n. 1, p. 60-70, 2013.
- MAEYAMA, M. A. et al. Promoção da saúde como tecnologia para transformação social. **Revista Brasileira de Tecnologias Sociais**, v. 2, n. 2, p. 129-43, 2015.
- MENDES, R.; PEZZATO, L. M.; SACARDO, D. P. Pesquisa-intervenção em promoção da saúde: desafios metodológicos de pesquisar “com”. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 21, n. 6, p. 1737- 45, 2016.
- NETTO, L.; SILVA, K. L.; RUA, M. S. Desenvolvimento de competências para promoção da saúde e mudança no modelo assistencial. **Texto Contexto Enfermagem**, v. 25, n. 2, p. 1-7, 2016.
- PEREIRA, I. C.; OLIVEIRA, M. A. C. O trabalho do agente comunitário na promoção da saúde: revisão integrativa da literatura. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 66, n. 3, p. 412-9, 2013.

- PITANO, S. C.; ROSA, C. S.; DAUDT, P.F. Conhecer e transformar: pesquisa-ação e pesquisa participante em diálogo internacional. **Reflexão & Ação**, v. 22, n. 2, p. 488-92, 2014.
- PORTO, M. F. S.; PIVETTA, F. Por uma promoção da saúde emancipatória em territórios urbanos vulneráveis. *In*: CZERESNIA, D.; FREITAS, C. M. (org.). **Promoção da saúde**: conceitos, reflexões e tendências. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2009.
- ROCHA, P. A. et al. Promoção da saúde: a concepção do enfermeiro que atua no programa saúde da família. **Revista Brasileira de Promoção da Saúde**, v. 25, n. 2, p. 215-20, 2012.
- SILVA, E. S.; LINS, G. A.; CASTRO, E. M. N. V. Historicidade e olhares sobre o processo saúde-doença: uma nova percepção. **Revista SUSTINERE**, v. 4, n. 2, p. 171-86, 2016.
- SOLIA, F. S. F.; SILVA, S. S. Educação para saúde por meio de processos dialógicos e o autocuidado da pessoa surda. **Ciência & Educação**, v. 23, n. 3, p. 677-89, 2017.
- TESSER, C. D. et al. Concepções de promoção da saúde que permeiam o ideário de equipes da estratégia saúde da família da grande Florianópolis. **Revista de Saúde Pública de Santa Catarina**, v. 3, n. 1, p. 42-56, 2010.
- THIOLLENT, M. **Metodologia da pesquisa-ação**. São Paulo: Cortez, 2011.

CAPÍTULO V

SAÚDE MENTAL DOS ALUNOS DE GRADUAÇÃO NA PANDEMIA DE COVID-19

DOI: 10.51859/ampla.csa511.1121-5

Synara Sepúlveda Sales ¹

Talita Mendes da Costa ²

Maria Julia Pegoraro Gai ³

¹ Mestre em Psicologia – Universidade Tuiuti do Paraná (UTP).

² Pós-graduanda em Educação na Universidade Cesumar (UNICESUMAR).

³ Doutoranda em Psicologia na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

RESUMO

A pandemia de COVID-19 afetou significativamente a saúde mental da população como um todo. No caso dos estudantes de graduação, os problemas de saúde mental parecem ter se agravado durante esse período, especialmente por estarem expostos a diferentes eventos estressores, que intensificam sua vulnerabilidade. Com isso, esse grupo torna-se suscetível aos impactos do contexto atual. Considerando esse cenário, este artigo objetiva contextualizar os fatores atrelados à saúde mental em estudantes universitários no contexto da pandemia de COVID-19. Para isso, foi realizada uma revisão de literatura integrativa nas bases de dados *Science Direct*, *Pubmed* e *BVS* de artigos publicados em 2020 e 2021. Do total de 840 artigos identificados, excluiu-se os documentos que não contemplavam os aspectos relacionados ao tema da pesquisa, restando 40 artigos que foram incluídos. Os fatores estressores identificados foram isolamento, transição abrupta para as aulas online, situação financeira, preocupação com a saúde, família, amigos e futuro resultando em altos índices de transtornos depressivos e de ansiedade, alterações nos hábitos alimentares, frustração, constante vigília, estando presente em maior intensidade em estudantes da área de saúde. Observa-se a necessidade de pesquisas sobre os impactos à saúde mental dos estudantes universitários a longo prazo, especialmente após o controle da pandemia, visando o desenvolvimento de mecanismos para a promoção e manutenção da saúde mental e o bem-estar desses futuros profissionais.

Palavras-chave: Saúde Mental. Alunos. Pandemia. COVID-19.

1. INTRODUÇÃO

A detecção do novo vírus SARS-CoV-2, doença a qual popularmente foi denominada como COVID-19 trouxe repercussões a nível mundial. A alta virulência do novo coronavírus, associada à inexistência de um tratamento eficaz para a doença, levou

à adoção de medidas emergenciais preventivas como a quarentena e o isolamento social (HOSSAIN, SULTANA & PUROHIT, 2020).

As instituições de ensino tiveram que reformular o modo de lecionar ao aderir ao ensino remoto, colocando em prática a portaria de nº 343/2020, que autoriza em caráter excepcional, a adequação das disciplinas presenciais em andamento por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação para a continuidade do ensino (BRASIL, 2020). Esta transformação da estrutura educacional acarretou uma migração de táticas metodológicas do ensino presencial para os ambientes virtuais de aprendizagem. Em virtude do fechamento das universidades, a educação mediada por tecnologias - como o Ensino a Distância (EaD) - suscitou inúmeros debates sobre os rumos da educação na atualidade e no período pós-COVID-19, evidenciando novas oportunidades para a educação (MARTINS, 2020).

A saúde mental da população estudantil tem sido uma preocupação por vários anos e a pandemia exacerbou esse problema. Dentre os diversos impasses gerados nesta crise, se comparado a períodos anteriores, nota-se um aumento significativo de relatos de ansiedade, depressão e estresse, assim como sentimentos de tristeza, fadiga, distúrbio do sono, redução significativa da concentração, alterações nos hábitos alimentares, frustração, constante vigília, preocupação e o medo da perda de amigos e familiares (SIQUEIRA, 2020; MORALES; LOPEZ, 2020; GUNDIM et al., 2021).

Alguns alunos não possuem amparo físico, familiar e emocional, evidenciando um quadro alarmante e desfavorável na comunidade acadêmica. As inquietações a respeito do bem-estar dos discentes durante o período de isolamento social ultrapassam os limites físicos e os efeitos decorrentes das medidas de isolamento social e adequação da modalidade de ensino remoto, acarretam danos à saúde mental a curto e longo prazo (MORALES; LOPEZ, 2020).

Há fatores que dificultam o acesso às atividades remotas por parte dos estudantes, como a falta de conhecimento tecnológico, condições sociais e econômicas, além da falta de motivação e isolamento, dificultando o desenvolvimento de estratégias, uma vez que não garante o acesso uniforme e equânime a todos os estudantes. Dessa forma, o impacto da pandemia refletirá no ensino superior por um tempo maior que o esperado (GUNDIM et al., 2021). Portanto, se faz necessário averiguar o contexto da vida do universitário em todas as esferas, assimilando as modificações nos aspectos

físicos, psicológicos, financeiros e ocupacionais que decorreram do isolamento social (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2020).

A saúde mental dos alunos de graduação sofreu alterações em resposta à pandemia COVID-19 em comparação com períodos anteriores. Pesquisas apontam que os problemas de saúde mental podem prejudicar significativamente o sucesso acadêmico e as interações sociais dos alunos, afetando sua carreira futura e oportunidades pessoais (KECOJEVIC; BASCH; SULLIVAN; DAVI, 2020). Dessa forma, o objetivo da pesquisa é identificar os fatores associados ao aumento dos problemas de saúde mental de estudantes de graduação durante o período da pandemia de COVID-19.

2. MÉTODO

Para alcançar o objetivo proposto neste trabalho, executou-se uma revisão integrativa da literatura seguindo o modelo de Hopia, Latvala e Liimatainen (2016), composto por 4 etapas:

1) identificação do problema de estudo e revisão de literatura. Quais são fatores associados ao aumento dos problemas de saúde mental de estudantes universitários durante o período da pandemia de COVID-19?

2) Definição dos critérios de inclusão, que são: estudos teóricos e empíricos publicados no ano de 2020 e 2021 disponibilizados nas bases de dados Science Direct, Pubmed e BVS. Os descritores utilizados foram: “*mental health AND undergraduate students AND COVID-19*” foram selecionados os textos considerando título, resumo e palavras-chave, conforme o DeCS (Descritores em Ciências da Saúde). Foram identificados um total de 840 artigos distribuídos entre as bases de dados: Science Direct (16), Pubmed (744), BVS (80).

3) Critérios de exclusão para análise dos textos selecionados: os textos foram analisados com base em três filtros sequenciais: a) leitura dos 840 resumos, com retirada dos textos duplicados entre as bases (16); b) exclusão dos 784 artigos que não abordavam os aspectos relacionados à saúde mental dos estudantes de graduação na pandemia de COVID-19.

A partir disso, foram eleitos os textos relacionados ao objetivo deste estudo, totalizando 40 artigos. Além destes textos centrais para este estudo, outros documentos sobre saúde mental foram incluídos, bem como aqueles relacionados à pandemia de COVID-19.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os problemas de saúde mental entre estudantes universitários parecem ter se agravado durante a pandemia de COVID-19 e demonstram ser uma preocupação da saúde pública (BATRA et al., 2021). A pandemia provocou turbulências na sociedade como um todo, em especial no agravamento dos problemas de saúde mental, em que estudos sugerem a necessidade de intervenções. Dessa forma, além do impacto direto na saúde física, houve alterações no bem-estar psicológico dos estudantes devido ao medo, incerteza, quarentena, isolamento social entre outros (HUCKINS et al., 2020).

O aumento do interesse em pesquisas relacionadas à COVID-19 associa-se ao aumento de casos de depressão e ansiedade, assim como mudanças comportamentais. Pesquisas apontam que os estudantes de Dartmouth, nos Estados Unidos, tornaram-se mais sedentários, visitaram menos locais e usaram mais os celulares, com aumento da duração do tempo em frente a tela (HUCKINS et al., 2020). Com o agravamento da pandemia, identificou-se que os estudantes dormiram menos (MACK et al., 2021; HUCKINS et al., 2020). Ainda no contexto dos Estados Unidos, houve uma piora na saúde mental associada a perdas de empregos, dificuldades de enfoque no trabalho acadêmico e preocupação com a COVID-19 (KECOJEVIC; BASCH; SULLIVA; DAVI, 2020; DHAR; AYITTEY; SARKAR, 2020). Fatores como tipo de residência, estado civil, residir ou não com pais, situação financeira, apoio social e familiar influenciou nos níveis e intensidade da ansiedade (MUDENDA et al., 2020).

Um aumento significativo de episódios depressivos foi relatado por jovens de 18 a 25 anos nos Estados Unidos, bem como o aumento de pensamentos relacionados a automutilação ou suicídio desde o início da pandemia (FRUEHWIRTH; BISWAS; PEREIRA, 2021). As regras de isolamento social alteraram significativamente o estilo de vida e as relações entre as pessoas que desenvolveram sintomas de ansiedade e insegurança, devido ao medo de contrair o vírus (SUNDARASEN et al., 2020).

Alunos de uma universidade pública em Northern New Jersey, Estados Unidos, demonstraram que o aumento dos níveis de depressão foi associado a dificuldades de adaptação a nova modalidade de ensino, concentração e realização de trabalhos acadêmicos e os aspectos financeiros e pessoais como obtenção de medicamentos e artigos de higiene (KECOJEVIC; BASCH; SULLIVAN; DAVI, 2020). Houve relatos de impactos na saúde mental, em que os sintomas mais frequentes foram ansiedade, angústia, insônia e medo (CAMPOS; CAMPOS; BUENO; MARTINS, 2021). Os alvos mais impactados têm sido as minorias raciais e étnicas, em que fatores sociais e econômicos transparecem disparidades existentes em períodos anteriores à pandemia (DORN; COONEY; SABIN, 2020).

Estudos apontam que os estudantes da Universidade da Zâmbia, no sul da África, tiveram um impacto negativo na saúde mental e na atividade física neste período de pandemia. Os alunos que experienciaram ansiedade associada aos riscos da COVID-19 e redução do tempo destinado a qualquer tipo de atividade física apresentaram maiores impactos na vida acadêmica. Para lidar com baixos níveis de bem-estar físico e mental durante a pandemia, sugeriu-se que as pessoas realizassem exercícios em casa. Estudos apontam que estudantes universitários que dormem e acordam mais cedo fizeram exercícios físicos e mantiveram uma dieta regular, apresentaram menos sintomas depressivos. As interrupções dos ritmos circadianos podem levar a mudanças afetivas e podem desencadear ou exacerbar os sintomas em indivíduos com predisposição para transtornos mentais (CHEN et al., 2020).

A maioria dos alunos acredita que o vírus da COVID-19 é perigoso, que o isolamento social é importante e tais percepções geram insegurança em relação à pandemia, em especial nos casos em que convivem com pessoas que testaram positivo para a COVID-19 (CAMPOS; CAMPOS; BUENO; MARTINS, 2021). Neste misto de vivências, as notícias e mídias sociais causaram as mais variadas emoções, como depressão, ansiedade, estresse, aborrecimento, medo, frustração, raiva, dificuldades da vida diária, injustiça social, corrupção, entre outros (WANG; ZHAO, 2020). Os principais estressores identificados são a preocupação com a saúde, família, amigos e com o futuro (ELMER; MEPHAM; STADTFELD, 2020). Preocupações referentes ao impacto financeiro, vida acadêmica, problemas pessoais de saúde e de pessoas do convívio familiar também

são fatores influentes à saúde mental durante esse período (LISCHER; SAFI; DICKSON, 2021).

Durante a fase inicial da pandemia, foi relatado que os estudantes universitários estavam expostos a mais tempo de tela, em grande parte devido ao aumento do isolamento social (SAVAGE et al., 2021). Ao coletar dados de pesquisas de estudantes universitários nos Estados Unidos no Google e no Youtube, percebeu-se que houve um aumento de atividades prolongadas nestas plataformas, em que 49% dos alunos tiveram um aumento nos escores de depressão e 53% obtiveram um aumento nos escores de ansiedade, medidos pelos instrumentos *Patient Health Questionnaire (PHQ-9)* e *Generalized Anxiety Disorder (GAD-7)* (ZHANG et al., 2020). O tempo de exposição às notícias relacionadas à pandemia pode ter contribuído para um aumento de pensamentos intrusivos e hiperexcitação. Estudos apontam que além das incertezas relacionadas à própria pandemia, existe uma grande quantidade de informações falsas ou manipuladas que podem gerar medo e confusão (HUCKINS et al., 2020).

Os estudos de Sundaresan et al. (2020) e Hasan e Bao (2020) apontaram que na Malásia os fatores de estresse dos estudantes incluíam restrições financeiras, ensino online ineficazes, incerteza sobre o futuro, bem como o medo de perder o ano letivo. O medo, sendo um fator multifacetado, é um dos fatores mais importantes do comprometimento da saúde mental e do bem-estar e podem causar mais danos, espalhando-se mais rápido que o próprio vírus (ELSHARKAWY; ABDELAZIZ, 2020). No Paquistão os estressores estão associados ao ensino online, preocupações com o desempenho acadêmico, a conclusão do semestre atual, as incertezas relacionadas às datas das provas e expectativas sobre o próximo semestre (BALOCH et al., 2021).

As estudantes do sexo feminino apresentaram níveis mais altos de ansiedade e depressão em relação aos estudantes do sexo masculino (BATRA et al., 2020; AIYER et al., 2020). Na Suíça, fatores como o sexo, indicam significativa ligação com estressores, em que as estudantes do sexo feminino demonstram maior risco de enfrentar consequências negativas para a saúde mental (ELMER; MEPHAM; STADTFELD, 2020). Os casos parecem se agravar em estudantes com histórico de experiências traumáticas, resultando em maiores taxas de ansiedade, depressão e reações de estresse agudo exacerbados na pandemia (LI et al., 2021).

Na Austrália, alunas universitárias com idades entre 18 e 24 anos, apresentaram mais sintomas de ansiedade e depressão (DODD et al., 2021). No cotidiano paquistanês, a COVID-19 não somente intensificou as restrições à transição do sistema educacional, como também expôs o patriarcado e seus resultados para as mulheres no país. Com isso, deve-se considerar as dificuldades das alunas sobre o acesso ao ensino, sendo foco de intervenção das políticas nacionais de educação (BALOCH et al., 2021).

Em Blagadesh, 54% das mulheres sofreram significativamente mais sintomas depressivos do que os homens (SAFA et al., 2021). Alunas de uma faculdade de ciências humanas relataram mais medo. Esse achado pode ter relação com uma carga maior de trabalho doméstico, papel de cuidadora ou violência doméstica (ELSHARKAWY; ABDELAZIZ, 2020). Para alguns autores, as pesquisas indicaram o contrário da maioria dos estudos, em que se identificou que a taxa de ansiedade entre estudantes do sexo masculino foi significativamente maior do que entre estudantes do sexo feminino (HAN et al., 2021).

Estudantes de graduação da área da saúde, de modo predominante mulheres jovens e com histórico de doenças crônicas, apresentaram mais sintomas de depressão e ansiedade. Dois terços de um grupo de estudantes e profissionais de saúde do Kuwait, com idade entre 18 e 29 anos indicaram depressão moderadamente severa ou depressão severa (ALSAIRAFI et al., 2021). Na Grécia, Espanha e Albânia, um terço da população de estudantes de enfermagem experimentou depressão leve, com níveis mais altos de depressão observados em estudantes espanhóis. Os fatores como sexo, estado civil e tipo de moradia influenciou nos resultados e a diminuição da idade foi associada ao aumento da depressão (PATELAROU et al., 2021; COUGHENOUR et al., 2020). Na China, estudantes de graduação em enfermagem apresentaram baixa avaliação cognitiva e maior prevalência de ansiedade e depressão (ZHU; WANG; WANG, 2021).

Estudos realizados na Índia e Marrocos apontaram que, ao comparar dados de antes e durante a pandemia, houve um aumento significativo nos níveis de estresse, com níveis de ansiedade dez vezes mais graves, com piora na saúde emocional durante o primeiro ano (SARASWATHI et al., 2020; ESSANGRI et al., 2020). O medo de contrair ou disseminar o vírus influencia consideravelmente os índices de problemas mentais dos

estudantes de medicina de Bangladesh, que apresentam maior prevalência de ansiedade e sintomas depressivos (SAFA et al., 2021).

Ao se considerar as instalações familiares, percebe-se que alguns alunos possuem oportunidades de aprendizagem desiguais, como ter apenas um cômodo servindo como dormitório e escritório, falta de aparelhos (computadores) e/ou dificuldade de acesso à internet (CAMACHO-ZUNIGA; PEGO; ESCAMILLA; HOSSEINI, 2021). As desigualdades no acesso aos meios digitais ficam evidenciadas durante a pandemia de COVID-19 (LISCHER; SAFI; DICKSON, 2021).

A exposição aos acontecimentos traumáticos durante períodos críticos da vida torna os estudantes chineses suscetíveis a diferentes níveis de ansiedade (WANG; ZHAO, 2020; ARREBOLA et al., 2020), principalmente aqueles com problemas de saúde mental preexistentes, experiências de abusos, negligências, vulnerabilidade em relação a contaminação resultando em um maior impacto na saúde mental (ALYSSA et al., 2021; TANG et al., 2020). Outro fator de impacto negativo foi o desemprego ou a demissão do trabalho (QI et al., 2020).

O estresse associado ao distanciamento físico, isolamento social e falta de interação com o ambiente educacional podem gerar impactos imediatos, como também a longo prazo após o fim da pandemia (LIGUS et al., 2021). O impacto da pandemia de COVID-19 no gerenciamento de problemas de saúde mental foi significativo. Com o interrompimento de consultas de saúde e a falta de acesso a medicamentos, desenvolver uma autoeficácia em saúde mental torna-se um fator de proteção ao bem-estar psicológico (LIGUS et al., 2021).

Estudos realizados na Turquia e na Austrália apontam que os significados atribuídos a vida e a saúde dos universitários é um dos componentes mais importantes para lidar com estressores em tempos difíceis. As concepções positivas refletem significativamente no bem-estar emocional, bem-estar social e bem-estar psicológico (ARSLAN et al., 2020; DODD, et al., 2021). Cabe ressaltar que o bem-estar emocional na pandemia depende de fatores tanto no nível individual quanto social (CLABAUGH et al., 2021).

Os estudantes com características altruístas, vivenciaram um alto risco na pandemia e dessa forma, sentiram-se impedidos de ajudar os outros, fato que pode ter reduzido sua autoeficácia e aumentado seus sentimentos de desamparo e outras

emoções negativas. A prevalência de características altruístas, assim como maior empatia para com os pacientes infectados e mais deprimidos torna os estudantes mais suscetíveis ao aumento da ansiedade e sintomas depressivos (FENG et al., 2020).

As instituições de ensino superior e os órgãos responsáveis devem formular políticas educacionais para maior atenção e apoio acadêmico, emocional e financeiro aos grupos mais fragilizados neste período (DODD et al., 2021), com financiamentos de subsídios de emergência (NISHIMURA et al., 2021). Isso pode desempenhar um papel fundamental de monitoramento durante a pandemia, auxiliando os alunos com os problemas de saúde mental visando a construção de um futuro melhor (DHAR; AYITTEY; SARKAR, 2020).

Será necessário que as universidades das áreas de saúde implementem novas políticas de segurança para reforçar o controle geral de infecções e higiene, o que muitas vezes é mal praticado pelos alunos. Uma revisão do currículo também será necessária para incluir o ensino sobre a COVID-19, uma vez que os estudantes dessas áreas podem tratar pacientes no futuro que sofrem de comorbidades crônicas associadas ao coronavírus (RAINBOW; DORJI, 2020).

As instituições educacionais devem reconhecer a insegurança relacionada às dificuldades financeiras e escassez de alimentos básicos. Estudos longitudinais de acompanhamento são necessários para rastrear a evolução dos sintomas e medir o impacto a longo prazo da pandemia (ESSANGRI et al., 2020).

Atividades em grupos virtuais e/ou noite de cinema virtual para um melhor enfrentamento neste período podem orientar e contribuir para um melhor desempenho físico, social e educacional dos estudantes. Cabe evidenciar que não existe uma solução padronizada para esta situação, portanto, é necessário continuar monitorando as mudanças para entender o efeito da pandemia e elaborar novas formas de apoiar os estudantes (SCHLESSELMAN; CAIN; DIVALL, 2020).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos dados identificados nessa pesquisa, observa-se que as políticas para lidar com a pandemia variaram entre os países. No entanto, ações de resposta como distanciamento social, bloqueios e recomendações ou ordens para o isolamento social

foram introduzidas. Fica evidente a vulnerabilidade dos universitários em diversos níveis de sua formação. Em meio a pandemia de COVID-19, com as aulas inicialmente suspensas e posteriormente sendo desenvolvidas de modo remoto, as instituições superiores tornaram-se um ambiente suscetível a interferências externas e os alunos ficaram expostos a estressores adicionais como a insegurança, insônia, isolamento social, aulas remotas, maior tempo de exposição à tela e às notícias sobre a pandemia, resultando em agravos na saúde mental, com o desenvolvimento de sintomas depressivos e ansiosos.

Alguns estudos apontaram que os estudantes do sexo feminino, relataram baixos níveis de bem-estar e medo, e que pode estar relacionado com uma carga maior de trabalho doméstico, papel de cuidadora ou violência doméstica. Em outras pesquisas, os estudantes do sexo masculino demonstraram mais sintomas de ansiedade do que os estudantes do sexo feminino. Tais amostras apontam que a maioria dos estudantes, independente do sexo, relatam dificuldades de adaptação à nova realidade pessoal, acadêmica, profissional e social em decorrência da pandemia de COVID-19.

Apesar dos grandes avanços científicos em torno da COVID-19 ainda há dúvidas acerca do futuro e as incertezas que permeiam a vida acadêmica dos universitários são alvo de preocupações. Os impactos causados pelas fases da pandemia só serão esclarecidos ao decorrer dos anos. Nesse sentido é necessário a identificação e análise contínua dos aspectos que fundamentam a realidade acadêmica, desenvolvendo mecanismos para a promoção e manutenção da saúde mental e o bem-estar dos futuros profissionais.

REFERÊNCIAS

- AIYER, Akshar et al. Covid-19 anxiety and stress survey (cass) in high school and college students due to coronavirus disease 2019. **Chest**, v. 158, n. 4, p. 314, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.chest.2020.08.312>. Acesso em: 05 de maio 2021.
- ALSAIRAFI, Zahra et al., (2021). Mental Health Status of Healthcare Professionals and Students of Health Sciences Faculties in Kuwait during the COVID-19 Pandemic. **Int. J. Environ. Res. Public Health**, v. 18, n. 4, p. 1-15, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/ijerph18042203>. Acesso em: 28 de maio 2021.

- ALYSSA, A. Guo; MARISSA, A. Crum; LAUREN, A. Fowler. Assessing the Psychological Impacts of COVID-19 in Undergraduate Medical Students. **Int J Environ Res Public Health**, v. 18, n. 6, p. 1-14, mar. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/ijerph18062952>. Acesso em: 05 de maio 2021.
- ARREBOLA, Inmaculada Alemany et al. Influence of COVID-19 on the perception of academic self-efficacy, state anxiety and trait anxiety in university students. **Frontiers in psychology**, v. 11, n. 570017, p. 1-7, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.570017>. Acesso em: 05 de maio 2021.
- ARSLAN, Gökmen et al. Meaningful Living to Promote Complete Mental Health Among University Students in the Context of the COVID-19 Pandemic. **International journal of mental health and addiction**, p. 1-13, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s11469-020-00416-8>. Acesso em: 29 de maio 2021.
- BALOGH, Gul. Muhammad. et al. COVID-19: exploring impacts of the pandemic and lockdown on mental health of Pakistani students. **PeerJ.**, v. 9, n. 10612, p. 1-15, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.7717/peerj.10612>. Acesso em: 28 de maio 2021.
- BATRA, Kavita et al. Assessing the psychological impact of COVID-19 among university students: evidence from 15 countries. **Health care**, v. 9, n. 2, p. 1-18, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/healthcare9020222>. Acesso em: 05 de maio 2021.
- CAMACHO-ZUNIGA, Claudia et al. The impact of the COVID-19 pandemic on students' feelings at high school, undergraduate and graduate levels. **Heliyon**, v. 7, n. 3, p. 1-11, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06465>. Acesso em: 28 de maio 2021.
- CAMPOS, Juliana Alvares et al. Emotions and mood swings of pharmacy students in the context of the coronavirus disease of 2019 pandemic. **Curr Pharm Teach Learn**, v. 13, n. 6, p. 635-642, jun. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.cptl.2021.01.034>. Acesso em: 28 de maio 2021.
- CHEN, Rong-ning et al. Mental health status and change in living rhythms among college students in China during the COVID-19 pandemic: A large-scale survey. **J Psychosom Res**, v. 137, n. 110219, aug. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2020.110219>. Acesso em: 29 de maio 2021.
- CLABAUGH, Alison; DUKE, Juan. F.; FIELDS, Logan. J. Academic stress and emotional well-being among college students in the United States after the beginning of the COVID-19 pandemic. **Frontiers in Psychology**, v.12, n.628787, p. 1-8, mar. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.628787>. Acesso em: 28 de maio 2021.

- COUGHENOUR, Courtney et al. Changes in Depression and Physical Activity Among College Students on a Diverse Campus After a COVID-19 Stay-at-Home Order. **J Community Health**, nov. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s10900-020-00918-5>. Acesso em: 29 de maio 2021.
- DHAR, Bablu Kumar; AYITTEY, Foster Kofi; SARKAR, Sabrina Maria. Impact of COVID-19 on Psychology among the University Students. **Glob Chall**, v.4, n.2000038, p.1-5, sep. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/gch2.202000038>. Acesso em: 05 de maio 2021.
- DODD, Rachael H. et al. Psychological Wellbeing and Academic Experience of University Students in Australia during COVID-19. **Int. J. Environ. Res. Public Health**, v.18, n. 3, p. 1-12, jan. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/ijerph18030866>. Acesso em: 12 de maio 2021.
- ELMER, Timon; MEPHAM, Kieran; STADTFELD, Christoph. Students under lockdown: Comparisons of students' social networks and mental health before and during the COVID-19 crisis in Switzerland. **PLoS ONE**, v.15, n.7, p. 1-22, jul. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0236337>. Acesso em: 28 de maio 2021.
- ELSHARKAWY, Nadia Bassuoni; ABDELAZIZ, Enas Mahrous. Levels of fear and uncertainty regarding the spread of coronavirus disease (COVID-19) among university students. **Perspect Psychiatr Care**, v. 10, p. 1-9, nov. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/ppc.12698>. Acesso em: 12 de maio 2021.
- ESSANGRI, Hajar et al. Predictive Factors for Impaired Mental Health among Medical Students during the Early Stage of the COVID-19 Pandemic in Morocco **Am J Trop Med Hyg**, v.104, n.1, p. 95-102. Disponível em: <https://doi.org/10.4269/ajtmh.20-1302>. Acesso em: 29 de maio 2021.
- FENG, Yi et al. When altruists cannot help: the influence of altruism on the mental health of university students during the COVID-19 pandemic. **Global Health** v.16, n.61, p. 1-8, jul. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s12992-020-00587-y>. Acesso em: 12 de maio 2021.
- FRUEHWIRTH, Jane Cooley; BISWAS, Siddhartha; PERREIRA, Krista M. The Covid-19 pandemic and mental health of first-year college students: Examining the effect of Covid-19 stressors using longitudinal data. **PLoS One**, v.16, n.3, p.1-15, mar. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0247999>. Acesso em: 27 de maio 2021.
- HAN, Wantong et al. Online survey on college student anxiety during the COVID-19 outbreak. **Research in psychology and behavior management**, v.14, p.385-392, mar. 2021 Disponível em: <https://doi.org/10.2147/PRBM.S298539>. Acesso em: 28 de maio 2021.

- HASAN, Najmul; BAO, Yukun. Impact of “e-Learning crack-up” perception on psychological distress among college students during COVID-19 pandemic: A mediating role of “fear of academic year loss”. **Child Youth Serv Rev.** v.118, p. 1-9, nov. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.chilgyouth.2020.105355>. Acesso em: 05 de maio 2021.
- HUCKINS, Jeremy F. et al. Mental Health and Behavior of College Students During the Early Phases of the COVID-19 Pandemic: Longitudinal Smartphone and Ecological Momentary Assessment Study. **J Med Internet Res**, v.22, n.6, p. 20185, jun. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.2196/20185>. . Acesso em: 29 de maio 2021.
- KECOJEVIC, Aleksandar et al. The impact of the COVID-19 epidemic on mental health of undergraduate students in New Jersey, cross-sectional study. **PLoS ONE**, v.15, n.9, p. 1-16, sep. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0239696>. Acesso em: 29 de maio 2021.
- LI, Xiaojing et al. Psychological stresses among Chinese university students during the COVID-19 epidemic: The effect of early life adversity on emotional distress. **Journal of affective disorders**, v. 282, p. 33–38, dec. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.12.126>. Acesso em: 28 de maio 2021.
- LIGUS, Kaleigh et al. Interruptions in the management and care of university students with pre-existing mental health problems during the COVID-19 pandemic, **Translational Behavioral Medicine**, v.11, n.3, p.802-807, mar. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/tbm/ibab020>. Acesso em: 29 de maio 2021.
- LISCHER Suzanne; SAFI, Netkey; DICKSON, Cheryl. Remote learning and students' mental health during the Covid-19 pandemic: A mixed-method enquiry. **Prospects**, p. 1-11, jan. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s11125-020-09530-w>. Acesso em: 28 de maio 2021.
- MACK, Dante et al. Mental Health and Behavior of College Students in the COVID-19 Pandemic: A Longitudinal Mobile Smartphone and Ecological Momentary Assessment Study. **Journal of medical Internet research**, apr. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.2196/28892>. Acesso em: 12 de maio 2021.
- MUDENDA, Steward et al. Impact of the Coronavirus Disease (COVID-19) on the Mental Health and Physical Activity of Pharmacy Students at the University of Zambia: A Cross-Sectional Study. **Int J Basic Clin Pharmacol**, v.10, n.4, p.324-332, jan. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1101/2021.01.11.21249547> . Acesso em: 27 de maio 2021.
- NISHIMURA, Yoshito et al. Impact of the COVID-19 Pandemic on the Psychological Distress of Medical Students in Japan: Cross-sectional Survey Study. **J Med Internet Res**, v.23, n. 2, p. 25232, feb. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.2196/25232>. Acesso em: 06 de maio de 2021.

- PATELAROU, Athina et al. Nursing students, mental health status during COVID-19 quarantine: evidence from three European countries. **Journal of mental health**, v.28, p.1-6, jan. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/09638237.2021.1875420> Acesso em: 06 de maio de 2021.
- RAINBOW, Sophie; DORJI, Tenzin. Impact of COVID-19 on medical students in the United Kingdom. **Germes**, v.10, n.3, p.240–243, sep. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.18683/germes.2020.1210>. Acesso em: 05 de maio 2021.
- SAFA, Farhana et al. Immediate psychological responses during the initial period of the COVID-19 pandemic among Bangladeshi medical students. **Children and youth services review**, v.122, n.105912, p. 1-9 mar. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105912>. Acesso em: 29 de maio 2021.
- SARASWATHI, Ilango et al. Impact of COVID-19 outbreak on the mental health status of undergraduate medical students in a COVID-19 treating medical college: a prospective longitudinal study. **PeerJ**, v. 16 n. 8, p. 10164, oct. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.7717/peerj.10164>. Acesso em: 12 de maio 2021.
- SAVAGE, M Matthew et al. Nine Months into the COVID-19 Pandemic: A Longitudinal Study Showing Mental Health and Movement Behaviours Are Impaired in UK Students. **Int J Environ Res Public Health**, v.18, n.6, p. 1-10, mar. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/ijerph18062930>. Acesso em: 28 de maio 2021.
- SUNDARASEN, Sheela et al. Psychological impact of COVID-19 and the blockade among university students in Malaysia: implications and policy recommendations. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v.17, n.17, p.1-13, Aug. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/ijerph17176206>. Acesso em: 28 de maio 2021.
- TANG, Wanjie et al. The role of alexithymia in the mental health problems of home-quarantined university students during the COVID-19 pandemic in China. **ELSEVIER, Pers Individ Dif**, v.165, p 110131, oct. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110131>. Acesso em: 29 de maio 2021.
- WANG, Chongying; ZHAO, Hong. The Impact of COVID-19 on Anxiety in Chinese University Students. **Front Psychol**, v.11, n.1168, p.1-8, may. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01168>. Acesso em: 28 de maio 2021.
- WANG, Xiaomei et al., (2020). Investigating Mental Health of US College Students During the COVID-19 Pandemic: Cross-Sectional Survey Study. **J Med Internet Res**, v.22, n.9, p e22817 , sep. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.2196/22817>. . Acesso em: 29 de maio 2021.

ZHANG, Boyu et al. The Relationships of Deteriorating Depression and Anxiety With Longitudinal Behavioral Changes in Google and YouTube Use During COVID-19: Observational Study. **JMIR mental health**, v.7, n.11, p. 24012, nov. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.2196/24012>. Acesso em: 05 de maio 2021.

ZHU, Yuanyuan; WANG, Hongyun; WANG, Aihong. An evaluation of mental health and emotion regulation experienced by undergraduate nursing students in China during the COVID-19 pandemic: A cross-sectional study. **International journal of mental health nursing**, v.10, p. 1-10, apr. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/inm.12867>. Acesso em: 29 de maio 2021.

CAPÍTULO VI

ATUAÇÃO DISCENTE NA ELABORAÇÃO DE UM WORKSHOP SOBRE SAÚDE MENTAL PARA PRÉ-VESTIBULANDOS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19

DOI: 10.51859/ampla.csa511.1121-6

Jessica Araújo Cavalcante ¹
Viviane Sthefanni Alves Rabelo ¹
Maria Natália Feitosa de Sousa ¹
Barbara Lívia Queirós Alves ¹
Jorge Wambaster Freitas Farias ²
Tatiana Paschoalette Rodrigues Bachur ³

¹ Graduanda do curso de Medicina. Universidade Estadual do Ceará – UECE.

² Mestre em Psicologia. Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Universidade Federal do Ceará – UFC.

³ Professora Doutora do curso de Medicina. Universidade Estadual do Ceará – UECE.

RESUMO

A saúde mental tem sido alvo de debate com bastante frequência, principalmente durante a pandemia de COVID-19, frente às condições exigidas de isolamento social, em que os pré-vestibulandos têm vivenciado um período de muitas incertezas, ansiedade, procrastinação, fadiga física e mental. Neste contexto, discentes de medicina com o desejo de ajudar esse público, decidiram realizar um *workshop*, com o intuito de promover meios de melhorar a saúde mental de pré-vestibulandos. A participação de estudantes de medicina na criação desse *workshop* mostra-se de grande valia para os futuros profissionais médicos, uma vez que prepara os discentes tanto para a relação médico-paciente quanto para o gerenciamento de atividades de educação em saúde, com relevante impacto social. Com o objetivo de demonstrar a relevância da participação do discente na elaboração e aplicação de um *Workshop* de Saúde Mental para Pré-Vestibulandos, o presente trabalho apresenta-se como um relato de experiência das atividades desenvolvidas por acadêmicos de diferentes semestres do curso de medicina de uma universidade pública do estado do Ceará. Verificou-se que os discentes tiveram a oportunidade de elaborar palestras, cujos temas foram: autocuidado como forma de gerenciamento de estresse e ansiedade, indicação de profissionais, cansaço digital e técnicas de relaxamento. Além disso, foram aplicadas ferramentas de avaliação de impacto, como pré-testes e pós testes, tendo como principal resultado a evolução do conhecimento dos participantes em relação a conceitos fundamentais explicados nas palestras. Ademais, os inscritos revelaram sentir-se mais motivados a adotar estilos de vida mais saudáveis e, dessa forma, melhorar a saúde mental.

Palavras-chave: Saúde mental. Psicologia positiva. Autocuidado.

1. INTRODUÇÃO

O momento pré-vestibular é bastante complexo e traz consigo inúmeros fatores que contribuem para aumentar o estresse e a ansiedade dos estudantes. Nesse período, além das incertezas e inseguranças quanto aos resultados das provas, soma-se a cobrança familiar, de amigos e as expectativas depositadas nos pré-vestibulandos (IKUNO *et al.*, 2020).

A pandemia de COVID-19, doença grave descoberta no final do ano de 2019, afetou a vida das pessoas de forma substancial. O rápido crescimento de infectados e de mortos ao redor do mundo gerou, nos indivíduos, uma sensação de incertezas e ansiedade. Todo o estresse inerente ao contexto pandêmico afetou consideravelmente os estudantes e trouxe consigo impactos na aprendizagem e na saúde mental dos alunos. Estes, não estão apenas preocupados com sua saúde, segurança e rendimento nos estudos, mas também têm muitas preocupações com o bem-estar de suas famílias e amigos (SAHU, 2020).

Percebe-se então, que além do estresse inerente à condição de pré-vestibulando, somaram-se novas preocupações atreladas à pandemia como medo, incertezas e isolamento social, com o potencial de comprometer ainda mais a saúde mental dos estudantes que almejam ingressar no ensino superior.

Olson, Hansen e Vermeesch (2020, p. 9340) afirmam que intervenções de saúde mental devem estar amplamente disponíveis em todos os momentos, sendo de fato reconhecida a importância delas em períodos de catástrofes globais, a exemplo da pandemia da COVID-19.

Nesse sentido, grupos de apoio ao aluno ou aconselhamento via plataformas eletrônicas são necessários para ajudar os pré-vestibulandos a aliviar problemas de saúde e fornecer-lhes suporte social, psicológico e acadêmico. Além disso, a realização de exercícios que estimulem resiliência, e pensamento positivo são apontados como importantes estratégias de enfrentamento aos impactos na saúde mental nesse contexto pandêmico. A promoção de educação on-line em saúde mental e com base em estratégias de intervenções pode ajudar os alunos a aumentar sua resiliência (LAI *et al.*, 2020).

A *International Federation of Medical Students' Association of Brazil* (IFMSA Brazil, traduzida como Federação Internacional das Associações de Estudantes de Medicina do Brasil) propôs aos estudantes de medicina da Universidade Estadual do Ceará (UECE) interessados em fazer parte dessa associação, realizarem alguma atividade de impacto social, como etapa seletiva para possibilitar a criação de um comitê local da IFMSA *Brazil* na UECE, de modo que os estudantes interessados no projeto decidiram, então, realizar um *workshop* sobre saúde mental voltado para pré-vestibulandos, tendo em vista ser um público carente de apoio psicoemocional e por observarem a necessidade de uma intervenção social nesse contexto da pandemia da COVID-19.

Este relato tem como objetivo descrever a experiência de estudantes de medicina na realização de um *workshop* como estratégia de impacto social, visando contribuir com apoio psicoemocional dos pré-vestibulandos, bem como estimulá-los a buscarem auxílio psicológico com profissionais quando sentirem necessidade.

2. METODOLOGIA

2.1. ASPECTOS GERAIS E ORGANIZAÇÃO DO “WORKSHOP” DE SAÚDE MENTAL PARA PRÉ-VESTIBULANDOS

Trata-se de um relato de experiência da atuação de discentes do curso de medicina de uma universidade pública do estado do Ceará (UECE) durante a pandemia de COVID-19 em 2020, a partir da organização e realização de um *Workshop* de Saúde Mental para Pré-Vestibulandos. Inicialmente foram realizadas capacitações com os professores orientadores e, em seguida, estipulado um prazo para o desenvolvimento do material para as palestras e para as atividades junto aos pré-vestibulandos. As capacitações obedeceram a um cronograma pré-estabelecido e os temas foram escolhidos de acordo com as orientações de uma psicóloga de um cursinho pré-vestibular da cidade de Fortaleza onde a ação seria desenvolvida.

A divulgação do *workshop* foi realizada por meio da rede social *WhatsApp*, a partir da parceria com a psicóloga do cursinho, a qual compartilhou diretamente nos grupos de alunos pré-vestibulandos. Os textos e a arte contendo a explicação da proposta e da dinâmica do *workshop*, assim como o link do Formulário Google para a inscrição, foram produzidos pelas acadêmicas envolvidas no projeto e encaminhados

aos alunos por ocasião da divulgação via *WhatsApp*. Inicialmente, planejou-se a participação de 25 alunos; mas, devido à grande procura e velocidade com que os alunos realizaram as inscrições, o formulário foi fechado com 4 alunos a mais do que o planejado, totalizando 29 inscritos para o *workshop*.

No formulário de inscrição - além de ser solicitado o nome do aluno, o e-mail para contato, o contato do *WhatsApp*, a idade e o porquê do interesse em participar -, foram acrescentadas questões sobre a sede escolar (o referido cursinho apresenta mais de uma sede), questões relacionadas ao perfil psicoemocional dos inscritos durante a quarentena e o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). A busca por determinar esse perfil psicoemocional surgiu com o fim de saber se haveria pessoas potencialmente sensíveis aos conteúdos ministrados, para que as palestras pudessem ser planejadas de modo a não causar nenhum dano psicoemocional aos participantes, bem como saber se já faziam algumas das práticas que sugerimos. Já o TCLE foi incluído com o intuito de informar que os questionários passados também serviram para avaliar o impacto da atividade na promoção de suas saúdes mentais no processo de filiação à IFMSA *Brazil*, bem como garantir o consentimento relacionado ao uso dos dados coletados em futuras publicações.

Em virtude das restrições sociais impostas pela pandemia, as atividades do *workshop* foram realizadas de modo *online* por meio da plataforma *GoogleMeet* e auxiliada pela rede social *WhatsApp*, na qual as dúvidas foram sanadas, os materiais de apoio foram compartilhados e os horários das palestras foram confirmados. As palestras abordaram temas diversos e, na ocasião, também eram fornecidas aos pré-vestibulandos as instruções para as atividades sugeridas; além disso, foi promovida uma troca de experiências pessoais concernentes à história anterior à aprovação das acadêmicas à medida que os vestibulandos faziam perguntas.

No primeiro dia de palestra – no qual foram debatidos os assuntos que mais poderiam constituir gatilhos de ansiedade para os participantes – foi aberta uma sala paralela, para que, caso alguém se sentisse desconfortável ou ansioso, pudesse ir lá conversar com duas integrantes do comitê de organização sobre assuntos mais sutis até o momento em que já não houvesse potenciais gatilhos na palestra principal. Esta sala paralela não foi utilizada por nenhum dos participantes.

No decorrer da atividade, ocorreram limitações e dificuldades, tais como a evasão dos participantes e conflitos de horários entre palestras e atividades da escola marcadas de última hora, os quais tiveram que ser contornados por remanejamento dos horários. Para compreendermos os motivos da evasão e ausência de interatividade por parte dos alunos não participativos, foi lançada uma lista de pesquisa nas próprias mensagens do grupo de *WhatsApp*, visto que os formulários de pré e pós-testes aplicados não estavam conseguindo extrair as impressões dos alunos sobre a atividade. Tal pesquisa não foi respondida por nenhum pré-vestibulando participante do *workshop*.

2.2. TEMAS E CONTEÚDO DAS PALESTRAS E DINÂMICA DAS ATIVIDADES DO "WORKSHOP"

Foram abordadas as seguintes temáticas e conteúdos durante o *workshop*:

1. Palestra sobre Ansiedade e Estresse (realizada em 27/08/2020): Autocuidado como abordagem humanizada ao bem-estar físico, mental e social em tempos de pandemia; *Mindset* de crescimento aplicado às adversidades decorrentes da pandemia e do período pré-vestibular; Condicionamento dos pensamentos geradores de ansiedade; Fisiologia do estresse e da ansiedade, como atividades de autocuidado diminuem tais fatores.

2. Palestra sobre Indicação de Profissionais da Saúde Mental (realizada em 27/08/2020): Indicações de profissionais pelo SUS e consultórios populares, condições psicológicas indicativas de ansiedade, despatologização da busca à assistência psicológica, tipos de abordagem do psicoterapeuta (*gestalt*, comportamental, psicanálise, *thetahealing*), ressaltar que toda emoção é válida, "chegar no psicólogo pela primeira vez: como assim vou me abrir com um completo estranho?".

3. Palestra sobre Cansaço Estudantil em tempos de EAD (realizada em 29/08/2020): Cansaço digital: o que é, como identificar, quais complicações, como lidar e evitar; Efeitos do uso exacerbado de dispositivos eletrônicos (*Text neck* e Síndrome do Olho Seco); Efeitos fisiológicos do sono para o bem-estar psicoemocional.

4. Palestra sobre técnicas de relaxamento (realizada em 29/08/2020): Como a respiração ativa sistema parassimpático e induz uma resposta de relaxamento; técnica

de respiração diafragmática, técnica A.C.A.L.M.E - S.E. Meditação *Mindfulness*, Meditação *Zazen*, Meditação Transcendental e Meditação Cristã.

2.3. MATERIAL DE APOIO:

Os seguintes materiais de apoio foram utilizados:

1. "Cronograma do bem": cronograma de práticas de autocuidado.
2. "Caderno de emoções": quadro de perguntas autopreenchíveis que induzem o indivíduo a entender as origens de determinada emoção como resposta a certo evento (BECK; BECK, 2011).
3. "Ansiobook": caderno digital com espaços para agradecimentos e afazeres.
4. "Entendendo o cansaço digital": caderno digital com espaços para autoavaliação quanto ao nível do próprio cansaço e para a descrição dos fatores mais extenuantes de cada um e manual do sono.
5. "Guia do A.C.A.L.M.E.-S.E.": guia que contém o resumo de cada passo dessa técnica.

2.4. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO

Como metodologia de avaliação de impacto, foram utilizados pré e pós-testes com perguntas concernentes ao aprendizado de conceitos explicados nas palestras, à aplicabilidade das técnicas ensinadas e a outros tópicos relativos aos objetivos das atividades desenvolvidas. A comparação entre as respostas dos dois testes serviu como parâmetro para indicar se os objetivos foram atingidos ou não.

2.4.1. PERGUNTAS DO PRÉ-TESTE 1:

1. De 1 a 5, o quão bem você classifica a qualidade do seu autocuidado?
2. De 1 a 5, o quão bem você classifica a sua capacidade de lidar com suas emoções?
3. Você se sente preparado para ir a um atendimento com o psicólogo, caso isso seja do seu interesse? Se não, por quê?
4. O que você pensa sobre pessoas em algum tipo de sofrimento mental?
5. Em suas palavras, quais as diferenças entre a atuação do psicólogo para a do psiquiatra?

6. Você acha que pessoas que buscam os profissionais citados são somente pessoas que têm problemas psicoemocionais?

2.4.2. PERGUNTAS DO PÓS-TESTE 1:

1. Como você se sentiu ao final do dia, após ter feito o cronograma do bem-estar, o “ansiobook” e o caderno das emoções? (Se você não fez uma delas, basta dizer qual)

2. Você recomendaria alguma dessas práticas para alguém?

3. Após a palestra, você se sente mais preparado ou disposto para ir a um atendimento com o psicólogo, caso isso seja do seu interesse?

4. Após a palestra, o que você pensa sobre pessoas em algum tipo de sofrimento mental?

5. Após a palestra, em suas palavras, quais as diferenças entre a atuação do psicólogo para a do psiquiatra?

6. Quem são as pessoas que buscam profissionais da saúde mental?

2.4.3. PERGUNTAS DO PRÉ-TESTE 2:

1. Você sabe o que é “cansaço digital”? Se sim, tente explicar em algumas palavras o que “cansaço digital” significa para você. Se não, responda “Não”.

2. Cite 3 malefícios do uso exacerbado de aparelhos digitais.

3. Você sabe o que é “text neck” e síndrome do olho seco? Se sim, tente explicar em algumas palavras o que significa para você. Se não, responda “Não”.

4. Você sente algum tipo de “ressaca virtual” por uso exacerbado de aparelhos eletrônicos no seu dia a dia ou você acha que o uso exacerbado desses aparelhos, durante a quarentena, atrapalhou o seu sono? Se sim, explique de que forma. Se não, responda “Não”.

5. Você acha que sentir estresse faz bem?

6. Se você tiver colocado “depende” na questão anterior, diga por que depende.

7. Você sabe identificar uma respiração diafragmática? Se sim, como você acha que é? 8. Você conhece alguma técnica de respiração e de meditação para relaxamento? Se sim, qual?

2.4.4. PERGUNTAS DO PÓS-TESTE 2:

1. Após a palestra, qual a sua definição de cansaço digital? Explique brevemente.

2. Após a palestra, qual a sua definição de “text neck”? E de síndrome do olho seco? Explique brevemente.

3. Você consegue identificar fatores promotores de uma ressaca virtual no seu cotidiano? Se sim, quais?

4. Após a palestra, você acha que sentir estresse pode fazer bem? 5. Se você tiver colocado “depende” na questão anterior, diga por que depende. 6. Após a palestra, como você identifica a respiração diafragmática?

7. Após as palestras, você se sente motivado a diminuir o tempo de uso de aparelhos eletrônicos?

8. Você acredita se sentir mais preparado para lidar com situações de estresse, ansiedade e cansaço após o *workshop*?

9. Resuma o que você achou da experiência em uma frase.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. RESULTADOS DO PRÉ-TESTE 1

O pré-teste do primeiro dia contou com 19 respostas. Pouco mais da metade dos estudantes classificaram suas práticas de autocuidado como medianas e a maioria lida de forma média ou boa com suas emoções. Em um estudo realizado com estudantes de enfermagem, Brandão e colaboradores verificaram que o principal fator de impedimento para estes estudantes terem melhor autocuidado é o tempo, o que também pode ser o principal fator entre os pré-vestibulandos, uma vez que sua rotina de estudo é intensa (BRANDÃO, *et al.*, 2009).

Dentre os participantes, 94,7% relataram inicialmente que se sentiriam preparados para ir a um atendimento com um psicólogo. A maioria informou que pessoas com sofrimento mental necessitam de ajuda profissional e empatia e que este sofrimento mental é algo comum, ao qual qualquer pessoa está sujeita. Os demais não souberam responder à pergunta por não compreender o termo sofrimento mental ou relataram que são pessoas infelizes ou relacionaram sofrimento mental à depressão.

Apenas uma (5,2%) pessoa apresentou uma resposta completa sobre a diferença de atuação do psicólogo e do psiquiatra, enquanto 14 (73,7%) dos participantes restringiram a diferença principalmente à legitimidade de prescrição medicamentosa -

dos quais dois manifestaram certa dúvida se o psiquiatra também poderia atuar na escuta e ajudar a lidar com as emoções; outros quatro participantes (21,1%) não souberam dizer.

Grande parte dos participantes (94,7%) acreditam que a procura por profissionais como psicólogo e psiquiatra não ocorre somente por pessoas necessariamente com problemas psicoemocionais.

3.2.RESULTADOS DO PÓS-TESTE 1:

O pós-teste do primeiro dia de palestrar obteve 12 respostas. Após a palestra, 83,3% dos inscritos falou positivamente das técnicas sugeridas - depois de terem feito o cronograma do bem-estar, o *ansiobook* e o caderno de emoções -, relatando sensação de dever cumprido, redução da ansiedade e bem-estar proporcionados. Uma pessoa informou que não havia feito nenhum, mas que iria se planejar para fazer; outra, não fez todas as atividades recomendadas, mas selecionou as que sentia mais necessidade de fazer. Apesar de 16,6% não ter feito alguma atividade proposta, 100% recomendariam as práticas a alguém, levando-nos a crer que consideram efetivas as técnicas ensinadas.

No pré-teste, 94,7% dos inscritos disseram que iriam para um atendimento com psicólogo, caso precisassem. Após a palestra, tal porcentagem aumentou para 100%. Além disso, previamente à palestra, duas pessoas manifestaram pensamentos de cunho pejorativo no tocante a indivíduos como algum sofrimento psicoemocional, tais como "São pessoas infelizes e incapazes de conviver com a realidade da vida" e "Falta de cuidado com elas mesmo". Após as palestras, 100% das respostas disseram que pessoas com algum sofrimento psicoemocional são pessoas normais, que necessitam de ajuda e que qualquer pessoa está sujeita a passar por algum sofrimento psicoemocional. Esse resultado mostra que, das pessoas que responderam o pós-teste, todas perceberam a importância da atuação dos profissionais que trabalham com saúde mental e nenhuma manifestou estereótipos previamente evidenciados. Dessa forma, o resultado foi positivo, frente ao fato de que o preconceito relacionado a dificuldades psicológicas e problemas psiquiátricos é muito comum - fator que dificulta a procura por profissionais de saúde mental - e que, quando presente, pode pôr em risco a qualidade de vida e o

tratamento de pessoas que precisam desses profissionais (MILLAN; ARRUDA, 2008; ASCENÇO, 2013).

Após a palestra, todos os participantes que responderam o pós-teste conseguiram compreender a diferença entre o atendimento psiquiátrico e o atendimento psicológico: 41,6% responderam corretamente, associando o psiquiatra a uma abordagem mais fisiológica e biomédica em comparação com o psicólogo, mas sem desconsiderar a atuação do psiquiatra em extrapolar a prescrição de medicamentos, bem como sem desconsiderar a atuação do psicólogo em analisar a estruturação da consciência humana e trabalhar as causas mais abstratas e emocionais para oferecer perspectivas de soluções com base nisso. Os 58,4% remanescentes, conseguiram definir a diferença sem que houvesse a restrição a possibilidade um prescrever medicamentos e outro não, mas não de forma completamente satisfatória.

Foi deixado um espaço para as pessoas descreverem como tinha sido sua experiência com as palestras e seis pessoas se sentiram motivadas a comentar e, inclusive, dar sugestões. Todos se mostraram muito gratos pela iniciativa e uma pessoa deu a ideia de haver mais *workshops* e de realização de rodas de conversa e atividades dinâmicas para fortalecer o tema de saúde mental cada vez mais entre as pessoas.

3.3.RESULTADOS DO PRÉ-TESTE 2:

O pré-teste do segundo dia contou com nove respostas abaixo discutidas.

O termo “cansaço digital ou virtual” é um termo novo e que, apesar de ainda não ter sido totalmente consagrado pela literatura científica, vem sendo bastante discutido, principalmente nesse período de pandemia, em que se tem evitado o contato presencial entre as pessoas. “Cansaço digital” se refere há um tipo de intoxicação pelo uso excessivo de redes virtuais, com sintomas que podem afetar, disposição, sono, musculatura e visão. Segundo Hussaindeen (2020), qualquer pessoa que use dispositivos digitais excessivamente, sem pausas adequadas, pode apresentar fadiga ocular e problemas musculoesqueléticos. Por ser um termo novo, poderia se esperar que os participantes não o reconhecessem. Na análise das respostas obtidas, duas pessoas (22,2%) não souberam dar uma definição para o termo, uma pessoa (11,1%) o relacionou a uma possível “pressão que as mídias digitais impõem (na sociedade) de ideia de positividade utópica”. As demais pessoas conseguiram dar uma definição mais

próxima do real significado do termo, demonstrando ter conhecimento prévio sobre o assunto ou boa capacidade de dedução.

Foram solicitados exemplos de três malefícios do uso exacerbado de aparelhos digitais e as respostas foram bem similares, sendo mencionados o impacto prejudicial que os aparelhos digitais podem trazer para visão, sono, saúde mental, musculatura da coluna, produtividade, demonstrando que os estudantes são conscientes dos danos. Segundo Moromizato et al. (2017), são numerosos os efeitos deletérios relacionados ao uso insalubre da internet: alterações na qualidade do sono, na nutrição e na atividade física, menor desempenho acadêmico ou profissional e prejuízo nos relacionamentos interpessoais, além de transtornos de humor, ansiedade, ansiedade social, solidão.

Foi questionado aos participantes se conheciam o termo “*text neck*” e síndrome do olho seco. Sete pessoas não souberam responder e duas conseguiram formular respostas adequadas. Esse fato revela que esses termos talvez ainda não sejam completamente conhecidos ou debatidos entre os pré-vestibulandos. Sete pessoas relataram que, por conta do uso exacerbado de aparelhos eletrônicos, manifestaram algum tipo de ressaca virtual e quatro mencionaram que tiveram prejuízos na qualidade do sono.

A maioria dos participantes (6/9) responderam que sentir estresse não é algo bom, já três deles responderam que depende, sendo que, dependendo da situação, o estresse pode ajudar a indicar que algo está errado e que o corpo o utiliza para agir com mais rapidez e com mais cautela. De fato, em algumas ocasiões, o estresse pode servir de ferramenta para auxiliar o indivíduo a ter mais cuidado ou atenção em situações que exijam concentração, como dirigir um carro, fazer uma prova, sendo muito relevante que os estudantes saibam identificar que o estresse pode estar presente e que isso pode ser algo bom.

Quando perguntado se eles sabiam o que era respiração diafragmática, quatro pessoas apresentaram respostas do tipo “não”. Outras quatro respostas se apresentaram incompletas. Somente uma se aproximou da definição correta do termo.

Quatro pessoas informaram que não conhecem nenhuma técnica de respiração ou meditação para relaxamento. As outras cinco respostas envolveram a técnica de *Mindfulness*, respiração profunda, meditações guiadas e respiração Ujjayi. Isso

demonstra que a maioria dos participantes já buscaram por métodos que os ajudassem a diminuir a sobrecarga e o estresse do dia a dia.

3.4.RESULTADOS DO PÓS-TESTE 2

O pós-teste do segundo dia obteve seis respostas. Antes das palestras, 55,5% dos participantes não sabiam o conceito de cansaço digital. Já após as palestras, 100% responderam corretamente. Após as palestras, também todos os inscritos souberam identificar exemplos de fatores causais de ressaca virtual, e dois relacionaram a pergunta aos sintomas de ressaca virtual, como enxaqueca, insônia, olhos avermelhados, fadiga muscular (apesar de não terem sido questionados a respeito dos sintomas). Quase a totalidade dos estudantes (83,3%) se sentiram mais motivados a diminuir o tempo de exposição a aparelhos e uma parcela (16,7%) respondeu “talvez”. Vale ressaltar que, no período de pandemia, os pré-vestibulandos participantes do *workshop* estão tendo aulas por meio remoto desde o mês de maio de 2020 e, possivelmente, vêm apresentando uma carga expressiva de aulas virtuais.

Todos os participantes conseguiram fornecer respostas coerentes e claras sobre o termo “*text neck*”, o que demonstra que o termo foi bem explanado e cabível de compreensão. Também pode-se prever que, depois de conhecido o termo, os estudantes serão capazes de se perceberem e corrigirem práticas errôneas ao usar os aparelhos digitais ou práticas errôneas. Esse fato é relevante, já que usuários de *smartphones* podem ser mais propensos a manter maiores ângulos de flexão do pescoço durante a mensagem de texto e isso levar a alterações importantes da musculatura (CUÉLLAR; LANMAN, 2017).

Antes da palestra, apenas 11,12% dos participantes sabiam o que é respiração diafragmática. Após a palestra, 60% responderam corretamente, manifestando claro entendimento de que a respiração diafragmática deve envolver o abdômen e menos o tórax, em contrapartida a algumas respostas do pré-teste. A respiração diafragmática envolve respirar profundamente e expandir os pulmões para dentro do diafragma, diminuindo a frequência respiratória por meio de um processo, como contar as respirações enquanto expande o abdômen e inspira profundamente. Ademais, a respiração diafragmática é um tratamento prontamente acessível para o controle do

estresse, assim que um gatilho é acionado sendo aquela uma ferramenta essencial para os estudantes (HOPPER et al, 2018).

Antes das capacitações, 44,44% dos participantes conheciam técnicas de respiração e meditação. Após os ensinamentos de técnicas de relaxamento, 100% dos participantes revelaram estar mais preparados para lidar com situações de estresse, ansiedade e cansaço por meio delas. Também antes das palestras, 66,67% das pessoas opinaram que estresse não fazia bem para o ser humano, enquanto 33,3% responderam que depende, e justificaram corretamente as respostas. Após a palestra, 83,3% responderam que depende da situação, e justificaram corretamente as respostas. Tal variação de 50% na resposta “depende” nos faz imaginar que houve uma ressignificação no tocante a encarar o estresse como um fator promotor de respostas adequadas a situações desafiadoras. Além disso, esses 83,3% estudantes também conseguiram entender que o estresse em excesso pode ser prejudicial ao organismo. Nesse cenário, vale ressaltar que para Rossi (1994 apud CABRAL et al, 2004) as respostas podem ser positivas ou negativas em frente a uma situação estressora, dependendo de como o sujeito a percebe, da intensidade e do tempo de permanência sobre ele.

A resposta média no pré-teste 1 da classificação de autocuidado, em uma escala de 1 a 5, foi 3 e da classificação de capacidade de gerenciamento emocional foi 3,3. Nesse pós-teste, 100% dos pré-vestibulandos acreditam, após o *workshop*, que se sentem mais preparados para lidar com situações de estresse, ansiedade e cansaço. Os alunos caracterizaram a experiência como rica, esclarecedora, valiosa e informativa para a vida dos estudantes.

Das quatro pessoas que deixaram um comentário/sugestão, todos reforçaram o quão proveitoso foi o *workshop* para eles, uma elogiou a ideia da sala paralela de acolhimento, caso alguém precisasse durante as palestras, duas solicitaram a realização de mais *workshops* como esse, duas pediram para continuarmos disseminando esse tipo de tema.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar dos empecilhos, o *Workshop* de Saúde Mental para Pré-Vestibulandos teve uma considerável eficácia, demonstradas através do efeito positivo que as

palestras e as atividades propostas tiveram sobre a saúde mental desses estudantes no auge da pandemia de COVID-19. Desse modo, fica evidenciado que a aplicação de ações de educação em saúde é necessária e pode impactar de verdade certas comunidades ao alcançar suas demandas sociais.

Além disso, o fato de o *workshop* ter sido realizado por um grupo de estudantes de medicina funcionou como uma válida e importante experiência para a formação integral e humana destes futuros profissionais da saúde.

AGRADECIMENTOS

Gostaríamos de agradecer ao cursinho pré-vestibular Ari de Sá (Fortaleza, Ceará) e à psicóloga Alana Ferreira Cordeiro pela disponibilidade em colaborar para a organização do Workshop de Saúde Mental para Pré-Vestibulandos. Também agradecemos aos nossos professores pelas excelentes capacitações, ao Psicólogo Jorge Wambaster e à Doutora Tatiana Bachur pela orientação na escrita deste relato de experiência.

REFERÊNCIAS

- IKUNO, Beatriz Alves et al. Estudo da ansiedade presente nos pré-vestibulandos durante a pandemia do novo coronavírus (COVID-19). In: **3º CONGRESSO SOBRE AMBIENTE, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO (CATE)-V. 3 2020**. 2020.
- LAI, Agnes Yuen-kwan et al. Mental health impacts of the COVID-19 pandemic on international university students, related stressors, and coping strategies. **Frontiers in Psychiatry**, v. 11, 2020.
- SAHU, Pradeep. Closure of universities due to coronavirus disease 2019 (COVID-19): impact on education and mental health of students and academic staff. **Cureus**, v. 12, n. 4, 2020.
- TIMKO OLSON, Erica R.; HANSEN, Margaret M.; VERMEESCH, Amber. Mindfulness and Shinrin-Yoku: Potential for Physiological and Psychological Interventions during Uncertain Times. **International journal of environmental research and public health**, v. 17, n. 24, p. 9340, 2020.

CAPÍTULO VII

DOCÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR EM SAÚDE EM TEMPOS DE PANDEMIA PELA COVID-19

DOI: 10.51859/ampla.csa511.1121-7

Tácio Fragoso Pereira ¹
Alex Maciel da Silva ²

¹ Mestrando em Ciência e Engenharia de Materiais – PPCEM. Universidade Federal da Paraíba - UFPB

² Professor na Faculdade Mantense dos Vales Gerais - INTERVALE

RESUMO

Este capítulo tem por objetivo descrever o atual momento que o mundo está vivendo devido a pandemia pelo covid-19, com grandes transformações e mudanças, principalmente no ensino superior em saúde onde docentes do ensino superior é obrigado a se adequar na problematização de atuação e superação em questões de caráter técnico e instrumental no ensino, buscando um trabalho que consiga uma promoção na formação profissional e pessoal dos alunos. Por esses motivos o objetivo da presente revisão da literatura é discutir sobre os principais desafios da educação no ensino superior da saúde em tempos de pandemia do Covid-19. O método utilizado se desenvolveu a partir de buscas nas bases de dados da biblioteca virtual da saúde, BVS, Google scholar, Bireme, Scielo, Lilacs, selecionados artigos e pesquisas que citaram a docência no ensino superior na saúde em tempos de pandemia.

Palavras-chave: Docência no ensino superior. Pandemia e educação. Covid-19.

1. INTRODUÇÃO

2020 trouxe para o mundo, principalmente para o Brasil, desafios para enfrentamento de uma crise que atingiu a saúde pública em nível mundial, onde teve início no continente asiático no ano de 2019. Doença essa que foi chamada de COVID-19, onde os primeiros casos foram confirmados em Wuhan, sobre a província de Hubei. Na China. Doença naquele momento desconhecida, onde começou a ser estudada por vários cientistas do mundo. Os chineses foram os primeiros a identificar seu agente causador, sendo denominado sobre um novo vírus da família do coronavírus, SARS-CoV-2 (GORBALENYA et al., 2020). No Brasil o primeiro caso da covid-19 foi confirmado no mês de fevereiro de 2020 na cidade de São Paulo e em um curto intervalo de tempo a

doença se alastrou em todos os estados. A partir disso novos termos, comportamentos e hábitos precisou ser inserido por toda população brasileira.

Garantir qualidade no ensino superior atualmente é um dos grandes desafios sobre a sociedade contemporânea. Estamos vivenciando os casos pela Covid-19 modificar toda a organização social sobre o mundo, tendo ênfase sobre o que move os cursos de nível superior presencialmente. Diante disso, o objetivo geral é discutir sobre os desafios da educação superior na saúde

O professor do ensino superior é objeto que atrai atenção de muitos estudiosos no período atual, tanto pela importância sobre sua formação, formas de adequação sobre novas didáticas e metodologias onde envolvam os alunos. No ensino superior, o docente é o profissional e sua identificação docente ainda se encontra sobre construção. Para a construção dessa identidade, é importantíssimo que o docente seja capaz de perceber, entender, acompanhar as mudanças que tem sobre o ensino superior (SOUZA et al., 2018; PAGNEZ, 2007).

A formação e desenvolvimento de professores na área da saúde são focos por diversas discussões, onde abordam aspectos como práticas pedagógicas, formação didática e currículo, tendo em vista a importância na formação de novos profissionais mais qualificados. O (DCNs) que são as diretrizes curriculares nacionais, orienta sobre a importância e necessidade na formação de profissionais de saúde mais humanos, reflexivos, críticos e generalistas. Sobre essa importância de orientação, o grande desafio é quebrar com o modelo de formações fragmentadas e técnicas onde busquem sempre formação de profissionais de saúde humanos, com posicionamentos de trabalho em equipe, integrada sempre focando na integralidade da atenção à saúde (PINTO et al., 2007; FREIRE et al., 2015; ROSSONI et al., 2004).

Diante da situação de crise sanitária, estudantes e professores universitários precisaram se acostumar com a mudança do modo como as aulas são ministradas como é o caso da inserção do ensino remoto sobre grande escala. Grandes aspectos são importantes nesse sentido sobre a educação formal, como: o papel do aluno e professor, as avaliações e metodologias de ensino, quanto tantos outros elementos importantes a se pensar sobre a lógica das tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC) (HODGES et al., 2020).

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1. ENSINO SUPERIOR COM A PANDEMIA DO COVID-19

A formação dos profissionais de nível superior são processo com constantes transformações, sendo modificadas a cada ano para didáticas mais dinâmicas onde problematizem a segurança em possíveis problemas que possam surgir ao longo do tempo. Sobre o atual momento da pandemia milhares de pessoas foram vítimas letais da covid-19 e outros milhares contaminadas.

Partindo de uma visão crítica a formação em cursos superiores ajuda na diminuição sobre as desigualdades sociais e resoluções em conflitos e problemas sociais se baseando sobre os dados científicos.

Segundo Soares e Cunha (2010), o professor precisa compreender a realidade em que se insere e desenvolver estratégias de formação, onde possam contribuir para uma aprendizagem efetiva, e principalmente visando um melhoramento da sociedade se baseando sempre em conhecimentos científicos. Neste sentido as instituições na formação de nível superior têm um importante e indispensável função no atual momento de pandemia que estamos vivendo.

2.2. EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO ESTRATÉGIA DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA

É constatado que o imaginado na pandemia pela covid-19, onde houve a produção de discurso relacionando a necessidade de defesa irrestrita a vida. Onde a palavra vida é referenciada no modelo biomédico, buscando estratégias de prevenção na saúde. Os discursos relacionados à falta de unidade de terapia intensiva e os respiradores ganham mais espaço, tendo em vista a quantidade de pessoas que estão morrendo no mundo devido à falta desses equipamentos (HODGES et al., 2020).

Existe uma lacuna no âmbito de produção do conhecimento sobre a quarentena e isolamento social, principalmente sobre as estratégias de como encaixar as medidas de isolamento sobre a população nacional, não tendo apenas imposições verticais onde deve ser cumprido. Sendo então necessário pensar sobre formas de implementação sobre a gestão do SUS, sem tirar as ideias sobre a mídia ou setores na sociedade que divulgam como a forma correta (GORBALENYA et al., 2020).

Na educação de saúde o processo educativo na construção sobre os conhecimentos e apropriação partindo da população sobre as medidas essenciais no Enfrentamento ao covid-19, tendo como foco as estratégias de promoção de saúde, sinais, sintomas e prevenção da doença, centrando a rede de atenção a saúde com o isolamento social. Sendo essencial também a produção pedagógica mostrando as formas eficazes do isolamento social, respeitando também a particularidade de cada pessoa (SOUZA et al., 2018; PAGNEZ, 2007).

Sobre o enfrentamento ao covid-19, as práticas de saúde precisam envolver três segmentos: população sendo o primeiro com a autonomia nos cuidados coletivos e individuais. Segundo gestores do SUS que implementem e dê apoio nas políticas de educação em Saúde, e por último e muito importante, profissionais de saúde que estejam comprometidos com o SUS, promoção de saúde e defesa da vida (SOUZA et al., 2016).

2.3. AULAS VIRTUAIS E FORMAÇÃO DOCENTE

A atual situação provocada pela covid-19 evidenciou ainda mais os problemas educacionais, levando em consideração que professores, profissionais estavam preparados para lidar sobre as dificuldades surgidas, porém as dificuldades sobre o desenvolvimento das aulas remotas, evidência o baixo investimento na educação, como também a falta de Políticas que sejam efetivas na formação e principalmente na valorização dos docentes do ensino superior (BELISÁRIO et al., 2020).

Os avanços derivados das tecnologias da informação e comunicação compuseram uma sociedade da informação, utilizados pela sociedade em contextos políticos e socioeconômicos, sendo originado sobre uma nova comunidade local e Global. As formações que foram desenvolvidas na sociedade da informação impactaram sobre as relações pelas várias possibilidades na interação, levando em conta a forma como é criado e divulgado os conhecimentos científicos (MARTINS et al., 2020).

A educação na modalidade a distância (EaD), não deve ser a única solução, sendo uma metodologia que pode evidenciar ainda mais as desigualdades existente, onde são parcialmente nivelados sobre os ensinos superiores, porque nem todos possui os equipamentos necessário. Caso a meta for apenas investir em ferramentas para aulas

digitais, vai haver uma contribuição para piora na aprendizagem dos alunos sobre curto, médio e longo prazo (SOUZA et al., 2016).

2.4.RECURSOS TECNOLÓGICOS NO ENSINO À DISTÂNCIA

A portaria do MEC, em 17 de março de 2020, com o número 343, onde fala sobre a substituição de aulas presenciais por aulas digitais enquanto houver duração sobre a PANDEMIA pelo covid-19. Nesse sentido, todos os meios de tecnologias como: mídias digitais, celulares, smartphones, televisão e internet, sendo ferramentas importantes para substituição.

Os recursos digitais estão presentes no dia a dia de toda população, como forma de lazer, trabalho e estudo. Na atualidade, várias profissões dependem da aprendizagem pela inteligência artificial, com os bancos de dados, segurança das informações, automação de processos, sendo inseridos atualmente na sociedade. No atual momento em que nos encontramos devido a pandemia do covid-19, grandes utilizações das tecnologias da informação e comunicação é aplicado na educação, usando de forma positiva no cenário atual que o mundo se encontra (BELISÁRIO et al., 2020).

Grande parte dos professores universitários que passaram para ensinos digitais, tem formas para ensinamentos que nem sempre é efetivo na passagem de conhecimentos aos acadêmicos, seja a escolha sobre a forma para ministrar as aulas ou a metodologia escolhida e o principal problema é não despertar o interesse dos discentes pelas aulas (BACICH et al 2015).

2.5.CURSOS DE SAÚDE EM AULAS EAD: FORMAÇÃO PRÁTICA DOS PROFISSIONAIS

Cursos da área da saúde, precisam e é considerado fundamental para o aprendizado o contato com o paciente, e atualmente é considerado uma das maiores dificuldades que precisam ser superados, tendo em vista o contexto pandêmico, os pesquisadores recomenda que o isolamento social deve ser cumprido, sendo o meio mais eficaz para redução na velocidade de contaminação do vírus (BARRETO et al., 2011; LIM et al., 2009).

A formação do docente de nível superior tem ligação sobre a qualidade na formação destes profissionais. Destacando que o ensino remoto não se resume apenas ao grau de formação, sobretudo, a escolha do ensino em questões teórica e metodologia pedagógica que contam muito. Sendo então um conjunto sobre a formação e práticas pedagógicas, quando a correlação das duas coisas for feita de forma coerente contribuem diretamente em uma formação mais efetiva (CORREIA, 2012).

Vivemos atualmente sobre um cenário sobre limitações de proteção individual e equipamento, a suspensão dos estágios práticos dos alunos dos cursos superiores em saúde vem como uma necessidade na logística, garantindo assim aos demais profissionais tenham como executar suas funções devidamente protegidos. Devido aos fatos mostrados essa necessidade de paralisação dos estágios práticos e visando também a manutenção na rotina de estudo dos alunos. O comitê de emergência do MEC ficou acordado pela flexibilidade temporária e começou as incorporações sobre estratégias no ensino à distância sobre as disciplinas e grade curricular que antes eram ofertadas presencialmente, em meio a pandemia é imprescindível uma avaliação de resposta pelas instituições de cursos superiores, e principalmente as instituições que oferecem formação de profissionais de saúde. Destacando também sobre os desafios que perduram no caminho sobre a implementação de uma formação que se aproxime do modelo tradicional e principalmente que não formem profissionais tão despreparados para a vida profissional (FERREL et al., 2020).

2.6.AULAS REMOTAS E INCENTIVO AOS ESTÁGIOS NA LINHA DE FRENTE AO COVID-19

O Ministério da Educação publicou em 20 de março de 2020, sob a portaria 356, onde fala sobre a atuação dos alunos de graduação da área da saúde no combate à pandemia, onde caracteriza mais uma das medidas emergenciais por conta do atual momento que vivemos.

O incentivo sobre inserir os alunos que estão concluindo e os que concluíram os seus cursos no Enfrentamento ao novo corona vírus não garante que eles vão estar em segurança, principalmente por ser atualmente uma das grandes preocupações mundiais. O grande índice sobre a contaminação é uma das características do covid-19 e nessa luta para redução de altos índices existem as recomendações rigorosas sobre o

uso de equipamentos de proteção Individuais (EPI). Onde esses profissionais tenham habilidades para manejo dos EPI, algo que é bastante importante quando se fala em proteção Individual e consequentemente aumentar ainda mais a sua segurança (TORRES et al., 2020)

Algo bastante relevante também a respeito dos estágios em tempos de pandemia é se os acadêmicos dos cursos superiores de saúde que estão finalizando sua graduação, quando submetidos (a), em altas pressões em questões emocionais quando necessário colocar em prática as aulas que foram ministradas a distância, se eles teriam as habilidades necessárias e principalmente não levar danos ao paciente e profissional. Colocando em prática o decreto do MEC onde autoriza os estágios obrigatórios, traz consigo grandes preocupações sobre a segurança profissional/paciente (MARTINS, 2020).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pandemia trouxe consigo a paralisação das atividades presenciais, em muitos casos não trouxe a paralisação das atividades universitária. As universidades precisam se adequar sobre o novo normal a respeito da pandemia pelo covid-19. Onde necessitam buscar novas estratégias para transferir o conhecimento aos alunos de uma forma que consiga chegar o mais próximo de como era o ensino na forma regular.

É importante se repensar sobre o fato que toda a população está sujeita as diversas ameaças, que por muitas vezes são mortais, armas nucleares, aparecimento de novos vírus ou os antigos fortalecidos. Então precisa-se aprender com as dificuldades vivenciadas e principalmente as superadas onde em novas emergências futuras possam ter desempenhos superiores menos agressivos ao docente/aluno. Onde o ensino remoto no futuro possa proporcionar outras experiencias aos docentes e estudantes, tendo também outra organização, porém sempre refletindo sobre os aprendizados deixados pela pandemia de Covid-19.

É notório que embora tenha estudos que viram a produção científica na formação para docência à distância, poucos são os que englobam a formação do docente na área de saúde para essa tarefa de ensino remoto em tempos de pandemia.

Em tempos de pandemia os esforços são valorizados, tanto no de manter questões econômicas sobre a educação no ensino superior, como também as ações que se direcionam sobre redução de danos no processo ensino/aprendizado. Não podendo esquecer o aumento da vulnerabilidade por parte dos acadêmicos. Tendo no atual momento que vivemos acadêmicos que estão sendo prejudicados sobre não conseguir ver as aulas por não ter um equipamento, questões emocionais abaladas, principalmente aqueles que perderam entes queridos, e isso pode levar a evasão do ensino superior e consequentemente um sonho perdido.

Contudo a educação se realiza como um processo, em que é obrigatório a busca rotineira em adaptações e sustentabilidade. Onde o momento atual traz reflexões, além de vários prejuízos em todos os sentidos, também a oportunidade de repensar práticas e estratégias que antes era utilizadas sobre a educação na formação dos profissionais da educação superior, focando sempre no discentes da saúde.

No momento atual de pandemia, o objeto de grandes estudos e discussão são as práticas de ensino sobre o tempo de pandemia, onde se tornou uma das principais áreas de investigação da atualidade. A literatura mostra a importância sobre refletir em metodologias de ensino e currículos onde preparem os acadêmicos de nível superior para a vida profissional.

Dentro desses aspectos os professores e acadêmicos estão passando por dificuldades de estrutura e oferta dos serviços direcionados na realização das aulas e atividades pelas questões de sistemas e didáticas e por essas questões, mostram grandes dificuldades, como: ansiedade, privação de sono, estresse emocional, distanciamento social e isolamento social.

REFERÊNCIAS

BACICH, L.; TANZI NETO, A.; TREVISANI, F. M. (Org.). **Ensino híbrido: Personalização e tecnologia na educação**. Porto Alegre: Penso, 2015.

BARRETO ACF, ROCHA DS. **COVID 19 e educação: Resistências, desafios e (im)possibilidades**. Ver Encant ECS [internet]. 2020 [Acesso em 2021 Março 03]; 2:01-11. Disponível em: <http://www.revistas.uneb.br/index.php/Encantar/article/view/8480/0>.

BELISÁRIO, A. B. et al. **Relatos de experiência de inserção de tecnologias digitais no ensino de engenharia**. *Revista Docência do Ensino Superior*, v. 10, p. 1-18,

e015139, 2020. Disponível em: <https://doi.Org/10.35699/2237-5864.2020.15139>.

BRASIL. **Portaria nº 343, de 17 de março de 2020.** Dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia Do Novo Coronavírus COVID-19. Brasília: DOU Diário Oficial da União. Publicado no D.O.U. de 17 de março de 2020. Disponível em: <http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/Portaria-n-343-de-17-de-marco-de-2020-248564376>

CORRÊA, G.T. **Formação pedagógica no ensino superior: um olhar sobre os mestrados e os doutorados acadêmicos em Saúde Coletiva.** Dissertação (Mestrado) Programa de PósGraduação em Educação em Ciências e Saúde, Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2012.

FERREL MN, RYAN JJ. **The Impact of COVID-19 on Medical Education.** *Cureus.* 2020;12(3):e7492. Published 2020 Mar 31. Disponível em: <https://www.cureus.com/Articles/29902-the-impact-of-covid-19-on-medical-Education>.

FREIRE LIF, FERNANDEZ C. **O professor universitário novato: tensões, dilemas e aprendizados no início da carreira docente.** *Ciênc Educ [Internet].* 2015 [cited 2015 May 5]; 21(1):255-72. Available from: <http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v21n1/1516-7313-ciedu-21-01-0255.pdf>.

GORBALENYA, A. E. et al. **Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: the species and its viroses – a statement of the Coronavirus Study Group.** *bioRxiv,* 2020. Disponível em: <https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.02.07.937862v1.full.pdf>. Acesso em: 22 jun. 2020.

HODGES, C. et al. **The Difference Between Emergency Remote Teaching and Online Learning.** *Educause Review,* 27, mar. 2020. Disponível em: <https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remoteteaching-and-online-learning>. Acesso em: 22 jun. 2020.

LIM EC, OH VM, KOH DR, SEET RC. **The challenges of continuing medical education in a pandemic era.** *Ann Acad Med Singapore.* 2009;38(8):724-726. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19736579>.

MARTINS, ER; GOUVEIA, LMB **Benefícios e desafios do uso do modelo pedagógico ML-SAI. Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento,** [S. l.], v. 9, n. 1, pág. E63911611, 2020. DOI: 10.33448 / rsd-v9i1.1611. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/1611>. Acesso em: 26 mar. 2021.

PAGNEZ, K.S.M.M. **O ser professor do ensino superior na área da saúde.** São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; 2007.

- Pinto JBT, Pepe AM. **A formação do enfermeiro: contradições e desafios à prática pedagógica.** Ver Latino-Am Enfermagem [Internet]. 2007 [cited 2015 May 5];15(1):120-6. Available from: http://www.scielo.br/pdf/rlae/v15n1/pt_v15n1a18.pdf
- SOARES, S.R.; CUNHA, M. I. da. **Formação do professor: à docência universitária em busca de legitimidade.** Salvador: EDUFBA, 2010.
- SOUZA, L.F. et al. **Docência no Ensino Superior na área de Saúde: estudo preliminar.** (N)ativa, v.7, n.1, p.50-67, 2018.
- SOUZA, S.; FRANCO, V. S.; COSTA, M. L. F. **Educação a distância Na ótica discente. Educação e Pesquisa**, São Paulo, v. 42, n. 1, p. 99-114, jan./mar. 2016. <https://doi.org/10.1590/s15179702201603133875>
- TORRES, A. C. M.; ALVES, L. R. G.; COSTA, A. C. N. **Educação e Saúde: reflexões sobre o contexto universitário em tempos de COVID-19.** 2020. Disponível em: <https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/view/640/885>. Acesso em: 16. jul.2020.
- MARTINS, PATRÍCIA DE SOUZA. **A aplicação de um ambiente virtual de aprendizagem no contexto do nível médio de ensino: A plataforma e-proinfo em uso.** Disponível em: <http://www.lingnet.pro.br/media/dissertacoes/cristina/MARTINS.pdf>. Acesso em: 10 abril. 2021.

CAPÍTULO VIII

METODOLOGIA DE APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS: SAÚDE E FAKE NEWS SOBRE COVID-19

DOI: 10.51859/ampla.csa511.1121-8

Vitor Augusto Pizzolatto ¹

Elis Rizzi Varela ¹

Matheus da Silva ¹

Daiara Manfio Zimmermann ²

Leandro Turmena ²

Deborah Catharine de Assis Leite ²

¹ Graduando(a) do curso de Ciências Biológicas – Licenciatura. Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR

² Professor(a) Doutor(a) do curso de Ciências Biológicas – Licenciatura. Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR

RESUMO

Doenças infectocontagiosas são, na sua maioria, causadas por agentes etiológicos virais, bacterianos, fúngicos, dentre outros, facilmente transmitidos de um indivíduo para outro. O trabalho em questão, teve por objetivo a construção de uma sequência didática baseada na metodologia de Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), partindo de *fake news* sobre doenças infectocontagiosas como o Coronavírus, visando a elaboração e divulgação de *safe news*¹. A proposta foi desenvolvida para estudantes do Ensino Médio, uma vez que nos três anos que compõe este nível de ensino, são abordados conteúdos que estão relacionados à saúde e às doenças infectocontagiosas, bem como pelo fato de adolescentes e jovens serem usuários natos do ciberespaço e estarem frequentemente expostos ao fluxo constante de informações veiculadas nos meios digitais. Em vista disso, o papel da escola é a formação de cidadãos responsáveis, capazes de refletir e discernir diante das diversas situações do cotidiano as quais estão sujeitos. No que tange, o produto deste trabalho, os estudantes orientados pelos professores, construirão *safe news* para serem divulgadas nas mídias digitais em resposta às *fakes news* por eles encontradas. Apesar de não ter sido testada para verificar sua eficácia, a sequência didática proposta representa uma iniciativa em direção ao uso coerente e responsável do ciberespaço, bem como permite desenvolver princípios morais e éticos em pesquisas a partir da construção das *safe news*. Vale salientar que, apesar do tema deste trabalho, a proposta pode ser adaptada para diferentes temáticas de acordo com a demanda dos professores e interesses dos estudantes.

Palavras-chave: Aprendizagem por Problemas. Educação para a saúde. Ensino. Interdisciplinaridade.

¹ *Safe news*, termo de autoria própria para designar uma notícia de conteúdo confiável.

1. INTRODUÇÃO

As doenças infectocontagiosas se destacam por serem facilmente transmissíveis através de um agente patológico ao corpo do hospedeiro. O conjunto de doenças infectocontagiosas é heterogênea, formada por doenças que têm em comum o fato de serem ocasionadas por agentes etiológicos vivos, adquiridos pelos hospedeiros, podendo ocorrer a partir do meio externo, bem como de um hospedeiro para o outro (SABROZA et al., 1995; THOMAS e WEBER, 2001, p. 45).

No contexto da educação básica na etapa do Ensino Médio, o conteúdo referente às doenças infectocontagiosas está distribuído entre os três anos dessa etapa. Segundo a Base Nacional Comum Curricular-BNCC Brasil (2017, p. 537) os estudantes do Ensino médio devem ter “condições para aprofundar o exercício do pensamento crítico além de buscar encontrar soluções de situação-problema”. Na ótica do mesmo documento, ressalta-se, que uma das habilidades que os alunos do Ensino médio precisam desenvolver é a capacidade de investigar e entender os impactos do programa de infraestrutura e demais serviços básicos (saneamento, vacina, atendimento à saúde, dentre outros) e realizar ações que favorecem uma melhor qualidade de vida para todos.

A integração interdisciplinar entre os professores da educação básica é uma das grandes barreiras que engessam o ensino, principalmente devido a organização escolar (currículo/disciplinas) multidisciplinar. A pouca comunicação entre os professores, a reduzida disponibilidade de tempo para o planejamento de atividades com caráter interdisciplinar e a resistência das escolas à utilização de tecnologias no ensino (KRASILCHIK, 2011).

Os avanços tecnológicos juntamente com a internet, proporcionaram a conexão das pessoas com o restante do mundo, ampliando as alternativas de comunicação e favorecendo a veiculação de informações nas diferentes faixas etárias e classes sociais. A facilidade com que as informações se difundem pelo ciberespaço, representado pela internet, se tornou o principal motivo da propagação de notícias e informações tidas como verdade ou “cientificamente comprovadas”, mas que não passaram pelo rigor metodológico do método científico, as chamadas *fake news* (SILVA, 2015).

Tendo em vista que os adolescentes e jovens do presente século são usuários natos das redes sociais e do ciberespaço, bem como considerando a premissa de que o papel da escola é formar cidadãos responsáveis e indivíduos capazes de refletir e discernir, este trabalho tem por objetivo a elaboração de uma sequência didática destinada a estudantes do Ensino Médio, propondo o uso da metodologia ativa de Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), visando a identificação de *fake news* nas mídias sociais pelos estudantes, a partir das quais produzir-se-ão *safe news* para serem veiculadas nestes meios e também impressas na escola.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1. DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS

Na busca por entender melhor a temática doenças infectocontagiosas algumas afirmações precisam ser consideradas. De acordo com Chagas et. al. (2019) e Santos et.al. (2019), a diversidade de doenças infectocontagiosas é abundante em virtude da diversidade de agentes etiológicos (vírus, bactérias, fungos, protozoários, entre outros), os quais infectam o hospedeiro quando este se expõe direta ou indiretamente, podendo ser transmitidos de um hospedeiro a outro por diferentes vias (respiratória, sexual e vertical). Esses fatores fazem das doenças infectocontagiosas um problema de saúde pública sobretudo no que tange o controle epidemiológico (VENDRUSCULO et. al. 2020)

Muitas são as doenças infectocontagiosas, entretanto neste trabalho a atenção será direcionada para àquela que tem gerado grande impacto na saúde mundial desde o ano de 2020, a COVID-19. O SARS-CoV-2 ou novo Coronavírus, “pertencente à família dos *Coronaviridae* identificado em morcegos da espécie *Rhinolophus affinis*, encontrados em Yunnan, na China”, o agente causador da COVID-19 (OLIVEIRA, PRADO e CHAVES 2020, p. 59). Segundo os mesmos autores, desde dezembro de 2019, este vírus portador de RNA de fita simples, tem causado uma doença no qual os principais sintomas envolvem febre, tosse, tomografia computadorizada torácica anormal e fadiga.

Transmitido através do contato das mucosas com gotículas de saliva contaminada, o SARS-CoV-2 se propaga de forma bem eficiente no aparelho respiratório superior e os sintomas de sua infecção inicial são menos severos (HEYMANN e SHINDO,

2020). Uma das medidas de prevenção é a quarentena e o isolamento social. Outras duas medidas preventivas são a lavagem adequada e frequente das mãos com sabão e utilização de álcool em gel, bem como o uso de máscaras como equipamento de proteção individual contra o SARS-CoV-2.

2.2. SAÚDE COMO TEMÁTICA NOS CURRÍCULOS DO ENSINO MÉDIO

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC 2017) é um documento que define os conjuntos de aprendizados essenciais do Ensino Infantil, Fundamental e Médio. Seu conteúdo concorda com o que prevê a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei nº 9.394, de 1996 e as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCNEB). Na BNCC, o Ensino médio está dividido em quatro áreas de conhecimento: Linguagens e suas tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Cada área do conhecimento determina competências específicas de área e cada competência está relacionada a um conjunto de habilidades. As competências se articulam dentro dos componentes curriculares.

As disciplinas contempladas para abordar a área Ciências da Natureza e suas Tecnologias são Biologia, Química e Física, sendo que Biologia preferencialmente e tradicionalmente aborda os assuntos relacionados à saúde, geralmente com enfoque biomédico (doenças, prevenção e higiene). Segundo Sousa et al. (2019, p.130), os textos da DCNEB e BNCC “ressaltam a saúde como um campo do conhecimento que deve estar contemplado nas diferentes áreas do conhecimento”.

Além disso, dentro da BNCC não são designadas competências e habilidades que abordem exclusiva e especificamente o tema saúde, ele encontra-se subentendido dentro das demais competências e habilidades e deve ser desenvolvido transversalmente. Sousa et al. (2019, pg. 148) concluem que no tocante a transversalidade do tema saúde, como propõe os Parâmetros Curriculares Nacionais – Temas Transversais (PCN – TT), “ela é defendida, mas em termos práticos é pouco evidenciada”.

2.3. FAKE NEWS E PÓS-VERDADE

O ciberespaço é um local onde uma infinidade de informações circulam diariamente, independentemente de sua veracidade. Por esse motivo pessoas leigas e menos instruídas podem facilmente acreditar em muito do que está disponível neste espaço, sem questionar/avaliar a confiabilidade e procedência dos fatos (SILVA, 2015). Allcott e Gentzkow (2017, p. 214) definem as *fake news* como “artigos noticiosos que são intencionalmente falsos e aptos a serem verificados como tal, e que podem enganar os leitores”. Segundo Bounegru et al., (2018, p. 18) “as notícias falsas podem ser consideradas não só em termos da forma ou conteúdo da mensagem, mas também em termos de infraestruturas mediadoras e culturas participativas”, que facilitam a sua circulação. Os autores ainda explicam que o foco é colocado na circulação porque os conteúdos falsos e desinformação tornam-se *fake news* em virtude do alcance.

Um outro termo bem discutido em trabalhos científicos por alguns autores como Andrade (2018) e Flood (2016) é a pós-verdade. Segundo Andrade (2018) a pós-verdade se refere ao momento em que a verdade perde sua relevância, e acrescenta que a pós-verdade é o que permite que as notícias falsas sejam divulgadas amplamente nas mídias digitais.

É interessante que ao entrarmos na era pós-verdade, na qual os fatos e evidências foram substituídos por crenças e emoções pessoais, onde a verdadeira história não importa mais (ROCHLIN, 2017). A pós-verdade é definida como uma estratégia de desvalorização dos fatos em prol dos interesses pessoais (FLOOD, 2016). As notícias falsas, vazias e que não apresentam fundamentos acabam caracterizando o universo da pós-verdade.

Diante do exposto não é difícil imaginar os impactos sociais desencadeados pelas *fake news*, uma vez que além da proliferação desenfreada de mentiras, prejudicam o senso crítico dos indivíduos confundindo sua capacidade de distinguir a verdade, o que leva ao que consideramos a pós-verdade. Os impactos podem ser ainda mais desastrosos quando a veiculação de *fake news* relacionadas a saúde, colocando em risco a saúde das pessoas que mudam seu comportamento ou adotam práticas no cotidiano sem questionar a efetividade ou seriedade da informação lida (MÜLLER e SOUZA, 2018).

2.4.METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO

Apostar em metodologias ativas no ensino significa transcender as amarras do ensino tradicional, inovando o processo de ensino e aprendizagem, rompendo com a passividade do aluno e incentivando a uma postura ativa, fazendo deste protagonista na construção e apreensão do conhecimento (SOUSA 2018; BES et al. 2019). Ademais, as metodologias ativas proporcionam a autonomia do estudante em seus estudos, o trabalho em equipe, a relação teoria e prática, bem como favorecem a avaliação processual e formativa (PAIVA et al., 2016).

Em contrapartida, não se pode desconsiderar os desafios a serem superados para a implantação efetivas das metodologias ativas nos diferentes níveis do ensino (PAIVA et al., 2016). Na visão de Moran (2015, p. 18), as mudanças atuais que buscam uma atuação ativa “esbarram em uma complexidade de fatores que precisam ser revistos para que as ideias inovadoras não se corrompam em práticas bem próximas as tradicionais que buscam superar”. Os fatores que precisam ser revisados são os currículos escolares, a forma como este se encontra organizado, as metodologias, e os tempos.

2.4.1. APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS (ABP)

“A aprendizagem baseada em projetos e em problemas é uma metodologia ativa que coloca os alunos na posição de investigadores, construindo o conhecimento de forma interdisciplinar e coletiva” (BES et al. 2019, pg. 125 e 126) Na metodologia ABP, a solução do problema é o norte para as atividades e o aluno ocupa parte central na aprendizagem.

Na ABP, o processo é investigativo e são abordadas questões cotidianas e contextualizadas. Os alunos trabalham dispostos em pequenos grupos e o professor atuar como facilitador. O professor cria as situações para despertar os alunos e conecta os conteúdos. É necessário definir os objetivos de aprendizagem, da disciplina e dos conteúdos que o estudo sobre um determinado problema pode oferecer.

Em síntese, Souza e Dourado (2015, p.191) propõem etapas para o desenvolvimento da metodologia ABP (figura 1).

Figura 1: Etapas da ABP

I) Elaboração do contexto problemático: deve abranger a realidade do estudante, ser um assunto instigante, boa delimitação de tamanho do problema. O professor é o responsável por esta etapa. É importante lembrar que o planejamento deve ser sempre revisitado durante a execução das atividades, para adequá-lo melhor às necessidades que porventura surjam;
II) Questões problema: momento de contato e investigação pelos alunos, levantamento de questões e a criticidade das ações. Os alunos devem estar dispostos em grupos pequenos para esta etapa. O professor nesta etapa atua como mediador;
III) Resolução dos problemas: nesta etapa os alunos continuam o processo investigativo, pesquisam e compartilham informações, tanto individualmente como coletivamente, visando em conjunto respostas as questões-problema elaboradas na etapa anterior;
IV) Apresentação do resultado e autoavaliação: síntese das ações executadas para alcançar o objetivo. Autoavaliação individual e coletiva.

Fonte: Adaptado de Souza e Dourado, 2015.

2.4.2. AVALIAÇÃO NA METODOLOGIA DE APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS

A avaliação é crucial em qualquer metodologia de ensino. Como Vasconcellos (2003, pg. 40) evidencia: “a avaliação para assumir caráter transformador, antes de tudo, deve estar comprometida com a aprendizagem da totalidade dos alunos [...]. É o que justifica sua existência no processo educativo”.

Em linhas gerais, a avaliação na ABP consiste numa abordagem mais formativa, na qual são consideradas três perspectivas distintas, geralmente com pesos diferentes, mas relacionadas entre si: I) a de cada aluno sobre o seu próprio trabalho (autoavaliação); II) a dos colegas que formam os grupos de trabalho que irão atuar na resolução dos problemas (avaliação entre pares); e III) a avaliação do professor. [...] A avaliação deve considerar a capacidade de observação, reflexão, criação, julgamento, comunicação, convívio, cooperação, decisão e ação (LOPES et al., 2019, p. 121).

A mudança proporcionada pela metodologia ativa também se estende para a avaliação, que “deve ser estruturada de tal forma que os estudantes possam pôr em prática a compreensão dos problemas e suas soluções de forma contextualmente significativas.” (SAVIN-BADEN & MAJOR, 2004; CARVALHO, 2009 apud SOUZA e DOURADO, 2015, pg. 194). A avaliação na ABP deve ser constante, reflexiva e não classificatória.

3. METODOLOGIA

Trabalhar com a metodologia de ABP, permite que estudantes tenham a oportunidade de pesquisar e praticar o método científico, enquanto aprendem um

determinado conteúdo, estimulando o autodidatismo. Seguindo esta linha de pensamento, alguns paradigmas educacionais precisam ser atualizados. O professor não detém o monopólio do saber, o aluno não é apenas um mero receptor de conteúdos e a sala de aula não é o único espaço para apropriação do conhecimento. O professor precisa deixar de assumir uma postura de transmissor do conhecimento para adotar uma postura de mediador entre os alunos e as tecnologias de informação que se apresentam como um espaço de aprendizagem para os estudantes (MAGALHÃES e OLIVEIRA, 2015). Assim o professor tem a função de direcionar o processo pedagógico, interferir e criar condições necessárias a apropriação do conhecimento pelo aluno (LIBÂNEO, 1992).

O presente trabalho é uma pesquisa qualitativa, uma vez que alicerçada em um referencial teórico, visa a elaboração de uma sequência didática que e foi conduzida conforme as etapas dispostas na Fig. 2.

Figura 2: Etapas da metodologia proposta para a sequência didática

O que pesquisar?
<p>O professor introduz o conceito de <i>fake news</i>, exemplificando. Um debate rápido sobre a opinião dos alunos deve ser realizado com o objetivo de instigar sua curiosidade sobre as <i>fake news</i>.</p> <p>Sugestão de perguntas: <i>Quem já recebeu fake news? Você achou que é verdade ou mentira? Por que as pessoas produzem este tipo de notícia?</i></p> <p>Após o debate, o professor apresenta a proposta de trabalho.</p> <p>Os alunos em grupo deverão selecionar uma mensagem, reportagem ou conteúdo disponível em redes sociais, páginas da internet e outros meios, relacionadas a COVID-19.</p>
Por que pesquisar?
<p>Os alunos apresentarão ao professor a notícia escolhida e juntos deverão elaborar as justificativas e hipóteses.</p> <p>Perguntas a serem respondidas: <i>Por que esta notícia é relevante para o grupo? Ela tem implicações regionais ou globais? De que maneira esta notícia afeta sua comunidade e você? O quão verdadeiro é o conteúdo desta notícia?</i></p>
Como pesquisar?
<p>O professor orienta os alunos sobre quais são as fontes seguras de informação, como pesquisar, extrair e interpretar dados. Esta é uma oportunidade de trabalhar em conjunto com professores de outras disciplinas. Os alunos irão pesquisar através de</p>

fontes seguras o assunto tratado pela *fake news* e a partir das informações coletadas elaborar uma *safe news*.

Como organizar as ideias?

Os alunos deverão escolher a forma de divulgação das notícias e partir disto organizar as ideias e conceitos estudados.

Exemplo: Para elaborar um infográfico com dados gerais sobre o Corona vírus, os alunos irão exercitar/desenvolver habilidades de escrita de pequenos textos, produzir gráficos simples, manipular imagens digitais e noções de publicidade.

Como concluir uma hipótese?

Esta é a etapa final do trabalho, onde os alunos irão divulgar/apresentar suas *safe news*, comparando a nova notícia, com a *fake news*.

Avaliação da metodologia

O professor fará uma autoavaliação da metodologia proposta nesta sequência didática, de modo a verificar se ela é aplicável, suas contribuições para o processo de ensino e aprendizagem, seus pontos positivos e negativos.

Sugestão: Construir Análise Swot para metodologia.

Avaliação dos estudantes

Ao final de cada etapa o professor avaliará o desempenho e aproveitamento dos alunos.

A avaliação consistirá no preenchimento de fichas avaliativas atribuindo um “peso” de 1 a 5 de acordo com a participação e contribuição de cada aluno para com o grupo. Os estudantes também serão avaliados através do material que irão produzir, no caso o texto jornalístico da *safe news*, bem como pela apresentação/divulgação desta.

Avaliação do professor

Na metodologia de ABP, é fundamental que o professor se autoavalie.

Autoavaliação sugerida:

1- Conseguiu atuar interdisciplinarmente com os demais professores participantes? Justifique.

2 – Aplicou toda a metodologia, seguindo todas as etapas de acordo com a proposta da sequência didática? (se não por que?)

3 – Durante o desenvolvimento da metodologia de ABP em suas aulas, abordando a temática saúde (como exemplo as doenças infectocontagiosas), você necessitou recorrer a alguma fonte de informação? (Já tinha conhecimento sobre o assunto ou precisou se aprofundar nele?) comente.

4 – No decorrer das aulas utilizando a metodologia proposta você sentiu dificuldades para executar as etapas da mesma? Justifique.

5 – Trace comentários sobre o seu desempenho durante as aulas, utilizando a metodologia de ABP.

6 – O que você mudaria em sua abordagem se tivesse oportunidade de aplicar esta metodologia novamente?

Fonte: Autoria própria.

4. RESULTADO

Como já citado este trabalho se propõe a apresentar uma sequência didática (figura 3) visando a aprendizagem utilizando as mídias digitais como ferramentas de pesquisa e produção de conhecimento. Como resultado espera-se alertar os estudantes sobre a veracidade das informações que são divulgadas nas redes sociais e mídias digitais, as quais estão expostos, orientando para uma busca por fontes seguras de pesquisa.

Figura 3: Sequência didática proposta

ETAPA 1 – O QUE PESQUISAR?
<ul style="list-style-type: none">• Apresentação da <i>fake News</i> <p>Situação-problema: “Durante a pandemia de COVID-19, Joana recebeu esta mensagem no celular, a mensagem mostra o título de um trabalho científico, publicado no que parece ser um <i>site</i> de publicações de artigos científicos da área médica. Com título “Vacina contra a gripe aumenta o risco de complicações relacionadas ao novo Coronavírus em 36%. [...] Resumo: tomar vacina agora pode aumentar em 36% ambiente para COVID-19”. No final da mensagem um <i>link</i> para acesso ao trabalho está disponível. Depois de receber essa mensagem Joana está considerando não tomar a vacina e está questionando se realmente elas são seguras. <i>Esta notícia trouxe informações seguras para Joana? Justifique sua resposta.</i> Em grupo, elaborem uma resposta a este problema. A resposta deve ser em forma de notícia.</p> <ul style="list-style-type: none">• Este tema foi selecionado devido a atual pandemia de Coronavírus e do crescimento do movimento antivacina.• Os estudantes terão que explicar como o Coronavírus infecta uma pessoa e como evitar que isto ocorra.
ETAPA 2 – POR QUE PESQUISAR?
<ul style="list-style-type: none">• Os estudantes deverão apresentar as justificativas de o porquê esta <i>fake news</i> é relevante para eles. O ideal é que as justificativas abranjam as três componentes curriculares. O professor pode instigar com perguntas para direcionar o pensamento para justificativas dentro dos assuntos. <p>Exemplo de resposta: “Podemos por a nossa saúde e a de pessoas próximas em risco por acreditar e propagar informações falsas; “É importante identificar informações falsa e esclarecê-las. Não se deve acreditar em tudo o que vê, pensamento crítico e científico é essencial;”</p>
ETAPA 3 – COMO PESQUISAR?

- Entendendo o problema: Joana acredita não ver como a vacina poderia ajudar a manutenção da saúde dela ou até mesmo de outras pessoas. Os estudantes devem descobrir se a vizinha está certa.
- Para isto deverão ter conhecimento sobre a doença COVID-19, como é transmitida, como se obtém a vacina e como funciona uma vacina imuniza uma pessoa.

Componente Biologia

Variáveis conhecidas:

- É obrigatória a imunização de crianças e idosos;
A COVID-19 é transmitida por contato com gotículas ou secreções respiratórias

de pessoas infectadas ou superfícies infectadas por elas;

- As vacinas são disponibilizadas gratuitamente na rede pública de saúde;
- Os sintomas mais comuns apresentados por uma pessoa infectada por COVID-19 é tosse, febre, coriza, dor de garganta, falta de ar.

Variáveis desconhecidas:

- Por que SARS-CoV-2 é um Coronavírus?
- Como evitar ou diminuir a infecção pela COVID-19?
- Quais são os métodos de detecção do vírus?
- Como é feita uma vacina?
- Como age uma vacina no organismo humano?
- **É importante ressaltar que neste planejamento ainda são necessários os tópicos dos componentes curriculares de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia e Filosofia, disciplinas que podem ser interessantes para o trabalho interdisciplinar desta sequência didática.**

ETAPA 4 – COMO ORGANIZAR AS IDEIAS?

Os estudantes deverão organizar os conhecimentos pesquisados nas etapas anteriores para elaborar uma notícia com informações seguras (*safe news*).

A elaboração da notícia será realizada em conjunto com a disciplina de Língua Portuguesa e eventualmente História e Filosofia. Os alunos podem escolher um fragmento do assunto para elaborar sua notícia.

Exemplos de assuntos que podem ser enfatizados:

- Etapas da produção da vacina;
- Mecanismo de ação das vacinas;
- Hábitos de higiene para prevenir a infecção da COVID-19;
- Mecanismos de transmissão da COVID-19;
- Políticas públicas para minimizar os impactos da doença.

ETAPA 5 – COMO CONCLUIR UMA HIPÓTESE?

Etapas de apresentação da resposta sobre a pergunta: A notícia apresentava informações seguras?

- Os estudantes irão apresentar suas notícias para a turma.

- São feitas reflexões de todo o processo de produção de uma notícia com teor científico, bem como sobre os impactos que as informações tem na vida das pessoas.
- São discutidas as avaliações, as expectativas e aprendizados do grupo.
- Quando possível as notícias podem ser divulgados em meio eletrônico, em sites e aplicativos de redes sociais.
- Após as apresentações e ajustes finais, as notícias podem ser impressas e dispostas pelo ambiente de convívio comum nas escolas (pátios, corredores) para a visualização de uma maior número de pessoas, ou divulgadas em meios digitais como as redes sociais.
- O professor pode estimular os estudantes a convidar outros estudantes de outras séries para apreciar o trabalho e receber explicações mais detalhadas dos estudantes.
- Análise SWOT:

	Contribui para a estratégia proposta	Dificulta a estratégia proposta
Aspectos internos	Pontos fortes	Pontos fracos
	- Metodologia ativa; - Avaliação formativa; - Pode ser reformulado;	- Metodologia não testada;
Aspectos externos	Oportunidades	Ameaças
	- Metodologia útil; - Aulas de Biologia mais próximas do proposto pela BNCC;	- Estrutura pedagógica da escola não abrange este tipo de metodologia; - Recursos físicos indisponíveis;

Fonte: Autoria própria.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao final deste trabalho consideramos que a partir do levantamento bibliográfico e do estudo da metodologia ABP, a sequência didática proposta atende a lógica da metodologia. Ponderamos o fato de que esta não foi testada para verificar sua eficácia no contexto da educação básica, apesar disso, a sequência didática proposta representa uma iniciativa em direção ao uso coerente e responsável do ciberespaço pelos adolescentes.

Ademais, a construção das *safe news* permitiria aos alunos a capacidade de desenvolver o método de pesquisa científica corretamente, observando princípios morais e éticos. Além de que este trabalho, que utiliza *fake news* na abordagem do tema "doenças infectocontagiosas", através da metodologia ABP, pode ser adaptado para

outras temáticas, cujas quais os professores julgarem pertinentes a serem desenvolvidas dentro dos grupos de estudantes, em sala de aula.

REFERÊNCIAS

- ALBERT EISNTEIN, Centro de Educação em Saúde Abram Szajman. “Fake News” na área médica preocupa profissionais: Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein reúne jornalistas e pesquisadores para discutir o tema, Revista Ciência e Vida, 2018. Disponível em: <<https://ensinoepesquisa.einstein.br/fiquepordentro/noticia/fake-news-na-area-medica-preocupa-profissionais>>. Acesso em: 11 de out. 2020.
- ALLCOTT, H., GENTZKOW, M. Social media and fake news in the 2016 election. **Journal of Economic Perspectives**, p. 211-236, 2017. Disponível em: <<https://web.stanford.edu/~gentzkow/research/fakenews.pdf>>. Acesso em: 16 de mar. 2020.
- ANDRADE, E. V. R. **Fake news, pós-verdade e seus impactos no cenário político atual**. 2018.
- BES, P. et al. **Metodologia para aprendizagem ativa**. Porto Alegre: SAGAH, 2019.
- BOUNEGRU, L., et al., A Field Guide to Fake news, Amsterdã. **Public Data Lab**. Disponível em: <<https://blogbibhecparis.files.wordpress.com/2017/07/sample-field-guide-to-fake-news.pdf>> Acesso em: 17 de mar. 2020.
- BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, p. 537, 2017. Disponível em: <<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/>>. Acesso em: 11 de mar. 2020.
- BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. **Parâmetros Curriculares Nacionais – Saúde**. Brasília: MEC, 2000. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/saude.pdf>>. Acesso em: 9 de mar. 2020.
- CHAGAS, Álvaro Girão Moura; et. al. Diagnóstico molecular em doenças infectocontagiosas. **Mostra Científica de Biomedicina**. Quixadá, v. 4, n. 1, 2019. Disponível em: <http://publicacoesacademicas.unicatolicaquixada.edu.br/index.php/mostrabiomedicina/article/view/3442>. Acesso em: 03 nov. 2020.
- FLOOD, A. **Post-truth named word of the year by Oxford Dictionaires**, 2016.
- HEYMANN D. L.; SHINDO, N. COVID-19: what is next for public health? **Lancet**, p. 542-545, 2020. Disponível em:

<<https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2930374-3>>. Acesso em: 24 de out. 2020.

KRASILCHIK, Myriam. **Práticas de Ensino em Biologia**. 4 ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2011.

LIBÂNEO, J. C. Tendências pedagógicas na prática escolar: Democratização da Escola Pública – a pedagogia crítico-social dos conteúdos, **Loyola**, São Paulo, 1992. Disponível em: <https://praxistecnologica.files.wordpress.com/2014/08/tendencias_pedagogicas_libaneo.pdf>. Acesso em: 15 de mai. 2020.

LOPES, R. M. et al. Aprendizagem baseada em problemas: fundamentos para a aplicação no ensino médio e na formação de professores. Rio de Janeiro: Publiki, 2019. Disponível em: <https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/432641>. Acesso em: 30 out. 2020.

MAGALHÃES, Fabrício Ricarte; OLIVEIRA, Alexandra Maria de. O uso das tecnologias da informação e comunicação na sociedade da informação. II CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. **Anais eletrônicos: II CONEDU – Políticas, Teorias e Práticas**, Campina Grande, out. 2015. Disponível em: https://www.editorarealize.com.br/revistas/conedu/trabalhos/TRABALHO_EV045_MD1_SA13_ID6268_07092015145336.pdf. Acesso em: 17 de mar. 2020.

MORAN, J. M. **Mudando a educação com metodologias ativas**. Coleção Mídias Contemporâneas. Convergências Midiáticas, Educação e Cidadania: aproximações jovens. Vol. II, Carlos Alberto de Souza e Ofelia Elisa Torres Morales (orgs.). PG: Foca Foto-PROEX/UEPG, p. 15-33, 2015. Disponível em: <http://www2.eca.usp.br/moran/wp-content/uploads/2013/12/mudando_moran.pdf>. Acesso em: 04 de ago. 2020.

MÜLLER, F. SOUZA, M. V. Fake news: um problema midiático multifacetado. Revista: **Ciki**. In: International Congress of Knowledge and Innovation-Ciki. 2018. Disponível em: <<http://proceeding.ciki.ufsc.br/index.php/ciki/article/view/511/261>>. Acesso em: 17 de mar. 2020

OLIVEIRA, W. A.; PRADO, M. C., e CHAVES, S. N. Emergência de saúde pública pelo novo Coronavírus: revisão bibliográfica. **Revista de Saúde**, Brasília, v.7, n.2, 2020. Disponível em: <<http://revista.faciplac.edu.br/index.php/RSF/article/view/639/262>>. Acesso em: 22 de out. 2020.

PAIVA, F. R. M. et al., Metodologias ativas de Ensino-aprendizagem: revisão integrativa. **Sanare Sobral**, v. 15, n.2, p. 145-153, 2016. Disponível em: <https://sanare.emnuvens.com.br/sanare/article/viewFile/1049/595>. Acesso em: 15 de mai. 2020.

- PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação do Paraná. **Diretrizes Curriculares da Educação Básica Biologia**. Paraná: MEC, 2008. Disponível em: <http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/diretrizes/dce_bio.pdf>. Acesso em: 10 de mar. 2020.
- ROCHLIN, N. **Fake News: belief in post-truth**. Emerald Insight, v. 35 No University of British, Coloumbia, Canadá. 2018.
- SABROZA, P.C. et al., Doenças transmissíveis: ainda um desafio. In: MINAYO, M.C.S. (Org.). **Os muitos Brasis: saúde e população na década de 80**. Hucitec/ ABRASCO, p. 177-244, 1995.
- SANTOS, Elisângela Luzia dos; et. al. Levantamento de pré-requisitos de qualidade para elaboração de um aplicativo de doenças infectocontagiosas. X SALÃO DE ENSINO E EXTENSÃO; XXV SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA. **Anais eletrônicos: XXV SEMIC – Descobrimos novas formas de aprender**. Universidade de Santa Cruz do Sul. 2019. Disponível em: <https://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/semic/article/view/19731>. Acesso em: 03 nov. 2020.
- SILVA, Alan de Angeles Guedes da. O uso do facebook no ensino de biologia. II CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. **Anais eletrônicos: II CONEDU – Políticas, Teorias e Práticas**, Campina Grande, out. 2015. Disponível em: http://www.editorarealize.com.br/revistas/conedu/trabalhos/TRABALHO_EV04_5_MD4_SA18_ID5152_13082015153806.pdf. Acesso em: 15 de mar. 2020.
- SOUSA, Mapoanney Nhalis Clares de; et. al. Conhecimento de discentes sobre metodologia ativa na construção do processo de ensino aprendizagem inovador. **Revista Interdisciplinar Encontro de Ciências**, Icó, v. 1, n. 1, p. 61-74, jan. 2018. Disponível em: <http://www.fvs.edu.br/riec/index.php/riec/article/view/7/5>. Acesso em: 26 jun. 2020.
- SOUZA, S. C.; DOURADO, L. Aprendizagem baseada em problemas (abp): um método de aprendizagem inovador para o ensino educativo. **HOLOS**, [S.l.], v. 5, p. 182-200, out. 2015. ISSN 1807-1600. Disponível em: <<http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/view/2880>>. Acesso em: 30 out. 2020.
- THOMAS, J. C., WEBER, D. J. **Epidemiologic methods for the study of infectious diseases**. Oxford University press, p. 19 -477, 2001.
- VASCONCELLOS, C. dos S. **Avaliação da aprendizagem: práticas de mudança - por uma práxis transformadora**. 5 ed. Vol. 6. São Paulo: Libertad, 2003.
- VENDRUSCOLO, V. G.; et. al. **Informações sobre doenças infectocontagiosas em tempos de pandemia: uma análise descritiva de uma rede social do Pró-Saúde-UNISC**.

MOSTRA DE EXTENSÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA UNISC. 2020. Disponível em:
<https://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/mostraextensaounisc/article/view/20562>. Acesso em: 03 nov. 2020.

CAPÍTULO IX

FILIAÇÃO DISCENTE A ONG INTERNACIONAL REPRESENTATIVA DE ESTUDANTES DE MEDICINA NO CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19

DOI: 10.51859/ampla.csa511.1121-9

Caio Pessoa Cruz ¹
Fernanda Ingrid Oliveira Ramos ¹
Eliana Mesquita Alves ¹
Alana Ferreira Cordeiro ²
Luiza Helena Monteiro de Sousa Rabelo ³
Maria das Graças Barbosa Peixoto ⁴
Daniele Vasconcelos Fernandes Vieira ⁵

¹ Graduando(a) do curso de Medicina. Universidade Estadual do Ceará – UECE

² Psicóloga. Universidade Federal do Ceará - UFC

³ Psicóloga. Centro Universitário Maurício de Nassau - UNINASSAU

⁴ Mestre em Saúde Pública. Universidade Estadual do Ceará - UFC

⁵ Mestre em Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde. Universidade Federal do Ceará - UFC

RESUMO

A iniciativa discente emerge como essencial para que, por meio de experiências extracurriculares, seja aprimorado um repertório de valores e habilidades indispensáveis na prática clínica de médicos generalistas. Este relato tem como objetivo descrever qualitativamente o processo de filiação realizado por acadêmicos de uma universidade pública do Ceará à Federação Internacional das Associações dos Estudantes de Medicina do Brasil, no intuito de consolidar oportunidades de aperfeiçoamento de competências para estudantes do seu curso. Durante essa vinculação, os acadêmicos se depararam com vários desafios entranhados à pandemia da COVID-19, os quais exigiram resiliência, liderança, resolução de conflitos e outras habilidades para que os graduandos conseguissem lograr êxito. Constatou-se, desse modo, que a ampliação do currículo acadêmico quanto às competências fundamentais para a plena formação do estudante de medicina foi se consolidando ao longo do processo.

Palavras-chave: Iniciativa estudantil. Medicina. Formação por competências. Covid-19.

1. INTRODUÇÃO

O mecanismo efetivo de ensino e aprendizagem de uma universidade é caracterizado por ter grupos de atores - a exemplo de coordenadores, discentes e docentes - que se articulam para atingir uma meta em comum (CHAGAS et al., 2018).

Para a eficácia de um curso de medicina, tal meta consiste em garantir uma formação ética, generalista, crítica e humanista, capaz de responder às necessidades de promoção, prevenção e recuperação da saúde da população; de modo que o profissional recém-graduado saiba integrar funcionalmente o sistema de saúde no qual atua, bem como consiga trabalhar em equipe multiprofissional, exercendo uma visão integral dos problemas de saúde do ser humano. (TAVARES et al., 2007; BRASIL, 2014).

Sob tal ótica, Lobo (2015) afirma que as instituições de ensino superior, particularmente as que possuem o curso de Medicina, passaram por diversas transformações no contexto ideológico e filosófico. Dentre elas, destaca-se a inserção do discente na tomada de decisões que influenciam na estrutura e pedagogia do curso, possuindo voz ativa em discussões com a coordenação e a gestão do curso.

Assim, a iniciativa discente, no contexto universitário, emerge como algo essencial para que a sua própria graduação seja efetiva. Santos et al. (2020), corrobora essa perspectiva ao afirmar que relações interpessoais vividas academicamente, extrapolando o currículo formal, resultam no chamado "currículo oculto", no qual se situa o vasto conjunto de experiências aprimoradoras de valores e atitudes, podendo ser considerado como o "pano de fundo" do processo de aprendizagem. Por meio do "currículo oculto", torna-se possível aperfeiçoar o profissionalismo no graduando, visando à formação de médicos capazes de exercer suas atribuições nos mais altos padrões de qualidade e dos princípios da ética e bioética, no nível tanto individual quanto coletivo (SANTOS et al., 2020).

À luz desses entendimentos, reconhece-se, de fato, a importância de experiências estudantis que proporcionem oportunidades de desenvolvimento das competências fundamentais para o efetivo trabalho em equipe na prática profissional. Com efeito, um conjunto estudantil de uma universidade pública do Ceará organizou-se em um comitê representativo de sua escola médica e submeteu-se ao processo de filiação da Federação Internacional das Associações de Estudantes de Medicina do Brasil (tradução de International Federation of Medical Students' Association of Brazil - IFMSA Brazil), com o intuito de estabelecer, no seu meio acadêmico, oportunidades de crescimento oferecidas por essa organização estudantil. Desse modo, este relato de experiência tem como fito discorrer sobre as percepções dos estudantes universitários a respeito de suas vivências no processo de filiação ao qual se submeteram.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo, na forma de relato de experiência, à medida que busca registrar e delinear, sem interferir, os fatos constituintes da experiência (GIL, 2008), e qualitativo, ao passo que é constituído por uma narrativa em perspectiva dos acadêmicos envolvidos, na qual sua subjetividade reflete o viver da experiência em questão (MINAYO, 2012).

3. DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA E DISCUSSÃO

A Federação Internacional das Associações de Estudantes de Medicina (IFMSA), fundada em 1951, é constituída por 133 Organizações Membros Nacionais (OMNs) provenientes de mais de 123 países, sendo reconhecida como uma das maiores e mais antigas organizações não governamentais dirigidas por estudantes no mundo. Pertence ao sistema das Nações Unidas e da Organização Mundial da Saúde, trabalhando também com a Associação Médica Mundial. Uma de suas OMNs é a IFMSA Brazil, a qual está presente em mais de 220 escolas médicas distribuídas nas cinco regiões brasileiras e atua em diversos eixos incluindo humanização, produção científica, promoção de saúde, educação médica, intercâmbios, representatividade estudantil e treinamentos.

Frente às oportunidades proporcionadas por essa federação, dez estudantes de diferentes períodos do Curso de Medicina da Universidade Estadual do Ceará (UECE) decidiram formar um comitê estudantil representante de sua escola médica e submeter-se ao processo de filiação à IFMSA Brazil, com o intuito de consolidar o acesso a tais oportunidades para os estudantes de seu curso. De modo geral, a filiação iniciou-se em setembro de 2019 e foi concluída em novembro de 2020, durante a pandemia de COVID-19, sendo implementada por meios digitais em respeito ao distanciamento social. Fez-se necessária a articulação entre o comitê aspirante, a Coordenação do Curso de Medicina da UECE, o Centro de Ciências de Saúde da UECE e a Vice-Presidente para Assuntos Internos (VPI) da IFMSA Brazil.

Seguiram-se normas estabelecidas pelo Regimento Interno da IFMSA Brazil, o qual define as etapas da vinculação. A princípio, houve a eleição de um estudante do comitê aspirante para constituir a ponte comunicativa entre a IFMSA Brazil e o seu grupo estudantil, de modo que este assumiu a responsabilidade de fazer o repasse, para os

seus parceiros, das normas de vinculação, exigências, documentos e *feedbacks* enviados pela VPI e o envio de documentos e dados acadêmicos do seu grupo para a federação.

Em seguida, os estudantes apresentaram a Federação para a coordenação do curso e outras entidades universitárias, por meio das plataformas digitais de comunicação - como o *G-mail*, o *Whatsapp* e o *Google Meet* -, com o objetivo de informá-las acerca dos eixos de atuação da ONG, dos benefícios inerentes ao vínculo interinstitucional e das obrigações que a coordenação assumiria caso os estudantes lograssem êxito.

A partir disso, houve a emissão de uma carta de apoio à filiação - por parte da coordenadora do curso, e o preenchimento de formulário com dados do curso e da universidade, de modo que se explicitou condições para amplo desempenho do vínculo interinstitucional em criação. Ressalta-se que, nesse período, a coordenação do curso estava sobrecarregada com a organização de adaptações pedagógicas em razão do fechamento, decorrente da pandemia, de estágios, internatos e projetos extracurriculares presenciais.

Além disso, houve dificuldades técnicas com computadores da coordenação. Tal circunstância exigiu do comitê aspirante uma comunicação compreensiva e a adoção de estratégias para superar o empecilho logístico, as quais incluíram a coleta presencial da carta de apoio e do formulário de filiação com o uso de máscaras PFF2, álcool em gel e distanciamento social. Além disso, o comitê manifestou, em formato de carta, o comprometimento do grupo com atividades de ensino, pesquisa e extensão - necessárias para a manutenção do vínculo interinstitucional.

Após a deliberação da Diretoria Executiva da IFMSA Brazil sobre os documentos até então enviados, solicitou-se ao grupo discente a promoção de atividade social inspirado nos projetos da Federação. Esta poderia ser realizada nas áreas de Saúde Pública, Saúde Sexual e Reprodutiva incluindo HIV/AIDS, Direitos Humanos e Paz, e Educação Médica, a depender do interesse do comitê, mas deveria ser, como critério da Federação, elaborada em resposta a alguma demanda social – buscando um impacto positivo no público-alvo, além de ser interativa e avaliativa quanto aos resultados alcançados.

Nesta etapa, os estudantes decidiram realizar um Workshop de Saúde Mental para Pré-Vestibulandos, em razão da sobreposição de fatores estressores enfrentados

pelo público-alvo. Segundo Ikuno et al. (2020), os vestibulandos defrontam-se geralmente com incertezas e inseguranças quanto aos resultados das provas, cobrança familiar, e expectativas de outros agentes - como coordenadores e amigos. Nas circunstâncias da pandemia vigente, somam-se a esse desgaste psicoemocional: queda de desempenho escolar durante estudo remoto, incertezas quanto à segurança na realização dos exames, bem como a necessidade de colaboração com renda familiar para garantir subsistência e transtornos psicológicos - como ansiedade e depressão - consequentes da própria pandemia de Sars-Cov-2 (IKUNO et al., 2020).

O Workshop constituiu a fase mais desafiadora do processo de filiação. Fez-se mister que os acadêmicos buscassem profissionais da área da saúde mental que os capacitassem a ministrar palestras e promover o evento de modo direcionado para as necessidades psicoemocionais dos participantes, sem que gatilhos fossem acionados.

No tocante à comunicação com esses profissionais, o conhecimento pessoal de alguns integrantes do comitê e a atuação do Centro de Ciências da Saúde da Uece foram imprescindíveis para que o comitê obtivesse contatos de psicólogos e professores universitários dispostos a colaborar no projeto, qualificando os graduandos.

Considerando que a abordagem do comitê não substituiria o acompanhamento com psicólogos ou psiquiatras, utilizou-se a abordagem da Psicologia Positiva para ministrar palestras e sugerir atividades práticas cujos temas foram: "Desmitificação da busca ao profissional de saúde mental", "Técnicas de gerenciamento emocional", "Autocuidado como abordagem humanizada ao bem-estar em tempos de pandemia" e "Cansaço estudantil em tempos de ensino remoto, como o arrefecer". O material para as palestras e para as práticas sugeridas no Workshop foram desenvolvidos inteiramente pelos estudantes de medicina envolvidos, por meio das plataformas *Canva* e *Google Apresentações*.

No que diz respeito à divulgação do evento, realizou-se em agosto de 2020, mediante aplicativo *WhatsApp*, a partir da parceria com a Psicóloga Alana Cordeiro - atuante no cursinho pré-vestibular Ari de Sá Cavalcante da cidade de Fortaleza -, a qual compartilhou, diretamente nos grupos das salas de cursinho, os textos e a arte de divulgação, bem como o link do *Formulário Google* para a inscrição.

Ao decorrer da atividade, houve limitações e dificuldades encontradas. Uma delas foi a desistência de muitos integrantes do comitê resultante da dificuldade de

conciliar a filiação com deveres curriculares, domésticos e até mesmo empregatícios, visto que alguns acadêmicos também iniciaram a colaborar com a renda familiar durante a pandemia. Outra razão da desistência dos acadêmicos foi o impacto psíquico da pandemia na própria qualidade de vida. Um dos resignantes afirmou que, à medida que estudava o conteúdo sobre ansiedade para ministrar uma das palestras, se colocou em situações intoleráveis de sofrimento psicoemocional. Quando se analisa a literatura concernente ao tema, percebe-se que tal justificativa é extremamente plausível.

Cybulski e Mansani (2017) explicitam que o estresse, a baixa periodicidade de atividades de lazer, a insatisfação com o desempenho acadêmico e a falta de apoio emocional - circunstâncias frequentemente presentes no cotidiano de estudantes de medicina - são fatores de alto risco para o desenvolvimento de sintomas depressivos.

Teixeira et al. (2021) acrescentam, ainda, que o contexto socioeconômico vivenciado, durante a pandemia de Covid-19, por estudantes brasileiros trouxe consigo outros fatores que acometem a aprendizagem e a saúde mental dos acadêmicos: o medo de contrair o vírus, a incapacidade de conseguir manter uma rotina saudável, a sensação de solidão consequente do isolamento social, a manutenção de aluguel de estadias universitárias e a dificuldade de acesso financeiro a utensílios básicos de sobrevivência.

Em se tratando das consequências da resignação de alguns membros do comitê, ressalta-se o acúmulo de funções para os estudantes remanescentes, o que os levou a considerar a desistência do processo como um todo. Todavia, alguns acadêmicos adotaram uma atitude de liderança, mediarão por recurso de diálogos compreensivos e motivacionais outras possíveis desistências e reorganizaram a divisão de trabalhos de acordo com a disponibilidade de cada um. Feito isso, o comitê decidiu seguir com a filiação e conseguiu concluir a atividade social, obtendo um *feedback* bastante gratificante dos participantes.

Tal fato simboliza uma vitória frente a todos os desafios superados e pode ser relacionado a alguns estudos que indicam que acadêmicos que assumem funções representativas do corpo discente estão submetidos a um maior estímulo à construção de habilidades referentes à mediação de discussões e conflitos internos, ao planejamento e tomada de decisões que afetam o coletivo e à destreza de coordenação de grupo (AMORE et al., 2018; GONCALVES; BENEDITE-PEREIRA, 2009). Essas

habilidades, quando aprimoradas, tornam-se competências fundamentais para um ator social da medicina, uma vez que preparam o graduando para cenários inerentes à prática clínica em unidades de saúde. Muitas vezes, tais cenários são marcados pela aptidão de gerência de grupos multiprofissionais que necessitam ser liderados e ter suas funções distribuídas para alcançar o objetivo da melhora clínica de pacientes e do aperfeiçoamento funcional e estrutural das unidades de saúde (COSTA et al., 2016 ; KAMINSKI; GOELLNER, 2010).

Por fim, coube aos integrantes do comitê se apresentarem em plenária, realizada na Assembléia Geral Extraordinária da IFMSA Brazil, no dia 02 de novembro de 2020. Houve a defesa dos interesses em se filiarem, a exposição das características da Universidade, do resumo do planejamento, da execução e dos resultados da atividade social. O comitê recebeu, no mesmo dia, a resposta de aprovação da filiação à ONG.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para o êxito do processo de vinculação à Federação Internacional das Associações de Estudantes de Medicina, os integrantes do comitê precisaram articular as habilidades previstas nas Diretrizes Curriculares Nacionais de formação médica por competências, ao projeto pedagógico do Curso relacionadas à comunicação interprofissional, à gestão e liderança, à resolução de conflitos e à organização de eventos de promoção de saúde, com as experiências vivenciadas na criação e execução do projeto.

A iniciativa dos estudantes pode ser representada neste relato como uma dimensão atitudinal significativa para uma formação crítica, capaz de promover maior percepção da realidade, das demandas sociais e de como intervir nelas afirmativamente, buscando uma mudança em relação ao grupo para e com o qual essas intervenções são construídas.

Constatou-se, desse modo, que a ampliação do currículo acadêmico quanto às competências fundamentais para a plena formação do estudante de medicina foi se consolidando ao longo do processo.

AGRADECIMENTOS

Gostaríamos de agradecer ao cursinho pré-vestibular Ari de Sá pela disponibilidade em colaborar para a organização da nossa atividade social, às psicólogas Alana Ferreira Cordeiro e Luiza Helena Rabelo pelas excelentes capacitações, à Professora Mestre, Maria das Graças Barbosa Peixoto pela articulação de contatos para durante o processo de filiação e à Professora Ms. Daniele Vasconcelos Fernandes Vieira pela orientação na escrita deste relato de experiência.

REFERÊNCIAS

- AMORE FILHO, Edson Dell; DIAS, Ruth Borges; TOLEDO JR, Antônio Carlos de Castro. Ações para a Retomada do Ensino da Humanização nas Escolas de Medicina. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 42, n. 4, p. 14-28, 2018.
- BRASIL. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina. **Resolução CNE/CES nº 3/2014**, 2014.
- CHAGAS, Nathália Bordeira et al. Qualidade de Vida de Estudantes de Medicina em um Curso que Adota Metodologias Ativas de Ensino-Aprendizagem. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 42, n. 4, p. 96-102, 2018.
- COSTA, Maria Cristina Guimarães da; TONHOM, Silvia Franco da Rocha; FLEUR, Lucas Noda. Ensino e aprendizagem da prática profissional: perspectiva de estudantes de medicina. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 40, n. 2, p. 245-253, 2016.
- CYBULSKI, Cynthia Ajus; MANSANI, Fabiana Postiglione. Análise da depressão, dos fatores de risco para sintomas depressivos e do uso de antidepressivos entre acadêmicos do curso de medicina da Universidade Estadual de Ponta Grossa. **Revista brasileira de educação médica**, v. 41, n. 1, p. 92-101, 2017.
- GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. Editora Atlas SA, 2008.
- GONÇALVES, Maria Bernadete; BENEVIDES-PEREIRA, Ana Maria Teresa. Considerações sobre o ensino médico no Brasil: consequências afetivo-emocionais nos estudantes. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 33, n. 3, p. 482-493, 2009.
- IKUNO, Beatriz Alves et al. Estudo da ansiedade presente nos pré-vestibulandos durante a pandemia do novo coronavírus (COVID-19). In: **3º CONGRESSO SOBRE AMBIENTE, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO (CATE)-V. 3 2020**. 2020.
- KAMINSKI, Leon Frederico; GOELLNER, Silvana Vilodre. Corpo discente em movimento: reivindicações estudantis na Escola Superior de Educação Física do Rio Grande

do Sul (1957-1964). **Motriz: Revista de Educação Física**, v. 16, n. 4, p. 984-994, 2010.

LOBO, Luiz Carlos. Educação médica nos tempos modernos. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 39, n. 2, p. 328-332, 2015.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. Análise qualitativa: teoria, passos e fidedignidade. **Ciência & saúde coletiva**, v. 17, p. 621-626, 2012.

SANTOS, Victor Hugo dos et al. Currículo oculto, educação médica e profissionalismo: uma revisão integrativa. **Interface-Comunicação, Saúde, Educação**, v. 24, p. e190572, 2020.

TAVARES, Ari de Pinho et al. O "currículo paralelo" dos estudantes de medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. **Revista Brasileira de educação médica**, v. 31, n. 3, p. 254-265, 2007.

TEIXEIRA, Larissa de Araújo Correia et al. Saúde mental dos estudantes de Medicina do Brasil durante a pandemia do coronavírus disease 2019. **Jornal Brasileiro de Psiquiatria**, v. 70, n. 1, p. 21-29, 2021.

CAPÍTULO X

VIVÊNCIAS NA MONITORIA: A IMPORTÂNCIA DAS METODOLOGIAS ATIVAS NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NO CAMPO DA SAÚDE

DOI: 10.51859/ampla.csa511.1121-10

Lisley Sinara Oliveira Félix ¹

Noália Magna Araújo ²

¹ Graduanda em Psicologia. Universidade de Fortaleza – UNIFOR

² Psicóloga. Professora da Universidade de Fortaleza – UNIFOR

RESUMO

A monitoria acadêmica trata-se de um programa inserido nas perspectivas de iniciação à docência, levando o aluno-monitor às suas primeiras experiências profissionais. As metodologias ativas são direcionadas ao campo de aprendizagem do aluno, no qual este será o protagonista do seu aprendizado. Este estudo tem como objetivo apresentar os resultados da pesquisa realizada com os alunos da disciplina de prática integrativa I, do curso de Psicologia, e relatar as vivências da monitoria no período do programa de monitoria, apontando as metodologias ativas como o método utilizado no processo de ensino-aprendizagem. Neste trabalho foi realizada uma pesquisa qualitativa, e para coleta de dados fez-se uso da entrevista semiaberta. Na análise, constatou-se que o processo de ensino-aprendizagem apresenta maiores resultados no campo das metodologias ativas, e estar envolvido neste processo proporciona ao aluno-monitor experiências práticas e maior fixação de conteúdo. Concluímos que o uso destas metodologias favorece a busca e interesse pessoais por novos conhecimentos, tornando o aluno e o aluno-monitor, sujeitos autônomos, autores de seus percursos acadêmicos e profissionais.

Palavras-chave: Metodologias Ativas. Monitoria. Autonomia. Aprendizagem.

1. INTRODUÇÃO

A monitoria acadêmica trata-se de um programa visionário inserido nas perspectivas de iniciação à docência, no qual leva o aluno-monitor às suas primeiras experiências pedagógicas, tornando-se um dos primeiros passos a percorrer em direção a este objetivo. Este tipo de programa na academia, proporciona um relacionamento mais estreito entre aluno-monitor e professor-orientador, e ainda, aluno e aluno, favorecendo o processo de ensino-aprendizagem. Sobre este fato, Santos

& Lins (2007, p. 59) esclarece: “O Programa de Monitoria é uma ação institucional consolidada que envolve professores e alunos na tentativa de se atingir os objetivos principais de uma instituição de ensino superior que é a produção, disseminação e aplicação do conhecimento”.

Nesse processo há uma aproximação entre os envolvidos; e para o alcance dos objetivos que envolvem o conhecimento é necessário que haja uma linguagem que seja no mínimo comum a todos, isto se refere a transmissão do saber, ao que será posto em sala de aula, e como será posto. Rubem Alves (2001) acredita que um dos objetivos da educação é o fazer pensar e a procura por descobertas, este pensamento vai de encontro ao que se propõe as metodologias ativas e também se insere nos objetivos da disciplina da prática integrativa I (esta disciplina faz parte da grade curricular de um curso de Psicologia com sede em Fortaleza; e insere o aluno no campo das pesquisas qualitativas por meio do uso de entrevistas). Segundo Neusi Berbel (2011) as metodologias ativas se baseiam em formas que irão desenvolver o processo de aprender.

As metodologias ativas são direcionadas ao campo de aprendizagem ativa do aluno, pois, entende-se que este é o maior interessado na construção do seu saber, portanto o ensino deve ser direcionado nesta perspectiva, onde o aluno será o protagonista do seu aprendizado, encorajado pelo docente e motivado para esta busca na tentativa de alcance da sua própria autonomia (DIESEL, 2017).

Desse modo, as metodologias ativas rompem com o ensino tradicional, uma vez que se baseiam em uma pedagogia problematizadora, onde o aluno se torna ativo em seu aprendizado, já que se torna um ser autônomo em busca do conhecimento a partir do caminho que lhe é posto. Trata-se, portanto, de uma nova estratégia para o processo de ensino-aprendizagem, que se desloca do campo individual e perpassa os demais campos, por exemplo, o coletivo (PAIVA et al., 2016).

O processo de ensino e aprendizagem, por sua vez, estão interligados, conforme aponta Saint-Onge (2001) ao dizer que a significação do ensino depende do sentido que se dá à aprendizagem, já significação da aprendizagem depende das atividades que são geradas pelo ensino, notando-se uma fuga do processo tradicional, em virtude de romper com a mecanização do ensino, onde o professor é a peça central para o aprendizado. No uso das metodologias ativas, esse processo torna-se dialético, pois o

educador já não é mais apenas o que educa, mas o que, enquanto educa, é educado, e o educando ao ser educado, também educa, conforme aponta Freire (1987).

No campo das ciências da saúde, esse tipo de metodologia se destaca por inserir o aluno nas áreas de discussão e debates, como é o caso do método de PBL (*problem-based learning*) que permite aos alunos discutir acerca de estudos de caso e casos clínicos na esperança que estes futuros profissionais sejam capazes de resolver problemas por meio de uma análise global do contexto de cada caso (PAIVA et al., 2016).

Neste contexto, o presente estudo tem por objetivos apresentar os resultados da pesquisa realizada com os alunos da disciplina de prática integrativa I, e relatar as vivências da monitora no programa de iniciação à docência apontando as metodologias ativas como principal ferramenta de ensino-aprendizagem.

A pesquisa foi realizada com os alunos de quatro turmas do primeiro semestre, da disciplina de prática integrativa I, do curso de psicologia. Será realizada articulação dos resultados obtidos com fundamentos teóricos de autores como: Mirza Medeiros dos Santos (2007); Neusi Aparecida Navas Berbel (2011); e Paulo Freire (2003), e há de se recorrer também a outros autores que possam auxiliar no alcance dos objetivos desta pesquisa servindo de base teórica para as questões que serão analisadas.

Este trabalho se torna relevante devido disseminar o conhecimento e as experiências adquiridas por meio da monitora, ao longo deste percurso, e também por contribuir para a possível resposta desta questão: como as metodologias ativas contribuem para o processo de ensino-aprendizagem e formação do futuro docente?

2. METODOLOGIA

Neste trabalho foi desenvolvido uma pesquisa qualitativa cuja finalidade “[...] não é contar opiniões ou pessoas, mas ao contrário, explorar o espectro de opiniões, as diferentes representações sobre o assunto em questão” como afirma Gaskell (2002, p. 68).

Quanto aos procedimentos utilizados para coleta de dados, inicialmente realizou-se uma pesquisa bibliográfica que se refere ao levantamento de dados já publicados realizada a partir de livros e artigos científicos, e da entrevista semiaberta que nasce a partir de um roteiro de questões guiadas pelo interesse e objetivos da

pesquisa que incentivam e sugerem novas hipóteses (DUARTE, 2008; MATOS & VIEIRA, 2002; TRIVIÑOS, 1990).

Somou-se a participação de 23 alunos, de quatro turmas em diferentes turnos da disciplina de prática integrativa I, que responderam duas questões norteadoras elaboradas pela monitora da disciplina, e que dão oportunidade ao entrevistador e entrevistado comentar e explorar livremente sobre o assunto proposto. A entrevista foi aplicada pela monitora, entre o mês de Maio e Junho de 2018, por meio presencial e virtual. Não houve identificação dos alunos entrevistados, portanto os mesmos não serão identificados nesta pesquisa, indo de encontro a ética de sigilo de dados e da pesquisa, e caso seja necessário citá-los serão tratados por nomes fictícios, como aluno A1, A2 ou aluno entrevistado.

A análise dos dados se apoia na teoria de Bardin (2009), no qual há uma comparação entre as falas dos entrevistados com as teorias encontradas na pesquisa bibliográfica; em contraste ainda com a experiência e orientações realizadas pela monitora na vivência em sala de aula, tratando-se também, este estudo, de um relato de experiência. Vale ressaltar que ao longo desse processo, obteve-se a orientação e a supervisão da professora orientadora.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A disciplina de prática integrativa I, inserida no primeiro semestre do curso de psicologia, propõe ao aluno, já no início do curso, uma aproximação ao campo da pesquisa, objetivando neste primeiro momento a familiarização com as práticas do profissional de psicologia, incentivando o aluno a buscar, de acordo com seus interesses, as áreas dos profissionais que mais lhe interessam para a partir desse ponto realizar uma pesquisa qualitativa, de acordo com as demais diretrizes do plano de ensino.

Neste contexto, pode-se observar que se trata de uma disciplina dinâmica e ativa, pois o discente terá que escolher por si e junto com sua equipe (duplas ou trios) a área pretendida à pesquisa; em sala de aula o campo de atuação do profissional é exposto, uma vez tendo visto a extensão deste campo, são diversas as possibilidades de pesquisa dada aos alunos que farão suas escolhas e iniciarão seus trabalhos. Esse método, no campo das metodologias ativas, é conhecido como aprendizagem baseada

em equipe (*team-based learning* – TBL) definido como um “método de aprendizagem dinâmico, que proporciona um ambiente motivador e cooperativo, onde a produção coletiva é valorizada” (BANDEIRA, SILVA & VILELA, 2017, p. 374).

Esta autonomia para a escolha do campo de atuação e de maneira mais específica, para o objetivo da pesquisa e o desenrolar da mesma, é algo que se insere dentro do campo das metodologias ativas, dado que, como clarifica Berbel (2011, p. 20): “têm o potencial de despertar a curiosidade, à medida que os alunos se inserem na teorização e trazem elementos novos, ainda não considerados nas aulas ou na própria perspectiva do professor”.

Desse modo, após ser pontuada as diretrizes da pesquisa, o aluno sai em busca daquilo que lhe interessa e volta para apresentar suas ideias de estudo, bem como também para apresentar os objetivos que pretende alcançar, buscando apenas auxílio de como fazê-lo. Isto vem de encontro a definição de Bastos (2006 apud BERBEL, 2011, p. 29) que apresenta as metodologias ativas como: “processos interativos de conhecimento, análise, estudos, pesquisas e decisões individuais ou coletivas, com a finalidade de encontrar soluções para um problema.”

Neste caminho, o professor atua como mediador, enquanto que o monitor atua como um auxiliar desta mediação, incentivando o aluno a realizar suas atividades e estabelecer quais maneiras utilizará para realização de seu projeto. Paulo Freire (2003) já falava sobre isto, mostrando que ensinar é dar oportunidades para a própria construção do saber. Questionados acerca da importância da disciplina e do acompanhamento do monitor, um dos alunos entrevistados afirma: “O monitor também incentiva a busca por próprias respostas no âmbito além da sala de aula com dicas de programa e atividades para o engajamento do aluno, e o próprio espelho torna-se [sic] o monitor” (A1).

Além dos pontos supracitados, como, de maneira inicial, a escolha do campo de atuação do profissional para início da pesquisa, outro ponto observado no quadro das metodologias ativas pode ser visto por meio da elaboração de questões que seriam dirigidas aos profissionais entrevistados. Primeiramente, os alunos realizaram uma leitura ativa da bibliografia orientada; nessa leitura ativa, também chamada de leitura comentada (PAIVA, et al., 2016) os alunos foram direcionados a elaborar questões acerca do texto e principais pontos, para em seguida elaborarem as questões para as

entrevistas. Neste ponto, por meio dos relatos, foi possível observar maior apropriação do conteúdo e maior segurança na condução das entrevistas.

Neste cenário, pode-se observar que o uso de metodologias ativas proporciona autonomia e incentivam uma busca pelo novo, e embora também sejam caracterizadas como ferramentas para além da sala de aula, se iniciam dentro do ambiente acadêmico, devido reflexões advindas do ensino, de como se aprende e dos caminhos propostos para percorrer a fim de alcançar os objetivos definidos, fazendo com que o estudante procure soluções para as problematizações apresentadas no decorrer do processo de aprendizagem. Sobre estes fatos Diesel (2017) afirma: “Nessa perspectiva de entendimento é que se situa as metodologias ativas como uma possibilidade de ativar o aprendizado dos estudantes, colocando-os no centro do processo” (p. 273).

Desta maneira, fica claro que o sujeito se torna ativo no processo de aprendizagem, uma vez que se torna autor e responsável por seu próprio conhecimento, passando a ter uma visão mais crítica até mesmo sobre o que se fala em sala de aula, levando-o a ser mais participativo e também a ter mais posicionamento, o que fará com que ele busque outras fontes de aprendizado, ou seja, vá além daquilo que lhe é oferecido em sala de aula, saciando assim suas questões de maneira autônoma. A monitora pode observar e constatar estes fatores no decorrer do ano letivo durante o programa de monitoria.

Neste ponto, menciona-se o aluno como um ser ativo, pois a própria disciplina exige que ele tenha autonomia sobre o que irá pesquisar, e no decorrer do trabalho que lhes é proposto a fazer, entra o papel do monitor com o intuito de contribuir na busca dos alunos que fará com que o estudante consiga realizar seu projeto e responder as próprias questões de pesquisa. Sobre esta metodologia, o aluno A2 relata que é: “Uma forma de amadurecimento muito grande, pois pela primeira vez em uma instituição de ensino eu tive que ir em busca de respostas com profissionais, com a realidade de certa forma” (A2).

Desta forma, é possível perceber na fala do participante que há comprometimento e autonomia do aluno, nota-se que o processo de ensino-aprendizagem no campo das metodologias ativas multiplica os saberes e constrói o conhecimento de maneira mais sólida, e somado ao compartilhamento de informações

proporciona aprendizado entre todos os envolvidos, fator este que pode ser confirmado nas palavras de Berbel (2011, p. 29):

O engajamento do aluno em relação a novas aprendizagens, pela compreensão, pela escolha e pelo interesse, é condição essencial para ampliar suas possibilidades de exercer a liberdade e a autonomia na tomada de decisões em diferentes momentos do processo que vivencia, preparando-se para o exercício profissional futuro.

À vista de tudo que fora exposto, se confirma a importância do exercício das atividades da monitoria para o aluno e para o aluno-monitor. Para este último, estar envolvido nas atividades acadêmicas de iniciação à docência e ter a oportunidade de aprender na prática e com orientação direta do professor-orientador, faz com que haja uma maior abertura quanto suas perspectivas profissionais, além do fato de enxergar a monitoria para além do currículo acadêmico, mas também como agregador profissional por meio das experiências que aprende na prática e vivência com os demais alunos e orientadores.

Nesse sentido, recorre-se ao pensamento de Paulo Freire quando defende que: “não há docência sem discência [...] quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender” (Freire 2003, p. 23), é nesta relação que surge o papel do monitor, é desta relação que as metodologias ativas proporcionam um maior alcance dos acadêmicos envolvidos no processo de ensino e de aprendizagem.

Dessa forma, no percurso da monitoria, o processo de ensino-aprendizagem se torna bastante presente, podendo assim ser confirmada a importância do uso das metodologias ativas como maneira de proporcionar aos sujeitos aprendizes maior autonomia e busca pelo conhecimento, uma vez que o aluno-monitor também participa, durante o programa de monitoria, de seminários, mesas-redondas, avaliações-orais e outros tipos de metodologias também consideradas ativas (PAIVA et al., 2016).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio desta pesquisa foi possível identificar como o uso das metodologias ativas favorecem a busca e o interesse pessoais por novos conhecimentos, agregando assim mais aprendizado, tornando discente e o aluno-monitor, sujeitos autônomos e autores de seus percursos acadêmicos e profissionais, havendo somente a necessidade que lhes sejam dados meios para tal.

Foi possível confirmar que ao fazer suas próprias escolhas acadêmicas, o aluno poderá se empenhar mais na realização das suas atividades, no qual ele mesmo irá se cobrar para um bom desempenho e realização da mesma, necessitando apenas das diretrizes que lhe proporcionem o alcance destes objetivos.

Dessa forma o aluno-monitor como mediador deste processo, se torna um apoio e contribui para tais finalidades e, ao mesmo tempo em que auxilia na construção do conhecimento e aprendizado, incentivando a autonomia, ele (aluno-monitor) aprende e traça seu percurso acadêmico e no âmbito profissional, também de maneira autônoma.

Esta pesquisa trouxe um olhar mais amplo para as questões referentes as metodologias utilizadas em sala de aula e importância que trazem para o aprendizado, construindo uma relação de troca de conhecimentos que envolvem aluno, aluno-monitor e professor. Foi possível notar também que a aproximação entre teoria e prática advinda dos métodos ativos possibilitam uma formação mais sólida, mais significativa, fator que muito se manifesta no campo da saúde devido a interdisciplinaridade.

Considerando a universidade como espaço um dos principais sítios para a mediação deste aprendizado, é importante a abertura de programas que proporcionem ao aluno vivências na prática, como o programa de monitoria, e também demais atividades para além da sala de aula, como cursos e extensões que aproximem o aluno de metodologias ativas, contribuindo para o crescimento e aprendizado do profissional que se encontra em formação.

REFERÊNCIAS

- ALVES, R. **A aula e o seminário**. In: _____. O amor que acende a lua. 5.ed. Campinas-SP: Papirus, 2001. p. 117-121.
- BANDEIRA, D. M. A; SILVA, M. A; VILELA, R. Q. B. Aprendizagem Baseada em Equipe. **Revist. Port.: Saúde e Sociedade**. 2017;2(1):371-379.
- BARDIN, L. **Análise de Conteúdo**. Lisboa, Portugal: Edições 70, LDA, 2009.
- BERBEL, N. A. N. As metodologias ativas e a promoção da autonomia de estudantes. **Semina: Ciências Sociais e Humanas**, Londrina, v. 32, n. 1, p. 25-40, jan./jun. 2011.

- DIESEL, A; ALDA, L. S. B; SILVA, N. M. Os princípios das metodologias ativas de ensino: Uma abordagem teórica. **Rev. Thema**, 2017, v. 14, n.1, p. 268-288.
- DUARTE, J; Entrevista em profundidade. In: DUARTE, J; BARROS, A. (Org.). **Métodos e técnicas de pesquisa em comunicação**. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2008. cap. 4. p. 62- 83.
- FREIRE, P. **Pedagogia do oprimido**. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra; 1987.
- FREIRE, P. Não há docência sem discência. In: _____. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. 27.ed. São Paulo: Paz e Terra, 2003. cap. 1. p. 21-45.
- GASKELL, G; BAUER, M. W. **Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som. Um manual prático**. In: GASKELL, George. Entrevistas individuais e grupais. Petrópolis. RJ. Vozes, 2002. Cap. 3. p. 64-88.
- MATOS, K. S. L. de; VIEIRA, S. L.. **Pesquisa educacional o prazer de conhecer**. 2 ed. Fortaleza: 2002.
- PAIVA, M. R. F; PARENTE, J. R. F; BRANDÃO, I. R; QUEIROZ, A. H. B. Metodologias ativas de ensino-aprendizagem: revisão integrativa. **SANARE, Sobral** - V.15 n.02, p.145-153, Jun./Dez. – 2016.
- SAINT-ONGE, M. **O ensino na escola: o que é e como se faz**. 2. ed. São Paulo: Loyola; 2001.
- SANTOS, M. M. dos; LINS, N. de M. A monitoria na universidade federal do rio grande do norte: um resgate histórico. IN: _____. **A monitoria como espaço de iniciação à docência: possibilidades e trajetórias**. Natal: EDUFRRN, 2007. p. 59-67.
- TRIVIÑOS, Augusto Nivaldo Silva. **Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em educação**. São Paulo: Atlas, 1990.

CAPÍTULO XI

EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL E PRÁTICA COLABORATIVA: VISÃO DE ACADÊMICOS DOS CURSOS DA SAÚDE

DOI: 10.51859/amplla.csa511.1121-11

Katia Fernanda Alves Moreira ¹
Marcos Antônio Sales Rodrigues ²
Lerissa Nauana Ferreira ³
Arlindo Gonzaga Branco Junior ⁴
Cleson Oliveira de Moura ⁵
Daiana Evangelista Rodrigues Fernandes ⁶
Edson dos Santos Farias ⁷

¹ Professor Adjunto do Departamento de Enfermagem. Universidade Federal de Rondônia – UNIR

² Graduando em Enfermagem. Universidade Federal de Rondônia – UNIR

³ Graduando em Enfermagem. Universidade Federal de Rondônia – UNIR

⁴ Professor Auxiliar do Departamento de Medicina. Universidade Federal de Rondônia – UNIR

⁵ Professor Auxiliar do Departamento de Medicina. Universidade Federal de Rondônia – UNIR

⁶ Professor Adjunto do Departamento de Enfermagem. Universidade Federal de Rondônia – UNIR

⁷ Professor Adjunto do Departamento de Educação Física. Universidade Federal de Rondônia – UNIR

RESUMO

Introdução: A Educação Interprofissional, consiste na inversão da lógica tradicional da formação em saúde, no qual as profissões aprendem juntas e uma sobre a outra, por meio do trabalho em equipe, a fim de desenvolver a Prática Colaborativa Interprofissional (PIC), que ocorre quando os atores em saúde mantêm relações de trabalho interprofissionais que permitem resultados ótimos de saúde. **Objetivo:** Verificar a disponibilidade para a aprendizagem interprofissional e prática colaborativa entre os alunos dos cursos de graduação vinculados ao Núcleo de Saúde da UNIR. **Metodologia:** Trata-se de um estudo exploratório, descritivo e quantitativo sobre Educação Interprofissional realizada com alunos representantes de cada curso da área da saúde da UNIR em condição de Bacharelado. **Resultados:** Os cursos possuem uma boa disponibilidade para a EIP, no qual os acadêmicos de Educação Física, Medicina e Psicologia obtiveram médias que os enquadraram na zona de conforto nos domínios de trabalho em equipe e colaboração e atenção centrada na pessoa/paciente, porém no domínio sobre identidade profissional, os referidos cursos classificaram-se na zona de alerta. Já o curso de Enfermagem apresentou-se zona de conforto nos três domínios. **Conclusão:** Apesar dos cursos apresentarem-se potencialmente aptos a EIP e PIC, ainda há obstáculos a serem atenuados voltados aos estereótipos profissionais que requerem ações de aprimoramento durante o ensino.

Palavras-chaves: Educação Interprofissional. Prática colaborativa. Trabalho em equipe.

1. INTRODUÇÃO

A discussão a respeito da formação em saúde ganhou espaço desde a implantação do SUS em 1990 e com a estruturação das novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), no qual as IES são estimuladas a formar profissionais mais humanizados com a incorporação de saberes das ciências sociais e humanas, além da valorização da comunidade para a formação voltada as realidades locais. Neste contexto, emergiu a necessidade de transformação das práticas profissionais em saúde, nessa ótica, precisa estruturar-se a partir da problematização do processo de trabalho e sua capacidade de proporcionar o cuidado nas várias dimensões que envolvem as necessidades de saúde das pessoas e dos coletivos (CECCIM; FEUERWERKER, 2004; FEUERWERKER; CECÍLIO, 2007; ROCHA; CESAR, 2008).

Para Batista (2010), a centralidade na formação para a integralidade do cuidado, articulando currículo, avaliação, gestão e integração com os serviços, traduz a compreensão de que a prática em saúde demanda um trabalho além dos fazeres individualizados de cada profissão, assumindo a importância da equipe. Projeta-se, assim, um profissional de saúde que, não abrindo mão da formação específica, possa estar atento às diferenças, aos movimentos de inclusão, ao interprofissionalismo presente em suas ações.

Neste contexto, a Educação Interprofissional (EIP) conforme descrita por Barr (1998), consiste na inversão da lógica tradicional da formação em saúde onde cada prática profissional pensada e discutida em si, abre espaços para a discussão do interprofissionalismo. É uma proposta onde profissões aprendem juntas sobre o trabalho conjunto e sobre as especificidades de cada uma, na melhoria da qualidade no cuidado ao usuário no qual o trabalho de equipe é uma característica marcante.

A Prática Colaborativa Interprofissional (PIC), por outro lado, ocorre quando os estudantes, profissionais, usuários, famílias e comunidades desenvolvem e mantêm relações de trabalho interprofissionais que permitem resultados ótimos de saúde. Conforme descrito no CIHC (2010), o objetivo geral da educação interprofissional e da prática colaborativa é fornecer aos usuários do sistema de saúde melhores resultados em saúde.

A EIP apresenta-se atualmente como a principal estratégia para formar profissionais aptos para o trabalho em equipe, prática essencial para a integralidade no cuidado em saúde. A implantação da EIP na formação em saúde consiste de oportunidades de treinamentos conjuntos para o desenvolvimento de aprendizagens compartilhadas ocasiões em que as profissões aprendem umas sobre as outras; a educação interprofissional é discutida com o intuito de estimular o aprimoramento do cuidado em saúde por meio do trabalho de equipe (BATISTA, 2012).

Nesta perspectiva, questionamos: Qual a percepção dos estudantes, acerca da EIP e da PIC? Os estudantes dos cursos de saúde da UNIR, modalidade bacharelado, percebem o desenvolvimento das competências para o trabalho em equipe durante o processo de formação? Os ensinamentos práticos/estágios supervisionados contribuem para a colaboração interprofissional entre os alunos de dos cursos de graduação da UNIR?

2. MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de um estudo exploratório, descritivo e quantitativo sobre Educação Interprofissional realizada com alunos representantes de cada curso da área da saúde da UNIR em condição de Bacharelado, que estejam em atividades nas UBS/comunidade, entre o quinto semestre e o início do estágio supervisionado em 2019.

Os alunos dos cursos de Educação Física, Enfermagem, Medicina e Psicologia foram convidados para participar da pesquisa no início do segundo semestre de 2019. Os critérios de inclusão foram: a) Alunos regularmente matriculados; b) em ensino prático/estágio em UBS de Porto Velho ou comunidade; c) Que aceitem participar do estudo. Como critérios de exclusão: a) os alunos com trancamento de matrícula nas disciplinas de ensino prático/estágios; b) em licença para tratamento de saúde. A amostra foi por conveniência.

Para a aplicação dos questionários foi utilizado a *Readiness Interprofessional Learning Scale* (RIPLS), questionário que apresenta núcleos responsáveis por avaliar a relação entre a variável de prontidão para a aprendizagem interprofissional e alguns dos atributos necessários para o trabalho e a colaboração em equipe, a identidade profissional, as funções e as responsabilidades profissionais, o crescimento pessoal e as relações e os benefícios para os usuários.

As respostas ao questionário estão dispostas em escala de Likert, um instrumento científico de observação e mensuração de fenômenos sociais, com a finalidade de medir atitudes - característica pessoal que faz referência ao conjunto de crenças sobre algo e sua resposta em relação a isso - através de opiniões de forma objetiva (LUCIAN, 2016).

Após a coleta, os dados tiveram dupla entrada em planilha eletrônica, posteriormente validada. Em seguida, foram processados no *Statistical Package for the Social Science* (SPSS), versão 21.

Para a análise da tendência atitudinal dos discentes foi calculada a média (M) das pontuações obtidas como resposta de cada assertiva. As médias obtidas foram interpretadas por intervalos lineares (IM): de 1,00 a 2,33, de 2,34 a 3,66 e de 3,67 a 5,00. A adoção desses intervalos decorre da observação que todos os níveis de atitude possuem a mesma probabilidade de ocorrência (1/3): concorda, discorda, dúvida/indiferença, com suas respectivas inclinações, não dependendo dos valores obtidos na amostra (BRUNO, 1999; BRUNO, 2001).

Utilizando a análise desses intervalos lineares proposta por Peduzzi et al. (2015), conforme o Quadro 1, convencionou-se que esses correspondem a zona de perigo que situações que necessitam de mudanças urgentes; zona de alerta, situação preocupante que requer aprimoramento; e, zona de conforto, que se sugere manutenção das atitudes.

No tratamento estatístico dos dados as variáveis contínuas foram apresentadas como média e desvio-padrão, enquanto as categóricas se apresentaram como frequências relativas e absolutas.

Quadro 1 - Classificação para a interpretação dos intervalos lineares das médias das pontuações da escala de LIKERT do questionário RIPLS

INTERVALO LINEAR DAS MÉDIAS	ATITUDES FRENTE AS ASSERTIVAS	CLASSIFICAÇÃO
1,00 a 2,33	Extremamente negativa	Zona de Perigo (para parar/ corrigir urgente)
2,34 a 3,66	Preocupante	Zona de alerta (para ter precaução/ requer aprimoramento)
3,67 a 5,00	Positiva	Zona de conforto (para seguir/ manutenção das atitudes)

O trabalho é vinculado ao projeto “Educação interprofissional e prática colaborativa entre profissionais da Atenção Primária à Saúde em Rondônia”, financiado pelo PPSUS – CHAMADA FAPERO/MS-DECIT/CNPq/SESAU-RO – Nº. 001/2018, o qual foi aprovado pelo CEP/UNIR sob o parecer n. 3.605.943.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante o estudo para a verificação da prontidão para aprendizagem interprofissional a partir da amostra ($n = 80$) de acadêmicos do núcleo de saúde da Universidade Federal de Rondônia – UNIR, pode-se traçar o perfil desses alunos, no qual se apresenta composta, em sua maior parte, pelo sexo feminino (73,75%) com predominância da faixa etária dos 21 aos 25 anos (58,75%), cujo percentual de formação no ensino médio foi na rede pública de ensino (75%) (Tabela 1).

Além disso, o curso mais presente nas respostas de acadêmicos ao questionário foi de enfermagem (45%), seguido pelos alunos de psicologia (37,5%); relacionado o tempo de formação, 73,75% estavam entre o 5º e o 8º período da graduação. Quando questionados sobre a participação em eventos científicos, 76,25% afirmaram participar de tais encontros e um percentual de 65% dessa amostra, fazem parte de grupos de pesquisa, projetos de extensão universitária ou Programa de Educação pelo Trabalho - PET-Saúde (Tabela 1).

Tabela 1 – Características da amostra de estudantes de graduação dos cursos da área de saúde da Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR. Porto Velho – RO, 2020

Variáveis	Perfil	
	n	%
<u>Gênero</u>		
Masculino	21	26,25
Feminino	59	73,75
<u>Faixa Etária</u>		
<21 anos	24	30,00
21 – 25 anos	47	58,75
>25 anos	9	11,25
<u>Conclusão do ensino médio</u>		
Público	60	75,00
Privado	19	23,75
<u>Curso</u>		
Educação Física	7	8,75
Enfermagem	36	45,00
Medicina	7	8,75
Psicologia	30	37,50
<u>Tempo de formação (períodos)</u>		
<4°	19	23,75
5° - 8°	59	73,75
>9°	3	3,75
<u>Eventos científicos</u>		
Sim	61	76,25
Não	19	23,75
<u>Grupos de pesquisa/Extensão/PET</u>		
Sim	52	65,00
Não	28	35,00
Total	80	100,00

Dentre as características dos cursos de saúde observa-se a predominância do sexo feminino na amostra, assim como uma maior disponibilidade desse público para a aprendizagem interprofissional. Tais achados também são evidenciados em estudo voltados a avaliação de programas indutores de praticas colaborativas como PET-Saúde e residências multiprofissionais em saúde (SOUZA, 2014; GARCIA, 2018; NUTO et al., 2017).

Relacionado à faixa etária expressa neste estudo, pesquisas realizadas em outros cenários apresentam resultados similares com médias entre os 20 aos 25 anos. A maior adesão de estudantes de períodos mais avançados nesse tipo de pesquisa o qual

relaciona-se com o envolvimento em grupo de pesquisa, extensões ou iniciação científica e sua compreensão sobre a relevância de tais programas para formação e contribuição para o meio científico e a sociedade (NUTO et al., 2017; PINHO, 2017; UCHÔA, 2018; TOMPSEM et al., 2018).

Ao avaliar a amostra de estudantes dos cursos da saúde, com base na variável prontidão para a aprendizagem interprofissional, que pode ser quantificada e classificada por meio da escala de disponibilidade para interprofissionalidade, adaptada por Peduzzi et al. (2015), constatou-se que os campos trabalho em equipe e colaboração e a atenção centrada na pessoa foram classificados na zona de conforto, já o item identidade profissional se dispôs na zona de alerta (Tabela 2).

Tabela 2 - Desenvolvimento das dimensões colaborativas, com base na média e desvio padrão, por cursos da saúde dos estudantes de graduação da saúde, da Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR. Porto Velho - RO, 2020

Curso	n	Trabalho em equipe e colaboração	Identidade profissional	Atenção centrada na pessoa
		Média DP±	Média DP±	Média DP±
Educação Física	7	4,69 0,79	3,49 1,64	4,74 0,81
Enfermagem	35	4,67 0,80	3,86 1,40	4,76 0,72
Medicina	7	4,66 0,76	3,57 1,55	4,77 0,94
Psicologia	30	4,70 0,79	3,63 1,61	4,77 0,78
Geral	80	4,68 0,79	3,67 1,54	4,76 0,75

Referente ao trabalho em equipe e colaboração, obteve-se por meio da escala uma média de $4,68 \pm 0,79$ que se classifica na zona de conforto, quando considerada a amostra total. Em relação à avaliação por curso, pode-se constatar que os quatros cursos do núcleo de saúde obtiveram média que os classificaram na zona de conforto para a primeira dimensão.

A partir da análise das assertivas que compõem a escala RIPLS para avaliação da disponibilidade para a aprendizagem interprofissional, foi realizada a média da amostra

de estudantes por assertiva de cada campo. Pode-se observar que no campo de trabalho em equipe e colaboração (PIC) as afirmativas de 1 a 15 em todos os cursos da saúde foram classificadas na zona de conforto.

Dessa forma, uma média entre as profissões estudadas, de $4,78 \pm 0,79$ – zona de conforto – e pode ser traduzida como uma atitude positiva destes para o trabalho em equipe e colaboração. Também quando se analisou essa dimensão por suas assertivas, todas se mantiveram na zona de conforto (3,68 a 5,00), tendo como providências manutenção situacional.

A partir da análise das assertivas que compõem a escala RIPLS para avaliação da disponibilidade para a aprendizagem interprofissional, foi realizada a média da amostra de estudantes por assertiva de cada campo. Pode-se observar que no campo de trabalho em equipe e colaboração (PIC) as afirmativas de 1 a 15 em todos os cursos da saúde foram classificadas na zona de conforto.

Dessa forma, uma média entre as profissões estudadas, de $4,78 \pm 0,79$ – zona de conforto – e pode ser traduzida como uma atitude positiva destes para o trabalho em equipe e colaboração. Também quando se analisou essa dimensão por suas assertivas, todas se mantiveram na zona de conforto (3,68 a 5,00), tendo como providências manutenção situacional.

Dessa maneira, afirmações do questionário como a assertiva 15 ($4,8 \pm 0,6$) “A aprendizagem compartilhada durante a graduação contribuiu para tornar-me um profissional que trabalha melhor em equipe”, demonstra-se que os alunos durante a graduação apresentam a percepção de que o trabalho em saúde necessita de um processo de trabalho conjunto para atender as complexidades em saúde (SOUTO; BATISTA; BATISTA, 2014).

Além disso, a afirmativa 13 ($4,83 \pm 0,65$) “Gostaria de ter a oportunidade de trabalhar em projetos, em pequenos grupos, com profissionais de outras profissões da saúde”, expõe ainda atitudes desses alunos para interagir com estudantes de demais categorias de formação e assim como a assertiva 9 ($4,53 \pm 0,91$) “A aprendizagem compartilhada me ajudou a compreender minhas próprias limitações” a qual evidência que o aluno compreende que os saberes de cada profissão devem ser complementares para atender as necessidades do usuário e formar um processo de trabalho integrado com diferentes profissionais (BATISTA et al., 2018).

Nesse sentido, observa-se que a formação em saúde com a interação de alunos de diferentes cursos propicia a base para o trabalho em equipe, visto que tais docentes possuem abertura para a colaboração e aprendizagem interprofissional, privilegiando relações e interações durante a graduação dos diferentes cursos. Assim pode-se construir uma base para a criação de competências interprofissionais além de compromisso e responsabilização entre esses futuros profissionais (SILVA; SCAPIN; BATISTA, 2011).

Logo, a prática em saúde vem demandando um trabalho que transcende os fazeres individualizados de cada profissão, assumindo a importância da equipe. Vislumbra-se um profissional de saúde que, mesmo com sua formação específica, encontra-se aberto às diferenças, ao compartilhamento em suas ações em saúde (BATISTA, 2013; PEDUZZI et al., 2013).

No campo da identidade profissional, a média geral da amostra de estudantes foi igual a $3,67 \pm 1,54$, classificado na zona de alerta. Ademais os cursos de educação física, medicina e psicologia apresentaram as respectivas médias de $3,49 \pm 1,64$, $3,57 \pm 1,55$ e $3,63 \pm 1,61$ todos classificados na zona de alerta, já o curso de enfermagem obteve a média de $3,86 \pm 1,4$ o qual se enquadrou na zona de conforto.

O campo identidade profissional (IP), o qual é composto por seis afirmativas, observou-se que nas assertivas D17 referente a adquirir mais conhecimento e habilidades que outros profissionais de saúde os cursos de Educação Física, Medicina e Psicologia obtiveram as respectivas médias de 3,30; 3,29 e 3,32 o quais foram classificados na zona de alerta, assim como a amostra geral, com média de 3,63.

Ademais, concernente à questão D19 que se refere à capacidade de usar somente o seu julgamento ou somente a sua perspectiva de formação sobre um determinado caso para exercer seu papel profissional, os cursos de Educação Física (3,1), Enfermagem (3,06), Medicina (2,71) e Psicologia (3,32), se detiveram na zona de alerta com base em suas respectivas médias, que corroborou para a média de 3,08 de toda a amostra, também na zona de alerta.

A questão 17 ($3,63 \pm 1,61$) “Preciso adquirir muito mais conhecimentos e habilidades que profissionais de outras profissões da saúde” indica competição entre profissões, ao invés de complementariedade e reforça as condutas e comportamentos individualistas. Ao analisar as respostas para a assertiva 19 ($3,08 \pm 1,51$) “serei capaz de

usar frequentemente o meu próprio julgamento no meu papel profissional” (autonomia profissional), percebe-se atitudes negativas de insegurança quanto ao “julgamento” profissional, assim como as atitudes para a assertiva 21 ($2,33 \pm 1,42$) “Minha principal responsabilidade como profissional é tratar meu paciente” desvelam um processo de formação ainda fragmentada e tecnicista, onde prevalece a clínica individual em contraponto as práticas colaborativas.

A ‘identidade profissional negativa’ revelam atitudes que desagregam o trabalho em equipe e a integralidade da atenção em saúde (PEDUZZI et al., 2015), reflete que a lógica da formação específica ainda é muito forte e exerce importante influência na construção das identidades profissionais (COSTA, 2016). O mesmo autor alerta que os cursos ainda funcionam em estruturas próprias, legitimando e fortalecendo a separação e dificultando a interação entre os alunos da área da saúde construindo uma barreira cultural entre os cursos de saúde.

Dessa maneira, a afirmação 6 ($4,43 \pm 0,96$) “A aprendizagem compartilhada me ajudou a pensar positivamente sobre outros profissionais”, classificada na zona de conforto denota atitudes positivas dos alunos frente as outras categorias, no qual se configura como base para redução de estigmas sobre compreensão do papel do outro e sua importância na equipe (SANTOS; SIMONETTI; CYRINO, 2018).

Uma das competências fundamentais da prática interprofissional colaborativas (PIC) é conhecer o papel das outras profissões no trabalho em saúde. Para tanto, há algumas habilidades que são esperadas como: conhecer onde termina a própria prática profissional e inicia-se a do outro; estar aberto às colocações do outro; assim como as contribuições e expertise dos mesmos; identificar habilidades comuns que fortalecem o trabalho colaborativo; preparar para a prática, contribuindo para a socialização entre os profissionais de saúde (SILVA, 2011).

A identidade profissional incorporada pelo modelo biomédico é um grande entrave para o real trabalho em equipe, visto que é embasada pelo modelo de formação em saúde pautado em competências específicas e altamente compartimentalizado, os quais são legitimados socialmente e conferem importância e status a profissão (ROSSIT et al., 2018). Além disso, o modo como as profissões enxergam umas as outras como concorrentes pelo mercado de trabalho e uniprofissionais transformam o cenários de

assistência em saúde em campos de disputa entre esses profissionais (LIMA et al., 2018; LIMA et al., 2020).

Portanto, o trabalho em saúde não se esgota somente em atuações individualizadas, no entanto, o trabalho em equipe se faz essencial no cuidado a saúde, visto que as atribuições das diferentes profissões de saúde não se bastam para o atendimento da população, mas um trabalho horizontal, para prestação de uma atenção a saúde de qualidade, por meio um prática colaborativa e em equipe (ESCALDA; PARREIRA, 2018).

No item abordagem centrada na pessoa/paciente (ACP), todos os cursos classificaram-se dentro da zona de conforto em cada uma das cinco assertivas que compõem esse campo, a média total da amostra obtida foi de $4,76 \pm 0,75$ o qual demonstra atitudes favoráveis para EIP. A partir disso, os cursos do núcleo de saúde da UNIR, obtiveram médias que os classificaram na zona de conforto para verificação da disponibilidade da aprendizagem interprofissional (Tabela 2).

No que consiste para abordagem centrada no paciente, inversão da lógica de trabalho centrada em técnicas para o foco as necessidades do usuário do serviço se reveste de grande importância, visto que tal prática provoca mudanças na perspectiva profissional para um olhar ampliado sobre a saúde dos indivíduos, para além de seu exercício profissional, logo a mudança do foco do cuidado no modelo de atenção gera um potencial para mudanças na qualidade da atenção à saúde (AGRELI; PEDUZZI; SILVA, 2016).

Atitudes positivas encontradas nesta dimensão da pesquisa podem contribuir para o exercício de uma cultura colaborativa no trabalho com foco na integralidade do cuidado, com base nos escores obtidos entre os estudantes entrevistados e avaliados da RIPLS, que apontou para uma situação de conforto tanto para a média geral do domínio ACP ($4,76 \pm 0,75$), assim como expressão de concordância para a assertiva 22 ($4,78 \pm 0,78$), *“gosto de entender o problema na perspectiva do paciente”* e assertiva dois (2) ($4,93 \pm 0,38$) *“os pacientes foram beneficiados quando estudantes da área de saúde trabalham juntos para resolver os problemas dos pacientes”*, revelam atitudes de empatia, indispensável para o cuidado integral e humanizado em saúde.

Tais atitudes demonstram a compreensão sobre o foco da assistência está voltado as necessidades em saúde trazidas pelos usuários, dessa forma aliada ao

trabalho em equipe, o entendimento acerca da integralidade pode ser efetivado, na lógica que tal ação só pode ser alcançada por meio de uma atuação conjunta e práticas colaborativas a fim de melhorar a organização do serviço (CASANOVA; BATISTA; MORENO, 2018; ALMEIDA; TESTON; MEDEIROS, 2019).

Assim, a tessitura da prática centrada no usuário ocorre devido ao desenvolvimento de competências que norteiam a atuação do profissional no trabalho colaborativo para a integralidade do cuidado, a partir da compressão real dos problemas de saúde, respeito a diversidade de ideias e diferentes olhares acerca das condições de saúde, principalmente do usuário, tomada de decisão, compressão do seu papel enquanto membro integrante de uma equipe para o trabalho em saúde e comunicação efetiva entre os profissionais (ROSSIT; BATISTA; BATISTA, 2014).

Desse modo a abordagem a atuação em equipes interprofissionais e as práticas a colaboração nos cenários dos serviços de saúde de ser maleável e contingencial, de forma que se adaptem as singularidades e comportamentos de cada população. Assim é possível compreender o indivíduo no seu modo de viver, compreender o nos e gatilhos que desencadeiam suas necessidades para prestação dos cuidados em saúde (PEDUZZI; AGRELI, 2018).

Portanto, o objeto de trabalho em saúde são as necessidades de saúde sentidas e trazidas pelos usuários. Tais necessidades são interpretadas pelos profissionais, razão pela qual pode ser classificado como reflexivo, e servem de base para a estruturação e oferta de ações voltadas à prevenção, manutenção e restauração da saúde, desse modo a interprofissionalidade e colaboração permitem a percepção que o usuário necessita dos olhares dos diversos profissionais que compõem uma equipe para o cuidado ampliado em saúde (PEDUZZI et al., 2013).

4. CONCLUSÃO

De uma maneira geral pôde-se constatar que os quatros cursos se enquadraram na zona de conforto para EIP, dessa maneira deve-se reforçar atitudes positivas. Entretanto, observa-se que os cursos de Educação Física, Medicina e Psicologia, com base no questionário RIPLS, apresentaram zonas de alerta com relação à identidade

profissional, o que demonstra reforço aos estereótipos sociais e *status* que são associados as profissões de saúde.

A partir das assertivas respondidas verifica-se tendências atitudinais que reforçam à competição pela maior obtenção de conhecimento que outros profissionais, ressaltando uma “identidade profissional negativa”, característica de uma formação ainda fragmentada, tecnicista e especialista, onde predominam as competências profissionais específicas sobre as competências comuns e colaborativas.

Assim, sugere-se que os cursos da área da saúde da UNIR desloquem o ensino uniprofissional para propostas pedagógicas que provoquem uma formação ampliada, tecida nos encontros com os outros, com as informações científicas, com os saberes cotidianos, com as próprias práticas, e aprendendo uma postura ativa e interativa na sua própria formação, na construção do conhecimento acadêmico e no reforço de atitudes para o trabalho em equipe interprofissional mesmo após a termino da graduação, o que acarreta melhorias no modelo de atenção a saúde e consolidação dos sistemas de saúde.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, R. G. S.; TESTON, E. F.; MEDEIROS, A. A. A interface entre o PET-Saúde/Interprofissionalidade e a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. **Saúde debate**, Rio de Janeiro, v. 43, n. spe1, p. 97-105, 2019. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-11042019000500097&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 22 Jun. 2020.
- AGRELI, H. F.; PEDUZZI, M.; SILVA, M. C. Atenção centrada no paciente na prática interprofissional colaborativa. **Interface**, Botucatu, v. 20, n. 59, p. 905-16, 2016. Disponível em: <https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1414-32832016000400905&script=sci_abstract&lng=pt>. Acesso em: 26 mai. 2020.
- BARR, H. Competent to collaborate: towards a competency-based model for interprofessional education. **J. Interprof. Care**, v. 12, p. 181-187, 1989.
- BATISTA, N.A. **Projeto Formação Profissional para a integralidade no cuidado: articulando formação, avaliação e integração com o SUS**. UNIFESP, 2010 (circulação restrita-não publicado).
- _____. Educação interprofissional em saúde: concepções e práticas. **Cad. Fnepas**, v. 2, p. 25-28, 2012.

BATISTA, N.A. et al. Educação em saúde e Educação em Ciências. **Atas do IX Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – IX ENPEC**. Águas de Lindoia, SP – 10 a 14 de Novembro de 2013, p.1-5.

BATISTA, N.A. et al. Educação interprofissional na formação em saúde: a experiência da Universidade Federal de São Paulo, campus Baixada Santista, Santos, Brasil. **Interface**, Botucatu, v. 22, n. supl. 2, p. 1705-15, 2018. Disponível em: <<https://www.scielo.org/article/icse/2018.v22suppl2/1705-1715/>>. Acesso em: 25 mai. 2020.

BRUNO, L. F. C. **Levantamento da qualidade de vida no trabalho**. Manaus: UFAM, 1999.

_____. **Gestão da Qualidade**. Apostilas do curso de Engenharia de Produção da Faculdade de Tecnologia da Universidade Federal do Amazonas. Manaus-AM, 2001.

CASANOVA, I. A.; BATISTA, N. A.; MORENO, L. R. A Educação Interprofissional e a prática compartilhada em programas de residência multiprofissional em Saúde. **Interface**, Botucatu, v. 22, v. supl.1, p. 1325-37, 2018. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-32832018000501325&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 22 Jun. 2020.

CECCIM, R. B.; FEUERWERKER, L. C. M. O quadrilátero da formação para a área da saúde: ensino, gestão, atenção e controle social. **Physis**, Rio de Janeiro, v. 14, n. 1, p. 41-65, 2004.

CANADIAN INTERPROFESSIONAL HEALTH COLLABORATIVE (CIHC). **A national interprofessional competence framework**. Vancouver: Canadian Interprofessional Health Collaborative; 2010.

COSTA, M. V. A educação interprofissional no contexto brasileiro: algumas reflexões. **Interface (Botucatu)**, Botucatu, v. 20, n. 56, p. 197-198, Mar. 2016. Disponível em: <<https://www.scielo.br/pdf/icse/v20n56/1807-5762-icse-20-56-0197.pdf>>. Acesso em: 23 mai. 2020.

ESCALDA, P.; PARREIRA, C. M. S. F. Dimensões do trabalho interprofissional e práticas colaborativas desenvolvidas em uma unidade básica de saúde, por equipe de Saúde da Família. **Interface**, Botucatu, v. 22, n. supl. 2, p. 1717-27, 2018. Disponível em: <<https://www.scielo.org/article/icse/2018.v22suppl2/1717-1727/>> . Acesso em: 25 mai. 2020.

FEUERWERKER, L. C. M.; CECÍLIO, L. C. O. O hospital e a formação em saúde: desafios atuais. **Cienc. Saude Colet.**, Rio de Janeiro, v.12, n.4, p. 965-971, 2007.

GARCIA, C. P. C. Contribuições do PET-Saúde/redes Bahiana na formação interprofissional em saúde. 2018. 117f. Tese (Doutorado em Medicina e Saúde humana) – Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, Programa de pós-graduação em Medicina e Saúde humana. Salvador, 2018.

- LIMA, V. V. et al. Desafios na educação profissional de Saúde: uma abordagem interdisciplinar e interprofissional. **Interface**, Botucatu, v. 22, n. supl. 2, p. 1549-62, 2018. Disponível em: <<https://scielosp.org/article/icse/2018.v22suppl2/1549-1562/>>. Acesso em: 24 mai. 2020.
- LIMA, A. W. S. et al. Percepção e manifestação de competências colaborativas em discentes da graduação em saúde. **Rev. Latino-Am. Enfermagem**, São Paulo, v. 28, n. e3240, p. 1-11, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/rlae/v28/pt_0104-1169-rlae-28-e3240.pdf>. Acesso em: 26 mai. 2020.
- LUCIAN, R. Repensando o uso da escala Likert: Tradição ou Escolha Técnica. **PMKT Revista Brasileira de Pesquisas de Marketing, Opinião e Mídia**. São Paulo, v.9, n.1, p.12-28, jan-abr. 2016.
- NUTO, S. A. S. et al. Avaliação da disponibilidade para aprendizagem interprofissional de estudantes de ciências da saúde. **Revista Brasileira de Educação Médica**, Brasília, v. 41, n. 1, p. 50-7, 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-55022017000100050&script=sci_abstract&lng=pt>. Acesso em 18 mai. 2020.
- PEDUZZI, M. et al. Educação interprofissional: formação de profissionais de saúde para o trabalho em equipe com foco nos usuários. **Rev. Esc. Enfer. USP**, São Paulo, v.47, n.4, p.977-83, 2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/reeusp/v47n4/0080-6234-reeusp-47-4-0977.pdf> Acesso 18 mar 2020.
- PEDUZZI, M.; NORMAM, I.; COSTER, S.; MEIRELES, E. Adaptação transcultural e validação da Readiness for Interprofessional Learning Scale no Brasil. **Rev. Esc. Enferm. USP-SP**, v.49, n. Esp2, p. 7-15, 2015.
- PEDUZZI, M.; AGRELI, H. F. Trabalho em equipe e prática colaborativa na Atenção Primária à Saúde. **Interface**, Botucatu, v. 22, n. supl. 2, p. 1525-34, 2018. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-32832018000601525&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 22 jun. 2020.
- PINHO, M. J. Ciência e ensino: contribuições da iniciação científica para o ensino superior. **Avaliação**, São Paulo, v. 22, n. 3, p. 658-75, 2017. Disponível em: <<https://www.scielo.br/pdf/aval/v22n3/1982-5765-aval-22-03-00658.pdf>>. Acesso em: 18 mai. 2020.
- ROCHA, A. A.; CESAR, C.L.G. **Saúde Pública**: bases conceituais. São Paulo: Atheneu, 2008.

- ROSSIT, R.; BATISTA, S. H.; BATISTA, N. A. Formação para integralidade do cuidado: potencialidades de um projeto interprofissional. **Revista Internacional de Humanidades Médicas**, v. 3, n. 1, p. 55-64, 2014. Disponível em: <<https://journals.eagora.org/revMEDICA/article/view/1169>>. Acesso em: 25 mai. 2020.
- ROSSIT, R. A. S. et al. Construção da identidade profissional na educação interprofissional em Saúde: percepção dos egressos. **Interface**, Botucatu, v. 22, n. supl. 1, p. 1399-410, 2018. Disponível em: <<https://www.scielo.br/pdf/icse/v22s1/1807-5762-icse-1807-576220170184.pdf>>. Acesso em 24 mai. 2020.
- SANTOS, L. C.; SIMONETTI, J. P.; CYRINO, A. P. A educação interprofissional na graduação de Medicina e Enfermagem em prática na atenção primária à saúde: a perspectiva dos estudantes. **Interface**, Botucatu, v. 22, n. supl. 2, p. 1601-11, 2018. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-32832018000601601&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 20 jun. 2020.
- SILVA, R. H. A., SCAPIN, L. T., BATISTA, N. A. Avaliação Da Formação Interprofissional No Ensino Superior Em Saúde: Aspectos Da Colaboração E Do Trabalho Em Equipe. **Avaliação**, Campinas, v. 16, n. 1, p. 165-84, 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-40772011000100009>. Acesso em 19 jun. 2020.
- SILVA, R.H.A. da. Educação interprofissional na graduação em saúde: aspectos avaliativos da implantação na Faculdade de Medicina de Marília (Famema). **Educar em Revista**, Curitiba, n. 39, p. 159-175, jan./abr. 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/er/n39/n39a11.pdf> Acesso 20 abr 2020.
- SOUTO, T. S. S.; BATISTA, S. H.; BATISTA, N. A. A educação interprofissional na formação em psicologia: olhares dos estudantes. **Psicologia: ciência e profissão**, v. 34, n. 1, p. 32-45, 2014. Disponível em: <<https://www.scielo.br/pdf/pcp/v34n1/v34n1a04.pdf>>. Acesso em: 19 jun. 2020.
- SOUZA, A. Formação profissional em saúde na perspectiva do trabalho em equipe e da integralidade do cuidado: percepção dos estudantes. 2014. 97p. Dissertação (Mestrado profissional) – Programa de pós-graduação mestrado em ensino em ciências da saúde, Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde, Universidade Federal de São Paulo Campus São Paulo. São Paulo, 2014.
- TOMPSEM, N. N. et al. Educação interprofissional na graduação em odontologia: experiências curriculares e disponibilidades dos estudantes. **Rev Odontol UNESP**, São Paulo, v. 47, n. 5, p. 309-20, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1807-25772018000500309>. Acesso em 18 mai. 2020.

UCHÔA, P. A. Estágio integrado em saúde e aprendizagem interprofissional: percepção dos discentes. 2018. 100f. Dissertação (Mestrado profissional em ensino na saúde)-Programa de pós-graduação em Ensino na Saúde, Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Alagoas. Maceió, 2018.

CAPÍTULO XII

O ENSINO A DISTÂNCIA NA FORMAÇÃO MÉDICA

DOI: 10.51859/ampla.csa511.1121-12

Caio Felipe Thomazin Panicio ¹

¹ Graduando do curso de Medicina. Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE

RESUMO

A Educação a Distância (EaD) é uma modalidade de ensino estabelecida com a finalidade de ampliar as possibilidades do acesso à educação, promovendo uma democratização do acesso ao conhecimento. O objetivo do trabalho foi analisar o impacto da telemedicina durante a formação médica. A metodologia foi uma revisão integrativa da literatura para responder a estratégia PICO (P: estudantes de medicina; I: educação à distância; C: educação presencial; O: a telemedicina como fator prejudicial): A Telemedicina pode ser prejudicial à formação médica? Observou-se que 90% dos alunos concordaram que esta metodologia foi motivadora, e que favoreceu a participação ativa dos alunos. A EaD, quando sistematizada e bem aplicada, permite maior interação, melhoria do conhecimento em um ambiente flexível, com consequente melhoria da qualidade do aprendizado, no entanto não deve ter como objetivo substituir o modelo de ensino médico tradicional, muito menos quando se tratando dos conteúdos práticos.

Palavras-chave: Educação. Educação a distância. Estudantes de medicina. Medicina. Telemedicina.

1. INTRODUÇÃO

Apesar do termo “educação a distância” ter se popularizado há pouco tempo, não se trata de nenhuma novidade. Cursos por correspondência já foram desenvolvidos por universidades por volta do século XIX e existem até hoje, além do rádio ter sido um meio predominante de ensino a distância na década de 1930. Atualmente, tornou-se o desenvolvimento de canais de televisão educativos. A novidade nos dias atuais é a utilização da internet como instrumento de viabilização de ensino a distância (HEIDE; STILBORNE, 2000), que consequentemente gera um processo de migração de uma cultura de ensino presencial para uma cultura virtual, em que a aprendizagem é mediada por tecnologias da informação e da comunicação (MEDEIROS; FARIA, 2003). A rede

mundial de computadores, além de ser um veículo mais acessível, vem proporcionando cada vez mais, maiores níveis de interação entre os usuários.

O ensino a distância é uma proposta educativa desafiadora, envolvendo mudanças tanto na metodologia de ensino quanto na relação professor-aluno (MEDEIROS et al., 2003). É uma modalidade de ensino estabelecida com o objetivo de ampliar as possibilidades do acesso à educação e conhecimento. Sua combinação aos avanços tecnológicos e de comunicação vem para diminuir a diferença entre o reduzido número de vagas no ensino superior e a demanda por inclusão social a uma parcela maior da população, promovendo uma democratização do acesso ao conhecimento (FILATRO, 2007). A educação a distância democratiza o acesso à educação, incentiva a educação permanente e permite a atualização e o aperfeiçoamento profissional, sendo necessários menos recursos financeiros. Os benefícios que a EaD proporciona podem ser explicados por sua característica principal, que é a separação física entre professor e estudante, permitindo ao aluno decidir o melhor local e horário para seu estudo (NUNES et al., 2011). Assim como a característica do distanciamento entre professor e aluno, a EaD apresenta características próprias que impõem a necessidade de novos conhecimentos por parte de quem planeja, desenvolve e avalia o curso. O desafio é aplicar a EaD de forma sistemática, de modo a melhorar a qualidade, a eficácia e a eficiência da educação (BIELSCHOWSKY, 2008).

No ensino médico brasileiro, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), o graduado em medicina terá formação geral, humanista, crítica, reflexiva e ética, com capacidade para atuar nos diferentes níveis de atenção à saúde (BRASIL, 2014). Portanto, espera-se que as escolas médicas estejam comprometidas em formar profissionais que tenham a capacidade de responder às necessidades sociais da população em todos os níveis da atenção à saúde, incluindo práticas em unidades de atenção primária e estágios nos hospitais universitários (BRASIL, 2006).

Além do cenário diversificado, as DCN propõem ainda que os cursos de graduação sejam baseados em metodologia ativa, centrada no aluno e, sendo o professor, um facilitador e mediador deste processo de aprendizagem (BRASIL, 2014). Neste aspecto, as atividades de ensino à distância têm ganhado espaço progressivo na educação superior, com o intuito de facilitar a relação professor-aluno. No entanto, com o advento da pandemia ocorrida no último ano até o momento atual, a Portaria Nº

343, de 17 de março de 2020, decidiu sobre a substituição das aulas presenciais por aulas remotas enquanto durar a pandemia da COVID-19, vetando a substituição de aulas práticas e estágios no curso de medicina. Já em 16 de junho de 2020, o Ministério da Educação (MEC) publicou a Portaria Nº 544, autorizando a substituição de estágio e práticas por aulas remotas no curso de medicina.

Seguindo as recomendações do MEC, as faculdades de medicina do país poderão interromper esse contato prático durante a pandemia, o que poderá comprometer o processo da formação médica, uma vez que o contato presencial nos estágios é essencial para sedimentar o conhecimento teórico.

O objetivo deste estudo foi analisar o impacto do ensino a distância durante a formação médica.

2. METODOLOGIA

Este estudo apresenta-se como uma revisão integrativa de literatura de natureza qualitativa e exploratória. Configura-se como qualitativa, pois estimula a análise e permite o desenvolvimento de conceitos e ideias a partir de padrões obtidos dos dados estudados e, exploratória, pois tem como objetivo contribuir para maior compreensão da temática estudada.

A revisão integrativa é uma metodologia utilizada para sintetizar os resultados de estudos já realizados, facilitando o acesso e permitindo constante atualização sobre o tema de interesse (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). Trata-se de uma importante ferramenta, que possibilita o leitor de aperfeiçoar-se e instituir novas práticas em sua rotina profissional. Os métodos qualitativos são aqueles nos quais é importante a interpretação por parte do pesquisador com suas opiniões sobre o fenômeno em estudo (PEREIRA et al., 2018). Enquanto o objetivo fundamental de uma pesquisa exploratória é descrever ou caracterizar a natureza das variáveis que se quer conhecer (KÖCHE, 2011).

Para elaboração da revisão, o processo metodológico foi subdividido em seis etapas: identificação do tema e seleção da questão de pesquisa; estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão; identificação dos estudos pré-selecionados e

selecionados; categorização, dos estudos selecionados; análise e interpretação dos resultados; e apresentação da revisão/síntese do conhecimento.

Esses aspectos facilitaram a identificação dos resultados relevantes e das lacunas, direcionando para o desenvolvimento de pesquisas e auxiliando profissionais na escolha de condutas e tomada de decisões, proporcionando um saber crítico.

2.1. TIPO DE ESTUDO

Elaborou-se uma revisão integrativa da literatura médica utilizando a estratégia PICO (Paciente, Intervenção, Controle, “Outcome” (controle)) para formulação da pergunta clínica desse estudo, sendo ela: Paciente: Estudantes de medicina; Intervenção: Ensino a distância (EAD); Controle: Ensino presencial; Resultado: “Outcome”: A Telemedicina como fator prejudicial à formação médica.

Então, para guiar o estudo, foi definida a pergunta norteadora: A Telemedicina pode ser prejudicial à formação médica?

2.2. CRITÉRIO DE BUSCA

O levantamento bibliográfico foi realizado através da busca eletrônica nas bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), USA National Library of Medicine (MEDLINE/PubMed), ScienceDirect e na biblioteca eletrônica Scientific Eletronic Library Online (SciELO). Os descritores, selecionados através dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), foram: “students, medical” AND “telemedicine” AND “education” OR “estudantes de medicina” AND “telemedicina” AND “educação”.

2.3. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

Primeiramente foi realizada a busca dos artigos nas bases de dados mencionadas, e após a coleta inicial, os artigos foram filtrados e selecionados. Dos estudos, foram incluídos ensaios clínicos randomizados, revisões integrativas, sistemáticas com meta-análises, experimental e estudo de coorte, publicados entre 2011 a 2020 e disponíveis na íntegra.

2.4. EXTRAÇÃO DOS DADOS

A extração de dados foi realizada a partir da leitura completa dos estudos extraídos das bases de dados apontadas. Os resultados obtidos dessa leitura foram organizados em uma planilha contendo seis dimensões de análise, a fim de possibilitar a categorização dos mesmos. As dimensões de análise foram: ano de publicação, fonte de publicação, tipo de estudo, amostra, objetivos, principais resultados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As buscas realizadas nas plataformas de pesquisas resultaram 36 artigos, sendo 23 excluídos por não apresentarem relação entre Estudantes de medicina e a Telemedicina. Mediante a leitura dos resumos e, de acordo com a leitura do texto na íntegra, 17 estudos não tiveram relação direta com o tema. Outros 4 ainda estão em andamento. Ao final da seleção 2 artigos compuseram o estudo por atenderem aos critérios de inclusão. Para melhor elucidar os achados, a Tabela 1 mostra a distribuição dos estudos encontrados.

Tabela 1 - Número absoluto (N) e porcentagem (%) de todos artigos encontrados por base de dados analisadas

Site de busca	N	%
PubMed	24	66,6
Embase	8	22,2
Lilacs	4	11,1

Fonte: Autoria própria.

Dos 36 estudos encontrados, a maioria foi encontrado na base de dados PubMed, com 24 artigos (66,6%), enquanto na Lilacs foram encontrados apenas 4.

A distribuição dos artigos selecionados para o presente estudo está apresentada no Tabela 2, juntamente com seus respectivos título, ano e país de publicação. Enquanto o Tabela 3 apresenta os estudos de acordo com o tipo de estudo, amostra, objetivos e principais resultados.

Tabela 2 - Estudos utilizados com seus autores, títulos, ano e país de publicação

Autores	Título	Ano	País
QUEVEDO; MATUS; ARELLANO.	Telemedicina como herramienta de enseñanza de la endocrinología en estudiantes de medicina	2019	Chile
SEGARRA et al.	Efectos de la capacitación en el uso de herramientas informáticas en la docencia médica	2013	Espanha

Fonte: Autoria própria.

Os estudos encontrados correspondem aos anos de 2013 a 2019, representando 2 países diferentes, sendo Chile e Espanha.

Tabela 3 - Distribuição dos estudos incluídos de acordo com autores, tipo de estudo, e amostra, objetivos e principais resultados

Autores	Tipo de estudo/Amostragem	Objetivos	Principais resultados
QUEVEDO; MATUS; ARELLANO.	Ensaio clínico randomizado N= 40 alunos do 3º ano (24 homens, 16 mulheres)	Analisar o alcance de competências e o grau de satisfação dos estudantes de medicina com o uso da telemedicina como estratégia didática no ensino de endocrinologia.	O desempenho dos alunos no módulo de teleendocrinologia na avaliação das competências de analisar, sintetizar e apresentar um caso clínico teleconsultado foi de 6,1 numa escala de 1 a 7, não sendo encontradas diferenças de acordo com o gênero. 90% dos alunos consideram a metodologia de

			ensino baseada na telemedicina muito motivadora e 82,5% consideram que esta metodologia favorece a integração dos conteúdos.
SEGARRA et al.	Ensaio clínico randomizando N= 477 alunos	Avaliar o efeito de uma estratégia educacional, dirigida a professores e alunos de graduação e pós-graduação da área da saúde, para a aplicação das tecnologias de informação e comunicação (TIC), como suporte no processo de formação.	Os alunos melhoraram significativamente em 80% no uso de ferramentas de informática, 100% de equipamentos e recursos de telemedicina e em 5 dos 9 valores éticos selecionados para o estudo.

Fonte: Autoria própria.

De acordo com os tipos de estudo apresentados no Tabela 3, foram encontrados dois ensaios clínicos randomizados.

Em relação aos resultados obtidos, observou-se que 90% dos alunos concordaram totalmente que a metodologia de ensino baseada em telemedicina foi motivadora, e que esta favoreceu a participação ativa dos alunos. Em contrapartida, apenas 17,5% dos alunos que encontraram em contato com a metodologia não tiveram participação ativa. Tais diferenças podem ser explicadas pelo fato de serem alunos que estão na fase de transição das ciências básicas para as ciências clínicas, o que pode gerar um maior grau de estresse ao estar em contato físico com pacientes e seus familiares, situação que não ocorre na telemedicina (QUEVEDO; MATUS; ARELLANO, 2019).

Os resultados estão de acordo com os obtidos, por RIENITS; TEUSS; BONNEY (2016), que observou que os alunos do terceiro ano da Universidade de Wollongong na

Austrália, que participou em um estudo sobre telemedicina, avaliaram positivamente em 88,9% esta estratégia. No estudo de QUEVEDO; MATUS; ARELLANO (2019), a avaliação das competências: analisar, sintetizar e apresentar um histórico médico endocrinológico, associado ao feedback imediato, o aluno mostrou um bom nível de qualificação nas três competências avaliadas. Sendo congruente com o trabalho de Nilsen, que avaliou as oportunidades de aprendizagem através da troca de conhecimentos entre profissionais que realizam teleconsulta (QUEVEDO; MATUS; ARELLANO, 2019).

Muitos autores concordam que as tecnologias de informação e comunicação (TICs) vêm permitindo maior interação, melhoria do conhecimento em um ambiente flexível, com consequente melhoria da qualidade do aprendizado (SEGARRA et al., 2013). As TICs constituem meios importantes na educação médica, tendo facilitado o acesso à informação e modificado o processo de ensino e aprendizagem, bem como a gestão e troca de informações em medicina, elemento essencial na prática e nos padrões médicos atuais de educação (HORNA et al., 2002).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Vimos, portanto, que a EaD, quando sistematizada e bem aplicada, traz inúmeros benefícios aos estudantes, permitindo mais flexibilidade na hora dos estudos e acesso à ilimitados conteúdos de capacitações, proporcionando maior leque de aprendizado quando comparado ao estudante do ensino tradicional. No entanto, a EaD não deve ter como objetivo substituir o modelo de ensino médico tradicional, muito menos quando se tratando dos conteúdos práticos. Assim, essa metodologia pode ser muito eficaz sendo utilizada como uma ferramenta adicional para o aprendizado dos alunos, e trazendo vantagens educacionais quando comparada apenas aos métodos tradicionais de ensino.

REFERÊNCIAS

BIELSCHOWSKY, C.E. **O crescimento da educação a distância no Brasil**. In: ABRAEAD – Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância. 4. ed. São Paulo: Instituto Monitor, 2008.

- BRASIL. Resolução CNE/CES nº 3, de 20 de junho de 2014. Institui Diretrizes curriculares nacionais do Curso de Graduação em Medicina. **Conselho Nacional de Educação**. Brasília: Câmara de Educação Superior, 2014. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15874-rces003-14&category_slug=junho-2014-pdf&Itemid=30192 Acesso em: 9 mar. 2021.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção a Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Política Nacional de atenção básica**. Série Pactos pela Saúde. Brasília: MS, 2006.
- FILATRO, A. **Design instrucional contextualizado: educação e tecnologia**. 2.ed. São Paulo: Senac São Paulo, 2007.
- HEIDE, A.; STILBORNE, L. **Guia do professor para a Internet**. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000.
- HORNA, P. et al. Conocimientos, habilidades y características del acceso a internet en estudiantes de medicina de una Universidad Peruana. **An Fac Med**, Lima, v. 63, n. 1, p. 32-39, mar. 2002. DOI: <https://doi.org/10.15381/anales.v63i1.1475>
- KÖCHE, J. C. **Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação à pesquisa** (Edição digital). Petrópolis: Vozes, 2011.
- MEDEIROS, M. F.; FARIA, E. T. **Algo de novo sob o sol? Capturas de traçados possíveis na construção do conhecimento produzido em EAD: desafios e intensidades no vivido**. In: Silva M. (Org.). Educação Online: Teorias, práticas, legislação, formação corporativa. São Paulo: Edições Loyola, 2003.
- MEDEIROS, M. F. et al. **Virtual learning environments: the challenge of new outlines in the creative production of knowledge**. In: Llamas-Nistal, M. et al. (Org.) Computers and education: Springer, Dordrecht, 2003. p.51-62. DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-017-1122-7_5
- NUNES, C. S. et al. Criação e compartilhamento do conhecimento em ead. **Novas tecnologias em educação**, Porto Alegre, v. 9, n. 1, jul. 2011. DOI: <https://doi.org/10.22456/1679-1916.21899>
- PEREIRA, A. S. et al. **Metodologia da pesquisa científica**. In: Núcleo de Tecnologia Educacional. 1. ed. Santa Maria: UFMS, 2018.
- QUEVEDO, I. L.; MATUS, O. B.; ARELLANO, J. V. Telemedicina como herramienta de enseñanza de la endocrinología en estudiantes de medicina. **Rev Chil Endo Diab**, Cidade de Concepción, v. 12, n. 4, p. 199-204. 2019.
- RIENITS, H.; TEUSS, G.; BONNEY, A. Teaching telehealth consultation skills. **The Clinical Teacher**, Wollongong, v. 13, n. 2, p. 119-123, mai. 2016. DOI: <https://doi.org/10.1111/tct.12378>

SEGARRA, J. O. et al. Efectos de la capacitación en el uso de herramientas informáticas en la docencia médica. **Revista de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca**, Cuenca, v. 31, n. 2, p. 28-35, jul. 2013.

SOUZA, M. T.; SILVA, M. D.; CARVALHO, R. Revisão integrativa: o que é e como fazer. **Einstein**, São Paulo, v. 8, n. 1, p. 102-106, mar. 2010. DOI: <https://doi.org/10.1590/s1679-45082010rw1134>

CAPÍTULO XIII

LIGA ACADÊMICA DE ESTOMATOPATOLOGIA: ATUAÇÃO NO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19

DOI: 10.51859/amplla.csa511.1121-13

Híttalo Carlos Rodrigues de Almeida ¹

Bruna Peixoto Nogueira dos Santos ²

Maria Augusta de Miranda Carneiro ³

Luiz Pedro Mendes de Azevedo ³

Márcia Maria Fonseca da Silveira ⁴

Ana Paula Veras Sobral ⁵

¹ Doutorando em Clínicas Odontológicas com ênfase em EstomatoPatologia Oral e Maxilofacial. Programa de Pós-Graduação em Odontologia – UPE.

² Mestrando em Clínicas Odontológicas com ênfase em EstomatoPatologia Oral e Maxilofacial. Programa de Pós-Graduação em Odontologia – UPE.

³ Graduando do Curso de Bacharelado em Odontologia. Universidade de Pernambuco – UPE.

⁴ Professor Adjunto do Departamento de Estomatologia. Universidade de Pernambuco – UPE.

⁵ Professor Associado do Departamento de Patologia Bucal. Universidade de Pernambuco – UPE.

RESUMO

Introdução: A Liga Acadêmica é uma organização multidisciplinar de estudantes e profissionais da área da saúde para desenvolvimento de pesquisas e atividades científicas, didáticas, assistenciais, culturais e sociais, com o objetivo de fortalecer a formação acadêmica. **Metodologia:** As atividades foram desenvolvidas no ano de 2020, durante a pandemia do COVID-19. As etapas metodológicas foram adaptadas para o modo remoto através de reuniões em plataformas digitais como o google Meet e Zoom. Foram realizadas publicações em rede social sobre a área da Estomatologia e Patologia Oral e Maxilofacial e eventos científicos online. **Resultados:** Interação de alunos e professores de nível nacional e internacional através de rede social e publicações de assuntos relacionados a área; realização de encontros científicos online certificados online com participação de professores de diversas instituições do Brasil e crescimento científico e crítico dos alunos participantes do projeto. **Conclusão:** A capacitação de seus integrantes na área da pesquisa, ensino e extensão são essenciais para a formação crítica, humanizada e com senso de diagnóstico para as principais lesões de boca.

Palavras-chave: Liga Acadêmica. Ensino. Pesquisa. Extensão. Estomatologia.

1. INTRODUÇÃO

A Liga Acadêmica (LA) é uma organização multidisciplinar de estudantes e profissionais da área da saúde para desenvolvimento de pesquisas e atividades

científicas, didáticas, assistenciais, culturais e sociais, com o objetivo de fortalecer a formação acadêmica (QUEIROZ et al. 2014; CAVALCANTE *et al*, 2018) Com a necessidade da criação de um espaço para discussão de lesões e os seus aspectos dentro da área de conhecimento da Estomatologia e Patologia Oral e MaxiloFacial, criou-se a Liga Acadêmica de EstomatoPatologia (LAEP). As atividades desenvolvidas pela LAEP constituem-se em atividades científicas teóricas e práticas, por meio de aulas, seminários, discussões de textos, acompanhamento a paciente e participação de grupos em atividades de ação social.

A LAEP possui como pontos principais permitir que o aluno tenha um maior aproveitamento das áreas, aprofundando seus conhecimentos da graduação, mas também fornecendo aprendizado de outros assuntos, ou seja, não vistos durante o curso de graduação, para uma visão mais ampla. Dessa forma, os alunos que participam da LAEP têm a oportunidade de contemplar os três pilares que envolvem uma LA – Ensino, Pesquisa e Extensão. Assim, produz-se um currículo diferenciado gerando conhecimentos de forma dinâmica, no qual amplia também o senso crítico e raciocínio científico (HAMAMOTO FILHO, 2011).

Como todas as outras Ligas Acadêmicas (LAs), a LAEP tem como objetivo promover um espaço transformador, no qual possibilita um desenvolvimento extra de ensino, pesquisa e extensão, que acontece de forma bastante interativa entre alunos de graduação, pós-graduação, professores e a própria sociedade (HAMAMOTO FILHO, 2010; SILVA & FLORES, 2015).

A área de ensino tem como objetivo fornecer o conhecimento através de um sistema de aprendizagem chamado de PBL, do inglês *Problem Based Learning* (Aprendizagem Baseada em Problemas), que se trata no estudo de problemas propostos pela equipe, provocando a busca do conhecimento pelos integrantes, ou seja, essa metodologia tem a proposta formativa, pois torna os estudantes ativos, gerando uma diferença na prática pedagógica tradicional que é informativa (BERBEL, 1998; SAKAI E LIMA, 1996).

A área de pesquisa possibilita a publicação para o meio acadêmico de assuntos discutidos ou de observações feitas com os dados obtidos, a partir das extensões realizadas pela LAEP. Dessa forma, também faz parte o estudo de artigos já publicados

para o melhor aperfeiçoamento na produção do mesmo e até promover uma pesquisa para complementar.

A área de extensão vem para aproximar os estudantes participantes da comunidade e envolvê-los em diversas atividades, como promover ações sociais, palestras, atividades clínicas, que são vivenciadas de forma dinâmica, com oportunidades únicas da LAEP. Tudo sendo divulgado nas redes sociais da Liga, assim como conteúdos informativos sobre a especialidade.

A pandemia da doença causada pelo novo coronavírus 2019, COVID-19, impactou a área de ensino e de sobremaneira o cenário mundial, agravando as taxas de morbidade e mortalidade, principalmente no Brasil. Diante desse cenário, foi necessitado urgente capacitar e qualificar profissionais da área de saúde no enfrentamento dessa doença e o ensino presencial foi suspenso e transformado em atividades remotas. O objetivo desse trabalho é demonstrar a atuação da LAEP trabalhando os pilares de uma LA durante a pandemia de COVID-19.

2. MÉTODOS

A LAEP é um projeto de extensão cadastrado juntamente a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) da Universidade de Pernambuco (UPE) e conta com a participação de 9 membros, esses sendo graduandos do curso de Bacharelado em Odontologia da Faculdade de Odontologia de Pernambuco do 5º ao 9º período, alunos de Pós-Graduação e professores externos, que passaram por um processo seletivo.

Após a seleção, a LAEP tem sua organização metodológica realizada através de encontros mensais, um chamado de encontro teórico e o outro de encontro prático (Laboratorial ou Social). O encontro teórico é um momento em que através do modelo PBL, é discutido casos clínicos, esclarecido dúvidas e mais informações sobre um tema previamente escolhido e informado aos participantes.

Os encontros mensais possuem uma duração de 4h com supervisão e orientação da professora coordenadora do projeto e possível convidado que possam contribuir com o momento. Enquanto isso, o encontro prático se constitui de um momento voltado para pôr em exercício os conhecimentos adquiridos durante os encontros teóricos da LAEP e já adquiridos ao decorrer da faculdade. O encontro prático laboratorial é

dedicado à prática laboratorial, com análises e diagnóstico de lâminas a cerca de um assunto previamente escolhido e informado aos participantes e o encontro prático social é dedicado para o contato dos participantes com a comunidade. Nele foram desenvolvidas ações de promoção de saúde e avaliações clínicas, afim de levantamento de dados e diagnósticos de patologias que acometem a região bucomaxilofacial.

Devido a Pandemia do NovoCoronavírus as etapas metodológicas da liga foram adaptadas para o modo remoto através de reuniões em plataformas digitais como o google meet e zoom. A LAEP realizou postagens em sua rede social semanalmente sobre assuntos relacionados a Estomatologia e Patologia Oral afim de estimular a escrita dos alunos. Além disso eram feitos debates sobre os temas previamente a realização das postagens.

Além disso, foram realizados encontros científicos online com professores convidados de outras instituições de ensino e com inscrição online para todo o Brasil. Cada encontro teve um professor convidado que tinha ligação com a aula abordada (Tabela 1)

Tabela 1 – Encontros científicos realizados com os membros da LAEP em 2020

Data do Encontro	Aula Ministrada	Palestrantes
25/06/2020	Encontro Interligas de EstomatoPatologia	Profa. Dra. Ana Paula Veras Sobral Profa. Dra. Evelyne Pedroza de Andrade Prof. Dr. Ricardo Luiz Cavalcanti de Albuquerque Júnior
30/07/2020	Mesa Redonda: Desafios do diagnóstico oral – da clínica ao laboratório	Prof. Dr. Leorik Pereira da Silva Prof. Dr. George João Ferreira do Nascimento Profa. Dra. Cyntia Helena Pereira de Carvalho
27/08/2020	Sessão Diagnóstica Clínica: Discussão de Casos Clínicos	Prof. Dr. Elismauro Mendonça Prof. Dr. Marcelo Marcucci Profa. Dra. Márcia Silveira
29/10/2020	Sessão Diagnóstica de Imagens: Discussão de Casos Clínicos	Profa. Dra. Maria Alves Garcia Profa. Dra. Flávia Perez

Fonte: Autoria Própria

Durante o período da Liga, seus membros fizeram levantamento bibliográfico na área de interesse dentro da EstomatoPatologia, para que ao término do ciclo de um ano cada um possa apresentar a tutora um artigo que possa contribuir na comunidade científica. Assim como, durante a permanência na liga, os participantes, produzem conteúdos de informação e promoção de saúde que serão divulgados nas redes sociais da LAEP, gerenciadas pelos seus membros, com orientação da professora coordenadora do projeto.

3. RESULTADOS

A Liga de Estomatopatologia da FOP/UPE (LAEP), em seu terceiro ano, teve como desafio a sua continuidade frente à Pandemia de Covid-19. O desenvolvimento de suas atividades nos objetivos de ensino, pesquisa e extensão, de forma integrada foram realizados no formato digital. Na primeira reunião do ano, foram realizadas as boas-vindas aos novos membros da LAEP e apresentação das suas orientadoras/tutoras. Além disso, a LAEP foi dividida internamente em três comissões: Comissão Científica, Comissão de Eventos e Comissão de Comunicação/Divulgação.

Duas vezes por semana foram realizadas postagens em nossa página no Instagram (@laepfop) e Facebook (Liga Acadêmica de EstomatoPatologia LAEP-FOP) acerca de assuntos da Estomatologia e Patologia Bucal no qual tivemos interação de alunos e professores de nível nacional e internacional, incluindo países como Argentina, México, Bélgica e Bolívia. Nossa página no Instagram tem mais de 170 publicações, 800 curtidas todo mês e em média de 1.587 seguidores. O nosso Facebook chega a um nível de mais de 1.000 visualizações todo mês.

Nas redes sociais postamos assuntos referentes a maio vermelho, julho verde, leucoplasia, líquen plano, exames complementares, hemangiomas e malformações vasculares, candidíase eritematosa, pigmentação dentária extrínseca medicamentosa, multiforme, herpes zoster, outubro rosa, hiperplasia fibrosa, novembro azul, osteogênese imperfeita, dezembro vermelho e laranja, janeiro branco, dentre outras (Foto 1).

Foto 1 – Postagens na Página do Instagram da LAEP

Fonte: Página do Instagram (@laepfop)

Todas as postagens são escritas pela comissão científica e passam pela revisão da orientadora da LAEP e finalmente são divulgadas através da comissão de divulgação. Além disso, devido a Pandemia do Novo Coronavírus, a Liga realizou mensalmente encontros científicos online com professores convidados de outras instituições de ensino e com inscrição online para todo o Brasil. O encontro Interligas de EstomatoPatologia foi realizado no dia 25 de Junho de 2020 das 16h às 22h e contou com três palestras de duração de duas horas cada.

1. 16h - Punção biópsia por agulha fina no diagnóstico das lesões bucomaxilofaciais; Palestrante: Profa. Dra. Ana Paula Veras Sobral
2. 18h - Queilite actínica: aspectos clínicos e histopatológicos; Palestrante: Profa. Dra. Evelyne Pedroza de Andrade.
3. 20h - Tumores de glândulas salivares: o que o clínico precisa saber e o que o patologista precisa informar. Palestrante: Prof. Dr. Ricardo Luiz Cavalcanti de Albuquerque Júnior

O evento foi online, promovido pela Liga de EstomatoPatologia da FOP/UPE (LAEP – FOP), em conjunto com a Liga Acadêmica de Estomatologia da UNIT/PE e Liga Sergipana de Diagnóstico Oral da UNIT/SE, divulgado pelas redes sociais (Foto 2) e transmitido ao público-alvo pelo aplicativo de reuniões Google Meet.

Foto 2 – Divulgação do Evento Científico nas redes sociais da LAEP

Fonte: Página do Instagram (@laepfop)

O Encontro Interligas de Estomatopatologia obteve 300 inscritos com menos de 2 horas de abertura das inscrições. Não foram ampliadas as vagas devido ao limite de usuários na plataforma do evento.

No mês seguinte houve a Mesa Redonda: Desafios no diagnóstico oral: da clínica ao laboratório, que foi realizada no dia 30 de Julho de 2020 das 19h às 22h com participação do Prof. Dr. Leorik Pereira- UFAM; Prof. Dr. George Nascimento-UFCG; Profa. Dra. Cyntia-UFCG e mediada pela tutora da liga (Dra. Ana Paula Sobral).

O evento foi online, promovido pela Liga de EstomatoPatologia da FOP/UPE (LAEP – FOP), em conjunto com a Liga Acadêmica de Diagnóstico Oral (LADO) da UFCG, divulgado pelas redes sociais (Foto 3). A inscrição do aluno era realizada pela plataforma Sympla e transmitido ao público-alvo pelo aplicativo de reuniões Zoom.

Foto 3 – Divulgação do Evento Científico nas redes sociais da LAEP

Fonte: Página do Instagram (@laepfop)

Foi criado um Manual do Participante para orientar o público como proceder em relação à inscrição no evento. A comissão organizadora, internamente, produziu um calendário de atividades para distribuir as funções de cada membro. Ao final, foi aberta oportunidade para os participantes debaterem e tirarem dúvidas acerca dos assuntos explanados. Mediante os questionamentos e comentários realizados no chat do bate papo foram realizadas avaliações do evento. Ao final da mesa redonda, foi aplicado um questionário de satisfação através do método de Análise Likert de 0 a 5.

O evento obteve 340 inscritos e iniciou pontualmente às 19h pela aluna de Mestrado Rebeka Thiara com a apresentação do evento e orientações iniciais, passando a palavra para Mediadora (Profa. Dra. Ana Paula Veras Sobral) que apresentou os palestrantes e deu início ao evento.

No dia 27 de Agosto de 2020 das 19h às 22h foi realizado o evento científico Sessão Diagnóstica: Discussão de Casos Clínicos com participação do Prof. Dr. Elismauro Francisco de Mendonça da Universidade Federal de Goiás e do Prof. Dr. Marcelo Marcucci da Universidade de Mogi das Cruzes – SP e mediada pela Profa. Dra. Márcia Silveira da Universidade de Pernambuco. Antecipadamente, o Prof. Elismauro e Marcelo trocaram entre si um caso clínico com informações básicas e uma imagem para cada um debater a possibilidade de diagnóstico.

O evento foi online, promovido pela LAEP e divulgado pelas redes sociais (Foto 4). A inscrição do aluno era realizada pela plataforma Sympla e transmitido ao público-alvo pelo aplicativo de reuniões Zoom. Foi criado um Manual do Participante para orientar o público como proceder em relação à inscrição no evento.

Foto 4 – Divulgação do Evento Científico nas redes sociais da LAEP

Fonte: Página do Instagram (@laepfop)

A comissão organizadora, internamente, produziu um calendário de atividades para distribuir as funções de cada membro. Ao final, foi aberta oportunidade para os participantes debaterem e tirarem dúvidas acerca dos assuntos explanados. Mediante os questionamentos e comentários realizados no chat do bate papo foram realizadas avaliações do evento.

O evento obteve 200 inscritos e iniciou pontualmente às 19h pela aluna de Mestrado Rebeka Thiara com a apresentação do evento. O ligante Luiz Pedro seguiu com as apresentações dos palestrantes e fez os avisos necessários, passando a palavra para a tutora da Liga (Profa. Dra. Ana Paula Veras Sobral) dar as boas-vindas aos professores e iniciar o evento com a Profa. Dra. Márcia Silveira.

O primeiro caso clínico foi apresentado pelo Prof. Elismauro e debatido pelo Prof. Marcelo. Ao término dessa rodada, foi aberto perguntas entre os participantes. A

interação palestrante-participantes era realizada através de chat no bate-papo. Num segundo momento, o Prof. Marcelo foi o apresentador e o Prof. Elismauro o debatedor. Ao final da discussão de caso clínico foi aberto perguntas entre os participantes. No final do evento foi disponibilizado um formulário para o aluno participante preencher com seus dados (Nome completo, instituição, CPF) comprovando a sua participação para emissão do certificado.

Seguimos a programação com o evento Sessão Diagnóstica de Imagens: Discussão de Casos Clínicos foi realizada no dia 29 de Outubro de 2020 das 19h às 22h com participação da Profa. Dra. Maria Alves Garcia da Universidade Federal de Goiás; Profa. Dra. Flávia Perez da Universidade Federal de Pernambuco e mediada pela Profa. Dra. Márcia Silveira da Universidade de Pernambuco. Antecipadamente, as professoras Maria e Flávia trocaram entre si um caso clínico com informações básicas e uma imagem para cada um debater a possibilidade de diagnóstico.

O evento foi online, promovido pela Liga de EstomatoPatologia da FOP/UPE (LAEP – FOP), divulgado pelas redes sociais (Foto 5). A inscrição do aluno era realizada pela plataforma Sympla e transmitido ao público-alvo pelo aplicativo de reuniões Zoom.

Foto 5 – Divulgação do Evento Científico nas redes sociais da LAEP

Fonte: Página do Instagram (@laepfop)

A comissão organizadora, internamente, produziu um calendário de atividades para distribuir as funções de cada membro. Ao final, foi aberta oportunidade para os

participantes debaterem e tirarem dúvidas acerca dos assuntos explanados. Mediante os questionamentos e comentários realizados no chat do bate papo foram realizadas avaliações do evento.

O evento obteve 100 inscritos e iniciou pontualmente às 19h pela aluna de Mestrado Rebeka Thiara com a apresentação do evento e seguiu com as apresentações dos palestrantes e fez os avisos necessários, passando a palavra para a tutora da Liga (Profa. Dra. Ana Paula Veras Sobral) dar as boas-vindas aos professores e iniciar o evento com a Profa. Dra. Márcia Silveira.

O primeiro caso clínico foi apresentado pela Profa. Maria Garcia e debatido pela Profa. Flávia. Ao término dessa rodada, foi aberto perguntas entre os participantes. A interação palestrante-participantes era realizada através de chat no bate-papo. Num segundo momento, a Profa. Flávia foi a apresentadora e a Profa. Maria Garcia a debatedora. Ao final da discussão de caso clínico foi aberto perguntas entre os participantes. No final do evento foi disponibilizado um formulário para o aluno participante preencher com seus dados (Nome completo, instituição, CPF) comprovando a sua participação para emissão do certificado.

4. DISCUSSÃO

Sendo duas disciplinas base no currículo do Curso de Odontologia, a Patologia Oral e MaxiloFacial, ciência que estuda as doenças através das alterações celulares, e a Estomatologia, ramo que estuda as doenças, sob o aspecto clínico e seus tratamentos, e, por questões didáticas, vistas separadamente no âmbito acadêmico, mas na prática clínica, em alguns pontos, sua indissociabilidade é inevitável.

Logo, por ter a necessidade de um ambiente onde possa ser discutido a doença e os seus aspectos dentro da Patologia Oral e MaxiloFacial e Estomatologia, tendo uma visão mais ampla e aprofundada do que é comum, a essas duas áreas e vendo a Liga acadêmica como um válido meio de promover esse espaço, foi sugerido a criação de uma Liga Acadêmica de Estomatopatologia (LAEP).

A LAEP no ano de 2020 adaptou os seus pilares com atividades remotas afim de transformar o conhecimento de seus integrantes através do aprofundamento de assuntos já vistos na graduação, mas também despertar o interesse na aérea para

métodos que não são oferecidos no curso de graduação. O uso do PBL para problematização de casos clínicos é uma das propostas pela professora/tutora da LA. Assim, os estudantes deverão sempre estar atualizados nas informações, estudando e participando ativamente das atividades para ter o objetivo desejado.

A vivência de extensão e pesquisa contribui com o aprendizado, dando a oportunidade aos que participarem da LAEP a construir um sentimento de maior segurança nas áreas em questão. Dessa forma, o estudo de artigos já publicados para o melhor aperfeiçoamento na produção do mesmo e até promover pesquisa. A área de extensão vem para aproximar os estudantes da comunidade e envolvê-los em diversas atividades, como promover ações sociais, educação em saúde (palestras), atividades clínicas, que irão ser vivenciadas de forma dinâmica.

A divulgação nas redes sociais da Liga, assim como conteúdos informativos sobre as especialidades, é essencial para o despertar da escrita. Assim, a universidade cria um espaço de debate e criação científica, voltada para uma área que, apesar de sua importância dentro da saúde, nem sempre tem sido valorizada. Os participantes da LA utilizam-se de um local de disseminação da Patologia Oral e MaxiloFacial e Estomatologia, onde novos assuntos são abordados e outros são retroalimentados.

5. CONCLUSÃO

A continuidade do pilar de pesquisa, ensino e extensão é essencial para formação crítica e humanizada do aluno de graduação e pós-graduação em Odontologia. Vale salientar que o ambiente de liga acadêmica, seja em qualquer área do conhecimento, estimula o crescimento do aluno e promove um espaço transformador de ideias.

AGRADECIMENTOS

A Pró-Reitoria de extensão e Cultura (PROEC) e Programa de Fortalecimento Acadêmico (PFA) da Universidade de Pernambuco (UPE) pelo apoio ao Projeto Liga Acadêmica de EstomatoPatologia (LAEP).

REFERÊNCIAS

- BERBEL, N. N.: “Problematization” and Problem-Based Learning: different words or different ways? **Interface — Comunicação, Saúde, Educação**, v.2, n.2, 1998.
- CAVALCANTE A.S.P et al. As Ligas Acadêmicas na Área da Saúde: Lacunas do Conhecimento na Produção Científica Brasileira. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v.42, n.1, p. 197-204, 2018.
- HAMAMOTO FILHO, P. T. et al. Ligas Acadêmicas: Motivações e Críticas a Propósito de um Repensar Necessário. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 35, n. 4, p. 535-543, out./dez. 2011.
- HAMAMOTO FILHO, P. T. et al. Normatização da abertura de ligas acadêmicas: a experiência da Faculdade de Medicina de Botucatu. **Revista Brasileira de Educação Médica**, Rio de Janeiro, v. 34, n. 1, p. 160-167, jan./mar. 2010.
- QUEIROZ, S.J. et al. A importância das ligas acadêmicas na formação profissional e promoção de saúde. **Fragmentos de Cultura**, Goiânia, v. 24, n. 01, p.73-78, dez. 2014.
- SAKAI, M. H.; LIMA, G.Z. PBL: uma visão geral do método. **Olho Mágico**, Londrina, v. 2, n. 5, p.1-29, 1996.
- SILVA, S.A. & FLORES, O. Ligas Acadêmicas no Processo de Formação dos Estudantes. **Revista Brasileira de Educação Médica**, Rio de Janeiro, v. 39, n. 03, p.410-417, jul. 2015.

CAPÍTULO XIV

AVALIAÇÃO DO GRAU DE SATISFAÇÃO DE ALUNOS EM EVENTOS REMOTOS NA ÁREA DA ESTOMATOPATOLOGIA

DOI: 10.51859/amplla.csa511.1121-14

Híttalo Carlos Rodrigues de Almeida ¹
Rebeka Thiara Nascimento dos Santos ²
Gabriela Laiza Candido da Silva ³
Gerciane Ramos Bezerra ³
Maria Eduarda Arruda Lucena ³
Márcia Maria Fonseca da Silveira ⁴
Ana Paula Veras Sobral ⁵

¹ Doutorando em Clínicas Odontológicas com ênfase em EstomatoPatologia Oral e Maxilofacial. Programa de Pós-Graduação em Odontologia – UPE.

² Mestrando em Clínicas Odontológicas com ênfase em EstomatoPatologia Oral e Maxilofacial. Programa de Pós-Graduação em Odontologia – UPE.

³ Graduando do Curso de Bacharelado em Odontologia. Universidade de Pernambuco – UPE.

⁴ Professor Adjunto do Departamento de Estomatologia. Universidade de Pernambuco – UPE.

⁵ Professor Associado do Departamento de Patologia Bucal. Universidade de Pernambuco – UPE.

RESUMO

Introdução: O ensino durante a pandemia do COVID-19 foi muito afetado e a alternativa vista pela área educacional foi oferecer o ensino remoto. **Métodos:** Estudo transversal que avalia o grau de satisfação de participantes em eventos científicos na área da Estomatologia e Patologia Oral e Maxilofacial. Foram realizados três eventos remotos nos meses de julho, agosto e outubro de 2020 pela Liga Acadêmica de EstomatoPatologia da Universidade de Pernambuco (LAEP-UPE), durante a pandemia de COVID-19. Foi avaliado o grau de satisfação dos alunos, o conteúdo ministrado, bem como a facilidade, qualidade e eficiência da plataforma de transmissão do evento através da análise Likert de 0 a 5. **Resultados:** O nível de satisfação dos participantes foi considerado Muito Satisfeito em todos os eventos (91,4%; 94%; 86,2%); O conteúdo de cada evento foi considerado de alta satisfação em todos os eventos (95,3%; 95,2%; 96,6%); A plataforma utilizada obteve uma eficiência e facilidade de 73,3% e 61,1% e a qualidade de transmissão entre 73,8% e 76,2%. **Conclusão:** Os eventos remotos na área da EstomatoPatologia foram considerados satisfatórios em todos seus aspectos para seus participantes e devem ser realizados a fim de transmitir conhecimento e estimular o senso diagnóstico dos alunos.

Palavras-chave: Estomatologia. Patologia Oral. Satisfação. Eventos.

1. INTRODUÇÃO

A educação é um processo que exige comprometimento das duas principais partes envolvidas: o docente e o discente (MARTINS & ALMEIDA, 2020; CUNHA, 2020). A atuação de um depende da performance do outro. A pandemia da COVID-19 fez com que instituições de ensino do mundo inteiro adotassem o ensino remoto emergencial para dar continuidade ao ano letivo (ARRUDA, 2020; RONDINI, 2020).

De acordo com Hodges (2020), o ensino remoto emergencial difere da modalidade de Educação a Distância (EAD), pois a EAD conta com recursos e uma equipe multiprofissional preparada para ofertar os conteúdos e atividades pedagógicas, por meio de diferentes mídias em plataformas on-line. Assim, os professores se reinventam todos os dias para dar continuidade as atividades pedagógicas, inclusive os de ensino superior.

O curso de Bacharelado em Odontologia necessita de uma carga horária prática maior devido as atividades clínicas e laboratoriais que estimulam as técnicas, habilidades e raciocínio diagnóstico dos alunos. Sendo duas disciplinas base no currículo do Curso de Odontologia, a Patologia Oral e MaxiloFacial, ciência que estuda as doenças através das alterações celulares, e a Estomatologia, ramo que estuda as doenças, sob o aspecto clínico e seus tratamentos, e, por questões didáticas, vistas separadamente no âmbito acadêmico, mas na prática clínica, em alguns pontos, sua indissociabilidade é inevitável.

A satisfação do conhecimento explanado nos eventos científicos remotos deve ser avaliada a fim de transparecer o entendimento dos alunos quanto a assuntos de senso diagnóstico. A Liga Acadêmica de EstomatoPatologia da Universidade de Pernambuco (LAEP) no ano de 2020, se deparando com a Pandemia do COVID-19, proporcionou a alunos do curso de Bacharelado em Odontologia, eventos científicos na área da Estomatologia e Patologia Oral e MaxiloFacial.

Diante do exposto, esse trabalho teve como objetivo avaliar o grau de satisfação dos alunos do curso de Odontologia de várias instituições de ensino com relação a eventos científicos remotos na área da EstomatoPatologia.

2. METODOLOGIA

A LAEP é um projeto de extensão cadastrado juntamente a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) da Universidade de Pernambuco (UPE) e conta com a participação de 9 membros, esses sendo graduandos do curso de Bacharelado em Odontologia da Faculdade de Odontologia de Pernambuco do 5º ao 9º período, alunos de Pós-Graduação e professores externos, que passaram por um processo seletivo.

Após a seleção, a LAEP realiza dois encontros mensais, um chamado de Encontro Teórico e o outro prático, podendo ser Laboratorial ou Social. Entretanto, diante da Pandemia do NovoCoronavírus as etapas metodológicas da liga foram adaptadas para o modo remoto através de reuniões em plataformas digitais como o *Google Meet* e *Zoom*. A LAEP realizou postagens em sua rede social semanalmente sobre assuntos relacionados a Estomatologia e Patologia Oral afim de estimular a escrita dos alunos. Além disso eram feitos debates sobre os temas previamente a realização das postagens.

Além disso, foram realizados encontros científicos online com professores convidados de outras instituições de ensino e com inscrição online para todo o Brasil. Cada encontro teve um professor convidado que tinha ligação com a aula abordada (Tabela 1)

Tabela 1 – Encontros científicos realizados com os membros da LAEP em 2020

Data do Encontro	Aula Ministrada	Palestrantes
30/07/2020	Mesa Redonda: Desafios do diagnóstico oral – da clínica ao laboratório	Prof. Dr. Leorik Pereira da Silva Prof. Dr. George João Ferreira do Nascimento Profa. Dra. Cyntia Helena Pereira de Carvalho
27/08/2020	Sessão Diagnóstica Clínica: Discussão de Casos Clínicos	Prof. Dr. Elismauro Mendonça Prof. Dr. Marcelo Marcucci Profa. Dra. Márcia Silveira
29/10/2020	Sessão Diagnóstica de Imagens: Discussão de Casos Clínicos	Profa. Dra. Maria Alves Garcia Profa. Dra. Flávia Perez

Fonte: Autoria Própria

Após cada evento, os participantes preenchem um questionário do *Google Forms* sobre o grau de satisfação do evento remoto ministrado. As perguntas estavam relacionadas: 1- Qual o seu grau de satisfação em relação ao evento?; 2- Qual seu grau de satisfação em relação ao conteúdo ministrado?; 3- Qual o seu grau de satisfação quanto a eficiência e facilidade de uso da plataforma Sympla?; 4- Qual o seu grau de satisfação em relação a qualidade de transmissão do evento?. Todas as respostas eram realizadas de acordo com o método de análise de Likert de 0 a 5, onde 5 significa “Muito Satisfeito”; 4 “Satisfeito”, 3 “Neutra”, 2 “Insatisfeito” e 1 “Muito Insatisfeito”.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O primeiro evento a ser realizado foi a “Mesa Redonda: Desafios no diagnóstico oral: da clínica ao laboratório” realizada no dia 30 de Julho de 2020 das 19h às 22h com participação do Prof. Dr. Leorik Pereira- Universidade Federal do Amazonas; Prof. Dr. George Nascimento- Universidade Federal de Campina Grande; Profa. Dra. Cyntia- Universidade Federal de Campina Grande mediada pela tutora da liga (Profa. Dra. Ana Paula Veras Sobral).

O evento foi online, promovido pela Liga de EstomatoPatologia da FOP/UPE (LAEP – FOP), em conjunto com a Liga Acadêmica de Diagnóstico Oral (LADO) da UFCG, divulgado pelas redes sociais. A inscrição do aluno era realizada pela plataforma Sympla e transmitido ao público-alvo pelo aplicativo de reuniões Zoom. O evento obteve 340 inscritos e iniciou pontualmente às 19h pela aluna de Mestrado Rebeka Thiara com a apresentação do evento e orientações iniciais, passando a palavra para tutora da liga que apresentou os palestrantes e deu início ao evento.

Na avaliação de satisfação foram consideradas 149 respostas válidas. Em relação à satisfação do evento, 91,4% dos participantes se apresentaram como “Muito satisfeito”, 7,3% como “Satisfeito” e 1,3% como neutro. Em uma análise geral o evento obteve 100% de aprovação por parte dos participantes (Gráfico 1).

Gráfico 1 – Análise Likert de 0 a 5 sobre a de satisfação do evento

Qual o seu grau de satisfação em relação ao evento?

151 respostas

Fonte: Autores

Os participantes avaliaram o conteúdo de forma positiva. 95,3% indicaram alta satisfação com a abordagem conteudista e 4,7% se colocaram como satisfeitos com a abordagem conteudista. Logo 100% dos participantes aprovaram o conteúdo ministrado no evento (Gráfico 2).

Gráfico 2 – Análise Likert de 0 a 5 sobre o conteúdo apresentado no evento

Qual o seu grau de satisfação em relação ao conteúdo ministrado no evento?

149 respostas

Fonte: Autores

Realizamos uma avaliação quanto ao uso da plataforma de inscrição (Sympla). A plataforma foi bem avaliada por 71,2% dos participantes (somando as avaliações 4 e 5), 12,8% avaliaram a plataforma de forma Neutra e 6,1% (somando as avaliações de 1 e 2) de maneira negativa (Gráfico 3).

Gráfico 3 – Avaliação da plataforma Sympla para inscrição dos participantes no evento

Qual o seu grau de satisfação quanto a eficiência e facilidade de uso da plataforma Sympla?

149 respostas

Fonte: Autores

Quanto à avaliação da qualidade da transmissão na plataforma Zoom, de maneira geral, não houve nenhuma votação negativa. Todas ficaram na escala de Neutro (3) a Muito satisfeito (5) – Gráfico 4.

Gráfico 4 – Avaliação da qualidade de transmissão do evento na plataforma Zoom.

Qual o seu grau de satisfação em relação a qualidade de transmissão do evento?

149 respostas

Fonte: Autores

Com a grande participação de estudantes nos eventos, seguimos o nosso calendário com o próximo evento em agosto. No dia 27 de Agosto de 2020 das 19h às 22h foi realizado a “Sessão Diagnóstica: Discussão de Casos Clínicos” com participação do Prof. Dr. Elismauro Francisco de Mendonça da Universidade Federal de Goiás e do Prof. Dr. Marcelo Marcucci da Universidade de Mogi das Cruzes e mediada pela Profa. Dra. Márcia Silveira da Universidade de Pernambuco. Antecipadamente, o Prof.

Elismauro e Prof. Marcelo trocaram entre si um caso clínico com informações básicas e uma imagem para cada um debater a possibilidade de diagnóstico.

A comissão organizadora, internamente, produziu um calendário de atividades para distribuir as funções de cada membro. Ao final, foi aberta oportunidade para os participantes debaterem e tirarem dúvidas acerca dos assuntos explanados. Mediante os questionamentos e comentários realizados no chat do bate papo foram realizadas avaliações do evento.

O evento obteve 200 inscritos e iniciou pontualmente às 19h pela aluna de Mestrado Rebecka Thiara com a apresentação do evento. O ligante Luiz Pedro seguiu com as apresentações dos palestrantes e fez os avisos necessários, passando a palavra para a tutora da Liga (Profa. Dra. Ana Paula Veras Sobral) dar as boas-vindas aos professores.

Na avaliação de satisfação foram consideradas 84 respostas válidas. Em relação à satisfação do evento, 94% dos participantes se apresentaram como “Muito satisfeito”, 4,8% como “Satisfeito” e 1,2% como neutro. Em uma análise geral o evento obteve 100% de aprovação por parte dos participantes (Gráfico 5).

Gráfico 5 – Análise Likert de 0 a 5 sobre a de satisfação do evento

Qual o seu grau de satisfação em relação ao evento?
84 respostas

Fonte: Autores

Os participantes avaliaram o conteúdo de forma positiva. 95,2% indicaram alta satisfação com a abordagem conteudista e 4,8% se colocaram como satisfeitos com a

abordagem conteudista. Logo 100% dos participantes aprovaram o conteúdo ministrado no evento (Gráfico 6).

Gráfico 6 – Análise Likert de 0 a 5 sobre o conteúdo apresentado no evento

Qual o seu grau de satisfação em relação ao conteúdo ministrado no evento?

84 respostas

Fontes: Autores

Realizamos uma avaliação quanto ao uso da plataforma de inscrição (Sympla). A plataforma foi bem avaliada por 90,5% dos participantes (somando as avaliações 4 e 5), 8,3% avaliaram a plataforma de forma Neutra e 1,2% de maneira negativa (Gráfico 7).

Gráfico 7 – Avaliação da plataforma Sympla para inscrição dos participantes no evento

Qual o seu grau de satisfação quanto a eficiência e facilidade de uso da plataforma Sympla?

84 respostas

Fonte: Autores

Quanto à avaliação da qualidade da transmissão na plataforma Zoom, de maneira geral, apenas 2,4% avaliaram negativamente a transmissão do evento. Avaliaram positivamente a transmissão do evento 96,4% e neutro 1,2% – Gráfico 8.

Gráfico 8 – Avaliação da qualidade de transmissão do evento na plataforma Zoom.

Qual o seu grau de satisfação em relação a qualidade de transmissão do evento?

84 respostas

Fonte: Autores

Seguimos a programação com o último evento “Sessão Diagnóstica de Imagens: Discussão de Casos Clínicos” que foi realizado no dia 29 de Outubro de 2020 das 19h às 22h com participação da Profa. Dra. Maria Alves Garcia da Universidade Federal de Goiás; Profa. Dra. Flávia Perez da Universidade Federal de Pernambuco e mediada pela Profa. Dra. Márcia Silveira da Universidade de Pernambuco. Antecipadamente, as professoras Maria e Flávia trocaram entre si um caso clínico com informações básicas e uma imagem para cada um debater a possibilidade de diagnóstico. O evento foi online, promovido pela Liga de EstomatoPatologia da FOP/UPE (LAEP – FOP), divulgado pelas redes sociais. A inscrição do aluno era realizada pela plataforma Sympla e transmitido ao público-alvo pelo aplicativo de reuniões Zoom.

Na avaliação de satisfação foram consideradas 29 respostas válidas. Em relação à satisfação do evento, 86,2% dos participantes se apresentaram como “Muito satisfeito” e 13,8% como “Satisfeito”. Em uma análise geral o evento obteve 100% de aprovação por parte dos participantes (Gráfico 9).

Gráfico 9 – Análise Likert de 0 a 5 sobre a de satisfação do evento

Qual o seu grau de satisfação em relação ao evento?

29 respostas

Fonte: Autores

Os participantes avaliaram o conteúdo de forma positiva. 96,6% indicaram alta satisfação com a abordagem conteudista e 3,4% se colocaram como satisfeitos com a abordagem conteudista. Logo 100% dos participantes aprovaram o conteúdo ministrado no evento (Gráfico 10).

Gráfico 10 – Análise Likert de 0 a 5 sobre o conteúdo apresentado no evento

Qual o seu grau de satisfação em relação ao conteúdo ministrado no evento?

29 respostas

Fonte: Autores

Realizamos uma avaliação quanto ao uso da plataforma de inscrição (Sympla). A plataforma foi avaliada de satisfatória com 86,2% dos participantes (somando as

avaliações 4 e 5), 10,3% avaliaram a plataforma de forma Neutra e 3,4% de maneira negativa (Gráfico 11).

Gráfico 11 – Avaliação da plataforma Sympla para inscrição dos participantes no evento

Qual o seu grau de satisfação quanto a eficiência e facilidade de uso da plataforma Sympla?

29 respostas

Fonte: Autores

Quanto à avaliação da qualidade da transmissão na plataforma Zoom, de maneira geral, apenas 3,4% avaliaram negativamente a transmissão do evento. Avaliaram positivamente a transmissão do evento 96,6% - Gráfico 12.

Gráfico 12 – Avaliação da qualidade de transmissão do evento na plataforma Zoom.

Qual o seu grau de satisfação em relação a qualidade de transmissão do evento?

29 respostas

Fonte: Autores

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O grau de satisfação dos alunos quanto aos eventos científicos ministrados foi satisfatório, bem como o conteúdo, qualidade e eficiência de transmissão do evento. O ensino remoto apresenta cada dia mais desafios que necessitam de engajamento por parte dos docentes da área odontológica para estimular o senso crítico e diagnóstico dos alunos.

AGRADECIMENTOS

A Pró-Reitoria de extensão e Cultura (PROEC) e Programa de Fortalecimento Acadêmico (PFA) da Universidade de Pernambuco (UPE) pelo apoio ao Projeto Liga Acadêmica de EstomatoPatologia (LAEP).

REFERÊNCIAS

- ARRUDA, E.P. Educação remota emergencial: elementos para políticas públicas na educação brasileira em tempos de Covid-19. Rede-Revista de Educação a Distância, v. 7, n. 1, p. 257-275, 2020.
- CUNHA, L.F.F; SOUZA, A.S.; SILVA, A.P. O ensino remoto no brasil em tempos de pandemia: diálogos acerca da qualidade e do direito e acesso à educação. Revista com censo: estudos educacionais do distrito federal, v. 7, n. 3, p. 27-37, 2020.
- HODGES, C. (et al). The Difference Between Emergency Remote Teaching and Online Learning. EDUCAUSE Review, 2020. Disponível em: <https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning#fn3>. Acesso em: 15 de maio 2021.
- MARTINS, V.; ALMEIDA, J. Educação em tempos de pandemia no brasil: saberes fazeres escolares em exposição nas redes. Revista Docência e Cibercultura, v. 4, n. 2, p. 215-224, 2020.
- RONDINI, C.A., PEDRO, K.M., DUARTE, C.S. Pandemia da covid-19 e o ensino remoto emergencial: mudanças na prática pedagógica. v. 10, n. 1, p. 1-17, 2020.

CAPÍTULO XV

A UTILIZAÇÃO DA OZONIOTERAPIA APLICADA PARA FINS ESTÉTICOS SAUDÁVEIS

DOI: 10.51859/amplla.csa511.1121-15

Glenda Vaz Oliveira Vilela ¹

Gabriel Brom Vilela ²

Eric Mateus Nascimento de Paula ^{2,3}

¹ Biomédica da Clínica Ozonize, Mineiros/GO.

² Docente da Universidade Estadual de Goiás – UEG, Unidade Mineiros.

³ Docente do Centro Universitário de Mineiros – UNIFIMES.

RESUMO

O ozônio tem sido amplamente estudado na medicina e atualmente aplicado em diferentes concentrações possíveis em várias disciplinas, como odontologia, dermatologia, doenças infecciosas agudas e crônicas e pneumologia. A ozonioterapia consiste no uso médico de uma mistura de gases de O₃/O₂, obtida a partir de oxigênio de grau médico usando um dispositivo gerador de ozônio. Seus efeitos anti-inflamatórios, reológicos, tróficos e moduladores do sistema imunológico o tornam uma ferramenta terapêutica muito eficaz e engenhoso para diversas aplicações, inclusive para fins estéticos. O objetivo geral desse trabalho é abordar os principais aspectos do uso da ozonioterapia aplicado a estética. Para tanto, foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica, do tipo explicativa, de característica qualitativa, por meio do levantamento de informações sobre o assunto, nas principais bases de dados, tais como Pubmed, Medline, NCBI, Períodos Capes, Scielo e Google Acadêmico. A ozonioterapia tem sido indicada para tratamento de doenças comuns da pele, como acne, psoríase, envelhecimento precoce, celulite, estrias, vasinhos, feridas e pele danificada, rosácea teleangiectásica, irrigação capilar, rugas, alergia, e gordura localizada. O uso das vias tópica, subcutânea, intra-articular e muscular deflagram efeitos predominantemente locais e regionais, enquanto a venosas e retais predominantemente sistêmicas. Desta forma, percebeu-se que a terapia com ozônio é uma opção para as pessoas que se preocupam com a aparência do corpo. Sendo possível oferecer à essas pessoas uma técnica segura, natural e minimamente invasiva, que além de melhorar a estética corporal, traz benefícios sistêmicos para a saúde.

Palavras-chave: Aparência corporal. Biomedicina estética. Medicina estética. Ozônio. O₃/O₂.

1. INTRODUÇÃO

A aparência do corpo é caracterizada como a forma que um indivíduo percebe o seu corpo ou o imagina, podendo ser essa percepção de forma positiva e/ou negativa. Em relação ao conceito positivo, esse se baseia no princípio da autopercepção corporal e a satisfação que uma pessoa tem de si própria. Nos últimos anos, a ascensão cultural, tecnológica e socioeconômica relacionada a imagem corporal, alcançou um alto nível de destaque. Índices de crescimento nunca registrados anteriormente, que indiretamente influenciam no modo de pensar e agir das mulheres na busca por novas técnicas de tratamentos estéticos (FERREIRA et al., 2016).

Seria possível então, a utilização de uma técnica, que melhore a aparência corporal, menos invasiva, mais naturais e que trouxessem benefícios reais e sistêmicos? O que sabemos é que existem diversas técnicas no mundo da ciência e da estética. Contudo, muitas delas não trazem as benesses desejadas ou baseiam-se na utilização de muitos compostos, substâncias químicas e medicamentos. E, no cenário atual, muitas pessoas têm buscado mudar suas ações e percepções de mundo, de modo a evitar o uso excessivo de fármacos, o que pode se extrapolado para a estética.

Mesmo as mais modernas preparações farmacológicas, utilizadas no tratamento de dermatoses, apresentam efeitos adversos indesejáveis, principalmente quando usado por muito tempo ou irracionalmente. Por esta razão, a cada vez mais torna-se mais interessante aventurar-se em formas de tratamento menos prejudiciais e mais eficazes. A terapia com ozônio é um desses métodos. Seus efeitos anti-inflamatórios, reológicos, tróficos e moduladores do sistema imunológico o tornam uma ferramenta terapêutica muito eficaz e engenhoso nesta especialidade (SCHWARTZ, 2017). Devido às suas propriedades únicas, o ozônio é amplamente utilizado na dermatologia. A maioria das clínicas que oferecem terapia estética com ozônio pode tratar doenças comuns da pele, como acne, psoríase e envelhecimento precoce. Esse procedimento tem excelentes resultados no tratamento de celulite, estrias, vasinhos, feridas e pele danificada (ZENG e LU, 2018).

Desta forma, ao compreender que existe uma recente técnica, de característica natural, e que essa pode ser uma alternativa para, além do uso medicinal, ser usada com fins estéticos, o objetivo geral desse trabalho é abordar os principais aspectos do uso da

ozonioterapia aplicado a estética. Adicionalmente, os objetivos específicos incluem: compreender os conceitos e as definições da ozonioterapia; elucidar suas aplicações mais comuns; discorrer sobre o processo do estresse oxidativo que envolve a terapia com ozônio; e dissertar sobre as principais abordagens no uso da estética.

Torna-se extremamente necessário conhecer os benefícios dessa técnica com outras finalidades, além do seu uso terapêutico. E ao pensar nas possibilidades mais palpáveis na dermatologia e na cosmetologia, podemos expandir esses conhecimentos para a estética, bem estender seus benefícios. O uso criterioso do ozônio (O₃) parece providencial porque antes de tudo elimina os patógenos e depois, ao liberar oxigênio (O₂), ativa a proliferação de fibroblastos, daí a construção da matriz intercelular com consequente proliferação de queratinoblastos e cicatrização sucessiva (TRAVAGLI et al., 2010). O que pode induzir uma melhora na pele ou em outra parte do corpo, que muitas vezes é alvo das pessoas na melhora na forma como as pessoas se veem.

Para tanto, foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica, do tipo explicativa, de característica qualitativa, por meio do levantamento de informações em material teórico sobre o assunto central desse trabalho. Sendo assim, foram consultadas as principais bases de dados, tais como Pubmed, Medline, NCBI, Períodos Capes, Scielo e Google Acadêmico. Para as buscas, foram utilizados, em três idiomas (português, inglês e espanhol), os seguintes descritores: ozônio; ozonioterapia; estética; medicina estética. Em que os critérios de inclusão envolveram o uso de artigos científicos ou livros, atualizados (com no máximo 10 anos de publicação) e com abordagem científica criteriosa.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1. CONCEITOS, DEFINIÇÕES E APLICAÇÕES DA OZONIOTERAPIA

Ozônio (O₃) é uma forma alotrópica triatômica do oxigênio que é muito reativa (menos estável) e mais solúvel (10 vezes) em água e plasma do que a forma alótropo diatômica (O₂). Sua potência antioxidante é a terceira depois do flúor e do persulfato e é superior ao O₂ (BOCCI, 2011). O ozônio tem sido amplamente estudado na medicina e atualmente aplicado em diferentes concentrações possíveis em várias disciplinas, como

odontologia, dermatologia, doenças infecciosas agudas e crônicas e pneumologia (BOCCI, 2006; ELVIS e EKTA, 2011).

A ozonioterapia consiste no uso médico de uma mistura de gases de O_3/O_2 , obtida a partir de oxigênio de grau médico usando um dispositivo gerador de ozônio e que deve ser administrada *in situ* devido à sua meia-vida curta (a 20°C a concentração de O_3 é dividido pela metade em 40 minutos, a 30°C em 25 minutos) (BOCCI, 2011). As concentrações clínicas típicas de O_3 variam de 10 a 60 $\mu g/mL$ (μg de O_3/mL de O_2) de uma mistura de O_3 (0,5–0,05%) e O_2 (95–99,5%) (SCHWARTZ-TAPIA et al., 2015). Portanto, embora mais de 95% da mistura de gases seja sempre oxigênio, pequenas variações no conteúdo de O_3 alteram seus efeitos potenciais.

Uma concentração mais alta de ozônio (máximo de 0,02 $\mu g/mL$) é benéfica, evitando que a luz ultravioleta prejudicial alcance a superfície da Terra (ANDRADY et al., 2009). No entanto, a exposição por inalação ao ozônio ao nível do solo prolongado danifica o sistema respiratório e os órgãos extrapulmonares. Da mesma forma, em humanos, o ozônio pode ser perigoso ou benéfico, dependendo da via e órgão / tecido de administração e da concentração de exposição. Está ficando claro como o sistema respiratório - ao passar por um estresse oxidativo crônico - pode liberar lenta, mas continuamente, muitos compostos tóxicos que podem entrar na circulação e causar sérios danos (BOCCI, 2006).

Além disso, a potente capacidade antioxidante do sangue exposto a uma pequena e precisamente calculada dose de ozônio por apenas alguns minutos pode modular o sistema antioxidante endógeno e auxiliar no controle de diferentes condições patológicas (GALIE et al., 2019). Para fins médicos, o ozônio pode ser administrado por via parenteral com efeitos colaterais mínimos, com a única exceção de não ser injetado por via intravenosa como um gás devido ao risco de embolia (BOCCI, 2006).

Como um poderoso oxidante, quando o ozônio entra em contato com o sangue ou outros fluidos corporais, ele libera espécies reativas de oxigênio (ROS) e produtos de oxidação lipídica (LOPs), ambos responsáveis pelos resultados biológicos (BOCCI, 2006). Embora o mecanismo exato de ação do ozônio esteja longe de ser totalmente elucidado, ele foi caracterizado por ter diferentes propriedades biológicas. Por exemplo, foi demonstrado que facilita a cicatrização de feridas, promovendo a liberação de oxigênio, fator de crescimento derivado de plaquetas e fator de crescimento transformador β

(VALACCHI et al., 2005). O ozônio também é considerado capaz de ativar o sistema imunológico aumentando a produção de interferon e interleucina-2 e diminuindo os níveis do fator de necrose tumoral (TNF) (ELVIS e EKTA, 2011).

Além disso, o ozônio estimula a taxa de glicólise dos glóbulos vermelhos, levando a um aumento da quantidade de oxigênio liberado para os tecidos, e o ciclo de Krebs, resultando em um aumento na produção de ATP. Também reduz significativamente a concentração de NADH e ajuda a oxidar o citocromo C, estimulando o metabolismo do oxigênio (ELVIS e EKTA, 2011), além de apresentar ação antiinflamatória e possível citoprotetora interagindo com os agentes de transcrição NF-KB e Nrf2 (MARTÍNEZ-SÁNCHEZ et al., 2020; VALDENASSI et al., 2020).

2.2. MODULAÇÃO DO ESTRESSE OXIDATIVO PELA OZONIOTERAPIA

As aplicações locais de ozônio podem induzir efeitos diretos e efeitos de modulação em nível local. No entanto, quando a ozonioterapia é aplicada com intenção sistêmica (principalmente por auto-hemoterapia e por insuflação retal), o ozônio não entra na circulação sanguínea e não é capaz de atingir nenhum tecido-alvo específico. O ozônio, que não é removido pelos antioxidantes do meio, interage com os ácidos graxos insaturados das membranas celulares na mucosa intestinal (administração retal) ou células do sangue (na mistura extracorpórea de sangue-ozônio, durante a auto-hemoterapia) gerando peróxido de ozônio, que forma H_2O_2 e 4-hidroxinonenal (4-HNE), que é um dos aldeídos mais relevantes. Essas substâncias agem como segundos mensageiros e induzem uma resposta adaptativa adicional do corpo (com potencial sobre a regulação dos sistemas antioxidantes) em uma relação dose-resposta hormonal (BOCCI et al., 2009; BOCCI et al., 2011; VIEBAHN-HANSLER et al., 2012).

Ou seja, o mecanismo de ação da terapia com ozônio sistêmico é um efeito “indireto”. O ozônio não segue os princípios padrão da farmacologia: absorção, distribuição, metabolismo e excreção. O ozônio atua apenas como um modulador, ao induzir mensageiros secundários, aumentando as respostas adaptativas subsequentes. Após essa reação rápida (alguns segundos), o ozônio desaparece. A concentração e os efeitos do ozônio não seguem uma relação linear: concentrações muito baixas podem não ter efeito e concentrações muito altas podem levar a efeitos contrários aos produzidos por concentrações baixas ou médias (RE et al., 2012). Mediadores como o 4-

HNE e o H_2O_2 estão entre os mensageiros secundários mais relevantes induzidos pelo ozônio durante a toxicidade pulmonar após a inalação das vias aéreas (HAMILTON et al., 1998; PRYOR et al., 1995), mas também, no curso da indução de efeitos benéficos durante a aplicação médica (MILKOVIC et al., 2015; PECORELLI et al., 2013).

Além disso, o H_2O_2 pode entrar no citoplasma de células mononucleares e modular o fator nuclear kappa B (NF- κ B). O H_2O_2 surge não como um indutor de NF- κ B, mas como um agente capaz de modular a ativação da via de NF- κ B por outros agentes. Essa modulação é genérica no nível de toda a via, mas específica no nível de um único gene. Portanto, H_2O_2 é um regulador de ajuste fino de processos dependentes de NF- κ B, como exemplificado por sua regulação dupla da inflamação (OLIVEIRA-MARQUES et al., 2009). Muito provavelmente, a dose terapêutica de O_3 bloqueia o sinal de NF- κ B, reduzindo a inflamação (HUTH et al., 2007). Em contraste, uma alta dose de O_3 promove a inflamação pela ativação da via do NF- κ B (KAFOURY et al., 2007). Além disso, H_2O_2 pode atuar como promotor da via Nrf2. O importante papel da indução de Nrf2 pelo ozônio para potencializar os sistemas antioxidantes foi descrito recentemente (WANG et al., 2018; GALIE et al., 2018; SINISCALCO et al., 2018).

Existe um amplo consenso sobre a relevância da indução de moléculas protetoras durante o estresse oxidativo pequeno, mas repetido (BOCCI et al., 2011; NAKASONE et al., 2016). O aldeído mais relevante produzido pela reação do O_3 é o 4-HNE, que permanece mais estável que ROS (BOCCI et al., 2011; PECORELLI et al., 2013). O 4-HNE é conhecido por ser bastante reativo; ele participa de vários processos fisiológicos como um mensageiro secundário não clássico e prontamente forma modificações covalentes de vários alvos (AYALA et al., 2014).

O 4-HNE é rapidamente degradado pelas álcool desidrogenases, aldeído desidrogenase e pela glutathione-S-transferase. O 4-HNE formará adutos com os grupos tiol (-SH) e amino de Cys34 presentes no domínio I da albumina. Dessa forma, o 4-HNE pode enviar um sinal de estresse oxidativo transitório para diferentes tecidos do corpo e seus efeitos dependem da concentração e da origem da célula ou tecido. Esta via pode ativar a síntese de várias substâncias, como: γ -glutamil transferase, γ -glutamil transpeptidase, HSP-70, HO-1 e enzimas antioxidantes, como SOD, GSH-Px, catalase e glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PDH, uma enzima doadora de elétrons crítica durante a eritropoiese na medula óssea) e a via do Nrf2. Além disso, esses efeitos

pluripotentes do 4-HNE podem ser explicados por suas interações dependentes da concentração com as redes de citocinas e sistemas antioxidantes celulares complexos, também mostrando especificidades celulares e teciduais (MILKOVIC et al., 2015; BREITZIG et al., 2016).

Como acontece com as ações potenciais do ozônio, as ações potenciais do 4-HNE são muito diferentes em concentrações mais baixas (regulação da proliferação e diferenciação e aumento de Nrf2 e sistemas antioxidantes) do que em altas concentrações (indução de estresse oxidativo, apoptose e necrose). Resultados experimentais demonstraram que o ozônio *ex vivo* ou *in vivo* pode ativar o Nrf2 (GALIE et al., 2019; RE et al., 2014).

Este mecanismo pode explicar o alvo genômico do ozônio, que induz a resposta proteômica (síntese de proteínas, como enzimas antioxidantes: por exemplo, HO-1, SOD, CAT), fornecendo uma proteção muito melhor contra os efeitos danosos totais do corpo causados pelos radicais livres. Além disso, um recente artigo demonstra o papel do ozônio na caseína quinase 2 (CK2) (outro regulador da atividade do Nrf2 por meio de sua fosforilação) em pacientes com esclerose múltipla [38]. No entanto, os efeitos do ozônio também envolvem a modulação (inibição) da via do NF- κ B. Esta via ativa a liberação de citocinas pró-inflamatórias, como: TNF α , INF γ , IL1 β , IL6, IL8, bem como genes pró-inflamatórios, como ciclooxigenase-2 (COX-2) e óxido nítrico sintase induzível (iNOS) (AHMED et al., 2017).

Como resultado, a dose administrada na terapia com ozônio e sua resposta hormonal têm um papel crucial para controlar o equilíbrio das respostas inflamatória e pró-inflamatória. As regulações de Nrf2 e NF- κ B são coordenadas para manter a homeostase redox em células saudáveis. No entanto, durante condições patológicas, essa regulação é perturbada, oferecendo uma oportunidade para intervenção terapêutica (AHMED et al., 2017; GANESH YERRA et al., 2013). A regulação da inflamação pela sinalização de NF- κ B, bem como as vias de Nrf2 separadamente, está amplamente documentada. Uma vez que ambas as principais vias de sinalização modulam a inflamação, elas podem se cruzar para provocar respostas inflamatórias coordenadas (MOHAN e GUPTA, 2018; WARDYN et al., 2015).

2.3. OZONIOTERAPIA APLICA À ESTÉTICA

A ozonioterapia possui ampla atuação em cirurgia, dermatologia, urologia, medicina interna. Seria estranho se o ozônio não fosse colocado em uso na cosmetologia ou na estética - um dos campos mais progressivos de sua aplicação. Em relação aos métodos de tratamento com ozônio, uma atenção particular é dada à melhoria da microcirculação, oxigenação, suprimento de energia das células, trofismo adequado e proteção da pele. Muitos problemas estéticos (acne, rosácea teleangiectásica, irrigação capilar, rugas, alergia, celulite, gordura) refletem o estado interno do organismo, portanto devem ser tratados não só por fora, mas também por dentro. E esta tarefa pode ser realizada com sucesso pelo ozônio produzindo um efeito desintoxicante, antimicrobiano, antiviral e aumentando a imunidade do organismo (MEDOZONS, 2020).

A ozonioterapia é, portanto, uma técnica que utiliza ozônio para tratamentos de diversas disfunções estéticas e terapêuticas. O procedimento é minimamente invasivo (ou não, quando usado em bags) que apresenta bons resultados na melhora da celulite, gordura localizada, flacidez, estrias, rugas, alopecia, hiperpigmentações, acne etc. Tem ação localizada e é realizada com o uso de agulhas muito curtas, injetando-se o gás em diferentes profundidades da pele, dependendo das necessidades do paciente e do efeito desejado (FARINA, 2019).

A terapia com ozônio faz muito mais do que apenas promover a saúde da pele. Ele purifica o sangue e o sistema linfático, aumenta a absorção de minerais e aumenta a imunidade. Devido ao seu forte efeito antibacteriano, ajuda a eliminar a acne e previne infecções. Em estudos de laboratório, ele regenerou com sucesso nervos faciais em ratos e ajudou a tratar hérnias de disco, eliminando a necessidade de cirurgia (OZBAY et al., 2017). Em dermatologia, praticamente todos os métodos existentes de terapia de ozônio podem ser aplicados, sendo fundamentais os procedimentos de ação local, que podem ser combinadas com procedimentos de tratamento sistêmico (SCHWARTZ, 2017).

As vias de aplicação podem deflagrar efeitos locais, regionais e/ou sistêmicos. O uso das vias tópica, subcutânea, intra-articular e muscular deflagram efeitos predominantemente locais e regionais, enquanto a venosa e retal predominam sistêmicas. As respostas terapêuticas da ozonioterapia nas

infecções transcendem possíveis respostas exclusivamente local ou regional. A via tópica pode ser utilizada com a exposição simples da área-alvo untada ou umedecida com água, solução fisiológica ou óleo pré-ozonizados ou não, com ou não acoplamento a sistemas de sucção (FARINA, 2019).

A pele é o maior órgão do corpo humano. Portanto, ele é exposto a germes, poluição e radicais livres em uma base constante. Além disso, é vulnerável a certos fatores, como tabagismo, deficiência de nutrientes e desequilíbrios hormonais. Em comparação com os tratamentos de pele tradicionais, a terapia estética de ozônio visa a causa do problema, não apenas os sintomas. Ele destrói bactérias e fungos que causam acne, melhorando o fluxo de sangue e oxigênio para os tecidos. O ozônio ativa o sistema imunológico do seu corpo e aumenta os níveis de antioxidantes, o que pode ajudar a retardar o envelhecimento. É particularmente eficaz no tratamento de úlceras, feridas, rosácea e infecções venéreas (BITKINA et al., 2010; TRAVAGLI et al., 2010).

Esta terapia pode rejuvenescer a pele e tirar anos do seu rosto. A longo prazo, pode reverter os sinais de envelhecimento e melhorar a liberação de oxigênio pelos glóbulos vermelhos. Isso leva a uma pele com aparência mais jovem, regeneração celular e cicatrização de tecidos. O ozônio também combate a inflamação e reduz o inchaço, tornando-o ideal para quem sofre de dores nas articulações, edema e doenças inflamatórias da pele.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base no levantamento bibliográfico, aqui realizado, é possível perceber que a ozonioterapia é um tratamento médico natural que visa saturar oxigênio no corpo através da mistura $O_2 + O_3$, que tem muitos efeitos benéficos. A terapia com ozônio é um método terapêutico eficaz que tem obtido desenvolvimento e disseminação. Novas formas de aplicação foram desenvolvidas, introduziu novos procedimentos, geradores modernos e precisos, bem como novos mecanismos de ação do ozônio foram descobertos. Esses benefícios se estendem para a estética.

As investigações experimentais, as publicações científicas consultadas, as observações clínicas aqui relatadas e a experiência acumulada servem para embasara utilização da ozonioterapia tanto na dermatologia e medicina estética. Sendo uma

alternativa para tratamentos de acne, psoríase, envelhecimento precoce, celulite, estrias, vasinhos, feridas e pele danificada, rosácea teleangiectásica, irrigação capilar, rugas, alergia, e gordura localizada.

Desta forma, percebe-se que a terapia com ozônio é uma opção para as pessoas que se preocupam com a aparência do corpo, que percebem o seu corpo de forma positiva, no princípio da autopercepção corporal e a satisfação que uma pessoa tem de si própria. Sendo possível oferecer à essas pessoas uma técnica segura, natural e minimamente invasiva, que além de melhorar a estética corporal, traz benefícios sistêmicos para a saúde.

REFERÊNCIAS

- AHMED, S. M.; LUO, L.; NAMANI, A.; WANG, X. J.; TANG, X. Nrf2 signaling pathway: Pivotal roles in inflammation. *Biochim. Biophys. Acta Mol. Basis Dis.* 2017;1863:585–597. doi: 10.1016/j.bbadis.2016.11.005.
- ANDRADY, A.; AUCAMP, P. J.; BAIS, A.; BALLARE, C. L.; BJORN, L. O.; BORNMAN, J. F.; CALDWELL, M.; CULLEN, A. P.; ERICKSON, D. J.; DE GRUIJL, F. R., et al. Environmental effects of ozone depletion and its interactions with climate change: Progress report, 2008. *Photochem. Photobiol. Sci.* 2009;8:13–22.
- AYALA, A.; MUNOZ, M. F.; ARGUELLES, S. Lipid peroxidation: Production, metabolism, and signaling mechanisms of malondialdehyde and 4-hydroxy-2-nonenal. *Oxid. Med. Cell Longev.* 2014;2014:360438. doi: 10.1155/2014/360438.
- BITKINA, O. A.; KOPYTOVA, T. V.; KONTORSHCHIKOVA, K. N.; BAVRINA, A. P. [Oxidative stress level in patients with rosacea and a rationale for the therapeutic use of an ozone-oxygen mixture]. *Klin Lab Diagn.* 2010 Apr;(4):13-6. Russian. PMID: 20524341.
- BOCCI, V. Is it true that ozone is always toxic? The end of a dogma. *Toxicol. Appl. Pharmacol.* 2006;216:493–504. doi: 10.1016/j.taap.2006.06.009.
- BOCCI, V. **Ozone A New Medical Drug.** 2nd ed. Springer Publishing; Dordrecht, The Netherlands: 2011.
- BOCCI, V.; BORRELLI, E.; TRAVAGLI, V.; ZANARDI, I. The ozone paradox: Ozone is a strong oxidant as well as a medical drug. *Med. Res. Rev.* 2009;29:646–682. doi: 10.1002/med.20150.
- BOCCI, V. A.; ZANARDI, I.; TRAVAGLI, V. Ozone acting on human blood yields a hormetic dose-response relationship. *J. Transl. Med.* 2011;9:66. doi: 10.1186/1479-5876-9-66.

- BOCCI, V. A. Scientific and medical aspects of ozone therapy. **State Art Arch Med Res.** (2006) 37:425–35. 10.1016/j.arcmed.2005.08.006
- BREITZIG, M.; BHIMINENI, C.; LOCKEY, R.; KOLLIPUTI, N. 4-Hydroxy-2-nonenal: A critical target in oxidative stress? **Am. J. Physiol. Cell Physiol.** 2016;311:C537–C543. doi: 10.1152/ajpcell.00101.2016.
- DELGADO-ROCHE, L.; RIERA-ROMO, M.; MESTA, F.; HERNANDEZ-MATOS, Y.; BARRIOS, J. M.; MARTINEZ-SANCHEZ, G.; AL-DALAIEN, S. M. Medical ozone promotes Nrf2 phosphorylation reducing oxidative stress and pro-inflammatory cytokines in multiple sclerosis patients. **Eur. J. Pharmacol.** 2017;811:148–154. doi: 10.1016/j.ejphar.2017.06.017.
- ELVIS, A. M.; EKTA J. S. Ozone therapy: a clinical review. **J Nat Sci Biol Med.** (2011) 2:66–70. 10.4103/0976-9668.82319
- FARINA, T. **Ozonioterapia aplicado a estética - online.** Cursos em estética, 2019.
- FERREIRA, J. B.; LEMOS, L. M. A.; SILVA, T. R. Qualidade de vida, imagem corporal e satisfação nos tratamentos estéticos. **Revista Pesquisa em Fisioterapia.** 2016 Nov;6(4):402-410.
- GALIE, M.; COSTANZO, M.; NODARI, A.; BOSCHI, F.; CALDERAN, L.; MANNUCCI, S.; COVI, V.; TABARACCI, G.; MALATESTA, M. Mild ozonisation activates antioxidant cell response by the Keap1/Nrf2 dependent pathway. **Free Radic. Biol. Med.** 2018;124:114–121. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2018.05.093.
- GALIE, M.; COVI, V.; TABARACCI, G.; MALATESTA, M. The Role of Nrf2 in the Antioxidant Cellular Response to Medical Ozone Exposure. **Int. J. Mol. Sci.** 2019;20:4009. doi: 10.3390/ijms20164009.
- GANESH YERRA, V.; NEGI, G.; SHARMA, S. S.; KUMAR, A. Potential therapeutic effects of the simultaneous targeting of the Nrf2 and NF-kappaB pathways in diabetic neuropathy. **Redox Biol.** 2013;1:394–397. doi: 10.1016/j.redox.2013.07.005.
- HAMILTON, R. F.; JR., LI, L.; ESCHENBACHER, W. L.; SZWEDA, L.; HOLIAN, A. Potential involvement of 4-hydroxynonenal in the response of human lung cells to ozone. **Am. J. Physiol.** 1998;274 (Pt 1):L8–L16. doi: 10.1152/ajplung.1998.274.1.L8.
- HUTH, K. C.; SAUGEL, B.; JAKOB, F. M.; CAPPELLO, C.; QUIRLING, M.; PASCHOS, E.; ERN, K.; HICKEL, R.; BRAND, K. Effect of aqueous ozone on the NF-kappaB system. **J. Dent. Res.** 2007;86:451–456. doi: 10.1177/154405910708600512
- KAFOURY, R. M.; HERNANDEZ, J. M.; LASKY, J. A.; TOSCANO, W. A.; JR., FRIEDMAN, M. Activation of transcription factor IL-6 (NF-IL-6) and nuclear factor-kappaB (NF-kappaB) by lipid ozonation products is crucial to interleukin-8 gene expression in

- human airway epithelial cells. **Environ. Toxicol.** 2007;22:159–168. doi: 10.1002/tox.20246.
- MARTÍNEZ-SÁNCHEZ, G.; SCHWARTZ, A.; DONNA, V. D. Potential cytoprotective activity of ozone therapy in SARS-CoV-2/COVID-19. **Antioxidants (Basel)**. (2020) 9:389. 10.3390/antiox9050389
- MOHAN, S.; GUPTA, D. Crosstalk of toll-like receptors signaling and Nrf2 pathway for regulation of inflammation. **Biomed. Pharmacother.** 2018;108:1866–1878. doi: 10.1016/j.biopha.2018.10.019.
- NAKASONE, M.; NAKASO, K.; HORIKOSHI, Y.; HANAKI, T.; KITAGAWA, Y.; TAKAHASHI, T.; INAGAKI, Y.; MATSURA, T. Preconditioning by Low Dose LPS Prevents Subsequent LPS-Induced Severe Liver Injury via Nrf2 Activation in Mice. **Yonago Acta Med.** 2016;59:223–231.
- OLIVEIRA-MARQUES, V.; MARINHO, H. S.; CYRNE, L.; ANTUNES, F. Role of hydrogen peroxide in NF-kappaB activation: From inducer to modulator. **Antioxid. Redox Signal.** 2009;11:2223–2243. doi: 10.1089/ars.2009.2601.
- OZBAY I, ITAL I, KUCUR C, ET AL. Effects of ozone therapy on facial nerve regeneration. **Braz J Otorhinolaryngol.** 2017;83(2):168-175. doi:10.1016/j.bjorl.2016.02.009
- PECORELLI, A.; BOCCI, V.; ACQUAVIVA, A.; BELMONTE, G.; GARDI, C.; VIRGILI, F.; CICCOLI, L.; VALACCHI, G. NRF2 activation is involved in ozonated human serum upregulation of HO-1 in endothelial cells. **Toxicol. Appl. Pharmacol.** 2013;267:30–40. doi: 10.1016/j.taap.2012.12.001.
- PRYOR, W. A.; SQUADRITO, G. L.; FRIEDMAN, M. The cascade mechanism to explain ozone toxicity: The role of lipid ozonation products. **Free Radic. Biol. Med.** 1995;19:935–941. doi: 10.1016/0891-5849(95)02033-7.
- RE, L.; MALCANGI, G.; MARTÍNEZ-SÁNCHEZ, G. Medical ozone is now ready for a scientific challenge: Current status and future perspectives. **J. Exp. Integr. Med.** 2012;2:193–196. doi: 10.5455/jeim.070612.ir.012.
- RE, L.; MARTÍNEZ-SÁNCHEZ, G.; BORDICCHIA, M.; MALCANGI, G.; POCOGNOLI, A.; ANGEL MORALES-SEGURA, M.; ROTHCHILD, J.; ROJAS, A. Is ozone preconditioning effect linked to Nrf2/EpRE activation pathway in vivo? A preliminary result. **Eur. J. Pharmacol.** 2014;742:158–162. doi: 10.1016/j.ejphar.2014.08.029.
- SCHWARTZ-TAPIA, A.; MARTÍNEZ-SÁNCHEZ, G.; SABAH, F. **Madrid Declaration on Ozone Therapy**. ISCO3 (International Scientific Committee of Ozone Therapy); Madrid, Spain: 2015.
- SINISCALCO, D.; TROTTA, M. C.; BRIGIDA, A. L.; MAISTO, R.; LUONGO, M.; FERRARACCIO, F.; D'AMICO, M.; DI FILIPPO, C. Intraperitoneal Administration of Oxygen/Ozone

- to Rats Reduces the Pancreatic Damage Induced by Streptozotocin. **Biology (Basel)** 2018;7:10. doi: 10.3390/biology7010010.
- TRAVAGLI, V.; ZANARDI, I.; VALACCHI, G.; & BOCCI, V. (2010). Ozone and ozonated oils in skin diseases: a review. **Mediators of inflammation**, 2010, 610418. <https://doi.org/10.1155/2010/610418>
- VALACCHI, G.; FORTINO, V.; BOCCI, V. The dual action of ozone on the skin. **Br J Dermatol.** (2005) 153:1096–100. 10.1111/j.1365-2133.2005.06939.x
- VALDENASSI, L.; FRANZINI, M.; RICEVUTI, G.; RINALDI, L.; GALOFORO, A. C.; TIRELLI, U. Potential mechanisms by which the oxygen-ozone (O₂-O₃) therapy could contribute to the treatment against the coronavirus COVID-19. **Eur Rev Med Pharmacol Sci.** (2020) 24:4059–61. 10.26355/eurev_202004_20976
- VIEBAHN-HANSLER, R.; LEON FERNANDEZ O.S., FAHMY Z. Ozone in Medicine: The Low-Dose Ozone Concept—Guidelines and Treatment Strategies. **Ozone-Sci. Eng.** 2012;34:408–424. doi: 10.1080/01919512.2012.717847.
- WANG, L.; CHEN, Z.; LIU, Y.; DU, Y.; LIU, X. Ozone oxidative postconditioning inhibits oxidative stress and apoptosis in renal ischemia and reperfusion injury through inhibition of MAPK signaling pathway. **Drug Des. Devel. Ther.** 2018;12:1293–1301. doi: 10.2147/DDDT.S164927.
- WARDYN, J. D., PONSFORD, A. H., SANDERSON, C. M. Dissecting molecular cross-talk between Nrf2 and NF-kappaB response pathways. **Biochem. Soc. Trans.** 2015;43:621–626. doi: 10.1042/BST20150014.
- ZENG, J.; LU, J. Mechanisms of action involved in ozone-therapy in skin diseases. **Int Immunopharmacol.** 2018 Mar;56:235-241. doi: 10.1016/j.intimp.2018.01.040.

CAPÍTULO XVI

FARMACOVIGILÂNCIA EM TEMPOS DE PANDEMIA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

DOI: 10.51859/amplla.csa511.1121-16

Lavínia Rebeca Viana Cabral ¹

Raíssa Rafaela Moura Jales ²

Luanne Eugênia Nunes ³

Patrícia Araújo Pedrosa do Vale ⁴

¹ Graduanda do curso de Farmácia. Faculdade de Enfermagem Nova Esperança de Mossoró – FACENE/RN

² Graduanda do curso de Farmácia. Faculdade de Enfermagem Nova Esperança de Mossoró – FACENE/RN

³ Doutora em Ciências Farmacêuticas e professora do Curso de Farmácia da Faculdade Nova Esperança de Mossoró – FACENE/RN

⁴ Especialista em Atenção Farmacêutica e Farmácia Clínica e professora do Curso de Farmácia da Faculdade Nova Esperança de Mossoró – FACENE/RN

RESUMO

Doenças causadoras de grande impacto na população pela alta taxa de contágio e mortalidade são datadas desde a antiguidade e nos dias atuais essa problemática ainda é existente. Em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou estado de emergência de saúde pública, Pandemia do Coronavírus, devido ao grande número de infectados pelo vírus Sars-Cov-2. Nesse contexto, deu-se início aos estudos por medicamentos já existentes que demonstrassem efetividade frente à COVID-19, ou seja, o uso *off-label* de medicamentos. O estudo tem por objetivo realizar um levantamento bibliográfico abordando a importância da farmacovigilância nos tratamentos *off-label*, como também, no surgimento de reações adversas a medicamentos. Trata-se de uma revisão integrativa, com abordagem qualitativa, do tipo descritivo, no período de março de 2020 a janeiro de 2021 nas bases de dados eletrônicas: PubMed, LILACS e SciELO. A seleção da amostra foi realizada segundo critérios de inclusão e exclusão pré estabelecidos. Com base no processo de identificação e seleção dos artigos, 120 artigos foram identificados, desses, 7 foram elegíveis para compor a amostra. Com base nesses artigos, verificou-se que apesar de todo avanço e tecnologia da indústria farmacêutica, atualmente nenhum medicamento disponível no mercado é eficiente e totalmente seguro para uso *off-label* no processo de cura da COVID-19. Portanto, evidencia-se a necessidade de fortalecer práticas de farmacovigilância através das notificações e registro das reações adversas aos medicamentos usados de forma *off-label* no tratamento da COVID-19, identificando e prevenindo complicações, além de garantir segurança aos pacientes.

Palavras-chave: Infecções por Coronavírus. Farmacovigilância. Uso *Off-Label*. Reação adversa a medicamentos.

1. INTRODUÇÃO

A população mundial ao longo dos séculos tem sua história marcada por inúmeras doenças que causaram a morte de milhares de indivíduos. A varíola, uma doença infectocontagiosa causada por *Orthopoxvirus variolae*, um vírus que possui material genético constituído por DNA, é datada desde a antiguidade na Índia e na África, onde alastrou-se por todo mundo. No Brasil, foi primeiramente referenciada em 1563 causando grande número de casos e óbitos, principalmente entre os indígenas. Por intermédio da vacinação, em 1967 foi eliminada nas Américas, com exceção do Brasil, que teve seu último caso em 1972 (LEVI; KALLÁS, 2002).

De forma semelhante, a peste bubônica, provocada pela bactéria *Yersinia pesti*, tornou-se pandemia na Idade Média ao assolar 1/3 da população europeia por volta de 1347. No Brasil, os últimos casos com óbitos foram datados no Ceará e na Paraíba em 1980, onde foram notificados 76 casos com três óbitos (ARAGÃO *et al.*, 2007).

A doença ebola, febre do tipo hemorrágica causada pelo vírus Ebola (DVE), do gênero *Filovirus*, é altamente contagiosa, com transmissão através do contato com o sangue ou outros fluidos biológicos de um ser humano ou animal infectado. Os primeiros registros de DVE foram encontrados em 1976 no Continente Africano, porém, a epidemia só ocorreu na África Ocidental entre 2013 e 2016 onde mais de 11 mil pessoas morreram (OMS, 2015).

Na década de 80, a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), doença causada pela infecção do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), tornou-se um grande desafio para a comunidade científica, sendo considerada pandemia pela grande taxa de contágio e alto número de mortes (DANTAS *et al.*, 2015).

No México, em 2009, o mundo passou pela pandemia de gripe A, experiência relacionada a uma doença respiratória causada por uma nova cepa do vírus Influenza A subtipo H1N1. Conhecida como a segunda pandemia do vírus H1N1 que alastrou-se de forma rápida e causou inúmeros óbitos. Vale ressaltar que em 1918, esse vírus foi o causador da gripe espanhola, uma das doenças mais mortais da história; causadora de grande impacto na Primeira Guerra Mundial, credita-se o aumento do contágio ao contato das tropas que eram enviadas aos campos de batalha (AUERBACH *et al.*, 2013).

Outros registros merecem destaque como o surto de poliomielite, em 2014, declarado estado de emergência de saúde pública de interesse global e, o surto do *Zika* vírus em 2016, com 175.063 confirmados em 48 países. Sabe-se que o *Zika* foi primeiro *Flavivírus* transmitido por mosquitos que se propagou rapidamente nas Américas, após sua aparição inicial no Brasil, em maio de 2015 (OLIVEIRA, 2020).

O ano de 2020 foi marcado pela chegada do vírus Sars-Cov-2, caracterizado como uma variação do Coronavírus, tendo seu primeiro caso registrado em 2019 na cidade de Wuhan, na China. O número de infectados e acometidos pela *Corona Virus Disease* (COVID-19), doença provocada pelo vírus, alastrou-se rapidamente e, em poucas semanas, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou situação de emergência de saúde pública, iniciando o cenário pandêmico da COVID-19, em março de 2020 (OLIVEIRA, 2020).

Arelado ao fato da chegada de uma nova doença que provoca sintomas distintos em cada indivíduo, a busca por medicamentos que tratem esses sintomas passou a ser meta para muitos estudiosos e profissionais da área, no entanto, diante da necessidade de tratamento e falta de fármacos específicos para tratar a COVID-19, iniciou-se a prescrição através do uso *off-label* de medicamentos (OLIVEIRA, 2020).

Os medicamentos são as ferramentas mais utilizadas no tratamento das doenças, porém seu uso deve ser feito de forma racional, uma vez que a utilização inadequada pode prejudicar o paciente. Tomando esse fato, vê-se que a farmacovigilância é essencial nos âmbitos relacionados à saúde pública, principalmente diante de uma pandemia, visto que a prevenção das reações adversas aos medicamentos (RAM), bem como a promoção do uso seguro e eficaz dos medicamentos para o tratamento das doenças contemplam seus objetivos (OMS, 2006).

Portanto, o objetivo deste trabalho é realizar um levantamento bibliográfico para compreender a atuação da farmacovigilância nos tratamentos a pacientes acometidos pelo vírus SARS-CoV-2, enfatizando a importância de evidências científicas para a segurança no tratamento desses pacientes. Dessa forma, justifica-se a relevância deste trabalho por abordar a segurança farmacológica durante a busca por uma terapêutica eficaz aos pacientes acometidos pela COVID-19, destacando a importância das notificações de eventos adversos, em especial, reações adversas por uso *off-label*.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura, realizada nas seguintes bases de dados: *National Library of Medicine* (PubMed), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e *Scientific Electronic Library Online* (SciELO). Para a seleção dos artigos utilizou-se os DeCS (Descritores em Ciências da Saúde) / MeSH (*Medical Subject Headings*) “Infecções por Coronavírus”, “Farmacovigilância” e “Uso *Off-Label*” e, seus correspondentes nos idiomas abordados na coleta de dados, associados aos operadores *booleano* “AND” e “OR”.

Como critérios de inclusão, a pesquisa reuniu evidências científicas, março de 2020 a janeiro de 2021, que abordem a temática proposta e com textos disponíveis na íntegra de forma *online* nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola. Para critérios de exclusão foram estabelecidos: estudos epidemiológicos e resumos simples e expandidos.

O processo de identificação e seleção dos artigos realizou-se com um fluxograma adaptado do *The PRISMA Group*, utilizando as seguintes etapas: identificação da temática através dos descritores e critérios de inclusão e exclusão; categorização e avaliação dos estudos identificados; análise dos resultados e síntese da revisão.

A presente revisão assegura os aspectos éticos, segundo as resoluções nº 466/12 e nº 510/2016, garantindo a autoria dos artigos pesquisados, através de citações e referências dos autores e, portanto, não necessita da apreciação pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tomando como base a temática proposta para pesquisa, foram identificados 120 artigos, sendo excluídos 2 destes devido duplicação nas bases de dados, os outros, portanto, passaram por uma análise fundamentada nos critérios de inclusão e exclusão supracitados. Dessa forma, 12 artigos foram elegidos para leitura na íntegra e, destes, 6 foram selecionados para compor o estudo de revisão, conforme descrito na Figura 1.

Figura 1 – Fluxograma de identificação e seleção dos artigos nas fases de revisão.

Fonte: Autoria própria.

A partir da análise dos trabalhos selecionados, foram retiradas informações dos artigos selecionados que discorrem acerca da farmacovigilância em tempos de pandemia. A amostra final está exposta na Tabela 1.

Tabela 1 – Descrição dos estudos levantados nas bases de dados sobre revisão integrativa.

BASE DE DADOS	TÍTULO DO ARTIGO	AUTOR/ANO	OBJETIVO	CONCLUSÃO
PUBMED	Pilot prospective open, single-arm multicentre study on off-label use of tocilizumab in patients with severe COVID-19.	SCIASCIA <i>et al.</i> (2020)	Mostrar que nenhum medicamento experimentado se mostrou completamente eficaz contra a COVID-19 em pacientes com estado grave.	Apesar de nenhum medicamento ter se mostrado completamente eficaz contra a COVID-19, o tocilizumab pode ser uma alternativa segura, uma vez que melhora parâmetros respiratórios.
	Off-label use of tocilizumab in patients with SARS-CoV-2 infection.	DI GIAMBENEDETTO <i>et al.</i> (2020)	Discutir o uso <i>off-label</i> do tocilizumab em pacientes infectados pelo SARS-CoV-2.	Os testes com o medicamento tocilizumab se mostraram eficazes para pacientes infectados pelo SARS-CoV-2 com casos graves de pneumonia.
	Treating COVID-19 – Off-Label Drug Use, Compassionate Use, and Randomized	KALIL, A. C. (2020)	Discutir o uso de drogas não oficiais no tratamento da infecção por SARS-CoV-2 e sobre os	Os ensaios clínicos podem ser iniciados imediatamente, mesmo durante a pandemia, visto que a rapidez nos

	Clinical Trials During Pandemics.		ensaios clínicos durante a pandemia.	cuidados é a única forma de buscar um tratamento para a Covid-19.
	COVID-19 and off label use of drugs: an ethical viewpoint.	SHOJAEI, A.; SALARI, P. (2020)	Apresentar as questões éticas envolvidas devido à prescrição e uso <i>off-label</i> de medicamentos em pacientes com a COVID-19.	Responsabilidade por parte dos prescritores com relação à segurança do medicamento de uso <i>off-label</i> à saúde do paciente.
LILACS	"Off-label" use of hydroxychloroquine, azithromycin, lopinavir-ritonavir and chloroquine in COVID-19: A survey of cardiac adverse drug reactions by the French Network of Pharmacovigilance Centers.	GÉRARD <i>et al.</i> (2020)	Discutir o uso de alguns medicamentos como hidroxicloroquina, azitromicina, lopinavir e cloroquina no tratamento da COVID-19 e suas reações adversas.	Poucas evidências no tratamento da COVID-19. O uso <i>off-label</i> desses medicamentos deve ser monitorado, visto que aumenta o risco de reações adversas cardíacas.
SCIELO	Off label, compassionate and irrational use of medicines in Covid-19 pandemic, health consequences and ethical issues.	PAUMGARTTEN, F. J. R; OLIVEIRA, A. C. A. X. (2020)	Discutir acerca da contradição entre o uso racional de medicamentos e a prescrição de medicamentos sem total segurança de eficácia para tratamento da Covid-19.	Preocupação pelo fato de que o uso <i>off-label</i> de medicamentos pode ser fator contribuinte para a mortalidade de indivíduos, salientando para os problemas cardíacos e eventos adversos graves que podem ser ocasionados.

Fonte: Autoria própria, 2021.

Segundo a OMS (2006), farmacovigilância é definida como “a ciência e atividades relativas à identificação, avaliação, compreensão e prevenção de efeitos adversos ou quaisquer problemas relacionados ao uso de medicamentos”. Desde 1970 a notificação espontânea a respeito dos eventos adversos, bem como todos os efeitos indesejados causados pelos medicamentos, tem sido impulsionada pela OMS, cujo objetivo é garantir o uso racional de medicamentos evitando tragédias como a da Talidomida (MENDES, 2008).

Nesse aspecto, em 1978 criou-se o centro colaborador da OMS para o Monitoramento Internacional de Medicamentos (Uppsala Monitoring Centre – UMC), trata-se de um centro independente de segurança de medicamentos e pesquisa

científica com o objetivo de promover a farmacovigilância. Atualmente com 143 países-membros, sendo o Brasil membro titular desde 2001 (UMC, 2021).

No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) é o órgão responsável pelo gerenciamento das notificações de eventos adversos com medicamentos e vacinas. Para tal, dispõe de dois sistemas de notificação de suspeitas desses eventos: NOTIVISA (para notificações da rede sentinela da Anvisa e núcleos de segurança de paciente) e o VigiMed (destinada às vigilâncias sanitárias, serviços de saúde, cidadãos, profissionais de saúde e detentores de registro de medicamentos) (ANVISA, 2021).

Frente à pandemia declarada pela OMS em 12 de março de 2020 e, a ausência de uma terapêutica específica ao SARS-CoV-2, vírus responsável por ocasionar a COVID-19, iniciou-se a busca por medicamentos já existentes com finalidade de tratar as pessoas acometidas pela nova doença (KALIL, 2020).

Por conseguinte, deu-se início ao uso *off-label* de medicamentos, que pode ser descrito como a utilização de fármacos para uma finalidade distinta da que foi autorizada pelo órgão regulatório do país, podendo ser usado em faixa etária e indicação diferente da que consta na bula, bem como, pode divergir quanto à via de administração, frequência e dose de uso (NOBRE, 2013). À vista disso, estudos demonstram que instituições de saúde de diversos países adotaram a terapia citada na expectativa de descobrir um tratamento promissor, como o uso da cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina, lopinavir/ritonavir, favipiravir, remdesivir, ribavirina, interferon, plasma convalescente e esteroides (KALIL, 2020).

No Brasil, o Ministério da Saúde (MS) divulgou protocolos liberando o uso no Sistema Único de Saúde (SUS) da cloroquina, hidroxicloroquina e azitromicina para tratamento de pacientes graves com COVID-19 (BRASIL, 2020). Outro fármaco listado como potencial no tratamento, foi a ivermectina, visto que houve diminuição na taxa de mortalidade de pacientes que estavam em hospitais na Ásia, América do Norte e Europa que receberam esse medicamento no tratamento, porém, vale ressaltar que a ivermectina mostrou a capacidade de diminuir a replicação do RNA viral do Sars-Cov-2 apenas *in vitro* e quando administrado em superior à dose aprovada (SCHMITH; ZHOU; LOHMER, 2020).

Arelado ao uso *off-label* de medicamentos, alguns problemas de saúde pública emergem, visto que as RAMs é fator contribuinte para aumento da morbimortalidade de pacientes, bem como impactam no prolongamento do tempo de internamento, facilitando o agravamento do prognóstico do paciente e dificultando a liberação de leitos para a chegada de novos indivíduos necessitados de cuidados médicos (MELO *et al.*, 2021).

Dessa forma, a reação adversa a medicamento (RAM) é definida pela OMS (2010) como sendo “qualquer resposta prejudicial ou indesejável e não intencional que ocorre com medicamentos em doses usualmente empregadas no homem para profilaxia, diagnóstico, tratamento de doença ou para modificação de funções fisiológicas”, diferentemente do Evento Adverso ao Medicamento (EAM) que consiste em “qualquer ocorrência médica desfavorável, que pode ocorrer durante o tratamento com um medicamento, mas que não possui, necessariamente, relação causal com esse tratamento” (OMS, 2010). Portanto, um fator inerente ao uso do medicamento, é a necessidade que esse uso seja racional e monitorado, pois a gravidade das RAMs pode variar entre leve, moderada, grave e letal (ROMEY *et al.*, 2011).

Os medicamentos como os inibidores da neuraminidase viral; inibidores da protease; antimaláricos e anti-helmínticos, passaram a ser frequentemente prescritos tanto para tratamento como para profilaxia, embora sejam eficazes e seguros frente a sua finalidade terapêutica original, em casos de infecções por SARS-CoV-2, as pesquisas são insuficientes ou revelam riscos devido à necessidade de elevadas doses para uma resposta eficaz (PAUMGARTTEN *et al.*, 2020). Desta forma, foi possível agrupar os principais problemas relacionados ao tratamento da COVID-19 desses fármacos na Tabela 2.

Tabela 2 – Principais medicamentos utilizados de forma *off-label* para tratamento da COVID-19

PRINCÍPIO ATIVO	MECANISMO DE AÇÃO	FINALIDADE TERAPÊUTICA	PRINCIPAIS RAMS	PROBLEMAS DE USO NA COVID-19
CLOROQUINA/ HIDROXICLOROQUINA	Supressão das respostas dos linfócitos T a mitógenos, inibição da quimiotaxia dos leucócitos, estabilização das enzimas lisossômicas, processamento por meio do receptor Fc, inibição da	Tratamento da malária e de doenças reumáticas	Dispepsias, náuseas, vômitos, dor abdominal, exantema e pesadelos.	Doenças cardíacas graves, arritmias, prolongamento do tempo de QT e parada cardíaca (PAUMGARTTEN <i>et al.</i> , 2020)

	síntese de DNA e de RNA, além da captação de radicais livres.			
AZITROMICINA	Inibe a síntese das proteínas bacterianas por meio da translocação ribossômica.	Tratamento de pneumonia, otite média, diarreia, faringite.	Distúrbios gastrointestinais	Quando utilizada sem controle pode afetar a flora do cólon, permite o crescimento da bactéria <i>Clostridium difficile</i> . Além disso, pode prolongar o intervalo QT e causar hepatotoxicidade (GÉRARD <i>et al.</i> , 2020).
IVERMECTINA	Paralisa os nematódeos e os artrópodes quando intensifica a transmissão de sinais nos nervos periféricos, mediada pelo GABA. O medicamento não mata os vermes adultos, porém bloqueia a liberação de microfilárias durante alguns meses após a terapia.	Usado na estrogiloidíase e na oncocercose e também é um fármaco alternativo em infecções por helmintos.	Fadiga, tontura, náuseas, vômitos, dor abdominal, constipação e astenia.	Cardiotoxicidade, além disso vale salientar que este fármaco mostrou <i>in vitro</i> a capacidade de diminuir a replicação do RNA viral do Sars-Cov-2 quando administrado em elevadas doses (SCHMITH; ZHOU; LOHMER, 2020).

Fonte: Autoria própria.

Outros fármacos que merecem destaque são: lopinavir, azitromicina e remdesivir. Lopinavir causa um aumento na concentração plasmática, prolongando e intensificando seus efeitos terapêuticos e reações adversas, como náuseas, diarreias e infecção no trato respiratório superior. A azitromicina quando utilizada sem controle pode afetar a flora do cólon e permite o crescimento da bactéria *Clostridium difficile*, além disso, pode prolongar o intervalo QT e causar hepatotoxicidade. O remdesivir pode acarretar uma hipotensão por infusão, náuseas, vômitos e diarreia; associado com a adrenalina, dobutamina, noradrenalina, vasopressina, rifampicina ou rifapentina pode causar interações medicamentosas do tipo fármaco-fármaco, devendo avaliar criteriosamente a conduta terapêutica (SCHMITH; ZHOU; LOHMER, 2020).

Visando um mapeamento relacionado às RAMs causadas no tratamento da COVID-19, Melo *et al.* (2021) realizam estudos de análise das notificações espontâneas no sistema de farmacovigilância brasileiro e, através dessas análises 632 RAMs foram identificadas em 402 pacientes, destacando-se os farmacêuticos (81,8%), como os profissionais que mais fizeram as notificações no sistema, os estados brasileiros que

mais registraram casos foram São Paulo (53,4%), Rio de Janeiro (11,9%) e Rio Grande do Sul (9,2%).

Nessa pesquisa, os autores demonstraram que o grupo com maior prevalência dos casos de RAMs, foram pessoas do sexo masculino (59,7%), com faixa etária de 45-65 anos e, cerca de 50% desses pacientes apresentavam outras doenças e fatores de risco como hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares e, que, diariamente, faziam uso de quatro ou mais medicamentos. Os medicamentos que mais causaram RAMs nos pacientes foram a hidroxicloroquina (59,5%), azitromicina (9,8%) e cloroquina (5,2%) e, as mais frequentes foram o prolongamento do intervalo de QT, sendo caracterizada como uma reação adversa grave, tendo como desfecho o óbito. Alguns pacientes apresentaram aumento das transaminases (TGO e TGP), o que levou alguns acometidos a óbito e, em outros casos, reações leves como diarreia e prurido (MELO *et al.*, 2021).

O uso de drogas *off-label* e RAMs no tratamento da COVID-19 e em estudos não controlados podem desencorajar os pacientes e profissionais da saúde em relação à realização de ensaios clínicos randomizados, dificultando o conhecimento que pode ser obtido a respeito dos medicamentos. Sabendo disso, é indiscutível a importância de descobrir novas terapias para conter a atual e futuras pandemias que podem existir (KALIL, 2020).

A farmacovigilância durante o uso de medicamentos *off-label* para o tratamento da COVID-19 merece destaque pela possibilidade de detecção de reações adversas em pacientes com problema cardíaco, por exemplo. Considerando que a cloroquina, lopinavir, azitromicina e hidroxicloroquina são considerados bloqueadores multicanal, pois inibem a corrente de sódio e bloqueiam a corrente de marcapasso e de potássio dependente de voltagem cardíaca, causando o prolongamento do QT, além de facilitar as arritmias ventriculares e taquicardia ventricular (GÉRARD *et al.*, 2020).

Estudos demonstram que apenas 40% dos cardiologistas medem corretamente o intervalo QT, sendo preocupante para evitar as reações adversas a medicamentos (RAMs). À vista disso, e para evitar as RAMs, a leitura automatizada do eletrocardiograma (ECG) deve ser complementar à interpretação do médico, além de que o ECG deve ser verificado com frequência quando se utilizam medicamentos para a infecção (GÉRARD *et al.*, 2020).

No ano de 2014, durante o surto de Ebola, a importância do monitoramento de eventos adversos também foi de suma importância, foram experimentadas diversas terapias contra o vírus, como a cloroquina, hidroxicloroquina, favipiravir, brincidofovir, anticorpos monoclonais, plasma convalescente, entre muitos outros, tentando encontrar um que fosse eficaz contra a doença e, no fim, nenhum se mostrou eficaz e seguro, levantando o questionamento sobre a evolução da tecnologia farmacêutica frente a vírus, fungos e bactérias, como também, o potencial da farmacovigilância em garantir a segurança do paciente pós registro de comercialização dos medicamentos (KALIL, 2020).

Outra vertente que surge atrelada ao uso de medicamentos no cenário pandêmico da COVID-19 é o ponto de vista ético, o uso ocorre de forma experimental devido à necessidade do paciente que, quando acometido pela doença, pode-se agravar em poucos dias. Portanto, a prescrição não ocorre necessariamente de forma irracional, contudo os médicos ao prescreverem devem estar conscientes e assumirem a responsabilidade de quaisquer prejuízos à saúde do paciente, avaliando o potencial de reações adversas e os benefícios que a terapia prescrita pode causar (PAUMGARTTEN *et al.*, 2020).

Apesar de alguns medicamentos apresentarem atividade *in vitro* contra algumas variantes do coronavírus, é importante salientar que nenhuma evidência clínica atual se mostrou segura e eficaz para a utilização em humanos, em especial em idosos (KALIL, 2020). Portanto, mesmo para o tratamento da sintomatologia da COVID-19, uma análise detalhada do quadro do paciente é indispensável, considerando os riscos e benefícios de forma individual, uma vez que, muitos pacientes possuem outras comorbidades tratadas com diversos fármacos, implicando em possíveis interações medicamentosas ou propiciando o surgimento de RAMs.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dos estudos apresentados, vê-se a inegável necessidade da busca por medicamentos eficazes no tratamento da COVID-19. O uso *off-label* de medicamentos é uma realidade mundial, apesar de fracas evidências científicas ou robustez que corrobore a efetividade e a segurança na terapêutica proposta, portanto, questões

éticas e legais merecem atenção e, principalmente, a responsabilidade por parte dos profissionais ao adotarem medidas de farmacovigilância para acompanhar e monitorar as RAMs que podem surgir.

O fato de alguns medicamentos apresentarem atividade promissora *in vitro*, não é garantia que possuam ação bem-sucedida frente ao tratamento clínico em patologia divergente do objetivo terapêutico original. Portanto, são necessários mais estudos que justifiquem principalmente a segurança no uso *off-label* de medicamentos, para que reações adversas graves sejam evitadas, uma vez que além do tratamento e cura, a segurança do paciente é essencial.

Portanto, ações no campo da farmacovigilância devem ser divulgadas aos profissionais e usuários de medicamentos, bem como encorajar a notificação e registro das reações adversas aos medicamentos usados de forma *off-label* no tratamento da COVID-19, visto como uma forma de aumentar os dados sobre medicamentos pós obtenção do registro de comercialização e fortalecer o uso racional de medicamentos, bem como, fomentar a prática apenas em ensaios clínicos controlados e aprovados, a fim de descobrir benefícios reais de fármacos, além do objetivo terapêutico original.

AGRADECIMENTOS

De forma especial, os agradecimentos são dedicados as nossas orientadoras Patrícia Vale e Luanne Nunes pelo incentivo e dedicação ao nosso projeto.

REFERÊNCIAS

- ARAGÃO, A. I. *et al.* Tendência secular da peste no Estado do Ceará, Brasil. **Cad. Saúde Pública (FIOCRUZ)**. v. 23, p. 715-24, 2007.
- AUERBACH, P.; OSELAME, G. B.; DUTRA, D. A. Revisão Histórica da Gripe no mundo e a nova H7N9. **Revista de Medicina e Saúde de Brasília**, v. 2, n. 3, 2013. Disponível em: <https://portalrevistas.ucb.br/index.php/rmsbr/article/view/4424/3099>. Acesso em: 05 fev. 2021.
- BRASIL, Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Fiscalização e Monitoramento**. 2021 Disponível: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/fiscalizacao-e-monitoramento/notificacoes/medicamentos-e-vacinas>. Acesso em: 15 mar. 2021.

- BRASIL, Ministério da Saúde. **Orientações do ministério da saúde para manuseio medicamentoso precoce de pacientes com diagnóstico da COVID-19**. Brasília, 2020. Disponível em: <https://saude.gov.br/images/pdf/2020/june/18/covid-final-16junho-livreto-1-v3.pdf>. Acesso em: 22 jan. 2021.
- DANTAS, M. S.; ABRÃO, F. M. S; COSTA, S. F. G; OLIVEIRA, D. C. HIV/AIDS: significados atribuídos por homens trabalhadores da saúde. **Escola Anna Nery Revista de Enfermagem**, v. 19, n. 2, p. 323-330, 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/ean/v19n2/1414-8145-ean-19-02-0323.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2021.
- DI GIAMBENEDETTO, S. *et al.* Off-label use of tocilizumab in patients with SARS-CoV-2 infection **Journal of Medical Virology**. v. 92, n. 10, p. 1787-1788, 2020. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/jmv.25897> Acesso em: 01. jan. 2021.
- GÉRARD, A. *et al.* “Off-label” use of hydroxychloroquine, azithromycin, lopinavir-ritonavir and chloroquine in COVID-19: a survey of cardiac adverse drug reactions by the French Network of Pharmacovigilance Centers. **Therapies**, v. 75, n. 4, p. 371-379, 2020. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32418730/>. Acesso em: 05 fev. 2021.
- KALIL A. C. Treating COVID-19-Off-Label Drug Use, Compassionate Use, and Randomized Clinical Trials During Pandemics. **JAMA**, v. 323, n. 19, p. 1897-1898, 2020. Disponível em: <https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2763802>. Acesso em: 07 fev. 2021.
- LEVI, G.C; KALLAS, E.G. Varíola, sua prevenção vacinal e ameaça como agentes de bioterrorismo. **Rev Assoc Med Bras**, v. 48, n. 4, p. 357-62, 2002. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/ramb/v48n4/14209.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2021.
- MELO, J.R.R. *et al.* Reações adversas a medicamentos em pacientes com COVID-19 no Brasil: análise das notificações espontâneas do sistema de farmacovigilância brasileiro. **Cad. Saúde Pública**, v. 37, 2021. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2021000105013. Acesso em: 10 fev. 2021.
- MENDES M.C.P. *et al.* História da farmacovigilância no Brasil. **Revista Brasileira de Farmácia**, v. 89, n. 3 p. 246-51, 2008. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/T7JpQNmVYMYWK48GhQrSDWh/?lang=pt>. Acesso em: 15 mar. 2021.
- Nobre, P. F. S. Prescrição Off-Label no Brasil e nos EUA: aspectos legais e paradoxos. **Ciênc. saúde coletiva**, v. 18, n. 3, 2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/qYpKwBB3SwTSnSMpcyMSrvm/abstract/?lang=pt#>. Acesso em: 07 fev. 2021.

OLIVEIRA, E. S.; MORAIS, A. C. L. N. COVID-19: uma pandemia que alerta à população. **InterAmerican Journal of Medicine and Health**, v. 3, p. 1-7, 2020. Disponível em: <https://www.iajmh.com/iajmh/article/view/80>. Acesso em: 22 jan. 2021.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Ebola Outbreak**. Genebra: OMS; 2015.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Terminologia de Reações Adversas da OMS: O Centro de Monitoramento de Uppsala**. 2010. Disponível em: <http://www.umcproducts.com/graphics/3149.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2021.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **The safety of medicines in public health programmes. Pharmacovigilance: An essential tool**. Geneva: WHO, 2006.

PAUMGARTTEN, F. J. R.; OLIVEIRA, A. C. A. X. Off label, compassionate and irrational use of medicines in Covid-19 pandemic, health consequences and ethical issues. **Ciênc. saúde coletiva**, v. 25, n. 9, p. 3413-3419, 2020. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S141381232020000903413&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em: 05 mar. 2021.

ROMEY, G. A. *et al.* Notificação de reações adversas em hospital sentinela de Fortaleza - Ceará. **R. Bras. Farm. Hosp. Serv. Saúde**, v. 2, n. 1, 2011. Disponível em: <https://www.rbfhss.org.br/sbrafh/article/download/91/91/> Acesso: 10 fev. 2021.

SCASCIA, S. *et al.* Pilot prospective open, single-arm multicentre study on off-label use of tocilizumab in severe patients with COVID-19. **Clin exp Rheumatol**, v. 38, n. 3, p. 529-532, 2020. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32359035/>. Acesso: 10 fev. 2021.

SCHMITH V. D.; ZHOU J. J; LOHMER L. R. L. The Approved Dose of Ivermectin Alone is not the Ideal Dose for the Treatment of COVID-19. **Clin Pharmacol Ther**, v. 108, n. 4, p. 762-765, 2020. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32378737/>. Acesso: 10 fev. 2021.

SENHORAS, E. M. Coronavírus e o papel das pandemias na história humana. **Boletim de Conjuntura (BOCA)**, v. 1, n. 1, p. 31-34, 2020. Disponível em: <https://revista.ufrb.br/boca/article/view/Eloi>. Acesso em: 22 jan. 2021.

SHOJAEI A.; SALARI P. COVID-19 and off label use of drugs: an ethical viewpoint. **Daru**, v. 28, n. 2, p. 789-793, 2020. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32385829/>. Acesso em: 15 mar. 2021.

UPPSALA MONITORING CENTRE. **The WHO Programme for International Drug Monitoring**. 2021. Disponível em: <https://www.who-umc.org/global-pharmacovigilance/who-programme-for-international-drug-monitoring/>. Acesso em: 15 mar. 2021.

CAPÍTULO XVII

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM FRENTE ÀS PRINCIPAIS TAXONOMIAS APLICADAS AO PACIENTE DE COVID-19 NA TERAPIA INTENSIVA

DOI: 10.51859/amplla.csa511.1121-17

Sandra Conceição Ribeiro Chicharo¹
Cristiane Teles Frazão¹
Juliana Soares de Souza Nogueira¹
Gabrielli dos Santos Netto de Melo¹
Dilson da Silva Lopes¹
Washington Luiz Raimundo Gomes Tavares¹
Gabriel Silva Da Rosa de Carvalho¹

¹ Centro Universitário São José, Escola de saúde, Curso de Graduação em Enfermagem – UNISJ

RESUMO

Resumo: Sabendo-se que a enfermagem atua desde a promoção à saúde até a linha de frente hospitalar e nos diversos níveis de atenção, sendo ela a principal linha de atuação no combate à pandemia do novo Coronavírus- nCOV 19, se faz importante ressaltar seu protagonismo na linha de frente do cuidado a estes pacientes. **Objetivo:** Traçar um plano de cuidados prioritários ao paciente com COVID-19 na terapia intensiva. **Metodologia:** Estudo descritivo, de abordagem qualitativa feita na base de dados Pubmed, Lilacs e Medline com recorte temporal dos últimos 12 anos. **Resultados:** Apesar de todas as limitações já conhecidas pela equipe de enfermagem, os profissionais de saúde mantêm seu protagonismo de cuidar. Neste momento caótico e pandêmico, em que a Enfermagem passa de “desvalorizada” para “protagonista”, é importante o debate sobre a formação do profissional e suas condições de trabalho, bem como, repensar o sistema de saúde e as formas para enfrentamento da pandemia. **Conclusão:** A enfermagem é a responsável pelos cuidados intensivos, ou seja, 24 horas por dia dos pacientes em ambiente hospitalar. A equipe de saúde representa uma parte importante no que se refere o cuidar, de maneira geral, no estado físico, mental e espiritual, usando os diagnósticos iniciais referidos por sintomas e análise de casos e referencias clinicas.

Palavras-chave: SARS-COV1. Enfermagem. Diagnóstico de enfermagem.

1. INTRODUÇÃO

O novo coronavírus (COVID-19) associado à síndrome respiratória aguda grave/SARS (SARS-CoV-2), dentre as doenças infecciosas emergentes, representa uma

ameaça à saúde mundial. Pois em dezembro de 2019 na Ásia, mais precisamente na China, foi relatada uma alta prevalência de pacientes com pneumonia de causa desconhecida e de relevante gravidade, mais especificamente na cidade de Wuhan (Província de Hubei), associada à infecção causada pelo vírus. Cujo país se tornou o epicentro deste surto da nova patologia (WU *et al.*, 2020; YUEN *et al.*, 2020; NEELTJE *et al.*, 2020; MATT *et al.*, 2020; SHOHEI *et al.*, 2020; BAI, 2020; OLIVEIRA, 2021).

O SARS-CoV-2 (*Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2*) é um RNA vírus envelopado, de genoma simples de sentido positivo, altamente mutagênico e com alta frequência de recombinação homóloga de RNA, resultando em uma maior variedade de cepas. Pertence à família *Coronaviridae*, ao gênero *Betacoronavirus*, subgênero *Sarbecovirus*. Comumente encontrado em humanos, outros mamíferos e aves, capazes de causar doenças respiratórias, entéricas, hepáticas e neurológicas (WOO *et al.*, 2009; WERTHEIM *et al.*, 2013; HU *et al.*, 2015; ESTRABELLI & UIP, 2020; YUEN *et al.*, 2020; OLIVEIRA, 2021).

Os vírus atuam como agentes etiológicos predominantes nas manifestações clínicas graves associadas a doenças do trato respiratório inferior, representando um fator de risco para indivíduos com comorbidades e doenças crônicas, tais com: cardiopatia, pneumopatia, diabetes, obesidade e asma. (NOBRE *et al.*, 2014).

Além afetar drasticamente o sistema respiratório, o coronavírus 2019 (2019-nCoV) está associado a disfunções cardíacas e hematológicas (coagulopatia disseminada). Esses dados epidemiológicos corroboram com a teoria de que o COVID-19 é uma infecção de evolução rápida e sistêmica (NING, 2020). Mediante esta problemática, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o CoVID-19 como uma “emergência de saúde pública de importância internacional” (WU *et al.*, 2020). E em 31 de janeiro de 2020, o Ministério da Saúde do Brasil instituiu o Grupo de Trabalho Interministerial de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional e Internacional para acompanhamento da situação e definição de protocolos de ação (LANA *et al.*, 2020).

Este patógeno é responsável pela atual pandemia de COVID-19, causando uma doença devastadora a qual já infectou e causou óbitos ao redor do mundo. Pelo seu alto poder de letalidade, a doença traz consigo sintomas graves e expressivos, fazendo com que sua detecção no indivíduo seja de forma abrupta, aumentando ainda mais seu risco

de morte. Os pacientes podem apresentar sintomas muito graves, bem como sintomas silenciosos, disseminando a doença de forma sutil e rápida entre a população (BRITO *et al.*, 2020).

Mundialmente, 107.423.526 casos de COVID-19 foram confirmados, destes, em torno de 2.360.280 evoluíram para óbito. Na Região das Américas, o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus chega a 29.677.344, em que o Brasil compreende 10.517.232 das notificações da doença (BRASIL, 2021; OPAS, 2021).

A pandemia ocasionada pelo Covid-19 afetou significativa a atividade laboral dos diversos profissionais da saúde, tanto da rede pública quanto da privada, provocando o atual colapso nas unidades de saúde. E por estar na linha de frente ao combate da disseminação do vírus, bem como, na assistência aos acometidos pela infecção, o enfermeiro é o profissional que está 24 horas ao lado do paciente infectado, lutando contra o vírus em prol do bem-estar da população (SOUZA E SOUZA, 2020).

Neste contexto, enfermagem destaca-se por ser é a categoria profissional responsável por prestar os cuidados individuais e coletivos à pacientes graves e que necessitam de tratamentos intensivos em ambiente hospitalar e suporte ventilatório, em unidades de terapia intensiva, intervindo de forma integral, além de todo apoio emocional necessário. Assim como também, é atribuição do enfermeiro realizar o diagnóstico de enfermagem conforme os sintomas evidenciados e traçar um plano de cuidados aplicados a cada paciente e de acordo com as suas necessidades.

Na linha de frente no combate à doença, o enfermeiro exerce sua profissão com determinada autonomia e em conformidade com as diretrizes, códigos deontológicos e seus estatutos. Atuando com dedicação em sua dura jornada de trabalho junto à instituição de saúde ao qual está inserido, cada um em sua particularidade. E exercendo um papel crucial no processo de “cuidar”, na promoção e nos mais variados níveis de atenção. Porém, com a realidade da atual situação imposta pela pandemia, ao mesmo tempo em que revelou a importância desta classe colocando-a em evidência na mídia, por outro lado fomentou as situações de adoecimento e riscos de vida decorrentes luta mundial contra a COVID-19 (BRITO, 2020; BELASCO E FONSECA, 2020).

2. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem qualitativa quanto a real situação da sintomatologia apresentada por pacientes infectados pelo Covid-19, diagnósticos e intervenções de enfermagem. A pesquisa teve como foco a descrição das características de uma determinada população ou fenômeno, bem como, suas relações e mudanças, a fim de pressagiar as consequências (GIL, 2008; OLIVEIRA, 2011). Além de organizar a maneira de explicar a opinião do pesquisador quanto ao fenômeno estudado, fundamentado na descrição qualitativa. Este método prioriza reunir os dados mais precisos para sustentar a estudo em questão (GERHARST & SILVEIRA, 2009; OLIVEIRA, 2011, PEREIRA *et al.*, 2018).

No presente trabalho, a escolha do método e o tipo de abordagem consistem em explicar um fenômeno que representa o objetivo central do estudo. E que é extremamente relevante para dar suporte à interpretação do pesquisador quanto à importância da atuação do profissional enfermeiro em relação a traçar planos de cuidados a serem aplicados nos pacientes acometidos pela doença, a partir dos diagnósticos de enfermagem.

Esse tudo foi elaborado a partir de uma revisão da literatura que permitiu adquirir e atualizar o conhecimento a partir de produções científicas já publicadas por outros autores sobre o referido: “Intervenções de enfermagem frente a principais taxonomias aplicadas ao paciente de covid-19 na terapia intensiva”.

O levantamento bibliográfico baseou-se na busca artigos científicos indexados nas seguintes bases de dados: *National Center for Biotechnology Information - Pubmed* (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed>); *Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde – Lilacs*; *Scientific Eletronic Library*; *Scielo* (<http://scielo.br/>); *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online – Medline*.

A seleção das pesquisas ocorreu de acordo com seguintes os critérios de inclusão: textos publicados em português e inglês, em um período compreendido entre os anos 2009 e 2021, em um recorte temporal dos últimos 12 anos. E que apresentassem relação com o tema proposto, utilizando as seguintes palavras-chaves: SARS-COV1; Enfermagem e Diagnóstico de enfermagem. E de exclusão: artigos científicos publicados em outros idiomas e que não estabeleceram relação direta com o tema proposto.

O estudo ainda buscou traçar planos de cuidados para os pacientes acometidos pelo COVID-19 e que necessitam de tratamento na unidade de terapia intensiva, bem como, identificar as sintomatologias predominantemente descritas pelos autores em suas publicações, com a finalidade de traçar os diagnósticos de enfermagem (DE) para os pacientes acometidos pela infecção pelo coronavírus, de acordo com os sistemas de classificação de enfermagem na construção DE, relacionando-os a estratégias taxonômicas propostas pela NANDA-I (*North American Nursing Diagnosis Association International*), a qual classifica os diagnósticos de enfermagem em domínios e classes, constituídos por título, com uma definição conceitual, características definidoras e fatores relacionados ou de risco, sendo mundialmente o mais utilizado e difundido. Intervenções de Enfermagem, pela *Intervention Classification* (NIC) e os resultados de enfermagem, pela *Nursing Intervention Classification* (NOC), aplicados a estes pacientes (NANDA, 2018-2010; PEREIRA, 2010).

3. DISCUSSÃO

Demonstrando que a síndrome respiratória aguda (SARS-CoV-2) infecta as células do hospedeiro através dos receptores ECA2, há estudos sobre a patologia referidas pela infecção por SARS-CoV-2 podem estar relacionados a ECA2, logo que é desencadeada pela ligação da espícula proteica do vírus na ECA2, a qual é altamente expressa no coração e nos pulmões, causando a doença por Coronavírus (COVID-19) (ZHENG et al., 2020).

A enzima conversora de angiotensina 2 (ECA2) é uma amino peptidase que exerce papel fundamental no bom funcionamento do coração e desenvolvimento de doenças crônicas como hipertensão e diabetes mellitus. (ZHENG et al., 2020).

Não está claro se a alta taxa de desenvolvimento de miocardiopatia nesta série de casos reflete uma complicação cardíaca direta da infecção de SARS-CoV-2 ou resultou do comprometimento pela gravidade do quadro clínico. Outros têm descrito miocardiopatia na

COVID-19, e pesquisas futuras podem melhor caracterizar o risco de seu desenvolvimento (Arents, MD; Yim; et al., 2020).

Um estudo publicado na The Lancet relacionou níveis elevados de interleucina-6 (IL6), troponina 1 ultrasensível e DHL aos casos de pacientes que evoluíram para óbito, devido a desordens do sistema imune durante a progressão da doença e resposta inflamatória sistêmica (ZHOU *et al.*, 2020).

Uma outra análise realizada por Bangalore *et al* (2020) evidenciou que pacientes com Covid-19 que apresentavam supra desnivelamento do segmento ST, designando potencial infarto agudo do miocárdio, com alta preponderância de doença obstrutiva. Corroborando com achados em análise equivalente desenvolvida por Mohammad *et al.* (2020) que explicitou a Síndrome coronariana aguda e infarto do miocárdio foram posteriormente à SARS.

Também foi relatada a coagulopatia induzida por sepse dentre as manifestações clínicas da infecção pelo Coronavírus, onde pacientes com COVID-19 decorrente da alteração de células endoteliais induzida pelo processo infeccioso, apresentaram hipercoagulabilidade resultando em excesso de produção de trombina e menor fibrinólise. Consequentemente a oclusão e formação de microtromboses em pequenos vasos pulmonares de pacientes críticos com COVID-19 fora observada (NING *et al.*, 2020).

Acredita-se que o SARS-CoV-2 infecte células do hospedeiro por meio da ECA2 para causar COVID-19, enquanto também pode causar dano ao miocárdio, embora os mecanismos específicos sejam incertos. Pacientes com DCV subjacente e infecção por SARSCoV-2 podem ter um prognóstico adverso. Portanto, deve ser dada atenção especial para a proteção do sistema cardiovascular durante o tratamento de COVID-19. (ZHENG, Ying-Ying; et al)

Tendo em vista as circunstancias referidas e analises baseados nos resultados da pesquisa e realizado o diagnóstico de enfermagem a partir do NANDA, intervenções de enfermagem – NIC e resultado esperado – NOC foram selecionadas as sintomatologias predominantemente encontradas nos pacientes acometidos pelo COVID-19.

Por meio da análise dos diagnósticos estudados foram alcançados a identificação de 12 diagnósticos que podem ser empregados no plano de ação de assistência de enfermagem, conforme podemos observar nas figuras 1, 2 e 3 abaixo.

Tabela 1: Lista de Diagnósticos associados aos COVID-19, domínios 1, 2 e 3

Domínio 1	Saúde deficiente da comunidade Envolvimento em atividades de recreação diminuída Disposição para controle melhorado Manutenção ineficaz da saúde Controle ineficaz da saúde Proteção ineficaz Comportamento de saúde propenso a risco
Domínio 2	Nutrição desequilibrada menor que as necessidades corporais Risco de função Hepática prejudicada
Domínio 3	Troca de gases prejudicada

Fonte: Os autores, 2020.

Figura 2: Lista de Diagnósticos associados aos COVID-19, domínios 4 e 5

Domínio 4	Insônia Capacidade de transferência prejudicada Deambulação prejudicada Mobilidade física prejudicada Mobilidade no leito prejudicada Campo de energia desequilibrada Risco de débito cardíaco diminuído Padrão respiratório ineficaz
Domínio 4	Risco de perfusão tissular cardíaca diminuída Intolerância a atividade Ventilação espontânea prejudicada Disposição para melhora prejudicada Resposta disfuncional ao desmame ventilatório Perambulação Fadiga Autonegligência
Domínio 5	Conhecimento deficiente Disposição para conhecimento melhorado Disposição para comunicação melhorada Comunicação verbal prejudicada

Fonte: Os autores, 2020.

Figura 3: Lista de Diagnósticos associados aos COVID-19, domínios 6, 9, 11 e 12

Domínio 6	Disposição para autocuidado melhorado Risco de dignidade humana comprometida Desesperança Disposição para esperança melhorada Baixa autoestima crônica
	Risco de síndrome pós-trauma

Domínio 9	Ansiedade Enfrentamento ineficaz Disposição para enfrentamento melhorado Sobrecarga de estresse Medo Tristeza Crônica
Domínio 11	Risco de infecção Risco de Choque Desobstrução ineficaz das vias aéreas Hipertermia Termorregulação ineficaz Risco de termorregulação ineficaz Risco de contaminação Risco de tromboembolismo venoso
Domínio 12	Conforto social Risco de Solidão Dor aguda

Fonte: Os autores, 2020.

Os quadros apresentados com os diagnósticos de enfermagem mostraram a relevância do papel do enfermeiro e da equipe de enfermagem mediante aos sinais e sintomas da patologia referida e no enfrentamento à pandemia.

Sabe-se que o processo de enfermagem é um guia sistematizado para um estilo de pensamento que direciona julgamentos clínicos apropriados. Visto isso, é essencial a utilização das taxonomias de enfermagem como a classificação e avaliação, determinação das intervenções e estipular resultados esperados baseados em evidências científicas (JOHNSON, et al., 2009).

O presente estudo teve como finalidade, propor uma formulação de semiologia, elaborando diagnósticos de enfermagem pré-agrupados, traçando estratégias de enfrentamento desta e de outras pandemias que venham surgir, através da relação dos cuidados de enfermagem com o avanço clínico de melhora do paciente.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As doenças infecciosas e contagiosas continuam sendo um grande desafio para a saúde da população e uma ameaça para equipe de enfermagem e outros profissionais ao redor do mundo. As doenças respiratórias por si só abrangem um público muito alto e seu frequente aumento nas internações mostram a importância das medidas preventivas para contenção da patologia. As mudanças climáticas influenciam na

questão saúde-doença, principalmente em um público idoso, causando assim, uma morbimortalidade importante, principalmente em doenças de vias aéreas.

Como já conhecida, em dezembro de 2019, a cidade de Wuhan, na província da China, tornou-se o centro das atenções, devido ao surto de uma pandemia de causa ainda desconhecida naquele momento. No dia 7 de janeiro de 2020, inúmeros cientistas chineses haviam isolado um novo tipo de Coronavírus (SARS-CoV-2) em pacientes com pneumonia viral, o que posteriormente, viria a descobrir-se novas variantes para a doença.

As práticas de enfermagem variam ao redor do mundo, porém, é imprescindível destacar que as competências intimamente ligadas aos enfermeiros intensivistas no combate à patologia são muito importantes para contenção e/ou minimização da mesma. Diante do número cada vez maior de internações pelo novo Coronavírus (SARS-Cov-2), com superlotação de pacientes e crescente escassez de leitos, o equilíbrio emocional tornou-se uma questão primordial para as tomadas de decisões durante o processo de trabalho.

A enfermagem segue sendo a principal e maior categoria profissional de saúde, com mais de 20 milhões de enfermeiros espalhados ao redor do mundo, onde seguem prestando todos os cuidados no contexto da pandemia por COVID-19. Desde a triagem de pacientes suspeitos, até os cuidados durante a internação decorrentes das complicações pela doença, bem como sua atuação em ações de educação em saúde, gerenciamento, gestão, ensino e pesquisa.

Com o desenvolvimento do estudo em questão, foi evidenciado a necessidade de uma terminologia aplicada para assistência de enfermagem, assim como, os benefícios e a finalidade de sua implementação. A relevância do papel do enfermeiro frente a pandemia da Covid-19 foi pontuada, mostrando os cuidados que não podem deixar de ser prestados para que se obtenha o êxito no tratamento, bem como a necessidade de diagnósticos e intervenções de enfermagem no cuidado e recuperação de pessoas acometidas com a doença.

A consulta de enfermagem se faz importante na avaliação do paciente, afim de identificar precocemente os casos de síndromes gripais e consequentemente contendo o número de casos confirmados. A conduta do enfermeiro deve se basear em uma assistência qualificada, sempre orientando os pacientes sobre os sintomas causados

pelo vírus e os cuidados que o mesmo deve ter para não transmitir o vírus ao próximo. Assim ajudando a saúde pública a conter o número de casos e possíveis transmissões do vírus. O presente estudo possui grande relevância, sendo realizado com o intuito de ajudar profissionais enfermeiros a se capacitarem, com a finalidade de realizar uma sistematização do cuidado da forma mais satisfatória possível, diante dos eventos relacionados à patologia.

REFERÊNCIAS

Bai, Y. **Presumed Asymptomatic Carrier Transmission of COVID-19**. Paraná: JAMA. 2020

Bangalore, S.; Sharma, A.; Slotwiner, A. **ST-Segment Elevation in Patients with Covid-19 - A Case Series**. N. Engl J Med, Apr 17. 2020.

Belasco A.G.S; Fonseca C.D. **Coronavírus 2020**. Rev Bras Enferm. 2020;73(2):e2020n2. doi: <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2020730201>

Cespedes, M. S.; Souza, J. C. R. P. **Coronavirus: a clinical update of Covid-19**. Rev. Assoc. Med. Bras.; 66(2):116-123. 2020. Disponível em: <<https://blog.scielo.org/wpcontent/uploads/2020/04/1806-9282-ramb-66-2-0116.pdf>>. Acesso em: 27/02/2021.

Gerhardt, T. E.; Silveira, D. T. **Métodos de Pesquisa**. Série Educação a Distância. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 1ª edição, 2009. Disponível em: <[file:///C:/Users/User/Downloads/derad005\(1\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/derad005(1).pdf)>

Hu, B.; Ge, X.; Wang, L. F.; Shi, Z. **Bat origin of human coronaviruses**. Virology journal. 12, 221. 2015. Disponível em: <<https://doi.org/10.1186/s12985-015-0422-1>>

Lana, R., M. *et al.* **Emergência do novo coronavírus (SARS-CoV-2) e o papel de uma vigilância nacional em saúde oportuna e efetiva**. Cad. Saúde Pública 2020; 36(3). Fev. 2020.

Lima, C. M. A. O. **Information about the new coronavirus disease (COVID-19)**. Radiologia Brasileira, 53(2), V-VI. Epub. 2020. Disponível em:<<https://doi.org/10.1590/01003984.2020.53.2e1>>

Matt, A. *et al.* **Characteristics and outcomes of 21 critically ill patients with COVID-19 in Washington State**. JAMA. Published online March 19, 2020. Disponível em: <toledo.ufpr.br> Doi: 10.1001/jama.2020.4326

NANDA. **Diagnósticos de enfermagem da NANDA-I. Definições e classificações**. 2018. Porto Alegre, BR. Disponível em:

<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4976902/mod_resource/content/1/NANDAI2018_2020.pdf>

Nobre, A. et al. **Primeira detecção de coronavírus humano associado à infecção respiratória aguda na Região Norte do Brasil**. Revista Pan-Amazônica de Saúde, 5(2), 37-41. 2014. Disponível em: <http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S217662232014000200005&lng=pt&lng=pt>

Oliveira, K. K. D.; Freitas, R. J. M.; Araújo, J. L.; Gomes, J. G. N. **Nursing Now e o papel da enfermagem no contexto da pandemia e do trabalho atual**. Rev. Gaúcha Enferm. 2021;42(esp):e20200120. doi: <https://doi.org/10.1590/1983-1447.2021.20200120>

Oliveira, M. F. **Metodologia Científica: um manual para a realização de pesquisas em administração**. / Maxwell Ferreira de Oliveira. 2011. Universidade Federal de Goiás. Campus Catalão – Curso de Administração. UFG, 72 p.: il, 2011. Disponível em: <https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/KtbxLthdkchVXXQrhWWfXcvVpMNIVkQkWg?pr_ojector=1&messagePartId=0.3>

Pereira, A. S. et al. **Metodologia da Pesquisa Científica**. Licenciatura em Computação. Núcleo de Tecnologia Educacional – NTE; 1ª Edição. Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria. RS, 2018. Disponível em: <https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/358/2019/02/Metodologia-da-PesquisaCientifica_final.pdf>

Pereira, J. C; Stuchl, R. A. G; Sena, C. A. **Proposta de Sistematização da Assistência de Enfermagem pelas Taxonomias NANDA/NIC/NOC para o Diagnóstico de Conhecimento Deficiente**. Cogitare Enferm. Jan/Mar; 15(1):74-81, 2010. Disponível em: <file:///D:/Users/Cristiane/Desktop/TRABALHO%20COVID19/ARTIGOS/taxonomi%20de%20nanda.pdf>.

Organização Pan-Americana da Saúde. **Folha informativa COVID-19 – Escritório da OPAS e da OMS no Brasil**. <<https://www.paho.org/pt/covid19>>. Acesso em: 14/03/2021.

Siegel, M.; Parsons, P.; Finlay, G. **Síndrome do desconforto respiratório agudo: epidemiologia, fisiopatologia, patologia e etiologia em adultos**. UpToDate. March 24, 2020. Disponível em: <<http://www.toledo.ufpr.br/portal/artigos-cientificos-covid-19/>>

Wertheim, J. O. **A Case for the Ancient Origin of Coronaviruses**. Journal of Virology. June, Vol 87 Number 12 p. 7039 –7045, 2013. ISSN 0022-538X. PMC 3676139. PMID 23596293. <https://doi:10.1128/JVI.03273-12>.

- Woo, P. C. Y. **Coronavirus diversity, phylogeny and interspecies jumping.** Exp Biol Med (Maywood). 2009;234(10):1117-1127. Disponível em: <<https://doi.org/10.3181/0903-MR-94>>
- Wu, D. **The SARS-CoV-2 outbreak: what we know.** International Journal of Infectious Diseases. Published online March 12, 2020. Disponível em: <<http://www.toledo.ufpr.br/portal/artigos-cientificos-covid-19/>>
- Yuen, K.; Ye, Z.; Fung, S.; Chan, C.; & Jin, D. **SARS-CoV-2 and COVID-19: The most important research questions.** Cell & Bioscience, 10, 40. 2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.1186/s13578-020-00404-4>>
- Zheng, Y. **COVID-19 and the cardiovascular system.** Nature. Published online: March 5, 2020. Disponível em: <<http://www.toledo.ufpr.br/portal/artigos-cientificos-covid-19/>>
- Zhou, F. **Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study.** Lancet, March 11, 2020. Disponível em: <[https://doi.org/10.1016/50140-6736\(20\)30566-3](https://doi.org/10.1016/50140-6736(20)30566-3)>

ASSISTÊNCIA DO ENFERMEIRO EMERGENCISTA FRENTE A PANDEMIA DA COVID-19: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

DOI: 10.51859/amplla.csa511.1121-18

Marcela Claudia de Paula Oliveira ¹

Kélita Mirelle Oliveira Lima ²

Sidcley Benardino de Araújo ³

¹ Mestranda em Hebiatria. Programa de Pós-Graduação em Hebiatria – UPE

² Enfermeira Obstetra. Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

³ Doutor em Biologia Aplicada à Saúde. Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

RESUMO

A COVID-19 foi descoberto pela primeira vez na cidade de Wuhan (Hubei, China), em dezembro de 2019. Em janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou que a epidemia da COVID-19 constituía uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional, em 11 de março de 2020, declarou estado de pandemia. Este estudo objetiva identificar a assistência do enfermeiro emergencista diante a pandemia da COVID-19 nos serviços de emergência hospitalares. Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, onde foram selecionado estudos disponível na íntegra, em português, inglês e espanhol, no período de 2019-2021. A busca foi feita nas bases de dados CINAHL, LILACS, Medline/PubMed, através do cruzamentos dos descritores em saúde. Foram incluídos 10 artigos publicados que compuseram a amostra desta revisão. Observou-se que o cenário de pandemia atual contribuiu com os mais diversos riscos e problemas enfrentados diariamente pelos trabalhadores de enfermagem. A assistência do enfermeiro emergencista têm enfrentado rotineiramente precarização no processo de trabalho e inúmeros problemas no sistema de saúde, como falta de insumos para o atendimento, dimensionamento inadequado de pessoal, falta de EPI, jornadas extensas, sobrecarga de trabalho, baixos salários, falta de capacitação e até mesmo o medo da contaminação. Embora esses problemas já existissem no país eles se agravaram durante a pandemia.

Palavras-chave: Enfermagem em emergência. Infecções por coronavírus. Assistência Pré-hospitalar.

1. INTRODUÇÃO

A COVID-19, doença causada pelo coronavírus denominado (SARS-CoV-2), foi descoberto pela primeira vez na cidade de Wuhan (Hubei, China), em dezembro de 2019. Em janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que a

epidemia da COVID-19 constituía uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional, em 11 de março de 2020, declarou uma pandemia. No Brasil, o Ministério da Saúde (MS) atuou imediatamente, a partir da constatação dos rumores sobre a doença. Em janeiro, foi acionado o Centro de Operações de Emergência (COE) do MS, coordenado pela Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/ MS), para o planejamento e organização da prevenção e controle da situação epidemiológica no país (OMS, 2019; ZHU et al. 2020, CRODA et al. 2020).

O MS, por meio da Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da SARS-CoV-2 reconhecendo que a situação demandava o emprego urgente de medidas de prevenção. No Brasil, o primeiro caso da doença foi confirmado no dia 26 de fevereiro de 2020, na cidade de São Paulo – SP. O paciente, um homem de 61 anos, apresentava histórico de viagem para a Itália, região previamente afetada. A irradiação da doença para alguns estados do país levou o governo a publicar o Decreto nº 515, de 17 de março de 2020, que determinou o fechamento de serviços não essenciais. Além disso, a população foi orientada a manter-se em casa e evitar aglomerações, para não aumentar o número de pessoas infectadas pela doença (BRASIL, 2020).

Nesse período, os serviços de atendimento de urgência e emergência intra e pré-hospitalares também começaram o preparo para receber pacientes acometidos pela Covid-19. Ressalta-se que a maioria dos Hospitais de urgência e emergência já apresentavam superlotação de atendimentos em decorrência de outras patologias que acometem a população. O serviço de atendimento pré-hospitalar (APH), é essencial pois envolve todas as ações que ocorrem antes da chegada do paciente ao ambiente hospitalar e pode influenciar positivamente nos índices de morbidade e mortalidade. Nesse sentido, uma assistência qualificada e a chegada precoce ao hospital são fundamentais para que a taxa de sobrevivência aumente (BRASIL, 2013; MARQUES et al. 2020;).

No Brasil, de acordo com o MS, os casos de coronavírus até o dia 09 de fevereiro de 2021 chegaram a 9.524.640, e as mortes em torno de 231.534. Este novo vírus é da família Coronaviridae, que infectam mamíferos e causam síndrome respiratória, pode ser transmitido por pessoas infectadas em até sete dias após o início dos sintomas, ou ainda quando o paciente estiver assintomático. Os sintomas podem variar de leves a

graves, tendo como sinais e sintomas algumas manifestações respiratórias, como tosse, dispneia e febre. Os casos mais graves da doença podem evoluir para uma pneumonia severa ou Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), necessitando de hospitalização e alguns casos de UTI (BRASIL 2020; BRASIL, 2021;).

Em eventos de pandemia, torna-se essencial empregar medidas que propiciem mais segurança aos profissionais que trabalhem com esse tipo de atendimento, tendo em vista o risco elevado de contaminação devido a manipulação de materiais biológicos e produtos químicos que aumentam a vulnerabilidade a danos para a saúde. Além do mais, alguns fatores como questões emocionais, gravidade dos atendimentos, bem como dificuldade de acessibilidade e periculosidade em determinadas situações, somados a condições inadequadas de trabalho, podem colocar em risco a segurança desses profissionais e pacientes (CABRAL et al. 2020).

Para assegurar a segurança do paciente nos serviços de emergência hospitalares, como porta de entrada nos serviços de saúde, especialmente no enfrentamento da pandemia da COVID-19, o enfermeiro emergencista tem como responsabilidade, fortalecer os métodos para a utilização segura eficiente e correta da classificação de risco, com o objetivo de identificar os pacientes pertencentes ao grupo de risco, aqueles que necessitam de atendimento imediato, pacientes com maior risco de hospitalização, e, os que necessitam de encaminhamento a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) (FREIRE et al. 2019).

Diante a pandemia da COVID-19 o enfermeiro emergencista, age de maneira ativa na tomada de decisões, além de prestar assistência, acompanha a evolução dos pacientes acometidos ou com suspeita da doença. No entanto necessita desenvolver uma escuta qualificada, utilizando um olhar clínico, conhecimento e habilidades técnico-científicas, com finalidade em um atendimento integral e seguro prestado a cada paciente que é atendido no serviço de emergência. Como líder o enfermeiro atua no gerenciamento do cuidado e da equipe, a fim de certificar uma assistência de enfermagem qualificada (CUNHA et al.2018; QUARESMA et al. 2019;).

Sendo assim, torna-se fundamental discutir sobre os aspectos e a atuação do enfermeiro gestor e assistencial na assistência da enfermagem nos serviços de emergência hospitalares, considerando-o uma ferramenta para melhoria da qualidade do atendimento aos pacientes acometidos pela COVID-19. Considera-se fundamental

discutir medidas contemporâneas, tendências e desafios para o cuidado de enfermagem diante desta pandemia, procurando responder a seguinte questão: Qual a atuação do enfermeiro emergencista na gestão do cuidado frente a pandemia por COVID 19? Uma vez que tal discussão contribuirá para o fortalecimento da saúde e do empoderamento da enfermagem. Este artigo tem como objetivo identificar a assistência do enfermeiro emergencista diante a pandemia da COVID-19 nos serviços de emergência hospitalares.

2. MÉTODO

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura. Neste tipo de método de estudo é feita uma coleta de artigos científicos sintetizados a partir de fontes secundárias realizadas através de um levantamento de dados de grande relevância, pois inclui simultaneamente estudos experimentais e não experimentais como também questionamentos teóricos ou empíricos. A maior motivação para a Prática Baseada em Evidências (PBE) é o fruto das pesquisas na prática clínica. A PBE tem como um dos propósitos o encorajamento da utilização do produto de pesquisas à assistência prestada à saúde, nos inúmeros pilares da atenção, trazendo amparo para a relevância da prática clínica através da pesquisa. (SOUZA et al. 2010, MENDES et al. 2008).

A elaboração desta revisão percorreu as seis etapas: elaboração da questão de pesquisa, busca na literatura dos estudos primários, extração de dados, avaliação crítica dos estudos primários incluídos que inclui a avaliação da qualidade metodológica dos artigos e o nível de evidência, interpretação dos resultados e apresentação da revisão (MENDES et al. 2008). A questão de pesquisa delimitada foi: Qual a atuação do enfermeiro emergencista na gestão do cuidado frente a pandemia por COVID 19?

Os estudos primários foram selecionados a partir dos critérios de inclusão: artigos originais que abordassem a temática do estudo, disponível na íntegra, em português, inglês e espanhol, publicados desde dezembro de 2019 à janeiro de 2021. Cartas ao leitor, editoriais, teses, dissertações, livro, capítulos de livros, matéria de jornal, relato de experiência, estudo reflexivo, revisões sistemáticas ou integrativas da literatura e estudos que não respondessem à pergunta condutora, foram excluídos.

A busca das publicações ocorreu entre dezembro a janeiro de 2021, nas bases de dados CINAHL, LILACS, Medline/PubMed. Para viabilizar a busca foi realizado consultas

dos Descritores em Ciências da Saúde (DeSC) e no *Medical Subject Headings* (MeSH). Foram identificados os seguintes descritores em português e seus correspondentes em inglês: “COVID-19” “Cuidados de enfermagem”, “Enfermagem em emergência”,

Inicialmente, os descritores foram combinados entre si por meio do operador booleano AND, primeiramente aos pares buscando apreender as relações entre enfermagem em emergência com os demais descritores mencionados. Depois, foram realizados os cruzamentos entre os dois e depois os três descritores, de maneira que “COVID-19” foi mantido em associação com os outros descritores: “Cuidados de enfermagem” “Enfermagem em emergência”. Todos os cruzamentos foram feitos igualmente e na mesma ordem em cada base de dados (Tabela 1).

Na etapa de seleção dos estudos primários, foi realizada a leitura dos títulos das 3.448 publicações encontradas. Sendo excluídos 3.186 artigos por não abordarem a temática do estudo nos títulos. Dos 262 artigos selecionados para aplicação dos critérios de elegibilidade, foram excluídos estudos indisponíveis na íntegra (38), revisões sistemáticas ou integrativas da literatura (45), conferências (30), editorial (32), repetidos na base de dados (70) (Figura 1). Os artigos encontrados em mais de uma base de dados, foram catalogados apenas uma vez, de acordo com a ordem de identificação na primeira base de dados Medline/PubMed. Das 47 publicações selecionadas para a leitura dos resumos, 37 foram excluídos por não responder a pergunta condutora da pesquisa. Restaram 10 publicações para análise e discussão (Tabela 2).

Tabela 1- Publicações identificadas nas bases de dados no período de dezembro de 2019 à janeiro de 2021, com enfoque na atuação do enfermeiro emergencista no âmbito hospitalar.

Cruzamentos	Bases de dados			Total
	Medline/ PubMed	Lilacs	CINAHL	
COVID-19 AND Cuidados de Enfermagem	2.062	33	586	2.681
COVID-19 AND Enfermagem em Emergência	343	2	68	413
COVID-19 AND Cuidados de Enfermagem AND Enfermagem em Emergência	343	2	9	345
Total	2.748	37	663	3.448

Fonte: Autoria própria.

Figura 1 – Processo de seleção dos artigos com enfoque na atuação do enfermeiro emergencista no âmbito hospitalar.

Fonte: Autoria própria.

A extração dos dados foi norteada por um instrumento validado e adaptado que contempla as informações sobre os autores, objetivo, características metodológicas e principais resultados do estudo (URSI ES, 2006). Para avaliar o rigor metodológico utilizou-se o instrumento adaptado *Critical Appraisal SkillsProgramm* (CASP), que classifica os estudos como: de boa qualidade metodológica e viés reduzido (categoria A - 6 a 10 pontos) e com qualidade metodológica satisfatória (categoria B - no mínimo 5 pontos), no entanto todos os artigos foram incluídos (CASP, 2013).

O nível de evidência foi avaliado de acordo com a classificação hierárquica, divididos em: nível 1, estudos de metanálise de múltiplos estudos controlados; nível 2, estudo individual com delineamento experimental; nível 3, estudo com delineamento experimental, como estudo sem randomização com grupo único, pré e pós-teste; nível 4, pesquisas descritivas correlacional e qualitativa ou estudo de caso; nível 5, relatórios de casos ou dados obtidos de forma sistemática, de qualidade verificável ou dados de avaliação de programas; e nível 6, opinião de autoridades respeitáveis baseada na competência clínica ou opiniões de comitês de especialistas, incluindo interpretações não baseadas em pesquisas (OXFORD, 2009). Os resultados foram discutidos nos referenciais da literatura científica.

3. RESULTADOS

Os 10 artigos incluídos nesta revisão integrativa foram publicados na língua inglesa, espanhol e português nos últimos três anos (entre 2019 e 2021) (DEITRICK et al. 2020; QUADROS et al. 2020; NEVES et al. 2020; MORAIS et al. 2020; XIAO YING WU et al. 2020; SCHOEDER et al. 2020; ARONS et al. 2020; ESTALELLA et al. 2021; GONZÁLEZ-GIL et al. 2021; ANDRÉS-GIMENO et al. 2021), sobressaindo-se os anos de 2020 e 2021. Em relação às bases de dados, três foram identificados na CINAHL (DEITRICK et al. 2020; QUADROS et al. 2020; NEVES et al. 2020), seis foram encontrados na MEDLINE/PubMed (XIAO YING WU et al. 2020; SCHOEDER et al. 2020; ARONS et al. 2020; ESTALELLA et al. 2021; GONZÁLEZ-GIL et al. 2021; ANDRÉS-GIMENO et al. 2021) e um na LILACS (MORAIS et al. 2020). No que se refere ao desenho de pesquisa dos estudos, duas são revisões sistemáticas (MORAIS et al. 2020; DEITRICK et al. 2020), três pesquisas transversais (XIAO YING WU et al. 2020; ARONS et al. 2020; GONZÁLEZ-GIL et al. 2021), uma pesquisa qualitativa (SCHOEDER et al. 2020), dois relatos de experiência (NEVES et al. 2020; ESTALELLA et al. 2021) e dois estudos reflexivos (QUADROS et al. 2020; ANDRÉS-GIMENO et al. 2021). Em relação ao nível de evidência são classificados como nível IV, conforme a classificação JBI (Joanna Briggs Institute), categorizada de I a V sendo o nível I o de maior nível de evidência.

A tabela 2 apresenta uma síntese dos estudos incluídos na revisão, contendo autor/ano, tipo de estudo, objetivo, resultados e nível de evidência.

Tabela 2 – Síntese dos estudos.

AUTOR/ANO	TIPO DE ESTUDO	OBJETIVO	RESULTADOS	NÍVEL DE EVIDÊNCIA
DEITRICK et al. 2020	Revisão sistemática	Dirigir o atendimento emergencial de enfermagem a pacientes com COVID-19.	O cuidado de enfermagem tem sido amplamente favorável, mas deve incluir um forte foco na propagação na mitigação da propagação da infecção para funcionários e pacientes.	Nível II-a
QUADROS et al. 2020	Estudo reflexivo	Refletir sobre desafios enfrentados pela Enfermagem	Recomendações sobre medidas de prevenção não estão sendo suficientes para barrar	Nível V-d

		brasileira no combate à COVID-19	as infecções entre os funcionários, é necessário o serviço de saúde fornecer infraestrutura material e pessoal e capacitação contínua aos trabalhadores	
NEVES et al. 2020	Relato de experiência	Relatar a experiência de enfermeiros na utilização de uma tecnologia móvel para o cuidado de enfermagem a usuários na atenção primária e especializada durante a pandemia da COVID-19.	Elaboração de novas ferramentas para o acompanhamento de usuários atendidos pelos serviços de saúde por meio de tecnologias remotas que mediaram a assistência de enfermagem.	Nível IV-c
MORAIS et al. 2020	Revisão sistemática	Descrever as rotinas e protocolos relacionados às melhores práticas para assistência de enfermagem aos pacientes com a COVID-19.	Montar estratégias para qualificar a assistência e, ao mesmo tempo, promover a segurança dos profissionais que atuam diretamente no cuidado aos pacientes com a COVID-19.	Nível II-a
XIAO YING WU et al. 2020	Estudo transversal	Resumir o papel da gestão de enfermagem na transformação de um hospital geral em um hospital designado para o tratamento de pacientes COVID-19.	Um sistema de gestão de enfermagem eficiente tem altos índices de cura e alta.	Nível IV-c
SCHOEDER et al. 2020	Estudo qualitativo	Explorar a experiência de ser uma enfermeira registrada cuidando de pacientes com COVID-19 em um centro médico acadêmico urbano durante os primeiros estágios da pandemia.	Os profissionais sentiram o dever de cuidar de pacientes com COVID-19 apesar do medo de adquirir ou disseminar a infecção.	Nível III-b
ARONS et al. 2020	Estudo transversal	Observar a transmissão de infecção da SARS-COV-2 em uma instalação de enfermagem especializada.	Estratégias de controle de infecção focadas apenas em residentes sintomáticos não foram suficientes para prevenir a transmissão após a introdução do	Nível IV-c

			SARS-COV-2 nesta instalação.	
ESTALELLA et al. 2021	Relato de experiência	Relatar a gestão e liderança dos serviços de enfermagem no plano de emergência para a pandemia COVID-19.	A capacidade de trabalhar em equipe, a gestão emocional e o respeito pelas decisões organizacionais tornaram possível enfrentar os desafios que a pandemia representou.	Nível IV-c
GONZÁLEZ-GIL et al. 2021	Estudo transversal	Identificar necessidades relacionadas a segurança, organização, tomada de decisão, comunicação e necessidades psico-socioemocionais percebidas por enfermeiros de cuidados intensivos e emergências na região de Madri, Espanha, durante a fase aguda da crise epidêmica.	37,5% dos profissionais relataram trabalhar com medo de se infectar e de suas consequências, e 28,2% relataram a exaustão relacionadas a carga de trabalho elevadas.	Nível IV-c
ANDRÉS-GIMENO et al. 2021	Estudo reflexivo	Fornecer recomendações para a prática clínica que auxiliem na protocolização do atendimento a dois enfermeiros em pacientes adultos internados em Unidades de Internação por COVID-19.	O desafio da gestão de enfermagem é a implementação de mecanismos que auxiliar na formação desses profissionais para o atendimento a pacientes com COVID-19.	Nível V-d

Fonte: Autoria própria.

4. DISCUSSÃO

Uma pandemia provoca um grande impacto social repercutindo no setor saúde, envolvendo toda Rede de Atenção à Saúde, que está na linha de frente no combate à doença. Os profissionais da assistência em contato direto com os pacientes são os protagonistas e, dessa forma, possuem alto risco de exposição ao patógeno. Em epidemias e pandemias anteriores, como o de MERS-CoV, os trabalhadores da saúde

tiveram papel significativo na propagação dos casos (MORAIS et al. 2020; QUADROS et al. 2020; NEVES et al. 2020).

Para o atendimento dos pacientes com COVID-19 em unidades de tratamento intensivo, os profissionais devem levar em consideração o manejo adequado da rotina diária, contribuindo com a segurança nas práticas assistenciais. Do mesmo modo, todos os profissionais devem ser capacitados para a prevenção da transmissão de agentes infecciosos e para o uso adequado dos EPI. Os profissionais envolvidos devem respeitar as normas e rotinas de cada instituição, visando a segurança da equipe de trabalho e do paciente (JACKSON et al. 2020).

Um dos principais problemas relacionados à assistência ao paciente com COVID-19 é a garantia do fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI) a todos os profissionais assistencialistas. Assim, é essencial para a segurança dos colaboradores, a manutenção de um estoque mínimo necessário de EPIs (ABENFO, 2020; BRASIL, 2005). Os profissionais que atuam por longas horas e próximos a pacientes vulneráveis em ambientes de saúde, é de suma importância estarem capacitados e equipados, não somente para impedir a transmissão desse agente para outras pessoas, mas também para diminuir ao máximo o risco de contrair a doença. No cenário atual não é diferente. Há uma tendência em aumentar a contaminação pela demanda apresentada na saúde, necessitando abordagem e controle ainda mais rigorosos (OMS, 2020; MORAIS et al. 2020).

Quanto ao dimensionamento de pessoal em serviço de emergência é importante manter um quantitativo mínimo dos diferentes níveis de formação para a cobertura assistencial nas instituições de saúde. É importante os gestores estarem atentos que nessa pandemia é crescente ao número de profissionais que podem necessitar de licença de saúde por terem sido contaminados (RIBEIRO, 2020). Por sua vez, os profissionais de enfermagem emergencistas com mais de 60 anos, as gestantes ou lactantes e as portadores de doenças do grupo de risco deverão ser protegidos, através do afastamento do serviço ou realocação para outros setores (ABENFO, 2005).

Dentre as medidas de controle e prevenção de infecções, especialmente na COVID-19, a mais importante é a higienização das mãos com água e sabonete líquido (por 40 a 60 segundos) ou com preparação alcoólica a 70% (por 20 a 30 segundos) (BRASIL, 2020; OLIVEIRA et al. 2016). É um procedimento simples e muito eficaz que

impede a transmissão de uma pessoa para outra. Do mesmo modo, os profissionais devem manter sempre as unhas curtas e limpas, a barba feita ou aparada, utilizar sapatos fechados, confortáveis e com solado de borracha para evitar escorregões e barulho (BRASIL, 2005). Sobre a jornada de trabalho, os preparativos iniciam com a retirada de adornos (anéis, alianças, correntes, brincos etc.), a manutenção dos cabelos presos e a remoção de utensílios de uso pessoal como celulares, tesouras, canetas, dentre outros (BRASIL, 2005; BRASIL, 2020).

A utilização dos EPIs é indispensável para a prevenção. Preconiza-se que as vestimentas a serem utilizadas sejam fornecidas pelo hospital: macacão, capote ou avental impermeável de manga longa, com punho de malha ou elástico e abertura posterior. Essa vestimenta deve ser amarrada no pescoço e na cintura e deve ser verificado se está bem fechado nas costas. Todo capote ou avental que apresentar sujidade deve ser removido e descartado após a realização do procedimento, antes de sair do quarto do paciente ou da área de assistência. Após a remoção do capote, deve-se proceder imediatamente a higienização das mãos para evitar a autotransmissão ou a transmissão do vírus para outros profissionais, aos pacientes e ao ambiente. O descarte de roupas sujas utilizadas pelos profissionais deve ser realizado com cuidado em recipiente apropriado (OLIVEIRA et al. 2020). Para o processo de lavagem das roupas, tanto as utilizadas pela equipe de saúde quanto as que tiveram contato com pacientes com COVID-19, o processo é o mesmo utilizado para as roupas provenientes de quaisquer outros pacientes (BRASIL, 2020).

A máscara facial indicada na assistência para a COVID-19 é a FFP3 ou, se essa não estiver disponível, a FFP2 ou N95. Deve-se vestir gorro e óculos de proteção ou a máscara protetora de face (face shield) quando houver risco de exposição do profissional a respingos de sangue, secreções corporais e excreções. Devem ser de uso exclusivo para cada profissional responsável pela assistência, sendo necessária a higienização correta após o uso (BRASIL, 2020; OLIVEIRA et al. 2020; OMS, 2020).

Para esses profissionais de saúde que atuam na linha de frente no cuidado na assistência ao paciente em condição crítica devem seguir cuidados para a saúde mental (MORAES et al. 2020). Fazer descansos entre os turnos de trabalhos, se possível durante o expediente, alimentar-se com dieta saudável e hidratação, manter contato com familiares sempre que possível, mesmo sendo virtual. Os coordenadores e gestores das

unidades devem estar disponíveis para oferecer um apoio social e manter contato livre com a equipe de psicologia (BRASIL, 2005; DAL-PIZZOL, 2020). Para minimizar o estresse e o controle emocional, deve-se assegurar uma equipe suficiente para cada turno de trabalho, realizando rodízio para as áreas com menor exposição e os funcionários menos experientes com os mais experientes. A boa relação entre colegas auxilia na redução do estresse e promove um ambiente mais seguro (DAL-PIZZOL, 2020; MORAES et al. 2020).

5. CONCLUSÃO

O cenário de pandemia atual contribuiu com os mais diversos riscos e problemas enfrentados diariamente pelos trabalhadores de enfermagem, entretanto, o compromisso com o cuidado biopsicossocial dos pacientes, família e comunidade mantém-se independentemente da situação vivenciada por esses profissionais. Nessa perspectiva, a assistência do enfermeiro emergencista têm enfrentado rotineiramente precarização no processo de trabalho e inúmeros problemas no sistema de saúde, como falta de insumos para o atendimento, dimensionamento inadequado de pessoal, falta de EPI, jornadas extensas, sobrecarga de trabalho, baixos salários, falta de capacitação e até mesmo o medo da contaminação. Observamos também inúmeros fatores (institucionais, profissionais e pessoais) que contribuem para o adoecimento desses profissionais. Embora esses problemas já existissem no país eles se agravaram durante a pandemia.

Considera-se então como limitação do estudo o fato de o tema abordado ser novo, com poucas publicações para fomentar o caráter reflexivo deste manuscrito, em especial no cenário atual. Outro fator limitante são os dados apresentados de profissionais que se modificam diariamente, cabendo a reflexão realizada apenas no momento da escrita do artigo, com consciência de que os dados apontados devem ser maiores e mais preocupantes com o passar dos dias.

Como contribuição para a prática clínica e assistencial, acredita-se ser importante registrar, documentar e refletir sobre o momento marcante e muito difícil vivenciado pela enfermagem durante a pandemia da COVID-19 que marcará toda a categoria profissional, permitindo futuramente subsidiar novas pesquisas e reflexões

relacionadas as condições de trabalho, a fim de pautar as ações de saúde para prevenção de agravos aos profissionais de saúde.

Embora o enfermeiro seja mediador de saúde que vêm trabalhando incansavelmente no enfrentamento da pandemia sob condições precárias, como baixa valorização salarial, ainda há poucos estudos que evidenciem a assistência do enfermeiro emergencista diante a pandemia da COVID-19 nos serviços de emergência hospitalares. Sendo assim, faz-se necessário mais estudos que evidenciem a maneira atuante desses profissionais no cenário de pandemia atual.

REFERÊNCIAS

- ANDRÉS-GIMENO, B.; SOLÍS-MUNOZ, M.; REVUELTA-ZAMORANO, M.; SÁNCHEZ-HERRERO, H.; SANTANO-MAGARINO, A. Cuidados enfermeros en el paciente adulto ingresado en unidades de hospitalización por COVID-19. **Enfermería Clínica**, 31 (2021) S49--S54.
- ARONS, M. M.; HATFIELD, K. M.; REDDY, S. C.; KIMBALL, A.; JAMES, A. et al. Presymptomatic SARS-CoV-2 Infections and Transmission in a Skilled Nursing Facility. **The new england journal of medicine**, 2020, p. 1-10.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMEIROS OBSTETRAS - ABENFO. Sociedade Brasileira de Enfermeiros Pediátricas. COVID-19. Nota técnica referente aos cuidados da equipe de enfermagem obstétrica, neonatal e pediátrica diante de caso suspeito ou confirmado. 2020.
- BRASIL. Secretaria da Saúde de Santa Catarina. Coronavírus. [Internet]. [Disponível em: <http://www.saude.sc.gov.br/coronavirus/doenca.html>. Acesso em: 05 mai 2021.
- BRASIL. Decreto nº 515, de 17 de março de 2020. Declara situação de emergência em todo o território catarinense, nos termos do COBRADE nº 1.5.1.1.0 – doenças infecciosas virais Florianópolis, SEA 3147/2020. [Internet]. Disponível em: https://www.sc.gov.br/images/DECRETO_525.pdf. Acesso em: 05 mai 2021.
- BRASIL. Ministério da Saúde (BR). Manual instrutivo da rede de atenção às urgências e emergências no Sistema Único de Saúde. Brasília, DF(BR), 2013. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_instrutivo_rede_atencao_urgencias.pdf. Acesso em: 05 mai 2021.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Boletim Epidemiológico-Semana Epidemiológica Brasília: Secretaria de Vigilância em Saúde- Centro de Operações de emergência em Saúde Pública; 09 Fev 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolo de Tratamento do Novo Coronavírus (2019-nCoV). Centro De Operações De Emergência Do Rio Grande Do Sul/COERS Brasília: Secretaria de Atenção Especializada à Saúde; 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (SAES). Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência (DAHU). Coordenação-Geral de Urgência (CGURG). Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FN-SUS). Protocolo de tratamento do novo coronavírus (2019-nCoV). Brasília. 2020. Disponível em: <https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/11/protocolo-manejo-Coronavirus.pdf>. Acesso em: 05 mai 2021.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde. Gerência de Vigilância e Monitoramento em Serviços de Saúde. Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº04/2020 - Orientações para serviços de saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2). 2020. 92p. Disponível em: portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+Técnica+n+04-2020+GVIMS-GGTES-ANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28. Acesso em: 05 mai 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Boletim Epidemiológico Nº 18 – Doença pelo Coronavírus 2019. Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública | COVID-19. 2020. Disponível em: <http://saude.gov.br/images/pdf/2020/June/18/Boletim-epidemiologico-COVID-2.pdf>. Acesso em: 05 mai 2021.

BRASIL. Ministério do Trabalho. Norma Regulamentadora NR 32 – Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. Brasília. Diário Oficial da União. 16/11/05. Disponível em: https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_NR/NR-32.pdf. Acesso em: 05 mai 2021.

CABRAL, C. C. O.; BAMPI, L. N. S.; QUEIROZ, R. S.; ARAUJO, A. F.; CALASANS, L. H. B.; VAZ, T. S. Quality of life of nurses from the mobile emergency care service. **Texto Contexto Enfermagem**, 2020, 29:e20180100.

CRODA, J. H. R.; GARCIA, L. P. Resposta imediata da Vigilância em Saúde à epidemia da COVID-19. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, 2020, 29(1):e2020002.

CUNHA, Y. M.; SANTOS, E. O.; JESUS, A. J.; DIAS, E. C.; ROCHA, L. S. A Prática do Enfermeiro em Urgência e Emergência: “Competências X Habilidades”. **Revista Científica Univiçosa**, Viçosa-MG, 1346 Anais X Simpac 2018;10(1):1346–50.

DAL-PIZZOL, F. Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB). Recomendações da Associação de Medicina Intensiva Brasileira para a abordagem do COVID-19 em medicina intensiva. 2020. Disponível em: <https://www.amib.org.br/>

fileadmin/user_upload/amib/2020/abril/04/Recomendacoes_AMIB04042020_10h19.pd. Acesso em: 05 mai 2021.

DEITRICK, K.; ADAMS, J.; CHEC-II, NREMT; JOSHUA DAVIS, M. D.; HERSHEY, P. A. Emergency nursing care of patients with novel coronavirus disease 2019. **Journal of emergency nursing**, 2020, 46(6):748-759

ESTALELLA, G. M.; ZABALEGUI, A.; GUERRA, S. S. Gestión y liderazgo de los servicios de Enfermería en el plan de emergencia de la pandemia COVID-19: la experiencia del Hospital Clínic de Barcelona. **Enfermería Clínica**, 2021, 31 p. 12-17.

FREIRE, G. V.; ARAÚJO, E. T. H.; ARAÚJO, E. B.; ALVES, L. S.; FREIRE, A. C. M.; SOUSA, G. F. Liderança do enfermeiro nos serviços de urgência e emergência: revisão integrativa. **Brazilian Journal of Health Review**, 2019; 2(2): 2029-2041.

GONZÁLEZ-GIL, M. T.; GONZÁLEZ-BLÁZQUEZ, C.; PARRO-MORENO, A. I.; PEDRAZ-MARCOS, A.; PALMAR-SANTOS, A. et al. Nurses' perceptions and demands regarding COVID-19 care delivery in critical care units and hospital emergency services. **Intensive & Critical Care Nursing**, 62 (2021) 102966.

JACKSON, J. M. F.; ÁVILA, A. A.; ALGRANTI, E.; GARCIA, E. G.; SAITO, C. A.; MAENO, M. A saúde do trabalhador e o enfrentamento da COVID-19. **Revista Brasileira de Saúde Ocupacional**, 2020;45: e 14.

MARQUES, L. C.; LUCCA, D. C.; ALVES, E. O.; FERNANDES, G. C. M.; NASCIMENTO, K. C. Covid-19: cuidados de enfermagem para segurança no atendimento de serviço pré-hospitalar móvel. **Texto Contexto Enfermagem**, 2020, 29:e20200119.

MENDES, K. D. S.; SILVEIRA, R. C. C. P.; GALVÃO, C. M. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. **Texto Contexto Enfermagem**, 2008. Disponível em: http://redenep.unisc.br/portal/upload/com_arquivo/revisao_integrativametodo_de_pesquis_para_incorporacao_de_evidencias_na_saude_e_na_enfermagem.pdf. Acesso em: 15 Set. 2020

MOHER D, LIBERATI A, TETZLAFF J, ALTMAN DG. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. *PLoS Med*. 2009;6(7):e1000097. DOI: 12.1371/journal.pmed.1000097 Disponível em: <https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1000097>. Acesso em: 15. Set. 2020.

MORAES, E. M.; ALMEIDA, L. H. A.; GIORDANI, E. Covid-19: cuidados de enfermagem em unidade de terapia intensiva. **Scientia Medica Porto Alegre**, v. 30, p. 1-11, jan.-dez. 2020.

NEVES, D. M.; MOURA, G. S.; GERMANO, S. N. F.; CACIANO, K. R. P. S.; SOUZA FILHO, Z. A.; OLIVEIRA, H. M.; CORDEIRO, P. M.; GARRIDO, M. S. Tecnologia móvel para o

cuidado de enfermagem durante a pandemia da covid-19. **Enfermagem em Foco**, 2020; 11 (Esp. 2): 160-166 160

Norma Regulamentadora NR 32 – Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. Brasília. Diário Oficial da União. 16/11/05. Disponível em: https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_NR/NR-32.pdf. Acesso em: 05 mai 2021

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Organização Pan- -Americana da Saúde (OPAS). Orientação sobre o uso de máscaras no contexto da COVID-19. Orientação provisória. 05 de junho de 2020. Disponível em: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52254/OPASWBRACOV-1920071_por.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 05 mai 2021.

OLIVEIRA, A. C. DE; DE PAULA, A. O.; SOUZA, M. A. DE; SILVA, A. G. Adesão à higiene de mãos entre profissionais de um serviço de pronto atendimento. **Revista de Medicina**. 2016;95(4):162-67.

OLIVEIRA, A. C.; LUCAS, T. C.; IQUIAPAZA, R. A. O que a pandemia da COVID-19 tem nos ensinado sobre adoção de medidas de precaução? **Texto Contexto - Enfermagem**. 2020;29:e20200106.

OXFORD. Oxford Centre for Evidence-based Medicine: levels of evidence. Disponível em: <http://www.cebm.net/oxfordcentre-evidence-based-medicine-levels-evidence-march-2009>. Acesso em: 16. Set. 2020.

OXFORD. Critical Appraisal Skills Programme . **Oxford**: CASP; 2013- Disponível em: http://media.wix.com/ugd/dded87_ebad01cd736c4b868abe4b10e7c2ef23.pdf Acesso em: 12 Set. 2020

QUARESMA, A. S.; XAVIER, D. M.; CEZAR-VAZ, M. R. O papel do enfermeiro na classificação de risco nos serviços de urgência e emergência. **Investigación y Educación en Enfermería**, 2019; 87, 1–10.

QUADROS, A.; FERNANDES, M. T. C.; ARAUJO, B. R.; CAREGNATO, R. C. A. Desafios da enfermagem brasileira no combate da covid-19. **Enfermagem em Foco**, 2020; 11 (1) Especial: 78-83.

RIBEIRO, M. L. B. Conselho Federal de Medicina. Parecer CFM nº 4/2020. Tratamento de pacientes portadores de COVID-19 com cloroquina e hidroxicloroquina. 2020. Disponível em: <http://www.saude.mppr.mp.br/arquivos/File/Corona/CFM/6.pdf>. Acesso em: 16. Set. 2020

SCHROEDE, K.; NORFUL, A. A.; TRAVERS, J.; ALIYU, S. Nursing perspectives on care delivery during the early stages of the covid-19 pandemic: A qualitative study. **International Journal of Nursing Studies Advances**, 2 (2020) 100006.

SOUZA, M. T.; SILVA, M. D.; CARVALHO, R. Revisão integrativa: o que é e como fazer. Einstein, 2010. Disponível em: http://www.astresmetodologias.com/material/O_que_e_RIL.pdf Acesso em: 16. Set. 2020.

WORLD HEALTH ORGANIZATION - WHO. Statement on the second meeting of the international health regulations (2005) emergency committee regarding the outbreak of novel coronavirus (2019-nCoV) [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2020 [cited 2020 Apr 7]. Available from: [https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-\(2019-ncov\)](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))

XIAOYING WU, SHAOYAN ZHENG, JIAJIA HUANG, ZELI ZHENG, MANQING XU AND YUHUA ZHOU. Contingency Nursing Management in Designated Hospitals During COVID-19. **Outbreak. Annals of Global Health**, 2020; 86(1): 70, 1–5.

ZHU, N.; ZHANG, D.; WANG, W.; LI, X.; YANG, B.; SONG, J. et al. A novel coronavirus from patients with pneumonia in China, 2019. **National Library of Medicine**, 2020, 382:727-33.

CAPÍTULO XIX

O IMPACTO DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS: DESAFIOS ECONÔMICOS E MENTAIS

DOI: 10.51859/ampla.csa511.1121-19

Pamela Gomes ¹
Wellington Vieira ²
Christian Recchioni ³

¹ Mestranda em Cirurgia e Traumatologia BucomaxiloFacial. Faculdade de Medicina e Odontologia São Leopoldo Mandic – SLMandic.

² Mestrando em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial. Faculdade de Medicina e Odontologia São Leopoldo Mandic – SLMandic.

³ Doutorando em Clínica Odontológica da Faculdade São Leopoldo Mandic e Coordenador de Cirurgia e Traumatologia da Uniavan.

RESUMO

A infecção pelo novo Coronavírus 2019 (COVID-19) tem causado um grave impacto na saúde mundial, nos setores hospitalar e odontológico. O Brasil registrou o segundo maior número de pacientes e mais óbitos pelo coronavírus no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. Os meios de comunicação social e científicas afirmaram que cirurgiões dentistas foram considerados grupo de risco para o COVID-19, podendo atuar como vetor de transmissão direta e indireta em sua rotina de atendimento odontológico. Diante do ocorrido novas regras e hábitos amparados pela Organização Mundial de Saúde, alertaram sobre os atendimentos e procedimentos Odontológicos fossem realizados em caso de necessidade extrema; ou seja; apenas atendimentos de urgência e emergência, e casos eletivos fossem postergados, como medida de prevenção da disseminação do COVID-19, o distanciamento social adotado no Brasil pode ter consequências econômicas e psicossociais para a odontologia. Neste contexto, o presente estudo, os autores realizaram uma pesquisa nacional com cirurgiões dentistas brasileiros para avaliar o impacto da pandemia do novo Coronavírus sobre as atividades odontológicas. Um total de 246 cirurgiões dentistas responderam à pesquisa e os resultados indicaram que a grande maioria dos profissionais tiveram renda diminuída no período, seja pelos cancelamentos de consultas ou diminuição o número de atendimentos. Eles têm consciência que estão mais expostos, e por este motivo realizaram investimento científico e aquisição de equipamentos de proteção individual e essas junções de fatores podem provocar maior prejuízo no período de pandemia.

Palavras-chave: COVID-19. Cirurgião-dentista. Impacto-econômico. Coronavírus-19. Pandemia.

1. INTRODUÇÃO

A Organização Mundial de Saúde (OMS), confirmou na china, o surto da COVID-19 em dezembro de 2019, causada pelo vírus de cepa Coronavírus. A COVID-19 foi considerada uma pandemia em função do seu poder de alcance, ocasionando grande números de adoecimento relacionados as vias respiratórias e óbitos mundiais, exigindo uma ação epidemiológica para combate e controle aos problemas ocasionados pela SARS-CoV-2 (WHO,2020). A sintomatologia característica do COVID-19 são: febre, fadiga, tosse seca , associadas à mialgia e dispneia (MS, 2020; PENG et al., 2020).

No último relatório do Ministério da Saúde, publicado em 14 de dezembro de 2020, estão documentados 6.901.952 casos confirmados, 181.402mortes, com registro em países de todas as regiões do mundo . No Brasil, a primeira notificação do COVID 19 ocorreu em 25 de fevereiro de 2020 4 e desde então o número de acometidos pelo vírus tem crescido, gradativamente. O ministério da saúde divulgou em seu site uma síntese dos casos ocorridos nas regiões brasileiras: sudeste com 2.409.036, seguidos da região nordeste 1.751.622, sul 1.143.101, centro-oeste com 815.043 e o Norte com 808.343 (MS,2020).

No que se refere aos aspectos epidemiológicos aos profissionais de saúde, o ministério da saúde lançou uma cartilha a fim de mantê-los informados quanto as questões de transmissão, e prevenção mediante a determinados procedimentos odontológicos eficazes em relação a COVID-19. Uma das principais informações foram sobre as vias de transmissão diretas são: tosse, espirro, inalação de gotículas ou transmissão por contato com a via oral, nasais ou membranas mucosas dos olhos, e por superfícies contaminadas (WHO,2020; BANERJEE,2020). Os motores odontológicos são os principais são as principais rotas diretas de transmissão: os aerossóis, priorizando-os como grupos de risco para a infecção do COVID-19 .Justificando a argumentação aos odontólogos á priorizassem os atendimentos emergenciais de seus pacientes, seguidos previamente de bochechos com clorexidina 0,12% ou água oxigenada 10 volumes (WHO,2020;BANERJEE,2020).Os cirurgiões dentistas são os profissionais aptos a identificar, solicitar exames: laboratoriais e exames de imagens como a tomografia, necessários em casos suspeitos de COVID-19, relacionadas aos sinais, sintomas, grupos de risco e gravidade da doença (MORES et al.,2009).

Estudos demonstram que a China foi o primeiro país que adotou a quarentena, o isolamento social como medidas protetivas a disseminação do novo Coronavírus indicam que há consequências psicológicas em massa, tais como ansiedade, depressão, uso excessivo de álcool, solidão, e menor bem estar mental em relação aos índices populacionais usuais (AHMED et al.,2020).

Associado a isso, pode constatar perdas econômicas nos locais mais afetados e crescente preocupação no setor econômico em consequência da pandemia do COVID-19, o risco psicossocial está intimamente interligado a recessão econômica, pobreza e desemprego (PRZYBYLSKI et al., 2020), mediante essas hipóteses os autores questionaram de que forma a pandemia poderia afetar negativamente a saúde mental e financeira dos odontólogos durante o episódio pandêmico.

2. METODOLOGIA

No presente estudo, os autores realizaram uma pesquisa, com cirurgiões dentistas brasileiros com intuito de avaliar qual foi o impacto do Coronavírus nas rotinas odontológicas desses profissionais sobre: o status de conhecimento pandêmico do COVID-19, as características epidemiológicas dos profissionais: gênero, idade, grupo de risco, a relação das regiões brasileiras, atendimento clínico: tipos de procedimentos realizados, as especialidades, alterações laboratoriais, prevenção, sintomas sugestivos, diretrizes de tratamento e o fator econômico.

A metodologia utilizada foi um estudo de caso descritivo, qualitativo, quantitativo, exploratório e inferencial, tendo como cenário a pandemia do COVID-19 nas rotinas odontológicas no Brasil. O estudo de caso na área da saúde tem a finalidade de investigar analisar e descrever um fenômeno de forma a validar uma pesquisa científica (PEREIRA et al.,2019).O Estudo de caso pode ser considerado complexo e completo; pois descreve, analisa e observa dados: qualitativos e quantitativos. Segundo Yin (2015) dados qualitativos e quantitativos são complementares em um amplo estudo investigativo.

Esse projeto de pesquisa teve a participação de 246 cirurgiões dentistas de ambos os sexos, de todas as regiões brasileiras, e que aceitaram participar do estudo, seguindo os preceitos éticos do estudo, assinando o Termo de Consentimento Livre e

Esclarecido (TCLE).O mesmo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa/CEP da Faculdade de Medicina e Odontologia da São Leopoldo Mandic, com parecer de aprovação nº 4.359.650.

A coleta de dados desse projeto foi realizada pelos mestrandos de cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial utilizando os seguintes instrumentos: Questionário sociodemográfico econômico; Questionário de Condições de Saúde; Questionário sobre o conhecimento da Pandemia do COVID-19, Questionário sobre aquisição de EPIS. Todos os instrumentos foram implantados para o banco de informações pelos mestrandos de cirurgia, através da plataforma de questionários online Google Forms. O instrumento de coleta de dados utilizado foi um questionário on line, composto de 21 questões ordenadas de perguntas fechadas e abertas, respondidos sem a presença do entrevistador (MARCONI & LAKATOS,2003). O questionário online utilizado neste período de quarentena ou isolamento social, possibilitou alcançar grande número de participantes em anonimato, além de não sofrer influência de opiniões do entrevistador, o questionário virtual, consiste em questões fechadas e uma questão aberta . A técnica de amostragem utilizada foi a amostra por conveniência devido ao período curto de permanência da pesquisa: 16 de agosto a 16 de setembro de 2020 (30 dias corridos),levando em consideração a disponibilidade de pessoas neste intervalo de tempo, resultando em um método mais prático, fácil, objetivo em seus resultados.

A amostra de conveniência do nosso projeto consta com uma parte dos cirurgiões dentistas que aderiram ao questionário neste cenário de Pandemia, permitindo observar e coletar informações críticas que devem ser resolvidas imediatamente.

Os critérios de inclusão foram: ser cirurgião dentista com atuação nas regiões brasileiras.Com a finalidade de garantir maior fidelidade nas informações e por não ser objeto de investigação, excluíram-se os demais profissionais.

A análise de dados foi utilizada pela plataforma Google Forms, separados e organizados em gráficos, quadros e tabelas, sendo os resultados apresentados em relação a quantidade e tipo de respostas de cada indivíduo, separados em categorias definidas pelos próprios questionários, finalizados de maneira rápida e segura.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A pesquisa em questão obteve adesão de 246 cirurgiões dentistas de todos os estados brasileiros responderam à pesquisa (Figura 1). Os profissionais com maior adesão ao nosso questionário são do gênero: feminino (61%), com maior prevalência entre 20 a 30 anos (31,3%), seguido pelos profissionais acima de 20 anos de formado (32,9%), com 24,9% dos CDS consideram-se grupo de risco. Diante dos dados obtidos, 210 cirurgiões dentistas foram unâimes em relatar que a rotina dos atendimentos odontológicos sofreu um impacto de 85,4% na queda do faturamento, com predominância na região sudeste 76,9%, seguidos da região Norte 8,3%, região Sul 4,1%, e empate entre as regiões Nordeste e Distrito Federal com 3,7% e região Centro-Oeste com 3,3% de cirurgiões dentistas atuantes nas regiões Brasileiras (Figura 2), ou seja, ainda que a pandemia tenha ocasionado um cenário de crise econômica brasileira, percebe-se as disparidades econômicas distribuídas ao longo do estudo.

Figura 1 – Distribuição epidemiológicas dos profissionais: gênero, faixa etária e tempo de formado.

Fonte: Autoria própria.

Figura 2 - Porcentagem do impacto econômico na rotina dos atendimentos odontológicos nas regiões Brasileiras.

Fonte: Autoria própria.

Neste contexto, a OMS (2015) relata os efeitos negativos imediatos provocados pela pandemia e como consequência o cenário microeconômico assimétrico conforme a fragilidade da região, em relação ao tempo de permanência necessário de medidas de contenção do COVID-19, findando a desaceleração, corroborando com a figura acima.

A pandemia gerou um quadro caótico com elevado número de contaminados e mortos, o Brasil adotou a quarentena ou o auto isolamento como medida de contenção do vírus (OMS, 2020). Essa queda no fluxo de atendimento deve-se ao profissional realizar atendimentos específicos: urgência e emergência em um primeiro momento, após a OMS (2020) constatar como vetor de transmissão direta pelo COVID-19. A conscientização e divulgação em massa das informações sobre a infecção, demonstra que 42,3% dos profissionais relataram reciclagem do ministério da saúde para o enfrentamento da Pandemia do COVID-19 (Figura 3).

Figura 3 – Porcentagem dos cirurgiões dentistas que relataram uma abordagem educativo do ministério da Saúde para o enfrentamento da Pandemia do COVID-19.

Fonte: autoria própria.

Por conseguinte, o estudo revelou que a totalidade dos cirurgiões dentistas (246) promoveram conhecimento dos Protocolos para o atendimento odontológico no período do COVID-19, através de: site ministério da Saúde (37%), site do conselho de Odontologia (27,6%), colegas (21,5%) e (13,5%) revistas científicas (Figura 4).

Figura 4 – Porcentagem dos diversos Métodos de busca pelos cirurgiões dentistas para conhecimento do Protocolo Odontológico do COVID-19.

Fonte: Autoria própria.

A crise provocou profunda reflexões na classe odontológica, diante da exposição e risco os cirurgiões dentistas, estes adotaram medidas protetivas e preventivas em relação a continuidade dos negócios e o andamento da economia de maneira que (41,8%) investiram em Equipamento de proteção individual (Epi) seja por meio de loja virtual (38,9%), seguidos de 22,5% de lojas físicas, 3,3% com conhecidos e 35,2% relataram recorrer as lojas: físicas e virtuais de forma preventiva e protetiva ao COVID-19. A aquisição dos EPIS, acabou por ser um investimento variável, relatado pelos profissionais, variando entre: 100 a 500 reais (41,8%), (32,2%) entre 500 a 1000 reais,

(11,7%) entre 1000 a 1500 reais, (9,2%) acima de 2000 e 5% relataram gastos entre 1500 a 2000 (Figura 5).

Figura 5 – Porcentagem do investimento dos cirurgiões dentistas na aquisição de Equipamentos de proteção individual, frente a Pandemia do COVID-19.

Fonte: Autoria própria.

Nos quesitos relacionados aos atendimentos realizados durante a pandemia, o atendimento emergencial foi o mais relatado com 44,3%, seguido pelo atendimento clínico (30,9%), exodontia (11%), Ortodôntico (8,1%), raspagem (0,8 %) , e 4,9% não relataram atendimento (Figura 6).

Figura 6 – Porcentagem dos atendimentos realizados cirurgiões dentistas durante a Pandemia do COVID-19.

Fonte: Autoria própria.

Os cirurgiões dentistas durante a pandemia do COVID-19, estabeleceram as rotinas de trabalho de forma a estabelecer novas formas de atendimento odontológico

aos clientes, destacando prioridades após o início da pandemia, como observado da figura 6.

O novo coronavírus trouxe sérios riscos à saúde dos profissionais de saúde, principalmente aos cirurgiões dentistas, o que permite realizar o levantamento e discussões em nosso estudo sobre a contaminação desses profissionais.

A contaminação provocou o afastamento desses profissionais de sua rotina de trabalho por: 01 a 10 dias (17,5%), de 10 a 20 dias (23,3%), de 20 a 30 dias (18,8%), de 30 a 40 dias (12,1%), e acima de 40 dias (28,3%), o que talvez explique o agravamento de ordem sistêmica pelo COVID-19 (Figura:7).

Figura 7 – Porcentagem de cirurgiões dentistas contaminados pelo COVID-19, relacionados aos dias de afastamento do trabalho.

Fonte: Autoria própria.

Essa contaminação pode ter ocorrido por descuido desses 57,7% (Figura 2), que não buscaram conhecimento através de curso para o enfrentamento da pandemia do COVID-19, contaminando-se com maior facilidade, seja pela não utilização de produtos específicos para a desinfecção de superfície (8,5%) ou os 3,3%(8) que não utilizaram os equipamentos de proteção individual (Figura 8).

Figura 8 -Porcentagem do uso de EPIS e produtos de desinfecção de superfície durante a rotina de atendimentos odontológicos.

	Sim	Não
--	-----	-----

EPIS	96,9%	
Produtos de desinfecção de superfície	8%	

Fonte: Autoria própria.

Os aspectos positivos da avaliação mencionados pelos cirurgiões dentistas foram a possibilidade de identificar os erros e dificuldades, gerados pela COVID-19, a fim de buscar alternativas para superá-los, e a motivação gerada por resultados satisfatórios.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo teve por objetivo avaliar o impacto econômico e mental da Pandemia do COVID-19 nas rotinas odontológicas dos cirurgiões dentistas no Brasil. A pesquisa buscou analisar as percepções e experiências relatadas pelos cirurgiões dentistas ocorridos durante a pandemia do COVID-19 e de que forma esses profissionais adquiriram conhecimento e aprendizado sobre a pandemia. As percepções e emoções mais relatadas pelos cirurgiões dentistas foram: medo, irritabilidade, ansiedade, desespero, desmotivação, taquicardia, impaciência, pânico, frustração, estresse, síndrome de Burnout, insegurança, medo de contaminar-se, depressão, insônia, tristeza, cefaleia, intolerante, transtorno de humor, fobia. Neste contexto, de conhecimento limitado e restrito do vírus, provoca mudanças abruptas nas rotinas odontológicas, relacionadas a realização de uma entrevista e anamnese prévia ao atendimento, seja via telefônica ou online; associadas as restrições das especialidades de urgência e emergência.

As principais evidências do estudo, os cirurgiões dentistas enquanto promotores de saúde bucal convivem com o risco biológico, evidente ao número de profissionais afastados do exercício de sua profissão, devido a contaminação pelo COVID-19. Embora, as sensações negativas estejam presentes, a minoria dos cirurgiões dentistas procura-se capacitar para o enfrentamento da pandemia, seja por meios formais ou informais.

O tema tem relevância; pois os resultados obtidos indicam a necessidade da reciclagem, considerando as influências dos problemas de saúde da COVID-19, sobre os processos de ensino e aprendizagem dos cirurgiões dentistas que estão inseridos no mercado de trabalho, sejam no âmbito público ou privado. Espera-se que o tema

promova uma reflexão norteadora entre acadêmicos, profissionais, e poder público de modo a subsidiar possíveis repercussões sobre os cirurgiões dentistas.

Os cirurgiões dentistas enquanto profissionais sejam de entidades brasileiras: públicas ou privadas deveriam ter uma proposta de âmbito nacional de programa de educação financeira e psicológica durante a pandemia do COVID- 19; pois eles tiveram suas rotinas profissionais alteradas, com prejuízos econômicos, e expostos a riscos gerando alterações psicossociais.

REFERÊNCIAS

- AHMED, MZ. Et al Epidemic of COVID-19 in China and Associated Psychological Problems. *Asian J Psych*.2020.
- BANCO MUNDIAL. Pandemia de Covid-19: choques na educação e respostas de políticas.2020. Recuperado de: <http://pubdocs.worldbank.org/en/321431590757092620//Covid-19-Education-Summary-port.pdf>.
- BANERJEE, D. The COVID-19 outbreak : Crucial role the psychiatrists can play. *Asian J Psych*.2020.
- BRASIL. Ministério da Saúde (MS). Brasil confirma primeiro caso da doença.2020. Recuperado de: <https://coronavirus.saude.gov.br>.
- BRASIL.(2020). Ministério da Saúde (MS). Corona vírus COVID-19.Recuperado de: <https://coronavirus.saude.gov.br/>.
- BRASIL. Ministério da Saúde (MS). Painel coronavírus.2020.
- HOLMES, EA. et al. Multidisciplinary research priorities for the COVID-19 pandemic: a call for action for mental health science. *Lancet Psych*.7(6):547-560.2020.
- HUANG, C.et al.Características clínicas de pacientes infectados com o novo coronavírus de 2019 em Wuhan, China. *Lancet*.1(395): 497–506.2020.
- MORENS,DM.; Folkers, GK.;Fauci, AS.(2009). What is a pandemic? *J Infect Dis*. 200(7):1018-1021.2009.
- Pan American Health Organization. **Folha informativa COVID-19**. 2020. http://www.paho.org/index.php?option=com_content&viem=article&id=6101:covid19&Itemid=875#datas-notificacoes.
- PENG, X. et al. Rotas de transmissão de controles nCoVand 2019 na prática odontológica. *Int J Oral Sci*.1(12): 9. 2020.

WHO. Coronavirus disease 2019 (COVID-19): situation report. 2020.

CAPÍTULO XX

CENÁRIO SOBRE A VIDA DO INDIVÍDUO COM DIABETES MELLITUS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19

DOI: 10.51859/ampla.csa511.1121-20

Heitor Oliveira Valladares ¹
Anne Caroline de Moraes Monção ²
Giulia Gabriella de Oliveira Pedroza ³
Victor Hugo Maria Paura Souza ⁴
Sávio Dias de Paula Mello ⁵
Marcela dos Santos Ferreira ⁶

^{1,2,3,4,5} Discente do curso de Enfermagem do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET/RJ

⁶ Docente do curso de Enfermagem do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET/RJ

RESUMO

O presente trabalho de pesquisa tem como objetivo caracterizar o impacto, nos indivíduos com diabetes mellitus, do distanciamento social causado pela COVID-19. O estudo caracteriza-se como transversal, quantitativo e de caráter exploratório, desenvolvido entre maio e setembro de 2020. Os indivíduos abordados no estudo foram submetidos a questionário respondido virtualmente, que contemplou questões acerca da situação sociodemográfica, estado psicoemocional e físico durante o período de distanciamento social adotado na pandemia do COVID19. Os dados foram analisados por estatística descritiva e inferencial. Em relação aos resultados, ocorreram mudanças em aspectos psicoemocionais em consequência ao desafio da vida cotidiana e mudança de rotina durante a pandemia. Todas estas evidências resultaram em estresse mental associado a presença de dores de cabeça frequentes. Foi constatado que 50% dos idosos desenvolveu o sentimento de inutilidade, considerando a dependência familiar para o cumprimento de atividades rotineiras básicas. Houve impacto da diminuição de renda no estado psicoemocional, mantendo relação com dificuldade de dormir. Em contrapartida, as respostas positivas em relação a adaptação ao distanciamento social, é visto nos portadores de DM que mantiveram atividades laborais em casa. Conclui-se que as alterações psicoemocionais possuem o potencial de agravar patologias ou propriamente serem fatores de risco para a condições crônicas, como a DM. O estudo demonstra a importância da criação e proteção de medidas de diminuição dos efeitos do distanciamento social na vida das pessoas do grupo de risco.

Palavras-chave: Diabetes Mellitus. COVID-19. Pandemia.

1. INTRODUÇÃO

Desde o final de 2019, uma doença recém-identificada espalhou-se pelo mundo, causando uma pandemia de uma coronavirose denominada COVID-19, ocasionada pelo vírus SARS-CoV-2, que apresenta manifestações de leve a grave. A gravidade do COVID-19 está relacionada com a ocorrência de uma pneumonia, que ao evoluir para uma síndrome respiratória aguda torna a face da doença mais letal.

O panorama desta pandemia na atualidade, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) é que em relação aos casos mundiais o quantitativo de casos confirmados, no mês de abril de 2021, já ultrapassou 149.216.984 milhões, com 3.144.028 milhões de óbitos. No Brasil a realidade é de mais de 14.441.563 milhões de infectados, com mais de 395.022 mil óbitos (OPAS, 2020).

Em se tratando da gravidade associada a esta doença, sabe-se que indivíduos portadores de doenças crônicas possuem um risco maior de desenvolver formas mais graves e fatais do COVID-19 comparando com indivíduos sem comorbidades (WANG *et al.*, 2020). Dentro do rol das doenças crônicas, a diabetes mellitus (DM) apresenta-se como a segunda patologia, após a hipertensão arterial sistêmica, a apresentar sintomas com maior nível de gravidade (WU *et al.*, 2020; WEI-JIE *et al.*, 2020). O risco aumentado em portadores de diabetes mellitus está associado a uma desregulação do sistema imunológico e/ou pelo descontrole glicêmico (GUO *et al.*, 2020).

A inexistência de tratamentos reconhecidamente eficazes para a patologia e de insuficientes medidas preventivas capazes de frear a disseminação do patógeno, faz com que neste momento atual da pandemia tenha que se utilizar de medidas como o distanciamento social (manutenção de distância espacial entre as pessoas), que se configura como um elemento capaz de minimizar a propagação do vírus, mas de difícil manutenção pela população (FARO *et al.*, 2020).

A implementação do distanciamento social, no contexto do COVID-19, atrela-se a outras ações, por vezes impositivas, que impactam na diminuição da transmissão do vírus, bem como, no cotidiano da população, tais como a: redução da mobilidade nas cidades; suspensão de atividades presenciais em escolas, academias e centros recreativos; interrupção de atividades comerciais não essenciais, entre outras medidas (FARO *et al.*, 2020). Essas influenciam no campo físico, financeiro, social, trabalhista,

político, e em especial no que tange o objetivo deste artigo, o da saúde mental, que foi impactado em mais da metade da população chinesa no período em que a pandemia atingiu o pico de contaminação (WANG et al., 2020).

A partir deste contexto, em que se associa a propagação de uma virose pouco conhecida pela comunidade científica, à implantação do distanciamento social, a existência de uma série de problemas socioeconômicos e a certeza de que os portadores de diabetes mellitus são um grupo de risco a agravos mais sérios, forma-se um ambiente permissivo ao desenvolvimento de um estado mental e físico que pode ser prejudicial à boa manutenção da saúde, em um período em que se faz essencial mantê-la.

Levando em consideração que todas essas mudanças decorrentes desta pandemia tem o potencial impactarem diretamente a vida de um portador de DM, haja vista que sua vida financeira pode ser modificada devido ao distanciamento social, bem como sua saúde mental e física também sofrem alterações nesse período, resolveu-se pesquisar acerca da rotina dos indivíduos com diabetes mellitus, durante o distanciamento social, com o objetivo de caracterizar o impacto em suas vidas e, dessa forma, diminuir a carência de informações referentes a essa temática no Brasil, proporcionando fundamentos para educação em saúde, que tem a capacidade de informar e melhorar a qualidade de vida do portador de diabetes mellitus.

2. CAMINHOS DA PESQUISA

A pesquisa sobre diabetes e distanciamento social durante a pandemia de COVID-19 esteve inserida em um projeto de extensão orientado para assuntos da área de diabetes Mellitus, que ocorre no Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – RJ. Os dados apresentados neste capítulo são frutos de dois estudos complementares transversais, quantitativo e de caráter exploratório.

A primeira pesquisa ocorreu durante os meses de maio e junho de 2020. Participaram do estudo 102 pessoas com DM, com idade média de 41,8 anos.

A coleta de dados foi realizada por meio da ferramenta Formulários do Google docs através da digitação online dos dados, havendo questões objetivas e fechadas, que constituíam as variáveis do estudo. O formulário era composto por 20 questões que contemplavam dimensões demográficas (sexo, idade e renda) e dimensões do autocuidado (monitorização da glicemia capilar, tratamento, alimentação, atividade

física, uso da medicação) baseadas no Questionário de Atividades de Autocuidado com o Diabetes, versão traduzida, adaptada e validada para a cultura brasileira (QAD), além de questões da dimensão saúde mental relacionada ao distanciamento social. Todas as respostas foram auto relatos.

A segunda pesquisa ocorreu no período de agosto a setembro de 2020. Participaram desta pesquisa 126 sujeitos, com idade média de 44 anos. Os participantes responderam a um questionário contendo 25 questões fechadas, contemplando variáveis sociodemográficas, com itens de autor relato sobre seu perfil, estado de distanciamento social, situação econômica, acesso a informações sobre a pandemia e estado de saúde. Também foi utilizadas questões de autor relato sobre informações da saúde mental, baseado no Self-Report Questionnaire (SRQ-20), instrumento desenvolvido pela OMS, e validado no Brasil, que tem sido amplamente utilizado para mensurar indicadores de possíveis transtornos mentais e comportamentais, especialmente os transtornos mentais menores, como depressão, ansiedade e estresse (SANTOS *et al.*, 2020).

Os dados referentes às manifestações físicas e psicoemocionais oriundas do questionário de informações sobre a saúde mental, antes de serem analisados, foram distribuídos em quatro dimensões correspondes ao risco de transtornos mentais menores, como depressão, ansiedade e estresse: (I) humor ansioso e depressivo; (II) sintomas somáticos; (III) decréscimo de energia e (IV) pensamentos depressivos. Tais dimensões correspondem às apresentadas pelo questionário Self-Report Questionnaire (SRQ-20).

A amostragem de ambas as pesquisas se deu por conveniência e de forma não probabilística. O critério de inclusão é ser portador da diabetes mellitus e ser maior de idade. Por conta da necessidade imprescindível da manutenção do distanciamento social, Os sujeitos de estudo foram convidados a participarem da pesquisa via redes sociais (Facebook®, Instagram®), haja vista que no período de distanciamento social, instalado durante a pandemia de COVID-19, a coleta de dados presencial não seria uma opção viável. Os questionários, construídos na plataforma de formulários do Google®, foram respondidos virtualmente.

No que se referem à análise dos dados, as variáveis foram descritas através de frequências absolutas e relativas e comparadas pelo teste qui-quadrado de Pearson. O

nível de significância adotado foi de 5% e os dados foram analisados no software Windows Microsoft Excel 2019.

Esta pesquisa faz parte de um projeto de pesquisa submetido à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), sendo aprovado sob o número do CAAE: 62518716.7.0000.5241, parecer 1.884.837. Também foram seguidas todas as diretrizes da Resolução 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde.

3. A VIDA DOS INDIVÍDUOS COM DIABETES MELLITUS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19

Durante o período de distanciamento social, pode ser observadas mudanças em aspectos psicoemocionais, que podem indicar a situação de saúde mental dos entrevistados. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a saúde mental é um reflexo das reações do indivíduo frente às exigências cotidianas, desafios e mudanças da vida e ao modo como interagem as suas ideias e emoções (WHO, 2018). Partindo desse conceito de saúde mental, o cenário de distanciamento social, estabelecido pela pandemia do novo coronavírus, demandou atitudes individuais e coletivas que impactaram no campo psicoemocional das pessoas.

A análise dos dados evidencia que parte da amostra afirmou sentir-se tenso/preocupado e assustado. De acordo com Brooks *et al.*, (2020) isso repousa em diversos fatores, como por exemplo, o medo de contrair a infecção, os sentimentos de frustração e aborrecimento, perdas financeiras e também na passagem de informações incorretas a respeito da doença. Cerca de 80% da amostra é representada por adultos, público esse, responsável, muitas das vezes, por trabalhar, estudar, se auto sustentar ou sustentar a própria família.

Entretanto, com o advento do distanciamento social e suas consequências socioeconômicas, assim como, o estabelecimento do grupo de risco, alguns desses indivíduos não conseguem por vezes cumprir com essas obrigações. Essa característica amostral pode estar atrelada a esse estado de tensão e preocupação, visto que de acordo com estudos existe um elo entre a falta de segurança em relação ao trabalho/remuneração e o adoecimento mental. As pessoas que se encontram na incerteza de manter seus empregos e a garantia de renda mostram risco maior para o

aparecimento de transtornos mentais, como estresse, ansiedade e depressão (REICHERT; TAUCHMANN, 2017; LLOSA et al., 2018).

Em relação a sintomas somáticos, foi possível identificar principalmente a referência a dores de cabeça frequentes. Esse tipo de sintomatologia frequentemente não consegue ser justificável por uma patologia orgânica e constantemente é associada com sofrimento psíquico (FORTES *et al.*, 2019). Os aspectos desta dimensão frequentemente podem estar associados, de forma causal, a dimensão decréscimo de energia vital, que neste estudo identificou a dificuldade para dormir como um achado, principalmente na população adulta. Para a população com diabetes este dado é preocupante, pois impacta em seu bem estar físico e mental, uma vez que a manutenção quantitativa do sono deficitária, ao provocar elevação do cortisol, causa interferência no metabolismo da glicose e no controle glicêmico (PEREIRA *et al.*, 2019).

Relativo aos pensamentos depressivos destaca-se que parte da amostra afirma ter perdido interesse pelas atividades que antes davam prazer e também afirmam possuir a sensação de inutilidade. De acordo com Ribeiro *et al.*, (2020) não saber lidar com o isolamento social e com um inimigo invisível pode resultar em tais pensamentos negativos. Tratando especialmente da população idosa, além da diabetes mellitus, a idade se torna um fator agravante dentro do grupo de risco da covid-19, com isso, visando não se expor ao vírus, esses indivíduos acabam se tornando dependentes de outros familiares.

A exacerbada exposição midiática acerca da crescente porcentagem de infectados e mortos pelo Novo Coronavírus, a rigurosidade do distanciamento social e os prejuízos financeiros são oportunos para o desencadeamento ou agravamento de distúrbios psicológicos, principalmente o transtorno de ansiedade e depressão, não contribuindo para a manutenção da saúde mental e o descuido adicional da fisiológica. Em um estudo feito na Etiópia em abril de 2020 indicou um aumento significativo na persistência de sintomas de depressão comparando com os dados anteriores à pandemia (OMS, 2020). No presente estudo, observa-se que um total de 78% são abalados mentalmente por conta do enfoque corriqueiro demonstrado em meios de comunicação. Fato esse que pode ser maximizado pela falta de suporte profissional, visto que ocorreu na população estudada, suspensão de consultas, algumas sendo substituídas pelo teleatendimento - não inclusivo a toda população.

Na presente pesquisa, observa-se que metade dos idosos estudados desenvolveu a sensação de inutilidade, considerando a dependência familiar necessária para a realização de atividades cotidianas básicas, e que pode ser responsável por provocar quadros de estresse, ansiedade e depressão. Além disso, devido à necessidade de distanciamento social, o acesso dos idosos aos serviços de saúde para o acompanhamento regular é limitado, o que pode descompensar condições clínicas pré-existentes e acarretar uma maior dependência física. Tais dependências ainda podem ser acrescidas da dependência financeira, que ocorre devido às pensões e aposentadorias serem insuficientes às necessidades básicas da pessoa idosa, como a compra de fármacos, alimentos e o fornecimento de água e energia, gerando condições precárias de vida (MORAES *et al.*, 2020).

Esse cenário mostra-se favorável ao sentimento cada vez mais aflorado de inutilidade e dependência, podendo influenciar negativamente na saúde mental da pessoa idosa, uma vez que o isolamento, o sentimento de inutilidade, a descompensação de patologias pré-existentes e em muitos casos a violência contra a pessoa idosa são somadas (MORAES *et al.*, 2020).

É importante salientar que este novo panorama pandêmico salientou dificuldades relacionadas ao envelhecimento, como limitações psicofísicas, além da carência de habituação aos recursos tecnológicos, que se mostraram essenciais durante o distanciamento social para amenizar alterações psicoemocionais. Ao se discutir o cotidiano dos indivíduos, durante a pandemia do novo coronavírus, é indispensável analisar a situação ocupacional, durante o distanciamento social. Diversas mudanças ocorreram durante este período, como demissão de funcionários, alteração na forma de trabalhar, dificuldades em novas colocações ocupacionais. Tendo em vista essa situação, buscou-se saber como se enquadra a situação ocupacional da amostra estudada.

Desta forma, aumenta-se a sensação de ócio que associada ao distanciamento social entre as pessoas produz uma piora na qualidade de vida dos indivíduos (GARRIDO; RODRIGUES, 2020). Esse quantitativo de pessoas sem atividade laboral pode estar associado ao aumento no número de desempregados, no período da pandemia, em 27,6%. Em maio, o número de pessoas sem ocupação era de 10,1 milhões, chegando a 12,9 milhões em agosto, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

No entanto, para um portador de diabetes a situação pode ser agravada pela dificuldade do exercício profissional presencial durante o período que perdurar a pandemia, por sua inserção no grupo de risco.

Tendo em vista o número total de adultos, 48 (48,98%) afirmaram estar trabalhando presencialmente, isto é, estão se expondo, diariamente, ao perigo de contrair o vírus, como forma de manutenção da renda financeira. A exposição de um grupo de risco desencadeia um maior risco de sofrer impacto psicológico durante a pandemia (DUARTE *et al.*, 2020). Em relação aos idosos, 26 (92,86%) afirmaram não trabalhar, podendo estar associado a uma provável aposentadoria.

Pesquisas que analisaram o impacto psicológico da quarentena em epidemias prévias reportam que a maioria dos estudos verificou efeitos psicológicos negativos, e que os principais fatores de estresse identificados foram a duração da quarentena, o medo da infecção, os sentimentos de frustração e de aborrecimento, a informação inadequada sobre a doença e seus cuidados, as perdas financeiras e o estigma da doença (BARROS *et al.*, 2020). Visto que, de acordo com o autor, as perdas financeiras é um dos fatores para o desequilíbrio psicológico, o estudo analisou a renda dos participantes do estudo.

De forma a analisar o impacto da diminuição da renda sob aspectos psicoemocionais já estudados, associou-se à dificuldade para dormir, com a redução da renda dos sujeitos do estudo. Dos indivíduos, 42 (33,33%) relatam terem sofrido diminuição da renda, ao mesmo tempo em que possuem dificuldades para dormir, associação essa com significância estatística ($p=0,0006$).

A associação entre dificuldade para dormir, que representa um aspecto psicoemocional, e queda da renda demonstra o quanto o estado de saúde mental é resultante também de fatores externos a constituição biológica. De acordo com Duarte *et al.*, (2020) ter renda diminuída no período da pandemia do novo coronavírus é fator que pode indicar maior prejuízo na saúde mental.

No que tange a avaliação do peso corporal, foram detectadas algumas mudanças durante o período de distanciamento social, sendo que o aumento do peso corporal foi o dado mais perceptível. Por meio das análises inferenciais, pode-se identificar uma associação entre aumento de peso e alimentação inadequada (32% referem não ter hábitos alimentares adequados) e déficit na prática de exercícios físicos

(52% não realizam tal prática). Estudos ressaltam que na DM2, o sobrepeso e a obesidade aumentam a incidência e gravidade do SARS-CoV-2 (DIETZ; SANTOS – BURGOA, 2020; HUSSAIN *et al.*, 2020).

A obesidade é um fator de risco conhecido para a ventilação anormal e pode contribuir para a redução do resíduo funcional da capacidade pulmonar (SELVIN; JURASCHEK, 2020).

Além disso, é necessário frisar que pesquisas enfatizam que o aumento de peso, nesse cenário pandêmico, compromete a imunidade dos indivíduos usuários frente à resposta ao vírus, e que o aumento na mortalidade pelo COVID-19 é maior em países onde a incidência de obesidade é mais proeminente (DIETZ; SANTOS – BURGOA, 2020). De forma a minimizar tais riscos, as recomendações durante o distanciamento social é a manutenção da regularidade na dieta diária e dos exercícios físicos em casa (SINGH *et al.*, 2020).

Diante do contexto atual, é compreensível que a maior parte dos esforços práticos e científicos esteja voltada a biologia da doença. Entretanto o contexto da pandemia e o tardio advento das medidas de controle afetam a população em muitas dimensões das condições de vida e saúde, entre elas, o da saúde mental. A presença de sofrimento psíquico, como depressão, ansiedade e estresse ou alterações pontuais no sono, no apetite, entre outros analisados neste estudo exercem de acordo Barros *et al.*, (2020) reconhecidos efeitos negativos no cotidiano e na qualidade de saúde e de vida das pessoas, contribuindo com o percentual relevante de anos vividos com incapacidades. Como também é importante ressaltar que alterações psicoemocionais podem se agravar ou constituir fatores de risco para doenças crônicas e/ou doenças virais.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pandemia COVID-19 representa uma adversidade sem precedentes para os pacientes com diabetes mellitus. Mesmo com a diminuição da pandemia, em alguns países, o distanciamento social para a parcela da população que compõem grupo de risco – como os indivíduos com diabetes mellitus – ainda será uma realidade por tempo ainda indeterminado.

O estudo permitiu que fossem visualizados diversos obstáculos relacionados à saúde mental de portadores de DM durante o distanciamento social decorrente da pandemia causada pelo Sars-Cov-2. A saúde mental e emocional do portador de DM, segundo análise do estudo, tem se mostrado frágil durante o distanciamento social, podendo-se identificar na amostra estudada o estresse, a ansiedade, depressão e transtornos de comportamento.

Além disso, pode ser identificada a acentuação de fatores que promovem alterações psicoemocionais, como alterações de renda, perda da qualidade do sono, isolamento familiar e exposição a notícias da mídia referentes à doença. Nesse contexto, a qualidade de vida geral do portador de DM é afetada durante o distanciamento social, influenciando em seu estado geral de saúde, o que representa um risco ao portador de DM.

Em contrapartida a todos esses efeitos psicoemocionais, as melhores respostas de adaptação ao distanciamento social é visto nos portadores de DM que mantiveram atividades laborais em casa, bom sono qualitativo, boa alimentação e atividade física suficiente. Dessa forma, essa parcela da amostra tem menor risco de desenvolver agravos decorrentes do distanciamento social. O estudo realizado demonstra a importância de criação e proteção de medidas de diminuição dos efeitos do distanciamento social aos pertencentes aos grupos de risco, uma vez que são as pessoas que mais necessitam do distanciamento. Assim como, é essencial destacar que a renda, o trabalho, devem ser preservados, mas utilizando mecanismos que protejam o trabalhador da exposição ao vírus, diminuindo seu medo de contrair COVID-19, evitando sentimentos de inutilidade, frustração e aborrecimento.

REFERÊNCIAS

- BARROS, M.B.A. et al. Relato de tristeza/depressão, nervosismo/ansiedade e problemas de sono na população adulta brasileira durante a pandemia de COVID-19. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 29, n. 4, p. 1-12, 2020. <http://dx.doi.org/10.1590/s1679-49742020000400018>.
- BROOKS, S.K. et al. The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. **The Lancet**, v. 395, n. 10227, p. 912-920, 2020. [http://dx.doi.org/10.1016/s0140-6736\(20\)30460-8](http://dx.doi.org/10.1016/s0140-6736(20)30460-8).

- DIETZ, W.; SANTOS-BURGOA, C. Obesity and its Implications for COVID-19 Mortality. **Obesity**, v. 28, n. 6, p. 1005-1005, 2020. <http://dx.doi.org/10.1002/oby.22818>.
- DUARTE, M.Q. *et al.* COVID-19 e os impactos na saúde mental: uma amostra do rio grande do sul, brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 25, n. 9, p. 3401-3411, 2020. <http://dx.doi.org/10.1590/1413-81232020259.16472020>.
- FARO, A. *et al.* COVID-19 e saúde mental: a emergência do cuidado. **Estudos de Psicologia (Campinas)**, v. 37, p. 1-14, 2020. <http://dx.doi.org/10.1590/1982-0275202037e200074>.
- FORTES, S. *et al.* Studying ICD-11 Primary Health Care bodily stress syndrome in Brazil: do many functional disorders represent just one syndrome?. **Brazilian Journal Of Psychiatry**, v. 41, n. 1, p. 15-21. 2019. <http://dx.doi.org/10.1590/1516-4446-2018-0003>.
- GARRIDO, R.; RODRIGUES, R.C. Restrição de contato social e saúde mental na pandemia: possíveis impactos das condicionantes sociais. **Journal Of Health & Biological Sciences**, v. 8, n. 1, p. 1-9, 2020. <http://dx.doi.org/10.12662/2317-3076jhbs.v8i1.3325.p1-9.2020>.
- GUO, W. *et al.* Diabetes is a risk factor for the progression and prognosis of COVID - 19. **Diabetes/Metabolism Research And Reviews**, v. 36, n. 7, p. 1-19, 2020. <http://dx.doi.org/10.1002/dmrr.3319>.
- Hussain A. *et al.* Obesity and mortality of COVID-19. Meta-analysis. **Obes Res Clin Pract.** Article in press, v. 14, n. 4, p. 295-300, 2020. doi.org/10.1016/j.orcp.2020.07.002.
- LLOSA-FERNÁNDEZ, J.A. *et al.* Incertidumbre laboral y salud mental: una revisión meta-analítica de las consecuencias del trabajo precario en trastornos mentales. **Anales de Psicología**, v. 34, n. 2, p. 211-223,. 2018. <http://dx.doi.org/10.6018/analesps.34.2.281651>.
- MORAES, C.L. *et al.* Violência contra idosos durante a pandemia de Covid-19 no Brasil: contribuições para seu enfrentamento. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 25, n. 2, p. 4177-4184, 2020. <http://dx.doi.org/10.1590/1413-812320202510.2.27662020>.
- ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS). O impacto da pandemia na saúde mental das pessoas já é extremamente preocupante. 2020 [acesso em 21 jul 2020]. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/oms-o-impacto-da-pandemia-na-saude-mental-das-pessoas-ja-e-extremamente-preocupante/>.
- ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE (OPAS). **Folha informativa COVID-19 - Escritório da OPAS e da OMS no Brasil.** (2020). <https://www.paho.org/pt/brasil>

- PEREIRA, F.H. *et al*. Effect of Educational Strategies on the Sleep Quality of People with Diabetes: randomized clinical trial. **Aquichan**, v. 19, n. 3, p. 1-13, 2019. <http://dx.doi.org/10.5294/aqui.2019.19.3.2>.
- REICHERT, A.R.; TAUCHMANN, H. Workforce reduction, subjective job insecurity, and mental health. **Journal Of Economic Behavior & Organization**, v. 133, p. 187-212, 2017. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jebo.2016.10.018>.
- RIBEIRO, E.G. *et al*. Saúde Mental na Perspectiva do Enfrentamento à COVID -19: Manejo das Consequências Relacionadas ao Isolamento Social. **Revista Enfermagem e Saúde Coletiva**, v. 4, n 2, p, 47-56, 2020.
- SANTOS, K.O. *et al*. Avaliação de um instrumento de mensuração de morbidade psíquica: estudo de validação do Self-Reporting Questionnaire (SRQ-20). **Revista Baiana Saúde Pública**, v. 34, n 3, p.544-560, 2011.
- SELVIN, E.; JURASCHEK, S.P. Diabetes Epidemiology in the COVID-19 Pandemic. **Diabetes Care**, v. 43, n. 8, p. 1690-1694, 2020. doi.org/10.2337/dc20-1295.
- SINGH, A. *et al*. Diabetes in COVID-19: prevalence, pathophysiology, prognosis and practical considerations. **Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews**, v. 14, n. 4, p. 303-310, 2020. doi.org/10.1016/j.dsx.2020.04.004.
- WANG, C. *et al*. Immediate Psychological Responses and Associated Factors during the Initial Stage of the 2019 Coronavirus Disease (COVID-19) Epidemic among the General Population in China. **International Journal Of Environmental Research And Public Health**, v. 17, n. 5, p. 1729-1745, 2020. <http://dx.doi.org/10.3390/ijerph17051729>.
- WEI-JIE, g. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. **New England Journal Of Medicine**, v. 382, n. 18, p. 1708-1720, 2020. <http://dx.doi.org/10.1056/nejmoa2002032>.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO), Strengthening mental health promotion.2018. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-healthstrengthening-our-response>
- WU, C. Risk Factors Associated With Acute Respiratory Distress Syndrome and Death in Patients With Coronavirus Disease 2019 Pneumonia in Wuhan, China. **Jama Internal Medicine**, v. 180, n. 7, p. 934-943, 2020. <http://dx.doi.org/10.1001/jamainternmed.2020.0994>.

PREDISPOSIÇÃO À INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS (SARS-COV-2) E A DEFICIÊNCIA DE VITAMINA D: EXISTE UMA RELAÇÃO?

DOI: 10.51859/ampla.csa511.1121-21

Rubens Barbosa Rezende ¹

¹ Biomédico Patologista Clínico. Pós-graduando em Imunologia Clínica. Faculdade UniBF

RESUMO

O contágio pela síndrome respiratória aguda grave do patógeno viral coronavírus 2 (SARS-CoV-2) se elevou ao status de pandemia em março de 2020, a doença do coronavírus (COVID-19). Dessa forma, objetivou-se discutir e analisar a relação entre a deficiência de vitamina D e a predisposição à infecção pelo novo coronavírus, bem como, analisar o papel da vitamina D no mecanismo imunológico. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura de cunho descritivo e exploratório, e natureza qualitativa. Tendo a busca feita no banco de dados: PubMed e SciELO, utilizando os descritores: “COVID-19” e “Vitamina D”. Empregando o operador booleano AND, respeitando os critérios de inclusão: artigos nacionais e internacionais, publicados entre dezembro de 2019 a março de 2021 em português, espanhol e inglês. A literatura reporta que a vitamina D é capaz de reduzir as taxas “no meio” de citocinas pró-inflamatórias, incluindo IL-1, IL-6, IL-12, TNF alfa e IL-17, e que apesar de os pacientes com COVID-19 e com quadro de deficiência de vitamina D, normalmente demonstrassem resultados ruins, aqueles com taxas aumentadas de vitamina D obtiveram melhores resultados. Conclui-se que, o presente estudo traz a relação entre a deficiência de vitamina D e a susceptibilidade à infecção pelo novo coronavírus, e de acordo com a literatura analisada tem-se uma lacuna no que diz respeito a suplementação vitamínica, uma vez que o seu uso pode deixar o paciente com o sistema imune deprimido.

Palavras-chave: Fatores de risco. Infecções por coronavírus. Vitamina D.

1. INTRODUÇÃO

O contágio pela síndrome respiratória aguda grave do patógeno viral coronavírus 2 (SARS-CoV-2) se elevou ao status de pandemia em março de 2020, a doença do coronavírus (COVID-19) representa um grande desafio para os sistemas de saúde no mundo todo (DONG, DU, GARDNER, 2020). As manifestações clínicas da COVID-19 variam de assintomáticos ou leves do trato superior respiratório até uma lesão a nível pulmonar aguda grave com presença de inflamação sistêmica subsequente,

apresentando insuficiência multiorgânica e podendo vir a óbito. E de acordo com CHEN et al., 2020; YANG et al., 2020; SHI et al., 2020, a idade avançada, comorbidades subjacentes e sexo masculino apresentaram uma ligação a COVID-19 grave.

A vitamina D é denominada como um hormônio esteroide, tendo sua síntese realizada na pele humana por meio do 7-desidrocolesterol em razão da exposição aos raios solares (ultravioleta B – UVB) num intervalo de 280–315 nm. Sendo esta, a principal fonte de vitamina D, como também existem as fontes dietéticas, que incluem óleos de fígado de peixes e produtos lácteos (MOHAN, CHERIAN, SHARMA, 2020).

A estrutura ativa da vitamina D3, 1 α , 25-dihidroxitamina D3 (1,25D3), conhecida também como calcitriol, é um hormônio pluripotente e fundamental na modulação da imunidade adaptativa e inata. A 25-hidroxitamina D total sérica (25 (OH) D) é utilizada normalmente para analisar o status de forma individual da vitamina D. Com isso, o baixo status da vitamina D demonstrou estar ligada a muitas circunstâncias clínicas, abrangendo a elevação da predisposição à doenças infecciosas, porém a sua função casual ainda não foi bem descrito (CHAROENNGAM, HOLICK, 2020). É fundamental alertar as pessoas sobre os problemas que a falta de vitamina D pode causar, uma vez que, uma série de deficiências podem ser evitadas se esta vitamina em questão, tiver em concentrações adequadas no corpo humano. Dessa forma, objetivou-se discutir e analisar a relação entre a deficiência de vitamina D e a predisposição à infecção pelo novo coronavírus, bem como, analisar o papel da vitamina D no mecanismo imunológico.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura de cunho descritivo e exploratório, e natureza qualitativa, visando reunir as principais informações referentes as implicações da deficiência da vitamina D e a predisposição à infecção pelo novo coronavírus. A busca foi feita no banco de dados: PubMed e SciELO, utilizando os descritores: “COVID-19” e “Vitamina D”. Empregando o operador booleano AND, respeitando os critérios de inclusão: artigos nacionais e internacionais, publicados entre dezembro de 2018 a março de 2021 em português, espanhol e inglês. Bem como, os

critérios de exclusão: resumos e artigos nos quais não abordavam a deficiência de vitamina D em pacientes COVID positivos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram encontrados 128 artigos nas duas bases de dados, após a primeira análise (leitura de título e resumo) foram excluídos 30 artigos da PubMed e 58 da SciELO, por não se enquadrarem nos critérios de inclusão. Na segunda análise (leitura superficial do artigo completo), foram excluídos mais 10 artigos da PubMed e 15 da SciELO. Na terceira análise (leitura completa e aprofundada) foram excluídos dois artigos da PubMed e um da SciELO. E por fim, foram incluídos sete artigos da PubMed e cinco da SciELO para o presente trabalho, totalizando 12 artigos.

3.1. VITAMINA D

Existem duas maneiras principais de obter vitamina D: alimentação rica em vitamina D ou síntetização da vitamina D na pele através da luz solar. Nessas duas formas, a vitamina D é um composto inativo, ou seja, para torná-la ativa precisa ser metabolizada para que possa desempenhar múltiplas funções no organismo. A síntese in vivo dos dois principais metabólitos biologicamente ativos da vitamina D ocorre em dois estágios (CÂMARA et al., 2021).

Tem-se no fígado a primeira hidroxilação da vitamina D3 ou D2 para a produção de 25-hidroxivitamina D, bem como a segunda hidroxilação acontece nos rins, dando origem a 1, 25-di-hidroxivitamina D. Esses metabólitos da vitamina D promovem a absorção ativa de cálcio e fósforo no intestino delgado, ajudando a aumentar os seus níveis séricos, o suficiente para mineralizar os ossos. Por outro lado, tais metabólitos também ajudam a mobilizar o cálcio e o fósforo dos ossos, nos quais são capazes de serem reabsorvidos pelos túbulos renais (PLUDOWSKI et al. 2018; CÂMARA et al., 2021).

A vitamina D é capaz de ser encontrada sob duas formas, a primeira é a Ergocalciferol (D2), presente em plantas e utilizada para fins terapêuticos (Figura 1), e a segunda é a colecalciferol (D3), presente no tecido animal através da luz ultravioleta no 7-deidrocolesterol da pele, na qual tem a principal atividade nutricional e biológica (Figura 1) (CÂMARA et al., 2021).

Figura 1 – Estrutura química do ergocalciferol (vitamina D2) e do colecalciferol (vitamina D3).

Fonte: adaptado de CÂMARA et al., 2021, p. 5907.

Se comparadas (D2 e D3) de início, ambas possuem a mesma estrutura, diferenciando apenas na sua cadeia lateral, no carbono 17, na qual a vitamina D2 exibe uma ligação dupla adicional e um grupo metil incorporado na cadeia lateral. E para a ativação delas nos rins e fígado é necessário a adição dos grupos hidroxila para ativá-las na forma hormonal, conforme Figura 2 e 3, respectivamente, designadas nesta ordem de 1,25-hidróxiergocalciferol [1,25-(OH)2D2] e 1,25-diidroxicolecalciferol ou calcitriol (CÂMARA et al., 2021).

Figura 2 – 1,25-hidróxiergocalciferol [1,25-(OH)2D2]

Fonte: adaptado de CÂMARA et al., 2021, p. 5908.

Figura 3 – 1,25-hidróxicolecalciferol [1,25-(OH)2D3] ou calcitriol

Fonte: adaptado de CÂMARA et al., 2021, p. 5908.

No interior da célula, a vitamina D é ligada aos seus receptores nucleares, e logo após estarem ativados, eles se dimerizam com os receptores retinóides X ou com eles próprios, e em seguida se translocam para o núcleo para englobar o elemento receptor de vitamina D. Já este receptor, ele tem o papel de regular a expressão de muitos genes do hospedeiro, tais como a catelicidina e a beta defensina. A beta defensina tem o papel de clivar de forma direta a membrana do vírus, já a catelicidina desempenha a ativação dos macrófagos, neutrófilos e células dendríticas. É ressaltado que a vitamina D desempenha um papel no sistema imune inato, através da liberação de óxido nítrico e da expressão de enzimas lisossomais, nas quais ambas auxiliam no combate à infecção. Bem como, as taxas de vitamina D são capazes de influenciar na expressão dos receptores *toll-like*, nos quais promovem a resposta imune inata, conforme o reconhecimento das proteínas patogênicas (MOHAN, CHERIAN, SHARMA, 2020).

De acordo com ZEMB et al., 2020 e MITCHELL, 2020 a vitamina D exerce a função regulatória do sistema imune através da supressão das respostas imunológicas adaptativas nas células epiteliais respiratórias no decorrer das infecções virais. A manifestação acontece principalmente via atenuação da proliferação de linfócitos T e a mudança resultante de linfócitos T auxiliares tipo 1 (Th1) para tipo 2 (Th2).

MOHAN, CHERIAN, SHARMA (2020) ressaltam que uma proliferação Th1 diminuída, resulta em níveis mais baixos de citocinas pró-inflamatórias e consequentemente, respostas imunológicas adquiridas minimizadas, nos quais são capazes de serem contraproducentes na composição de uma resposta imune bem-sucedida frente a um vírus. A vitamina D atua também na maturação dos linfócitos T, e

é capaz de deslocar o desenvolvimento da massa de linfócitos T auxiliares inflamatórios tipo 17 em direção às populações de células T regulatórias anti-inflamatórias (ZEMB et al., 2020; MITCHELL, 2020).

E desta forma, a vitamina D é capaz de reduzir as taxas “no meio” de citocinas pró-inflamatórias, incluindo IL-1, IL-6, IL-12, TNF alfa e IL-17, enquanto eleva o anti-inflamatório IL-10. A expressão diminuída de citocinas pró-inflamatórias diminui a diferenciação e a ativação de muitos tipos de células imunológicas e com isso, sendo capaz de prevenir lesões imunomediadas. Bem como, a vitamina D impede de forma direta a via do fator nuclear *kappa-light-chain-enhancer* das células B ativadas (NFkB), minimizando assim a síntese de citocinas pró-inflamatórias. Com isso, a vitamina D, através de suas ações opostas na regulação das citocinas e na diferenciação dos linfócitos T, desempenha a função dupla complexa na imunopatologia. A literatura reporta que a vitamina D é capaz de minimizar a regulação dos receptores ACE-2 e, portanto, ter efeitos protetores na COVID-19 (ZEMB et al., 2020; MITCHELL, 2020).

3.2.COVID-19

O coronavírus é uma variedade de vírus que pode infectar muitos animais diferentes e pode causar infecções respiratórias leves a graves em humanos. Os sintomas da COVID-19 podem ser observados após cerca de 5 dias de incubação. Após a incubação do SARS-COV-2, o tempo médio de início dos sintomas foi de 5,1 dias, enquanto o tempo de início dos sintomas de pessoas infectadas foi de 11,5 dias. Foi demonstrado que essa duração está intimamente relacionada ao sistema imunológico do paciente e à idade. Os sintomas gastrointestinais incluem diarreia, vômitos e anorexia, e quase 40% dos pacientes apresentam esses sintomas. Bem como, cerca de 10% dos pacientes com sintomas gastrointestinais não exibiram sinais de febre ou infecções do trato respiratório (WANG et al., 2020).

A COVID-19 também está ligada à doenças hipercoaguláveis, aumentando o risco de trombose venosa. Também há relatos de sintomas neurológicos (como tontura, fadiga e distúrbio da consciência), derrames (hemorrágicos e isquêmicos) e danos musculares. Muitos sintomas extrapulmonares incluem manifestações oculares e cutâneas. Foi encontrado por pesquisadores italianos, manifestações cutâneas em 20% dos pacientes. Devido à insuficiência respiratória, as perspectivas clínicas das crianças

podem deteriorar-se gradualmente. Em casos graves, o uso de oxigênio tradicional (ou seja, cânula nasal) não pode corrigir a insuficiência respiratória em 1-3 dias. A marca registrada é choque séptico, sepse, sangramento maciço e contínuo causado por coagulação anormal e acidose metabólica (WANG et al., 2020; MOHAMADIAN et al., 2021).

Além de infecções pulmonares graves, o choque séptico pode causar danos graves e gerar danos a vários órgãos. Quando ocorrem anormalidades do sistema extrapulmonar, incluindo o sistema circulatório e o sistema digestivo, é provável que cause choque séptico e aumente muito a taxa de mortalidade. Quando não há oxigênio suficiente para o pré-natal, ocorrerão partos prematuros e hipóxia intrauterina (WANG et al., 2020; MOHAMADIAN et al., 2021).

3.3.COVID-19 X VITAMINA D

Apesar de que os pacientes com COVID-19 e com quadro de deficiência de vitamina D, normalmente demonstrassem resultados ruins, aqueles com taxas aumentadas de vitamina D obtiveram melhores resultados. A literatura reporta que haviam evidências ecológicas substanciais para associar a deficiência de vitamina D com a gravidade no quadro da infecção por COVID-19. Bem como, é ressaltado o benefício da suplementação para pacientes afro-americanos com deficiências de vitamina D, e também para pacientes com piores resultados de COVID-19.

Dessa forma, alguns autores ressaltaram que o risco de infecções graves por COVID-19 em certas populações distintas não pode ser baseado de forma adequada por seu quadro de deficiência de vitamina D, bem como a suplementação de vitamina D minimiza as respostas Th2 no decorrer da infecção fúngica por *Aspergillus* spp. em pacientes com fibrose cística, e é fundamental ressaltar que a aspergilose pulmonar é uma infecção secundária entre os pacientes críticos de COVID-19. Com isso, a suplementação é capaz de tornar os pacientes com COVID-19 susceptíveis às infecções secundárias por espécies do gênero *Aspergillus* spp. e apesar de que tais relações ainda não tenham sido bem consolidadas. Assim, o esse vai e volta de suplementação no decorrer da infecção por COVID-19 continua (MOHAN, CHERIAN, SHARMA, 2020; CHEN et al., 2020; YANG et al., 2020; SHI et al., 2020).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo traz a relação entre a deficiência de vitamina D e a susceptibilidade à infecção pelo novo coronavírus, e de acordo com a literatura analisada tem-se uma lacuna no que diz respeito a suplementação vitamínica, uma vez que o seu uso pode deixar o paciente com o sistema imune deprimido e com isso ter o risco de se contagiar com uma infecção fúngica e em contrapartida, a deficiência da vitamina D pode agravar o quadro do paciente COVID positivo. Com isso, se faz necessária mais pesquisas em relação a suplementação vitamínica e desmistificar a lacuna do tomar ou não tomar a suplementação.

REFERÊNCIAS

- ALI N. Role of vitamin D in preventing of COVID-19 infection, progression and severity. **J Infect Public Health**. 2020 Oct;13(10):1373-1380. doi: 10.1016/j.jiph.2020.06.021.
- CÂMARA, J. et al. Vitamina D: uma revisão narrativa. **Brazilian Journal of Health Review**, Curitiba, v.4, n.2, p. 5904-5920 mar./apr. 2021 DOI:10.34119/bjhrv4n2-152
- CHAROENNGAM, N., HOLICK, M.F. Immunologic Effects of Vitamin D on Human Health and Disease. **Nutrients** 2020, 12, 2097.
- CHEN, N. et al. Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: A descriptive study. **Lancet** 2020, 395, 507–513.
- MITCHELL F. Vitamin-D and COVID-19: do deficient risk a poorer outcome? **Lancet Diabetes Endocrinol**. 2020 Jul;8(7):570. doi: 10.1016/S2213-8587(20)30183-2.
- MOHAMADIAN M, et al. COVID-19: Virology, biology and novel laboratory diagnosis. **J Gene Med**. 2021 Feb;23(2):e3303. doi: 10.1002/jgm.3303.
- MOHAN M, CHERIAN JJ, SHARMA A. Exploring links between vitamin D deficiency and COVID-19. **PLoS Pathog**. 2020 Sep 18;16(9):e1008874. doi: 10.1371/journal.ppat.1008874.
- PLUDOWSKI, P. et al. Vitamin D supplementation guidelines. **Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology**, v.175, p. 125-135, 2018.
- SHI S, et al. Association of Cardiac Injury With Mortality in Hospitalized Patients With COVID-19 in Wuhan, China. **JAMA Cardiol**. 2020;5(7):802–810. doi:10.1001/jamacardio.2020.0950

- WANG M. et al. SARS-CoV-2: Structure, Biology, and Structure-Based Therapeutics Development. **Front Cell Infect Microbiol.** 2020 Nov 25;10:587269. doi: 10.3389/fcimb.2020.587269.
- YANG M. et al. Clinical course and outcomes of critically ill patients with SARS-CoV-2 pneumonia in Wuhan, China: a single-centered, retrospective, observational study. **Lancet Respir Med** 2020;8: 475–81. DOI: doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30079-5
- ZEMB P, et al. Vitamin D deficiency and the COVID-19 pandemic. **J Glob Antimicrob Resist.** 2020 Sep;22:133-134. doi: 10.1016/j.jgar.2020.05.006.

CAPÍTULO XXII

ANÁLISE ESPACIAL DA VACINAÇÃO DA COVID-19 NO ESTADO DA PARAÍBA

DOI: 10.51859/amplla.csa511.1121-22

Lara Kamylli Felismino Chagas¹
Emanuelle Rodrigues da Silva²
Kleyton Wesllen de Lima Ferreira³
Sara Maria Silva Alves⁴
Daniel Ulisses Silva⁵
Maria Ríllary Santos de Queiroz⁶
Natália Nascimento Moreira⁷
Katarine Kellin Silva Leite⁸
Lúcia Magnólia Albuquerque Soares de Camargo⁹

¹Pós-Graduanda em Administração e Auditoria Hospitalar. Consultora em Aleitamento Materno. Vice Coordenadora Grupo de Estudo em Liderança, Gestão e Inovação em Enfermagem. Enfermeira – UNIFACISA.

²Pós-Graduanda em Gestão Hospitalar e Serviços de Saúde. Coordenadora do Núcleo de Vigilância Epidemiológica do Hospital Geral de Queimadas/PB. Membro do Grupo de Estudo em Liderança, Gestão e Inovação em Enfermagem. Enfermeira – UNIFACISA.

³Residente no Programa Multiprofissional Saúde da Criança. Pós-graduando em Urgência e Emergência e UTI. Membro do Grupo de Estudo em Liderança, Gestão e Inovação em Enfermagem. Enfermeira – UNIFACISA.

^{4,5,6,7,8}Membro do Grupo de Estudo em Liderança, Gestão e Inovação em Enfermagem. Graduando(a) do Curso de Enfermagem – UNIFACISA.

⁹Mestre em Saúde Coletiva. Especialista em Gestão em Saúde e Administração Hospitalar. Coordenadora do Grupo de Estudo em Liderança, Gestão e Inovação em Enfermagem. Docente no Curso de Enfermagem – UNIFACISA.

RESUMO

A cultura da vacinação no Brasil se estruturou para milhões de brasileiros desde 1966. Desde 2020 o mundo tenta sobreviver a pandemia pelo vírus causador da COVID-19. Em meio centenas de milhares de óbitos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária brasileira aprovou o uso e produção de uma vacina, porém o ritmo para a vacinação ainda é. Na Paraíba a saúde pública foi questionada pela evolução da taxa de incidência e sua relação com a distribuição dessas vacinas no Estado. Este estudo ecológico descritivo, teve como base as informações epidemiológicas de incidência de casos, através de análise espacial e cobertura vacinal da COVID-19 na Paraíba/PB. A coleta foi realizada nos dias 10 e 11 de abril de 2021. As variáveis analisadas foram: casos novos da doença e a quantidade de doses distribuídas a cada município. Os cálculos de incidência, bem como a elaboração de tabela foram processados com uso do programa Excel for Windows 2016. Observou-se os municípios de Pombal, Nova Floresta, Santa Rita, a capital João Pessoa, Guarabira, Esperança, e Campina Grande possuem taxa de incidência maior que 25%. A maioria das cidades apresentou taxa entre 0 e 5%. Tornou-se evidente a necessidade do Ministério da Saúde otimizar da Campanha Nacional, para que seja proporcionada maior cobertura para os municípios com maior incidência. Considerando tal colocação, é possível que a consequência possa ser percebida em altas taxas de ocupação de leitos, e/ou altas taxas de morbidade e letalidade, sendo necessário mais estudos para tal análise.

Palavras-chave: Vacinação. COVID-19. Epidemiologia Descritiva.

1. INTRODUÇÃO

A saúde pública brasileira estabeleceu planos de vacinação para a sua população desde o século XX, com isso o governo vacinou mais de 80 milhões de brasileiros entre os anos de 1966 a 1973. Com este movimento a Organização Mundial da Saúde - OMS declarou a erradicação da varíola no país. Em seguida houve uma vacinação o Brasil iniciou a campanha para vacinação de febre amarela, BCG e poliomielite. A partir de então, a cultura de vacinação no país se estruturou, sendo manifestada por uma adesão governamental, cujo o objetivo era a ampliação do consumo de vacinas por parte da população. Foi deste modo que surgiu o Programa Nacional de Imunização - PNI, caracterizado pela sua política pública eficiente, se adaptando às mudanças políticas, epidemiológicas e sociais, e cumprindo com as doutrinas do Sistema Único de Saúde - SUS (HOCHMAN, 2011; DOMINGUES et al., 2020).

Em 08 de dezembro de 2019, a China registrou casos de uma pneumonia desconhecida na cidade de Wuhan, até que em 29 de dezembro do mesmo ano, foi identificado o código genético de um novo Coronavírus, o SARS-CoV2, o agente etiológico da COVID-19. Entretanto o primeiro caso da doença só foi registrado no dia 31 de dezembro de 2020. Devido à rápida propagação, a OMS fez uma declaração no dia 30 de janeiro de 2020 sobre o surto do novo Coronavírus em escala de emergência internacional. Desde então foi dado início a uma corrida para a criação de uma vacina (DOMINGUES, 2021).

Atualmente, em 2021 o Brasil se encontra em um epicentro do novo vírus, de acordo com o Ministério da Saúde - MS, o primeiro óbito no Brasil pela COVID-19, foi registrado em Março de 2020, no mês seguinte, em Abril no dia 11 o país chegou a registrar mais de 1100 óbitos em vinte quatro horas. Já era considerado alarmante. O aumento no número dos casos no país era exponencial, e rapidamente o Brasil tornou-se o segundo colocado com o maior número de óbito no mundo. Deste modo o país alcançou o pico em sua primeira onda de contaminação, no mês de julho de 2020, onde em um único dia registrou o total de 1590 óbitos. Em novembro do mesmo ano o Brasil teve baixa na taxa de contaminação e em mortos pela doença, entretanto em março de 2021 com o registro em vinte quatro horas de mais de 2280 mortes, foi considerado o marco da segunda onda de contaminação. Neste mesmo mês o Brasil registrou o

recorde de mortos em um único dia, no total de 4 249 óbitos por COVID-19 (BRASIL, 2020).

No Estado Paraíba, a pandemia pelo novo coronavírus também se alastrou rapidamente. De acordo com a Secretária do Estado da Paraíba (2021), o primeiro caso confirmado para Covid-19, ocorreu dia 16 de março de 2020, na cidade de João Pessoa, Capital do Estado. Rapidamente os casos confirmados aumentaram significativamente, fazendo com que o sistema de saúde do Estado se igualasse aos dos demais Estados do Brasil (PARAÍBA, 2021).

O esperado para o primeiro semestre de 2021, no país, com aprovação das vacinas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, era uma vacinação em massa da população. Porém o período está sendo marcado por muita frustração. O Brasil apresenta um ritmo lento para a vacinação de sua população contra a COVID-19, estudos já apontam um mau planejamento governamental do país e no investimento para a vacinação, o que favorece uma terceira onda de contaminação, pois a lentificação das vacinas está fazendo com que o SARS-CoV2, agente da doença, sofra mais mutações, além da falta de conhecimento e divulgação de informações sobre a vacinação, impondo dificuldade para a organização no plano da vacinação junto a população (DOMINGUES, 2021).

Tendo em vista o atual cenário, e a problemática de saúde pública sobre o Estado da Paraíba em relação a pandemia do COVID-19, foi questionado a evolução da taxa de incidência e sua relação com a distribuição da vacinação no Estado. Deste modo, este estudo objetivou analisar a evolução da taxa de incidência da COVID-19 e associar a distribuição espacial da vacinação no Estado da Paraíba.

2. MÉTODO

Foi realizado um estudo ecológico descritivo, com base nas informações epidemiológicas de incidência de casos e cobertura vacinal da COVID-19 no Estado da Paraíba/PB. Os registros de doses fornecidas a cada município da Paraíba foram obtidos na plataforma de livre acesso do Ministério da Saúde. Sendo utilizado também a análise espacial de número de casos novos registrados diariamente na Paraíba, formulado pelo

Laboratório de Estatística Aplicada ao Processamento de Imagens e Geoprocessamento
- LEAPIG, de acesso aberto.

O Estado da Paraíba/PB possui uma população de aproximadamente 4.018.127 milhões de habitantes, segundo a estimativa de 2019 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, com 223 municípios numa área de 56.467,242 km². Foram analisados os registros de 27 municípios do Estado. A amostra do estudo incluiu todas as primeiras doses do imunobiológico da COVID-19 enviadas aos municípios até 11 de Abril de 2021, e casos novos da doença nas mesmas cidades no dia 10 de Abril de 2021.

A coleta foi realizada nos dias 10 e 11 de Abril de 2021. As variáveis analisadas foram: casos novos da doença e a quantidade de doses distribuídas a cada município. A partir do número de novos casos, calcularam-se as Taxas de Incidência -TI (número de casos novos confirmados dividido pela população residente, multiplicado por 100.000 habitantes). Os cálculos de incidência, bem como a elaboração de tabela foram processados com uso do programa Excel for Windows 2016.

Não foi necessário submeter o estudo para aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, visto que os dados utilizados serem de acesso público e sem identificação de participantes.

3. RESULTADOS

3.1. DOS NOVOS CASOS

De acordo com dados do IBGE, o estado da Paraíba tem uma população atual estimada de 4.018,127 habitantes, sendo o 13^a Estado mais populoso do território brasileiro. No dia 21 de março de 2020 foi confirmado o primeiro caso da doença no Estado da Paraíba, em sua capital João Pessoa. Até o dia 11 de Abril de 2021, o maior número de novos casos registrados e um só dia ocorreu no dia 01 de Março do corrente ano, com 1886 novos casos, enquanto na presente data, registaram-se apenas 43 novos casos (BRASIL, 2021).

Como mostra na figura 1, as cidades ilustradas na cor marrom escuro, possuem TI maior que 25%, sendo elas, Pombal, Nova Floresta, Santa Rita, a capital João Pessoa, Guarabira, Esperança, e Campina Grande. A maioria das cidades mostra-se com TI entre 0 e 5%.

Figura 1. Análise espacial da incidência da Covid-19 na Paraíba.

Fonte: LEAPIG, 2021.

3.2.DAS DOSES DISTRIBUÍDAS E A TAXA DE INCIDÊNCIA

De acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19, o Brasil levaria 21 dias para vacinar 14.846.712 brasileiros da primeira fase com a primeira dose da vacina. Considerando esta meta estabelecida, seria necessário imunizar 707 mil pessoas por dia (BRASIL, 2020). A primeira dose do imunobiológico para COVID-19 administrada na Paraíba realizou-se no dia 19 de Janeiro de 2021 (PARAÍBA, 2021). Até o dia 11 de Abril, 919.380 mil doses foram distribuídas para a Paraíba (tabela 1), onde, de acordo com o Plano Estadual de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19, a primeira fase da população a ser vacinada é composta por 1.202.872 pessoas (PARAÍBA, 2020).

Na Tabela 1 podemos observar que as maiores TI's são expressas pela capital do Estado, João Pessoa (64,02%), em seguida pelo município de Nova Floresta (30,08%), destacados em marrom escuro (TI igual ou maior que 25%). Apenas Santa Rita ocupa a TI entre 20 e 25% (marrom claro). Com TI's entre 10 e 15%, Campina Grande, Taperoá e Sumé estão expressadas na cor ocre. A maioria das 27 cidades (15) demonstram TI's

entre 5 e 10% (amarelo), e 5 cidades sinalizam TI's entre 1 e 5% (bege), conforme cores correspondentes ilustradas Figura 1.

Tabela 1. Distribuição das doses e taxa de incidência da Covid-19 na Paraíba.

Município/Escala	Doses Distribuídas	Taxa de Incidência
Paraíba	919.380	36,83%
João Pessoa	195.659	64,02%
Nova Floresta	2.534	30,08%
Santa Rita	25.574	20,49%
C. Grande	86.757	15,62%
Taperoá	4.092	10,40%
Sumé	4.522	10,02%
Juripiranga	2.242	9,56%
Pombal	8.464	9,45%
Pirpirituba	2.074	9,45%
Solânea	5.685	9,08%
Alagoa Grande	6.450	8,44%
Santa Luíza	4.346	8,45%
Araçagi	3.660	8,24%
Esperança	6.754	7,57%
Guarabira	9.730	6,78%
Lagoa Seca	5.444	6,54%
Itabaiana	5.896	6,53%
Rio Tinto	4.642	5,79%
São Bento	5.706	5,58%
Catolé do Rocha	7.074	5,56%
Pitimbu	2.600	5,24%
Duas Estradas	784	4,17%
Mamanguape	7.526	2,27%
São Mamede	2.304	1,81%
Cajazeiras	15.214	1,77%

Boa Vista	1.456	1,70%
Cruz do E. Santo	2.452	1,15%

Fonte: Ministério da Saúde, 2021.

4. DISCUSSÃO

Verifica-se uma rápida variação na taxa de incidência na Paraíba entre os dias, principalmente aos finais de semana. Como corrobora Praxedes (2021), onde ressalta a influência direta da subnotificação que ainda é alta em alguns estados, pois os dados não apresentam o número exato de enfermos. Deste modo, sugeriram que o número de infecções no país pode ser de 10 a 15 vezes maior do que o número de casos relatados. Nessa perspectiva, não há conhecimento da verdadeira amplitude da pandemia, o que representa uma barreira contra a redução do problema.

De acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19 teve início no dia 18 de Janeiro de 2021. Na ocasião, o início da vacinação se deu pelos trabalhadores da saúde, pessoas idosas residentes em instituições de longa permanência, pessoas maiores de 18 anos com deficiência institucionalizadas e indígenas vivendo em terras indígenas, seguido dos idosos acima de 60 anos, de acordo com os cenários de disponibilidade da vacina (BRASIL, 2021).

Para interrupção da circulação do vírus, seria necessário que 70% ou mais da população fossem vacinados para eliminar a doença, dependendo da eficácia da vacina para evitar a transmissão. Portanto, em um momento inicial, o principal objetivo da vacinação foi ser focado na redução da morbimortalidade causada pela covid-19. No entanto, em face da quantidade ainda limitada na disponibilidade das vacinas, o Programa Nacional de Imunização ressalta a importância das doses disponíveis para estes grupos que inicialmente apresentam os critérios de exposição à infecção e de maiores riscos de agravamento e óbito pela doença. Contudo, os quesitos epidemiológicos devem ser levados em consideração, devendo o acesso a vacina ser com equidade e de acordo com a taxa de incidência, e não promover a distribuição das doses aos estados e municípios de maneira proporcional à sua população, como ocorre atualmente (BRASIL, 2021; CASTRO, 2021).

Divergente a isto, especificamente os estados da região Norte, devido ao aumento do número de casos confirmados de covid-19, foram beneficiados com equivalente à 5% do total de doses de vacinas, onde foram promovidas medidas estratégicas para o país, que culminou na definição de um Fundo Estratégico. O Fundo estratégico foi implementado a partir da segunda pauta de distribuição dessa Campanha (BRASIL, 2021).

Diante disso, demonstra-se a necessidade do Ministério da Saúde seguir empreendendo esforços na aquisição de vacinas com prontidão, para fins de otimização da Campanha Nacional, para que seja proporcionada maior cobertura para os municípios com maior TI. A disponibilidade de maior quantidade de vacinas irá fortalecer os impactos da vacinação com redução na incidência de casos graves e óbitos pela covid-19.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao realizar uma análise espacial das TI's sinalizadas em 27 cidades do Estado da Paraíba tais dados expressam porcentagens oscilantes, além de divergência com princípios epidemiológicos ao associar com a distribuição de vacinas para a Paraíba. É importante que em um plano de vacinação siga a aspectos epidemiológicos que informam a situação de saúde da população cumprido seu propósito de guiar e avaliar ações de saúde. Em um plano de vacinação da magnitude e importância para a saúde pública como o da COVID-19 ao curso do estado de pandemia, tais princípios devem ser rigorosamente desempenhados, o que não é percebido atualmente.

O cenário percebido guia a conclusão desse estudo a delinear a inabilidade ou equívoco da Secretaria Estadual de Saúde ao conduzir um plano de vacinação adequadamente, caracterizando um panorama o qual expõe a população Paraibana a vulnerabilidade de compor altas taxas de incidência e não ser contemplada com doses proporcionais. Considerando tal colocação, é possível que a consequência possa ser percebida em altas taxas de ocupação de leitos, e/ou altas taxas de morbidade e letalidade, sendo necessário mais estudos para tal análise.

REFERÊNCIAS

- BRASIL, Ministério da Saúde. **Coronavírus Brasil**. 202. Disponível em: <https://covid.saude.gov.br/>
- BRASIL, Ministério da Saúde. **COVID-19. Vacinação. Doses Aplicadas**. 2021. Disponível em: https://viz.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19Vacina/DEMAS_C19Vacina.html.
- BRASIL, Ministério da Saúde. **Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19**. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2020/dezembro/16/plano_vacinacao_versao_eletronica-1.pdf
- BRASIL, Ministério da Saúde. **Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19**. 5 ed. 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/marco/23/plano-nacional-de-vacinacao-covid-19-de-2021>
- BRASIL, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Paraíba**. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/panorama>
- CASTRO, R. Vacinas contra Covid-19: o fim da pandemia?. **Physis**, v. 31, n. 1, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.org/article/physis/2021.v31n1/e310100/>
- PRAXEDES S. A. et al. Análise da morbimortalidade dos casos da COVID-19 nos estados brasileiros. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 13, n. 2, p. e6332, 22 fev. 2021. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/6332/4130>
- DOMINGUES, C. M. A. **Desafios para a realização da campanha de vacinação contra a COVID-19 no Brasil**. Caderno de Saúde Pública, 2021. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2021000100101&tlng=pt
- DOMINGUES, C. M. A. et al. **46 anos do Programa Nacional de Imunizações: uma história repleta de conquistas e desafios a serem superados**. Cadernos de Saúde Pública, 2020. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2020001402003&tlng=pt.
- BRASIL, Laboratório de Estatística Aplicada ao Processamento de Imagens e Geoprocessamento. **Número de casos novos registrados diariamente na Paraíba**. Disponível em: http://www.de.ufpb.br/~leapig/projetos/covid_19.html.

PARAÍBA, Governo do Estado. Governo inicia vacinação contra a COVID-19. João Pessoa, 2021. Disponível em: <https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/painel-de-vacinacao>.

PARAÍBA, Secretaria Estadual de Saúde. **Dados epidemiológicos COVID-19, Paraíba.** 2020. Disponível em: <https://superset.plataformatarget.com.br/superset/dashboard/55/>.

PARAÍBA, Secretaria Estadual de Saúde. **Plano Estadual de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19.** João Pessoa, 2020. Disponível em: https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/arquivos-1/plano-operacional-da-estrategia-de-vacinacao-a-covid-19-paraiba_29_12.pdf.

HOCHMAN, G. **Vacinação, varíola e uma cultura da imunização no Brasil.** Ciência coletiva, 2011. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232011000200002&lng=en&nrm=iso. access on 14 Apr. 2021. <http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232011000200002>.

BRASIL. Ministério da Saúde. 2020. **Situação epidemiológica da COVID - 19.** 2020. Disponível em: <https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/12/2020-04-11-BE9-Boletim-do-COE.pdf>.

ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA E O RASTREIO DE VACINAÇÃO DE SARAMPO NO BRASIL DURANTE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (SARS-COV-2) NO ANO DE 2020

DOI: 10.51859/ampla.csa511.1121-23

Rubens Barbosa Rezende ¹

¹ Biomédico Patologista Clínico. Pós-graduando em Imunologia Clínica. Faculdade UniBF

RESUMO

O sarampo é caracterizado como uma doença febril aguda com elevado grau de contágio relacionado a um quadro característico de erupção cutânea maculopapular eritematosa. Dessa forma, objetivou-se analisar o perfil epidemiológico do Sarampo no Brasil, bem como compreender as estratégias de vacinação e seus impactos de forma negativa no período pandêmico. Trata-se de uma revisão bibliográfica, de natureza qualitativa e caráter descritivo, utilizando a questão norteadora: Qual a situação epidemiológica do sarampo no Brasil em 2020 no contexto pandêmico? A busca foi realizada nas bases de dados: PubMed e SciELO, como também, foram extraídos dados do boletim epidemiológico de Sarampo entre as Semanas 1 a 49 de 2020, pertencente ao site do Ministério da Saúde/Brasil. Os critérios de inclusão foram: artigos nacionais e internacionais completos, disponibilizados de forma gratuita, publicados entre os anos de 2016 a janeiro de 2021 em inglês, espanhol e português. A literatura reporta que entre as Semanas Epidemiológicas 1 a 46, foram notificados 16.451 casos de infecções pelo vírus do sarampo, destes, 8.344 (50,7%) foram confirmados. Como também se teve início à pandemia da doença do coronavírus 2019 (COVID-19) ocasionada pelo novo coronavírus (SARS-COV-2), no qual teve-se um impacto negativo no comparecimento presencial nos postos de saúde, caindo radicalmente em muitos países, devido as medidas necessárias de distanciamento social. Conclui-se que ainda se tem muitos surtos ocasionados pelo vírus do sarampo, devido a brecha na cobertura vacinal ocasionada pela pandemia, como também a ação dos grupos antivacinas e das *fake news* que assombram os imunizantes.

Palavras-chave: Brasil. Epidemiologia. Sarampo.

1. INTRODUÇÃO

O sarampo é uma doença altamente contagiosa e que tem o ar como um meio de propagação. O agente etiológico do sarampo é um vírus de RNA de fita única e sentido negativo, possui um genoma com aproximadamente 16 kb, pertencente à

família Paramyxoviridae e ao gênero *Morbillivirus*. É portador de oito proteínas, sendo seis estruturais (polimerase grande, hemaglutinina, proteína de fusão, proteína da matriz, fosfoproteína e a nucleoproteína) e as outras duas não estruturais (proteínas C e V) nas quais são codificadas pelo genoma viral (MENESES, et al., 2019).

De acordo com Meneses e colaboradores (2019) se comparado aos vírus de DNA, os de RNA possuem elevada susceptibilidade de concentrar a variabilidade em sua sequência genômica, em razão da ausência de atividade de revisão das RNA polimerases e aos títulos virais mais expressados ao longo da fase aguda da doença. Na qual essa variabilidade é representada em 24 genótipos do vírus do sarampo, sendo eles, A, B1-B3, C1 e C2, D1-D11, E, F, G1-G3, H1 e H2. Contudo, apenas cinco desses genótipos citados (B3, D4, D8, D9 e H1), foram relatados, entre outubro de 2017 a setembro de 2018.

O sarampo é caracterizado como uma doença febril aguda com elevado grau de contágio relacionado a um quadro característico de erupção cutânea maculopapular eritematosa. Sua disseminação se dá por gotículas conduzidas pelo ar ou no contato com o indivíduo possuindo a doença através de secreções bucais e nasais. Em pacientes imunocomprometidos, complicações graves, tais como morbidades fatais (diarreia grave e pneumonia) e cegueira, são capazes de se desenvolverem. Além disso, duas doenças neurológicas raras e muito graves, também podem ser originadas pela infecção do vírus do sarampo, sendo elas panencefalite esclerosante subaguda e encefalite de corpos de inclusão do sarampo (GOLDANI, 2018).

Xavier e colaboradores (2019) ressaltam que a propagação viral acontece de quatro a seis dias antes ou quatro dias depois do aparecimento do exantema. Graças aos anticorpos maternos, a infecção em recém-nascidos de mães vulneráveis, é moderadamente rara no primeiro semestre de vida.

Goldani (2018) relata que na década de 80 o sarampo foi a principal causa a nível mundial de morbimortalidade infantil e responsável por cerca de 2 milhões de óbitos/ano antes da elevação na cobertura global de vacinação. Bem como, os surtos da doença eram prevalentes nas populações com menos de 10% dos indivíduos não imunizados.

O sarampo pode ser evitado pela vacina, sendo observado nas últimas décadas a diminuição da mortalidade ocasionada pela doença. Se comparado a década de 80, o

número de óbitos diminuiu muito, de aproximadamente 2 milhões/ ano para cerca de 100.000/ano, e isso se deve pela melhora nos indicadores sociais e ao empenho mundial na cobertura vacinal. Contudo, é necessária a vigilância oportuna de casos com suspeita da doença, utilizando meios com diagnóstico molecular altamente específico e sensível, somados com a diferenciação genética dos isolados, sendo vias para o combate ao vírus (MENESES, et al., 2019).

Goldani (2018) complementa que a imunização em massa comprovou ser um dos meios de saúde pública mais econômicos. Para atingir as metas regionais de eliminação do vírus são fundamentais a vigilância e a elevação da cobertura vacinal com duas doses através dos investimentos adicionais substanciais e amparados nos sistemas de saúde. Como também, a avaliação adicional do custeio de esquemas de duas doses e sua sorologia são capazes de conceder dados relevantes para uma possível extinção global do vírus. Dessa forma, objetivou-se analisar o perfil epidemiológico do Sarampo no Brasil, bem como compreender as estratégias de vacinação e seus impactos de forma negativa no período pandêmico.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão bibliográfica, de natureza qualitativa e caráter descritivo, utilizando a questão norteadora: Qual a situação epidemiológica do sarampo no Brasil em 2020 no contexto pandêmico? A busca foi realizada nas bases de dados: PubMed e SciELO, utilizando os descritores: “Sarampo”, “Epidemiologia” e “Brasil” cadastrados no DeCS/MeSH e empregando o operador booleano AND. Como também, foram extraídos dados do boletim epidemiológico de Sarampo entre as Semanas 1 a 49 do ano de 2020, pertencente ao site do Ministério da Saúde/Brasil.

Os critérios de inclusão foram: artigos nacionais e internacionais completos, disponibilizados de forma gratuita, publicados entre os anos de 2016 a janeiro de 2021 em inglês, espanhol e português. Como também, os critérios de exclusão foram: artigos com acesso restrito, resumos e nos quais não abordavam a situação epidemiológica do sarampo no Brasil.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a pesquisa dos descritores nas bases de dados, foram encontrados 235 artigos. Foi realizada a leitura dos títulos e resumos, com isso excluiu-se 203 artigos. Em seguida, foi realizada uma leitura mais detalhada e excluindo-se mais 24 artigos e incluindo nove no estudo, conforme quadro 1.

Quadro 1 – Retorno da busca nas bases de dados.

Bases de dados	PubMed	SciELO
Descritores	"Sarampo" AND "Epidemiologia" AND "Brasil"	"Sarampo" AND "Epidemiologia" AND "Brasil"
Retorno da pesquisa	34	201
Primeira avaliação (exclusão)	24	179
Segunda avaliação (exclusão)	5	18
Inclusão no estudo	5	4

Fonte: Autoria própria, 2021.

O vírus do sarampo possui um genoma não segmentado e de sentido negativo (Figura 1 b), bem como um envelope lipídico. Seu genoma de 16 kb codifica oito proteínas e é provável que sua evolução ocorreu do vírus da peste bovina, na qual é uma doença erradicada do gado. O vírus possui seis proteínas (Figura 1 a), e seu envelope contem projeções de superfície compostas pela hemaglutinina viral (H) e glicoproteínas de fusão (F) com a proteína da matriz (M) envolvendo o seu interior. A partir do RNA genômico envolto com a proteína do nucleocapsídeo (N), empacotado dentro do envelope na forma de uma bobina simétrica com a fosfoproteína (P) e as proteínas grandes da polimerase (L) anexadas, o nucleocapsídeo helicoidal é formado (MENESES, et al., 2019).

O gene P codifica duas proteínas não estruturais, C e V, que regulam a resposta da célula à infecção e regulam os aminoácidos de sinalização do interferon (IFN) C. A proteína V possuem o mesmo terminal N (com 231 aminoácidos) que P, mas com a adição de uma guanina extra em cada versão de RNA muda o quadro de leitura, resultando em um domínio C-terminal de ligação de zinco rico em cisteína de 68 aminoácidos que é altamente conservado entre os paramixovírus. H interage com

receptores virais para que ocorra a ligação, enquanto F interage com H, e com a mesma ou com uma proteína celular adicional para fusão e entrada (Figura 1 c) (MENESES, et al., 2019).

Figura 1 – Esquemas do vírus do sarampo (a), genoma (b) e ciclo de replicação intracelular (c).

Nota: (a) O vírus com envelope possui seis proteínas: duas glicoproteínas de superfície, hemaglutinina (H) e fusão (F); uma proteína de matriz (M); uma proteína do nucleocapsídeo (N) que envolve o RNA de sentido negativo e duas proteínas replicase, a fosfoproteína (P) e a proteína polimerase grande (L). (b) O gene P também codifica duas proteínas reguladoras da resposta da célula hospedeira, V e C. (c) A proteína H interage com um dos vários receptores do vírus do sarampo, resultando na fusão mediada por F com a membrana plasmática. A replicação ocorre no citoplasma e no botão de vírus montado a partir da membrana plasmática. Fonte: adaptado de GRIFFIN D. E., LIN W. H., PAN C. H., 2012, p. 650.

O sarampo é uma doença que apresenta uma significativa causa de hospitalização e morbimortalidade infantil, e o desfecho final está estreitamente associada com o grau de avanço socioeconômico das pessoas afetadas, nutrição, cuidados de saúde adequados e padrões de higiene. A incapacidade de vacinar a população toda, gera um problema a nível mundial na decisão de exterminar a doença, uma vez que, pessoas que são vulneráveis ao vírus são capazes de propagar o sarampo e gerar um surto naquela região (XAVIER, et al., 2019). Em 2020 no Brasil, foram registrados casos de sarampo em 21 unidades federativas, conforme (Figura 2).

Figura 2 – Casos confirmados de sarampo por unidade federada, Brasil, semanas epidemiológicas 1 a 46, 2020.

Fonte: Secretaria de Vigilância em Saúde/MS. Atualização em 20/11/2020. Adaptado de Ministério da Saúde, 2020, p. 2.

De acordo com o Ministério da Saúde (2020), destas 21 unidades federativas, 17, paralisaram a cadeia de propagação viral, e quatro estados ainda mantiveram o surto por mais algum tempo, sendo eles o Amapá, Pará, São Paulo e Rio de Janeiro. Entre as Semanas Epidemiológicas (SE) 1 a 46 de 2020 (29/12/2019 a 14/11/2020), tiveram notificações de 16.451 casos de infecções pelo vírus do sarampo, destes, 8.344 (50,7%) foram confirmados, 7.716 (46,9%) descartados e 391 (2,4%) ficaram sob investigação, conforme (Figura 3).

Figura 3 – Distribuição dos casos de sarampo por semana epidemiológica do início do exantema e classificação final, Brasil, semanas epidemiológicas 1 a 46, 2020.

Fonte: Secretaria de Vigilância em Saúde/MS. Atualização em 20/11/2020. Adaptado de Ministério da Saúde, 2020, p. 2.

O Ministério da Saúde (2020) ressalta que os quatro estados (Amapá, Pará, São Paulo e Rio de Janeiro) onde o surto durou mais tempo, teve uma concentração de casos confirmados, atingindo 8.066 casos (96,7%), e em relação aos óbitos nestes estados, somente o Amapá não obteve nenhum caso, o Pará confirmou cinco óbitos, Rio de Janeiro e São Paulo, um cada, totalizando sete, sendo demonstrado na (Tabela 1).

Tabela 1 – Casos confirmados e óbitos por sarampo por unidade da federação, Brasil, semanas epidemiológicas 1 a 46, 2020.

ID	UF	Confirmados		Óbitos	
		N	%	N	%
1	Pará	5.377	64,4	5	71,4
2	Rio de Janeiro	1.347	16,1	1	14,3
3	São Paulo	833	10	1	14,3
4	Paraná	377	4,5	0	0
5	Amapá	132	1,6	0	0
6	Santa Catarina	110	1,3	0	0
7	Rio Grande do Sul	37	0,4	0	0
8	Pernambuco	34	0,4	0	0
9	Minas Gerais	22	0,3	0	0
10	Maranhão	17	0,2	0	0
11	Mato Grosso do Sul	8	0,1	0	0

12	Goiás	8	0,1	0	0
13	Sergipe	8	0,1	0	0
14	Bahia	7	0,1	0	0
15	Ceará	7	0,1	0	0
16	Rondônia	6	0,1	0	0
17	Distrito Federal	5	0,1	0	0
18	Amazonas	4	0	0	0
19	Alagoas	3	0	0	0
20	Mato Grosso	1	0	0	0
21	Tocantins	1	0	0	0
Total		8.344	100,0	7	100,0

Fonte: Secretaria de Vigilância em Saúde/MS. Atualização em 20/11/2020. Adaptado de Ministério da Saúde, 2020, p. 3.

Através da Rede Nacional de Laboratórios de Saúde Pública (RNLSP) a vigilância laboratorial do sarampo no Brasil é acompanhada através dos exames realizados. O LACEN executa tanto a sorologia para o diagnóstico laboratorial quanto o diferencial, sendo o método oficial de diagnóstico o ensaio de ELISA, graças a sua especificidade e sensibilidade. E o Laboratório de Referência Nacional/FIOCRUZ executa além da sorologia, a reação em cadeia da polimerase com transcrição reversa (RT-PCR) e isolamento viral, em especial, o último é o meio mais específico para identificação do genótipo e da linhagem viral que ocasiona o sarampo, do vírus responsável pela infecção (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020).

E segundo o Ministério da Saúde (2020) no intuito de deter a circulação do vírus, é recomendado a adesão de estratégias e condutas, frente aos resultados dos exames de biologia molecular e sorologia liberados pelos LACEN, no local onde se tenham surtos estabelecidos. E as recomendações do (Quadro 2), são direcionadas somente enquanto continuar o surto local, e após cessar o surto, é necessário voltar a seguir os fluxos preconizados pelo Guia de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde.

Quadro 2 – Estratégias a serem adotadas em municípios com surto ativo para envio de amostras para o diagnóstico de sarampo.

Sorologia (ELISA)	RT-PCR (Critérios para envio de amostras para Fiocruz)
Resultado de sorologia IgM Reagente para sarampo: confirmar o caso;	Enviar amostras dos 3 primeiros casos suspeitos que estão diretamente relacionados ao caso índice;
Resultado de IgG Reagente para sarampo: caso não tenha história de vacinação, coletar e avaliar o aumento de títulos de IgG por pareamento das amostras.	Enviar amostras dos 3 casos suspeitos que ocorreram em uma nova localidade ou município;
	A cada dois meses, enviar três novas amostras de casos da mesma localidade ou município onde os casos que iniciaram o surto foram confirmados.

Fonte: adaptado de Ministério da Saúde, 2020, p. 4.

De acordo com Litvoc e Lopes (2019) há dois anos atrás, especificamente no mês de março de 2019, o Brasil perdeu seu título de país livre do sarampo. Na primeira quinzena de abril de 2019, foram notificados novos casos de sarampo em São Paulo, além disso, o primeiro caso de disseminação autóctone foi comprovado no início do mês de maio, do mesmo ano. Os surtos em abril, foram dados com importados e vieram da Ilha de Malta (por meio dos navios pelo porto de Santos), Noruega e Israel. Sendo o genótipo D8 identificado como agente etiológico dos casos paulistas.

Na segunda quinzena de agosto de 2019, foram confirmados 2.753 casos, descartados 2.109 e manteve-se sob investigação mais de 15 mil casos, e sendo o estado de São Paulo, responsável por 98,3% dos casos confirmados, e deste 82,5% distribuídos em seus municípios, mas em especial na grande capital. Além disso, este mesmo estado, confirmou três mortes em indivíduos com ausência de imunização, nos quais eram, um adulto de 42 anos e duas crianças menores de um ano) (LITVOC e LOPES, 2019).

Costa e colaboradores (2018) reportaram que mesmo após o estabelecimento do Plano de Controle e Eliminação do Sarampo no Brasil, em 1992, teve-se notificações da doença de forma endêmica e com picos a cada dois a três anos. Com isso o Ministério da Saúde (2020) afirma que está disponível na rotina dos serviços de saúde a vacina tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba), de acordo com as recomendações do Calendário Nacional de Vacinação do Programa Nacional de Imunizações.

Moss (2017) ressalta que a vacinação é a uma estratégia necessária de saúde pública, utilizada para precaver a disseminação do vírus do sarampo e, dessa forma, prevenindo agravos e óbitos. Medeiros (2020) diz que a imunização contra o sarampo não traz riscos ao indivíduo e também é a forma mais eficaz de prevenção. Porém, em todo mundo existem grupos antivacinas, poucos em comunidades religiosas e, como também, têm-se pais com informações equivocadas, levando-os a acreditar em *fake news*.

E esta onda de informações falsas associadas aos imunizantes, principalmente nas redes sociais, relacionada aos efeitos colaterais, impactam muito no modo de agir dos pais, influenciando-os a não imunizarem seus filhos, ou até mesmo se vacinarem, elevando-se assim o número de vulneráveis, facilitando assim a reemergência de doenças já eliminadas. A estrutura de vacinação do Ministério da Saúde do Brasil compreende duas doses do imunizante contra o sarampo relacionadas à proteção frente a outros vírus. Sendo a primeira dose MMR (sarampo, caxumba e rubéola) administrada com 12 meses de idade, e a segunda que seria a tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela) aos 15 meses de idade (MEDEIROS, 2020).

Com isso, em 2020, teve-se início à pandemia da doença do coronavírus 2019 (COVID-19) ocasionada pelo novo coronavírus (SARS-COV-2), no qual teve-se um impacto negativo no comparecimento presencial nos postos de saúde, caindo radicalmente em muitos países, devido as medidas necessárias de distanciamento social para minimizar na propagação do vírus SARS-COV-2, dessa forma, muitas doses destinadas a imunização infantil não foram administradas (SATO, 2020).

Sato (2020) afirma que os esforços para controlar a pandemia, engloba práticas de telemedicina e a utilização de outras tecnologias no intuito de continuar os cuidados em domicílio, impactando assim as ações de vacinação, nas quais necessitam de deslocamento aos postos de saúde. Outro ponto, seria a preocupação dos pais em expor seus filhos ao vírus SARS-COV-2 ao levá-los aos postos de vacinação, o que contribuiu de forma negativa para a diminuição nas coberturas vacinais.

E Abbas e colaboradores (2020) em um estudo de avaliação risco-benefício em países da África, demonstrou que os óbitos evitáveis pela imunização de rotina excederam a abundante morte por COVID-19 relacionado ao comparecimento nos

postos de saúde para a administração do imunizante, comprovando a necessidade dos esforços ligados a elevação nas coberturas vacinais naquele momento.

O Ministério da Saúde (2020) reitera que as operações das ações de vacinação devem ser levadas em conta o cenário epidemiológico da COVID-19, em particular, nos locais onde se tem casos ativos da doença, e que também possuem a circulação ativa do vírus do sarampo. Com isso, a imunização de rotina como também as outras estratégias que têm como pretensão cessar a cadeia de propagação do vírus do sarampo, é fundamental a adesão de medidas profiláticas para profissionais responsáveis pela imunização e também para a população como um todo, procurando executar a vacinação de modo seguro, e ao mesmo passo, diminuindo o risco de propagação da COVID-19.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dessa forma, fica claro que ainda se tem muitos surtos ocasionados pelo vírus do sarampo, devido a brecha na cobertura vacinal ocasionada pela pandemia, como também a ação dos grupos antivacinas e das *fake news* que assombram os imunizantes.

Outro ponto seria a necessidade de mais estudos voltados ao impacto da COVID-19 na diminuição da cobertura vacinal, tanto no Brasil quanto em outros países, uma vez que se tem pouquíssima literatura com esta abordagem.

REFERÊNCIAS

- ABBAS K., PROCTER S. R., ZANDVOORT K., CLARK A., FUNK S., MENGISTU S., et al. Routine childhood immunisation during the COVID-19 pandemic in Africa: a benefit-risk analysis of health benefits versus excess risk of SARS-CoV-2 infection. **Lancet Glob Health**. v. 8, n. 10, p. 1264-1272, 2020. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(20\)30308-9](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30308-9)
- COSTA, N. R. et al. Measles epidemiological profile in Brasil from 2013 to 2018. **Rev. Assoc. Med. Bras.**, São Paulo, v. 66, n. 5, p. 607-614, May 2020. <http://dx.doi.org/10.1590/1806-9282.66.5.607>.
- GOLDANI, L. Z. Measles outbreak in Brazil. **Braz J Infect Dis.**, v. 22, n. 5, p. 359-360, 2018. doi: 10.1016/j.bjid.2018.11.001.
- GRIFFIN D. E., LIN W. H., PAN C. H. Measles virus, immune control, and persistence. **FEMS Microbiol Rev**. v. 36, n. 3, p. 649-662, 2012. doi: 10.1111/j.1574-6976.2012.00330.x.

- LITVOC, M. N., LOPES, M. I. B. F. From the measles-free status to the current outbreak in Brasil. **Rev. Assoc. Med. Bras.**, São Paulo, v. 65, n. 10, p. 1229-1230, Oct. 2019. <https://doi.org/10.1590/1806-9282.65.10.1129>.
- MEDEIROS, E. A. S. Entendiendo el resurgimiento y el control del sarampión en Brasil. **Acta paul. enferm.**, São Paulo, v. 33, n. 1, p. 1-4. 2020. <https://doi.org/10.37689/acta-ape/2020edt0001>.
- MENESES, C. A. R. et al. Molecular characterisation of the emerging measles virus from Roraima state, Brazil, **Mem. Inst. Oswaldo Cruz**, Rio de Janeiro, v. 114, n. 1, p. 1-4, 2019. <https://doi.org/10.1590/0074-02760180545>.
- MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Informe semanal sarampo – Brasil, semanas epidemiológicas 1 a 49, 2020**. Boletim Epidemiológico, v. 51, n. 50, p. 16-20, 2020. Disponível em: https://www.gov.br/saude/ptbr/media/pdf/2020/dezembro/28/boletim_epidemiologico_svs_50.pdf
- MOSS, WJ. Measles. **Lancet**. v. 2; n. 390, p. 2490-2502, 2017. doi: 10.1016/S0140-6736(17)31463-0.
- SATO, A. P. S. Pandemia e coberturas vacinais: desafios para o retorno às escolas. **Rev. Saúde Pública**, São Paulo, v. 54, n. 1, p. 115-116, 2020. <https://doi.org/10.11606/s1518-8787.2020054003142>.
- XAVIER, A. R. et al. Diagnóstico clínico, laboratorial e profilático do sarampo no Brasil. **J. Bras. Patol. Med. Lab.**, Rio de Janeiro, v. 55, n. 4, p. 390-401, 2019. <https://doi.org/10.5935/1676-2444.20190035>.

CAPÍTULO XXIV

SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ RELACIONADA À COVID-19

DOI: 10.51859/ampla.csa511.1121-24

Franklin de Castro Alves Neto ¹
Levi Souza Mesquita ²
Livia Mourão de Moraes Ribeiro ²
Talita Ponte Mendes ¹
Tayná de Lima Viana ²
Edson da Silva Freitas ³

¹ Graduando(a) do curso de Medicina. Universidade Estadual do Ceará – UECE

² Graduando(a) do curso de Medicina. Universidade Potiguar - UNP

³ Professor do curso de Medicina. Universidade Potiguar - UNP.

RESUMO

O SARS-CoV-2 é um vírus que, mesmo com sua relevância atual, ainda demonstra grande mistério. Apesar do acidente vascular cerebral isquêmico (AVCi) ser a manifestação neurológica mais comum da doença, também merece atenção a síndrome de Guillain-Barré (SGB). O objetivo do presente capítulo é revisar os aspectos voltados à apresentação, diagnóstico, terapia e prognóstico da SGB relacionada à COVID-19. Na perspectiva fisiopatológica, estipula-se mecanismos de disseminação hematogênica e de ligação ao receptor da enzima conversora de angiotensina 2 (ECA-2) na barreira hematoencefálica (BHE). O fenótipo clínico da SGB varia entre paralisia flácida e disautonomias, englobando diversas variantes. Avaliações complementares, como ressonância magnética (RM), exame do líquido e estudos de eletrofisiologia podem subsidiar o diagnóstico. Para tratamento, é possível utilizar imunoglobulina intravenosa (IgIV) e plasmáfereze. Grande parte dos pacientes evolui com prognóstico favorável, apesar de alguns exibirem mau desfecho, sendo possível prever esse cenário com o exame do líquido e o escore de Erasmus modificado (mEGOS). Conclui-se que é indubitável a importância da ciência baseada em evidências para as especificidades sobre quadro clínico, tratamento e prognóstico da associação entre SGB e a COVID-19, ressaltando-se a necessidade de estudos mais aprofundados sobre o assunto.

Palavras-chave: Síndrome de Guillain-Barré. SARS-CoV-2. COVID-19.

1. INTRODUÇÃO

O SARS-CoV-2 é um vírus que, apesar da sua relevância atual, ainda demonstra grande mistério. A sua grande afinidade pelo receptor da enzima conversora de angiotensina 2 (ECA-2) pode explicar a ampla gama de manifestações da *coronavirus disease 2019* (COVID-19), pois tal estrutura é expressa em diversos tipos celulares no

organismo humano, dos quais cabe destacar as células do sistema nervoso, como células da glia e neurônios (SRIWASTAVA et al, 2020), o que pode acarretar variadas manifestações neurológicas. Dentre elas, apesar do acidente vascular cerebral isquêmico (AVCi) ser a mais comum (COLLANTES et al, 2021), também merece atenção a síndrome de Guillain-Barré (SGB), a qual é a principal causa de paralisia flácida aguda e uma polirradiculoneuropatia inflamatória que apresenta diversas formas clínicas: sensório-motora clássica, puramente motora, puramente sensorial, faringo-cervicobraquial, paraplégica, paralisia facial bilateral associada a parestesias, síndrome de Miller-Fisher e encefalite de tronco cerebral de Bickerstaff; e eletrofisiológicas: polirradiculoneuropatia desmielinizante inflamatória aguda, neuropatia axonal motora aguda e neuropatia axonal sensório motora aguda (LEONHARD et al, 2019); das quais algumas têm sido relatadas em pacientes acometidos pela COVID-19.

O objetivo do presente capítulo é revisar os aspectos voltados à apresentação, diagnóstico, terapia e prognóstico da SGB relacionada à COVID-19.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1. EPIDEMIOLOGIA

Demonstrado através dos seus efeitos pandêmicos, o SARS-COV-2 tem apresentado grande destaque no meio científico, devido à tentativa de melhorar a elucidação de seus efeitos e consequências na vida dos pacientes infectados. Caracterizada como uma doença espectral, a COVID-19 possui nuances de sinais e sintomas, podendo manifestar desde sintomas leves a graves complicações, gerando sequelas permanentes ou morte. Dentre os sistemas extra respiratórios acometidos, foram relatados casos de afecção viral no sistema nervoso central e periférico, sendo uma das principais doenças a Síndrome de Guillain-Barré (ORRÙ et al, 2020).

Em relação aos gradientes epidemiológicos, apesar de ser representada como uma patologia parcialmente rara, com incidência de 1,6 / 100.000 pessoas-ano até os estudos atuais (SRIWASTAVA et al, 2020), a síndrome tem sido continuamente observada em concomitância com a COVID-19. Dos acometidos, os estudos mostraram uma maior prevalência no sexo masculino, podendo este cenário refletir o perfil epidemiológico do SARS-CoV-2 (ABU-RUMEILEH et al, 2020); (CHUA et al, 2021); (HASAN

et al, 2020); (SANCTIS et, 2020); (SRIWASTAVA et al, 2020); (UNCINI et al, 2020). Aliados aos dados supracitados, pacientes com idades mais avançadas, entre 49 e 70 anos, mostraram-se com predomínio da doença nos estudos avaliados (CHUA et al, 2021); (GITTERMANN et al, 2020); (HASAN et al, 2020); (SANCTIS et, 2020); (SRIWASTAVA et al, 2020); (UNCINI et al, 2020). Entretanto, maiores estudos são necessários para a montagem de um perfil epidemiológico mais fidedigno e consistente.

2.2.FISIOPATOLOGIA

Os gangliosídeos são glicoesfingolípídeos que estão presentes em vários sistemas corporais, sendo encontrados, predominantemente, no sistema nervoso. Essas estruturas são responsáveis pelo reconhecimento, adesão e regulação de inúmeras funções celulares, como modulação dos receptores de sinalização e interação com proteínas reguladoras do sistema nervoso. Os diversos tipos de gangliosídeos possuem distribuição preferencial nos nervos periféricos. A Síndrome de Guillain-Barré (SGB), geralmente, ocorre após um evento desencadeante, principalmente, uma infecção e destacamos nesse momento, especificamente, a infecção pelo SARS-CoV-2 como um dos fatores capazes de desencadear o estímulo que culminará no envolvimento neurológico dos pacientes. Sabe-se, no entanto, que outros tipos de coronavírus foram identificados como capazes de infectar o SNC, sendo, portanto, um grupo considerado potencialmente neuroinvasivo (GITTERMANN, FERIS E GIACOMAN, 2020).

Postula-se a possibilidade de alguns mecanismos diferentes que podem explicar o dano central e periférico do sistema nervoso causado pelo SARS-CoV-2 (ABU-RUMEILEH et al, 2020). Primeiro, acredita-se em uma possível disseminação hematogênica, que irá causar infecção de células endoteliais e de leucócitos ou disseminação transneuronal, por meio do trato olfatório ou de outros nervos cranianos acometidos, culminando na transmissão viral ao SNC devido ao neurotropismo deste vírus. Outro potencial mecanismo de dano neurológico do SARS-CoV-2 inclui a ligação do vírus à enzima conversora de angiotensina 2 (ECA-2) na barreira hematoencefálica, o que facilita a entrada de SARS-CoV-2 em células hospedeiras humanas. Acredita-se que a alta expressão e abundância notável de ECA-2 em diversos órgãos, incluindo pulmões, endotélio vascular e sistema nervoso, facilitam a disseminação do SARS-CoV-2. Advoga-se, também, a possibilidade de uma resposta imunomediada, por meio do

reconhecimento linfocítico de auto-antígenos, ou seja, um forma de mimetismo molecular; causando envolvimento neurológico secundário, devido a afecções autoimunes e hiperprodução de citocinas, visto que dados clínicos indicam que o SARS-CoV-2 é capaz de causar uma reação imunológica exacerbada com um nível elevado de citocinas (principalmente a IL-6), que são produzidas por leucócitos ativados que estimulam a cascata inflamatória, levando a extensos danos aos tecidos, ocasionando, por exemplo, lesões aos nervos periféricos.

Logo, observou-se que a grande maioria dos trabalhos analisados advogam a favor dos dois últimos artifícios postulados, visto que tais mecanismos apresentam maiores evidências que corroboram com a hipótese de que um mecanismo fisiopatológico mais provável seja o pós-infeccioso para a SGB, em vez de uma fisiopatologia para-infecciosa, como já foi observada em outras etiologias da síndrome. Dessa forma, para a doença ser desencadeada por SARS-CoV-2, foi hipotetizado que a ligação do vírus às superfícies celulares seja mediada pela proteína viral *spike*, que se liga ao receptor da ECA-2 e também a alguns tipos de gangliosídeos. Sugeriu-se, portanto, que a reatividade cruzada entre os gangliosídeos associados à proteína viral e os gangliosídeos de nervos periféricos seja resultado de um mimetismo molecular, por conta da semelhança de epítomos (SRIWASTAVA et al, 2020). Essa reação cruzada se torna um grande risco para a atração de anticorpos, que na tentativa de erradicar o vírus, lesionam o próprio neurônio acidentalmente, e, assim, geram a inflamação desmielinizante própria da Síndrome de Guillain-Barré.

Portanto, essa síndrome é considerada uma polirradiculoneuropatia imunomediada devido à existência de citocinas inflamatórias, células T ativadas e anticorpos anti-gangliosídeo no sangue destes pacientes, bem como pelo depósitos de complemento, imunoglobulinas e macrófagos nos nervos periféricos. Desse modo, são produzidos anticorpos contra o agente infeccioso estruturalmente semelhante aos gangliosídeos, bem como contra os próprios gangliosídeos nos nervos periféricos, conduzindo a uma reação cruzada contra os componentes da bainha de mielina do axônio em muitos nervos periféricos, culminando na desmielinização e degeneração axonal, levando finalmente ao aparecimento da clínica característica da SGB.

2.3. QUADRO CLÍNICO

Segundo a maioria dos estudos, houve um período de latência entre os primeiros sintomas de COVID-19 e o início do quadro de SGB, o qual teve mediana entre 10 e 14 dias (HASAN et al, 2020); (ABU-RUMEILEH et al, 2020). De acordo com Shahrizaila et al (2021), esse período pode ser estendido até 4 semanas.

Em uma pequena parcela dos casos, houve manifestação concomitante das duas patologias, com sintomas sobrepostos, o que pode ser explicado pelo fato de o SARS-CoV-2 ter um período de incubação de cerca de 1 semana (SANCTIS, P. de et. al, 2020), tempo suficiente para gerar uma reação imunomediada mesmo com uma carga viral a qual ainda não seja capaz de manifestar os sintomas do vírus. Esse fato poderia explicar até mesmo uma sintomatologia por SGB antes das afecções pelo SARS-CoV-2, o que ocorreu com um paciente (SCHEIDL et al, 2020); (SANCTIS et. al, 2020).

Foi possível notar claro predomínio da forma sensório-motora clássica da síndrome em relação a outras variantes, como Síndrome de Miller-Fisher, forma motora pura, encefalite do tronco cerebral de Bickerstaff, etc. (UNCINI et al, 2020); (ABU-RUMEILEH et al, 2020); (SHAHORIZAILA et al, 2021). Desse modo, o início típico foi marcado por fraqueza muscular em MMII e sintomas sensitivos (como paraparesia e quadriparesia), os quais iniciam-se nas pernas e progridem para os braços (SANCTIS et. al, 2020); (SHAHORIZAILA et al, 2021), além do envolvimento de nervos cranianos (gerando paralisia facial, diplegia facial, disfagia etc) (ABU-RUMEILEH et al, 2020); (GITTERMANN et al, 2020), sintomas disautonômicos e dor (ABU-RUMEILEH et al, 2020). Na maior parte dos casos, essa fraqueza de membros foi progressiva até atingir um platô que durou até 4 semanas, e depois começou a reduzir (SHAHORIZAILA et al, 2021). Também foi muito comum a arreflexia, seja ela generalizada ou apenas dos membros inferiores, acometendo principalmente os reflexos tendinosos (ABU-RUMEILEH et al, 2020); (SANCTIS et. al, 2020).

Vale ressaltar, ainda, que o número de pacientes com acometimento de nervos cranianos sofreu um aumento em relação às informações pré-pandêmicas, representando, possivelmente, uma característica distinta da SGB quando associada à COVID-19 (GITTERMANN et al, 2020). Todavia, estudos futuros ainda devem avaliar se

os pacientes com uma associação entre a síndrome e o SARS-CoV-2 são um subgrupo específico, com diferentes antígenos alvo, ou não.

Acerca dos critérios diagnósticos, os critérios de NINDS e Brighton continuaram a ser amplamente utilizados (tabela 1). O diagnóstico da síndrome de Guillain-Barré requer a presença de, no mínimo, a paresia flácida simétrica e a diminuição de reflexos na ausência de outro diagnóstico (SHAHRIZAILA et al, 2021).

Tabela 1 - Critérios Diagnósticos da Síndrome de Guillain-Barré

NINDS modificado			Critério de Brighton			
	Obrigatório	Facultativo	Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4
SGB Clássica						
Paresia flácida bilateral dos membros	Sim	-	Sim	Sim	Sim	-
Diminuição ou desaparecimento dos reflexos tendinosos	Sim	-	Sim	Sim	Sim	-
Ausência de um diagnóstico alternativo	Sim	-	Sim	Sim	Sim	Sim
Características clínicas adicionais						
Curso monofásico, com tempo adicional entre o surgimento e o platô de 12h a 28 dias	-	Sim	Sim	Sim	Sim	-
Simetria relativa	-	Sim	-	-	-	-
Sinais ou sintomas sensoriais leves	-	Sim	-	-	-	-

Caráter progressivo (após 2 a 4 semanas de platô)	-	Sim	-	-	-	-
Envolvimento de nervo craniano (facial, olfatório, oculomotor, etc)	-	Sim	-	-	-	-
Disfunção autonômica	-	Sim	-	-	-	-
Ausência de febre no início dos sintomas neurológicos	-	Sim	-	-	-	-
Análise do LCR						
Contagem de células brancas <50 (normalmente <10)	-	Sim	Sim	Sim *	-	-
Aumento da contagem de proteínas (após a primeira semana)	-	Sim	Sim	Sim *	-	-
Estudo da condução nervosa						
Consistente com condução diminuída e bloqueio	-	Sim	Sim	Sim	-	-

NINDS=National Institute of Neurological Disorders and Stroke. *Para atingir o nível 2 dos Critérios de Brighton, o resultado dos estudos de LCR ou de condução nervosa devem ser acessíveis.

Fonte: (SHAH RIZAILA, 2021).

Outros sintomas, os quais acometeram uma minoria dos pacientes, foram parestesia facial, diplopia, ptose, SGB forma paraparética e forma com componente

motor puro, ataxia e retenção urinária (SANCTIS et. al, 2020). Também foi encontrada fraqueza localizada, fraqueza progressiva ocular e essas variantes e uma variante faríngea-cervical-braquial. (SANCTIS et. al, 2020); (SRIWASTAVA et al, 2020); (SHAHRIZAILA et al, 2021); (CHUA et al, 2021).

Apesar dos achados, deve-se levar em consideração que o próprio coronavírus já induz acometimentos neurológicos por si só. De acordo com uma revisão sistemática realizada por Helms et al (2020), 58 de 64 pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) pela COVID-19 tiveram sintomas neurológicos causados por encefalopatia devido ao próprio coronavírus, como agitação, confusão mental, síndrome disexecutiva, ataxia e sinais do trato corticoespinal.

Uma sintomatologia menos frequente ainda durante a síndrome inclui tosse, febre, diarreia, insuficiência respiratória, anosmia e ageusia (UNCINI et al, 2020); (HASAN et al, 2020); (GITTERMANN et al, 2020); (SCHEIDL et al, 2020); (SHAHRIZAILA et al, 2021), o que ocorreu principalmente quando as manifestações da SGB foram simultâneas às de COVID-19 (SANCTIS et. al, 2020). No tocante ao quadro respiratório, houve um número significativo de casos de disventilação pulmonar induzida pela SGB, o que possivelmente se acrescentou aos problemas respiratórios causados pela presença de pneumonia por COVID-19. Em uma análise feita por Toscano et al (2020), por exemplo, em um total de nove pacientes, seis apresentaram insuficiência respiratória e necessitam de ventilação mecânica. Apesar disso, ainda não há, em nenhum estudo, um esclarecimento que confirme se essa insuficiência respiratória foi decorrente da disfunção neuromuscular gerada pela SGB ou de um acometimento respiratório pelo SARS-CoV-2, necessitando de mais estudos para a obter essa informação. Entretanto, já é possível inferir uma correlação de intensidade entre as duas doenças, de modo que, quanto mais graves os sintomas respiratórios durante a fase aguda da COVID-19, maior a probabilidade de uma forma mais grave da SGB (SCHEIDL et al, 2020).

Acerca do nível de consciência dos pacientes, houve apenas um relato de perda da consciência, o qual não teve evidências de associação com insuficiência respiratória (CHUA et al, 2021).

Assim, é possível afirmar que o quadro clínico e o curso da doença foram muito semelhantes à SGB de outras etiologias, apesar das inúmeras variações de casos clínicos.

2.4.EXAMES COMPLEMENTARES

Os sinais e sintomas elucidados no quadro clínico podem ser subsidiados por exames complementares para auxílio diagnóstico.

Em uma revisão sistemática escrita por Abu-Rumeileh e colaboradores (2020) de 73 casos da doença, o clássico sinal de dissociação albuminocitológica ou proteinocitológica ao exame do líquido cefalorraquidiano (LCR), no qual há aumento proteico e celularidade diminuída ou normal, esteve presente em 71,2% dos pacientes. Nesse mesmo estudo, alguns indivíduos não demonstraram hiperssinal nas raízes nervosas à ressonância magnética (RM), o que acontece na SGB em outros cenários, mas é necessário considerar a diminuição na frequência de exames realizados no contexto pandêmico restritivo, além do fato desse achado ter sido detectado em outros trabalhos (SRIWASTAVA et al, 2020 e SANCTIS et al, 2020). Ainda sobre esse exame, alguns casos também demonstraram realce de nervos cranianos e de meninges (SRIWASTAVA et al, 2020). Também é importante ressaltar que todos os casos em parte dos estudos encontrados não tinham RNA do SARS-CoV-2 detectados no LCR (ABU-RUMEILHEH et al, 2020; GITTERMANA, FERIS e GIACOMAN, 2020; SRIWASTAVA et al, 2020; COLLANTES et al, 2021), o que concorre para uma característica pós-infecciosa da síndrome, em consonância com cenários previamente conhecidos. Desse modo, é possível encontrar, em pacientes recuperados da infecção pelo vírus, hipersinal em raízes nervosas, nervos cranianos ou meninges à RM. Ademais, também é importante pesquisar o achado clássico de dissociação albuminocitológica ou proteinocitológica no líquido extraído dos pacientes.

Anticorpos antigangliosídeos, relacionados à variante axonal, têm sido menos frequentes nos casos de SGB relacionada à COVID-19 (ABU-RUMEILHEH et al, 2020; HASAN et al, 2020), o que talvez indique preferência para o subtipo desmielinizante nesse cenário (HASAN et al, 2020), fato que é corroborado pela maior frequência dessa variante em alguns estudos (ABU-RUMEILHEH et al, 2020) e pelos exames eletrofisiológicos, os quais mostram sinais característicos, na maioria dos casos, de uma polineuropatia desmielinizante, mas é possível, também, encontrar outros subtipos, como os axonais (HASAN et al, 2020). Assim, é possível concluir que há uma provável preferência pela variante desmielinizante da SGB no cenário pós-COVID-19, o que é

detectado por exames de eletrofisiologia e pela ausência, em muitos casos, de anticorpos antigangliosídeos, indicadores dos subtipos axonais.

2.5. TRATAMENTO

A síndrome de Guillan-Barré em decorrência da COVID-19 é tratada da mesma forma que em consequência de outras causas (LEONHARD et al, 2019).

O tratamento se mostrou eficaz quando iniciado entre duas a quatro semanas do dia de início dos sintomas da SGB. Duas modalidades merecem destaque: a imunoglobulina intravenosa (IgIV) e a plasmaférese. Preferencialmente, deve ser iniciado com a administração de IgIV devido ao menor custo para o sistema de saúde e à maior facilidade em aplicar a terapia. Ademais, cabe ressaltar que a plasmaférese em combinação com a IgIV é uma opção de tratamento utilizada, contudo, não é mais eficaz do que esses tratamentos administrados isoladamente (LEONHARD et al, 2019).

2.5.1. IMUNOGLUBULINA INTRAVENOSA (IGIV)

De acordo com estudos clínicos, a terapia com IgIV deve ser iniciada em até duas semanas após o início dos sintomas da SGB para um melhor resultado (WALGAARD et al, 2017). Esse tratamento deve ser considerado, principalmente, quando os pacientes apresentam fraqueza rapidamente progressiva, disfunção autonômica, insuficiência bulbar ou insuficiência respiratória. Caso o paciente não esteja apto a caminhar por dez metros sem ajuda, deve-se iniciar o tratamento obrigatoriamente (LEONHARD et al, 2019).

2.5.2. PLASMAFÉRESE

No tocante à plasmaférese, o tratamento deve ser iniciado dentro de 4 semanas após o início dos sintomas da SGB. Faltam evidências sobre a eficiência dessa terapêutica quando aplicada além desses períodos de tempo (WALGAARD et al, 2017).

2.5.3. OUTRAS POSSIBILIDADES DE TRATAMENTO

Há outros métodos que exibiram resultados positivos no tratamento do quadro clínico em decorrência da síndrome, todavia, não se mostraram superiores aos previamente citados (WALGAARD et al, 2017).

Pode-se elencar os glicocorticoides, que, apesar de terem sido utilizados anteriormente em oito ensaios clínicos analisados, não foi demonstrada eficácia

(LEONHARD et al, 2019). Já o tratamento antimicrobiano ou antiviral pode ser considerado em pacientes com SGB que apresentam uma infecção em andamento; contudo, as infecções anteriores geralmente desaparecem antes do início da fraqueza (LEONHARD et al, 2019).

2.6. PROGNÓSTICO E COMPLICAÇÕES

A evolução das manifestações clínicas da Síndrome de Guillain-Barré (SGB) relacionadas à COVID-19 depende de fatores intrínsecos do indivíduo, das características da afecção viral e do manejo terapêutico. Desse modo, é possível compreender que, mesmo após a instituição do tratamento, deve haver monitorização regular dos pacientes com a finalidade de detectar precocemente possíveis complicações (LEONHARD et al, 2019, p. 679).

Em relação à evolução prognóstica, os estudos apontaram que cerca de 70-80% dos pacientes com SGB progridem para remissão total ou parcial dos sintomas, estando associado a isso o diagnóstico e tratamento precoces. Entretanto, 22% persistem sem melhora, dos quais 11% necessitam de cuidados intensivos e 5-6% morreram (ABU-RUMEILEH et al, 2020, p.1-38); GLITTERMANNA et al, 2020).

Por se tratar de uma patologia de característica autoimune, a resposta esperada para cada indivíduo é muito subjetiva. No entanto, tem-se percebido que a progressão para um pior prognóstico está relacionada principalmente a idade avançada (>70 anos) e sintomas respiratórios mais graves na fase aguda da COVID-19 (ABU-RUMEILEH et al, 2020, p.1-38; CHUA et al, 2021; SCHEIDL et al, 2020).

A avaliação do aumento de proteínas do líquido é um importante biomarcador para identificar gravidade e extensão da doença. De semelhante modo, tem-se observado que o escore de ERASMUS modificado (mEGOS) é utilizado como indicador prognóstico a longo prazo, no sétimo dia de admissão e com base na apresentação clínica, de maneira que, quanto maior o valor, mais alta a probabilidade de incapacidade na deambulação independente em 6 meses após a admissão (SRIWASTAVA et al, 2020).

Em relação às complicações encontradas, estas podem ser em decorrência da SGB, assim como pelo SARS-CoV-2. Qualquer que seja a etiologia do agravamento do quadro clínico, esta pode servir como um catalisador para desencadear potenciais eventos letais. Algumas complicações são comumente encontradas em pacientes

hospitalizados, como trombose venosa, infecções adquiridas em ambiente hospitalar e úlceras de pressão. Outras são principalmente associadas à SGB, precipitadas pela paralisia de um segmento nervoso, provocando retardo do retorno à deambulação, disfagia ou ulcerações de córnea, por exemplo (Tabela 2). Dessa forma, faz-se necessário um segmento multiprofissional do paciente a fim de tratar e/ou prevenir tais complicações (LEONHARD et al, 2019, p. 679-681). É importante destacar que maiores estudos precisam ser realizados para resultados mais conclusivos.

Tabela 2 – Complicações importantes de Síndrome de Guillain-Barré.

Complicações	Quando estar alerta:
Choque	Paralisia Bulbar
Arritmias cardíacas	Todos os pacientes
Infecções adquiridas no hospital	Paralisia bulbar e facial, imobilização, disfunção vesical, ventilação mecânica.
Dor e alodínea tátil	Comunicação limitada
Delirium	Comunicação limitada
Depressão	Comunicação limitada
Retenção urinária	Todos os pacientes
Constipação	Imobilização
Ulceração da córnea	Paralisia facial
Deficiência dietética	Paralisia bulbar e facial
Hiponatremia	Todos os pacientes
Úlceras de pressão	Imobilização
Neuropatia de compressão	Imobilização

Contratura e ossificação de membros	Fraqueza severa por um período prolongado de tempo.
-------------------------------------	---

(Fonte: Leonhard.S et al, 2019, p.679). Importantes complicações da Síndrome de Guillain-Barré (SGB). A maioria dessas complicações pode ocorrer em qualquer paciente com SGB, a qualquer momento, mas a segunda coluna mostra quando elas são mais prováveis de ocorrer e/ou quando está especialmente alerta.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A infecção pelo SARS-CoV-2 mostra-se, no cenário atual, como uma infecção de grande relevância em virtude da sua fisiopatologia multifatorial e suas manifestações clínicas heterogêneas, tornando-se uma temática de grande importância para estudos futuros. Ressaltamos, sobretudo, o componente neurológico desta afecção, com possibilidades de comprometimento variáveis nos pacientes, como a SGB abordada neste capítulo. Devido ao caráter neurotrópico do SARS-CoV-2, o paciente acometido por uma infecção causada pelo vírus está altamente suscetível a lesões neuronais diversas.

Faz-se necessário salientar, também, que a SGB relacionada à COVID-19 seguiu os mesmos padrões clássicos clínicos e laboratoriais de quando é desencadeada por outras etiologias (SANCTIS et. al, 2020), bem como respondeu à mesma terapia de escolha, com imunoglobulina IV (ABU-RUMEILEH et al, 2020).

Assim, é indubitável a importância da ciência baseada em evidências tanto para os dados já obtidos quanto para as informações que ainda precisam ser encontradas, principalmente as especificidades da associação entre SGB e a COVID-19.

REFERÊNCIAS

- ABU-RUMEILEH, Samir et al. Guillain–Barré syndrome spectrum associated with COVID-19: an up-to-date systematic review of 73 cases. **Journal of Neurology**, p. 1-38, 2020;
- COLLANTES, Maria Epifania V. et al. Neurological manifestations in COVID-19 infection: a systematic review and meta-analysis. **Canadian Journal of Neurological Sciences**, v. 48, n. 1, p. 66-76, 2021;

HASAN, Imran et al. Síndrome de Guillain - Barré associada à infecção por SARS - CoV - 2: uma revisão sistemática e meta - análise de dados de participantes individuais. **Jornal do Sistema Nervoso Periférico** , v. 25, n. 4, pág. 335-343, 2020;

HELMS, Julie et al. Neurologic features in severe SARS-CoV-2 infection. **New England Journal of Medicine**, v. 382, n. 23, p. 2268-2270, 2020.

LEONHARD, Sonja E. et al. Diagnosis and management of Guillain–Barré syndrome in ten steps. **Nature Reviews Neurology**, v. 15, n. 11, p. 671-683, 2019;

MUNHOZ, Renato Puppi; PEDROSO, José Luiz; NASCIMENTO, Fábio Augusto; ALMEIDA, Sergio Monteiro de; BARSOTTINI, Orlando Graziani Povoas; CARDOSO, Francisco Eduardo C; TEIVE, Hélio A Ghizoni. Neurological complications in patients with SARS-CoV-2 infection: a systematic review. **Arquivos de Neuro-Psiquiatria**, [S.L.], v. 78, n. 5, p. 290-300, 01 jun. 2020. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/0004-282x20200051>;

SANCTIS, P. de et al. Guillain–Barré syndrome associated with SARS-CoV-2 infection. A systematic review. **European Journal Of Neurology: The office journal of the european academy of neurology**. Romanzzo, p. 1-16. 05 ago. 2020. **Disponível em:** <<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ene.14462>> Acesso em: 06 maio 2021.

SRIWASTAVA, Shitiz et al. Guillain Barré Syndrome and its variants as a manifestation of COVID-19: A systemic review of case report and case series. **Journal of the neurological sciences**, p. 117263, 2020;

SCHEIDL, Erika et al. Guillain-Barré syndrome during SARS-CoV-2 pandemic: A case report and review of recent literature. **J Peripher Nerv Syst: PMC Free Article**. Germany, p. 1-6. 26 abr. 2020;

SHAHORIZAILA, Nortina; LEHMANN, Helmar C.; KUWABARA, Satoshi. Guillain-Barré syndrome. **The Lancet**, 2021;

TOSCANO, Gianpaolo et al. Guillain–Barré syndrome associated with SARS-CoV-2. **New England Journal of Medicine**, v. 382, n. 26, p. 2574-2576, 2020.

TRUJILLO GITTERMANN, L. M.; VALENZUELA FERIS, S. N.; VON OETINGER GIACOMAN, A. Relation between COVID-19 and Guillain-Barré syndrome in adults: A systematic review. **Neurología (English Edition)**, 2020;

ORRÙ, Graziella; CONVERSANO, Ciro; MALLOGGI, Eleonora; FRANCESCONI, Francesca; CIACCHINI, Rebecca; GEMIGNANI, Angelo. Neurological Complications of COVID-19 and Possible Neuroinvasion Pathways: a systematic review. **International Journal Of Environmental Research And Public Health**, [S.L.], v. 17, n. 18, p. 6688, 14 set. 2020. MDPI AG. <http://dx.doi.org/10.3390/ijerph17186688>.

LEONHARD, Sonja E. et al. Diagnosis and management of Guillain–Barré syndrome in ten steps. **Nature Reviews Neurology**, v. 15, n. 11, p. 671-683, 2019.

WALGAARD, Christa et al. Tracheostomy or not: prediction of prolonged mechanical ventilation in Guillain–Barré syndrome. **Neurocritical care**, v. 26, n. 1, p. 6-13, 2017.

SÍNDROME HIPERTENSIVA GESTACIONAL E SUAS IMPLICAÇÕES AO BINÔMIO

DOI: 10.51859/ampla.csa511.1121-25

Amanda Vieira de Oliveira ¹

¹ Professora de Enfermagem. Escola Técnica Estadual de Saúde. Profª Clóris Torres de Oliveira – Sapé/PB

RESUMO

Os problemas hipertensivos gestacionais são um dos principais agentes que impulsionam situações de risco para mãe e feto. Durante o período gravídico e puerperal, gestantes e neonatos estão predispostos a várias doenças, classificando-se, dessa forma, como gestação de alto risco para assistência e cuidados nos serviços de saúde. As Síndromes Hipertensivas Gestacionais (SHG) são classificadas em hipertensão crônica, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, pré-eclâmpsia sobreposta à hipertensão crônica, hipertensão gestacional, além da Síndrome HELLP. Dentre das várias maneiras preventivas para uma gestação livre de riscos, a assistência pré-natal destaca-se por promover segurança física e psicológica a gestante, por meio do compartilhamento de informações sobre o progresso gestacional e fetal, mantendo-se uma interrelação profissional-paciente para o esclarecimento de dúvidas, haja vista que permitirá maior engajamento no tratamento e a minimização de desfechos desfavoráveis.

Palavras-chave: Gestantes. Hipertensão. Hipertensão Induzida Pela Gravidez

1. INTRODUÇÃO

Durante o período gravídico e puerperal, gestantes e neonatos estão predispostos a várias doenças, classificando-se, dessa forma, como gestação de alto risco para assistência e cuidados nos serviços de saúde. (ALBRECHT et al., 2019). Com isso, define-se hipertensão arterial quando esta igual ou superior a 140/90 mmHg, e se manifesta de várias formas na gestação, identificando como síndrome hipertensiva gestacional (SHG), é definida como fator para o alto índice de mortalidade materna indireta. (ABRAHÃO et al., 2020).

A SHG é denominada como hipertensão crônica (quando reconhecida antes da gestação ou até 20ª semana gestacional), pré-eclâmpsia/eclâmpsia (hipertensão e

proteinúria após a 20ª semana, desaparecendo até 12 semanas pós-parto/ presença de convulsões com qualquer quadro hipertensivo), pré-eclâmpsia sobreposta à hipertensão crônica (pré-eclâmpsia em mulheres com hipertensão crônica ou problema renal) e hipertensão gestacional (essa sem presença de proteinúria). (GASPARIN et al., 2018);

Segundo Fiorio et al., 2020 problemas hipertensivos gestacionais são um dos principais agentes que impulsionam situações de risco para mãe e o feto. Dentre os resultados podem originar falência cardíaca, hemorragia de retina, falha renal, coagulopatias e encefalopatia hipertensiva. Como também desfechos desfavoráveis ao neonato como descolamento prematuro da placenta (DPP), morte intrauterina, sofrimento fetal, e baixo peso ao nascer.

Abrahão et al., 2020 aborda que cerca de 5-10% de todas as gestações no Brasil, são seguidas de síndromes hipertensivas, além disso, as internações e agravos em UTI's chegam a 90%. Com o desenvolvimento da pré-eclâmpsia (PE) quando esta não é tratada ou quando a gestação não é interrompida, coopera para a evolução de formas mais graves, como eclâmpsia e a síndrome de HELLP. A eclâmpsia está envolvida com uma elevada taxa de morbidade, sobretudo, quando ligada a prematuridade, variando em torno de 30% dos casos.

É importante destacar que existe outra disfunção perigosa que participa das SHG, que é a Síndrome de HELLP, em que os pacientes com eclâmpsia ou pré-eclâmpsia apresentam hemólise, aumento das enzimas hepáticas e baixo nível de plaquetas. Essa síndrome envolvida em alterações da coagulação sanguínea, definida como, Coagulação Intravascular Disseminada (CIVD), fornece armazenamento de fibrina na microvasculatura, e em seguida o aproveitamento de plaquetas e seus fatores da cascata de coagulação. Sendo considerada em média de 0,5 a 0,9% das gestações e de 10% a 20% com definição diagnóstica de pré-eclâmpsia grave. (ABRAHÃO et al., 2020).

Dentre das várias maneiras preventivas para uma gestação livre de riscos, a assistência pré-natal destaca-se por promover segurança física e psicológica a gestante, por meio do compartilhamento de informações sobre o progresso gestacional e fetal, além de hábitos e práticas que influenciem o reconhecimento de fatores que causem essas intercorrências, como o caso da SHG. (GASPARIN et al., 2018)

Diante da importância de se ter um conhecimento sobre a Síndrome Hipertensiva Gestacional e suas Implicações ao Binômio, o presente trabalho consiste em uma revisão de literatura, limitada a pesquisa teórica da Síndrome Hipertensiva Gestacional, com enfoque nos seus vários aspectos, na etiologia, na suas formas clínicas, nos seus desfechos perinatais, no seu tratamento não farmacológico e farmacológico, e nas suas medidas preventivas.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1. ETIOLOGIA

As causas das Síndromes Hipertensivas na Gestação (SHG) ainda são consideradas desconhecidas, contudo, presume-se que as condições estejam relacionadas a fatores genéticos, lapso no desenvolvimento placentário, problemas imunológicos, irregularidade na coagulação sanguínea, má circulação, e aumento na produção do tromboexano A2/PGI2 (prostaciclina), entre outros. Esses agentes contribuem para a diminuição na pressão da perfusão uteroplacentária, ocasionando isquemia placentária na gestação. (ABRAHÃO et al., 2020)

Com a deficiência placentária e alterações da circulação intraútero, desenvolvem-se complicações por hipoxemia no tecido placentário, a qual estimula a liberação de fatores inflamatórios e polipeptídeos antiangiogênicos. Essas modificações danificam a monocamada vascular sistêmica, e o desenvolvimento de comorbidades clínicas, por meio da hipertensão arterial e a alterações de órgãos-alvo, contudo, as lesões glomerulares são as maiores motivadoras para o surgimento da proteinúria. (PERAÇOLI et al., 2019)

Relacionam-se a ocorrência da SHG em jovens primigestas e múltiparas com idade mais elevada, além disso, outros fatores de risco que podem estar relacionadas estão: escolaridade, devido prejuízo orientacional de condutas preventivas, e a baixa renda, por dificultar no acesso à assistência desses jovens com idade elevada. (GASPARIN et al., 2018)

Conforme Abrahão et al., 2020, pesquisas apontam que aspectos envolvidos na fragilidade socioeconômica, baixo nível de instrução, uso de bebidas alcoólicas, obesidade antes e durante a gestação, ineficiência da assistência pré-natal, são

estimuladores do processo. Essa afecção pode advir no decorrer da gestação, trabalho de parto e puerpério imediato. Exterioriza-se, eventualmente, antes da 20ª semana de gestação, e a maior parte das convulsões desencadeiam-se antes do parto, com 67% dos casos, e as que se manifestam no puerpério (após 48 horas), está em torno de 79%. Ademais, ressalta-se a existência de outros aspectos encarregados no desenvolvimento da SHG como, por exemplo: diabetes, raça negra, obesidade, múltiparas, primiparidade, idade acima dos 30 anos, doença renal, predisposição genética de hipertensão arterial crônica e pré-eclâmpsia. (ALBRECHT et al., 2019)

De acordo com Peraçoli et al., 2019 independente da etiologia inexplorada da PE, gestantes com índice de massa corporal alta (IMC > 30 kg/m²) ou obesas, desenvolvem maior risco a doença. Dentre outros fatores de risco estão associadas à hipertensão arterial crônica, diabetes pré-gestacional e lúpus eritematoso.

O Ministério da Saúde elucida que mulheres gestantes acima dos 35 anos, determinada como gravidez tardia, que são classificadas como agente de risco para morbimortalidade ao binômio mãe-bebê. Vale acrescentar que gestantes adolescentes são mais predispostas a problemas obstétricos, especialmente em alto índice da SHG, como a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia. Essa problemática está associada em adolescentes < 16 anos, pela sua relação à nuliparidade, precário estado nutricional e omissão na assistência pré-natal. (ARAÚJO et al., 2017)

2.2. FORMAS CLÍNICAS DA SHG

Hipertensão crônica: Hipertensão comunicada e/ou identificada pela gestante antes da vigésima semana de gestação.

Pré-eclâmpsia: Aparecimento de crise hipertensiva com pressão maior ou igual a 160 e/ou 110 mmHg, comprovada por intervalo de 15 minutos, de preferência após repouso e com a gestante sentada. Caracterizada como hipertensão arterial após a 20ª semana, adjunto com proteinúria considerável. Contudo, mesmo diante do destaque a proteinúria, essa não é conclusiva para o diagnóstico da pré-eclâmpsia. Dessa forma, o ideal é reconhecer a análise se constatar hipertensão após a 20ª semana juntamente com problemas sistêmicos ou alterações de órgãos-alvo (baixo número de plaquetas, insuficiência hepática/renal, edema agudo de pulmão, incidência de eclâmpsia, com ou sem proteinúria). Ademais, vale ressaltar a importância do acompanhamento nos sinais

de alterações placentárias, a exemplo da limitação do desenvolvimento fetal e/ou mudanças da dopplervelocimetria.

Abrahão et al., 2020 elucida que a fisiopatologia inserida na pré-eclâmpsia (PE) está dividida em dois estágios: o primeiro está fundamentado na redução da perfusão placentária, provavelmente pela anormalidade da placenta, permutação ineficiente das artérias espiraladas e falha na invasão trofoblástica. O segundo está associado às ocorrências maternas sistêmicas que favorece para as alterações vasculares, podendo acarretar danos em vários órgãos.

Pré-eclâmpsia sobreposta à hipertensão arterial crônica: Constituída por algumas especificações: 1. Após 20 semanas de gestação com presença ou piora da proteinúria, já identificada na primeira metade da gravidez, com alerta se o acréscimo for maior a três vezes o valor inicial. 2. Quando gestantes hipertensas crônicas precisam da terapêutica de anti-hipertensivos ou incentivo do tratamento inicial. 3. Quando lesão de órgãos-alvo.

Hipertensão gestacional: Determinada quando gestante normotensa apresenta hipertensão, sem sintomas de proteinúria, ou sinais relacionados a pré-eclâmpsia. Essa patogenia desaparece até 12 semanas após o parto. Deve-se ter, portanto, atenção a identificação da pré-eclâmpsia, principalmente quando ausência de proteinúria, uma vez que podem estar ligados a hipertensão gestacional, visto que até 25% das gestantes manifestarão sintomas ligados a PE, o que irá dificultar o diagnóstico.

Eclâmpsia: Surgimento de convulsões em pacientes com pré-eclâmpsia. Pode estar presente no decorrer da gravidez, parto ou até 10 dias de puerpério, é determinada por crises convulsivas tônicas-clônicas generalizadas, sendo essa hipertensa ou portadora de pré-eclâmpsia com descarte de problemas neurológicos. (PERAÇOLI et al., 2019)

Difícilmente ocorre antes da 20ª semana, e quando acontece deve-se excluir a suspeita de mola hidatiforme ou desordem sistêmica autoimune. Em sua grande maioria, as convulsões são caracterizadas com indícios supostos, dentre eles os mais habituais são cefaléia, visão dupla, visão turva e escotomas. Os principais fatores para a mortalidade materna por eclâmpsia são a insuficiência cardíaca congestiva (ICC), acidente vascular cerebral (AVC/AVE) e complexidades nas cirurgias obstétricas. Com a manifestação da eclâmpsia no final da gravidez, é indicado a indução do trabalho de

parto principalmente por meio de confirmação das causas da pré-eclampsia, antes das crises convulsivas começarem. No pós-parto, as convulsões acontecem nas 24 horas iniciais. É importante a conscientização das puérperas sobre as alterações e indícios pressupostos da eclampsia em alta hospitalar. (NÓBREGA et al., 2016)

Síndrome HELLP: A expressão HELLP procede do idioma inglês e está relacionada a hemólise (Hemolysis), problema hepático (ElevatedLiverEnzymes) e grande uso de plaquetas (LowPlatelets), em pacientes com pré-eclampsia. (PERAÇOLI et al., 2019)

Os sintomas adquiridos com a Síndrome HELLP atrapalha seu eventual diagnóstico por assemelhar-se com circunstâncias da própria gravidez, a qual pode-se incluir a epigastralgia, vômitos, cefaléia, confundindo o prognóstico como um possível problema viral. Consequentemente, essa patologia desenvolve complexidades, como insuficiência renal (acometendo 8% das pacientes), descolamento prematuro da placenta (16%), dentre outros distúrbios como edema cerebral, descolamento de retina, edema de glote, hematoma hepática e a CIVD, registro de 21% das gestantes. (ABRAHÃO et al., 2020)

2.3. DESFECHOS PERINATAIS

As complicações acarretadas pela SHG afetam tanto a mãe como o feto, esse último é acometido por diversas sequelas, como aumento do risco de morte, prematuridade, elevação de cesarianas, baixo peso ao nascer, além do baixo índice de apgar. Diante disso, complicações acometidas ao feto impulsionam a necessidade da sua entrada na UTI neonatal para cuidados intensivos, principalmente em virtude de asfixia e a prematuridade, verificada com maior incidência. (ALBRECHT et al., 2019)

Um dos problemas comuns encontradas nas UTI neonatais, está a hipotensão neonatal, recorrente em prematuros, associada a pré-eclampsia materna. O desfecho dos neonatos está na identificação da icterícia, encontrado regularmente pela prematuridade, principalmente nas SHG. A literatura afirma que a etiologia da doença envolve diversos fatores que atingem o organismo materno e neonatal, como o trabalho de parto prematuro, ruptura das membranas com mais de 18 horas, infecção materna, baixo peso ao nascer, ventilação mecânica orotraqueal, cateter central ou umbilical e nutrição parenteral. Evidências afirmam que a indicação de cesarianas em gestantes

hipertensas, seria necessária em critérios específicos, como frequência cardíaca fetal não tranquilizadora, oligodramnio e alteração vascular fetal. (CASSIANO et al., 2020)

De acordo com Ferrão et al., 2006, os impactos neonatais são evidenciados pelas modificações na introdução placentária, em que a invasão de trofoblastos extravilosos, impulsionando as artérias espiraladas a não cometer lapso fisiológico, especialmente em frações miometriais, reduzindo o fluxo placentário pelo incremento de espasmos vasculares e alteração da homeostase hemodinâmica fetal.

Por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), são consideradas como motivadoras evitáveis de mortes perinatais, comportamentos de prevenção por intermédio da assistência de saúde de qualidade nas instituições de saúde durante o ciclo gravídico-puerperal. Investigações concluem que a permanência materna de hipertensão gestacional e hipertensão arterial crônica, eleva o risco para problemas respiratórios no recém-nascido (RN), como também a presença de hemorragia e disfunção pulmonar em RN pré-termos e com baixo peso. Nota-se que essas irregularidades são requisitos ligados ao cenário de prematuridade, consideradas uma das principais repercussões das SHG. Consequências neurológicas em RN prematuros de mães portadoras da SHG são questionáveis e poucos pesquisados, sendo alcançadas circunstâncias envolvendo a hemorragia intraventricular, alterações cerebrais isquêmicas e leucomalácia periventricular. A periodicidade de complicações como enterocolite necrosante, neutrofilia, aumento de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico, hipotensão neonatal, pneumonia, icterícia e baixo nível de glicemia foram menos contabilizadas, entretanto, seus efeitos para o RN são de grande impacto. (CASSIANO et al., 2020)

2.4.MANEJO E MEDIDAS TERAPÊUTICAS

2.4.1. TRATAMENTO NÃO FARMACOLÓGICO

Aconselha-se alimentação normal, sem necessidade da suspensão do cloreto de sódio, haja vista que não possuem indicativos que esse comportamento colabore para o controle da pressão ou na profilaxia de eventos desfavoráveis. Ademais, é importante ressaltar que gestantes podem necessitar de grandes dias de internação e a conservação de uma alimentação minimamente saudável evolui para um desfecho importante. Entretanto pode-se afirmar que a redução no consumo de sódio pode diminuir o volume intravascular. Além disso, é recomendado a diminuição do exercício físico para mulheres

diagnosticadas com pré-eclampsia descompensada, pois acredita-se que contribua para evitar o aumento descontrolado da hipertensão e favoreça o seu restabelecimento uteroplacentário. (PERAÇOLI et al., 2019)

2.4.2. TRATAMENTO FARMACOLÓGICO

Em concordância com o Instituto Nacional para Saúde e Excelência Clínica (National Institute for Health and Clinical Excellence – NICE) indica que mulheres portadoras de hipertensão gestacional ou pré-esclampsia, estabeleça medicação quando a pressão for $\geq 150 \times 100$ mmHg. Contudo, o Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia (American College of Obstetricians and Gynecologists) – ACOG preconiza a terapêutica quando a pressão for ≥ 160 mmHg ou a diastólica for ≥ 105 mmHg. (TANURE et al., 2014)

Com isso, a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda a regulamentação assistencial, como também a profilaxia e tratamento dos quadros por síndromes hipertensivas através do sulfato de magnésio. É certificado que o uso do sulfato de magnésio juntamente a uma assistência equivalente diminui em até 50% dos riscos de mortalidade. Ao longo da terapêutica, a paciente e seus sinais vitais devem ser observados, no tocante a frequência respiratória, débito urinário, saturação de oxigênio e reflexos patelares. (ABRAHÃO et al., 2020)

Para as gestantes com convulsões é normal a prescrição de Sulfato de Magnésio para prevenir o desencadeamento da eclampsia em mulheres com pré-eclampsia grave. Sua utilização simultânea com a nifedipina deve ser manipulada com segurança para evitar hipotensão grave e depressão do miocárdio. A anti-hipertensiva metildopa é apontada como medicamento de ação central efetiva para a hipertensão crônica gestacional. Todavia, exerce pouco efeito para a terapêutica da crise hipertensiva por causa do seu pico de ação, a qual demora de 3 a 6 horas para ocorrer. Embora não mostre ampla redução da pressão arterial, a medicação pode ser estabelecida para pacientes com administração conservada por mais de 48 horas, como por exemplo mulheres com suspensão indicada e esperam o decorrer completo de corticosteroides para maior amadurecimento pulmonar do feto. (TANURE et al., 2014)

É recomendado, portanto, em situações repetitivas das crises convulsivas a prescrição de mais de 2g de sulfato de magnésio endovenoso (em bolus) e sua

conservação com 2g/h. Diante do conteúdo abordado e explanado, mostra-se a importância da percepção da gestante acerca da Síndrome Hipertensiva Gestacional e suas repercussões, mantendo-se a inter-relação profissional-paciente para o esclarecimento de dúvidas, haja vista que permitirá maior engajamento no tratamento e a minimização de desfechos desfavoráveis.

Com base nas medicações mais usufruídas por via oral são destacadas a metildopa, propranolol (beta bloqueador) e bloqueadores dos canais de cálcio, conhecidas como nifedipina e nicardipina, ao passo que nas intercorrências emergentes são indicadas medicações intravenosas como a hidralazina, que atua para o tratamento da SHG em situações mais complexas com o uso de sulfato de magnésio endovenosa, prescrito como fármaco profilático e curativo, no bloqueio e atenuação de crises convulsivas, respectivamente. (NÓBREGA et al., 2016)

A monitoração da vitalidade fetal de início está associada a cardiotocografia basal, e avaliação do bem-estar fetal. Quando esse apresenta julgamento estável, é indicada a biometria fetal com verificação Doppler fluxométrica fetal, por exame invasivo nas artérias umbilicais. Pesquisas aconselham que o Doppler fetal precisa também ser inserido em todas as situações de hipertensão arterial crônica descompensada á pré-eclampsia grave. (TANURE et al., 2014)

2.5.MEDIDAS PREVENTIVAS

Abrahão et al., 2020 ressalta que a melhor maneira de prevenir as Síndromes Hipertensivas está aliada a assistência obstétrica, na eclampsia é apontado cerca de 20% a 38% de gestantes com convulsões que apresentaram pressão arterial inferior a 140 x 90 mmHg, antes dos episódios.

Com isso, a OMS, divulgou em 2016 novas recomendações, com objetivo de reduzir o número de natimortos e complicações gestacionais, ao elevar o número mínimo de consultas de quatro para oito. (GASPARIN et al., 2018)

É reconhecido que a percepção da gestante sobre seu problema colabora para seu autocuidado, e seu comprometimento com a saúde exerce para que essa obtenha maior responsabilidade pelo binômio. Portanto, entende-se a importância que os profissionais de saúde na assistência pré-natal, parto e pós-parto, conduzam para o paciente discernimento sobre a doença e o interesse a cuidar de si e do bebê. Essas

orientações são determinadas com magnitude na promoção a saúde e a precaução para o desenvolvimento de doenças e suas complexidades. (SILVA et al., 2011)

O acompanhamento pré-natal é considerado de alta importância por oferecer orientações a gestantes acerca dos maus hábitos alimentares e o aumento no ganho de peso, essa assistência deve ser contínua no início da gravidez até o final da amamentação. Sobretudo, estudos desenvolvidos afirmam que o devido auxílio nutricional previne essas pacientes do aumento de peso, haja vista, que esse é um dos fatores de risco para a SHG, sendo caracterizado como duas vezes mais risco para cada aumento de 5 a 7 kg/m² no índice de massa corporal (IMC). (SOARES e LENTSCK, 2021)

Vale ressaltar que o papel do enfermeiro na assistência pré-natal é fundamental na identificação dos agravos no período gestacional, na observação de sinais e sintomas e na conscientização para sua prevenção, objetivando a redução dos riscos de morbimortalidade ao binômio. (GASPARIN et al., 2018)

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do conteúdo abordado e explanado, mostra-se a importância da percepção da gestante acerca da Síndrome Hipertensiva Gestacional e suas repercussões, mantendo-se a interrelação profissional-paciente para o esclarecimento de dúvidas, haja vista que permitirá maior engajamento no tratamento e a minimização de desfechos desfavoráveis.

Ademais, faz-se necessário o desenvolvimento de condutas preventivas na assistência a saúde, principalmente na atenção básica, por meio do pré-natal, com programas ampliados a prevenção da SHG e seus fatores de risco, obtendo-se um olhar mais holístico sobre a temática. Destaca-se a importância do despertar da questão, não somente do enfermeiro, mas também de outros profissionais de saúde acerca da problemática, com a finalidade da obtenção do diagnóstico imediato, a diminuição das intercorrências de maior gravidade, que conseqüentemente irão amenizar os números alarmantes de óbitos associados ao binômio.

REFERÊNCIAS

- ALBRECHT, C.C et al. Características evidenciadas em recém-nascidos de gestantes hipertensas e diabéticas: revisão sistemática da literatura. **J. nurs. Health**, v.9, n.1, p.199105. 2019.
- ABRAHÃO, A.C. M et al. Atuação do enfermeiro a pacientes portadoras de síndrome hipertensiva específica da gestação. **RevCientEsc Estadual Saúde PúblicaGoiás “Candido Santiago”**.v.6, n.1, p.51-63.2020.
- GASPARIN, V.A et al. Atividade física em gestantes como prevenção da síndrome hipertensiva gestacional. **Revenferm UFPE online**. Recife, v.12, n.4, p.1017-26, abr., 2018.
- FIORIO, T.A et al. Doença hipertensiva específica da gestação: prevalência e fatores associados. **Braz. J. of Develop.**, Curitiba, v. 6, n.6, p.35921-35934 jun. 2020.
- SOARES, L.G; LENTSCK, M.H. Fatores associados à síndrome hipertensiva da gestação: análise múltipla em modelos hierarquizados. **R. pesq.: cuid. fundam. online**, v.13, jan/dez, p.626-633.2021.
- PERAÇOLI, J.C et al. Pré-eclâmpsia/eclâmpsia. **FEMINA**, v. 47, n. 5, p.258-273. 2019.
- ARAÚJO, I.F.M et al. Síndromes hipertensivas e fatores de risco associados à gestação. **Rev enferm UFPE online.**, Recife, v.11, n.10, p.4254-62, out., 2017.
- HERCULANO, M.M.S et al. Aplicação do processo de enfermagem a paciente com hipertensão gestacional fundamentada em OREM. **Rev Rene**, Fortaleza, v. 12, n.2, p. 401-8, abr/jun., 2011.
- NÓBREGA, M.F et al. Perfil de gestantes com síndrome hipertensiva em uma maternidade pública. **Revenferm UFPE online.**, Recife, v.10, n.5, p.1805-11, maio., 2016.
- CASSIANO, A.N et al. Desfechos perinatais em gestantes com síndromes hipertensivas: revisão integrativa. **Rev. Enferm. UFSM – REUFSM**. Santa Maria, RS, v. 10, n.23, p. 1-20, 2020.
- FERRÃO, M.H.L et al. Efetividade do tratamento de gestantes hipertensas. **RevAssoc Med Bras**. v.52, n.6, p.390-4., 2006.
- TANURE, L.M et al. Manejo da crise hipertensiva em gestantes. **FEMINA**. v.42, n.4, Julho/Agosto, 2014.
- SILVA, E.F et al. Percepções de um grupo de mulheres sobre a doença hipertensiva específica da gestação. **Rev Gaúcha Enferm.**, Porto Alegre (RS), v.32, n.2, p.316-22, jun., 2011.

USO DE PSICOFÁRMACOS DURANTE A GRAVIDEZ: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

DOI: 10.51859/amplla.csa511.1121-26

Mariana Cunha Ferreira ¹
Ana Carolina Oliveira Ferreira ²
Ana Flávia da Silva ³
Ana Luiza Santiago Soares Dias ⁴
Maria Paula Moraes Vasconcelos ⁵

¹ Estudante de Medicina; Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG

² Estudante de Medicina; Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG

³ Estudante de Medicina; Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG

⁴ Estudante de Medicina; Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG

⁵ Doutora em Medicina; Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG

RESUMO

A gestação e o puerpério são inexoravelmente fatores de risco para o desenvolvimento e exacerbação de problemas na saúde mental. Apesar da grande relevância dos transtornos psiquiátricos na gravidez, a relação entre a vantagem de continuar ou de interromper a terapia medicamentosa durante essa fase continua incerta. Interromper ou continuar o uso das medicações para controle dos distúrbios é uma decisão do médico e do paciente, com vistas a avaliar os riscos e os benefícios para o desenvolvimento do feto e para a saúde materna. Quando grávidas do serviço de saúde mental não têm pré-natal de qualidade, a presença no organismo de determinadas substâncias, que podem passar pelo líquido amniótico e pelo cordão umbilical ou pelo leite, tem chances de resultar em defeitos no tubo neural ou cardíacos no feto, além de agitações ou sonolência no recém nato. Outro ponto de grande preocupação dos profissionais é sobre a descontinuação do uso desses fármacos abruptamente que pode ocasionar complicações físicas ou psicológicas ao expor ao transtorno da gestante, ela e o feto ou recém-nascido, uma vez que a perda de controle no tratamento pode levar a episódios de agressões ou de abandono do cuidado. Mesmo havendo poucas pesquisas a respeito dos efeitos específicos dos medicamentos psicotrópicos em grávidas, o conhecimento médico sobre efeitos teratogênicos gerais de algumas dessas drogas auxilia consideravelmente a tomada de decisão quanto à exposição das mulheres e de seus filhos a algum fármaco.

Palavras-chave: Gravidez. Psicofármacos. Saúde mental.

1. INTRODUÇÃO

Os transtornos mentais são causa de 8,8% da mortalidade e 16,6% da incapacidade em países de baixa e média renda, se constituindo em um importante problema de saúde pública. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), 450 milhões de pessoas sofrem algum transtorno mental. A gestação e o puerpério são inexoravelmente fatores de risco para o desenvolvimento e exacerbação de problemas na saúde mental, com prevalências similares na gravidez quanto no pós-parto (COSTA et al., 2018).

A gestação é um período da vida da mulher que deve ser abordado com atenção especial. Esse período é caracterizado por alterações físicas, hormonais, psíquicas e de inserção social, que impactam diretamente na saúde mental (SOUZA et al., 2017). Mais de 10% das mulheres em idade fértil possuem uma doença mental e são expostas a um medicamento psicotrópico antes de engravidar. Transtornos depressivos maiores, transtornos de ansiedade, transtorno afetivo bipolar e transtornos psicóticos são encontrados durante a gravidez em taxa semelhante à das mulheres não grávidas (HANLEY et al., 2020).

Apesar da grande relevância dos transtornos psiquiátricos na gravidez, a relação entre a vantagem de continuar ou de interromper a terapia medicamentosa durante essa fase continua incerta (LEONG et al., 2017). O não tratamento dessas perturbações mentais associa-se frequentemente a graves consequências materno-fetais, com implicações até mesmo durante o trabalho de parto. Na literatura, a segurança do uso dos psicofármacos durante a gestação ainda não foi totalmente estabelecida (SOUZA et al. 2017).

A decisão de instituir terapêutica psicofarmacológica deverá ser tomada sempre com base na gravidade da doença mental, levando em consideração os riscos e benefícios do tratamento para a mãe e feto (CHISOLM; PAYNE, 2016). Estes devem ser comparados com os riscos apresentados pela doença subjacente para a mãe e filho. Assim, o uso de medicamentos deve ser adotado apenas quando o risco potencial para o feto resultante da exposição à terapêutica for superado pelo risco do não tratamento da perturbação materna. Deve-se ressaltar que a percepção da teratogenicidade dessas

drogas pelo médico é um fator importante para selecionar o medicamento com melhor nível de evidência de segurança (DAMKIER et al., 2018).

É fato que a escolha de prescrever um psicotrópico na gravidez é um processo de decisão complexo, que deve envolver uma interação constante entre doente, família, obstetra e psiquiatra, sendo fundamental o estabelecimento de uma aliança terapêutica (SOUZA et al. 2017).

2. OBJETIVO

Analisar estudos sobre o uso de psicofármacos durante a gravidez.

3. MÉTODO

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura pautada na busca online em bases de dados de divulgação do conhecimento técnico e científico da área da saúde: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), PubMed e SciELO.

Primeiramente, foi realizada uma seleção de descritores de assunto que orientassem as pesquisas em inglês e português. Nesse sentido, para a busca em inglês, foram utilizados os descritores “pregnancy” como parte do título, “psychotropic drugs”, como parte do resumo e “antidepressants” como qualquer parte do texto. Já para a busca em português foram usados os descritores “gravidez” no resumo e “complicações” e “depressão” em qualquer parte da publicação.

De acordo com a pesquisa por meio dos descritores em inglês, foram encontrados 10 documentos na base BVS, um na SciELO e 51 na base PubMed, totalizando 62 artigos. Também, foram utilizados como critérios de inclusão artigos publicados a partir de 2016, a disponibilidade do documento completo, escritos em inglês, português ou espanhol e publicado nas bases LILACS e Medline, de maneira que houve redução dos resultados totais para 14 artigos, sendo 10 na BVS e quatro no PubMed.

De modo semelhante, foi realizada a pesquisa com os descritores em português, obtendo como resultados iniciais 9 estudos na BVS, 2 na SciELO e nenhum na PubMed, totalizando 11 artigos. Ao aplicarem-se os filtros de inclusão, houve redução para um

total de sete documentos, todos na BVS. Assim, foram selecionados 21 artigos para uma nova fase de avaliação.

Dos 21 artigos, cinco foram excluídos devido à repetição nas bases selecionadas, de modo que 16 passaram para a próxima etapa de avaliação. Desses, três não foram aprovados pelo título do estudo, de forma que 13 foram para a análise do resumo.

Por fim, houve concordância dos autores, após criteriosa leitura e verificação dos resumos, na exclusão de estudos com enfoque que fugia de problemas relacionados à saúde mental na gravidez ou que eram revisões bibliográficas. Após essa seleção, restaram oito artigos a serem incluídos nesta revisão.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A amostra foi composta por oito artigos. Para melhor visualização dos dados, estes foram inseridos em um quadro, com: artigo, autores (as), ano de publicação, revista e número de citações (Quadro 1).

Quadro 1 - Dados dos artigos selecionados.

Artigo	Autores (as)	Ano de Publicação	Revista	Número de Citações
A Cohort Study of Psychotropic Prescription Drug Use in Pregnancy in British Columbia, Canada from 1997 to 2010.	Gillian E. Hanley, Tarita Miller e Barbara Mintzes	2020	Journal of Women's Health	1
Pregnancy exposure to venlafaxine-Therapeutic drug monitoring in maternal blood, amniotic fluid and umbilical cord blood and obstetrical outcomes.	Michael Paulzen, Georgios Schoretsanitis, Gerhard Gründer, Cordula Franz, Julia C. Stingl e Marc Augustin	2020	Journal of Affective Disorders	5

Psychopharmacology in Pregnancy and Breastfeeding.	Jennifer L. Payne	2019	Medical Clinics of North America	27
Patterns and predictors for prescription of psychotropics and mood-stabilizing antiepileptics during pregnancy in Denmark 2000-2016.	Damkier, Louise Skov Christensen e Anne Broe	2018	British Journal of Clinical Pharmacology	5
The Use of Psychotropic Drugs During Pregnancy.	Dengtang LIU, Peiwei XU e Kaida JIANG	2017	Shanghai Archives of Psychiatry.	6
British Association for Psychopharmacology consensus guidance on the use of psychotropic medication preconception, in pregnancy and postpartum 2017.	R Hamish McAllister-Williams, David S Baldwin, Roch Cantwell, Abby Easter, Eilish Gilvarry, Vivette Glover, Lucian Green, Alain Gregoire, Louise M Howard, Ian Jones, Hind Khalifeh, Anne Lingford-Hughes, Elizabeth McDonald, Nadia Micali, Carmine M Pariente, Lesley Peters, Ann Roberts, Natalie C Smith, David Taylor, Angelika Wieck, Laura M Yates e Allan H Young	2017	Journal of Psychopharmacology	112
Psychotropic Drug Use before, during, and after Pregnancy: A Population-Based Study in a Canadian Cohort (2001-2013).	Christine Leong, Colette Raymond, Dan Château, Matthew Dahl, Silvia Alessi-Severini, Jamie Falk, Shawn Bugden e Alan Katz	2017	The Canadian Journal of Psychiatry	24

Effects of relaxation on depression levels in women with high-risk pregnancies: a randomised clinical trial.	Wanda Scherrer de Araújo, Walckiria Garcia Romero, Eliana Zandonade e Maria Helena Costa Amorim	2016	Revista Latino-Americana de Enfermagem	16
--	---	------	--	----

Fonte: Autoria própria (2021).

Ao analisar os objetivos e os resultados obtidos com a referida revisão, observou-se, nos artigos incluídos, que a gravidez é um momento de muita vulnerabilidade e alterações emocionais na mulher, sendo ainda mais complexo no que diz respeito ao do manejo de gestantes que fazem uso de medicamentos psicotrópicos (ARAÚJO et al., 2016). O primeiro ponto observado, relaciona-se ao fato de que mulheres em idade reprodutiva e que fazem algum acompanhamento psiquiátrico – devido à depressão, à crises epiléticas, à transtornos de bipolaridade - precisam ser alertadas a respeito de algumas possíveis complicações no caso de uma gestação durante o tratamento (PAYNE, 2017). Segundo evidências, o mais adequado a ser feito é um planejamento anteriormente à gravidez para que sejam evitadas intercorrências ou haja mudanças medicamentosas (PAYNE, 2017).

Analisando um estudo de coorte retrospectivo no Canadá, evidenciou-se que em 12 anos – no período de 2001 a 2013 – as gestantes que já faziam uso de medicações psicotrópicas, permaneceram com a ingestão durante a gravidez (LEONG et al, 2017). Nesse sentido, as instruções estabelecidas estão focalizadas em evitar a suspensão repentina da medicação psicotrópica. No caso de haver alguma alteração, fazê-la de modo que os riscos da troca do fármaco não superem os benefícios para a mãe e para o feto (MCALLISTER-WILLIAMS et al., 2017) (HANLEY et al., 2020) ou, se houver interrupções, fazê-la de forma gradativa, com exceção aos conhecidos teratogênicos que devem ser interrompidos o quanto antes (PAYNE, 2017). Em mulheres grávidas com depressão, terapias alternativas como técnicas de relaxamento e de meditação, podem trazer efeitos na redução de sintomas, sendo uma opção para situações de impedimento medicamentoso (ARAÚJO et al., 2016).

As alterações fisiológicas ocorridas na gestação têm reflexos na cinética dos fármacos, podendo resultar em diminuição ou em aumento da fração desses

medicamentos no organismo materno – com mudanças enzimáticas do fígado – ocasionando possíveis transferências pela placenta durante o período gestacional ou pelo leite durante a amamentação (PAYNE, 2017). Um pequeno estudo realizado com nove mulheres grávidas e com nove recém-nascidos na Alemanha, apresentou dados relevantes sobre a transferência do medicamento *venlafaxina* para o feto, quantificando a presença dessa droga no sangue materno, no líquido amniótico e o sangue do cordão umbilical – ao nascimento (PAULZEN et al., 2020). Os dados obtidos revelaram a presença considerável do fármaco no líquido amniótico, pois sua pouca ligação às proteínas plasmáticas permitirem que ele atravesse a barreira placentária, com grande exposição do feto pela ingestão, pelo contato cutâneo e pelo seu metabolismo hepático (PAULZEN et al., 2020). Desse modo o estudo cogita uma relação entre essa exposição elevada ao medicamento e a síndrome de descontinuação nos recém natos, com modificações comportamentais e agitação, recomendando a mudança de tratamento para outra droga com menor absorção pelo feto (PAULZEN et al., 2020). Ademais, muitos dos medicamentos psiquiátricos ocasionam sedações nos bebês, passados pelo leite materno, sendo necessário constante observação acerca de sinais como sonolência excessiva e perda de apetite (PAYNE, 2017).

Outrossim, é relevante o acompanhamento das gestantes pacientes de saúde mental em virtude dos benefícios do cuidado para a mãe e o feto. Caso ele não ocorra, ambos ficam vulneráveis à possíveis efeitos colaterais de algumas medicações ou a um corte indevido do medicamento sem auxílio médico, ocasionando uma piora do quadro psiquiátrico materno (PAYNE, 2017). A falta de tratamento, por vezes, resulta em descontrole psíquico – com possíveis riscos à vida da gestante e do feto ou recém-nascido (MCALLISTER-WILLIAMS et al., 2017), como desatenção com o filho (LIU et al., 2017), negligência com o autocuidado materno e piora do humor (PAYNE, 2017). Somado a isso, a depressão não medicada durante a gravidez também pode apresentar riscos a futuras alterações comportamentais nas crianças, como a hiperatividade (MCALLISTER-WILLIAMS et al., 2017).

Dados mais concretos a respeito do uso de psicotrópicos e gestação são limitados em virtude da dificuldade para a realização de estudos randomizados nesse grupo (MCALLISTER-WILLIAMS et al., 2017). No entanto, alguns medicamentos têm seus danos fetais relativamente conhecidos como a *pregabalina*, anticonvulsivante, e o *valproato*,

anticonvulsivante e estabilizador de humor, resultando em malformações congênitas (DAMKIER et al., 2018). Ademais, o uso de fármacos com ácido *valpróico* e a *carbamazepina* também são validados como de grande risco à gestação, com elevadas taxas de malformações – como defeitos no tubo neural, anomalias craniofaciais e defeitos cardíacos – sendo necessário que mulheres com assistência pré-natal substituam ou interrompam o tratamento (PAYNE, 2017). A administração de lítio em gestantes pacientes de saúde mental é outro ponto que precisa ser acompanhado de perto devido aos riscos de defeito cardíaco no feto, com poucos dados demonstrando efeitos a longo prazo (PAYNE, 2017). Além disso, um estudo de coorte retrospectivo no Canadá, dos anos de 1997 a 2010, observou que para alguns medicamentos antipsicóticos é possível visualizar taxas elevadas de diabetes gestacional e partos prematuros (HANLEY et al., 2020).

Dessa forma, o conhecimento médico adequado e atualizado sobre efeitos teratogênicos de algumas drogas psicotrópicas auxilia bastante na tomada de decisão ou na exposição às grávidas sobre a situação, podendo assim trabalhar com níveis de evidência mais seguros - diante do que é possível ter (DAMKIER et al., 2018). Todavia, é imprescindível a promoção de mais pesquisas a respeito do manejo de medicamentos psicotrópicos, trazendo informações mais concretas sobre o impacto durante a gestação e a longo prazo (PAYNE, 2017). A condução de casos de gestações com pacientes de saúde mental necessita de olhares mais individualizados a mulheres em período fértil, resultando em indicações medicamentosas mais compatíveis a uma redução de danos, em casos de haver uma gestação com pré-natal inadequado ou sem acompanhamento (PAULZEN et al., 2020).

5. CONCLUSÃO

Torna-se evidente que no período gravídico ocorrem várias modificações no organismo da mulher, abrangendo aspectos físicos, hormonais, psicológicos e sociais. De forma geral, todas as adaptações visam promover condições para um desenvolvimento fetal adequado e em completo equilíbrio com o organismo materno. No entanto, tais modificações podem exercer impacto direto na saúde mental da

mulher, o que reflete na significativa prevalência de transtornos mentais na gravidez, estendendo-se ao puerpério.

Nesse contexto, nota-se na literatura certa escassez de estudos e de um consenso bem estabelecido sobre o uso de psicofármacos e seu impacto para a saúde da gestante e do feto, o que dificulta o manejo dos transtornos mentais durante e imediatamente após o período de gestação. Através da presente revisão constata-se também a necessidade de estudos relacionados à segurança do uso de psicofármacos na lactação e de investigações sobre o efeito a longo prazo em crianças expostas a tais drogas na gestação.

Uma vez que o tratamento de transtornos psiquiátricos e a prescrição de psicofármacos durante a gestação é de fato controversa e desafiadora na prática clínica, cabe salientar a importância de um atendimento multidisciplinar visando o cuidado integral à mulher grávida, garantindo a terapêutica adequada à mãe com vistas a proteção de sua saúde e do bebê. Deve-se avaliar criteriosamente o risco-benefício do uso materno de drogas antidepressivas, estabilizadoras de humor ou antipsicóticas, seja na introdução, adequação de dose ou descontinuação do fármaco, priorizando sempre a qualidade da relação mãe-criança, o desenvolvimento do bebê e a saúde da mulher nesse contexto de saúde mental em obstetrícia.

REFERÊNCIAS

- DAMKIER, P.; CHRISTENSEN, L. S.; BROE, A. Patterns and predictors for prescription of psychotropics and mood-stabilizing antiepileptics during pregnancy in Denmark 2000-2016. **Br J Clin Pharmacol**, v.84, n. 11, p. 2651–2662, ago. 2018. Disponível em: <<https://doi.org/10.1111/bcp.13732>>. Acesso em: 18 mar. 2021.
- CHISOLM, M. S.; PAYNE, J. L. Management of psychotropic drugs during pregnancy. **BMJ**, jan. 2016. Disponível em: <<https://doi.org/10.1136/bmj.h5918>>. Acesso em: 18 mar. 2021.
- LEONG, C.; RAYMOND, C.; CHÂTEAU, D.; DAHL, M.; SEVETINI, S. A.; FALK, J.; BUGDEN, S.; KATZ, A.; Psychotropic Drug Use before, during, and after Pregnancy: A Population-Based Study in a Canadian Cohort (2001-2013). **Can J Psychiatry**, v. 62, n.8, p. 543-550, ago. 2017. Disponível em: <<https://doi.org/10.1177/0706743717711168>>. Acesso em: 18 mar. 2021.
- HANLEY, G.E.; MILLER, T.; MINTZES, B. A Cohort Study of Psychotropic Prescription Drug Use in Pregnancy in British Columbia, Canada from 1997 to 2010. **Journal of**

women's health, v. 29, n. 10, p. 1339–1349, out. 2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.1089/jwh.2019.8199>>. Acesso em: 18 mar. 2021.

COSTA, D. O.; SOUZA, F. I. S.; PEDROSO, G. C.; STRUFALDI, M. W. L. Transtornos mentais na gravidez e condições do recém-nascido: estudo longitudinal com gestantes assistidas na atenção básica. **Ciênc. saúde coletiva**, Rio de Janeiro, v. 23, n. 3, p. 691-700, mar. 2018. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1413-81232018233.27772015>>. Acesso em: 18 mar. 2021.

SOUZA, A. R.; MENDES, M. H.; XIMENES, T. V.; MOURA, A. D. A.; LIMA, G. G.; FEITOZA, A. R. Gestação de mulheres portadoras de transtorno mental. **RETEP - Rev. Tendên. da Enferm**, v. 9, n. 1, p. 2089-2094, jan. 2017. Disponível em: <<http://www.coren-ce.org.br/wp-content/uploads/2019/02/GESTA%C3%87%C3%83O-DE-MULHERES-PORTADORAS-DE-TRANSTORNOS-MENTAIS.pdf>>. Acesso em: 18 mar. 2021.

PAULZEN, M.; SCHORETSANITIS, G.; GRUNDER, G.; FRANZ, C.; STINGL, J. C.; AUGUSTIN, M. Pregnancy exposure to venlafaxine—therapeutic drug monitoring in maternal blood, amniotic fluid and umbilical cord blood and obstetrical outcomes. **Journal of affective disorders**, v. 266, p. 578-584, abr. 2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.02.010>>. Acesso em: 18 mar. 2021.

PAYNE, J. L. Psychopharmacology in pregnancy and breastfeeding. **Medical Clinics**, v. 40, n. 2, p. 217-238, jun 2017. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.psc.2017.01.001>>. Acesso em: 18 mar. 2021.

LIU, D.; XU, P.; JIANG, K. The use of psychotropic drugs during pregnancy. **Shanghai archives of psychiatry**, v. 29, n. 1, p. 48-50, fev. 2017. Disponível em: <<https://doi.org/10.11919/j.issn.1002-0829.216115>>. Acesso em: 18 mar. 2021.

MCALLISTER-WILLIAMS, R. H. et al. British Association for Psychopharmacology consensus guidance on the use of psychotropic medication preconception, in pregnancy and postpartum 2017. **Journal of Psychopharmacology**, v. 31, n. 5, p. 519-552, 2017. Disponível em: <<https://doi.org/10.1177/0269881117699361>>. Acesso em: 18 mar. 2021.

ARAÚJO, W. S.; ROMERO, W. G.; ZANDONADE, E.; AMORIM, M. H. C. Effects of relaxation on depression levels in women with high-risk pregnancies: a randomised clinical trial. **Revista latino-americana de enfermagem**, v. 24, maio 2016. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1518-8345.1249.2806>>. Acesso em: 18. Mar. 2021.

O USO DA ASPIRINA E DO CÁLCIO NA PROFILAXIA DA PRÉ-ECLÂMPsia NO PRÉ-NATAL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

DOI: 10.51859/amplla.csa511.1121-27

Marcela Claudia de Paula Oliveira ¹

Kélita Mirelle Oliveira Lima ²

Sheyla Costa de Oliveira ³

¹ Mestranda em Hebiatria. Programa de Pós-Graduação em Hebiatria. Universidade de Pernambuco - UPE

² Enfermeira Obstetra. Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

³ Doutora em Enfermagem. Universidade Federal do Ceará - UFC

RESUMO

Objetivo: identificar as evidências científicas disponíveis na literatura sobre o uso do ácido acetilsalicílico e o cálcio na profilaxia da pré-eclâmpsia no pré-natal. **MÉTODO:** Revisão de literatura, a busca das publicações ocorreu nas bases de dados CINAHL, LILACS, Medline/PubMed e Web of Science. Foram analisados dez publicações para discussão. A maioria dos artigos encontrados tinha nível de evidencia 1 e o rigor metodológico A. A efetividade das medidas profiláticas da pré-eclâmpsia permanece controversa entre os autores dessa revisão. Entretanto, diante das evidências atuais, a administração do AAS em mulheres de alto risco reduz o risco de desenvolver a pré-eclâmpsia desde que utilizado acima de 100 mg abaixo disso nos artigos não teve efeito significativo. Já nas gestantes de baixo risco o AAS não houve eficácia. O AAS está relacionado a uma menor taxa de parto pré-termo e menor risco de crescimento intrauterino restrito nos artigos estudados. Em relação ao CA alguns artigos relatam a eficácia do CA para mulheres com ingestão alimentar inadequada deste elemento, para as mulheres com bom consumo nutricional as evidências para o benefício da suplementação do CA não são conclusivas. Em relação a suplementação combinada de AAS e CA não há uma diminuição significativa na incidência da PE. Futuros estudos acerca desse tema são significativos, a fim de contribuir para a tomada de decisões dos profissionais da saúde na assistência as gestantes durante o pré-natal, possibilitando um cuidado sistematizado na prevenção da PE e eclâmpsia.

Palavras-chave: Pré-eclâmpsia. Prevenção. Cálcio. Aspirina.

1. INTRODUÇÃO

A pré-eclâmpsia (PE) é uma doença multifatorial e multissistêmica, é uma das patologias obstétricas mais graves, sendo uma das principais causas de morbimortalidade materna e fetal. Frequentemente manifesta-se na segunda metade

da gravidez, complicando 2 a 8% das gestações e contribuindo para mais de 100.000 mortes maternas por ano em nível global. Segundo a International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy (ISSHP), a PE é definida pelo início da hipertensão após 20 semanas de gestação, combinada com proteinúria ($>300\text{mg}/\text{dia}$) ou outras disfunções de órgão-alvo (ACOG, 2013; MAGEE, L. A. et al., 2014). De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), os distúrbios hipertensivos da gestação indicam importante causa de morbidade e mortalidade, tanto materna quanto perinatal. Mundialmente cerca de 10% a 15% das mortes maternas diretas estão relacionadas à PE/ eclâmpsia. Contudo, 99% dessas mortes acontecem em países de baixa e média renda. As morbidades graves correlacionadas à PE e à eclâmpsia, que podem causar a morte, incluem insuficiência renal, acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca, edema agudo de pulmão, coagulopatia e insuficiência hepática (OMS, 2014). A definição das causas da PE possivelmente reduzirá os índices de morbimortalidade materna e perinatal. Contudo sua etiologia permanece desconhecida, o que impossibilita que se atue na prevenção do seu desenvolvimento de forma realmente efetiva (prevenção primária). Todavia é importante a identificação de fatores de risco que possibilitem a atuação no sentido de impedir a manifestação de formas graves da doença (prevenção secundária). Recentemente, a patogênese mais importante envolve placentação deficiente, predisposição genética, quebra de tolerância imunológica, resposta inflamatória sistêmica, desequilíbrio angiogênico e deficiência do estado nutricional (NGENE et al., 2018). As evidências apontam que, embora a etiologia seja desconhecida da PE, mulheres com obesidade ou Índice de Massa Corporal (IMC) elevado $> 30 \text{ kg}/\text{m}^2$ indicam maior risco para o desenvolvimento da doença. Outros fatores de risco são hipertensão arterial crônica, diabetes pré-gestacional, lúpus eritematoso sistêmico, nulíparidade, ter idade menor que 20 anos ou maior que 35 anos, antecedente de hipertensão em gestação anterior, entre outros (SPRADLEY et al., 2015; JAUNIAUX et al., 2016). No sentido de buscar a profilaxia da PE no pré-natal de alto risco (PNAR) há um consenso que a dose ideal deveria ser acima de 75mg, pois estudos que usaram doses menores, não mostraram benefícios. A OMS, recomenda a administração de uma dose baixa de AAS 75 mg/dia como profilaxia da PE em mulheres que tem risco elevado de desenvolver a condição. 10 O colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas (ACGO), divulgou o relatório da força tarefa sobre hipertensão na gravidez, recomendando

baixas doses diárias de aspirina a partir do final do primeiro trimestre para mulheres com história de PE precoce e parto prematuro menor que 34 semanas e deve ser iniciada entre 12 semanas e 28 semanas de gestação. Há melhores resultados quando o tratamento é iniciado entre 12 semanas e 16 semanas e continuada diariamente até o parto (FEBRASGO, 2017; OMS, 2014; ACOG, 2017). Além do AAS, outros estudos relacionados a profilaxia da PE, verificaram uma relação inversa entre a ingestão de cálcio (CA) e a incidência da PE. Diante desta descoberta, na década de 90 foram realizados ensaios clínicos randomizados (ECRs) para avaliar a efetividade da suplementação de CA na prevenção da PE. A partir de 2000, os resultados desses ECRs foram compilados por meio de revisões sistemáticas que evidenciaram o benefício dessa medida. Segundo revisão sistemática dos dados de 15.000 participantes incluídas em 12 ECRs, a suplementação de CA a partir do 2º trimestre da gestação reduz em 64% o risco de desenvolver PE e em 20% o risco de morbimortalidade materna em mulheres com baixa ingestão alimentar de CA. A OMS recomenda a suplementação de 1,5g a 2,0g de CA por dia durante a 2ª metade da gravidez como uma medida efetiva para prevenir a PE e reduzir a mortalidade materna (WHO 2011, SOUZA, 2014). Neste sentido, a consulta pré-natal é um indicador de qualidade importante para diminuir agravos a saúde da mulher, mortalidade materna e comorbidades. Na atenção PNAR o Ministério da Saúde (MS), recomenda o atendimento das gestantes por equipe multidisciplinar, que engloba o profissional enfermeiro. Entre as intervenções do enfermeiro em uma equipe multidisciplinar destaca-se a consulta de enfermagem permitindo identificar potenciais problemas da gestante e consequentemente, desenvolver o planejamento das ações de cuidados essenciais (BRASIL, 2012). O enfermeiro é o profissional que possui um papel importante na consulta pré-natal realizando rastreio e abordagem inicial das mulheres com risco de PE. É fundamental que o enfermeiro assuma sua função pautado em conhecimentos científicos e técnicos, bem como comprometer-se a orientar a gestante sobre os cuidados com a saúde e as possíveis alterações que podem ocorrer nesse período além de conscientizá-la da importância das consultas pré-natais a fim da detecção precoce da PE. Algumas das ações do enfermeiro na consulta pré-natal está a aferição da pressão arterial e a identificação da proteinúria por meio de exames laboratoriais ou por fita reagente. Neste sentido, o estudo pretende rever as evidências mais recentes sobre a eficácia do AAS e do CA como profilaxia da pré-eclâmpsia e teve

como objetivo identificar as evidências científicas disponíveis na literatura sobre o uso do ácido acetilsalicílico e o cálcio na profilaxia da pré-eclâmpsia no pré-natal.

2. MÉTODO

Trata-se de uma revisão de literatura do tipo integrativa. Este método de estudo é uma coleta de artigos científicos sintetizados a partir de fontes secundárias realizadas através de um levantamento de dados de grande relevância, pois inclui simultaneamente estudos experimentais e não experimentais como também questionamentos teóricos ou empíricos. A maior motivação para a Prática Baseada em Evidências (PBE) é o fruto das pesquisas na prática clínica. A PBE tem como um dos propósitos o encorajamento da utilização do produto de pesquisas à assistência prestada à saúde, nos inúmeros pilares da atenção, trazendo amparo para a relevância da prática clínica através da pesquisa. (SOUZA M.T et al., 2010, MENDES et al., 2008). A elaboração desta revisão percorreu as seis etapas: elaboração da questão de pesquisa, busca na literatura dos estudos primários, extração de dados, avaliação crítica dos estudos primários incluídos que inclui a avaliação da qualidade metodológica dos artigos e o nível de evidência, interpretação dos resultados e apresentação da revisão (MENDES et al., 2008). A questão de pesquisa delimitada foi: Quais as evidências científicas sobre o uso do ácido acetilsalicílico e do cálcio na profilaxia da pré-eclâmpsia no pré-natal? Os estudos primários foram selecionados a partir dos critérios de inclusão: artigos originais que abordassem a temática do estudo, disponível na íntegra, em português, inglês e espanhol, publicados nos últimos 10 anos. Cartas ao leitor, editoriais, teses, dissertações, livro, capítulos de livros, matéria de jornal, relato de experiência, estudo reflexivo, revisões sistemáticas ou integrativas da literatura e estudos que não respondessem à pergunta condutora, foram excluídos. A busca das publicações ocorreu entre julho a setembro de 2020, nas bases de dados CINAHL, LILACS, Medline/PubMed e Web of Science. Para viabilizar a busca foi realizada consultas dos Descritores em Ciências da Saúde (DeSC) e no Medical Subject Headings (MeSH). Foram identificados os seguintes descritores em português e seus correspondentes em inglês: “pré-eclâmpsia”, “prevenção”, “aspirina” e “cálcio”. 12 Inicialmente, os descritores foram combinados entre si por meio do operador booleano AND, primeiramente aos pares buscando

apreender as relações entre a pré-eclâmpsia com os demais descritores mencionados. Depois, foram realizados os cruzamentos entre os quatros e depois três descritores, de maneira que “Pré-eclâmpsia” foi mantido em associação com os outros descritores: “Prevenção” “Cálcio” e “Aspirina”. Todos os cruzamentos foram feitos igualmente e na mesma ordem em cada base de dados (Tabela 1). Na etapa de seleção dos estudos primários, foi realizada a leitura dos títulos das 1.886 publicações encontradas. Sendo excluídos 1.624 artigos por não abordarem a temática do estudo nos títulos. Dos 215 artigos selecionados para aplicação dos critérios de elegibilidade, excluindo-se estudos indisponíveis na íntegra (57), Revisões sistemáticas ou integrativas da literatura (98), conferências (10), editorial (8), repetidos na base de dados (42) (figura 1). Os artigos encontrados em mais de uma base de dados, foram catalogados apenas uma vez, de acordo com a ordem de identificação na primeira base de dados Medline/PubMed. Das 47 publicações submetidas à leitura dos resumos, 37 foram excluídos por não discorrer sobre a utilização do AAS e do CA na prevenção da PE. Restaram 10 publicações para análise e discussão (Tabela - 2).

Tabela 1- Publicações identificadas nas bases de dados no período de 2010-2020, com enfoque na relação do uso do AAS e do CA na profilaxia da PE.

Cruzamentos	Base de dados				Total
	Medline/ PubMed	Lilacs	CINAHL	Web of Science	
Pré-eclâmpsiaAND prevenção	246	3	20	59	328
Pré-eclâmpsiaAND cálcio	310	19	182	112	623
Pré-eclâmpsiaAND Aspirina	375	7	282	193	857
Pré-eclâmpsiaAND prevenção AND cálcio AND Aspirina	3	5	4	4	16
Pré-eclâmpsiaAND cálcio ANDAspirina	30	4	20	8	62
Total	964	38	508	376	1.886

Fonte: Autoria própria.

Figura 1 – Processo de seleção dos artigos sobre o uso do CA e do AAS na profilaxia da PE.

Fonte: Autoria própria.

A extração dos dados foi norteada por um instrumento validado e adaptado que contempla as informações sobre os autores, objetivo, características metodológicas e principais resultados do estudo (URSI ES, 2006). Para avaliar o rigor metodológico utilizou-se o instrumento adaptado *Critical Appraisal Skills Programm* (CASP), que classifica os estudos como: de boa qualidade metodológica e viés reduzido (categoria A - 6 a 10 pontos) e com qualidade metodológica satisfatória (categoria B - no mínimo 5 pontos), no entanto todos os artigos foram incluídos (CASP, 2013).

O nível de evidência foi avaliado de acordo com a classificação hierárquica, divididos em: nível 1, estudos de metanálise de múltiplos estudos controlados; nível 2, estudo individual com delineamento experimental; nível 3, estudo com delineamento experimental, como estudos em randomização com grupo único, pré e pós-teste; nível 4, pesquisas descritivas correlacionais qualitativas ou estudo de caso; nível 5, relatórios de casos ou dados obtidos de forma sistemática, de qualidade verificável ou dados de avaliação de programas; e nível 6, opinião de autoridades respeitáveis baseada na competência clínica ou opiniões de comitês de especialistas, incluindo interpretações não baseadas em pesquisas (OXFORD, 2009). Os resultados foram discutidos nos referenciais da literatura científica.

3. RESULTADOS

Na análise dos 10 artigos selecionados prevaleceu o idioma Inglês sendo 8 artigos, publicados na base de dados MEDLINE/ PubMed, seguido de 1 artigo publicado na LILACS em idioma Espanhol e 1 artigo publicado na CINAHL em idioma Inglês. O ano de 2017 apresentou o maior número de artigos publicados (n = 3).

Os periódicos em que os artigos foram publicados eram na maioria na área medica, seguido das publicações na área da nutrição. Dentre todas as intervenções realizadas prevaleceu uso do AAS como prevenção eficaz da PE em comparação ao uso do CA. Sobre a classificação das evidências, segundo os artigos selecionados para esta revisão, predominou o nível de evidência 1 (n = 6). E o nível de evidencia 4 (n=3). Com relação à avaliação do rigormetodológico, foi visto que 6 dos estudos apresentaram nível A e 4 apresentou nível B.

Tabela 2- Síntese dos artigos sobre o uso do AAS e do CA como profilaxia da Pré-eclâmpsia.

Autores/ Ano/ Pais/ Base de dados	Objetivo	Tipo de estudo/ Nível de evidência	Método/ População e amostra	Resultados	Conclusão
TRIVEDI N.A 2011, Índia, CINAHL	Avaliar o efeito do AAS na prevenção da PE em mulheres de alto e baixo risco.	Metanálise NE: 1	Ensaio clínico randomizado. Amostra: 19 A população do estudo foi dividida em grupos de alto e baixo risco.	A incidência geral da PE foi de 7,4%. Com o grupo da aspirina foi de 6,9%, enquanto no grupo do placebo foi de 7,8%.	O AAS tem um pequeno efeito na prevenção da pré- eclâmpsia em mulheres consideradas de alto risco para a doença.
VILLA et al., 2012, Finlândia MEDLINE / PubMed	Estudar o efeito da aspirina na prevenção da PE em mulheres de alto risco.	Estudo randomizado, duplo-cego e controlado por placebo. NE: 1	Amostra 152 mulheres com fatores de risco para PE. Os participantes foram randomizados para iniciar aspirina com dosagem de 100 mg / dia ou placebo.	A aspirina em baixa dose não reduziu a taxa de PE	Não mostrou nenhum efeito estatisticame nte significativo de aspirina na prevenção da PE em mulheres de alto risco.

CHEN Q. et al., 2013, China MEDLINE / PubMed	Investigar a adição de altos níveis de cálcio para ascélulas endoteliais antes de sua exposição aos ativadores associados à pré- eclâmpsia poderia reduzir a ativação das células endoteliais.	Ensaio clínico NE: 1	Detritos trofoblásticos necróticos foi colhido de explantes placentários do primeiro trimestre. As células endoteliais foram tratadas com concentrações variadas de cálcio.	O pré-tratamento com concentrações crescentes de cálcio inibiu a ativação do endotélio células em resposta a NTD ou IL-6 ou soros pré-eclâmpsicos.	A suplementação de cálcio pode prevenir a ativação do endotélio em resposta a ativadores.
SOUZA et al., 2014, Brasil, MEDLINE / PubMed	Investigar a eficácia do AAS combinado com a suplementação de cálcio para prevenir PE em mulheres com hipertensão crônica.	Um ensaio clínico randomizado. NE: 1	Amostra: 49 mulheres com hipertensão crônica.	Houve o desenvolvimento da PE sobreposta.	A suplementação combinada de aspirina e cálcio começando com 20-27 semanas de gestação produziu uma diminuição não significativa na incidência de PE.
GABBAY A et al., 2014, Israel, MEDLINE / PubMed	Examinar a associação entre os níveis de cálcio durante o primeiro trimestre de gravidez e sea hipocalcemiaé um fator de risco para a PE	Estudo retrospectivo de base populacional NE: 4	A comparação foi realizada entre mulheres com e sem hipocalcemia durante o primeiro trimestre da gravidez.	16% tiveram hipocalcemiae 84% tinha um nível normalde cálcio.	Hipocalcemia durante o primeiro trimestre da gravidez não é um fator de risco para a PE.
PARK F et al., 2015, Australia MEDLINE / PubMed	Demonstrar o valor da aspirina em baixa dose e quais as intervenções após a previsão doprimo trimestre de gestação.	Coortes de mulheres rastreadas para PE antes de 34 semanas de gestação. NE: 2	A primeira coorte foi observada rastrear a PE. Na segunda coorte foram informadas de seus riscos e receberam aspirina (150 mg à noite).	Para todos os casos de PE pré-termo (<37 semanas), houve 0,83% casos.	O uso de aspirina parao risco parece ser eficaz na redução da prevalência de PE pré- termo.
MONE et al., 2016, Irlanda, MEDLINE	Determinar se é mais benéfico em termos de	Ensaio clínico controlado randomizado aberto	Amostra foi composta por três grupos: (I) o que usou	A Aspirina deve ser usada (uma vez	A importância da aplicação de um teste

/ PubMed	eficácia e aceitabilidade e para prescrever rotineiramente AAS para mulheres nulíparas de baixo risco em comparação com o teste indicando o AAS.	multicêntrico NE: 1	aspirina de rotina, (II) sem aspirina e (III) com aspirina.	Diariamente 75 mg) deve ser administrado desde o primeiro trimestre até a 36ª semana.	de triagem reduziria o custo do uso da aspirina em mulheres com baixo risco de PE.
BASCHAT A.A et al., 2017, Estados Unidos, MEDLINE / PubMed	Comparar as tendências da pressão arterial ao longo da gravidez entre mulheres com risco e aquelas que desenvolveram PE, apesar de iniciar aspirina no primeiro trimestre.	Estudo prospectivo de abordagem quantitativa NE- 4	Foi Iniciado AAS 81 mg por dia com início antes de 16 semanas de gestação em mulheres com risco aumentado de PE com base na história materna e incisura da artéria uterina bilateral.	12,2% que iniciaram AAS de 81 mg por dia no primeiro trimestre desenvolveram PE.	Mulheres que desenvolvem PE com AAS têm significativamente sustentado PA mais alta desde o início da gravidez..
ROLNIK, D.L et al., Massachusetts, 2017, MEDLINE / PubMed	Identificar se a ingestão de aspirina em baixas doses durante a gravidez	Estudo multicêntrico, duplo-cego e controlado por placebo NE: 1	Participaram 798 participantes no grupo da aspirina e 822 no grupo do placebo.	A PE pré-termo ocorreu em 1,6% dos participantes.	Tratamento com aspirina resultou em uma incidência menor desse diagnóstico do que o placebo.
GONZÁLEZ V.M.C et al., 2017, Cuba LILACS	Demonstrar a eficácia e segurança dos suplementos de aspirina e cálcio em gestantes de risco.	Foi realizada uma investigação observacional prospectiva na consulta pré-natal de um Hospital Universitário. NE: 4	As mulheres receberam 125 mg de AAS a noite, conforme recomendação do Programa Nacional Materno-Infantil, foi indicado 1 g de carbonato de cálcio por dia.	O uso de aspirina e cálcio, nas doses utilizadas, mostrou-se eficaz na redução da incidência de pré-eclâmpsia e de suas formas graves.	Nenhum aumento de eventos adversos foi observado na mãe e no neonato tratados.

Fonte: Autoria própria.

4. DISCUSSÃO

A amostra final dos artigos resultou em publicações recentemente produzidas, pois foi realizado buscas para os últimos 10 anos, foram encontrados trabalhos que corresponderam ao período de 2011 a 2017. Isso reflete a importância da investigação da profilaxia da PE, que vem sendo estudada desde 1978. A seguir apresenta-se uma síntese de cada um dos artigos incluídos.

Dos estudos incluídos nessa revisão a metanálise (MA) que avaliou mulheres como de alto risco e de baixo risco para PE, estratificaram as de alto risco devido a história prévia da doença, hipertensão essencial, história familiar positiva ou distúrbio vascular subjacente, idade materna <20 anos ou > 40 anos e diabetes mellitus gestacional. Em comparação com o ensaio clínico randomizado de MONE et al., (2016), que identificou as mulheres como de alto risco de PE após testes de triagem positivo para doença placentária. A MA distinguiu mulheres com baixo risco de PE aquelas consideradas sem qualquer fator de risco para PE. Foi administrado AAS na faixa de 40-160 mg / dia. A incidência geral da PE no grupo de alto risco foi de 4,3% no grupo tratado com AAS e 4,4% no grupo tratado com placebo. No grupo de alto risco, houve uma redução geral de 11% no risco de crescimento intrauterino restrito (CIUR) com o uso do AAS. Não houve redução significativa no risco de CIUR no grupo de baixo risco (TRIVEDINA, 2011).

De acordo com os resultados dos autores desta MA, concluíram que o AAS em baixa dose tem um pequeno efeito na prevenção da PE nas mulheres de alto risco ($RR=0,87$ com $IC_{95\%}$, 0,79-0,9611 e $RR=0,79$ com $IC_{95\%}$, 0,65-0,97,12 respectivamente), não apresentando, contudo, um efeito significativo na redução de risco nas mulheres de baixo risco ($RR=0,95$ com $IC_{95\%}$, 0,81-1,11 e $RR=0,86$ com $IC_{95\%}$, 0,64-1,1, respectivamente. De acordo com os resultados obtidos em estudos anteriores por DULEY et al. 2001 e RUANO et al. 2005, que afirmam que o AAS produz um benefício marginal na redução do risco de PE no grupo de alto risco com RR 0,83, ($IC_{95\%}$ 0,77-0,89) e 0,87 ($IC_{95\%}$ 0,79-0,96), respectivamente. Enquanto estiver no grupo de baixo risco, não produz nenhuma vantagem significativa (TRIVEDINA, 2011).

Um outro autor incluído nessa revisão utilizou um programa que seleciona e identifica mulheres com alto risco para PE pré-termo com 11, 13 e 6 semanas de

gestação, administrou AAS de 150 mg a noite, como uma intervenção terapêutica e reduziu a prevalência de PE pré-termo significativamente, com uma redução de 90% na prevalência da doenças. Os autores concluíram que o AAS administrado em mulheres com base no alto risco de PE pré-termo não pareceu impactar a prevalência da doença levando ao parto em 34-36 semanas de gestação, no entanto os números são pequenos. Quando toda PE pré-termo foi considerada houve uma redução significativa no número de mulheres que interrompem a gestação antes de 37 semanas (PARK et al. 2015).

Uma força-Tarefa de Serviços Preventivos dos Estados Unidos da América (USPSTF) e o ACOG, identificou os fatores de risco qualificados em alto e moderado, qualquer fator de alto risco único, qualifica as mulheres para profilaxia com AAS começando entre 12 e 28 semanas de idade gestacional preferencialmente antes da 16 semana, pois é quando ocorre a fase ativa da invasão do trofoblasto, que se dar a partir da 14 semanas de gestação. Os autores identificados nesta revisão, que avaliaram a eficácia do AAS iniciado antes da 16ª semana de gestação, obtiveram como resultado uma redução significativa na PE subsequente ou parto de recém-nascidos pequenos para idade gestacional. E concluíram que mulheres com características maternas como pressão arterial ou o IMC elevado em uma única ocasião no primeiro trimestre leva a diminuição da eficácia do AAS (LEFEVRE, 2014; ACOG, 2018; BASCHAT et al. 2017).

Os autores de um estudo randomizado, não identificaram estatisticamente o efeito do AAS em baixa dose como profilaxia da PE, em gestantes identificadas por fatores de risco. O que contradiz com a MA de BUJOLD et al. 2010, que relata que o AAS e outros agentes antiplaquetários mostraram uma redução moderada, no risco de desenvolver PE, com uma população de 32. 217 gestantes, em seu estudo o risco relativo da PE foi de 0,9 em mulheres recebendo agentes antiplaquetários em comparação com mulheres do grupo controle. Em julho de 2018 a ACOG, divulgou uma atualização de seu parecer do comitê com novas recomendações para o uso do AAS como profilaxia da PE, que defende o seu uso mais disseminado (ACOG 2018, VILLA et al. 2012).

Com relação a dosagem do AAS durante a gravidez à uma discordância entre os autores, em relação a dosagem ideal o ensaio clínico incluído no estudo utilizou (75 mg vs 150 mg), a comparar com um MA de ROBERGE et al. 2017, que sugere que há uma dose de AAS de efeito e resposta, com doses mais altas de aspirina tomadas antes da 16 semanas de gestação, associando a uma maior redução da PE em comparação com o

dosagem padrão. A USPSTF e a ISSHP são consensuais em recomendar o uso de AAS em baixa dose como profilaxia da PE em mulheres de alto risco. A USPSTF conclui com moderada certeza haver evidência suficiente para recomendar o uso de AAS na dose de 60 a 150mg/dia. Enquanto a ISSHP conclui haver razoável evidência para recomendar o uso de AAS na dose de 75 a 162mg/dia (MONE et al. 2016; LEFEVRE, 2014; MAGEE et al. 2014).

Um ensaio randomizado desenvolvido com gestantes com uma única gestação, identificadas por meio de triagem como sendo de alto risco para PE pré-termo, utilizaram AAS na dose de 150 mg por dia, da 11 a 14 semana até a 36 semana de gestação. Os autores tiveram como resultado uma menor incidência de PE pré-termo do que no grupo placebo. Não houve significância entre o grupo, diferença na incidência de outra gravidez, complicações fetais, efeitos adversos ou resultados neonatais. A dose de 150 mg de AAS por dia foi selecionada com base em evidências anteriores, e concluíram que a dose de 81 mg de AAS por dia não teve efeito apreciável na função plaquetária em até um terço das mulheres grávidas incluídas no estudo (ROLNIK et al. 2017).

Segundo os autores, assim como o AAS, sugere-se que a baixa ingestão de cálcio pode causar aumento da pressão arterial devido à estimulação do paratormônio ou liberação de renina, assim aumentando os níveis de CA no músculo liso vascular e facilitando a vasoconstrição. Um possível modo de ação dos suplementos de CA é que eles reduzem a liberação do hormônio da paratireoide e do CA intracelular, o que reduz a contratilidade no músculo liso. Por mecanismo semelhantes, os suplementos de CA também podem reduzir a contratilidade uterina e prevenir o trabalho de parto prematuro (HOFMEYER et al. 2011; VELÁSQUEZ et al. 2013).

Os autores evidenciaram que o uso do CA e do AAS em combinação como profilaxia da PE em gestante com alto risco não tem significância estatística. No estudo foi administrado 125 mg de AAS por dia a partir de 12 semanas à noite, até 36 semanas e a administração de 1g/dia de suplemento CA. Todas as pacientes estudadas receberam suplementação de carbonato de cálcio (1 g / dia) por serem consideradas pacientes de alto risco para PE. Porém apenas 14% apresentavam de acordo com a pesquisa alimentar um baixo consumo de CA. O restante das pacientes apresentou ingestão dentro dos valores considerados normais (86%). Neste estudo, não houve diferenças significativas na incidência da PE nas pacientes que receberam CA, uma vez que 13,5% daqueles com

baixa ingestão de CA desenvolveram PE contra 11,5% daquelas com ingestão normal (GONZÁLEZ et al. 2017).

O estudo piloto desenvolvido no Brasil, que também utilizou AAS e CA como profilaxia da PE sobreposta, obteve uma amostra de 65 mulheres com hipertensão crônica e Doppler das artérias uterinas anormais, as gestantes estavam recebendo atendimento pré-natal na clínica durante o período do estudo. Sendo 26 para o grupo placebo e 23 para o grupo de tratamento. Foi realizada suplementação com 100 mg de AAS e 2 g de CA começando após 20 semanas de gestação e teve como resultado uma redução na taxa da PE sobreposta em 28,6% e a taxa de restrição de crescimento fetal em 80,8% nessas mulheres com hipertensão crônica e Doppler anormal da artéria uterina no segundo trimestre. No entanto, essas reduções ficaram aquém da diferença estatística. Os suplementos não afetaram a taxa de partos prematuro (SOUZA et al. 2014).

Na visão de outros autores o baixo nível de CA está associado a ativação de células endoteliais, bem como com aumento da pressão arterial. Portanto, foi sugerido que a suplementação de CA seja potencialmente útil na proteção contra a PE, especificamente em áreas onde a ingestão de CA é restrita ou baixa e também em mulheres com fatores de risco pré-existentes para PE. Os efeitos do CA na prevenção da PE só são eficazes se iniciado precocemente. De acordo com os autores incluídos nessa revisão sugeriram que o início da suplementação de CA antes da gravidez pode fornecer melhor proteção contra o desenvolvimento de PE do que começar após 20 semanas de gestação (HOFMEYER et al. 2011; CHEN et al. 2013).

Um estudo retrospectivo incluído nessa revisão, avaliou o nível de CA corrigido durante o primeiro trimestre da gravidez como um marcador para o desenvolvimento da PE em curso posterior da gravidez. O principal achado do estudo é que não houve correlação significativa entre os níveis de CA sérico durante o primeiro trimestre da gravidez e a PE leve e grave ou quaisquer distúrbios hipertensivos. O que contradiz com um grande ensaio clínico desenvolvido pela OMS (2014), envolvendo 8.325 gestantes normotensas com dieta pobre em CA, obteve como resultado uma redução significativa da hipertensão gestacional grave (RR=0,71; IC95%=0,61-0,82) e eclâmpsia (RR=0,68;

IC95%=0,48-0,97) no grupo que recebeu suplementação com 1,5 g/dia de CA, sem diferenças sobre a mortalidade materna e neonatal. (GABBAY et al. 2014).

5. CONCLUSÃO

A maioria dos artigos encontrados tinha nível de evidencia 1 e rigor metodológico A. A efetividade das medidas profiláticas da pré-eclâmpsia permanece controversa. Entretanto, diante das evidências atuais, a administração do AAS em mulheres de alto risco reduz o risco de desenvolver a pré-eclâmpsia desde que utilizado acima de 100 mg, abaixo disso nos artigos estudados não teve efeito significativo. Já nas gestantes de baixo risco o AAS não houve eficácia. O AAS está relacionado a uma menor taxa de parto pré-termo e menor risco de crescimento intrauterino restrito.

Em relação ao CA alguns artigos relatam a eficácia do CA para mulheres com ingestão alimentar inadequada deste elemento, para as mulheres com bom consumo nutricional as evidências para o benefício da suplementação do CA não são conclusivas. Em relação a suplementação combinada do AAS e o CA não há uma diminuição significativa na incidência da PE, porém houve uma redução da PE sobreposta e diminuição da restrição do crescimento fetal. Futuros estudos acerca desse tema são significativos, a fim de contribuir para a tomada de decisões dos profissionais da saúde na assistência as gestantes durante o pré-natal, possibilitando um cuidado sistematizado na prevenção da PE e eclâmpsia.

REFERÊNCIAS

- American College of Obstetricians and Gynecologists; Task Force on Hypertension in Pregnancy. Hypertension in pregnancy. Report of the American College of Obstetricians and Gynecologists' Task Force on Hypertension in Pregnancy. **Obstet Gynecol**, 2013;122(5):1122-31.
- BASCHAT, A. A., DEWBERRY, D., SERAVALLI, V., MILLER, J. L., BLOCK-ABRAHAM, D., & BLITZER, M. G. Estados Unidos da America (2017). Maternal blood pressure trends throughout pregnancy and development of pre-eclampsia in women receiving first trimester aspirin prophylaxis. **Ultrasound in Obstetrics & Gynecology**. doi:10.1002/uog.18992
- BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Gestação de alto risco: manual técnico Brasil, 2012.

Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_tecnico_gestacao_alto_risco.pdf Acesso em: 05 Set. 2020.

BUJOLD E, ROBERGE S, LACASSE Y, BUREAU M, AUDIBERT F, MARCOUX S, *et al*. Prevention of preeclampsia and intrauterine growth restriction with aspirin started in early pregnancy: a meta-analysis. **Obstet Gynecol**. 2010;116(2 Pt 1):402-14. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK79955/> Acesso em: 10 Set. 2020.

CHEN Q. *et al.*, "Pre-treatment with calcium prevents endothelial cell activation induced by multiple activators, necrotic trophoblastic debris or IL-6 or preeclamptic sera: Possible relevance to the pathogenesis of preeclampsia," **Placenta**, vol. 34, no. 12, pp. 1196–1201, China, 2013.

Critical Appraisal Skills Programme . **Oxford**: CASP; 2013- Disponível em: http://media.wix.com/ugd/dded87_ebad01cd736c4b868abe4b10e7c2ef23.pdf Acesso em: 12 Set. 2020

GABBAY A. T. TZUR, A. Y. WEINTRAUB, I. SHOHAM-VARDI, R. SERGIENKO, AND E. SHEINER, "Calcium level during the first trimester of pregnancy as a predictor of preeclampsia," **Hypertens. Pregnancy**, vol. 33, no. 3, pp. 311–321, Israel, 2014.

GONZÁLEZ C, MERCEDES V *et al.* Resultados del uso del ácido acetilsalicílico y los suplementos de calcio en la prevención de la preeclampsia. **Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología**, [S.l.], v. 43, n. 3, dic. Cuba, 2017.

HOFMEYR GJ, LAWRIE TA, ATALLAH ÁN, DULEY L. Suplementação de cálcio durante a gravidez para a prevenção de doenças hipertensivas e problemas relacionados **The Cochrane Library**. 2011. Disponível em: <http://apps.who.int/whl/reviews/CD001059.pdf> Acesso em: 16 Set. 2020.

JAUNIAUX E, BURTON GJ. The role of oxidative stress in placental related diseases of pregnancy. **J Gynecol Obstet Biol Reprod Paris**. 2016;45(8):775-85. French. DOI 10.1016/j.jgyn.2016.02.012

LEFEVRE, M. L. (2014). Low-Dose Aspirin Use for the Prevention of Morbidity and Mortality From Preeclampsia: U.S. Preventive Services Task Force Recommendation Statement. **Annals of Internal Medicine**, 161(11), 819.

MAGEE, L. A., PELS, A., HELEWA, M., REY, E., & VON DADELSZEN, P. (2014). Diagnosis, evaluation, and management of the hypertensive disorders of pregnancy. Pregnancy Hypertension: **An International Journal of Women's Cardiovascular Health**, 4(2), 105–145. DOI:10.1016/j.preghy.2014.01.003

- MENDES KDS, SILVEIRA RCCP, GALVÃO CM. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. **Texto Contexto Enferm**, Florianópolis, 2008.
- MONE, F., MULCAHY, C., MCPARLAND, P., STANTON, A., CULLITON, M., DOWNEY, P., MCAULIFFE, F. M. (2016). An open-label randomized-controlled trial of lowdose aspirin with an early screening test for pre-eclampsia and growth restriction (TEST): **Trial protocol. Contemporary Clinical Trials**, 49, 143–148, 2016.
- MOHER D, LIBERATI A, TETZLAFF J, ALTMAN DG. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. *PloS Med*. 2009;6(7):e1000097. DOI: 12.1371/journal.pmed.1000097
- NGENE, N. C., & MOODLEY, J. (2018). Role of angiogenic factors in the pathogenesis and management of pre-eclampsia. **International Journal of Gynecology & Obstetrics**, 141(1), 5–13. DOI:10.1002/ijgo.12424
- Oxford Centre for Evidence-based Medicine: levels of evidence. Disponível em: <http://www.cebm.net/oxfordcentre-evidence-based-medicine-levels-evidence-march-2009>. Acesso em: 16. Set. 2020.
- PARK, F., RUSSO, K., WILLIAMS, P., PELOSI, M., PUDDEPHATT, R., WALTER, M., ... HYETT, J. Prediction and prevention of early-onset pre-eclampsia: impact of aspirin after first-trimester screening. **Ultrasound in Obstetrics & Gynecology**, 46(4), 419–423 Australia, 2015. DOI:10.1002/uog.14819.
- Pré-eclâmpsia nos seus diversos aspectos. São Paulo: Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO), 2017. Disponível em: https://www.febRASGO.org.br/media/k2/attachments/12-PRE_ECLAMPSIA.pdf Acesso em: 16. Set. 2020.
- Recomendações da OMS para a prevenção e tratamento da hemorragia pós-parto. Guia. I. Organização Mundial da Saúde. ISBN 978 92 4 854833 8 (Classificação NLM: WQ 330). c Organização Mundial da Saúde 2014 Acesso em: 27. Nov. 2020
- ROBERGE S, NICOLAIDES K, DEMERS S, *et al*. The role of aspirin dose on the prevention of preeclampsia and fetal growth restriction: systematic review and meta-analysis. **Am J Obstet Gynecol** 2017;216: 110-20.
- RUANO R, FONTES RS, ZUGAIB M. Prevention of preeclampsia with low-dose aspirin – a systematic review and meta-analysis of the main randomized controlled trials. **Clinics**, 2005;60(5):407-14.
- ROLNIK D. L. ET AL., “Aspirin versus Placebo in Pregnancies at High Risk for Preterm Preeclampsia” **N. Engl. J. Med.**, vol. 377, no. 7, pp. 613–622, Massachuset, 2017.

SOUZA EV, TORLONI MR, ATALLAH AN, SANTOS GM, KULAY L JR, SASS N. Aspirin plus calcium supplementation to prevent superimposed preeclampsia: a randomized trial. **Braz J Med Biol Res.** Brasil, 2014 May;47(5):419-25.

SOUZA MT, SILVA MD, CARVALHO R. Revisão integrativa: o que é e como fazer. Einstein, 2010. Disponível em: http://www.astresmetodologias.com/material/O_que_e_RIL.pdf Acesso em: 16. Set. 2020.

SPRADLEY FT, PALEI AC, GRANGER JP. Increased risk for the development of preeclampsia in obese pregnancies: weighing in on the mechanisms. *Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol.* 2015;309(11):R1326-43. DOI: 10.1152/ajpregu.00178.2015 Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4698403/> Acesso em: 16. Set. 2020.

TRIVEDI N AA meta-analysis of low-dose aspirin for prevention of preeclampsia **J Postgrad Med [serial online]** India, 2011. Disponível em: <https://www.jpgmonline.com/text.asp?2011/57/2/91/81858> Acesso: 16. Set. 2020.

URSI ES. Prevenção de lesões no perioperatório: revisão integrativa da literatura **Rev Lat Am Enfermagem**; 2006;14(1):124-31.

Uso de aspirina em baixas doses durante a gravidez. Parecer do Comitê ACOG nº 743. American College of Obstetricians and Gynecologists. **Obstet Gynecol** 2018; 132: e44-52.

VELÁSQUEZ M, GIL-VILLA AM, CADAVID AP. Lipoxinas induzidas por aspirina: uma alternativa para modular processos pró-inflamatórios na pré-eclâmpsia. **Rev Cubana ObstetGinecol.** 2013; 39 (3): 292-305.

VILLA PM., *et al.*, "Aspirin in the prevention of pre-eclampsia in high-risk women: A randomised placebo-controlled PREDO Trial and a meta-analysis of randomised trials," *BJOG An Int. J. Obstet. Gynaecol.*, vol. 120, no. 1, pp. 64–74, Finlândia, 2012, DOI: 10.1111/j.1471-0528.2012.03493.x.

World Health Organization (WHO). WHO recommendations for prevention and treatment of pre-eclampsia and eclampsia. **Geneva**: WHO; 2011. Disponível em: https://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/9789241548335/en/ Acesso em: 16. Set. 2020.

ANÁLISE DAS TÉCNICAS DE EXPIRAÇÃO LENTA EM RECÉM NASCIDOS INTERNOS EM UTI NEONATAL

DOI: 10.51859/amplla.csa511.1121-28

Mariana Pereira da Silva ¹

Maria do Socorro Nunes Gadelha ²

Sandra Maria Cordeiro Rocha de Carvalho ³

Felícia Ferreira da Mota ⁴

Natália Mota da Silva Borges ⁵

Nadine Oliveira Cabral ⁶

¹ Graduando do curso de Fisioterapia. Universidade Federal da Paraíba – UFPB

² Docente do curso de Fisioterapia. Universidade Federal da Paraíba – UFPB

³ Docente do curso de Fisioterapia. Universidade Federal da Paraíba – UFPB

⁴ Fisioterapeuta do Hospital Universitário Lauro Wanderley - HULW

⁵ Graduando do curso de Fisioterapia. Universidade Federal da Paraíba - UFPB

⁶ Graduando do curso de Fisioterapia. Universidade Federal da Paraíba - UFPB

RESUMO

OBJETIVO: Analisar as técnicas de expiração lenta em recém-nascidos internos na UTI neonatal. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo descritivo, exploratório de abordagem quantitativa, realizado no período de julho de 2019 a fevereiro de 2020. Consistiu na aplicação de seis repetições das técnicas AFEL, ELPr e DAA. Foram registradas as variáveis de SpO₂, FC, FR e PA antes da aplicação, imediatamente após e um minuto após a aplicação das técnicas. Foi aplicado, ainda, um questionário validado adaptado do Instituto da Criança do HC – FMUSP, contendo informações pessoais e clínicas dessas crianças. Foi aplicado o teste de significância de Wilcoxon para amostras dependentes com 5% de nível de significância. **RESULTADOS:** Foram avaliadas 10 RNTPs, que, em sua maioria, apresentaram baixo peso ao nascimento (1.791 Kg), com média de internação de duas semanas e majoritariamente do sexo masculino (70%). A eficácia das técnicas de expiração foi comprovada pelo resultado do Teste T-pareado, no qual o p-valor se mostrou estatisticamente significativo para todas as manobras nos parâmetros FC e FR. A SpO₂, no entanto, se manteve estatisticamente irrelevante. **CONCLUSÃO:** As técnicas aplicadas foram eficazes para a higiene pulmonar, estabilidade hemodinâmica e manutenção da estabilidade da SpO₂, o que permite afirmar que a atuação fisioterapêutica na assistência ao neonato na UTIN é de fundamental importância para a melhora do estado clínico do neonato.

Palavras-Chave: Fisioterapia. Performance. Surfactante. Desconforto Respiratório.

1. INTRODUÇÃO

As infecções respiratórias agudas (IRAs) são as maiores causas de morbimortalidade nos pacientes pediátricos, sendo responsáveis por aproximadamente 30% dos óbitos infantis. Os vírus responsáveis por essa doença acometem, principalmente, o trato respiratório inferior de crianças, na faixa etária entre 18 dias a quatro anos. As infecções respiratórias mais frequentes são pneumonia e bronquiolite, e seus sintomas mais comuns são a tosse, febre, rinite e sibilância (PRATO et al., 2014).

Dentre as patologias que acometem o sistema respiratório do recém nascido pré-termo (RNPT), a Síndrome do Desconforto Respiratório (SDR) ou Doença da Membrana Hialina (DMH) é uma das disfunções de maior prevalência nas Unidades de Terapia Intensiva Neonatais (UTIN), sendo responsável por altas taxas de morbidade e mortalidade na faixa etária neonatal. Cerca de 50% dos óbitos que ocorrem neste período são decorrentes de distúrbios respiratórios, destes 80 a 90% são casos de SDR (CONSOLO; PALHARES; CONSOLO, 2002; SEGRE, 2002).

Segundo Stiller (2000) a fisioterapia respiratória envolve grande número de procedimentos, em particular as manobras de remoção de secreção brônquica-técnicas que garantem a perviabilidade das vias aéreas, promovendo condições para a adequada ventilação e prevenção de infecções respiratórias, através da prevenção ou a redução das consequências da obstrução por secreção, tais como hiperinsuflação, atelectasia e alteração da relação ventilação/perfusão (V/Q) e aumento do trabalho respiratório (OVERWALDER, 2000; GÜRSKI, 2002; POSTIAUX, 2000).

A aplicação das técnicas varia entre as formas passiva, ativo-assistida ou ativa, de acordo com a idade e grau de cooperação do paciente; têm por objetivo auxiliar na mobilização e remoção das secreções retidas, a fim de melhorar o intercâmbio gasoso e reduzir o trabalho ventilatório. As condutas mais usadas são: Aumento do fluxo expiratório (AFE); Expiração lenta e prolongada (ELPr); Drenagem autógena assistida (DAA); Expiração Lenta com a Glote Aberta (ELTGOL) (SCANLAN, WILKINS, STOLLER, 2000).

As técnicas fisioterapêuticas para a remoção de secreção brônquica compreendem três níveis de atuação: (1) descolamento do muco brônquico de vias aéreas de pequenos e médios calibres; (2) deslocamento do muco brônquico das vias

aéreas de grande calibre; e (3) eliminação do muco brônquico (Nozawa E, Sarmento GJV, Vega JM, Costa D, Silva JEP, Feltrim MI, 2008). Dentre elas, destaca-se a AFE: técnica não convencional de desobstrução brônquica que pode ser aplicada desde o nascimento, inclusive no RN pré-termo, quando existe doença respiratória com obstrução das vias aéreas (Santos AMN, Goulart AL, Kopelman BI, Almeida MFB, Miyoshi MH, Guinsburg R. 2004).

O objetivo deste estudo é analisar a contribuição da assistência fisioterapêutica com a aplicação das técnicas de Expiração Lenta em Recém Nascidos internados na UTI neonatal do Hospital Universitário Lauro Wanderley.

2. METODOLOGIA

Estudo descritivo e quantitativo em neonatos com doenças pulmonares, internadas na UTI neonatal do HULW, acometidos por SDR, com idades variando entre 0 a 3 meses, de ambos os sexos, no período de julho de 2019 a fevereiro de 2020. Foram incluídos os RNPT de ambos os gêneros, internados no HULW e com diagnóstico de SDR. Foram excluídos os RNs que não apresentam a SDR, com malformações congênitas, instabilidade hemodinâmica ou impossibilidade de realizar as técnicas AFEL, ELPr e/ou DAA.

Foi realizada uma busca sistemática da literatura para o embasamento teórico desta pesquisa, por meio de consultas aos indexadores de pesquisas na base de dados eletrônicos SciELO (*Scientific Electronic Library Online*), PubMed, artigos científicos de revisão e/ou experimentais e pesquisas em livros referentes aos assuntos relacionados com este estudo, entre os anos de 1996 a 2019.

Foi criado banco de dados contendo as seguintes informações: identificação, dados neonatais e sócio-demográficos, sinais vitais, exame físico e dados pré e pós-intervenção fisioterapêutica. A intervenção consistiu na aplicação de seis repetições das técnicas AFEL, ELPr e DAA.

As manobras foram aplicadas por um fisioterapeuta especialista e, logo após, as seguintes variáveis foram registradas em ficha de coleta de dados: Saturação periférica (SpO₂), Frequência Cardíaca (FC), Frequência Respiratória (FR) e Pressão Arterial (PA). Estes dados foram anotados 1 minuto antes da aplicação da técnica (momento A1),

durante a aplicação da técnica (momento A2) e 1 minuto após aplicação da técnica (momento A3). Todos os pacientes foram submetidos inicialmente à AFEL, depois à ELPr e posteriormente à DAA. A realização das manobras tinha duração de cerca de 20 segundos (momento A2) em seguida o paciente descansava por 1 minuto (momento A4), totalizando 6 repetições de cada técnica.

Os dados coletados foram tabulados e analisados através do *software* SPSS 10 (*Statistical Package for the Social Science*), versão 21, observando as variáveis SpO₂, FR, FC, PA e características sociodemográficas através do teste de significância de *Wilcoxon* para amostras dependentes com 5% de nível de significância.

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba (CAAE: 84301318.800015183). Ressalta-se que todos os procedimentos foram aplicados mediante consentimento dos pais ou responsáveis pelo neonato.

3. RESULTADOS

Fizeram parte da amostra 10 RNPTs, sendo 7 do sexo masculino, com idade ao nascer mais incidente o pré-termo moderado e pré-termo extremo. Os RNPTs apresentaram peso entre 730 e 3.585 gramas (DP 1.791,30 ± 990,56) e tempo de internação entre 1 e 47 dias (DP 14,89 ± 15,5).

Observou-se que 1 RNPT (10%) apresentou o padrão respiratório diafragmático e 9 apresentaram padrão misto (90%). Ao avaliar a expansibilidade torácica foi constatado 1 acometido com uma diminuição à direita (10%) e 9 com expansão simétrica (90%). Os tipos de tórax foram todos classificados como normais. Um RNPT foi avaliado com ritmo respiratório irregular e dispnéico (10%) e nove com ritmo regular e eupnéico (90%). Quanto ao uso da musculatura acessória, 1 RNPT utilizou (10%) e 9 não utilizavam (90%). Foi detectado tiragem em apenas 1 neonato (10%).

Tabela 1 – Aspectos clínicos dos Rn's avaliados.

Características	n	%
Esforço respiratório		
Ausente	6	60
Leve	4	40
Ausulta respiratória		
Murmúrio vesicular diminuído	5	50
Roncos	3	30
Sibilos	2	20
Secreção		
Sim	8	80
Não	2	20
Tipo de Secreção		
Mucóide	5	50
Mucopurulento	1	10
Purulento	1	10
Hemática	1	10
Quantidade de Secreção		
Diminuída	2	20
Moderada	1	10
Aumentada	4	40
Viscosidade da secreção		
Ausente	2	20
Presente	8	80
Tosse		
Ausente	5	50
Presente	5	50

Fonte: Dados da pesquisa.

De acordo com resultados da Tabela 2, em relação ao comportamento da variável de SpO_2 na AFEL, observamos que não houve alteração em seus valores logo após a técnica, nem após o primeiro minuto. Quanto à FC na AFEL, seu valor também aumentou logo após a técnica, mas retornando a maiores níveis no primeiro minuto após. Para FR na AFEL, observamos também um aumento médio dos valores no momento imediatamente após a aplicação da técnica, apresentando diminuição após o 1 minuto. Na aplicação da AFEL (Tabela 2), obtivemos valores semelhantes quanto à SpO_2 sendo a média nos três momentos.

Em relação a técnica ELPr ao analisar a SpO_2 , o maior valor ocorreu logo após a aplicação da manobra. Para a FC, o maior valor mensurado também ocorreu logo após o procedimento. No tocante da FR, a maior mensuração aconteceu quando transcorreu

1 minuto depois da execução do manejo. Assim, podemos observar em nosso estudo que os valores de SpO₂ foram semelhantes no minuto após a aplicação tanto da AFEL.

Tabela 2 – Aspectos clínicos analisados a partir da técnica das técnicas AFEL, ELPr e DAM.

Características	Fluxo Expiratório Lento (AFEL) Média ± DP	Expiração Lenta Prolongada (ELPr) Média ± DP	Drenagem Autógena Modificada (DAM) Média ± DP
SpO₂ antes	95,01 ± 2,28	95,30 ± 3,60	95,5 ± 2,12
SpO₂ logo após	96,10 ± 2,3	96,9 ± 2,76	97,2 ± 2,78
SpO₂ 1 minuto após	95,3 ± 3,56	96,0 ± 2,6	97,2 ± 2,15
FC antes	144,8 ± 22,24	142,5 ± 25,6	143,5 ± 23,51
FC logo após	149,5 ± 20,4	149,8 ± 21,8	148,0 ± 20,4
FC 1 minuto após	141,7 ± 25,07	146,9 ± 23,4	145,9 ± 22,9
FR antes	33,3 ± 10,86	35,1 ± 11,7	42,0 ± 10,12
FR logo após	38,7 ± 12,25	35,5 ± 9,98	38,1 ± 11,78
FR 1 minuto após	36,6 ± 10,34	40,3 ± 8,6	36,4 ± 10,54

Fonte: Dados da pesquisa.

Na análise pareada das médias em momentos distintos, constata-se a diferença estatisticamente significativa nas seguintes comparações: entre as frequências cardíacas logo após a realização da técnica AFEL (149,5) e depois de um minuto (141,7), (p-valor= 0,034); entre as frequências respiratórias antes da realização da técnica AFEL (33,3) e logo após (38,7), (p-valor = 0,006); entre as frequências cardíacas antes da realização da técnica ELPr (142,5) e logo após (149,8), (p-valor= 0,019); entre as frequências respiratórias antes da realização da técnica ELPr (35,1) e depois de um minuto (40,3), (p-valor = 0,047); entre as frequências respiratórias logo após a realização da técnica ELPr (35,5) e depois de um minuto (40,3), (p-valor = 0,046); entre as frequências cardíacas antes da realização da técnica DAM (143,5) e logo após (148), (p-valor = 0,019); e entre as frequências respiratórias antes da realização da técnica DAM

(42) e depois de um minuto (36,4), (0,047) tendo, portanto, diretamente poder explicativo significativo.

Tabela 3 – Resultado do Test t pareado em relação às técnicas AFEL, ELPr e DAM

AFEL	p-valor	ELPr	p-valor	DAM	p-valor
SpO2		SpO2		SpO2	
Antes X Logo	0,148	Antes X Logo	0,104	Antes X Logo após	0,060
após	0,764	após	0,285	Antes X 1'	0,063
Antes X 1'	0,309	Antes X 1'	0,356	Logo após X 1'	1,000
Logo após X 1'		Logo após X 1'			
FC		FC		FC	
Antes X Logo	0,187	Antes X Logo	0,019*	Antes X Logo após	0,019*
após	0,353	após	0,118	Antes X 1'	0,348
Antes X 1'	0,034*	Antes X 1'	0,349	Logo após X 1'	0,292
Logo após X 1'		Logo após X 1'			
FR		FR		FR	
Antes X Logo	0,006*	Antes X Logo	0,716	Antes X Logo após	0,131
após	0,127	após	0,047*	Antes X 1'	0,047*
Antes X 1'	0,362	Antes X 1'	0,046*	Logo após X 1'	0,427
Logo após X 1'		Logo após X 1'			

Considera-se p-valor < 0,05.

Fonte: Dados da pesquisa. João Pessoa-PB, 2020.

4. DISCUSSÃO

A amostra que compõe esse estudo foi composta por RNTPs de baixo peso ao nascimento, com média de internação de duas semanas e majoritariamente do sexo masculino. De acordo com Serafim e colaboradores (2007), RNs do sexo masculino apresentam 1,5 vezes maior de risco de hospitalização por doenças respiratórias. Estudos anteriores também indicaram que os meninos tinham uma resposta imune diferente contra infecções de gripe quando comparada com a resposta das meninas, mas essa diferença gradualmente desaparece à medida que crescem (Wang X *et al.* 2015)

Dentre as características clínicas vistas durante a inspeção inicial da amostra, observou-se prevalência do padrão respiratório misto, ou seja simétrico, considerado normal. No entanto, foi observado em um dos pacientes o padrão diafragmático, logo assimétrico, caso que se encaixa nas possibilidades de alterações na expansibilidade

torácica em casos de efusões pleurais, pneumotórax, atelectasias, aspiração de corpo estranho, paralisia diafragmática e bronquiolite viral aguda (Matsuno, 2012; Castro et al, 2011). A ausência de tiragens e quadro geral de desconforto respiratório encontradas nesta pesquisa contradizem achados anteriores da literatura, nos quais geralmente são notados aumento do ritmo respiratório e uso de musculatura acessória (Matusno 2012; Azevedo, 2005).

Ao tratarmos de RN, levando em consideração a imaturidade do aparelho respiratório, é importante lembrar que o mesmo apresenta um menor número de bronquíolos e alvéolos, o desenvolvimento completo pode ocorrer até os 8 anos de idade, visto que a evolução das vias aéreas e dos alvéolos depende até certo grau das solicitações que lhe são impostas. Diante da situação de esforço respiratório, em crianças com comorbidade, o diafragma não consegue desempenhar suas funções com eficácia e o sistema nervoso central recruta a ajuda dos acessórios, modificando desde então o padrão respiratório do paciente (Azeredo, 1993).

Quanto à aplicação das técnicas de expiração lenta, foi empregada, primeiramente, a AFEL. Nesta, constatou-se, imediatamente após e um minuto depois de sua aplicação, o aumento da frequência respiratória, o que não corrobora com estudo realizado por Puplin e colaboradores (2009), que relataram redução da FR em indivíduos submetidos a AFEL, resultado este justificado pela redução componente obstrutivo de vias aéreas.

Resultado semelhante à AFEL foi encontrado durante a aplicação da técnica ELPR, na qual a SpO₂ aumentou; também foi registrada elevação dos parâmetros FC e FR, o que corrobora com os resultados dos maiores valores de SpO₂ do estudo de Campos e colaboradores (2005), que também foram obtidos após os 1 minuto de realização da técnica.

Já durante a aplicação da técnica DAM, apesar de ter havido aumento da FC e saturação periférica, houve redução da FR em aproximadamente 15%, o que pode ser justificado pela capacidade da técnica de favorecer a remoção de secreções brônquicas por meio de respirações a diferentes volumes pulmonares, de modo que possam ser eliminadas, o que culmina em melhor qualidade respiratória (COPPO, 2007; HADDAD, 2006).

A eficácia das técnicas de expiração lenta aqui abordadas pode ser comprovada conforme observado no resultado do Teste T-pareado, no qual o p-valor se mostrou estatisticamente significativo para todas as manobras nos parâmetros das frequências cardíacas e respiratórias. A SpO₂, no entanto, se manteve estatisticamente irrelevante, no entanto destaca-se que a mesma permaneceu estável após a aplicação das técnicas.

Nestes termos, acredita-se que o acompanhamento fisioterapêutico dos RNs seja capaz de proporcionar uma estabilidade dos parâmetros avaliados, além da pressão arterial, bem como preservar e promover sua manutenção funcional, além de reduzir a necessidade de aspiração endotraqueal, culminando em maior eficiência em menor tempo de terapia (NICOLAU, 2010; SELESTRIN, 2007).

5. CONCLUSÃO

De forma geral, este estudo abordou a aplicação das técnicas de expiração lenta em RNTs internados em UTI, na qual a maior parte da amostra foi classificada dentro dos padrões clínicos normais, apresentando padrão misto, com ritmo respiratório regular e sem uso de musculatura acessória. Foi constatado que as manobras aplicadas foram eficazes para a manutenção da higiene pulmonar, estabilidade hemodinâmica e manutenção da estabilidade da saturação periférica. Portanto, faz-se necessária a atuação fisioterapêutica ininterrupta na assistência ao neonato na alta complexidade, com a aplicação de manobras cientificamente comprovadas, mediante identificação da adequação das técnicas ao estado clínico do neonato.

REFERÊNCIAS

- AZEREDO, C. A. C. **Fisioterapia respiratória moderna**. 2. ed. São Paulo: Manole, 1993.
- CAMPOS, R. S. et al. Efeito do aumento do fluxo expiratório ativo-assistido em crianças com pneumonia. **Arq Med ABC**, São Paulo, p. 38-4, 2007.
- SANTOS, A. M. N. et al. **Diagnóstico e Tratamento em Neonatologia**. São Paulo: Atheneu; 2004.
- SARMENTO, G. V. **Fisioterapia respiratória em pediatria e neonatologia**. São Paulo: Manole, 2007.

SERAFIM, S. R.; ROSA, G. J. Fisioterapia respiratória: técnica de escolha. **Psychophysiology**, v. 44, n. 5, p. 787–806, 2007.

STILLER, K. Fisioterapia em Terapia Intensiva: Rumo a uma Prática Baseada em Evidências. **Chest**, v. 118, n. 6, p. 1801–13 2000.

PRATO, M. I. C. et al. Doenças respiratórias na infância: uma revisão integrativa. **Rev. Soc. Bras. Enferm. Ped**, v.14, n.1, p 33-9, 2014.

WANG, X. et al. Age and sex differences in rates of influenza-associated hospitalizations in Hong Kong. **Am J Epidemiol**, v, 18, p. 335-44, 2015.

CAPÍTULO XXIX

FATORES ECONÔMICOS, HABITACIONAIS E EDUCACIONAIS EM CRIANÇAS HOSPITALIZADAS POR DOENÇAS RESPIRATÓRIAS

DOI: 10.51859/amplla.csa511.1121-29

Arielson Santos Alves da Silva ¹
Maria do Socorro Nunes Gadelha ²
Robson da Fonseca Neves ³
Sandra Maria Cordeiro Rocha de Carvalho ⁴
Natália Mota da Silva Borges ⁵
Nadine Oliveira Cabral ⁶
Isabelle Rayanne Alves Pimentel da Nóbrega ⁷

¹ Graduando do curso de Fisioterapia. Universidade Federal da Paraíba - UFPB

² Docente do curso de Fisioterapia. Universidade Federal da Paraíba - UFPB

³ Docente do curso de Fisioterapia. Universidade Federal da Paraíba - UFPB

⁴ Docente do curso de Fisioterapia. Universidade Federal da Paraíba - UFPB

⁵ Graduando do curso de Fisioterapia. Universidade Federal da Paraíba - UFPB

⁶ Graduando do curso de Fisioterapia. Universidade Federal da Paraíba - UFPB

⁷ Fisioterapeuta do Hospital Universitário Lauro Wanderley - HULW

RESUMO

OBJETIVO: Analisar os determinantes sociais da saúde, com enfoque nos fatores econômicos, habitacionais e educacionais em crianças hospitalizadas com doenças respiratórias. **METODOLOGIA:** Estudo transversal descritivo de abordagem quantitativa através de coleta de dados nos prontuários no mês de julho/2020. Compuseram a amostra crianças de ambos os sexos internadas por acometimentos respiratórios no HULW. Foi aplicado modelo do questionário adaptado dos Determinantes Sociais da Saúde (DSS) e registradas as variáveis de nível educacional do contexto familiar e macro determinantes socioeconômicos. Os dados foram analisados através do software *Statistical Package for the Social Science* (SPSS), versão 20, com análise descritiva e cálculo de medidas de centro para as variáveis quantitativas. **RESULTADOS:** A amostra foi composta por 12 crianças, de faixa etária de 1 a 8 anos, dos quais metade deles desenvolveram problemas respiratórios em decorrência de comprometimentos neurológicos (50%) e vivenciavam sua primeira internação hospitalar (50%). Observou-se um perfil de internos que possuem a mãe como principal cuidadora (58,3%). Referente a escolaridade do(a) cuidador(a), em sua maioria se encaixaram na categoria 'ensino médio completo' (41,7%), contando com renda familiar entre um e dois salários mínimos (58,3%). Quanto ao saneamento básico, 41,7% declararam não disporem em suas residências. **CONCLUSÃO:** Os fatores econômicos, habitacionais e educacionais em crianças que necessitaram de assistência hospitalar por doenças respiratórias vislumbram relação com o padrão social e educacional, fazendo-se necessárias pesquisas mais abrangentes.

Palavras-Chave: Determinantes sociais da saúde. Doenças Respiratórias. Fisioterapia.

1. INTRODUÇÃO

Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), a saúde é um estado de completo bem-estar físico, psíquico e social, não se configurando apenas como ausência de doença, indo além do que se acreditava por séculos. Mesmo aparentemente utópica, esta concepção permanece forte, servindo como ideal a ser seguido, uma perspectiva de saúde global (ALBUQUERQUE; SILVA, 2014).

Segundo a Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde, os Determinantes Sociais da Saúde (DSS) são formados pelos fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que se relacionam com os fatores de risco e o processo de adoecimento da população (BUSS, 2007). Já o modelo desenvolvido por Dahlgren e Whitehead comporta estes determinantes em diferentes camadas, analisando o nível educacional do contexto familiar e os macro determinantes socioeconômicos (BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007).

Com o desenvolvimento dos estudos sociais relacionados à saúde, o fator habitação obteve protagonismo devido sua globalidade e variantes de extrema importância. As condições de moradia envolvem questões relacionadas ao material utilizado para construção da casa, acesso a serviços de eletricidade, saneamento, coleta de lixo e água potável. A habitação deve conter elementos mínimos para garantir uma vida digna e contribuir para o bem-estar dos seus membros. Segundo Magalhães e colaboradores (2013), ações que visaram melhorias no setor habitacional, apresentaram a longo prazo mais efetividade sobre a saúde quando comparado com intervenções médicas isoladas.

O fator econômico pode interferir no acesso a serviços de saúde ou obtenção de fármacos e bens necessários para o bom desenvolvimento. Hábitos, alimentação e práticas cotidianas que proporcionam melhores condições à saúde estão intimamente ligadas ao poder econômico (CARRAPATO; CORREIA; GARCIA, 2017).

Segundo França e colaboradores (2017) a educação se mostra como um importante indicador indireto da condição socioeconômica e facilitador para o crescimento dos índices de mortalidade infantil. Nos anos 2000 a taxa de mortalidade infantil era de 16,7 por 1.000 nascidos em relação a mulheres com escolaridade acima

de 8 anos, já mães com no máximo 3 anos de escolaridade apresentavam média de 40,2 óbitos por mil.

Conforme a Organização Mundial da Saúde, as infecções respiratórias agudas são responsáveis por mais de 2 milhões de óbitos ao ano em menores de 6 anos (ALVES; VERÍSSIMO, 2006). Em decorrência das mudanças que o planeta vem sofrendo tanto no meio ambiental quanto social, as doenças respiratórias se tornam mais comuns. Devido a sua gravidade, previsões indicam que até o ano de 2030 as doenças pulmonares obstrutivas crônicas estarão entre as 5 maiores causas de mortalidade no mundo. Os índices de mortalidade infantil são indicadores de extrema relevância referente ao quadro de saúde pública, sinalizando a necessidade de políticas e programas de promoção à saúde materno infantil (FRANÇA et al, 2017).

Diante desse contexto, este estudo tem por objetivo avaliar as condições econômicas, educacionais e habitacionais de crianças hospitalizadas por doenças respiratórias durante a pandemia do COVID-19 e quais os fatores podem predispor o desenvolvimento de problemas respiratórios nos primeiros anos de vida.

2. METODOLOGIA

Estudo transversal descritivo e quantitativo, ocorrido na Enfermaria e UTI Pediátrica do Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). A pesquisa transcorreu com a análise de prontuários no mês de julho de 2020. Foram incluídos no estudo prontuários de pacientes pediátricos, de ambos os sexos, com idade de 1 a 8 anos internos em decorrência de doenças respiratórias e/ou submetidos à ventilação mecânica invasiva (VMI), cujos responsáveis tenham assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

Foi aplicado um modelo questionário adaptado dos Determinantes Sociais da Saúde (DSS) desenvolvido por Dahlgren e Whitehead (apud 2007), que comporta os determinantes em diferentes camadas. Devido a extensão do modelo, foram analisadas as variáveis do nível educacional do contexto familiar e os macro determinantes socioeconômicos. Este estudo foi planejado em etapas que segue inicialmente com a realização de um teste piloto, seguido da preparação do instrumento de coleta de dados. Os registros dos dados consideraram os determinantes: idade, história familiar,

ocupação e renda (componente das condições de vida e de trabalho), escolaridade (componente da educação), procedência (componente da habitação) e as variáveis sociodemográficas, clínicas e de caracterização da doença. As informações que não constavam no prontuário, foram adquiridas diretamente com o(a) cuidador(a). Devido ao surgimento e riscos envolvidos com a COVID-19, a realização da coleta de dados seguiu todas as normas de segurança exigidas pela OMS e pelo HULW. O pesquisador não teve contato com o usuário do serviço, realizando a pesquisa por meio virtual; através da plataforma *Google forms*, com base na aprovação do comitê de ética da instituição (CAAE: 30654820.5.0000.5183).

Os dados foram tabulados em uma planilha eletrônica (*Microsoft Office Excel* 2010) e em seguida transferidos para *software* estatístico *Statistical Package for the Social Science* (SPSS), versão 20, no qual foi realizada a análise descritiva, a partir de frequências absolutas e relativas para variáveis categóricas do estudo, além do cálculo de medidas de centro para as variáveis quantitativas. Para determinar as diferenças e associações estatisticamente significativas entre as variáveis independentes foi utilizado o nível de significância de 5% ($p\text{-valor} < 0,05$).

3. RESULTADOS

A amostra foi composta, em sua maioria, por sujeitos do sexo masculino (66,7%), com idade entre um e oito anos, predominando a faixa etária de um a três anos (50%); a média foi estabelecida em 4,17 anos.

Observa-se que a maioria possui a mãe como cuidadora (58,3%). A respeito da escolaridade do cuidador, sobressai o ensino médio completo (41,7%). Referente a ocupação do cuidador(a) observou-se a predominância de donas de casa e empregada doméstica, 33,3% e 25%, respectivamente (Tabela 1).

Tabela 1 – Características gerais dos participantes da pesquisa e cuidadores/responsáveis.

CATEGORIA	N	%
Sexo		
Masculino	8	66,7
Feminino	4	33,3
Faixa etária		
1 a 3 anos	6	50,0
4 a 6 anos	3	25,0
7 anos ou mais	3	25,0
Cuidador		
Mãe	7	58,3
Irmão(a)	3	25,0
Avó	1	8,3
Não possui	1	8,3
Escolaridade do cuidador		
Fundamental incompleto	1	8,3
Médio incompleto	2	16,7
Médio completo	5	41,7
Não identificado	2	16,7
Outro	1	8,3
Ocupação do (s) responsável (is)		
Empregada doméstica	3	25,0
Dona de casa e padeiro	1	8,3
Dona de casa e eletricista	1	8,3
Dona de casa e construção civil	1	8,3
Dona de casa e comerciante	1	8,3
Serviços gerais	1	8,3
Servidor público e comerciante	1	8,3
Aposentado	1	8,3
Não identificado	2	16,7
Total	12	100

Fonte: Dados da Pesquisa, 2020.

Observou-se que 58,3% apresentaram renda mensal entre R\$ 1045,00 e R\$ 2090,00, enquanto que 41,7% receberam até R\$ 1045,00. Quanto à fonte da renda, 41,7% dos participantes a obtinham por meio do trabalho do(s) responsável(is); 33,3% recebiam Benefício de Prestação Continuada (BPC) e 8,3% recebiam renda do Bolsa Família. No que diz respeito à moradia, a maioria vivia em casa de alvenaria (91,7%), com saneamento básico (58,3%) (Tabela 2).

Tabela 2 – Condições socioeconômicos dos participantes da pesquisa.

CATEGORIA	N	%
Renda mensal		
Até R\$ 1045,00	5	41,7
Entre R\$ 1045,00 e R\$ 2090,00	7	58,3
Fonte da renda		
Responsável	5	41,7
BPC	1	8,3
Responsável e BPC	2	16,7
Responsável e Bolsa família	1	8,3
Aposentadoria	1	8,3
Não identificado	2	16,7
Moradia		
Alvenaria	11	91,7
Improvisada	1	8,3
Saneamento básico		
Sim	9	75,0
Não	3	25,0
Total	12	100

Fonte: Dados da Pesquisa, 2020.

Percebe-se predomínio de acometimentos neurológicos (58,3%) nas crianças estudadas. Destas, destaca-se a neuropatia crônica (25%) e atrofia espinhal (16,7%). Já os acometimentos respiratórios representam 41,7%, predominando doenças como a fibrose cística, tuberculose pleural, pneumonia (16,7%) e Covid 19 (7,7%).

Em relação ao quadro clínico, todos os participantes apresentaram desconforto respiratório e 50% tiveram o registro de falta de ar. Sinais de fadiga e febre foram registrados em 33,3% dos participantes, enquanto que respiração ruidosa foi observada em 25% e irritação em apenas 8,3% (Tabela 3).

Tabela 3 – Diagnóstico e Aspectos clínicos dos participantes da pesquisa.

CATEGORIA	N	%
Diagnóstico		
Neuropatia crônica	3	25,0
Agenesia do corpo caloso, Irpa neuromuscular e síndrome epiléptica	1	8,3
Atrofia muscular espinhal e Irpa neuromuscular	1	8,3
Atrofia espinhal	2	16,7
Fibrose cística	2	16,7
Tuberculose pleural	1	8,3
IRA e Pneumonia	1	7,7
Pneumonia	1	7,7

Covid 19		
Sinais de desconforto		
Sim	12	100
Falta de ar		
Sim	6	50,0
Não	6	50,0
Fadiga		
Sim	4	33,3
Não	8	66,7
Febre		
Sim	4	33,3
Não	8	66,7
Obstrução nasal		
Sim	2	16,7
Não	10	83,3
Irritação		
Sim	1	8,3
Não	11	91,3
Respiração ruidosa		
Sim	3	25,0
Não	9	75,0
Total	12	100

Fonte: Dados da Pesquisa, 2020.

A maior parte da amostra foi internada uma única vez (50%) e 41,7% duas a três vezes, sendo a mediana para a amostra de 1,5 internações. Quanto ao tempo de internação, 41,7% possui mais de 6 meses; 33,3% de um a 6 meses e 16,7% menos de um mês. A maioria recebeu orientações (83.3%) apenas ao receber alta.

Nas crianças, a cada aumento de um ano de idade observou-se uma diminuição de 13% na chance de internação hospitalar, com maior chance de internação para o sexo masculino (Tabela 4).

Tabela 4 – Informações relacionadas à internação hospitalar.

CATEGORIA	N	%
Quantidade de internações		
Apenas 1 internação	6	50,0
2 a 3 internações	5	41,7
6 internações	1	8,3
Tempo de internação		
Menos de 1 mês	3	25,0
Entre 1 e 2 meses	2	16,7

Entre 2 e 3 meses	1	8,3
Entre 5 e 6 meses	1	8,3
Mais de 6 meses	5	41,7
Recebeu orientação		
Internação atual	7	58,3
Primeira internação	3	25,0
Não	2	16,7
Total	12	100

Fonte: Dados da Pesquisa, 2020.

4. DISCUSSÃO

Neste estudo, a amostra por crianças da primeira à terceira infância, em sua maioria do sexo masculino, que tinham a mãe como principal cuidadora. A presença materna como cuidadora está relacionada com o cenário sociocultural brasileiro, possuindo a figura materna como principal desenvolvedora e responsável das atividades domésticas (VIEIRA; AMARAL, 2013).

No que diz respeito à escolaridade dos cuidadores, foi visto que, em sua maioria, contavam apenas com o ensino médio completo, fato que corrobora com a realidade educacional brasileira. Em 2016 o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) notificou que 51% da população brasileira possui o fundamental completo e apenas 26% o ensino médio (IBGE, 2016).

Quanto à ocupação trabalhista dos cuidadores, foi notada elevada estimativa referente a ausência de trabalho com vínculo empregatício fixo, o que permite inferir que há inviabilidade existente entre a realização do papel de cuidador(a) e da atividade remunerada, devido a exigência e dedicação que ambas exigem.

Relacionado à isto, Castro (2006) mostra que crianças provenientes de famílias com renda *per capita* de até 0,75 salários-mínimos apresentam maior chance de internação hospitalar. Jardim e Buckeridge (2020) esclareceram a relação entre a vulnerabilidade socioeconômica de moradores da São Paulo com o risco de contágio do vírus Sars-Cov-2, descrevendo a possível concordância entre o fator socioeconômico com a predisposição a agravos de saúde.

A ausência do saneamento básico expõe a população a riscos iminentes e constantes, se tornando um fator de risco epidemiológico. Das moradias às quais pertenciam as crianças, um quarto delas não contavam com condições ideais de

saneamento básico, condizente com os fatores de risco, que são: baixa idade, precárias condições socioeconômicas, desnutrição, déficit no nível de escolaridade dos pais, poluição ambiental e assistência de saúde de má qualidade (PRATO et al., 2014).

De acordo com Evans et al (1994), Hulka & Wheat (1985), as pessoas com pior condição socioeconômica têm mais necessidades de saúde, visto isso, procuram mais os serviços de saúde. Nos Estados Unidos, a pobreza e o desemprego apresentaram associação positiva e a educação, associação negativa com as taxas de internação (McLaughlin et al., 1989; McMahon et al., 1993).

A operacionalização do Modelo Comportamental inclui nos fatores predisponentes: sexo e idade (demográficos), educação, ocupação e raça (estrutura social); e nos fatores capacitantes, renda, cobertura por seguro de saúde, existência de fonte regular de cuidado, tempos de viagem até o serviço e de espera até o atendimento, entre outros. O uso de serviços é medido em unidades de consultas médicas de internações hospitalares, podendo ser especificada para um determinado problema de saúde ou tipo de serviço (Andersen, 1995).

Caetano et al. (2002) e Pinto et al. (2017) afirmam que as causas mais frequentes das afecções em crianças menores que cinco anos são as doenças respiratórias agudas e entre as internações hospitalares devido à insuficiência respiratória aguda (IRA), destaca-se a pneumonia como a principal causadora. Nos países desenvolvidos, o efeito letal da pneumonia afeta menos de 2% das crianças na faixa etária de 0 a 5 anos, enquanto nos países em desenvolvimento a estimativa atinge 10 a 20% (Caetano et al. 2002), faixa etária compatível com a apresentada neste estudo. O número de crianças nesta faixa etária pode estar relacionado ao sistema imunológico pouco desenvolvido, ao meio ambiente em que vivem e ao contexto social. (MENDONÇA et al, 2017).

Mais da metade das crianças estudadas na amostra foram acometidas por doenças de cunho respiratório, agudas ou crônicas, tanto das vias aéreas superiores como das inferiores; Prato et al (2014) ressalta que estas comorbidades interferem diretamente no cotidiano das crianças e de suas famílias, além de ser um problema de saúde pública em todo o mundo, em particular nos países em desenvolvimento, onde a morbidade e a mortalidade apresentam índices mais altos que nos países já desenvolvidos.

Nas crianças, a cada aumento de um ano de idade observou-se uma diminuição da chance de internação hospitalar, com maior probabilidade de internação para o sexo masculino, corroborando com Oliveira et al (2012), o qual expôs em seu estudo um perfil encontrado para hospitalizações como: predominância de internações de menores de um ano, do sexo masculino, por causas respiratórias. O grupo que apresentou três ou mais internações apresenta a característica de menor renda, dessa forma, uma maior chance de ser internado.

Este estudo foi limitado pela amostra relativamente baixa e pela disponibilidade limitada de tempo de acompanhamento da mesma, visto que o acesso ao HULW e seus pacientes foi restrito devido à pandemia do COVID-19.

5. CONCLUSÃO

Este estudo constatou que as crianças internadas no HULW, em sua maioria, foram acometidas por doenças respiratórias, seguidas de disfunções neurológicas. Quanto aos seus cuidadores, em geral as mães dos pacientes, provinham de lares com baixa renda familiar *per capita* e não exerciam atividade remunerada, o que expõe a situação de vulnerabilidade nas quais estas crianças estão inseridas. Fatores econômicos, habitacionais e educacionais em crianças que necessitam de assistência hospitalar por doenças respiratórias, em comparação com os dados obtidos no estudo, expõe a relação com o padrão social entre o meio familiar do interno, tornando necessário a abrangência de pesquisas com maior número amostral e um desafio único de estudos em crianças no esforço e na preparação de melhorias na saúde pública.

REFERÊNCIAS

- ALBUQUERQUE, G. S. C.; SILVA, M. J. S. Sobre a saúde, os determinantes da saúde e a determinação social da saúde. **Saúde debate**, Rio de Janeiro, v. 38, n. 103, p. 953-965, 2014. <https://doi.org/10.5935/0103-1104.20140082>.
- BUSS, P. M. Globalização, pobreza e saúde. **Ciênc. saúde coletiva**, Rio de Janeiro, v. 12, n. 6, p. 1575-1589, 2007. <https://doi.org/10.1590/S1413-81232007000600019>.
- BUSS, P. M.; PELLEGRINI FILHO, A. A saúde e seus determinantes sociais. **Physis**, Rio de Janeiro, v. 17, n. 1, p. 77-93, 2007. <https://doi.org/10.1590/S0103-73312007000100006>.

- MAGALHÃES, K. A. et al. A habitação como determinante social da saúde: percepções e condições de vida de famílias cadastradas no programa Bolsa Família. **Saude soc.**, São Paulo, v. 22, n. 1, p. 57-72, 2013. <https://doi.org/10.1590/S0104-12902013000100007>.
- CARRAPATO, P.; CORREIA, P.; GARCIA, B. Determinante da saúde no Brasil: a procura da equidade na saúde. **Saude soc.**, São Paulo, v. 26, n. 3, p. 676-689, 2017. <https://doi.org/10.1590/s0104-12902017170304>.
- FRANCA, E. B. et al. Principais causas da mortalidade na infância no Brasil, em 1990 e 2015: estimativas do estudo de Carga Global de Doença. **Rev. bras. epidemiol.**, São Paulo, v. 20, supl. 1, p. 46-60, 2017. <https://doi.org/10.1590/1980-5497201700050005>.
- VIEIRA, A.; AMARAL, G. A. Uma arte de ser Beija-Flor na tripla jornada de trabalho da mulher. **Saude soc.** São Paulo, v. 22, n. 2, p. 403-414, 2013. <http://dx.doi.org/10.1590/S0104-12902013000200012>.
- IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Roberto Cavararo. **Síntese de indicadores sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira**. Brasília, n. 16, p. 146, 2016.

HIPERCALEMIA E A ADMINISTRAÇÃO DE CLORETO DE POTÁSSIO EM CRIANÇAS – REVISÃO SISTEMÁTICA

DOI: 10.51859/amplla.csa511.1121-30

Bárbara Rebeca Alves Pereira ¹

Diego Santos Silva ¹

Ana Karina Marques Fortes Lustosa ²

Débora Cavalcante Braz ³

¹ Graduando do curso de Farmácia. Universidade Federal do Piauí – UFPI

² Supervisora farmacêutica. Hospital Infantil Lucídio Portela - HILP

³ Professora do Departamento de Farmácia. Universidade Federal do Piauí – UFPI

RESUMO

O estudo apresentado teve por objetivo avaliar se o número de casos de hipercalemia em crianças hospitalizadas tratadas com cloreto de potássio (KCl) é maior quando comparado a crianças não tratadas com o medicamento. A revisão sistemática realizada foi sustentada pela estratégia de busca PICO: População – pacientes pediátricos hospitalizados; Intervenção – terapia com cloreto de potássio; Comparação – grupo sem tratamento com KCl e o “Outcome” – ocorrência de hipercalemia. As buscas foram realizadas em novembro de 2020 nos bancos de dados eletrônicos Pubmed, Embase, Lilacs, Scopus e Web of Science por meio dos seguinte descritores: “hyperkalemia”, “hyperpotassemia”, “potassium chloride”, “children”, “child”. De 234 publicações, 25 estudos possibilitaram uma revisão com 1.049 crianças. O maior registro de hipercalemia foi observado em crianças que não foram expostas ao tratamento com KCl, mas apresentavam diagnóstico de doenças hereditárias, como pseudo-hipoaldosteronismo, disfunções renais de causa genética, hiperleucocitose e nos casos de esmagamento após trauma físico. Os estudos com KCl mostraram que esse fármaco foi utilizado na prevenção e tratamento da hipocalemia na área de pediatria cardiovascular e condições clínicas que exigiam internação em UTI. Além disso, mostraram que o tratamento com o KCl enteral e a utilização de protocolos de prescrição e dispensação podem prevenir a ocorrência de hipercalemia. Desta forma, o presente estudo evidenciou que o uso de KCl em pacientes pediátricos pode ser seguro, desde que seja administrado seguindo protocolos e com acompanhamento de profissionais de saúde.

Palavras-chave: Hipercalemia. Cloreto de potássio. Compostos de potássio. Pseudo-hipoaldosteronismo. Crianças hospitalizadas.

1. INTRODUÇÃO

O potássio é o cátion intracelular mais abundante, estando presente principalmente no músculo esquelético, onde a concentração varia de 140 a 150 mmol/L. Cerca de 2% do potássio do corpo está no fluido extracelular, onde a concentração é rigidamente regulada em 3,5 a 5,5 mmol/L pela atividade da bomba de trifosfato de sódio-potássio-adenosina (Na^+/K^+ -ATPase) e excreção renal (CRAWFORD, 2014). Uma vez que o gradiente de concentração de potássio através da membrana celular é um fator chave na determinação do potencial da membrana celular, mesmo um pequeno desvio entre o nível de potássio sérico e o valor normal definido pode causar disfunção muscular grave, levando à insuficiência respiratória e parada cardíaca (RHODES et al., 2016).

Quando os níveis séricos de K^+ são inferiores ou iguais a 3,5 mmol/L tem-se a hipocalemia. Por outro lado, a hipercalemia é definida quando os níveis séricos deste íon são superiores a 5,5 mmol/L em crianças e adultos e superior a 6 mmol/L em recém-nascidos. A hipercalemia é um importante distúrbio eletrolítico dado ao risco inerente que oferece (BOUADMA et al., 2019). Esta pode ser causada por fatores variáveis como insuficiência renal, trauma físico, hiperleucocitose e doenças hereditárias como o pseudo-hipoaldosteronismo (PHA) tipo I e II (CAYIR et al., 2019; MATSUDA et al., 2014).

Os distúrbios clínicos da homeostase do potássio também são recorrentes em pacientes hospitalizados, especialmente quando em polifarmácia, visto que muitos medicamentos podem alterar os níveis de potássio, como os suplementos de cloreto de potássio (KCl), capazes de aumentar a carga endógena do cátion (DALY; FARRINGTON, 2013).

A reposição de potássio é frequentemente administrada entre crianças doentes hospitalizadas para correção dos níveis de K^+ em quadros de desidratação através da solução de reposição oral. Além disso, suplementação de KCl é parte integrante do manejo diário de pacientes pediátricos gravemente enfermos com doença cardíaca e em tratamento nas unidades de terapia intensiva para prevenção e correção da hipocalemia (AMIRNOVIN et al., 2018).

Entretanto, é importante destacar que o KCl é considerado um medicamento de risco elevado pela prática do Institute of Safe Medication, pois possui maior

probabilidade de provocar danos significativos aos pacientes em decorrência de falha no processo de utilização (RHODES et al., 2016). Os erros que acontecem com esse medicamento possuem alta gravidade, podendo causar níveis elevados imediatos de potássio sérico e provocar lesões permanentes ou serem fatais para os pacientes (FLYNN et al., 2012).

A utilização inadequada de solução injetável concentrada de KCl, por exemplo, está associada ao risco elevado da ocorrência de eventos fatais em pacientes adultos e pediátricos, como arritmias, parada cardíaca e morte (REHMAN SIDDIQU et al., 2017). No entanto, apesar de seu amplo uso em ambiente hospitalar, existem poucos dados sobre os protocolos de reposição de KCl em pacientes pediátricos, além disso, a terapia ainda é mal caracterizada em relação à sua segurança terapêutica nessa população (AMIRNOVIN et al., 2018).

Dessa maneira, tendo em vista a importância da reposição de KCl para a saúde, levando-se em consideração o seu uso frequente em pacientes pediátricos e, especialmente, a escassez de estudos relacionados à sua eficácia e segurança nessa população, o presente estudo de revisão tem como objetivo avaliar se os casos descritos de hipercalemia em pacientes pediátricos têm relação com a administração de KCl.

2. METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão sistemática, baseada nas diretrizes metodológicas da Cochrane (Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions, 2021), guiada pela seguinte pergunta de pesquisa “A ocorrência de hipercalemia como uma RAM é diferente entre crianças tratadas com KCl com diferentes condições clínicas quando comparadas a crianças não tratadas?”, sustentada na estratégia PICO: População – pacientes pediátricos hospitalizados; Intervenção – tratamento com cloreto de potássio; Comparação – grupo sem tratamento com cloreto de potássio e o “Outcome” - a ocorrência de hipercalemia.

2.1. LOCAL DE REALIZAÇÃO E PERÍODO DOS ESTUDOS ANALISADOS

Foram levantados estudos descritivos sobre eventos de hipercalemia em pacientes pediátricos hospitalizados tratados com KCl, realizados em quaisquer países, sem restrição de idioma, publicados entre janeiro de 1980 a outubro de 2020.

2.2. CRITÉRIO DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO DOS ESTUDOS

Foram incluídos estudos descritivos prospectivos e retrospectivos e ensaios clínicos que avaliavam a ocorrência de hipercalemia a partir dos dados qualitativos ou quantitativos de prontuários e/ou estudos que determinaram os níveis de potássio em amostras de sangue em crianças tratadas em ambiente hospitalar. Foram excluídos os estudos com adultos e com animais, as publicações que não forneceram os dados individuais dos pacientes e as variáveis referidas nos critérios de inclusão e os que não possuíam resumo disponível.

2.3. BUSCA E IDENTIFICAÇÃO DOS ARTIGOS

Foi realizada uma revisão sistemática para identificar os estudos que atendessem aos critérios de inclusão estabelecidos. Para isso, pesquisaram-se os bancos de dados PubMed; Literatura Latinoamericana y Del Caribe em Ciências de la Salud (Lilacs); Web of Science; Embase e Scopus, de janeiro de 1980 a outubro de 2020. Para a busca, foram utilizados descritores controlados de acordo com o PubMed, Medical Subject Headings (MeSH) e utilizados os operadores booleanos “AND” e “OR”. As palavras-chave utilizadas foram: “hyperkalemia”, “hyperpotassemias”, “hyperpotassemia”, “potassium chloride”, “children”, “child”, “hipercalemia”, “hiperpotassemias”, “hiperpotassemia”, “cloreto de potássio”, “crianças”, “criança”, “pacientes pediátricos hospitalizados”. Utilizou-se os seguintes termos de busca no PubMed que foram adaptados à estratégia para as outras bases de dados: “(Hyperkalemia) OR (Hyperpotassemia) OR (Hyperpotassemias) AND (Potassium chloride) AND (Children) OR (Child)”. Os estudos foram selecionados utilizando a Plataforma Rayyan® (Qatar) por meio da identificação, seleção e avaliação da elegibilidade. Após a identificação dos estudos, foram excluídos artigos duplicados por meio do software.

2.4. SELEÇÃO DOS ESTUDOS

A seleção dos estudos foi realizada de maneira independente por dois revisores, por meio da plataforma de seleção Rayyan® (Qatar). Inicialmente os artigos foram selecionados após a leitura do título e resumo e os que atenderam à questão norteadora da pesquisa e que tiveram consenso entre os dois revisores, foram lidos na íntegra para inclusão ou exclusão na revisão. As discordâncias na fase da leitura de resumo foram

resolvidas por um terceiro revisor. Foram encontrados 234 artigos que após serem filtrados com os critérios de elegibilidade resultaram em 25 artigos como fonte (Figura 1).

Figura 1 – Diagrama do resultado da aplicação dos critérios de inclusão e exclusão do estudo.

Fonte: Autoria própria.

3. RESULTADOS

O potássio é um dos eletrólitos administrados de forma aguda mais comum na prática hospitalar, no entanto, existem poucos estudos publicados que descrevam as características de resposta à essa terapia em pacientes pediátricos (RHODES et al., 2016). A fim de avaliar essa resposta complexa, projetamos um estudo para examinar a ocorrência de hipercalemia em crianças hospitalizadas tratados com KCl em comparação a aquelas que não faziam uso da terapia.

Foram identificados, nas fontes pesquisadas, após análise de título, resumo e palavras-chave, 73 artigos sobre o tema “hipercalemia em pacientes pediátricos em tratamento com cloreto de potássio”, dos quais apenas 25 atendiam aos critérios de inclusão. Os estudos incluídos foram divididos em dois grupos: 17 artigos que abordavam a hipercalemia em crianças sem exposição ao KCl e 8 artigos que abordavam a hipercalemia em pacientes pediátricos tratados com cloreto de potássio.

As informações dos estudos relacionados a hipercalemia sem uso de KCl incluídos na revisão sistemática são apresentadas na Tabela 1. Observamos que 76,5% (n=13) dos estudos eram relatos de caso, 17,6% (n=3) sendo série de relatos e 8,9% (n=1) eram estudos observacionais. Somente três estudos incluíram crianças atendidas em instituições exclusivamente pediátricas. Os estudos analisados foram realizados em onze países diferentes, sendo o Japão, a Índia e Israel os países que apresentaram mais estudos.

A idade dos pacientes foi relatada em 17 estudos, variando de 5 dias a 13 anos. Os estudos envolveram um total de 59 crianças, com variação de 1 a 21 crianças, com média de 3,5 crianças (Tabela 1).

Dezessete estudos informaram o diagnóstico das crianças, sendo o PHA o diagnóstico prevalente (Tabela 1). A variável quantitativa apresentada em todos os estudos foi a concentração sérica de potássio, que variou de 5,8 a 27,2 mmol/L, com média de 9,34 mmol/L. Episódios de hipercalemia foram relatados em 49 crianças no total, equivalentes a 83% da população estudada.

Tabela 1 - Descrição das características dos estudos incluídos na avaliação da hipercalemia em pacientes pediátricos sem exposição ao tratamento com Cloreto de potássio (KCl).

Cenário	Autor, ano	População	Nível de potássio	Porcentagem de casos de hipercalemia
Pseudo-hipoaldosteronismo tipo I	Cayir et al., 2019	3 crianças média de 11 dias	$\bar{X}$ SK ⁺ 10,8 mmol/L	3/3= 100%
	Sharma et al., 2013	1 criança com 10 dias	SK ⁺ 10,3 mmol/L	1/1= 100%
	Schweiger et al., 2009	1 criança com 17 dias	SK ⁺ 9 mmol/L	1/1= 100%
	Güran et al., 2011	1 criança com 7 dias	SK ⁺ 13 mmol/L	1/1= 100%
	Al-Agha, 2011	1 criança com 2 anos	SK ⁺ 6,4 mmol/L	1/1= 100%
		1 criança com 2 anos		
Pseudo-hipoaldosteronismo tipo II	Park et al., 2017	2 crianças com média de 20,5 meses	$\bar{X}$ SK ⁺ 6,6 mmol/L	2/2= 100%
	Prahlad et al., 2005	1 criança com 50 dias	SK ⁺ 6,3 mmol/L	1/1= 100%
	Formosa; Webb; Shenoy, 2011	1 criança com 1 mês	SK ⁺ 7 mmol/L	1/1= 100%
				1/1= 100%

	Mitani et al., 2016 Farfel et al., 2010	1 criança com 3 anos 21 crianças com média de 9 ± 4 anos	SK ⁺ 6,6 mmol/L $\bar{X}$ SK ⁺ 5,8 mmol/L	11/21= 52,4%
Pseudo-hipoaldosteronismo severo	Bistritzer et al., 1996	2 crianças com 5 dias	$\bar{X}$ SK ⁺ 9,0 mmol/L	2/2= 100%
Pseudo-hipoaldosteronismo secundário	Korkut et al., 2019	8 crianças com média de 24 dias	$\bar{X}$ SK ⁺ 7,5 mmol/L	8/8= 100%
Pseudo-hipoaldosteronismo transitório	De Clerck et al., 2017	1 criança com 3 meses	SK ⁺ 6,8 mmol/L	1/1= 100%
Lesão ou disfunção renal	Sauder, 1987	1 criança com 13 anos e 7 meses	SK ⁺ 7,9 mmol/L	1/1= 100%
	Finer et al., 2003	12 lactentes	$\bar{X}$ SK ⁺ 9,0 ± 1,2 mmol/L	12/12= 100%
Hipercalemia secundária	Grzych et al., 2019	1 criança com 4 anos	SK ⁺ 27,2 mmol/L	1/1= 100%
	Matsuda et al., 2014	1 criança com 5 anos	SK ⁺ 9,54 mmol/L	1/1= 100%

Legenda: SK⁺: Potássio sérico.

Fonte: Autoria própria.

As características gerais dos 8 estudos relacionados a hipercalemia por KCl incluídos na revisão sistemática são apresentadas na Tabela 2. Foi observado que 37,5% (n=3) tiveram delineamento prospectivo, 37,5% (n=3) tiveram delineamento retrospectivo e 25% (n=2) eram relatos de caso. Apenas dois estudos incluíram crianças atendidas em instituições exclusivamente pediátricas. Os estudos analisados foram realizados em seis países diferentes, sendo um da Inglaterra, três dos Estados Unidos da América, um da Bélgica, um de Bangladesh, um do Paquistão e um de Israel.

A idade dos pacientes relatada nesses estudos variou de 16 dias a 17 anos. Os estudos envolveram um total de 990 crianças, variando de 1 a 353 crianças, com média de 112,5 crianças (Tabela 2). A variável quantitativa apresentada em todos os estudos foi a concentração sérica de potássio, que variou de 3,5 a 12,6 mmol/L, com média de 5,89 mmol/L.

Tabela 2 - Descrição das características dos estudos incluídos na avaliação da hipercalemia em pacientes pediátricos em tratamento com Cloreto de potássio (KCl).

Cenário	Autor, ano	População	Intervenção	Nível de potássio após intervenção	Desfecho
Solução de reidratação oral	Islam, 1985	94 crianças menores de 5 anos com desidratação diarreica.	Reidratação oral com citrato de potássio e solução da OMS.	Grupo citrato com SK ⁺ 4,1 mmol/L e grupo OMS com 3,5 mmol/L.	Nenhum paciente desenvolveu hipercalemia.
	Kahn; Blum, 1980	7 crianças com 5 semanas a 8 meses com desidratação.	Solução oral semelhante à da UNICEF.	Média de PK ⁺ de 5,1 mmol/L após 24h do tratamento.	Seis casos com elevação de PK ⁺ após 41 ± 9h.
	Tamer et al., 1985	100 crianças com idade de 3 a 33 meses com enterite e desidratação.	Solução oral A e B e KCl intravenoso.	SK ⁺ após 24h no grupo oral 5,3 ± 0,8 mmol/L e no grupo IV 4,6 ± 0,8 mmol/L.	Nenhum paciente do grupo oral desenvolveu hipercalemia.
Pediatria cardíaca	Rhodes et al., 2016	353 pacientes com média de 0,43 anos na UTI cardíaca.	Protocolo para redução da prescrição de KCl IV.	4 episódios/1000 pacientes/dia de SK ⁺ > 5,9 mmol/L após protocolo.	A ocorrência de hipercalemia diária e semanal diminuiu.
	Rehman Siddiqui et al., 2017	41 crianças com 1 mês a 15 anos internadas após cirurgia cardíaca.	KCl intravenoso e KCl enteral.	Grupo IV com SK ⁺ 4,47 ± 0,62 mmol/L e grupo enteral com 4,48 ± 0,60 mmol/L.	Nenhum episódio de hipercalemia foi relatado.
	Amirnovin et al., 2018	138 pacientes com idade média de 3 meses com doença cardíaca.	Protocolos de uso de K ⁺ de baixa dose (LD), alta (HD) e escalonada (TD).	1 episódio de SK ⁺ ≥ 4,8 mmol/L após LD, 7 episódios após HD e 3 episódios após TD.	De 939 de KCl, 11 apresentaram SK ⁺ pós-dose ≥ 4,8 mmol/L.
Unidade de Cuidado Intensivo	Bar-Joseph et al., 2008	1 criança de 16 dias de vida com deterioração neurológica e respiratória.	Solução de KCl concentrado em bolsa de reposição de diálise.	SK ⁺ 12,6 mmol/L após 15 min de diálise.	Parada cardíaca por erro de administração de KCl.
	White; Veltri; Fackler, 2005	166 formulários de crianças de 0 a 18 anos recebendo KCl IV na UTI.	Formulário de solicitação de KCl para reduzir as PCEs.	Ocorrênciaa de 0% de SK ⁺ > 5; 5,5 e 6 mmol/L pós-infusão.	A ocorrência de hipercalemia diminuiu para 0% após formulário.

Legenda: SK⁺: Potássio sérico; PK⁺: Potássio plasmático; PCEs: Causas proximais de erros.

Fonte: Autoria própria.

4. DISCUSSÃO

De acordo com os descritores utilizados nesta pesquisa, não existem estudos publicados no Brasil sobre a administração do KCl em crianças e adolescentes, informação que representa um alerta porque esse medicamento é considerado potencialmente perigoso por ser capaz de induzir parada cardíaca (BAR-JOSEPH et al., 2008). Além disso, os eventos adversos relacionados ao KCl como hipercalemia, arritmias e colapso hemodinâmico (RHODES et al., 2016) podem acontecer e não serem registrados.

Os artigos incluídos nesta revisão sistemática mostraram que a hipercalemia em crianças e adolescentes pode ou não estar associada ao tratamento com KCl. Esse fato era esperado, no entanto, a seleção apenas de artigos que abordassem o tema hipercalemia e que apresentassem a concentração de K^+ dos pacientes permitiu identificar que os casos de hipercalemia com níveis mais elevados de K^+ sérico foram observados naquelas crianças que não receberam tratamento com KCl, mas apresentavam doenças pré-existentes como PHA tipo I e II, PHA secundário, PHA transitório, hipercalemia secundária a lesão ou disfunção renal, hiperleucocitose e após trauma físico. Nesses casos, a concentração média de K^+ dos pacientes incluídos no grupo controle foi superior à dos estudos com KCl. No grupo controle as manifestações clínicas relatadas ao PHA ocorreram logo após o nascimento ou ainda no primeiro mês de vida. Apenas nos casos de hipercalemia como consequência de lesão ou disfunção renal a média de idade observada foi acima de 10 anos de idade.

O pseudo-hipoaldosteronismo (PHA) foi a causa de hipercalemia mais documentada nos artigos avaliados. No PHA tipo I o quadro clínico do paciente tende a apresentar maior gravidade porque pode evoluir com hiponatremia severa (CAYIR et al., 2019) e/ou pneumonia seguida de septicemia (SHARMA et al., 2013), condições que levaram os pacientes desses estudos à óbito. Os portadores de PHA I com disfunção de múltiplos órgãos também são considerados graves (BISTRITZER et al., 1996). O PHA tipo II apresenta melhora com a idade, fato evidenciado pelo maior nível de potássio sérico encontrado em crianças quando comparado a adultos de uma mesma família (0,5 mmol/L de K^+ a mais nas crianças) (FARFEL et al., 2010).

Os estudos também relataram elevados níveis de potássio em pacientes com disfunção renal com causa genética. A hipercalemia nesses casos foi devida a uma complicação da síndrome de Batter, que induziu hipercalemia sem acidose e um dos pacientes evoluiu para o óbito (FINER et al., 2003), e por um defeito na excreção tubular do potássio (SAUDER, 1987). Óbito também foi relatado em paciente com pseudo-hipoaldosteronismo secundário devido a síndrome de Prune-Belly, uma doença congênita rara (KORKUT et al., 2019). A síndrome do esmagamento após trauma físico (MATSUDA et al., 2014) e hiperleucocitose (GRZYCH et al., 2019) também induziram hipercalemia. Para as outras condições clínicas os artigos não relataram óbito, mas foi registrada a ocorrência de hipercalemia, taquicardia e arritmia ventricular (GÜRAN et al., 2011; MATSUDA et al., 2014; SHARMA et al., 2013).

Os estudos que avaliaram o tratamento com KCl foram realizados com um maior número de pacientes e mostraram que esse fármaco foi prescrito para a prevenção e/ou tratamento da hipocalemia na área de pediatria cardiovascular (AMIRNOVIN et al., 2018; REHMAN SIDDIQU et al., 2017; RHODES et al., 2016), na Unidade de Terapia Intensiva (BAR-JOSEPH et al., 2008; WHITE; VELTRI; FACKLER, 2005) e para casos de enterite aguda apresentando diarreia e desidratação (ISLAM, 1985; TAMER et al., 1985) em ambiente hospitalar. As crianças e adolescentes desses estudos também apresentavam hipocalemia pós cirurgia cardíaca e hipocalemia causada pelo tratamento farmacológico, incluindo diuréticos como a furosemida. A utilização do potássio em soro de reidratação oral nas concentrações de 20 mmol/L (OMS) e de 30 mmol/L (ISLAM, 1985; TAMER et al., 1985) é considerada segura e bem tolerada. No entanto, em caso de crianças bem nutridas e menores de 1 ano de idade se o tempo de terapia for acima de 24 horas será necessário monitorar os níveis plasmáticos de K^+ (KAHN; BLUM, 1980). Com isso, os estudos sobre a utilização do KCl estão direcionados as crianças com doenças cardiovasculares e internadas em UTI, principalmente.

Os resultados obtidos demonstraram a importância de um protocolo para a prescrição de KCl IV (AMIRNOVIN et al., 2018) e enteral (REHMAN SIDDIQU et al., 2017), de um protocolo para a dispensação pelo setor de farmácia (WHITE; VELTRI; FACKLER, 2005) e da dosagem diária do K^+ dos pacientes (RHODES et al., 2016). Um protocolo para a prescrição do KCl é indispensável em um hospital ou setor porque irá padronizar a concentração do K^+ sérico que poderá indicar ao médico o momento para o tratamento

da hipocalemia. Esse procedimento pode prevenir a ocorrência de hipercalemia (RHODES et al., 2016). No caso de suplementação de K^+ IV, o regime de dose é um parâmetro que deve ser considerado e definido em um protocolo, a dose escalonada demonstrou maior eficácia porque manteve os níveis normais de K^+ com um menor número de doses suplementares e apresentou maior segurança devido a menor exposição do paciente à hipercalemia, quando comparado ao regime de doses baixa (0,5 mmol/kg para $K^+ < 3,2$ mmol/L) e alta (1 mmol/kg para $K^+ < 3,2$ mmol/L) de KCl, respectivamente. Esses regimes de dose são seguros, no entanto a dose escalonada teve melhor resposta por ser prescrita de acordo com os níveis sanguíneos de K^+ , KCl 0,5 mmol/kg para $K^+ 2,9$ a 3,2 mmol/L e 1 mmol/kg para $K^+ \leq 2,8$ mmol/L (AMIRNOVIN et al., 2018).

Outra forma de diminuir a ocorrência de hipercalemia pós-infusão de KCl IV e aumentar a segurança do paciente seria através de um protocolo para dispensação pelo setor de farmácia do hospital. Esse procedimento permitiria a verificação da prescrição e evitaria, por exemplo, que pacientes com creatinina > 2 mg/dL e potássio no soro medindo acima de 4,5 mmol/L recebessem KCl IV (WHITE; VELTRI; FACKLER, 2005). Além desse protocolo, a vigilância constante pelo setor de farmácia para evitar estoques não autorizados de KCl e, em setores específicos, permitir o armazenamento em armário ou caixa fechados, separado de outros diluentes injetáveis (LANKSHEAR, 2005). Essas medidas poderiam evitar erros de administração do KCl IV (BAR-JOSEPH et al., 2008).

A prescrição de KCl enteral também poderia prevenir hipercalemia e eventos adversos mais graves. Nos pacientes com doenças cardiovasculares, a suplementação enteral reduziu os registros de hipercalemia e hipocalemia utilizando um protocolo de doses escalonadas, com a dose ajustada uma vez ao dia de acordo com o nível de potássio sérico matinal (RHODES et al, 2016) e demonstrou a mesma eficácia observada para o KCl IV. Então, a ideia não seria excluir a administração IV, mas sim apresentar o KCl enteral como um medicamento seguro para grupos específicos como pacientes cardíacos e em UTI (RHODES et al., 2016; REHMAN SIDDIQU et al., 2017).

A administração de KCl enteral iria reduzir a sobrecarga de fluidos quando comparado a administração IV, diminuiria a suplementação do K^+ , que é uma consequência da diurese intensa comum nesses pacientes (MOFFETT et al., 2011). Então, esse ciclo de diurese constante com perda de K^+ e suplementação de K^+ diminuiria

porque o volume de fluidos administrados é 10 vezes menor por paciente com o KCl enteral (RHODES et al., 2016). No entanto, merece cautela porque eventos adversos como vômitos e arritmias (REHMAN SIDDIQU et al., 2017) e uma suspeita de sangramento gastrointestinal quando associado à administração de vasopressina (MOFFETT et al., 2011) foram registrados em pacientes que utilizaram essa via de administração. Além disso, a suplementação enteral tem um custo financeiro significativamente menor para o hospital (RHODES et al., 2016) podendo ser até 10 vezes mais barato porque diminui a utilização de acesso central, a bomba de infusão não seria utilizada (REHMAN SIDDIQU et al., 2017), além de diminuir o risco de infecções hospitalares associadas ao cateter (MOFFETT et al., 2011).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo aponta que o uso de cloreto de potássio em pacientes pediátricos parece não ser um fator de risco para a ocorrência de hipercalemia, visto que o maior registro desse evento foi observado em crianças com doenças hereditárias e que não foram expostas ao tratamento com KCl. No entanto, por ser classificado como um medicamento potencialmente perigoso, sua administração pode ser considerada segura quando administrada seguindo protocolos de prescrição e dispensação pelo setor de farmácia, que levam em consideração os níveis séricos de K^+ , o histórico clínico do paciente e que estimulam o uso da terapia enteral.

REFERÊNCIAS

- AL-AGHA, A. Pseudohypoaldosteronism, hypothyroidism and hypoparathyroidism in a two-year-old boy. **Pakistan Paediatric Journal**, v. 35, p. 175-177, 2011.
- AMIRNOVIN, R. et al. Safety, Efficacy, and Timeliness of Intravenous Potassium Chloride Replacement Protocols in a Pediatric Cardiothoracic Intensive Care Unit. **Journal of Intensive Care Medicine**, v. 35, n. 4, p. 371-377, 2018.
- BAR-JOSEPH, G. et al. Mysterious hyperkalemia and cardiac arrest in a newborn infant undergoing continuous veno-venous hemofiltration dialysis: answer. **Pediatric Nephrology**, v. 23, n. 7, p. 1055-1057, 2008.
- BISTRITZER, T. et al. Severe pseudohypoaldosteronism in a pair of twins not associated with hydramnios. **Pediatric Nephrology**, v. 10, n. 4, p. 438-441, 1996.

- BOUADMA, L. et al. Influence of dyskalemia at admission and early dyskalemia correction on survival and cardiac events of critically ill patients. **Critical Care**, v. 23, n. 1, 2019.
- CAYIR, A. et al. Systemic Pseudohypoaldosteronism Type 1 due to 3 Novel Mutations in SCNN1A and SCNN1B Genes. **Hormone Research in Paediatrics**, v. 91, n. 3, p. 175–185, 2019.
- DALY, K.; FARRINGTON, E. Hypokalemia and Hyperkalemia in Infants and Children: Pathophysiology and Treatment. **Journal of Pediatric Health Care**, v. 27, n. 6, p. 486–496, 2013.
- DE CLERCK, M. et al. An infant presenting with failure to thrive and hyperkalaemia owing to transient pseudohypoaldosteronism: case report. **Paediatrics and International Child Health**; v. 38, n.4, p. 277–80, 2017.
- FARFEL, A. et al. Effect of age and affection status on blood pressure, serum potassium and stature in familial hyperkalaemia and hypertension. **Nephrology Dialysis Transplantation**, v. 26, n. 5, p. 1547–1553, 2010.
- FINER, G. et al. Transient neonatal hyperkalemia in the antenatal (ROMK defective) Bartter syndrome. **The Journal of Pediatrics**, v. 142, n. 3, p. 318–323, 2003.
- FLYNN, L. et al. Nurses Practice Environments, Error Interception Practices, and Inpatient Medication Errors. **Journal of Nursing Scholarship**, v. 44, n. 2, p. 180–186, 2012.
- FORMOSA, M.; WEBB, N. J.; SHENOY, M. An unusual case of hyperkalaemia in infancy: question. **Pediatric Nephrology**, v. 26, n. 7, p. 1065–1065, 2011.
- GRZYCH, G. et al. Benefit of point of care testing in patient with major hyperleukocytosis. **Clinical Biochemistry**, v. 65, p. 55–57, 2019.
- GÜRAN, T. et al. Critical Points in the Management of Pseudohypoaldosteronism Type 1 - Case Report. **Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology**, v. 3, n. 2, p. 98–100, 2011.
- HIGGINS, J. P. T.; THOMAS, J.; CHANDLER, J.; CUMPSTON, M.; LI, T.; PAGE, M. J.; WELCH, V. A. **Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions**. Cochrane, 2021. Disponível em: <<https://training.cochrane.org/handbook>>. Acesso em: 20 maio. 2021.
- ISLAM, M. R. Can potassium citrate replace sodium bicarbonate and potassium chloride of oral rehydration solution? **Archives of Disease in Childhood**, v. 60, n. 9, p. 852–855, 1985.
- KAHN, A.; BLUM, D. Hyperkalæmia and UNICEF type rehydration solutions. **The Lancet**, v. 315, n. 8177, p. 1082, 1980.

- KORKUT, S. et al. A potential serious complication in infants with congenital obstructive uropathy: Secondary pseudohypoaldosteronism. **JPMA. The Journal of the Pakistan Medical Association**, v. 69, n. 1, 2019.
- LANKSHEAR, A. J. Evaluation of the implementation of the alert issued by the UK National Patient Safety Agency on the storage and handling of potassium chloride concentrate solution. **Quality and Safety in Health Care**, v. 14, n. 3, p. 196–201, 2005.
- MATSUDA, J. et al. Cardiopulmonary arrest due to early hyperkalemia after liver injury. **The American Journal of Emergency Medicine**, v. 32, n. 11, p. 1440, 2014.
- MITANI, M. et al. A patient with pseudohypoaldosteronism type II complicated by congenital hypopituitarism carrying a *KLHL3* mutation. **Clinical Pediatric Endocrinology**, v. 25, n. 4, p. 127–134, 2016.
- MOFFETT, B. S. et al. Enteral potassium supplementation in a pediatric cardiac intensive care unit: Evaluation of a practice change. **Pediatric Critical Care Medicine**, v. 12, n. 5, p. 552–554, 2011.
- PARK, J. S. et al. Three cases of Gordon syndrome with dominant *KLHL3* mutations. **Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism**, v. 30, n. 3, 2017.
- PRAHLAD, N.; VIJAYAKUMAR, M.; NAMMALWAR, B. R.; SURESH, V. Pseudo-hypoaldosteronism Type II. **Indian pediatrics**, v. 42, n. 6, p. 602–604, 2005.
- REHMAN SIDDIQU, N. UR et al. Comparison of enteral versus intravenous potassium supplementation in hypokalaemia in paediatric patients in intensive care post cardiac surgery: open-label randomised equivalence trial (EIPS). **BMJ Open**, v. 7, n. 5, p. e011179, 2017.
- RHODES, L. A. et al. Decreasing IV Potassium in Pediatric Cardiac Intensive Care. **Pediatric Critical Care Medicine**, v. 17, n. 8, p. 772–778, 2016.
- SAUDER, S. E. Suppression of Plasma Renin Activity in a Boy With Chronic Hyperkalemia. **Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine**, v. 141, n. 8, p. 922, 1987.
- SHARMA, R. et al. Pseudohypoaldosteronism type 1: Management issues. **Indian Pediatrics**, v. 50, n. 3, p. 331–333, 2013.
- SCHWEIGER, B.; MORIARTY, M. W.; CADNAPAPHORNCHAI, M. A. Case report: severe neonatal hyperkalemia due to pseudohypoaldosteronism type 1. **Current Opinion in Pediatrics**, v. 21, n. 2, p. 269–271, 2009.
- TAMER, A. M. et al. Oral rehydration of infants in a large urban U.S. medical center. **The Journal of Pediatrics**, v. 107, n. 1, p. 14–19, 1985.

WHITE, J. R. M.; VELTRI, M. A.; FACKLER, J. C. Preventing adverse events in the pediatric intensive care unit: Prospectively targeting factors that lead to intravenous potassium chloride order errors. **Pediatric Critical Care Medicine**, v. 6, n. 1, p. 25–31, 2005.

DESENVOLVIMENTO DE LIVRO COM ATIVIDADES LÚDICAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL EM SAÚDE E MEIO AMBIENTE

DOI: 10.51859/amplla.csa511.1121-31

Amanda Almeida Valle¹
Talita Fernanda Fabrin da Graça¹
Mariana Lopes Teixeira²
Jaqueline Carneiro²

¹ Graduanda do curso de Farmácia. Centro Universitário Autônomo do Brasil – UniBrasil.

² Professor Adjunto da Escola de Saúde. Centro Universitário Autônomo do Brasil – UniBrasil.

RESUMO

A prática de atividades lúdicas é importante na infância, pois colabora com o desenvolvimento da coordenação motora e da construção de senso crítico das crianças. Conteúdos que abordam o cuidado com o meio ambiente e aspectos relacionados com a saúde individual e coletiva na educação infantil, desperta curiosidade sobre o tema, possibilita o entendimento das consequências da falta de cuidados com o meio em que se vive e da própria saúde. Livros, jogos, brincadeiras e histórias são exemplos de atividades lúdicas que, por meio da interação com novos universos e personagens, são capazes de envolver com facilidade diversos temas. Ainda, a diversificação de abordagens educativas favorece a fixação de um conteúdo, já que existem diferenças na forma como cada indivíduo aprende. Nesse contexto, o objetivo desse trabalho foi desenvolver um livro com atividades lúdicas como ferramenta educativa, incluindo os temas saúde, medicamentos, hábitos saudáveis e meio ambiente, pensado para crianças entre 4 a 12 anos. Os temas referidos e as atividades do livro foram estudados e criados de modo que as atividades que pudessem ser realizadas tanto individualmente, através da leitura de histórias e resolução de exercícios, quanto coletivamente, por meio de jogos e brincadeiras. O livro obtido como produto desta pesquisa é o centro de um projeto social, sendo que o lucro das vendas será destinado à distribuição de novos livros às comunidades carentes. Como perspectivas, espera-se avaliar o impacto do uso desta nova ferramenta na conscientização sobre saúde e meio ambiente voltado para crianças.

Palavras-chave: Atividades lúdicas. Saúde. Meio ambiente. Educação infantil.

1. INTRODUÇÃO

O cuidado com a saúde individual e coletiva, assim como a preservação do meio ambiente, são temas que vêm preocupando profissionais de diversas áreas, em especial

os profissionais da área da saúde. Os impactos da industrialização, como o aumento da poluição e contaminação do solo, surgem como consequências dos tempos modernos, com impacto não somente sobre meio ambiente, mas também na saúde dos indivíduos que vivem nesse meio. Um levantamento realizado em 2016 pelo Ministério da Saúde, apontou um aumento de 14% no número de mortes relacionadas com a poluição ao longo de 10 anos, sendo as principais causas as doenças crônicas não transmissíveis e câncer de pulmão (Araújo et al., 2016).

Outros fatores preocupantes em termos de saúde da sociedade são o aumento da prática da automedicação e a má alimentação, principalmente pelo alto consumo de alimentos processados e ultra processados, resultando em uma população idosa com diabetes, hipertensão e demais problemas cardíacos (Gadenz; Benvegnú, 2013).

A inclusão de tópicos que abordam saúde e meio ambiente na educação infantil é de extrema importância, pois é na infância que o aprendizado é facilitado e aplicado por diferentes abordagens, sendo uma delas as atividades lúdicas. Isso justifica-se pois, é na infância que a neuroplasticidade, capacidade do cérebro moldar-se de acordo com os conhecimentos adquiridos e o meio em que está inserido, é mais eficiente, o que facilita a aprendizagem nessa faixa etária (Galaburda, 2003).

A educação básica tem utilizado cada vez mais diferentes formas de aprendizagem, o que faz com que o aluno tenha maior conhecimento e fixação dos conteúdos que são propostos em sala de aula e no ambiente doméstico. A inclusão de atividades lúdicas traz ao aluno um aprendizado de forma divertida e prática, onde ele poderá aprender o conteúdo através de jogos e brincadeiras que incluam os temas a serem ensinados (Coscrato et al., 2010). Além disso, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) cita em lei que é direito do indivíduo brincar na infância, sendo, então, relevante a inclusão de brincadeiras como ferramentas didáticas.

Quando se trata de saúde individual e coletiva, os profissionais da saúde têm muito a contribuir, seja participando de aulas sobre essa temática, palestrando ou desenvolvendo ferramentas auxiliares no processo de ensino-aprendizagem. Com isso, professores, pedagogos e gestores da Educação Básica podem ser beneficiados ao desenvolver atividades interdisciplinares e lúdicas, através de colaboração com profissionais de outras áreas nesse processo (Falkenberg et al., 2014).

Mediante a importância das atividades lúdicas sobre saúde e meio ambiente na educação infantil para a melhoria da qualidade de vida da população em geral, destaca-se a necessidade de novas ferramentas educacionais no Ensino Básico. Assim, o objetivo principal desse trabalho foi o desenvolvimento de um livro abordando tais assuntos de maneira simplificada e acessível, voltado para crianças de 4 a 12 anos, para auxiliar no processo ensino-aprendizagem através de jogos e brincadeiras como ferramentas didáticas. Com isso, espera-se que alcançar a maior conscientização não só das crianças, mas também daqueles ao seu redor.

2. REVISÃO DE LITERATURA

Os problemas ambientais como a poluição do solo, da água e da atmosfera, preocupam profissionais de diversas áreas (Andrade; Felchak, 2013). Esse tema vem crescendo e tomando grande proporção em campanhas de conscientização da população. “A preocupação com o desenvolvimento sustentável representa a possibilidade de garantir mudanças sociopolíticas que não comprometam os sistemas ecológicos e sociais que sustentam as comunidades” (Jacobi, 2003).

Dentre os vários problemas ambientais, encontra-se o descarte incorreto de medicamentos e a separação inadequada, ou até inexistente do lixo, seja por uma comunidade ou uma empresa. No contexto de descarte incorreto de medicamentos, observa-se o aumento do acúmulo de medicamentos em residências e locais de saúde, que muitas vezes acabam sendo descartados de forma incorreta. Da mesma forma, o descarte inadequado de resíduos sólidos têm sido uma preocupação e um desafio para políticas públicas que tratam da gestão ambiental no Brasil. Um estudo realizado por Alencar e colaboradores (2014) demonstrou que a população, em geral, não descarta o lixo sólido corretamente, sendo possível observar a presença de substâncias químicas potencialmente tóxicas no solo e na água, o que afeta diretamente a saúde coletiva, aumentando os casos de doenças crônicas e a preocupação sobre o futuro do planeta (Alencar et al., 2014).

Ueda e colaboradores (2010) realizaram um estudo com o objetivo de entender se a população que frequentava a instituição de ensino superior tinha conhecimento sobre as formas corretas de descartar os medicamentos. A maioria dos entrevistados

não tinha conhecimento sobre o assunto ou, ao menos, consciência de quão prejudicial poderia ser essa prática no dia a dia. Já Quadra e colaboradores (2019) reportaram que, dentre 100 indivíduos que participaram de uma pesquisa sobre medicamentos, 66 afirmaram que descartam os medicamentos em desuso ou com validade expirada no lixo comum, sendo que a maioria disse que nunca recebeu nenhuma informação sobre a devida forma de descarte. Percebe-se, então, que o maior problema relacionado ao descarte indevido dessas substâncias no meio ambiente pode ser a falta de informação da população sobre o tema.

Um impacto direto do descarte incorreto de medicamentos é a constatação de que os ecossistemas globais estão contaminados com as mais diversas substâncias químicas. Por serem substâncias de lenta e difícil decomposição, encontram-se no solo e na água e, assim, prejudicam nossa saúde e a natureza em geral, retornando ao nosso organismo ao contaminar a terra e os alimentos. Além disso, frequentemente, alguns tipos de hormônios são encontrados em quantidades significativas nos rios, como os estrógenos provenientes de anticoncepcionais, trazendo riscos e malefícios à vida marinha ao entrarem contato com os peixes, especialmente os do sexo masculino (Ueda et al., 2010).

O acelerado crescimento das indústrias farmacêuticas, com o aumento da produção de novos fármacos e substâncias para tratamento de seres humanos e animais, aliado à falta de fiscalização de órgãos de autoridade, pode justificar a incidência do descarte incorreto dos medicamentos no meio ambiente e a automedicação.

Nesse contexto, o cuidado com a saúde individual e coletiva é outro tema de grande relevância. O conhecimento sobre automedicação, alimentação correta e prática de atividades físicas regulares, são exemplos de temas que podem ser abordados desde a infância para que a sociedade em geral se torne mais saudável. A alimentação saudável tem grande impacto na prevenção de doenças crônicas como as alterações cardiovasculares, que é a principal causa de morte na população idosa (Gadenz; Benvegnú, 2013). Com o aumento da produção industrial e a intensificação da carga de trabalho da população, a piora na dieta dos brasileiros tem sido observada. Uma revisão de literatura reportou que, entre os anos de 1973 à 2006, houve uma grande expansão no setor industrial, gerando mais empregos e consequentemente maior produção,

refletindo em maior quantidade de produtos industrializados nas residências das famílias brasileiras, trazendo malefícios à saúde e aumentando a prevalência de doenças crônicas não transmissíveis (Sousa 2011). Dentre os alimentos industrializados mais consumidos estão os pães e os doces, sendo que esse, em geral, tem pouco valor nutricional e podem levar à obesidade (Bielemann et al., 2015).

A obesidade infantil, mais expressiva nos Estados Unidos da América (EUA), é um agravante para o desenvolvimento de doenças cardíacas, maior incidência de derrames e de outras doenças como o câncer, hipertensão e a diabetes do tipo 2. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição (NHANES) de 2003 a 2006, indicaram que o risco de ter pressão arterial elevada aumenta significativamente em pessoas obesas e principalmente na idade entre 8 e 17 anos (Centers for Disease Control and Prevention, 2011).

Algumas organizações internacionais, como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para Infância (UNICEF), destacam o quão prejudicial é uma alimentação inadequada durante a infância no que diz respeito a morbimortalidade dos indivíduos e, por esta razão, enfatizam a importância de programas para a promoção da saúde das crianças desde o período de lactação (Einloft et al., 2018). Os dados relacionados à obesidade infantil, registrados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) apontam dados alarmantes sobre o aumento de peso em crianças entre cinco a dez anos (Tabela 1) e em adolescentes (Tabela 2) (IBGE, 2019).

Tabela 1 - Percentual de crianças com idade entre 5 e 10 anos com sobrepeso no Brasil

Sobrepeso	16,33%
Obesidade	9,38%
Obesidade grave	5,22%

Fonte: IBGE (2019)

Tabela 2 – Percentual de adolescentes com sobrepeso no Brasil

Sobrepeso	18%
Obesidade	9,53%
Obesidade grave	3,98%

Fonte: IBGE (2019)

Os medicamentos têm papel importante na recuperação e manutenção da saúde quando utilizados de maneira consciente e segura. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a automedicação consiste na seleção e utilização de medicamentos isentos de prescrição (sem tarja) para tratar doenças autolimitadas ou seus sintomas, tornando-se parte do autocuidado do ser humano. Porém, na prática, observa-se que as pessoas fazem automedicação inclusive com medicamentos tarjados, sendo alguns dos motivos, utilização de prescrições e sobras de tratamentos anteriores (Beckhauser et al., 2010). Observa-se que pelo menos 35% dos medicamentos adquiridos no Brasil são utilizados para automedicação. Isso acontece porque, muitas vezes, o cidadão brasileiro não encontra serviços de saúde acessíveis e disponíveis na rede pública de saúde, precisando, com frequência, ficar dias ou meses esperando uma consulta médica para obter uma prescrição (De Aquino, 2008).

Na infância, a prática da automedicação é realizada pelo responsável da criança. Porém, deve-se tomar um cuidado redobrado nesta idade pois, por motivos éticos, legais e econômicos, as crianças não são incluídas em muitos ensaios clínicos dos medicamentos. Em um estudo de caráter observacional, com delineamento transversal, realizado em Santa Catarina e fundamentada em entrevistas com cuidadores (pais ou outros responsáveis) de crianças de 21 dias a 5 anos de idade, observou-se que, das 350 crianças incluídas na pesquisa, 199 (ou 56,9%) fizeram o uso de pelo menos um fármaco nos 15 dias que antecederam a entrevista, ou seja, os responsáveis automedicaram mais da metade das crianças analisadas (Maniero et al., 2018).

O termo educação relaciona-se com o ato de aprender coisas novas, sendo fundamental para a sobrevivência do ser humano e para convívio com outros indivíduos (Dallabona; Mendes, 2004). É na infância que se constrói a base de conhecimentos que auxiliam no desenvolvimento futuro. Drielle e Sousa (2016) destacam que, através de brincadeiras, a criança aprende, se socializa, assimila regras, integra-se ao grupo, aprende a dividir, a competir, a cumprir regras (Drielle; Sousa, 2016).

Segundo a UNESCO (2005, p. 44), “Educação ambiental é uma disciplina bem estabelecida que enfatiza a relação dos homens com o ambiente natural, as formas de conservá-lo, preservá-lo e de administrar seus recursos adequadamente”. A inclusão do

tema na educação escolar promove a discussão de valores e responsabilidades entre os seres vivos e a vida do planeta (Medeiros et al., 2011).

Na neuropsicologia, ciência que estuda o sistema nervoso e suas funções, é visto que a inteligência (faculdade de conhecer e aprender) está relacionada tanto com a herança biológica do indivíduo (genótipo) quanto com os fatores ambientais externos a ele. Enquanto o cérebro está em desenvolvimento, ele é denominado plástico (possui neuroplasticidade), ou seja, ele é capaz de reorganizar as conexões sinápticas e isso é importante para que o indivíduo adquira novas capacidades intelectuais de aprendizagem. Tal dissemelhança, decorre da facilidade das células neuronais em período de desenvolvimento se reorganizarem, formando novas conexões, o que permite que o indivíduo desenvolva habilidades de maneira mais rápida (Silva; Kleinhans, 2006). Com o avanço da idade, a capacidade de aprendizagem diminui, pois a neuroplasticidade do cérebro também diminui (Pinheiro, 2007). Nesse sentido, abordar temas como saúde e meio ambiente na infância torna-se ainda mais relevante (Vinicius et al., 2016).

Brincar e praticar atividades lúdicas no ensino pode auxiliar no desenvolvimento da criança, desde os primeiros anos de vida, atuando na coordenação motora e desenvolvendo senso crítico. Livros, jogos, brincadeiras e histórias são exemplos de atividades lúdicas que, por meio de interação com personagens e com os colegas, abrange diversos temas, buscando soluções alternativas para resolução de problemas (Gumieri; Treviso, 2016). Nesse contexto, os jogos fazem parte de um aprendizado experiencial, simulando uma situação real e auxiliando na fixação do conteúdo exposto. As atividades praticadas coletivamente, muitas vezes, têm como objetivo estimular a competição positiva entre os participantes, criando motivação e proporcionando prazer ao aluno (Wangenheim, 2012).

Vygotsky relatou um conceito importante sobre o uso dos jogos na educação, sendo ele a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZPD). A ZPD é considerada a distância entre as zonas de conhecimento de desenvolvimento do indivíduo durante a aprendizagem, sendo elas de desenvolvimento potencial e desenvolvimento real (COLE et al., 1998). O desenvolvimento real traz como base a forma como o indivíduo consegue aprender individualmente sobre determinado assunto, e o desenvolvimento potencial mostra como o aluno consegue aprender com um auxílio de outro indivíduo melhor

desenvolvido sobre o assunto proposto. Portanto, os jogos estimulam o cérebro e desenvolvem essas zonas, contribuindo para o aprendizado do tema proposto no jogo educacional (Ramos et al., 2016).

Dessa forma, percebe-se que é importante o uso de atividades lúdicas como complemento na educação básica. Quando relacionado à educação em saúde, os profissionais de saúde podem e devem auxiliar nesse processo. Inclusive, a Comissão Assessora de Saúde Pública que compõe o Conselho Regional de Farmácia (CRF) do estado de São Paulo (2019), elaborou uma cartilha em que descreve as principais funções do farmacêutico em contribuição às diversas áreas assistenciais, sendo uma delas a atenção farmacêutica. Nesta área, é de suma importância acompanhar e avaliar qualidade dos produtos e serviços prestados por eles ou por outrem, e observou-se que a educação continuada da população pode ser um meio para alcançar uma melhoria na qualidade de vida da população (CRF PR, 2019). Por fim, destaca-se a importância de avaliar o resultado das atividades propostas, com base no feedback dos alunos e educadores (Gumieri; Treviso, 2016).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Para o desenvolvimento do livro, a equipe composta por 1 professor farmacêutico e 4 alunos de graduação do curso de Farmácia, reuniu-se semanalmente, de forma remota, durante 8 meses. Os assuntos gerais a serem abordados, assim como cada atividade específica, foram discutidos e desenvolvidos em conjunto e sempre com o apoio da literatura científica. Quando necessário, profissionais da área da educação, como professores do ensino infantil e pedagogos, foram consultados.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O processo de construção teve início com a seleção de temas de relevância para a comunidade sobre saúde e meio ambiente, menos comuns no ambiente escolar nos primeiros anos da criança. O consumo e o descarte inadequado de medicamentos e alimentos processados foram os temas selecionados como tópicos centrais do livro.

Para que fosse possível atingir crianças de diferentes idades, o livro foi separado em 3 capítulos, com atividades de níveis de dificuldades distintas. Em cada capítulo, foi

criada uma atividade para que a criança aprenda de forma mais dinâmica, que foi denominado de “faça você mesmo”, como, por exemplo, criar seu próprio jogo, contribuindo também para o aprimoramento de sua coordenação motora recortando e colando (sendo recomendada sempre a presença de um adulto).

No primeiro capítulo, sobre reciclagem e descarte correto de medicamentos, teve-se como objetivo alcançar crianças de 4 a 6 anos de idade, sendo esse o capítulo com nível de menor dificuldade para crianças regulares dessa faixa etária. Nesse sentido, criou-se uma história com o título “O engano de Zik” que descreve de forma fantasiosa a vida de um menino fazendeiro que descartou o lixo no lugar indevido e acabou prejudicando a vida de seus amigos animais, visando a reflexão de como o descarte do lixo interfere no meio ambiente e das consequências que pode trazer a vida deles e da comunidade. Criou-se também uma atividade de labirinto, com o objetivo de conduzir com o lápis um material orgânico (casca de banana) até seu respectivo lugar de descarte (lixo marrom). Com a mesma finalidade de ensinar o descarte correto de cada tipo de material, foi criada uma atividade de ligar os pontos. No “faça você mesmo” deste capítulo, elaborou-se um jogo da memória para fixar ainda mais o conhecimento adquirido, que pode ser iniciado de maneira individual, com duas ou mais pessoas.

Durante o desenvolvimento do segundo capítulo, abordou-se o tema hábitos saudáveis, que devem, principalmente, ser estimulados desde a infância pois, grande parte dos óbitos relacionados às doenças crônicas poderiam ser evitados se fosse praticado o cuidado com a alimentação, com a preferência do consumo de alimentos saudáveis e com maior concentração de vitaminas, ingestão correta de água diariamente, exercícios físicos e outros hábitos que visam a melhoria da saúde física e mental (Bernal et al., 2017). Esses assuntos foram apresentados de diversas formas no capítulo dois, iniciando com uma história chamada “O dia em que a água acabou”, a qual estimula o cuidado e o não desperdício de água. Ainda, foi desenvolvido um tabuleiro com cartas de sorte ou azar dentro do tema proposto e, também, outras atividades como caça palavras e cruzadinhas.

No terceiro capítulo, os temas dos capítulos anteriores (saúde e meio ambiente) foram reforçados, com um enfoque ainda maior em uso, cuidado e descarte correto de medicamentos. Nele, está descrita a história de Amélia, uma adolescente que fez uso irracional de um medicamento para emagrecer e teve como consequência desse ato um

prejuízo a sua saúde. Nesta história inseriu-se uma situação de atenção farmacêutica para que a população se torne mais consciente sobre o papel do farmacêutico nas terapias medicamentosas. Foram criadas cruzadinhas e mais cartas para complementar o tabuleiro do capítulo dois, onde a criança pode responder perguntas sobre os temas em questão e, também, interagir umas com as outras de diferentes maneiras como por exemplo, através da mímica. O “faça você mesmo”, estimula a criança a fazer sua própria caixa coletora de medicamentos, estabelecendo a ela que a mesma deve ser levada até uma farmácia quando estiver cheia para o descarte correto.

Como os capítulos foram criados para atingir diferentes idades, teve-se o cuidado com a linguagem escrita em cada um deles, respeitando o desenvolvimento da criança. Por exemplo, no primeiro capítulo os personagens são infantis e ao longo do livro eles vão crescendo, até se tornarem adolescentes no terceiro capítulo.

Por fim, as perspectivas do presente trabalho incluem a atualização e criação de novas atividades em um site criado para o projeto, assim como a avaliação do impacto do uso dessa nova ferramenta na conscientização sobre saúde e meio ambiente. Destaca-se que o livro desenvolvido está vinculado a um projeto social, no qual o lucro da venda dos exemplares será utilizado para distribuir livros em escolas de comunidades carentes.

5. CONCLUSÃO

O desenvolvimento industrial contribuiu para a piora na qualidade de vida das pessoas, seja estimulando a má alimentação, o uso irracional de medicamentos, o acúmulo e descarte inadequado do lixo, e pelo aumento da poluição em geral. Um dos fatores que podem ajudar a atenuar esses problemas é levar conhecimento às crianças por meio de uma ferramenta prática, como um livro educacional.

De maneira geral, o aprendizado é facilitado nos primeiros anos de vida e as atividades lúdicas são ferramentas de suma importância para facilitar o aprendizado. Assim, um livro com os temas saúde e meio ambiente foi desenvolvido nesse trabalho como uma estratégia de conscientização da população e estímulo de hábitos saudáveis ainda na infância. Tal ferramenta de ensino-aprendizagem poderia ser utilizado em ambiente domiciliar ou escolar, com o suporte de profissionais da educação.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a colaboração dos graduandos Gabriel Jeisson Pimentel e Milena Martendal no desenvolvimento do livro.

REFERÊNCIAS

- ALENCAR, T. DE O. S.; MACHADO, C. S. R.; COSTA, S. C. C.; ALENCAR, B. R. Descarte de medicamentos: Uma análise da prática no Programa Saúde da Família. *Ciencia e Saude Coletiva*, v. 19, n. 7, p. 2157–2166, 2014.
- ANDRADE, A. R. DE; FELCHAK, I. M. a Poluição Urbana E O Impacto Na Qualidade Da Água Do Rio Das Antas - Irati/Pr. *Geoambiente On-line*, v. 0, n. 12, p. 108–132, 2013.
- DE AQUINO, D. S. Por que o uso racional de medicamentos deve ser uma prioridade? *Ciencia e Saude Coletiva*, v. 13, n. SUPPL. 0, p. 733–736, 2008.
- ARAÚJO, R. DA S.; ARCURI, E. A. M.; LOPES, V. C. Home Delivery Medicament Program: access, inactivity and cardiovascular risk. *Revista latino-americana de enfermagem*, v. 24, p. e2810, 2016.
- BECKHAUSER, G. C.; DE SOUZA, J. M.; VALGAS, C.; PIOVEZAN, A. P.; GALATO, D. Utilização de medicamentos na pediatria: A prática de automedicação em crianças por seus responsáveis. *Revista Paulista de Pediatria*, v. 28, n. 3, p. 262–268, 2010.
- BERNAL, R. T. I.; ISER, B. P. M.; MALTA, D. C.; CLARO, R. M. Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel): mudança na metodologia de ponderação. *Epidemiologia e servicos de saude: revista do Sistema Unico de Saude do Brasil*, v. 26, n. 4, p. 701–712, 2017.
- BIELEMANN, R. M.; SANTOS MOTTA, J. V.; MINTEN, G. C.; HORTA, B. L.; GIGANTE, D. P. Consumption of ultra-processed foods and their impact on the diet of young adults. *Revista de Saude Publica*, v. 49, 2015.
- CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. School health guidelines to promote healthy eating and physical activity. v. 60, n. 5, 2011.
- COLE, M.; SCRIBNER, S.; VYGOTSKY, L. A formação social da mente, 1998.
- COSCRATO, G.; PINA, J. C.; DE MELLO, D. F. Use of recreational activities in health education: Integrative review of literature. *ACTA Paulista de Enfermagem*, v. 23, n. 2, p. 257–263, 2010.
- DALLABONA, S. R.; MENDES, S. M. O-Ldico-Na-Educao-Infantil. *Icpq*, v. 1, p. 13, 2004.

- DRIELLE, P.; SOUSA, B. a Contribuição Dos Jogos E Brincadeiras No Processo De Ensino-Aprendizagem De Crianças De Um Cmei Na Cidade De Teresina. *Revista Fundamentos*, v. 2, n. 2, 2016.
- EINLOFT, A. B. D. N.; COTTA, R. M. M.; ARAÚJO, R. M. A. Promoção da alimentação saudável na infância: Fragilidades no contexto da atenção básica. *Ciencia e Saude Coletiva*, v. 23, n. 1, p. 61–72, 2018.
- FALKENBERG, M. B.; MENDES, T. DE P. L.; DE MORAES, E. P.; DE SOUZA, E. M. Educação em saúde e educação na saúde: Conceitos e implicações para a saúde coletiva. *Ciencia e Saude Coletiva*, v. 19, n. 3, p. 847–852, 2014.
- GADENZ, S. D.; BENVEGNÚ, L. A. Saúde Coletiva Hábitos alimentares na prevenção de doenças cardiovasculares e fatores associados em idosos hipertensos. *Ciência e Saúde Coletiva*, v. 18, n. 12, p. 3523–3533, 2013. Disponível em: <<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63028840009>>.
- GALABURDA, A. M. Neuroscience, education, and learning disabilities. *Human Neuroplasticity and Education*, v. XIV, p. 151–166, 2003.
- GUMIERI, F. A.; TREVISO, V. C. A importância do lúdico para o desenvolvimento da criança: o brincar como ferramenta de aprendizagem na Educação Infantil. *Cadernos de Educação: Ensino e Sociedade*, Bebedouro-SP, v. 3, n. 1, p. 66–80, 2016.
- JACOBI, P. Educação ambiental, cidadania e sustentabilidade. *Cadernos de Pesquisa*, n. 118, p. 189–206, 2003.
- MANIERO, H. K.; MARTINS, A. A.; MELO, A. C.; et al. Use of drugs in children aged zero to five years old in Tubarão, Santa Catarina, Brazil. *Revista Paulista de Pediatria*, v. 36, n. 4, p. 437–444, 2018.
- MEDEIROS, A. B.; MENDONÇA, M. J. DA S. L.; SOUSA, G. L.; OLIVEIRA, I. P. A Importância da educação ambiental na escola nas séries iniciais. *Revista Faculdade Montes Belos*, v. 4, n. 1, p. 1–17, 2011.
- PINHEIRO, M. Fundamentos de Neuropsicologia - O Desenvolvimento Cerebral da Criança. *Vita et Sanitas*, v. 1, n. 1, p. 34–48, 2007. Disponível em: <<http://ecaths1.s3.amazonaws.com/neurociencialinguistica/1147103176.desenvolvimento-do-sistema-nervoso.pdf>>.
- QUADRA, G. R.; SILVA, P. S. A.; PARANAÍBA, J. R.; et al. Investigation of medicines consumption and disposal in Brazil: A study case in a developing country. *Science of the Total Environment*, v. 671, p. 505–509, 2019. Elsevier B.V. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.03.334>>. .
- RAMOS, D. K.; LORENSET, C. C.; PETRI, G. Jogos Educacionais: Contribuições Da Neurociência À Aprendizagem. *Revista X*, v. 2, n. 1.2016, p. 1–17, 2016.

SILVA, M. DE F. M. C.; KLEINHANS, A. C. DOS S. Processos cognitivos e plasticidade cerebral na Síndrome de Down. Revista Brasileira de Educação Especial, v. 12, n. 1, p. 123–138, 2006.

SOUSA, M. C. C. DE. Crescimento Da Indústria Alimentícia E a Prevalência Da Hipertensão Arterial No Brasil. , p. 01–32, 2011.

UEDA, J.; TAVERNARO, R.; MAROSTEGA, V. Impacto ambiental do descarte de fármacos e estudo da conscientização da população a respeito do problema. Ciências do Ambiente On, v. 5, p. 1–6, 2010. Disponível em: <<http://www2.ib.unicamp.br/revista/be310/index.php/be310/article/view/176/129>>.

VINICIUS, S.; II, S.; OLIVEIRA, I. DE. Crianças na educação infantil: a escola como lugar de, p. 131–150, 2016.

WANGENHEIM, C. G. VON; WANGENHEIM, A. VON. Ensinando Computação com Jogos, , n. February 2013, p. 33, 2012.

O USO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS LEVE-DURA NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CRIANÇA

DOI: 10.51859/amplla.csa511.1121-32

Matheus Gomes Andrade ¹

Lurdiane Gabriel Pereira ²

Maria Larysse Muniz Pereira ³

Sinara Pereira do Amaral ⁴

Maria Thalia de Oliveira Nascimento ⁵

Dilene Fontinele Catunda Melo ⁶

¹ Graduando em Enfermagem pela Faculdade Princesa do Oeste.

² Graduando em Enfermagem pela Faculdade Princesa do Oeste.

³ Graduando em Enfermagem pela Faculdade Princesa do Oeste.

⁴ Graduando em Enfermagem pela Faculdade Princesa do Oeste.

⁵ Graduando em Enfermagem pela Faculdade Princesa do Oeste.

⁶ Mestre em Saúde Pública pela UNISAL e Coordenadora de Pesquisa e Extensão do Curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Princesa do Oeste (FPO).

RESUMO

As viroses merecem uma atenção diferenciada, não só pelo seu maior número e diversidade, mas também pela propriedade mutações de vírus. O objetivo principal desse estudo é relatar uma experiência de acadêmicos no curso de bacharelado em enfermagem em uma abordagem metodológica com atividades lúdicas com o público infantil, realizando ações específicas sobre viroses e sua prevenção. A apresentação se deu através das tecnologias digitais e manuais. Foram confeccionadas placas com imagens reais de vírus e bactérias utilizando material escolar e, posteriormente, foi reproduzido um vídeo animado. Para o processo ensino-aprendizagem dos alunos, a parceria da escola e do grupo de extensão indígena é essencial. Nessa perspectiva, a extensão se torna uma experiência necessária na integralização do trabalho dos acadêmicos com a equipe pedagógica, no qual, dispõe de didáticas infantis que promovem o aperfeiçoamento do conhecimento das crianças.

Palavras-chave: Abordagens. Criança. Escola. Virozes.

1. INTRODUÇÃO

A urbanização, o crescimento demográfico, as alterações de fronteiras e formação de blocos geopolíticos são exemplos de impacto não somente sobre o ecossistema, mas também sobre os padrões de ocorrência e distribuição das doenças (SILVA, 2008).

Com isso, a situação epidemiológica das doenças transmissíveis tem apresentado mudanças significativas, observadas através dos padrões de morbimortalidade em todo o mundo. Este grupo de doenças continua a oferecer desafios aos programas de prevenção, com a introdução de novas doenças, a exemplo de agentes que sofrem modificações genéticas e se disseminam rapidamente através das populações de países e continentes (BRASIL, 2010).

Por consequência, o processo de desenvolvimento econômico, crescimento populacional e urbanização verificado no Brasil a partir da segunda metade do século XX colocou as arboviroses entre as viroses de grande impacto, real ou potencial, na saúde pública (SILVA, 2008).

No entanto, reduções significativas têm sido observadas na ocorrência de várias doenças transmissíveis, para as quais se dispõe de instrumentos eficazes de prevenção e controle. Porém, ainda há doenças transmissíveis com quadro de persistência, como por exemplo, as hepatites virais (BRASIL, 2010).

Apesar da redução na mortalidade pelas doenças infecciosas e da diminuição significativa na morbidade por um conjunto importante dessas doenças, ao mesmo tempo, em outra direção, configura-se, no Brasil, um quadro que, além de expor as frágeis estruturas ambientais urbanas do país, que tornam as populações vulneráveis a doenças que pareciam superadas, amplia a já alta carga de doenças da população (BRASIL, 2016).

Os vírus constituem a menor entidade biológica capaz de se replicar, ainda que necessitem sempre de uma célula, animal ou vegetal, para essa replicação. São partículas constituídas de proteínas e ácido nucléico. Reproduzem-se pela invasão e posse do controle da maquinaria de auto reprodução celular (SILVA, 2008).

As viroses respiratórias constituem um importante causa de morbidade e mortalidade infantis. O rotavírus como causa importante de diarreia em crianças e mesmo em adultos, os vírus passaram a ser reconhecidos como relevantes tanto do ponto de vista clínico como de saúde pública (BRASIL, 2016).

De acordo com Brasil (2016), até o final dos anos 70, as viroses era uma das principais causas de óbito dentre as doenças infectocontagiosas, sobretudo em menores de 5 anos, em decorrência de complicações, especialmente a pneumonia.

Diante o conceito de educação em saúde, que vai além da transmissão de informações, é o processo educativo que envolve as relações entre os profissionais de saúde, os gestores que apoiam esses profissionais e a população que necessita construir seus conhecimentos e aumentar sua autonomia nos cuidados individual e coletivamente (MARTINS, 2019).

A prática da educação em saúde no ambiente escolar requer do profissional de saúde, principalmente o profissional de enfermagem, por sua proximidade com a população e também por esta prática, uma contribuição para que as crianças adquiram conhecimentos claros para o seu pleno desenvolvimento e crescimento e melhorem a sua qualidade de vida ao decorrer do seu crescimento (SILVA, 2017).

As ações de enfermagem devem ser também direcionadas pelos princípios da humanização do cuidado, beneficiando-se das tecnologias e dispositivos que configuram e fortalecem esse cuidado. O que permite segundo Coelho e Jorge (2009)

“Todos os sujeitos ampliarem suas ações para além de um trabalho técnico e hierarquizado, um trabalho com interação social, com maior “horizontalidade e flexibilidade” dos diferentes saberes, com maior possibilidade de criatividade dos agentes e maior integração da equipe”. (COELHO E JORGE, 2009, p. 1524)

Para Merhy (2005), conforme citado por Coelho e Jorge (2009)

“As tecnologias podem ser classificadas como leve, leve-dura e dura. Todas tratam a tecnologia de forma abrangente, mediante análise de todo o processo produtivo, até o produto final. As tecnologias leves são as das relações; as leve-duras são as dos saberes estruturados, tais como as teorias, e as duras são as dos recursos materiais”. (COELHO E JORGE, 2009, p. 1524)

Desse modo, a educação em saúde pueril deve ser considerada um campo de grande relevância na prática assistencial da Enfermagem, o qual beneficia a articulação de ações preventivas e promotoras de transformação, oferecendo a possibilidade de agrupamento entre a pesquisa, ensino e extensão oportunizando a troca de saberes entre graduandos e a comunidade.

Nesse contexto, o objetivo principal desse estudo é relatar uma experiência de acadêmicos bacharelando no curso de enfermagem em uma abordagem metodológica com atividades lúdicas com o público infantil, realizando ações específicas sobre viroses e sua prevenção, abrangendo com a necessidade do público infantil serem vulneráveis

a essa exposição, uma vez que os mesmo por serem criança não tem o domínio e conhecimento do quão grave é a contaminação.

2. METODOLOGIAS

Trata-se de um estudo descritivo, tipo relato de experiência, realizado por acadêmicos do curso de bacharelado em enfermagem da Faculdade Princesa do Oeste, no grupo de extensão *“PRÁTICAS DE ENFERMAGEM NA PROMOÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA INDÍGENA”*.

O grupo formado por sete acadêmicos que foram aprovados na seleção, acompanhados pela a coordenadora de extensão da Faculdade Princesa do Oeste, do município de Crateús-Ceará. As pesquisas descritivas, por sua vez, têm por objetivo descrever criteriosamente os fatos e fenômenos de determinada realidade, de forma a obter informações a respeito daquilo que já se definiu como problema a ser investigado (AUGUSTO, 2013). O grupo realizava encontro semanais todas as sextas-feiras levando as crianças da escola Cariri Tabajaras, métodos lúdicos com intuito de realizar ações sobre temáticas necessárias para o aprendizado pessoal dos alunos. Logo, foi realizado projetos sobre o abuso sexual infantil; festejado o dia das crianças; celebração do natal.

Desta forma, foi realizado uma ação sobre “Combate de viroses” com alunos no ensino fundamental I, com turma do 1º ao 5º ano, na qual os alunos tinham idades entre 6 a 10 anos da escola Cariri tabajaras no mês de dezembro do ano de 2019. Para cada ação realizada, era construído um planejamento para organizar quais os materiais iriam ser utilizados na abordagem da metodologia.

Nesse sentido, para a ação sobre “Combate as viroses”, foram enfatizadas e utilizadas metodologias ativas e da tecnologia leve-dura, a citar a confecção de uma luva com material escolar, e utilização de glitter para representar os microrganismos que não são visualizados a olho nu, além do uso de softwares digitais, bem como áudio e vídeo, sendo reproduzido um vídeo de uma história de animação computadorizada demonstrando a importância das lavagens das mãos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A extensão universitária é uma ação da universidade relacionada à formação profissional e a promoção da saúde à comunidade, ou seja, transformar espectadores em atores que compreendam e construam espaços de transferência de conhecimento para a população alvo, com isso permitir a desconstrução de concepções e tabus e a reconstrução social de novos valores.

A Faculdade Princesa do Oeste no ano de 2019 deu início a seleção para os alunos de graduação do curso bacharelado em enfermagem participar do grupo de extensão Saúde da criança indígena.

O grupo formado por sete acadêmicos que foram aprovados na seleção, acompanhados pela a coordenadora de extensão da Faculdade Princesa do Oeste, da cidade de Crateús-Ceará, onde são realizados encontros semanais para o planejamento de ações que serão realizadas.

No mês de dezembro de 2019, o grupo se reuniu e executou um momento lúdico e didático com as crianças sobre o tema “Combate de viroses”. Deu-se início com a apresentação dos acadêmicos e indagação se os alunos tinham conhecimento sobre os vírus e bactérias. A princípio, os alunos da escola cariri tabajaras, responderam o que eram microrganismo e que não dava para visualizar, a não ser que fosse pelo o microscópio e que esses microrganismos causavam doenças, doenças essas que era necessário um tratamento hospitalar, a citar: medicações intravenosas ou como as crianças referenciaram “injeção”.

Em consoante, após eles responderem, os acadêmicos do grupo de extensão utilizaram tecnologias leve-dura para demonstrar como esses organismos são, quais suas formas de transmissão e como se prevenir. A apresentação se deu através das tecnologias digitais e manuais. Com material escolar, foi confeccionado placas com as imagens reais dos vírus e bactérias, e em seguida uma apresentação de uma animação de vídeo através de um software. O áudio-vídeo fez a exposição da importância das lavagens das mãos e quais problemas de saúde poderiam se manifestar quando não há uma higiene pessoal.

Trabalhar doenças causadas por virose, transmitidos por mosca-doméstica e influenza é essencial para evitar a disseminação de doenças. Dessa forma, foram

ressaltados a importância das lavagens das mãos, para não passar a mão na mucosa do olho ou da boca, uma vez que é nessas mucosas que os vírus e bactérias se fixam nos vasos sanguíneos e assim replicam-se e desenvolve a doença.

A abordagem com tecnologias leve-dura foi essencial para este resultado, visto que o processo de educação com criança sobre temas pertinentes à realidade é complicada em relação ao entendimento deles, uma vez que com o passar do tempo em relação a idade, vão esquecendo os detalhes do que foi ensinado em certo dia.

Logo, o grupo fez uma distribuição de uma atividade para exercitarem o conhecimento ensinado pelo o grupo, essa atividade possui figuras para que os alunos pudessem identificar o que é uma bactéria, um vírus e quais os hábitos de higiene devem ser realizados para prevenir a contaminação viral.

Fernandes, Rocha, Souza (2015) enfatizam que a escola é um ambiente propício para a aplicação de programas de educação em saúde, pois a mesma está inserida em todas as dimensões do aprendizado.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nessa perspectiva, a parceria da escola, comunidade e do grupo de extensão indígena, torna-se essencial no ensino-aprendizado dos alunos para que os mesmos possam multiplicar a informação com os pais, e assim torna-se um hábito de higiene rotineiro na realidade de cada um, possibilitando a quebra da cadeia de multiplicação e transmissão de diversas doenças.

Assim, é possível ressaltar a validade da iniciativa dos acadêmicos do curso de bacharelado em enfermagem em trabalhar com a promoção da saúde nesse espaço, na qual puderam atuar como protagonistas em resolução da questão levantada em meio prático, como também ofereceu as orientações benéficas para educação infantil. E por meio dessas orientações, foram sanadas as dúvidas contempladas pelo público específico oportunizando prevenções que são de extremas importância para o atual cenário de pandêmico de covid-19.

Dessa forma, concluiu-se que a extensão se torna uma experiência necessária em uma maior integração do trabalho dos acadêmicos com a equipe pedagógica na qual

dispõe sobre didáticas infantis promovendo conhecimento á o público pueril e promove a parceria da equipe de saúde com a equipe da educação.

REFERÊNCIAS

- AUGUSTO, C. A.; et al. **Pesquisa Qualitativa: rigor metodológico no tratamento da teoria dos custos de transação em artigos apresentados nos congressos da Sober (2007-2011)**. RESR, Piracicaba-SP; Vol. 51, Nº 4, p. 745-764. 2013
- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. **Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso**. 8. ed. rev. – Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 444 p.: Il. – (Série B. Textos Básicos de Saúde). Disponível: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_infecciosas_parasitaria_guia_bolso.df>.
- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços. **Guia de Vigilância em Saúde: [recurso eletrônico]** 1. ed. atual. – Brasília: Ministério da Saúde, 2016. 773 p. Disponível em: <<https://www.cevs.rs.gov.br/upload/arquivos/201701/23105437-gvs.pdf>>.
- COELHO, M. O. JORGE, M. S. B. **Tecnologia das relações como dispositivo do atendimento humanizado na atenção básica à saúde na perspectiva do acesso, do acolhimento e do vínculo**. Rev. Ciência & Saúde Coletiva, vol. 14 supl.1 p. 1523-1531, 200. Rio de Janeiro Sept./Oct. 2009.
- FERNANDES, M.H.; ROCHA, V.M.; SOUZA, D.B. **A concepção sobre saúde do escolar entre professores do ensino fundamental (1ª a 4ª séries)**. 2005. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-59702005000200004&script=sci_arttext>.
- Merhy EE. **Saúde: a cartografia do trabalho vivo**. 2ª ed. São Paulo: Hucitec; 2005.
- MARTINS, Isabel. **Educação em Ciências e Educação em Saúde: breves apontamentos sobre histórias, práticas e possibilidades de articulação**. Ciência & Educação (Bauru), v. 25, n. 2, p. 269-275, 2019. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1516-731320190020001>>.
- SILVA, LJ., and ANGERAMI, RN. **Víroses emergentes no Brasil [online]**. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2008, 132 p. Temas em Saúde collection. ISBN 978-85-7541-381-4. Disponível em: <<https://doi.org/10.7476/9788575413814>>.
- SILVA, Clarissa Bohrer da et al. **Atividades de educação em saúde junto ao ensino infantil: relato de experiência**. Revista de Enfermagem UFPE On Line. Recife. Vol. 11, supl. 12 (dez. 2017), p. 5455-5463, 2017.

OCORRÊNCIA DE BACTÉRIAS RESISTENTES À ANTIBIÓTICOS: UMA ANÁLISE EM SEUS MECANISMOS

DOI: 10.51859/amplla.csa511.1121-33

Rubens Barbosa Rezende ¹

¹ Graduando do curso de Biomedicina. Departamento de Biomedicina. Faculdade Santa Rita – FASAR. Conselheiro Lafaiete – MG, Brasil.

RESUMO

Muitas doenças que acometem as pessoas e que impactam na saúde pública tem origem bacteriana e a propagação de bactérias possuindo resistência aos antibióticos é grave e gera preocupação. Dessa forma, objetivou-se descrever o que são infecções, atuação do sistema imunológico na presença de um patógeno, como também os mecanismos realizados pelas bactérias para se tornarem resistentes aos antibióticos. Por meio de uma revisão de literatura de natureza qualitativa e de cunho descritivo e exploratório, tendo como questão norteadora: Como se sucede a resistência aos antimicrobianos? A busca foi executada em livros e nos bancos de dados: Scientific Electronic Library Online (SciELO) e PubMed, como também nos sites oficiais da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), World Health Organization (WHO) e Ministério da Saúde do Brasil. A diminuição do arsenal tecnológico ou a ausência de alternativa terapêutica, são algumas das graves consequências diretas das infecções ocasionadas por microrganismos resistentes aos antimicrobianos. A resposta que o sistema imune promove tem papel fundamental na defesa do organismo contra agentes infecciosos e se consiste na principal barreira de proteção contra eventos de infecções disseminadas. Portanto, uma das origens da resistência antibiótica está associada aos mecanismos de transdução, transformação e conjugação, uma vez que pode ocorrer pela conquista de genes resistentes, por recombinação de DNA exógeno no cromossomo bacteriano ou por mutações em seus genes.

Palavras-chave: Antibiótico. Bactérias. Infecções bacterianas. Mecanismos de defesa. Resistência bacteriana a antibióticos.

1. INTRODUÇÃO

Mesmo havendo uma diversidade de medicamentos com potencial antimicrobiano que agem sobre os micróbios patogênicos, estudos buscam por um fármaco com atividade bactericida ideal, ou seja, que apresente maior espectro de ação, menor toxicidade, custo e indício de resistência bacteriana (PAZHANI et al., 2004).

De acordo com Santos (2004) o avanço da indústria farmacêutica no decorrer dos anos, levou ao surgimento de diversos antimicrobianos incluindo a descoberta das penicilinas naturais com amplo espectro de ação. Contudo, é sabido que a resistência bacteriana foi desencadeada pela exposição descontrolada aos antibacterianos, gerando restrições nas opções terapêuticas.

A propagação de bactérias resistentes a antibióticos ocorre tanto no âmbito nosocomial como na sociedade, sendo maior em hospitais, em particular nos que dispõem de unidades de terapia intensiva (UTI), centro cirúrgico, unidades de pediatria, berçário neonatal, clínica médica e/o cirúrgica, em que a antibioticoterapia é utilizada nos pacientes. Estes ambientes representam um “habitat” que alberga bactérias com potencial resistência frente a fármacos de uso, e se forem administrados de forma errada e/ou excessiva (SANTOS, 2004).

Cunico e colaboradores (2004) descrevem que a resistência a agentes antimicrobianos é grave e gera preocupação, e propõe não somente a pesquisa para o desenvolvimento de novas substâncias antimicrobianas, mas também uma nova visão perante as infecções bacterianas, sugerindo a criação de novas abordagens de tratamento.

Portanto, devido a disseminação de bactérias resistentes tanto na sociedade como nos hospitais e por elas gerarem muitas preocupações em relação a diminuição de antibióticos eficazes, torna-se necessário o estudo. Dessa forma, objetivou-se descrever o que são infecções, atuação do sistema imunológico na presença de um patógeno, como também os mecanismos realizados pelas bactérias para se tornarem resistentes aos antibióticos.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de uma revisão de literatura de natureza qualitativa e de cunho descritivo e exploratório, tendo como questão norteadora: Como se sucede a resistência aos antimicrobianos? A busca foi executada em livros e nos bancos de dados: Scientific Electronic Library Online (SciELO) e PubMed, como também nos sites oficiais da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), World Health Organization (WHO) e Ministério da Saúde/Brasil. Para a busca, foram utilizados os descritores: “antibióticos”,

“infecções bacterianas” e “resistência bacteriana”. Foram encontrados ao total 343 artigos, e selecionados 16 publicações para a presente pesquisa e a partir dos achados, os artigos foram analisados e discutidos. Respeitando os critérios de inclusão: artigos nacionais e internacionais, publicados entre 2000 a 2020 em português e inglês, e nos quais abordavam a resistência aos antibióticos. Como também os critérios de exclusão: artigos com acesso restrito, relatos de experiência, resumos, como também aqueles em que não estavam associados a infecções bacterianas. A pesquisa foi realizada no primeiro semestre de 2021 e os dados obtidos foram processados e implantados no Microsoft Word®.

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1. INFECÇÕES

A elevação da mortalidade e morbidade, do tempo de internação, da diminuição ou perda da proteção para os pacientes submetidos a diversos procedimentos, diminuição do arsenal tecnológico ou a ausência de alternativa terapêutica, são algumas das graves consequências diretas das infecções ocasionadas por microrganismos resistentes aos antimicrobianos (ANVISA, 2017a).

De acordo com a ANVISA (2017a) se os antibióticos tiverem a sua eficácia perdida, não terá opções rápidas e confiáveis para o tratamento das infecções bacterianas, incluindo pneumonias bacterianas, doenças transmitidas por alimentos (intoxicação) e as Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS). Cada vez mais bactérias tornam-se resistentes a uma boa parcela de antibióticos, e com isso as opções terapêuticas vão diminuindo e consequentemente aumentando o seu preço, podendo num futuro bem próximo, em alguns casos, extinguir.

Para VERONESI-FOCACCIA (2015) o termo infecção é definido como:

Presença do microrganismo em um determinado local do corpo (intracelular, intratecidual, na pele etc.) com multiplicação daquele e uma resposta do hospedeiro (mobilização de micrófagos e macrófagos, linfócitos, produção de anticorpos etc.). Enfatizamos que infecção não é sinônimo de doença, e temos muitas situações em que a multiplicação não acarreta lesão visível, talvez até porque as defesas estão funcionando a contento (VERONESI-FOCACCIA, 2015, p. 3).

3.1.1. MECANISMOS DE DEFESA

A resposta que o sistema imune promove tem papel fundamental na defesa do organismo contra agentes infecciosos e se consiste na principal barreira de proteção contra eventos de infecções disseminadas, constantemente relacionadas com alta taxa de mortalidade. Em comparação, as deficiências ligadas ao sistema imunológico, sejam elas relacionadas a imunidade inata (disfunções de células fagocíticas e deficiência de complemento) ou a imunidade adaptativa (deficiência de produção de anticorpos ou deficiência da função de células T), são relacionadas com a ampliação de vulnerabilidade a infecções (JANEWAY, 2001).

Mesmo que os anticorpos de forma isolada, por si só não possuam a habilidade de eliminar bactérias, eles podem neutralizá-las, fazendo com que haja o impedimento de sua ligação com o tecido do hospedeiro. De forma complementar, em combinação com o complemento, as bactérias podem ser lisadas pelos anticorpos, funcionando como opsoninas, contribuindo a fagocitose. Para a defesa do hospedeiro, células como os neutrófilos, eosinófilos e macrófagos são importantíssimas, pois elas exercem sua ação microbicida de forma mais ampla contra vários tipos de agentes infecciosos (DEBENEDICTIS et al., 2001).

A comprovação de que células fagocíticas apresentam em sua membrana receptores como o *toll-like receptor* (TLR), que se conectam exclusivamente a padrões moleculares presentes em diversos agentes infectantes (PASARE, MEDZHITOV, 2004), torna-se inapropriado denominar inespecífica a resposta imune inata (DEBENEDICTIS et al., 2001).

A ação microbicida que os neutrófilos possuem é de fundamental importância contra bactérias; já na defesa contra agentes intracelulares (protozoários e bactérias intracelulares) os macrófagos são as células importantes; e por último os eosinófilos, não menos importantes, são fundamentais não tanto pela atividade fagocítica, mas sim pela atividade citotóxica contra os helmintos (DEBENEDICTIS et al., 2001).

No mecanismo de defesa contra agentes intracelulares (como vírus, protozoários, fungos e bactérias intracelulares) a resposta mediada pelas células T é extremamente efetiva. E estas células podem realizar seu papel por meio da citotoxicidade mediada por células CD8+ ou por intermédio da secreção de citocinas que

irão estimular macrófagos para eliminar os agentes intracelulares (DEBENEDICTIS et al., 2001).

O queratinócito e a célula de Langerhans são outros elementos que podem participar do processo de defesa contra agentes infecciosos, já que muitas vezes diversos microrganismos invadem a pele. A capacidade de secretar inúmeras citocinas é dada aos queratinócitos, e dessa maneira ocorre a ativação e recrutamento de células inflamatórias e linfócitos para a pele (DEBENEDICTIS et al., 2001).

Já as células de Langerhans, por sua vez, desempenha a função primordial de guardar a área cutânea, fagocitando a começar de partículas proteicas inanimadas até vírus, bactérias ou qualquer outro agente infeccioso invasor. Depois da fagocitose a célula de Langerhans migra para o linfonodo regional com o intuito de efetivar a apresentação antigênica aos linfócitos, concedendo início ao progresso de imunidade específica protetora, tolerância ou hipersensibilidade (ROMANI et al. 2003).

3.1.2. OCORRÊNCIA DE INFECÇÕES

Pode-se compreender organismo patogênico como aquele capaz de infectar o indivíduo, isto é, penetrar seu corpo (LEVINSON, 2016). As infecções bacterianas consistem uma ameaça à saúde humana, sendo uma questão crítica para os sistemas de saúde, principalmente devido ao aumento no índice de infecções nosocomiais com crescente disseminação de bactérias multirresistentes (WHO, 2014).

Ao longo de praticamente um século, no entanto, os cuidados para o controle da infecção nosocomial foram de baixa qualidade. No começo do século XX, a mais relevante conquista científica, no âmbito médico, que veio auxiliar para o controle das infecções bacterianas, entre elas as nosocomiais, foi a da penicilina, antibiótico inserido no decorrer da segunda guerra mundial (WEINSTEIN, 2001).

De acordo com Ferreira e colaboradores (2008) após o descobrimento da penicilina, por Alexander Fleming em 1928, novos antibióticos foram criados e o índice de infecções diminuiu-se notavelmente (FERREIRA, PAES, LICHTENSTEIN, 2008). Desde aquela época, entre os fármacos mais prescritos no mundo estão os antimicrobianos, e tendo o uso de forma correta, podem salvar vidas (KASPER e FAUCI, 2015). No mundo inteiro, 10.000 toneladas ou mais de vários fármacos antimicrobianos são fabricados e utilizados anualmente (MADIGAN et al., 2016).

O sucesso da penicilina no controle das infecções provocadas por “bactérias Gram-positivas”, trouxe a desleal concepção de que os antibióticos conseguiriam ter controle e, possivelmente, acabar com todas as doenças infecciosas. Contudo, com a aparição da bactéria *Staphylococcus aureus*, resistente à penicilina, no meio desse século, desencadeou a uma agressiva epidemia nosocomial com esses agentes. A infecção era frequente por esta bactéria em pacientes internados nas unidades cirúrgicas e pediátricas (GRINBAUM, 2000).

Lamentavelmente, em pleno século XXI, mesmo com todo progresso tecnológico, a infecção nosocomial permanece ainda sendo a causa de altas taxas de morbidade e mortalidade em todo o mundo (SANTOS, 2004). No Brasil, segundo o Ministério da Saúde (2019), é estimado que a taxa de infecção nosocomial atinja 14% das internações hospitalares. Sendo grande parte acometida pela própria microbiota do paciente ou aqueles oportunistas presentes no âmbito nosocomial ou até mesmo aqueles presentes no meio ambiente nos quais se aproveitam da fragilidade do sistema imunológico e ocasiona uma infecção. As infecções também podem ser transmitidas pelas mãos do profissional de saúde ou do acompanhante, por equipamentos invasivos, como respirador para ventilação mecânica, ou mesmo por contato com outros pacientes (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019).

Microrganismos podem ser transmitidos por um processo denominado transmissão vertical, ou seja, da mãe para o recém-nascido, através da placenta, no interior do canal de parto durante o nascimento e aleitamento materno. Por outro lado, a transmissão horizontal se dá na transmissão interpessoal, excetuando-se a transmissão da mãe para o recém-nascido. Existem quatro relevantes portas de entrada: trato respiratório, trato intestinal, trato genital, e pele (LEVINSON, 2016).

3.2.RESISTÊNCIA BACTERIANA

Antes de caracterizar a resistência bacteriana, é importante entender basicamente o que são os fármacos antimicrobianos sendo a classificação com base na sua estrutura molecular e espectro de atividade. Segundo Madigan e colaboradores (2016) fármacos antimicrobianos são compostos que inibem ou controlam o crescimento de patógenos no hospedeiro (*in vivo*), apresentam uma toxicidade seletiva; ou seja, inibem ou matam os patógenos, sem afetar adversamente o hospedeiro. A

classificação dos fármacos antimicrobianos se dá com base na sua estrutura molecular, no mecanismo de ação e espectro de atividade antimicrobiana.

Como por exemplo a classe das quinolonas, que é constituída de antibacterianos sintéticos que afetam o metabolismo microbiano intervindo na DNA-girase bacteriana, impossibilitando o superenovelamento do DNA, uma etapa necessária ao acondicionamento do DNA na célula bacteriana. Já as fluoroquinolonas são eficientes na terapia de infecções por bactérias gram-positivas e gram-negativas, uma vez que a DNA-girase é encontrada em todas as bactérias (MADIGAN et al., 2016).

Em relação ao espectro de atividade antimicrobiana, cada agente quimioterápico antimicrobiano afeta um grupo limitado e bem definido de microrganismos. Alguns poucos agentes são muito específicos e afetam o crescimento de apenas um único gênero. Por exemplo, a isoniazida, é o fármaco mais eficiente utilizado no controle e tratamento da tuberculose, sendo assim afetando somente organismos do gênero *Mycobacterium*, pois interfere na síntese de ácido micólico, um componente específico presente na parede celular de micobactérias (MADIGAN et al., 2016).

A resistência aos fármacos antimicrobianos é descrita pela capacidade de um organismo de resistir aos efeitos de um agente quimioterápico onde ele é normalmente suscetível. A utilização inapropriada de antimicrobianos é o principal motivo do rápido desenvolvimento de resistência específica a estes em microrganismos causadores de doenças (MADIGAN et al., 2016).

A resistência aos antimicrobianos é, de outro modo, uma adequação genética ligada à existência de genes incluídos no microrganismo que através de diferentes mecanismos bioquímicos impossibilitam a ação dos fármacos. A resistência pode ser causada por mutações que acontecem no organismo durante sua fase reprodutiva e resultam de erros de cópia na sequência de bases que compõem o DNA cromossômico, responsáveis pelo código genético. A outra origem da resistência é a importação dos genes responsáveis da adequação, consistindo na resistência transferível, que se dá pelo meio de mecanismos de transdução, transformação e conjugação (TAVARES, 2000). A resistência bacteriana pode acontecer quando ela adquire genes resistentes, por recombinação de DNA exógeno no cromossomo da bactéria ou, ainda, por mutação (HAESE, SILVA, 2004).

Segundo o Grupo *Ad hoc* de Coordenação Interagências (IACG) para a Resistência Antimicrobiana (2019), se nenhuma ação for tomada, doenças que têm agentes etiológicos resistentes a fármacos podem causar 10 milhões de mortes a cada ano até 2050, além de danos à economia tão catastróficos quanto a crise financeira global de 2008 a 2009. Estima-se que até 2030, a resistência antimicrobiana pode levar à extrema pobreza aproximadamente 24 milhões de pessoas. De acordo com IACG (2019), pelo menos 700.000 pessoas falecem a cada ano devido a doenças resistentes a fármacos, incluindo 230.000 pessoas que vieram a óbito por tuberculose multirresistente.

Cada vez mais, doenças comuns como infecções do trato respiratório, infecções sexualmente transmissíveis (IST) e infecções do trato urinário (ITU), se tornam difíceis de serem tratadas; procedimentos médicos que salvam vidas estão se tornando muito mais arriscados devido as IRAS (WHO, 2019). Vale lembrar que linhagens bacterianas resistentes são sobretudo comuns entre profissionais da equipe hospitalar, em razão de que o uso de antibióticos é progressivo em seu círculo de trabalho (TORTORA, FUNKE, CASE, 2017).

3.2.1. MECANISMOS DE RESISTÊNCIA BACTERIANA AOS ANTIMICROBIANOS

Para todos os antimicrobianos conhecidos e disponíveis para uso humano e veterinário, têm sido detectados e apresentados os seus mecanismos de resistência, em particular para antibióticos mais novos, como: cefalosporinas, aminoglicosídeos e fluorquinolonas (TORTORA, FUNKE, CASE, 2017).

Periodicamente, para evitar o efeito dos antimicrobianos as bactérias utilizam estratégias com múltiplos mecanismos que podem gerar um acentuado crescimento da resistência aos antimicrobianos. A criação da propriedade intrínseca de uma espécie bacteriana se deve à resistência a determinado antimicrobiano, e para esta resistência, a bactéria deve modificar seu DNA, o que acontece de duas formas, sendo a primeira pela indução de mutação no DNA nativo; e a segunda pela introdução de um DNA estranho - genes de resistência - que podem ser passados entre gêneros ou espécies diferentes de bactérias (ANVISA, 2017b).

De acordo com pesquisas realizadas pela ANVISA (2017b), os genes de resistência na maior parte dos casos integram o DNA de plasmídeos extracromossômicos, nos quais

podem ser passados entre microrganismos. Alguns genes de resistência integram as unidades de DNA denominadas transposons, possuem motilidade entre cromossomos e plasmídeos transmissíveis. O DNA estranho pode ser contraído mediante modificação, ocasionando trocas de DNA cromossômico entre espécies, com subsequente recombinação interespecies.

A resistência antimicrobiana está intimamente relacionada a sobrevivência dos microrganismos. Assim, os microrganismos patogênicos desenvolveram mecanismos de resistência aos antimicrobianos e, segundo Antônio (2009), os principais mecanismos de resistência bacteriana são síntese de enzimas; redução da incorporação do antibiótico por diminuição da permeabilidade ou por efluxo ativo, que ocorre devido ao bombeamento ativo do antibiótico para fora da célula bacteriana e; alteração do alvo de ação do antibiótico. Abaixo serão abordados de forma detalhada todos os mecanismos de resistência.

3.2.1.1. ALTERAÇÃO DE PERMEABILIDADE

Primeiramente, há diferença na permeabilidade da parede celular das bactérias Gram-positivas e Gram-negativas. As positivas retêm o corante cristal violeta devido à presença de uma espessa camada de peptidoglicano (polímero constituído por açúcares e aminoácidos que originam uma espécie de malha na região exterior à membrana celular das bactérias) em suas paredes celulares, apresentando-se na cor roxa. Já as negativas apresentam uma parede de peptidoglicano mais fina que não retém o cristal violeta durante o processo de descoloração e recebem a cor rósea/avermelhada no processo de coloração final (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001).

É também uma propriedade das negativas, a permeabilidade da membrana celular externa formada de lipopolissacarídeo (ANVISA, 2017b). A permeabilidade forma-se na presença de porinas, que são proteínas transmembranas, que constituem canais específicos pelos quais as substâncias podem atravessar para o espaço periplasmático e, posteriormente, para a parte interna da célula, com isso o fármaco alcança seu receptor na parede celular e realiza sua atividade bactericida (ANVISA, 2017b; DEL FIO; DE MATTOS FILHO; GROppo, 2000).

As bactérias em formato de defesa, começam a sintetizar as proteínas transmembranas cada vez menor, podendo ser até ausente, com isso não ocorrendo o

influxo do fármaco para a célula. (DEL FIO; DE MATTOS FILHO; GROPPPO, 2000). As bactérias utilizam este mecanismo na aquisição de resistência (ANVISA, 2017b). Segundo a ANVISA (2017b), uma alteração na porina específica da membrana celular externa de *Pseudomonas aeruginosa*, pela qual o imipenem normalmente se espalha, pode excluir o antimicrobiano de seu alvo, tornando *P. aeruginosa* resistente ao imipenem (TORTORA, FUNKE; CASE, 2017; ANVISA, 2017b).

3.2.1.2. ALTERAÇÃO DO SÍTIO DE AÇÃO DO ANTIMICROBIANO

Compõe um dos mecanismos mais importantes de resistência, a alteração do local-alvo de atuação de determinado antimicrobiano, de modo a impedir o acontecimento de qualquer efeito bacteriostático (inibitório) ou bactericida (TORTORA, FUNKE, CASE, 2017; ANVISA, 2017b). Com a finalidade de o fármaco atuar sobre um microrganismo é fundamental que tenha a ligação fármaco-receptor, como esse meio altera-se o alvo do fármaco tornando-o ineficaz a reação. As bactérias frequentemente por mutação cromossômica proporcionam a modificação bioquímica desse receptor detendo a ligação ou pela pose de um gene que codifica um novo produto resistente ao antibiótico trocando o alvo primário (DEL FIO; DE MATTOS FILHO; GROPPPO, 2000; ANVISA, 2017b).

3.2.1.3. BOMBA DE EFLUXO

A diminuição da concentração de fármacos do meio intracelular para o extracelular, confere resistência bacteriana a certos antimicrobianos. Com isso o fármaco não alcança concentrações suficientes no meio intracelular para conferir ação farmacológica, pois com a ação da bomba de efluxo, o fármaco é bombeado no mesmo instante para o meio extracelular. Toma-se como exemplo o bacilo Gram-negativo, *Escherichia coli*, que com a ação da bomba de efluxo ativo, é conferida a resistência bacteriana em frente às tetraciclinas codificada por plasmídeos (ANVISA, 2017b).

3.2.1.4. MECANISMO ENZIMÁTICO

A degradação do antimicrobiano por enzimas é o mecanismo de resistência bacteriana mais importante e frequente. A ligação amida do anel β -lactâmico é hidrolisada pelas β -lactamases, eliminando o local de ligação dos antimicrobianos β -lactâmicos às proteínas de ligação à penicilina (PBPs) bacterianas realizando sua

atividade antibacteriana. Essas enzimas são codificadas em cromossomos ou sítios extracromossômicos por meio de plasmídeos ou transposons, sendo capaz de serem criadas de modo constitutivo ou ser induzido (ANVISA, 2017b).

De acordo com a ANVISA (2017b), a resistência quase universal de *Staphylococcus aureus* à penicilina se dá por uma β -lactamase induzível, codificada por plasmídeo. Foram feitos β -lactâmicos aptos de se unirem permanentemente às β -lactamases, ou seja, inibindo elas. Foram combinados esses compostos (ácido clavulânico, sulbactam, tazobactam) com as penicilinas para restaurar seu efeito, a despeito da presença de β -lactamases em estafilococos e hemófilos. Bactérias Gram-negativas, possuem β -lactamases que são secretadas no espaço periplasmático, a atuação se dá em conjunto com a barreira de permeabilidade da parede celular externa, sendo assim, produzindo resistência clinicamente significativa a antimicrobianos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, fica claro que propagação de bactérias resistentes aos antibióticos ocorre não somente nos hospitais, mas na sociedade também. Como também uma das origens da resistência antibiótica está associada aos mecanismos de transdução, transformação e conjugação, uma vez que pode ocorrer pela conquista de genes resistentes, por recombinação de DNA exógeno no cromossomo bacteriano ou por mutações em seus genes. Como também a alteração do local-alvo de atuação de determinado antibiótico, de modo que ocorre o impedimento do fármaco atuar, seja com o efeito bacteriostático ou bactericida.

REFERÊNCIAS

- AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). **Plano Nacional para a Prevenção e o Controle da Resistência Microbiana nos Serviços de Saúde.** 2017a. Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271855/Plano+Nacional+para+a+Preven%C3%A7%C3%A3o+e+o+Controle+da+Resist%C3%Aancia+Microbiana+nos+Servi%C3%A7os+de+Sa%C3%BAde/9d9f63f3-592b-4fe1-8ff2-e035fcc0f31d> Acesso em 18 de maio de 2020.
- AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). **Resistência microbiana: mecanismos e impacto clínico.** 2017b. Disponível em: http://www.anvisa.gov.br/servicosade/controle/rede_rm/cursos/rm_controle

/opas_web/modulo3/mec_permeabilidade.htm. Acesso em: 11 de maio de 2020.

ANTÔNIO N. DA SILVA. et al. Mecanismos de resistência bacteriana. **REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE MEDICINA VETERINÁRIA** – ISSN: 1679-7353. Ano VII – Número 12 – Janeiro de 2009 – Periódicos Semestral.

BUCHALLA C. M.; WALDMAN E. A.; LAURENTI R. A mortalidade por doenças infecciosas no início e no final do século XX no Município de São Paulo. **Rev. Bras. Epidemiol.** Vol. 6, Nº 4, 2003 p. 335-344.

CUNICO M. M, CARVALHO J.L.S., KERBER V.A., HIGASKINO C.E.K., CRUZ ALMEIDA S.C., MIGUEL M.D., et al. Atividade antimicrobiana do extrato bruto etanólico de raízes e partes aéreas de *Ottonia martiana* Miq.(Piperaceae). **Rev Bras Farmacogn.** 2004;14(2):97-103.

DEBENEDICTIS C., JOUBEH S., ZHANG G., BARRIA M., GHOMESTANI R.F. Immune functions of the skin. **Clin Dermatol.** 2001; 19:573-85.

DEL FIO, F. S.; DE MATTOS FILHO, T. R.; GROppo, F. C. Resistência bacteriana. **Revista Brasileira de Medicina (Rio de Janeiro)**, v. 57, n. 10, p. 1129-1140, 2000.

FERREIRA, M. V. C; PAES, V. R.; LICHTENSTEIN, A. Penicilina: oitenta anos. **Revista Medicina (São Paulo)**, v. 87, n. 4, p. 272-276, 2008.

GRINBAUM RS. Tornando a racionalização de antimicrobianos mais racional. **Prát Hosp** 2000 Set-Out; 2(11): 65-8.

HAESE, D.; SILVA, B. A. N. Antibióticos como promotores de crescimento em monogástricos. **Revista Eletrônica Nutritime**, v. 1, n. 1, p. 07-19, jul. /ago. 2004.

IACG. **Antimicrobial resistance.** 2019. Disponível em: <https://www.who.int/antimicrobial-resistance/interagency-coordination-group/en/> Acesso em: 12 de maio de 2020.

JANEWAY C.A. JR. How the immune system protects the host from infection. **Microbes Infect.** 2001;3:1167-71.

KASPER, D. L.; FAUCI, A. S. Doenças infecciosas de Harrison. Porto Alegre: **AMGH Editora**, 2015. p. 1165.

LEVINSON, W. **Microbiologia médica e imunologia.** 13. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

MADIGAN, M. T. et al. **Microbiologia de Brock.** 14. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2016.

MINISTÉRIO DA SAÚDE, **SECRETARIA DE POLÍTICAS DE SAÚDE, PROGRAMA NACIONAL DE DST E AIDS. Técnica de Coloração de GRAM.** Brasília 2001. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/115_03gram.pdf> Acesso em: 27 de dezembro de 2019.

- MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Projeto em UTIs de 119 hospitais permite salvar 558 vidas.** 2019. Disponível em: <http://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/45309-projeto-em-utis-de-119-hospitais-permitiu-salvar-558-vidas> Acesso em: 16 de maio de 2020.
- PASARE C., MEDZHITOV R. Toll-like receptors and acquired immunity. **Semin Immunol.** 2004;16:23-6.
- PAZHANI, G.P. et al. Clonal multidrug-resistant *Shigella dysenteriae* Type 1 strains associated with epidemic and sporadic dysenteries in Eastern India. **Antimicrobial Agents Chemotherapy**, v.48, n.2, p.681-4, 2004.
- ROMANI N., HOLZMANN S., TRIPP C.H., KOCH F., STOITZNER P. Langerhans cells - dendritic cells of the epidermis. **APMIS.** 2003;111:725-40.
- SANTOS N. Q. A resistência bacteriana no contexto da infecção hospitalar. **Texto Contexto Enferm** 2004; 13(n.esp):64-70.
- TAVARES, W. Bactérias gram-positivas problemas: resistência do estafilococo, do enterococo e do pneumococo aos antimicrobianos. **Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical**, v. 33, n. 3, maio/jun. 2000.
- TORTORA, G. J.; FUNKE, B. R.; CASE, C. L. **Microbiologia.** 12. Ed. Porto Alegre: ArtMed, 2017.
- VERONESI, R. - FOCACCIA, R. **Tratado de Infectologia** - Vol. 1 - 5ª Ed. São Paulo: Atheneu. Cap. 1, p. 3. 2015.
- WEINSTEIN RA. Controlling antimicrobial resistance in hospitals: infection control and use of antibiotics. **Emerg Infect Dis** 2001; 7(2):1888-92.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION - WHO, Antimicrobial Resistance, **Global Report on Surveillance** 2014, 2014, p. 257.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION - WHO. **Antimicrobial resistance: No Time to Wait: Securing the future from drug-resistant infections.** 2019. Disponível em: <https://www.who.int/antimicrobial-resistance/interagency-coordination-group/final-report/en/> Acesso em: 12 de maio de 2020.

SOROPOSITIVIDADE: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA DOENÇA APÓS O IMPACTO DO DIAGNÓSTICO

DOI: 10.51859/ampla.csa511.1121-34

Paulo de Tarso Xavier Sousa Junior ¹
Carlos Antônio Santos ²

¹ Mestrando em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

² Psicólogo. Mestre em Psicologia Social (UFPB) e docente.

RESUMO

Os seres humanos ao se confrontarem com a possibilidade de estarem próximos da morte através da contaminação de um vírus, como o da Imunodeficiência Humana (HIV). Uma pessoa soropositiva, assim é chamada, pois significa que está infectada com o vírus HIV, passa, portanto por uma mudança em sua vida em vários fatores. Neste sentido, essas novas percepções construídas são chamadas de Representações Sociais, termo criado por Serge Moscovici. O presente artigo relata os resultados obtidos por meio de uma pesquisa que teve como objetivo compreender como o sujeito constrói novas representações sociais e passa a ver sua família e a sociedade após ter passado por um diagnóstico positivo para o vírus HIV, causador da AIDS. O estudo teve abordagem qualitativa, descritiva e de campo realizada por meio de entrevistas semiestruturadas questionários sociodemográficos com sete entrevistados de ambos os gêneros em uma casa de acolhimento no município de Teresina/PI. Observou-se que os sujeitos identificaram a presença do vírus após algum tipo de adoecimento físico, causando reações de espanto, raiva e indignação diante do diagnóstico, fazendo com que projetos futuros, hábitos e rotinas fossem modificados. Além disso, com a distância de amigos e familiares, provocada pelo impacto do diagnóstico, fizeram os indivíduos procurarem formas de reconstruir suas vidas. Conclui-se que as representações sociais construídas pelos indivíduos soropositivos refletem-se em mudanças de modos de vida, rompimento e construção de novos vínculos interpessoais e modificações de projetos de vida futuros.

Palavras-chave: HIV. Representações sociais. Visões de mundo. Percepções.

1. INTRODUÇÃO

Desde o início dos anos de 1980 a humanidade convive com o HIV, o vírus da Imunodeficiência Humana, que causa a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA ou AIDS, no inglês). O surgimento dos primeiros casos foram diagnosticados em sujeitos homossexuais do sexo masculino nos Estados Unidos, associando então a sexualidade

ao aparecimento da doença (MATOS, 2014). Considerada até hoje como uma doença sem cura, o HIV teve rápida disseminação por todos os continentes e a AIDS é considerada uma pandemia, responsável por milhares de mortes em todos os anos, provocando inquietações acadêmicas acerca de possíveis resultados de estudos que tragam melhorias do quadro de adoecimento (PINHEIRO et al., 2005).

Uma vez instalado no corpo do indivíduo é impossível, até os dias atuais, se livrar do vírus HIV e a única forma de saber se alguém está infectado é através de testes sanguíneos distribuídos gratuitamente na rede pública de saúde através dos Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA) espalhados pelo Brasil (VARELLA, 2009). Atualmente sabe-se de diversas formas de contágio do vírus, sendo a mais comum por meio de relações sexuais sem proteção. Entretanto, novos comportamentos de risco, como o uso de seringas contaminadas, estão fazendo jovens e adultos passarem a ter contato direto com o vírus e se infectarem como, por exemplo, por meio de injeções contaminadas utilizadas para o consumo de substâncias psicoativas, atingindo atualmente um grande número de indivíduos heterossexuais (GOMES et al., 2012).

No Brasil, em 2019, foram notificados 41.919 casos de HIV, concentrando 37.308 na fase de Aids, onde a mesma prevalece em jovens entre 25 a 39 anos (BRASIL, 2020). Conforme Villarinho et al., (2013) além disso já foram notificados mais de 205 mil mortes por conta do agravamento que a AIDS gera nos sujeitos desde 1982, quando os primeiros casos apareceram na cidade de São Paulo. As primeiras políticas de assistência às pessoas com diagnóstico confirmado apareceram mediante o apoio das Santas Casas, ligadas em sua grande parte a instituições religiosas que já realizavam o cuidado a pessoas excluídas pela sociedade. Segundo Pereira & Nichiata (2011) de lá para cá, após muitas lutas e reivindicações, existem em vários lugares políticas públicas de saúde que trabalhem não somente na prevenção, mas na promoção de saúde aos sujeitos soropositivos em busca de uma melhor qualidade de vida.

A confirmação do diagnóstico positivo, a presença do vírus HIV no corpo humano, provocam mudanças em vários aspectos dos sujeitos, como suas experiências a partir desta patologia. Nesse sentido é possível afirmar que essas mudanças contribuem para a formação de novas representações sociais acerca de si mesmo e do mundo a seu redor (MEIRELLES, 2010). Considerando as relações com a dinâmica dessa patologia, na década de 1980, o aparecimento da doença foi logo ancorado em imagens

de loucura, homossexualidade, hemofilia, drogadicção e transfusões de sangue contaminado. As pessoas rapidamente construíram teorias informais para explicar a ameaça desconhecida (JODELET, 2001).

A teoria das representações sociais foi originada na Europa com a publicação da tese de doutorado de Moscovici em 1961, *La Psychanalyse, son image et son public*, tendo como base o conceito de Representações Coletivas de Émile Durkheim (1858-1917) (GURARESCI, 2007). As Representações Sociais diferem de outras formas psicológicas de psicologia social e podem ser definidas como um conjunto de ideias, conceitos, imagens que fazem com que o indivíduo compreenda melhor o mundo a seu redor. Porém esses conjuntos de ideias que são formadas e agrupadas tem origem no senso comum à medida que as coisas vão modificando seu significado com o tempo (ÁLVARO E GARRIDO, 2010).

Uma das características mais importantes quando se trata das Representações Sociais é compreender que é por meio delas que é possível conhecer os sentidos dados ao mundo pelos sujeitos. Esses sentidos fazem parte da construção social de cada um, sofrendo influências por meio dos contatos construídos pelos indivíduos ao longo da sua vida (JODELET, 2001).

As Representações Sociais ocorrem a cada aprendizado onde cada um produz conceituações acerca de algo ou alguém. Esses conhecimentos são adquiridos ao longo da história de cada um, relacionando sempre a crenças que são estabelecidas, mantendo uma profunda interação com o ambiente externo (REIS e BELLINI, 2011). A representação de determinadas questões possibilita a construção de valores que permitem cada pessoa vivenciar suas experiências da maneira que achar mais adequada. Essa construção é ativa, uma vez que por meio das compreensões feitas de cada um oportuniza a modificação da realidade, deixando o espaço habitado um lugar parecido com sua identidade (MAZZOTTI, 2008).

Ao considerar o surgimento da AIDS, observa-se que várias concepções acerca da doença foram sendo construídas e disseminadas socialmente. Muitas destas concepções estavam associadas à representações de morte relacionadas à homossexualidade. Também foram acrescentados julgamentos morais a essas representações, muitas vezes, embasados em determinadas doutrinas religiosas. Tais

acontecimentos, fomentaram o desenvolvimento de estudos sobre o conhecimento popular acerca de temas específicos (JODELET, 2001).

Baseado nessa e em outras considerações este artigo apresenta os resultados encontrados por meio de uma pesquisa científica que analisou como as pessoas constroem novas representações sociais e passam a ver sua família e a sociedade após terem recebido diagnósticos positivos para o vírus HIV, causador da AIDS.

2. MÉTODO

O estudo teve caráter qualitativo, descritivo e de campo. A amostra foi constituída por pessoas abrigadas em uma casa de amparo para pessoas soropositivas da cidade de Teresina-PI, de idades variadas e ambos os gêneros, perfazendo um total de sete entrevistados, diagnosticados com HIV há, no máximo, um ano. Pessoas com alterações cognitivas graves, fala e compreensão comprometidas ou não autorizadas pela direção da instituição pesquisada não puderam participar.

A coleta de dados se deu por meio de uma entrevista semiestruturada, obedecendo a um roteiro que abarcou as informações esperadas. O roteiro foi construído para que as questões norteadoras da pesquisa fossem adequadamente respondidas. Além disso, foi utilizado um questionário com perguntas demográficas com a intenção de caracterizar os participantes. Para assegurar a validade e a fidedignidade das falas e, com autorização dos participantes, o pesquisador utilizou um gravador de voz durante a coleta de dados. Número de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa – CAEE nº 56589716.0.0000.5211.

Como técnica para organização e análise dos dados a pesquisa utilizou o método de Análise de Conteúdo. Essa técnica visa organizar e identificar nos dados as partes semelhantes e diferentes dos discursos por meio do processo de categorização, onde os termos são reunidos a fim de se estabelecer significados sobre os mesmos, tendo como base para reflexão a literatura disponível sobre o tema (MINAYO, 2016).

De acordo com os dados analisados foram identificadas quatro categorias: 1) A descoberta do diagnóstico; 2) Reações pessoais e interpessoais mediante o diagnóstico; 3) As mudanças corporais, pessoais e sociais; 4) Visões acerca de si e dos outros.

3. RESULTADOS

A pesquisa contou com a participação de 7 (sete) sujeitos, sendo 6 do gênero masculino e uma apenas do gênero feminino, abarcando além disso mais informações referentes ao tempo de diagnóstico, reações ao mesmo e o atual estágio de tratamento da doença.

Tabela 1 – Dados sócio-demográficos dos participantes

Participante	Gênero	Idade	Tempo de Diagnóstico	Religião	Reação ao Diagnóstico	Tratamento a base de medicação
P1	F	28	3 meses	Sem religião	Tristeza, raiva, surpresa, desespero	Sim
P2	M	40	6 meses	Evangélico	Desespero	Sim
P3	M	40	5 meses	Espírita	Tristeza	Sim
P4	M	46	9 meses	Evangélico	Tristeza, raiva, surpresa, desespero	Sim
P5	M	38	9 meses	Evangélico	Tristeza, raiva, surpresa, desespero	Sim
P6	M	29	8 meses	Católico	Desespero, dúvidas	Sim
P7	M	27	9 meses	Evangélico	Medo	Sim

Fonte: Autoria própria.

Baseado nessas questões o estudo trouxe as falas dos participantes distribuídas em quatro categorias descritas a seguir:

3.1. A DESCOBERTA DO DIAGNÓSTICO

Os participantes relataram que levavam cada um a seu modo, sua vida normalmente. A grande maioria morava com a família e possuía contato com muitas

peessoas, considerando-as como amigos. Durante os relatos evidenciou-se que todos já possuíam experiências sexuais, de orientação heterossexual, entretanto não havia um cuidado em relação a se proteger durante as mesmas. Isso provocou, possivelmente, o contágio do vírus HIV, descobrindo do seu diagnóstico apenas há algum tempo depois. Logo em seguida, os sujeitos passaram a sentir algumas dores, geralmente associados a outras doenças, procurando assim serviços médicos, mas logo em seguida os sintomas prosseguiram e com maior intensidade. Dessa vez os profissionais indicaram a realização do teste rápido nos Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA) e dessa forma veio então a confirmação da presença do vírus HIV.

“Depois de muito tempo que eu tava doente ai o médico pediu o testes, pelos sintomas já estava sentindo, eu acho que ele já precavia que era HIV, ai eu fiz o teste sem saber, eu já estava em alucinações, ai quando eu morava em Parnaíba e vim para Teresina, o diagnostico já estava pronto e recebi e fiquei triste né, eu fui uma vítima, não fui eu quem foi atrás, eu peguei da minha própria esposa que na época já tinha falecido só não sabia porque.” (Entrevistado 1)

3.2.REAÇÕES PESSOAIS E INTERPESSOAIS MEDIANTE O DIAGNÓSTICO

Outro ponto que merece destaque são as emoções relacionadas após a descoberta da doença, onde todos relataram ficarem tristes acerca do resultado do exame. Outro elemento comum nas falas foi à surpresa, pois apesar de não estarem rotineiramente cuidando da saúde não imaginavam que poderiam contrair o vírus. Logo após a notícia veio em sua grande maioria reações como surpresa, tristeza e decepção. Houve relatos que fizeram alguns entrevistados acreditarem que por estarem com o vírus estariam mais próximos da morte e que suas vidas acabariam após aquele momento.

“Eu fiquei foi pensando em como seria a partir daquele momento sabe. Se ia mudar muita coisa e mudou. Uma mistura de sentimento... tristeza, dor, se desse pra voltar atrás, mas não pode né.” (Entrevistado 5)

Uma das grandes mudanças que o impacto do diagnóstico trouxe aos entrevistados foi a diferença posterior nas relações que eles possuíam com seus familiares e amigos. De alguma forma esses laços foram distanciados e a rotina de vida que existia antes do diagnóstico foi mudada por conta do afastamento dessas relações.

Os participantes ainda contam do afastamento dos vínculos sociais que possuíam bem como dificuldades em criar novas relações afetivas.

“Mudou com relação a quê? A minha relação mudou assim muito porque a história que eu tinha essa AIDS as pessoas se afastaram, tinham como um monstro uma coisa assim que pegasse... eles me rejeitaram inclusive até hoje tenho sequelas que na cidade, um dente não arrancam, sempre quando eu vou lá tá faltando um material, que material! Outro sai bem assim da consulta com o dente arrancado e pra mim nunca tem.” (Entrevistado 6)

Após algum tempo da informação do diagnóstico alguns familiares de apenas um dos entrevistados tiveram uma reação diferente ao longo do tempo. Eles passaram a compreender melhor sobre a doença e o sofrimento psíquico decorrente dela prestando assim o apoio necessário para fazer o tratamento e o que fosse necessário para obter saúde apesar do diagnóstico.

“A minha família alguns apoiaram, alguns afastaram, mas aí não me importava porque assim como chegou à minha porta ia chegar à porta de qualquer pessoa que tava... como é que se diz... eu não era a primeira e não era a última. Mas minha família me aceitou. Quem era principal para tá do meu lado me apoiaram, como até hoje me apoia não me abandonou, então o que eu precisava eu tenho.” (Entrevistado 1)

Os relacionamentos interpessoais dos entrevistados mudaram e atualmente eles não obtêm tanto contato com seus familiares e outras pessoas por conta do diagnóstico e do tratamento realizado, longe das suas cidades. Possuindo então poucos amigos e pouco contato, a não ser por outros meios de comunicação como o celular.

“Ainda tem muitos que preferem não falar comigo, só diz “oi, bom dia” ou “boa tarde”. Amigos, minha família me convida para almoçar, ontem mesmo eu recebi ligação de umas pessoas pedindo que quando eu saísse daqui, passasse lá, aí eu fico feliz né, quando a gente recebe assim uma ligação as pessoas querem te ver.” (Entrevistado 2)

3.3.AS MUDANÇAS CORPORAIS, PESSOAIS E SOCIAIS

Os entrevistados relatam que tiveram de abdicar de alguns projetos futuros por conta do diagnóstico sabendo que eles precisam obedecer a uma série de restrições. Além disso, há um cuidado maior em relação a sua saúde e com o modo que leva a vida. As rotinas também foram modificadas uma vez que eles precisam agora requerer ter certos cuidados para a saúde. Atualmente muitos procuram os serviços médicos

constantemente, procurando apoio para o enfrentamento diante das dificuldades que o vírus estabelece no dia-a-dia de cada um.

“Que foi modificado foi, até porque eu tinha um sonho e agora não posso mais realizar. Eu queria me formar, ser enfermeira, mas como é que uma pessoa vai ser enfermeira tendo HIV?” (Entrevistado 4)

3.4. VISÕES ACERCA DE SI E DOS OUTROS

Os participantes relataram a incompreensão das demais pessoas com HIV, pois cada um se mostrou e reagiu de maneira diferente ao diagnóstico. Alguns participantes da pesquisa diagnosticados com a doença relataram adoecimento psíquico, que interferiu na rotina das suas vidas, já outros demonstram não se abater por conta da sua atual condição e conseguem levar suas rotinas, na medida do possível, de uma boa maneira.

“Assim, na verdade eu nem sei dizer. Tem pessoas que reagem diferente, não falam pros outros porque é diferente daquela pessoa. Então eu nem consigo diferenciar.” (Entrevistado 5)

4. DISCUSSÃO

Nem sempre os indivíduos sabem reconhecer os sinais referentes a presença do vírus HIV por atualmente haver várias formas de contato e muitas vezes por não haver maiores informações acerca dela. Ainda conforme essa literatura é comum encontrar uma culpabilização de alguém acerca da transmissão do vírus, não reconhecendo a responsabilização de ambas as pessoas diante da relação sexual sem proteção (GONÇALVES; WEBER e ROSO, 2013) Ainda segundo Silva et al., (2015) é importante ressaltar também que muitos ao longo da vida ainda possuem a falta de informações acerca das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), bem como as formas de se proteger delas.

O impacto causado pelo diagnóstico ainda está associado à proximidade da morte e gerando a interrupção de desejos e sonhos futuros. Cada um reage de uma forma distinta, entretanto em sua grande maioria as reações são associadas a emoções negativas como raiva, ódio, tristeza uma vez que a sociedade colabora para a manutenção da estigmatização acerca dos indivíduos soropositivos por ainda acreditarem

em determinados tabus relacionados a forma de transmissão do vírus (SOUZA e FREIRAS, 2010).

Gazzinelli et al., (2005) relatam que as representações sociais se constroem mediante o aprendizado diante da experiência humana, gerando assim a aquisição de novas informações e consequentemente base para futuras ações desempenhadas por cada sujeito. Já Pinto (2015) relatam que as pessoas com o vírus HIV passam a reconhecer o papel importante desempenhado pelas relações afetivas construídas no seio familiar e fora dele, além dos benefícios e consequências que a manutenção dessa rede causa diante da confirmação do diagnóstico. Diante disso novas formas de representações são construídas uma vez que há a criação de novos suportes que aliviam o sofrimento, como a presença da espiritualidade. Desse modo fica evidente que existem alguns obstáculos a serem superados como o tabu da morte e a estigmatização humana, pois elas causam influências diretas na melhora no bem estar e nas perspectivas acerca da vivência humana.

Ao longo do tempo os sujeitos passam a compreender melhor acerca do vírus e passaram a reconhecer as etapas relativas ao tratamento. Nesse percurso onde há uma maior adequação aos seus sentimentos os sujeitos soropositivos passam a fazer novas representações sobre a maneira de ver o mundo e de se relacionar com ele. É importante ressaltar que o auxílio de parentes, amigos e pessoas significativas são essenciais para as pessoas que possuem o vírus HIV olharem para novas possibilidades e compreenderem que é possível viver com qualidade, evitando assim o surgimento de patologias psíquicas como a depressão e tendências a comportamentos suicidas (COUTINHO; ODWYER e FROSSARD, 2018).

Outros estudos evidenciam a dificuldade das pessoas soropositivas em se relacionar com as pessoas. A discriminação ainda é um fator que causa medo e isolamento nessas pessoas. Essas características auxiliam muitas vezes no impasse em construir novas redes de relacionamento, bem como a construção de projetos futuros, como a construção de uma carreira profissional seja ela por meio do estudo formal ou pela empregabilidade. Todas essas questões influenciam diretamente na maneira como cada um vive e se expressa, alimentando sentimentos como o medo e baixa autoestima (LÔBO et al., 2018).

O preconceito acerca da soropositividade que ainda existe provoca mudanças em diversas esferas do conviver humano. A literatura aponta na dificuldade da manutenção das relações relacionados a medo da rejeição e das possíveis formas de ridicularizações feitas pelos demais. Os sujeitos passam a se perceberem também de outra forma, mantendo mudanças acerca dos pensamentos e visões que cada um carrega. O constrangimento acerca do diagnóstico pode causar reações como a omissão da presença do vírus no organismo como uma forma de ser aceito perante a sociedade numa tentativa de levar uma vida comum como a das demais pessoas (KAWAGOE, 2012).

Apesar dos muitos mitos existentes acerca do vírus HIV atualmente existem muitas formas de tratamento para a melhora no quadro de saúde. Apesar da não existência de uma cura precisa esses tratamentos produzem uma maior qualidade de vida, possibilitando construir e realizar novos sonhos (HIPOLITO et al., 2017). O apoio psicológico serve como uma estratégia importante para a realização dessas novas ressignificações onde permite os indivíduos a conviverem melhor com o diagnóstico, causando comportamentos de resiliência acerca dos desafios obtidos pela soropositividade.

Mesmo apesar da letalidade da presença do vírus, em alguns casos, a forma como pessoas soropositivas são tratadas podem chegar a ser mais fatais, pois baseado nas considerações e comportamentos preconceituosos acerca da doença impede que haja a motivação necessária para o prosseguimento do tratamento, que muitas vezes causam muito sofrimento, bem como as demais alterações realizadas pelo vírus na existência humana (COSTA, 2015).

As reações acerca do diagnóstico desde a descoberta do vírus até os dias atuais pouco sofreram mudanças (CHAVES, 2016). Entretanto é necessário continuar investindo em políticas públicas de saúde que levem informações adequadas a todas as camadas da sociedade, pois a disseminação desses conhecimentos acerca do vírus comprovadamente diminuem as taxas de infecções. É importante que também haja mais suporte psicológico para essas pessoas uma vez que o diagnóstico mexe profundamente com questões emocionais trazendo sintomas e prejuízos cognitivos que provocam o adoecimento e consequentemente no agravamento do vírus no corpo humano.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essa pesquisa fortalece os demais estudos existentes onde se confirmam os primeiros impactos acerca do diagnóstico. Os sujeitos, muitas vezes, não obtêm a instrução necessária para lidarem com suas experiências sexuais, estando expostos à contaminação por infecções sexualmente transmissíveis. Nem sempre, os primeiros sintomas são associados ao vírus HIV. Por isso, a demora e agravamento do quadro de saúde. As primeiras reações são associadas a proximidade de morrer e pela perda da rotina que cada um leva. Esses pensamentos são associados então a emoções adversas, mas todas com um aspecto em comum: o medo.

Os sujeitos sofrem constantemente por conta das representações estabelecidas pela sociedade sobre a AIDS, levando as demais pessoas a apresentarem comportamentos preconceituosos que discriminem e isolem os portadores da doença do convívio social. Essas influências repercutem em vários aspectos da realidade humana. Os sonhos e projetos de vida são gravemente modificados uma vez que ainda não há muito espaço para pessoas soropositivas trabalharem e poderem construir um futuro digno e honesto. Desse modo as pessoas são obrigadas a mudarem suas rotinas se adequando as consequências trazidas pelo preconceito.

Os sujeitos soropositivos constroem novas representações sociais acerca das pessoas e do mundo de modo geral. Os familiares e as pessoas próximas muitas vezes acabam se afastando dessas pessoas por conta do tabu estabelecido, forçando então a criação de novos laços afetivos, entretanto essa tentativa não é fácil uma vez que a fragilidade desse afastamento gera certos medos e incertezas diante da interação com novas pessoas.

O estereótipo do diagnóstico traz uma série de mudanças que causam impactos diferentes em cada um. Enquanto uns conseguem ressignificar da melhor forma possível e focar no cuidado com sua saúde para outros pode significar um agravamento no seu estado, evidenciando um maior adoecimento psíquico. É importante salientar que os estudiosos estão constantemente desenvolvendo protótipos de vacinas e drogas experimentais que auxiliem em uma possível cura ou que minimizem os impactos causados pelo vírus no organismo, proporcionando uma melhora na qualidade de vida dos sujeitos soropositivos.

REFERÊNCIAS

- ÁLVARO, J. L.; GARRIDO, A. **Psicologia Social: perspectivas psicológicas e sociológicas** – tradução Miguel Cabrera Fernandes; revisão técnica Ana Raquel Rosas Torres. – São Paulo : McGraw-Hill, 2010.
- BRASIL. Cai o número de casos e mortes causados pela Aids no país. **Governo do Brasil – Gov.br**. Dezembro de 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/12/cai-o-numero-de-casos-e-mortes-causados-pela-aids-no-pais#:~:text=No%20Brasil%2C%20em%202019%2C%20foram,%2C4%25%20do%20sexo%20feminino>.
- CHAVES, J. C. S. **Pacientes Portadores de Hiv/Aids: As repercussões subjetivas após o diagnóstico**. 2016. 20 p. Monografia (Especialização em Saúde Mental e Atenção Básica) – Escola de Medicina e Saúde Pública, Salvador.
- COSTA, M. S. **A concepção das pessoas com HIV/Aids acerca do estigma e da discriminação: um estudo junto ao serviço de assistência especializada em HIV/Aids e Hepatites virais (SAE) do município de Campina Grande-PB**. 2015. 94 p. Monografia (Graduação em Serviço Social) – Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande. 2015.
- COUTINHO, M. F. C.; ODWYER, G.; FROSSARD, V. Tratamento antirretroviral: adesão e a influência da depressão em usuários com HIV/Aids atendidos na atenção primária. **CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS DE SAÚDE (CEBES)**, v. 42, n. 116, p. 148-161, 2018.
- GAZZINELLI, M. F. et al. Educação em saúde: conhecimentos, representações sociais e experiências da doença. **Cadernos de Saúde Pública**, 21, 200-206, 2005.
- GONÇALVES, C.; WEBER, B.; ROSO, A. R. Compartilhamento do diagnóstico do HIV/AIDS: um estudo com mulheres. **Mudanças-Psicologia da Saúde**, v. 21, n. 2, p. 1-11, 2013.
- GOMES, A. M. T. et al. As facetas do convívio com o HIV: formas de relações sociais e representações sociais da AIDS para pessoas soropositivas hospitalizadas. **Esc Anna Nery**, 16(1), 111-20, 2012.
- GUARESCHI, P. A. **Textos em representações sociais** – 9. Ed. – Petrópolis, RJ : Vozes, 2007.
- HIPOLITO, R. L. et al. Qualidade de vida de pessoas convivendo com HIV/aids: relação temporal, sociodemográfica e perceptiva da saúde. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, 25, 2874, 2017.

- JODELET, D. Representações sociais: um domínio em expansão. In: JODELET, D. **As representações sociais** – Tradução Lílian Ulup. Rio de Janeiro: Editora da UERJ, 2001. p. 17- 44.
- KAWAGOE, J. et al. As dificuldades de adaptação do convívio social de pacientes portadores de HIV/AIDS. **Journal of Human Growth and Development**, 22(1), 93-97, 2012.
- LÔBO, A. L. D. S. F. et al. Representações sociais de mulheres frente a descoberta do diagnóstico do HIV. **Revista de Pesquisa, Cuidado é Fundamental Online**, 10(2), 334-342, 2018.
- MATTOS, R. S. O mal do século—A Aids e o Rock Brasil. In: **I Seminário Internacional História do Tempo Presente-ISSN 2237 4078**, 2014.
- MAZZOTTI, A. J. A. Representações sociais: aspectos teóricos e aplicações à educação. **Em aberto**, v. 14, n. 61, 2008.
- MEIRELLES, B. H. S. Percepções da qualidade de vida de pessoas com HIV/AIDS. **Northeast Network Nursing Journal**, 11(3), 2010.
- MINAYO, M.C.S. (Org.) **Pesquisa Social: teoria, método e criatividade**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2016.
- PEREIRA, A. J., & NICHATA, L. Y. I. A sociedade civil contra a Aids: demandas coletivas e políticas públicas. **Ciência & Saúde Coletiva**, 16, 3249-3257, 2011.
- PINHEIRO, P. N. C. et al. O cuidado humano: reflexão ética acerca dos portadores do HIV/AIDS. **Revista latino-americana de enfermagem**, 13(4), 569-575, 2005.
- PINTO, R. N. L. **MULHERES COM HIV/AIDS - MEDICINA, RELIGIÃO E FAMÍLIA NO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA**. 2015. 156 f. Tese (Doutorado em Ciências da Religião) – Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia-GO.
- REIS, S. L. A.; BELLINI, M. Representações sociais: teoria, procedimentos metodológicos e educação ambiental. **Acta Scientiarum. Human and Social Sciences**, v. 33, n. 2, 2011.
- SILVA, L. C. et al. Impacto psicossocial do diagnóstico de HIV/Aids em idosos atendidos em um serviço público de saúde. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, 18(4), 2015.
- SOUZA, M. C. M. R.; FREITAS, M. I. F. Representações de profissionais da atenção primária sobre risco ocupacional de infecção pelo HIV. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, v. 18, n. 4, p. 748-754, 2010.

VARELLA, D. **Coleção Doutor Dráuzio Varella: Guia Prático de Saúde e Bem-Estar – 1º ed.** – São Paulo: Gold Editora, 2009.

VILLARINHO, M. V. et al. Políticas públicas de saúde face à epidemia da AIDS e a assistência às pessoas com a doença. **Revista Brasileira de Enfermagem**, 66(2), 2013.

FREQUÊNCIA E CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DA ANEMIA NOS ADULTOS ATENDIDOS EM UM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EM FORTALEZA-CE

DOI: 10.51859/ampla.csa511.1121-35

Alcínia Braga de Lima Arruda ¹

Sonia Garcia Monteiro ²

¹ Professor Associado do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da Universidade Federal do Ceará -UFC

² Farmacêutica

RESUMO

As anemias mais comuns no mundo são a ferropriva e a anemia das doenças crônicas. Os pacientes acometidos por estas afecções podem apresentar apatia, sonolência, cansaço, emagrecimento e irritabilidade, comprometendo sua vida pessoal e profissional. O objetivo desse trabalho foi avaliar a frequência da anemia e caracterizar o tipo morfológico e a intensidade desta afecção entre adultos jovens e de meia idade. Trata-se de um estudo retrospectivo e descritivo realizado a partir da análise de laudos dos pacientes atendidos em um Laboratório Público de Análises Clínicas em Fortaleza-CE, no período de janeiro a junho de 2017. Foram utilizados os parâmetros da OMS para determinar a anemia e o grau de intensidade desta. A análise estatística foi feita utilizando o software EXCEL 2013 e o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará com o número do parecer 2.648.096. Os resultados mostram que dos 1.191 exames analisados, 555 foram selecionados obedecendo os critérios de exclusão e inclusão. A anemia acometeu 16,2% da população, sendo 11,7% de mulheres e 4,5% de homens. Segundo a gravidade, foi visto que 58,9% dos indivíduos apresentaram anemia de intensidade leve. Quanto a classificação morfológica, a maior proporção dos indivíduos apresentou anemia do tipo normocítica e normocrômica (43,3% das mulheres e 21,1% dos homens). Concluiu-se que a frequência de anemia foi relevante e apesar do estudo apresentar como limitação a ausência de outros marcadores biológicos para o diagnóstico desta, espera-se que esses dados possam contribuir para novas pesquisas.

Palavras-chave: Anemia. Ferro. Doença crônica.

1. INTRODUÇÃO

A anemia é caracterizada pela redução da concentração de hemoglobina, de acordo com o parâmetro de referência. Esta varia conforme o sexo, a idade e a situação fisiológica do indivíduo, bem como na altitude em que esse se encontra. Assim, a diminuição de hemoglobina culmina com a redução do aporte de oxigênio com consequente prejuízo aos tecidos orgânicos (WHO, 2011, p.1; MARQUES *et al.*, 2016, p.27).

A anemia pode ser causada pela deficiência de elementos essenciais à eritropoese; pela perda das hemácias por sangramento agudo ou crônico; pela destruição dos eritrócitos devido a presença de alterações genéticas ou em decorrência de agentes ou fatores que causam hemólise e, também, pela presença de processos inflamatórios, infecciosos crônicos ou neoplásicos (MARQUES *et al.*, 2016, p.27).

Dentre as causas supracitadas, a anemia relacionada a deficiência de ferro é a mais comum, correspondendo a mais de 50% dos casos no mundo (MACHADO *et al.*, 2019, p.2). Essa anemia ocorre quando a quantidade de ferro ingerida ou absorvida não é capaz de suprir as necessidades do organismo ou quando há perda deste elemento por sangramentos (CANÇADO; CHIATTONE, 2010, p.241; RODRIGUES; JORGE, 2010, p.49).

A carência de ferro pode ocorrer de forma lenta e progressiva no organismo e apresenta três estágios até que a anemia se instale: inicialmente há depleção do ferro em estoque, provocando redução da ferritina sérica, entretanto a concentração da hemoglobina e o nível de ferro sérico estão normais. Se o balanço negativo continua, ocorre o segundo estágio que se caracteriza pela deficiência de ferro sérico com diminuição dos níveis da saturação da transferrina e elevação da protoporfirina eritrocitária livre; e, por fim, ocorre a instalação da anemia ferropriva, com aumento do RDW e redução da hemoglobina, do hematócrito e dos índices hematimétricos, caracterizando uma anemia do tipo microcítica e hipocrômica (CARVALHO; BARACAT; SGARBIERI, 2006, p.57).

Com a anemia instalada os sintomas surgem gradualmente, tais como a palidez, tontura, apatia, sonolência, cansaço, anorexia, dispneia, irritabilidade, disfagia intensa, diminuição da libido e fertilidade, maior susceptibilidade às infecções, insuficiência

cardíaca, diminuição da concentração e memória com um impacto negativo no desempenho físico e mental dos indivíduos (CARVALHO; BARACAT; SGARBIERI, 2006, p.58; DE SANTIS, 2019, p.242).

A anemia ferropriva apresenta etiologia, fisiopatologia e tratamento diferente das outras anemias microcíticas e sua investigação laboratorial é complexa. Para contornar esse problema, utiliza-se o eritrograma, em especial os índices hematimétricos e o RDW, tendo em vista o baixo custo e a importância desses exames na elucidação das anemias. Porém, apesar do RDW auxiliar no diagnóstico da anemia, a confirmação desta deve ser feita com exames mais específicos, como a dosagem de ferro e ferritina (SUASSUNA, 2006, p.10; MATOS *et al.*, 2008, p.121; LEAL *et al.*, 2015, p.61).

Outra anemia relevante no nosso meio, sendo a segunda mais frequente nos pacientes com anemia e a primeira em pacientes acamados ou hospitalizados, é a anemia das doenças crônicas (ADC), a qual pode ocorrer em indivíduos que apresentam processo inflamatório associado a doenças crônicas (infecciosas ou não) e à neoplasia. Sua prevalência aumenta com a idade e é a anemia mais comum nos idosos (CANÇADO; CHIATTONE, 2002, p.128; p.5; LOPES, 2011, p.5).

A ADC ocorre no decurso de doenças inflamatória como resultado da ativação do sistema imune. Assim, a ação das citocinas inflamatórias pode comprometer a proliferação e diferenciação das células precursoras eritróides; o aumento das citocinas IL-1, TNF- α e INF- γ pode inibir a produção de eritropoetina pelos rins; o aumento da produção de interleucina 6 pode incrementar a produção de hepcidina, levando à diminuição da liberação do ferro dos macrófagos ao plasma e o estado de hiperatividade do sistema mononuclear fagocitário pode levar a redução da sobrevivência dos eritrócitos (CANÇADO; CHIATTONE, 2002, p.129; CARVALHO; BARACAT; SGARBIERI, 2006, p.59; LOPES, 2011, p.1; DE SANTIS, 2019, p.245).

Muitas vezes a anemia é diagnosticada ao acaso durante a realização de exames de rotina. E a sintomatologia da ADC é similar à de outras anemias e quando presente pode contribuir para o agravamento dos sintomas da doença de base (CANÇADO; CHIATTONE, 2002, p.132; DE SANTIS, 2019, p.245).

No eritrograma a anemia das doenças crônicas se caracteriza por ser do tipo normocítica e normocrômica, de intensidade leve a moderada e em 20 a 30% dos casos

pode ser microcítica e hipocrômica. Laboratorialmente, a concentração do ferro sérico e a saturação da transferrina apresentam-se diminuídos, a capacidade total de ligação do ferro está normal ou diminuída, enquanto a ferritina apresenta-se elevada. O diagnóstico diferencial da ADC com a anemia por deficiência de ferro é importante ser feito, pois ambas podem apresentar similaridade quanto aos índices hematimétricos (CANÇADO; CHIATTONE, 2002, p.133; DE SANTIS, 2019, p. 245).

No Brasil, a literatura mostra que a anemia ferropriva é mais prevalente em crianças com idade entre seis meses e cinco anos e nas gestantes (OSÓRIO *et al.*, 2001, p.102; AMARANTE *et al.*, 2015, p.39). Entretanto, há falta de dados no que se refere à frequência da anemia em adultos jovens e de meia idade. Assim, é importante a realização deste estudo que irá fornecer informações da anemia nessa parcela da população.

2. OBJETIVO

Avaliar a frequência da anemia e caracterizar o tipo morfológico e a intensidade desta entre os adultos jovens e de meia idade usuários dos serviços de um Laboratório Público de Análises Clínicas em Fortaleza-CE.

3. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo retrospectivo e descritivo que foi realizado a partir da análise de laudos dos usuários atendidos em um Laboratório Público de Análises Clínicas em Fortaleza-CE, no período de janeiro a junho de 2017.

A idade da população da pesquisa foi adaptada do estudo realizado por Gonçalves (2016), então considerou-se a fase de adultos jovens, correspondente à faixa etária de 21 aos 44 anos e adultos de meia idade, a faixa etária correspondente de 45 a 59 anos (GONÇALVES, 2016, p.94).

Foram utilizados os parâmetros da OMS para determinar a anemia e o grau de intensidade desta: as mulheres foram consideradas anêmicas quando o valor da hemoglobina era inferior a 12,0 g/dl, sendo anemia leve quando o valor da hemoglobina oscilava entre 11 e 11,9 g/dl; moderada entre 8 e 10,9 g/dl e grave quando menor que 8 g/dl. Nos homens, a anemia ocorria quando a dosagem de hemoglobina era inferior a

13,0 g/dl, sendo de grau leve quando a hemoglobina estava entre 11 e 12,9 g/dl; moderada quando o parâmetro de hemoglobina estava entre 8 e 10,9 g/d; e menor que 8 g/dl foi considerada grave (WHO, 2011, p.3).

Foram incluídos no estudo exames com os dados completos e que correspondessem a indivíduos com idade variando de 21 a 59 anos e foram excluídos os exames com dados incompletos, não correspondessem as idades supracitadas e aqueles pertencentes a gestantes.

Foi realizada a análise estatística descritiva simples utilizando o software EXCEL 2013 e o projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Ceará, sendo aprovado com número do parecer 2.648.096.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tabela 1 - Distribuição dos pacientes atendidos por um Laboratório Público de Análises Clínicas, segundo sexo e idade

Faixa etária (anos)	População	Sexo		N	%
		Feminino	Masculino		
21 – 44	Adultos	152	99	251	45,2
45 – 59	Adultos de meia- idade	190	114	304	54,8
Total		342	213	555	100

Fonte: Dados obtidos na pesquisa

No Laboratório Público de Análises Clínicas em Fortaleza-CE foram analisados 1.191 exames e após os critérios de exclusão, foram selecionados 555, dos quais, 45,2% pertenciam a adultos jovens (21 a 45 anos) e 54,8% a adultos de meia idade (45 a 60 anos). Sendo a predominância em ambos os grupos, do sexo feminino apresentados na tabela 1.

O resultado encontrado na presente pesquisa está em concordância com a literatura, mostrando que as mulheres, de modo geral, procuram mais os serviços de saúde, pois estas apresentam maiores necessidades do que os homens, especialmente

durante a gravidez e após o parto. Ademais, o sexo feminino se preocupa mais em relação à sua saúde, realizando com mais frequência exames de rotina e de prevenção (PINHEIRO *et al.*, 2002, p.687).

Tabela 2 - Distribuição dos pacientes atendidos por um Laboratório Público de Análises Clínicas, segundo a presença de anemia, sexo e idade

Faixa etária (anos)	Sexo							
	Feminino				Masculino			
	Não Anêmico		Anêmico		Não Anêmico		Anêmico	
	N	%	N	%	N	%	N	%
21 – 44	120	21,6	32	5,8	88	15,9	11	1,98
45 – 59	157	28,3	33	5,9	100	18,0	14	2,52
Total	277	49,9	65	11,7	188	33,9	25	4,50

Fonte: Dados obtidos na pesquisa

Na tabela 2 está descrito a frequência de anemia e foi visto que esta acometeu 16,2% da população, sendo 11,7% de mulheres e 4,5% de homens. Em ambos os sexos, a anemia predominou na faixa etária de 45 a 59 anos de idade.

O resultado supracitado (predomínio de anemia em mulheres de meia idade) não era esperado visto que, segundo a literatura, as mulheres jovens apresentam maior risco de ter anemia devido a presença de menstruação excessiva, gestações, mioma uterino e hiperplasia endometrial (RODRIGUES; JORGE, 2010, p.50).

Porém, foi encontrado um trabalho cujo resultado se assemelhou à presente pesquisa. Nesse estudo, realizado no período de setembro de 2009 a abril de 2014, com a revisão de 460 prontuários de pacientes cadastrados no ambulatório de Hematologia da ACISPES, na cidade de Juiz de Fora-MG, foi visto maior prevalência de anemia no sexo feminino, sendo mais frequente na faixa etária dos 41 a 50 anos, com 19,9% dos casos (RODRIGUES *et al.*, 2016, p.585).

Com relação a anemia nos homens de meia idade, essa provavelmente está relacionada à diminuição da testosterona nessa fase da vida. Esse hormônio masculino é um importante estimulador da eritropoese e a sua redução tem como consequência a

restrição do número de eritrócitos e dos níveis de hemoglobina no organismo (ROY *et al.*, 2017, p.481; MACHADO *et al.*, 2019, p.11).

No Brasil há poucos dados na literatura sobre a anemia em homens adultos, mas uma pesquisa realizada com 1.237 trabalhadores do sexo masculino, selecionados aleatoriamente através de prontuários médicos de um Serviço de Medicina Ocupacional de Salvador-Bahia, mostrou que 12,8% dos homens tinham anemia (SANTANA, 2001, p.109). Valor superior ao encontrado no presente estudo.

Tabela 3 - Distribuição dos pacientes atendidos por um Laboratório Público de Análises Clínicas, segundo a intensidade da anemia, sexo e idade

Faixa etária (anos)	Sexo	Intensidade da anemia					
		Leve		Moderada		Grave	
		N	%	N	%	N	%
21 – 44	Feminino	22	24,4	10	11,1	0	0
45 – 59	Feminino	15	16,7	14	15,6	04	4,4
21 – 44	Masculino	05	5,6	06	6,7	0	0
45 – 59	Masculino	11	12,2	03	3,3	0	0
Total		53	58,9	33	36,7	04	4,4

Fonte: Dados obtidos na pesquisa

Com relação à gravidade da anemia, foi visto que 58,9% dos indivíduos apresentaram anemia de intensidade leve, 36,7% anemia moderada e 4,4% grave, sendo que nas mulheres e homens, predominou a anemia leve com 41,1% e 17,8% dos casos, respectivamente (Tabela 3).

Vale ressaltar que, apesar da maioria dos pacientes apresentar anemia leve, uma parcela considerável tinha anemia moderada. Tal frequência merece atenção, pois quando a hemoglobina está entre 6 e 9g/dl o indivíduo pode apresentar dispneia, palpitações, taquicardia e fadiga ao menor esforço realizado (FAILACE, 2010, p.110).

Na literatura, encontrou-se trabalho com resultado semelhante ao da presente pesquisa. Estudo transversal realizado em Yaounde-Camarões com 236 adultos de ambos os sexos, mostrou predomínio de anemia no sexo feminino e que mais da metade das mulheres tinha anemia do tipo leve a moderada (JINGI *et al.*, 2018, p.3).

Trabalho realizado com base na população nacional de 12 províncias da Jordânia em 2017, com 1125 homens e 2797 mulheres com idade entre 18 e 90 anos, utilizando a classificação de severidade da anemia de acordo com a definição da OMS, mostrou que a anemia foi predominantemente leve em 81%, 57% e 65% dos homens, mulheres não grávidas e gestantes, respectivamente (ABDO *et al.*, 2019, p.345).

Tabela 4 - Distribuição dos pacientes atendidos por um Laboratório Público de Análises Clínicas, segundo a intensidade da anemia, índices hematimétricos e RDW

Índices Hematimétricos						
Faixa etária (anos)	Sexo	VCM, HCM e RDW normais		VCM, HCM diminuídos e RDW aumentado		VCM e RDW aumentados HCM normal
21 – 44	Feminino	21	23,3	11	12,2	0 0
45 – 59	Feminino	18	20,0	15	16,7	0 0
21 – 44	Masculino	06	6,8	04	4,4	01 1,1
45 – 59	Masculino	13	14,4	0	0	01 1,1
Total		58	64,5	30	33,3	02 2,2

Fonte: Dados obtidos na pesquisa

No que diz respeito a classificação morfológica das anemias, segundo os valores de VCM e HCM, a maior proporção dos indivíduos apresentou anemia do tipo normocítica e normocrômica (64,5% dos usuários, sendo 43,3% das mulheres e 21,2% dos homens) (Tabela 4).

Estudo transversal utilizando dados provenientes de exames laboratoriais da Pesquisa Nacional de Saúde, no qual foram incluídos 8.060 indivíduos com idades acima de 18 anos, mostrou que a prevalência de anemia foi de 9,9%, sendo a anemia do tipo normocítica e normocrômica a mais comum (56,0%) (MACHADO *et al.*, 2019, p.6).

Na presente pesquisa prevaleceu anemia normocítica e normocrômica em ambos os sexos e três hipóteses podem justificar esse achado: 1) presença de uma anemia microcítica e hipocrômica em tratamento; 2) estágio inicial da deficiência por

deficiência de ferro; 3) presença de doença crônica não transmissível (DCNT) na amostra pesquisada (ADAMSON, 2016, p.2901; SILVA, 2020, p.33).

No Brasil, estudos têm mostrado um aumento das doenças crônicas não transmissíveis na população adulta, associadas ao sedentarismo, obesidade, tabagismo, alimentação de má qualidade e uso abusivo de álcool nessa faixa etária (MALTA *et al.*, 2016, p.2). Por sua vez, o processo inflamatório decorrente da DCNT pode ser responsável pela anemia do tipo normocítica e normocrômica, pois as citocinas inflamatórias podem agir inibindo a produção de eritropoetina; suprimindo a resposta da medula óssea ao estímulo da eritropoetina e reduzindo a sobrevivência dos eritrócitos (CANÇADO; CHIATTONE, 2002, p.129; DE SANTIS, 2019).

Com relação às anemias com hemácias microcítica hipocrômica e RDW elevado, esta alteração estava presente em 33,3% dos casos (mulheres= 28,9% e homens= 4,4%) (Tabela 4). Esse tipo de anemia normalmente está associado com a carência de ferro e este déficit em indivíduos adultos pode ocorrer devido à deficiência nutricional, à má absorção do ferro e à perda sanguínea desse mineral seja pelo sangramento uterino anormal ou por problemas gastrointestinais (RODRIGUES; JORGE, 2010, p.50).

Estudo conduzido pela Faculdade de Medicina Rajah Muthiah-Índia, com 100 pacientes ambulatoriais, mostrou que a anemia estava presente principalmente nas mulheres, sendo a microcítica e hipocrômica o segundo tipo morfológico mais comum (SELVAMUTHUKUMARAN, 2018, p.L22).

No presente estudo foi encontrada uma baixa frequência de anemia macrocítica e esse dado era esperado, tendo em vista que esse tipo de anemia é a menos comum em nosso meio (Tabela 4).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados encontrados mostraram que a frequência de anemia foi maior nas mulheres adultas de meia idade e a anemia do tipo normocítica e normocrômica e de grau leve predominou na amostra total. Embora a frequência de anemia tenha sido relevante, o estudo apresentou como limitação a ausência de outros marcadores

biológicos para determinar a sua causa. Entretanto espera-se que os dados aqui gerados sirvam para subsidiar outras pesquisas.

REFERÊNCIAS

- ABDO, N.; DOUGLAS, S. *et al.* The prevalence and determinants of anaemia in Jordan. **EMHJ**. v. 25, n. 5, p.341-349, 2019.
- ADAMSON, J.W. Deficiência de ferro e outras anemias hipoproliferativas. In: KASPER DL, FAUCI AS, LONGO DL, BRAUNWALD E, HAUSER SL, JAMESON JL. **Harrison Medicina Interna**. 19. ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill Interamericana do Brasil Ltda. 2016.
- AMARANTE, M. K; OTIGOSSA, A; SUEIRO, A. C; OLIVEIRA, C. E. C; CARVALHO, S.R.Q. Anemia Ferropriva: uma visão atualizada. **Biosaúde**. v. 17, n. 1, p. 34-45, 2015.
- CANÇADO, R. D.; CHIATTONE, C. S. Anemia de doença crônica. **Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia**, v. 24, n. 2, p. 127-36, 2002.
- CANÇADO, R.D.; CHIATTONE, C.S. Anemia ferropênica no adulto -causas, diagnóstico e tratamento. **Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia**, v. 32, n. 3, p. 240-6, 2010.
- CARVALHO, M.C.; BARACAT, E.C.E.; SGARBIERI, V.C. Anemia Ferropriva e Anemia de Doença Crônica: Distúrbios do Metabolismo de Ferro. **Segurança Alimentar e Nutricional**. v.13, n.2, p. 54-63, 2006.
- DE SANTIS, G.C. Anemia: definição, epidemiologia, fisiopatologia, classificação e tratamento. **Medicina (Online)**. v.52, n.3, p.239-251, 2019.
- FAILACE, R. **Hemograma manual de interpretação**. 5ed. Porto Alegre: Artmed.
- GONÇALVES, J.P. Ciclo Vital Início, Desenvolvimento e Fim da Vida Humana Possíveis – Contribuições Para Educadores. **Contexto & Educação**. n. 98, p. 79-110, 2016
- JINGI, A.M. *et al.* Prevalence and associates of anemia in adult men and women urban dwellers in Cameroon: a cross-sectional study in a SubSaharan setting. **Ann Blood**. v. 3, p.1 -7, 2018.
- LEAL, K.S.T. *et al.* Relação entre os valores do VCM e do RDW-CV em hemogramas de pacientes atendidos no Laboratório de Análises Clínicas do Hospital das Clínicas em Itaperuna, RJ. **Acta Biomédica Brasiliensia**. v.26, p.59-67, 2015.
- LOPES, A.J.O.C. **Anemia da doença crônica artigo de revisão**. 2011. 76p. Dissertação (Mestrado Integrado em Medicina) – Faculdade de Medicina, da Universidade de Coimbra, 2011.

- MACHADO, I.E.; MALTA, D.C.; BACAL, N.S.; ROSENFELD, L.G.M. Prevalência de anemia em adultos e idosos brasileiros. **Rev Bras Epidemiol**, v.22, n.2, p. 2-15, 2019.
- MALTA, D.C.; BERNAL, R.T.I.; SOUZA, M.F.M.; SZWARCOWALD, C.L.; LIMA, M.G.; BARROS, M.B.A. Social inequalities in the prevalence of self-reported chronic non-communicable diseases in Brazil: national health survey 2013. **Int J Equity Health** v.15, n.153, p.2-11, 2016.
- MARQUES, F.; FONSECA, C. *et al.* Contextualizando a Elevada Prevalência de Anemia na População Portuguesa: Percepção, Caracterização e Preditores: Um Sub-Estudo do EMPIRE. **Rev. Soc. Portuguesa Medicina Interna**. v.23, n.4, p.26-38, 2016.
- MATOS, J.F.; DUSSE, L.M.S.; STUBBERT, R. V.B. *et al.* Índice de anisocitose eritrocitária (RDW): diferenciação das anemias microcíticas e hipocrômicas. **Rev. Bras. Hematol. Hemoter.** v.30, n.2, p.:120-123, 2008.
- OSÓRIO, M.M.; LIRA, P.I.; BATISTA-FILHO, M.; ASHWORTH, A. Prevalence of anemia in children 6-59 months old in the state of Pernambuco, Brazil. **Rev Panam Salud Publica**. v.10, n.2, p. 101-7, 2001.
- PINHEIRO, R.S. *et al.* Gênero, morbidade, acesso e utilização de serviços de saúde no Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 7, n. 4, p. 687-707, 2002.
- RODRIGUES, L.P.; JORGE, S. R. P. F. Deficiência de ferro na mulher adulta. **Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia**, v. 32, n. 2, p. 49-52, 2010.
- RODRIGUES, D.O.W. *et al.* Perfil do ambulatório de hematologia em um consórcio intermunicipal de saúde. **Rev. APS**. v.19, n.4, p. 582-59, 2016.
- ROY, C.N.; SNYDER, P.J.; STEPHENS-SHIELDS, A.J.; ARTZ, A.S.; BHASIN, S.; COHEN, H.J. Association of Testosterone Levels With Anemia in Older Men: A Controlled Clinical Trial. **JAMA Intern Med**. v.177, n.4, p. 480-90, 2017.
- SANTANA, V. S. *et al.* Morbidade em candidatos a emprego na região metropolitana de Salvador, Bahia, Brasil. **Cad. Saúde Pública**. v.17, n.1, p.107-115, 2001.
- SELVAMUTHUKUMARAN, S. A Clinical Study of Severity of Anaemia in Adults Attending Outpatient Department with Regard to Signs and Symptoms in Rural South Indian Medical College. **International Journal of Contemporary Medical Research**. v.5, p.L21- L24, 2018.
- SILVA, P.S.C. **Prevalência e fatores associados à recomendação por profissional de saúde e prática de atividade física no lazer em brasileiros com doenças crônicas**. 2020. 154p. Tese (Doutorado em Saúde Coletiva) - Centro de Ciências da Saúde, da Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2020. Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2020.

SUASSUNA, L. C. **Avaliação da utilidade do RDW na interpretação morfológica das anemias.** 2006. 20f. Monografia de Especialização em Hematologia Clínica. Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem. Universidade Federal do Ceará. Fortaleza, 2006.

WHO (World Health Organization). **Haemoglobin concentrations for the diagnosis of anaemia and assessment of severity.** Switzerland: Department of Nutrition for Health and Development (NHD), 2011.

CAPÍTULO XXXVI

PERFIL DE SENSIBILIDADE DE BACTÉRIAS ISOLADAS DA UROCULTURA DE PACIENTES DE UM LABORATÓRIO PRIVADO DE ANÁLISES CLÍNICAS NO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG

DOI: 10.51859/ampla.csa511.1121-36

Rubens Barbosa Rezende ¹

Isadora Moreira Costa do Nascimento Nogueira ²

¹ Graduando do curso de Biomedicina. Departamento de Biomedicina. Faculdade Santa Rita – FASAR. Conselheiro Lafaiete – MG, Brasil.

² Mestra em Biomedicina – Medicina pelo Instituto de Ensino e Pesquisa da Santa Casa de Belo Horizonte – SCBH. Belo Horizonte - MG, Brasil.

RESUMO

A infecção do trato urinário (ITU) é determinada pela presença de microrganismos patogênicos que invadem os tecidos urinários, e de acordo com sua localização é classificada em infecção urinária baixa e alta. Objetivou-se avaliar a prevalência e o perfil de sensibilidade aos antimicrobianos de bactérias isoladas de amostras de urinas de mulheres provenientes de um Laboratório privado de Análises Clínicas no município de Conselheiro Lafaiete-MG. Foi realizado um estudo observatório transversal, do tipo quantitativo, visando à coleta de dados secundários sobre a prevalência e o perfil de sensibilidade de bactérias isoladas das uroculturas positivas em pacientes do gênero feminino com faixa etária entre 18 a 60 anos, no período de janeiro a dezembro de 2019. No período do estudo foram identificadas neste laboratório 226 uroculturas positivas provenientes de mulheres dentro da faixa etária estipulada. A bactéria Gram negativa *Escherichia coli* foi a mais prevalente nas quatro estações (66,37%). Já a Gram positiva *Enterococcus* sp. (3,54%) foi mais frequente no outono. Amoxicilina/clavulanato, ceftriaxona e nitrofurantoina foram os antimicrobianos com menor taxa de resistência por parte de *E. coli* (90%; 93,33% e 97,33% de sensibilidade, respectivamente). E em relação às bactérias Gram positivas prevalentes, ampicilina foi a que mostrou maior sensibilidade. É fundamental instruir os pacientes a respeito dos perigos que a ITU pode acarretar e reforçar que a recomendação terapêutica correta é muito importante, do mesmo modo que a posologia determinada pelo médico, com o propósito de dificultar o aparecimento de cepas mais resistentes diante da utilização inapropriada desses antimicrobianos.

Palavras-chave: Bactérias. *Escherichia coli*. Infecções. Infecções bacterianas. Infecções urinárias.

1. INTRODUÇÃO

A infecção do trato urinário (ITU) é determinada pela presença de microrganismos patogênicos que invadem os tecidos urinários, e de acordo com sua localização é classificada em infecção urinária baixa e alta (OLIVEIRA, 2018). Segundo Tortora, Funke e Case (2017) as ITU são descritas em fases distintas, desde uma uretrite a uma pielonefrite. Inicialmente, é constatada a inflamação da uretra (uretrite), e se não tratada, a princípio, essa inflamação pode atingir por via ascendente a bexiga (cistite) e com capacidade de acometer os ureteres (uréterite). O risco mais significativo deste tipo de infecção é que os microrganismos podem se deslocar pelos ureteres, alcançando os rins (pielonefrite). Em casos mais graves pode-se ter uma evolução a septicemia, o que pode culminar em óbito do paciente. Segundo Oliveira (2018) no Brasil, as ITU são descritas como infecções bacterianas mais comuns, sendo responsáveis por 80 em cada 1.000 consultas clínicas. A etiologia e a prevalência das ITUs necessitam de vários fatores como: distribuição geográfica, idade, sexo, comorbidades concomitantes, dentre outras (CATTO et al., 2016).

O sexo feminino se comparado ao masculino é mais vulnerável, isso se dá pela anatomia da uretra ser mais curta e da proximidade da genitália com o ânus, sendo a via ascendente a sua principal via de contaminação. A probabilidade de uma mulher na fase adulta desenvolver ITU é de cinquenta vezes superior quando comparada aos homens (RORIZ et al., 2010). É significativa a parcela de mulheres acometidas, incluindo variadas faixas etárias, especialmente nos períodos pré e pós gestacional (acomete de 10% a 12% das gestantes) (LIMA e LIMA, 2018; DE CARVALHO et al., 2018). Segundo Piçarra (2015) a flora presente na porção distal da uretra é majoritariamente composta por bactérias Gram positivo (*S. epidermidis*, *Streptococcus* spp. e *Lactobacillus* spp.), que desempenham um papel de defesa local.

As ITUs podem ser classificadas como sintomáticas ou assintomáticas. Os sinais e sintomas relacionados a esta infecção são poliúria, disúria, alteração na cor e no aspecto da urina e odor forte, podendo também ocorrer febre e dores abdominais no paciente (BRAGGIATO e LAZAR, 2016). Elas são de grande relevância clínica pelo fato dos agentes etiológicos desenvolverem mecanismos de resistência, isso acontece devido ao uso exacerbado e inapropriado dos antimicrobianos, principalmente no âmbito

nosocomial, uma vez que deveria ser realizada de forma racional a prescrição do fármaco de acordo com o diagnóstico concreto e não com base em dados epidemiológicos frente às principais bactérias relacionadas a estas infecções (KADOSAKI; SOUSA; BORGES, 2012; LOUREIRO et al., 2016). A origem da resistência bacteriana se dá por mutação e recombinação de genes, outro fato relacionado é a ausência de antimicrobianos para serem usados na terapia de casos mais graves, sendo necessários antibióticos de última geração; porém, o número de resistências bacterianas é mais rápido do que o processo de descobrimento de novos antimicrobianos (GRILLO et al., 2013; LOUREIRO et al., 2016).

Para a prevenção das complicações geradas pela ITU, é importante o diagnóstico precoce, bem como a identificação do microrganismo envolvido e seu perfil de suscetibilidade aos antimicrobianos, que conduzirão ao tratamento adequado (FIGUEIREDO et al., 2012; DUARTE et al., 2008).

Dentre as bactérias envolvidas em ITU, destaca-se *Escherichia coli* (*E. coli*), pertence à família Enterobacteriaceae, é um bacilo Gram negativo, bactéria anaeróbia facultativa, responsável por aproximadamente 90% dos casos (SIQUEIRA, et al., 2018). Outras bactérias constantes nas ITU são *Staphylococcus saprophyticus*, *Proteus mirabilis*, *Streptococcus agalactiae* e o gênero *Klebsiella* spp. Também podem acometer, esporadicamente, fungos do gênero *Candida* spp. (KAPER, 2004; ALÓS, 2005; SCHENKEL et al. 2014;). Segundo Wiest e colaboradores (2009) a *E. coli*, faz parte das bactérias do grupo coliforme, subdividindo-se em vários biótipos e sorotipos, alguns dos quais patogênicos em potencial para o homem, sendo os alimentos e a água suas principais fontes de infecção.

De acordo com Levinson (2016), a *E. coli* é fermentadora de lactose, sendo esta uma característica que a distingue dos dois principais patógenos intestinais, *Shigella* spp. e *Salmonella* spp. Ela possui três antígenos usados para identificação do organismo em investigações epidemiológicas: o antígeno O (ou parede celular); o antígeno H (ou flagelar); e o antígeno K (ou capsular). Existem mais de 150 antígenos O, 50 H e 90 K, as muitas combinações somam em mais de 1.000 tipos antigênicos de *E. coli*. Os sorotipos específicos estão ligados a determinadas doenças; como por exemplo, O55 e O111 que causam surtos de diarreia neonatal, e a O157 entero-hemorrágica que tem como

reservatório o gado bovino, e sendo transmitida através da ingestão de carne malcozida (LEVINSON, 2016).

Assim, devido as ITU apresentarem importante relevância clínica sendo responsáveis por 80 em cada 1.000 consultas, pelo fato dos agentes etiológicos desenvolverem mecanismos de resistência aos antimicrobianos, e por serem classificadas como infecções bacterianas mais comuns, é significativo a parcela de mulheres acometidas, incluindo variadas faixas etárias, especialmente nos períodos pré e pós-gestacional (acomete de 10% a 12% das gestantes). Estima-se que, mais de 50% das mulheres apresentarão um episódio de ITU durante a vida e pelo menos 25% terão uma ou mais recorrências, justifica-se assim, a realização do presente trabalho. Para tanto, no presente estudo avaliou-se a prevalência e o perfil de sensibilidade aos antimicrobianos de bactérias isoladas de amostras de urinas de pacientes de um Laboratório privado de Análises Clínicas no município de Conselheiro Lafaiete-MG.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo observatório transversal, do tipo quantitativo, visando a coleta de dados secundários sobre a prevalência e o perfil de sensibilidade de bactérias isoladas das uroculturas positivas em pacientes do gênero feminino com faixa etária entre 18 a 60 anos. Foram consideradas culturas positivas as placas que apresentaram contagem de unidades formadoras de colônia (UFC) por mililitro (mL) de urina não centrifugada maior ou igual a 10⁵ UFC/mL, de acordo com as recomendações do *Clinical and Laboratory Standards Institute* (CLSI, 2014), mesmo que alguns desses exames fossem realizados pela mesma paciente, em ocasiões diferentes. As informações obtidas serão referentes ao ano de 2019, cujos dados serão confrontados com o embasamento técnico científico.

O laboratório onde os dados serão obtidos está localizado no município de Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais, região sudeste do Brasil, ocupando uma área territorial de 369.544 km². Sua população é composta por 128.589 habitantes segundo o último censo demográfico em 2010 (IBGE, 2019).

A comparação em questão acontecerá apoiando-se em artigos científicos, teses e dissertações encontrados em bases de dados como SciELO (Scientific Eletronic Library

Online), LILACS (Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e Medline (Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica), no site da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), como também em livros de Microbiologia. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob protocolo número CAAE: 30767220.0.0000.8122.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

No período em estudo, 470 uroculturas foram realizadas no laboratório de Análises Clínicas. Destas, 226 (48,09%) foram de mulheres cujas idades variaram entre 18 e 60 anos (média de $43,15 \pm 13,1$ anos). Não foram apurados dados clínicos das pacientes e não foram descritos os exames que corresponde a casos de ITU sintomática ou de bacteriúria assintomática. Entre as 226 uroculturas positivas, 188 (83,19%) corresponderam a bactérias Gram negativas, 38 (16,81%) a bactérias Gram positivas.

Pires e colaboradores (2007) diz que o exame visto como padrão ouro para diagnóstico da infecção urinária é a urocultura, pois é um importante método que caracteriza e quantifica as bactérias que proporcionam a infecção no indivíduo, permitindo assim o seu isolamento para consecutivo estudo da sensibilidade frente aos antimicrobianos por meio do antibiograma.

Entre as bactérias isoladas, *E. coli* foi predominante (150/226; 66,37%), seguida por *Enterococcus* sp. (16/226; 7,09%), *Klebsiella* sp. (13/226; 5,75%), *Staphylococcus aureus* (11/226; 4,87%) e *Staphylococcus* sp. (11/226; 4,87%). As demais bactérias em associação corresponderam a 11,05% do total de isolamentos, dispostos na (Tabela 1). Brambilla e colaboradores (2019) em seu trabalho realizado em um laboratório da região do Noroeste do Paraná, mostraram-se semelhantes aos resultados obtidos neste atual estudo, no qual a *E. coli* foi o microrganismo mais isolado (66,37%), seguido pelo gênero *Klebsiella* sp. (5,75%), o que se encontra em conformidade com outros autores, uma vez que o gênero *Klebsiella* sp. também é um gênero de bactérias bacilares, gram negativas, e que é mais encontrado seguido da *E. coli* com 7,9% segundo Correia et al., (2007); 8,12% segundo Araujo e Queiroz (2012); 10,4% segundo Machado et al., (2019) e 12% Brambilla et al. (2019). Quadros leves de infecção são desencadeados pela família das Enterobacteriaceae, entretanto a *E. coli* extra intestinal (UPEC) dispõe de fatores de

virulência que amplia a sua patogenicidade, contribuindo para a adesão na parede uretral e com isso provocando problemas renais (MOURA, 2011).

A alta prevalência da *E. coli* se dá pelo fato da bactéria fazer parte da flora intestinal normal, da uretra na mulher ser mais curta, e da maior proximidade do ânus com o vestíbulo vaginal (HEILBERG et al., 2003), o que a torna um dos principais agentes envolvidos em casos de bacteriúria feminina por razões anatômicas (ANDABATI et al., 2010).

Menin e Graziotin (2010), na cidade de Campus de Erechim/RS, observaram uma espécie pouco comum como a *Klebsiella ozaenae*, sua prevalência foi de (1/36; 2,77%), e no atual estudo foi de (1/226; 0,44%). Trata-se de um subtipo de *K. pneumoniae*, e tem sido um motivo conhecido de doença inflamatória crônica das vias aéreas superiores, além de ITU, abscesso hepático, infecções de tecidos moles dentre outras patologias (ABBAS et al., 2019).

Tabela 1 – Prevalência de microrganismos em uroculturas de mulheres entre 18 a 60 anos no período de janeiro a dezembro de 2019.

Bactérias	Prevalência	
	n	(%)
<i>Escherichia coli</i>	150	66,37
<i>Enterococcus</i> sp.	16	7,09
<i>Klebsiella</i> sp.	13	5,75
<i>Staphylococcus aureus</i>	11	4,87
<i>Staphylococcus</i> sp.	11	4,87
<i>Enterobacter</i> sp.	9	3,99
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	5	2,21
<i>Proteus</i> sp.	5	2,21
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	2	0,88
<i>Klebsiella ozaenae</i>	1	0,44
<i>Proteus penneri</i>	1	0,44
<i>Providencia</i> sp.	1	0,44
<i>Morganella morganii</i>	1	0,44
Total	226	100

Fonte: Elaborada pelos autores, 2020.

A *Morganella morganii* esteve presente em apenas um indivíduo no trabalho de Brambilla et al. (2019), no atual estudo também, estando assim em concordância. Rempel, Tizzot e Vasco (2011) descreve que o bacilo Gram negativo habitualmente provoca ITU e também no respiratório. É relatado por Liu et al. (2016), que a bactéria está presente em 8,1 % das ITU, entretanto, Brambilla et al. (2019) obteve um resultado

menor, 4%, e no presente estudo obteve 0,44%. Dado este inferior quando comparado aos outros estudos apresentados, porém deve-se levar em conta o número amostral de uroculturas, sendo cada trabalho um número diferente.

O antibiograma é tido como uma das provas mais relevantes para tratamento de ITU, pois trata-se de um método de fácil execução e por ser prático. Devido à grande diversidade de antimicrobianos no mercado, é essencial a análise destes medicamentos em relação aos agentes etiológicos da ITU, deste modo agindo de forma preventiva ao fracasso terapêutico e provável resistência bacteriana (SANTOS, et al., 2012; APOLINÁRIO, et al., 2014).

As cinco bactérias mais prevalentes no intervalo pesquisado foram analisadas em relação à sensibilidade aos antimicrobianos. Duas delas eram Gram negativas (*E. coli* e *Klebsiella* sp.), correspondendo a 163 uroculturas, e três eram Gram positivas (*Enterococcus* sp., *Staphylococcus aureus* e *Staphylococcus* sp.), correspondendo a 38 uroculturas. *E. coli* apresentou resistência para ampicilina (36,67%) e norfloxacin (24%) e boa sensibilidade a amoxicilina/clavulanato, ceftriaxona e nitrofurantoína (90%; 93,33% e 97,33% respectivamente). Já a *Klebsiella* sp. demonstrou alta resistência para ampicilina (100%) e boa sensibilidade a nitrofurantoína (100%) apresentado na (Tabela 2).

Araujo e colaboradores (2017) evidenciou a capacidade dos microrganismos se tornarem resistentes ao uso clínico dos antimicrobianos, enfatiza ainda que tal resistência pode ser passada por fatores genéticos, tais como mutações e variam conforme a situação do paciente, como por exemplo faixa etária, recidiva de ITU e o uso inadequado destes medicamentos.

A *E. coli* se apresentou-se mais resistente em dois antimicrobianos, um deles foi a ampicilina (36,67%) e o outro é a norfloxacin (24%). Correia e colaboradores (2007) em seu trabalho enfatiza que a fraca ação da ampicilina sobre a bactéria *E.coli* pode estar relacionada a produção de beta lactamases sendo necessário assim a associação de outro antimicrobiano que seja inibidor desta enzima. Já o antimicrobiano norfloxacin pertencente ao grupo das fluoroquinolonas apresentou também uma baixa percentagem de susceptibilidade para a *E. coli*, o que pode atribuir-se à sua utilização massiva e indiscriminada na prática clínica e também na veterinária desde a sua introdução comercial, fato este confirmado por um estudo de 2001, onde a maior taxa

de utilização destes antimicrobianos era no continente europeu, mais precisamente em Portugal (MEI LAU, 2004; ANDREU, 2005). Em conformidade com os dados apresentados acima Machado et al. (2019) em seu trabalho obteve para *E. coli* alta resistência frente a ampicilina (41,9%) e para norfloxacin (19,10%) o que condiz também com o atual estudo.

Em relação as principais classes de antimicrobianos testados, a *E. coli* apresentou maior sensibilidade a classe dos Nitrofuranos (Nitrofurantoína 97,33%), seguida das cefalosporinas de terceira geração (Ceftriaxona 93,33%). Corroborando com Dias, Coelho e Dorigon (2015) em que foi observado sensibilidade acima de 90% para cefalosporinas de terceira geração e nitrofurantoína. Como também, diante do estudo de Koch et al. (2008) a classe dos aminoglicosídeos tiveram taxas pequenas de resistência, assim como a pesquisa realizada por Araujo e Queiroz (2012) que relata que a *E. coli* se mostrou pouco resistente a classe dos aminoglicosídeos com 13% para gentamicina, corroborando com o atual trabalho em que obteve-se 10,67%.

O gênero *Klebsiella* sp. se mostrou resistente a ampicilina 100%, o que corrobora com o trabalho de Lima (2017) em que a ampicilina apresentou 94% estando bem próximo do resultado encontrado. Em relação ao perfil de sensibilidade ela apresentou (100%) para ceftriaxona, 84,61% para amoxicilina/clavulanato e 92,3% para ciprofloxacina, norfloxacin, ampicilina/sulbactam e sulfametoxazol/trimetoprima, no trabalho de Dias, Coelho e Dorigon (2015), a sensibilidade encontrada foi de 83,3% a 100% para ceftriaxona, ciprofloxacina e norfloxacin, os outros não foram testados, tais valores estão de acordo com o atual estudo, já em Lima (2017), os resultados foram todos menores se comparados com o atual trabalho, ceftriaxona apresentou 41%, amoxicilina/clavulanato 75%, ciprofloxacina 75%, norfloxacin 42%, ampicilina/sulbactam (não testado) e sulfametoxazol/trimetoprima 18%.

As enterobactérias *E. coli* e *Klebsiella* sp. apresentaram boa sensibilidade à classe dos aminoglicosídeos, 86% e 76,92%, respectivamente. O que se assemelha com o estudo de Dias, Coelho e Dorigon (2015), onde a *E. coli* apresentou 90% de sensibilidade e o gênero *Klebsiella* sp. apresentou sensibilidade de 83,3% a 100%.

Tabela 2 – Perfil de sensibilidade das bactérias Gram negativas mais frequentemente isoladas (n=163) em uroculturas de mulheres entre 18 a 60 anos no período de janeiro a dezembro de 2019.

Agente antimicrobiano	<i>Escherichia coli</i> (n = 150)		<i>Klebsiella sp.</i> (n = 13)	
	S (%)	R (%)	S (%)	R (%)
Ciprofloxacina	77,33	22,67	92,3	7,7
Norfloxacina	75,33	24	92,3	7,7
Ampicilina	57,33	36,67	0	100
Nitrofurantoina	97,33	1,33	100	0
Sulfazotrim	6	10,67	-	7,7
Gentamicina	86	10,67	76,92	15,4
Amoxicilina/clavulanato	90	9,33	84,61	15,4
Ampicilina/sulbactam	88,67	7,33	92,3	-
Ceftriaxona	93,33	4,67	100	-
Sulfametoxazol/trimetoprima	68	13,33	92,3	-

Nota: S (suscetível); R (resistente).

Fonte: Elaborada pelos autores, 2020.

Entre as bactérias mais prevalentes Gram positivas, a espécie *Staphylococcus aureus* apresentou frente à amoxicilina/clavulanato, ampicilina/sulbactam, ceftriaxona, ciprofloxacina e nitrofurantoina (100% de sensibilidade) e para norfloxacina, gentamicina, sulfametoxazol/trimetoprima e tetraciclina (90,9% de sensibilidade), já ampicilina apresentou boa sensibilidade (81,81%). Dentre os antibióticos testados para a referida bactéria, obteve baixa resistência em ampicilina, penicilina e eritromicina (18,19%; 9,1% e 9,1%, respectivamente) dispostos na (Tabela 3).

O gênero *Staphylococcus sp.* apresentou frente à gentamicina (100% de sensibilidade), ampicilina, amoxicilina/clavulanato, sulfametoxazol/trimetoprima e nitrofurantoina (90,9% de sensibilidade) ciprofloxacina, norfloxacina, ampicilina/sulbactam, ceftriaxona e tetraciclina (81,81% de sensibilidade). E em relação a resistência teve-se a penicilina, norfloxacina e ciprofloxacina (36,36%; 18,19% e 18,19%, respectivamente).

O gênero *Enterococcus spp.* foi o mais isolado dentro das Gram positivas (7,09%) sendo comum nas ITU, uma vez que estes habitam a microbiota do trato digestivo do ser humano e de animais (TAVARES, 2000), e também fazem parte do trato genital feminino (ANVISA, 2007) apresentando uma baixa patogenicidade ao indivíduo. Contudo, eles são agentes etiológicos em infecções urinárias e intra-abdominais, agindo como patógenos oportunistas em infecções hospitalares (TAVARES, 2000). Assim como no trabalho realizado por Lima (2017) no qual o gênero foi encontrado em 2% das uroculturas femininas, mostrando que o atual trabalho está em conformidade e que também foi o coco gram positivo mais prevalente. Lima (2017) ainda em seu estudo

obteve para o gênero *Enterococcus* spp. um perfil de resistência de 100% para norfloxacin e 91% a ciprofloxacina, diferindo do atual trabalho que obteve (37,5%) para ambos. Já em relação ao perfil de sensibilidade, a ampicilina apresentou (93,75%) o que está levemente inferior ao se comparar ao trabalho de Lima (2017) que apresentou (95%).

O antibiótico com menor índice de resistência é a nitrofurantoína, pois se foi reduzido o seu uso em consequência dos seus efeitos colaterais e também a chegada de novos antibióticos (ARAUJO; QUEIROZ, 2012; DIAS; COELHO; DORIGON, 2015).

Tabela 3 – Perfil de sensibilidade das bactérias Gram positivas mais frequentemente isoladas (n=38) em uroculturas de mulheres entre 18 a 60 anos no período de janeiro a dezembro de 2019.

Agente antimicrobiano	Enterococcus sp. (n = 16)		Staphylococcus aureus (n = 11)		Staphylococcus sp. (n = 11)	
	S (%)	R (%)	S (%)	R (%)	S (%)	R (%)
Ciprofloxacina	37,50	37,50	100	0	81,81	18,19
Norfloxacina	56,25	37,50	90,90	-	81,81	18,19
Ampicilina	93,75	-	81,81	18,19	90,90	9,10
Nitrofurantoína	6,25	-	100	0	90,90	9,10
Sulfazotrim	6,20	-	-	-	9,10	-
Gentamicina	12,50	-	90,90	-	100	0
Amoxicilina/clavulanato	6,25	-	100	0	90,90	-
Ampicilina/sulbactam	6,20	-	100	0	81,81	-
Ceftriaxona	-	6,25	100	0	81,81	9,10
SXT	-	-	90,90	-	90,90	-
Tetraciclina	25	68,75	90,90	-	81,81	9,10
Rifampicina	37,5	50	72,72	-	36,36	-
Clorafenicol	81,25	-	54,54	-	72,72	-
Penicilina	75	-	18,18	9,10	18,18	36,36
Vancomicina	6,25	-	-	-	-	-
Eritromicina	6,25	12,50	9,10	9,10	-	-
Clindamicina	-	-	45,45	-	-	-
Oxacilina	-	6,25	54,54	-	36,36	-

Nota: SXT (Sulfametoxazol/trimetoprima); S (suscetível); R (resistente).

Fonte: Elaborada pelos autores, 2020.

De acordo com o dicionário Houaiss, o termo “sazonal” é descrito como “relativo a estação do ano; próprio de uma estação; estacional”. Altizer e colaboradores (2006) dizem que as alterações sazonais são cíclicas, bastante previsíveis, e sem dúvida retratam a mais poderosa e universal fonte de transformações externas que influenciam sistemas naturais e humanos. Para Rodrigues (2018) mesmo sendo conhecida a correlação entre doenças infecciosas e sazonalidade, tem-se poucas informações sobre

os seus mecanismos e aspectos pouco compreendidos, os fatores associados a esse fenômeno e em particular nas infecções por BGN são ainda mais obscuros. Segundo Fisman (2007), as mudanças ambientais sazonais influenciam direta ou indiretamente na virulência de patógenos, como por exemplo, a temperatura, umidade e precipitação são determinantes na população, sobrevivência, virulência e transmissibilidade de patógenos.

Os meses que obtiveram mais casos de ITU de forma decrescente foram maio (32/226; 14,16%), fevereiro (25/226; 11,06%), julho (23/226; 10,17%), abril (22/226; 9,73%) e novembro (20/226; 8,85%), o restante dos meses ficaram abaixo de vinte casos por mês, totalizando (46,03%).

No verão, o mês que obteve mais casos de ITU foi fevereiro (11,06%), no outono foi maio (14,16%), no inverno foi julho (10,17%) e na primavera foi o mês de novembro (8,85%). A Tabela 4 traz dados referentes as estações, em ordem decrescente fica o outono com a maior prevalência de ITU (67/226; 29,65%), seguido do verão (54/226; 23,9%), inverno (53/226; 23,45%) e primavera (52/226; 23%), acredita-se que as taxas mais altas no outono e verão se dá pelo fato da alta temperatura, associada a umidade.

A bactéria mais prevalente nas quatro estações foi a Gram negativa *E. coli* (150/226; 66,37%), tendo destaque no outono, onde obteve maior prevalência se comparado aos outros meses, ficando com (41/226; 18,14%). Enquanto que, a Gram positiva *Enterococcus* sp. teve maior frequência no outono (8/226; 3,54%) e menor no inverno (1/226; 0,44%).

Tabela 4 – Influência da sazonalidade no quadro de prevalência de microrganismos em uroculturas de mulheres entre 18 a 60 anos no período de janeiro a dezembro de 2019, demonstrado em estações.

BACTÉRIAS	VERÃO	OUTONO	INVERNO	PRIMAVERA	TOTAL
<i>Escherichia coli</i>	40	41	36	33	150
<i>Staphylococcus</i> sp.	4	3	2	2	11
<i>Staphylococcus aureus</i>	-	4	3	4	11
<i>Enterococcus</i> sp.	5	8	1	2	16
<i>Enterobacter</i> sp.	1	2	1	5	9
<i>Klebsiella</i> sp.	2	2	8	1	13
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	-	3	1	1	15
<i>Klebsiella ozaenae</i>	-	-	-	1	1
<i>Proteus</i> sp.	1	3	-	1	5
<i>Proteus penneri</i>	1	-	-	-	1

<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	-	1	-	1	2
<i>Providencia sp.</i>	-	-	-	1	1
<i>Morganella morganii</i>	-	-	1	-	1
TOTAL POR ESTAÇÃO	54	67	53	52	226

Fonte: Elaborada pelos autores, 2020.

4. CONCLUSÃO

É fundamental a instrução aos pacientes a respeito dos perigos que a ITU pode acarretar e reforçar que, a recomendação terapêutica correta é muito importante, do mesmo modo que a posologia determinada pelo médico, com o propósito de dificultar o aparecimento de cepas mais resistentes diante da utilização inapropriada desses antimicrobianos. A partir dos resultados obtidos neste estudo, foi possível identificar que todos os objetivos foram alcançados, uma vez que se obteve o número de casos de infecções em pacientes do gênero feminino entre 18 a 60 anos, foi avaliado a estação com maior prevalência de ITU, apresentou-se em tabelas todos os patógenos encontrados, e descrito o perfil de sensibilidade das bactérias aos principais antimicrobianos de relevância clínica.

REFERÊNCIAS

- ABBAS, A. F. et al. Role of outer membrane proteins in virulence of *Klebsiella ozaenae* and antibiotic sensitivity. **IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series** 1294 (2019) 062088.
- ALÓS JL. Epidemiology and etiology of urinary tract infections in the community. Antimicrobial susceptibility of the main pathogens and clinical significance of resistance. **Enferm Infecc Microbiol Clin**. 2005;23(4):3-8.
- ALTIZER S, DOBSON A, HOSSEINI P, HUDSON P, PASCUAL M, ROHANI P. Seasonality and the dynamics of infectious diseases. **Ecol Lett**. 2006;9:467-84.
- ANDABATI G, BYAMUGISHA J. Microbial aetiology and sensitivity of asymptomatic bacteriuria among ante-natal mothers in Mulago hospital, Uganda. **Afr Health Sci**. 2010;10(4):349-52.
- ANDREU A, ALÓS JL, GOBERNADO M et al: Etiología y sensibilidad a los antimicrobianos de los uropatógenos causantes de la infección urinaria baja adquirida en la comunidad. **Enferm Infecc Microbiol Clin** 2005;23: 4-9.
- ANVISA. **Resistência microbiana – mecanismos e impactos clínicos. Enterococcus spp.** Modulo 3. 2007.Disponível

em:<http://www.anvisa.gov.br/servicosade/controlere/rede_rm/cursos/rm_control/opas_web/modulo3/gramp_entero.htm> Acesso em: 17 abr. 2020.

APOLINÁRIO TA, CAMPOS KAMS, TAVARES B, AGOSTINHO LA, FERNANDES FM. Prevalência de infecção urinária e resistência a antimicrobianos em um grupo de gestantes. **Rev Científica da Faminas**. 2014;10(2).

ARAÚJO MQ, CARVALHAIS RP, FARIA SO, MARINHO MF, SANTOS FM, SANTOS TGQA, et al. Perfil de resistência bacteriana em fômites de UTI em hospital público do estado do Tocantins. **Rev Cereus**. 2017;9 (2):126-41.

ARAUJO, K. L.; QUEIROZ, A. C. Análise do perfil dos agentes causadores de infecção do trato urinário e dos pacientes portadores, atendidos no Hospital e Maternidade Metropolitana - SP. **J Health Sci Inst**, v. 30, n. 1, p. 7-12, 2012.

BRAGGIATO CR E LAZAR CAEL. Infecções do trato urinário não complicada na mulher: relato de caso e revisão de literatura. **Rev da Faculdade de Ciências Médicas de Sorocaba**. 2016;18(4).

BRAMBILLA, G. G.; et al. Incidência de microrganismos em infecções no trato urinário e sua relação com o antibiograma em um laboratório da região do noroeste do paraná. **Rev. UNINGÁ**, Maringá, v. 56, n. 4, p. 85-97, out./dez. 2019.

CATTO, A. J. A. et al. Prevalência e perfil de resistência de escherichia coli em uroculturas positivas no município de Triunfo/RS. **Rev AMRIGS**. 2016;60(1):21-25.

Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing; Twenty-Fourth Informational Supplement, Document M100-S24. Wayne: **CLSI**; 2014;34(1):1-230.

CORREIRA, C. M. et al. Etiologia das infecções do tracto urinário e sua susceptibilidade aos antimicrobianos. **Acta Med Port**, v. 20, p. 543-549, 2007.

DE CARVALHO, F.L.O et al. Infecção urinária de repetição e os aspectos gerais, microbiológicos e imunológicos associados à saúde da mulher. **Revista de Saúde ReAGES**, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 24-30, nov. 2018. ISSN 2596-0970.

DIAS, ILO ODILON VILLA; COELHO, ALESSANDRA DE MELLO; DORIGON, IONARA. Infecção do trato urinário em pacientes ambulatoriais: prevalência e perfil de sensibilidade frente aos antimicrobianos no período de 2009 a 2012. **Saúde (Santa Maria)**, Santa Maria, Vol. 41, n. 1, Jan./Jul, p. 209-218, 2015.

DUARTE, G. MARCOLIN, A.C. QUINTANA, S.M. CAVALLI, R.C. Infecção urinária na gravidez. **RevBrasGinecol Obstet**. 30(2):93-100, 2008.

FIGUEIREDO A, GOMES G, CAMPOS A. Urinarytractinfections in pregnancy – diagnosistreatmentandprevention. **Acta ObstetGinecol Port**. 2012;6(3):124-33.

- FISMAN DN. Seasonality of infectious diseases. **Annu Rev Public Health**. 2007;28:127-43.
- GRILLO VTRDS, GONÇALVES TG, CAMPOS JJ, PANIÁGUA NC, TELES CBG. Incidência bacteriana e perfil de resistência a antimicrobianos em pacientes pediátricos de um hospital público de Rondônia, Brasil. **Rev Ciênc Farm Básica Apl**. 2013;34(1):117-23.
- HEILBERG IP, SCHOR N. Abordagem diagnóstica e terapêutica na infecção do trato urinário – Itu. **Rev Assoc Med Bras**. 2003;49(1):109-16.
- HOUAISS A. **Dicionário Houaiss da língua portuguesa**. São Paulo: Objetiva, 2001.
- IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística Brasil/ **Minas Gerais/ Conselheiro Lafaiete**, 2019. Disponível em: <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/conselheirolafaiete/pesquisa/33/29171?tipo=ranking>> Acesso em: 14 fev. 2020.
- KADOSAKI, L. L.; SOUSA, S. F.; BORGES, J. C. M. Análise do uso e da resistência bacteriana aos antimicrobianos em nível hospitalar. **Rev Bras Farm**, v. 93, n. 2, p. 128-135, 2012.
- KAPER JB, NATARO JP, MOBLEY HLT. Pathogenic Escherichia coli. **NatRev Microbiol**. 2004;2:123-40.
- KOCH, C. R. et al. Resistência antimicrobiana dos uropatógenos em pacientes ambulatoriais 2000-2004. **Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical**, v. 41, n. 3, p. 277-281, 2008.
- LEVINSON, W. **Microbiologia médica e imunologia**. 13. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.
- LIMA, A. D. P. **Perfil de infecções bacterianas do trato urinário e resistência aos antibióticos**. 2017. v. 41, n. 3, p. 277-281.
- LIMA, A.R.V. LIMA, L.R. Infecção urinária na gestação: Uma revisão de literatura. **Mostra Interdisciplinar do curso de Enfermagem**, ISSN: 2448-1203. 2018.
- LIU, H. et al. Morganella Morganii, a non-negligent opportunistic pathogen. **International Journal of Infectious Diseases**, v. 50, p. 10-17, 2016.
- LOUREIRO RJ, ROQUE F, RODRIGUES AT, HERDEIRO MT, RAMALHEIRA E. O uso de antibióticos e as resistências bacterianas: breves notas sobre a sua evolução. **Revista Portuguesa de Saúde Pública**. 2016;34(1):77-84.
- MACHADO, A. D. et al. Prevalência de infecção urinária em um laboratório de análises clínicas da cidade de Jaraguá do Sul, SC, no ano de 2017. **RBAC**. 2019;51(3):213-8.

- MEI LAU S, PENG M, CHANG F: Resistance rates to commonly used antimicrobials among pathogens of both bacteremic and non-bacteremic community-acquired urinary tract infection. **J Microbial Immunol Infect** 2004; 37:185-191.
- MENIN VT, GRAZZIOTIN, NA. Infecções do Trato Urinário Diagnosticadas no Laboratório Universitário da URI - Campus de Erechim/RS. **Revista Brasileira de Análises Clínicas**. 2010; 42(4): 307-10.
- MOURA, L. B. A incidência de infecções urinárias causadas por E. coli. **Revista Olhar Científico**, v. 01, n. 2, p.411-426, 2011.
- OLIVEIRA, S. M; SANTOS, L. L. G. Infecção do trato urinário: estudo epidemiológico em prontuários laboratoriais. **Journal Health NPEPS**. 2018; 3(1):198-210.
- PIÇARRA, Ana Margarida Faquínéu. **Infecções Urinárias: Aspectos Microbiológicos e Epidemiológicos**. Dissertação apresentada para a obtenção do Grau de Mestre em Ciências Farmacêuticas no curso de Mestrado Integrado e Ciências Farmacêuticas conferido pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Lisboa, 2015.
- PIRES MCS, FROTA KS, MARTINS POJ, CORREIA AF, CORTEZ-ESCALANTE JJ, SILVEIRA CA. Prevalência e suscetibilidades bacterianas das infecções comunitárias do trato urinário, em hospital universitário de Brasília, no período de 2001 a 2005. **Rev Soc Bras Med Trop**. 2007;40(6):643-7.
- REMPEL, L. C. T.; TIZZOT, M. R. P. A.; VASCO, J. F. M. Incidência de infecções bacterianas em pacientes queimados sob tratamento em hospital universitário de Curitiba. **Rev Bras Queimaduras**, v. 10, n. 1, p. 3-9, 2011.
- RODRIGUES, F. S. **Fatores Associados à Aquisição Nosocomial de Bacilos Gram-Negativos no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu em Diferentes Estações do Ano: Um Estudo Tipo Caso-Caso**. Botucatu, 2018.
- RORIZ JSF, VILAR FC, MOTA LM, LEAL CL, PISI PCB. Infecção do trato urinário. **Rev USP**. 2010;43(2):118-25.
- SANTOS TKP, SANCHES IT, PITTNER E, SANCHES HF. Identificação e perfil antimicrobiano de bactérias isoladas de urina de gestação atendidas na irmandade da Santa casa de misericórdia de Prudentópolis, Paraná. **Semina: Ciências Biológicas e da Saúde**. 2012;33(2):181-92.
- SCHENKEL DF, DALLÉ J, ANTONELLO VS. Microbial etiology and susceptibility of community urinary tract infections during pregnancy in the South of Brazil. **Rev Bras Ginecol Obstet**. 2014;36(3):102-6.
- SILVEIRA, S. A. et al. Prevalência e susceptibilidade bacteriana em infecções do trato urinário de pacientes atendidos no Hospital Universitário de Uberaba. **RBAC**, v. 42, n. 3, p. 157-160, 2010.

- SIQUEIRA, M. L. B. et al. Avaliação de infecção urinária em gestantes atendidas pela unidade municipal de saúde de Rondonópolis, MT. **Biodiversidade**. 2018;17(3):145-53.
- TAVARES, W. Bactérias Gram-positivas problemas: resistência do estafilococo, do enterococo e do pneumococo aos antimicrobianos. **Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical**, v. 33, n. 3, p. 281-301, 2000.
- TORTORA GJ, FUNKE BR, CASE CL. Doenças Microbianas dos Sistemas Urinário e reprodutor. In: Tortora GJ, Funke BR, Case CL. **Microbiologia**. Tradução Roberta Marchiori Martins. Porto Alegre: Artmed; 2017.
- WIEST JM, CARVALHO HHC, AVANCINI CAM , GONÇALVES AR. Inibição e inativação de Escherichia coli por extratos de plantas com indicativo etnográfico medicinal ou condimentar. **Ciênc. Tecnol. Aliment.**, Campinas, 29(3): 474-480, jul.set. 2009.

BENEFÍCIOS NUTRICIONAIS DO LEITE DE JUMENTA PARA CRIANÇAS ALÉRGICAS A PROTEÍNA DO LEITE DE VACA

DOI: 10.51859/amplla.csa511.1121-37

Maria Arniele Pereira Silva ¹

Thaís da Silva Alves de Lemos ²

Rayane Chagas Cavalcanti ³

Manuelle Januário Souza ⁴

César Taynã Pereira dos Santos ⁵

Yolanda Gomes Torres Pinto ⁶

¹ Graduanda do curso de Enfermagem. Faculdade CESMAC do Sertão – FCS.

² Graduanda do curso de Enfermagem. Faculdade CESMAC do Sertão – FCS.

³ Graduanda do curso de Enfermagem. Faculdade CESMAC do Sertão – FCS.

⁴ Graduanda do curso de Enfermagem. Faculdade CESMAC do Sertão – FCS.

⁵ Médico Veterinário pelo Centro Universitário CESMAC. Pós-graduando em Nutrição e Alimentação de ruminantes.

⁶ Enfermeira, mestranda em Educação para Saúde.

RESUMO

Este capítulo tem como objetivo reunir informações a cerca do leite de jumenta como alternativa nutricional para crianças alérgicas a proteína do leite de vaca. Trata-se de revisão integrativa da literatura elaborada com artigos presentes nas bases de dados SciELO e PubMed por meio dos descritores: Hipersensibilidade a leite, Assistência Integral a saúde da criança, Alimentação alternativa, considerando ano de publicação 2013 a 2020. Encontrados inicialmente 14 artigos, ao utilizar critérios de elegibilidade, apenas 7 foram selecionados para compor a revisão integrativa. Os resultados apontam que o leite de jumenta apresenta similaridade em composição, palatabilidade, alto valor nutritivo e possui menor concentração de β -lactoglobulina e caseína, o que provavelmente está relacionado com características hipoalergênicas. Sendo assim, pode ser consumido como alternativa de consumo ao leite humano, uma vez que é o que mais se assemelha ao leite humano. O leite de jumenta tem se mostrado eficiente principalmente em casos de crianças alérgicas a proteína do leite da vaca. Sendo assim, é necessário propagar conhecimentos referentes a ele, visto que é pouco abordado e trata-se de boa alternativa substitucional por ser alimento similar ao humano em proteínas, lactose, minerais e estudos confirmam o seu uso como alimento seguro e válido.

Palavras-chave: Hipersensibilidade a leite. Assistência Integral a saúde da criança. Alimentação alternativa.

1. INTRODUÇÃO

Qualquer alimento pode vir a causar alergia alimentar, porém, em lactentes e crianças pequenas, o leite de vaca se apresenta como o principal responsável. A prevalência da alergia alimentar varia entre 5% na população pediátrica, com indícios de que sua prevalência vem aumentando na última década. No que se diz respeito à Alergia a Proteína do Leite de Vaca (APLV), se tem prevalência em torno de 2,5% em crianças e 0,3% em adultos, segundo Sicherer e Sampson (2010) apud Rocha Filho, Scalco, Pinto (2014).

A alergia alimentar é um problema nutricional contemporâneo e em evolução (ARANDA et al., 2018). Resultante de resposta imunológica específica e reprodutível da exposição a determinado antígeno alimentar, geralmente uma proteína, associada a uma resposta imunitária hipersensível (HO; WONG; CHANG, 2014).

Ainda conforme o autor supracitado, as manifestações da APLV iniciam nos primeiros meses ou dias de vida e, na maioria dos casos, é uma condição transitória, que dificilmente persiste além do segundo ano de vida, podendo desencadear sintomas diversos, dependendo do mecanismo imunológico envolvido. A maioria das reações ocorre logo após a ingestão, devido à produção excessiva de imunoglobulina E (IgE) para determinado alimento. Estas reações podem atingir pele e/ou mucosas, vias respiratórias e os sistemas gastrintestinal e cardiovascular, de forma isolada ou combinada (HO; WONG; CHANG, 2014).

Ao final do século XIX, o leite de jumenta era bastante utilizado na alimentação de crianças órfãs na França, uma vez que, esse leite apresenta similaridade em composição, palatabilidade, tem alto valor nutritivo, pode ser consumido como alternativa de consumo ao leite humano, na alimentação de crianças com intolerância à proteína do leite de vaca e o que mais se assemelha ao leite humano (MANSUETO et al., 2013).

Além da importância para a progênie, o leite de jumenta pode ser uma alternativa para crianças alérgicas a certos componentes do leite de vaca, como a β -lactoglobulina que está presente em menor quantidade. Ainda assim, esse leite possui efeito hipolipêmico capaz de influenciar a homeostase metabólica e o estado

inflamatório, modulando a função mitocondrial e a composição microbiana intestinal (TRINCHESE et al., 2015).

A escolha pelo tema motivou-se a partir da descoberta que o leite de jumenta é o mais semelhante ao leite humano e os estudos ainda estão escassos sobre o assunto. Partindo desse pressuposto, o objetivo do estudo consiste em reunir informações a cerca do leite de jumenta como alternativa nutricional para crianças alérgicas a proteína do leite de vaca.

2. METODOLOGIA

Para o desenvolvimento do presente trabalho, optou-se pelo o caminho metodológico de revisão integrativa da literatura de caráter descritivo com abordagem qualitativa.

A coleta de dados foi realizada por meio da consulta a publicações no período de tempo de Fevereiro a Maio de 2021 nas bases de dados eletrônicas nacional do Scientific Electronic Library Online (SciELO) e base de dado internacional do PubMed, considerando os anos de publicações dos artigos 2013 a 2020.

A busca deste estudo foi realizada por meio dos descritores confirmados nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Hipersensibilidade a leite, Assistência Integral a saúde da criança, Alimentação alternativa.

Foram adotados como critérios de elegibilidade: artigos no idioma português e inglês, artigos disponíveis na íntegra, artigos que responderam o objetivo do estudo e artigos com ano de publicação igual ou superior a 2013. Excluiu-se artigos em espanhol, artigos que não responderam o objetivo do estudo, artigos não disponíveis na íntegra e que passaram de 8 anos de publicação.

Fluxograma 1. Seleção dos artigos.

Fonte: Elaborado pelos autores.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A construção do estudo foi baseada em artigos nos idiomas português e inglês. Foram encontrados 14 artigos inicialmente e ao utilizar os critérios de elegibilidade, apenas 7 foram selecionados para realizar a presente revisão uma vez que ainda se tem poucas informações a respeito do tema.

Foi possível identificar que os maiores números de publicações foram nos anos de 2014 (n=3) e 2015 (n=3) seguidos de 2016 (n=1), conforme o gráfico abaixo.

Gráfico 1 – Distribuição dos artigos selecionados por ano de publicação.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Quadro 1 – Características dos artigos incluídos na Revisão Integrativa.

Título	Autores	Ano	Base de dados
Consumo de leite cru ou aquecido de diferentes espécies: uma avaliação dos benefícios nutricionais e potenciais para a saúde.	CLAYES et al	2014	PubMed
Produção e composição do leite de jumenta da raça Nordestina no Estado do Rio Grande do Norte.	PEREIRA	2014	SciELO
Alergia a alimentos: epidemiologia, patogênese, diagnóstico e tratamento	SICHERER; SAMPSON	2014	PubMed
Comunicação breve: produção de leite e características qualitativas.	COSENTINO et al	2015	PubMed
ASPECTOS COMPOSICIONAIS NUTRICIONAIS DO LEITE DE JUMENTA: UMA REVISÃO.	RANGEL et al	2015	SciELO
Diferenças no empoderamento e qualidade de vida entre pais de crianças com alergia a alimentos.	WARREN; GUPTA; SOHN	2015	PubMed
Cadeia leiteira Amiata burra: avaliação da saúde animal e qualidade do leite.	RAGONA et al	2016	PubMed

Fonte: Elaborado pelos autores.

Ao realizar a busca na literatura, Clayes et al. (2014) menciona em seu estudo que o leite de todos os mamíferos apresenta composição similar, isto é, água, proteínas,

gorduras, carboidratos, vitaminas e minerais, porém seus conteúdos variam entre o leite de ruminantes e não ruminantes.

Ainda conforme o autor supracitado, o leite de jumenta apresenta cor branca acentuada e consistência fluida, provavelmente devido à baixa concentração de sólidos totais. No que se diz respeito à lactose, o leite de jumenta apresenta quantidade semelhante ao leite humano, e 1,5 vezes mais do que o leite de vaca. Em função do conteúdo similar de proteína, lactose e minerais com o do leite humano, o leite de jumenta é visto como a melhor alternativa para substituí-lo, em comparação ao leite de ruminantes (CLAYES et al., 2014).

Em complemento ao autor anterior, Sicherer e Sampson (2014) menciona que o principal tratamento preconizado para a APLV é a exclusão do alimento da dieta do paciente. Uma vez que o leite é um alimento que está presente de modo constante na culinária habitual, tornando, desta maneira, esta tarefa muito difícil e demandando uma educação intensa e contínua dos pais e cuidadores dos pacientes alérgicos (WARREN; GUPTA; SOHN, 2015) sendo assim, observa-se como uma boa alternativa o leite de jumenta.

Tabela 1 – Composição do leite de alguns mamíferos.

Espécie	Matéria Seca (g/L)	Proteína (g/L)	Gordura (g/L)	Lactose (g/L)	Energia (KJ/L)
Humana	107-129	9-19	21-40	63-70	2843
Bovina	118-130	30-39	33-54	44-56	2709-2843
Jumenta	88-117	14-20	3-18	58-74	1607-1803

Fonte: Adaptado de Clayes et al. 2014.

O alto teor de lactose do leite de jumenta é um fator benéfico para introduzi-lo na dieta infantil, isso ficou perceptível no estudo de Ragona et al. (2016) uma vez que, a lactose é responsável pela boa palatabilidade do leite, além de ser importante para a otimização da absorção intestinal de cálcio, a qual é essencial para a mineralização óssea em crianças.

Os baixos teores de β -lactoglobulina e de caseína presentes no leite de jumenta provavelmente, estão relacionados com as características hipoalergênicas, sendo a β -lactoglobulina o principal alérgeno para crianças e lactentes podendo representar até

50% do total da proteína do soro do leite, enquanto, a caseína é o alérgeno predominante no adulto (RANGEL et al., 2015).

O potencial hidrogeniônico (pH) do leite de jumenta está descrito na faixa de 7,0-7,5, e o leite humano, apresentam-se na mesma faixa. A semelhança para esta variável contribui na facilidade da substituição do leite humano pelo leite de jumenta, sendo o pH importante sobre os aspectos microbiológicos e manutenção da qualidade do alimento durante o armazenamento, tratamento térmico ou seu processamento (PEREIRA, 2014).

O leite de jumenta, quando comparado ao de ruminantes, apresenta uma considerável quantidade de ácidos graxos insaturados, importantes para prevenção de doenças inflamatórias cardiovasculares. Vale mencionar ainda que, possui altas concentrações de lisozima, um agente antimicrobiano natural, que pode funcionar no trato digestivo do bebê, reduzindo a incidência de infecções gastrointestinais (COSENTINO et al., 2015). Sua concentração é duas vezes maior em relação ao leite humano. Dessa forma, apresenta efeitos positivos sobre a estocagem do leite cru (RANGEL et al., 2015).

Tabela 2. Composição mineral do leite de alguns mamíferos (mg/100mL).

Espécie	Cálcio	Fósforo	Potássio	Magnésio	Sódio	Cloro	Ferro
Humana	28-34	14-43	53-62	3-4	10-18	60-63	0,04-0,2
Bovina	112-123	59-119	106-163	7-12	58	100-119	0,03-0,1
Jumenta	33-115	32-73	24-75	2-8	10-27	14-50	0,04-0,26

Fonte: Adaptado de Clayes et al. 2014.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir de todos os fatos mencionados, percebe-se que, o consumo do leite de jumenta tem se mostrado um alimento eficiente, principalmente em crianças alérgicas a proteína do leite de vaca, uma vez que apresenta boa quantidade de ácidos graxos insaturados atuando na prevenção de doenças inflamatórias cardiovasculares e ainda assim, possui maiores quantidade de lisozima que o leite humano, um agente antimicrobiano natural, que pode funcionar no trato digestivo do bebê, reduzindo a

incidência de infecções gastrointestinais. Sendo assim, faz-se necessário propagar conhecimentos referentes ao leite de jumenta, visto que é pouco abordado e trata-se de boa alternativa substitucional por ser alimento similar ao humano em proteínas, lactose, minerais e estudos confirmam o seu uso como alimento seguro e válido.

REFERÊNCIAS

- ARANDA CS, et al. Increased sensitization to several allergens over a 12-year period in Brazilian children. **Pediatr Allergy Immunol**. 2018; 29(3):321-4.
- CLAYES WL, et al. Consumption of raw or heated milk from different species: an evaluation of the nutritional and potential health benefits. **Food Control**, v. 42, p. 188- 201, 2014.
- COSENTINO C, et al. Short communication: jenny milk production and qualitative characteristics. **J Dairy Sci**. 2015;95(6):2910-5.
- HO MH, WONG WH, CHANG C. Clinical spectrum of food allergies: a comprehensive review. **Clinic Rev Allerg Immunol**. 2014; 46(3):225-40.
- MANSUETO P, et al. Ass's milk in allergy to cow's milk protein: a review. **Acta Medica Mediterranea**, v. 29, p. 153-160, 2013.
- PEREIRA DDS. A. **Produção e composição do leite de jumenta da raça Nordestina no Estado do Rio Grande do Norte**. 2014. 20f. Monografia (Graduação em Zootecnia) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2014.
- RAGONA G, et al. Amiat donkey milk chain: animal health evaluation and milk quality. **Ital J Food Saf**. 2016; 5(3):5951.
- RANGEL AHN, et al. ASPECTOS COMPOSICIONAIS E NUTRICIONAIS DO LEITE DE JUMENTA: UMA REVISÃO. **Rev. Inst. Laticínios Cândido Tostes**, Juiz de Fora, v. 70, n. 3, p. 160-171, 2015.
- ROCHA FILHO W, SCALCO MF, PINTO JA. Alergia à proteína do leite de vaca. **Rev Med Minas Gerais**, Belo Horizonte – MG, v. 24, n. 3, p. 374-380, 2014.
- TRINCHESE G, et al. Human, donkey and cow milk differently affects energy efficiency and inflammatory state by modulating mitochondrial function and gut microbiota. **J Nutr Biochem**. 2015;26(11):1136-46.
- SICHERER SH, SAMPSON HA. Food allergy: epidemiology, pathogenesis, diagnosis, and treatment. **J Allergy Clin Immunol**. 2014;133(2):291-307.
- WARREN CM, GUPTA RS, SOHN MW. Differences in empowerment and quality of life among parents of children with food allergy. **Ann Allergy Asthma Immunol**. 2015; 114(2):117-25.

PREVALÊNCIA DE HIPERTENSÃO E PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS POR UMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM TEIXEIRA DE FREITAS – BA

DOI: 10.51859/ampla.csa511.1121-38

Emerson da Silva Mendes ¹
Marina Lima de Oliveira Carvalho ²
Karolina de Oliveira Lima ³
Grasiely Faccin Borges ⁴

¹ Pós-graduando em Direito Penal e Processual Penal pela Faculdade União das Américas (UniAmérica), Pós-Graduado em Gênero e Sexualidade na Educação pela Universidade Federal da Bahia (UFBA - 2020), Bacharel em Humanidades pela Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB - 2018), Graduando no Curso de Bacharelado em Direito pela Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB).

^{2,3} Bacharel em Saúde pela Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB). Acadêmica do curso de Medicina - UFSB. Membro pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Saúde (NEPS) do Centro de Formação em Ciências da Saúde - UFSB.

⁴ Professora Adjunta do Programa de Pós-Graduação em Saúde, Ambiente e Biodiversidade. Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB). Pós-Graduação em Educação Física. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) e Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). Coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Saúde (NEPS) do Centro de Formação em Ciências da Saúde - UFSB.

RESUMO

A Hipertensão Arterial (HA) é um grave problema de saúde pública, atingindo milhares de pessoas no Brasil. Nesse sentido, esta pesquisa teve como objetivo descrever a prevalência de HA e características socioeconômicas e de saúde de adultos e idosos atendidos em uma Unidade de Estratégia Saúde da Família no Município de Teixeira de Freitas, Bahia. Foi realizado estudo transversal. Participaram 38 sujeitos de ambos os sexos. Nesse sentido, o presente estudo identificou que a Hipertensão Arterial (HA) atingiu 86,84% da amostra, a média de idade de 64,5 anos com desvio padrão $\pm 10,15$ anos, sendo 60,53% do sexo feminino, 50% se autodenominou pardos, 71,05% sabiam ler e escrever, 47,37% tinha ensino fundamental, 52,63% eram casados, 55,26% profetizados a fé católica e 55,26% avaliaram sua saúde como regular. Por fim, pode-se concluir que a Hipertensão Arterial (HA) atinge grande parte da amostra, sendo predominantemente do sexo feminino, pardos e negros, que sabiam ler e escrever, possuíam Ensino Fundamental, eram casados, de fé católica e avaliaram sua saúde quando em comparação com alguém do seu próprio círculo social e com características semelhantes às normais.

Palavras-chave: Hipertensão Arterial. Fatores de Riscos. Políticas Públicas.

1. INTRODUÇÃO

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial caracterizada pela elevação crônica dos níveis pressóricos sistólicos ≥ 140 mmHg e/ou diastólicos ≥ 90 mmHg medida em pelo menos duas ocasiões diferentes. Inúmeros estudos apontam a hipertensão arterial (HA) como um problema de saúde pública, que atinge milhares de pessoas no mundo, sendo o principal fator de risco modificável para doenças cardiovasculares (DCV), doença renal crônica (DRC) e morte prematura (BARROSO et al., 2021).

A HAS tem alta prevalência e baixas taxas de controle e por isso é de extrema importância o diagnóstico precoce, prevenção e controle da doença, o que evita alta morbimortalidade e perda importante da qualidade de vida. Para o diagnóstico não há necessidade de tecnologia sofisticada e para controle e prevenção pode-se aplicar mudanças no estilo de vida (BRASIL, 2013; RABI et al., 2020).

Um estudo que comparou as Diretrizes de pressão arterial mais recentes, do American College of Cardiology (ACC)/ American Heart Association (AHA) e da European Society of Cardiology (ESC)/European Society of Hypertension (ESH) do ano de 2018, enfatizou a relevância da prevenção da HAS, especificamente, com dieta de baixo teor de sódio, atividade física, redução do peso corporal, baixa ingestão de álcool e ingestão adequada de potássio (BAKRIS, ALI, PARATI, 2019).

Há também o elenco de fatores de risco, que quando associados entre si e a outras situações, favorecem o surgimento da HAS, dos quais podem ser também de natureza socioeconômico, decorrente do nível de escolaridade, vida precária e/ou marginalizada, devido ao baixo acesso à bens e serviços, perpassando pelos modos de vidas adotados pelos sujeitos que englobam o consumo de bebidas alcoólicas, utilização de tabaco, sedentarismo e também questões inerentes à vida em sociedade, tais como, baixa qualidade de vida, condições de trabalho, desgaste físico, estresse psicológico condicionado à vida cotidiana, até relações entre raça, estado conjugal, religião, sexo e idade (ANDRADE et al., 2014; BARROSO et al., 2021).

No que se refere ao nível de escolaridade, parece existir uma direta ligação entre o nível de instrução educacional das pessoas com a HA, por este Fator de Risco possuir interferência tanto na qualidade de vida quanto no modo de vida adotado pelo/a

sujeito/a. A baixa escolaridade compromete o acesso à educação em saúde, estratégia que possibilita a adoção de comportamentos saudáveis e a mobilização social para a melhoria das condições de vida, influencia a adesão ao tratamento de condições crônicas, como a HAS, em virtude da relação com menores condições econômicas e acesso a serviços de saúde (ANDRADE et al., 2014).

Nesse sentido, sobre as condições sócio-econômicas, bem como, o acesso à direitos básicos e fundamentais, é possível afirmar que as diferenças socioeconômicas têm um papel importante nas condições de saúde que influenciam diferentes fatores, tais como acesso ao sistema de saúde, grau de informação, entendimento da condição médica e adesão ao tratamento (TAVARES et al., 2016).

O tabagismo é um dos principais fatores de risco não apenas à HA, mas à saúde de modo geral, é considerado um dos grandes causadores da perda de saúde, acarretando e/ou agravando diversos casos clínicos de doenças cardiovasculares e também cânceres. Não obstante, os progressos obtidos com os meios empregados para a redução do tabagismo, o uso do tabaco é considerado a principal causa de doenças evitáveis no mundo, estando relacionado a mais de 50 doenças e ser responsável por 20% das mortes (MUAKAD, 2014; BARRETO, 2018; BARROSO et al., 2021).

Interseccionalizando a discussão entre HA, com recorte de raça, é possível observar que a HA tem atingido principalmente a população negra quando comparado com brancas ou pardas, como apontado pela Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial 2020 (BARROSO et al., 2021).

A fé e/ou religiosidade tem sido também estudada com relação às práticas preventivas em saúde. O exercício de alguma fé vem contribuindo na busca por uma melhor qualidade de vida, onde o envolvimento religioso está associado a melhor saúde mental. Observa-se que pessoas com determinados quadros clínicos, buscam no exercício religioso respostas e formas de conforto que auxiliam nos tratamentos (REINALDO, 2016; BARROSO et al., 2021).

Assim, ao entender a HA associada aos fatores de risco, em diferentes grupos populacionais, é necessário o planejamento de Políticas Públicas que envolvam estratégias combinadas e associadas às ações, que deem resposta à prevenção da HA e possibilitem estimular uma melhor qualidade de vida, respeitando a subjetividade e a

autonomia do usuário, tendo como base a realidade de cada grupo social e suas especificidades.

Diante do exposto, a presente pesquisa visa descrever as características socioeconômicas e de saúde dos participantes do estudo, a fim de apresentar os hábitos de vida e características, assim como, elencar eventuais as doenças/comorbidades que acometem os participantes da pesquisa.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Participaram do estudo 38 indivíduos de ambos os sexos, adultos e idosos residentes na área urbana, atendidos pela Estratégia Saúde da Família, na Unidade Básica de Saúde (UBS) Wilson Brito, localizado na Cidade de Teixeira de Freitas, Estado da Bahia, por meio do programa HIPERDIA, introduzido no fluxo do Sistema Único de Saúde (SUS) (FEITOSA; PIMENTEL, 2016).

A presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Estadual de Feira de Santana, por meio de parecer registrado sob o nº CAAE: 58368216.1.0000.0053.

3. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO DA AMOSTRA

Foram incluídos participantes com idade igual ou acima de 50 anos de ambos os sexos. Os (As) participantes que integraram o estudo foram encaminhados pela Unidade Básica de Saúde (UBS) e posterior avaliação médica. A caracterização do quadro clínico e hipertensivo foi encaminhada aos pesquisadores do projeto por meio dos registros da UBS. Desse modo, integraram o estudo sujeitos de ambos os sexos com independência no desempenho das atividades físicas diárias.

Considerou-se, enquanto critérios de exclusão, os seguintes aspectos: fazer uso de bebidas alcoólicas frequentemente, apresentar tonturas ou mal-estar frequentes, problemas osteomusculares graves ou cirurgia nos últimos nove meses. Foram também excluídos participantes que apresentaram disfunção renal severa, diarreia crônica, micção dolorosa ou difícil, desidratação, hemorragia retal.

4. COLETA DE DADOS E INSTRUMENTOS

O estudo foi realizado em 02 (dois) momentos. Inicialmente os participantes foram selecionados para a pesquisa por meio de encaminhamentos realizados pela Unidade Básica de Saúde (UBS), sendo posteriormente convidados(as) a colaborar com o projeto por meio da anuência de participação sendo, em seguida, aplicado questionário sociodemográfico e de saúde.

Os dados coletados a partir dos questionários foram precedidos de prévia autorização livre e manifestamente concedida por meio do termo de consentimento livre e esclarecido. Sendo informado aos participantes os riscos, bem como os benefícios decorrentes da participação na pesquisa, além das informações pertinentes à realização das etapas da pesquisa.

Os participantes foram convidados a integrar a segunda fase, a qual foi constituída previamente de específicas avaliações da pressão arterial. No primeiro momento, os participantes receberam prévias explicações acerca dos procedimentos, tendo respondido ao questionário sociodemográfico e de saúde. O questionário aplicado apresenta-se como um hábil instrumento de pesquisa, sendo utilizado com a finalidade de coletar e derivar dados sobre os aspectos socioeconômicos e demográficos dos participantes.

5. QUESTIONÁRIO

Objetivando a coleta de dados acerca do estado de saúde e as condições socioeconômicas dos sujeitos participantes, recorreu-se à aplicação de questionários, com tempo médio de duração estimado em 10 (dez) minutos. Para tanto, coletou-se os seguintes dados: nome; idade; data de nascimento; sexo (feminino e masculino); raça (branca, negra, parda, amarela e indígena); endereço; bairro; telefone para contato; nacionalidade (brasileiro (a) ou não); naturalidade (qual o município que o indivíduo nasceu); estado civil (solteiro, casado, divorciado e viúvo); grau de escolaridade; profissão; peso e altura; sinais vitais (será verificado a pressão arterial e a frequência cardíaca da participante); quais doenças que o indivíduo possui (será perguntado para o voluntário se ele possui algum outro tipo de doença, assinalar sim ou não; se sim, quais das seguintes doenças: diabetes tipo I, diabetes tipo II, acidente vascular encefálico,

artrite, reumatismo, osteoporose, artrose, depressão, gastrite, se possui alguma doença renal, se possui alguma doença pulmonar, se já teve ou tem câncer); foi também perguntado no questionário se o indivíduo estava fazendo uso de algum tipo de medicamento (tendo sido coletado o motivo pelo qual o indivíduo está usando esse medicamento, o nome genérico ou comercial do medicamento, a dose diária e data que o indivíduo começou a fazer uso do medicamento).

As variáveis independentes que nortearam o desenvolvimento analítico desta pesquisa foram divididas em sociodemográficas e comportamentais, das quais destacam-se: Cor/Raça, Escolaridade, Tabagismo e Religião. Assim, esta pesquisa se apresenta enquanto um estudo transversal, descritivo, uma vez que este tipo de estudo permite um alto grau de descrição analítica.

Participaram da pesquisa adultos e idosos que manifestaram prévia concordância de forma voluntária e gratuita, além de estarem enquadrados nos critérios do estudo. Para a seleção da amostra, os participantes da pesquisa foram encaminhados a partir de prévia avaliação médica realizada na Unidade Básica de Saúde Wilson Brito, receptora da pesquisa.

À Coordenadora da Equipe Estratégia Saúde da Família e aos participantes foi apresentado o projeto de pesquisa, tendo sido explicado minuciosamente todos os objetivos do estudo, os procedimentos adotados, sendo apontado e disponibilizado os nomes, telefones de contatos dos pesquisadores, além de todos os riscos e benefícios da pesquisa.

Após apresentação manifestação interesse em participar da pesquisa, procedeu-se com aplicação de questionário socioeconômico. Os dados foram dispostos e representados por percentuais, médias e desvios padrão. Os resultados encontram-se apresentados a seguir.

6. RESULTADOS

Os resultados coletados, posteriormente analisados, encontram-se expostos nas tabelas 1 e 2. A partir destes, foi possível verificar que a presente pesquisa contou com a participação de 38 (trinta e oito) participantes entrevistados, sendo 60,53% do gênero feminino e 39,47% do gênero masculino. A média de idade dos participantes foi de 64,5

anos com desvio padrão de ($\pm 10,15$). Quanto ao indicativo cor/raça, 50% dos participantes se autodeclararam como pardos(as), 21,05% como brancos(as), 18,42% como negros(as), 10,52% não responderam à questão.

Observou-se que a maior parte dos participantes sabiam ler e escrever (71,05%), o contrário também foi identificado em 28,95% dos participantes. Quando questionados(as) acerca do nível de escolaridade, constatou-se que 47,37% eram alfabetizados, 31,58% dos(as) participantes não eram alfabetizados(as) e, 21,05% haviam concluído o ensino médio.

Quanto ao estado civil dos(as) participantes, apurou-se que mais da metade dos participantes estavam casados(as) (52,63%), enquanto 13,16% se encontravam solteiro(a), 13,16% divorciado(a) e 21,05% viúvo(a).

A religião foi outra variável incorporada ao estudo, dados obtidos permitiram evidenciar que 55,26% dos(as) participantes exerciam a fé católica, 39,50% fé evangélica, e uma menor parcela de outras religiões, representados por cerca de 5,26% das respostas.

Tabela 01. Variáveis sócio-demográficas.

Variável	N	%
Gênero		
Masculino	15	39,47
Feminino	23	60,53
Cor/Raça		
Parda	19	50
Branca	8	21,05
Negra ou Preta	7	18,42
Indígena	0	0
Amarela	0	0
Nunca pensou sobre	3	7,90
Não respondeu	1	2,63
Sabe ler e escrever		
Sim	27	71,05
Não	11	28,95
Escolaridade		
Não Alfabetizado Ensino Fundamental	12	31,58
Ensino Médio	18	47,37
Ensino Superior	8	21,05
Pós Graduação	0	0
	0	0

Estado Civil		
Casado	20	52,63
Solteiro	5	13,16
Divorciado/Separado	5	13,16
Viúvo	8	21,05
Religião		
Católico	21	55,26
Evangélico	15	39,50
Espírita	0	0
Outros	2	5,26

Fonte: Autoria própria

Acerca da auto-avaliação em saúde, restou confirmado que 55,26% dos(as) participantes compreendiam sua saúde como regular, enquanto 26,32% como boa, 7,90% ruim, 7,90% muito ruim e, apenas 2,63% como muito boa. Nesse íterim, quando solicitados a compreender o estado particular de saúde através de um exercício de comparação de saúde a de pessoas próximas, com a mesma idade, foi possível descortinar que 50% dos(as) participantes compreendiam que sua saúde estava em melhor estado quando comparada com as pessoas utilizadas por eles(as) como parâmetro comparativo. Diante deste exercício comparativo, verificou-se também que 28,95% disseram que sua saúde estava em igual estado, 18,42% declararam ter a percepção de piora, e 2,63% muito exauriram observar estar em melhor estado de saúde.

Os hábitos de saúde foram variáveis importantes para esta pesquisa. Assim, ao considerar os hábitos de vida, comprovou-se que 52,63% dos(as) participantes já haviam feito o uso de tabaco em algum momento da vida. Por outro lado, 39,47% responderam que nunca haviam fumado, e 7,90% declararam ainda fazer uso de tabaco. Entre as pessoas que relataram ter feito uso do tabaco em algum momento de sua vida, e aquelas que afirmaram não serem mais fumantes, foi possível determinar que o tempo médio de vida fazendo uso dessa substância foi de 19,25 anos com desvio padrão de $\pm 11,81$.

Nesse sentido, ainda considerando os hábitos de vida, a respeito do consumo de bebidas alcoólicas, observou-se que 76,32% dos(as) participantes manifestaram-se no sentido de não consumirem bebida alcoólica, enquanto 13,16% consomem mensalmente ou menos, 7,90% consomem de duas a três vezes por semana, e 2,63% afirmaram consumir no período de duas a quatro vezes do mês.

Da amostra de participantes, a prevalência de HA restou identificado em 86,84% destes, notou-se também a existência de outras doenças, conforme dados apresentados na tabela 02, apresentada a seguir:

Tabela 02. Percepção de saúde e doenças relatadas.

Autoavaliação da Saúde		
Muito boa	1	2,63
Boa	10	26,32
Regular	21	55,26
Ruim	3	7,90
Muito ruim	3	7,90
Comparação de sua saúde		
Muito Pior	0	0
Pior	7	18,42
Igual	11	28,95
Melhor	19	50,00
Muito Melhor	1	2,63
Hipertensão Arterial	33	86,84
Diabetes	14	36,84
Doenças no Coração	2	5,26
Derrame ou AVC	5	13,16
IST's*	0	0
Doenças Pulmonares	2	5,26
Câncer	2	5,26
Osteoporose	8	21,05
Depressão	7	18,42
Demência	1	2,63
Úlcera Gástrica	2	5,26

*Infecções Sexual Transmissíveis (IST's)

Fonte: Autoria própria

7. DISCUSSÃO

Os resultados encontrados nesta pesquisa possibilitaram verificar que a HA acometia a maior parte dos(as) participantes (86,84%). No estudo elaborado por Jardim et al. (2007), com aproximadamente 1.739 sujeitos, constatou-se que a prevalência de HA foi de 36,4%, sendo maior entre homens (41,8%) que entre mulheres (31,8%). Por

outro lado, no estudo elaborado por Piccini e Victora (1994), com cerca de 1.657 indivíduos, foi possível observar a prevalência de HA em 328 deles. Desse modo, com base nos resultados apontados foi possível detectar uma maior taxa de HA entre pessoas de cor preta, sendo estas respectivamente, 18,6% da amostra e 26,8% de prevalência. Por fim, em outro estudo conduzido por Lolio et al. (1993), com indivíduos com idade entre 15 a 74 anos, residente na zona urbana do Município de Araraquara, Estado de São Paulo, em 1987, verificou uma maior prevalência de HA em pessoas negras e com renda baixa.

A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 2013, intitulada Percepção do estado de saúde, estilos de vida e doenças crônicas, realizado pelo Ministério da Saúde e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aponta, que o uso de tabaco está associado a presença de determinados Fatores de Riscos. Desse modo, a pesquisa indica que as pessoas com menor grau de instrução - leia-se grau de formação escolar, com idade entre 40-59 anos e declaradas pretas utilizam o tabaco em maior escala (IBGE, 2014).

No que tange à autodeclaração racial os dados da pesquisa conduzem no sentido da maior parte dos participantes se autodeclaram como pardos(as). Ainda que estes resultados tenham sido alcançados, os desfechos do estudo produzido por Andrade et al. (2015), não indicou diferenças na prevalência de HA em indivíduos de raça/cor preta e branca. Uma possível explicação para esse fato estaria na fragilidade de uma associação entre raça/cor da pele, hipertensão e outras doenças crônicas, posto que a raça/cor consiste em um marcador influenciado por uma interação complexa entre fatores genéticos e desigualdades sociais, ambos com capacidade de influência quanto à adoção de comportamentos saudáveis ou prejudiciais à saúde.

Em sua pesquisa de dissertação, Pereira (2013), ressalta que “[...] a avaliação dos relatos aponta a religiosidade mútua como fator que melhora a relação médico-paciente”. A religiosidade também foi destacada como elemento importante para o processo de controle e prevenção da HAS (BRASIL, 2013, p. 21). Assim, sob tal aspecto “[...] a religiosidade traz benefícios à saúde geral das pessoas, fortalecendo a confiança do paciente para com o médico” (PEREIRA, 2013). Prestando, assim, em consonância ao afirmado pela autora, meio hábil à complementação ao exercício terapêutico, inclusive

no campo da saúde mental, posto o nível de orientação e influência que a prática religiosa exerce sobre o sujeito social.

Em igual sentido, Lucchetti et al. (2010), destaca a existência de profícua relação entre religiosidade e espiritualidade, cuja confluência reverbera no sistema hormonal. De modo que a frequência semanal religiosa foi associada por meio de estudos à diminuição da prevalência de HA em comparação aos que não frequentavam serviços religiosos. Tais resultados corroboram com a ideia de que as pessoas buscam no exercício religioso respostas e formas de confortos que possibilitam auxiliar em seus tratamentos, o que possibilita compreender a proporção de pessoas religiosas associadas a estes estudos.

As vulnerabilidades sócio-culturais e propensão à HA têm sido observadas como aspectos capazes de estabelecer uma possível relação entre pessoas vulnerabilizadas e HA. Em seu estudo, Zaitune et al. (2006), ao discutir a condição social e econômica e a HA, aponta que pessoas com nível sócio-econômico desfavorável estariam mais propensas à depressão e ao estresse crônico, ambos causados pelas dificuldades cotidianas, aumentando assim os níveis de catecolaminas e, conseqüentemente, a frequência cardíaca e a pressão arterial.

À vista disso, Andrade et al. (2015), aduz que a HA, além de ser responsável por óbitos, é um dos fatores de risco para doenças cardiovasculares. Desta ainda que o envelhecimento; excesso de peso; baixa escolaridade; tabagismo; consumo de bebidas alcoólicas; e cor da pele/raça negra são fatores associados ao desenvolvimento da HA.

Os resultados alcançados por esta pesquisa, comprovou que 52,63% das pessoas já haviam feito em algum momento da via o uso de cigarro/tabaco. O tabagismo é um dos principais fatores de risco não apenas à Hipertensão Arterial (DE SOUSA, 2015), mas à saúde de modo geral, sendo comumente considerado um dos grandes causadores da perda de saúde, acarretando e/ou agravando diversos casos clínicos de doenças cardiovasculares e também cânceres. Essa relação estaria associada a liberação de catecolaminas, elevando a frequência cardíaca, a pressão arterial, resistência periférica, também reduzindo o número de glóbulos vermelhos e elevando os riscos de deposição de gorduras nos vasos (PESSUTO; CARVALHO, 1998).

O acesso à educação foi outro determinante social importante para esta pesquisa, pois permite derivar suas influências no processo da vida social e ao acesso a

melhores condições de vida. Em que pese, para Andrade et al. (2014), a baixa escolaridade compromete o acesso à educação em saúde, estratégia que possibilita a adoção de comportamentos saudáveis e a mobilização social para a melhoria das condições de vida, bem como influencia a adesão ao tratamento de doenças crônicas, como a HAS, em virtude da relação com menores condições econômicas e acesso a serviços de saúde.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de todo o exposto, é possível concluir que a Hipertensão Arterial acomete a maior parte da amostra, sendo estes em sua maioria do gênero feminino, em grande parte àqueles autodeclarados pardos(as) e negros(as), que sabiam ler e escrever, possuíam o Ensino Fundamental, eram casados(as), de fé católica e avaliaram sua saúde quando comparada à de alguém do seu próprio círculo social e com características semelhantes como regular.

Nesse sentido, é perceptível que a Hipertensão Arterial possui uma intrínseca relação com os fatores de riscos e determinantes sociais, ou seja, os hábitos de vida e suas relações sociais que o indivíduo estabelece consigo e com o território que o circunda. As demandas ao Sistema Único de Saúde, assim como a prevenção de doenças crônicas devem ser qualificadas, a fim de atender as especificidades sociais, garantindo, outrora, efetividade ao direito à saúde dos cidadãos.

As condições de vida, associadas às possibilidades de realização social e o acesso à direitos e garantias fundamentais se apresentam como fatores imprescindíveis a serem observados pelos gestores e formuladores de políticas públicas em saúde, pois possuem esses uma distinta relação de interdependência.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), pelo apoio Institucional por meio da concessão de 01 (uma) Bolsa de Apoio à Permanência (BAP), mediante Edital nº 08/2016, da Pró-reitoria de Sustentabilidade e Integração Social (PROSIS).

REFERÊNCIAS

- ANDRADE, Silvana Suely de Araújo; STOPA, Sheila Rizzato; BRITO, Alessandra Scalioni; CHUERI, Patrícia Sampaio; SZWARCOWALD, Célia Landmann; MALTA, Deborah Carvalho. Prevalência de hipertensão arterial autorreferida na população brasileira: análise da Pesquisa Nacional de Saúde, 2013. **Epidemiologia e Serviço de Saúde**, Brasília, v. 24, n. 2, p. 297-304, Jun. 2015.
- ANDRADE, João Marcus Oliveira et al. Influência de fatores socioeconômicos na qualidade de vida de idosos hipertensos. **Ciência e saúde coletiva**, Rio de Janeiro, v. 19, n. 8, p. 3497-3504, Ago. 2014.
- BAKRIS, George; ALI, Waleed; PARATI, Gianfranco. ACC/AHA versus ESC/ESH on hypertension guidelines: JACC guideline comparison. **Journal of the American College of Cardiology**, v. 73, n. 23, p. 3018-3026, 2019.
- BARRETO, Ivan Farias. Tabaco: a construção das políticas de controle sobre seu consumo no Brasil. **Hist. cienc. saúde-Manguinhos**, Rio de Janeiro, v. 25, n. 3, p. 797-815, Set. 2018.
- BARROSO, Weimar Kunz Sebba et al. Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial – 2020. **Arq. Bras. Cardiol.**, São Paulo, v. 116, n. 3, p. 516-658, Mar. 2021. Disponível em: <https://abccardiol.org/wp-content/uploads/articles_xml/0066-782X-abc-116-03-0516/0066-782X-abc-116-03-0516.x44344.pdf>. Acesso em: 21 mai. 2021
- BRASIL. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Percepção do estado de saúde, estilos de vida e doenças crônicas. Brasil, grandes regiões e unidades da federação**. Pesquisa Nacional de Saúde–PNS 2013, 2014.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: hipertensão arterial sistêmica. 128 p. : il. (Cadernos de Atenção Básica, n. 37) Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2013.
- DE SOUSA, Márcio Gonçalves. Tabagismo e Hipertensão arterial: como o tabaco eleva a pressão. **Rev Bras Hipertens vol**, v. 22, n. 3, p. 78-83, 2015.
- FEITOSA, Isabella de Oliveira; PIMENTEL, Adelma. HIPERDIA: práticas de cuidado em uma unidade de saúde de Belém, Pará. **Rev. NUFEN**, Belém, v. 8, n. 1, p. 13-30, 2016.
- JARDIM, P. C. B. V. et al. Hipertensão arterial e alguns fatores de risco em uma capital brasileira. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, v. 88, n. 4, p. 452-7, 2007.
- LOLIO, Cecília Amaro de et al. Hipertensão arterial e possíveis fatores de risco. **Revista de Saúde Pública**, v. 27, p. 357-362, 1993.

- LUCCHETTI, Giancarlo; GRANERO, Alessandra L. Granero; NOBRE, Fernando; JR., Álvaro Avezum. Influência da religiosidade e espiritualidade na hipertensão arterial sistêmica. **Revista Brasileira de Hipertensão**, v. 17, n. 3, p. 186-188, 2010.
- MUAKAD, Irene Batista. Tabagismo: maior causa evitável de morte do mundo. **Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo**, São Paulo, v. 109, p. 527-558, dez. 2014. ISSN 2318-8235.
- PESSUTO, J.; CARVALHO, E.C. de. Fatores de risco em indivíduos com hipertensão arterial. **Rev.latinoam.enfermagem**, Ribeirão Preto, v. 6, n. 1, p. 33-39, jan. 1998.
- PEREIRA, Valdelene Nunes de Andrade. **Religiosidade em indivíduos hipertensos de uma unidade do Programa Saúde da Família de Pedras de Fogo - PB**. 2013 - 179f. Dissertação (Mestrado em Ciências das Religiões), Universidade Federal da Paraíba - UFPB.
- PICCINI, Roberto Xavier; VICTORA, Cesar Gomes. Hipertensão arterial sistêmica em área urbana no sul do Brasil: prevalência e fatores de risco. **Revista de Saúde Pública**, v. 28, p. 261-267, 1994.
- RABI, Doreen M. et al. Hypertension Canada's 2020 comprehensive guidelines for the prevention, diagnosis, risk assessment, and treatment of hypertension in adults and children. **Canadian Journal of Cardiology**, v. 36, n. 5, p. 596-624, 2020.
- REINALDO, Amanda Márcia dos Santos; SANTOS, Raquel Lana Fernandes dos. Religião e transtornos mentais na perspectiva de profissionais de saúde, pacientes psiquiátricos e seus familiares. **Saúde debate**, Rio de Janeiro, v. 40, n. 110, p. 162-171, set. 2016.
- TAVARES, Noemia Urruth Leão et al. Fatores associados à baixa adesão ao tratamento farmacológico de doenças crônicas no Brasil. **Revista de Saúde Pública**, v. 50, p. 10s, 2016.
- ZAITUNE, Maria Paula do Amaral et al. Hipertensão arterial em idosos: prevalência, fatores associados e práticas de controle no Município de Campinas, São Paulo, Brasil. **Caderno de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 22, n. 2, p. 285-294, Fev. 2006.

CIÊNCIAS DA SAÚDE

APRENDIZADOS, ENSINO E PESQUISA NO CENÁRIO CONTEMPORÂNEO

CIÊNCIAS DA SAÚDE

APRENDIZADOS, ENSINO E PESQUISA NO CENÁRIO CONTEMPORÂNEO