ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СВОЙСТВА HERICIUM ERINACEUS

Айкешев Булат Мусульманбекович

Кандидат биологических наук, PhD

Казахский Агротехнический университет им. С. Сейфуллина

Нур-Султан, Казахстан

Арыстанбай Аяулым

магистр естественных наук

Казахский Агротехнический университет им. С. Сейфуллина

Нур-Султан, Казахстан

MEDICINAL PROPERTIES OF HERICIUM ERINACEUS

Aikeshev Bulat Musulmanbekovich

Candidate of Biological Sciences, PhD

Kazakh Agrotechnical University named after S. Seifullin

Nur-Sultan, Kazakhstan

Arystanbay Ayaulym

master of Natural Sciences

Kazakh Agrotechnical University named after S. Seifullin

Nur-Sultan, Kazakhstan

Аннотация. Лекарственные грибы стали привлекательной темой, ввиду содержащихся в них биоактивных соединений, потенциально пригодных для терапевтического применения. Среди набирающих популярность лекарственных грибов- *Hericium erinaceus*. *Hericium erinaceus* лекарственный съедобный гриб, имеет долгую историю использования в традиционной китайской медицине, а также в других странах Востока. Наряду с этим, несколько его биологически активных соединений послужили основой для создания пищевых добавок. Его плодовые тела, и мицелий богаты активными веществами, способствующими укреплению здоровья. Испытания веществ, извлеченных из этого гриба, на животных и *in vitro* дали хорошие результаты. Их начинают использовать при лечении рака, заболеваний печени, болезней Альцгеймера и Паркинсона, заживления ран. Они улучшают когнитивные способности, поддерживают нервную и иммунную системы.

Abstract. Medicinal mushrooms have become an attractive topic due to their bioactive compounds potentially useful for therapeutic use. Among the growing popularity of medicinal mushrooms is *Hericium erinaceus*. *Hericium erinaceus* is a medicinal edible mushroom with a long history of use in traditional Chinese medicine as well as in other countries of the East. Along with this, several of its biologically active compounds served as the basis for the creation of nutritional supplements. Its fruiting bodies and mycelium are rich in active substances that promote health. Tests of substances extracted from this fungus in animals and *in vitro* have given good results. They are beginning to be used in the treatment of cancer, liver diseases, Alzheimer's and Parkinson's diseases, and wound healing. They improve cognitive abilities, support the nervous and immune systems.

Ключевые слова: *Hericium erinaceus*, лекарственные грибы, съедобные грибы, активные вещества, мицелий.

Key words: *Hericium erinaceus*, medicinal mushrooms, edible mushrooms, active substances, mycelium.

С древнейших времен грибы использовались в качестве основного продукта питания человека и наряду с этим признаны уникальным лекарственным средством [1]. Сообщается, что они содержат несколько биоактивных метаболитов, которые отвечают за широкий спектр фармакологических действий, таких как антиоксидантное, противоопухолевое, противомикробное, иммуномодулирующее, гепатопротекторное и т. д. [2].

Грибы считаются нутрицевтическими продуктами, поскольку они содержат большое количество белков, витаминов, минералов и содержат мало незаменимых жирных кислот, калорий и жиров [3]. Более того, съедобные грибы накапливают различные биоактивные молекулы, которые являются очень эффективными поглотителями пероксирадикалов, включая фенольные соединения, терпены и стероиды [4].

Гриб *Hericium erinaceus* является одним из таких, хорошо известных, лечебных грибов, который широко встречается в странах Восточной Азии, включая Японию и Китай [5].

H. erinaceum, когда-то принадлежал к классу *Basidiomycetes*, подклассу *Holobasidiomycetidae*, отряду *Hericiales*, семейству *Hericiaceae* [6], в то время как *Index Fungorum* [7] представляет принятую в настоящее

время таксономию *Hericium erinaceus* следующим образом: *Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Incertae sedis, Russulales, Hericiaceae*.

Гриб *H. erinaceum* - это преимущественно сапрофит, но иногда он также может быть слабым паразитом деревьев. Он образует сильно разветвленные плодовые тела, неправильные луковицы с колючим гименофором. Плодовое тело чаще всего прикрепляется к субстрату сбоку, с округлым или полушаровидным основанием, выступающим и неразветвленным [8]. Этот вид встречается на мертвых или умирающих лиственных деревьях [9, 10]. По мнению многих авторов, гриб *H. erinaceum* распространен практически во всем Северном полушарии, за исключением тропических и полярных регионов [11, 12]. Грибок в природе встречается нечасто. В 2003 г. *H. erinaceus* был занесен в красные списки в 13 из 23 европейских стран, поскольку его естественные среды обитания начинают исчезать [13].

В зрелом состоянии *H. erinaceus* легко идентифицировать, так как его заметные базидиомы состоят из множества одиночных, обычно длинных, свисающих, мясистых шипов, которые сначала белые, затем становятся желтоватыми, а затем с возрастом буроватыми. Виды рода *Hericium* макроскопически различаются наличием разветвленных и неразветвленных структур гименофоров, поддерживающих шипы различной длины, наличием отдельных или множественных скоплений, а микроскопически - наличием амилоидорфных базидиоспор [14]. Однако базидиомы *Hericium* часто начинают отличаться от зачатков более или менее как единое скопление и только с возрастом развивают свои ветви [15].

Скорость роста мицелия гриба *Hericium erinaceus* в субстрате тесно связана с его ферментативной активностью. *H. erinaceum* производит гидролитические ферменты, вызывающие разложение целлюлозы, лигнина, крахмала и белков в субстрате. Скорость роста мицелия в *Hericium* коррелирует с активностью β -амилазы и протеазы [16]. Обнаружена корреляция между активностью лакказы и продолжительностью цикла развития у этого гриба [17]. Чем выше активность высвобождающейся лакказы, тем короче период роста.

Оптимальная температура для роста мицелия гриба *Hericium erinaceus* составляет 21–24°C при влажности субстрата от 50 до 70% [9]. Установлено, что оптимальная температура роста мицелия может быть разной и находится в диапазоне 25–30°C, а максимальная температура составляет 35°C [18]. На период плодоношения рекомендуется поддержание постоянной температуры 23°C [19]. Оптимальный pH субстрата может составлять от 5,8 до 6,2 [20].

Выращивание гриба *H. erinaceus* может быть экстенсивным или интенсивным. Первый широко применяется в Китае. В деревянные бревна или пни заделываются небольшие фрагменты древесины, поросшие мицелием гриба *H. erinaceus*. Бревна после посева помещают в помещения, где поддерживается повышенная влажность. Посев происходит в естественных неконтролируемых условиях, поэтому в этой системе выращивания плодовые тела образуются в разное время, то есть от нескольких месяцев до года после заражения древесины. Этот метод выращивания гриба *H. erinaceus* очень прост и не требует значительных вложений или специального оборудования. Его основной недостаток связан с длительным периодом до сбора урожая грибов и высокой трудоемкостью [9].

Для получения высоких урожаев хорошего качества необходимо использовать интенсивные методы выращивания. Интенсивное выращивание гриба *H. erinaceus* обычно проводится в широкогорлых банках или пакетах. Субстраты для культивирования необходимо стерилизовать, поэтому банки должны быть изготовлены из термостойких материалов, таких как, например, стекло или полипропилен. Чтобы облегчить дыхание мицелия во время зарастания, бутылки и пакеты, используемые для культивирования, должны быть оснащены фильтром, который обеспечит газообмен и в то же время предотвратит проникновение микроорганизмов - бактерий или грибов внутрь бутылок или пакетов. Выращивание в полипропиленовых мешках проще и дешевле; однако плодовые тела, растущие из пакетов, обычно меньше, чем плодовые тела, растущие из банок, где обычно получается одно большое плодовое тело. Так же, как и при выращивании других грибов, при выращивании гриба *Hericium erinaceus* используются отходы сельского хозяйства, лесного хозяйства, деревообработки или пищевой промышленности. Гриб *H. erinaceus* можно выращивать, например, на стерилизованных опилках с добавлением зерновых отрубей [21].

Гриб *H. erinaceum* имеет относительно высокую питательную ценность. Плодовые тела гриба львиная грива содержат 57% углеводов, 3,52% жиров, 7,81% клетчатки, 22,3% белка и 9,35% золы на сухое вещество. Кроме того, также были обнаружены следующие растворимые сахара: арабитол - 127,17 мг/г, глюкоза - 11,35 мг/г, маннит - 12,98 мг/г, инозитол - 1,43 мг/г и трегалоза - 9,71 мг/г в сутки [22].

Исследования, проведенные в последние годы, привели к выделению из гриба *H. erinaceum* нескольких биологически активных метаболитов [23]. И плодовые тела, и мицелий гриба *H. erinaceum* содержат полезные для здоровья соединения. Выращивание *H. erinaceum* может быть оптимизировано для получения плодовых тел, богатых избранными веществами [24]. К наиболее важным группам соединений относятся полисахариды, например: ксилан, гериценоны и эринацины.

Лечебные свойства *H. erinaceus* были хорошо известны на протяжении сотен лет в традиционной китайской и японской кулинарии и фитотерапии для лечения различных заболеваний человека. Плодовое тело состоит из

множества компонентов, таких как полисахариды, белки, лектины, фенолы, гериценоны, эринацины и терпеноиды. Биологическая активность некоторых этих компонентов также была изучена [25].

Гриб *H. erinaceum* употребляют в виде таблеток из сушеных и измельченных плодовых тел. Благоприятное действие на больных гепатитом В было также показано свежими плодовыми телами гриба *H. erinaceum*. Таким образом, *H. erinaceum* является лекарственным, и его использование было оправдано достижениями и традициями китайской медицины. Его плодовые тела и полученные из них препараты считались прекрасным лекарственным материалом. Однако результатов физиологических и фармацевтических тестов, принятых в качестве стандарта при выводе на рынок новых лекарственных препаратов в Европе и США, не было [26, 27]. Таким образом, экстракты (сырой экстракт или его фракции) были подвергнуты стандартным испытаниям, чтобы исключить их потенциальное вредное воздействие и определить механизмы их биоактивного действия, тем самым подтвердив их полезные для здоровья свойства.

В начале 60-х годов XX века китайские и японские учёные уже установили, что *H. erinaceus* оказывает замечательное противоопухолевое воздействие. Особенно эффективен для лечения различных видов рака, включая карциномы пищевода и желудка. Противоопухолевое воздействие обусловлено полиозой гриба. Его механизм связан с повышением болезнеустойчивости самого организма или укреплением способности переносить химио- и радиотерапию, что позволяет достичь цели уничтожении раковых клеток. Промышленно выпускаемый лекарственный препарат (таблетки) из герициума эффективен при лечении рака желудка, пищевода и других злокачественных опухолей. Ван с сотрудниками экстрагировали из культуральной жидкости гриба полиозу, молекулярная масса которой больше 115 104 Да. Она активна против метастазирования опухоли лёгких, кроме того, может увеличивать количество Т-клеток и макрофагов, повышать активность клеток натуральных киллеров, противодействовать снижению вызванного циклофосфаном количества лейкоцитов [28].

Последнее исследование, проведенное *in vitro*, подтвердило эффективность экстракта *H. erinaceum* против клеток рака печени HepG2 и Huh-7, клеток рака толстой кишки HT-29 и клеток рака желудка NCI-87. Это указывает на потенциальное применение гриба *H. erinaceum* в качестве лекарства от рака желудочно-кишечного тракта [29].

Исследования показали, что активность полиозы в организме связана не только с воздействием на иммунитет, но и имеет тесную связь с нейрогуморальной системой. Недавно японские учёные выделили из этого гриба компонент под названием NGSF (стимулятор восстановления нервной ткани). Была доказана способность гериция регенерировать рост новых нейронов в головном мозге, останавливая развитие дегенеративных неврологических заболеваний [30, 31].

Этаноловый экстракт гриба *H. erinaceum* противодействует гибели нейронов [32]. Экстракты этанола из *H. erinaceum* содержат NGF, уровень которого снижается у пациентов с болезнью Альцгеймера, и этот эффект может оказаться полезным при лечении этого заболевания [33, 34]. Его можно использовать для контроля боли при диабетической невропатии и при лечении болезни Паркинсона [35]. Прием экстрактов гриба *H. erinaceum* улучшает способности к обучению и улучшает память [36].

H. erinaceus использовался в Восточной Азии в качестве питания и для фитотерапии с древних времен. Было сообщено, что он способствует росту нервов благодаря секреции фактора роста нервов, которые участвуют в поддержании и организации холинергических нейронов в центральной нервной системе. Специальные лабораторные исследования этого гриба показали, что *H. erinaceum* способен предотвратить нарушения пространственной краткосрочной памяти и визуального распознавания, благодаря наличию амилоидных β (25-35) пептидов. Это открытие указывает на то, что этот гриб может быть полезен в профилактике когнитивной дисфункции [37].

В последние годы широко распространена множественная лекарственная устойчивость патогенных микроорганизмов человека из-за неизбирательного использования противомикробных препаратов, обычно используемых при лечении инфекционных заболеваний. В постоянном поиске новых антимикробных структур грибы представляют интерес для исследователей. Из грибов выделено 60 противомикробных соединений. Однако до сих пор на рынке в качестве антибиотиков присутствовали только соединения микроскопических грибов [38].

Также была подтверждена способность активировать макрофаги водными экстрактами из *H. erinaceum* [39]. Был охарактеризован НЕРЗ β -D-глюкан, полученный из плодовых тел *H. erinaceum* [40]. Новый гетерополисахарид был выделен из плодовых тел гриба *H. erinaceum*. Он содержит фукозу, галактозу и глюкозу, а также рамнозу. Эксперименты на крысах показали иммуномодулирующие свойства полисахаридов, полученных из гриба *H. erinaceum*, что проявилось в повышении секреции цитокинов IL-12, IFN- γ и IL-10 [41]. Полисахариды, полученные из *H. erinaceum*, способны усиливать активность антиоксидантных ферментов в коже, обеспечивая тем самым антивозрастные свойства [42].

Также было обнаружено, что метанольные экстракты из тел сухих плодов гриба *H. erinaceum* проявляют антиоксидантные свойства [43]. В исследованиях на животных были показаны антиоксидантные свойства полисахаридов, полученных из *H. erinaceum*. Продукт, полученный ферментацией уксусной кислоты с использованием *H. erinaceum* в качестве субстрата, проявлял антиоксидантные свойства [44].

Многие исследователи показали и другие полезные для здоровья эффекты гриба *H. erinaceum*. Студентки, принимавшие препараты с его экстрактами, заявили об улучшении качества сна [45]. Депрессия или тревога встречались гораздо реже и были менее интенсивными у женщин в менопаузе, которым давали порошкообразные плодовые тела гриба *H. erinaceum*, по сравнению с группой, получавшей плацебо [46].

Исследования показали, что водные экстракты способствуют процессу заживления открытых ран и уменьшают размер и видимость рубцов у скарифицированных крыс [47]. Другое исследование показало эффективность водорастворимых соединений, выделенных из гриба *H. erinaceum*, в усилении иммунного ответа и лечении ран. В свою очередь, метанольные экстракты и содержащиеся в них вещества - D-треит и D-арабинит, а также пальмитиновая кислота способны снижать уровень липидов и глюкозы в крови у исследованных крыс [48].

Гериценон В, полученный из гриба *H. erinaceum*, способен ингибировать агрегацию тромбоцитов [49]. *H. erinaceum* может регулировать функции нервной, пищеварительной, кровеносной и иммунной систем организма, что способствует общему здоровью человека [50]. Вещества из *H. erinaceum* могут быть использованы для лечения и профилактики возрастных заболеваний [51]. Добавление полисахаридов из гриба *H. erinaceum* в корм для цыплят-бройлеров может привести к производству мяса с пониженным уровнем холестерина [52].

Литература

1. Dias D.A., Urban S., Roessner U. A. Historical overview of natural products in drug discovery. *Metabolites*. 2012. - № 2. - pp. 303–336.
2. Chakraborty N., Banerjee A., Sarkar A., Ghosh S., Acharya K. Mushroom polysaccharides: A potent immune-modulator. *Biointerface Research in Applied Chemistry*. 2021. - № 11. - pp. 8915–8930.
3. Reis F.S., Barros L., Martins A., Ferreira I.C.F.R. Chemical composition and nutritional value of the most widely appreciated cultivated mushrooms: an inter-species comparative study. *Food Chem. Toxicol.*, 2012. - № 50. - pp. 191–197.
4. Barros L., Ferreira M.J., Queirós B., Ferreira I.C.F.R., Baptista P. Total phenols, ascorbic acid, b-carotene and lycopene in Portuguese wild edible mushrooms and their antioxidant activities. *Food Chem.*, 2007. - № 103. - pp. 413–419.
5. Khan M.A., Tania M., Liu R., Rahman M. *Herichium erinaceus*: An edible mushroom with medicinal values. *Journal of Complementary and Integrative Medicine*, 2013. - № 10. - pp. 253–258.
6. Wojewoda W. *Encyklopedia biologiczna*. Kraków: OPRESS, 1998.
7. Index Fungorum [Internet]. 2016 [cited 2016 Jan 19]. Available from: <http://www.indexfungorum.org>
8. Gumińska B, Wojewoda W. *Grzyby i ich oznaczanie*. Warszawa: PWRiL, 1985.
9. Stamets P. *Growing gourmet and medicinal mushrooms*. Berkeley, CA: Ten Speed Press, 1993.
10. Forá C.G., Lauer K.F., Stefan C., Banu C. *Herichium erinaceus* and *Sacroscypha coccinea* in deciduous forest ecosystem. *Journal of Horticulture, Forestry and Biotechnology*, 2009. - № 13. - pp. 67–68.
11. Doll R. Die Verbreitung der gestielten Stachelpilze sowie das Vorkommen von *Herichium*, *Creolophus cirrhatus*, *Spongipellis pachyodon* und *Sistotrema confluens* in Mecklenburg. *Feddes Repert.* 1979. - № 90(1–2). - pp. 103–120.
12. Grace J., Mudge K.W. Production of *Herichium* sp. (lion's mane) mushrooms on totem logs in a forest farming system. *Agroforestry Systems*. 2015. - № 89(3). - pp. 549–556.
13. Boddy L., Crockatt M.E., Ainsworth A.M. Ecology of *Herichium cirratum*, *H. corraloides* and *H. erinaceus* in the UK. *Fungal Ecol.* 2011. - № 4. - pp. 163–173.
14. Ginns J. *Herichium* in North America: cultural characteristics and mating behavior. *Can J Bot.* 1985. - № 63. - pp. 1551–1563
15. Bernicchia A., Gorjón S.P. *Corticaceae s. l. Fungi Europaei*, vol. 12. Edizioni Candusso, 2010.
16. Kim Y.D., Ha K.Y., Lee J.K., Kim S.D. Variability of rice koji enzyme activities using Basidiomycete. *Int Rice Res Notes*. 2000. - № 25(3). - pp. 10.
17. Sun S.J., Liu J.Z., Hu K.H., Zhu H.X. The level of secreted laccase activity in the edible fungi and their growing cycles are closely related. *Curr Microbiol.* 2011. - № 62. - pp. 871–875.
18. Ko H.G., Park H.G., Park S.H., Choi C.W., Kim S.H., Park W.M. Comparative study of mycelia growth and basidiomata formation in seven different species of the edible mushroom genus *Herichium*. *Bioresour Technol.* 2005. - № 96. - pp. 1439–1444.
19. Hu S.H., Wang J.C., Wu C.Y., Hsieh S.L., Chen K.S., Chang S.J., et al. Bioconversion of agro wastes for the cultivation of culinary-medicinal lion's mane mushrooms *Herichium erinaceus* (Bull.: Fr.) Pers. and *H. laciniatum* (Leers) Banker (Aphyllphoromycetidae) in Taiwan. *Int J Med Mushrooms*. 2008. - № 10(4). - pp. 385–398.
20. Grygansky A.P., Solomko E.F., Kirchhoff B. Mycelial growth of medicinal mushroom *Herichium erinaceus* (Bull.: Fr.) Pers. in pure culture. *Int J Med Mushrooms*. 1999. - № 1(1). - pp. 81–87.

21. Oei P. Mushroom cultivation, appropriate technology for mushroom growers. Leiden: Backhuys Publishers; 2003.
22. Mau J.L., Lin H.C., Ma J.T., Song S.F. Non-volatile taste components of several speciality mushrooms. Food Chem. 2001. - № 73. - pp. 461–466.
23. Kenmoku H., Kato N., Shimada M., Omoto M., Mori A., Mitsunashi W., et al. Isolation of (-)-cyatha-3,12-diene, a common biosynthetic intermediate of cythane diterpenoids, from an erinaceine producing basidiomycete, *H. erinaceum*, and its formation in a cell-free system. Tetrahedron Lett. 2001. - № 42. - pp. 7439–7442.
24. Gerbec B., Tavcar E., Gregori A., Kreft S., Berovic M. Solid state cultivation of *Hericium erinaceus* biomass and erinaceine A production. J Bioprocess Biotech. 2015. - № 5(2). - p. 210.
25. Mizuno. Bioactive substances in *Hericium erinaceus* (Bull.:Fr.) Pers. (Yamabushitake), and its medicinal utilization. Int. J. Med. Mushr. 1999. - pp. 105–119.
26. Pegler D.N. Useful fungi of the world: the monkey head fungus. Mycologist. 2003. - № 17(3). - pp. 120–121.
27. Jieli L. Studies on adenosine composition with medicinal effects of *Hericium erinaceus* and its pharmaceutical products. Edible Fungi of China. 2002. - № 21(3). - p. 32.
28. Ван Сяньхуй, Фань Сюйжун. Регулирующее воздействие полиозы ежевика гребенчатого на Т-лимфатические клетки // Журнал китайской экспериментальной клинической иммунологии. 1990. - № 2(4). - С. 40–43.
29. Li G., Yu K., Li F., Xu K., Li J., He S., et al. Anticancer potential of *Hericium erinaceus* extracts against human gastrointestinal cancers. J Ethnopharmacol. 2014. - № 153. - pp. 521–530.
30. Чжан Чжончэн, Ли Цзиньдун, Ли Шичжэнь и др. Анализ лечебной эффективности полиозы ежевика гребенчатого и пептида зубной железы при перестройке иммунитета мышей, перенёсших трансплантацию костного мозга // Журнал китайской экспериментальной клинической иммунологии. 1995. - № 7(5). С. 13–16.
31. Фу ЮйИнь, Хэ Цинбан. Определение состава полиозы восьми съедобных грибов и их влияние на лимфатические клетки // Китайская сельскохозяйственная наука 1995. - № 28(5). - С. 78–80.
32. Nagai K., Chiba A., Nishino T., Kubota T., Kawagishi H. Dilinoleoyl-phosphatidylethanolamine from *H. erinaceum* protects against ER stress-dependent Neuro2a cell death via protein kinase C pathway. J Nutr Biochem. 2006. - № 17. - pp. 525–530.
33. Xu T., Beelman R.B. The bioactive compounds in medicinal mushrooms have potential protective effects against neurodegenerative diseases. Advances in Food Technology and Nutritional Sciences. 2015. - № 1(2). - pp. 62–66.
34. He C.Y., Chen S.D., Lu W.J., Wang H.C., Chang Y.C., Cheng Y.H., et al. Effect of ethanol extracts from *H. erinaceum* solid-state fermented wheat on nerve cells growth. Hans Journal of Food and Nutrition Science. 2015. - № 4. - pp. 1–10.
35. Dhawan S., Chouhan U. Structural and functional characterization of *H. erinaceum*, manganese peroxidase as an antioxidant against iron induced Parkinson's. Int J Sci Res. 2015. - № 4(8). - pp. 431–438.
36. Wang L.L., Guo H.G., Wang Q.L., Tan R., Fu Q.W., Liu N., et al. A preliminary study of fresh *Hericium erinaceus* oral liquid on health-care function and promotion of learning and memory. Mycosystema. 2011. - № 30(1). - 85–91.
37. Mori K., Obara Y., Moriya T., Inatomi S., Nakahata N. Effects of *Hericium erinaceus* on amyloid β (25–35) peptide-induced learning and memory deficits in mice. Biomedical Research. 2011. - № 32(1). - pp. 67–72.
38. Lindequist U., Niedermeyer T.H.J., Jülich W.D. The pharmacological potential of mushrooms, Evid. Based Complement Altern. Med. 2005. - pp. 285–299.
39. Lee J.S., Cho J.Y., Hong E.K. Study on macrophage activation and structural characteristics of purified polysaccharides from the liquid culture broth of *Hericium erinaceus*. Carbohydr Polym. 2009. - № 78. - pp. 162–168.
40. Dong Q., Jia L.M., Fang J.N. A β -D-glucan isolated from the fruiting bodies of *Hericium erinaceus* and its aqueous conformation. Carbohydr Res. 2006. - № 341. - pp. 791–795.
41. Sheu S.C., Lyu Y., Lee M.S., Cheng J.H. Immunomodulatory effects of polysaccharides isolated from *Hericium erinaceus* on dendritic cells. Process Biochem. 2013. - № 48. - pp. 1402–1408.
42. Xu H., Wu P., Shen Z., Chen X. Chemical analysis of *H. erinaceum* polysaccharides and effect of the polysaccharides on derma antioxidant enzymes, MMP-1 and TIMP-1 activities. Int J Biol Macromol. 2010. - № 47. - pp. 33–36.
43. Mujic I., Zekovic Z., Vidovic S., Zivkovic J. Antioxidant properties of selected edible mushroom species. Journal of Central European Agriculture. 2010. - № 11(4). - pp. 387–392.
44. Han Z.H., Ye J.M., Wang G.F. Evaluation of in vivo antioxidant activity of *Hericium erinaceus* polysaccharides. Int J Biol Macromol. 2013. - № 52. - pp. 66–71.

45. Okamura H., Anno N., Tsuda A., Inokuchi T., Uchimura N., Inanaga K. The effects of *Herichium erinaceus* (Amyloban® 3399) on sleep quality and subjective well-being among female undergraduate students: a pilot study. *Personalized Medicine Universe*. 2015. - № 4. - pp.76– 78.
46. Nagano M., Shimizu K., Kondo R., Hayashi C., Sato D., Kitagawa K., et al. Reduction of depression and anxiety by 4 weeks *Herichium erinaceus* intake. *Biomedical Research*. 2010. - № 31(4). - pp. 231–237.
47. Abdulla M.A., Fard A.A., Sabaratnam V., Wong K.H., Kuppusamy U.R., Abdullah N., et al. Potential activity of aqueous extracts of culinary-medicinal lion's mane mushroom, *Herichium erinaceus*. *Int J Med Mushrooms*. 2011. - № 13(1). - pp. 33–39.
48. Wang J.C., Hu S.H., Wang J.T., Chen K.S., Chia Y.C. Hypoglycemic effect of extract of *Herichium erinaceus*. *J Sci Food Agric*. 2005. - № 85(4). - pp. 641–646.
49. Mori K., Kikuchi H., Obara Y., Iwashita M., Azumi Y., Kinugasa S., et al. Inhibitory effect of hericenone B from *Herichium erinaceus* on collagen-induced platelet aggregation. *Phytomedicine*. 2010. - № 17. - pp. 1082–1085.
50. Jiang S., Wang S., Sun Y., Zhang Q. Medicinal properties of *Herichium erinaceus* and its potential to formulate novel mushroom-based pharmaceuticals. *Appl Microbiol Biotechnol*. 2014. - № 98. - pp. 7661–7670.
51. Noh H.J., Yang H.H., Kim G.S., Lee S.E., Lee D.Y., Choi J.H., et al. Chemical constituents of *H. erinaceum* associated with the inhibitory activity against cellular senescence in human umbilical vascular endothelial cells. *J Enzyme Inhib Med Chem*. 2015. - № 30(6). - pp. 934– 940.
52. Shang H.M., Song H., Wang L.N., Wu B., Ding G.D., Jiang Y.Y., et al. Effects of dietary polysaccharides from the submerged fermentation concentrate of *Herichium caput-medusae* (Bull.: Fr.) Pers. on performance, gut microflora, and cholesterol metabolism in broiler chickens. *Livest Sci*. 2014. - № 167. - pp. 276–285