УДК 574.5

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ КОРМОВОЙ БАЗЫ РЕКИ НУРА

Куржыкаев Ж.¹, Крайнюк В.Н.², Асылбекова А.С.³, Баринова Г.К.⁴

¹ кандидат с.-х. наук, заведующий лабораторией Северного филиала ТОО НПП «Рыбное хозяйство», г.Нур-Султан, Казахстан

² заведующий опорным пунктом г.Караганда Северного филиала ТОО НПП «Рыбное хозяйство», г.Караганда, Казахстан

³ кандидат с.-х. наук, ассоц.профессор НАО КАТУ им.С.Сейфуллина, г.Нур-Султан, Казахстан

⁴ кандидат биологических наук, и.о. ассоц.профессора НАО КАТУ им.С.Сейфуллина, г.Нур-Султан, Казахстан

ANALYSIS OF THE STATE OF THE NURA RIVER FORAGE BASE

Kurzhikaev Zh.¹, Krainyuk V.N.², Assylbekova A.S.³, Barinova G.K.⁴

¹ Candidate of Agricultural Sciences, head of the laboratory of the Northern Branch of the LLP «Fisheries Research and Production Center», Nur-Sultan, Kazakhstan

² Head of the support point of Karaganda of the Northern Branch of the LLP «Fisheries Research and Production Center», Karaganda, Kazakhstan

³ Candidate of Agricultural Sciences, assoc.professor of S.Seifullin Kazakh Agro Technical University, Nur-Sultan, Kazakhstan

⁴ Candidate of Biological Sciences, acting assoc.professor of S.Seifullin Kazakh Agro Technical University, Nur-Sultan, Kazakhstan

Аннотация. В данной статье приводятся результаты исследований по состоянию кормовой базы реки Нура. В водоемах были определены видовой состав, общая масса, численность зоопланктона и зообентоса. Зоопланктон исследованных водоемов также разнообразен и включает широко распространенные виды, которые можно разделить на 3 группы: коловратки, ветвистоусые, веслоногие ракообразные. На исследованных водоемах в составе зоопланктона отмечено 40 таксонов, из которых 11 видов – коловраток, 16 – ветвистоусых ракообразных, 13 – веслоногих ракообразных. Доминантами по частоте встречаемости у коловраток являются *A.priodonta*, *P.remata* и *F.longiseta*, у ветвистоусых – *D.cuclata* и *D.galeata*, у копепоид–представители рода *Mesocyclops*. Общее видовое разнообразие бентического комплекса реки Нура содержит более 100 видов. На реотильных участках очень высоко обилие мелких двустворчатых моллюсков семейств *Euglessidae* и *Pisidiidae*, образующих основу биомассы бентоса. Донное население лимнических и близких к ним по характеристикам участков более разнообразно в видовом плане. Доминантами здесь выступают хирономиды *Chironomidae* spp., имевшие высокую численность. Кормовая база участков реки соответствует условиям среды и позволяет существовать определенному стаду промысловых рыб.

1. **Abstract.** This article presents the results of research on the state of the Nura River forage base. The species composition, total mass, and abundance of zooplankton and zoobenthos were determined in the reservoirs. The zooplankton of the studied reservoirs is also diverse and includes widespread species that can be divided into 3 groups: rotifers, branched-moustached, oar-footed crustaceans. In the studied reservoirs, 40 taxa were noted as part of zooplankton, of which 11 species are rotifers, 16 are branched crustaceans, and 13 are oar-footed crustaceans. *A.priodonta*, *P.remata* and *F.longiseta* are dominant in the frequency of occurrence in rotifers, *D.cuclata* and *D.galeata* in branchiiformes, and representatives of the genus *Mesocyclops* in copepods. The total species diversity of the benthic complex of the Nura River contains more than 100 species. The abundance of small bivalve mollusks of the families *Euglessidae* and *Pisidiidae*, which form the basis of benthic biomass, is very high in the rheotic areas. The bottom population of limnic and areas close to them in terms of characteristics is more diverse in species terms. The dominant species here are the chironomids *Chironomidae* spp., which had a high number. The forage base of the river sections corresponds to the environmental conditions and allows a certain herd of commercial fish to exist.

Ключевые слова: река Нура, зоопланктон, зообентос, кормовая база, численность, биомасса

Key words: Nura river, zooplankton, zoobenthos, food supply, abundance, biomass

Нура – крупнейшая река Нура-Сарысуйского бассейна. Бассейн реки располагается на территории двух областей – Карагандинской и Акмолинской. Впадает через систему пойменных водоемов в озеро Тенгиз. Основными притоками реки Нура являются реки Шерубай-Нура, Улькен-Кундызды, Есен и Ошаганды.

В настоящее время река имеет статус рыбохозяйственного водоема республиканского значения. Промысловый лов развит на пойменных водоемах и водохранилищах, имеющих статус водоемов местного значения. В русле реки и на ее старицах ведется любительский лов рыбы.

Близкое расположение таких крупных центров как Астана и Караганда обеспечивают высокий статус данной водной системе в плане рекреации и любительского рыболовства. Это, соответственно, определяет высокую степень нагрузки на ее экосистемы и промысловые популяции рыб.

Целью исследований является изучить анализ современного состояния кормовой базы реки Нура.

Материалы и методы исследований. Материал был собран в результате полевых выездов мае - сентябре 2020 года. Было обследовано 6 точек на р. Нура (рисунок 1), проанализировано 36 проб зоопланктона и зообентоса. Для оценки состояния водного объекта по зоопланктону и зообентосу использовали данные о видовом разнообразии в основных группах, общей численности и биомассе организмов, а также кормности водоёма.

Рис. 1 - Карта-схема расположения станций отбора проб в системе реки Нуры

При отборе и анализе гидробиологических проб основывались на методике [1]. Сбор гидробиологического материала велся в соответствии с общепринятыми методиками [2,3]. Пробы зоопланктона отбирались процеживанием 100 л воды через сеть Апштейна с последующей фиксацией 40 % раствором формалина.

В лабораторных условиях проводились идентификация и подсчет организмов планктона под микроскопами МБС-10 и МСХ-300. При выявлении их видового состава использовались известные определители [4-7]. Организмы зоопланктона просчитывались в определенной части пробы в камере Богорова, с последующим просмотром половины её объёма или всего остатка для выявления крупных и редких особей. При расчётах индивидуального веса зоопланктонов применялись уравнения линейно - весовой зависимости [3]. Для каждого вида ракообразных учитывалась численность и масса всех стадий развития. Количество особей и весовой показатель всех выявленных видов суммировались далее по основным группам организмов и сообществу в целом. Численность и масса зоопланктона рассчитывались на 1м³ водной толщи.

Бентосные пробы отбирали с помощью скребка с захватом 1,0 м², промывались в ситах с разной ячейей. Бентосные организмы помещались в 4-10% раствор формалина. При наличии в пробе значительного количества двухстворчатых моллюсков применяли 10% раствор формалина, так как вода из мантийной полости разбавляет фиксирующую жидкость. Пробы хранились в широкогорлых банках из тёмного стекла. Для установления численности организмы помещали в чашку Петри, выявленные в процессе подсчёта формы определяли по систематическим группам до уровней типа, класса или отряда с последующим более детальным определением систематического положения животных до уровня рода и вида, за исключением трудноопределяемых групп организмов [7-13]. Взвешивание проводили после предварительной обсушки в бюксах на аналитических весах. Определение численности и биомассы проводилось по методологической рекомендации [14]. Кормность водоема определялась по С. П. Китаеву [15].

Результаты исследований. Высокое разнообразие условий среды обитания живых организмов в системе реки Нуры формирует достаточно специфические планктоценозы.

Коловратки в зоопланктоне р. Нуры представлены 9-11 видами, ветвистоусые рачки – 15-16 видами, веслоногие – 10-13 видами (таблица 1).

Таблица 1

Таксономический состав и частота встречаемости зоопланктона р. Нуры

Таксон	Частота встречаемости, %				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rotatoria					
<i>Asplanchnapriodonta</i> Gosse, 1850	24	36	64	56	54
<i>Brachionusangularis</i> Gosse, 1851	32	64	21	44	46
<i>B. urceus</i> (L., 1758)	20	50	43	38	40
<i>Filinia longiseta</i> (Ehrenberg, 1834)	24	43	14	69	62
<i>Keratella cochlearis</i> (Gosse, 1851)	64	71	93	31	56
<i>K. quadrata</i> (Muller, 1786)	36	71	57	0	44
<i>Lecanella</i> (Muller, 1776)	20	29	36	19	26
<i>Notholca squamula</i> (Muller, 1786)	0	0	0	13	11
<i>Polyarthralumina</i> Kutikova, 1962	92	79	79	44	44
<i>P. remata</i> Skorikov, 1896	64	36	21	50	46
<i>Pompholyx sulcata</i> Hudson, 1885	12	0	29	38	36
Cladocera					
<i>Aloina guttata</i> Sars, 1862	32	57	71	38	36
<i>Bosmina longirostris</i> Schoedler, 1866	72	93	43	44	42
<i>Ceriodaphnia reticulata</i> (Jurine, 1820)	64	57	100	69	73
<i>C. rotunda</i> Sars, 1862	20	43	0	31	36
<i>C. laticaudata</i> R. Muller, 1867	28	71	50	50	48
<i>Chydorus ovalis</i> Kurz, 1875	52	71	86	69	66
<i>Ch. spaericus</i> (O.F. Muller, 1785)	20	36	36	0	13
<i>Daphnia longispina</i> O.F. Muller, 1785	100	93	100	38	34
<i>D. pulex</i> Leydig, 1860	16	57	57	50	53
<i>D. cucullata</i> Sars, 1862	76	93	36	88	74
<i>D. galeata</i> , Sars, 1864	7	4	5	8	76

	2	3	0	1	
<i>Macrotrixhirsuticornis</i> Norman et Brady, 1867	4	0	0	3 8	44
<i>Moinamacrocopa</i> (Straus, 1820)	2 8	4 3	4 3	2 5	23
<i>Polyphemus pediculus</i> (Linnaeus, 1761)	1 2	7	2 9	5 0	54
<i>Sidacristallina</i> (O.F. Muller, 1776)	3 6	7	3 6	3 1	36
<i>Simocephalus serrulatus</i> (Koch, 1841)	4 0	5 0	3 6	2 5	33
Copepoda					
<i>Arctodiaptomus bacillifer</i> (Koelbel, 1885)	6 0	1 00	6 4	4 4	54
<i>Acanthocyclops trajani</i> Mirabdullayev & Defaye, 2004	7 6	5 7	7 1	3 8	42
<i>A. vernalis</i> (Fischer, 1853)	3 2	2 9	0	3 8	34
<i>Eudiaptomus graciloides</i> (Lilljeborg, 1888)	8 8	5 0	8 6	1 3	36
<i>Cyclops abyssorum</i> Sars, 1863	2 4	2 1	3 6	3 1	42
<i>C. strenuus</i> Fischer, 1851	5 6	7 9	6 4	6 9	62
<i>C. vicinus</i> Uljanin, 1875	6 4	5 0	5 7	5 0	62
<i>Diacyclops bicuspidatus</i> (Claus, 1857)	4	0	2 1	6	16
<i>Eucyclops serrulatus</i> (Fischer, 1851)	2 4	5 0	3 6	5 6	48
<i>Mesocyclops leuckarthi</i> (Claus, 1857)	2 8	5 0	4 3	7 5	78
<i>M. crassus</i> (Claus, 1857)	1 6	7 9	0	9 4	74
<i>M. oithonoides</i> (Sars, 1862)	2 0	6 4	5 7	8 8	76
<i>Paracyclops tiberiatus</i> (Fischer, 1853)	3 6	1 4	0	1 9	17
Всего видов:	3 9	3 7	3 4	3 8	40

Доминантами по частоте встречаемости у коловраток являются *A. priodonta*, *P. remata* и *F. longiseta*, у ветвистоусых – *D. cuclata* и *D. galeata*, у копепод – представители рода *Mesocyclops*. Динамика видового состава, численности и биомассы зоопланктона так же находится в прямой зависимости от факторов среды. Наибольшие показатели были характерны для стариц с развитыми прибрежными фациями. В этом случае развитие имели не только фитофильные формы, но и типично планктонные.

Количественные показатели развития зоопланктона на исследованных участках реки Нуры даны в таблице 2.

Таблица 2

Характеристика сообществ кормовых для рыб организмов (зоопланктон, комплексная проба)

Группа зоопланктеров	п. Алмас		п. Сабынды (русло)		п. Сабынды (старица)		с. Шахтерское (русло)	
	Численность, $\times 10^3 \text{ экз/м}^3$	Биомасса, г/м^3	Численность, $\times 10^3 \text{ экз/м}^3$	Биомасса, г/м^3	Численность, $\times 10^3 \text{ экз/м}^3$	Численность, $\times 10^3 \text{ экз/м}^3$	Численность, $\times 10^3 \text{ экз/м}^3$	Биомасса, г/м^3
Rotatoria	9,8	0,05	0	0	48,9	0,07	43,1	0,07
Cladocera	13,2	0,47	18,6	0,67	47,5	3,58	21,3	0,59
Copepoda	7,3	0,25	8,1	0,28	45,3	3,12	16,2	0,33
Всего:	30,3	0,77	26,7	0,95	141,7	6,77	80,6	0,99
Группа зоопланктеров	с. Шахтерское (старицы)		п/л Топольки		п.Г. Мустафина		с. Шешенкара	
	Численность, $\times 10^3 \text{ экз/м}^3$	Биомасса, г/м^3	Численность, $\times 10^3 \text{ экз/м}^3$	Биомасса, г/м^3	Численность, $\times 10^3 \text{ экз/м}^3$	Биомасса, г/м^3	Численность, $\times 10^3 \text{ экз/м}^3$	Биомасса, г/м^3
Rotatoria	87,5	0,31	75,3	0,23	85,3	0,23	52,4	0,09
Cladocera	50,2	3,97	52,2	4,13	43,1	3,23	34,5	2,45
Copepoda	34,5	2,57	31,2	2,45	37,3	2,13	35,2	2,53
Всего:	172,2	6,85	158,7	6,81	165,7	5,59	122,1	5,07

Зоопланктон на русловых станциях характеризовался как β –олиготрофный. В более лимнических условиях уровень развития зоопланктона был α –эвтрофного типа, что является высоким показателем для речных экосистем. В целом же, степень развития зоопланктона соответствует условиям среды обитания.

Зообентос. По результатам многолетних исследований видовая принадлежность была определена для 71 образца. Еще 4 надвидовых групп, неопределенных до вида, включает по нашим оценкам от 3 до 15 видов. Таким образом, общее видовое разнообразие бентического комплекса р. Нура содержит по нашим оценкам около 100 видов. Их список с распространением в бассейне приводится ниже (таблица 3).

Таблица 3

Таксономический состав зообентоса в р. Нура (1 – присутствует в составе бентофауны)

Таксон	Станция							
	п. Алмас	п. Сабынды, русло	п. Сабынды, старица	с. Шахтерское, русло	с. Шахтерское, старицы	п/л Топольки	п. Токаревка	с. Шешенкара
Oligochaeta								
<i>Uncinialisuncinata</i> (Oersted, 1842)	1	-	-	-	1	-	1	1
<i>Haemonias waldvogeli</i> Bretscher, 1900	-	1	1	1	1	1	-	1
<i>Slavina appendiculata</i> (d'Udekem, 1855)	1	-	-	1	1	-	1	-
<i>Chaetogaster diastrophus</i> (Gruith, 1828)	1	1	-	1	-	1	-	1
<i>Pristina longiseta</i> Ehrenberg, 1828	-	1	-	-	-	1	-	-
<i>Nais elinguis</i> Muller, 1773	-	-	1	1	1	-	1	-

<i>N. variabilis</i> Piguet, 1906	-	1	-	-	-	-	-	-	-
<i>Aulodrilus pluriset</i> a (Piguet, 1906)	-	-	1	1	-	-	-	-	-
<i>Limnodrilus claparedeanus</i> Ratzel, 1868	-	1	-	1	-	-	-	1	-
Bivalvia									
<i>Colletopterum ponderosum</i> (Pfeiffer, 1825)	1	1	-	1	-	1	1	1	1
<i>C. anatinum</i> (L., 1758)	-	1	-	1	-	-	1	-	-
<i>C. piscinale</i> (Nilsson, 1821)	1	-	-	1	-	1	-	-	-
<i>Adacna colorata</i> (Eichwald, 1829)	-	1	-	1	-	1	1	-	-
Pisidiidae spp.	1	-	1	-	1	-	1	1	1
Euglessidae spp.	1	-	1	-	1	1	1	1	1
Gastropoda									
<i>Cincinnati</i> depressa (Pfeiffer, 1828)	-	1	-	-	1	-	-	-	1
<i>Bythinia tentaculata</i> (L., 1758)	-	-	1	-	1	-	1	1	1
<i>Opisthorchophorus hispanicus</i> (Servain, 1880)	-	1	-	-	1	1	1	1	1
<i>Op. trosc</i> heli(Paasch, 1842)	1	1	1	-	-	-	-	-	-
<i>Acroloxus lacustris</i> (L., 1758)	1	-	-	1	-	-	1	-	-
<i>Lymnaea stagnalis</i> (L., 1758)	-	-	1	-	1	1	-	-	1
<i>L. fragilis</i> (L., 1758)	-	-	-	-	1	-	1	1	1
<i>L. iliensis</i> Lazareva, 1967	1	1	1	1	-	1	-	-	-
<i>L. kazakensis</i> Mozley, 1935	-	-	1	-	1	-	-	-	1
<i>L. auricularia</i> (L., 1758)	-	-	-	-	1	1	1	1	1
<i>L. tumida</i> (Held, 1836)	-	1	-	1	-	-	1	-	-
<i>L. ovata</i> (Draparnaud, 1805)	1	-	1	-	1	-	-	-	-
<i>L. balthica</i> (L., 1758)	-	-	-	-	1	-	-	-	-
<i>Physa skinneri</i> Taylor, 1954	-	-	-	-	1	1	-	-	-
<i>Planorbarius corneus</i> (L., 1758)	-	-	1	-	-	1	-	-	-
<i>Planorbis planorbis</i> (L., 1758)	1	-	-	-	-	1	1	-	-
<i>Armiger crista</i> (L., 1758)	-	-	-	-	-	-	1	-	-
<i>Ar. bielzi</i> (Kimakowicz, 1884)	1	-	-	1	-	1	-	-	1
<i>Anisus spirorbis</i> (L., 1758)	-	-	-	-	1	-	-	-	-
<i>An. vortex</i> (L., 1758)	-	1	1	1	1	-	-	-	1
<i>Bathyomphalus crassus</i> (Da Costa, 1778)	-	-	1	-	-	-	1	1	1
<i>Gyraulus draparnaldi</i> (Sheppard, 1823)	1	1	1	1	-	1	-	-	-
<i>G. stelmach</i> oetus (Bourguignat, 1860)	1	-	-	-	1	-	1	-	-
<i>G. acronicus</i> (Ferrussac, 1807)	-	1	1	-	-	1	-	-	1
Hirudinea									
<i>Glossiphonia complanata</i> (L., 1758)	1	1	1	1	-	1	1	-	-
<i>Erpobdella octoculata</i> (L., 1758)	1	1	-	1	1	1	1	1	1
Crustacea									
<i>Gammarus lacustris</i> L., 1758	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Insecta									
Odonata									
<i>Agrion splendens</i> (Harris, 1782)	-	-	1	-	1	1	-	-	1
<i>Sympecma paedisca</i> Brauer, 1880	-	1	-	1	-	-	-	-	-
<i>Chalcolestes viridis</i> (van der Linden, 1823)	-	-	1	-	-	-	-	-	-
<i>Lestes sponsa</i> (Hausemann, 1823)	1	1	-	-	1	-	-	-	1
<i>L. dryas</i> Kyrby 1890	-	-	1	-	-	-	-	-	-
<i>Coenagrion puella</i> (L., 1758)	-	-	-	-	1	1	-	-	1
<i>C. pumilio</i> (Charpentier, 1840)	1	1	1	-	-	-	1	1	1
<i>Enallagma cyathigerum</i> (Charpentier, 1840)	-	-	1	-	1	-	-	-	-
<i>Ischnura elegans</i> (van der Linden, 1823)	1	-	-	1	-	-	-	-	1

<i>Nepacineria</i> L., 1758	1	1	1	1	1	1	1	1
<i>Sigara lateralis</i> (Leach, 1817)	1	-	-	1	1	1	1	-
<i>S. gebleri</i> (Fieber, 1848)	-	1	1	-	-	-	-	1
<i>S. falleni</i> (Fieber, 1848)	-	1	-	-	-	1	-	-
<i>Corexia sahlbergi</i> (Fieber, 1864)	-	-	1	1	-	-	-	-
<i>C. linnaei</i> (Fieber, 1864)	1	1	-	-	1	-	-	1
<i>Cymatia coleoprata</i> (Fieber, 1864)	-	-	1	-	1	1	1	-
<i>C. rogenhoferi</i> (Fieber, 1864)	1	-	-	-	-	-	1	-
<i>Notonecta glauca</i> L., 1758	-	-	1	-	1	-	-	-
<i>N. lutea</i> Muller, 1776	-	-	-	-	-	1	1	1
<i>Hydrometra stagnorum</i> (L., 1758)	-	1	1	-	1	-	1	-
<i>Gerys argentatus</i> Schummel, 1832	1	-	1	1	-	1	-	-
Diptera								
Chironomidae spp.	1	1	1	1	1	1	1	1
Ceratopogonidae spp.	1	1	1	1	1	1	1	1
Trichoptera								
<i>Phryganeabipunctata</i> Retzius, 1783	1	-	-	1	-	-	1	-
<i>Limnephilus decipiens</i> (Kolenati, 1848)	-	1	1	-	1	-	-	1
<i>L. flavicornis</i> (Fabricius, 1787)	1	1	-	-	-	1	-	1
<i>L. nigriceps</i> (Zetterstedt, 1840)	-	1	1	1	1	-	-	-
<i>L. politus</i> McLachlan, 1865	1	-	-	-	-	1	1	-
<i>L. stigma</i> Curtis, 1834	-	-	-	1	1	-	1	1
<i>L. rhombicus</i> (L., 1758)	-	-	1	-	-	-	-	-
Количество видов	3	3	3	3	3	3	3	3
	3	4	5	2	7	4	6	4

Количественные показатели бентоса складываются гораздо лучше в условиях, более приемлемых для большинства донных организмов. Участки реки, обладающие заметным течением, менее кормны, чем лимнические (таблица 4). Моллюски учитывались без крупных представителей родов *Colletopterum*, *Limnaea* и *Planorbarius*. Класс кормности изученных участков реки варьирует от β -олиготрофного до α -мезотрофного. Наименьшей кормностью обладали реотические участки русла реки, наибольшей – старицы. По сравнению с 2019 годом на ряде участков кормность уменьшилась, что связано с динамикой гидрологического режима.

Таблица 4

Характеристика сообществ кормовых для рыб организмов (зообентос)

Группа зообентоса	п. Алмас		п. Сабынды, русло		п. Сабынды, старица		с. Шахтерское, русло	
	Численность, экз/м ²	Биомасса, г/м ²	Численность, экз/м ²	Биомасса, г/м ²	Численность, экз/м ²	Биомасса, г/м ²	Численность, экз/м ²	Биомасса, г/м ²
Oligochaeta	492	0,083	88	0,033	412	0,265	317	0,092
Bivalvia	0	0	1	0,004	7	0,033	5	0,042
Gastropoda	9	0,122	3	0,019	7	0,037	9	0,055
Hirudinea	14	0,033	13	0,048	15	0,091	13	0,088
Crustacea	23	0,488	17	0,204	43	1,534	28	0,491
Odonata	7	0,138	5	0,092	9	0,143	9	0,18
Ephemeroptera	95	0,233	40	0,083	0	0	12	0,034
Hemiptera	7	0,058	16	0,138	15	0,125	24	0,158
Trichoptera	9	0	4	0,103	8	0,1	7	0,1

га		,070				22		35
Diptera	262	⁰ _{,531}	214	0,638	593	^{2,2} ₁₄	361	^{0,6} ₁₈
Всего:	918	¹ _{,756}	401	1,362	1109	^{4,5} ₆₄	785	^{1,9} ₃₁
Преобладающий тип водоема	β-олиготрофный		β-олиготрофный		α-мезотрофный		β-олиготрофный	
Группа зообентоса	с. Шахтерское, старицы		п/л Топольки		п. Токаревка		с. Шешенкара	
	Численность, экз/м ²	Биомасса, г/м ²	Численность, экз/м ²	Биомасса, г/м ²	Численность, экз/м ²	Биомасса, г/м ²	Численность, экз/м ²	Биомасса, г/м ²
Oligochaeta	216	0,067	¹⁷³ ₇	^{0,3} ₃₈	196	^{0,0} ₉₆	834	0,237
Bivalvia	5	0,024	1	^{0,0} ₀₉	32	^{0,3} ₃₇	16	0,110
Gastropoda	13	0,056	8	^{0,0} ₉₂	16	^{0,1} ₀₉	10	0,088
Hirudinea	10	0,038	16	^{0,0} ₅₁	9	^{0,0} ₆₈	7	0,038
Crustacea	23	0,688	43	^{1,0} ₉₈	62	^{1,6} ₉₄	50	2,013
Odonata	3	0,105	8	^{0,3} ₃₅	6	^{0,4} ₁₂	4	0,158
Ephemeroptera	0	0	45	^{0,4} ₁₂	21	^{0,0} ₄₃	24	0,055
Hemiptera	5	⁰ _{,044}	16	0,152	29	^{0,2} ₂₇	4	^{0,0} ₇₁
Trichoptera	12	⁰ _{,238}	5	0,100	4	^{0,1} ₄₆	5	^{0,1} ₁₇
Diptera	632	² _{,314}	861	1,307	513	^{0,6} ₃₁	411	^{0,6} ₅₈
Всего:	919	³ _{,574}	2740	3,894	888	^{3,7} ₆₃	1365	^{3,5} ₄₅
Преобладающий тип водоема	α-мезотрофный		α-мезотрофный		α-мезотрофный		α-мезотрофный	

Донные сообщества подвержены фактору скорости течения. На лимнических и умеренно реотических участках видовое разнообразие, численность и биомасса больше, чем на быстром течении. На реотильных участках очень высоко обилие мелких двустворчатых моллюсков семейств *Euglossidae* и *Pisidiidae*, образующих основу биомассы бентоса. Видовое разнообразие этих трудно диагностируемых групп достаточно высокое: каждое семейство представлено 3 – 6 видами нескольких родов.

Донное население лимнических и близких к ним по характеристикам участков более разнообразно в видовом плане. Доминантами здесь выступают хирономиды *Chironomidae spp.*, имевшие высокую численность. Также были многочисленны гаммарусы *G. lacustris*, клопы нескольких родов. Также высоко было обилие малощетинковых червей, что однако не отражалось на их суммарной биомассе.

Кормовая база исследованных участков зависит от условий среды обитания кормовых организмов. Зоопланктон на русловых станциях характеризовался как β-олиготрофный. В более лимнических условиях уровень развития зоопланктона был α-эвтрофного типа, что является высоким показателем для речных экосистем. Класс кормности изученных участков реки варьирует от β-олиготрофного до α-мезотрофного. Наименьшей кормностью обладали реотические участки русла реки, наибольшей – старицы. Кормовая база участков реки (включая старицы и слепые рукава) соответствует условиям среды и позволяет существовать определенному стаду промысловых рыб.

Исследование финансируется Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (Грант № BR10264205).

Список литературы:

- 1 Кузнецова М. А., Охапкин А. Г., Шурганова Г. В., Юлова Г. А. Методы биоиндикации водных экосистем //Экологический мониторинг. Ч. 1. Методы биомониторинга. -Н. Новгород: Изд ННГУ, 1995. -С. 76-141.
- 2 Руководство по методам гидробиологического анализа поверхностных вод и донных отложений. – Л.: Гидрометиздат, 1983. – 240 с.
- 3 Методическое пособие при гидробиологических рыбохозяйственных исследованиях водоёмов Казахстана (планктон, зообентос). – Алматы, 2018. – 43 с.
- 4 Кутикова Л.А. Коловратки фауны СССР. – Л.: Наука, 1970, – 744 с.
- 5 Мордухай-Болтовской Ф.Д., Ривьер И.К. Хищные ветвистоусые фауны мира.– Л.: Наука, 1987. - 182 с.
- 6 Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий. -Т.1: Низшие беспозвоночные/ Цалолихин С. Я. (ред). –СПб.: Наука, -1994. -400 с.
- 7 Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий – Т. 2: Ракообразные/ Цалолихин С. Я. (ред).– СПб: Наука, -1995, - 632 с.
- 8 Методические рекомендации по сбору и обработке материалов при гидробиологических исследованиях на пресноводных водоёмах. Зообентос и его продукция. – Л., 1984. – 52 с.
- 9 Определитель пресноводных беспозвоночных Европейской части СССР/ Отв. ред. Кутикова Л. А. и Старобогатов Я. И. - Л.: Гидрометиздат, 1977.- 512 с.
- 10 Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий. -Т.3: Паукообразные, Низшие насекомые/ Цалолихин С. Я. (ред). –СПб: Наука. 1997. -458 с.
- 11 Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий. -Т.4: Двукрылые насекомые/ Цалолихин С. Я. (ред). –СПб: Наука. 2000. -977 с.
- 12 Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий. -Т.5: Высшие насекомые/ Цалолихин С. Я. (ред). –СПб: Наука. 2001. -825 с.
- 13 Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий. -Т.6: Моллюски, Полихеты, Немеритины/ Цалолихин С. Я. (ред). –СПб: Наука. 1994. -528 с.
- 14 Методические рекомендации по сбору и обработке материалов при гидробиологических исследованиях на пресноводных водоёмах. Зоопланктон и его продукция.– Л.,1984.- 33 с.
- 15 Китаев С.П. Основы лимнологии для гидробиологов и ихтиологов. - Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2007. – С. 132-137.

References

- 1 Kuznecova M. A., Ohapkin A. G., SHurganova G. V., JUlova G. A. Metody bioindikacii vodnyh jekosistem //JEkologicheskij monitoring. CH. 1. Metody biomonitoringa. -N. Novgorod: Izd NNGU, 1995. -S. 76-141.
- 2 Rukovodstvo po metodam gidrobiologicheskogo analiza poverhnostnyh vod i donnyh otlozhenij. – L.: Gidrometizdat, 1983. – 240 s.
- 3 Metodicheskoe posobie pri gidrobiologicheskikh rybohozajajstvennyh issledovanijah vodojomov Kazahstana (plankton, zoobentos). – Almaty, 2018. – 43 s.
- 4 Kutikova L.A. Kolovratki fauny SSSR. – L.: Nauka, 1970, – 744 s.
- 5 Morduhaj-Boltovskoj F.D., Riv'er I.K. Hishhnye vetvistousye fauny mira.– L.: Nauka, 1987. - 182 s.
- 6 Opredelite' presnovodnyh bespozvonochnyh Rossii i sopredel'nyh territorij. -Т.1: Nizshie bespozvonochnye/ Calolihin S. JA. (red). –SPb.: Nauka, -1994. -400 s.
- 7 Opredelitel' presnovodnyh bespozvonochnyh Rossii i sopredel'nyh territorij – Т. 2: Rakoobraznye/ Calolihin S. JA. (red).– SPb: Nauka, -1995, - 632 s.
- 8 Metodicheskie rekomendacii po sboru i obrabotke materialov pri gidrobiologicheskikh issledovanijah na presnovodnyh vodoemah. Zoobentos i ego produkcii. – L., 1984. – 52 s.
- 9 Opredelitel' presnovodnyh bespozvonochnyh Evropejskoj chasti SSSR/ Otв. red. Kutikova L. A. i Starobogatov JA. I. - L.: Gidrometizdat, 1977.- 512 s.
- 10 Opredelitel' presnovodnyh bespozvonochnyh Rossii i sopredel'nyh territorij. -Т.3: Paukoobraznye, Nizshie nasekomye/ Calolihin S. JA. (red). –SPb: Nauka. 1997. -458 s.
- 11 Opredelitel' presnovodnyh bespozvonochnyh Rossii i sopredel'nyh territorij. -Т.4: Dvukrylye nasekomye/ Calolihin S. JA. (red). –SPb: Nauka. 2000. -977 s.
- 12 Opredelitel' presnovodnyh bespozvonochnyh Rossii i sopredel'nyh territorij. -Т.5: Vysshie nasekomye/ Calolihin S. JA. (red). –SPb: Nauka. 2001. -825 s.
- 13 Opredelitel' presnovodnyh bespozvonochnyh Rossii i sopredel'nyh territorij. -Т.6: Molljuski, Polihety, Nemeretiny/ Calolihin S. JA. (red). –SPb: Nauka. 1994. -528 s.

14 Metodicheskie rekomendacii po sboru i obrabotke materialov pri gidrobiologicheskikh issledovanijah na presnovodnyh vodoemah. Zooplankton i ego produkcii.– L.,1984.- 33 s.

15 Kitaev S.P. Osnovy limnologii dlja gidrobiologov i ihtiologov. - Petrozavodsk: Karel'skij nauchnyj centr RAN, 2007. – S. 132-137.