STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARINDA METİSİLİNE DİRENÇ ORANINDAKİ DEĞİŞİM: METİSİLİNE DİRENÇ AZALIYOR MU?

Murat TELLİ¹®, Yavuz OKULU²®, Yağız PAT¹®

¹Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, AYDIN

²Fethiye Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, MUĞLA

ÖZ

Staphylococcus aureus, tüm dünyada morbidite ve mortalitesi yüksek enfeksiyonlara neden olabilen önemli bir bakteridir. *S.aureus* suşlarında metisiline karşı direncin ortaya çıkmasından sonra, metisiline dirençli *S.aureus* (MRSA) klonları dünyada ciddi nozokomiyal enfeksiyonlara neden olmuştur. Doksanlı yıllarda ise toplumda, cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarına neden olan farklı *S.aureus* klonları ortaya çıkmıştır. Günümüzde MRSA, hastanelerde olduğu kadar toplumda da çeşitli enfeksiyonlara yol açan önemli bir enfeksiyon etkeni haline gelmiştir. Çalışmamızın amacı, Ağustos 2007 - Temmuz 2008 tarihleri arasında izole edilmiş *S.aureus* suşları ile 2016 yılı içerisinde izole edilmiş suşların metisiline direnç oranlarını karşılaştırmaktır.

Çalışmamıza dahil edilen 376 *S.aureus* suşunun 100'ü Ağustos 2007 - Temmuz 2008 tarihleri arasında, 276'sı 1 Ocak 2016 - 31 Aralık 2016 tarihleri arasında Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Laboratuvarı'na gönderilen klinik örneklerden izole edilmiştir. *S.aureus* suşlarının tanımlanmasında tam otomatik bakteri tanımlama sistemi Phoenix® (BD Diagnostic Systems, ABD), DNaz, mannitol tuz agarına üreme ve koagülaz testleri kullanılmıştır. Antimikrobiyal duyarlılık, Phoenix® (BD Diagnostic Systems, ABD) tam otomatik duyarlılık sistemi ve disk difüzyon yöntemi ile belirlenmiştir. Duyarlılık sonuçları Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) ve The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) kılavuzlarına göre yorumlanmıştır.

Çalışmamızda, Ağustos 2007 - Temmuz 2008 tarihleri arasında elde edilen *S.aureus* suşlarının % 34'ü metisiline dirençli bulunmuştur. 2016 yılında ise *S.aureus* suşlarında metisiline direnç % 15.3 olarak bulunmuştur. MRSA oranlarının dokuz yıllık zaman süresi içerisinde % 34'ten, % 15.3'e düştüğü gözlenmiştir ($p<0.05$). Çalışmamızda hem invazif hem de invazif olmayan izolatlar kullanılmış olmasına rağmen hastane kaynaklı MRSA (HK-MRSA) ve toplum kaynaklı (TK-MRSA) suşları arasında ayırım yapılamamıştır. Invazif MRSA enfeksiyonlarındaki bu azalma, enfeksiyon kontrol prosedürlerindeki gelişmelere bağlı olabilir. Ancak, sadece invazif örneklerin değerlendirilmesi MRSA oranının saptanmasında yetersiz kalabilir. Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları gibi non-invazif enfeksiyonlara neden olan TK-MRSA suşlarının, artan öneminden dolayı, alınan önlemlerin *S.aureus* üzerinde ne kadar etkili olduğunun tam olarak anlaşılabilmesi için, hem invazif hem de non-invazif izolatları içeren, HK-MRSA ve TK-MRSA suşları arasında geniş çaplı epidemiyolojik çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar sözcükler: antimikrobiyal direnç, metisiline direnç, *Staphylococcus aureus*

ABSTRACT

The Change of the Methicillin Resistance Ratio in *Staphylococcus aureus* Strains: Is There a Decrease in Methicillin Resistance?

Staphylococcus aureus is a major healthcare problem that can cause infections with high morbidity and mortality rates worldwide. Since, discovery of resistance to methicillin in *S.aureus* strains, the methicillin resistant *S.aureus* (MRSA) clones spread to the world and caused serious nosocomial infections. In 90s, different clones of *S.aureus* that often cause skin and soft tissue infections arose in community. Currently MRSA is an important infectious agent that causes various infections in community as well as healthcare settings. The aim of this study was to compare the antimicrobial resistance profiles of *S.aureus* strains that were isolated in 2016 and between August 2007 August - July 2008.

A total of 376 *S.aureus* strains were isolated from clinical specimens in Adnan Menderes University Medical Faculty Medical Microbiology Laboratory. A hundred strains were isolated between August 2007 - July 2008 and, 276 strains were isolated in 2016. Fully automated bacterial identification system, Phoenix® (BD Diagnostic Systems, USA), DNase, growth on mannitol salt agar and coagulase tests were used for identification of *S.aureus* strains. Antimicrobial susceptibilities were determined by the Phoenix® (BD Diagnostic Systems, USA) full automated sensitivity system and disk diffusion method. Susceptibility results were interpreted according to the guidelines of the Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) and The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST).

In our study, we have founded the *S.aureus* to methicillin resistance 34% between August 2007 - July 2008 and 15.3 % in 2016. In our study, we found that MRSA rates decreased from 34 % to 15.3 % during a time period of nine years ($p<0.05$). Recently significant reductions of MRSA rates in invasive isolates were reported worldwide, similar to our study. In our study both invasive and non-invasive isolates were included but healthcare associated MRSA (HA-MRSA) and community associated MRSA (CA-MRSA) strains could not be differentiated. The reduction of invasive MRSA infections could be linked to improvements in infection control procedures. But it can be insufficient to detect MRSA rates by using data from only invasive isolates. CA-MRSA strains that cause non-invasive conditions, like skin and soft tissue infections are of concern. Therefore there is a need for a large scale epidemiological studies that involve both invasive and non-invasive isolates in order to fully understand if the measures on *S.aureus* are effective.

Keywords: antimicrobial susceptibility, methicillin resistance, *Staphylococcus aureus*

İletişim adresi: Murat Telli. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, AYDIN

Tel: (0256) 444 12 56/2726; GSM: (0533) 616 00 53

e-posta: mtelli@adu.edu.tr, mutelli@hotmail.com

Alındığı tarih: 30.07.2018, Yayına kabul: 26.11.2018

Yazarların Orcid ID noları: M. T. 0000-0003-2648-881X , Y. O. 0000-0003-4397-4529, Y. P. 0000-0003-4268-4933

GİRİŞ

Staphylococcus aureus ilk tanımlandığı 1881 yılından beri klinik önemi her geçen gün gittikçe artan ciddi bir enfeksiyon etkenidir. Sahip olduğu birçok virülans faktörü ile mortalitesi ve morbiditesi yüksek enfeksiyonlara yol açabilmekte ve ayrıca antibiyotiklere karşı geliştirdiği direnç nedeni ile tedavisi daha da güçleşmektedir. *S.aureus* bakteriyemi, enfektif endokardit, deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının ve osteoartriküler enfeksiyonların başlıca etkeni olup; hem toplum kaynaklı hem de hastane kaynaklı enfeksiyonlara yol açabilmektedir⁽¹⁷⁾. National Healthcare Safety Network'ün (NHSN) 2011-2014 verilerine göre *S.aureus* Amerika Birleşik Devletleri'nde hastane kaynaklı enfeksiyonlarda en sık ikinci, ventilatör ilişkili pnömoni ve cerrahi yara enfeksiyonlarında en sık etken patojendir⁽²⁰⁾. 1959 yılında beta-laktamaza dirençli bir antibiyotik olan metisilinin bir tedavi seçeneği olarak kullanıma girmesinden iki yıl sonra metisiline dirençli *S.aureus* (MRSA) suşları ortaya çıkmış ve ilerleyen yıllarda önemli bir hastane kökenli enfeksiyon etkeni olarak yerini almıştır⁽¹⁴⁾. 1990'lardan itibaren ise hastane kökenli suşlardan farklı genetik yapıda, kendisine ait virülans faktörleri olan toplum kökenli MRSA (TK-MRSA) suşları izole edilmeye başlanmıştır⁽⁴⁾. Özellikle deri ve yumuşak doku gibi non-invazif enfeksiyonlara yol açan bu suşlar tüm dünyaya yayılarak önemli epidemilere yol açmıştır⁽⁴⁾. *S.aureus* suşları beta-laktam antibiyotikler dışında tedavide kullanılan diğer antibiyotiklere de direnç geliştirebilmekte ve bu durum tedavi seçeneklerini iyice daraltmaktadır⁽¹⁵⁾.

Antibiyotik direnci gelişiminin mortalite ve morbidite üzerindeki önemli etkileri bulunmaktadır⁽¹²⁾. Bu nedenle, çalışmamızda hastanemizde enfeksiyon etkeni olarak izole edilen MRSA suşlarının antibiyotik direnç profilinin yıllar içerisindeki değişimini belirlemek amaçlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM

Çalışmamıza, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Laboratuvarı'na gönderilen klinik örneklerden, 100'ü Ağustos 2007 - Temmuz 2008 tarihleri arasında, 276'sı 1 Ocak 2016 - 31 Aralık 2016 tarihleri arasında izole edilmiş toplam 376 *S.aureus* suşu dahil edilmiştir. Her hastaya ait tek ve ilk suş çalışmaya dahil edilmiştir. *S.aureus* suşlarının tanımlanmasında, tam otomatik bakteri tanımlama sistemi Phoenix® (BD Diagnostic Systems, ABD) ile DNaz, mannitol tuz agar-da üreme ve koagülaz testleri kullanılmıştır. Antimikrobiyal duyarlılıkları, Phoenix (BD Diagnostic Systems, ABD) tam otomatik duyarlılık sistemi ile ve metisilin direnci sefoksitin disk difüzyon yöntemi ile belirlenmiştir. Duyarlılık sonuçları Ağustos 2007-Temmuz 2008 tarihlerindeki suşlar için Clinical Laboratory Standarts Institute (CLSI) ve 1 Ocak-31 Aralık 2016 tarihlerindeki suşlar için The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) kılavuzlarına göre yorumlanmıştır^(7,16). Çalışmamızda orta duyarlı çıkan sonuçlar dirençli olarak kabul edilmiştir. Çalışmamızda istatistiksel analiz için SPSS 16,0 programı kullanılmıştır. İstatistik analiz tekniği olarak Fisher Ki-kare ve frekans

testlerinden yararlanılmıştır. Test sonuçları $p < 0.05$ ise anlamlı kabul edilmiştir.

BULGULAR

Çalışmamıza dahil edilen suşların % 51.8'i kan örneklerinden izole edilmiş, izolatların klinik örneklerle göre dağılımı Tablo 1'de verilmiştir.

Ağustos 2007 - Temmuz 2008 tarihleri arasında izole edilen 100 suşun 34'ü, 2016 yılında elde edilen 276 suşun % 15.3'i metisiline dirençli bulunmuştur. Her iki yıl grubu arasındaki metisilin direncindeki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur ($p < 0.05$). İzolatlarda vankomisin ve linezolid direnci saptanmamıştır. Antimikrobiyal direnç oranları Tablo 2'de verilmiştir. 2016 yılında elde edilen *S.aureus* suşlarının örneklerle göre metisiline direnç oranları Tablo 3'de verilmiştir.

Tablo 1. *S.aureus* suşlarının izole edildikleri örneklerin yıllara göre dağılımı [n (%)].

Örnek türü	Toplam	Ağustos 2007- Temmuz 2008	2016
Kan	195 (51.8)	41 (41)	154 (55)
Yara yeri	106 (28.1)	48 (48)	58 (21)
İdrar	38 (10.1)	3 (3)	35 (12)
Balgam	23 (6.1)	4 (4)	19 (7)
Diğer	14 (3.7)	4 (4)	10 (5)
Toplam	376 (100)	100	276

Tablo 2. *S.aureus* suşlarının yıllara göre direnç oranları (%).

Antibiyotik	Ağustos 2007- Temmuz 2008	2016
Metisilin	34.0	15.3
Penisilin	77.8	95.5
Eritromisin	40.0	14.9
Siprofloksasin	34.0	4.4
Ko-trimoksazol	14.3	1.4
Klindamisin	12.0	3.2
Linezolid	0	0
Vankomisin	0	0

Tablo 3. 2016 yılına ait *S.aureus* suşlarının örneklerle göre metisiline direnç oranları [n (%)].

Örnek türü	Sayı	Dirençli	Duyarlı
Kan	154	25 (16.2)	129 (83.8)
Yara yeri	57	11 (19.3)	46 (80.7)
İdrar	35	2 (6)	33 (94)
Balgam	19	2 (10.5)	17 (89.5)
Oküler	6	2 (33.4)	4 (66.6)
Kateter	2	0 (0)	2 (100)
BOS	1	0 (0)	1 (100)
Toplam	274	42 (15.3)	232 (84.7)

TARTIŞMA

İlk izole edilen MRSA klonları genellikle hastane kaynaklı enfeksiyonlara neden olmuş, 1990'dan itibaren ise toplum kaynaklı enfeksiyonlara neden olan farklı MRSA klonları ortaya çıkmıştır. Daha çok cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarına neden olan TK-MRSA klonlarının artması toplam MRSA oranının artmasına neden olmuştur⁽¹⁷⁾. Günümüzde MRSA insidansı tüm dünyada değişen oranlarda görülmektedir. European Antimicrobial Resistance Surveillance Network'ün (EARS-Net) 2015 yılı verilerine göre Avrupa ülkelerinde izole edilen *S.aureus* suşlarındaki MRSA oranı % 0 ile % 57.2 arasında değişmektedir. Avrupa genelinde ortalama MRSA oranı % 16.8 bulunmuştur⁽¹¹⁾. NHSN'nin 2014 verilerine göre ise cerrahi alan enfeksiyonlarında MRSA oranı % 42.6, santral kateter ilişkili enfeksiyonlarda % 50.7, kateter ilişkili idrar yolu enfeksiyonlarında ise % 52.0'dır⁽²⁰⁾. Asya ülkelerinde yapılan çalışmalara göre ise hastane kökenli MRSA (HK-MRSA) oranı Çin'de % 45.8, Güney Kore'de % 73, Hindistan'da % 45, Japonya'da % 41, Tayvan'da % 55.9 olarak bulunmuştur⁽⁵⁾. Ülkemiz Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi'nin (UAMDSS) 2013 yılı

verilerine göre *S.aureus* suşları arasındaki MRSA oranı % 26.9'dur⁽¹⁸⁾. Ülkemizde 2010 ile 2012 yılları arasında yapılan çeşitli çalışmalarda bu oran % 27.3 ile % 74 arasında bulunmuştur^(1,2,6,10,13). Çalışmamızda da 2016 yılında MRSA oranı % 15.3 olarak bulunmuş ve ülkemiz oranlarına göre düşük olduğu görülmüştür. Çalışmamızda hastane kaynaklı veya toplum kaynaklı MRSA ayırımına gidilememiştir. Yara yeri örneklerinin çoğunlukla toplum kaynaklı, kan örneklerinin de hastane kaynaklı enfeksiyonlar olabileceği düşünüldüğünde 2016 yılına ait bu örneklerle ait MRSA oranları birbirine yakın çıkmıştır (Tablo 3). Ancak daha ayırıcı çalışmalar gerekmektedir.

Son yıllarda, invazif MRSA enfeksiyon sıklığında düşüş gözlenmekte ve bu durum çeşitli yayınlarda bildirilmektedir^(11,14,17,19). EARS-Net'in 2015 verilerine göre 2011 yılından bu yana Avrupa ülkelerindeki ortalama MRSA oranlarında düzenli bir azalma bildirilmektedir. Direnç oranı 2011'den 2015 yılına kadar % 18.8'den % 6.8'e düşmüştür⁽¹¹⁾. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan Active Bacterial Core Surveillance (ABCs) programının 2015 yılı verileri invazif HK-MRSA insidansının 2014 yılına göre % 10 oranında düştüğünü göstermektedir⁽³⁾. EARS-Net'in 2003-2008 yıllarındaki Türkiye MRSA oranları ise sırasıyla % 43, % 40, % 35, % 36, % 34, % 38'dir⁽⁹⁾. Bu verilere UAMDSS'nin 2013 yılı verileri de eklendiğinde Türkiye'deki MRSA oranlarında da düştüğü görülebilmektedir (2003-2013, % 43 - % 26.9). EARS-Net, UAMDSS ve ABCs'nin kullandığı tüm veriler kan ve beyin omurilik sıvısı (BOS) sıvısından elde edilen klinik örnekler olup invazif MRSA enfeksiyonlarını göstermektedir^(3,11,18). Bu veriler ülkemiz-

de ve bir çok dünya ülkesinde invazif MRSA enfeksiyonundaki azalmayı göstermektedir. Çalışmamızda da, hastanemizdeki MRSA oranı 2007-2008 tarihleri arasında % 34 iken, 2016 yılı içerisinde % 15.3 olarak bulunmuştur. Ayrıca çalışmamızda test edilen eritromisin, klindamisin, ko-trimoksazol ve sip-rofoksasin antibiyotiklerine de dirençte düşüş görülmüştür. Çalışmamızda Avrupa, Amerika ve ülkemizdeki verilere paralel olarak geçen dokuz yıllık süre içerisinde metisiline direnç oranında düşüş saptanmıştır. Çalışmamızda hem invazif hem de non-invazif enfeksiyonlardan elde edilen *S.aureus* suşları dahil edilmiştir. Suşların çoğu (% 51.8) kan kültüründen izole edilmiştir. Suşlarımızdaki MRSA oranındaki düşüşün sebebi invazif MRSA enfeksiyonundaki enfeksiyon kontrol önlemlerine (el hijyeni, temas izolasyonu, uygun antibiyoterapi gibi) bağlı düşüş olabilir. Çalışmamızın eksik yönü, yıllara göre HK-MRSA TK-MRSA, invazif ve non-invazif MRSA enfeksiyonlarının belirlenmesi ve karşılaştırılması yapılamamıştır. Bu nedenle bulduğumuz MRSA oranlarındaki düşüşün nedeni kesin olarak belli değildir. Bunun için ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. Ancak daha çok deri ve yumuşak doku gibi non-invazif enfeksiyonlara yol açan TK-MRSA klonları dikkate alındığında, sadece invazif örneklerin değerlendirildiği çalışmaların *S.aureus* suşlarındaki MRSA oranının belirlenmesinde yetersiz kaldığını düşünmekteyiz. David ve ark.⁽⁸⁾ 2003-2008 yılları arasındaki hem invazif hem de non-invazif MRSA enfeksiyonlarına ait verileri kullanarak yaptıkları bir çalışmada aynı yıllarda yapılan ve sadece invazif MRSA enfeksiyonlarına ait veri kullanan diğer çalışmalardan farklı olarak

MRSA oranında % 100'lük bir artış bildirmişlerdir. Ancak son yıllarda, özellikle ülkemizde, TK_MRSA oranları ile ilgili çalışmalara çok fazla rastlanmaktadır. Bu nedenle oranları hakkında net bilgi verilememiştir.

Enfeksiyon etkenlerinin direnç gelişimini engellemek için alınan önlemler hastane kaynaklı enfeksiyonlar üzerinde halen tam olarak etkili değildir⁽¹⁹⁾. Birçok enfeksiyon etkeni giderek daha da direnç kazanmaktadır^(11,18,20). İnvazif MRSA enfeksiyonlarındaki azalma bu önlemlerin HK-MRSA suşları üzerinde etkili olduğunu düşündürmektedir. Bizim çalışmamızda da bu bulguyu destekler sonuçlar elde edilmiştir. Ancak alınan önlemlerin *S.aureus* üzerinde ne kadar etkili olduğunun tam olarak anlaşılabilmesi için hem invazif hem de non-invazif MRSA enfeksiyonlarını içeren ayrıca TK-MRSA'ların da dahil edildiği geniş çaplı epidemiyolojik çalışmalara ihtiyaç vardır.

KAYNAKLAR

1. Aydeniz Ozansoy F, Cevahir N, Kaleli İ. Klinik örneklerden izole edilen *Staphylococcus aureus* suşlarında makrolid, linkozamid ve streptogramin B direncinin fenotipik ve genotipik yöntemlerle araştırılması. *Mikrobiyol Bul.* 2015;49(1):1-14.
<https://doi.org/10.5578/mb.8790>
2. Ucak Ö, Koçoğlu E, Taş T, Tekin D, Mengeloğlu FZ. *Staphylococcus aureus* izolatlarında agar tarama ve mikrodilüsyon yöntemleri ile vankomisin direncinin araştırılması. *Türk Mikrobiyol Cem Derg.* 2014;44(1):28-32.
<https://doi.org/10.5222/TMCD.2014.028>
3. Centers for Disease Control and Prevention. 2015. Active Bacterial Core Surveillance Report, Emerging Infections Program Network, Methicillin Resistant *Staphylococcus aureus*, (2015).
4. Chambers HF, DeLeo FR. Waves of resistance: *Staphylococcus aureus* in the antibiotic era. *Nat Rev Microbiol.* 2009;7(9):629-41.
<https://doi.org/10.1038/nrmicro2200>
5. Chen CJ, Huang YC. New epidemiology of *Staphylococcus aureus* infection in Asia. *Clin Microbiol Infect.* 2014;20(7):605-23.
<https://doi.org/10.1111/1469-0691.12705>
6. Cirit OS, Müderris T, Uzala Mızraklı A, Vurupalmaz Y, Barış A. Yara kültürlerinden izole edilen aerob bakteriler ve antibiyotik duyarlılıkları. *Türk Mikrobiyol Cem Derg.* 2014;44(4):149-57.
7. CLSI. Performance standards for antimicrobial susceptibility testing. 26th ed. CLSI Supplement M100S. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; (2016).
8. David MZ, Medvedev S, Hohmann SF, Ewigman B, Daum RS. Increasing burden of methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* hospitalizations at US academic medical centers, 2003-2008. *Infect Control Hosp Epidemiol.* 2012;33(8):782-9.
<https://doi.org/10.1086/666640>
9. EARSS Annual Report 2008 On-going surveillance of *S.pneumoniae*, *S.aureus*, *E.coli*, *E.faecium*, *E.faecalis*, *K.pneumoniae*, *P.aeruginosa* (http://www.ecdc.europa.eu/en/activities/surveillance/EARS-Net/Documents/2008_EARSS_Annual_Report.pdf).
10. Ertürk A, Çopur Çiçek A, Köksal E, Köksal Ş, Özyurt S. Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların çeşitli klinik örneklerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları. *ANKEM Derg.* 2012;26(1):1-9.
11. European Centre for Disease Prevention and Control. Antimicrobial resistance surveillance in Europe 2015. Annual Report of the European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net). Stockholm: ECDC; (2017).
12. George M, Eliopoulos, Sara E. Cosgrove, Yehuda Carmeli; the impact of antimicrobial resistance on health and economic outcomes. *Clin Infect Dis.* 2003;36(11):1433-7.
<https://doi.org/10.1086/375081>
13. Güngör S, Karaayak Uzun B, Gül Yurtsever S, Baran N. Kan kültürlerinden izole edilen *Staphylococcus aureus* suşlarında antibiyotiklere direnç. *ANKEM Derg.* 2012;26(4):171-5.
14. Sancak B. MRSA direnç mekanizmaları: Dünyada ve Türkiye'de epidemiyolojisi. *ANKEM Derg.* 2012;26(Ek 2):38-47.
15. Sancak B. *Staphylococcus aureus* ve antibiyotik direnci. *Mikrobiyol Bul.* 2011;45(3):565-6.
16. The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. Breakpoint tables for interpretation of MICs and zone diameters. Version 7.1,

- (2017). <http://www.eucast.org>.
17. Tong SY, Davis JS, Eichenberger E, Holland TL, Fowler VG Jr. Staphylococcus aureus infections: epidemiology, pathophysiology, clinical manifestations, and management. Clin Microbiol Rev. 2015;28(3):603-61. <https://doi.org/10.1128/CMR.00134-14>
18. Ulusal Antimikrobiyal Direnç Surveyans Sistemi, 2013 Yılı Yıllık Raporu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Sağlık Bakanlığı Ankara. <http://uamdss.thsk.gov.tr>.
19. Ventola CL. The antibiotic resistance crisis: Part 1: causes and threats. Pharmacy and therapeutics. 2015;40(4):277-83.
20. Weiner L, Webb A, Limbago B, Dudeck M, Patel J, Kallen A, Sievert D. Antimicrobial-resistant pathogens associated with healthcare-associated infections: summary of data reported to the national healthcare safety network at the centers for disease control and prevention, 2011-2014. Infection Control&Hospital Epidemiology 2016; 37(11):1288-301. <https://doi.org/10.1017/ice.2016.174>