REFERÊNCIAS

1. Arendt, H. (2001). A Condição Humana. Lisboa: Relógio D'Água Editores.
2. Aristóteles (1995). Categorias. Porto: Porto Editora.
3. Bento, J. Educação cívica, liberdade e humanidade. Revista Portuguesa de Ciências do Desporto, set. 2005, vol. 5, n.º 3, p. 251-252.
4. Bento, J. (2010). Da Coragem, do Orgulho e da Paixão de ser Professor: Auto-Retrato. Belo Horizonte: Casa da Educação Física.
5. Bento, J. (Unidade Curricular "Formação Pedagógica" do Programa Doutoral em Ciências do Desporto da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, 17 Fev a 17 Mar 2010).
6. Bento, J.; Bento, H. (2010). Desporto e Educação Física – acerca do ideal pedagógico. In J. Bento, G. Tani & A. Prista (Org.), Desporto e Educação Física em Português. Porto: CIFID D – Centro de Investigação, Formação, Inovação e Intervenção em Desporto - Faculdade de Desporto da Universidade do Porto.
7. Coimbra, L. (1912). Escerto. A Águia, 2 (2) 49-55.
8. Coimbra, L. (1993). Obras. Porto: Lello e Irmão Editores.
9. Coimbra, L. (2004). Obras Completas. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda.
10. Dias, J. Filosofia da Educação. Pressupostos, Funções, Método, Estatuto. Revista Portuguesa de Filosofia, 40 (1993) 3-28.
11. Drouin-Hans, A-M. (2006). Valor(es). In A. Carvalho (Coord.), Dicionário de Filosofia da Educação (pp. 368-360). Porto: Porto Editora.
12. Epicuro (2009). Cartas, Máximas e Sentenças. Lisboa Edições Sílabo.13 - Escola, J. (2006). Pessoa (A). In A. Carvalho (Coord.), Dicionário de Filosofia da Educação (pp. 287-291). Porto: Porto Editora.
14. Freire, P. (1974). Uma Educação para a Liberdade. Porto: Textos Marginais.
15. Gilson, É. (2008). René Descartes. Discurso do Método. Lisboa: Edições 70.
16. Maia, C. (2006). Dever (Pedagogia do). In A. Carvalho (Coord.), Dicionário de Filosofia da Educação (pp. 72-75). Porto: Porto Editora.
17. Marcel, G. (1963). Homo Viator. Paris: Aubier-Montaigne.
18. Morin, E. (2005). O Método 5. Porto Alegre: Sulinas.
19. Pereira, P. (2006). Acolhimento e Educação. In A. Carvalho (Coord.), Dicionário de Filosofia da Educação (pp. 9-14). Porto: Porto Editora.
20. Savater, F. (1998). O Valor de Educar. São Paulo: Martins Fontes Editora.
21. Savater, F. (2000). O Meu Dicionário Filosófico. Lisboa: Publicações Dom Quixote.
22. Savater, F. (2008). Convite à Ética. Lisboa: Fim de Século.
23. Wulf, C. (2006). Outro (O). In A. Carvalho (Coord.), Dicionário de Filosofia da Educação (pp. 258-259). Porto: Porto Editora.

AUTORES:

Clésia P. Gonçalves Silva ¹

Emerson Cruz de Oliveira ¹

Allan Cristian Gonçalves ¹

¹ Centro Universitário Metodista
Izabela Hendrix, Belo Horizonte, Minas
Gerais, Brasil

Prevalência de sobrepeso e obesidade em crianças e adolescentes de uma escola municipal

4030

PALAVRAS CHAVE:

Obesidade. Sobrepeso. Crianças. Exercício.

RESUMO

A obesidade é considerada um grave problema de saúde pública. Devido à interação de múltiplos fatores, cada vez mais crianças e adolescentes têm chegado à condição de sobrepeso ou de obesidade, gerando um problema que somente será resolvido quando seus fatores geradores forem conhecidos e compreendidos. O objetivo foi determinar a prevalência de obesidade ou sobrepeso em crianças e adolescentes do ensino fundamental de uma escola municipal da cidade de Contagem - MG, Brasil e iniciar uma reflexão sobre os fatores que podem interferir no processo. A avaliação foi feita pela determinação do índice de massa corporal e sua classificação em relação aos percentis ajustados para a idade. Verificou-se elevada prevalência de sobrepeso e a obesidade entre os avaliados, sobretudo nas crianças do sexo feminino. Observou-se que a falta de espaços de lazer ou a falta de estímulos para a prática de atividade física não são fatores que concorrem para o sobrepeso e a obesidade na população estudada, e sim o estilo de vida adotado que surge como o principal contribuinte para essa condição.

Correspondência: Clésia Perdigão Gonçalves Silva. Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix — Belo Horizonte — MG, Brasil.

Prevalence of overweight and obesity in children and adolescents of a municipal school

ABSTRACT

Obesity is considered a serious public health problem. Due to the interaction of multiple factors, more and more children and adolescents have come to the condition of overweight or obese. In order to define strategies to combat overweight and obesity, it is important to know the problem well. The Objective was to determine the prevalence of obesity or overweight in primary school children in a school hall in the city of Contagem - MG, Brazil. The evaluation of the children was made by determining body mass index and their classification in relation to percentiles adjusted for age. There was high prevalence of overweight and obesity among the subjects, especially in female children. In conclusion it was observed that the lack of amenity or lack of incentives for physical activity are not factors that contribute to overweight and obesity in the population studied, but the lifestyle adopted that comes as a major contributor to this condition.

KEY WORDS:

Obesity. Overweight. Children. Exercise.

INTRODUÇÃO

A obesidade é geralmente definida como excesso de gordura corporal. A definição de excesso, no entanto, não é clara. A adiposidade não é um traço contínuo marcado por uma clara divisão em normal e anormal. Além disso, é difícil medir a gordura corporal diretamente. Por conseguinte, a obesidade, muitas vezes é definida como excesso de peso corporal, em vez de excesso de gordura ²⁰. Antes considerado um problema apenas de países desenvolvidos, atualmente a obesidade está em rápida ascensão em países em vias de desenvolvimento, especialmente em ambientes urbanos ²⁷. A obesidade é uma enfermidade multifatorial e, independente dos fatores genéticos, endócrinos, familiares, dietéticos e psicológicos, apresenta relevante dimensão social e afeta praticamente todas as faixas etárias e grupos socioeconômicos ¹.

A prevalência mundial da obesidade infantil vem apresentando um rápido aumento nas últimas décadas, sendo caracterizada como uma verdadeira epidemia em todo o mundo ^{5,22}. Nos Estados Unidos a prevalência de sobrepeso e obesidade mais que triplicou (de 5% para 16%) nas últimas três décadas ¹⁹. Aumentos similares foram observados na Grã-Bretanha, Austrália, Finlândia, China, Portugal, Chile, Brasil, Alemanha, França e Rússia ¹⁰. Estudos indicam que crianças obesas aumentam em três vezes as chances de ser um adulto obeso, enquanto adolescentes obesos apresentam 70% de chances de adquirir algum tipo de doença crônica não transmissível na idade adulta ⁷. Alguns hábitos indesejáveis podem ser adquiridos na infância e na adolescência e podem tornar-se determinantes no desenvolvimento da obesidade tais como o declínio na participação de atividades físicas e o aumento da ingestão de alimentos com alto valor energético ²⁵. Soma-se a isso, o aumento do tempo despendido com formas eletrônicas e virtuais de diversão onde se incluem a televisão ^{7,23}, o computador, o videogame ³.

O Índice de Massa Corporal (IMC) medida desenvolvida pelo matemático belga Lambert Adolphe Jacques Quetelet para estudos de caráter epidemiológico – também denominado de “Índice de Quetelet” é o método mais utilizado para avaliar o excesso de peso/obesidade ⁹. Este índice foi adotado desde 1997 pela organização mundial da saúde para avaliação da massa corporal em adultos. A obesidade pode ser definida com base no IMC, o qual também é utilizado para classificar a própria condição do indivíduo na fase adulta.

Em crianças, a classificação do IMC muda com a idade, devido a mudanças no peso e na altura. Desta forma, embora o IMC absoluto seja conveniente para definir a relação de peso e altura em adultos, para crianças percentis específicos para idade e gênero definem baixo peso, peso adequado, sobrepeso e obesidade ².

Dado o exposto, o presente estudo teve como objetivo identificar os padrões de obesidade e sobrepeso na população escolar, bem como a prevalência de sobrepeso e obesidade baseados no IMC em alunos do ensino fundamental de uma Escola Municipal na cidade Contagem – MG, Brasil.

METODOLOGIA

Para a realização deste trabalho 98 indivíduos (42 do sexo masculino e 56 do sexo feminino) com idade entre 7 e 13 anos (média de 9,71 ± 1,86 anos), regularmente matriculados em uma escola pública de ensino fundamental do município de Contagem – MG, Brasil, foram submetidos à avaliação antropométrica onde se mensurou a estatura (em metros) e a massa corporal (em quilos). Para a coleta dos dados utilizou-se uma balança digital portátil com precisão de 100g conjugada com estadiômetro graduado em centímetros da marca Toledo® – modelo 2096pp.

Após a pesagem e a mensuração da estatura calculou-se o Índice de Massa Corporal (IMC), definido como o resultado da divisão da massa corporal do avaliado (em quilos) pela estatura (em metros) elevada ao quadrado, expresso portando como Kg/m². No momento da avaliação os participantes foram orientados a utilizar roupas leves. A estatura foi medida com o avaliado em posição ortostática e descalço. A idade dos avaliados foi calculada em meses. Após a coleta destes dados, os avaliados foram classificados de acordo com a tabela de percentis ajustados para a idade em indivíduos do sexo masculino e do sexo feminino ²¹. As referidas tabelas classificam em: baixo peso (percentil < 5), peso adequado (percentil entre 5 e 85), sobrepeso (percentil entre 85 e 95) e obeso (percentil ≥ 95). Os resultados foram classificados em relação ao gênero e apresentados como percentual do total de meninos e meninas dentro das categorias supracitadas. Os dados também foram apresentados como percentual em relação ao total da amostra. Todos os procedimentos utilizados respeitam as normas internacionais de experimentação com humanos que constam na Declaração de Helsinque de 1975.

RESULTADOS

Verificou-se que, do total de crianças avaliadas, 52,38% de meninos e 48,21% de meninas apresentaram peso corporal adequado para a idade. No entanto, 35,71% dos meninos e 39,29% das meninas foram classificados como tendo sobrepeso, perfazendo 37,76% do total. Ainda, 11,91% dos meninos foram classificados como obesos, assim como 12,50% das meninas. Os indivíduos classificados como obeso correspondem 12,24% do total. Os dados mostraram que 50% dos estudantes avaliados apresentam sobrepeso e ou obesidade. Observou-se ainda que a prevalência de sobrepeso/obesidade foi ligeiramente maior entre as meninas comparado aos meninos. Os resultados são apresentados na tabela 1.

TABELA 1 — Classificação do IMC das crianças de acordo com o percentil por idade.

CLASSIFICAÇÃO	MENINOS (N = 42)	MENINAS (N = 56)	TOTAL (N = 98)
BAIXO PESO	0,00%	0,00%	0,00%
PESO NORMAL	52,38%	48,21%	50,00%
SOBREPESO	35,71%	39,29%	37,76%
OBESO	11,91%	12,50%	12,24%

DISCUSSÃO

Atualmente no Brasil observa-se uma tendência de declínio da desnutrição infantil, sobretudo a partir da década de 2000, em particular nos estratos populacionais tradicionalmente mais afetados por esse problema ¹⁴. No momento, a preocupação é com a elevação dos índices de obesidade. Ela atinge muitos adultos e começa a se manifestar cada vez mais cedo nas crianças. Dados do IBGE no ano 2010¹⁴ mostravam que quase metade da população adulta brasileira (49%) estava acima do peso. O levantamento, que fez parte do estudo “Antropometria e estado nutricional de crianças, adolescentes e adultos no País”, revelava que o excesso de peso também atingia uma em cada três crianças entre 5 e 9 anos. Segundo a “Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009 – Antropometria, Estado Nutricional de Crianças, Adolescentes e Adultos no Brasil”, a partir dos 5 anos, confirma-se a tendência de aumento acelerado do problema em todas as idades. Assim a frequência de excesso de peso, que vinha aumentando modestamente até o final da década de 1980, em crianças entre 5 e 9 anos de idade e entre adolescentes, praticamente triplicou nos últimos 20 anos ¹⁴.

No presente estudo, prevalências elevadas de sobrepeso (37,76%) e obesidade (12,24%) foram observadas no grupo de crianças que compuseram o total da amostra. Lopes e colaboradores ¹⁶ também verificaram uma prevalência de 38,3% de sobrepeso/obesidade em alunos de uma escola pública localizada na região sul da cidade de São Paulo – SP, Brasil.

Outro grupo de pesquisa relatou uma prevalência de 15,7% de sobrepeso e 18% de obesidade em crianças de 7 a 10 anos de idade (n = 10822) em estudo realizado na cidade de Santos – SP, Brasil ⁶. Prevalências menores foram verificadas em 1253 alunos (547 do sexo masculino e 706 do feminino), com média de idade de 12,4 ± 2,9 anos. Destes, 267 matriculados em escolas particulares e 986 em escolas públicas da zona urbana da cidade de Maceió – AL, Brasil ¹⁷. Segundo estes autores a prevalência total de sobrepeso e obesidade foi de 9,3% e 4,5%, respectivamente, não havendo correlação significativa

entre gênero e sobrepeso e entre gênero e obesidade. De acordo com os resultados apresentados por esses autores, o sobrepeso e a obesidade em crianças e adolescentes ainda apresentaram uma baixa prevalência quando correlacionados à escola pública.

Campos e colaboradores ⁴ verificaram uma prevalência de sobrepeso/obesidade de 19,5 % (n= 1158 adolescentes de 10 a 19 de ambos os sexos). Os autores concluíram que é relevante o problema do sobrepeso/obesidade em adolescentes escolares de Fortaleza — CE, Brasil, sendo maior nas escolas da rede privada e na adolescência precoce (10 a 14 anos), não apresentando diferença entre os sexos. É importante observar que nos dois últimos trabalhos citados, em duas capitais do nordeste brasileiro a obesidade já é considerada um problema relevante. Nesta região historicamente o baixo peso e a desnutrição eram problemas de maior relevância.

Observa-se que o excesso de peso e a obesidade são encontrados com grande frequência, a partir dos 5 anos de idade, em todos os grupos de renda e em todas as regiões brasileiras ¹⁴. A prevalência de sobrepeso e obesidade entre crianças de diferentes classes sociais entre 2003 e 2007, foi comparada e verificou-se que houve um aumento na prevalência de obesidade entre crianças de baixa escolaridade e baixa renda em lugares onde o nível de desemprego é maior ¹². Também foi verificado que crianças de uma escola cuja clientela era de baixa renda ingeriam mais alimentos ricos em calorias comparados com aqueles que estudavam em uma escola onde o nível socioeconômico era maior, e ainda, os alunos de baixa renda despendiam mais tempo em frente à televisão e ao computador ¹⁸.

Os dados apresentados neste estudo mostram que indivíduos do sexo feminino apresentaram valores de IMC superiores aos indivíduos do sexo masculino para sobrepeso (39,29% para as meninas contra 35,71% para os meninos) e obesidade (12,50% das meninas contra 11,91% dos meninos). Costa e colaboradores ⁶ verificaram valores de 14,8% para o sobrepeso e 20,3% para a obesidade para o sexo masculino e, 16,6% e 15,8% para o sexo feminino. A Organização Mundial de Saúde ²⁷ sugere que a maior prevalência entre as meninas, deve-se ao fato de que o excesso de energia nas mulheres é preferencialmente estocado, sob a forma de gordura no tecido adiposo e não em forma de proteínas teciduais, sobretudo musculares, como acontece no caso do sexo masculino.

Crianças e adolescentes tendem a ter sobrepeso quando sedentários e, o próprio sobrepeso pode fazê-los ainda mais sedentários. Além disso, crianças frequentemente fazem suas refeições em frente à televisão e, grande parte das propagandas é sobre alimentos pouco nutritivos e ricos em calorias. Grazini e Amâncio ¹³ analisaram o teor das propagandas veiculadas em horários de programas para adolescentes e observaram que a maior parte (53%) era de lanches e refrigerantes.

O tempo despendido em frente à televisão é um critério importante quando se estuda os fatores causadores de sobrepeso e obesidade. Segundo Rossi e colaboradores ²³, o tempo

em frente à TV associa-se à inadequação dos hábitos alimentares e à redução da atividade física. Revela-se o hábito de assistir à televisão como um importante fator que pode propiciar a obesidade entre crianças e adolescentes.

No presente estudo, verificou-se que os alunos da escola analisada têm acesso a espaços construídos para a prática de atividades físicas e, contam também, com orientação profissional para as mesmas, no entanto, é de espontânea vontade que estes abdicam de usufruir destes benefícios. No entorno da escola avaliada existem vários espaços que permitem muitas possibilidades de práticas de movimento, tais como praças com aparelhos de ginástica, quadras e campo de futebol onde são oferecidas escolinhas de iniciação de diversas modalidades esportivas. Mesmo com tantas possibilidades e incentivo, não foi possível conter um alto índice de sobrepeso e obesidade na população estudada. Desta forma, deve-se refletir sobre novas propostas que levem à melhor utilização dos espaços destinados à prática de atividades físicas com vistas a elevar o engajamento desta população em práticas físicas saudáveis.

O tratamento da obesidade é intenso e requer o suporte de equipes multidisciplinares ^{8,26}. Em seu trabalho, Wiegel e colaboradores ²⁶ realizaram um trabalho de intervenção com 73 crianças de 7 a 15 anos que consistiu em práticas de exercícios físicos orientados, educação nutricional por 12 meses que incluíam o período de férias escolares e verificaram que houve redução do índice de massa corporal dos indivíduos do grupo de intervenção quando comparados ao grupo de controle que recebeu apenas um trabalho de aconselhamento sobre hábitos saudáveis de vida. Estes autores concluíram que uma abordagem multidisciplinar que integra a terapia comportamental em um programa de tratamento abrangente, que inclui dieta e exercício é considerada benéfica no tratamento do sobrepeso e obesidade. Tal conclusão é corroborada por Uli e colaboradores ²⁵ que afirmam que combinações de dieta, exercício e aconselhamento são geralmente mais eficazes para controle do peso que cada componente sozinho.

De igual importância é o envolvimento dos pais no processo de controle do peso corporal de seus filhos sejam crianças ou adolescentes. Shrewsbury e colaboradores ²⁴ avaliaram a comunicação e interação entre pais e adolescentes em relação ao peso e controle do peso e observaram que mesmo os pais que tinham um bom conhecimento sobre estratégias para o controle do peso dos filhos, poderiam precisar de ajuda para colocar este conhecimento em prática. Os autores relatam que os pais foram relutantes em envolver profissionais de saúde no processo de controle de peso dos filhos e só recorreram a eles quando a situação se tornou grave, comprometendo a integridade física ou a saúde psicológica das crianças. A influência dos pais e do ambiente reside no fato de que as crianças têm muito pouco controle sobre a escolha de seus alimentos, opções de atividades físicas, em especial naqueles ambientes que favorecem o desenvolvimento da obesidade. O aumento

no tamanho das porções, o fácil acesso a alimentos com alto valor energético, mudanças na dinâmica familiar e de aparatos tecnológicos que reduzem a necessidade de atividades físicas diárias contribuem para o problema.

É bem reconhecido que os modelos familiares afetam o estado nutricional de seus filhos. Programas de intervenção destinados a pais de crianças obesas já possuem sucesso comprovado na redução da obesidade ¹¹. Intervenções sociais que levem a mudanças positivas no comportamento de crianças e adolescentes não podem, contudo, ser dissociadas das escolas. O ideal seria que as escolas fornecessem informações sobre os elementos necessários à prevenção da obesidade ou sobre um programa de controle eficaz ¹⁵. Doak e colaboradores ⁸ realizaram uma revisão da literatura acerca de intervenções dietéticas, de atividades físicas e de comportamento relacionados à obesidade, propostas em estudos quantitativos realizados em escolas. Estes autores relatam que as intervenções que utilizaram a educação física escolar e promoveram estratégias que levaram à redução do tempo dispendido em frente à televisão foram mais bem sucedidas. O trabalho ressalta também a importância do uso de estratégias de educação nutricional. Os autores afirmam que a inversão da tendência dos jovens de ter sobrepeso ou se tornarem obesos não é uma tarefa fácil e que, os investimentos necessários não são apenas um compromisso financeiro, de vários setores da sociedade, mas um investimento de tempo, esforço e suporte, que deve contar com a participação de pais, professores, diretores de escolas, pedagogos, das indústrias e de órgãos governamentais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste estudo, observou-se um elevado índice de sobrepeso entre os indivíduos avaliados. A prevalência de sobrepeso e obesidade mostrou-se mais elevada entre os estudantes do sexo feminino. Acredita-se que tal fato seja explicado em sua maior parte por maus hábitos alimentares associados ao sedentarismo. Deve-se ressaltar que, embora sedentários, os estudantes avaliados têm acesso a espaços adequados a práticas físicas e esportivas bem como ao serviço de profissionais especializados para orientá-los, no entanto, estes voluntariamente rejeitam essas práticas, optando por formas de entretenimento com baixo gasto energético. Os dados apresentados aqui estão em concordância com muitos estudos realizados no Brasil e no exterior. Pesquisas recentes destacam a elevação da prevalência de sobrepeso e obesidade entre crianças e adolescentes. Estas afirmam que as estratégias para prevenção, controle e tratamento do sobrepeso e obesidade devem envolver mudanças no estilo de vida no que concerne à educação nutricional e o aumento da prática de exercícios, assim como no ambiente onde as crianças e adolescente vivem o que envolve diretamente os pais, as escolas e a comunidade como um todo. Tais preocupações são tão importantes quanto a implementação de políticas públicas e o investimento financeiro para controle da obesidade que assume contornos de epidemia.

REFERÊNCIAS

1. Araújo LMB (2003). Obesidade In: Rabelo, M M. Manual Prático de Endocrinologia. São Paulo: Editora Byk, 355-362
2. Barlow SE (2007). Expert committee recommendations regarding the prevention, assessment, and treatment of child and adolescent overweight and obesity: summary report. *Pediatrics* 120: S164-S192
3. Braccialli LMP, Vilarta R (2000). Aspectos a serem considerados na elaboração de programas de prevenção e orientação de problemas posturais. *Revista Paulista de Educação Física* 14(1): 16-28
4. Campos LA, Leite AJM, Almeida PCA (2007). Prevalência de Sobrepeso e Obesidade em Adolescentes Escolares do Município de Fortaleza, Brasil. *Rev. Bras. Saúde Matern. Infant.* 7 (2): 183-190
5. Chaves VLV, Freese E, Lapa TM, Cesse EAP, Vasconcelos ALR (2010). Evolução espaço-temporal do sobrepeso e da obesidade em adolescentes masculinos brasileiros, 1980 a 2005. *Cad. Saúde Pública* 26(7): 1303-1313
6. Costa RF, Cintra IP, Fisberg M (2006). Prevalência de Sobrepeso e Obesidade em Escolares da Cidade de Santos-SP. *Arq. Bras. Endocrinol. Metab.* 50(1): 60-67
7. Danner FW (2008). A National Longitudinal Study of the Association Between Hours of TV Viewing and the Trajectory of BMI Growth Among US Children. *Journal of Pediatric Psychology* 33(10): 1100-1107
8. Doak CM, Visscher TLS, Renders CM, Seidell JC (2006). The prevention of overweight and obesity in children and adolescents: a review of interventions and programmes. *Obesity Reviews* 7: 111-136
9. Douglas CR (2006). Tratado de Fisiologia Aplicada às Ciências Médicas. 6ª ed. - Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.
10. Flegal KM, Tabak CJ, Ogden CL (2006). Overweight in children: definitions and interpretation. *Health Education Research* 21 (6): 755-760
11. Gittelsohn J, Kumar MB (2007). Preventing Childhood Obesity and Diabetes: Is It Time to Move Out of The School? *Pediatric Diabetes* 8 (Suppl. 9): 55-69
12. Gopal KS, Siahpush M, Kogan M. (2010) Rising Social Inequalities in US Childhood Obesity, 2003–2007. *Ann. Epidemiol.* 20: 40-52
13. Grazini J, Amâncio OMS (1998). Analogia Entre Comerciais de Alimentos e Hábito Alimentar de Adolescentes. *Elect. J. Ped. Gast. Nut. Liv. Dis.* 2(1)
14. IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010) - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009: Antropometria e Estado Nutricional de Crianças, Adolescentes e Adultos no Brasil, Rio de Janeiro
15. Katz DL, O'Connell M, Njike VY, Yeh MC, Nawaz H (2008). Strategies for the Prevention and Control of Obesity in The School Setting: Systematic Review and Meta-Analysis. *International Journal of Obesity* 32: 1780-1789
16. Lopes S, Carriel P, Prado SRLA, Colombo P (2010). Fatores de risco associados à obesidade e sobrepeso em crianças em idade escolar. *Revista Brasileira de Enfermagem* 63(1): 73-78
17. Mendonça MRT, Silva MAMS, Rivera IR, Moura AAM (2010). Prevalência de Sobrepeso e Obesidade em Crianças e Adolescentes da Cidade de Maceió. *Rev. Assoc. Med. Bras.* 56(2): 192-6
18. Merchant AT, Dehgan M, Behnke-Cook D, Anand SS (2007). Diet, Physical Activity, and Adiposity in Children in Poor and Rich Neighbourhoods: A Cross-Sectional Comparison. *Nutrition Journal* 11(6): 1
19. Montoya C, Lobo ML (2011). Childhood Obesity: A Wilsonian Concept Analysis. *Journal of Pediatric Nursing.* 26: 465-473
20. Ogden CL, Yanovski SL, Carrol MD, Flegal KM (2007). The Epidemiology of Obesity. *Gastroenterology.* 132: 2087-2102
21. Ogden CL, Flegal KM (2010). Changes in Terminology for Childhood Overweight and Obesity. *National Health Statistics Reports*, 25: 1-5
22. Oliveira CL, Fisberg M (2003). Obesidade na Infância e Adolescência - Uma Verdadeira Epidemia. *Arq. Bras. Endocrinol. Metab.* 47(2): 107-8
23. Rossi CE, Albernaz DO, Vasconcelos FAG, Assis MAA, Di Pietro PF (2010). Influência da televisão no consumo alimentar e na obesidade em crianças e adolescentes: uma revisão sistemática. *Rev. Nutr.* 23(4): 607-620

24. Shrewsbury VA, King LA, Hattersley LA, Howlett SA, Hardy LL, Baur LA (2010). Adolescent-Parent Interactions and Communication Preferences Regarding Body Weight and Weight Management: A Qualitative Study. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity* 7: 16

25. Uli N, Sundararajan S, Cuttler L (2008). Treatment of Childhood Obesity. *Current Opinion in Endocrinology, Diabetes & Obesity*, 15: 37-47

26. Weigel C, Kokocinski K, Lederer P, Dötsch J, Rasher W, Knerr L (2008). Childhood Obesity: Concept, Feasibility, and Interim Results of a Local Group-based, Long-term Treatment Program. *J. Nutr. Educ. Behav.* 40: 369-373

27. WHO - World Health Organization (2000). Obesity: Preventing and Managing the Global Epidemic — Report of a WHO Consultation Geneva, Switzerland

AUTORAS:

Teresa Marinho ¹

Helena Baguinho Bento ¹

¹ Faculdade de Desporto
da Universidade do Porto, Portugal

Rumo a uma pedagogia do cuidado: O sentido do humano no desporto

4041

PALAVRAS CHAVE:

Pessoa Humana. Desporto. Cuidado.
Alteridade.

RESUMO

Debate-se hoje o homem com uma atmosfera tísica, disforme e aterradora. Nesta era do vale tudo, parecemos ter olvidado o que verdadeiramente nos dá alento e inspiração para sermos humanos. Há que estender o nosso cuidado ao que nos rodeia e a quem nos circunda, tal como o sublinha Leonardo Boff ^(6, p.35): “o ser humano é um ser de cuidado, mais ainda, a sua essência se encontra no cuidado. Colocar cuidado em tudo o que projeta e faz, eis a característica singular do ser humano”. O nosso propósito cria desassossego: perceber que só a pessoa humana é a razão da nossa sensibilidade discursiva, do nosso cuidado, da nossa ilusão. Por isso, acreditamos que o desporto continua a encerrar em si mesmo uma formação íntegra e integral, uma ética incontornável do dever, uma estética que irradia luminosidade, uma *praxis* que enleva a excelência e um homem que se supera na arte do esforço, da dor e da intenção. Intentaremos demonstrar que esta liturgia do desporto e da vida não nos deixa repousar no arrivismo e na indolência, pelo contrário, atira-nos para o que de nós é de esperar: a abertura autêntica ao outro, à grandeza, à poesia, ao amor.

Correspondência: Teresa Marinho. Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Rua Dr. Plácido Costa, 91. 4200-450, Porto, Portugal. (tmarinho@fade.up.pt).