Com a realização deste evento procuramos salvaguardar o princípio de que a ciência e o saber são bens Universais. Promover a troca de experiências com o objetivo de se desenvolver projetos transfronteiriços é também uma forma de incentivar as boas práticas científicas tal como estas se podem corporizar na internacionalização da produtividade científica que até agora tem sido realizada em contextos isolados e em que a prioridade, graças ao isolamento dos investigadores, tende a traduzir-se na excessiva preocupação em acrescentar linhas ao curriculum vitae de cada investigador.

Partilhamos da opinião que é urgente encontrar estratégias que permitam o desenvolvimento de uma nova cultura de prática científica, traduzida em formas de partilha diferentes daquela que atualmente dispomos e que impõe limites à operacionalização da criatividade científica. Neste sentido e certos que este é um primeiro passo na longa caminhada que se adivinha na construção de comunidades internacionais de pesquisadores em que diferentes áreas científicas se predispõem a procurar soluções para os problemas comuns e que despertam a curiosidade dos seus membros.

Complementarmente, convirá sublinhar que a RPCD tem vindo a constituir-se, desde o seu início, como um veículo privilegiado de divulgação em língua portuguesa do conhecimento gerado por académicos e investigadores da área das ciências do desporto e afins em diferentes partes do mundo, nomeadamente nos países de expressão portuguesa.

Assim sendo, a resposta da RPCD à solicitação da Comissão Organizadora do EIPSE para publicar um determinado número de comunicações aprovadas pela respectiva comissão científica para serem apresentadas na terceira edição deste importante evento científico foi naturalmente positiva, salvaguardado que fosse um conjunto de critérios que assegurasse a qualidade e o mérito do conteúdo a publicar.

Em conformidade, e na linha do verificado em situações anteriores similares, a RPCD e a Comissão Organizadora do EIPSE definiram um conjunto de critérios a respeitar para a revisão e avaliação cegas dos trabalhos submetidos para publicação, os quais serviram de base ao trabalho posteriormente desenvolvido pelos peritos convidados para esse efeito pela Comissão Organizadora do EIPSE.

Conforme anteriormente referido, o presente número é um dos quatro números especiais que a RPCD destinou para a publicação das comunicações selecionadas para esse efeito pela Comissão Organizadora do EIPSE. Esperamos que a sua leitura se constitua como uma experiência útil e agradável para todos que a isso se decidirem...

AUTORES:

José Carlos Tatmatsu-Rocha¹

Adaneuda Silva Britto²

Francisca de F dos Anjos²

Marliane Aline S Magalhães²

Tiago Lopes Farias²

Daisy de Araujo Vilela³

¹ Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Ceará – UFC, Fortaleza, Ce – Brasil

² Universidade Federal do Piauí / Campus de Parnaíba/UFPI. Parnaíba, Pi-Brasil

³ Universidade Federal de Goiás; Campus Jatai, UFG, Go-Brasil

<https://doi.org/10.5628/rpcd.17.S2A.13>

RESUMO

A Escoliose gera anormalidades estéticas, dor, complicações cardiopulmonares e neuromusculares. Objetivo: identificar a ocorrência de escoliose em estudantes de escolas públicas e privadas no município de Parnaíba-Piauí. Para tanto, avaliaram-se 87 alunos de duas escolas públicas e duas privadas na cidade de Parnaíba-Piauí. Para a análise postural, utilizamos simetrógrafo e teste de Adams. Quanto à presença de escoliose, os meninos apresentaram uma frequência maior (41.46%) do que as meninas (34.8%), porém não estatisticamente significativa ($p > .05$). Entretanto, a presença da escoliose foi significativamente maior nos alunos das escolas privadas ($p < .05$) do que nas públicas e em 62.07% do total de alunos observamos um padrão de normalidade das curvaturas anatômicas. A curvatura da escoliose foi identificada em 37.93%, dos alunos avaliados, sendo que 49% destes apresentaram desnível à esquerda e 51% à direita. Neste estudo observou-se a escoliose em mais de um quarto da população estudada, sendo mais afetada a população masculina de escolas privadas. Este trabalho possibilita conhecer dados posturais da região nordeste do Brasil, bem como gerar uma reflexão que, através de pouca instrumentação e baixo custo, é possível realizar a prevenção de desvios posturais nas escolas, evitando-se o desenvolvimento de curvaturas patológicas antes da adolescência.

Correspondência: José Carlos Tatmatsu-Rocha. Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Ceará – UFC, Fortaleza, Ce – Brasil. (tatmatsu@gmail.com)

Scoliosis screening in children 10 to 12 years old

ABSTRACT

Scoliosis generates aesthetic abnormalities, pain, cardiopulmonary and neuromuscular complications. Objective: To identify the occurrence of scoliosis in students from public and private schools in Parnaíba City (Brazil). We evaluated 87 prepubertal students from two public and two private schools. For postural analysis, we use symmetrograph and Adams test. Boys had a higher rate about presence of scoliosis (41.46%) when compared with girls (34.8%), but the difference was not statistically significant ($p > .05$). However, the presence of scoliosis was significantly higher in students from private ($p < .05$) than public schools; 62.07% of the students observed possessed a normal range of anatomical curvatures. The curvature of scoliosis was identified in 37.93% of the evaluated students, and 49% presented left unevenness and 51% to right. In this study, scoliosis was found in more than a quarter of the population studied; the male population of private schools was more affected. This work enables to know postural data in northeastern Brazil, as well as generate a reflection that, through little instrumentation and low cost, it is possible to prevent postural deviations in schools, preventing the development of pathological curvatures before adolescence.

KEY-WORDS:

Posture. Spinal curvatures.
Child development. Puberty. Spine.

INTRODUÇÃO

A infância e a adolescência são os períodos de maior importância para o desenvolvimento musculoesquelético, pois nessas fases existem fatores intrínsecos e extrínsecos que podem predispor o desenvolvimento de deformidades posturais em decorrência de hábitos incorretos, resultando em prejuízos significativos aos escolares, particularmente às estruturas que compõem a coluna vertebral (Martelli & Traebert, 2006; Zapater, Silveira, Vitta, Padovani, & Silva, 2004).

Os desalinhamentos posturais são consequência de vários fatores, incluindo a má postura, a condução inadequada de objetos, tensões, obesidade, condições físicas nas quais o indivíduo vive, bem como por fatores emocionais, socioeconômicos ou ainda alterações decorrentes do crescimento e desenvolvimento humano (Penha, João, Casarotto, Amino, & Penteado, 2005; Scartoni, 2008).

Dentre os desvios posturais mais comuns destaca-se a escoliose, patologia que acomete mais comumente o sexo feminino e é mais frequente dos nove aos treze anos de idade, ou seja, no período em que há o estirão de crescimento. Nesta fase, os alunos apresentam padrões inadequados de postura ao sentar, carregar mochilas e até mesmo da marcha. A permanência na posição sentada por até seis horas nas escolas, com pequenos intervalos em pé, pode acarretar esse desequilíbrio postural (Ferriani, Cano, Candido, & Kanchina, 2006).

A alteração postural supracitada é definida pela *Scoliosis Research Society* (2016) como um desvio da coluna vertebral no plano frontal superior a 10° , associado ou não a alteração rotacional, sendo caracterizada por modificação tridimensional incluindo curvatura lateral no plano frontal, rotação lateral no plano transversal e retificação no plano sagital (Salate, Aroni, & Ferreira, 2003). Conforme sua etiologia, pode ser classificada em estrutural e não estrutural. A primeira pode ser idiopática (sem causa aparente), neuromuscular e osteopática. Já a segunda pode ser o resultado de assimetria de membros inferiores, espasmo ou dor muscular da coluna vertebral por compressão de raiz nervosa ou outra lesão na coluna e, ainda, pelos maus hábitos posturais (Bonorino, da Silva Borin, & da Silva, 2008).

A detecção precoce da escoliose pode resultar na prevenção de anormalidades estéticas, dor, complicações cardiopulmonares e neuromusculares (Salate et al., 2003). O diagnóstico precoce na infância e adolescência permite uma intervenção eficiente, principalmente porque nestas fases o sistema musculoesquelético é complacente e os protocolos de exercícios e uso de órteses são efetivos para estacionar a progressão da deformidade, e, deste modo, dispensar a necessidade de cirurgias (Braccialli & Vilarta, 2000; Ferreira, Suguiyama, Pachioni, Fregonesi, & Camargo, 2009; Santos et al., 2009).

A idade escolar é considerada a fase ideal para recuperação de alterações da coluna de maneira mais eficaz (Pereira, 2016). Nessa faixa etária faz-se necessário um trabalho que englobe prevenção e educação, possibilitando a aquisição de hábitos posturais adequados e abolição de posições viciosas, a fim de que se proporcione uma melhor qualidade de vida

durante o crescimento, desenvolvimento e vida adulta (Braccialli & Vilarta, 2000; Kavalco, 2000). O objetivo deste estudo foi identificar a ocorrência de escoliose em estudantes de escolas públicas e privadas em um município do Nordeste Brasileiro.

MÉTODO

Trata-se de uma pesquisa observacional, de corte transversal, realizada com estudantes de ambos os sexos que frequentavam a 7ª série do ensino fundamental da rede pública e privada na cidade de Parnaíba, Piauí, no ano de 2010. Naquele ano, o município de Parnaíba possuía uma população total de 145.705, sendo 36.564 o total de alunos matriculados e, destes, 9719 do ensino fundamental entre 7-14 anos A amostra de conveniência envolveu um universo de 87 alunos. O tamanho da amostra deveu-se ao fato de terem sido avaliados todos os alunos que devolveram os Termos assinados pelos pais ou responsáveis.

AMOSTRA

Três escolas públicas e três privadas do Município de Parnaíba – Piauí foram inicialmente contactadas. Posteriormente, foi realizado um sorteio aleatório para escolha de duas escolas públicas e duas privadas para a avaliação postural dos alunos matriculados nestas escolas. Os Termos de Consentimento Livre Esclarecido foram enviados aos pais ou responsáveis dos escolares; estes termos elucidavam o trabalho proposto e solicitavam a assinatura dos mesmos concordando ou não com a participação do filho na pesquisa bem como garantidos o anonimato e confidencialidade dos dados.

Foram excluídos do estudo os escolares que não apresentaram seu Termo de Consentimento Livre Esclarecido devidamente preenchida pelo responsável e/ ou que haviam realizado qualquer intervenção fisioterapêutica prévia, bem como meninas que tivessem atingindo a menarca. Este trabalho foi aprovado pelo CONEP sob número 184503.

INSTRUMENTOS

Para a análise utilizou-se fita métrica, lápis dermatográfico, balança com escada ergométrica, um simetógrafo e uma ficha de avaliação postural contendo os principais pontos anatômicos de referência para análise postural, metodologia empregada por outros autores (Penha et al., 2005). Para realizar o processo avaliativo, as crianças foram posicionadas em frente ao simetógrafo, primeiramente em vista anterior, onde foram analisados os pontos correspondentes a essa vista; em seguida foram observadas na vista posterior e lateral, para verificar se havia ou não presença de novas alterações não percebidas anteriormente ou para confirmar as já observadas. O teste de Adams era realizado após a análise pelo simetógrafo, a fim de confirmar os achados encontrados quanto à escoliose ou não.

PROCEDIMENTOS

Os avaliadores foram treinados por duas semanas com intuito de padronização do método de avaliação postural e minimização de erros entre avaliadores, tendo os membros sido divididos em equipes de dois; cada uma delas ficou responsável por um determinado número de escolas e de crianças a serem avaliadas.

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Para calcular o tamanho da amostra, foi utilizada uma prevalência média dos desfechos (desvios posturais do tronco) de 20%, com intervalo de confiança de 95% (IC = 95%), poder de 80% e erro padrão de 3%. Nesse cálculo, utilizou-se o *software* estatístico Epi-Info 6.0 (Atlanta, USA). A análise estatística realizada foi exploratória e descritiva, com análise dos dados realizada utilizando-se o *software* SPSS versão 18.0 for Windows. O teste utilizado para verificação da variação de frequências e do grau de associação entre as variáveis foi o Qui-Quadrado. Consideramos o valor de $p < .05$.

RESULTADOS

O total de alunos com 10 a 12 anos avaliados foi de 87 crianças de ambos os sexos, 79.3% originários de escolas privadas e 20.7% de unidades públicas, sendo que, do total da amostra colhida nesse estudo, 52.8% foram do sexo feminino e 47.2% do masculino. Verificou-se que 61.1% dos analisados das escolas públicas pertenciam ao sexo masculino e 39.9% ao feminino e que 43.5% dos alunos das privadas pertenciam ao sexo masculino e 56.5% ao feminino.

Na análise da ocorrência de escoliose pelo número total de alunos, tendo como variáveis dependentes a idade, sexo e escolaridade, observou-se diferença estatisticamente significativa ($p = .00$; $p = .01$; $p = .01$) entre os grupos. O sexo masculino apresentou uma frequência maior (41.46%) do que o sexo feminino (34.8%) quanto à presença de escoliose. Entretanto, essa diferença não foi significativa ($p > .05$).

QUADRO 1. Resultados da comparação das variáveis idade, gênero e presença de curvatura escoliótica em escolas públicas. Parnaíba, Piauí.

		ESCOLIOSE TORÁCICA		
		Esquerda	Direita	Ausente ou Normal
Idade	10 anos	0%	40%	60%
	11 anos	12.5%	0%	87.5%
	12 anos	40%	40%	20%

No quadro II observa-se um número de desvios à esquerda somente nas idades de 11 e 12 anos. Observou-se que a presença de escoliose foi significativa nos alunos das escolas privadas ($X^2 = 4.18$; $gl = 1$; $p < .05$), diferentemente do que ocorreu nos alunos das escolas públicas, onde não houve significância estatística da variável presença de escoliose ($X^2 = 0.88$; $gl = 1$; $p > .05$).

QUADRO 2. Resultados da comparação das variáveis idade, gênero e presença de curvatura escoliótica em escolas privadas. Parnaíba, Pi.

ESCOLIOSE TORÁCICA		SEXO	
		MASCULINO	FEMININO
A esquerda	Idade	10 anos	-
	Idade	11 anos	60%
		12 anos	37.50%
A direita	Idade	10 anos	33.34%
		11 anos	50%
		12 anos	50%
Ausente ou normal	Idade	10 anos	75%
		11 anos	58.34%
		12 anos	30.76%

DISCUSSÃO

Neste estudo identificou-se a presença de escoliose em 37.93% dos alunos, sendo esta incidência de escoliose semelhante em relação aos sexos na faixa etária de 12 anos. Pode-se atribuir a maior incidência desse desvio postural em escolares desta idade pelo fato de estarem passando pelo chamado “estirão de crescimento”, em que as estruturas ósseas tendem a ter um crescimento exponencial, ou ainda ao transporte incorreto do material escolar, seja por mochilas carregadas em um ombro só ou mochilas com rodas com posicionamento da alça em relação ao quadril inadequado (Ramprasad, Alias, & Raghuveer, 2010).

Outros fatores que poderiam influenciar na maior incidência escoliótica seriam o peso excessivo das mochilas e o uso equivocado do mobiliário escolar (e.g., ausência de apoio para pés e sentar-se lateralmente nas cadeiras). Em estudo realizado por Figueirôa e Pereira (2016) com crianças e adolescentes de 9 a 14 anos matriculados em uma escola municipal do distrito sanitário Cabula-Beirú na cidade de Salvador, Bahia, foi constatado que 23.1% dos avaliados transportavam a mochila escolar com peso superior a 10% do peso corporal. Além disso, o uso incorreto da mecânica corporal e do estilo de vida cada vez mais voltado para

hábitos sedentários contribuem para esses achados clínicos. Os padrões adequados e inadequados de postura e movimento começam a ser determinados na infância, são praticados na adolescência e logo se tornam habituais (Santos et al., 2009). A má ergonomia escolar pode estar associada a padrões posturais inadequados, uma vez que o aluno procura um maior conforto, contribuindo para a manutenção de posturas erradas (Gonçalves, 2015).

Constatamos que 39% (7) dos escolares de escolas públicas apresentavam algum desvio e 37.6% (26) dos 69 de escolas privadas. Logo, observamos uma maior ocorrência na rede pública de ensino, talvez pelo tamanho da amostra; contudo uma afirmação mais categórica sobre este assunto extrapola os limites deste estudo.

Em um estudo realizado por Santos et al. (2009) em 247 escolares de sete a doze anos em uma escola pública de São Paulo, constatou-se a prevalência de escoliose de 15.7%, resultado semelhante ao estudo realizado por Espírito Santo, Guimarães e Galera (2011) que, em sua primeira avaliação, encontrou 12.3% de escoliose em escolares utilizando o teste de Adams. Ferriani et al. (2006) analisaram os distúrbios posturais em 378 escolares de seis aos quatorze anos e detectaram, através do teste de Adams, 23.5% de escoliose nestes alunos. Penha et al. (2005) avaliaram a postura de 132 crianças na faixa etária de 7 a 10 anos de idade, todas do sexo feminino, e constataram que 48% destas, com dez anos, apresentaram escoliose.

Um estudo recente de Pereira et al. (2016) realizado em 143 escolares (13.26 ± 1.52 anos), 40 meninos e 103 meninas, com o objetivo de verificar a prevalência de casos suspeitos de escoliose e sua associação com peso do material escolar em alunos de uma escola pública do município de Jequié – BA mostrou que, para este grupo de escolares, a prevalência de casos suspeitos de escoliose é maior no sexo feminino, no grupo etário mais velho e nos indivíduos com peso do material escolar inadequado. Já em outro estudo com 966 portugueses de 10-16 anos não se encontrou correlação do peso das mochilas e hábitos posturais inadequados com o aparecimento de escoliose (Rocha, Rodrigues, & Farias, 2011). Na pesquisa de Sedrez, da Rosa, Noll, da Silva Medeiros e Candotti (2015), que avaliaram 59 indivíduos entre 7 e 18 anos, 28 apresentaram escoliose associada à prática de esporte competitivo de grande volume e ao tempo de sono superior a 10 horas.

Carneiro et al. (2016) avaliaram (n = 23) alunos, utilizando o mesmo método avaliativo usado neste trabalho, o simetógrafo, cujos indivíduos se dispõem na posição ortostática em vistas: anterior, lateral e posterior. Encontraram 69.6% de escoliose, 30.5% de hipercifose e 17.4% de hiperlordose, demonstrando que 86.9% dos avaliados apresentam algum tipo de desvio postural, tendo a escoliose como predomínio. Quando comparado os sexos, 72.2% das mulheres e todos os homens apresentaram algum desvio, possivelmente em decorrência de maus hábitos posturais.

A avaliação postural de escolares colabora para programas intervencionais e educativos, possibilitando assim uma adequada saúde escolar e evitando patologias futuras na coluna vertebral, podendo contribuir para melhorar o rendimento do aluno e paea promover o seu bem-estar físico e emocional (Martelli & Traebert, 2006; Santos et al., 2009).

Os desvios posturais são capazes de levar a compensações patológicas (escoliose, hiperlordose lombar), apresentando grande incidência em alunos do ensino fundamental (Santos et al., 2009). Os distúrbios posturais têm sido apontados como problema de saúde pública, pois se observa a significativa incidência dos mesmos em crianças de todo o mundo, sendo as causas mais comuns uma postura errônea durante as aulas, o uso incorreto de mochila escolar, a utilização de calçados inadequados, o sedentarismo e a obesidade (Penha et al., 2005).

As maiores dificuldades encontradas nesse estudo e que podem gerar um viés de nossos resultados foram a quantidade de termos de consentimento assinados e o número reduzido de pais nos encontros proporcionados entre eles e o grupo pesquisador, o que gerou perdas de 30% do total de alunos inicialmente contatados. Nas escolas públicas, além dos fatores supramencionados, ocorreu uma greve de professores no período da pesquisa, prejudicando a comunicação entre alunos e pesquisadores.

CONCLUSÕES

Em nossa pesquisa houve diferença estatisticamente significativa entre escolas, com maior ocorrência dos desvios nas escolas privadas. Entretanto, ao confrontarmos os resultados quanto ao sexo e a variável escoliose, não existiram diferenças entre os grupos.

Nesse contexto, são necessários mais estudos que fomentem dados a respeito das principais alterações anatômicas e seus desvios em escolares, principalmente diferenças entre regiões, que são fundamentais para a formação de um banco de dados que possibilite traçar um panorama nacional dessas alterações, podendo servir como instrumento para políticas públicas.

REFERÊNCIAS

- Bonorino, K. C., da Silva Borin, G., & da Silva, A. H. (2008). Tratamento para escoliose através do método iso-stretching e uso de bola suíça. *Cinergis*, 8(2), 1-6.
- Braccialli, L. M. P., & Vilarta, R. (2000). Aspectos a serem considerados na elaboração de programas de prevenção e orientação de problemas posturais. *Revista Paulista de Educação Física*, 14(2), 159-171.
- Carneiro, J. A. O. (2016). Predominância de desvios posturais em estudantes de Educação Física da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. *Saúde. com*, 1(2).
- Espírito Santo, A., Guimarães, L. V., & Galera, M. F. (2011). Prevalência de escoliose idiopática e variáveis associadas em escolares do ensino fundamental de escolas municipais de Cuiabá, MT, 2002. *Revista Brasileira de Epidemiologia*, 14(2), 347-356.
- Ferreira, D. M. A., Sugikawa, T. R., Pachioni, C. A. S., Fregonesi, C. E. P. T., & Camargo, M. R. (2009). Rastreio escolar da escoliose: medida para o diagnóstico precoce. *Revista brasileira de crescimento e desenvolvimento humano*, 19(3), 357-368.
- Ferriani, M. G. C., Cano, M. A. T., Candido, G. T., & Kanchina, A. S. (2006). Levantamento epidemiológico dos escolares portadores de escoliose da rede pública de ensino de 1º grau no município de Ribeirão Preto. *Revista Eletrônica de Enfermagem (online)*, 2(1).
- Figueirôa, G. R., & Pereira, J. S. L. (2016). Frequência de posturas escolióticas em crianças e adolescentes. *Revista Pesquisa em Fisioterapia*, 6(3), 247-260.
- Gonçalves, A. P., & Fontoura, H. S. (2015). Influência do mobiliário escolar na flexão lateral da coluna de estudantes: Uma revisão. In *Anais do Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão da UEG*.
- Martelli, R. C., & Traebert, J. (2006). Estudo descritivo das alterações posturais de coluna vertebral em escolares de 10 a 16 anos de idade. Tangará-SC, 2004. *Revista Brasileira de Epidemiologia*, 9(1), 87-93. doi:10.1590/S1415-790X2006000100011
- Penha, P. J., João, S. M. A., Casarotto, R. A., Amino, C. J., Penteado, D. C. (2005). Postural assessment of girls between 7 and 10 years of age. *Clinics*, 60(1), 9-16.
- Pereira, L. M. (2016). Escoliose: Triagem em escolares de 10 a 15 anos. *Saúde. com*, 1(2).
- Ramprasad, M., Alias, J., & Raghuvveer, A. K. (2010). Effect of backpack weight on postural angles in preadolescent children. *Indian Pediatrics*, 47(7), 575-580.
- Rocha, J. C. T., Rodrigues, G. L., & Farias, T. L. (2011). Alterações do equilíbrio escapular em escolares de 10 a 12 anos no município de Parnaíba/PI. *Fisioterapia Brasileira*, 12(6), 442-446.
- Salate, A. C. B., Aroni, F. C., & Ferreira, D. M. A. (2003). Estudo da evolução a curto prazo da escoliose por meio de mensurações da gibosidade, radiográficas e da dor em adolescentes e adultos jovens. *Revista Brasileira de Fisioterapia*, 7(1), 39-44.
- Santos, C. I. S., Cunha, A. B. N., Braga, V. P., Saad, I. A. B., Ribeiro, M., Conti, P. B. M., & Oberg, T. D. (2009). Ocorrência de desvios posturais em escolares do ensino público fundamental de Jaguariúna, São Paulo. *Revista Paulista de Pediatria*, 27(1), 74-80.
- Scartoni, F. R. (2008). Alterações posturais de alunos de 5ª e 6ª séries do Ensino Fundamental. *Fitness & Performance Journal*, (1), 10-15.
- Scoliosis Research Society (2015). *Milwaukee: The Society; 1966-2016. For Adolescents; [1 tela]*. Disponível em <http://www.srs.org/patientsand-families/conditions-and-treatments/adolescents>
- Sedrez, J. A., da Rosa, M. I. Z., Noll, M., da Silva Medeiros, F., & Candotti, C. T. (2015). Risk factors associated with structural postural changes in the spinal column of children and adolescents. *Revista Paulista de Pediatria*, 33(1), 72-81.
- Zapater, A. R., Silveira, D. M., Vitta, A. D., Padovani, C. R., & Silva, J. D. (2004). Postura sentada: A eficácia de um programa de educação para escolares. *Ciência e Saúde Coletiva*, 9(1), 191-199. doi:10.1590/S1413-81232004000100019