REFERÊNCIAS

- Barbanti, V. J. (2003). *Dicionário de educação física e esporte*. São Paulo: Manole.
- Barreto, J. A. (2003). *Psicologia do esporte para o atleta de alto rendimento*. Rio de Janeiro: Shape.
- Berté Junior, D. (2004). *Um estudo sobre o nível de ansiedade estado pré-competitiva em atletas de futsal*. Trabalho de conclusão de curso, Faculdade de Pato Branco, Brasil. Disponível em www.boletimef.org/
- Bocchini, D., Morimoto, L., Rezende, D., Cavinato, G., Luz, L.M.R. (2008). Análise dos tipos de ansiedade entre jogadores titulares e reservas de futsal. *Revista da Faculdade de Educação Física da UNICAMP*, 6(Ed. Especial), 522-532.
- Confederação Brasileira de Futsal. (2015). Retirado de <http://www.cbfs.com.br/2015>
- Cruz, J. F. (1996). *Stress, ansiedade e rendimento na competição desportiva*. Dissertação de doutorado, Universidade do Minho, Portugal.
- Damázio, W. (1997). *A ansiedade no voleibol*. Trabalho de conclusão de curso, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, Brasil.
- Fernandes, M.G., & Nunes, S. A. N. (2006). Ansiedade pré-competitiva e home advantage. *Revista Saúde.com.*, 2(1), 21-29.
- Fernandes, M. G., Nunes, S. A. N., Raposo, J. V., & Fernandes, H. M. (2014). Efeitos da experiência nas dimensões de intensidade, direção e frequência da ansiedade e autoconfiança competitiva: Um estudo em atletas de esportes individuais e coletivos. *Motricidade*, 10(2), 81-89.
- Frischnecht, P. (1990). A influência da ansiedade no desempenho do atleta e do treinador. *Treino Desportivo*, 15, 21-28.
- Jogos de Minas Gerais. (2015). Retirado de www.jogsdeminas.esportes.mg.gov.br
- Miloski, B., Pinho, J. P., Freitas, C. G., Marcelino P. R., & Arruda A. S. F. (2014). Quais ações técnico-táticas realizadas durante as partidas de futsal podem discriminar o resultado de vitória ou derrota? *Revista Brasileira de Educação Física e Esporte*, 28(2), 203-209.
- Moraes, L. C. (1990). Ansiedade e desempenho no esporte. *Revista Brasileira de Ciência e Movimento*, 4(2), 51-56.
- Moraes, L. C., Lôbo, I., & Lima, O. (2002). Análise da ansiedade pré-competitiva de atletas de diferentes esportes. In E. Silami-Garcia & L. C. Moraes (Eds.), *Resultados das avaliações*. Belo Horizonte: UFMG.
- Moutinho, M. A. C. (2016). *Fatores relacionados com os níveis de ansiedade em atletas do escalão de iniciais de equipas de futsal do desporto escolar*. Dissertação de mestrado, Vila Real, Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal. Disponível em <http://hdl.handle.net/10348/6431>
- de Rose Júnior, D., & Vasconcellos, E. G. (1997). Ansiedade-traço competitiva e atletismo: Um estudo com atletas infanto-juvenis. *Revista Paulista de Educação Física*, 11(2), 148-154.
- Salles, W. das N., Oliveira, C. C., Barroso, M. L. C., & Pacheco, R. W. (2015). Ansiedade pré-competitiva e esporte: Estudo com atletas universitários. *Conexões*, 13(3), 85-100.
- Samulski, D. (2002). *Psicologia do esporte*. Manole: São Paulo.
- Santos, S. R. M., Pedrozo, S. C., & Perondi, D. (2016). Nível de ansiedade-traço e ansiedade-estado na fase preparatória e na fase pré-competição em atletas de futsal de xavantina (sc). In *Seminário de Iniciação Científica, Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão e Mostra Científica*. SIEPE 2016. Santa Catarina: Unoesc.
- Silva, C. V., Lima, P. L., Ribeiro, G. P., Costa, V. de O., & Hernandez, J. A. E. (2015). *Ansiedade traço em atletas de esportes coletivos e individuais*. Disponível em <https://www.researchgate.net/publication/277311736>.
- Silva, M. V. P. D. (2014). *Análise dos sistemas táticos utilizados no futsal feminino nos jogos escolares de Porto Alegre em 2013*. Trabalho de conclusão de curso, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil. Disponível em <http://migre.me/v9POn>
- Weinberg, R. S., & Gould, D. (2001). *Fundamentos da psicologia do esporte e do exercício*. (2ª Ed.). Porto Alegre: Artmed.

AUTORES:

Cristina Carvalho de Melo
Tatiana Lima Boletini
Israel Teoldo da Costa
Agnes Vasconcelos Arreguy
Franco Noce

<https://doi.org/10.5628/rpcd.17.S2A.141>

Depressão e dança de salão: Fatores de influência em idosos

PALAVRAS CHAVE:

Idosos. Depressão. Dança.

RESUMO

O objetivo do presente estudo foi verificar os fatores que influenciam a incidência de depressão em um grupo de idosos praticantes de dança. A investigação se tornou relevante devido à expressividade da população idosa no contexto brasileiro e por acreditar-se que a identificação destes fatores pode auxiliar o combate, tratamento e prevenção desta enfermidade. A amostra compôs-se de 51 idosos com idade média de 66.33 anos ($\pm$ 6,89), de ambos os gêneros e que praticavam dança de salão. A fim de verificar a incidência de depressão nos participantes aplicou-se o Inventário de Beck e como instrumento investigativo das capacidades cognitivas fez-se uso do questionário Mini-Mental, do qual os escores considerados baixos seriam utilizados como critério de exclusão. A análise dos dados identificou significância da influência das variáveis: ser profissionalmente ativo; ter passado por uma situação trágica e apresentar alguma doença associada na incidência de depressão. Estes dados evidenciam a necessidade de maiores investigações sobre como evitar tais influências.

Factors which influence depression in ballroom dancing elderly practitioners

ABSTRACT

The aim of this study was to analyze the factors that influence the incidence of depression in a group of ballroom dancing elderly practitioners. The research is relevant due to the expressivity of the elderly population within the Brazilian context and to the belief that the identification of such factors can help fight, treat and prevent this disease. The sample comprised 51 elderly with a mean age of 66.33 years old (± 6.89), from both genders and who practiced ballroom dancing. Aiming to verify the incidence of depression within the practitioners, the Beck Depression Inventory was used, and as a research tool for cognitive capacities, the Mini-Mental questionnaire was applied, from which lower scores would be considered as exclusion criteria. Data analysis identified the significant influence of the following variables: being professionally active; having experienced a tragic situation and presenting any disease related to the incidence of depression. This results highlight the need for further investigation on how to avoid such influences.

KEY-WORDS:

Elderly. Depression. Dancing.

INTRODUÇÃO

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ([IBGE], 2013), o Brasil evidencia um crescente aumento na população idosa e, como consequência, ocorrem mudanças no perfil epidemiológico. A diminuição da taxa de natalidade somada às políticas públicas adotadas influenciam esta mudança demográfica, sendo que a segunda ainda favorece a incidência da longevidade.

A depressão é um dos maiores problemas de saúde pública do mundo, devido à sua alta morbidade e mortalidade (Laks, Ribeiro, Pompeu, Ferreira, & Deslandes, 2007). Em menos de quarenta anos, as enfermidades próprias das faixas etárias mais avançadas, se tornaram mais expressivas, o que provocou relevantes alterações nos indicadores de morbimortalidade. Assim, a associação do envelhecimento com a perda das capacidades físicas, mentais e sociais se tornou comum (Carmo, Barratelo, & Silva, 2003; Rabelo & Neri, 2005).

A depressão é um dos principais problemas de saúde pública caracterizada por uma redução crônica do humor e da capacidade de experimentar sensações prazerosas (Stella et al., 2013). Outro estudo da mesma autora, realizado em 2002 (Stella, Gobbi, Corazza, & Costa, 2002), reforça que a depressão é uma das enfermidades que acomete com frequência os idosos e é caracterizada como uma síndrome de causa multifatorial. Defende ainda que esta doença aumenta o risco de morbidade clínica e de mortalidade e que alguns aspectos enfrentados por esta faixa etária, como isolamento social, luto, abandono e doenças incapacitantes podem gerar perda da qualidade de vida e propiciar a ocorrência de depressão.

Stella, Gobbi, Corazza e Costa (2002) e Justo e Calil (2006) reforçam que a depressão realmente é comum em idosos e acrescentam que esta pode se manifestar de formas diferentes em homens e mulheres, como por exemplo no âmbito biológico, onde os aspectos hormonais e suas consequências chamam atenção. Barzotto, Breschigliari e Maciel (2002) defendem ainda que esta doença compromete as áreas física, mental e social, pois a consideram como um transtorno afetivo que altera a área psíquica global do indivíduo, mudando sua maneira de valorizar a vida.

Preocupados com a apresentação desta doença em idosos e com as consequências que esta gera para a saúde dos indivíduos, estudiosos buscam instrumentos que ajudem na prevenção e no combate da depressão, além de intervenções que visem melhora da saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde (2007), a saúde pode ser definida como "situação de perfeito bem estar físico, mental e social".

Estudos como os de Matsudo (2002), Macedo et al. (2003), Guimarães e Caldas (2006), Pitanga (2002), Teoldo, Samulski, Noce e Costa (2003), e Headrick et al. (2011) corroboram no que diz respeito aos efeitos positivos da atividade física e/ ou exercícios físicos na melhora da saúde de indivíduos, pois afirmam que a prática de atividades trabalha com os aspectos físico, mental e social. Interessante ressaltar que os três primeiros estudos

foram voltados para a terceira idade. O uso do exercício físico como alternativa não farmacológica é de fato importante coadjuvante no tratamento da depressão, particularmente em idosos, por promover o alívio de sintomas desagradáveis, mudanças de atitudes e modificação dos estilos de vida pouco saudáveis, o que contribui em muito com a melhoria da qualidade de vida da população (Mello et al., 2014).

Enquanto prática de atividade física, a dança trabalha com autonomia, independência, movimentação e percepção do corpo, noção espacial, autoestima e autoimagem, além de buscar a diminuição do estresse e proporcionar a socialização e a comunicação dos praticantes (Leal & Haas, 2006; Neri, 1993). No campo da saúde, a dança de salão tem sido compreendida, por profissionais de educação física e demais da área, como veículo de promoção da qualidade de vida dos indivíduos (Araújo, 2010).

A prática da dança ainda permite que homens e mulheres aprendam de forma lúdica e prazerosa a utilizar seu corpo para se comunicarem e através de suas expressões corporais evidenciem as sensações e as interpretações do que vivem (Leal & Haas, 2006). Ainda de acordo com Leal e Haas (2006), além da dança ser um dos exercícios mais procurados pela terceira idade, sua prática é suficiente para trabalhar os aspectos sociais, físicos e mentais de um indivíduo. Fatores estes, diretamente afetados pela depressão. Para Araújo (2010) “dançar é mais que gasto calórico e a saúde é mais que ausência de doença”. Para o autor, a dança de salão, por ser um instrumento importante na integração de pessoas pode ser indicada como uma forma de terapia e, ainda, por movimentar o corpo, está diretamente relacionada à parte fisiológica do indivíduo, e estimula a oxigenação do cérebro.

Para encontrar a forma mais adequada de prevenção e combate da depressão, é importante identificar quais fatores influenciam a incidência desta enfermidade, para que assim se possa evitar e/ou minimizar a ocorrência dos mesmos. Alguns estudos sugerem que a idade, o nível de escolaridade, o papel sociofamiliar desempenhado pelo indivíduo, assim como estado civil estão associados aos sintomas depressivos (Justo & Calil, 2006).

Desta forma, após identificar incidência de depressão em um grupo de idosos praticantes de dança de salão, o presente estudo objetiva verificar quais fatores influenciam a depressão neste grupo.

MÉTODO

AMOSTRA

Participaram deste estudo de caso de forma voluntária, 51 idosos, sendo 32 mulheres e 19 homens; a idade da amostra variou entre 53 e 85 anos com média de 66.33 anos (± 6.89); 76.4% dos sujeitos possuíam escolaridade superior a sete anos. Os indivíduos praticavam dança de salão duas vezes na semana em média há 17.16 anos (± 16.46) e apenas 23.5% destes permanecem profissionalmente ativos.

Por se tratar de um método transversal, foi utilizada como critério de exclusão a apresentação de limitações cognitivas observadas através do escore fornecido pela aplicação do *Mini-Mental* (Brucki, Nitrini, Caramelli, Bertolucci & Okamoto, 2003). Vide pontos de corte na Análise Estatística.

INSTRUMENTOS

Para avaliação subjetiva de depressão, foi utilizado o Inventário de *Beck* (Beck, Ward, Mendelson, Mock & Erbaugh, 1961) que é composto por 21 afirmativas referentes a sentimentos pessoais. O voluntário deveria identificar a opção que mais se assemelhasse a forma como se sentia na semana anterior a da realização da pesquisa (Gorestein & Andrade, 1998).

Já o questionário *Mini-Mental* foi utilizado para verificar a capacidade cognitiva dos indivíduos. Este é composto por dados pessoais, perguntas que avaliam a orientação temporal e espacial, a memória imediata e a capacidade realizar raciocínio lógico. Os escores variam de 0 a 30 pontos (Almeida & Crocco, 2000).

PROCEDIMENTOS

Como primeiro passo, solicitou-se ao responsável do projeto de dança de salão autorização prévia para a realização da pesquisa. Esta se deu através da assinatura da Carta de Ciência, apresentada ao Comitê de Ética em Pesquisas da Universidade Federal de Ouro Preto com CEP Nº. 001/2012. Em um segundo momento, houve a abordagem direta com os voluntários durante as atividades desenvolvidas.

Foi informado aos participantes, individualmente, o objetivo do estudo e explicado de forma verbal, como este se daria. Garantindo-lhes o anonimato e expondo que poderiam abandonar a pesquisa a qualquer momento. Os indivíduos que concordavam participar, assinavam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, respondiam o *Mini-Mental* e logo em seguida o questionário de Beck.

Os instrumentos foram conduzidos pelos pesquisadores de forma oral. A fim de minimizar possíveis problemas com a compreensão por parte dos idosos, as perguntas eram lidas quantas vezes estes achassem necessárias e para a formulação das respostas não havia tempo pré-determinado. O que evitava a existência de pressão sobre os mesmos. Contudo, na intenção de impedir interferências dos aplicadores sobre as respostas dos participantes, antes do início da coleta de dados, todos foram instruídos e preparados a realizar leitura clara e impessoal. E se ainda assim algum participante não conseguisse responder a algum dos instrumentos, seus dados seriam excluídos da amostra, o que não se fez necessário nesta pesquisa.

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Inicialmente, os dados foram inseridos no programa *SPSS*, versão 19. Para as variáveis qualitativas existentes no Inventário de *Beck* e suas respectivas respostas, foram criados códigos e em seguida verificou-se suas distribuições. Nas correlações de algumas variáveis descritas posteriormente nos resultados, adotou-se como nível de significância ($p = 0,05$).

Através do teste *Kolmogorov-Smirnov* avaliou-se os valores de normalidade do escore de depressão e do *Mini-Mental*. A atribuição de escores neste último instrumento se deu de acordo com os pontos de corte determinados pela escolaridade sugeridos por Caramelli e Nitrini (2000), que agregam os seguintes valores para cada grupo: analfabetos (18 pontos), 1-3 anos de escolaridade (21 pontos), 4-7 anos (24 pontos) e mais de 7 anos (26 pontos).

RESULTADOS

Após analisar os valores de normalidade das variáveis; escore de depressão e do *Mini-Mental* com o teste de *Kolmogorov-Smirnov*, foi possível observar que os dados assumiram distribuição não-paramétrica para o mini-mental ($p = .000$) e paramétrica para depressão ($p = .113$).

O Gráfico 1 descreve a pontuação atingida pelos idosos na aplicação do questionário *Mini-Mental* no qual se pode ressaltar que 39 dos 51 indivíduos atingiram valores maiores ou iguais a 26 pontos e que os escores apresentados pela amostra neste instrumento permitem dizer que nenhum dos avaliados foi considerado com baixa capacidade cognitiva, sendo todos aptos então a continuar na pesquisa.

GRÁFICO 1. Escore do mini-mental dos idosos praticantes de dança (N=51)

Em sequência observa-se quadro que relaciona os valores atingidos no *Mini-Mental* com o nível de escolaridade da amostra, onde 76.4% desta possuem escolaridade superior a 7 anos.

QUADRO 1. Distribuição de pontos no *Mini-Mental* de acordo com a escolaridade

SCORE MINIMENTAL (PTS)	FUNDAMENTAL	FUNDAMENTAL	MÉDIO	SUPERIOR	TOTAL
22	2	0	0	0	2
23	1	0	0	0	1
24	8	0	0	0	8
25	1	0	0	0	1
26	0	2	0	0	2
27	0	0	6	2	8
28	0	2	5	1	8
29	0	1	8	5	14
30	0	0	5	2	7
Total	12	5	24	10	51

No Quadro 2 é possível visualizar a distribuição dos 51 indivíduos quanto aos níveis de depressão, sendo que 60.8% apresentaram algum grau da enfermidade.

QUADRO 2. Níveis de depressão de idosos praticantes de dança (N=51)

DEPRESSÃO	%
Normal	39,2
Leve	47,1
Leve a Moderada	7,8
Moderada a Severa	5,9

Após análise dos dados do Inventário de Beck, percebeu-se que as variáveis profissionalmente ativo, ter passado por alguma situação trágica, como por exemplo, perda de parente próximo, e apresentar alguma doença associada, evidenciaram significância.

QUADRO 3. Fatores que influenciam a incidência de depressão – Inventário de Beck ** Diferença significante $p = 0,05$

GRUPO	SUB-GRUPO	ESCORE	N	VALOR DE P
Gênero	Masculino	12	19	0,124
	Feminino	10	32	
Profissionalmente ativo	sim	8,5	12	0,01
	não	12,5	39	

Renda	< de 5 salários min.	10,77	30	0,424
	Entre 6 e 10 sal. min.	11,23	13	
	> de 10 salários min.	13,13	8	
Mora com	sozinho	10,18	17	0,669
	filhos	12	17	
	cônjuge	11,42	12	
	outros	12	5	
Situação trágica**	sim	12,24	37	0,09
	não	8,64	14	
Alguém na família com depressão	sim	12,63	16	0,141
	não	10,63	35	
Doença atual**	sim	12,57	23	0,05
	não	10,18	28	
Estado civil	solteiro	10,8	10	0,443
	casado	10,87	15	
	viúvo	12,8	15	
	divorciado	10,09	11	

DISCUSSÃO

Corroborando com Almeida e Crocco (2000) e Caramelli e Nitrini (2000), esta pesquisa observou que os indivíduos com maiores escores no *Mini-Mental* possuíam escolaridade superior a sete anos, o que reafirma a influência do nível da escolaridade na capacidade cognitiva.

Entretanto, o que mais interessou a este estudo foi o nível de depressão em idosos que praticam dança. Este fato se torna relevante devido à confirmação de estudos como os de Guimarães e Caldas (2006) e Stella et al. (2002), onde a prática de atividade física é uma “alternativa não-farmacológica” do tratamento desse transtorno. Essa afirmativa é reforçada por Witter, Buriti, Silva, Nogueira e Gama (2013), onde define que a dança é uma atividade que desperta emoções positivas, prazer e socialização, que são aspectos fundamentais a serem estimulados em um indivíduo acometido pela depressão.

Contudo, a detecção de níveis de depressão (Figura 3) em idosos que praticam a dança demonstra a necessidade de reflexão sobre esta doença como uma síndrome de causas multifatoriais, o que incita a investigação de quais são os possíveis fatores associados à incidência desta e quais auxiliam na prevenção ou combate. Como exposto por Araújo (2010), a

prática de exercícios regulares, além de contribuir para a melhoria de aspectos fisiológicos, produz benefícios psicológicos, tais como: melhor sensação de bem-estar, humor e autoestima, redução da ansiedade, tensão e depressão. Já para Cunha et al. (2008), num estudo com idosos praticantes de dança de salão, foi evidenciado que esta atividade promove modificações no comportamento e estado físico, fisiológico e emocional dos praticantes, promovendo autoconhecimento, atitudes de confiança diante da vida e também (re)socialização, sendo desta forma a dança de salão uma estratégia em potencial para ser aplicada por profissionais da área da saúde visando a promoção de atitudes positivas diante da vida.

A fim de responder a estes questionamentos é que estudos como o de Stella et al. (2002) citam as enfermidades crônicas e incapacitantes; as frustrações; perdas progressivas relacionadas aos familiares, aos laços afetivos e a capacidade de trabalhar; o isolamento social; a impossibilidade de reabsorção do mercado de trabalho e a diminuição dos recursos financeiros como fatores comprometedores da qualidade de vida dos idosos que os predispõem ao desenvolvimento da depressão. Já Bocalini (2007) reforça que diversos fatores influenciam a qualidade de vida dos indivíduos, incluindo-se aspectos mais objetivos (condição de saúde, salário, moradia) e aspectos mais subjetivos (humor, autoestima, autoimagem).

O estudo de Trentini et al. (2005) apresenta, ainda, que os idosos tendem a expressar sua depressão através de percepções somáticas. No entanto, como observado na figura 4, para a amostra participante do presente estudo, apenas as variáveis; estar profissionalmente ativo ($p = .01$); ter passado por situação trágica ($p = .009$) e apresentar alguma doença associada ($p = .05$), evidenciaram influência significativa no índice de depressão.

Isto permite inferir que para cada grupo ou indivíduo será possível encontrar diferentes fatores determinantes da apresentação de depressão, porém estes influenciadores permanecem no conjunto de elementos relacionados aos aspectos físicos, mentais e sociais dos sujeitos, o que corrobora com a literatura consultada.

CONCLUSÕES

Apesar da dança trabalhar os aspectos físicos, mentais e sociais dos idosos, verificou-se neste estudo que, para a amostra participante, o fato de praticar a dança não impediu a identificação de níveis de depressão. Enquanto alguns estudos indicam o comprometimento funcional como um fator de risco para o aparecimento de sintomas depressivos em idosos, outras evidências suportam a ideia de que tais sintomas possam predizer a perda da funcionalidade.

A identificação das variáveis: “estar profissionalmente ativo”; “ter passado por situação trágica” e “apresentar alguma doença associada” foram fatores que influenciaram a incidência de depressão desta amostra. Esta informação permite que futuros estudos tracem diferentes estratégias para entender este mecanismo e elaborar propostas para combatê-los e/ou amenizá-los.

REFERÊNCIAS

- Almeida, O. P., & Crocco, E. I. (2000). Percepção dos déficits cognitivos e alterações do comportamento em pacientes com doença de alzheimer. *Arquivos de Neuropsiquiatria*, 58(2-A), 292-299.
- Araújo, J. L. (2010). *Trechos teóricos sobre dança de salão e depressão: Relação possível?* Monografia. Disponível em <http://dspace.bc.ueob.edu.br/jspui/handle/123456789/9798>
- Barzotto, A. P., Breschigliari, J. L., & Maciel, M. G. G. (2002). A intervenção da terapia ocupacional por meio de oficina terapêutica para pacientes depressivos. *Multítemas*, 25, 134-142.
- Beck, A. T., Ward, C. H., Mendelson, M., Mock, J. & Erbaugh, G. (1961). An Inventory for Measuring Depression. *Archives of General Psychiatry*, 1(4), 53-63.
- Bocalini, D. S., Santos, R. N., & Miranda, M. L. J. (2007). Efeitos da prática de dança de salão na aptidão funcional de mulheres idosas. *Revista Brasileira de Ciência e Movimento*, 15(3), 23-29.
- Brucki, S. M. D., Nitrini, R., Caramelli, P., Bertolucci, P. H. F., & Okamoto, I. H. (2003). Sugestões para o uso do mini-exame do estado mental no Brasil. *Arquivos de Neuro-Psiquiatria*, 61(3B), 777-781.
- Caramelli, P., & Nitrini, R. (2000). Como avaliar de forma breve e objetiva o estado mental de um paciente? *Revista da Associação Médica do Brasil*, 46(4), 301-304.
- Carmo, E. H., Barratelo, M. L., & Silva, J. R. (2003). Mudanças nos padrões de morbimortalidade da população brasileira: Os desafios para um novo século. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*, 12(2), 63-75.
- Cunha, M. L., Landim, F. L. P., Cavalcante-Lima, M. F., Vieira, L. J. E. S., Mesquita, R. B., & Collares, P. M. (2008). Dança de salão: Repercussões nas atividades de vida diária. *Cadernos de Saúde Coletiva*, 16(3), 559-568.
- Gorestein, C., & Andrade, L. (1998). Inventário de Depressão de Beck: Propriedades psicométricas da versão em português. *Revista de Psiquiatria Clínica*, 25(5), 245-250.
- Guimarães, J. M. N., & Caldas, C. P. (2006). A influência da atividade física nos quadros depressivos de pessoas idosas: uma revisão sistemática. *Revista Brasileira de Epidemiologia*, 9(4), 481-492.
- Headrick, J., Davids, K., Renshaw, I., Araújo, D., Passos, P., & Fernandes, O. (2011). Proximity-to-goal as a constraint on patterns of behaviour in attacker-defender dyads in team games. *Journal of Sports Sciences*, 30(3), 247-253.
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2013). *Projeção da População do Brasil por idade e sexo 2000-2060. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Rio de Janeiro. [dados demográficos]*. Disponível em <http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000014425608112013563329137649.pdf>
- Justo, L. P., & Calil, H. M. (2006). Depressão: O mesmo acontecimento para homens e mulheres. *Revista de Psiquiatria Clínica*, 33(2), 74-79.
- Laks, J., Ribeiro, P., Pompeu, F. A. M. S., Ferreira, C., Deslandes, A., & Moraes, H. (2007). O exercício físico no tratamento da depressão em idosos: revisão sistemática. *Revista de Psiquiatria*, 29(1), 70-79.
- Leal, I. J., & Haas, A. N. (2006). O significado da dança na terceira idade. *Revista Brasileira de Ciências do Envelhecimento Humano*, 3(1), 64-71.
- Macedo, C. S. G., Garavello, J. J., Oku, E. C., Miyagusuku, F. H., Agnoll, P. D., & Nocetti, P. M. (2003). Benefícios do exercício físico para saúde e qualidade de vida. *Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde*, 8(2), 19-27.
- Matsudo, S. M. M. (2002). Envelhecimento, atividade física e saúde. *Revista Mineira de Educação Física*, 10(1), 195-209.
- Neri, A. L. (1993). *Qualidade de vida e idade madura*. Campinas: Papirus.
- Mello, M. T., Bueno, O. F. A., Cassilhas, R. C., Miranda, R. E. E. P. C., Santos-Galduraz, R. F., & Antunes, H. K. M. (2014). O baixo consumo de oxigênio tem reflexos nos escores de depressão em idosos. *Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia*, 17(3), 505-515.
- Organização Mundial da Saúde. (2007). *Classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo.
- Pitanga, F. J. G. (2002). Epidemiologia, atividade física e saúde. *Revista Brasileira de Ciência e Movimento*, 10(3), 49-54.
- Rabelo, D. F., & Neri, A. L. (2005). Recursos psicológicos e ajustamento pessoal frente à incapacidade funcional na velhice. *Psicologia em Estudo*, 10(3), 403-412.
- Stella, F., Gobbi, S., Corazza, D. I., & Costa, J. L. R. (2002). Depressão no idoso: Diagnóstico, tratamento e benefícios da atividade física. *Matriz*, 8(3), 91-98.
- Stella, F., Gobbi, S., Garuffi, M., Andrade, L. P., Pereira, J. R., Cancela, J. M., Aryan, C., & Nascimento, C. M. C. (2013). Exercícios físicos generalizados, capacidade funcional e sintomas depressivos em idosos brasileiros. *Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano*, 15(4), 486-497.
- Teoldo, I., Samulski, D., Noce, F., & Costa, V. T. (2003). A importância da atividade física para a manutenção da saúde e os principais fatores que motivam professores, alunos e funcionários de duas universidades brasileiras a praticarem exercícios. *Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde*, 8(1), 52-61.
- Trentini, C. M., Xavier, F. M. F., Chachamovich, E., Rocha, N. S., Hirakata, V. N., & Fleck, M. P. A. (2005). A influência de sintomas somáticos sobre o desempenho dos idosos no Inventário de Depressão de Beck (BDI). *Revista Brasileira de Psiquiatria*, 7(2), 119-123.
- Witter, C., Buriti, M. A., Silva, G. B., Nogueira, R. S., & Gama, E. F. (2013). Envelhecimento e dança: Análise da produção científica na Biblioteca Virtual de Saúde. *Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia*, 16(1), 191-199.