Maciel, A. C. C. & Araújo, L. M. (2010). Fatores associados às alterações na velocidade de marcha e força de preensão manual em idosos institucionalizados. *Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia*, 13(2), 179-189.

Marin-Leon, L., Oliveira, H. B., Barros, M. B. A. Dalgalarrondo, P., & Botega, N. J. (2007). Social inequality and common mental disorders. *Revista Brasileira de Psiquiatria*, 29(3), 250-253.

Mazo, G. Z. (2008). *Atividade física, qualidade de vida e envelhecimento*. Porto Alegre: Sulina.

Neri, A. L. (2007). Qualidade de vida na velhice e subjetividade. In A. L. Neri (Org.), *Qualidade de vida na velhice: Enfoque multidisciplinar* (pp. 13-59). Campinas: Editora Alínea.

Organização Mundial da Saúde. (2007). Classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde (10ª Rev.). São Paulo: Centro Colaborador da Organização Mundial da Saúde/ Editora da Universidade de São Paulo.

Organização Mundial da Saúde. (2014). *Carta de Ottawa*. Disponível em <http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/>

Pagotto, V., Bachion, M. M., Silveira, E. A. (2013). Autoavaliação da saúde por idosos brasileiros: Revisão sistemática da literatura. *Revista Panamericana de Salud Publica*, 33(4), 302-310.

Paim, J. S., Travassos, C., Almeida, C., Bahia, L., & Macinko, J. (2011). The Brazilian health system: History, advances, and challenges. *Lancet*, 377, 1778-1797.

Rocha, A. S. R. M. (2013). *Catastrofização da dor e percepção de doença em indivíduos com dor crônica*. Dissertação de mestrado, Universidade Fernando Pessoa do Porto, Portugal.

Rodrigues, R. N., & Alves, L. C. (2005). Determinantes da autopercepção de saúde entre idosos do município de São Paulo, Brasil. *Revista Panamericana de Salud Publica*, 17(5/6), 333-341.

Santos, F. H., Andrade, V. M., & Bueno, O. F. A. (2009). Envelhecimento: Um processo multifatorial. *Psicologia em Estudo*, 14(1), 3-10.

Sargent-Cox, K. A., Anstey, K. J., & Luszcz, M. A. (2010). The choice of self-rated health measures matter when predicting mortality: Evidence from 10 years follow-up of the Australian longitudinal study of ageing. *BMC Geriatrics*, 10(18).

Shirom, A., Toker, S., Berliner, S., Shapira, I., & Melamed, S. (2008). The effects of physical fitness and feeling vigorous on self-rated health. *Health Psychology*, 27, 567-575.

Theme-Filha, M. M., Szwarcwald, C. L., & Souza Junior, P. R. (2008). Measurements of reported morbidity and interrelationships with health dimensions. *Revista de Saúde Pública*, 42(1), 73-81.

AUTORES:

Alexandre Magno dos Santos¹
 Andréa Damasceno Rocha¹
 Hideo Suzuki²
 Aguinaldo Silva G Segundo²
 Maurício Almeida Cardoso³
 Isabella Simões Holz⁴
 Leopoldino Capelloza Filho³

¹ Área Ortodontia, U. Sagrado Coração, Bauru, S. Paulo (Brasil)

² Dep. Ortodontia, C Pesquisa e Pós-Grad., São Leopoldo Mandic, S. Paulo (Brasil)

³ Dep. Ortodontia, C Pesquisa e Pós-Grad., U Sagrado Coração, Bauru, S. Paulo

⁴ Hospital Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, Universidade S. Paulo (Brasil)

<https://doi.org/10.5628/rpcd.17.S2A.65>

RESUMO

Este estudo teve como objetivo avaliar uma população de Nipo-Brasileiros (Xantodermas) nos conceitos subjetivos de estética facial em esteticamente agradável, aceitável e desagradável e a sua percepção em diferentes grupos de avaliadores; adicionalmente, nos Nipo-Brasileiros considerados agradáveis, objetivou-se realizar uma análise facial numérica do perfil. O presente trabalho avaliou uma amostra de indivíduos Nipo-Brasileiros com equilíbrio musculo-facial, representado pelo selamento labial passivo, ausência de tratamento ortodôntico ou cirurgia facial prévia. A amostra foi constituída de 82 indivíduos (42 mulheres e 40 homens), avaliados por cinco grupos: ortodontistas leucodermas, ortodontista Nipo-Brasileiros e cirurgiões buco-maxilo-faciais com relação à agradabilidade facial. Para verificar a concordância entre os examinadores foi utilizado o coeficiente de concordância de Kendall. Na comparação entre os grupos foi utilizado o teste do qui-quadrado e o teste de proporções, com nível de significância de 5% ($p < .05$). A maioria dos indivíduos foi considerado esteticamente aceitável. Nos indivíduos esteticamente desagradáveis, o nariz e o queixo foram as estruturas que mais impactaram suas faces. Quando comparados com os leucodermas, os nipo-brasileiros apresentam uma maior protrusão do lábio superior e inferior. A convexidade facial foi menor nos nipo-brasileiros. O excesso do terço inferior em relação ao terço médio da face foi maior nos brasileiros leucodermas.

Correspondência: Andréa Damasceno Rocha. Área de Ortodontia, Universidade do Sagrado Coração, Bauru, São Paulo (Brasil). (adrorto@yahoo.com.br)

Evaluation of the Japanese Brazilian profiles through subjective and numerical analysis

ABSTRACT

This study aimed to evaluate a population of Japanese-Brazilians (Xanthoderm) on the subjective concepts of facial aesthetic – aesthetically pleasing, acceptable and unpleasant –, considering the perception of different groups of evaluators; in Japanese-Brazilians which were considered pleasant, a numerical facial analysis of this profile was performed. This study evaluated a sample of Japanese-Brazilian individuals with balanced facial muscle structure, represented by passive lip seal, and with no orthodontic treatment or prior facial surgery. The sample consisted of 82 subjects (42 women and 40 men), evaluated by five groups: caucasians orthodontists, Japanese-Brazilian orthodontists and oral and maxillofacial surgeons regarding facial attractiveness. To verify the agreement between examiners, the Kendall coefficient was used. And for the comparison between groups, the chi-square test and the proportions test with a significance level of 5% ($p < .05$) were conducted. Most individuals were considered aesthetically acceptable. In aesthetically displeasing individuals, the nose and chin were the structures that most impacted their faces. When compared to Caucasian, Japanese-Brazilians had a greater protrusion of the upper and lower lip. The facial convexity was lower in Japanese-Brazilians. The excess of the lower third of the average third of the face was higher in caucasian Brazilians.

KEY-WORDS:

Orthodontics. Facial. Aesthetics.

INTRODUÇÃO

A análise facial tem sido um recurso diagnóstico valorizado desde os primórdios da ortodontia. Vários autores (Angle, 1907; Cox & Van der Linden, 1971; Wuerpel, 1937) tentaram estabelecer padrões de normalidade na direção das quais os pacientes ortodônticos deveriam ser tratados. Essa preocupação da ortodontia está em concordância com a expectativa do paciente, cuja principal motivação, na maioria dos casos, para o tratamento ortodôntico é a melhora estética. O diagnóstico em ortodontia baseia-se na análise facial, oclusal, de modelos e cefalométrica. A análise facial deve ser feita levando-se em conta a observação da morfologia da face do paciente, assim podemos notar a existência ou não de assimetrias, de selamento labial, compressão labial e discrepâncias entre as bases ósseas.

Capelozza Filho (2004) estabeleceu que o ortodontista deve estar atento aos conceitos de beleza facial e às predileções vigentes, para que as ações técnicas no terço inferior da face e no sorriso respeitem os critérios técnicos e as limitações que contribuem, dentro do possível, para a satisfação do paciente. Para isso, este autor desenvolveu um sistema de classificação baseado na morfologia facial. Os indivíduos podem ser classificados como padrão I, II, III, face longa ou face curta. Nesta classificação, o padrão I é identificado pela normalidade facial, a má oclusão quando presente é apenas dentária não associada a qualquer discrepância esquelética sagital ou vertical. Os padrões II e III são caracterizados pela presença de degrau sagital respectivamente positivo e negativo entre a maxila e a mandíbula. Nos padrões face longa e curta, a discrepância é vertical.

Segundo Reis et al. (2006a), a análise facial subjetiva permite o estudo da avaliação estética realizada rotineiramente pela sociedade. Por meio dessa análise, classificamos os indivíduos, de acordo com a agradabilidade estética, em esteticamente agradável (notas de 7 a 9), esteticamente aceitável (notas de 4 a 6) e esteticamente desagradável (notas de 1 a 3). A diversidade étnica e consequentemente a variedade de características faciais é muito frequente na nossa especialidade, e a necessidade de estudar a individualidade de cada grupo étnico se faz cada dia mais relevante. Esta análise foi considerada ainda importante por Rehme et al. (2014) que realizaram uma revisão sistemática de artigos publicados entre 1960 e 2010 e reafirmaram sobre a importância da mesma no diagnóstico ortodôntico, principalmente pelos fatores psicológico e social envolvidos.

Xantoderma é uma classificação que se refere originalmente apenas à cor da pele, sendo esta amarela. Porém, em ortodontia, os xantodermas são indivíduos oriundos de países do leste da Ásia, principalmente Japão, China e Coreia (Santos et al., 2010).

O objetivo deste trabalho foi avaliar indivíduos nipo-brasileiros segundo a agradabilidade facial e, nos nipo-brasileiros considerados agradáveis, realizar uma análise facial numérica do perfil.

ANÁLISE FACIAL SUBJETIVA E NUMÉRICA

Wuerpel (1937), estudando o equilíbrio e a harmonia facial, enfatizou a importância de uma abordagem individualizada em relação aos aspectos faciais do paciente. Portanto, a face humana deve ser estudada com muito critério sob todos os ângulos, e o ortodontista deve fazer o possível para em primeiro lugar, favorecer o aspecto facial do paciente, em segundo, preservar as características étnicas e, por último, obter sua satisfação profissional.

A análise do perfil tegumentar em telerradiografias laterais onde o tecido mole é medido diretamente na telerradiografia foi proposta por Burstone (1958). A amostra tinha 40 adultos jovens, com faces agradáveis, selecionados por três artistas do Instituto Herron de Artes, em Indianápolis (EUA). O autor observou que as faces agradáveis possuíam medidas que variavam em um desvio padrão. No entanto, se todas as medidas tivessem uma variação uniforme, o perfil facial ainda seria harmonioso.

No ano de 1996, Suguino et al., por meio de revisão de literatura, determinaram alguns parâmetros para análise facial. Esses devem ser avaliados na posição natural da cabeça, na qual o indivíduo é instruído a se sentar em posição ereta, olhando para frente, na linha do horizonte. Na vista frontal a face deve ser examinada para avaliação da simetria direita e esquerda, traçando-se uma linha vertical verdadeira (plano sagital mediano), dividindo-se a face em duas partes semelhantes. Também na vista frontal são avaliados a proporção dos terços faciais, a largura nasal, a posição dos lábios, o comprimento e grau de exposição dos incisivos. Na visão de perfil são avaliados a convexidade facial, espessura do lábio superior e do lábio inferior, ângulo nasolabial, projeção nasal, linha queixo pescoço, sulco mento-labial e a posição do mento.

CARACTERÍSTICAS FACIAIS E CEFALOMÉTRICAS DE XANTODERMAS

Engel e Spolter (1981) realizaram um estudo longitudinal com o intuito de obter valores de normalidade para os indivíduos Japoneses. A amostra foi constituída por 72 indivíduos japoneses, com idade entre 6 a 18 anos, não apresentando tratamento ortodôntico anterior e os indivíduos da amostra não tiveram nenhum critério de seleção relacionado à presença de oclusão normal, porém, nenhum indivíduo apresentava maloclusões severas. Os valores de 50 medidas foram obtidos nos 72 indivíduos da amostra, sendo mensuradas aos 8, 12 e 16 anos, com o intuito de observar o crescimento, desenvolvimento e valores de normalidade dependendo da idade. Os valores foram obtidos e analisados, obtendo os valores de normalidade para cada medida pesquisada dos indivíduos Japoneses. Desta forma, puderam comparar com os valores de normalidade em caucasianos e foram observadas algumas diferenças entre as raças. Uma das descobertas mais marcantes foi que os japoneses apresentaram uma maior protrusão dentária em comparação aos caucasianos. Os resultados também comprovaram um maior padrão de crescimento vertical presente nos Japoneses. Os Japoneses apresentaram comprimento facial maior, comprimento

mandibular maior, largura e comprimento do nariz maior em relação aos caucasianos. Uma última comparação se encontrou na vista frontal, no sentido latero-lateral, onde os Japoneses apresentaram uma maior largura da face.

Scavone Júnior et al. (2006) analisaram fotografias de Nipo-Brasileiros com oclusão normal e faces equilibradas com o objetivo de estabelecer normas para análise de perfil de Nipo-Brasileiros e compará-los com os leucodermas americanos. Foi constatado que os Nipo-Brasileiros apresentam a glabella posicionada mais anteriormente, menor projeção nasal e lábios mais protruídos e ângulo naso labial mais obtuso (isso pode ser devido a uma base do nariz mais superiormente inclinada). Os valores normativos obtidos para Nipo-Brasileiros não devem ser estritamente interpretados como regras ou objetivos do tratamento, mas, sim, como guias ou bases para comparação. Considerando, além de valores normativos para étnica, as opiniões dos pacientes Japoneses e suas percepções de beleza para estabelecer planos de tratamento individualizados.

Bronfman et al. (2014) compararam cefalometrias de jovens leucodermas (40 indivíduos), xantodermas (31 indivíduos) e Nipo-Brasileiros (32 indivíduos) com oclusão normal e bom perfil facial. Com relação aos incisivos superiores e inferiores foi constatado que esses se apresentaram mais protruídos e inclinados na amostra xantoderma e de Nipo-Brasileiros (em menor grau) quando comparadas aos leucodermas. Também observou-se através da análise da profundidade facial (PoOr.NPog), que indivíduos xantodermas possuem o mento mais retruído que os leucodermas e estes mais retruídos que os mestiços. Ao que compete as relações estéticas, foi verificado que o lábio inferior do grupo xantoderma e de nipo-brasileiros estava mais protruído que o do grupo de leucodermas.

MATERIAIS E MÉTODO

Caracteriza-se como um estudo transversal com abordagem quali-quantitativa. Esta pesquisa foi autorizada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Pesquisas Odontológicas São Leopoldo Mandic sob o número 838.545 em 29/09/2014.

Todos os participantes da amostra assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que explicou os objetivos e procedimentos a serem utilizados na pesquisa bem como autorização das imagens em trabalhos científicos.

AMOSTRA

A amostra foi constituída por 82 indivíduos Nipo-Brasileiros (xantodermas), 40 homens e 42 mulheres obtida através de fotografias realizadas nas cidades de Maringá-PR e São Paulo-SP. Os indivíduos participantes da amostra apresentavam idade variando entre 18 e 35 anos.

Os critérios de inclusão utilizados foram: homens e mulheres com idade entre 18 e 35 anos, Nipo-Brasileiros, com presença de um adequado equilíbrio muscular facial (representado pelo selamento labial passivo, ausência de tratamento ortodôntico ou cirurgia facial prévia) e pretensamente padrão I.

INSTRUMENTOS

Para a obtenção das fotografias da face dos participantes desta pesquisa foram necessários uma máquina Nikon Coolpix D80 (Nikon, Tokyo, Japão), lente 18-105 mm (Nikon, Tokyo, Japão), cadeira fixa, e tripé (Líder, Belo Horizonte, Brasil).

PROCEDIMENTOS

Foram tiradas fotografias da face em norma lateral. Na padronização das mesmas foi utilizada uma cadeira fixa para o posicionamento do paciente. A câmera fotográfica foi apoiada em um tripé com regulagem de altura e inclinação a 1.8 m de distância. A variação de altura de um indivíduo ao outro causado pelo uso da cadeira fixa foi ajustado com a regulagem do tripé, mantendo sempre o plano bipupilar paralelo ao solo. A altura sofreu um ajuste que variou de 1.1 a 1.5 m.

Imagens de perfil facial direito foram obtidas para cada indivíduo, posicionado lateralmente olhando para o espelho a sua frente, sentado em uma cadeira, orientado a permanecer na PNC (posição natural da cabeça), com os dentes em oclusão e com os lábios relaxados.

FIGURA 1. Pacientes posicionados em PNC.

MÉTODO DE CLASSIFICAÇÃO DAS IMAGENS PELA ANÁLISE SUBJETIVA DA FACE

A classificação das fotos seguiu o padrão descrito por Reis et al. (2006a). A amostra foi avaliada por um total de 35 examinadores que foram separados em cinco grupos: OL– ortodontistas leucodermas, OX– ortodontistas xantodermas, LL– leigos leucodermas, LX– leigos xantodermas e CBM– cirurgiões buco-maxilo-facial (leucodermas, 1 Nipo-Brasileiro).

Foi solicitado, aos avaliadores que, após avaliarem as fotos por 30 segundos, atribuísem notas de 1 a 9 ao perfil de acordo com os seguintes critérios: (a) notas 7, 8, 9: esteticamente agra-

dável; (b) notas 4, 5, 6: esteticamente aceitável; e (c) notas 1, 2, 3: esteticamente desagradável. Nas fotografias com notas de 1 a 3, deveriam mencionar o fator que os desagradava no perfil.

ANÁLISE FACIAL NUMÉRICA DO PERFIL

Nos indivíduos classificados como esteticamente agradáveis foram feitas demarcação de pontos tegumentares e realizada uma análise facial numérica do perfil, utilizando as seguintes grandezas: (a) ângulo nasolabial (Cm.Sn.Ls) – ângulo formado pela base do nariz e pelo lábio superior; (b) ângulo do sulco mentolabial (Li.Lm.Pg') – ângulo formado entre o lábio inferior e a projeção anterior do mento; (c) ângulo interlabial (Sn.Ls.Li.Lm) – ângulo formado entre os lábios superior e inferior e que determina o grau de protrusão labial; (d) ângulo de convexidade facial total (G.Pr.Pg') – ângulo formado pela intersecção das linhas glabella-ponta do nariz e ponta do nariz-pogônio tecido mole; (e) ângulo do terço inferior da face (Sn.Gn'.C) – ângulo formado entre as linhas subnasal-gnátio mole e gnátio-tecido mole cervical; (f) ângulo da convexidade facial (G.Sn.Pg') – suplemento do ângulo formado pela intersecção das linhas glabella-subnasal e subnasal-pogônio tecido mole; (g) proporção entre a altura facial anterior média e a altura facial anterior inferior (AFAM/AFAI) – proporção entre as distâncias glabella-subnasal e subnasal-mentoniano mole, projetadas na linha vertical verdadeira; e (h) proporção do terço inferior da face – proporção entre as distâncias subnasal-estômio e estômio-mentoniano mole projetadas na linha vertical verdadeira.

FIGURA 2. Análise Facial Numérica do Perfil

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os dados foram descritos por meio de tabelas e gráficos utilizando-se de frequência absoluta (n) e relativa (%).

Para verificar a concordância dentro de cada categoria de examinador foi utilizado o coeficiente de concordância de Kendall.

Para comparação entre as cinco categorias de examinadores quanto à classificação em cada grau de agradabilidade foi utilizado o teste do qui-quadrado e o teste de proporções.

No que diz respeito a comparação entre análise facial numérica dos leucodermas e xantodermas foi utilizado o teste t de Student para cada variável. Em todos os testes foi adotado nível de significância de 5% ($p < .05$).

Todos os procedimentos estatísticos foram executados no programa Statistic versão 12 (StatSoft Inc., Tulsa, EUA).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A face humana deve ser estudada com muito critério sob todos os ângulos, e o ortodontista deve fazer o possível para favorecer o aspecto facial do paciente, preserva-lhes as características étnicas e obter sua satisfação profissional (Bronfman et al., 2014; Capellozza Filho, 2004; Denize et al., 2014; Reche et al., 2002; Wuerpel, 1937).

O quadro 1 mostra que houve concordância na percepção dos ortodontistas leucodermas (OL), ortodontistas xantodermas (OX), leigos leucodermas (LL), leigos xantodermas (LX) e cirurgiões-buco-maxilo-faciais (CBM).

QUADRO 1. Coeficiente de concordância de Kendall (W) entre os examinadores dentro de cada categoria (Concordância inter-examinadores).

CATEGORIA	W	P
OL	0.29	p < .001*
OX	0.26	p < .001*
LL	0.22	p < .001*
LX	0.13	p < .001*
CBM	0.26	p < .001*

No presente trabalho, dos 82 indivíduos da pesquisa, 65% foram classificados como esteticamente aceitáveis, 21% como esteticamente desagradáveis e 14% como esteticamente agradáveis, considerando todos os avaliadores, já na avaliação dos leigos xantodermas, 86.6% dos indivíduos foram considerados esteticamente aceitáveis, 8% desagradáveis e 5.4% agradáveis, estes resultados obtidos são semelhantes aos resultados obtidos no trabalho feito por Reis et al. (2006a), onde 89% dos indivíduos leucodermas foram considerados esteticamente aceitáveis, 8% desagradáveis e 3% agradáveis.

GRÁFICO 1. Classificação total da amostra por todos os avaliadores

Os cirurgiões buco-maxilo-faciais foram os mais rigorosos na avaliação, quando comparados aos outros avaliadores, 32.3% dos pacientes foram considerados desagradáveis. Este resultado já era esperado, pois os cirurgiões avaliam os pacientes pela perspectiva de resultado que sua especialidade pode oferecer, possibilitando através da cirurgia ortognática que o paciente mude de padrão facial. Isto foi confirmado pelos ortodontistas xantodermas, que são influenciados também pela possibilidade de tratamento e foi a segunda categoria a encontrar mais pacientes desagradáveis, 29.5% dos indivíduos (QUADRO 2). Nos trabalhos de Almeida et al. (2013) e Ferrari Junior et al. (2015), os cirurgiões envolvidos com o tratamento de fissurados foram os menos rigorosos, seguidos dos leigos e dos cirurgiões sem experiência em tratamento de fissurados. Neste trabalho, os leigos xantodermas foram os menos rigorosos na avaliação, sendo que 8.0% dos pacientes foram considerados desagradáveis.

QUADRO 2. Comparação entre as classificações de cada categoria de examinador

CATEGORIA	DESAGRADÁVEL	ACEITÁVEL	AGRADÁVEL
OL	13.3% ^a	69.7% ^a	17% ^{ac}
OX	29.5% ^b	48.5% ^b	22% ^a
LL	21.3% ^c	62.9% ^c	15.8% ^{ac}
LX	8% ^d	86.6% ^d	5.4% ^b
CBM	32.3% ^b	55.5% ^{bc}	12.2% ^c
p	< .001*	< .001*	< .001*

É importante salientar que, neste trabalho, a face esteticamente agradável foi restrita a poucos indivíduos da amostra – 14%. Este resultado também foi obtido no trabalho feito com leucodermas por Reis et al. (2006a), onde indivíduos esteticamente agradáveis foram a minoria, 3% da amostra. Somente indivíduos do gênero feminino foram considerados esteticamente agradáveis, concordando com o trabalho de Reis et al. (2006a).

FIGURA 3. Pacientes considerados agradáveis pela maioria dos avaliadores.

A pesquisa procurou identificar as estruturas faciais associadas à aparência estética desagradável estimulando os avaliadores a justificarem quando o indivíduo era classificado como desagradável. O queixo e o nariz foram as estruturas que mais contribuíram para que os indivíduos fossem considerados desagradáveis, concordando com os resultados obtidos com o estudo realizado em leucodermas por Reis et al. (2006a).

Nos indivíduos classificados como esteticamente desagradáveis, o tratamento deve ter como objetivo oferecer a estes a possibilidade de um incremento estético na pirâmide de agradabilidade, sendo muitas das vezes indicada cirurgia ortognática (Capelozza Filho, 2004; Reis et al., 2006a).

Os pacientes esteticamente aceitáveis são a maioria e o plano de tratamento dos mesmos devem ser feitos com a premissa de melhora da estética.

Para o ângulo nasolabial o valor médio obtido por Reis et al. (2006) foi de 108.13°, valor semelhante ao valor encontrado neste trabalho, que foi de 107.33° (QUADRO 3). Este valor sugere uma maior protrusão labial superior, quando comparado ao padrão de normalidade Norte-Americano, que é de 112°, resultado também encontrado nos trabalhos de Miyajima e Tizuka (1996) e Shindoi et al. (2013).

Para o ângulo do sulco mentolabial o valor médio obtido por Reis et al. (2006b) foi de 132.37°; no presente trabalho, o valor médio obtido foi de 133.67°. Este valor foi significativamente maior que os 124° sugeridos como padrão para leucodermas, indicando uma menor projeção do lábio inferior ou do mento para xantodermas portadores de equilíbrio facial (QUADRO 3).

QUADRO 3. Valores obtidos da análise facial numérica do perfil de xantodermas.
Média dos valores de xantodermas.

	ÂNGULO NASO-LABIAL	ÂNGULO DO SULCO MENTOLABIAL	ÂNGULO INTERLABIAL	ÂNGULO DA CONVEX. FACIAL	ÂNGULO DA CONVEX. FACIAL TOTAL	ÂNGULO DO TERÇO INFERIOR DA FACE	AFAM/AFAI	PROPORÇÃO DO TERÇO INFERIOR DA FACE
Indivíduo 1	106°	143°	126°	7°	149°	102°	1.06	0.51
Indivíduo 42	111°	128°	124°	6°	153°	96°	1.12	0.48
Indivíduo 55	105°	130°	104°	8°	151°	102°	1.25	0.42
Média dos Xantodermas	107.33°	133.67°	118°	7°	151°	100°	1.14	0.47
DP dos Xantodermas	3.21	8.14	12.17	1.00	2.00	3.46	0.10	0.05

Para o ângulo interlabial, o valor médio obtido por Reis et al. (2006b) foi de 135.35° enquanto no nosso trabalho o valor médio foi de 118°. Este valor sugere uma maior protrusão dos lábios superior e inferior dos xantodermas em relação aos leucodermas padrão I, resultado também encontrado nos trabalhos de Okuyama e Martins (1997) e Miyajima e Tizuka (1996).

O ângulo da convexidade facial apresentou média de 12.32° no trabalho feito por Reis et al. (2006b). Neste trabalho, o valor médio obtido foi de 7°, indicando uma menor convexidade do perfil dos xantodermas quando comparados aos leucodermas padrão I.

Para o ângulo de convexidade facial total, o valor médio obtido por Reis et al. (2006b) foi de 137.85°. Neste trabalho, o valor médio obtido foi de 151°, confirmando a menor convexidade dos indivíduos xantodermas.

O ângulo do terço inferior da face permite avaliar a protrusão do mento em relação ao terço médio da face. Para este ângulo, o valor médio obtido por Reis et al. (2006b) foi de 103.41°; no presente trabalho, o valor médio obtido foi de 100°, sugerindo uma maior protrusão do mento nos indivíduos xantodermas.

A proporção AFAM/AFAI permite comparar as alturas dos terços médio e inferior da face (QUADRO 3). É consenso na literatura ortodôntica que a harmonia e o equilíbrio do perfil facial estão associados a um comprimento semelhante desses terços, resultando em um valor de 1 ± 0.08 para essa proporção. Neste trabalho, o valor médio obtido foi de 1.14, demonstrando um equilíbrio do perfil facial. Já o valor obtido por Reis et al. (2006b) foi de 0.93, denotando uma tendência dos Brasileiros leucodermas apresentarem um excesso do terço inferior em relação ao terço médio da face.

A proporção do terço inferior da face avalia o comprimento do lábio superior em relação aos comprimentos somados do lábio inferior e do mento, sendo que o padrão de normalidade descrito na literatura é 0.5. A proporção do terço inferior da face foi 0.47, valor semelhante ao encontrado por Reis et al. (2006b) em leucodermas Brasileiros, que foi de 0.45.

A análise facial subjetiva como rotina na atividade clínica que a classificação estética do paciente é mais um instrumento diagnóstico, que tem sua importância aumentada por ser o parâmetro pelo qual o paciente e as pessoas com as quais ele convive vão avaliar os resultados do tratamento. Portanto, a análise do tecido mole facial deve ser elemento fundamental para o diagnóstico ortodôntico bem sucedido. O ideal seria adequar uma proposta de exame facial à cefalometria convencional, o que viria enriquecer a qualidade do diagnóstico e facilitar o plano de tratamento (Almeida et al., 2013; Ferrari Junior et al., 2015; Morihisa & Maltagliati, 2009; Reche et al., 2002; Reis et al., 2006b).

O presente trabalho trará auxílio para futuros planejamentos e tratamentos ortodônticos no que se refere a padrão facial e racial xantoderma. Irá criar uma amostra fidedigna de pacientes xantodermas padrão I para futuras pesquisas, estabelecendo características faciais e morfológicas de um grupo étnico que vem crescendo no Brasil.

CONCLUSÕES

A partir dos resultados deste estudo pôde-se concluir que a maioria dos avaliadores considerou os indivíduos aceitáveis, sendo que a avaliação dos leigos xantodermas encontrou a maior porcentagem de indivíduos esteticamente aceitáveis.

Nos pacientes esteticamente desagradáveis, o nariz, lábio e o queixo foram as estruturas que mais impactaram as notas.

Foi possível observar que a análise facial subjetiva é mais um instrumento auxiliar no diagnóstico. Este método valoriza o parâmetro pelo qual o paciente e as pessoas com as quais ele convive vão avaliar sua face pré e pós-tratamento.

Os valores médios dos indivíduos Nipo-Brasileiros (xantodermas) agradáveis foram: ângulo naso-labial de 107.33º, ângulo mento labial de 133.67º, ângulo interlabial de 118º, ângulo da convexidade facial de 7º, ângulo da convexidade total de 151º, ângulo do terço inferior da face de 100º, proporção AFAM/ AFAI de 1.14 e proporção do terço inferior da face de 0.47.

Quando comparados aos indivíduos leucodermas Brasileiros, os indivíduos xantodermas apresentaram ângulo nasolabial e mentolabial semelhantes, maior protrusão labial, e menor convexidade facial. O excesso do terço inferior em relação ao terço médio da face foi maior nos brasileiros leucodermas e a proporção do terço inferior da face foi semelhante.

REFERÊNCIAS

- Angle, E. H. (1907). *Treatment of malocclusion of the teeth. Angle's system* (7ª Ed.). Philadelphia: S. S. White.
- Almeida, A. M., Capellozza Filho, L., Ferrari Junior, F. M., Lauris, R. C. M. C. & Garib, D. G. (2013). Evaluation of facial esthetics in rehabilitated adults with complete unilateral cleft lip and palate: A comparison between professionals with and without experience in oral cleft rehabilitation. *IRSN Plastic Surgery*, 1(1), 1-7.
- Bronfman, C. N., Pinzan, A., Janson, G., Almeida, R. R. & Rocha, T. L. (2014). Padrão cefalométrico de Ricketts em Brasileiros leucodermas, xantodermas e mestiços. *Ortodontia*, 47(5), 421-431.
- Burstone, C. J. (1958). The integumental profile. *American Journal of Orthodontics*, 44(1), 1-25.
- Capellozza Filho, L. (2004). *Diagnóstico em ortodontia*. Maringá: Dental Press.
- Cox, N. H. & Van der Linden, F. P. (1971). Facial harmony. *American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics*, 60(2), 175-183.
- Denize, E. S., McDonald, F., Sherriff, M. & Naimi, F. B. (2014). Facial profile parameters and their relative influence on bilabial prominence and the perceptions of facial profile attractiveness: A novel approach. *Korean Journal of Orthodontics*, 44(4), 184-194.
- Engel, G., & Spolter, B.M. (1981). Cephalometric and visual norms for a Japanese population. *American Journal of Orthodontics*, 80(1), 48-60.
- Ferrari Junior, F. M., Ayub, P. V., Capellozza Filho, L., Lauris, J. R. P. & Garib, D. G. (2015). Esthetic evaluation of the facial profile in rehabilitated adults with complete bilateral cleft lip and palate. *Journal of Oral and Maxillofacial Surgery*, 73(169), 169.e1-169.e6.
- Miyajima, K., & Lizuka, T. (1996). Treatment mechanics in class III open bite malocclusion with tip edge technique. *American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics*, 110(1), 1-7.
- Morihisa, O., & Maltagliati, L. A. (2009). Avaliação comparativa entre agradabilidade facial e análise subjetiva do Padrão Facial. *Revista Dental Press de Ortodontia e Ortopedia Facial*, 14(6), 46.e1-46.e9.
- Okuyama, C. C., & Martins, D. R. (1997). Preferência do perfil facial tegumentar, em jovens leucodermas, melanodermas e xantodermas de ambos os sexos, avaliados por ortodontistas, leigos e artistas plásticos. *Ortodontia*, 30(1), 6-18.
- Reche, R., Colombo, V. R., Verona, J., Morisca, C. A., & Moro, A. (2002). Análise do perfil facial em fotografias padronizadas. *Revista Dental Press de Ortodontia e Ortopedia Facial*, 7(1), 37-45.
- Rehme, T. B. S., Baptista, J. M., Semaan, M. S., Valieri, S., & Jabra, J. J. H. (2014). Análise facial subjetiva e sua relação com o diagnóstico ortodôntico considerando a miscigenação racial no Brasil. *Ortho Science: Orthodontics Science and Practice*, 7(26), 226-228.
- Reis, S. A. B., Abrão, J., Capellozza Filho, L., & Claro, C. A. A. (2006). Análise facial subjetiva. *Revista Dental Press de Ortodontia e Ortopedia Facial*, 11(5), 159-172.
- Reis, S. A. B., Abrão, J., Capellozza Filho, L., & Claro, C. A. A. (2006). Análise facial numérica do perfil de Brasileiros padrão I. *Revista Dental Press de Ortodontia e Ortopedia Facial*, 11(6), 24-34.
- Santos, D. J. S., Palomares, N. B., Normando, D., & Quintão, C. C. A. (2010). Raça versus etnia: Diferenciar para melhor aplicar. *Dental Press Journal of Orthodontics*, 15(3), 121-124.
- Scavone Junior, H., Trevisan Junior, H., Garib, D. G., & Ferreira, F. V. (2006). Facial profile evaluation in Japanese-Brazilian adults with normal occlusions and well-balanced faces. *American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics*, 129(6), 721.e1-721.e5.
- Shindoi, J. M., Matsumoto, Y., Sato, Y., Ono, T., & Harada, K. (2013). Soft tissue cephalometric norms for orthognathic and cosmetic surgery. *Journal of Oral and Maxillofacial Surgery*, 71(1), e24-30.
- Suguino, R., Ramos, A. L., Terada, H. H., Furquim, L. F., Maeda, L., & Silva Filho, O. G. (1996). Análise facial. *Revista Dental Press de Ortodontia e Ortopedia Facial*, 1(1), 86-107.
- Wuerpel, E. H. (1937). On facial balance and harmony. *Angle Orthodontics*, 7(2), 81-89.