Morales, J., Ubasart, C., Solana-Tramunt, M., González, L. M., Fukuda, D., & Franchini, E. (2018). Effects of rapid weight loss on balance and reaction time in elite judo athletes. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 29, 1-21.

Oppliger, R. A., Case, H. S., Horswill, C. A., & Gregory, L. M. D. (1996). ACSM-position stand: Weight loss in wrestlers. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 28(6), 9-22.

Oppliger, R. A., Steen, S. A., & Scoot, J. R. (2003). Weight loss practices of college wrestlers. *International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism*, 13(1), 29-46.

Roemmich, J. N., & Sinning, W. E. (1997). Weight loss and wrestling training: Effects on nutrition, growth, maturation, body composition, and strength. *Journal of Applied Physiology*, 82(6), 1751-1759.

Saarni, S. E., Rissanen, A., Sarna, S., Koskenvuo, M., & Kaprio, J. (2006). Weight cycling of athletes and subsequent weight gain in middle age. *International Journal of Obesity*, 30(11), 1639-1644.

Suzuki, M., Nakaji, S., Umeda, T., Shimovama, T., Mochida, N., Kojima, A., ... Sugawara, K. (2003). Effects of weight reduction on neutrophil phagocytic activity and oxidative burst activity in female judoists. *Luminescence*, 18(4), 214-217.

Trexler, E. T., Smith-Ryan, A. E., & Norton, L. E. (2014). Metabolic adaptation to weight loss: Implications for the athlete. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 11(1), 1-7.

World Medical Association Declaration of Helsinki (1997). Recommendations guiding physicians in biomedical research involving human subjects. *Journal of the American Medical Association*, 277(11), 925-926.

AUTORES:

Bebiana Sabino ¹

Maria João Almeida ²

António Manuel Fonseca ¹

¹ Centro de Investigação, Formação, Inovação, e Intervenção em Desporto (CIFI2D), Faculdade de Desporto, Universidade do Porto, Portugal

² Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física, Universidade de Coimbra, Portugal

<https://doi.org/10.5628/RPCD.18.02.29>

Análise preliminar das propriedades psicométricas da versão portuguesa do questionário de atividade física PAQ-C em jovens em idade escolar

PLAVRAS CHAVE:

PAQ-C. Adaptação cultural.

Fiabilidade. Validade. Jovens.

SUBMISSÃO: 20 de Setembro de 2017

ACEITAÇÃO: 30 de Maio de 2018

RESUMO

O *Physical Activity Questionnaire for Older Children* (PAQ-C) é um instrumento de autor-retrato concebido para avaliar o nível de atividade física geral de jovens em idade escolar. Contudo, não existem evidências científicas quanto à validade deste instrumento na população portuguesa. Através de dois estudos com amostras independentes, a presente investigação procurou avaliar as propriedades psicométricas deste instrumento, nomeadamente a fiabilidade e a validade convergente, para medir os níveis de atividade física em jovens portugueses entre os 10 e os 15 anos. O questionário foi traduzido e adaptado para a língua e cultura portuguesas e, posteriormente, foi testada a fiabilidade (coeficiente de correlação intraclasse, alfa de Cronbach e correlação item – total da escala) e validade convergente (i.e., por comparação com o índice de massa corporal e VO_{2max} , através da correlação de Spearman) desta versão. Os resultados revelaram boa consistência interna e fiabilidade teste-reteste e moderada validade convergente com o VO_{2max} . As propriedades psicométricas aceitáveis tornam a versão portuguesa do PAQ-C mais uma opção para estudos de larga escala em jovens portugueses.

Autor para correspondência: Bebiana Sabino. Faculdade de Desporto, Universidade do Porto, Rua Dr. Plácido Costa, 91, 4200-450 Porto, Portugal. e-mail: bebianasabino7@hotmail.com

Preliminary analysis of the psychometric properties of the Portuguese version of the PAQ-C physical activity questionnaire in school-age youth

ABSTRACT

The Physical Activity Questionnaire for Older Children (PAQ-C) is an instrument that was tailored to assess the physical activity levels in older children. However, there aren't scientific indications about the validity of this instrument for Portuguese youth. Using independent samples in two studies, this research aimed to evaluate the psychometric proprieties of this instrument, in particular its reliability and convergent validity. The questionnaire was translated and adapted to the Portuguese language and culture. Reliability (intraclass coefficient correlation, Cronbach alpha and correlation item/scale) and convergent validity (i.e., by comparison with body mass index and VO_{2max}) were assessed. Results showed good internal consistency and test-retest reliability, and moderate convergent validity with VO_{2max} . The results suggested that the psychometric properties of the PAQ-C are acceptable, making it a valid instrument for large-scale studies in Portuguese youngsters.

KEYWORDS:

PAQ-C. Cultural adaptation.
Reliability. Validity. Youth.

INTRODUÇÃO

Segundo a Organização Mundial de Saúde, 3,2 milhões de pessoas morrem, por ano, devido a insuficientes níveis de atividade física (*World Health Organization*, 2015). Estes baixos níveis de atividade física, entre outros comportamentos não saudáveis, constituem fatores de risco para doenças cardiovasculares e metabólicas e determinantes de estados de excesso de peso e obesidade em idades pediátricas (Carson, Stone, & Faulkner, 2014; Janssen & LeBlanc, 2010). Em contraste, a integração dos jovens em práticas de atividade física é benéfica para a sua saúde, na medida em que a adoção deste comportamento durante a infância e a adolescência poderá significar a persistência do mesmo na idade adulta (Telama et al., 2005).

Contudo, apesar dos benefícios para a saúde descritos na literatura (Janssen & LeBlanc, 2010), os níveis de atividade física parecem ser insuficientes um pouco por todo o mundo (Cooper et al., 2015), e em Portugal somente 36% das crianças e 4% dos adolescentes cumprem as recomendações diárias para a prática de atividade física (Baptista et al., 2012). Neste sentido, a comunidade científica desenhou diferentes programas de intervenção com o intuito de manter e aumentar os níveis de atividade física e os comportamentos de saúde em crianças e adolescentes (Heath et al., 2012). De modo a avaliar a eficácia dessas intervenções, é essencial a utilização de instrumentos fiáveis e válidos para medir a atividade física. Acrescendo a esta necessidade, é essencial perceber que a atividade física é um comportamento complexo, tornando-se um desafio a seleção do instrumento mais adequado para a medição desta variável.

Pela sua objetividade, os métodos mais recomendados para avaliação da atividade física são os diretos (e.g., sensores de movimento, pedómetros, água duplamente marcada, monitores de frequência cardíaca e calometria indireta) que se caracterizam por medições objetivas de todas as componentes da atividade física (Vanhelst et al., 2012). No entanto, o seu elevado custo e a falta de exequibilidade em amostras de grande dimensão, leva a que a investigação nesta área de estudo utilize métodos indiretos, nomeadamente medidas de autorrelato como questionários, entrevistas e diários para a avaliação da atividade física (Petee, Storti, Ainsworth, & Kriska, 2008). Isto acontece porque estes métodos subjetivos permitem avaliar amostras de grande dimensão, a um baixo custo, sendo facilmente adaptados a diferentes idades e a necessidades particulares da população (Trost, 2007). Para além disso, contrariamente aos métodos objetivos, permitem inferir informação acerca da tipologia do comportamento, bem como do contexto em que ocorre (Chinapaw, Mokkink, van Poppel, van Mechelen, & Terwee, 2010).

Os métodos de autorrelato, particularmente os questionários, são assim utilizados com maior frequência para a avaliação dos níveis de atividade física em jovens (Petee et al., 2008; Trost, 2007). Importa, porém, sublinhar que os padrões de atividade física dos adultos, bem como as suas competências linguísticas e cognitivas, diferem muito das compe-

tências das crianças e adolescentes, devendo estas diferenças estar contempladas nas medidas de autorrelato (Corder, Ekelund, Steele, Wareham, & Brage, 2008). Nessa medida, devem incluir questões relacionadas com a frequência e participação nas aulas de educação física, transporte de e para a escola, atividades recreativas depois da escola e atividades realizadas durante o fim de semana (Montoye, Kemper, Saris, & Washburn, 1996).

Considerando estas características da atividade física dos jovens, o questionário *Physical Activity Questionnaire for Older Children* (PAQ-C), desenhado por Crocker, Bailey, Faulkner, Kowalski, e McGrath (1997), constitui um potencial instrumento válido e fiável (Crocker et al., 1997; Kowalski, Crocker, & Kowalski, 1997), desenvolvido com métodos apropriados e fácil de aplicar (Biddle, Gorely, Pearson, & Bull, 2011). Este questionário foi desenhado para avaliar a atividade física de intensidade moderada a vigorosa dos sete dias anteriores ao seu preenchimento, em jovens canadianos entre os 9 e os 15 anos de idade. Vários estudos avaliaram as suas propriedades psicométricas e classificaram-nas como aceitáveis (Crocker et al., 2010; Janz, Lutuchy, Wenthe, & Levy, 2008; Kowalski et al., 1997); adicionalmente, o PAQ-C já foi alvo de adaptação e validação em diferentes países (Bervoets et al., 2000; da Silva, 1998; Guedes & Guedes, 2015; Thomas, & Upton, 2014; Wang, Baranowski, Lau, Chen, & Pitkethly, 2016).

Decorrendo do exposto anteriormente, e considerando, por um lado, a importância da utilização de instrumentos válidos e fiáveis que sejam práticos, não evasivos e que não demorem muito tempo a ser preenchidos, e, por outro lado, a escassez de instrumentos de autorrelato validados para a população portuguesa nestas idades (Mota et al., 2002) - não obstante a possibilidade de limitação do nosso conhecimento sobre todos os estudos existentes, justifica a pertinência desta investigação - o objetivo da presente investigação foi avaliar a fiabilidade e a validade convergente do PAQ-C em jovens portugueses com idades entre os 10 e os 15 anos.

Este artigo está estruturado em dois estudos. Os dados do Estudo I provêm de um estudo piloto para validação do instrumento, sendo descritas as características do questionário, designadamente a distribuição e descrição estatística dos itens, a correlação item – total da escala e a fiabilidade. Os dados do Estudo II reportam-se a uma amostra independente do estudo 'Programa de Atividade Física e Nutrição para Adolescentes'¹ (PANPAs) e permitiram determinar a consistência interna e a validade convergente do PAQ-C com o índice de massa corporal (IMC) e a aptidão cardiorrespiratória. Importa referir que as

medidas utilizadas para avaliar a validade convergente no presente estudo também foram utilizadas na validação deste instrumento em outros países (Bervoets et al., 2014; Thomas & Upton, 2014; Wang et al., 2016).

ESTUDO 1

PARTICIPANTES

A amostra foi obtida através de um estudo piloto realizado em diferentes grupos comunitários de recreação/ animação e desportivos da região norte de Portugal. Não obstante 121 jovens terem inicialmente aceitado participar na investigação, dada a necessidade de administrar o questionário duas vezes, com o intervalo de uma semana, a amostra final ficou reduzida a 111 alunos (64 rapazes e 47 raparigas), com idades compreendidas entre os 10 e os 15 anos, que completaram todo o processo.

MEDIDAS

Physical Activity for Older Children (PAQ-C). Este questionário é composto por 10 itens, sendo nove utilizados para calcular o *score* de atividade física geral (média dos nove itens). Cada item é respondido numa escala tipo likert entre 1 e 5. Os valores mais elevados correspondem a níveis mais elevados de atividade física.

PROCEDIMENTOS

Adaptação cultural do PAQ-C

Considerando que o PAQ-C foi desenhado para a população canadiana e desenvolvido em língua inglesa, foi previamente necessário realizar-se a sua tradução e adaptação cultural. Este processo foi realizado de acordo com as recomendações metodológicas sugeridas por Beaton, Bombardier, Guillemin, e Ferraz (2000). Inicialmente, dois profissionais (um com conhecimentos na área das ciências do desporto) efetuaram a tradução do PAQ-C de inglês para português. Posteriormente, procedeu-se à confrontação das duas versões e ao desenvolvimento da versão portuguesa inicial. A retroversão da versão portuguesa para inglês foi preparada por um profissional nativo de língua inglesa que não tinha conhecimento da versão original do PAQ-C. Numa fase seguinte foram comparadas e debatidas as duas versões, e aprovada a versão final portuguesa por uma comissão constituída pelos tradutores e equipa de investigação.

Comparativamente à versão original foram efetuadas algumas adaptações no sentido de manter os constructos definidos na versão original; mais especificamente, foram efetuadas alterações em três dos 10 itens da versão original. A primeira questão corresponde a uma lista de 17 atividades (desportos, atividades de lazer/ recreação e domésticas ou jogos), incluindo ainda dois espaços para outras atividades, sendo respondida numa escala

¹ O PANPAs é um programa de intervenção escolar de promoção de atividade física e hábitos alimentares saudáveis, e consequentemente, de combate ao excesso de peso e obesidade em crianças e adolescentes. Este programa de intervenção multinível, com 16 meses de duração, contempla quatro componentes de intervenção: (a) recreio (reabilitação de espaços, dinamização de atividade física); (b) dinamização de atividades físicas organizadas; (c) educacional (distribuição de material impresso, atividades pedagógicas, palestras) e; (d) formação (distribuição de material didático e ações de formação para docentes).

tipo Likert de 5 pontos (1 = “Não”; 5 = “7 ou mais vezes”) acerca dos últimos sete dias. Nesta questão foram excluídos desportos que não correspondessem à realidade portuguesa. Nas questões 2 a 7 são medidos os níveis de atividade física nas aulas de educação física, intervalos escolares e de almoço, desporto dentro e fora da escola e desporto durante o fim de semana. Para adaptar o questionário ao contexto cultural português, as questões 5 e 6 foram modificadas. O item 5, que se referia à atividade física praticada ‘*right after school*’ (i.e., imediatamente após a escola), foi alterado para: “Nos últimos sete dias, em quantos dias, *dentro da escola*, praticaste desporto ou fizeste atividades em que foste muito ativo/a (tirando a educação física)?”. Adicionalmente, o item 6, que avaliava a atividade física praticada ao fim da tarde/ noite (i.e., *evenings*) foi modificado para: “Nos últimos sete dias, em quantos dias, fora da escola, praticaste desporto ou fizeste atividades em que foste muito ativo/ a?”. A questão 8 (oito) refere-se à afirmação que melhor descreve os últimos sete dias. A última questão (9) questiona acerca da frequência de atividade física durante cada um dos últimos sete dias.

RECOLHA DE DADOS

Os participantes foram convidados a participar no estudo após autorização dos respetivos encarregados de educação. Os encarregados de educação receberam uma carta com informação garantindo a confidencialidade e o anonimato dos resultados do seu educando. Antes dos participantes iniciarem o preenchimento do questionário, o investigador responsável fornecia as instruções e disponibilizava-se para esclarecer quaisquer dúvidas que decorressem deste processo. O preenchimento do PAQ-C demorou aproximadamente 20 minutos, após o que foram efetuadas as medidas antropométricas (peso e altura).

ANÁLISE DE DADOS

Para a análise dos dados recorreu-se à estatística descritiva (i.e., média, desvio-padrão e amplitude), ao teste não paramétrico de Mann-Whitney para analisar diferenças entre os sexos, ao coeficiente de correlação intraclasse (CCI) para testar a fiabilidade teste-reteste, ao coeficiente da correlação de Spearman para avaliar a estabilidade, ao alfa (α) de Cronbach para avaliar a consistência interna, e à correlação item - total da escala (CIT) para testar a relação item – total da escala. Todas as análises foram realizadas no programa SPSS, versão 22. O nível de significância foi estabelecido em 5%.

RESULTADOS

Análise comparativa em função do sexo

Num primeiro momento, com o objetivo de examinar as características dos participantes do estudo, procurámos analisar a existência de diferenças, nas variáveis em estudo, entre rapazes e raparigas.

Como se pode verificar no quadro 1, os rapazes reportaram níveis superiores de atividade física, quando comparados com as raparigas. Deste modo, como se verificaram diferenças entre sexos na variável central em estudo e, como o objetivo da presente investigação é examinar a fiabilidade e validade de um instrumento que mensura esta variável, todos os processos para a sua consecução devem confirmar a aplicabilidade do instrumento em ambos os sexos.

QUADRO 1. Variáveis envolvidas no estudo: análise em função do sexo ($N = 111$)

	RAPAZES ($n= 64$)	RAPARIGAS ($n= 47$)	MANN WHITNEY U (p)
IDADE	12.19 $\pm$ 1.68	12.17 $\pm$ 1.61	1731.0 (.965)
SCORE DO PAQ-C	2.89 $\pm$ 0.60	2.53 $\pm$ 0.51	909.0 (.000)

Avaliação da estabilidade e consistência interna do questionário

No que respeita à fiabilidade teste-reteste, os valores do CCI para o *score* final de atividade física foram .85 (95% IC: .79 – .90) para a totalidade da amostra e .86 e .84 para rapazes e raparigas, respetivamente (VER QUADRO 2). A pergunta relativa à lista de atividades físicas praticadas durante o ‘tempo livre’ apresentou a fiabilidade teste-reteste mais baixa (CCI = .44). Por sua vez, as questões acerca dos ‘intervalos das aulas’ e da ‘hora de almoço’ mostraram a estabilidade mais elevada (CCI = .92). O coeficiente de correlação de Spearman mostrou que as correlações entre os dois momentos eram positivas e estatisticamente significativas em todos os itens ($r = .35 - .87$; $p < .01$). Por último, o valor do alfa de Cronbach foi .69 (raparigas $_{\alpha} = .62$; rapazes $_{\alpha} = .71$).

QUADRO 2. Fiabilidade teste-reteste* do PAQ-C ($N = 111$).

	TOTAL	RAPAZES	RAPARIGAS
SCORE DO PAQ-C	.85	.86	.84
LISTA	.44	.55	.40
EDUCAÇÃO FÍSICA	.79	.85	.69
INTERVALO DAS AULAS	.92	.92	.90
ALMOÇO	.92	.94	.89
DENTRO DA ESCOLA	.80	.79	.83
FORA DA ESCOLA	.81	.70	.85
FIM-DE-SEMANA	.68	.66	.72
DESCRIÇÃO	.74	.75	.70
FREQÜÊNCIA SEMANAL	.71	.77	.67

* Coeficiente de correlação intraclasse

Distribuição dos itens do PAQ-C

As estatísticas descritivas dos diferentes itens que constituem o PAQ-C são exibidas no quadro 3. Recorde-se que, para cada item, a amplitude pode variar entre 1 e 5, correspondendo os valores mais elevados a níveis mais elevados de atividade física. Neste estudo, a maioria dos itens apresentou uma média próxima do centro da amplitude do *score* e uma variabilidade adequada. Apenas os itens relativos ao 'almoço' e ao 'fim de semana' apresentaram valores inferiores; todavia, não obstante estes valores se encontrarem abaixo do esperado, apresentaram ainda assim uma variância adequada. A 'aula de educação física' foi o item com a média mais elevada, mas com uma variância adequada. A lista de atividades físicas relativas ao 'tempo livre' apresentou a média e variância mais baixas de todos os itens. Importa ressaltar que este item assume uma elevada importância, uma vez que permite ao aluno recordar-se das atividades que realizou na última semana. Numa análise por sexo, verificou-se a existência de diferenças estatisticamente significativas nos itens 'educação física', 'intervalo das aulas', 'fora da escola', 'fim de semana' e 'frequência semanal', apresentando os rapazes valores médios superiores. Finalmente, a análise da relação entre o item e o total de itens que compõem a escala mostrou que, com exceção de um item correspondente às atividades 'fora da escola' (.15), todos os itens obtiveram uma CIT superior a .20.

QUADRO 3. Estatísticas descritivas e correlação item - total escala do PAQ-C no Estudo I (N = 111).

ITEM	ESTUDO I			
	AMPLITUDE	MÉDIA	DP	CIT
LISTA	1-1.83	1.23	0.14	.34
EDUCAÇÃO FÍSICA	1-5	3.60	0.97	.22
INTERVALO DE AULAS	1-5	2.73	1.13	.42
ALMOÇO	1-5	2.51	1.19	.38
DENTRO DA ESCOLA	1-5	2.67	1.10	.37
FORA DA ESCOLA	1-5	2.74	1.10	.15
FIM-DE-SEMANA	1-5	2.00	0.73	.51
DESCRIÇÃO	1-5	2.78	1.04	.58
FREQUÊNCIA SEMANAL	1.14-4.86	2.88	0.73	.63
SCORE PAQ-C	1.5-4.64	2.74	0.53	

DP – desvio-padrão; CIT – correlação item-escala

De um modo geral, neste estudo, o instrumento PAQ-C, evidenciou uma boa consistência interna e uma boa fiabilidade teste-reteste.

ESTUDO 2

PARTICIPANTES

No Estudo II recorreu-se a uma subamostra do PANPAs, composta por 981 alunos (558 rapazes e 423 raparigas), com idades compreendidas entre os 10 e os 15 anos, provenientes de quatro escolas públicas da Região Autónoma da Madeira (QUADRO 4).

QUADRO 4. Variáveis envolvidas no estudo: análise em função do sexo (N = 981).

	RAPAZES (n = 583)	RAPARIGAS (n = 436)	MANN-WHITNEY U (p)
IDADE	11.68 ± 1.48	11.55 ± 1.41	117692.0 (.215)
ÍNDICE DE MASSA CORPORAL	20.16 ± 3.96	20.27 ± 3.93	120188.0 (.591)
APTIDÃO CARDIORRESPIRATÓRIA	43.13 ± 3.97	41.08 ± 3.22	78674.5 (.000)
SCORE DO PAQ-C	2.85 ± 0.77	2.27 ± 0.56	67664.5 (.000)

MEDIDAS

Aptidão Cardiorrespiratória

Para avaliação da aptidão cardiorrespiratória recorreu-se ao teste motor do vaivém (20 m) da bateria de testes motores do FITNESSGRAM (The Cooper Institute, 2007). Este teste requer que os participantes percorram um trajeto de 20 m, obedecendo a uma cadência sonora. A velocidade inicial é de 8.5 km/h, aumentando 0.5 km/h a cada minuto, sendo que no minuto 20 corresponde a 18 km/h. O teste termina quando os sujeitos falharem duas vezes o sinal sonoro, não concluindo o percurso. O número de percursos permite calcular o $\text{VO}_2\text{máx}$ de cada participante, através da fórmula de Leger, Mercier, Gadoury, e Lambert (1988). Boreham, Paliczka, e Nichols (1990) demonstraram a capacidade deste teste prever a aptidão cardiorrespiratória em crianças e adolescentes.

Índice de Massa Corporal

O índice de massa corporal foi calculado com base na altura e no peso [peso (kg)/ altura² (m)]. O peso e altura foram avaliados com os participantes sem sapatos e de t-shirt e calções. Cada participante foi avaliado duas vezes, sendo realizada uma terceira avaliação sempre que o limite de tolerância (altura, 2mm e peso, 0.5kg) não fosse respeitado. Para a avaliação da altura foi utilizado um antropómetro de Martin e respetiva base de fixação e, para o peso, a balança com aproximação de valores até 0.5kg.

PROCEDIMENTOS

Recolha de dados

Os encarregados de educação dos alunos foram contactados através das escolas que aceitaram participar no estudo. As autorizações para a participação no estudo, bem como o

processo de aplicação do instrumento, foram idênticos aos descritos no Estudo I. As medidas antropométricas e a aptidão cardiorrespiratória foram avaliadas durante a aula de educação física.

Análise de dados

Para além dos procedimentos estatísticos descritos no estudo I, o coeficiente da correlação de Spearman foi também utilizada para avaliar a validade convergente, testando a relação do PAQ-C com o IMC e com a aptidão cardiorrespiratória.

RESULTADOS

Análise comparativa em função do sexo

Inicialmente, tal como no Estudo I, começamos por comparar os sexos relativamente às variáveis em estudo com o objetivo de caracterizar a amostra do estudo.

Como se pode verificar no quadro 4, os rapazes apresentaram uma aptidão cardiorrespiratória superior às raparigas, reportando também níveis superiores de atividade física.

Consistência interna do PAQ-C

O valor do alfa de Cronbach foi .79, sendo inferior nas raparigas ($\alpha = .67$) comparativamente aos rapazes ($\alpha = .79$).

Distribuição dos itens do PAQ-C

Os itens 'almoço', 'fim-de-semana', 'intervalo das aulas', 'fora da escola' e 'descrição' apresentaram uma média inferior ao centro da amplitude do *score* do PAQ-C, mas demonstraram variâncias adequadas. Numa análise por sexo, verificaram-se diferenças estatisticamente significativas em todos os itens do questionário, tendo os rapazes apresentado valores médios superiores aos das raparigas. Os valores de CIT, correspondentes ao estudo II, que são apresentados no quadro 5, sugerem que as propriedades item/ total da escala do PAQ-C são aceitáveis para esta população.

QUADRO 5. Estatísticas descritivas e correlação item - total da escala do PAQ-C no Estudo II (N = 981).

ITEM	ESTUDO II			
	AMPLITUDE	MÉDIA	DP	CIT
LISTA	1.56-4.44	1.92	0.39	.40
EDUCAÇÃO FÍSICA	1-5	3.84	0.94	.35
INTERVALO DE AULAS	1-5	2.25	1.28	.43
ALMOÇO	1-5	2.28	1.29	.42
DENTRO DA ESCOLA	1-5	2.35	1.21	.53
FORA DA ESCOLA	1-5	2.49	1.27	.55
FIM-DE-SEMANA	1-5	2.41	1.17	.54
DESCRIÇÃO	1-5	2.41	1.22	.53
FREQUÊNCIA SEMANAL	1-5	2.75	0.98	.62
SCORE PAQ-C	1-5	2.60	0.74	

DP – desvio-padrão; CIT – correlação item-escala

Validade convergente

A avaliação da validade convergente foi efetuada através da correlação do *score* de atividade física do PAQ-C com o IMC e a aptidão cardiorrespiratória. O *score* de atividade física do PAQ-C estava inversamente correlacionado com o IMC ($r = -.13$; $p < .01$) e positivamente relacionado com a aptidão cardiorrespiratória ($r = .34$; $p < .01$). a análise por sexo revelou que a correlação entre o PAQ-C e a aptidão cardiorrespiratória se mantinha significativa (rapazes: $r = .26$, $p < .01$; raparigas: $r = .23$, $p < .01$). A relação do *score* do PAQ-C com o IMC só se mostrou significativa para os rapazes ($r = -.17$; $p < .01$).

Assim, de uma forma geral, este estudo demonstrou que a versão portuguesa do PAQ-C apresentou medidas adequadas de fiabilidade teste-reteste, consistência interna e validade convergente com o VO_{2max} .

DISCUSSÃO

O presente estudo foi desenhado para avaliar a fiabilidade e a validade convergente do questionário de atividade física PAQ-C em jovens portugueses dos 10 aos 15 anos. As análises realizadas neste estudo sugeriram que as propriedades psicométricas do questionário PAQ-C são aceitáveis, tornando-se mais uma opção para estudos de larga escala em jovens portugueses.

Inicialmente, os 10 itens que contemplam o questionário original PAQ-C (Crocker et al., 1997) foram traduzidos para a língua portuguesa. Como foi descrito no Estudo I, foram realizadas três alterações que visaram adaptar o questionário ao contexto cultural português: (a) na questão 1 foram efetuadas alterações na lista de atividades; (b) na questão 5,

o item “*right after school*” foi alterado para “dentro da escola”; na questão 6, “*evenings*” foi substituído por “fora da escola”. A alteração na questão 1 também se verificou em outras adaptações do mesmo questionário realizadas no Reino Unido (Thomas & Upton, 2014), no Brasil (da Silva, 1998; Guedes & Guedes, 2015), na Bélgica (Bervoets, 2014) e na China (Wang et al., 2016). As modificações nas outras duas questões procuraram adequar os itens ao funcionamento escolar português, permitindo, simultaneamente, avaliar todos os momentos em que os alunos pudessem estar integrados na prática de algum desporto, dança ou jogos, em que tivessem sido muito ativos ao longo do dia. Para além disso, considerámos que uma tradução literal dos termos poderia não diferenciar oportunidades distintas da prática desportiva prevista no instrumento original. Assim, com a alteração efetuada na questão 5, permitiu-se que o aluno reportasse atividades em que tivesse sido muito ativo dentro da escola, para além dos intervalos escolares, podendo, por exemplo, incluir as atividades de desporto escolar. Com a alteração da questão 6, o aluno pode reportar se foi muito ativo num desporto, dança ou atividades fora da escola, podendo este espaço temporal corresponder à manhã, tarde e/ ou noite.

A versão original do questionário PAQ-C está validada para jovens dos 9 aos 14 anos. Contudo, na presente investigação incluíram-se participantes com 15 anos. Na nossa perspetiva, a inclusão deste espectro de idades permitiu avaliar a maioria dos alunos do 2º e 3º ciclos do ensino básico, o que poderá ser uma mais-valia para investigadores que pretendam utilizar o questionário, dado que na maioria das escolas portuguesas estes ciclos de ensino funcionam na mesma instituição. Para além disso, existe um instrumento idêntico ao PAQ-C, o *Physical Activity Questionnaire for Adolescents* (PAQ-A), destinado a adolescentes entre os 14 e os 18 anos (Kowalski et al., 1997). A diferença entre estes questionários é que o PAQ-A apresenta menos um item – ‘intervalos das aulas’ –, pelo facto de os autores considerarem que não se adequa à população alvo que procuram avaliar. Contudo, para a nossa população, a manutenção desta questão é crucial, uma vez que o funcionamento do horário escolar é idêntico no 2º e 3º ciclos e também no ensino secundário. A ponderação da manutenção deste item também foi analisada por Storey e McCargar (2012), para adolescentes que se incluem em escolas que mantêm os intervalos escolares. Assim, considerou-se que o intervalo de idades inicialmente proposto no questionário original podia ser alargado quando aplicado à realidade portuguesa.

A média dos itens e a sua variância foram examinados separadamente por sexo, bem como na totalidade da amostra, nos dois estudos. Na maioria dos itens verificaram-se duas premissas importantes que os itens de uma escala devem assumir (DeVellis, 1991): (a) a média de cada item estava próxima do centro da amplitude desse item; e (b) apresentavam uma variabilidade elevada. Em ambos os estudos a exceção foi o item relativo à ‘educação física’, cuja média se afastou do centro da amplitude amostral. Tal pode dever-se ao facto da aula de educação física não ser uma escolha, assumindo um carácter obrigatório no

currículo escolar português. Acrescendo a este facto, a análise fatorial exploratória efetuada em outros estudos coloca em causa o contributo desta questão para o *score* final de atividade física (Janz et al., 2008).

Por outro lado, ambos os estudos evidenciaram a sensibilidade das diferenças entre rapazes e raparigas no que respeita ao nível de atividade física, tal como é referenciado na literatura (dos Santos et al., 2016). Além disso, o *score* do PAQ-C foi em média de 2.74 (± 0.59) no Estudo I, e de 2.60 (± 0.74) no Estudo II, resultados idênticos à média para a população chinesa (2.62 ± 0.68) (Wang et al., 2016), mas inferiores comparativamente a amostras brasileiras (2.84 ± 0.57) (Guedes & Guedes, 2015), britânicas (3.49 ± 0.68) (Thomas & Upton, 2014) ou belgas (3.05 ± 0.89) (Bervoets et al., 2014). Contudo, quando comparados os resultados deste estudo com os de uma amostra americana (2.51 ± 0.61) (Jank et al., 2008) e um estudo em que foi aplicada a versão original do questionário PAQ-C na população portuguesa (2.48 ± 0.62) (Santos-Silva, Melo, Gonçalves, Coelho, & Carvalho, 2014), no presente estudo o *score* PAQ-C revelou-se ligeiramente superior. Em todo o caso, refira-se que, de um modo geral, os dados da população portuguesa obtidos neste estudo eram expectáveis, na medida em que os níveis de atividade física das crianças e adolescentes portugueses são mais baixos do que de outros países europeus (*World Health Organization Regional Office for Europe*, 2016).

Os nossos resultados mostraram ainda boa estabilidade entre os dois momentos de avaliação, bem como uma aceitável consistência interna. No que respeita à estabilidade, o valor alcançado neste estudo (CCI = .85) foi ligeiramente superior ao de outros estudos de tradução e adaptação do questionário a diferentes idiomas (e.g., CCI = .75 a .82) (Guedes & Guedes, 2015; Wang et al., 2016). Quanto à consistência interna, considerada importante por diferentes autores no que respeita ao desenvolvimento de escalas (e.g., DeVellis, 1991), foram encontrados valores aceitáveis ($\alpha = .69$; $\alpha = .79$). De forma similar, estudos com o intuito de validar e testar a fiabilidade do questionário original apontaram valores de consistência interna entre .70 e .86 (Crocker et al., 1997; Janz et al., 2008), que se assemelham aos nossos resultados. Paralelamente, o CIT foi avaliado para verificar se cada item isoladamente estava correlacionado com a totalidade dos outros itens da escala, cumprindo outra das propriedades que os itens de uma escala devem apresentar (DeVellis, 1991); uma escala homogênea deve apresentar um valor de CIT superior a .20 (Streiner, Norman, & Cairney, 2015). Na presente investigação, o valor de CIT variou entre .14 e .63 no Estudo I e entre .35 e .61 no Estudo II. Estes valores sugeriram que todos os itens estão a medir o mesmo constructo (DeVellis, 1991).

Relativamente à validade convergente, analisada no Estudo II, o *score* do PAQ-C mostrou-se significativamente relacionado com a aptidão cardiorrespiratória e com o IMC. Quanto à aptidão cardiorrespiratória, apesar de a literatura apontar para correlações fracas entre a atividade física e aptidão aeróbica em crianças (Kowalski et al., 1997), na pre-

sente investigação a magnitude da correlação da aptidão cardiorrespiratória com o *score* do PAQ-C mostrou-se semelhante e até superior à reportada em outros estudos já realizados (Moore et al., 2002; Thomas & Upton, 2014). Contudo, deve considerar-se o facto de os instrumentos de avaliação da aptidão cardiorrespiratória poderem ser diferentes de estudo para estudo. Relativamente ao IMC, a literatura evidencia a relação entre os níveis de atividade física e o estado nutricional dos jovens, sendo que crianças que apresentam excesso de peso ou obesidade se mostram menos ativas (Janssen et al., 2005; Nemet, 2016). Neste sentido, no presente estudo, a validade convergente foi analisada, também, examinando a relação entre o *score* do PAQ-C e o IMC. A correlação encontrada entre estas variáveis foi inversa e de magnitude inferior à anteriormente descrita. Na mesma linha, e apesar de fraca, outros estudos que examinaram a validade convergente apresentaram valores de magnitude idêntica, tal como foi verificado em crianças americanas de origem europeia ($r = -.16$) (Moore et al., 2007) e chinesas ($r = -.18$) (Wang et al., 2016), evidenciando que crianças que apresentaram valores de IMC mais elevados praticam menos atividade física (Janssen et al., 2005).

Resumindo, de uma forma geral, a versão portuguesa do PAQ-C demonstrou possuir uma boa consistência interna, uma boa fiabilidade teste-reteste e uma moderada validade convergente com o $VO_{2\text{máx}}$, sugerindo que este é um instrumento viável para a avaliação dos níveis de atividade física em jovens portugueses. Importa recordar a importância da utilização de instrumentos válidos e fiáveis que sejam práticos, não evasivos e que não demorem muito tempo a ser preenchidos. Para além disso, a escassez de instrumentos de autorrelato validados para a população portuguesa nestas idades (Mota et al., 2002), não obstante a possibilidade de limitação do nosso conhecimento sobre todos os estudos existentes, justifica a pertinência desta investigação. Consideramos ainda a utilidade que possa advir da utilização deste instrumento em diferentes áreas, como a prática clínica ou a investigação epidemiológica, contribuindo deste modo para a prevenção de problemas de saúde associados à inatividade física.

Todavia, importa reconhecer que, apesar de índices aceitáveis de fiabilidade e validade é essencial considerar que o PAQ-C avalia os níveis globais de atividade física, não considerando a sua frequência, intensidade ou duração. Além disso, este questionário revela valores de atividade física geral, mas não atribui nenhum intervalo de valores que permita caracterizar a atividade física como baixa, moderada ou elevada. Outras dificuldades referem-se ao tipo de atividades desempenhadas pelos jovens destas idades, o qual é difícil de captar por instrumentos de autorrelato; e ao facto de o PAQ-C só poder ser aplicado durante o período escolar.

Quanto à validação do questionário, ressalte-se que, no presente estudo, o PAQ-C não foi validado pelo confronto com uma medida critério/ *standard*, mas sim com uma medida de aptidão cardiorrespiratória. De forma a combater esta lacuna, futuras investigações

devem procurar validar a versão portuguesa do PAQ-C avaliando a validade concorrente confrontando-o com medidas objetivas de avaliação da atividade física. Além disso, refira-se que alguns estudos de validação efetuaram uma análise exploratória dos dados relativos ao PAQ-C e identificaram a existência de dois e três fatores, pelo que é essencial, em futuros estudos, efetuar-se esta análise para a versão portuguesa.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a todos os participantes, encarregados de educação, professores e escolas/grupos comunitários e desportivos que participaram neste estudo. Este trabalho foi suportado pela FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia, através da bolsa concedida ao primeiro autor deste artigo (ref. SFRH/BD/89150/2012).

REFERÊNCIAS

- Baptista, F., Santos, D. A., Silva, A. M., Mota, J., Santos, R., Vale, S., ... Sardinha, L. B. (2012). Prevalence of the Portuguese population attaining sufficient physical activity. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 44(3), 466-473.
- Beaton, D., Bombardier, C., Guillemin, F., & Ferraz, M. (2000). Guidelines for the process of cross-cultural adaptation of self-report measures. *Spine*, 25, 3186-3191.
- Bervoets, L., Van Noten, C., Van Roosbroeck, S., Hansen, D., Van Hoorenbeeck, K., Verheyen, E., ... Vankerkhoven, V. (2014). Reliability and validity of the Dutch Physical Activity Questionnaires for Children (PAQ-C) and Adolescents (PAQ-A). *Archives of Public Health*, 72(1), 47. doi:10.1186/2049-3258-72-47
- Biddle, S. J. H., Gorely, T., Pearson, N., & Bull, F. C. (2011). An assessment of self-reported physical activity instruments in young people for population surveillance: Project ALPHA. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 8, 1. doi:10.1186/1479-5868-8-1
- Boreham, C. A. G., Paliczka, V. J., & Nichols, A. K. (1990). A comparison of the PWC170 and 20-MST tests of aerobic fitness in adolescent schoolchildren. *Journal of Sports Medicine and Physical Fitness*, 30(1), 19-23.
- Carson, V., Stone, M., & Faulkner, G. (2014). Patterns of sedentary behavior and weight status among children. *Pediatric Exercise Science*, 26(1), 95-102.
- Chinapaw, M. J. M., Mokkink, L. B., van Poppel, M. N. M., van Mechelen, W., & Terwee, C. B. (2010). Physical Activity Questionnaires for Youth: A systematic review of measurement properties. *Sports Medicine*, 40(7), 539-563.
- Cooper, A. R., Goodman, A., Page, A. S., Sherar, L. B., Esliger, D. W., van Sluijs, E. M. F., ... Ekulund, U. (2015). Objectively measured physical activity and sedentary time in youth: the International children's accelerometer database (ICAD). *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 12, 1-10.
- Corder, K., Ekelund, U., Steele, R. M., Wareham, N. J., & Brage, S. (2008). Assessment of physical activity in youth. *Journal of Applied Physiology*, 105(3), 977-987.
- Crocker, P. R. E., Bailey, D. A., Faulkner, R. A., Kowalski, K. C., & McGrath, R. (1997). Measuring general levels of physical activity: Preliminary evidence for the physical activity questionnaire for older children. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 29(10), 1344-1349.
- da Silva, R. C. (1998). *Coronary heart disease risk factors and health-related fitness of adolescents in Niterói, Rio de Janeiro, Brazil*. Unpublished doctoral dissertation. Michigan State University, USA.
- DeVellis, R. F. (1991). *Scale development: Theory and applications*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- dos Santos, F. K., Gomes, T. N., de Souza, M. C., Chaves, R. N., Santos, D. M. V., Pereira, S. I. S., ... Maia, J. A. (2016). Physical activity, BMI and metabolic risk in Portuguese adolescents. *Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano*, 18(1), 103-113.
- Heath, G. W., Parra, D. C., Sarmiento, O. L., Andersen, L. B., Owen, N., Goenka, S., ... Brownson, R. C. (2012). Evidence-based intervention in physical activity: Lessons from around the world. *Lancet*, 380(9838), 272-281.
- Janssen, I., Katzmarzyk, P. T., Boyce, W. F., Vereecken, C., Mulvihill, C., Roberts, C., ... Pickett, W. (2005). Comparison of overweight and obesity prevalence in school-aged youth from 34 countries and their relationships with physical activity and dietary patterns. *Obesity Reviews*, 6(2), 123-132.
- Janssen, I., & LeBlanc, A. G. (2010). Systematic review of the health benefits of physical activity and fitness in school-aged children and youth. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 7, 40-55.
- Janz, K. F., Lutuchy, E. M., Wenhe, P., & Levy, S. M. (2008). Measuring activity in children and adolescents using self-report: PAQ-C and PAQ-A. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 40(4), 767-772.
- Kowalski, K. C., Crocker, P. R. E., & Kowalski, N. P. (1997). Convergent validity of the Physical Activity Questionnaire for Adolescents. *Pediatric Exercise Science*, 9(4), 342-352.
- Leger, L. A., Mercier, D., Gadoury, C., & Lambert, J. (1988). The multistage 20 metre shuttle run test for aerobic fitness. *Journal of Sports Sciences*, 6(2), 93-101.
- Montoye, H., Kemper, H., Saris, W., & Washburn, R. A. (1996). *Measuring physical activity and energy expenditure*. Champaign, IL: Human Kinetics.
- Moore, J. B., Hanes Jr, J. C., Barbeau, P., Gutin, B., Treviño, R. P., & Zenong, Y. (2007). Validation of the Physical Activity Questionnaire for Older Children in children of different races. *Pediatric Exercise Science*, 19(1), 6-19.
- Mota, J., Santos, P., Guerra, S., Ribeiro, J. C., Duarte, J. A., & Sallis, J. F. (2002). Validation of a physical activity self-report questionnaire in a Portuguese pediatric population. *Pediatric Exercise Science*, 14(3), 269-276.
22. Nemet, D. (2016). Childhood obesity, physical activity, and exercise. *Pediatric Exercise Science*, 28(1), 48-51.
- Pettee, K., Storti, K., Ainsworth, B., & Kriska, A. (2008). *Measurement of physical activity and inactivity in epidemiologic studies: Epidemiologic methods in physical activity studies*. Oxford, UK: Oxford University Press.
- Guedes, D. P., & Guedes, J. E. R. P. (2015). Medida da atividade física em jovens brasileiros: Reprodutibilidade e validade do PAQ-C e do PAQ-A. *Revista Brasileira de Medicina do Esporte*, 21(6), 425-432.
- Santos-Silva, R., Melo, C., Gonçalves, D., Coelho, J., & Carvalho, F. (2014). Comparison between exercise performance in asthmatic children and healthy controls: Physical Activity Questionnaire application. *Revista Portuguesa de Pneumologia*, 20(3), 138-145.
- Storey, K. E., & McCargar, L. J. (2012). Reliability and validity of Web-SPAN, a web-based method for assessing weight status, diet and physical activity in youth. *Journal of Human Nutrition and Dietetics*, 25(1), 59-68.
- Streiner, D., Norman, G., & Cairney, J. (2015). *Health measurement scales: A practical guide to their development and use* (5th ed.). Oxford, UK: Oxford University Press.
- Telama, R., Yang, X., Viikari, J., Välimäki, I., Wanne, O., & Raitakari, O. (2005). Physical activity from childhood to adulthood: A 21-year tracking study. *American Journal of Preventive Medicine*, 28(3), 267-273.
- The Cooper Institute (2007). *Fitnessgram. Activitygram. Test Administration Manual*. Champaign, IL: Human Kinetics.
- Thomas, E. L., & Upton, D. (2014). Psychometric properties of the physical activity questionnaire for older children (PAQ-C) in the UK. *Psychology of Sport and Exercise*, 15(3), 280-287.
- Trost, S. G. (2007). State of the art reviews: Measurement of physical activity in children and adolescents. *American Journal of Lifestyle Medicine*, 1(4), 299-314.
- Vanhelst, J., Béghin, L., Duhamel, A., Bergman, P., Sjöström, M., & Gottrand, F. (2012). Comparison of uniaxial and triaxial accelerometry in the assessment of physical activity among adolescents under free-living conditions: The HELENA study. *BMC Medical Research Methodology*, 12, 26. doi:10.1186/1471-2288-12-26
- Wang, J. J., Baranowski, T., Lau, W. C. P., Chen, T. A., & Pitkethly, A. J. (2016). Validation of the Physical Activity Questionnaire for Older Children (PAQ-C) among Chinese Children. *Biomedical and Environmental Sciences*, 29(3), 177-186.
- World Health Organization Regional Office for Europe. (2016). *Growing up unequal: Gender and socioeconomic differences in young people's health and well-being. Health behaviour in school-aged children study: International report from the 2013/14 survey*. Disponível em http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0014/303440/HSBC-No.7-Growing-up-unequal-PART-1.pdf?ua=1
- World Health Organization. (2015). *Global status report on noncommunicable diseases 2014*. Geneva, Switzerland: World Health Organization.