REFERÊNCIAS

- Afonso, J., Garganta, J., McRobert, A., Williams, A.M. & Mesquita, I. (2012). The perceptual cognitive processes underpinning skilled performance in volleyball: Evidence from eye-movements and verbal reports of thinking involving an in situ representative task. *Journal of Sports Science & Medicine*, 11(2), 339-345.
- Baker, J., & Horton, S. (2004). A review of primary and secondary influences on sport expertise. *High Ability Studies*, 15(2), 211-228.
- Baker, J., Wattie, N., & Schorer, J. (2019). A proposed conceptualization of talent in sport: The first step in a long and winding road. *Psychology of Sport & Exercise*, 43, 27-33.
- Duncan, M.J., Woodfield, L., & al-Nakeeb, Y. (2006). Anthropometric and physiological characteristics of junior elite volleyball players. *British Journal of Sports Medicine*, 40, 649-651.
- Gabbet, T., & Georgieff, B. (2006). The development of a standardized skill assesement for junior volleyball players. *International Journal of Sports Physiology & Performance*, 1, 95-107.
- Lidor, R., & Ziv, G. (2010). Physical characteristics and physiological attributes of adolescent volleyball players: A review. *Pediatric Exercise Science*, 22(1), 114-134.
- Melrose, D.R., Spaniol, F.J., Bohling, M.E. & Bonnette, R.A. (2007). Physiological and performance characteristics of adolescent club volleyball players. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 21, 481-486.
- Milic, M., Grgantov, Z., Chamari, K., Ardigò, L.P., Bianco, A. & Padulo, J. (2017). Anthropometric and physical characteristics allow differentiation of young female volleyball players according to playing position and level of expertise. *Biology of Sport*, 34(1), 19-26.
- Ramos, A., Coutinho, P., Ribeiro, J., Fernandes, O., Davids, K., & Mesquita, I. (2020). Increasing tactical complexity to enhance the synchronisation of collective behaviours: An action-research study throughout a competitive volleyball season. *Journal of Sports Sciences*, 38(22), 2611-2619.

AUTORES:

Filipa Sousa ^{1, 2}

Pedro Fonseca ²

Leandro Machado ^{1, 2}

João Paulo Vilas-Boas ^{1, 2}

¹ Centro de Investigação, Formação, Intervenção e Inovação em Desporto (CIFIID), Faculdade de Desporto, Universidade do Porto, Portugal

² Laboratório de Biomecânica do Porto (LABIOME), Universidade do Porto, Portugal

<https://doi.org/10.5628/rpcd.21.S2.133>

No início era assim. Unidade na diversidade. Biomecânica

A BIOMECÂNICA DO DESPORTO

Os movimentos básicos de locomoção do ser humano são a marcha, a corrida e os saltos. Depois de adquirir a posição bípede, o Homem aprende a caminhar e a correr e, finalmente, a saltar. Tal como a marcha e a corrida, também os saltos, verticais (e horizontais) são essenciais no desempenho e treino de várias modalidades. Apresentam a dupla função de servir como meios de execução e treino, potenciando as capacidades motoras, assim como meios de avaliação da aptidão desportivo-motora de desportistas (Van Hooren & Zolotarjova, 2017).

O desempenho desportivo motor é função de múltiplos fatores, sendo o gesto técnico um dos mais importantes na maioria das situações. A importância da qualidade do gesto técnico decorre inclusivamente de si mesmo, nomeadamente quando é função da sua dimensão estética, da sua estabilidade ou precisão, ou é definida pelas possibilidades que oferece de produzir forças ou momentos de força e de transformar estas variáveis em aceleração, velocidade e deslocamento (lineares e angulares) de um segmento corporal, do corpo todo, ou de um engenho desportivo. É neste contexto – quando consideramos as forças em presença e os deslocamentos e velocidades associados – que reconhecemos a relevância de outras variáveis, como sejam o trabalho realizado, a energia despendida e a potência de uma ação. Todas estas são variáveis que facilmente reconhecemos como determinantes do sucesso na generalidade dos contextos de realização desportivo-motora, seja quando se pretende ser mais veloz, chegar mais alto ou ser mais forte (*Citius, Altius, Fortius*). E todas elas são variáveis mecânicas, ou BIOMECÂNICAS, no caso especial do seu estudo em contexto biológico, como é também o caso do desporto e demais domínios do movimento humano.

Portanto, ser tão eficiente quanto possível na produção de potência mecânica (utilizar adequadamente os recursos bioenergéticos disponíveis) através da capacidade de gerar forças e de as traduzir em deslocamento mais ou menos veloz, são questões centrais do desempenho desportivo, fazendo da Biomecânica um domínio nuclear das ciências do desporto e, portanto, também da avaliação e aconselhamento desportivos. Neste artigo referir-nos-emos aos contributos da biomecânica neste projeto, nomeadamente através da avaliação da potência dos membros inferiores dos jogadores com recurso a dois saltos verticais: o salto em agachamento e o salto com contramovimento. Começaremos, todavia, por uma breve introdução à biomecânica, que clarificará as relações entre as variáveis relevantes que introduzimos acima, realizada com a intenção de facilitar o entendimento da opção tomada pelas avaliações realizadas no projeto INEX.

A biomecânica é a área da biofísica que se dedica ao estudo dos seres vivos, ou sistemas biológicos, com base nos princípios, leis, meios e métodos da mecânica. A mecânica, por sua vez, é a área da física que se dedica ao estudo do movimento, sua ausência e respetivas causas. O movimento, ou a sua ausência, é causado pela força. Esta é a entidade que permite alterar o estado de repouso ou de movimento de um corpo, ou até de o deformar. Assim, o objeto de estudo da Biomecânica são as forças produzidas pelos sistemas biológicos (forças internas), as forças a que estão sujeitos (forças externas), bem como os efeitos dessas mesmas forças (movimentos, acelerações, deformações e equilíbrios). Nos seres humanos, os músculos constituem órgãos especializados na produção de força, nomeadamente força suscetível de os locomover, ou de lhes permitir relacionar-se com outros desportistas e outros corpos, frenando-os ou impulsionando-os.

Os objetivos da biomecânica do desporto são variados, mas dirigem-se fundamentalmente para a descrição rigorosa do movimento, sua interpretação, explicação, modelação e simulação, no sentido da otimização da técnica desportiva, estendendo-se também à otimização de materiais e equipamentos desportivos e à profilaxia de lesões no desporto. Em última instância diríamos, portanto, que a biomecânica do desporto procura a otimização do movimento e dos equipamentos desportivos, minimizando episódios adversos, nomeadamente lesões. Se se atentar no conceito de otimização, por norma referenciado ao custo energético da tarefa (Di Prampero, 2015), entende-se que esta passa pela maximização da força produzida e da potência desenvolvida a partir de um dado input energético ou, tão simplesmente, por gerar a força e a potência necessárias, considerando a duração, repetibilidade e precisão do movimento, com o mínimo investimento energético. Claro que se entende que quanto mais elevada a força produzida e a potência gerada por unidade de energia investida, mais energia sobrar para a produção de movimentos subsequentes. Força e potência são, portanto, grandezas centrais na produção do movimento no desporto. Como veremos a seguir, estas são mediadas pela velocidade do movimento, com a velocidade máxima requerendo a potência máxima, e a velocidade ideal, esperadamente obtida com a mínima força, e menor potência e dispêndio energético.

FORÇA, VELOCIDADE E POTÊNCIA

De acordo com a segunda lei do movimento de Newton ($F = m \cdot a$), para acelerar um corpo de massa m (alterar o estado de repouso ou de movimento), é necessário que sobre ele atue uma força resultante diferente de zero, ocorrendo a referida aceleração (a) na direção e sentido da força (F). É exatamente pelo facto da força e da aceleração só serem descritas adequadamente após a indicação da sua direção e sentido, não bastando a intensidade, ou magnitude, para as caracterizar, que são designadas por grandezas vetoriais, sendo representadas por vetores. A unidade em que se representa a força é o Newton (N), que corresponde à aceleração de 1m.s^{-2} de uma massa de 1kg.

Quando aplicamos uma força sobre um corpo com o intuito de o acelerar, este efeito será tanto mais elevado quanto menor for a sua massa m (diz-se, quanto menor for a sua inércia) e quanto menores forem as forças que se oponham à força aplicada. Neste caso, as forças que se opõem, uma vez somadas vetorialmente à força aplicada, definem a *força resultante* a que nos referimos acima ($\vec{R}$). Para que uma dada força muscular produza um efeito (aceleração) tão pronunciado quanto possível será, portanto, necessário que a inércia do corpo e as forças opostas ao movimento sejam tão reduzidas quanto possível. Obtendo-se, num dado intervalo de tempo, a máxima aceleração possível, a velocidade média (v) de movimento nesse período será também máxima para uma mesma velocidade inicial. Ao produto da força aplicada pela velocidade (instantânea) do movimento chama-se potência (P), a qual representa a capacidade de realizar trabalho num determinado intervalo de tempo. Percebe-se facilmente esta relação se se considerar que o trabalho realizado por uma força, na sua expressão matemática mais simples, corresponde ao produto da magnitude da força pelo deslocamento do ponto de aplicação. Por outro lado, considerando que o deslocamento dividido pelo tempo nos dá a velocidade, constata-se que o trabalho realizado num dado período (*força * deslocamento/tempo*) é o mesmo que potência (*força * velocidade*). A unidade do trabalho é o Joule (J), que mede o trabalho realizado ao deslocar um corpo em um metro aplicando uma força de 1 N. A unidade de potência designa-se por Watt (W), correspondendo ao trabalho realizado por segundo. Por outro lado, trabalho e energia, são as duas faces de uma mesma moeda, e podem ser convertidos um no outro. Assim, a potência representa a quantidade de energia fornecida ou concedida por unidade de tempo para realizar uma tarefa (Markovic & Jaric, 2007). Uma máquina é considerada mais potente que outra, quando é capaz de realizar a mesma tarefa num tempo menor ou, ainda, realizar uma quantidade maior de tarefas no mesmo intervalo de tempo. Relativamente ao movimento humano, a potência muscular é considerada um importante fator responsável pelo sucesso da execução de movimentos rápidos e máximos, tal como acontece nos saltos, corridas rápidas, lançamentos, etc. (Aura & Komi, 1986).

Percebe-se agora claramente porque é que a capacidade de gerar força (sobretudo pela ação muscular) e de desenvolver potência estão associadas e constituem elementos determinantes da capacidade desportivo-motora de um indivíduo. Acresce que força muscular, velocidade e potência apresentam relações complexas, abrindo espaço a que as mesmas se estudem para cada indivíduo, para cada movimento e em cada situação. Em vários tipos de movimentos de extensão multiarticulares, força e velocidade apresentam uma relação tendencialmente inversa e quase linear, enquanto que a potência e a velocidade apresentam uma relação polinomial de segundo grau (Bobbert, 2012; McMaster et al., 2013; Samozino et al., 2012, 2014). Destas relações extrai-se normalmente, para a avaliação funcional, o valor máximo da potência e o declive da função força/velocidade (Samozino et al., 2012, 2014).

A capacidade de produzir rapidamente trabalho mecânico pelos membros inferiores (potência mecânica) durante a fase propulsiva de movimentos balísticos (saltos), é determinante no desempenho de diversos desportos. A avaliação desta capacidade física é prática comum entre os profissionais de desporto, permitindo monitorizar os efeitos do treino e/ou da recuperação muscular, assim como a capacidade de prever e maximizar a performance (Duthie, 2006; Komi, 2000; Nicol et al., 2006). Os testes comumente utilizados neste quadro são os saltos verticais, especialmente o salto em contramovimento - "*Counter Movement Jump*" (CMJ) - e o salto em agachamento - "*Squat Jump*" (SJ) (Castagna & Castellini, 2013; Jimenez-Reyes et al., 2014; Markovic & Jaric, 2007; Sanchez-Sanchez et al., 2014). A escolha recai nestas duas ações, uma vez que nelas são produzidas grandes quantidades de trabalho mecânico num breve intervalo de tempo, permitindo gerar elevada potência, deslocando rápida e verticalmente a massa corporal do sujeito (Morin et al., 2019). Ao longo dos tempos, alguns estudos demonstraram uma correlação significativa entre a altura máxima atingida durante os saltos verticais, a produção de força (Bosco & Komi, 1980) e a potência extensora dos membros inferiores (Arnason et al., 2004; Petrigna et al., 2019), assim como com outras componentes da performance: a velocidade (Wisloff et al., 2004) e a agilidade (Barnes et al., 2007), por exemplo. Embora a qualidade de um desportista não possa ser determinada por um reduzido conjunto de fatores determinantes do desempenho, a avaliação das características de força, velocidade e potência, parecem ser essenciais para aprofundar a nossa compreensão acerca dos mecanismos biomecânicos que estão por trás da capacidade de saltar e de correr, a fim de otimizar o desenvolvimento dos desportistas e, inclusivamente, facilitar a identificação de talentos (Morin et al., 2019; Silva et al., 2015).

Apesar de há muito se dispor de soluções simplificadas para a extração de métricas de força e potência a partir de saltos verticais (especialmente monitorizando o tempo de voo, como no clássico teste de Bosco (1983), o recurso a testes laboratoriais com instrumentação sofisticada proporciona um aumento no rigor da medida e um crescimento do volume da informação disponibilizada na avaliação das capacidades e desempenho dos praticantes, tanto ao nível do desporto de formação quanto de elite.

OS SALTOS SQUAT JUMP (SJ)

E COUNTER MOVEMENT JUMP (CMJ)

No CMJ, os sujeitos iniciam o salto partindo da posição estática de pé com as mãos na cintura. São instruídos a realizar um contramovimento, ou seja, uma flexão dos membros inferiores (fase descendente), seguido de uma rápida e vigorosa extensão dos mesmos (fase ascendente), que os leva a entrar em fase aérea. Durante o salto, os atletas devem permanecer com o tronco na vertical procurando saltar o mais alto que conseguirem. A aterragem deverá acontecer tão próximo quanto possível do lugar de descolagem do solo (o que define a verticalidade do salto) e incluir uma ação de amortecimento, traduzida por nova flexão dos membros inferiores com elevada ação excêntrica da musculatura extensora. A esta segunda fase excêntrica segue-se uma fase concêntrica suave que permite recuperar a posição ortostática bípede.

Na figura 1 podem observar-se as curvas representativas da componente vertical da força de reação do solo, da velocidade vertical do centro de gravidade do atleta e da potência desenvolvida durante o CMJ. De notar a utilização de diferentes escalas verticais e o alinhamento das escalas correspondentes à velocidades e potências de modo a que a sua componente nula (0 m/s; 0 W) coincida com a linha do peso corporal no eixo da força vertical. A linha horizontal inicial representa a posição ortostática bípede com um peso corporal de cerca de 750 N (sensivelmente 76.5kg de massa corporal considerando uma aceleração da gravidade em torno de 9.8 m.s^{-2}) e velocidade e potência nulas. O sujeito está imóvel, ou quase, não se notando oscilações relevantes nem dos valores de força, nem dos valores de velocidade e potência antes de iniciar o movimento. Entre a primeira e a segunda setas da figura decorre a fase inicial do contramovimento, que corresponde a uma "queda" (flexão dos membros inferiores e do tronco) inicialmente "livre" ($a < 0$; $v < 0$) até ao mínimo intermédio (valor mínimo da força – segunda seta) e, depois, cada vez mais controlada (progressivamente maior contração excêntrica dos músculos extensores), criando uma desaceleração vertical do centro de gravidade do sujeito até à velocidade mínima, obtida na terceira seta, que corresponde ao momento final de aceleração negativa da "queda". Este instante corresponde a uma componente vertical da força de reação do solo que foi crescendo por ação excêntrica dos músculos extensores dos membros inferiores, até voltar a igualar o peso e a aceleração vertical ser nula (terceira seta). Entre a terceira e a quarta setas, a componente vertical da força de reação do solo excede cada vez mais o peso do sujeito por ação concêntrica dos extensores dos membros inferiores, acelerando-o verticalmente para cima (queda "retardada"; $a > 0$; $v < 0$), aumentando, portanto, a velocidade até esta atingir o valor zero antes de passar a assumir valores positivos (o movimento do centro de gravidade deixa de ser descendente – quarta seta). Aqui o sujeito está na posição de maior agachamento e, devido à continuada ação da componente vertical da força de reação do solo provocada pela ação concêntrica dos músculos extensores dos membros inferiores, inicia-se a fase de impulsão, que se prolonga até à quinta seta, momento de perda de contacto com o solo.

FIGURA 1. Componente vertical da força de reação do solo (a cheio em negro), velocidade do centro de gravidade do sujeito (tracejado) e potência desenvolvida (a pontilhado) durante o salto com contramovimento (CMJ)

Note-se que a componente vertical da força de reação do solo atingiu o seu máximo de fase concêntrica na quarta seta, momento em que se observa a máxima bondade do arranjo intersegmentar que favorece a produção de força, decaindo a partir daí com a continuada extensão das ancas, joelhos e flexão plantar dos tornozelos, que culmina com a descolagem (*take-off*). Entretanto, entre a quarta e a quinta setas, quando o produto da força pela velocidade é máximo, observa-se a potência máxima. Entre a quinta e a sétima setas ocorre a fase de voo, onde a força de reação do solo é nula (não há contacto com o solo). Durante a primeira parte do voo a velocidade ascendente do corpo diminui devido à aceleração da gravidade e, a partir de metade da fase de voo (sexta seta), começa a ser negativa (descendente, e aumenta em módulo). Na sétima seta inicia-se a receção ao solo, que se caracteriza por um pico da componente vertical da força de reação do solo muito elevado e produzido num curto intervalo de tempo. Esta constitui uma elevada taxa de aceitação de carga, que poderá produzir uma agressão importante à integridade do sujeito. Neste instante, o contacto com o solo acelera positiva e acentuadamente o centro de gravidade do sujeito, frenando a sua velocidade de queda, no que tem de ser compensado por uma rápida e acentuada contração excêntrica dos extensores dos membros inferiores, ao mesmo tempo que estes, em conjunto com o tronco, são fletidos, para controlar o impacto. As oscilações subsequentes traduzem ligeiros “ressaltos” que se verificam até à estabilização da posição ortostática bípede final.

Na figura 2 é apresentado o comportamento das mesmas variáveis no SJ. Pode observar-se que os perfis das três curvas são semelhantes ao anteriormente descrito para o CMJ, sendo sobretudo de notar dois aspetos: (a) antes do momento de ocorrência da potência máxima não são registados valores da componente vertical da força de reação do solo inferiores ao peso do sujeito, uma vez que não existe queda controlada do mesmo e (b) consequentemente, a curva da velocidade não apresenta fase negativa, impondo o mesmo à potência, o que traduz inexistência de fase excêntrica (absorção de energia, armazenada sob forma elástica, neste caso).

FIGURA 2. Componente vertical da força de reação do solo (a cheio em negro), velocidade do centro de gravidade do sujeito (tracejado) e potência desenvolvida (a pontilhado) durante o salto em agachamento (SJ)

De facto, durante um SJ, os atletas iniciam o salto a partir da posição estática com os membros inferiores fletidos a aproximadamente 90°, as mãos na cintura e o tronco tão vertical quanto possível. Os atletas devem permanecer nesta posição durante três segundos antes de iniciar o salto, para evitar os efeitos de potenciação por pré ativação ou armazenamento e restituição de energia elástica pelos tendões e outras estruturas anatómicas, interrompendo assim o ciclo de alongamento-encurtamento (CAE). De seguida devem realizar uma rápida e vigorosa extensão dos membros inferiores, saltando o mais alto que conseguirem. Depois, a receção deverá também acontecer tão próximo quanto possível da posição de descolagem, ocorrendo de forma semelhante à observada no CMJ.

É exatamente por existir no CMJ uma fase excêntrica imediatamente antecedente à impulsão (fase concêntrica), que implica uma pré ativação (Bobbert & Casius, 2005), bem como da ocorrência de potência negativa e de consequente absorção e armazenamento de energia nas estruturas elásticas em série e em paralelo do *complexo músculo-tendinoso*,

que a performance no CMJ é geralmente mais elevada do que no SJ, refletindo uma efetiva utilização do CAE (Bobbert & Casius, 2005; Bobbert et al., 1996). Os mecanismos responsáveis pela elevação da performance quando se estabelecem CAE são diversos e complexos, mas não constituem o objeto central deste artigo, pelo que não nos alongaremos mais no tema.

NO INEX: OS RESULTADOS

NO BASELINE

A habilidade de saltar verticalmente, assim como a força e a potência dos membros inferiores, aumenta com a idade cronológica dos sujeitos durante a fase pubertária (Karatrantou et al., 2019). Diversos fatores, como a idade, o sexo, o nível de atividade física, experiência de treino e especificidade da modalidade, podem afetar o desempenho nos saltos verticais. Sabemos que o padrão de crescimento e desenvolvimento da força muscular e da potência, pode ser diferente quando examinamos populações com diferentes características (atletas vs. não atletas, por exemplo) ou praticantes de diferentes modalidades desportivas (Baxter-Jones, 1995; Ben Abdelkrim et al., 2007; Gerodimos et al., 2013; Maffulli et al., 1994). São muito escassos, e até algo controversos, os estudos disponíveis que relacionam a habilidade de saltar verticalmente com a idade pubertária. Habitualmente são estudos realizados apenas com rapazes, e em estudos transversais (Battaglia et al., 2014; Bencke et al., 2002).

O estudo de Karatrantou et al. (2019), acompanhou e avaliou 380 rapazes jovens, praticantes de basquetebol, futebol e voleibol, bem como um grupo de não atletas, com idades compreendidas entre os 11 e os 15 anos. Foi encontrada uma interação significativa entre modalidade e idade nos SJ e nos CMJ. Neste estudo, os voleibolistas destacaram-se nos saltos verticais, face aos praticantes de basquetebol e futebol. Por volta dos 15 anos, quando as adaptações específicas do treino em cada modalidade eram já evidentes, o desempenho dos atletas nos saltos verticais aumentou devido aos estímulos de treino específicos e aos atributos fisiológicos que potencialmente afetam o desenvolvimento desta habilidade. Comparativamente, os atletas de futebol e basquetebol percorrem maiores distâncias em jogo e executam uma grande variedade de movimentos, tais como corridas, *sprints*, mudanças de direção súbitas, etc., enquanto os voleibolistas se movimentam num espaço de jogo mais reduzido e executam um maior número de saltos, em movimentos específicos do ataque e defesa como são os serviços, os remates e o bloco (Battaglia et al., 2014; Ben Abdelkrim et al., 2007).

Battaglia et al. (2014) avaliaram a influência de três anos específicos de treino, no desempenho dos saltos verticais e do lançamento, em trinta e uma jovens adolescentes do sexo feminino, praticantes de basquetebol e voleibol. Nas duas modalidades e em ambos os saltos, SJ e CMJ, tal como era esperado, a altura de salto foi mais elevada nos CMJ comparativamente com os SJ. Tal como no estudo de Karatrantou et al. (2019), e embora com uma metodologia diferente, foram as voleibolistas que se destacaram no desempenho dos saltos verticais. Por outro lado, as basquetebolistas obtiveram um melhor desempenho no lançamento da bola medicinal por cima da cabeça. O estudo demonstrou que os três anos de treino específico de cada modalidade tenderam a proporcionar adaptações neuromusculares nos atletas, ainda que os autores não tenham observado diferenças significativas, possivelmente devido ao número reduzido de sujeitos e de anos de treino.

Passando à apresentação dos resultados do INEX, o quadro 1 apresenta, por idades, o resultado médio dos valores das quatro variáveis biomecânicas selecionadas para análise (altura de salto, força máxima de impulsão vertical, potência máxima do salto e força máxima na aterragem), nas cinco modalidades estudadas, no primeiro momento de avaliação do INEX. Com exceção da força registada na receção ao solo após o salto, todas as outras variáveis apresentam diferenças significativas nos valores médios com a idade.

Conforme o esperado no início do projeto, os atletas mais velhos apresentaram uma maior capacidade de saltar verticalmente do que os seus colegas mais jovens, tanto nos SJ ($F = 23.69, p < .001, \eta^2 = .19$) como nos CMJ ($F = 39.67, p < .001, \eta^2 = .25$), mostrando uma significativa interação entre idade e a experiência de treino (QUADRO 1). Esta tendência verificou-se igualmente em quase todas as demais variáveis analisadas (força de impulsão vertical e potência de salto), tanto nos SJ, como nos CMJ. A exceção foi a força na receção ao solo que foi superior nos mais novos. Estes resultados são coerentes com o expectável aumento da elevação da capacidade de produção de força e de potência com a idade, gerando alturas de salto superiores, mesmo considerando a elevação dos valores de massa corporal. Concordam ainda com a possibilidade de, nas idades ou na idade mais baixa, a capacidade de amortecer a carga durante a receção de um salto ainda não se encontrar completamente consolidada, como se observa pela redução da força na receção com o avançar da idade do atleta. Estes resultados podem ainda ser influenciados pelo facto de, no primeiro grupo de idades, não terem participado praticantes de todas as modalidades estudadas (apenas de andebol, basquetebol e voleibol), o que também ocorreu no grupo dos 15 anos, onde só estão incluídos jogadores de basquetebol.

QUADRO 1. Resultados de todas as modalidades, distribuídos por idade dos participantes, durante o *baseline*, para a altura de salto, força máxima de impulsão vertical, potência máxima do salto e força máxima na recepção, nos saltos com agachamento e com contramovimento

DOMÍNIO DA BIOMECÂNICA	11 ANOS (n = 82)		12 ANOS (n = 67)		13 ANOS (n = 198)		14 ANOS (n = 156)		15 ANOS (n = 29)		TODAS AS IDADES (n = 632)		F (p) ²	CONTRASTE ³
	M ± DP ¹		M ± DP		M ± DP		M ± DP		M ± DP		M ± DP			
	ALTURA DE SALTO (CM)													
Saltos com agachamento	19.71 ± 3.95		20.97 ± 5.02		23.92 ± 5.01		24.97 ± 4.62		27.02 ± 3.31		22.75 ± 5.18		23.69*** (19)	15>13>11; 14>12; 14>11.
Saltos com contramovimento	19.68 ± 3.90		21.96 ± 4.91		24.86 ± 4.76		26.92 ± 5.15		28.59 ± 4.47		24.00 ± 4.46		39.67*** (25)	15>13; 15>12; 15>11; 14>13>12>11.
FORÇA MÁXIMA DE IMPULSÃO VERTICAL (N/KG)														
Saltos com agachamento	20.61 ± 3.31		21.12 ± 3.05		21.55 ± 2.49		22.24 ± 2.39		22.97 ± 4.14		21.49 ± 2.91		4.99*** (0.05)	15>11; 14>11; 15>12.
Saltos com contramovimento	20.68 ± 2.27		21.16 ± 2.51		21.43 ± 2.16		21.86 ± 2.52		23.01 ± 2.88		21.41 ± 2.44		6.63*** (0.05)	15>13; 15>12; 15>11; 14>11.
POTÊNCIA MÁXIMA DO SALTO (W)														
Saltos com agachamento	900.57 ± 409.95		1198.11 ± 578.74		1563.07 ± 693.16		2057.90 ± 804.72		1620.73 ± 390.10		1454.95 ± 742.92		37.33*** (28)	15>12>11; 14>13>12>11.
Saltos com contramovimento	922.76 ± 411.94		1163.75 ± 571.01		1450.31 ± 627.15		1784.53 ± 770.40		1537.54 ± 354.54		1390.27 ± 680.76		28.54*** (19)	15>12; 15>11; 14>13>12; 14>11; 13>11.
FORÇA MÁXIMA NA RECEÇÃO (N/KG)														
Saltos com agachamento	50.76 ± 16.90		44.60 ± 13.43		44.62 ± 11.44		41.46 ± 9.32		43.72 ± 7.55		44.86 ± 12.74		4.84*** (05)	11>12; 11>13; 11>14.
Saltos com contramovimento	46.93 ± 15.47		47.28 ± 13.87		45.03 ± 11.45		44.74 ± 11.24		43.48 ± 7.92		45.77 ± 12.49		1.22ns (01)	-

Notas: 1: M ± DP refere-se aos valores das médias e desvios-padrão; 2: F (p¹) refere-se ao valor da estatística F para testar a hipótese (nula) que as médias das variáveis não diferem entre si. Quanto maior for o valor F tanto maior é a chance de haver diferenças significativas. p¹ refere-se a uma estatística designada por *partial eta square* (i.e. *eta squared* parcial), uma estatística de magnitude do efeito. 3: Contraste refere-se aos resultados das múltiplas comparações entre as médias dos atletas das cinco idades. Assim, 15>14>13>12>11 significa que a média da altura de salto de todos os atletas com 15 anos é significativamente maior do que a dos atletas de 14 anos, e assim sucessivamente; (***) p < .001; ns representa diferenças não significativas.

ALTURA DO SALTO VERTICAL

Quando examinamos a cinemática (a forma do movimento) dos saltos verticais, notamos que o SJ é um movimento menos natural do que o CMJ, uma vez que quase todos os movimentos vigorosos são realizados com um “pequeno” contramovimento (Hasson et al., 2004). Por essa razão este salto é particularmente difícil de assimilar pelos mais jovens, e no nosso estudo foram efetivamente observados ligeiros contramovimentos, ainda que impercetíveis à vista desarmada, e realizados de forma inconsciente pelos participantes, durante os SJ. Estas ocorrências são apenas detetáveis quando as curvas de força são examinadas, e ocorrem com alguma frequência, tendo sido reportadas em estudos anteriores (Bobbert et al., 1996; 2008; Hatze, 1975; Moran & Wallace, 2007; Sheppard & Doyle, 2008; Voigt et al., 1995).

Dada a dificuldade de realização do movimento, bem como da diferente natureza das ações musculares, já explicada no início deste artigo, a altura de salto obtida com um CMJ é, normalmente, superior à do SJ, como pode ser observado na figura 3, sugerindo uma crescente capacidade de recorrer ao CAE com a idade. A quase inexistência de diferenças aos 11 anos poderá ser explicada pela incapacidade de exploração do CAE nesse escalão etário.

FIGURA 3. Altura de salto realizada durante o salto em agachamento (SJ) e salto com contramovimento (CMJ), de acordo com a idade do participante, para todas as modalidades desportivas

De notar que esta observação é apenas válida se considerarmos todos os participantes no estudo, independentemente da sua modalidade desportiva. Quando estes resultados são observados tendo em conta as modalidades, como reproduzido na figura 4, as conclusões são ligeiramente diferentes.

FIGURA 4. Resultados obtidos para a altura de salto, ao longo da idade dos participantes, em cada modalidade desportiva, durante o salto em agachamento (SJ) e o salto com contramovimento (CMJ), e comparação com a média de todas as modalidades

Observa-se que os andebolistas apresentam um aumento da altura de salto com a idade, mas em que esta é consistentemente inferior à das demais modalidades desportivas, tanto no CMJ como no SJ. Por outro lado, os voleibolistas apresentam maiores alturas em ambos os tipos de salto aos 11 anos de idade, mas aos 14 anos apenas alcançam alturas superiores às outras modalidades no CMJ. O polo aquático apresenta um aumento substancial da altura de salto aos 13 anos, mas, no ano seguinte, não melhora esse registo. No basquetebol, bem como no futebol, parece haver um crescimento constante e gradual da capacidade de alcançar alturas superiores com o avançar da idade. De notar que, por motivos alheios à nossa vontade, nesta primeira avaliação, os resultados dos futebolistas encontram-se limitados aos CMJ.

FORÇA DE IMPULSÃO VERTICAL

Apesar das diferenças de altura alcançadas com o SJ e com o CMJ, a força de impulsão vertical normalizada à massa corporal gerada pelos participantes é tendencialmente idêntica entre tipos de salto e cresce com a idade. Tal constata-se facilmente examinando a figura 5, onde os resultados relativos à força de impulsão vertical, normalizada à massa do participante, se encontram ilustrados. Isto indica que a força máxima gerada por unidade de massa pelo atleta não é o único fator determinante para que se alcance uma altura de salto mais elevada. Neste caso, a exploração de valores absolutos de força poderá ser mais discriminante, mas importaria, sobretudo, termos também em consideração o tempo de aplicação dessa força e, portanto, o impulso gerado.

FIGURA 5. Força de impulsão vertical realizada durante o salto em agachamento (SJ) e salto com contramovimento (CMJ), de acordo com a idade do participante, para todas as modalidades desportivas

A análise da força de impulsão vertical por modalidade desportiva (FIGURA 6) revela uma dinâmica distinta entre elas. Os praticantes de andebol, à semelhança da altura de salto, apresentam a menor capacidade de produção de força de impulsão. Por outro lado, os basquetebolistas apresentam a maior capacidade de produção de força de impulsão no SJ, mas não nos CMJ aos 14 anos, idade na qual os voleibolistas superam as demais modalidades.

De notar que, apesar da ligeira diminuição da força de impulsão vertical dos basquetebolistas aos 15 anos, tal não resulta numa diminuição da altura de salto, pelo que mais uma vez se sugere a ponderação dos restantes fatores que determinam a altura de salto, com ou sem contramovimento. De igual modo se percebe que nem sempre o CMJ permite níveis superiores de produção de força quando comparado com o SJ, o que reforça o peso dos complexos mecanismos neuromotores envolvidos.

FIGURA 6. Resultados da força de impulsão vertical, ao longo da idade dos participantes, de cada modalidade desportiva, durante o salto em agachamento (SJ) e o salto com contramovimento (CMJ) e comparação com a média de todas as modalidades

POTÊNCIA

A potência dos saltos, seja o SJ ou o CMJ, aumenta consistentemente com a idade, sendo o aumento mais acentuado a partir dos 12 anos, muito provavelmente associado aos processos de maturação. Dos 14 para os 15 anos ocorre uma redução da potência em ambos os tipos de salto. No entanto há que notar que tal não indica uma tendência dos desportistas para uma redução de potência nestas idades, mas sim o facto da média resultar exclusivamente do contributo dos basquetebolistas, que foram os únicos a ter participantes nesta faixa etária.

Na figura 7 observa-se que a potência gerada nos dois tipos de saltos não se distingue até aos 13 anos de idade, mostrando que a avaliação desta variável pode ser feita indistintamente através de qualquer dos saltos verticais em análise.

FIGURA 7. Potência dos membros inferiores durante o salto em agachamento (SJ) e salto com contramovimento (CMJ), de acordo com a idade do participante, para todas as modalidades desportivas

Apreciando os resultados obtidos para esta variável em cada modalidade desportiva (FIGURA 8), percebe-se a divisão das mesmas em dois grupos, independentemente do salto que se considere. Assim, inclui-se no grupo de maior potência o voleibol e o andebol, enquanto o basquetebol, o polo aquático e o futebol são as modalidades com menor potência gerada no salto.

FIGURA 8. Resultados obtidos para a potência do salto, ao longo da idade dos jogadores, em cada modalidade desportiva, durante o salto em agachamento (SJ) e o salto com contramovimento (CMJ) e comparação com a média de todas as modalidades

FIGURA 8. Resultados obtidos para a potência do salto, ao longo da idade dos jogadores, em cada modalidade desportiva, durante o salto em agachamento (SJ) e o salto com contramovimento (CMJ) e comparação com a média de todas as modalidades (cont.)

FORÇA NA RECEÇÃO AO SOLO

No que respeita à força na receção ao solo (FIGURA 9), percebe-se uma progressiva atenuação da sua intensidade máxima com a idade, sugerindo uma superior capacidade de amortecimento da queda, ação que envolve contrações excêntricas e mecanismos coordenativos complexos que poderão implicar um demorado processo de consolidação neuromotora. Compreende-se também que a dinâmica da receção ao solo parece ser razoavelmente independente do tipo de salto vertical que lhe esteve na origem.

FIGURA 9. Força vertical durante a receção do salto em agachamento (SJ) e salto com contramovimento (CMJ), de acordo com a idade do participante, para todas as modalidades desportivas

Analisando a força máxima de receção ao solo por grupos de praticantes de diferentes modalidades desportivas (FIGURA 10) percebe-se a mesma tendência geral para uma atenuação com a idade, mas uma elevada variabilidade entre grupos.

FIGURA 10. Resultados da força vertical durante a receção, ao longo da idade, dos praticantes de cada modalidade desportiva, durante o salto com agachamento (SJ) e o salto em contramovimento (CMJ) e comparação com a média de todas as modalidades

UMA ANÁLISE DAS MODALIDADES

Nos pontos seguintes, iremos discutir os principais resultados por modalidade desportiva: andebol, basquetebol, futebol, polo aquático e voleibol.

ANDEBOL

O andebol é um desporto caracterizado pela combinação de esforços intermitentes sendo as ações mais decisivas, os remates, saltos, *sprints* e contra-ataques, executados com grande precisão, velocidade, potência e força explosiva (Aloui et al., 2020). Alguns estudos reportaram que, além das habilidades técnicas e táticas, as características antropomé-

tricas, a força, a potência, e a velocidade de remate, são fatores determinantes para o sucesso competitivo no andebol (Aloui et al., 2020; Chelly et al., 2010; Vila et al., 2012). De facto, Ciplak et al. (2020) reportaram que as características antropométricas afetaram o desempenho do salto vertical em andebolistas do sexo feminino entre os 11 e 12 anos de idade. Já Ramirez-Campillo et al. (2020) referem que o treino específico de salto se mostrou uma estratégia eficiente e prática para aumentar o desempenho no andebol, permitindo uma melhoria da força muscular dos membros inferiores em jovens andebolistas de ambos os sexos.

No INEX, os andebolistas durante a primeira avaliação, distribuíram-se entre os 11 e os 14 anos de idade. Como esperado, apresentaram diferenças entre SJ e CMJ, sendo este último potenciador de maiores alturas de salto, como se constata pela figura 11 e quadro 2.

O gradual aumento da altura de salto com idade é suportado por um igual aumento da força de impulsão vertical e da potência, em ambos os saltos. Isto demonstra uma estreita relação entre a altura de salto e a capacidade de gerar força e potência pelos membros inferiores para os andebolistas desta faixa etária.

FIGURA 11. Média da altura de salto obtida pelos andebolistas nos saltos em agachamento (SJ) e com contramovimento (CMJ), em função da idade

Durante a receção ao solo observa-se uma maior capacidade de absorção do impacto aos 14 anos, comparativamente aos 11 anos, mas apenas nos SJ, pois no CMJ esta diferença não é substancial.

QUADRO 2. Resultados resultados obtidos para a altura de salto, força máxima de impulsão vertical, força máxima na receção e potência máxima do salto nos saltos em agachamento (SJ) e com contramovimento (CMJ), de acordo com a idade dos jogadores no andebol

ANDEBOL	11 ANOS	12 ANOS	13 ANOS	14 ANOS	15 ANOS
	<i>M ± DP</i>	<i>M ± DP</i>	<i>M ± DP</i>	<i>M ± DP</i>	<i>M ± DP</i>
ALTURA DE SALTO (CM)					
Saltos com agachamento	17.33 ± 3.52	17.75 ± 5.19	21.51 ± 3.73	22.55 ± 4.70	-
Saltos com contramovimento	18.87 ± 3.98	19.18 ± 5.00	22.23 ± 3.66	24.51 ± 5.48	-
FORÇA MÁXIMA DE IMPULSÃO VERTICAL (N/KG)					
Saltos com agachamento	18.52 ± 5.21	19.29 ± 2.54	19.97 ± 1.72	21.45 ± 2.25	-
Saltos com contramovimento	19.57 ± 1.79	19.60 ± 1.78	20.30 ± 1.78	21.15 ± 2.17	-
POTÊNCIA MÁXIMA DO SALTO (W)					
Saltos com agachamento	1351.99 ± 279.69	1724.49 ± 463.02	2050.77 ± 454.35	2510.34 ± 638.75	-
Saltos com contramovimento	1453.72 ± 356.93	1839.11 ± 524.78	2112.85 ± 398.06	2524.10 ± 709.13	-
FORÇA MÁXIMA NA RECEÇÃO (N/KG)					
Saltos com agachamento	42.21 ± 11.23	37.37 ± 10.29	41.74 ± 12.39	38.54 ± 10.26	-
Saltos com contramovimento	43.78 ± 16.92	42.00 ± 11.09	42.51 ± 9.95	43.87 ± 10.74	-

BASQUETEBOL

Também no basquetebol, os jogadores devem completar com sucesso múltiplas ações de alta intensidade e curta duração, tais como os *sprints*, manobras de corte e rotação, mudanças de direção, além de 40 a 60 saltos e receções (McInnes et al., 1995), que executam por jogo, com elevado nível de força e potência (Thomas et al., 2017). A capacidade de saltar é, por isso, uma das habilidades mais importantes no basquetebol, permitindo ao jogador mais chances de ser bem-sucedido em competição.

Na primeira avaliação do INEX, os basquetebolistas foram a única modalidade que incluiu atletas com 15 anos (FIGURA 12, QUADRO 3). Estes seguiram a tendência normal e apresentaram valores de altura de salto superiores nos CMJ, comparativamente com os SJ, com exceção dos atletas de 11 anos. Os valores de altura de salto aumentaram de forma muito semelhante entre os 11 e os 12 anos, começando, a partir desta idade, a ser superiores nos CMJ, talvez por consolidação dos mecanismos neuromotores subjacentes ao CAE.

FIGURA 12. Média da altura de salto obtida pelos basquetebolistas nos saltos em agachamento (SJ) e com contramovimento (CMJ), em função da idade

Apesar de apresentarem valores modestos de potência de salto, os basquetebolistas evidenciam uma maior força de impulsão vertical do que as demais modalidades. De notar que, ainda que a altura de salto seja maior durante o CMJ, a força de impulsão vertical (mas também a potência) tende a ser menor para este tipo de salto, do que para o SJ. Tais resultados evidenciam claramente a complexidade dos mecanismos envolvidos no salto vertical, em atletas altamente vocacionados para este tipo de movimento.

QUADRO 3. Resultados resultados obtidos para a altura de salto, força máxima de impulsão vertical, força máxima na recepção e potência máxima do salto nos saltos em agachamento (SJ) e com contramovimento (CMJ), de acordo com a idade dos jogadores no basquetebol

BASQUETEBOL	11 ANOS	12 ANOS	13 ANOS	14 ANOS	15 ANOS
	<i>M ± DP</i>	<i>M ± DP</i>	<i>M ± DP</i>	<i>M ± DP</i>	<i>M ± DP</i>
ALTURA DE SALTO (CM)					
Saltos com agachamento	20.21 ± 3.61	22.49 ± 4.48	24.08 ± 4.60	25.82 ± 4.99	27.02 ± 3.31
Saltos com contramovimento	19.82 ± 3.64	22.72 ± 4.68	25.02 ± 4.93	27.03 ± 5.78	28.36 ± 4.38
FORÇA MÁXIMA DE IMPULSÃO VERTICAL (N/KG)					
Saltos com agachamento	21.24 ± 2.22	22.97 ± 2.92	22.98 ± 2.54	23.59 ± 8.25	22.97 ± 4.14
Saltos com contramovimento	21.02 ± 2.36	21.68 ± 2.20	22.05 ± 2.18	21.89 ± 1.66	22.62 ± 2.02

QUADRO 3. Resultados resultados obtidos para a altura de salto, força máxima de impulsão vertical, força máxima na recepção e potência máxima do salto nos saltos em agachamento (SJ) e com contramovimento (CMJ), de acordo com a idade dos jogadores no basquetebol (cont.)

BASQUETEBOL	11 ANOS	12 ANOS	13 ANOS	14 ANOS	15 ANOS
	<i>M ± DP</i>	<i>M ± DP</i>	<i>M ± DP</i>	<i>M ± DP</i>	<i>M ± DP</i>
POTÊNCIA MÁXIMA DO SALTO (W)					
Saltos com agachamento	695.51 ± 233.05	969.10 ± 394.33	1119.35 ± 395.15	1406.12 ± 472.48	1620.73 ± 390.10
Saltos com contramovimento	706.60 ± 174.55	968.86 ± 348.11	1112.96 ± 271.46	1362.90 ± 336.24	1521.92 ± 350.73
FORÇA MÁXIMA NA RECEÇÃO (N/KG)					
Saltos com agachamento	56.79 ± 10.96	47.49 ± 12.28	46.92 ± 11.08	43.72 ± 8.25	43.72 ± 7.55
Saltos com contramovimento	47.41 ± 15.01	49.70 ± 13.08	45.37 ± 10.95	44.31 ± 10.30	42.90 ± 7.40

FUTEBOL

O futebol é um desporto altamente popular, tanto pela sua dimensão recreativa como pela sua capacidade de integrar múltiplas ações físicas como correr, saltar, chutar e mudar de direção, constantemente repetidos tanto no treino, como em competição. A sua otimização é essencial para a melhoria do desempenho desportivo, não só em adultos, mas também em jovens atletas do sexo masculino e feminino (Cometti et al., 2001; Haugen et al., 2012; Meylan & Malatesta, 2009; Ramos-Campo et al., 2016; Svensson & Drust, 2005). Dada a importância dos membros inferiores nesta modalidade, bem como a sua capacidade de produção de força explosiva, são geralmente encontradas elevadas taxas de desenvolvimento de força e potência (Silva et al., 2015). Taticamente, o salto vertical é importante, pois permite a obtenção de uma supremacia dos jogadores sobre os oponentes. na consecução de ações tanto defensivas como ofensivas.

Como já referimos, nesta primeira avaliação, e por motivos alheios à nossa vontade, foram apenas avaliados os saltos CMJ nos praticantes de futebol. Não obstante, e apesar desta lacuna nos dados, a apresentação dos resultados de CMJ permitem tecer uma imagem da capacidade máxima de salto destes atletas pois, como referido anteriormente, é geralmente este tipo de salto que permite alcançar maiores alturas.

Segundo Malina (2004), existem diferenças consideráveis nas diversas capacidades funcionais em adolescentes rapazes praticantes de futebol, entre os 13 e os 16 anos. Parte destas diferenças são atribuídas aos diversos estágios de desenvolvimento dos jogadores, maturidade física e aumento do número de horas de treino. Efetivamente, os nossos resultados demonstram que a capacidade de salto aumenta com a idade, em particular a partir dos 13 anos, observando-se uma maior taxa de crescimento da altura de salto, conforme ilustrado na figura 13 e quadro 4.

FIGURA 13. Média da altura de salto obtida pelos futebolistas nos saltos em agachamento (SJ) e com contramovimento (CMJ), em função da idade

Ainda que não seja possível comparar as demais variáveis com o desempenho no SJ, podemos observar que, com o avanço da idade, a força de impulsão vertical durante o CMJ não se altera substancialmente. Por outro lado, a potência do salto aumenta com a idade e a força na recepção diminui. Isto indica um desenvolvimento de habilidades motoras que promovem a realização de movimentos mais potentes com a mesma aplicação de força, ou seja, investindo na velocidade de realização do salto.

QUADRO 4. Resultados resultados obtidos para a altura de salto, força máxima de impulsão vertical, força máxima na recepção e potência máxima do salto nos saltos em agachamento (SJ) e com contramovimento (CMJ), de acordo com a idade dos jogadores fo futebol

FUTEBOL	11 ANOS	12 ANOS	13 ANOS	14 ANOS	15 ANOS
	<i>M ± DP</i>	<i>M ± DP</i>	<i>M ± DP</i>	<i>M ± DP</i>	<i>M ± DP</i>
ALTURA DE SALTO (CM)					
Saltos com agachamento					
Saltos com contramovimento					
FORÇA MÁXIMA DE IMPULSÃO VERTICAL (N/KG)					
Saltos com agachamento					
Saltos com contramovimento					

QUADRO 4. Resultados resultados obtidos para a altura de salto, força máxima de impulsão vertical, força máxima na recepção e potência máxima do salto nos saltos em agachamento (SJ) e com contramovimento (CMJ), de acordo com a idade dos jogadores no futebol (cont.)

FUTEBOL	11 ANOS	12 ANOS	13 ANOS	14 ANOS	15 ANOS
	<i>M ± DP</i>	<i>M ± DP</i>	<i>M ± DP</i>	<i>M ± DP</i>	<i>M ± DP</i>
POTÊNCIA MÁXIMA DO SALTO (W)					
Saltos com agachamento					
Saltos com contramovimento					
FORÇA MÁXIMA NA RECEÇÃO (N/KG)					
Saltos com agachamento					
Saltos com contramovimento					

POLO AQUÁTICO

O desempenho nos saltos verticais constitui uma habilidade técnica fundamental nas mais diversas modalidades desportivas, incluindo o polo aquático (Platanou, 2006; Sekulic et al., 2015). Além dos *sprints* em técnica de nado, o polo aquático inclui movimentos explosivos de grande intensidade e curta duração, súbitos arranques e paragens, saltos e mudanças de direção, todas estas habilidades dependendo da força e potência explosiva dos membros inferiores (Dias de Castro et al., 2021; Keiner et al., 2020; Zinner et al., 2015), mas com a particularidade destas ações serem realizadas no meio aquático.

A habilidade de impulsionar o corpo para fora da água (*kick*) para executar gestos como passar a bola, rematar ou bloquear, é considerado um atributo fundamental nos jogadores, tendo um impacto significativo no resultado do jogo de polo aquático (Keiner et al., 2020; McCluskey et al., 2010). De modo a concretizar este salto, o jogador deve mover o seu corpo verticalmente para fora de água para passar a bola, receber ou rematar, ou impedir o adversário de realizar as mesmas ações (Sanders, 1999). Isto é particularmente importante nas jogadas ofensivas, visto que quanto maior e explosivo for o salto, menor probabilidade terá o guarda-redes de impedir a marcação de golo.

A capacidade de saltar verticalmente dentro de água está diretamente relacionada com a habilidade de saltar em seco. Platanou (2006), avaliou saltos verticais em jogadores de polo aquático de elite, dentro e fora de água e encontrou diferenças consideráveis entre os jogadores de diferentes posições e níveis de competição. O estudo mostrou que, os sujeitos que exercitaram os seus saltos dentro de água mais frequentemente (como foi o caso dos guarda redes), tiveram uma melhoria mais expressiva na capacidade de saltar fora de água.

No INEX, os praticantes de polo aquático, nesta primeira avaliação, distribuíram-se entre os 12 e os 14 anos de idade. Os resultados obtidos são apresentados na figura 14 e no quadro 5. Apesar da importância da capacidade de salto para a posição no jogo, tal não foi considerado, atendendo ao desejavelmente incipiente nível de especialização da amostra. Entre os 12 e 13 anos de idade, observa-se um aumento da altura de salto, tanto com SJ como CMJ. No entanto, aos 14 anos de idade não se observa uma continuidade deste aumento. Ainda que tal não tenha sido analisado, poder-se-á especular que tal resulte da especificidade da posição em jogo. Isto é, ainda que os guarda-redes possam (como indica a literatura) realizar maiores alturas de salto, estes apresentam uma menor contribuição para a média da amostra nesta idade, comparativamente aos demais jogadores de outras posições que possam, porventura, alcançar menores alturas.

FIGURA 14. Média da altura de salto obtida pelos jogadores de polo aquático nos saltos em agachamento (SJ) e com contramovimento (CMJ), em função da idade

Estes resultados tornam-se particularmente interessantes quando comparamos a altura de salto com outras variáveis de desempenho. Por exemplo, ainda que não haja substancial diferença em termos de força de impulsão vertical e potência entre SJ e CMJ, estas aumentam com a idade. Este aumento é, no entanto, menos pronunciado na força de impulsão, indicando que esta possa ser a principal determinante na capacidade de elevação vertical dos jogadores de polo aquático.

QUADRO 5. Resultados resultados obtidos para a altura de salto, força máxima de impulsão vertical, força máxima na receção e potência máxima do salto nos saltos em agachamento (SJ) e com contramovimento (CMJ), de acordo com a idade dos jogadores no polo aquático

POLO AQUÁTICO	11 ANOS	12 ANOS	13 ANOS	14 ANOS	15 ANOS
	<i>M ± DP</i>	<i>M ± DP</i>	<i>M ± DP</i>	<i>M ± DP</i>	<i>M ± DP</i>
ALTURA DE SALTO (CM)					
Saltos com agachamento		20.64 ± 4.59	25.23 ± 5.57	25.32 ± 2.36	-
Saltos com contramovimento		21.73 ± 5.04	26.22 ± 4.81	26.44 ± 5.89	-
FORÇA MÁXIMA DE IMPULSÃO VERTICAL (N/KG)					
Saltos com agachamento		19.65 ± 2.00	21.32 ± 2.40	21.66 ± 1.92	-
Saltos com contramovimento		20.32 ± 1.90	21.45 ± 1.84	21.56 ± 1.38	-
POTÊNCIA MÁXIMA DO SALTO (W)					
Saltos com agachamento		757.75 ± 258.88	972.50 ± 287.54	1154.12 ± 375.85	-
Saltos com contramovimento		784.21 ± 241.40	1079.49 ± 299.10	1145.34 ± 349.53	-
FORÇA MÁXIMA NA RECEÇÃO (N/KG)					
Saltos com agachamento		46.19 ± 15.30	47.56 ± 13.49	43.02 ± 7.49	-
Saltos com contramovimento		46.81 ± 16.32	48.26 ± 13.43	43.93 ± 16.18	-

VOLEIBOL

O voleibol é uma modalidade desportiva em que o sucesso depende, em grande parte, de fatores como a precisão de remate e a potência dos jogadores (D'Isanto et al., 2017). Dentro da classificação fisiológica das modalidades desportivas, é considerado uma atividade intermitente e alternada entre esforços aeróbios e anaeróbios, com uma grande participação de habilidades como saltar rápida e explosivamente. O salto é um elemento chave para o sucesso desta modalidade (Satler et al., 2015), estando relacionado com habilidades de ataque (serviços e remates) e de defesa (bloco). Por exemplo, uma maior altura de salto durante um bloco, potencia a redução da eficácia do gesto do atacante. Por outro lado, durante o remate, uma maior elevação permite que o jogador entre em contato com a bola acima da altura da rede (e do bloco), possibilitando-lhe a escolha do melhor ângulo de remate. De facto, de acordo com a revisão de Ziv e Lidor (2010), os jogadores de voleibol (masculinos e femininos) com melhor desempenho em jogo, são aqueles que conseguem saltar mais alto durante um salto vertical.

De acordo com a figura 15 e o quadro 6, os voleibolistas, aos 11 de idade, são capazes de saltar mais alto em SJ do que em CMJ. Isto é contrário ao observado nas demais modalidades desportivas, e poderá indicar que ainda não desenvolveram as capacidades necessárias ao aproveitamento do efeito de potenciação decorrente do CAE. A partir desta idade, o habitual padrão de supremacia do CMJ torna-se evidente.

FIGURA 15. Média da altura de salto obtida pelos jogadores de voleibol nos saltos em agachamento (SJ) e com contramovimento (CMJ), em função da idade

De notar que, ao longo das idades, a potência de salto aumentou consistentemente. No entanto, a força de impulsão vertical não apresenta um crescimento semelhante, indicando que o aumento da potência se deve ao aumento da velocidade de execução do salto. Em oposição, observa-se uma diminuição da força na receção, a qual diminui entre os 11 e os 14 anos, sugerindo uma crescente capacidade de amortecimento do impacto.

QUADRO 6. Resultados resultados obtidos para a altura de salto, força máxima de impulsão vertical, força máxima na receção e potência máxima do salto nos saltos em agachamento (SJ) e com contramovimento (CMJ), de acordo com a idade dos jogadores no voleibol

VOLEIBOL	11 ANOS	12 ANOS	13 ANOS	14 ANOS	15 ANOS
	<i>M ± DP</i>	<i>M ± DP</i>	<i>M ± DP</i>	<i>M ± DP</i>	<i>M ± DP</i>
ALTURA DE SALTO (CM)					
Saltos com agachamento	22.98 ± 5.91	21.69 ± 4.93	24.03 ± 5.29	25.75 ± 3.73	
Saltos com contramovimento	21.12 ± 6.91	22.55 ± 5.50	25.26 ± 5.09	28.839 ± 4.69	
FORÇA MÁXIMA DE IMPULSÃO VERTICAL (N/KG)					
Saltos com agachamento	21.03 ± 2.41	20.41 ± 2.28	21.03 ± 2.12	21.32 ± 2.08	
Saltos com contramovimento	20.85 ± 1.57	21.06 ± 2.99	21.56 ± 2.62	21.78 ± 2.25	

QUADRO 6. Resultados resultados obtidos para a altura de salto, força máxima de impulsão vertical, força máxima na receção e potência máxima do salto nos saltos em agachamento (SJ) e com contramovimento (CMJ), de acordo com a idade dos jogadores no (cont.)

VOLEIBOL	11 ANOS	12 ANOS	13 ANOS	14 ANOS	15 ANOS
	<i>M ± DP</i>	<i>M ± DP</i>	<i>M ± DP</i>	<i>M ± DP</i>	<i>M ± DP</i>
POTÊNCIA MÁXIMA DO SALTO (W)					
Saltos com agachamento	1658.20 ± 184.86	1789.57 ± 529.44	2138.71 ± 643.55	2594.99 ± 601.73	
Saltos com contramovimento	1500.87 ± 200.95	1842.97 ± 501.55	2140.33 ± 547.96	2589.82 ± 580.89	
FORÇA MÁXIMA NA RECEÇÃO (N/KG)					
Saltos com agachamento	56.79 ± 10.96	44.24 ± 14.97	41.48 ± 8.52	40.83 ± 9.64	
Saltos com contramovimento	53.54 ± 16.61	41.78 ± 12.18	41.61 ± 9.86	41.19 ± 10.74	

QUADROS E IMAGENS SUPLEMENTARES

Nos quadros 7 e 8 são apresentados os valores médios e respetivos desvios padrão dos resultados obtidos para o SJ e o CMJ, de acordo com a idade dos participantes, nas cinco modalidades desportivas estudadas. De sublinhar que os jogadores de futebol não realizaram os SJ e que algumas modalidades não apresentam participantes para determinadas idades.

QUADRO 7. Resultados obtidos no salto em agachamento, de acordo com a idade dos participantes e as respetivas modalidades desportivas, para a altura de salto, força máxima de impulsão vertical, força máxima na receção e potência máxima do salto

PARÂMETRO	11 ANOS	12 ANOS	13 ANOS	14 ANOS	15 ANOS
	(<i>n</i> = 82)	(<i>n</i> = 167)	(<i>n</i> = 198)	(<i>n</i> = 156)	(<i>n</i> = 29)
	<i>M ± DP</i>	<i>M ± DP</i>	<i>M ± DP</i>	<i>M ± DP</i>	<i>M ± DP</i>
ALTURA DE SALTO (CM))					
Andebol	17.33 ± 3.52	17.75 ± 5.19	21.51 ± 3.73	22.55 ± 4.70	-
Basquetebol	20.21 ± 3.61	22.49 ± 4.48	24.08 ± 4.60	25.82 ± 4.99	27.02 ± 3.31
Futebol	-	-	-	-	-
Polo aquático	-	20.64 ± 4.59	25.23 ± 5.57	25.32 ± 2.36	-
Voleibol	22.98 ± 5.91	21.69 ± 4.93	24.03 ± 5.29	25.75 ± 3.73	-

QUADRO 7. Resultados obtidos no salto em agachamento, de acordo com a idade dos participantes e as respetivas modalidades desportivas, para a altura de salto, força máxima de impulsão vertical, força máxima na receção e potência máxima do salto (cont.)

PARÂMETRO	11 ANOS	12 ANOS	13 ANOS	14 ANOS	15 ANOS
	(<i>n</i> = 82)	(<i>n</i> = 167)	(<i>n</i> = 198)	(<i>n</i> = 156)	(<i>n</i> = 29)
	<i>M</i> ± <i>DP</i>	<i>M</i> ± <i>DP</i>	<i>M</i> ± <i>DP</i>	<i>M</i> ± <i>DP</i>	<i>M</i> ± <i>DP</i>
FORÇA MÁXIMA DE IMPULSÃO VERTICAL (N/KG)					
Andebol	18.52 ± 5.21	19.29 ± 2.54	19.97 ± 1.72	21.45 ± 2.25	-
Basquetebol	21.24 ± 2.22	22.97 ± 2.92	22.98 ± 2.54	23.59 ± 8.25	22.97 ± 4.14
Futebol	-	-	-	-	-
Polo aquático	-	19.65 ± 2.00	21.32 ± 2.40	21.66 ± 1.92	-
Voleibol	21.03 ± 2.41	20.41 ± 2.28	21.03 ± 2.12	21.32 ± 2.08	-
POTÊNCIA MÁXIMA DO SALTO (W)					
Andebol	1351.99 ± 279.69	1724.49 ± 463.02	2050 ± 77 ± 454.35	2510.34 ± 638.75	-
Basquetebol	695.51 ± 233.05	969.10 ± 394.33	1119.35 ± 395.15	1406.12 ± 472.48	1620.73 ± 390.10
Futebol	-	-	-	-	-
Polo aquático	-	757.75 ± 258.88	972.50 ± 287.54	1154.12 ± 375.85	-
Voleibol	1658.20 ± 184.86	1789.57 ± 529.44	2138.71 ± 643.55	2594.99 ± 601.73	-
FORÇA MÁXIMA NA RECEÇÃO (N/KG)					
Andebol	42.21 ± 11.23	37.37 ± 10.29	41.74 ± 12.39	38.54 ± 10.26	-
Basquetebol	56.79 ± 10.96	47.49 ± 12.28	46.92 ± 11.08	43.72 ± 8.25	43.72 ± 7.55
Futebol	-	-	-	-	-
Polo aquático	-	46.19 ± 15.30	47.56 ± 13.49	43.02 ± 7.49	-
Voleibol	56.79 ± 10.96	44.24 ± 14.97	41.48 ± 8.52	40.83 ± 9.64	-

QUADRO 8. Resultados obtidos no salto com contramovimento, de acordo com a idade dos participantes e as respetivas modalidades desportivas, para a altura de salto, força máxima de impulsão vertical, força máxima na receção e potência máxima do salto

PARÂMETRO	11 ANOS	12 ANOS	13 ANOS	14 ANOS	15 ANOS
	(<i>n</i> = 82)	(<i>n</i> = 167)	(<i>n</i> = 198)	(<i>n</i> = 156)	(<i>n</i> = 29)
	<i>M</i> ± <i>DP</i>	<i>M</i> ± <i>DP</i>	<i>M</i> ± <i>DP</i>	<i>M</i> ± <i>DP</i>	<i>M</i> ± <i>DP</i>
ALTURA DE SALTO (CM))					
Andebol	18.87 ± 3.98	19.18 ± 5.00	22.23 ± 3.66	24.51 ± 5.48	-
Basquetebol	19.82 ± 3.64	22.72 ± 4.68	25.02 ± 4.93	27.03 ± 5.78	28.36 ± 4.38
Futebol	-	22.97 ± 3.98	24.64 ± 4.26	28.17 ± 4.41	-
Polo aquático	-	21.73 ± 5.04	26.22 ± 4.81	26.44 ± 5.89	-
Voleibol	21.12 ± 6.91	22.55 ± 5.50	25.26 ± 5.09	28.839 ± 4.69	-
FORÇA MÁXIMA DE IMPULSÃO VERTICAL (N/KG)					
Andebol	19.57 ± 1.79	19.60 ± 1.78	20.30 ± 1.78	21.15 ± 2.17	-
Basquetebol	21.02 ± 2.36	21.68 ± 2.20	22.05 ± 2.18	21.89 ± 1.66	22.62 ± 2.02
Futebol	-	22.46 ± 2.95	21.18 ± 1.74	22.30 ± 3.38	-
Polo aquático	-	20.32 ± 1.90	21.45 ± 1.84	21.56 ± 1.38	-
Voleibol	20.85 ± 1.57	21.06 ± 2.99	21.56 ± 2.62	21.78 ± 2.25	-
POTÊNCIA MÁXIMA DO SALTO (W)					
Andebol	1453.72 ± 356.93	1839.11 ± 524.78	2112.85 ± 398.06	2524.10 ± 709.13	-
Basquetebol	706.60 ± 174.55	968.86 ± 348.11	1112.96 ± 271.46	1362.90 ± 336.24	1521.92 ± 350.73
Futebol	-	850.39.19 ± 277.98	1011.22 ± 231.49	1262.86 ± 299.75	-
Polo aquático	-	784.21 ± 241.40	1079.49 ± 299.10	1145.34 ± 349.53	-
Voleibol	1500.87 ± 200.95	1842.97 ± 501.55	2140.33 ± 547.96	2589.82 ± 580.89	-

QUADRO 8. Resultados obtidos no salto com contramovimento, de acordo com a idade dos participantes e as respetivas modalidades desportivas, para a altura de salto, força máxima de impulsão vertical, força máxima na receção e potência máxima do salto (cont.)

PARÂMETRO	11 ANOS	12 ANOS	13 ANOS	14 ANOS	15 ANOS
	(n = 82)	(n = 167)	(n = 198)	(n = 156)	(n = 29)
	M ± DP	M ± DP	M ± DP	M ± DP	M ± DP
FORÇA MÁXIMA NA RECEÇÃO (N/KG)					
Andebol	43.78 ± 16.92	42.00 ± 11.09	42.51 ± 9.95	43.87 ± 10.74	-
Basquetebol	47.41 ± 15.01	49.70 ± 13.08	45.37 ± 10.95	44.31 ± 10.30	42.90 ± 7.40
Futebol	-	51.35 ± 14.37	47.19 ± 11.95	48.04 ± 11.74	-
Polo aquático	-	46.81 ± 16.32	48.26 ± 13.43	43.93 ± 16.18	-
Voleibol	53.54 ± 16.61	41.78 ± 12.18	41.61 ± 9.86	41.19 ± 10.74	-

De modo a ilustrar de forma mais clara as diferenças entre saltos de cada modalidade desportiva, estes resultados podem ser consultados graficamente. A figura 16 apresenta graficamente os resultados obtidos no salto em agachamento (SJ) e contramovimento (CMJ), de acordo com a idade dos participantes e as respetivas modalidades desportivas, para a força máxima de impulsão vertical (FIV), potência máxima do salto (POT) e força máxima na receção (FR).

FIGURA 16. Valores médios obtidos no salto em agachamento (SJ) e contramovimento (CMJ), de acordo com a idade dos participantes, em todas as modalidades desportivas, para a força máxima de impulsão vertical, potência máxima do salto e força máxima na receção

FIGURA 16. Valores médios obtidos no salto em agachamento (SJ) e contramovimento (CMJ), de acordo com a idade dos participantes, em todas as modalidades desportivas, para a força máxima de impulsão vertical, potência máxima do salto e força máxima na receção (cont.)

CONCLUSÕES

No quadro dos vários domínios que contribuíram para a concretização do projeto INEX, no domínio biológico foram avaliados distintos territórios relacionadas com o crescimento físico, a composição corporal, o somatótipo, a maturação biológica e o desempenho motor. Inserida na apreciação das habilidades relacionadas com o desenvolvimento motor dos atletas, a biomecânica contribuiu com a avaliação e caracterização das ações envolvidas nos saltos verticais, nomeadamente saltos em agachamento (SJ) e saltos com contramovimento (CMJ), sua importância, conexão e envolvimento em torno da questão fundamental do projeto "INEX: Em busca da excelência no desporto".

De uma forma geral, considerando as confluências das diferentes modalidades e as especificidades de cada uma, pudemos constatar que os resultados encontrados na fase inicial do INEX, no que às variáveis biomecânicas selecionadas para avaliação dizem respeito, mostram um aumento das forças de impulsão vertical, potência e altura de salto, com o aumento da idade. Ainda que, na generalidade, esteja confirmado que o CMJ permite

alcançar maiores alturas de salto do que o SJ, tal é dependente da modalidade praticada. Outros fatores também se revelaram importantes, como a força de impulsão e potência gerada, ambas com diferentes associações às modalidades desportivas e estado maturacional dos seus praticantes.

Por outro lado, as forças na receção ao solo tenderam a diminuir com a idade. Isto traduz-se num aumento da capacidade de amortecimento da carga na receção do salto, muito provavelmente devido ao desenvolvimento do complexo de fatores neuromotores determinantes dessa ação. Com o avançar da idade e experiência de treino, os atletas conseguiram interiorizar o movimento e executar a receção ao solo de forma suave, amortecendo a queda e evitando futuras lesões.

Das conclusões da etapa inicial deste estudo podemos sublinhar que os saltos verticais (SJ e CMJ) constituem instrumentos importantes para a monitorização da progressão da capacidade funcional entre diferentes escalões etários, nomeadamente no que à capacidade de produção de força e potência diz respeito, bem como à respetiva tradução em altura de salto. Os treinadores deverão estar cientes destas particularidades, especialmente aquelas associadas à sua modalidade.

IMPLICAÇÕES PARA O TREINADOR

1. Os saltos verticais são uma ferramenta útil para aferir a função motora dos membros inferiores em jovens atletas. No entanto, apenas o salto em contramovimento permite aferir a capacidade de utilização do CAE, o que se traduz em alturas de salto superiores.

2. A idade do atleta deverá ser tida em conta quando analisada a sua capacidade de saltar verticalmente, bem como o tipo de salto que realiza. Não obstante, a altura de salto deverá ser analisada em conjunto com outras variáveis por forma a entender quais constituem os determinantes do desempenho motor.

3. As receções ao solo estão associadas a uma maior incidência de lesões dos membros inferiores. Como tal, os treinadores deverão incentivar os atletas, desde idades mais jovens, a realizarem uma aterragem mais suave, mediada pela flexão dos membros inferiores e tronco. Os atletas deverão aprender que a maior altura de salto é obtida pela sua capacidade de impulsão, e não pela força com que aterram.

4. Rotinas de salto vertical deverão ser implementadas no planeamento de treino, não só como meio de desenvolvimento da habilidade motora, mas também para efeitos de monitorização e acompanhamento do desenvolvimento do atleta e adequação do referido plano.

5. Este estudo apresenta resultados por modalidade, agrupando assim as diferentes posições em jogo e especialidades dos jogadores. No entanto, o treinador deverá procurar avaliar e adequar os seus programas de treino às particularidades da sua modalidade e dos atletas, garantindo assim a aplicação dos estímulos de treino adequados às suas exigências motoras.

6. O treinador que implemente uma rotina de avaliação de altura de salto, e munido da informação média da capacidade de salto dos atletas da sua modalidade, poderá usar esta informação para ajudar a selecionar jogadores para diferentes posições de jogo, mediante a sua capacidade de salto.

7. Os resultados deste estudo são baseados em procedimentos metodológicos robustos e equipamentos precisos. Como tal, o treinador poderá recorrer a estes resultados como uma referência para comparação da capacidade de salto vertical dos seus atletas.

REFERÊNCIAS

- Aloui, G., Hermassi, S., Hammami, M., Cherni, Y., Gaamouri, N., Shephard, R. J., van den Tillaar, R., & Chelly, M. S. (2020). Effects of elastic band based plyometric exercise on explosive muscular performance and change of direction abilities of male team handball players. *Frontiers in Physiology*, 11, 604983. doi:10.3389/fphys.2020.604983
- Arnason, A., Sigurdsson, S. B., Gudmundsson, A., Holme, I., Engebretsen, L., & Bahr, R. (2004). Physical fitness, injuries, and team performance in soccer. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 36(2), 278-285. doi:10.1249/01.MSS.0000113478.92945.CA
- Aura, O., & Komi, P. V. (1986). Effects of prestretch intensity on mechanical efficiency of positive work and on elastic behavior of skeletal muscle in stretch-shortening cycle exercise. *International Journal of Sports Medicine*, 7(3), 137-143.
- Barnes, J. L., Schilling, B. K., Falvo, M. J., Weiss, L. W., Creasy, A. K., & Fry, A. C. (2007). Relationship of jumping and agility performance in female volleyball athletes. *The Journal of Strength & Conditioning Research*, 21(4), 1192-1196. doi:10.1519/R-22416.1
- Battaglia, G., Paoli, A. B., M., Bianco, A., & Palma, A. (2014). Influence of a sport-specific training background on vertical jumping and throwing performance in young female basketball and volleyball players. *The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness*, 54(2), 581-587.
- Baxter-Jones, A. D. (1995). Growth and development of young athletes: Should competition levels be age related? *Sports Medicine*, 20(2), 59-64. doi:10.2165/00007256-199520020-00001
- Ben Abdelkrim, N., El Fazaa, S., & El Ati, J. (2007). Time-motion analysis and physiological data of elite under-19-year-old basketball players during competition. *British Journal of Sports Medicine*, 41(2), 69-75. doi:10.1136/bjsm.2006.032318
- Bencke, J., Damsgaard, R., Saekmose, A., Jorgensen, P., Jorgensen, K., & Klausen, K. (2002). Anaerobic power and muscle strength characteristics of 11 years old elite and non-elite boys and girls from gymnastics, team handball, tennis and swimming. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 12(3), 171-178. doi:10.1034/j.1600-0838.2002.01128.x
- Bobbert, M. F. (2012). Why is the force-velocity relationship in leg press tasks quasi-linear rather than hyperbolic? *Journal of Applied Physiology*, 112(12), 1975-1983. doi:10.1152/jappphysiol.00787.2011
- Bobbert, M. F., & Casius, L. J. (2005). Is the effect of a countermovement on jump height due to active state development? *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 37(3), 440-446. doi:10.1249/01.mss.0000155389.34538.97
- Bobbert, M. F., Casius, L. J., Sijpkens, I. W., & Jaspers, R. T. (2008). Humans adjust control to initial squat depth in vertical squat jumping. *Journal of Applied Physiology*, 105(5), 1428-1440. doi:10.1152/jappphysiol.90571.2008
- Bobbert, M. F., Gerritsen, K. G., Litjens, M. C., & Van Soest, A. J. (1996). Why is countermovement jump height greater than squat jump height? *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 28(11), 1402-1412.
- Bosco, C., & Komi, P. V. (1980). Influence of aging on the mechanical behavior of leg extensor muscles. *European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology*, 45(2-3), 209-219. doi:10.1007/BF00421329
- Bosco C, L. P., Komi PV. (1983). A simple method for measurement of mechanical power in jumping. *European Journal of Applied Physiology*, 50(2), 273-282. doi:10.1007/BF00422166
- Castagna, C., & Castellini, E. (2013). Vertical jump performance in Italian male and female national team soccer players. *The Journal of Strength & Conditioning Research*, 27(4), 1156-1161. doi:10.1519/JSC.0b013e3182610999
- Chelly, M. S., Hermassi, S., & Shephard, R. J. (2010). Relationships between power and strength of the upper and lower limb muscles and throwing velocity in male handball players. *The Journal of Strength & Conditioning Research*, 24(6), 1480-1487. doi:10.1519/JSC.0b013e3181d32fbf
- Ciplak, M. E., Eler, N., Eler, S., & Acar, H. (2020). The relationship between anthropometry and jumping performance in handball. *Progress in Nutrition*, 22(2), 536-540.
- Cometti, G., Maffiuletti, N. A., Pousson, M., Chatard, J. C., & Maffulli, N. (2001). Isokinetic strength and anaerobic power of elite, subelite and amateur French soccer players. *International Journal of Sports Medicine*, 22(1), 45-51. doi:10.1055/s-2001-11331
- D'Isanto, T., Altavilla, G., & Raiola, G. (2017). Teaching method in volleyball service: Intensive and extensive tolls in cognitive and ecological approach. *Journal of Physical Education and Sport*, 17(Supplement 5), 2222-2227. doi:10.7752/jpes.2017.s5233
- Di Prampero, P. E. (2015). *La locomozione umana su terra, in acqua, in aria: Fatti e teorie* (2nd ed.). Edi-Ermes.
- Dias de Castro, C., Tucher, G., Paixão, D. A., Vasques, D. M., Garrido, N., & De Souza Castro, F. (2021). Agility, vertical jump, and shot velocity of Brazilian water polo players: correlations and top performances analysis. *The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness*, 26. doi:10.23736/S0022-4707.21.12318-7
- Duthie, G. M. (2006). A framework for the physical development of elite rugby union players. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 1(1), 2-13. doi:10.1123/ijsp.1.1.2
- Gerodimos, V., Karatrantou, K., Dipla, K., Zafeiridis, A., Tsiakaras, N., & Sotiariadis, S. (2013). Age-related differences in peak handgrip strength between wrestlers and nonathletes during the developmental years. *The Journal of Strength & Conditioning Research*, 27(3), 616-623. doi:10.1519/JSC.0b013e318257812e
- Hasson, C. J., Dugan, E. L., Doyle, T. L., Humphries, B., & Newton, R. U. (2004). Neuromechanical strategies employed to increase jump height during the initiation of the squat jump. *Journal of Electromyography and Kinesiology*, 14(4), 515-521. doi:10.1016/j.jelekin.2003.12.004
- Hatze, H. (1975). A new method for the simultaneous measurement of the movement of inertia, the damping coefficient and the location of the centre of mass of a body segment in situ. *European Journal of Applied Physiology*, 34(4), 217-226.
- Haugen, T. A., Tonnessen, E., & Seiler, S. (2012). Speed and countermovement-jump characteristics of elite female soccer players, 1995-2010. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 7(4), 340-349. doi:10.1123/ijsp.7.4.340
- Jimenez-Reyes, P., Samozino, P., Cuadrado-Penafiel, V., Conceicao, F., Gonzalez-Badillo, J. J., & Morin, J. B. (2014). Effect of countermovement on power-force-velocity profile. *European Journal of Applied Physiology*, 114(11), 2281-2288. doi:10.1007/s00421-014-2947-1
- Karatrantou, K., Gerodimos, V., Voutselas, V., Manouras, N., Famisis, K., & Ioakimidis, P. (2019). Can sport-specific training affect vertical jumping ability during puberty? *Biology of Sport*, 36(3), 217-224. doi:10.5114/biolSport.2019.85455
- Keiner, M., Rahse, H., Wirth, K., Hartmann, H., Fries, K., & Haff, G. G. (2020). Influence of maximal strength on in-water and dry-land performance in young water polo players. *The Journal of Strength & Conditioning Research*, 34(7), 1999-2005. doi:10.1519/JSC.0000000000002610
- Komi, P. V. (2000). Stretch-shortening cycle: a powerful model to study normal and fatigued muscle. *Journal of Biomechanics*, 33(10), 1197-1206.
- Maffulli, N., King, J. B., & Helms, P. (1994). Training in elite young athletes (The Training of Young Athletes (TOYA) Study): Injuries, flexibility and isometric strength. *British Journal of Sports Medicine*, 28(2), 123-136. doi:10.1136/bjsm.28.2.123
- Malina, R. M., Eisenmann, J. C., Cumming, S. P., Ribeiro, B., & Aroso, J. (2004). Maturity-associated variation in the growth and functional capacities of youth football (soccer) players 13-15 years. *European Journal of Applied Physiology*, 91(5-6), 555-562. doi:10.1007/s00421-003-0995-z
- Markovic, G., & Jaric, S. (2007). Is vertical jump height a body size-independent measure of muscle power? *Journal of Sports Sciences*, 25(12), 1355-1363. doi:10.1080/02640410601021713
- McCluskey, L., Lynskey, S., Leung, C. K., Woodhouse, D., Briffa, K., & Hopper, D. (2010). Throwing velocity and jump height in female water polo players: Performance predictors. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 13(2), 236-240. doi:10.1016/j.jsams.2009.02.008

- McInnes, S. E., Carlson, J. S., Jones, C. J., & McKenna, M. J. (1995). The physiological load imposed on basketball players during competition. *Journal of Sports Sciences*, 13(5), 387-397. doi:10.1080/02640419508732254
- McMaster, D. T., Gill, N., Cronin, J., & McGuigan, M. (2013). The development, retention and decay rates of strength and power in elite rugby union, rugby league and American football: A systematic review. *Sports Medicine*, 43(5), 367-384. doi:10.1007/s40279-013-0031-3
- Meylan, C., & Malatesta, D. (2009). Effects of in-season plyometric training within soccer practice on explosive actions of young players. *The Journal of Strength and Conditioning Research*, 23(9), 2605-2013. doi:10.1519/JSC.0b013e3181b1f330
- Moran, K. A., & Wallace, E. S. (2007). Eccentric loading and range of knee joint motion effects on performance enhancement in vertical jumping. *Human Movement Science*, 26(6), 824-840. doi:10.1016/j.humov.2007.05.001
- Morin, J. B., Jimenez-Reyes, P., Brughelli, M., & Samozino, P. (2019). When jump height is not a good indicator of lower limb maximal power output: Theoretical demonstration, experimental evidence and practical solutions. *Sports Medicine*, 49(7), 999-1006. doi:10.1007/s40279-019-01073-1
- Nicol, C., Avela, J., & Komi, P. V. (2006). The stretch-shortening cycle: A model to study naturally occurring neuromuscular fatigue. *Sports Medicine*, 36(11), 977-999. doi:10.2165/00007256-200636110-00004
- Petrigna, L., Karsten, B., Marcolin, G., Paoli, A., D'Antona, G., Palma, A., & Bianco, A. (2019). A review of countermovement and squat jump testing methods in the context of public health examination in adolescence: reliability and feasibility of current testing procedures. *Frontiers in Physiology*, 10, 1384. doi:10.3389/fphys.2019.01384
- Platanou, T. (2006). Simple 'in-water' vertical jump testing in water polo. *Kinesiology*, 38(1), 57-62.
- Ramirez-Campillo, R., Alvarez, C., Garcia-Hermoso, A., WL Keogh, J., García-Pinillos, A., A., P. L., & Loturco, I. (2020). Effects of jump training on jumping performance of handball players: A systematic review with meta-analysis of randomised controlled trials. *International Journal of Sports Science & Coaching*, 15(4), 584-594.
- Ramos-Campo, D. J., Rubio-Arias, J. A., Carrasco-Poyatos, M., & Alcaraz, P. E. (2016). Physical performance of elite and subelite Spanish female futsal players. *Biology of Sport*, 33(3), 297-304. doi:10.5604/20831862.1212633
- Samozino, P., Edouard, P., Sangnier, S., Brughelli, M., Gimenez, P., & Morin, J. B. (2014). Force-velocity profile: Imbalance determination and effect on lower limb ballistic performance. *International Journal of Sports Medicine*, 35(6), 505-510. doi:10.1055/s-0033-1354382
- Samozino, P., Rejc, E., Di Prampero, P. E., Belli, A., & Morin, J. B. (2012). Optimal force-velocity profile in ballistic movements -altius: Citius or fortius? *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 44(2), 313-322. doi:10.1249/MSS.0b013e31822d757a
- Sanchez-Sanchez, J., Garcia-Unanue, J., Jimenez-Reyes, P., Gallardo, A., Burillo, P., Felipe, J. L., & Gallardo, L. (2014). Influence of the mechanical properties of third-generation artificial turf systems on soccer players' physiological and physical performance and their perceptions. *PLoS One*, 9(10), e111368. doi:10.1371/journal.pone.0111368
- Sanders, R. (1999). A model of kinematic variables determining height achieved in water polo 'boosts'. *Journal of Applied Biomechanics*, 15, 270-283.
- Satler, T., Hadzic, V., Dervisevic, E., & Markovic, G. (2015). Vertical jump performance of professional male and female volleyball players: Effects of playing position and competition level. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 29(6), 1486-1493.
- Sekulic, D., Kontic, D., Esco, M. R., Zenic, N., Milanovic, Z., & Zvan, M. (2015). Sport-specific conditioning variables predict offensive and defensive performance in high-level youth water polo athletes. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 30(5), 1316-1324.
- Sheppard, J. M., & Doyle, T. L. (2008). Increasing compliance to instructions in the squat jump. *The Journal of Strength & Conditioning Research*, 22(2), 648-651. doi:10.1519/JSC.0b013e31816602d4
- Silva, J. R., Nassis, G. P., & Rebelo, A. (2015). Strength training in soccer with a specific focus on highly trained players. *Sports Medicine - Open*, 1(1), 17. doi:10.1186/s40798-015-0006-z
- Svensson, M., & Drust, B. (2005). Testing soccer players. *Journal of Sports Sciences*, 23(6), 601-618. doi:10.1080/02640410400021294
- Thomas, C., Kyrialidou, I., Dos'Santos, T., & Jones, P. A. (2017). Differences in vertical jump force-time characteristics between stronger and weaker adolescent basketball players. *Sports*, 5(3), 63. doi:10.3390/sports5030063
- Van Hooren, B., & Zolotarjova, J. (2017). The difference between countermovement and squat jump performances: A review of underlying mechanisms with practical applications. *The Journal of Strength & Conditioning Research*, 31(7), 2011-2020. doi:10.1519/JSC.0000000000001913
- Vila, H., Manchado, C., Rodriguez, N., Abrales, J. A., Alcaraz, P. E., & Ferragut, C. (2012). Anthropometric profile, vertical jump, and throwing velocity in elite female handball players by playing positions. *The Journal of Strength & Conditioning Research*, 26(8), 2146-2155.
- Voigt, M., Simonsen, E. B., Dyhre-Poulsen, P., & Klausen, K. (1995). Mechanical and muscular factors influencing the performance in maximal vertical jumping after different prestretch loads. *Journal of Biomechanics*, 28(3), 293-307.
- Wisloff, U., Castagna, C., Helgerud, J., Jones, R., & Hoff, J. (2004). Strong correlation of maximal squat strength with sprint performance and vertical jump height in elite soccer players. *British Journal of Sports Medicine*, 38(3), 285-288. doi:10.1136/bjsm.2002.002071
- Zinner, C., Sperlich, B., Krueger, M., Focke, T., Reed, J., & Mester, J. (2015). Strength, endurance, throwing velocity and in-water jump performance of elite German water polo players. *Journal of Human Kinetics*, 45, 149-156. doi:10.1515/hukin-2015-0015
- Ziv, G., & Lidor, R. (2010). Vertical jump in female and male volleyball players: A review of observational and experimental studies. *Scandinavian Journal of Medicine & Science*, 20(4), 556-567. doi:10.1111/j.1600-0838.2009.01083.x