REFERÊNCIAS

- Carvalho, H. M., Lekue, J. A., Gil, S. M., & Bidaurreazaga-Letona, I. (2017). Pubertal development of body size and soccer-specific functional capacities in adolescent players. *Research in Sports Medicine*, 25(4), 421-436.
- Carvalho, H. M., Leonardi, T. J., Soares, A. L. A., Paes, R. R., Foster, C., & Gonçalves, C. E. (2019). Longitudinal changes of functional capacities among adolescent female basketball players. *Frontiers in Physiology*, 10, 339.
- Gabbett, T., & Georgieff, B. (2007). Physiological and anthropometric characteristics of Australian junior national, state, and novice volleyball players. *The Journal of Strength and Conditioning Research*, 21(3), 902-908.
- Kilic-Toprak, E., Yapici, A., Kilic-Erkek, O., Koklu, Y., Tekin, V., Alemdaroglu, U., & Bor-Kucukatay, M. (2015). Acute effects of Yo-Yo intermittent recovery test level 1 (Yo-YoR1) on hemorheological parameters in female volleyball players. *Clinical Hemorheology and Microcirculation*, 60(2), 191-199.
- Leyhr, D., Kelava, A., Raabe, J., & Höner, O. (2018). Longitudinal motor performance development in early adolescence and its relationship to adult success: An 8-year prospective study of highly talented soccer players. *PLoS ONE*, 13(5), e0196324.
- Lidor, R., & Ziv, G. (2010a). Physical characteristics and physiological attributes of adolescent volleyball players: A review. *Pediatric Exercise Science*, 22(1), 114-134.
- Lidor, R., & Ziv, G. (2010b). Physical and physiological attributes of female volleyball players--a review. *The Journal of Strength and Conditioning Research*, 24(7), 1963-1973.
- Melrose, D. R., Spaniol, F. J., Bohling, M. E., & Bonnette, R. A. (2007). Physiological and performance characteristics of adolescent club volleyball players. *The Journal of Strength and Conditioning Research*, 21(2), 481-486.
- Nikolaidis, P. T., Gkoudas, K., Afonso, J., Clemente-Suarez, V. J., Knechtel, B., Kasabalis, S., Kasabalis, A., Douda, H., Tokmakidis, S., & Torres-Luque, G. (2017). Who jumps the highest? Anthropometric and physiological correlations of vertical jump in youth elite female volleyball players. *The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness*, 57(6), 802-810.
- Papanikolaou, K., Chatzinikolaou, A., Pontidis, T., Avloniti, A., Deli, C. K., Leontsini, D., Draganidis, D., Tsimeas, P. D., Rafailakis, L., Jamurtas, A. Z., Krustup, P., Mohr, M., & Fatouros, I. G. (2019). The yo-yo intermittent endurance level 2 test: Reliability of performance scores, physiological responses and overload characteristics in competitive soccer, basketball and volleyball players. *Journal of Human Kinetics*, 67, 223-233.
- te Wierike, S. C., de Jong, M. C., Tromp, E. J., Vuijk, P. J., Lemmink, K. A., Malina, R. M., Elferink-Gemser, M. T., & Visscher, C. (2014). Development of repeated sprint ability in talented youth basketball players. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 28(4), 928-934.

AUTORES:

Filipa Sousa ^{1, 2}

Pedro Fonseca ²

Leandro Machado ^{1, 2}

João Paulo Vilas-Boas ^{1, 2}

¹ Centro de Investigação, Formação, Intervenção e Inovação em Desporto (CIFID), Faculdade de Desporto, Universidade do Porto, Portugal

² Laboratório de Biomecânica do Porto (LABIOMEPE), Universidade do Porto, Portugal

<https://doi.org/10.5628/rpcd.21.S2.253>

INTRODUÇÃO

O desempenho desportivo resulta da complexa conjugação das diferentes qualidades e habilidades de um jogador. O treinador tem o papel crucial de adotar a metodologia de treino mais ajustada e trabalhar as qualidades e habilidades determinantes que irão levar o seu jogador a um nível de desempenho mais elevado. Na atualidade, a evidência científica sugere que o uso da precisão tecnológica característica da biomecânica, proporciona aos treinadores e aos seus praticantes desportivos, as melhores condições e oportunidades para que estes possam alcançar os níveis de desempenho desejados (Bidaurreazaga-Letona et al., 2015).

O desempenho ideal e o risco diminuído deveriam andar sempre de mãos dadas. Por exemplo, a componente vertical da força de reação do solo, produzida durante a receção após um salto, é provavelmente o evento mais crítico nos saltos, especialmente no que ao potencial lesivo diz respeito. O súbito aumento de carga produzido quando o corpo entra em contacto com o solo, após a fase de voo, produz sobre as estruturas anatómicas do membro inferior uma sobrecarga transitória e de elevada magnitude que é considerada a principal fonte de sobrecarga indutora de lesões agudas (Lake et al., 2021; Van Hooren & Zolotarjova, 2017). Assim, quanto melhor a técnica utilizada pelo sujeito durante a execução do movimento, menor a probabilidade de contrair uma lesão e maior a probabilidade de melhorar o seu desempenho (Hughes & Bartlett, 2002).

Os especialistas em biomecânica do desporto concentram habitualmente os seus esforços na análise de determinadas habilidades de uma modalidade, em que a técnica do movimento é crucial. Como tal, a seleção de indicadores de desempenho, ou performance, além da sua combinação, permitem caraterizar e definir algumas das particularidades do desempenho dos jogadores. Os indicadores de desempenho, quando usados individualmente (por exemplo, a altura de salto) são informativos, mas poderão contribuir para uma análise mais detalhada, se agregados com outros indicadores (e.g., força de impulsão vertical, potência, etc.) Por exemplo, nos saltos verticais, a força, posição do corpo, velocidade e coordenação no momento da impulsão, entre outras, são variáveis determinantes da execução dos saltos e, como tal, indicadores de desempenho tão importantes como o resultado final do salto, obtido como a altura máxima atingida.

INEX: A MUDANÇA

Ao longo do projeto INEX, foram recolhidos dados de jovens praticantes de várias modalidades desportivas. No domínio da biomecânica estes traduziram-se, essencialmente, na capacidade de realizar três repetições de saltos verticais em agachamento (SJ: *squat jump*) e com contramovimento (CMJ: *countermovement jump*) sobre uma plataforma de forças. Tal totalizou mais de 12.435 saltos para uma amostra de aproximadamente 600 sujeitos voluntários, distribuídos por cinco modalidades. Destes saltos, foi selecionada a melhor execução do SJ e do CMJ de cada participante, tendo sido analisados quatro caraterísticas desses saltos: altura de salto, força máxima de impulsão vertical, potência máxima de salto e força vertical máxima na receção.

São escassos os estudos longitudinais desenvolvidos sobre o desempenho físico de jovens praticantes de jogos desportivos coletivos. A maioria dos estudos são de natureza transversal, sendo que a informação obtida, nos impossibilita de acompanhar os praticantes ao longo do tempo e traçar trajetórias do crescimento e desenvolvimento, principalmente em períodos de rápido crescimento, garantindo as mais adequadas interpretações do potencial de desempenho e, por isso, também as mais convenientes respostas ao treino e à avaliação da competição (Lloyd & Oliver, 2012; Lloyd et al., 2012).

De uma forma geral, os sujeitos do nosso estudo apresentaram melhores resultados no desempenho dos saltos verticais (SJ e CMJ) nas quatro variáveis analisadas à medida que a idade aumentava. Estes resultados refletem, provavelmente, o efeito da maturação e desenvolvimento, associado ao aumento do número de horas e anos de prática (Bidaurrezaga-Letona et al., 2015). Além disso, outras questões mecânicas contribuem para estes resultados, como se pode observar no estudo de Lloyd et al.

(2012), onde os sujeitos de 12 e 15 anos produziram maior força de reação no solo do que os de 9 anos no mesmo intervalo do tempo de contacto. Os sujeitos mais jovens utilizaram maiores tempos de contacto com o solo para produzir força, menores tempos de voo e menores níveis de rigidez (*stiffness*) no agachamento (força máxima de reação do solo/máximo deslocamento do centro de massa).

A estatística descritiva (média e erro-padrão) do desempenho dos jogadores das cinco modalidades estudadas, nas quatro variáveis selecionadas durante a execução do salto com agachamento (SJ) e do salto com contramovimento (CMJ), estão apresentadas no quadro 1. Estes dados, bem como as trajetórias médias e respetivos intervalos de confiança a 95% (FIGURA 1), foram obtidos com recurso a modelos estatísticos mistos, também designados por modelos multinível. Este tipo de modelos otimiza toda a informação disponível, não sendo necessária informação completa em todos os momentos de avaliação de cada um dos jogadores. O *software* utilizado foi o Stata 17.

Os valores médios e o erro-padrão, são encontrados a partir do modelo, sendo este último valor (o erro-padrão), uma medida de precisão de uma estimativa encontrada por esse modelo, que representa a incerteza do valor estimado. Quanto menor o valor do erro padrão, mais próximo da realidade se encontra o valor estimado pelo modelo.

A altura de salto foi mais elevada nos CMJ do que nos SJ (QUADRO 1). O mesmo resultado tinha já sido observado no primeiro momento de avaliação (artigo 09 desta revista, *baseline*), com exceção dos voleibolistas aos 11 anos. Dada a dificuldade técnica de realização do salto com agachamento (SJ), especialmente pelos sujeitos dos escalões etários mais baixos, “ligeiros” contramovimentos foram observados nos nossos resultados, o que pode ter contribuído para alguma potenciação do salto. Estas ocorrências foram já reportadas anteriormente em outros estudos (Bobbert et al., 2008; Bobbert et al., 1996; Hatze, 1975; Kitamura et al., 2017; Moran & Wallace, 2007; Sheppard & Doyle, 2008).

Relativamente à altura de salto, nos SJ (FIGURA 1 [a]), a progressão com a idade apresenta um padrão não-linear, contrariamente ao padrão linear (incremento constante) observado nos CMJ (FIGURA 1 [b]). Resultados diferentes dos nossos foram obtidos, no estudo de Bidaurrezaga-Letona et al. (2015) e Deprez et al. (2014), no entanto, em ambos os estudos, foram apenas analisados saltos com contramovimento em jovens futebolistas.

Analisando as figuras complementares deste trabalho (FIGURAS 2, 3, 4, 5 e 6), observamos que foram os basquetebolistas que alcançaram os valores mais elevados de altura de salto, seguidos pelos jogadores de futebol, de voleibol e, finalmente, pelos jogadores de andebol e de polo aquático. No estudo de Karatrantou et al. (2019), com praticantes de basquetebol, futebol e voleibol, com idades entre os 12 e 15 anos, foram os voleibolistas que se destacaram na altura de salto. No projeto INEX, os basquetebolistas

listas apresentam uma gama etária mais alargada (11-17 anos) do que os voleibolistas (11-15 anos). Uma vez que as exigências físicas e técnicas tendem a aumentar com o desenvolvimento a longo prazo, e este processo está relacionado com a especialização dos desportistas, é esperado que as capacidades relacionadas com a potência e a habilidade de saltar aumentem ao longo do processo de maturação e treino dos sujeitos (Baxter-Jones, 1995; Deprez et al., 2014; Kitamura et al., 2017; Medeiros et al., 2014). Outros estudos desenvolvidos em praticantes de rugby, apresentaram resultados semelhantes aos do INEX, relativamente à altura de salto (Kobal et al., 2016).

Quanto à força de impulsão vertical, a trajetória de desenvolvimento segue uma tendência linear com o aumento da idade tanto nos SJ, como nos CMJ, embora neste último, o valor do erro padrão tenha sido superior, demonstrando, por isso, uma maior incerteza do valor estimado pelo modelo nesta variável. Analisando as figuras complementares deste artigo (FIGURAS 2, 3, 4, 5, e 6), a força de impulsão vertical não foi, como esperávamos, superior em todas as modalidades e em todas as idades, nos CMJ relativamente aos SJ. No estudo de Kirby et al. (2011), a força de impulsão vertical produzida durante a fase propulsiva quer do SJ, quer do CMJ, foi o mais forte preditor da altura de salto.

Na potência de salto nos SJ e nos CMJ (FIGURA 1[a] e [b]), a trajetória de desenvolvimento foi não-linear, em ambos os saltos, com erros-padrão mais elevados nas idades de extremo, isto é, nas idades mais baixas (10 anos) e nas mais elevadas (17 anos). Os basquetebolistas registaram os valores mais elevados de potência de salto, seguidos pelos jogadores de futebol, de voleibol e, finalmente, pelos de andebol e de polo aquático, mas o fator idade pode ter influenciado esta ordenação. Como sabemos, o treino de força a longo prazo proporciona um aumento da potência muscular dos membros inferiores e pode estar relacionada com o aumento da capacidade de salto com a idade, sendo considerado um fator determinante no desempenho dos desportistas (Kitamura et al., 2017; Sheppard & Doyle, 2008). Esta é também uma adaptação resultante do processo de crescimento e do desenvolvimento e, portanto, da idade dos sujeitos. A potência máxima desenvolvida durante os saltos é usualmente aceite como uma variável determinante do desempenho, sendo determinada pela capacidade simultânea de produzir força e velocidade e dependente, principalmente, da habilidade dos sistemas neuromuscular e osteoarticular dos sujeitos para produzir níveis de força elevados e garantir a eficaz aplicação dessa força ao meio ambiente (Deprez et al., 2014; Jimenez-Reyes et al., 2018; Morin et al., 2017).

A força vertical produzida na receção de ambos os saltos apresentou uma trajetória de desenvolvimento não-linear e decrescente, tal como esperado, tendo estabilizado entre os 16 e 17 anos, nos dois saltos. Tal indica um progressivo desenvolvimento das complexas capacidades neuromotoras de amortecimento após o salto (FIGURA 1).

A progressiva atenuação da força máxima na receção, observada na figura 1, com o aumento da idade, reflete a superior capacidade de amortecimento das forças pelos jogadores mais velhos e mais experientes, capazes de uma maior coordenação e controle motor no que diz respeito à realização de movimentos de amortecimento. Uma das recomendações para diminuir os impactos na receção após os saltos, é alterar a técnica de execução, aumentando o tempo de aterragem, com movimentos coordenados e uma maior flexão dos membros inferiores durante o contacto. Uma elevada intensidade da componente vertical da força de reação do solo, durante a receção após os saltos, pode estar diretamente implicada na ocorrência de lesões, em especial do membro inferior (Lloyd & Oliver, 2012). Segundo Lian et al. (1996), durante um jogo de voleibol, são executados por cada hora de jogo cerca de 60 saltos com intensidade máxima. Num jogo de basquetebol de elite, os sujeitos realizam cerca de 70 saltos por jogo (McClay et al., 1994). A importância dos saltos fica assim enfatizada e percebemos por isso que num número elevado de modalidades desportivas, os seus praticantes ficam expostos a forças de impacto muito elevadas, pondo em risco a integridade física osteoarticular dos seus praticantes.

Na figura 1 são apresentadas as trajetórias de desenvolvimento das variáveis altura de salto (AS), força máxima de impulsão vertical (FIV), potência máxima de salto (POT) e força máxima na receção (FR), nos dois tipos de salto ((a) – SJ e (b) – CMJ).

A estatística descritiva das quatro variáveis selecionadas relativas ao desempenho dos jogadores nas cinco modalidades estudadas, ao longo do tempo, durante a execução do salto em agachamento (SJ) e no salto com contramovimento (CMJ) são apresentadas no quadro 1.

FIGURA 1. Trajetórias de desenvolvimento das variáveis altura de salto, força máxima de impulsão vertical, potência máxima de salto e força máxima na recepção, nos saltos (a) em agachamento (SJ) e (b) com contramovimento (CMJ)

QUADRO 1. Valores médios e respectivos erros-padrão das variáveis altura de salto, força máxima de impulsão vertical, potência máxima de salto e força máxima na recepção ao longo do tempo, em todos os sujeitos de todas as modalidades, durante os saltos com agachamento (SJ) e saltos com contramovimento (CMJ)

	10 ANOS	11ANOS	12 ANOS	13 ANOS	14 ANOS	15 ANOS	16ANOS	17 ANOS
	M ± EP	M ± EP	M ± EP	M ± EP	M ± EP	M ± EP	M ± EP	M ± EP
ALTURA DE SALTO (CM)								
Salto com agachamento	17.73 ± 0.46	19.88 ± 0.30	21.91 ± 0.21	23.82 ± 0.18	25.62 ± 0.18	27.31 ± 0.18	28.87 ± 0.23	30.33 ± 0.35
Salto com contramovimento	18.11 ± 0.32	20.30 ± 26.00	22.50 ± 0.21	24.70 ± 0.17	26.90 ± 0.17	29.10 ± 0.20	31.29 ± 0.26	33.48 ± 0.32
FORÇA MÁXIMA DE IMPULSÃO VERTICAL (N/KG)								
Salto com agachamento	20.90 ± 0.18	21.21 ± 0.14	21.55 ± 0.11	21.88 ± 0.90	22.22 ± 0.82	22.56 ± 0.95	22.90 ± 0.12	23.24 ± 0.15
Salto com contramovimento	20.77 ± 0.17	21.02 ± 0.14	21.27 ± 0.10	21.52 ± 0.08	21.77 ± 0.79	22.03 ± 0.10	22.28 ± 0.14	22.53 ± 0.18
POTÊNCIA MÁXIMA DO SALTO (W)								
Salto com agachamento	295.21 ± 123.62	623.74 ± 55.22	1085.86 ± 35.50	1634.93 ± 29.53	2224.35 ± 27.11	2807.47 ± 31.12	3337.68 ± 39.10	3768.36 ± 77.50
Salto com contramovimento	214.56 ± 82.24	740.84 ± 45.26	1217.65 ± 26.37	1644.10 ± 22.47	2022.88 ± 21.79	2351.29 ± 28.24	2630.23 ± 53.50	2859.70 ± 96.20
FORÇA MÁXIMA NA RECEÇÃO (N/KG)								
Salto com agachamento	54.330 ± 1.29	49.82 ± 0.76	46.12 ± 0.45	43.22 ± 0.36	41.14 ± 0.35	39.85 ± 0.37	39.38 ± 0.54	39.70 ± 0.94
Salto com contramovimento	52.34 ± 1.52	49.27 ± 0.84	46.74 ± 0.49	44.77 ± 0.42	43.33 ± 0.40	42.44 ± 0.52	42.0 ± 0.99	42.29 ± 1.77

FIGURAS COMPLEMENTARES

Andebol

FIGURA 2. Valores médios obtidos no salto em agachamento (SJ) e contramovimento (CMJ), de acordo com a idade dos participantes, no andebol, para a altura de salto, força máxima de impulsão vertical, potência máxima do salto e força máxima na receção

Basquetebol

FIGURA 3. Valores médios obtidos no salto em agachamento (SJ) e contramovimento (CMJ), de acordo com a idade dos participantes, no basquetebol, para a altura de salto, força máxima de impulsão vertical, potência máxima do salto e força máxima na receção

Futebol

FIGURA 4. Valores médios obtidos no salto em agachamento (SJ) e contramovimento (CMJ), de acordo com a idade dos participantes, no futebol, para a altura de salto, força máxima de impulsão vertical, potência máxima do salto e força máxima na receção

Polo aquático

FIGURA 5. Valores médios obtidos no salto em agachamento (SJ) e contramovimento (CMJ), de acordo com a idade dos participantes, no polo aquático, para a altura de salto, força máxima de impulsão vertical, potência máxima do salto e força máxima na receção

FIGURA 6. Valores médios obtidos no salto em agachamento (SJ) e contramovimento (CMJ), de acordo com a idade dos participantes, no voleibol, para a altura de salto, força máxima de impulsão vertical, potência máxima do salto e força máxima na recepção

CONCLUSÃO

Os dados obtidos no final do nosso projeto, permitem-nos desenhar um perfil das variáveis selecionadas, relativas aos saltos verticais em agachamento (SJ) e contramovimento (CMJ) nos jovens praticantes de andebol, basquetebol, futebol, polo aquático e voleibol, auxiliando os técnicos e treinadores a tomarem decisões profissionais adequadas em relação ao desempenho dos seus jogadores. Fornece aos treinadores a possibilidade de abordar e perspetivar o desenvolvimento de determinadas habilidades com os seus jogadores, com base em processos de identificação e avaliação com evidência científica. É importante perceber que o sucesso de qualquer programa de desenvolvimento de longo prazo dependerá em grande parte, do nível de educação e qualidade de instrução recebidas pelos praticantes, oriundas do seu treinador responsável. Os modelos multinível em geral, e o modelo estatístico utilizado no INEX em particular, ofereceu-nos uma abordagem viável para traçar trajetórias de desenvolvimento dos jogadores e características do desempenho, no seio de cada modalidade, ao longo do tempo.

REFERÊNCIAS

- Baxter-Jones, A. D. (1995). Growth and development of young athletes. Should competition levels be age related? *Sports Medicine*, 20(2), 59-64. doi:10.2165/00007256-199520020-00001
- Bidaurreaga-Letona, I., Carvalho, H. M., Lekue, J. A., Santos-Concejero, J., Figueiredo, A. J., & Gil, S. M. (2015). Longitudinal field test assessment in a Basque soccer youth academy: A multilevel modeling framework to partition effects of maturation. *International Journal of Sports Medicine*, 36(3), 234-240. doi:10.1055/s-0034-1385881
- Bobbert, M. F., Casius, L. J., Sijpkens, I. W., & Jaspers, R. T. (2008). Humans adjust control to initial squat depth in vertical squat jumping. *Journal of Applied Physiology* (1985), 105(5), 1428-1440. doi:10.1152/jappphysiol.90571.2008
- Bobbert, M. F., Gerritsen, K. G., Litjens, M. C., & Van Soest, A. J. (1996). Why is countermovement jump height greater than squat jump height? *Medicine & Science & Sport & Exercise*, 28(11), 1402-1412.
- Deprez, D., Valente-Dos-Santos, J., Coelho, E. S. M., Le-noir, M., Philippaerts, R. M., & Vaeyens, R. (2014). Modeling developmental changes in yo-yo intermittent recovery test level 1 in elite pubertal soccer players. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 9(6), 1006-1012. doi:10.1123/ijsp.2013-0368
- Hatze, H. (1975). A new method for the simultaneous measurement of the movement of inertia, the damping coefficient and the location of the centre of mass of a body segment in situ. *European Journal of Applied Physiology*, 34(4), 217-226.
- Hughes, M. D., & Bartlett, R. M. (2002). The use of performance indicators in performance analysis. *Journal of Sports Science*, 20(10), 739-754. doi:10.1080/026404102320675602
- Jimenez-Reyes, P., Samozino, P., Garcia-Ramos, A., Cuadrado-Penafiel, V., Brughelli, M., & Morin, J. B. (2018). Relationship between vertical and horizontal force-velocity-power profiles in various sports and levels of practice. *PeerJ*, 6, e5937. doi:10.7717/peerj.5937
- Karatrantou, K., Gerodimos, V., Voutselas, V., Manouras, N., Famisis, K., & Ioakimidis, P. (2019). Can sport-specific training affect vertical jumping ability during puberty? *Biology of Sport*, 36(3), 217-224. doi:10.5114/biolsport.2019.85455
- Kirby, T. J., McBride, J. M., Haines, T. L., & Dayne, A. M. (2011). Relative net vertical impulse determines jumping performance. *Journal of Applied Biomechanics*, 27(3), 207-214. doi:10.1123/jab.27.3.207
- Kitamura, K., Pereira, L. A., Kobal, R., Cal Abad, C. C., Finotti, R., Nakamura, F. Y., & Loturco, I. (2017). Loaded and unloaded jump performance of top-level volleyball players from different age categories. *Biology of Sport*, 34(3), 273-278. doi:10.5114/biolsport.2017.67123
- Kobal, R., Nakamura, F. Y., Moraes, J. E., Coelho, M., Kitamura, K., Cal Abad, C. C., Pereira, L. A., & Loturco, I. (2016). Physical performance of brazilian rugby players from different age categories and competitive levels. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 30(9), 2433-2439. doi:10.1519/JSC.0000000000001348
- Lake, J. P., Mundy, P. D., Comfort, P., McMahon, J. J., Suchomel, T. J., & Carden, P. (2021). Effect of barbell load on vertical jump landing force-time characteristics. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 35(1), 25-32. doi:10.1519/JSC.0000000000002554
- Lian, O., Engebretsen, L., Ovrebo, R. V., & Bahr, R. (1996). Characteristics of the leg extensors in male volleyball players with jumper's knee. *American Journal of Sports Medicine*, 24(3), 380-385. doi:10.1177/036354659602400322
- Lloyd, R., & Oliver, J. (2012). The youth physical development model. *Strength and Conditioning Journal*, 34(3), 61-72. doi:10.1519/SSC.0b013e31825760ea
- Lloyd, R. S., Oliver, J. L., Hughes, M. G., & Williams, C. A. (2012). Age-related differences in the neural regulation of stretch-shortening cycle activities in male youths during maximal and sub-maximal hopping. *Journal of Electromyography and Kinesiology*, 22(1), 37-43. doi:10.1016/j.jelekin.2011.09.008

McClay, I. S., Robinson, J. R., Andriacchi, T. P., Frederick, E. C., Gross, T., Marin, P., Valiant, G., Williams, K. R., & Cavagna, P. R. (1994). A profile of ground reaction forces in professional basketball. *Journal of Applied Biomechanics*, 10, 222-236.

Medeiros, A., Marcelino, R., Mesquita, I., & Palao, J. M. (2014). Physical and temporal characteristics of under 19, under 21 and senior male beach volleyball players. *Journal of Sports Science and Medicine*, 13(3), 658-665.

Moran, K. A., & Wallace, E. S. (2007). Eccentric loading and range of knee joint motion effects on performance enhancement in vertical jumping. *Human Movement Science*, 26(6), 824-840. doi:10.1016/j.humov.2007.05.001

Morin, J. B., Petrakos, G., Jimenez-Reyes, P., Brown, S. R., Samozino, P., & Cross, M. R. (2017). Very-heavy sled training for improving horizontal-force output in soccer players. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 12(6), 840-844. doi:10.1123/ijsp.2016-0444

Sheppard, J. M., & Doyle, T. L. (2008). Increasing compliance to instructions in the squat jump. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 22(2), 648-651. doi:10.1519/JSC.0b013e31816602d4

Van Hooren, B., & Zolotarjova, J. (2017). The difference between countermovement and squat jump performances: A review of underlying mechanisms with practical applications. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 31(7), 2011-2020. doi:10.1519/JSC.0000000000001913

AUTORES:

Cláudia Dias ¹

Nuno Corte-Real ¹

Sara Silva ¹

António Manuel Fonseca ¹

¹ Centro de Investigação, Formação, Intervenção e Inovação em Desporto (CIFI²D), Faculdade de Desporto, Universidade do Porto, Portugal

<https://doi.org/10.5628/rpcd.21.S2.265>

Mudanças no desempenho dos jovens atletas.

Unidade na diversidade.

Psicologia

INTRODUÇÃO

Não obstante a participação no desporto organizado oferecer aos jovens um vasto leque de benefícios psicossociais (Larson, 2000), pode também ser caracterizada por elevados níveis de stress e pressão emocional, exacerbados por um ambiente competitivo em que os atletas se expõem e são sujeitos a avaliações e comparações sociais (Sabiston et al., 2014) e onde emoções como a ansiedade (Mellalieu et al., 2006) e o medo de falhar (Sagar et al., 2009, 2010) podem ter importantes implicações no desempenho desportivo dos jovens adolescentes, e, a médio e longo-prazo, serem determinantes na continuidade da sua participação desportiva.

Contudo, apesar de uma adequada gestão das emoções competitivas se constituir como um requisito para o sucesso desportivo, a maioria das investigações na literatura especializada focou-se em dados transversais e em associações inter-individuais, pouco se sabendo acerca do modo como emoções como a ansiedade ou o medo de falhar se desenvolvem e flutuam ao longo do tempo, designadamente durante a adolescência. Este conhecimento poderá ser particularmente útil porque o funcionamento socio-emocional dos indivíduos está em constante evolução (Masten & Kalstabakken, 2018) e as múltiplas mudanças biológicas, psicológicas e sociais experienciadas pelos adolescentes geram um conjunto de inseguranças e ambivalências (Michalčáková et al., 2013) que podem influenciar as suas experiências emocionais. A exploração do modo como as emoções variam ao longo do tempo permitirá, assim, delinear trajetórias de desenvolvimento e estudar diferenças inter-individuais, monitorizando o desenvolvimento emocional em jovens atletas em períodos de rápido desenvolvimento.