Efeitos da Cirurgia Bariátrica na Estrutura e na Função do Ventrículo Esquerdo

Effects of Bariatric Surgery on Left Ventricular Structure and Function

Eduardo Cavalcanti Lapa Santos, Maria Inês Remígio de Aguiar, Roberto de Oliveira Buril, Alvaro Antônio Bandeira Ferraz, Josemberg Marins Campos, Fernando Ribeiro de Moraes Neto, Patrícia Sampaio Gadelha
Hospital das Clínicas, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE - Brasil

Resumo

Fundamentos: A obesidade está associada a alterações estruturais e funcionais do ventrículo esquerdo (VE). A cirurgia bariátrica tem o potencial de reverter tais achados. Os efeitos do procedimento nas funções diastólica e sistólica do VE não foram claramente definidos. O presente estudo teve por objetivo avaliar as alterações na estrutura e funções sistólica e diastólica do ventrículo esquerdo de pacientes obesos que se submeteram à cirurgia bariátrica.

Métodos: Foram avaliados 23 pacientes (16 mulheres e 7 homens, com idade média de $32,9 \pm 8,9$ anos), com índice de massa corporal $\geq 40 \text{ kg/m}^2$, que foram submetidos à derivação gástrica em Y de Roux (RYGB). As avaliações clínicas e ecocardiográficas foram realizadas no pré-operatório e em 3 a 7 meses após a cirurgia.

Resultados: Após período médio de seguimento de 4,7 meses, foram observadas reduções significativas no índice de massa corporal (de $46,7 \pm 5,3$ para $36,2 \pm 4,7 \text{ kg/m}^2$; $p < 0,001$); na espessura do septo interventricular (de $10,3 \pm 1,4$ para $8,9 \pm 1,2 \text{ mm}$); na parede posterior do VE (de $9,3 \pm 1,3$ para $8,4 \pm 1,1 \text{ mm}$; $p < 0,001$) e na massa do VE (valor absoluto: de $168,7 \pm 35,2$ para $149,8 \pm 40,7 \text{ g}$, $p = 0,008$; indexada pela altura: de $45,1 \pm 11,3$ para $39,7 \pm 10,3$, $p = 0,006$). A geometria normal do VE foi observada em 60,9% dos pacientes antes da cirurgia e em 91,3% no período de seguimento. O Doppler tecidual revelou melhora na função diastólica do VE (velocidade de onda E' mitral lateral, $0,16 \pm 0,03$ no pré-operatório contra $0,17 \pm 0,03 \text{ m/s}$ no seguimento; $p = 0,026$). No pós-operatório, não houve diferença significativa na função sistólica do VE.

Conclusões: Após um seguimento médio de 4,7 meses, a cirurgia bariátrica promoveu melhora na estrutura ventricular esquerda e em um dos parâmetros da função diastólica (velocidade de E'). Não houve alterações nos parâmetros sistólicos do ventrículo esquerdo. (Arq Bras Cardiol: Imagem cardiovasc. 2016;29(4):118-123)

Palavras-chave: Obesidade; Cirurgia Bariátrica; Derivação Gástrica; Função Ventricular Esquerda; Ecocardiografia, Diástole.

Abstract

Background: Obesity is associated with changes in left ventricular (LV) structure and function. Bariatric surgery can favorably improve cardiac remodeling. The effects of the procedure in LV diastolic and systolic function have not been clearly defined. The aim of this study was to evaluate the changes in left ventricular structure, systolic and diastolic function in obese patients who have undergone bariatric surgery.

Methods: We evaluated 23 patients (16 women, seven men; age, 32.9 ± 8.9 years) with body mass index $> 40 \text{ kg/m}^2$ who underwent Roux-en-Y gastric bypass (RYGB). Clinical and echocardiographic evaluations were performed preoperatively and 3–7 months after surgery.

Results: After a mean follow-up of 4.7 months, significant reductions were observed in body mass index (from 46.7 ± 5.3 to $36.2 \pm 4.7 \text{ kg/m}^2$; $p < 0.001$); thickness of the interventricular septum (from 10.3 ± 1.4 to $8.9 \pm 1.2 \text{ mm}$); LV posterior wall (from 9.3 ± 1.3 to $8.4 \pm 1.1 \text{ mm}$; $p < 0.001$) and LV mass (absolute value: from 168.7 ± 35.2 to $149.8 \pm 40.7 \text{ g}$, $p = 0.008$; indexed by height: from 45.1 ± 11.3 to 39.7 ± 10.3 , $p = 0.006$). Normal LV geometry was observed in 60.9% of patients before surgery and in 91.3% at follow-up. Tissue Doppler imaging revealed improved LV diastolic function (mitral E' lateral 0.16 ± 0.03 preoperatively vs. $0.17 \pm 0.03 \text{ m/s}$ at follow-up; $p = 0.026$). Postoperatively, there was no significant difference in LV systolic function.

Conclusions: After a mean follow-up of 4.7 months, bariatric surgery promoted improvement in left ventricular structure and in one of the parameters of diastolic function (E' velocity). There were no changes in left ventricular systolic parameters. (Arq Bras Cardiol: Imagem cardiovasc. 2016;29(4):118-123)

Keywords: Obesity; Bariatric Surgery; Gastric Bypass; Ventricular Function, Left; Echocardiography; Diastole.

Full texts in English - <http://departamentos.cardiol.br/dic/publicacoes/revistadic/>

Correspondência: Eduardo Cavalcanti Lapa Santos •

Av. Moraes Rego, SN. CEP 50670-420, Cidade Universitária, Recife, PE - Brasil

E-mail: eduardolapa@gmail.com

Artigo Recebido em 14/03/2016; revisado em 25/04/2016; aceito em 13/06/2016.

DOI: 10.5935/2318-8219.20160031

Introdução

A obesidade afeta a estrutura e a função cardíaca. Pacientes obesos apresentam aumento do volume sanguíneo circulante e do débito cardíaco.¹ Tais alterações hemodinâmicas podem induzir à hipertrofia do ventrículo esquerdo (VE) e à disfunção diastólica e sistólica desta câmara.²⁻⁴ A hipertrofia do VE é um dos fatores de risco para a morbidade e mortalidade cardiovasculares.⁵

A cirurgia bariátrica está associada à redução dos casos de mortalidade em geral.⁶ As diretrizes atuais recomendam o procedimento nos casos de obesidade resistente ao tratamento clínico, em pacientes com índice de massa corporal (IMC) $\geq 40 \text{ kg/m}^2$ ou $\geq 35 \text{ kg/m}^2$ na presença de comorbidades.⁷ O procedimento pode reverter algumas das alterações cardíacas causadas pela obesidade, reduzindo a massa e o tamanho da câmara do VE, além de melhorar seu enchimento diastólico.⁸⁻¹⁰

A melhoria estrutural e funcional do VE após a cirurgia bariátrica não é observada de forma consistente entre diversos estudos.² Portanto, o objetivo do presente estudo foi avaliar as alterações estruturais e funcionais do ventrículo esquerdo em pacientes obesos após a cirurgia bariátrica.

Material e métodos

Foi realizado estudo de coorte não randomizado, observacional, longitudinal, analítico e prospectivo. Os indivíduos foram submetidos à derivação gástrica em Y de Roux (RYGB), no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, de maio de 2012 a setembro de 2014. Os critérios de inclusão foram IMC $\geq 40 \text{ kg/m}^2$, idade > 18 anos, concordância em se submeter à cirurgia bariátrica e a disponibilidade de imagens ecocardiográficas de boa qualidade técnica. Os critérios de exclusão foram insuficiência cardíaca, doença arterial coronariana, valvopatia, fibrilação atrial, cardiopatia congênita, diabetes mellitus (DM) e doença pulmonar obstrutiva crônica.

Os pacientes foram submetidos a ecocardiograma transtorácico antes da cirurgia bariátrica e de três a sete meses após o procedimento, ocasiões em que peso, altura, idade e pressão arterial também foram registrados. O peso foi obtido com o paciente de pé, descalço, vestindo roupas leves, sobre uma balança digital. A altura foi obtida com um estadiômetro de parede calibrado. O IMC foi calculado através da fórmula peso (kg)/altura (m)². Um esfigmomanômetro aneróide calibrado foi utilizado para determinar a pressão arterial pelo método indireto de palpação com ausculta.

Os exames ecocardiográficos foram realizados por dois ultrassonografistas profissionais e experientes, utilizando um aparelho de ultrassom GE Vivid®i (fabricado pela GE Healthcare, Wauwatosa, WI, EUA), com transdutor setorial com frequência de 2,5-MHz. A variabilidade intra e interobservador não foi avaliada.

A espessura do septo interventricular e da parede posterior do VE assim como os diâmetros sistólico final e diastólico final do VE (DSFVE e DDFVE, respectivamente) foram medidos utilizando o modo M no plano do eixo paraesternal longitudinal. Quando não foi possível realizar as medições ideais em modo M, foram obtidas medidas

lineares utilizando-se o modo bidimensional.¹¹ A fração de encurtamento do VE foi calculada através da fórmula (DDVE-DSFVE)/DDVE $\times 100\%$. A fração de ejeção do VE foi estimada pela fórmula de Teichholz.¹²

A massa do VE foi aferida usando a fórmula de Devereux.¹³ O resultado foi elevado à potência de 2,7, conforme proposto por De Simone et al.¹⁴ A hipertrofia ventricular esquerda foi definida como massa do VE/altura^{2,7} $> 51 \text{ g/m}^{2,7}$. A espessura relativa da parede (ERP) foi calculada como $2 \times$ espessura da parede posterior/DDVE; os valores $> 0,42$ foram considerados anormais. A geometria do VE foi classificada como um dos quatro padrões: geometria normal (massa do VE normal e ERP normal), remodelamento concêntrico (massa do VE normal e aumento da ERP), hipertrofia concêntrica (aumento da massa do VE e da ERP) e hipertrofia excêntrica (aumento da massa do VE e ERP normal).

A velocidade diastólica precoce de enchimento da mitral (onda E) e a velocidade diastólica tardia de enchimento da mitral (onda A) foram medidas através de Doppler pulsátil no plano apical quatro câmaras. A velocidade tecidual diastólica precoce (E') foi registrada ao nível do anel mitral lateral. As razões E/A e E/E' foram calculadas.

As variáveis contínuas foram expressas como média $\pm$ desvio padrão e as variáveis categóricas foram expressas em forma de frequência ou percentagem. As diferenças entre as variáveis categóricas foram analisadas pelo teste do qui-quadrado. O teste *t* de Student foi utilizado para variáveis contínuas. As diferenças entre variáveis contínuas, antes e após a cirurgia bariátrica, foram analisadas pelo teste *t* de Student para amostras correlacionadas. Coeficientes de correlação beta com intervalos de confiança de 95% foram obtidos utilizando um modelo de regressão linear. Todos os testes estatísticos foram realizados com nível de significância de 5%. A análise dos dados foi realizada por meio do SPSS para Windows, versão 15.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, EUA).

Obteve-se Termo de Consentimento de cada participante do estudo. O comitê de ética institucional aprovou o estudo.

Resultados

Vinte e três pacientes foram avaliados no estudo. A Tabela 1 apresenta os dados descritivos. A maioria dos pacientes apresentava hipertensão arterial sistêmica (HAS) (69,6%). No seguimento, foram observadas reduções significativas no IMC ($p < 0,001$), na pressão arterial sistólica ($p < 0,001$) e pressão arterial diastólica ($p = 0,002$).

A Tabela 2 traça um comparativo entre os parâmetros estruturais do VE obtidos no pré e no pós-operatórios. Os ecocardiogramas pré-operatórios revelaram um aumento da espessura do septo interventricular em 14 pacientes (60,9%) e aumento da massa do VE em sete pacientes (30,4%). O ecocardiograma realizado em 4,7 meses de pós-operatório, em média, revelou reduções significativas na espessura das paredes do VE e na ERP ($p < 0,001$ para ambas).

A Tabela 3 compara os padrões geométricos do VE no pré e no pós-operatórios. A maioria dos pacientes apresentava

Artigo Original

geometria normal do VE antes da derivação gástrica em Y de Roux (RYGB). A hipertrofia concêntrica do VE foi a geometria anormal mais comum do VE, ocorrendo em 21,5% dos pacientes no pré-operatório e em nenhum paciente no seguimento.

A função sistólica do VE apresentou-se normal em todos os pacientes antes da cirurgia, não sofrendo alterações significativas durante o seguimento. O único parâmetro diastólico de VE que apresentou melhora significativa foi a velocidade de E' (Tabela 4).

Discussão

O presente estudo confirma a melhora das alterações estruturais anteriormente relatadas, ocorridas no VE após a cirurgia bariátrica.²

O padrão geométrico do VE apresenta implicações prognósticas. De Simone et al.¹⁵ mostraram que pacientes

com hipertrofia do VE possuíam um risco cardíaco 3,3 vezes maior. No presente estudo, a maioria dos pacientes (60,9%) apresentou uma geometria normal do VE durante o pré-operatório. Esse achado diverge de estudos prévios, que mostraram que a maioria dos pacientes apresentava uma geometria anormal do VE no pré-operatório^{16,17}. Os pacientes desses trabalhos, no entanto, eram mais velhos e apresentavam valores de IMC e pressão arterial maiores do que os do presente estudo. Ademais, 91,3% dos nossos pacientes apresentaram uma geometria normal do VE durante o seguimento, indicando que o remodelamento reverso havia ocorrido no curto prazo.

Não foi observada uma mudança significativa no DDVE no pós-operatório, o que é compatível com estudos prévios.^{17,18} Nenhum dos pacientes apresentou DDVE anormal no pré-operatório.¹⁹

Tabela 1 – Dados demográficos

Dados clínicos	Pré-operatório	Pós-operatório	Valor p
Idade (anos)	32,9 (8,9)		
Sexo Feminino	16 (69,6%)		
IMC (kg/m ²)	46,7 (5,3)	36,2 (4,7)	< 0,001*
Peso (kg)	126,3 (25,0)	97,7 (19,0)	< 0,001*
PAS (mmHg)	138,6 (14,9)	118,8 (8,9)	< 0,001*
PAD (mmHg)	85,8 (10,4)	79,7 (6,5)	< 0,002*

* Valor significativo. Dados expressos como média (desvio padrão). IMC: índice de massa corporal; PAD: pressão arterial diastólica; PAS: pressão arterial sistólica.

Tabela 2 – Comparativo entre os parâmetros estruturais do VE no pré e pós-operatório

Parâmetro estrutural	Pré-operatório	Pós-operatório	Valor p
DDFVE (mm)	48,3 (3,3)	49,4 (4,4)	0,165
Septo (mm)	10,3 (1,4)	8,9 (1,2)	< 0,001*
Parede posterior (mm)	9,3 (1,3)	8,4 (1,1)	< 0,001*
ERP	0,39 (0,06)	0,34 (0,04)	< 0,001*
MVE (g)	168,7 (35,2)	149,8 (40,7)	0,008*
IMVE (g/m ²)	45,1 (11,3)	39,7 (10,3)	0,006*

* Valor significativo. Dados expressos como média (desvio padrão). VE: ventrículo esquerdo; DDFVE: diâmetro diastólico final do VE; MVE: massa do ventrículo esquerdo; IMVE: índice de massa do ventrículo esquerdo; ERP: espessura relativa da parede.

Tabela 3 – Efeitos da cirurgia bariátrica na geometria do VE

Geometria do VE	Pré-operatório	Pós-operatório
Normal	14 (60,9)	21 (91,3)*
Remodelagem concêntrica	2 (8,7)	0 (0)
Hipertrofia concêntrica do VE	5 (21,7)	0 (0)*
Hipertrofia excêntrica do VE	2 (8,7)	2 (8,7)*

* $p < 0,05$. Dados expressos como n (%). VE: ventrículo esquerdo.

Tabela 4 – Parâmetros funcionais do VE no pré e no pós-operatório

Parâmetro funcional	Pré-operatório	Pós-operatório	Valor p
FEVE (%)	69,2 (6,8)	67,5 (5,3)	0,317
Encurtamento fracionado do VE	39,1 (5,5)	37,9 (3,8)	0,404
Velocidade da onda-E (m/s)	0,89 (0,14)	0,91 (0,15)	0,581
Velocidade da onda-A (m/s)	0,61 (0,13)	0,57 (0,14)	0,197
Relação E/A	1,51 (0,34)	1,65 (0,46)	0,065
Velocidade E' (m/s)	0,16 (0,03)	0,17 (0,03)	0,026*
Relação E/E'	5,95 (1,27)	5,42 (1,16)	0,083
Tempo de desaceleração da onda-E	188,3 (37,3)	187,1 (42,2)	0,910

* Valor significativo. Dados expressos como média (desvio padrão). VE: ventrículo esquerdo; FEVE: fração de ejeção do ventrículo esquerdo.

O aumento da espessura do septo interventricular foi a alteração ecocardiográfica mais comum detectada no pré-operatório. A redução da espessura das paredes do VE acarretou uma diminuição na ERP, na massa do VE e no IMVE. No pré-operatório, 30,4% dos pacientes apresentaram aumento na ERP; após o procedimento bariátrico, todos os pacientes apresentaram ERP normal. O aumento na ERP está associado a um risco cardiovascular 2,56 vezes mais elevado em pacientes hipertensos.²⁰

Observou-se uma redução média de 11,2% na massa do VE após a cirurgia. Tal redução resultou da diminuição da espessura das paredes do VE, visto que o diâmetro diastólico final do VE não sofreu alterações após a cirurgia bariátrica.

O enchimento diastólico do VE é o primeiro parâmetro funcional a se alterar em decorrência da obesidade.² Com relação à função diastólica do VE, apenas dois pacientes (8,7%) apresentaram relação E/A < 1 antes da cirurgia. Outros estudos relataram uma taxa mais elevada dessa anormalidade.^{16,21} Cunha et al.¹⁶ mostraram que 17,4% de seus pacientes apresentavam uma relação E/A anormal e Luaces et al.²¹ detectaram uma taxa ainda maior, de 27,9%.

Alguns fatores explicam essa diferença. Primeiramente, nossa população era mais jovem (32,9 anos) do que as dos estudos conduzidos por Cunha et al.¹⁶ (37,9 anos) ou por Luaces et al.²¹ (40,2 anos), e o avanço da idade está associado a uma maior prevalência da disfunção diastólica.²² Em segundo lugar, pacientes diabéticos foram excluídos do presente estudo, e o diabetes é conhecido por causar disfunção diastólica.²² Tavares et al.²² demonstraram que, em pacientes obesos, antes da cirurgia bariátrica, a prevalência de diabetes era 3,6 vezes maior no subgrupo com disfunção diastólica. Em terceiro lugar, a prevalência de hipertensão arterial em nosso estudo também foi inferior a de outras séries (69,6% x 82,5% no estudo de Cunha et al.).¹⁶ Por fim, outros estudos realizaram exames ecocardiográficos apenas em pacientes com múltiplos fatores de risco cardiovascular ou com eletrocardiogramas alterados,²³ enquanto enquanto que na atual análise todos os pacientes incluídos foram submetidos ao exame, independentemente dos fatores de risco cardíaco.

Houve uma tendência ao aumento da relação E/A após a cirurgia, mas essa não alcançou significância

estatística ($p = 0,06$). Outros estudos que evidenciaram um aumento significativo nesse parâmetro tiveram um maior tempo de seguimento.^{16,18,24} Assim, um período maior de acompanhamento no presente estudo poderia ter revelado um aumento na relação E/A.

A velocidade de E' é particularmente útil na avaliação após a cirurgia bariátrica, pois é um índice de relaxamento do VE que sofre pouca influência da pré-carga.^{25,26} Esse parâmetro é fácil de ser obtido em pacientes obesos¹ e possui valor prognóstico, com resultados abaixo da faixa normal prevenindo uma maior mortalidade cardiovascular.²⁷ Nenhum dos pacientes apresentou diminuição da velocidade de E' (<10 cm/s) antes da cirurgia. Outros estudos encontraram velocidades de E' reduzidas antes da cirurgia bariátrica.^{22,28} Willens et al.²⁸ observaram uma velocidade de E' média de 7,6 cm/s antes da cirurgia bariátrica, contudo seus pacientes apresentavam IMC mais elevado (54 kg/m²), pressão arterial sistólica em níveis maiores (145 mmHg) e uma prevalência de 29,4% de diabetes.

No presente estudo, a velocidade de E' aumentou 6,25% no pós-operatório. Outros observaram um aumento significativo nesse parâmetro após a cirurgia bariátrica.^{10,17,28}

A relação E/E' pode ser usada como um índice de pressões de enchimento do VE.²⁵ Valores abaixo de 8 implicam pressões normais de enchimento em pacientes com fração de ejeção preservada.²⁹ Todos os pacientes do estudo apresentavam E/E' < 8 antes da cirurgia.

A relação E/E' apresentou tendência à redução mas sem alcançar significância estatística. O comportamento desse parâmetro após a cirurgia bariátrica é heterogêneo entre os estudos. Luaces et al.³⁰ não encontraram nenhuma alteração em 12 meses após a cirurgia bariátrica, mas outros observaram reduções significativas na relação E/E' após a cirurgia: Willens et al.,²⁸ de 12,3 para 10 após um seguimento médio de 7,4 meses; e Ippisch et al.,¹⁰ de 7,7 para 6,3, após 10 meses de seguimento pós-operatório. Em comparação com o presente estudo, os períodos de seguimento foram mais longos e a relação E/E' durante o pré-operatório, mais elevada, sugerindo maiores pressões de enchimento diastólico.

Em relação à função sistólica do VE, nenhum dos pacientes apresentou redução na fração de ejeção do VE antes da cirurgia,

uma vez que esse foi um critério de exclusão para o estudo. Não se observou alteração nesse parâmetro após a cirurgia bariátrica. Isso é compatível com as constatações de outros pesquisadores.^{30,31} Garza et al.⁹ observaram resultados similares, mesmo no subgrupo de pacientes que apresentaram redução da fração de ejeção do ventrículo esquerdo antes da cirurgia.

Os resultados do nosso estudo devem ser interpretados no contexto de algumas limitações. O tamanho da amostra foi pequeno. Não havia grupo controle de pacientes obesos tratados clinicamente. O estudo foi observacional e as decisões referentes ao manejo dos pacientes foram feitas pelos médicos assistentes. Somente pacientes com obesidade grau 3 foram avaliados; pacientes com diabetes não foram incluídos. A variabilidade das medidas ecocardiográficas intra e interobservador não foi avaliada.

Conclusões

Após um período médio de seguimento de 4,7 meses, a cirurgia bariátrica promoveu melhora na estrutura ventricular esquerda e em um dos parâmetros da função diastólica velocidade de E'. Não houve alterações nos parâmetros sistólicos do ventrículo esquerdo.

Referências

1. Kardassis D, O, Schönander M, Sjöström L, Petzold M, Karason K. Impact of body composition, fat distribution and sustained weight loss on cardiac function in obesity. *Int J Cardiol*. 2012;159(2):128-33.
2. Grapsa J, Tan TC, Paschou S, Kalogeropoulos AS, Shimony A, Kaier T, et al. The effect of bariatric surgery on echocardiographic indices: a review of the literature. *Eur J Clin Invest*. 2013;43(11):1224-30.
3. Lakhani M, Fein S. Effects of obesity and subsequent weight reduction on left ventricular function. *Cardiol Rev*. 2011;19(1):1-4.
4. Zarich SW, Kowalchuk GJ, McGuire MP, Benotti PN, Mascioli EA, Nesto RW. Left ventricular filling abnormalities in asymptomatic morbid obesity. *Am J Cardiol*. 1991;68(4):377-81.
5. Levy D, Garrison RJ, Savage DD, Kannel WB, Castelli WP. Prognostic implications of echocardiographically determined left ventricular mass in the Framingham Heart Study. *N Engl J Med*. 1990;322(22):1561-6.
6. Sjöström L, Narbro K, Sjöström D, Karason K, Larsson B, Wedel H, et al. Effects of Bariatric Surgery on Mortality in Swedish Obese Subjects. *N Engl J Med*. 2007;357(8):741-52.
7. Mechanick JL, Kushner RF, Sugerman HJ, Gonzalez-Campoy JM, Collazo-Clavell ML, Spitz AF, et al. American Association of Clinical Endocrinologists, The Obesity Society, and American Society for Metabolic & Bariatric Surgery medical guidelines for clinical practice for the perioperative nutritional, metabolic, and nonsurgical support of the bariatric. *Obesity*. 2009; 17(Suppl 1):S1-70.
8. Ikononidis I, Mazarakis A, Papadopoulos C, Patsouras N, Kalfarentzos F, Lekakis J, et al. Weight loss after bariatric surgery improves aortic elastic properties and left ventricular function in individuals with morbid obesity: a 3-year follow-up study. *J Hypertens*. 2007;25(2):439-47.
9. Garza CA, Pellikka PA, Somers VK, Sarr MC, Collazo-Clavell ML, Korenfeld Y, et al. Structural and functional changes in left and right ventricles after major weight loss following bariatric surgery for morbid obesity. *Am J Cardiol*. 2010;105(4):550-6.
10. Ippisch HM, Inge TH, Daniels SR, Wang B, Khoury PR, Witt S, et al. Reversibility of cardiac abnormalities in morbidly obese adolescents. *J Am Coll Cardiol*. 2008;51(14):1342-8.

Contribuição dos Autores

Concepção e Desenho da Pesquisa: Santos ECL, Aguiar MIR, Moraes Neto FR; Obtenção de dados: Santos ECL, Aguiar MIR, Buril RO; Análise e interpretação dos dados: Santos ECL, Gadelha PS; Análise estatística: Santos ECL; Redação do manuscrito: Santos ECL, Moraes Neto FR, Gadelha PS; Revisão crítica do manuscrito quanto ao conteúdo intelectual importante: Santos ECL, Ferraz AAB, Campos JM, Gadelha PS.

Potencial Conflito de Interesses

Declaro não haver conflito de interesses pertinentes.

Fontes de Financiamento

O presente estudo não teve fontes de financiamento externas.

Vinculação Acadêmica

Este artigo faz parte da tese de mestrado de Eduardo Cavalcanti Lapa Santos pelo serviço de Pós-graduação em Cirurgia da Universidade Federal de Pernambuco.

11. Lang RM, Bierig M, Devereux RB, Flachskampf FA, Foster E, Pellikka PA, et al. Recommendations for chamber quantification: a report from the American Society of Echocardiography's. Guidelines and Standards Committee and the Chamber Quantification Writing Group, developed in conjunction with the European Association of Echocardiography. *J Am Soc Echocardiogr*. 2005; 18(12):1440-63.
12. Teichholz LE, Herman V. Problems in echocardiographic presence or absence volume determinations : correlations in the of asynergy. *Am J Cardiol*. 1976;37(1):7-11.
13. Devereux RB, Alonso DR, Lutas EM, Gottlieb GJ, Campo E, Sachs I, et al. Echocardiographic Assessment of Left Ventricular Hypertrophy: comparison to necropsy finding. *Am Heart J*. 1986;57(5):450-8.
14. De Simone G, Daniels SR, Devereux RB, Meyer RA, Roman MJ, de Divitiis O, et al. Left ventricular mass and body size in normotensive children and adults: assessment of allometric relations and impact of overweight. *J Am Coll Cardiol*. 1992;20(5):1251-60.
15. De Simone G, Devereux RB, Daniels SR, Koren MJ, Meyer RA, Laragh JH. Effect of Growth on Variability of Left Ventricular Mass : assessment of allometric signals in adults and children and their capacity to predict cardiovascular risk. *J Am Coll Cardiol*. 1995;25(5):1056-62.
16. Cunha L de CB, Cunha CL, de Souza AM, Chiminacio Neto N, Pereira RS, Suplicy HL. Evolutive echocardiographic study of the structural and functional heart alterations in obese individuals after bariatric surgery. *Arq Bras Cardiol*. 2006;(87):562-8.
17. Hsuan CF, Huang CK, Lin JW, Lin LC, Lee TL, Tai CM, et al. The effect of surgical weight reduction on left ventricular structure and function in severe obesity. *Obesity*. 2010;18(6):1188-93.
18. Kanoupakis E, Michaloudis D, Fraidakis O, Parthenakis F, Vardas P, Melissas J. Left ventricular function and cardiopulmonary performance following surgical treatment of morbid obesity. *Obes Surg*. 2001;11(5):552-8.
19. Alpert M, Terry BE, Kelly DL. Effect of weight loss on cardiac chamber size, wall thickness and left ventricular function in morbid obesity. *Am J Cardiol*. 1985;55(6):783-6.

20. Verdecchia P, Schillaci G, Borgioni C, Ciucci a, Battistelli M, Bartoccini C, et al. Adverse prognostic significance of concentric remodeling of the left ventricle in hypertensive patients with normal left ventricular mass. *J Am Coll Cardiol.* 1995;25(4):871-8.
21. Luaces M, Cachofeiro V, García-Muñoz-Najar A, Medina M, González N, Cancer E, et al. Anatomical and functional alterations of the heart in morbid obesity. Changes after bariatric surgery. *Rev Española Cardiol.* 2012;65(1):1-3.
22. Tavares IS, Sousa AC, Menezes Filho RS, Oliveira MA, Barreto Filho JÁ, et al. Left ventricular diastolic function in morbidly obese patients in the preoperative for bariatric surgery. *Arq Bras Cardiol.* 2011;98(4):300-6.
23. Cavarretta E, Casella G, Calì B, Dammaro C, Biondi-Zoccai G, Iossa A, et al. Cardiac remodeling in obese patients after laparoscopic sleeve gastrectomy. *World J Surg.* 2013;37(3):565-72.
24. Valezi AC, Machado VHS. Morphofunctional evaluation of the heart of obese patients before and after bariatric surgery. *Obes Surg.* 2011;21(11):1693-7.
25. Nagueh SF, Middleton KJ, Kopelen HA, Zoghbi WA, Quin MA. Doppler tissue imaging : anoninvasive technique for evaluation of left ventricular relaxation and estimation of filling pressures. *J Am Coll Cardiol.* 1997;30(6):1527-33.
26. Sohn DW, Chai IH, Lee DJ, Kim HC, Kim HS, O BH, et al. Assessment of mitral annulus velocity by Doppler tissue imaging in the evaluation of left ventricular diastolic function. *J Am Coll Cardiol.* 1997;30(2):474-80.
27. Wang M, Yip GW, Wang AY, Zhang Y, Ho PY, Tse MK, et al. Peak early diastolic mitral annulus velocity by tissue Doppler imaging adds independent and incremental prognostic value. *J Am Coll Cardiol.* 2003;41(5):820-6.
28. Willens HJ, Chakko SC, Byers P, Chirinos J, Labrador E, Castrillon JC, et al. Effects of weight loss after gastric bypass on right and left ventricular function assessed by tissue Doppler imaging. *Am J Cardiol.* 2005;95(12):1521-4.
29. Nagueh SF, Appleton CP, Gillebert TC, Marino PN, Oh JK, Smiseth O, et al. Recommendations for the evaluation of left ventricular diastolic function by echocardiography. *Eur J Echocardiogr.* 2009;10(2):165-93.
30. Luaces M, Martínez E, Medina M, Miana M, González N, Fernández-Pérez C, et al. The impact of bariatric surgery on renal and cardiac functions in morbidly obese patients. *Nephrol Dial Transpl.* 2012;27(Suppl 4):iv 53-7.
31. Leichman JG, Wilson EB, Scarborough T, Aguilar D, Miller CC, Yu S, et al. Dramatic reversal of derangements in muscle metabolism and left ventricular function after bariatric surgery. *Am J Med.* 2008;121(11):966-73.