A photograph of a forest with tall, thin trees and a forest floor covered in dry leaves and pine needles. The image is split diagonally, with the top-left portion showing the forest and the bottom-right portion being black.

2

VOLUME

MEIO AMBIENTE EM FOCO

Fabiane dos Santos Toledo
(Organizadora)

Editora Poisson

Editora Poisson

Meio Ambiente em Foco Volume 2

1ª Edição

Belo Horizonte
Poisson
2018

Editor Chefe: Dr. Darly Fernando Andrade

Conselho Editorial

Dr. Antônio Artur de Souza – Universidade Federal de Minas Gerais

Ms. Davilson Eduardo Andrade

Dr. José Eduardo Ferreira Lopes – Universidade Federal de Uberlândia

Dr. Otaviano Francisco Neves – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Dr. Luiz Cláudio de Lima – Universidade FUMEC

Dr. Nelson Ferreira Filho – Faculdades Kennedy

Ms. Valdiney Alves de Oliveira – Universidade Federal de Uberlândia

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

M514

Meio Ambiente em Foco - Volume 2/

Organização: Fabiane dos Santos Toledo

Belo Horizonte - MG : Poisson,

2018 - 164p

Formato: PDF

ISBN: 978-85-7042-032-9

DOI: 10.5935/978-85-7042-032-9

Modo de acesso: World Wide Web

Inclui bibliografia

**1. Meio ambiente 2. Gestão. I. Toledo,
Fabiane dos Santos**

CDD-577

O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade exclusiva dos seus respectivos autores.

Baixe outros títulos gratuitamente em www.poisson.com.br

contato@poisson.com.br

APRESENTAÇÃO

Há uma exigência imperiosa em ligarmos as relações humanas com as bases da sustentabilidade para a vida em nosso planeta. Ressignificar, no sentido de atribuir o que se conhece à nossa visão sobre o meio do qual somos integrantes, é um dos caminhos para a percepção ambiental mais eficiente e ativa em prol da educação e da qualidade de vida que constitui a essência de qualquer ser vivo. Para tal, requer-se mudar as perspectivas e alterar os resultados, além das escolhas e dos comportamentos.

Formar entendimento e conectar o ser humano com o meio ambiente apazigua e restaura os valores, as escolhas e as atitudes ambientais, transformando a sociedade e a cultura além das necessidades. É com esse viés que se pode chegar à tomada de consciência e às mudanças significativas.

Ao ampliarmos os conhecimentos e levá-los adiante cumprimos com o desafio de coordenar a riqueza ambiental do país de forma mais equitativa e descentralizada, assegurando a reflexão e o debate com justiça socioambiental. Desenvolvendo, portanto, a clareza do papel de cada um nesse processo.

Alinhar ao que o caro leitor espera, surpreendê-lo e estimulá-lo a compartilhar com o maior número de pessoas, desde estudantes, profissionais, a tomadores de decisões, se propaga nas próximas páginas, recheadas de bons conteúdos, comprometimento dos autores e amplas vias de conhecimento.

Aproveite a leitura!

Fabiane dos Santos Toledo

Sumário

Capítulo 1: Variabilidade da precipitação e da temperatura do ar no sul do Amazonas	7
Paulo, André da Silva Martins, Carlos Alexandre dos Santos Querino, Juliane Kayse Albuquerque da Silva Querino, Aryanne Rezende de Melo Moura, Sara Angélica Santos de Souza	
Capítulo 2: Precipitação e El Niño no sul do Amazonas	13
Sara Angélica Santos de Souza de Souza, Carlos Alexandre Santos Querino, Juliane Kayse Albuquerque da Silva Querino, Altemar Lopes Pedreira Junior, Luiz Octavio Fabricio dos Santos .	
Capítulo 3: Mimetismo urbano: A Relevância do Planejamento Bioclimatológico na Urbe Amazônica	18
Ariele Luckwü Mendes, Roberta Monique da Silva Santos, Luciana Melo Felix da Silva	
Capítulo 4: Habitar às margens: projeto de requalificação das áreas de risco no bairro Mauazinho	27
Lara Patricia dos Santos Chaves	
Capítulo 5: Cotidiano da vida ribeirinha: Caracterização e limitações em comunidades rurais de Manicoré, Amazonas.....	41
Danielle Ivana Pereira dos Santos, Francimara Souza da Costa, Ísis Ribeiro do Nascimento, Hyago Mardone Maciel, Juliana Gervasio Nunes, Alexandro Relvas Pereira	
Capítulo 6: Pescadores artesanais e os conflitos socioambientais em novo airão (AM).....	50
Maria Ferreira de Oliveira Filha, Janaína Zildeia da Silva Paiva, Dorinethe dos Santos Bentes	
Capítulo 7: O manejo comunitário participativo com ênfase no pirarucu (Arapaima gigas) região do Alto Solimões / Fonte Boa-Am.....	56
Francisco Das Chagas Melo Benevides, Sebastião Ferreira Lisboa Neto	
Capítulo 8: Sustentabilidade e geração de energia: Estudo da Viabilidade de Biodigestor em Comunidades Ribeirinhas da Amazônia.....	66
Julian Oliveira Gama, Clayssa Picanço de Lima, Débora Cristina Bandeira Rodrigues, Joel Rodrigues, Barbara Gabriella Oliveira Chaves	
Capítulo 9: O uso de malhadeiras numa comunidade de várzea, boca do arapirí, Alenquer-Pará	75
Sara Laurido, Tony Braga	
Capítulo 10: Áreas degradadas: utilização de pneus para contenção de voçoroca e assoreamento em córrego na católica do Tocantins	85
Sharlés Gabriel de Souza Borges, Letícia Santos Silva, Ana Karolline Soares Alves, Larissa Lorrana Silva, Chrissy Ferreira Macêdo, Allan Guilherme Rodrigues de Souza	

Sumário

Capítulo 11: Análise da qualidade da água da nascente do córrego da católica do Tocantins	91
Letícia Santos Silva, Sharles Gabriel de Sousa Borges, Daíse Araújo Soares de Souza, Allan Guilherme Rodrigues de Souza, Chryss Ferreira Macêdo	
Capítulo 12: Efeito de mudanças no ciclo hidrológico sobre as áreas produtivas da várzea	94
Lucirene Aguiar Souza, Fabíola de Souza Barão, Carlos Edwar de Carvalho Freitas	
Capítulo 13: Potabilidade da água para o abastecimento público em alguns municípios do estado do Amazonas	101
Fabíola Esquerdo De Souza, Solange Santos Costa, Elizia Raquel Cunha, Uarlisson Machado, Vandereia Castro Bezerra	
Capítulo 14: Potencial eólico nos municípios de boca do acre e lábrea no Amazonas	111
Aryanne Resende de Melo Moura, Carlos Alexandre Santos Querino, Altemar Lopes Pedreira Junior, Luiz Octavio Fabrício Santos, Paulo André da Silva Martins	
Capítulo 15: Aterramento do igarapé espírito santo em 1893, atual Avenida Eduardo Ribeiro: retrocesso político ou questões socioeconômicas	118
Robson Lima Da Silva, Maximillian Nascimento Da Costa, Jean Carlos Oliveira Coelho, Karine Canani de Oliveira	
Capítulo 16: Deposição irregular dos resíduos da construção civil e demolição em Guarabira-Pb	127
Thiago de Sá Sena, Anderson Oliveira de Sousa, Bruno Menezes da Cunha Gomes, Felipe Augusto da Silva Santos, Lucas Moura Delfino, Luiz Ricardo da Silva Linhares, Manoel Leandro Araújo e Farias	
Capítulo 17: A guarda municipal e sua relação com as áreas protegidas de Manaus: Um estudo analítico à luz da lei nº 13.022/2014.	134
Antonio Jorge Barbosa da Silva, Ygor Felipe Távora da Silva	
Capítulo 18: Metropolização e receitas públicas: Análise a partir dos impostos e dos fatores socioeconômicos*	143
Guilherme Augusto Bentes Furtado Neto, Isaque dos Santos Sousa, Susane Patrícia Melo de Lima	
Autores:	148

Capítulo 1

VARIABILIDADE DA PRECIPITAÇÃO E DA TEMPERATURA DO AR NO SUL DO AMAZONAS

Paulo, André da Silva Martins

Carlos Alexandre dos Santos Querino

Juliane Kayse Albuquerque da Silva Querino

Aryanne Rezende de Melo Moura

Sara Angélica Santos de Souza

Resumo: O conhecimento da variabilidade espaço-temporal dos elementos climáticos é fundamental para o entendimento da dinâmica das variáveis meteorológicas, como a temperatura do ar. Esta variável exerce um papel fundamental no desencadeamento de processos físicos e fenômenos meteorológicos. O objetivo deste trabalho foi identificar a variabilidade da precipitação e da temperatura do ar na mesorregião Sul do Amazonas. Foram coletados dados horários de temperatura dos anos de 2008 á 2018 pelas estações meteorológicas automáticas de superfície pertencente ao Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, nos municípios de Humaitá, Apuí, Lábrea, Boca do Acre e Manicoré. Para precipitação, utilizou dados mensais correspondente aos anos de 1998 a 2018 estimado pelo satélite TRMM_3B42RT disponibilizados no site da National Aeronautics and Space Administration (NASA). As médias mensais de temperatura do ar e os totais mensais da precipitação foram comparados com 2 normais climatológicas (1960-1990 e 1980-2010). A sazonalidade da precipitação teve três comportamentos, período chuvoso (Outubro a Abril), transição (Maio e Setembro) e seco (Junho a Agosto). Manicoré obteve os maiores totais anuais com 2554 mm e Humaitá o menor 1949 mm. No período chuvoso, ocorrem entre 82 e 85% de toda a precipitação anual da região. A temperatura do ar teve anomalias positivas quando comparadas as normais climatológicas em Lábrea e Manicoré. O período seco obteve os menores valores médios (25 ° C) e maiores médias mensais 27 ° C no início do período chuvoso de setembro a novembro. Os resultados mostraram que os fatores altitude e precipitação influenciaram o comportamento da temperatura do ar.

Palavras Chave: Precipitação, Climatologia, Normal Climatológica.

1. INTRODUÇÃO

Anomalias de temperatura, seja ela positiva ou negativa, é motivo de grande preocupação por parte da comunidade científica nas últimas décadas, pois sua alteração, em decorrência de mudanças microclimáticas, implicam em impactos ambiental, social e econômico (Ferrari et al., 2012). Essa grande preocupação referente as alterações no clima, deve-se a variação da temperatura do ar em escala global desde o século passado (GOMES, 2015).

As variações da temperatura do ar ficaram conhecidas como aquecimento global, que seria a resultante do agravamento do efeito estufa, fenômeno este que é natural e foi um dos responsáveis pela existência de vida na terra (LIMA et al., 2017). O efeito estufa é o principal regulador da temperatura do planeta, sendo responsável por manter a mesma em valores que possibilite a existência de vida (BARCELLOS, 2009). Entretanto, com a intensificação do desmatamento, são feitas grandes queimadas para substituição de floresta em plantações e pastos com propósitos mercantis. Ao longo da história, indivíduos têm sempre se beneficiado da remoção de árvores para usos diversos como fonte de energia, construções de habitações e tornar terra disponível para agricultura (Arraes et al., 2012; Tavares 2017).

Em muitos aspectos, os desmatamentos que ocorrem atualmente na Amazônia não são significativamente diferentes dos que ocorreram em regiões temperadas séculos atrás. Os estados que estão localizados dentro da Amazônia sofrem com forte pressão antrópica e os índices de desmatamento anuais estão em uma crescente. Contudo, dentre os estados que compõem a Amazônia legal, o Amazonas caracteriza-se por ter os menores índices de desmatamento em relação aos outros. No

entanto, parte do Amazonas, especificamente a mesorregião sul, tem se destacado quanto à modificação do uso da terra (Perreira 2004).

Segundo Filho (2009) dentre as cidades que compõem o sul do Amazonas, Apuí (29%), Manicoré (24%), Lábrea (19%) e Boca do Acre (10%) apresentam os maiores percentuais de desflorestamento do estado. Além de impactos na fauna e flora, esses desflorestamentos podem causar alterações no clima em escala local e regional, pois alterações na cobertura do solo interferem na quantidade de calor latente que é utilizado na transferência de vapor d' água para a atmosfera, e aumenta o calor sensível responsável por elevar a temperatura da superfície sem vegetação, desta forma pode interferir na modificação no balanço de radiação e, consequentemente, energético superficial (Biudes et al., 2015).

Desta forma o objetivo deste trabalho foi analisar a variabilidade da precipitação e da temperatura do ar na mesorregião Sul do Amazonas.

2. DESENVOLVIMENTO ÁREA DE ESTUDO

Os municípios de Humaitá, Apuí, Manicoré, Boca do Acre e Lábrea compõem a mesorregião sul do estado do Amazonas, localizam-se entre as coordenadas 5° 48' 32" S 61° 18' 0" W e 07°30'22" S 63°01'15" W com altitudes variando entre 32 e 127 m (Figura 1). Suas áreas somadas contemplam 206,215 Km² (IBGE, 2010).

De acordo com a classificação de Köppen, a região possui um clima tropical chuvoso com dois períodos bem definidos: chuvoso (outubro a abril) e seco (maio a setembro) (Pedreira Junior et al., 2017; Pavão et al., 2014).

Figura 1: Localização das cidades que compõem a área de estudo no sul do estado do Amazonas, Brasil.

3.DADOS

Os dados de temperatura do ar foram coletados pela estação meteorológica automática de superfície pertencente ao Instituto Nacional de Meteorologia – INMET por um período de 10 anos (Abril de 2008 à Abril de 2018) (Tabela 1). Os dados foram processados em médias mensais e posteriormente comparados com duas normais climatológicas da temperatura do ar (1960-1990 e 1980-2010). O termo Normal Climatológica é empregado quando o número de anos para os quais se dispõe de médias mensais, é maior ou igual a 30 anos (Inmet, 2009).

Para precipitação, utilizou dados mensais

correspondente aos anos de 1998 a 2018 pelo satélite TRMM_3B42RT coletados e disponibilizados no site da National Aeronautics and Space Administration (Nasa), através do servidor Giovanni (<https://giovanni.gsfc.nasa.gov>). O satélite orbita entre 350 a 403 Km e tem seu período de translação curto (91 minutos), isto possibilita uma alta resolução temporal e espacial do imageamento. Os instrumentos que realizam estas medidas são o imageador de micro-ondas (TMI), radar de precipitação (PR), radiômetro no visível e no infravermelho (VIRS), sensor de energia radiante da superfície terrestre e das nuvens (Ceres), e sensor para imageamento de relâmpagos (LIS).

Tabela 1: Localização das estações meteorológicas automáticas avaliadas no estudo, e período de coleta dos dados.

Estações	Latitude	Longitude	Altitude (m)	Período dos Dados
Humaitá	-7.552520º	-63.071343º	54	2008-2018
Apuí	-7.205475º	-59.888561º	157	2008-2018
Manicoré	-5.788533º	-61.288276º	41	2011-2018
Boca do Acre	-8.776804º	-67.332557º	112	2008-2018
Lábrea	-7.260681º	-64.788501º	62	2008-2018

4.RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com base no cômputo dos dados de 20 anos pode-se estabelecer um padrão na precipitação nas cidades que compõem o estudo, com 3 periodos distintos; o chuvoso que vai de Outubro a Abril, o seco de Junho a Agosto e o período de transição composto pelos meses de Maio e Setembro (Figura 2).

A estação chuvosa nas cidades estudadas

tiveram uma precipitação média de 1902mm em Boca do Acre e 1645 mm em Humaitá correspondendo a 84% da precipitação anual. Apuí e Lábrea obtiveram 85% dos valores anuais de 2066mm e 1785 respectivamente. Já Manicoré, registrou 82% de toda sua precipitação anual no período chuvoso totalizando 2014 mm.

Os totais anuais mostraram que o volume de precipitação em manicoré (2554 mm) foram

maiores que as demais cidades avaliadas e, Humaitá, os menores (1949 mm).

O período seco (Junho a Agosto) foi responsável por 10 a 12% da precipitação nas áreas de

estudo, sendo que, dentre este período o mês de Junho obteve o maior volume de chuva entre relação aos outros variando de 51 mm em Lábrea e 82 mm em Manicoré. Nos meses restante Julho e Agosto há uma regularidade nos percentuais de precipitação, entretanto Boca do Acre sobressai em Agosto com 52 mm.

O regime de chuvas que ocorrem na parte sul da Amazônia, e por sua vez na área de estudo está diretamente interligado com a atuação predominante da Zona de

Convergência do Atlântico Sul (Zcas), das linhas de instabilidade, da penetração de sistemas frontais, da fonte de vapor d'água representada pela floresta amazônica (evapotranspiração), pela atuação da cordilheira dos Andes (Barreira Física, que não permite a passagem de umidade que saem da Amazônia) (Ferreira et al., 2005), e da Alta da Bolívia (AB) que desse caracteriza como um anticiclone em altos níveis da troposfera (200 hPa) durante os meses de verão, associado a forte convecção da região Amazônica. A AB resulta na convergência do ar mais aquecido e umidade nos baixos níveis (850 hPa) e divergência do ar que se resfria em altos níveis da atmosfera (200 hPa) e que tem posição variável intra-sazonal e interanual (Turco et al., 2005).

Figura 2: Totais médios de Precipitação da mesorregião Sul do Amazonas.

A temperatura média mensal (Figura 3A) para a área de estudo variou até 3°C entre o mês mais frio e o mês mais quente. Os valores mais baixos de temperatura foram encontrados nos meses de junho e julho, com média de temperatura de 25°C enquanto o mês mais quente foi setembro (26,5 °C). Ainda na Figura (3A), nota-se que os valores da temperatura apresentam valores médios de 26 °C nos meses de Janeiro a Abril. A partir de Maio até Julho os valores caem para média de 25 °C. Em Agosto as temperaturas médias voltam a subir para 27 °C.

Dentre as cidades estudadas Humaitá e Lábrea mantem um comportamento harmônico nos 6 primeiros meses do ano, pois, após junho a temperatura em Humaitá aumenta 1 °C em relação a Lábrea. Apuí, Manicoré e Boca do Acre tem comportamento diferente dos demais

municípios do estudo. Manicoré não apresenta grandes amplitudes de temperatura. Embora tenha um período com baixos valores médios, a média nunca foi inferior aos 26 °C. Já Apuí esteve em todos os períodos do estudo com valores médios abaixo dos demais municípios. Em agosto seu maior valor médio foi de 26,5°C enquanto que Boca do Acre teve a maior amplitude térmica, variando de 25 °C a 27 °C entre julho e outubro. Dos cinco municípios quatro mantiveram as menores temperaturas entre os meses de junho a agosto, isso ocorre em razão da estação do ano, neste período embora não tenha nuvens de tempestades que atenuariam a entrada de radiação, encontra-se no inverno austral onde a quantidade de radiação emitida para o hemisfério Sul diminui em razão da declinação solar. Já Apuí teve os menores valores nos três primeiros meses do ano, isso ocorre em razão da quantidade de

precipitação mensal a maior entre os cinco municípios, e por ter maior altitude (Tabela 1) em relação aos demais. (Marengo et al., 2001).

Manicoré teve a menor amplitude térmica (Figura 3A) não tendo grandes variações de temperatura. Segundo Souza et al. (2010) esse comportamento ocorre em regiões que estão próximas da linha do Equador e este ser o lugar que mais recebe radiação solar durante todo o ano.

As temperaturas médias mensais das cidades de Lábrea e Manicoré seguiram o mesmo padrão das suas respectivas normais climatológicas (NC) (Figura 3- B-C). O comportamento da temperatura de Lábrea nas duas normais climatológicas (1960-1990 e 1980-2010), embora tenham o mesmo comportamento durante o ano, a NC de 1980 a 2010 mostrou anomalia positiva

em relação a NC de 1960 a 1990 em aproximadamente $1,2^{\circ}\text{C}$. Esta Anomalia é ainda maior quando comparados com dados do INMET tendo seu maior valor de $27,5^{\circ}\text{C}$ em setembro, ficando 2°C acima da NC de 1960 a 1990. Este mesmo comportamento também é visto em Manicoré, com anomalias de $1,4^{\circ}\text{C}$ entre as duas NC e $1,2^{\circ}\text{C}$ em relação aos valores de superfície do INMET.

Alguns fatores tiveram influência nos valores de temperatura. A precipitação, (Figura 2) foi responsável pelo declínio da temperatura nos primeiros meses do ano. As estações do ano e, variações de pressão atmosférica, e altitude pois quanto maior a altitude, menor será suas temperaturas, pois nesses lugares, a quantidade de moléculas de ar também são menores, reduzindo a pressão atmosférica e sua capacidade de armazenar calor, estes fatores somados são determinante nas variações do clima (Souza et al., 2010).

Figura 3: Variação média mensal da temperatura do ar e normais climatológicas das cidades de Lábrea e Manicoré.

5. CONCLUSÕES

A temperatura do ar no sul do Amazonas apresentou valores e comportamentos distintos. As medidas atuais de superfície nas cidades de Lábrea e Apuí apresentaram anomalias positivas superiores as duas normais climatológicas. Dentre os

municípios analisados, Apuí continuou a apresentar os menores valores médios de Temperatura do ar, enquanto Humaitá os maiores valores após os meses de Agosto. Ressalta-se ainda que Manicoré estava abaixo da NC de 1980 a 2010 após o mês de julho.

A precipitação apresentou três períodos distintos, o período chuvoso (outubro a abril), período de transição (maio e setembro) e um período seco (junho a agosto). Manicoré foi a cidade que mais choveu, e Humaitá obteve

os menores valores. O período chuvoso representou o maior percentual da precipitação anual em todas as cidades julho foi o mês com o menor valor de precipitação para todas as cidades.

REFERÊNCIAS

- [1] Arraes, R. A. M.; Zilania, F. S.; Gomes, A. Causas do desmatamento no Brasil e seu ordenamento no contexto mundial. *Rev. Econ. Sociol. Rural* .2012, vol.50, n.1, pp.119-140.
- [2] Barcellos, Christovam. Mudanças climáticas e ambientais e as doenças infecciosas: cenários e incertezas para o Brasil. *Epidemiol. Serv. Saúde*. 2009, vol.18, n.3, pp.285-304.
- [3] Biudes, M. S.; Vourlitis, G. L.; Machado, N. G.; Arruda, P. H. Z.; Neves, G. A. R.;
- [4] Lobo, F. A.; Neale, C. M. U.; Nogueira, J. S. Patterns of energy exchange for tropical eco systems across a climate gradient in Mato Grosso, Brazil. *Agricultural and Forest Meteorology* , V.202, p.112-124, March, 2015.
- [5] Ferreira, A. G.; Mello, N. G. S. Principais sistemas atmosféricos atuantes sobre a região Nordeste do Brasil e a influência dos oceanos Pacífico e Atlântico no clima da região. *Revista Brasileira de Climatologia*, São Paulo, v. 01, n. 1, p. 15-28, 2005.
- [6] Ferrari, A. L.; Vecchia, F. A. S.; Colabone, R. O. Tendência e variabilidade anuais da temperatura e da pluviosidade em Pirassununga-SP. *Revista Brasileira de Climatologia*, Ano 8 – Vol. 10 – Jan/Jun. 2012.
- [7] Filho, A. C.; Souza, O. B. Atlas de Pressões e Ameaças às Terras Indígenas na Amazônia Brasileira, Série Cartô Brasil socioambiental, ISA (instituto socioambiental), São Paulo, novembro de 2009. 48p.
- [8] Gomes, A. C. S; Análise estatística das tendências de elevação nas séries de temperatura média máxima na Amazônia central: estudo de caso para a região do oeste do Pará. *Revista Brasileira de Climatologia*, v. 17, dez. 2015
- [9] Ibge – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Estatística Populacional – Censo 2010. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/geociencias-novoportal/organizacao-doterritorio/estrutura-territorial/15761-areas-dos-municipios.html?t=destaques&c=1301704>>. Acesso em: Maio de 2018.
- [10] Inmet – Instituto Nacional de Meteorologia. Normais Climatológicas do Brasil 1961-1990. Brasília, DF. 465p. 2009.
- [11] Lima, G. L. L, A. M. Lima, D. A. ; Santos, G. F. Análise DA Temperatura do Ar em os menores valores. O período chuvoso representou o maior percentual da precipitação anual em todas as cidades julho foi o mês com o menor valor de precipitação para todas as cidades.
- [12] Vilhena, Rondônia. In: Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia - Contecc, 2017, Belém - PA. 74ª Soea/Contecc, 2017.
- [13] Marengo, J. Mudanças Climáticas Globais e Regionais: Avaliação atual do Brasil e Projeções de Cenários Climáticos. *Revista Brasileira de Meteorologia*, Rio de Janeiro, v. 16, n. 1, p.1-18, jun. 2001.
- [14] Pavão, V.M.; Querino, C. A. S. ; Querino, J. K. A. S. ; Martins, P. A. S. ; Siqueira, L.
- [15] F. ; Leite, L. O. ; Passos, L. A. ; Costa, T. A. C. R. ; Machado, N. G. ; Biudes, M. S. .
- [16] Análise da radiação solar global (rg) e albedo superficial sobre um ecossistema de floresta nativa em Humaitá- am durante o período chuvoso. *Revista EDUCamazônia - Educação, Sociedade e Meio Ambiente*, v. 12, p. 42-56, 2014.
- [17] Pereira, José Carlos Matos. Importância e Significado das Cidades Médias na Amazônia: uma abordagem a partir de Santarém (PA). Dissertação de Mestrado em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará, 2004.
- [18] Pedreira Junior, A. L.; Costa, E. R. O. ; Cunha, K. C. L. ; Moura, A. R. M. ; Gois, D.
- [19] ; Brissow, A. T. S. ; Lima, S. S. ; Santos, P. G. S. ; Nascimento, I. R. ; K.A.S.Querino,
- [20] J. ; Querino, C. A. S. . Caracterização da normal climatológica da precipitação na região sul do Amazonas. In: VII Simpósio Internacional de Climatologia - VII SIC, 2017, Petrópolis - RJ. Clima, Variabilidade e Perspectivas Futuras, 2017.
- [21] Souza, D.M.; Nery, J.T. Análise da temperatura, da umidade e do conforto térmico no município de Ourinhos. In: IX simpósio brasileiro de climatologia geográfica – Climatologia e gestão de território. Fortaleza, Ceará. 26 a 30 de setembro de 2010.
- [22] Tavares, L. Cordeiro, L. Perfil socioeconômico e ambiental do sul do estado do Amazonas: Subsídios para Análise da Paisagem. WWF-Brasil, 2017.
- [23] Turco, J. E. P. de; Faria, M. T. de; Fernandes, E. J. Influência da forma de obtenção do saldo de radiação na comparação de métodos de estimativa da evapotranspiração de referência. *Irriga, Botucatu*, v. 10, n. 3, p. 215-228,. 2005.

Capítulo 2

PRECIPITAÇÃO E EL NIÑO NO SUL DO AMAZONAS

Sara Angélica Santos de Souza de Souza

Carlos Alexandre Santos Querino;

Juliane Kayse Albuquerque da Silva Querino

Altemar Lopes Pedreira Junior

Luiz Octavio Fabricio dos Santos .

Resumo: O clima e suas variações exercem grande influência sobre a sociedade. As variações climáticas podem ser antrópicas ou naturais, como por exemplo, as provocadas pelo El Niño. O El Niño é caracterizado por anomalias positivas da temperatura da superfície do oceano pacífico e, como consequência, altera a precipitação em todo o globo. No Brasil, o El Niño normalmente é responsável pelas secas nas regiões Norte e Nordeste e o excesso de chuva nas regiões Sul e Sudeste. O objetivo deste trabalho foi analisar o impacto do El Niño, de intensidade forte, na precipitação no município de Humaitá – AM. O município de Humaitá localiza-se na mesorregião sul do estado do Amazonas. Os dados de precipitação, no período de 1998 até 2017, para os anos de ocorrência do El Niño intenso (anomalia da temperatura do oceano Pacífico acima de $1,5^{\circ}\text{C}$), foram estimados pelo satélite TRMM e estão disponíveis no site da National Aeronautics and Space Administration (NASA) (<https://giovanni.gsfc.nasa.gov/>). Os totais sazonais (período seco e chuvoso) e anuais dos anos de ocorrência do El Niño foram comparados com as normais climatológicas do município, disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia – INMET. Nos anos de El Niño intenso, aproximadamente 71%, dos sete anos estudados, a precipitação local foi em média 13,7% inferior a normal climatológica.

Palavras Chave: ENOS, Sul do Amazonas, Pluviometria.

1. INTRODUÇÃO

O estado do Amazonas situa-se na parte equatorial do Brasil. É caracterizado por um clima quente e úmido, com vasta disponibilidade de energia solar (FISCH et al., 2018). Ainda segundo o autor, os maiores totais de radiação que chegam na sua superfície ocorrem nos meses de Setembro/Outubro, sendo que os mínimos são nos meses de Dezembro à Fevereiro. Algumas atividades, sejam elas de origem natural ou antrópica, podem influenciar na estabilidade desse clima, alterando a normalidade das variáveis meteorológicas, principalmente a temperatura e a precipitação.

As variações no clima podem ser devido a consequências antrópicas, como a urbanização. Todavia, podem ocorrer também de maneira natural. Fenômenos acoplado entre oceano e atmosfera, como o ENOS (El Niño Oscilação Sul), podem alterar o volume de precipitação pluviométrica de uma região, ocasionando assim alterações nas normais climatológicas definidas. No Norte do Brasil, por exemplo, eventos de El Niño durante o período chuvoso afetam o posicionamento dos sistemas dinâmicos geradores de chuva, reduzindo a umidade do ar, inibindo a convecção e ocasionando períodos de seca e temperaturas acima da média (OLIVEIRA et al., 2008).

El Niño é um fenômeno que ocorre no Oceano Pacífico tropical e que interfere nas condições meteorológicas, sobretudo na precipitação pluvial e temperatura, em diversas regiões do globo (JACÓBSEN et al., 2004). O fenômeno é caracterizado por anomalias positivas da temperatura da superfície do mar, ou seja, águas mais quentes que as normais (MOLION, 2017). O Índice Oceânico Niño (ION) é um índice que identifica as anomalias da superfície do oceano Pacífico através de uma média móvel de três meses. Quando o ION for maior que + 0,5 °C por no mínimo três meses consecutivos, o período é caracterizado como El Niño (MARCUIZZO, 2013).

O ENOS exerce grande influência sobre clima do Brasil (ALVES et al., 1997). A precipitação, uma das variáveis meteorológicas mais modificadas pela ação deste fenômeno, vai variar de acordo com a intensidade do ENOS. De maneira geral, em eventos El Niño ocorrem secas nas Regiões Norte e Nordeste e excesso de chuva nas Regiões Sul e Sudeste do Brasil (MOLION, 2017). De acordo com Andreoli (2007), as secas severas no Nordeste brasileiro têm sido relacionadas à ocorrência dos eventos El Niño. Em estudo realizado em Fortaleza – CE foi constatado que em anos de El Niño forte e moderado (1900, 1907, 1932, 1941, 1958, 1983), notavelmente esta cidade sofreu secas severas e que a variabilidade interanual de precipitação no NEB, em alguns anos, pode ser mais fortemente relacionada ao ENOS (ANDREOLI et al., 2004).

Portanto, analisar possíveis impactos que fenômenos meteorológicos como El Niño podem causar no clima do sul do estado do Amazonas torna-se relevante, uma vez que a diminuição da precipitação favorece o aumento de queimadas na região. Assim, o objetivo deste trabalho foi verificar os impactos do El Niño, categoria forte, na precipitação em Humaitá – Am.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 METODOLOGIA

Área de estudo O município de Humaitá (07° 38' S, 63° 04' W, 72m) tem área territorial de aproximadamente 33.111,164 km² e está localizado na mesorregião do sul do estado do Amazonas (IBGE, 2018) (Figura 1). O clima da região possui dois períodos bem definidos: um chuvoso prolongado (outubro a maio) e um seco de pequena duração (junho a setembro) (TAVARES, 2017). No período chuvoso, o total pluviométrico esperado é de 1949,6 mm e no período seco 244,1 mm, totalizando 2193,7 mm por ano (INMET, 2009).

Figura 1. Localização geográfica do município de Humaitá, no sul do Amazonas, Brasil.

Dados: Foram utilizados dados de precipitação, no período de 1998 a 2017, obtidos pelo sensor TRMM_3B42RT do satélite TRMM e disponibilizados no site da National Aeronautics and Space Administration (NASA) (<https://giovanni.gsfc.nasa.gov/>). Devido a falhas nos dados do satélite, em 2015 foram utilizados dados da estação meteorológica do

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) (7.55° S e 63.07° W, 54 m) instalada no município de Humaitá.

Os dados de ENOS, nos anos de ocorrência do El Niño intenso (anomalia acima de 1,5 ° C), foram obtidos no site do Serviço Climatológico Nacional dos Estados Unidos (NOAA - National Weather Service) (www.nws.noaa.gov) (Tabela 1).

Tabela 1. Anos de ocorrência do fenômeno El Niño de intensidade forte.

Fenômeno	Anos
El Niño	1998, 2002-2003, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017

Processamento dos dados: Os dados de precipitação foram tratados e analisados através dos totais pluviométricos sazonais (período seco e chuvoso) e anuais. Para efeito de referência, os dados coletados foram comparados com a normal climatológica da precipitação para o município de Humaitá. Esta normal foi obtida através de uma média de dados pluviométricos no período entre 1960 e 1990 e disponibilizados pelo INMET (2009).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nos anos de 1998, 2014, 2015, 2016 e 2017 houve uma diminuição na precipitação anual de aproximadamente 13,7% em relação a normal climatológica (Tabela 2). Dentre todos os anos estudados no período, o ano de 1998 apresentou a menor precipitação estimada, de aproximadamente 37,3%, possivelmente ainda em decorrência do intenso El Niño que

se iniciou em 1997 e que trouxe efeitos significativos, sobretudo nos meses de dezembro e janeiro (NOAA, 2018). O ano de 2016 também registrou uma baixa significativa, cerca de 14,1%, que foi resultado de um El Niño intenso que se havia iniciado no final do ano de 2014 e durou até o primeiro semestre de 2016 (NOAA, 2018).

No entanto, nos anos de 2002 e 2003 notou-se aumento na precipitação anual de aproximadamente 13,5% em relação a normal climatológica. O fato pode estar relacionado aos efeitos da atividade do La Niña (aumento da precipitação) que vinham atuando até alguns meses antes dos anos citados.

Em estudo realizado no Nordeste brasileiro Kane (1997) afirmou que apesar de alguns grandes El Niños, destacando-se 1877-1878, 1891, 1900, 1907, 1932, 1941, 1958 e 1983, estarem associados com as secas do Nordeste, muitos outros não mostram tal relacionamento. Dos 46 El Niños no período

de 1850-1992, apenas 21 mostraram secas em Fortaleza. Eventualmente, o não impacto do El Niño no sul da região Norte também pode ser observado, já que aproximadamente 37,5% dos anos de ocorrência do fenômeno, no período estudado, não apresentou redução da precipitação.

Comparando-se a normal climatológica anual do município de Humaitá com o total de precipitação anual obtido nos anos sob

influência do El Niño, observa-se que o fenômeno realmente origina variação no total pluviométrico nos anos estudados (Figura 2). Essas variações também foram observada em estudo realizado na porção territorial da bacia do rio Solimões principalmente em 1972-73, 1983-88, 1998, 2005 e 2010 onde constatou-se que com exceção de 2005, em todos os outros anos houve um desfavorecimento de chuvas na Amazônia (SERRÃO et al., 2015).

Tabela 2. Total anual de precipitação dos períodos chuvoso e seco de Humaitá

Anos	Período Chuvoso (mm)	Período Seco (mm)	Total (mm)	Diferença da normal (mm)
1998	1270,3	104,4	1374,8	-818,9
2002	2216,1	236,5	2452,6	258,9
2003	2200,8	319,9	2520,7	327,0
2014	1894,8	134,6	2029,4	-164,3
2015	1960,2	144,6	2104,8	-88,9
2016	1654,7	229,9	1884,6	-309,1
2017	1867,8	200,1	2067,9	-125,8

Figura 2: comparação entre o total pluviométrico anual, para cada ano de ocorrência de eventos de el niño forte, com a normal climatológica do inmet para o município de humaitá, amazonas, brasil.

4. CONCLUSÕES

O fenômeno El Niño reduziu o total pluviométrico do município de Humaitá em 13,7% durante cinco dos sete anos em que houve eventos classificados com magnitude forte, no período estudado. Isso implica que, a princípio, aproximadamente em 71% dos casos de El Niño forte refletem em anomalias negativa da precipitação no sul do Amazonas.

Sugere-se que estudos mais aprofundados correlacionando os dados para todos os graus de El Niño sejam realizados, bem como ampliar a análise para todo o sul do estado do Amazonas.

REFERÊNCIAS

- [1] Alves, M. B.; Souza, E. B.; Repelli, C. A.; Vitorino, M. I.; Ferreira, N. S. Episódios de La Niña na bacia do oceano pacífico e equatorial e a distribuição sazonal e intrasazonal das chuvas no setor norte do nordeste brasileiro. *Revista Brasileira de Meteorologia*, v. 12, nº 1, p.63-76, 1997.
- [2] Andreoli, R. V.; Kayano, M. T. A importância relativa do atlântico tropical sul e pacífico leste na variabilidade de precipitação do Nordeste do Brasil. *Revista Brasileira de Meteorologia*, v.22, nº 1, 63-74, 2007.
- [3] Andreoli, R. V.; Kayano, M. T.; Guedes, R. L.; Oyama, M. D.; Alves, M. A. S. A influência da temperatura da superfície do mar dos oceanos Pacífico e Atlântico na variabilidade de precipitação em Fortaleza. *Revista Brasileira de Meteorologia*, v.19, nº 3, 337-344, 2004.
- [4] Fisch, G.; Marengo, J. A.; Nobre, C. A. Clima da Amazônia. Disponível em: <<http://climanalise.cptec.inpe.br/~rclimanl/boletim/cliesp10a/fish.html>>. Acesso em: 07 maio, 2018.
- [5] Ibge – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Estatística Populacional – Estimativa 2017. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/geociencias-novoportal/organizacao-do-territorio/estrutura-territorial/15761-areas-dos-municipios.html?t=destaques&c=1301704>>. Acesso em: 14 maio, 2018.
- [6] Inmet – Instituto Nacional de Meteorologia. Normais Climatológicas do Brasil 1961-1990. Brasília, DF. 465p. 2009.
- [7] Jacóbsen, L. O.; Fontana, D. C.; Shimabukuro, Y. E. Efeitos associados ao El Niño e La niña na vegetação do estado do Rio Grande do Sul, observados através do NDVI/NOAA. *Revista Brasileira de Meteorologia*, v. 19, nº 2, 129-140, 2004.
- [8] Kane, R. P. Prediction of droughts in North-east Brazil: role of enso and use of periodicities. *International Journal of Climatology*, vol. 17, 655–665, 1997.
- [9] Marcuzzo, F.F.N.; Romero, V. Influência do El Niño e La niña na precipitação máxima diária do estado de Goiás. *Revista Brasileira de Meteorologia*, v.28, nº 4, 429 - 440, 2013.
- [10] Molion, L. C. B. Gênese do El Niño. *Revista Brasileira de Climatologia*, v.21. 2237-8642 (Eletrônica), 2017.
- [11] Noaa – National Weather Service. Climate Prediction Center. Disponível em: <http://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.php>. Acesso em: 31 mar, 2018.
- [12] Oliveira, F. M.; Araújo, R. L.; Carvalho, J. S.; Costa, S. S. Determinação da variação no microclima de Manaus – AM por atividades antropogênicas e modulações climáticas naturais. *Acta Amazônica*. vol. 38, nº 4, 687 – 700, 2008.
- [13] Serrão, E. A. D. O.; Santos, C. A. D.; Wanzeler, R. T. S.; Gonçalves, L. D. J. M.; Lima, A. M. M. D. Avaliação da seca de 2005 e 2010 na Amazônia: análise da bacia hidrográfica do rio Solimões. *Revista Geogr. Acadêmica*, v. 9, nº 2, 5 – 20, 2015.
- [14] Tavares, L.; Cordeiro, L. Perfil socioeconômico e ambiental do sul do estado do Amazonas: Subsídios para Análise da Paisagem. WWF-Brasil, 2017.

Capítulo 3

MIMETISMO URBANO: A RELEVÂNCIA DO PLANEJAMENTO BIOCLIMATOLÓGICO NA URBE AMAZÔNICA

Ariele Luckwii Mendes

Roberta Monique da Silva Santos;

Luciana Melo Felix da Silva

Resumo: Muitos estudiosos da Amazônia afirmam o papel das cidades como vetores de inovação para um modelo de desenvolvimento pró-ambiental. Todavia, se as redes urbanas se integram em benefício da região, o mesmo não se pode afirmar do modelo de ocupação urbana. Pensar o papel das cidades no futuro da Amazônia é pensar cidades na Amazônia e para Amazônia, motivo pelo qual o planejamento bioclimatológico adquire relevância frente ao modelo vigente de formação e crescimento das cidades. Além de oferecer importantes serviços para manutenção das populações locais, a urbanização possui caráter institucional e ideológico, daí sua importância estratégica. Entretanto, a repetição do modelo de aglomeração urbana desenfreada, denominada aqui de mimetismo urbano, é um problema porque a velocidade em que o espaço urbano readquire qualidade ambiental é mais lenta do que o crescimento do seu território, bem como a rapidez com que surgem novas cidades satélites. O mesmo fenômeno ocorreu em várias cidades planejadas. Consequentemente, há o paradoxo entre a posição estratégica da cidade sobre controle de áreas de preservação e seu impacto nessas áreas. A urbanidade é impulsionada pela adequação de seu aparato físico, que não se forma a partir de planos rígidos, mas é guiada por estratégias de boa ocupação. A infraestrutura básica e o ordenamento urbano devem alinhar-se aos princípios do planejamento bioclimatológico da organização do conjunto e do projeto das edificações. Baseado nisto, o presente estudo buscou realizar uma reflexão sobre a importância do planejamento bioclimatológico na Amazônia. A pesquisa, de cunho bibliográfico, foi desenvolvida a partir da consulta de livros e artigos científicos de autores consagrados, as novas correntes de pensamento sobre a relação do ser humano com a natureza, a necessidade do manejo sustentável e a busca consciente de humanização.

Palavras-Chave: sustentabilidade, urbanismo, rede urbana na Amazônia.

1. INTRODUÇÃO

A urbanização completa da sociedade, mais do que uma hipótese teórica, é uma forte tendência e orientação do modelo atual de ocupação dos espaços (LEFEBVRE, 2008), especialmente na América Latina, a mais urbanizada região entre os países em desenvolvimento. Na Amazônia Brasileira, em especial no estado do Amazonas, a rede urbana oferece importantes serviços para manutenção das populações tradicionais que lá habitam, formando fronteiras de resistência ao desmatamento provocado pela agroindústria e a mineração (BECKER, 1974).

O papel dos espaços urbanos para preservação da floresta amazônica, bem como a sustentabilidade das atividades nela exercidas, contradizem a percepção das reservas de proteção ambiental como áreas intocadas e intocáveis, sobre as quais o homem parece sempre exercer uma influência negativa (DIEGUES, 2001). Entretanto, muitos estudiosos da Amazônia afirmam o papel das cidades como vetores de inovação para um modelo de desenvolvimento pró-ambiental, tanto pelo processo de produzir para conservar (BECKER, 1974) como para empoderamento das comunidades locais pelo direito a cidade (HARVEY, 2009).

Se o processo de urbanização se integra em benefício da região, o mesmo não se pode afirmar do modelo de ocupação urbana. Assim como os produtos alimentícios industrializados invadem o imaginário, tornando-se atrativos pelo preço competitivo, pela facilidade de armazenamento e estocagem, mas principalmente pelo marketing (SCHOR et al., 2016), o mesmo acontece desde os materiais de construção civil aos planos de ocupação urbana, que poucas vezes se adequam as condições climatológicas e especificidades locais.

Somados a precariedade da infraestrutura e má gestão de recursos, estes impasses podem tornar o viver nas cidades amazônicas uma experiência insalubre ou topofóbica, caso se repitam os mesmos erros cometidos nas metrópoles tentaculares (TUAN, 1980) das quais emanam tanto as tomadas de decisões como os modelos imaginários de desenvolvimento urbano. Contraditoriamente, as ideias de utopia, não como “não-lugar” mas como “lugar feliz”, sempre esteve atrelada a modelos de planejamento urbano. (HARVEY, 2000)

Se a arquitetura vernacular, ribeirinha ou indígena, se harmoniza ao meio natural (OLGYAY, 1998) no contexto rural, o aglutinado ambiente das cidades diminui sua eficiência, embora em muitos casos continue mais adequada do que as construções a partir de projetos e materiais genéricos. Pensar o papel das cidades no futuro da Amazônia é pensar cidades na Amazônia e para Amazônia, motivo pelo qual o planejamento bioclimatológico adquire relevância frente ao modelo vigente de formação e crescimento das cidades, abordagem explorada pelo presente artigo.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa, de cunho bibliográfico (GIL, 2010) foi desenvolvida a partir da consulta de livros e artigos científicos de autores consagrados. Foram analisados os processos de urbanização (LEFEBVRE, 2008), a formação das cidades (TUAN, 1980), importância da urbe para os países em desenvolvimento (HARVEY, 2009) e para a região amazônica – sua influência como vetor de inovação pró-ambiental (CHAZDON, 2003), seu significado (TRINDADE JR., 2015), seu papel na estrutura espacial brasileira (BECKER, 1974), seu posicionamento estratégico para os povos tradicionais (MCSWEENEY; JOKISCH, 2015), sua relação com as bacias fluviais para mobilidade (ELOY; BRONDIZIO; PATEO, 2015) e estruturação de redes urbanas (SCHOR et al., 2016).

Em seguida foram demonstradas novas correntes de pensamento sobre a relação do ser humano com a natureza (DIEGUES, 2001), a necessidade de viabilizar o manejo e a produção nas áreas florestais para sua preservação (BECKER, 1974) e a busca consciente de humanização (MORIN; KEM, 2003). Por fim, foram indicadas as premissas de uma ocupação urbana (mais) sustentável para a Amazônia, em relação a qualidade ambiental nas cidades e a mitigação das demandas por recursos e geração de resíduos.

Neste âmbito, analisou-se a relação entre arquitetura e clima (OLGYAY, 1998) com exemplos daquilo que já foi realizado em edificações relativamente recentes (CERETO, 2016), as estratégias bioclimáticas aplicáveis ao contexto local (LOUREIRO; CARLO; LAMBERTS, 2002), a relevância da vegetação urbana para cidades em clima quente e

úmido (BARBOSA; BARBIRATO; VECCHIA, 2003) e da climatologia na gestão dos espaços urbanos (AMORIM, 2010).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

“Comparadas entre si às sociedades urbanas nada tem de comparáveis” (LEFEBVRE, 2008), entretanto pode-se observá-las como um todo orgânico (organicismo) de continuidade histórica (continuismo) que se estruturam e são estruturadas por períodos de transformações das relações sociais (evolucionismo). A proliferação do tecido urbano, não como unidade isolada, mas como um sistema de cidades interligadas que exercem domínio sobre as áreas rurais e/ou florestais, ao mesmo tempo em que delas depende.

A concentração da população e dos meios de produção só pode acontecer se existem áreas que forneçam matérias-primas e serviços ambientais, comumente, mas não necessariamente, fora dos limites urbanos. Da mesma forma como existe a dependência das cidades entre si e de vias de fluxo para o abastecimento e escoamento de produtos.

O fato é que a urbanização desde a época da revolução industrial ocorre tipicamente por meio da explosão desordenada de grandes cidades pelos subúrbios, que são legitimados e qualificados somente após o período inicial de ocupação, com surgimento paralelo de aglomerados satélites menores onde a prática urbana é apreendida e reaprendida.

O período de crescimento urbano segue ao da problemática urbana, quando as soluções às mazelas da cidade, embora já sabidas, são executadas após a sua formação, com exceção de poucos casos bem-sucedidos de cidades planejadas. É possível encontrar exemplos deste sistema ineficiente de ocupação territorial em muitas cidades contemporâneas, em especial na americana latina, desde metrópoles a pequenas cidades aparentemente isoladas, ainda que cada agrupamento apresente sua particularidade.

A urbanização possui caráter institucional e ideológico, daí sua importância estratégica. A partir de cidades menores se podem administrar vastos territórios, sobre a regência de uma ou mais “cidades grandes” e o controle de grandes centros administrativos. Em determinado momento trona-se necessário fazer a planificação da *urbe*, ou seja, gerar plantas e planos para cidade:

trata-se de “um olhar ao mesmo tempo ideal e realista – do pensamento, do poder – situa-se na dimensão vertical, a do conhecimento e da razão, para dominar e construir uma totalidade [...]” (LEFEBVRE, 2008).

Mais do que um processo de ocupação, trata-se de um processo de implosão-explosão, ou explosão-implosão, na qual a cidade ao mesmo tempo requalifica seu ambiente e reafirma sua imagem, assim a realidade urbana torna-se causa e razão. A repetição deste fenômeno põe a problemática urbana em escala mundial, pois o tempo em que o espaço urbanizado readquiri sua qualidade ambiental é mais lento do que o crescimento de seu próprio território, bem como surgimento de novos aglomerados satélites.

Consequentemente, há o paradoxo entre a posição estratégica da cidade sobre controle de áreas de preservação e seu impacto nessas áreas. Cabe lembrar que o mesmo problema ocorreu em muitas cidades planejadas, em especial segundo o modernismo – como em Brasília, por exemplo - devido à segregação das diversas áreas da ciência que atuam direta ou indiretamente sobre os espaços e ao menosprezo do processo de formação histórico-cultural das cidades.

O ideal edênico se descola do urbano para natureza, pois o primeiro tornou-se mais selvagem no imaginário coletivo (TUAN, 1980), escondendo a intrínseca relação de serviços que ambos se fornecem. Esta dicotomia entre ambiente urbano e ambiente natural torna difícil o pensamento da Amazônia como selva urbanizada (BECKER, 1974), assim como sua complementaridade e seus múltiplos benefícios aos povos tradicionais (MCSWEENEY; JOKISCH, 2015).

Entretanto, a conquista do direito a cidade, entendido como “direito que todos temos de criar cidades que satisfaçam nossas necessidades humanas” (HARVEY, 2009, p.269), obviamente ocorre a partir do seu surgimento da cidade e da necessidade em transforma-la em melhor. A crise ambiental pode ser entendida como um reflexo da crise econômica, que por sua vez se reflete na crise urbana.

“Vale notar que com frequência é na escala geográfica da vida em pequena escala da cidade que se situam os ideais das organizações sociais utópicas” (HARVEY, 2000, p.208). Sendo assim, a manutenção tanto dos recursos naturais como dos povos

tradicionais da Amazônia por meio de um modelo de urbanização sustentável, e consequentemente inovador, faz mais sentido em uma rede de cidades pequenas do que no magnetismo imaginário e decadente da metrópole contemporânea.

Embora não haja uma visão integrada dos processos de recuperação florestal, entende-se que muitas áreas degradadas dos trópicos de hoje exigirão assistência humana para recuperar a estrutura da floresta (CHAZDON, 2003), o que enfatiza a relevância das cidades próximas a essas áreas como incubadoras de novas formas de recuperação, manejo e tecnologias sustentáveis, daí a importância de torná-las vetores de inovação.

É preciso reconhecer a diversidade urbana em suas múltiplas dimensões, que na Amazônia é expressa pela pluralidade da estruturação do espaço e suas respectivas “[...] formas e os conteúdos urbanos como produtos, meios e condições de processos sócio-espaciais em face da diferenciação inter-regional” (TRINDADE JR., 2013, p.104). Áreas de conservação florestal com

residentes correspondem a 30,8% da região amazônica, e são divididas em duas categorias: áreas indígenas e áreas de ocupação e manejo por populações rurais (ELOI; BRONDIZIO; PATEO, 2015).

Com algumas exceções, a maior parte dos centros urbanos amazônicos se caracteriza por sua baixa densidade, sendo negligenciados pela típica representação cartográfica, particularmente do IBGE, que apresenta a Amazônia Brasileira como um enorme vazio demográfico, desconsiderando aspectos como: dinâmica populacional, variáveis históricas, infraestrutura, relações interurbanas, *inputs*, *outputs*, etc. (SCHOR et al., 2016). Não obstante, são obscurecidas as cadeias migratórias sazonais e a relação da população “não urbana” com a cidade.

Baseada no esquema do espacial da teoria do desenvolvimento polarizado (FRIEDMANN, 1967) e na operação das relações nesse sistema (STÖHR, 1990), Bertha Becker propõe um esquema do sistema espacial hipotético para o Brasil (Figura 1) por meio da descrição da atual relação entre os diferentes tipos regiões do país (Figura 2):

Figura 1 - Sistema espacial hipotético para o Brasil (BECKER, 1974).

Figura 2 - Relação entre diferentes tipos regiões do Brasil (BECKER, 1974).

Os esquemas acima demonstram a influência da localização espacial nos objetivos nacionais. O desequilíbrio regional revela a forte centralidade do poder econômico e político, nesse cenário a região norte – em que se situa boa parte da floresta amazônica – é vista como fronteira de recursos. Estudos recentes e evidências empíricas demonstram a invalidade de proteger reservas florestais inabitadas, o que implica na necessidade urgente de programar um novo padrão de desenvolvimento para transformar as tendências globais em oportunidades de desenvolvimento não predatório e não mais em intensificação de riscos (BECKER, 1974).

Antecipar um novo padrão de desenvolvimento para a Amazônia, pela união da ciência e tecnologia em prol da sustentabilidade ambiental, social e econômica, alinhando a preservação do patrimônio natural e cultural. Este desafio transdisciplinar não se constitui apenas por ideais utópicos ou técnicas inovadoras, mas principalmente a partir da articulação dos mesmos com modelos de produção já existentes, lhe atribuindo o devido valor.

A cidade como base logística desta proposta, deverá ter sua qualidade ambiental pensada e/ou restaurada, fazendo jus ao *status* de lócus da (r)evolução planetária (MORIN; KEM, 2003). Entendem-se as escalas locais e globais como inseparáveis, assim com a inevitável sinergia entre primeiro, segundo e terceiro setores frente aos impasses que

ameaçam tanto a destruição da floresta amazônica como a sobrevivência humana no planeta terra.

Não se deve esquecer que o processo de ocupação da região norte, com exceção do período pré-colonial, sempre esteve associado a surtos de expansão movidos a mudanças no cenário mundial. Até agora estes *booms* trouxeram poucos benefícios ao desenvolvimento regional, é preciso haver cadeias produtivas de beneficiamento de produtos florestais, que atualmente são exportados como matéria prima, gerando riquezas em outras localidades.

A urbanização, além de uma consequência ou um aparato físico necessário, integra-se a produção do espaço social, compreendido como formação de espaço de lugar e espaço de fluxos, pelos processos formação e interdependências de cidades em uma dada rede urbana. Elas operam sistemas de produção e abastecimento, são agentes ativos em um processo contínuo de apropriação e aprimoramento, por esse motivo os modelos de ocupação territorial devem ser adaptados às especificidades locais e às funções de cada *urbe* na *hinterlândia*.

Além das interações físicas, a conectividade virtual favorece a troca de conhecimentos e a profissionalização, da qual depende a produção de serviços de alto valor agregado e o posicionamento dos cidadãos nas decisões tomadas pelos grandes projetos

nacionais para região. A mudança do paradigma implica em maior autonomia da região, das cidades e da população.

A consciência sobre o futuro e a importância da biodiversidade para uma economia baseada em cadeias produtivas complexas capazes de competir globalmente, conforme o duplo imperativo progredir para resistir, no caso da Amazônia resistir a precarização e ao desflorestamento, entre outras barbáries. O progresso econômico nesses termos dar-se-á por meio do progresso da hominização, cujo fim último seria “o nascimento da sociedade/comunidade planetária dos indivíduos, das etnias, das nações” (MORIN; KEM, 2003, p.101). Portanto, se requalificam e ampliam os sentidos de desenvolvimento econômico, social e urbano.

Felizmente, além das construções vernaculares e neoclássicas, existem boas referências de arquitetura na Amazônia que datam de períodos atuais ou relativamente recentes, é o caso das obras modernistas de arquitetos como Severiano Mario Porto e Lúcio Costa. “Curiosamente, sabe-se pouco sobre a modernidade amazônica [...]” (CERETO, 2016).

Espera-se que surgimento do Seminário de Arquitetura Moderna na Amazônia – SAMA em 2016 permita, além da discussão e troca de conhecimento sobre o patrimônio moderno, maior produção científica a respeito da participação dos arquitetos no processo de urbanização da região. É preciso indicar os erros e acertos cometidos, não como crítica aos autores e suas obras, mas como critérios para entender os princípios que os guiaram e as dificuldades que encontraram.

Um exemplo dos princípios citados é o projeto bioclimático, cujo objetivo é a “[...] adequada e harmoniosa relação entre o ambiente construído, o clima e seus processos de troca de energia, tendo como

objetivo final o conforto ambiental humano” (BABIRATO; SOUZA; TORRES, 2007, p.12). Tal objetivo é alcançado por meio do equilíbrio na inter-relação entre climatologia, biologia, tecnologia e arquitetura (OLGYAY, 1998).

O primeiro passo da arquitetura e urbanismo bioclimáticos é a interpretação dos fatores dos geofísicos e seu efeito nos seres humanos: as variações de zonas de conforto que se expressam nas configurações de refúgio e entorno, de acordo com as características climáticas e ambientais de cada região. É possível observar, tanto pelas construções vernaculares como pela obra de alguns arquitetos renomados – como Severiano Porto – as estratégias que norteiam a escolha da localização, a orientação e controle solar, o direcionamento dos ventos e do fluxo de ar interno, o uso e eficiência térmica dos materiais e sistemas construtivos.

Diferente do ordenamento empírico, o planejamento bioclimatológico analisa e calcula as variáveis do clima e do bioma, buscando aproveitar ao máximo as potencialidades naturais, reduzir a necessidade de climatização artificial e em consequência o consumo de energia e pegada de carbono. Durante o IX Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente, por exemplo, foi apresentada a carta bioclimática para Manaus, podendo ser utilizada como exemplo para outros municípios da região norte, até a futura criação das próprias.

Nesta carta foram destacados três itens como necessários para o conforto térmico nas edificações: sombreamento constante, ventilação e ar condicionado, além do desconforto ambiental na maior parte das horas do ano (LOUREIRO; CARLO; LAMBERTS, 2002), em decorrência das altas temperaturas e taxas de umidade do ar, além da baixa velocidade dos ventos, como pode ser observado abaixo (tabela 1):

Tabela 1 - Relatório com as estratégias bioclimáticas para Manaus (LOUREIRO; CARLO; LAMBERTS, 2002).

Normais Climatológicas: 1961-1990		Ano Base: 1994		Pressão: 101.13 KPa	
Dia e mês inicial: 01/01		Dia e mês Final: 31/12		Total de horas: 8760	
Conforto				0,24%	
Desconforto	Calor	<div></div>	Ventilação	65,20%	99,77%
		<div></div>	Resfriamento evaporativo	0%	
		<div></div>	Massa térmica para resfriamento	0,0685%	
		<div></div>	Ar condicionado*	34,10%	
		<div></div>	Umidificação	0%	
		<div></div>	Ventilação/ massa térmica	0,126%	
		<div></div>	Ventilação/massa/resfriamento evaporativo	0,24%	
		<div></div>	Massa/resfriamento evaporativo	0,0342%	
Sombreamento					100%

*Estratégias para diminuir o uso e/ou impacto do ar condicionado

Tais características são comuns a maior parte dos municípios da Amazônia Brasileira, com ressalva da acentuação do desconto causado pela formação de ilhas de calor urbanas. Ao contrário do que se costuma pensar, esta formação ocorre em cidades de pequeno e médio porte, a magnitude das anomalias geradas pode levar a uma diferença de temperatura de até 10°C entre as áreas urbanas e rurais (AMORIM, 2010).

Vale ainda destacar a importância da vegetação urbana em cidades de clima quente e úmido, como pode ser demonstrado por meio da medição em áreas urbanas arborizadas e não arborizadas, sendo constatada sua influência positiva melhorias nas condições microclimáticas da malha urbana, no tangente a valores de temperatura, umidade relativa e direção do fluxo dos ventos. (BARBOSA; BARBIRATO; VECCHIA, 2003).

4. CONCLUSÕES

O processo de urbanização da Amazônia deve considerar não apenas os serviços

oferecidos pela cidade, mas a qualidade de vida de seus habitantes e seu impacto ambiental. Se a rede-urbana é uma realidade e ao mesmo tempo um processo em andamento, deve-se questionar o modelo de cidade que está sendo replicado, denominado aqui de mimetismo urbano.

É preciso pensar a cidade como elo de um conjunto de interações ambientais, sociais e econômicas que ocorrem interna e externamente. A urbanidade, no sentido de civilidade e afabilidade, é impulsionada pela adequação de seu aparato físico, que não se forma a partir planos rígidos, mas é guiada por diretrizes boa ocupação.

A infraestrutura básica (água, esgoto, drenagem, pavimentação, coleta seletiva, etc.) E o ordenamento urbano (hierarquia viária, loteamentos, habitação, comércio e serviços, instituições, parques, corredores ecológicos, apps, etc.) Devem alinhar-se aos princípios do planejamento bioclimatológico da organização do conjunto e do projeto das edificações (olgyay, 1998), os quais são descritos abaixo (tabela 2):

Tabela 2 - Estratégias Bioclimáticas para Climas Quentes e Úmidos (OLGYAY, 1998).

Desenho Bioclimático do Conjunto	Desenho Bioclimático da Edificação
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Edificações posicionadas nas cotas mais altas do terreno; ▪ Edificações individualizadas, com espaçamento entre si de modo a favorecer a circulação de ar entre as edificações; ▪ Espaços públicos e áreas externas permanentemente sombreadas; ▪ Vegetação próxima alta, proporcionando sombreamento sem barrar a ventilação; ▪ Sistemas de escoamento da água em caso de chuvas torrenciais. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Edificações altas de forma livre e alongada na direção norte-sul, na proporção 1:1,7 a 1:30; ▪ Elementos que favoreçam a circulação interna de ar e proteção contra a insolação direta, em todas as fachadas; ▪ Atenção especial ao excesso aberturas nas fachadas leste e oeste; ▪ Planta de distribuição deve ser livre e de preferência com jardim ou pátio interno; ▪ Evitar o excesso de zonas pavimentadas; ▪ Malha protetora contra insetos nas aberturas ▪ Existência de pelo menos uma área protegida contra tempestades; ▪ Ambientes internos onde se produza calor e umidade (cozinha, banheiro, etc.) devem possuir ventilação permanente e estar separados do resto da edificação; ▪ Demais espaços internos com paredes móveis ou muros baixos, permitindo o fluxo de vento durante as atividades diurnas; ▪ Materiais com resistência a umidade e boa inércia térmica; ▪ Superfícies em cores claras.

Todavia, antes de mais nada é necessário conhecer as demandas da área por meio do diálogo com a comunidade local e outros *clusters* envolvidos, explorar a arquitetura vernacular em busca de não somente de soluções bioclimatológicas, mas de representações culturais – sem as quais não existe o sentimento de pertencimento ao lugar – entender as funções que a cidade desempenha na rede urbana e antever consequências de sua expansão. Não obstante, é preciso impedir o crescimento desenfreado e desordenado, bem como priorizar a requalificação das áreas urbanas existentes e a utilização dos recursos disponíveis no local.

O planejamento bioclimatológico certamente não poderá abarcar todas os problemas urbanos, mas poderá minimiza-los e quem

sabe até suprimir boa parte dos danos ambientais. A cidade amazônica poderá torna-se uma inovação em si mesma, repensando a maneira de ocupação urbana – hominizada, eficiente e em equilíbrio com ambiente – possibilitando a apreensão desses em outras localidades, exportar-se-ia então a própria sustentabilidade urbana.

AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com apoio do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Brasil.

Agradecemos ainda às contribuições da Profa. Dra. Tatiana Schor.

REFERÊNCIAS

- [1] Amorim, M. C. DE C. T. Climatologia e gestão do espaço urbano. Mercator - Revista de Geografia da UFC, v. 9, n. 1, p. 71–90, 2010.
- [2] Babirato, G. M.; Souza, L. C. L. De; Torres, S. C. Clima e Cidade. Alagoas: ABEU, 2007.
- [3] Barbosa, R. V. R.; Babirato, G. M.; Vecchia, F. A. S. Vegetação urbana: Análise

experimental em cidade de clima quente e úmido. Encac - Cotedi 2003, n. 1, p. 722–729, 2003.

- [4] Becker, B. K. A Amazônia na estrutura espacial do Brasil. Revista Brasileira de Geografia, v. 2, n. 36, p. 3–36, 1974.
- [5] Cereto, M. Amazônia Moderna. Vitruvius Drops, v. 102.1, p. 1–3, 2016.
- [6] Chazdon, R. L. Tropical forest recovery: Legacies of human impact and natural disturbances. Perspectives in Plant Ecology,

Evolution and Systematics, v. 6, n. 1–2, p. 51–71, 2003.

[7] Diegues, a. C. S. O mito moderno da natureza intocada. 3. Ed. São paulo: editora hucitec, 2001.

[8] Eloy, L.; Brondizio, E.; Pateo, R. do. New perspectives on mobility, urbanization and resource management in riverine Amazonia. Bulletin of Latin American Research, v. 34, n. 1, p. 3–18, 2015.

[9] Friedmann, J. A general theory of polarized development. Growth Centres in Regional Economic Development, p. 82–107, 1967.

[10] Gil, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 184p

[11] Harvey, D. Alternativas ao neoliberalismo e o direito à cidade. Novos Cadernos NAEA, v. 12, n. 2, p. 269–274, 2009.

[12] Lefebvre, H. A Revolução Urbana. 3. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008.

[13] Loureiro, K.; Carlo, J.; Lamberts, R. Estudos de estratégias bioclimáticas para a cidade de Manaus. IX Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, p. 153–162, 2002.

[14] Mcsweeney, K.; Jokisch, B. Native amazonians' strategic urbanization: Shaping territorial possibilities through cities. Journal of Latin American and Caribbean Anthropology, v. 20, n. 1, p. 13–33, 2015.

[15] Morin, E.; KEM, A. B. Terra Pátria. 2. ed. Porta Alegre: Editora Meridional LTDA, 2003.

[16] Olgyay, V. Arquitectura y Clima. Barcelona: Gráfica 92, 1998.

[17] Schor, T. et al. Apontamentos metodológicos sobre o estudo de cidades e de rede urbana no estado do Amazonas, Brasil. PRACS: Revista Eletrônica de Humanidades do Curso de Ciências Sociais da Unifap, v. 9, n. 1, p. 9, 2016.

[18] Stöhr, W. Estrategias de desarrollo local para hacer frente a la crisis local. Instituto de Estudios Urbanos y Regionales (IIR), v. 18, n. 55, p. 5–11, 1990.

[19] Trindade JR., S.-C. C. da. Uma floresta urbanizada? Legado e desdobramentos de uma teoria sobre o significado da cidade e do urbano na Amazônia. Espaço Aberto, v. 3, n. 2, p. 89–108, 2013.

[20] Trindade JR., S.-C. C. DA. Cidades e centralidades na Amazônia: dos diferentes ordenamentos territoriais ao processo de urbanização difusa. Revista Cidades, v. 12, n. 21, p. 305–334, 2015.

[21] Tuan, Y.-F. Topofilia: Um estudo da percepção, atitudes e valores do meio ambiente. Rio de Janeiro: Difel Editorial S.A., 1980

Capítulo 4

HABITAR ÀS MARGENS: PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE RISCO NO BAIRRO MAUAZINHO

Lara Patricia dos Santos Chaves

Resumo: O bairro Mauazinho, Zona Leste de Manaus, está no quadro de bairros que necessitam de intervenções sociais e urbanas, além de possuir recursos naturais que precisam ser preservados. O principal motivo em se trabalhar tal área foi o observado pela intensa degradação ambiental, manifestada pela precária qualidade de vida da população residente nas áreas de risco geológico e áreas de inundação do bairro e do seu entorno, devido ao alto índice de chuvas que degrada as encostas e intensifica os “fundos de vale”. O projeto tem como objetivo requalificar a área urbana e reordenar as moradias flutuantes e ribeirinhas existentes, reassentamento da população residente nessas áreas de risco, de modo a proporcionar a qualidade de vida para os moradores, estruturar o meio físico e biótico através de parque urbano ecológico, integrando a população ribeirinha ao restante do bairro, sem perder a identidade visual e tipologias regionais. Por meio da democratização da orla e da fluidez dos espaços abertos, espera-se qualificar o ambiente construído, minimizar as desigualdades e promover a mobilidade entre diferentes espaços.

Palavras Chave: Requalificação Urbana, Integração, Moradia.

1. INTRODUÇÃO

A ocupação e uso do solo de forma desordenada representa um dos principais problemas na área urbana de Manaus. O uso indiscriminado e inadequado do solo urbano, aliado a falta de infraestrutura de saneamento básico devido à dificuldade de fornecer estes serviços na mesma velocidade em que a ocupação se processava, levou ao atual cenário de degradação dos corpos d'água e as áreas do entorno, e de risco social a que estão sujeitas as populações que ali vivem. Historicamente vem se buscando a solução deste problema e se processando principalmente ações emergenciais e mitigadoras, porém sem solução em longo prazo.

A chegada da Zona Franca e suas indústrias na cidade de Manaus, foi o precursor da ocupação

Vários fatores levaram a escolha da área de intervenção, o bairro possui inúmeras problemáticas à serem abordadas, mas dentre elas, a escolha das áreas de fundo de vale e áreas de proteção permanente como unidades de planejamento, representam a afirmação dessas áreas como integrantes do ambiente urbano, que devem ser consideradas no momento do planejamento. Outro fator determinante são as moradias em áreas de risco estão entre os maiores desafios devido ao alto índice de chuvas e degradação de suas encostas e fundos de vale. Através do projeto de requalificação das áreas de risco, a população ribeirinha será conectada ao restante do bairro através da orla democratizada, integradas ao parque urbano linear proposto. Ao recuperar o rio a partir da interpretação ambiental e conseguir vinculá-lo a outros sistemas mencionados é gerado um circuito natural que recupera a qualidade do ar e da água no bairro ao longo da rota do igarapé e educa o público sobre a riqueza da biodiversidade. O projeto busca desenvolver a consciência ambiental, preservar espécies nativas da região, conectar a rede biótica da área e a proteger do rápido crescimento urbano, considerando a carência de opções de lazer e de locais públicos para atividades sociais do bairro, o

que será suprido parcialmente pelo projeto proposto, atraindo contextos culturais ao longo da implantação do parque, para melhorar a qualidade do espaço público e infraestruturas para a cidadania, proporcionar espaços para a aprendizagem através de percursos com paisagens e vegetação variadas e oferecer espaços desportivos para compor um parque amplo, onde os moradores possam se divertir e educar-se, com isso, gerando fluidez e espaços abertos sem perder a identidade visual e tipologias regionais.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 HABITAR ÀS MARGENS: REQUALIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE RISCO DO MAUAZINHO.

2.1.2 SISTEMA AMBIENTAL DE CONEXÃO PARA A CIDADE

O projeto surge como estruturante do meio biótico e meio físico das áreas de risco do bairro Mauazinho. Atualmente a vegetação se encontra desarticulada da rede de espaço público e contida em pequenas franjas pouco permeáveis. As encostas onde estão presentes as moradias estão cada vez mais degradadas pelo seu acúmulo de lixo provenientes de ocupações espontâneas e à intensas chuvas, causando risco geológico. O Parque Ambiental e Urbano do Mauá proposto para essas áreas degradadas, busca articular os corpos de água, os vazios verdes, e as infraestruturas, em algumas regiões inexistentes, sobre o igarapé mauazinho, por meio de sua recuperação e integração dos moradores ribeirinhos com o restante do bairro, que hoje encontram-se isolados nessas áreas de risco geológico e como consequência, a poluição do rio vem aumentando. O Projeto é idealizado para buscar o regionalismo como essência, valorizando as paisagens formadas ao longo da orla, de uma área protegida por lei, mas pela vontade do homem, uma estética incompreensível se impõe diante à natureza, propõe a integração com a mata remanescente da orla fluvial, junto com a paisagem ambiental, preservando a praia.

Figura 1: Vegetação existente na área de intervenção.

Fonte: CHAVES, 2018

Ao recuperar o rio a partir da interpretação ambiental e conseguir vinculá-lo a outros sistemas mencionados é gerado um circuito natural que recupera a qualidade do ar e da água na cidade e ao longo de sua rota educa o público sobre a riqueza da nossa biodiversidade. O projeto busca desenvolver a consciência ambiental, preservar espécies nativas da região, reordenar as moradias ribeirinhas e flutuantes, construir um porto mercado público para fornecer serviços básicos, melhorar a conectividade, gerar atividade econômica, revitalizar o igarapé do bairro e ao mesmo tempo protegendo do rápido crescimento urbano, atrair contextos culturais ao longo do eixo do seu contexto para melhorar a qualidade do espaço público e infraestruturas verdes, proporcionar espaços para a aprendizagem através de percursos com paisagens e vegetação variadas e oferecer espaços desportivos para compor um parque amplo, incentivando as pessoas a se comunicarem e colaborarem uns com os outros, onde eles possam se divertir e educar o público sobre a riqueza da nossa biodiversidade representa um dos principais problemas na área urbana de Manaus.

O projeto visa a melhoria do quadro ambiental do bairro, promovendo a recuperação ambiental da bacia e integrar o igarapé do Mauzinho com a cidade, a área intervenção é definida em função da propriedade pública disponível ao longo dos margens do igarapé através da requalificação urbana e preservação e reflorestamento das áreas

degradadas e de proteção permanente determinada para ambas as margens, implementando programas de saneamento, desassoreamento e a utilização racional do uso do solo as margens do igarapé, com vistas a manutenção do patrimônio natural e a melhoria das condições de vida da população ribeirinha, trabalhando a integração, mobilidade, oferecendo desenvolvimento econômico e facilitando a participação cidadã.

2.2 CRITÉRIOS PROJETUAIS

- 1) O igarapé como Eixo Estrutural: Aproveitando a hierarquia natural do igarapé para criar um parque ambiental, que ligue os sistemas naturais da cidade em um circuito ambiental no igarapé do Mauá.. O novo corredor biótico metropolitano torna-se um parque ambiental, cultural e desportivo.
- 2) Repotenciação de lacunas verdes urbanas e seu vínculo ao sistema ambiental: Os vazios verdes urbanos encontrados na área de influência do igarapé Mauá, são classificados, reutilizados e reconectados ao corredor biótico.
- 3) Recuperação e integração de corpos de água: Promover a recuperação e proteção dos fluxos de água através de sua integração com o corredor biótico. Reconhecer estas estruturas naturais como parte ativa e influente sobre o bem-estar geral do rio e do igarapé e intervir nestes para incorporação na rede de espaço público e ambiental dada assegura o equilíbrio/recuperação do sistema

biótico garante da cidade, promovendo educação aos cidadãos para protegê-los e garantir a sua manutenção.

4) Reciclagem de estruturas subutilizadas na área de influência do corredor biótico: são aproveitadas as estruturas subutilizadas ou de usos insustentáveis do corredor do rio para reciclá-las e dotar de usos que complementem a vocação do Parque Mauá.

5) Cultural: A compreensão da ocupação ribeirinha como patrimônio cultural deverá contemplar os critérios de projeto, o qual se expressará através da releitura desse modelo nas plataformas flutuantes, assimilando o rio como território e via modal.

6) Conforto: Princípios bioclimáticos são capazes de agregar eficiência a um projeto promovendo ganhos substanciais de conforto. Serão consideradas medidas potencializadoras de microclima para promover ventilação, estabelecendo mecanismos de controle e proteção contra incêndio solar.

7) Sustentabilidade: Promover medidas sustentáveis dada a extrema relevância do tema ambiental. A permeabilidade do solo deverá ser preservada da mesma maneira, será entendida como pertinente a recomposição da mata ciliar às margens do igarapé;

8) Natural: Será considerado aspectos naturais da área para definir implantação projetual que seguem: a morfologia dos cursos d'água deverá ser respeitada evitando aterros, canalizações ou mudanças de curso d'água.

2.3 REDES ECOLÓGICAS – CORREDOR BIÓTICO/ REFLORESTAMENTO

Interferências humanas nos ecossistemas naturais, causam influências na dinâmica da flora e fauna local. Segundo Ricklefs, quanto menores e mais isolados os fragmentos florestais, mais facilmente as populações de fauna e flora mitigam à extinção. Outra consequência da fragmentação é o aumento de bordas expostas. A solução seria a criação do corredor ecológico conectando esses fragmentos verdes que garanta equilíbrio ecológico social sobre o território. O principal interesse do Parque Ambiental e Urbano Mauá é a reconexão da biodiversidade fragmentada e promoção da conectividade ecológica através da gestão sustentável e da conservação da natureza. O reflorestamento tem objetivo de conferir conforto térmico ao usuário ao longo do percurso do parque. Optou-se por espécies nativas, que produzam flores e frutos que atraiam os animais. Para recuperar os fragmentos, o projeto propõe zonas de reflorestamento da mata ciliar e plantio de mudas de espécies arbóreas nativas no seu entorno com a finalidade de diminuir o efeito de borda e aumentar a quantidade de alimentos para a fauna local. Para possibilitar o acesso da fauna ao referido fragmento, foi proposto um corredor ecológico interligando-o a uma área de proteção permanente ao redor do igarapé. Setorização do parque em bosques ao leste, zonas de reflorestamento e preservação nas áreas mais degradadas, preservando a vegetação existente e qualificação com estabilização e ampliação dos bosques. Vegetação para sombreamento nos espaços públicos com árvores frutíferas e floridas.

Figura 2: Área de intervenção – Sistema de Conexão com a cidade

Figura 3: Área Reflorestada.

Fonte: Chaves, 2018.

2.4 USO DO SOLO A PARTIR DA RECRIAÇÃO DE AMBIENTES E PAISAGENS

Os usos do solo dependem da relação com a paisagem proposta, as intervenções para

restaurar e reformar corpos de água e a re-conexão dos vazios verdes.

Figura 4: Estudo de Massas.

Fonte: chaves, 2018.

Porto Mercado: Porto público para ordenamento das embarcações da população ribeirinha, flutuante e demais embarcações dos moradores dos bairros, integrado ao mercado, proporcionando desenvolvimento econômico e oportunidade de emprego para os moradores. Sistema de transporte intermodal: Ponto de embarque, alternativa de conexão do bairro mauzinho até o porto de Manaus, no centro de Manaus. Atrair

contextos culturais ao longo do eixo do parque para melhorar a qualidade do espaço público e infraestruturas para a cidadania, proporcionar espaços para a aprendizagem através de percursos com paisagens e vegetação variadas e oferecer espaços desportivos para compor um parque amplo, onde os residentes do bairro possam divertir e educar-se.

Figura 5: Praça escadaria integrada ao mercado.

Fonte: Chaves, 2015

2.5 SETORIZAÇÃO PARQUE AMBIENTAL E URBANO MAUÁ

O Parque Ambiental e Urbano do Mauá, está dividido em setores para melhor distribuição de atividades e reordenamento de moradia (ver figura 07).

Módulo 1: Entrada pela via Solimões, possui estacionamento, escola e parque biblioteca, área de lazer para a população, hortas comunitárias, posto policial e área residencial

Módulo 2: Museu à céu aberto, trilhas no bosque, praças nas áreas desmatadas, playground, mirante, ponte suspensa, posto policial e estacionamento.

Módulo 3: Área de reflorestamento da mata ciliar para revitalizar parte do igarapé assoreado, caminhos para pedestres, habitações de especial interesse social, parque, equipamento urbanos, habitação popular tipo 2, estacionamento.

Módulo 4: Área de lazer, equipamentos urbanos, trilhas para pedestres, habitação popular tipo 2, estacionamento.

Módulo 5: Área de preservação e reflorestamento da mata ciliar para revitalização do igarapé. Hortas nas áreas alagadiças.

Módulo 6: Área de preservação e reflorestamento da mata ciliar para revitalização do igarapé, escola e parque biblioteca, horta comunitária.

Módulo 7: Hortas ribeirinhas, ordenamento da população ribeirinha, pontes suspensas, áreas de reflorestamento.

Módulo 8: Área comercial, escadaria, habitações populares tipo 1, parque integrado, porto mercado, hortas nas áreas de várzea.

Figura 6: Setorização

Fonte: Chaves, 2015.

2.6 CRITÉRIOS VIÁRIOS E DE MOBILIDADE

Estudo do sistema viário e seus fluxos, indicam como se comportam as condicionantes de acessos da área de estudo e seu entorno, facilitando o entendimento e as possibilidades de alterações necessárias. O local conta com um Sistema viário muito precário, isso é reflexo da sua ocupação desordenada proveniente de terrenos invadidos por famílias de baixa renda. Os transportes coletivos que atendem a área e proximidades e que transitam pela via arterial (Avenida Solimões) principal via que liga os bairros à zona leste da cidade. O porto será uma solução proposta de mobilidade, sistema

de transporte intermodal, levando os moradores do mauzinho até o porto no centro da cidade, o que facilita a chegada dos visitantes que procuram outras alternativas de transporte e também ciclovias e o sistema de acesso para os portadores de Necessidades Especiais, que hoje encontram-se inexistentes. São 17,4 km de vias para pedestres e ciclistas ao longo de todo o parque proposto (de leste a oeste entre as margens) e passarelas de conexão para as margens e melhoria de acessos existentes em pontos deficientes.

Figura 7: Proposta de novas conexões de acesso ao bairro mauzinho

Fonte: Chaves, 2015.

Qualificação dos acessos de pedestres, passarelas suspensas e conexões entre os braços dos igarapés facilitando a mobilidade e democratizando a orla para que os moradores tenham mais acesso ao rio. Caminhos pedonais desobstruídos, promovendo a mobilidade básica para todos. Elementos de paisagismo e mobiliários. Parque linear ecológico nas bordas das encostas criando acessos para o rio transformando passarelas em espaços públicos. Pelo menos 2 m livres de calçada para garantir que os percursos são acessíveis a todos.

1) Criação de novas conexões entre o mauzinho e a cidade;

2) Segregação dos veículos ao longo do parque, sem cruzar caminhos de pedestres, ciclistas e pontes suspensas;

3) Circulações de pedestres sombreadas e com mobiliário de apoio;

4) Sombreamentos com pavimentação permeável;

5) Reaproveitamento das vias e áreas pavimentadas existentes integrando as novas vias do parque integrando às vias pedonais.

6) A proposta de reordenamento das moradias palafitas para uma estrutura integrada ao deck suspenso visa dar a infraestrutura necessária para os seus moradores, sendo conectada ao sistema de abastecimento do bairro.

Figura 8: Croqui de perspectiva de habitações ribeirinhas integradas ao parque ambiental urbano do Mauá

Fonte: Chaves, 2015

Figura 9: Croqui de conexões moradias ribeirinhas ao parque urbano.

Fonte: Chaves, 2015

Figura 10: Habitações Palafitas reordenadas no setor urbanizado integrando-se ao parque, junto aos demais acessos e equipamentos urbanos propostos.

Fonte: Chaves, 2015

Porto público para ordenamento das embarcações da população ribeirinha, flutuante e demais embarcações dos moradores dos bairros, integrado ao mercado, proporcionando desenvolvimento

econômico e oportunidade de emprego para os moradores.

Sistema de transporte intermodal: Ponto de embarque, alternativa de conexão do bairro mauzinho até o porto no centro de Manaus.

Figura 11: Perspectiva Porto Mercado.

Fonte: Chaves, 2015.

Figura 12 : Perspectiva de porto com sistema de transporte fluvial.

Fonte: Chaves, 2015.

2.7 FLUTUANTES

A ideia é manter a identidade arquitetônica das construções flutuantes preservando a relação homem e natureza, mas de forma menos agressiva com estruturas mais seguras e sistemas de saneamento e infraestrutura adequada. O sistema de encaixe em estrutura flutuante proposto para receber as casas flutuantes (ver figura 13), é modular, conforme o crescimento da população flutuante, mas

casas possam ser conectadas ao atracadouro. Utilizando elementos e técnicas construtivas simples que sejam totalmente adaptadas a região amazônica, mesclando com soluções atuais de aproveitamento dos recursos que o próprio ambiente proporciona e empregando soluções de arquitetura vernacular.

Figura 13: Sistema de encaixe em estrutura flutuante projetada para receber as casas flutuantes.

Fonte: Chaves, 2015.

No ambiente de várzea, as comunidades ribeirinhas da Amazônia precisam adaptar as moradias para viverem em conformidade com a sazonalidade dos rios. No entanto, a falta de tecnologias adequadas de saneamento expõe a população a uma série de riscos. O saneamento em casas flutuantes começa a ser viável. Pesquisadores do Instituto Mamirauá testaram e adaptaram uma tecnologia de tratamento de esgoto adequada e acessível financeiramente.

2.7 ESTRATÉGIAS ESPAÇO PÚBLICO

1. Relação com a Natureza: Construir um sistema de caminhos pelo parque que permita um contacto permanente com a natureza e especialmente com os ecossistemas endêmicos para que, além de

reconstituir o tecido biótico do igarapé, proporcione processos de formação e conscientização diária acerca da natureza..

2. Passarelas, decks suspensos para contemplação da área reflorestada e encontro das águas. Esses caminhos são interligados ao parque urbano na orla do igarapé.

3. Coesão social: Uma associação forte entre os bairros ou zonas adjacentes, gerando apropriação pública.

4. Dar continuidade a uma rua pedonal que se estende por todo o eixo do parque, que incentiva atividades cívicas e recreativas e possa abrigar eventos da cidade.

5. Construir estâncias para incentivar o encontro cidadão e permanência no espaço público

Figura 14: Mobiliário urbano proposto.

Figura 15: Espaço público – Parque Ambiental e Urbano Mauá.

Fonte: Chaves, 2015.

Figura 16: Acesso ao Espaço público – Parque Ambiental e Urbano Mauá.

Fonte: Chaves, 2015

Figura 17: Acesso as moradias ribeirinhas reordenadas ao Parque Ambiental e Urbano Mauá.

Fonte: Chaves, 2015

As atividades que norteiam os objetivos da intervenção nas áreas de risco, são ambientais e culturais com a finalidade de propiciar momentos de integração comunitária, permitindo a visita de moradores do bairro e visitantes para questões socioambientais valorizando o patrimônio natural do igarapé do Mauazinho. Com o programa de necessidades, busca encontrar solução para a integração da população do bairro com os moradores ribeirinhos promovendo a socialização e bem-estar.

Fundamentalmente, a preservação e restauração da paisagem natural, como florestas, banhados e áreas de inundação, são componentes essenciais da Infraestrutura Verde. Quando estas áreas sensíveis são protegidas, há melhora na qualidade da água da comunidade, o habitat da vida selvagem é mantido e, além disso, geram-se oportunidades de recreação. Além disso, aumenta a recarga de aquíferos, já que a capacidade de infiltração é importante para a recarga do lençol freático, responsável por 40 % da água que mantém o nível dos córregos e rios. A técnica de Infraestrutura

Verde filtra o excedente hídrico, evitando o transporte de poluentes através de tubos e galerias.

Os sistemas naturais oferecem valiosos serviços ecológicos para as cidades: o abastecimento de água, o tratamento das águas pluviais, a melhoria do microclima, etc. A infraestrutura verde é uma maneira de reconhecer e aproveitar os serviços que a natureza pode realizar no ambiente urbano, é vista como uma tapeçaria formada por uma variedade de espaços abertos. Na escala regional essa rede de espaços é composta de parques, corredores verdes e espaços naturais preservados. Mas podemos expandir essa rede, se aplicarmos criativamente os sistemas naturais para atender aos desafios de readequação da infraestrutura urbana já implantada, especialmente aqueles relacionados à drenagem e à qualidade da água. As tipologias de espaços tratados paisagisticamente, foram selecionados tendo em consideração modos de tornar a infraestrutura verde uma parte significativa da paisagem urbana

Figura 18: Maquete Física do projeto.

Fonte: Chaves, 2015

Figura 19: Maquete Física do projeto.

Fonte: Chaves, 2015

3. CONCLUSÕES

A valorização do patrimônio natural no perímetro urbano através de intervenções urbanas, contribui para a valorização da nossa biodiversidade amazônica. As intervenções urbanas podem atender a diversas finalidades sociais e culturais dentro da cidade proporcionando a vivência da população em ambientes saudáveis e sustentáveis. O desafio de intervir em áreas de baixa renda, não está só na escolha do local, mas em uma variedade de diretrizes e decisões que juntos podem transformar o lugar em um espaço com grande vitalidade e desejado por todos. Dentre essas premissas, o presente trabalho analisou as necessidades dos habitantes das áreas de risco no bairro Mauzinho, a falta de infraestrutura, necessidades de equipamentos urbanos e a preservação da identidade do lugar, da

tipologia da moradia ribeirinha, do paisagismo que desperta sensações, da preservação da rica biodiversidade do local e a sustentabilidade do mesmo.

A proposta de reordenamento de moradias ribeirinhas e flutuantes para melhor fluidez e democratização da orla através do Parque Ambiental e Urbano que busca integrar a população com o meio natural, buscando recuperar o rio a partir da interpretação ambiental e conseguir vinculá-lo a outros sistemas, gerando um circuito natural que recupera a qualidade do ar e da água no bairro ao longo da rota do igarapé e educa o público sobre a riqueza da biodiversidade. Firmando assim, a busca por maior contato com a população com a natureza e a necessidade da inclusão social, proporcionando ambientes sem restrições de usos.

REFERÊNCIAS

- [1] Irgit Georgi. (2011). CITIES OF TOMORROW.
- [2] Européia, U. (2011). Cidade de Amanhã-Desafios, Visões e Perspectivas. Luxemburgo: Comissão Européia.
- [3] Frota, T. (junho de 2009). Arquitetura Acessível. Fonte: [thaisfrota.wordpress.com:](https://thaisfrota.wordpress.com/) <https://thaisfrota.wordpress.com/>
- [4] Gehl, J. (07 de 2011). Especialista em criar cidades melhores. (N. GARCIA, Entrevistador)
- [5] Harvey, D. (2012). CIDADES REBELDES. SÃO PAULO: LIVRARIA LTDA.

- [6] Jacobs, J. (2001). Morte e Vida de Grandes Cidades. São Paulo: Martins Fontes.
- [7] Lamas, J. M. (2004). Mofologia Urbana e Desenho da Cidade. Blume.
- [8] Lima, A. (1994). Problemas de Utilização na Conceituação de termos como Espaços Livres, Áreas verdes e Correlatos. CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE ARBORIZAÇÃO URBANA.
- [9] Loboda, C. R., & Angelis, B. L. (2005). Áreas Verdes Públicas Urbanas: Conceitos, Usos E Funções. Guarapuava: Âmbiência.
- [10] Ministerio do Meio Ambiente. (2015). Fonte: [mma.gov.br:](http://www.mma.gov.br/cidades-) <http://www.mma.gov.br/cidades->

sustentaveis/areas-verdes-urbanas/parques-e-%C3%A1reas-verdes

[11] Porto, S. M. (09 de novembro de 1984). Arquitetura de Morar. (A. V. AMAZÔNIA, Entrevistador)

[12] Reis, A. T., & Lay, M. C. (jul./set. de 2006). Avaliação da qualidade de projetos-uma

abordagem perceptiva e cognitiva. Ambiente Construído, pp. p21-34.

[13] Scocuglia, J. B. (OUTUBRO de 2009). O Parc de la Tête d'Or: patrimônio, referência espacial e lugar de sociabilidade. Fonte: VITRUVIUS: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/10.113/20>

Capítulo 5

COTIDIANO DA VIDA RIBEIRINHA: CARACTERIZAÇÃO E LIMITAÇÕES EM COMUNIDADES RURAIS DE MANICORÉ, AMAZONAS

Danielle Ivana Pereira dos Santos

Francimara Souza da Costa

Ísis Ribeiro do Nascimento

Hyago Mardone Maciel

Juliana Gervasio Nunes

Alexandro Relvas Pereira

Resumo: O clima da região amazônica é definido como enchente, cheia, vazante e seca. Esse regime hidrológico condiciona o modo de vida das populações que estão adjacentes às margens de corpos hídricos, os ribeirinhos. Por esse motivo, neste trabalho o principal objetivo consistiu em caracterizar o modo de vida dos ribeirinhos em três comunidades amazonenses: Bracinho, Braço Grande e Repartimento localizadas no município de Manicoré, região sul do Estado do Amazonas. Além disso, também pretende-se fornecer informações para auxiliar e otimizar as políticas públicas que favoreçam a qualidade de vida desses ribeirinhos na região. A metodologia adotada foi o levantamento bibliográfico a respeito da dinâmica desses comunitários e suas diferentes relações com o ambiente e principalmente, com o rio e aplicação de entrevistas nas comunidades. Como resultados, obteve-se a compreensão do modo de vida dos ribeirinhos amazonenses, seus hábitos, suas principais limitações, e sobretudo, como se relacionam com a natureza. Pôde-se verificar que apesar da insuficiência da infraestrutura e serviços básicos imprescindíveis para a qualidade de vida, os ribeirinhos reconhecem e compreendem seus desafios e limitações, porém permanecem em suas residências e não demonstram qualquer intenção de abandoná-las, pelo contrário, seguem fortificando suas relações afetivas para com o meio no qual estão inseridos.

1. INTRODUÇÃO

O regime hidrológico na Amazônia é caracterizado pela dinâmica de secas e cheias dos seus rios. Para o homem amazônida, esse processo é encarado culturalmente, visto que aprendem a adaptar-se diante da variabilidade sazonal dos rios da região. Não obstante, os eventos climáticos ocorridos na primeira década do século XXI vem influenciando nessa relação (OLIVEIRA; MAFRA; SOARES, 2012), provocando alterações na vida e no ambiente em que vivem as populações amazônicas.

Dal'Asta, Amaram e Monteiro (2014) definem comunidades ribeirinhas como importantes agentes na estruturação territorial amazônica, pois representam núcleos populacionais que muitas vezes atuam na conservação ambiental dessas áreas. Para Pojo, Elias e Vilhena (2014) a sazonalidade dos rios condiciona o estilo de vida de comunidades que vivem em áreas rurais, pois as pessoas que vivem nestas localidades têm o rio como sua estrada e meio de locomoção. Diegues (2007) afirma que uma grande parte dessas populações que vivem à beira dos rios, lagos e igarapés têm a pesca como sua principal atividade mantenedora em uma relação de interdependência com esses recursos naturais, e por esse motivo recebem a denominação de “ribeirinhos”.

Nesse, sentido o contato diário com as águas permitiu aos ribeirinhos amazônicos desenvolver os “saberes das águas”, ou seja, são detentores de profundo conhecimento empírico sobre as quatro fases do regime hidrológico amazônico: enchente, cheia, vazante e seca (BITTENCOURT e AMADIO, 2007). Sabe-se que essa habilidade também propicia-lhes identificar com precisão o tempo e as “boas águas” para navegar e pescar em suas embarcações.

Os saberes aprofundados sobre os ciclos naturais são transmitidos por meio de herança cultural, configurando em mais uma característica desses povos, os quais não se amedrontam diante das intempéries climáticas, pelo contrário, há respeito, e não medo (DIEGUES, 2007). Dictoro e Hanai (2016) realçam a existência de diversas relações entre ribeirinho e rio/água, não somente a utilitarista, mas relações afetivas e simbólicas com a água: respeito, admiração, sentimento, religiosas, místicas, de saúde, de sobrevivência, de conservação e lazer.

Lira e Chaves (2016) dizem que a influência dos rios interferem até mesmo na construção das casas dos ribeirinhos que a fazem de frente para o rios para serem vistos pelas embarcações e facilitar o escoamento e venda de produtos para o dono dessas embarcações (atravessadores), evidenciando o alto poder simbólico que o rio tem na vida deles.

No que concerne a unidade familiar e/ou de vizinhança, também é uma peculiaridade importante no modo de vida dessas populações, uma vez que trabalham em conjunto e de modo cooperativo a fim de garantir sua subsistência e às vezes, para comercializações. Nesse contexto, os principais insumos produzidos por eles são provenientes da pesca, da caça, do extrativismo de produtos florestais, do cultivo do açaí e da banana, da fabricação e venda de rabetas, da produção de carvão, da produção da farinha e do trabalho nas olarias.

Os ribeirinhos têm uma produção baseada na Agricultura Familiar que segundo Fraxe (2007) caracteriza-se como uma importante forma de organização da produção, associando produção, família e trabalho nos ambientes aquáticos e terrestres em que são desenvolvidos, e desta forma exercem uma pluralidade de atividades produtivas que são fundamentais na complementação da renda e nas suas necessidades de vivência. Um fato importante a salientar é que nestas localidades, mesmo onde a forma de produção ocorre em núcleos familiares individuais, também há uma espécie de cooperativismo entre os indivíduos, sejam eles da mesma família ou não.

Por outro lado, nestas localidades os moradores sofrem com a carência de serviços básicos à sobrevivência humana, tendo como motivo principal a sua própria localização, que dificulta o acesso aos centros urbanos, seguida das dificuldades de transporte, comunicação, assistência médica, escoamento da produção, energia, dentre outros.

Diante deste cenário, este trabalho buscou caracterizar e situar as limitações do modo de vida dos ribeirinhos no Amazonas no atual contexto, tomando como base comunidades rurais do Rio Madeira no município de Manicoré, situado no sul do Estado. O estudo trás elementos para reflexão sobre esta categoria social e contribui com informações

aos agentes públicos para a elaboração de políticas públicas destinadas à região.

2. DESENVOLVIMENTO

Para realizar a pesquisa, a metodologia adotada foi revisão de literatura com ênfase no modo de vida do ribeirinho, bem como, observação da área de estudo, identificação dos atores sociais e institucionais participantes da pesquisa, aplicação de técnicas para o levantamento dos dados primários e análise dos resultados.

O estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória. Segundo Ensslin e Vianna (2008), a pesquisa de predominância qualitativa inclina-se para explorar as questões pouco estruturadas, os territórios ainda não mapeados, os horizontes inexplorados e os problemas que envolvem

atores, contextos e processos, enquanto que a pesquisa descritiva, por sua vez, inclina-se a descrever em detalhes os fatos e fenômenos de determinada realidade, geralmente utilizado quando a intenção do pesquisador é conhecer determinada comunidade, suas características, valores e problemas relacionados à cultura (VERGARA, 2000).

As áreas de estudo compreendem as comunidades rurais de Bracinho (05°32'55.4"S e 060°00'52.1"O) e Braço Grande (05°32'21.3"S 061°02'13.8"O) do Projeto de Assentamento Agroextrativista do Jenipapo e Repartimento (05°30'28.2"S e 060°59'33.8"O), localizada na área da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio Madeira (Figura 01).

Figura 01. Mapa de localização das comunidades amazonenses: Bracinho, Braço Grande e Repartimento em Manicoré.

Fonte: Pesquisa de campo (2017).

Para coleta de dados realizou-se 10 entrevistas, sendo 04 (quatro) no Repartimento, 03 (três) no Bracinho e 03 (três) no Braço Grande no período de 27 a 29 de dezembro de 2017. Após as entrevistas, foi possível obter a compreensão da história, da economia, do cotidiano, das dificuldades e a relação homem/natureza dessas populações ribeirinhas.

A zona climática dessa região, segundo a classificação de Köppen, pertence ao grupo A (Clima Tropical Chuvoso) e tipo climático Am (chuvas do tipo monção), apresentando uma época seca de pequena duração. A pluviosidade é limitada entre 2.250 e 2.750

mm, com período chuvoso iniciando em outubro, prolongando-se até junho. As temperaturas médias anuais se alteram entre 25°C e 27°C e a umidade relativa do ar varia entre 85 e 90%. Sendo assim, o clima nessa região pode ser classificado como equatorial, no qual as estações se subdividem entre um semestre chuvoso e outro de estiagem. Em se tratando de vegetação, sobressaem matas de terra firme, várzea e igapós adaptadas ao principal rio da região, o Madeira, o qual subsidia a economia, o transporte e alimentação da população que o circunda.

Por essa razão, a fim de conservar e otimizar o uso dos recursos naturais no rio Madeira,

em 03 de julho de 2006, foi criada a Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio Madeira pelo DECRETO N.º 26.009, situada entre os municípios de Manicoré e Novo Aripuanã. É gerida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) e em 2017, foi reconhecida com uma área total de 283.117 ha⁻¹ direcionada a atender 480 famílias distribuídas 25 comunidades (BRASIL, 2018). O perfil dos moradores é caracterizado como pequenos produtores rurais, os quais possuem acesso ao Programa de Crédito Instalação e de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF.

Em 2014, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, atualmente SEMA, aprovou por meio da Portaria 126/2014 - o Plano de Gestão da Unidade de Conservação do Rio Madeira, cujo principal propósito é o de conservar o continuum e a funcionalidade dos ecossistemas existentes na área de abrangência da BR 319 no Estado do Amazonas, constituindo uma barreira frente ao desmatamento e à expansão de atividades ilegais e não sustentáveis.

O PAE do Jenipapo, outra área de estudo, é gerido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Caracteriza-se como um assentamento rural ambientalmente diferenciado, posto que incorpora a ideia de gestão participativa, ou seja, integra importância às regras informais estabelecidas pelos usuários nas relações de apropriação dos recursos de uso comum, a qual é realizada em conjunto com as organizações estabelecidas pelas comunidades. Este processo estimula a organização social comunitária, cujos instrumentos passam a ser a concessão de uso e o plano de uso. As atividades desenvolvidas nestas áreas devem ser de base familiar, executadas coletivamente e obrigatoriamente devem ser

economicamente viáveis e ecologicamente sustentáveis.

O PAE do Jenipapo localiza-se à sudoeste da RDS do Rio Madeira e foi criado por meio da PORTARIA/INCRA/GAB/SR-25/Nº33, de 28 de novembro de 2006. Possui uma área de aproximadamente, 9.667 hectares e comporta 379 Unidades Agrícolas Familiares distribuídas em 14 comunidades (SILVA, 2014).

Como resultados, captou-se que as comunidades têm relação direta com o lago do Jenipapo no uso da água, principalmente no que diz respeito à navegabilidade, pois esse corpo hídrico constitui-se na principal rota até o Rio Madeira. Além disso, também é utilizado para tráfego das crianças para as escolas, para o escoamento de produção (castanha do Brasil e banana), acesso à sede Manicoré para o recebimento de benefícios governamentais, atendimento médico e aquisição de fármacos.

3. PARTICIPAÇÃO DO INCRA NO PROJETO DE ASSENTAMENTO AGROEXTRATIVISTA (PAE) JENIPAPOS – SOB A PERSPECTIVA DO INCRA.

As informações aqui transcritas foram retiradas do site do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (<http://www.incra.gov.br>) com entrevista divulgada em 08 de fevereiro de 2011, dada pela superintendente do Incra no Amazonas, na época. De acordo com essa entrevista, em 2011 o INCRA entregou 123 casas a quatro comunidades do Projeto de Assentamento Agroextrativista (PAE) Jenipapos (Figura 02), sendo construídas com madeira certificada e recursos do Crédito Instalação, com investimento de mais de R\$ 615 mil.

Figura 02: Casas entregues pelo INCRA ao PAE Jenipapos.

Fonte: <http://www.incra.gov.br/incra-entrega-123-casas-a-assentados-agroextrativistas-de-manicore-am>

Pela reportagem, o ato de entrega das moradias contou com uma comitiva incluindo a presença da superintendente e do chefe da Divisão Fundiária do INCRA/AM. Também participaram lideranças políticas e sociais do município. O grupo parou inicialmente na comunidade Repartimento Evangélico, onde houve a entrega de 14 moradias. Uma das beneficiadas que nasceu e vive no local há mais de 60 anos disse: "Estou muito feliz", acrescentando que a vida melhorou a partir das ações do INCRA.

Na comunidade Repartimento Católico, a segunda parada, foram entregues outras 22 casas. Segundo o INCRA, um dos beneficiários, era só agradecimentos: "Agora tenho uma casa nova, e também um motor rabeta e outras coisas que consegui com o primeiro crédito que recebi do Incra. A vida está melhorando por aqui", reiterou.

As outras comunidades beneficiadas foram Bracinho e Braço Grande, onde a comitiva foi encerrada. Segundo o INCRA, o programa teria continuidade, e outras 178 casas

deveriam ser entregues até junho de 2011. "As casas entregues são padronizadas, elas medem 46 metros quadrados e tem varanda, sala, cozinha, dois quartos e banheiro. As moradias contam com fossa biodigestora (ecológica) telada - uma forma de prevenção contra o mosquito transmissor da malária - e são dotadas do chamado 'kit pró-chuva', para aproveitamento da água pluvial".

4. PARTICIPAÇÃO DO INCRA NO PROJETO DE ASSENTAMENTO AGROEXTRATIVISTA (PAE) JENIPAPOS – SOB A PERSPECTIVA DOS ASSENTADOS

Com base nas entrevistas nas comunidades é possível verificar contradições nas informações apresentadas pelo INCRA na entrevista. Os moradores afirmaram que nunca houve um evento para entrega oficial das casas e que as mesmas não foram totalmente terminadas, muitas ficaram inacabadas, sem pintura e sem telhado, entregues ao acaso (Figura 03).

Figura 03: Casa inacabada, sem telhados e morador.

Fonte: Pesquisa de campo (2017)

Alguns moradores, inclusive afirmaram que fizeram o telhado da própria casa e que também pintaram. Todos os entrevistados afirmaram que as casas não têm banheiros, contrastando com as informações dispostas pelo INCRA.

Essas divergências refletem as limitações institucionais na Amazônia, especialmente entre aquelas relacionadas à gestão dos espaços e dos recursos naturais. O INCRA conduz o processo de ocupação da Amazônia desde 1970, visa parcerias com o Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) para assegurar a sua modernização tecnológica para melhorar a governança fundiária e ambiental das áreas de reforma agrária na região. Por outro lado, Le Tourneau

e Bursztyn (2010) explicitam que "é imprescindível a implementação de um sistema eficiente de assistência técnica, com profissionais residentes dentro dos assentamentos e com propostas adequadas à realidade local", o que não ocorre nas comunidades, e ainda que o INCRA atue na implementação dos assentamentos, a assistência às comunidades é insuficiente.

5. FORMA DE ORGANIZAÇÃO

Os ribeirinhos amazônicos de Manicoré possuem uma hierarquia socializada culturalmente, pois cada comunidade possui seu próprio líder, o qual é eleito pela respectiva comunidade. As famílias são

numerosas, pois a maioria possui média superior a 10 filhos, das quais as mães se orgulham em enfatizar que todos os filhos são “vivos, nenhum morto”. Constatou-se que os idosos possuem destaque nas comunidades, sendo sinônimo de experiência e conhecimento, logo são reverenciados pelos demais.

Outro aspecto relevante observado é a coletividade e o respeito mútuo praticado entre as comunidades, pois quando houve a grande cheia do Rio Madeira em 2014, todos se mobilizaram na construção de novas casas, obtenção de alimentos e transportes, demonstrando assim preocupação com o bem-estar de todos os habitantes nas comunidades.

6.ECONOMIA

Verificou-se com unanimidade que em todas as comunidades visitadas a base da sua economia é a venda de castanha do Brasil (*Bertholletia excelsa*). As latas utilizadas como referência de quantidade coletada e vendida são latas de tinta de 20 litros, vendidas a R\$ 40,00 neste ano. O produto é repassado para “atravessadores”, os quais compram nas comunidades alegando diminuir o custo do frete. Também foi relatado que os produtores de castanha vendem na própria comunidade para um responsável, o qual também repassa para os atravessadores.

Percebeu-se durante as entrevistas que a Cooperativa dos Produtores Extrativistas dos

Recursos Naturais (COPEMA) foi dissolvida nessas comunidades, pois segundo os entrevistados: “o primeiro líder os representava e os motivava com a melhora do preço, unia a comunidade para pagamentos de um único frete”, mas infelizmente, a cooperativa foi enfraquecida até chegar a sua completa dissolução em razão do sentimento de abandono que os ribeirinhos sentem.

Por outro lado, na comunidade de Repartimento é bem evidente a produção de banana, no entanto uma produção limitada em detrimento do transporte. A produção geralmente é de 200 cachos de banana que são transportadas nas costas durante o “verão” em uma caminhada de aproximadamente duas horas e meia pelo “caminho grande”, enfrentando lama e expostos ao ataque de jacarés e cobras. Destaca-se também que o escoamento da banana é feito de forma individual, cada um paga seu próprio frete. O preço do frete não foi revelado, mas para transladar um “jerico” (um trator utilizado para fazer plantações agrícolas) de Manicoré para Repartimento é uma logística inviável devido à longa distância em solo alagadiço.

No período chuvoso, o transporte é facilitado pelas águas, pois os comunitários lançam a produção nas rabetas (Figura 04), saem de suas respectivas comunidades por meio do lago do Jenipapo até chegar no Rio Madeira para escoar sua produção no município de Manicoré.

Figura 04: A – Meio de transporte utilizados pelos ribeirinhos (rabeta) e B – travessia pelo lago do Jenipapo, Amazonas.

Fonte: Pesquisa de campo (2017).

Em se tratando da produção de farinha, todas produzem para consumo próprio, porém nas comunidades de Bracinho e Braço Grande a

produção é mais significativa e vendem a saca de farinha de 60 kg por R\$ 150,00 (Figura 05).

Figura 05: A – Produção de farinha manual e B - saca de farinha produzida na Comunidade Bracinho, Manicoré – Amazonas.

Fonte: Pesquisa de campo (2017).

O açaí (*Euterpe sp*), por sua vez, também é retirado somente para consumo e a madeira é retirada somente para construção de casa e

confeção de canoa por encomenda, e dependendo do tamanho pode custar até R\$ 200,00 (Figura 06).

Figura 06: A – Ateliê para construção de canoas B – Canoa no tamanho “médio” na Comunidade Bracinho, Manicoré – Amazonas.

Fonte: Pesquisa de campo (2017).

Outra fonte de renda que as populações recebem consistem nos auxílios: aposentadoria, bolsa floresta e bolsa verde. O bolsa verde compreende a um valor de R\$ 300,00 e é recebido trimestralmente, enquanto que o bolsa floresta possui valor de R\$ 50,00 e é recebido por mês, ambas atuam como reconhecimento pelos serviços ambientais prestados pelas três comunidades pesquisadas, sobretudo, por não terem desmatado a floresta.

7.SANEAMENTO BÁSICO E SAÚDE

Os banheiros foram construídos pelas próprias comunidades e os dejetos humanos são lançados nos corpos hídricos. No que

tange a saúde, foi verificado apenas um agente de saúde na comunidade de Braço Grande, o qual atende 35 famílias. Não há medicação nas comunidades, o máximo encontrado foi dipirona e paracetamol que os próprios ribeirinhos trazem de Manicoré. As parturientes têm seus filhos nas próprias residências e as mulheres muitas vezes fazem o parto sozinha, pois não querem atrapalhar seus maridos com o trabalho.

Em relação aos enfermos, não foi observado qualquer meio de condução para emergências nas comunidades. Os relatos apontam que pessoas que sofreram picadas de cobras e ataques de jacarés têm que andar por horas, por vezes desmaiados e carregados, consequente, duplicando ou

triplicando o tempo gasto até chegarem ao Verdum – comunidade mais próxima que possui uma ambulância e encaminha os casos de emergência para Manicoré. Outro agravante é a noite, muitas vezes os incidentes ocorrem entre 21 e 23 horas e mesmos nesses horários, os ribeirinhos saem para sua longa caminhada e esperam o barco na “beira do rio”, o qual geralmente passa às 4 horas da madrugada.

8.COMUNICAÇÃO

No que se refere a comunicação, há telefones do tipo “orelhão” que são carregados por placas solares, mas não funcionam, tornando a comunicação insuficiente. Os entrevistados afirmaram ter internet, porém somente nas escolas e demonstraram insatisfação com a conexão, pois relataram que é muito ruim. O principal modo de comunicação ainda é feito verbalmente com as comunidades mais próximas. Notou-se que as alternativas são: “ou atravessam o lago do Jenipapo em rabetas no período de chuvas ou caminham por horas pelo “caminho grande” no verão para se comunicar com as comunidades adjacentes.

9.CONCLUSÕES

Apesar de todas as dificuldades encontradas de infraestrutura e serviços públicos básicos, sobretudo no que se refere ao transporte,

condicionado pela sazonalidade da região e ameaças de animais selvagens, os entrevistados são unânimes em afirmar que não se mudariam de suas comunidades para a cidade e aqueles que tentaram sair do local, retornaram, pois preferem o silêncio e a tranquilidade da mata e do rio, cujo significado retrata o sossego, a fonte de comida e de água, o transporte, em detrimento às cidades, que representam a violência, o barulho, o medo de serem assaltados, de terem suas mulheres e crianças violentadas ou vitimadas por acidentes de trânsito ou de qualquer natureza criminal.

Por fim, entende-se que a assistência do INCRA é fundamental para promover às famílias incentivo e conhecimento técnico, não apenas para produzirem o próprio consumo, mas também para escoarem os seus excedentes. Contudo, apesar do INCRA empenhar-se para atender às demandas relacionadas a obras de infraestrutura em assentamentos para melhorar a qualidade de vida desses pequenos produtores rurais, a realidade observada nessas comunidades indica discrepâncias e insuficiência nas ações referentes à infraestrutura e assistência técnica, variáveis preponderantes para estimular o processo produtivo e consequente ampliação de renda dos ribeirinhos amazonenses.

REFERÊNCIAS

- [1] Alves, L. M.; Marengo, J. A.; Cavalcanti, I. F. A. Histórico de secas na Amazônia. In: BORMA, L de S.; NOBRE, C. A. Secas na Amazônia: causas e consequências. São Paulo: Oficina de Textos, p. 21-27, 2013.
- [2] Barcellos, C.; Monteiro, A. M.; Corvalán, C.; Gurgel, H. C.; Carvalho, M. S.; Artaxo, P.; Hacon, S.; RAGONI, V. Mudanças climáticas e ambientais e as doenças infecciosas: cenários e incertezas para o Brasil. Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, Vol.8, p. 285-304, 2009.
- [3] Bittencourt, M. M.; Amadio, S. A. Proposta para identificação rápida dos períodos hidrológicos em áreas de várzea do rio Solimões-Amazonas nas proximidades de Manaus. Revista Acta Amazônica. Manaus, Vol. 37, p. 303 – 308, 2007.
- [4] Brasil, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA. Incra entrega 123 casas a assentados agroextrativistas de Manicoré (AM). Disponível em: [http://www.incra.gov.br/incra-](http://www.incra.gov.br/incra-entrega-123-casas-a-assentados-agroextrativistas-de-manicore-am)

entrega-123-casas-a-assentados-agroextrativistas-de-manicore-am. Acesso em: dez 2017.

- [5] Brasil. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE. PRODES estima 7.989 km² de desmatamento por corte raso na Amazônia em 2016. Disponível em: http://www.inpe.br/noticias/noticia.php?Cod_Noticia=4344. Acesso: mar 2018.
- [6] Costa, F. S. da. A dinâmica dos recursos comuns em Unidades de Conservação e Assentamentos Rurais no Amazonas: uma abordagem fuzzy set. Tese apresentada ao Programa de Pós-graduação em Ciências Socioambientais/ Orientadora: Profa. Dra. Nirvia Ravena, Belém, UFPA, 2014.
- [7] Dal'asta, A. P.; Amaral, S.; Monteiro, A. M. V. O Rio e as cidades: uma análise exploratória de dependências e alcances das comunidades do Arapiuns (Pará-Brasil) e a formação do urbano na Amazônia. Revista Espinhaço, Vol. 3, n. 1, p. 98-109, 2014.

- [8] Dictoro, V. P.; Hanai, F. Y. Análise da relação homem-água: a percepção ambiental dos moradores locais de cachoeira de Emas – SP, bacia hidrográfica do rio Mogi-Guaçu. *Revista Ra'e Ga*. Curitiba, Vol. 36, p 92 -120, 2016.
- [9] Diegues, A. C. Água e cultura nas populações tradicionais brasileiras. In: *Encontro Internacional: Governança da Água*, São Paulo: Universidade de São Paulo, p. 01-20, 2007.
- [10] Easterling, D. R.; Meehl, G. A; Parmesan, C., Changnon, S. A.; Karl, T. R.; Mearns, L. O. Climate extremes: observations, modeling, and impacts. *Science*, Vol. 289, p. 2068-2074, 2000.
- [11] Fraxe, T. J. P.; Pereira, Henrique Dos Santos (Org.) ; WITKOSKI, Antonio Carlos (Org.) . *Comunidades Ribeirinhas Amazônicas: Modos de Vida e Uso dos Recursos Naturais*. 1. ed. Manaus: EDUA, 2007.
- [12] Le Tourneau, F.;Bursztyn. M. Assentamentos rurais na Amazônia: contradições entre a política agrária e a política ambiental. *Revista Ambiente & Sociedade*. Campinas, Vol. 8, p. 111-130. 2010.
- [13] Lira, T. M; Chaves, M. P. S. R. Comunidades ribeirinhas na Amazônia: organização sociocultural e política. *Interações (Campo Grande)*, Vol. 17, n.1, p.66-76. 2016.
- [14] Oliveira, V. P. de; Mafra, V. P.; Soares, A. P. A. Eventos climáticos extremos na Amazônia e suas implicações no município de Manaquiri (AM). *Revista Geonorte, Edição Especial 2*, Vol.1, p.977 – 987. 2012.
- [15] Pojo, E. C.; Elias, L. G. D.; Vilhena, M. de N. As águas e os ribeirinhos – beirando sua cultura e margeando seus saberes. *Revistas Margens Interdisciplinar*. Abaetetuba, Vol. 8, p. 177-198, 2014.
- [16] Sanchez, A. Atividades Humanas e Mudanças Climático-Ambientais: uma Relação Inevitável. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Nuclear – Reatores/ Orientador: Prof. Dr. Luiz Antônio Mai. São Paulo: USP, 2009.
- [17] Silva, T. de S. Dinâmica do desmatamento em áreas de assentamentos rurais no município de Rorainópolis/RR: desafios para o desenvolvimento sustentável. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da Amazônia/ –Boa Vista, UFRR, 2014.
- [18] Vergara, S. C. *Projetos e relatórios de pesquisa em administração*. 3ª ed. Rio de Janeiro: Atlas. 2000.

Capítulo 6

PESCADORES ARTESANAIS E OS CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS EM NOVO AIRÃO (AM)

Maria Ferreira de Oliveira Filha

Janaína Zildeia da Silva Paiva

Dorinethe dos Santos Bentes

Resumo: O presente artigo tem por objetivo analisar as dificuldades enfrentadas por pescadores artesanais para realizar a pesca no município de Novo Airão, já que 80% da área do município é de Unidades de Conservação. Trata-se de uma pesquisa qualitativa que se utilizou de fonte bibliográfica, documental, entrevistas semiestruturadas e observação direta. Com a realização da pesquisa observou-se que o trabalho na pesca em Novo Airão é cercado por conflitos socioambientais envolvendo o acesso aos recursos naturais, decorrentes da implantação de Unidades de Conservação de uso restrito no município. Com o objetivo de propor soluções para o conflito estão sendo realizadas várias negociações entre o ICMBio e as entidades representativas dos pescadores para construção de acordos de pesca no âmbito do Parque Nacional de Anavilhanas¹.

Palavras Chave: Unidades de Conservação, Pescadores Artesanais, Conflitos socioambientais.

¹ Artigo apresentado no V Seminário Internacional em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia Campus Universitário da UFAM, Manaus, 14 a 17 de Agosto de 2018.

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo tem por objetivo analisar as dificuldades enfrentadas por pescadores artesanais para realizar a pesca no município de Novo Airão-AM, uma vez que 80% da área do município é definida como Unidades de Conservação (UC).

A criação e a manutenção de UC são estratégias adotadas pelo Estado para a conservação dos recursos naturais. Nessa perspectiva, a lei nº 9.985/2000 define UC como espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivo de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção (Art. 2º).

Com essa configuração, as UC existentes no Brasil estão divididas em dois grupos específicos: os de proteção integral e os de uso sustentável. As UC de proteção integral têm como objetivo preservar a natureza e possibilitar a realização de pesquisas científicas; a presença humana é restrita à visitação, incluem-se a estação ecológica; a reserva biológica; parque nacional, estadual e natural municipal; o refúgio de vida silvestre e o monumento natural (BRASIL, 2000).

Por outro lado, as UC de uso sustentável garantem às populações tradicionais a permanência no interior das unidades de conservação e permitem o uso dos recursos naturais mediante a elaboração e a implementação de um plano de manejo, assegurando a participação da população local. Neste grupo, incluem-se a área de proteção ambiental; a área de relevante interesse ecológico; a floresta nacional, estadual e municipal; a reserva extrativista; a reserva de fauna; a reserva de desenvolvimento sustentável e a reserva de patrimônio particular natural (BRASIL, 2000).

O reconhecimento do direito à permanência de populações tradicionais em seus territórios redefinidos como UC é um fato recente na história da legislação ambiental no Brasil. Para Moura et al. (2016), até o final da década de 1990 as UC de proteção integral eram o modelo predominante, representado pelos parques e reservas ambientais que determinava a retirada das populações residentes nessas áreas porque havia entendimento de que sua presença era uma

ameaça à integridade dos ambientes a serem preservados.

Foi sob essa perspectiva que a política ambiental idealizada pelo governo do Amazonas iniciou o Projeto Corredores Ecológicos em 1998, criando uma série de áreas protegidas na região central da Amazônia, as quais em quase sua totalidade, foram destinadas à proteção integral.

Em Novo Airão, as UC federais e estaduais foram criadas em tempos diferentes, permeadas de processos políticos, cada qual com sua história, e de conflitos entre moradores e instituições. Sob essa ótica, Novo Airão tem cerca de 80% de seu território ocupado por UC. A área ocupada contém sete UC das esferas federais, estaduais². Dessa forma, o município apresenta-se como um verdadeiro mosaico de áreas protegidas.

Ressalta-se que Novo Airão dá acesso, entre outras, a duas grandes áreas de proteção ambiental: os Parques Nacionais de Anavilhanas e do Jaú. Assim, a sede do Município está localizada na zona de amortecimento do PARN Anavilhanas³.

O Parque Nacional de Anavilhanas foi criado pelo Decreto nº 86.061, de 02 de junho de 1981, como Estação Ecológica (ESEC), tendo sido recategorizado à Parque em 2008 por meio da lei nº 11.799, de 29 de outubro. Possui uma área de aproximadamente 340.831,53km², abrangendo os municípios de Manaus (28%) e Novo Airão (72%). Configura-se como um dos maiores arquipélagos fluviais do mundo, contendo cerca de 400 ilhas.

O Parque Nacional do Jaú foi criado pelo Decreto nº 85.200, de 24 de setembro de 1980, possui uma área de 2.272km², sendo atualmente o maior Parque Nacional do Brasil e o segundo maior do mundo em florestas tropicais contínuas (IBAMA/FVA, 1998). O PARN Jaú abrange os municípios de Novo Airão e Barcelos. O Parque é assim denominado por ser banhado pelo rio Jaú (*do tupi ya'u*), e também de um dos maiores peixes brasileiro, o jaú (*Paulicea luetkern*).

² Parque Nacional de Anavilhanas, o Parque Nacional do Jaú, o Parque Estadual Rio Negro Setor Norte, a Área de Proteção Ambiental (APA) Margem Direita do Rio Negro, a APA Margem Esquerda do Rio Negro, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio Negro e as Terras Indígenas Waimiri Atroari.

³ É o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade (Lei nº 9.985/2000, art 29, Inc XVIII).

Atualmente, a gestão dos Parques Nacionais de Anavilhanas e do Jaú é de responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Entretanto, o processo de implantação dos Parques de Anavilhanas e Jaú, gerou enormes conflitos e impactos decorrentes da desterritorialização de grupamentos sociais que habitavam a região.

Em linhas gerais, podemos dizer que a criação e a gestão das UC na atualidade vêm se constituindo por meio da intervenção Estatal e da iniciativa privada, visando a conservação da biodiversidade e o desenvolvimento sustentável. “Entretanto, esse processo tem sido acompanhado por conflitos e impactos decorrentes da desterritorialização de grupamentos sociais (tradicionais ou não) em várias partes do mundo” (VALEJO, 2009, p. 01). E, no Amazonas, não é diferente.

Little (2001) explica que os conflitos socioambientais envolvem três dimensões: os conflitos em torno do controle sobre os recursos naturais; os conflitos em torno dos impactos ambientais e sociais gerados pela ação humana e natural; e, os conflitos em torno do uso dos conhecimentos ambientais. Em muitos casos, os conflitos socioambientais são gerados, principalmente, devido à implantação de UC de proteção integral em territórios tradicionalmente ocupados, como observado no município de Novo Airão.

Segundo Rodrigues (2010), a pesca em Novo Airão possui uma dinâmica espacial peculiar, o que torna a pesca comercial questionável, obrigando os pescadores a lutar por mais áreas de pesca. Enquanto nada se resolve, muitos pescadores entram de forma clandestina nas áreas dos Parques Nacionais de Anavilhanas e do Jaú para retirar o sustento de suas famílias.

Diante do exposto surge a seguinte problemática: quais as principais dificuldades enfrentam por pescadores para realizar a pesca artesanal no município de Novo Airão?

2. DESENVOLVIMENTO

O município de Novo Airão-AM, nosso locus da pesquisa, fica situado na microrregião do Rio Negro, com distância de aproximadamente 195 km⁴ da capital do

estado, Manaus. Com população de cerca de 14.723 habitantes, sendo assim distribuídos: 9.499 na zona urbana e 5.224 na zona rural (IBGE, 2010).

A pesquisa foi realizada durante o ano de 2016⁵, com pescadores artesanais e com representantes das Colônias de Pescadores Z-34 e AM-34. Metodologicamente, foi conduzida por meio de uma abordagem qualitativa, com o uso de entrevistas semiestruturadas, observação direta e análise documental (referente à atividade pesqueira e as políticas de proteção ambiental) que permitiu de forma sistemática a identificação de aspectos significativos sobre a realidade dos pescadores artesanais em Novo Airão.

De acordo com a lei nº 10.779/2003, o pescador artesanal, é definido como aquele que exerce sua atividade de forma profissional e ininterruptamente, individualmente ou em regime de economia familiar. Para Diegues (1983), o pescador artesanal é aquele que explora vários ambientes aquáticos, sozinho, em parcerias ou com a ajuda do grupo familiar; captura espécies variadas de pescado utilizando instrumentos de pesca diversificados com base nos conhecimentos tradicionais adquiridos sobre a natureza.

Em Novo Airão os pescadores artesanais encontram muitas dificuldades para exercer a atividade pesqueira, em primeiro lugar, por causa dos limites das áreas de conservação, onde parte dos ambientes aquáticos não são acessíveis para a pesca. Assim, os pescadores são proibidos de pescar nesses locais, e acabam entrando escondidos dentro das UC, principalmente à noite para realizar a pesca. De acordo com a narrativa destes pescadores: “o pescador de Novo Airão virou ladrão! devido às áreas de pesca ficarem dentro das UC, assim são obrigados a entrar escondidos no Parque para pescar e alimentar suas famílias”. Nesse cenário contraditório, muitos pescadores ignoram as restrições impostas ao acesso dos recursos pesqueiros e entram

ou de ônibus, através da Ponte Rio Negro, pela rodovia AM-070 (Estrada Manoel Urbano) e, no Km 80, vire à direita e siga pela rodovia AM-352 que leva até Novo Airão. O percurso dura em média 2 horas e 51 minutos. A viagem também pode ser feita por via fluvial em barco regional (9 horas de viagem).

⁵ Este artigo é síntese de algumas discussões realizada em OLIVEIRA FILHA, M.F. Pescadores Artesanais de Novo Airão: Dos conflitos socioambientais aos direitos da Seguridade Social, 2017. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia (PPGSS-UFAM).

⁴ O trajeto de Manaus (capital do estado do Amazonas) ao município de Novo Airão pode ser realizado de carro

clandestinamente no interior dos Parques, exercendo a pesca em locais proibidos. Para Illenseer (2011), os pescadores de Novo Airão são chamados de “pescadores sem água”, devido às restrições impostas ao acesso dos ambientes de pesca que ficam dentro dos Parques de Anavilhanas e Jaú.

Assim, os pescadores artesanais reclamam da fiscalização dos órgãos governamentais, pois, segundo eles é abusiva porque quando são abordados por esses agentes, além do peixe também são apreendidos o material de pesca (canoa, malhadeira, anzol, dentre outros).

De uma maneira geral, os pescadores entrevistados, indicam as seguintes regiões como os principais locais utilizados para a pesca em Novo Airão: os rios Paudari e Jauperi (área de livre acesso), Rio Branco (fora das áreas de reservas), Unini (área de acordo de pesca); Os lagos: Apacu Grande, Boto, Canaurí, Lago do Ambé, Lago do Capim, Lago do Cupim, Lago do Boiuasul, situados dentro das Unidades de Conservação.

Os Parques do Jaú e Anavilhanas representam parte dos ambientes aquáticos não acessíveis para a pesca comercial. É possível dizer que o “que sobrou” para os pescadores é a região compreendida entre os dois Parques e o entorno (entre o Rio Jauaperi até o Rio Branco), que já estaria no limite entre o Baixo e o Médio Rio Negro (ILLENSEER, 2011).

De acordo com as narrativas dos presidentes das Colônias Z-34 e AM-34, os locais “livres” para a pesca são insuficientes e em alguns casos, extremamente distantes da sede do município de Novo Airão. Nesse sentido, segundo eles, o ICMBio vem mantendo uma parceria com os pescadores em Novo Airão por meio de reuniões para falar sobre as regras de acesso as UC de proteção integral e firmando acordos informais para que os pescadores pesquem minimamente dentro dos Parques.

Segundo os representantes das Colônias Z-34 e AM-34, quando o pescador vem na sua canoa apenas com o peixe e o material de pesca e encontra com o ICMBIO, eles não são punidos. Quando acontece algum conflito é porque o pescador tá fazendo alguma coisa errada - eles pegam tracajá, pegam pirarucu em grandes quantidades, é nesse sentido que o ICMBio recolhe a produção e os apetrechos de pesca dos pescadores.

Na visão do ICMBio (2016), a pesca de subsistência é tolerada no interior do Parque Nacional de Anavilhanas, pois dela depende a sobrevivência das comunidades tradicionais. Contudo, sem regulamentação, o que gera são inúmeros conflitos entre moradores do entorno do PARNA Anavilhanas e a gestão da UC, o que se traduz num cenário de insegurança tanto para a equipe gestora do parque, quanto para os pescadores artesanais.

Assim, em Novo Airão, os pescadores lutam para conquistar o privilégio de acessar os locais de pesca que ficam no interior da UC de proteção integral. Como consequência dessa resistência estão sendo realizadas várias negociações com o ICMBio para construção de acordos de pesca no PARNA Anavilhanas.

Illenseer (2011) argumenta que os acordos informais de manejo não formalizados juridicamente em unidades de conservação são caracterizados por dinâmicas muito específicas. Dentre as dinâmicas se incluem a clandestinidade da atividade da pesca ou condições de acessos negociados com os gestores públicos de unidades de conservação.

Com o objetivo de propor soluções para o conflito, foi criado um Grupo de Trabalho (GT Pesca) em 2008 (embora tenha sido paralisado várias vezes), no âmbito do Conselho Consultivo do Parque Nacional de Anavilhanas, sendo reativado em 2015 e acorda-se um planejamento de ações, que propõe a elaboração de um documento técnico, com a proposta de regulamentação e, por outro, a definição de estratégias jurídicas e políticas para sua implementação. Para a construção do documento técnico, foi necessária a realização de um diagnóstico socioeconômico sobre a atividade pesqueira o parque, para qualificar as informações e subsidiar a regulamentação proposta⁶.

Nesse contexto, foi realizado um planejamento junto ao Grupo de Trabalho da Pesca de Novo

⁶ É nesse contexto que a WCS-Brasil, através do projeto “Consolidação da Conservação no Baixo Rio Negro”, com recursos da Fundação Moore, vem apoiar o Grupo de Trabalho Pesca do Parque Nacional de Anavilhanas na elaboração do diagnóstico socioeconômico pesqueiro do entorno imediato da UC, a fim de subsidiar a proposta de regulamentação da atividade de pesca de subsistência no interior do Parque, e dessa forma fomentar o fortalecimento da gestão e monitoramento de biodiversidade e uso de recursos no Mosaico de Áreas Protegidas do Baixo Rio Negro (ICMBio, 2016).

Airão. O fórum de acompanhamento dessa consultoria, composto por instituições que atuam na região, como o Instituto Chico Mendes (ICMBio), Colônia de Pescadores Z-34 e AM-34 de Novo Airão, Associação de Pescadores de Iranduba e de Novo Airão, SEMA/DEMUC e INP, para caracterizar a pesca de subsistência das comunidades ribeirinhas localizadas no entorno do PARNA Anavilhanas.

As reuniões foram realizadas no período de setembro a dezembro de 2015, em 14 polos distribuídos no entorno do PARNA Anavilhanas, incluindo a cidade de Novo Airão. Participaram aproximadamente 431 pessoas representantes de 39 comunidades. As reuniões foram divididas em três etapas: a primeira teve como objetivo o preenchimento de um formulário com informações sobre peixes utilizados para a subsistência, além dos locais de pesca comumente visitados pelos pescadores. De posse dessas informações, foi utilizada a técnica de mapeamento participativo para identificar as áreas numa imagem satélite da região estudada, como é possível conferir na Figura 1:

Figura 1: Reunião realizada em Novo Airão, em setembro e dezembro de 2015

Fonte: ICMBio (2016)

O resultado desse diagnóstico mostrou que a pesca é uma atividade de suma importância econômica para as comunidades localizadas no entorno do Parque. Assim, conclui-se que 90% dos indivíduos envolvidos na exploração de recursos pesqueiros são pescadores artesanais, sendo apenas 10 % pescadores profissionais (Idem, 2016).

O diagnóstico também evidencia que o PARNA Anavilhanas é a principal área de pesca das comunidades localizadas no seu entorno, e também dos pescadores da cidade de Novo Airão, já que os corpos de água

presentes nas UC de entorno do PARNA diminuem consideravelmente durante os períodos de seca, restando apenas os lagos e canais no interior do Parque Nacional de Anavilhanas para a aquisição do pescado.

Devido à localização geográfica das comunidades, o diagnóstico recomenda ser possível estabelecer polos que possam se transformar em unidades de manejo, da mesma maneira. Também ser possível estabelecer essas unidades por meio de sub-regiões hidrográficas dentro do parque.

Na visão do ICMBio, a realização de acordo informal ajudou a reduzir o número de abordagens de pescadores artesanais de posse de animais silvestres abatidos, principalmente mamíferos e quelônios, ou carregando apetrechos irregulares. O acordo informal possibilitou uma certa cooperação entre a gestão do Parque e os pescadores, resultando num aumento significativo de denúncias feitas pelos pescadores artesanais sobre os pescadores de grandes barcos de Manaus que “vinham roubar os peixes do PARNA Anavilhanas às toneladas”.

O diagnóstico apresentado pelo ICMBio, em 2016, recomenda que haja o fortalecimento de projetos de extensão nas unidades de conservação do entorno do PARNA, com vistas a discutir, viabilizar e implementar alternativas econômicas para a população tradicional moradora do entorno, tanto quanto, uma capacitação nas entidades representativas dos pescadores com vista à coleta de dados sobre desembarque pesqueiro no município de Novo Airão.

Para Rodrigues (2014), a realidade pesqueira se mostra com mudanças que Novo Airão perpassou no tempo e no espaço, num contexto de resistências e lutas por direitos sociais. Nessa perspectiva, Cardoso (2010) assinala que hoje, as áreas protegidas se configuram como instrumentos fundamentais de desenvolvimento territorial e conservação. Porém, a questão fundiária ainda se constitui como elemento conflitante, o que exige novas e criativas saídas no ordenamento territorial da região, que levem em conta os contextos sociais, ecológicos, econômicos e políticos do Rio Negro e de seus habitantes e à convergência entre conservação e qualidade de vida.

3. CONCLUSÕES

A história de Novo Airão é marcada por processos econômicos distintos: o primeiro está relacionado a decadência do extrativismo, pelo despovoamento sucessivo e pelo isolamento geográfico; atualmente é marcado por conflitos socioambientais relacionados ao uso dos recursos naturais localizados dentro das UC de proteção integral e ocorre entre a população local, dentre eles, os pescadores artesanais e os órgãos governamentais responsáveis pela gestão das UC.

Por consequência, exercer a pesca tem sido uma tarefa difícil. A principal dificuldade para realizar a atividade pesqueira em Novo Airão, segundo relato dos pescadores artesanais e seus representantes no município, ocorre devido as áreas de conservação, tornarem parte dos ambientes aquáticos não acessíveis para a pesca, o que prejudica sobremaneira a reprodução do modo de vida dos pescadores artesanais. Segundo eles: “Hoje tudo é parque”.

Neste cenário, muitos pescadores ignoram as restrições impostas ao acesso dos recursos pesqueiros e entram clandestinamente para

pescar no interior dos Parques Nacionais do Jaú e Anavilhanas, principalmente à noite. Em alguns casos, muitos pescadores artesanais são flagrados pelo órgão governamental que fiscaliza as UC, quando esses pescadores são abordados por esses agentes, além do peixe apreendem também o material de pesca (canoa, malhadeira, anzol, dentre outros), causando conflitos entre as partes.

Atualmente, o ICMBio é órgão responsável pela fiscalização e gestão dos parques em Novo Airão e discute, junto com os representantes do segmento pesqueiro, a problemática do uso dos recursos naturais dentro dos parques federais. No entanto, as relações entre os trabalhadores da pesca e o ICMBio não são muito harmoniosas, uma vez que cada territorialidade tem seus objetivos e metas próprios (RODRIGUES, 2014). Enquanto o agente do Estado preocupa-se em manter “intocada a natureza, por outro lado, o pescador procura formas de exercer a pesca clandestinamente, tendo o cuidado de não ser autuado, multado ou ter seus apetrechos de pesca apreendidos pelos agentes do ICMBio, pois da pesca depende o sustento de sua família, além de ser sua principal fonte de trabalho e renda.

REFERÊNCIAS

[1] Brasil, SNUC - Sistema Nacional de Unidades de Conservação, Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000. Brasília – DF: Senado, 2000.

[2] Brasil. Lei nº 13.134 de 16 de junho de 2015. Altera a Lei 10.779 de 2003, que dispõe sobre o seguro desemprego ao pescador.

[3] Cardoso, T. M. Depoimento: o mosaico do baixo rio Negro. Unidades de Conservação no Brasil, 2010. Disponível em: <http://uc.socioambiental.org/territ%C3%B3rio/depoimento-o-mosaico-do-baixo-rio-negro>. Acessado em: Dezembro de 2016.

[4] Diegues, A. C. S. O Mito Moderno da Natureza Intocada. São Paulo: Edusp/Nupaub, 1994.

[5] Fva/Ibama. Plano de Manejo do Parque Nacional do Jaú. Manaus: Fundação Vitória Amazônica/IBAMA, maio de 1998. 258p. (Versão 8).

[6] Ibge, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico de 2010. Disponível em: <http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=130340> Acesso em: 20/11/2015.

[7] Icmbio. Diagnóstico Socioeconômico Pesqueiro do Parque Nacional de Anavilhanas - Manaus, 2016.

[8] Illenseer, Rafael. Pescadores sem águas: estratégias de adaptabilidade dos pescadores artesanais no Mosaico de Áreas Protegidas do Baixo Rio Negro (AM). Dissertação (Mestrado em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia) — Universidade Federal do Amazonas, 2011.

[9] Little, Paul E. Os Conflitos Socioambientais: um Campo de Estudo e de Ação Política. (Org.) BURSZTYN, M. In: A Dificil Sustentabilidade: Política energética e conflitos ambientais. Rio de Janeiro: Ed. Garamond Ltda. p. 107-122. 2001.

[10] Rodrigues, Fúlvia Maria Gomes. Pesca em Novo Airão (AM) e suas territorialidades em Conflito. Anais XVI Encontro nacional dos Geógrafos. Porto Alegre - RS, 2010.

[11] Vallejo, L.R. Unidade de Conservação: Uma Discussão Teórica à Luz dos Conceitos de Território e Políticas Públicas. GEOgraphia, América do Norte, 4, set. 2009

Capítulo 7

O MANEJO COMUNITÁRIO PARTICIPATIVO COM ÊNFASE NO PIRARUCU (ARAPAIMA GIGAS) REGIÃO DO ALTO SOLIMÕES / FONTE BOA-AM

Francisco Das Chagas Melo Benevides

Sebastião Ferreira Lisboa Neto²

Resumo: Este trabalho levanta alguns elementos importantes e que devem ser considerados para uma melhor avaliação do Manejo Participativo Sustentável de Pirarucu no município de Fonte Boa - AM no ano de 2016. O estudo investiga a melhoria sócio econômica das famílias de Pescadores envolvidas nas atividades do manejo tendo o grande desafio de conciliar a conservação da biodiversidade local ao desenvolvimento sustentável. Trata-se de uma Pesquisa quantitativa e qualitativa através de entrevistas com pescadores e o Instituto de Desenvolvimento Sustentável de Fonte Boa - IDSFB.

Palavras-chave: Pirarucu; Comunidade; Economia.

1. INTRODUÇÃO

A pesca e a comercialização do pirarucu foi sempre uma das principais atividades econômicas e meios de sobrevivência encontrados na natureza pelos povos da região norte do Brasil, mas que infelizmente sua importância socioeconômica ainda não foram totalmente divulgadas para o mundo inteiro, mesmo por se tratar de um dos maiores peixes de água doce do planeta muito cobiçado e apreciado pelo sabor que sua carne oferece produzindo diversos pratos típicos regional sendo conhecido em outras regiões do nosso país e do mundo como: “O Bacalhau da Amazônia”, muitas vezes inacessível à várias famílias e consumidores brasileiros de baixa renda por ser um pescado nobre de preço elevado para o consumo no mercado atual, por isto é um fator economicamente isolado que merece toda a atenção e principalmente nossos estudos e pesquisas.

Cada vez mais no decorrer dos tempos temos acesso a novas informações que nos levam a reavaliar nossos pensamentos e principalmente nossos valores. Todos que possuem contato com a história e o estudo desta espécie ameaçada de extinção, sabem que ela é contada de acordo com os interesses de quem a conta. É importante que comecemos acompanhar e estudar o processo de exploração legal e racional deste pescado como sendo uma atividade sócioeconômica importante e indispensável ao benefício de milhares de famílias ribeirinhas que vivem da cadeia produtiva desta pesca administrada de forma planejada, organizada, direcionada e controlada possuindo monitorias e fiscalizações próprias nas áreas de procriação destes peixes para o aumento natural de seus estoques no meio ambiente. Para isto foi necessário se usar outras informações, mas nunca esquecendo que é necessário um profundo senso de responsabilidade para não cairmos em teorias equivocadas.

Este trabalho que enfoca o tema O Manejo Participativo Sustentável de Pirarucu e seus reflexos na economia do município de Fonte Boa-AM se propõem a contrapor e confrontar algumas visões contraditórias de sua história antiga e tradicional, mas em nenhum momento pretende trabalhar com alguma verdade definitiva e absoluta, mas sim mostrar os vários lados e interesses existentes no tema. Com isso, resolve-se saber e entender um pouco mais a cerca das

atividades de Desenvolvimento Sustentável ecologicamente correto envolvendo este enorme peixe de escamas, como é chamado no Município possuindo pertinentes políticas públicas voltadas para suas atividades, e é sob a ótica dos pescadores e demais comunitários ribeirinhos envolvidos na execução de todas as etapas produtivas deste referido processo social economicamente rentável que me deparei com um RICO UNIVERSO de informações e esclarecimentos essenciais que subsidia a elaboração deste Paper.

2. O MANEJAMENTO PARTICIPATIVO DE LAGOS COM ÊNFASE NO PIRARUCU

A pesca do pirarucu (*Arapaima gigas*), vem sendo realizada legalmente no município de Fonte Boa através do Manejo Comunitário Participativo criado há treze anos. Desenvolvida pelos comunitários, que moram nas comunidades localizadas em uma Unidade de Conservação estadual (U.C.) a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (RDSM), e por usuários que moram no entorno da U.C. Estes lagos foram identificados e zoneados em comunidades e setores, que passaram a exercer o direito de uso dos recursos pesqueiros existentes nestes ambientes, no entanto precisam cumprir com os deveres e obrigações, necessários para o desenvolvimento do manejo do pirarucu de modo sustentável, regras estas que se aplicam também aos usuários. Estas comunidades estão atualmente organizadas em setores, que foram constituídos levando em consideração as comunidades mais próximas umas das outras e a geografia do local, que agrupam de cinco a quinze comunidades, localizados dentro da reserva Estadual de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. O Instituto de Desenvolvimento Sustentável de Fonte Boa -IDSFB é a instituição gestora e responsável pelo acompanhamento das diversas etapas destas tarefas por meio de sua Coordenação de recursos Pesqueiro itinerante, por se tratar de uma atividade que prioriza o uso dos recursos pesqueiros naturais de forma sustentável e com a utilização direta de uma espécie que possui defeso permanente pelas Instruções Normativas de Nº. 34 de 18 de junho de 2004; e Nº. 01 de 01 de junho de 2005 do IBAMA. Apresentamos as informações referentes à contagem de lagos, quantidade de peixes capturados, informações de: peso, setores e

suas eficiências de captura, entre outras informações referentes à pesca do pirarucu nos, últimos anos como princípio norteador para gestão, na busca contínua da utilização responsável dos recursos pesqueiros, evitando a diminuição dos estoques e a escassez dos recursos. Vale ressaltar que esta pesquisa limita-se apenas a extensão geográfica do município de Fonte Boa e nas comunidades que estão sob a responsabilidade do IDSFB.

3. MAPEAMENTO DE LAGOS E CONTAGEM DO PIRARUCU (ARAPAIMA GIGAS)

O levantamento da quantidade de pirarucus e lagos é uma das atividades mais importantes em todo o processo de manejo, esta mensuração é realizada através de contagem que é realizada por pessoas qualificadas submetidas em cursos específicos para realizar esta atividade. Esta contagem é realizada devido a espécie possuir respiração aérea, precisando emergir para respirar o ar atmosférico.

Desta forma permite-se melhor a classificação de pirarucus e bodecos, que respectivamente são contabilizados distintamente para que as quantidades que deverão ser capturadas sejam baseadas em animais adultos, e para avaliação do aumento dos estoques de animais jovens que precisam ter primeiramente recrutamento biológico para posterior manter o aumento dos estoques de animais adultos.

Os lagos de várzeas precisam estar propícios para serem contados, conforme a sazonalidade, os lagos ficam isolados perdendo a conexão de um lago com o outro, com igapó e do lago com o rio, quando o nível das águas diminui com a seca no verão esta condição permite a entrada de canoas que conduzem os contadores e impedem que os peixes migrem para outros lagos e até mesmo para o rio permitindo a contagem e também a pesca dos peixes por cada lago, a época ideal para este período no município de Fonte Boa geralmente acontece entre os meses de julho a janeiro de cada ano.

A metodologia de contagem baseia-se no método de Castello (2004), no comportamento da espécie que demora em média vinte minutos entre os intervalos para respirar, o contador delimita uma área de observação com média de 1 hectare e se posiciona em ponto estratégico registrando

todas as boiadas estabelecendo um prazo de tempo de vinte minutos quando todos os animais daquela área delimitada já tenham boiado. Baseado nas informações das contagens realizadas em 370 lagos, a quantidade de animais adultos corresponde a 72.003, estipulando a cota máxima de 30% do estoque obtivemos a quantidade de 21.601, corresponde à cota que solicitamos para pesca de 2017.

3.1 TIPOS DE LAGO

Com o plano de manejo da RDSM (SCM, 1996), aplicaram-se gradativamente medidas restritivas e normativas destinadas à regulamentação da pesca, elaboradas com a participação das comunidades locais. Criaram-se zonas de preservação permanente, circundadas por zonas destinadas à exploração sustentada dos recursos naturais, para as comunidades residentes e usuárias. Na área de uso sustentável, os moradores também fazem uso de um sistema comunitário de zoneamento de lagos, introduzido na década de 80, na região do médio Solimões pela igreja católica, o qual destina os lagos a três diferentes tipos de uso:

- Lagos de procriação: onde nenhuma atividade pesqueira permitida;
- Lagos de manutenção: destinados à pesca para a subsistência dos moradores e usuários;
- Lagos Livres: nestes, anteriormente ao Plano de Manejo, não havia controle, quando então Passaram à categoria de “Lagos de comercialização”, destinados à pesca para a geração de renda e de uso exclusivo dos moradores e usuários (SCM, 1996; VIANA et al., 2004).

Como medidas compensatórias às restrições determinadas no Plano de Manejo, foram oferecidas propostas de alternativas econômicas com base nos resultados das pesquisas científicas e no monitoramento do uso dos recursos naturais, sendo estas atividades produtivas tradicionais (ou mesmo não tradicionais), de baixo impacto ambiental no intuito de valorizar os produtos da biodiversidade local no mercado além de agregar valor a estes produtos e produtos similares local.

Os lagos de várzea, habitat natural do pirarucu, estão sujeitos a grandes variações

de extensão e de profundidade, dependendo da conexão com o rio, que pode ser temporária ou permanente, em função da morfologia, posição e tamanho do lago. Todos eles influenciam, à sua maneira, no comportamento dessa espécie. A água nestes lagos tem que apresentar bons níveis de oxigênios indispensáveis à sobrevivência de outras espécies de peixes que servirão de alimentos ao pirarucu, já para o pirarucu em si a água por mais que tenha baixo nível de oxigênio não o afeta muito, pelo fato de este realizar a respiração aérea. O estudo dos sistemas lacustres é importante para oferecer subsidio à compreensão da dinâmica de vida e comportamento de espécie nestes ambientes, bem como modelar a densidade populacional, sendo dependente do tamanho e distribuição dos tipos de lagos, como por exemplo temos os lagos destinados à subsistência que são aqueles em que os moradores pescam para a sua própria alimentação, não exigindo organização em grupo para a captura do pescado, já os lagos de preservação integral são aqueles onde a pesca do Pirarucu é proibida por serem os lagos que conservam o maior número de espécies e características ambientais relevantes para a manutenção da biodiversidade local. Essas áreas ficam reservadas para eventuais necessidades futuras, por serem redutos para a reprodução dos peixe, podendo contribuir para um ocasional repovoamento dos outros lagos explorados pela RESEX.

4.SOLICITAÇÃO DE COTA DE PIRARUCU A SER CAPTURADA

Após a contagem de todos os lagos de manejo os dados são lançados em um banco de dados e agrupados por comunidades e setores, este quantitativo é a base para o estabelecimento da quantidade a ser explorada do estoque presente nos lagos, baseados em modelos holísticos e considerando uma população de indivíduos adultos de espécie sedentária com sistema fechado (lagos isolados pela sazonalidade) para imigração e emigração, está sendo usado como cota máxima de captura um percentual de 30% da população, baseado na contagem do ano anterior, no entanto os dados das capturas dos últimos cinco anos demonstram que esta porcentagem nunca foi alcançada em sua totalidade considerando os dados de todos os setores, este fato contribuiu para que os estoque nos lagos tenham aumentado e as curvas de crescimento da população inicial tenha sido exponencial mudando para uma curva de crescimento logístico, por outro lado podemos entender que os beneficiários possuem dificuldades de captura por uma série de fatores como: falta de apetrechos, dificuldades de acesso aos lagos, dificuldades de comercialização, preços baixos para venda, dificuldade de transporte dos peixes dos lagos para a calha do rio e deste para a cidade, entre outros.

Gráfico 01. Porcentagens capturadas em relação à cota autorizada entre os anos de 2004 e 2015.

Gráficos referentes à porcentagem capturada até 2015. No ano de 2016 a cota autorizada foi de 13.909 peixes, pelo método de liberação de cotas do IBAMA que autorizou cotas entre

16% (dezesesseis) e 30% (Trinta por cento) das contagens feitas.

Gráfico 02. Porcentagem capturada até 2015 em comparação com 2016.

4.1 AUTORIZAÇÃO DA PESCA PELO IBAMA

A autorização de captura da espécie pirarucu (*Arapaima gigas*) pelo IBAMA, foi emitida no dia 25 de julho de 2016, permitindo que as comunidades realizassem programação de

venda e organização para captura com antecedência, baseado na quantidade de peixes autorizados por setores como mostra o quadro abaixo:

Autorizações concedidas aos setores:

Quadro 01 Obs: A soma total corresponde a 13.909 peixes, Nº 14/2016/Gt Fauna/Ibama/Am.

unidade de conservação	setor	pirarucus	%	cota autorizada
Rdsm	sol. de cima i	3.802	20	883
Rdsm	Sol. Do meio	567	23	130
Rdsm	Maiana	4.719	22	1.038
Rdsm	Sol. De baixo	4.843	20	1.003
Rdsm	Auati-paraná	11.325	25	2.831
Rdsm	Panauã	8.939	22	1.965
Rdsm	Guedes	23.994	16	3.839
Rdsm	Sol. De cimaii	2.701	20	540
Rdsm	Mineroá	7.532	20	1.522
Rdsm	Campina	529	30	159
Total		68.945		13.909

5. A PESCA MANEJADA NOS LAGOS

Sobre os métodos de pesca, existem restrições a utensílios ou formas de pesca, estabelecidas principalmente pela Portaria IBAMA 466/1972, de alcance nacional, e a portaria IBAMA 008/96, para as bacias dos rios Amazonas, Araguaia e Tocantins. Em geral, existem diversos aspectos da pesca em pequena escala que um administrador ou técnico precisa entender. Uma pescaria é composta por pescadores que desenvolvem um determinado esforço de pesca (embarcação, apetrechos de pesca e etc.). O manejo participativo do pirarucu consiste basicamente na avaliação e no monitoramento dos estoques com a participação efetiva dos usuários. A metodologia baseia-se na organização dos grupos de manejo e comunidades; na troca de conhecimentos e tecnologias tradicionais e científicas; e na capacitação gradual dos

pescadores em assumirem ações coletivas para a gestão do recurso.

As estratégias de capturas ou despesca são planejadas de forma coletiva, usando redes padronizadas e arpões. O grupo de manejo organiza o calendário e as atividades coletivas e os pescadores dividem-se entre as diversas tarefas. O manejo busca a simplificação de sistemas complexos para que essa ferramenta possa ser entendida e implantada tanto pelos técnicos como pelos grupos comunitários de manejo. Para o bom andamento e sucesso da pesca manejada nos lagos, a organização comunitária é de fundamental importância para que qualquer projeto de manejo, que envolva a participação de um grupo de pessoas, seja eficiente. Pois o conhecimento prático de pescadores padronizados e suas habilidades na pesca da espécie, combinados com a técnica padronizada, resulta em um método eficiente

e de baixo custo já que os pescadores com experiência na pesca do pirarucu possuem uma excelente capacidade de detectar, visual ou acusticamente, o rápido ato da buiada. A estrutura das capturas (e classes ou idades presentes) nos permite inferir parâmetros populacionais como crescimento, mortalidade e comprimento máximo esperado. Por outro lado, a estrutura da captura pode nos dar importantes informações sobre o ecossistema dos lagos ou sobre o tipo de pesca que nele se desenvolve.

6-MONITORAMENTO PARTICIPATIVO DA PESCA MANEJADA

Para obtenção dos dados de capturas efetuadas pelos setores é necessário realizar os serviços de monitoramento com informações referentes ao: local de captura, números de lacres de segurança, comprimento, peso, sexo e estado das gônadas (aparelho reprodutivo das fêmeas), que através destas informações é possível registrar a quantidade de peixes retirada dos lagos.

Este trabalho é realizado por pessoas qualificadas, o IDSFB realiza a capacitação para formação de monitores com um mini curso para monitoramento, com carga horária de vinte horas, os participantes recebem orientações, informações e treinamentos referentes ao preenchimento das fichas de monitoramento, utilização correta dos recursos naturais, tamanho mínimo de captura das espécies, noções da lei de crimes ambientais.

Em relação ao estágio gonadal para acompanhamento da maturação sexual dos pirarucus, os monitores observam as gônadas dos peixes e descrevem a sua coloração, sendo que os monitores que moram nas suas comunidades de origem são remunerados pelas suas próprias comunidades por sua dedicação e prestação de serviços temporários durante o manejo, garantindo um ganho extra.

7. FISCALIZAÇÃO DE LAGOS COM PEIXES

A fiscalização desta etapa do manejo de lagos é feita principalmente pelas comunidades e pelos pescadores que possuem a idéia de utilização dos recursos pesqueiros de maneira perene, o monitor que acompanha a pesca nas comunidades também atua como orientador para evitar crimes ambientais, após a captura as embarcações se deslocam das comunidades para a sede do município juntamente com os monitores que trazem portando consigo as informações das capturas que são repassadas e conferidas pelos técnicos do IDSFB, que solicitam guia de transporte com o destino da embarcação, para garantir que todos os peixes tenham a procedência legal oriundos de lagos de manejo, os animais são lacrados individualmente e com suas respectivas informações de peso, comprimento e sexo, constantes em uma planilha que segue em anexo com a guia de transporte.

As fiscalizações de rotina realizadas pelo IBAMA e Polícia Ambiental acontecem nas embarcações nos deslocamentos destas, até os pólos consumidores. No decorrer das viagens de acompanhamento da pesca ainda é possível encontrarmos situações de crimes ambientais. A fiscalização se torna mais frágil no período da “cheia” quando alguns lagos possuem diversos acessos e assim o controle de invasores fica mais difícil. A pesca clandestina compromete todo o trabalho do manejo de lagos e ainda os estoques pesqueiros, o IDSFB atende as demandas solicitadas pelos comunitários para minimizar os casos de invasão, para tornar a fiscalização mais eficiente os comunitários utilizam o sistema de rodízio de fiscais, permanecendo sempre uma equipe de vigilância nos lagos de manejo. Algumas comunidades possuem organização frágil e dificuldade também para realizar fiscalização durante todo o ano nos lagos.

Quadro 02: Resultados Das Capturas Do Ano 2016

Unidade de Conservação	Setor	Pirarucus	%	Cota autorizada	Cota capturada	Eficiência de captura %
Rdsm	Sol. De cima i	3.802	20	883	611	69
Rdsm	Sol. Do meio	567	23	130	78	60
Rdsm	Maiana	4.719	22	1.038	803	77
Rdsm	Sol. De baixo	4.843	20	1.003	889	89
Rdsm	Auati-paraná	11.325	25	2.831	2.097	74
Rdsm	Panauã	8.939	22	1.965	1.549	79
Rdsm	Guedes	23.994	16	3.839	2.773	72
Rdsm	Sol. De cima ii	2.701	20	540	418	77
Rdsm	Mineroá	7.532	20	1.522	1.155	76
Rdsm	Campina	529	30	159	159	100
Total		68.945		13.909	10.532	76

8. COMERCIALIZAÇÃO

No município de Fonte Boa existem cerca de 110 comunidades que participam da pesca anualmente localizadas em dez setores, dois setores são considerados livres como áreas abertas com processo de Acordo de Pesca entre si, com a exceção de oito setores na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá - RDSM.

A comercialização da produção é de total responsabilidade das comunidades. Ao acertarem a venda de suas produções os comunitários procuram o IDSFB, para ajuda no sentido de respaldar a venda e assegurar o pagamento da produção, neste contexto é realizado um contrato de compra e venda,

entre a comunidade representada pelo seu presidente e o comprador ou procurador por ele designado, a orientação que é repassada pelo IDSFB é para que a comercialização seja feita com pagamento à vista. O resultado da comercialização geral realizada pelas comunidades no ano de 2016, ficaram assim: Capturaram 10.532 Peixes que pesaram o total de 558.857 Kg vendidos ao preço total de R\$ 1.747.496,00, recurso este que é injetado anualmente na economia do município, consequentemente este valor aumenta cada ano conforme a cota autorizada e a eficiência de capturas e aumento da procura destes pescados com preços mais justos no mercado.

Quadro 03: Resumo das informações do Manejo Participativo no Município em 2016.

Discriminação	Resultados
01 - Cota Autorizada G/fauna/ibama-am	13.909 Pirarucus
02 - Cota Capturada	10.532 Pirarucus
03 - Cota Capturada em Quilos (ie)	558.857 kg
04 - Comunidades Envolvidas	61
05 - Comunidades que Participaram da Pesca	44
06 - Eficiência de Captura (Porcentagem)	76%
07 - Valor total de Comercialização Inteiro Eviscerado (ie)	R\$ 1.747.496,00
08 - Renda Média por Pescador	R\$ 2.688,46
09- Pescadores Envolvidos	650
10 - Preço Médio de Comercialização (r\$)	R\$ 3,12
11 - Quantidade de Monitores	45
12 - Quantidade de Embarcações Envolvidas no Transporte	52
13 - Peixes Capturados Acidentalmente (bodecos Arapaima gigas)	169
14 - Instituições Beneficiadas com Doação de Pescado	1

Pela comercialização realizada pelas comunidades com preço médio de R\$ 3,12 por kg de peixe, a renda média por pescador foi encontrada pela divisão do valor arrecadado e a quantidade de pescadores

envolvidos com renda média de R\$ 2.982,26 (Dois mil e novecentos e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos) por pescado no ano de 2016, conforme gráfico abaixo.

Gráfico. 03 Número de pescadores e renda média anual com a pesca do pirarucu.

Na captura utilizando apetrechos seletivos como é o caso das malhadeiras pirarucuzeiras, que possuem malha 140 destinadas apenas para captura de animais maiores, captura também indivíduos com tamanho menores que o mínimo permitido que é de 150 cm, alguns animais menores que esse comprimento possuem circunferência maior que animais acima de 150 cm, mas ainda não atingiram este tamanho fato este que facilita a sua captura pois não conseguem passar pelas malhas sem ficarem presos, outros se prendem pela cabeça, opérculo e nadadeiras, quando o pescador localiza um peixe jovem "bodeco"

nesta situação o mesmo corta a malha e desloca o animal até a margem para que descanse e sobreviva, muitas vezes esta percepção é muito tarde e alguns morrem acidentalmente.

Estes peixes com tamanho abaixo do permitido são doados nas comunidades e também trazidos para a sede do município de Fonte Boa e são doados para as instituições sociais e filantrópicas como Hospital, Creche, CRAS, PETI, Delegacia e Casa do Índio. As capturas de pirarucus jovens corresponderam a menos de 1% do total da produção em quilos considerando a captura dos peixes com tamanho acima de 150 cm.

Quadro 04: Quantidade e peso total de bodecos mortos acidentalmente em 2016.

Espécie	Quantidade	Peso
Arapaima gigas	169	3.856

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Promover a conservação dos estoques pesqueiros é extremamente difícil devido a complexidade ecológica e principalmente pela grande área geográfica, escassez de recursos humanos e financeiros, aliado ao pouco conhecimento da biologia, ecologia e dinâmica populacional das espécies de peixes. O pirarucu (*Arapaima gigas*) uma das espécies mais nobre dos peixes de água doce, teve uma pressão de pesca muito intensa que diminuiu bruscamente os estoques desta espécie levando-o a extinção, já com o manejo participativo de lagos se está

favorecendo o aumento dos estoques de pirarucus. Com a conservação dos lagos, outras espécies também estão dando sinal de que seus estoques também estão aumentando como é o caso do tambaqui (*Colossoma macropomum*) e Aruanã (*Osteoglossum bicirrhosum*), entre outras espécies, esses peixes como não possuem defeso permanente sofrem um grande esforço de captura imediatamente após o defeso anual para reprodução, com a pouca valorização e a necessidade de cumprimento das regras para pesca do pirarucu, algumas comunidades são obrigadas a capturarem

nos lagos de manejo outras espécies, além das comunidades, ocorre também a invasão por pescadores de fora que invadem os lagos e capturam também o pirarucu, que estão realizando o cuidado parental dos filhotes ou ainda não reproduziram, influenciando diretamente para o crescimento da população existentes nos lagos.

As etapas do manejo precisam serem otimizadas em todas as suas fases incluindo desde a contagem até a comercialização e principalmente na fiscalização, não apenas pelos usuários dos recursos naturais, mas também pelos gestores das diversas instituições sejam elas de extensão, pesquisa e fiscalização, para que este exemplo de desenvolvimento sustentável seja realizado de

maneira mais eficiente, na busca pela utilização dos recursos pesqueiros de forma racional, responsável e perene na melhoria da qualidade de vida dos pescadores e comunitários usuários destes recursos naturais.

Acreditamos que o refinamento da legislação, apoiado nos resultados das pesquisas científicas sirvam para fortalecer o programa de manejo da espécie em questão. Esperamos que os governos adotem medidas para apoiar as atividades de manejo, pois é uma forma de apoiar as comunidades ribeirinhas a recuperarem os estoques pesqueiros, havendo ganhos ambientais, sociais e econômicos para um grande número de pessoas envolvidas.

REFERÊNCIAS

- [1] Couto, R. (org.) P699 Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável: Parintins – AM,
- [2] 2005-2012 / Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, Projeto de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais do Estado do Amazonas – Manaus: Ibama, ProVárzea, 2005.
- [3] Gulland, J. A. (Ed.). Fish population dynamics: the implications for management. Chichester: John Wiley & Sons, 1988. 522p.
- [4] Ruffino, Mauro Luis Gestão do uso dos recursos pesqueiros na Amazônia. Manaus: Ibama, 2005. 135p.
- [5] Ruffino, Mauro Luis. A pesca e os recursos pesqueiros na Amazônia brasileira – Manaus: Ibama/ProVárzea, 2004.
- [6] Schaefer, M. B. Some aspects of the dynamics of populations important to the management of the commercial marine fisheries. Bull. Inter-Am. Trop. Tuna Comm., v.1, n.2, p.27-56, 1954.
- [7] Shepherd, J. G. Fish stock assessment and their data requirements. In:
- [8] Vazzoler, A. E. A. de M. 1981. Manual de métodos para estudos biológicos
- [9] Sobre populações de peixes. Crescimento e reprodução. Brasília, CNPq. Programa Nacional de Zoologia, 108 p.
- [10] Arantes, C.C. Ecologia do Pirarucu *Arapaima gigas* (Schinz, 1822) na várzea da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, Amazonas, Brasil. 2009. Dissertação (mestrado em zoologia) – Universidade Estadual de Santa Cruz. Ilhéus – Bahia, 2009.
- [11] Amaral, Ellen Silvia Ramos; Balbino, Nataluzo da Silva; Silva, Ruiter Braga da et. AL O Manejo Comunitário de Pirarucu (*Arapaima gigas*) nas Reservas de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e Amanã: ano 2008. Tefé, AM: IDSM, 2009. 40p. (Relatório Técnico-Documento interno).
- [12] Amazonas. Governo do estado. Secretaria de Estado do Meio Ambiente e desenvolvimento Sustentável. Análise Ambiental e de Sustentabilidade do Estado do Amazonas. Nova Iorque: Nações Unidas. 2007. 202p.
- [13] Arantes, C. C.; Serqueira, D. G.; Castello, L. Densidades de pirarucu (*Arapaima gigas*, Teleostei, Osteoglossidae) nas Reservas de desenvolvimento Sustentável Mamirauá e Amanã, Amazonas, Brasil. UAKARI, Belém, n. 2, p. 37-43, 2006.
- [14] Batista, V. S.; Issac, V. J.; Viana, J.P. Exploração e manejo dos recursos pesqueiros da Amazônia. In: Ruffino, Mauro Luís (Ed.). A pesca e os recursos pesqueiros na Amazônia Brasileira. Manaus: ProVárzea, p. 63-152, 2004.
- [15] Ibama – Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Estatística da Pesca 1999: Brasil: grandes regiões e unidades da federação. Tamandaré: IBAMA, 2001. 95P.
- [16] Smith, N, J, H Pesca no Rio Amazonas. Manaus, Inpa/CNPq, 1979, 14 p.
- [17] Veríssimo, J. A pesca na Amazônia. Rio de Janeiro, Livraria Alves, 1895, 137 p.
- [18] Petrere, M. Pesca e esforço de pesca no estado do Amazonas. I. Esforço e captura por unidade de esforço. ACTA Amazônica 8 (3): 1978.439-454.
- [19] Menezes, RS., Notas biológicas e econômicas sobre o pirarucu *arapaima gigas* (cuvier) (actinopterygii. Arapaimidae). Serviço de informação agrícola/Ministerio da agricultura. Serie estudos técnicos vol. 3, p. 9-39. 1951.

- [20] Queiroz, H. L.; Sardinha, A. D. A preservação e o uso sustentado dos pirarucus em Mamirauá. In: H.L. Queiroz.&W.G.R Crampton (Eds.) Estratégias para o manejo de recursos pesqueiros em Mamirauá. Brasília: Sociedade Civil Mamirauá/ Ministério de Ciência e Tecnologia/Conselho Nacional de Pesquisa, PP. 108-141. 1999.
- [21] Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. Plano diretor IDSM: 2006-2009, Brasília: Idsm, 2006, 64p.
- [22] Janér. A. RDS Mamirauá Pescados: Relatório intermediário. [2002]
- [23] Ibama. Estatística Pesqueira. <http://www.ibama.gov.br/recursospesqueiros/documentos/estatística-pesqueira,2006>.
- [24] Ibama. Instrução normativa №. 29. Ibama, Brasília, DF.2003.
- [25] Sawaya, P. Sobre a biologia de algumas espécies de peixes de respiração aérea *Lepidosiren paradoxa*, Fitz. e *Arapaima gigas* Cuv. Bol. Facul. Filosof. Cien Let. Universidade de São Paulo, Zoologia 11, 255-286. 1946.
- [26] Micgrath, D. G.; Castro, F.; Futemma, C. Reservas de lago e manejo comunitário da pesca no baixo Amazonas: uma avaliação preliminar. In: D'Incao, M. A; & Silveira, I.M. (eds) Amazônia e a crise da modernização. Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, 1994.
- [27] Amaral, E.S.R. A comunidade e o mercado: desafios na comercialização do pirarucu manejados das reservas Mamirauá e Amanã, Amazonas, Brasil. Uakari 3 (2): 7-17, dezembro, 2007.

Capítulo 8

SUSTENTABILIDADE E GERAÇÃO DE ENERGIA: ESTUDO DA VIABILIDADE DE BIODIGESTOR EM COMUNIDADES RIBEIRINHAS DA AMAZÔNIA

Julian Oliveira Gama

Clayssa Picanço de Lima

Débora Cristina Bandeira Rodrigues

Joel Rodrigues

Barbara Gabriella Oliveira Chaves

Resumo: Nas sociedades globalizadas do século XXI as fontes de energia usuais se tornam mais escassas, a busca por alternativas energéticas que em seu modelo de geração de energia promova a sustentabilidade, se constitui desafio em grande escala para a ciência, tecnologia e inovação, sendo um tema de grande relevância para o conjunto da sociedade. Dessa maneira, o objetivo da pesquisa foi analisar a disponibilidade de matéria prima para geração de energia com Biodigestor, de forma a mapear os recursos existentes e as possíveis potencialidades do uso de biogás para a produção de energia, adotando como locus a comunidade de São Lázaro, localizada no município de Caapiranga/AM. A metodologia utilizada possibilitou uma análise qualitativa e quantitativa dos dados obtidos, para alcançar tais resultados foram utilizadas ferramentas metodológicas como: entrevistas, aplicação de formulários semiestruturados e observações em campo junto aos moradores da comunidade. As características energéticas da comunidade foram identificadas e um estudo voltado a tirar proveito do biogás, oriundo do possível uso do biodigestor como tipo de fossa séptica, na comunidade foi feito, considerando duas alternativas para o uso do biogás: a geração de energia elétrica através de geradores específicos e o uso como gás de cozinha, onde uma demanda expressiva por este último foi identificada na comunidade. Entre os principais resultados da pesquisa constatou-se a viabilidade de execução do uso de biogás pela comunidade, uma vez que 65% consomem mensalmente 1 botija GLP 13Kg no valor de R\$ 70,00, considerado oneroso tendo em vista baixa renda dos comunitários, os moradores demonstraram grande interesse na viabilidade do projeto, pois poderá contribuir ainda no saneamento básico, de acordo com dados da pesquisa 88% dos informantes relataram não possuir fossa séptica nas casas, neste caso o uso do biogás reduziria os custos com gás de cozinha e possibilitaria melhoria na saúde da comunidade pela implantação de fossas biodigestoras.

Palavras Chave: Energia; Sustentabilidade; Biodigestor; Biogás; Comunidades Amazônicas.

1. INTRODUÇÃO

No cenário global de debates em torno das mudanças climáticas, a busca por fontes renováveis de produção de energia é essencial, sendo este um dos principais meios de combate às mudanças decorrentes da elevação dos gases de efeito estufa na atmosfera. As fontes de energia renováveis, se implantadas apropriadamente e observando os recursos locais disponíveis, podem contribuir para o desenvolvimento social e econômico, universalização do acesso à energia e redução de efeitos nocivos ao meio ambiente e à saúde, ao mesmo tempo em que promove a redução da poluição de recursos hídricos e áreas rurais mais distantes possam ser energeticamente supridas (UCZAI, 2012).

Este artigo está vinculada ao Grupo Interdisciplinar de Estudos Socioambientais e de Desenvolvimento de Tecnologias Sociais na Amazônia, e teve como *locus* a comunidade de São Lázaro (Dominginhos) localizada no município de Caapiranga/AM. A comunidade apresenta o seu modelo econômico, a qualidade de vida e meios de transporte utilizados bem característicos da região amazônica, cujo acesso é por via fluvial. O artigo possui uma abordagem qualitativa, e contou ainda com pesquisa bibliográfica e de campo, a partir da realização de entrevistas, formulários semiestruturados, junto aos moradores da comunidade *locus* da pesquisa, observações e anotações em campo para o alcance das informações necessárias para o projeto, tendo como questão objetivo geral: analisar a disponibilidade de matéria prima para geração de energia com Biodigestor, desdobrando-se este na caracterização das formas de geração de energia existentes na comunidade, mapeamento dos recursos naturais existentes na comunidade de São Lázaro para a geração de energia e identificação das potencialidades para a geração de biogás para produção de energia renovável, os quais foram alcançados além do uso de dados obtidos em campo, com aporte teórico em Barbosa G. & Langer M. (2011), Uczai (2012), BAUNGRATZ, K.L (2013), EMBRAPA (2009), Aneel (2008), Oliveira (2013) e ANDRADE(2017).

Este artigo é resultado do projeto de iniciação científica na categoria do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI), financiado com bolsa pelo CNPq,

vinculado a PROTEC/UFAM e apresenta a metodologia utilizada e os instrumentos de pesquisa, assim como a caracterização do *locus* para o seu desenvolvimento, seguida de uma abordagem de importantes conceitos teóricos referentes ao assunto. Finalizando por uma discussão referente a viabilidade do projeto proposto.

2.DESENVOLVIMENTO

2.1 METODOLOGIA

No que concerne à metodologia, o método de pesquisa foi o estudo de caso. Foram estabelecidas fases para o seu desenvolvimento, sendo estas interligadas e complementares. Assim, percorreu os seguintes passos: na primeira fase foram realizadas leituras, fichamentos de textos e livros sobre as temáticas, tais como: sustentabilidade, energia e energia renovável na contemporaneidade, abordando, ainda, os avanços científicos em torno das temáticas em debate. Na segunda fase foi realizada pesquisa de campo com aplicação de formulário, entrevistas e observação, assumiu o aporte metodológico das abordagens qualitativas sem excluir os aspectos quantitativos. A terceira fase constituiu na análise de dados.

Portanto, a pesquisa assumiu relevância social porque possibilitou o resgate e valorização dos conhecimentos tradicionais na Amazônia, além de buscar medidas que colaborem para o desenvolvimento socioambiental da comunidade e seus moradores, assim, também promovendo a associação entre conhecimento tradicional e conhecimento técnico-científico, além de colaborar na identificação das formas de difusão e aprendizado dos conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade, ao mesmo tempo em que buscou dar visibilidade e mapear as técnicas de uso e manejo de plantas medicinais na Amazônia.

Conforme Minayo (1994), a fase da pesquisa de campo engloba os instrumentais e os procedimentos de análise de dados. A pesquisa apresenta uma característica qualitativa e quantitativa, que de acordo com Goldenberg (2004) a pesquisa qualitativa visa destacar os aspectos subjetivos da realidade, sendo a quantitativa expressa em seus aspectos numéricos. Dessa forma, foram utilizadas técnicas de coleta de dados, como a aplicação de formulários e a realização de

entrevistas junto aos comunitários, onde utilizamos registros fonográficos, anotações em caderno de campo e o registro fotográfico. A comunidade estudada no momento do levantamento de dados, realizado em outubro de 2017, contava com 43 famílias no total. Para tanto foi estabelecida uma amostra de 17 sujeitos representantes dos núcleos familiares que residem na comunidade, sendo 3 informantes chaves para as entrevistas semiestruturadas.

3. LOCUS DA PESQUISA

O *locus* da pesquisa foi a comunidade de São Lázaro (Dominguinhos) pertencente ao município de Caapiranga no Estado do Amazonas. A comunidade apresenta uma infraestrutura básica composta de uma igreja, uma escola, um posto de saúde, um centro comunitário, um campo de futebol e uma praça. Com relação ao fornecimento de energia elétrica a comunidade, segundo estudo de Andrade (2017) é realizado por meio do programa do Governo Federal “Luz Para Todos”, no qual a comunidade recebia 500L de combustível no mandato (2012-2015) da Prefeitura do Município de Caapiranga, que servia para alimentar um motor gerador comunitário durante 3 horas no período da noite das 18:00 às 21:00, porém, o diesel fornecido não é suficiente para garantir energia todos os dias do mês. No tocante ao abastecimento de água, os comunitários dispõem de recursos próprios para a utilização de água na comunidade, através de poço artesiano ou cisterna para o armazenamento de água proveniente da chuva, em caso de defeito na bomba ou período de estiagem (sem chuva na região), a comunidade faz uso da água do rio. O nível da água do rio na comunidade determina a dinâmica da economia local, que é voltada principalmente para a agricultura. O saneamento da comunidade é característico das regiões ribeirinhas do Amazonas, com uso do “buraco negro”, ou fossas negras, que oferecem riscos à saúde dos comunitários. O uso desse tipo de fossa não oferece proteção aos cursos d’água utilizados para o poço artesiano, podendo ser contaminado por substâncias tóxicas resultantes da decomposição de fezes e urina que são despejados diretamente no solo, característica do tipo de fossa utilizada na comunidade.

4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste início do século XXI é possível identificar um aprofundamento do processo de mobilização, por parte de governantes, políticos, empresários e cientistas, entre outros, em busca de tecnologias alternativas para substituir os combustíveis fósseis na produção de energia. Tecnologias limpas, renováveis e com baixos custos de investimento, que minimizem os efeitos nocivos ao meio ambiente e contribuam para a melhoria da qualidade de vida de todos os habitantes do planeta. De acordo com Deganutti et al. (2002), a preocupação com os recursos não renováveis e consequentemente com o meio ambiente, teve início no século XX com a crise do petróleo, o que proporcionou um crescimento no desenvolvimento de fontes alternativas de energia. Importante destacar que no primeiro momento as pesquisas em alternativas energéticas não foram pensadas visando a melhoria do meio ambiente, mas sim para diminuir a dependência dos países para com o petróleo.

No caso do Brasil, mesmo possuindo uma base energética mais limpa em relação a maioria dos países, graças às hidroelétricas, também iniciou pesquisas para diversificar sua base energética e diminuir ainda mais sua dependência do petróleo. Exemplos de pesquisas alternativas realizadas no Brasil são: o etanol e o biodiesel.

A reposição das fontes de energia fóssil e nuclear exigem um horizonte de tempo geológico, essas são consideradas não renováveis. Já as fontes renováveis de energia são repostas imediatamente pela natureza; é o caso dos potenciais hidráulicos (quedas d’água), eólicos (ventos), a energia das marés e das ondas, a radiação solar e o calor do fundo da Terra (geotermal). A biomassa também é uma fonte renovável de energia e engloba diversas subcategorias, desde as mais tradicionais (como a lenha e os resíduos animais e vegetais) até as mais modernas (como o etanol para automóveis, biodiesel, bagaço de cana para cogeração energética e gás de aterros sanitários utilizados para a geração de eletricidade) (ANEEL, 2008).

Uma das fontes renováveis de energia é o biodigestor, o qual compõe-se basicamente de uma câmara fechada na qual uma biomassa (em geral dejetos de animais) é fermentada anaerobicamente, ou seja, sem

presença de ar, acelerando o processo de decomposição da matéria orgânica. O biodigestor pode ser construído de alvenaria, concreto ou outros materiais, onde é depositado o material a ser digerido. O processo de decomposição da matéria orgânica resulta na liberação de biogás e produção de biofertilizante.

Das fontes para produção de energia, o biogás é uma das mais favoráveis ao meio ambiente. Sua aplicação permite a redução dos gases causadores do efeito estufa e contribui com o combate à poluição do solo e dos lençóis freáticos. Isto porque o biogás é obtido da biomassa contida em dejetos (urbanos, industriais e agropecuários) e em esgotos (ANEEL, 2008).

O biofertilizante é resultado direto da decomposição anaeróbica, consiste em uma parte líquida e uma parte sólida, onde, a parte líquida pode ser utilizada adicionando-se água e pulverizando-se onde se deseja e a parte sólida utilizada como adubo na hora do plantio. Uma das principais vantagens do uso de biofertilizantes na agricultura é o baixo custo. Estes não geram problemas quanto à acidez e degradação do solo, como ocorre com o uso de fertilizantes de origem química. (BARBOSA e LINGER, 2011)

Em consonância com o objetivo do projeto, de identificar viabilidade de biodigestores em comunidades ribeirinhas da Amazônia como forma de geração de energia sustentável, através da utilização de resíduos como os dejetos humanos, apresenta-se resultado da pesquisa sobre os resíduos da mandioca como potencial matéria prima para o biodigestor. Na região, a mandioca é utilizada principalmente na produção de farinha, que desempenha um importante papel na dieta alimentar dos brasileiros, sendo o Brasil figurado como um dos maiores produtores dessa cultura alimentar e também como grande consumidor. O processo da industrialização da mandioca acontece em fábricas conhecidas como farinhas ou casas de farinha, já as que industrializam o amido são conhecidas como fecularias. Independentemente de serem de pequeno ou grande porte, estas indústrias precisam lidar com os resíduos que são gerados no processo que, se não forem descartados corretamente, podem ocasionar sérios problemas ao meio ambiente, principalmente aos corpos hídricos. A manipueira é um efluente industrial resultante da transformação da mandioca, possui cor amarela, de alta

umidade, gerado em grande volume na prensagem da massa da raiz. Suas principais características são a elevada carga orgânica e alto teor de cianeto (linamarina). Possui efeito deletério ao meio ambiente se armazenada ou descartada incorretamente, sem um prévio tratamento. (LEITE et. al, 2016)

O lançamento das águas residuais em corpos hídricos sem um prévio tratamento pode ocasionar problemas de poluição ambiental, contribuir para a alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas das águas, a fauna ictiológica e a flora local desencadeando risco ao bem estar público comprometendo o solo, modificando sua estrutura natural, prejudicando a diversidade dos ecossistemas, ocasionando perda de diversidade. O processo de prensa da mandioca já libera uma quantidade de manipueira.

De acordo com Saka (2015) outras vantagens do biodigestor é a neutralização do cianeto, resíduo altamente tóxico, possibilidade de melhor utilização do biofertilizante e redução do mau cheiro ao redor da fecularia, proporcionando assim uma destinação sustentável a produtiva dos resíduos de mandioca nessas comunidades.

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

5.1 ANÁLISE DO SANEAMENTO, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA DA COMUNIDADE

A água contaminada por falta de mínimas condições de saneamento pode gerar uma série de doenças no ser humano, podendo inclusive causar a morte, Costa e Guilhoto (2014) afirmam que a falta de tratamento do esgoto sanitário doméstico traz várias consequências negativas para a sociedade. A literatura cita a saúde como a principal variável impactada pelas más condições sanitárias da população. Observou-se que São Lázaro não possui condições apropriadas de saneamento, as fossas utilizadas não apresentam segurança a saúde, visto que 100% dos entrevistados não utilizam fossa séptica.

O fato de não haver contato direto com resíduos provenientes do esgoto, não elimina o risco, a contaminação pode acontecer pela água, tanto pelos poços como pela água do rio que rodeia a comunidade pois trata-se de uma região de várzea e os moradores costumam utilizar desta água para diversas

atividades desde banho à alimentação. Assim, visando atender às necessidades de tratamento de esgoto em comunidades ribeirinhas, foi avaliado um sistema alternativo de tratamento de esgoto, as fossas sépticas biodigestoras, que são uma excelente alternativa de saneamento básico na área rural e podem contribuir para o desenvolvimento local, pois o sistema biodigestor apresenta tripla funcionalidade: previne contra doenças, protege o lençol freático (água do poço) e produz adubo orgânico de qualidade além de produzir biogás, que possui várias aplicações entre elas a geração de energia. Uma das principais problemáticas da realidade da comunidade está relacionado ao destino de resíduos sólidos humanos, conforme o levantamento podemos notar que 100% dos entrevistados declaram usar as fossas do tipo Fossa Negra.

Com relação ao uso da água por parte dos comunitários, podemos relacionar o uso com questões de saúde, no levantamento realizado foi identificado que 94% dos moradores utilizam a água proveniente dos

poços artesianos, sendo que um dos entrevistados N°1, declarou que na falta de água do poço, utiliza a água do rio às vezes.

A energia elétrica da comunidade se limita ao uso de um grupo gerador utilizando o diesel como combustível. Esse diesel é fornecido pela prefeitura de Caapiranga/AM e possibilita o uso por parte dos comunitários de energia elétrica por até 4 horas por dia. Além do uso do gerador comunitário, de acordo com resultado da pesquisa 24% possui geradores particulares em algumas residências.

6. RESÍDUOS SÓLIDOS

Os resíduos sólidos disponíveis na comunidade tem grande relevância para o projeto, compreender a sua destinação e uso ajuda na caracterização das atividades realizadas na comunidade, assim como os hábitos de consumo por parte dos comunitários. A relação dos resíduos catalogados nos levantamentos feitos pode ser visto no quadro abaixo.

Quadro: Relação de resíduos sólidos da comunidade.

Destinação de resíduos sólidos na comunidade		
Tipo de Resíduos	Caracterização/Destinação	Análise
Resto de Comida	Os restos de comida têm um potencial na utilização de biodigestores, mas conforme os comunitários são destinados à alimentação de animais de estimação como cachorros e gatos na comunidade.	No caso dos restos de comida, apesar de apresentar certo potencial não é possível fazer o seu uso, pois estaríamos retirando a alimentação de animais de estimação da comunidade.
Folhas Secas	As folhas secas na comunidade são usadas como adubo no entorno de algumas plantas e em sua maioria são queimadas conforme o levantamento feito.	O uso de folhas secas apresenta potencial como biomassa presente na comunidade, mas são mais usadas em processos que utilizem a queima de biomassa, não apresentando relevância para os biodigestores.
Forno de Farinha (Casca da mandioca e outros líquidos provenientes da produção)	Foi identificado uma grande quantidade de resíduos provenientes dos fornos de farinha que é um dos aspectos forte da economia da comunidade, segundo os comunitários a produção anual tem variações de acordo com as estações do ano. Esses resíduos não são aproveitados totalmente pela comunidade, assim como as cascas, não são usados para a alimentação de animais e em sua maioria acabam sendo descartados em qualquer lugar e em poucos casos usados como adubo.	Identificamos nesse caso um grande potencial para o uso em biodigestores. Por esses resíduos da produção não estarem sendo reutilizados e sendo descartados pelos comunitários, sendo encontrados em grande quantidade na comunidade estudada.

Fonte: Pesquisa PIBITI, 2017

Com base nos resultados do estudo foi construída a relação do descarte de resíduos na comunidade, como sacolas plásticas, pilhas, garrafas PET, garrafa de vidro, latas,

panela de alumínio, entre outros. De acordo com os comunitários as sacolas plásticas e garrafas pets são queimadas quando não são reutilizadas, no caso das garrafas PETs em

geral são reutilizadas para o armazenamento de água e combustíveis usados em motores como das embarcações e de geradores. Com relação a garrafas de vidros e pilhas antigas, esses objetos são descartados na maioria das vezes de qualquer forma na área da comunidade, não ocorrendo o descarte correto.

7. DEFINIÇÕES, CÁLCULOS E VIABILIDADE DO PROJETO

De acordo com os dados coletados e as observações feitas em campo, foram definidas opções de modelos de biodigestores para as características das residências analisadas. O parâmetro inicial utilizado foi o número de pessoas por casa, uma vez que não seria possível projetar as

fossas biodigestoras para a casa de cada entrevistado. A faixa de números de pessoas por residência com 53% dos casos é de 4 a 6 pessoas, dessa forma, foi idealizado o número de 5 pessoas por casa como padrão para o projeto. Considerando que, de acordo com Herrero (2008), uma pessoa de 70kg produza em média 280g de fezes por dia. Como não há um estudo específico que indique a quantidade de biogás produzido por quilograma de fezes humanas, foi considerado o valor da quantidade produzida pelas fezes de suínos, pois se assemelham consideravelmente a de humanos. Assim, chega-se a quantidade de Biogás produzida diariamente e mensalmente por uma família de 5 pessoas:

$$\frac{\text{Biogás}}{\text{dia}} = 0,105 \text{ m}^3 \text{ Humano}$$

$$\frac{\text{Biogás}}{\text{mês}} = 3,15 \text{ m}^3 \text{ Humano}$$

Importante considerar ainda, a relação de produção diária por animais o que pode

impulsionar a produção, apresentando valores mais satisfatórios.

$$\frac{\text{Biogás}}{\text{dia}} = 0,4 \text{ m}^3 \text{ Bovino}$$

$$\frac{\text{Biogás}}{\text{dia}} = 0,17 \text{ m}^3 \text{ Suíno}$$

Dessa forma, utilizou-se o modelo de biodigestor definido pela Embrapa, que apresenta uma forma de construção acessível para o objetivo desse projeto, além de um

funcionamento simplificado já utilizado e testado em outras regiões do Brasil. Como ilustrado na figura que segue,

Figura 3: Modelo da fossa séptica biodigestora.

Fonte: Galindo et al. (2010) apud COSTA & GUILHOTO, 2014.

Para a viabilidade do projeto pode-se considerar duas opções para a utilização do biogás resultante do processo de biodigestão, a primeira opção é no uso para o funcionamento de um gerador transformação em energia elétrica e para a segunda opção o

uso como substituto do gás de cozinha (GLP) utilizado nas residências. Os comunitários mostraram-se com maior interesse na segunda opção para o projeto, o que pode ser explicado pelo consumo demonstrado no gráfico a seguir.

Figura: Gráfico da utilização de Botijas de GLP (13Kg) mensal na comunidade

Fonte: Pesquisa PIBITI, 2017

Conforme demonstrado há alto consumo de botijas de GLP por parte dos comunitários, representando uma significativa parcela da renda de cada família da comunidade, se comparar que cada botija de 13 quilogramas no momento da pesquisa, ano de 2017, custava 70 reais segundo os comunitários. Com isso, a utilização do biogás como gás de cozinha mostra-se um importante possível resultado da utilização de biodigestores na comunidade. Dessa forma, através das relações de transformação onde 1 quilograma de gás de cozinha (GLP) é equivalente a 1,24 metros cúbicos de biogás segundo a empresa Fogás, relacionar a demanda mensal e diária de biogás por parte das residências da comunidade.

Essa demanda foi calculada utilizando o valor de consumo do equipamento referente a cada opção de projeto. No caso da geração de energia elétrica, foi realizado o cálculo da demanda total de uma casa idealizada de

acordo com os levantamentos de equipamentos feita nos formulários aplicados na comunidade, dessa forma dimensionamos um gerador de energia movido a gás que atenderia a demanda diária calculada de aproximadamente 2,8 kW/h (2.800 Watts por hora). De acordo com a especificação do equipamento, relacionamos o consumo diário e mensal necessário de biogás para o funcionamento do gerador por 4 horas.

No que concerne ao gás de cozinha, de maneira semelhante com o cálculo do consumo já feito de acordo com a relação do uso das botijas, escolhemos um fogão com configurações comuns para de acordo com a sua especificação definimos o consumo médio diário e mensal necessário de biogás. Finalmente temos a seguinte relação entre as demandas de gás para a questão de energia elétrica e em relação ao gás de cozinha, e a produção de uma casa padrão de 5 pessoas diariamente e mensalmente.

Tabela: Relação entre a demanda e produção diária e mensal de biogás.

Relação de demanda com a produção de biogás				
Demanda de biogás	Volume diário de biogás [m³/dia]	Volume mensal de biogás [m³/mês]	Relação com a produção diária	Relação com a produção mensal
Energia Elétrica	3,968	119,04	3%	3%
Gás de cozinha	0,537	16,12	20%	20%
Produção biodigestor				
5 pessoas	0,105	3,15	-	-

Fonte: Pesquisa PIBITI, 2017

Dessa forma, chega-se à análise final da viabilidade da utilização dos biodigestores do tipo fossa séptica, onde podemos notar que comparando a produção diária e mensal de biogás, a opção do uso para a geração de energia mostrasse inviável uma vez que a produção de biogás somente alcançaria aproximadamente 3% da demanda necessária para o funcionamento do gerador a gás em um período de 4 horas. Além disso, o custo envolvido na implementação de um sistema de geração seria muito elevado para os comunitários. Essa opção teria maior viabilidade, se houvesse uma grande produção de biogás, como por exemplo, em grandes fazendas de criação de animais onde o investimento feito gera um retorno mais rápido pelo tamanho da produção de biogás.

Entretanto, a produção de biogás para a utilização como gás de cozinha mostrasse viável apesar de não suprir a demanda definida, podemos perceber a produção diária e mensal de biogás alcançaria aproximadamente 20% da demanda solicitada, lembrando que é a quantidade referente ao uso de uma botija de 13 quilogramas de GLP por mês, que é uma demanda muito alta. Mesmo assim, essa porcentagem de 20% representaria uma economia significativa em um intervalo de tempo definido, considerando o preço de uma botija de GLP igual 70 reais em um ano seria possível economizar aproximadamente 200 reais. Outra questão importante é que estamos utilizando somente valores para a produção diária para 5 pessoas, a mistura com os resíduos animais como os bovinos poderia potencializar a produção, apresentando valores mais satisfatórios de economia.

REFERÊNCIAS

- [1] Uczai, Pedro. Energias renováveis: riqueza sustentável ao alcance da sociedade – Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2012.
- [2] Minayo, Maria C. de Souza; Deslandes, Suely F. et al. Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. Maria Cecília de Souza Minayo (Org.). 31. ed.- Petrópolis, RJ: Vozes, 1994.

8. CONCLUSÕES

Por meio de análises qualitativas e quantitativas, verificou-se que a viabilidade de biodigestores em comunidades ribeirinhas é um projeto possível e eficiente, propondo uma solução para o saneamento precário e de vantagem econômica, pois substituiria o gás de cozinha e produziria adubo de boa qualidade. Observou-se que na comunidade São Lázaro, *locus* da pesquisa, existem casos cada vez mais frequentes de doenças feco-orais indicando que a água consumida já apresenta nível de contaminação, nesse sentido, a fossa séptica biodigestora, ao isolar totalmente os dejetos humanos do solo e por funcionar na ausência de oxigênio, garante que os vetores causadores dessas doenças morram durante o processo da biodigestão, proporcionando melhoria na qualidade de vida dos moradores.

As fossas biodigestoras são aplicadas no Brasil de maneira eficiente desde 2001, quando o médico veterinário Antônio Pereira de Novaes, pesquisador da Embrapa Instrumentação Agropecuária, de São Carlos (SP), teve a ideia de criar o sistema das Fossas Sépticas Biodigestoras. No Amazonas apesar de poucas as aplicações, além de prevenir e/ou evitar a contaminação dos lençóis freáticos e rios, apresenta grande potencial de produção de biogás, pois, a temperatura média do estado propicia um ambiente favorável à biodigestão.

Em consonância com o projeto, fez-se o estudo da viabilidade de biodigestores também para os resíduos da mandioca, que apresentam exacerbado potencial poluente e toxicidade. Entretanto, apesar de já haver aplicações do biodigestor para a manipueira, resíduo líquido do processo de produção da farinha, em fábricas de produção em larga escala, não foi possível montar o protótipo na comunidade no âmbito desta pesquisa, sendo indicada continuidade do estudo para aprofundamento do aproveitamento destes resíduos.

- [3] Andrade, N. Práticas Socioculturais e Mecanismos Jurídicos de Proteção aos Conhecimentos Tradicionais Associados ao Uso de Plantas Medicinais na Amazônia. Manaus, 2017.

- [4] Embrapa. Saúde e renda no campo: Saiba como reaplicar o sistema inovador de Fossas Sépticas Biodigestoras Cartilha Passo-a-Passo. Brasília: PlanoMídia, 2009.

[5] Fogás. GLP x Gás Natural x Energia Elétrica. Disponível em: <<https://www.fogas.com.br/granel/glp-gasnatural-energiaeletrica/>>. Acesso dia 15 de abril de 2018, as 16 horas.

[6] Costa C. C., Guilhoto J. J. M. Saneamento rural no Brasil: impacto da fossa séptica biodigestor. 2014. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1590/S141341522014019010000171>>

[7] Da Silva, W.T.L. (2011). *Comunicação pessoal*.

[8] Oliveira, Suzy Sarzi. Metabolismo da linamarina em reator de digestão anaeróbia com separação de fases. 2003. xiv, 88 f. Tese (doutorado) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências Agrônômicas, 2003. Disponível em: <<http://hdl.handle.net/11449/101739>>.

[9] Leite, Vera G.C. et al – A Biodigestão anaeróbica como alternativa sustentável no

tratamento de águas residuárias de feculárias de mandioca. Disponível em: <<https://www.tratamentodeagua.com.br/wp-content/uploads/2016/09/A-biodigest%C3%A3o-anaer%C3%B3bia-como-alternativa-sustent%C3%A1vel-aplicada-no-tratamento-de-%C3%A1guas-residu%C3%A1rias-de-feculárias-de-mandioca.pdf>> Acesso em : 23 de abril de 2018

[10] Aneel. Atlas da Energia Elétrica do Brasil: Parte II – Fontes Renováveis, 2008. Disponível em: <http://www2.aneel.gov.br/arquivos/pdf/atlas_par2_cap4.pdf> Acesso em: 12 dez. 2017.

[11] SAKA, V. Biodigestor para o resíduo do Processamento da Mandioca, 2015. Disponível em: <<https://pt.linkedin.com/pulse/biodigestor-para-o-resíduo-do-processamento-da-mandioca-valter-saka>> Acesso em: 27 dez. 2017.

Capítulo 9

O USO DE MALHADEIRAS NUMA COMUNIDADE DE VÁRZEA, BOCA DO ARAPIRÍ, ALENQUER-PARÁ

Sara Laurido

Tony Braga

Resumo: O objetivo deste trabalho foi descrever o uso de malhadeiras e o histórico deste uso pelos pescadores da comunidade Boca do Arapirí, no município de Alenquer, Pará. Os dados foram coletados através de entrevistas com formulários semiestruturados utilizando-se da técnica de “*snowball*”. Os entrevistados foram questionados sobre o uso de malhadeiras, ambientes utilizados para a pesca, e sobre possíveis mudanças ocorridas nos ambientes e nos estoques pesqueiros, percebidas ao longo dos anos. As informações foram analisadas através de estatística descritiva. Foram entrevistados 42 pescadores com idade média de 40 anos e que pescam, aproximadamente, 4 dias por semana. A pesca é a principal atividade econômica na comunidade, realizada tanto para subsistência quanto para fins comerciais, utilizando principalmente redes de emalhar de nylon sintético 0.35 por 35mm (entre nós) denominadas de “aracuzeira” e de 0.35 por 40mm (entre nós) denominadas de “maparazeira”; além das de algodão de fios 0.08, 0.09 e 0.12 com malha 55mm (entre nós), utilizadas para a captura de etnoespécies com maiores valores comerciais, como tambaqui e curimatá. Cada pescador tem pelo menos uma malhadeira e explora principalmente o ambiente de lago, seguido de igarapés, paranás e o próprio Rio Amazonas. Descrevem que as redes passaram a ser utilizadas na comunidade a partir de 1950 e popularizadas em 1980, o que levou a intensificação das capturas acarretando a diminuição na produção capturada e no tamanho dos exemplares. Como medida de conservação os pescadores estabeleceram regras de manejo locais e cujo cumprimento ainda é um grande desafio.

Palavras Chave: Várzea, Pesca, Malhadeira.

1. INTRODUÇÃO

A atividade de pesca é destaque na Amazônia, sua importância antecede a colonização visto que os indígenas habitantes dessa região já utilizavam o pescado como parte indispensável para alimentação (VERÍSSIMO, 1895). A prática se estendeu até a atualidade caracterizando o pescado como a principal fonte proteica na alimentação, especialmente para as populações que vivem as margens dos grandes rios amazônicos onde o consumo direto de pescado estimado gira em torno de 500g/dia (FABRÉ; ALONSO, 1998; ISAAC; ALMEIDA, 2011).

A pesca nessa região é importante não só pela produção de alimento, mas como comércio, renda e lazer para grande parte de sua população garantindo 168.315 empregos diretos e mobilizando R\$ 389 milhões por ano (ALMEIDA et al., 2010; BARTHEM; FABRÉ, 2004). Economicamente a pesca tornou-se uma atividade dominante nas organizações sociais e produtivas dos povos amazônicos, proporcionando a exploração do grande potencial pesqueiro da região estimado em cerca de aproximadamente três mil espécies (PEREIRA et al., 2007; SANTOS; SANTOS, 2005).

No século XIX a pesca era feita em pequenas canoas e com instrumentos desenvolvidos pelos indígenas, onde se destacava o arpão feito de concha e a flecha lançada sem arcos e que certamente sofreram influência trazida pelo colonizador. A partir do contato dos portugueses com indígenas os apetrechos foram evoluídos e aprimorados enquanto outros foram introduzidos como malhadeiras que não eram observadas no século XIX. Atualmente, a pesca em águas interiores da Amazônia apresenta diferentes opções no uso de apetrechos, o que atribuem a essa atividade características diferenciais por ser realizada por multi-aparelhos que atuam sobre a captura de diferentes espécies de peixes, sendo, portanto multiespecífica (BARTHEM et al., 1997; DORIA et al., 2012; FREITAS; RIVAS, 2006).

As malhadeiras, também conhecidas como rede de espera, rede de emalhar, ou caçoeira eram confeccionadas com algodão ou fibra da palmeira do tucumã (fibras naturais). Posteriormente com o surgimento do náilon passaram a ser confeccionadas também com fibras sintéticas. São apetrechos geralmente constituídos de uma panagem retangular constituída por um conjunto de malhas de

dimensões variadas, estendida entre duas linhas denominadas: i) tralha superior: munida de flutuadores (principalmente isopor) e ii) tralha inferior com um lastro de chumbada, permitindo que as redes se mantenham verticalmente na água (LOPES, 2008). Foram observadas com pouca frequência em 1960 e mais frequentemente a partir da década de 70 (BATISTA et al., 2004; SMITH, 1979), possibilitando maior eficiência de captura do pescado permitindo maior poder de pesca e, conseqüentemente, maior pressão sobre os estoques.

O aumento da pressão sobre os estoques fez com que a atividade de pesca deixasse de ser um problema localizado para ser uma questão regional com fortes implicações sociais, econômicas, culturais, ecológicas e políticas. Assim os comunitários passaram a adotar, em diversos pontos da Amazônia brasileira, acordos comunitários que especificam as medidas a serem tomadas e as sanções a serem usadas contra infratores dentro da comunidade. Essas medidas são tomadas para o ordenamento da atividade de pesca nas comunidades visando à sustentação dos recursos, a mais frequente é a proibição do uso da malhadeira considerada a principal causa da pressão excessiva sobre os recursos aquáticos (BATISTA et al., 2004; MCGRATH et al., 1993).

Dada a grande importância das malhadeiras para as atividades de pesca desenvolvida por comunidades ribeirinhas no interior da Amazônia, esse trabalho objetivou fazer uma descrição do uso desse apetrecho e determinar o período em que o mesmo passou a ser utilizado na comunidade Boca do Arapirí, região do município de Alenquer, no Pará.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi desenvolvido junto aos comunitários da comunidade Boca do Arapirí, inserida no Projeto de assentamento agroextrativista – (PAE)⁷ Atumã, Alenquer/PA,

⁷ O projeto de assentamento agroextrativista é uma modalidade de assentamento estabelecida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) pela portaria N°268 de 23 de outubro de 1996, como medida a regularizar a situação de famílias que ocupavam territórios pertencentes à União, e inserir as formas diferenciadas de ocupação do solo e relacionamento com a natureza na política nacional de reforma agrária (SOUZA e COSTA, 2016).

localizado à margem esquerda do rio Amazonas (Figura 1).

Figura 1. Localização da comunidade Boca do Arapirí no assentamento Atumã.

Fonte: Laboratório de Geoinformação e Análise Ambiental (ICTA/UFOPA).

A principal técnica para coleta de dados utilizada na pesquisa foi a entrevista, com uso de formulário semiestruturado, para qual recebeu parecer favorável da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) (Parecer: 1.099.840). A técnica apresenta possibilidades e abertura para novos questionamentos se o pesquisador sentir tal necessidade (MINAYO, 2001). A metodologia “snowball” (BAILEY, 1982) também foi utilizada e consistiu na procura por pescadores que possuíssem experiência e conhecimento da atividade de pesca para realização de entrevista, ao final foi solicitado ao informante que indicasse um ou mais pescadores da comunidade que tivessem a pesca como uma das principais atividades e que fosse considerado experiente.

Os entrevistados foram questionados sobre o uso de malhadeiras, ambientes mais utilizados para a realização das atividades de pesca por períodos hidrológicos, como são escolhidos e espécies capturadas. Também os questionamos sobre possíveis mudanças ocorridas nos ambientes e nos estoques pesqueiros, percebidas ao longo dos anos.

Com o intuito de verificar as diferentes estratégias de capturas com o uso das malhadeiras, os pescadores considerados especialistas por seus pares foram convidados a realizar as pescarias com as malhadeiras que eles denominam de “brancas” e “tingidas” durante as quatro fases do ciclo hidrológico (enchente, cheia, vazante e seca). Os apetrechos utilizados (Figura 2A) tiveram os mesmos comprimentos e altura (Figura 2B) e foram confeccionados, segundo a orientação de cinco pescadores “especialistas” que se dispuseram a realizar a atividade de pesca.

As atividades de pesca foram realizadas pelos pescadores locais que fizeram a armação das redes e realizaram as despescas a cada duas horas, totalizando duas despescas por ambiente escolhido. Foram realizadas pescarias por dois dias durante cada fase do ciclo hidrológico. Os peixes capturados foram contabilizados, pesados e após identificação foram doados aos comunitários.

Figura 2. A: malhadeiras (tingida e branca) testadas na comunidade; B: modelo de malhadeiras com comprimento e altura.

As informações coletadas foram digitalizadas em um banco de dados relacionais na plataforma Access e em seguida foram analisadas através de estatística descritiva ordenando-os e classificando-os para torná-los de fácil entendimento (GONZÁLEZ et al., 2006).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram entrevistados 42 pescadores com idade média de 39,8 ($\pm 14,14$) anos, os quais já desenvolviam essa atividade há uns de 25 ($\pm 14,1$) anos. Associado ao tempo de pesca está a experiência do pescador na atividade, a qual garante maior domínio das artes de pesca e sua utilização para a captura das diferentes espécies, além da identificação dos principais pesqueiros.

A pesca é a principal atividade econômica desenvolvida na comunidade e os envolvidos pescam em média 3,6 ($\pm 1,02$) dias/semana na companhia de um parceiro. Smith (1979) já informava que alguns pescadores faziam a opção de passar vários dias em uma pescaria para economizar tempo e dinheiro nas viagens.

Os entrevistados realizam tanto a pesca artesanal de subsistência quanto a comercial e para isso empregam diversas tecnologias de pesca, das mais simples (arpão, flecha) a outras mais sofisticadas (malhadeira, tarrafa), adaptadas a determinada condição ambiental, com fins de exploração eficiente de determinado recurso (BARTHEM, 1999; BATISTA et al., 2004; QUEIROZ, 1999; SANTOS; SANTOS, 2005).

A malhadeira é o apetrecho mais utilizado pelos pescadores durante o ano inteiro, independente do período hidrológico, sendo que essa preferência é baseada na facilidade e rapidez para a captura do recurso. Corrêa et al. (2012) atribuíram a maior frequência de ocorrência a malhadeira em Coari, estado do Amazonas, por sua versatilidade e oportuna utilização o ano inteiro. Freitas e Rivas (2006) atribuem o domínio desse apetrecho na região ocidental da Amazônia pela facilidade de uso por uma única pessoa, e pelo fato de poder se desenvolver outras atividades enquanto ela permanece armada.

Cada pescador tem pelo menos uma malhadeira, fabricada artesanalmente ou entalhada a partir da compra do pano pra malhadeira. Os pescadores comumente utilizam uma malhadeira amarrada à outra (formando baterias de malhadeiras). Na região em estudo foi observado o uso de mais de uma bateria por pescador durante as pescarias, assim como verificado e descrito para as pescarias artesanais em diferentes pontos da Amazônia (BATISTA et al., 2004; CORRÊA et al., 2012; LIMA, 2010).

O ambiente mais explorado com uso de malhadeira é o lago, com destaque em mais de 50% dos casos, seguidos de igarapés (17%), paranás (17%) e o próprio Rio Amazonas (15%). Um dos fatores que contribuem para isso é a produtividade neste ambiente, outro é a facilidade de acesso ao local para realização da comercialização da produção. Os lagos são ambientes de grande importância nas áreas alagáveis e essenciais para a sustentabilidade dos recursos pesqueiros na Amazônia. Isso é confirmado pelos diversos trabalhos realizados na região

e que demonstram que os sistemas de lagos são os mais utilizados para a pesca na região e são de extrema importância na questão do manejo pesqueiro (ALCÂNTARA et al. 2015; SILVA; BRAGA, 2016; LIMA et al., 2016)

Os pescadores usam malhadeiras de nylon sintético (Figura 3A) e algodão (Figura 3B), possuindo em maiores quantidades as de

algodão com fios e malhas diversas. Os comprimentos variam entre 15 e 300 metros, e altura de 11 a 50 malhas (11 malhas de 55mm entre os nós = 1,21 metros). Essas características observadas estão entre as descritas por Falabela (1994) e Petrere Jr. (1978B), cujas dimensões descritas foram de 13 a mais de 51 metros para o comprimento e a altura podendo atingir 5 metros.

Figura 3. Frequência de uso de fios e malhas das redes de emalhar na comunidade. 3A: nylon sintético, 3B: algodão.

As redes de Nylon (ou miqueira) mais citadas foram a “maparazeira” e a “aracuzeira”. A primeira é feita com fio 0,35 e malha 40 mm entre nós (0,35/40mm), e é específica para a captura do mapará, *Hypophthalmus* spp.. Essa é uma das redes consideradas mais importantes para a atividade comercial, pelo fato de os pescadores da comunidade reunirem-se no lago entre março e agosto para juntos realizarem a captura dessa espécie.

A segunda “miqueira” mais utilizada, a aracuzeira (0,35/35mm), está associada a pesca dos aracus, *Schizodon* spp. e *Leporinus* spp., que se dá entre agosto e setembro (“arribação⁸”) no paraná. Comportamento equivalente foi verificado por

Braga e Rebelo (2017) no baixo rio Juruá, sudoeste do estado do Amazonas, os quais se referem a esse período (vazante, em que os peixes migram: da floresta para o lago e do lago para o rio) como de fartura, chamado pelos pescadores de “migração do peixe gordo”.

Para as redes de algodão observou-se maior diversidade de fios e malhas. Essa característica ocorre pela seletividade das malhas, onde o pescador faz a opção por espécies com maiores valores comerciais. Os destaques são dados as malhadeiras com fio 0.09, 0.08 e 0.12 (respectivamente) e malha 55 mm entre nós (11 cm nó a nó) cuja captura concentra-se principalmente sobre: curimatá (*Prochilodus nigricans* Agassiz, 1829), bocó (jovem de *Colossoma macropomum* Cuvier, 1818), tucunaré (*Cichla* spp), pescada

⁸ A arribação ocorre quando os peixes estão saindo do lago para se reproduzir (citação verbal).

(*Plagioscion* sp.), carau-açu (*Astronotus crassipinnis* Heckel, 1840).

Durante as pescarias experimentais foram capturadas e identificadas 19 etnoespécies

(Tabela 1). O maior número de indivíduos capturados foi observado no período de seca com 36 indivíduos, seguida de 18 no período de cheia.

Tabela 1. Ocorrência das etnoespécies capturadas no período de coleta.

Etnoespécie (Nome científico)	Enchente	Cheia	Vazante	Seca
Acari (Loricariidae)				
Acari pedra (Loricariidae)				
Apapá ou sarda (<i>Pellona</i> sp.)				
Arraia (<i>Potamotrygon</i> sp.)				
Bacu (Doradidae)				
Baiano (<i>Osteoglossum bicirrhosum</i> Cuvier, 1829)				
Bocó ou tambaqui (<i>Colossoma macropomum</i> Cuvier, 1818)				
Cara de gato (<i>Platynemichthys notatus</i> Jardine, 1841)				
Cujuba (<i>Oxydoras niger</i> Valenciennes, 1821)				
Curimata (<i>Prochilodus nigricans</i> Agassiz, 1829)				
Pescada (<i>Plagioscion</i> sp.)				
Piracatinga (<i>Calophysus macropterus</i> Lichtenstein, 1819)				
Piranha (Serrasalminidae)				
Pirarara (<i>Phractocephalus hemioliopterus</i> Bloch & Schneider, 1801)				
Puraquê (<i>Electrophorus electricus</i> Linnaeus, 1766)				
Sacarolha/ mapará (Ageneiosidae)				
Saranha (Cynodonotidae)				
Surubim (<i>Pseudoplatystoma punctifer</i> Castelnau, 1855)				
Tucunaré (<i>Cichla</i> sp.)				

A maior diversidade foi vista no período de cheia, onde foi capturado 9 espécies diferentes, associando essas evidências a complexidade de habitats, e aos níveis de inundação sazonal. Observações correlatas foram vistas por Freitas e Rivas (2006) na Amazônia Ocidental, Anjos et al. (2005) no lago Jacaré, e Chaves (2006) no lago pagão da reserva de desenvolvimento sustentável Mamirauá.

A maior biomassa (~22 kg) foi capturada no período da seca, quando a extensão do lago diminui, concentrando os indivíduos em uma área menor. Esse comportamento ambiental é descrito por Crampton (1999) e por Santos e Santos (2005), ao afirmarem que os peixes

que vivem na floresta alagada durante a cheia ficam confinados em um habitat especializado no período de seca, por causa do menor volume de água. A produção em biomassa por tipo de malhadeira é detalhada no gráfico (Figura 4) onde é possível observar um pequeno destaque das redes brancas no período de enchente e cheia, em que o nível de água no lago é maior (2,60m e 3,40m respectivamente), e com maior transparência (84,5cm e 61cm). No entanto, as maiores capturas foram obtidas com as redes tingidas no período de vazante e seca, quando a área do lago disponível aos peixes diminui e tornando-se mais raso (1,54 cm e 0,20 cm) com menor transparência (0,37 cm e 0,06 cm).

Figura 4. Biomassa (g) capturada por tipo de malhadeira nas fases do ciclo hidrológico.

Questionados sobre a relação entre a cor das malhadeiras e sua influência na produção capturada os pescadores, em sua maioria, relacionam o fato dos peixes enxerga-las ou não, afirmam que “*enxergando a malhadeira*” os peixes desviam dela e a captura é menor.

“Tem tempo (Verão) que fica bom de pegar peixe com elas, parece que os peixes enxergam as brancas” (Pescador 40 anos, 2015).

“Tem período (maio e abril) que a água fica mais preta, aí a malhadeira tem que acompanhar a cor a água” (Pescador 44 anos, 2015).

“Porque depende da água para o peixe não conhecer a malhadeira, se a água estiver morena e a malhadeira branca o peixe estranha” (Pescador 53 anos, 2015).

Sobre há quanto tempo os entrevistados já faziam uso da malhadeira, 41 dos 42 pescadores disseram que sempre usaram a malhadeira e quando questionados sobre o surgimento das redes na comunidade 85% afirmaram não saber, alegando que sempre existiu.

“Quando me entendi como gente ela já existia” (Pescador 46 anos, 2015).

“Quando eu pescava com papai já tinha malhadeira” (Pescador 39 anos, 2015).

Smith (1979) afirma que os índios carajás usavam redes no rio Araguaia, fabricadas a partir de fibras de *Cecropia* sp., fortes o bastante para não ser rompida por grandes peixes, outras eram feitas de algodão ou de fibras da palmeira do tucumã (*Astrocarym* sp.). Diferente do que ocorre atualmente, as redes apenas impediam que os recursos

pesqueiros escapassem, ficando retidos em determinada área e sendo retirados manualmente. Em um relato mais antigo, Veríssimo (1895) menciona que as redes eram tecidas de cordas da entrecasca da castanha jurera, e outras espécies de fibras, e tinham malhas com um palmo de largura.

O pescador que nem sempre usou malhadeira, afirma:

“Ela nem existia, quando ela apareceu eu tinha uns 12 anos, antes eu pescava com tarrafa e caniço. Quem primeiro apareceu com esse tipo de malhadeira foi a família da Raimundada (Sr. Raimundo), e de lá... pronto! Exalou aqui no Arapirí. Agora eu não sei onde foi que ele viu” (Pescador 77 anos, 2015).

Baseado na idade desse pescador pode-se afirmar que as redes surgiram na comunidade há aproximadamente 65 anos, na década de 50. Smith (1979) em sua publicação caracteriza o uso em larga escala desse apetrecho no ano de 1955, e há evidências de uso no Pará em meados do século XX. Seu uso foi pouco difundido até a introdução de fibras sintéticas, que resistem por mais tempo.

“No tempo que começaram a usar malhadeira foi depois dessas épocas de 1958, por aí assim. A primeira que apareceu era 0.48 a linha, depois foi 0.46” (Pescador 80 anos, 2015).

As informações fornecidas pelos entrevistados estão de acordo com as afirmações de McGrath et al. (1993) ressaltando que a principal inovação tecnológica da pesca se deu a partir da introdução das fibras de monofilamento e o

crescente uso das redes de emalhar a partir de 1950, com popularização na década de 60 quando o nylon tornou-se mais acessível (BATISTA; ISAAC; VIANA, 2004). Em 1970 o uso se intensificou na prática comercial, permitindo que a malhadeira se tornasse o apetrecho de pesca mais importante (PETRERE JR., 1978B).

A redução no tamanho dos peixes e na quantidade capturada são as repostas frequentes aos questionamentos sobre as principais mudanças observadas a partir introdução das malhadeiras.

“Mais era arpão e tarrafa que a gente usava, e com o passar do tempo apareceu a malhadeira. Com a quantidade de malhadeira foi diminuindo também a quantidade de peixe, a gente pegava muito peixe com pouca malhadeira e hoje a gente pesca com muita malhadeira e pega menos peixes” (Pescador 46 anos, 2015).

“Nossa pescaria aqui do lago era tarrafa, espinhel e rapazinho, e era só peixe graúdo⁹ que a gente matava, era tambaqui, surubim e pirarucu” (Pescador 44 anos, 2015).

“A gente via muito peixe, a malhadeira enchia de tambaqui, curimatá, era rápido que pegava. A gente via pirarucu boiar pra todo lago, agora a gente não vê” (Pescador 46 anos, 2015).

“Só não está extinto porque Deus coloca de volta” (Pescador 52 anos, 2015).

Os pescadores mais antigos comentaram a diminuição de grandes quantidades de peixes, principalmente surubim, tambaquis e pirarucus, pois atualmente são raramente encontrados. Eles associam essa afirmativa com as capturas que passaram a ser efetuadas com as malhadeiras. Isso demonstra que as malhadeiras se tornaram um apetrecho de grande importância para região causando grandes mudanças nesses estoques, os quais já vêm demonstrando sinais de sobreexploração há mais de 25 anos nos ambientes naturais, resultando na alteração do tamanho médio dos peixes desembarcados nos principais portos da região (ISAAC; SILVA; RUFFINO, 2004; MERONA; BITTENCOURT, 1988; SANTOS; SANTOS, 2005; SOUSA et al., 2012).

Como medida, os pescadores em acordo com a comunidade limitaram o uso de malhadeiras por pescador no lago. O acordo estabelecido em ata comunitária foi normalizado em portaria (45 de 28 de outubro de 2009) pelo Plano de utilização do assentamento. A regra determina a proibição do uso de malhadeiras de 15 de novembro a 1 de janeiro, permitido apenas o uso de redes “maparazeira” limitadas a 150 metros somadas por embarcação, além de outras medidas como a proibição do uso de rabetas e bajaranas. O cumprimento das regras é um grande desafio e tem sido levantada como um fator prejudicial à sustentabilidade da pesca no lago.

4. CONCLUSÕES

A pesca é a principal atividade realizada na comunidade seja para fins de subsistência ou para fins comerciais onde são empregados diferentes apetrechos destacando as malhadeiras utilizadas o ano inteiro. Cada pescador tem pelo menos uma malhadeira fabricada a partir de nylon sintético, sendo as mais citadas de fio 0.35 e malhas de 35 e 40 mm (entre nós) atuando sobre a captura de aracu (*Schizodon* sp.) e mapará (*Hypophthalmus* spp.), respectivamente, e redes de algodão com diferentes fios e malhas, as mais citadas foram as de fio 0.08, 0.09 e 0.12 e malha 55mm (entre nós). São utilizadas uma amarrada a outra estendida em diferentes ambientes do lago, igarapés, paranás e Rio Amazonas, sendo o lago o ambiente mais explorado com uso de malhadeiras. As malhadeiras tingidas demonstraram ter mais sucessos de captura quando as águas estão baixas e as quantidades de sedimentos no ambiente estão mais elevadas. No entanto, recomenda-se que novos estudos sejam realizados, levando em consideração um período maior de atividades pesqueiras experimentais e a realização dessas atividades em outros tipos de ambientes formados por rios de água clara e preta, onde a malhadeira também é utilizada e tingida, para uma melhor compreensão a respeito dessa prática. As malhadeiras passaram a ser utilizada na comunidade a partir de 1950 e se intensificou na década de 80, levando a intensas modificações na atividade acarretando a diminuição no tamanho e quantidade capturada, intensificando a pressão sobre os principais estoques comercializados pelos pescadores da comunidade.

⁹ Bem desenvolvido, crescido.

REFERÊNCIAS

- [1] Almeida, O.; Lorenzen, K.; Mcgrath, D., Amaral, L.; Rivero, S. Importância Econômica do Setor Pesqueiro na Calha do Rio Amazonas-Solimões. Paper do NAEA 275, Novembro de 2010. ISSN 15169111. 2010.
- [2] Alcantara, N. C.; Gonçalves, G.S.; Braga, T. M. P.; Santos, S. M.; Araújo, R. L.; Pantoja-Lima, J.; Aride, P.H.R.; Oliveira, A.T. Avaliação do desembarque pesqueiro (2009-2010) no município de Juruá, Amazonas, Brasil. *Biota Amazônia*. v.5, n.1, p.37-42, 2015.
- [3] Bailey, K. D. *Methods of social research*. New York: 2 ed. McMillan Publishers.1982.
- [4] Barthem, R.B.; Petrere Jr. M.; Isaac, V.J.; Ribeiro, M.C.L.B.; Mcgrath, D.; Vieira, I.; Valderrama, M. A pesca na Amazônia: problemas e perspectivas para o seu manejo. In: Valladares-Padua, C.; Bodmer, R. & Cullen JR., L. *Manejo e Conservação da Vida Silvestre no Brasil*. Rio de Janeiro, p. 173-184. 1997.
- [5] Barthem, R. A pesca comercial no Médio Solimões sua interação com a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. In: QUEIROZ, H. L; Crampton, W. G. R. (eds.), *Estratégias para Manejo de recursos pesqueiros em Mamirauá*. Brasília, Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá/IDS/OS/MCTI, p. 72-107. 1999.
- [6] Barthem, R.B.; Fabré, N.N. *Biologia e diversidade dos recursos pesqueiros da Amazônia*. In: Ruffino, M.L. (Org.) *A pesca e os recursos pesqueiros na Amazônia*. IBAMA, Manaus, Amazonas, 2004. p. 17-62.
- [7] Batista, v. s.; Isaac, v. j.; Viana, j. p. Exploração e manejo dos recursos pesqueiros da Amazônia. In: Ruffino, M.L. (ed.), *A pesca e os recursos pesqueiros na Amazônia*. Manaus, Ibama, p. 63-151. 2004.
- [8] Braga, T. M. P, Rebêlo, G. H. Traditional Knowledge of the Fishermen of the Lower Juruá River: Understanding the Reproductive Patterns of the Region's Fish Species. *Desenvolvimento e meio ambiente*, v.40, p. 385-397, 2017.
- [9] Corrêa, A.A; Kahn, J.R; Freitas, C. E.C. A pesca no município de Coarí, estado do Amazonas, Brasil. *Revista Brasileira de Engenharia de Pesca*, v.6, n.2, p. 1-7, 2012.
- [10] Doria, C. R. C.; Ruffino, M. L.; Hijazi, N. C.; Cruz, R. L. A pesca comercial na bacia do rio Madeira no estado de Rondônia, Amazônia brasileira. *Acta Amazônica*, v. 42, n. 1, p. 29-40, 2012.
- [11] Fabré, N. N.; Alonso, J. C. Recursos icticos no alto Amazonas: sua importância para as populações ribeirinhas. *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, Série Zoologia*, Belém, v.14, n.1, p.19-55, 1998.
- [12] Falabela, P. G.R. *A pesca no Amazonas: Problemas e soluções*. 2. Ed. Imprensa oficial, Manaus, Amazonas. 180 pp.
- [13] Freitas, C.E. C.; Rivas, A. A. F. A pesca e os recursos pesqueiros na Amazônia Ocidental. *Ciência e cultura*, São Paulo, v. 58, n. 3, p. 30-32, 2006.
- [14] Furtado, L. G. Características gerais e problemas da pesca amazônica no Pará. *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi: Série Antropologia*, Belém, v. 6, n. 1, p. 41-93, Jun. 1990.
- [15] González, C. G. et al. *Tratamiento de datos*. Universidad de Vigo. Edicione Díaz de Santos. 2006.
- [16] Isaac, V. J.; Silva, C. O.; Ruffino, M. L. A pesca no Baixo Amazonas. In: Ruffino, Mauro Luís. (Org.) *A pesca e os recursos pesqueiros na Amazônia*. Manaus: IBAMA, PróVarzea, p.184-211. 2004.
- [17] Isaac, V. J.; Almeida, M. El consumo de pescado en la amazonia brasileña. *Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación*. 2011.
- [18] Lima, M. A. L. *Pesca em duas comunidades ribeirinhas na região do médio rio Madeira, Porto Velho – RO*. 2010. 86f. Dissertação (Mestrado em Ciências Pesqueiras nos Trópicos). Universidade Federal do Amazonas- Programa de pós-graduação em Ciências pesqueiras nos trópicos, Manaus, 2010.
- [19] Lopes, L. O. C. *Várzea e varzeiros da Amazônia*. 1. Ed. Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi, 2008.
- [20] Mcgrath, D. G.; Castro, F.; Futemma, C.; Amaral, B. D.; Calabria, J. Fisheries and the Evolution of Resource Management on the Lower Amazon Floodplain. *Human Ecology*, v.21, n.2, p.167-195, jun. 1993.
- [21] Merona, B.; Bittencourt, M. M. A Pesca na Amazônia Através dos Desembarques no Mercado de Manaus: Resultados Preliminares. *Memorias de la Sociedad de Ciencias Naturales la Salle*, v.48, n. suplemento, p.433-453, 1988.
- [22] Minayo, M. C. S. *Pesquisa social: teoria, método e criatividade*. 18 ed., Petrópolis, Vozes. 2011.
- [23] Pereira, H.S.; Souza, D.S.R.; Ramos, M.M. A diversidade da pesca nas comunidades da área focal do projeto Piatam, In: FRA, T.J.P.; PEREIRA, H.S.; NITKASKI, A.C. *Comunidades Ribeirinhas amazônicas: modos de vida e uso dos recursos naturais*. EDUA, Manaus, 2007. p. 171-195.
- [24] Petrere Jr., M. Pesca e esforço de pesca no estado do Amazonas: I Esforço e captura por unidade de esforço. *Acta Amazônica*, v.8, n.3, p.439-454, 1978.

- [25] Queiroz, H. L. A pesca, as pescarias e os pescadores de Mamirauá. In: QUEIROZ, H. L.; Crampton, W. G. R. (eds.), *Estratégias para Manejo de recursos pesqueiros em Mamirauá*. Brasília, Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá/ IDS/OS/MCTI, p. 37-71. 1999.
- [26] Santos, G. M.; Santos, A. C. M. Sustentabilidade da Pesca na Amazônia. *Estudos Avançados*. v.19, n.54, p.165-182, 2005.
- [27] Silva, J. T.; Braga, T. M. P. Caracterização da Pesca na comunidade de Surucua (Resex Tapajós Arapiuns). *Biota Amazônica*. v.6, n.3, p.55-62, 2016.
- [28] Smith, N.J.H. A pesca no rio Amazonas. 1 ed., Manaus, Amazonas. 1979.
- [29] Sousa, C. F. M.; Costa, F. M.F. S. Planos de utilização em projetos de assentamento agroextrativistas: autoritarismo e participação. In: Reunião Brasileira de Antropologia, 30, João Pessoa, 2016. Disponível em: <http://www.30rba.abant.org.br/arquivo/downloadpublic?q=YToyOntzOjY6InBhcmFtcyl7czozNToiYT0xOntzOjEwOiJJRF9BUIFVSZVZPljtzOjQ6IjM0MjQiO30iO3M6MT0iaCI7czozMjoiMjA0ZDNINWQ1Yjg4OGUyOTQ1Nzg0NzI0N2FjYTAzNDMiO30%3D>. Acesso em: 02/10/2017.
- [30] Souza, A. S.; Camargo, S. A. F.; Camargo, T. R. L. A pesca na Amazônia brasileira. In: Camargo, S. A. F.; Camargo, T. R. L. (eds.), *Direito, política e manejo pesqueiro na Bacia Amazônica*. São Carlos, RiMa, p. 1-18. 2012.
- [31] Veríssimo, J. A pesca na Amazônia. 1 ed., Rio de Janeiro, Clássica de Alves & C. 1895.

Capítulo 10

ÁREAS DEGRADADAS: UTILIZAÇÃO DE PNEUS PARA CONTEÇÃO DE VOÇOROCA E ASSOREAMENTO EM CÓRREGO NA CATÓLICA DO TOCANTINS

Sharles Gabriel de Souza Borges

Letícia Santos Silva

Ana Karolline Soares Alves

Larissa Lorrana Silva

Chryss Ferreira Macêdo

Allan Guilherme Rodrigues de Souza

Resumo: Visando a atualidade do País e procurando estabelecer uma destinação correta aos resíduos produzidos diariamente em todos os estados, está cada vez mais evidente a execução de trabalhos acadêmicos e/ou empreendimentos que utilizem materiais recicláveis como meio de promover a recuperação de áreas degradadas devido ao baixo custo e a pouca mão de obra necessária para realizar as atividades. O trabalho aqui descrito objetivou consorciar a destinação correta de pneus com a necessidade do controle de voçoroca em talude/barranco/margem, além de desassoreamento no “Curso d’água CAMPUS II” da Católica do Tocantins (Campus de Ciências Agrárias e Ambientais), a metodologia baseou-se em conceitos de bioengenharia de solos e conservação de recursos naturais de forma não onerosa, dividindo a atividade em duas etapas, a primeira de intervenção direta nos problemas e outra em criação de área de lazer para os acadêmicos. Concluiu-se que a voçoroca foi controlada observando o preenchimento total de seu espaço com pneus e solo, e que após a conclusão da primeira etapa do trabalho as primeiras chuvas não deram continuidade ao carregamento excessivo de sedimentos ocasionando novo assoreamento ao córrego.

Palavras-chave: Cursos d’água; Erosão; Materiais inertes; Solo.

1. INTRODUÇÃO

No contexto nacional e internacional, a produção de resíduos e lixo afim é exorbitante, no entanto, muitas vezes, este material é despejado em locais inadequados, ou o destino que lhe dão é precário. Existem inúmeros métodos de reaproveitamento e reciclagem de materiais advindos das atividades diárias dos seres humanos, como construção de hortas de garrafas PET's, suportes de carretéis de madeira advindos das companhias elétricas, mesas e cadeiras de pneus entre outros inúmeros resíduos que para muitos não têm utilidade nenhuma, mas para outros é de grande valia. No artigo aqui descrito, os materiais usados majoritariamente para realizar a atividade de contenção de voçoroca foram pneus velhos, coletados nas borracharias da Capital, Palmas/TO.

Para ter noção de elaboração, viabilidade e construção, os acadêmicos basearam-se no conceito de Bioengenharia, consistindo na utilização de materiais provenientes de plantas vivas e mortas, materiais inertes artificiais e técnicas flexíveis de engenharia para mitigar problemas ambientais, tais como encostas erodidas e desestabilizadas, margens de rios, sistemas de trilhas etc. (Araujo 2008). Como percebe-se ao decorrer do projeto não se apegou unicamente e piamente a este conceito, pois usou-se muito pouco de plantas na primeira etapa do trabalho.

As técnicas de Bioengenharia dependem do conhecimento biológico para construir estruturas geotécnicas e hidráulicas para fortalecer encostas e margens de rios instáveis. Plantas inteiras ou suas partes são utilizadas como materiais de construção para reforçar locais instáveis, em combinação com materiais de construção tradicionais. Dessa forma, a engenharia biotécnica não substitui a engenharia hidráulica ou geotécnica tradicional (como, por exemplo, geotêxteis ou blocos de concreto), mas complementa e melhora os outros métodos de engenharia. (Araujo 2008).

Seja naturalmente, ou pela mão do homem, os rios estão sujeitos a desequilíbrios que podem ser mitigados ou evitados por meio de obras adequadas (Brandão 2001), essa mitigação pode ser feita com a colocação de uma carga de pedras, ou enroscamentos e até mesmo arrimo de pneus, o que foi usado neste trabalho, para que possa reter a massa do

terreno, porém permita a drenagem e percolação da água. Este é um dos métodos utilizados para controle dos desmoronamentos.

Sulcos, ravinas e voçorocas são formações de grandes buracos de erosão causados pela chuva e intempéries, em solo onde a vegetação é escassa e não mais o protege, que fica cascalhento e suscetível de carregamento por enxurradas (Gomes *et al.* 2010), assim sendo, quando se retira a mata ciliar de um rio, córrego, ou qualquer corpo hídrico, tende-se o mesmo a ser assoreado e degradado conforme o passar do tempo.

O objetivo deste trabalho, em primeira parte, foi recuperar a área erodida à margem do curso d'água intermitente da Católica do Tocantins, além de desassorear o trecho do mesmo, baseado em conceitos e técnicas de bioengenharia de solos, que protege o talude do rio, proporcionando futuramente o crescimento de vegetação, retomando o mais próximo possível do natural. Verificou-se após a conclusão desta primeira etapa que a voçoroca sessou, a lixiviação diminuiu, faltando atualmente a segunda etapa que consiste em plantar grama, arborizar e transformar em uma área de lazer e convivência para os acadêmicos em geral.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi realizado no Campus de Ciências Agrárias e Ambientais da Católica do Tocantins localizada em Palmas – TO, na microbacia do Taquarussu-Grande, no córrego CAMPUS II (assim apelidado pelos acadêmicos por nascer e correr dentro do Campus II). A imagem abaixo ludifica e exemplifica a área em que se trabalhou o projeto:

Para a construção da barreira de contenção foram utilizados os seguintes equipamentos: 2 (duas) cavadeiras, 4 (quatro) picaretas, 2 (dois) carrinhos de mão, 2 (duas) alavancas e 4 (quatro) marretas e como matérias prima foram utilizadas pneus e solo retirado do talvegue e arredores.

A princípio dos estudos verificou-se que as maiores causas da voçoroca foram o desnível, do terreno nas margens do córrego, apresentando declividade de 3,65%, além da pouca vegetação ciliar e o tipo de solo do barranco.

Figura 4 Área da Católica do Tocantins onde se realizou o trabalho.

Fonte: Google Earth Pro 2016.

A área total trabalhada é de 160 m², destes cerca de 10 m² foi reestruturada/recuperada por meio da intervenção dos estudantes, caracterizada como área degradada, o restante foi trabalhada com o nivelamento, e futuramente o plantio de mudas nativas do Cerrado e grama, transformando o cenário, fazendo-o de área de lazer.

No período chuvoso o escoamento superficial da região chegava ao córrego com muita pressão, devido a inclinação do terreno. Então, a ausência de vegetação facilitava a lixiviação do solo e o carreamento de sedimentos para o curso d'água e ocasionava o início de ravinas nas margens e entorno. Como este solo é arenoso, acelerava ainda mais os processos erosivos proporcionando assim a voçoroca.

O trabalho foi dividido em duas etapas, a primeira era a intervenção imediata, nivelando e realizando o arrimo de pneus, a segunda será o plantio de mudas e grama, prevista para o segundo semestre de 2016.

Por meio dos problemas formularam-se as possíveis soluções, que aplicadas provaram-se eficientes. Na primeira parte:

1. Primeiramente o entorno da área foi limpo para o início da construção da barreira de contenção;
2. Um *corte* tornou-se necessário nas dimensões da encosta do córrego, para encaixar os pneus mais facilmente. Aproximadamente 1m de altura por 0,8m de profundidade e 3 metros de comprimento na margem, cavadeiras e picaretas foram de grande utilidade.
3. Os pneus foram colocados em fileiras e enchidos com solo retirado do talvegue, pois o córrego encontrava-se assoreado e,

assim, reaproveitou-se todo o sedimento em excesso que ali havia, além de estar seco, pois o curso d'água é intermitente (cessa no período de estiagem). Sabe-se que estava assoreado devido mesmo no período de cheia a água correr com dificuldade, o que antes não acontecia. Além de notar, também, quando chovia, a quantidade de sedimentos que eram carreados para dentro do córrego advindos dos arredores e da própria voçoroca, localizada no talude (barranco) do corpo d'água;

4. Colocou-se os pneus em fileiras, foram utilizados em cada pneu três carrinhos de mão com solo, despejando proporcionalmente a medida que se sovava.
5. Para sovar tal solo utilizaram-se as marretas, moldando para que ficasse uniforme dentro do pneu.
6. A barreira de contenção foi estabilizada utilizando estacas de madeira entre a armação dos pneus.

Todo o serviço foi realizado pelos acadêmicos, manualmente. Apenas o transporte dos pneus velhos à Faculdade é que se deu por veículo automotor.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como resultado na 'parte um' do trabalho obteve-se a construção da barreira de contenção, utilizando pneus descartados no ambiente, a qual permite a retenção de partículas de solo devido seu carregamento pela água da chuva e consequente redução do assoreamento do curso d'água da Católica do Tocantins. Entretanto, com o nivelamento, a quantidade de materiais lixiviados também diminuiu, ou seja, a associação do arrimo de

pneus com o nivelamento gerou resultados mais que positivos. Além disso, a área de lazer será suporte para implantação de espécies de plantas herbáceas e arbustivas nativas da região, utilizadas para aperfeiçoamento da barreira e estética. Não se constatou o contínuo fluxo de carreamento de sedimentos os quais ocorria antes,

verificando assim o sucesso da atividade. Uma das dificuldades encontradas ao decorrer da atividade foi encontrar parceria para doação de grama, conseguindo fechar o apoio apenas no final do semestre 2016/1, com a FMMA- Fundação Municipal de Meio Ambiente.

Figura 5. Limpeza e demarcação da área.

Figura 6. Parte da equipe de trabalho.

Figura 4. Construção da área de lazer

Atualmente o trabalho concluído é utilizado como área de recreação e lazer para os acadêmicos. Após a Bioengenharia, houve o plantio de grama e arborização, e a construção da área de lazer com bancos feitos de troncos velhos encontrados nas

imediações da faculdade. A segunda etapa findou-se em 2016/2 devido ao atraso da doação de grama e substrato, advindos de parceria com a FMMA-Fundação Municipal de Meio Ambiente, que cedeu a liberação apenas para o início de Agosto de 2016.

Figura 5. Erguimento da barreira de pneus.

Figura 6. Enchimento e sova do solo na barreira.

Figura 7. Equipe na área pronta

Figura 8. Área de lazer durante a noite

4. CONCLUSÃO

Percebeu-se que o uso de pneus em técnicas similares as de bioengenharia, como a barreira de contenção, é uma forma viável e econômica para retenção de solo e para evitar assoreamento de cursos d'água e controle de voçoroca. Entretanto, apenas construir essa barreira não é totalmente efetivo, necessitou ainda a conclusão da segunda etapa, para alcançar totalmente os objetivos propostos. Contudo, a primeira etapa concluída é de grande valia, sendo a parte principal, pois conteve de imediato a voçoroca e a lixiviação.

AGRADECIMENTOS

Agradecer aos professores que deram suporte ao trabalho com as revisões e

REFERÊNCIAS

- [1] Andrade, C.A; Cappi, Dm.; Ometto, J.P.H.; Cerri, C.C. Potencialidade do uso de ¹³ C como traçador natural em experimentos de degradação de bio sólidos (compact disc).
- [2] Araujo, G. H. S. Gestão Ambiental de Áreas Degradadas. 3.ed. Bertand Brasil, 167 p.
- [3] Brandão, J. L. B. 2001. Obras de regularização do leito. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo.

indicação de bibliografia. Agradecer também as borracharias que cederam os pneus velhos para que o trabalho fosse concluído. Principalmente agradecer aos colaboradores (acadêmicos) que não desistiram da ideia de recuperar o córrego da Católica, continuaram firmes e presentes até o atual momento. Indispensável a parceria com FMMA-Fundação Municipal de Meio Ambiente que forneceu a grama e o substrato para construção de área de lazer e convivência para os acadêmicos que todos os dias desfrutam do clima agradável do Campus II, agora, a partir do segundo semestre de 2016 terão mais conforto para conversar e debater ideias, ler um livro dentre outras atividades.

- [4] Conselho Nacional Do Meio Ambiente. Estabelecem diretrizes, critérios e procedimentos para gestão dos resíduos da construção civil, disciplinando as ações necessárias de forma a minimizar os impactos ambientais. Resolução nº 307, de 05 de Julho de 2002.
- [5] Gomes, M.A.F; Filizola, H.F; Boulet, R. Ageitec - Agência Embrapa de Informação Tecnológica - Formação de Voçorocas. Disponível em http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/agricultura_e_meio_ambiente/arvore/CONTAG01_58_21_0200792814.html > Acesso em novembro/2015.

Capítulo 11

ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA DA NASCENTE DO CÓRREGO DA CATÓLICA DO TOCANTINS

Letícia Santos Silva

Shalles Gabriel de Sousa Borges

Daíse Araújo Soares de Souza

Allan Guilherme Rodrigues de Souza

Chryss Ferreira Macêdo

Resumo: O cuidado com os recursos hídricos é de grande relevância por diversos fatores, uma vez que, os recursos hídricos possuem não somente importância de cunho ambiental, como também sua importância econômica, política e social. Este presente estudo tem o intuito de averiguar a qualidade da água da nascente do córrego que percorre a Católica do Tocantins, que sofre com interferências antrópicas, analisando pH, condutividade, cor verdadeira, turbidez, fósforo total, nitrogênio total, alcalinidade, dureza total, ferro e Demanda Biológica de Oxigênio (DBO). Como referência de qualidade de água será utilizada a Resolução N° 357/05 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) que estabelece os níveis em que devem se enquadrar cada parâmetro de qualidade de água. Percebeu-se ao analisar tais variáveis que a água precisa de tratamento caso venha a suprir alguma atividade de captação, corrigindo principalmente a turbidez, que apresentou valor bem acima do permitido na legislação. O trabalho foi realizado no Campus de Ciências Agrárias e Ambientais da Católica do Tocantins (Campus II), coletando água em pontos do córrego e analisando as amostras no Laboratório de Análises Químicas da própria Faculdade e do Laboratório de Análises da Odebrecht Ambiental – Saneatins, companhia de abastecimento do Estado do Tocantins

Palavras-chave: Mata ciliar, Parâmetros da água, CONAMA.

1. INTRODUÇÃO

Apesar de todos os esforços para armazenar e diminuir o seu consumo, a água está se tornando, cada vez mais, um bem escasso, e sua qualidade se deteriora cada vez mais rápido. Todos os dias, centenas de litros de esgoto são despejados em rios e lagos, construções são realizadas no entorno de nascentes que brotam nos grandes centros, lixo é jogado clandestinamente pela própria população sem o mínimo de consciência para os riscos que estas estão proporcionando a si mesmas.

A água subterrânea, por exemplo, além de ser um bem econômico, é considerada mundialmente uma fonte imprescindível de abastecimento para consumo humano, para as populações que não têm acesso à rede pública de abastecimento ou para aqueles que, tendo acesso a uma rede de abastecimento, têm o fornecimento com frequência irregular.

As nascentes perdem as capacidades quantitativa e qualitativa da água, quando é alterada, por ações antrópicas, em ambientes de contribuição natural de infiltração em seu entorno e na área de recarga do lençol freático, comprometendo seu reabastecimento e sua produção de água (Rodrigues, 2006). A degradação das matas ciliares e sua substituição por atividades agropecuárias e expansão urbana vêm causando alterações na qualidade das águas e afetando o abastecimento público (Davide *et al.*, 2002), necessitando de ajustes no planejamento e na gestão dos recursos hídricos.

Para uma gestão adequada dos recursos hídricos, o primeiro passo é o monitoramento da qualidade da água, a fim de caracterizar aspectos físico-químicos que permitem diagnosticar as mudanças ocasionadas por ações antrópicas ou naturais, no uso e na ocupação da terra (Queiroz *et al.*, 2010). A resolução CONAMA 357/05 dá um devido respaldo para análise superficial da água, pois dentro dessa resolução indica parâmetros físicos e químicos a serem analisados, para um resultado de qualidade.

Diante disso, esse trabalho teve como objetivo analisar a qualidade da água da nascente do Córrego que percorre por entre o *Campus* de Ciências Agrárias e Ambientais da Católica do Tocantins, com base nas normas do CONAMA 357/2005, para estudos de água superficial.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Inicialmente realizou-se a visita e o conhecimento do local, onde se averiguou as condições aparentes da nascente do córrego e suas propriedades físicas, assim como a mata ciliar, que serve de proteção para a mesma. Para as devidas análises coletaram-se dois pontos ao longo do córrego, o primeiro localizado 5 metros após a nascente, e o seguinte 30 metros, onde o curso d'água já sofria alteração antrópica que provavelmente afetaria a qualidade da água.

As amostras foram coletadas em recipientes de plástico com volume de 1 litro, acondicionados em uma caixa térmica de isopor, preenchida com gelo a fim de manter a temperatura em torno de 5 a 10 °C, procurando conservar ao máximo os parâmetros que serviram como indicadores para a qualidade da água do Córrego. Posteriormente as amostras foram armazenadas em sistema refrigerado.

As análises químicas para aferir os padrões de qualidade da água foram realizadas em período inferior a 24 horas após a coleta das amostras, para se obter resultados mais próximos possíveis dos níveis reais.

As variáveis analisadas foram: pH, condutividade, cor verdadeira, turbidez, fósforo total, nitrogênio total, alcalinidade, dureza total, ferro e Demanda Biológica de Oxigênio (DBO). Todos os parâmetros analisados foram em decorrência do acontecido no entorno da nascente, pois houve uma intervenção antrópica onde se fez necessário o conhecimento da qualidade da água. Os métodos para análise foram conforme a resolução CONAMA.

As amostras coletadas foram analisadas no Laboratório de Análises Químicas da Católica do Tocantins e no Laboratório de Análises da Odebrecht Ambiental – Saneatins e seus resultados registrados para averiguação dos limites permitidos pela resolução.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com as análises realizadas, foi possível obter resultados que respaldam nossa pesquisa, nos dando devido parecer sobre a qualidade da água da nascente, resultados esses que serão apresentados devidamente para melhor entendimento da qualidade. A resolução 357/05 nos mostra valores máximo permitidos

para cada parâmetro, com base nisto, foi averiguado se os parâmetros contidos nas amostras estão dentro dos padrões de qualidade ou estão excessivos.

Abaixo segue a tabela com cada parâmetro avaliado, seguido da unidade de medida e dos limites permitidos pela legislação, por último os valores obtidos das amostras.

Figura 1- Relaciona os parâmetros legais e os resultados obtidos no estudo das amostras.

Resultados obtidos a partir das amostras					
Parâmetros	Unidade	LQ	VMP	Amostra P1	Amostra P2
Alcalinidade	-	-	-	0,0435	51,4
Condutividade	µS/cm	0,1	-	97,4	97,3
Cor	uH	1,0	-	21	21
Dureza Total	mg/L de CaCO ₃	10	-	41	49
Ferro	mg/l	0,03	0,3	0,46	0,51
pH	-	0,01	-	6,44	6,48
Turbidez	NTU	0,001	-	1,43	4,37
Nitrogênio Total	mg/l	0,02	-	0,5	-0,3
DBO	mg/L	<0,03	5	6,01	8,9

Fonte: Pesquisa 2015-Conama 357/2005

LQ: Limite de qualidade da água estabelecido pelo CONAMA 357/2005
VMP: Volume Máximo de qualidade estabelecido pelo CONAMA 357/2005

Importante ressaltar que a Amostra P2 de Turbidez, apresentou valores bem acima do permitido. Por meio dos resultados apresentados nas análises, percebe-se que há alteração de valores nos quesitos Dureza total, Ferro em ambas as amostras, necessitando correção para se caso venha a captar água.

4. CONCLUSÃO

A partir dos resultados obtidos, é possível afirmar que, para que haja uso do córrego, a fim de quaisquer tipos de abastecimentos, será necessário um tratamento prévio.

REFERÊNCIAS

- [1] Conama 357/2005. Classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais. Ministério do Meio Ambiente. Disponível em <<http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res05/res35705.pdf>>. Acessado em 20.03.2016
- [2] Davide A. C et al. 2002. Nascente: O Verdadeiro Tesouro Da Propriedade Rural – O Que Fazer Para Conservar As Nascentes Nas Propriedades Rurais. Lavras: UFLA.

Sendo assim, é importante que haja um cuidado maior com a nascente, o curso d'água e os arredores do córrego, para que não sofram com atividades antrópicas, que alterem a qualidade desse recurso.

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao apoio da companhia de saneamento do estado Odebrecht Ambiental – Saneatins que na realização da pesquisa permitiu o uso do laboratório e seus equipamentos e aos colegas que contribuíram para a mesma.

- [3] Queiroz, M.M.F.; IOST, C.; GOMES, S.D.; VILAS BOAS, M.A. Influência do uso do solo na qualidade da água de uma microbacia hidrográfica rural. Revista Verde, Mossoró, v.5, n.4, Out/Dez, 2010.

- [4] Rodrigues, V.A. 2006. Recuperação De Nascentes Em Microbacias Da Cuesta De Botucatu. In: Rodrigues VA, Bucci LA, organizadores. Manejo de microbacias hidrográficas: experiências nacionais e internacionais. Botucatu: FEPAF.

Capítulo 12

EFEITO DE MUDANÇAS NO CICLO HIDROLÓGICO SOBRE AS ÁREAS PRODUTIVAS DA VÁRZEA

Lucirene Aguiar Souza

Fabíola de Souza Barão

Carlos Edwar de Carvalho Freitas

Resumo: A modelagem consiste em uma representação do mundo real que proporcione a capacidade de prever a ocorrência de eventos em um sistema. Este trabalho usa a modelagem para prever os efeitos de oscilações atípicas no nível do rio sobre a produtividade na várzea. A área de estudo foi a comunidade Senhora das Graças, Manacapuru/Am, onde foram entrevistadas 74 pessoas, durante o ano de 2012. O programa utilizado para modelagem foi o software Stella, empregando sistema de derivação Runge-Kutta. Foram criados dois cenários para região: 1) um aumento na amplitude do nível do rio de 5 m. 2) valores foram da mesma amplitude foram acrescentados ou diminuídos de forma aleatória em relação ao tempo. O modelo mostra que quanto mais intensa e aleatória é a oscilação do rio mais imprevisível se torna a produtividade na várzea. Devido à instabilidade da agropecuária ser mais acentuada com as variações do nível do rio, provavelmente se ocorrerem mais cheias e secas extremas nesta região haverá três possibilidades de mudanças no comportamento do ribeirão: 1) migração das pessoas que desenvolvem agropecuária para a pesca, aumentando assim a demanda por pescado e o esforço de pesca; 2) migração para áreas de terra firme próximas ao local de residência atual; e 3) êxodo rural. Sendo que as duas últimas não excluem a primeira hipótese.

Palavras Chave: Modelagem de ecossistemas, pulso de inundação, várzea.

1. INTRODUÇÃO

Drásticas mudanças no clima obrigam muitas pessoas pobres a trocarem seus meios de subsistência. Isso ocorre particularmente nos países em desenvolvimento, pois estes são mais vulneráveis às alterações climáticas, dadas as dificuldades que possuem para ampliar e diversificar seus meios de vida (CORREA, 2008). As alterações climáticas têm afetado os níveis de oscilação dos principais rios amazônicos e impactando as populações ribeirinhas que deles dependem. Estas áreas necessitam de sistemas de proteção para as populações humanas locais como, por exemplo, programas robustos de previsão do nível do rio (SCHÖNGART & JUNK 2007), para que as atividades econômicas feitas conforme as flutuações do nível dos sistemas

hídrico, como: a pesca, a agricultura e o extrativismo vegetal, possam se ajustar a esses fenômenos. É neste intuito que este trabalho tenta por meio da modelagem criar cenários para verificar os efeitos de oscilações atípicas no nível do rio sobre atividades ribeirinhas de uma comunidade de várzea.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 ÁREA DE ESTUDO

A Área de estudo compreendeu a comunidade de Nossa Senhora das Graças (03°20'37"S e 60°35'34"W), localizada no Município de Manacapuru Amazonas (Figura 1)

Figura 1. Localização da comunidade N. Sr^a das Graças Fonte: Google (2018).

3. COLETA DE DADOS

Coleta de dados foi feita por meio de questionários aplicados no ano de 2012 e da utilização de mapas da região para obtenção de informações junto aos comunitários sobre a distância da área de residência para pesca.

4. MODELAGEM

A modelagem foi feita utilizando o software STELLA. O modelo construído foi alimentado com os dados dos questionários e submetidos ao sistema de integração Runge-Kutta 2. O Δt utilizado foi de 0,25. A simulação foi feita para 200 meses.

Construção de Cenários: foi realizada alterando características de oscilação do ciclo hidrológico, resultante de possíveis mudanças climáticas. Para isso tomou-se como base uma simulação do ciclo hidrológico (figura 2), com nível de oscilação próximo aos níveis atuais do rio, tendo como base as cotas do rio Negro, a partir da qual foram construídos os seguintes cenários: 1) a

amplitude do nível do rio aumenta em 5m e 2) além de ter o aumento acima descrito, as oscilações se tornavam aleatórias, usando para isso a função RANDON, que randomiza valores de 0 a 5 metros em torno do ciclo estabelecido como base.

Funções Ciclo hidrológico - função trigonométrica sinwave, que promove a formação de uma onda senoidal infinita.

Número de pescadores - quantidade de pessoas que exercia a atividade de pesca. Foi estimado pela equação: $NPESCADORES = 66 * \text{Taxa de oscilação populacional II}$;

Números de agricultores - quantidade de pessoas que exercia agricultura na comunidade. Foi estimada pela equação: $N AGRICULTORES = 74 * \text{Taxa de oscilação populacional I}$;

Número de pecuarista - quantidade de pessoas que exercia a pecuária na comunidade. Foi representada pela equação: $N PECUARISTA = 3 * \text{Taxa de oscilação populacional I}$;

Área por residência de cultivo- foi inserida como função gráfica dependente da variação do ciclo hidrológico, na qual se considerou uma relação inversamente proporcional entre área de cultivo e nível do rio.

Área por residência da pecuária -. Foi inserida em forma de função gráfica como dependente do pulso de inundação, para qual foi considerada uma relação inversamente proporcional entre a área disponível para pecuária e o nível do rio.

Distância por residência da pesca - Esta também foi uma função gráfica na qual representada por uma relação inversamente proporcional entre o nível do rio a distância da área de pesca.

5.RESULTADOS E DISCUSSÃO

O modelo foi construído baseado em 74 questionários aplicados na comunidade, o mesmo pode ser observado na figura 2 abaixo. Apesar de muitos habitantes se retirarem de áreas alagáveis durante a cheia, isto não foi observado na área de estudo para o ano coletado e dessa forma essa relação de dependência não foi considerada no modelo. Durante o período simulado pode se observa que o ciclo hidrológico influenciou fortemente todas as atividades produtivas da região

(Figura 3 e 4), concordando com o descrito por Souza (2003) e Fraxe (2000). Foi verificado que houve oscilação das áreas disponíveis para atividades produtivas, sendo que a mais constante em relação ao nível do rio foi a pesca. A agricultura e a pecuária são praticadas nas comunidades na época da vazante e seca e a pesca é pratica em todas as estações do ciclo hidrológico (Mourão et al. 2007; Fraxe, 2000; Souza, 2003), porém um maior deslocamento é necessário no período de seca, aumento o perímetro de uso da pesca em relação a residência (Figura 4), fato já observado por Souza (2003) e Cerdeira et al. (2000).

Na cheia o acesso aos pesqueiros fica mais próximo, porém há a ausência da agropecuária gera um aumento do esforço pesqueiro em função da disponibilidade de tempo e falta de melhores opções para alimentação. Este padrão de comportamento foi também observado por Garcez (2000) e Souza (2003). Mesmo os pescadores comerciais, como são a maioria dos que atuam nessa atividade na comunidade, precisam de maior dedicação para obtenção do pescado nesta fase do ciclo hidrológico para compensar a baixa capturabilidade durante este período, que resulta em menor produtividade para manutenção dos rendimentos (GARCEZ, 2000).

Figura 2: Modelo referente ao uso dos recursos naturais em N. Sra. das Graças.

5.1 CENÁRIO I

A simulação do aumento de amplitude do ciclo hidrológico (Figura 3) alterou o padrão de uso da área, sendo a principal mudança detectada o aumento da cota do rio e a chegada ao nível zero da quantidade de terra disponível para agricultura e pecuária e o tempo de duração nesta cota é um pouco maior do que o observado no padrão normal de nível do rio. Caso esse cenário realmente ocorra poderá gerar uma migração temporária dos residentes na comunidade e em consequência da inundação das moradias

e da uma demora na submersão das terras alagadas, que leva a diluição do tempo para cultivo e colheita e a falta de área para o pasto. A maioria dos vegetais cultivados não suporta inundação por período prolongado, por isso os ribeirinhos escolhem plantas de ciclos curtos, para sem plantadas e colhidas antes da cheia (DIEGUES, 1995; SOUZA, 2003), porém a possibilidade desse tempo ser ainda mais reduzido pode inviabilizar a atividade agrícola.

Figura 3: Simulação do Cenário I sobre a área de criação, cultivo e de pesca total de Nossa Senhora das Graças. Área de criação e cultivo em hectares e perímetro de execução da pesca em metros.

5.2 CENÁRIO II

Nesse cenário a amplitude das áreas e distâncias das atividades produtivas dessa comunidade foi semelhante ao do cenário anterior, porém com variações aleatórias mais evidenciadas (Figura 4). Segundo os resultados, tais mudanças afetariam na produtividade dos ribeirinhos, em alguns momentos seria impossível prever o tamanho das áreas disponíveis para a atividade da agropecuária, assim como o tempo necessário para que sejam executados os procedimentos de plantio e colheita.

A área para agricultura e a pecuária tem amplitude de oscilação maior, já a atividade pesqueira é uma atividade mais constante,

sendo desenvolvida durante todo o ano em ambos os cenários testados. A amplitude desta variação em relação a pesca e as outras atividades é difícil de ser definida através dos gráficos dos cenários, uma vez que as unidades plotadas nos gráficos são diferenciadas. Witkoski, (2007) afirma de acordo com o padrão de subida e descida do nível do rio o período de plantio pode ser favorecido ou prejudicado; as configurações dos lagos e paranás mudam influenciando o acesso do pescador e a reprodução da fauna aquática; a criação de animais é impactada; e por fim o escoamento da produção, de uma forma geral, também é afetado na situação de extrema seca.

Figura 4. Simulação do Cenário II sobre a área de criação, cultivo e de pesca de Nossa Senhora das Graças. Área de criação e cultivo em hectares e perímetro de execução da pesca em metros.

Dado o grau de fertilidade dos solos de várzea é natural que a principal atividade durante o período de seca seja a agricultura, porém a maior área é apontada sendo usada para a pecuária (Figura 4). A grande necessidade de área para criação de gado em relação a outras atividades já foi observada antes por Barreto (2015), um maior tempo de alagação pode gerar um maior gasto com aluguel de pastos em terra firme, ou mais trabalho, pois o gado terá que ser confinado na maromba e tem que ser alimentado pelos comunitários através de plantas aquáticas que tem que ser cortadas e transportadas para serem posteriormente oferecidas aos animais (DIEGUES, 1995). O gado é considerado a “poupança” do ribeirão utilizada em um momento de emergência a partir de uma esporádica comercialização (Batista *et al.*, 1998).

Apesar da importância da pecuária, o mais preocupante é o pouco tempo para execução da agricultura por ser esta a principal fonte de renda, assim a instabilidade do ciclo poderá gerar êxodo rural ou a migração para atividades menos afetadas pelo ciclo hidrológico como a pesca, aumentando assim o esforço sobre os estoques locais. A inviabilização da agricultura também poderia levar a migração para áreas mais elevadas para execução da agropecuária, o que resultaria a um maior a retirada de vegetação nativa para cultivo e pasto. Este procedimento provocaria grandes alterações ambientais, degradação e contaminação do ambiente

aquático e do solo, e afetando a biodiversidade (ILHA, 2015).

O ciclo hidrológico é fundamental para a manutenção das atividades produtivas dos ribeirinhos, porém, este fenômeno traz também incertezas devido às variações anuais na amplitude do nível da água (WINKELERPRINS, 1997), que vem se tornando cada vez mais inconstante. Segundo COX *et al.* (2008) haveria a possibilidade de futuramente aumentar a incidência de intensas secas na região. A magnitude, frequência e previsibilidade das oscilações afetam fortemente a forma como as populações se adaptam ou não a estes eventos (BUDKE, 2007). Dessa forma qualquer mudança na oscilação do nível do rio, podem afetar tanto os ribeirinhos quanto os recursos dos quais fazem uso. Para MARENGO *et al.* (2010), as consequências da mudança climática em ciclos hidrológicos é particularmente preocupante na Amazônia. Em 2005, uma estiagem extrema atingiu o oeste e o sudoeste da Amazônia, prejudicando as fontes de água, alimento e transporte das populações ribeirinhas (MARENGO *et al.* 2008^a; 2008b).

Quando os recursos ou o espaço físico de um sistema são limitados os níveis de população são dependentes da capacidade suporte do meio ambiente (NUNES, 2006). No caso das populações ribeirinhas a terra disponível para produção é um recurso limitante, variando ao longo do ciclo hidrológico e essa oscilação na disponibilidade no uso da terra para

agricultura e/ou pecuária é um fator preponderante para permanência de pessoas nas áreas sujeitas a inundação. Durante a cheia é comum nas várzeas que alguns moradores saiam temporariamente de suas residências, devido tanto à alagação de suas casas, quanto à falta de alternativas para geração de renda neste período (SMITH, 1979), assim apesar de não ter se identificado esta saída no ano de coleta, este fenômeno pode se iniciar com as intensificação das cheias em decorrências dos seus efeitos.

6. CONCLUSÕES

Nos cenários criados foi verificado que maior área é utilizada durante o período da cheia e que alterações no ciclo hidrológico afetariam a produtividade dos ribeirinhos, uma vez que impossibilitaria prever a área disponível para

produção e o tempo disponível para esse uso. Caso ocorresse, este fato afetaria principalmente a agricultura que necessita de intervalo de tempo compatível para que sejam executados os procedimentos desde a semeadura até a colheita, tornando a atividade cada vez mais sujeitas à perda de produção. O aumento no tempo da terra alagada e aumento excessivo no nível do rio podem levar o ribeirinho a perder suas sementes e esgotarem seus recursos armazenados durante o período agrícola e maior trabalho ou custo com a pecuária. Isso resultaria na desestruturação socioeconômica das comunidades que dependem desse recurso para sua subsistência e inviabilizar a retomada das atividades no período de águas baixas e ao aumento do esforço de pesca na região.

REFERÊNCIAS

- [1] Barreto, P.. Como reduzir a contribuição da pecuária brasileira para as mudanças climáticas. Imazon, 48p. 2015.
- [2] Batista, V.S.; Freitas, C.E.C.; Silva, A. J. I.; Brasil, D. F. Os ribeirinhos e a pesca nas várzeas da Amazônia Central. Revista da UA. Série Ciências Agrárias, 7: 81-99. 1998.
- [3] Budke, J. C. Pulso de inundação, padrões de diversidade e distribuição de espécies arbóreas em uma floresta ribeirinha no Sul do Brasil. Tese de Doutorado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 195pg. 2007.
- [4] Cerdeira, R.G.P.; Isaac, V. J.; Ruffino, M. L. A. Captura de pescado nas comunidades ribeirinhas do Lago Grande de Monte Alegre – PA, Brasil. 281-316p. In: IBAMA. Recursos pesqueiros do Médio Amazonas: Biologia e estatística pesqueira. Coleção Meio ambiente. Série Estudos Pesca. 22. Brasília: Edições IBAMA. 350p. 2000.
- [5] Cox, P., Harris, P., Huntingford, C., Betts, R., Collins, M., Jones, C., Jupp, T., Marengo, J.A. & Nobre, C. Increase risk of Amazonian drought due to decreasing aerosol pollution. Nature. 453: 212-216. 2008.
- [6] Diegues, A. C. S. Povos e Mares: Leitura em sócio-antropologia marítima. São Paulo: NUPAUB - USP. 296p. 1995.
- [7] Fraxe, T. J. P. Homens anfíbios: Etnografia de um campesinato das águas. Fortaleza. Secretaria da Cultura e Desporto do Governo do Estado do Ceará. 192p. 2000.
- [8] Garcez, D. S. A pesca de ribeirinhos em ambientes de várzea de uso comum, Baixo Solimões, Amazônia Central. Dissertação de
- mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Biologia Tropical e Recursos Naturais. INPA/UFAM. 89p. 2000.
- [9] Ilha, P. Efeitos da conversão de florestas em áreas agrícolas sobre assembleias de peixes das cabeceiras do Rio Xingu. Effects of forest conversion into agricultural areas on fish assemblages in the headwaters of the Xingu River. 2015.
- [10] Marengo, J. A., Nobre, C., Tomasella, J., Oyama, M., Sampaio, G., Camargo, H., Alves, L.; Oliveira, R.: The drought of Amazonia in 2005. Journal of Climate, 21: 495-516. 2008.
- [11] Marengo J.A., Nobre, C., Tomasella, J. & Cardoso, M.M. O. Hydro-climatic and ecological behavior of the drought of Amazonia in 2005. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Biological Sciences 21: 1-6. 2008b.
- [12] Mourão, R.; Rivas, A.; Fraxe, T. O estado da economia nas comunidades de várzea: atividades tradicionais e integração do mercado. 149-169p. In: Teixeira, P.; Brasil, M.; Rivas, A. Produzir e viver na Amazônia rural: estudo sociodemográfico de comunidade do Médio Solimões. Manaus, Edua, 191p. 2007.
- [13] Nunes, R. R. Dinâmica de Populações: Um Breve Histórico. III Biental da Sociedade Brasileira de Matemática. Instituto de Matemática e Estatística. Universidade Federal de Goiás. Disponível no site: <http://www.mat.ufg.br/biental/2006>. Acessado em 26 de janeiro de 2007.
- [14] Schöngart, J., & Junk, W.J. Forecasting the flood-pulse in Central Amazonia by ENSO indices. Journal of Hydrology. 335: 124-132. 2007.

[15]

mith, N. J. H. A pesca no rio Amazonas. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq / INPA. Manaus - AM. 154p. 1979.

[16]

Souza, L. A. Sustentabilidade Ecológica e Econômica da Pesca de Subsistência na Amazônia Central. Dissertação apresentada ao programa de Pós-graduação em Biologia Tropical e Recursos Naturais do convênio INPA/UFAM, como parte dos requisitos para obtenção do título de mestre em Ciências Biológicas, área de

concentração em Biologia de Água Doce e Pesca Interior. 139p. 2003.

[17]

Winklerprins, A. M. G. A. Land-use decision-making using local soil knowledge on the lower Amazon floodplain. *The Geographical Review*. 87(1): 105-108. 1997.

[18]

Witkoski, A. C. Terras, florestas e águas de trabalho: os camponeses amazônicos e as formas de uso de seus recursos naturais. Editora da Universidade Federal do Amazonas. 2007.

Capítulo 13

POTABILIDADE DA ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO PÚBLICO EM ALGUNS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS

Fabíola Esquerdo De Souza

Solange Santos Costa

Elizia Raquel Cunha

Uarlisson Machado

Vandereia Castro Bezerra

Resumo: As águas apresentam importância sanitária e econômica. Do ponto de vista sanitário, o abastecimento de água visa controlar e prevenir doenças, implantar hábitos higiênicos na população, facilitar a limpeza pública e propiciar conforto e bem estar. Posteriormente, foi realizado levantamento sobre os parâmetros físico-químicos e microbiológicos da qualidade da água do banco de dados da Companhia de Saneamento do Estado do Amazonas – COSAMA, no período de 2013 a 2017 em 12 municípios do estado do Amazonas, os quais são abastecidos por poços e de águas de superfícies dos rios da Amazônia. Os resultados obtidos das análises dos parâmetros de Coliformes Totais, Coliformes Termotolerantes e Coliformes Heterotróficos das amostras de água coletadas estão em conformidades com a Portaria nº 2914/2011 (BRASIL, 2011) e a Resolução CONAMA nº 357/2005. A região da Amazônia possui característica diferenciada de outras regiões do país, como é o caso da água, solo, clima e outros fatores. Em relação às águas, os rios da região apresentam valores variados de pH, turbidez e cor aparente, ao longo dos seus percursos é encontrado vários fatores que contribuem para as propriedades das águas, tais como materiais em decomposição, materiais húmicos, sedimentos e formação rochosa, conforme o local onde está situado há variação de pH, turbidez e cor aparente. Conclui-se que o monitoramento físico-químico e microbiológico, durante os anos pesquisados entre os anos de 2013 a 2017, foi capaz de detectar as principais variáveis de qualidade da água de abastecimento rural no estado do Amazonas.

Palavras Chave: Qualidade da água, Amazonas, Municípios.

1. INTRODUÇÃO

No Brasil, as legislações vigentes que tratam de potabilidade da água para consumo humano são, respectivamente, a Portaria nº 2914, de 12 de dezembro de 2011, do Ministério da Saúde (BRASIL, 2011) e a Resolução nº 357 de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA (BRASIL, 2005). Para enquadrar-se a legislação atual, é importante atender o padrão de potabilidade, nos quais são valores permitidos, em referência a vários itens, podem ser admitidos na água para abastecimento, valor definidos por meio da legislação (RIGOBELLO *et al.*, 2009).

A qualidade de vida do homem está diretamente relacionada à água, pois é utilizada para funcionamento adequado do organismo, preparo de alimentos, higiene pessoal e de utensílios (ZANCUL, 2006). Determinar as propriedades físicas da água é de simples compreensão, tendo as propriedades essenciais: cor, sabor, odor, turbidez, temperatura e condutividade elétrica. Sendo os padrões fundamentais para determinar o uso da água e em especial verificar a qualidade da mesma (LARSEN, 2010). A análise físico-química da água define de forma precisa e clara algumas propriedades da amostra para se analisar a qualidade da água (CRUZ *et al.*, 2007).

A região da Amazônia tem superado problemas históricos de saneamento principalmente em relação a potabilidade da água nos municípios, neste contexto vale ressaltar as características ancestrais da região como ocupação afastada ribeirinha e costume de uso de água sem tratamento, associa-se à necessidade de acompanhar as intensas formas consequente de uma rápida urbanização, causada sem o avanço de oferta de serviços de saneamento (BECKER, 2005). É através do saneamento rural que ocorre a salubridade ambiental, utilizando recursos naturais de forma sustentável, revertendo à degradação do meio ambiente, em especial o

comprometimento dos mananciais de água doce, decorrente da despejo inadequado de esgotos sanitários e de resíduos sólidos (LARSEN, 2010).

De acordo com Silva (2005), em muitas cidades do estado do Amazonas, a distribuição de água realizada pelos órgãos competentes não recebe nenhum tratamento, sendo captada por poços tubulares ou águas fluviais e diretamente distribuída para a população por rede de distribuição.

Diante do exposto, a pesquisa teve como objetivo realizar avaliação e interpretação da qualidade das águas superficiais e subterrâneas, no período de 2013 a 2017, a partir dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos do abastecimento público nos municípios que são abastecidos pela Companhia de Saneamento do Estado do Amazonas – COSAMA, comparando com os padrões estabelecidos pela Portaria nº 2.914/2011, ANVISA e a Resolução CONAMA 357/2005.

2. DESENVOLVIMENTO

Para o desenvolvimento desta pesquisa, foi realizado um levantamento bibliográfico atualizado dos principais trabalhos do tema abordado através de dissertações, artigos e livros sobre a qualidade das águas de abastecimento público, com ênfase em padrões de potabilidade de acordo com as normas de âmbito federal e análises realizadas nos municípios do estado do Amazonas.

Posteriormente, foi realizado levantamento dos dados e em seguida foram avaliados e interpretados os parâmetros físico-químicos e microbiológicos para avaliar a qualidade da água em doze municípios: Alvarães, Autazes, Benjamin, Carauari, Careiro da Várzea, Codajás, Eirunepé, Itamarati, Juruá, Manaquiri, São Paulo de Olivença e Tabatinga (Figuras 1).

Figura 1: Localização da área em estudo.

Fonte: Autora (2018).

Os parâmetros físico-químicos e microbiológicos de qualidade da água foram adquiridos do banco de dados da Companhia de Saneamento do Estado do Amazonas – COSAMA, no período de 2013 a 2017 em 12

municípios do estado do Amazonas, os quais são abastecidos por águas subterrâneas dos poços e de águas de superfícies dos rios da Amazônia (Tabela 1).

Tabela 1: Municípios do Amazonas que são abastecidos pela COSAMA, conforme as sub-bacia hidrográfica, manancial, sistema de tratamento, população e produção de litros por dia.

Municípios	População*	Produção litros/dia**	Sub-bacia Hidrográfica	Manancial	Sistema de Tratamento
Autazes	37.752	3.860.129	Amazonas / Madeira	Rio Autaz Açu	Estação de Tratamento de Água - ETA
Benjamin Constant	40.417	5.798.710	Javari / Solimões	Rio Javari	
Careiro da Várzea	28.592	659.032 l	Amazonas	Rio Amazonas	
São Paulo de Olivença	37.300	2.965.226	Solimões / Jutai	Igarapé do Jarutuba	
Tabatinga	62.346	10.517.097	Solimões	Rio Solimões	
Eirunepé	34.461	5.268.678 l	Juruá	Misto: Superficial - Rio Juruá e Subterrâneo (poços profundos)	ETA e Adição de cloração
Alvarães	15.729	1.120.129	Solimões / Purus	Subterrâneo (poços profundos)	Adição de cloração
Itamarati	8.153	664.677	Japurá / Solimões		
Juruá	13.581	2.280.645	Juruá / Jutai / Japurá		
Manaquiri	29.327	4.377.935	Solimões / Madeira		
Carauari	28.111	6.250.000	Juruá / Jutai		
Codajás	27.303	3.504.903	Solimões / Purus		

*População estimada em 2016 (IBGE). ** Produção diária de 2016 (COSAMA).

Fonte: ANA (2010), COSAMA (2016) e IBGE (2016). Organizado pela Autora (2018).

Os parâmetros físico-químicos: Cloro Livre, Turbidez, Cor Aparente e pH, e microbiológicos: Coliformes Totais, Coliformes Termotolerantes e Coliformes Heterotróficas, foram utilizados por serem mais relevantes na questão de análises de qualidade de água de consumo (SIOLI, 1950; SIOLI 1984; FURCH & JUNK, 1997; BECKER, 2005; AZEVEDO, 2006; LAZEN, 2010; ESTEVES, 2011; SILVA *et al*, 2015). Os dados obtidos foram mensais, os quais foram calculados as médias de cada ano, conforme cada município estudado. Estes dados foram inseridos e processados em planilhas eletrônicas do Microsoft Excel 2013 para geração de gráficos e tabelas.

3. CLORO LIVRE

O Gráfico 1 apresenta as análises realizadas para o parâmetro de cloro livre, Alvarães obteve a sua maior média em 2016 com 1,1 mg/L e a menor média com 0,9 mg/L nos períodos de 2013 a 2015. No município de Autazes a maior média foi de 1,7 mg/L nos anos de 2014 e 2015, a menor média foi de 1,4 mg/L em 2016. Em Benjamin a maior

média foi de 1,5 mg/L em 2014 e a menor de 1,1 mg/L em 2016. O município de Carauari manteve-se oscilando entre as médias de 1,3 e 1,4 mg/L nos períodos pesquisados. O município de Careiro da Várzea apresentou a maior média de 2,0 mg/L em 2013 e a menor média com 1,7 mg/L nos anos de 2015 a 2017.

O município de Codajás apontou a maior média de 1,8 mg/L em 2015 e a menor média de 1,5 mg/L em 2017. No município de Eirunepé a maior média foi de 1,8 mg/L em 2013 e 2014 e a menor média com 0,5 mg/L em 2016. O município de Itamarati apresenta a média de 1,5 mg/L em todos os anos pesquisados. Para o município de Juruá a maior média foi de 1,3 mg/L em 2013 e 2017, e a menor média com 1,0 mg/L em 2015. No município de Manaquiri a maior média foi de 1,5 mg/L em 2017 e a menor média de 0,6 mg/L em 2014. O município de São Paulo de Olivença apresentou a maior média de 1,8 mg/L em 2017 e a menor média com 1,4 mg/L em 2016. Já o município de Tabatinga teve sua maior média com 2,1 mg/L, em 2013 e a menor média de 1,4 mg/L, em 2017.

Gráfico 1: Resultado do Cloro Livre dos municípios analisados.

Fonte: COSAMA (2013 a 2017). Organização: Autora (2018).

Os resultados do cloro livre (mg/L) mostram que o teor de cloro livre foi superior a 0,2 mg/L e não chegando a 5,0 mg/L, variando de 0,5 a 2,1 mg/l nos municípios pesquisados. Os resultados analisados estão em conformidade com Portaria nº 2914/2011 (BRASIL, 2011), para os padrões de potabilidade para águas destinadas ao abastecimento e consumo humano. A legislação estabelece um teor de cloro livre de 0,5 mg/L, sendo exigido no mínimo, 0,2 mg/L para a manutenção em qualquer ponto da rede de distribuição de água. E também estão de acordo com a Resolução CONAMA nº 357/2005, estabelece para a classe 2, cloro

livre de 0,1 mg/l. Azevedo (2006) encontrou o cloro em conformidade com a portaria 2914/2011 no município de Tabatinga.

4. TURBIDEZ

Ao avaliar a turbidez (uT) nos municípios estudados (conforme Gráfico 2), o município de Alvarães apresentou a maior média de 4,5 uT em 2013 e a menor média encontrada de 0,9 uT em 2016. Em Autazes as maiores médias foram de 9,4 uT em 2015, com 7,6 uT em 2013 e 7,0 uT em 2014, a menor média foi com 1,6 uT em 2017. No município de

Benjamin Constant a maior média encontrada foi de 8,3 uT em 2017 e o menor média com de 2,3 uT em 2013. Para o município de Carauari nos anos estudados não houve a coleta do parâmetro turbidez (uT).

Avaliando o município de Careiro da Várzea as maiores médias apresentadas foram 17,3 uT em 2013, com 15,1 uT em 2016 e 10,9 uT em 2017, a menor média encontrada foi 2,4 uT em 2015. O município de Codajás apresentou a maior média de 2,2 uT em 2017 e com a menor média foi de 1,4 uT nos anos de 2013 e 2014. No município de Eirunepé a maior média analisada foi de 4,2 uT e a menor

média com 0,5 uT em 2016. Em Itamarati as médias encontradas oscilaram entre 0,1 uT a 2,0 uT nos anos analisados. No município de Juruá a maior média apresentada foi de 3,7 uT em 2014 e a menor média com 1,9 uT em 2015. O município de Manaquiri a maior média analisada foi de 7,0 uT em 2013 e menor média com 0,2 em 2015. Para o município de São Paulo de Olivença a maior média pesquisada foi de 3,8 uT em 2015 e a menor média com 3,0 uT em 2013 e 2016. Em Tabatinga as maiores médias apresentadas foram de 12,1 uT em 2013 e 10,2 uT em 2014, e a menor média foi de 1,3 uT em 2016.

Gráfico 2: Resultado do Cloro Livre dos municípios analisados.

Fonte: COSAMA (2013 a 2017). Organização: Autora (2018).

Por meio dos resultados de turbidez (uT), foi possível verificar a média de turbidez para as análises efetuadas nos doze municípios estudados com variação de 0,1 a 17,3 uT, em cinco municípios (Autazes – 2013, 2014 e 2015, Benjamin – 2017, Careiro da Várzea – 2013, 2016 e 2017, Manaquiri - 2013 e Tabatinga - 2013) as médias estiveram acima de 5,0 uT não estando em adequação a Portaria nº 2914/2011 (BRASIL, 2011). Mas segundo o Art. 15 da Resolução CONAMA 357/2005 que estabelece para a classe 2, o máximo permitido é de 100 uT, indicando que os resultados obtidos nesta pesquisa estão em conformidade com esta Resolução. Para Azevedo (2016), a cidade de São Paulo de Olivença que utiliza o igarapé do Ajaratuba como manancial, possui a água ácida apresentando a turbidez normalmente baixa com 4,2 NTU e a tonalidade escura desse manancial confere a cor aparente com valor de 71 mg/L.

5. COR APARENTE

O Gráfico 3 apresenta as análises de cor aparente (uH) dos municípios pesquisados. O município de Alvarães apresentou a maior média de 12,6 uH em 2013 e a menor média encontrada foi em 2015 com 0,1 uH, já em 2017 não houve análises. Em Autazes foram encontradas as maiores médias de 27,4 uH em 2014 e com 18,1 uH em 2013, a menor média foi com 5,6 uH em 2017. No município de Benjamin Constant a maior média foi de 14,9 uH em 2015 e o menor média foi de 9,8 uH em 2013. Já no município de Carauari nos anos pesquisados não houve análise para Cor Aparente (uH).

O Careiro da Várzea apresentou a maior média de 12,1 uH em 2014, a menor média encontrada com 9,2 uH em 2015. Em Codajás a maior média foi de 7,5 uH em 2013 e com a menor média com 2,4 uH nos anos de 2015 e 2016. O município de Eirunepé a maior média analisada foi de 5,5 uH em 2014 e a menor

média foi de 2,8 uH em 2015 e 2016. Já o município de Itamarati não realizou análises nos anos de 2013 a 2016, já em 2017 a médias encontrada foi de 5,1 uH. No município de Juruá a maior média estudada foi de 12,3 uH em 2014 e a menor média com 8,3 uH em 2013. O município de Manaquiri apresentou a média de 5,0 uH em todos os

anos pesquisados. Em São Paulo de Olivença as maiores médias foram encontradas com 11,9 uH em 2013 e de 11,8 uH em 2015, e a menor média de 9,6 uH em 2017. Já no município de Tabatinga apresentou a maior média com 12,8 uH em 2013, a menor média foi de 0,6 uH em 2017.

Gráfico 3: Resultado do Cor Aparente dos municípios analisados.

Fonte: COSAMA (2013 a 2017). Organização: Autora (2018).

Para os resultados das análises da cor aparente (uH) nos municípios pesquisados, para o período de 2013 a 2017 cor aparente que variou de 0,1 a 27,4 uH, o único município que teve sua média acima de 15 uH em relação a todos municípios analisados perante os anos pesquisados, foi Autazes com médias de 27,4 uH em 2014 e de 18,1 uH em 2013, a qual não está em conformidade com a Portaria nº 2914/2011 (BRASIL, 2011). Porém, de acordo o Art. 15 da Resolução CONAMA 357/2005 todos os resultados analisados neste estudo estão enquadrados com esta Resolução. Segundo Azevedo (2016), o manancial usado no município de Benjamin Constant é o rio Javari cuja captação está localizada muito próxima a foz desse rio que deságua no rio Solimões, e em análises realizadas neste mesmo manancial obteve-se a cor aparente de 40 uH.

6. PH

Ao analisar o pH nos municípios estudados (Gráfico 4), o município de Alvarães apresentou a maior média de 6,2 pH em 2017 e a menor média com 4,8 uH em 2013. Em Autazes a maior média analisada foi de 6,0 pH em 2017 e a menor média com 4,6 pH em

2015. No município de Benjamin Constant a maior média pesquisada foi de 6,4 pH em 2016 e o menor média com 4,9 uH em 2014. Para o município de Carauari a maior média encontrada foi de 5,7 pH nos anos de 2013 a 2015 e 2017 e a menor média com 4,2 pH em 2016.

Careiro da Várzea apresentou a maior média de 12,7 pH em 2015, a menor média com 6,0 pH em 2013 e 2014. Já o município de Codajás analisou a maior média com 7,1 pH em 2013 e a menor média foi de 5,7 pH nos anos de 2016. Em Eirunepé a maior média encontrada foi de 5,8 pH em 2017 e a menor média com 5,3 pH em 2013. No município de Itamarati a maior média apresentada foi de 6,6 pH em 2017, já a menor médias com 5,8 pH. Para o município de Juruá a maior média foi de 7,2 pH em 2017 e a menor média com 5,3 pH em 2013. Em Manaquiri a maior média analisada foi de 6,0 pH em 2016 e menor média com 5,1 pH. No município de São Paulo de Olivença a maior média encontrada foi de 6,6 pH em 2017 e a menor média com 5,1 pH em 2016. Já no município de Tabatinga a maior média analisada foi de 7,1 pH em 2016 e a menor média com 6,5 pH em 2014.

Gráfico 4: Resultado do Cloro Livre dos municípios analisados.

Fonte: COSAMA (2013 a 2017). Organização: Autora (2018).

Nos municípios pesquisados os resultados das análises de pH, em todas as avaliações do pH para o período de 2013 a 2017 o pH variou de 4,6 a 12,7, dois municípios (Carauari e Eirunepé) não atingiram em todos os anos pesquisados a média de 6,0 a 9,5 pH conforme a Portaria nº 2914/2011 (BRASIL, 2011) e de 6,0 a 9,0 estabelecido pela Resolução CONAMA 357/2005. Tabatinga é o único município que está em conformidade com a legislação federal em todos os anos. No município de Careiro da Várzea no ano de 2015 o pH ultrapassou o mínimo e máximo permitido pela Portaria e Resolução utilizadas neste estudo. Silva (2005) em sua pesquisa encontrou em Alvarães o pH variando de 5,2 a 5,3, caracterizando como águas ácidas e a turbidez variou de 0,3 a 0,4 uT. De acordo com Santos e Ribeiro (1988) as águas do rio Javari apresentam pH ácido, perto de neutro, com baixa concentração de cor e de material húmico.

Os rios Solimões, Amazonas, Javari, Juruá e Madeira são rios de águas brancas, os quais abastecem os municípios de Tabatinga, Careiro da Várzea, Benjamin Constant, Eirunepé e Autazes, já o rio Jutá é considerado rio de águas pretas e abastece o município de São Paulo de Olivença, essa classificação está de acordo com a descrita por Sioli (1950). Os rios da Amazônia em seu estado natural possuem valores de pH diferenciados, conforme classificação de Sioli diz que, os rios de águas brancas estão entre 6,2 e 7,2 pH, os rios de águas claras entre 4,5 e 7,8 pH e os rios de águas pretas entre 3,8 e 4,9 pH. Esteves (2011) em sua pesquisa

encontrou o pH de 4,0 até 7,8 ao longo do percurso do Rio Amazonas.

7. ANÁLISE BIOLÓGICA

Os resultados obtidos das análises dos parâmetros de Coliformes Totais, Coliformes Termotolerantes e Coliformes Heterotróficos das amostras de água coletadas estão em conformidades com a Portaria nº 2914/2011 (BRASIL, 2011) e a Resolução CONAMA nº 357/2005. Em seus estudos, Azevedo (2006) não encontrou presença de coliformes totais e termotolerantes em águas de poço tubular no município de Urucará-AM, estando desta forma em acordo com a legislação vigente.

8. CARACTERÍSTICAS DAS ÁGUAS DOS RIOS DA AMAZÔNIA

A região da Amazônia possui característica diferenciada de outras regiões do país, como é o caso da água, solo, clima e outros fatores. Em relação às águas, os rios da região apresentam valores variados de pH, turbidez e cor aparente, ao longo dos seus percursos são encontrados vários fatores que contribuem para as propriedades das águas, tais como materiais em decomposição, materiais húmicos, sedimentos e formação rochosa, conforme o local onde está situado há variação de pH, turbidez e cor aparente. Em relação aos parâmetros de qualidade da água para abastecimento da região da Amazônia, existe o desejo de se realizar o enquadramento dos rios da Amazônia na legislação federal, visto que suas

características são diferenciadas das demais regiões do país.

As diferenças de qualidade das águas da região amazônica explicam-se pelas diferenças geológicas e geomorfológicas nas respectivas áreas de captação (JUNK 1983). Segundo Sioli (1984) as propriedades físicas e químicas das águas são reflexo da composição geológica, climática e cobertura vegetal da bacia de drenagem.

As águas dos rios da Amazônia apresentaram em sua maioria formação bem particular, com pH variando de 3,96 a 7,56 (SILVA *et al.*, 2015). Esta condição ácida está relacionada à presença de material orgânico proveniente da decomposição de folhagem e outros (SIOLI e KLINGE, 1962). Segundo Esteves (1998), em grande parte da região de terra firme da Amazônia central, no litoral e em regiões de turfeiras apresentam pH baixo. Os aspectos naturais como o rompimento das rochas e a fotossíntese, ou aspectos antrópicos como os esgotos domésticos e industriais influenciam no pH (VON SPERLING, 2007).

Vale ressaltar a falta de normas específicas para ambientes especificamente de águas da Amazônia, pois a Resolução CONAMA 357/2005 utiliza a metodologia para todas as águas sob jurisdição nacional, contudo, não faz a especificação de padrões de qualidade da água para a região da Amazônia. Isso pode ser visto nos itens referentes a classificação dos corpos de águas e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências, mas são estabelecidas tendo como referência as características das águas da região centro sul do país, não levando em consideração as características naturais das águas dos rios da Amazônia. Alguns estudos realizados em água amazônicas contribuíram para a caracterização físico-química dos rios de águas brancas, pretas e lagos de várzea (FURCH & JUNK, 1997). E também os aspectos físicos, químicos e ecológicos de misturas das águas naturais brancas e pretas e sua influência nos compostos húmicos e nos sólidos minerais (LOPES, 1992).

Diversas diferenças químicas existentes nas águas Amazônicas são resultados do processo pluviométrico que facilita a lixiviação de várias substâncias para as águas, dando a estas uma variedade de tons, concentrações

de substância húmica e de sais minerais (SANTOS *et al.*, 1984). Estas pequenas diferenças químicas eventuais podem ter origens de vasta abundância de capim flutuante que, uma porção entra em estado de decomposição, ocasionando assim gases tóxicos e é bastante característico desta região os processos erosivos em águas de várzeas (SANTOS & RIBEIRO, 1988).

9. CONCLUSÕES

De acordo com o dados analisados, verificou que as águas ofertadas aos usuários dos municípios de Alvarães, Autazes, Benjamin, Caruari, Careiro da Várzea, Codajás, Eirunepé, Itamarati, Juruá, Manaquiri, São Paulo de Olivença e Tabatinga, durante o período pesquisado, apresentaram características físico-químicas e microbiológicas que permitem classificá-las como potáveis, conforme os principais padrões de potabilidade das resoluções e portarias.

Dentre as amostras coletadas nos municípios, apenas a variável cloro livre dos parâmetros físico-químicos está dentro do valor estabelecido pela Portaria Nº 2.914 (BRASIL, 2011) e a Resolução CONAMA 357/2005. Para o parâmetro turbidez, em cinco municípios não estavam em conformidade com a legislação vigente neste estudo. Já em relação a cor aparente apenas um município apresentou não conformidade com Portaria e a Resolução. Para o pH apenas um município está em acordo com a legislação vigente. O principal indicador sanitário da água para abastecimento público e consumo humano deve ter ausência total de *E.coli*, e o resultado obtidos da análise biológica nesta pesquisa está em conformidade com a Portaria Nº 2914/2011. Neste aspecto, acredita-se que o objetivo desta pesquisa foi plenamente alcançado.

Verificou-se que os problemas sanitários rurais são complexos e precisam de melhorias, pois se o mesmo continuar desta forma poderá causar danos à saúde da população local. Portanto, o monitoramento físico-químico e microbiológico, durante os anos pesquisados entre 2013 a 2017, foram capazes de detectar as principais variáveis de qualidade da água de abastecimento rural no estado do Amazonas.

REFERÊNCIAS

- [1] Agência Nacional de Águas – Ana. Atlas Brasil. Abastecimento Urbano de Água. Resultado por Estados. Volume 2. 2010. Disponível em: www.ana.gov.br/atlas. Acesso em 25/11/2017.
- [2] Azevedo, R. P. Aspectos sobre o uso da água subterrânea na fronteira Brasil-Colômbia: O caso da Cidade de Tabatinga no Estado do Amazonas. In: XXX Congresso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Anais. Punta del Este - Uruguai. 2006.
- [3] _____. Um retrato do saneamento básico das cidades de Benjamin Constant e Tabatinga no Amazonas: 25 anos depois da cólera. In: 46ª Assembleia Nacional da Assemae; XX Exposição de Experiências Municipais em Saneamento. Anais. Jaraguá do Sul - SC. 2016.
- [4] Becker, B.K. Geopolítica da Amazônia. Estudos Avançados, São Paulo, V.19, N.53, p.71-86, 2005.
- [5] Brasil. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução Conama nº. 357/2005, 17 de março de 2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. 2005.
- [6] _____. Ministério da Saúde. Portaria nº 2914 de 12 de dezembro de 2011. Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Diário Oficial [da República Federativa do Brasil], Brasília, Seção 1, p. 266. 2011.
- [7] Cosama. Companhia de Saneamento do Amazonas. Informações de qualidade da água, 2013.
- [8] _____. Companhia de Saneamento do Amazonas. Informações de qualidade da água, 2014.
- [9] _____. Companhia de Saneamento do Amazonas. Informações de qualidade da água, 2015.
- [10] _____. Companhia de Saneamento do Amazonas. Informações de qualidade da água, 2016.
- [11] _____. Companhia de Saneamento do Amazonas. Informações de qualidade da água, 2017. Disponível em: <http://www.cosama.am.gov.br/qualidade/>. Acessado em: 25/10/2017 a 12/02/2018.
- [12] Cruz, Patrícia et al. Estudo comparativo da qualidade físico-química da água no período chuvoso e seco na confluência dos rios Poti e Parnaíba em Teresina/PI. In: Congresso de Pesquisa e Inovação da Rede Norte Nordeste de Educação Tecnológica, Teresina-PI. Connepi 2007. p. 1 - 6. 2007.
- [13] Esteves, F.A. Fundamentos de Limnologia. 2ª ed. Rio de Janeiro: Interciência. p. 602. 1998.
- [14] _____. Fundamentos de limnologia. 3. ed. Rio de Janeiro: Interciência. p.826. 2011.
- [15] Furch, K. & Junk, Wolfgang J. Physicochemical Conditions in Floodplains. In: Junk, W.J. (Ed.) The Central Amazon Floodplain: ecology of a pulsing system. Berlin: Dordrecht, 1997.
- [16] Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Estimativa da população dos municípios do Estado do Amazonas. 2016. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/geociencias-novoportal/organizacao-do-territorio/estruturateritorial/15761-areas-dos-municipios.html?t=destaques&c=13>. Acesso em 25/11/2017.
- [17] Junk, W.J. “Recursos hídricos da região amazônica: utilização e preservação”. Acta Amaz. 9, pp. 37-51. Geisler, R.; Knöppel, H. A. & Sioli, H. 1973 — The ecology of fresh-water fisher in Amazonia: present status and futures tasks for research. Applied Sciences and Development, 2: p.144-162. 1983.
- [18] Larsen, D. Diagnóstico do saneamento rural através de metodologia participativa. Estudo de caso: bacia contribuinte ao reservatório do rio verde, região metropolitana de Curitiba, PR. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do Paraná, Curitiba, p.182. 2010.
- [19] Lopes, U. B. Aspectos Físicos, Químicos e Ecológicos das misturas Naturais de Águas Físico-Quimicamente Diferentes, na Amazônia. Tese de Doutorado. INPA/UFAM. Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas. Manaus, 1992.
- [20] Rigobelo, E. C. et al. Padrão físico-químico e microbiológico da água de propriedades rurais da região de Dracena. Rev. Acad., Ciênc. Agrár. Ambient. v. 7, n. 2, p. 219-224, 2009.
- [21] Santos, U. M & Ribeiro. M N. G. Hidroquímica do Rio Solimões-AM. Acta Amazônica, 3-4(18): 145 -172, 1988.
- [22] Santos, U. M *et al.* Rios da Bacia Amazônica I: afluentes do rio Negro. Acta Amazônica, -2 (14): 222-237, 1984.
- [23] Silva, M. S. R.; Cunha, H. B.; Miranda, S. A. F.; GOMES, N. A.; Pascoaloto, D.; Santana, G. P. Recursos Hídricos da Amazônia: Uma classificação dos tipos e águas segundo a carga iônica- Brasil. XXI.7 Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos. Brasília – DF. Pág. 158. 2015.
- [24] Silva, M. L. Estudo Hidroquímico e dos Isótopos de Urânio nas Águas Subterrâneas em Cidades do Estado do Amazonas (AM). Rio Claro: Unesp, p. 178. 2005. Tese (Doutorado em Geociências e Meio Ambiente), Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista. 2005.

[25] Sioli, H. "Das Wasser in Amazonasgebiet". *Forsch. Fortschr.* 26 (21/22), p. 274-280. 1950

[26] _____. Introduction: history of discovery of the Amazon and the research of Amazonian waters and landscapes. In: SIOLI, H., *Amazon: limnology and landscape ecology of a mighty tropical river and its basin*. The Hague, Dr. W. Junk. p. 1-13. 1984.

[27] Sioli, H. & Klinge, H. Solos, tipos de vegetação e águas na Amazônia. *Boi. Mus. Par.*

Emílio Goeldi: Nova série: Avulsa. Belém, 1: p. 27-41. 1986.

[28] Von Sperling, M. V. Estudos e modelagem da qualidade da água de rios. Belo Horizonte: Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental; Universidade Federal de Minas Gerais. 2007.

[29] Zancul, M. S. Água e saúde. 2006. Disponível em: www.cdcc.sc.usp.br/ciencia/artigos/art. Acessado em 28/11/2017.

Capítulo 14

POTENCIAL EÓLICO NOS MUNICÍPIOS DE BOCA DO ACRE E LÁBREA NO AMAZONAS

Aryanne Resende de Melo Moura;

Carlos Alexandre Santos Querino

Altemar Lopes Pedreira Junior

Luiz Octavio Fabrício Santos

Paulo André da Silva Martins

Resumo: O aumento na demanda por energia elétrica tem se tornado uma preocupação mundial. Então surge a necessidade de explorar fontes alternativas de energias renováveis, dentre elas a energia eólica. O objetivo deste trabalho foi estimar o potencial eólico em dois municípios do Amazonas. Os aspectos considerados para estimativa da velocidade do vento e do potencial eólico basearam-se numa série histórica de dados coletados pelas estações meteorológicas automáticas de superfície pertencente ao Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). As estações foram instaladas nos municípios de Boca do Acre (8° 46' S, 67° 19' W, 111m) e Lábrea (07° 15' S, 64° 47' W, 64m) no período de 9 anos (2008 – 2017). Avaliou-se a velocidade média mensal dos ventos na altura de 10 metros. A partir dos dados diários, estimou-se a velocidade e o potencial eólico para os níveis de 50, 80 e 100 metros. As velocidades mais frequentes à 10 m foram entre 1 e 2 m s⁻¹ em Boca do Acre e de 0 a 1 m s⁻¹ em Lábrea. Para as alturas de 50, 80 e 100 m, a maior frequência estimada se manteve entre 2 a 3 m s⁻¹ em ambos os municípios. O potencial estimado apresentou frequência relativa acima de 90% para os valores entre 0 e 50 W m⁻² em todas as alturas analisadas. As estimativas obtidas de velocidade e potencial eólico nos níveis de 50, 80 e 100 metros não se apresentaram apropriadas para a instalação de aerogeradores para produção de energia em ambos municípios.

Palavras Chave: energia; vento; Amazônia.

1. INTRODUÇÃO

A energia eólica é a energia cinética contida nas massas de ar em movimento (vento). É considerada um tipo de energia alternativa limpa e abundante (SANTANA et al., 2011). Seu aproveitamento ocorre por meio da conversão da energia cinética de translação em energia cinética de rotação, com o emprego de turbinas eólicas, também denominadas aerogeradores (EPALANGA, 2013).

A conversão da energia cinética dos ventos em energia mecânica vem sendo utilizada pela humanidade há mais de 3000 anos. Desde a antiguidade, a energia eólica era usada para mover barcos, engrenar moinhos, e bombeamento de água. As primeiras tentativas para produzir eletricidade foram feitas no fim do século 19, mas só no início da década de 70, com a crise mundial do petróleo, houve um grande interesse de países europeus e dos Estados Unidos em desenvolver equipamentos para produção de eletricidade que ajudassem a diminuir a dependência do petróleo e carvão (CBEE, 2018).

O vento produz cinco vezes a energia necessária na Terra, e, é susceptível de satisfazer todas as necessidades energéticas a nível mundial (PINHO, 2008). Um dos benefícios que a energia eólica oferece ao meio ambiente está no fato de que ela não emite poluentes durante sua operação, pois parques eólicos não alteram o lençol freático por consumo, contaminação, geração ou lançamento de resíduos (FERREIRA, 2008). Os impactos sobre a flora e a fauna são considerados mínimos nas áreas de influência do empreendimento. Algumas mortes de pássaros são registradas pela colisão nas turbinas, mas são índices muito abaixo naqueles expostos na prática da caça, colisão com linhas de transmissão e tráfego de veículos (SILVA, 2015; BREITENBACH, 2016).

Na crise energética atual, as perspectivas da utilização da energia eólica são cada vez

maiores no panorama energético geral, pois apresentam um custo reduzido em relação a outras opções de energia (DA SILVA, 2007). Atualmente no Brasil, observa-se o surgimento de empreendimentos eólicos em microrregiões, como solução para o fornecimento de energia elétrica limpa, como é o caso da microrregião Sudoeste do Paraná e Oeste de Santa Catarina (ROSSONI, 2013; BAILÃO, 2016).

A matriz energética do estado do Amazonas é composta por termelétricas e a hidroelétrica de Balbina localizada no rio Uatumã, própria da concessionária e de Produtores Independentes de Energia – PIE's, representando o maior Sistema Isolado Brasileiro (EGGERMA, 2014). No entanto a energia produzida pela hidroelétrica de Balbina é destinada a cidade de Manaus, e aos municípios de Iranduba, Presidente Figueiredo e Manacapuru, os demais municípios são atendidos por sistemas elétricos isolados supridos por termelétricas.

Os municípios de Boca do Acre e Lábrea do sul do Amazonas, sofrem com a limitação das suas matrizes energéticas, pois dependem exclusivamente das termelétricas. Para solucionar essa limitação e evitar a falta de energia, é necessário que novas alternativas sejam exploradas. Assim, o objetivo deste estudo foi estimar e analisar o potencial eólico nessas regiões, para possível aproveitamento da energia eólica.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 MATERIAL E MÉTODOS

Área de Estudo

A região Sul do Amazonas possui dois períodos sazonal distintos, um chuvoso (outubro a março) e um seco (junho a agosto) com restante dos meses considerado período de transição (VIDOTTO et al., 2007). O estudo abrange dois municípios pertencentes à mesorregião do sul amazonense, Boca do Acre e Lábrea (Figura 1).

Figura 1 - Localização dos municípios de Boca do Acre e Lábrea, no sul do estado do Amazonas, Brasil.

Dados

Os dados horários de velocidade e direção do vento foram coletados entre agosto de 2008 a dezembro de 2017, pelas estações meteorológicas automáticas de superfície pertencente ao Instituto Nacional de Meteorologia – INMET nos municípios de Boca do Acre (8° 46' S, 67° 19' W, 111m) e

Lábrea (07° 15' S, 64° 47' W, 64m), no período de agosto de 2008 a dezembro de 2017.

O cálculo da velocidade média diária do vento (U) ($m s^{-1}$) (Equação 3), foi resultante das componentes zonal ($CZ = u$) (Equação 1) e meridional ($CM = v$) (Equação 2), onde (dd) é a medida de onde o vento vem e (ff) e para onde o vento sopra.

$$CZ = u = -ff \sin dd \quad (1)$$

$$CM = v = -ff \cos dd \quad (2)$$

$$U = \sqrt{u^2 + v^2} \quad (3)$$

A velocidade do vento nas alturas 50, 80 e 100 m, foi estimada pela Lei de Hellmann (Equação 4) e posteriormente foi feita a

estimativa do potencial eólico nas regiões (Equação 5) (FEITOSA et al., 2014).

$$Vh2 = Vh1 \cdot (h2/h1)^\alpha \quad (4)$$

$$P/A = 1/2 \rho v^3 \quad (5)$$

Em que, $Vh1$ é a velocidade média do vento na altura medida ($m s^{-1}$), $Vh2$ é a velocidade estimada do vento na altura de interesse ($m s^{-1}$), $h1$ é a altura medida pela estação meteorológica, $h2$ é a altura de interesse e α é o expoente de altitude de Hellmann, que neste estudo foi utilizado 0,4, P/A é o Potencial Eólico ($W m^{-2}$), ρ é a massa

específica do ar ($\rho = 1,225 kg m^{-3}$) e V é a velocidade do vento ($m s^{-1}$).

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO

As médias mensais indicam que, em geral, a direção do vento se manteve estável a sul nos dois municípios, com pequenas variações a

Sudeste no mês de julho em Lábrea (Figura 2a e 2b). Esse comportamento assemelha-se com os encontrados por Siqueira (2017), ao

analisar o regime de ventos no município de Manaus – AM, no período de 2001 a 2015.

Figura 2 – Direção média do vento a 10 m, ao longo do ano, nos municípios de Boca do Acre (a) e Lábrea (b), sul do Amazonas, no período de 2008 a 2017.

A velocidade do vento (Figura 3a e 3b) em ambos os municípios foi maior durante os meses de verão e menor no inverno, apresentando comportamento sazonal. No entanto em Boca do Acre a sazonalidade é mais perceptível, pois a variação da velocidade do vento ao longo do ano foi maior, com valor mínimo médio mensal de $0,77 \text{ m s}^{-1}$ no mês de julho e máximo de $1,29 \text{ m s}^{-1}$ em janeiro. Em Lábrea a variação foi inferior, com mínimo de $0,66 \text{ m s}^{-1}$ em agosto e máximo de $0,81 \text{ m s}^{-1}$ em fevereiro. Este fato pode estar relacionado com a altitude do município, pois Boca do Acre apresenta altitude de 111 m, enquanto que a de Lábrea é de 64 m. A intensidade da velocidade do vento é relativa ao gradiente de pressão atmosférica, quanto maior o gradiente de pressão, mais rápido os ventos se deslocarão (MOHMAD, 2010). A velocidade do vento oscilou no período de transição seco e chuvoso (Figura 2a e 2b). O aumento da velocidade durante a estação seca está associado a ausência de nuvens e maior incidência da radiação solar que fornece calor ao sistema termodinâmico atmosférico,

no qual, transformar-se, em energia cinética (movimento do ar) (TOMASINI, 2011).

As velocidades médias para todo o período analisado foram $1,07 \text{ m s}^{-1}$ e $0,75 \text{ m s}^{-1}$ em Boca do Acre e Lábrea, respectivamente. Os valores máximos médios diários ocorreram nos dias 17 de junho de 2017 e 11 de setembro de 2009 quando o vento atingiu uma velocidade de $3,55 \text{ m s}^{-1}$ (Boca do Acre) e $2,54 \text{ m s}^{-1}$ (Lábrea).

Os potenciais eólicos estimados nas regiões apresentam valores entre 0 a $437,31 \text{ W m}^{-2}$ em Boca do Acre e 0 a $160,96 \text{ W m}^{-2}$ em Lábrea, com médias de $9,23 \text{ W m}^{-2}$, $16,2 \text{ W m}^{-2}$ e $21,20 \text{ W m}^{-2}$ em Boca do Acre, e $4,69 \text{ W m}^{-2}$, $8,25 \text{ W m}^{-2}$ e $10,78 \text{ W m}^{-2}$ em Lábrea, para as alturas de 50, 80 e 100 m, respectivamente. Verificou-se que os aumentos nas alturas corresponderam significativamente no aumento do potencial eólico, no qual a maior intensidade ocorreu na altura de 100 m, onde apresentou valores médios mensais de $26,27 \text{ W m}^{-2}$ em janeiro e $10,33 \text{ W m}^{-2}$ em fevereiro, para os respectivos municípios de Boca do Acre e Lábrea (Figura 3a e 3b).

Figura 3 – Velocidade do vento para as alturas de 10m (medida), 50, 80 e 100 m (estimadas) e Potencial Eólico para as alturas estimadas nos municípios de Boca do Acre (a) e (c) e Lábrea (b) e (d).

Em todo o período estudado as velocidades mais frequentes à 10 m foram as compreendidas entre 1 e 2 m s⁻¹ e 0 e 1 m s⁻¹ para os municípios de Boca do Acre e Lábrea, respectivamente. Para as alturas estimadas de 50, 80 e 100 m, a maior frequência se manteve entre 2 a 3 m s⁻¹ em ambos os municípios (Figura 4a e 4b), demonstrando um aumento na frequência de ventos (ligeiramente) mais “fortes”. Essa tendência mostra-se também na (Figura 3a e 3b), onde o vento progressivamente torna-se mais intenso com o aumento das alturas estimadas. A medida que os ventos se

afastam da superfície, tornam-se mais uniformes e alcançam maiores velocidades devido a redução do que tende a ser maior próximo da superfície e ocasionam uma diminuição na velocidade do ar (SANTOS et al., 2006).

Os valores de potencial eólico entre 0 e 50 W m⁻², apresentaram frequência relativa acima de 90% em todas as alturas analisadas, em ambos os municípios. Percebe-se que quanto maior o valor do potencial eólico, menor a sua frequência, que em alguns casos chega a ser nula (Figura 4c e 4d).

Figura 4 - Frequência Relativa da Velocidade e Potencial Eólico Estimado (W m^{-2}) nos municípios de Boca do Acre (a) e (c) e Lábrea (b) e (d).

De acordo com Santos et al. (2009) a velocidade à qual as turbinas eólicas ou aerogeradores começam a rodar situa-se entre $2,5$ e 3 m s^{-1} , no entanto para o sistema eólico ser viável, é preciso que a velocidade média esteja em torno de 7 a 8 m s^{-1} , no qual, produziria aproximadamente a densidade de 500 W m^{-2} (GRUBB e MEYER, 1993).

É importante lembrar que, devido as características pontuais dos ventos, os resultados apresentados têm validade para os locais em que se encontram as estações meteorológicas e suas vizinhanças (locais próximos e de mesma topografia).

4.CONCLUSÕES

A velocidade do vento e potencial eólico estimados até 100 m de altura, para os municípios de Boca do Acre e Lábrea, foram muito fracos para que justificasse instalações de aerogeradores nas regiões de estudo.

Contudo, salienta-se que a instalação deste tipo de equipamento demanda de outras análises específicas, como o estudo de turbulências dos ventos em função da rugosidade da região, levantamentos ambientais sobre fauna e flora, possíveis rotas migratórias de pássaros na região, e por fim uma análise financeira detalhada de custos de implantação de torres e projetos de parques.

REFERÊNCIAS

- [1] Bailão, R. O.: Estudo Do Potencial Eólico E Análise De Regiões Propícias À Instalação De Microcentrais E Minicentraís Eólicas No Paraná. Campo Mourão – PR, 2016. 35p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Ambiental).
- [2] Breitenbach, G. Análise Do Potencial Eólico Para Geração De Energia Elétrica Em São Francisco De Paula, Rs, Utilizando Método Computacional Wasp. Lajeado, Rio Grande do Sul, UNIVATES, 2016, 79p., Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Ambiental).
- [3] Campos, M. J.; Vendramini, P. S., Santos, R. F.; Chaves, L. I.; Rosa, H. A.; Souza, S. N. M., Estimativa do potencial eólico no Município de Palotina – Paraná. Acta Iguazu, Cascavel, v.1, n.2, p. 94-103, 2012.
- [4] Da Silva, Juliane Kayse Albuquerque. Wind Characterization and Aeolian Potential estimate to the coastal region (Pilar, AL). Adviser: Prof. Dr. Roberto Fernando da Fonseca Lyra. Maceió-AL, 2007. 64p. Dissertação (Mestrado em Meteorologia).
- [5] Epalanga, O. Â. S., Energia Eólica – Viabilidade Técnica De Projeto Eólico Na Região De Urubici. Florianópolis: UFSC, 2013, Trabalho de conclusão (Universidade Federal de Santa Catarina para obtenção do título de Engenheiro Civil).
- [6] Feitosa, E. de O.; Albiero, D.; Praciano, A. C.; Macedo, D. X. S.; Chioderoli, C. A.; Simulação Do Aproveitamento da Energia Eólica para Irrigação no Distrito de Irrigado Baixo-Acaraú – CE. Revista Brasileira de Energias Renováveis, v. 3, 2014. p. 65-79.
- [7] Ferreira, H., T. Energia eólica: barreiras a sua participação no setor elétrico Brasileiro. Fagá - São Paulo, Universidade de São Paulo, 2008. 111p. Dissertação (Mestrado – Programa Interunidades de Pós-Graduação em Energia).
- [8] Greenpeace. Manifesto pela energia limpa. Disponível em <www.greenpeace.org/brasil>. Acesso em: 12 de outubro de 2017.
- [9] Grubb, M. J.; Meyer, N. I. Wind Energy: Resources, Systems and Regional Strategies. In: Johansson, T. B.; Kelly, H.; Reddy, A.; Williams, R. Renewable Energy: Sources for Fuels and Electricity. Washington, D.C.: Islan Press, 1993.
- [10] Lima, J. L.; Cavalcanti, E. P.; Souza, E. P.: Avaliação Do Potencial Eólico Em Cinco Regiões Do Estado Da Paraíba. Revista de Geografia. Recife: UFPE – Dcg/Napa, v. 27, n. 1, jan/mar. 2010.
- [11] Pinho, António Monteiro. Gestão de Projectos de Parques Eólicos. Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Porto, 2008.
- [12] Rossoni, R.: Estudo Da Viabilidade Técnica Para Implantação De Parque Eólico Na Microregião Sudoeste Do Paraná E Oeste De Santa Catarina. Pato Branco - SC, 2013. 55 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica).
- [13] Santana, M. S. Uma proposta de regulador nebuloso para geradores eólicos de indução. 104 f. Dissertação (Mestrado) – Centro de Ciências Exatas e da Terra, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2000.
- [14] Santos, A. A.; Ramos, D. S.; Santos, N. T. F.; Oliveira, P. P. Projeto de Geração de Energia Eólica. Santos: Universidade Santa Cecília, 2006.
- [15] Santos, R. G.; Santos, R. F.; Santiago, W. E. e Fiorese, D. A. Avaliação do potencial eólico do campus da Faculdade Assis Gurgacz em Cascavel, PR. Revista Cultivando o Saber. 2009. Cascavel.
- [16] SILVA, Neilton F. Energias Renováveis na expansão do setor elétrico brasileiro: o caso da energia eólica. Rio de Janeiro: Synergia, 2015.
- [17] Siqueira, L. F. Análise do Regime de Ventos em Manaus-AM no período de 2001 e 2015. Humaitá-AM: UFAM, 2017, 60p., Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Ambiental).
- [18] Tomasini, J. Padrão de Variabilidade do Vento à Superfície, em Lajeado, Rio Grande do Sul, Brasil: Implicações Ambientais. Rio Grande do Sul: Univates, 2011, 59p., Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Ambiental).
- [19] Vidotto, E.; Pessenda, L. C. R.; Ribeiro, A.S.; Freitas, H. A.; Bendassolli, J. A. Dinâmica do ecótono floresta-campo no sul do estado do Amazonas no Holoceno, através de estudos isotópicos e fitossociológicos. ACTA Amazônica, v. 37, p. 385 – 400, 2007.
- [20] Centro Brasileiro de Energia Eólica - Cbee. Panorama da Energia Eólica. Disponível em: www.eolica.org.br.

Capítulo 15

ATERRAMENTO DO IGARAPÉ ESPÍRITO SANTO EM 1893, ATUAL AVENIDA EDUARDO RIBEIRO: RETROCESSO POLÍTICO OU QUESTÕES SOCIOECONÔMICAS

Robson Lima Da Silva

Maximillian Nascimento Da Costa

Jean Carlos Oliveira Coelho

Karine Canani De Oliveira

Resumo: No centro da cidade de Manaus (originalmente chamada de Manáos), na atual Avenida Eduardo Ribeiro, o Igarapé do Espírito Santo permanece aprisionado até os dias atuais, em seu subsolo o leito latente, afluente do Rio Negro, e suas consequências advinda deste ato de retrocesso político. A motivação da pesquisa consistiu em conhecer os motivos pelos quais a sociedade da época decidiu pelo aterramento do igarapé, mesmo sabendo das consequências que poderiam advir em decorrência das transformações realizadas na flora e na fauna da cidade. O propósito do estudo consistiu em esclarecer as consequências oriundas do ato decisório ao retrocesso da política de proteção ambiental, liberando o aterramento do igarapé, visando a remodelação urbanística e arquitetônica da capital, permitindo grandes modificações na paisagem da cidade, na tentativa em transformar a capital manauense na ‘Paris dos Trópicos’. A metodologia adotado para o estudo foi de uma pesquisa bibliográfica e teve como instrumento de coleta de dados, livros, material disponibilizado na internet, de doutos cientistas do século XIX, principalmente os que estudaram, vivenciaram e residiram na cidade de Manáos, como os escritos do Dr. Alfredo A. da Matta e do pesquisador francês Paul Walle. A pesquisa revelou que o processo de ocupação urbana de Manaus é complexo até os dias atuais e o retrocesso político, que culminou em sua ‘modernização’, contribuindo de forma expressiva, não apenas para a degradação do meio ambiente, como também para o aumento da temperatura do microclima da cidade.

Palavras Chave: Manaus, Igarapé Espírito Santo, Retrocesso político

1. INTRODUÇÃO

Com a Proclamação da República, Manaus (originalmente chamada de Manáos) torna-se a capital do Estado e vivenciando um momento econômico conhecido como período Áureo da Borracha e para ampliação da área e complementar o projeto de embelezamento da cidade, o governador Eduardo Ribeiro sancionou a Lei 36, de 29 de julho de 1893, que autorizou a desapropriação dos prédios situados às margens do Rio Negro, vista da então, no período do aterramento, conhecida popularmente hoje como Praça XV de Novembro ou Praça da Matriz.

Acreditava-se que com a reestruturação urbana da Avenida Eduardo Ribeiro, procurando atender uma demanda dos moradores daquela época (minoria), não traria efeitos indesejados, como os próprios trabalhadores para a execução das obras, pois as suas moradias acabaram desestruturando outros igarapés. E com o declínio do 'ciclo da borracha' houve a migração de trabalhadores dos seringais para a capital do Amazonas, colaborando com a expansão demográfica e as ocupações irregulares.

Manáos, Estado do Amazonas, localizada cerca de 18 km da Foz do Rio Negro, um grande afluente do Rio Amazonas, nas coordenadas geográficas, Latitude 3°08'05.36" S e Longitude 60°01'34.31" W, sendo a geolocalização do Igarapé da Olaria, um braço do Igarapé Espírito Santo, seus primeiros habitantes Manáos, Tarumãs e de outras tribos que habitavam das Lages ao Tarumã Mirim. Segundo Saint-Adolphe (1845), 'A antiga villa da província do Pará assentada na margem esquerda do Rio Negro de que toma o appellido, a 3 léguas do lugar onde elle se lança no Amazonas', sendo chamada de Lugar da Barra do Rio Negro sua fundação está inteiramente ligada com a construção e instalação do Forte de São José da Barra do Rio Negro, onde os estudiosos afirmam que a data da sua construção foi em 1669.

Da elevação a categoria de Vila da Barra do Rio Negro em 29 de março de 1808 ao período provincial (1852 - 1889), nessa época, a recém-criada Província contava com apenas oito escolas de ensino primário, das quais sete eram masculinas e uma feminina: duas no Lugar da Barra – sendo uma para cada sexo – uma em Maués, uma em Ega (Cidade de Tefé), uma em Moura (Cidade de

Silves), uma em Borba e a última em Barcelos. A masculina da Capital funcionava, de maneira provisória, em uma casa situada de frente para o então largo da Olaria.

Um dos mais lindos cartões-postais que já existiram na Cidade, mas que sucumbiu ante ao 'desenvolvimento' e ao descuido dos administradores públicos e da própria população, esse logradouro estendia-se, inicialmente, da antiga rua Brasileira, atual avenida Sete de Setembro, até as margens do igarapé da Olaria – braço do igarapé do Espírito Santo – ao lado da antiga olaria provincial, sendo, por isso, chamada de Largo da Olaria. Na Planta das Villas de Manáos e Ega, levantada em 1845 por Raphael Lopes Anjo, esse espaço já aparece com o nome de Praça da Alegria. (DUARTE, 2009, p. 19)

Diante do problema que permeia o presente estudo, o propósito principal foi de esclarecer as consequências oriundas do ato decisório ao retrocesso da política de proteção ambiental, liberando o aterramento do igarapé, na tentativa de transformar a capital manauense na 'Paris dos Trópicos', alterando a paisagem natural, permitindo grandes modificações na paisagem da cidade.

2. METODOLOGIA

A metodologia adotada para este trabalho foi de uma pesquisa exploratória, porque é o primeiro passo de todo trabalho científico, pois buscou-se entender como o estudo do aterramento da Igarapé do Espírito Santo, ocorrido em 1893, no centro da cidade de Manáos procurando constatar os fatos descritos da época.

A classificação da pesquisa quanto à natureza foi caracterizada como pesquisa Básica e Aplicada. Básica, pois objetivou apresentar uma revisão da literatura sobre os fatos históricos narrados com suas implicações no meio ambiente e principalmente para a cidade de Manáos. E aplicada porque visou gerar conhecimento para a aplicação prática na solução de problema.

Quanto aos objetivos foi também caracterizada como uma Pesquisa Descritiva, pois visou descrever os principais aspectos da época que motivaram à promoção estruturais da cidade, em contrariando leis que visavam a preservação do ambiente, em busca de uma modernização de Manáos,

bem como investigar as principais vantagens e desvantagens do aterramento do igarapé do Espírito Santo.

Quanto aos procedimentos técnicos, tratou-se de uma pesquisa bibliográfica e documental, pois recorreu ao uso de materiais, como livros, artigos, relatórios e material disponibilizado na internet, bem como uma pesquisa não experimental, pois informações foram obtidas por meio das análises documentais disponibilizadas pela Biblioteca Virtual do Amazonas, com seu riquíssimo e raríssimo acervo de documentos disponibilizadas através da rede mundial de computadores (internet).

3. PAISAGEM DO IGARAPÉ DO ESPÍRITO SANTO

Ao tentar recordar da paisagem do Igarapé Espírito Santo é reverenciar a Tribo dos Manáos vivendo em perfeito equilíbrio com a natureza e sendo um local sagrado das ygásauas ou urnas mortuárias dos seus antepassados. A palavra Igarapé é originária do Tupi que significa 'estreita corrente d'água entre a vegetação', ou de l'ARA, 'canoa', mais PE, 'caminho' (Figura 1).

Os índios têm uma linda expressão para designar essas pequenas ramificações dos rios; chamam-nas igarapés, isto é, literalmente, caminho da piroga; em muitos pontos, efetivamente, há o lugar exato para dar passagem a uma embarcação desse gênero. (AGASSIZ, 2000, p. 196)

Figura 1 - Igarapé do Espírito Santo

Fonte: Keller (1874).

Segundo Matta (1915), utiliza-se erroneamente o termo 'igarapés', pois as fases de enchentes do Rio Negro alteravam o regime das águas, então o que chamamos de igarapé na realidade são pequenos rios de Manáos, afluentes do Rio Negro, onde as águas se avolumam, tumultuam e se esbatem pelas diferenças de nível, pelas planícies e encostas adjacentes.

São eles impropriamente conhecidos sob o nome de igarapé, derivado do tupi, significa um pseudo-furo, estreito, de ordinário, e sempre aberto em suas duas extremidades, chamadas com prescrição – 'bocas do igarapé'. Não se pode aplicar semelhante vocabulo a qualquer curso de água em Manáos. Cada qual possui a sua nascente, um leito apropriado e volume variavel de água corrente; serpenteiam aproveitando as diferenças de nível, colleando aqui, se

reunindo acolá, se projectando mais adiante. (MATTA, 1915, p. 5)

Loureiro (1978), ratificado pelo mapa levantado por Anjo (1845) percebemos a modificação da paisagem do referido igarapé da então, Cidade da Barra do Rio Negro, possuindo então 170 casas de pedra e de tijolo, três pontes de madeira, a matriz N.S. da Conceição, a Capela dos Remédios, várias lojas de artefatos europeus, 16 ruas, 3850 habitantes e uma praça que é o aterramento do Igarapé da Olaria, um braço do Igarapé Espírito Santo, sendo o início da urbanização da cidade. Nos relatos do pesquisador Agassiz (1865), por recomendação de Dom Pedro II, visitando a cidade, elevada então, a categoria de Província do Amazonas, podemos deduzir que as águas dos igarapés do perímetro urbano da cidade de Manáos

encontravam-se impróprias para o consumo humano.

Passeios - Os 'aguadeiros'. Um dos meus grandes prazeres em Manaus é, à tarde, ao cair do dia, dirigir os meus passeios para a floresta vizinha e ver desfilarem os "aguadeiros", índios ou negros, que passam de volta por um estreito caminho, trazendo na cabeça um grande jarro vermelho de barro, cheio d'água. É como uma procissão, de tarde e de manhã; a água do rio passa por não ser boa para se beber, e, de preferência, a cidade se fornece das pequenas lagoas e riachos da mata. (AGASSIZ, 2000, p. 197)

O sistema de abastecimentos realizados pelos "aguadeiros" proviam do igarapé Cachoeira Grande, as "termas" da floresta, posteriormente canalizada, sendo o primeiro serviço de água canalizada do Brasil, a partir da represa da Cachoeira Grande, em 1883/84.

Chama-se a 'cascatinha', para distinguir este lugar dum outro mais pitoresco ainda, segundo dizem, situado a meia légua do outro lado da cidade, e onde existe uma queda d'água mais considerável. Em trinta minutos, os remadores nos conduziram, através dos caprichosos meandros do rio, a uma espécie de barragem natural feita pelos rochedos; as águas se precipitam com grande ruído sobre as partes baixas do rio, formando corredeiras. (AGASSIZ, 2000, p. 246)

Manáos teve um crescimento constante até a Proclamação da República. Teve a primeira iluminação urbana a gás globe (óleo de nafta), em 1858; serviços telefônicos em 1888; um Museu Botânico, em 1883 e o Mercado Municipal Adolpho Lisboa em 1881, torna-se a capital do Estado e vivenciando um momento econômico conhecido como período Áureo da Borracha e para ampliar a área e complementar o projeto de embelezamento dessa Praça, o Governador Eduardo Ribeiro sancionou a Lei 36, de 29 de julho de 1893, que autorizou a desapropriação dos prédios situados às margens do rio Negro, vista da então Praça da Imperatriz no período do aterramento da sua área.

De acordo com as estatísticas oficiais Matta (1915) e Loureiro (1978) afirmar que, 'em 1890, ano seguinte a instalação do Regime República a cidade de Manáos, contava com uma população de 38.720 habitantes, dos quais 20.568 do sexo masculino e 18.162 do sexo feminino, uma cidade de porte médio'.

4. O ATERRAMENTO DO IGARAPÉ DO ESPÍRITO SANTO

Segundo Correa (2012), Manáos apenas uma grande aldeia, antes do Ciclo Gumífero (Ciclo da Borracha), mas os primeiros moradores desta aldeia, a tribo dos Manáos conviveram milhares de anos harmoniosamente com o Igarapé do Espírito Santo, e em suas margens um local sagrado, onde enterravam seus ascendentes nas suas ygásauas (urnas mortuárias).

Na segunda metade do século XIX, a Metrópole da Borracha, iniciava-se, assim o seu período áureo que lhe permitiria grandes e profundas transformações, em uma urbe moderna e um verdadeiro polo de atração de comerciantes, profissionais liberais, construtores, operários especializados e aventureiros.

O Governador Eduardo Ribeiro (1890), intimamente vinculada ao alto comando militar-positivista encontrou no estado do Amazonas opulento recursos financeiros e teve visão e audácia para a remodelação urbanística e arquitetônica. O estado do Amazonas precisando apenas, de um homem de 'engenheiro e arte', e Eduardo Ribeiro 'O Pensador' fundamentado no Pensamento Positivistas, tendo a França como expoente de suas ideias e difusão e a *beaux-art* (fina arte) de Paris de Haussmann é o sincronismo perfeito para o início das obras de Engenharia na cidade de Manáos.

A remodelação urbanística e arquitetônica da capital dá prova de sua audácia e visão. E sua Mensagem de 10 de julho de 1894 nos diz da prosperidade do Estado. Nela, lemos: 'A opulenta receita do Estado, os grandes excessos sempre crescentes das arrecadações efetuadas sobre as orçadas, são a prova mais evidente de que o Amazonas é capaz dos mais corajosos empreendimentos. (CORREA, 2012. p. 25)

As inspirações do Governador Eduardo Ribeiro foram as grandes obras do Barão Georges-Eugène Haussmann, Prefeito de Paris (meados do século XIX) como grande parte de Paris, o bairro de Le Marais fedia horivelmente em 1853, cujo principal objetivo era limpar Paris, estavam certas as ideias que o Rio Bievre seria concretado e enterrada, e não viajaria mais para o Sena, mas para os esgotos de Paris.

Quando o imperador francês Napoleão III deu instruções a Haussmann para reconstruir a cidade com grandes e salubres avenidas. Regiões inteiras da cidade seriam demolidas e substituídas por avenidas. Haussmann construiu grandes quarteirões, parques inspirados no Hyde Park, de Londres, um sistema de esgoto abrangente, um novo aqueduto que dava acesso amplo a água doce, uma rede de canos de gás subterrâneos para iluminar ruas e prédios, banheiros públicos grandiosos.

Reconduzido ao posto de governador, com o apoio do então presidente da República Floriano Peixoto (1891-1894), Eduardo Ribeiro tenta demonstrar que é o homem certo para o momento. Por meio de mensagens ao Congresso Estadual, pode acompanhar o ritmo de trabalho que impôs ao seu Governo e as suas obras.

DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS

Art. 1.º – O período governamental ocupado pelo Governador Dr. Eduardo Gonçalves Ribeiro, e Vice-Governador Coronel Guilherme José Moreira (Barão de Juruá) terminará quatro anos depois da promulgação desta Constituição.

Art. 2.º – O mandato dos actuaes Representantes terminará a 32 de dezembro de 1894. (C.P.E.A, 1892. p. 118)

Desde a construção de arruamento e calçamento das vias públicas, até a construção de prédios para Administração e abastecimento d'água e o aterramento de igarapés, sendo o primeiro deles o Igarapé do Espírito Santo (Figura 2).

Figura 2 - Canalização e casas à beira do Igarapé do Espírito Santo

Fonte: huebner (1890).

5. O RETROCESSO POLÍTICO DO CÓDIGO DE POSTURA MUNICIPAL DE MANÁOS

Ao analisar a Promulgação da Lei N. 247 - de 1 de junho de 1872 - Código de Posturas Municipal de Manáos, pode-se afirmar que a legislação encontra-se na vanguarda de seu tempo, muito bem elaborada pelos legisladores, onde elenca as leis e as suas penalidades sobre os seguintes temas: Licença prévia para construção, Extração de Jazidas, Delimitação de Área de Preservação Permanente (APP), Resíduos da Construção Civil (RCC), Fiscalização de obras de construção civil, *Fiscalização de poluição sonora, Limpeza pública, Controle e aferição de pesos e medidas e etc...*

Alguns artigos da Lei Municipal N. 247 - de 1 de junho de 1872 - Promulga o Código de Posturas Municipais de Manáos:

Art. 1. - Sem previa licença da camara e alinhamento dado pelos empregados competentes, não se dará começo dentro dos limites da cidade, a qualquer, a qualquer edificio ou muro nem reconstrucção d'elles; e sempre fôr possível buscará o projectado edificio ou muro [...]

§ 1. - Os proprietarios, apresentando o risco e desenho exterior da obra que deseja construir, deverão requeer à camara, o alinhamento necessário afim de que,

aprovados pela camara taes desenhos, ella conceda o referido alinhamento.

Art. 5. - Dentro do municipio ninguem poderá, em estradas, margens de rio ou terras devolutas cortar arvores, quer sejam frutiferas ou não. O infracto incorrerá na multa de trinta mil réis ou oito dias de prisão.

Art. 7. - Fica prohibido o corte de arvores ou varas maiores de dois metros em todas as margens de riachos ou igarapés dentro dos limites da cidade e suburbios, em uma zona de quatorze metros de largura a partir do leito dos mesmos riachos ou igarapés.

O infracto incorrerá na multa de vinte mil réis ou cinco dias de prisão.

§ 1. - Nesta mesma pena incorrerão aquelles que fizeram escavações nesses lugares, revolverem lama, deitarem lixo, pedras, páos, cousas putridas ou qualquer outra materia, que possam alterar a passagem das aguas.

Art 39. Fica Prohibido d'ora em diante tirar-se agua no igarapé do atterro para ser vendida a população e bem assim n'elle lavar roupa, cavallos e outros animaes. Ao infractor cinco mil réis de multa ou dois dias de prisão.

Art. 52 – Os igarapés dos Remedios, Espirito Santo e São Vicente, que cortão esta cidade deverão ser limpos todos os annos, pela menos duas vezes, à custa da camara, afim de desinfectal-os de quaequer immundiciais que, estagnadas, possam causar insalubridade publica, bem como roçar e queimar as matas em tempo próprio, de forma que no principio das enchentes se conserve todo o espaço sempre limpo. Aquelles que forem encontrados a fazer n'elles despejos ou obstruções, por meio d'entulhos, serão multados em trinta mil réis ou oito dias de prisão, e o dobro na reincidencia.

O retrocesso político evidencia-se com a promulgação em 27 de junho de 1891, da primeira Constituição Política do Estado do Amazonas onde são suspensas as leis, deliberações, posturas, resoluções e decisões das Intendências Municipais e a nomeação do Governado Eduardo Ribeiro permitindo grandes modificações na paisagem da cidade e ocasionado um retrocesso na política ambiental.

Art. 114 – As leis, deliberações, posturas, resoluções e decisões das Intendencias Municipaes que offenderem explicita ou implicitamente as Constituições e leis da União e do Estado e forem manifestamente

contrarias a ecconimia do municipio, serão suspensa em todo ou em parte, pelo Poder Executivo da Estado quando delle tiver sciencia e poderão ser annulladas pelo Congresso do Estado.

§ Unico – Neste caso cumpe ao Governador ou ao Congresso providenciar de modo que o serviço do municipio não seja perturbado. (C.P.E.A, 1891, p. 113)

Em 1892, ano seguinte a promulgação do retrocesso político, foi dado início à reestruturação urbana e à execução do projeto paisagístico dá então Praça da Imperatriz, sendo renomeada como Praça XV de Novembro em homenagem a Proclamação da República, e do Tesouro do Estado, no término do aterro do igarapé o Espírito Santo. Projetando um grande número de vias públicas, inclusive a avenida Eduardo Ribeiro, terminando no alto da colina no Palácio Justiça, cuja a construção iniciou em 1894, pela firma inglesa Moers & Moretonaté.

Manáos, a bucólica cidade descrita pelo pesquisador AGASSIZ, (1865):

Manaus. Que poderei dizer da cidade de manaus? É uma pequena reunião de casas, a metade das quais parece prestes a cair em ruínas, e não se pode deixar de sorrir ao ver os castelos oscilantes decorados com o nome de edificios públicos: tesouraria, câmara legislativa, correios, alfândega, presidência. Entretanto, a situação da cidade, na junção do rio negro, do amazonas e do solimões, foi das mais felizes na escolha. (Agassiz, 2000, p. 1965)

A reestruturação da cidade de Manaós não buscava apenas atender aos interesses do Governo, mas de uma sociedade que emergiu dos auferidos lucros dos negócios da seringa, que em suas viagens a Europa voltavam vislumbrados com a arquitetura e representações teatrais.

Casas, mansões e palacetes começaram a preocupar os homens enriquecidos nos negócios da seringa. As viagens à europa, os produtos importados, as notícias publicadas nos periódicos, que começavam a circular, o dinheiro ocioso, fizeram nascer naquela sociedade de bandeirantes a necessidade do conforto, do luxo e, muitas vezes, de requinte. (Correa, 2012, p. 27)

6. PAISAGEM MODIFICADA DO IGARAPÉ DO ESPÍRITO SANTO

Com o aterramento do Igarapé do Espírito Santo, a Avenida Eduardo Ribeiro tornou-se a artéria principal onde se sente o luxo e esplendor e o elevado nível de Manáos e a preferida dos manauenses, sendo

notoriamente comparada pelo pesquisador francês Paul Walle (1907) à Paris e admirando os grandes esforços e as obras de Engenharia para o embelezamento da cidade (Figura 3).

Figura 3 - Manaos - Avenue Eduardo Ribeiro (Manáos - Avenida Eduardo Ribeiro)

Fonte: Walle (1907).

A maior parte das transformações e embelezamentos foram inaugurados sob a administração do Dr. Eduardo Ribeiro, que proporcionalmente manteve para Manáos o que o Barão Haussmann fez para Paris. A superfície construída está aumentando dia a dia, e como o solo é muito pouco acidentado, os habitantes tiveram que fazer um trabalho considerável, cavar traquéias, elevar colinas, erguer moradas e encher murais. Mas o mais moderno e bonito de todos é a Avenida Eduardo Ribeiro, lindamente pavimentada e iluminada. É o ponto de encontro do mundo elegante, a caminhada preferida dos Manaenses. (WALLE, p. 107, tradução nossa)

Mesmo com toda admiração do pesquisador francês Paul Walle (1907) outro pesquisador naturalista suíço Agassiz (1865) realizou pesquisas nos igarapés de Manáos prevendo os efeitos ambientais, caso houvesse a reduzindo do habit para os peixes amazônicos.

Os deslocamentos dos peixes amazônicos são o efeito da extensão ou da redução do habitat, o qual segue a amplitude do aumento e da diminuição das águas; não são o resultado dum instinto de migração. Poderiam ser comparados aos movimentos de certos peixes do oceano que, em dada estação, procuram os baixios do litoral e passam o

resto do ano nas águas mais profundas. (AGASSIZ, 2000, p. 328)

Nos dias atuais, ao caminharmos pela Avenida Eduardo Ribeiro jamais poderíamos abstrair o ar bucólico do início do século XX, relatado por Matta (1915).

O mais importante é o da avenida Eduardo Ribeiro e cujo traçado precisei já; poucas pessoas ao passar nessa bonita via publica com a sua linha de carris electricos, toda arborizada, com regulares construcções, tendo no alto de um lado o Palácio de Justiça e do outro o Theatro Amazonas, suspeitarão sequer que ahi existia quasi todo o antigo leito do chamado igarapé do Espirito Santo, ou do Aterro. (MATTÁ 1915, p. 11)

O século XIX, com seus naturalistas científicos, vê reacender a fascinação, mas agora tingida por um apelo racional do cientista prussiano Humboldt (1659 -1769), o aclamado e influente cientista-naturalista que explorou as Américas na virada do século XVIII para XIX, é considerado o pai de ciências como geografia física, meteorologia e ecologia. Ele empregou o termo hileia (*Hyleae*) [do grego, floresta selvagem] para a Amazônia, e com as riqueza e encantamento das suas descrições minuciosas, inspirou gerações de naturalistas, Darwin entre eles. De Humboldt vêm as primeiras sugestões da

ligação entre a floresta, a umidade do ar e o clima que inspiram Matta a seguinte conclusão:

Apreciações de estrangeiros e até de brasileiros empestam ao Amazonas as características de um clima insuportável, senegalesco, ardente, mortífero, sendo Manáos o ponto principal porque se acha próximo a linha do Equador. Verdade é que a evolução e marcha dos trabalhos a que foi submetida a capital do Amazonas, algo alteraram as suas antigas condições meteorológicas, visto os aterros de igarapés, a protecção de ruas e avenidas com asfalto, os paralelepípedos de granito, a pedra tosca, milhares de construções de um, dois e mais andares, o desbastamento e a destruição das matas e florestas de toda a zona urbana e suburbana, excepto de certos trechos de alguns igarapés, a construção de usinas e tantos outros factores do progresso. Dahi, porém, áquellas conclusões vai um absurdo. (MATTA, 1915, p. 35)

Matta (1915), homenageado através da Fundação de Dermatologia Tropical e Venereologia Alfredo da Matta (FUAM), relacionou o aumento da temperatura com as reestruturações urbanas do Governador Eduardo Ribeiro, entre elas: desmatamento e aterramento dos igarapés da cidade de Manáos. Segundo Nobre (2016), “Por tudo isso, é necessário, desejável, viável e até lucrativo alterar o *modus operandi* da ocupação humana na Amazônia.

Na grande floresta da Amazônia, a Terra guarda um de seus mais espetaculares tesouros: a profusão de vida que inala gás carbônico e exala oxigênio, transpira água, emite odores mágicos, remove gases tóxicos, pulsa e regula, umedece e faz chover, propele ventos e alimenta rios aéreos, acalmando a fúria dos elementos, tornando amigo o clima próximo e também o mais distante. (NOBRE, 2016, p. 36)

As sociedades abrigadas sob seu hálito doador de vida têm nela um cordão umbilical que sustém suas economias e lhes dá bem-estar Nobre (2016), cordão umbilical que a Tribo dos Manáos, que significa Mãe dos Deuses, soube perpetuar por séculos, mantendo sua ligação com a floresta Amazônica. Daí os fatos que inter-relacionam com as observações de Agassiz (1865) e as afirmações de Matta (1915, p. 35).

O clima de que gosamos causa-nos surpersa das mais agradáveis. Esperava sempre viver,

desde que estivessemos na região amazônica, debaixo de um calor afflictivo, ininterrupto, intolerável. Longe disso: as manhãs são frescas; é uma delícia passear de manhã a pé ou a cavalo, entre seis e oito horas. Si ao meio dia o calor é realmente muito grande, elle diminue para as quatro horas; as tardes são inteiramente agradáveis e a temperatura das noites nunca é incommoda. Quando mesmo correr do dia ella é mais forte, o calor não é suffocante; sempre uma brisa sopra lentamente (AGASSIZ, 1865 apud MATTA, 1915, p. 36).

7. CONCLUSÃO

O Igarapé do Espírito Santo é o marco de uma política de reestruturação urbana na cidade de Manáos na busca da *Belle Époque* ‘Bela Época’, onde a França transformou-se em referência mundial em educação, ciência e arte, sendo a capital Paris o ‘coração’ da *Belle Époque* Mundial, mas notoriamente a promulgação da Lei N. 247 de 1 de junho de 1872 – Código de Posturas Municipaes de Manáos, é prova cabal que a referida lei municipal encontrava-se na *avant-garde* (vanguarda) da *Belle Époque* Mundial.

[...]As reestruturações urbanas pelo capital não eliminam o infortúnio, fazem apenas com que reapareça em outro lugar [...]. O problema não é de construção de casas, mas da lógica social. (ENGELS, 1872)

A reestruturação urbanas da Avenida Eduardo Ribeiro buscou atender os anseios de uma Sociedade de Bandeirantes e ocasionou infortúnio com os próprios trabalhadores, pois suas moradias acabaram desestruturando outros igarapés. E com o declínio do ‘ciclo da borracha’ a migração de trabalhadores dos seringais para a capital do Amazonas colaboraram com a expansão demografia e as ocupações irregulares.

O aterramento dos igarapés de Manáos contribuiu de forma expressiva, não apenas para a degradação do meio ambiente, como alteração na umidade do ar, precipitações e ventos e consequentemente o aumento da temperatura do microclima da cidade, relatados por Matta (1915), sendo comprovado cientificamente 101 (cento e um anos) depois por Corrêa et al (2016) que os fatores antropogênicos (derivados das atividades humanas) como ilha de calor e o efeito de urbanização das cidades, ou à

combinação dos dois são os responsáveis pelo aumento da temperatura.

Atualmente a expansão da cidade para Região Metropolitana de Manaus (RMM) composta pelos municípios de Manaus, Careiro da Várzea, Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Novo Airão, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva é preocupante, pois não basta haver leis ambientais rigorosas como a Lei N. 247 de 1ª de junho de 1872 –

Código de Posturas Municipais de Manáos, mas Políticas de Estado para conduzir a ocupação e ordenamento urbano das cidades no Estado do Amazonas, evitando Crimes Ambientais e ocupações irregulares.

‘Por tudo isso, é necessário, desejável, viável e até lucrativo alterar o modus operandi da ocupação humana na Amazônia’. (NOBRE, 2016)

REFERÊNCIAS

- [1] Agassiz L.; Agassiz. E. C. Viagem ao Brasil 1865 – 1866. Brasília-DF: Senado Federal, Conselho Editorial, 2000.
- [2] Bbc Brasil. O homem que construiu a Paris que conhecemos hoje. Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/02/160203_vert_cul_criador_paris_lab>. Acesso em: 20/02/2018.
- [3] Brasil, Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Novo Código Florestal Brasileiro. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm> Acesso em: 20/02/2018.
- [4] Collecção das leis da província do Amazonas. Lei Municipal N. 247, de 1 de junho de 1872 – Código de Posturas Municipais de Manáos. Manáos (1872). Disponível em: https://issuu.com/bibliovirtualsec/docs/c077_colec_o_das_leis_da_prov_n. Acesso em: 25/02/2018.
- [5] CORREA, L. M. O. Nascimento de uma cidade Manaus 1890 a 1900. 2012. 2ª Ed. Ed. Cultura. Governo do Estado do Amazonas. Disponível em: <https://issuu.com/bibliovirtualsec/docs/nascimento_de_uma_cidade_o_-_manau>. Acesso em: 25/02/2018.
- [6] Corrêa, P. B. et al. Estudo do Fenômeno da Ilha de Calor na Cidade de Manaus/AM: Um Estudo a Partir de Dados de Sensoriamento Remoto, Modelagem e Estações Meteorológicas. Revista Brasileira de Meteorologia, v. 31, n. 2, 167-176, 2016. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/rbmet/v31n2/0102-7786-rbmet-31-02-0167.pdf>>. Acesso em: 28/03/2018.
- [7] Constituição Política do Estado do Amazonas. Manáos (1892). Disponível em: <https://issuu.com/bibliovirtualsec/docs/constituio_pol_tica_do_estado_do_>. Acesso em: 25/02/2018.
- [8] Estado do Amazonas. Contracto de Exgottos e Abastecimento d'água. Protesto interposto pela Associação dos Produtores de Manáos contra a Fazenda do Estado e a Manáos Improvement Limited. Manáos. 1908. Disponível em: <https://issuu.com/bibliovirtualsec/docs/contracto_de_exgoto>. Acesso em: 10/02/2018.
- [9] Engels, F. Sobre a questão da moradia. Coleção: Marx e Engels. Boitempo Editorial. 2015.
- [10] Herrán, J. Coleção Jorge Herrán. Disponível em: <<https://noamazonaseassim.com.br/represa-da-cachoeira-grande-em-manaus/>>. Acesso em: 15/02/2018.
- [11] Matta, A. A. Geographia e Topographia Médica de Manáos. Livraria Reunaud 1916. Disponível em: <https://issuu.com/bibliovirtualsec/docs/geographia_e_topographia_medica_de_>. Acesso em: 16/02/2018.
- [12] Nobre, A. D. O Futuro Climático da Amazônia. Relatório de Avaliação Científica. Ed. ARA Articulación Regional Amazônica. 2016. Disponível em: <https://www.socioambiental.org/sites/blog.socioambiental.org/files/futuro-climatico-da-amazonia.pdf>. Acesso em: 18/02/2018.
- [13] Keller, F. The Amazon and rivers. Sketches and descriptions from the notebook of an explorer. London. Chapman and Hall, 193, Piccadilly, 1874.
- [14] Saint-Adolphe, J. C. R. M. Dictionario Geographico do Imperio do Brazil. Paris. em casa de J.P. Aillaud, Editor 11, Quai Voltaire, 1845.
- [15] Souza, D. C. Album de Manaus 1848 a 1948. 1ª Centenários da Fundação da Cidade de Manaus. Ed. Prefeitura Municipal de Manaus. Disponível em: <https://issuu.com/bibliovirtualsec/docs/albumdacidadedemanaus_1848.1948> Acesso em: 20/02/2018.
- [16] Souza, D. A. Album da Cidade de Manaus, 1948. Disponível em: <https://issuu.com/bibliovirtualsec/docs/albumdacidadedemanaus_1848.1948>. Acesso em: 20/02/2018.
- [17] Walle, P. Caoutchouc du Brésil. Au Pays de Lyor Noir. Paris: Editeur E. Guilmoto, 1909. Disponível em: <<https://issuu.com/scduag/docs/fra11207>>. Acesso em: 20/02/2018.

Capítulo 16

DEPOSIÇÃO IRREGULAR DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DEMOLIÇÃO EM GUARABIRA-PB

Thiago de Sá Sena

Anderson Oliveira de Sousa

Bruno Menezes da Cunha Gomes

Felipe Augusto da Silva Santos

Lucas Moura Delfino

Luiz Ricardo da Silva Linhares

Manoel Leandro Araújo e Farias

Resumo: O objetivo da pesquisa foi avaliar os locais de deposição irregular de RCD no município de Guarabira-PB, avaliando os possíveis impactos ambientais e socioeconômicos causado pela prática. Foram feitas visitas junto as Secretaria de Urbanismo, Meio Ambiente e Saneamento (SUMASA) para entrevistas, visando obter dados a respeito do plano de gestão dos resíduos da construção civil do município de Guarabira-PB. Em seguida foram visitados os locais com suspeitas de deposições irregulares e a partir de fotos tiradas no local obteve-se um diagnostico da situação. Os resultados mostraram situações de descaso ao meio ambiente e saúde pública nos locais de deposições irregulares, visto que não há nenhum monitoramento e nem serviços técnicos presentes nesses locais. Portanto, politicas de gerenciamento de RCD se faz necessário no município de Guarabira-PB para que haja melhor planejamento e responsabilidade com o meio ambiente.

Palavras Chave: Meio ambiente., Disposição irregular., RCD.

1. INTRODUÇÃO

O desenvolvimento da sociedade ocorreu de forma desordenada, sem planejamento, à custa de níveis crescentes de poluição e degradação ambiental. Com o avanço da urbanização, o consumo de matéria prima e consequentemente a geração de resíduos passou a ser destaque diante da questão ambiental. A população processa, por meio de sua tecnologia, os recursos naturais finitos, gerando algum tipo de poluição. (RIBEIRO E DIAS, 2013). Pode-se considerar a construção civil como um dos maiores consumidores de recursos naturais. O desempenho do setor da construção civil, segundo valores de produção e comercialização de materiais, serviços e unidades prediais, apresentou 9,21% do PIB – Produto Interno Bruto do Brasil, em 2010 (MELENDRES, 2011).

Dos tipos de resíduos destacam-se os da Construção Civil e Demolição (RCD) devido principalmente ao volume e a quantidade gerados em todo país. A Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos (Abrelpe) relata que foram coletados mais de 35 milhões de toneladas de RCD em 2012, um aumento de 5,3% em relação a 2011 e um índice de 0,686 Kg.habitante⁻¹.dia⁻¹ (ABRELPE, 2013).

Diante do grande desperdício desses materiais, são gerados inúmeros problemas e um deles é o local adequado para o despejo devido principalmente pela grande quantidade. (RIBEIRO E DIAS, 2013). Os geradores são "pessoas, físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, responsáveis por atividades ou empreendimentos que gerem os resíduos" e os transportadores são os encarregados da coleta e do transporte dos resíduos entre as fontes geradoras e as áreas de destinação. (CONAMA, 2002).

Essa realidade também faz parte do município de Guarabira-PB que é caracterizado como um dos maiores do estado e possui uma população estimada de 55.340 habitantes segundo dados do IBGE (2010). Está localizado no semiárido, em uma região transitória entre as planícies litorâneas e as

elevações do planalto da Borborema, o município está inserido na unidade geoambiental da Depressão Sertaneja e sua superfície é caracterizada pelo relevo suave-ondulado cortado por vales estreitos. (CPRM, 2005).

Nesse contexto, o presente trabalho realizou uma investigação nos locais de deposição irregular de RCD na cidade de Guarabira-PB, com intuito de analisar os impactos ambientais e socioeconômicos.

2. OBJETIVO

Analisar os locais de deposição irregular de RCD no município de Guarabira-PB, com ênfase nos impactos ambientais e socioeconômicos causado pelo material.

3. METODOLOGIA

Foram feitas visitas junto as Secretaria de Urbanismo, Meio Ambiente e Saneamento (SUMASA) para entrevistas, visando obter dados a respeito do plano de gestão dos resíduos da construção civil do município de Guarabira-PB. Em seguida foram visitados os locais com suspeitas de deposições irregulares e a partir de fotos tiradas no local obteve-se um diagnostico da situação.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

uarabira é um município do estado da Paraíba, no Brasil. É uma das cidades mais populosas do estado. Situa-se a 98 quilômetros da capital estadual João Pessoa; a 100 quilômetros de Campina Grande, mais populosa cidade do interior paraibano; a 198 quilômetros de Natal, a capital do Rio Grande do Norte; e a menos de 250 quilômetros do Recife, a capital de Pernambuco. A figura 01 ilustra a localização da cidade em relação ao estado da Paraíba.

Figura 01: Mapa da localização da cidade de Guarabira-PB.

Fonte: www.skyscrapercity.com.

A figura 02 mostra a área de um dos despejos dos resíduos de construção e demolição (RCD) localizada na área urbana da cidade, a

figura 03 mostra outro local de despejo dos resíduos localizado às margens da PB-073, no trecho que liga Guarabira à Mari.

Figura 02: Imagem aérea de um dos locais de deposição de resíduos de construção e demolição (RCD), na área urbana da cidade de Guarabira-PB.

Fonte: Google Maps, 2015.

Figura 03: Imagem aérea do lixão da cidade de Guarabira-PB, localizado às margens da PB-073, outro local de destino para os resíduos de construção e demolição (RCD).

Fonte: Google Maps, 2015.

As figuras 04 e 05 mostram realidade do lixão da cidade Guarabira-PB, onde há

degradação ambiental e saúde pública se mostram comprometidas.

Figura 04: Lixão da cidade de Guarabira-PB, localizado às margens da PB-073, outro local de destino para os resíduos de construção e demolição (RCD).

Fonte: <http://guarabira50graus.blogspot.com.br>.

Figura 05: Lixão da cidade de Guarabira-PB, localizado às margens da PB-073, outro local de destino para os resíduos de construção e demolição (RCD).

Fonte: <http://guarabira50graus.blogspot.com.br>.

O mais grave na atual cena urbana de Guarabira-PB é o lixão a céu aberto, queimando os resíduos durante o dia e a noite e liberando fumaça extremamente tóxica para

dentro da cidade. A figura 06 mostra as queimadas frequentes no lixão da cidade, no qual a fumaça altamente tóxica prejudica a população mais próxima da região.

Figura 06: Queimadas no lixão da cidade de Guarabira-PB, localizado às margens da PB-073, outro local de destino para os resíduos de construção e demolição (RCD).

Fonte: <http://guarabira50graus.blogspot.com.br>.

As figuras 07, 08 e 09 mostram o segundo local de deposição irregular na cidade de Guarabira-PB, onde o despejo é feito sem

nenhum controle técnico, e com o consentimento da prefeitura local.

Figura 07: Caminhão despejando resíduos de construção e demolição (RCD) na cidade de Guarabira-PB, localizado nas intermediações do bairro nordeste I e nordeste II.

Fonte: Dados da pesquisa, 2015.

Figura 08: Caminhão despejando resíduos de construção e demolição (RCD) na cidade de Guarabira-PB, localizado nas intermediações do bairro nordeste I e nordeste II.

Fonte: Dados da pesquisa, 2015.

Figura 09: Resíduos de construção e demolição (RCD) na cidade de Guarabira-PB, localizado nas intermediações do bairro nordeste I e nordeste II.

Fonte: Dados da pesquisa, 2015.

Como visto na figura 07, 08 e 09 os entulhos são despejados continuamente e em grande quantidade por caminhões particulares e de empresas privadas, muitos deles estão a serviço de pequenas e médias construtoras da cidade. As empresas e os motoristas dos caminhões infringiram as leis ambientais federais 9.605, dos crimes ambientais, 12.305, da Política Nacional de Gerenciamento e Gestão de Resíduos

Sólidos, e 6.938, que trata da Política Nacional do meio ambiente. As figura 10, 11 e 12 mostra uma triste realidade próximo a esse local de deposição irregular, onde um rio e casas residenciais ficam exposto aos resíduos de construção e demolição, no qual em dias de chuvas pode acarretar no assoreamento dos rios e como consequências inundações/cheias na região.

Figura 10: Residências próximas a um rio, local de deposição de resíduos de construção e demolição (RCD) na cidade de Guarabira-PB, localizado nas intermediações do bairro nordeste I e nordeste II.

Fonte: Dados da pesquisa, 2015.

Figura 11: Rio próximo ao local de deposição de resíduos de construção e demolição (RCD) na cidade de Guarabira-PB, localizado nas intermediações do bairro nordeste I e nordeste II.

Fonte: Dados da pesquisa, 2015.

Figura 12: Residências próximas ao local de deposição de resíduos de construção e demolição (RCD) na cidade de Guarabira-PB, localizado nas intermediações do bairro nordeste I e nordeste II.

Fonte: Dados da pesquisa, 2015.

5.CONCLUSÕES

A construção civil ainda tem grandes desafios no reaproveitamento e reciclagem dos RCD, pois esse problema está ligado a diminuição do déficit habitacional, a criação e melhoramento da infraestrutura de transporte, saneamento, energia e etc., e assim amenizando os problemas ambientais causados por essa grande demanda. Os problemas ambientais devem ter mais

importância no âmbito da construção civil, visto que empresas e engenheiros são as que mais contribuem para esse cenário degradante. Portanto, para uma melhor eficácia e aproveitamento desses resíduos as construtoras e a prefeitura devem trabalhar em sintonia para a diminuição do impacto ambiental e social.

REFERÊNCIAS

- [1] Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais – Abrelpe. Disponível em: http://www.abrelpe.org.br/panorama_apresentacao.cfm. Acesso em: 22 fev. 2015.
- [2] Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama. Resolução Nº 307, de 5 de julho de 2002. Ministério das Cidades, Secretaria Nacional de Habitação. Publicada no Diário Oficial da União em 17 set. 2002.
- [3] CPRM - Serviço Geológico do Brasil. Projeto cadastro de fontes de abastecimento por água subterrânea. Diagnóstico do município de Guarabira, estado da Paraíba. Organizado [por] João de Castro Mascarenhas, Breno Augusto Beltrão, Luiz Carlos de Souza Junior, Franklin de Moraes, Vanildo Almeida Mendes, Jorge Luiz

Fortunato de Miranda. Recife: CPRM/PRODEEM, 2005.

- [4] IBGE. Censo 2010. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/tabelas_pdf/total_populacao_paraiba.pdf. Acesso em: 15 ago. 2015.
- [5] Melendres, Luciana Nunes. Gerenciamento Integrado dos Resíduos Sólidos Urbanos da Construção Civil: Administração Alicerçada na Resolução Federal CONAMA nº 307/2002 - O Caso de Uberlândia/MG. 2011. 172 f. Dissertação (Mestre) - Curso de Arquiteta e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2011.
- [6] Ribeiro, F. A. B. S.; Dias, J. F. Deposição Irregular dos Resíduos de Construção Civil Em Uberlândia/MG. Uberlândia: Revista Nacional de Gerenciamento de Cidades, v. 1, n. 5, 2013. Mensal.

Capítulo 17

A GUARDA MUNICIPAL E SUA RELAÇÃO COM AS ÁREAS PROTEGIDAS DE MANAUS: UM ESTUDO ANALÍTICO À LUZ DA LEI Nº 13.022/2014.

Antonio Jorge Barbosa da Silva

Ygor Felipe Távora da Silva

Resumo: Esta obra tem por objetivo analisar as atribuições do guarda municipal na conservação do Meio Ambiente como patrimônio municipal por meio das unidades de conservação, em especial destacando os avanços legais após o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Justificando-se pelo dever do Poder Público em salvaguardar o meio ambiente em face da degradação ambiental, o Estatuto assegura competências específicas de proteção ao patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do Município aos guardas municipais. Todavia, aborda-se como problemática a incidência de queimadas na vegetação e a degradação ambiental nos centros urbanos, destacando-se as invasões habituais dentro das áreas protegidas. Assim questiona-se: Qual a efetividade da atuação dos Guardas Municipais diante das novas competências e responsabilidades socioambientais? Para elaboração deste trabalho utilizou-se como metodologia uma pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. Em resultado ao trabalho, observou-se que de 2008 a 2017 houve 4.598 ocorrências ambientais registrado pelo Centro Integrado de Operações de Segurança do Estado do Amazonas, o ano de 2015 principalmente nos meses de agosto e setembro foram registradas as maiores ocorrências. Portanto, as invasões e impactos sofridos nas áreas de patrimônio de Manaus devem ser repelidos por uma atuação eficaz, não somente pelo Poder de Polícia do Município, com ações mais efetiva no combate às infrações ambientais; inclusive adotando medidas educativas e preventivas. E através da proteção dos guardas municipais, pois sua atuação é fundamental para a conservação de unidades ambientais, por serem considerados patrimônios de Manaus.

Palavra Chave: Guarda municipal, Meio Ambiente, Patrimônio Municipal.

1 INTRODUÇÃO

Inicialmente é importante estabelecer uma base conceitual da Guarda Municipal, suas competências e atribuições bem como o panorama histórico desta instituição a fim de traçarmos sua estreita relação com o Meio Ambiente. O objetivo basilar desta obra é analisar as atribuições do guarda municipal na conservação do Meio Ambiente como patrimônio municipal por meio das unidades de conservação, em especial destacando os avanços legais após o Estatuto Geral das Guardas Municipais.

O Meio ambiente possui um papel fundamental para a manutenção dos recursos biofísico-químicos necessários para a vida do Homem. Neste contexto antropocentrista, acrescenta Celso Antônio Pacheco Fiorillo (2006): “o direito ambiental possui uma necessária visão antropocêntrica, porquanto o único animal racional é o homem, cabendo a este a preservação das espécies, incluindo a sua própria”. Sendo assim, o Homem assume um papel basilar não apenas no contexto local, mas principalmente no cenário internacional ao assumir responsabilidades de proteção a um bem transfronteiriço.

Com a promulgação da Constituição Brasileira de 1988, o Meio Ambiente adquiriu **status** constitucional, perfazendo uma responsabilidade na proteção e atuação efetiva a todos os cidadãos e, principalmente ao Poder Público para salvaguarda e concretizar uma sadia qualidade de vida às presentes e futuras gerações. Como agente de atuação na proteção do patrimônio público a Guarda Municipal de Manaus que fora criada no dia 15 de junho de 1949, através da Lei nº 132, com a denominação de Guarda Municipal de Parques e Jardins, assume a figura de garantia da qualidade de vida da população, atuando para evitar atos antissociais e os que degradam o patrimônio público.

Como agente de integração social da democracia e do patrimônio público, é essencial uma análise acerca da atribuição da guarda municipal com o meio ambiente, justificando-se esta obra pela função ambiental efetiva das atividades de segurança desempenhadas pelos Guardas Municipais dentro das Unidades de Conservação do Município de Manaus. Ou seja, o Meio ambiente sempre será elemento de consolidação da vida, portanto o dever de

proteção torna-se solidário aos entes que o compõem, incluindo o Poder Público.

2 DESENVOLVIMENTO

Vale ressaltar que a pesquisa para desenvolvimento de uma análise pautada nas competências constitucionais utilizou bibliografia jurídica, entrevista devidamente autorizada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, legislações e reportagens, bem como artigos atualizados, através de um procedimento reflexivo, sistemático e crítico que possibilita a investigação de problemas que são eles teóricos ou práticos por meio de processos científicos. Ainda nesta contextualização, observamos que a principal problemática abordada é a efetividade das atividades dos guardas municipais dentro das Unidades de Conservação, diante dos níveis significativos de degradação ambiental nos grandes centros urbanos, destacando-se as invasões habituais dentro das áreas protegidas.

Portanto, diante do exposto é fundamental uma reflexão jurídico-social das atribuições dos agentes públicos na conservação dos territórios legalmente constituídos como elemento de mitigação dos impactos ocasionados pela degradação ambiental nas grandes metrópoles. Razão pela qual, a Guarda Municipal detém características essenciais para uma maior atuação na conservação do meio ambiente, seja de modo preventivo ou ostensivo.

2.1 UMA ANÁLISE HIERARQUICA E HISTÓRICA DA GUARDA MUNICIPAL

A Guarda Municipal se insere no Sistema Nacional de Segurança Pública, destacando-se como polícia administrativa para salvaguardar o patrimônio bem como a garantia dos serviços do Município, conforme art. 144, §8º da Constituição Federal:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

§ 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

Desse modo a Guarda Municipal é responsável institucionalmente pela vigilância e manutenção do patrimônio do Município,

sendo assim a preservação e execução de atividades previstas, bem como o seu uso pela comunidade. E ainda, o cuidado de prédios públicos da administração em que são disponibilizados serviços nas áreas da educação, saúde, da cultura, do esporte, do meio ambiente, da assistência social, possuindo significado expressivo no cotidiano do município. Ademais, a Constituição do Estado do Amazonas de 1989 também disciplina a relevância da Guarda Municipal na proteção de seus bens, vedando apenas o uso de armas de fogo, conforme art. 125, § 5º:

Art. 125. É da competência dos Municípios:

§ 5º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, sendo-lhes vedado o uso de armas de fogo de qualquer tipo, conforme dispuser a lei.

Sendo assim, a Guarda Municipal se caracteriza como uma instituição de segurança pública municipal de caráter civil, uniformizada e atualmente armada com o advento da lei federal nº. 13.022/14 (Estatuto Geral das Guardas Municipais) a Guarda Municipal assumiu como competência a proteção do patrimônio ecológico, histórico e ambiental.

Art. 2º Incumbe às guardas municipais, instituições de caráter civil, uniformizadas e armadas conforme previsto em lei, a função de proteção municipal preventiva, ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal.

Em outro aspecto que merece destaque é a necessidade de investimentos na preservação ambiental, assim concentrando esforços na capacitação e ampliação do grupo de guardas municipais para a atuação no meio ambiente em todo município. Sendo assim, a Guarda Municipal passou a deter atribuições expressas na proteção do patrimônio ambiental.

Art. 5º São competências específicas das guardas municipais, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais:

VII - proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do Município, inclusive adotando medidas educativas e preventivas;

Parágrafo único. No exercício de suas competências, a guarda municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos

de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal ou de congêneres de Municípios vizinhos e, nas hipóteses previstas nos incisos XIII e XIV deste artigo, diante do comparecimento de órgão descrito nos incisos do caput do art. 144 da Constituição Federal, deverá a guarda municipal prestar todo o apoio à continuidade do atendimento.

Não obstante, a Lei Orgânica do Município de Manaus estabeleceu a criação de um corpo de agente especializado (Guarda Ambiental ou Patrulha Ambiental) voltado para o cumprimento de medidas como o planejamento e implementação de ações pertinentes a preservação do Meio Ambiente (em unidades de conservações, escolas, associação de moradores, entre outros), fiscalização e controle de desmatamento, depósito de lixo irregular, resíduos orgânicos e químicos, construção em área verde, poluição de rios e lagos, patrulhamento voltado também para inibição de caça e pesca irregular com atuação através de convênio com IBAMA, Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM, Polícia Ambiental Estadual, Secretaria de Meio Ambiente do Município e Ministério Público, conforme disciplina o art. 8º da Lei Orgânica Municipal.

Art. 8º Compete ao Município:

[...]VI - instituir a guarda Municipal destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei;

Parágrafo Único - A guarda Municipal de que trata o inciso VI, deste artigo, contará com um corpo especializado de proteção ecológica e ambiental.

Diante do exposto, é possível constatar que a Guarda Municipal sempre contemplou um caráter institucional de proteção do patrimônio público, através de competências definidas desde a Constituição Federal, perpassando pela Constituição Estadual, Lei Orgânica do Município e Estatuto Geral da Guarda Municipal, todavia, a análise de responsabilidade na segurança do Meio Ambiente se concretiza por meio de atividades voltadas nas unidades de Conservação localizadas no centro urbano da região metropolitana de Manaus.

3 UM ESTUDO ANALÍTICO DA ATUAÇÃO DO GUARDA MUNICIPAL NO PARQUE MUNICIPAL DO MINDÚ.

Nesta seara de atuação protecionista do guarda municipal, destaca-se o Parque Municipal do Mindú, uma unidade de conservação de proteção integral administrada pela Prefeitura de Manaus, localizada na zona Centro-Sul de Manaus. Foi legalmente instituído em 1993, através da Lei Municipal nº 219 de 11 de novembro, com a área de 309.518 m². O Parque oferece uma estrutura que inclui um anfiteatro, banheiros, bibliotecas, chapéu-de-palhas, lanchonetes e instalações onde a Guarda Municipal tem sua base de patrulhamento e apoio ao turista e meio ambiente. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMMAS), responsável pela gestão do Parque do Mindú, também realiza programações específicas no local, conforme seu cronograma (SANTOS, 2014).

O Parque do Mindú é formado por vários tipos de vegetação, mas sua maior parte (58%) ainda é composta de floresta densa o que o torna uma área de grande relevância e riqueza ecológica. Dentro de seu território, é propício o desenvolvimento de atividades de educação ambiental e de pesquisas aliados a conservação da natureza do parque, propiciando avaliações sobre a preservação ambiental e funcionando, inclusive, como um agente renovador do “microclima” do bairro onde está inserido.

E ainda de acordo com Santos (2014) o nome “Mindú” é uma referência a um dos igarapés (curso d’água típico de Manaus) mais conhecidos da cidade. O Mindú é o mais extenso igarapé de Manaus. É justamente nas margens do Parque que ele está mais visível, lutando para fugir dos impactos ambientais e da poluição.

Surgiu em 1989, através de um movimento dos moradores do entorno como forma de proteger o habitat do Sauim de Manaus, sendo uma das unidades de conservação vitrine das espécies de flora e fauna. Além disso, é um atrativo turístico, sendo um dos cartões-postais da cidade de Manaus. O Parque do Mindú passou por obras de revitalização de sua estrutura física, recebendo um novo orquidário e um Centro de Atendimento ao Visitante. Também foi feito trabalho de recomposição florestal, com o plantio de espécies nativas ornamentais e

medicinais e reflorestamento das áreas de clareira.

Todo este trabalho na conservação de áreas ambientais urbanas se concretiza através de atividades organizacionais conjuntas entre os órgãos municipais, como, por exemplo, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade e Guarda Municipal. Contudo, foi através de entrevista aos gestores das instituições supracitadas que podemos analisar as atividades do Poder Público.

O Diretor da Guarda Municipal em 2014 aduziu que a Guarda Municipal de Manaus atua diretamente na segurança de alguns parques (exemplo do Parque do Mindu), executando a segurança de servidores que exercem atividades nessas áreas. Contudo, a Instituição diretamente não desenvolve programas de proteção ambiental, dando apenas apoio e suporte aos órgãos ambientais.

O Diretor ressaltou ainda, que os guardas municipais contam com cursos de formação e atualização profissional em matéria ambiental, todos fornecidos pela Escola do Servidor Público. Mesmo assim, a Guarda Municipal exerce parceria efetivada em eventos ambientais, exclusivamente, por meio do suporte técnico de segurança do patrimônio público ambiental.

Diante do exposto, observa-se que a atuação supracitada, limita-se ao dever sinequa non de proteção ambiental através de apoio a outros organismos públicos ou privados. Mesmo que a referida instituição contemple a partir de 2014 a possibilidade de porte de arma de fogo para a efetivação de atividades de proteção, o que por sua vez, representa uma prática possivelmente mais coercitiva na inibição de atos degradatórios dentro das Unidades de Conservação.

4 OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA DENTRO E FORA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MANAUS.

A notícia do crime chega à Delegacia Especializada em Crimes Contra o Meio Ambiente - DEMA através do público, que comparece à delegacia para registrar Boletim de Ocorrência Policial, através da transferência de BO's de outras unidades policiais, através de ofício do Ministério Público ou outros órgãos ligados ao meio

ambiente como o IPAAM e a SEMMAS e apresentações dos infratores realizadas, principalmente, pelo Batalhão Ambiental da Polícia Militar.

É importante ilustrar, antes do exame dos crimes ambientais nas Unidades de Conservação da Região Metropolitana de

Manaus, os dados dos crimes ambientais mais comuns registrados e contabilizados pelo Centro Integrado de Operações de Segurança do Estado do Amazonas, para o período de 2008-2017, conforme apresentado na tabela 1:

Tabela 1: Registro Anual das ocorrências registradas no CIOPS de Crimes Contra o Meio Ambiente de 2008-2017 no município de Manaus.

Mês	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Total Geral Ano
Janeiro	0	13	29	20	20	15	25	16	43	9	190
Fevereiro	0	29	14	18	13	8	14	21	19	8	144
Março	3	22	31	23	23	12	41	19	18	13	205
Abril	1	23	20	36	9	9	12	22	17	8	157
Mai	3	16	19	36	19	22	27	22	29	18	211
Junho	6	14	44	49	23	35	30	23	26	27	277
Julho	35	36	33	69	32	24	14	42	39	53	377
Agosto	32	125	78	121	68	60	23	128	59	138	832
Setembro	37	173	112	68	58	88	155	251	17	44	1.003
Outubro	19	97	65	44	34	51	43	221	50	22	646
Novembro	18	54	40	23	28	20	29	65	48	7	332
Dezembro	12	38	33	21	9	17	25	37	20	12	224
Total Geral Mês	166	640	518	528	336	361	438	867	385	359	4.598

Fonte: Centro Integrado de Operações de Segurança - CIOPS, 2017.

Analisando os dados da Tabela 1, verifica-se que o ano de 2015 foi o de maior incidência de crimes ambientais; porém, a partir deste ano, o número de crimes foi decrescendo. Observa-se, que os meses de agosto e setembro foi os que mais registraram crimes ambientais. Essa incidência de crimes pode ter sido ocasionada pelas queimadas típica nesta época do ano.

A figura 2, extraída dos estudos de Valle (2014) mostra o Registro Anual das ocorrências registradas no Centro Integrado de Operações de Segurança – CIOPS, de Crimes Contra o Meio Ambiente de 2008-2013 de acordo com a natureza do delito, no município de Manaus.

Figura 2: Registro Anual das ocorrências registradas no CIOPS de Crimes Contra o Meio Ambiente de 2008-2013 de acordo com a natureza do delito, no município de Manaus.

Naturezas	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Incêndios em vegetação	63	409	177	215	203	118
Crime ambientais	63	191	323	307	126	9
Infração de ambientais	28	20	9	4	0	0
Poluição/danos a saúde do homem, animais ou da flora	0	0	0	0	0	51
Corte de árvores em florestas de preservação permanente	0	0	0	0	0	38
Incêndio em mata ou florestas	0	0	0	0	0	37
Danos à fauna	6	17	5	2	0	0
Cortar ou transformar madeira em carvão ilegalmente	0	0	0	0	0	10
Invasão em unidade de conservação	6	0	0	0	2	0
Incêndio florestal	0	0	0	0	0	8
Causar poluição	0	3	4	0	1	0
Desmatamento	0	0	0	0	3	0
Dano a vegetação de dunas ou mangues	0	0	0	0	0	2
Crime a fauna	0	0	0	0	1	0
Extração de minerais irregulares em florestas	0	0	0	0	0	1
Com./uso de motosserra em floresta, sem licença ou reg.	0	0	0	0	0	1
Exportação para o exterior de peles e couros de anfíbios e répteis	0	0	0	0	0	1

Fonte: Valle, 2014.

Conforme os dados disponibilizados por Valle (2014) verifica-se que, o crime de maior incidência foi o de queimada em vegetação segundo a análise das informações, 2009 foi ano com o maior índice de registro de crimes ambientais. Quanto aos crimes cometidos em Unidades de Conservação, observa-se que em 2008 foram registradas seis invasões e em 2012 este número caiu para dois registros. Ressalta-se a fragilidade e inexistência dos

arquivos de registros de ocorrências nas próprias Unidades de Conservações Municipais que prejudicam os resultados no que diz respeito à realidade habitual do cotidiano municipal.

A fim de ilustrar os períodos de 2014-2017 e para enriquecer e corroborar ao estudo proposto por Valle (2014) solicitou-se, junto ao CIOPS, um relatório de crimes ambientais, conforme ilustra a Tabela

2.

Tabela 2: Registro Anual das ocorrências registradas no CIOPS de Crimes Contra o Meio Ambiente de 2013-2017 de acordo com a natureza do delito, no município de Manaus.

Crimes ambientais no período ocorridos entre 2013 a 2017						
Natureza	2013	2014	2015	2016	2017	Total geral por natureza
Incêndio em Vegetação Urbana	122	197	623	201	257	1400
Transporte Ilegal de Madeira	22	45	70	36	39	212
Corte de arvores em floresta de preservação permanente	39	42	35	36	12	164
Poluição com danos a saúde do homem, dos animais ou da flora	51	39	17	24	6	137
Cortar ou transformar madeira em carvão ilegalmente	13	14	28	30	12	97
Incêndio em mata ou floresta	46	12	22	10	3	93
Crime Ambiental	9	45	9	9	4	76
Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécies da fauna silvestre	19	13	22	12	4	70
Afirmção falsa ou enganosa em procedimento de licenciamento ambiental	7	2	7	4	5	25
Obstar fiscalização ambiental	4	1	12	4	2	23
Destruição ou danificação de floresta de preservação permanente	3	6	4		6	19
Receber ou adquirir produtos de origem vegetal em desatenção às determinações legais	1		3	7		11
Incêndio em vegetação		8	2			10
Destruição ou danificação da vegetação primária ou secundária	2	3	2	1	1	9
Construir ou fazer funcionar obras ou serviços potencialmente poluidores, em desacordo com a lei	4	1	1	3		9
Fraude em estudo, laudo ou relatório ambiental		3		3	1	7
Omissão em obrigação de relevante interesse ambiental	4		2		1	7
Provocar o perecimento de espécimes da fauna aquática	3	2	1			6
Extração de minerais irregular em florestas	2	3	1			6
Comercialização ou uso de motosserra em floresta, sem licença ou registro	1		1	2	1	5
Dano a vegetação de dunas ou mangues	3		2			5
Concessão de licença em desacordo com as normas ambientais	3	1				4
Desmatamento			1		2	3
Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem autorização				1	2	3
Dano as unidades de conservação	1			1		2
Exportação para o exterior de peles e couros de anfíbios e reptéis	1			1		2
Exploração econômica de floresta de domínio público		1	1			2
Apreensão de carvão vegetal			1			1
Invasão de área de proteção ambiental					1	1
Penetrar em unidades de conservação com substâncias ou instrumentos para caça ou para exploração florestal	1					1
Total Geral Por Ano	361	438	867	385	359	2410

Fonte: Centro Integrado de Operações de Segurança - CIOPS, 2017.

Contata-se, conforme a Tabela 2, que o crime de maior incidência foi o de incêndio em vegetação urbana e, no ano de 2015 foi o de maior índice de registro de crimes ambientais. Quanto aos crimes cometidos em Unidades de Conservação, observa-se que apenas em 2017 houve um registro.

A Delegacia do Meio Ambiente do Estado do Amazonas, no ano de 2005 a 2017, enviou à

Vara do Meio Ambiente (VEMA) dois mil, oitocentos e noventa e dois (2.892) procedimentos, entre inquéritos e TCOs, referentes a registros de ocorrências de crimes ambientais em todo o Estado, segundo levantamento manual realizado junto ao cartório da DEMA, conforme tabela 3.

Tabela 3: Procedimentos lavrados pela DEMA (2005-2017) e enviados à Vara Especializada do Meio Ambiente - VEMA.

Ano	IP	TCO	Total
2005	20	56	76
2006	43	82	125
2007	22	65	87
2008	32	133	165
2009	26	97	123
2010	30	114	144
2011	11	255	266
2012	27	263	290
2013	21	183	204
2014	26	213	239
2015	45	313	358
2016	81	287	368
2017	114	333	447

Fonte: Cartório Delegacia Especializada em Crimes Contra o Meio Ambiente - DEMA, 2017.

Dentre esses crimes ambientais, no período de 2008-2012, segundo estudos de Valle (2014), foram enviados à Justiça (VEMA) cento e sessenta e quatro (164) procedimentos, relativos a crimes ambientais ocorridos em UC's Estaduais de proteção integral e de uso sustentável da Região Metropolitana de Manaus (RMM), referentes a crimes contra a fauna, contra a flora e, à poluição (dentre outros crimes previstos nos Arts. 54-64 da Lei 9.605/98 - Lei dos Crimes Ambientais), dados colhidos manualmente junto ao cartório da Delegacia do Meio Ambiente do Amazonas.

Em 2011, a Guarda Municipal de Manaus, em conjunto com a Polícia Militares e fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMMAS) retiraram cerca de 80 famílias que invadiram um terreno dentro da Área de Proteção Permanente (APP) do Tatumã, Zona Rural de Manaus. Segundo a SEMMAS entre janeiro e novembro de 2011, foram desarticuladas 105 invasões de terras.

Nas imagens coletadas no local da invasão é possível observar não apenas o desmatamento das áreas legalmente protegidas pelo município, mas o desenvolvimento de práticas proibidas pelo Código Ambiental do Município de Manaus, conforme disciplina o inciso III e XVIII do art. 138 e inciso I do art. 139.

Art. 138 - Considera-se infração muito grave:

[...]

III - desrespeitar as normas estabelecidas para Unidades de Conservação e outras áreas

XVIII - danificar árvores nas áreas de preservação permanente e nas Unidades de Conservação; protegidas por legislação específica;

Art. 139 - Considera-se infração gravíssima:

I - suprimir ou sacrificar árvores nas áreas de preservação permanente e nas Unidades de Conservação;

Figura: Héveny Bandeira (2011)

Diante da imagem apresentada, é possível observar que a invasão de terras realizada em 2011 dentro de uma área de proteção ambiental na zona rural de Manaus apresentou um significativo impacto ecológico, afetando o ecossistema local, por meio de incêndios e supressão de árvores na Unidade de Conservação. Como agente de proteção do patrimônio público, o Guarda Municipal tem função de garantir a integridade das áreas afetadas e inibir qualquer prática delituosa, de modo preventivo. Todavia, por conflitos existentes entre poder público e invasores, a atuação do Guarda necessita de intervenção de outros órgãos como exemplo da Polícia Militar, diante do poder ostensivo desta instituição.

Nesta visão analógica, pode ser observado que os guardas municipais, assumem riscos inerentes a sua função, razão pela qual demandam determinadas necessidades para uma efetiva atuação, mesmo não sendo unânime esta visão dentro da corporação, o poder público municipal deve garantir a proteção e segurança dentro das Unidades de Conservação, principalmente quando estas, representam uma significativa proporção do meio ambiente natural, como a exemplo do Parque do Mindú.

5. CONCLUSÕES

Diante do exposto nesta análise, é possível salientar o papel da Guarda Municipal como agente de proteção do Meio Ambiente, através do histórico da Guarda Municipal, inicialmente como guardas municipais de parques e jardins, e posteriormente como detentores de ações constitucionais através do dever público na manutenção do patrimônio municipal e na conservação de áreas ambientais legalmente definidas.

Vale destacar que os guardas municipais já atuavam dentro das unidades de conservação municipais, coibindo práticas delituosas de degradação ambiental. Porém com os avanços jurídicos no campo da competência e atribuições dos agentes públicos, os guardas passaram a exercer, de forma taxativa, um dever essencial na proteção das áreas protegidas, contemplando um corpo especializado de proteção ecológica e ambiental, conforme disciplina a Lei Orgânica do Município de Manaus.

Todavia, como destaque na atuação dos agentes municipais é a Unidade de Conservação presente no coração da região metropolitana de Manaus, Parque do Mindú, pois, sua grande extensão e significado para o povo manauara, que transforma em um símbolo de ecossistema a ser preservado. Contudo, a efetividade de proteção ambiental se perfaz através de atuações conjuntas exercidas pelos agentes públicos, em especial, ao guarda municipal com atividades preventivas e de suporte aos programas desenvolvidos no combate à degradação ambiental.

Ademais, com as mudanças regimentais dos Guardas Municipais e a ampliação de atividades como: Formação Específica em Meio Ambiente e uso de materiais e equipamentos adequados para o pronto emprego em ações nas Unidades de Conservação do Município de Manaus.

Portanto, por meio do exposto acima, pode-se concluir que a atuação dos guardas municipais é fundamental para a conservação de unidades ambientais, por serem considerados patrimônios de Manaus e consequentemente símbolo da riqueza ecológica presente em seu território. As invasões e impactos sofridos nestas áreas devem ser repelidos por uma atuação eficaz e

coercitiva, concretizada através de atividades de suporte e fortalecimento do Poder de

Polícia do Município.

REFERÊNCIAS

[1] Amazonas. Constituição (1989). Constituição Política do Estado do Amazonas. Disponível em: <<http://www.ale.am.gov.br/wp-content/uploads/2015/01/Constituicao-do-Estado-do-Amazonas-atualizada-2015.pdf>>. Acesso em: 10 de Dez. de 2016.

[2] Baierle, Tatiana Cardoso. Ser segurança em tempos de insegurança: sofrimento psíquico e prazer no trabalho da Guarda Municipal de Porto Alegre. Dissertação defendida em 24 de maio de 2007. Defendida na Universidade Federal de Rio Grande do Sul no Programa de Pós Graduação em Psicologia Social e Institucional. 24 de Maio de 2007.

[3] Brasil. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 2007.

[4] _____. Lei Federal 13.022, de 8 de agosto de 2014. Dispõe sobre o Estatuto Geral da Guardas Municipais.

[5] Campos, Jonas do Carmo Vaz Barbosa de. Poder de Polícia em Posturas Municipais para a Guarda Municipal com a Regulamentação da Atividade Funcional e o seu Papel Social na Segurança Pública. Disponível em: <<http://www.guarda.dourados.ms.gov.br>>. Acesso em: 10 de Dez. de 2016.

[6] Fiorillo, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 7. ed. Saraiva: São Paulo, 2006.

[7] Manaus, Lei Orgânica do Município de Manaus, Constitui a Lei Fundamental do Município de Manaus, com o objetivo de organizar o

exercício do poder e fortalecer as instituições democráticas e os direitos da pessoa humana. 1990. Diário Oficial da Município. Manaus – AM.

[8] _____. Lei Municipal 605 de 24 de julho de 2001. Institui o Código Ambiental do Município de Manaus

[9] Santos, Marcos. Habitat do Sauim de Manaus, Parque do Mindú é espaço de lazer e educação ambiental [2014]. Disponível em: <<http://www.amazonasemais.com.br/manaus/habitat-sauim-de-manaus-parque-mindu-e-espaco-de-lazer-e-educacao-ambiental>>. Acesso em: 10 de Dez. de 2016.

[10] Silva, A. J. B. Guarda Municipal de Manaus, Coletânea da Criação à Atualidade. Prefeitura Municipal de Manaus. 2007.

[11] Silva, Antonio Jorge Barbosa da. A Atribuição da Guarda Municipal em Ações Ambientais Efetivas nas Unidades de Conservação de Manaus. 79 f. *Dissertação* (Mestrado) - INPA, Manaus, 2018.

[12] Soares, Luiz Eduardo. Segurança Municipal no Brasil – sugestões para uma agenda mínima. In: Sento-sé, João Trajano. Prevenção da Violência: o Papel das Cidades. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.

[13] Valle, Izolda de Castro e Couto. Crimes Ambientais em Unidades de Conservação Estaduais da Região Metropolitana de Manaus, junto à Delegacia Especializada em Crimes Contra o Meio Ambiente do Amazonas. Manaus: [s.n], 2014. 64 f. *Dissertação* (Mestrado) – INPA

Capítulo 18

*METROPOLIZAÇÃO E RECEITAS PÚBLICAS: ANÁLISE A PARTIR DOS IMPOSTOS E DOS FATORES SOCIOECONÔMICOS**

Guilherme Augusto Bentes Furtado Neto

Isaque dos Santos Sousa

Susane Patrícia Melo de Lima

Resumo: Este trabalho é parte integrante da pesquisa “Dinâmicas urbano-regionais na Região Metropolitana de Manaus: uso e ocupação do espaço em Iranduba e Manacapuru”, desenvolvido pelo Núcleo de Pesquisas Urbana e Regional/NPUR. Seu objetivo é analisar os impactos das mudanças socioeconômicas causadas pelo processo de metropolização na geração de receitas públicas nos municípios de Iranduba e Manacapuru, no Amazonas e integrantes da RMM. A abordagem teórico-metodológica utilizada nele foi baseada no método histórico-crítico-dialético, que permite observar a realidade a partir das desigualdades e contradições no espaço. Quanto aos procedimentos metodológicos utilizados podem ser citados a pesquisa bibliográfica e o levantamento documental de dados das principais fontes de receitas públicas dos dois municípios, entre os anos de 2007 e 2016, do contingente populacional e do número de empresas atuantes no recorte, aproximadamente no mesmo período. Após a organização dos dados coletados, observou-se que as principais fontes de receitas públicas dos municípios pesquisados eram providas dos repasses das cotas-partes do FPM e do ICMS; e, das arrecadações municipais do ISS. Além disso, também se observou que as principais variações nos valores dessas receitas, no período pesquisado, foram semelhantes às variações dos dados quantitativos referentes aos fatores socioeconômicos que influenciaram na dinâmica delas, como, por exemplo, o contingente populacional e o número de empresas atuantes nos dois municípios. Um fato importante notado na análise dos dados foi a existência de variações relevantes nos seus valores em anos próximos ao início da construção e à inauguração da Ponte Jornalista Phelippe Daou, eventos ocorridos em 2008 e 2011, respectivamente. Assim, pode-se dizer que essa obra influenciou diretamente na dinâmica do processo de metropolização em Manacapuru e Iranduba porque afetou diretamente a dinâmica socioeconômica e, conseqüentemente, a geração de receitas públicas ligadas essa dinâmica ao intensificar os fluxos, principalmente econômicos, entre esses municípios e a metrópole Manaus. Essa intensificação ocorreu porque a Ponte citada facilitou o percurso, que antes só poderia ser realizado por meios fluviais ou aéreos, entre esses lugares que são separados pelo Rio Negro.

Palavras Chave: Metropolização, Receitas públicas, Ponte Jornalista Phelippe Daou.

1. INTRODUÇÃO

A análise realizada durante o decorrer desse trabalho é voltada para o estudo da influência da metropolização na arrecadação de receitas públicas em Manacapuru e Iranduba, municípios do Estado do Amazonas e integrantes da Região Metropolitana de Manaus. Para realizar tal análise foram utilizados como referencial teórico as legislações tributárias, livros e artigos de autores como Pinto (2007, p. 2003), que afirma que o nível de atividade econômica é a variável fundamental para se definir o tamanho da base tributária, sobre a qual o governo poderá exercer seu poder de instituir impostos; Arrais (2014, p. 201), que afirma que os fluxos de capital, trabalho e o acionamento de serviços nos municípios metropolitanos se encontram muitas vezes fora das bases territoriais deles, o que influencia diretamente nos seus orçamentos; e por fim Lencioni (2007, p. 48), que afirma que em um território metropolizado os fluxos de pessoas e mercadorias ou de informações são múltiplos, intensos e permanentes, facilitando a reprodução do capital nele.

O ponto central desse trabalho é a discussão sobre o processo de metropolização e a sua relação com a geração de receitas públicas em Manacapuru e Iranduba, tendo como fator de análise a construção da Ponte Jornalista Phelippe Daou, a qual representa um marco essencial para as transformações socioespaciais nos municípios supracitados como recorte. Durante essa discussão, destacou-se alguns pontos importantes para o seu andamento, entre eles estão a identificação e distinção das fontes de receitas mais relevantes vinculadas diretamente a fatores socioeconômicos; a análise da relação entre as receitas e os fatores socioeconômicos visando conhecer a correlação entre eles; e a análise da influência da construção da Ponte Jornalista Phelippe Daou na dinâmica da metropolização e na geração dessas receitas.

2. DESENVOLVIMENTO

A metodologia utilizada ao longo dessa pesquisa baseou-se no método histórico-crítico-dialético, cuja interpretação da realidade compreende as diferentes e

desigualdades sociais, bem como as contradições da sociedade que são manifestadas no espaço. Optou-se por esse método também por ele permitir a utilização de dados quantitativos (receitas públicas) na realização da análise de um fenômeno qualitativo (processo de metropolização) (SPOSITO, 2000, p. 356), possibilitando entender os fatos a possível correlação entre os fatores envolvidos.

Quanto aos procedimentos metodológicos utilizados nesse trabalho podem ser citados como principais a pesquisa bibliográfica e o levantamento documental. Os dados utilizados nessa pesquisa foram coletados através de levantamento documental dos relatórios anuais de prestação de contas públicas municipais e estaduais (disponíveis no Portal da Transparência da Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas/SEFAZ-AM e nos sistemas de prestações de contas da Secretaria do Tesouro Nacional/STN) e das informações referentes às empresas brasileiras registradas oficialmente nos bancos de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/IBGE. Após essa coleta, esses dados foram organizados e representados em gráficos de linha e tabelas que permitiram a visualização das variações ocorridas nas receitas públicas e demais dados pesquisados no recorte temporal situado entre 2007 (ano de institucionalização da Região Metropolitana de Manaus) e 2016 (último ano com dados totalmente disponíveis) ou em recortes mais aproximados deste de acordo com a disponibilidade dos dados.

Após a realização desses procedimentos se observou que dentre todas as fontes de receitas públicas dos municípios de Manacapuru e Iranduba, as que apresentaram maior importância dentro de ambos os orçamentos municipais e maior relevância para a pesquisa foram provenientes dos repasses das cotas-partes do FPM (Fundo de Participação Municipal) e do ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços); e das arrecadações municipais do ISS (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza). Pode-se constatar esse fato ao se analisar no gráfico a seguir o comportamento das principais receitas públicas providas da arrecadação de impostos e dos repasses intergovernamentais ao município de Manacapuru:

Gráfico 1- Comportamento das principais fontes de receitas públicas ligadas à arrecadação de impostos em Manacapuru entre 2007 e 2016.

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional; SEFAZ-AM (Relatórios de contas e repasses anuais de 2007 a 2016). Elaborado por: Furtado Neto, Guilherme A. B., 2017.

No gráfico acima se notam poucas variações nos repasses da cota-parte do FPM para o município de Manacapuru até o ano de 2011, quando houve um aumento considerável de 21% no valor repassado em relação ao ano anterior. No mesmo gráfico é possível realizar um comparativo entre os repasses para esse município nos anos de 2007, 2010 e 2016. Em relação ao ano de 2010, o valor repassado em 2016 apresentou um aumento de 82,6%, sendo esse o período com maior crescimento dele. Ao comparar o valor repassado em 2007 ao repassado em 2016, observou-se um aumento de 126,6% nos valores repassados dessa cota para o município no período em questão.

Antes de analisar os repasses da cota-parte do ICMS para o município de Manacapuru, cabe destacar que os seus valores são calculados de acordo com a divisão determinada no código tributário e podem estar sujeitos às mudanças das alíquotas cobradas no imposto, mas de maneira o geral esses repasses seguem uma divisão na qual “os estados devem transferir aos municípios de seu território 25% do ICMS arrecadado. Desse montante, 75% é partilhado entre os municípios de acordo com sua atividade e 25% conforme lei de cada estado, de caráter redistributivo (PINTO, 2007, p. 209).

Quanto aos dados referentes aos repasses dessa cota para o município citado,

percebeu-se claramente um crescimento maior nos valores repassados a partir do ano de 2010, quando ocorreu um aumento de 27,2% desse valor em relação a 2009. Novos aumentos foram registrados até ao ano de 2014, quando o valor repassado foi 78,2% maior do que o repassado em 2009. Ao se analisar recorte temporal total da pesquisa, foi observado que o valor repassado em 2016 foi 90,4% maior do que o repassado em 2007. Também vale ressaltar que o último valor registrado desse repasse não foi o maior, pois, houve uma queda nesse valor a partir de 2015. Essa queda alcançou a porcentagem de 9,1% em 201 e pode ter sido influenciada pela crise econômica que assolou o país a partir do ano de 2015.

Antes de analisar as variações ocorridas na arrecadação municipal do ISS em Manacapuru, é necessário entender que esse imposto tem como fator gerador a prestação de serviços realizada por um profissional autônomo ou empresa, com ou sem estabelecimento fixo, que prestem serviços de qualquer natureza definida em lei, desde que esses serviços não estejam na competência de outro nível governamental que não seja o municipal (BRITO & DIAS, 2013? p.8).

Ao se analisar as variações ocorridas nos valores arrecadados com esse imposto em Manacapuru no período pesquisado, se percebeu uma anormalidade no valor

repassado em 2010. Essa anormalidade pode ser percebida quando se leva em consideração que no ano de 2009 o valor arrecadado com esse imposto apresentou queda de 42,4% em relação ao ano de 2008, enquanto que no ano de seguinte se percebeu um aumento de 205% em relação ao valor arrecadado em 2009. Após esse crescimento anormal, houve uma queda brusca nesse valor no ano seguinte, pois, em 2011, o mesmo foi 82,8% menor do que o arrecadado em 2010. A partir de 2011 não ocorreram variações consideráveis nos valores arrecadados. Entre todas as inconstâncias ocorridas na arrecadação do

ISS em Manacapuru entre 2007 e 2016, tem-se que o valor arrecadado no último ano pesquisado foi 42,4% menor do que o arrecadado em 2007.

Ao analisar o orçamento municipal de Iranduba entre os anos de 2007 e 2016, notou-se que as principais fontes de receitas ligadas à arrecadação de impostos nas suas bases territoriais foram também providas dos repasses da cota-parte do FPM, da cota-parte do ICMS e da arrecadação do ISS. No gráfico a seguir, pode-se notar a predominância das fontes de receitas citadas diante das outras também ligadas diretamente à arrecadação de impostos nesse município:

Gráfico 2- Comportamento das principais fontes de receitas providas da arrecadação de impostos em Iranduba entre 2007 e 2016.

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional; SEFAZ-AM (Relatórios de contas e repasses anuais de 2007 a 2016).
Elaborado por: Furtado Neto, Guilherme A. B., 2017

No gráfico acima é possível perceber que os valores repassados da cota-parte do FPM ao município de Iranduba começaram a apresentar um crescimento acima da média a partir do ano de 2011, quando se registrou um aumento de 27% no valor repassado em relação ao ano anterior. Quando comparados os valores dos repasses de 2016 aos de 2011, foi possível perceber um aumento de 51% nos valores repassados nesse período. Quando se fez o mesmo comparativo entre os anos de 2016 e 2007, esse aumento alcançou a porcentagem de 144,7%.

Ao analisar as variações ocorridas nos repasses da cota-parte do ICMS para Iranduba, foi observado que as mais notáveis foram a queda de 4% registrada no valor

repassado em 2009 em relação ao de 2008 e o aumento de 27% no valor repassado em 2010 em relação ao de 2009. No mesmo gráfico, se observa que esse comportamento relativamente instável nesses valores durou até o ano de 2010, quando se iniciou um crescimento notável neles que durou até 2014, ano anterior à crise econômica brasileira, quando alcançou a porcentagem de crescimento de 77% em relação ao valor repassado em 2009. A partir desse ano, iniciou-se um declínio nesses valores, pois, quando comparados o valor repassado em 2016 ao repassado em 2014, foi observada uma queda que atingiu a porcentagem de 9,4%. Quando analisado o recorte temporal total da pesquisa, notou-se um crescimento

de 92,5% quando comparado o valor repassado em 2016 ao repassado em 2007.

Ao analisar as variações na arrecadação municipal do ISS em Iranduba no mesmo período, observou-se que os valores arrecadados começaram a apresentar altas notáveis a partir do ano de 2009, quando foi registrado um aumento de 178,2% dos valores arrecadados em relação a 2008. Esse aumento se tornou ainda maior no ano de 2010, quando em relação ao ano de 2008, o valor arrecadado foi 226% maior, tornando-se o maior de todo o período pesquisado. A partir de 2011, os valores arrecadados com esse imposto entraram em um período de queda notável que seguiu até o ano de 2013, quando essa queda alcançou porcentagem de 76% em relação ao ano de 2010, tornando o valor arrecadado nesse ano o menor do período pesquisado. Após esse período de queda, esses valores tiveram um novo aumento no ano de 2014, quando em relação a 2013, o valor arrecadado foi 200% maior, continuando a aumentar em 2015, quando alcançou a porcentagem de crescimento de 244%. Apesar de se ter registrado uma queda de 11,2% do valor arrecadado em 2016 em relação ao ano anterior, esse valor

representou um aumento de 205,5% do valor em relação ao ano de 2013. Quando se comparado o valor arrecadado no ano de 2016 ao arrecadado em 2007, pôde-se perceber um aumento de 139,1% nos valores arrecadados nesse período.

O principal fator social que interferiu nas variações encontradas nos repasses das cotas-partes do FPM para Manacapuru e Iranduba foi o aumento populacional ocorrido nos dois municípios. Esse fenômeno influenciou interferiu nessas variações porque o contingente populacional dos municípios é o critério utilizado para calcular o volume de repasses da cota-parte do FPM para eles (PEREIRA, 2002, apud BRITO & DIAS, 2013?, p. 9). Os contingentes populacionais declarados à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) por Iranduba e Manacapuru apresentaram aumentos consideráveis nos anos de 2009 e 2013, respectivamente. Anteriormente a esses anos, observou-se relativa estabilidade no número de habitantes desses municípios, chegando até a ocorrer quedas no contingente populacional declarado, como se pode visualizar no gráfico a seguir:

Gráfico 3- Contingente populacional de Manacapuru e Iranduba declarado entre 2007 e 2015.

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional; SEFAZ-AM (Relatórios de contas e repasses anuais de 2007 a 2016).
Elaborado por: Furtado Neto, Guilherme A. B., 2017.

No gráfico acima é possível observar pouca variação no contingente populacional de Manacapuru até o ano de 2012, tendo ocorrido anteriormente a ele até mesmo uma

queda de 1,5% no quantitativo declarado no ano de 2009 em relação ao declarado em 2008. A partir de 2013, os números da população de Manacapuru apresentaram

aumento considerável em relação aos anos anteriores, pois, nesse ano houve um crescimento de 5,5% desse número em relação ao ano anterior. Esse crescimento se manteve até o ano de 2015, quando atingiu a porcentagem de 8,3% em relação ao ano de 2012. Quando comparados os quantitativos declarados no ano de 2007 aos declarados no ano de 2015, observou-se um crescimento de 10,4% no quantitativo populacional declarado nesse período.

Quanto ao contingente populacional de Iranduba, pôde-se observar no gráfico apresentado que o mesmo apresentou variações contidas até 2009, quando houve um crescimento acima da média que atingiu a porcentagem de 22,1% em relação ao contingente registrado no ano de 2008. Outra variação importante notada ao se analisar o gráfico acima, foi o aumento do contingente populacional registrado entre os anos de 2009 e 2015, pois, nesse período esse aumento atingiu a porcentagem de 12,7%. Em relação ao ano de 2007, o aumento desse contingente registrado no ano de 2016 atingiu a porcentagem de 37%.

Após essa análise dos dados dos repasses do FPM e do contingente populacional, foi possível observar que os principais aumentos nos repasses dessa cota-parte e desse contingente em Manacapuru e Iranduba foram registrados entre os anos de 2009 e 2013, ou seja, existiu uma proximidade entre os anos nos quais foram registrados esses aumentos com o ano de 2011, quando a Ponte Jornalista Phelippe Daou foi inaugurada. Entre os principais fenômenos influenciados por essa obra está o crescimento populacional acima da média em Manacapuru e Iranduba registrado nos anos próximos a 2011, quando houve a inauguração dela, ou seja, durante os anos de construção e nos primeiros anos de utilização da ponte, se intensificando nitidamente após essa inauguração.

Esse crescimento foi decorrente do aumento dos fluxos entre a metrópole Manaus e esses municípios, intensificados pela existência da ponte ligando diretamente as duas margens do Rio Negro. Afirma-se isso com base no fato de que esse aumento nos fluxos trouxe consigo melhores condições de reprodução do capital para esses municípios, o que dinamizou as economias locais e, conseqüentemente, ajudou a reter e atrair

mais pessoas para os dois municípios. Uma das consequências desse crescimento populacional registrado é o aumento de repasses provindos da cota-parte do FPM nesses dois municípios, como registrado nos gráficos apresentados.

Outros dados analisados foram os referentes aos números das empresas que realizavam atividades geradoras do ICMS e do ISS entre os anos de 2007 e 2015, em Manacapuru e Iranduba. Entendeu-se que esses dados foram importantes para a pesquisa porque serviram como uma forma de mensuração dos fatores geradores dos respectivos impostos, pois, mesmo que a correlação entre esses dados não tenha sido perfeitamente sincrônica, algumas variações percebidas nos repasses e arrecadações desses impostos tiveram clara influência do aumento ou da diminuição nos números dessas empresas nos dois municípios. Na tabela 1 podem ser visualizados esses números dentro do período citado.

A principal semelhança entre o número das empresas que realizam atividades passíveis de cobrança do ICMS e as variações nos repasses da cota-parte desse imposto para Manacapuru no mesmo período pode ser notada quando observado que no ano de 2010 o número dessas empresas cresceu 22,7% em relação ao ano anterior, enquanto que no mesmo ano os valores repassados pela cota-parte do ICMS também apresentaram aumento considerável, o que leva a concluir que esse aumento nesses valores foi motivado, principalmente, pelo aumento da quantidade de empresas contribuintes do ICMS em Manacapuru nesse ano. A partir de 2010, notou-se que os dados se tornaram variáveis quando comparados um ao outro, pois, enquanto os valores repassados com a cota-parte do ICMS se mantiveram em constante aumento a partir desse ano, o número de empresas se manteve instável a partir do mesmo. Essa situação pode ser explicada por diversos fatores como variações na eficiência da arrecadação do imposto, mudanças na cotação do real ou mudanças nas porcentagens cobradas, o que ocorre constantemente e poderia levar a não concordância entre as variações no valor repassado e as variações no número dessas empresas.

Tabela 3- Número de empresas realizadoras de atividades passíveis de cobrança de impostos em Manacapuru e Iranduba (2007 a 2015).

Município ANO	Manacapuru		Iranduba	
	Com atividades passíveis de cobranças do ICMS	Com atividades passíveis de cobranças do ISS	Com atividades passíveis de cobranças do ICMS	Com atividades passíveis de cobranças do ISS
2007	381	614	75	76
2008	547	778	92	110
2009	559	739	101	125
2010	686	913	149	165
2011	580	774	121	140
2012	458	589	148	176
2013	680	828	168	210
2014	456	550	167	198
2015	486	566	171	225

Fonte: IBGE- Cadastro Central de Empresas. Elaborado por: FURTADO NETO, Guilherme A. B., 2018.

Ao se analisar a tabela acima, notou-se um crescimento anormal de 47% no número de empresas que realizavam atividades geradoras do ICMS em Iranduba no ano de 2010. Esse crescimento já se apresentava em menores porcentagens nos anos anteriores a esse, mas não se manteve no ano de 2011, quando se registrou uma queda de 18,8% no número dessas empresas. No ano de 2012, esse número voltou a crescer e continuou se elevando com algumas variações até o ano de 2015, quando esse crescimento atingiu a porcentagem de 41,3% de aumento em relação ao número registrado em 2011. Dentro do recorte temporal pesquisado, o número de empresas com essas características atuando em Iranduba cresceu 128% entre 2007 e 2016.

Por fim, ao serem analisadas as variações dos valores repassados com a cota-parte do ICMS e as variações no número de empresas atuantes em Manacapuru e Iranduba, notou-se que as variações mais notáveis ocorreram ou começaram a ocorrer nos anos próximos a 2011, quando foi inaugurada a Ponte Jornalista Phelippe Daou. Outra característica notada durante essa análise é o fato de que os dados referentes às duas variáveis analisadas começaram a apresentar crescimentos maiores a partir dos anos próximos a esses eventos, elevando-se a maioria deles a patamares maiores nos quantitativos a partir desse período.

Na mesma tabela foi possível se notar muitas semelhanças entre as variações ocorridas no número de empresas prestadoras de serviços em Manacapuru entre 2007 e 2015 e as

variações encontradas nos valores arrecadados com o ISS no município entre os anos de 2007 e 2016 (*ver gráfico 1*). Entre elas, pode-se destacar a ocorrida entre o crescimento de 23,5% no número dessas empresas no ano de 2010 e o crescimento anormal ocorrido na arrecadação do ISS nesse município no mesmo ano. Outra semelhança que foi notada entre essas variáveis ocorreu entre a queda de 5% no número de empresas prestadoras de serviços atuantes nesse município no ano de 2009 e a queda no valor arrecadado com o ISS municipal no mesmo ano. Apesar dessas semelhanças, o que se observou a partir do ano de 2011 é que o número de empresas atuando em Manacapuru começou a apresentar disparidade em relação ao valor arrecadado com o ISS nesse ano e nos anos posteriores, o que pode ser explicado como efeito da diminuição da eficiência municipal na arrecadação desse imposto.

Quanto a esse número de empresas prestadoras de serviços no município de Iranduba, pôde-se notar que os aumentos e quedas nele acompanharam em certa medida as variações nos valores arrecadados com o ISS apresentadas no gráfico anterior. Esse fato pode ser percebido quando se leva em consideração que o número de empresas atuantes no município cresceu constantemente até o ano de 2010, quando se registrou um aumento de 117,1% nesse número em relação ao registrado em 2007, enquanto que no mesmo período também se notou crescimento semelhante nas arrecadações do ISS nesse município. Outra

semelhança notável entre esse número de empresas e os valores arrecadados com o ISS em Iranduba pode ser percebida quando se analisa os dados referentes ao ano de 2011, no qual o número de empresas atuantes no município caiu 15,1% em relação ao ano anterior enquanto que no mesmo ano o valor arrecadado com esse imposto sofreu igualmente uma queda. A partir do ano de 2012, o número de empresas atuantes voltou a crescer atingindo a porcentagem de crescimento de 60,7% em relação ao número registrado no ano de 2011. Entre os anos de 2007 e 2015, o aumento no número de empresas atuantes nesse município foi de 196%, o que significa que mesmo entre altos e baixos houve um crescimento econômico que foi refletido nesse aumento da quantidade de empresas em Iranduba.

3. CONCLUSÕES

Sobre o processo de metropolização ocorrente na Região Metropolitana de Manaus, pode-se afirmar que ele elevou a taxa de crescimento populacional, aumentou a intensidade dos fluxos econômicos e expandiu o setor de serviços nos municípios de Manacapuru e Iranduba. Cada um desses fenômenos está relacionado de alguma forma à geração de receitas públicas nesses municípios por influenciarem a geração

daquelas providas de repasses como os do FPM e do ICMS, e de arrecadações municipais como a do ISS municipal, já que essas receitas têm como fatores geradores, atividades ou características ligadas a esses fenômenos. Logo, a tendência seria que os valores dessas receitas se elevassem na medida em que os fenômenos consequentes desse processo avançassem sobre os dois municípios nos últimos anos, o que de fato foi observado nos gráficos e tabelas apresentados nesse trabalho.

O que vale aqui ressaltar é que foi observada uma intensificação desses fenômenos e a ocorrência de aumentos mais expressivos nos valores das receitas vinculadas a eles em Manacapuru e Iranduba nos anos próximos ao início da construção e à inauguração da Ponte Jornalista Phelippe Daou, nos anos de 2008 e 2011, respectivamente. Esse fato reflete a influência que os investimentos realizados pelo poder público têm na intensificação do processo de metropolização na região. Nesse caso, o investimento realizado na construção dessa ponte intensificou esse processo ao criar melhores condições de reprodução do capital nesses municípios, o que por sua vez aumentou a base disponível para tributação por parte do Estado em uma espécie de investimento realizado pelo mesmo a longo prazo.

REFERÊNCIAS

- [1] Arrais, Tadeu Alencar. As receitas públicas municipais e a funcionalidade da integração espacial em ambientes metropolitanos. *Sociedade & Natureza*, Uberlândia, n. 26 (2), 201-220, 2014. Disponível em: <www.scielo.br/pdf/sn/v26n2/1982-4513-sn-26-2-0201.pdf>. Acesso em: 15 fev. 2018.
- [2] Brito, Horlânia de S.; DIAS, Ricjarderson R. O comportamento da Receita Pública Municipal: um estudo de caso no município de Paranaíba-PI. Artigo Científico (Pós-graduação) - Curso de Pós-Graduação (lato sensu) em Gestão e Contabilidade Pública, Universidade Estadual do Piauí. Teresina, p. 22. 2013?.
- [3] Lencioni, Sandra. Reconhecendo metrópoles: território e sociedade. In: FREIRE, Désirée Guichard et al. (Org.). *Metrópole: governo, sociedade e território*. 1. ed. Rio de Janeiro: DP&A, Faperj, 2006. cap. 2.
- [4] Pinto, S. G. B. Análise do desempenho fiscal dos municípios das áreas metropolitanas. In: RIBEIRO, Luiz C. de Q.; SANTOS JUNIOR, Orlando A. dos. (Org.) *As metrópoles e a questão social brasileira*. 1. ed., Rio de Janeiro: Editora Revan, 2007, cap. 7.
- [5] SPOSITO, Eliseu Savério. A questão do método e a crítica do pensamento geográfico. In: CASTRO, Iná Elias; Egler, Cláudio; Miranda, Mariana. (Org.). *Redescobrimos o Brasil, 500 anos depois*. Rio de Janeiro: Bertrand; FAPERJ, 2000. p. 347-359.
- [6] Ibge. Cempre- Cadastro Central de Empresas. 2015. Disponível em: <<https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/empre/quadros/brasil/2015>>. Acesso em: 17 mai. 2018.
- [7] Secretaria do Tesouro Nacional. Finbr- Finanças do Brasil- Dados contábeis dos municípios. 2007. Disponível em: <http://www.Tesouro.fazenda.gov.br/pt_PT/contas- anuais>. Acesso em: 08 nov. 2017.
- [8] Secretaria do Tesouro Nacional. Finbr- Finanças do Brasil- Dados contábeis dos municípios. 2008. Disponível em: <http://www.Tesouro.fazenda.gov.br/pt_PT/contas- anuais>. Acesso em: 08 nov. 2017.
- [9] Secretaria do Tesouro Nacional. Finbr- Finanças do Brasil- Dados contábeis dos

municípios. 2009. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt_PT/contas-anuais>. Acesso em: 08 nov. 2017.

[10] Secretaria do Tesouro Nacional. Finbra-Finanças do Brasil- Dados contábeis dos municípios. 2010. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt_PT/contas-anuais>. Acesso em: 08 nov. 2017.

[11] Secretaria do Tesouro Nacional. Finbra-Finanças do Brasil- Dados contábeis dos municípios. 2011. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt_PT/contas-anuais>. Acesso em: 08 nov. 2017.

[12] Secretaria do Tesouro Nacional. Finbra-Finanças do Brasil- Dados contábeis dos municípios. 2012. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt_PT/contas-anuais>. Acesso em: 08 nov. 2017.

[13] Secretaria Do Tesouro Nacional. Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI) - Tabela de receitas orçamentárias municipais. 2013. Disponível em: <https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/consulta_finbra/finbra_list.jsf>. Acesso em: 09 nov. 2017.

[14] Secretaria Do Tesouro Nacional. Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI) - Tabela de receitas orçamentárias municipais. 2014. Disponível em: <https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/consulta_finbra/finbra_list.jsf>. Acesso em: 09 nov. 2017.

[15] Secretaria do Tesouro Nacional. Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI) - Tabela de receitas orçamentárias municipais. 2015. Disponível em: <https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/consulta_finbra/finbra_list.jsf>. Acesso em: 09 nov. 2017.

[16] Secretaria do Tesouro Nacional. Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI) - Tabela de receitas orçamentárias municipais. 2016. Disponível em: <https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/consulta_finbra/finbra_list.jsf>. Acesso em: 09 nov. 2017.

[17] Sefaz-Am. Relatório anual de repasses-Iranduba. 2007. Disponível em: <<http://sistemas.sefaz.am.gov.br/srt/publico.do>>. Acesso em: 10 nov. 2017.

[18] Sefaz-Am. Relatório anual de repasses-Iranduba. 2008. Disponível em: <<http://sistemas.sefaz.am.gov.br/srt/publico.do>>. Acesso em: 10 nov. 2017.

[19] Sefaz-Am. Relatório anual de repasses-Iranduba. 2009. Disponível em: <<http://sistemas.sefaz.am.gov.br/srt/publico.do>>. Acesso em: 10 nov. 2017.

[20] Sefaz-Am. Relatório anual de repasses-Iranduba. 2010. Disponível em: <<http://sistemas.sefaz.am.gov.br/srt/publico.do>>. Acesso em: 10 nov. 2017.

[21] Sefaz-Am. Relatório anual de repasses-Iranduba. 2011. Disponível em: <<http://sistemas.sefaz.am.gov.br/srt/publico.do>>. Acesso em: 10 nov. 2017.

[22] Sefaz-Am. Relatório anual de repasses-Iranduba. 2012. Disponível em: <<http://sistemas.sefaz.am.gov.br/srt/publico.do>>. Acesso em: 10 nov. 2017.

[23] Sefaz-Am. Relatório anual de repasses-Iranduba. 2013. Disponível em: <<http://sistemas.sefaz.am.gov.br/srt/publico.do>>. Acesso em: 10 nov. 2017.

[24] Sefaz-Am. Relatório anual de repasses-Iranduba. 2014. Disponível em: <<http://sistemas.sefaz.am.gov.br/srt/publico.do>>. Acesso em: 10 nov. 2017.

[25] Sefaz-Am. Relatório anual de repasses-Iranduba. 2015. Disponível em: <<http://sistemas.sefaz.am.gov.br/srt/publico.do>>. Acesso em: 10 nov. 2017.

[26] Sefaz-Am. Relatório anual de repasses-Iranduba. 2016. Disponível em: <<http://sistemas.sefaz.am.gov.br/srt/publico.do>>. Acesso em: 10 nov. 2017.

Autares

FABIANE DOS SANTOS TOLEDO (Organizadora)

Mestre em geografia pela Universidade Federal de Uberlândia, na área de planejamento ambiental, atuante em geociências, com ênfase em ambiental - áreas verdes, índice de áreas verdes, espaços públicos livres e parques urbanos. Possui graduação em Geografia (Licenciatura e Bacharelado) pela Universidade Federal de Uberlândia, mestrado em geografia pela Universidade Federal de Uberlândia. Tem experiência na área de Geociências, com ênfase em Geografia ambiental, atuando principalmente nos seguintes temas: áreas verdes, índice de áreas verdes, espaços públicos livres e parques urbanos.

ALEXANDRO RELVAS PEREIRA

Formação acadêmica em Matemática, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e também em Gestão Pública, ambas pela Universidade do Estado do Amazonas. Possui experiência com atuação nas áreas de Tecnologia da Informação, Redes de Computadores e Docência Matemática e Informática. Especializado em Gestão Escolar, Segurança de Redes de Computadores e MBA Profissional em Análise de Sistemas e Telecomunicações, com o desenvolvimento de atividades e implementação de soluções voltadas à Tecnologia da Informação e Gestão Pública.

ALLAN GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA

Pós-Graduando em Meio Ambiente, Desenvolvimento e Sustentabilidade pelo Instituto ProMinas. Graduando em Administração de Empresas pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Graduado em Tecnologia em Gestão Ambiental pela Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro - FAETERJ (2017). Foi Secretário executivo da Associação dos Gestores Ambientais do Estado do Rio de Janeiro - Anagea/RJ (2015-2017). Foi Estagiário do Museu de solos do Brasil da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ (2015-2017). Coordenou o projeto de pesquisa Verticalizando - Educação Ambiental - (2015). Desenvolve trabalhos de extensão, pesquisa e ensino em áreas de Agronomia e Meio Ambiente.

ALTEMAR LOPES PEDREIRA JUNIOR

Graduando em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal do Amazonas - UFAM/IEAA. Integrante do Grupo de Pesquisa Interação Biosfera e Atmosfera - GPIBA. Atualmente é tesoureiro do Centro Acadêmico do curso de Engenharia Ambiental (CAEAMB) do Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente - IEAA/UFAM.

ANA KAROLLINE SOARES ALVES

Cursou o ensino fundamental e o Médio no Colégio Instituto Presbiteriano Vale do Tocantins em Paraíso /TO. Formada em Tecnologia em Gestão Ambiental pela Faculdade Católica do Tocantins em Palmas /TO e Pós-graduada em Educação Ambiental pela Faculdade Campos Elíseos. Bolsista do PIBIC CNPq na Organização Não Governamental IDAHRA (Instituto de Desenvolvimento Ambiental e Humano na Região Amazônica). Trabalhou na empresa Instituto Tocantins de Pesquisa, Ensino e Ciência em parcerias com as Prefeituras do Estado do Tocantins com ICMS Ecológico, atuou também na área de Licenciamento Ambiental na empresa TM Engenharia e Consultoria.

ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA

Atualmente é pós-graduando na Especialização em Engenharia Diagnóstica, Patologia e Perícias na Construção Civil - INBEC, graduado em Engenharia Civil pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). Exerce o cargo de inspetor do CREA-PB

ANTONIO JORGE BARBOSA DA SILVA

Bacharel em Direito, Centro Universitário do Norte – UNINORTE; Pós Graduado em Direito Penal e Processual Penal, Universidade Federal do Amazonas – UFAM; Pós Graduado em Segurança Pública e Inteligência Policial, Universidade de Cuiabá – UNIC; Mestre em Gestão de Áreas Protegidas na Amazônia, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA

ARIELE LUCKWU MENDES

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia – PPG/CASA da Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Especialista nível MBA em Gestão de Projetos pela Faculdade Estácio de Sá. Bacharel em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Luterana do Brasil (ULBRA). Experiência em projetos arquitetônicos de edificações comerciais e institucionais, projetos de reforma e retrofit, metodologia Building Information Modeling (BIM) e eficiência energética em edificações. Linhas de pesquisa: Arquitetura bioclimática, conforto ambiental e obras do arquiteto Severiano Mario Porto.

ARYANNE RESENDE DE MELO MOURA

Graduanda no curso de Engenharia Ambiental na Universidade Federal do Amazonas (UFAM) no Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente. Bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 2017-2018. Integrante do Grupo de Pesquisa Interação Biosfera e Atmosfera - GPIBA. Atualmente Coordenadora de Assuntos Estudantis do Centro Acadêmico de Engenharia Ambiental - CAEAMB - gestão 2017/2018

BARBARA GABRIELLA OLIVEIRA CHAVES

Mestre em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia na Universidade Federal do Amazonas - Período 2016-2018. Graduada em Serviço Social pelo Centro Universitário do Norte - Manaus - AM, período (2010-2013).

BRUNO MENEZES DA CUNHA GOMES

Atualmente é mestrando de recursos hídricos e meio ambiente com ênfase em materiais sustentáveis pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ/COPPE), graduado em Engenharia Civil pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), foi presidente da centro acadêmico de Engenharia civil (CAEC) no período de 2013-2016, foi estagiário da Pilares Empresa Júnior, MGA construções e participante do grupo de pesquisa CURIMATAÚ EFICIENTE, onde desenvolveu pesquisas sobre sistemas hídricos e desenvolvimento sustentável.

CARLOS ALEXANDRE SANTOS QUERINO

Meteorologista, Prof. Adjunto da Universidade Federal do Amazonas - UFAM, vinculado Instituto de Educação Agricultura e Ambiente - IEAA e ao Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais. Possui graduação e mestrado em meteorologia pela Universidade Federal de Alagoas (2003) e (2006) e Doutorado em Física Ambiental pela Universidade Federal de Mato Grosso (2016). Realiza pesquisas no âmbito da interação biosfera-atmosfera na Amazônia e Pantanal. Tem experiência na área de Geociências (Meteorologia), com ênfase em Radiação Solar, Micrometeorologia e Climatologia.

CARLOS EDUARDO DE CARVALHO FREITAS

Doutor em Ciências da Engenharia Ambiental pela Universidade de São Paulo, pós-doutorado em Washington and Lee University (USA). Professor Titular da Universidade Federal do Amazonas,

CHRYSS FERREIRA MACÊDO

Possui graduação tecnológica em Gestão Ambiental pela Universidade Norte do Paraná (2010), Especialista em Gestão Pública e Sociedade pela UFT (2011), Especialista em MBA em Perícia, Auditoria e Gestão Ambiental (UFT) e Mestre em Engenharia Ambiental (UFT). Possui experiência na área de Ciências Ambientais, atuando principalmente : Projetos Ambientais, Palestras e Oficinas de Educação Ambiental voltadas a professores, comunidades científicas e população em geral. Docente da Faculdade Católica do Tocantins nos cursos de Gestão Ambiental, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Administração, Engenharia Ambiental, Estágio Supervisionado em viveiro para produção de mudas nativas.

CLAYSSA PICAÑO

Acadêmica de Engenharia Elétrica na Universidade Federal do Amazonas, atualmente no 10º período.

DAÍSE ARAÚJO SOARES DE SOUZA

Tecnóloga em Gestão Ambiental pela Faculdade Católica do Tocantins, graduanda de Engenharia Ambiental pela Universidade Federal do Tocantins Campus Palmas e Pós-graduanda em Perícia, Auditoria e Gestão Ambiental.

DANIELLE IVANA PEREIRA DOS SANTOS

Possui graduação em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal do Amazonas (2013), Especialista em Docência em Ensino Superior pela Universidade Paulista Barão de Mauá (2017) e atualmente mestranda em Ciências Ambientais pela Universidade Federal do Amazonas. Detém experiência na área de Engenharia Ambiental em tratamento de água para abastecimento industrial e humano, tratamento de efluentes líquidos industriais, gerenciamento de resíduos sólidos, licenciamento e monitoramento ambiental, implantação de sistema de gestão ambiental (ISO 14001). Além disso, participa de pesquisas acerca da adaptabilidade de comunidades ribeirinhas a eventos extremos bem como atua na área de geotecnologias sobretudo no que se refere a recursos hídricos, uso e ocupação de solo e modelagem ambiental.

DEBORA CRISTINA BANDEIRA RODRIGUES

Graduada em Serviço Social pela Universidade Federal do Amazonas (1996), mestrado em Sociedade e Cultura na Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas (2001) e doutorado em BIOTECNOLOGIA, área de concentração de Gestão da Inovação, pela Universidade Federal do Amazonas (2009). Atualmente é docente do departamento de Serviço Social e do Programa de Pós Graduação em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia (PPGSS) da Universidade Federal do Amazonas- UFAM, Vice coordenadora do Programa de Pós Graduação em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia - PPGSS/UFAM. Pesquisadora do Grupo Interdisciplinar de Estudos Socioambientais e Tecnologias Sociais na Amazônia. Tem experiência na área de Serviço Social, com ênfase em Fundamentos do Serviço Social, atuando principalmente nos seguintes temas: questões sócio-ambientais na Amazônia; conhecimentos tradicionais na Amazônia; pesquisa-ação; pesquisa participante, cidadania - interdisciplinaridade, educação ambiental - formação profissional e relação homem-natureza na Amazônia.

DORENETHE DOS SANTOS BENTES

Professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Amazonas. Com experiência na área de História e Direito, atuando principalmente na docência superior, com experiência em Pesquisa Jurídica, Hermenêutica, Direito do Trabalho, Direito Administrativo, Direito Constitucional, Prática Jurídica Real, Estágio supervisionado, Metodologia do Ensino Superior, Metodologia no Ensino de História e Direito, História da Amazônia e história das Relações Internacionais.

ELIZIA RAQUEL CUNHA

Possui graduação em Engenharia Ambiental pelo Centro Universitário do Norte (UNINORTE) e especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho pelo IEMAC. Consultora Ambiental, Assessora em Licenciamento Ambiental, Serviços e Projetos Ambientais e Estação de Tratamento de Esgoto - ETE.

FABÍOLA DE SOUZA BARÃO

Graduada em Engenharia de Pesca. Professora do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas

FABÍOLA ESQUERDO DE SOUZA

Possui graduação em Engenharia Ambiental pelo Centro Universitário do Norte (UNINORTE) e especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho pelo IEMAC. Atualmente é Consultora e Assessora Consultora Ambiental, Assessora em Projetos e Serviços Ambientais. Tem experiência na área de Meio Ambiente e Geoprocessamento.

FELIPE AUGUSTO DA SILVA SANTOS

Felipe Augusto da Silva Santos é Engenheiro Civil formado pela Universidade Estadual da Paraíba (2016). Profissionalmente, atua na área de projetos e execução de obras. Atualmente é Responsável Técnico da Carvalho Construções LTDA

FRANCIMARA SOUZA DA COSTA

Doutora em Ciências Socioambientais pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (Universidade Federal do Pará). Possui graduação em Agronomia pela Universidade Federal do Amazonas; Mestrado em Aquicultura em Águas Continentais pela Universidade Estadual Paulista. Especialização em Políticas governamentais, desenvolvimento sustentável e comunidades tradicionais na Amazônia pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA. É professora adjunta da Universidade Federal do Amazonas, desenvolvendo atividades de ensino, pesquisa e extensão nas áreas de agroecologia, agricultura familiar e sustentabilidade socioambiental.

FRANCISCO DAS CHAGAS MELO BENEVIDES

Licenciado em História pela Universidade do Estado do Amazonas, Pós graduado em Gestão e Políticas Públicas Municipais pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci - UNIASSELVI. Atua como professor da Secretaria de Educação e Qualidade de Ensino - SEDUC.

GUILHERME AUGUSTO BENTES FURTADO NETO

Discente do curso de Geografia da Universidade do Estado do Amazonas, Escola Normal Superior/ENS, vinculado ao Núcleo de Pesquisas Urbana e Regional/NPUR. Possui estudos com ênfase em Geografia Urbana e seus processos de metropolização na Região Metropolitana de Manaus. Também atua em estudos voltados para a área da Geografia da População.

HYAGO MARDONE MACIEL

Tecnólogo em Agrimensura pela Universidade Estadual do Amazonas, campus Humaitá. Atua na área de geotecnologias com ênfase em delimitação de bacias hidrográficas, cadastro ambiental rural e análises de impactos ambientais.

ISAAQUE DOS SANTOS SOUSA

Professor do Curso de Geografia da Universidade do Estado do Amazonas e do Mestrado Profissional Gestão e Regulação dos Recursos Hídricos (ProfAgua). Doutor em Geografia Humana (USP/2013), com experiência no Ensino e na Pesquisa em Geografia Humana. Mestre em Arquitetura e Urbanismo (UFSC/2007). Lidera o Núcleo de Pesquisas Urbana e Regional (NPUR) e atua principalmente nos seguintes temas: Dinâmica Urbana na Amazônia, Mercado Imobiliário na Região Metropolitana de Manaus, Metropolização do Espaço e Desenvolvimento Urbano-Regional. Exerce o cargo de Coordenador de Extensão na Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários/PROEX-UEA.

ÍISIS RIBEIRO DO NASCIMENTO

Graduanda em Engenharia Ambiental na Universidade Federal do Amazonas, campus Humaitá. Bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) pela Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado do Amazonas (FAPEAM) 2017-2018. Voluntária no Núcleo de Pesquisa e Extensão em Ambiente, Socioeconomia e Agroecologia - NUPEAS - . Diretora de Pesquisa e Extensão na Executiva Nacional dos Estudantes de Engenharia Ambiental - ENEEA - gestão 2018/2019. Presidente do Centro Acadêmico de Engenharia Ambiental - CAEAMB - gestão 2017/2018. Representante discente no Colegiado de Engenharia Ambiental.

JANAINA ZILDEIA DA SILVA PAIVA

Graduada em Serviço Social pela Universidade Federal do Amazonas - UFAM; Mestra em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia pela UFAM. Atualmente, é Doutoranda do Programa de Pós-Graduação Sociedade e Cultura na Amazônia da UFAM. Pesquisadora do Grupo de Estudos e do Grupo de Pesquisa: Processos de Trabalho e Serviço Social na Amazônia - GETRA da UFAM.

JEAN CARLOS OLIVEIRA COELHO

Graduado em Administração de Empresas pela Universidade Gama Filho/RJ (UGF94), Pós-Graduado em Gestão de Logística do Estado do Amazonas (UEA/2010) e Pós-Graduado em Docência do Ensino Superior pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci – Uniasselvi (2015) e especializando-se em Gestão Escolar, MBA em Gestão Empresarial, Engenharia de Produção e Coordenação Pedagógica pela Uniasselvi. Atuei como professor da Escola de Comunicações nos anos de 1997-2001/2004-2007 nas áreas de Telecomunicações, Segurança das Comunicações e Administração Militar. Experiência na área Orçamentária, Financeira e Patrimonial da Administração Pública, especificamente na área de auditoria em Conformidade de Gestão do Sistema Integrado da Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI). Atuei como professor substituto na Faculdade La Salle na disciplina Relações de Políticas Internacionais no ano de 2011. Nos de 2012 a 2016 atuei como Professor Tutor

Externo de Logística e Gestão Comercial do Grupo Uniasselvi do Centro Universitário Leonardo da Vinci do Polo de Manaus. Orientador de trabalhos acadêmicos (TCC, artigo, paper, banner) e atualmente sou professor-tutor de Pós-Graduação da UNIASSELVI-Manaus. Professor de Curso Técnico do Instituto de Educação Marchelli de Almeida Crispim (IEMAC) nas áreas de Gestão da Produção e Qualidade/Logística. Fui Consultor Técnico da Agência de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, na área de Comunicações em HF em 2016/2017. Mentor do Curso intitulado como Desatando os nós da Produção de Artigos Científicos Eficientes.

JOEL RODRIGUES

Graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Amazonas (1995). Atualmente cursando mestrado em Controle e Automação (aluno especial). Experiência na área de Engenharia Elétrica, em: telecomunicações, automação de testes em aparelhos acabados de áudio e vídeo, automação de testes de placas eletrônicas, Automação de processos de manufatura, introdução de novos modelos de aparelhos eletrônicos, projetos de pesquisa e desenvolvimentos na indústria de manufatura.

JULIAN OLIVEIRA GAMA

Estudante da área de Engenharia Elétrica 10º Período, com ênfase em Sistemas Elétricos de Potência na Universidade Federal do Amazonas.

JULIANA GERVASIO NUNES

Mestre em Engenharia de Edificações e Ambiental, pela Universidade Federal do Mato Grosso - UFMT. Possui graduação em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal do Amazonas (2012), pós graduação em Perícia e Auditoria Ambiental pelo Centro Universitário Internacional - UNINTER (2013) e curso Técnico em Agropecuária pela Escola Agrotécnica Federal de Colorado do Oeste - RO (2002). É Professora do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso-IFMT, Campus Sorriso, nos cursos de Tecnologia em Gestão Ambiental, Tecnologia em Produção de Grãos e Técnico em Agropecuária. Também é membro do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Sorriso-MT.

JULIANE KAYSE ALBUQUERQUE DA SILVA QUERINO

Doutora em Física Ambiental (2017) pelo programa de Pós-Graduação em Física Ambiental da Universidade Federal do Mato Grosso-UFMT. Possui graduação em Meteorologia pela Universidade Federal de Alagoas (2003), onde trabalhou com os dados de radiação solar do projeto LBA comparando o comportamento desta variável em área de pastagem. Em junho de 2006 concluiu o curso de mestrado em meteorologia, também pela Universidade Federal de Alagoas - UFAL, onde dissertou sobre "Caracterização do vento e estimativa do potencial eólico para a região de Tabuleiros Costeiros (Pilar - AL, Brasil)". No período de Julho de 2007 a Março de 2008, trabalhou no Escritório do LBA - INPA sob a orientação do Dr. Theotonio Pauliquevis, na realização do EUCAARI (European Integrated project on Aerosol Cloud Climate and Air Quality interactions) e do projeto Instituto do Milênio Integração de abordagens do ambiente, uso da terra e dinâmica social na Amazônia: as relações homem-ambiente e o desafio da sustentabilidade ? MilênioLBA2?, na componente 7, de Aerossóis e Precipitação, atuando em cooperação com o prof. Dr. Paulo Artaxo, do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. No ano de 2008, ministrou as aulas das disciplinas de Laboratório de Física I e II na Universidade Federal do Amazonas - UFAM, Campus Humaitá. Em 2009 foi aprovada e admitida como professora assistente no curso de engenharia ambiental na Universidade Federal do Amazonas - UFAM, Campus Humaitá.

KARINE CANANI DE OLIVEIRA

Possui graduação em Pedagogia pelo Centro Universitário FACVEST (2007). Especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional e Especialista em Educação Global e Desenvolvimento Humano pela Fesp de Curitiba. Atualmente cursa o Mestrado em Educação pela FLORIDA CHRISTIAN UNIVERSITY - Núcleo Nordeste - Campus UNIFUTURO e Especialização em Metodologia do Ensino de Artes pela Uninter. Atuando à 13 anos em vários seguimentos da educação, com experiência em Educação Infantil, Ensino Fundamental, Médio e Profissionalizante. Desenvolvendo também atividades de Atendimento Psicopedagógico Clínico e Assessoramento Psicopedagógico Clínico e Institucional. Participou de trabalhos científicos (artigos) publicados nos seguintes eventos: 5º SICASA - Seminário Internacional de Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia (2018), III Workshop nas Trilhas e Redes dos Saberes da UFAM (2018). Possui ainda, artigo aceito para a Jornada "O tráfico ilícito do patrimônio bibliográfico na América Latina e Caribe" da Biblioteca Nacional (2018).

LARA PATRICIA DOS SANTOS CHAVES

Arquiteta e Urbanista pela Universidade Luterana do Brasil. Aluna especial no Programa de Pós-Graduação Sociedade e Cultura na Amazônia.

LARISSA LORRANA SILVA

Possui graduação em Gestão Ambiental pela Faculdade Católica do Tocantins (2016). Atualmente é professor de inglês do Centro Cultural Anglo Americano de Paraíso do Tocantins. Tem experiência na área de Ciências Ambientais. Atua na área de palestras, entrevistas, projetos e publicidade ambiental.

LETÍCIA SANTOS SILVA

Possui Graduação em CST em Gestão Ambiental pelo Faculdade Católica do Tocantins, Pós graduanda em Perícia e Auditoria Ambiental, pela faculdade Laboro (Cursando). Com experiência na área de Ciências Ambientais na relação de quebras de dormências de sementes nativas do bioma Cerrado, e em saneamento básico na área de controle da qualidade de água. Possui experiência na área de Meio Ambiente, como Consultora Técnica em licenciamento e Estudos Ambientais, Relatórios de Impacto Ambiental sobre meio socioeconômico, Planos de Controle Ambiental e Relatórios, e Planos de gerenciamentos de resíduos sólidos. Atua como palestrante nas áreas de educação ambiental e licenciamento ambiental.

LUCAS MOURA DELFINO

Atualmente é graduando em Engenharia Civil pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Diretor presidente da empresa Pilares Consultoria Júnior de Engenharia Civil. Também participa de pesquisas de extensão nas áreas de patologia estrutural e análise estrutural. É monitor da disciplina Resistência dos Materiais II.

LUCIANA MELO FELIX DA SILVA

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia PPGCASA da Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Especialização em Gerenciamento de Projetos pela UFAM. Bacharel Administração de empresas pelo Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas (CIESA). Experiência como professora de nível superior com ênfase em ensino à distância. Atua como tutora a distância no curso de Administração Pública pela UFAM.

LUCIRENE AGUIAR DE SOUZA

Mestrado e Doutorado em Biologia de Água Doce e Pesca Interior. Professora do Curso de Engenharia de Pesca da Universidade Federal do Amazonas. Área de conhecimento: Modelagem de Ecossistemas Pesqueiros

LUIZ OCTAVIO FABRICIO DOS SANTOS

Graduando em Engenharia Ambiental, no Instituto de Educação Agricultura e Ambiente - IEAA, UFAM. Integrante do Grupo de Pesquisa Interação Biosfera e Atmosfera - GPIBA.

LUIZ RICARDO DA SILVA LINHARES

Graduando em engenharia civil pela Universidade Estadual da Paraíba. Técnico em edificações pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (2012).

MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA OLIVEIRA FILHA

Graduada em Serviço Social pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM); Especialista em Prevenção e Tratamento da Dependência Química pela Faculdade Salesiana Dom Bosco; Mestra em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia pela UFAM. Atualmente, é Doutoranda do Programa de Pós-Graduação Sociedade e Cultura na Amazônia da Universidade Federal do Amazonas. Pesquisadora do Grupo de Pesquisa Políticas Públicas, Território e Ambiente na Amazônia da Universidade Federal do Amazonas.

MAXIMILLIAN NASCIMENTO DA COSTA

Atualmente é militar do 2º Grupamento de Engenharia. Tem experiência na área de Engenharia Civil, Logística e Transportes. Graduando em Engenharia Civil pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (2018). Participou e apresentou trabalhos científicos (artigos) publicados nos seguintes eventos: 49º CBG - Congresso Brasileiro de Geologia (2018), 5º SICASA - Seminário Internacional de Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia (2018), XVI Rio de Transporte (2018), XXXI ANPET (2017), XV Rio de Transportes (2017) e I Encontro de Transportes do IFAM (2017). Possui ainda, artigo aceito para o 8º PLURIS - Congresso Luso-Brasileiro para o Planejamento Urbano, Regional, Integrado e Sustentável em Coimbra - Portugal (2018).

PAULO ANDRÉ DA SILVA MARTINS

Possui graduação em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM) (2014). É discente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (Mestrado) pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Membro do grupo de pesquisa Interação Biosfera Atmosfera na Amazônia (GPIBA). Tem experiência na área de Saneamento Ambiental com ênfase na elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Gestão Integrada. Em meteorologia desenvolve trabalhos de pesquisas nas áreas de Radiação Solar, Temperatura do Ar, Balanço Hídrico e Coeficiente de Transmissividade (Kt). Foi membro da equipe multidisciplinar na elaboração Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Gestão Integrada no Município de Apuí - AM. Trabalhou em parceria juntamente ao Instituto Chico Mendes da conservação e Biodiversidade (ICMBio) na Floresta Nacional do Jatuarana (2013).

ROBERTA MONIQUE DA SILVA SANTOS

Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia – PPG/CASA da Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Mestre em Ciências Florestais e Ambientais pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais – PPG/CIFA da UFAM. Especialista em Gestão Ambiental pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Bacharel em Engenharia Florestal pela UFAM e em Administração pela UEA. Experiência como consultora nas áreas de administração e gestão ambiental e como professora de nível superior. Integra o corpo docente da Faculdade Salesiana Dom Bosco como coordenadora dos cursos de Administração e Superiores de Tecnologia.

ROBSON LIMA DA SILVA

Técnico em Contabilidade (1995), Técnico em Topografia pela Escola de Instrução Especializada - Exército Brasileiro (1997), Acadêmico de Engenharia Civil na Faculdade Estácio do Amazonas (2015). Curso de Cartografia e Sistema de Informação - 2º Centro de Geoinformação (2018). Participou e apresentou trabalhos científicos (artigos) publicados nos seguintes eventos: 49º CBG - Congresso Brasileiro de Geologia (2018), 5º SICASA - Seminário Internacional de Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia (2018), III Workshop nas Trilhas e Redes dos Saberes UFAM (2018). Possui ainda, artigo aceito para a Jornada "O tráfico ilícito do patrimônio bibliográfico na América Latina e Caribe" da Biblioteca Nacional (2018). Possui experiência em Engenharia Civil, Cartografia e Topografia, com ênfase em Rodovias, Aeroportos e Portos e Cartografia - realizando os seguintes trabalhos: Execução de Projetos Rodoviários e Serviços Cartográficos.

SARA ANGÉLICA SANTOS DE SOUZA

Graduanda do curso de Engenharia Ambiental pelo Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente da Universidade Federal do Amazonas - IEAA/UFAM. Atualmente integrante do Grupo de Pesquisa Interação Biosfera e Atmosfera - GPIBA, desenvolvendo pesquisas correlacionando as anomalias climáticas causadas pelos fenômenos El Niño e La Niña.

SARA FONTINELLI LAURIDO

Engenheira de pesca. Mestranda em Ciências Pesqueiras nos Trópicos pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

SEBASTIÃO FERREIRA LISBOA NETO

Graduado em Biologia (ULBRA), Especialista em Gestão de Recursos Naturais e Meio Ambiente (UNINORTE) e Metodologia de Ensino em Ciências Biológicas (UNIASSELVI), mestrando em Ciência e Meio Ambiente (UFPA). Atualmente é biólogo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável de Fonte Boa, onde ocupa o cargo de Vice Diretor.

SHARLES GABRIEL DE SOUSA BORGES

Graduado em Gestão Ambiental (Tecnólogo) pela Católica do Tocantins, em Palmas-TO, como Bolsista ProUni. Membro da Coordenação Nacional de Estudantes de Gestão Ambiental ocupando o cargo de Polinizador de Ideias. Foi membro do Centro Acadêmico de Gestão Ambiental da Católica do Tocantins como Diretor Geral. Foi coordenador de ações do Projeto Ecoponto na Escola vinculado ao Instituto de Desenvolvimento Ambiental e Humano da Região Amazônica - IDAHRA, atuando com crianças, em conjunto com professores, estando apto a gerenciar também a sala de aula. Co-Coordenador do Projeto de Demarcação de árvores matrizes do Cerrado na área do Campus II da Católica do Tocantins. Possui especialização em Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos no Nordeste, pela Agência Nacional das Águas - ANA. Especializado pelo Curso Água e Gestão da Agência

Nacional das Águas -ANA. Atua na área de palestras, entrevistas, projetos e publicidade ambiental. Boa desenvoltura em público, facilidade de interação e trabalho em equipe. Tem facilidade em redigir textos científicos, artigos e resumos expandidos. Trabalhou como voluntário em inúmeros projetos e ações públicas, a exemplo os I Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, Projeto de revitalização do Córrego Angico na comunidade quilombola de Malhadinha e outros. Em suma, tem facilidade em trabalhar com público desde a criança até os mais velhos, aptidão em resolver problemas complexos, boa desenvoltura em falar, escrever e disseminar o aprendizado

SOLANGE SANTOS COSTA

Possui graduação em Geologia pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), mestrado e doutorado em Geociências pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é Professora do Departamento de Geociências da UFAM. Tem experiência na área de Sensoriamento Remoto, atuando nos seguintes temas: Interpretação de imagens ópticas e de Radar, aplicação da geotecnologia na área de geociências e meio ambiente.

SUSANE PATRÍCIA MELO DE LIMA

Professora Assistente da Universidade do Estado do Amazonas/UEA/ no Curso de Geografia. Geógrafa, bacharel e licenciada, formada pela Universidade Federal do Amazonas/Ufam e Mestre em Geografia formada pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Amazonas. Atua nas Ciências Humanas, com ênfase em Sociedade, Cultura, Natureza e Ambiente, Geografia Humana - Geografia Urbana e Econômica, Política e Teoria da Geografia, com ênfase nos temas: Cidades, Rede Urbana, Regiões Metropolitanas na Amazônia, Configurações Produtivas, Desenvolvimento Regional, processos de Metropolização no Amazonas, dinâmicas do trabalho na RMM. Pesquisadora do Núcleo de Pesquisas Urbana e Regional/Npur/UEA. Coordenou de Área do Programa Institucional de iniciação à Docência/PIBID/CAPES/UEA. Coordenadora do Curso Modular Licenciatura em Geografia (Carauari, Presidente Figueiredo, Boca do Acre e Ipixuna).

THIAGO DE SÁ SENA

Concluiu o segundo grau na Escola Estadual Olivina Olívia Carneiro da Cunha (2013), onde foi bolsista do programa PIBICJr (2012) da FAPESQ-PB em parceria com o CNPq. Atualmente é graduando em Engenharia Civil pela Universidade Estadual da Paraíba - UEPB, onde foi membro do Centro Acadêmico de Engenharia Civil ocupando a função de Secretário Geral. Membro colaborador do Grupo de Pesquisa CURIMATAÚ EFICIENTE, no qual realiza pesquisas nas áreas de recursos hídricos, desenvolvimento sustentável e controle tecnológico em obras. Também foi membro da diretoria executiva da Pilares Consultoria Júnior de Engenharia Civil na função de Assessor de Marketing.

TONY MARCOS PORTO BRAGA

Doutor em Ecologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Professor da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) em Santarém-Pa.

UARLISSON MACHADO

Possui graduação em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Consultora Ambiental, Assessora em Licenciamento Ambiental, Serviços e Projetos Ambientais e Estação de Tratamento de Esgoto - ETE.

VANDERLEIA CASTRO BEZERRA

Graduada em Engenharia Ambiental e Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho, pela UniNorte Laureate Internacional Universities. Exerceu o cargo de TST-Coordenadora do SESMT, na empresa Pool Engenharia LTDA. É consultora e assessora na área de Segurança do Trabalho e Ambiental, executando serviços em empresas de diversos ramos de atividade.

YGOR FELIPE TÁVORA DA SILVA

Bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Amazonas; Bacharel em Administração pela Universidade Federal do Amazonas; Pós graduação, lato sensu, em Direito do trabalho, Processo do Trabalho e Direito Previdenciário pelo Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas - CIESA; Mestre em Gestão de Áreas Protegidas da Amazônia pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia - INPA; Mestre em Direito Ambiental pela Universidade do Estado do Amazonas; Doutorando em Geografia pela Universidade Federal de Goiás; Professor efetivo de Gestão do Instituto Federal do Amapá.

Agência Brasileira do ISBN

ISBN 978-85-7042-032-9

9 788570 420329