Lista comentada das espécies
Ordem Anura Fisher von Waldheim, 1813
**Família Aromobatidae Grant, Frost, Caldwell, Gagliardo, Haddad,
Kok, Means, Noonan, Schargel & Wheeler, 2006**

Wilian Vaz-Silva
Natan Medeiros Maciel
Fausto Nomura
Alessandro Ribeiro de Moraes
Vinícius Guerra Batista
Danusy Lopes Santos
Sheila Pereira Andrade
Arthur Ângelo Bispo de Oliveira
Reuber Albuquerque Brandão
Rogério Pereira Bastos

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros

VAZ-SILVA, W., MACIEL, N.M., NOMURA, F., MORAIS, A.R., BATISTA, V.G., SANTOS, D.L., ANDRADE, S.P., OLIVEIRA, A.Â.B., BRANDÃO, R.a., BASTOS, R.P. Família Aromobatidae Grant, Frost, Caldwell, Gagliardo, Haddad, Kok, Means, Noonan, Schargel & Wheeler, 2006. In: *Guia de identificação das espécies de anfíbios (Anura e Gymnophiona) do estado de Goiás e do Distrito Federal, Brasil Central* [online]. Curitiba: Sociedade Brasileira de Zoologia, 2020, pp. 17-18. Zoologia: guias e manuais de identificação series. ISBN: 978-65-87590-01-1. <https://doi.org/10.7476/9786587590011.0005>.

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International license](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença [Creative Commons Atribuição 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia [Creative Commons Reconocimiento 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

LISTA COMENTADA DAS ESPÉCIES

Allobates goianus (Bokermann, 1975)

NOME POPULAR SUGERIDO

Rãzinha-da-mata

Localidade-tipo e distribuição geográfica.

A localidade-tipo é o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, Goiás, Brasil. Além da localidade-tipo a espécie tem ocorrência confirmada para os municípios de Silvânia (Bastos *et al.* 2003), Niquelândia (Silva *et al.* 2005), Minaçu (Brandão & Araujo 2008) e Cavalcante (RPPN Serra do Tombador).

Foto: L.O. Drummond.

Figura 14. *Allobates goianus*. Niquelândia, GO.

Caracterização. Espécie de tamanho pequeno (CRC em média de 18 mm em machos) (Bokermann 1975), apresentando colorido dorsal pardacento com quatro manchas grandes de coloração marrom escuro, sendo que a primeira se apresenta em forma de um triângulo com o vértice voltado para região posterior. Estreita faixa interocular clara delimitando a parte anterior da primeira mancha escura. Apresenta uma faixa dorsolateral marrom escura, que se inicia no focinho e termina na região inguinal, e uma fina faixa branca no lábio superior.

Morfologia larval. Os girinos são caracterizados pelo corpo oval em vista dorsal e trapezoidal em vista lateral, com os olhos e narinas posicionadas lateralmente. O disco oral é ventral, com papilas marginais interrompidas por lacuna dorsal e fórmula dentária 2(2)/3(1). A cobertura da mandíbula superior é em formato de arco e a inferior em "V". Espiráculo sinistro, localizado no terço médio do corpo, dirigido posterodorsalmente. Nadadeiras ventral e dorsal em arco amplo (Bokermann 1975).

História Natural. Espécie diurna e crepuscular que habita a serapilheira de Matas de galeria, próximo a riachos. Como outras espécies do gênero, deposita os ovos na serapilheira, podendo ter (ou não) cuidado parental. O canto de anúncio é composto por uma nota com duração variando entre 0,65 e 0,79 segundos (Bastos *et al.* 2011). O canto apresenta modulação de frequência e as frequências fundamental e dominante são, respectivamente, $2467,3 \pm 53,5$ Hz e $4946,3 \pm 107,2$ Hz (Bastos *et al.* 2011). Os indivíduos vocalizam em uma taxa de emissão de 76 cantos por minutos (Bastos *et al.* 2011).

Figura 15. Registros de *Allobates goianus*. **Estrela** = Localidade-tipo.