Lista comentada das espécies
Ordem Gymnophiona Müller, 1832
Família Siphonopidae Bonaparte, 1850

Wilian Vaz-Silva
Natan Medeiros Maciel
Fausto Nomura
Alessandro Ribeiro de Moraes
Vinícius Guerra Batista
Danusy Lopes Santos
Sheila Pereira Andrade
Arthur Ângelo Bispo de Oliveira
Reuber Albuquerque Brandão
Rogério Pereira Bastos

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros

VAZ-SILVA, W., MACIEL, N.M., NOMURA, F., MORAIS, A.R., BATISTA, V.G., SANTOS, D.L., ANDRADE, S.P., OLIVEIRA, A.Â.B., BRANDÃO, R.a., BASTOS, R.P. Família Siphonopidae Bonaparte, 1850. In: *Guia de identificação das espécies de anfíbios (Anura e Gymnophiona) do estado de Goiás e do Distrito Federal, Brasil Central* [online]. Curitiba: Sociedade Brasileira de Zoologia, 2020, pp. 183-184. Zoologia: guias e manuais de identificação series. ISBN: 978-65-87590-01-1.
<https://doi.org/10.7476/9786587590011.0018>.

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International license](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença [Creative Commons Atribuição 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia [Creative Commons Reconocimiento 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Siphonops annulatus (Mikan, 1820)

NOME POPULAR

Cecília-anelada; cobra-cega

Localidade-tipo e distribuição geográfica.

A localidade-tipo da espécie é Sebastiãoopolis (Rio de Janeiro), Brasil. Espécie de distribuição cis-andina amplamente distribuída pela América do Sul. A distribuição no estado de Goiás é pouco conhecida com registros esparsos nas regiões sul e norte, formando uma lacuna nos pontos de ocorrência da espécie (ver Maciel *et al.* 2013).

Caracterização. Comprimento máximo do corpo de 450 mm. Anéis circundando o corpo. Número de anéis no corpo variando de 78 a 98 (Taylor 1968).

Morfologia larval. Não se aplica.

História Natural. Espécie terrestre fossorial. Maciel & Hoogmoed (2011) fazem uma revisão dos dados de história natural existentes para a espécie, citando Taylor (1968) e Lynch (2006), que mencionam a tolerância da espécie a ambientes mais secos. Wilkinson *et al.* (2008) descrevem a dermatofagia maternal dos jovens.

Figura 255. *Siphonops annulatus*. Itapua Oeste, RO.

Foto: U.S.C. Oliveira.

Figura 256. Registros de *Siphonops annulatus*.

Siphonops paulensis Boettger, 1892

NOME POPULAR SUGERIDO

Cecília-paulistana;
cobra-cega-paulistana

Localidade-tipo e distribuição geográfica.

A localidade-tipo é São Paulo, Brasil. Ocorre no Brasil, Argentina, Paraguai e Bolívia (Miranda *et al.* 2013, Frost 2018). Espécimes de *S. paulensis* foram coletados nas regiões norte e sul do estado de Goiás.

Caracterização. Comprimento máximo do corpo de 470 mm. Anéis circundando o corpo. Número de anéis no corpo variando de 102 a 117 (Taylor 1968).

Morfologia larval. Não se aplica.

História Natural. Espécie terrestre e fossorial. Dados de ecologia reprodutiva foram apresentados por Montero *et al.* (2005), evidenciando cuidado parental, número e tamanho de ovos e tamanho de filhotes recém eclodidos.

Foto: R. A. Brandão

Figura 257. *Siphonops paulensis*. Jataí, GO.

Figura 258. Registros de *Siphonops paulensis*.