Lista comentada das espécies
Ordem Gymnophiona Müller, 1832
Família Typhlonectidae Taylor, 1968

Wilian Vaz-Silva
Natan Medeiros Maciel
Fausto Nomura
Alessandro Ribeiro de Moraes
Vinícius Guerra Batista
Danusy Lopes Santos
Sheila Pereira Andrade
Arthur Ângelo Bispo de Oliveira
Reuber Albuquerque Brandão
Rogério Pereira Bastos

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros

VAZ-SILVA, W., MACIEL, N.M., NOMURA, F., MORAIS, A.R., BATISTA, V.G., SANTOS, D.L., ANDRADE, S.P., OLIVEIRA, A.Â.B., BRANDÃO, R.a., BASTOS, R.P. Família Typhlonectidae Taylor, 1968. In: *Guia de identificação das espécies de anfíbios (Anura e Gymnophiona) do estado de Goiás e do Distrito Federal, Brasil Central* [online]. Curitiba: Sociedade Brasileira de Zoologia, 2020, pp. 185. Zoologia: guias e manuais de identificação series. ISBN: 978-65-87590-01-1.
<https://doi.org/10.7476/9786587590011.0019>.

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International license](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença [Creative Commons Atribuição 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia [Creative Commons Reconocimiento 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Potomotyphlus kaupii (Berthold, 1859)

NOME POPULAR

SUGERIDO

Cecília-aquática-de-kaupi

Localidade-tipo e distribuição geográfica.

A localidade-tipo da espécie é Angostura, Bolívar Venezuela. Ocorre no Brasil (Acre, Amapá, Amazonas, Goiás, Pará, Maranhão, Rondônia e Roraima), Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Peru e Venezuela (Cintra *et al.* 2010, Maciel & Hoogmoed 2011, Oliveira *et al.* 2012). No estado de Goiás foi registrada no município de Niquelândia, Usina Hidrelétrica de Serra da Mesa, e rio Tocantins.

Caracterização. Comprimento máximo do corpo de 69,5 mm (Taylor 1968). Cabeça comprimida dorsoventralmente e mais estreita comparada ao restante do corpo. Pequenos tentáculos anteriores, abaixo da narina. Corpo comprimido lateralmente. Presença de quilha dorsal ou nadadeira na metade posterior do corpo (Taylor 1968, Maciel & Hoogmoed 2011).

Morfologia larval. Não se aplica.

História Natural. Espécie de hábito aquático associada a ambientes de água corrente (Marty *et al.* 2007), frequentemente capturada em armadilhas “matapi” para a captura de camarões (Maciel & Hoogmoed 2011) e em estudos relacionados com usinas hidrelétricas (Oliveira *et al.* 2012).

Foto: C.E.D. Cintra.

Figura 259. *Potomotyphlus kaupii*. Estreito, MA.

Figura 260. Registro de *Potomotyphlus kaupii*.