Capítulo 2

Bacia do rio Almada (Bahia): criação de cenários ambientais a partir do diagnóstico da fragmentação florestal

Waleska Ribeiro Caldas da Costa Viana
Maria Eugênia Bruck de Moraes

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros

VIANA, WRCC., and MORAES, MEB. Bacia do rio Almada (Bahia): criação de cenários ambientais a partir do diagnóstico da fragmentação florestal. In: MORAES, MEB., and LORANDI, R., orgs. *Métodos e técnicas de pesquisa em bacias hidrográficas* [online]. Ilhéus, BA: Editus, 2016, pp. 35-56. ISBN 978-85-7455-443-3. Available from SciELO Books <<http://books.scielo.org>>.

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International license](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença [Creative Commons Atribuição 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia [Creative Commons Reconocimiento 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

CAPÍTULO 2

Bacia do rio Almada (Bahia): criação de cenários ambientais a partir do diagnóstico da fragmentação florestal

Waleska Ribeiro Caldas da Costa Viana
Maria Eugênia Bruck de Moraes

Introdução

Bacias hidrográficas são sistemas ecológicos complexos em função do conjunto de interações antrópicas e naturais que ocorrem em seus limites. As comunidades humanas têm se estabelecido nas proximidades dos corpos d'água desde os primórdios da história e a sua atuação, desde então, tem ocasionado fenômenos danosos aos biomas, ecossistemas e comunidades inseridos em seu território.

Tradicionalmente, a necessidade de uso e ocupação do solo tem precedido os estudos sobre seus sistemas naturais, haja vista a necessidade de se ocupar espaços naturais, modificando suas estruturas, para extrair deles matéria prima e energia para a produção de bens de consumo, alimento e para a geração de renda. Tal necessidade acarreta muitos danos ambientais, alguns passíveis de recuperação e outros irreparáveis. Nessa perspectiva, o desenvolvimento de atividades antrópicas que respeitem a sustentabilidade e a manutenção dos serviços ecossistêmicos em uma bacia hidrográfica é fundamental.

Pires, Santos e Del Prette (2002) destacam que o conceito de bacia hidrográfica tem sido ampliado e expandido, passando a ser utilizado na área de planejamento ambiental como unidade de gestão da paisagem, envolvendo o conhecimento da estrutura biofísica da bacia e a dinâmica nos padrões de uso e ocupação do solo. Steinitz et al. (1991) ressaltam que a abordagem metodológica para subsidiar as atividades de gestão ambiental em uma bacia deve contemplar os conceitos e métricas da Ecologia da Paisagem.

Segundo Forman e Godron (1986), o estudo da paisagem deve considerar três características principais: sua estrutura, formada por uma matriz (elemento predominante), manchas e corredores; sua função, relacionada à interação entre os elementos que a compõem; e sua dinâmica, as alterações na estrutura e função ao longo do tempo.

Para Forman (1995), a análise da estrutura da paisagem representa uma etapa essencial para o seu manejo, considerando a sua integridade ecológica e o desenvolvimento de atividades antrópicas na perspectiva da sustentabilidade e manutenção dos serviços ecossistêmicos.

A dinâmica, consequência em parte da ação do homem e técnicas por ele empregadas, reflete na inter-relação dos componentes bióticos e abióticos dos ecossistemas ali existentes. Esta dinâmica, por sua vez, pode gerar uma heterogeneidade na paisagem, com formação de manchas de diferentes tamanhos (LANG; BLASCHKE, 2009). Esse processo é denominado fragmentação, sendo atualmente uma das principais consequências da atividade antrópica.

Na medida em que altera os processos ecológicos, a fragmentação florestal em uma dada paisagem desequilibra a própria estrutura e funcionamento do cenário biótico, provocando não só grande suscetibilidade dos fragmentos a distúrbios externos, mas até extinção de espécies nativas (caso o processo de fragmentação não seja devidamente freado). Daí a importância da avaliação da fragmentação florestal a partir do emprego de métricas da paisagem (FORMAN, 1995; METZGER, 1999; PIRES; PIRES; SANTOS, 2004; MORAES et al., 2012).

Existe uma diversidade de métricas da paisagem que pode contribuir para o entendimento dos processos que geram a fragmentação florestal. O estudo do arranjo espacial dos fragmentos em uma paisagem pode empregar o uso de métricas como o número, tamanho, formato, isolamento e simulações de conectividade dos fragmentos, dentre outras.

De acordo com Pires, Pires e Santos (2004), a restauração da conectividade entre fragmentos é de suma importância para a manutenção da diversidade biológica e da integridade dos ecossistemas inseridos em uma paisagem. Os autores ainda destacam que a definição de alternativas de manejo para uma bacia hidrográfica pode ser beneficiada pela criação de cenários ambientais voltados para a conservação dos recursos naturais e manutenção das funções ecológicas. Forman (1995) destaca que a identificação de alternativas para reestabelecer a conectividade entre os compo-

nentes de uma paisagem é de fundamental importância para o seu manejo adequado.

Em função de sua localização, área de abrangência, propriedades físico-bióticas, características socioeconômicas e uso da água para o abastecimento público, a bacia do rio Almada apresenta uma série de conflitos ambientais que são agravados pela expansão das atividades agropecuárias e turísticas (SANTANA, 2011).

Quanto aos usos da água, os mananciais desta bacia, em especial o rio Almada, são utilizados para o abastecimento público de quase todas as cidades e povoados da Região Cacaueira no Sul da Bahia, inclusive do município de Itabuna, que também faz parte da bacia do rio Cachoeira (BAHIA, 2001).

Dados preliminares apontam que o fenômeno de fragmentação florestal associado ao crescimento da atividade pecuária tem se intensificado na bacia do rio Almada (VIANA, 2011; MORAES et al., 2012), fato este que influenciou na escolha desta bacia para a realização de estudos mais aprofundados. Nesse sentido, o presente capítulo apresenta um estudo sobre a avaliação da fragmentação florestal e criação de cenários ambientais para esta bacia a partir da delimitação de três unidades de gerenciamento.

Caracterização da bacia do rio Almada

A Bacia Hidrográfica do Rio Almada (BHRA) abrange uma área em torno de 1.570 km² e está inserida, total ou parcialmente, nos municípios de Almadina, Coaraci, Ibicaraí, Barro Preto, Itajuípe, Itabuna, Ilhéus e Uruçuca, todos abastecidos completamente ou em parte pelas águas desta bacia (Figura 1).

O clima, segundo a classificação de Köppen, é definido como do tipo Tropical Chuvoso Selva Isotérmico (Afi), com índices pluviométricos de médias anuais de 1.780 mm, diminuindo gradativamente para o interior. A maior incidência de chuvas ocorre no período de março a abril. Ainda, a temperatura anual apresenta média de 22,9°C, com valores mínimos em julho e agosto e máximos em janeiro e fevereiro. Já a umidade relativa é máxima nos meses de maio, junho e julho, coincidindo com os períodos de baixas temperaturas e baixo número de horas de insolação (BAHIA, 2001).

FIGURA 1 – Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Almada na Bacia do Leste e na Bahia

Fonte: Base de dados do IBGE / Banco de dados do LAPA – UESC.

Devido à estruturação do substrato rochoso, a rede de drenagem que compõe a bacia - com densidade de drenagem em torno de $1,56 \text{ km/km}^3$, diferencia-se em, pelo menos, dois setores. Na porção oeste, ocorre o predomínio do padrão em treliça; e no restante da bacia, ocorre, preferencialmente, o padrão dendrítico. O rio Almada possui 138 km de extensão, nascendo no município de Almadina e desaguando no Oceano Atlântico,

em Ilhéus. Seus principais afluentes da margem direita são o rio do Braço, o ribeirão do Boqueirão e o riacho Sete Voltas; enquanto, na margem esquerda, encontram-se o rio São José e os ribeirões de Jussara e Braço Norte (MORAES et al., 2012).

De acordo com Gomes et al. (2012), as cotas altimétricas distribuem-se entre 0 e 370 m, com acentuado desnível entre a baixada litorânea (0 a 80 m) e as serras do Pereira e do Chuchu (180 a 370 m), localizadas na porção oeste da bacia. Já nos topos de morro, a altitude chega a atingir 1.050 m.

A bacia é geologicamente integrante da unidade geotectônica Cráton do São Francisco e pertence ao domínio geotectônico/geocronológico Escudo Oriental da Bahia e, em menor extensão, à Província Costeira e Margem Continental. O primeiro corresponde aos limites do Cráton do São Francisco, de idade pré-cambriana, enquanto a segunda é constituída pelas bacias costeiras mesocenoicas, representadas pela Bacia Sedimentar do rio Almada (GOMES et al., 2012).

De acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2006), as unidades de solo são: ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico, ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Eutrófico, ESPODOSSOLO FERROCÁRBICO Hidromórfico, LATOSSOLO AMARELO Coeso, ARGISSOLO AMARELO Distrófico, LUVISSOLO CRÔMICO Órtico e NEOSSOLO QUARTZARÊNICO (FRANCO et al., 2012; GOMES, 2013).

Quanto ao uso e ocupação do solo, as principais classes são: as áreas urbanas, pastagens e áreas de solo exposto, que juntas correspondem a 23% da área da bacia; as áreas de cabruca, com 54%; e os remanescentes de Mata Atlântica (Floresta Ombrófila Densa e Floresta Estacional Semidecidual) e ecossistemas associados (restinga e manguezal), que correspondem a 18% (MORAES et al., 2012; GOMES et al., 2013).

A cabruca é o sistema agroflorestal adotado na BHRA para o cultivo do cacau (*Theobroma cacao* L.) à sombra das copas das árvores da floresta nativa (SAMBUICHI et al., 2012). Esse sistema é considerado muito superior em termos de conservação da biodiversidade, quando comparado com outras monoculturas ou pastagens (SCHROTH et al., 2011).

Métodos e Técnicas de Pesquisa

Delimitação das unidades de gerenciamento

Foram delimitadas automaticamente 30 sub-bacias hidrográficas por meio da interface ArcSWAT no Sistema de Informação Geográfica (SIG) ArcGIS 9.3. Posteriormente, foram unidas as sub-bacias que apresentaram características físico-ambientais similares como características climáticas, curvas de nível, hidrografia e uso do solo. Tais atributos contribuem para um funcionamento diferenciado em cada Unidade de Gerenciamento (UG). Por fim, foram delimitadas três unidades de gerenciamento que representam o alto, médio e baixo curso do rio Almada e seus respectivos afluentes (Figura 2).

Mapeamento dos fragmentos florestais

Para o mapeamento dos fragmentos florestais foi utilizada a Carta de Uso e Ocupação do Solo da BHRA em escala 1:100.000, disponibilizada pelo Laboratório de Análise e Planejamento Ambiental (LAPA) da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC).

Foram vetorizados os polígonos correspondentes aos fragmentos florestais das três unidades de gerenciamento através do ArcMAP 9.3. Esses polígonos foram classificados por tamanho, totalizando sete classes, que variaram de menos de 5 ha até mais de 100 ha.

Métricas da paisagem aplicadas

Após o cálculo do tamanho dos fragmentos, partiu-se para a avaliação do formato dos fragmentos, utilizando o Índice de Circularidade (IC). Esse índice avalia o formato dos fragmentos em relação à área de um círculo de mesmo tamanho através da fórmula

$$IC = \frac{\sqrt{A1}}{A2}$$

em que: A1 é igual à área do fragmento em quilômetros quadrados e A2 equivale à área de um círculo de mesmo perímetro do fragmento correspondente.

FIGURA 2 – Localização das unidades de gerenciamento na Bacia Hidrográfica do Rio Almada

Fonte: VIANA (2011) / Banco de dados do LAPA – UESC.

O grau de suscetibilidade dos fragmentos foi avaliado visando identificar a suscetibilidade de cada fragmento ao efeito de borda com base no IC, pois as áreas de borda de um fragmento são mais suscetíveis a efeitos negativos, tais como mudanças microclimáticas, fogo, aumento da atividade de indivíduos predadores e invasão de espécies exóticas (FORERO-MEDINA; VIEIRA, 2007). Quanto mais próximo de 1 for o IC, mais arredondado é o fragmento e menor sua suscetibilidade ao efeito de borda.

O grau de isolamento foi avaliado através da expansão das áreas de borda dos fragmentos em distâncias previamente determinadas com base em Ranta et al. (1998). Os fragmentos foram considerados isolados quando, a uma distância d (pré-determinada), não havia sobreposição de sua borda à de outro fragmento. Da mesma maneira, os fragmentos foram considerados conectados quando houve sobreposição de sua borda expandida em relação à borda expandida dos fragmentos vizinhos.

Com o objetivo de propor alternativas de manejo da paisagem na BHRA, foram simulados dois cenários ambientais (cenário 1 e cenário 2). A criação desses cenários para as UG considerou três situações distintas: cenário 0, que representa o diagnóstico da fragmentação florestal atual; cenário 1, que simulou a conexão entre fragmentos pequenos e próximos; e cenário 2, que simulou a criação de Fragmentos de Ligação (FL).

Diagnóstico da fragmentação florestal atual

Tamanho e distribuição espacial dos fragmentos florestais

A área de um fragmento é uma das métricas mais importantes no estudo de uma paisagem. Não apenas porque ele é a base para o cálculo de outras métricas, mas porque, por si só, representa uma informação de grande valor (FORMAN; GODRON, 1986). Fragmentos muito pequenos, por exemplo, não são capazes de abrigar uma série de espécies. Belovsky (1987) afirma que para abrigar populações mínimas viáveis de muitas espécies, o limite inferior de tamanho de área deveria ser de 1.000 ha. Por outro lado, autores como Laurence e Bierregaard (1997) já consideram fragmentos com área a partir de 300 ha como de alto valor para a conservação da biodiversidade, enquanto fragmentos com área inferior a 3 ha são considerados de baixíssimo valor para a manutenção de muitas espécies da fauna devido à grande suscetibilidade a fatores externos.

FIGURA 3 – Distribuição espacial dos fragmentos florestais mapeados na Bacia Hidrográfica do Rio Almada

Fonte: VIANA (2011) / Banco de dados do LAPA – UESC.

No presente estudo, foram mapeados 55 fragmentos florestais remanescente de Mata Atlântica, sendo que a maior parte está localizada na UG 1 (37 fragmentos), no interior da bacia, e na UG 3 (12 fragmentos), próxima ao litoral; enquanto na UG 2, porção central da bacia, foram

identificados apenas 6 fragmentos (Figura 3). Como visto, a área de fragmentos pequenos é completamente afetada em termos microambientais, o que compromete especialmente a riqueza de espécies na borda. Uma vez que esses fragmentos tendem a desaparecer, optou-se por incluir três fragmentos com menos de 3 ha, que podem funcionar como trampolins ecológicos (*stepping stones*) entre fragmentos maiores (GUEVARA; PURATA; VAN DER MAAREL, 1986).

Assim, os fragmentos aqui mapeados e analisados variam entre menos de 3 ha e mais de 4.000 ha. Conforme apresentado na Tabela 1, dos 55 fragmentos, oito têm até 10 ha, 27, até 100 ha, oito, até 250 ha e 12, mais de 250 ha. Tendo em vista o tamanho, pode-se considerar que a área de estudo ainda abriga fragmentos bastante representativos com significativo valor para a conservação da diversidade de espécies típicas da Mata Atlântica.

Por outro lado, a análise da Figura 4 revela uma má distribuição desses fragmentos, visto que na UG 2, além de identificados apenas seis fragmentos, cinco deles são pequenos (com menos de 25 ha) e alongados; e apenas um tem formato um pouco mais circular e possui mais de 50 ha. Deste modo, os fragmentos maiores estão limitados às porções leste (UG 3) e oeste (UG 1) da BHRA, sem conexão entre si. Moraes et al. (2012) encontraram situação semelhante e atribuem essa distribuição desigual ao aumento das áreas de pastagem na porção central da BHRA. Além disso, acrescentam que a manutenção de fragmentos maiores e mais próximos uns dos outros, na porção leste da bacia, pode ter sido beneficiada pela dificuldade de acesso ao local.

TABELA 1 – Classes de tamanho dos fragmentos florestais (frags) mapeados

Classe de tamanho (ha)	Nº de frags	Área (ha)	Área relativa (%)
frags < 5	4	11,93	0,09
5 < frag < 10	4	32,66	0,26
10 < frag < 25	6	115,35	0,90
25 < frag < 50	11	440,51	3,45
50 < frag < 100	10	680,82	5,33
100 < frag < 250	8	1.378,48	10,80
frags >250	12	10.102,44	79,16
Total	55	12.762,19	100,00

Fonte: VIANA (2011).

FIGURA 4 – Distribuição dos fragmentos florestais mapeados na Bacia Hidrográfica do Rio Almada por classe de tamanho

Fonte: VIANA (2011) / Banco de dados do LAPA – UDESC.

Quanto aos 37 fragmentos mapeados na UG 1, observa-se que muitos deles são pequenos (com até 25 ha), estando localizados na periferia da bacia. E os maiores encontram-se isolados uns dos outros.

Formato dos fragmentos e suscetibilidade ao efeito de borda

De acordo com Périco et al. (2005), o tamanho e o formato de um fragmento estão intrinsecamente ligados à borda e, quanto menor o fragmento ou mais alongado, mais intensos são os efeitos de borda em função da diminuição da razão interior/borda.

As espécies de interior, restritas às condições ambientais das áreas internas dos fragmentos, são geralmente excluídas das bordas pelas espécies adaptadas a esse tipo de hábitat durante o processo de competição. Desta forma, outro elemento relevante para a avaliação da fragmentação é a identificação do formato dos fragmentos.

No presente estudo, essa avaliação foi realizada através do cálculo do IC, visto que fragmentos com formato mais arredondado tendem a ter seu interior preservado dos efeitos de borda, mantendo as características microclimáticas inalteradas.

Na Figura 5, encontram-se os valores do IC de cada um dos fragmentos mapeados nas três unidades de gerenciamento. Observa-se que a maioria apresenta uma tendência ao formato alongado e que nenhum se aproximou do valor ideal; ou seja, $IC=1$. O IC mais próximo de 1 corresponde ao dos fragmentos 8 e 16, que apresentaram IC 0,6.

Conectividade da paisagem e criação de cenários ambientais

O processo de fragmentação de habitats naturais é, em grande parte, resultado das atividades antrópicas que quebram a continuidade da paisagem, ocasionando mudanças tanto na estrutura e composição quanto na diversidade das comunidades locais. Esse processo acaba desencadeando outro grave fenômeno associado, o isolamento dos fragmentos, que reduz a quantidade de cruzamentos heterogênicos, diminuindo assim a variabilidade genética, causando extinções locais e, conseqüentemente, a perda de biodiversidade (METZGER, 1999). Em situações dessa natureza, as populações isoladas tendem a se tornar mais vulneráveis ao processo de extinção mediante a redução de recursos e a possibilidade de deterioração genética (HARRIS, 1984).

FIGURA 5 – Índice de Circularidade (IC) dos fragmentos florestais mapeados na Bacia Hidrográfica do Rio Almada

Fonte: VIANA (2011).

Quanto maior a distância entre os fragmentos, mais ocasional torna-se o fluxo entre os mesmos, sendo que, em grandes distâncias (a partir de 350 m), ele deixa de existir (PIRES; PIRES; SANTOS, 2004).

O fato dos fragmentos mapeados apresentarem no cenário atual (cenário 0) um formato alongado mostra que aqueles remanescentes de Mata Atlântica existentes na BHRA estão ameaçados pelo efeito de borda. Isso justifica uma análise da conectividade a partir de simulações da expansão da borda dos fragmentos. Esse tipo de análise simula atividades de reflorestamento, de processo natural de recuperação da área florestada ou de qualquer atividade desta natureza que amplie a área dos fragmentos florestais, possibilitando assim a conexão entre eles e configurando uma opção para o planejamento da paisagem e das ações de reflorestamento. Os resultados dessa análise estão apresentados na Tabela 2.

TABELA 2 – Resultados da análise de conectividade entre fragmentos florestais (frags) identificados nas unidades de gerenciamento (UG) a partir da simulação da expansão de borda de 30 a 350 m

	UG1	UG2	UG3	Total	
Borda (m)	Frag (nº)	Frag (nº)	Frag (nº)	Frag (nº)	Frag (%)
30	5	0	9	14	25,5
50	9	0	9	18	32,7
100	23	0	10	33	60,0
150	28	3	10	41	74,5
200	33	3	10	46	83,6
250	34	3	10	47	85,5
300	35	3	11	49	89,1
350	36	3	11	50	90,9

Fonte: VIANA (2011).

A Tabela 2 mostra um gradiente crescente de conectividade entre os fragmentos, conforme aumenta-se o valor de expansão das bordas de 30 para 350 m.

Na UG 1, composta por 37 fragmentos, a partir de uma expansão das bordas de 30 m, cinco fragmentos passaram a se conectar; aumentando esse valor para 150 m, 28 fragmentos conectaram-se; e com a expansão máxima de 350 m, quase todos os fragmentos se conectaram (36).

Na UG 2, a situação é mais crítica, visto que, mesmo com a expansão de borda máxima, apenas três dos 6 fragmentos passaram a se conectar. E na UG 3, composta por 12 fragmentos, a partir de uma expansão de borda de 30 m, nove se conectaram e com a expansão máxima, quase todos os fragmentos passaram a se conectar (11).

Simulação do cenário ambiental 1

Noss (1987) e Pires, Pires e Santos (2004) defendem que a melhor estratégia para a manutenção da integridade ecológica de uma paisagem seria interligar fragmentos isolados para que se possa permitir o fluxo de espécies de interior de hábitat. E também que o tamanho e o formato dos fragmentos possibilitem uma área núcleo razoável e índice de circularidade próximo de 1.

Assim, a proposta de criar este cenário para a área de estudo acompanha a hipótese de que à medida que a área dos fragmentos é ampliada, diminui a suscetibilidade dos mesmos e aumenta a área de hábitat de interior.

No cenário 0, de um total de 55 fragmentos, 40 (72%) foram considerados suscetíveis em função do seu tamanho e formato, um dado preocupante quando se pensa no equilíbrio do funcionamento ecológico de uma bacia hidrográfica.

Após a remodelagem desses fragmentos, o cenário 1 (Figura 6) passou a apresentar um total de 54 fragmentos, resultado da união entre os fragmentos 14 e 15.

Utilizando-se o ArcGIS 9.3, os fragmentos vizinhos das áreas de cabruca tiveram suas áreas parcialmente aumentadas, suas bordas suavizadas através da diminuição das suas reentrâncias e sua forma aproximada à de um círculo. Essa medida permitiria uma diminuição da suscetibilidade dos fragmentos e, ainda assim, a manutenção do cultivo do cacau pelo sistema cabruca.

A modelagem aplicada ao formato dos 39 fragmentos considerados mais suscetíveis nas três unidades de gerenciamento produziu uma mudança no IC dos mesmos. No cenário 0, nenhum fragmento aproxima-se do valor ideal $IC=1$. Já no cenário 1 haveria um aumento no IC desses fragmentos. De um total de 39 fragmentos, 26 deles passariam a apresentar IC entre 0,8 e 1, valores considerados próximos do ideal.

FIGURA 6 – Cenário 1: simulação do aumento do tamanho dos fragmentos florestais mais suscetíveis para uma área de 100 ha

Fonte: VIANA (2011) / Banco de dados do LAPA – UESC.

Simulação do cenário ambiental 2

Assim como o formato dos fragmentos, também a conectividade é importante para a sua longevidade. Fragmentos isolados estão fadados ao desaparecimento, pois o efeito de borda provoca o raleamento e a homogeneização do interior dos mesmos (VIANA; PINHEIRO, 1998). Além disso, para a manutenção da integridade ecológica da paisagem, é preciso manter sua diversidade estrutural e funcional. Segundo Pires, Pires e Santos (2004), em áreas fragmentadas, isso depende da conectividade entre fragmentos.

Nesse sentido, o cenário 2 (Figura 7) foi elaborado com base nas informações obtidas no cenário 1, utilizando os fragmentos já ampliados. O principal objetivo da segunda simulação foi aumentar a conectividade entre os fragmentos a partir da criação de fragmentos de ligação (FL) em pontos estratégicos que serviriam como trampolins ecológicos. Esses fragmentos promovem um aumento na heterogeneidade da paisagem e atuam como refúgio para espécies que requerem ambientes particulares que só ocorrem nessas áreas (FORMAN; GODRON, 1986). Esses pontos foram localizados com base na simulação de sobreposição de bordas expandidas até 350 m e englobando áreas de nascentes, quando possível.

Foram criados 16 fragmentos de ligação (FL) distribuídos da seguinte forma: dez na UG1 (765,8 ha); um na UG2 (32 ha); e cinco na UG3 (292 ha). O tamanho desses fragmentos variou entre 13 e 300 ha e aumentou em 1.179 ha a área florestada na bacia. A porção oeste, que vem sofrendo com a destinação cada vez maior de áreas para a bovinocultura, foi a que recebeu a maior quantidade de FL.

Um fato relevante na UG1 é a combinação da criação dos FL com a localização dos rios. Atualmente, existem em torno dos afluentes do rio Almada muitas áreas destinadas à pastagem, uma associação negativa que acarreta o assoreamento dos rios e pisoteio de suas margens, entre outros problemas. Com a criação dos FL, alguns puderam funcionar como mata ciliar para sete trechos em rios diferentes.

FIGURA 7 – Cenário 2: simulação da criação de fragmentos de ligação para aumento da conectividade da paisagem

Fonte: VIANA (2011) / Banco de dados do LAPA – UESC.

Se comparado aos cenários anteriores (cenário 0 e cenário 1), o cenário 2 apresentou, respectivamente, um aumento de 6,2% e 4,5% no total de fragmentos conectados, aumentando para 71 o número total de fragmentos florestais na área de estudo.

Considerações Finais

A ocorrência de remanescentes de Mata Atlântica apenas de forma fragmentada na área de estudo implica no aumento de sua suscetibilidade ecológica. Aplicadas à fragmentação, as métricas da paisagem possibilitaram identificar as áreas com maior e menor suscetibilidade.

Através do mapeamento dos remanescentes de mata nativa foi possível constatar seu atual estágio de fragmentação, avaliando-se a distribuição espacial, quantidade, tamanho e formato dos fragmentos nas unidades de gerenciamento. E, através da criação de cenários ambientais, ainda foi possível avaliar o grau de conectividade da paisagem.

Os cenários 1 e 2 apresentaram dados relevantes no que tange às necessidades de restauração florestal. Sugere-se a adoção de medidas de restauração nas áreas consideradas mais críticas, como na UG 2; de proteção das áreas prioritárias para a conservação do bioma Mata Atlântica, como na UG 3; e de recuperação das áreas de nascentes, como na UG 1. Desse modo, acredita-se garantir o equilíbrio dos sistemas ambientais que compõem a bacia do rio Almada, essencial para a continuidade dos serviços ecossistêmicos prestados por essa bacia que, por sua vez, são essenciais para o desenvolvimento das atividades agroflorestais e agropecuárias.

A significativa conectividade dos fragmentos (apenas um fragmento manteve-se isolado dos demais no cenário 0 após a expansão de borda de 350 m), atrelada à resposta positiva com a diminuição do grau de suscetibilidade ao efeito de borda, através da remodelagem dos fragmentos, indica a necessidade de intervenção no tamanho e formato dos mesmos, o que poderia ser feito por meio do reflorestamento das áreas indicadas no mapeamento. No entanto, a escala geográfica deve ser ajustada para abranger o nível de detalhamento necessário ao correto planejamento das ações a serem implantadas. Finalmente, ressalta-se que a ampliação da conectividade dos fragmentos na bacia também deve considerar as suas especificidades com relação às necessidades para a manutenção da sua diversidade funcional, ou seja, a capacidade de dispersão e locomoção das espécies locais.

Referências

BAHIA. GOVERNO DO ESTADO. **Diagnóstico das bacias hidrográficas dos rios Cachoeira e Almada**. Salvador: SEINFRA/SRH/UESC, 2001.

BELOVSKY, G. E. Extinction models and mammalian persistence. In: SOULÉ, M. **Viable populations for conservation**. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. p. 35-58.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. **Sistema brasileiro de classificação de solos**. 2. ed. Rio de Janeiro: EMBRAPA Solos, 2006.

FORERO-MEDINA, G.; VIEIRA, M. V. Conectividade funcional e a importância da interação organismo-paisagem. **Oecologia Brasiliensis**, Rio de Janeiro, v. 11, n. 4, p. 493-502, 2007.

FORMAN, R. T. T. Some general principles of landscape and regional ecology. **Landscape Ecology**, v. 10, n. 3, p. 133-142, 1995.

FORMAN, R. T. T.; GODRON, M. **Landscape ecology**. New York: John Wiley & Sons, 1986.

FRANCO, G. B. et al. Classificação geotécnica dos solos da bacia do rio Almada – Bahia. **Caminhos de Geografia**, Uberlândia, MG, v. 13, n. 42, p. 42-49, 2012.

GOMES, R. L. et al. Aspectos físico-ambientais e de uso e ocupação do solo na bacia hidrográfica do rio Almada – BA. **Boletim de Geografia**, Maringá, PR, v. 30, n. 2, p. 45-57, 2012.

GOMES, R. L. Avaliação da fragilidade ambiental e vulnerabilidade natural à perda de solo da bacia hidrográfica do rio Almada – Bahia. **Boletim de Geografia**, Maringá, PR, v. 31, n. 3, p. 41-53, 2013.

GOMES, R. L. et al. Panorama do uso e ocupação do solo presente nas áreas de preservação permanente da bacia hidrográfica do rio Almada – BA. **Revista Geografia** (UFPE), Recife, v. 30, n. 3, p. 98-115, 2013.

GUEVARA, S.; PURATA, S. E.; VAN DER MAAREL, E. The role of remnant forest trees in tropical secondary succession. **Vegetatio**, v. 66, n. 2, p. 77-84, 1986.

HARRIS, L. D. **The fragmented forest**. Chicago: University of Chicago Press, 1984.

LANG, S.; BLASCHKE, T. **Análise da paisagem com SIG**. São Paulo: Oficina de Textos, 2009.

LAURENCE, W. F.; BIERREGAARD, R. O. **Tropical forest remnants ecology, management and conservation of fragmented communities**. Chicago: Chicago University Press, 1997.

METZGER, J. P. Estrutura da paisagem e fragmentação: análise bibliográfica. **Anais da Academia Brasileira de Ciências**, v. 71, n. 3-I, p. 445-463, 1999.

MORAES, M. E. B. et al. Análise da Paisagem da Bacia Hidrográfica do Rio Almada (BA) com base na fragmentação da vegetação. **Caminhos de Geografia**, Uberlândia, MG, v. 13, n. 41, p. 159-169, 2012.

NOSS, R. F. Corridors in real landscapes: a reply to Symberloff and Cox. **Conservation Biology**, Cambridge, v. 1, n. 2, p. 159-164, 1987.

PÉRICO, E. et al. Efeitos da fragmentação de habitats sobre comunidades animais: utilização de sistemas de informação geográfica e de métricas da paisagem para seleção de áreas adequadas a testes. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO, 12., 2005, Goiânia, GO. **Anais...** Goiânia, GO: INPE, 2005. v. 2. p. 2339-2346.

PIRES, J. S.; SANTOS, J. E. dos; DEL PRETTE, M. E. A utilização do conceito de bacia hidrográfica para a conservação dos recursos naturais. In: SCHIAVETTI, A.; CAMARGO, A. F. M. (Eds.) **Conceitos de bacias hidrográficas: teorias e aplicações**. Ilhéus, BA: Editus, 2002. p. 17-35.

PIRES, J. S. R.; PIRES, A. M. Z. C.; SANTOS, J. E. Avaliação da integridade ecológica em bacias hidrográficas. In: SANTOS, J. E.; CAVALLHEIRO, F.; PIRES, J. S. R.; OLIVEIRA, C. H.; PIRES, A. M. Z. C. R. (Orgs.) **Faces da polissemia da paisagem: ecologia, planejamento e percepção**. São Carlos, SP: Rima, 2004. p.123-150.

RANTA, P. et al. The fragmented Atlantic Rainforest of Brazil: size, shape and distribution of forest fragments. **Biodiversity and Conservation**, Cambridge, v. 7, n. 3, p. 385-403, 1998.

SAMBUICHI, R. H. R. et al. Cabruca agroforests in Southern Bahia, Brazil: tree components, management practice and tree species conservation. **Biodiversity and Conservation**, Cambridge, v. 21, n. 4, p. 1055-1077, 2012.

SANTANA, L. M. **Análise física e química da água e estrutura da comunidade fitoplanctônica (sul da Bahia)**. 2001. 120 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, BA, 2011.

SCHROTH, G. et al. Conservation in tropical landscape mosaics: the case of the cocoa landscape of Southern Bahia, Brazil. **Biodiversity and Conservation**, Cambridge, v. 20, n. 8, p. 1635-1654, 2011.

STEINITZ, C. et al. (Eds.) **Alternatives futures for the Snyderville Basin, Summit County, Utah**. Cambridge: Harvard University/Graduate School of Design, 1991.

VIANA, V. M.; PINHEIRO, L. A. F. V. Conservação da biodiversidade em fragmentos florestais. **Série Técnica IPEF**, Piracicaba, SP, v. 12, n. 32, p. 25-42, 1998.

VIANA, W. R. C. da C. **Fragmentação florestal e diversidade de habitats na bacia hidrográfica do rio Almada, sul da Bahia, Brasil**. 2011. 86 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, BA, 2011.