Pentatominae, não classificados em nenhuma das tribos

Thereza de Almeida Garbelotto
Luiz Alexandre Campos

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros

GARBELOTTO, TA., and CAMPOS, LA. Pentatominae, não classificados em nenhuma das tribos. In: *Pentatominae do Sul de Santa Catarina* [online]. Curitiba: Sociedade Brasileira de Zoologia, 2014, pp. 9-12. Zoologia: guias e manuais de identificação series. ISBN 978-85-98203-08-9. Available from SciELO Books <<http://books.scielo.org>>.

All the contents of this chapter, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 3.0 Unported.

Todo o conteúdo deste capítulo, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.

Todo el contenido de este capítulo, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.

Pentatominae, não classificados em nenhuma das tribos

Capivaccius bufo Distant, 1883

Thyanta (Argossoma) humilis Bergroth, 1891

Thyanta (Thyanta) perditor (Fabricius, 1794)

1

Capivaccius bufo Distant, 1883

Diagnose: Coloração geral castanho claro; margens das jugas, clípeo e cicatrizes do pronoto negras. Manchas negras na metade posterior do pronoto, entre os ângulos umerais, no dis-

co do escutelo e porção central do cório. Mácula marfim no centro do lobo pós-frenal do escutelo. Membrana mais longa que o abdômen.

Tamanho dos adultos: 7,6-9,2 mm.

Metodologia de coleta: coleta manual e guarda-chuva entomológico.

Local de Coleta: Criciúma.

Bibliografias:

Brailovsky, H. & Rolston, J. H. 1986. Dos nuevas especies de Pentatomidos neotropicales (Hemiptera-Heteroptera-Pentatomini). **Folia Entomológica Mexicana**, **68**: 29-40.

2

Thyanta (A.) humilis Bergroth, 1891

Diagnose: Superfície dorsal verde a castanha, muitas vezes com faixas vermelhas a roxas entre os ângulos umerais, no dorso da cabeça e ápice do escutelo. Margens anterolaterais do pronoto retas a pouco côncavas em

vista dorsal; ângulos umerais arredondados a agudos, projetados lateralmente além da margem do cório (Rider & Chapin 1991).

Tamanho dos adultos: 7,2-9,4 mm.

* Fotos ilustrando a variação de padrões de coloração, como descrito acima e sem as faixas avermelhadas.

Metodologia de coleta: coleta manual, guarda-chuva entomológico e rede de varredura.

Local de Coleta: Araranguá, Criciúma, Içara, Maracajá, Nova Veneza e Urussanga.

	Planta hospedeira	Nome popular
Malvaceae	<i>Gossypium arboreum</i> L.	Algodoeiro

Bibliografias:

Grazia, J. 1977. Revisão dos Pentatomíneos citados no Quarto Catálogo dos Insetos que Vivem nas Plantas do Brasil (Hemiptera: Pentatomidae, Pentatomini). **Dusenía**, **10** (3): 161-174.

Rider, D.A. & Chapin, J.B. 1991. Revision of the genus *Thyanta* Stål, 1862 (Heteroptera: Pentatomidae) I. South America. **J New York Entomol Soc**, **99** (1): 1-77.

Rider, D.A. & Rolston, L.H. 1995. Nomenclatural changes in the Pentatomidae (Hemiptera-Heteroptera). **Proc Entomol Soc Wash**, **97** (4): 845-855.

Thyanta (T.) perditor (Fabricius, 1794)

Diagnose: Coloração geral verde; frequentemente com uma mancha ferrugínea no clipeo e dorso da cabeça. Ângulos umerais espinhosos, direcionados anterolateralmente além da margem do cório. Pronoto usualmente com uma banda ferrugínea entre os ângulos umerais; cicatrizes do pronoto com cada

canto mediano negro (Rider & Chapin 1991).

Tamanho dos adultos: 10,6-10,8 mm.

Metodologia de coleta: coleta manual.

Local de Coleta: Urussanga.

Nome popular: percevejo-do-trigo.

	Planta hospedeira	Nome popular
Asteraceae	<i>Baccharis trimera</i> (Less.) DC.; <i>Helianthus annuus</i> L.	Carqueja; Girassol;
Brassicaceae	<i>Nasturtium officinals</i> L.; <i>Brassica napus</i> L. var. <i>oleifera</i> Meitzg.	Agrião-d'água; Colza;
Fabaceae	<i>Lupinus albus</i> L.; <i>Glycine max</i> (L.) Merrill	Tremoço-branco; Soja
Linaceae	<i>Linum usitatissimum</i> L.	Linho
Poaceae	<i>Brachiaria plantaginea</i> (Link) Hitchc.; <i>Oryza sativa</i> L.; <i>Sorghum vulgare</i> L.; <i>Triticum aestivum</i> L.	Papuã; Arroz; Graminae; Trigo
Solanaceae	<i>Solanum paniculatum</i> L.	Jurubeba

Bibliografias:

Link, D. & Grazia, J. 1987. Pentatomídeos da região central do Rio Grande do Sul (Heteroptera). **An. Soc. Entomol. Bras.** **16** (1): 115-129.

Malaguido, A.B. & Panizzi, A.R. 1998. Pentatomofauna associated with sunflower in Northern Paraná state, Brazil. **An. Soc. Entomol. Bras.** **27** (3): 473-475.

Panizzi, A.R. 1997. Wild hosts of Pentatomids: ecological significance and role in their pest status on crops. **Annu. Rev. Entomol.** **42**: 99-122.

Panizzi, A.R.; McPherson, J.E.; James, D.G.; Javahery, J.M. & McPherson, R.M. 2000. Stink Bugs (Pentatomidae), p. 421-474. In: C.W., Schaefer & A.R., Panizzi (Org). **Heteroptera of economic importance**. USA, CRC Press.

Rider, D.A. & Chapin, J.B. 1991. Revision of the genus *Thyanta* Stål, 1862 (Heteroptera: Pentatomidae) I. South America. **J. New York Entomol. Soc.** **99** (1): 1-77.

Salvadori, J.R.; Lau, D. & Pereira, P.R.V.da S. 2009. Pragas e métodos de controle. **Embrapa Trigo, Sistemas de Produção No. 4**. Cultivo de Trigo. Disponível online em: <http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Trigo/CultivodeTrigo/pragas.htm> [Acesso em: 19 dez. 2013.]