Nezarini

Thereza de Almeida Garbelotto
Luiz Alexandre Campos

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros

GARBELOTTO, TA., and CAMPOS, LA. Nezarini. In: *Pentatominae do Sul de Santa Catarina* [online]. Curitiba: Sociedade Brasileira de Zoologia, 2014, pp. 53-61. Zoologia: guias e manuais de identificação series. ISBN 978-85-98203-08-9. Available from SciELO Books
<<http://books.scielo.org>>.

All the contents of this chapter, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 3.0 Unported.

Todo o conteúdo deste capítulo, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.

Todo el contenido de este capítulo, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.

Nezarini

Chinavia difficilis (Stål, 1860)

Chinavia nigrodorsata (Breddin, 1901)

Chinavia obstinata (Stål, 1860)

Chinavia pengue (Rolston, 1983)

Chinavia runaspis (Dallas, 1851)

Nezara viridula (Linnaeus, 1758)

Chinavia difficillis (Stål, 1860)

Diagnose: Coloração geral verde a verde-clara; cicatrizes do pronoto, ângulos basais do escutelo sem manchas negras; e ângulos póstero-laterais do conexivo podendo apresentar manchas negras. Espinho abdominal no máximo alcançando as mesocoxas. Espiráculos escuros. Antenas verdes (Schwertner & Grazia 2007; Campos *et al.* 2012).

Tamanho dos adultos: 12-15 mm.

Metodologia de coleta: guarda-chuva entomológico.

Local de Coleta: Criciúma.

Bibliografias:

Schwertner, C.F. & Grazia, J. 2007. O gênero *Chinavia* Orian (Hemiptera, Pentatomidae, Pentatominae) no Brasil, com chave pictórica para os adultos. **Rev. Bras. entomol.** **51** (4): 416-435.

Campos, L.A.; Bianchi, F.M. & Garbelotto, T.A. 2012. On the genus *Chinavia* Orian: Additions to the description of three species (Hemiptera: Pentatomidae). **Neotrop. Entomol.** **41**: 163-167.

36

Chinavia nigrodorsata (Breddin, 1901)

Diagnose: Coloração geral verde, com margens das jugas, pronoto, terço basal do hemiélitro e conexivo de coloração avermelhada. Ângulos umerais, geralmente desenvolvidos em espinho; cicatrizes do pronoto e ângulos basais do escutelo sem manchas negras; manchas negras no conexivo

junto aos ângulos póstero-laterais presentes; espiráculos escuros e calo junto aos espiráculos presente (Schwertner & Grazia 2007).

Tamanho dos adultos: 11-13 mm.

Metodologia de coleta: coleta manual

Local de Coleta: Criciúma

	Planta hospedeira	Nome popular
Aizoaceae	<i>Tetragonia expansa</i> Murray; <i>Tetragonia tetragonioides</i>	Espinafre; _
Apiaceae	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill. var. <i>capillaceum</i> (Gilibi.)	Funcho
Asteraceae	<i>Cynara scolymus</i> L.; <i>Helianthus annuus</i> L.	Alcachofra; Girassol
Brassicaceae	<i>Brassica napus</i> L. var. <i>oleifera</i> Meitzg.; <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>acephala</i> DC.	Colza; Couve-comum
Fabaceae	<i>Aeschynomene rudis</i> Benth.; <i>Glycine max</i> (L.) Merrill; <i>Lupinus albus</i> L.; <i>Pisum sativum</i> L.; <i>Phaseolus vulgaris</i> L.; <i>Lupinus angustifolius</i> L.; <i>Lens culinarie</i> Medik.; <i>Mimosa invisa</i> Mart.	Anjiquinho; Soja; Tremoço-branco; Ervilha; Feijoeiro; Tremoço-azul; Lentilha; _
Linaceae	<i>Linum usitatissimum</i> L.	Linho
Malvaceae	<i>Hibiscus esculentus</i> L.	Quiabeiro
Poaceae	<i>Oryza sativa</i> L.; <i>Triticum aestivum</i> L.	Arroz; Trigo
Solanaceae	<i>Nicotiana tabacum</i> L.; <i>Solanum sisymbirifolium</i> Lam.	Fumo; Joá

Bibliografias:

Link, D. & Grazia, J. 1987. Pentatomídeos da região central do Rio Grande do Sul (Heteroptera). **An. Soc. Entomol. Bras.** **16** (1): 115-129.

Schwertner, C.F. & Grazia, J. 2007. O gênero *Chinavia* Orian (Hemiptera, Pentatomidae, Pentatominae) no Brasil, com chave pictórica para os adultos. **Rev. Bras. entomol.** **51** (4): 416-435.

37

Chinavia obstinata (Stål, 1860)

Diagnose: Corpo ovalado. Coloração geral verde-clara a verde-escura. Cicatrizes do pronoto imaculadas, com um par de manchas nos ângulos internos ou dois pares de manchas nos ângulos inter-

nos e externos. Ângulos basais do escutelo imaculados ou negros. Conexivo imaculado ou com amplas manchas negras junto aos ângulos póstero-laterais. Espinho abdominal ultrapassando as mesocoxas; espiráculos claros ou negros (Schwertner & Grazia, 2007; Campos *et al.* 2012).

Tamanho dos adultos: 11-15 mm.

Metodologia de coleta: coleta manual, guarda-chuva entomológico e rede de varredura.

Local de Coleta: Araranguá, Criciúma e Içara.

	Planta hospedeira	Nome popular
Fabaceae	<i>Glycine max</i> (L.) Merrill	Soja
Passifloraceae	<i>Passiflora edulis</i> Sims	Maracujá-amarelo

Bibliografias:

Schwertner, C.F. & Grazia, J. 2007. O gênero *Chinavia* Orian (Hemiptera, Pentatomidae, Pentatominae) no Brasil, com chave pictórica para os adultos. **Rev. Bras. entomol.** **51** (4): 416-435.

Campos, L.A.; Bianchi, F.M. & Garbelotto, T.A. 2012. On the genus *Chinavia* Orian: Additions to the description of three species (Hemiptera: Pentatomidae). **Neotrop. Entomol.** **41**: 163-167.

Chinavia pengue (Rolston, 1983)

Diagnose: Coloração geral verde a verde clara. Margens das jugas, pronoto, terço basal do hemiélitro e conexivo de coloração vermelha a vermelho-alaranjada. Ângulos basais do escutelo imaculados.

Presença de pequenas máculas amareladas na face dorsal do corpo. Manchas negras junto às margens posteriores do conexivo atingindo pelo menos a metade da largura deste (Schwertner & Grazia, 2007).

Tamanho dos adultos: 11-13 mm.

Metodologia de coleta: guarda-chuva entomológico.

Local de Coleta: Araranguá.

	Planta hospedeira	Nome popular
Aquifoliaceae	<i>Ilex paraguariensis</i> A. St. Hil	Erva-mate
Brassicaceae	<i>Brassica napus</i> L. var. <i>oleifera</i> Meitzg.	colza
Fabaceae	<i>Glycine max</i> (L.) Merrill; <i>Lupinus albus</i> L.; <i>Crotalaria pallida</i> Aiton	Soja; termoço-branco; -
Malvaceae	<i>Gossypium arboreum</i> L.	algodoeiro

Bibliografias:

Link, D. & Grazia, J. 1987. Pentatomídeos da região central do Rio Grande do Sul (Heteroptera). **An. Soc. Entomol. Bras.** **16** (1): 115-129.

Schwertner, C.F. & Grazia, J. 2007. O gênero *Chinavia* Orian (Hemiptera, Pentatomidae, Pentatominae) no Brasil, com chave pictórica para os adultos. **Rev. Bras. entomol.** **51** (4): 416-435.

39 *Chinavia runaspis* (Dallas, 1851)

Diagnose: Corpo alongado. Coloração geral verde-clara a verde-escura, com ampla faixa vermelha a vermelho-alaranjada nas margens das jugas, pronoto, terço basal do hemiélitro e conexivo. Cicatrizes do pronoto e ângulos basais do escutelo sem manchas negras.

Margens anterior e posterior do conexivo com amplas manchas negras, ultrapassando a metade da largura destes; espiráculos verdes (Schwertner & Grazia, 2007).

Tamanho dos adultos: 15-19 mm.

Metodologia de coleta: coleta manual e rede de varredura.

Local de Coleta: Criciúma e Nova Veneza.

	Planta hospedeira	Nome popular
Arecaceae	<i>Elaeis</i> sp.	Dendê
Oleaceae	<i>Ligustrum lucidum</i> (Ait.)	Ligustro

Bibliografias:

Schwertner, C.F. & Grazia, J. 2007. O gênero *Chinavia* Orian (Hemiptera, Pentatomidae, Pentatominae) no Brasil, com chave pictórica para os adultos. **Rev. Bras. entomol.** **51** (4): 416-435.

Nezara viridula (Linnaeus, 1758)

Diagnose: Coloração geral variando de completamente verde a completamente amarelo. Alguns indivíduos de coloração geral verde-amarelado e outros com a margem anterior do pronoto e da cabeça amarelas (Vivan & Panizzi 2002). Espinho abdominal livre; ângulos umerais não desenvolvidos.

Tamanho dos adultos: 10 mm ou mais.

*Fotos mostrando alguns dos diferentes padrões de coloração.

Metodologia de coleta: coleta manual e rede de varredura.

Local de Coleta: Braço do Norte, Cocal do Sul, Criciúma, Içara e Sombrio.

Nomes Populares: Percevejo-verde, percevejo-da-soja, percevejo-verde-da-soja.

	Planta hospedeira	Nome popular
Anarcadiaceae	<i>Schinus molle</i> L.	Aroeira-mansa;
Asteraceae	<i>Cynara scolymus</i> L.; <i>Bidens pilosa</i> L.; <i>Helianthus annuus</i> L.; <i>Lactuca sativa</i> L.;	Alcachofra; Picão; Girassol; Alface;
Apiaceae	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill. var. <i>capillaceum</i> (Gilib.)	Funcho
Brassicaceae	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>acephala</i> ; <i>Brassica alba</i> (L.) Boiss.; <i>Raphanus raphanistrum</i> L.; <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>capitata</i> L.; <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>botrytis</i> L. subv. <i>asparagoides</i> DC.; <i>Brassica napus</i> L. var. <i>oleifera</i> Meitzg.; <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>botrytis</i> L. subv. <i>cauliflora</i> (Gars.) DC.; <i>Brassica napus</i> L.; <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>radicula</i> Pers.;	Couve-comum; Mostarda; Nabiça; Repolho; Brocoli; Colza; Couve-flor; Nabo; Rabanete;
Curcubitaceae	<i>Sechium edule</i> Swartz	Chuchu
Fabaceae	<i>Medicago sativa</i> L.; <i>Lotus corniculatus</i> L.; <i>Pisum sativum</i> L.; <i>Phaseolus calcaratus</i> Roxbg.; <i>Vigna sinensis</i> (L.) Savi; <i>Phaseolus vulgaris</i> L.; <i>Lens culinarie</i> Medik.; <i>Lotononis bainesii</i> Baker.; <i>Macroptilium atropurpureum</i> Urb.; <i>Glycine max</i> (L.) Merrill ; <i>Glycine wightii</i> (W. & A.) Verdec.; <i>Lupinus luteus</i> L.; <i>Lupinus angustifolius</i> L.; <i>Lupinus albus</i> L.;	Alfafa; Cornichão; Ervilha; Feijão-arroz; Feijão-miúdo; Feijão; Lentilha; Lotononis; Siratro; Soja; Soja-perene; Tremoço-amarelo; Tremoço-azul; Tremoço-branco;

Liliaceae	<i>Asparagus officinale</i> L.;	Aspargo
Linaceae	<i>Linum usitatissimum</i> L.;	Linho
Malvaceae	<i>Sida</i> sp.; <i>Hibiscus esculentus</i> L.; <i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	Guaxuma; Quiabo; Mimo- de-Vênus;
Meliaceae	<i>Cedrella fissilis</i> Vell.;	Cedro
Oleaceae	<i>Ligustrum lucidum</i> (Ait.)	Ligustro
Poaceae	<i>Oryza sativa</i> L.; <i>Avena sativa</i> L.; <i>Zea mays</i> L.; <i>Sorghum vulgare</i> L.; <i>Triticum aestivum</i> L.; <i>Brachiaria plantaginea</i> (Link) Hitchc.; <i>Zea mays</i> L. var. <i>rugosa</i> Bonafous;	Arroz; Aveia; Milho; Sorgo; Trigo; Papuã; Milho-doce;
Rosaceae	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch;	Pessegueiro
Rutaceae	<i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck	Laranjeira
Solanaceae	<i>Solanum variabile</i> Mart.; <i>S. sisymbriifolium</i> Lam.; <i>S. incarceratum</i> Ruiz & Pav.; <i>S. balbisii</i> Dunal; <i>S. tuberosum</i> L.; <i>Lycopersicum esculentum</i> Mill.; <i>Nicotiana tabacum</i> L.; <i>S. melongena</i> L.; <i>S. nigrum</i> L.; <i>Capisicum annum</i> L.; <i>S. americanum</i> Mill.;	_; Joá; _; _; Batata; Tomate; Fumo; Berinjela; MªPretinha; Pimentão; MªPreta

Bibliografias:

Basso, L.V.; Link, D. & Lopes, O.J. 1974. Entomofauna de algumas solanáceas em Santa Maria, RS. **Rev. Centro Ciências Rurais** 4 (3): 263-270.

Bertels, A. 1962. Relação de insetos encontrados sobre plantas hospedeiras da família Solanaceae. **Iheringia, Sér. Zool.** 25: 2-11.

Corrêa-Ferreira, B.S. & Panizzi, A.R. 1999. **Percevejos da soja e seu manejo**. Londrina, PR. Embrapa-CNPSO. 45p. (Embrapa-CNPSO. Circular Técnica, 24). Disponível online em: http://ag20.cnptia.embrapa.br/Repositorio/circTec24_000ge7ag4ne02wx5ok0ylax2l2xuj1ts.pdf [Acesso em: 20 dez. 2013.]

FMC. 2013. **Percevejos.com.br**. Disponível online em: <http://www.percevejos.com.br/> [Acesso em: 19 dez. 2013.]

Grazia, J. 1977. Revisão dos Pentatomíneos citados no Quarto Catálogo dos Insetos que Vivem nas Plantas do Brasil (Hemiptera: Pentatomidae, Pentatomini). **Dusenía** 10 (3): 161-174.

Link, D. & Grazia, J. 1987. Pentatomídeos da região central do Rio Grande do Sul (Heteroptera). **An. Soc. Entomol. Bras.** 16 (1): 115-129.

Lopes, O.J.; Link, D. & Basso, L.V. 1974. Pentatomídeos de Santa Maria – Lista preliminar de plantas hospedeiras. **Rev. Centro Ciências Rurais** 4 (4): 317-322.

Malaguido, A.B. & Panizzi, A.R. 1998. Pentatomofauna associated with sunflower in Northern Paraná state, Brazil. **An. Soc. Entomol. Bras.** 27 (3): 473-475.

- Panizzi, A.R. 1997. Wild hosts of Pentatomids: ecological significance and role in their pest status on crops. **Annu. Rev. Entomol.** **42**: 99-122.
- Panizzi, A.R.; McPherson, J.E.; James, D.G.; Javahery, J.M. & McPherson, R.M. 2000. Stink Bugs (Pentatomidae) p. 421-474. In: C.W. Schaefer & A.R. Panizzi (Org). **Heteroptera of economic importance**. USA, CRC Press.
- Salvadori, J.R.; Lau, D. & Pereira, P.R.V.da S. 2009. Pragas e métodos de controle. **Embrapa Trigo, Sistemas de Produção No. 4**. Cultivo de Trigo. Disponível online em: <http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Trigo/CultivodeTrigo/pragas.htm> [Acesso em: 19 dez. 2013.]
- Schwertner, C.F. 2005. **Filogenia e classificação dos percevejos-verdes do grupo *Nezara Amyot & Serville* (Hemiptera, Pentatomidae, Pentatominae)**. 253 f. Tese. (Doutorado em Biologia Animal). Área de concentração: Biologia comparada – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
- Vivan, L.M. & Panizzi, A.R. 2002. Two new morphs of the southern green stink bug, *Nezara viridula* (L.) (Heteroptera: Pentatomidae), in Brazil. **Neotrop. Entomol.** **31** (1): 475-476.